

Caylusea hexagyna (Forssk.) M.L. Green



Hviv

Basionyme : *Reseda hexagyna* Forssk.

Synonymes : *Caylusea canescens* (L.) A. St.-Hil.
Caylusea hexagyna var. *glabrescens* (Müll. Arg.) Maire
Caylusea hexagyna var. *glabra* Maire
Caylusea hexagyna var. *papillosa* Maire
Caylusea hexagyna var. *rigida* (Müll. Arg.) Maire

Description : plante à souche vivace formant souvent des touffes diffuses, étalées sur le sol, pouvant atteindre 80 centimètres de diamètre lorsqu'elle est rabattue sous l'effet d'un pâturage intensif, les rameaux dressés étant le plus souvent broutés. **Rameaux** et feuilles vert clair, plus ou moins glauques, couverts d'une pubescence blanche. **Feuilles** persistantes d'environ 5 x 10-15 millimètres, à bord ondulé. **Flours** disposées en longues grappes spiciformes à l'extrémité des tiges, de petite taille, blanchâtres, avec des étamines grège foncé. Carpelles au nombre de 6, partiellement soudés et portés par un gynophore.

Biogéographie : espèce saharo-sindienne.

Type biomorphologique de Raunkier : hémicryptophyte/thérophyte.

Port : plante vivace se comportant le plus souvent en herbe annuelle, sous l'effet du pâturage ou de conditions écométéorologiques adverses.

Préférences édaphiques : espèce des sols sablo-limoneux pouvant être plus ou moins rocailleux.

Préférences hydriques : espèce xérophile.

Tolérance aux sels : non.


Biotopes : plante souvent discrète mais assez fréquente dans les épandages, les lits d'oued, les cuvettes des regs.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : peu d'intérêt direct mais présente dans de nombreux biotopes de reproduction.

Espèce voisine : *Oligomeris linifolia* (Vahl ex Hornem.) J.F. MacBr. est une Resedaceae annuelle, au port érigé, à feuilles longues et non ondulées. Les carpelles ne sont pas portés par un gynophore. Le fruit est une petite capsule à 3 à 5 dents sommitales. C'est une espèce sub-cosmopolite des régions arides.

Références bibliographiques

Ozenda	278	Quézel & Santa	438	Barry & Celles	304	Nègre	
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	--



Touffe étalée, en fleur et fruit. On remarque une jeune tige centrale érigée qui risque d'être rapidement broutée.



Jeune repousse érigée, en début de floraison.



Jeune inflorescence.



Espèce voisine : *Oligomeris linifolia*. Touffe en fructification.



Espèce voisine : *Oligomeris linifolia*. Infrutescence.

