

## *Hyoscyamus muticus* L. subsp. *falezlez* (Coss.) Maire



Hviv

**Basionyme :** *Hyoscyamus falezlez* Coss. (1864)

---

**Description :** herbe à base ligneuse, pubescente à velue, atteignant 30 à 90 centimètres de haut. Elle forme ordinairement de grosses touffes herbacées. **Feuilles** elliptiques ou largement lancéolées, de 4 à 10 centimètres de long, charnues et velues, certaines dentées, d'autres entières. **Inflorescence :** grandes cymes de 20 à 35 centimètres de long. **Fleurs** de 2 à 3 centimètres de large, irrégulières, avec des pétales soudés en tube, à la coloration assez variable (violet, jaune, blanchâtre...).

Plante toxique pour divers mammifères (dont l'homme).

**Biogéographie :** espèce endémique au Sahara.

**Type biomorphologique de Raunkier :** hémicryptophyte pouvant se comporter en thérophyte.

**Port :** espèce vivace (ou annuelle) formant de grosses touffes herbeuses denses.

**Préférences édaphiques :** espèce des sols sablo-limoneux.

**Préférences hydriques :** espèce hygro-mésophile.

**Tolérance aux sels :** espèce pouvant tolérer une légère salinité.

**Biotopes :** plante rencontrée dans des biotopes où les sols offrent une forte humidité pouvant s'estomper progressivement. Localement abondante.

**Intérêt pour le Criquet pèlerin :** **PLANTE IMPORTANTE**. Appréciée, elle fournit abri et nourriture.

### Références bibliographiques

Ozenda	380	Quézel & Santa	824	Barry & Celles	327	Nègre	
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	--



Jeune touffe en début de floraison.



Très jeune fleur sur plant en tout début de floraison. Calice et corolle forment des tubes concentriques.



Vielle touffe en fin de floraison et début de fructification.



Très jeune plant encore en rosette. Feuilles dentées ; les suivantes pouvant être entières.

