




F.7.



*D. de Candolle*



# SUPPLEMENTUM FLORAE LAPONICAE

QVAM EDIDIT

Dr. GEORGIUS WAHLENBERG

AUCTORE

SEV. CHRISTIANO SOMMERFELT

SACRI VERBI MINISTRO

REG. SOC. SCIENT. NIDROSIENSIS SODALI.

LIBRARY  
NEW YORK  
BOTANICAL  
GARDEN

---

CUM TABULIS COLORATIS III.

---

CHRISTIANLÆ.  
TYPIS BORGIANIS ET GRÖNDALIANIS.  
1826.

+QK286

.W34

Suppl.

MANIBUS

CHRISTIANI SOMMERFELT

PATRIS

SEMPER PIO ANIMO COLENDI

QVI

DOCTRINA ET EXEMPLO

JAM PUERILEM ANIMUM STUDIO

SCIENTIARUM ET NATURÆ SCRUTANDÆ

IMBUIT

OPUSCULUM HOCCE SACRUM ESSE

VOLUIT

AUCTOR.



## PRÆFATIO.

---

Historiæ naturalis studium, patre dilectissimo  
duce et adhortatore tenerrima jam ætate in me  
excitatum, postqvam anno MDCCCXI<sup>mo</sup> alma  
patria, qvæ jam dudum frustra Universitatem sibi  
dicatam desideraverat, voti tandem compos facta  
est, confirmatum et certum in finem directum est.  
Regio enim promisso confisus speravi, me huic  
Universitati literariæ doctorem adscriptum iri;  
qvare rationem studiorum jamjam initam mutavi  
atqve, præoptato studio indulgens, omne meum  
tempus literis ad historiam naturalem oeconomi-  
amqve publicam pertinentibus impendi. Tribus  
præterlapsis annis, cum sine ulla mea culpa, ut  
muneri promisso operam meam dicarem, non  
contingeret, ad studia theologica iterum reversus,  
historiam naturalem nec eam qvidem totam, sed  
partem ejus maxime mihi arridentem, botanicen,  
horis tantum subsecivis colere potui. Cursu de-  
inde theologico peracto, anno 1818 parochus in  
parochiam Saltdalen in Halogalandia sive Nord-  
landia veni, non ita multo postqvam immatura,  
proh dolor! morte *Christianus Smith*, Professor,

in expeditione Congoana a Britannis suscepta Universitati nostræ et omnibus botanices cultoribus ereptus est, qvem eruptum luget adhuc Universitas cum omnibus literarum studiosis, qvi Floræ mysteriis sese initiari cupiunt; et eo magis luget, qvo nemo hactenus ei successit. Qvo pauciores igitur in patria tum rei herbariæ operam navabant, eo lubentius constitui, loco illo longinqvo pro parte virili ad studium mihi gravissimum promovendum adniti. Mox vero, cum *Cl. Wahlenbergii floram Lapponicam* (Berolini 1812) mecum portans, plantas ibi occurrentes scrutari inciperem, vix fieri posse reperiebam, ut botanices cultor celeriter regionem aliquam peragrans, qvamvis oculatissimus, catalogum omnino integrum omnium ibi occurrentium plantarum, præsertim minorum cryptogamarum, conscribere possit, qvamqva confidendum est, præclarum hunc auctorem, plus qvam exspectari posset, eximio hocce et inclyto opere præstisset; nam ante eum nemo Halogalandiam et Lapponiam ad extremos usqve earum fines tam sæpe tantisve laboribus obnoxius peragravit: nemo ante eum regionum, qvibus gignerentur, naturam usqve respiens plantas exploravit: nemo botanicis explorationes physicas tales, qvales sunt altitudinis montium, temperiei et vegetationis, adjecit. Idem

etiam LXX plantis novis locupletatus rediit. Ad finem, qvem sibi celeberrimus ille auctor in opere suo proposuerat, adseqvendum ut aliquantulum conferrem: "ut certo constaret, qvid Lapponia ferat, qvid ferre recuset" (p. V), qvod ut constet, si Halogalandiam et Lapponiam spectas, tanto pluriſ interest, qvando arctoæ hæ regiones limitem magni continentis orientalis et regionum maritimarum occidentalium efficiunt, et maximam partem utriusqve terræ temperie et natura gaudent, putavi me operæ pretium facturum, si libellum, qvi pro supplemento operis incliti auctoris esse posset, conficerem, ideoqve sex, qvos in Halogalandia degi, annis omne meum otium in explorandas hujus terræ plantas, præcipue cryptogamas, contuli. Sedes mea ab omni literaria consociatione remota hunc mihi laborem perdifficilem qvidem fecit \*), sed hanc tamen utilitatem attulit, ut qvæ

---

\*) Non possum non hoc loco grato animo mentionem facere Cl. H. G. Flörke, in universitate Rostockiensi Professoris, qvi me annotationibus et speciminibus lichenologicis largissime locupletavit; Cl. Dr. Wikström Holmiæ, qvi maxima cum benignitate liberum mihi ad magnum Swartzianum apparatus aditum dedit; et Cl. Dr. Wahlenbergii Upsaliæ, qvi liberaliter mihi collectiones suas ostendere dignatus est. Nonnihil etiam auxilii e collectione plantarum in Finmarkia orientali crescentium, qvam dedit Universitati nostræ rev.

invenissem, sœpius qvam acerrime explorare congerer. Summam harum scrutationum hic herbarum studiosis offerre audeo. Opusculum tamen edere non potuissem, nisi societas regia pro salute Norvagiæ, literas promovendi studiosissima, larga manu idem sublevasset. Tantum nihilo minus abest, ut lucri aliquid inde sperem, ut contentus sim, si modo nihil rei familiaris detrimenti ex eo capiatur, nec hujus scientiæ principes poeniteat, qvantulumcunque ad eam promovendam protulerim.

Cum in hoc opusculo plantæ aliis in terris raræ nec satis notæ occurrunt, semper annotationes sive descriptiones succinctas adjunxi, ne peritiores dubitarent, qvamnam plantam in manibus haberim. Librum meum partem posteriorem floræ Lapponicæ Wahlenbergii haberi cupiens, bene cavi, ne qvæ in hoc opere jam legerentur, repeterem, et ordinem ejus semper fere secutus sum, licet interdum sententiæ auctoris, — systemati Linnaeano ordinem Monogamiam in Syngenesia, item Classes Dodecandriam et Polygamiam servando, & systemati Hedwigiano qvoad muscorum genera &c. nimis, ut mihi videtur, addicti — minus

arriderent. Propter novum habitationis locum plantam non nominavi, nisi cum intra fines Norvagiæ quasdam, antea Sveciæ proprias dictas, vel in paucis tantum locis lectas, invenirem. Nonnullas, quas non omnino accurate cognoscere potui, omittere quam dubias afferre malui. Erunt forte, qui putent, me nimis paucos auctores laudasse, sed eam legem mihi injunxi, ut eos solum nominarem, quos easdem, quas ipse, plantas describere mihi perswasum haberem. Alios modo laudavi, cum alia quædam ratio ex gr. geographicâ postularet, & tum etiam, quorum auctoritate nixus sim, adjeci. *Synonymis*, quæ e libris aliorum exscribuntur, semper aliquid incerti adhæret. Libri volumen eis tantum crescit. Si quis de his edoceri cupiat, ea apud auctores a me laudatos invenerit. Ut lectores me excusent, quod non omnibus recentioribus operibus classicis usus sim, oro, cum mihi opusculum scribenti ad nullum botanicum publicum apparatus aditus pateret. Nec exspectet quisquam a tirone perfectum quid, aut tale, quod ab eo, qui in hoc studio omne tempus & omnes vires consumserit, exigi possit.

Videbor fortasse multis in mutationibus suscipiendis audacior fuisse, in primis quod ad Lichenes attinet, dum plures species ab inclytis auc-

toribus adscitas, mihi vero forma tantum variare visas, in unam redegi. At si consideretur, qvam prompti sint plerumqve botanici ad novas species condendas, qvam varii Lichenes qvotqve mutationes pro natura loci et ætate subeant, nec non descriptiones ex. gr. Cl. Acharii maximam partem singulis minutisqve speciminibus ab alio missis nixas esse, cum in locis ipsis multiplices eorundem transitus formasqve diversas, qvibus occurrant, botanici non observaverint: rationem meam probatum iri spero, qvi confirmare possim, me nunqvm nisi accuratissime his plantis exploratis, pluresqve per annos in locis, qvibus gignantur, observatis, mutationem talem instituisse.

Tractus, cuius intra fines observationes meæ præsertim factæ sunt, est regio circa sinum Saltensem, \*) in primis pars intima Saltdalen dicta \*\*)

\*) Peragravi qvidem Lapponiam Pitensem, sed celerius, qvam ut perlustratione mea herbarum studio multum prodessem.

\*\*) Qvi descriptionem hujus regionis uberiorem cupit, topographiam meam physico - oeconomicam Actis regiæ Societ. Nidrosiensis 1826 insertam adeat, Breves aliquot de Halogalandia in genere & præfectura ejus Saltensi in specie annotationes statisticæ & oeconomice a b. H. H. Rosenvinge, tunc temporis judice, anno 1790 conscriptæ inveniuntur in promtuario statistico-

qvæ usqve ad fines Svecicos porrigitur. Tractus est vallis angusta, ubi montes e superficie maris sæpe supra limites Betulæ surgunt. Latissime patent regiones alpina & subalpina, e qvibus alta cacumina velut e basi communi crebro assurgunt. Summum est cacumen, qvod Saulo vocatur, 5309 ped. supra mare sec. Wahlg; deinde Solvaag-tinden circiter 4000 ped. supra mare elatum. Qvod ad latitudinem geographicam attinet, coelo mitissimo gaudet & ob angustias vallis, qvæ vim solis magnopere augent, & ob maris propinquitatem, qva hiemis frigus præcipue mollitur, qvo fit, ut plantæ, qvas in regionibus arcticis inveniri non crediderimus, nobis sese offerant, ut *Impatiens*, *Arenaria trinervia* &c. Materia montium est saxum qvarzoso - micaceum (Glimmerskifer) et saxum calcarium originarium (Urkalk) qvod etiam ad variationem vegetationis multum confert, & rarius saxum spathaceo - qvarzosum (Gneis). Qvamqvam ratione aliarum terrarum coelum aestivum alpium Norvagiæ mitissimum est, qvo fit, ut Lappones in tenuibus suis tentoriis per totum annum in alpibus habitare possint, Cl. Wahlenbergius tamen (*de vegetatione et climate Helve-*

*tiae p. XC.) id mitius, quam re vera est, describit;* nam etiam mensibus Junio & Augusto nive satis sæpe alpes Saltenses teguntur; qvin Julio mense plantas in alpibus legi, dum ningebat, licet nix cädens cito liqvesceret, & die 16 Julii 1824 multæ plantæ alpinæ, ut *Pedicularis Sceptrum*, *Aspidium Lonchitis* (juvenis frigoris impatiens, senex vero per hiemem illæsum perdurat), *Pingvicula* &c. frigore ustæ sunt.

Qvamvis sententiæ Wahlenbergii, plantas Lapponicas partim e Siberia partim e terris occidentalibus oriundas esse, aliquid veritatis inest, qvatenus terræ maritimæ & a mari remotæ propria tum vegetatione tum coelo gaudent, qvam ob rem arcticæ Scandinaviæ regiones nonnihil utriusqve floræ habent, in specialioribus tamen sæpe fallitur, qvod in multis plantis ab eo nominatis accidit. Sic (cfr. p. XVI) crescit *Pingvicula villosa* etiam in montibus Norvagiæ meridionalis, et *Lysimachia thyrsiflora* in tota Norvagia meridionaliori satis vulgariter. *Polemonium cæruleum* in pluribus mari adjacentibus locis nunc inventum est. *Convallaria bifolia* a terra Saltensi usqve ad Christiansandensem ubiqve obvia est. *Juncus parviflorus* *Daphne* & *Scheuchzeria* omnes plantæ Norvagiæ sunt. *Lychnis alpina* in alpibus Norvagiæ

mediæ (ut in Dovre, Tronfjeld) non raro occurrit. *Splachnum luteum & rubrum* per totam Norvagiā a finibus Halogalandiæ inveniuntur.

Multas plantas non recte Lapponiæ proprias esse dicit (cfr. p. XVIII), cum sæpe vulgares Norvagiā incolant, ut *Aira alpina*, *Diapenzia*, *Luzula arcuata*, *Alsinella stricta*, *Ranunculus pygmæus*, *Salix lanata*, *Gnaphalium alpinum*, *Carex microglochin*, *capitata*, *norvegica*, *rotundata*, *ustulata*, *alpina*. Præterea inveniuntur *Aira atropurpurea*, *Juncus arcticus*, *Rhododendrum lapponicum* in Dovre & alpibus adjacentibus. *Myosotis deflexa* in tota Norvagia australi occurrit, ubi eam jam anno 1808 legi.

Ut indoles floræ Lapponicæ facilius cognoscatur, incrementum etiam, qvod meo supplemento familiis naturalibus (cfr. p. LVIII) accessit, exponere liceat.

Qvod de *Lichenibus* præclarus ille auctor jam scripsit: "omnium vegetabilium Lapponicarum longe numerosissimæ sunt, utpote qvare ultra 207 species inveniantur", rectius nunc dicendum, cum 170 species accesserunt, ita ut totus numerus 377 fiat, et haud dubie herbarum studiosi in futurum Halogalandiam visitantes saltem viginti tres etiamnum invenient species, in primis si scopulos alpesqve terræ Lofotensis adeant.

*Muscis frondosis* una cum *hepaticis* 58 species accessere.

*Fungorum* numerus 347 speciebus tantum augetur, ut lichenum numerum superet. Haud dubie plures etiam fungi quam lichenes post-hac botanicis occurrent. Cum vero plurimi minoris sint momenti et vita brevissima fruantur, vegetationem non insignem reddere possunt; quare lichenibus cedere eos oportet.

*Algarum aquatricarum* 60 species a me sunt indagatae, quarum pleræque aquarum dulcium incolæ sunt. Autumni demum tempore lacus et rivi ab aqua nivali et frigore liberantur, ita ut Conservæ in ipsis nasci possint. Sed cum Cl. Wahlenberg per hæc loca itinera faceret, hoc anni tempus non præstolatus est, qua re haud dubie factum est, ut tam paucas Algas in aqua dulci habitantes memoret.

*Filicum* numerus una modo specie augetur.

*Inundatarum* species antea 7 fuerunt; nunc 5 additæ.

*Hydrocharidum* tribus *Nymphæis* sese associat *Stratiotes*.

*Calamariarum* Lapponicarum numerosæ species adhuc 8 novis, omnibus tamen rarius occurrentibus, augentur.

*Graminum* 6 species, qvæ in primis coelum mite marinum amant, a Wahlenbergio non observatæ sunt.

*Orchidearum* pulchra familia nunc 17 species complectitur, inter qvas per pulchrum *Cypripedium*.

*Caryophyllearum* 7 accedentes species loca inferalpina & maritima in primis diligunt.

*Compositæ Semiflosculosæ* speciebus 3 vulgarioribus, *Discoideæ* speciebus 3 rarioribus augentur.

*Aggregatarum* primitiæ 2 sc. *Scabiosæ* floræ Lapponicæ ornamento sunt.

*Multisiliqvosæ* antea 20, *Siliqvosæ* antea 21 & *Succulentæ* 11 species fuerunt, nunc singulæ 2 novis augentur; sed *Personatæ* 15, *Senticosæ* 17, *Papilionaceæ* 10 & *Calycanthemæ* 6 species antea habentes, una modo augentur.

*Holoraceis* 3 species accedunt.

*Corydalibus* sese associat *Impatiens*.

*Campanulaceæ*, *Rotaceæ* & *Gruinales* unicæ speciei augmento singulæ gaudent.

E *Tricoccarum* familia alias Lapponiæ aliena *Euphorbia* intra limites hujus regionis observatur.

E plantis a Linnæo in flora Lapponica nominatis, sed a Wahlenbergio exclusis, a me inventæ & rursus adscriptæ sunt 11.

Ita lectori benevolo patebit, in solo Lappo-  
nico 680 plantas, qvas inter 88 hactenus non de-  
scriptæ fuere, a me primum detectas esse.

Errata, qvæso, benevole lector excuses, qvæ  
plura forsan occurrent, in primis in plagulis prio-  
ribus, quarum correctionem ipse curare non potui.

Scripsi in prædio pastorali Bjerke parochiæ  
Asker d. XII Martii a. MDCCCXXVI.

---

LIBRARY  
NEW YORK  
BOTANICAL  
GARDEN

## CLASSIS I.

### MONANDRIA.

1. **HIPPURIS** *vulgaris* Whlbg. fl. lap. n. 1 ubi  
vide.

In Lacu parvo Fiskevaagvandet Saltdalen Nordlandiæ verno tempore hanc stirpem legens mihi persiasi, *H. maritimum* Fl. dan. nil esse nisi parum memorabilem varietatem vel rectius formam tabidam *H. vulgaris*. Mense sc. Maji, glacie nuper disolutâ hanc plantam a priori anno restantem inveni, foliis infinitis quaternis ovatis; mox vero verticilla 6, et involuta in apice 8—10 linearia continebant. Hæ stirpes erant stolones a priori anno, quæ plantam hujus anni efficerent. Caule crescente, folia suprema libera prodeunt, inferiora vero ovata hyberna tabent et decidunt, et hoc modo plantam florentem a vulgari minime differentem habemus. In Finmarkia, ubi tota vegetatio rapidius progredi cogitur, planta jam floret, antequam folia hyberna decidunt, sed ut in icona Floræ danicæ et in specimine e Finmarkia orientali in horbario Universitatis Christianiæ asservato nulli flores ad folia infima, e contrario radices — folia huic loco non propria significantes — cernuntur. Icon Floræ danicæ recte etiam superiores verticillos 8—9 phyllas habet. Attamon specimina fenonica magis diversa quam finmarkica.

## CLASSIS II.

## DIANDRIA.

- 13 PINGVICULA vulgaris  $\beta$ . Whlbg. fl. lap.  
n. 13, ubi vide.

Synonymon Gunnieri fl. norv. n. 641 excludatur  
et ad seqventem speciem referatur.

$\beta$  obtusa: calcare obtusiore brevioreqve Horn  
fl. oec. 3. 1. p. 27.

Hab in alpibus inferioribus Saltdalen Nordlandiae.

## CLASSIS III.

## TRIANDRIA.

20. SCIRPUS Bæothryon: Whlbg. fl. lap. n. 20.  
ubi vide.

Hab in udis inferalpinis Saltdalen Nordlandiae haud  
raro.

22. SCIRPUS acicularis. Whlbg. fl. lap. n.  
22, ubi vide.

Hab: in Finmarkia orientali, ubi legit Rev. Dein-  
boll.

- 28 ERIOPHORUM capitatum.

Hab: in udis, imprimis ad rivulos subalpinos Saltda-  
len haud raro. E. vaginato serotinus est.

- 1082 $\frac{1}{2}$ ; ERIOPHORUM latifolium: culmis tri-  
gonis, foliis planiusculis apice triquetris, spicis  
pedunculatis, pedunculis angulatis scabris.

E: latifolium Schrad fl. germ. p. 154. Whlbg.  
fl. ups. n. 36. fl. dan. t. 1681.

E. polystachion Sp. plant. ed. Wild. 1p. 312.  
Smith fl. brit. p 59. Leers herb. n. 37. Lin-  
grostis panicula ampliore Scheuch Agrost. p. 306.

Hab. in paludibus inferalpinis parcus, in subalpinis  
parcissime Saltdalen Nordlandiæ.  
Flavescens et usque ad bipedalem altitudinem.

38 AGROSTIS *alpina*. Whlbg. fl. lap. n. 38.

Postquam specimina hujus plantæ e Laponia Lulensi et norvegica e Finmarkia orientali et e subalpinis Merager præfecturæ niderosiensis cum speciminibus *A*: *rubra* e Saltdalen Nordlandiæ et subalpinis Dovre anxie contuli, nullum discrimen inter has detegere potui, nisi forte sit: quod panicula rami in *A*: *rubra* subhispidi, in *A*: *alpina* læviusculi. Panicula in utraqve planta florente purpurascens-viridis, in fructifera rufescens. In flora upsalensi Cl. Whalenberg quidem *A*: *rubram* fl. lap. cum *A*: *vulgarem* et quidem *β. aristatam* Schrdr. conjungit, quod forsitan in *var. β. fl. lap.*, a *var. α.* tum diversa, convenit, sed in *var. α.* dictum esse non potest, quia de illa expresse: "corolla univalvi" (fl. lap. p. 23) scribit Cl. auctor. Synonyma linnæana floræ lapponicæ suis locis facile assignantur, si n. 45 cum Cl. Whalenberg ad *A*: *rubram* *α* & *alpinam*, et n. 45 ad *A*: *vulgarem*, in quam et character: "panicula omnium tenuissima" et synonymon Scheuchzeri: "Gramen montanum, panicula spadicea delicatiore" muticam speciem saltem indicans, bene convenient. Obstat unice quod "in alpibus vulgare" scribit, cum *A*: *vulgaris* subalpinam regionem vix excedat. Minoris tamen momenti annotatio hæcce generalis de gramine vulgatisimo alias ab eo neglecto videtur.

1089<sup>2</sup>/<sub>3</sub> AIRA *aqvatica*: panicula diffusa subverticillata, glumis obtusis, flosculis obconoideis calycem excedentibus, culmo adscendente, radice repente.

*A*: *aqvatica* Lin. fl. sv. n. 68. Sp. pl. ed. Wild. p. 376 Fl. dan. t. 381 mala- Hall. helv. n. 1471 Pallas iter sib. 1 p. Schrad. germ. p. 256. Molinia *aqvatica* Whlbg fl. ups. n. 58. Hartm. scand. p. 55.

Gramen *miliaceum aqvaticum* Scheuch. agrost. p. 176.

Hab. ad rivulos lutosos et in locis uidis inferalpinis circa sinum saltensem Nordlandiae e. gr. Fiskevaag Saltdalen.

A vulgari planta nil differt.

109 <sup>et</sup> *POA distans*: panicula æquali, ramis, tructiferis deflexis, spiculis linearibus subquinqve-floris, flosculis obtusis liberis, radice fibrosa.

*Poa distans*. *Lin. mant. p. 32 Sp. pl. ed. Wild. 1 p. 401. Smith brit 1 p. 96. Fl. dan. t. 251*  
haud bona.

*Poa salina Pollich.*

*Glyceria distans Whlbg fl. ups. n. 70. Molinia distans Hartm. fl. scand. p. 55.*

Hab. in littoribus humidioribus sinus saltensis frequenter; nullibi vero a me reperta est *P. maritima*.

Spithameam altitudinem non excedit. Folia linearia lævia, apice compressa.

62 *POA alpina*: *Whlbg fl. lap n. 62*, ubi vide.  
*Poa var. ß. Lin. fl. lap. n. 51.*

63 *POA laxa Whlbg. fl. lap. n. 63*. ubi vide.

Hab. in alpibus elatis Soelvaagtinden et Baadfjeld Saltdalen Nordlandiae.

Statura palmari, in hisce locis nunquam spithamea, mollitie et glabritie, glumis fusco-viola-ceis glabris, flosculis carinæ basi hirsutis alias glabris, fasciculo villi tenui connexis mox insignis planta.

64 *POA pratensis Whlbg fl. n. 64.*

*v. rigens*: panicula oblonga pauciflora, spiculis 2—4 floris, foliis brevissimis. *Poa pratensis v. rigens. Læstadius in Act Ac holm. 1822 p. 328.*

*P. rigens. Hartm. fl. scand. p. 448.*

Hab. in locis sole exustis et lapidosis Lapponiae et Finmarkiae; juxta Qvikjok lapp. lulensis *Læstadius*; ad Utsjoki Lapp. Kemensi et Kaisavarre Finmarkiae *Wahlenberg*.

Panicula oblonga, pauciflora brevis ramis horizontaliter patentibus lævibus. Spiculae 2—4 floræ ovatae, flosculis evidenter 5 nerviis undique fere villosis. Calmus pedalis, s. semipedalis erectus strictus, rigidus, foliis brevissimis vaginæ glaberrimis; ligula brevi truncata. Radix ascendens stolonibus angustis conduplicatis. A.

*P. fleexuosa* differt abunde: ramis patentibus rigidis, flosculis evidenter nervosis, culmo usque a medio foliis destituto, tota denique statura rigida. Non dubito, qvin haec etiam varietas ad *P. pratensem* reducenda sit, quamquam loco arduo crescens monstrifer facta sit (ob: habitum alienum induerit) *Læstad.* l. c.

1091 $\frac{6}{7}$  *POA serotina*  $\beta$  *firma*: panicula coarcta-  
ta pauciflora, spiculis ovato-lanceolatis subtri-  
floris, flosculis basi villo connexis obsolete qvi-  
gvenervibus, ligula subbrevi, radice repente.

*P. serotina*  $\beta$ . *firma*, *Horn. fl. oec.* 1 p. 108.

*P. serotinæ* var. *Schrad. germ.* p. 299.

*P. angustifoliæ* var. *Whlb. fl. ups.* n. 66.

Hab. in alpibus siccis elatis Saltdalen Nordlandiæ ex.  
gr. Søelvaagtinden et Baadfjeld.

Radix repens, vel potius culmi adscendentes ad  
genicula radicantes.

Genicula ad radicem conferta, in superioris cul-  
mi parte fere nulla. Culni glabriuscui spithamei  
vix pedalem altitudinem attingunt. Folia perangusta  $\frac{1}{2}$   
lin., mox convoluta vaginis striatis subasperis. Li-  
gula brevis sed minime brevissima. Panicula coarcta-  
ta ramis 2—3 in singulo verticillo, qvorum plurimi  
simplices, 1—4 floribus ornati, scabrinsculi. Spiculæ  
3, raro 4 floræ ovato-lanceolatæ, iis in *P. nemoralis*  
latiores, fusco-virides. Glumæ acuminatæ trinerves  
glabræ fuseo violaceæ. Corollæ valvula exterior obtusa  
inferne ad carinam et marginem villo subtili tecta,  
qvo flosculi connexi. Etsi sane habitum *Poæ nemora-*  
*lis* brevioris et rigidioris præ se fert, eam ad *P. se-*  
*rotinam* tamen referri debere credo ob: ligulam  
longiorem, flores villo connexos (in illa qvidem flos-  
culi ad carinam et marginem pubescentes, sed nullus  
villi fasciculus ad basin, qvo flosculi conjuncti, adest;) spiculasmajores semper 3 floræ radicemque repentem.  
Gramen hocce quoque perserotoninum, initio mensis  
Augusti antheris nondum explicatis,

1092 $\frac{6}{7}$  *FESTUCA elatior*: panicula secunda pa-  
tente ramosa, spiculis linearibus multifloris  
muticis, foliis linearibus, radice fibrosa. *Whlb.*  
*fl. ups.* n. 75. *Lin. fl. svec.* n. 94. *DeC. fl. fr.*  
3, n. 1579.

## TRIANDRIA

*F. pratensis* Smith brit. 1 p. 123. Schrad. germ. p. 332. Fl. dan. t. 1323.

*Poa* Hall. helv. n. 1451.

Grammen loliaceum etc. Scheuchz Agrst. p. 300.  
Hab. in lateribus montium inferalpinorum calidioribus  
Saltdalen Nordlandiae.

Bipedalem altitudinem vix excedit.

1093 <sup>72</sup> DACTYLIS glomerata: panicula secunda glomerata, foliis carinatis. Lin. fl. sv. n. 87. Sp. pl. ed. Wild. 1 p. 408. Smith brit. 1 p. 111. Schrad. germ. p. 311. Fl. dan. t. 745. Bromus Hall. helv. n. 1512.

Gramen spicatum folio aspero. Scheuch Agrost. p. 299. t. 6 f. 15.

Hab. in collibus calidioribus adsinum exteriorem saltensem circa Bodoe parcius.

73 AVENA pubescens: panicula aequali coarctata, spiculis trifloris, florebus calycem excedentibus, radice subrepente,

A: pubescens. Lin. sp. pl. app. p. 1665. Smith brit. 1 p. 140. Schrad. germ. p. 382. Fl. dan. t. 1203. Whlbg. fl. ups. n. 85.

A: pratensis Whlbg. fl. lap. n. 31.

A: pratensis β. Lin. sp. pl. p. 119.

Avena spicis erectis, calyce longioribus Lin. lap. n. 31.

Hab. in pratis siccis ad sinum saltensem Nordlandiae passim.

Cum A: pratensis nec a Cl. Wahlenbergio in boreali Svecia nec a me in latere norvegico circulo arctico proprius quam ad Brönöe Helgolandiae meridionalis observata sit, et A: pubescens diu — usque ad annum 1763, — ut species saltem distincta Linnæum lauerit, et character imprimisque synonymon Raji syn. t 21 f 2 a Linnæo in fl. lap. n. 31 allatum unice in A: pubescenti convenerit, mihi nullum est dubium, quin Stirps floræ lap. n. 31 A: pubescens sit, quam vero Linnæus postea, illam ab A: pratensi nondum distinguens (cfr. Sp. pl. I. c.), male in flora svecica ut synonymon Avenæ pratensi apposuit. A: pratensis ergo a Cl. Wahlenbergio synonymy mia Linnæana seducto in floram lapponicam introdueta iterum excludatur. Gramen nordlandicum a vulgari A: pubescente nil differt.

## TETRANDRIA.

7

- 79 KOENIGIA *islandica*: Whlbg fl. lap. n. 79.  
Hab. ad fontes et rivulos frigidos alpium saltensium,  
a et lapponiae lulensis. *Læstadius.*"

Plantam pusillam et serotinam (medio Septembris floribus nuper evolutis legi) nunquam vidi Cl. Wahlenberg, sine dubio, qvia jam alpes, anteqvam illa viguit, reliquit. Vix pollicaris hisce locis occurrat. Maxima pars caulis nudus et decumbens. Primum par foliorum oppositum; dein folium unum alternum; denique vermiculus trium foliorum 3. flores eingens. Stigma sessile purpureum. Semen pro ratione plantæ maximum, lœve, nitens.

## CLASSIS IV.

## TETRANDRIA.

### SCABIOSA.

Lin. gen. pl. ed. Screeber n. 149. Gærtn. fr. 2, p. 38.

- 1094<sup>7</sup>/<sub>8</sub> SCABIOSA *arvensis*: corollalis quadrididis, radiantibus, foliis subbipinnatisidis, eanelispido. S. arvensis Lin. fl. sv. n. 117. Sp. pl. ed. Wild. 1 p. 550. Smith. brit. 1 p. 170. Whlbg fl. ups. n. 94. Fl. dan. t. 447.

Trichera arvensis Schrad. .... Hartm. fl. scand. p. 70.

Hab. in collibus calidioribus ad exteriorem sinum saltensem Nordlandiæ e. gr. Bodöe.

- 1095<sup>7</sup>/<sub>8</sub> SCABIOSA *succisa*: corollulis quadrididis æqualibus, receptaculo globoso, squamis receptaculi floribus subæquantibus, foliis ovato-lanceolatis pilosiusculis.

S. succisa Lin. fl. sv. n. 119. Sp. pl. ed. Wild. 1 p. 548. Smith fl. brit. 1 p. 170. Fl. dan. t. 279. Whlbg. fl. ups. n. 96. Hartm. fl. scand p. 70.

Hab. in pratis subhumidis ad sinum saltensem Nordlandiæ e. gr. Bertnæs,

Flores azurei serotini prata defessa ornant.

## TETRANDRIA.

82 **GALIUM palustre:** Whlbg. fl. lap. n. 82,  
ubi vide.

Hab. quoque ad rivulos et in convallibus humidis Nordlandiæ saltensis pasim.

83 **GALIUM trifidum:** Wahlbg fl. lap. n. 83,  
ubi vide.

Hab. in paludibus inferalpinis Saltdalen Nordlandiæ non raro e. gr. ad Fiskevaagvandet. Per totam fere Norvegiam disperse obvenit.

92 **POTAMOGETON natans** Whlbg. fl. lap.  
n. 91.

Hab. in lacubus turfosis minoribus inferalpinis et versus subalpinam regionem Saltdalen Nordlandiæ freqventer.

93 **POTAMOGETON perfoliatum:** Whlbg. fl.  
lap. ubi vide.

Hab. in lacubus et fluviis lenti circa sinum saltensem Nordlandiæ e. gr. Fiskevaagosen inferalpino et in subalpinis Saxenvig Saltdalen.

Quod in subalpinis crescit, folia remotiora, brevioraque nec non pedunculos breves habet; de cætero a vulgari non differt.

1096 **POTAMOGETON heterophyllum**: pedunculis sursum subincrassatis, foliis submersis sub lanceolatis acutis natantibus pedunculis ellipticis utrinque obtusis.

P. heterophyllum Hartm. fl. scand. p. 78. Whlbg. fl. ups. n. 111. Schum. säll. 1. p. 49. Fl. dan. t. 1263 opt.

P. gramineum Fl. dan t. 222.

Hab. in lacubns minoribus turfosis Saltdalen Nordlandiæ rarius e. gr. Lillevatne Midbymarken.

Planta late virens. Caulis dichotome ramosus tenuis. Folia omnia alterna stipulata, si tota planta demersa, lato linear-lanceolata, si apex emergens, folia emersa natantia elliptica pollicem longa,  $\frac{1}{2}$  pol. lata, coriacea, petiolo dimidiæ folii longitudinis. Pedunculus caule triplo fere crassior, sursum subincrassatus.

P. Gramineum Whlbg. fl. lap. ab hoc diversum foliis duplo longioribus, 3 poll., in flumine Pasjok Finmarkiæ orientalis legit Rev. Deinboll.

**1097 POTAMOGETON rufescens:** foliis summis subnata tantibus oblongis basi attenuatis immersis duplo longioribus linearie lanceolatis sessilibus.

P. rufescens Schrad. ined. — Whlbg. fl. ups. n.

**113. Roemer syst veg 3 p. 510 ex Whlbg. Hartm. fl. scand. p. 79. Act. Ac. holm. 1818.**

P. lucens var. angustifolium. Fl. dan. t. 1635 bona.

Hab lacu inferalpino Fiskevaagvandet Saltdalen Nordlandiae copiose.

Denominatio bona, nam et in aqua et impensis siccata rufescit. Per totam Norvegiam frequens, vulgo pro *P. fluitante* habita planta. Si in tam profunda aqua crescit, ut superficiem attingere non valeat, folia omnia æqvalia. Variat foliis superioribus oblongis et lanceolatis obtusis, attamen Fl. dan. t. 1450 (*P. fluitans*) ob folia inferiora nimis lata, fere ovato-lanceolata ad hoc pertinere vix credo. Folia in hoc semper linearie-lanceolata, obtusiuscula, ad 5 pol. longa, ½ pol lata suprema modo stipulata. Pedunculus variæ longitudinis, crassitie canlis. Semina oblique ovata apicibus distantibus, ejusdem formæ ac in *P. natanti*, sed minora. Seqventi multo affinior quam *P. lucenti*, a quo longe distare mihi videtur.

**1098 POTAMOGETON prælongum:** foliis basi ovatis subamplicentibus lanceolatis obtusis, seminibus lunatis carinatis, spice conniventibus. P. prælongum. Wulfen.... Hartm! fl. scan. p. 79. Fl. dan. t. 1687 mala.

P. acuminatum. Whlbg. fl. ups. n. 416 (excluso synon Fl. danicæ.)

Hab. in lacu inferalpino Fiskevaagvandet Saltdalen Nordlandiae copiose.

Orgyalis et supra, intense viridis, erectus ramosus, e dichotomiis pedunculos fere spithameos æquales caule sub crassiores spicis 1—2 pollicibus, rarius superficiem attingentibus terminatos exserens. Folia basi 1 pol. lata, 4—7 pol. longa. A *P. lucenti* basi foliorum p. p. statim dignoscitur. Icon florae danicæ ob caulem simpli-

cem, pedunculos breves et basin foliorum attenuatam hujus loci vix esse videtur.

- 95 **POTAMOGETON** *pusillum* Whlbg. fl. lap. n. 95, ubi vide.

Hab. in fundo aquarum Nordlandiae saltensis passim e. gr. ad Fiskevaag et Midbye Saltdalen.

- 1099 **POTAMOGETON** *pectinatum*: caule foliisque filiformibus, stipulis foliiferis vaginatis, spicis interruptis.

*P. pectinatum*. Lin. fl. sv. n. 150, Smith. fl. brit. 1 p. 197. Whlbg. fl. ups n. 121. Hartm. scand. p. 81. Horn. fl. oec. p. 186.

*P. marinum* fl. dant. 186.

Hab. in rivulis inferalpinis circa sinum saltensem Nordlandiae passim copiose e. gr. Bodoe, Rognan; in lacubus versus subalpinam regionem Saltdalen rarius e. gr. Lillevatne Midbye.

In lacubus suberectum, in amnibus diffusum. Ab hoc *P. marinum* Lin., ut videtur, Sveciae proprium, omnino diversum: foliis linearibus p. p.

### CLASSIS V.

## PENTANDRIA.

- 98 **MYOSOTIS** *sylvatica*: foliis oblongo-lanceolatis, hirsutis, racemis longis subebracteatis, pedicellis patentibus, limbo quam tubo longiore, seminibus levibus.

*M. sylvatica*. Ehrh.... Horn. fl. oec. 1 p. 207.

*M. alpestris*. Hoppe.... Hart. fl. scand. p. 98.

*M. scorpioides* Whlbg. fl. lap. n. 98 (exclusis pluribus synonymis, quatenus hanc a *M. palustris* non distinguenteribus) Fl. dan. t. 583 fig. dext. Lin. lap. n. 75.

*M. scorpioides* v. Smith fl. brit. 1 p. 212.

Hab. in graminosis etiam siccis per omnes partes universae Lapponiae, imprimisque in nemoribus subalpinis Nordlandiae, usque in lateribus superioribus alpium vulgaris. In paludosis s. udis nunquam observavi.

Differt hæc a simile *M. palustri*, caule altiori erectiorique, pubescens copiosiori et patentiori, racemis multo longioribus p. p.

- 99 **MYOSOTIS arvensis Whlbg. fl. lap.** 99  
ubi vide.

Hab. in cultis, imprimis in hortis Nordlandiæ saltensis freqventer, sine dubio introducta.

- 102 **PULMONARIA maritima Whlbg. fl. lap.**  
n. 102, ubi vide.

Hab. in fundo sinus saltensis ad ostium fluminis Saltensely. Etjam in sinu intimo Stördaliæ nidrosensis legi. Hoc eontra Cl. Wahlenbergium, qvi l. c. negat illam versus fundum sinuum provenire.

- 107 **PRIMULA farinosa β stricta Whlbg fl.**  
*lap. n. 107*, ubi vide.

P. stricta Horn. fl. oec. 1 p. 225. Hartm fl. scand. p. 100.

P. Hornemanniana Lehman Mon. Prim. p. 55 t. 4.

Qvi unquam varias hujus plantæ formas a subhumidis inferalpinis usque ad summos fere alpes Nordlandiæ observaverit, *P. strictam* propriam constituere speciem vix dicet. In inferalpinis Bodœ, si numerum florum excipis, plantæ in paludibus sællandicis obviæ convenientissima occurrit. Ut vero versus alpes ascendit caulis stricior, folia nudiora integrioraque, flores pauciores evadunt. Nunquam vero his in regionibus petalis adeo leviter emarginatis, ut habet icon fl. damæ, sed fere bifidis inveni.

- 108 **PRIMULA Finmarkica:** foliis ovatis nudis integerrimis petiolatis, petalis obconicis bifidis.  
P. finmarkica Lin. sp. pl. ed. Wild. 1 p. 806.  
Whlbg fl. lap. n. 108. Hartm. fl. scand. p. 100.  
P. norvegica Retz fl. scand. ed. 2 p. 249. Horn. fl. oec. 1 p. 225.

P. egalicensis Fl. dan. t 1511 Lehman Mon. Prim. t. 7.

P. integrifolia Gun. fl. norv. n. 154. Fl. dan. t. 188.

Hab. in Finmarkia occidentali, ubi ad Hasvig, Maasoe et Vardœ legit Ill. Gunnerus, anno 1759.

Deinde ignota usqvedum ad Hasvig et Talvig reperit Rev. Deinboll.

Planta pallide viridis, flores 5 uncias vix superans. Folia subcarnosa. Si corollæ formam et calycem nimis profunde partitum excipis, icon fl. dan. t. 188 plantam optime refert. Cl. Hornemann grönlandica et finmarkica specimina conferens nullum inter has discrimen detexit, nec icon *P. egalicensis* Fl. dan. t. 1512 tale quid præbet, nisi quod petala angustiora picta sunt quam in planta finmarkica esse videntur. Hoc contra Hartm. fl. scand. p. 100.

**113 POLEMONIUM cæruleum Whlbg fl. lap. n. 123 et p. XVI.**

Hab. per Nordlandiam passim: in graminosis lateribus montium inferalpinorum Saltdalen rarius ipse legi; in Ofoten Dr. Cetterstedt; ad Indyr parochiæ Gillesgaard Cl. Rathke.

## IMPATIENS.

Gen. pl. ed. Schreber n. 1365.

**1100~~115~~ IMPATIFNS nolitangere:** foliis ova-tis, pedunculis solitariis multifloris, geniculis caulinis tumentibus. Lin. fl svec. n. 792 Sp. pl. ed, Wild. 1 p. 1176. Smith fl. brit. 1 p. 243. Gun. nor n. 134 fl. dan. t. 588. Pal. it. sib.

Hab. in convallibus angustis inferalpinis a Rubis et Filicibus suboceulta Saltdalen Nordlandiæ. Frigoris impatiens in asyla aptissima quoque confudit. Planta vero ipsa nil differt a vulgari norvegica.

**123 GENTIANA involucrata Whlbg fl. lap. n. 123, ubi vide.**

Hab. in Saltdalen et circa totum sinum saltensem pas-sim copiose, ubi præter vulgares flores livido-cærulescentes etjam flores albos, sed nunquam flavos vel flavescentes inveni. Cl. Wahlenberg l. c. flores quidem albos dicit, sed modo rarius tales sese mihi obtulerunt.

**124 GENTIANA nivalis Whlbg fl. lap. n. 124,**  
ubi vide,

Hab. quoque in lateribus declivis herbosis inferalpinorum Nordlandiae, ubi circa sinum saltensem imo ad prata submaritima descendit. Memoriabile est, hanc plantam uno anno iisdem locis prorsus desse, in quibus altero anno copiose legebatur.

Radix biennis. Folia radicalia magnitudine variar, sepe caulinis triplo majora, quae sine dubio *G. verna* Olafs. island.

**1101<sup>125</sup> 127 GENTIANA campestris:** corollis hypocrateriformibus quadrididis fauce barbatis, calycis laciniis alternis maximis

*G. campestris* Lin. fl. svec. n. 230. *lap. n. 94.*  
*Sp. pl. ed. Wild.* 1 p. 1348. *Fl. dan. t. 367.*  
*Whlbg fl. ups. n. 168.*

Hab. in pratis imprimis maritimis circa sinum saltensem Nordlandiae ubique.

Mirum quod planta in regione laudata frequenter oculatissimum Wahlenbergium effugeret. Variat floribus cæruleis, violaceis et albis: de cætero a vulgari planta minime diversa.

**127 GENTIANA serrata α detonsa:** corollis infundibuliformibus quadrididis, laciniis rotundatis *serrulatis*, calycis laciniis inæqualibus alternis ovatis acutis, alternis lanceolatis acuminatis.

*G. serrata α* Horn fl. oec. 1 p. 301.

*G. serrata β* Whlbg fl. lap. n. 127.

*G. ciliata* Gun. nor. n. 733 t 2 f. 3—5 (bona)

*G. detonsa* Rotboll in Act. hafn. 10 p. 435 t. 1 f. 3 Sp. pl. ed. Wild. Sp. 1 p. 1352.

Hab. in littore a summo fluxu vix remoto ad sinum saltensem e. gr. Gradholmen et Liönæsœn Skjerstad, Bertnæs, Bodoe. "Ad Talvig Finmarkiae Dr. Cetterstedt."

An ad hanc pertineat, an species diversa sit *G. serrata* Gun. norv. n. 819. *Fl. dan. t. 317.* *G. serrata β acuta* Hornemann et Wahlenberg

constituere nequeo, cum illam nunquam vidi. Ex icono habitus idem, sed si vere laciniæ calycinae æquales, quales figura Fl. danicæ et Frölich (Gent. p. 117 n. 47, at forsitan ex figura laudata) eas habent, diversam habeo. Quamquam

pluribus locis copiose eam legi, corollæ semper quadrifidae; Calyx perraro 5 fidus. Duæ occurunt varietates: a, Corolla principali, raro 1—2 ex lateralibus, quadrangula intense vivideque cærulea, lobis rotundatis argute serrullatis, capsula initium loborum vix attingente. b, Corolla principali una cum lateralibus cærulecenti-glaucæ (venæ imprimis cæruleæ) lobis angustioribus obtusis subserrulatis, capsulam vix superantibus. Etiam occurrit lateralibus similis capsulam modo æqvans. In hac varietate capsula semper major. Ceteroquin incremente capsula corollæ splendor et magnitudo diminui videtur, nam in omnibus floribus lateralibus, in quibus capsula ratione floris maxima, corolla exigua. Hæ varietates commiscue crescentes primo obtutu satis diversæ nil nisi varietates sunt, quia caulis, folia florresque laterales utræque iidem sunt. Folia lanceolato-linearia, radicalia suboblonga. Radix tenuis annua. Mense Julii floret.

**136 PIMPINELLA *Saxifraga* Whlbg. fl. lap. n. 136**

Hab. in collibus et lateribus montium inferalpinorum Saltdalen Nordlandiæ freqventer.

Variat magis minusve pubescens, foliis magis minusve dissectis.

## TAMARIX.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 510. Gartn. de fruct t. 61.

**1102<sup>135</sup> TAMARIX germanica:** floribus decandris, racemis spicatis terminalibus, foliis sessilibus oblongo-linearibus.

T. germanica Lin. faun. svæc. ap. p. 557. Sp. pl. ed. Wild. 1 p. 1499. Gun. norv. n. 152. Fl. dan. t. 234. Pall. ross. t. 80. Hall. helv. n. 948. Whlbg fl. carp. n. 297.

Hab. in insulis fluminum Nordlandiæ rarissime. A me inter Qvæle et Övesgaard Saltdalen copiose lecta.

Folia glauca obtusiuscula. Capsula levissima  
calyce duplo longior. Stamina basi connata, al-  
terna breviora

## LINUM.

Gen. pl. ed. Schreber n. 523 Gærtn. de fruct. 2 t. 112.

- 1103 <sup>149</sup><sub>144</sub> LINUM *catharticum*: foliis oppositis  
ovato-lanceolatis, caule superne dichotomo, peta-  
lis acutiusculis Whlbg fl. ups. n. 204. fl. carp.  
n. 301. Lin. fl. svec. n. 271. Sp. pl. ed. Wild.  
1 p. 1541. Fl. dan. t. 851.

Hab. in collibus meridiei expositis una cum Dactyli  
glomerata et Scabiosa arvensi Bodoe Nordlandise.

## CLASSIS VI.

## HEXANDRIA.

- 149 IUNCUS *balticus*: aphyllus, panicula la-  
terali effusa angusta, capsulis acutis calyce sub-  
longioribus.

I. *balticus* Wild.... Horn, fl. oec. 1 p. 381.  
Hartm. fl. scand. p. 140.

I. *glaucus* Whlbg fl. lap. n. 149 exclus. omnib.  
synon.

Hab. ad littora maris locisqve depresso Nordlandie  
freqventer.

Radix valde repens, Culmus rigidus levis viridis  
1—2 pedalis. Pedunculi 3—4 inæquales multi-  
flori, floribus iis *Iunci glauci* duplo fere majo-  
ribus.

- 153 IUNCUS *trifidus* Whlbg fl. lap. n. 153  
ubi vide.

S. *monanthos*: flore unico. Horn. fl. oec. 1 p.  
387.

I. *monanthos* Iacq. obs. p. 236 t. 4 f. 1.

Hab. in siecis apriis alpiis Nordlandiæ et Finmarkiæ.

Parum memorabilis varietas mihi videtur. Sæpius flore unico quam tribus reperitur. Folia mox adsunt mox desunt.

**1104<sup>155</sup>** *IUNCUS nodulosus*: foliis culmeis sub-exarticulatis bâsi canaliculatis, culmo erecto, panicula composita, foliolis calycinis interioribus obtusiusculis, capsula acuta brevioribus *Whlbg fl. ups n. 222.*

*I. rariflorus* et *alnesiris* *Hartm. fl. scand. p. 141.*

*I. subnodulosus* *Hoppe.*

Optime de hoc Cl. Wahlenberg in flora ups, sed sine dubio hunc et *I. sylvaticum* in fl. lap. n. 155 (*Iuncus sylvaticus*) confudit. In Nordlandia nullum aliud reperi, sed verosimiliter *I. sylvaticus*: panieula supradecomposita in paludibus profundis Lapponiæ svecicæ obvenit. Utrasque species Hartmanni ex speciminibus authenticis notas habeo, sed præter colorem obscuriorem et flores subplures aggregatos in *I. alpestri* nullum descrimen detegere valeo.

**164** *IUNCUS campestris* *Whlbг fl. lap. n. 164,* ubi vide.

*v. nivalis*: spicis paucis, subsessilibus capitato-conglomeratis, floribus minoribus.

Luzula campestris  $\beta$  nivalis *Læstadius!* in *Act. Ac. holm* 1822 p. 334.

Hab. in alpibus Lapponiæ Iulensis et Nordlandiæ saltensis rarius.

Etsi habitum satis alienum inflorescentia ob pendulos brevissimos capituliformi præ se fert, nil nisi varietas alpestris rigida et diminuta est, nam inflorescentia revera ex 2—3 capitulis minoribus constat et capsula et calyx præter minorem molem *I. campestri* vulgari simillima. Et jam ad vaginam foliorum similium adsunt pila raria.

**1105<sup>173</sup>** *RUMEX domesticus*, floribus hermaphroditis, valvulis cordatis nudis integerrimis, foliis lanceolatis undulatis bâsi acutis.

*R. domesticus* *Hartm. fl. scand. p. 148.*

*R. aquaticus*  $\beta$  *crispatus* *Whlbг fl. lap. p. 91.*

*Lin. fl. lap. n. 129*  $\alpha$ .

Hab. in agris et ad domos per totam Lapponiam svecicam et norvegicam, imo totam Norvegiam, ubi *Rumex crispus* rarissimus, si unquam lectus. Hic Norvagorum notissimus *Hæmule*, *Hoimule*, *Bikjesyre* est, qvare *Rumex crispus* Gun. norv. n. 35 ut hujus syuonymon citare valde sum proclivis, cum saltē pro parte, ut pote in Finnmarkia et Nordlandia crescens dicitur, ad eum pertineat. *R. aquaticus* satis differt: valvularum basi truncata, et foliis radicalibus cordato-oblongis.

## CLASSIS VIII.

## OCTANDRIA.

**1106<sup>150</sup><sub>151</sub>** **EPILOBIUM nutans:** foliis linearibus obtusis denticulatis, caule paucifloro sparse tenuiterque pubescente basi decumbente, siliqvis glabris, stigmate clavato subemarginato.

*E. nutans* Fl. dan. t. 1387.

*E. alpinum* β. *nutans* Horn fl. oec. 1 p. 425.

Hab. in udis glareosis subalpinorum Nordlandiae saltensis rarius. In subalpinis Norvegitæ inferioris frequentius.

Est quasi forma inter *E. palustre* et *alpinum* media, at ab utroque diversa. Flores parvi albi nutantes; siliqua deflorata suberecta. Folia radicalia ellipstica, sed caulina formaam linearem obtusam constanter servant; omnia glabra et subtiliter denticulata. *E. alpino* proxime quidem accedit, sed abunde diversum: forma foliorum et pubescensca caulis. Flores nec unquam cærulei observati sunt. *E. alpinum* quoad folia quidem quam maxime ludit, sed oblonga formâ nunquam augustiora, at quidem latiora, imo iis *E. montani* subsimilis evadunt. Pubes rara et singula in siliqvis ope lentis conspicitur, sed hoc commune cum *E. alpino* habet, nec hanc ob rem cum *E. palustri* siliqvis pubescentia albescentibus stigmataque acuminata confundi potest. Gl.

*Hornemann* auctoritate Cl. *Wahlenbergii* ianixus  
hoc nuper cum *E. alpino* coniunctum.

181 *EPILOBIUM alpinum* Whlg. fl. lap. n.

481, ubi vide. Excludatur synon. *Flor. dan.* t. 1387 ad *E. nutans* pertinens.

1107<sup>190</sup><sub>197</sub> *POLYGONUM amphibium*: floribus pent-andris digynis, staminibus exsertis, spicis solitariis oblongis, foliis ellipticis basi cordatis.

*P. amphibium* Lin. fl. svec. n. 341 sp. pl. ed. Wild. 2 p. 443. *Fl. dan.* t. 282. Whlg. fl. ups. n. 132 carp. n. 372. Hall. helv. n. 1565.

Hab. in flumine Pasjok Finmarkiae orientalis, ubi legit Rev. *Deinboll*.

## ADOXA.

Gen. pl. ed. Schreber n. Gartzia de fruct. n.

1108<sup>197</sup><sub>197</sub> *ADOXA moschatellina* Lin. fl. sv. n. 347. sp. pl. ed. Wild. 2 p. 472. *Gun. norv.* n. 616. *Fl. dan.* t. 94. *Svensk Bot.* t. 435.

*Moschatellina* Hall. helv. n. 1005.

Hab. ad Vadsöe Finmarkiae orientalis, a Rev. *Deinboll* lecta.

## CLASSIS X.

## DECANDRIA.

208 *CHRYSOSPLENIUM alternifolium* Whlg. fl. lap. n. 208, ubi vide.

Hab. ad sinum Varanger in Finmarkia orientali, ubi legit Rev. *Deinboll*.

209 *SAXIFRAGA Cotylédon* Whlg. fl. lap. n. 209, ubi vide.

Hab. etiam in ipsis alpibus Nordlandiæ saltensis rarius.  
A me supra Vasbotn in Saltdalen mense Julii  
florens semel sat copiose lecta est.

Statura multo minore, ramis paniculæ minus  
ramosis, attenuatum non simplicibus, quales habet  
icon. Lin. fl. lap. t. 2 f. 2, insignis; de cætero  
plantæ in rupibus inferalpinorum simillima.

212 SAXIFRAGA stellaris Whlbg. fl. lap. n.  
212, ubi vide.

$\beta.$  comosa: panicula subuniflora vivipara.

S. stellaris  $\beta$  comosa Hartm. fl scand. p. 169.

Lin. fl. lap. p. 137 fl. svec. p. 141.

Hab. in alpibus lakensibus Linné; in alpibus salt-  
dalensibus Nordlandiæ copiose ipse legi.

Miror, Cl. Wahlenbergium nullam hujus me-  
morabilis varietatis, sive rectius monstrositatis  
mentionem fecisse. Loco florum geminæ e foliis  
carnosis obtusiusculis imbricatis constantes ori-  
nuntur, quæ demum delapsæ bulbillerum instar  
novas plantas proferunt. Flos interdum nullus,  
sæpius 1-3 in apicibus ramosum principalium  
adest.

1109 CUCUBALUS maritimus: caulis decum-  
bentibus, petalis coronatis, calycibus inflatis gla-  
bris reticulato-venosis, capsulis subglobosis, fo-  
liis linearis-lanceolatis serrulatis.

C. Behen  $\beta.$  maritimus Whlbg. fl. lap. p. 121,  
ubi vide. Lin. fl. svec. n. 385

Silene maritima Smith brit. 2 p. 468. Sp. pl. ed.  
Wild. 2 p. 700. Horn. fl. oec. 1 p. 486. Cucubalus  
littoralis Pers. syn. 1 p. 496. Silene amoena  
Lichts. scot. p. 227.

Hab. in littoribus maris Nordlandiæ et Finmarkiæ passim.

Si ad notas allatas constantes colorem totius  
plantæ glaucum et corollam quam in C. Behen  
duplo majorem addideris, speciem distinctissimam  
habebis. Capsula quidem quoad dissepimenta ut  
jam observavit Cl. Wahlenberg, sed non quoad  
formam variat. Capsula Cucubali Behen oblonga.

1110<sup>226</sup> STELLARIA longifolia: foliis linearibus  
basi attenuatis, panicula solitaria laterali, calyce  
obsolete trinervi corollam æquante.

*S. longifolia* Fries nov. p. 49 Hartm. fl. scand. p. 178. Horn fl. oec. 1 p. 493

*S. uliginosa* v. Whlbg. fl. ups. p. 149.

Hab. in nemoribus humidiusculis Nordlandiæ saltensis haud raro.

*S. gramineam* habitu maxime refert sc. panicula et foliis longis; attamen re vera *St. uliginosæ* proxime affinis, cui floribus simillima. Utroque tenuior est. Usque ad pedalem longitudinem accedit. Panicula versus apicem ex axilla foliorum egreditur. Cilia singula ad basin foliorum sæpissime adsunt.

223 STELLARIA. *crassifolia* β. *minor* Whlbg. fl. lap. p. 125, exclusis synonymis Floræ danicæ, Rottböllii et Swartzii ad seuentem pertinentibus.

~~111228~~ *STELLARIA humifusa*: foliis ovatis glabris subsecundis, pedunculis unifloribus brevissimis, calycibus, corolla brevioribus, caule diffuso subprerente.

*S. humifusa* Rottböll in Act. Hafn. 10. p. 447. t. 4 f. 14. Swartz in Act. holm. 1789 p. 111 t. 6 f. 1. Fl. dan. t. 978. Hartm. fl. scand. p. 178. Horn. fl. oec. 1 p. 495.

Hab. in maritimis ad sinum Varanger Finnmarkia orientalis, ubi primum legit Cl. Vahl, nuper Rev. Deinboll.

*Stellariæ crassifoliæ* qvidem affinis, sed habitu omnino diverso gaudet. Caulis brevior foliis latioribus dense, ad basin subimbricate, obsitus. Folia interstitia caulis æquantia seu superantia mox pallescunt et subscariosa evadunt. Calyces obsolete trinerves, obtusiusculi. Pedunculi solitarii et rari terminales foliis vix longiores florem sat magnum sustentant. Petala speciora quam in *S. crassifolia*. Icones citati omnes sibi invicem adeo simillimæ, ut si una, tum etiam omnes ad hanc speciem pertineant.

231 STELLARIA *cerastoides* Whlbg. fl. lap. n. 231, exclusive synon. Willdenowii, adde:

*St. multicaulis* Sp. pl. ed. Willd. 2 p. 714,

*Cerastium stellaroides* Hartm. fl. scand. p. 181.

~~114237~~ ALSINELLA Gieschii: glanduloso-hispida

da, foliis linear-lanceolatis rigidis trinerviis, pedunculis longissimis unifloris, petalis calyce brevioribus.

*Arenaria Gieseckii* Fl. dan. t. 1518. Horn. fl. oec. 1 p. 503.

Hab. in Finmarkia orientali, ubi legit Rev. Deinboll.

Habitu proxime ad *A. bifloram* accedit, sed ab omnibus abunde diversa. Ab *Arenaria lanceolata Allion.* pedunculis longis et petalis brevibus differt. Icon fl. dan. per bona; modo capsula obscure depicta; attamen eam ad *Alsinellas* neque ad *Arenarias* pertinere patet. Ex una radice tenui cæspes parvus pedunculis copiosis  $1\frac{1}{2}$  unc. longis medio bracteis oppositis ornatis oritur. Capsula matura petalis duplo longior est.

235 ARENARIA *humifusa* Whlbg. fl. lap. n. 235, ubi vide.

Excludatur synon. Gunneri et Floræ danicæ.

236 ARENARIA *ciliata*: foliis obovato-oblongis uninervibus basi ciliatis, caulinis diffusis, floribus terminalibus pedunculatis, petalis calycem superantibus.

A: *ciliata* Gun. norv. n. 1078. Flor. dan. t. 346. Rottböll in Act. hafn. 10 p. 448 t. 4 f 5 (priori melior).

A. *ciliata* Lin. sp. pl. 608? Wulfen in Jacq. coll. 1 p. 245 t. 16 f. 2? Whlbg. fl. carp. n. 428?

A. *norvegica* Gun. norv. n. 1100 t. 9. Fl. dan. t. 1269.

A: *multicaulis* Gun. norv. n. 666?

Hab. in rupibus maritimis circa sinum saltensem Nordlandiæ passim e. gr. in Madbjergct, promontorio Oinæs, Knaplundsöen. In Loppen Finmarkiæ occidentalis lectam in herbario Cl. Gunneri vidi.

An eadem planta ac illa, qvæ alpes Europæ australis incolat? Illa perennis, hæc annua, saltem cum defloruerit, periit. Cum vero characteres optime convenient, eas distingvere non potui. Qvin A: *norvegica* Gunneri et Fl. danicæ hujus loci sit vix dubito. In mea etiam cilia foliorum interdum desunt. Icon fl. dan. folia ni-

mis angusta et flores nimis glebosos (magis oblongi sunt) habet. Ut peritiores dijudicent, descriptionem adjungo.

**Radix tenuis fibrosa.**

**Caules** plures diffusi 14 pôl. longi quadranguli, pube tenuissima retrosum hispidi eæspitem tenuem efficiunt. Rami alterni.

**Folia** carnosa opposita connata obovato-oblonga, 2 lin. longa, basi margine membranaceo albo et ciliis distinctis tenuibus ornata, uninervia s. forsū rectius carinata, cum nervus a parenchymate folii parum modo sese distingvat, interstitia subæquantia.

**Viva** lævia, secca punctis concoloribus raris obsita. Flores terminales 1—2 pari foliorum minorum in medio pedunculi 3—5 linearis fulerati.

Petala alba oblonga obtusa calycem acutum obsoletæ trinervem albo-marginatum parum superant.

Capsula oblonga longitudine petalorum. Semina reniformia convexa.

**1113337 ARENARIA serpyllifolia:** foliis ovatis acutis subsessilibus quinquevenervibus, calycibus pubescentibus petala superantibus, capsulam erectam æquantibus.

A: serpyllifolia Lin. fl. svec. n. 398. sp. pl. ed. Willd. 2 p. 720. Fl. dan. t. 977. Gun. norv. n. 564. Whlbg. fl. ups. n. 289. Hall. helv. n. 875. Smith fl. brit. 2. p. 479.

Hab. in coilibus ad pedes montium inferalpinorum Saltdalen Nordlandiæ passim. e. gr. Dverset, Fiskevaag.

Tota incano-pubescentia, imprimis venæ pube obsoitæ, erecta et ramis paucioribus ornata, quam esse solet.

**1113237 ARENARIA trinervia:** foliis ovatis acutis subpetiolatis trinervibus, calycibus glabris carina pubescentibus petala capsulamque reflexam superantibus.

A: trinervia Lin. fl. svec. n. 397. sp. pl. ed. Willd. 2 p. 718. Fl. dan. t. 429. Gun. norv. n. 4016. Whlbg. fl. carp. n. 427. fl. ups. n. 288.

Hab. sub rupibus inqve earum fissuris meridiei obversis Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Tota planta diffusa pedalis fere longitudinis pube parca undique obsita. Folia usque ad pollicarem longitudinem accedunt.

- 240 SEDUM *annuum* Whlbg. fl. lap. n. 240. ubi vide.

Excludatur synon. Hænkei.

- 1115<sup>246</sup> CERASTIUM *ovale*: viscoso-hirsutum, caule basi ramosissimo erecto, foliis caulinis ovalibus majoribus, floribus glomeratis. Pers. syn. 1 p. 521. Hartm. fl. scand. p. 182. Horn. fl. oec. 1 p. 516.

C viscosum Whlbg fl. ups. n. 297.

C viscosum β Lin. fl. svec. n. 414.

C vulgatum Smith fl. brit. 2 p. 496.

Myosotis n. 3. Vaill. paris: p. 142 t. 30 f. 3.

Hab. in cultis Saltdalen Nordlandiae passim copiose.

A Cerastio vulgato, cui proxime affinis, differt: hirsutie glandulosa et multo longiore, foliis latioribus, acuminatis (in utraqve hirsutis, nec ut vult Cl. Wahlenberg in fl. carp. p. 138, glabris) C. viscosum foliis duplo minoribus ovatis, pube brevi glutinoso, foliis calycinis obtusiusculis margine scarioso albo lato abunde distinctum est. Modo folia calycina hujus interiora margine tenui albo ornata sunt. Corolla sepiissime nulla adest; præseps folia calycina non excedit. Capsula curvata calyce duplo longior. Flores solitarii in dichotomia caulis, terminales pedunculis brevibus glomerati. Folia suprema infimis duplo latiora sunt.

- 247 CERASTIUM *vulgatum* Lin. fl. svec. n. 415. mant. p. 390. Whlbg fl. ups. n. 296.  
C. viscosum Whlbg fl. lap. n. 247. (excluso syn. Lin. fl. svec. n. 414) ubi vide.

## CLASSIS XII.

## DODECANDRIA.

### EUPHORBIA.

Gen. pl. ed. Schreb. p. 832.

- 1116 EUPHORBIA *helioscopia*: foliis cuneiformibus serratis, umbella quinquefida trifida: dicho-

toma, capsulis utrinque lœvibus, petalis subrotundis.

E. helioscopia Lin. fl. svec. n. 425. fl. lap. 220. sp. pl. ed. Willd. 2 p. 914. Fl. dan. t. 725. Whlbg fl. ups. n. 310. fl. carp. n. 462.

Hab. in agris Bodœ Nordlandiæ cum cerealibus allata copiose.

## CLASSIS XII.

### ICOSANDRIA.

257 ROSA villosa Whlbg fl. lap. n. 257, ubi vide.

Sterilis hisce regionibus sæpissime observatur, non quia a climate infusto depressa rarius flores gignere valet, sed quia, si non inter rupes occulta latet, a capris qvotannis ad radicem fere devoratur. Fructus subglobosi et pedunculi pilis glandulosis rarior obsiti, sed petala emarginata et Iaciniæ calycinæ simplices in nervibus glanduloso-pilosæ.

260 RUBUS arcticus Whlbg fl. lap. n. 260, ubi vide.

Usqve ad Ibbestad Nordlandiæ senjensis, ubi legit Cl. Rathke, descendit.

1117<sup>253</sup><sub>28</sub> POTENTILLA argentea: foliis quinatis lanceolato-cuneiformibus incisis subtus niveis, caule erectiusculo, Whlbg fl. ups. n. 336 Lin. fl. sv. n. 454 sp. pl. ed. Willd. 2 p. 1101. Fl. dan. t. 865. Gun. norv. n. 144.

Hab. in montibus sylvaticis Lapponiæ pitensis rarissime. Ad Ischijach Arjeplog legit Stud. Lestadius.

Obs POTENTILLA Gunneri Hartm. fl. scand. p. 201. Horn. fl. oec. 1 p. 576 Potentilla nivea Gun. norv. n. 512 t. 3 f. 1 post Gunneri tempora nunquam inventa est. Specimen vero, typum iconis in herbario Ill Gunneri, quod Ni-

drosiae asservatur, vidi, et iconem habitum plantae bene reddentem inveni. Nec specimina nec icones, ut confererentur, aderant; me vero iudice nil est nisi *Fragaria sterilis*, a qua etiam icon nullo differt charactere, si caulem simplicem excipias. Tota planta hirsuta; folia radicalia 3 ternata foliolis obovatis serratis, pagina superiore quam inferiore hirsutiore pilis sat longis. Caulis basi squamosus suberectus uno modo folio flori approximato fulcratus. Petala alba ova-ta longitudine calycis. Radix fibrosa. Sinus Varanger tam multas alias plantas illae regioni alienas alit e. gr. *Thymus serpyllum*, *Cineraria campestris*, *Adoxa moschatellina* etc. ut forsitan haec etiam illuc aberraverit.

## CLASSIS XIII

## POLYANDRIA.

272, 273 NYMPHÆA *alba* et *lutea* Whlbg fl.  
lap. n. 272, 273.

Hab. quoque in lacubus versus regionem subalpinam Nordlandiae meridionalis ex. gr. Lomsvandet in Brennemarken et Övesgaardmarken Saltdalen.

**1118<sup>276</sup>** ANEMONE *ranunculoides*: caule subbifloro, involuci foliolis subpetiolatis ternis ternatis incisis dentatisque, petalis 5 luteis.

A: *ranunculoides* Lin. fl. svec. n. 486. sp. pl. ed. Willd. 2 p. 4282. Whlbg fl. carp. n. 542. Fl. dan. t. 140. Gun. norv. 1117. Pal. iter sib. 1 p.

Hab in Alnetis humidiusculis Nordlandiae meridionalis e. gr. Saltdalen passim.

Foliis petalis cauleque angustioribus a vulgari planta differt. Flores rarius bini.

280 RANUNCULUS *Flammula*: Whlbg fl. lap. n. 280.

Hab. quoque in Finnmarkia orientali, ubi legit rev.  
*Deinboll.*

$\beta.$  foliis inferioribus longe petiolatis ovalibus,  
superioribus sessilibus linearibus.

R. *Flammula*  $\delta.$  *Arenaria DC. syst.* 1 p. 247.

Hab. in stagnis turfosis Nordlandiae meridionalis e. gr.  
ad Bertnæs Bodöe.

Folia inferiora rigidiora natantia petiolis 5 poll.  
longis gaudent. Caulis ad geniculos inferiores  
creberime radicat.

287 RANUNCULUS *hyperboreus*: *Whlbg fl. lap.*  
n. 287, ubi vide.

Hab. in locis limosis uidis Nordlandiae saltensis e. gr.  
in Fiskevaagmoen Saltdalen copiose.

Præter Cl. *Rouiböllum* in Act: hafn, nemo  
memorabilem anomaliam hujus Ranunculi tria mo-  
do petala gerentis observavit. R: *scelerato* no-  
strorum proxima affinitate conjunctus est.

288 RANUNCULUS *reptans*: *Whlbg fl. lap.* n.  
r. 288, ubi vide.

Hab. quoque per Nordlandiam in inundatis uidisque  
arenosis inferalpinorum et subalpinorum fre-  
quenter.

1119 ~~221~~ RANUNCULUS *pantothrix* feliis omnibus  
cappillaceo-mutifidis, petalis obovatis calyce  
majoribus, seminibus subglabris.

R. *pantothrix*  $\beta$  cæspitosus *DC syst.* 1 p. 236.  
*Horn. fl. oec.* 1 p. 623.

R. *aquatilis*  $\alpha$  *Lin. fl. svec.* n. 509.

R. *fluvialis* *Whlbg. veg. helv.* n. 597.

Hab. in lacubus et amnibus Saltdalen Nordlandiae pas-  
sim copiose.

Etsi sepe in inundatis, dein exsiccatis locis  
repetitur, nunquam folia alia quam capillacea ob-  
veniunt. Flores etiam multo minores quam in  
R. *aquatili*. Semina vero juniera vere subhis-  
pida, sed matura glabrescunt. Dimidia petoli  
pars membrana vaginante auriculata. Totius folii  
longitudo pollicem non aqvat. Pedunculi subter-  
minales folia duplo fere longiores.

## CLASSIS XIV.

## DIDYNAMIA.

1120 <sup>225</sup> AJUGA *pyramidalis*: tetragono-pyramidalis villosa, foliis radicalibus caulinis excedentibus. Whlbg fl. ups. n. 372. fl. carp. n. 567. Lin. fl. svec. n. 512. sp. pl. ed. Willd. 3 p. 8. Fl. dan. t. 185. Gun. norv. 343.

Hab. in graminosis humidis inferalpinorum Nordlandiae saltensis, e. gr. Saltdalen, Bodoe, Ofoten. Flores albo cæruleoqve variegati.

308 PEDICULARIS *Sceptrum Carolinum* Whlbg fl. lap. n. 308, ubi vide.

Hab. in alpinis et subalpinis, qvin etiam rarissime in inferalpinis salicetis humidis Saltdalen Nordlandiae copiose; sed alpes maritimos fugit.

311 PEDICULARIS *hirsuta* Whlbg fl. lap. 311.

Hab. in cacuminibus summarum alpium Nordlandiae saltensis, e. gr. Soelvaagtinden.

## CLASSIS XV.

## TETRADYNAMIA.

317 DRABA *Wahlenbergii* Hartm. fl. scand. p. 249.

D. *androsacea* Whlbg fl. lap. n. 317 (excl. synon.) ubi vide.

D. *lapponica* DC. syst 2 p. 344.

319 DRABA *hirta* Whlbg fl. lap. n 319 (excl. syn. Iacq.) ubi vide.

1121 <sup>322</sup> ISATIS *tinctoria*: siliculis cuneatis basi acuminatis apice subspatulatis obtusissimis glabris latitudine majore triplo longioribus. DC. syst. 2 p. 569. Lin. fl. svec. n. 614. Sp. pl. ed. Willd. 3 p. 421. Smith. fl. brit. 2 p. 693. Svensk Bot. t. 35.

Hab. in littoribus scopulorum Nordlandiæ meridionalis rarissime. In Grönholmen extra sinum saltem sem plantam hanc inopinata offendit.

Caulis procerus fere bipedalis. Folia radicalia crenata, caulinis amplexicaulia integerrima.

**323 CAKILE maritima Whlbg fl. lap. n. 323.**

Hab. in littoribus maris ad Bodoe Nordlandiæ copiose.

**331 ERYSIMUM Barbaræa Whlbg fl. lap. n. 331, ubi vide.**

Hab. ad flumina inferalpinorum Saltdalen Nordlandiæ e. gr. Saxenvigely rarissime.

**333 ERYSIMUM hieracifolium:** foliis lanceolatis serratis stellato-pubescentibus, superioribus sessilibus acutis, inferioribus basi attenuatis obtusiusculis, petalis calyce majoribus obovato-oblongis, stigmate emarginato.

*E. hieracifolium Lin. fl. svec. n. 620. sp. pl. ed. Willd. 3 p. 511. Whlbg fl. ups. n. 433. Fl. dan. t. 229. Gun. fl. norv. n. 513.*

*E. virgatum DC. syst. 2 p. 496.*

*Cheiranthus alpinus Whlbg fl. lap. n. 333 t. 12 f. 1.*

Hab. in locis siccis calidioribus tum alpinis Nordlandiæ et Lapponiæ Iulensis, tum in primis in inferalpinis Nordlandiæ ac totius Norvegiæ freqventer.

Caulis strictus simplex, superne modo ramis nonnullis floriferis ornatus, nervulis elevatis striatus, pilis simplicibus raris adpressis subpubescens. Folia utrinque stellato-pubescentia, tenuiter remoteque serrata, inferiora subintegerrima (nec ut de suo *E. hieracifolio* dicit Ill *D'Candolle*: dentibus lobulivis grosse serrata, summa subintegra) subcaduca. Flores inodori subeorymboси, dein longe racemosi. Pedunculi longitudine calycis, 3 lin. Petalorum limbus obovato-oblongus calycem longitudine vix æquat. Siliquæ erectæ tetragonæ stellato-pubescentes 1—2 unc. longæ, stylo latitudinem siliqvarum æquante stigmateque tumido emarginato terminatae.

**1122 TURRITIS glabra:** foliis radicalibus densatis hispidis, caulinis amplexicanibus integerri-

mis glabris. *Lin. fl. svec.* n. 606. *sp. pl. ed. Willd.* 3 p. 542. *DC. syst.* 2 p. 211. *Whlbg carp.* n. 677. *fl. ups.* n. 436. *Fl. dan.* n. 809.

Hab. in graminosis lateribus montium meridiei obversis Nordlandiae meridionalis inferalpinæ rarissime. A me semel in Saltdalen ad Fiskevæg loca est. Solito gracilior alias similis. Prima folia caulinæ opposita hispidaque.

## CLASSIS XVII.

## DIADELPHIA.

338 **FUMARIA officinalis**: capsulis subglobosis retusis, racemis multifloris, foliis supradecompositis rectis, foliolis cuneiformibus obtusatis, caule diffuso.

*F. officinalis Lin. fl. svec.* n. 630. *sp. pl. ed. Willd.* 3 p. 868. *Smith. brit.* 2 p. 750. *Whlbg lap.* n. 338. *fl. ups.* n. 452. *carp.* n. 699. *Fl. dan.* n. 940. *Gün. norv.* n. 161.

Hab. in agris Nordlandiae passim frequenter e. gr. Saltdalen.

340 **ANTHYLLIS vulneraria Whlbg fl. lap.** n. 340 ubi vide.

Hab. quoque in collibus Nordlandiae saltensis passim frequenter. In Bodœ floribus albidis variantem legi.

1123<sup>344</sup>/<sub>345</sub> **VICIA sepium**: pedunculis paucifloris brevissimis, leguminibus erectiusculis, foliolis ovatis obtusis, exterioribus minoribus.

*V. sepium Lin. fl. svec.* n. 651. *sp. pl. ed. Willd.* 3 p. 1109. *Smith. brit.* 2 p. 773. *Whlbg fl. ups.* n. 465. *carp.* n. 720. *Fl. dan.* 699. *Gün. norv.* n. 588.

Hab. in lateribus montium inferalpinorum sylvaticis Saltdalen Nordlandiae.

Stipulae tridentatae, dentibus subsetaceis. Flores pauciores quam in planta vulgari.

- 348 **PHACA lapponica** Hartm. fl. scand. p. 277.  
*Phoca montana* Whlbg fl. lap. n. 348 (excl. omnibus synon) ubi vide.
- 351 **ASTRAGALUS oroboides** Horn. fl. dan. t. 1396. fl. oec 1 p. 776, Whlbg fl. carp. n. 739. A. leontinus Whlbg fl. lap. n. 351 (excl. synon Iacq. et Willd.) ubi vide.  
 Hab. quoque in montibus subinferalpinis Nordlandiæ.  
 A me copiose in Fiskevaagfjeldet Saltdalen lectus

## CLASSIS XIX.

## SYNGENESIA.

- ~~1124~~<sup>356</sup> **SONCHUS arvensis**: pedunculis calycibusque glanduloso-hispidis subumbellatis, foliis runcinatis dentatis basi cordatis.  
*S. arvensis* Lin. fl. svec. n. 687. sp. pl. ed Willd. 3 p. 1512. Gnn. norv. n. 135. Whlbg fl. carp. n. 778. ups. n. 489. Smith brit. p. 817. Fl. dan. t. 606.  
 Hab. in littoribus circa sinum saltensem loeis pluribus frequenter.
- 358 **SONCHUS sibiricus** Whlbg fl. lap. n. 358, ubi vide.  
 Hab. quoque ad flumen Tana Finmarkiæ orientalis, ubi legit-rev Deinboll.
- 359 **LEONTODON Taraxacum** Whlbg fl. lap. n. 459.  
 $\beta$  *tenue*: pedunculo tenuiore, squamis calycinis erectissimis paucioribus, foliis sinuato-dentatis.  
*L. Taraxacum*  $\beta$  *tenue* Whlbg. fl. ups. p. 257.  
*L. Taraxacum*  $\beta$  *lividum* Whlbg fl. carp. p. 238.  
*L. palustre* Smith brit. 2 p. 823. Horn. fl. oec. p. 813. Hartm. fl. scand. p. 302.  
*L. lividum* sp. pl. ed Willd. 3 p. 1545.

Hab. in humidis paludosisq;e inferalpinorum imprimis vero subalpinorum Nordlandiae saltensis frequenter.

Qui ambas varietates crescentes saepe viderit, vix dubitat, quin ejusdem speciei formæ a loco ortæ sint. Calyceum etiam reflexum et subreflexum in stirpe de cetero *L. palustri* simillima observavi.

**1125<sup>3/4</sup>** *HIERACIUM dubium*: foliis lanceolatis integerrimis cauleque unifolio multifloro hispidis, floribus corymboso-panicalatis

*H. dubium Lin. fl. sv. n. 698. sp. pl. p. 1125.  
Hartm. fl. scand. p. 299. Fl. dan. t. 1044.  
Whlbg fl. ups. n. 496.*

*H. Auricula Sp. pl. ed. Willd 3 p. 1566. Whlbg  
fl. carp. n. 787. fl. lap. n. 363 (sec. flor carp.)*

$\beta$  *strigosum*: foliis oblongo-lanceolatis subpetiolatis utrinque pilis fulvescentibus pube tenui stellata immixta strigosis, floribus corymbosis.

*H. dubium  $\beta$  strigosum Hartm. fl. scand. p. 299.*

*H. cymosum Lin. sp. pl. p. 1126?*

*H. echooides Sp. pl. ed. Willd. 3 p. 1587?*

Hab. in collibus lateribusq;e siccis montium inferal, pinorum Nordlandiae e. gr. Saltdalen passim copiose;  $\beta$  in terræ rupium inferalpinarum Saltdalen rarus.

Pila basi tumidae flavescenti demum nigrae insidentia 1—2 lin longa, divergentia in foliis var  $\alpha$  lanceolatis basi attenuatis alba ad marginem et nervum crebra, in pagina superiore rarissima. Folia vero plantæ sterilis, in eunte anno primum florentis, oblongo-lanceolata utrinque, imprimisq;e in pagina superiore, pilis bilinearibus fulvescentibus adpressis obsita. Folia hujus sterilis plantæ transitum formæ  $\alpha$  in  $\beta$  demonstrant, nam hæc folia iis in var  $\beta$  similia, si exceperis, quod illa basi longius attenuata subpetiolata et pubeminta stellata alba inter pila strigosa ornata sint. Caulis pedalis; in  $\beta$  crassior 2—3 foliis et eadem mixta pubescens obsitus est. Pubes illa stellata apud var.  $\alpha$  sub spicem modo caulis est

in pedunculis parcissime observatur, dum in var  
ſe pedunculi ex illa albescunt. Calyces et pe  
dunculi utrorumque simul glanduloso-pilosi.  
In descriptione Linnæi l. c. nil invenio, qvod im  
pediat, qvo minus' *H. cymosum* hujus loci sit,  
imprimis cum dicat, eum ab *H. Auricula* differre:  
foliis non supra glabris; Synon. *Lin fl. lap. n.*  
*282* ob cynonemiam forte ad *H. auriculam* in  
cæteris patriæ plagis vulgatissimam, in Nordlan  
dia vero nunquam visam, pertinet. Synon. vero  
*Whlbg fl. lap. n. 363* et secundum syn. fl. dan.  
ibi et Willdenowii in fl. carp. n. 687 citatum ad  
hunc pertinet; cum vero postea suam sententiam  
(cfr. *fl. ups. n. 495*) ipse mutaverit, dubium  
utique permanet.

**1126** *HIERACIUM prenanthoides*: caule sim  
plici folioso hirsuto, foliis ovato-oblongis acu  
minatis dentatis ciliatis amplexicaulibus, subtus  
glaucescentibus. corynbo paucifloro, calycibus  
glanduloso-pilosis.

*H. prenanthoides* Smith brit. 2 p. 835. Hartm.  
fl. scand. p. 300. Horn. fl oec. 1 p. 822. Whlbg.  
fl. carp. n. 799.

*H. Spicatum* All. fl. ped. t. 27 f. 1. 3. (ex Horn.)

Hab. in graminosis sicciusculis ad sinum saltensem  
passimi.

Caule multifolio, foliis oblongis subtus glauces  
centibus, denticulis raris, basi cordatis, caly  
ceo-que nigroviridi glanduloso-hispido a cæteris  
indigenis mox distinguitur. Flores 2—5 lon  
ge pedunculati flavi. Pubescentia caulis parca,  
peduncularum stellata confertior. Altitudinem  
sesquipedalem attingit.

**371** *SERRATULA arvensis* Whlbg fl. lap. n.  
871.

Hab. in agris submaritimis ad sinum saltensem e. gr.  
Skjerstad rarius.

**381** *GNAPHALIUM supinum* Whlbg fl. lap.  
n. 381, ubi vide.

*β fuscum*: caule altiori, floribus pluribus rotun  
dioribus subpedunculatis.

*Gn. fuscum* Scop. carn. Sp. pl. ed. Willd. 3 p. 1889. Hartm. fl. scand. p. 316. Fl. dan. t. 332 mala.

Hoc nil nisi varietatem proceriorem *Gn. supini* esse cum *Cl. Wahlenbergio* certissime persuasum habeo. Majus in alpibus nordlandicis rarius occurit, sed in speciminiis maximis flores infimos flore longius pedunculatos cæterosque sessiles saepe vidi. In *Gn. fuscum* vero ex alpibus Dovre ex eadem radice caulem 5 pollicarem floribus pedunculatis et 3 pollicarem floribus omnino sessilibus observavi. Nec ullis aliis notis quam supra allatis a *Gn. supino* distingvi potest. Ut planta procerior lanam parciorem interdum gerit seu gerere videtur.

1127<sup>381</sup>/<sub>332</sub> GNAPHALIUM *carpathicum*: caulis erectis, foliis radicalibus lanceolatis trinervibus, floribus cymosis dioicis; squamis calycinis fusco-reticulatis obtusis planis.

*Gn. carpathicum* Whlb. fl. carp. n. 843 t. 3. Læstadius in Act. holm. 1822 p. 336.

*Gn. alpinum* Sp. pl. ed. Willd. 3 p. 1883 (exc. syn. et descrip. Linnæi.)

Hab. in locis subocultis humidis alpium Lapponiae Iulensis e. gr. Kappavare, Kjergevare, ubi his legit Stud. Læstadius.

Cyma pauciflora. Squamæ calycinæ scariosæ basi lanatae apice tenuissime erosæ obtusinsculæ. Folia et caulis foliosus lanata. Ab affini *Gn. alpino* statim dignoscitur: foliis radicalibus lanceolatis et floribus brevissime pedunculatis. Ab affini *Gn. leontopodio* floribus dioicis ebracteatis, foliis nervosis etc. diversum est.

386 ERIGERON *uniflorum* Whlb. fl. lap. n. 336 ubi vide.

Hab. quoque in alpibus Nordlandiae e. gr. Saltdalen copiose.

389 SENECIO *vulgaris* Whlb. fl. lap. n. 389 ubi vide.

Hab. in cultis Nordlandiae sine dubio cum cerealiis allatus.

## CINERARIA.

Gn. pl. ed. Schreb. n. 1294.

**1128** *CINERARIA campestris*: floribus umbellatis, foliis radicalibus ovatis crenulatis, caulinis lanceolatis integrermis cauleque simplici lanatis.

*C. campestris* Retz prd. scand. 2. n. 1027 Sp. pl. ed. Willd 3 p. 2081. Hartm. fl. scand. p. 313. Horn. fl. oec. 1 p. 863. Fl. dan. t. 1177.

*C. alpina* γ integrifolia Lin. sp. pl. 2 p. 1248.

*C. integrifolia* Smith. fl. brit. 2 p. 895.

*Senecio* Hall. helv. n. 68.

*Solidago* Gmel. sib. 2 p. 154. t. 71 f. a.

Hab. rarissime in Finmarkia orientali, ubi circum Bomenieid legit Rev. Deinboll.

Umbella pauciflora, pedunculis bracteatis. Semina sericeo-villosa.

**391** *ARNICA alpina*: caule uniflora, foliis caulinis binis oppositis, radicalibus trinervibus denticulatis, lanceolatis.

*Doronicum* foliis lanceolatis Lin. fl. lap. n. 305.

*A. alpina* Hartm. fl. scand. p. 313.

Horn. fl. oec. 1 p. 867. Læstadius in Act. holm. 1822 p. 337.

*A. montana* β Lin. fl. svec. p. 295 Wahlbg. fl. lap. n. 391.

Hab. in alpibus Lapponiae Iulensis rarissime. Semel legit Stud. Læstadius.

Caulis sub flore lanatus. Folia subglabra. Calycinæ squamæ pilosæ.

**1129** *VIOLA mirabilis*: foliis reniformi-cordatis acutiusculis, stipulis integrermis ciliatis, floribus radicalibus sterilibus petaloideis; caulinis apetalis fructiferis.

*V. mirabilis* Lin. fl. svec. 789. sp. pl. ed. Willd. 1 p. 1167. Wahlbg. fl. ups. n. 546. carp. n. 913. Fl. dan. t. 1045.

Hab. in lucis ad latera montium inferalpinorum Salt-dalen Nordlandiæ passim freqventer e. gr. supra Fiskevaag.

Nil differt a planta, qve in australiori Norvegia obvenit. Meuse Maji jani floret. Odor idem gratus ac in *V. odorata* his in regionibus fere gravior, qvam qvalem alibi sensi. Petala sublactea, venis violaceis. Semel florem radicalem fructiferum reperi. Caulis triqveter.

*V. uliginosa* Schrad. — Hartm. fl. scand, p. 108 Nordlandiæ sane incola, e. gr. in palude ad Fiskevaag Saltdalen crescens, cum vero nec descripti, nec specimen servavi, dubiam afferre nolui.

399 **VIOLA montana** Whlb. fl. lap. n. 399. ubi vide.

Hab. in graminosis siccis lateribus montium inferalpinorum Saltdalen Nordlandiæ, ubi ut diversa a *V. canina* semper mihi sese obtulit.

400 **VIOLA tricolor** Whlb. fl. lap. n. 400.

Hab. in Nordlandia saltensi, imprimis ad littore passim.

## CLASSIS XX

### GYNANDRIA.

401 **Orchis bifolia** Whlb. fl. lap. n. 401.

Hab. in lateribus sylvaticis meridiei expositis maxium inferalpinorum Nordlandiæ saltensis parcus.

402 **Orchis latifolia** Whlb. fl. lap. n. 402.

Hab. quoqoe in udis pratis Nordlandiæ meridionalis rarius e. gr. Skjerstad.

409 **NEOTTIA repens** Whlb. fl. lap. n. 409, ubi vide.

Obs. Radix in terram non penetrat, sed inter Hypna humiditate inter ea retenta vigens latet.

1430<sup>111</sup> **EPIPACTIS latifolia**: foliis ovatis, floribus pendulis, labello spice integro acutiusculo petalis breviori.

E. latifolia Sp. pl. ed. Willd. 4 p. 85.

Serapias latifolia Lin. syst. veg. p. 678.

## GYNANDRIA.

*Serapias Helleborine*  $\alpha$  *Lin. fl. svec.* n. 819.  
*Sp. pl. p. 1344.*

$\alpha$  *atropurpurea*: foliis subovatis, germinibus pubescentibus, floribus atropurpureis.

*S. latifolia*  $\beta$  *Smith brit. 3 p. 943. Hartm. scand.*  
p. 333.

*S. latifolia Whlbg. fl. ups. n. 557. carp. n. 936.*  
*Gun. norv. n. 970 t. 5 f. 3. bona. Fl. dan.*  
t. 811.

$\beta$  *pallida*: foliis late-ovatis, infimis suborbiculatis, germinibus subglabris, floribus carneis.

*S. latifolia*  $\alpha$  *Smith brit. p. 943. Hartm. scand.*  
p. 332.

**Hab.** in lateribus montium calcareorum calidioribus Saltdalen Nordlandiae rarius. e. gr. supra Fiskevaag copiose.

Si pubescentiam germinum gradatim evanescentem non vidi sem, distinctas species judicaverim. Una crescent, ergo non varietates a loco ortae sunt.

**1131 $\frac{1}{4}$**  *EPIPACTIS ovata*: caule bifolio, foliis ovalibus oppositis, labello bisido linearis petalis obtusis triplo longiore. *Sp. pl. ed. Willd. 4 p. 87.*  
*Whlbg. fl. carp. n. 934.*

*Ophrys ovata Lin. fl. sv. n. 808. Horn. fl. oec.*  
**1** p. 893. *Fl. dan. t. 137. Gun. norv. n. 127.*

*Neottia ovata, Hartm. fl. scand. p. 331.*

**Hab.** in collibus fruticosis Bedoe Nordlandiae rarius.

## CYPRIPEDIUM.

Swartz in *Act. holm. 1800 p. 50.*

**1132 $\frac{1}{4}$**  *CYPRIPEDIUM Calceolus*: lobo galeo elliptico obtuso, labello petalis breviore compressiusculo, foliis attenuato-ovatis.

*C. Calceolus Lin. fl. svec. n. 820. lap. n. 318.*  
*Sp. pl. ed. Willd. 4 p. 142. Whlbg. fl. ups. n. 560. carp. n. 939. Hall. helv. n. 1300. Gun.*  
*norv. n. 1113. Fl. dan. t. 999. Pall. it. sib.*

Hab. in lateribus calidioribus montium inferalpinorum Saltdalen Nordlandiæ rarius e. gr. in Fiskevaaglien copiose. "In Lapponia tornensi rarius." Linné.

Floret speciosa hæc planta jam medio mensis Junii sæpe duobus floribus ex uno folio fulerante. Petala lateralia angustiora spiraliter torta, basi ciliis longis albis.

## CLASSIS XXI.

### MONOECIA.

**415 CHARA flexilis Whlbg. fl. lap. n. 415, ubi vide.**

Hab. quoque in fundis lacuum et stagnorum Nordlandiæ saltensis passim. e. gr. Övervandet, Grönholmen.

**1133<sup>4</sup><sub>1</sub><sup>5</sup> CHARA hispida:** caulis fragilibus, papillis reflexis hispidis, ramis suboctonis, bracteis inæqualibus fructu longioribus.

Ch. hispida Lin. svec. n. 1131. lap. 469? sp. pl. ed. Willd. 4 p. 185. Hartm. fl. scand p. 376.

$\beta$  microphylla: caule tenui 3 pollicari erecto ramosissimo fragilissimo, verticillis approximatis fructibus copiosis, bracteis fructum æqvantibus

Ch. hispida  $\beta$  microphylla Schum. fl. sæll. 1 p. 260.

Ch. hispida  $\gamma$  tenuis? Hartm. l. c.

Hab. in lacūhus turfosis Saltdalen Nordlandiæ passim copiose e. gr. Fiskevaagvandet, Brennelomsvandet.  $\beta$  in Lillevandet Midbyemarken,

Var.  $\alpha$  torta 1 lin. fere crassa perlonga, verticillis interstitiis bipollicaribus remotis, pallide viridis crusta calcarea tenuiore induta. Inferior caulis pars sæpe sublavata, sep. papillæ reflexæ in superiore crebræ.

Var.  $\beta$  habitum præbet omnino alienum: caule tenui brevi erecto, ramis approximatis, crusta crassiori albo, sed ut species vix distingvi potest. In aqua minus profunda crescit,

## KOBRESIA.

*Sp. pl. ed. Willden. 4 p. 205:*

**23** KOBRESIA *scirpina*: spica solitaria simpliciteri, foliis filiformibus. *Scirpus Bellardi Whlbg.* *fl. lap. n. 23*, ubi vide,

Hab. quoque in collibus apricis submaritimis Bodöe copi se et varius in summis alpibus Saltdalen Nordlandiae.

**4134** KOBRESIA *caricina*: spica oblonga composita, spiculis multifloris, foliis angustissimis conduplicatis.

*K. caricina Sp. pl. ed. Willd. 4 p. 206. Hartm. fl. scand. p. 27. Horn. fl. oec. 1 p. 917. Svensk Bot. 527. f. 2.*

*Carex hybrida Schk. caric. t. Rr. f. 161.* (sec. Willd.)

Hab. ad Berlevaag in Finmarkia orientali, Rev. Deinboll.

Gramen rigidum 2-5 poll. altum. A *K. scirpina* spicis 3-5 multifloris et foliis explanatis lineam latis statim dignoscitur. Folia culmum florentem stepe excedunt. Squamae late-ovatae subacuminatae pallide-fuscæ nervo virescente. Bractea ovata membranacea interdum in cuspide viridem ciliatum abiit. Germen squamâ a latere interiorc laxè involutum est.

**418** CAREX *dioica* Whlbg. *fl. lap. n. 418* ubi vide.

$\beta$  flore unico femineo ad basin spicæ masculinæ.

Hab. in palude subalpino ad Lomsvatne in Brennemarcken Saltdalen Nordlandiae.

Nec semen nec folia ullo modo a vulgari stirpe  
discrepant, attamen memorabilis, qvia modo uno  
loco et ibi per plures annos (alias spicas femi-  
neas vero nullas) eam obseravyi.

**1135** *CAREX parallela*: spica simplici dioica,  
stigmatibus binis, fructibus ovato-lanceolatis gib-  
bis superne lævibus demum patentibus, foliis an-  
gustissimis canaliculatis.

*C. dioica*  $\beta$  *parallela*: *Læstadius* in *Act. holm.*  
1822 p. 338.

Hab. una cum *C. dioica* in locis madefactis alpium  
Lapponiæ lulensis, et Nordlandiæ saltensis copiose.  
Stud. *Læstadius*.

Satis me judice differt a *C. dioica*: spica  
feminea linearis subsparsiflora (non oblonga densi-  
flora) fructibus ejusdem qvidem formæ, sed lon-  
gioribus, non superne serrulatis nec divaricatis,  
vix patentibus, foliisque canaliculatis, subcondu-  
plicatis (non teretibus filiformibus) Culmus semi-  
pedalis lævis, profundius striatus quam in *C.*  
*dioica*. Radix stolonifera subcæspitosa. Culmi  
*C. dioicae* semper magis dispersi,

**420** *CAREX leucoglochin* *Whlbg. fl. lap.* n. 420  
ubi vide,

Hab. in paludibus inferalpinis et subalpinis ad sinum  
saltensem Nordlandiæ frequentissime.

**1136** *CAREX pulicaris*: spica simplici andro-  
gyna superne mascula, stigmatibus binis, fructi-  
bus oblongis teretiusculis utrinque attenuatis gla-  
bris reflexis.

*C. pulicaris* *Sp. pl. ed. Willd.* 4 p. 213. *Leers*  
*fl. herb.* n. 705 t. 14 f. 1. *Smith. brit.* 3 p.  
965. *Whlbg. fl. ups.* n. 575.

*C. psyllophora* *Ehrh.* *Hartm. fl. scand.* p. 27.

Hab. in Finmarkia orientali, ubi legit Rev. *Dein-*  
*boll.*

**1137** *CAREX microstachya*: spica terminali  
androgyna linearis spiculis lateralibus foensineis  
confertis triplolongiore, fructibus ovatis acumi-  
natis squamam ovatam excedentibus, foliis angu-  
stissimis.

*C. microstachya* Ehrh. — *Whlbg. fl. upz* n. 584.  
*Sp. pl. ed. Willd.* 4 p. 250. *Hartm. fl. scand.*  
p. 31.

Hab. in Lapponia pitensi et luleensi rarius e. gr.  
ad Arjeplog; Tiaawotis. *Stud. Læstadius.*

Gramen gracile et strictum, flavescens. Folia  
vix dimidiata culmi longitudinem attingunt.  
Squamæ flavæ margine searioso albo. Fructus  
superne serrulati. Bractea aphylla.

**1138** *CAREX ornithopoda*: spicula mascula  
solitaria, spiculis foemineis incluse pedunculatis  
linearibus confertis paucifloris, bracteis vaginanti-  
bus aplivallis, stigmatibus tribus, fructibus obova-  
tis apiculatis triquetris pubescentibus squamam  
obovatam excedentibus.

*C. ornithopoda* *Sp. pl. ed. Willd.* 4 p. 255;  
*Whlbg. fl. carp.* n. 966. *Fl. dan.* t. 1405.

*C. digitata* *β Whlbg.* in *Act. holm.* 1803  
p. 158.

*C. pedata* *Schkuhr.*

Hab. in pratis siccis ad sinum saltensem Nordlandie  
rarissime. A me leeta ad Bodoe copiose.

*C. digitata* qvidem affinis, sed differt statura  
fere triplo minore, culmis saepissime incurvis,  
fructibus maturis squamas satis excedentibus,  
pedunculisque omnino inclusis, adeo ut sessiles  
apparent spiculæ feminæ bina ternæve mascula  
longiores, 4—6 floræ.

**444** *CAREX pedata* *Whlbg. fl. lap.* n. 444, ubi  
vide.

Hab. quoque in alpibus Boskarheienc Saltalen Nord-  
landie parcus.

**1139** *CAREX bicolor*: spicis androgynis sub-  
ternis inferne masculis pedunculatis erectis, stig-  
maibus binis, fructibus obovatis obtusis pubes-  
centibus squamas ovatas excedentibus.

*C. bicolor* *Allion* — — — *Schk. car.* t. Aaaa f.  
181 see. *Sp. pl. ed. Willd.* 4 p. 222. *Læsta-  
dius!* in *Act. Ac. holm.* 1822 p. 338.

Hab. in locis arenosis alpium Lapponiæ luleensis rarissime.  
Inter alpes Kjergevare et Tuoddaratsch  
iuxta lacum Poljaure legit *Stud. Læstadius.*

Planta digitalis glaucescens. Folia mollia apice  
scabriuscula. Bractea amplectens basi auriculata  
apice foliaceo serrulato. Squamæ brunneæ nervo  
viridi. Fructus albi tenuissime pubescentes.  
Ab omnibus nostris distinctissima.

- 456 CAREX *saxatilis* Whlbg. fl. lap. n. 456,  
ubi vide.

$\beta$  *monstrosa*: fructibus inflatis globosis.

C. *saxatilis*  $\beta$  inflata Hartm. fl. scand. p. 34.

C. *rigida* Whlbg. in Act. Ac. holm. 1803 p. 166.

Hab. in alpibus una cum vulgari planta.

Nunquam obvenit spica fructibus globois  
unice praedita, sed nonnulli tales aliis immixtis  
modo reperiuntur. Attamen sæpe tales spicas  
omnino steriles sunt. Monstrositas a larva tenui  
coccinea producta, nec varietas est, quare ut talis  
enumerari non merebat, nisi synonyma laudata  
suis locis assignarentur. An C. *rigida* Angl.  
vere a C. *saxatili* differt? Hujus culmus etiam  
superne scaber, infra medium latus.

## CLASSIS XXII.

### DIOECIA.

- 472 SALIX *herbacea* Whlbg. fl. lap. n. 472, ubi  
vide.

In Saltdalen Nordlandiæ ex alpibus omnino descendit,  
ad flumen Saltelven inter Saltnæs et Oös, et ad  
viam inter Flskevaag et Bognan, vix 600 passus  
a mari remota, et vix 20 pedes supra mare co-  
piose provenit.

- 473 SALIX *polaris* Whlbg. fl. lap. n. 473, ubi  
vide.

Hab. quoque in uliginosis alpium Nordlandiæ saltensis  
rarius. A me lecta in Storfjeldet supra Botn-  
vatne Saltdalen.

- 479 SALIX *myrtilloides* Whlbg. fl. lap. n. 479  
ubi videtur.

Hab. quoque in spongiosis Nordlandiæ subinferalpinæ rarius, e. gr. in Soelvigmarken paroeciæ Skjerstad.

**488** *SALIX livida* Whlbg. fl. lap. n. 488 (excl. syn. Ehrharti.) ubi vide.

**1140<sup>488</sup>** *SALIX sphacelata*: germinibus pedicellatis pubescentibus, stigmatibus subsessilibus bilobis, foliis ellipticis utrinque pubescentibus cinereis integerrimis.

*S. sphacelata* Smith fl. brit. p. 1066. Sp. pl. ed. Willd. 4 p. 702.

*S. livida* β cinerascens Whlbg. fl. lap. p. 273.

Hab. in subalpinis et inferalpinis Lapponiarum præcipue septentrionalium usque ad Utsjoki passim freqenter, unde etiam juxta flumina in partem sylvaticam descendit. Cl. Wahlenberg et Læstadius.

Statura diversa ex sede magis minusve alpina. Folia exstipulata non rugosa hanc a *S. aurita* statim distingunt. Supra demum subglabra. Amenta feminea subpollicaria foliolis subtribus bracteata. Capsulæ maturæ subglabræ. Hisce regionibus omnino exstipulata et esphacelata occurrit. Vix hujus loci est *Salix* Lin. fl. lap. 358.

**490** *HIPPOPHAE Rhamnoides* Whlbg. fl. lap. n. 490.

Hab. in Nordlandia saltensi passim, ex. gr. in latere montis supra Fiskevæg Saltdalen et ad littora Bodöe copiose.

**491** *MYRICA Gale* Whlbg. fl. lap. n. 491, ubi vide.

Hab. in Saltdalen Nordlandiæ parissime, semel a me lecta.

## STRATIOTES.

Gen. pl. ed. Schreber n. 1541.

**1141<sup>488</sup>** *STRATIOTES aloides*: foliis ensiformibus carinatis ciliato-aculeatis. Lin. fl. svec. n.

479. *Sp. pl. ed. Willd.* 4 p. 820. *Fl. dan.* t.  
337. *Gun. norv.* n. 653.

Hab. in fossis Nordlandiae rarissime. In paroecia  
Ofoten legit *Cl. Gunnerus.*

## CLASSIS XXIII.

### POLYGAMIA.

- ~~4142~~<sup>425</sup><sub>457</sub> ATRIPLEX *hastata*: cane erecto foliis  
triangulari - hastatis profunde dentatis concoloribus,  
calycibus fructus sinuato - dentatis dente in-  
termedio elongato *Lin. Sp. pl. ed. Willd.* 4 p.  
963. *fl. svec.* n. 921. *Horn. fl. oec.* 1 p. 289.  
*Hartm. fl. scand.* p. 113.

Hab. in littoribus exterioribus sinus saltensis passim  
copiose e. gr. in Grönholmen ad Bödöe.

Adeo luxuriat, ut cognitu difficilis evadat.  
Omnia folia triangulari - hastata, infima subinte-  
gerrima superiora crebre et grosse dentata, sub-  
tus squamis albis raris conspersa. Caulis ultra  
pedalem altitudinem assurgit et folia cum petiolo  
4 poll. longa 2½ lata gerit. Calyces maturos non  
examinavi. In littoribus Saltdalen Atriplex minor  
difusa obvenit, an vero hujus s. *A. patulae* forma  
certo dicere non audeo, cum specimina desint.

## CLASSIS XXIV.

### CRYPTOGAMIA.

#### ORDO I. FILICES.

510. ASPLENIUM *Trichomanes*: *Whlb.* *fl. lap.*  
n. 510.

Hab. in lateribus calidioribus montium interalpinorum  
saltaliensium Nordlandiae varius.

**1143<sup>5</sup><sub>5</sub><sup>16</sup>** *BOTRYCHIUM matricarioides*: scapo nudo, frondibus radicalibus tripartito-subpinnatis, foliolis oblongis obtusis dentatis. *Lin. sp. pl. ed. Willd.*, 4 p. 62.

*B. rutaceum Svensk bot. t. 372.*

*Osmunda Lunaria* ♂. *Lin. fl. svec. p. 370. Fl. dan. t. 18 fig. sup.* et intermedia; perbona. *Smith brit. 3 p. 1107.*

Hab. in graminosis siccis circa Fiskevaag Saltdalen Nordlandiae rarius.

A *B. Lunaria*, et ut videtur a *B. rutaceo Wild.* (a me non invento), adeo distinctum, ut cum illis nec conjungi nec confundi queat.

**528** *EQUISETUM reptans Whlbg. fl. lap. n. 528.* nbi vide.

Obs. Spica autumno jam parata, ineunte vere fleret.

## ORDO II. MUSCI.

**1144<sup>5</sup><sub>5</sub><sup>19</sup>** *SPHAGNUM squarrosum*: ramis elongatis attenuatis, foliis ovato-acuminatis, acuminibus squarroso-recurvis. *Web. et Mobb. crypt. p. 73. St. svec. t. 2 f. 1 a. b. Flor. dan. t. 1415. H. et T. musc. brit. p. 4 t. 4. Sp. latifolium β Whlbg. fl. ups. p. 391.*

Hab. in stagnis frigidis Saltdalen, e. gr. circa Fiskevaag, Nordlandiae.

Satis a *Sph. latifolio* diversum.

**1145<sup>5</sup><sub>5</sub><sup>21</sup>** *GYMNOSTOMUM Donnianum*: subacaulis, foliis a latiori basi linearis-subulatis strictis, sporangio turbinato, operculo rostrato.

*G. Donnianum H. et T. musc. brit. p. 13 t. 7.*

Hab. rarissimus hicce muscus in rupibus suboccultis calcareis circa Fiskevaag Saltdalen Nordlandiae freqventer. Certo etiam alibi, ob minutiem non observatum.

Caveas, ne pusillam stirpem cum Weissiae sp. confundas. *W. calcaream* eam esse primum credidi, a qua satis diversus: peristomio nullo et columella exserta. Folia rigida nervo lato modo ad basin parenchymate angusto ornata, obtusius-

cula. Sporangium flavescentia, demum pallidofuscescens. Totum 3 lin. altum.

**532 GYMNSTOMUM Heimii Whlbg. fl. lap.**  
n. 532, ubi vide.

Hab. sat vulgare in littoribus sinus saltensis exterioribus.

**542 SPLACHNUM sphæricum: Whlbg. l. c.**  
n. 542.

Hab. in subalpinis Nordlandiae meridionalis rarius.

**543 SPLACHNUM vasculosum Whlbg. l. c.**  
n. 543.

Hab. in paludosis et inundatis Nordlandiae inferalpinae e. gr. Saltdalen freqventer.

**544 SPLACHNUM urceolatum: Whlbg. l. c.**  
n. 544.

*y majus*: caule foliis setisqve longioribus.

Sp. mnioides  $\beta$  majus H. et T. musc. brit.  
p. 20 t. 9.

Sp. fastigiatum. Swartz svec. p. 24. Fl. dan.  
t. 1414.

Sp. brewerianum Hedv. stirp. t. 38.

Hab. cum var.  $\beta$  in pinetis Nordlandiae inferalpinae freqventer.

Præter staturam majorem et colorem pallidorem, qvi magnopere tamen et in hoc et in var.  $\beta$  variat, nullæ adsunt notæ, qvibus a Sp. mnioidi distingvi potest. Illi enim sanc propius, qvam illud Sp. urceolato, foliis ampullaceis acumine brevi capillaceo insigni, adstat.

**345 SPLACHNUM angustatum: Whlbg. l. c.**  
n. 345, ubi vide.

Hab. in truncis emortuis nec non firmo vetusto pinterorum saltdalensium Nordlandiae copiose.

**1146 SPLACHNUM Wormskjoldii: caule subramoso, foliis ampullaceis ovatis acuminatis integerimis, nervo evanescente, sporangio cupuliforme apophysi obconico- oblongo latiore, ore ampio.**  
Sp. Wormskjoldii Fl. dan. t. 1659. Hartm. fl. scand. p. 385.

Hab. in rupibus Finnmarkie orientalis, ubi ad Vadsöe invenit Rev. Deinboll.

## CRYPTOGAMIA.

*Stirps gracilis pollicaris. Flores steriles s. masculini in ramis ejusdem surculi. Foliorum acumen breve recurvum. Reticulum laxissimum. Nec in speciminibus Finmarkicis operculum vidi. Sp. *tenui* non parum affine est.*

547. ENCALYPTA *ciliata*: Whlbg. l. c. n. 547; ubi vide.

*β minor*: subacaulis, foliis muticis, seta brevissima.

Hab. in collibus arenosis Saltdalen Nordlandiae.

Calyptra dentibus regularibus ornata, ergo ad hanc speciem pertinet, etsi subacaulis, et tota planta 4—5 linearis. Folia quidem prorsus mutica, sed in hoc genere vix nota diagnostica sufficiens ad propriam speciem condendam, licet *E. ciliatae* var. *α* vulgo apiculatis foliis (contra Whlbergium. l. c.) gaudet. Capsula levis.

550. ENCALYPTA *rhaftocarpa*: caule subdiviso, foliis oblongis apiculatis, calyptra ore sublaci-nato, sporangio striato.

*E. rhaftocarpa* Schwægr. suppl. t. 16.

*E. streptocarpa* Whlbg. fl. lap. n. 550 (excl. char. et omnibus synonymis). Cfr Whlbg. fl. carp. p. 336.

*E. ciliata* γ H. et T. musc. brit. p. 36 t. 2.

Hab. in rupibus convallium inferalpinarum Nordlandiae meridionalis freqventer.

Etsi sporangia satis spiraliter striata inveni, tamen differt vera *E. streptocarpa* magnitudine et foliis semper muticis. Me judice *E. vulgaris* quam *E. ciliatae* affinior, nam nunquam dentes in calyptra, etsi attente et saepè vulgarem plantam observavi, mihi sese obtulerunt. Eodem modo ac *E. vulgaris* magnitudine valde variat. Dentes sporangii breviores quam in *E. ciliata*. Sporangium *E. ciliatae* semper levissimum; hujus vero sporangia matura semper striata, sulcis dia-phaniis inter strias elevatas rubras.

551. DIDYMODON *latifolium*: Whlbg. fl. lap. n. 551, ubi vide.

Hab. copiose una cum Gymn. Heimii et Bryo cæspiticio etiam in littore ad Bodœ Nordlandiæ. Æstivale est.

**554** **DIDYMODON rostratum:** Whlbg. l. c. n. 554, ubi vide.

**Didymodon flexicaule** Whlbg. fl. carp. n. 1087. Excludatur synonymon Web. et Mohr. cryp. germ.

**1147<sup>555</sup>** **DIDYMODON rigidulum:** foliis subpatentibus lato-lanceolatis acuminatis carinatis nervo rigido extra apicem excurrente, sporangio oblongo erecto, operculo rostrato.

D. rigidulum H. et T. musc. brit. p. 67 t. 20. (opt.) Hedw. stirp. 3 t. 4. W. et Mohr germ. p. 159. Whlbg. fl. carp. n. 1088.

Hab. in glareosis subudis Nordlandiæ meridionalis rarissime. A me semel in Saltdalen lectum.

Dignoscitur a *Tortula unguiculata*: rostro breviore; a *Weissia curvirostra*: rostro longiore; a *Tortula fallaci*: directione foliorum; harum enim habitu iudit. Satis eximum nervo rigido apiculo sat longe extra apicem folii excurrente, attamen folia apiculata vix dici possunt, quia versus apicem adeo sensim sensimque attenuata sunt, ut attenuatio folii cum nervo excurrente confluat, quod optime etiam in iconе expresse-runt Ch. Hooker et T. Margo foliorum reflexa. Operculi rostrum vix dimidiæ sporangii longitudinis. Sporangium oblongum subcylindricum.

**1148<sup>559</sup>** **TORTULA cuneifolia:** subacaulis, foliis late ovatis concavis nervo valido in apiculum excurrente, operculo breviter rostrato.

T. cuneifolia H. et T. musc. brit. p. 33 t. 12. Barbula cuneifolia W. et Mohr cryp. germ. p. 207.

Hab. in terra turfosa rupium Bodœ Nordlandiæ rarissime. Æstivale est.

Habitu minutam refert T. subulatam plantam hæcce pallescens. Folia crassa brevia apice modo magis modo minus attenuata, reticulo ad basin laxiore, in apice densiore. Seta 3 lin. flexuosa. Operculi rostrum obtusiusculum, tertiam sporangiæ oblongi partem longitudine ægvans. Periste-

mii dentes basi breviter connati, breves parum  
forti, ad connexionem partiti.

**1149** *BARBULA ungviculata*: caule diviso,  
foliis lanceolatis obtusiusculis apiculatis subpaten-  
tibus, margine subreflexis, operculo sporangii  
longitudine.

*B. ungviculata Hedw. stirp. t. 23. W. et Mohr.  
crys. germ. p. 208.*

*Tortula ungviculata H. et T. musc. brit. p. 33  
t. 42,*

*T. mucronulata Swartz svec. p. 40 Whlbg. fl.  
carp. n. 1092.*

Hab. ad sinum saltensem in rupibus calcareis et los-  
cis argillosis passim.

Variat surculo longiori et breviori, foliis mar-  
gine magis minusve revolutis, sed semper apicu-  
latis.

**562** *BARBULA convoluta*: *Whlbg. fl. lap. n.  
562*, ubi vide.

Hab. in collibus et terra calcarea rupium soli exposi-  
tarum Saltdalen Nordlandiæ frequentissime.

**563** *PTEROGONIUM filiforme*: *Whlbg. fl. lap.  
n. 563.*

Hab. in rupibus saxisque et in truncis Salicis Capreæ  
ubique circa sinum saltensem, imprimis in Salt-  
dalen Nordlandiæ.

Magnopere quoq; habitum variat hic muscus.  
In rupibus crassior, nigro-virens apicibus lutes-  
centibus, semper sterilis; in arboribus gracilior  
flavescenti-virens, haud raro fructifer. Nervus  
quoq; varius, mox fere nullus, mox bini, mox  
unus tenuis ad medium fere pertingens. Folia  
oblonga acuta et ovata acuminata, ut nullam  
notam constantem ad hoc a *Pt. gracili* disting-  
endum præter marginem reflexum, qui in hoc  
semper adest, invéniam.

**1150** *GRIMMIA maritima*: caule brevi pulvi-  
nato, foliis lanceolatis acuminatis substrictis, sie-  
cis crispati, perichaetialibus nervo excurrente,  
sporangio ovato sessili, operculo breviter rostrato.  
*H. et T. musc. brit. p. 37 t. 13.*

Gr. alpicola ♂, *Whlbg. fl. lap. p. 320.*

Hab. in maritimis Nordlandiæ passim.

**1151<sup>565</sup>** **GRIMMIA crinita:** caulis erectis strictis divisis, foliis erectis oblongis apice capillaceo diaphano, sporangio ovato immerso, operculo conico, dentibus pertusis apice subfissis.

Gr. *crinita* W. et Mohr *cryp. germ* p. 480 et 456;

Hab. in saxis elatis alpium Saltdalensium Nordlandiæ haud freqvens; ex. gr. Hestene Botnifjeldet:

Arcte cæspitosa; intense viridis, 3—4 lin; alta. Sureuli stricti divisi, et qvidem versus apicem subfasciculatè divisi; quam ob rem sporangium re vera terminale lateraliter insertum videtur. Folia nervo valido etiam apicem diaphanum in supremis reliquo folio sæpe longiore, in infimis breviorem percurrente; crassa; intense viridia; concava. Seta brevissima e basi crassa. Sporangium ovatum totum immersum, siccum longitudinaliter sulcatum, effoetum ore ampio. Operculum conicum f., brevissime rostellatum; rostello obtuso. Calyptra mitræformis, lævis. De synonymo mihi nullum est dubium, nam specimina germanica collata unice foliis majoribus dilatiusque coloratis, vegetiore habitationis loco ortis, differunt. In herbario Cl. Swartzii specimina scotica sterilia sub nomine: *Gr. leucophœa* Greville huic omnino similia vidi.

**1152<sup>565</sup>** **GRIMMIA alpestris:** caulis cæspitosis divisis, folijs erecto-patentibus oblongis apice capillaceo diaphano, seta brevi exserta recta, sporangio oblongo-ovato, operculo rostrato; rostro per brevi, dentibus integris;

Gr. *alpestris* Schleich. (sec; specim. a Cl. Hornschuch missis);

Trichostomum pulvinatum  $\beta.$  *alpestre* W. et Mohr. *cryp. germ.* p. 110.

Gr. *Donniana?* Hook et T. *musc. brit* p. 40 t. 13.

Hab. in saxis rupibusqve siccis circa sinum saltensem Nordlandiæ e. gr. ad Saltnæs, Bertnæs;

Præcedenti adeo affinis, ut qvi illam varietatem aere alpino contractam dicat, haud magnopere erret. Attamen satis distineta est sporangio exerto et operculo longius rostrato, etsi rostrum capsula sexies brevius. Re vera *Gr. pulvinata*

## CRYPTOGAMIA.

*Hook.*, affiniſ, ſed in illa ſeta arcuata, operculi roſtrum ſporangiī dimidiæ longitudinis, et dentes fere ſemper diviſi, eum in mea eos tales nunqvaſ observaverim. Habitū magis qvam characteribus a *Gr. ovata* *Hook.* recedit. Calyx intensiſſime viridis, ſurculi brevioreſ vix ultra 6 lin. alti, apices foliorum diaphani duplo fere longiores, ſetæ roſtraque breviore hanc mox diſtinguunt, ſed *Gr. Donniana* *Hook.* vix diſverſa. Aitamen icon l. c. habitū meae ſtipris non refert.

1153<sup>333</sup> GRIMMIA ovata: cauliſ cæſpitotis di- viſis, foliis lanceolatiſ in apicem capillaceum dia- phanum brevem attenuatiſ, ſeta brevi, ſporangiis ovatiſ, dentiſ periſtomii perforatiſ fiffiſive, ope- culo conico-roſtrato, roſtro brevi obtuso curvato. *Gr. ovata* *H.* et *T. musc. brit.* p. 39 t. 13. *W.* et *Mohr it. svec.* t. 2 f. 4. *Schwægr. ſupl.* t. 25.

*Trichostomum ovatum* *W.* et *Mohr cryp. germ.* p. 111. *Hartm. fl. scand.* p. 399.

*Dieranum ovale* *Whlbг. fl. ups. n.* 752. *fl. carp.* n. 1129?

*Grimmia obtusa* *Schwægr. ſupl.* t. 25.

Hab. in rupiſ et faxis apricis circa ſinu ſaltensem Nordlandiæ paſſim copioſe.

Qvot auctores deſcripſerunt, ad tot fere gene- ra relata eſt hæc ſtipps, partim qvia a plurimiſ cum Dicranō ovali confundebatur, partim qvia vere plura genera conjungit. Dicranis male as- ſociatur, utpote habitu ab illiſ alieniſſimo et dentiſ periſtomii rariuſ modo fiffiſ gaudens. Cum Grimmiiſ ſumma affinitate qvidem conju- ncta eſt: diſfert tamen calyptra dimidiata, ut vix male Weissiis adnumeretur. A *Gr. pulvinata* *Hook.* ſatiſ diſfert: ſurculiſ anguſtioribus, ſeta recta, foliis ſenſim attenuatiſ, acumine breviore, ſporangiis minoriбуſ, opeculo roſtro brevi, ſed a *Gr. obliqua* *Hornsſch.* modo acumine parum breviore et ore ſporangiī forſan magis contracto, nam qvoad hunc characterem etiam mea planta variat. Periſtomii dentes ſemper perforati, rariuſ fiffiſ, prium erecti, dein reflexi, nunqvaſ ut in Dicranorum inflexi. Sed *Dicranum ovale*

*Schwægr.* suppl. 1 p. 189. *Campylopus ovatus* Bridel (meth. nova musc.), quem, e genuinis speciminiibus Hornschuchianis, meis e rupibus Stördalæ nidrosiensis et e faxis Asker christianiensis convenientissimi, notum habeo, ab hoc sa- tis diversa est stirps, quippe quæ surculos longi- ores, minus arcte caespitosos, folia longiora paten- tia, basi fere divergenti-patentia (forma eadem), sporangia ampliora exacte evalia o: medio lata versus utrosque fines angustata, ore semper con- tracto, operculum rostratum, rostro acutissimo incurvo capsulam longitudine subæqvante, dentes peristomii semper et evidenter fissos habet. Tri- chostomi bona species, sed calyptra dimidiata.

1153<sup>562</sup> WEISSIA trifaria: caule simplici perbre- vi, foliis lanceolatis obtusiusculis erecto-patentibus strictis, sporangio hemisphærico-pyriformi, dentibus reflexilibus.

*Grimmia trifaria W. et Mohr crypt germ.* p. 143.  
*Weissia tristicha Schwægr.* suppl. t. 26.

Hab. in rupibus calcareis et rupium fissuris inferalpi- norum et subalpinorum Saltdalen Nordlandiæ fre- quenter. Autumno maturescit.

Atrovirens, rigida, sporangiis freqventibus vigen- tibus subglobosis flavescentibus operculo rostrato ru- bro insignis. Folia quidem trifaria, in tanta vero pu- sillitate difficilius discernuntur. Nervus excurrens vulgaris latitudinis. Sporangium maturum fuscum breve pyriforme, dentibus reflexilibus integris ru- bris. A *W. Seligeri* differt: foliis obtusiusculis trifariis, sporangio pyriformi, minime ovali.

1154<sup>567</sup> WEISSIA calcarea: subacaulis, foliis li- nearibus obtusiusculis, nervo lato, sporangio ob- longo-turbanato.

*W. calcarea H. et T. musc.* brit. p. 47 t. 15.

Hab. in rupibus calcareis occultis unicum Gymn. Den niano, sed molto rarius in Saltdalen Nordlandiæ. Æstivalis est.

Folia sicca stricta, madida magis patentia, e ba- si parum latiori linearia s. lanceolato linearia, qua- lia etiam in icona Hookeri optime picta sunt. crassi- uscula, nervo lato sape versus apicem quasi eva- nescente s. totum folium occupante. Setsa cum

sporangio pallida. Differt a præcedenti: colore, foliis angustioribus crassioribusqve, seta longiore, forma sporangii suboblonga dentibusqve angustioribus. Sed sine dubio bene cum hac *W. Seligeri Mohr* conjunxit Schwægrichen. Planta Wahlenbergiana fl. lap. n. 568 unice foliis acutioribus differre videtur.

**1155** *WEISSIA longipes*: caule stricto simpli-  
ciusculo, inferne subnudo, foliis adpressis ovatis  
subnervibus, sporangio brevi ovato erecto, oper-  
culo breviter rostrato.

Icon tab. nostra 1.

Hab. in argillosis uidis Nordlandiæ saltensis. Semel  
ad rivulum supra Midbyeosen in Saltdalen mense  
Julii sporangiis maturis et novellis a me lecta.

Ad *W. nudam* unice accedit, sed toto coelo  
diversa: caule, sporangio erecto, operculo rostra-  
to etc. Caulis usqve ad 4 lin. altus, strictus, foliis  
minutis adpressis nigris obsitus, in apice modo  
folia pauciora læte virentia gerens, et innova-  
tiones ex alis foliorum breves emittens. Folia  
reticulata ovata subacuminata obtusiuscula, interi-  
ora oblonga obtusiora concava, nervo haud an-  
gusto sed tenui. Seta longa 4—5 lin. fusca.  
Sporangium brunneum dein fuscum erectum, glo-  
bosum ovatum, effoetum sub ore contractum, oper-  
culo breviter rostrato, dentibus concoloribus in-  
tegris.

**1156** *TRICHOSTOMUM aciculare*: caulis  
adscendentibus subramosis, foliis strictis lenissime  
subhomomallis lanceolatis obtusiusculis apice ser-  
rulatis, sporangio oblongo, operculo rostrato.

*T. aciculare W. et Mohr* cryp. germ. p. 119. *H. et T. musc. brit.* p. 62 t. 19.

Dieranum aciculare *Smith* brit 3 p. 1212. *Hedw.*  
*stirp.* 3 t. 33, *Whlb.* fl carp. n. 1128. fl. ups.  
n. 753.

Brynm aciculare *Lin.* sp. pl. 2 p. 1583.

Hab. in fluminibus inferalpinorum cirea sinum salten-  
sem rarius ex. gr. in Botnelven Saltdalen.

Turgidior, alias vulgari similis.

**583** *TRICHOSTOMUM cylindricum Whlb.* fl.  
lap. n. 583, ubi vide.

Excludatur synonymon *Dicksonii* ad *Gymnostomum tenue* pertinens. Cfr. H. et T. musc. brit. p. 43.

- 584 FISSIDENS *taxifolius*: Whlbg. fl. lap. n.  
584, ubi vide.

*F. subbasilaris* Hedw.

In terra madida et succosa rupium inferalpinorum Saltdaliæ utrasqve varietates fructiferas copiose legi, nec ullis aliis notis qvam magnitudine et insertione setæ differentes observavi, nam folia caulina nec non perichaetalia — minime enervia ut vult Hooker et T. I. c. p 51 — in utraqve omnino similia. *F. subbasilaris* Hedw. quasi forma intermedia inter *F. taxifolium* et *adianthoidem*, et ipse est, qvi hic occurrit, nam seta vere subbasilaris semper supra radicem inserta et sporangium æqvale erectum: interdum qvidem subnutans ob setam valde flexuosam, sed nunqvm cernuum.

- 592 DICRANUM *flagellare* Whlbg. fl. lap. n.  
592.

$\beta$  *scottianum*: foliis strictiusculis undiqve vergentibus, siccis subcrispabilibus, apice serrulatis.

*D. scottianum* H. et T. musc. brit. p. 56 t. 18.  
Smith. brit. p. 1286.

Hab. in saxis sylvarum Saltdalen Nordlandiæ.

De synonymo anglico nullus dubito, qvando qvidem omnino et iconi et characteri convenit; sed qvomodo a *D. flagellari* notis laudatis exceptis ad speciem propriam constituendam me judice non sufficientibus distingvam, haud scio.

- 594 DICRANUM *Sphagni* Whlbg. fl. lap. n.  
594, ubi vide.

Deleatur (?) post synon. *Schwægrichenii* sec. spec. helvetica cum norvegicis omnino congruentia.

- 1157<sup>594</sup> DICRANUM *Starkii*: surculis subdivisis, foliis lanceolato-subulatis curvatis secundis integerrimis, sporangiis ovate-oblongis suberectis strumosis.

*D. Starkii* W. et Mohr cryp. germ. p. 189.  
*Schwægr.* suppl. t. 46. H. et T. musc. brit p. 45 t. 17.

Hab. in terra rupium subalpinorum Nordlandiae rarius ex. gr. in Saltdalen.

Tota planta pellicaris. Sporangia pallida seta que tortilis. Sporangiis oblongis suberectis saltem a *D. falcato* Whlb. capsula cernua pyriformi differt. Specimina islandica nordlaudicis omnino convenient.

**1158** DICRANUM *flexuosum*; caule erecto subsimplici, foliis lanceolato-subulatis undique divergentibus strictiusculis nervo lato, seta brevi flexuosa, sporangio ovato æquivali substriato, operculo rostrato.

*D. flexuosum* H. et T. musc. brit. p. 53 t. 16. W. et Mohr crypt. germ. p. 169.

Hab. in saxis inferalpinis Saltdalen Nordlandiae rarior.

Surculi breves. Seta 2 lin. flexuosa curvataque paululum modo folia excedit. Sporangium omnino æqvale, striis magis minusve obsoletis. Haec striæ obsoletæ, folia minus stricta et nervus latus, non vero latissimus aliquantulum ab iconi Hookeri, alias optime convenienti discrepant.

**1159** DICRANUM *pellucidum*; surculis subdivisis, foliis lanceolatis patenti divergentibus, apice subrecurvis, margine undulatis serrulatis, sporangio ovato estrumoso subcernuo, operculo conico-rostrato.

*D. pellucidum* Swartz svec. p. 35. Smith brit. 3 p. 1223. H. et T. musc. brit. p. 55. t. 17. W. et Mohr cryp. germ. p. 183.

*Bryum pellucidum* Lin. fl. svec. n. 997. sp. pl. p. 1583.

Hab. ad rivulos inferalpinos Nordlandiae e, gr. Skipperelven Saltdalen.

Muscus mollitie insignis, quare citissime siccatur et crispatur. Folia nervo valido quasi carina in pagine inferiora prostanti instructa. Dentes peristomii vix ad medium fissi. Folii brevibus latioribus molibus serrulatis nec non colore rubiendo-viridi a congeneribus facile distinguuntur, si *D. flavescentem* Hook. et *D. squarrosum* excipis. Illud etiam in alpibus stördalenibus a me lectum differt: surculis longioribus

pallidoribus, foliis longioribus, minus patentibus, apice modo subserrulato, sporangio oblongo. *Hoc* Norvegiæ australis incola foliis integerrimis, squarroso-recurvis, e latissima basi attenuatis facile dignoscitur.

**600 DICRANUM varium Whlbg. fl. lap. n. 600,**  
ubi vide.

Hab. in argillosis Nordlandiæ circa sinum saltensem passim copiose.

**601 DICRANUM cerviculatum: Whlbg. fl. lap. n. 601.**  
D. flavidum Schwægr. suppl. t. 45.

Hab. in arenosis humidis Nordlandiæ frequentissime.

**1160<sup>604</sup>/<sub>605</sub> DICRANUM bullatum:** subacaulis; foliis obovatis obtusissimis bullatis conniventibus apiculatis, sporangio oblongo.

Weissia latifolia Schwægr. suppl. t. 18.

Grimmia latifolia W. et Mohr. crypt. germ.  
p. 147.

Hab. in terra turfosa rupium maritimorum circa sinum saltensem Nordlandiæ rarius ex. gr. ad Qvandal, Boldöe.

Ob *Dicranum latifolium*, cui hæc stirps fere nimis affinis, nomen immutare necesse erat, nam Weissiæ sp. minime est. Dentes peristomii remotiusculi iis in *Dic. latifolio* simillimi, ad basin fissi; etiam ut in ille quasi ex interiore margine orificii surgentes. Sane hæ duæ species æqvo jure ac *Didym. latifolium* Didymodontibus associari potuerunt, nec unquam hæ tres segregari debuerunt. Foliis flavescens-pallide-viridibus conniventibus facile dignoscitur a *Dicr. latifolio*, cui alias habitu refert: seta sc., sporangio modo parum breviore et operculo breviter rostellato, sed hoc nunquam caulescens. Folia ex nervo excurrente apiculata, apiculo in superioribus longo et flexuoso. In errore igitur est Cl. Schwægrichen in icona sua alias bona nervum ante apicem evanescentem pingens. In specimenibus germanicis ex herbario Cl. Swartzii a me examinatis dentium et nervi ratio omnino eadem ac in mea stirpe est.

**611 POLYTRICHUM septentrionale Whlbg. fl.**  
**lap. n. 611, ubi vide,**

Nunc etiam Cl. Wahlenberg (cfr. Fl. carp. n. 1137) cum Cl. Hooker in *Pol. sexangulari* cum hoc conjugendo conspirat, quod etiam me ex experientiae convenit, cum *P. septentrionale* capsula angulata in alpibus nordlandicis saepe invenerim.

- 614 POLYTRICHUM *hercynicum* Whlbg. fl. lap. n. 614; ubi vide.

Hanc plantam calyptra levissima, qualis etiam in *Flora danica* t. 1417 et in *Muscologia britanica* t. 10 depicta est, semper inveni, quamobrem differentia *P. levigati* imprimis in sporangio oblongo cernuo et forma foliorum quærenda est.

- 622 MNIUM *albicans*: Whlbg. fl. lap. n. 622, ubi vide.

*Bryum Wahlenbergii* Schwægr. suppl. t. 70.

Male hanc speciem distinctissimam cum *B. cæspiticio* conjugunt *H. et T. l. c.* p. 121.

- 1161<sup>625</sup> MNIUM *cuspidatum*: foliis obovato-acuminatis marginatis, superne uncinato-serratis, nervo excurrente, sporangio ovato pendulo, operculo conico obtuso.

*M. cuspidatum* Whlbg. fl. ups. n. 708.

*Bryum cuspidatum* Smith brit. 3 p. 1368, *H. et T. musc. brit.* p. 127. t. 31.

*Hypnum aciphyllum* W. et Mohr. crypt. germ. p. 295.

*Mnium serpyllifolium*  $\beta$  *cuspidatum* Lin. fl. svec. n. 982. Sp. pl. 2 p. 1577.

$\beta$ . *affine*: ex omni parte major, setis pluribus. *M. affine* Schwægr. suppl. p. 134 t. 2. *Hedw. sp. muse.* p. 192 t. 45 (sec. Schwægr.)

Hab. in graminosis humidis circa sinum saltensem Nordlandiae freqventer.  $\beta$  iisdem locis udioribus haud rarum in Saltdalen.

Sureculi steriles decumbentes radicantes. A confinibus *M. punctato* et *rostrato* foliis augustoriibus acuminatis et operculo conico discernitur. Haud raro setæ gemellæ adsunt.

Varietas  $\beta$  habitu qvidem valde recedit, et interdum *M. roseo* proprius accedit, sed si magnitudinem exceperis, nullam notam distinctivam in-

venies; imo etiam respectu magnitudinis transitus manifestos vidi et possideo. Caulis usque ad 4 unc; folia ac serraturæ duplo majores, et sporangium quidem longius, sed omnino ejusdem formæ. Tomentum in caulo var.  $\alpha$  etiam adest, et in hoc setæ 1-4, in illa minime raro 2 occurunt.

- 1162**  $\frac{5}{2} \frac{5}{2}$  **MNIUM marginatum**: caule erecto simplici, foliis ovatis apiculatis marginatis serratis, sporangio oblongo subpendulo, operculo rostrato. M. marginatum Whlbg. fl. ups. n. 710.  
M. serratum Schwægr. suppl. t. 78.  
Bryum marginatum H. et T. musc. brit. p. 126 t. 31. Smith brit. 3 p. 1362.

Hab. in lateribus humidis montium inferalpinorum Nordlandiæ e. gr. Saltdalen.

Pallidum, pellucidum solitarie crescit. Sureuli steriles foliis latioribus subdistichis gaudent. Nervis, marginibus et calyptra sangvineis insigne.

- 627 CINCLIDIUM stygium**: Whlbg. fl. lap. n. 627, ubi vide.

Hab. etiam in paludibus inferalpinorum et subalpinorum Nordlandiæ freqyenter.

- 630 MEESIA longiseta**: Whlbg. fl. lap. n. 630, ubi vide,

Hab. in paludosis ad rivos subalpinorum Saltdalen Nordlandiæ raro.

- 1163**  $\frac{6}{2} \frac{3}{2}$  **BRYUM annotinum**: caulis abbreviatis stoloniferis, foliis erecto-patentibus lanceolatis acuminatis pellucidis integerrimis, nervo excurrente, in iis stolonum evanescente, sporangio oblongo pendulo.

Bryum annotinum Swartz. svec. p. 50.

?Hypnum annotinum W. et Mohr. crypt. germ. p. 281?

Mnium annotinum Leers fl. herb. n. 820.

Hab. in arenosis humidis Nordlandiæ saltensis e. gr. Midbyesandgraven Saltdalen.

Sureuli brevissimi in arena stolonibus creberimis uncialibus setisque modo conspicui latent. Folia anguste lanceolata; stolonum breviora nervo evanescente, sed ejusdem formæ. Dubius prorsus sum, an ad hoc an ad seqvens Bryum anno-

*tinum Whlbg. fl. lap. n. 635* referri debeat. Huic quidem optimie quadrant omnia, quæ de illo warrantur, si "capsulas collo elongate curvoque pyriformes" ex cipias, nam in mea stirpe sunt breves oblongæ pendulæ. Tales vero capsulas, quales Cl. Auctor descripsit, habet seqvens ab omni parte duplo majus, foliis ovatis acuminatis, surculis longioribus a musco Wahlenbergiano diversum apparet.

Tenuitate et sporangiis brevibns rufescensibus haud longe a *B. carneo* recedit. Innovationes bulbiferæ; bulbuli ovati dilute virentes, dein purpurei pellucidi solidi solitarii, in alis foliorum sessiles.

**1165** *BRYUM intermedium*: caule brevi innovationibus ramoso, foliis subpatentibus oblongo acuminatis subintegerrimis, margine subreflexo, nervo excurrente, in iis stolonum evanescente, sporangio elongato-pyriformi.

Webera intermedia Schwægt. *supl.* t 75.

*B. pallescens* Schwægr. *supl.* t 76,

*B. turbinatum* H. et T. *musc. brit.* p. 122 t. 29 perbona.

*B. intermedium* Hartm. *fl. scand.* p. 414.

? *B. pallens* Swartz *svec.* p. 88 t. 4.

*Muscus fl. dan.* t. 215.

Hab. in arenosis humidis Nordlandiæ saltensis frequenter.

Cfr. observ. ad antecedens.

Species insignis et me judice ab affinibus distincta: sporangii inæqualis pyriformis collo elongato curvoque. Surculi altitudine satis variant, ut recte habent H. et T. l. c. In udis Norvegiæ australis surculos unciales legi; nordlandici vero breves 1—4 lin., innovationibus longioribus, non vero semper præsentibus. Folia ob marginem leviter reflexum marginata apparent, a nervo percurrente subapiculata, in summo apice serrulata; stolonum cæteris similia, modo breviora et nervo evanescente. In alis foliorum innovationum bulbuli foliosi haud rari suut.

*B. pallens* Sw. foliis erectioribus unice differre videtur. Nomen *B. intermedium* nomini *B. turbinato*, etsi de synymo e muscologia brit. certissimus, prætulit, cum synouymia fersan nimis

numerosa (ipsum *B. turbinatum* Swartz mihi imprimis dubium. Cfr. quoque Hartm. fl. scand. p. 415) congesserint Cl. Hooker et Taylor.

638 BRYUM carneum Whlbg. fl. lap. n. 638, ubi vide.

*B. carneum* H. et T. musc. brit. p. 119 t. 29.

*B. cucullatum* Schwægr. suppl. t. 68.

Hab. in subalpinis Saltdalen Nordlandiæ e. gr. supra Saxenvig.

Muscus hic obvius cum speciminiibus genuinis Hornschuchianis *Bryi cucullati* Schwægr. omnino quadrat. Habet sc. surculos simplices 2 lin. altos; folia erecta imbricata oblongo-lanceolata acutiuscula, superne subserrulata, nervo valido basi rubro sub apice tenuiore; sporangia brevia pyriformia pallida, operulum conicum acentum. Icon muscologiæ brit. folia optime representat, sporangia vero nimis brevia. Non possum non contra Schwægrichenium hoc cum *B. carneo* conjugere.

639 RRYUM alpinum: Whlbg. fl. lap. 639, ubi vide.

Hab. in scopolis maritimis Nordlandiæ. Intra fines hujus floræ non quidem legi, sed vix dubito, quin legi posset, cum in insulis Helgolandiaæ borealis ex. gr. Selsœ collegerim.

1166<sup>6</sup>/<sub>47</sub> ORTHOTRICHUM subrepens: surculis subdecumbentibus, foliis ovato-lanceolatis erecto-patentibus, siccitate subcrispis, seta exserta sporangioclavato striato ore connivente, peristomio interno nullo, dentibus 8 geminatis, calyptora pilosa. Tab. nostra 1.

*O. crispum* β. Whlbg. fl. lap. p. 364.

Hab. ad truncos Alnorum Nordlandiæ saltensis. A me Skjerstad vulgatus, Saltdalen rarius lectum.

Surculi pulvinati decumbentes breves, in ambitu subrepentes, intense virides, basi fusci, ramis brevibus creberrimis, folia multo latiora (perichætalia imprimis lata) brevioraque, subacuta modo subcrispata et defectus ciliorum hoc ab *Or. criso* satis distinguunt. Cilia etsi anxia cura peristomia perplura lustravi, nulla mihi sese obtulerunt. Sporangium ec *Or. crisi* fere perfectius

clavatum, striatum et quidem spiraliter, ore convenientissimo, dentibus albis concavis, linea media notatis, rarissime vero fissis.

**470 ORTHOTRICHUM curvifolium Whlbg. fl. lap. n. 470, ubi vide.**

O. Hutchinsiæ H. et T. musc. brit. p. 73 t. 21.

De synynomo anglico nullum mihi dubium, nam non modo descriptio et icon Hookeri convenientissimæ, sed etjam specimina anglica in herbario Cel. Swartzii cum stirpe norvegica omnino quadrantia inveni.

**4167<sup>647</sup> ORTHOTRICHUM affine:** foliis patentibus lanceolatis, sporangio subsessili striato, peristomio interno ciliis 8, calyptre subpilosa.

$\alpha$ . foliis lanceolatis, intense viridibus, setis demersis, calyptre pilosa.

O. affine  $\alpha$  H. et T. musc. brit. p. 74 t. 21.

O. affine Web. et Mohr crypt. germ. p. 233. Schwægr. suppl. t. 49. Whlbg. fl. carp. n 1162.

$\beta$ . foliis linear-lanceolatis flavoviridibus, setis subexsertis, calyptre pilosa.

O. affine Smith. fl. brit. 3 p. 1263.

$\gamma$ . *pumilum*: caule brevi, foliis intense viridibus calyptre subcalva.

O. affine  $\beta$ . *pumilum* H. et T. musc. brit. p. 74. t. 21. Whlbg. fl. ups. n. 731.

O. *pumilum* Swartz svec. p. 42. t. 4 f. 9. Schwægr. suppl. t. 58. Web. et Mohr. crypt. germ. p. 232. Smith. brit. 3 p. 1264.

**Hab.**  $\alpha$  in rupibus;  $\beta$ . in arboribus imprimis juniperis freqventer;  $\gamma$ . in salicibus rarius, Saltdalen Nordlandiæ.

Var.  $\alpha$  et  $\gamma$ . vulgaribus similis sed  $\beta$  (ad quam synonomous Cl. Smithii sine dubio pertinet, qvia folia pallidiora lutescentia linear-lanceolata dicit) habitu ad O. Lyelli Hook. satis aequedit: surculis longioribus, foliis linear-lanceolatis, siccis parum erispatis, sed cilia constanter 8 et iis in O. affini similia sunt. Setæ, imprimis in sporangiis manus, exsertæ. Calyptre dense pilosa.

**1168<sup>672</sup>** LESKEA *norvegica*: surculis repentibus, ramis aggregatis erectis, foliis erecto-patentibus ovato-longe acuminatis integerrimis margine inferne reflexo, nervo valido excurrente, sporangio cylindrico erecto, operculo conico-rostrato. Icon nostra Tab. II.

Hab. ad radicem arborum e. gr. Alnorum et Juniperorum Nordlandiae saltensis passim freqventer.

Tota stirps lurida, ramificatione et sporangiis *Leskeæ polyanthæ*, foliis *L. incurvatæ*, modo angustioribus. Denso grege crescit et eodem modo pulvinata ac *L. polyantha*. Folia crassiuscula acumine angusto longo, sed non acutissimo, interdum subhomomalla, nervo versus apicem obsoletiore. Margo, ubi folium latum est, evidenter reflexum. Peristomium Leskeæ generis. Operculum ei *Weissiæ curvirostræ* simillimum.

**658** LESKEA *polyantha* Whlbg. fl. lap. n. 658, ubi vide.

Excludatur synonymon Smithii.

**1169<sup>672</sup>** LESKEA *Deinbollii*; foliis imbricatis lanceolato-subulatis falcato-secundis margine planis integerrimis nervo ad  $\frac{1}{2}$  evanescente, sporangio erecto subcylindrico.

*L. Deinbollii* Swartz in herbario.

Hab. ad sinum Varanger in Finmarkia orientali, ubi eam legit Rev. *Deinboll*.

Qvod Leskeæ generis sit, auctoritate Cl. Swartzii innitor, Totus habitus *Hypni adunci*, nulli aliæ Leskeæ affinis. Tota pallescens, et quantum ex speciminibus in herbario Swartzii asservatis videre licuit, sureuli breviusculi.

**663** HYPNUM *obtusatum* Wahlbg. fl. lap. n. 663.

H. *denticulatum*  $\beta$  *obtusifolium* H. et T. musc. brit. p. 92 t. 24.

H. *Dunnianum* Smith. brit. p. 1286.

Non possum non cum Cell. Hookero in hoc cum *H. denticulato* qvoad nervum, acumen et magnitudinem quam maxime variabile musco, conjugendo conspirare.

**2170<sup>672</sup>** HYPNUM *stellatum*  $\beta$  *minus*: foliis laxis squarroso-cordata basi subulatis integerrimis,

basi obsolete binervibus, sporangio oblongo-cylindraceo, opereculo conico.

*H. Stellatum*  $\beta$  minus *W.* et *M. musc. germ.* p. 551. *H. et T. musc. brit.* p. 108. t. 26. *Wahlbg. fl. carp.* n. 1183.

*H. Halleri?*  $\beta$  majus *Whlbg. fl. lap.* p. 375.

*H. squarrosum* *Brid.*

Habitu nec minus characteribus cum *H. stellato*, minime cum *H. Halleri* convenit. Var.  $\alpha$  surculo strictiori et colore viridiori, in paludosis crescens parum modo differt.

**1171** *HYPNUM affine*: surculo repente, ramis erectisculis, foliis cordato-ovatis subito acuminatis patentibz divergentibus integrerrimis, obsolete binerviis, sporangio clavato-cylindraceo cernuo, operculo conico.

*H. Seligeri Fl. dan.* 1536.

Hab. in lignis putridis locis humidis Nordlandiae saltensis satis frequenter.

Dubia sane species. Statura omnino refert *H. serpentem*, surculis gracilibus, setis longis creberimis, sporangiis ratione musci magnis, sed differt omnino. foliis; e contrario quod attinet ad characteres *H. stellato* adeo simile, ut vix ullam notam distinctivam praeter surculum repentem reperire possim, sed statura quam in illius var. minori triplo gracilior. Icon fl. danicae adeo bona, ut vix dubitem, quin idem sit; folia modo minus divergentia et minus subito acuminata.

**674** *HYPNUM moniliforme*: *Whlbg. fl. lap.* n. 674 *H. et T. musc. brit.* p. 96 t. 24.

$\beta$  *apiculatum*: foliis concavissimis apiculo reflexo.

Hab. var.  $\beta$  in terra rupium interalpinorum Saltalen Nordlandiae.

Habitu convenit cum var.  $\alpha$ , attamen satis memorabile apiculo illo tenuissimo reflexo. Hunc vero aetate deciduum vidiisse credo, quare ut propriam speciem referre non ausus sum. Nec fructiferum vidi.

**1172** *HYPNUM silesianum*: surculis repentibus, ramis erectis subfaciseulatis, foliis oblongo-

subulatis planis patentibus serrulatis subsecundis, obsolete binerviis, sporangio subcylindrico erecto-cernuo, operculo conico.

*H. silesianum* Web. et *M. crypt. gprm.* p. 343.

*H. et T. musc. brit.* p. 113. t. 27. *Schwgr. suppl.* t. 94. *Whlb. fl. carp.* n. 1186.

Hab. in et imprimis sub rupibus madidis marinis et subalpinis Nordlandiae saltensis.

Muscus vivide virens, nitidus arcte cæspitosus. Hypno pulchello vere affinis, nec ab *H. denticulato*, cui saepè immixtum crescit, alienum. Sporangia tenuia, effoeta cernua, vigentia vero subæqvalia, setis e surculo repente s. basi ramorum surgentibus. Surculus fere oblitteratus ramis vi-gentibus. Autumno maturescit.

1173<sup>676</sup> HYPNUM *incurvatum*: foliis laxis lanceo-lato - subulatis subsecundis subintegerrimis, basi obsolete binerviis, sporangio cylindrico subclavato cernuo, operculo conico acuminulato.

*H. incurvatum* Schrad. — *Web. et M. crypt. germ.* p. 342. *Schwægr. suppl.* p.

Hab. in ligno putrido Saltdalen Nordlandiae.

Surculi repentes habitu *H. serpentis* majoris, modo dilutius colorati. *H. silesiano* ex characteribus proximum, modo omnia folia secunda. De cætero *H. cypressiformi* affinior, a quo solummodo foliis laxis angustioribus, non ita circinnalibus, et operculo brevi conico differt. Secundum specimina ipsius Schraderi in herbario Cl. Swartzii visa et examinata hoc verum est.

1174<sup>530</sup> HYPNUM *falcatum*: surculis procumbentibus, foliis lanceolato-acuminatis subfalcato - secundis, margine planis integerrimis, nervo valido superne evanescente.

*H. falcatum* Brid. *musc.* 2, 2 t. 1 f. 6 *cex. specim.* in herb. Swartzii. *Web. et M. crypt. germ.* p. 359.

Hab. ad fontes in Nordlandia saltensi. A. me unice ad Skipperelven in Saltdalen sterile lectum.

Muscus obesus intense viridis, opacus. Folia latiora brevioraque sine omnibus striis et plicis, integerrima, magis homomalla quam uncinata, et nervi validissimi sub apice repente evanescentes,

in inferiori surculi parte parenchymate distituti setarum instar restantes hanc speciem insigniunt et ab affinibus *H. adunco* et *cupressiformi* distinguunt. Affinitatem ullam cum *H. filicino* eqvidem non agnosco,

**1175<sup>ss</sup>** *HYPNUM uncinatum*: foliis lanceolato-subulatis uncinatis serrulatis striatis, nervo versus apieem evanescente, sporangio cylindrico cernuo conico acuto.

*H. uncinatum H. et T. musc. brit. p. 111. t. 26.  
W. et Mohr. crypt. germ. p. 358. Wahlbg. fl. up. n. 685.*

$\beta$  *obesum*: sureulis crassioribus aureis, sporangio suberecto breviore.

Hab. in pratis humidis et in saxis ad rivulos inferalpinos Nordlandiae saltensis freqventer.  $\beta$  vero in sterilibus subhumidis ad Skansen in Saltdalen Nordlandiae.

Miror muscum hunc frequentissimum oculatissimam Wahlebergium effugere potuisse. In pratis sureulis pallescentibus erectis, in saxis udis sureulis decumbentibus fulvescentibus variat.

Var.  $\beta$  satis diversa. Totum aureo-nitens. Folia latiora, subovato subulata acumine longissimo subserrato, canaliculata, striis raris. Sporangia suberecta, subclavata. Sureli illis in var.  $\alpha$  fere triplo crassiores ob folia latiora et confertiora, decumbentes, vix biunciales. An *H. aduncum*  $\beta$  *rugosum* Hook?

**1176<sup>ss</sup>** *HYPNUM palustre*: foliis ovatis subacuminatis secundis concavis integerrimis, margine superne inflexis, nervo vario, nunquam supra  $\frac{2}{3}$  evanescente, sporangio oblongo-ovato, operculo conico.

*H. palustre H. et T. musc. brit. p. 110. t. 26.  
W. et M. crypt. germ. p. 365. Lin. sp. pl. p. 1593.  
H. lucidum Swartz. svec. p. 59. Hedw. stirp. 4 t. 38.*

? *H. alpinum* *Whlbg. fl. lap. n. 672.*

Hab. in rupibus irrigatis et lapidibus rivulorum inferalpinis & subalpinis Nordlandiae saltensis. Ego in Saltdalen freqventer legi.

**P**olymorpha et lurida stirps. Nervi in ejusdem surculi 2 ad basin, 2 ad medium, 1 ad medium, 1 ad  $\frac{1}{2}$  evanescentes. In rupibus verticalibus inferalpinis Saltdaliæ siccuseulis modificatio occurrit fulva, surculis brevibus, habitu *H. fluviatilis*, ab illo attamen plane diversa. In rupibus submari- timis Skjerstad inter muscos palustres altera occurrit surculis erectis simplicieulis longis flagellaribus, sed vix diversa, nam folia simillima. De synomino Wahlenbergiano vix dubito.

682 HYPNUM *diastrophillum*: Wahlbg. fl. lap. n. 682.

Sententiæ Celb. Schwægrichenii, hunc et *H. filicinum* conjungenti omnino sumi addictus. Surculis tenuioribus crassioribusque, foliis plicatis et non plicatis saepe in diversis partibus ejusdem surculi, nervo excurrente et sub apice evanescente adeo latit, ut me judice nullæ note distinctivæ fixæ adsint. Memorabiliorum varietatem in rivulo Saltdensi Præstelven sporangiis subpyriformibus pendulis legi, cum vero folia *H. filicini*, sed apud nullum auctoreum hanc notam ei attributam invenio, formam casu fortuito ortam censeo.

117: <sup>1/2</sup> HYPNUM *arcticum*: surculo repente, ramis flagellaribus, foliis remotiusculis erecto patentibus subrotundis acutiusculis concavis in margine planis integrerimis, nervo valido ad  $\frac{1}{2}$  evanescente, sporangio brevi cernuo.

Icon Tab. nostra II.

Hab. in rivulis subalpinis Saltdalen Nordlandiæ ratiuis.

Ad *H. alpestre* Sw. et *H. molle* Dick accedit, sed ab utroque satis diversum, quod ex diagnosi jam satis elucidere opinor. Surculi quidem repentes, ramis erectiusculis, sed haud subterranei. Rami longi, quam in *H. alpestri* multo longiores subsimplices, ut fere flagellares. Folia ut totus muscus rigidiora quam in duobus affinibus; quoque minus lurida, magis flavescens, caulina saepissime delecta. Seta brevis tenuis. Operculum haud vidi. Nervi interdum bicrani, semper validi. Ab

Islandia quoque specimina sub nomine *H. mollis* accepta possideo.

**1178** *HYPNUM murale*: foliis erecto-patentibus imbricatis oblongis obtusis acuminulatis, concavis integerrimis nervo ad  $\frac{1}{2}$  evanescente, seta laevi, sporangio cornuo, operculo longirostro.  
*H. murale H. et T. musc. brit. p. 97, t. 24.*  
*Smith. brit. p. 1304. Web. et Mohr. crypt. germ. p. 323. Hedw. supr. 4. t. 30.*

**Hab.** in rupibus et in terra rupium ad latera montium saltdalensium Nördlandiae.

Surculi prostrati, sepe adeo intortexti, ut panum referant; cylindrici, intense virides, nitiduli. Folia adpressa concava obtusa acuminata parvo, nervo manifesto. Operculi rostrum sporangii fere longitudine flexuosum. Hisce notis facile et ab *H. molli* et *puro* dignoscitur. Vere sporangia maturescunt.

**1179** *HYPNUM catenulatum*: surculis repentibus intricatis, ramis ramosis confertis erectiusculis, foliis erecto-patentibus ovatis, subito acuminatis dorso papilloso, integerrimis margine reflexis, nervo valido ad  $\frac{1}{2}$  pertingenti, (sporangio ovato inclinato, operculo conico acuminato. *Hook.*)  
*H. catenulatum H. et T. musc. brit. p. 96, t. 24.*  
*Schwægr. suppl. p. 218.*

*Grimmia? catenulata W. et Mohr. crypt. germ. p. 157.*

*Pterigonium catenulatum Brid. musc. 2, 1. t. 5. f. 4.*

**Hab.** in rupibus et saxis siccis Saltdalen Nordlandiae satis freqventer.

Rupibus arte adnatum, surculis dense intricatis ramisque confertis pulvino latos luride atrovirides efficit. Folia imbricata, sicca adpressa crassa, e basi rotundata s. subcordata versus medium subito acuminata, acuminata non acutissimo, usque ad initium acuminationis concava, margine evidenter reflexo, reticulo compacto, nervo ad medium fere attingente ibique subito evanescente. Variat paululum acuminis longitudine et directione, quæ interdum subsecunda, sed semper magis et angustius acuminata, quam icon Hookerii l. c. ea

sistunt. Semper sterile. Semel modo stirpem fructiferam vulgari tenuiorem, foliisque ratione illius habita angustioribus et longioribus, quæ ad hoc pertinere credo, sed haud perswasus sum, reperi. Illi sporangia ovata suberecta, peristomio hypoideo, quæ id describit Cl. Hooker, erant. *Læskeæ incurvataæ* sane affinitate conjunctum, sed ramis brevibus erectis, nervo foliorum evanescente etc. bene distinctum. Planta nordlandica et salisburgensis plane convenient.

685 *HYPNUM sarmenosum*: Whlbg. fl. lap. n. 685.

Hab. in rupibus irrigatis subalpinis et alpinis Nordlandiæ saltensis haud raro.

Post iterata examina non possum non hoc eum *H. stramineo* conjungere. Est modo varietas loci habitationis vi orta sc. ramosior et intensius calorata, ut pote fusco rufescens, dum muscus palustris pallidior virenii-stramineus. Cum his Cl. Schiægrichen suppl. 2. p. 212 quoque bene conjugit *H. trifarium*.

Seqventi modo hæc tria exponenda.

*HYPNUM sarmenosum*: foliis ovato-oblongis obtusis erectis laxe imbricatis integerrimis nervo subexcurrente, sporangio-subcylindrico cernuo, operculo conico.

*α stramineum*: surculis simpliciusculis, foliis oblongis adpressis pallidis.

*H. stramineum* Auct.

*β fuscescens*: surculis ramosis, foliis oblongis laxius imbricatis fusco-rufescens.

*H. sarmenosum* Whlbg. l. c.

*γ trifarium*: surculis simpliciusculis, foliis ovatis concavioribus pallide-viridibus, nervo vix superante.

*H. trifarium* Auct.

Folia in omnibus varietatibus obsolete trifaria; in apicibus arctius infra laxius imbricata; impressis hoc in var. *β.* manifestum. Nervi in foliis ejusdem surculi modo ad  $\frac{1}{3}$ , modo infra apicem evanescunt; vix unquam apicem ipsum attingunt;

Nomen characteristicum Wahlenbergianum retainendum putavi.

**1180** *HYPNUM cordifolium*: surculis elongatis, ramis abbreviatis, foliis laxis patentibus cordatis obtusis integerrimis, nervo sub summo apice evanescente, operculo conico acuto.

*H. cordifolium H. et T. musc. brit.* p. 107 t. 26.  
*Smith brit.* p. 1318. *W. et Mohr crypt. germ.* p. 320. *Whlb. fl. ups.* n. 357. *fl. earp.* n. 1189. *Hedw. stirp.* 4 t. 37.

Hab. in paludosis circa sinum saltensem Nordlandiae affini *H. cuspidato* longe frequentius.

**688** *HYPNUM nitens*: Wahlbg. fl. lap. n. 688.

Hab. in paludosis inferalpinis et subalpinis Nordlandiae non raro.

**1181** *HYPNUM salebrosum*: surculo repente, ramis abbreviatis pinnato, foliis erecto-patentibus, lanceolato-subulatis, margine plica reflexis serratis, nervo supra  $\frac{2}{3}$  evanido, seta laevi, sporangio obovato, operculo conico-acuminato acuto.

*H. salebrosum W. et Mohr. crypt. germ.* p. 312,  
*H. plumosum Hedw. stirp.* 4. t. 15.

Hab. in ligno et lapidibus imprimis ad latera rivulorum inferalpinorum Nordlandiae saltensis.

Tota planta repens et nitens, plerisque Hypnis repentibus major. Esi Cl. Hartmann fl. scand. p. 406 *Hypn. plumosum* Hedw. ut speciem distinctam refert, ego nullum discriminem essentiale inter haec reperio, et icon *Hedwigii* meam plantam bene representat. Ab *H. lutescente* unice fere differt, foliis latioribus et seta laevi. Vere sporangia brevia subobovata maturescunt. Seta breviscula.

**1182** *HYPNUM populeum*: surculis decumbentibus, foliis erecto-patentibus lanceolato-subulatis, margine subreflexo, serrulatis, nervo subcurrente, sporangio ovato subcerno, seta seabriuscula, operculo conico-acuminato acuto.

*H. populeum H. et T. musc. brit.* p. 94. t. 25.  
*W. et Mohr. crypt. germ.* p. 305. *Hartm. scand.* p. 428.

*H. implexum Smith brit.* p. 1310.

*H. plumosum Swartz svec.* p. 66.

Hab. in lapidibus et ad radicem arborum per Saltdalen Nordlandiae passim copiose.

Tota stirps lutescens nitens, fere faciem *Leskeæ sericeæ* præ se ferens, precedenti duplo tenuior. Folia basi rotundata, apice serrulata, leviter reflexa. Peristomium internum laciniis majoribus angustis perforatis interjectis singulis filiformibus.

**1183<sup>ss</sup>** HYPNUM *reflexum*: surculis decumbentibus, ramis reflexis foliis laxis cordato-acuminatis, patentib- divergentibus, serrulatis nervo subexcurrente, seta scabriuscula, sporangio obovato cernuo, operculo conico-acuminulato.

H. *reflexum* H. et T. musc. brit. p. 95. t. 25.  
Web. et Mohr. crypt. germ. p. 33, 476.

Hab. ad radicem arborum et ad lapides in umbrosis lateribus montium per Saltdalen Nordlandiae frequenter.

Species distincta: pallido colore, ramis reflexis, foliis subdivergentibus, sporangio brevi. Folia suprema interdum subsecunda.

**1184<sup>ss</sup>** HYPNUM *megalopolitanum*: foliis laxis, subpatentibus ovato subulatis, margine subreflexo, subintegerrimis, nervo ad  $\frac{2}{3}$  evanido, seta laevi, sporangio oblongo cernuo, operculo rostrato obtuso.

H. *megalopolitanum* W. et Mohr. crypt. germ. p. 325.

H. *obtusirostrum* Sonrf. Ms.

Hab. in graminosis sub Pinis Saltdalen Nordlandiae rarius.

De synomyno Cl. Mohrii vix dubito, etsi nec iconem nec specimen musci unquam vidi, nam characteres omnes convenientissimi, nec non annotatione: "H. pilifero multum similis species" aptissima, nam habitus omnium partiam H. *piliferi*, attamen illud seta scabra, operculi rostro longiore acutissimo statim dignoscitur. Hoc operculi rostro brevi et obtuso ab omnibus mihi notis Hypnis diversum, quare de synomyno nondum edocet id H. *obtusirostrum* vocavi. Saecculi albescentes, ramis longis. In foliis plie et serraturæ obsoletissimæ,

- 1185<sup>888</sup>** *HYPNUM ruscifolium*: foliis laxis sub-patentibus ovatis acutis concavis estriatis serrulatis, nervo ad  $\frac{2}{3}$  evanescente (operculo rostrato).  
*H. ruscifolium H. et T.*, p. 106 t. 26. *Smith. brit.* p. 1292.  
*H. riparoides Hedw. stirp. 4 t. 4. Web. et Mohr. crypt. germ.* p. 326.  
*H. prolixum Swartz. svec.* p. 63.  
Hab. ad rivulos et in pratis humidis Saltdalen Nordlandiæ passim.  
Majus plerisque ceteris, pallide viride, foliis ovatis lævibus acutis, minime acuminatis notabile. Surculi non compressi.

### MUSCI HEPATICI.

- 1186<sup>888</sup>** *IUNGERMANNIA scutata*: surculo ascendente, foliis subrotundis concavis bidentatis, dentibus conniventibus acutiusculis, amphigastriis ovato-subtriangularibus acutiusculis integris, calyce terminali oblongo subplicato, ore connivente dentato.  
*I. scutata W. et Mohr cryp. germ.* p. 408. *Web. prd.* p. 41.  
Tab. nostra 111.  
Hab. in subalpinis Nordlandiæ saltensis inter Conostomum boreale nec non in Lapponiæ pitensi ad Hornavan inter Bryum carneum, semper in terra arenaria humida.  
Tota stirps tenuissima fragilis pellucida pallide viridis Surculi ramosi  $\frac{1}{2}$  unc. longi. Folia concavissima; dentibus ita conniventibus, ut modo fissa appareant, reticulo laxo. Amphigastria ratione plantæ magna subpatentia margine inæqvabili quin etiam uno altero dente ornato. Ob amphigastria distinctissima cum I: connivente s: curvifolia vel alia affini confundi néquit.

- 1187<sup>788</sup>** *IUNGERMANNIA pallescens*: surculo ascendente ramoso, foliis planis subrotundis integerrimis, amphigastriis ovatis bisidis, lobis acuminatis calycibus lateralibus clavato-oblongis, lacero quadrifidis, laciiniis reflexis.

I. pallescens. *W. et Mohr.* *crypt. germ.* p. 404.  
*Web.* *prd.* p. 28. *Hartm. fl. scand.* p. 436. (\*)  
Hab. in locis humidis et saxis muscosis e rivulis ex-  
sertis Saltdalen Nordlandice passim.

Pulcherrima et maxima nostrarum. Vivide pal-  
leseens — rarius nigrescit — ad usque duarum linea-  
rum latitudinem crescit. Surculi plani, ramis vagis.  
Amphigastria manifesta foliis quinquevies minora.  
Calycos magni ante evolutionem sporangii viridis  
rigidi, dein subflaccidi, ob lacinias reflexas aper-  
ti, ad basin ramorum propullulant.

1188389 IUNGERMANNIA *scalaris*: surculo ad-  
scendente suberecto, foliis rotundatis concavis  
erecto-patentibus, amphigastriis lanceolato-subu-  
latis.

I. *scalaris* *Hook. jung.* t. 61?, at non Fl. dan.  
et Schrad.

Hab. in marginibus terrenis arenosis Saltdalen Nord-  
landice rarius e. gr. in Fiskevaagmoen ad flumen.

Planta haec semipellicaris, tota albida et pel-  
lucida, sat rigida sed fragilis, innovationibus sal-  
tem erectis, reticulo grandissimo angulato, amphigas-  
triis patentibus a basi triangulari linearis-subu-  
latis apice obtusiusculo insignis est. Etsi iconem  
citatam Hookeri ipse non vidi, de synynomio vix  
dubito, cum ob amphigastria alia esse vix possit.  
In innovationibus annotinis, ubi radiculi adhuc-  
desunt, amphigastria imprimis manifesta,

717 IUNGERMANNIA *Taylori*: surculo erecto  
radiculoso, foliis oblongo-orbiculatis (siccitate punc-  
tatis) inferioribus revoluto-convexis, superioribus  
conniventibus, amphigastriis late subulatis calyci-  
bus evatis apice compressis truncatis bilabiatis).

I. *Taylori* *Hook. jung.* t. 57.

I. *Sphagni Whlb.* *fl. lap.* n. 717, excl. syn.  
*Hartm. fl. scand.* p. 441 excl. syn.

Hab. in paludibus, rupibus uidis, ad rivulos inter mu-  
cos per Nordlandiam et Lapponiam ubique fre-  
quenter.

\*) Modo, Fasciculos I — X et XII — XV ex Monographia  
Jungermanniarum Britanicae auctore Hookero conferre inhi-  
licuit.

Priori triplo vel quadriplo maior, modo amphigastria minor. De synonymis nullum mihi est dubium. Non solùmmodo cum iconे Hookeri, sed etiam cum speciminibus anglicis Iungermanniae Taylori plantam nordlandicam contuli, et plane eandem esse inveni. Stipulae etiam re vera adsunt, etsi minutæ et inter radiculos occultæ. Reticuli areolæ grandissimæ, qva ex re folia sieca punctata. Minor qvod Cl. Hartmann l. c. dicat: stirpe anglicam differre areolis minutissimis, et (qvod nullum dubium de veritate synonymi apud eum excitetur) licet hoc ut nota principalia ab auctoriis anglicis de eorum J: Sphagni afferatur. Stirps nostra qvidem inter muscos, et imprimis inter Sphagna serpit, sed erecta, cæspites densos formans, apicibus turgidis sæpissime purpureis insignis. Simillima I. anomala, Norvægiæ australioris incola, differt: surculo supra Sphagnum repente foliis oblongis, modo rotundatis, modo acutis, colore viridiori. Calyces Iungermanniae Taylori simillimi sc. tubulosi apice compressi truncati. An hujus loci I. Sphagni Germanorum? Cfr. Ann. Cl. Hookeri ad t. 33.

**IUNGERMANNIA compressa:** surculo erecto rigido diviso, foliis bitariis orbicularibus, summis majoribus subreniformibus subrepandis planius ulis erectis adpressis (calycibus terminibus perichætio immersis).

I; compressa Hook. jung. t. 58,

Hab. in rupibus apud inter muscos Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Planta mea pollicarem altitudinem non excedit, nec adeq. purpureo coloratum est, ut icon Hookeri, sed his quoque rebus a descriptione Hookeri modo discrepat. Alio tamen esse non potest ob: surculum rigidum (non fragilem) crebre divisum, a foliis denudatum denigratumque basi persistentem, foliis magnis, quam ea I: crenulatæ duplo majoribus et I. Taylori fore æquivalentibus, erectis adpressis. Folia apice sæpissime subrepanda vel leviter retusa, alias integrerrima, Amphigastria minutissima in innovationibus operentis simplicis videre visus sum, sed sub vitris

compositis eos distincte discernere mihi nunquam contigit.

**720** *IUNGERMANNIA quinquedentata*: surculo ascendentē diviso, foliis subquadralis subquadrididis undulatis plicatis, amphigastriis bipartitis fimbriatis, calycibus terminalibus tubulosis ore constrictis dentatis.

I. *quinquedentata* Whlb. fl. lap. n. 720. upr. n. 860. W. et Mohr crypt. germ. p. 330. Web. prd. p. 88. Lin. sp. pl. 2 p. 1538.

I. *barbata* Hook. jung. t. 70. Schmid. ic. t. 48. Michel. gen. t. 5 f. 41 ex Whlb.

Hab. in sylvis imprimis acerosarum per Nordlandiam Lapponiamque ubique frequenter.

Amphigastria in hoc detegere semper mihi contigit, sed in apice, ubi radiculi desinunt, quærenda sunt. Bipartita, lacinis lanceolato-subulatis undique lacinis filiformibus fimbriata. Hæc species ceteroquin quam maxime variat magnitudine foliis densioribus remotioribusve, 2—5 dentalis. Varietatem erectiusculam in Lapponia pitensi habitu gentiliori insignem sureulis longis subdichotome divisionis angustis subulaceis, foliis trifidis rarius quadrididis, amphigastriis magnis frequentibusque legi. Hæc. sine dubio *I. Florkei*. Descriptioni Wahlenbergii, at non iconi, optime convenit. Sed vix ab hac specie distingui potest.

**706** *IUNGERMANNIA taxifolia* Whlb. fl. lap. n. 706, ubi vide.

Valde sum proclivis cum Cl. Hartmanno (fl. scand. p. 433) hanc ut varietatem *I. albicanti* associare, nam si medium folii hyalinum in *I. albicante* exceperis, nullum discrimen invenies. Specimina sanis longa hujus quoque dantur, sed semper aliquid angustiora. Semel unicum specimen solitarium *I. albicantis* o: medio folio hyalino in Nordlandia reperi.

**709** *IUNGERMANNIA resupinata* Whlb. l. c. n. 709, ubi vide.

I. *umbrosa* Hook. jung. t. 24.

**1190** *IUNGERMANNIA Dicksoni*: surculo erectiusculo subsimplici filiformi, foliis inaequalibus bilobis, lobis conduplicatis, inferioribus maio-

ribus utrisque ovatis integerrimis acutis, (calycibus terminalibus plicatis ore contracto dentato).

*I. Dicksonii* Hook. jung. t. 48.

Hab: in terra arenosa crypta humidaqve Saltalen Nordlandiae.

Minutie ab omnibus affinibus discernitur. Surculi tonnucissimi, *I. byssaceæ* vix sequentes, cæspites erecti 3—4 lineares una cum foliis vix ad medium fissis laxioris substantiæ et vivide viridis coloris sunt. Ab iconi Hookeri unice foliis non adeo profunde fissis paulisper differt.

714 *JUNGERMANNIA inflata*: foliis subretundinis concavis subdistantibus acute bifidis, lobis obtusis subinæqualibus, calycibus pyriformibus ore contracto dentato.

*I. inflata* Hook. jung. t. 38, *Huds. angl.* ex Hookero. *Whlb.* fl. lap. n. 714?

$\beta$  *palustris*: surculis simplicibus filiformibus, foliis remotis oblongis, lobo inferiore minore.

Hab: in rupibus udis sylvisqve humidis;  $\beta$  copiose in paludibus subalpinis Nordlandiae et Lapponiae pitensis.

Cl. Hookeri icon et descriptio convenientissima, sed de synonymo Wahlenbergii dubius sum, quia dicit: "lobis acutiusculis", et forsitan majori jure ad hanc referri potest: *I. Funckii* *Whlb.* l. c.

713. Planta texturæ mollis intense viridis, foliorum lobis uno fere semper altero majori, quod etiam bene expressit Cl. Hooker in fig. 4. Caulis adscendens et erectus.

Var  $\beta$ . valde insignis, sed ab hac divelli non potest. Ubi loco semper aquoso crescunt, surculi cæspitosi erecti tenues simplices ad 3 poll. longi molles texturæ laxæ vivide, sed dilute virides, evadunt; ubi vero aqua interdum deficit, virescenti nigri procumbentes limum quasi panno tegunt, sed de cætero haud diversi. Folia disticha remota alterna oblonga acute bifida, lobis uno altero evidenter majore obtusis, inferiora confusa, superiora remotiora. Calyx clavato-cylindraceus ore connivente dentato. Sporangium oblongum.

**1191 IUNGERMANNIA laxifolia:** surculo erecto simpliciusculo filiformi, foliis distantibus subquadritariis erecto-patentibus ovatis acute bifidis, calyce clavato-oblongo, ore contracto dentato.

I. *laxifolia* Hook. jung. t. 59.

Hab. in rivulis subalpinis Nordlandiae saltensis rarius.

Surculi cæspitosi nigro-virides erecti tenuissimi cum foliis irregulariter ad omnia surculi latera dispositis hanc statim eximiam reddunt 1—2 poll. alta nuda sine ulla radicalis, plerisque tenuior. Retinulum ut in *I. bicuspidata* lexissimum, ut etiam in caule opus vasculare appareat. Calyces pro ratione magni. Folia perichæstia cæteris similia.

**1192 IUNGERMANNIA curvifolia:** foliis subrotundis erectiusculis valde concavis bifidis, laciniis acuminatis incurvis, calyce in ramis propriis brevissimis.

I. *curvifolia* Diks... IV. et Mohr cryp. germ. p. 423. Web. prd. p. 76, Hook. jung. t. 16.

Hab. in terra limosa sylvatica inferalpinorum Nordlandiae saltensis rarius e. gr. in Fiskevaagmoen Saltdalen.

Planta gracilis. Rami erectiusculi subcæspitosi.

**1193 IUNGERMANNIA excisa:** caule prostrato subsimplici, foliis patentibus subquadratatis profunde emarginatis, calycibus terminalibus oblongis albidis rufescensque, ore plicato dentato.

*β. crispata*: foliis longitudinaliter undulatis, segmentis inæqualibus crispatis. Hook. jung. t. 9. Hart. fl. scand. p. 440. Fl. dan. t. 1715, 1.

?I. *dubia* et *Ehrhartiana* Web. prd. p. 79, 81?

Hab. in sylvis imprimis in ligno putrido, sed etiam in terra humida per Nordlandiam saltensem et Lapponiam pitensem fere ubique.

Valde miror, quod hæc stirps vulgatissima oculatissimum Wahlenbergium plane effugere potuerit,

**1194 IUNGERMANNIA ventricosa:** caule prostrato subramoso, foliis patentibus subquadratatis obtuse emarginatis, calyce terminali concolor sub-sphærico, demum oblongo-ovato, ore contracto dentato.

*I. ventricosa* Hook. jung. t. 28. *Diks. fasc.* 2 p. 14. *Dill. Musc.* i. 70 f. 14.

*I. bicorpis* Hoffm. *fl. germ.* 2 p. 89. *Fl. dan.* t. 888. b.

*I. globulifera* Roth. *germ.* 3 p. 379.

Hab. in terra humida sat frequenter in Saltdalen Nordlandiae.

Magnitudine et directione foliorum magnopere variat. Surculi interdum subplani. Difficillime a priori secernitur, at tamdiu quam seorsim enumeratur dignosci debet: mole majori, foliis saepissime rematioribus, obtuse et levius emarginatis, uno margine convexo, altero subconcavo. Glomeruli pulverulentii in apicibus foliorum vix huic, ut vult Cl. Hooker, uice propria, nam specimena pulverulenta, quae ob calycem ad *I. excisam* trahi debent, habeo. Rarius priori et imprimis rarius fructifera obvenit. Synonyma ex opere Cl. Hookeri desumpta sunt.

**1195 IUNGERMANNIA pusilla**: surculis prostratis simpliciusculis; foliis horizontalibus subquadris undulatis 2—3 lobis, calycibus terminalibus campanulatis,

*I. pusilla* Lin. *fl. svec.* n. 1050. W. et Mohr. *cryp. germ.* p. 429. Web. *prd.* p. 87. Whlbg. *fl. ups.* n. 814, *Fl. dan.* t. 1717. Hook. jung. t. 69. ex *Fl. dan.*

Hab. in terra uida ad latera montium Saltdalen Nordlandiae.

Autumno calycibus pulchre ornatam inveni.

**1196 IUNGERMANNIA crenulata**: caule procumbente subramoso, foliis suborbicularibus conniventibus, calyce terminali obovato longitudinaliter quadrangulari-compresso,

*I. crenulata* Hook. jung. t. 27. Engl. bot. t. 1463 ex Hook.

?*I. Sphagni* β minor Whlbg. *fl. lap.* n. 394?

Hab. in terra arenosa sterili tum Nordlandiae saltem, sis, tum Lapponiae pitensis.

Plerumque rufescit haecce species. Insignis est foliis suborbicularibus reticulo marginum quadrangulari, quod tamen etiam in aliis Jungermann-

aliis rotundifoliis et gr. compressa observatur. Folia versus apicem conferta imbricata. Au ad hanc an ad *I. scalaris* referri debeat synon. Wahlenbergii pro certo dicere non audeo. Differt illa ab hoc i amphigastriis, caule erectiusculo etc.

**1197 JUNGERMANNIA pumila**  $\beta$ . *nigricans*: caule adscendente ramoso, foliis subremotis horizontalibus concavis elliptico-ovatis, (calyce oblongo-ovato acuminato).

I. *pumila*  $\beta$  *nigricans* Hook. jung. t. 17. f. 7, 8, 9. optima.

II. *scalaris* Fl. dan. t. 1716. ?

Hab. in terra interqvæ muscos ad fontes et rivulos inferalpinos Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Surculi angusti, 3-5 lin. longi dorso radiculosæ. Folia intense viridia et nigro-viridia oblongo-rotundata, reticulo denso tenui. Vix dubito, qvin hujus loei est *Fl. dan.* t. 1716, nam nulla amphigastria quoqve ibi picta sunt, quam obrem *I. scalaris* Hook. esse non potest. *I. scalaris* Schmid. foliis convexis suborbicularibus differre videtur.

**1198 JUNGERMANNIA cordifolia**: surculo erecto flexuoso dichotomo, foliis cordiformibus erectis concavis subcircumvolutis, (calyce terminali axillariqvæ).

I. *cordifolia* Hook. jung. t. 32. opt.

Hab. in rivulis subalpinis Nordlandiæ saltensis passim copiose ex. gr. in Saltdalen.

Nulli alii affinis. Modo leviter inspecta cum *I. undulata*, quam magnitudine et crescendi modo æqvat, confundi potest. Intense viridis, siccata nigrescit. Adeo flaccida et substantia laxæ ut siccata in aqua difficulter perfecte reviviscat. Folia non cordata, sed cordiformia s. quadrato-ovata obtusa. Surculi passim stolones laterales emittunt, quibus evolutis dichotome divisi evadunt.

**1199** <sup>722</sup> <sub>723</sub> **JUNGERMANNIA pinguis**: fronde oblongo decumbente enervi carnosa sinuata divisaqve, calyce ex inferiore parte prope marginem egrediente brevissimo, perisporangio exerto cylindrico.

I. *pinguis* Lin. svec. n. 1048. Leers herb. p. 53. W. et Mohr. crypt. germ. p. 432. Web. prd. p. 93.

*Fl. dan.* t. 1423. *Hook. jung.* t. 45. opt. *Dill. musc.* t. 74. f. 42. (excl. fig. K. R. S.)

I. fronde foliacea lacera ex latere florifera *Hall. helv.* n. 1884.

$\beta$ . *angustior*: fronde elongata sublineari, simpli-  
citer vel subpinnatum ramosa *Hook. jung.* t. 46, 2.  
Hab. in argillosis uidis Saltdalen Nordlandiae passim.

Frons spongiosa supra planiuscula, subtus con-  
vexa fragilis vivide viridis. An calyx marginis;  
an inférus, difficile perspicitur. Sporangia oblonga.

728 JUNGERMANNIA *Blasia* *Hech. jung.* t. 81.  
*Whlbg. fl. tips.* n. 818.

*Blasia pusilla* *Whlbg. fl. lap.* n. 728, ubi vide.

726 MARCHANTIA *hemisphaerica*: *Whlbg. fl. lap.* n. 726, ubi vide.

Hab. quoque in terra umbrosa ad rupes Nordlandiam salterissem passim frequenter.

1200 MARCHANTIA *conica*: receptaculo femineo integro ovato-conico subangulate, masculo sessili,  
*W. et Mohr. crypt. germ.* p. 890. *Web. prd.* p. 106. *Hedw. theor.* t. 27. f. 8-5. t. 28. *Lin. sp. pl.* 2 p. 1604. *Dill. musc.* t. 75. f. 1.

Hab. in marginibus terrenis et saxis ad rivulos inferal-  
pinos Saltdalen Nordlandiae frequentes.

Mense Junii receptacula novella in ampulla hyalina squamis reniformibus purpureis stipata, sessilia et subglobosa reperiuntur et Targionicam eximie referunt. Autumno receptacula novella effermata sunt, et primo vero vigent maxime effectus statim evanescunt. Calyces proprii s. calyptrae veré adstinent. In planta nondum matura calyx proprius albus hyalinus arctissime pedunculum sporangiumque obvelat includit. Cum loculamentorum substantia removatur, nudi apparent et pedunculi et germen, sed si inter digitos premuntur, prosilit germen cum pedunculo et remanet saccus esse tenuissimus albus pellucidus. Cum maturuerit et erupuerit germen, calyx intra fines loculamenti transversaliter disruptus romanet, et tubulosus pedicellum et basin germinis includit. In liquore interno receptaculorum masculinorum *Vibrios* *Anguillulas* *Muell.* inveni,

**1201 MARCHANTIA cruciata:** loculamentis nudis  
oppositis f. cruciatis tubulosis cristatis hyalinis.

*M. cruciata Lin. sp. pl. 2. 1604. Dill. musc.  
t. 75. f. 5.*

Hab. in terra rupium et in collibus ad pedes monstrosum  
callidiissimum Saltdalen Nordlande ex. gr. supra  
pedes pastoriales copiose una cum *M. pilosa*.

Planta haec rarissima nitidissimaque biennis,  
medio mense Junii florans, mox defloraicit et pe-  
riit. Frondes iis *M. hemisphericae* minores, vi-  
rides mox pallescentes, crassiuscula, substantia  
substratae solidae, alias tubulosa, subtus nervo  
purpureo radiculis dense tecta. Pedunculus teres  
flexuoso hyalinus ratione stirpis crassissimus ut  
pote *M. polymerpha* crassior. Loculamenta 2 op-  
posita f. 3-4 cruciatim, centro alterum alteri af-  
fixum, pileo nullo teeta tubulosa supra carinata  
apice transverse fissa, ex qua fissura erumpit ger-  
men ferrugineo-rufum globosum, pedicello brevi  
viridi, in lacinias 8-9 sece findens, nulla calyp-  
tra s. calyce proprio stipatum, sed junius viride  
nondum e loculamento eruptum apiculo setiformi  
quasi stylo caduco terminatum est. Loculamenta  
flavescenti-alba subhyalina, sepiissime modo duo  
fructifera, uno vel duobus sterilibus adstantibus,  
fimbriis ornata. Fimbriae haec vera corona pedun-  
culi inter pedunculum et loculamenta affixa et in  
nulla conjunctione cum germinibus sunt.

### ORDO III ALGÆ.

#### LICHENES \*)

**1202 VARIOLARIA communis** crusta cartila-  
ginea levigata demum iæqvabili cinerascenti-albi-  
da, sordeis immarginatis albis pulverulentis.

\*) Genera plurima (sive ut Genera sive ut subgenera consi-  
dero) et nomina Achariana ut a plurimis recepta retinui,  
cum locus novi systematis coadendi hic non sit. Nonnulla  
tamen invita prorsus natura ab Achario condita a. gr. Ur-  
ceolariam, Gyalectam Pormam, Pyrenulam anis omnibus  
associavi. Lecideam notione Acharii retinai, cum novum  
genus Biatorum Fries hoc loco adoptare ueluerim.

*V. communis* Ach. syn p. 130. *Fl. Lief.* n. 170.  
*Whlbg. fl. nps.* n. 974.

*Lichen lagineus* Ach. prd. p. 27. *Lin. fl. sv.* n. 1066. *Whlbg. fl. carp.* n. 1234.

Hab. in truncis Arborum, imprimis Betule et Alni usquead subalpinam regionem per Nordlandiam frequentem.

Variolæ sphæroideæ et planæ. Jam *Cl. Flörke* l. c. inter hanc et *V. discoideam* (*amarum* Ach. syn.) permutationem apud *Gl. Acharium* irrepsisse observavit.

**733** *LECANORA parella*  $\beta$  *pallescens*: crusta rugosa lœvi, apotheciis regularibus disco pallido.

*L. parella*  $\beta$  *pallescens* Ach. syn. p. 169.

*Lichen pallescens* Ach. prd. p. 36. *Whlbg. fl. nps.* n. 828. *carp.* n. 1236. *Lin. fl. svec.* n. 1071.

Hab. in arboribus ubique per Nordlandiam saltensem, sed vix altius versus alpinam regionem quam *Sorbus* ascendit.

Solummodo crista parum crassiori a var. *upsaliensi* differt, et si ab aliis ut species distincta, et quidem nuperrime a *Wahlenbergio* in fl. ups. relata non esset, vix memoratu digna. At haec duæ varietates unitæ unam insignem varietatem *L. parellæ* sc. crista tenui, apotheciis regularibus, disco lutescente ob substantiam internam luteam, (quæ in  $\alpha$  vix pallida) constituant. Hujus crista etiam interdum sorediis pulverulenta; in hoc statu semper a formis subsimilibus *L. tartarea* dignoscitur: sorediis albis s. pallescentibus, non quam flavis s. ochraceis.

**734** *LECANORA tartarea*  $\delta$ . *grandinosa*: crusta cartilaginea verrucoso-granulata, verrueis subglobosis glabris.

*L. tart.*  $\beta$  *grandinosa* Ach. syn. p. 172.

Hab. in truncis Juniperi ad latera montium inferalpinorum Saltdalen Nordlandiæ rarius sterilis.

**1202** *LECANORA bryontha*: crista tenuissima alba, glebulis globosis seu papillæformibus subpulveraceis adspersa, apotheciis planis rugulosis pallidis, marginem thallodem demum obtusis.

*L. bryontha* Ach! syn. p. 156. Lich. un. p. 392.  
(excl. syn. Whlb.)

Hab. in muscis subdestructis per Nordlandiam saltem sem rarius.

Crusta subicularis saepè inconspicua; glebulæ intra cutem teniem massam pulveraceam includentes saepè ita elongantur, ut papillæ evadant, quorum ex apice erumpunt apothecia opaca; madida tumida subgelatinosa et pellucida, ascis albidis maximis referta. Tanidu incorrupta sunt, semper pallida. Aestate proiecta Lecideæ speciem omnino mentitur.

12047<sup>3</sup>/<sub>2</sub> **LECANORA symmicta**: crusta subgranulata sulphurea, apotheciis planiusculis demum convexis difformibus subglobosisque pallide luteolis fuscescentibusque, margine thallodè juniorum tenui integrimo evanescente. Ach. syn. p. 340.

*L. varia* var. *symmicta* Ach. lich. un. p. 379.

*L. anomala* var. *ochrostoma* ibid. p. 383.

Lecidea *symmicta* Ach. syn. p. 36.

$\beta$  *leprosa*: crusta tartareo-granulata, granulis in pulverem virescitentem fatiscentibus;

*L. symmicta*  $\beta$ . *leprosa* Ach. syn. p. 340.

$\gamma$  *apochroea*: crusta disperse granulata, apotheciis e granulis erumpentibus et ab iis marginatis, disco planinculo pallido, virescenti, livescenti-fusco nigroque marginem thallodem tenuem sulphureum demum suboccludente.

*L. summieta*  $\gamma$ . *apochroea* Ach. syn. p. 340.

*L. apochroea* ibid. p. 162 (excluso syn. Flörkei) lich. un. p. 138 (Spiloma Vitiligo et soradiatum).

*L. varia* var. *ravida*, *apochroea* et *pinara* Ach. lich. un. p. 378, 379.

*Parmelia cerina*  $\delta$ . *ravida* Ach. meth. p. 175.

Hab.  $\alpha$  in truneis arborum frondosarum frequenter;  $\beta$ : in parietibus vetustis;  $\gamma$ : in ramis decorticatis et cortice Pini per Nordlandiam saltem sem inferalpinam.

Est quasi species inter *L. variam* et *Ehrhardtianam* media. Var.  $\beta$  modo forma crusta luxuriante ideoque rarius fructificans. Var.  $\gamma$ . econ-

trario adeo diversa, ut vix magnopere erret, qvi seorsim eam enumeret. Subicularem crustam albam sorediferam, in qua saepe provenit, ad eam non pertinere, Inculenter demonstratur, ubi in cortice Pini proveniat. Crusta e granulis dispersis, saepe minutissimis constat. Ex his, rupto apice, procedunt apothecia, qvalem efformationem in var.  $\alpha$  observare mihi nunquam contigit. In cortice Pini proveniens apotheciis minutis ornata est.

**1205<sup>235</sup>/<sub>736</sub> LÉCANORA Ehrhardtiana  $\beta$  polytropa:** crusta cartilaginea pallida granulato-areolata, apotheciis planiusculis margini tenui flexuosis lobatisqve demum subglobosis carneo lutescentibus flavescentibusqve.

Lecidea Ehrhardt.  $\beta$  polytropa Ach. syn. p. 47.  
Lecidea polytropa Ach. meth. p. 72.

Lichen varius  $\beta$ , maculiformis Whlbg. fl. lap. p. 403 (excl. synon. Hoffm.).

Lichen polytropus Ehrh.

Hab. in saxis rupibusqve inferalpinis et alpinis per Nordlandiam et Finmarkiam ubique.

Crusta et apothecia nitida. Color apotheciorum in summa senectute in carneum et subferrugineum, sed nunquam in viride fuscum nigrumve abire potest. A *L. Ehrhardtiana* secerni nequit, qvia præter colorem nil similius esse potest qvam horum apothecia. Vera qvoqve Lecanoræ sp., qvod etiam Cl. Wahlenberg agnovit, sed ob crustam subconcoloram cartilagineæ substantiæ margo proprius appetet, etsi vere thallodes est. Qvoad crassitudinem crustæ admodum variat, cum interdum rimosa, interdum subnulla.

**1206<sup>235</sup>/<sub>736</sub> LECANORA mutabilis:** crusta diffracto-areolata opaca pallide sulphurea, areolis rugosis subcrenulatis, apotheciis adnatis planis demum convexis virescenti-pallidis viridibus fuscisqve, margine thallode tenui flexuoso persistente.

*L. intricata* Ach! syn. p. 154. Fr! lich. exs. n. 101.

Hab. in saxis micaeis, imprimis prope littora per Nordlandiam saltensem.

Nitoris defectus, color apotheciorum, margo, etsi tenuis, persistens notæ sunt unice constantes, quibus hæc variabilis ab antecedenti variabili dignosci potest. Diu hæsitavi, anne eos conjungere, sed illa ab *L. Ehrhardtiana* secerni, hæc cum ea conjungi nequit. De synynomo Acharii specimine\*) certus, sed cum Cl. Flörke meum Lichenem novam speciem agnoverit, vereor, ut synonymon *Schraderi* (*Lichen intricatus* *Journ. f. d. bot.* 1. p. 72) ad hunc pertineat, et hanc ob rem nomen meum retinui. A. *L. sulphurea* differt crista cartilaginea, apotheciis nunquam subpruinosis, margine evidenter persistenti.

**1207** *LECANORA ocrinæta*  $\beta$  *conglobata*: crusta rugulosa tuberosaque rimosa pallescente, apotheciis submembranaceis flexuosis disco flavescenti-ochraceo, demum convexo difformi tuberculatoque marginem thallodem tenuem pallidum subobtegente.

Cfr. *L. ocrinæta Ach. syn.* p. 162.

Hab. in saxis micaceis circa Fiskevaag Saltdalen Nordlandiæ rarius,

Disco apotheciorum confertorum magno ochraceo opaco margine pallido ocellato mox distinguitur. Ætate subpruinosus, margine flexuoso lobato. Hujus speciei esse declaravit Flörke.

**1208** *LECANORA leucococca*: crista effusa granulato - verrucosa pallescenti - alba, granulis margine subcrenulatis, apotheciis planis pallidis subvirescentibus margine thallode albo subflexuoso.

Hab. in rupibus schistosis circa sinum saltensem Nordlandiæ passim.

Granula crustæ modo aggregata, modo dispersa convexa; iis adnata sunt apothecia minora, habitu fere Lecideoidea, cum margo thallodes a disco quasi illitus, ejusdem substantiæ esse videatur. Ex crista vero re vera oritur, quod etiam in aliis speciminibus ab exteriore parte manifeste apparet. An *L. livida Ach.* hujus loci?

\*) Cum speciminum Acharianorum mentionem facio, quæ in herbario El. b. Swartzii, hunc ab illo data, intelligo.

**1209<sup>73</sup>/<sub>3</sub>** LECANORA *Sommerfeltiana*: crista tareo rimulosa subpulverulenta alba; apotheciis elevatis livido-carneis subpruinosis, disco plano dentum convexiusculo, margine thallode tenui sub-integerrimo,

L. *Sommerfeltiana* Fl. Ms.

$\beta$ . *macra*: crista lævigata subgranulata, apotheciis margine elevato crenulato.

Hab. in rupibus micaceis et calcareis;  $\alpha$ : in rupibus ab imbribus magis absconditis,  $\beta$ : in rupibus eis magis expositis circa sinum saltensem Nordlandiae passim copiose.

Maculas pollicares, etiam minores confertas candidas cretaceas subeffiguratæ in rupibus efficit. Apothecia minuta flexuosa madida subpellucida valde tument et ampliantur. A *Lec. Swartzii* differt colore et minutie apotheciorum p. p. Var.  $\beta$ . satis diversum præbet habitum, ad *L. angulosæ* formas accedens, sed est modo forma ab imbribus et sole trita, qva re totus lichen durior factus est: crista subcartilaginea lævigata, in granula magis diffractæ, margine apotheciorum rigidore crenulato flexuosoque. Ab Ill. Flörke ut sp. nova etiam in Germaniæ montibus obvia agnita est.

**1210<sup>73</sup>/<sub>3</sub>** LECANORA *albella*  $\beta$ . *cinerella*: crista tenui effusa continua membranacea subrugosa cinereo-lactea, apotheciis confertis minutulis plano convexis subpruinosis albido-pallidis denum fusco-incarnatis, margine thallode tenui subevanido

Fl. Liefr. n. 88.

L. *angulosa* b. leptyrea Ach! syn. p. 167.

L. *angulosa*  $\alpha$  leptyrea Ach. lich. un. p. 364.

Lichen angulosus Whlb. fl. carp. n. 1243.

L. *pallidus* Hagen hist. lich. t. 1 f. 6.

Hab. in Alnis Salicibus etc. inferalpinorum circa sinum saltensem Nordlandiae ubique copiose.

Colore pallidiore imprimis a *L. angulosa* distinguatur, ut etiam vulgo: apotheciis minoribus margineque tenuiore, etsi sat magna et flexuosa in Populis ad Bodöe legi.

**1211<sup>735</sup>** LECANORA *carneolutea*: crusta tenui submenibracea lavigata canescens - alba, apotheciis subinnatis, disco plano dein convexo ruguloso pallescente, margine thallode tenui subinfuso crenulato demum occluso;

*L. carneolutea Ach.* syn. p. 171. *lich. un.* p. 374,  
*Parmelia carneolutea Turner* . . . *Engl. bot.* t. 2010  
(ex Achar.)

Lecidea protuberans *Somrf.* in lit.

Hab. in cortice Alnorum Betularumque in inferalpinis Saltdalen Nordlandiae freqventer; in Lapponia pitensi supra Arjeplog rarius.

E crusta lavigata subcartilaginea tenui apothecia minora disco subspongioso, a crusta rupta marginata erumpunt. In junioribus margo ideo inflexus, sed mox, disco progradiente, omnino occluditur, et nisi saepe scutellæ vacue a crusta fermentæ, disco elapso, cernebantur, Læcideæ species haberetur, necesse erat. In crusta tenui adest tamen stratum fœculiferum viride. De synonymo Achariano certus, viso specimine.

**1212<sup>735</sup>** LECANORA *unicolor*: crusta tartarea inæqvabili rimosa subcartilaginea areolis plicatis, livido-sulphurea, apotheciis superficialibus planis disco carneo-pallido rore cæsio marginem thallodem crassiusculum æquante, demum convexa marginem occidente.

Hab. in latèribus saxonum absconditis in summis alpibus e. gr. Baadfjeldet Saltdalen Nordlandiae rarissime.

Ubi crusta crassior, tartarea rimoso-areolata, ubi tenuior, granulata, granulis lavigatis; ubi granula parce adsunt, fibroso-radiata. Apothecia etate rore deraso, nigrescunt, interdum lobato-difformia, imo semel botryosa. *L. cenisiæ* f. *rugosæ* proxime adstat.

**1213<sup>735</sup>** LECANORA *lutescens*: crusta effusa tenui membranacea lactea, granulis virescenti-pallidi-pulverulentis adspersa, apotheciis disco planiusculo carneo-pallescenti, in margine flexuoso pulverulenta.

*L. lutescens Ach.* syn. p. 168 *lich. un.* p. 367.  
*L. elatina Ach.* *lich. un.* p. 387.

*Parmelia lutescens* Flörke!

*Lepraria leiphaema* et *sulphurea* Ach. syn.  
p. 330.

*L. leiphaema* Flörke! Lief. n. 60.

*Lepra sulphurea* Erh.

*Parmelia sulphureo-nigricans* Fl! hujus var.

Hab. in cortice vetusto Betule in inferalpinis Nordlandiae saltensis rarius.

Collatis speciminiibus Flörkeanis *Lepr. leiphaemæ* et *Lec. lutescentis* cum meis, in quibus crusta omnino eadem ac *L. leiphaema* Liefr. n. 60. et apothecia eadem ac in *L. lutescente*, nullum mihi dubium est, quin *L. lutescens* unice granulis confertioribus subiculum album subobtegentibus differat. De synomyno *P. sulphureo-nigricantis* ab ipso Cl. Flörkeo certior factus sum. Cfr. quoque obs. ad *L. symmictam*.

**1214<sup>736</sup><sub>737</sub> LECANORA salicina:** crusta granulata inaequabili flavescente, apotheciorum disco plano demum convexiuseculo aurantio margine proprio integerissimo intra marginem thallodem tenuem crenulatum denum subexlusum.

*L. salicina* Ach. syn. p. 175. Lich. un. p. 400.

*Patellaria salicina* Hofm. pl. lich. t. 61.

*Lichen salicinus* Whlbg. fl. ups. n. 832.

b. *microthelia*: crusta verrucosa papillataque.

*L. salicina* b. *microthelia* Ach. syn. p. 175.

*Parmelia microthelia* Ach. meth. p. 174.

*Lichen flavorubescens* Wither. (ex Achar.)

c. *nudiuscula*: crusta cineraseente, s. subnulla.

*Lecidea aurantiaca* Ach. syn. p. 50. meth. p. 69.

*Lichen aurantiacus* Ach. prd. p. 44. Fl. dan. t. 955, 1. Whlbg. fl. ups. n. 833.

*Biatora aurantiaca* Fries in Act. Ac. holm. 1822 p. 275.

d. *erythrella*: apotheciis intense aurantiacis, disco elevatiore, margine proprio manifesto, thallodem sub excludente.

*L. erythrella* Ach! syn. p. 175. meth. lich. p. 174.

*Verrucaria viridi-rufa* et *flavovirescens* Hoffm. fl. germ.-pl. lich. t. 20 (ex Achar.)

Hab. a. et c. in truncis Populorum et Salicuum frequenter; b. in muscis rarius; d. in rupibus calca-

reis et schistosis passim in inferalpinis circa sinum saltensem Nordlandiae.

Cum *Cl. Acharius* var. *microtheliam* ne veram quidem varietatem censuerit, ceteræ illam honorem multo minus merentur. Apotheciorum indeole, in charactere meo, ut credo, bene expressa optime distincta species. Toti speciei proprium quoque est, in pateulis, disco elasto, novos discos, saepe 2-3 demum confluentes, provenire. Cuique observatori in loco habitationis utrasque cognoscenti patebit, *L. erythrella* a *L. Salicina* modo ut formam saxicolam, aequa ac *Lecideam aurantiacam* Ach. modo defectu crustae flavescentis saepissime aetate et imbribus destructæ, differre. Var. *erythrella* eodem modo diffinis obvenit. Interdum in rupibus granula sat magna subcrenulata; tum dupli apotheciorum margine a *L. lobulata* Fl. distinguitur.

**1215<sup>736</sup><sub>737</sub> LECANORA lobulata:** crusta subfoliacea lobulata lutea, lobis brevissimis rotundato-crenatis, apotheciis confertis thallum subobtegentibus disco plano intense luteo, margine thallode regulari integerrimo.

*L. lobulata* Fl. Liefr. n. 14.

Hab. in rupibus meridie expositis inferalpinorum Saltdalen Nordlandiae passim e. gr. supra Storen-gen Fiskevaag.

Media inter *L. salicinam* et *muronum*. Dignoscitur: crusta granulata, granulis depressis subfoliaceis lobato-crenatis margine regulari elevato integerrimo, Tamen aetate discus convexus; quoque crusta oblitteratur, ut granula Foliaceam speciem amittant. Planta germanica prorsus eadens est ac planta nordlandica.

**737 LECANORA vitellina:** Whlbg. fl. lap. n. 737.

*B. coruscans:* crusta diffracto-granulosa, apotheciis confertissimis flexuosis crenatis lobatisve disco plano saturate vitellino.

*L. vitellina* *B. coruscans* Ach. syn. p. 174.

*V. aurella:* crustæ granulis dispersis s. nullis; apotheciis minutis regularibus margine elevate integro.

*L. vitellina*  $\gamma$ . *aurella* Ach. syn. p. 175.

*Parmelia murorum*  $\beta$ . *aurella* Ach. meth. p. 195.  
*Verrucaria aurella* et *byssina* Hoffm. fl. germ. p. 195.

Hab.  $\beta$ . in saxis lapidibus rupibusqve soli obversis per Nordlandiam saltensem inferalpinam. Var.  $\alpha$ . etiam in muscis summarum alpium rarissime legi.

Var.  $\beta$  insignis est crusta crassiori et apothecis majoribus subdifformibus a juventute crenatis, dein lobatis et crenatis. Apothecia in var.  $\gamma$ . magis quam duplo minora. *V. byssina* Hoffm. quam ad *Lecideam luteo-albam*  $\gamma$ , refert Cl. *Acharius*, nostra var.  $\gamma$ . sine crusta, apotheciis in byso quodam nigro rupestris sedentibus, est. Species haecce facile disco piano concolori opaco, interdum supruinoso dignoscitur. *L. citrina*, huic valde affinis, disco aurantiaco, et granulis crustae minutis subpulverulentis distingvi debet.

4216 **LECANORA citrina**: crusta granulato pulverulenta citrina, apotheciis adpressis planis aurantiis, margine thallode tenui subpulverulento.

*L. citrina* Ach. syn. p. 176. Fl. ! Liefr. n. 108. *Lichen citrinus* Ach. prd. p. 73.

*Verrucaria citrina* Hoffm. germ. p. 198.

Hab. in saxis et lignis vetustis per Nordlandiam saltensem rariss.

In tigillis aestate proiecta habitum satis alienum assumit. Crusta crassiuscula pulverulenta flavoviridis, demum viridis; apothecia majora piano - convexa aurantiaca nitentia subimmarginata.

741 **LECANORA Acharii**: crusta tenuissime rimosa ferruginea, rosea albidae, vigente intus aurantiaca, apotheciis minutis immersis rubellis dein fusco - nigris.

$\alpha$ . *genuina*: crusta subdeterminata levigata pallide - ochracea roseave, apotheciis planis subimmersis margine regulari integerrimo rubellis fulvisve.

*Urceolaria Acharii* Ach. prd. p. 33. fig. tit. syn. p. 137. Whlbg. fl. lap. n. 741. ups. n. 838. Engl. bor. 1087 ex Achar.

**b. cyrtaspis:** crusta determinata rufescenti - ochracea, apotheciis fuscis.

**U. Acharii**  $\beta.$  *cyrtaspis* Ach. meth. p. 151.  
syn. p. 137.

**L. cyrtaspis** Ach. lich. un. p. 397.

**Lichen Acharii**  $\beta$  *cyrtaspis* Whlbg. fl. lap. p. 405.  
**Lichen punctatus** Engl. bot. t. 450 ex Ach.

**$\beta.$  rhodopis:** crusta subeffusa subtartarea inæquavabili pulveracea que rosea - albida, madida intus aurantiaca, apotheciis minutis immersis irregularibus immarginatisque.

**b. melanopis:** apotheciis superficialibus submarginatis fuscis.

**c. depressa:** crusta tenuiore subæqvabili rimulosa cinerascenti-pallida, apotheciis minutis nigro-fuscis elevatis irregularibus disco depresso.

**Sagedia depressa** Ach, syn. p. 134.

**Hab.**  $\alpha$  in lapidibus rupibusque qvarzosis fluminum et inferalpinorum et alpinorum Nordlandiæ et Fiamarkiæ,  $\beta$  in rupibus calcareis stillieidiis aquarum madefactis Nordlandiæ inferalpinæ e. gr. Saltdalen freqventer;  $\beta.$  c. vero ibidem rarius.

Meam *U. rhodopin* cum *U. Acharii* Ach. modo post iterata examina speciminum perpluribus locis lectorum nullos fines determinatos stabilire permittentium conjungo. Differentia imprimis in crista qværenda est. In var.  $\beta.$  crista crassior laxioris substantiæ, qvæsi dissolutæ particulæ rupium calcariarum substantiæ crustæ immixtæ erant; Qvia laxioris substantiæ qvin etiam subpulveracea est, marginem adeo regularem quoqve efformare nequit, qvam ob rem discus ille roseus subgelatinosus subnudus in crista nidulari videtur. Particulæ calcariæ forsitan quoqve efficiunt, ut color ochraceus crustæ in superficie omnino evanuerit, et ad interiora repulsus sit. Modus idem, qvætate mutatur, formas *b. b.* proferens, eas quoqve ejusdem speciei esse ostendit, nam formæ: *cyrtaspis* et *melanopis* nil est nisi var.  $\alpha.$  et  $\beta.$ , in qvibus, et imprimis si locis proveniunt, ubi modo sicca modo madefacta soli exposita sint, apothecia magis elevata et obscurioris coloris ætate evaserint,

## CRYPTOGAMIA.

Crusta in varietate  $\beta.$  re vera subdeterminata suborbicularis, sed sæpius plures magnam rupis partem tegentes confluunt. In var.  $\alpha.$  crista omnino lævigata tenuis sicca rimulosa lapidi arctissime adiuncta est.

Forma  $\beta.$  c. *depressa* magis diversa apparat apotheciis elevatis annulatis, cum margines elevati subflexuosi nigri discum depresso suboccultantes annulos pusillos referant, attamen interna crustæ indoles (nam stratum aurantiacum etsi tenuius vere adest), et efformatio apotheciorum eam huc revocant. In rupe calcarea supra Fiskevaag Salt-dalen rarius modo irrigata hæc forma habitavit, et ibi per plures annos eam observans de vera ejus indole et affinitate certior factus sum. Qvoad crustam var.  $\alpha$  cum  $\beta.$  conjungit.

**4217<sup>741</sup><sub>722</sub>** LECANORA *granatina*: crusta tartarea rimoso - diffracta superficie granulosa fusco - rufescentes, apotheciis planis demum convexiusculis adnatis minutis coccineo - rubellis nitentibus, margine tenui plâno integerrimo albido.

Hab. in saxis apricis inferalpinis, rarissime alpinis Saltdalen Nordlandiæ. Nunc demum qvoqve in valle Valders australioris Norvegiæ a me lecta.

Species nitidula ab aliis distinctissima. Crustæ natura difficulter describitur. Crassiuscula, tota e granulis parvis, interdum crenulatis composita et quasi alba fuisse et rubro tincta esset videtur, nam puncta alba, quasi tinctura detrita esset, plura intermixta sunt. Apothecia minuta granata parva in saxo referunt, madida subhyalina, margine thallode tenuissimo, rarius quasi eroso s. subgranulato. *L. trapeliæ* Ach. mihi ignotæ proxime adstare videtur, sed ut speciem novam hanc qvoqve agnovit Cl. Flörke.

**4218<sup>741</sup><sub>722</sub>** LECANORA *rubra*: crusta inæqvabilis granulato - pulverulenta alba, apotheciis confertis concavis rubris, margine albo pulverulento subcrenulato.

*L. rubra* Ach. syn. p. 177. lich. un. p. 389.

Lichen Ulmi Ach. prd. p. 54.

*L. marmoreus* Engl. bot. t. 339. ex Ach.

**Hab.** supra mūcos putridos terramque rupium inferali pinorum per Nordlandiam saltensem rarius e gr. sub Ravnflauet Saltdalen.

Apothecia madida carneo-rubella, dissecta tria produnt strata, quorum supremum aurantiacum pulvere superficiali albo, qui colorem aurantiacum in carneum seu rubrum transmutat; medium virenti-pellucidum; et infimum, quod crusta intus viridis substrata est. Maxime affinis *L. tartarea*, quasi inter hanc et *L. subfuscum* media.

**744 LECANORA (Lichen) sarcopis Whlbg. fl. lap. n. 744. ubi vide. Ach. syn. p. 177.**

Duae occurunt varietates:

$\alpha$  crusta granulata tenuiore pallescente, apothecis parvis rubris.

$\beta$  marina: crusta subnulla s. verrucoso-frustulosa livida, apothecis demum subamplis, irregularibus livido-rubris.

Var.  $\beta$  semper in parietibus a mari non remotis occurrit, et speciem a *L. varia* distinctam *Lecanorae Hageni* propiorem demonstrat.

**742 LECANORA (Lichen) hæmatomma Whlbg. fl. lap. n. 742, excl. (?) post syn. Vahlii).**

*L. hæmatomma*  $\beta$ . porphyria Ach. syn. p. 178.

*L. lacteus* Fl. dan. t. 1185 f. 1.

**1219<sup>743</sup><sub>744</sub> LECANORA hydrophila:** crusta granulata pallescenti-alba, granulis dispersis levigatis subcrenatis, apothecis adnatis planis rubris, margine thallode crassiusculo elevato integerrimo, demum discum æquante crenulato.

**Hab.** in saxis a rivulis subalpinis interdum irrigatis Nordlandiae meridionalis rarissime; ex. gr. in Jarbroelven Saltdalen.

Crusta *L. leucococcæ* haud absimilis, sed apothecia magis *L. subfuscum* var. *argentatam* referunt. Granula satis magna, rarius aggregata, interdum plicata, opaca. Apothecia medice magnitudinis, intus albida, madida rufo-fulva.

**1220<sup>744</sup><sub>747</sub> LECANORA alpina:** crusta dispersa subtenui æqvabili rimosa pallenti-cinerea, apotheciorum disco immerso plano rufo, dein nigriscente margine thallode tenui integerrimo.

Hab. in saxis cacuminum alpestrium Nordlandiæ saltensis rarissime, ex gr. in alpe Hekkeltinden Skjerstad.

Urceolariæ species secundum normam Cl. Acharii. Affinitas summa cum *L. cinerea*, sed ob colorem apotheciorum hoc loco eam memoro. Sine dubio adest subiculum tenue atrum, in quo areolæ 2-5 lineares rimosæ in medio apotheciis sat magnis, *U. cinereo-rufescens* multo majoribus planis opacis ornatæ sedent. Ob crustam dispersam, apotheciorumque colorem et marginem tenuem non potest non a *L. cinerea* distingvi. Crusta tenui appланata et apotheciis ab *U. cinereo-rufescens* mox discernitur.

~~42217<sup>2</sup>~~<sup>2</sup><sub>7</sub> LECANORA coarctata: crusta effusa tenui rimulosa rugulosa albocinerascente, apotheciorum disco subimmerso, dein elevato plano nigrescenti-rubo, margine thallode tenui irregulari inflexo, demum subocculto.

*L. coarctata* cum var. *Ach.* syn. p. 150, 151. *lich. univ.* p. 353.

$\beta.$  ornata; crusta rimoso-areolata, apotheciis rubris, demum atrorubentibus subimmarginatis.

Hab. in rupibus occultis et a terra parum prominulis inferalpinis et subalpinis Saltdalen Nordlandiæ freqventer;  $\beta.$  in rupibus schistosis ad Bodöe.

Var.  $\beta.$  satis diversa crista crassiore, et apotheciis pulchrius coloratis, subsangvineis, et margine adeo occluso, ut vix appareat. Areolæ crustæ ad margines subeffiguratae. Cl. Flörke etiam hujus loci esse agnovit.

Formæ, quæ de cætero hic occurunt, proprie ad varietates Acharii pertinent, nam apothecia minuta, margo nunquam tam elevatus, et crista albidior quam in var.  $\alpha$  esse solet. Cæterum varum modo differunt, et vix ut varietates distinguvi merentur. Crusta interdum adeo tenuis et subtiliter rugulosa ut ad pulveraceum accedat. Apothecia minime atra, qualia describit Cl. Acharius, sed juniora rufescens, dein madida pallide rufa, sicca nigrescenti-rufa. Margo sicendo interdum adeo coarctatur, ut apothecia globulum minutissimum poro notatum referant; in madefac-

tis vero margo retrahitur discusque tumet. Cum nulla alia, saltem indigena, confundi potest.

747 **LECANORA subfuscus**: crusta cartilaginea lævigata demum granulata inæqvabili albo-cinerascente, apotheciis subfuscis margine elevato integrissimo demum flexuoso crenulatoque crustæ concolori.

Lichen subfuscus Whlbg. fl. lap. n. 747, ubi vide synonyma.

Præter complures modificationes quoad colorem apotheciorum et crassitudinem crustæ sequentes hujus speciei varietates memorabiles occurunt.

**β. allophana**: crusta cinerascente alba granulata, apotheciis confertis pallide fuscis margine flexuoso.

**L. subfuscus** g. allophana Ach. syn. p. 158.

**a. pallide-fusca**: apotheciis planis demum amplis subirregularibus margine elevato flexuoso crenulatoque. Verrucaria pallide-fusca Hoffm. fl. germ. p. 181 sec. Flörke in lit. et Ach.

**b. fusca**: apotheciis confertissimis convexiusculis margine proprio tenui marginem thallodem suboccludenti.

V. fusca Hoffm. fl. germ. p. 181 sec Flörke in lit. et Ach.

Hab. in saxis rupibusq; inferalpinis Nordlandiæ saltensis:

Orbicularis, sed interdum adeo lata ut orbes diametri spithamæ efficiat. Crusta semper granulata, granulis modo magis modo minus confertis. Formæ a. et b. nullo modo ut distinctæ varietates discerni possunt, quia in ætate juvenili apothecia simillima sunt. Hujus loci vix est **L. atra** β. expansa Ach. lich. un. sed synon. Hoffmanni modo ibi male citatum est.

**γ. epibryon**: crusta cartilaginea rugosa inæqvabili alba, apotheciorum disco nigropurpurascenti nitido marginem thallodem tenuem elevatum integrum, demum flexosum æqvante.

Lichen subfuscus β. bryontha Whlbg! fl. lap. p. 408 excl. syn. Ach.

**L. epibryon** Ach. syn. p. 155. Lich. un. p. 336.

Lichen epibryon Ach. prd. p. 79 sed non Whlbg.

Lichen hypnorum Wulf in Jacq. Coll. 4 t. 7 f. 4.

Hab. in muscis destructis et supra plantarum radices in inferalpinis frequenter, in alpinis rarius. In caudicibus putridis rarissime.

De synonymis Ach. et Wulf. me quoque certorem reddidit Cl. Flörke, et plantam Cl. Wahlenbergii ex ipsius specimine notam habeo, quare de synonymia nullum mihi dubium est; nec de loco seu affinitate, nam *L. subfuscæ a. argentatæ* Ach. adeo similis, ut ab ea ut species diversa minime discerni possit. Diversitas unice in margine apotheciorum tenuiore, saepe æque elevata sed non adeo crasso vel tumido constat. Apothecia in *L. subf. a. argent.*: etiam nitida, et quod in *L. epibryon* magis flexuosa seu irregularia sunt, e laxiori s. rugulosiori habitationis loco oritur. Specimina illa in caudice putrido lecta prorsus intermedia sunt.

? *L. flavescentia* Ach. syn. p. 158?  
*L. subfusca*  $\beta$  chlorona Ach. syn. p. 158?

Hab. in truncis Betularum circa sinum saltensem exteriorem Nordlandiæ rarius; e. gr. Bodoe, Bernæs.

Apothecia vix unquam fuscescunt, quare forsitan propria species, sed occasio iterata ejus observandæ mihi non erat, et multa comunia cum *L. subfuscæ* habet. Ob marginem non crenulatum et discum non concavum de syn. Ach. dubius haereo.

**1222 LECANORA obsoleta:** crusta subtartarea rugosa inæquabilis cinereo-pallescens, apotheciis planis fuscis nitidis, margine thallode integro elevato albido.

? *Lichen epibryon* Whlg. fl. lap. n. 749? (excl. omnib. synon.)

Hab. in terra e museis putrefactis orta alpium saltæ-lensium Nordlandiæ rarissime.

Species a *L. epibryon* Ach. distinctissima. Crusta cartilagineæ quidem substantiaæ, sed crassiuscula et adeo rugosa, ut tartarea dici debeat. Aestate fuscescit. Apothecia parva regularia orbiculata, semper plana margine elevato integerrimo crusta

*albidiori cincta.* Characteri Wahlenbergii bene convenit, sed specimen illius plantæ nunquam vidi.

- 1223. LECANORA angulosa:** crusta membranacea dein crassiuscula inæqvabili subrimosa albida, apotheciis plano-convexusculis fuscis tandem margine flexuoso crustæ concolori subdifformibus. *L. angulosa Ach. syn. p. 166.*

Hab. in cortice arborum e. gr. Sorbi; Alni Nordlandiæ meridionalis rarius.

Apothecia semper nuda, attamen re vera hujus loci sunt, qvod etjam Cl. Flörke affirmavit. Ab simili *L. subfusca* dignoscitur: crusta crassiori et apotheciis imperfectis nigro punctata.

- 1224. LECANORA Hageni:** crusta cartilaginea tenui subgranulata albo-cinerascente, apotheciis confertis minutis, disco plano demum convexo fusco nigroqve cæsio-pruinoso, margine thallode integerrimo.

*L. Hageni Ach. syn. p. 167. Fl! Lief. n. 106.*  
*Lichen Hageni Ach. pr. p. 57.*

*L. cærulescens Hagen lich. bor. p. 59 t. 4 f. 5.*  
*b. crenulata:* crusta tenui cinerascente, I. fibris ligni innata subnulla, apotheciis confertissimis, margine crenulato demum flexuoso cæsioqve pulvulento.

*L. Hageni e. crenulata Ach. syn. p. 168.*

*L. Hageni δ. cyanescens Ach. lich. un. p. 368.*  
*Parmelia cyanescens Ach. meth. p. 163.*

*β. sorbina:* crusta tenui lævigata demum granulata inæqvabili, apotheciis minutis confertissimis pallidis, carneis fuseescentibusqve, subnudis margine thallode tenui dein evanescente.

*L. Hageni b. syringea Ach. syn. p. 168? lich. un. p. 368?*

Hab. α in parietibus, tigillis, cortice Juniperi rupubisqve micaceis per Nordlandiam saltensem;  
β in epidermide Sorborum et Salicum imprimis juniorum versus radicem Saltdalen Nordlandiæ passim copiose.

Ab una parte hæcce species ad *L. subfuscum*: ab altera ad *L. sophoden* accedit. Qvæ *L. sophodi* affinis est, ad varietatem *crenulatam* s: *umbrinam lich. un.* pertinet; Hæcce forma im-

primitus apothecis majoribus, confertioribus sæpe crustam subobliterentibus, margine crenulato insignis est. Var  $\alpha.$  a *L. subfurca* apothecis minutis, margine albidiore tenuiore, disco pallidiore sæpissimeque pruinoso dignoscitur. Quæ in rupibus obvenit, lignicolæ similis est.

Var.  $\beta.$  *sorbina* ad *Lecideam cyrtellam* Fl. Lief. n. 162 *L. anomala*  $\beta.$  *cyrtella* Ach. syn. adeo accedit, ut, cum in adultis apothecis margo thallodes evanuerit, vix distinqui possint, et sine dubio ex iis unam novam speicem, *Lecanoram cyrtellam* constitutere naturæ convenientissimum esset. Madefacta crista viridis, apothecia subpellucida sunt. Margo nunquam tumidus, etsi manifestus. Inter varietates, quas descripsit Acharius, *b. syringæ* proxima affinis, sed non eademi.

**1225 LECANORA dispersa:** crusta leprosa subnulla, apothecis parvis superficialibus dispersis, disco planiusculo pallido, cæsio fuscescentive, margine subtus libero elevato crenato albo.

*L. dispersa* Fl! Lief. p. 45.

*Lichen dispersus* Pers. in Ust. An. bot. 7. p. 27. Ach. prd. p. 49

*Parmelia dispersa* Ach. meth. p. 169.

*Lecanora galactina* b. *dispersa* Ach. syn. p. 187.

*Verrucaria dispersa* Hoffm. fl. germ. p. 189. ex Fl.

Hab. in lapidibus calcareis in inferalpinis Saltdalen Nordlandiæ parcius.

Apothecia parva crenulata dispersa sine crusta mox dignoscuntur. Si *L. galactina* Ach. vere *L. angulosæ* forma est (cfr. Fl. Liefr. n. 89) ab hac. distinctissima.

**1226 LECANORA leptacina:** crusta effusa granulata, granulis cartilagineis levigatis crenatis stramineis, apothecis minutis disco plano olivaceo, margine thallode subtumido integerrimo.

Hab. in Andræis summorum alpium Nordlandiæ saltensis passim copiose.

Crustæ indole ab omnibus formis *L. atrosulphureæ* diversa. Margo rarius subcrenulatus aestate nonnihil recedit, cum discus procedat.

Madefacta nil mutatur, nisi quod apothecia quid fuscescunt, et rorem, quo tecta sunt, alias invisibilem produnt,

**1227<sup>742</sup>** LECANORA *roscida*: crusta granulata, granulis subdispersis minutis, cinerascenti-alba, apotheciorum disco plano cæsio pruinoso marginem thallodem integerrimum elevatum tandem superante.

*L. turfosa*  $\beta$ . *pachnea* Ach. syn. p. 156?

*L. epibryon*  $\beta$ . *pachnea* Ach. lich. un. p. 396?

Hab. in museis rupium calciarum inque rupibus ipsius meridiei obversis in inferalpinis Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Totus Lichen opacus. Crustæ granula stepitis dispersa, sæpiissime ab apotheciis, quæ interdina satis conferta sunt, oblitterata. Apothecia minuta semper pruinosa et plana, madida carneo s. Intescenti-fuseescentia, margine summa ætate quidem flexuoso sed nunquam crenato. Cum *L. surfacea*, quæ potius *L. sophodis* varietatibus associari potest, conjungi nequit. *Licheni panyrgo* Whlbg. mihi ignoto affinis esse sed imprimis crusta tenuiore differre videtur.

**1228<sup>751</sup>** LECANORA *alpestris*: crusta determinata orbiculari contigua granulato-rugosa roseo-grisea, dein nigrescente, margine tenuissimo subgranulato, apotheciis rufis margine thallode tenui dein evanescente.

*L. alpestris* Ach. syn. p. 152.

*L. maritima* Sommerfelt in Act. Ac. holm. 1823 p. 116.

Hab. in lapidibus qvarzosis litoralibus Nordlandiæ saltensis e. gr. Skjerstad, Öxengaard.

De vero synonymo Achariano a Cl. Flörke edocens sum. Etsi verum Placodium, ob fere nimirum affinitatem cum *L. aipospila* hoc loco ejus mentionem facio. Crusta tenuis, margine obsolete effigurata, junior et occulte crescents roseo-grisea, senior fusco-nigrescens margine dilutiore. Apothecia minora centralia rufo-fusca, margine tenui integerrimo crustæ concolori, dein subevanido. Differt *L. aipospila*: crusta distinctius papillata apotheciisq; obscurioribus; *L. variabilis*: crusta inæquabilis cæsio-virescente, apotheciis

## CRYPTOGAMIA.

magis dispersis et loco habitationis sc. semper in lapidibus calcariis.

**753 LECANORA (Lichen) spodophæa Whlbg.**  
fl. lap. n. 753, ubi vide.

Hab. una cum L. poliophæa et aipospila in scopulis et lapidibus totius littoris Nordlandiæ et Finmarkiæ.

Etiam huic limes ille byssinus albus, cuius apud *L. poliophæam* mentionem facit Cl. Wahlenberg, tribuendus est, qvare a sententia Cl. Flörkei *L. poliophæam* hujus formam senilem pronunciantem (in lit.) non magnopere abhorreo.

**1229<sup>757</sup> LECANORA exigua:** crusta inæquabili cinerascente f. subobsoleta, apotheciis minutis confertis planis margine tenui cinerascente, dein convexis margine subevanido, nigris opacis intus albis.

L. exigua Fl! Ms.

L. periclea β exigua Ach. syn. p. 151. Lich. nn. p. 356.

Parmelia exigua Ach. meth. p. 154.

Lichen exiguis Ach. prd. p. 69. Act. Ac. holm. 1795, t. 5 f. 6. d. e. f.

Verrucaria abietina Hoffm. fl. germ. 2 p. 93.

Hab. in rupibus dissolutis circa sinum saltensem Nordlandiæ parcus.

Apothecia majora quam in stirpe vulgari arborea alias simillima. Differt ab omnibus *L. sophidis* varietatibus: crusta margoque alba nec madida viridis, margine tenuiore, disco minore nigro, nec fusco. Cum *L. periclea b. pinicola* Ach., qvæ vera Lecideæ species, vix confundi potest.

**1230<sup>757</sup> LECANORA melanochlora:** crusta tartarea noduloso-granulata fusco-virescente, madida lœte viridi, apotheciorum disco atro marginè thallede elevato flexuoso subcrenulato.

L. viridis Somrf. in lit.

Hab. in lapidibus saxisqve inferalpinorum Nordlandiæ saltensis parcus.

*L. sophodi* proxima attamen distincta: crustæ crassioris madefaciæ colore intense et pure viridi, apotheciis majoribus et constanter atris.

757 LECANORA (*Lichen*) *atrosulphurea* Whlbg.

fl. lap. n. 757.

L. thiodes Sprengel *Entdeck.* 1 p. 224.

Hab. quoque in saxis siccis circa sinum saltensem Nordlandiae ex. gr. Bodoe.

Apotheciorum disco madido virescente ab omnibus affinibus discernitur. De synomino Sprengelii a Cl. Flörke centior factus sum. In lapis litoralibns ad Skjerstad forma maior, ab undis imbribusque sine dubio trita, habitu satis alieno: crusta sublævigata, apotheciis parvis, margine tenui, attamen non diversa occurit.

760 LECANORA (*Lichen*) *cinerea* Whlbg. fl. lap. n. 760, ubi vide et adde:

*Urcularia cinerea*  $\alpha$ ;  $\beta$ . *tigrina*  $\gamma$ . *polygonia*  $\delta$ . *graphica* Ach. syn. p. 140.

*Urc. ocellata* Fl. Liefr. n. 13.

*Sagedia lœvata* Ach. syn. p. 134.

*Lecidea pantosticta*  $\delta$ . *viridana* Ach. syn. p. 13.

Male atra apothecia dicit Cl. *Acharius*; modo nigra sunt, et toti speciei characteristicum est, quod madida fuscescant et juniora qvidem pallescant. Indoles apotheciorum interna in *Sagedia lœvata* prorsus eadem ac in *U. cinerea*, quare has discernere minime possum. Sine dubio plurimæ *Sagedia* species ad alios Lichenes referri debent. *Lecidea pant.  $\delta$ . viridana* ad Var.  $\beta$ . *vi-*  
*rens* Whlbg. pertinet.

762 LECANORA (*Lichen*) *protuberans* Whlbg. fl. lap. n. 762, ubi vide.

Hab. quoque in rupibus absconditis ad sinum saltensem Nordlandiae, ubi vero crusta cinerea nunquam pallescit. Margine tumido subinfuso demum flexuoso ab affini *L. cinerea* dignoscitur.

763 LECANORA (*Lichen*) *pelobotrya* Whlbg. fl. lap. n. 763, ubi vide.

Hab. quoque rarissimus hiece lichen, quem semel modo legit Cl. Wahleberg, in rupibus subirrigatis subalpinorum Saltdalen Nordlandiae rarius. Etiam ab Am. Blydt in rupibus Merager nideosiensis nuper lecta est.

Cum *U. gypsacea* Ach. ab exteris vulgo confunditur, a qua vero diversissima. Crusta qvidem subspongiosa, minime vero pulverulenta, at tartarea rimosa sublævigata livido-grisea (quasi quid rosei colori griseo immixtum est.) Apothecia, cum e crusta erumpant, minuta, dein ampliantur, subdifformia et quasi ex pluribus cœposita evadant. Margo juniorum satis coarctatus. Manufacta nil mutatur. Viso specimine Cl. Wahlenbergii de synonymo certus sum.

**761 LECANORA scruposa:** crusta tartarea rugoso-granulata s. cretaceo-pulverulenta cinerascente albaque, apotheciis urceolatis immersis cœsio-nigris.

$\alpha$ . *scruposa*: crusta rimosa rugoso-granulata cinerascente, apotheciis margine thallode intumescente subrugoso discoideum obtegente.

Lichen scruposus Whlb. fl. lap. n. 764. carp. n. 1245. Ach. prd. p. 32. Hoffm. En lich. t. 6. f. 1.

*Urceolaria scruposa*. Ach. syn. p. 142, meth. p. 147.

Hab. in saxis rupibusque per Nordlandiam ubique.

$\beta$  *parasitica*: crusta tenui contigua rugosa sublævigata albida, apotheciis minoribus nigro-cœsiis margine thallode discoideum obtegente.

*Urc. scruposa* var. *bryophila* Fl. dan. t. 1351, 2. *U. bryophila* Vulgo.

Lichen impressus Ach. prd. p. 104.

Hal: in thallo Cenom: pyxidatae aliisque muscis, quos destruit, per Nordlandiam saltensem. In caudice putrescente ad Löfmok Lapponiae pitensis quoque legi.

$\gamma$ . *gypsacea*: crusta molli pulveracea albissima cinerascenteque alba, apotheciis subpruinosis primum conniventibus a crusta subtectis, dein urceolatis apertis pruinosis, margine spurio thallode cinctis.

*Urceolaria scruposa*  $\beta$ . albissima Ach. meth. p. 147.

*U. gypsacea* Ach. syn. p. 142. Lich. un. p. 338.

*U. diacapsis* Ach. syn. p. 142. Lich. un. p. 339.

?*Gyaleeta cretacea* Ach. syn. p. 10?

Hab. in rupibus saxisque et in muscis rarius semper locis absconditis per Nordlandiam saltensem passim copiose.

Vereor, ne, me plura, quam par est, synonyma hoc loco coniunxisse, videatur. Attamen primum post iterata examina speciminum perplurimum a me ipso collectorum et saepissime in ipsis locis habitationis observatorum hoc de sententia Cl. Acharii decedens feci. Si specimina parva siccæ *Urc. scruposæ* Ach. cum crassa pulveracea *Urc. gypsaceæ* s. *diacapsis* Ach conferas, diversissima quidem apparent, sed non ita si ipse in rupibus innumeris formas, qua una in alteram abiit, observaveris. Apothecia plene eadem in omnibus, juvenilia subglobosa, ore connivente, grandeva subexplanata margine proprio elevato, a crusta firma et adhaerente tecta sed a laxa pulveracea que mox soluta liberaque, quare primum margo liber, dein totum fere apothecium liberum in cavitate crustæ marginem spurium mentiente (*U. diacapsis*) nidulatur.

Crusta crassa pulveracea varietatis γ. in locis absconditis humidis a pluvia ac ventis remota provenit. Color variat ab albissimo ad cinerascentem, saepe pallescentem in eodem individuo saepe ad pedalem latitudinem effuso lineamque crasso. Antea etiam *Cl. Flörke* var. β. *parasiticam* *Gyalectam bryophilam* Ach. syn. dixit, sed nuper scripsit: veram *G. bryophilam* nunc obtinui, sed ab *Urc. scruposæ* formis (ut talem meam agnoscit) vere distincta, et ad normam Acharii vera *Gyalectæ species.*" Hac auctoritate nixus synomon Acharii e synopsi exclusi. De cætero thallos Cenomycidis crusta teetus a plerisque "margo foliaceus lobatus" habetur, sed false. Ubi tecta crescit haecce varietas, pulveracea evadit et transitua ad *Urc. gypsaceam* manifeste demonstrat. Ubi in lignis et in muscis obvenit, saepe adsunt granula in crusta tenui elevata, e quibus lamina proligera prorumpit, qua re apothecia satis elevata Leeanoroidea, non Urceolaroidea proferuntur. An *Urc. mutabilis* Ach. ab hac diversa?

**4231** *LECANORA calcaria*  $\beta$ . Hoffmanni: crusta areolata, areolis subdispersis sordide cinerascentibus, apotheciorum disco minuto immerso nigro cæsio-pruinoso margine thallode elevato tumido albido-plumbeo.

*Urceolaria calcaria*  $\beta$  Hoffmanni Ach. syn. p. 143.  
U. Hoffmanni Ach. lich. un. p. 333. prdr. p. 31.  
U. contorta Fl! Lief. n. 30.

*Verrucaria contorta* Hoffm. pl. lich. t. 22, 1, 3.  
*Lichen contortus* Whlbg. fl. ups. n. 344 carp. n. 1246.

Hab. in rupibus saxisque non calcariis Saltdalen Nordlandiæ rarissime.

**4232** *LECANORA micraspis*: crusta tartarea papillata alba, papillis tenuibus cylindraceis, apotheciis minutis disco plano elevato atro, marginem thallem integerrimum excedente.

Hab. in rupibus inferalpinis maritimisque Nordlandiæ meridionalis rarius. Fructifera modo lecta est ad Björn Helgolandiae.

Orbes latos in rupibus efficit. Rarius modo fructifera, tumique magis granulata quam papillata. Papillæ breves tenuesque. Apothecia in apice granulorum proveniunt minutissima, disco subpulveraceo, (qvo Caliciis similia), marginem superante. A *L. illimata* omnino diversa.

**767** *LECANORA oculata*: crusta glabra papillata ramulosa albida: apotheciis subsessilibus atris, madidis badiis, concavis margine thallode tumido.

*L. oculata* Ach. syn. p. 148. *Diks cryp.* 2 p. 17. t. 6, f. 3. (Lichen) ex Achar.

*Isidium oculatum* (NB. siccum) Ach. lich. un. p. 550.

*Isidium dactylinum* (NB. madidum) Ach. syn. p. 282. lich. un. p. 570. meth. p. 137 t. 3. prd. p. 89.

*Lichen dactyliferus* Whlbg. fl. lap. n. 767.

Hab. supra muscos in subuliginosis alpium Nordlandiæ et Finmarkiæ copiose. In inferalpinis Saltalen Nordlandiæ rarius.

**877** *LECANORA sinopica*: crusta ximoso-areolata effigurato-sublobata virenti-rubra ochraceave,

apotheciis planis immersis nigris margine thallode tumido integerrimo.

*Endocarpon sinopicum Ach. syn. p. 98, Whlbg. fl. lap. n. 877, ubi vide.*

Vera Urceolariæ species secundum methodum Acharianam. Modo apothecia juniora punctiformia. Ab exteris planta evoluta vulgo pro *Urceolaria diamarta* habetur.

**1233<sup>758</sup>/<sub>759</sub> LECANORA nephæa:** crusta in subiculo atro, areolato-granulata, areolis convexis nigrescente-ferrugineis, apotheciis planis fuliginosis, margine thallode elevato flexuoso crenulatissimo. Hab. in saxis inferalpinis ad Fiskevaag Saltdalen rassisime.

Lichen distinctus et ut Lecanoræ species memorabilis ratione crustæ, cujus indeoles Lecideis similes est. Areolæ minores elevatæ subglobosæ subdispersæ ferrugineæ ætate nigrescunt; madidæ ferrugineo-fuscæ sunt. Apotheciorum color ater modo superficialis, margoque quam maxime flexuosus et crenatus. Nulli alii mihi notæ affinis est \*).

### \*\* *Placodium.*

**1234<sup>770</sup>/<sub>771</sub> LECANORA lentigera:** crusta orbiculari alba; lobis incisis crenatis, apotheciis planiusculis lutescentibus margine thallode elevato.

*L. lentigera Ach. syn. p. 179.*

*Lichen lentigerus Ach. prd. p. 103, Fl. dan. t. 1185 f. 2. Hoffm. En. lich. t. 9. f. 4. Pl. lich. t. 48 f. 1.*

Hab. in terra montium calciorum Saltdalen Nordlandiæ rarius. In Lyngen et Maasoe Fiamarkie legit Cl. Vahl.

**774 LECANORA murorum Whlbg. fl. lap. n. 774, ubi vide.**

\* ) Dubius ille *LICHEN obtusatus*, quam in supibus ad Klöven in Nordlandia senjensi legit Cl. Vahl et ad Dufouream retulit Cl. Acharius (syn. p. 247) sine dubio Lecanoræ species, L. oculatae aitnis, est.

*Var. γ crenulata*, quam cum dubio ad hanc speciem refert *Cl. Acharius*, re vera hujus speciei est. Specimine ab ipso *Wahlenbergio* accepto notam haheo.

4235 <sup>777</sup> LECANORA *callopisma*: crusta subrimosa-areolata flava nuda, ambitu lobato flavissimo, lacinis dilatatis planiusculis incisis, apotheciis convexiusculis subaurantiacis, margine thallode integro.

*L. callopisma Ach. syn. p. 184.*

*L. murorum var. callopisma Flotow in Jahrb. d. Gewächsk. 1, 3 p. 146,*

*Lichen murorum β. major Whlbg fl. lap. p. 416.*  
Hab. in rupibus calcariis maritimis Nordlandiae saltensis e, gr. promonterio Tangodden.

Nondum de veritate sententiae *Cl. Wahlenbergii* et *Flotowii*, hanc cum *L. murorum* conjungentium persvasum mihi est. Media mihi videtur inter *L. murorum* et *elegantem*. Ab illa differt: colore dilatiori, apotheciis majoribus; ab hac: colore dilatiori, lacinis magis contiguis, apotheciisqve majoribus. In alpinis Norvegiae australioris haud rara obvenit.

4236 <sup>777</sup> LECANORA *miniata* β. *obliterata*: crusta subeffusa areolato - verrucosa miniato - flavicante, ambitu subeffigurato, apotheciis minutis confertis conuexis concoloribus margine thallode integrimo.

*L. miniata β. oblitterata Ach. syn. p. 182.*

*Lichen oblitteratus Pers. in Ust. an. bot. 11 p. 15.*  
Hab. in saxis, imprimis corneis inferalpinorum et subalpinorum Saltdalen Nordlandiae rarius.

Cum var. α Ach. mihi ignota sit, utrum *Cl. Acharius* rectius ad hanc, an *Wahlenbergius* ad *L. elegantis* varietatem *Lobariam miniata Hoffm.* retulerit, dijudicare nescio. Ad *L. lobulatam Fl.* accedit, a qua imprimis colore et crusta magis placodioidea differt.

783 <sup>777</sup> LECANORA (*Lichen*) *melanaspis* Whlbg. fl. lap. n. 783, ubi vide.

Nomen et character *Wahlenbergii* non bonus, nam apothecia rarius modo nigra, sed, idqve imprimis madida, rubra s. rufo-fusca et male ad

*Parmelias* refertur. Vix ut species differt *L. alaphophlaca*. Crusta in illa modo crassior et una cum apothecis dilutius colorata, sed de cætero utræque ejusdem omnino indolis sunt.

\*\*\* *Pforoma*

779 LECANORA (*Lichen*) *brunnea* Whlb. fl. lap. n. 779.

*B. coronata*: crusta cinerea, apotheciis minutulis fulvis s. fuscorufis.

*L. brunnea* *B. coronata* Ach. syn. p. 194.

*L. coronata* Fl! Liefr. n. 151.

*Pfora coronata* Hoffm. pl. lich. t. 56, 1.

Hab in terra umbrosa turfosa nec non cortice putrido ad radices Populorum Nordlandiæ saltensis.

Non possum non contra *Cl. Flökeum*, postquam ipsius specimina vidi, hos duos Liehenes conjungere. Termini inter eos certi minime adsunt.

1237<sup>780</sup>/<sub>31</sub> LECANORA *limbata*: crusta imbrieata squamoso-phylloidea, lobis inciso crenatis cinereis, apotheciis amplis lamina proligera urceolata hadia margine proprio integerrimo, accessorio foliaceo plano sublobato virescente.

Sommerfeltia arctica Flörke in lit. Icon tab. nostra 111.

Hab. in terra arenosa humida subabscondita circa sinum saltensem interiorem Nordlandiæ, imprimis ad Fiskevaag in Saltalen.

Perquam memorabilis et elegans Lichen. Ob affinitatem eum *L. hypnorum* Ach. syn. ad hoc esse genus referendum esse credidi, etsi *Cl. Flörke novum* ex illo constituit genus hisce characteribus: "Apothecium urceolatum e thallo (squamoso-phylloideo) eminens, margine accessorio duplice instructum, exterior coriaceus planus subincisus, interior laminam proligera coloratam cingens, serratus subinflexus." Sane genus distinctius quam pleraque Achariana, *Solorinae* imprimis affine, nam lamina proligera illæ in *S. saccata* simillima, et codem modo ante evolutionem tenui tecta membrana, quæ rumpens alteram illam interiorem, mox evanescentem marginem efformat. Margo exterior siccus cinerascens, madidus late virens linearis latitudinis et ultra e duobus constat stra-

tis: inferius lutescenti albidum apothecium efformans, superius viride ad laminam proligeram, siccata rufo-fuscam subasperam, attingens, et inden stratum tenue fæculiferum viride sub illa persistens. Apotheciorum ureoli ad 4 lineas saepe lati. Ut ureoli minuti pallide-virescentes proveniunt. Semina duo in perispermio. Perispermia 3-4 saepe in una serieadsunt, et sine dubio apices eorum laminam asperam efficiunt. Crusta byssino tormentosa supra cinerea, intus viridis, subtus alba. Siccata supra etiam albescit, et stuposa ejus indoles tum optime appetet.

**782 LECANORA cervina:** crusta squamata, squamis lobatis crenatisve livido-castaueis s. pallescentibus, apotheciorum disco immerso fuscescentiruto, margine thallode tandem prominente  $\alpha$ , *glauc ocarpa*: squamis discretis lividis crenatis, fructiferis margine subtus albis, apotheciis centralibus planis rufis pulverulentis nudisqve margine proprio et thallode elevato, squamam fere tegentibus L, *glaucocarpa Ach. syn. p. 189. lich. un. p. 410. Sprengel Entd. 1 p. 222.* *Lichen glaucocearpus Whlbg. in Act. Ac. holm. 1806 p. 143 t. 4.*

Hab. in rupibus lapidibusqve calcariis Nordlandie saltensis e. gr. Saltdalen freqventer.

$\beta$  *cervina*: crusta areolato-effigurata, apotheciorum disco plano rufo-fusco margine thallode tenui.

*L. cervina Ach. syn. p. 188.*

*L. badia a. et halophæa Ach. lich. un. p. 407, 408.*

*Lichen cervinus Pers. Whlbg. fl. lap. n. 782. ups. n. 851. Sprengel Entdeck. 1 p. 226.*

*L. squamulosus Schrader. Ach. prd. p. 230.*

Hab. in lapidibus rupibusqve imprimis calcariis totius Nordlandiae et Lapponiae.

$\gamma$ . *discreta*: squamis discretis subrotundis convexis fuscescenti-castancis (parvis sed crassis), apotheciorum disco minuto immerso rufescenti-fusco, margine thallode elevato subconnivente.

*L. badia  $\beta$  discreta Ach. lich. un. p. 407.*

**Hab.** in lapidibus saxisque non calcariis per Nordlandiam freqventer.

**δ.** *effigurata*: squamis subimbricatis lobatis livido-castaneis nitentibus, apotheciorum disco parvo rufoscenti - fusco immerso subimmarginato.

**Hab.** in rupibus qvarzosis versus mare Nordlandiae e. gr. Bodöe,

**ε.** *endocarpoidea*: crusta livida, demum subcastanea, squamis subdiscretis planis (tenuibus) lobatis, apotheciis punctiformibus rufoscenti - fuscis.

**Hab.** in saxis rupibusqve non calcariis Nordlandiae saltensis freqventer.

**ζ.** *smaragdula*: crusta viridi - lutea, apotheciis punetiformibus rufo - fuscis.

Endocarpen smaragdulum Whlbg! fl. Lap. n. 878.

*Ach.* syn, p. 98.

**Hab.** in petrarum rimis scrobiculisque siccoribus Nordlandiae et Finmarkiae.

Species quam maxime varia et vera Urecolaria, si factitium hocce genus retinendum erat. Ei proprium est, qvod crusta cujusvis coloris madida semper viridis est.

Ad. *var. α.* A Cl. Flörke, cui bis varia hujus specimina misi, pro vera agnita est. Forma elegantissima et perfectissime evoluta hujus speciei est, sed transitus ad *L. cervinam* manifestus est.

Ad *var. β.* Sunt in crusta pro ætate et loco magis minusve aprico vices lividi et castanei coloris, et si squamæ nunc subcontiguae, rimis igitur areolas subeffiguratæ efformantes, discrete creverunt, uti etiam nonnullæ re vera crescant, tum difficillime a *var. α.* distinguitur; sit crusta latiore extra apothecium. Efformatio omnino cadem in formis omnibus, quam opium describit Wahlenberg l. c.

Ad. *var. γ.* Hæc magis habitu quam characteribus a *var. α.* differt. *Var. discretam* ad hanc pertinere me edocuit Cl. Flörke. Interdum subimbrina, ad *L. molybdinae* varietates accedens, sed illæ differunt: colore in humido nunquam virescente et margine effigurata vere placeoidea.

*Ad. var. δ.* Crusta veluti sumtu apotheciorum efformata perfecte lobata, illa vero parva immarginata planum æqvabile cum crusta fere efficiunt. Transitus ad præcedentem, et adhuc magis ad sequentem non negandus sed etiam affinitate cum *L. hysgina* s. *molybdinæ* conjuncta est.

*Ad var. ε.* Crusta in hujus forma propria variari α. simillima, modo tenuior sed apothecia eadem ac in var. β. qvare has duas conjungit. Sed etiam imprimis in rupibus marinis variat crusta crassiori subpulposa quasi pruinosa, cuius color a rufescenii-lividum ad ochraceum variat, sed semper intersunt squamæ coloris vulgaris, qva re affinitas ejus vera, qvæ etiam ex apotheciis patet, manifestatur. In hac varietate color lividus jam sœpe in pallescentem, qvi in seqventi varietate perfectus evadit, abiit.

*Ad var. ζ.* Est per var. ε. cum cæteris conjuncta, casu quodam colore pulchrius tincta. Iam Cl. Wahlenberg, eam prope ambitum nonnihil rufescere (ο: castaneo-lividum fieri, quod nos optime perspeximus) et nullam veram Endocarpi speciem esse observavit.

**1238** *LECANORA cartilaginea*: crusta subfoliacea lobulata pallida, lobis linearis laciniatis imbricatis, apotheciis planis fulvis, margine thallode tenui demum flexuoso repando crenatoque persistente.

*L. cartilaginea* Ach. syn. p. 191. meth. lich. p. 184. *Lichen cartilagineus* Ach. in Act. ac. holm 1795 p. 133 t. 5 f. 4. prd. p. 97.

*β. latifolia*: lobis imbricatis latiusculis rotundato-laciniatis crenatisque.

Hab. in rimis scupolorum extra sinum saltensem rariss; β in rupibus absconditis insulae Knaplundsöen in sinu saltensi passim copiose.

*Var. α.* illæ, qvæ in Svecia circa Holmiam occurrit, simillima est, sed var. β. differt lobis minime linearibus. Apothecia vero prorsus eadem; modo nonnulla, imprimis juuora crustæ concoloria, qvar sine dubio imperfecia sunt. Crusta in huc magis quoqve virescit.

*Lich. crassus fl. dan.* t. 1006, quam iconem ad *L. cartilagineam* in prodromo l. c. refert Cl. Acharius, minime hujus loci est, sed ad *L. chryssoleucam*, quam per bene sistit et quæ in subalpinis Dovre Norvegiae copiose provenit, pertinet.

**1239<sup>782</sup>** *LECANORA polycarpa*: crusta phylloidea subimbricata flava, lobis minutis congestis sublaeviatis, laciniiis incisis crenatis modis, apotheciis numerosis elevatis plano-concavis aurantiis, margine thallode subintegerrimo. *Fl. Liefr.* n. 90, *Lobaria polycarpa Hoffm. fl. germ.* 2 p. 159, *Lichen polycarpus Ehrh.*

*Lecanora candelaria*  $\beta$  *polycarpa Ach. syn.* p. 192.

**Hab.** in truncis Betularum lignisque vetustis ad sinum saltensem exteriorem rarius.

Cl. Flörke quidem negat, *L. candalariam*  $\beta$ .

Ach. hujus loci esse, sed nonne clarissimus Auctor synonymo ullo hac in re deceptus est, cum et character Acharii in plantam Flörkeanam convenit, et ipse specimen Acharianum in herbario Cl. Swartzii, quod hic lichen esset, vidi.

A varietatibus *L. candelariae* apotheciis copiosioribus frequentissimisque et imprimis crusta nunquam in pulverem fatiscente, et substantiae minus foliaceæ differt.

**1240** *PARMELIA tribacia*: thallo squamuoso substellato-incano, lobis irregularibus eroso-crenulatis lobatisque imbricatis, subtus concoloribus subfibrillosis, margine pollinifero (apotheciis adpresso disco plano pallido margine elevato.)

*Lecanora tribacia Ach. syn.* p. 191.

**Hab.** in lapidibus campestribus Saltdalen Nordlandiæ rarius;

A me fructifera nondum inventa. Adeo affinis *P. cæsiæ*, a qua differt: lobis margine pulvren-lentis et *Borreræ tenellæ* Ach., ut ab his sequegari non possit. Ab hac thallo magis squamuoso imbricato, laciniiis minus adscendentibus fibrillosisque differt.

**786** *PARMELIA (Lichen) cyclosclis Whlg. fl. lap.* n. 786, ubi vide.

*b. virella*: thalló minori, laciniiis elevatis squamiformibus, pulvere madido flavovirescente subobliteratis, apotheciis rarioribus,

*Lecanora virella Ach. syn. p. 191. prd. p. 103.*  
 Hab. in truncis arborum imprimis Sorborum Saltdalen  
 Nordlandiae.

Est proprie var.  $\beta.$  *lithotea Ach. syn. p. 217,*  
 quam memorat Cl. Wahlenberg t. c. Differit haecce  
 species a peraffili *P. ulothrice* imprimis apotheciis  
 subtilibus nudis et sorediis. *Lecan. virella* est  
 modo forma parva hujus speciei, quae, cum varia-  
 tatem  $\beta.$  *lithoteam* laciniis linearibus angustis in-  
 signem discernas, ut seorsim enumeretur, vix digna  
 est. Cfr. etiam *Fl. Liefr.* n. 91 obs.

**4241** ~~787~~ PARMELIA *pulverulenta*: thallo orbicu-  
 lari brunneo alboque pruinoso madido viridi, sub-  
 tus atro tomentoso-hispido, laciniis linearibus mul-  
 tifidis in ambitu discretis planis adpressis undula-  
 tis apicibus retusis, apotheciis fuscis cæsiisque prui-  
 nosaque.

*P. pulverulenta Ach. syn. p. 214. Fl! Liefr. n.  
 472.*

*Lichen pulverulentus Schrebr. . . Hagen lich.  
 ber. t. 2 f. 8. Ach. prd. p. 112.*

*Lobaria pulverulenta Hoffm. fl. germ. 2 p. 152.  
 pl. lich. t. 8. f. 2.*

*Lichen allochrous Ehrh.*

$\beta.$  *hybrida*: thallo albido, lobis latiusculis lacini-  
 atis, apotheciis planis concoloribus margine eleva-  
 to crenato.

*P. pulverulenta*  $\delta.$  *allatoria Lich. un. p. 474 ex  
 Ach. syn.*

*P. venusta*  $\beta.$  *hybrida Ach. syn. p. 214. Lich.  
 un. p. 475.*

Hab. in truncis Populorum Salictumque Saltdalen Nord-  
 landiae frequenter; in saxis (forma c. *angustata*  
*Ach. syn.*) rariss.  $\beta.$  in Salicibus vetustis rarius  
 e. gr. ad Skjerstad.

*P. venusta* Ach. modo forma vetusta et luxuri-  
 ans *P. pulverulenta vulgaris* in Norvegia austra-  
 liori passim copiose proveniens est. Cfr. Bot. Jahr-  
 büch. 3 p. 151. *Var.*  $\beta.$  *hybrida* quoad apothecia  
 forma est intermedia madida æque viridis. Thal-  
 us et apothecia nuda pruinosaque sine ullo dis-

crimine in omnibus varietatibus sunt. Huic speciei proxime adstat *P. muscigena*, et si quis ambas conjungat, vix magnopere erret. Apothecia illius adnata convexiscula, margine depresso notam optimam diagnosticam præbent. Rarissime quoque illa profert apothecia, quod idem etiam alii Lichenes, in quibus thallus valde luxuriat, faciunt.

**1242<sup>287</sup>** *PARMELIA aipolia*: thallo stellato cæsio-albido cinerascentiique, subtus albido fibrillis fusco-nigris, laciniis subconnatis planis seulis multifidis, apotheciis nigris cæsio-pruinosis.

*a. acrita*: thalli laciniis albidis subcontiguis pli-catis in ambitu planis.

*b. cercidia*: thallo virescenti-cinereo subtus albicante fibrillis nigris.

*c. anthelina*: thalli albidi laciniis sublinearibus multifidis a centro ad ambitum continuatis sub-discretis.

*P. aipolia*, *a*, *b*, *c*. *Ach. syn.* p. 215.

Lichen aipolius et anthelinus *Ach. prd.* p. 111.

Hab. in truncis arborum, *a*. imprimis in Sâlice pentandra; *b*. in Sorbo; *c*. in Populo Nordlandiæ saltensis.

Affinis *P. stellaris* differt: mole minori, laciniis convexis.

**789.** *PARMELIA aleurites* Whlbg. fl. lap. n. 789.

Hab. per Nordlandiam imprimis in Juniperis frequenter, nec non rarius in rupibus, in quibus etiam regionem alpinam ascendit.

Male ab auctoribus apothecia nigro-fusca dicuntur, cum badia nitentia sint. Cl. Wahlenberg ab affini *P. ambigua* nimis longe removit.

**1243<sup>285</sup>** *PARMELIA intestiniformis*: thallo imbricato dichotomo multifido albido-seneove nigro, laciniis linearibus elongatis compresso-teretibus decumbentibus subarticulatis, apicibus subfureatis attenuatis acutis, subtus atris lœvibus, apicibus fuscis, apotheciis minutis atris opacis, margine thallode albido.

*P. intestiniformis* *Ach. syn.* p. 220.

Lichen intestiniformis Villars . . . . . Bellardi app. fl. ped,

Hab. in saxis elatis alpium saltdalensis Nordländiae rarissime e. gr. in Laadfjeldet, in Hestene Botn-vandfjeldet.

Hanc veram esse *Lichenem intestiniformem* Bell., auctoritate Cl. Flörkei innixus affirmare video. Ad *P. encrustam* quidem valde accedit, sed apothecia illius magna membranacea nitida spiculum distinctissimam declarant. Angustis formis *P. physodis* quoque affinis est. Hujus apothecia e medio laciniarum erumpunt, omnino sessilia, vix lineam unam lata, disco carbonaceo, marginem albido sat crassum subæquante. Laciniæ articolatæ apparent, sed revera modo nodulosæ articulis spuriis, intus contiguae alba byssina substantia farctæ sunt.

**1244** ~~§ 93~~ PARMELIA *recurva*: thallo stellato pallido soredifero, subtus nigro-fibrilloso-spongioso, laciniis angustissimis convexis, (apotheciis rufo-fuseis, margine subintegerrimo).

*P. recurva* Ach. syn. p. 206.

Lichen incurvus Pers. in Ust. An. Bot. 7 p. 24. Ach. prd. p. 107.

*L. multifidus* Diks. fasc. 3. t. 9. f. 7. ex Achar.

Hab. in rupibus ad sinum saltensem rarissime. A modo in Knaplundsöen lecta est.

A *P. ambigua*: laciniis angustissimis convexis; a *P. centrifuga*: notis iisdem et glomerulis dig noscitur. Nusquam fructifera mihi obvenit.

**1245** ~~§ 93~~ PARMELIA *pulla*: thallo substellato olivaceo-nigro, subtus nigro, utrinque rugosiusculo nudo nitido, laciniis angustis flexuosis plicatis multipartitis, apotheciis æncis, margine integerissimo.

*P. pulla* Ach. syn. p. 206.

*P. olivacea* f. *prolixa* Ach. lich. un. p. 463.

Lichen pallus Schreber.

Hab. in saxis alpinis Nordlandiae saltensis rarius e. gr. Hvidbjerget Saltdalen.

A *P. olivacea* differt: colore obscuriore, laciniis angustioribus nitidioribus flexuoso-plicatis, margine apotheciōrum semper integerrimo; a *P. encrusta* laciniis latioribus (non subterētibus) colore magis in viride (non in cinereum) vergente.

**1246<sup>187</sup>** PARMELIA *tiliacea*: thallo suborbiculari coriaceo glabro albo tenuissime nigro punctato, subtus atro-fibrilloso hispido, lobis longiusculis sinuatis rotundatis crenatisque, (apotheciis rufofuscis margine subintegerrimo).

P. *tiliacea* Flörke!

P. *scortea* Ach. syn. p. 197. prd. p. 149, Whlbg. carp. n. 1262.

Lichen *tiliaceus* Hoffm. En. lich. p. 96. t. 16. f. 2. sec. Flörke.

Hab. in scopolis maritimis extra sinum saltensem Nordlandiae rarissime.

P. *tiliacea* Ach. mihi haud nota, sed sec. Cl. Flörke in lit. P. *scortea* modo varietas ejus levis est. Cam P. *glomulifera* in rupibus sine glomerulis obvenit, huic satis similis est, sed color ejus magis mutabilis. A P. *saxatili* longius distare mihi videtur.

**1247<sup>187</sup>** PARMELIA *pinastri*: thallo foliaceo depresso virenti-flavo, laciniiis rotundato-lobatis crenatis, marginibus crispis pulverulentis, apotheciis marginalibus depresso-concavis, margine tumido crenulato involuto dilute badiis. Sommerfelt in Act. Ac. holm. 1823 p. 117.

Lichen *pinastri* Scop. fl. carn. p. 1387. Ach. prd. p. 168.

Sqvamaria *pinastri* Hoffm. pl. lich. p. 33. 17 f. 1. Cetraria juniperina β. *pinastri* Ach. meth. p. 298. syn. p. 226. Whlbg. fl. lap. p. 432 (Lichen). upsp. p. 412.

Hab. ad sepes, truncos Pini et Betule per totam Nordlandiam et Lapponiam. Fructifera solummodo bis in caudicibus Betule in Saltdalen Nordlandiae reperta est.

Sententiam Il. Schreberi (Ach. syn. p. 226.) quæ et semper mea fuit, propriam hanc constitutere speciem, nunc plane comprobata habeo, postquam fructiferam legere mihi contigit. Apothecia tenuissima parva concava flavescens-badia, margine tumido connivente crenulato sepiissimamente pulvulenento. Lamina proligera adeo tenuis est, ut in siccatis margo sese omnino coaret et apothecium inconspicuum reddat. A Cetraria jw.

*juniperina* differt: colore paginæ thalli superioris magis virente, laciñis depresso-lobatis nec laceris, marginib[us] constanter pulverulentis, qvi in illa dentibus nigris obsiti sunt, et apotheciis tenuioribus pallidioribus concavisq[ue], margine thallode tamido connivente, nec tenui acuto.

- 810 PARMELIA (Lichen) *juniperina* Whlbg. fl. lap. n. 810, ubi vide.

In summis alpibus Saltdalea Nordlandiae ad terram s. rectius in fruticulis repentibus alpinis ex gr. Dryade, varietas cæspitosa, thallo planiusculo lacunoso, qvæ sine dubio *C. Tillesii* Ach. syn. p. 228 est, obvenit. Re vera medium inter *C. juniperinam* et nivalem tenet, sed ad illam aperte attinet.

- 811 PARMELIA (Lichen) *sæpincola* Whlbg. fl. lap. n. 811, ubi vide.

Var.  $\beta$ . *ulophyllum*, *Peltigera clorophylla* Willd., fructiferam in pinis Saltdaliæ legi.

- 4248 $\frac{1}{2}$  $\frac{2}{3}$  PARMELIA *prunastri*: thallo foliaceo ramoso albo-pallescidente, laciñis dichotomo multiifidis erecto adseendentibus linearie attenuatis rugoso-lacunosis, subtus canaliculatis albissimis, apotheciis rufescensibus.

*P. prunastri* Ach. meth. p. 257. syn. p. 245 (*Evernia*) Fl! Lief. n. 92.

Lichen *prunastri* Lin. fl. svec. n. 1092. Ach. præ. p. 171. Dill. musc. t. 21. f. 54. 55.

Hab. in ramis Pinorum Saltdalen Nordlandiae rarissime.

Soredia alba in margine adsunt. Apices furcati.

- 4249 $\frac{2}{3}$  $\frac{1}{2}$  RAMALINA *fastigiata*: thallo compresse levigato lacunoso ramoso albo-glanco, ramis sursum incrassatis fastigiatis, apotheciis terminalibus peltato-sessilibus flavescenti albidis. Ach. syn. p. 296.

Lichen *fastigiatus* Pers. in Ust. An. Bot. 1. p. 256. Ach. in Act. Ac. holm. 1797 p. 201 t. 9, f. 1.

L. *Populinus* Ehrh. — Hoffm.

Hab. in populis circa Fiskevaag Saltdalen Nordlandiae satis frequens.

R. *fraxineaæ* fere nimis affinis. Margines subfimbriati;

**1250<sup>820</sup>** RAMALINA *scopulorum*: thallo compresso lævigate nitenti sublacunoso ramoso cinerascenti-pallido, ramis linearibus attenuatis.

*R. scopulorum Ach. syn. p. 297.*

*Lichen calicaris Ach. in Act. Ac. holm. 1797 p. 210 t. 9 f. 2. G. H. Fl. dan. t. 959.*

*L. siliquosus Huds. fl. angl. ex. Achar.*

*Hab. in scopulis Nordlandiae meridionalis.*

Thallus undique tuberculatus, (apoth. imperfectoris?) obsitus. *R. polymorphæ proxima.*

**1251<sup>821</sup>** RAMALINA *pollinaria*: thallo plano laciniato-ramuloso lacunoso pallido canescenteque, sorediis planis superficialibus pulverulento.

*R. pollinaria Ach. syn. p. 198. Fl! Lief. n. 115.*

*Lichen squarrosum Pers. in Ust. Bot. An. 14 p. 35.*

*L. pollinarius Ach. in Act. Ac. holm. 1797 p. 263 t. 11 f. 2.*

*Hab. in rupibus subabsconditis ad sinum saltensem Nordlandiae passim copiose.*

Statura humili vix ultra pollicarem altitudinem.

**821** RAMALINA (Lichen) *farinacea* Whlbg. fl. lap. n. 821, ubi vide et adde: apotheciis lateratis planis concoloribus.

*R. calicaris Fries! lich. exs. n. 72 modo hujus status fructifer sorediis rarioribus est.*

**825** CORNICULARIA (Licken) *ochroleuca*: Whlbg. fl. lap. n. 825, ubi vide.

*Hab. in ramis Pini Saltdalen Nordlandiae rarissime, a vulgari nil discrepans. In rupibus maritimis Skarvhammeren ad Skjerstad Lichen occurit pendulus, hanc et Corniculariam (Alectoram) *sarmenosam* omnino conjungens. Ob locum habitationis et apices interdum nigricantes ad hanc forsitan summo jure refertur, etsi habitum illius omnino præ se fert.*

**875** PYCNOTHELE *ceratites*: thallo radicato, radice ramosa, ramosissimo, ramis teretibus erectis solidis fastigiatis albis, apotheciis concavis flavis, margine thallode tenui subconnivente.

*Dufourea ceratites Sommerfelt in Act. Ac. holm. 1823 p. 118.*

*Bæomyces ceratites* Whlbg. fl. lap. n. 875.

*Cenomyce? ceratites* Ach. syn. p. 279.

Hab. in terra nuda succosa alpium Nordlandiæ, rarius in subalpinis.

Lichen memorabilissimus imprimis radice perfecta ramosissima luto aretissime innata. A caudice simplici subradieali brevissimo rami primum breves partim erecti partim ad latera adscendentates, dein omnes erecti fastigiati arte cæspitosi per longitudinem rugosi usque ad 2 unciam longitudinem assurgunt. Sub epidermide opaca stratum fæculiferum hæte virens. Apices obtusiusculi denique se rumpunt et laminam prolieram tenuissimam urceolatam flavam visui præbent. Apothecium sœpe quasi radiatum, cum ramuli e margine prolificent. Nomen Dufoureae ob genus plantarum phanerogamarum homonymum immutare necesse erat.

824 *USNEA florida* *β.* *comosa*: thallo subpendulo pallido-virente divergenti dichotomo, ramulis divergentibus, cephalodiis carneopallidis, apotheciis amplis planis ciliatis concoloribus.

*β. plicata*: thallo longiore pendulo.

*U. florida* var. *Flörke!* in lit.

*U. plicata* a. et b. *comosa* Ach. syn. p. 305, Whlbg. fl. ups. n. 907.

Lichen comosus Ach. in Act. Ac. holm. 1795 p. 209 t. 8 f. 1.

Lichen plicatus Lin. fl. sv. n. 1122 lap. n. 457.

*L. barbatus* Whlbg. fl. lap. n. 824 ex! synon.

Hab. in arboribus, imprimis in Betulis per Nordlandiam et Lapponiam sylvaticam parcius.

Apothecia rarissime occurunt, sed ab iis *Usnea florida* minime differunt. Usque ad 5 lin. lata. Ab *U. florida* modo differt: colore pallidiore, thallo pendulo vel subpendulo. Synonymon floræ lap. hujus loci esse, tum character ipsius, tum locus natalis — nullibi *U. barbatam* nec in Nordlandia nec in Lapponia pitensi observavi — demonstrant. Lin. fl. lap. n. 457 etiam ipse Linnæus in fl. sv. 1, c. ad *L. plicatum* refert. Cephalodia illæ carnea - pallida, quæ primum (efr. præp. p. 223) apothecia habuit Cl. Acharius, vel parasitica vel exrescentia segregata sunt, qualia in

Cenomycidibus etiam occurunt. Glemeruli pulvri-  
verulenti frequentes.

**1252** COLLEMA *hæmaleum*: thallo crustæformi  
differente rimoso granulato-rugoso fuscescente - ru-  
fo, apotheciis confertissimis innatis plano - con-  
vexusculis, disco nitido nigrescente, madefacto  
olivaceo - fuscescente, marginem thalodem crena-  
tum æqvante, demum exeludente.

$\beta$  *hæmatopis*: apotheciis superficialibus urceolatis  
marginibus elevatis integerrimis, disco minuto,

Hab. in lapidibus schistoso - micaceis dissolutis alpium  
Saltdalensium Nordlandiæ rarius sed copiose. var.

$\beta$ . in lapidibus non dissolutis sed sæpe irrigatis.  
Crusta crassiuscula, crux similis, sanguineo-  
fuscescens, intus virescens madefacta parum modo  
tumet, magis vero rufescit,

Crusta in var.  $\beta$ . eadem nec non disci indole,  
si dissecatur, similis, qvare nil nisi varietas  
ab udo habitationis loco orta est.

**1253** COLLEMA *petrosum*: thallo crustæformi  
subramuloso inæqvabili rimoso fusco - nigro, apo-  
theciis confertis parvis planis, demum convexius-  
culis subconcoloribus, margine tenuissimo sub-  
crenulato.

*C. petrosum Ach. syn. p. 309.*

Hab. in saxis inferalpinorum Saltdalen Nordlandiæ  
passim.

Totus Lichen opacus; siccus fusco - nigrescens  
rimosissimus, madidus tumidus inæqvabilis niger  
fibrillosam f. ramulosam indolem manifestans.  
Apothecia fulvescenti - nigra totum thallum sæpe  
tegunt. Ab omnibus formis *C. nigri Ach.* di-  
versissimum est.

**1254** COLLEMA *subtile*: thallo stellato, laciniis  
filiformibus adpressis digitato partitis obtusis ra-  
diantibus, (apotheciis centralibus planiusculis con-  
coloribus, margine tenui integerrimo).

*C. subtile Ach. syn. p. 328.*

Lichen subtilis Schrader.

Hab. in rupibus calcariis Saltdalen Nordlandiæ rarius,  
ex. gr. ad Övesgaard.

Circulos radiantes centro destructo granulato tentissimos in rupibus efformat. Semper sterile mihi obvenit. Madidum satis tumet.

- 834 COLLEMA tenuissimum Ach. syn. p. 338.**  
*Lichen byssinus Whlbg. fl. lap. n. 834 (excl. syn. Hoffm.) ubi vide.*  
 Hab. quoque in rupibus Nordlandiae rarius, in muscis lignisqve frequentius. Basis thalli semper plumbea.

- 835 COLLEMA byssinum:** thallo effuso granulato, granulis aggregatis minutis crenulatis fusco-viridibus, apotheciis minutissimis concaviusculis concoloribus margine thallode integerrimo.  
*C. byssinum Fl. Liefr. n. 100. Hoffm. fl. germ. p. 105 ex Fl.*  
*C. cheileum d. byssaceum Ach. syn. p. 310.*  
 **$\beta.$  juniperinum:** thalli granulis adscendentibus inciso-crenatis atro viridibus.  
 Hab. in rupibus calcariis inferalpinorum Saltdalen Nordlandiae rarius; var.  $\beta.$  ibidem in Juniperis. Siccum rimoso granulatum fusco-nigrum. A specimine Flörkei l. c. modo colore, qui in illo magis cinereo-viridis est, et apothecis adhuc minoribus aliquantulum differt.

*Var.  $\beta.$  modo thallo obscurius colorato et liberius evoluto, non adeo adpresso differt. Apothecia ejusdem indolis, suburceolato-concavis. Ad suum C. byssinum pertinere etiam agnovit Cl. Flörke.*

- 887 COLLEMA fuligineum:** thallo subtilissime granulato atro-viridi, apotheciis immersis, disco punctiformi margine elevato integerrimo.  
*Verrucaria fuliginea Whlbg. fl. lap. n. 887, ubi vide. Ach. syn. p. 122.*

Hab. in rupibus Nordlandiae et Finmarkie.

Cl. Wahlenberg hunc Lichenem minutulum in statu sicco describit, in quo vere pulverulento-floccosus appetet, et discos minutos, apices verrucarum referentes, habet; si vero madefacta inspicitur, vera ejus indoles in lucem prodit. E specimine a Cl. Wahlenbergio benevole communicato notum habeo.

**1256** COLLEMA *conglomeratum*: thallo lobato fusco, lobis minutis adscendentibus cæspitulos discretos formantibus, inciso-crenatis, apothecis terminalibus confertis minutis urceolato-concavis concoloribus margine thallode integerrimo.

C. conglomeratum Hoffm. fl. germ. p. 102. sec. Flörke.

C. fasciculare y. conglomeratum Ach. syn. p. 317.

Lichen fascicularis y. Bernk. in Schrad. journ. f. d. Bot. 1799, 1 t. 1 f. 3 c.

Hab. in truncis Populorum Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Lobi thalli minuti crassi suberecti in superficie quasi granulati. Apotheciorum discus punctiformis impressus, margine elevato semper integerissimo. A. C. fasciculari species distincta, minutie partium, imprimis apotheciorum statim dignoscenda.

**1257** COLLEMA *fasciculare*: thallo suborbiculari prasino imbricato-plicato, plicis centralibus erectis flexuosis anastomosantibus, lobis periphericis rotundatis inciso-crenatis, apotheciis marginalibus turbinatis, disco convexiuseulo rufo, margine tenui integerrimo.

C. fasciculare Ach. syn. p. 317.

Lichen fascicularis Lin. mant. 1 p. 133? Ach. prd. p. 129. Fl. dan. t. 462. f. 2.

β. *aggregatum*: lobis erectiusculis cæspitoso-fasciculatis dilutius-viridibus, apotheciis majoribus.

?C. fasciculare β. aggregatum Ach. syn. p. 317?

Hab. in lapidibus rupibusque calcariis inferalpinorum Saltdalen Nordlandiæ copiose, β. in arboribus parcis.

Sæpe orbes spithameæ latitudinis efficit. Medianum intense viride, siccus nigrexit. Var. in eo differt, quod thallus non effusus, sed lobi e communis basi parva erectiuseuli adscendant, et capitulum subpodicillatum s. obconicum efficiunt. Apothecia ejusdem naturæ.

**1258** COLLEMA *myriococcum*: thallo nigro-viride laciñato, laciñis granulatis s. papillatis, apicibus globosis in apothecia primum globose, dein

disco punctiformi impresso demumque turbinate globosa concava margine integerrimo concolore abeuntibus.

*C. myriococcum Ach. syn. p. 314. in Act. Ac. holm. 1801 p. 159 t. 3 f. 2 (jun.)*

Hab. inter et supra muscos in inferalpinis Nordlandiae saltensis rarissime.

Cæspites parvi apotheciis confertissimi minutis demum suburceolatis regularibus mez dignoscit. Thallus difficilime perspicitur, ut describatur. *Cl. Acharius* semper stirpem juniores describit. Apotheciis minutis globosis et concavis a *C. fasciculari* differt.

**1259<sup>ss</sup>** COLLEMA *pulposum*: thallo suborbiculari e lobis crassis subdiscretis formato, apotheciis confertis planiusculis ferrugineo - virescentibus, margine thallode tumido integerrimo.

*C. pulposum Ach. syn. p. 311. var.  $\alpha$ . Lich. un. p. 632. Bernh. in Schrad, jour. f. d. Bot. 1799. 1 t. 1 f. 1 a. ex. Achar.*

Hab. in terra montium calcariorum Saltdalen Nordlandiae rarius.

Apothecia quam in cæteris ampliora, secca fulva. Thallus hujus et sequentis nec non aliorum Collematum thallo pulposo præditorum fila monili-formia *Nostocina* (*Nostoc muscorum* Ag.) intus fovet, sed hanc ab rem non Algæ aquaticæ sed veri Lichenes sunt,

**1259<sup>ss</sup>** COLLEMA *tenax*: thallo suborbiculari imbricatore, lobis crassis plano - incumbentibus inciso - lobatis, lobis repandis rotundatis subintegerrimis, apotheciis in lobis immersis concavis rufescentibus, margine thallode tumido subintegerrimo, dein granulato s. foliaceo - criso.

*C. tenax Ach. syn. p. 314.*

*Lichen tenax Ach. prd. p. 128. in Act. Ac. holm. 1795. t. 1 f. 1.*

*Lichen pulcher Leers fl. herb. p. 259. excl. syn. Dillen.*

*C. Burgessii Fl. dan. t. 1475.*

*B. litoreum*: lobis subuplicatis laciniatis, laciniis angustioribus granulatis.

**Hab.** in terra humida ad latera montium inferalpinorum nec non  $\beta.$  ad litora Nordlandiæ saltensis passim copiose.

Species pulchra et variabilis. Primum inventur ut rosula sterilis tumida intense et vivide viridis pollicaris diametri lobata, lobis rotundatis integerrimis centro papillosa, subtus spongiosa-tomentosa, apotheciis rarioribus. Aestate lobi elongantur et prolificantur, qva re lobi elongati et imbricati nec non apotheciis copiosis ornati subtus subglabri, saltem non nisi versus centrum tomentosi, evadunt. Margo apotheciorum rarius integrimus, sed a prima juventute subgranulosus, dein lobatus vel crispus, omnino qualis in iconē citata fl. danicæ, qvæ sane hujus loci est, picta est. De synonymo Leersii nullus dubito, cum descriptio ejus convenientissima sit. De syn-  
onymo Acharii certiorem etiam me fecit Cl. Flörke. In var.  $\beta$  apothecia simillima, nec non thalli color et substantia, sed lobis laciniatis, la-  
ciniis interdum sublinearibus erectiusculis habitum  
qvendam alienum præ se fert.

**1261** COLLEMA *radiatum*: thallo stellato orbiculari lobis crassiusculis decumbentibus tereti-linearibus simplicibus digitatimque fissis obtusis intense viridibus, centro papilloso.

**Hab.** in rupibus calcareis a stillieidiis interdum irrigatis Saltdalen Nordlandiæ rarissime. ex. gr. in Skipperelydalen ad Fiskevaag.

Etsi fructiferum nondum inventum, tamen thalli forma species distinctissima est. Rosulas pollicaris diametri gelatinosas nitidas radiantes efformat attamen ad *Polythidia* Ach. referri non potest ob substantiam pulposam. Lobi lineares  $\frac{1}{2}$  lin lati.

**1262** COLLEMA *palmatum*: thallo pulvinato orbiculari glaucescente s. fuscescente-viridi, lo-  
bis crassis erectis confertis fastigiatis subcompre-  
sis linearibus palmato-incisis, apicibus turgidis,  
(apotheciis rufo-fulvis).

C. *palmatum* Ach. syn. p. 319 (exclusa varia-  
te b.) meth. lich. 242.

Lichen palmatus Huds. fl. angl. ex. Achar,

Hab. in rupibus calcariis irrigatis inferalpinorum Saltalen Nordlandiae rarius.

Pulvinos orientares convexos compactos superficie turberculatae turgidae in rupibus efformatae. Lobis erectis linearibus compressis palmato-incisis mox dignoscitur. *C. corniculatum Hoffm.* (*palmatum Bernh.*) ab hoc diversissimum thallo ienui foliaceo p. p. Synonymiam me edocuit Cl. Flörke.

**1263<sup>832</sup>** *COLLEMA flaccidum*: thallo foliaceo membranaceo lævi granulato atro-viridi, lobis discretis magnis rotundatis integerrimis laxis, apotheciis raris sparsis planiusculis.

*C. flaccidum Ach.* syn. p. 322.

*Lichen flaccidus Ach.* in *Act. Ac. holm.* 1795, p. 14 t. 1 f. 4, prd. p. 131. *Whlbg. fl. upsc.* n. 889.

*L. nigrescens Ehrh.*

*L. rupestris Swartz* . . .

Hab. in rupibus inferalpinis circa sinum saltensem Nordlandiae rarius.

Est quasi medium inter *C. furvum* et *C. nigrescens*. Ab illo differt: thallo majore nec adeo adnato nec criso; haec vero: thallo lævi tenuiore non granulato, apotheciis confertis. Granula folia minutissima sunt.

**1264<sup>833</sup>** *COLLEMA furvum*: thallo foliaceo membranaceo rugoso-plicato atro-viridi utrinque granulato, lobis integerrimis undulato crispis, apotheciis elevatis sparsis concoloribus, margine integerrimo.

*C. furvum Ach.* syn. p. 323\*). *Fl! Liefr.* n. 140.

*C. granulosum Hoffm.* *fl. germ.* p. 99.

*L. furvus Ach.* prd. p. 132, in *Act. Ac. holm.* 1801 p. 164, t. 3 f. 6.

\* Flora dan. t. 462, 1. quam ad *C. furvum* referat Cl. Achardius in synopsi, hujus loci non est. Stirpem iconis dorsæ danicæ in terra littorali ad Bodœ sed sterile reperi. Potius varietas *C. tenacis*? A *C. furvo* differt: thalli lobis crassis subimbricatis p. p.

Hab. in lapidibus et rupibus calcariis ad sinum saltensem Nordlandiae freqventer.

**813 PELTIDEA ulorrhiza**: thallo polyphyllo cinereo s. fusco-virescente subtomentoso laciniato-lobato, laciniis inciso-crenatis suberispis, subtus albicante venis nigro-fuscis reticulato denseque fibrilloso, fibrillis villoso-tomentosis cinereis vel fuscis Fl! Liefr. n. 154.

P. canina  $\alpha$  Ach. syn. p. 239. Whlbg. fl. lap. n. 843. fl. ups. n. 8. Fl. dan. t. 767 f. 2.

P. spuria Ach. meth. p. 283 t. 5 f. 2.

P. polydactyla var. spuria Fl! Liefr. n. 74.

P. polydactyla Schradr.

P. rufescens Hoffm. fl. germ. p. 107.

Dill. hist. t. 27 f. 103 A.

**$\beta$ . prætextata**: thalli marginibus fimbriatis, apotheciis majoribus erectis rufis.

P. ulorrhiza  $\beta$ . prætextata Fl! Ms.

Hab. in sylvis totius Lapponiae Nordlandiae.  $\beta$ . ad radices et trunco putrescentes in Saltdalen Nordlandiae.

Frons coriacea subtomentosa, subtus venis fuscocentibus subconfluentibus, lobis fertilibus longius protractis, peltis sapissime reflexis insignis est. Superficies tomentosa eam a *P. polydactyla* distingvit.

Margines fimbriati varietatis  $\beta$ . e foliis squamiformibus, nunquam polliniferis constat. Var. *crispa* Ach. et Whlbg. est modo forma sterilis vulgaris margine criso pollinifero ad *P. uloph.*  $\alpha$  pertinens.

**1265 $\frac{3}{4}$**  **PELTIDEA leucorrhiza**: thallo tenui membranaceo (in sice.) albo s. cinereo-virescente subtomentoso rotundato lobato, subtus albicante, venis concoloribus reticulato, denseque fibrilloso, fibrillis villoso-tomentosis, baseos fuscocinereis, ambitus candidis. Fl! Liefr. n. 153.

P. canina  $\beta$ . membranacea Ach. syn. p. 233.

P. canina Hoff. fl. germ. p. 106.

Dill. hist. t. 27 f. 102 E.

Fronde membranacea tomentosa subtus venis concoloribus reticulata, apotheciis majoribus badius rarius reflexis imprimis insignis est.

**1266<sup>3 4 3</sup>/<sub>4 4</sub>** PELTIDEA *polydactyla*: thallo glauco-virescente glabro nitido, subtus nudiusculo s. passim fusco-fibrilloso, venis confluentibus fuscis reticulato, lobulis fertilibus saepe creberrimis, apotheciis verticalibus revolutis fuscoc-atis, margine integerrime. *Fl!* Liefr. n. 175. *Ach. syn.* p. 240. *Hoffm. fl. germ.* p. 206.

*P. canina*  $\delta$ . *glabra Ach. syn.* p. 239.

$\beta$ . *collina*: thallo tenuiore, lobis crenulatis crassis pulverulentis, fertilibus brevioribus, apotheciis minoribus transverse-oblongis.

*P. scutata*  $\beta$ . *collina Ach. syn.* p. 237.

Hab. in interque muscos ad radicem arborum in inferis alpinis Saltdalen Nordlandiae.

Color, levitas, indoles paginæ inferioris, apotheciaque nigro-fusca revoluta varietatem  $\beta$ . hujus speciei formam esse videntur.

*P. scutata*  $\alpha$ . *Ach. syn.* (excl. syn. Dicks. ad Cetrariam spongicolam Ach. pertinente) apotheciis planis solummodo differre videtur.

**1267<sup>3 4 7</sup>/<sub>3 3</sub>** PELTIDEA *parilis*: thallo membranaceo olivaceo-fusco, subtus levi pallido nigricanteque, apotheciis posticis subfuscis.

*P. parilis Ach. meth.* p. 289.

*P. resupinata*  $\beta$ . *papyracea Whlb. fl. lap.* n. 848. *Nephroma parile Ach. syn.* p. 242.

$\beta$ . *papyracea*: marginibus demum crassis pulvulento.

*Nephroma resupinata*  $\beta$ . *papyracea Ach. syn.* p. 242.

*Peltigera papyracea Hoffm. fl. germ.* p. 108 ex. Achar.

Hab. in rupibus, saxis truncisque arborum ubique parcus.

Forsitan cum jure haec cum *P. resupinata* coniunctit Cl. Wahlenberg. Si vero discernenda, nota distinctiva imprimis e pagina inferiore levi summi debet, quare etiam var. *papyracea* huic associanda est. Color paginarum variabilis.

**1268<sup>§ 47</sup> PELTIDEA lœvigata:** thallo cartilagineo-membranaceo olivaceo-castaneo, subtus pallido-lacunoso utringve glabro nitente, lobulis fertilibus brevibus, apotheciis posticis badiis.

*Nephroma lœvigata Ach. syn. p. 242.*

Hab. in terra subhumida Nordlandiae saltensis et Laponiae pitensis. Usque ad summas alpes ascensit, at modo in subalpinis fructiferam legi.

Distincta species. Longe fragilior quam cæteræ. Thallus magnus laciinis adscendentibus crispatis cæspites insignes interdum efformat. Genera illa factitia, *Nephroma*, *Solorinam* et *Peltideam* conjungit. Apothecia *Nephromatis*. Thallus *Peltideæ* s. *Solorinæ*.

**852 STEREOCAULON paschale:** podetiis eretiusculis ramosissimis pallidis tomentosis, squamulis phylloideis crenatis cinereo-cæsiis tectis, apotheciis sparsis parvis planis fuscis.

*S. paschale Fl! Liefr. n. 199. Ach. syn. p. 284. Hoff. fl. germ. 2 p. 130. pl. lich. t. 5 f. 1. (Corallinoides). S. tomentosum Fries! lich. exs. n. 90. Boeomyces paschalis Whlbg. fl. lap. p. 852 (pro parte).*

*Lichen Lin. fl. lap. n. 439.*

Hab. in sterilibus tum sylvaticis tum alpestribus ubique copiose.

Hoc et seqvens confudit eum plerisque auctribus Cl. Wahlenberg, quod ex eo patet, quod ei et campos et saxa ut habitationis loca adtribuit. Attamen caule tomentoso altiori, ramis vagis, apotheciis duplo minoribus, bene distincta species. *Stereocaulorum* podetia non thallum dici debere, bene annotat Cl. Fries l. c.

**1269 STEREOCAULON dactylophyllum:** podetiis subdecumbentibus ramosissimis glabriusculis pallidis, subtus nudis, supra squamis digitato-incisis viridi-cineraceentibus vestitis, apotheciis sparsis majusculis convexiusculis fuscis.

*S. dactylophyllum Fl! Liefr. n. 78.*

*Boeomyces paschalis β. nanus Whlbg. fl. lap. p. 450.*

*β. major:* podetiis eretiusculis albido-pallescibus

*S. coralloides* Fr! lich. exs. n. 118.

*Lichen paschalis* Lin. fl. svec. p. 1120, Fl. dan. t. 151.

*Bæomycæs paschalis* Whlbg. fl. lap. n. 752. pro parte.

Hab. in saxis rupibusqve par Nordlandiam et Lapponiā sylvaticam et subalpinam.

Hunc Lichenem veram varietatem *S. dactylophylli* Fl! esse, pro certo habemus tum ex collatione speciminis, tum ex literis Cl. Auctoris. Ad *S. pileatum* qvam ad *S. paschale* proprius accedit, sed ab illo caule ramosissimo satis differt. Bipollicarem altitudinem nunquam exceedit. Varietas solummodo majori mole differt. Radix subscutata caules plurimos fasciculatos seu cæspitosos emittit.

**1270 STEREOCAULON denudatum:** podetis ramosis glabriusculis superne granulis subphylloideis crenatis lobatisqve lividis albomarginatis arcte vestitis, apotheciis planiusculis fuscis,

*S. denudatum* Fl! Liefr. u. 79.

Hab. in saxis rupibusqve Nordlandiæ, imprimis maritimæ passim copiose.

Ab antecedentibus bene distincta. Cæspites magnos, ramis mediis erectis, lateribus subdecumbentibus efficit. Granula crassiora, qvam in cæteris; quasi subpeltata. Fructus rarius profert. Corpuscula illa parasitica nigra conglomerata glabra, qvorum mentionem facit Flörke l. c., vulgariora. Hæc apud *S. paschale* vulgatissima, floccosa nigra, madida cærulecentia, sed apud *S. dactylophyllum* rarius observantur.

**853 CENOMYCE symphyarpa** Whlbg. fl. lap. n. 853, ubi vide.

*C. cariosa* Fl! Liefr. n. 95 (ipso Fl. annuente).

**854 CENOMYCE cariosa** Whlbg. fl. lap. n. 854, ubi vide. Dill. t. 15. f. 15, 8, C.

*C. decorticata* Fr! lich. exs. n. 81,

*C. cariosa* et *pyxida* β. *coralloides* Ach. syn. p. 273, 253.

Differit hæc ab antecedente præter podetia carioso - cancellata, statu longe altiori, apotheciis obscurius coloratis, et ut plurimum podetis squa-

miosis. Stirps nordlandica a germanica colore cinnereo, qui in illa subpallescens, parum modo differt. Folia thalli minime ut vult Acharius (syn. p. 273), minuta, sed potius majuscula.

856 CENOMYCE coccifera: thallo foliacéo laeñiis subtus nudis, podetiis elongate turbinatis cinnereo-flavo-virescentibus, apotheciis majusculis coccineis.

C. coccifera Ach. lich. un. p. 537. Fl! Monographia Cenom. Ms.

Lichen cocciferus β. Lin. fl. sv. p. 421. fl. lap. n. 429.

α. extensa: podetiis granulatis demum subpulverulentis, scyphi marginibus fructiferis protensis.

C. coccifera α. extensa Fl! Mon. Cen. Ms.

C. extensa Fl! in Berl. mgz. 1808 p. 222. Ach. syn. p. 269. Whlbg. fl. lap. p. 856 (B. cocciferus). Fl. dan. t. 1188. 1.

β. asotea: scyphis regularibus cyatiformibus e centro diaphragmatis aggregato proliferis, demum foliosissimis.

C. coccifera β. asotea Fl! Mon. Cen. Ms..

C. extensa β. asotea Fl! in Brl. mgz. p. 223. Liefr. n. 96 Ach. syn. p. 269.

Lichen Lin. fl. lap. n. 432?

γ. pleurota: subpulverulenta albœ-pallido-virescente, scyphis regularibus, margine subintegro radiatove.

C. coccifera γ. pleurota Fl! Mon. Cen. Ms.

C. pleurota Fl! in Brl. mgz. 1808 p. 218. Ach. syn. p. 270. Whlbg. fl. lap. n. 858. Fr! lich. exs. n. 84.

Hab in terra macra inferalpina ac alpestri per omnem Nordlandiam et Lapponiam.

C. extensa Auct. aestate omnino pulverulenta evadit, et superficies nuda et pulverulenta nec non margo protensa et radiata sic gradatim in se invicem in speciminiis variis transeunt, ut ipse Cl. Flörke natura duce meliora edocet utrasque conjugat.

857 CENOMYCE polydactyla β. macilenta Fl! Mong. Cen. Ms.

*Baeomyces macilentus* Whlb. fl. lap. n. 859,  
ubi vide. *Fr! lich. exs. n. 52* (Cenomyce).  
*Cladonia filiformis* Schärer specil. lich. helv.  
*Lichen cocciferus* α. Lin. fl. svec. n. 1199.

Formam scyphiferam o: *C. polydactyla* α. Fl. in Nordlandia eqvidem non legi, sed in comple-  
tissima Cenomycidum collectione, qvam pro egre-  
gia erga me benevolentia mihi misit Cl. Flörke,  
unam speciem in alteram transire satis mani-  
feste vidi.

**1272** *CENOMYCE Flörkeana*: thallo minuto  
laciiniis subtus nudis, podetis cylindricis glabris  
verrucosisqve virenti-cinereis apice divisis, apo-  
theciis coccineis.

*C. Flörkeana* Fr! lich. exs. n. 82.

*C. chloroides* Fl! Mong. Cen. Ms. - Dill. musei.  
t. 15. f. 19, C.

*Lichen digitatus* Fl. dan. 1188, 2.

Hab. in terra sterili pinetorum versus regionem sub-  
alpinam Nordlandiae et Lapponiae rarius.

*C. polydactylæ* β. *macilentæ* proprius accedit,  
sed superficie minime pulverulenta differt, nec  
eum alia confundi potest. Scyphos perfectos non  
profert. Unciam altitudinem vix attingit. In  
summa ætate interdum podetia squamis o: verru-  
cis laris exasperantur. Rami fere omnes fer-  
tiles.

**1272** *CENOMYCE straminea*: thallo minuto sub-  
tus nndo, podetis pallidis dein fuscescentibus elon-  
gatis tubæformibus squamis pallidis seabridis om-  
nibus scyphiferis, apotheciis subpedicellatis pallidis.  
*C. Flörkeana* Sommerfelt in Actis Ac. nide-  
rosiensis.

Hab. in saxis inter muscos Nordlandiae rarissime. A  
me solummodo in Junkersdalen Saltalen lecta est.

Ponetia nuda, sed semper squamis exasperata  
cylindrica apice in scyphum regularem dilatata,  
rarissime ramosa, cum e senescente podetio nova  
simplicia assurgant. Scyphi rarissime margine  
prolifera. Apothecia inaequula plana constanter  
pallida. *A C. coccifera* var. *ochrocarpia* Fl.  
omnino diversa. In illius apotheciis subpallidis  
rubram tamen translucet. Colore apotheciorum,

podetiis tubæformibus, squamis pallidis arete exasperatis ab omnibus bene distincta species. Cum nomen priori speciei a Friesio dicatum mihi occurreret, meum mutavi, quia illa stirps ut vulgarior ad nomen hujus plantarum familie meritisimum celebrandum aptior erat.

**1273 CENOMYCE carneo-pallida**: thallo minuto, podetiis pulverulentis lutescenti-pallidis albisve, basi fusco-cærulescentibus, apotheciis livido-carneis pallidisqve.

$\alpha$ . *scyphosa*: podetiis turbinato scyphiferis, margine crenulato proliferoqve.

*C. carneola* Fries! lich. exs. n. 415 (pro parte, nam intersunt quoqve specimina *C. polydactylæ* Fl!).

*C. fimbriata*  $\gamma$ . *carneo-pallida* Ach. syn. p. 258.

*Capitularia pyxidata*  $\gamma$ . *carneo-pallida* Fl! in Web. Beitr. 2 p. 304.

$\beta$ . *cyanipes*: podetiis cylindricis cernutis subsimplicibus, demum apice ramosis, ramis brevibus subdivaricatis.

*C. cyanipes* Somrf. in Actis Acad. niderosi.

Hab.  $\alpha$ . in trniciis. dejectis caudicibusqve putridis imprimis versus regionem subalpinam Nordlandiæ et Lapponiæ;  $\beta$ . inter Hypna in sylvaticis Ncrdlandiæ saltensis.

Hæc species ab omnibus formis *C. fimbriata* constanter diversa est. Color podetiorum et apotheciorum nunquam in cinereum vel fuscum vergit. Subtilius pulverulenta quam fere illa alia species. Var.  $\alpha$  e margine sæpe repetito prolifera, proliferationibus omnibus scyphiferis; apothecia in marginibus protensis subpedicellata. Thalli laciniæ subtus albæ subtomentosæ. Basis senectute cærulescit, quod in  $\alpha$ . obsoletius, sed in  $\beta$ . semper evidenter adest. Hæc nota hanc ab omnibus formis similibus *C. polydactylæ* Fl. distingvit, nam illius basis senectute fulvescit. Varietatem  $\beta$ . semper seorsim crescentem diu speciem novam et distinctam habui, nam in ea etiam rarius observantur scyphi parvi, qui vero mox in ramos breves torulosos abeunt, quorum

apices rarissime apothecis minutis pallidis ornantur; sed nunc de vera ejus affinitate non dubito. Ad Cl. Flörkeum eam misi, qui etiam formam cornutam consuit, sed ad quam referret, incertus fuit. Podetia substantiae tenerrimae fragillima et saepe verrucosa usque ad 2 unciarum alti tudenem attingunt.

862 CENOMYCE *fimbriata*: Ach. syn. p. 254  
(excl. var. *y.*)

Bæomyces *pyxidatus* Whlbg. fl. lap. n. 962  
(excl. syn. Lin. fl. suec. n. 1111 et fl. lap. n. 824.) ubi vide.

1274 <sup>1/2</sup> CENOMYCE *chlorophæa*: thallo foliaceo  
rundato, podetis elongate turbinato scyphiferis  
granulatis albo s. fusco-virescentibus, margine  
dentalato, apotheciis luscis,

*C. chlorophæa* Fl! Mon. Cen. Ms.

?C. *pyxidata*. b. *staphylea*. c. *syntheta* Ach. syn.  
p. 255.

Fl. dan. t. 1188, 3. opt. Dill. musc. t. 14  
f. 8 A—G.

Hab. in terra sterili per Nordlandiam et Lapponiam  
passim.

Est species media inter *C. fimbriatam* et *pyxidata* Ach. (pyxidata et neglectam Fl.). Formam *C. fimbriata* gerit, sed minime pulverulenta. Granula quidem tenuia, nec ut in *C. pyxidata* vetusta verrucosa, sed pulvis dici non possunt. Rarius si unquam quoque occurunt forme cornutæ. Tales ipse nunquam legi, et quas mihi misit Cl. Flörke, satis ad *C. fimbriatam* accedunt. Vario modo prolifera, proliferationibus scyphiferis. Podetia ipsa juncea alba, dein fusca, granulis virescentibus. Ob thalli lacinias magnas Fl. dan. t. 1855 f. 2 ad hanc pertinere non potest.

863 CENOMYCE *pyxidata*: Ach. syn. p. 252  
excl. var. excepta *d. lophyra*.

*C. pocillum* Ach. l. c. p. 253.

Bæomyces *neglectus* Whlbg. fl. lap. n. 863. ubi  
vide. Fl! Liefr. n. 16 et 200 (*C. pocillum*).

Lichen *pyxidatus* Lin. fl. suec. n. 1111.

Nullum mihi dubium est, qvin hæc cum antecedente et sequente veris *Lichen pyxidatus Lin.* sit. *C. posillum* forma modo est juvenilis et inessiformata.

- 864 CENOMYCE *verticillata* Whlbg. fl. lap. n.  
864, ubi vide.

$\beta$ . *phylophora*: thallo majusculo in podetia angusta brevia albida adscendente, scyphis dilatatis.

*C. verticillata*  $\beta$ . *phylophora* Fl! Mong. Cen. Ms.  
? *C. cervicornis* Ach. prd: p. 184. syn. p. 251.  
in Act. Ac. holm. 1801 t. 4, f. 3.

Hab. in terra sterili alpesi et subalpina Nordlandiæ.

Synonymum Acharii mihi indubium, cum modo iconem, nimis parvam, alias bonam, viderim, dubitante tandem apposui.

- 866 CENOMYCE *gracilis* Whlbg. fl. lap. n. 866.  
ubi vide et adde.

*Lichen* Lin. fl. lap. n. 428.

Hie, minime vero *C. fimbriata* vel *pyxidata* campos colore albo inducit.

- 4275 CENOMYCE *coniocreæ*: thallo foliaceo, podetis cæspitosis elongatis subventricosis subdivisis glabris supra medium pulverulentis cinereo s. fusco-viridis subulatis scyphove angustato terminatis, apothecis fuscis.

*C. coniocreæ* Fl! Mon. Cen. Ms.

*C. coniocreæ*  $\beta$  excelsa Fl! Liefr. n. 139.

*C. cornuta* Fr! lich. exs. n. 116. Lin. fl. svec. (Lichen) n. 1115, lap. n. 434, (pro maxima parte.)

Hab. in terra sterili inferalpinorum Nordlandiæ ac Lapponiæ frequenter.

In hisce regionibus quoque rarius oœverit *C. coniocreæ*  $\alpha$  Fl! Liefr. n. 138, quam nunc in Monogr. Cen. ab ea nomine *C. flexuosæ* distinxit. Illi nec non inibi adhuc dubia. Cum *C. coniocreæ* jure conjuncta videtur, nam ab illa modo differt: statura duplo minori, podetis fere omnibus scyphiferis. Habitu *C. fimbriata* var. *fibulam* retinet. Hæc species et ad *C. fimbriata* v. *cornutam* et ad *C. gracilem* cornutam accedit, sed ab utraqve differt podetis inferne glabris superne pulverulentis, scyphisqve subinterrimo angustato. Nullus dubito. qvin *L. cor-*

*nutus* Lin. imprimis hujus loci sit, etsi ille auctor celeberrimus ut quoque Cl. Acharius in scriptis antiquoribus illi formas aliarum specierum cornutas certe associavit.

**1276 CENOMYCE decorticata**: thallo squamæformi, podetiis simplicibus, fructiferis cylindricis, sterilibus subulatis, decorticatis albissimis fuscisqve squamis minutissimis albido cinereis adpersis, apotheciis subpeltatis fuscis. *Fl!* *Mon.* *Cen.* *Ms.* *Fl!* *Liefr.* n. 75 (non vero Fries).

*C. pityrea* c. *decorticata* *Ach.* *syn.* p. 254.

**Hab.** in lateribus montium inferalpinorum sub Pinis in Saltalen Nordlandiæ rarissime.

Podetia fructifera rarius apice divisa, semper opaca quasi byssῳ albo tecta. Apothecium primum singulum podetia terminat, quod rotundatum crescens medio rumpitur et plura apothecia mentionem scyphamqve perivium spurium efficit. Opacitate et defectu scyphorum ab omnibus formis *C. pityrea* diversa. *C. cariosa* sane affinior, et podetiis integris simplicibus, apotheciis pallidioribus etc. differt.

**1277 CENOMYCE parecha**: thallo foliaceo majusculo, laciniis suberectis incisis crenatisqve, podetiis levigatis lacteo-virescentibus cylindraceo-obconicis scyphiferis, scyphis cribrosis margine lacero-dentatis prolificantibus, proliferationibus ramosis turgescientibus subaseyphis, apotheciis parvis pallide-fuscis.

*C. parecha* *Fl!* *Mon.* *Cen.* *Ms.* *Ach.* *syn.* p. 272. *Lich. un.* p. 532. prd. p. 185 in *Act Ac. holm.* 1821 t. 4 f. 2. *Fl. dan.* t. 1356 f. 2.

*C. Candelabrum* *Ach.* *lich. un.* p. 533.

*b. corniculata*: podetiis elongatis subulatis divisis aseyphis.

**Hab.** in sterilibus inferalpinis parcus, in subsylvaticis copiosius per Nordlandiam et Lapponiam.

*C. unciali* proxime affinis, sed cum ea ob eolum, scyphos perfectos, thallum majuseulum etc. confundi nequit. Scyphi eadem modo cribrosi ac in *C. amaurocræa* *Fl.* qvæ statura altiori graciliori qve, podetiis apotheciisqve pallidis mox agnoscitur. Varietas arcte caspita, sœpe 4 une

longa rarius sed magna copia obvenit. Thallus ad uncialem longitudinem assurgit.

**1278 CENOMYCE papillaria:** thallo subcrustaceo granulato albido, podetiis brevissimis ventricosis glabris albis simplicibus ramulosisqve, ramis brevibus subconfluentibus, apotheciis planiusculis rufo-fuscis.

*C. papillaria* Fl! Mon. Cen. Ms. Ach. syn. p. 248.

*Lichen papillaria* Ehrh. — Ach. prd. p. 88. Engl. bot. t. 907. Dill. musc. t. 16 f. 28.

Hab. in terra nuda turfosa in rupibus submaritimis Nordlandiæ saltensis ex. gr. supra Skarvhammen Skjerstad.

Granula thalli crenulata, ergo foliaceæ indolis. Podetia primum conica, apice fulvo-fuscescente, deinde ampliantur, sed vix supra 8 lin. assurgunt. Apothecium terminale unicum subpedicellatum. Priori nulli affinior est.

**1279 CENOMYCE cenotea:** thallo foliaceo minuto pulverulento, podetiis longiusculis ventricoso-subteretibus tenuissime pulverulentis albis cinereisqve apice apertis scyphiformibus, margine repetito prolificantibus, apotheciis parvis nigro-fuscis.

*C. cenotea* Al! Mon. Cen. Ms.... Lief. n. 177. Ach. syn. p. 271.

*Bæomyces cenoteus* Ach. meth. p. 345 t. 7 f. 7. Whlbg. fl. ups. n. 915.

*C. gonorege* α Ach. lich. un. p. 551.

*C. brachiata*, Fr! lich. exs. n. 55.

*Cladonia uncinata* Hoffm. fl. germ. p. 116.

Hab. in truncis dejectis putridis et terra tenui rupium inferalpinorum et subalpinorum Nordlandiæ et Lapponiæ freqventer.

**872 CENOMYCE furcata:** podetiis elongatis gracilibus laevibus albo-viridibus, lividis s. subspadiceis dichotome ramosis, axillis perforatis, ramis acicularibus, apicibus subfurcatis divergentibus, fertilium apotheciis fassis. Fl! Lief. n. 196. Mon. Cen. Ms. Dill. musc. t. 16. f. 26, 27.

$\alpha$ . erispata: podetis brevioribus crassioribus, axillæ perioribus dilatatis verticillato - prolificans.

$C.$  furcata var. erispata Fl! Mon. Cen. Ms.

$C.$  erispata Ach. syn. p. 272. Whlbg. fl. lap. n. 866, ubi vide.

$\beta$ . furcata: podetis elongatis gracilibus lœvigatis, liridis spathuliforme dichotomis, ramis subconcentris, apicibus furcatis.

$C.$  furcata var. Fl! Liefr. n. 195. Mon. Cen. Ms.

$C.$  furcata Ach. syn. p. 276. Whlbg. fl. lap. n. 872, ubi vide.

$\beta$ . subulata: podetis parcus ramosis, ramis erectis succulatis.

$C.$  furcata b. subulata Fl! Mon. Cen. Ms. . . .

Liefr. n. 197. Whlbg. fl. lap. p. 457, ubi vide.

$\gamma$ . racemosa: podetis albo-virescentibus elongationibus dentim subinflatæ parcus ramosis, ramis subsimilibus apice subturgescens, apothecis conformatis.

$C.$  furcata var. racemosa Fl! Mon. Cen. Ms.

$C.$  racemosa Ach. syn. p. 275. Whlbg. fl. lap. n. 870, ubi vide.

$\beta$ . adspersa: podetis elongatis squamoso-furfuraceis viridi-albis, parce ramosis, ramis subsimilibus, apothecis rufioribus. Fl! Liefr. n. 198. Mon. Cen. Ms.

$C.$  pityrea b. acuminata Ach. syn. p. 254. Dill. musc. t. 16 f. 27, e.

Hab. in Nordlandia et Lapponia passim ubique;  $\alpha$ . in uidis;  $\beta$ . in sterilibus;  $\gamma$ . inter muscos in sylvaticis.

A vario loco habitacionis variae formarum mutationes queque declarantur. Var.  $\alpha$ . in  $\beta$ . abire et in germanicis et in nordlandicis speciminiibus evidenter observavi, nec  $\beta$ , a  $\gamma$ . distingui potest, nam male omnino axillæ in  $C.$  furcata imperforatae dicuntur. Hoc in forma subulata macriforma rarius forsitan observatur.

876 ENDOCARPON Sommerfeltii: crusta lœvigate cinerascente-lactea verrucosa, apotheciorum

verrucis subconico-hemisphaericis, ostiole subsectori regulari fuscescente.

*Porina Sommerfeltii Flörke* in lit.

*E. pertusum Whlbg!* fl lap. n. 876, exclusis omnibus syn.

Hab. in cortice Salicis Capreae, Populi et Juniperi Lapponiae kemensis et Nordlandiae saltensis haud raro.

Crusta semper in cinerascentem nunquam in pallescentem colorem vergit. Verrucas, imprimis juniores, semper subconicæ, versus apicem acutissimæ; ætate vero magis hemisphaericæ. Ostiole 1—4 primum sub prominula, dein depressa. Ascii exuberantissimi lineares sporidiis 8 ovalis. *Porina lejoplaca* multo affinior quam *P. pertusa*. Ab illa differt: colore semper in cinereum vergente, verrucis minoribus, nunquam oblongis convexis, ostiole regulari, nec a juventute modo impresso, sed prominulo, nec rimoso aperiundo. Ab hac crista alba tenuiere, verrucas majores gerit. Cum summo jure *Porina* genus cum Endocarpo conjunxit Cl. Wahlenberg.

4280 ENDOCARPON *lejoplacum*: crusta pallens - lactea verrucosa levigata, apotheciorum verrucis oblongis convexis, ostiolis 1—3 discretae fuscescentibus irregularibus tandem rimoso-aperiundis.  
*Porina lejoplaca Fl! Lief. n. 11. Ach. syn. p. 110.*

Hab. in cortice Alchorum Nordlandiae saltensis passim copiose.

4281 ENDOCARPON *fallax* *β. rupicola*: crusta subeffusa glabra plicata-rugosa verrucosa cinereo-pallide-olivacea, apotheciorum verrucis regularibus depresso amictu tumente marginatis, ostiolis subpluribus impressis differentibus.  
*Porina fallax var. Ach. syn. p. 110. Fl! Lief. n. 147.*

Hab. in ripibus submaritimis occultis Nordlandiae saltensis rarius ex. gr. inter Löb et Mikelbostad.

Crusta quam vulgaris crassior, plicato-nodulosa, sed revera membranacea cohaerens. Apothecia

rum verrucæ confertæ elevatae regulares valde impressæ, ut margine tumido eingantur, sed margo non flexuosus, quare discus magis apertus quam in  $\alpha$ . Ostiola qvidem juniora elevata, sed mox depressa, cum tota fere nuclei superficies nigrescens in apertum veniat. Nucleus alias rufescens haud profunde immersus est.

**4282 ENDOCARPON xanthostomum:** crusta submembranacea verrucosa laevigata alba, apotheciorum verrueis elevatis subrotundis planiusculis, ostiolis depressis pallidis. *Sommerf. in Act. Ac. holm. 1823 p. 115 (Porina).*

**Hab.** in cortice Juniperi exsiccati rariusque in muscis graminibusque destructis in maritimis Nordlandiæ saltensis e. gr. ad nosocomium Bodöe.

Crusta tenuis effusa subnitida. Discus verrucarum ob nucleus perlucentem pallescit. Verrucæ madefactæ immutatae parum tument. Ostiola 1—5 pallida subperforata. Sæpe verruca rupta nudus appetet nucleus e tot perithecio proprio cinctis nucleolis, quot ostiola adsunt, constans. Primum intuitu hæc planta *Lecanoram parellam*  $\beta.$ , quæ etiam in Juniperis freqventer obvenit, refert, sed abunde distincta est.

**4283 ENDOCARPON globularis:** crusta subcartilaginea verrucosa cinerascente-alba, apotheciorum verrucis sparsis subglobosis pallescenti-albidis, ostiolo solitario protuberante convexo nigro, demum impresso.

*Porina globularis Ach. syn. p. 112.*

?*Porina glomerata Ach. syn. p. 111. Schleich pl. cr. cent. 3. n. 77 (Lichen) ex Achar.*

**Hab.** supra muscos destructos in rupibus umbrosis inferalpinorum Saltdalen Nordlandiæ parcus e. gr. sub Ravnflauet.

Crusta summa ætate pulverulenta sed vix granulata, multo minus granulis confertissimis ramulisqve. Granula, quæ in tenui subcartilaginea crusta adsunt, apothecia juniora ostiolo adhuc latente sunt. Apotheciorum verrucæ magnitudine seminis Brasiciæ quasi tinctoria pallescente nitente leviter perfusæ, subglobesæ, vix hemisphæricæ sunt. Ostiola juniora protuberantia, sed mox impressæ,

cum nucleus junior albus parum denudetur et nigrescat, et tum verrucæ madidæ disco latiori nigrescente scutellam referunt.

Auctoritate Cl. Flörke hanc stirpem ut *P. globularem* nec ut *P. glomeratam* Ach. recenseo, licet character hujus l. c. et frustula specimenis Achariani *P. glomeratæ* in herbario Cl. Swartzii melius convenient. Sed de Lichene meo rescripsit Am. Flörke: "Aliquis crederet, hunc lichenem quatenus europæum *P. glomeratam* Ach esse, sed *P. globularis* est; illa enim ab omni parte major verrucas modo hemisphæricas habet."

- 879 ENDOCARPON *theephroides* Whlbg. fl. lap. n. 879, ubi vide.

Et subfoliaceum et effuso-erustaceum (*β. polythecium* Ach. syn.) obvenit. Stratum viride manifestum continet, adeo ut madidum sæpe subvirescat (contra Wahlbergium). Usque ad alpes superiores adscendit.

- 1284 ENDOCARPON *viride*: thallo foliaceo membranaceo subrotundo concaviusculo, margine integrime inflexo, late virescente, subtus albido nude. Achar. syn. p. 100. Fr! lich. exs. n. 36.

Hab. in terra turfosa inferalpinorum Saltdalen Nordlandiæ passim.

Stirps dubia nondum fructifera lecta. Intervidum eam in thallum *Cenomyc. digitatae* abire manifeste observasse credidi, cum vero thallum *C. digitatae* nec semper nec vulgo hoc modo oriri viderim, dubia vera denuo excitabantur. Thallus subcucullatus, supra infragve laevis.

- 1285<sup>884</sup> VERRUCARIA *punctiformis*: crusta tenuissima levigata fuscescente, apotheciis minutis hemisphærico-globosis subastomis, nucleo globoso albo. Ach. syn. p. 87.

*β. atomaria*: crusta tenuissima olivacea fuscescente; apotheciis minutissimis subglobosis et hemisphærico-conoideis.

V. *punctiformis* *β. atomaria* Ach. syn. p. 87.  
V. *stigmatella* *β. micans* et *ε. atomaria* Ach. lich un. p. 277.

Hab.  $\alpha$ , in cortice livo Sorborum rarius;  $\beta$ . in cortice Alnorum ubique per Nordlandiam.

*Crustia* sine dubio in hac segregat in *V. epidermidis* hyalina, a cortice substrato colorem assumens. A *V. epiderm.* differt: apothecis globosis, non oblongis.

**1286 VERRUCARIA nigrescens:** crusta subtartarea zimosa - areolata inaequabilis subgelatinosa fusco-nigricante, apothecis immersis papillula elevata prominentibus, intus albidis.

*V. nigrescens* Ach. syn. p. 128. Pers. in An. d. Bot. 14 p. 56. Fl! Liefr. n. 43.

*V. umbrina*  $\beta$ , *nigrescens* Ach. lich. un. p. 231.

Hab. in scolis lapidibusque calcaris et schistosis per Nordlandiam passim.

Crusta multo crassior, inaequabili imo subgranulata, dilatans colorata, semper opaca p. g. a sequento differt, quare male cum suam *V. umbrinam* conjunxit Cl. Acharius.

**890 VERRUCARIA maura:** crusta tartarea tenui levigata rimosissima vix cinereo-fusca demuraria, apothecis minutis crusta obtectis subumbonatis, nucleo albissimo Fl! Liefr. n. 181. Ach. syn. p. 95. Whlbg. fl. lap. 890.

*V. aractina* Whlbg. fl. lap. n. 889. Ach. syn. p. 121 (*Pyrenula*); punctata.

*Verrucaria umbrina*  $\alpha$ . Ach. lich. un. p. 231.

Whlbg. fl. lap. n. 885? junior.

*Lichen terminalis* Fl. dan. t. 879.

?*Pyrenula ethiobola* Ach. syn. p. 125?

?*V. marginata*  $\beta$ . *ethiobola* Whlbg. l. c. p. 465.

?*V. mucosa* Ach. syn. p. 93. Whlbg. l. c. n. 892?

Hab. in lapidibus et rupibus littoralibus Nordlandie et Finmarkie ubique.

De indotitate *V. mucosa* et *V. marginata* nondum persicatum mihi est. Saltem *V. mucosa*, ut vult Cl. Flürke l. c., in umbra evoluta stirpe non est; potius juvenilis forma dicenda est, si ambo coniungendae sunt, licet transitum non videmus.

**1287 VERRUCARIA Schraderi:** crusta subtartarea contigua levigata albescente, apothecis con-

*fertis immersis subglobosis perforatis, intus sor-  
dide hyalinis.*

*V. Schraderi Ach. syn. p. 93. prd. p. 13.*

*V. rupestris Schrad. specil. p. 109 t. 2 f. 7.*

*Lichen immersus Hoffm. en. lich. t. 3 f. 5.*

*β. lepadicola:* crusta tenuissima albescente s.  
subnulla, apotheciis globosis.

Hab. in saxis rupibusq; calcariis per Nordlandiam  
saltensem frequenter; β. in testis Lepidum et  
Patellarum ad oras Nordlandiae.

Crusta cinerascente, rufescens, pallescentiique —  
sthesca cum lapide arce conjuncta, intus strato  
fæculifero vivide viridi e massa pulveracea co-  
haerenti constat. Apothecia saepe decidunt et pu-  
eros vacuos relinquent. Forsan verius ad Endo-  
carpa referrebatur haecce species, *End. tephroidi*  
*affinis*.

Var. β. imprimis loco habitationis memorabilis  
est. In statu sicco vix ulla crusta distingvi po-  
test; in statu madido testa circa apothecia parum  
virescit, etsi stratum fæculiferum distingvi non  
potest. Apothecia modo breviora, alias ostio  
plano poro pertuso, intus hyalino-albido si m.  
var. α. omnino similia sunt.

1288 VERRUCARIA *hydrela*: crusta effusa tenui  
subcontigua inæquabili fusco-cinereo-virescente,  
deinde subobliterata, apotheciis minutis subglobosis  
semiimmersis papillatis intus albidis.

*V. hydrela Ach. syn. p. 94.*

Hab. in rupibus saxisq; passim irrigatis Saltdalen  
Nordlandiae.

Apothecia globoso-conoidea conferta saepissime  
nuda in lapide observantur, si vero manefacta  
sunt, rudimenta crustæ viridia nonnulla apparent.

1289 VERRUCARIA *epipolæa*: crusta tartareo-  
pulveracea contigua rugosa inæquabili alba s.  
obliterata nulla, apotheciis parvis hemisphærico-  
subglobosis prominentibus papillatis pertusis.

*V. epipolæa Ach. syn. p. 95.*

Hab. in lapidibus rupibusq; calcariis Saltdalen rarius.

De synonymis Acharianis ad hanc et anteceden-  
tiem pertinentibus non omnino certus, atamen

aliæ vix esse possunt. Mox dignoscitur hæc ab aliis nostris apothecis parvis acutiusculis e crusta alba pulveracea prominentibus.

**1290 VERRUCARIA theleodes**: crusta verrucosa virescenti alba, verrucis convexis lobato - crenatis, apotheciis magnis adnatis globosis lævibus, denique rugosis, stomate plano pertuso.

*β. contigua*: crusta verrucis confluentibus taretæa subcontigua.

Hab. in rupibus interdum stillicidiis irrigatis per Nordlandiam saltensem ex. gr. ad Fiskevaagosen Saltalen copiose.

Verrucæ crustæ interdum satis dispersæ; in umbrosis crescentes omnino virescent et sicea pruina modo tenui alba teguntur. Apothecia gelatina copiosa sporis referita scatent, et magnitudine semen Cannabis æqvant.

**1291 VERRUCARIA rubra**: crusta mucoso - gelatinosa subdeterminata lævissima tenui rubra, apotheciis minutis immersis globosis, ostiolo impresso, nucleo hyalino.

Hab. in lapidibus a fluxu maris inundatis ad litora Nordlandiæ freqventer.

Crusta junior sive occulte crescens sordide lutea. In lapidibus opacis fusco - rubra apparet, sed in qvarzo albo verum suum celorem rubrum s. sangvineum prodit. In termino Lichenum et Algarum est.

**1292 VERRUCARIA gelatinosa**: crusta gelatinosa tenui inæqvabili albido - virescente, apotheciis basi innatis hemisphæricis ostiolo impressis.

V. gelatinosa Ach. syn. p. 93.

Hab. in museis rupium inferalpinorum Saltalen Nordlandiæ rarius.

Colore erustæ a charactere Acharii differt, sed sine dubio illa moriens, mea vigens.

**1293 VERRUCARIA stictica**: crusta tenuissima arachnoidea fibris ligni s. corticis mixta nivea, demum sordide albo - cinerascente, apotheciis minutis innatis hemisphæricis pertusis. Fl! Liefr. n 168. Ach. meth. p. 118.

V. byssacea β. stictica Ach. syn. p. 97.

Hab. in cortice lavigato Populorum Saltdalen Nordlandiæ passim.

Specimina ad Cl. Flörke nisi et veram agnoscit. Pyrenotea stictica secundum specimina mihi obvia in *Fries lich. exs.* n. 22. vix discerni potest.

## SPILOMA.

*Acharii synop. lichen. p. 1.*

1294 SPILOMA *paradoxum*: crusta subnulla soridide cinerascente, apotheciis convexiusculis subrotundis ellipticis difformibusque fusco nigris, intus in sicco subsolidis subfulvis. *Ach. syn. p. 3.*  
*Conioloma paradoxum Fr! lich. exs. n. 1.*

Hab. in epidermide vetusta Betularum nec non lignis putrescentibus per Nordlandiam saltensem.

Hæcce stirps sine dubio verius Fungis quam Lichenibus ad numerabatur. Cum *Lecidea dryina Ach. ex. Fl! Liefr.*, quam vera est Lecidæ sp., ob internam diversissimamque apotheciorum indolem minime conjungi potest.

1295 SPILOMA *circinatum*: crusta tenui albida, apotheciis erumpentibus irregularibus oblongis s. sublinearibus circinati confluentibusque nigris substantiæ floccoso-pulveraceæ.

Hab. in cortice Populorum Saltdalen Nordlandiæ parcius.

Ubi adest, totos truncos fere tegit. Orbis nigros  $\frac{1}{4}$  lineam latos efficit. Epidermis inter apothecia dilutius colorata, quam ob rem crusta adesse videtur, etsi ab epidermide secerri non potest. Cl. Flörke Spilomatis speciem agnoscit; alias eam forsitan potius inter Fungos recensueram.

1296<sup>1297</sup> ARTHONIA *punctiformis*; crusta tenuissima fuscescente f. subnulla, apotheciis minutis innatis subrotundis plano-convexusculis opacis atris.

*A. punctiformis Fl! Liefr. n. 2. Ach. syn. p. 4.*  
*Nævia orbicularis Fr! lich. ex. n. 21.*

Hab. in cortice levavi rameum Populi tremule per Nordlandiam saltensem.

Juvenis a velo epidermidis tecta est, atamen vix, ut vult Cl. Fries l. c., ad Fungos referri debet. Næviam orbicularem Fr. a vulgaris A. punctiformi unice magnitudine exintiam ut speciem diversam distinguere minime possum. Orbicularia et oblonga apothecia in uno specimine invenies. In Nordlandia vulgo major occurrit.

894 OPEGRAPHA astroidea: Whlbg. fl. Lap. n. 894, ubi vide, Ach. syn. p. 6.

Hab. in Alnis circa sinum saltensem Nordlandiae frequenter.

1291 ~~§ 24~~ OPEGRAPHA cymbiformis: crusta tenui levigata alba demum albida, apotheciis sessiliis oblongis, dein oblongo-elipticis elongatisque flexuosis disco aperto plano in medio subdilatato, marginibus elevatis subinflexis.

O. cymbiformis Fl! Lief. n. 165.

O. vulvella Ach. syn. p. 77.

O. rimalis Fr! lich. exs. n. 32. Ach. syn. p. 77.

Hab. in cortice yetusta Populorum imprimis ad radices in inferalpinis Saltdalen Nordlandiae rarius.

Cum et Cl. Flörke meam stirpem ut veram agnorit, et ego ipse eam specimine ejusconvenientem invenerim, de synonymo ejus dubitare nequeo. Cum vero etiam specimeen *O. rimalis* a Cl. Fries, inter lich. exs. datum omnino conveniat, et diagnosis Achariana et specimen Flörkei (Lief. n. 143.) *Opigraphæ rimalis* l.c., si apothecia angustiora et margines parallelas excipias, hanc ab *O. vulvella* minime distingvat, non possum non utr quoque nimis affines credere. Apothecia ab initio minuta rimæ media modo notata, sed mox ecrescunt, nonnulla in latitudinem oblonga disco late, alia in longitudinem elongata flexuosa subdivisa disco modo medio dilatato. Discus nunquam concavus, sed modo ob margines elevatos talis appetet. Crusta semper levigata remanet, sed ætate obscurescit.

1298 LECIDEA coracina: crustæ subculo astro subradiante, areolis cinerascenti-nigris, apotheciis

*sessilibus planis demum convexis atris, margine tenuissimo, intus atris cornicis strato tenuissimo pellucido sub disco.*

*L. coracina Ach. syn. p. 11. Hoffm. fl. germ. p. 183 (Verrucaria).*

Hab. in rupibus subalpinis et alpinis Saltdalen Nordlandiae rarius.

*L. fuscoatrae et atro-albae proxime adstat; Apothecia rarius inter areolas sed saepius in eis, margine tenuissime crenulato, disco raro sicco nigro vix visibili, madido manifesto virescenti praedito. Areolae parvae convexae, madefactae virescent, et interdum adeo confertae sunt, ut crusta rimoso areolata videatur. Subiculum eximie crassum.*

906 LECIDEA *fusco-atra* Whlbg. fl. lap. n. 906,  
ubi vide.

*L. fumosam Ach. syn. et Whlbg. fl. lap. n. 911, cum hac, et sine dubio summo jure conjungit Cl. Flörke (Berl. Mag. 3 p. 312), nam areolarum nec non apotheciorum (intus nigra carbonacea sub disco strato pellucido) indeles eadem est, sed cum subiculum atrum in *L. fumosa* rarius quidem lecta nunquam viderim litem peritoribus dijudicare relinquo.*

1299 LECIDEA *atrofulva*: crista: subiculum tenui atrum areolis confertis subglobosis ochraceo-fulvis, in pulverem cinereum fatiscentibus, apotheciis planis minutis atris, margine crasso intus concoloribus strato sub disco albido.

Hab. in rupibus silaceis et semel lecta in cortice trunci Populi sub rupe hoc Lichene tecta dejecti in Saltdalen Nordlandiae.

*L. atro-albae affinis, perraro fructifera. Apothecia minuta laevia sed crassiuscula, margine quoque crassiusculo etsi parum elevato. Areolae demum cinerascent.*

1300 LECIDEA *lugubris*: crista rugoso-plieata areolata inaequabili violaceo-fuscescente, areolis sublobatis, apotheciis superficialibus planis marginatis, margine elevato, intus albidis.

? *L. squalida Ach. syn. p. 19?*

Hab. in rupibus inferalpinis Saltdalen Nordlandiae rarius, e. gr. supra Storeungen Fiskevæg.

*Crusta areolato-lobata granulatavæ coriacea et apotheciis constanter planis marginatis imprimis eximia est. Affinitate quidem cum varietate fusca *L. atroalba* conjuncta est, sed ab crustam diversam apotheciaque majora intus albida cum ea confundi nequit. Crustæ natura et colore a *L. daphoena* differt,*

- 1301 LECIDEA tessellata:** crusta tartarea rimoso-areolata alba, areolis planiusculis angulatis, apotheciis immixtis sessilibusque planis subconvexis marginatis atris, intus albidis subfarinaceis. *Fl!*  
*Liefr.*, n. 64.  
? *L. pantosticta*  $\alpha$ . *Ach.* syn. p. 13?

Hab. in saxis alpinis Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Specimine Flürkei omnino similis, modo areolæ rugosæ s. granulato exasperatæ, quod sine dubio aer alpinus efficit. Crusta crassiuscula ab apotheciis propellantibus st̄epe nigro punctata. Margo tenuis, *L. contiguae* (*lapicidæ* *Ach.* syn. excl. varietatibus  $\beta$ .  $\gamma$ . et  $\delta$ .) et *L. epipoliæ* satis affinis. Ab utraqve differt: apotheciis immersis internaque eorum indole aliena. Quoqve quam *L. epipolia* major est. Sine dubio hujus loci est *L. pantosticta*  $\alpha$ . *Ach.*, quæ ceteroquin species prava e partibus diversissimis composita sc. var.  $\beta$ . ad *L. lithophilam* *Ach.*,  $\gamma$ . ad *L. daphoena*,  $\delta$ . ad *Urceolariam cinereum* *Ach.* pertinente.

- 1302 LECIDEA aglæa:** crusta tartarea rimoso-verrucoso-areolata pallescenti-alba, apotheciis subinnatis convexis immarginatis denique confluentibus subdifformibus atris intus corneis atris strato sub disco cinerascente,

Hab. in rupibus maritimis Nordlandiæ meridionalis e. gr. Bodöe.

Species pulchra, *L. contiguae* et *theiodi* Somrf. affinis. Ab utraqve differt: apotheciis ab initio convexis immarginatis in areolis nec inter eas sitis coloreque crustæ, qui constanter niveus tinctura pallescenti nitenti quasi superfusa. Crusta subeffusa, attamen haud magnas maculas efficit. Areolæ convexæ lèves, denique rugosæ.

**1303 LECIDEA thsiodes:** crusta tartarea ineqvabilis rimoso-areolata sulphurea, areolis rugoso-granulatis, apotheciis innatis planis cærulescenti atris, margine elevato flexuoso persistente intus fuscis strato sub disco cinereo.

Hab. in saxis inferalpinorum Saltdalen Nordlandiae rarius.

Areolæ crustæ rimis formatæ denuo ex pluribus minoribus areolis s. granulis rotundatis lævibus opacis consistunt. Apothecia sat magna supra crustam vix elevata, rore tenui cæsio interdum obiecta, margine subcrispato.

*L. viridiatræ* Ach. affinis, sed a Cl. Flörkeo ut sp. nova agnita est. Cum *L. atrovirente* confundi non potest.

**1304 LECIDEA lepadina:** crusta (raro) tartarea æqvabili lævigata subrimosa grisea; (vulgo) glebulosa, glebulis solitariis orbicularibus conicis obtusis lævigatis griseis, lamina proligera atra tenui immarginata glebulis adnata.

Hab. in saxis summorum cacuminum alpium Nordlandiae saltensis. A me unice in Hekkeltind Skjerstad lecta est.

Lichen habitu et indole prorsus alienus, nulli alii affinis. Crusta effusa semper sterilis. Glebulæ basi 2—4 lin. latæ, usqve ad 2—3 lin. altæ, intus cretaceæ. Earum ut plurimum in apice, rarius in lateribus immersæ sunt laminæ atræ planiusculæ, margine nec proprio nec thallode ornatae, etsi glebularum margines supra eas prostant.

**1305 LECIDEA daphoena β. ochracea:** crusta rimoso-lævigata rubro-ochracea, apotheciis superficialibus planis atris, margine elevato, intus sub. lamina tenui albis.

*L. daphoena β. ochracea* Ach. syn. p. 337.

*γ. rorida:* crusta æqvabili lævigata ferrugineo-cinerea, apotheciorum disco piano pruinoso sub lamina tenui albo, margine elevato nudo atro demum flexuoso.

*L. fumosa β.* Mossigk Ach. syn. p. 42. sec. spec.

*L. lapidea*  $\beta.$  *monticola* et  $\delta.$  *cyanæa* Ach. syn. p. 14. *L. albo-cærulescens*. Fl. dan. t. 1432, 2: 213.  
Hab. in saxis rupibusq; non calcariis Nordlandæ saltensis;  $\beta.$  rarius,  $\gamma.$  frequentissime in Salt-dalen.

Lecidearum seriem in operibus Acharianis nova indigere reformatione, hæc species quoque demonstrat. Apothecia sat magna, in  $\gamma.$  interdum maxima, plana margine valido intus sub lamina tenui alba, hanc speciem ab omnibus aliis distinguunt, quamvis crustæ color et superficies nec non apothecia quoad pruinam multis variationibus obnoxia sunt. Crusta in var.  $\gamma.$  albida, cinerea, cinnereo-virescens, ferrugineo-cinerea quin etiam subferruginea obvenit. Ros apotheciorum cæsius et subferrugineus in aqua non evanescit, sed evidenter fit.

**1306 LECIDEA flavicunda:** crusta lœwigata, tenuissime rimosa albida s; pallido-flavante s. ochracea, apotheciis superficialibus sparsis regularibus atris, disco plano subpruinoso, margine elevato nudo, intus nigris strato sub disco corneo-hyaline.

*L. flavicunda* Ach. syn. p. 22, lich. uni. p. 166.  
*L. flavocærulescens*. Fl. dan. t. 1431, 1. Ach. syn. p. 23.

Hab. in rupibus saxisq; non calcariis inferalpinotum Salt-dalen Nordlandæ frequenter.

Apotheciorum indole interna *L.* confluentibus unice affinis, differt vero ab illa: apothecis regularioribus pruinosis, margine elevatione, crustæ crassiore. Crusta sæpiissime nitente; in modificatione vero ochracea, quæ fere ob colorem crustæ inæquabilis et apothecia ferrugineo-pruinosa, ut propria varietas enumerari, metebat, opaca est. Crusta sterilis per rimas in pulverem cinerem fatiscit. Ubi alium Lichenem offendit, nigro marginata est. Apothecia juvenilia minuta crassa, adulta majuscula. Icon Floraæ danicæ bona, modo disensu nimis vivide cæruleus.

**1307 LECIDEA petrea:** crusta temet serbiculare sublimitata tenuissime subrimosa subpulverulenta

albida, apothecis crustæ adnatis protuberantibus tumidis, disco plano margine tumido elevato integrissimo subcoarctato, intus nigris opacis.

L. petræa Ach. syn. p. 15.

Verrucaria petræa et tigrina Hoffm. pl. lich. t. 50. ex. Achar.

Hab. in rupibus non calcariis. Nordlandiæ saltensis parcus.

Crusta alba, et cæsio-albida, sed nunquam cinerea,

tenuis æquabilis subrimosa, nunquam tartarda, areolata, quam ob rem mihi facile persuadeam,

L. petræam Whlb. fl. Lap. n. 912, alias mihi ignotam, vix hujus loci esse. Nonne potius L. epipoliae forma? Apothecia parva sparsa margine crassissimo o: tumido at non valde elevato, subconnivente, ut conum brevem decollatuni interdum referant. Margo thalloides spurius ea quoque interdum cingit.

**1308 LECIDEA epipolia:** crusta tartarea rimosa-areolata alba cinerascentiæ, apothecis planis demum convexiusculis atris cæsio-pruinosis, margine proprio persistente, intus concoloribus strato sub disco pellucido.

L. epipolia Ach. syn. p. 32. prd. 58.

Hab. in saxis rupibusque inferalpinis Nordlandiæ saltensis; ex. gr. Saltdalen frequenter.

Modificatio, quæ hisce locis occurrit, ob crustam laevioram et apothecia planiuscula elevato marginata, propriam varietatem fere constituere potuit. Re vera tamen hujus speciei forma est. Apothecia inter areolas immersa parva quidem, sed non minuta ut in sequente. Ubi a pluvia et sole remotior erescit, crusta subpulveracea substantia. Ut vulgo apothecia ætate pruinata carent.

**1309 LECIDEA polycocca:** crusta effusa areolata, areolis subsparsis minutis difformibus convexiusculis cinerascentibus, apothecis superficialibus minutis planis dein convexis intimarginatis atris cæsio subpruinosis, intus cinerascentibus.

Hab. in rupibus calcariosis inferalpinorum Saltdalen Nordlandiæ e. gr. infra Fiskevaagflata et farus.

Areolæs verrucæ nunquam sessilis papaveris magiores madidament et virescunt. Apothecia in areolis sedent migrantes primi juventute vix margini-

nata, rugulosa, demum subtuberculosa, intus strato cinerascente totum fere apothecium occupante. Species distincta, *L. vesiculari* affinis etsi non similis.

**1310 LECIDEA Dilleniana:** crusta tartarea pli-  
cato-gyrosa granulataque molli roseo-cinerea,  
apotheciis sessilibus planiusculis atris cæsio-prui-  
nosis, margine nudo tumidulo.

*L. Dilleniana* Ach. syn. p. 30. prd. 57. t. 1, 1.  
**Hab.** sub præruptis rupium Nordlandiæ saltensis  
parcius.

In Nordlandiæ fructiferam nunquam legi, sed  
mox crusta memorabilis molli superficie pulveru-  
lenta, intus laxa stuposa dignoscitur.

**1311 LECIDEA margaritacea:** crusta tartarea in-  
æqvabili contigua subrimosa subpulveracea alba,  
apotheciis minutis immersis pruinosis primum pla-  
nis margine tenuissimo, deinde convexis hemi-  
sphericisque margine evanido, sed margine thallode  
spurio subcinctis, intus nigris.

*L. margaritacea* a. et b. calcaria Ach. syn. p. 32.  
*Flotow in Jahrb. d. Bot.* 1, 3 p. 97.

*L. corticola* Ach. l. c. p. 32. *Fl! Liefr.* n. 41.  
*Lichen amylaceus* Ehrh.

**Hab.** in rupibus absconditis imprimis calcariis circa  
sinum saltensem Nordlandiæ.

Ubi absconde crescit, crusta tota pulveracea  
et contigua; ubi vero pluviae et soli magis ob-  
noxia est, crusta superficiem lævigationem rimis-  
que subareolatam acqvirit, sed nunquam æqvabilis,  
semper terulosa. Apothecia minuta conferta im-  
mersa opaca, etiam rore desituta, cum crusta  
crassa hanc speciem mox notam facit. *L. corti-  
cola* Ach. minime ab hac distingvi potest. No-  
men illud etsi antiquius, attamen minus aptum  
rejeci.

**1312 LECIDEA melaleuca:** crusta tartarea rimoso-  
areolata pallescenti-alba, areolis superficialibus,  
intersticiis areolarum demum cærulescenti-nigris,  
lamina proligera planiuscula difformi aterrima  
areolis adnata, intus concolori.

**Hab.** in saxis summorum alpium e. gr. Baadfjeldet  
Saltdalen Nordlandiæ rarius.

**Crusta crassa** intus cretacea alba superficie rimis areolata, sed rimæ totam non penetrant. Areolæ convexæ irregulares subconfertæ et dispersæ. Apothecia maculas subconfluentes aterrimas in areolis elevatis efficiunt. Tenuia sunt et omnino difformia, margine vix ullo. *L. amylaceæ* proxime adstare videtur. Ubi areolæ patescunt, interstitia cærulecentia quasi atramento tenui tincta apparent. Ubi sterilis crescit, interstitia hæc cæruleo-nigricantia satis lata sunt.

- 1313 LECIDEA nobilis:** crusta effusa areolata, areolis discretis cartilagineis convexis subhemisphæricisqve rotundato-flexuosis nitentibus cæsio-  
aibis, apotheciis convexis dein conglomeratis ni-  
gro-cæruleis intus atris.

Hab. in rupibus subalpinorum Saltdalen Nordlandiæ  
rarissime.

Habitu gentiliiori inter ceteras Lecideas crustaceas insignis est. Crustæ areolæ intus sub strato tenui viridi albæ substuposæ. Apothecia ab initio simplicia mox ampliantur et botryoidea evadant, qvare speciem conglomeratam acquirunt. Si ros intense cæruleus adest, tum tenuissimus, nam a superficie nec distergi nec distingvi potest.

- 1314 LECIDEA platycarpa:** crusta tartarea sub-contigua inæqvabili alba, apotheciis amplis planis atris intus concoloribus, strato sub disco cartilagineo albo, margine persistente flexuoso. *Ach.*  
*syn.* p. 17.

Hab. in saxis inferalpinorum Saltdalen Nordlandiæ  
rarissime ex. gr. ad Oxengård.

Discus apotheciorum tenuiter pruinatos, qvare madida subviridia fuit.

- 1315 LECIDEA polycarpa:** crusta tartarea rimosa inæqvabili subpulveracea cinerascenti-alba, apo-  
theciis confertissimis planis angulatis atris mar-  
gine tenui elevato, intus subfarinosis albis.  
*L. polycarpa Fl. Ms.*

Hab. in saxis qvarzosis inferalpinorum Saltdalen Nord-  
landiæ rarius,

Substantia crustæ fere omnino pulveracea, qvare late evanescit. Memorabile est, apothecia, eti

intus alba, aterima esse. Cum *L. cæsia* Ach.  
conferenda esse videtur.

**1316 LECIDEA lithophila:** crusta effusa rimoso-  
rugosa subgranulata cinerea s. nulla, apotheciis  
atris planis marginatis, margine tenui, demum con-  
vexis marginem occidentibus, disco madefactione  
subrufescente, intus totis albis.

*L. lithophila* Ach. syn. p. 14 } pro parte;

*L. enteroleuca* Ach. syn. p. 19 } pro parte;

*L. enteroleuca* Flotow in Jahrb. d. gew. 1. 3-  
p. 106.

Hab. in saxis tum calcariis tum schistosis inferalpino-  
rum Nordlandiae saltensis passim; in ligno putrido  
rarus.

Bona et distincta species si ad indolem apotheci-  
orum attendatur. Semper sunt levigata, vix  
nitida, infus cornea; sine ulti stratis discoloribus  
alba s. albida. Madefactione parum mutantur;  
In nonnullis, imprimis in varietate crista cras-  
siuscula, discus satis rufescit, in aliis fuscescit, in  
ecrustaceis fere immutatus persistit, attamen distingui-  
nec possunt, nec debent. Cum *L. contigua*  
s. *lapicida* Ach. nullam, sed cum sequenti mag-  
nam habet affinitatem, quare *L. enteroleucam*  
Ach. quatenus in ligno putrido crescentem absque  
ullo dubio hujus esse censeo. Ad *L. lithophila*  
Cl. Acharius quidem nonnulla heterogenea  
ex. gr. *L. immersæ* var. retulit, attamen hoc no-  
men minorem confusionem quam aptius *L. ente-*  
*roleucæ* efficiens refinui.

**1317 LECIDEA elæochroma:** crusta sublimitata  
tenui ruguloso-granulata rimosaque pallide flavo-  
virescente, apotheciis planis marginatis; demum  
convexis subimmarginatis rugoso-diformibus sub-  
teraginoso-atris, intus corneis albido-fuscescenti-  
bus strato sub disco albido.

*L. elæochroma* Ach. syn. p. 18.

*L. parasema* β. *elæochroma* Ach. lich. un. p.  
275. Whlbg. fl. lap. p. 469.

*L. enteroleuca* γ. *elæochroma* δ. *flavida*, ε. *calaf-*  
*mistrata* Frits in Act. Ac. holm. 1822, p. 261.

β. *achrista*: crusta glaucescente rugoso-granu-  
lata, apotheciis cæruleoscenti-nigris.

*B. enteroleuca*  $\beta.$  *carnescens*. Fr. l. c.  
*b. grandinosa*: crusta cinerea, demum granulosa,  
 apothecia atris.

*L. enteroleuca*  $\alpha.$  (junior) et *b.* (enilis) Fr.  
 Schlecht. exs. n. 27.  
*y. dolosa*: crusta effusa subpulveracea-granulata  
 ferrugineo-sa virescenti-cinerascente, apothecis  
 minoribus atris.

*L. dolosa* Whlbg! fl. lap. n. 898. Ach. syn.  
 p. 19. Fr. lich. exs. n. 66?

? *L. enteroleuca*  $\beta.$  *padinea* Fr. in Act. Ac. holm.  
 1822 p. 261?

Hab.  $\alpha.$  in arboribus, imprimis in Betulis in regione  
 maritima, ubi L. parasemam fere omnino oclu-  
 dit, in rupibus rarissime;  $\beta.$  imprimis in Po-  
 pulis et Alnis;  $y.$  in arboribus acrosis per Nord-  
 landiam et Lapponiam.

Etsi crusta variat, attamen bona et bene limi-  
 tata species ob apothecia distincta. Pruinæ qui-  
 dem variant, nam in  $\alpha.$  interdum pulcherrime  
 aeruginosa, in cætuis subnuda, sed interna indeoles  
 constanter eadem. Madefacta tum ob pruinam  
 sunt ob stratum hyalinum sub tenuem superficiem  
 aerulescunt. Qvomodo erustæ formæ gradatim  
 in se invicem transeant, evidenter perspexi. Li-  
 nes nigrescens e subculo cinereo-nigricante  
 ornat. De *L. dolosa* incertior sum, utrum cum  
*Cl. Flörke* eam ad hanc referre, an scorsim

enumerarem, sed postquam specimen ab ipso Wah-  
 lenbergio datum contuleram et formas ejus colore  
 erustæ parum differentes in Pino sylvestri et Ju-  
 niperò inveneram, illius sententiam complexus  
 sum. In Juniperò obvia (var. *padinea* Fr?)  
 transitum ad var.  $\alpha.$  imprimis evidenter manife-  
 stat. Granula erustæ hujus var. magis discreta  
 et minima, attamen colligentem sat crassum eru-  
 stam esiam nec efformant. Apothecia minime  
 granulatae concoloria, qualia describit Ct. Aclarius,  
 sed iis in *L. elaeochroma* similis. Ob apothecia  
 constanter plana et cæsio pruinosa opusta inque  
 tenuem albam a *Leprana rubente* subdestructam  
*L. dolosam* Fr. lich. exs. n. 66. dubitanter hue

apposui, Forsan var. *roburnea* Ach. lich. un. p. 181. quæ vix hujus loci est.

1318 LECIDEA *punctata*: crusta tenui effusa leprosa rimulosa rugosa cinerea s. subnulla, apothecis minutis confertis demum convexiusculis atris intus nigricantibus, margine integerrimo. Fl! Ms... Liefr. n. 81. (L. parasema  $\beta$ . punctata).

L. parasema b. punctata et d. myriocarpa Ach. syn. p. 17, 18. Whlb. fl. lap. p. 469.

Verrucaria *punctata* Hoffm. germ. p. 193.  
Hab. in cortice Alnorum imprimis ad radicem, in pa-  
zieibus vetustis nec non in saxis Nordlandiæ et  
Laponiæ.

Minutie et copia apotheciorum insignis est. Etiam in his ut in omnibus Leeideis stratum sub disco hyalinum, ubi apothecia adeo magna sunt, ut discerni possit, et ætate non depravata sunt, adest, quam ob rem Cl. Flörke de eo assentiri non possum, quod *L. crustulata* ut speciem a *L. punctata* et *parasema* strato sub disco hyalino distinctam recenset. In saxis hæcce species ad *L. immersam*  $\gamma$ . *goniophilam* Fl. satis accedit.

1319 LECIDEA *immersa*: crusta effusa tenuissima contigua albicante s. subnulla, apotheciis plano-concavis lapidi immersis marginatis atris disco subpruinoso, humectatis atrosangvineis, demum convexiusculis intus albicantibus. Ach. syn. p. 27. prd. 70. Fl! Liefr. n. 23. Schrad. specil. t. 1 f. 7 a. b. (Lichen).

Verrucaria atrosangvinea Hoffm. germ. p. 192.  
 $\beta$ . *emergens*: crusta subnulla, apotheciis lapidi adnatis nudis pruinosisque humectatis rufo-fuscis. L. *immersa* b. *emergens* Ach. syn. p. 28.

$\beta$ . *atrosangvinea*: crusta subnulla, apotheciis sparsis in basi alba superficialibus planis nigris nudis cæsioque pruinosis marginatis humectatis sangvineis margine integerrimo nigro.

L. *immersa*  $\beta$ . *atrosangvinea* Fl! in berl. mag. 3 p. 310. Ach. syn. p. 28.

$\gamma$ . *goniophila*: crusta subnulla, apotheciis minutiis adpressis semper planis, disco atrosangvineo demum atro, margine elevato subflexuoso atro.

*L. immersa*  $\gamma$ . *geniophila* Fl! l.c. p. 311. Ach.  
syn. p. 28.

Hab.  $\alpha$ . in rupibus calcariis rarius; b. frequenter;  
 $\beta$ . et  $\gamma$ . in rupibus saxisque calcariis et mica-  
ceis passim in inferalpinis Saltdalen Nordlandiae.

Modificatio b., quam Cl. Acharius solummodo  
**e** Gallia habuit, hisce locis ceteris frequentior, et  
**a** forma  $\alpha$ . solummodo apotheciis minus immer-  
sis et minus rufescens aliquantulum differt:  
nam eodem modo plana et marginata, rarius con-  
vexa apothecia occurunt.

Var.  $\beta$ . apothecia quam ceteræ fere duplo ma-  
jora habet, et satis alienum habitum præbet, im-  
primis apotheciis in substrato substantiæ subpul-  
veraceæ albo sessilibus. An substratum hoc cra-  
sta sub apothecia coercita, an parenchyma apo-  
theciorum? Ne cum *L. erytrophæa* Fl. confundas, caveas.

Var.  $\gamma$ . si cum priori comparatur apothecia mi-  
nuta, sed quam in  $\alpha$ . non minora habet. Jam sicca  
atrosanginea, madida ut ea ceterarum sanginea.  
Sæpe ex disco novum oritur apothecium. (b. *pro-  
lifera* Fl!). Vetusta convexiuscula, margine ele-  
vato flexuosisissimo.

**1320 LECIDEA parasitica:** crusta subnulla, apo-  
theciis minutis depresso planis atris intus nigrican-  
tibus, margine tenui integerrimo. Fl! Liefr.  
n. 101.

*L. alba* Ach. syn. p. 24 (apothecia; crusta ad Le-  
canoram Turneri pertinet).

Hab. in Leprariis, crusta *L. vernalis* etc. per Nord-  
landiam saltensem parcius.

**1321 LECIDEA pinicola:** crusta tenui submem-  
branacea cinerascente, apotheciis minutis conser-  
tis planis, margine proprio tenui, demum con-  
vexis marginem ocludentibus, intus nigrican-  
tibus.

*L. pinicola* Fl! M6.

*Leccanora pericula* b. *pinicola* Ach. syn. p. 151.

Hab. in cortice Pini sylvestris Saltdalen Nordlandiae  
rarissime.

*Apothecia* madefacta haud mutantur. *Discus* opacus scaber eam a *L. punctatum* statim distinguvit.

**1322 LECIDEA assercularum** *β.* *pithyophilax*: crusta tenui subæquabili cinerascente s. nulla, apotheciis confertis minutis convexis rugulosis immarginatis, intus fuscis.

Hab. in ramis exsiccatis decorticalisque Pinorum inferalpinis Nordlandiæ saltensis frequentissime.

Crusta tenuis, apothecia minuta plane immarginata hunc Lichenem a cœteris distinguunt. Crusta etsi tenuissima adest, nam lignum circa ea in macula oblonga obscurius coloratum est. A *Cl. Flörke* ut nova varietas hujus speciei agnita est.

**1323 LECIDEA xanthogocca:** crista granulata, granulis subdistantibus flavescentibus, apotheciis minutis punctiformibus, dein disco depresso margine tenui elevato.

Hab. in ligno ramisque decorticatis Pini Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Maculas subpollicares flavescentes atropunctatas in ligno efficit. Granulae areolæ minutæ ex ligno erumpunt, usq; adhaerentia proveniunt apothecia, certe intus concoloria, sed ob minutiem interna structura discerni negvit. Nulli affinis sit *L. atroalba*.

**1324 LECIDEA papillata:** crista granulata inæquabili subcontigua, papillato, ramulosa, papillis subdispersis, alba, apotheciis parvis atris planis, margine tenui dein convexis immarginatis demumque difformibus suhtuberculosis intus concoloribus, efficiens. Hab. in muscis rupium inferalpinorum Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Ubi crustæ granula remota, ibi papillosa levat dunt, ibi vero confertia, ibi crustam subcontiguum superficie granulatam singit. *L. sangvinaria* affinis, sed apothecia minora et intus nil rubri habent. Nec illa in muscis lecta est.

**1325 LECIDEA citrinella:** crista leprosa granulata pulvulenata virestanti lava, apotheciis sessilibus marginatis densa, parvexis atris, intus concoloribus. Ach. syn. p. 25. præd. p. 64. in

*Act. Ac. holm.* 1796 t. 5 f. 5. *Fr. ibid.* 1822  
P. 257. *Fl. Lief.* n. 83.

$\beta.$  *scabrosa*: crusta glebosol verrucosa si plicata  
sublobata subpulverulenta, apotheciorum marginis  
tenui mox occluso.

*L. citrinella*.  $\beta.$  *scabrosa*. *Ach. syn.* p. 25.

*Lichen flavo-virescens* *Diks.* pl. cr. 3 p. 13.  
t. 8 f. 9. *Fr. in. Act. Ac. holm.* 1822 p. 252  
(*Trachylia*).

**Hab.**  $\alpha.$  in terra arenosa ad vias inferalpinorum;  $\beta.$  in  
terra macra saxisque usque ad regionem subalpi-  
nam Nordlandiae saltensis parcus;

*L. flavovirescens* speciee nentiqam differt  
multo minus generice. Quae in saxis occurrit,  
crusta sua subcontigua plicata rugosa satis diversa  
apparet, sed per tot gradus in *L. citrinellam*  
abit, ut termini nulli stabili possint. Nee sub-  
stantia apotheciorum alia quam in compluribus  
aliis Lecideis intus concoloribus strato sub disco  
hyalino tenui. Granula crustae *L. citrinellae* etiam  
ab initio cuticulo tenui tecta sunt, quo rupto pul-  
verulenta evadunt. In var.  $\beta.$  modo granula  
majora, interdum sublobata, ad *L. Wahlenbergii*  
satis accendentia, cuticulo crassiori, quare rarius  
rumpuntur et pulverem evolvunt. In saxis crusta  
macrior, inde pulveracea substantia tenui modo  
referta vix rumpens.

899. **LECIDEA sabuletorum**: crusta effusa granu-  
lata passim subramulosa cinerea albida, apotheciis  
plano convexis hemisphaericisque subimarginatis  
atris intus corneis concoloribus, strato subdisco  
pellucido.

*L. sabuletorum*. *Ach. syn.* p. 20. *Wahlbg. fl.*  
*lap.* n. 899. *Fl. in Berl. Mag.* 3 p. 309.  
*Schreb. spic.* p. 143 (*Lichen*).

$\beta.$  *syncomista*: crusta squamacea granulata sub-  
cohærente, granulis subimbricatis sublobatis, cælio-  
albida fuscescenteque, apotheciis parvis eonglo-  
meratis hemisphaericis immarginatis, intus corneis  
concoloribus strato hyalino tenuissimo.

*L. sabuletorum*  $\beta.$  *syncomista* *Fl. l. c.* p. 310  
*Lichen muscorum* *Fl. dan.* t. 1003. 1.

*b. alpestris*: crusta granulata bareolata, granulis convexis contiguis et dispersis, apotheciis majoribus subeonglomeratis.

Hab. in terra montium, imprimis calcariorum, rupibusque per Nordlandiam inferalpinam maritimamque. *β. b.* in terra alpium passim copiose.

Est species habitu satis variabilis. De synonymis Flörkei certus, sed vix *β. geochroam* Ach. syn. ad hanc referre audeo — cfr. seqventem — Var. *β. crusta cartilaginea squamulosa lobulata subcontigua*, apotheciis atris opacis conglomeratis sat insignis, sed in *b. alpestrum* manifeste transit, nec ab *α.* bene distingvi potest, nam color cæsio-albus idem et granula interdum squamacea. In interiori substantia apotheciorum nulla nota distinctiva adest, nam stratum cinereum etsi tenuius in junioribus et vigentibus apotheciis semper adest. Aestate subobliteratur imprimis in var. *alpestris*.

1326 LECIDEA *arctica*: crusta effusa granulata, granulis subdiscretis minutis subpapillæformibus cæsiis et fuscescente-albidis, apotheciis immarginatis subglobose levibus cæsio-pruinosis intus corneis cinerascentibus.

*L. sabuletorum* *β. geochroa* Whlb. fl. lap. p. 470 excl. syn. Ach. syn. p. 20?

Hab. in Andræis et Dicranis alpium et quidem summarum freqenter; in subalpinis et inferalpinis rariis per Nordlandiam.

Species pulchra et distincta. Nulla ratione cum var. *β. præcedentis*, nec cum *α. secundum* specimen, quæ genuina censuit Cl. Flörke, conjugi potest. Bene de crustæ granulis dicit Wahlenberg, nam separata levia granula insignia et regularia intus strato fæculifero lato viridi, solida sunt. Madefacta non mutatur, sed in apotheciis ros melius appetet. Apothecia nec conglomerantur nec confluant, sed summa etate subdifformia sub-tuberculata.

1327 LECIDEA *euphorea*: crusta effusa granulata-vertucosa subareolata albida cinereaque, apotheciis confertissimis adnatis planis marginatis, dein

convexis subimmarginatis nigris intus fuscis strato  
sub disco cinereo.

*L. euphorea* Fl! Ms.

*L. subuletorum* y. *euphorea* Fl! Lief. n. 4.  
in berl. mag. 3 p. 311. *Ach. syn.* p. 20. *Whlb.*  
*fl. lap.* p. 470.

Hab. in parietibus vetustis Nordlandiae et Lapponiae  
copiose.

Crustæ granulis magis irregularibus subcohæ-  
rentibus apotheciisqve minutissimis subplanis hæc  
a *L. sabuletorum* dignoscitur. Indoles interna  
apotheciorum ob minutiem difficulter perspicitur.  
Crusta madefacta virescit.

**1328 LECIDEA sæpincola:** crusta determinata  
gleboso-granulata pallide flavo-virecente, apothe-  
ciis adnatis planiusculis marginatis, dein convexis  
immarginatis nigris intus cinerascentibus.

*L. sæpincola* Ach. syn. p. 35. sec. Flörke.

Hab. in lignis pineis vetustis Saltdalen Nordlandiae  
rarius.

Maculas oblongas  $\frac{1}{2}$  — 1 pol. latas granulato-  
rugosas, apotheciis centralibus efficit. Apothecia  
qvam in priore majora, juniora satis elevato-mar-  
ginata. Color variat; interdum ater, interdum  
helvelo-niger. Priori peraffinis, colore crustæ  
determinatæ virescente s. flavescente, apotheciis  
majoribus imprimis differt.

**1329 LECIDEA cumulata:** crusta effusa verru-  
cosa, verrucis inæquabilibus sublobatis, cinerea,  
apotheciis minutissimis conglomeratissimis con-  
stanter planis atris, margine tenui, intus albidis.

Hab. in terra uda alpium summorum passim copiose  
ex. gr. Soelvaagtinden Saltdalen Nordlandiae.

Apothecia in maculas o: acervos planiusculos  
in terra inter areolas sessiles congesta sunt, et in  
comuni basi sedere videntur, sive unum supra  
alterum impositum, sive ut proliferationes veteris  
apothecii consideranda sunt. Ob minutiem vera  
indoles difficulter extricatur.

**1330 LECIDEA geophila:** crusta tenui submem-  
branacea inæquabilis alba, apotheciis planis mar-

ginatis, margine tenui, dein convexis margine  
occluso, atris, intus nigris.

*L. geophila* Fl! Ms.

*L. sabuletorum* var. depauperata *Fl!* in Berl.

mag. 3. p. 312.

Hab. in muscis saxorum inferalpinorum Saltdalen  
passim.

Crusta inæquabilis, interdum subgranulata, ob  
museos substratos apparet, revera submembrana-  
cea est. Apothecia quam in prioribus majora,  
intus strato tenui sub disco pellucido subconco-  
loria. Ubi stratum illud pellucidum adeo tenue  
est, nigre imprimis in ætate proiectis perspicitur,  
re vera tamen semper adest. Discus eximie ru-  
gulosus.

*LECIDIA*

**1331 LECIDEA mixta:** Crusta carnosæ rugoso-  
verrucosa laceræ, apothecis planis levibus marginatis,  
dēnum subdiformibus margine occluso li-  
vido nigris, intus albidis.

Biatora mixta *Fl!* dicta ex spon. 40. in Act Ac.  
holm. 1822, p. 267.

*L. angulata* *Fl!*, *Biebr.* n. 164, excl. syn. Ach.

Hab. in cortice rufusto Betularum per Nordlandiam  
saltensem rupis.

Apothecia livida sublyalina, deinde nigrescunt  
et subatra evadant, semper levigata, rarius sub-  
pruinosa. Semper aliquid opacum dividumve ni-  
gridini immixtum est, quod notam habitualem  
præbet. Præcedenti re vera affinis, sed abunde  
diversa. Inter Biatoras me judice a Cl. Fries male  
collocatur, utpote et ipse marginem dilutiorem  
modo videri non esse, fatetur.

**1332 LECIDEA miscella:** Crusta crassa granulosa  
coherente diffusa, rimosa albida & interascente s.  
ceryina, apothecis adnatis convexis immarginatis  
diformibus nigricantibus intus subconcoloribus  
strato sub disco albido.

*L. misella* Ach. syn. p. 21. prd. p. 63 (Lichen).

Hab. in terra turfosa ex muscis putrefactis orta in ri-  
mis rupium maritimorum Nordlandæ saltensis ex-  
gr. ad Skjerstad.

*Crusta* etæva, apothecis parvis immarginatis

nigricantibus intus pallidius statim dignoscitur.

*Crusta madida cervina.* Qvoad crustam ad *L. fuscoluteam* a. accedit, sed apothecia diversissima. Apothecia juvenilia subconcava, sed sine margine distincto vel regulari.

1333 *LECIDÉA muscicola*: crusta inæquabilis granulata fuscescente, granulis sublobulatis, apothecis obconicis planis fusco-nigris margine elevato, disco ruguloso. *Sommerfelt in Act. Act. holm.* 1828 p. 413.

Hab. in muscis destruetis rupium inferalpinorum et subalpinorum Saltdalen Nordlandiae frequenter. Crusta effusa tenuis granulata, granulis parvis difformibus ad margines sublobatis, sicca fuscescens a cinereo ad nigreseens, madida fuscescenti-viridis. Apothecia juniora subglobosa disco impresso, dein obconicis subpedicellatis fusco-nigris, madidis concoloribus, margine elevato integerimo, intus fuscis, seu propriè hyalinis, sed obambitum fuscum fuscis apparentibus, nam margo etsi concolor et a crusta diversa tamen discum plane secretum in sinu fovet, quare Biatorae species sec' normam Cl. Friesii, eque ac *L. fuscolutea*, cum qua summa affinitate, etsi constantè distincta, conjuncta est. Habitu magis accedit ad *L. uliginosam*, granulis crustae magis contiguis apothecisqve diversissimis. A *L. carnosa* Somrf. (*Leccanora muscorum* Ach. syn.), cui affinem credidit Cl. Fries. (l. c. in nota), diversissima est.

1334 *LECIDÉA phæocarpa* B. *microcarpa*: crusta tenui squamaceo-granulata, granulis subinensis, fuscescenti-alba, apotheciis minuissimis confertis hemisphaericis immarginatis rugulosis nigris. *L. phæocarpa* (var.). Fl! Ms.

*y. montana*: crusta tenui granulata fuscescenti s. nulla, apotheciis parvis immarginatis planis dein conyexis nigris.

Hab. *B.* in muscis destructis subalpinorum Saltdalen rariss. *y.* cypri terram apicant e muscis putrefactis ottam in montibus statim Nordlandiae meridionalis passim.

Var.  $\alpha$ . quam modo e Germania habeo, a var.  
 $\gamma$ . modo crusta crassiori, subeontigua albidiori-  
 que, et in var.  $\beta$ . subsimili paululum differt.  
 Var.  $\beta$ . apotheciis minutissimis sese distingvit.  
 Tota species apotheciis parvis confertis opacis ni-  
 gris o: fuscescente-atris immarginatis insignis est.  
 Apothecia intus concoloria madida magis fusces-  
 cunt. Crusta in  $\gamma$ . sine dubio ob ventos, qui  
 eam semper terunt, tenuissima et interdum fere  
 omnino oblitterata.

**1335 LECIDEA icmalea:** crusta gelatinoso-pulve-  
 racea fuscescenti-viridi, apotheciis subimmersis  
 planiusculis demum convexis immarginatis sca-  
 briusculis nigris intus concoloribus.

*L. fuliginea*  $\beta$ . *icmalea* Ach. syn. p. 35.

Hab. in terra turfosa ad radices Pinorum in inferal-  
 pinis Saltdalen Nordlandiae parcus.

Cum *L. fuliginea* Ach., Collematibus valde  
 affini, apotheciis minutis regularibus siccis planis  
 atris, madidis tumidis brunneis nulla fere affini-  
 tate conjuncta est; multo majore cum *L. uliginosa*,  
 sed natura crustae crassae a pulvere subge-  
 latinoно constitutae perquam diversa.

**1336 LECIDEA tuberculata:** crusta effusa tenui-  
 leprosa subcohaerente virenti-albida, apotheciis  
 minutis sparsis immarginatis mox subglobosis tu-  
 berculatis nigris intus concoloribus.

Hab. sub praeruptis rupium saxorumque inferalpinorum  
 Saltdalen Nordlandiae rarius.

Cum nulla alia specie nordlandica confundi pos-  
 test. Re vera *Baeomycide rufo* Ach. affinis.  
 Crusta tenuiter rimosa substantiae laxae. Apothe-  
 cia primum punctiformia, dein hemisphaerica et  
 mox tuberculata, quo in statu substipitata appa-  
 rent, quia e basi exigua superficies tuberculata  
 excrevit. Totum apothecium magnitudine vix  
 unquam semen Papaveris sequit. Madidum tu-  
 met, sed colorem vix mutat. *L. botryosae* Fries  
 affinis videtur, sed ob immarginata subglobosa  
 nonquam disco depressa apothecia cum illa con-  
 fundi nequit.

emum rugulosis, subtus fibrillis rigidis atris, apothecis minutis adnatis convexis immarginatis gris, intus concoloribus.

*Endocarpon parasiticum Ach. syn. p. 100. Engl. t. t. 1866.*

in *Parmelia omphalodi* et *saxatili* inferalpino-  
im Nordlandiæ saltensis rarius.

Cæspites parvos convexos in *Parmeliis* colore erulescenti mox insignes efformat. Lobi primum concavi subcucullati læves, dein planiuscrugulosi, sed ob substantiam foliaceam diffractrimosi fieri non possunt. Subtus fibrillis atermis divisis a pallido ad fuscum variat. Apotheca qvidem initio in substantia thalli superficiati latent, sed minime endocarpoidea, nam nullus nucleus cum ostiolo, & nullus margo, sed ubi umpsunt, statim superficialia subglobosa, primum tuginoso pruinosa, dein nuda. Thallus ei *Parmeliorum* satis similis, ut primum *Parmeliam* parasita deformatam crediderim; ubi vero sterilem venerim, distinctum esse mox agnovi.

**GYROPHORA arctica:** thallo crasso duro  
ido rugoso olivaceo, demum fusco, subtus  
ido subglabro pallide-ochroleuco ad centrum  
gricane, apotheciis subsessilibus convexius-  
lis.

*arctica Ach. meth. p. 106 t. 2, 6. lich. un.  
221. Dill. hist. musc. t. 30, f. 119.*

*proboscidea β. arctica Whlbg. fl. lap. p. 483.  
ch. syn. p. 65.*

naxis petrisqve maritimis & alpinis per Nord-  
idiam & Lapponiam.

Mihi species distincta & constans, æqve bona  
pleræqve aliæ Gyrophorarum. Supra ad um-  
icium nunquam cinerascit, subtus semper ni-  
escit.

**CALICIUM tigillare** *Ach. syn. p. 55.  
scidea tigillaris Whlbg. fl. lap. n. 895, ubi vide.*

**CALICIUM turbinatum:** crusta nulla, apo-  
theciis turbinato - subsessilibus atris nitidis, disco-  
ra marginem crassum nigro opaco demum pro-

Var.  $\alpha$ . quam modo e Germania habeo,  
 modo crusta crassiori, subeontigua albi-  
 que, ea in var.  $\beta$ . subsimili paululum c  
 Var.  $\beta$ . apotheciis minutissimis sese disti-  
 Tota species apotheciis parvis confertis opac-  
 gris o: fuscescente - atris immarginatis insigni.  
 Apothecia intus concoloria madida magis fu-  
 cunt. Crusta in  $\gamma$ . sine dubio ob ventos  
 eam semper terunt, tenuissima et interdum  
 omnino oblitterata.

**1335 LECIDEA icmalea:** crusta gelatinoso-p  
 racca fuscescenti-viridi, apotheciis subim-  
 planiuseulis demum convexis immarginatis  
 briuseulis nigris intus concoloribus.

*L. fuliginea*  $\beta$ . *icmalea* Ach. syn. p. 35.

Hab. in terra turfosa ad radices Pinorum in in-  
 pinis Saltdalen Nordlandiae parcus.

Cum *L. fuliginea* Ach., Collematibus  
 affini, apotheciis minutis regularibus siccis  
 atris, madidis tumidis brunneis nulla fere e-  
 tate conjuncta est; multo majore cum *L. u-  
 nosa*, sed natura crustæ crassæ a pulvere s  
 latinoso constructæ perqvam diversa.

**1336 LECIDEA tuberculata:** crusta effusa  
 leprosa subcoarcente virenti-albida, apet  
 minutis sparsis immarginatis mox subglobos-  
 beticulatis nigris intus concoloribus.

Hab. sub præruptis rupium saxorumqve inferalpin  
 Saltdalen Nordlandise rarius.

Cum nulla alia specie nordlandica confun-  
 test. Re vera *Bæomycte rufo* Ach. a  
 Crusta tenuiter rimosa substantiæ laxæ. Ap-  
 etia primò punctiformia, dein hemisphæri  
 mox tuberculata, qvo in statu substipitata  
 rent, qvia e basi exigua superficies tuber-  
 excrevit. Totum apothecium magnitudine  
 unqvam semen Papaveris æqvat. Madidur  
 met, sed colorem vix mutat. *L. botryosæ*  
 affinis videtur, sed ob immarginata subgl-  
 nunqvam disco depressa apothecia cum illa  
 fundi neqvit.

demum rugulosis, subtus fibrillis rigidis atris, apotheciis minutis adnatis convexis immarginatis nigris, intus concoloribus.

*Endocarpon parasiticum Ach. syn. p. 100. Engl. bot. t. 1866.*

Hab. in *Parmelia omphalodi* et *saxatili* inferalpinorum Nordlandiæ saltensis rarius.

Cæspites parvos convexos in *Parmeliis* colore cærulecenti mox insignes efformat. Lobi primum concavi subcucullati læves, dein planiusculi rugulosi, sed ob substantiam foliaceam diffracto-rimosi fieri non possunt. Subtus fibrillis aterrimis divisus a pallido ad fuscum variat. Apothecia quidem initio in substantia thalli superficialia latent, sed minime endocarpoidea, nam nullus nucleus cum ostiolo, & nullus margo, sed ubi erumpunt, statim superficialia subglobosa, primum æruginoso pruinosa, dein nuda. Thallus ei *Parmeliorum* satis similis, ut primum *Parmeliam* parasita deformatam crediderim; ubi vero sterilem invenerim, distinctum esse mox agnovi.

**1361 GYROPHORA arctica:** thallo crasso duro rigido rugoso olivaceo, demum fusco, subtus nudo subglabro pallide-ochroleuco ad centrum nigricante, apotheciis subsessilibus convexis culis.

*G. arctica Ach. meth. p. 106 t. 2, 6. lich. un. p. 221. Dill. hist. musc. t. 30, f. 119.*

*G. proboscidea β. arctica Whlbg. fl. lap. p. 483. Ach. syn. p. 65.*

Hab. in saxis petrisque maritimis & alpinis per Nordlandiam & Lapponiam.

Mihi species distincta & constans, æque bona ac pleræque aliæ Gyrophorarum. Supra ad umbilicum nunquam cinerascit, subtus semper nigrascit.

**895 CALICIUM tigillare Ach. syn. p. 55.**

*Lecidea tigillaris Whlbg. fl. lap. n. 895, ubi vide.*

**1362 CALICIUM turbinatum:** crusta nulla, apotheciis turbinato - subsessilibus atris nitidis, disco intra marginem crassum nigro opaco demum pro-

minulo pulveraceo. *Fl! Liefr.* n. 125. *Ach. syn.*  
p. 56. *Pers. disp. fung. suppl.* p. 59.

*C. sessile Pers. l. c.*

*C. stigonellum Ach. syn.* p. 56. *meth.* p. 88.

*Lecidea gelasinata Ach. meth.* p. 33.

Hab. in crusta Lecideæ cupreæ Saltdalen Nordlandiæ.

Crusta, qvam describit Cl. Acharius, Porina  
pertusa Ach. est.

**1363 CALICIUM pullatulum:** crista subnulla,  
apotheciis subtilissimis fusco-nigris clavato-turbi-  
natis nitentibus, excipulo discum punctiformem  
impressum ambiente, stipite tenui concolori.

*C. pullatulum Ach. in Act. Ac. holm.* 1816. p.  
121. t. 5, 5.

*C. byssaceum Fr! lich. exs.* n. 12.

Hab. in ramis emortuis junioribus Alni & Salicu-  
m Saltdalen Nordlandiæ freqventer.

Plane microscopicum, nudis oculis vix visibi-  
le. Crusta atra, enjus mentionem facit Cl. Acha-  
rius, sane heterogena, cum rarius cum ea con-  
junctum occurrit. Stipes sæpe divisus, sat ri-  
gidus.

**1364 CALICIUM albo-atrum:** crista leprosa  
alba, apotheciis minutis turbinato-lentiformibus  
subimmarginatis scabridis, demum subtuberculati-  
tis aterrimis, stipitibus tenuissimis brevibus opa-  
cis concoloribus.

*C. albo-atrum Fl! Liefr.* n. 26.

Hab. in cortice vetusto Salicis Capreæ Saltdalen  
Nordlandiæ.

Totum opacum molliusculum. Stirps nordlan-  
dica parum altius stipitata qvam germanica. Mag-  
nitudine *C. pussillum* subæqvat. Madefacta apo-  
thecia tument, qva nota a seqventi statim digno-  
scitur.

**1365 CALICIUM pusillum:** crista tenuissima  
expansa arachnoidea fibris ligni mixta nivea, de-  
mum albocinerascente, apotheciis minutis lenti-  
formibus subimmarginatis, disco plano-convexo  
subpulverulento fusco-atro, stipitibus filiformibus  
breviusculis concoloribus *Fl! Liefr.* n. 188.

- C. subtile Fr! lich. exs. n. 14. Ach. lich. un.*  
*p. 243.*  
*C. claviculare α. pusillum Ach. lich. un. p. 236.*  
*C. claviculare β. subtile Ach. syn. p. 57, excl.*  
*syn. Pers. Whlbg. fl. lap. p. 485.*  
*Lichen sphærocephalus Ach. prd. p. 84.*

Hab. in lignis truncisqve decorticatis imprimis saliciniis diu aeri expositis ubiqve.

Si annotatio Ill. Linnæi in itinere scan. p. 20, qvæ *C. trabinellum* *Ach. meth.* manifeste indigitat, conferatur, *L. sphærocephalus Lin.*, ut vult Cl. Fries, ad hoc conferri non potest, etsi vix dubium est, qvin Linnæus plures harum minutarum stirpium species in unam congesserit. *C. subtile Pers.* huc referri non potest, qvia capitulum subcinereum cum *C. furfuraceo* forma conveniens dicit. Magnitudine qvidem variat hæcce species, sed semper pusilla, nec mihi unquam cinereo-pruinosa obvenit. Stipites confertissimi rigidi, omnes ad unum latus plerumqve vergentes. De synonymo Acharii ex prodromo nullum mihi dubium est, cum *C. claviculari* minorem dicat.

**1366 CALICIUM abietinum:** crusta tenuissima cinerascente, apotheciis turbinatis margine albicans, disco pulveraceo prominente subcylindrico plano, aterrimis, stipitibus brevibus rigidis concoloribus.

- C. abietinum Pers. disp. fung. p. 59.*  
*C. sphærocephalum β. glaucellum? et γ. abietinum Ach. syn. p. 58.*  
*C. cerviculatum Ach. in Act. Ac. holm. 1816 p. 119. t 5, 3. Fr! lich. exs. n. 13.*

Discus pulverulentus prominens variæ longitudinis, sed semper marginem excipuli erectum excedit. Margo in infantilibus flavescens quoque occurrit.

**1367 CALICIUM melanophænum:** crusta tenuissima alba, apotheciis subgloboso-turbinatis excipulo margine inflexo stipitibusqve longiusculis nitentibus nigris, disco nigrescenti-umbrino.

*C. melanophænum Ach. in Act. Ac. holm. 1816 p. 276 t. 8, 8. Fr! lich. exs. n. 9.*

*C. sphærocephalum Swartz... sec. Fries. Whlbg. fl. lap. p. 486?*

Hab. in lignis putrescentibus, imprimis abietinis in Lapponia pitensi nec non Nordlandia saltensi rarius.

A seqventi modo differt: colore a prima juventute nigro nitenti apotheciisqve minoribus, qvare, cum modo rarius legerim, adhuc incertus sum, annon Cl. Flörke (Liefr. n. 84.) rectissime utraqve conjunxerit. Crusta adeo granulata ut in speciminibus Friesii nunquam mihi sese obtulit. Synonymon Wahlenbergii hujus loci est, si non rectius ad formam majorem vetustioremqve *C. pusilli* refertur, qvandoqvidem ubiqve crescentem et apothecia sublentiformia subumbrina dicit.

**1368 CALICIUM salicinum:** crusta tenuissima lævigata albida, apotheciis subglobosis demum turbinato-cyathiformibus castaneo-fuscis, disco pulveraceo nigricante, stipitibus longis nigris apice excipulo concoloribus.

*C. salicinum Pers. in Ust. An. Bot. 7 p. 20 t. 3, 3. Fl! Liefr. n. 84.*

*C. trachelinum et xylonellum Ach. syn. p. 58.*

*C. sphærocephalum β. xylonellum Whlbg. fl. lap. p. 486.*

*C. corylinum Schum. säll. 2 p. 882.*

Hab. in lignis truncisqve decorticatis aeri diu expositis Nordlandiæ et Lapponiæ parcius.

*C. xylonellum* modo est forma major. Cum apud Acharium bis, si non ter occurrat, nomen antiquissimum Persoonii præferendum esse credidi.

**1369 CALICIUM quercinum:** crusta granulata subpulveracea cinerea, apotheciis subglobosis, demum lentiformibus subtus albido-cinereis pruinosis, disco stipiteqve crassiusculo opaco atris.

*C. quercinum Pers. disp. fung. p. 59. Fl! Liefr. n. 66.*

*C. claviculare Whlbg. fl. lap. n. 485 excl. var. Ach. syn. p. 57. (excl. syn. Pers.) meth. p. 90.*

*C. lenticulare Ach.* in *Act. Ac. holm.* 1816 p. 262 t. 8,

*C. lichenoides Schum.* sæll. 2 p. 180 *Lin. fl. sv.* n. 1287 (Mucor).

*Lichen Clavellus Ach.* prd. p. 83.

Hab. in cortice frustuloso Pini sylvestris et abietis Lapponiæ passim.

Synonymon *Wahlenbergii* ad seqvens quidem refert *Cl. Fries* sec. spec. *Cl. Wahlenbergii*, sed specimen erroneum sit, necesse est, quia character et descriptio l. c. optime in hoc, minime in seqvens convenit.

**1370 CALICIUM roscidum:** crusta granulata rugulosa sordida s. subnulla, apotheciis turbinatis demum lentiformibus irregularibusqve, disco margineqve flavicante æruginoso-pulverulentis subinde atris margine subevanido, stipitibus crassis brevibus nigris.

*C. roscidum* Fl! Lief. n. 42. Fr! lich. exs. n. 10. *Ach.* in *Act. Ac. holm.* 1816. t. 8, 6.

*C. mutabile* *Ach.* l. c. 1817. p. 234 t. 8, 13 sec. Fr.

*C. hyperellum* b. *roscidum* *Ach.* syn. p. 59.

*C. claviculare* β. *roscidum* *Ach.* meth. p. 90.

*C. adspersum* *Schum.* sæll. 2 p. 181.

β. *trabinellum*: gracilis, crusta subnalla, apotheciis turbinatis sublentiformibus, disco subdepresso, margine flavo-viridi.

*C. claviculare* β. *trabinel.* *Ach.* lich. un. p. 235.

*C. chlorellum* β. *orochroum* *Whlbg.* fl. lap.

p. 487.

*C. chorellum* β. *trabin.* *Ach.* syn. p. 60.

*C. trabinellum* *Ach.* meth. suppl. p. 15.

Hab. in ligno imprimisqve caudicibus putrescentibus Pini Nordlandiæ et Lapponiæ freqventer.

Crusta variabilis et granulis tum manifestis tum nullis, et colore cinerascente et sordide flavo-virescente. Stipitibus crassis brevibus et disco flavo-æruginoso-nigricante mox distingvitur. Hic color disci quoqve var. β. huc revocat, & a teneriore *C. chlorello* disco dilute umbrino secernit. Aestate discus evacuatur, & tum quasi cine-

reo-pruinosis. Transitus var.  $\alpha$  in  $\beta$ . evidentissime perspexi in lichene hocce vulgatissimo. *C. chlorellum* verum in Nordlandia nusquam legi.

**1371 CALICIUM brunneolum:** crusta tenuissima albicante s. subnulla, apotheciis turbinato-globosis, excipulo parvo albo-pruinoso, disco magno marginem suboccludente cinereo-umbrino s. rufescente pulverulento, stipitibus longis filiformibus flexuosis nigris.

*C. brunneolum Ach. in Act. Ac. holm. 1816. p. 279 t. 8. f. 12 affirmante Friesio! lich. exs. n. 4.*

? *C. trichiale Ach. syn. p. 62. Fr! l. c. n. 15?*

Hab. in caudicibus putridis Pini Alniqe Saltdalen Nordlandiae passim.

Crusta *C. trichialis* sine dubio spuria et aliena, qvia inter apothecia cum pedicellis *C. brunneoli* & *C. trichialis* nullum discrimin intercedit. Qvod in Nordlandia occurrit majus & *C. trichiali* simillimum, sed constanter sine crusta granulata, si, ubi una cum *C. hyperello* & *rosicido* obveniat, excipis. Stipes interdum a rore excipuli decurrente albescit. An *C. gracilellum* Ach. ab hoc diversum? In descriptione sane nihil, qvo differat.

**933 CALICIUM chrysocephalum Whlbg. fl. lap. n. 933, ubi vide.**

Hab. in ramis, imprimisqve strobilis emortuis Pini Nordlandiae frequentius.

**934 CALICIUM capitellatum Whlbg. fl. lap. n. 934, ubi vide.**

Hab. ad radices arborum, in qvisqviliis a terra suboccultis, subqve rupibus in umbrosis Nordlandiae inferalpinæ passim.

## A L G Æ.

**1372 FUCUS ceranoides:** fronde subdichotoma constata integerrima, ramos laterales angustiores fructiferos emittente, receptaculis compressis linearis

acuminatis *Lyngb. Hydrph.* p. 5. *Ag. sp. al.* 1.  
p. 193. *Turn. hist.* t. 89 ex *Ag.*

An *F. ceranoides Whlbg. fl. lap.* n. 939 excl.  
syn.

Hab. in rupibus a refluxu maris denudatis ad litora  
Nordlandiæ saltensis e. gr. ad Bodöe.

*Fucus ceranoides Whlbg.* a Cll. Lyngbye &  
Agardh forsitan synonymis nimis fidentes, ad *F. distichum* refertur. Ego vero nunquam *F. distichum* inveni, etsi minorem Algarum marinorum  
qværendarum occasionem mili iuuisse, fatear ne-  
cessere est.

944 *FUCUS saccharinus Whlbg. fl. lap.* n. 944. ex-  
clus. syn. *Fuci bifurcati Gunn. norv.* n. 312 ad *F. digitatum* (minorem) pertinente & syn. *Ulvæ latissimæ Lin.* & *U. mesenteriformis Roth* ad *U. latissimam* pertinentibus.

947 *FUCUS mamillosus Whlbg. fl. lap.* n. 947.  
*Ag. sp. al.* 1 p. 260. *Lyngb. hydr.* p. 14 (Sphæro-  
coccus). Adde.

*Fucus norvegicus Gunn! norv.* n. 971 t. 3, 4.  
*Ag. sp. 1* p. 255. syn. p. 24. (Sphærococcus).  
*Lyngb. Hydr.* p. 16 (*Chondrus*).

Postquam specimen Gunneri typum iconis, in  
herbario clarissimi viri Niderosiæ vidi, pro certo  
affirmare audeo, *F. norvegicum Gunn.* nil esse  
nisi *F. mamillosum* juniorem, tuberculis nondum  
ornatum, qvod etiam a sententia Cl. auctoris non  
abhorret, cum l. c. dicat: "cæterum videtur esse  
*Fucus junior*, adeo ut non satis liqveat, an sit  
species ab omnibus notioribus distincta, necne."  
*F. norvegicus Turn.* vero australioris Europæ  
incola ab hoc forsitan omnino diversus.

950 *FUCUS palmatus Whlbg. fl. lap.* n. 950.

Ab hujus var. *laciniatus Whlbg.* & *Lyngb.*  
minime distingvi potest *Fucus soboliferus Vahl*  
in *Flor. dan.* t. 1065. *Whlbg. fl. lap.* n. 949, ut  
recte autumat Cl. Agardh in *sp. alg.* p. 219.

1373 *FUCUS rubescens*: fronde lanceolata subcu-  
neiformiæ integra, apice sublobata olivaceo-  
rufo-fuscescente, seminibns majusculis solitariis  
frondi immersis,

*Ulva rubescens* Lyngb! hydr. p. 27, t. 7,  
Hab. in Fucis majoribus sinus saltensis Nordlandiæ  
rarius.

Me jndice genere a *F. palmato* divelli non potest. Frons non regulariter reticulata qvare vix ad *Zonarias* Ag. (cfr. sp. alg. p. 121) referri potest. Substantia membranacea, illa U. plantagineifoliae multo crassior, punctis fuscis longitudinaliter dispositis ornata. Frons usqve ad spithameam longitudinem, & ad semiuncialem latitudinem asscendit.

**954 FUCUS cristatus** Ag. sp. alg. I. p. 300 (Spærococcus).

*F. coccineus* β. pusillus Whlbg. fl. lap. n. 954 (ex. Ag.) excl. syn. Gunneri.

*F. cartilagineus* Gunn., qvem ad hunc fucum refert Cl. Wahlenberg, verus Spærococcus cartilagineus Ag. est, & non raro ad oras Nordlandia, forsan a maribus remotis advectus reperitur.

**1374 FUCUS Lomentaria:** fronde terete simplissima breviori, basi attenuata, cingulis contractis intersepta.

*Chorda lomentaria* Lyngb. Hydr. p. 74. t. 18. bona.

*Scytesiphon Filum* γ. lomentarius. Ag. sp. alg. 1 p. 162.

Hab. in litore Nordlandiæ saltensis rarius ex. gr. ad Bertnæs.

E radice exigua frondes plures fasciculati palmares hinc illinc contractæ internodiis 3—6 lin. longis, obtusæ assurgunt. Nullo tomento lubrico obsiti sunt, nec cum *F. Filo* conjungendum esse videtur.

**1375 ULVA latissima:** fronde oblonga subrotundate latissima plana sicca (non viscida) læte viridi.

*U. latissima* Ag. sp. alg. I p. 407. syn. p. 41. Lin. fl. svec. n. 1156. it. vestg. p. 169.

*U. Lactuca* Lyngb. Hydr. p. 30.

Hab. ad oras Nordlandiæ passim.

Viva & qve pulchrum viridem colorem ac sequens habet, sed siccata obscurescit. Tenuis membranacea sed sine omni viscositate, qvare siccata chartæ non adhæret. Qvam illa quoque multo major, nec ab initio saccata fuisse videtur.

*U. fronde dilata subsinuata centro radicata* Ström Sönd. p. 137 & Act. Ac. hafn. 10 t. g. f. 9 vix juste ad hanc refert Cl. Agardh, qvia *U. plicata Fl. dan. t. 829* eadem est planta, icones secundum specimen Cl. Strömi ex insula Erknöe picta.

968 **ULVA Lactuca:** fronde obovata plana undulata laciniato-crispa molli viscida læteviridi.

*U. lactuca Ag. sp. alg. 1 p. 409. Whlbg. fl. lap. n. 968, ubi vide.*

Hab. quoque in superiore litoris parte in sinu saltensi Nordlandiæ.

In prima juventute clausa crescit — genus *Scyotosiphon* Lyngb. factitius esse luculenter demonstrans —, deinde apice rumpitur et finditur planaque evadit. Chartæ arcte adhæret et colorem vivacissimum retinet, 4 poll. longitudine vix superat.

1376 **ULVA rigida:** fronde ad basin fissa rigiduscula obscure-viridi, laciniis plicato-crispis.

*U. rigida Ag. sp. alg. 1 p. 410.*

*U. plicata Ström? Fl. dan. t. 829?*

Hab. in litore superiore ad oras Nordlandiæ ex. gr. in sinu saltensi.

*U. latissimæ proxima, sed rigidior minor, obscurius colorata.* Chartæ non adhæret. A radice minuta scutata frons peltata pluribus laciniis sensim dilatatis crispatis erosionis fissa ecrescit. Margo erosus forsitan vi undarum, cui semper exposita est, oritur.

1377 **ULVA intestinalis:** fronde tubulosa simplici inflata subcompressa.

*U. intestinalis Ag. sp. alg. 1 p. 418. syn. p. 45. Whlbg. ups. n. 1002 Lin. fl. svec. n. 1154. lap. n. 458.*

**U. confervoides** *Forsk. fl. Æg. arab.*

*Scytosiphon intestinalis* *Lyngb. Hydr. p. 67.*

*β. crispa*: fronde compressa margine criso *Ag. l. c. Lyngb. l. c.*

*γ. maxima*: fronde valde anfractuosa et sinuosa diametro unciali *Ag. l. c.*

*δ. cornucopiae*: fronde brevissima dilatato-clavata, fauce aperta *Ag. l. c.*

**U. compressa** *β. Whlbg. fl. lap. p. 508.*

*ε. nana*: fronde brevissima, crispato-flexuosa lineariformi.

Hab. ad litora sinuum intiomorum aqua dulci repletorum Nordlandiae saltensis ex. gr. Saltdalen copiose, ubi etiam in flumen ascensit.

Frondes a linearis basi interdum ad  $2\frac{1}{2}$  poll. latitudinem dilatantur. Haec rarius brevissimae (var. δ.), frequentius spithameæ (var. γ.). Nunquam ramosos observavi. Quidam *Lin. fl. lap. n. 458* ad hanc nec ad U. compressam attineat, et ob characterem: "tubulosa simplex" et ob synonyma *Raji* 3 p. 62. *Bauh. pin.* p. 364. *hist.* 3 p. 803. nullum dubium mihi est.

*Var. ε.* satis memorabilis. Nunquam supra pollicem alta et semilineam lata pallidior crispissima subcompressa in rupibus cæspitose crescit.

**970 ULVA compressa** *Whlbg. fl. lap. n. 970,* ubi vide, excl. syn. *Lin. fl. lap.* et var. β. ad priorem pertinentibus.

**1378 ULVA velutina**: fronde tereti filiformi simplici intricata, hic illic in membranam dilatata. *Scytosiphon velutinus* *Lyngbye Hydr. p. 68. t. 16.*

Hab. in terra ad radices Pinorum a mari haud longius remotorum Saltdalen Nordlandiae passim.

Cum icon et descriptio l. c. optimæ sint, non potest non haecce species esse, etsi loco habitationis differt. Nonne ab initio fila plana, modo angustissima, ut cylindrica appareant, quæ deinde dilatata quoque plana apparent. Attamen memorabile, quod interdum medio appalentur api-

cibus cylindricis, medio quasi dirupto. Cæspitosa et dense intricata crescent. Ab uno anno ad alterum perdurat, saltem prolificat. In filis angustis granula Bangiæ (Lyngb.) speciem referunt, in dilatatis more Ulvarum quaternata sunt. Color vivide viridis.

1379 *ULVA percursa*: fronde tubulosa capillari simplici stria unica longitudinali percursa, striisque transversalibus notata interstitiis diametro subæqualibus *Ag. sp. alg. 1 p. 424. syn. p. 87.* (Conf.) *Fl. dan. t. 1837. Scytesiphon compres. γ. confervoideus Lyngb. Hydr. p. 65, t. 15, B. 4—6.*

Hab. in lapidibus littoralibus sinus saltensis intimi Nordlandiæ ex. gr. ad Rognan primo vere copiose.

Bene ad *Ulvas* hanc ab *U. compressa* diversam nunc refert Cl. Agardh. Geniculi sane spuri. Linea longitudinalis non semper conspicua, imprimis in statu vigente, cum granula ulvoidea manifesta sint. Color lutescenti-viridis. Valde lubrica mox periit.

972 *ULVA cylindrica Whlbg. fl. lap. n. 972,* ubi vide.

Hab. quoque ad lapides trabesque in fundo fluminum leniter fluentium Nordlandiæ saltensis ex. gr. Botn vatneelven Saltdalen autumno.

Sæpiissime cylindricæ, sed non rarius basi quam apice incrassatae, et majores sæpe contracto-sinuosæ, quamobrem forsitan *U. lubrica Roth* ab ea non distingvenda. Seminorum acervuli interdum quaternatim dispositi. Semina puncto s. stria in medio notata sunt.

973 *ULVA filiformis Whlbg. fl. lap. n. 973,* ubi vide, excl. syn. *Hudsoni* ex *Ag. sp. alg. 1 p. 359.*

Stirps Wahlenbergiana minime a *Gastridio* (Lyngb.) s. *Halymenia* (Ag.) *filiformi* distingvi debet, cfr. *Ag. sp. alg. 1 p. 220.* Junior enim obscurior, cylindrica ramis non æque longis, vix lubricis. Ætate latior compressa flexuosa dilutior lubrica s. subgelatinosa, ramis subfastigiatis.

## VAUCHERIA.

Agardh sp. alg. 1. p. 458. Lyngb. Hydr. 1 p. 75.

**1380 VAUCHERIA dichotoma;** filis erectis setaceis dichotomis fastigiatis, coniocystis globosis sessilibus solitariis *Ag. sp. alg.* 1 p. 460 *Lyngb. Hydr.* p. 75 t. 19. *Fl. dan.* 1724, 1 et 3. *Lin. sp. pl.* p. 1635 (Confervae).

Hab. in argillosis inundatis ad Midbye Saltdalen Nordlandiæ.

**1381 VAUCHERIA bursata:** filis laxe ramosis, coniocystis solitariis globosis pedunculatis, pedunculo horizontali simplici *Ag. sp. alg.* 1 p. 461. *syn. p. 48.*  
*V. ovata* *Lyngb. Hydr.* p. 76 t. 20. *Fl. dan.* t. 1727, 2.

Hab. ad rivulos subalpinos Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Pedunculum modo unicum terminalem curvatum, quales Cl. Lyngbye eos pinxit, observavi.

**1382 VAUCHERIA Dillwynii:** filis flexuosis, coniocystis sessilibus lateralibus globosis.  
*Ag. sp. alg.* 1 p. 463. *Lyngb. Hydr.* p. 77, t. 21. *Fl. dan.* 1596, 1. *Whlb. ups.* n. 1001.  
*Conterva frigida* *Schum. säll.* 2 p. 105.  
*C. amphibia* *Lin. fl. svec.* n. 1164.  
*Riccia arachnoidea* *Fl. dan.* t. 898, 2.

Hab. in nuda terra in umbrosis humidis inferalpinorum et subalpinorum Nordlandiæ saltensis vere et autumno freqventer.

**1383 VAUCHERIA cæspitosa:** filis dichotomis cæspitosis, coniocystis binis terminalibus cornu intermedio *Ag. sp. alg.* 1 p. 468. *Lyngb. Hydr.* p. 81 t. 23. *Fl. dan.* t. 1726, 2.  
*Confervae canalicularis* *Lin. fl. svec.* n. 1162.

Hab. ad ripas rivulorum frigidorum nec non fontium inferalpinorum et subalpinorum Saltdalen Nordlandiæ vere.

- 1384 VAUCHERIA racemosa:** filis ramosis cæspitosis, coniocystis racemosis. *Ag. sp. alg.* 1 p. 469. *syn. p. 50. Lyngb. Hydr.* p. 82 t. 23. *Fl. dan.* t. 1727, I.  
*Ceramium cæspitosum Roth. cat.* 1 p. 154 ex *Ag.*  
**Hab.** in aqua stagnante inferalpinorum Saltdalen rarius aestate.

### LYNGBYEA.

Fila capillaria continua hyalina apice vesiculifera, vesicula granulis coloratis repleta.

- 1385 LYNGBYEA pulvinata:** filis pulvinatis cæspite convexa lacteis, tenuissimis, vesicula rufescente subcuneata.

$\beta$  *geminata:* vesiculis binis pedicellatis.

*Echinella geminata Lyngb. Hydr.* p. 210 t. 70.

- Hab.** in lapidibus rivulorum fluminumque rapidiorum Saltdalen Nordlandiæ passim copiose.

Cæspitibus aggregatis nucem Coryli avellanæ sæpe majoribus convexis rufescens lapides tegit. Color rufescens e vesiculis oritur. Fila collecta lactea, singula sub vitro omnino hyalina continua. Vesiculæ primum figuram sporangii Splachni urceolati omnino gerunt, maturæ vero cuneato-clavatae, et tum mox effoetæ hyalinæ. Sæpe delabuntur. Una cum seqventibus et *E. paradoxa* Lyngb. distinctum genus constituit, quippe quæ e filis regularibus chrySTALLINIS nulla massa gelatinosa cinctis constant. *E. radiosa* Ach. nullo modo hujus loci est. *E. acuta* Lyngb., quæ etiam in Nordlandiæ occurrit, ad Bacillarias (Nitzsch) sine dubio melius refertur. *E. olivacea* et *stipitata* Lyngb. mihi ignotæ sunt.

- 1386 LYNGBYEA cuneata:** filis subaggregatis brevissimis, vesiculis ovato-cuneatis.

*Echinella cuneata Lyngb. Hydr.* p. 211 t. 70.

- Hab.** in Ectocarpo litorali Nordlandiæ vere.

Stipes re vera adest, sed hyalinus brevissimus difficilis observatur. Qvoad magnitudinem hæc et seqvens cum priori conferri non possunt, cum hæ oculo nudo vix visibiles. Sunt etiam modo vesiculæ, qvæ in illa qvoqve punctiformes. Mirror, oculatissimum Lyngbye effugere posse, fasciam vesiculærum flavescentem sporarum copiam continere. Vesiculæ hujus priori multo latiores, apice subemarginatae.

**1387 LYNGBYEA fasciculata:** filis fasciculatis simplicibus rigidis strictis fastigiatis, vesiculis cylindricis.

*Echinella fasciculata* Lyngb. *Hydr.* p. 210 t. 70.  
*Fl. dan.* t. 945.

*Diatoma fasciculata* Ag. syn. p. 120.

Hab. in Ectocarpo litorali aliisqve Confervis marinis vere, sed etiam in Vaucheriis aqvæ dulcis autumno in Nordlandia legi.

Cum massam sporaceam etiam in medio fili observaverim, incertus, an tota stirps vesicula longa cylindrica sessilis dicatur.

**974 CONFERVA atrovirens** Whlbg. *fl. lap.* n. 974, ubi vide et adde:

*Scytonema atrovirens* Ag. syn. p. 115.

*Bangia atrovirens* Lyngb. *Hydr.* p. 85 t. 25.

*Lichen pubescens* Whlbg. *fl. lap.* n. 830 cum syn.

**1388 CONFERVA tuberculata:** tuberculiformis, nigra, filis erectis arcte cæspitosis flexuosis subramosis obtusis, granulis in qvavis serie 1—2 dispositis.

Hab. in terra sterili summarum alpium una cum Cenomyce vermiculari et Jung. julacea Saltdalen Nordlandiæ.

*Bangiæ species secundum* Lyngbye. Sicca apothecium convexum Lecideæ refert, sed maderfacta dilatatur et structuram fibrosam manifestat. Fila sub lente olivacea. Granula sphærica.

**1389 CONFERVA Myochrous:** filis in cæspitem nigro-fuscum densissime intricatis, intus annula-

tis, ramis geminis secundis. *Lyngb. Hydr.* p. 96 t. 27. *Ag. syn.* p. 113. *Fl. dan.* t. 1602, 2 optima. (*Scytonema*).

$\beta.$  *inundatum*: annulis internis subrotundis.

*Scytonema*  $\beta.$  *inundatum* *Lyngh. l. c.* *Ag. l. c.*

*Conferva seriata* *Whlbg. fl. lap.* n. 984. t. 30,2

Hab. in fundo lacuum alpinorum Nordlandiæ passim.

Var.  $\beta.$  in limo inundato paludum Lapponiæ sylvaticæ legit *Cl. Wahlenberg*.

**1390 CONFERVA compacta:** filis in cæspitem nigro - viridem densissime intricatis dichotomis, intus annulatis, ramis erectis strictis, angulis dichotomiarum acutis.

*Scytonema compactum* *Lyngh! Hydr.* p. 97 t. 28. *Ag. syn.* p. 116.

Hab. in trabibus ramisqve inundatis lacus ad Fiskevaag Saltdalen Nordlandiæ.

Fila sub vitro viridi-hyalina, annulis obsoletis.

**1391 CONFERVA (OSCILLATORIA) limosa:** filis simplicibus cærulescenti - viridibus e strato atrovirente lubrico, densissime compactis utrinque longissime radiantibus strictis rectis *Lyngh. Hydr.* pag. 85. *Ag. syn.* pag. 104. *Fl. dan.* t. 1549,2.

Hab. in fundo limoso aqvarum circa domos, dénum superficie innatans.

**1392 CONFERVA (OSCILLATORIA) nigra:** filis simplicibus viridi - lutescentibus intricatis e strato nigro lubrico longe radiantibus rigidis rectis. *Lyngh. Hydr.* p. 87. t. 26. *Ag. syn.* p. 103.

Hab. in rupium latebris tenui terra tectis aqva stilante madefacta, corium tenue nigrum in aqua mox radians referens.

**1393 CONFERVA (OSCILLATORIA) tenuis:** filis simplicibus dilute viridibus e strato virenti lubrico breviter radiantibus, strictis rectis. *Lyngh. Hydr.* p. 88. *Ag. syn.* p. 105. *Fl. dan.* t. 1779. *C. fontinalis* *Roth. cat.* 3 p. 195 ex *Ag.*

*O. viridis* *Vaucher* p. 195 t. 15, 7 ex *Ag.*

Hab. in lacubus inferalpinis, primo vere aqvæ innatans, antea fundo adnata Saltdalen Nordlandiæ.

Colore intense sed pulcherrime viridi filis tenuioribus imprimis a *C. limosa* dignoscitur. Stratum subjectum e Conterva delecta ortum *Bacillaria fulva* Nitzsch repletum est.

**1394 CONFerva (OSCILLATORIA) Retzii:** filis simplicibus hyalinis e strato compacto supra gelatinosum virenti-atro subtus virente breviter radiantibus.

O. Retzii *Ag.* syn. p. 105.

O. subfuscata *Lyngb. Hydr.* p. 88.

Hab. in canalibus ligneis inferalpinorum Saltdalen Nordlandiae

Satis compacta strato supra stratum innovando. Nullos annulos in filis tenuissimis detegere valui. Fila sub lente creberrime sese motitarunt flectendo, sed non elongando.

**1395 CONFerva (OSCILLATORIA) distorta:** filis in cæpitulum globularem contextis ramosis rigidiusculis fusco-virescentibus.

O. distorta *Lyngb! Hydr.* p. 90. *Ag. syn.* p. 112.

C. distorta *Fl. dan.* t. 820. *Dillw.* t. 22 ex *Ag.*

Hab. In lacu inferalpino ad Fiskevaag Saltdalen Nordlandiae æstate et autumno.

Primum ramentis plantisqve aquaticis adhaeret, demum libere natat fundumqve legit. Globulari forma *C. Ægagropilam* referens mox dignoscitur.

**1396 CONFerva (OSCILLATORIA) muralis:** filis viridibus rigidiusculis crassiusculis curvato-flexuosis in stratum viride implicatis, annulis laxis *Ag. syn.* p. 108. *Lyngb. Hydr.* p. 95. *Fl. dan.* t. 1599,2.

C. parietina *Vaucher* p. 196 t. 15, 8 e *Lyngb.*

Hab. ad parietes subqve tectis in ligno abscondito putrido Saltdalen Nordlandiae frequenter.

Fila capillo crassiora, non lubrica, saepe flavo-viridia. Semper iis immixta est pulvis concolor, e granulis quadratis 2—6 connatis constans. An fila vetusta delecta?

**1397 CONFerva (CALLITHAMNIUM) rosea:** fronde tenui alternatim decomposito-pinnata, ramis ramulisqve alternis patulis subulatis, articulis diametro triplo longioribus, capsulis secun-

dis globosis subsessilibus *Lyngb!* *Hydr.* p. 126  
t. 39 (*Callithamnium*).

*Ceramium roseum* *Ag. syn.* p. 62. *Roth cat.* 3  
p. 145 *Confervæ rosea* *Dillw.* t. 17.

Hab. in lapidibus litoralibus sub *Fuco digitato* Nord-  
landiæ saltensis ex, gr. ad Bodöe.

Tenuis et elegans species plures frondes ex  
una radice exserens.

**1398 CONFERVA (CALLITHAMNIUM) *Rothii*:** frondibus minutissimis cæspitosis erectis  
dichotomo-ramosis, ramis elongatis strictis al-  
ternis, articulis diametro subtriplo longioribus.

*C. Rothii* *Dillw.* t. 73 ex *Lyngb!* *Hydr.* p. 129  
t. 41 (*Callithamnium*).

*C. violarea* *Roth, cat.* 1 p. 190 t. 4, 1.

Hab. in rupe litorali stillicidio irrigata ab undis vix  
nisi procella motis madefacta Saltdalen Nordlan-  
diæ autumno.

Articuli purpurei, sed nulla massa sporacea  
repleti, cum a me legerentur. Ramuli cylindrici  
obtusiusculi.

**1399 CONFERVA (CALLITHAMNIUM) *flori-  
dula*:** frondibus minutissimis fasciculato-cæspi-  
tosis abbreviatis rigidiusculis subsimplicibus, ar-  
ticulis diametro subtriplo longioribus.

? *Callithamnium floridulum* *Lyngb.* *Hydr.* p.  
130 t. 41?

Hab. in lapidibus littoralibus una cum *Fuco palmato*  
Nordlandiæ saltensis passim.

Cæspitulos parves vix 2 lineas latos rubros in  
lapidibus efficit. Fila 1 lin. longa. *A. C. Rothii*  
filis brevioribus rigidiusculis subsimplicibus dif-  
fert.

**1400 CONFERVA (ECTOCARPUS) *silicu-  
lo-sa*:** filis tenuissimis densissimis ramosissimis,  
articulis diametro sesqvilongioribus, capsulis lan-  
cealato-acuminatis pedunculatis. *Lyngb.* *Hydr.*  
p. 131 t. 43. *Dillw. suppl.* t. E.

*Ceramium siliculosum* *Ag. syn.* p. 65.

*C. confervoides* *Roth. cat.* 3 p. 148.

Hab. ad litora Nordlandiæ saltensis *Fucis* adhærens.

Cl. Agardh *C. litoralem* Whlbg. fl. lap. n. 982 ad *C. siliculosam* dubitans refert, sed etsi forsan Cl. Wahlenberg utrasque non distinxit, tamen synonymon ejus ad *C. litoralem* summo jure refertur, qvia "segmenta abbreviata" dicit.

**1401 CONFERTA (ECTOCARPUS) aurea:** terrestris, fulva dein canescens, filis cæspitosis abbreviatis ramosis, ramis patentibus rigidiusculis, articulis diametro sesqvilongioribus Lyngb. Hydr. p. 134 t. 44. Dillw. t. 35. Whlbg. fl. ups. n. 998- Ceramium aureum Ag. syn. p. 68. Byssus aurea Lin. sp. pl. p. 1638. Fl. dan. t. 718, 1. Lichen aureus Ach. prd. p. 11.

Hab. in muscis, corticibus lapidibusque absconditis Saltdalen Nordlandiæ frequentius.

**1402 CONFERTA rubens:** lignicola, filis effusis abbreviatis crispabilibus ramosis rufofulvis inodoris, articulis diametro æqualibns.

Lepraria rubens Ach. syn. p. 331.

Lichen rubens Hoffm. En. lich. p. 4 t. 1, 5 ex Ach. Verrucaria rubens (*crusta*) Fl. Berl. mag. 1807 ex Ach.

Hab. in cortice vetusto subcrypto Salicis Capreæ Saltalen Nordlandiæ rarius.

Postquam cum vulgari stirpe in sèpibus et corticibus australioris Norvegiæ obvia contuli et eandem esse reperi de synynomo Cl. Acharii nullum mihi dubium. Ad *C. odoratam* Lyngb. quidem accedit, sed mea constenter inodora, filis crassioribus crispatis (non erectis), non adeo dense cæspitosis p. p. diversa. Articuli diametro æqvales massa coccinea (nou fusca) repletii, geniculis marginibusque hyalinis. Fila lineam vix superant, ramis brevissimis torulosis. Sub epidermis s. ligni teuuissima membrana cariosa flocculosaqve latent demumqve erumpunt. Siccata et asservata virescit.

**1403 CONFERTA denigrata:** filis cæspitosis erectiusculis brevibus atèrrimis ramosis, ramis divergentibus brevibus, articulis subrotuudis diametro æqualibus.

Hab. in epidermide vetusto Betulæ albae Saltdalen Nordlandiæ passim.

Cæspites parvos s. confluentes velutinos aterrimos efficit. Fila vix ultra 2 linearum longitudinem, moniliformia, articulis approximatis rotundis diametro æqualibus. Nulla massa sporacea inesse videtur. An *C. ebenea* Dillw? sed non Lyngb! *Hydr.* p. 164, quæ modo *Racodium rupestre* Pers. est. *C. melæna* Lyngb!, quæ *Torula antennata* Pers., ab hac diversissima. Attamen Torulæ speciem habuisse, si simplex fuerat.

**1404 CONFERVA barbata:** filis tenuissimis cæspitoso-fasciculatis implicatis atris ramosis, ramis vagis patentibus, articulis linearibus diametro subdupo longioribus.

Hab. in epidermide Sorborum Saltdalen Nordlandiæ rarius.

A priori et a *Racodio rupestri* Pers. omnino diversa. Fila 2 — 5 lin. longa; juniora brevia crispata apparent; ætate proiecta in fasciculos erectos coalita s. complicata sunt; tenacia, quaere ad fungos non pertinet. Geniculi manifesti. Articuli nulla massa sporacea repleti, minime moniliformes.

**1405 CONFERVA muscicola:** filis ramosis repentibus flexuosis ferrugineis, ramis alternis divaricatis acuminatis, articulis diametro longioribus, Lyngb! *Hydr.* p. 161. *Ag. syn.* p. 73.

*C. castanea* Dillw. t. 72 ex Lyngb.

Hab. in caule muscorum ubique freqventer.

Dubia mihi stirps.

**1406 CONFERVA obtusangula:** filis ramosis flexuosis crispis, ramis remotis subsimplicibus, angulo rotundato exeuntibus, articulis diametro duplo longioribus. Lyngb. *Hydr.* p. 159 t. 55.

*C. riparia* Dillw. intr. n. 111. t. E. sec. Lyngb.

Hab. in rimis rupium maritimorum a summo fluxu vix inundatarum vel stiilicidiis madefactarum circa sinum Saltensem Nordlandiæ passim copiosa e. gr. inter Rognan et Hals.

Chartæ non adhæret. Pannos bullato-criptatos

satis satis interdum in rupibus efficit. Massa viridis margines hyalinos semper reliquit. Rami breves et brevissimi.

**1407 CONFERVA uncialis:** filis ramosissimis fasciculatis, fasciculis clavatis rotundatis, ramis remotis divaricatis, ultimis brevibus subsecundis, articulis diametro subduplo longioribus.

*C. uncialis* Lyngb. *Hydr.* p. 160 t. 56. *Fl. dan.* t. 771, 1.

Hab. in lapidibus imi refluxus ad litora exteriora sinus saltensis Nordlandiae.

Fasciculis densis obconicis pollicaris longitudinis mox dignoscitur.

**981 CONFERVA glomerata Whlbg. fl. lap. n. 981.**

Ad var.  $\beta$ . excludatur synonymon Rothii.

**1408 CONFERVA stellaris:** filis ramosis tenuissimis æqualibus e basi orbiculari parallele excurrentibus. Lyngb. *Hydr.* p. 150 *Fl. dan.* t. 660, 1. Schum. *sæll.* 2 p. 105. *Ag. syn.* p. 92. Wilcke in *Act. Ac. holm.* 1764 t. 8?

Hab ad latéra interiora vasorum vitreorum quotidie aqua fontana repletorum ineunte æstate Saltdalen Nordlandiae.

Icon *fl. danicæ bona*, sed synonymum Wilckii multum dubium mihi est, quia suam plantulam erectam subfasciculatamque sistit; haec vero stellariformis e centro grumoso fila radiantia ad 3 lin. longa emittens. Articuli diametro 4 plus longiores.

**1409 CONFERVA tortuosa:** filis simplicibus in pannum intricatis crispatis rigidiusculis, articulis diametro duplo longioribus.

*C. tortuosa* Lyngb. *Hydr.* p. 145 t. 49. Dillw. t. 46.

Hab. supra arenam in rimis rupium litoris superioris Nordlandiae saltensis.

Color viridis et flavescenti-viridis. Pannosa tenacia rigidiuscula crispataque fila eam insignem reddunt. Sæpe massa viridi toti fere impleti sunt articuli, geniculis hyalinis.

**1410 CONFERVA rivularis:** filis simplicibus tenuibus rectis longissimis fluctuantibus, articulis

diametro subtriplo longioribus siccitate alternatim compressis *Lyngb.* *Hydr.* p. 142 t. 48. *Ag.* syn. p. 81. *Fl. dan.* t. 881 fig. inf. t. 1837 *Lin.* *fl. svec.* n. 116L. *Gunnorv.* n. 608. *Whlbg.* *fl. ups.* n. 994. *Schum.* *sæll.* 2 p. 106. *Hall.* n. 2115. *C. funiformis* *Roth.* *cat.* 1 p. 169.

Hab. in rivulis inferalpinis leniter fluentibus Nordlandiæ saltensis ex. gr. Fiskevaagøsen æstate.

Ad 2 ulnarum longitudinem accedit. *Var.*

*mucosa* *Ag.* filis lubricis brevioribus lutescentibus hisce locis quoque occurrit. Granula articulorum vario modo congregata.

**1411 CONFERTA capillaris:** filis simplicibus tenuibus crispatis laxe intricatis, articulis diametro duplo longioribus, siccitate alternatim compressis.

*C. capillaris* *Lyngb!* *Hydr.* p. 141 t. 47. *Ag.* syn. p. 81. *Lin.* sp. pl. 2 p. 1636.

*C. crispa* *Dillw.* *intr.* p. 46 *supl.* t. B. e *Lyngb.*

Hab. in lapidibus rivulorum locis soli expositis fluentium ineunte æstate circa sinum saltensem passim copiose ex. gr. ad Bodoe.

Fila breviora crista intricata demumque flavescentia hanc a priori mox distingunt.

**1412 CONFERTA mucosa:** filis simplicibus tenuissimis lubricis flavescentibus, articulis subtorsis, diametro æquilibus. *Lyngb.* *Hydr.* p. 140 t. 47. *Dillw.* *supl.* t. B.

Hab. in stilicidiis rupium una cum *Palmellis* vere Saltdalen Nordlandiæ parcus.

Cæspes tenuis subgelatinosus flavescens. Ubi articuli longiores apparent, ut in iconé *Lyngb.* I. c. picti sunt, geniculum intermedium a massa sporacea occultum est. Fila apice non attenuata.

**1413 CONFERTA alpina:** filis simplicibus tenuissimis natantibus fusco-purpureis, articulis diametro triplo longioribus.

*C. alpina* *Lyngb!* *Hydr.* p. 139 t. 47.

*C. ericetorum* β. aquatica *Ag.* syn. p. 76.

*C. violacea* *Huds.* *angl.* p. 592 e *Lyngb.*

Hab. in stagnis lacubusqve subalpinis et alpinis ter-

minum Betulæ longe excedens per Nordlandiam saltensem.

Cæspes nebulosus fluctuans fuscopurpureus.  
Genicula obsoleta et pellucida.

**1414 CONFerva sordida:** filis simplicibus, tenuissimis arachnoideis tenacibus, articulis subpellucidis, diametro quadruplo longioribus *Lyngb.* *Hydr.* p. 138 t. 46. *Dillw.* t. 60 et *Roth cat.* 1 p. 177 e. *Lyngb.*

*C. bombycina Ag. syn.* p. 78.

Hab. in scrobiculis rupium ad ripas lacuum inferalpinorum Nordlandiæ saltensis rarius ex. gr. in Botnvandet autumno.

Memorabile est, quod paucissimæ modo Confervæ aquarum dulcium in Nordlandia ante autumnum proveniant, cuius causa in eo quærenda est, quod flumina et rivuli ad illum usque tempus repleti sunt aqua nivali frigidissima, quæ tempore ad Algas alendas necessariam non habet.

**1415 CONFerva floccosa:** filis simplicibus arachnoideis lentis inistratum bullosum implicatis, articulis diametro subæqualibus *Ag. syn.* p. 79. *Lyngb. Hydr.* p. 138, t. 46.

Hab. in rivulis lente fluentibus inferalpiorum Saltdalen Nordlandiæ ut stratum mucilaginosum flavovirens bullosum aquæ innatans, demum immersum.

**1416 CONFerva fugacissima:** filis simplicibus tenuissimis mollibus, articulis diametro sesqvilonioribus medio granulis fasciatis *Lyngb. Hydr.* p. 137 t. 46. *Ag. syn.* p. 80. *Roth. cat.* 1 p. 176.

Hab. in aqua stagnanti Saltdalen Nordlandiæ autumno.

Cæspes priori multo tenuior viridiorque.

**1417 CONFerva zonata:** filis simplicibus tenuibus lubricis attenuatis, articulis diametrum æquivalentibus fascia transversali notatis.

*C. zonata Lyngb. Hydr.* p. 136 t. 45. *Ag. syn.* p. 81. *Web. et Mohr. it.* t. 1 f. 7, a. b. *Dillw. intr.* p. 41. *Fl. dan.* t. 1838.

*C. lucens Dillw.* t. 47 e *Lyngbye.*

Hab. in lapidibus fluminis Saltelven Nordlandiæ, ubi adhuc fluxus maris adscendit, Octobri.

Fasciculi 1—2 pollicares vivide virides gelatinosi lapidibus adhaereunt. An *C. dissiliens* ab hac diversa?

**1418 CONFerva (ZYGNEma) nitida:** filis fluctuantibus simplicibus crassis rigidis lubricis demum conjugatis, articulis diametro subdupo longioribus, spiris cruciatis tenuibus arctis, seminibus ovatis.

*C. nitida* Fl. dan. t. 819 Dillw. t. 4, C.

*C. jugalis* Fl. dan. t. 883.

*C. setiformis* & *conjugata* Roth cat. 3 p. 271. Schum sæll. 2. p. 106.

*C. scalaris* Roth Cat. 2 p. 196. Schum sæll. 2 p. 106.

Zygnema nitidum Ag. syn. p. 98. Lyngb. Hydr. p. 172 t. 59. Whlbg. fl. ups. n. 987.

Hab. in aqua stagnante Saltdalen Nordlandiæ Octobri.

Princeps Confervarum. Fila abbreviata quam seta equina subcrassiora.

**938 CONFerva (ZYGNEma) qvinina Whlbg.**

fl. lap. n. 988.

*β. longata:* flavo-viridis, submucosa, articulis longioribus.

Hab. in stagnantibus et ad flumina per Nordlandiam et Laponiam ubique. Etiam in alpes adscendit, ubi var. *β.* in fontibus frigidissimis 2500 ped. supra mare elevatis mense Septembris legi.

**1419 CONFerva (ZYGNEma) cruciata:** filis simplicibus lubricis demum conjugatis, articulis diametro duplo longioribus maculas binas stelliformes continentibus, seminibus subglobosis.

Zygnema cruciatum Ag. syn. p. 102. Vauch. p. 76 t. 6 f. 4 (Conjugata) ex Ag.

Z. bipunctatum Lyngb. Hydr. p. 171 t. 60 excl. syn. Whlbgi. Roth Cat. 2 p. 204 (Conferva).

Hab. in stillieidiis rupium et aquis stagnantibus inferalpinorum Saltdalen Nordlandiæ ineunte æstate.

Ab hac omnino differt *C. bipunctata* Whlbg. fl. lap. n. 987 (Dillw. t. 2, C.), quam ad Z. pectinatum ut var. *β. confluens* refert Cl. Lyngb. l. c. p. 175 t. 60. Illa in fluminibus rapidissimis Lapponiæ et Nordlandiæ tum sylvaticæ tum alpi-

næ saxis adnascens obvenit, qvam ob rem vix unquam tantum quietis ei datur, ut copulari possit, qvare Zyg nematis speciem non habere possum. Massa interna intense et pure viridis etiam sæpe indivisa, et ubi divisa non tam en stellariformis, qvalem bene refert icon Lyngbyei.

**990 CONFerva (DIATOMA) flocculosa:**

*Whlbг. fl. lap. n. 990*, ubi vide.

*Diatoma flocculosa Lyngb. Hydr. p. 179 t. 61.*

*Ag. syn. p. 119.*

Hab. quoque inter Confervas Nordlandiæ inferalpinæ autumno freqventer.

**983 CONFerva mutabilis Whlbг. fl. lap. n.**

983, ubi vide.

*Draparnaldia glomerata et plumosa Ag. syn. p. 124. Lyngb. Hydr. p. 189 t. 64.*

Cum et ob characterem et ob synonyma dubium sit, qvamnam duarum laudatarum auctorum specierum intellectam voluit Cl. Whlbг, et ego utrasque in aquis Nordlandiæ inferalpinæ et subalpinæ sæpius legerim, et parum modo discriminis inter eas viderim, utrariumque sub illius nomine mentionem facere consultius duxi.

**1420 NOSTOC sphæricum: fronde globosa aggregata solida atroviridi lævi pisiformi.**

*N. sphæricum Ag. syn. p. 153. Lyngb. Hydr. p. 200. Vauch. p. 223 t. 16. f. 2 ex Ag.*

*Conferva pisum Fl. dan. t. 660, 2.*

Hab. inter muscos ad rivulos et sthilicidia Nordlandiæ inferalpinæ autumno rarius.

A semine Cannabis ad Pisi magnitudinem variat.

**1421 NOSTOC cæruleum: fronde minuta globosa solitaria solida lævi cærulea subpellucida.**

*N. cæruleum Lyngb! Hydr. p. 201 t. 68.*

Hab. in stagnis inter Hypna Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Semen Cannabis magnitudine non superat.

## CHÆTOPHORA.

*Lyngbye, Hydroph. p. 191 t. 65, 66.*

**1422 CHÆTOPHORA elegans:** fronde hemisphaerica aggregata, filis arctis dichotomis, ramis divaricatis, superne subfasciculatis, articulis diametro duplo longioribus.

*C. elegans Lyngb. Hydr. p. 192 t. 65. Ag. syn. p. 128. Roth cat. 3 p. 337 (Rivularia).*

*Batrachospermum intricatum Vauch. t. 12, 2, 3 ex Ag.*

Hab. ad lapides rivulorum inferalpinorum et subalpinorum Saltdalen Nordlandiae aestate freqventer.

Frondes dilute virides hyalinæ Piso majores.

## LINCKIA.

*Lyngbye Hydroph. p. 194 t. 66 et 67.*

**1423 LINCKIA atra:** fronde hemisphaerica solitaria dura atro-viridi, filis excentricis fasciculatis acuminatis hyalino-viridescentibus.

*L. atra Lyngb. Hydr. p. 195 t. 97 Fl. dan. t. 1839, 2.*

*Rivularia atra Roth. cat. 3 p. 340 ex Ag. syn. p. 130.*

*Tremella hemisphaerica Lin. svec. n. 1141. Gun. norv. n. 952. Schum säll. 2 p. 114.*

*β. coadunata:* frondibus in stratum gelatinosum atroviride coadunatis.

Hab. in lapidibus litoralibus; *β.* in terra litoris supream per Nordlandiam ubique freqventer.

Varietatem *β.* hujus loci esse etiam agnovit Algarum peritissimus Hofman Bang.

**1424 LINCKIA dura:** fronde globosa solida dura viridi, filis excentricis fasciculatis acuminatis hyalino-viridescentibus.

*L. dura Lyngb. Hydr. p. 197 t. 67. Fl. dan. t. 1488, 1. perbona Roth cat. 3 p. 358 (Rivularia).*

Hab. in trabibus lapidibusque inundatis in Fiskevaagosen Saltdalen Nordlandiae autumno.

Magnitudine Semen Cannabis superat. Figura regulariori, colore dilutioni, substantia molliori nec non lodo habitacionis a priori, cui substantia interna similis, differt.

**1425 LINCKIA natans:** fronde globosa caya viridi s. olivacea, filis sparsis attenuatis globo insidentibus.

L. natans Lyngb. Hydr. p. 196 t. 67. Roth germ. 3 p. 551. Hedw. theor. t. 36, 7—10 (Tremella) e Lyngb. Rivularia angulosa Ag. syn. p. 130. Roth. cat. 3 p. 340 ex Ag.

Hab. in stagnantibus Nordlandiae saltensis rarius.

### PALMELLA.

Lyngb. Hydroph. p. 203 t. 68 et 69.

Massa gelatinosa subhyalina granulis solitariis subglobosis farcta.

**1426 PALMELLA Myosurus:** fronde elongata cylindracea solida ramosa, ramis tenuissime ramulosis, granulis minutis globosis viridibus.

P. Myosurus Lyngb. Hydr. p. 203 t. 68 Fl. dan. t. 1604.

Batrachospermum Myosurus Ducluzeau ess. p. 76. DC. fl. fr. 2 p. 591 e Lyngb.

$\alpha$  æstivalis: cinerascenti-sordida.

$\beta$ . autumnalis: umbrina s. fusco-olivacea.

Hab.  $\alpha$  in lapidibus rivuli subalpini Fiskevaagsæteren mense Julii:  $\beta$ . in lapidibus fluminis Saltelven mense Octobris Saltdalen Nordlandiae.

Vix unum genus cum sequentibus, multo minus cum *Tubercularia rosea* Pers., constituere debet. Per plures annos eodem loco var.  $\alpha$ . eodem colore legi, sed nullam notam inter eas distinguenter praeter colorem detegere potui, nam odor ingratus idem et substantia interna eadem.

Ætate ramos amittit, et cylindrica remanent fila principalia, penna columbina vix crassiora, granulis tum quaque subobsoletis.

**1427 PALMELLA gigantea:** fronde magna subglobosa natante hyalina, granulis virescentibus raris. Hab. in stagnis turfosis scopulorum Nordlandiæ meridionalis rarius æstate.

Massa mollis gelatinosa ut inter digitis capientium dillabatur, magnitudine interdum ovum asserinum superat. Forma non exacte globosa. Granula minuta rara. Siccata chartæ omnino adhæret et micat. Hæc species cum seqventibus Genus Palmellæ sensu strictiori naturalique constituit, sc. substantia difformi subglobosa molli gelatinosa granulis farcta.

**1428 PALMELLA viridissima:** fronde subglobosa natante vivide viridi, granulis confertis.

Hab. in stagnis turfosis scopulorum Nordlandiæ meridionalis passim copiose ex. gr. Grönholmen.

Frondes globosæ et oblongæ nucis Coryli avellanæ magnitudine vividissime virides, quem colorem etiam siccatae chartæ arctissime adhaerentes retinent. Granula minuta conferta suboblonga, sæpiissime bina connata. Siccata Linckiam natantem refert.

**1429 PALMELLA rupestris:** fronde difformi rugosa molli æruginosa s. flavo-virescente, granulis suboblongis didymis, medio punctatis.

P. rupestris Lyngbye Hydr. p. 207 t. 69.

Hab. in rupibus stillicidiis madefactis inferalpinorum Saltdalen Nordlandiæ per totam æstatem.

Minor, tum conyexa subhemisphærica, tum subeffusa. Granula semper didyma, linea subtilissima distincta mihi sese obtulerunt. Qvam in prioribus fere majora. Colore unice aliquid a descriptione Lyngbyei differt, sed ob omnes alias notas convenientissimas vix distingvi debet.

**1430 PALMELLA obscura:** fronde difformi convexa rugosa duriori fuscescenti-viridi, granulis subtilissimis.

? P. adnata Lyngb. Hydr. p. 205 t. 69.

Hab. in rimis rupium irrigatarum inferalpinorum Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Licet Am. Hof. Bang specimen siccum P. adnata Lb. agnoverit, attamen de synonymo dubium

mihi est, qvippe quæ loco Habitationis et granulis subtilissimis, yix summo augmento conspicuis differre videtur. Substantia perfecte gelatinosa, sed qvam in prioribus durior.

### SPHÆRELLA.

Sommerfelt in Magz. for Naturvidensk. 1824 p. 252.

Vesiculæ gelatinosæ globosæ minutissimæ.

**1431 SPHÆRELLA nivalis:** vesiculis dispersis (in nive) punctiformibus sangvineis Sommerfelt l. c.

*Uredo nivalis* De Cand. . . . *Bauer in Journal of sciences and arts* n. 14.

Hab. in nive perenni alpium nordlandicarum e. gr. Storfjeldet, Soelvaagtinden in Saltdalen.

Hisce regionibus non latas plagas occupat, sed maculas spithamæas, sæpe plures seriatim subconfluentes efficit. Nivem pulchre roseum tingit. Si nix in manu capitur et inspicitur, ut puncta coccinea appetet, nec nivem vere tingit sed color ejus translucet. Sub lentibus ut globuli  $\frac{1}{10}$  —  $\frac{1}{5}$  lineæ lati coccinei, carnei, lividi ceriniqve sese produnt. Coccinei semper majores, qvare aliter colorati sine dubio stirpes juiores sunt. Manifeste perspicitur, eas e membra hyalina substantiam coloratam includente constare. Cum marginem nivis deliquescentis incolant, rarius in massam cruxi simillimam colliguntur.

Qvin alga nostocina sit, tota vegetatio et substantia gelatinosa pulposaque satis comprobatur. Cum seqventi et *S. Wrangelii* Somrf. (l. c. *Lepraria kermesina* Wrangel in Act. Ac. holm. 1823), qvarum interna structura ob minutiem discerni nequit, distinctum genus constituere mihi videtur.

**730 SPHÆRELLA botryoides:** vesiculis aggregatis minutis viridibus Somrf. l. c.

*Palmella botryoides* Lyngb. *Hydr.* p. 205 (excl. syn. Lin.) *Ag. syn.* p. 134 (*Nostoc.*)

*Lichen botryoides* Ach. prd. p. 10. Whlbg. lap. n. 730.

*Byssus botryoides* Fl. dan. t. 899, 5.

*Mucor viridescens* Lin. mant. altera p. 313.

Hab. in lignis putridis terraqve turfosa Nordlandiæ.

Melius describi vix potest, qvam describit Ill. Linne suum M. viridescentem sc. "crusta viridis e granis subrotundis inæqvalibus viridibus, humidis gelatinosis." Attamen hoc synonymon negligebatur, et *Byssus botryoides* Lin. sv. n. 1187 ob synonymum Dillenii citatum ad hanc referebatur, etsi nec character specificus nec genericus nec locus natalis indicatus in hanc conuenierunt.

## FUNGI.

**1432 SPHÆRIA multiformis:** difformis rugosa fusco-rubiginosa dein nuda nigrescens, intus cinereo-nigra, peritheciis subglobosis demum prominentibus papillatis Fr. syst. myc. 2 p. 334. obs. 1. t. 1, 2, 3. (See also Sphaeria fuscata Willd.)

*S. rubiformis* Pers. syn. p. 9. Ann. bot. 2 p. 20.

t. 2, 1.

*S. cinereo-fusca* Schum sæll. 2 p. 164 (jun.)

Hab. in cortice Alni Betulæqve emortuæ Nordlandiæ Saltensis copiose.

Forma regulari et subrotunda, si cortici supersidet, irregulari et applanata, si cortice disrupto emergit, gaudet. Perithecia prominula et papillata a *S. fuscum* hanc distingvunt.

*β. granulosa*: effusa, subnuda, peritheciis ad di-midium liberis. Fr. l. c.

*S. mammæformis* Whlbg. fl. lap. n. 1003.

Perithecia interdum omnino libera sunt, sed *S. mamæformi* minora.

**1433 SPHÆRIA citrina:** carnosa, effusa, planiuscula, citrina, ostiolis prominulis fuscescentibus Fr. l. c. p. 337. Pers. syn. p. 18.

*Næmaspora sulphurea* Whlbg. fl. ups. n. 1116.

Hab. in Polyporo betulino putrido Saltdalen Nordlandiae rarissime.

Haud male Næmasporis a Wahlenbergio associatur, nam etiam mihi gelatina erumpens sese obtulit cirrhosam. Per unam noctem in capsula botanica asservata planta (an etiam sub dio?), hi cirrhi phænomenon memorabilissimum præbuerunt: Motu spontaneo, vermiculis albis omnino similes, tamdiu non aruerunt, celerrime vibrarunt.

**1434 SPHÆRIA rubiginosa:** late effusa, tenuis, pulverulenta, rubiginosa, peritheciis prominulis umbilicatis.

S. rubiginosa Pers. syn. p. 11. Fr! l. c. p. 340.

Hab. in caudicibus decorticatis Alni Saltdalen Nordlandiae rarissime.

Margo sterilis crustacea. Nunquam lutescens, semper rubiginosam in juventute observavi.

**1435 SPHÆRIA atropurpurea:** effusa, tenuis, appanata, purpurascenti-nigra, peritheciis connatis prominulis, apice plano papillato Fr. l. c. p. 340. obs. 1 p. 174.

Hab. in truncis cariosis Populi Saltdalen Nordlandiae rarius.

Habitum S: serpentis omnino refert, sed differt: stromate proprio vix ullo (ergo nullus ut in Sp. serpente fundus albus); sphærulis modo superne collitis, junioribus haud villo cinereo pruinosis, sed ex macula tenuissima atramentosa emergunt perithecia, ab hac macula sterili circumdata; colore purpuracente-nigro nec atro.

**1436 SPHÆRIA serpens:** effusa, tenuis, appanata nigra, intus basi alba, peritheciis globosis prominulis papillatis.

S. serpens. Fr. l. c. p. 341. Pers syn. p. 20. NE syst. f. 317, 318. Wahlbg. fl. ups. n. 1108.

S. undulata Schum. sæll. 2 p. 162.

Hab. in truncis Salicis Capreæ sub cortice soluto Saltdalen Nordlandiae.

**1437 SPHÆRIA Stigma y. decorticata:** ambiens effusa, appanata, lævis, ferrugineo-nigra intus

albida, peritheciis ovatis, ostiolis conicis prominulis.

S. Stigma *για* Fr. l. c. p. 350. Pers. syn. p. 21.

S. Stigma Schum. säll. 2 p. 163. Whlbg. fl. ups. p. 1107.

Hab. in rāmis subputridis Betulæ in Nordlandiæ saltensis.

Epidermide Betulæ rupto cincta. Perithecia minuta, lævia, capillo triplo crassiora.

**1438 SPHÆRIA disciformis**: orbicularis, plana, lævis, nigrescens, intus alba, peritheciis in collum tenue attenuatis, ostiolis punctiformibus Fr. l. c. p. 353. Pers. syn. p. 24. Schum. säll. 2 p. 170. NE. syst. f. 321 B.

Hab. in ramis Alni Salicisqve arescentis Nordlandiæ saltensis passim copiose.

Epidermide primum tecta, dein lacero cincta. Linea circumscribens nigra ad lignum usqve penetrat.

**1439 SPHÆRIA favacea**: difformis, nigra, peritheciis oblongo-ovatis collo brevi stromate tenui albido tectis, ostiolis prominulis convexo-subtundis rugosis.

S. favacea Fr! syst. 2 p. 354. Obs. 2 p. 324 t. 8, 5.

Hab. in ramis truncisqve emortuis Alnorum Nordlandiæ saltensis.

Irregulariter erumpens suborbicularis s. pluribus confluentibus oblonga stromate extus atro intus albo tecta, epidermideqve rupta arcte cincta. Perithecia sat magna, copiosa gelatina scatentia, ut totam stirpem juniores viscosam reddat. Colla breviora recta, qvare in tota superficie erumpentia, apicibus modo subpenetrantibus. Ab affini S. Prunastri stromate interno albo statim dignoscitur.

**1440 SPHÆRIA flavovirens**: effusa, rugosa, nigra, intus pulverulenta flavovirens, peritheciis globosis, ostiolis prominulis rugosis.

S. flavovirens Fr. l. c. p. 357. Pers. syn. p. 22.

Hab. in ligno putrescente in Nordlandia saltensi.

Omnino opaca, scabrosa. Perithecia sine ordine, non modo simplici serie immersa semine papaveris minora gelatina alba. Colore stromatis interno virescente statim dignoscitur.

**1441 SPHÆRIA aneirina:** effusa, tecta, peritheciis conferfis in stromate flavescente nidulantibus, ostiolis prominulis convexis.

Hab. sub epidermide Populi emortuæ Nordlandiæ saltensis satis freqventer.

*S. subcutaneæ Whlbg.* affinis differre videtur: loco habitationis, stromatis colore in illa fuliginoso atro, peritheciis et ostiolis sine ordine confertis, attamen in centro non confertioribus. Tumores ultra pollicem latos, ad 4 poll. longos determinatos inter epidermidem et corticem nidulantes sistit. Epidermidem non decolorat, sed nigro-punctatam ob ostiola conferta prominula reddit. Perithecia globosa flava, demum fusca, gelatina flavescenti.

**1442 SPHÆRIA Prunastri β. Betulæ:** elliptica, stromate corticali, ostiolis prominentibus globosis sulcato-rugosis.

*S. Prunastri var. Fr. l. c. p. 380.*

Hab. in ramis Betularum emortuarum Nordlandiæ saltensis, hieme vigens.

Transversim erumpens; Conceptaculum nigrum ventricosum oblongum, ostiola vero conniventia lanceolata superfiem produnt. Perithecia in stromate a matrice formato fulvescente subvilloso oblongo-ovata arce congesta, seminis Popaveris magnitudine, nullo stromate albido tecta nidulantur. Ostiola longa, connivent-erectiuscula apicibus globosis, sulcato-rugulosis atris, *Sphæriam pulvis pyrius* habitu referentibus epidermidem penetrant destruuntque. Gelatina copiosa nigrescenti-olivacea. A forma vulgari ostiolis connatis, apicibus modo subliberis, non 4gonis differre videtur.

**1001 SPHÆRIA Sorbi:** *Fr. l. c. p. 380.*

*S. coronata Wahlg. fl. lap. n. 1001 (excl. syn. Hoffm.) ubi vide.*

**1443 SPHÆRIA corniculata:** innata, conica, conceptaculo latissimo plures conjungente supra tecta, disco truncato nigro, stromate pallido, ostiolis globosis, dein stricte rostratis pertusis.

Sp. *corniculata* Fr! l. c. p. 384. NE. syst. p. 302. f. 330. Pers. syn. p. 40.

Hab. in ramis emortuis Padi per Nordlandiam saltensem rarius e. gr. Saltdalen.

Sphærulæ circinnatæ, erectæ, corticem in pustulas elevantes, supra tectæ sunt conceptaculo lato, qvod in ipsa cortice serpit, et multas et forsan omnes pustulas conjungit et ab iis passim elevatur, quo discus planus niger formatur, sed inter pustulas in cortice omnino latet, ut, si cortex et sphæriarum pustulæ una verticaliter discentur, veluti linea nigra in medio corticis discos formans appareat. Rostra demum longiora strictioraque quam in iconi NE. depicta, torulosa quasi ex successivo incremento.

**1444 SPHÆRIA fibrosa:** innata, conico-depressa, stromate fibroso late circumscripto, ostiolis confertis subrotundis lævibus nitidis umbilicatis.

Fr. l. c. p. 384. Pers. syn. p. 40. t. 2 f. 3.

Hab. in ramis emortuis Sorbi Nordlandiæ rarius.

Icon Personii versus apicem nimis angustata et ostiola in mea obtusa. Discus minutus, epidermide rupta. Subiculum haud observavi. Linea nigra circumscribens late effusa usque ad lignum penetrat. Fibræ corticis Sphæriam penetrant.

**1445 SPHÆRIA leucostoma:** subconica, stromate corticali in conceptaculo arcte inclusa, disco truncato albo, poris nigrescentibus perforata.

Fr. l. c. p. 387. NE. f. 332. Pers. syn. p. 39.

*Cytispora rubescens* Fr. l. c. p. 542 (juniior).

Hab. in ramis Populi et Sorbi per Nordlandiam saltensem freqventer.

*Cytisporam rufescem* Fr. ut synon. ad hanc observatione certa nixus referto. In ramulo ejusdem rami, qui totus C. rufescenti tectus erat, omnes fungillos in Sphæriam leucostomam muta-

tos inveni. Ipsa Cytispora qvidem in medio erat immutata, sed intra circuitum conceptaculi sphærulæ circinarunt, ostiolis globosis atris in commuui disco ostiolum magnum Cytisporæ cingentibus. Et forma Sphæroidea et forma Cytisporoidea ut veræ a Cel. Fries agnitæ sunt.

**1446 SPHÆRIA microstoma:** orbicularis, subimmersa, perithecia stromate fulvo corticali inclusa, disco prominente planiusculo, ostiolis minutissimis umbilicatis obtecto.

*S. microstoma* Fr. l. c. p. 388. NE. syst. p. 302. f. 331. Pers. syn. p. 40.

Hab. in ramis emortuis Alni Nordlandiæ e. gr. Saltalen satis freqventer.

Margo conceptaculi subliber. Pustulæ 1 lin. latæ disco minuto nigro ostiolis rugoso epidermidem perrumpunt. Ope lentis modo ostiola umbilicata ut pori exigui papillato-elevato marginata deteguntur.

**1447 SPHÆRIA tessella:** laxe circumscripta, peritheciis circinantibus globosis, ostiolis erumpentibus solitariis determinate distantibus Fr! l. c. p. 393. Pers. syn. p. 48.

Hab. in ramis Salicis phyllicifoliæ et Capreæ per Nordlandiam saltensem.

Perithecia, juniora ostiolis nondum instructa, in stromate mere corticali, attameu saturatius quam cetero cortice colorato, ergo a materia aliena satiato, lineaque nigra flexuosa circumscripta nidulantur. In centro semper adest foramen cinerascens, discum comunem mentiens. Cum epidermis tenuis sit, translucente linea nigra et stromate fulvo ramos pulchris maculis limitatis ornat.

**1448 SPHÆRIA decorticans:** pustulata, peritheciis subdiformibus aggregatis, ostiolis minutis confertis in discum nigrum conjunctis. Fr. l. c. p. 396.

Hab. in cortice Alni incanæ, quem rumpit et elevat, per Nordlandiam saltensem.

Mox dignoscitur pustulis orbicularibus depres-

sis, lineam latis e cortice formatis, sed nigris,  
etsi inferne nulla linea nigra circumscriptis.

**1449 SPHÆRIA clopima:** pustulata, peritheciis  
globosis circinantibus, stromate nullo, ostiolis  
junctis in disco minuto punctiformi. *Fr. l. c.*  
p. 401.

Hab. in ramis emortuis Salicis phylicif. per Nordlan-  
diam saltensem rarius.

Pustulæ plures confertæ. Discus punctiformis  
niger lævis ostiolis minutis lævibus punctatus.

**999 SPHÆRIA ambiens:** *Fr. l. c.* p. 403. *Pers.*  
*syn.* p. 44.

Sp. calvula *Wahlbg. fl. lap.* n. 999, ubi vide.

Hab. in ramis Sal. phylicifoliæ in Saltdalen Nordlan-  
dæ passim copiose

*Melan conium betulinum*. *Fr! exs.* n. 199 nil nisi  
Sphæria hujus familiæ junior in evolutione retenta.

**1002 SPHÆRIA pulchella** *Fr. l. c.* p. 406. *Pers.*  
*syn.* p. 43.

Sp. pusilla *Wahlbg. fl. lap.* n. 1002, ubi vide,  
excluso *syn.* Personii.

**1450 SPHÆRIA vasculosa:** circinans, peritheciis  
subovatis, ostiolis longis apice incrassatis in dis-  
cum opacum transversim erumpentem junctis.  
*Fr. l. c.* p. 408.

Re vera S. pulchellæ affinis, sed disci aterri-  
mi angusti, transversim erumpentes, epidermi-  
dem cingentem vix excedentes hanc mox notam  
reddunt.

**1451 SPHÆRIA coccinea:** cæspitosa, stromate  
elevato pallescente, peritheciis subovatis lævibus  
coccineis, ostiolo verrucæformi applanato pertuso.  
Sp. coccinea *NE. syst.* p. 300 t. 328.

? Sp. coccinea *Fr. l. c.* p. 412?

Hab. in cortice Alni nuper emortuæ Saltdalen Nord-  
landiæ.

Iconi et descriptioni NE. optime convenit,  
sed ob formam ostioli de *syn.* Friesii incertus  
sum.

**1452 SPHÆRIA Cucurbitula:** cæspitosa, peritheciis ovato-globosis lævibus aurantio-rubris collapsis cupulæformibus fuscescentibus, ostiolo obsoletō. *Fr. l. c. p. 415. Pers. syn. p. 53. NE. syst. f. 387.*

Hab. in cortice Pinorum juniorum Saltdalen Nordlandiæ.

Stroma tenue flavidō - rufescens. Perithecia tenacia majora qvam in simili S. decoloranti.

**1453 SPHÆRIA tristis:** peritheciis confertis plano - subglobosis rugulosis collapsis astomis atris, subiculo strigoso insidentibus. *Fr. l. c. p. 444. Pers. syn. p. 87.*

Hab. in cortice Padi sub epidermide soluta Saltdalen Nordlandiæ.

Subiculum Racodium s. Corniculariam decumbentem intertextum refert. Sub lente fila flexuosa ramosissima æqvalia, opaca. Sæpe etiam perithecia sparsa, et tum sine subiculo nuda in cortice.

**1454 SPHÆRIA mutabilis:** peritheciis subglobosis tomento virescenti-ferrugineo tectis ostiolo subpapillæformi nigrescente. *Fr. syst. p. 447. Pers. syn. p. 72.*

Hab. in ligno putrido Alni Saltdalen Nordlandiæ.

Si tomentum excipias, perithecia semine Papaveris vix majora.

**1455 SPHÆRIA decolorans:** gregaria s. cæspitosa, stromate spurio, peritheciis globosis tuberculatourgos cinnabarini decolorantibus.

Sp. decolorans *Pers. syn. p. 49.*

Sp. cinnabarina *Fr. syst. p. 412.*

Hab. in stipite Tubiculariæ vulgaris parasitica in ramis Ribis rubri nec non Padi per Nordlandiam saltensem freqventer.

Observationibus certis persvasus hanc ad Simplices refero. Stroma sic dictum nil aliud qvam stipes Tubiculariæ, cuius hymenium excludit, sed nunquam in hymenio hospitatur. Perithecia fragilia, qvare collabescendo mox rupta et Peziarum more gelatinâ evacuatâ cava.

**1456 SPHÆRIA pomiformis:** minor, atra, peritheciis confertis globosis lævibus circa ostiolum papillæforme impressis, demum rupta pezizoidea. S. pomiformis *Fr. syst.* 2 p. 455. *Pers. t. syn.* p. 65.

Hab. in ligno betulino putrescente Saltdalen Nordlandiæ.

**1457 SPHÆRIA obducens:** subsparsa, minor, atra, peritheciis ovato-rotundatis subdiformibus rigidis, ostiolo subpapillæformi obsoleto.

? S. obducens *Fr. syst.* 2 p. 456.

Hab. in ligno putrescente ad Arfisjaure Lapponiæ pictensis.

Perithecia sparsa rotundata subdiformia convexa opaca rugulosa, arcte adnata intus albo-farcta, rigida nec collabentia nec depressa. Ostiolum obsoletissimum. Lecideam atrocarpam ecrustaceam habitu magis quam Sphæriæ speciem refert.

**1458 SPHÆRIA pulveracea:** conferta, minuta, atra, peritheciis subovatis rigidis nitidulis, ostiolo distincto pertuso.

Sp. pulveracea *Fr! syst.* 2 p. 459. *Pers. syn.* p. 83.

Hab. in ligno Populi putrescente Saltdalen Nordlandiæ.

Minutie — S. pulvispyrio dimidio minor — superficie lævi sed inæqvabili, ostiolo subconico etsi obsoleto, et peritheciis rigidis, sæpe ruptis dignoscitur.

**1459 SPHÆRIA obliquata:** (*Denudata*) conferta, atra, peritheciis globoso-conicis in ostiolum acutiusculum desinentibus, lævibus, lateri adnatis.

Hab. in squamis infra superficiem externam strobilorum nuper exsiccatorum Pini sylvestris per Nordlandiam inferalpinam saltensem rarius.

Etiam a Cell. Friis ut nova species agnita. Minuta, simplex, peritheciis pyriformi-conicis, nitidis. Memorabilis est situ sphærularum, cum latere non basi affixæ sint, qva ex re tota stirps quasi obliquata et adscendens fit.

**1460 SPHÆRIA moriformis:** conferta, nigra, peritheciis obovatis, corrugato-tuberculatis.

Sp. moriformis *Fr. syst.* 2 p. 458. *Pers. syn.*  
p. 86.

Hab. in truncis decorticatis Populi Saltdalen Nordlandiæ rarissime.

Subdeformis, seminis Sinapios magnitudine,  
rugulosa et corrugata, non vero rimosa.

**1005 SPHÆRIA pulvispyrius Whlbg. fl. lap. n. 1005.**

Hab. in truncis radicibusque decorticatis Alni per  
Nordlandiam saltensem freqventer.

**1461 SPHÆRIA myriocarpa:** conferta, atra, nitida,  
peritheciis minimis globosis lævibus astomis  
*Fr! syst.* p. 459.

Sp. atomus *Schum. sæll.* 2 p. 158.

Hab. in cortice putrido Padi Saltdalen Nordlandiæ.

Minutie, lævitie et ætate collabescendo mox  
dignoscitur. Ostium obsoletum, mox deciduum  
pertusum.

**1462 SPHÆRIA sordaria:** subemergens, gregaria,  
atra, peritheciis globosis mollibus collabentibus  
rugulosis cum ostiolo obsoleto confluentibus *Fr!*  
*syst.* 2 p. 458. *exs. n.* 270!

Hab. in lignis vetustis humidis Saltdalen Nordlandiæ  
passim.

Optime describit Cl. Fries l. c., sed male ad  
*Denudatas* refert, cum inter Pertusas recenseri  
deberet.

**1463 SPHÆRIA curta:** gregaria, peritheciis pro-  
minulis rugulosis conico-globosis sordide nigris,  
ostiolo brevi compresso linearis *Fr. syst.* 2 p. 470.

Hab. in ramis exsiccatis Salicis phylicifoliæ Saltdalen  
Nordlandiæ.

Lignum, in quo nidulant, quodque conice ele-  
vant, cinerascit. Juniores totæ innatæ, ostiolo  
nitente saepe acuto ut ad Platystomas vix refera-  
tur, sed dein latius lineare labiis clausis evadit.

**1464 SPHÆRIA barbara:** sparsa, peritheciis emer-  
sis elongato-globosis cinereo-nigricantibus, rima  
transversali fissis.

Sp. barbara *Fr. syst.* 2 p. 468.

*Hysterium cinereum Pers. syn.* p. 99.

Hab. in ramis decorticatis siccis Populi Saltdalen Nordlandiæ.

Paradoxa Sphæria. Labii subturgidis Hystericum satis æmulat, sed forma oblonga (in altitudinem) rotundata Sphæriæ est. Magnitudine fere seminis Cannabis, in ligno destructo aliquantulum immersa, et ab ejus fibrillis dissolutis quasi contaminata, quare sæpe albescunt. Gelatina firma subcarnosa albida. Ostium conicum nuncquam mihi sese obtulit.

**1465 SPHÆRIA pilifera:** gregaria, nuda, atra, peritheciis minimis globosis lævibus, ostio longissimo acuminato. *Fr. syst.* 2. p. 472. *Sp. dryinæ var. Pers. syn.* p. 58. *NE. syst.* 1. 354. B.

*Sp. rostrata Schum. sæll.* 2 p. 155.

Hab. in ligno fisso humido pineo, rariusque in ramis siccatis Pinorum Saltdalen Nordlandiæ.

Stirps subtilissima. Perithecia tertiam partem seminis papaveris magnitudine æqvat. Mucedine nigrescente loca, in quibus crescit, subiecta sunt.

**1466 SPHÆRIA rostrata:** gregaria, emergens, atra, peritheciis globosis rugosis, ostio longissimo inæqvabili acuto.

*Sp. rostrata Fr. syst.* 2 p. 473. *Pers. syn.* p. 58. *Tode meckl.* p. 14. t. 9 f. 79.

Hab. in ligno subcarioso per Nordlandiam saltensem passim.

Initio ligno immersa, rostris prodeuntibus modo manifesta. Hac re nec non rostris obtusioribus, torulosis, peritheciis majoribus a priori satis diversa. Perithecia demum tota emersa.

**1467 SPHÆRIA hæmatorhynca:** (*Ceratostoma*) gregaria, emergens, atra, peritheciis minutis globosis lævibus, ostio longissimo inæqvabili subclavato, sub apice sangvineo pruinoso.

Hab. in ligno Salicis Capreæ aeri exposito Saltdalen Nordlandiæ rarius & in parva copia.

Lignum, in quo sedit, rufescit. *Sp. rostratae proxime adstat, attamen rostro longiore, apice incrassato pruinoso satis distincta. Faciem Calicis apothecio subcylindrico iudit.*

**1468 SPHÆRIA astroidea:** gregaria, peritheciis immersis globosis, ostiolis superficialibus magnis radiato-sulcatis.

Sp. *astroidea* Fr. syst. 2 p. 478.

Hab. in Nordlandia saltensi truncos decorticatos Sorbi incrustans.

Lignum haud elevant etsi nigricant perithecia creberrima gelatina nigrescenti-olivacea, attamen sicca intus alba. Ostiolis non conicis sulcatis, sed a juventute astroideis a Sp. *entypa* b Fr. differt.

**1469 SPHÆRIA eutypa:** sparsa, peritheciis immersis globosis, ostiolis in ligno fuscescente prominulis conicis sulcatis.

Sp. *eutypa* b Fr. syst. 2 p. 478.

Sp. *operculata* b. Pers. syn. p. 80.

Hab. in ligno putrescente truncorum Populi Saltdalen Nordlandiæ.

Gregaria, sed perithecia remota lignum intermedii quasi devastant fuscumque reddunt. Sphærulae semine Papaveris minores.

**1470 SPHÆRIA livida & grisea,** sparsa, peritheciis subglobosis in tuberculo ligneo prominente elliptico griseo nidulantibus, ostiolo pertuso. Fr. syst. 2. p. 479.

Hab. in ramis aridis decorticatis Salicis Capreæ & pentandræ.

Optime describit Cel. Fries hunc eximum fungum: "In ligno, cui innascitur, macula elongata, subdeterminata albida s. canescens. Perithecia tenuia tuberculo ligneo admodum regulari elliptico,  $1\frac{1}{2}$  lin. longo, demum supra ligni superficiem toto elevato undique cincta."

**1471 SPHÆRIA anserina:** gregaria, peritheciis ovatis immersis cum ligno prominulis, ostiolis erumpentibus papillato-teretibus. Pers. syn. p. XVII.

Hab. in truncis cariosis decorticatis populinis Saltdalen Nordlandiæ.

A Sp. *eutypa* sphærulis lignum nigricans quoque clevantibus, ostiolis cylindricis acutis læ-

vibus differt. Cutem colliculosam anserinam optimè refert.

- 1472 SPHÆRIA *decedens*:** gregaria, peritheciis globosis immersis nigris, collo subnullo, ostiolis epidermide lacerata erumpentibus distantibus. *S. decedens Fr. syst. 2 p. 481.*  
*S. tessella* β. *decedens Pers. syn. p. 48. NE. syst. p. 307 f. 340.*

Hab. sub epidermide ramorum Populi per Nordlandiam saltensem.

Icon *NE. l. c.*, qvæ sphærulas integras auctas refert, perbona, nam fere sine collo, dum ostiolum crassum brevissimum ex epidermide prorumpit & discum minimum mentitur. Perithecia intus albida, subfarcta, sæpe quasi operculata, lineâ elevata cincta, qvæ forsitan oritur, cum perithecia collabesci incipient. A Sp. *Corticis*, differt, qvod epidermis qvidem immutata sed exasperata est.

- 1473 SPHÆRIA *vibratilis*:** subgregaria, peritheciis tectis integris globosis lævibus, ostiolo subtili latente, demum disco spurio punctiformi epidermidem perrumpente.

? *S. vibratilis Fr. syst. 2 p. 482.*

Hab. sub epidermide ramorum Salicis capreæ Saltalen Nordlandiæ.

Qvando epidermis immutata rumpitur, ei adhærentia observantur perithecia copiosa lævia nigra, seminis Papaveris dimidiæ magnitudinis, mox collabescendo cupulæformia. NB non superiore sed inferiore parte collabescunt. Pauca modo cortici, in quo tamen nuda nidulantur, adhærent. Per epidermidem poro minuto pertusum tandem gelatinam protendunt, qva siccata, discus spurius minutus nigrescens oritur. Ostiolum vix ullum, perithecia modo poro tenuissimo subelevato notata.

- 1474 SPHÆRIA *pinastri*:** peritheciis globosis depresso immersis in ostiolum breve compressum epidermidem perforans productum.

*S. pinastri Fr! syst. 2 p. 488.*

Hab. in foliis dejectis Pini. Vere.

Perithecia in parenchymate foliorum sparsa, superiore parte angustata.

**1475 SPHÆRIA palina:** sparsa, erumpens, sublibera, conica, subrugosa, nigra, poro pertusa, truncata *Fr. syst. 2 p. 494?*

*S. protusæ affinis Fr! exs. n. 311.*

Hab. in ramis salicinæ Saltalen Nordlandiæ.

Interdum perithecia 3—4 aggregata, ut Cæspitosam refert. Perithecia majora quam in eadem specie, quam ex australi Norvegia habeam. Intus subsolida albida.

**1476 SPHÆRIA strobilina:** gregaria, erumpens, peritheciis rotundatis, primo mollibus fuligineis, dein nigris, rima longitudinali subdehiscentibus.

*Fr! syst. 2 p. 495.*

*Hysterium conigenum Pers. syn. p. 102. obs. myc. 1 p. 30.*

Hab. in exteriore pagina strobilorum Pini. Vere.

Minutissima. Quando dissecatur, fundus omnino sphæriæformis, etsi rumpens Hysterium magis æmulatur.

**1477 SPHÆRIA lichenicola** (subtecta) subgregaria, peritheciis subimmersis dein prominulis, minutis, ovatis, lævibus, ostiolo demum depresso.

*Fl dan. t. 955, 1.*

? *Endocarpon athallum Spreng. Entd. 1 p. 217.*

Hab. in apotheciis Lecanoræ salicinæ et erylhrellæ Ach. p. p.

In quoque apothecio perithecia 3—5, primum immersa apice modo prominulo atro, dein ad diuidum nuda, ostiolo convexo, dein collabendo depresso; gelatina albida. Mihi sane Sphæriis quam Lichenibus affinior videtur.

**1478 SPHÆRIA arbuticola:** gregaria, confluens, epidermide nigrescente tecta, peritheciis difformibus nigris astomis, disco demum erumpente opaco. *Fr! syst. 2 p. 500. Sowerby. fung. t. 370. f. 6.*

*Xyloma cupulatum Fr. obs. 2 p. 360 (senilis).*

Hab. in foliis emortuis Arbuti uvæ ursi.

De hac optime Fr. l. c.

**1479 SPHÆRIA xantholeuca:** sparsa, subinnata, peritheciis erumpentibus conico-subrotundis albo-lutescentibus, pilis erectis albis.

*S. xantholeuca Fr. syst. p. 503.*

Hab. in caulibus exsiccatis Urticæ dioicæ verè Salt-dalen Nordlandiæ.

Molliuscula, subpellucida, habitu refert Pezizam eqvinam fl. dan. siccata. Adeo minuta & ob pilos in apice imprimis confertos adeo occulta, ut, an ostiolum vere adsit, certo dicere nequeam.

**1480 SPHÆRIA acuta:** subgregaria, peritheciis orbicularibus subconicis atris nitidis, ostiolo rostellato stricto cylindrico obtuso.

*S. acuta Fr. syst. 2 p. 507. Schum. sæll. 2 p.*

*157. Pers. syn. p. 62.*

Hab. in caulibus plantarum hortensium e. gr. Delphinii, Pisi, Urticæ vere per Nordlandiam saltem freqventer.

Sub epidermide libera, et mox, illa lacerata, nuda. Collabendo planiuscula nunquam vero concava. Basis plana, ut vix globosa dici potest, rectius forsitan compresso-globosa. Ostiola rigida, crassiuscula, peritheciis longitudine, facile diffracata. In volva Geastris quadrifidi modificationem sine dubio hujus speciei ab omni parte minorem, rugosiora meqve inveni. *S. Doliolum* peraffinis unice peritheciis magis conicis, vix unquam depresso, ostiolo breviori differt.

**1481 SPHÆRIA complanata:** sparsa, peritheciis oblongo-globosis lævibus nigris mox collabescendo plano-depressis, ostiolo papillæformi persistente Fr! syst. 2 p. 508. *exs. n. 36.*

*S. herbarum a. complanata Pers. syn. p. 78.*

Hab. in caulibus exsiccatis plantarum majorum ex. gr. Urticæ Nordlandiæ saltensis vere.

Priori triplo minor. Inter hanc et illam intermedia est *S. pisi* Fr., vix ab utraqve diversa.

**1482 SPHÆRIA coniformis:** sparsa, peritheciis globoso-conicis lævibus nitidis atris ostiolo crasso confluente.

*S. coniformis* Fr. syst. 2 p. 508.

Hab. in pericarpiis exsiccatis Pedicularis Sceptri in subalpinis Saltdalen Nordlandiæ.

Vegetatio eadem ac *S. acutæ*; illâ vero minor, dimidiâ seminis Papaveris magnitudinem vix æquans, junior globosa in ostiolum attenuata i. e. conica, ætate proiectior vero circa ostiolum depresso-sculpta globosa ostiolo papillæformi. Nunquam vero collabitur. Gelatina alba, sicca compacta.

**1483 SPHÆRIA Rhinanthe:** gregaria, minor, atra, peritheciis subtectis lævibus orbiculatis concavo-depressis, ostiolo prominente punctiformi.

Hab. in caulis exsiccatis Rhinanthe cristæ galli verè passim.

*Sp. Plinthi* affinis, sed satis distincta: ostiolo manifesto. A *Sp. herbarum* Fr. peritheciis minime globoso-depressis, sed orbiculatis convexis, siccis subcupulæformibus. Sub epidermide latens Pezizam minutulam omnino refert. Cel. Fries, ad quem specimina misi, novam eam agnovit. Icon NE. syst. 242, b, hanc bene sistit.

**1484 SPHÆRIA culmifraga:** sparsa, peritheciis minutissimis tectis erumpentibus subcompressis atris, ostiolo nudo brevi conico. *Fr. syst.* 2. p. 510.

Hab. in culmo Arundinis epigeios Saltdalen Nordlandiæ.

**1485 SPHÆRIA poliota:** peritheciis confertis punctiformibus astomis atris, e macula elongata grisea emergentibus *Fr. syst.* 2 p. 512.

Hab. in caulis exsiccatis Scabiosæ atropurpureæ in hortis Saltdalen Nordlandiæ, vere.

In maculis griseis conferta apparent puncta nigra, primum tecta, dein nuda. Perithecia oblonga, poro vix conspicuo pertusa.

**1486 SPHÆRIA punctiformis:** sparsa, peritheciis innatis punctiformibus lævibus subnitidis nigris prominulis, collabescendo umbilicatis. *Fr. syst.* 2 p. 525. *Schum. sæll.* 2 p. 156. *Pers. syn.* p. 90.

*S. impressa Fr! exs. n. 152.*

Hab. in foliis dejectis Sorbi Aucupariæ, vere.

Modo in pagina superiore folii his locis observavit.

1006 SPHÆRIA *Dematum*: Whlbg. fl. lap. n.

1006 excluso signo interrogationis post synonymum Persoonii.

1007 SPHÆRIA *setacea*: Whlbg. fl. lap. n. 1007,

excluso synonymo Todei et signo interrogationis post synon. Persoonii.

## CYTISPORA.

Fries syst. 2 p. 318.

Celluloso-multilocularis, cellulis difformibus membranaceis apice junctis.

Nucleus gelatinoso-sporulosus, per ostiolum comune elongatum subcirrhose propellitur.

1487 CYTISPORA *chrysosperma*: cellulis in conceptaculo incusis, disco erumpente nigrescente, cirrhis luteis. Fr. syst. 2 p. 542.

Næmaspora chrysosperma Pers. syn. p. 108. Obs. myc. 1 p. 80, t. 5 f. 8.

Hab. in cortice Salicis imprimis S. phylicifoliæ per Nordlandiam saltensem.

Præeunte Cl. Fries hocce genus, Sphæriæ fere nimis affine, retinui. Hæc species Sphæriis incusis adeo accedit, ut difficillime ab eis secernatur, cum & illas cirrhos protendentes interdum observavi. Cfr. quoque annotata ad *Sph. leuostomam*, & NE. syst. p. 303 sub *S. pustulata*.

1488 CYTISPORA *carphosperma*: conceptaculo nullo, cellulis fuscescentibus circinantibus disco sordide pallescente, cirrho albo-lutescente.

C. carphosperma Fr. syst. p. 543.

Hab. in ramulis siccatis Betulæ et Salicis Saltalen Nordlandiæ.

Pustulæ orbiculatæ depressæ in cortice interiore nidulantes, stromate ceraceo tegente dis-

cum erumpentem rotundum fingunt. Memorabilis est totius fungilli efformatio: primum in macula alba byssina cernitur tuberculum sclerotioideum læve nitens flavescentia, dein nigrum. Hac crescente sub ambitu ejus byssino efformantur perithecia, qvæ dein tuberculum in discum ea tegentem subambientemque elevant, qva re illud pallescit, et tomentosioris substantiæ fieri videtur. Sphærulas discretas in hac specie detegere non potui.

**1489 CYTISPORA fugax:** conceptaculo nullo, cellulis atris circinantibus, disco plano cinereo perforato, cirrhis pallidis.

C. fugax. *Fr. syst.* 2 p. 544.

Sphæria pustulata *NE. syst.* p. 303 f. 334. *Pers. syn.* p. 41.

Præcedenti proxima accedit. Cellula modo una magna gelatinâ lactea opaca copiose referta. In medio est ostiolum commune, etsi vix cum gelatina conjuncta est, discum perforans.

## PHOMA.

Fries *syst.* 2 p. 546.

Nucleus grumosus in tuberculo a matrici formato inclusus, demum ore simplici pertuso sporidiisqve rejectis evacuatus.

**1490 PHOMA salignum:** unilocularis, subrotunda convexa fusco-nigra, centro subumbonato.

Ph. saligna *Fr. syst.* 2 p. 546.

Xyloma saligna *Pers. syn.* p. 106.

β. *populi:* ferrugineo-fusca.

Ph. Populi *Fr. syst.* 2 p. 547. *Obs.* 2 p. 321. *Sowerby fung.* t. 374 f. 2.

Hab. α. in foliis Salicis phylicifoliæ et β. in foliis Populi vere passim.

Merdas muscarias in foliis fungilli hi tenues referunt. Pustulæ orbiculares, sed pluribus confluentibus angulatæ, intus albidae. De cætero præter colorem utræque varietates ab omni par-

te omnino similes, sc. umbonatæ, simo subpapillatæ. Multilocularem nunquam reperi pustulam, qvæ epidermide folii tecta nitet, alias opaca.

## DOTHIDEA.

Fries syst. p. 548.

Cellulæ in stromate immersæ, subrotundæ, nucleo cereo farctæ, demum ore simplici apertæ, absqve proprio perithecio.

**1491 DOTHIDEA moriformis:** nuda, superficialis, subglobosa, tuberculata, nigra intus cornea fuscescens (obsolete cellulosa).

D. moriformis Fr! syst. p. 549. Ach. syn. lich. (Arthonia) p. 5. D. gibberulosa Fr. obs. 2 p. 349, t. 5 f. 5.

Hab. in caudicibus putrescentibus decorticatis pineis per Nordlandiam saltensem.

Auctoritate Cl. Friesii permotus ad hoc genus, a qvo mihi omnino aliena videtur, retuli, nam nunquam cellulas videre mihi contigit, sed substantia similaris tenax sese obtulit. Primum prorumpit ut apothecium Lecideæ; convexiuscula, livido-fusca, læviuscula, sed madida omnino mollis, subpellucida. Dein magis magisque convexa, rugulosa et fusca evadit usqve dum omnino nigra et tuberculata fit. Interdum qvasi rore cæsio pruinosa.

**1492 DOTHIDEA Ribesia:** erumpens, elliptica, depressa, nigra, cellulis minimis periphericis albis. Fr. syst. 2 p. 550.

Sphæria Ribesia. Pers. syn. p. 14. in Usteri bot. Anal. 11 p. 24. NE. syst. f. 312.

Hab. in ramis emortuis Ribis rubri per Nordlandiam saltensem freqventer.

Atra, opaca, disco longitudinaliter subcanaliculata, ex ostiolis prominulis sub lente granulata,

**1493 DOTHIDEA Lichenum:** erumpens, subrotunda, planiuscula, rugulosa, atra, a matrice marginata, cellulis subimmersis albidis.

Sticta pulmonacea b. pleurocarpa (apothecia) Ach.  
syn. p. 233. lich. un. p. 450.

Hab. in thallo Stictæ pulmonaceæ, Gyrophoræ arcticæ nec non Cenomycidum Saltdalen Nordlandiæ frequenter.

Hæcce stirps qvam Lichenem parasiticum habet Cl. Flörke (Liefr.) et Pezizam Cl. Fries (lich. exs. n. 131) vix ad aliud genus referri potest. Si transversini dissecatur, sub superficie rugulosa subrimosa atra stratum apparet albidum, quod sub lente composito visum cellulas rotundas subcohærentes, ex ascis tenuissimis subclavatis paraphysibusqve constantes exhibet. Substantia nigra madida grumosa, sicca dura, cornea. Evolutio stirpis eam nec Lichenem nec Pezizam esse demonstrat. Ut maculæ deustæ minutæ primum sub epidermide prorumpunt. In Gyrophoris epidermidem ut pustulas magnitudine semi-nis Viciæ sæpe evehunt; dein discum formantes ab epidermide thalli more Lecanorarum marginati magis procedunt.

**1014 DOTHIDEA pyrenophora:** Fr. syst. 2.  
p. 552.

Hysterium Sorbi Whlbg. fl. lap. n. 1014, ubi vide.

Hab. non solum ad ramos Sorbi sed etiam tenellis Salicis phylicifoliæ per Nordlandiam frequentissime.

His locis nunquam occurrit cellula centralia atra, sed sive intus alba, sive linea atra i. e. cellula sterili notata.

**1494 DOTHIDEA typhina:** culmos ambiens, albida, mox fulva, ex ostiolis citrino-granulosa.

D. typhina Fr. syst. 2. p. 553.

Sphaeria typhina Pers. syn. p. 29. Schum. sœll. 2 p. 162. NE. syst. 1. 314.

Hab. in vaginis culmorum Tritici canini Saltdalen Nordlandiæ.

Peritheciis subevolutis hocce genus cum veris Sphaeriis conjungit.

- 997 DOTHIDEA *fulva* Fr. syst. 2 p. 554.  
Polystigma aurantiacum Pers. myc. eur. t. 5 f. 1.  
Sphaeria ochracea Whlbg. fl. lap. n. 997. (excluso synon. Persoonii), ubi vide.

- 996 DOTHIDEA *betulina*: Fr. syst. 2 p. 555.  
Sphaeria Betulæ nanæ Whlbg. fl. lap. n. 996. t. 30 f. 3, ubi vide.  
Hab. in foliis Betulæ nanæ per alpes Nordlandiæ saltensis minime rara.  
Hujus generis species.

- 1495 DOTHIDEA *Epilobii*: macula ambiente laevigata uniformi picea, cellulis sparsis prominulis. Fr. syst. 2 p. 559.  
Hab. in caule Epilobii angustifolii verè in Saltdalen Nordlandiæ.

Maculæ difformes determinatæ 3—4 lin. longæ tenuissimæ absqve radiis. Cellulæ minutæ læves demum apice depressæ. Si transversim sectæ vitro composito subjiciuntur, ex ascis s. cellulis compositæ cernuntur. Adsunt etiam perithecia hisce similia in interstitiis caulis non nigro coloratis, globosa, astoma, collabendo depresso, de qvibus dubius an hujus loci, an *Sphaeria disseminata* Fr. sint.

- 1015 XYLOMA *salicinum* Whlbg. fl. lap. n. 1015.

Etiam forma vulgaris major in foliis Salicis Capreæ & phyllicifoliæ per Nordlandiam occurrit. Forma minor qvoqve in foliis Salicis herbaceæ observatur.

- 1016 XYLOMA *Andromedæ* Whlbg. fl. lap. n. 1016.

Errat Cl. Wahlenberg dicendo: intus aterrimum sine ulla basi discolori, nam si vigens vel madefactum dissecatur, basis alba substrata statim appareat. Hac vero etiam clarus patet, si rite evolutum et maturum reperitur, cum sc. per ru-

gas dirrumpit, et rimæ validæ labyrinthiformes massa alba subgelatinosa repletæ patent. Peritherium nigrum tenue veram indolem tum quoque manifestat.

**1496 XYLOMA Empetri:** gregarium, minus, subrotundum, nitens, tenue, atrum, costatum, dein per costas subrimose ruptum.

X. Empetri Fr. obs. 2 p. 363.

Hab. in foliis vivis et marcescentibus Empetri per Saltdalen Nordlandiæ inferalpinæ.

Ordine in utroque latere nervi paginæ superioris folii proveniunt. Primum laxe, dein costatum, modo simpliciter hysteriforme, modo frustulatim xylomoideum (rhytismoideum) ruptum. Sæpe minutulum X. Andromedæ refert. Sphaeræ species minime est, ut de ignota stirpe autumat Cl. Fr. syst. 2 p. 522. Si non Rhyisma s. Xyloma, tum inter Phacidia summo jure seponitur.

## PHACIDIUM.

Fries syst. 2 p. 371.

Peritheciū sessile subrotundum, primo clausum, dein dehiscens a centro versus ambitū in laciniis plures a nucleo disciformi discreto.

**1497 PHACIDIUM Pini:** erumpens, subhemisphæricum, nigrum, peritheciū laciniis obtusis, discous fuligineo.

P. Pini Fr. syst. 2 p. 573.

Hysterium valvatum NE. syst. f. 399 bona.

Hab. ad corticem Juniperi et ramorum Pini.

In ramis sparsum Pezizam minutam refert. Vix seminis cannabini magnitudine æquans. Discus carnosus albido-virescens mox siccatur, et madefactione minime reviviscit, sed modo gelatina nigrescente subresidua sese manifestat.

**1011 HYSTERIUM elongatum:** Whlbg. fl. lap. n. 1011.

In ligno putrescente hujus perithecia in crusta subiculo tomentoso nigro innata inveni. Hæc, rarerius ramo unicō ornata, sed flexuosa et curvata, qualia etiam in vulgari *H. elongato*, sine ullo dubio eadem stirps ac *H. graphicum*, Fr. syst. 2 p. 581. Cum vero subicum heterogeneum aliquid sit, discrimen ab *H. elongato* nullum invenio.

**1498 HYSTERIUM biforme:** innato-superficiale, elongatum et oblongum, subflexuosum, atrum, labiis laevibus conniventibus, disco linearis.

*H. biforme*, Fr. syst. 2 p. 582. Obs. 2 p. 354.  
Hab. in lignis pineis resinosis per Lapponiam pitem et semet Nordlandiam saltensem.

*H. pulicari* nimis sere similis. Differre modicū videtur: peritheciis subflexuosis et variæ magnitudinis, nam nonnulla 1—2 lin., alia omnino sphæroidea, et alia inter utraqve intermedia ova-ta acuta, omnia subdepressa; labiis conniventibus et rimose dehiscentibus, laevibus qvidem, sed subtilissime striatis. Basi sane innata; qvin etiam suberumpentia.

**1499 HYSTERIUM acuminatum:** subimmersum atrum, peritheciis rectis discoque corneo linearilanceolatis acuminatis, labiis tenuibus prominulis  
Fr. syst. 2. p. 582. Pers. myc. eur. t. I. f. 3, 4.  
Hab. in ramis siccis decorticatis s. cortice subdestructo Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Linearilanceolatum, angustum, vix dimidiæ latitudinis *H. elongati*, cui alias affine, acuminatum, 1+1½ lin. longum; labiis subconniventibus, dein dehiscentibus et medio distantibus.

**1500 HYSTERIUM aggregatum:** aggregatum, pusillum, subparallelum, oblongum, compressum, laeve atrum, subclausum.  
*H. aggregatum* Decand. fl. fr. 6 p. 168 e Fr. syst. 2 p. 583.

Hab. in caudicibus decorticatis putrescentibus Pini Saltdalen Nordlandiæ.

Descriptione l. c. nil convenientius: "nudo oculo refert maculas atras irregulares 2—3 lin. longas, sublente e peritheciis pereignis, con-

vexit secundum ligni fibras dispositis, compositas." Perithecia saepe connata s. divisa, stellulas 5—4 radiatas efformantia, imprimis ubi magis disperse crescit, quasi in aggregatione spatium ad evolutionem perfectissimam deficeret.

**1501 HYSTERIUM pinastri:** epiphyllum, innatum, ovali-oblongum, lave, nigricans, ore aperto, disco nigricante.

*H. pinastri* Fr. syst. 2 p. 587. Pers. syn. p. XXVIII. Schum. säll. 2 p. 152.

Hab. in foliis exsiccatis Pini freqventer et Juniperi rarius per Nordlandiam.

Perithecia crista nigra prominentia lineis rectis nigris folia dividentibus circumscripta. Folia pinea alias exsiccando fulvescentia s. rufescens, his parasitis obsita albescunt.

**1502 HYSTERIUM arundinaceum:** innatum, ovale, depresso, opacum, fusco-nigrum, rima longitudinali demum hians. Fr. syst. 2 p. 590. Pers. syn. p. XXVIII.

Hab. in culmis Arundinis Phragmitis per Lapponiā pitensem.

**1503 HYSTERIUM xylomoides:** epiphyllum, innatum, sparsum, ellipticum obtusum tumidulum, lave, nitidum, atrum, rima longitudinali depresso.

*Hypoderma xylomoides* De Cand. fl. fr. 6 p. 164. e Fr. syst. 2 p. 592 (*Hysterium foliicolum*).

*Xyloma Hysterooides* Pers. syn. p. 106.

*Phoma sorbinum* Somrf. diar. Ms.

Hab. in foliis Sorbi imprimis ad rachidem, vere, per Nordlandiam.

Si quis hanc speciem ad novum genus *Phoma* retulerit, vix magnopere errat. Perithecia levissima, nitida si vigeat, tumidula et linea longitudinali, mihi vero semper clausa, notata; sicca delabuntur, concava, linea vix manifesta. Nomen antiquius et convenientius Decandollii restituendum credidi.

**1504 ASTEROMA Padi** De Cand. sec Fries! syst. 2 p. 602.

*Tubercula subglobosa fuscescentia innata fibrillis innatis radiata.*

Hab. in foliis Padi vigentibus Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Stirps dubia. *Tubercula minuta punctiformia; fibrilli radiantes basi confluentes maculas siccas unciales s. semiunciales in foliis efficiunt. Est quasi Erysiphes species innata.*

## CÆOMA

Nees Esenbeck system p. 11, f. 1—13.

\* *Æcidium Pers.*

**1505 CÆOMA Pini:** sparsum, peridiis elongatis subcompressis incarnatis, ore lacero, sporidiis aurantiacis.

*C. Pini NE. syst. p. 13, f. 4 opt.*

*Æcidium Pini Schum. säll. 2 p. 226.*

Hab. in foliis Abietis ad Arjeplog Lapponiæ pitensis autumno.

**1506 CÆOMA grande:** sparsum, magnum, peridiis saccatis oblongis albidis irregulariter rumpentibus, sporidiis aurantiacis ovatis.

*Æcidium Pini Willd. in mag. bot. 2 p. 16. Pers. syn. p. 213.*

Hab. in ramis Pini sylvestris Saltdalen Nordlandiæ vere.

Vix cum priori conjungi debet; quintuplo enim grandius, nec ita compressum. Latere passim rumpitur; ore regulari nunquam legi. Peridia usque ad 3 lineas longa, apice rotundata e corice prorumpunt. Synonymon Persoonii sine dubio et ad hoc & ad prius pertinet.

**1507 CÆOMA? columellatum:** sparsum, peridiis flavo-aurantiacis basi pallidis primo convexis, deinde truncatis, membranula tenuissima vel partim vel tota evanescente tectis, columella compacta cylindrica truncata aurantiaca, interstitio inter hanc et peridium pulvere grumoso subcitrino repleto *Schum. säll. 2 p. 226 (Æcidium).*

Hab. in foliis vivis Rubi idæi Saltdalen Nordlandiæ aestate rarius copiose.

Vix hujus generis. Forsan *Dermosporii* (Link) sp. Semel id modo legi, nec tum internæ structuræ sub lentibus compositis explorandæ occasio mihi erat. Sporidia subrotunda simplicia. Peridiæ solitaria.  $\frac{1}{2}$  lin. lata.

**1508 CÆOMA Tragopogi:** sparsum, peridiis subellipticis hemisphæricis luteis, dein ore lacinato-crenulato albo, sporidiis flavis.

Æcidium *Tragopogi* Pers. syn. p. 211. Schum. sæll. 2 p. 225. Whlbg. ups. n. 1142.

Hab. in foliis Crepidis tectorum Nordlandiæ saltensis.

**1509 CÆOMA Tussilaginis:** peridiis circinnatis in macula purpurascente - flava immersis pallescenti - virescentibus, ore laciniato, laciñis rotundatis, sporidiis aurantiacis.

Æ. *Tussilaginis* Pers. syn. p. 209. Schum. sæll. 2. p. 225. *Lycoperdon epiphyllum* Lin. fl. sv. n. 1275.  
β. *Taraxaci*, minor.

Hab. in foliis *Tussilaginis* Farsfaræ et Leontodo *Taraxaci* Nordlandiæ saltensis.

**1510 CÆOMA mammillatum:** peridiis circinnatis in macula elevata pallida immersis mammillatis flavis, dein cupulæformibus pallidis ore crenato, sporidiis flavis.

β. *Actææ*, minor.

Hab. in foliis Aconiti septentrionalis et *Aconiti* spicatae Nordlandiæ saltensis.

A priori differt peridiis magis exsertis, macula nunquam violacea, sporidiis pallidioribus.

**1511 CÆOMA Thalictri:** peridiis congestis in macula cærulescente immersis globosis flavis, dein cupulæformibus, ore crenato albo, sporidiis aurantiacis.

Poulsen it. island. in Nat. Selsk. Sk. 5, 1 p. 179.

Hab. in foliis et petiolis *Thalictri alpini* Nordlandiæ.  
\*\* *Uredo Pers.*

**1512 CÆOMA Alchemillæ:** peridiis oblongo-linearibus subparallelis flavo-virescentibus, demum ruptis persistentibus, sporidiis aurantiacis.

*Uredo Alchemillæ Pers. syn. p. 215. Schum. säll. 2 p. 227. Fl. dan. t. 1436. Whlbg. ups. n. 1143.*

Hab. in foliis Alchemillæ vulgaris et Rubi saxatilis, cæteris semper minoribus in Saltdalen Nordlandiæ.

**1513 CÆOMA Ulmariæ:** peridiis effusis pallentibus, dein ruptis, sporidiis aurantiacis.

*Uredo Ulmariæ Schum. säll. 2 p. 227.*

Hab. in foliis petiolisqye Spirææ Ulmariæ Nordlandiæ saltensis.

Magnitudine et forma irregulari effusa imprimis a priori differt.

**1514 CÆOMA Saxifragæ:** peridiis discretis ovatis elevatis virente-pallidis demum ruptis, sporidiis aurantiaco-flavis subrotundis.

? *U. Euphorbiæ Pers. syn. p. 215.*

Hab. in foliis Saxifragæ aizoidis Saltdalen Nordlandiæ æstate.

**1515 CÆOMA farinosum:** peridiis subrotundis confluentibus, sporidiis ochraceo-flavescensibus.

*U. farinosa Pers. syn. p. 217. Schum. säll. 2 p. 228.*

Hab. in foliis salicinis, qvin etiam Salicis herbaceæ Nordlandiæ saltensis.

**1516 CÆOMA alneum:** subcorticale, bullatum, varie effusum, sporidiis cinnamomeis rotundis.

*Uredo alnea Pers. disp. meth. p.*

Hab. sub epidermide Alnorum Nordlandiæ.

**1517 CÆOMA candidum:** peridiis variis effusis subclausis albis, sporidiis candidis orbicularibus NE. syst. p. 15. f. 8.

*U. candida a. Pers. syn. p. 223. Schum. säll. 2 p. 234.*

Hab. in foliis Cochleariae Armoraciæ Nordlandiæ.

**1518 CÆOMA carpophilum:** peridiis effusis albescensibus, sporidiis angulatis nigris.

*U. carpophila Schum. säll. 2 p. 234.*

*U. caricis Pers. syn. p. 225. Fl. dan. 1457,1.*

Hab. in capsulis Caricum imprimis digitatae et panicæ per Nordlandianam.

Sporidiis majusculis angulatis sub vitro olivaceis a sequenti differt.

**1519 CÆOMA Hydropiperis:** peridiis effusis medio ruptis albidis, sporidiis nigrescenti-purpureis rotundis.

Uredo *Hydropiperis Schum.* säll. 2 p. 234.

Hab. in fructibus *Polygoni vivipari* per Nordlandiam.

Peridium medio ruptum saepe ut pileus residet. Rudimenta fructus saepe 4 columnas efformant. Sporidia minutissima sub vitro nigrella hoc a *C. utriculoso NE.* distingvunt.

**1520 CÆOMA cinctum:** peridiis sparsis ovatis rotundisqve elevatis demum ruptis persistentibus, sporidiis cinnamomeis ovatis apice acutis.

*C. cinctum NE. syst. p. 15 f. 9.*

*U. Betæ Pers. syn. p. 220.*

Hab. in pagina supina ad nervum foliorum *Polygoni vivipari* Nordlandiæ freqventer.

Peridia lineam lata sunt.

**1020 CÆOMA appendiculatum:** peridiis confertis parvis rotundis lividis, dein ruptis subcupulatis, sporidiis umbrinis pyriformibus pedicellatis, pedicello subbreviore.

*C. Phaseoli NE. syst. p. 16 f. 10.*

*U. appendiculata a. Pers. syn. p. 221.*

Æcidium *Phacæ frigidæ Whlbg. fl. lap. n. 1020.*

*β. Hieracii:* pedicellis sporidiisqve brevioribus.

Uredo *Hieracii Schum.* säll. 2 p. 232.

Hab. in foliis *Phacæ frigidæ & Hieracii murorum & dubii* per Nordlandiam & Lapponiam.

Ob peridia parva, margine persistente subcupulæformia ad Æcidia retulit Cl. Wahlenberg, sed falso, qvod etiam sporidia demonstrant. Var. *β.* forma sporidiorum ad priorem valde accedit, sed totus habitus hujus loci.

\*\*\* *Puccinia Link (Dicæoma NE).*

**1521 CÆOMA Violæ:** peridiis subcircinatis parvis subrotundis umbrinis, dein ruptis, sporidiis brunneo-ferrugineis oblongis medio annulatis utrinqve acutis, pedicello brevissimo.

*Uredo violæ Schum.* sæll. 2 p. 233. *Fl. dan.* t. 1317, 1.

Hab. in foliis Violæ bifloræ, Campanulæ rotundifoliæ & Veronicæ alpinæ per Nordlandiam saltensem.

Si pedicellus non fuerat longior, *Pucciniam Circææ Pers.* crederem.

**1522 CÆOMA Caricis:** peridiis ovatis rotundis-  
ve distinctis pallido-cinereis elevatis, sporidiis  
ferrugineo-badiis oblongis medio constrictis pe-  
dicello longioribus.

*Uredo Caricis Schum.* sæll. 2 p. 231. *Fl. dan.* t. 1317, 2.

Hab. in foliis Caricum e. gr. *C. capillaris* Nordlan-  
diæ saltensis vere.

Per rimam longitudinalem erumpunt. Spori-  
dia in hac et seqventibus compacta, ut digitos  
non inquinent.

**1523 CÆOMA graminis:** peridiis linearibus ele-  
vatis virescentibus, sporidiis ferrugineis nigrisqve  
subturbanatis medio constrictis pedicellum subæ-  
quantibus.

*Uredo graminis Pers. syn.* p. 228. *disp. meth.* t. 3 f. 3.

*U. ferruginea & culmorum Schum.* sæll. 2 p. 230, 233.

Hab. in foliis Tritici canini per Nordlandiam rarius.

**1524 CÆOMA Betonicæ:** peridiis rotundis gre-  
gariis subconfluentibusqve flavescentibus, spori-  
diis umbriuis ovatis acutiusculis infra medium  
annulatis stipite brevi longioribus.

*C. Betonicæ NE. syst.* p. 16 f. 11.

Hab. in foliis petiolisqve Geranii sylvatici per Nord-  
landiam saltensem æstate.

Peridia juniora flava, mox puncto umbrino no-  
tata in macula rubro-flavescente sedent.

**1525 CÆOMA verrucosum:** peridiis gregariis  
subcircinatis subrotundis elevatis, sporidiis com-  
pactis umbrinis oblongis supra medium annulato-  
constrictis, pedicello longiore brevioribus.

*C. verrucosum NE. syst.* p. 16 f. 12.

Hab. in foliis Stellariæ nemorum Saltdalen Nordlan-  
diæ autumno.

Peridiis paulo majoribus obscurius coloratis parum modo ab iconē citato differt. Sporidia sub vitro hyalina.

**1526 CÆOMA Solidaginis:** peridiis subcircinatis distinctis convexis, sporidiis purpureo-umbinis obovatis medio obsolete annulatis, pedicello longiori tenuissimo brevioribus.

? *C. caulincola* NE. syst. p. 16 f. 15.

Hab. in foliis Solidaginis virgaureæ Nordlandiæ aestate.

A *C. caulincola* modo pedicellis longioribus & sporidiis quam in iconē parum brevioribus differt. *C. Betonicæ* simillimum, sed differt peridiis non confluentibus, texturæ multo compactioris nunquam in pulverem sese dissolventis sporidiisqve longe pedicellatis. Sporidia colorata, obsolete annulata, non oblonga pedicello æque longo sed multo tenuiore hoc a *C. verrucoso* distinguunt.

## CONISPORIUM.

Nees Eseinbeck system p. 27 f. 22.

**1527 CONISPORIUM?** *roseum*: sporidiis roseis in glebulas subhemisphæricas collectis.

*Tubicularia rosea* Pers. syn. p. 114.

*Lichen roseus* Schreber .... Fl. dan. t. 1243, 1.

*Sclerotium persicolor* Schum. säll. 2 p. 186.

*Palmella rosea* Lyngb. Hydr. p. 207.

Hab. in Parmeliis tum in arboribus cum in saxis Nordlandiæ saltensis autumno.

Forsan nec hujus generis e descriptione mihi modo noti est, sed ad nullum cæterorum, ad quæ retulerunt auctores, referri potest. Hoc et Palmi, Myosurus ejusdem generis commilito! Substantia omnino similaris e sporidiis minutissimis subglobosis hyalino-roseis, in aqua subgelatinosis constat. Intus albescentem dicit Cl. Lyngbye, sed hoc modo ad basin, si destrui incipit. Omnino superficialis libera est.

## ÆGERITA.

Fries syst. mycolog. 3 p.

- 1528 *ÆGERITA persicina*: peridiis subovatis sub-aggregatis roseis.

*Æ. persicina* Fr! scler. exs. n. 300. (NE. syst. p. 27).

Hab. in thallo Peltidearum subputridarum Nordlandiae saltensis.

Fungillus singulus semine Papaveris triplo minor, sed plerumque plures aggregati. In aqua sporidia proveniunt. Siccata non mutatur.

## TUBERCULARIA.

Pers. syn. p. 111.

- 1529 *TUBERCULARIA vulgaris*: gregaria, hemisphærica, sulcato-rugosa, rubro-incarnata, stipite crasso brevi pallido, intus rubro.

*T. vulgaris* Pers. syn. p. 112. Schum. säll. 2. p. 182.

*Tremella purpurea* Lin. fl. sv. n. 1142.

$\beta.$  *minor*: T. Artemisiæ Schum. säll. 2 p. 183.

Hab. in ramis exsiccatis Ribis rubri & Pruni Padi per Nordlandiam saltensem freqventer;  $\beta$  in caulinis Artemisiæ Abrotani in hortis Saltdalæ.

Var.  $\beta.$  modo minore mole & stipite intus pallidiore paululum differt.

## SPHÆROBOLUS.

Fries syst. 2 p. 509.

- 1530 *SPHÆROBOLUS stellatus*: globosus, flavo-pallescens, ore regulari stellato-dentato. Fr. syst. 2 p. 311. Pers. syn. p. 115. NE. syst. p. 129, f. 122.

*Lycoperdon Carpobolus Lin. sp. pl. p. 1654. Fl. dan. t. 865.*

Hab. in lignis putrescentibus, imprimis ramis, etjam in subalpinis Saltdalen Nordlandlæ.

A vulgari stirpe nihil differt.

## PILOBOLUS.

Fries syst. 2. p. 308.

**1531 PILOBOLUS crystallinus:** utero obovato deorsum stipitiformi, vesicula hemisphærica nigra. *Fr. syst. 2 p. 308. Pers. obs. 1 p. 76. t. 4. f. 9—11. Schum. sæll. 2 p. 188. NE. syst. f. 81. Fl. dan. t. 1080. (opt).*

*Mucor urceolatus Diks. pl. crypt. 1 p. 25, t. 3. β. minor:* utero globoso, stipite elongato filiformi, vesicula punctiformi.

*P. roridus Fr. syst. p. 309. Schum. sæll. 2 p. 188. Hab. α. & β. in fimo suillo et humano Saltdalen Nordlandiæ freqventer.*

Sane nullum discriminem constans inter utrasque varietates contra plerosqve mycologos invenire possum. Est stirps adeo multis mutationibus qvoad formam obnoxia, ut exiguae illæ variationes vix ad speciem condendam sufficient. Vesiculam in utraqve senilem subtus ferrugineam observavi.

## GEASTRUM.

Persoon syn. p. 131. Nees Esenbeck syst. p. 155.

**1532 GEASTRUM quadrifidum:** radio subquadrifido, peridio obconico ventricoso, oris fimbria canescente.

*G. quadrifidum γ. Pers. syn. p. 135. Whlg. fl. upr. 1125.*

Hab. ad terram in juniperetis ad latera montium inferalpinorum Saltdalen Nordlandiae rarissime.

*G. obconicum* nuncupatum volui, si ansa hoc cum var. *a.* Pers. conferendi mihi data fuerat; nam iconibus illius apud Cl. *Esenbeckium* (syst. t. 128) et *Gleditschium* (meth. fung. t. 6) meum adeo dissimile, ut distincta species esse videatur, sc. peridio multo majore, minime a latissima globi basi pedicellato, sed a medio latissimo versus basin sensim attenuato, vere obconico; volva radiis latioribus spadiceis. Semel modo lectum mense Maii, statu decrepito.

**1024 LYCOPERDON Bovista:** magnum, subglobosum, molle, albidum denum fuscescens, subtus plicatum, subsquamulosum. *Whlbg. fl. ups.* n. 1128. *lap.* n. 1024. *Svensk. bot.* t. 294 bona. *Lin. fl. svec.* n. 1280. *lap.* n. 525. *Schum. säll.* 2 p. 190. ? *L. gigantei* var. *Pers. syn.* p. 140.

Hab. in pratis sicciosculis ubique.

Maximum nostrorum ad  $3\frac{1}{2}$  unc. latum, saepe altitudine latior, quare minime obconicum, subcaule, squamis obsoletis, mollibus minutisqve. Vix ullus botanicorum Scandinaviae dubitat, qvin hoc verum *L. Bovista* Lin. sit, sed *L. Bovista* Persoonii mihi differre videtur, forma obconica s. turbinata, squamis latiusculis, et impennis, si icon NE. syst. f. 125 verum Persoonium, a meo omnino alienum, representat.

**1533 LYCOPERDON areolatum:** obconicum umbrino-albidum basi contractum plicatum subcaule tessellatum, verrucis latis acutis mollibus. *L. areolatum* Schæf. *fung.* 4. t. 190 sec. Pers. *L. Bovista* Pers. *syn.* p. 141. NE. *syst.* t. 125. optima.

Hab. in graminosis Nordlandiae saltensis inferalpinæ rarius.

Mole minore, forma obconica s. turbinata, et verrucis amplis confertissimisqve a precedenti satis distinctum. Radiculi breves, vix manifesti. Si synonyma apud Persoonium in *Synopsi & in*

Ols. myc. 1 p. 4. conferas, ipsum de Bovista suo non satis certum fuisse appareat.

**1534 LYCOPERDON saccatum:** peridio subgloboso sublævi, collo contracto plicato, stipiteque longo terefi albido.

L. saccatum Fl. dan. t. 1139. Schum. sæll. 2 p. 189.

L. excipuliforme γ. Pers. syn. p. 144. NE. syst. f. 126.

Hab. in cothibus graminosis Nordlandiæ saltensis rarius. Verrucis minutis obsitum.

**1535 LYCOPERDON umbrinum:** turbinatum, subumbonatum, primo cinereum, dein umbrinum olivaceum, verrucis tenuibus hirtum Pers. syn. p. 147. Usteri an. bot. 11 p. 28.

Hab. in agris subcæspitose Saltdalen Nordlandiæ. Stipes breviusculus, radiculis albis longis. Verrucæ ætate caducæ, quo in statu levitie trironem facile fallit.

**1536 LYCOPERDON perlatum:** cespitosum, peridio ovato acuto, stipiteque longitculo cylindrico albido, verrucis compactis in mucronem portatis deciduis.

L. perlatum Pers. syn. p. 145. Obs. 1 p. 4.

L. gemmatum Schum. sæll. 2 p. 190. Fl. dan. 140.

Hab. in pratis Saltdalen Nordlandiæ passim. Priori major. Verrucæ in icono Fl. danicæ alias bona nimis maguæ. Maturum pallide oliveum.

**1537 LYCOPERDON pyriforme:** cespitosum, minus, pyriforme, umbonatum, umbrino-pallidum, squamuulis tenuissimis radiculis albis longis.

L. pyriforme Pers. syn. p. 148. Schum. sæll. 2 p. 190 Fl. dan. t. 1680, 2 haud bona.

Hab. in arenosis graminosis Saltdalen Nordlandiæ ex. gr. ad Skipperelven Fiskevaag ubi quodannis eodem loco provenit.

Radiculi plurium fungorum connati. Squamu- lae adeo tenues et fugaces ut levigatum fere dici possit. Vix pollicare.

1538 LYCOGALA *conica*: sparsa, conica, matuta fusco-pallescens, nitida.

*L. conica* Pers. syn. p. 159.

Hab. in truncis dejectis decorticatis putridis Populi Saltdalen Nordlandiae rarius.

Nunquam nisi statim decrepito obvenit, sed statim forma exacte conica insignis. Peridium tenacius.

## FULIGO.

Persoon syn. p. 159.

1539 FULIGO *varians*: effusa rotundataque, flavo dein rufa, peridio rugoso fragili, pulvere ferrugineo-fusco, reticulo pallido.

*F. flava et rufa* Pers. syn. p. 161, 159 t. 4. f. 1.

*F. flavescens et rufa* Schum. säll. p. 194.

*Æthalium flavum* NE. f. 92.

*Mucor septicus* Fl. dan. t. 773.

Hab. ad radicem truncorum muscosorum Populorum per Nordlandiam saltensem passim autumno.

Forma varia, effusa et subglobosa, sed nunquam tam minuta, qualem habet icon NE. f. 92. A. Evidenter transitum coloris a citrino ad rufescens-flavum, dein rufescentem et ultimo rufo-ferrugineum, superficie quasi cruentata observavi. Ab initio tota gelatinosa seu rectius cremor lacteus peridio tenuissimo flavo reticuloque intertexto pallido. Mox vero induratur, quo in pulverem ferrugineum abiit cremor, reticulo persistente, quod tamen in grandævo fungo modo ut puncta sparsa apparet. Peridium modo compactius, modo laxius prout citius vel lentius vegetatio peracta sit, quare duas Persooni species distingvi debuisse non credo.

1540 FULIGO *lævis*: hemisphærica, peridio lœvi nitenti pallido, pulvere umbrino.

? *F. lœvis* Pers. syn. p. 160.

Hab. in ligno pineo putrescente Saltdalen Nordlandiae estate raro.

A basi plana hemisphærica ad 2 unc. longa,  $1\frac{1}{2}$  lata, peridio submembranaceo quasi vernicato. Iuvenis pulposa pallescenti-alba. Nondum matura massa interna compacta fibris intertextis. De synomino Persoonii dubius, qvia nunquam basin s. subiculum membranaceum reperi.

## DIDERMA.

Persoon synopsis p. 164.

**1541 DIDERMA umbilicatum:** peridio subglobo-so ruguloso sordide albo nitenti 4 — 5 fido persistenti, subtus umbilicato, columella subhemisphærica, stipite crasso brevi pallescenti-albo, pulvere purpureo-atro.

D. umbilicatum Pers. syn. p. 165.

D. crassipes Schum. säll. 2 p. 196.

Hab. in cortice siccato Sorbi Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Non possum non fungillum Persoonii et Schumacheri conjungere, cum character utriusque in meum optime conveniat. Leangii sp. sec. NE. syst. p. 114. A *Didermate stellaris* differt: columella rutescenti-alba, (non nigra) peridio albo (non fuscescente) laciniis patentibus (non reflexis), stipite crassiore breviore. Peridium sordide album, minime vero cipereum.

**1542 DIDERMA lobatum:** globosum, oblongum s. difformi-lobatum, peridio exteriori farinaceo albo, interiori subtilissimo fuscescente, columella alba oblonga rotundata, pulvere nigro-fusco, stipite fulvescenti.

Didymium lobatum NE. syst. p. 112 f. 104.

Physarum tigrinum? fl. dan. t. 1434.

Hab. in cortice, ramulis, muscis et graminibus Saltdalen Nordlandiæ Octobri passim.

Physaris affinis species. Columella multo tenuioris substantiæ, utpote tatus fungillus, quam in præcedenti. Stipites vere adsunt, sed irregulares submembranacei fulvescentes ex hypothallo

antea fixili, nunc sicco. Columellæ figura secundum figuram peridii. Fili creberrimi a columella radiantes.

**1543 DIDERMA difforme:** sessile, difforme, convexum, lœve, candidum, nitidum, peridio interno cœruleo-pellucido, columella subglobosa, pulvere umbrino.

D. difforme Pers. syn. p. 167.

Hab. in cortice putrido Sorbi Saltdalen Nordlandiæ rarissime.

A priori satis distinctum peridio externo non flocculoso farinaceo, sed submembranaceo fragili nitenti lœvi sed ruguloso. Peridium internum subreticulatum pellucidum, qvare cœruleoscens ob pulverem translucentem.

## PHYSARUM.

Pers. syn. p. 163.

**1544 PHYSARUM congestum:** acaule, congestum, peridiis lœvibus, ut plurimum angulatis, flavescenti-olivaceis, filis liberis, pulvere carneo.

? Ph. contextum Pers. syn. p. 168?

Hab. in ligno et muscis humidis ad domos Saltdalen Nordlandiæ rarissime.

Ob mutuam pressionem peridia subangulata & leviter cohærentia, etsi nullum ligamentum perspicendum est, lœvia, nitentia, molliuscula, non fragilia. Reticulum a peridio liberum, qvare de synynomio dubito et Trichiis affine, sed elastice expansum nunquam vidi.

**1545 PHYSARUM confluens:** gregarium, sessile, album, peridiis depresso-convexis oblongis lœvissimis, capillitio compacto fusco.

P. confluens Pers. syn. p. 169.

Hab. in ligno putrescente abscondito Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Ovula insectorum habitu referunt peridia rigidissima et insignia, qvod modo subconvexa,

minime hemisphærica, forma irregulari, a rotunda ad oblongam et qvidem in lineam elongatam confluentia. Sine dubio obscure cinerea ante maturitatem.

**1546 PHYSARUM bivalve:** compressum, flexuoso, elongato-sinuosum, cinereo-albidum, margine dehiscens. *Pers. syn.* p. 169. *Obs.* 1 p. 6. t. 1 f. 2. *Ust. an. bot.* 15, t. 3 f. 3.

*Reticularia sinuosa Sow. fung.* t. 6. *Bull. champ.* t. 446 f. 3. sec. *Pers.*

Hab. in graminibus in umbrosis circa Fiskevaag Saltdalen Nordlandiæ. Mense Augusti bis lectum.

Adeo diversum, ut nulli alii affine. Valvulae filis rigidis conjunctæ. Pulvis atro-fuscus.

**1547 PHYSARUM botryoides:** peridiis oblongis lœvibus albis glomeratis, stipitibus decumbentibus membranaceis flaccidis subconcretis fulvescentibus, filis albis adnatis.

? *Ph. hyalinum Pers. syn.* p. 170? *Disp. meth?* t. 2 f. 2, 3 minime conveniens.

*β. ovoideum:* peridiis congestis subsessilibus, stipitibus ex hypothallo vix efformatis.

*Ph. ovoideum Schum. sæll.* 2 p. 198.

Hab. in lignis putridis et fungis destructis, ut Polyporo fomentario et Thelephora puteana Saltdalen Nordlandiæ passim autumno.

Nonne hujus loci *Sphaerocarpus utricularis* *Bull. champ.* p. 120, t. 417 f. 1? Contigit mihi totum vegetationis processum hujus fungilli observare. Qvæ viderim nunc exponam. Primum massa fluxilis pulposa ramose divisa lutea gelatinâ hyalinâ involuta, omnino qvæsi vitellus in albumine dissolutus; dein in granula mox sese colligit luteum, et stipites prostrati sese efformare incipiunt; denique granula magis distincta in peridia oblonga sæpe composita (qvæsi 2 s. 3 omnino concreta in uno stipite) et semper in botryn aggregata abeunt. Adhuc ejusdem lutei coloris sunt, sed mox reticulo albo (armato oculo perspecta) obducuntur, intus succo luteo repleta. Nunc maturescendo color a luteo in fuscum, dein in nigrum et tum tandem in cæsio-al-

bum mutatur. Primum rugulosa, dein fere omnino lævia, peridii membrana simplici fragili capillitio adnato albo persistenti et pulvere nigro repleta. Stipites prostrati, qvare peridiorum glomeruli nunquam erecti, sed re vera tenuissimis, ut plurimum coalitis stipitibus solo habitationis affixi. In var.  $\beta$ . peridia ob hypothallum fere ineffectuatum membranam cohærentem efficien-tem sessilia apparent, sed aliud discriminem non adest.

**1548 PHYSARUM columbinum:** peridio globoso fuligineo-chalybeo lævi, stipite brevi concolori.

Ph. columbinum Pers. syn. p. 173. Obs. 1 p. 5.

Hab. iu Jungermanniis mense Octobris per Nordlan-diam saltensem rarius.

Pulvis fuliginosus. Sine dubio ad hoc pertinet *Physarum salicinum Schum.*

**1549 PHYSARUM globosum:** peridio globoso primum atro-fusco, demum cæsio, stipite subula-to fuscescenti-flavo breviusculo.

Ph. globosum Schum. sæll. 2 p. 203?

Hab. in ligno putrido Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Pulvis niger. Fungillus Schumacheri differt for-san: stipite subcylindrico nigro.

**1550 PHYSARUM farinaceum:** peridio globoso cortice tenuissimo farinaceo-villoso cinereo, sti-pite tenui fuscescente.

Ph. farinaceum Pers. syn. p. 174. Fl. dan. t. 1314, 1 (stipite nimis brevi).

Hab. in corticibus et lignis putridis per Nordlandiam saltensem freqventer.

Minus ceteris. Stipes tenuis, attamen basi in-crassatus. Peridio subevanescente capillitium Cibrariam mentiens persistit. Pulvis niger.

## TRICHLIA.

Persoon synopsis p. 176.

**1551 TRICHLIA fallax:** pyriformis, primum ru-bra, dein flavescenti-ænea, peridio inferne cum stipite subuplicato.

*T. fallax Pers. syn.* p. 177. *Obs.* 1 p. 59. t. 3.  
f. 4—5. *NE. syst.* p. 118. t 115. *Schum. säll.* 2  
p. 209.

*Arcyria decipiens Pers. in Usteri anal. bot.*

**Hab.** in lignis putridis alibiique per Nordlandiam saltensem passim frequenter.

Qvoad longitudinem stipitis valde variat modo subsessilis, modo stipite fere lineam longa. Placae ut plurimum at non semper adsunt. Periodii superior pars tenuior et pallidior, mox decadens operculum mentitur. Nuper prorupta alba, dein rufescit. Sporidia ovata.

**1552 TRICHIA nitens:** peridiis congestis sessilibus globosis cinnamomeis, capillitio pulvereoque luteo.

*T. nitens Pers. syn.* p. 180. *NE. syst.* f. 113 B.

*T. favoginea Schum. säll.* 2 p. 207.

**Hab.** in lignis putridis per Nordlandiam saltensem passim.

Gelatina alba, unde oritur hypothallus membranaceus, substrata est. Sporidia angulata, sed vix adeo stellulata, ut ea Cl. *N. Esenbeck* l. c. depinxit.

## ARCYRIA.

*Persoon synopsis* p. 182. *Nees Esenbeck syst.* p. 117.

**1553 ARCYRIA incarnata:** congesta, sordide carnea, ovata, capillitio effuso confluente, stipite brevi.

*A. incarnata Pers. syn.* p. 185. *Obs.* 1 p. 58. t. 5, f. 4, 5.

**Hab.** in Polyporo hirsuto putrescente semel lecta Saltdalen Nordlandiae.

Arctius congesta, dilutius colorata, brevius stipitata forma ovata a sequenti affini dignoscitur.

**1554 ARCYRIA punicea:** gregaria, rubra, peridio conico, capillitio subcylindrico.

*A. punicea Pers. syn.* p. 185. *Schum. säll.* 2 p. 215. *NE. syst.* f. 114. *Whlbg. fl. ups.* n. 1132.

*Fl. dan.* 1364, 2 optim.

*Clathrus denudatus Lin. spec. pl.* p. 1649.

Hab. in trunco putrido Septbr. Saltdalen Nordlandiæ.

**1555 ARCYRIA vermicularis:** cespitosa, peridiis cylindricis flexuosis rubris, capillitio cylindrico longissimo flexuoso rufo, stipitibus elongatis umbrinis subdistinctis.

*A. vermicularis Schum.* sæll. 2 p. 212.

Hab. in lignis putrescentibus cellarum parietumque Saltdalen Nordlandiæ.

Ob capillitium constanter elongato-cylindricum, nec confluens, et formam quoque peridiorum ab *A. incarnata* et *punicea* omnino diversa.

**1556 ARCYRIA dentata:** subconferata, peridiis globoso-ovatis nitentibus rufo fuscescens, excipulo cupulæformi dentato, dein patellæformi nudo, capillitio subcompacto cum pulvere cinereo-carneo, stipite concolor.

*A. dentata Schum.* sæll. 2 p. 213.

Hab. in lignis humidis Saltdalen Nordlandiæ rufus.

Peridium seminis Sinapeos fere majus, inæquilaterum ruptum marginem dentatum relinqvit; demum vero magis explanatur, dentibus subobsoletis. Stipites et 1 lin. longæ et brevissimi, plures in hypothallo conjuncti. Capillitium parum modo sese expandit. Modo maturam vidi.

**1557 ARCYRIA atra:** sparsa, peridio globoso acuto atro, capillitio subcompacto atrofusco, excipulo obsoleto, stipite brevi subulato concolori.  
*A. atra Schum.* sæll. 2 p. 215. *Fl. dan.* t. 1494 optima.

Hab. in ramis siccatis decorticatisque Pini per Nordlandiam saltensem ut credo, non rara, sed rarius præ minutie observatur.

Hiemem maturatur. Nulli aliarum affinis. Peridium semine papaveris minus. Globulos illos ex sporidiis coagulatis oblongos in capillitio parum expanso haud observavi. Sporidia subrotunda s. oblonga. Seqventi generi accedit, sed stylidium non adest.

**1026 STEMONITIS fasciculata Whlbg.** fl. lap. n. 1026.

Hab. qvoqve in Nordlandia saltensi freqventer.

**1558 STEMONITIS ovata:** gregaria, peridio globoso-ovato nigro, stylidio ad dimidium penetrante. *Pers. syn.* p. 189. *Schum. säll.* 2 p. 217.

Hab. in lignis humidis freqventer, in ramis decorticatis rarius per Nordlandiam saltensem.

Peridium magnitudine seminis Brasicæ primum fuscum nitidissimum, dein purpureo-fuscum opacum. Capillitium persistens, demum deciduum, ubi stipites 2—3 lin. longi ut setulæ nigrae remanent. Stipites ex hypothallo quasi radice scutata Fucorum ornati sunt. Differt a *S. papillata*: stylidio ad dimidium modo penetrante et stipitus longioribus.

## L I C E A.

Nees Esenbeck *syst.* p. 106.

**1559 LICEA bicolor:** subrotunda, compressa, atroviridis, pulvere sulphureo.

*L. bicolor Pers. syn.* p. 195.

*Didymium parietinum Schrader.*

Hab. in cellis et lignis suffocatis Nordlandiæ.

Differt similis *L. strobilina* Alb. et Schw., quam ante plures annos in squamis strobili Abietini Norvegiæ australis legi, loco habitationis, calore brunneo, sporidiis magnis oblongis, quæ in hac subrotunda magnitudine vulgari.

**1560 LICEA fragiformis:** suborbicularis, peridiis cylindricis aggregatis rubris, dein ferrugineis, pulvere roseo-ferrugineo.

*L. fragiformis NE. syst.* p. 107, f. 102.

*Tubulina fragiformis Pers. syn.* p. 198. *Schum. säll.* 2 p. 220.

*Tubulifera Cremor Fl. dan.* t. 659, 1.

Hab. in cortice caudicis putridi Alni Saltdalen Nordlandiæ rarissime.

Superficies granulata ob rotundatos et læves peridiorum apices, Membrana peridiorum tenuissima; hyalina.

## PILIGENA.

Schumacher enum. plant. sæll. 2. p. 220.

- 1561 PILIGENA *lycoperdoides* Schum. l. c. Fl. dan. t. 1740, 2.

*Onygena pilifera* Pers. in lit.

Hab. in cute murina putrida semel mense Septembris in sylva Fiskevaag Saltdalen Nordlandiæ lecta.

Gregaria. Peridium externum membranaceum album basi solvit et delabitur; interius subtilissimum, pellucidum, a pulvere purpurascente-carneo translucente concolor apprens, e filis intertextis ut videtur contextum, persistens, et qvia cum réticulo interiori cohærit, etiam pulvis diu persistit. Sporidia subtilissima iis in cæteris gasteromycetis longe subtiliora. Stipes ad  $\frac{1}{2}$  unc. longus cylindricus candidus lævis substantiæ fibrosæ. Forsan cum jure ad Onygenas refert Cl. Persoon, sed novum nomen specificum haud probandum.

- 1562 MUCOR *caninus*: congestus, byssoides, albus, peridiis minutis lutescentibus, demum ferrugineis, stipite longiusculo. Pers. syn. 201, Obs. 1, p. 96. t. 6 f. 3, 4. NE. syst. f. 78.

Hab. in muscerda per Nordlandiam saltensem, autumno.

Stipites primum erecti, demum diffusi. Stipites longi vetant, qvo minus *M. murinus* Pers. sit.

- 1563 MUCOR *tenellus*: congestus, peridiis globosis minutis hyalino-flavescentibus, demum nigris, stipitibus longissimis tenuissimis flaccidis hyalinis.

*M. tenellus* Schum. sæll. 2 p. 237. Pers. syn. p. 202.

Hab. in fungis putrescentibus et lignis humidis per Nordlandiam saltensem passim.

Peridium sæpe pendulum, sporidia annularia o: centro diaphana. Stipites interdum subpollicares radiantes.

## STILBUM.

Persoon mycologia eur. 1 p. 347.

**1564 STILBUM** *mycophilum*: sparsum, stipite filiformi subrigido hyalino, capitulo subrotundo albo.

*S. mycophilum Pers. myc. eur. 1 p. 351.*

*S. pellucidum Schrader?*

Hab. in lignis putridis cellarum Saltdalen Nordlandiæ.

Longitudinem lineæ non excedit. Incipit ut stipes hyalinus, qvi dein apice incrassatur et opacum fit demumqve in capitulum album dilatatur. Siccando non mutatur.

## ISARIA.

Persoon mycologia europ. 1 p. 44.

**1565 ISARIA** *fasciculata*: stipitibus fasciculatis basi nudis simplicibus albis.

*I. epiphylla Pers. myc. eur. 1 p. 46?*

Hab. in Thelephora destructa Saltdalen Nordlandiæ Octbr.

Stirps nitidula minutissimaqve. Stipites erecti divergenti-fasciculati filiformes 2 lin. alti. Habitu omnino refert iconem NE. syst. f. 78, a.

## EUROTIUM.

Nees Esenbeck system p. 96 f. 91.

**1566 EUROTUM** *herbariorum*: peridiis globosis flavescentibus in tomento ferrugineo insidentibus. *NE. l. c. Pers. syn. p. 202 (Mucor). Gleditsch. meth. p. 162. Hall. helv. n. 1257.*

Hab. in plantis exsiccatis humido loco asservatis Saltdalen Nordlandiæ.

## NIDULARIA.

Fries systema 2 p. 297.

- 1567 NIDULARIA Crucibulum:** companulato-cylindrica, utrinque truncata, extus, subtomentosa, ochraceo-ferruginea, intus laevis, luteo-pallescens, sporangiis albido-plumbeis *Fr. l. c. p. 299.*  
*Cyathus crycibulum Pers. syn. p. 238. NE. syst. f. 133. Fl. dan. t. 1490, 1. Holmsk. ot. 1 t. 1.*  
*Peziza lentifera Fl. dan. t. 105.*

Hab. in lignis putrescentibus per Nordlandiam saltensem rarius.

- 1568 NIDULARIA farcta:** sessilis, subglobosa, flava, sicca albida, subtomentosa, irregulariter rumpens, sporangiis orbiculatis brunneis.  
*N. farcta a. Fr. l. c. p. 301. Raji syn. n. 21. t. 1. f. 2 sec. Fries.*

Hab. in ligno dejecto putrido Saltdalen Nordlandiae.  
*Effoeia cupularis.* Sporangia primum alba in gelatina hyalina nidulantur, dein sicca brunnea nitentia absqve filo umbilicali. A *Cyatho deformi Willd.* differt: colore flavo et sporangiis orbiculatis.

## AGARICUS.

Fries syst. 1 p. 8.

- 1569 AGARICUS vaginatus:** pileo campanulato dein planiusculo, margine sulcato, lamellis albis, stipite fistuloso attenuato, basi volva vaginali ornato.

*A. vaginatus Fr. syst. 1 p. 14.*

*a. lividus.* *A. livida Pers. syn. p. 247.* *A. plumbeus Fl. dan. t. 1014.*

*β. fulvus.* *A. fulvus Schum. säll. 2 p. 247.* *A. spadicea Pers. syn. p. 248.*

Hab. in Pinetis Nordlandiae saltensis freqventer. Aug.

**1570 AGARICUS muscarius:** pileo subsangvi-neo albo-verrucoso margine striato, lamellis albis, stipite subfarcto bulboso, volva squamosa ornato. *A. muscarius Fr. syst. 1 p. 16. NE. syst. f. 166. Pers. syn. p. 253. Fl. dan. t. 1129. Gun. norv. n. 642. Lin. fl. lap. n. 515. sv. n. 1235. Whlbg. ups. n. 1003.*

Hab. in sylvis Nordlandiæ saltensis rarius, nec his regionibus ante finem Septembbris observatus.

**1571 AGARICUS (Lepiota) cristatus:** graveo-lens, pileo candido sericeo-nitente rimoso-squamoso, squamis ferrugineis, lamellis confertis, stipite lævi subcavo, annulo subpersistenti.

*A. cristatus Fr. syst. 1 p. 22. Bolt. fung. t. 7. sec. Fr.*

*A. colubrinus γ. Pers. syn. p. 259.*

Hab. in frustulis ligneis inter gramina dejectis Salt-dalen Nordlandiæ.

Fungus amoenus dissecus odorem fortem, non vero ingratum spirat. Lamellæ concordes ad basin excisæ ut stipitem vix attingant. Fistula stipitis byssò tenuissimo repleta. Annulus mihi omnino persistens apparuit.

**1572 AGARICUS illinitus:** pileo subglutinoso albo convexo, margine striato, lamellis liberis, stipite subannulato lævi.

*A. illinitus Fr. syst. 1 p. 23. Obs. 2 p. 8. (excl. syn. Fl. dan.) Lin. fl. lap. n. 475. sv. n. 1198.*

Hab. in sylvis graminosis subalpinis Saltalen Nordlandiæ.

Umbo pilei interdum cinerascit. Velum potius volva quam annulus.

**1573 AGARICUS granulosus:** pileo exasperato luteo, lamellis adfixis albidis, stipite infra annulum squamoso.

*A. granulosus Fr. syst. p. 24. Pers. syn. p. 264. Whlbg. fl. ups. n. 1004.*

*A. muricatus Fl. dan. t. 1015.*

*Fl. dan. t. 1248 f. 1 vix hujus loci.*

Hab. inter Hypna in pinetis Nordlandiæ saltensis.

**1574 AGARICUS (Armillaria) melleus:** cæspitosus, pileo sordide luteo, squamis pilosis nigrican-

tibus echinato, lamellis albidis adnato-decurrentibus, annulo patulo. *Fr. syst.* 1 p. 30. *Fl. dan.* t. 1013.

A. *Polymyces Pers. syn.* p. 269. *Hall. n.* 2399. *Whlbg. fl. ups.* n. 1005.

Hab. ad radices arborum frondosarum putridas Saltalen Nordlandiæ.

**1575 AGARICUS (Limacium) hypothejus:** pileo explanato concavo fusco-umbrino viscoso, lamellis distinctis flavis, stipite glutinoso pallescente.

A. *hypothejus Fr. syst.* 1 p. 55. *Obs.* 2 p. 10.

A. *pyxidatus Schum. säll.* 2 p. 321.

Hab. in pinetis Saltdalen Nordlandiæ Octbr.

Solitarius, rarius bini, stipite glutinoso, lamellis vivide sulphureis, pileo obscuro mox dignoscitur.

**1055 AGARICUS (Tricholoma) eqvestris:** pileo compacto flexuoso umbrino-luteo, lamellis confertis citrinis, stipite brevi lutescente.

A. *eqvestris Lin. sp. pl.* 1642. *fl. sv.* n. 1219. *lap.* 502. *Gun. norv.* n. 900.

A. *flavovirens Fr. syst.* 1 p. 41. *Pers. syn.* p. 319. A. *luteus Batsch.*

Hab. in pascuis rarius Nordlandiæ saltensis.

Quid est, qvod nomen Linnæanum repudiatur? Est sane eqves inter plebejos. Pileus 3—6 unc. latus; stipes vix 2 unc. altus.

**1576 AGARICUS rutilans:** pileo obtuso, sicco flavo, villo squamuloso rubello tecto, lamellis utrinque attenuatis flavis, stipite concolore variegato, apice albo.

A. *rutilans Fr. syst.* 1 p. 41. *Pers. syn.* p. 320. *Whlbg. fl. ups.* n. 1006.

A. *variegatus Schum. säll.* 2. p. 294. opt. *Lin. fl. lap.* n. 495.

Hab. inter Hypna pinetorum Nordlandiæ saltensis rarius.

**1041 AGARICUS (Russula) emeticus:** pileo planiusculo subdepresso compacto margine demum sulcato, lamellis latis integris albissimis, stipite breviusculo.

A. *emeticus Fr. syst.* 1 p. 56.

A. Linnæi. *Fr. obs.* 1 p. 67.

A. integer *Whlbg. fl. ups.* n. 1016.

*a. sangvineus.* A. integer *Lin. fl. sv.* n. 1230 *fl. lap.* n. 486, 487. *Fl. dan.* t. 1009 *Gun. norv.* n. 902.

A. emeticus Pers. syn. p. 445. *Obs.* 1 p. 100.

*b. livido purpurascens.* A. cynoxanthus Pers. syn. p. 445. *Schum. säll.* 2 p. 246.

*β. flavus.* A. Georgii *Lin. fl. svec.* n. 1210. *lap.* n. 496. *Whlbg. fl. lap.* n. 1049.

A. ochroleucus. Pers. syn. p. 443. *Obs.* 1 p. 102.

Hab. in sylvis Lapponiæ pitensis et Nordlandiæ saltensis freqventissime.

Auctoritatem *Cl. Friesii* seqvens var. β. ad hunc refero. Mihi semper constanter diversus.

A pecoribus avide eduntur.

**1577 AGARICUS (Galorrhæus) torminosus:** pileo zonato albescenti-incarnato, margine involuto barbato, stipite subconcolori cavo lævi.  
*A. torminosus Fr. syst.* 1 p. 63. *Pers. syn.* p. 430.  
*Fl. dan.* t. 1068. *Whlbg. fl. ups.* n. 1017.  
*A. barbatus Retz. in Act. Ac. holm.* 1769.  
*A. piperatus Lin. fl. sv.* n. 1195.

Hab. in ericetis Lapponiæ pitensis circa Hornavan rarius.

Madidus qvidem lævis, siccus vero fibrillosus. Fimbriæ latæ, primum stipitem cingentes et lac album acre hunc insignem reddunt.

**1578 AGARICUS piperatus:** pileo infundibili-formi rigido fulvescenti-albido, lamellis angustissimis confertiis, lacte stipiteqve solido obeso albis.

*A. piperatus Fr. syst.* 1 p. 76. *Pers. syn.* p. 429.  
*Fl. dan.* t. 1132.

*Agaricus Lin. fl. sv.* n. 1194. *fl. lap.* n. 473 auct. Fr.

Hab. in pratis Nordlandiæ saltensis Aug.

**1579 AGARICUS deliciosus:** pileo umbilicato obsolete zonato testaceo, lamellis lateritiis, succo aurantiaco, stipite cavo.

*A. deliciosus Fr. syst.* 1 p. 67. *Pers. syn.* p.

432. *Whlbg. fl. ups.* n. 1018. *Fl. dan.* t. 1131.

*Lin. fl. sv.* n. 1018.

Hab. in pratis Nordlandiæ saltensis passim Septbr.

1037 AGARICUS *quietus*: pileo obtuso lævi sicco opaco, lamellis testaceo-rufescens, stipite solido firmo rufescente. *Fr. syst.* 1 p. 69.  
*A. rubescens* *Fl. dan.* t. 1069.

*A. lactifluus* *Lin. fl. lap.* n. 484. sp. pl. p. 1641.

Hab. in sylvis Nordlaudiæ saltensis. In Finmarkia.

*Vahl.*

Pileus ut plurimum umbilicatus.

1580 AGARICUS (*Clitocybe*) *gilvus*: pileo infundibiformi rigido lævi flavo-ferrugineo nitido, lamellis luteis, stipite farcto subtuberoso.

*A. gilvus* *Pers. syn.* p. 448. *Fr. syst.* 1 p. 80.

*A. cyathiformis* *Vahl. Nat. Sels. Sk.* 3 p. 180.

*Fl. dan. t. 1011.*

Hab. in pratis Nordlandiæ saltensis freqventer. Aug.

Iconi fl. dan. t. 1606 similem nunquam vidi.

1581 AGARICUS *membranaceus*: pileo demum infundibiformi submembranaceo lævi testaceo, lamellis decurrentibus albescens, stipite fistuloso sursum attenuato. *Whlbg. fl. ups.* n. 1032.  
*Vahl. Nat. Sels. Sk.* 3 p. 178. *Fl. dan.* t. 1012.

*A. flaccidus* β. *Fr. syst.* 1 p. 81.

Hab. in graminosis pinetorum Saltdalen Nordlandiæ rarius.

1582 AGARICUS *clavipes*: pileo planiusculo lævi fuligineo-livido, margine subalbicante, lamellis decurrentibus albidis, stipite solido conico. *Fr. syst.* 1 p. 86. *Pers. syn.* p. 353.

Hab. in pratis Nordlandiæ saltensis Octobr.

1583 AGARICUS *conicus*: pileo conico subviscido luteo, demum nigrescente, lamellis confertis adscendentibus, stipite fistuloso striato subpellucido.

*A. conicus* *Fr. syst.* 1 p. 103. *Pers. syn.* p. 335.

*Schum. säll.* 2 p. 290. *Fl. dan.* 599. 833, 1 malæ.

*A. aurantiacus* *Vahl. Nat. Sels. Sk.* 3 p. 166.

*A. glutinosus Fl. dan. t. 1009, 2.*

Hab. in pratis Nordlandiæ saltensis.

Fractus nigrescit, qva re ab omnibus affinibns distinctus.

**1584 AGARICUS miniatus:** pileo convexo demum umbilicato stipiteqve subfarcto æqvali miniatis, lamellis latis adnatis lutescentibus *Fr. syst. 1 p. 105.*

*A. glutinosus Fl. dan. t. 1009, 2 sinistra.*

Hab. in paludosis Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Pileus croceus opacus subsquamulosus. Lamellæ flavæ margine demum fulvo. Stipes basi albo-villösus.

**1585 AGARICUS dryophilus:** pileo subcarnoso lævi subdepresso alutaceo, lamellis subliberis albis, stipite fistuloso glabro lutescenti, basi incrassato. *Fr. syst. 1 p. 124. Pers. syn. p. 452. Schum. säll. 2 p. 287.*

Hab. inter muscos Pinetorum Nordlandiæ saltensis rarius.

**1586 AGARICUS aquosus:** pileo subcarnoso planiusculo albo-lutescente margine striato, lamellis emarginatis albis, stipite fistuloso fulvo.

*A. aquosus Fr. syst. 1 p. 125. DeC. fr. 2 p. 154. Bull. champ. t. 17. sec. Fr.*

Hab. in sylvis Saltdalen Nordlandiæ parcus.

Priori affinis. Cæspitosus, radicibus terram involvens. Stipes fulvus 3 unc. long., 1 lin. lat. basi subincrassatus. Pileus albescenti-alutaceus convexo-planus, centro alutaceo subdepresso.

**1587 AGARICUS (Collybia) epiphyllus:** pileo convexiusculo rugoso lamellisqve paucis venosis albis, stipite fistuloso deorsum spadiceo *Fr. syst. 1 p. 139. Pers. syn. p. 468. Schum. säll. 2 p. 307.*

*A. rugatus Fl. dan. t. 1194, 1.*

Hab. in foliis deciduis per Nordlandiam saltensem passim.

Obs. *A. androsacei Whlbg. fl. lap. n. 1044* mentionem non facio, qvia in Nordlandia nunquam reperi; in Lapponia pitensi qvidem obser-

vavi, sed haud examinavi, ut incertus, an hic an *A. Rotula* sit.

**1040 AGARICUS** (*Mycena*) *galericulatus*: inodorus, pileo fuscescente, lamellis albidis adnatis, dente decurrente, stipite livido lævi tenaci basi radicato strigoso. *Fr. syst.* 1 p. 143. *Obs.* 2 p. 159. *Pers. syn.* p. 376.

*A. campanulatus Lin. fl. lap.* n. 507. *fl. sv.* 1. n. 1054.

Hab. in truncis putridis udis locis dejectis per Nordlandiam saltensem.

*A. campanulatus Lin fl. sv.* 2 n. 1213 non hujus loci, sed *A. varius P.* Lamellæ demum subrubellæ.

**1588 AGARICUS** *polygrammus*: pileo obsolete striato subcinereo, lamellis attenuato-adnatis albis, stipite longo rigido striato splendente basi strigoso. *Fr. syst.* 1 p. 146. *Pers. syn.* 377. *Fl. dan.* t. 1615, 1.

*A. galericulatus Fl. dan.* t. 1498. *Schum. sæll.* 2 p. 303. (*cæspitosus*).

*A. fuscipes Schum. l. c.* p. 296 (*solitarius*.)

Hab. in truncis putridis udis per Nordlandiam saltensem, cæteris Agaricis nordlandicis præcocior, ut pote jam mense Junii lectus.

**1589 AGARICUS** *hæmatopus*: cæspitosus, pileo carnoso-membranaceo lævi albo-rufescente, lamellis adfixis stipiteque fistuloso concolore succo purpureo referti.

*A. hæmatopus Fr. syst.* 1 p. 149. *Obs.* 1 p. 33. *Pers. syn.* p. 379.

Hab. in trunco putrido salicino per Nordlandiam saltensem rarissime e. gr. in Junkersdalen.

Forma *A. galericulati*, adeo ut sane invita natura ad Galorrheos refereretur. Pileus primum subglobosus, dein campanulatus.

**1590 AGARICUS** *purus*: pileo carnoso-membranaceo obtuso subroseo, lamellis rotundatis ventricosis pallidioribus, stipite lævi basi villoso.

*Fr. syst.* 1 p. 151. *Pers. syn.* p. 339. *Fl. dan.* t. 1612.

*A. roseus Fl. dan. t. 1673.*

Hab. in lucis Nordlandiæ saltensis.

**1591 AGARICUS Corticola:** minutissimus, flavescenti-albus, pileo tenui hemisphærico, dein umbilicato striato, lamellis distantibus uncinato-decurrentibus, stipite brevi incurvo.

*A. Corticola Fr. syst. 1 p. 159. Pers. syn. p. 394.*

*A. corticalis Sowerby fung. t. 243.*

Hab. ad cortices Salicum Populorumque vetustarum per Nordlandiam saltensem passim.

Pileus 1 lin. lata. Lawellæ 4—6. Stipites 1—2 lin longi. Pileus et stipes furfure subtili subtecti.

**1592 AGARICUS sacharinus:** pileo lævi subplicato campanulato, demum plano et subumbilicato lamellisqve distantibus latissimis albis, stipite longissimo lævi basi subroseo strigoso.

*A. pterigenus β. sacharinus Fr. syst. 1 p. 160.*

*A. epiphyllus β. sacharinus Pers. syn. p. 469.*

*A. sacharinus Batsch. Cont. 1. f. 83. sec. Fr.*

Hab. inter Hypna et gramina Saltdalen Nordlandiæ; aestate rarius.

Colore albo, demum subpallescente, lamellis latitudine longitudinem æquante, et stipite gracillimo 3—4 unc. longo insignis.. Lamellæ deurrentes. Pileus 6—7 lin. latus.

**1052 AGARICUS (Omphalia) umbelliferus:** pileo subturbanato plano umbilicato striato, lamellis distantibus postice latissimis albis, stipite brevi fistuloso.

*A. umbelliferus Whlg. fl. ups. n. 1014. Lin. fl. sv. 1192. lap. n. 471.*

*A. niveus Fl. dan. t. 1015, 1.*

*A. ericorum Fr. syst. 1 p. 165. Pers. syn. p. 472. Obs. 1. t 4, f. 12.*

*β. flavus.*

Hab. in terra sterili sylvestri Nordlandiæ et Laponiæ. β. in tumulis muscorum subputridorum rupium subalpinorum Saltdalen Nordlandiæ.

Var. β. quam primum *A. nivale Vahl cre-*

didi, tota flava, pileo convexiusculo umbilicato,  
at species vix diversa.

**1593 AGARICUS cyathiformis:** pileo subcarnoso infundibuliformi lævi glabro nigrescente-umbriño, margine subinvoluto, lamellis distantibus cinerascentibus, stipite sursum attenuato concoleore. *Fr. syst.* 1 p. 173.

*A. obcampanulatus Schum. sæll.* 2 p. 329.

*A. tardus Pers. syn.* p. 461.

*A. aithopus NE. syst.* f. 192 *Holmsk. ot. t.* 41 (var. stip. reticulate).

*A. sordidus Dicks fasc.* 1 p. 16. t. 3 f. 1. bona.

Hab. in lignis putrescentibus dejectis Saltdalen Nordlandiæ rarius.

**1594 AGARICUS trullæformis:** pileo carnoso infundibuliformi fusco-cinereo, margine patente, lamellis connexis candidis, stipite striato *Fr. syst.* 1 p. 174.

Hab. in pinetis Saltdalen Nordlandiæ rarius. Octobr.

Margo pilei dilutior. Lamellis brevibus longis adnatis candidisque a priore statim dignoscitur. Stipes flexuosus, solidus, 2 poll. longus, apice pileo concolor, basi albidus.

**1595 AGARICUS (Pleurotus) serotinus:** pileo compacto viscido fulvescenti-viridi, lamellis confertis flavis, stipito brevi crasso pubescente flavo. *A. serotinus Fr. syst.* 1 p. 187 *Obs.* 2 p. 226. *Pers. syn.* p. 481.

*A. lateralis a. Schum. sæll.* 2 p. 364.

*A. stiptici var. Fl. dan.* t. 1293 f. 2.

Hab. in Alnis dejectis subputridis per Nordlandiam saltensem freqenter. Septbr.

Pileus reniformis, junior punctulis viridibus immersis conspersis; grandiori natu punctula confluent totumque afflatu viridi tingunt. Viscidus, ut folia et gramina ei sæpe adglutinata sint. Insectorum expers, seu ob serotinum proventum seu verosimilius ob siccum et exsuccum substantiam.

**1596 AGARICUS mitis:** pileo submembranaceo glabro lævi sicco rufescenti-albo, lamellis con-

fertis, a stipite apice dilatato rotundato discretis albis.

A. mitis *Fr. syst.* 1 p. 188. *Pers. syn.* p. 481. *Obs.* 1 t. 3 f. 5 (qvoad figuram optimam).

b. *pileo rufescente.* A. laccatus *Schultz starg.* n. 480 *sec. Fr.*

Hab. in truncis et ramis Pini sub cortice per Nordlandiam saltensem freqventer.

**1597 AGARICUS nidulans:** pileo latere adnato carnoso tomentoso lutescente, lamellis vitellinis in puncio subcentrali concurrentibus.

A. nidulans *Pers. syn.* p. 482. *Ic. et desc.* t. 6. f. 4 *sec. Fr. syst.* 1 p. 189.

Hab. in truncis dejectis Alni Saltdalen Nordlandiae rarius.

Usqve ad 2 unc. longus, 1 latus. Pileus integer, uno latere dimidio adnatus, obcompanulatus.

**1598 AGARICUS petaloides:** imbricatus, pileis adscendentibus subreniformibus laevibus glabris flavescenti-albis, lamellis confertis decurrentibus albis, stipite brevissimo subtomentoso albo.

? A. petaloides *Fr. syst.* 1 p. 183. *Bull. champ.* t. 226, 557 f. 2. *sec. Fr.*

Hab. in truncis putridis Betulae in subalpinis Nordlandiae saltensis, et Lapponiae pitensis circa Arjeplog passim.

Ab. *A. spathulato Pers.* — vide infra — sporidiis albis omnino diversus. De synomyno Friesii vix dubito, etsi pileus semper glaber a me observatus. Ab *A. spathulato* praeter colorem pallidiorem qvoqve eo alienus, qvod caro hujus fere semper, illius nunquam ab insectis destratur.

**1599 AGARICUS tremulus:** griseus, pileo reniformi diaphano, lamellis linearibus, stipite marginali adscendente villoso *Fr. syst.* 1 p. 191. *Sow. fung.* t. 242.

A. epigaeus β. tephromelas. *Pers. syn.* p. 484.

Hab. ad muscos et terram Saltdalen Nordlandiae rarius.

Totus griseus, stipite brevi lateralí tomentoso  
mox distinguitur.

**1600 AGARICUS** (*Clitopilus*) *fertilis*: pileo sub-  
umbonato glabro livido-pallescidente, lamellis an-  
nexis incarnatis, stipite farcto glabro subbulboso.  
*Fr. syst.* 1 p. 197. *Pers. syn.* p. 328. *Hall. helv.*  
n. 2417. *A. phanopermus* *Bull. champ.* t. 534 547. f. 1.  
*DeC. fr.* 2 p. 187 *sec. Fr.*

Hab. in cultis Saltdalen Nordlandiæ passim.

Magnus, gregarius, luridus ingratusqve. Terra  
sæpe sporidiis roseis tecta.

**1038 AGARICUS** *Pluteus*: pileo carnoso gla-  
briuscule nigrescente-fuligineo, lamellis albis dein  
incarnatis, stipite firmo nigro-fibrilloso. *Fr. syst.*  
1 p. 199. *Pers. syn.* p. 357.  
*A. cervinus* *Fl. dan.* t. 1067,2. *Whlbg. fl. lap.*  
n. 1038.

Hab. in lignis truncisqve putridis per Nordlandiam et  
Finmarkiam passim.

**1601 AGARICUS** *umbrinellus*: pileo membra-  
naceo-carnoso convexo umbrino, margine dilu-  
tiore subfimbriato, lamellis basi rotundatis libe-  
ris planis consertis incarnato-albis, stipite cavo  
nitenti albido.

Hab. in terra macra madida ad latera umbrosa mon-  
tium inferalpinorum Nordlandiæ saltensis parce.

Pileus  $\frac{1}{2}$  unc. latus ab epidermide excedente  
fimbriatus. Stipes tenuis incurvus subpollicaris  
radicatus. Caro tenacissima. *A. phlebophoro*  
proxime adstat.

**1043 AGARICUS** *serrulatus*: pileo convexo sub-  
sqvamoso demum umbilicato nigrescente, lamel-  
lis cæsio-incarnatis adnatis nigro marginatis, stipi-  
te fistuloso atro-cæruleo. *Fr. syst.* 1 p. 204.  
*Pers. syn.* p. 463.

*A. cyanipes* *Fl. dan.* t. 1071. f. 3.

*A. cæruleus* *Schum.* 2 p. 296.

Hab. in pratis Nordlandiæ & Finmarkiæ.

Seqventi adeo similis, ut vix nisi colore pilei

et stipitis parum obscuriore, lamellis sordidioribus nigro marginatis distingvatur.

**1602 AGARICUS asprellus:** pileo fibrilloso-squamoso chalybeo, lamellis adnatis, stipite fistuloso basi albo-lanato chalybeo.

A. asprellus *Fr. syst.* 1. p. 208.

Hab. in pratis siccis inter gramina Saltdalen Nordlandiæ passim, Juli.

Lamellæ adnatæ emarginatæ albidæ, dein roseo-pallidæ.

**1032 AGARICUS (Dermocybe) cinnamomeus:** pileo umbonato subcarnoso sericeo subcinnamomeo, lamellis adfixis confertis, stipite tenui squamali lutescente. *Fr. syst.* 1 p. 229. *Lin. fl. svec.* n. 1229. *lap. n.* 485.

Hab. in sylvis subhumidis Nordlandiæ saltensis et Lapponiæ pitensis parcus

**1603 AGARICUS caperatus:** pileo lacunoso citrino villo albido in disco uniformi, marginem versus squamuloso consperso, stipite solido albo supra annulum reflexum squamuloso *Fr. syst.* 1 p. 241. *Pers. syn.* p. 273. *Obs.* 1 p. 48. *Fl. dan.* t. 1675.

Hab. in sylvis Lapponiæ pitensis.

**1051 AGARICUS (Pholiota) subluteus:** pileo carnoso-membranaceo plano umbonato squamuloso, margine striato, lamellis decurrentibus, stipite solido lævi elongato annulato deorsum incrassato concolori.

A. subluteus *Fl. dan.* t. 1192. *Whlbg. fl. lap.* n. 1051.

Hab. in truncis arborum putridorum Finmarkiæ. *Vahl.*

**1604 AGARICUS mutabilis:** pileo subcarnoso glabro cinnamomeo-expallente, lamellis subdecurrentibus confertis pallide-ferrugineis, stipite fistuloso tenui. *Fr. syst.* 1 p. 245. *Bull. champ.* t. 530 f. 2. t. 543. f. 0. P.

A. caudicinus *Pers. syn.* p. 271.

A. ochroleucus *Vahl Nat. Sels. Sk.* 3, 2 p. 200,

A. acutus & unicolor *Schum. säll.* 2 p. 257.

Ag. *Lin. fl. sv.* n. 1208 *lap.* n. 497.

Hab. in truncis lignisqve putridis per Nordlandiam saltensem freqventer.

Magnitudine nec non stipite nudo annulatoqve valde variat;

**1605 AGARICUS unicolor:** pileo carnoso-membranaceo glabro umbonato subhemisphærico ochraceo-ferrugineo, lamellis liberis stipiteqve flexuoso perforato concoloribus.

A. *unicolor*. *Fl. dan.* t. 1071. f. 1.

Hab. in acervis assularum putridarum Saltdalen Nordlandiæ passim.

Icon fl. dan. optima, si excipias, qvod fistula tenuis byssō repleta stipitis deest. Cæspitose crescit, adeo ut 3—5 stipites basi byssō albo cohærent. Annulus pro ratione magnus et persistens. Pilens junior campanulatus.

**1036 AGARICUS (Galera) Sphagnorum:** pileo convexo umbonato flavo-ochraceo expallente, lamellis planis subtrigvetris stipiteqve longo glabro laxo pallidis.

A. *Hypnorum* γ. *Sphagnorum* *Fr. syst.* 1 p. 267.  
Pers. syn. p. 386. *Whlbg. fl. lap.* n. 1036.

Hab. in paludosis Nordlandiæ; ad Polmäk Finmarkiæ legit Cl. Wahlenberg.

Fungus gracilis, pileo humido sulcato; stipes ætate fulvescit.

**1606 AGARICUS (Crepidotus) atrotomentosus:** pileo carnoso subdimidiato ferrugineo subzonato, lamellis basi rotundatis liberis latis carneo-pallescētibus, stipite brevi crasso tomentoso.

A. *atrotomentosus* *Fr. syst.* 1 p. 272. Pers. syn. p. 472. *NE. syst.* f. 175.

Hab. in truncis putridis Saltdalen Nordlandiæ rarissime.

Suborbicularis, stipite excentrico, zona marginali obscuriore quasi tomento tecta ornatus.

**1047 AGARICUS proboscideus:** pileo ochraceo subcarnoso vertice porrecto stipitiformi, lamellis in puncto excentrico concurrentibus pallidis.

A. *proboscideus* *Fr. l. c.* p. 274. *Obs.* p. 232.

A. *resupinatus* *Fl. dan.* t. 1072.

Hab. in ramis putridis Alni Nordlandiæ; et Finmar-kiæ *Vahl*; passim.

Facillime dignoscitur pileo ex puncto marginali in stipitem brevem attenuato et lamellis qua-  
si foramen infra prolongationem pilei formantibus.  
Velum, cuius mentionem facit *Cl. Vahl*, nunquam  
observavi. Nec resupinatus dici potest, cum ob  
stipitem curvatum hymenium omnino versus ter-  
ram spectet. Minime, ut vult *Cl. Fries*, proge-  
nies monstrosa in obscuro proventa.

**1607 AGARICUS spathulatus:** pileo carnosomo-  
membranaceo flabelliformi sublobato lævi aluta-  
ceo-pallido, lamellis conferatis decurrentibus fer-  
ragineo-albidis decolorantibus, stipite horizontali  
brevi tomentoso.

A. *spathulatus Pers. syn. p. 479. NE. syst. f. 178.*

A. *anomalus Pers. obs. 1 p. 55, t. 4, f. 1.*

A. *petaloïdes β. spathulatus Fr. syst. 1 p. 183.*

Hab. in truncis putridis, imprimis Betulæ Saltdalen  
Nordlandiæ passim,

Iconi Persoonii s. Esenbeckii omnino conve-  
nit, modo stipes non canaliculatus, nec discus  
squamulosus, adscendens nec erectus. Lamellæ  
exsiccatæ violaceæ, et aqua emolliatæ hanc spori-  
diis copiosis ferrugineis ferrugineam tingunt. Cfr.  
A. *petaloïdem.*

**1045 AGARICUS variabilis:** gregarius, pileo  
membranaceo subtomentoso albo, lamellis albido-  
rubiginosis.

A. *variabilis Fr. syst. 1 p. 275. Pers. syn. p. 483.*

A. *sessilis Schum. sæll. 2 p. 366. Fl. dan. t. 1556.*

A. *pubescens Fl. dan. t. 1073, f. 2.*

Hab. in ramis stipitibus putridis terraque per Nord-  
landiam freqventer.

**1608 AGARICUS arcticus:** imbricatus, pileo  
membranaceo resupinato in stipitem porrecto ru-  
fescente-albo villoso, lamellis in punctum con-  
currentibus pallide rufescensibus.

Hab. in ramis putridis Betulæ per epidermidem pe-  
netrans in Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Fungi minutuli 3—6 lin. alti, 3 lin. lati tenaces carne albo, siccii ob villum omnino canescentes, convoluti. Madidi magis rufescunt et expanduntur, formam A. proboscidei, cui etiam proximi, gerentes. Ab A. depluenti differt: loco habitationis, substantia tenaci, forma oblique cyathiformi, non reniformi, et tota superficie villosa.

- 1609 AGARICUS** (*Volvaria*) *speciosus*: pileo glabro, viscoso, albo griseo, lamellis incarnatis, stipite solido attenuato volvaqve laxa villoso. *Fr. syst.* 1 p. 278 *Fl. dan.* t. 1737.  
*A. pubescens Schum. säll.* 2 p. 247.  
*Ag. Lin. fl. lap.* n. 483.

Hab. in assulis putridis Saltdalen Nordlandiæ rarius.  
 Stipes 5 unc. longus, subbulbosus.

- 1610 AGARICUS** (*Psaliota*) *campestris*: pileo carnosu rufescenti squamoso, lamellis ventricosis rufescenti - fuscis, stipite brevi farcto annulato albo.  
*A. campestris. Fr. syst.* 1 p. 181. *Pers. syn.* p. 418. *Lin. fl. svec.* n. 1203. *lap.* n. 482. *Fl. dan.* t. 704. *Hall. helv.* n. 2443.

Hab. in pratis et locis pingvibus per Nordlandiam passim.

Vix differt *A. edulis Pers.*, sed icon NE. syst. f. 195 male colorata.

- 1611 AGARICUS** *præcox*: pileo carnosu lævi hemisphærico, demum explanato alutaceo-lutescente, lamellis flavescenti - fuscis, stipite farcto adscendente pallescente, annulo reflexo.  
*A. præcox Pers. syn.* p. 420. *Fr. syst.* 1 p. 282.  
*A. æstivalis Schum. säll.* 2 p. 259.

Hab. in ericetis Saltdalen Nordlandiæ passim.

Lamellæ demum subcinnamomeæ. Annulus crassus.

- 1612 AGARICUS** *semiglobatus*: pileo hemisphærico lævi viscoso flavo, vertice umbrino, lamellis adnatis subtriangularibus demum nigro-nebulosis, stipite fistuloso glabro supra annulum arachnoideum nigro punctato.  
*A. semiglobatus Fr. syst.* 1 p. 284. *Pers. syn.* p. 407.

A. præcox Schum. sæll. 2 p. 315.

Hab. in fimo per prata Nordlandiæ saltensis.

**1033 AGARICUS nitens:** pileo umbonato subviscoso flavo marginem versus squamoso, lamellis adfixis nigris, stipite cavo glabro. *Fl. dan.* t. 1067. *Fr. syst.* 1 p. 204.

Hab. in fimo vaccino Finmarkiæ. *Vahl.*

**1029 AGARICUS Hornemannii:** magnus, pileo carnoso glabro convexo subumbonato sordide pallescente, lamellis confertis demum nigrescentibus margine albido, stipite solido infra annulum squamuoso, pallescente.

A. Hornemannii *Fr. syst.* 1 p. 285. *Obs.* 2 p. 13.

A. depilatus *Pers. syn.* p. 408.

A. squarrosum *Fl. dan.* t. 1191.

Hab. in cumulis assularum putridarum Nordlandiæ; "et truncis putridis Betulæ Finmarkiæ" *Vahl.*

**1613 AGARICUS (Psilocybe) capnoides:** pileo carnoso sicco luteo, lamellis cæsiis dein purpurascensibus, stipite fistuloso glabro. *Fr. syst.* 1 p. 289. *Obs.* 2 p. 27.

A. turfosus Schum. sæll. 2 p. 305 sec. *Fr.*

Hab. in pinetis ad terram et imprimis ad caudices Pinorum per Nordlandiam saltensem freqventer.

Sæpiissime cæspitosus et fascicularis, sed etjam solitarius. Velum in junioribus adest marginale purpureum. Stipes 2—4 unc. altus, 1—3 lin. latus. Pileus  $\frac{1}{2}$ —2 unc. latus. Ab affini *A. fasciculari* bene distingvit Cl. Fries: sapore dulci, lamellis nunquam virescentibus.

**1614 AGARICUS (Psathyra) Candollianus:** pileo subcarnoso lævi fulvo-violaceo albescente, lamellis adfixis violaceis demum subferruginea, stipite fibrilloso cavo.

A. Candollianus *Fr. syst.* 1 p. 296. *Obs.* 2 p. 182.

A. mutabilis *Fl. dan.* t. 774.

A. appendiculatus Schum. sæll. 2 p. 302.

A. violaceo-lamellatus *DeC. fl. fr.* 2 p. 143. e *Fr.*

Hab. ad terram in lucis Saltdalen Nordlandiæ passim,

Sporidia mihi semper visa sunt ferruginea, quare sine dubio Dermnis rectius quam Pratellis adnumeratur.

**1615 AGARICUS murcidus:** pileo subcarnoso convexo obtuso spadiceo expallente, lamellis adnatis umbrinis, stipite nudo glabro. *Fr. syst.* 1 p. 299.

Hab. in terra umbrosa sub fruticibus ad latera monium Saltdalen Nordlandiæ passim copiose.

Cæspitosus. Sporidia atropurpurea. Velum fungos parvulos glandiformes prominentes totos tegit fulvo-strigosum, cuius pars basi stipitis adhaerens remanet, dum fungus sese evolvit. Junior igitur pileus fulvo-strigosus, sed mox pili disperant, et pileus lævissimus, tactu mollis. Seqventi dimidio minor.

**1616 AGARICUS torpens:** pileo submembranaceo lævi pallescente, lamellis adnatis basi angustatis fuscis margine albidis, stipite glabro. *Fr. syst.* 1 p. 299.

Hab inter folia ramosque putridos Saltdalen Nordlandiæ rarius. Juli.

**1048 AGARICUS (Coprinarius) semiovatus:** pileo subcarnoso campanulato viscido lævi dilute argillaceo, lamellis adnatis latis cinereo-atris, stipite longo bulboso, pileo concolore supra annulum deflexum atro punctulato.

A. semiovatus *Fr. syst.* 1 p. 300 *Pers. syn.* p. 408.

A. ciliaris *Schum. säll.* 2 p. 360 bene.

A. separatus *Lin. fl. svec. n.* 1220. *lap. n.* 504.

Hab. in stercore eqvino per loca uda Nordlandiæ saltensis.

**1617 AGARICUS papilionaceus:** pileo subcarnoso campanulato sicco nigrescente-fuligineo pallescente, lamellis adnatis cinereo-atris, margine albis, stipite longo rufescente, apice striato atropulverulento. *Fr. syst.* 1 p. 301. *Pers. syn.* p. 410. A. semiovatus β. *Schum. säll.* 2 p. 360.

Hab. in fimo vaccino per prata Nordlandiæ saltensis freqventer.

**1618 AGARICUS fimicola:** pileo subcarnoso hemisphærico fuscescente-alutaceo, lamellis adnatis latis cinereo-atris, stipite glabro apice albo-pulverulento. *Fr. syst.* 1 p. 301. *Pers. syn.* p. 412.

Hab. in fimo eqvino Saltdalen Nordlandiæ. Juli.

**1035 AGARICUS** (*Coprinus*) *comatus*: pileo subcarnoso campanulato - cylindrico squamoso - albo, lamellis albis dein purpurascens, stipite subbulboso attenuato albo.

A. *comatus* *Fr. syst.* 1 p. 307. *Pers. syn.* p. 395. *Fl. dan.* t. 834 bona.

A. *cylindricus* *Sow. fung.* t. 189. *Whlbg. fl. ups.* n. 1029. *Lin. fl. lap.* n. 480, 481.

Hab. in agris et circa domos Nordlandiæ saltensis passim.

Margo pilei interdum in stipite annulum mobilem evanescere relinquit. Major cæteris. Mox deliqescit, stipite restante.

**1030 AGARICUS** *deliqescens*: cæspitosus, pileo membranaceo striato pallenti-fuligineo glabro, lamellis linearibus lurido-nigris, stipite subæquali nudo candido.

A. *deliqescens* *Fr. syst.* 1 p. 309.

A. *fuscescens* *Schæf.* t. 17.

A. *bicolor* *Fl. dan.* t. 1070 bona.

Hab. in arenosis humidis absconantis Nordlandiæ; "in pratis Finmarkiæ" *Vahl.*

Primum pileus campanulatus pallide-cinereus, lamellis fuscis. Deinde pileus aliquid explanatur et obscurescit, lamellis nigris. Denique margo revolvitur, et una cum lamellis in succum atrum abiit. Stipes valde fistulosus sursum parum attenuatus.

**1034 AGARICUS** *cinereus*: pileo sulcato subtomentoso cinereo, vertice calvo lævi, lamellis linearibus, stipite subtomentoso squamoso. *Fr. syst.* 1 p. 310. *Pers. syn.* p. 398. *Vahl. Nat. Sels. Sk.* 3, 2 p. 175. *Fl. dan.* t. 1195.

A. *stercorarius* *Sow. fung.* t. 262, *per bona*.

A. *filmetarius* *Lin. fl. svec.* n. 1215. *lap.* n. 503.

Hab. in fimo Saltdalen Nordlandiæ.

**1619 AGARICUS** *ephemeroides*: tenerrimus, pileo striato-plicato squamuloso cinerascenti-albido disco pallescente, lamellis remotis subhyalinis dein nigris, stipite hyalino annulato, annulo persistente albo.

*A. ephemerooides* Bull. *champ.* t. 582 f. 1. *DeC.*  
*fr.* 2 p. 145. *sec. Fr. syst.* 1 p. 313.

Hab. in fimo per agros Saltdalen Nordlandiæ passim copiose. Aug.

Pileus demum complanatus 2 — 4 lin. latus.  
 Stipes 1 pol. longus,  $\frac{1}{2}$  lin. latus. Annulus mox mobilis. Hic vetat eum *A. radiatum* haberi.

**1620 MERULIUS aurantiacus:** pileo carnosο  
 subdepresso tomentoso stipiteqve farcto aurantiacis.

*M. aurantiacus* Pers. *syn.* p. 488 *myc.* 2 p. 11.  
*NE. syst.* f. 233. *Whlbg. fl. ups.* n. 1040.

*Cantharellus aurantiacus* Fr. *syst.* 1 p. 318.

Hab. in graminosis Saltdalen Nordlandiæ passim rarius, ubi *M. Cantharellus* P. nonquam mihi sese obtulit.

**1621 MERULIUS muscigenus:** subhorizontalis,  
 livido-fuscus, stipite brevi laterali, plicis ramosis.

*M. muscigenus*. Pers. *syn.* p. 493. *NE. syst.* f. 236.

*M. serotinus* Pers. *myc.* 2 p. 22.

*Cantharellus muscigenus* b. Fr. *syst.* 1 p. 323.

*Elvella verticalis* Vahl *Nat. Sels. Sk.* 2, 1 p. 26.

Hab. in arenosis viarum Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Descriptio Vahlii l. c. bona: "Stipes solitarius vix unguicularis teres livido-fuscus. Pileus subrotundus membranaceus longitudine stipitis, verticalis, utrinque stipite concolor, opacus, glaber margine plano: pagina aversa plicis nonnullis teretibus, superne divergenti-subramosis, inferne versus stipitem confluentibus." Obscurior est vulgari *M. muscigeno*.

**1074 MERULIUS lobatus:** subhorizontalis, sessilis, lobatus, subfuscus, venis ramosis subanastomosantibus.

*M. lobatus* Pers. *syn.* p. 494. *myc.* 2 p. 23.  
*Fr. syst.* 1 p. 323 sub *Cantharello*.

*Helvella membranacea* Vahl l. c. p. 61. *Fl. dan.* t. 1077. *Whlbg. fl. lap.* n. 1074. *Dicks. fasc.* 1 p. 21.

Hab. in muscis paludum Vardoe Finmarkiæ, ubi invenit Cl. Vahl.

1622 MERULIUS *muscorum*: sessilis, cucullatus, niveus, dein subrufescens, extus lævis, intus subvenosus.

M. *muscorum* Pers. syn. p. 495 myc. 2 p. 24.  
Roth. in Usteri An. bot. I p. 40 t. 1 f. 4.

*Cantharellus muscorum* Fr. syst. I p. 325.

Hab. in muscis humidis Saltdalen Nordlandiæ rarissime.

Pileus 1—2 lin. latus, subdiaphanus, tenuissimus, attamen gelatinosus dici non potest. Venæ in juniore nullæ, in adulto obsoletæ, qva re facillime a *M. bryophilo* dignoscitur.

1623 MERULIUS *tenellus*: sessilis, mollis, nigrescens, venis prominulis inæqvalibus radiantibus.

M. *tenellus* DeC. fr. 2 p. 132. Syn. p. 27 e Fr. syst. I p. 325 sub *Cantharello*. Fl. dan. t. 1295, f. 2. Pers. myc. 2 p. 25.

Hab. in trabibus putridis Saltdalen Nordlandiæ rarissime.

Variæ magnitudinis, sed nunquam ultra  $\frac{1}{2}$  poll. Venæ inæqvales o: inter longiores ad marginem plures breviores, sed ne longiores qvidem ad basin omnino abeunt, sed omnes radiantes. In majoribus margo qvoqve lobata, ut nihil sit, qvod non iconi Fl. danicæ perbonæ conveniat. Nec de synonymo DeCandoliano dubitare possum, cum character et descriptio (Fr. l. c.) perfecte conveniat.

1624 MERULIUS *tremellosus*: pileo carnosō-tremeloso reflexo tomentoso albo, plicis subporiformibus acutis rubicundis Pers. syn. p. 496. Fr. syst. I p. 327. Fl. dan. t. 776, 1 perbona.

*Xylomyzon tremellosum* Pers. myc. 2 p. 30.

Hab. in caudicibus betulinis e rimis corticis erumpens Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Icon Fl. dan. t. 1553 crassior et rubrior s. pallidior, qm qvi hic occurrit, cujus hymenium rufescēti-violaceum.

1625 MERULIUS *serpens*: subeffusus, coriaceo-gelatinosus, glaber, niveus, plicis subobsoletis rugiformibus.

*M. serpens Whlbg. fl. ups. n. 1041. Pers. syn.*  
p. 497. *myc. 2 p. 31 (Xylomyzon).*

? *M. serpens Fr. syst. 1 p. 327.*

Hab. in truncis ramisqve Alnorum putridis frequenter, Populorum rarius per Nordlandiam saltensem.

Effusus centro modo adnatus, sed ubi libere & late viget, pileus dimidijs modo adnatus, altera parte libera reflexa; tum lateres inferiore ferrugineo, sed nunquam ferruginei s. rufescens qvid in pagina hymenina semper nivea observavi. Plicae primum obsoletae. Margo subcrenata, sed nunquam fimbriata seu byssina. Rotundus seu oblongus  $\frac{1}{2}$  —  $2\frac{1}{2}$  unc. latus. Sicca membranam tenuem albam efficit, vigens spongiosus mollissimus. Contra morem hand bene de hoc Cl. Fries. *M. fugax Fr.* nonne hujus forma juvenilis et in humido evoluta.

**1626 MERULIUS lacrymans:** effusus, magnus, flavo-ferrugineus, margine tomentoso albo, plicis amplis poroso-sinuatis, demum papillatis.

*M. lacrymans Fr. syst. 1 p. 328. Schum. sæll.*  
2 p. 371.

*Merulinus destruens Pers. syn. p. 496.*

*Xylomyzon destruens Pers. myc. 2 p. 27.*

*Sistotrema cellare Pers. syn. p. 554. myc. 2 p. 198.*

Hab. ad domos, qvas destruit ubique per Nordlandiam.

*Sistotrema cellare P.* certe nil est, nisi hujus forma vetusta, hymenio papillato sporidiisqve effusis ferrugineo-pulverulento. Subtus stratum himantioideum adest, sed hoc inter et hymenium stratum album gelatinosum. Ubi primi erumpit, totus byssinus albus balteo carneo tuberculato, qvod mox in hymenium abiit.

**1627 MERULIUS vastator:** effusus, aureus, margine albo byssino, venis crispis gyroso-plicatis.

*M. vastator. Fr. syst. 1 p. 329. Obs. 1 p. 100.*  
*Schum. sæll. 2 p. 371.*

*M. solare Pers. myc. 2 p. 29.*

Hab. ad ramos foliaqve putrida Saltdalen Nordlandiae rarins aestate.

Antecedenti multo minor tenuior atque lætior.  
Synonymon suum e synopsi ad *M. lachrymantem*  
retrahit Cl. Persoon (myc. 2 p. 27).

1628 *MERULIUS molluscus*: effusus, tenuis, fulvo-carneus, margine byssino albo, plicis gyroso-porosis.

*M. molluscus* Fr. syst. 1 p. 329.

Hab. in ligno pineo putrescente Saltdalen Nordlandiæ rarius autumno.

Membrana mollis, sicca, subtus villosa alba, Thelephoram habitu refert. Primum versus marginem tuberculoso-plicatus, quod demum in hymenium gyroso-porosum mutatur.

## DÆDALEA.

Fries syst. myc. 1 p. 331.

1629 *DÆDALEA betulina*: sessilis, pallescens, pileo coriaceo zonato tomentoso, lamellis rectis subramosis. *Fr. syst. 1 p. 333 Obs. 1 p. 104. Whlbg. fl. ups. n. 1045.*

*Agaricus coriaceus* Pers. syn. p. 486. *Bolton fung. t. 158 sec. Pers.*

*Ag. betulinus* Lin. sp. pl. p. 1645, fl. sv. n. 1244.

Hab. in truncis ramisqve emortuis Betulæ per Nordlandiam saltensem.

Lamellæ ætate valde convexæ, fere gibbæ. Supra cinereo-pallescens, subtus pallescenti-cinerea, margine lamellarum albo. *D. betulina Fl. dan. t. 1555* alia omnino species ob colorem diversissimum et sine dubio: lævitatem. Ipse olim in Sællandia illam legi, sed specimina non ad-sunt.

1058 *DÆDALEA sepiaria*: *Fr. syst. 1 p. 333.*

*Merulius sæpiarius* *Whlbg. fl. lap. n. 1058.*

Hab. in lignis subputridis Pini Nordlandiæ freqventer.

**1068 DÆDALEA unicolor.** Fr. syst. 1 p. 356.  
Sistotrema cinereum Whlbg. fl. lap. n. 1068, ubi  
vide. Pers. myc. 2 p. 204.

Hydnus parasiticum Lin. sp. pl. 2 p. 1648?  
Hab. ad truncos, imprimis Betulæ, per Nordlandiam  
freqventer.

**1630 DÆDALEA decipiens:** effuso-reflexa, pileo  
coriaceo villoso albido, lamellis dentato-laceratis  
violaceis.

Agaricus decipiens. Willd. in Röm. et Ust. Mag.  
4 p. 12. t. 2 f. 5.

Hydnus decipiens Schrad. spec. p. 180.

Hydnus parasiticum Willd. berol. p. 1149.

Sistotrema violaceum Pers. syn. p. 551, myc. 2  
p. 203.

Polyporus abietinus Fr. syst. 1 p. 370. pro parte.

Hab. in truncis caudicibusqve Pini Nordlandiæ; Abi-  
etis Lapponiæ pitensis freqventissime.

Non possum non hanc a *Boleto abietino* P.  
sane affini segregare, nam sæpiissime eam obser-  
vavi, et semper a prima origine hymenium la-  
mellatum, mox laceratum, nunquam simul poro-  
sum inveni. Ubi *B. abietinus* senescit, pori qui-  
irregularis et laceri, sed in lamellas lineares la-  
ceratos attamen haud vidi. Pileus qvidem in  
utroqve similis & ejusdem indolis, at vix aliquis  
hanc inveniens ignoransqve sub Polyporo  
qværet.

**1631 DÆDALEA mollis:** resupinata, elongata,  
submembranacea, mollis, cinereo-pallens, margine  
concolore, poris rotundis longissimeqve flexu-  
osis.

Hab. ad corticem putridam Alnorum Saltdalen Nord-  
landiæ passim.

A *D. latissima* Fr. diversissimam censuit ipse  
Cl. Fries. Qvæsi ex tomentosa stupa confecta 1  
pol. lata, usqve ad pedalem longitudinem non  
arctius cortici adnata, qvam bene secerni potest.  
Subtus nigro-fusca tomentosa. Margo subliber,  
tomentosior, sed ejusdem substantiæ et coloris ac  
pagina superior.

## BOLETUS.

Fries syst. 1 p. 385.

**1059 BOLETUS luteus:** pileo flavescente glutine fusco secedente virgato et maculato, tubulis adnatis rotundis luteis, stipite farcto annulato subcarneo, apice flavescente punctato.

B. luteus Lin. fl. sv. n. 1247. lap. n. 520. Fr. syst. p. 386. Obs. 2 p. 242.

B. annulatus Pers. syn. p. 503. myc. p. 125. NE. syst. f. 204. Fl. dan. t. 1135. Vahl Nat. Sels. Sk. 3, 2 p. 205.

Hab. in pinetis Saltdalen Nordlandiae freqventer.

**1632 BOLETUS flavidus:** pileo viscoso flavescente-livido striis fuscis virgato, tubulis adnatis angulatis compositis flavis, dein fulvis, stipite tenui albido farcto annulato.

B. flavidus Fr. syst. 1 p. 387. Obs. 1 p. 110. Hall. helv. n. 2301. B. velatus Pers. myc. p. 125. t. 20, 1—3.

Hab. in graminosis sylvarum Saltdalen Nordlandiae.

Inter B. luteum et bovinum mediis. Utroque minor. Ab hoc differt: annulo et toto colore; ab illo hymenio convexo, demum fulvo, tubulis angulatis compositis, stipite, colore pilei et carne sordide alba, nec ut in illo flava. Annulus tenuis ferrugineus adglutinatus. Si pori rotundati non obstetissent, B. luteum Lin. ad hunc retuleram.

**1060 BOLETUS bovinus:** pileo viscoso rufescente-pallido, tubulis adnatis compositis, porulis brevioribus angulatis, virescenti-flavis, demum ferruginascentibus, stipite nudo tenui pileo colore.

B. bovinus Fr. syst. 1 p. 388. Obs. 1 p. 112. Whlbg. fl. ups. n. 1048. lap. n. 1060. Lin. fl. svet. n. 1246, lap. n. 518.

B. gregarius Fl. dan. t. 1018 poris male pictis Vahl Nat. Sels. Sk. 3, 2 p. 205.

Hab. in pinetis Nordlandiae saltensis parcus; "in Lapponia sylvatica" Linné.

Caro pallida. Pori angulati e 3—4 minoribus compositi. Pileus appланatus, сæpe repandus, et ob visciditatem quasi aqua superflusus.

**1633 BOLETUS variegatus:** pileo fasciculato tomentoso flavo subviscido, tubulis adnatis parvis simplicibus angulatis fulvis dein ferrugineis, stipite lævi flavo basi rufescente.

B. variegatus *Fr. syst.* 1 p. 388. *Obs.* 1 p. 117.  
Hab. in pinetis Saltdalen Nordlandiæ.

Caro dissecta s. pressa virescit. Hymenium planiusculum.

**1634 BOLETUS subtomentosus:** pileo pulvinato sicco subtomentoso, tubulis adnatis magnis angulatis luteis, stipite firmo lævi *Fr. syst.* 1 p. 389. *Pers. syn.* p. 506. *NE. syst.* f. 206. *Fl. dan.* t. 1074. *Lin. svec.* n. 1251.

B. chrysenterinus *Schum. säll.* 2 p. 376.  
Hab. in Pinetis Saltdalen Nordlandiæ.

Pileus sæpiissime ferrugineus.

**1635 BOLETUS edulis:** pileo pulvinato glabro vaccino, tubulis semiliberic rotundis minutis pallescentibus, stipite crassissimo.

B. edulis *Fr. syst.* 1 p. 392. *Pers. syn.* p. 510. *myc.* 2 p. 131. *Svensk. bot.* t. 197.

B. crassipes *Schum. säll.* 2 p. 378.

B. rubiginosus *Retz. in Act. Ac. holm.* 1769 p. 252.

Hab. in pinetis Saltdalen Nordlandiæ freqventer.

Caro alba compacta. Hymenium inæqvale intus flavum.

**1636 BOLETUS scaber:** pileo pulvinato glabro, tubulis liberis rotundis albis, stipite firmo attenuato squamoso-scabro.

B. scaber *Fr. syst.* 1 p. 393. *Pers. myc.* 2 p. 146.

B. aurantius *Pers. syn.* p. 504. *myc.* 2 p. 147.

B. viscidus *Lin. svec.* n. 1248. *Fl. dan.* t. 833,2.

B. convexus *Retz. in Act. Ac. holm.* 1769 p. 253.

Hab. in inferalpinis et alpinis Nordlandiæ saltensis freqventer.

Omnium fungorum carnosorum sane frigoris patientissimus est, qvippe qvi in alpes longe supra Betulam ascendit ibique læte viget. Ga-

lor pilei varius, rufus, fulvus et subfuligineus.  
Hymenium stipesqve sordidi.

## POLYPORUS.

Fries systema mycol. i p. 341.

**1637 POLYPORUS squamosus:** pileo carnosolento subochraceo, squamis obscurioribus, poris amplis angulatis laceris pallidis, stipite sublaterali basi nigrescente.

P. squamosus Fr. syst. 1 p. 343. Fl. dan. t. 1196.  
Boletus platyporus Pers. syn. p. 521.

B. cellulosus Ligh. scot. p. 1032.

P. juglandis Pers. myc. 2 p. 38.

Hab. in caudicibus putrescentibus Populi Saltdalen Nordlandiæ rarissime.

B. squamosus Schum. säll. 2 p. 301 hujus loci esse non potest, cum poros minutos et stipitem pallidum dicat.

**1638 POLYPORUS brumalis:** pileo carnosolento subumbilicato villoso fuligineo-expallente, poris subangulatis albis, stipite pallido ferrugineo-que Fr. syst. 1 p. 348. Obs. 2 p. 255. Pers. syn. p. 517.

Boletus ciliatus Fl. dan. t. 1297 (minor).

B. polyporus Retz. in Act. Ac. holm. 1769 p. 252.

Hab. in Betulis dejectis putridis inferalpinorum et subalpinorum Nordlandiæ saltensis.

Per hiemem restans glabriusculus, ciliatus et pallidus obvenit.

**1639 POLYPORUS varius:** pileo rigido glabro lævi albo, poris minutis subrotundis pallidis, stipite brevi sublaterali lævi pallescente deorsum abrupte nigro.

P. varius Fr. syst. 1 p. 352. Pers. myc. 2 p. 52.

Boletus varius Pers. syn. 523. obs. 1 p. 85.

B. lateralis Bolton fung. t. 83. Fl. dan. t. 1075, 1.

B. numularius: stipite centrali.

*B. numularius* Bull. *champ.* t. 124 e *Pers.* *syn.* p. 519. *myc.* 2 p. 44. *NE.* *syst.* f. 214.

Hab. in truncis putridis Betulæ Saltdalen Nordlandiæ passim.

Pileus nunquam aliter coloratus hisce regionibus occurrit. Forma β. modo varietas levis est.

**1640 POLYPORUS umbellatus:** ramosissimus, pileis suborbicalatis depresso sordide ochraceis, poris stipitibusque pallidis.

*P. umbellatus* Fr. *syst.* 1 p. 354. *Pers. myc.* 2 p. 46.

*B. ramosus* Fl. dan. t. 1197. Schum. *sæll.* 2 p. 383.

Hab. in ligno putrescente ad terram in Saltdalen Nordlandiæ rarissime.

Pilei conferti imbricati.

**1641 POLYPORUS betulinus:** pileo carnoso-suberoso suborbiculari fusco-rufescente-albido, vertice obliquo brevissime stipitato, poris inaequivalentibus albidis.

*P. betulinus* Fr. *syst.* 1 p. 358.

*Boletus betulinus* Pers. *syn.* p. 535. Fl. dan. t. 1254 haud bona. Bolton *fung.* t. 159.

*B. suberosus* Wulfen.

Hab. in Betulis putridis Nordlandiæ et Lapponiæ frequenter.

Nunquam dimidiatus. Si stipes abest, tamen vertice pilei affixus. Pileus albus epidermide separabili rufescente vestitus est. Hymenium omnino separabile.

**1642 POLYPORUS odorus:** dimidiatus irregularrisque, pileo glabro pallescente, poris rotundis albido-ochraceis.

*Boletus Lin. fl. lap. n.* 522.

Dædalea svaveolens Fr. *syst.* 1 p. 337?

Hab. in Salicibus Nordlandiæ saltensis.

Bis modo et pauca legi specimina, quæ plane evoluta nondum erant. Odore pergrato et forti aniseo membrabilis. Interstitia pororum laceatae apparebant, pori tamen integri rotundi. Ob synonymon Linnei fungum a me non perfecte exploratum omittere nolui.

**1643 POLYPORUS fumosus:** imbricatus, pileis carnosso-fibrosis undulatis fuligineo-pallidis, poris curtis minutis obscure cinereis.

P. fumosus *Fr. syst.* 1 p. 367 *Pers. syn.* p. 530.  
Hab. ad radicem Betularum Saltdalen Nordlandiae rarius.

Cæspitosus, imbricato-connatus, 2—4 unc. latus; pileus singulus vero vix 1 unc. latus.

**1644 POLYPORUS hirsutus:** pileo plano coriaceo-suberoso strigoso zonato albo, poris subrotundis fuscescentibus.

P. hirsutus *Fr. syst.* 1 p. 367.  
Boletus hirsutus *Schrader* . . . *Wulfen* . . .  
Hab. in truncis dejectis Alni Betulæque Nordlandiae saltensis freqventer.

Utrinque planiusculus. Pori ferruginei et obscure cinerei. Qvam seqvens duplo major est.

**1667 POLYPORUS velutinus:** pileo subero-co-riaceo velutino subzonato albo flavescentiisque, poris rotundis albis. *Fr. l. c. p. 358.*

a. *albus.* B. *velutinus* *Pers. syn. p. 539?*  
b. *lutescens.*

B. *lutescens* *Pers? l. c. Whlb. fl. lap. n. 1067.*  
Hab. in truncis Populorum Nordlandiae et Finmarkiae.

**1645 POLYPORUS ochraceus:** pileis subcoriaceis zonatis subvelutinis ochraceo-pallescentibus, poris parvis rotundis flavescenti-albis.

Boletus ochraceus *Pers. syn. p. 540.*  
P. *radiatus* *Sowerby t. 190 sec. Fr. syst. 1 p. 369?*

Hab. ad radicem caudicis putridi Populi Saltdalen Nordlandiae.

Subsessilis, dimidiatus, gregarius, imbricatus, coriaceus, glaber s. sericeus, striis longitudinalibus obsoletis, versus basin ochraceus tuberculatus, de cætero albo-flavescens zonis obscurioribus, margine acuto, poris convexiusculis brevibus. Pileus saepissime lobatus, lobis rotundatis. E ligno putrido ut corpora globosa viscosa propullat. Varietatem B. versicoloris Cl. Persoon eum nunc in literis dixit, sed mihi diversus videtur.

**1646 POLYPORUS abietinus:** effuso-reflexus, pileo coriaceo villoso albido, poris acutis fusco-purpureis.

P. abietinus (junior) *Fr. syst.* 1 p. 370.

Boletus abietinus *Dicks. fasc.* 3 t. 9 f. 9 *Pers. syn.* p. 541. *Obs.* 1 p. 24. *myc.* 2 p. 77.

Hab. in Pinis emortuis Saltdalen Nordlandiæ rarius.  
Cfr. Dædalea decipientem.

**1064 POLYPORUS cinnabarinus:** *Whlbg. fl. lap.* u. 1064 (Boletus) ubi vide.

Hab. in truncis Betularum dejectis Saltdalen Nordlandiæ freqventer.

**1065 POLYPORUS pinicola:** *Fr. syst.* 1 p. 372. *Whlbg. fl. ups.* n. 1056.

B. igniarius *Whlbg. fl. lap.* n. 1065, (excl. syn. Lin.) ubi vide. *Fl. dan.* t. 953.

**1066 POLYPORUS fomentarius:** *Whlbg. fl. lap.* n. 1066. Boletus *Lin. fl. lap.* n. 521.

**1647 POLYPORUS igniarius:** durus, pileo crasso obtuso sublaevi e ferrugineo-cinereo, margine porisqve convexis exiguis subcinnamomeis *Fr. syst.* 1 p. 375. *Lin. fl. svec.* n. 1256 (excl. descrip. Hydni imbricati).

B. fomentarius var. obtusus *Pers. syn.* p. 536.

Hab. in Salicibus Betulisqve Nordlandiæ parcus.

A priori imprimis differt forma magis irregulare (ille pedem equinum omnino refert) et substantia tenuiore duriori ad fomitem inutili.

**1648 POLYPORUS nigricans:** durissimus, pileo pulvinato crasso concentrice sulcato nigro, margine porisqve exiguis ferrugineis *Fr. syst.* 1 p. 375.

Hab. ad trunco Betulae inferalpinorum et subalpinorum Nordlandiæ.

Forma omnino P. fomentarii, sed substantia lignosa.

**1649 POLYPORUS salicinus:** resupinatus, durus, late effusus, marginatus, subundulatus, obscure cinnamomeus.

P. salicinus *Fr. syst.* 1 p. 376. *Pers. syn.* p. 543.

Hab. in Salicibus vetustis per Nordlandiam saltensem.

Pori rotundi æquales, alii ob situm obliquum hiantes, saepe rore albido superfusi, qui in margine sterili  $\frac{1}{2}$  lin. lato acuto imprimis conspicuus est. Totus ex hymenio constat, strato tenuissimo subviloso subjecto. Cl. Persoon in literis eum propriam constituere speciem suspicatus est, sed a charactere ejus nil distinctivi perspicio. Cum priore magnam habet affinitatem.

**1650 POLYPORUS versiporus:** resupinatus, late effusus, albus, margine tenui glabro nudo, poris magnis obliquis laceris. *Pers. myc.* 2 p. 105.

*P. vaporarius Fr. syst.* 1 p. 382?

Hab. in lignis putridis, imprimis in cellis per Nordlandiam saltensem.

Humidus, mollis, 3 lin. crassus. Membrana tenuis alba substrata est.

**1651 POLYPORUS dolosus:** resupinatus, effusus mollis, tenuis, incarnatus, subtus albo-villosus, poris laceris et erosio-dentatis. *Pers. myc.* 2 p. 77. *Hyd. Holpii et Pseudoboletus Fr. syst.* 1 p. 420; *sec. Pers. DC. fl. fr.* 6 p. 37 (bis) et 36.

Hab. in Pinis exsiccatis Nordlandiae.

Primum ut macula parva villosa, in cuius centro unus alterve porus, incipit. E particulis residuis regenerat.

**1652 POLYPORUS micans:** resupinatus, effusus, tenuis, incarnato albidus, ambitu byssino albo, poris acutis angulatis.

*P. micans Fr. syst.* 1 p. 383.

Hab. in ligno populino putrido Nordlandiae.

Suborbicularis, confluens. Substantia byssina, sed ambitu non fimbriato; pori impressi ut excavationes superficiales, hexagoni, margine tenuissimo acuto crenato.

**1653 POLYPORUS aneirinus:** resupinatus, effusus, tenuis, poris amplis angulosis subobliquis fulvescenti-albis, ambitu byssino tenuissimo albo.

Hab. in cortice putrido Populorum Saltdalen Nordlandiae.

Vegetatio omnino prioris, sed hic triplo major. Ambitus 1 lin. lata. Cortici arcte adhaeret,

Margo pororum irregularium acutus integerimus.

**1654 POLYPORUS macer:** resupinatus, effusus, tenuissimus, poris majusculis angulatis, margine acutis dentato-laceratis albis, ambitu subnullo.

Hab. in ligno putrido Populorum Saltdalen Nordlandiæ.

Albus, siccus pallescens. Nulla membrana substrata est, sed lignum per poros translucet, etsi fibris byssinis raris tectum. Byssus subtillis marginalis sese statim efformat in poros, qvi ad 1 lineæ altitudinem ecrescunt.

**1655 HYDNUM strigosum:** pileo dimidiato coriaceo rugoso fasciculato-strigoso ferrugineo-fusco, aculeis rufis apice albis.

*H. strigosum* Fr. syst. 1 p. 414. Pers. myc! 2 p. 175.

*H. parasiticum* Pers. syn. p. 558.

*NE. syst. f. 245* (mala).

Hab. in Padis langvidis Saltdalen Nordlandiæ.

Imbricatum pollicem latum. Margo o: initium hymenii nudus carnosus crenatus. Omnes autores siccum habuerunt, qvare aculeos cinereos describunt, nam siccando cinerascunt.

**1656 HYDNUM farinaceum:** effusum, crustæforme, pallescens ambitu subbyssino, aculeis tenuissimis subdistantibus acutis. *Fr. syst.* 1 p. 419. *Pers. syn.* p. 562.

Hab. in lignis putridis Nordlandiæ rarius.

Aculeis distantibus sublongis acutis a *H. crustaceo* diversum.

**1657 HYDNUM niveum:** effusum, submembranaceum, album ambitu byssino, aculeis confertis brevibus. *Fr. syst.* 1 p. 419. *Pers. disp.* t. 4, 6, 7. *syn.* p. 563. *NE. syst. f. 246.*

*β. fimbriatum:* candidum, fugax, ambitu radiosofimbriato, aculeis granulosis *Fr. l. c.*

Hab. in cortice putrido Alni Nordlandiæ rarius.

Recens candidus, Thelephoram omnino refert, sed aculei manifesti brevissimi copiosi, etsi non conferti. Var. *β.* substantiæ omnino Himantiae, fibrillosa, qvæ fibræ in margine adhuc liberæ. Aculei graniformes vix aculei dicendi.

**1658 HYDNUM argutum:** effusum, tomentosum, candidum, aculeis obliquis acutis serratis. *Fr. syst. 1 p. 424.*

Hab. in cortice Juniperi Nordlandiae rarius.

Subiculum tenue adnatum absqve ambitu brysino sterili, qvia adeo tenue & irregulariter effusum, ut marginem efformare non possit. Aculei acutissimi, saepe apice fissi, saepe medio dentibus 1 — 2 e subulis concretis inæqualibus orti notati. Memorabile me nullum Hydnum stipitatum in Nordlandia legisse.

**1659 THELEPHORA cristata:** cæspitosa, pallida, adscendens, ramosissima, ramis difformibus undique ad latera papillosis, apicibus obtusis fimbriato-cristatis.

*Th. cristata Fr. syst. 1 p. 434. Gled. meth. p. 52.*

*Clavaria laciniata Sowerby t. 158 e Fr.*

*Merisma cristatum Pers. myc. 1 p. 156, syn. p. 583.*

Hab. in locis humidis pinetorum Saltdalen Nordlandiae rarissime.

Primum pallida dein rubella subpruinosa, basi alba. Rami plerique teretiusculi, nonnulli, imprimis apices, compressi. Papillæ conicæ minimæ acutissimæ cristam efficientes non ascigeræ, sed e substantia interna formatæ sunt.

**1660 THELOPHORA caryophyllæa:** stipitata, infundibiformis, coriacea fibrosa, fusco-purpurascens, margine inciso.

*Th. caryophyllæa Fr. syst. 1 p. 430. Pers. syn. p. 565. NE. syst. f. 250. Holmsk. ot. 1 t. 7.*

*Craterella ambigua Pers. Obs. 1 p. 56 t. 6, 8, 10.*

Hab. in terra in graminosis nemorosis Saltdalen Nordlandiae rarissime æstate.

**1661 THELEPHORA laciniata:** dimidiata, imbricata, ferrugineo-fusca, fibroso-squamosa, margine laciniato-crispo.

*Th. laciniata Fr. syst. 1 p. 431. Pers. syn. p. 567.*

*Th. caryophyllæa β. laciniata Pers. myc. 1 p. 112.*

*Th. mesenteriformis Fl. dan. t. 1198.*

*Corticium laciniatum Pers. obs.* 1 p. 39.

*Helvella pineti Lin. sp. pl.* 2 p. 1649 excl. syn.  
Hab. in terra et ad radices caudicum Nordlandiæ  
saltensis freqventer.

*Th. terrestri* affini durior & pallidior.

**1662 THELEPHORA hirsuta:** effuso-reflexa, co-  
riacea, strigoso-hirsuta, subtus glabra lævis lute-  
scens *Fr. syst.* 1 p. 439. *Pers. syn.* p. 570.

*Auricularia aurantiaca Schum. säll.* 2 p. 358.

*A. reflexa Bull. herb.* t. 483. *Sow. t.* 27 e *Pers.*

Hab. in truncis Betulæ Alniqve per Nordlandiam.

**1663 THELEPHORA purpurea:** effuso-reflexa, im-  
bricata, coriaceo-mollis, zonata, strigoso-hirsuta,  
subtus lævis purpurascens *Fr. syst.* 1 p. 440.  
*Pers. syn.* p. 571. *myc.* 1 p. 121. *Schum. säll.*  
p. 398.

*Th. faginea & lilacina Schum. l. c. Fl. dan.* t.  
1619, 1.

Hab. in truncis putridis Betulæ, Pini etc. per Nord-  
landiam.

Hymenium a colore fusco-purpureum ad palli-  
de lilacinum variat.

**1664 THELEPHORA sangvinolenta:** effusa, re-  
flexaque ad tactum cruentata, margine libero pu-  
bescente-tomentoso, hymenio lævi flavidio s. ci-  
nereo-pallido.

*Th. sangvinolenta Alb. et Schw.* p. 274 sec. *Fr.*  
*syst.* 1 p. 440.

*Th. avellana Fr. syst.* 1 p. 442.

*Th. sericea β. Pers. myc. eur.* 1 p. 117.

? *Th. corylea et peltata Pers. l. c.* p. 126.

Hab. in truncis putrescentibus Alni Salicis Pinique  
Saltdalen Nordlandiæ.

Pro loco et ætate variat. Junior umbilicata  
molliuscula fragilis flavidia margine albo; ætate  
dilatatur et induratur. Sæpiissime effusa, margi-  
ne libero subtus ferruginascenti tomentosa; sed  
etiam reflexa subimbricata occurrit. Modo ju-  
nior succulenta ad tactum cruentata, sed etiam  
vetustior aqua emollita idem patitur. Semel  
cruentata colorem non recipit. Hymenium sem-  
per læve, si etiam quædam papilla adest.

**1565 THELEPHORA alnea:** effusa utrinque glabra, mollis, pallescenti-gilva, papillis sparsis subrotundis. *Fr. syst.* 1 p. 447.

Hab. in cortice Alnorum emortuorum Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Membrana crassiuscula adhærens superficie pruinosa et molliore substantiæ fibrosæ. Siccata subrimosa, madefacta tumet, sed alio modo non mutatur. A priori molliori substuposa substantia dignoseitur.

**1078 THELEPHORA salicina:** resupinata, subtus libera, albido-subvillosa, supra glaberrima sanguineo-rubra.

*Th. salicina Fr. syst.* 1 p. 442 (at non Pers.)  
*Peziza sarcoides Whlbg. fl. lap.* n. 1078.

Hab. in ramis emortuis Nordlandiæ et Lapponiæ frequenter.

**1666 THELEPHORA Pini:** resupinata, duriuscula, subtus glabra ferrugineo-pallescens, supra purpureo-fuscescens papillosa *Fr. syst.* 1 p. 443.  
*Pers. myc.* 1 p. 123.

*Th. abietina* β. *pinea Alb. et Schw.* p. 276 e *Fr.*

Hab. in ramis emortuis Pinorum Nordlandiæ.

Coriaceo-rigida, peltata, sed etiam longitudinaliter confluens.

**1667 THELEPHORA puteana:** resupinata, suborbicularis, coriaceo-carnosa, flavescens, dein fulvo-olivacea, postremo cinereo-olivacea, margine byssino albo, papillis confertis obtusiusculis.

*Th. puteana Schum. säll.* 2 p. 397?

Hab. in truncis decorticatis putridis ad domos Nordlandiæ saltensis.

Fragillima, 1 lin. crassa. Ætate ipsa sese a trunco solvit. Hieme putrescit et nigrescit, sed anno seqvente destructam incrustat nova. Asci creberrimi.

**1668 THELEPHORA fimbriata:** effusa; carnosa, alba, lœvis, papillis minutis copiosis, ambitu fibroso.

*Th. incrustans Fr. syst.* 1 p. 448? (non Pers!)

Hab. in ligno putrescente pineo ad domos Saltdalen Nordlandiae rarius.

Tenuis, leviter adhærens usque ad spithamam longa et 3. unc. lata. Fibrilli marginales interdum fasciculati suberecti. Siccando pallescit.

**1669 THELEPHORA comedens:** effusa, subcorticis, erumpens, tenuis, glabra, albida, levis, demum rimosa.

Th. comedens *NE. syst.* p. 239. f. 255. *Fr. syst.* 1 p. 447.

Th. decorticans *Pers. myc.* 1 p. 157 (nomen opt.)

Hab. in Alnis exsiccatis Nordlandiae freqventer.

Sub epidermide, qvam solvit et dirrumpit, provenit. Humida viscosa. Albida v. pallescenti-albida; nunqvm subcarneam nec ambitum floccosum vidi.

**1670 THELEPHORA polygonia:** subeffusa, adnata, subpruinosa, incarnato-rosea, tuberculis magnis polygonis.

Th. polygonia *Fr. syst.* 1 p. 444 *Pers. myc.* 1 p. 152.

Hab. in cortice Populorum Saltdalen Nordlandiae.

Th. roseæ similis, sed carnosior et magis adnata. Erumpit e Sphæriarum tuberculis, qvare in centro adest quasi radix s. stipes, qvæ satis crassus, alias tenuissima. Rore rōseo abstero subtus rubra.

**1671 THELEPHORA violaceo-livida:** subeffusa, adnata, subpruinosa, violaceo-livida, corrugato-tuberculosa, tuberculis spuriis magnis.

Hab. in cortice ramorum siccorum Salicis Capreæ Saltdalen Nordlandiae.

Priori affinis. Substantia eadem grumoso-carnosa, et vegetatio eadem supra pustulas Sphærias proveniens, dénum confluens. Junior subfulva, sed mox color mutatur.

**1672 THELEPHORA fallax:** subeffusa, adnata, glabra, alutaceo-flava, papillis spuriis magnis.

*Fr. syst.* 1 p. 454. *Pers. myc.* 1 p. 151. *syn.* 1 p. 574.

Hab. in ramis junioribus Beiuleæ per Nordlandiam, Prioribus et Stilbosporis affinis.

1673 THELEPHORA *rosea*: effusa, membranacea,  
subcorrugata, rosea, margine subtusque tomentosa.

Th. *rosea* Fr. *syst.* 1 p. 451. Pers. *myc.* 1 p. 131.  
Hab. in cortice Populorum Nordlandiæ freqventer.  
Papillosa et rugosa, pulchre colorata.

1674 THELEPHORA *populina*: effusa, mollis, lævis,  
cinerascenti-ferruginea, margine subtusque tomentosa.

? Th. *fusca* Fr. *syst.* 1 p. 431?  
Hab. in cortice Populorum Nordlandiæ rarius.

Supra Sphæriam leucostomam omnino superficialis, primum ut tuberculum villosum pallidum, in cuius medio dein hymenium læve efformatur, provenit. Junior orbicularis medio a Sphæria latente umbonata, dein confluens, sat longa sed angusta. Fere tota e tomento contexta. Vetusta siccata subrimosa, margine reflectente.

1675 THELEPHORA *bombycina*: effusa, nivea,  
rimosa, hymenio tenui glabro papilloso, papillis rotundatis, subtus e villo laxo byssino contexta.

? Hypochnus *sereus* Fr. *obs.* 2 p. 278?  
Hab. in cortice putrido Alni Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Per rimas hymenii glabri villus laxus, e quo tota stirps composita, patet. Hymenium nullos ascos continet, sed e sola congerie sporidiorum constat.

## CLAVARIA.

Persoon *mycol. europæa* 1 p. 160,

1676 CLAVARIA *svecica*: ramosissima, mollis,  
alutaceo-pallida, ramis laxis subcompressis, ramulis acutis.

C. *svecica* Fr. *syst.* 1 p. 469. *obs.* 1 p. 156.

Hab. inter muscos ad lacum subsylvaticum Sædva  
Laponiæ pitensis. Aug.

2—3 unc. alta. Potius dichotome quam verticillate ramosa.

**1677 CLAVARIA pyxidata:** ramosissima, e palido rufescens, ramis ramulisqve verticillatis in tubum dilatatis *Pers. Comm.* p. 47 t. 1, 1 (opt.) *myc. eur.* 1 p. 165. *Fr. syst.* 1 p. 470. *Fl. dan.* t. 1304, 1.

Hab. in truncis pineis putridis Saltdalen Nordlandiæ rarius æstate.

**1678 CLAVARIA pratensis:** cæspitosa, lutea, caule tenui, ramis brevibus geniculatis divaricatis, ramulis subfastigiatis. *Fr. syst.* 1 p. 471. *Pers. myc.* 1 p. 171. *comm.* p. 51 t. 4, 5. *Holmsk. ot.* 2 p. 90. *C. muscoides Fl. dan.* t. 836, 2. *Hall. helv.* n. 2198.

Hab. inter muscos in pratis inferalpinorum Saltdalen Nordlandiæ rarius.

**1679 CLAVARIA viscosa:** ramosa, tenax, viscosa, vitellina, ramis ramulisqve furcatis, caule tenui radicato *Pers. comm.* p. 53 t. 1, 5. *myc.* 1 p. 171. *Fr. syst.* 1 p. 486. *Holmsk. ot.* 2 p. 81.

Hab. in truncis putridis Pini per Nordlandiam.

**1680 CLAVARIA cornea:** subcæspitosa, minor simplex ramosaqve, viscosa, lutea, basi connata *Fr. syst.* 1 p. 486. *Pers. comm.* p. 54. *syn.* p. 596. *Fl. dan.* t. 1305, 2. *Whlbg. ups.* n. 1077.

Hab. in truncis Populorum putridis, e qvorum rimis prorumpit, per Nordlandiam.

**1681 CLAVARIA pistillaris:** solitaria, magna glabra, e flavo-rufescens, sursum incrassata, obtusa. *Fr. syst.* 1 p. 477. *Pers. myc.* 1 p. 174. *comm.* p. 61. *Fl. dan.* t. 1255. *Lin. svec.* n. 1266. *Hall. helv.* n. 2204. *Whlbg. fl. ups.* n. 1072.

Hab. in terra sylvatica Lapponiæ pitensis.

**1682 CLAVARIA fistulosa:** longissima, fistulosa, gracilis, stricta, glabra, pallide-rufescens, radice villosa. *Fr. syst.* 1 p. 479. *Fl. dan.* t. 1256.

*C. pilipes Fl. dan.* t. 1076, 1. (optima).

*C. strigosa Schum. sæll.* 2 p. 403.

Hab. in ramis Alneis dejectis circa sinum saltensem Nordlandiæ rarissime.

Qvæ hic occurrit est C. pilipes *Fl. dan.*, quam certe cum C. fistulosa bene conjunxit Ch. Fries. Harum omnino ignarus est Cl. Persoon — cfr. myc. eur.

**1683 CLAVARIA ericetorum:** subcæspitosa, flavescentia, clavulis incrassatis subcompressis obtusis pallidis, stipite nitente flavo.

C. ericetorum *Pers. syn. p. 600. myc. 1 p. 180. NE. syst. f. 155. opt.*

C. argillacea *Fr. syst. 1 p. 483. obs. 2 p. 295. (Geoglossum).*

Hab. in terra sterili alpium Lapponiæ et Nordlandiæ nec non in inferalpinis passim rarius.

Icon *Fr. obs. 2 t. 5, 3 adeo dissimilis, ut vix varietatem sistere videatur.*

**1684 CLAVARIA pusilla:** subgregaria, minutissima, sublinearis, alba.

C. pusilla *Pers. comm. p. 86. t. 3, 6. myc. 1 p. 187. Pistillaria pusilla Fr. syst. 1 p. 498.*

Hab. in caulinibus exsiccatis aconiti per Nordlandiam aestate.

Stipes nullus distinctus, latitudini subæquali, 1—2 lin. alta.

**1685 CLAVARIA pallida:** gregaria, subsimplex, clavulis subfalcatis acuminatis pallidis, stipite flexuoso albido subpellucido, basi incrassata.

C. pallida *Schum. sæll. 2 p. 406. Fl. dan. t. 1576 opt. Pers. myc. 1 p. 188.*

C. mucida *Fr. syst. 1 p. 476. Pers. syn. p. 595 (?) sec. Fr.*

Hab. in terra humida sterili una cum Bæomycide rufo Saltdalen Nordlandiæ.

Clavula saepè fissa. Stipes a clavula omnino discretus, qvare sine dubio rectius Geoglosso's. novo generi Typhulæ Fr. (si retinendum) associatur. Tota  $\frac{1}{2}$  unc. longa. Sicca lutescit.

## GEOGLOSSUM

Fries systema mycol. 1 p. 487. NE. syst. p. 172.

**1686 GEOGLOSSUM glabrum:** glabrum, subsiccum, purpureo-nigricans, stipite subcylindrico basi dilutiore.

*G. glabrum* Fr. syst. 1 p. 488. Pers. myc. 1 p. 194. Syn. p. 608 Schum. säll. 2 p. 407.

*Clavaria ophioglossoides* Fl. dan. t. 1076, 2. Lin. 2 p. 1652.

Hab. in graminosis humidis Nordlandiae et Lapponiae pitensis parcus.

## MITRULA.

Fries systema mycolog. 1 p. 491.

Hymenium clavatum stipitem discretum arcte ambiens.

**1687 MITRULA globosa:** major, clavula globosa lœvi spadicea, stipite solido deorsum attenuato concolore. *Tab. nostra III.*

Hab. in terra arenosa inferalpinorum Saltdalen Nordlandiae parissime. Uno loco sed per plures annos Octobri lecta.

Ad subgenus: *Heyderia* Fr. proprie pertinet, nam stipes clavulam percurrit, margine ad basin connexo. *Leotiae Clavo* Pers. myc. eur. simillima, sed abunde diversa stipite longiori 1—2 unc. alto concolorique et loco habitationis. Nec Clavulam unquam adeo latam legi. Disperse crescit.

## LEOTIA.

Fries systema mycologicum 2 p. 25.

**1688 LEOTIA marcida:** coriaceo-carnosa, fulva, opaca, pileo tenui repando lœvi, subtus substiposo albicante, stipite longo deorsum attenuato,

*L. marcida* Fr. syst. 2 p. 28? Pers. myc. 1 p. 202? *Phallus marcidus* Fl. dan. t. 654, 1.

Hab. in terra pinetorum Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Minime subtremellosa nec flavovirens. Optime iconi Fl. dan. convenit, modo stipitem ultra 2 unc. longam non legi, et optimum illius nomen, nam tota substantia re vera ut marcida, corio præparato similis, imprimis in pagina inferiori, ubi nullæ venæ, sed tomentositas qvædam adest. A *L. circinanti* sine dubio non longe distat.

## MORCHELLA.

Fries systema mycolog. 2 p. 5.

**1689 MORCHELLA esculenta** ð. *conica*: pileo conico basi adnato, costis firmis in areolas elongatas anastomosantibus, stipite lævi Fr. syst. 2 p. 7. Fl. dan. t. 53. Gled. meth. p. 61, d.

*M. conica* Pers. myc. 1 p. 207.

Hab. in terra micacea sub rupibus calidioribus Saltdalen Nordlandiæ rarissime Junio.

**1073 HELVELLA Infula** Whlbg. fl. lap. n. 1073.

*Phallus triceps* Fl. dan. t. 835 (perbona).

Hab. etiam in lignis putridis nemorum Nordlandiæ.

**1690 HELVELLA pygmæa**: pileo libero deflexo lævi fusco, subtus albido subpruinoso, stipite sublævi pallescente.

Hab. in terra arenosa inferalpinorum Saltdalen Nordlandiæ rarissime.

Stipes farctus 3–4 lin. altus,  $\frac{2}{3}$  lin. latus. Pilus 2 lin. latus.

**1691 HELVELLA atra**: fuligineo - nigra, pileo deflexo utrinque adpresso libero, subtus lævi, stipite farcto furfuraceo - villoso. Fr. syst. 1 p. 19. Fl. dan. t. 334, 1. Gun. norv. n. 1059. Afzel. in Act. Ac. holm. 1783 p. 307.

*H. nigricans* Pers. myc. 1 p. 214. obs. 1 p. 72.

Hab. in pratis humidis Nordlandiæ saltensis \*).

**1692 PEZIZA badia:** subsessilis, integra, flexuosa, rufescens - brunnea, margine primo involuto, extus pruinosa dilutior subolivacea *Fr. syst.* 2 p. 46. *Pers. myc.* 1 p. 224. *syn.* p. 639.

Hab. in terra graminosa sylvarum Nordlandiæ saltensis rarius.

**1693 PEZIZA abietina:** subcæspitosa, concava, flexuosa, integra, subcinnamomea, basi lacunosa albo-villosa.

*P. abietina Fr. syst.* 2 p. 47. *Pers. myc.* 1 p. 232.

*P. grandis:* maxima, olivaceo-umbrina.

*P. abiet. P. grandis Pers. myc.* 1 p. 233 *Fr. l. c.*

*P. grandis Pers. obs.* 1 p. 27.

Hab. in truncis dejectis putridis Populi per Nordlandiam saltensem.

Var. *a.* hisce locis ochraceo - fulva, extus non farinosa occurrit. Larvis devoratur.

**1694 PEZIZA aurantia:** subsessilis, irregularis, obliqua, aurantiaca, extus subtomentosa albida.

*P. aurantia Fr. syst.* 2 p. 49. *Pers. myc.* 1 p. 222. *NE. syst.* f. 279. *Fl. dan.* t. 657, 2. *Hall. helv.* n. 2222 excl. var. *Gled. meth.* p. 49.

*P. cyathoides Whlbg. fl. ups.* n. 1091.

*P. coccinea Sow.* t. 78. *Bull. champ.* t. 474 sec. *Fr.*

*P. dichroa Holmsk. ot.* 1 t. 7.

Hab. in terra stercorata Nordlandiæ rarius.

\* Fungum dubii generis per duos annos in terra ad radicem Populi in inferalpinis Saltdalen legi.

Stipitatus, forma Boleti, pileo pallido - ferrugineo carnoso lento margine attenuato deflexo, ut saepissime adnato (Juniores margine omnino libero, seniores omnino adnato). Hymenium inferius primum rugulosum subtomentosum album, dein subporosum pallescens : tomentum in poros brevissimos irregulares abiit, et saepe per totum stipitem concolorum crassum carnosum utrinque incrassatum in pileum dilatatum descendit. Stipes  $1\frac{1}{2}$ —3 unc. altus. Pileus 1—3 unc. latus. Larvis repletus. Cfr. mihi ignotum *Hypolyssum ventricosum Pers. myc.* 2 p. 8 (*Merulius boletoides Sow. fung.* t. 402).

Fere æqve tomentosa ac *P. coccinea*, a qua differt: colore, forma irregulariori stipiteqve obsoletiori.

**1695 PEZIZA coccinea:** infundibiformis, coccinea, extus stipiteqve villo brevi adpresso subtomentosa albida.

*P. coccinea* *Fr. syst.* 2 p. 79. *Pers. myc.* 1 p. 258. *NE. syst.* f. 288. *Gled. meth.* p. 47.

Hab. in ramis lignisqve dejectis humo tectis imprimis in Alnetis Nordlandiæ.

Fungus elegantissimus. Stipes longitudine magnopere variat. Extus semper glabra, sed interdum subglobosa. Cupula primum globosa clausa, dein rumpitur magis magisqve explanatur. Interdum rumpendo 3—5 lobata evadit. Semel inveni stipe in radicem perennem nigrum abientem. Sine dubio perennis, nam iu ea duo aderant rami qui caudices detruncati pristinorum fungorum erant. An semper tali modo radicata?

**1696 PEZIZA Rapulum:** tenuis, subalutacea, cupula demum subexplanata glabra, stipite elongato tenui lævi.

? *P. Rapulum* *Fr. syst.* 2 p. 59. *NE. syst.* f. 291?

Hab. in fimo vaccino in loco uliginoso una cum Sphagno urceolato Saltdalen Nordlandiæ vere.

Cum radicem non viderim, de synonymis non certus sum. Stipes pollicaris; cupula  $\frac{1}{2}$  pol. lata pertenuis. Color inter fuscescentem et flavescentem.

**1697 PEZIZA alpestris:** sessilis, parva, e campanulato explanata, extus subnuda, disco aurantia-co fulvo.

*P. rutilans* d. *alpestris* *Fr. syst.* 2 p. 68.

Hab. in interqve Sphæchna urceolata Saltdalen Nordlandiæ.

1—2 lin. lata, mollis, læte colorata.

**1698 PEZIZA humosa:** sessilis, carnosa, plana s. convexiuscula miniata, margine integerrimo, subtus cinereo-livida.

*P. humosa* *Fr. syst.* 2 p. 71. *Obs.* 2 p. 309. *Fl. dan.* t. 656.

*P. cartilaginea Sowerby* t. 369,2 bene.

Hab. in terra arenosa ad ripas rivulorum Saltdalen Nordlandiæ.

Ascis lividos cylindricos octosporos filis succulentis fulvis immixtos sporidia ejicere sub lente vidi.

1699 PEZIZA *fascicularis*: cæspitosa, sessilis, coriaceo-membranacea, cupulis subhemisphæricis, dein subexplanatis difformibus sordide olivaceis, extus nigris farinosis.

*P. fascicularis Fr!* syst. 2 p. 75. Pers. myc. 1 p. 292. Alb. et Sw. p. 315 t. 12, 2 sec. Fr.

*P. populnea Pers. syn.* p. 671 (excl. syn.) myc. 1 p. 329.

Hab. in cortice Populi putrido Nordlandiæ.

Sicca varie flexuosa, margine involuta; mappa ex planata 3—5 lin. lata, colore disco olivaceo, pallescente nigricanteve. Furfur secedens imprimis marginem albidum reddit.

1700 PEZIZA *furfuracea*: cæspitosa, sessilis, carnosocoriacea, extus ochracea furfuracea, margine involuto integro, disco cinnamomeo-nigro.

*P. furfuracea Fr. syst.* 2 p. 76. Pers. myc. 1 p. 323.

*P. marchica Willd. in bot. Mag.* 2 p. 15 f. 9.

$\beta.$  *minor. P. furfuracea a. Fr. l. c.*

Hab. in Alnis,  $\beta.$  in Salicibus emortuis ligno innata corticem perrumpens per Nordlandiam e. gr. Saltalen passim.

Fasciculatæ, usqve ad 10 conjunctæ basi subtilitatæ erumpunt. Rarius modo explicatæ. Rimose dehiscit, qva in re ut etiam substantia tenace Cenangia satis refert, sed vera Peziza. Hy menium tenue læve. Var.  $\beta.$  triplo quadruplove minor, etiam fasciculata, de cetero nil differt.

1701 PEZIZA *hemisphærica*: sessilis, urceolata, carnosa, extus umbrina, pilis fasciculatis nigricantibus tecta, margine ciliato, disco livido.

*P. hemisphærica Fr. syst.* 2 p. 82. Pers. syn. p. 316. Fl. dan. t. 1558, 2. 656, 1. Hall. helv. n. 2231.

*P. fasciculata Pers. myc. 1 p. 244. Hedw. stirp. 2 t. 4.*

*P. hirsuta Holmsk. ot. 1 t. 19.*

Hab. in terra nemorum Nordlandiæ saltensis.

**1702 PEZIZA scutellata:** applanata, miniato-rubra, extus pallidior, marginem versus setis nigris strictis hispida *Fr. syst. 2 p. 85. Pers. myc. 1 p. 256. syn. p. 650. Fl. dan. t. 1437,2 Whlbg. ups. n. 1090. Lin. svec. n. 1272.*

*Octospora hirta Hedw. stirp. 2 t. 3.*

Hab. in lignis putridis et terra ad rivulos inferalpinorum Nordlandiæ saltensis et Lapponiæ pitensis.

**1703 PEZIZA Erinaceus:** gregaria, orbicularis, de-pressa, ochraceo-alba, extus setulis longis badio-fuscis. *Schwein. fung. carol. p. 93 e Fr. syst. 2 p. 86.*

Hab. in ligno populino perputrido Saltdalen Nordlandiæ parcius.

De synomymo vix dubitare possum, cum et character et descriptio convenientissimæ sint, modo pili longiores in fungo americano esse vi-dentur, nam in mea latitudinem qvidem minorum, sed non majorum cupularum æqvant. Non ultra 4 lin. lata. Extus, si pila excipis, concolor, disco parum lividiori, qvod vetat, quo minus *P. li-vidam Schum.* habeam. Pila non conferta. Mar-go subelevatus.

**1704 PEZIZA stercorea:** gregaria, minor, concava, fulva, extus setis badiis suberectis stipata. *Fr. syst. 2 p. 87. Pers. myc. 1 p. 246.*

*P. eqvina Fl. dan. t. 779, 3 (bona). Sowerby t. 352.*

*Octospora scutellata Hedw. stirp. 2, t. 3.*

*P. cupularis Whlbg. fl. ups. n. 1089, sed vix Lin.*

Hab. in stercore eqvino, qvod vere, nive deliq-ue-cente, strato superficiali rufescente tegit, quasi hieme vegetans.

Minuta subglobosa, disco subimpresso, colore incarnato-fulva occurrit. Semel modo æestate in loco paludososo evolutam, concavo-applanatam sed a priori vix diversam inveni,

**1705 PEZIZA calycina:** stipitata, coriacea, erumpens, infundibiliformis, extus albido-villosa, disco planiusculo aurantiaco *Fr. syst.* 2 p. 91. *Schum. säll.* 2 p. 424. *DC. fr.* 6 p. 25.

*P. chrysophtalma Pers. myc.* 1 p. 259.

Hab. in ramis emortuis Pini per Nordlandiam saltensem et Abietis per Lapponiam pitensem frequenter.

Sicca margine involuto tota albida.

**1706 PEZIZA bicolor:** minuta, subsessilis, globosa, tomentosa, alba, disco luteo *Fr. syst.* 2 p. 92. *Bull. champ.* t. 410, 3 sec. Fr.

*P. qvercina Pers. myc.* 1 p. 260. *NE. syst.* f. 284.

*P. transparens Pers. obs.* 2 p. 84.

Hab. in ramis exsiccatis Nordlandiae vere.

Arenam albam in stipitibus refert. *P. pulchella Pers. myc.* modo hujus varietas disco coccineo.

**1707 PEZIZA clandestina:** stipitata, minuta, turbinata, extus cervina furfuraceo-villosa, disco pallidente.

*P. clandestina Fr. syst.* 2 p. 94. *Pers. myc.* 1 p. 262.

Hab. in ligno putrido Alni Nordlandiae saltensis.

Gregaria, sed non conferta, quo crescendi modo et defectu crustae imprimis a parum minori *P. anomala* differt.

**1708 PEZIZA Schumacheri b. cærulescens:** sessilis, minuta, subrotunda, extus nigro-fusca tomentoso-pubescent, disco cærulescente.

*P. Schumacheri b. Fr. syst.* 2 p. 98.

*P. cærulescens Schum. säll.* 2 p. 434. *Pers. myc.* 1 p. 252. *Fl. dan.* t. 1755.

Hab. in ligno vetusto Saltdalen Nordlandiae.

Rarius rotunda, saepissime oblonga. Discus dilute cærulescens, sublacteus, planus, siccus omnino a margine elevato pubescente occultus.

**1709 PEZIZA sulphurea:** sessilis, minuta, subglobosa, strigoso-tomentosa sulphurea, disco pallido *Fr. syst.* 2 p. 104. *Pers. syn.* p. 649 excl. var.

Hab. in caulis Aconiti Saltdalen Nordlandiæ vere.

Colore nitidissimo, pure sulphureo dignoscitur.  
Ætate ferruginea evadit.

**1710 PEZIZA hyalina:** sessilis, punctiformis, subglobosa, humida vitreo-pellucida, extus subpilosa  
*Fr. syst. 2 p. 102. Pers. myc. 1 p. 316 excl.*  
*var. γ.*

Hab. in lignis putridis Nordlandiæ saltensis.

**1711 PEZIZA granuliformis:** sessilis, minuta, persistens, globosa, villosa alba, ore subconinvente, disco albido rubelloque.

*P. granuliformis Pers. myc. 1 p. 267. syn. p. 651.*  
*NE. syst. f. 283.*

*P. villosa Fr. syst. 2 p. 104. Pers. syn. p. 655.*

Hab. in stipitibus plantarum Nordlandiæ.

**1712 PEZIZA anomala:** substipitata, confertissima, in subiculo tenui brunneo sedens, cupulis turbinatis villosis cervinis, disco urceolato albido.

*P. anomala Fr. syst. 2 p. 106. Pers. syn. p. 656.*  
*Obs. 1 p. 29.*

*P. stipata Pers. myc. 1 p. 270. Sow. t. 369 (P. rugosa).*

Hab. in truncis ramisqve putrescentibus ligno adnata per Nordlandiam saltensem.

Interdum totos trunco, quasi velo tomentoso incrustat; sed in parvis maculis, qvoqve et quidem Sphærias destructas incolans subfasciculata prorumpit. Etiam stipes e tomento confectus, ut præter cupulam inconspicuam nil fungosi in ea sit. In aqua pulchre reviviscit.

**1713 PEZIZA fusca:** sessilis, cupulis concavis demum applanatis extus fuscis, subiculo lato tomentoso fusco-virescente insidentibus, disco livido s. pallescente.

*P. fusca Fr! syst. 2 p. 109. Pers. myc. 1 p. 272.*

*P. pruni avium Pers. myc. 1 p. 273.*

Hab. in ligno dejecto putrido Alni per Nordlandiam freqventer.

Sicca mox disco pallescente margine nigro subiculo insidente dignoscitur.

**1714 PEZIZA sangvinea:** sessilis, cupulis concavis glabris nigrescentibus, basi tomento brevi sangvineo cinctis *Fr. syst.* 2 p. 110. *NE. syst.* f. 271. *Pers. myc.* 1 p. 273.

Hab. in ligno populino putrescente Saltdalen Nordlandiæ passim.

Subiculum interdum pallescit, intus modo rubrum. Interdum omnino abesse videtur, lignum rubrum modo tingens. Cupulæ juniores regulares fuscescentes, Sphaeriam, adultæ magis flexuosæ nigræ, apothecia Lecideæ referunt.

**1715 PEZIZA fructigena:** tenax, glabra, pallida, lutescens, cupula patelliformi, stipite longo tenui flexuoso *Fr. syst.* 2 p. 118. *Schum. säll.* 2 p. 420. *NE. syst.* f. 282. *Pers. myc.* 1 p. 282. *obs.* 1 p. 42.

$\beta.$  *virgultorum:* minor, flavescens *Fr. l. c.*

$\gamma.$  *virgultorum Fl. dan.* t. 1016, 2. *Whlbg. ups.* n. 1088.

$\gamma.$  *salicina:* flava, subtus alba, cupula flexuosa, stipite deorsum attenuato, *Fr. l. c. Pers. myc.* 1 p. 283.

*P. salicina Pers. syn.* p. 663.

*P. convexa Holmsk. ot.* t. 16.

Hab. in amentis salicinisi rarius;  $\beta.$  &  $\gamma.$  in ramis salicinisi et alneis frequentius per Nordlandiam saltensem.

**1716 PEZIZA clavata:** lævis, glabra, pallido-fuscens, stipite crassiusculo cum cupula in clavam poro notatam confluente *Pers. myc.* 1 p. 185. *Fr. syst.* 2 p. 122.

Hab. in caulis Aconiti septentrionalis et Delphinii intermedii in Saltdalen Nordlandiæ vere.

Tota rigida, glaberrima, pallida, dein fuscescens. Habitu Calicium refert.

**1717 PEZIZA Marchantiæ:** minuta, sessilis, infundibuliformis, glabra, albida, margine ciliata, ciliis erectis distinctis.

Hab. in fronde Marchantiæ polymorphæ marcescentis ad rivula subalpina Saltdalen Nordlandiæ aestate.

Magnitudine seminis Sinapeos et minor. Ob defectum stipitis et minutiem cum *P. radiata* *P. confundi* non potest.

**1718 PEZIZA *rhodoleuca*:** tenuis, roseoalba, cupula glaberrima planiuscula, stipite æquali.

P. *rhodoleuca* Fr. syst. 2 p. 127. Obs. 2 p. 306.  
Hab. in stipitibus putridis Eqviseti palustris Saltdalen Nordlandiæ æstate.

Levissime concava, margine obsoleto.

**1719 PEZIZA *citrina*:** conferta, citrina, cupulis plano-concavis cum stipite brevi crasso albidiori obconicis Fr. syst. 2 p. 131. Pers. syn. p. 663. myc. 1 p. 293.

P. *cyathoides* Lin svec. n. 1273 sec. synonymon sed non secundum locum indicatum.  
Hab. in truncis putridis Nordlandiæ passim.

**1720 PEZIZA *lenticularis*:** conferta, convexiuscula, citrino-flava, stipite papillæformi nigrescente. P. *lenticularis* Fr. syst. 2 p. 133. Pers. syn. p. 664.

P. *citrina* Fl. dan. t. 1294, 1.

P. *citrina* \* *lenticularis* Pers. myc. 1 p. 293.

Helotium *nigripes* Schum. sæll. 2 p. 412.

Hab. in truncis dejectis subalpinorum et inferalpinorum Nordlandiæ saltensis.

A priori leviter modo differt, ut bene utrasque conjungere velit Cl. Persoon.

**1721 PEZIZA *imberbis*:** carnosoceracea, glabra, alba, cupulis plano-concavis subflexuosis, stipite papillæformi Fr. syst. 2 p. 136.

Hab. in cortice putrido Alni Saltdalen Nordlandiæ rarius.

P. *citrina* duplo minor. Sicca imprimis margine crispatur. Discus siccando pallescit, margine immutabili.

**1722 PEZIZA *coccinella*:** sessilis, minuta, submembranacea, glabra, planiuscula, suboblonga, saturate rosea, sicca pellucido-coccinea, margine tenui.

? P. *xanthostigma* Fr. syst. 2 p. 146 Obs. 1 p. 166?

Hab. in cortice frustuloso Betulæ et ramis emortuis Populi per Nordlandiam saltensem passim.

Vix lineam lata. Interdum ætate subirregularis.

Multa affinia cum *Dacrymyce Urticæ* habet, sed illa magis tremellosa.

- 1723 PEZIZA cinerea:** sessilis, mollis, minuta, scutellata, cinerea, margine integerrimo albidiori *Fr. syst. 2 p. 142. Pers. myc. 1 p. 302. NE. syst. f. 269.*  
*P. callosa Schum. säll. 2 p. 417. Fl. dan. t. 1490, 2.*  
*P. Alni et plana Schum. säll. 2 p. 417.*

Hab. in ligno putrido Alni Nordlandiæ.

- 1724 PEZIZA livido-fusca:** sessilis, membranaceo-mollis, planiuscula, glabra, subtus fusca, supra livido-pallens *Fr. syst. 2 p. 147.*

Hab. in ligno putrido arborum frondosarum Saltdalen Nordlandiæ.

Distincta species, *P. fuscæ* simillima, si subiculum ausers, Illa quoque major.

- 1725 PEZIZA melanochlora:** sessilis, minuta, disco plano virescente, margine elevato subcrispō nigrescente, sicca collapsa nigra.

Hab. in ligno betulino canescente Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Gregaria,  $\frac{1}{2}$  lin. lata cupulas *P. sangvineæ* sicca referens, sed madefacta mox tumet, disco molli plano, margine tenuissimo quasi membranaceo.

- 1726 PEZIZA Resinæ:** sessilis, dura, urceolato-patellata, aurantiaca, margine evanescente *Fr. syst. 2 p. 148.*

*Lecidea Resinæ Fr. obs. 1 p. 180.*

*Sphaeria Resinæ Fr. syst. 2 p. 453. Obs. 1 p. 180. (junior).*

Hab. in resina lignoque resinoso Pini Nordlandiæ saltensis freqventer,

Satis Lichenosa, sed nulla crusta, et stipite brevissimo obconica. Subtus pallidior. *Sph. Resinæ Fr.* modo est hujus initium propullans, disco incipiente punctiformi ostiolum mentiente. Intus sub strato ascigero albida.

- 1727 PEZIZA difformis:** sessilis, firma, applana-ta, subirregularis, subimmarginata, tota atra *Fr. syst. 2 p. 151.*

Hab. in resina lignoqye resinoso Pini Saltdalen Nordlandiæ.

Semper in vel una cum *Racodio pithyo* obvenit, illæ, qvæ in resina Abietis provenit, simillima, sed in resina Abietina etiam minorem, tenuorem, margine evidentiore sine *R. pithyo*, ab altera tamen vix specifice diversam reperi, qvare Racodium ad hanc ut subiculum non pertinet; modo eadem habitationis loca amat. Omnino opaca disco inæqvabili, margine obsoletissimo. Memorabile, qvod hymenium latus inferius usque ad receptaculum, quo medio affixus est funillus, quoqve occupat. Stratum hyalinum ascigerum receptaculum obscurum quasi nucleus subtipitatum includit.

**1728 PEZIZA Lecideola:** sessilis, minuta, subcornea, concava, nigra.  
P. *Lecideola Fr. syst. 2 p. 151. Obs. 1 p. 166 t. 4, 2.*

Hab. in ligno putrido Alni Nordlandiæ.

Gregaria, superficialis, humectata mollier. Crustam maculiformem cinereum, qvam describit Cl. Fries, nunquam observavi; sine dubio heterogenea.

## BULGARIA.

Fries systema mycologicum 2 p. 166.

**1729 BULGARIA pura:** gelatinosa, turbinata, lævis, hyalina rufescenti-albida.

*B. pura Fr. syst. 2 p. 168.*

*Peziza pura Pers. myc. 1 p. 320. Obs. 1 p. 40.*

Hab. in ramis dejectis salicinis Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Primum sessilis obconica extus rugulosa, supra plano-convexa margine subelevato, cærulescenti-albida, deinde stipes et pileus efformantur. Pileus convexiusculus, repando-lobatus rufescenti-albus in stipitem crassiusculum abiens. Stratum

ascigerum superficiale tenuissimum. Intus aquosa sine ulla floccis.

**1730 BULGARIA sarcoides:** subcæspitosa, polymorpha, gelatinoso-carnosa, purpurascenti-rubella, extus subvenosa, disco excavato.

*B. sarcoides Fr. syst. 2 p. 168. Hall. helv. n. 2221.*

*Peziza sarcoides Pers. myc. 1 p. 320 syn. p. 633,*  
*Octospora carnea Hedw. stirp. 2 t. 7, b.*

*b. P. carnosa Fl. dan. t. 1017, 1 Whlbg. lap. n. 1077.*

*β. pileata:* stipite longiusculo compresso, pileo plano lævi.

*P. sarcoides γ. cellaris Pers. syn. p. 634?*

**Hab.** in ramis dejectis putridis, imprimis Alneis; *γ.* in Populis imprimisqve in cellis Nordlandiæ saltensis.

Vix magnopere errat *Cl. Schumacher* sub sua *P. metamorpha* hanc et *Tremellam sarcoidem* *Fr. conjungens*. Substantia in hac firmior sane unicam præbet differentiam in plantis tam polymorphis. *Cl. Wahlenberg* duas hujus formas: *P. turbinatam et carnosam Fl. dan.* secundum *Cl. Vahl*ium recenset, sed secundum loca habitationis (in ramis Coryli Avellanæ) allata illæ infra limites hujus floræ ei obvenerunt. In var. *γ.* stipes compressus non vi factus est, nam in cellis libere crescentem talem inveni.

**1731 BULGARIA chrysocoma:** sessilis, subglatinosa, glabra, luteo-fulva, junior sphærica, demum centro depressa *Fr. syst. 2 p. 140* (Peziza). *Bull. champ. t. 376, 2 sec. Fr.*

*Peziza aurea Pers. myc. 1 p. 304. Obs. 1 p. 41.*  
*P. subplana Schum. sæll. 2 p. 416. Pers. myc.*

*1 p. 305.*

**Hab.** in sepibus vetustis et ramis decorticatis pineis Nordlandiam saltensem.

Bona hujus generis species. Asci et stratum ascigerum pertinues, Sicca omnino pezizoidea, margine varie flexuoso involutoqve, sed madida tumet, et basi gelatinoso tumido sæpe lacunoso insidet cupula, qvæ est ejusdem baseos latus su-

perius depresso ascigerum. Colore pulcherrimo nitet, sed aetate fuscescit, in quo statu eam descriptis Cl. Schumacher. Satis refert *Dacrym. stillatum* et *lacrymalem*, sed substantia tenacissima praeter alia differt,

## DITIOLA.

Fries. sistema mycologicum 2 p. 169.

Suberosæ, hymenium demum plicatum deliquescentia aperta, velo universali.

- 1732 DITIOLA *radicata*: disco planiusculo aureo, stipite crasso villoso albo radicato *Fr. syst.* 2 p. 170 opt.  
*Helotium radicatum NE. syst. f. 161.*  
*Leotia tuberculata Fl. dan. t. 1378.*  
*Peziza Turbo Pers. myc. 1 p. 321.*  
*Tremella Peziza Pers. syn. p. 628 (minor).*  
*Tubercularia Pini Schum. sæll. 2 p. 183.*  
Hab. in ligno pineo fermentante, imprimis fabrefacto Nordlandiæ saltensis.

## TYMPANIS.

Fries sistema mycologicum 2 p. 173.

Corneo-coriaceæ, hymenium demum fatiscens cupula aperata, velo partiali.

- 1733 TYMPANIS *alnea*: erumpens, nigra, suboblonga primum clausa, dein rima longitudinali flexuosa circinanteque dehiscens, obsolete marginata, basi crassa.  
*T. alnea Fr. syst. 2 p. 174.*  
*Peziza alnea Pers. myc. 1 p. 325. syn. p. 675.*  
Hab. in cortice Alnorum emortuarum epidermidem penetrans Saltdalen Nordlandiæ freqventer.  
Sparsa, gregaria, 2 lin. lata. Discus angustus hysteroides mollis subexplanatus, intus saltem pallescens, nam extus ob ambitus nigros niger

qvidem appareat. Discus sæpe circinans, sæpe 2 distincti in communi basi, ei T. conspersæ simili.

**1083 TYMPANIS conspersa Fr! syst. 2 p. 175.**

Peziza conglomerata Whlbg. fl. lap. n. 1083, ubi vide, excl. syn.

P. sphæroides NE. syst. f. 231 Pers. myc. 1 p. 528.

P. Aucuparia Pers. myc. 1 p. 327.

Hab. qvoqve in Alnis Sorbisqve Nordlandiæ.

## CENANGIUM.

Fries systema mycologicum 2 p. 177.

Subcoriacea; hymenium læve persistens, cupula clausa, sero aperta.

**1008 CENANGIUM Cerasi β. Padi:** subcæspitosum, difforme, primum tuberculatum rugosum ochraceum, dein cupulatum, disco nigrescente Fr. syst. 2 p. 180. Alb. et Schw. p. 345.

Peziza Cerasi Pers. myc. 1 p. 329.

Sphæria fallax Whlbg. fl. lap. n. 1008 excl. syn.

**1734 CENANGIUM pithyum:** minus, subsessile, difforme, læve, opacum atrum, ore rimoso, disco nigro Fr! syst. 2 p. 184. Obs. 2 p. 350 (Dothidea).

Hab. in cortice Pinorum emortuarum Nordlandiæ.

Primum tuberculiforme variumqve, dein rimose dehiscit, laciniis flexuosis undulatisqve. Cupula 1 lin. lata non profunda. Basis incrassata stipitiformis.

**1735 CENANGIUM arcticum:** solitarium, minimum, nigrum, suborbiculare, cupula in lacinas tres obtusas dehiscente, demum trigonum, disco albido Fr. syst. 2 p. 186. Ehrenb. fung. Cham. n. 33 t. 20 f. 17. sec. Fr.

Hab. in caulis Andromedæ tetragonæ alpium Lapponiæ.

**1736 CENANGIUM ferruginosum:** gregarium, coriaceo-membranaceum, substipitatum, pruino-

sum, cervino-nigrescens, ore linearis inflexo disco lutescente.

*C. ferruginosum Fr. syst. 2 p. 187.*

*Triblidium pineum Pers. myc. 1 p. 332.*

*Peziza abietis Pers. syn. p. 671.*

*P. cervina Pers. syn. p. 647.*

Hab. in cortice Pinorum nuper emortuarum hieme pulchre vegetans per Nordlandiam saltensem.

**1737 CENANGIUM Patella:** erumpens, sparsum, sessile, orbiculare, primum clausum totum olivaceo-nigrum, laxe, disco depresso, demum apertum cupulatum, disco albido, margine denticulato nigrescente.

*Sphæria Patella Fr. syst. 2 p. 511. Pers. syn. p. 76.*

*Peziza Chailletii Pers. myc. 1 p. 288. Fr. syst. 2 p. 144.*

*P. Ligustici DC. fr. 6 p. 21 sec. Fr.*

Hab. in caulis exsiccatis Umbelliferarum sed imprimis Angelicæ sylvestris in subalpinis Nordlandiæ saltensis.

Vix illius plantæ determinatio magis me vexavit, nam etsi vegetatio (per epidermidem erumpit) et habitus Sphæriæ erant, interna indoles (Peziza in perithecio inclusa — character Cenangii) me mox edocuit, Sphæriam non esse; & quamquam per plures hebdomades eam in aqua habui, attamen cupulæ modo tumidæ, non apertæ. Demum æstate in subalpinis evolutam inveni, & veram ejus naturam perspexi. Optime hujus generis characterem præbet. *Phacidio coronato Fr.* sane simillis, sed illius discus vix duplum continet stratum. Primum Sph. acuta vix major; cupulæ evolutæ 1—2 lin. latæ. \*)

\*) Duas Cenangii species non perfecte evolutas, quare mihi dubias, adhuc in Nordlandia legi.

## STICTIS.

Fries systema mycologicum 2 p. 191.

**1084 STICTIS Lecanora:** erumpens, suborbicularis, carnoso-tremellosa, planiuscula, rubra, fulva lividaque, margine erectiusculo sublacero furfuraceo-albido.

$\alpha.$  major, rubra.

P. ocellata Pers. myc. 1 p. 313. Fr. syst. 2 p. 193.

$\beta.$  minor, fulvescens lividave.

Peziza Lecanora Kunz . . . Fr. syst. 2 p. 193.

Pers. myc. 1 p. 313.

P. radiata Whlbg! fl. lap. n. 1084 excl. syn.

Hab. inter membranas epidermidis s. epidermidem ramorum Salicum Nordlandiae et Lapponiae.

Pez. ocellata Pers. sane a P. Lecanora non differt, cum vero de illo synonymo non plane convictus sum, nomen recentius adoptavi. Colore & magnitudine adeo variat, & margo prominens ætate semper albescit & sicca sese involvit, ut ex his rebus nulla nota distinctiva hauriri possit. Discus tenuis madefactus nonnihil quidem tumet, sed planus & depresso remanet.

**1738 STICTIS nigrella:** erumpens, orbicularis, ceraceo-mollis, patellæformis, disco nigro convexiusculo, margine tenui farinoso-albicante.

Hab. inter membranas epidermidis Salicis phylicifoliæ Saltdalen Nordlandiae rarius.

In statu sicco vix nisi colore disci nigro & margine minore a priori differt, qvibus notis permotus eam ut speciem non distinxeram, nisi madefactione aliam naturam exhibuerat; tum sc. valde tumet discus plano-convexus, niger, punctis o: apicibus ascorum exasperatus, marginem omnino occludens, apothecium Lecideæ referens; subtus pallidior. Hymenium ascis longiusculis refertum nigrum, receptaculum subcrassum extus intusque pallide-fuscum.

**1739 STICTIS mollis:** subimmersa, orbicularis, limbo tomentoso niveo, disco atro-virenti convexiusculo.

*S. mollis Pers. myc. 1 p. 337.*

*Sphæria venusta Sommerf. in lit. (jun).*

*b. minor*, limbo obsoletiore.

*Agyrium atrovirens Fr. syst. 2 p. 232,*

Hab. in ramis & truncis decorticatis Populi Saliciumque  
Saltdalen Nordlandiæ.

Juniores subclausæ, globosæ tomento compacto albo tectæ, disco punctiformi nigrescente impresso, intus carnosæ pallidæ; tum Sphæriæ habitum (*Sph. venusta Somerf.*) *Sph. ovinæ* affinis mentitur, sed nullum verum peritheciū adest, sed nucleus carnosus, (non gelatinosus) nudus in receptaculo nidulatur. Postea explanantur; tomentum recedit, & discus niger magis denudatur, usquedum tomentum limbum planum subcrenatum efformat. Tum nucleus s. hymenium antea intus pallidum carnosum e floccis et fors<sup>an</sup> ascis constans totum atrovirens gelatinoso-grumosæ substantiæ, in qua flocci rari, evadit. Demum hymenium delabitur, et receptaculum urceolatum vacuum residet. *Agyrium atrovirens* modo est hujus forma macrior, in qua interdum limbis receptaculi omnino oblitteratus & discus minor subhemisphæricus est. Nec cum *Ag. rufo et cæsio* *Fr.* ob substantiam diversam in uno genere conjugi potest.

**1740 STICTIS pallida:** gregaria, immersa, nuda, globosa, intus fulvescens, ore connivente sublacero.

*S. pallida Fr. syst. 2 p. 196. Pers. myc. 1 p. 338.*

*Peziza punctiformis Pers. syn. p. 338.*

Hab. in ramis decorticatis Pini frequentissime; in cortice Alnorum rarius per Nordlandiam saltensem.

Quæ in Alno crescit, disco pallidiore gaudet. Magnitudinem seminis Papaveris vix æqvat. Extus fusco-ferruginea.

**1741 STICTIS hemisphærica:** prominens, subglobosa, punctiformis, nigra, ore subconnivente rotundo, intus pallida *Fr. syst. 2 p. 196.*

Priori affinis, Sphæriam immersam referens, sed minor, et charactere indicato satis diversa.

1012 STICTIS parallelis Fr. syst: 2 p. 197.

Hysterium parallelum Whlbg. fl. lap. n. 1012,  
ubi vide.

1013 STICTIS versicolor. d. Fr. syst. 2 p. 198.

Hysterium pezizoides Whlbg. fl. lap. n. 1013,  
ubi vide.

1742 STICTIS rhodoleuca: erumpens, ovata, ma-  
juscula, plana, roseo-alba, pruinosa, intus flava,  
marginie spurio cincta.

? S. versicolor Fr. syst. 2 p. 198?

Hab. in truncis decorticatis putridis Populi passim,  
in ramis decorticatis strobilisqve Pini rarius Salt-  
dalen Nordlandiae.

Primum ligno omnino innata, mox vero hoc  
lineare rumpit, et demum discus prominet con-  
vexo-planus 1—2 lin. longus. Color roseus e  
substrato flavo per pruinam albam translucente  
oritur. Nullum receptaculum, sed superne a  
matrice velata, qvæ rupta marginem menti-  
tur. Intus ex ascis longis, in qvibus sunt sporidia  
6—7 oblonga, quasi duplicata s. linea superne  
divisa, et floccis constat. Siccando non muta-  
tur. A priori diversam esse. affirmare audeo.

## TREMELLA.

Fries systema mycologicum 2 p. 210.

1743 TREMELLA lutescens: cæspitosa, minor,  
mollis, undulato-gyrosa, glabra, nitens, albida  
dein lutea.

T. lutescens Fr. syn. 2 p. 213. Pers. syn. p. 622.

T. mesenterica β? lutescens Pers. myc. 1 p. 100.

T. mesenterica Weber.... Bull. champ. t. 406,  
b, c, d. 499, f. 6, u, v. sec. Fr.

T. juniperina Whlbg. fl. lap. n. 1075.? non Lin.

Hab. inter lignum corticemqve truncorum Alni pu-  
tridorum Saltdalen Nordlandiae.

Viscida, demum in gelatinam aquosam deli-  
quescit.

**1744. TREMELLA mesenterica:** expansa, adscendens; subtenax, plicato-undulata, aurantiaca. *Fr.* syst. 2 p. 214. *Pers. syn.* p. 622. *myc.* 1 p. 99. *NE.* syst. f. 142. *Schum. säll.* 2 p. 458. *Retz.* in *Act. holm.* 1769.

T. chrysocoma *Bull. champ.* t. 174 sec. *Fr.*  
Hab. in ramis emortuis Populi Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Ut conus obuersus undulato-plicatus saepissime occurrit. *Fl. dan.* t. 885, 3 vix hujus loci (contra Fries) cum rufo-fusca dicatur.

**1745. TREMELLA albida:** expansa, tenax, undulata, subgyrosa, albida. *Fr.* syst. 2 p. 215. *Huds. angl.* 2 p. 565. *Engl. bot.* t. 2117 sec. *Fr.* T. candida *Pers. syn.* 1 p. 624. *myc.* 1 p. 100. Hab. in ramis putridis dejectis Betulæ albæ Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Nunquam candida, sed albida subhyalina, demum fuscescens. Substantia fere callosa. Sub sibi effusa; ad 2 unc. longa.

**1746. TREMELLA indecorata:** sessilis, rotunda, tumida, convexa, plicata, opaca, sordida, sicca nigro-fusca.

Hab. in ramis siccis Salicis phylicifoliæ vere in Saltalen Nordlandiæ.

E cortice ramorum rotunda erumpit; sicca epidermidem vix excedit, et tum opaca aspero-corrugata, dura; madefacta tumet, superficie convexa, plicata, opaca ob spöridia subpulveracea ex livido olivaceoqve fuscescens, intus concolor, quasi e pluribus lobis connatis composita, 2-4 lin. lata, 2 lin crassa. Substantia sat tis firma.

**1085. TREMELLA sarcoides:** cæspitosa, mollis, viscosa, carneo-purpurascens, clavæformis, dein compressa lobata plicataqve. *Fr.* syst. 2 p. 217. *Engl. bot.* t. 2450 sec. *Fr.*

*Helvella sarcoides* *Dicks. fasc.* 1 p. 21.  
T. dubia *Pers. syn.* p. 630. *myc.* 1 p. 106.  
*Coryne Acrospermum* *NE.* syst. f. 143.  
T. Cerasi *Schum. säll.* 2 p. 438.  
*Acrospermum cylindricum* *Fl. dan.* t. 1076, 4.

- 1012 STICTIS *parallela* Fr. syst. 2 p. 197.  
Hysterium parallelum Whlbg. fl. lap. n. 1012,  
ubi vide.
- 1013 STICTIS *versicolor* d. Fr. syst. 2 p. 198.  
Hysterium pezizoides Whlbg. fl. lap. n. 1013,  
ubi vide.
- 1742 STICTIS *rhodoleuca*: erumpens, ovata, ma-  
juscula, plana, roseo-alba, pruinosa, intus flava,  
marginè spūio cincta.  
? S. *versicolor* Fr. syst. 2 p. 198?  
Hab. in truncis decorticatis putridis Populi passim,  
in ramis decorticatis strobilisqve Pini rarius Salt-  
dalen Nordlandie.  
Primum ligno omnino cinnata, mox vero hoc  
lineare rumpit, et dénum discus prominent convexo-planus 1—2 lin. longus. Color roseus e  
substrato flavo per pruinam albam translucente  
oritur. Nullum réceptaculum, sed superne a  
matrice velata, qvæ rupta marginem menti-  
tur. Intus ex ascis longis, in qvibus sunt sporidia  
6—7 oblonga, qvasi duplicata s. linea superne  
divisa, et floccis constat. Siccando non muta-  
tur. A priori diversam esse. affirmare audeo.

## TREMELLA.

Fries systema mycologicum 2 p. 210.

- 1743 TREMELLA *lutescens*: cæspitosa, minor,  
mollis, undulato-gyrosa, glabra, nitens, albida  
dein lutea.  
T. *lutescens* Fr. syn. 2 p. 213. Pers. syn. p. 622.  
T. *mesenterica* β? *lutescens* Pers. myc. 1 p. 100.  
T. *mesenterica* Weber. . . . Bull. champ. t. 406,  
b, c, d. 499, f. 6, u, v. sec. Fr.  
T. *juniperina* Whlbg. fl. lap. n. 1075. ? non Lin.  
Hab. inter lignum corticemqve truncorum Alni pu-  
tridorum Saltdalen Nordlandie.

Viscida, demum in gelatinam aquosam deli-  
quescit.

**1744 TREMELLA mesenterica:** expansa, adscendens, subtenax, plicato-undulata, aurantiaca *Fr.* *syst.* 2 p. 214. *Pers. syn.* p. 622. *myc.* 1 p. 99. *NE. syst.* f. 142. *Schum. säll.* 2<sup>o</sup> p. 438. *Retz. in Act. holm.* 1769.

*T. chrysocoma Bull. champ.* t. 174 sec. *Fr.*  
Hab. in ramis emortuis Populi Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Ut conus obuersus undulato-plicatus sæpissime occurrit. *Fl. dan.* t. 885, 3 vix hujus loci (contra Fries) cum rufo-fusca dicatur.

**1745 TREMELLA albida:** expansa, tenax, undulata, subgyroza, albida *Fr. syst.* 2 p. 215. *Huds. angl.* 2 p. 565 *Engl. bot.* t. 2117 sec. *Fr.*

*T. candida Pers. syn.* 1 p. 624. *myc.* 1 p. 100.  
Hab. in ramis putridis dejectis Betulæ albæ Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Nunquam candida, sed albida subhyalina, demum fuscescens. Substantia fere callosa. Subeffusa, ad 2 unc. longa.

**1746 TREMELLA indecorata:** sessilis, rotunda, tumida, convexa, plicata, opaca, sordida, sicca nigro-fusca.

Hab. in ramis siccis Salicis phylicifoliæ vere in Saltalen Nordlandiæ.

E cortice ramorum rotunda erumpit; sicca epidermidem vix excedit, et tum opaca aspero-corrugata, dura; madefacta tumet, superficie convexa, plicata, opaca ob sporidia subpulvracea ex livido olivaceoqve fuscescens, intus concolor, quasi e pluribus lobis connatis composita, 2–4 lin. lata, 2 lin crassa. Substantia sat firma.

**1085 TREMELLA sarcoides:** cæspitosa, mollis, viscosa, carneo-purpurascens, clavæformis, dein compressa lobata plicataqve *Fr. syst.* 2 p. 217. *Engl. bot.* t. 2450 sec. *Fr.*

*Helvella sarcoides Dicks. fasc.* 1 p. 21.

*T. dubia Pers. syn.* p. 630. *myc.* 1 p. 106.

*Coryne Acrospermum NE. syst.* f. 143.

*T. Cerasi Schum. säll.* 2 p. 438.

*Acrospermum cylindricum Fl. dan.* t. 1076, 4.

*b. galeata*: capitulo subrotundo albicante *Fr. l. c.*  
*Acrospermum galeatum Fl. dan. t. 1076. 3. Pers.*  
*comm. p. 91. myc. 1 p. 108. (Tremella) syn. p.*  
*678. (Helotium) Whlbg. fl. lap. n. 1085.*  
*T. cylindrica Schum. säll. 2. p. 441. Pers. myc.*  
*1 p. 108.*  
**Hab.** in ramis putridis dejectis Nordlandiæ saltensis.  
 Cfr. Bulgariam sarcoidem,

## NÆMATELIA.

Fries systema mycologicum 2 p. 227.

**1747 NÆMATELIA encephala**: subsessilis, pulvinata, plicato-rugosa, carneo pallida, demum fuscescens *Fr! syst. 2 p. 227.*  
*Tremella encephala Willd. in bot. magz. 4 p.*  
*17. f. 14. Pers. myc. 1 p. 98. Schum säll. 2 p. 438.*  
**Hab.** ad truncos Pinorum putridos Saltdalen Nordlandiæ rarius.

## EXCIDIA.

Fries systema mycologicum 2 p. 228.

**1748 EXCIDIA recisa**: gregaria, substipitata, obconica, fusco-ferruginea, subpellucida, supra lævis nitens, margine subcrenato, subtus rugoso-venosa opaca.  
*E. recisa Fr. syst. 2 p. 223.*  
*Tremella recisa NE. syst. f. 141. Pers. myc. 1 p. 103.*  
*T. sagarum Retz. in Act. Ac. holm. 1769.*  
*Peziza gelatinosa Pers. syn. p. 653.*  
**Hab.** in ramis salicinis Nordlandiæ.  
 Bulgariæ puræ peraffinis.

**1749 EXCIDIA spiculosa**: adpressa, crassiuscula, lævis, costata-undulata nigra nitens, subtus opaca, margine crenulato acutiusculo.  
*T. spiculosa Pers. myc. 1 p. 102. syn. p. 624.*

*T. atra Fl. dan.* t. 884 (fig. super. bona).

*E. glandulosa Fr. syst.* 2 p. 224. *Schum. säll.* 2 p. 437.

Hab. in epidermide ramorum siccorum Alni Nordlandiae saltensis rarius.

Gregaria, luci obversa vitro nigro similis est. Discus convexus in papillis passim elevatus, sed ubique laevis nitens, subtus dilutior opaca subrugosa. Flocci curvati.

**1750 EXCIDIA sacharina:** subtuberculosa, gyroso-undulata, crassa, fulvo-cinnamomea, papillis rarissimis adspersa *Fr. syst.* 2 p. 225.

Hab. in Pinis emortuis e cortice, sub qua nidulatur basis pallida compressa, prorumpens per Nordlandiam saltensem.

**1751 EXCIDIA repanda:** adpressa, subrotunda, crassa, laevis, carneo-cinnamomea, margine crenulato-crispo *Fr. syst.* 2 p. 225.

Hab. in ramis Betulæ Nordlandiae inferalpinæ.

Colore dilutiore, defectu stipitis ab *E. recisa* differt. Etiam in aqua difficulter reviviscit.

## DACRYMYCES.

Nees Esenbeck syst. p. 39. Fries syst. 2 p. 228.

**1752 DACRYMYCES stillatus:** rotundatus, subdiformis, convexus, demum deliquescentia, rubrofulvus.

*D. stillatus NE. syst. f.* 90 *Fr. syst.* 2 p. 250.

*Tremella abietina Pers. myc.* 1 p. 104. *syn. p. 627. obs. 1 p. 78. Schum. säll.* 2 p. 440.

*T. sepincola a. Willd. in Bot. mag.* 4 p. 18.

Hab. in parietibus sepibusque pineis putridis per Nordlandiam saltensem freqventer.

**1753 DACRYMYCES lacrymalis:** rotundata, conxiuscula, disco depresso, demum varie torta lutescens subdiaphana nitida, demum fuscescens.

*D. stillatus β. Fr. syst.* 2 p. 250. *NE. syst. p. 90.*

*Tremella lacrymalis Pers. myc.* 1 p. 104. *syn. p. 628.*

*T. torta Willd. in bot. mag.* p. 18.

- b. galeata*: capitulo subrotundo albicante *Fr. l. c.*  
*Acrospermum galeatum Fl. dan.* t. 1076. 3. *Pers. comm.* p. 91. *myc.* 1 p. 108. (*Tremella*) *syn.* p. 678. (*Helotium*) *Whlbg. fl. lap.* n. 1085.  
*T. cylindrica Schum. sæll.* 2. p. 441. *Pers. myc.* 1 p. 108.  
 Hab. in ramis putridis dejectis Nordlandiæ saltensis.  
 Cfr. *Bulgariam sarcoidem*.

## NÆMATELIA.

Fries *systema mycologicum* 2 p. 227.

- 1747 NÆMATELIA encephala**: subsessilis, pulvinata, plicato-rugosa, carneo pallida, demum fuscescens *Fr! syst.* 2 p. 227.  
*Tremella encephala Willd. in bot. magz.* 4 p. 17. f. 14. *Pers. myc.* 1 p. 98. *Schum sæll.* 2 p. 438.  
 Hab. ad truncos Pinorum putridos Saltdalen Nordlandiæ rarius.

## EXCIDIA.

Fries *systema mycologicum* 2 p. 220.

- 1748 EXCIDIA recisa**: gregaria, substipitata, obconica, fusco-ferruginea, subpellucida, supra lævis nitens, margine subcrenato, subtus rugoso-venosa opaca.  
*E. recisa Fr. syst.* 2 p. 223.  
*Tremella recisa NE. syst. f. 141. Pers. myc.* 1 p. 103.  
*T. sagarum Retz. in Act. Ac. holm.* 1769.  
*Peziza gelatinosa Pers. syn.* p. 633.  
 Hab. in ramis salicinis Nordlandiæ.

*Bulgariæ puræ peraffinis.*

- 1749 EXCIDIA spiculosa**: adpressa, crassiuscula, lævis, costata-undulata nigra nitens, subtus opaca, margine crenulato acutiusculo.  
*T. spiculosa Pers. myc.* 1 p. 102. *syn.* p. 624.

*T. atra Fl. dan.* t. 884 (fig. super. bona).

*E. glandulosa Fr. syst.* 2 p. 224. *Schum. sæll.* 2 p. 437.

Hab. in epidermide ramorum siccorum Alni Nordlandiæ saltensis rarius.

Gregaria, luci obversa vitro nigro similis est.

Discus convexus in papillis passim elevatus, sed ubique lævis nitens, subtus dilutior opaca subrugosa. Flocci curvati.

**1750 EXCIDIA sacharina:** subtuberculosa, gyroso-undulata, crassa, fulvo-cinnamomea, papillis rarissimis adspersa *Fr. syst.* 2 p. 225.

Hab. in Pinis emortuis e cortice, sub qua nidulatur basis pallida compressa, prorumpens per Nordlandiam saltensem.

**1751 EXCIDIA repanda:** adpressa, subrotunda, crassa, lævis, carneo-cinnamomea, margine crenulato-crispo *Fr. syst.* 2 p. 225.

Hab. in ramis Betulæ Nordlandiæ inferalpinæ.

Colore dilutiore, defectu stipitis ab *E. recisa* differt. Etiam in aqua difficulter reviviscit.

## DACRYMYCES.

Nees *Esenbeck syst.* p. 39. Fries *syst.* 2 p. 228.

**1752 DACRYMYCES stillatus:** rotundatus, subdiformis, convexus, demum deliquescentes, rubrofulvus.

*D. stillatus NE. syst.* f. 90 *Fr. syst.* 2 p. 250.

*Tremella abietina Pers. myc.* 1 p. 104. *syn p. 627. obs. 1 p. 78. Schum. sæll.* 2 p. 440.

*T. sepincola a. Willd. in Bot. mag.* 4 p. 18.

Hab. in parietibus sepibusque pineis putridis per Nordlandiam saltensem freqventer.

**1753 DACRYMYCES lacrymalis:** rotundata, conxieuscula, disco depresso, demum varie torta lutescens subdiaphana nitida, demum fuscescens.

*D. stillatus β. Fr. syst.* 2 p. 250. *NE. syst.* p. 90.

*Tremella lacrymalis Pers. myc.* 1 p. 104. *syn. p. 628.*

*T. torta Willd. in bot. mag.* p. 18.

Hab. in ramis decorticatis Populorum Pinorumque Nordlandiae saltensis frequentissime.

Species bona a priori omnino distincta, minor, subpezizoidea. Substantia multo tenacior vix diliquescit. Colore constanter ab illa diversus. Nec ille unquam fuscescit. Attamen non juvenis, sed senilis siccando fuscescit. Centro modo affixus, quare etiam centro depresso, quod numquam in priore. Structura interna eadem.

**1754 DACRYMYCES cæsius:** rotundatus, convexus, dein subirregularis centro depresso, sordide lac-tea, subhyalina.

Hab. in parietibus putridis Saltdalen Nordlandiae hie-me rarius.

Magnitudine seminis Cannabis. Sicca omnino evanescit, sed madefacta reviviscit. Ut species nova etiam a Cl. Fries agnita est.

**1755 DACRYMYCES Urticæ:** gregarius, subrotundus oblongusque, planiusculus s. excavatus, laevis, aurantio-ruber. D. Urticæ Fr! syst. 2 p. 251.

T. Urticæ Pers. myc. 1 p. 104. syn. p. 628.

T. sepincola β. Willd. in bot. mag. 4 p. 18.

Hab. ad caules exsiccatos Urticæ Saltdalen Nordlandiae vere rarius.

## A G Y R I U M.

Fries systema mycologicum 2 p. 231.

**1756 AGYRIUM rufum:** gregarium, subsphaericum, compactum, incarnatum, dein rufo-fuscum. A. rufum. Fr! syst. 2 p. 232.

Stictis rufa Pers. myc. 1 p. 338. Obs. 2 t. 6, 6. Tremella Stictis Pers. syn. p. 628.

Lichen (Verruc.) hyloicus Achar! prd. p. 16.

Hab. in ligno decorticato Juniperorum & Pinorum putrescente Nordlandiae.

Lignum, in quo basi applanata sedet, albicat. Demum fere omnino nigrum.

## SCLEROTIUM.

Fries systema mycologicum 2 p. 246.

**1757 SCLEROTIUM muscorum:** subterraneum, difforme, lobatum, glabrum, tuberculosum, subfibrillosum, extus intusque aureum.

*S. muscorum* Fr. syst. 2 p. 252. Pers. syn. p. 120.  
*Rhizoctonia muscorum* Fr! syst. 2 p. 265.

Hab. ad radices muscorum per Nordlandiam saltensem rarius.

**1758 SCLEROTIUM Semen β. Brassicola:** subimmersum, confertum, sphæricum, ex albido-lutescente spadiceum, demum corrugatum nigrum, intus pallidum Fr. syst. 2 p. 249.

Hab. in foliis Brassicæ Dauciique putridis Nordlandiæ saltensis vere.

Ab initio innatum est.

**1759 SCLEROTIUM durum:** adnatum, oblongum, subdifforme, depresso, substriatum, nigrum, intus albidum Fr. syst. 2 p. 259. Pers. syn. p. 121  
*in Usteri bot. An.* 11 p. 51. Schum. säll. 2 p. 185.

Hab. in caulinibus plantarum majorum ex. gr. Ruminicum per Nordlandiam saltensem.

Forma elongata, substantiaque dura eximum est.

**1760 SCLEROTIUM tomentosum:** ovatum, varium, interdum plura reticulatim connexa, crassum, rugulosum, nigrescens, albo-tomentosum, intus album.

*S. compactum* DC. Mem. p. 416. t. 14, 5 e Fr. syst. 2 p. 258.

*Periola tomentosa* Fr. syst. 2 p. 258.

Hab. ad tubera Solani tuberosi in cellis vere Saltdalen Nordlandiæ.

Cum fungillum eundem & supra receptacula & semina Helianthi annui & ad fructus putridos Cucumeris sativi inveni, vix de synonymo DeCandollii dubito etsi nullam mentionem tegumenti mucedinci albi facit. Tale quid etiam in priore juniore, sed evanescens, vidi; in hoc vero persistit. Magnitudine admodum variat. De synonymo Friesii majus mihi est dubium, cum colorem nigrum sub tomento albo non memorat.

Hab. in ramis decorticatis Populorum Pinorumque Nordlandiae saltensis frequentissime.

Species bona a priori omnino distincta, minor, subpezizoidea, Substantia multo tenacior vix deliquescit. Colore constanter ab illa diversus. Nec ille unquam fuscescit. Attamen non juvenis, sed senilis siccando fuscescit. Centro modo affixus, quare etiam centro depresso, quod nunquam in priore. Structura interna eadem.

**1754 DACRYMYCES cæsius:** rotundatus, convexus, dein subirregularis centro depresso, sordide lac-tea, subhyalina.

Hab. in parietibus putridis Saltdalen Nordlandiae hie-me rarius.

Magnitudine seminis Cannabis. Sicca omnino evanescit, sed madefacta reviviscit. Ut species nova etiam a Cl. Fries agnita est.

**1755 DACRYMYCES Urticæ:** gregarius, subrotundus oblongusque, planiusculus s. excavatus, laevis, aurantio-ruber.

D. Urticæ Fr! syst. 2 p. 251.

T. Urticæ Pers. myc. 1 p. 104. syn. p. 628.

T. sepincola β. Willd. in bot. mag. 4 p. 18.

Hab. ad caules exsiccatos Urticæ Saltdalen Nordlandiae vere rarius.

## A G Y R I U M.

Fries systema mycologicum 2 p. 251.

**1756 AGYRIUM rufum:** gregarium, subsphaericum, compactum, incarnatum, dein rufo-fuscum. A. rufum. Fr! syst. 2 p. 252.

Stictis rufa Pers. myc. 1 p. 338. Obs. 2 t. 6, 6.

Tremella Stictis Pers. syn. p. 628.

Lichen (Verruc.) hyloicus Achar! prd. p. 16.

Hab. in ligno decorticato Juniperorum & Pinorum putrescente Nordlandiae.

Lignum, in quo basi applanata sedet, albicat.

Demum fere omnino nigrum.

## SCLEROTIUM.

Fries systema mycologicum 2 p. 246.

**1757 SCLEROTIUM muscorum:** subterraneum, difforme, lobatum, glabrum, tuberosum, subfibrillosum, extus intusque aureum.

S. muscorum Fr. syst. 2 p. 252. Pers. syn. p. 120.

Rhizoctonia muscorum Fr! syst. 2 p. 265.

Hab. ad radices muscorum per Nordlandiam saltensem rarius.

**1758 SCLEROTIUM Semen β. Brassicola:** subimmersum, confertum, sphæricum, ex albido-lutescente spadiceum, demum corrugatum nigrum, intus pallidum Fr. syst. 2 p. 249.

Hab. in foliis Brassicæ Dauciique putridis Nordlandiæ saltensis vere.

Ab initio innatum est.

**1759 SCLEROTIUM durum:** adnatum, oblongum, subdifforme, depresso, substriatum, nigrum, intus albidum Fr. syst. 2 p. 259. Pers. syn. p. 121 in Usteri bot. An. 11 p. 31. Schum. sæll. 2 p. 185.

Hab. in caulinibus plantarum majorum ex. gr. Ruminicium per Nordlandiam saltensem.

Forma elongata, substantiaque dura eximum est.

**1760 SCLEROTIUM tomentosum:** ovatum, varium, interdum plura reticulatim connexa, crassum, rugulosum, nigrescens, albo-tomentosum, intus album.

S. compactum DC. Mem. p. 416. t. 14, 5 e Fr. syst. 2 p. 258.

Periola tomentosa Fr. syst. 2 p. 258.

Hab. ad tubera Solani tuberosi in cellis vere Saltdalen Nordlandiæ.

Cum fungillum eundem & supra receptacula & semina Helianthi annui & ad fructus putridos Cucumeris sativi inveni, vix de synonymo DeCandollii dubito etsi nullam mentionem tegumenti mucedinei albi facit. Tale quid etiam in priore juniore, sed evanescens, vidi; in hoc vero persistit. Magnitudine admodum variat. De synonymo Friesii majus mihi est dubium, cum colorrem nigrum sub tomento albo non memorat.

**1761 SCLEROTIUM vestitum:** confertum, globosum, fuscum, subcorrugatum, cortina lœvigate alba cinctum.

*S. vestitum NE.*

*Acinula candicans Fr. syst. 2 p. 267.*

Hab. in foliis graminum herbarumqve putrescentium vere nive deliquescente in Saltdalen Nordlandiæ passim copiose.

Cortina alba modo a *S. Semine* differt. Cortina e byssina substantia constat. Sæpe plura individua filis continuis cohærent, qva re factum est, ut puncta aliquva nuclei infecta remanserint, quod una cum superficie lœvigate indurataqve sine dubio effecit, ut Cl. Fries hanc cortinam diffluentem habeat. In guttula æqvæ microscopio subjectum adhuc naturam floccosam manifestat. A Sclerotiis vix juste discernitur.

## TRICHODERMA.

Nees Esenbeck system p. 80. f. 74.

**1762 TRICHODERMA viride:** subrotundum effusumqve villo albido, sporidiis obscure viridibus.

*T. viride Pers. syn. p. 231. Fl. dan. t. 1495.  
NE. l. c. Schum. sæll. 2 p. 235.*

Hab. in ligno fermentante per Nordlandiam saltem sem freqventer.

Primum provenit ut tomentum album, in quo postea sporidia viridia efformantur, donec tomentum tandem ab iis omnino oblitteratur.

**1763 TRICHODERMA roseum:** ovatum et sub effusum convexum villo roseo-albido, sporidiis roseis.

*T. roseum Pers. syn. p. 231. (minime vero Trichotecium roseum NE. syst. p. 46).*

Hab. in truncis Populorum inter lignum corticemqve solutum inqve earum rimis Saltdalen Nordlandiæ autumno passim.

Primum clausum, convexum 3–8 lin. longum

e filis byssinis albis contextum, dein sporidiis roseis efformatis rumpitur. Fibrilli adsunt inter sporidia magna, simplicia, qvæ sub lente ut vesiculæ pulverulentæ apparent.

**1764 TRICHODERMA flavum:** rotundatum, subconfluens, basi attenuatum, villo albo, sporidiis flavis.

Hab. in Gado virente sale condito in loco humido dejecto Saltdalen Nordlandiæ autumno rarius.

Gregarium, 2—4 lin. latum, 3—5 lin. altum. Primum macula parva byssina alba, cuius in medio nucleus oritur flavescentia pellueidus. Deinde globula byssina basi elongatur, ut subturbinata evadat. Postremo sporidia flavissima in superficie velo tenuissimo, quod mox flocculose abit, tecta efformantur. Sub strato sporigero album e filis byssinis tenuissimis compacte contextis permanet, sed sporidia fibrillis ex hac basi egredientibus immixta sunt. Sporidia minutiissima globosa \*).

## PENNICILIUM.

Nees Esenbeck system p. 58.

**1086 PENNICILIUM glaucum:** Pers. myc. I p. 40.

Monilia digitata Whlb. fl. lap. n. 1086, ubi vide.

**1765 PENNICILIUM fasciculatum:** filis simplicibus fasciculatis erectis, apice trifidis, ramis ramosis sporigeris, sporidiis cinerascentibus.

P. glaeum ß. fasciculatum Pers. myc. I p. 412.

Hab. in Sclerotio duro ad caules Runicis domestici Saltdalen Nordlandiæ vere.

\*) **FUSISPORIUM avenaceum** Fr. syst. 2 p. 238 (gelatinoso-carnosum, culmos recenter desectos Hordei tegens, flavum, floccis erectis albis undique pilosum) semel copiose in Saltdalen Nordlandiæ legi, cum vero sub microscopio non perlustravi, dubiam plantulam alio modo memorare nolui.

**1761 SCLEROTIUM vestitum:** confertum, globosum, fusum, subcorrugatum, cortina laevigata alba tenuissimum.

S. vestitum NE.

Acinula candidans Fr. syst. 2 p. 267.

Hab. in foliis graminum herbarumque putrescentium vere nive deliquescente in Saltdalen Nordlandiae passim copiose.

Cortina alba modo à S. Semine differt. Cortina e byssina substantia constat. Sæpe plura individualia filis continuis cohaerent, quae re factum est, ut puncta aliquæ nucelli intacta remanserint, quod una cum superficie laevigata indurataque sine dubio efficit, ut Cl. Fries hanc cortinam diffluentem habeat. In guttula æquæ microscopio subjectum adhuc naturam floccosam manifestat. A Sclerotio vix juste discernitur.

## TRICHODERMA.

Nees Esenbeck system p. 80. f. 74.

**1762 TRICHODERMA viride:** subrotundum effusumque villo albido, sporidiis obscure viridibus.

T. viride Pers. syn. p. 231. Fl. dan. t. 1495.  
NE. l. c. Schum. sæll. 2 p. 235.

Hab. in ligno fermentante per Nordlandiam saltem sem freqventer.

Primum provenit ut tomentum album, in quo postea sporidia viridia efformantur, donec tomentum tandem ab iis omnino obliteratur.

**1763 TRICHODERMA roseum:** ovatum et subeffusum convexum villo roseo-albido, sporidiis roseis.

T. roseum Pers. syn. p. 231. (minime vero Trichotecium roseum NE. syst. p. 46).

Hab. in truncis Populorum inter lignum corticemque solutum inque earum rimis Saltdalen Nordlandiae autumno passim.

Primum clausum, convexum 3—8 lin. longum

e filis byssinis albis contextum, dein sporidiis roseis efformatis rumpitur. Fibrilli adsunt inter sporidia magna, simplicia, quæ sub lente ut vesiculæ pulverulentæ apparent.

**1764 TRICHODERMA flavum:** rotundatum, subconfluens, basi attenuatum, villo albo, sporidiis flavis.

Hab. in Gado virente sale condito in loco humido dejecto Saltdalen Nordlandiæ autumno rarius.

Gregarium, 2—4 lin. latum, 3—5 lin. altum. Primum macula parva byssina alba, cujus in medio nucleus oritur flavessens pellucidus. Deinde globula byssina basi elongatur, ut subturbinata evadat. Postremo sporidia flavissima in superficie velo tenuissimo, quod mox flocculose abit, tecta efformantur. Sub strato sporigero album e filis byssinis tenuissimis compacte contextis permanet, sed sporidia fibrillis ex hac basi egredientibus immixta sunt. Sporidia minutissima glabosa \*).

## PENNICILIUM.

Nees Esenbeck system p. 58.

**1086 PENNICILIUM glaucum:** Pers. myc. I p. 40.

Monilia digitata Whlbg. fl. lap. n. 1086, ubi vide.

**1765 PENNICILIUM fasciculatum:** filis simpli- cibus fasciculatis erectis, apice trifidis, ramis ramosis sporigeris, sporidiis cinerascentibus.

P. glaucum f. fasciculatum Pers. myc. I p. 412.

Hab. in Sclerotio duro ad caules Rumicis domestici Saltdalen Nordlandiæ vere.

\*) **FUSISPORIUM avenaceum** Fr. syst. 2 p. 238 (gelatinoso-carnosum, culmos recenter desectos Hordei tegens, flavum, floccis erectis albis undique pilosum) semel copiose in Saltdalen Nordlandiæ legi, cum vero sub microscopio non perlustravi, dubiam plantulam alio modo memorare nolui.

Fila hyalina articulata iis *P. expansi* NE. simillima, modo omnia erecta. Semper apices in tres ramos finduntur, quorum singuli ramis brevibus sparsis ornati sunt.

### BOTRYTIS.

Persoon mycologia europaea 1 p. 32.

**1766 BOTRYTIS cinerea:** congesta subsparsaque cinerea, stipitibus dichotomis subracemosis, sporidiis glomeratis sparsis Schum. säll. 2 p. 238.  
*Pers. myc.* 1 p. 32. *disp.* p. 46, t. 3, 9.

Hab. in vegetabilibus putridis Nordlandiae.

**1767 BOTRYTIS cinereo-virens:** cæspitoso-effusa, fusco-viridis demum cinereo-virens erecta, decomposite ramosa, ramis oppositis, ramulis subalternis, sporidiis globosis obsitis.

*B. cinereo-virens Pers. myc.* 1 p. 33.

Hab. in truncis ramisque dejectis decorticatis Populorum & Salicium Nordlandiae.

Usque ad 2 poll. effusa. Vix linearem altitudinem attingit.

### CEPHALOTRICHUM.

Nees Esenbeck system. p. 87, f. 87.

**1768 CEPHALOTRICHUM Stemonitis:** gregarium, stipite setaceo rigido subfurfuraceo, sporidiis in capitulum elongato-conicum collectis cinereis. *C. Stemonitis NE. syst.* p. 87.

*Periconia Stemonitis Pers. syn.* p. 687 t. 3, 15. *Schum. säll.* 2 p. 240.

*Isaria Stemonitis Pers. comm.* p. 111.

*Byssus conoidea Fl. dan.* t. 897, 2.

Hab. in lignis mucidis cellarum Nordlandiae saltensis passim.

Cæspitulum e filis densis flexuosis sporidia involventibus constat. Fila in guttula aquæ sub lente lustrata articulata sese demonstrant.

## ERINEUM.

Persoon mycologia europaea 1 p. 2.

**1769 ERINEUM sorbeum:** floccis linearibus dense intricatis compressis latiusculis albis, exsiccatis flavescentibus Fr. obs. 1 p. 218. (Phyllerium) Pers. myc. 1 p. 4.

Hab. in foliis Sorbi Aucupariæ Saltdalen Nordlandiæ.  
Flocci varie torti compressi sub lente Ulvam subtilem referunt.

**1770 ERINEUM Alni incanæ:** floccis linearibus intricatis tortis subpulvinatis compressis albo-rufescentibus, dein subferrugineis.

E. Alni incanæ Pers. myc. 1 p. 5.

E. alneum NE. comm. p. 14 t. 1, 10 sec. Pers.

Hab. in foliis Alni incanæ Nordlandiæ copiose.

Ab E. alneo Pers. in foliis A. glutinosæ floccis linearibus omnino diversum. Priori similis, sed crassius et aliter coloratum.

**1771 ERINEUM betulinum:** suborbiculare, subimmersum, albidum dein rufo-fuscum, floccis cupulatis, cupulis scutellatis stipite deorsum attenuato duplo brevioribus.

E. betulinum Fr. obs. 1 p. 221. Schum. säll. 2 p. 445.

Hab. in pagina inferiori foliorum Betulæ marcescentium Nordlandiæ rarius autumno.

**1772 ERINEUM purpureum:** effusum, superficiale, sangvineo-purpureum, floccis cupulatis, cupulis turbinatis stipite crassiusculo brevioribus.

E. purpureum Fr. obs. 1 p. 221.

E. betulinum Alb. et Schw. consp. p. 370 sec. Fr. Uredo betulina Whlbg. fl. Lap. n. 1021?

Gjögeblod (sangvis Cuculi) Norvagis.

Hab. in foliis Betulæ, imprimis in pagina superiore per Nordlandiam passim copiose aestate.

Cum priori distinctissimo confundit Cl. Persoon (myc. eur. 1 p. 6). In prima juventute virescenti-albido-rubicundum sed mox sangvineo-purpureum immutabile.

Differt hæc a simili *M. palustri*, canale altiori erectiorique, pubescentia copiosiori et patentiori, racemis multo longioribus p. p.

- 99** *MYOSOTIS arvensis Whlbg. fl. lap.* n. 99, ubi vide.

Hab. in cultis, imprimis in hortis Nordlandiæ saltensis frequenter, sine dubio introducta.

- 102** *PULMONARIA maritima Whlbg. fl. lap.* n. 102, ubi vide.

Hab. in fundo sinus saltensis ad ostium fluminis Saltenselv. Etiam in sinu intimo Stördaliæ nidrosensis legi. Hoc contra Cl. Wahlenbergium, qui l. c. negat illam versus fundum sinuum provenire.

- 107** *PRIMULA farinosa* β. *stricta Whlbg. fl. lap.* n. 107, ubi vide.

P. *stricta Horn. fl. oec.* 1 p. 225. *Hartm. fl. scand.* p. 100.

P. *Hornemanniana Lehman Mon. Prim.* p. 55 t. 4.

Qui unquam varias hujus plantæ formas a subhumidis inferalpinis usque ad summos fere alpes Nordlandiæ observaverit, *P. strictam* propriam constituere speciem vix dicet. In inferalpinis Bodœ, si numerum florum excipis, plantæ in paludibus sællandicis obviæ convenientissima occurrit. Ut vero versus alpes ascendit caulis stricior, folia nudiora integrioraque, flores pauciores evadunt. Nunquam vero his in regionibus petalis adeo leviter emarginatis, ut habet icon fl. daniæ, sed fere bifidis inveni.

- 108** *PRIMULA Finmarkica*: foliis ovatis nudis integerrimis petiolatis, petalis obconicis bifidis, lacinias ovatis.

P. *finmarkica Lin. sp. pl. ed. Willd.* 1 p. 806. *Whlbg. fl. lap.* n. 108. *Hartm. fl. scand.* p. 100.

P. *norvegica Retz. fl. scand. ed. 2* p. 249. *Horn. fl. oec.* 1 p. 225. *Fl. dan.* t. 1819.

P. *integrifolia Gun. fl. norv.* n. 154. *Fl. dan.* t. 188.

Hab. in Finmarkia occidentali, ubi ad Hasvig, Maasœ et Vardœ legit III. *Gunnerus*, anno 1759.

Deinde ignota usq; vedum ad Hasvig et Talvig reperit Rev. *Deinboll.*

Planta pallide viridis, florens 5 uncias vix superans. Folia subcarnosa. Si corollæ formam et calycem nimis profunde partitum excipis, icon *Fl. dan.* t. 188 plantam optime refert.

**112 AZALEA procumbens** *Whlbg. fl. lap.* n. 112, ubi vide.

Hab. quoque in rupibus a ventis marinis tritis vix 100 ped. supra mare elevatis ad Skjerstad Nordlandiæ, quod novum præbet argumentum, ventos marinos clima alpinum efficere.

**113 POLEMONIUM cœruleum** *Whlbg. fl. lap.* n. 113 et p. XVI.

Hab. per Nordlandiam passim: in graminosis lateribus montium inferalpinorum Saltdalen et ad Indyr parochiæ Gillesgaard rarius; in Ofoten *Dr. Cetterstedt.*

## IMPATIENS.

Gen. pl. ed. Schreber n. 1365.

**1100116 IMPATIENS nolitangere:** foliis ovatis, pedunculis solitariis multifloris, geniculis caulinis tumentibus. *Lin. fl. svec.* n. 792 *Sp. pl. ed. Willd.* 1 p. 1176. *Smith. fl. brit.* 1 p. 243. *Gun. norv.* n. 134 *Fl. dan.* t. 588. *Pal. it. sib.*

Hab. in convallibus angustis inferalpinis a Rubis & Filicibus subocculta in Saltdalen Nordlandiæ. Frigoris impatiens in asyla aptissima quoque confugit. Planta vero ipsa nil differt a vulgari norvegica.

**123 GENTIANA involucrata** *Whlbg. fl. lap.* n. 123, ubi vide.

Hab. in Saltdalen et circa totum sinum saltensem passim copiose, ubi præter vulgares flores livido-cærulescentes etiam flores albos, sed nunquam flavos vel flavescentes inveni. Cl. Wahlenberg l. c. flores quidem albos dicit, sed modo rarius tales sese mihi obtulerunt.

Differt hæc a simili *M. palustri*, caule altiori erectiorique, pubescentia copiosiori et patentiori, racemis multo longioribus p. p.

- 99 MYOSOTIS *arvensis* Whlbg. fl. lap. n. 99, ubi vide.

Hab. in cultis, imprimis in hortis Nordlandiæ saltensis frequenter, sine dubio introducta.

- 102 PULMONARIA *maritima* Whlbg. fl. lap. n. 102, ubi vide.

Hab. in fundo sinus saltensis ad ostium fluminis Saltenselv. Etjam in sinu intimo Stördaliæ nidrosiensis legi. Hoc contra Cl. Wahlenbergium, qui l. c. negat illam versus fundum sinuum provenire.

- 107 PRIMULA *farinosa* β. *stricta* Whlbg. fl. lap. n. 107, ubi vide.

P. *stricta* Horn. fl. oec. 1 p. 225. Hartm. fl. scand. p. 100.

P. *Hornemanniana* Lehman Mon. Prim. p. 55 t. 4.

Qui unquam varias hujus plantæ formas a subhumidis inferalpinis usque ad summos fere alpes Nordlandiæ observaverit, *P. strictam* propriam constituere speciem vix dicet. In inferalpinis Bodœ, si numerum florum excipis, plantæ in paludibus sællandicis obviæ convenientissima occurrit. Ut vero versus alpes ascendit caulis stricior, folia nudiora integrioraque, flores pauciores evadunt. Nunquam vero his in regionibus petalis adeo leviter emarginatis, ut habet icon fl. danicæ, sed fere bifidis inveni.

- 108 PRIMULA *Finmarkica*: foliis ovatis nudis integerrimis petiolatis, petalis obconicis bifidis, laciniiis ovatis.

P. *finmarkica* Lin. sp. pl. ed. Willd. 1 p. 806. Whlbg. fl. lap. n. 108. Hartm. fl. scand. p. 100.

P. *norvegica* Retz. fl. scand. ed. 2 p. 249. Horn. fl. oec. 1 p. 225. Fl. dan. t. 1819.

P. *integrifolia* Gun. fl. norv. n. 154. Fl. dan. t. 188.

Hab. in Finmarkia occidentali, ubi ad Hasvig, Maasœ et Vardœ legit III. Gunnerus, anno 1759.

Deinde ignota usqvedum ad Hasvig et Talvig reperit *Rev. Deinboll.*

Planta pallide viridis, florens 5 uncias vix superans. Folia subcarnosa. Si corollæ formam et calycem nimis profunde paritum excipis, icon *Fl. dan.* t. 188 plantam optime refert.

**112 AZALEA procumbens** *Whlbg. fl. lap.* n. 112,  
ubi vide.

Hab. qvoqve in rupibus a ventis marinis tritis vix 100 ped. supra mare elevatis ad Skjerstad Nordlandiæ, qvod novum præbet argumentum, ventos marinos clima alpinum efficere.

**113 POLEMONIUM cœruleum** *Whlbg. fl. lap.*  
n. 113 et p. XVI.

Hab. per Nordlandiam passim: in graminosis lateribus montium inferalpinorum Saltdalen et ad Indyr parochiæ Gillesgaard rarius; in Ofoten *Dr. Cetterstedt.*

## IMPATIENS.

Gen. pl. ed. Schreber n. 1365.

**1100<sup>116</sup> IMPATIENS nolitangere:** foliis ovatis, pedunculis solitariis multifloris, geniculis caulinis tumentibus. *Lin. fl. svec.* n. 792 *Sp. pl. ed. Willd.* 1 p. 1176. *Smith. fl. brit.* 1 p. 243. *Gun. norv.* n. 134 *Fl. dan.* t. 588. *Pal. it. sib.*

Hab. in convallibus angustis inferalpinis a Rubis & Filicibus subocculta in Saltdalen Nordlandiæ. Frigoris impatiens in asyla aptissima qvoqve confugit. Planta vero ipsa nil differt a vulgari norvegica.

**123 GENTIANA involucrata** *Whlbg. fl. lap.*  
n. 123, ubi vide.

Hab. in Saltdalen et circa totum sinum saltensem passim copiose, ubi præter vulgares flores livido-cœruleentes etjam flores albos, sed nunquam flavos vel flavescentes inveni. Cl. Wahlenberg l. c. flores quidem albos dicit, sed modo rarius tales sese mihi obtulerunt.

Fila hyalina articulata iis *P. expansi* NE. si-millima, modo omnia erecta. Semper apices in tres ramos finduntur, qvorum singuli ramis brevi-bus sparsis ornati sunt.

## BOTRYTIS.

Persoon mycologia europaea 1 p. 32.

**1766** BOTRYTIS *cinerea*: congesta subsparsaque cinerea, stipitibus dichotomis subracemosis, sporidiis glomeratis sparsis Schum. säll. 2 p. 238.  
*Pers. myc.* 1 p. 32. *disp.* p. 46, t. 3, 9.

Hab. in vegetabilibus putridis Nordlandiæ.

**1767** BOTRYTIS *cinereo-virens*: cæspitoso-effusa, fusco-viridis demum cinereo-virens erecta, de-composite ramosa, ramis oppositis, ramulis sub-alternis, sporidiis globosis obsitis.

B. *cinereo-virens* *Pers. myc.* 1 p. 33.

Hab. in truncis ramisque dejectis decorticatis Popu-lorum & Salicum Nordlandiæ.

Usque ad 2 poll. effusa. Vix linearem altitu-dinem attingit.

## CEPHALOTRICHUM.

Nees Esenbeck system. p. 87, f. 87.

**1768** CEPHALOTRICHUM *Stemonitis*: gregarium, stipite setaceo rigido subfurfuraceo, sporidiis in capitulum elongato-conicum collectis cinereis. C. *Stemonitis* NE. syst. p. 87.

Periconia *Stemonitis* *Pers. syn.* p. 687 t. 3, 15. Schum. säll. 2 p. 240.

Isaria *Stemonitis* *Pers. comm.* p. 111.

Byssus conoidea *Fl. dan.* t. 897, 2.

Hab. in lignis mucidis cellarum Nordlandiæ saltensis passim.

Cæspitulum e filis densis flexuosis sporidia in-volventibus constat. Fila in guttula aquæ sub lente iustrata articulata sese demonstrant.

## ERINEUM.

Persoon mycologia europaea 1 p. 2.

- 1769 ERINEUM sorbeum:** floccis linearibus dense intricatis compressis latiusculis albis, exsiccatis flavescentibus *Fr. obs.* 1 p. 218. (*Phyllerium*) *Pers. myc.* 1 p. 4.  
**Hab.** in foliis Sorbi Aucupariæ Saltdalen Nordlandiæ.  
 Flocci varie torti compressi sub lente Ulvam subtilem referunt.
- 1770 ERINEUM Alni incanæ:** floccis linearibus intricatis tortis subpulvinatis compressis albo-rufescentibus, dein subferrugineis.  
*E. Alni incanæ Pers. myc.* 1 p. 5.  
*E. alneum NE. comm.* p. 14 t. 1, 10 sec. Pers.  
**Hab.** in foliis Alni incanæ Nordlandiæ copiose.  
 Ab *E. alneo Pers.* in foliis A. glutinosæ floccis linearibus omnino diversum. Priori similis, sed crassius et aliter coloratum.
- 1771 ERINEUM betulinum:** suborbiculare, subimmersum, albidum dein rufo-fuscum, floccis cupulatis, cupulis scutellatis stipite deorsum attenuato duplo brevioribus.  
*E. betulinum Fr. obs.* 1 p. 221. *Schum. säll.* 2 p. 445.  
**Hab.** in pagina inferiori foliorum Betulæ marcescentium Nordlandiæ rarius autumno.
- 1772 ERINEUM purpureum:** effusum, superficiale, sangvineo-purpureum, floccis cupulatis, cupulis turbinatis stipite crassiusculo brevioribus.  
*E. purpureum Fr. obs.* 1 p. 221.  
*E. betulinum Alb. et Schw. consp.* p. 370 sec. *Fr. Uredo betulina Whlbg. fl. lap.* n. 1021?  
 Gjögeblod (sangvis Cuculi) *Norvagis.*  
**Hab.** in foliis Betulæ, imprimis in pagina superiore per Nordlandiam passim copiose æstate.  
 Cum priori distinctissimo confundit Cl. Persoon (myc. eur. 1 p. 6). In prima juventute virescenti-albido-rubicundum sed mox sangvineo-purpureum immutabile.

## RACODIUM.

Persoon mycologia europaea 1 p. 67.

1773 RACODIUM *rupestre*: expansum, pannosum, aterrimum, filis ramosis laxe contextis.

*R. rupestre* Pers. myc. 1 p. 68. syn. p. 701.  
(excl. var.)

Dematium *rupestre* NE. syst. p. 76. Dill. t. 1, f. 18.

Conferva *ebenea* Lyngb! Hydr. p. 164.

Byssus *nigra velutina* Hall. helv. n. 2104. Leers herb. n. 1006.

Hab. in rimis absconditis rupium inferalpinorum Nordlandiae saltensis.

Sane nulla Conferva, cum continua omnino sint fila; nec madefacta mutantur. Stratum velutinum aterrimum refert.

1774 RACODIUM *pithyum*: expansum, molle, nigro-viride, filis simplicibus subæqualibus.

Hab. in resina et ligno resinoso Pini sylvestris per Nordlandiam saltensem.

Colore viridi & filis simplicibus a *R. vulgaris* et *resinæ Fr.* differt. Sæpiissime una cum *Peziza difformi* obvenit.

1775 RACODIUM *populinum*: expansum, tenuem, ochraceo-ferrugineum, filis tenuissimis indiscretis ramosissimis dichotomis.

*R. ochroleucum* Pers. myc. 1 p. 71?

Hab. inter strata ligni putrescentis Populi Saltdalen Nordlandiae.

Lignum putrescens Populi grato odore spirat, & fortius, si fungum alit; attamen certe odor non a fungo oritur; sed quod fungus statum illum putredinis, qui odorem procreat, amat.

## OZONIUM.

Persoon mycologia europaea 1 p. 86.

1776 OZONIUM *sulphureum*: fibrosum, dispersum, ramosum, elegantissime sulphureum.

*O. croceum* Pers. myc. p. 86.

*Himantia sulphurea* Pers. syn. p. 703.

*Athelia citrina Pers. myc.* 1 p. 86?

*Rhizomorpha corticata Fr. obs.* 1 p. 214.

*Elvella monstrosa lutea Gled. meth.* p. 52.

Hab. in caudicibus populinis putridis, quos perreptat,  
in Saltdalen Nordlandiae rarius.

Fibræ e filis tenuissimis sericeis contextæ,  
compactæ, sed vix vera cortina tectæ, fila inter-  
dum soluta, tum fibræ filum lanuginosum refe-  
runt. Adest quoque interdum membranaceum  
aliqvæd expansum tenuissimum expallens, intus  
vero croceum ut cætera, quod sine dubio ortum  
est, cum fila ad fibras formandas spatiū non  
haberent.

### RHIZOMORPHA.

*Persoon mycologia europaea* 1 p. 54.

**1777 RHIZOMORPHA subcorticalis:** compres-  
sa, fusco-nigricans, nitida, ramis sparsis reticulato  
anastomosantibus.

R. subcorticalis *Pers. myc.* 1 p. 54. *syn..* p. 704.  
*Ach. syn.* p. 288. *Fl. dan.* t. 713.

R. fragilis *Roth.* in *Ann. bot.* 1 p. 7.

*Elvella fibroso-reticulata* etc. *Gled. meth.* p. 53.

Hab. inter corticem et lignum arborum nec non ad  
loculos sepulchrales Nordlandiae saltensis fre-  
quenter.

Hos Lichenibus associare, liberos caliginis libe-  
ris lucis immiscere erat.

**1778 RHIZOMORPHA Friesii:** teretiuscula, te-  
nua, strigosa, fragilis, nigra, intus concolor, di-  
chotome ramosa, ramis ramulisque strictis acu-  
minatis.

Rh. Friesii *Ach.* in *Act. Ac. holm.* 1814 p. 227.  
t. 9. f. 4, a, b. *Fr! obs.* 1 p. 213.

Hab. sub cortice Pinorum Saltdalen Nordlandiae.

niis rotundifoliis e. gr. *compressa* observatur. Folia versus apicem conferta imbricata. An ad hanc an ad *I. scalarem* referri debeat synon. Wahlenbergii pro certo dicere non audeo. Dif- fert illa ab hac: amphigastriis, caule erectiusculo etc.

- 1197 JUNGERMANNIA pumila**  $\beta.$  *nigricans*: caule adscendente ramoso, foliis subremotis horizontalibus concavis elliptico - ovatis, (calyce oblongo-ovato acuminato).  
*J. pumila*  $\beta.$  *nigricans* *Hook. jung.* t. 17. f. 7, 8, 9. optima.

Hab. in terra interque muscos ad fontes et rivulos inferalpinos Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Surculi angusti, 3-5 lin. longi dorso radiculoso. Folia intense viridia et nigro-viridia oblongo-rotundata, reticulo denso tenui. *I. scalaris* Schmid. foliis convexis suborbicularibus differre videtur.

- 1198 JUNGERMANNIA cordifolia**: surculo erecto flexuoso dichotomo, foliis cordiformibus erectis concavis subcircumvolutis, (calyce terminali axillariqe).

*J. cordifolia* *Hook jung.* t. 32. opt. *Fl. dan.* t. 1775, 1.

Hab. in rivulis subalpinis Nordlandiæ saltensis passim copiose ex. gr. in Saltdalen.

Nulli alii affinis. Modo leviter inspecta cum *I. undulata*, quam magnitudine et crescendi modo æqvat, confundi potest. Intense viridis, siccata nigrescit. Adeo flaccida et substantiæ laxæ ut siccata in aqua difficulter perfecte reviviscat. Folia non cordata, sed cordiformia s. quadrato-ovata obtusa. Surculi passim stolones laterales emittunt, quibus evolutis dichotome divisvi evadunt.

- 1199  $\frac{2}{7} \frac{3}{4}$  JUNGERMANNIA pingvis**: fronde oblonga decumbente enervi carnosa sinuata divisaqve, calyce ex inferiore parte prope marginem egrediente brevissimo, perisporangio exerto cylindrico. *J. pingvis* *Lin. svec.* n. 1048. *Leers. herb.* p. 53. *W. et Mohr. crypt. germ.* p. 432. *Web. prd.* p. 93.

*Fl. dan.* t. 1428. *Hook. jung.* t. 46 opt. *Dill. musc.* t. 74. f. 42. (excl. fig. K. R. S.)

*J. fronde foliosa lacera ex latere florifera Hall. helv.* n. 1884.

*P. angustior:* fronde elongata sublineari, simpli- citer vel subpinnatim ramosa *Hook. jung.* t. 46, 2.

Hab. in argillosis udis Saltdalen Nordlandiæ passim.

Frons spongiosa supra planiuscula, suhtus con- vexa fragilis vivide viridis. An calyx marginalis, an inferus, difficile perspicitur. Sporangia oblonga.

728 **JUNGERMANNIA Blasia** *Hook. jung.* t. 81. *Whlbg. fl. ups.* n. 818.

*Blasia pusilla Whlbg. fl. lap.* n. 728, ubi vide.

726 **MARCHANTIA hemisphærica:** *Whlbg. fl. lap.* n. 726, ubi vide.

Hab. quoque in terra umbrosa ad rupes per Nordlan- diam saltensem passim freqventer.

1200 **MARCHANTIA conica:** receptaculo femineo integro ovato-conico subangulato, masculo sessili. *W. & Mohr crypt. germ.* p. 390. *Web. prd.* p. 105. *Hedw. theor.* t. 27. f. 3-5. t. 28. *Lin. sp. pl.* 2 p. 1604. *Dill. musc.* t. 75. f. 1.

Hab. in marginibus terrenis et saxis ad rivulos infe- ralpinos Saltdalen Nordlandiæ freqventer.

Mense Junii receptacula novella in ampulla hyalina squamis reniformibus purpureis stipata, sessilia et subglobosa reperiuntur et Targioniam eximie referunt. Autumno receptacula novella efformata sunt, et primo vere vigent moxque effectæ statim evanescunt. Calyces proprii s. calyptræ vere adsunt. In planta nondum matura calyx proprius albus hyalinus arctissime pedunculum sporangiumque obvelat includitque. Cum loculamentorum substantia removeatur, nudi apparent et pedunculi et germen, sed si inter digitos premuntur, prosilit germen cum pedunculo et remanet saccus ille tenuissimus albus pellucidus. Cum maturuerit & erupuerit germen, calyx intra fines loculamenti transversaliter dirruptus remanet, et tubulosus pedicellum & basin germinis includit. In liqvore interno receptaculorum masculinorum *Vibriones Angvillulas Muell.* inveni.

niis rotundifoliis e. gr. *compressa* observatur. Folia versus apicem conferta imbricata. An ad hanc an ad *I scalarem* referri debeat synon. Wahlenbergii pro certo dicere non audeo. Dif fert illa ab hac: amphigastriis, caule erectiusculo etc.

- 1197 JUNGERMANNIA pumila**  $\beta.$  *nigricans*: caule adscendente ramoso, foliis subremotis horizontalibus concavis elliptico-ovatis, (calyce oblongo-ovato acuminato).  
*J. pumila*  $\beta.$  *nigricans* *Hook. jung.* t. 17. f. 7, 8, 9. optima.

Hab. in terra interqve muscos ad fontes et rivulos inferalpinos Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Surculi angusti, 3-5 lin. longi dorso radiculoso. Folia intense viridia et nigro-viridia oblongo-rotundata, reticulo denso tenui. *I. scalaris* Schmid. foliis convexis suborbicularibus differre videtur.

- 1198 JUNGERMANNIA cordifolia**: surculo erecto flexuoso dichotomo, foliis cordiformibus erectis concavis subcircumvolutis, (calyce terminali axillariqve).

*J. cordifolia* *Hook jung.* t. 32. opt. *Fl. dan.* t. 1775, 1.

Hab. in rivulis subalpinis Nordlandiæ saltensis passim copiose ex. gr. in Saltdalen.

Nulli alii affinis. Modo leviter inspecta cum *I. undulata*, quam magnitudine et crescendi modo æqvat, confundi potest. Intense viridis, siccata nigrescit. Adeo flaccida et substantiæ laxæ ut siccata in aqua difficulter perfecte reviviscat. Folia non cordata, sed cordiformia s. quadrato-ovata obtusa. Surculi passim stolones laterales emittunt, qvibus evolutis dichotome divisæ evadunt.

- 1199  $\frac{2}{2} \frac{3}{4}$  JUNGERMANNIA pingvis**: fronde oblonga decumbente enervi carnosa sinuata divisaqve, calyce ex inferiore parte prope marginem egrediente brevissimo, perisporangio exerto cylindrico. *J. pingvis* *Lin. svec.* n. 1048. *Leers. herb.* p. 53. *W. et Mohr. crypt. germ.* p. 432. *Web. prd.* p. 93.

*Fl. dan.* t. 1428. *Hook. jung.* t. 46 opt. *Dill. musc.* t. 74. f. 42. (excl. fig. K. R. S.)

*J. fronde foliosa lacera ex latere florifera Hall. helv.* n. 1884.

*β. angustior*: fronde elongata sublineari, simpli- citer vel subpinnatim ramosa *Hook. jung.* t. 46, 2.

Hab. in argillosis udis Saltdalen Nordlandiæ passim.

Frons spongiosa supra planiuscula, suhtus con- vexa fragilis vivide viridis. An calyx marginalis, an inferus, difficile perspicitur. Sporangia oblonga.

728 **JUNGERMANNIA** *Blasia* *Hook. jung.* t. 81. *Whlb. fl. ups.* n. 818.

*Blasia pusilla* *Whlb. fl. lap.* n. 728, ubi vide.

726 **MARCHANTIA hemisphærica**: *Whlb. fl. lap.* n. 726, ubi vide.

Hab. quoque in terra umbrosa ad rupes per Nordlan- diam saltensem passim freqventer.

1200 **MARCHANTIA conica**: receptaculo feminineo integro ovato-conico subangulato, masculo sessili. *W. & Mohr crypt. germ.* p. 390. *Web. prd.* p. 105. *Hedw. theor.* t. 27. f. 3-5. t. 28. *Lin. sp. pl.* 2 p. 1604. *Dill. musc.* t. 75. f. 1.

Hab. in marginibus terrenis et saxis ad rivulos inferalpinos Saltdalen Nordlandiæ freqventer.

Mense Junii receptacula novella in ampulla hyalina squamis reniformibus purpureis stipata, sessilia et subglobosa reperiuntur et Targioniam eximie referunt. Autumno receptacula novella efformata sunt, et primo vere vigint moxque effiectæ statim evanescunt. Calyces proprii s. calyptræ vere adsunt. In planta nondum matura calyx proprius albus hyalinus arctissime pedunculum sporangiumque obvelat includitque. Cum loculamentorum substantia removeatur, nudi apparent et pedunculi et germen, sed si inter digitos premuntur, prosilit germen cum pedunculo et remanet saccus ille tenuissimus albus pellucidus. Cum maturuerit & erupuerit germen, calyx intra fines loculamenti transversaliter disruptus remanet, et tubulosus pedicellum & basin germinis includit. In liquore interno receptaculorum masculinorum *Vibriones Angvillulas* Muell. inveni.

## RACODIUM.

Persoon mycologia europaea 1 p. 67.

1773 RACODIUM *rupestre*: expansum, pannosum, aterrimum, filis ramosis laxe contextis.

*R. rupestre* Pers. myc. 1 p. 68. syn. p. 701.  
(excl. var.)

*Dematium rupestre* NE. syst. p. 76. Dill. t. 1, f. 18.

*Conferva ebenea* Lyngb! *Hydr.* p. 164.

*Byssus nigra velutina* Hall. *helv.* n. 2104. *Leers herb.* n. 1006.

Hab. in rimis absconditis rupium inferalpinorum Nordlandiae saltensis.

Sane nulla *Conferva*, cum continua omnino sint fila; nec madefacta mutantur. Stratum velutinum aterrimum refert.

1774 RACODIUM *pithyum*: expansum, molle, nigro-viride, filis simplicibus subæqualibus.

Hab. in resina et ligno resinoso Pini sylvestris per Nordlandiam saltensem.

Colore viridi & filis simplicibus a *R. vulgari et resinæ* Fr. differt. Sæpiissime una cum *Peziza difformi* obvenit.

1775 RACODIUM *populinum*: expansum, tenue, ochraceo-ferrugineum, filis tenuissimis indiscretis ramosissimis dichotomis.

*R. ochroleucum* Pers. myc. 1 p. 71?

Hab. inter strata ligni putrescentis Populi Saltdalen Nordlandiæ.

Lignum putrescens Populi grato odore spirat, & fortius, si fungum alit. attamen certe odor non a fungo oritur; sed quod fungus statum illum putredinis, qui odorem procreat, amat.

## OZONIUM.

Persoon mycologia europaea 1 p. 86.

1776 OZONIUM *sulphureum*: fibrosum, dispersum, ramosum, elegantissime sulphureum.

*O. croceum* Pers. myc. p. 86.

*Himantia sulphurea* Pers. syn. p. 703.

*Athelia citrina Pers. myc. 1 p. 86?*

*Rhizomorpha corticata Fr. obs. 1 p. 214.*

*Elvella monstrosa lutea Gled. meth. p. 52.*

Hab. in caudicibus populinis putridis, quos perreptat, in Saltdalen Nordlandiæ rarius.

Fibræ e filis tenuissimis sericeis contextæ, compactæ, sed vix vera cortina tectæ, fila interdum soluta, tum fibræ filum lanuginosum referunt. Adest quoque interdum membranaceum aliiquid expansum tenuissimum expallens, intus vero croceum ut cætera, quod sine dubio ortum est, cum fila ad fibras formandas spatium non haberent.

## RHIZOMORPHA.

Persoon mycologia europæa 1 p. 54.

**1777 RHIZOMORPHA subcorticalis:** compressa, fusco-nigricans, nitida, ramis sparsis reticulato anastomosantibus.

*R. subcorticalis Pers. myc. 1 p. 54. syn.. p. 704.  
Ach. syn. p. 288. Fl. dan. t. 713.*

*R. fragilis Roth. in Ann. bot. 1 p. 7.*

*Elvela fibroso-reticulata etc. Gled. meth. p. 53.*

Hab. inter corticem et lignum arborum nec non ad loculos sepulchrales Nordlandiæ saltensis frequenter.

Hos Lichenibus associare, liberos caliginis liberis lucis immiscere erat.

**1778 RHIZOMORPHA Friesii:** teretiuscula, tenuis, strigosa, fragilis, nigra, intus concolor, dichotome ramosa, ramis ramulisque strictis acuminatis.

*Rh. Friesii Ach. in Act. Ac. holm. 1814 p. 227.  
t. 9. f. 4, a, b. Fr! obs. 1 p. 213.*

Hab. sub cortice Pinorum Saltdalen Nordlandiæ.

---

## ADDENDA.

---

Pag. 83. HYPNUM *arcticum*.

Sine dubio hujus loci est *Leskeæ Smithii Hartm.*  
*fl. scand.* excluso synonymo Schwægrichenii. For-  
san Leskeæ species est, nam cum peristomio integro  
nunquam habui, sed habitus omnino Hypni. Sane  
natura duce anglici botanici genera Hypnum et Les-  
keam conjungunt.

---



INDEX  
GENERUM ET SPECIERUM  
CUM  
SYNONYMIS SELECTIS.

---

<i>Acinula candicans</i>	p. 311
<i>Adoxa moschatellina</i>	- 18.
<i>Æcidium</i> vide <i>Cæoma</i> .	
<i>Ægerita persicina</i> Fr.	- 235
<i>Agaricus androsaceus</i>	- 256
<i>aqvosus</i>	... - 255
<i>arcticus</i>	... - 262
<i>asprellus</i>	... - 260
<i>atrotomentosus</i>	... - 261
<i>betulinus</i>	... - 270
<i>bicolor</i>	... - 266
<i>campanulatus</i>	... - 255
<i>campestris</i>	... - 263
<i>Candollianus</i>	... - 264
<i>caperatus</i>	... - 260
<i>capnoides</i>	... - 264
<i>caudicinus</i>	... - 260
<i>cervinus</i>	... - 259
<i>cinereus</i>	... - 266
<i>cinnamomeus</i>	... - 260
<i>clavipes</i>	... - 253
<i>comatus</i>	... - 266
<i>conicus</i>	... - 253
<i>coriaceus</i>	... - 270
<i>Corticola</i>	... - 256
<i>cristatus</i>	... - 250
<i>cyanipes</i>	... - 259
<i>cyathiformis</i>	- 253, 257
<i>cylindricus</i>	... - 266
<i>cynoxanthus</i>	... - 252
<i>decipiens</i>	... - 271
<i>deliciosus</i>	... - 252
<i>deliqvescens</i>	... - 266
<i>dryophilus</i>	... - 254

<i>Agaricus emeticus</i>	p. 251
<i>ephemeroides</i>	... - 266
<i>epigæus</i>	... - 258
<i>epiphyllus</i>	... - 256
<i>eqvestris</i>	... - 251
<i>ericetorum</i>	... - 256
<i>fertilis</i>	... - 259
<i>fimetarius</i>	... - 266
<i>fimicola</i>	... - 265
<i>flaccidus</i>	... - 253
<i>flavovirens</i>	... - 251
<i>fulvus</i>	... - 249
<i>galericulatus</i>	... - 255
<i>Georgii</i>	... - 252
<i>gylvus</i>	... - 253
<i>glutinosus</i>	... - 254
<i>granulosus</i>	... - 250
<i>haematópus</i>	... - 255
<i>Hornemannii</i>	... - 264
<i>Hypnorum</i>	... - 261
<i>hypothejus</i>	... - 251
<i>illinitus</i>	... - 250
<i>integer</i>	... - 252
<i>lactifluus</i>	... - 253
<i>lividus</i>	... - 249
<i>melleus</i>	... - 250
<i>membranaceus</i>	... - 253
<i>miniatus</i>	... - 254
<i>mitis</i>	... - 257
<i>murcidus</i>	... - 265
<i>muricatus</i>	... - 250
<i>muscarius</i>	... - 250
<i>mutabilis</i>	... - 260, 264
<i>nidulans</i>	... - 258

## INDEX.

- Agaricus nitens* . . . P. 264  
*ochroleucus* . . . - 252  
*papilionaceus* . . . - 265  
*petalooides* . . . . - 258  
*piperatus* . . . . - 252  
*plumbeus* . . . . - 249  
*Pluteus* . . . . . - 259  
*polygrammus* . . . . - 255  
*polymyces* . . . . - 251  
*præcox* . . . . . - 263, 264  
*proboscideus* . . . . - 261  
*pterigenus* . . . . . - 256  
*pubescens* . . . . . - 262  
*purus* . . . . . - 255  
*quietus* . . . . . - 253  
*resupinatus* . . . . - 261  
*rutilans* . . . . . - 251  
*sacharinus* . . . . . - 256  
*semiglobatus* . . . . - 263  
*semiovatus* . . . . . - 265  
*separatus* . . . . . - 265  
*serotinus* . . . . . - 257  
*serrulatus* . . . . . - 259  
*sordidus* . . . . . - 257  
*spadiceus* . . . . . - 249  
*spathulatus* . . . . . - 262  
*speciosus* . . . . . - 263  
*Sphagnorum* . . . . . - 261  
*sqvamosus* . . . . . - 264  
*subluteus* . . . . . - 260  
*tardus* . . . . . - 257  
*torminosus* . . . . . - 252  
*torpens* . . . . . - 265  
*tremulus* . . . . . - 258  
*trullæformis* . . . . - 237  
*umbelliferus* . . . . - 256  
*umbrinellus* . . . . - 259  
*unicolor* . . . . . - 261  
*variabilis* . . . . . - 262  
*variegatus* . . . . - 251  
*Agrostis alpina* . . . . - 3  
*rubra* . . . . . - 3  
*Agyrium atrovirens* . . . . - 304  
*rufum* . . . . . - 304  
*Aira aquatica* . . . . - 3  
*Ajuga pyramidalis* . . . - 27  
*Alsinella Gieseckii* . . . - 21  
*Anemone ranunculoides* 25  
*Anthyllis Vulneraria* . - 29  
*Arcyria atra Sch.* . . . - 245  
*dentata Sch.* . . . . - 245  
*incarnata P.* . . . . - 244  
*Arcyria punicea P.* p. 244  
*vermicularis Sch.* . . . - 245  
*Arenaria ciliata* . . . . . - 21  
*Gieseckii* . . . . . - 21  
*humifusa* . . . . . - 21  
*norvegica* . . . . . - 21  
*serpyllifolia* . . . . . - 22  
*trinervia* . . . . . - 22  
*Arnica alpina* . . . . . - 34  
*Arthonia punctiformis* - 141  
*m oriformis* . . . . - 223  
*Asplenium trichoman* - 43  
*Asteroma Padi* . . . . . - 228  
*Astragalus oroboides* - 30  
*Atriplex hastata* . . . - 43  
*Avena pratensis* . . . . - 6  
*pubescens* . . . . . - 6  
*Barbula convoluta* . . . . - 48  
*cuneifolia* . . . . . - 47  
*mucronulata* . . . . - 48  
*unguiculata* . . . . . - 48  
*Batrachospermum myosurus* . . . . . - 202  
*Boletus annulatus* . . . . - 272  
*aurantius* . . . . . - 273  
*bovinus* . . . . . - 272  
*edulis* . . . . . - 273  
*flavidus* . . . . . - 272  
*luteus* . . . . . - 272  
*platyporus* . . . . . - 274  
*ramosus* . . . . . - 275  
*saaber* . . . . . - 273  
*subtomentosus* . . . . - 273  
*variegatus* . . . . . - 273  
*velatus* . . . . . - 272  
*Botrychium matricarioides* . . . . - 44  
*Botrytis cinerea* . . . . - 313  
*cinereo-virens* . . . . - 315  
*Bryum alpinum* . . . . . - 59  
*annotinum* . . . . . - 57  
*carneum* . . . . . - 59  
*cucullatum* . . . . . - 59  
*intermedium* . . . . . - 58  
*pallens* . . . . . - 58  
*pallescens* . . . . . - 58  
*turbinatum* . . . . . - 58  
*Wahlenbergii* . . . . . - 56  
*Bulgaria chrysocoma* - 299  
*pura* . . . . . - 298  
*sarcoides* . . . . . - 299  
*Byssus aurea L.* . . . - 194  
*Cæoma Alchemillæ* . . . - 230

## INDEX

324

- |                                  |      |                   |
|----------------------------------|------|-------------------|
| <i>Cæoma alneum</i>              | p.   | 231               |
| appendiculatum                   | -    | 232               |
| <i>Betonicæ</i>                  | ...  | 233               |
| candidum                         | ...  | 231               |
| <i>Caricis</i>                   | ...  | 231, 233          |
| carpophilum                      | ...  | 231               |
| <i>caulincola</i>                | ...  | 234               |
| cinctum                          | ...  | 232               |
| <i>columellatum</i>              | ...  | 229               |
| farinosum                        | ...  | 231               |
| <i>graminis</i>                  | ...  | 233               |
| grande                           | ...  | 229               |
| <i>Hydropiperis</i>              | ...  | 232               |
| <i>mamillatum</i>                | ...  | 230               |
| <i>Pini</i>                      | ...  | 229               |
| saxifragæ                        | ...  | 231               |
| <i>solidaginis</i>               | ...  | 234               |
| <i>Thalictri</i>                 | ...  | 230               |
| <i>Tragopogi</i>                 | ...  | 230               |
| <i>Tussilaginis</i>              | ...  | 230               |
| <i>Ulmariae</i>                  | ...  | 231               |
| <i>verrucosum</i>                | ...  | 231               |
| <i>Violæ</i>                     | ...  | 232               |
| <i>Cakile maritima</i>           | ...  | 28                |
| <i>Calicum abietinum</i>         | P.   |                   |
| alboatrum Fl.                    | ...  | 179               |
| <i>brunneolum</i> A.             | ...  | 182               |
| <i>byssaceum</i> Fr.             | ...  | 178               |
| <i>capitellatum</i> A.           | ...  | 182               |
| <i>cerviculatum</i> A.           | ...  | 179               |
| <i>chrysocephalum</i> A.         | ...  | 182               |
| <i>claviculare</i> A.            | ...  | 180               |
| <i>lenticulare</i> A.            | ...  | 181               |
| <i>melanophæum</i> A.            | ...  | 179               |
| <i>mutable</i> A.                | ...  | 181               |
| <i>pullatum</i> A.               | ...  | 178               |
| <i>pusillum</i> Fl.              | ...  | 178               |
| <i>querincum</i> P.              | ...  | 180               |
| <i>roscidum</i> Fl.              | ...  | 181               |
| <i>salicinum</i> P.              | ...  | 180               |
| <i>sessile</i> P.                | ...  | 178               |
| <i>sphærocephalum</i>            |      | 180               |
| <i>stigonellum</i> A.            | ...  | 178               |
| <i>subtile</i> Fr.               | ...  | 179               |
| <i>tigillare</i> A.              | ...  | 177               |
| <i>trabineum</i> A.              | ...  | 181               |
| <i>trachelinum</i> A.            | ...  | 180               |
| <i>trichiale</i> A.              | ...  | 182               |
| <i>turbinatum</i> Fl.            | ...  | 177               |
| <i>xylonellum</i> A.             | ...  | 180               |
| <i>Callithamnium</i>             | vide | <i>Conferva</i> . |
| <i>Carex bicolor</i>             | ...  | p. 40             |
| dioica                           | ...  | 38                |
| leucoglochin                     | ...  | 39                |
| microstachya                     | ...  | 39                |
| ornithopoda                      | ...  | 40                |
| parallela                        | ...  | 39                |
| pedata                           | ...  | 40                |
| <i>psyllophora</i>               | ...  | 39                |
| pulicaris                        | ...  | 39                |
| rigida                           | ...  | 41                |
| saxatilis                        | ...  | 41                |
| <i>Cenangium arcticum</i>        | -    | 301               |
| <i>Cerasi</i>                    | ...  | 301               |
| ferruginosum                     | ...  | 301               |
| <i>Patella</i>                   | ...  | 302               |
| <i>Cenomyce cariosa</i> A.       | -    | 126               |
| <i>carneola</i> Fr.              | ...  | 129               |
| carneo-pallida Somf.             | -    | 129               |
| cenotea A.                       | ...  | 133               |
| <i>Ceratites</i> Whlb.           | -    | 116               |
| <i>cervicornis</i> A.            | ...  | 131               |
| <i>chlorooides</i> Fl.           | ...  | 128               |
| <i>chlorophæa</i> Fl.            | ...  | 150               |
| <i>coccifera</i> Fl.             | ...  | 127               |
| <i>coniocraea</i> Fl.            | ...  | 131               |
| <i>cornuta</i>                   | ...  | 131               |
| <i>crispata</i>                  | ...  | 134               |
| <i>cyanipes</i> Somf.            | -    | 129               |
| decorticata                      | ...  | 126, 132          |
| <i>extensa</i> Fl.               | ...  | 127               |
| <i>fimbriata</i> A.              | ...  | 130               |
| <i>Flörkeana</i> Fr.             | ...  | 128               |
| <i>furcata</i> A.                | ...  | 134               |
| <i>furcata</i> Fl.               | ...  | 133               |
| <i>gracilis</i> Fl.              | ...  | 131               |
| <i>neglecta</i> Fl.              | ...  | 130               |
| <i>papillaria</i> A.             | ...  | 133               |
| <i>parecha</i> A.                | ...  | 132               |
| <i>pityrea</i> A.                | ...  | 132, 134          |
| <i>pleurota</i> Fl.              | ...  | 127               |
| <i>polydactyla</i> Fl.           | ...  | 127               |
| <i>Pocillum</i> A.               | ...  | 130               |
| <i>pyxidata</i> A.               | ...  | 130               |
| <i>racemosa</i> A.               | ...  | 134               |
| <i>straminea</i> Somf.           | ...  | 128               |
| <i>sympycarpa</i>                | ...  | 126               |
| <i>verticillata</i> Fl.          | ...  | 131               |
| <i>Cephalotrichum Stemonitis</i> | ...  | 313               |

- Ceramium aureum** P. 194  
**confervoides** . . . . . 193  
**roseum** . . . . . 193
- Cerastium ovale** . . . . . 23  
**viscosum** . . . . . 23  
**vulgatum** . . . . . 23
- Chætophora elegans** . . . . . 201
- Chara flexilis** . . . . . 37  
**hispida** . . . . . 37
- Cheiranthus alpinus** . . . . . 23
- Chrysosplenium alternifolium** . . . . . 18
- Cineraria alpina** . . . . . 34  
**campestris** . . . . . 34
- Clavaria argillacea** . . . . . 286  
**cornea** . . . . . 285  
**ericetorum** . . . . . 286  
**fistulosa** . . . . . 285  
**mucida** . . . . . 286  
**muscoïdes** . . . . . 285  
**pallida** . . . . . 286  
**pilipes** . . . . . 285  
**pistillaris** . . . . . 285  
**pratensis** . . . . . 285  
**pyxidata** . . . . . 285  
**pusilla** . . . . . 286  
**svecica** . . . . . 284  
**viscosa** . . . . . 285
- Collema Bürgessii** Fl.  
**dan.** . . . . . 120  
**byssinum** Hoff. . . . . 118  
**cheileum** A. . . . . 118  
**conglomeratum** Somf. . . . . 119  
**fasciculare** A. . . . . 119  
**flacidum** A. . . . . 122  
**fuligineum** Somf. . . . . 118  
**furvum** A. . . . . 122  
**granulosum** Hoff. . . . . 122  
**hæmaleum** Somf. . . . . 117  
**myriococcum** A. . . . . 119  
**nigrum** A. . . . . 173  
**palmatum** A. . . . . 121  
**petrosum** A. . . . . 117  
**pulposum** A. . . . . 120  
**radiatum** Somf. . . . . 121  
**subtile** A. . . . . 117  
**tenax** A. . . . . 120  
**tenuissimum** A. . . . . 118
- Conferva alpina** . . . . . 197  
**atrovirens** . . . . . 188
- Conferva aurea** . . . p. 194  
**barbata** . . . . . 195  
**bipunctata** . . . . . 199  
**bombycina** . . . . . 198  
**canalicularis** . . . . . 188  
**capillaris** . . . . . 197  
**castanea** . . . . . 195  
**compacta** . . . . . 191  
**cruciata** . . . . . 199  
**denigrata** . . . . . 194  
**distorta** . . . . . 192  
**ebenea** . . . . . 195, 315  
**ericetorum** . . . . . 197  
**floccosa** . . . . . 198  
**flocculosa** . . . . . 200  
**floridula** . . . . . 193  
**fugacissima** . . . . . 198  
**glomerata** . . . . . 196  
**limosa** . . . . . 191  
**mucosa** . . . . . 197  
**murialis** . . . . . 192  
**muscolica** . . . . . 195  
**mutabilis** . . . . . 200  
**myochrous** . . . . . 190  
**nigra** . . . . . 191  
**nitida** . . . . . 199  
**obtusangula** . . . . . 195  
**pectinata** . . . . . 199  
**qvinina** . . . . . 199  
**hetzii** . . . . . 193  
**riparia** . . . . . 195  
**rivularis** . . . . . 196  
**rosea** . . . . . 192, 193  
**Rothii** , , , , - 192  
**rubens** , , , , - 194  
**seriata** , , , , - 191  
**siliculosus** , , , , - 193  
**sordida** , , , , - 198  
**stellaris** , , , , - 196  
**tenuis** , , , , - 191  
**toruosa** , , , , - 196  
**tuberculata** , , , - 190  
**uncialis** , , , , - 196  
**violacea** , , , , - 193, 197  
**zonata** , , , , - 198
- Conisporium roseum** - 234
- Cornicularia ochroleuca** A. . . . . 115
- Cucubalus maritimus** - 19
- Cypripedium Calceolus** . . . . . 36
- Cytispora carphosperma** . . . . . 221

<b>Cytispora chrysosperma</b>	<b>Echinella fasciculata</b>
	P. 190
<i>fugax</i> , , , - 222	<i>geminata</i> , , - 189
<i>rubescens</i> , , - 209	<i>Ectocarpus aureus</i> , - 194
<b>Dacrymyces cæsius</b> - 309	<i>siliculosus</i> , , - 193
<i>lacrymalis</i> , , - 308	<i>Encalypta ciliata</i> , - 46
<i>stillatus</i> , , - 308	<i>rhaftocarpa</i> , , - 46
<i>Urticæ</i> , , , - 309	<i>streptocarpa</i> , , - 46
<b>Dactylis glomerata</b> - 6	<b>Endocarpon fallax</b> A. - 135
<b>Dædalea betulina</b> , - 270	<i>globulare</i> A. , , - 136
<i>decipiens</i> , , , - 271	<i>glomeratum</i> A. , - 136
<i>mollis</i> , , , - 271	<i>lejoplacum</i> A. , - 135
<i>sepiaria</i> , , , - 270	<i>parasiticum</i> A. , - 177
<i>unicolor</i> , , , - 271	<i>pertusum</i> Whlbg. 135
<b>Diatoma flocculosa</b> - 200	<i>sinopicum</i> Whlbg. 103
<b>Dicranum aciculare</b> - 52	<i>smaragdulum</i> Whlbg. - 107
<i>bullatum</i> , , - 55	<i>Sommerfeltii</i> Fl. , - 134
<i>cerviculatum</i> , , - 55	<i>tephroides</i> , , - 137
<i>cylindricum</i> , , - 52	<i>xanthostomum</i> Somf. 136
<i>flagellare</i> , , - 53	<i>viride</i> , , , - 137
<i>flavescens</i> , , - 54	<b>Epipactis latifolia</b> , - 35
<i>flexuosum</i> , , - 54	<i>ovata</i> , , , - 36
<i>ovalè</i> , , , - 50	<b>Epilobium nutans</b> , - 17
<i>pellucidum</i> , , - 54	<i>alpinum</i> , , , - 17
<i>Scotianum</i> , , - 53	<b>Equisetum reptans</b> , - 44
<i>Sphagni</i> , , , - 53	<b>Erigeron uniflorum</b> - 33
<i>svarrosum</i> , - 54	<b>Erineum alneum</b> - 314
<i>Starkii</i> , , , - 53	<i>alni incanæ</i> , , - 314
<i>varium</i> , , , - 55	<i>betulinum</i> , , - 314
<b>Diderma crassipes</b> , - 240	<i>purpureum</i> , , - 314
<i>diforme</i> , , , - 241	<i>sorbeum</i> , , , - 314
<i>lobatum</i> , , , - 240	<b>Eriophorum capitatum</b> - 2
<i>umbilicatum</i> , , - 240	<i>latifolium</i> , , , - 2
<b>Didymodon flexicaule</b> - 47	<i>polystachium</i> - 2
<i>latifolium</i> , , - 46	<b>Erysimum Barbaræa</b> - 23
<i>rigidulum</i> , , - 47	<i>hieracifolium</i> , , - 28
<i>rostratum</i> , , - 47	<i>virgatum</i> , , , - 28
<b>Ditiola radicata</b> , , - 309	<b>Euphorbia helioscopia</b> - 23
<b>Dothidea betulina</b> , - 225	<b>Eurotium herbariorum</b> 248
<i>Epilobii</i> , , , - 225	<b>Exidia recisa</b> , , , 307
<i>fulva</i> , , , - 225	<i>repanda</i> , , , , 308
<i>Lichenum</i> , , , - 224	<i>saccarina</i> , , , , 308
<i>moriformis</i> , , - 223	<i>spiculosa</i> , , , , 307
<i>pyrenophora</i> , , - 224	<b>Festuca elatior</b> , , , 5
<i>Ribesia</i> , , , - 223	<i>pratensis</i> , , , , 6
<i>typhina</i> , , , - 225	<b>Fissidens</b>
<b>Draba androsacea</b> , - 27	<i>subbasilaris</i> , , , 53
<i>hirta</i> , , , , - 27	<i>taxifolius</i> , , , , 53
<i>Wahlenbergii</i> , , - 27	<b>Fucus bifurcatus</b> , 183
<b>Draparnaldia glomerata</b> - 200	<i>cartilagineus</i> , , , , 184
<i>mutabilis</i> , , , - 200	<i>ceranoides</i> , , , , 182
<b>Echinella cuneata</b> 190	<i>cristatus</i> , , , , 184

- Fucus Lomentaria**, p. 184  
*mamillosus* , , , 183  
*norvegicus* , , , 183  
*palmatus* , , , 183  
*rubescens* , , , 183  
*sacharinus* , , , 183  
*soboliferus* , , , 183
- Fuligo flava** , , , 239  
*laevis* , , , , 239  
*rufa* , , , , 239  
*varians* , , , , 239
- Fumaria officinalis** , 29
- Fusisporium avenaceum** 312
- Galium palustre** , , 8  
*trifidum* , , , , 8
- Geastrum quadrifidum** , 236
- Gentiana campestris** , 13  
*detensa* , , , , 13  
*involucrata* , , , , 12  
*nivalis* , , , , 13  
*serrata* , , , , 13
- Geoglossum glabrum** , 288
- Gnaphalium carpaticum**  
*fuscum* , , , , 33  
*supinum* , , , , 32
- Grimmia alpestris** , , 49  
*crinita* , , , , 49  
*leucophæa* , , , , 49  
*maritima* , , , , 48  
*obliqua* , , , , 50  
*ovata* , , , , 50
- Gyalecta cretacea A.** , 100  
*Wahlenbergiana* 171
- Gymnostomum Donnianum**  
*Heimii* , , , , 45
- Gyrophora arctica** , , 177
- Helvella atra** , , , 288  
*Infula* , , , , 288  
*membranacea* , , , 267  
*nigricans* , , , , 288  
*pygmæa* , , , , 288
- Hieracium Auricula** , 31  
*dubium* , , , , 31  
*echioides* , , , , 31  
*prenanthoides* , , , 32
- Hippophae Rhamnoides** , 42
- Hippuris maritima** , 1  
*vulgaris* , , , , 1
- Hydnnum argutum** , , 290
- Hydnnum farinaceum** p. 279  
*Hollii* , , , , 278  
*niveum* , , , , 279  
*parasiticum* , , , 279  
*pseudoboletus* , , , 278  
*strigosum* , , , , 279
- Hypnum affine** , , , , 62  
*alpinum* , , , , 64  
*alpestre* , , , , 65  
*arcticum* , , , , 65  
*catenulatum* , , , , 66  
*cordifolium* , , , , 68  
*diastrophylum* , , , , 55  
*Donnianum* , , , , 61  
*falcatum* , , , , 65  
*filicinum* , , , , 65  
*incurvatum* , , , , 63  
*megapolitanum* , , , , 69  
*moniliforme* , , , , 62  
*murale* , , , , 66  
*nitens* , , , , 68  
*obtusatum* , , , , 61  
*palustre* , , , , 64  
*plumosum* , , , , 68  
*populeum* , , , , 68  
*reflexum* , , , , 69  
*riparoides* , , , , 70  
*ruscifolium* , , , , 70  
*salebrosum* , , , , 68  
*sarmentosum* , , , , 67  
*S eligeri* , , , , 62  
*silesianum* , , , , 63  
*sqvarrosulum* , , , , 62  
*stellatum* , , , , 61  
*stramineum* , , , , 67  
*trifarum* , , , , 67  
*uncinatum* , , , , 64
- Hypolyssum ventricosum** , 289
- Hysterium acuminatum** 227  
*aggregatum* , , , , 227  
*arundinaceum* , , , , 228  
*biforme* , , , , 227  
*elongatum* , , , , 226  
*foliicolum* , , , , 228  
*pinastri* , , , , 228  
*valvatum* , , , , 226  
*xylomoides* , , , , 228
- Impatiens nolitangere** , 12
- Isaria epiphylla** , 248  
*fasciculata* , , , , 248
- Isatis tinctoria** , , , , 27
- Juncus alpestris** , , 16

- Juncus balticus*, , p. 15  
*campestris*, , , 16  
*glaucus*, , , 15  
*monanthos*, , , 15  
*nodulosus*, , , 16  
*rariiflorus*, , , 16  
*trifidus*, , , , 15
- Jungermannia*  
*anomala*, , , , 72  
*barbata*, , , , 73  
*Blasia*, , , , 78  
*compressa*, , , , 71  
*cordifolia*, , , , 77  
*crenulata*, , , , 76  
*curvifolia*, , , , 75  
*Dicksoni*, , , , 73  
*excisa*, , , , 75  
*inflata*, , , , 74  
*laxifolia*, , , , 75  
*pallescens*, , , , 70  
*pinguis*, , , , 77  
*pumila*, , , , 77  
*pussilla*, , , , 76  
*quinquedentata*, , , 73  
*resupinata*, , , , 73  
*scalaris*, , , , 71  
*scutata*, , , , 70  
*Sphagni*, , , 71, 76  
*taxifolia*, , , , 71  
*Taylori*, , , , 73  
*umbrosa*, , , , 73  
*ventricosa*, , , , 75
- Kobresia caricina*, , , 58  
*scirpina*, , , , 58
- Koenigia islandica*, , , 7
- Lecanora Acharii* Somf. 33  
*aipospila* Whlbg., , 97  
*albella* Fl., , , , 84  
*alpestris* A., , , , 97  
*alphoplaca* Whlbg., 105  
*alpina* Somf., , , , 91  
*angulosa*, , , , 84, 95  
*anomala* A., , , , 163  
*apochroea* A., , , , 81  
*atrosulphurea* Whlbg. 99  
*brunnea* A., , , , 105  
*bryontha*, , , , 80  
*calcaria* Somf., , , , 101  
*callopisma* A., , , , 104  
*carneolutea* A., , , , 85  
*cartilaginea* A., , , , 108  
*cervina* Somf., , , , 106  
*cinerea*, , , , , 99
- Lecanora citrina* A. p. 88  
*coarctata* A., , , , 92  
*coronata* Fl., , , , 105  
*dispersa* Fl., , , , 96  
*Ehrhardtiana* Somf., 82  
*epibryon* A., , 93, 94  
*erythrella* A., , , , 86  
*exigua* Fl., , , , , 98  
*glaucocarpa* A., , 106  
*granatina* Somf., , , , 90  
*hæmatomma* A., , , , 91  
*Hageni* A., , , , , 93  
*hydrophila* Somf., , , , 91  
*hypnorum* A., , , , , 174  
*intricata* A., , , , , 82  
*lentigera* A., , , , , 103  
*leptacina* Somf., , , , , 96  
*leucococca* Somf., , , , , 83  
*limbata* Somf., , , , , 105  
*lobulata* Fl., , , , , 87  
*lutescens* A., , , , , 85  
*maritimæ* Somf., , , , , 97  
*melanaspis* Whlbg., , , , , 104  
*melanochlora* Somf., , , , , 98  
*micraspis* Somf., , , , , 101  
*miniata* A., , , , , 104  
*murorum* A., , , , , 103  
*muscorum* A., , , , , 174  
*mutabilis* Somf., , , , , 85  
*nephæa* Somf., , , , , 103  
*obsoleta* Somf., , , , , 94  
*ocrinæta*, , , , , 83  
*oculata* A., , , , , 101  
*parella* A., , , , , 80  
*pelobotrya* Whlbg., , , , , 99  
*periclea* A., , 98, 153  
*poliophæa* Whlbg., , , , , 98  
*polycarpa* Fl., , , , , 109  
*protuberans* Whlbg., , , , , 99  
*roscida* Somf., , , , , 97  
*rubra* A., , , , , 90  
*salicina* Somf., , , , , 86  
*sarcopsis* Whlbg., , , , , 91  
*scruposa* Somf., , , , , 100  
*sinopica* Somf., , , , , 101  
*Sommerfeltiana* Fl., , , , , 84  
*spodophæa* Whlbg., , , , , 98  
*subfuscæ* A., , , , , 93  
*symmicta* A., , , , , 81  
*tartarea* A., , , , , 80  
*thiodes* Spr., , , , , 99  
*tribacia* A., , , , , 109  
*turfosa* Whlbg., , , , , 97

Lecanora unicolor Somf.,	p. 85
virella A. , , , 110	
vitellina A. , , , 87	
Lecidea aglæa Somf. , 144	
alabastrina A. , 165	
albocærulescens 146	
ammiospila A. , 168	
anomala , , 158, 163	
arctica Somf. , , , 155	
asserculorum A. , , , 154	
atrotulva Somf. , , , 143	
atrorufa A. , , , 175	
aurantiaca , , , 86, 169	
cæsio-rufa , , , 169	
candida A. , , , 176	
carnosa Somf. , , , 174	
cinereo-fusca A. 168	
cinnabarina Somf. , 170	
citrinella A. , , , 154	
coracina A. , , , 142	
corticola A. , , , 148	
cumulata Somf. , , , 157	
cuprea Somf. , , , 165	
cyrtaea Fl. , , , 163	
daphoena , , , 145	
decolorans A. , , , 171	
Dilleniana A. , , , 148	
dolosa Whlb. , 151	
Ehrhardtiana A. 82	
elæochroma Somf. , 150	
enteroleuca , , , 150	
epipolia A. , , , 147	
erythrophæa Fl. 153, 163	
euphorea Fl. , , , 156	
ferruginea Somf. , , , 168	
flavicunda A. , , , 146	
flavo-cærulescens 146	
foveolaris Somf. , , , 171	
fumosa A. , 143, 145	
fuscescens Somf. , , , 161	
fuscoatra A. , , , 143	
fuscolutea A. , , , 166	
gelasinata A. , , , 178	
geophila Fl. , , , 157	
globifera A. , , , 175	
hypnophila A. , , , 165	
icmalea Somf. , , , 160	
immersa A. , , , 152	
incana , , , , 164	
lapicida A. , , , 146	
leptomerea Somf. , , , 161	
lepadina Somf. , , , 145	

Lecidea lithophila Somf.	p. 150
lugubris Somf. , , , 143	
luteoalba A. , , , 169	
luteola A. , , , , 164	
lurida , , , , 175, 176	
margaritacea A. , , , 148	
marmorea A. , , , , 171	
melaleuca Somf. , , , 148	
melizea A. , , , , 171	
microphylla A. , , , , 173	
miscella A. , , , , 153	
mixta Fr. , , , , 158	
muscicola Somf. , , , , 159	
muscorum A. , , , , 167	
myrmecina , , , , 175	
nobilis Somf. , , , , 149	
norvegica Somf. , , , , 176	
panæola A. , , , , 162	
pantosticta A. , , , , 144	
papillata Somf. , , , , 154	
parasema , , , , 151, 152	
parmeliarum Somf. , , , , 176	
parasitica Fl. , , , , 153	
pellucida Fl. , , , , 161	
percæna A. , , , , 162	
petræa A. , , , , 146	
phæocarpa Somf. , , , , 159	
pinicola Fl. , , , , 153	
platycarpa A. , , , , 149	
polycarpa Fl. , , , , 149	
polycocca Somf. , , , , 147	
polytropa A. , , , , 82	
punctata Fl. , , , , 152	
rupestris A. , , , , 166	
sabuletorum Fl. 155, 156	
sangvineoatra , , , , 158	
sæpincola A. , , , , 161	
scalaris A. , , , , 157	
sphaeroides Somf. , , , , 175	
tessellata Fl. , , , , 144	
triptophylla A. , , , , 173	
tuberculata Somf. , , , , 160	
vernalis A. , , , , 165	
vesicularis A. , , , , 176	
Leontodon lividum , , , , 30	
palustre , , , , 30	
taraxacum , , , , 30	
Leotia marcida , , , , 287	
Lepraria leiphæma A. 86	
sulphurea A. , , , , 86	
rubens A. , , , , 194	

- Leskea Deinbolii*, p. 61  
*norvegica*, , , , 61  
*polyantha*, . , , 61
- Licea bicolor*, , , 246  
*fragiformis*, , , 246
- Lichen atrosangvinneus*, , , , 152  
*barbatus* Whlbg., 116  
*botryoides* Whlbg. 205  
*calicaris*, , , 115  
*carnosus* Dicks., 174  
*cupularis*, , , 171  
*dactyliferus* Whlbg.  
 102
- fagineus* L., , 80  
*flavovirescens* Dick.  
 155
- geoicus* Whlbg., 171  
*impressus*, , , 100  
*iungermanniae* Vahl.  
 167
- lacteus* Vahl., , 91  
*luteus* Dick., , 171  
*obliteratus* P., 104  
*pallescens* L., , 80  
*pinastri*, , , 113  
*plicatus* L., , , 116  
*prunastri* L., , , 114  
*rubens* Hoffm., , 194  
*terminalis* Fl. dan. 138
- Linckia atra*, , , , 201  
*dura*, , , , , 201  
*natans*, , , , , 202
- Linum catharticum*, 15
- Lycogala conica*, , 239
- Lycoperdon areolatum* 237  
*Bovista*, , , , , 237  
*Carpobolus*, , 236  
*excipuliforme*, 238  
*gemmaatum*, , , 238  
*perlatum*, , , , 238  
*pyriforme*, , , , 238  
*saccatum*, , , , 238
- Lyngbyea cuneata*, , 189  
*fasciculata*, , , , 190  
*pulvinata*, , , , 189
- Marchantia conica*, , 78  
*cruciata*, , , , 79  
*hemisphaerica*, , , 78
- Meesia longiseta*, , , 57
- Merulius aurantiacus*, 267  
*boletoides*, , , , 289  
*destruens*, , , , , 269
- Merulius lacrymalis* p. 269  
*lobatus*, , , , , 267  
*molluscus*, , , , , 270  
*muscigenus*, , , , , 267  
*muscorum*, , , , , 263  
*serpens*, , , , , 268  
*solare*, , , , , 269  
*tenellus*, , , , , 268  
*tremellosus*, , , , , 268  
*vastator*, , , , , 269
- Mitrula globosa*, , , 287
- Mnium albicans*, , , 56  
*affine*, , , , , 56  
*cuspidatum*, , , , , 56  
*marginatum*, , , , , 57
- Morchella conica*, , , 288
- Mucor caninus*, , , 247  
*tenellus*, , , , , 247  
*viridescens*, , , , , 205
- Myosotis alpestris*, , , 10  
*arvensis*, , , , , 11  
*scorpioides*, , , , , 10  
*sylvatica*, , , , , 10
- Myrica Gale*, , , , , 42
- Næmatelia encephala*, 307
- Neottia repens*, , , , 35
- Nephroma* vide *Peltidea*
- Nidularia Crucibulum* 249  
*farcta*, , , , , 249
- Opegrapha astroidea*, 142  
*cymbiformis* Fl., , 142  
*rimalis* A., , , 142  
*vulvella* A., , , 142
- Ophrys ovata*, , , 36
- Orchis bifolia*, , , , 35  
*latifolia*, , , , , 35
- Orthotrichum affine*, , 60  
*curvifolium*, , , , 60  
*Hutchinsia*, , , , 60  
*pumilum*, , , , , 60  
*subrepens*, , , , , 59
- Oscillatoria* vide *Confervæ*.
- Ozonium sulphureum*, 315
- Palmella adnata*, , , 203  
*botryoides*, , , , , 204  
*gigantea*, , , , , 203  
*viridissima*, , , , , 203  
*Myosurus*, , , , , 202  
*obscura*, , , , , 203  
*rupestris*, , , , , 203
- Parmelia aipolia* A., , , 111  
*aleurites* A., , , , 111

## INDEX.

- Parmelia cycloselis* A. p. 109  
*iitestiniformis* , , 111  
*juniperina* , , , 114  
*pinastri* Somf. , , , 113  
*prunastri* , , , 114  
*pulla* A. , , , 112  
*pulverulenta* A. , , 110  
*recurva* A. , , , 112  
*sæpincola* , , , 114  
*scorte a* A. , , , 113  
*tiliacea* Fl. , , , 113  
*tribacia* , , , 109  
*venusta* A. , , , 110  
*Pedicularis hirsuta* , , 27  
*Sceptrum* , , , 27  
*Peltidea canina* Å. 123, 124  
*lævigata* A. , , , 124  
*leucorrhiza* Fl. , , , 125  
*parilis* A. , , , 124  
*polydactyla* Fl. 123, 124  
*resupinata* A. , , 124  
*rufescens* Hoff. , 123  
*scutata* A. , , , 124  
*spuria* A. , , , 123  
*ulorrhiza* Fl. , , , 125  
*Pennicilium fasciculatum* 512  
*glaucum* , , , 512  
*Peziza abietina* ; , , 289  
*alnea* , , , , 300  
*alpestris* , , , , 290  
*anomala* , , , , 294  
*Aucuparia* , , , 301  
*aurantia* , , , , 289  
*aurea* , , , , 299  
*badia* , , , , 289  
*bicolor* , , , , 293  
*cærulescens* , , 293  
*calycina* , , , , 293  
*cartilaginea* , , , 291  
*Cerasi* , , , , 301  
*Chailletii* , , , , 302  
*chrysocoma* , , , 299  
*cinerea* , , , , 297  
*citrina* , , , , 296  
*clandestina* , , , , 295  
*clavata* , , , , 295  
*coccinea* , , , , 289, 290  
*coccinella* , , , , 296  
*conglomerata* , , 301  
*diformis* , , , , 297  
*Erinaceus* , , , , 292  
*fasciculata* . , 291, 292
- Peziza fructigena* , , p. 295  
*furfuracea* , , , , 291  
*fusca* , , , , 294  
*gelatinosa* , , , , 307  
*grandis* , , , , 289  
*granuliformis* , , , , 294  
*hemisphærica* , , , , 291  
*humosa* , , , , 290  
*hyalina* , , , , 294  
*imberbis* , , , , 296  
*Lecanora* , , , , 303  
*Lecideola* , , , , 298  
*lenticularis* , , , , 296  
*livido-fusca* , , , , 297  
*Marchantiæ* , , , , 295  
*marchica* , , , , 291  
*melanochlora* , , , , 297  
*ocellata* , , , , 303  
*populnea* , , , , 291  
*pura* . , , , 293  
*qvercina* , , , , 295  
*Rapulum* , , , , 290  
*Resinæ* , , , , 297  
*rhodoleuca* , , , , 296  
*sarcoides* , , , 282, 299  
*sangvinea* , , , , 295  
*Schumacheri* , , , , 293  
*scutellata* , , , , 292  
*sphæroides* , , , , 301  
*stercorea* , , , , 292  
*sulphurea* , , , , 293  
*turbo* , , , , , 300  
*villosa* , , , , , 294  
*virgultorum* , , , 295  
*xanthostigma* , , , 296  
*Phaca lapponica* , , , 30  
*montana* ; , , , 30  
*Phacidium Pini* , , , 226  
*Phallus marcidus* . 288  
*triceps* , , , , , 288  
*Phoma populi* , , , , , 222  
*salignum* , , , , , 222  
*sorbinum* , , , , , 228  
*Physarum bivalve* , , , 242  
*botryoides* , , , , , 242  
*columbinum* , , , , , 243  
*confluens* , , , , , 241  
*congestum* , , , , , 241  
*contextum* , , , , , 241  
*farinaceum* , , , , , 243  
*globosum* , , , , , 243  
*ovoidem* , , , , , 242  
*Piligena lycoperdoides* 247

- Pilobolus crystallinus* p. 236  
*roscidus* , , , 236  
*Pimpinella Saxifraga* , 14  
*Pingvicula vulgaris* , , 2  
*Poa alpina* , , , , 4  
*angustifolia* , , , 5  
*distans* , , , , 4  
*flexuosa* , , , , 5  
*laxa* , , , , 4  
*pratensis* , , , , 4  
*rigens* , , , , 4  
*serotina* , , , , 5  
*Polygonum amphibium* 18  
*Polyporus abietinus* , 277  
*aneirinus* , , , , 278  
*betulinus* , , , , 275  
*brumalis* , , , , 277  
*cinnabarinus* , , , , 277  
*dolosus* , , , , 278  
*fomentarius* , , , , 277  
*fumosus* , , , , 276  
*hirsutus* , , , , 276  
*igniarius* , , , , 277  
*juglandis* , , , , 274  
*lutescens* , , , , 276  
*macer* , , , , 278  
*micans* , , , , 278  
*nigricans* , , , , 277  
*numularius* , , , , 274  
*ochraceus* , , , , 276  
*odorus* , , , , 275  
*pinicola* , , , , 277  
*salicinus* , , , , 277  
*squamulosus* , , , , 274  
*umbellatus* , , , , 275  
*varius* , , , , 274  
*velutinus* , , , , 276  
*versiporus* , , , , 278  
*Polytrichum hercynicum* 56  
*septentrionale* , , , 55  
*sexangulare* , , , 56  
*Porina* vide *Endocarpon*.  
*Potamogeton gramineum* 8  
*heterophyllum* , , , 8  
*marinum* , , , , 10  
*natans* , , , , 8  
*pectinatum* , , , , 10  
*perfoliatum* , , , , 8  
*praelongum* , , , , 9  
*pusillum* , , , , , 10  
*rufescens* , , , , , 9  
*Potentilla argentea* , , , 24  
*Potentilla Gunneri* p. 24  
*nivea* , , , , , 24  
*Primula farinosa* , , , 11  
*finmarkica* , , , , 11  
*norvegica* , , , , 11  
*stricta* , , , , , 11  
*Pterogonium catenulatum* , , , , , 66  
*filiforme* , , , , , 48  
*Pulmonaria maritima* , 11  
*Pycnothele Ceratites* , 115  
*Racodium pityum* , , , 315  
*populinum* , , , , , 315  
*rupestre* , , , , , 315  
*Ramalina calicaris* Fr. 115  
*farinacea* A. , , , , 115  
*fastigiata* A. , , , , 114  
*pollinaria* A. , , , , 115  
*scopulorum* A. , , , , 115  
*Ranunculus Flammula* 25  
*fluvialis* , , , , 26  
*hyperboreus* , , , , 26  
*pantothrix* , , , , 26  
*reptans* , , , , , 26  
*Rhizomorpha corticata* 316  
*Friesii* , , , , , 316  
*subcorticalis* , , , , , 316  
*Rosa villosa* , , , , , 24  
*Rubus arcticus* , , , , , 24  
*Rumex aquaticus* , , , , 16  
*domesticus* , , , , , 16  
*Sagedia depressa* A. 89  
*laevata* A. , , , , 99  
*Salix herbacea* , , , , 41  
*livida* , , , , , 42  
*myrtilloides* , , , , , 41  
*polaris* , , , , , 41  
*sphacelata* , , , , , 42  
*Saxifraga Cotyledon* , , 18  
*stellaris* , , , , , 19  
*Scabiosa aryensis* , , , , 7  
*succisa* , , , , , 7  
*Sclerotium durum* , , , , , 310  
*compactum* , , , , , 310  
*muscorum* , , , , , 310  
*Semen* , , , , , 310  
*tomentosum* , , , , , 310  
*vestitum* , , , , , 311  
*Scirpus acicularis* ; , , 2  
*Bellardi* , , , , , 38  
*Bæothryon* , , , , , 2

- Scytosiphon** vide *Ulva*.  
*Sedum annuum*, , p. 23  
*Senecio vulgaris*, , 33  
*Serapia latifolia*, 35  
*Serratula arvensis*, , 32  
*Silene maritima*, , 19  
**Sistotrema violaceum** 271  
*Sonchus arvensis*, , 30  
  *sibiricus*, , , 30  
**Sphærella botryoides**, 204  
  *nivalis*, , , , 204  
**Sphæria acuta**, , , 219  
  *ambiens*, , , , 211  
  *aneirina*, , , , 208  
  *anserina*, , , , 216  
  *arbuticola*, , , , 218  
  *astroidea*, , , , 216  
  *atropurpurea*, , , , 206  
  *barbara*, , , , 214  
*Betulae nanæ*, , , 224  
  *calvula*, , , , 211  
  *cinnabarinæ*, , , 212  
  *citrina*, , , ; , , 205  
  *clopima*, . , , , 211  
  *coccinea*, , , , 211  
  *complanata*, , , , 219  
  *coniformis*, , , , 219  
  *corniculata*, , , , 209  
  *coronata*, , , , 208  
*Curcurbitula*, , , , 212  
  *culmifraga*, , , , 220  
  *curta*, , , , , 214  
  *decedens*, , , , , 217  
  *decolorans*, , , , , 213  
  *decorticans*, , , , , 210  
*Dematiium*, , , , , 221  
  *disciformis*, , , , , 207  
  *dryina*, , , , , 215  
  *eutypa*, , , , , 216  
  *favacea*, , , , , 207  
  *fibrosa*, , , , , 209  
  *flavovirens*, , , , , 207  
  *hæmatoryncha*, , , , , 215  
  *leucostoma*, , , , , 209  
  *lichenicola*, , , , , 218  
  *livida*, , , , , 216  
  *microstoma*, , , , , 210  
  *moriformis*, , , , , 213  
  *multiformis*, , , , , 205  
  *mutabilis*, , , , , 212  
  *myriocarpa*, , , , , 214  
  *obducens*, , , , , 213  
**Sphæria obliquata** p. 213  
  *palina*, , , , , 218  
  *pinastri*, , , , , 217  
  *pilifera*, , , , , 215  
  *paliota*, , , , , 220  
  *pomiformis*, , , , , 213  
  *Prunastri*, , , , , 208  
  *pulchella*, , , , , 211  
  *pulvispyrius*, , , , , 214  
  *pulveracea*, , , , , 213  
  *punctiformis*, , , , , 220  
  *pusilla*, , , , , 211  
**Resinæ**, , , , , 297  
*Rhinanthi*, , , , , 220  
*Ribesia*, , , , , 223  
  *rostrata*, , , , , 215  
  *rubiformis*, , , , , 205  
  *rubiginosa*, , , , , 206  
  *setacea*, , , , , 221  
  *serpens*, , , , , 206  
*Sorbi*, , , , , 208  
  *sordaria*, , , , , 214  
*Stigma*, , , , , 206  
  *strobilina*, , , , , 218  
  *tessella*, , , , , 210  
  *tristis*, , , , , 212  
  *typhina*, , , , , 224  
  *vibratilis*, , , , , 217  
  *xantholeuca*, , , , , 219  
*Sphærobolus stellatus*, 235  
*Sphagnum squarrosum*, 44  
*Spiloma circinatum* Som. 141  
  *paradoxum* A. , , , 141  
*Splachnum angustatum* 45  
  *brewerianum*, , , , 45  
  *fastigiatum*, , , , 45  
  *sphæricum*, , , , , 45  
  *urceolatum*, , , , , 45  
  *vasculosum*, , , , , 45  
  *Wormskjoldii*, , , , , 45  
*Stellaria cerastoides*, 20  
  *crassifolia*, , , , , 20  
  *humifusa*, , , , , 20  
  *longifolia*, , , , , 19  
  *multicaulis*, , , , , 20  
*Stemonitis fasciculata*, 245  
  *ovata*, , , , , , 246  
*Stereocaulon corallinoides* Hoffm. , , , , , 173  
  *coralloides* Fr. , , , , , 126  
  *dactylophyllum* Fl. , , , , , 125  
  *denudatum* Fl. , , , , , 126  
  *paschale* Fl. , , , , , 125, 126


- Strictis hemisphærica* p. 304  
*Lecanora* , , , 303  
*mollis* , , , 303  
*nigrella* , , , 303  
*pallida* , , , 304  
*parallela* , , , 305  
*rhodoleuca* , , , 305  
*rufa* , , , 309  
*versicolor* , , , 305  
*Stilbum mycophilum* , 248  
*Stratiotes aloides* , , 42  
*Tamarix germanica* , 14  
*Tortula cuneifolia* , , 47  
  *ungvicolata* , , 48  
*Tremella abietina* , 308  
*albida* , , , , 306  
*dubia* , , , , 306  
*encephala* , , , 307  
*hemisphærica* , 201  
*indecorata* , , , , 306  
*lacrymalis* , , , 308  
*lutescens* , , , , 305  
*mesenterica* , , , , 306  
*sarcoïdes* , , , , 306  
*spiculosa* , , , , 307  
*Trichia fallax* , , , , 243  
  *favoginea* , , , , 244  
  *nitens* , , , , 244  
*Trichoderma flavum* , 312  
  *roseum* , , , , , 311  
  *viride* , , , , , 311  
*Trichostomum aciculare* 52  
  *cylindricum* , , , 53  
*Tubercularia vulgaris* , 235  
  *Artemisiæ* , , , , 235  
*Tubulina fragiformis* , 246  
*Turritis glabra* , , , , 28  
*Tympanis alnea* , , , , 300  
  *conspersa* , , , , 301  
*Ulva compressa* , , , , 186  
  *cylindrica* , , , , 187  
*filiformis* , , , , 187  
*intestinalis* , , , , 185  
*Lactuca* , , , , 184, 185  
*latissima* , , , , 184  
*percura* , , , , 187  
*rigida* ; ; ; ; p. 185  
*rubescens* , , , , 184  
*velutina* , , , , 186  
*Urceolaria* vide *Lecanora. bryophila* , 100  
*diacapsis A.* , , , 100  
*Urceolaria cinereo-rufescens* , , , , 92  
*contorta A.* , , , , 101  
*gypsasea A.* , , , , 100  
*ocellata Fl.* , , , , 99  
*Uredolvide Cæoma.*  
*Usnea florida* , , , , 116  
  *plicata* , , , , , 116  
*Variolaria communis* , 79  
*Vaucheria bursata* , , , , 188  
  *cæspitosa* , , , , , 188  
  *dichotoma* , , , , , 188  
*Dillwynii* , , , , , 188  
*ovata* , , , , , 188  
*racemosa* , , , , , 189  
*Verrucaria epipolæa A.* 139  
*gelatinosa A.* , , , , 140  
*hydrela A.* , , , , , 139  
*margacea Whlbg.* , , , 138  
*maura Fl.* , , , , , 138  
*mucosa Whlbg.* , , , , , 138  
*nigrescens Fl.* , , , , , 138  
*punctiformis A.* , , , , , 137  
*rubra Somf.* , , , , , 140  
*Schraderi A.* , , , , , 138  
*stictica Fl.* , , , , , 140  
*theleodes Somf.* , , , , , 140  
*umbrina A.* , , , , , 138  
*Vicia sepium* , , , , , 29  
*Viola mirabilis* , , , , , 34  
  *montana* , , , , , 35  
  *tricolor* , , , , , 55  
*Weissia calcaria* , , , , , 51  
  *longipes* , , , , , 52  
  *nuda* , , , , , 52  
  *trifaria* , , , , , 51  
  *tristicha* , , , , , 51  
*Xyloma Andromedæ* , 225  
  *Empetri* , , , , , 226  
  *salicinum* , , , , , 225  
*Zygnema* vide *Confervæ.*


## CORRIGENDA.

---

Pag.		Pag.	
1 lin. 21	lege	herbario	obliterantibus
penult.	—	fennonica	
5 lin. 1	—	flexuosa	subfusca
— — 25	—	scabriuscui	speciem
6 — 15	—	ad sinum	convenientissimum
7 — 3	—	"et	speciem
— — 7	—	occurrit	ob
16 — 24	—	paucis	902 pro: 8
17 — 3	dele si unqyam	I23 — 10	Fl.
20 — 8	lege utraqve	I33 — 26	fuscus
— — 18	—	calycibus co-	globulare
		rolla	snbglobosa
— — 34	—	magnum	specimen
30 — 2	—	Phaca	Nordlandia
— — 5	—	Whlbg	Lepraria
32 — 8	—	synonymiam	e
34 — 17	—	unifloro	modificatio-
37 — 54	—	sed	nibus
46 — 30	—	me	crassiora
47 — 31	—	late	cylindrica
— — ult.	—	æqvans	parcius
50 — 5	—	Color pro:	Parmeliacum
		Calyx	subpenult.
— — 41	—	minus pro:	fusca
		magis	liefr. n. 174
63 — 35	—	sec	n. 77
64 — 32	—	infra pro: su-	umbrinis
		pra	fluxili.
71 — 16	—	Fl. dan. t. 1716	rarius.
		pro: at non	campanulato
		Fl. dan.	orbiculatis
72 — 11	—	parenthe-	latitudine
		sis exclu-	parcissime
		datur	lævis
— — 13	—	principalis	subglabra
76 — 3	—	bicornis	1786
83 — 4	—	eas	ille
— — 15	—	pallescente	tremellosum

---





New York Botanical Garden Library



3 5185 00221 8954



06-09 MIN



8 032919 990075

[www.colbrisystem.com](http://www.colbrisystem.com)

