

---

BULLETIN MENSUEL

DE LA

**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOÛT 1937

des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON  
REUNIES

et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, ANNECY, etc

**Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6<sup>me</sup>)**

Trésorier : M. P. OMISOS, 9, cours du Docteur-Long, Lyon

---

**ABONNEMENT ANNUEL : France et Colonies Françaises : 700 francs — C.C.P. Lyon 101-98**  
**Etranger . . . . . 800 francs**

---

## DEUXIEME SUPPLEMENT AU CATALOGUE DES LEPIDOPTERES DE LA REGION LYONNAISE

par R. MOUTERDE et C. DUFAY

(avec la collaboration des lépidoptéristes lyonnais)

Le Catalogue des Lépidoptères de la Région Lyonnaise a paru en fascicules dans ce Bulletin, de mars 1952 à novembre 1956. Un premier supplément, intercalé entre le Catalogue des « Macrolépidoptères » et son complément sur les Pyralidae, a déjà été publié en juin 1955.

Mais, depuis cette date, l'activité des quelques lépidoptéristes lyonnais a rendu nécessaire la rédaction d'un second supplément. Environ quarante espèces, nouvelles pour la région, doivent en effet être signalées. D'autre part la répartition géographique dans la région lyonnaise d'un assez grand nombre de lépidoptères est un peu mieux connue, du fait surtout de chasses effectuées dans des régions très peu étudiées auparavant, comme celles de Saint-Etienne et des Dombes. Enfin un certain nombre d'espèces, jusqu'à présent très peu signalées, semblent être actuellement plus communes que ne l'indiquait le Catalogue ; d'autres, mentionnées seulement d'après les auteurs du siècle précédent (en particulier d'après le manuscrit inédit de ROÜAST et les notes de DONZEL) ont été retrouvées ces dernières années, ce qui confirme leur présence dans la région.

Ces quelques progrès accomplis dans la connaissance de la faune lépidoptérologique du Lyonnais sont dus, en grande partie, à l'emploi plus fréquent de procédés modernes de chasse, tels que l'utilisation de lampes à vapeur de mercure en des localités plus variées, et aussi, mais plus récemment, d'une source de courant transportable.

Cependant la faune des lépidoptères nocturnes reste encore bien imparfaitement connue, en particulier dans les parties montagneuses (massif du Pilat, Monts du Beaujolais surtout) et les Dombes, et en bien d'autres endroits aussi (comme les environs de Vienne par exemple). Il est certain que des recherches plus nombreuses en de telles localités seraient susceptibles d'augmenter encore le nombre des espèces, comme l'ont montré d'ailleurs un bien petit nombre de chasses à la lumière pratiquées dans le massif du Pilat et le Haut-Beaujolais.

Ces dernières ont permis de préciser l'habitat dans la région lyonnaise de certaines espèces montagnardes. Plusieurs de celles-ci, signalées jusqu'à présent seulement du Pilat dans la région, ont été prises, comme on pouvait s'y attendre, dans le Haut-Beaujolais : *Diarsia mendica* F. (*Epipsilia festiva* Schiff.), *Mamestra contigua* Schiff., *Mamestra pisi* L., *Plusia pulchra* Haw. ; inversement, quelques autres, connues seulement du Haut-Beaujolais, ont été capturées dans le Pilat : *Mythimna comma* L., *Cucullia campanulae* Frr., ainsi que *Mythimna conigera* Schiff. qui a été pris près du Pilat à Saint-Etienne.

Quelques-unes d'entre elles ont été découvertes aussi en basse altitude : dans les Dombes [*Mythimna comma* L., *Apamea crenata* Hfn. (= *Parastichtis rurea* Fab.), *Boarmia lichenaria* Hfn.], où le climat, relativement plus froid et plus humide que celui des autres parties de faible altitude, a permis sans doute à certains éléments boréo-montigènes de se maintenir en plaine sous notre latitude. C'est d'ailleurs cette région des Dombes qui a apporté le plus de nouveaux éléments septentrionaux dans la faune de la région lyonnaise.

En effet une assez grande proportion des Lépidoptères nouveaux pour la région, cités dans ce supplément, est constituée d'espèces septentrionales dont la plupart ont été prises en Dombes, à Villars-les-Dombes (par exemple *Cerura bicuspis* Bkh., *Ephesia fulminea* Scop., *Drepana curvatula* Bkh., *Drepana laceritaria* L.). Les autres ont été capturées dans le massif du Pilat [*Amathes collina* Boisd., *Polia bombycina* Hfn. (= *Miselia advena* Schiff.), *Athetis palustris* Hb.] et une en Beaujolais (*Cidaria luctuata* Schiff.).

Mais les espèces méridionales, nouvelles pour la région, sont assez nombreuses, une partie d'entre elles a été trouvée un peu au Sud de Lyon, à Saint-Genis-Laval (*Rhoptria asperaria* Hb., *Chesias isabella* Schaw., *Cosymbia suppunctaria* Zell., *Nycteola columbana* Trn., *Nycteola asiatica* Krul.), une à Saint-Etienne

(*Dryobotodes accipitrina* Esp.) et une dans le massif du Pilat, au Bessat (*Mamestra corsica weissii* Drdt.). Les autres ont été découvertes en diverses localités : *Euphithectia oxycedrata* Rbr. à Lyon-Point-du-Jour, *Cleta filacearia* dans l'est de la région (Chazey-sur-Ain, Chatelans).

Toute population ou tout peuplement entomologique subit des fluctuations plus ou moins importantes d'une année à une autre ou d'un cycle d'années à un autre : telle espèce, plus fréquente à un certain moment a tendance à se raréfier par la suite, telle autre montre le phénomène inverse. Cela a été observé pour certaines espèces au cours de ces dernières années : ainsi *Amathes triangulum* Hfn., *Mamestra persicariae* L., *Actinotia polydon* Cl. deviennent à peu près partout plus communs. R. MOUTERDE a constaté à Lyon-Point-du-Jour une plus grande fréquence ces derniers temps d'*Ilema complana*, *Habrosyne derasa*, *Lophopterix cuculla*, *Agrotis exclamatoris* et au contraire une diminution du nombre des exemplaires de *Ilema lurideola*, *Lophopteryx camelina*, *Scotia segetum*, *Cryphia muralis*. Il en résulte que les appréciations de rareté ou d'abondance indiquées par le Catalogue ne sont pas absolues, car elles varient au cours du temps.

La systématique et la nomenclature employées ici sont celles suivies dans le Catalogue des Lépidoptères de France et de Belgique de L. LHOMME (1923-1935), que R. MOUTERDE a respectées dans le Catalogue paru de 1952 à 1956. C'est uniquement pour ne pas rompre le plan du Catalogue des Lépidoptères de la Région Lyonnaise, et pour pouvoir suivre sa numérotation, que nous avons adopté cette solution, et c'est ce qui nous empêche, à notre regret, d'employer ici la systématique et la nomenclature actuelles.

\*  
\*\*

Abréviations employées :

Be = R. BÉRARD ; De = C. DENNINGER ; Du = C. DUFAY ; Ma = R. MARTIN ; Mo = R. MOUTERDE ; Ro = E. ROMAN ; Te = M. TERREAUX ; To = H. de TOULCOËT. Pour les autres abréviations et signes conventionnels utilisés ici, nous reportons le lecteur p. 7 du Catalogue.

---

## RHOPALOCERES

---

### PAPILIONIDAE

3 (7). *Parnassius apollo* L. — Les deux captures relativement récentes signalées du Mont Pilat nous paraissent bien sujettes à caution d'après certains renseignements. L'apollon n'aurait donc jamais été retrouvé depuis MULSANT (1870).

### PIERIDAE

7 (13). *Pieris mannii* Mayer. — La signalisation de cette espèce de Villars-les-Dombes (premier supplément, p. 99), résultant d'une erreur de transcription, est à supprimer.

12 (20). *Anthocharis euphenoides* Stgr. — Les captures de Collonges-au-Mont-d'Or faites en 1945 sont très sujettes à caution.

### SATYRIDAE

30 (64). *Satyrus arethusa* Esp. — Après une disparition de plus de cinquante ans, a été repris récemment dans les Monts d'Or : plusieurs ex., 16-VIII-1953, la Garenne-de-Poleymieux (Ro) ; 2 ex. aux bords du Garon près de Chaponost, localité constamment visitée où il n'avait jamais été vu, fin de saison 1957 (Mo).

- 38 (75). *Aphantopus hyperanthus* L. — Environs de Saint-Etienne (Be).  
 42 (82). *Coenonympha hero* L. — Priay (Ain), 2 ex. V-1956 et V-1957 (Ma).

#### NYPHALIDAE

- 45 (90). *Apatura iris* L. — Les Allymes entre Ambérieu et le Mont Luisandre, un ex. 17-VII-1955 (Mo) ; sommet du Mont Tourvéon, VI-1957, 2 ex. observés mais non capturés (Ma) ; Amplepuis, un ex. 17-VIII-1957 (ENRICO).  
 58 (104). *Araschnia levana* L. — Abondant en Dombes en VIII-IX 1957 (Ma) ; La Verpillière, un ex. 14-V-1957 (Ro) ; Odenas, V-1958 (To) ; Amplepuis, un ex. 4-VIII 1958 (ENRICO).  
 59 (107). *Melitaea aurinia* Rott. — Plusieurs ex. en V-1958 à Saint-Genis-Laval, localité où il n'avait jamais été observé auparavant (Du).  
 67 (119). *Clossiana selene* Schiff. — Ac. dans le massif du Pilat (Be) ; c. à La Montagne du Jumeau le 14-VI-1958 (Du) ; col de la Cambuse près de Meaux, en Beaujolais, un ex. 22-V-1958 (Ma) ; Amplepuis (ENRICO).  
 68 (120). *Clossiana euphrosyne* L. — Ac. dans le massif du Pilat (Be) ; c. au Col de la Cambuse près de Meaux, le 22-V-1958 (Ma et Du).  
 72 (124). *Brenthis ino* Rott. — La Verpillière, plusieurs ex. en VI- 1958 (Du).

#### LYCAENIDAE

- 84 (139). *Strymon spini* Schiff. — Paraît c. au sommet du Mt Luisandre (Mo).  
 86 (142). *Strymon acaciae* Fab. — Avec le précédent au Mt Luisandre (Mo).  
 91 (148). *Heodes dispar rutilus* Wern. — Observé aussi sur les bords de la Saône près de Trévoux (Ma).  
 96 (154). *Lampides baeticus* L. — C. certaines années, par exemple en 1958, à l'Observatoire de Saint-Genis-Laval, sur les baguenaudiers (Du) ; Villefranche, 1 ex. 17-VIII-1958 (Ma).  
 98 (156). *Everes coretas* Ochs. — Précédemment connu seulement de l'est lyonnais (région de Bourgoin surtout), existe aussi dans le Sud-ouest lyonnais : St-Genis-Laval, 3 ♀ 8-V-1959 (Du) ; Semons près d'Ampuis (Du) ; gorge de Malleval (Du).  
 100 (158). *Cupido minimus* Fuessl. — Repris 2 ex. à Saint-Genis-Laval en V-VI 1958 (Du) ; La Chapelle-de-Mardore (ENRICO).  
 109 (176). *Polyommatus coridon* Poda. — Les ex. de Chasse, signalés avec doute comme étant des *albicans* H.S. (*hispana* H.S.), sont en fait des *coridon* (DUJARDIN det.) ; Rive-de-Gier, plusieurs ex. (Be).  
 110 (177). *Polygonmatius albicans* H.S. (*hispana* H.S.). — Vaulx-Milieu, au bord des étangs, plusieurs ex. VI-1958 (Du).  
 113 (186). *Scolitantides orion* Pall. — Repris près d'Ampuis à Semons (commune de Tupin-et-Semons), 8-V-1957 (Mo).

---

#### GRYPOCERES

---

#### HESPERIIDAE

- 126 (203). *Hesperia armoricanus* Obth. — Rive-de-Gier (Be).  
 127 (204). *Hesperia serratulae* Rbr. — Le Bessat, Planfoy (Be).  
 133 (226). *Pamphila palaemon* Pall. — Saint-Marcel-en-Dombes (Ro).

---

#### « HETEROCERES »

---

#### ARCTIDAE (LITHOSIIDAE)

- 143 (229). *Celama centonalis* Hb. — Non retrouvé depuis plus de 30 ans. a été repris tout récemment : Villars, 1 ex. 13-VII-1958 (Ma).

144 (231). *Celesa confusalis* H.S. — Aussi à Saint-Genis-Laval (5 ex. du 24-IV au 8-V-1958 (Du) et à Trévoux, 1 ex. 7-V-1958 (Ma).

145 (232). *Nola cuculatella* L. — Aussi en Dombes : Villars, 2 ex., VI-1957, VII-1958 (Ma).

146 (233). *Roeselia albula* Schiff. — Ac. à Villars (Ma) et à Saint-Genis-Laval (Du).

146 bis (234). *Roeselia strigula* Schiff. — Voir p. 101. — 2 ex. repris à Saint-Genis-Laval, VI-1958 (Du).

146 ter (235). *Roeselia togatalis* Hb. — Voir p. 101. — Un 4<sup>me</sup> ex. pris à Saint-Genis-Laval, VII-1956 (Du) ; aussi à Lyon-Point-du-Jour (Mo) et à Saint-Etienne (Be).

150 (240). *Ilema lurideola* Zinck. — A Saint-Genis-Laval, toujours bien plus rare que *I. complana*, qui y est ac. (Du).

154 (244) *Ilema lutarella* L. — Repris au Mt Pilat : Le Bessat, et à La Ricamarie (Be).

159 (251). *Cybosia mesomella* L. — Saint-Etienne, 2 ex. VI-1957 (Be) ; Montagne du Jumeau entre Yzeron et le col de Malval, 6 ex. à la lumière, 14-VI-1958 (Du).

— (254). *Apaidia mesogona* God. — 1 ex. a été pris à Saint-Romain-la-Motte, localité plutôt froide et humide, près de Roanne (Mo). Cela rend probable sa présence dans le Lyonnais.

165 (258). *Euprepia striata* L. — Mt Thou, où il n'avait jamais encore été capturé, 1 ex. (Mo) ; Saint-Etienne (Be).

168 bis (264). *Phragmatobia maculosa* Gern. — V-VI, VII-VIII. — Espèce relativement ac. dans les Alpes et les Pyrénées, signalée çà et là dans le reste de la France (Lot, Ardèche, Saône-et-Loire, Indre, Deux-Sèvres, bassin parisien, Aube, Marne, Aisne, etc. — cf. H. de TOULGOET, « *l'Entomologiste* », 1958, XIV, p. 56), dont l'absence de la région lyonnaise paraissait peu probable. 2 ex. ont été pris au Bessat dans le massif du Pilat, le 18-VI-1958 (Be et Du).

171 (268). *Diacrisia urticae* Esp. — Trévoux, 1 ex. V-1957 (Ma).

185 (285). *Atolmis rubricollis* L. — Bien plus fréquent en 1956 qu'auparavant, à Saint-Etienne (Be), Lyon-Point-du-Jour (Mo) et à Saint-Genis-Laval (12 ex. du 28-VI au 1<sup>er</sup>-VII) (Du). Repris en 1958 dans cette dernière localité (Du).

186 (286). *Utetheisa pulchella* L. — N'avait pas été repris dans la région depuis très longtemps. Saint-Etienne, 2 ex. en 1956 (Be) ; Saint-Genis-Laval, 3 ex. 11 et 13-V-1958, avec de nombreux ex. d'autres espèces migratrices, telles que *Celerio livornica* (Du).

## NOCTUIDAE

189 bis (—). *Chloridea nubigera* H.S. — V-VI, VIII-X. — Espèce connue en Europe seulement d'Espagne, dont l'habitat normal s'étend depuis les Iles Canaries à travers toute l'Afrique septentrionale, l'Asie Mineure et Antérieure jusqu'au Turkestan. Elle a été signalée de France pour la première fois par Ch. BOURSIN (*Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1943, 48, p. 7) d'après deux ex. pris à La Bessée-sur-Durance (Hautes-Alpes) en 1939 et en 1942. Relativement abondante dans le Lyonnais en V-1958 au cours d'une importante migration de diverses espèces (*Celerio livornica*, *Plusia ni*, *Laphygma exigua*, *Chloridea peltigera*, etc.) (1) : 14 ex. pris à Saint-Genis-Laval du 11 au 20-V-1958 (Du) ; 17 ex. à Saint-Etienne du 11 au 21-V-1958 (Be) ; 1 ex. à Lyon-Point-du-Jour le 2-VI-1958 (Mo).

190 (292). *Chloridea armigera* Hb. — Saint-Etienne (Be).

192 (294). *Xylena delphinii* L. — Saint-Genis-Laval, 3 nouveaux ex. en VI-1956 (Du).

193 (295). *Actinotia radiosa* Esp. — Cité d'après une seule capture en Beaujolais, vient d'y être retrouvé en plusieurs ex., V-1958 (To).

194 (296). *Actinotia polyodon* Cl. — Saint-Etienne, 3 ex. V-1957 (Be) ; Villars-les-Dombes, ac. (Ma) ; Saint-Genis-Laval, un premier ex. 30-IV-1957, c. en V-VI-1958 et en V-1959 (Du) ; Lyon-Point-du-Jour, pr. (Mo). Semblerait donc en extension.

195 (297). *Actinotia hyperici* Schiff. — Saint-Etienne (Be).

(1) Cf. R. BÉRARD et C. DUFAY, « Sur une importante migration de Lépidoptères en mai 1958 », *Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, 1959, p. 142-149.

- 200 (307). *Euxoa corticea* Schiff. — La Ricamarie, 1 ex. (Be) ; c. à Planfoy (Be).
- 201 (308). *Euxoa cinerea* Schiff. — 1 ex. à Saint-Etienne (Be) ; c. à Planfoy et au Bessat (Be).
- 203 (313). *Euxoa obelisca* Schiff. — Saint-Etienne (Be)
- 204 (313 bis). *Euxoa aquilina* Hb. — Nouvelles captures récentes : Lyon-Point-du-Jour, 2 ex. (Mo) ; Villars, 1 ex. VII-1956 (Ma) ; Saint-Genis-Laval, une quinzaine d'ex. en VII-1953 (Du).
- 207 (321). *Euxoa trux* Hb. — Saint-Etienne (Be).
- 208 (323). *Euxoa nigricans* L. — Connu de la région d'après 2 ex. seulement, dont un seul pris assez récemment, vient d'y être retrouvé : Lyon-Point-du-Jour (Mo) ; Saint-Etienne (Be).
- 211 (327). *Euxoa tritici* L. — Trévoux, 3 ex. (Ma) ; Saint-Etienne, ac. en VII-VIII (Be).
- 218 (339). *Agrotis orbona* Hfn. — Lyon-Point-du-Jour (Mo) ; Saint-Etienne (Be) ; Montagne du Jumeau (Du).
- 222 (344). *Agrotis triangulum* Hfn. — Cité dans le Catalogue seulement d'après 3 ex., tend à devenir plus fréquent : Lyon-Point-du-Jour, pr. (Mo) ; St-Etienne, ac. en VI-1957 (Be) ; Trévoux, 6 ex. (Ma) ; Villars (Ma) ; Saint-Genis-Laval, 5 ex. du 28-VI au 2-VII-1956, plusieurs ex. en VI-1958 (Du) ; col de Crie, 1 ex. (Du).
- 223 (345). *Agrotis ditrapezium* Schiff. — La localité : Morancé, est à supprimer. Il n'existe donc pas de capture récente de cette espèce dans la région.
- 225 (347). *Agrotis baja* Fab. — Saint-Etienne, 1 ex. VII-1957 (Be).
- 228 (351). *Agrotis rhomboidea* Esp. — Saint-Etienne (Be).
- 231 (355). *Agrotis rubi* View. — Saint-Etienne (Be) ; Trévoux, 1 ex. (Ma) ; ac. à Villars (Ma).
- 232 bis (358). *Agrotis collina* Boisd. — VII. — Lumière. Espèce euro-sibérienne se trouvant en France surtout dans les Alpes, signalée aussi d'Alsace et des Pyrénées-Orientales. 1 ex. pris à Planfoy le 6-VII-1958 (Be) (Ch. BOURSIN vidit).
- 237 (367). *Epipsilia festiva* Schiff. — Repris dans le massif du Pilat : Planfoy, 4 ex. fin VI-1958 (Be). Découvert en Beaujolais : col de Crie, 6 ex. à la lumière, VI-1958 (Du et Ma).
- 240 (371). *Epipsilia simulans* Hfn. — La capture d'un ex. à Saint-Romain-la-Motte près de Roanne (Mo), rend vraisemblable sa présence dans la région, signalée par ROÛAST.
- 242 (374). *Lycophotia molothina* Esp. — Saint-Etienne (Be).
- 243 (375). *Lycophotia porphyrea* Schiff. — Saint-Etienne (Be).
- 247 (389). *Lycophotia praecox* L. — Signalée seulement par le manuscrit de ROÛAST, sa présence dans la région paraissait aussi probable, puisqu'il n'est pr. à St-Jean-de-Muzols (GIRERD). Un ex. à Saint-Etienne, 24-IX-1958 (Be).
- 253 (400). *Naenia typica* L. — Un quatrième ex. dans la région, en Dombes : Villars, 13-VII-1957 (Ma).
- 254 (401). *Epilecta linogrisea* Schiff. — Lyon-Point-du-Jour (Mo).
- 255 (402). *Triphaena fimbria* L. — Saint-Etienne (Be).
- 264 (415). *Miselia luteago* Schiff. — Saint-Etienne (Be).
- 265 (418). *Miselia contigua* Schiff. — Signalée seulement d'après ROÛAST, cette espèce vient d'être retrouvée : Saint-Etienne, c. en VI-1957 (Be) ; ac. au Bessat en VI-1958 (Be et Du) ; découverte aussi en Beaujolais, 2 ex. VI-1958 (To). Signalée autrefois d'Yzeron par GAYNON. Son habitat, montagnard, s'étend donc probablement du Pilat au Beaujolais en passant par les Mts du Lyonnais.
- 267 (420). *Miselia thalassina* Hfn. — Ac. à Saint-Etienne (Be) et davantage au Bessat (Be et Du) ; St-Genis-Laval, 1 ex. V-1958 (Du).
- 270 (423). *Miselia persicariae* L. — Signalé r. dans le Catalogue, cette noctuelle devient plus fréquente ces dernières années : pr. à Lyon-Point-du-Jour (Mo) ; ac. à Saint-Etienne en VI-VII 1957 (Be) ; Trévoux, 6 ex. en VII-1957 (Ma) ; Saint-Genis-Laval, plusieurs ex. en VII-1956, une douzaine d'ex. en VI-1958 (Du) ; col de Crie, 1 ex. à la lumière (Du).
- 270 bis (424). *Miselia advena* Schiff. — VII-VIII. — Lumière. Espèce euro-sibérienne, montagnarde sous notre latitude ; signalée déjà près de la région lyonnaise à Neuville-sur-Ain (COSTA DE BEAUREGARD). 1 ex. pris à Planfoy, 7-VII-1958 (Be).
- 272 (426). *Miselia nebulosa* Hfn. — Signalé ar. dans le Catalogue, devient

plage commun ces dernières années : Saint-Etienne (Be) ; le Bessat (Du) ; montagne du Jumeau (Du) ; Saint-Genis-Laval, plusieurs ex. du 5 au 8-V-1958 (Du) ; col de Crie, un ex. (Du).

274 (429). *Miselia pisi* L. — Connue de la région par une seule capture faite à Ecully (CLERC) il y a plus de 50 ans, a été retrouvée tout récemment dans le massif du Pilat et les Mts du Beaujolais : Planfoy, 4 ex. VI-1958 (Be) ; le Bessat, 1 ex. 18-VI-1958 (Be) ; col de Crie, 4 ex. 23-VI-1958 (Du et Ma).

275 (430). *Miselia dentina* Schiff. (nana Hfn.). — Tc. au Bessat en VI-1958 (Be et Du) ; montagne du Jumeau dans les Mts du Lyonnais (Du) ; col de Crie, en Beaujolais (Du).

278 bis (—). *Miselia corsica* Rbr. — Représenté en France continentale par la ssp. *weissi* Drdt. — VI-VIII. — Lumière. Espèce très voisine de *M. serena* Schiff., avec laquelle on peut la confondre facilement. Répandue en Afrique du Nord, en Espagne et dans tout le Sud-Est de la France, elle ne paraissait cependant pas dépasser la zone de l'olivier. Sa capture dans la région accroît donc sensiblement vers le Nord son aire d'extension. 1 ex. a été pris au Bessat, dans le massif du Pilat, le 18-VI-1958 (Du) (Ch. BOURSIN det.).

Des recherches dans ces espèces pourraient peut-être faire connaître d'autres localités de cette espèce dans la région, où sa présence pouvait paraître improbable jusqu'à présent.

282 (439). *Miselia magnolii* Boisd. — Saint-Etienne, 1 ex. (Be) ; 2 ex. repris à Saint-Genis-Laval (Du).

283 (440). *Miselia filigramma* Esp. — Planfoy, 1 ex. V-1958 (Be) ; Saint-Genis-Laval, un second ex., V-1955 (Du) ; Saint-Didier, 1 ex. V-1956 (De).

285 (442). *Miselia albimacula* Bkh. — Saint-Etienne, 3 ex. VI-1957 (Be).

286 (443). *Miselia conspersa* Schiff. — Ac. au Bessat et à Planfoy (Be).

289 (447). *Hadena reticulata* Vill. — Saint-Etienne, La Talaudière (Be) ; Saint-Genis-Laval, ac. (Du).

292 (453). *Trichoclea albicolon* Sepp. — Saint-Etienne (Be).

293 (455). *Chabuata conigera* Schiff. — 1 ex., sans doute errant, à Lyon-Point-du-Jour (Mo) ; c. à Saint-Etienne en VII-VIII 1957 (Be). N'était connu auparavant que des Echarmeaux, en Haut-Beaujolais.

302 (469). *Monima gracilis* Schiff. — Saint-Etienne (Be).

308 (479). *Cirphis loreyi*, Dup. — Espèce tropicale, méridionale en France, et migratrice. Un seul ex. avait été pris à St-Genis-Laval en 1952 (Du). Lors de l'importante migration constatée dans la région en V-VI 1958, 2 ex. ont été repris dans la même localité, 20-V et 13-VI (Du). 1 ex. a aussi été capturé à St-Etienne le 14-X-1958 (Be) ; il est possible qu'il s'agisse d'une seconde génération issue de pontes des migrants du printemps.

310 (482). *Cirphis comma* L. — Signalé seulement du Haut-Beaujolais (Mt St-Rigaud) dans le Cat., a été retrouvé dans la région du Pilat : La Talaudière, Saint-Etienne (Be) ; tc. au Bessat (Be et Du) ; et aussi, en basse altitude, dans les Dombes : Villars, 1 ex. 7-VI-1958 (Ma).

312 (489). *Cirphis scirpi* Dup. — Rive-de-Gier (Be), Trévoux (Ma).

312 bis (490). *Cirphis unipuncta* Haw. — VI-X. — Lumière. Espèce très répandue dans le monde, méridionale en France, et migratrice. Citée par erreur dans le Cat. (p. 36), et supprimée en conséquence dans le premier Supplément (p. 103) ; cette noctuelle a été trouvée effectivement dans la région : 1 ex., Saint-Genis-Laval, 26-X-1957 (Du).

314 (493). *Leucania impura* Hb. — Ex. isolés à Lyon-Point-du-Jour (Mo), Saint-Etienne, La Talaudière (Be), Trévoux (Ma) ; Saint-Genis-Laval, plusieurs ex. en V-VI 1958 (Du).

315 (494). *Leucania straminea* Tr. — Retrouvé en 1958 après une disparition de près de 30 ans : Villars, 1 ex. 19-VII (Ma) ; Lyon-Point-du-Jour, 1 ex. 22-VI (Mo) ; Saint-Genis-Laval, 1 ex. 8-VI (Du).

317 (496). *Leucania obsoleta* Hb. — Plus répandu actuellement que ne l'indiquait le Cat., où sont citées deux localités seulement. Saint-Etienne, 3 ex. (Be) ; Trévoux, 1 ex. (Ma) ; Villars, 1 ex. (Ma) ; pas tr. à Saint-Genis-Laval (Du).

318 (497). *Leucania pudorina* Schiff. — Un second ex. pris à St-Genis-Laval, 24-VI-1958 (Du).

319 (502). *Cucullia absinthii* L. — Saint-Etienne, 2 ex. VII-1957 (Be).

321 (506). *Cucullia chamomillae* Schiff. — Pr. à Saint-Etienne (Be) ; ac. à Saint-Genis-Laval (Du) ; Villars, 1 ex. (Ma).

323 (508). *Cucullia lactucae* Schiff. — Saint-Etienne (Be).

324 (510). *Cucullia campanulae* Fr. — Signalé seulement de Chasselay (Mo) et d'Odenas (To), vient d'être trouvé au Pilat : Le Bessat, 2 ex. 18-VI-1958 (Be et Du) (Ch. BOURSIN det.).

326 (515). *Cucullia caninae* Rbr. — Signalé seulement d'après des ex. obtenus d'élevage, vient d'être trouvé à l'état adulte : St-Genis-Laval, 2 ex. à la lumière, 13 et 22-V-1958 (Du) (Ch. BOURSIN det.).

327 (517). *Cuculia lychnitis* Rbr. — Saint-Etienne (Be) ; Saint-Genis-Laval (Du).

341 (547). *Aporophyla nigra* Haw. — Signalé d'après ROÜAST, n'a été retrouvé récemment qu'à Saint-Genis-Laval (Du). Un second ex. dans cette même localité, 6-XI-1957 (Du).

342 (551). *Lithophane semibrunnea* Haw. — Saint-Etienne, 1 ex. (Be).

345 (555). *Lithophane furcifera* Hfn. — Villars, 1 ex. 7-III-1957 (Ma) ; St-Genis-Laval, 1 ex. III-1959 (Du).

— (557). *Graptolitha leautieri* Bois. (*lapidea* Hb. dans le Cat. des Lép. Fr. LHOMME). — BERCE a écrit, d'après MILLIÈRE : « éclôt du 20 au 30 novembre dans les environs de Lyon, et en Provence dès le mois de septembre ». Faut-il en conclure que MILLIÈRE prenait cette espèce à Lyon ? Ou bien a-t-il élevé à Lyon des chenilles prises plus au Sud, à La Voulté-sur-Rhône par exemple, où il a souvent chassé ? En tout cas, cette noctuelle n'a jamais été signalée par ailleurs de la région, où sa présence reste hypothétique.

348 (560). *Axylia exoleta* L. — Saint-Etienne (Be).

356 (569). *Agriopsis convergens* Schiff. — St-Etienne (Be).

357 (571). *Eumichtis satura* Schiff. — Trévoux (Ma).

358 (572). *Eumichtis adusta* Esp. — Cité dans le Cat. d'après une seule capture faite au Pilat en 1946 (Te), vient d'y être retrouvé : Le Bessat, 5 ex. 18-VI-1958 (Du).

358 bis (575). *Eumichtis accipitrina* Esp. — IX-XI. — Lumière. Europe méridionale. Sans doute tr. dans la région : 1 ex. pris à Saint-Etienne, 3-X-1957 (Be).

360 (580). *Valeria jaspidea* Vill. — Trévoux (Ma). Pas r. à Saint-Genis-Laval (Du). Non repris à Lyon-Point-du-Jour depuis longtemps (Mo).

361 (582). *Antitype flavicincta* Schiff. — Trévoux, 2 ex. (Ma).

363 (587). *Antitype xanthomista* Hb. — Saint-Etienne, 2 ex. X-1957 (Be).

367 (595). *Eupsilia satellitia* L. — Saint-Etienne (Be).

373 bis (—). *Conistra alicia* Laj. — Voir p. 103. — Nouvelles captures et ex. déterminés depuis la publication du précédent supplément : 1 ♂ de couleur uniforme noire, St-Rambert-l'Île-Barbe, 9-XI-1955 (De, coll. Du) ; bords du Rhône à Condrieu, 1 ♂ 1-XI-1923 (Ro) ; Saint-Didier-au-Mont-d'Or (Ro) ; La Pape, 3 ex. 20-X-1928 (Ro) ; Neyron, 1 ♂ 20-X-1928 (Ro).

374 (602). *Conistra ligula* Esp. — Saint-Etienne (Be).

376 (608). *Omphaloscelis lunosa* Haw. — Saint-Etienne (Be) ; Villars, ac. (Ma).

377 (600). *Amathes ruticilla* Esp. — N'avait été pris dans la région qu'en un seul ex. à Ecully en 1907 (CLERC) ; vient d'être retrouvé : St-Genis-Laval, 2 ex. 19-III-1957 et 19-IV-1958 (Du).

380 (615). *Amathes lota* L. — Trévoux, 1 ex. (Ma).

382 (617). *Amathes circellaris* Hfn. — Villars, ac. (Ma).

385 bis (621). *Amathes iners* Germ. — VI-VIII. — Lumière. Espèce eurosibérienne, assez peu commune en France. 2 ex. à St-Etienne, 20-VI-1957, 18-VII-1958 (Be) ; 2 ex., Villars-les-Dombes, 5-VII-1958 (Ma).

386 (622). *Atethmia xerampelina* Esp. — Saint-Etienne (Be).

387 (624). *Cosmia auraga* Schiff. — Pas tr. actuellement à Saint-Genis-Laval (Du) et à Lyon-Point-du-Jour (Mo).

389 (626). *Cosmia fulvago* L. — Saint-Etienne (Be).

390 (627). *Cosmia gilvago* Schiff. — Villars (Ma) ; Trévoux (Ma) ; Saint-Etienne (Be).

392 (629). *Cosmia ocellaris* Bkh. — Saint-Etienne (Be) ; Villars (Ma) ; repris à Saint-Genis-Laval (Du).

394 (632). *Pyrois cinnamomea* Kleem. — Signalé d'après seulement 2 ex. pris à St-Genis-Laval (Du) où un troisième ex. a été capturé, 28-X-1957 (Du).

397 (640). *Stygiostola umbratica* Goeze. — Probablement c. dans la chaîne Pilat-Mts du Lyonnais-Ht Beaujolais qui doit être son habitat normal ; c. à Planfoy et au Bessat, VI-1958 (Be) ; montagne du Jumeau (Du) ; col de Crie (Du et Ma) ; aussi en Dombes : Villars, 2 ex. (Ma).

- 398 (641). *Mania maura* L. — Trévoux, 1 ex. (Ma).
- 399 (643). *Dipterygia scabriuscula* L. — Saint-Etienne (Be).
- 401 (644). *Parastichtis sublustris* Esp. — Saint-Etienne (Be).
- 403 (646). *Parastichtis hepatica* L. — Lyon-Point-du-Jour, 1 ex., 4-VII-1957 (Mo) ; Saint-Genis-Laval, un troisième ex. 29-VI-1956 (Du).
- 404 (647). *Parastichtis rurea* Fab. — Cité seulement d'après DONZEL et GAYNON, ainsi que d'après un ex. pris bien plus récemment aux environs de Lyon. St-Etienne, 4 ex. VI-1957 (Be) ; ac. à Planfoy (Be) ; c. au Bessat (Be et Du) ; aussi en Dombes : Villars, 1 ex. VI-1958 (Ma).
- 406 (649). *Trachea illyrica* Frr. — Connue de la région par 2 ex. seulement, pris à Tassin et Charbonnières ; vient d'être découvert dans la région du Pilat : le Bessat, ac. (Be et Du), plus r. à Saint-Etienne et à Planfoy (Be).
- 407 (650). *Trachea obscura* Haw. — Sa présence est confirmée par la capture suivante : St-Etienne, 3 ex. (Be).
- 408 (651). *Trachea basilinea* Schiff. — Plus c. à Lyon-Point-du-Jour (Mo) et à St-Genis-Laval (Du) depuis 1955 ; St-Didier (De) ; c. à Villars (Ma) ; Trévoux (Ma) ; le Bessat (Du).
- 410 (655). *Trachea anceps* Schiff. — Le Bessat (Du) ; Lyon-Point-du-Jour (Mo) ; Villars (Ma).
- 413 (658). *Euplexia lucipara* L. — Trévoux, 2 ex. (Ma) ; Saint-Etienne (Be) ; plus c. à Saint-Genis-Laval en VI-1958 (Du).
- 414 (659). *Procus ophiogramma* Esp. — Lyon-Point-du-Jour, repris 2 ex. (Mo) ; Saint-Etienne, 2 ex. VII-1958 (Be) ; Villars, 2 ex. VII-1958 (Ma).
- 415 (661). *Procus scolopacina* Esp. — Repris à Saint-Genis-Laval, 1 ex. VII-1956 (Du) ; c. en Dombes, à Villars (Ma).
- 420 bis (670). *Eremobia platinea* Tr. — VII. — Lumière. Europe centrale, Alpes. En France, Alpes, Massif central, Pyrénées. Découvert dans la région par la capture suivante : 1 ex. à Saint-Etienne, 8-VII-1957 (Be) (Ch. BOURSIN det.). Cet ex. n'est pas de la forme alpine courante, blanchâtre, mais est plus coloré et de tonalités plus contrastées.
- 422 (674). *Sidemia fissipuncta* Haw. — Repris à Saint-Genis-Laval, 2 ex. VI-VII-1956 (Du) ; Saint-Didier, 1 ex. (De).
- 429 (685). *Eriopus juventina* Cr. — Connue par une seule capture faite en forêt de Seillon (RÉAL), sa présence est confirmée par les captures suivantes : Trévoux, 1 ex. 8-VII-1958 (Ma), Villars, 2 ex. 2-VII-1958 (Ma). Sans doute localisé dans le Nord-Est de la région et les Dombes.
- 434 (690). *Bryophila algae* Fab. — Villars (Ma).
- 435 (692). *Bryophila ravula* Hb. — Saint-Etienne (Be).
- 437 (694). *Bryophila pineti* Stgr. — Espèce des Hautes-Alpes et de l'Hérault, qui n'était connue du Lyonnais que par la capture d'un ex. à Saint-Didier en 1925 (Ro). 3 ex. repris ces dernières années confirment l'indigénat de *pineti* dans le Lyonnais : Saint-Genis-Laval, 1 ex. 1-VII-1956, 1 ex. 17-VI-1958 (Du) ; Lyon-Point-du-Jour, 1 ex. 18-VI-1958 (Mo).
- 438 (695). *Bryophila divisa* Esp. — Saint-Etienne (Be).
- 439 (697). *Polyphaenis sericata* Esp. — Trévoux (Ma).
- 441 (700). *Dasaochaeta alpium* Osb. — Villars, 1 ex., VI-1957 (Ma).
- 443 (702). *Acronycta strigosa* Schiff. — Connue seulement par une mention de DONZEL dans le manuscrit de ROÜAST. Sa présence vient d'être confirmée : Villars, 1 ex. 6-VIII-1958 (Ma).
- 450 (709). *Acronycta auricoma* Schiff. — Villars (Ma). Ac. à Saint-Genis-Laval (Du).
- 452 (712). *Acronycta euphorbiae* Schiff. — Saint-Etienne, 1 ex. VII-1957 (Be).
- 453 (713). *Acronycta leporina* L. — Villars, 2 ex. 13-VII-1958 (Ma) ; plusieurs ex. repris à Saint-Genis-Laval (Du) ; pas r. à Saint-Etienne et à Planfoy en 1957 et 1958 (Be).
- 454 (714). *Simyra albovenosa* Goeze. — Signalé seulement d'après quelques ex. de Neyron et des Echets (Du DRESNAY), vient d'être retrouvé : Villars, 5 ex. 15 et 19-VII-1958 (Ma). Ne doit pas être tr. en Dombes.
- 460 (723). *Athetis superstes* Tr. — Plusieurs ex. repris à St-Genis-Laval (Du) (Ch. BOURSIN det.), seule localité connue de cette espèce.
- 461 (724). *Athetis respersa* Schiff. — Signalé seulement de St-Genis-Laval et des Mts d'Or, vient d'y être repris : St-Didier, 1 ex. VII-1955 (De).
- 461 bis (728). *Athetis selini* Boisd. — Voir p. 104. — Repris à Saint-Genis-Laval : 1 ex. VI-1956, plusieurs ex. VI-1958 (Du) ; 1 ex. Lyon-Point-du-Jour (Mo).

- 464 (734). *Athetis kadenii* Frr. — Trévoux (Ma).
- 465 (736). *Athetis morpheus* Hfn. — Saint-Etienne (Be); le Bessat (Du); montagne du Jumeau (Du); col de Crie (Du).
- 465 bis (742). *Acosmetia palustris* Hb. — V-VII. — Lumière. Espèce eurosibérienne, septentrionale et montagnarde; découverte dans le massif du Pilat: c. à Planfoy (Be) et au Bessat (Be et Du) en VI-1958.
- 467 (745). *Monodes venustula* Hb. — Une demi-douzaine d'ex. en VI-1958 à St-Genis-Laval (Du) où cette espèce n'avait jamais été observée auparavant; ac. à Trévoux (Ma); col de Crie, 1 ex. (Du).
- 471 (750). *Hydraecia micacea* Esp. — Saint-Etienne, 1 ex. VII-1958 (Be); Villars, 1 ex. VII-1958 (Ma).
- 473 (754). *Ipimorpha retusa* L. — C. à Villars en VII-1958 (Ma).
- 474 (755). *Ipimorpha subtusa* Schiff. — C. à Villars en VII-1958 (Ma); St-Etienne, 3 ex. en VI et VII-1957 (Be).
- 477 (758). *Calymnia pyralina* Schiff. — Saint-Etienne, 1 ex. (Be); Villars, 3 ex. (Ma).
- 478 (759). *Calymnia affinis* L. — Saint-Etienne, 1 ex. (Be).
- 480 (761). *Dicycla oo* L. — N'avait pas été repris dans la région depuis 1911. St-Genis-Laval, 1 ex. 1-VII-1956 (Du).
- 480 bis (763). *Energia paleacea* Esp. — Voir p. 105. — Découvert dans la région par la capture d'un ex. à St-Genis-Laval (Du), a été retrouvé en Dombes où peut-être il n'est pas tr.: 3 ex., Villars, 13-VII-1958 (Ma).
- 482 (766). *Arenostola lutosa* Hb. — Villars, 1 ex. (Ma); 4 nouveaux ex. à St-Genis-Laval (Du); Saint-Etienne (Be).
- 482 bis (770). *Arenostola pygmina* Haw. — VII-IX. — Lumière. Europe septentrionale et centrale. Lieux humides ou marécageux. 1 ex. Villars-les-Dombes, 6-IX-1958 (Ma) (Ch. BOURSIN vidit).
- 488 (790). *Eublemma ostrina* Hb. — Très rarement pris dans la région avant 1958. A été plus fréquent à St-Genis-Laval (Du) et à Lyon-Point-du-Jour (Mo) lors du passage en V-1958 de l'importante migration de *Celerio livornica*, *Phytometra ni*, *Laphygma exigua*, etc. Villars, 3 ex., 6-VIII-1958 (Ma).
- 489 (791). *Eublemma parva* Hb. — Avec la précédente espèce, 2 ou 3 ex. à Lyon-Point-du-Jour (Mo) en V-1958, 2 ex. au même moment à St-Genis-Laval (Du); 1 ex. au Mt Verdun du côté de Poleymieux, 11-VIII-1958 (Ro); Trévoux, 1 ex. 23-IV-1958 (Ma).
- 495 (807). *Eustrotia olivana* Schiff. — Villars, 2 ex. VI-1956 (Ma).
- 496 (808). *Eustrotia candidula* Schiff. — Trévoux, Villars (Ma).
- 500 (814). *Sarothripus revayana* Scop. (*Nycteola revayana* Scop.). — Le paragraphe du Cat. doit être annulé et remplacé par :
- IV-X. — Au vol en battant les taillis; lumière. Ar. à ac., mais bien répandu. Lyon, Saint-Genis-Laval (c.), Ecully, bois de Serres près Ecully, Saint-Didier, col de la Croix du Banc (Monts du Lyonnais), St-Etienne, Pilat, etc.
- Très variable, mais les formes rencontrées le plus souvent sont des formes brunes: *atrata* Ter Haar, *stoninus* Curt., *undulana* Hb., *rufescens* Sheld., *obsoleta* Sheld., *variegata* Sheld., *conjuncta* Cock., *adusta* Sheld., *obscura* Warr.; des formes grises se rencontrent plus rarement: *notata* Sheld., *afzeliana* Swed., *plumbea* Sheld., etc.
- Ainsi, sur une trentaine d'ex. capturés à St-Genis-Laval, une dizaine seulement peuvent être rapportées à ces trois dernières formes, les autres sont de coloration générale brune ou tendant au brun.
- 500 bis (—). *Sarothripus columbana* Trn. (*Nycteola columbana* Trn.). Espèce décrite de la Haute-Loire, en tant que « race » de *revayana* Scop., avec laquelle elle est demeurée longtemps confondue, et dont on ne peut la distinguer, dans la plupart des cas, avec certitude, que par l'examen des armures génitales (cf. C. DUFAY, « Révision des *Nycteola* Hb. (*Sarothripus* Curt.) paléarctiques », *Ann. Soc. Entom. Fr.* 127, 1958, p. 107). — IV-X. — Lumière, au vol en battant les taillis, les chênes. Bassin méditerranéen. Surtout méridionale en France. Saint-Genis-Laval, 1 ♂, 23-X-1952 (f. *griseus* Obr.); 1 ♂, 26-VII-1954 (f. *ramosoides* Dufay, Type !) (Du).
- 501 (—). *Sarothripus degenerana* Hb. (*Nycteola degenerana* Hb.). — Le paragraphe du Catalogue, concernant l'espèce suivante (comme il est indiqué p. 126), doit être annulé pour cette espèce, qui était jusqu'à présent inconnue du Lyonnais, et remplacé par :

IV-X. — Lumière ; en battant les saules, les peupliers ; élevage. Espèce eurosibérienne, dont la sous-espèce nominative est très rare en France : 3 ex. authentiques en sont connus actuellement (Alsace, Savoie, Rhône) dont 1 ex. pris à la lumière à St-Genis-Laval, 5-V-1958 (Du). Cet ex., très frais, est identique au « Type » de HÜBNER.

501 bis (—). *Sarothrips siculana* Fuchs. (*Nycteola siculana* Fuchs = *pseudodilutana* Obr.). — Déjà signalé, dans le Catalogue, sous le nom de *degenerana* indiqué sous réserves, rectifié en *pseudodilutana* Obr. p. 126. — IV-X. — Lumière ; en battant taillis, saules ou peupliers ; élevage. Espèce eurosibérienne, très répandue en France mais peu commune. Bords de l'Azergues près des Chères (Mo) ; Ecully (Mo) ; Trévoux (Ma) ; Villars (Ma). Probablement plus répandue dans les peuplements de peupliers, que ne l'indiquent ces localités.

Plusieurs formes se rencontrent dans la région, mais la plupart des ex. capturés sont de coloration générale grisâtre, très peu sont verdâtres.

501 ter. (—). *Sarothrips asiatica* Krul. (*Nycteola asiatica* Krul.). — IV-X. — Lumière ; sur les saules, les peupliers. Eurosibérienne. En France, méridionale et rare. Déjà connu près de la région à St-Jean-de-Muzols (GIRERD) (1 ex. f. *nigerrina* Dufay, Type !), cette espèce y a été découverte : 1 ♂, Saint-Genis-Laval, 25-X-1953 (Du).

504 (817). *Hylophila bicolorana* Fuessl. — Saint-Etienne (Be).

506 (821). *Mormonia sponsa* L. — Saint-Etienne, 3 ex. (Be).

511 (827). *Catocala promissa* Esp. — Saint-Etienne, 2 couples (Be).

515 (832). *Catocala conversa* Esp. — Connu de la région seulement par la capture de 3 ex. Un quatrième ex. pris à St-Genis-Laval, 17-VI-1958 (Du).

515 bis (834). *Ephesia fulminea* Scop. — VII-VIII. Eurosibérienne. En France, septentrionale et centrale. Découverte en Dombes, où elle n'est peut-être pas très rare : Villars, 3 ex. 17 et 19-VII-1958 (Ma). Il est curieux que cette espèce, pourtant bien visible et bien reconnaissable, n'ait jamais été rencontrée auparavant ; probablement très localisée.

517 (857). *Parallelia algira* L. — Saint-Etienne, 1 ex. (Be).

520 (843). *Colocasia coryli* L. — R. à Saint-Etienne, plus c. à Planfoy et au Bessat (Be) ; montagne du Jumeau (Du) ; col de Crie (Du).

521 (853). *Phytometra* ni Hb. — Toujours r. dans la région, cette espèce a été exceptionnellement abondante lors du passage d'une migration avec d'autres noctuelles et *Celerio lineata livornica*, en V-VI-1958 à Saint-Etienne (Be), Saint-Genis-Laval (Du) et Lyon-Point-du-Jour (Mo), ainsi qu'à Veurey dans la région de Grenoble (Général Touchon). Resté fréquent toute l'année 1958, sans doute par générations issues de pontes des migrants du mois de mai.

522 (855). *Phytometra chalcytes* Esp. — Repris plusieurs ex. à Lyon-Point-du-Jour (Mo) et à Saint-Genis-Laval (Du) ; Saint-Etienne, 2 ex. (Be).

523 (857). *Phytometra festucae* L. — Villars, 2 ex. (Ma).

525 (860). *Phytometra pulchrina* Haw. — Signalé dans le Cat. d'après une seule capture faite au Pilat (Mo). Repris au Pilat, 1 ex. 2-VIII-1957 (Ma) ; 1 ex. à Saint-Etienne (Be) ; c. à Planfoy en VI-1958 (Be) ; 1 ex. à la montagne du Jumeau dans les Monts du Lyonnais (Du) ; 1 ex. au col de Crie, en Ht Beaujolais (Du) ; enfin un ex. Lyon-Point-du-Jour (Mo). Ces localités, sauf la dernière où l'espèce est sans doute accidentelle, nous montrent que l'habitat normal de *pulchrina* doit être la chaîne montagneuse Pilat-Mts du Lyonnais-Haut-Beaujolais, où elle ne doit pas être tr.

526 (861). *Phytometra iota* L. — Signalé d'après une seule capture faite près d'Ecully (Mo), et les notes de Roüast, vient d'être repris : Saint-Genis-Laval, 1 ex. 1-VII-1956 (Du) ; Lyon-Point-du-Jour, 1 ex. 8-VI-1957 (Mo) ; St-Etienne (Be).

531 (871). *Unca tripartita* Hfn. (*Abrostola triplasia* L.). — Caluire, 1 ex. (coll. Du) ; Trévoux, 1 ex. (Ma), St-Genis-Laval, 1 ex. V-1959 (Du).

534 (876). *Catephia alchymista* Schiff. — Saint-Etienne, 3 ex. (Be).

536 (878). *Aedia funesta* Esp. — Trévoux, 1 ex. (Ma).

538 (882). *Asticta pastinum* Tr. — Villars, 1 ex. VII-1956 (Ma).

540 (884). *Asticta cracca* Fab. — Saint-Etienne (Be).

541 (886). *Autophila dilucida* Hb. — Après une éclipse de 40 ans, 1 ex. avait été repris, à St-Genis-Laval (Du) ; un second vient de l'être, à Lyon-Point-du-Jour (Mo).

543 (890). *Laspeyria flexula* Schiff. — C. à Villars (Ma).

545 (892). *Parascotia fuliginaria* L. — Villars, 1 ex. (Ma) ; pr. à Lyon-Point-du-Jour (Mo).

- 548 (896). *Epizeuxis calvaria* Fab. — Villars, 1 ex. (Ma); repris un second ex. à St-Genis-Laval (Du) et plusieurs à Lyon-Point-du-Jour (Mo).  
 549 (897). *Polygogon barbalis* Cl. — St-Genis-Laval, 1 ex. VI-1958 (Du).  
 550 (898). *Pechipogo plumigeralis* Hb. — Trévoux, 1 ex. (Ma).  
 556 (906). *Aethia emortualis* Schiff. — Aux deux captures récentes s'ajoute une troisième : St-Etienne, 1 ex. VII-1957 (Be).  
 558 (908). *Mixomelia grisealis* Hb. — Lyon-Point-du-Jour (Mo); St-Etienne (Be).  
 564 (917). *Hypena obsitalis* Hb. — Trévoux, 1 ex. (Ma).

#### LIPARIDAE

- 566 (921). *Dasychira pudibunda* L. — Tc. à la montagne du Jumeau (Du).  
 569 (928). *Arctornis l-nigrum* Müll. — Trévoux, 1 ex. (Ma).  
 570 (929). *Stilpnotia salicis* L. — Trévoux, 1 ex. (Ma); Saint-Etienne (Be).  
 572 (931). *Lymantria monacha* L. — Villars, 1 ex. 5-VI-1958 (Ma).

#### CALLIMORPHIDAE

- 576 (936). *Callimorpha dominula* L. — Trévoux, 1 ex. (Ma); Villars, 1 ex. (Ma).

#### SPHINGIDAE

- 580 (940). *Hyloicus ligustri* L. — Montagne du Jumeau (Du); col de Crie (Ma).  
 584 (944). *Sphinx ocellata* L. — Saint-Etienne (Be); Villars (Ma).  
 586 (946). *Haemorrhagia tityus* L. — 1 ex. à la Croix-du-Collet dans le Mt Pilat (Be).  
 589 (949). *Proserpinus proserpina* Pall. — 1 ex. Lyon-Point-du-Jour (Mo).  
 593 (954). *Celerio vespertilio* Esp. — 1 ex. Crémieu (Mein).  
 595 (956). *Celerio lineata livornica* Esp. — Surabondant à Saint-Genis-Laval (Du), St-Etienne (Be) et Lyon-Point-du-Jour (Mo) lors de la migration du 10 au 21 mai 1958.  
 597 (958). *Pergesa porcellus* L. — Le Bessat (Du).

#### THYATIRIDAE

- 599 (960). *Habrosyne derasa* L. — Plusieurs ex. à Saint-Etienne (Be); ac. à Lyon-Point-du-Jour depuis peu de temps (Mo); Trévoux, 2 ex. (Ma); ac. à Villars (Ma).  
 600 (961). *Thyatira batis* L. — Plusieurs ex. à Saint-Etienne (Be).  
 601 (963). *Palimpsestis duplaris* L. — Saint-Didier, 1 ex. VIII-1956 (De); St-Genis-Laval, 1 ex. IV-1957, 3 ex. V-1958 (Du); Trévoux, 1 ex. (Ma); c. à Villars (Ma).  
 602 (694). *Palimpsestis or* Fab. — Saint-Genis-Laval, 1 ex. V-1958 (Du); Villars, ac. en V-1958 (Ma).  
 603 (965). *Palimpsestis ocellaris* L. — Apparitions plus fréquentes d'ex. mélanisants, à antérieures uniformément foncées sur lesquelles se détachent bien les signes blancs, à Saint-Genis-Laval, en V-1958 (Du).  
 605 (967). *Polyploca flavicornis* L. — Villars, 1 ex. 3-III-1957 (Ma).  
 606 (968). *Polyploca ridens* Fab. — Plusieurs ex. repris à Saint-Genis-Laval en IV-V-1958 (Du).

#### CERURIDAE

- 606 bis (973). *Cerura furcula* Cl. — Voir p. 106. — 2 ex. repris à Trévoux (Ma); aussi à Villars-les-Dombes, 3 ex. (Ma).

606 ter (972). *Cerura bicuspis* Bkh. — IV-V, VII-VIII. — Lumière. Septentrionale et centrale en France. Découverte dans les Dombes, où elle est sans doute localisée : 1 ex., Villars, 5-VIII-1958 (Ma).

607 (974). *Cerura bifida* Hb. — Villars, 1 ex. (Ma) ; Saint-Etienne (Be).

608 (975). *Dicranura erminea* Esp. — Saint-Etienne, 1 ex. (Be) ; Trévoux, 1 ex. (Ma).

610 (977). *Stauropus fagi* L. — Saint-Etienne, 1 ex. (Be) ; ac. à Villars (Ma).

613 (980). *Gluphisia crenata* Esp. — Saint-Etienne, 1 ex. (Be) ; pas tr. à St-Genis-Laval (Du) ; ac. à Trévoux et à Villars (Ma).

614 (981). *Drymonia querna* Fab. — Villars (Ma).

615 (982). *Drymonia trimacula* Esp. — Planfoy, 1 ex. (Be).

616 (983). *Drymonia chaonia* Hb. — Saint-Etienne, 1 ex. (Be).

617 (984). *Pheosia tremula* Cl. — Saint-Etienne (Be).

618 (985). *Pheosia dictaeoides* Esp. — Villars (Ma) ; Saint-Etienne (Be).

620 (987). *Notodonta ziczac* L. — Saint-Etienne (Be).

621 (988). *Notodonta anceps* Goeze. — Saint-Etienne (Be) ; montagne du Jumeau (Du).

622 (989). *Notodonta phoebe* Sieb. — Saint-Etienne, 1 ex. (Be) ; Villars, 2 ex. (Ma). A Saint-Genis-Laval, où *phoebe* est assez commun, a été pris un ex. de la f. *tiefi* Bartel (28-IV-1958) (Du), plus courante dans le Midi de la France et les Alpes.

623 (992). *Leucodonta bicoloria* Schiff. — Signalé d'après une seule capture faite à Lent en 1948 (PERRON), vient d'être retrouvé : Mt Saint-Rigaud, 1 ex. trouvé mort, 28-VI-1956 (Ma).

625 (996). *Lophopteryx camelina* L. — Le Bessat, Planfoy (Be) ; montagne du Jumeau (Du) ; capturé pour la première fois à St-Genis-Laval le 19-VI-1958 (Du).

626 (997). *Lophopteryx cuculla* Esp. — Villars, 2 ex. VIII-1958 (Ma).

632 (1007). *Thaumetopoea processionea* L. — Villars (Ma).

633 (1008). *Thaumetopoea pityocampa* Schiff. — Saint-Etienne (Be).

## GEOMETRIDAE

634 (1011). *Abraxas grossulariata* L. — Saint-Etienne, 1 ex. (Be).

638 (1017). *Bapta bimaculata* Fab. — Trévoux, 1 ex. (Ma) ; pas tr. à Saint-Genis-Laval (Du) ; Lyon-Point-du-Jour (Mo).

639 (1018). *Bapta temerata* Schiff. — Lyon-Point-du-Jour (Mo) ; Trévoux, 1 ex. (Ma) ; col de Crie (Du) ; pas tr. à St-Genis-Laval en 1958 (Du) ; Le Bessat, 1 ex. (Du).

643 (1023). *Anagoga pulveraria* L. — Trévoux, 1 ex. (Ma).

645 (1025). *Ellopija fasciaria* L. — Mt Tourvéon (Ma) ; col de Crie (Du).

649 (1030). *Ennomos alniaria* L. — Saint-Etienne, 1 ex. (Be) ; Villars, 1 ex. (Ma).

650 (1031). *Ennomos fuscantaria* Steph. — Saint-Etienne (Be).

651 (1032). *Ennomos erosaria* Schiff. — Ac. à Saint-Etienne (Be).

652 (1033). *Ennomos quercaria* Hb. — 1 ex. à Lyon-Point-du-Jour (Mo).

654 (1035). *Selenia lunaria* Schiff. — Le Bessat (Du) ; Pouilly-les-Feurs (Be).

657 (1038). *Gonodontis bidentata* Cl. — Signalé d'après le manuscrit de RoüAST, n'avait été repris qu'à Yzeron, un exemplaire ex larva (Mo). Vient d'être repris : St-Genis-Laval, 1 ex. 25-V-1958 (Du) ; Le Bessat, 4 ex. 18-VI-1958 (Be et Du).

659 (1040). *Crocallis tusciaria* Bkh. — Trévoux (Ma).

661 (1043). *Angerona prunaria* L. — Mornant, 1 ex. (De) ; Trévoux (Ma) ; St-Genis-Laval, 1 ex. 19-VI-1958 (Du) ; ac. à Villars (Ma).

663 (1045). *Plagodis dolabraria* L. — Saint-Etienne (Be) ; col de Crie (Du).

665 (1047). *Epione repandaria* Hfn. — Trévoux, 1 ex. (Ma).

669 (1052). *Semiothisa notata* L. — Col de Crie, 2 ex. (Du et Ma).

671 (1055). *Semiothisa liturata* Cl. — Saint-Etienne (Be) ; Trévoux (Ma).

679 (1068). *Lycia hirtaria* Cl. — Saint-Etienne (Be).

680 (1069). *Biston strataria* Hfn. — Saint-Etienne (Be).

681 (1070). *Biston betularia* L. — Tc. au col de Crie (Du) dans sa forme nominative. Les formes mélanisantes de plus en plus fréquentes (environ 50 %, et même plus, des ex.) à St-Genis-Laval (Du).

**691 bis (1092). Boarmia lichenaria** Hfn. — VII-IX. — Lumière ; élevage ; en battant les sapins. Déjà signalé dans le Catalogue, mais avec doute, d'après des chenilles prises au Pilat en 1912 (Mo), dont l'élevage n'a donné qu'un papillon, détruit par la suite, qui semblait être *lichenaria*. La présence de cette *Boarmia* dans le Lyonnais vient d'être confirmée, par les captures suivantes faites dans les Dombes : Villars, 3 ex. 13-VII-1958, 1 ex. 19-IX-1958 (Ma).

**698 (1100). Boarmia extersaria** Hb. — Trévoux (Ma) ; repris de nouveaux ex. à St-Genis-Laval (Du).

**701 bis (1108). Rhoptria asperaria** Hb. — IV-V, IX. — Lumière ; sur les cistes. Espèce méridionale, signalée au plus près de St-Jean-de-Muzols (GIRERD). 1 ex. pris à la lumière le 9-V-1958 à St-Genis-Laval (Du). Cette capture eut lieu par très fort vent du sud.

**707 (1118). Gnophos mucidaria** Hb. — Pouilly-les-Feurs (Be).

**709 (1122). Gnophos aenearia** Obth. — Repris au Pilat (Be).

**714 (1144). Bupalus piniaria** L. — Pas r. à Saint-Etienne (Be).

**718 bis (1152). Itame fulvaria** Vill. — VI-VIII. — Au vol dans les peuplements de *Vaccinium* ; lumière. Espèce septentrionale et montagnarde. Découverte dans la région en 4 localités différentes, éloignées les unes des autres : 1 ex. Crest de l'Éillon dans le massif du Pilat, 12-VIII-1956 (Mo) ; 1 ex. col de Crie, en Haut-Beaujolais, à la lumière, 23-VI-1958 (Du) ; 1 ex. Villars-les-Dombes, 13-VII-1958 (Ma) ; 1 ex. Lyon-Point-du-Jour, à la lumière, 20-VII-1958 (Mo). En raison surtout de son vol diurne, il paraît assez improbable que cette espèce soit passée inaperçue pendant plus d'un siècle, et soit capturée ensuite coup sur coup en 4 ex. (dont le dernier loin de tout *Vaccinium*) ; il semblerait donc que cette espèce soit en extension à présent (R. Mouterde).

**721 (1154). Lithina chlorosata** Scop. — Montagne du Jumeau (Du).

**727 (1170). Siona lineata** Scop. — Montagne du Jumeau (Du).

**728 (1172). Aspilates gilvaria** Schiff. — St-Didier (De) ; Vaulx-Milieu (Du).

**730 (1174). Perconia strigillaria** Hb. — Saint-Genis-Laval (Du) ; Le Bessat (Du).

**732 (1178). Rhodometra sacraria** L. — Villars, 1 ex. (Ma).

**736 (1184). Ortholitha mucronata** Scop. — Le Catalogue (p. 70) fait allusion à une espèce distincte et très voisine de *mucronata*, sur laquelle aucune précision n'a pu alors être donnée. Il s'agit d'*O. plumbaria* Fab. Des recherches sur le terrain et dans les collections lyonnaises seraient nécessaires pour pouvoir préciser l'habitat de ces 2 espèces. Toutefois elles existent toutes deux dans la région, comme nous l'a montré l'étude des armures génitales de quelques exemplaires ; parmi les ex. ainsi étudiés, plusieurs se sont révélés être des *mucronata* : 1 ♂, Lavaure près Givors (Mo) ; 1 ♂, St-Genis-Laval (Du) ; 1 ♂, col de Crie, 22-V-1958 (Du).

Il est certain que cette espèce est plus répandue que ne l'indiquent ces trois localités.

**736 bis (—). Ortholitha plumbaria** Fab. — V-VI, VII-IX. — Au vol dans les prés et les friches ; lumière. Cette espèce serait peut-être plus répandue dans la région que la précédente, et il est certain qu'une partie des localités citées dans le Catalogue pour *mucronata*, se rapporte en réalité à *plumbaria*. Nous pouvons cependant signaler avec certitude pour cette espèce les localités suivantes : bois de Mably (Loire), 1 ♂ (Mo) ; bois de La Tour-de-Salvagny, 1 ♂ (Mo) ; bords du Garon près de Chaponost, 1 ♀ (Mo) ; Saint-Genis-Laval, 2 ♂, 3 ♀ (Du) (armures génitales de tous ces ex. examinées). A Saint-Genis-Laval, *plumbaria* semble plus c. que *mucronata* (Du).

**737 (1185). Ortholitha chenopodiata** L. — C. partout aux environs de Saint-Etienne (Be).

**739 bis (1192). Mesotype virgata** Hfn. — VI-VIII. — Au vol dans les lieux herbeux et ensoleillés. Espèce d'Europe centrale, paraissant manquer en France dans de nombreuses régions. Sa localité la plus proche était, à notre connaissance, le nord du Jura. Un ex. pentes ouest du Mt Luisandre, 17-VII-1955 (Mo).

**745 bis (1205). Chesias isabella** Schaw. — V-VII. — Lumière. Espèce méridionale, dont l'aire de répartition connue jusqu'à présent comprenait l'Espagne et les départements suivants : Pyrénées-Orientales, Aude, Gironde, Corrèze, Lozère, auxquels il faut ajouter l'Ardèche : St-Jean-de-Muzols près Tournon (GIRERD) (HERBULOT det.) : Les captures de 4 ex. à Saint-Genis-Laval, 19-V, 22-V et 7-VI-1958 (Du) (C. HERBULOT vidit), faites à la lumière, étendent notablement vers le Nord l'habitat de cette espèce.

748 (1029). *Nophopteryx polycommata* Schiff. — Signalé seulement d'après DONZEL, n'avait pas été retrouvé depuis. Sa présence est confirmée : Villars, 1 ex. 30-III-1956 (Ma) (C. HERBULOT det.).

749 (1211). *Lobophora halterata* Hfn. — Trévoux (Ma) ; pas tr. à St-Genis-Laval en V-1958 (Du).

753 bis (1216). *Oporinia christyi* Prout. — IX. — Lumière ; contre les troncs. Dans les bois des montagnes. Espèce septentrionale, qui, à notre connaissance, n'était connue en France que des environs de Divonne (Ain) (Ro). Elle vient d'être découverte près de la région lyonnaise, dans le Puy-de-Dôme, à St-Anthème, 1 ex. 23-IX-1956 (Be). Sa présence dans le Lyonnais paraissait dès lors probable ; effectivement un ex. a été pris dans le Mt Pilat, ex larva, éclos 9-IX-1912 (Mo) (C. DUFAY det., genitalia prép. C. DUFAY n<sup>os</sup> 827 et 844). Cette espèce est très probablement méconnue, du fait de sa ressemblance externe avec ses congénères, et du fait de la variabilité de celles-ci. Il est possible aussi qu'elle soit très localisée.

753 ter (1217). *Oporinia autumnata* Bkh. — IX-XI. — Contre les troncs ; lumière. Espèce eurosibérienne très répandue, dont l'absence de la région lyonnaise pouvait paraître improbable. 1 ♀, Vaugneray, 11-XI-1932 (Mo) (C. DUFAY det.) ; 1 ♂, Le Bessat, 28-IX-1956 (Be) (C. HERBULOT det.). Existe aussi un peu en dehors des limites de la région, à Saint-Anthème (Puy-de-Dôme) où 2 ex. ont été pris avec l'ex. d'*O. christyi* signalé précédemment (Be) ; en cette localité les *Oporinia* ont été observés en abondance, mais les trois seuls ex. signalés ont pu être capturés (Be). *O. autumnata* doit être plus répandu dans le Lyonnais, et doit être méconnu, sans doute du fait de son apparition tardive.

756 (1220). *Calocalpe cervinalis* Scop. — Trévoux, 2 ex. (Ma).

759 (1224). *Philereme transversata* Hfn. — Quelques ex. Lyon-Point-du-Jour (Mo).

767 (1233). *Cidaria bicolorata* Hfn. — Repris à Saint-Genis-Laval, 1 ex. VI-1956 (Du) ; Trévoux, 3 ex. (Ma).

768 (1234). *Cidaria variata* Schiff. — *Stragulata* Hb. (sous-espèce de *variata*, ou bonne espèce ?) commun au Pilat, mais aussi dans le Haut-Beaujolais : col de Crie (Du).

771 (1239). *Cidaria firmata* Hb. — Signalé seulement, avec un très léger doute (p. 73), d'après un seul ex., une ♀ obtenue ex larva, Messimy (Mo). Sa présence est confirmée : 1 ♂, St-Genis-Laval, à la lumière, 22-X-1956 (Du).

772 (1240). *Cidaria siterata* Hfn. — Saint-Etienne (Be).

774 (1242). *Cidaria truncata* Hfn. — Saint-Genis-Laval, 1 ex. VI-1958 (Du).

777 (1250). *Cidaria spadicearia* Schiff. — Saint-Genis-Laval, 11 ex. le 12-IV-1957, ac. en IV-V-1958 et V-1959 (Du) ; St-Etienne (Be).

778 (1251). *Cidaria ferrugata* Cl. — Bien plus r. que la précédente à Saint-Genis-Laval : 2 ex. en V-1958 (Du) ; Villars, 2 ex. V-1958 (Ma).

779 (1253). *Cidaria designata* Hfn. — Quelques ex. Lyon-Point-du-Jour (Mo).

780 (1254). *Cidaria obstipata* Fab. — Villars (Ma).

785 bis (1267). *Cidaria multistrigaria* Haw. — XI-IV. — Lumière. Déjà signalé de Tence (Haute-Loire) par MANEVAL, donc près de la région, cette espèce, septentrionale et montagnarde, vient d'y être découverte : Saint-Etienne, 1 ex. 4-V-1958 (Be) ; Le Bessat, 1 ex. 5-V-1958 (Be).

797 (1293). *Cidaria cuculata* Hfn. — Plusieurs ex. repris à St-Genis-Laval (Du) ; Lyon-Point-du-Jour (Mo) ; St-Etienne (Be) ; Villars (Ma).

798 (1294). *Cidaria unangulata* Haw. — Ac. à Villars (Ma).

799 bis (1296). *Cidaria luctuata* Schiff. — V-VI, VIII-IX. — Au vol dans les bois ; lumière. Espèce septentrionale et montagnarde. Unique capture : 1 ex. au vol, bois de La-Roche-d'Ajoux près de Poule, 22-V-1958 (Du).

800 (1297). *Cidaria molluginata* Hb. — Le Bessat (Be, Du) ; Mt Tourvéon près de Beaujeu, 1 ex. VII-1957 (Ma).

801 (1298). *Cidaria polygrammata* Bkh. — Ac. à Villars (Ma).

803 (1301). *Cidaria silaceata* Schiff. — Saint-Genis-Laval, 1 ex. 30-V-1955 (Du) ; Planfoy, 1 ex. 9-VI-1958 (Be).

804 (1302). *Cidaria corylata* Thnbg. — 1 ex., obtenu ex larva, Duerne (Mo) ; un ex. en dehors des limites de la région, à Usson-en-Forez (Be).

805 (1304). *Cidaria albicillata* L. — Planfoy, 1 ex. (Be) ; col de Crie, 1 ex. (Ma).

808 (1307). *Cidaria tristata* L. — Le Bessat (Du) ; Mt Saint-Rigaud (Ma) ; ac. dans les bois de La-Roche-d'Ajoux, près de Poule (Ma et Du).

- 810 (1311). *Cidaria rivata* Hb. — Col de Crie (Du).  
 812 (1315). *Cidaria alchemillata* L. — Villars (Ma) ; Saint-Etienne (Be) ; Le Bessat (Du).  
 816 (1320). *Cidaria blandiata* Schiff. — A l'unique capture contemporaine faite près de Vaugneray (Mo), s'ajoutent de nouvelles : St-Genis-Laval, 1 ex. 5-VIII-1958 (Du) ; St-Etienne, 1 ex. 6-VIII-1958 (Be).  
 817 (1321). *Cidaria albulata* Schiff. — C. au Bessat (Be et Du) ; St-Genis-Laval, 5 ex. le 20-V-1958 (Du).  
 818 (1322). *Cidaria flavofasciata* Thnbg. — Trévoux, ac. (Ma) ; St-Genis-Laval, 3 ex. VI-1958 (Du) ; Lyon-Point-du-Jour, plus fréquent qu'autrefois (Mo).  
 820 (1324). *Cidaria coeruleata* Fab. — Découvert en Beaujolais : Mt Saint-Rigaud, VI-1956 (Ma).  
 824 (1332). *Hydrelia flammeolaria* Hfn. — Quelques ex. Lyon-Point-du-Jour (Mo) ; Trévoux (Ma) ; Saint-Genis-Laval (Du).  
 825 (1333). *Euchoeca nebulata* Scop. — Trévoux (Ma) ; Villars (Ma).  
 827 bis (1337). *Eupithecia tenuiata* Hb. — VI-VII. — Lieux frais. Elevage ; lumière. 1 ex. Lyon-Point-du-Jour, 25-VI-1957 (Mo) (C. HERBULOT det.).  
 828 (1338). *Eupithecia haworthiata* Dbld. — Saint-Etienne (Be).  
 831 (1343). *Eupithecia linariata* Fab. — Saint-Etienne (Be).  
 832 (1344). *Eupithecia pulchellata* Steph. — Saint-Just-d'Avray, ex. larva (Mo) ; Saint-Etienne (Be) ; Saint-Genis-Laval (Du).  
 833 (1345). *Eupithecia laquearia* H.S. — La présence de cette espèce, signalée seulement d'après une mention de MILLÈRE (vers La Pape), est confirmée : St-Genis-Laval, 2 ex. 14 et 25-V-1958 (Du) (C. HERBULOT det.).  
 835 bis (1350). *Eupithecia valerianata* Hb. — V-VII. — Prairies, bosquets ; lumière. Lyon-Point-du-Jour, 1 ex. 1-VI-1957 (Mo) (C. HERBULOT det.) ; St-Genis-Laval, 1 ex. 19-VI-1958 (Du) (C. HERBULOT det.).  
 841 (1371). *Eupithecia cauchiata* Dup. — Trévoux, 19-VI-1957 (Ma). Cette espèce n'est donc connue que d'après 3 captures.  
 842 (1373). *Eupithecia tripunctaria* H.S. — Aux seuls 4 ex. cités, s'ajoutent quelques autres : Lyon-Point-du-Jour (Mo) (C. HERBULOT det.). St-Genis-Laval, 1 ex. 13-V-1958 (Du).  
 846 (1378). *Eupithecia vulgata* Haw. — Saint-Etienne (Be).  
 848 (1380). *Eupithecia castigata* Hb. — Saint-Etienne (Be) ; St-Genis-Laval, plusieurs ex. (Du).  
 852 (1388). *Eupithecia millefolliata* Rössl. — 2 ou 3 ex. Lyon-Point-du-Jour (Mo) ; St-Genis-Laval, 1 ex. 1-VII-1956 (Du) (C. HERBULOT det.).  
 856 (1398). *Eupithecia nanata* Hb. — Saint-Etienne (Be) ; Saint-Genis-Laval (Du).  
 857 bis (1400). *Eupithecia unedonata* Mab. — Voir p. 107. — Espèce à rayer du Catalogue des Lépidoptères de la Région Lyonnaise, car cette mention résulte d'une erreur.  
 860 (1407). *Eupithecia sobrinata* Hb. — Lyon-Point-du-Jour, loin de tout peuplement de genévrier (Mo) (C. HERBULOT det.).  
 860 bis (1409). *Eupithecia oxycedrata* Rbr. — III-IV, VII-X. — Lumière ; élevage. Espèce méridionale et orientale, inféodée aux genévriers. Unique capture, loin de tout peuplement de genévriers : Lyon-Point-du-Jour, 1 ♂ 13-X-1957 (Mo) (C. HERBULOT det.).  
 861 bis (1414). *Eupithecia lanceata* Hb. — IV-VII. — Espèce inféodée aux conifères (sapins et mélèzes). Lumière. 1 ex. Lyon-Point-du-Jour, 20-V-1956 (Mo) (C. HERBULOT det.).  
 864 (1418). *Chloroclystis rectangulata* L. — St-Etienne (Be).  
 865 (1419). *Chloroclystis debiliata* Hb. — Le Bessat, 1 ex. (Be).  
 872 (1431). *Scopula immorata* L. — Saint-Genis-Laval, 3 ex. VI-1958 (Du) ; La Verpillière (Du).  
 886 bis (1478). *Cleta filacearia* H.S. — VI-VII. — Au vol dans les lieux secs et ensoleillés. Surtout méridionale. 4 ex. à Chazey-sur-Ain, 26-V-1957 (Te) ; ac. à Chatelans (Te). Aussi, un peu en dehors des limites de la région, à Marchamp (Ain) (Te).  
 887 (1459). *Sterrrha aureolaria* Schiff. — Les citations de Chazey-sur-Ain et de Chatelans sont à supprimer pour cette espèce. Affoux, 2 ex. (Ma) ; col de la Croix-Rosier (To).  
 904 (1499). *Sterrrha herbariata* Fab. — Saint-Etienne (Be).

914 (1512). *Sterrrha inornata* Haw. — A Lyon-Point-du-Jour où *deversaria* était fréquent, c'est maintenant *inornata* qui paraît le remplacer (Mo).

917 (1515). *Sterrrha emarginata* L. — Villars (Ma).

918 (1518). *Cosymbia pendularia* Cl. — Villars, 2 ex. (Ma) ; Priay (Ain) (Ma) ; St-Genis-Laval, 1 ex. VI-1958 (Du).

919 (1519). *Cosymbia orbicularia* Hb. — Deux ex. seulement avaient été pris. Un troisième, Villars, 28-V-1955 (Ma).

920 (1521). *Cosymbia annulata* Schulze. — Trévoux (Ma) ; St-Genis-Laval, 1 ex. en 1956, 8 en V-1958 (Du).

921 (1522). *Cosymbia puppillaria* Hb. — Saint-Etienne (Be) ; Villars (Ma).

922 (1523). *Cosymbia porata* L. — Saint-Etienne (Be).

922 bis (1524). *Cosymbia quercimontaria* Bastelb. — V-VII. — Au vol dans les bois ; lumière. Le Catalogue indique : « Ne paraît pas appartenir à notre région. Une ♀ de petite taille, bois de Serres près Ecully, 15-IV-1926 (Mo), a été rapportée avec doute par G. PRAVIEL à cette espèce, mais est plus probablement *ruficiliaria* ». Cet ex. est en effet *ruficiliaria*. *Quercimontaria* n'était donc pas connu de la région. Mais il vient d'y être découvert : 1 ex. pris à la lumière, St-Genis-Laval, 5-V-1958 (Du) (C. HERBULOT det.) ; Villars, 1 ex. (Ma).

923 (1525). *Cosymbia ruficiliaria* H.S. — Saint-Etienne (Be).

924 (1526). *Cosymbia punctaria* L. — Saint-Etienne (Be).

924 bis (—). *Cosymbia suppunctaria* Zell. — V-VI, VIII-IX. — Au vol dans les bois et les taillis ; lumière. Cette espèce, méridionale, souvent confondue avec ses congénères, en particulier avec *ruficiliaria*, existe dans la région lyonnaise : St-Genis-Laval, 2 ex., 26-V-1952, et 10-V-1958 (Du) (genitalia prép. C. DUFAY, nos 530 et 820).

925 (1527). *Cosymbia linearia* Hb. — Croix-Marchampt (Rhône), 2 ex. VIII-1956 (Ma) ; Lyon-Point-du-Jour, 1 ex. (Mo).

927 (1530). *Hipparchus papilionaria* L. — Villars, 1 ex. (Ma).

928 (1531). *Comibaena pustulata* Hfn. — Ac. à Saint-Genis-Laval (Du) ; Trévoux, 1 ex. (Ma) ; col de Crie (Du).

929 (1532). *Hemithea aestivaria* Hb. — Saint-Genis-Laval, pas c. (Du).

931 (1534). *Chlorissa cloraria* Hb. — Exemplaïres de détermination certaine : Lentilly, 1 ♂ (Mo) ; signal St-Bonnet, 1 ♀ (Mo) ; et un troisième ex. un peu en dehors des limites de la région, à la Chartreuse-de-Portes, 1 ♂ (Mo).

932 (1535). *Chlorissa pulmentaria* Gn. — Tarare (Ma).

939 (1546). *Alsophila quadripunctata* Esp. — St-Genis-Laval, 3 ex. (Du).

943 (1552). *Brephos notha* Hb. — Villars, III-1957 (Ma).

## ATTACIDAE

944 (1556). *Saturnia pyri* Schiff. — Saint-Etienne (Be).

946 (1558). *Agria tau* L. — Une ♀ prise à La Boisse, au pied de la Côte des Dombes, avril 1955 (cf. DAVID et LAVIOLETTE, *Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, 1955, p. 213) ; les Sauvages, en chenilles (ENRICO).

## PSYCHIDAE

951 (1571). *Oreopsyche angustella* H.S. — Le Bessat, c. (Be) (J. BOURGOGNE det.).

953 (1580). *Sterrhopteryx hirsutella* Hb. — Saint-Genis-Laval, 1 ex. à la lumière (Du) ; Trévoux, id. (Ma) (J. BOURGOGNE det.).

## COSSIDAE

964 (1608). *Dyspessa ulula* Bkh. — Trévoux, 1 ex. (Ma).

965 bis (1611). *Phragmataecia castaneae* Hb. — V-VIII. — Lumière. Signalé dans le Catalogue comme proche des limites de la région, d'après un ex. pris à St-Benoît (Ain), ce Cossidé y existe effectivement : 1 ex., Crémieu, 21-V-1956 (M&N) ; 1 ex., Villars-les-Dombes, 7-VI-1958 (Ma).

## LASIOCAMPIDAE

- 976 (1628). *Epicnaptera tremulifolia* Hb. — Lyon-Point-du-Jour (Mo).  
 977 (1630). *Gastropacha quercifolia* L. — Saint-Etienne (Be).  
 980 (1633). *Dendrolimus pini* L. — Plusieurs ex. repris à Saint-Genis-Laval (Du) ; Villars (Ma).

## ENDROMIDIDAE

- 981 (1635). *Endromis versicolora* L. — Nouvelle capture : 1 ♂ très frais, pris à la lumière, 21-III-1957, à St-Genis-Laval (Du).

## HETEROGENEIDAE

- 982 (1636). *Cochlidion limacodes* Hfn. — Villars, Trévoux (Ma).

## ZYGAENIDAE

986 bis (—). *Procris subsolana* Stgr. — V-VII. Au vol, dans les prés. Europe centrale et surtout méridionale. En France, les départements les plus septentrionaux de son aire de dispersion semblaient être jusqu'à présent, la Drôme et les Hautes-Alpes. 1 ♂, Le Poirier près Lentilly, 28-VI-1957 (Mo) (genitalia examinés, C. DUFAY det.). Seule capture connue de la région. Vient d'être signalé des environs de Montmédy (Meuse) et découvert en Belgique (E. de LAEVER, *Lambillionea*, 58, 11-12, p. 90-93, 1958).

988 (1645). *Procris manni* Led. — Chatelans (Te). (DUJARDIN det.); Neyron. coteaux en direction de La Pape, tc. 16-V-1957 (Mo) (C. DUFAY det.).

990 (1647). *Zygaena erythrus* Hb. — Découvert dans la région en 1912 seulement, pris depuis en plusieurs localités à exposition généralement chaude ; a été capturé récemment à St-Didier, 2 ex. 18-VI-1955 (De) ; Mercruey près Lentilly, 1 ex. (Mo) ; bords de l'Azergues aux Chères, 1 ex. (Mo) ; et un peu en dehors des limites de la région, à Saint-Rambert-d'Albon, 1 ex. 2-VII-1953 (Du). Les trois premières signalisations étendent l'habitat actuel de l'espèce à des localités fréquemment visitées : les Mts d'Or, les Mts du Lyonnais à une altitude déjà assez élevée ; et enfin à une région nettement plus proche de Villefranche que de Lyon.

991 (1648). *Zygaena purpuralis* Brunn. — Versant Sud-Est du Mt Thou (Mo) ; Poleymieux (Ma) ; col de la Croix-Marchampt (Ma). Il est très curieux que cette espèce, connue auparavant seulement de l'extrême-est de la région, vienne d'être découverte dans des localités aussi explorées que celles des Mts d'Or.

995 (1661). *Zygaena carniolica* Scop. — Paraît c. au sommet du Mt Luisandre (Mo).

## DREPANIDAE

1001 (1669). *Drepana falcataria* L. — Saint-Etienne (Be).

1001 bis (1670). *Drepana curvatula* Bkh. — V. VII-VIII. — Lumière, au vol dans les bois. Espèce septentrionale et occidentale en France. Sans doute ac. en Dombes : plusieurs ex. en VII et VIII-1958 à Villars-les-Dombes (Ma).

1002 (1671). *Drepana harpagula* Esp. — Plusieurs ex. ces dernières années à Lyon-Point-du-Jour (Mo) ; 1 ex. 5-VIII-1958 à Saint-Genis-Laval (Du).

1002 bis (1672). *Drepana lacertinaria* L. — V. VII-VIII. — Au vol dans les bois ; lumière. Surtout septentrionale. Sans doute pas tr. en Dombes : 4 ex., Villars-les-Dombes, 13-VII-1958 (Ma).

## AEGERIIDAE

1008 (2784). *Paranthrene tabaniformis* Rott. — 1 ex. à Châtillon-d'Azergues, 12-VI-1955 (VoisIN).

## HEPIALIDAE

1025 bis (—). *Hepialus humuli* L. — VI-VII. — Au vol dans les prairies et les clairières humides ; lumière. Plutôt septentrionale. Signalée, au plus près des limites de la région, des départements du Puy-de-Dôme et du Jura (VIETTE, 1948, Faune de France, Lépidoptères Homoneures, p. 65) mais trouvé aussi en Savoie (Mo) et dans l'Isère : Allevard (Mo). Vient d'être découvert dans le Lyonnais : 1 ♀, Trévoux, 28-VI-1956 (Ma).

1027 (—). *Korscheltellus fusconebulosus* De Geer. — 1 ex. montagne du Jumeau, 14-VI-1958 (Du) ; environs de Planfoy, 3 ex., 13-VII-1958 (Be). Aux environs de Planfoy, les ex. observés volaient de jour au ras des *Vaccinium*, (Be). Ils appartiennent à la petite forme ayant la taille et l'aspect de *lupulinus*, mais les dessins de *fusconebulosus*, signalée du Massif Central à Pierre-sur-Haute (Mo) dans le Cat. ; leur envergure est de 29 à 31,5 mm. L'ex. de la montagne du Jumeau est semblable à ceux de Planfoy. Leur comportement diurne est à rapprocher de celui des espèces alpines *ganna* Hb. et *carna* Esp.

Par contre, à Tence (Haute-Loire) a été pris un ex. de la forme nominative, de 37 mm d'envergure, mais à une époque plus précoce (11-VI-1958) (Be).

## PYRALIDAE

1028 bis (1677). *Hypsotropa limbella* Z. — VII-VIII. — Au vol la nuit sur les coteaux secs de la Côte d'Azur, Alpes-Maritimes et Var [Saint-Raphaël (Mo)]. 1 ex. Lyon-Monplaisir (rue Laënnec), 9-VIII-1956 (Ro) (MARION det.). La capture peut être considérée comme accidentelle mais on peut se demander si ce lépidoptère, de très faible apparence, ne passe pas inaperçu en des stations intermédiaires qui relieraient son habitat de la Côte d'Azur à celui du Lyonnais.

1039 (1706). *Eccopisa effractella* Z. — Un ex. Lyon-Point-du-Jour, 25-VII-1956 (Mo) (MARION det.).

1046 (1730). *Zophodia convolutella* Hb. — Saint-Genis-Laval (Du).

1048 (1733). *Euzophera pinguis* Haw. — Villars (Ma).

1049 bis (1739). *Cateremna terebrella* Z. — VI-VIII. — Lumière. Espèce inféodée aux conifères, signalée de France en des localités dispersées. 4 ex. Lyon-Point du Jour, 3 en 1956, 1 en 1958 (Mo).

1052 (1760). *Microthrix similella* Zinck. — Seconde localité connue : Châtellans (Te).

1055 (1769). *Divona dilucidella* Dup. — Lyon-Point-du-Jour, 2 ex. à la lumière (Mo).

1057 bis (—). *Psorosa brephiella* Stgr. — IV-VI. — Au vol sur les coteaux secs ; lumière. Espèce signalée nouvelle pour la France par H. MARION (*Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, 1958, p. 183) à qui ont été soumis avec des ex. des Basses-Alpes (Du), un ex. pris à St-Genis-Laval, 28-VI-1956 (Du).

1059 (1787). *Nephopteryx formosa* Haw. — Trévoux (Ma) ; Saint-Genis-Laval, plusieurs ex. (Du).

1062 (1791). *Nephopteryx rhenella* Zinck. — Lyon-Point-du-Jour, 1 ex. (Mo).

1069 (1810). *Acrobasis obliqua* Zinck. — Lyon-Point-du-Jour, 1 ex. en 1953, 4 ex. en 1956 (Mo). La localité est loin de tout peuplement de cistes, auxquels est inféodée cette espèce.

1072 (1815). *Acrobasis glaucella* Stgr. — Lyon-Point-du-Jour (Mo).

1073 (1816). *Acrobasis noctuana* Hb. — Ac. ces dernières années à Lyon-Point-du-Jour (Mo).

1078 (1829). *Myelois ceratoniae* Z. — Repris un ex. à Lyon-Point-du-Jour, 1-VII-1957 (Mo). L'ex. cité du 11-VI-1909 est à rayer.

1079 (1831). *Phycita spissicella* Fab. — Trévoux (Ma).

1080 bis (1835). *Dioryctria abietella* Schiff. — VI-VIII. — Cette espèce existe, avec *mutatella* Fuchs, à Lyon-Point-du-Jour (Mo) (MARION det.) et n'y paraît pas tr. Les ex. de *mutatella* provenant des autres localités citées seraient à vérifier.

1082 (1841). *Eurhodope marmorea* Haw. — Saint-Genis-Laval (Du).

1085 (1844). *Eurhodope suavella* Z. — Un ex. Lyon-Point-du-Jour (Mo).

1090 (1864). *Crambus contaminellus* Hb. — Saint-Genis-Laval (Du).

1112 (1911). *Argyria cerusella* Schiff. — Pollionnay (Mo).

- 1137 (1962). *Perinephele lancealis* Schiff. — Marais du Vernay près Bourgoin (Mo).  
 1140 bis (1968). *Scoparia zelleri* Wocke. — VI-VII. — Posé contre les troncs et les rochers. Lumière. Espèce localisée, surtout dans les montagnes, où elle est c. par places ; plus r. en plaine. 2 ex. pris à Trévoux, 22-VI-1955, 7-VII-1956 (Ma) (MARION det.).  
 1149 (1991). *Agrotera nemoralis* Scop. — Trévoux (Ma) ; Saint-Genis-Laval (Du).  
 1151 (1995). *Margaronia unionalis* Hb. — Villars (Ma).  
 1156 (2008). *Diasema litterata* Scop. — Villars (Ma) ; col de Crie (Du).  
 1167 (2044). *Pyrausta ciliaris* Hb. — Villars (Ma).  
 1179 (2069). *Pyrausta sanguinalis* L. — Villars (Ma).  
 1181 (2073). *Pyrausta aurata* Scop. — Villars (Ma).  
 1191 (2098). *Orobena extimalis* Scop. — Trévoux (Ma).  
 1192 (2099). *Orobena straminalis* Hb. — Villars (Ma).

\*\*

Le nombre d'espèces de « Macrolépidoptères », plus les *Aegeriidae* et les *Hepialidae*, connues actuellement ou ayant été signalées de la région lyonnaise, s'élève à 1087. Le dernier numéro du Catalogue pour ces familles est 1028 ; il faut en retrancher 2 numéros omis ou rayés et y ajouter 23 numéros bis du premier supplément (l'un d'eux étant supprimé) et 38 numéros bis du présent supplément.

Pour les *Pyralidae* et *Galleriidae*, le nombre d'espèces s'élève à 179. Le dernier numéro du Catalogue étant 1200, le premier 1029, pour ces familles, on doit en retrancher un numéro rayé et y ajouter 3 numéros bis cités dans l'addenda faisant suite aux *Galleriidae* (p. 121) et 5 numéros bis du second supplément.

Toutes les familles traitées ici totalisent donc 1266 espèces actuellement connues ou ayant été signalées dans la région lyonnaise.

Mais il est évident que la faune des Lépidoptères de cette région n'est pas complètement connue, comme l'ont montré les découvertes assez nombreuses faites ces dernières années. De nouvelles recherches, en particulier dans des régions comme le massif du Pilat, le Haut-Beaujolais, les Dombes et peut-être les environs de Vienne seraient susceptibles d'accroître encore le nombre des espèces, et ainsi, de donner lieu à d'éventuels suppléments ultérieurs.

#### Liste des espèces nouvelles pour la région citées dans ce supplément

- 168 bis (264). *Phragmatobia maculosa* Gern.  
 189 bis (—). *Chloridea nubigera* H.S.  
 232 bis (358). *Agrotis collina* Boisd.  
 270 bis (424). *Miselia advena* Schiff.  
 278 bis (—). *Miselia corsica weissii* Drdt.  
 312 bis (490). *Cirphis unipuncta* Haw.  
 358 bis (575). *Eumichtis accipitrina* Esp.  
 385 bis (621). *Amathes iners* Germ.  
 420 bis (670). *Eremobia platinea* Tr.  
 465 bis (742). *Acosmetia palustris* Hb.  
 482 bis (770). *Arenostola pygmaea* Haw.  
 500 bis (—). *Sarrothripus columbana* Trn.  
 501 (—). *Sarrothripus degenerana* Hb.  
 501 bis (—). *Sarrothripus siculana* Fuchs.  
 501 ter (—). *Sarrothripus asiatica* Krul.  
 515 bis (834). *Ephesia fulminea* Scop.  
 606 ter (972). *Cerura bicuspis* Bkh.  
 691 bis (1092). *Boarmia lichenaria* Hfn.  
 701 bis (1108). *Rhoptria asperaria* Hb.  
 718 bis (1152). *Itame fulvaria* Vill.

- 736 bis (—). *Ortholitha plumbaria* Fab.  
 739 bis (1192). *Mesotype virgata* Hfn.  
 745 bis (1205). *Chesias isabella* Schaw.  
 753 bis (1216). *Oporinia christyi* Prout.  
 753 ter (1217). *Oporinia autumnata* Bkh.  
 785 bis (1267). *Cidaria multistrigaria* Haw.  
 799 bis (1296). *Cidaria luctuata* Schiff.  
 827 bis (1337). *Eupithecia tenuiata* Hb.  
 835 bis (1350). *Eupithecia valerianata* Hb.  
 860 bis (1409). *Eupithecia oxycedrata* Rbr.  
 861 bis (1414). *Eupithecia lanceata* Hb.  
 886 bis (1478). *Cleta filacearia* H.S.  
 922 bis (1524). *Cosymbia quercimontaria*-Bastelb.  
 924 bis (—). *Cosymbia suppunctaria* Zell.  
 965 bis (1611). *Phragmataecia castaneae* Hb.  
 986 bis (—). *Procris subsolana* Stgr.  
 1001 bis (1670). *Drepana curvatula* Bkh.  
 1002 bis (1672). *Drepana lacertinaria* L.  
 1025 bis (—). *Hepialus humuli* L.  
 1028 bis (1677). *Hypotropa limbella* Z.  
 1049 bis (1739). *Cateremna terebrella* Z.  
 1057 bis (—). *Psorosa brephiella* Stgr.  
 1080 bis (1835). *Dioryctria abietella* Schiff.  
 1140 bis (1968). *Scoparia zelleri* Wocke.

Rappel des espèces signalées nouvelles pour la région dans le premier supplément. (L'astérisque indique celles citées dans le second supplément).

- 15 bis (—). *Colias australis* Vrty. (p. 99).  
 17 bis (36). *Erebia medusa* Fab. (p. 100).  
 24 bis (57). *Melanargia syllius* Herbst. (p. 100).  
 \*146 bis (234). *Roeselia strigula* Schiff. (p. 101).  
 \*146 ter (235). *Roeselia togatulalis* Hb. (p. 101).  
 201 bis (310). *Euxoa distinguenda* Led. (p. 101).  
 251 bis (398). *Mythimna oxalina* Hb. (p. 102).  
 272 bis (427). *Miselia splendens* Hb. (p. 102).  
 291 bis (450). *Anepia irregularis* Hfn. (p. 102).  
 326 bis (516). *Cucullia thapsiphaga* Tr. (p. 103).  
 \*373 bis (—). *Conistra alicia* Laj. (p. 103-104).  
 417 bis (663). *Procus literosa* Haw. (p. 104).  
 \*461 bis (728). *Athetis selini* Boisd. (p. 104).  
 \*480 bis (763). *Enargia paleacea* Esp. (p. 105).  
 484 bis (777). *Nonagria maritima* Tausch. (p. 105).  
 492 bis (804). *Lithacodia deceptorica* Scop. (p. 105).  
 519 bis (842). *Clytie illunaris* Hb. (p. 105).  
 555 bis (904). *Herminia zelleralis* Wocke (p. 105).  
 \*606 bis (973). *Cerura furcula* Cl. (p. 106).  
 622 bis (990). *Notodonta tritophus* Esp. (p. 106).  
 678 bis (1074). *Apocheima hispidaria* Schiff. (p. 106).  
 706 bis (1117). *Gnophos variegata* Dup. (p. 106).  
 778 bis (1252). *Cidaria biriviata* Bkh. (p. 107).  
 \*857 bis (1400). *Eupithecia unedonata* Mab. (p. 107).

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 13 décembre 1958