



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Inocybaceae*

Inocybe olida Maire

Sous feuillus méditerranéo-atlantiques, surtout sous chênes verts ou chênes-lièges sur sol calcaire. Chapeau 2-5 cm, lisse à fibrillo-vergeté, ocre jaunâtre à brunâtre. Lames pâles puis ochracées. Stipe blanchâtre, rosé au sommet, un peu jaunissant par la base, bulbe plus ou moins marginé. Odeur miellée ou de *Mahonia*. Spores 9-11 x 6-7,5 µm avec de nombreuses bosses. Cystides métuloïdes sur les lames et tout le long du stipe.

Espèce de la Section *Marginatae*, bien caractérisée, notamment dès l'instant où l'odeur spécifique a été perçue. A noter malgré toute une ressemblance avec *I. cookei*, surtout à odeur identique, et qui pourrait conduire vers une identification de terrain erronée ; la microscopie de ce dernier, à spores lisses, lève tout doute.

Inocybe peu fréquent à nos yeux, la récolte présentée a été réalisée en octobre 2019 à Ronce les Bains. La nette odeur miellée a attiré l'attention, les spores contrôlées mesuraient 9-10 x 6,2-7,5 µm.

Biblio : DM 111.