

Cortinarius turmalis var. subclaricolor (Henry)

Je trouve ce beau cortinaire du sous-genre Phlegmacium, de la section Claricolores, dès la fin du mois d'août dans les forêts d'épicéas du Doubs, vers 850 m.

Le champignon frappe par la luxuriance de son voile et sa fréquente ressemblance avec *Rozites caperata* (la « Pholiote ridée »).

Cespiteux, il croit souvent en touffes denses.

Ce *C. turmalis* des conifères (étant admis que *C. turmalis* est une espèce collective) a été décrit comme *C. turmalis* var. *subclaricolor* par R. Henry, BSMF 1958 (74) p.271, puis *C. claroturmalis* BSMF (1963) 79 et probablement sous le nom de *C. turmalis* var. *velutisectus* par Bidaud, Moëgne-Loccoz, Reumaux, Carteret dans la Pars XIX de l'Atlas des Cortinaires.

Description:

Chapeau : 4-9 cm, jaune-orangé, modérément visqueux, d'aspect soyeux par temps sec, lames claires, devenant ocracées, serrées.

Pied 4-9 cm, blanc, parfois fusiforme, abondante cortine blanche engainante.

Spores sublisses, amygdaliformes à ellipsoïdes, avec parfois une guttule. 7-9 x 4-5 μ .

Ci-dessous: exemplaires jeunes. L'aspect des carpophores d'une même collection change passablement au fil des jours. (Cf. pages suivantes)




Cortinarius turmalis var. *subclaricolor* (Henry)



Une des forêts d'épicéas où je trouve régulièrement cette espèce




Cortinarius turmalis var. *subclaricolor* (Henry)



Cortinarius turmalis



Les exemplaires suivants ont été récoltés en forêt de Tronçay (F 03, altitude 200 m) sous chênes et hêtres, le 18.10.2014. Il s'agit probablement de *C. turmalis* Fries, var. *turmalis*



Cortinarius turmalis



La cortine a laissé un manchon rouille sur le stipe et des restes à la marge du chapeau.

