



Leg. JCV & det. JCV

Lieu
humide

1

2

3

- 1 : Spores fusiformes, hyalines, non septées, non guttulées, $6-8 \times 1,2-1,5 \mu\text{m}$.
 2 : Paraphyses lancéolées, $4-7 \mu\text{m}$ de diamètre, dépassant les asques de $20-25 \mu\text{m}$.
 3 : Poils cylindriques, à sommet largement arrondi, hyalins, à paroi mince, entièrement incrustés de fines granulations, $70-120 \times 3-4 \mu\text{m}$, 2-3-septés, non couronnés de cristaux.

Apothécies, $0,3-0,5 \text{ mm}$, de couleur blanchâtre à crème pâle, couverte, particulièrement à la marge, de poils droits blanc pur. Stipe cylindrique, élancé, blanchâtre, avec une partie jaunâtre à la base, quelque peu poilu dans la moitié supérieure.

Sur feuilles tombées de *Quercus robur* (chêne pédonculé).
 Combe Saint-Martin, maille 3023D14, le 5 juin 2017.

Peu
fréquent

► *Lachnum charretii* peut être confondu avec *L. rhytismatis*. Microscopiquement, par contre, les deux espèces se distinguent facilement, car *L. rhytismatis* possède des poils portant de gros cristaux sphériques apicaux et de petites spores clavées, alors que les poils sont sans exsudations et les spores plus longues et régulièrement fusiformes chez *L. charretii*.