



► *Inocybe incarnata* Bres.



Leg. JCV & det. JCV

1 : Spores très largement elliptiques, 9-13 x 7-8,5 µm.

2 : Cystides avec quelques cristaux au sommet, fusiformes à ventrues, 50-75 x 15-25 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 2-3 µm.



Chapeau 3-8 cm, convexe et largement mamelonné, revêtement soyeux-fibrilleux, ocracé rougeâtre, saumoné, briqueté, plus cuivré à la fin. Lames beige taché de rose puis rouillé. Stipe sublisse à soyeux-fibrilleux, 5-8 x 0,6-1,2 cm, blanc rosâtre, rosâtre, devenant brun rougeâtre à partir de la base. Chair rougeâtre, odeur forte de poire cuite.

Dans les bois environnants, sous feuillus.

Le Plain-des-Essoyottes, maille 3023D12, le 2 octobre 2017.



► L'*Inocybe* à odeur de poire fructifie du mois d'août au mois d'octobre, isolé ou en groupes, aussi bien sous feuillus que résineux, généralement sur sol calcaire. Cet *Inocybe*, comme les autres champignons du groupe qui présentent pour la plupart une toxicité plus ou moins forte, présence de muscarine, est à rejeter.