

NOTE COMPLÉMENTAIRE AU SUJET DE L'ISOETES GARNIERI

Par Aug. CHEVALIER et P. MONNIER.

Dans le *Bulletin du Muséum* de janvier 1946, sous le titre « Une nouvelle espèce d'Isoetes de l'Afrique occidentale française » nous décrivions l'*Isoetes Garnieri* sp. nov., sans pouvoir conclure formellement, faute de matériel, à sa non-identité avec *I. nigritiana* Al. Br.

L'un de nous a reçu récemment de M. E. J. SALISBURY, Directeur du Royal Botanic Gardens de Kew, des renseignements complémentaires très intéressants. Un cotype d'*I. Garnieri* Aug. Chev. et P. Monnier, envoyé à Londres a été comparé avec l'unique type de *I. Nigritiana* Al. Br. — le 1020 de Barter — qui se trouve dans les collections de l'herbier de Kew. Ils présentent des différences frappantes, notamment dans l'aspect des macrospores, différences consignées ci-dessous :

Macrospores	Taille moyenne	Couleur	Ornementation
<i>Isoetes nigritiana</i> ..	480 $\mu$	gris-brun terne	1 seul (ou 2) tubercules par face apicale.
<i>Isoetes Garnieri</i> ...	530 $\mu$	Blanc-gris crayeux	plusieurs tubercules.

Pour M. BALLARD, spécialiste de Kew ayant procédé à la comparaison, il n'y a pas de doute que l'on ait à faire à deux espèces différentes.

Il résulte de ces informations nouvelles que *Isoetes Garnieri* Aug. Chev. et P. Monnier sp. nov. peut être considéré définitivement comme une bonne espèce distincte d'*I. nigritiana* Al. Braun et s'ajouter à la liste, certainement très incomplète encore, des Isoètes africains.

Laboratoire d'Agronomie Coloniale du Muséum.

Le Gérant : Marc ANDRÉ.