



Vol. I & II: sectio 1-2


(Vol III does not)

QK603


.F7

v.1

c.2




Kenneth K. Mackenzie  
Collection



Released from Library  
Horticultural Society of New York, Inc.

EX-LIBRIS



Bequest of  
Kenneth K. Mackenzie  
October 1934

1249

# SYSTEMA MYCOLOGICUM;

SISTENS

## FUNGORUM

ORDINES, GENERA ET SPECIES,

HUC USQUE COGNITAS,

QUAS

AD NORMAM METHODI NATURALIS

DETERMINAVIT, DISPOSUIT ATQUE

DESCRIPSIT

ELIAS FRIES,

Acad. Carol. Adjunctus,

Acad. Cœsar. Leopold. Carol. Nat. Curiosorum,

Reg. Soc. Nat. Curios. Lips., Botan. Ratisbon.,

Physiogr. Lund. Membrum.

---

VOLUMEN I.

---

LUNDÆ MDCCXXI.

Ex Officina BERLINGIANA,

FT.

WT.

c.2

VIRO  
ILLUSTRISSIMO ET GENEROSISSIMO  
COMITI  
LAURENTIO  
VON ENGESTRÖM,

*Summo Rerum Sviogothicarum Externarum Ministro,  
Academiae Carolinæ Cancellario, Reg. Ord. Svec. Equiti  
et Commendatori, Ord. Regis CAROLI XIII:i, Le-  
gionis Honor. Reg. Gall. cum Insigni Grandiori, Ordinis  
Regii Boruss. cum Insigni Aquilæ Nigræ et Rufæ  
atque Reg. Hungar. Ord. S:t Stephani cum  
magna cruce Equiti.*

*Cum nihil, quantulum fuerit, a Viro generoso  
rejici soleat, quod Illi animus beneficiorum memor  
consacraverit, non miraberis, Vir Illustrissime! si*

*nos in eandem spem erecti, hoc opus Tuo sub pa-  
trocino sistere audemus. Tibi enim, Vir Illustris-  
sime! qui ex edito illustrique loco varia disciplina-  
rum temperamenta intuearis, et minima et maxima  
æque patent.*

*Verum enim vero ita mihi pluries gratulabor,  
si quæ a me, Vir Illustrissime! juste postulan-  
tur, ea rite præstare meque Tuo, ut antea, ita  
posthac favore dignum reddere potuero. Quo stu-  
dio excitatus, quoad vixero, ero permansurus.*

ILLUSTRISSIMI TUI NOMINIS

*cultor devotissimus  
ELIAS FRIES,*

## Ratio Operis.

Vicesimus jam labitur annus ab editione *Synopsis Fungorum Persoonianæ*, operis meritissimi, ultimi specialem in *Mycologia continentis*. Quo a tempore studium mycologicum, ducibus Link & Nees, & præcipue inferiorum Ordinum, plane reformatum & ad hodiernum scientiarum cultum magis, quam reliquæ Botanices partes, accommodatum. Perennia in *Systematologia stabilita principia*; genera plurima nova determinata & jam cognita acuratius circumscripta. Inter scientiae ultimis his annis promotores eximium sibi vindicant locum Sowerby, Décandolle, Schumacher, Albertini & Schweiniz, Swartz, Kunze & Schmidt, Ehrenberg, Dittmar aliique. Opus horum & antecessorum observationes, novo examini subjectas & conciliatas, in compendio colligens, ad conspectum scientiæ facilitandum, in præsente mihi visum maxime necessarium.

Mycologia enim jam ampliorem Botanices partem constituit, quam vulgo creditur. Species hactenus cognitæ plures, quarum etiam fere omnes Europeæ, quam editio prima Linnæana Specierum Plantarum recenset. Ob studium totius dispositionis rationem, non plantarum characterem solum, sed & indolem e.s.p. exponere, multo majus quoque evasit opus nostrum & in tria volumina divisum. Primum describit fungos Pileatos & Clavatos; secundum reliquos recensebit Hymenomycetes & Gasteromycetes (*Phaneromycetes*); tertium Hyphomycetes & Coniomycetes (*Cryptomycetes*). Restat tandem *Mycologia theoretica Fungorum historiam, terminologiam & physiologiam exponens*.

Prius præsens opus adgressus sum, fungos in diversis Sveciae provinciis, montosis & campestribus, acerosis & frondosis, per decennium & quod excurrit, diligentissime conquisivi, examinavi & descripsi. Celererrimi Germaniae Mycologi plurima novorum generum & specierum specimina mihi largiti sunt, quorum vero pauca ad præsens Volumen pertinentia, cum exsiccatas in herbariis conservari nequeant. (Hæc ratio quoque videtur, cur multi Botanici hodierni ad herbaria augenda curiosissimi magis quam Veteres, scientiam in naturæ gremio colentes, fungos vilipendant). In sequentibus vero voluminibus ad unamquamque speciem, cui specimina debo gratissimus agnoscam. Data hac occasione, Fungorum ut & Lichenum specimina rariora & originalia possidentes velint mecum communicare, amice rogo. Me in his remunerandis paratissimum invenient.

Dein omnia, quæ de fungis scripta novi, perlegi & quæ ad partem systematicam spectant, in hoc opere in meum usum convertere studui. Reliquæ, ad Mycologiam theoreticam reservata, ob summum inter Systema naturale & Physiogiam nexus heic quoque passim tangere coactus fuit. Qui vero omnia in nuce collecta cupit, adest acutissimum Neesii ab Esenbeck opus (Das System der Pilze und Schwämme), quod uniuscujusvis studio diligentissimo demandatum volui. — In literatura novissima forsan quædam ad nos nondum perventa, me fugiunt. Præcipue doleo, quod tabulas CCCCI priores, aliquot exceptis, in prætioso Sowerbei opere (English Fungi) tantum inspicere mihi contingit.

Si recentiores ad cognitionem Fungorum Pileorum minus contulerint, eo plura apud antecessores Persoonii, ab ipso vero omissa, determinanda restant. E veteribus J. Bauhini Historiam, utpote in synonymis locupletissimam, & Raji Historiam, ob observationes multis accuratas, præcipue allegavi. Icones Vaillantii, Michelii, Bauxbaumii omnes, ut & Battaræ, uno alterove excepto Agarico, neutiquam sfernendas, deter-

minavimus. Nullam, pro nova venditatem speciem, apud Schæffer, Bulliard, Batsch, Bolton, Sowerby, Holm-skold, in Flora Danica &c. nisi lapsu calami, omisi. Reliquorum Auctorum species plurimas extricavi; Schumacheri aliorumque ex Auctorum iconibus ineditis cognosco. Tantum species Villarii & Ottonis ob mancas descriptiones parum curare potui. — De cetero vero omnia aggregare citata in animo non fuit; tantum primum uniuscujusque speciei, sive novæ, sive pro nova habitæ, descriptorem citavi; reliquorum e synonymis cognoscantur.

In ipso libro conscribendo summam brevitatem cum rei integritate, (hinc & summa œconomia typographica) conciliare volui \*). Sine hoc brevitatis studio triplo auctius præsens evasisset volumen. Generis Agarici apud auctores descriptæ species plures quam Lichenum, Muscorum e. s. p. Hinc diagnoses tantum ad species uniuscujusque tribus distinguendas adaptavi. Quæ ad tribus, omnes ut puto naturales, jam allata in specierum descriptionibus, (quæ hinc brevissimæ videntur, sed vix essentialē notam omittunt) numquam repetii. Si in his l. observationibus frequenter inter-

---

\*) Indicem completam synonymorum studio omisi, cum ipso libro vix tertia parte minor evasisset. Majoris quoque utilitatis foret commentarius ordine chronologico omnes Auctores Mycologicos (& præcipue icones) criticis observationibus illustrans. Hic vices Bibliothecæ Mycologicæ supleret. Opera majora pervolventibus explicationem iconem mox præberet. Si Botanicis placeret, hujus M:scr. typis exscribendum curab̄. — Quando genus in plura, e. gr. Boleti, divisum, species Auctorum sub novis, ut Polypero quærendæ. Ad quamque speciem nomen primi determinatoris in indice hinc adposui. Melius sane placet Polyporus perennis Linn, sub Bol., quam P. perennis Mihi, illud historicō respectu utilitatis non caret, neque hoc specie vanæ gloriæ cupiditatis.

spersis, quid ad scientiae progressum contulero, benevoli operis nostri censores dijudicent.

Conspectus Systematis præmissus, ob genera multa nova & reformanda, omnem perspicuitatem attingere non potuit. Revisiones unicuique classi & ordini subjunctæ magis ad hoc illustrandum conferant. Constructio, quæ multis forsan curiosa & paradoxa, mili probari videtur ex immensa harmonice mundi ratione, qua omnia in universum sibi congruunt & correspondunt.

Dabam Lundæ in Svecia d. 16 Nov. 1820,

---

## INTRODUCTIO.

### DE SYSTEMATIS CONSTRUCTIONE.

Systema naturale, monente jam immortali a Linné, ultimus Botanices finis. Multi autem summi Viri sectatores hoc ita sumere videntur, ut semper inter pia desideria maneret, saltim non pauci hujus constructionis tentamen temerarium judicarunt. Jam vero inter omnes constare spero, methodum quamcumque artificialei vero scientiae scopo nullo modo satisfacere, sed utpote ab omni essentiali studio remotum lave, immo perniciosum \*) esse compedium. E contrario systema naturale omnes partes earumque sublimiorem rationem respiciens, explicationem per se continet studiumque physiologicum arctissime jungit. Sunt quidem ordines naturales hujus tantum fragmenta, sed ad horum veram dispositionem omnium formarum cognitionem, ut

---

\*) Plena utriusque disponendi generis comparatio limites nostros nimis excederet. Speciosissime exposuit *Decandolle*. Quae de Systematis Naturalis difficultate recitari solent, veritati repugnant. Tirones faciliter certam plantarum cognitionem secundum ordines naturales, quam ex Systemate sexuali sibi adquirunt. Verum quidem hos Systema naturale non perspicere, sed ordines nat. ad ejus cognitionem ducent. Neque incertum, quia plurimum formarum locus in systemate artificiali vacillat, & in hoc maxima confusio e partis defectu &c. oritur.

nonnulli objiciunt, non esse necessariam, omnino persvasum nobis. Pendet multo magis e vera de naturæ systematisque constructione idea.

Affinitatem plantarum simplicem efficere seriem l. catenam, multis ab hinc annis explosa sententia. Plantas omnes utrinque affinitatem monstrare, expressis verbis jam docuit Linné. At ab egregio hoc vaticinio nimis discessit, statuens genera a Natura stricte esse limitata. Species unica in natura fixe circumscripta idea \*). Superiores nullas agnovimus sectiones strictissime circumscriptas, tantum circulos plus minus clausos, affines vero ubique tangentes. Hos tribus, genera, sectiones &c., simulque si naturæ vestigia sequuntur, naturales dicimus.

Qui igitur omnes plantas in simplici serie empirice disponnut, temere oberrant. Ob diversas, quas ad se invicem adaptare student series, hanc methodum adaptatam dicimus. Ordines proxime collocatos in tali Systemate plus minus semper esse affines non negamus; sed centena hoc modo oriri possunt Systemata æque bona, quorum alterum in hoc, alterum in alio capite veritatem magis tangit. Conspectum quendam universalem quidem tradunt, sed nexum cum totius plantæ constructione non exhibent.

\*) Hinc omnia, quæ confluunt, jungimus, quamquam in diversis statibus ad diversa genera, classes, immo regna pertinere videantur. Ut tales existant, necesse nobis videtur. *Vide exempla & caussas infra.*

Veri autem Systematis (absoluti dicendi, utinam quoddam suum nomen mereatur!) hoc erit consilium, simulque omnes plantarum affinitates exprimere & ante oculos ponere. Hujus constructionem acutissime exposuit Cel. Oken, estque tam simplex, quam vera. Non in Systemate quærimus solum, quomodo hæc l. illa species differant, sed potius quo modo exterior discrepans forma exprimit <sup>a</sup> diversas harum formarum rationes. Has enim vitæ l. organismi rationes, organa externa exprimunt. Singulum organum esse entia representat propriam classem, ad quam referuntur ordines & genera, in quibus hoc præ ceteris evolutum. Hæc classis iterum in ordines dividitur ad eandem normam, adeo ut, quando organum quod maxime eminet classem, dein perfectissimum ordinem indicet. Ita & subdivisiones, quas hoc modo ortas semper cum natura, verissima Systematis magistra, conspirare expertus sum.

<sup>en</sup> Hæc dispondi ratio non tantum unica genuina nobis videtur, sed & naturam affinitatem alio modo exprimere potuisse non perspicimus. Quid enim sit affinitas, nisi characterum (organorum = classum = ordinem) harmonia universalis? Vidimus semper quando organum mutatur, alia etiam inde turbari; quando unum perfectius, alterum imperfectius evadit e. s. p. Ipsum hoc æquilibrium uniuscujusque locum in Systemate indicat. Locus uniuscujusque non solum indicatur, sed & demonstratur, quare alias esse nequeat. Nulla mutatio frustra assumitur. Quando rite constructum, omnia amicissime conspirant.

Ex altera parte locus in Systemate indolem & characterem magis quam descriptio indicat. Hic formulis facile exprimi posse videtur, ut infra in Systematis Mycologici conspectu invenies. Quattuor literis relationes cosmicorum 4 momentorum (sunt nisus reproductive, aër, calor, lux), e quibus determinatur fungus l., qui cum his intime cohærent, 4 fungorum characterum essentialium, exprimuntur. — Formula *Polypori* est  $HH^2U$ ; non solum indicat characterem (*H* hymenium esse maxime esse entiale l. *Classem*; *H<sup>2</sup>* receptaculum supra mediante luce dilatum sterile l. *Ordinem*; *U* hymenium esse porosum (*uterinum*), cum pileo concretum (*genus*); sed & totam evolutionem, locum natalem in ligno exsiccatu &c. &c. Unica mutata litera omnes differentias Agarici indicat. Genus, cuius formula latet, non intelligimus; hac data universam illius harmoniam perspicimus.

Quæcumque sectio characterem superioris optimè exprimens (l. quæ organum sectionis typum perfectissime evolutum sistit, ut reliquas simul sumtas antecellat l. sæpe excludat) *Centrum* dicitur. Ut hoc a reliquis sectionibus distinctissimum sit, hinc etiam sequitur. Relationes cum reliquis organis essentialibus hec etiam minus mutantur, indeque species in centro magis similes evadunt. Genera igitur centralia, ordinem typi, semper vastissima (*Agaricus*, *Fucus*, *Lichen* sensu Wahlenb., *Hypnum* e. s. p.) & multo difficilius in plura genera divelluntur, quam *radii*, qui sunt sectiones (genera, ordines &c.).

ab una ad alteram transeuntes. Ex. gr. *Dædalea ex hymenii forma* in plura genera, quam *Agaricus*, dividit potest e. s. p.

Hæc centra totius systematis fundamenta. Ordo (v. g. *Cantharelloidei* P.), genus \*) (Köleria, *Dædalea*) e variis radiis compositum artificiale dicimus & in dispositione primaria non respicienda. Numquam negligendum, unumquodque regnum, ordinem, genus &c. in systemate, ut individuum esse sumen-

\*) Genera in hoc systemate non pro Iubitu esse finienda, sed ab natura ipsa fixa & quoad numerum & porportionem esse determinata, facile patet. Genera ad quattuor classes refero :

1. GEN. ORIGINARIA, quæ organum quoddam essentiale exponunt v. gr. *Agaricus lamellas* (*hymenium* *hymeninum*), *Polyporus poros* (*hym. uterinum*) ; *Rosa* *receptaculum calycinum*, *Fragaria* *rec. baccatum*, *Helleborus*, *Ranunculus* &c. Talia graminum apud Linné.

2. G. INTERMEDIA, quæ duo originaria jungunt v. gr. *Dædalea Agaricos* & *Polyporos*, *Kobresia Cariées* & *Scirpos*, *Trichophorum Scirpos* & *Eriophora*, *Oxytropis*, & fere omnium recentiorum inter gramina.

3. G. SUBORDINANTIA, quæ a genere originario subdiviso oriuntur; essentialem hujus characterem participant, sed in accidentalibus differunt. (vide supra) Sic *Anemone* (cujus essentia involucrum 5phyll. & corolla polypetala) continet *Hepaticam*, *Pulsatillam* &c.; *Arenaria Alsinellam*, *Halianthum* &c.; *Paramelia Lecanoram*, *Borreram*, *Cetrariam* &c. Hæc tribus nos dicimus.

4. G. ABERRANTIA, quæ parte quadam luxuriante 1. mutilata 1. alia ex ordine heteroclita nota distinguuntur; *Ranunculi* genera aberrantia sunt *Ficaria*, *Myosurus*. *Potentilla* *Tomentilla* & *Sibbaldia*; *Convallariæ Majanthemum* &c. (Omnes aberrationes numeris facile reducuntur, secundum numerum originarium, qui v. gr. inter *Acotyledoneas* 2. *Monocotyledoneas* 3. *Dicoty wholeoneas* 5 eorumque produeta e. s. p.)  
— *Solorina* e. s. p.

dum \*). Sic in dispositione classis ad classem, ordo ad ordinem, genus ad genus abeunt, eodem modo ac in specierum serie proxime affines sequuntur; non vero ita ut v. gr. summum antecedentis ordinis genus in infimum sequentis abeat l. perfectissima inferioris generis species in infimam sequentis. Omnis sectio naturalis circulum per se clausum exhibet. Potius summum genus ad superiora sequentis ordinis abit \*\*).

Facile hinc patet, totum Systema, ad infimas formas extensem, non, ut in simplici serie proponitur, esse perspiciendum. Hinc & facile explicatur, qua ratione imperfiores formæ s<sup>a</sup>p<sup>e</sup>e perfectioribus in libro anteponuntur, ex. gr. *Clavariæ fungis Mitratis*. Sunt enim Mitrati fastigium Hymenomycetum Uterinorum & Clavati infima stirps Hym. Hymeninorum. Demonstravimus vero Hymeninos Uterinis simul sumtis esse perfectiores; inde vero non sequitur infimos Hymeninos summis Uterinis esse inferiores, sed summos Uterinos summis Hymeninis esse inferiores (quod p. 455 demonstravimus). Series enim naturæ, ut sapissime diximus, non simplex est; sequitur unamquamque seriem

\*) Die natur ist der entwickelte Gott, so ist jedes Naturareich sein entwickeltes Individuum. Oken.

\*\*) Altera dispositio est methodus adaptata e. gr. Si post resupinates Merulios poneres resupinatos Polypores dein reliquas tribus usque ad Mesopodem; porro Hydna stipitata, sessilia, resupinata; tandem Thelephoras resupinatas &c. Exemplum evidens, ut spero; haec vero vera Systematum adaptatorum idea!

donec in hac directione ulterius progredi nequeat. (Vid. Obs. post primam Fungorum classem). Tum novus rerum nascitur ordo; nova ab ipsis elementis adscendit series, antecedentes breviter repetens &c. — Systema vere *constructum* omnium tamen nexum proponit.

Præmissa, ad nostri Systematis cognitionem maxime necessaria, leviter esse exposita & altioris scientiæ votis non satisfacere facile video. In his consulenda Cel. Okenii scripta.

---

### *De Affinitatis et Analogiæ differentia.*

E mutua elementorum, ut puto, relatione in infinitis fere modificationibus omnes oriuntur diversitates, quas species, immo & genera, ordines &c. dicimus. Hæ regulas perpetuas sequuntur. Chemia recentior elementorum in proportionibus definitis conjunctionem demonstravit, & unice ex his derivari nobis videtur specierum constantia; sine his undique quoque confluenter species. Nisi unumquemque organismum per se integrum & discretum, & vis vitalis inorganicæ naturæ leges subordinantes reddidisset (non sustulit) nulla differentia inter species & conjunctiones chemicas existeret. Aliter in reliquis sectionibus, quæ stricte circumscripτæ in natura non existunt. Omnes classes, ordines &c. natura invita acute limitati. Natura tamen, ubique varia, temper tamen eadem h. e. eandem ideam exponere tendit, mutatis modo, quæ ex ulteriori ratione ne-

cessario pendent; eadem sequitur principia, ita modo ut inferiora, (v. g. exterior forma, quæ in infimis adhuc vaga) superioribus cedant. Errant igitur, qui distinctiones summas e forma exteriori tantum ducunt; quis ex hæc regnum animale & vegetabile definire potuit? Evidentissime hoc demonstrant Lichenes & Fungi \*). Recentiores horum differentiam in characteribus externis tantum ponentes, cum Fungis jungere voluerunt Leprarias, Opegraphas, Galicia, Verrucarias e. s. p., quod nullo modo probare possumus. Altius illorum differentia deducenda. Sed cum natura eadem via inter Lichenes & Fungos ubique progreditur, singulum genus *Lichenum* Fungis correspondet. At hæc inde *affinia* non dicimus; sed *analogia*.

*Affinia* igitur sunt, quæ in eadem serie sequuntur & in se invicem transire videntur. Hæc in ulterioribus congruunt, sed in citerioribus rationibus differunt. *Analogia* autem dicimus, quæ in diversis seriebus locis parallelis posita sunt, & sibi invicem correspondent. Ultima cosmica momenta differunt, sed citeriora congruunt, quæ in habitu externo & characteribus accidentalibus mutandis maxime valent. Ubiunque in Historia naturali oculles convertimus, singulum organismum multiplicia hujus offerunt exempla. Systema mycologicum, in-

\*) E characteribus externis, si vitam perfectiorem in spontaneitate expressam neglexeris, *Monas* &c. etiam fungis adnumerari posset. Nulla in forma existit e. g. differentia inter *Mucedines* & *Algas* e. s. p. in infinitum.

fra explicatum, his omnino nititur. Uredo & Puccinia, Melanconium & Stilbospora affinia sunt; sed Uredo & Melanconium, Phragmidium & Puccinia analoga. Sphæria & Hysterium affinia, sed Sphæria & Verrucaria analoga. Clavaria & Peziza, Biatora (v. gr. Lec. icmadophila Ach.) & Bæomyces affines sunt, Clavaria & Bæomyces, Peziza & Biatoræ analogæ e. s. p. in infinitum.

Comparatio Linnæana affinitatis plantarum cum mappa geographicâ haud ignobilis visa fuit; ignoscatur igitur mihi hanc ita extendentî, ut affinitas in hac indicet longitudinem & analogia latitudinem.

Neque hoc tantum in inferiores classes quadrat. Naturæ leges ubique harmonicæ. Sic Labiatæ & Personatæ, Asperifoliæ & Solanaceæ analogæ; Labiatæ & Asperifoliæ, Solanaceæ & Personatæ affines. Summam brevitatem quærere coactus, limites mihi præscriptos jam excedens, addam modo \*) initium tabulæ comparationis, affinitatem & analogiam Ordinum Dicotyledonearum Polypetalarum indicantis; ordines affines subjuncti, analogi oppositi.

## Calicifloræ.

## Thalamifloræ.

Rosaceæ

Ranunculaceæ

Salicariæ

Papaveraceæ

\*) Si Systema Mycologicum & principia, quibus nititur, omnibus non displicerent, totius regni vegetabilis dispositionem demonstrare conahor, Plurima jam elaboravi.

<i>Leguminosæ</i> *)	—	<i>Cruciferæ</i>
<i>Françulaceæ</i>	—	<i>Berberideæ</i>
<i>Portulacaceæ, Crassulaeæ &amp;c.</i> ( <i>Montia</i> , — <i>Scleranthus</i> &c.).	—	<i>Caryophyllaceæ</i> cum <i>Droseraceis &amp;c. &amp;c.</i>

Etiā in horum subdivisionibus analogiam reperimus v. gr. Inter Rosaceas & Ranunculaceas analogae sunt Potentilleæ & Ranunculeæ, Spireæ & Helieborinæ. e. s. p. Quid? quod; Rosa & Nymphæa. — Mutatis modo, quæ ex utriusque seriei charactere essentiali pendent.

In regno animali Quadrupedia & Cetacea in intimis vitae principiis conveniunt; sed hæc ob momenta secundaria, v. gr. vitam submersam, Piscibus analoga sunt.

Quando tandem hæc analogia in sectionibus generum valde affinum, v. gr. apud Lichenes & Fungos observatur, mutationum caussæ valde accidentales necesse sint. Ita & utrum Polypori, Dædaleæ, Thelephoræ stipitatae & sessiles, an resupinatae, e situ locoque pendere solet.

Quo magis in superficie acquieverunt naturæ scrutatores, eo magis analoga cum affinibus communtarunt.

\*) Vidimus semper perfectiores ordines floribus regularibus (*verticillatis*) ab ordinibus floribus irreguläribus (*symmetricis*), in quibus & staminum numerus depauperatus, adscendere. Sic Rosaceæ a Leguminosis, Asperifoliæ a Labiatis, Solanaceæ a Personatis, Cistini a Violaceis &c.; sed saepius & rectius hi sub eodem ordine comprehensi, ut *Delphinia* &c. inter Ranunculaceas, *Fumariæ* inter Papaveraceas e. s. p.

*De Fungorum affinitate et differentia.*

Regnum Vegetabile in duas maxime naturales sectiones, Cotyledoneas & Acotyledoneas (Vasculares & Cellulares), dividi, notissimum est \*). Ad has sensu strictissimo sumtas referuntur Anandreae Link \*\*), defectu contextus cellulosi regularis (ne dicam vasorum vestigii) bene diversae. A Linnæo sub ultimis duobus Cryptogamiæ Ordinibus, Algis & Fungis, comprehenduntur; sed neque Hic neque alius illos characteribus externis circumscribere valuit. Recentiores hinc in plures disposuerunt ordines, inter quos eminet acutissimus Link.

Eodem vero modo ac Cotyledoneas natura ipsa in duas series (Monocotyledoneas & Dicotyledoneas, divisit, ita & divisio Linnæana naturalissimas Anandrarum series indicare videtur, cuius vero ratio non exposita. Etiam divisi in plures Ordines ægre ex externis characteribus distinguerentur, nisi Algas & Mucedines, Lichenes Conithalamos & Coniomycetes, Lich. Pyrenothalamos & Pyrenomycetes &c. jungeres, quod ego saltim numquam probarem. Probat, quod supra attuli, characteres strictos externos inter superiores non existere sectiones \*\*\*).

\*) Introductionem Systematis Vegetabilium sectiones que generales vide in egregio opere: *Regni Vegetabilis Systema Naturale. Auct. Decandolle, Vol. I.*

\*\*) Berlin. Magaz. Naturf. 1808.

\*\*\*) Tales quoque sunt *Algæ* & *Fungi*. Cum natura in infimis maxime multiplicata, plantas Anandras reliquias simul sumtas numero superare concludo. De fungis hoc a priori deducitur; sed exemplo harum rela-

E variis differentiis, quæ e contextu, duratione, chemica compositione e. s. p. sumi solent, præcipue eminet sequens. Apud Algas fructificationes secundariæ & thallus essentialis, apud Fungos vero tota planta fructus & thallus semper accidentalis. Hæc vero nota tantum comparativa & a thalli definitione pendet.

Respicimus autem ipsa vegetationis momenta, mox eximie differunt Algæ & Fungi. Vegetatio est 1. primitiva *Algæ* (Protophyta) 1. reproductiva, *Fungi* (Hysterophyta.)

PROTOPHYTA sine humo enasci possunt. Etiam Floræ esse primigenita, Geologia probat. Partes adhuc vix discretæ, quare tota herba cum Linnaeo Radix optime dicitur. Ex his totum ascendit regnum vegetabile. Protophyta sunt *aquatica* (Algæ proprie sic dictæ) 1. *aërea* (Lichenes.) Hæc duo Classes eandem seriem constituunt. Differentia sæpe solum ex *proximis*, cosmicis momentis pendet. Algæ in aëre (h. e. locis exsiccatis) contrahuntur; sed in eadem directione (immutatis vegetationis polis) crescunt & Lichenes evadunt. *Nostoc muscorum* abit in *Collema limosum*, *Confervæ atrovirens* in

tionem illustrabo. Ager Femisionensis vix  $\frac{1}{2}$  quadrati milliar. spatio alit 420 phanerogamas, inter quas multas (100 circiter) recentiori ævo advenas; Lichenes & Algæ 450; Fungi 2000 & ultra. — In tropicis cryptogamas pauciores esse conjiciunt, sed equidem rationes sufficietes non perspicio. Etiam in his Fungorum numerus, ubi plantarum reliquarum auctus, augeri debit.

*Corniculariam pubescentem, Scytonema minutum \*) &c.*  
 Et nuperius Cel. Smith iterum distinxit emersam  
 & submersam *Lichinæ pygmeæ* formam, quarum hanc  
 Algam, illam Lichenem pronunciavit. — Abeunt  
 quidem Algæ etiam in Fungos, sed rarius & alio  
 modo, tum *vegetationis poli* convertuntur & moriens  
 in *vegetationem reproductivam* abit. (*Conf. fenestralis* Nees Syst. p. 50!). E contrario fungus in Al-  
 gam abit numquam, quia *vegetatio reproductiva pri-*  
*mitiva evadere nequit.*

HYSTEROPHYTA tantum in organismis lan-  
 guescientibus & destructis oriuntur, eorumque (non  
 vero vegetabilium, quibus subordinant) ultima ratio  
 est nisus organismorum reproductivus \*\*). Infimæ  
 quoque formæ vix nisi exanthemata, l. partes plan-  
 tarum in functionibus turbatæ & libertate in ve-  
 getatione compotes factæ, v. gr. *Phylleria*. Superi-  
 ores vero, v. gr. in potentia terræ, etiam sponte  
 evolvuntur e. s. p. Totius regni vegetabilis finem  
 constituunt & jam tritam sententiam simplicissima  
 quævis organisma esse primigenita refutant. Ut En-  
 tozoa inter animalia novam inchoant seriem, sic &  
 Fungi inter plantas; quod Infusoria inter illa, Mu-  
 cedines inter Fungos. Inde & omnes in infusioni-  
 bus obviæ stirpes Fungi, nec Algæ. (Cf. *Lyngbye*  
*Hydroph. Dan.*, qui sub una Confervarum sectione

\*) Cf. Agardh *de Metamorphosi Algarum Lund* 1820 ubi  
 varia exempla.

\*\*) Cf. Spreng. Neu, Entd. 1.

tantum recenset Mucedineas, plurimas jam descriptas e. s. p.)

Objiciunt jure, quia aberrationes sectantur, etiam Lichenes in alia vegetabilia occurre, sed tum arbor, cui innascitur aut viva aut plane exsiccato-exsiccata; & his locis numquam occurunt Fungi. Summa adhibita diligentia Fungos & Lichenes in matrice ejusdem indolis numquam reperi, sed in ligno &c. putrescente Lichenem destrui (putrescere), quando oritur fungus. Ramos vidimus uno latere vivos Lichenosos, altero emortuos Stilbosporis inquinatos e. s. p.

Natura, ubique perpetuas sequens leges l. potius ex eodem elementorum influxu pendens, easdem repetit inter Hysterophyta formas, quas olim inter Protophyta formavit. Ob eximiam hanc analogiam, ut secundum eadem principia disponantur, necesse est.

Specialem unicusvis ordinis et generis analogiam suo loco indicabo. Conspectum modo generalem hoc loco addam.

Fungi e Classe et Ordinibus Mucedineis Algis analogae ex. gr.

Epiphytæ Muced.	—	<i>Chlorococcum</i> *).
Gymnosporangium	—	<i>Nostoc.</i>
Geotrichum	—	<i>Diatoma!</i>
Acremonium	—	<i>Vaucheria.</i>
Zyzygites	—	<i>Zygnema!</i>

---

\* ) *Tremella botryoides*, Schreb. *Nostoc*, Agardh.

<i>Byssus</i>	—	<i>Oscillatoria</i> !
<i>Dematiu</i> m	—	<i>Scytonema</i> !
<i>Alternariæ Spec.</i>	—	<i>Lemania</i> .
<i>Plegmatiu</i> m etc.	—	<i>Ceramium</i> .
<i>Xylostroma</i>	—	<i>Codium</i> .
<i>Anthina</i> *)	—	<i>Zonaria</i> !
<i>Rhizomorpha</i>	—	<i>Fucus</i> .

Sed plurimas et evidentissimas analogias indicant variae Confervarum species, quæ genus multo latius apud Algologos sumitur, quam ullum inter Mucedines apud Mycologos recentiores.

Reliqui, exceptis summis Geogeniis, cum Lichenibus, v. gr.

<i>Conisporium</i>	—	<i>Lepraria</i> .
<i>Apiosporium</i>	—	<i>Coniangium Fr.</i> **).
<i>Tubercularia</i>	—	<i>Calicium</i> .
<i>Stilbum</i>	—	<i>Coniocybe</i> .
<i>Thelebolus</i>	—	<i>Pyrenotea</i> ! <i>Fr.</i> ***).
<i>Sphæria</i>	—	<i>Verrucaria &amp;c.</i>
<i>Hysterium</i>	—	<i>Graphis</i> .
<i>Phacidium</i>	—	<i>Limboria</i> .
<i>Peziza</i> s	—	<i>Biatora Fr.</i> †).
<i>Clavaria</i>	—	<i>Bæomyces</i> .
<i>Tremella</i>	—	<i>Collema e. s. p.</i>

\*) *Ceratonëmia dilatatum* Roth.

\*\*) *Spiloma paradoxum* l. *Lecidea dryina*, Ach.

\*\*\*) *Verrueania* (*Sphæria*, *Cyphelium* &c.) *leucocephala*,

†) Huc Lecideæ apotheciis coloratis. Hæ, *Lecanoreæ*, *Borreræ*, *Cetrariæ* &c. unius generis originarii tantum (*Parmeliæ*) tribus, nec magis diversæ, quam

Ex altera parte Fungi (Exanthemata quasi terræ) cum Exanthematis veris, quæ etiam a nisu reproductivo oriuntur, confluunt. Difficilius sane inter hæc, quam inter reliques ordines, acuti ponuntur limites. Infimæ formæ oppido Exanthemata, & partes plantarum in statu morboso v. gr. Phyllea, Selerotium Clavus e. s. p. Quando per se libera vegetant, ad fungos refero. Doctrina de membris plantarum cum Mycologia intime cohæret.

### *Fungorum sectiones generales \*).*

Aqua & tellus sunt cosmica momenta *Vegetabilis* evolutionem determinantia \*\*). Quando *hoc* per nisum organismorum reproductivum educitur, oritur *fungus*. Hujus diversa evolutio determinatur mediante *aëre, calore, luce*. Quattuor hinc oriuntur fungorum classes, quarum prima adhuc maxime a ipso *nisu reproductivo*, secunda ab *aëre*,

tribus Polypori, Hydni &c.; cum vero jam distincta, equidem ut genera subordinantia retineo. (Longe a Blatoris distant Leeideæ veræ. Inter Lichenes, utrum marginati, an immarginati, utrum Idiothalami, an Cœnothalami, non genera originaria, multo minus sectiones differunt).

\* ) Ex intimis vegetationis elementis regnum Myctoideum acutissime deduxit Nees ab Esenbeck (Syst. p. 1—3), quæ & reliqua Physiologica ut jam cognita heic suppono.

\*\*) Im Wesentlichen sind alle Organismen gleich, und ihr Unterschied liegt allein in dem Verhältnisse zu den Urfunktionen ihres Planeten, durch welchen sie zur Evolution determinirt werden. Nees I. c. 2. Cf. 1, 3, 4 &c.

tertia a calore, quarta a luce præcipue determinantur. Hæ nec pro lubitu, neque ut symbola assumuntur, sed ad finem uniuscujusque classis a posteriori (præcipua in opere practico exponendi ratio) demonstrantur \*). Mere vero hinc exstruere Systema superfluum foret, cum horum influxus in organis externis exprimitur. Unicuique e citatis momentis correspondet organum, quod perfectius evadit, quo magis ab uno altero pendet. Cum vero in diversis proportionibus simul agunt, unum organum alterum non excludit; sed horum relationes inde determinantur.

Totius fungi, ut supra monui, essentia fructus. Organa fungi essentialia hinc etiam ad fructificationem pertinent partesque fructificationis maxime necessarias apud plantas perfectiores representant. Sunt *Sporidia, Flocci, Uterus, Hymenium*.

Nitus Vegetabilium reproductivus in statu primario (simplicissimo) producit *Sporidia* = cellulas plantarum discretas solutas \*\*). — (Pulverem, quem seminula fungorum \*\*\*) dicimus). Simplicissima

\*) Hyphomycetes esse fungos aëreos & Gasteromycetes caloris jam probavit Illust. Nees.

\*\*) Metamorphoseos processum exposuit Nees Syst. p. 9. Hinc facile patet, quare ex his sporidiorum forma apud Epiphytos centrales (*Uredines*) pendet. Etiam quando hi copiose evolvuntur, planta ipsa (minor naturalem nisum reproductivum deponit & sterilis evadit !

\*\*\*) Notæ sunt pulcherrimæ Ehrenbergii de germinatione fungorum observationes — Nos plures instituimus observationes, ut fungorum generationem æquivocam probemus.

igitur vegetationis reproductivæ forma; e qua regnum Mycetoideum adscendit, est mere *Pollen* \*). Infimarum quoque formarum sporidia sunt tantum Pollen in statu morboso v. gr. *Uredo Antherarum*. Sporidia perfectiorum fungorum itidem cellulæ discretæ & cellulæ (ascis) sæpe inclusa. Quando accedunt reliqua cosmica momenta varie mutantur; accedente aëre elongata, pedicellata, donec in floccos abeunt; accedente calore annulata & entospora, donec in uterum expanduntur.

Nodus vegetabilium reproductivus in potestate aëris producit *Floccos* — cellulas (plantarum) discretas contiguas (fila tenuia elongata, simplicia l. ramosa). Vidimus eadem ratione in plantis vegetis cellulas discretas elongari — & hoc modo oriuntur Pili plantarum. Infimæ quoque Mucedineæ sunt tantum pili plantarum in statu morboso v. gr. *Phylloeria*. Sed necesse est, ut libere evolutæ perfectiores evadant, quales *Byssi*. Ob hanc structuram cellularēm *Nees* bene Algas aëreas dixit. Perfectissimus & maxime essentialis, vasis cinctus! contextus cellulosus in *Pistillo* plantarum, cui respondent perfectiores (*Aspergillus* \*\*), *Aerosporium*, *Stilbum*, *Byssi* varii &c.) ; infimæ adhuc stigmata sessilia (*Taphria*, *Rubigo*). Sed a reliquo cosmicō-

\*) *Pistillum polline obrutum!*

\*\*) *Infusorium vegetabile* — Sic & prima animalia reproductiva & principium reproductionis in hoc regno *Entozoa* (*Animalecula infusoria*). Apud *Cryptogamas* semina adhuc tantum *Pollen*.

xum momentorum influxu varie modificantur, ut dispositio infra exponit.

Modum, quo sporidia, determinatis polis, in floccos abeunt, acute exponit Nees *Syst.* p. 39. Summam affinitatem insuper horum organorum demonstrant flocci variorum in sporidiis solvendi & *Ciliosporium* sporidiis in floccis conjungendis. Facile igitur patet, hæc duo organa unius tantum esse modificationes. Superior Classis etiam inferiores continet, indeque iterum in sequentibus occurrunt.

Nisus hic reproductivus in potestate caloris producit *Uterum* — Fungum clausum, intus expansum semina colligentem, varie rumpentem. Prototypos exhibent sporidia distincte entospora, quæ expansa uterus constituunt, ut & flocci apice inflati; sed hi modo formæ transitoriae. Genuini enim Fungi Uterini ab infusorio vegetabili (corrupto & aqua) per calorem fervescente oriuntur. *Aethalium*, *Cibrariæ* &c. plurima offerunt exempla, suo loco enarranda. Sæpius quoque in succum soluti & fluxiles. Infimæ formæ sunt *Glandulæ plantarum* in statu morboso v. gr. *Polysticta*; l. cellulæ plantarum fervescendo concretæ (in *Perisporio*, et confusæ *Xyloma* e. s. p.). — Optime etiam sitit fructum plantarum perfectiorum, variasque capsularum species \*).

---

\*). Sic &: *Die Fruchtkapsel auf den höheren Pflanzen ist ein Pilz auf einem belaubten Stiele, ein durch das Licht organisirter Pilz*, Oken.

Nisus idem reproductionis in potestate lucis \*) producit *Hymenium* == Receptaculum apertum, sporidiis immersis. Totum e cellulis (solutis & elongatis contiguis) concretum. Sporidia saepius in propriis cellulis (asciis) continentur. De cetero *Hymenium*, saltim apud perfectiores formas, etiam reliqua organa continet. Representat quoque receptaculum plantarum perfectiorum una cum flore & fructu. Utriusque forma simplicissima est semen nudum — *Sclerotium* & infima *Sclerotii* species (*S. Clavus*) verum est semen in statu morboso. Quo modo accedentibus reliquis elementis mutatur, indicat conspectus Systematis.

Quamquam locus est inter proxima momenta fungi evolutionem determinatia, ideoque tantum analogiam indicat, intime, generaliter sumtus, cum reliquis coheret. Sporidia nuda (*Epiphyti*) progignuntur in organismis vivis languescentibus l. recenter emortuis; Flocci (*Mucedines*) in organismis sub putrescentia processu (fervescentibus); Uterus

\*\*) *Hyphomycetes* luce privi optime vigent; hi & *Uterini* in cryptis non mutantur. Sed *Hymenini* luce privi semper monstrosi evadunt, perraro ascos formare queunt. *Pezizæ clausæ* (*Uterinæ*) manent. *Pileum*, genuinam *Hymeniorum* formam, sine luce formari non posse (p. 502) plurimis exemplis probavi. Agit, ut in floribus plantarum perfectiorum: Sensu strictissimo in hos quadrat: Die Urtendenz der Pflanze ist also Sprossen von der Erde nach dem Lichte — linigter Prozess, um sich von der Erde los zu machen und im Lichte von Neuem zu polarisiren — Diese Urtendenz, als Sprossen ausgedrückt, ist bey den niedern Pflanzen in den Schlauchreihen, Kieser.

(*Xylarii*) in organismis putrefactis l. sæpius exsiccato-induratis; Hymenium (*Gecgenii*) in terra, ipsa humo. Hæc tamen in centra præcipue quadrant; radii uniuscujusque sectionis, ut ex iis, quæ de analogia disserui, sequitur, quoad locum natalem præcipue conveniunt cum sectione, ad quam transeunt.

Quo magis organismus dissolutus, eo liberius agunt reliqua cosmica momenta, eo perfectior evadit fungus. In quavis sectione (Classe, Ordine, Genere) imperfectiores sunt fungi, quo magis ad Epiphytorum naturam accedunt (parasitantes); quo magis recedunt, eo perfectiores; perfectissimi *Geogenii*. Infinita hujus exempla, & qui mutuam hanc relationem novit, locum natalem a priori determinare potest. Cf. Classium ordines infra.

Exemplo afferam, Coniomycetes & Hyphomycetes Epiphytos semper in organismis languescentibus crescere; Gasteromycetes Epiphytos etiam in organismis putrescentibus; Hymenomycetes Epiphytos summos in ipsa terra — neque in ipso flore plantarum perfectiorum, ut Epiphyti proprii, descendunt. — Insuper infimi Hymenomycetum ordinis (*Sclerotiacarum*) species in foliis vivis plantarum perfectiorum (*Erysiphe*) occurrunt; Tremellinæ Epiphytæ in caulis plantarum vivarum, sed imperfectiorum; Cupulati epiphyti in Muscis tantum vivis; & summi Pileati, quando epiphyti, tantum in Fungis vivis occurrunt. Apud reliquos

ordines eandem seriem ubique servatam invenies, ut quo perfectior sectio, eo magis ab Epiphytis ad Geogenios tendat. — Epiphyti inferiores in partibus nobilibus plantarum perfectiorum vivis crescunt, epiphyti perfectiores tantum iu plantis imperfectioribus l. emortuis e. s. p.

---

Eadem igitur omnino oriuntur Classes Fungorum, e quovis principio consideratorum. Sunt nempe:

A. *E cosmicis momentis, fungi evolutionem determinantibus :*

I. Protomycetes. II. Fungi aërei. III. F. caloris. IV. F. lucis.

B. *Ex organis primariis : \*).*

I. Coniomycetes. II. Hyphomycetes. III. Gasteromycetes. IV. Hymenomycetes.

C. *Ex interiori constructione :*

I. Cellulis discretis, solutis. II. Cellulis diseretis contiguis. III. Cellulis concretis, discretis centralibus. IV. Cellulis concretis, fructiferis (discretos secedentibus) superficialibus \*\*).

---

\* ) Reliquæ fungorum partes *Hypothallus*, *stipes &c.* omnino accidentales sunt — & in ipsa terminologia ulterius exponendæ.

\*\*) Hæ iterum e humore mucidinoe discretæ, Mucidines evadunt. v. gr. *Isaria*.

D. *Ex organorum significacione:*

I. Pollinares. II. Pistillares. III. Capsulares.

IV. Receptaculares.

E. *E loco natali:*

I. Epiphyti. II. Mucedinei. III. Xylarii. IV.

Geogenii.

Dispositio chemica desideratur.

Allatam Classum seriem esse naturalissimam, ita ut classis superior simul sumta inferiorem semper superet, ex quavis dispenendi ratione facile demonstratur. Vide ipsas ordinum revisiones in libro. Probat insuper evolutionis historia; perfectiores in diversis ætatis statibus integrum seriem inferiorum classum percurrunt v. gr. Speridia Hymenomycetum sunt Coniomycetes (Entophyta!); hæc germinantia l. prima evolutio sunt Hyphomycetes (Mucedines!), juniores adhuc Gasteromycetes \*) tandem evoluti Hymenomycetes.

Pyrenomycetes ob affinitatem cum Lichenibus \*\*) perfectissimos esse, multi statuunt. Quod vero profiscitur ab aliena de affinitate idea. Ipsa hæc affinitas imperfectionem potius indicat; perfectissima enim sunt in quavis sectione ab omni-

\*) Pezizas in statu juniori clausas, dein apertas Sphaeris semper clausis perfectiores esse, nobis extra omne dubium videtur.

\*\*) Systema nostrum Lichenologicum hanc seriem optime illustrabit & comprobabit. Infimi sunt Lichenes Fungis proximi; perfectissimi ab his remoti (Parmeliæ),

bus aliis remotissima. Sic perfectissima animalia & Vegetabilia, quæ maxime a se invicem remota; infima, quorum limites confluunt. — Sed non hinc solum; sed omni respectu Pileati perfectissimi. Cf. p. 455.

Gasteromycos & Scleromycos, quos omnes recentiores Mycologi distinctos tradunt, eandem si- stere classem, nos a priori didicimus, sed restat, ut testem naturam provocemus & per analogiam demonstremus. Quod peridium & peritheciū dici- tur idem omnino organum, illud vero magis indu- ratum. Perithecia tamen multa mollia & fragilia, peridia vero indurata citare possumus; hæc enim differentia, ut reliquæ ejusdem indolis v. e. pileus carnosus l. suberosus, a loco, cui innascitur fungus pendet, adeoque e citerioribus rationibus deduci- tur. Asci, qui primo aspectu maxime essentiales videntur, notam certe micrologicam & fallacem of- ferunt! Vidimus in Hymenomycetum classe, non solum in infimis ordinibus, sed & in uniuscujs per- fectoris Ordinis, immo generis, speciebus imper- fectoribus ascos desiderari. Vidimus apud multas Sphæriaceas genuinas, Bostrychias, Sphæronæmata &c. ascos nunc plane desiderari, nunc simplices re- ferre filos. Vidimus apud alios Pyrenomycetes & Pezizas ascos ascellos iterum includere, quis ex his peculiarem constitueret classem? Respectu elemen- torum & evolutionis historiæ omnino conveniant.

Quod flocei apud Trichias, ascii apud Sphærias (*vide infra*). Ortus Ascorum huic sententie *eximie* fayet. Altera ex ratione Byssos (*entosporos*) & Mucedines (*ectosporas*), Coniomycetes septatos e. s. p. etiam distingueres. Reliquæ familiæ probant. In quovis Algarum ordine, saltim in hodierna dispositione, ecto — & entosporæ occurrunt. Ascis inter Lichenes minoris esse momenti jam persvasis sumus. Verrucariæ saxicolæ ascis destitutæ, quæ in corticolis (V. nitida, gemmata &c.) præsentes! (Hæ hinc inter illas & Sphærias media! Quanta elementorum vis!) Idem in Parmeliz genere sensu latiori sumtum. Sed ne nimius in re aprica, quis inter plantas perfectissimas classe distingueret gymnospermos Ranunculos l. Potentillas a capsuliferis Helleboris l. Spireis? Ea latius quotidie serpit opinio, characteres, quo magis absconditi & microscopici (sæpe tantum vident, quod quærunt), eo præstantiores & certiores esse; quamquam hi multo minus ad totius plantæ temperamentum mutandum valent, præcipue in infimis formis. Notæ micrologicæ in speciebus distingvendis præstantissimæ!; sed in sectionibus generalibus parum valent & ad distinctiones artificiales ducunt \*).

---

\*). Reliqua in ipso libro demonstrata invenies v. gr. locum Mitratorum p. 499 e, s, p. Hoc maxime nej

In quavis classe (ut & ordine &c.) observanda esse centrum & radios, supra jam monui. In illud, quod species plurimas continet, character optime quadrat; hi, ad reliquas classes (l. ordines, genera &c.) abeuntes, utriusque classis characterem conciliant, sed ad illam, cuius character maxime eminet, referuntur. Sic ex. gr. inter Coniomycetes jam receptaculum (hymenium) observatur, sed hoc l. sporidiis inexplicatis homogeneum! l. sporidiis undique obrutum, indeque ad Hymenomycetes non referantur. Trichoderma hinc ad Mucedines ob floccos magis, Mucor ad Gasteromycetes ob uterus magis perfectum referuntur. Systema radios, ubique tangentes ubique exprimit!

*Centrum* abit semper in duas series, inferiorem & superiorem, quarum illa ad antecedentem, hæc ad sequentem classem evidentius accedit. Ubique ex eodem principio derivantur. Ob analogiam harum in quattuor allatis classibus, illas earumque rationem heic breviter exponam,

I. CONIOMYCETUM duas series rite indicarunt summi Viri Link & Nees; nempe *Entophytas plantarum vivarum & mortuarum*. Respectu evolutionis historiæ maxime differunt.

---

cessarium duco, ut, ubi erravero, alias rationes nostras refutet & hinc certum aliquando eliciatur. Simplicia Schemata ad hanc exoptatam metam non ducunt,

II. HYPHOMYCETES in duas suas series optime solutos apud Neesium quoque invenies. Inferiorem constituunt ectospori (Coniomycetoidei) *Mucedines*; superiorem entospori \*) *Byssacei*. Ob thalli indolem diversam in his *fibræ*, in illis *flocci* dicitur.

III. GASTEROMYCETES ulterius analogas continere series, nullum mihi restat dubium. Prater uterum, in centro accedunt receptacula partialia, in inferioribus ectospora (*flocci* dicta = pappus), in superioribus entospora (*asci* \*\*) dicta = arillus, alæ &c.). — In illis uterus dicitur *peridium* (Gasteromyci Auct. Trichomyci P.) ; in his *peritheciū* (Scleromyci Willd. l. Pyrenomycetes mihi).

IV. HYMENOMYCETUM denique receptaculum in inferioribus tantum *fulcrans* (*elongatum* & *verticale*) evadit indeque hymenium superum; in superioribus simul obtegens & includens (in perfectissimis

\*) Nemo objiciat Byssaceos quosdam esse sporidiosos; formæ enim transitoriae nullibi desiderantur; centrum ubique respiciendum. At quantum differunt v. gr. sporidia. *Helicosporii*, *Helraisporii* &c. quæ potius *fibræ*!, a *Mucedinum*, oculatum non fugit &c. &c.

\*\*) Expositio comparativa omnium fungorum organismorum cum partibus fructificationis reliquarum plantarum desideratissima. Inter fungos hæc ad quattuor evolutiones ejusdem typi referuntur. Eodem modo ac perfectissimæ plantæ & inferiorum partes rite evolutas sistunt earumque significationem explicant, sic & apud infimas, ubi omnes confluent, perfectiorum rudimenta oceurunt. — Summa mihi videtur Botanices pernicies studium singulas tantum cognoscere & elaborare familias, quæ inde status in statu evadunt, Talis *Lichenologia* &c., &c.,

saltim), dilatatum & horizontale. In illis receptaculum *Clavula* (*Clavati*), his *Pileus* (*Pileati*) dicitur.

Oriuntur e conjunctione cosmicorum momentorum diversoque ex his in diversa serie prædominante. Sic inter Coniomycetes (*Protomycetes*) evolutio elementorum, optime monente T. F. Nees, magis impedita in plantis vivis, quam in plantis mortuis, ubi influxus aëris accedit. Hyphomycetes (*fungi aërei*) sporidiosi & parasitantes (*Mucedines*) adhuc indolēm Coniomycetum mere-reproductivam magis servant, quam subxylarii & aspori *Byssacei*, veri fungi aëris. Inter Gasteromycetes (*fungos caloris*) *Trichomycetes* magis in potestate aëris retinentur, quam ascigeri & clausi *Pyrenomycetes*. Tandem inter Hymenomycetes (*fungos lucis*) inferiores ad lucem tendentes elongantur; sed superiores luce saturati etiam (dehiscentes) dilatantur. *De his Cf. p. 502.*

In quavis insuper classe series inferior ad inferiorem, superior ad superiorem sequentis classis abit, Hoe facilius patebit e serierum dispositione parallela :

<i>Series inferior</i>	<i>S. superior</i>
1. Hypodermia	— 1. Stilbosporeæ,
2. Mucedines ( <i>Trichoderma</i> )	— 2. Byssacei ( <i>Antennaria</i> ).
3. Trichomycetes	— 3. Pyrenomycetes.
4. Clavati ( <i>carnosi</i> )	— 4. Pileati ( <i>subsuberosi</i> ).

Series inferior distinguitur molliori & delicatiōri contextu, superior firmiori & persistente. Superior vero prius desinit, ad principium revertens sem-

per deliquescendo perit, ex qua nova surgit generatio. Hinc deducam omnia genera deliquescentia; hinc Namspora e contactu aëris, Byssus e contactu caloris \*), Sphæriæ (ut & Phallus, Clathrus) e contactu lucis deliquescunt. Tandemque in momentaneis Coprinis regnum Mycetoideum subvertitur.

His ex seriebus perspicitur superiorum Classium ex inferiorum conjunctione origo; hinc patet, qua ratione Persoon Hypodermia & Trichomycetes, Stilbosporas & Pyrenomycetes conjunxit &c.; sed omnes exponere reflexiones, quæ hinc deduci possent, limites nostros excederet.

---

### *Conspectus Systematis.*

#### Classis I. CONIOMYCETES.

CHAR. Sporidia nuda — absque receptaculo heterogeneo. *Huc referuntur fungi, in quibus sporidia præ reliquis partibus eminent & sic fungi essentiam constituunt.* Hinc etiam heic magis evoluta occurrunt, quam in alia classe v. gr. *Exosporii*, *Prosthemii* &c. Receptaculum, si adest, oritur l. e pedicellis connatis l. sporidiis connatis & cum sporidiis immaturis homogeneum \*\*) (sporidia abortiva).

---

\*) Hoc plurimis experimentis probavi. Byssi in temperatura calida in aquam solvuntur. Byssus nivalis mihi, latas plegas inter liquefiantes nives in ericetis occupans, sole tacta perit.

\*\*) Numquam thallus floccosus. Organa fructificantis & nutrionis eadem.

Ordines, ut semper, quattuor, quorum in hac prima classe primus centrum, reliqui tres ad sequentes classes abeunt \*).

- I. ENTOPHYTÆ (CE). Sporidia nuda, libera, absque receptaculo. *Receptacuti rudimentum in summo genere uniuscujusvis seriei.*
- II. SPORODESMIA (CM). Sporidia nuda, inata, septata l. pedicellata (elongata). *Receptaculum in duobus summis generibus.*
- III. CONIOSPORIA (CU). Sporidia distincte angiospora!, subinde velata. *Receptaculum in tribus summis generibus.*
- IV. TUBERCULARIÆ (CH). Sporidia nuda, simplicia, receptaculo inspersa. *Receptaculum in omnibus, tantum in prima specie obsoletum \*\*)*

Singulus ordo quattuor continet genera primaria. Hæc iterum quattuor ordinibus correspondent. *Hymenini* cognoscuntur receptaculi rudimento per-

\*) Ut hæc affinitas facilius patebit formulam, hanc experimentum, nemini subjunxi. C. indicat Coniomycetes. M Hyphomyctes (Mucedineos) U — Uterinos, Gasteromycetes. H — Hymenomycetes. Nec omitendum cum his synonyma esse E. Epiphytas X — Xylarios. G — Geogenios.

\*\*) Quamvis hæc, ut & omnes sequentes sectiones a priori deductæ sint, illas esse naturalissimas respectu characterum, elementorum, loci natalis, quæ simul sumta affinitatem indicant, demonstrabimus. Experiencia semper erit sapientiae testis & magistra. Ad interim tamen affere juvabit dispositionem nostram (jam 1815 exstructam, Cf. *Liljebl. sv. fl.*) sæpius cum summi Neesii conspirare — deflectentem expōnere conabor.

fectissimo; sporidiis vero Uterinis &c. imperfectioribus, fere Epiphytorum! — Uterinorum indolem indicant sporidia septata! Mucedinum sporidia pedicellata. Entophytarum sporidia strictissime simplicia, absque septis & pedicellis.

Ord. I. ENTOPHYTÆ. Nees p. 9. Abit, ut supra demonstravimus, in duas series.

Subordo. I. HYPODERMIA. (*CE<sup>1</sup>*) in plantis vivis parasitica. *Persoon inter Gasteromycos.*

Genera I. *Cœoma* Lk. (*CE<sup>1</sup>E*).

— 2. *Spilocœa* Fr. (*CE<sup>1</sup>M*).

— 3. *Phragmidium* Lk. (*CE<sup>1</sup>U*).

— 4. *Podisoma* Lk. (*CE<sup>1</sup>H*).

Centrum (*Cœoma*) iterum, secundum eadem principia!, in quattuor subgenera abit — (*Uredo*), *Cœomurus*, *Puccinia* Lk, *Aecidium*\*). His caliculus, pro more, perfectior, sed sporidia, ut in Uredinibus. Subdivisiones e plantarum ordinibus naturalibus, quibus innascuntur, sumenda. Quo imperfectior familia, eo imperfectior hic caliculus. Exemplo erint Peridermia in Coniferis, Rœsteliæ in Rosaceis. Hic caliculus, quamquam e plantarum epidermide formatur, eodem modo ac sporidia e plantarum cellulis determinantur, notam essentialem offert. — Restant nonnulla genera intermedia v. gr. *Bullaria* Dec.

Subordo II. STILBOSPOREI (*CE<sup>2</sup>*) Entophytæ plantarum mortuarum. *Persoon inter Xylarias*, (Nees Syst. p. 20!).

---

\* Cf. *Stictis*, *Sphaerobolus*, genera epiphyto-hymeninae,

- Genera I. *Melanconium*. Lk. (*CE<sup>2</sup>C*).  
 — 2. *Fusidium*. L. (*CE<sup>2</sup>M*).  
 — 3. *Stilbospora*. P. (*CE<sup>2</sup>U*).  
 — 4. *Næmaspora*. Fr. (*CE<sup>2</sup>H*).

Ubique conferendus Nees locis citatis, qui in præsenti ulteriores omnes observationes superfluas reddit. Stroma, in omnibus hujus generibus passim observatum, spurium est! Genera intermedia jam plura *Didymosporium* Nees, *Astrosporium*, *Septaria* Fr. \*) &c. In *Næmaspora* iterum sporidia ad formam simplicissimam revertuntur. Cf. *V. A. H.* 1817 & *Ehrenb. silv. Myc. Ber.*

Ord. II. SPORODESMIA. (Nees l. c.) Sporidia innata egregium sistunt characterem.

- Genera I. *Seiridium* Nees (*CMC*).  
 — 2. *Sporodesmium* L. (*CMM*).  
 — 3. *Exosporium* L. (*CMU*).  
 — 4. *Gymnosporangium* Dec. (*CMH*).

Sporidia in primo tantum genere exannulata.

*Coryneum* Nees medium genus inter *Sporodesmium* & *Exosporium*.

Ord. III. CONIOSPORIA. Angiospori; & in genere centrali Uteri quoque rudimentum.

- Genera: I. *Conisporium*. Lk. (*CUC*).  
 — 2. *Bactridium*. Kuñz. (*CUM*).  
 — 3. *Prosthemium*. Kz. (*CUU*).  
 — *Sclerococcum*. Fr. (*CUH*).

\*) In Systemate sequenti modo exprimuntur genera intermedia: *Septaria* + *Stilbospora* *Uredo* Dec.) = *CE<sup>2</sup>M+U*. *Spaxassis* = *HH<sup>1</sup>+H<sup>2</sup>* e. s. p.

*Conisp. olivaceum Lk.* non vidi, tantum peculiare *C. circinans* Nees. Ordo heic necessarius; an vero omnia allata genera loco naturalissimo posita, inquirendum.

Ord. IV. TUBERCULARIÆ. Nees syst. p. 29. Sporidia, ut semper in Hymeninis, antecedentium imperfectiora.

- Genera: 1. *Aegerita*. P. (CHC).
- 2. *Fusarium*. L. (CHM).
- 3. *Atractium*. Lk. (CHU).
- 4. *Tubercularia*. Tod. (CHH).

Ad eadem principia *Aegerita* quattuor subgenera continet (*Illosporium*, *Psilonia*, *Dermosporium*, *Aegerita*); ita & *Tubercularia*. In genere *Mucedineo* sporidia elongata.

Ulterius Coniomycetes progredi nequeunt; si enim *Sporedesmium* una dignitate augeretur (CMMM), evaderet *Monilia*; si *Prosthemium* attuleretur ad CUUU, vera evaderet *Sphæria*; si *Tubercularia* fieret CHHH, culminaret & *Helotii* species (quales & nonnullæ species *Todei*). Immo *Aegerita* evaderet *Sclerotium*. — Etiam in *Tubercularia* ad summam Mycetoideam formam pileatam evecti!

Quattuor hujus ordines representant *Lepraria*, *Pulveraria*, *Coniangium*, *Calicum* inter Lichenes.

## Classis II. HYPHOMYCETES.

CHAR. *Thallus floceosus*. *Hoc charactere* reliquis classibus mox cognoscitur. *In nulla alia classe*

*tam perfecte evoluti flocci occurrunt, quamquam ut organa subordinantia in Uterinis & Hymenomycetibus occurrunt.*

Ordo primus Epiphytes revocat; secundus censum constituit; tertius in Gasteromycetes; quartus in Hymenomycetes abit.

- Ord. I. PHYLLERIACEÆ (ME) Fibræ spuriæ, contiguæ, entosporæ. Receptaculum nullum. *In foliis vivis.*
- II. INOMYCETES (MM) Fibræ genuinæ, subseptatæ. Receptaculum nullum. *In organismis putrescentibus.*
- III. STILBOIDEI (MU) Fibræ in receptaculum concretæ. Sporidia in capitulo discreto denudato inclusa.
- IV. CEPHALOTRICHI (MH) Receptaculum distinctum, floccis obductum, sporidiis impersis.

Ord. I. PHYLLERIACEÆ. (Nees Syst. p. 63).  
*Sunt status morbos vestitus plantarum. Evidenter hoc monstrant Phyllerium Gei, Rubi, quæ nihil nisi pili foliolum aggregati & paululum mutati. Horum metamorphosin, in Phyllerio tiliaceo, Erineo nervisequo &c. &c. observatum, ut suo loco ulteriorius exponam; Hinc patet, quare sporidia nulla.*

- Genera:
- 1. *Taphria* Fr. (MEE).
  - 2. *Phyllerium* Fr. (MEM).
  - 3. *Rubigo* L. ex em. (MEU).
  - 4. *Erineum* P. (MEH).

Flocci in Taphria sporidia referunt. Phylleria centrum constituunt & hinc minus quam reliqua a pilorum indole recedunt. Cronartium genus medium inter 2 & 3.

Ord. II. INOMYCETES. Abit in duas series:

Subordo I. MUCEDINES (*MM'*) Flocci pellicidi, septati, eōspongi. Cf. Nees *Syst.* p. 42.  
† ENTOPHYTÆ (*MM'C*) Flocci peregrini, sporidiis cōpiosissimis immixtis l. innatis.  
†† MUcedineae LIBERÆ (*MM'M*) Flocci genuini, liberi, sporidiis libere evolutis inspersi.

††† TRICHODERMATA (*MM'U*) Flocci genuini, cōjuncti, sporidiis libere evolutis subinspersi.  
†††† HYPOCHNI (*MM'H*) Flocci essentiales, contexti, sporidiis ex articulis collabentibus: *Transitus ad Eysos.*

† Entophytæ. Nees *Syst.* p. 44.

Genera: 1. *Sepedonium* Lk. (*MM'CC*).

— 2. *Mycogone*, Lk. (*MM'CM*).

†† Muc. liberæ. Nees *Syst.* p. 45. \*).

Ordinis sectio centralis iterum in quattuor genera superiora l. subdivisiones collabitur:

\* *Sporomyei* (*MM'MC*) Sporidia copiosa, eiseptata, floccos parcos decumbentes obtengentia.

\*\* *Trichomyei* (*MM'MM*) Sporidia cseptata, floccis decumbentibus hinc inde inspersa.

\*\*\* *Trichothecii* (*MM'MU*) Sporidia septata, floccis decumbentibus inspersa.

\*) Singula sectio forsitan potius genus & genera allata tribus. Primaria attuli, de cetero ob formarum cōpiam centra magis, quam radios, subdividere necessarium est.

\*\*\*\* *Botrytides* (MMM'H) Speridia regulariter coacer-vata, in floccis erectis \*).

\* *Sporomyci*. Nees Syst. p. 45.

Genera: 1. *Arthrinium*. K. (Sporomyc. E).

— 2. *Fusisporium*. Lk. ( — . M.)

— 3. *Epochnium*. Lk. ( — U.)

— 4. *Acremonium*. Lk. ( — H.)

\*\* *Trichomyci*. Nees p. 47.

Genera: 1. *Aleurisma*. Lk. (Trichom. C.)

— 2. *Sporotrichum*. Lk. ( — M.)

— 3. *Macrosporium*. Fr. ( — U.)

— 4. *Collarium*. Lk. ( — H.)

*Sporotrichum* 4 subgenera continet. Byssocladium medium inter Algas & Trichomycetes.

\*\*\* *Trichothecii*. H. I. tantum duo genera descripta:

*Trichothecium*. Lk. & *Scolicotrichum*. Kz.

\*\*\*\* *Botrytides*. Ehrenb. — *Mucedines capitatae*.

Nees Syst. p. 51.

\*) Sunt forsitan, qui judicent me aliquando pro lubitu, sine sufficiente ratione, ut nullus typus desideraretur, unum alterumve genus 1. sectionem collocasse. Mehercle! nullibi, quantum novi. Sic heic (in centro tam alto!) *Sporomyci* loco natali, sporidiorum forma & copia affinitatem cum Coniomycetibus indicant. *Trichomyei* procul dubio centrum constituent. *Trichotheciorum* sporidia septata (ut inter *Epiphytos* demonstravi) affinitatem remotiorem cum *Uterinis* & *Botrytidum* forma, locus, sporidia subcapitata cum *Hymeninis* indicant. Cf. ulterius ipsa genera, inter quae, jam a reliquis remotissima, vestigia nondum obsoleta; sed semper observandum quid sectionis character mutat v. gr. inter *Sporomycos* M. sporidia elongata, sed inter, *Trichomycos* floccie.s. p. — At universalem harmoniam, quam ubique perspicimus, verbis frustra exponege conabimur.

- Genera: 1. *Acrosporium*. Nees (Botryt C.)  
 — 2. *Botrytis*. Mich. ( — M)  
 — 3. *Dactylium* Nees. ( — U.)  
 — 4. *Aspergillus*. Mich. ( — H.)

Botrytis quattuor continet subgenera. Cf. Nees.  
 Accedunt alia intermedia.

+++ Trichodermata. *Nematomycet. tegentes*. Nees  
 Syst. p. 79.

- Genera: 1. *Myrothecium*. Tod. (MM' UC).

- 2. *Trichoderma*. P. ex Lk. (MM' UM).

+++ Hypochni. Habitu, loco, sporidiis ad Muced. hymen. accedunt.

- Genera: 1. *Oidium*. Lk. (MM' HC).

- 2. 3. *Hypochnus*. Fr. (MM' HM & U).

- 4. *Geotrichum*. Lk. (MM' HG).

Subordo 2. BYSSACEI (MM<sup>2</sup>) Fibræ! entosporæ, opacæ, fructiferæ articulatæ; steriles \*) continuæ. Cf. de cetero Nees Syst. p. 62! Humectatæ aquam repellunt, quod nec Mucidenes veræ, neque Algeæ.

† EPIPHYTI. (MM<sup>2</sup> E) Fibræ spuriæ, nudæ, disjunctæ, articulatæ.

† BYSSI SOLIDI (MM<sup>2</sup> M) Fibræ genuinæ, nudæ; disjunctæ, fertiles articulatæ.

+++ GASTEROTRICHI. (MM<sup>2</sup> U) Fibræ fertiles velatæ, liberæ, articulatæ.

++++ HYMENOTRICHI. (MM<sup>2</sup> H) Fibræ nudæ, concretæ, subasporæ.

\*) Byssus paucissimaque genera semper sterilia,

† Epiphyti. — In haec serie, quod Entophytæ in priori; sed aspori. Fibræ articulatis a Phylériis differunt.

H. l. *Herpotrichum* Fr. &c.

†† Byssi solidi. Nees Syst. p. 65, 69. Sectio centralis iterum subdividenda.

\* *Monilia*. MM<sup>2</sup>ME) Fibræ totæ articulatæ.

\*\* *Byssini*. (MM<sup>2</sup>MM) Fibræ remote septatæ, l. tenuissimæ, septulis inconspicuis.

\*\*\* *Racodia* (MM<sup>2</sup>MX) Fibræ continuæ, granuliferæ; granulæ intus fibris moniliformibus (*fertilibus*).

\*\*\*\* *Helmisporia* (MM<sup>2</sup>MH) Fibræ primariæ erectæ; rigidæ, continuæ; secundariæ (*fertiles*, *sporidia vulgæ dictæ*) septatæ secedentes.

\* *Moniliæ*. Mere sporidia concatenata. Genus *Torula* P. est epiphytum. (Cf. Nees Syst. p. 72. H. l. quoque *Hormiscium* Kz., *Monilia* Lk, *Alternaria* Nees.

\*\* *Byssini*. Centrum oonstituunt.

H. l. *Plegmatium* Fr., BYSSUS! Lk., *Lanosa*, Fr. — *Acrotannium* Nees videtur genus hymeninum hujus subdivisionis.

\*\*\* *Racodia*. Subdivisio uterina, prototypus sectio- nis uterinæ subsequentis.

H. l. *Racodium* P. — & *Dematium* Lk, si ad Fungos pertineat.

\*\*\*\* *Helmisporia*. Byssi disjuncti Nees p. 65.

**Genera:** 1. *Cladosporium*. Lk. (Genus E.)

— 2. *Helicosporium* Nees ( — M.)

— 3. *Helmisporium* Lk. ( — U.)

— 4. *Chloridium* Lk. ( — H?)

Ad superiores subdivisiones omnia genera seorsim non proposui, cum plura non viderim. Singula subdivisio cum correspondente prioris subordinis conferenda v. gr. *Helmisporia* & *Botrytides*. Sporidia sic dicta *Helmisporiorum* eadem sunt ac fibræ *Antennariæ*, interiores *Racodii* &c. ; in genere mucedineo (*Helicosporio*) optimè evoluta. Jam Illustr. Link in *Gladosporio* ramos in sporidia abire notavit e. s. p.

†† Gasterotrichi. Cf. Nees p. 278.

Genera: 1. *Clisosporium*. Fr. (MM<sup>2</sup>UC).

— 2. *Antennaria*. Lk. (MM<sup>2</sup>UU).

— 3. *Epicksylium* Tod. (MM<sup>2</sup>UH?).

*Antennariam* hujus loci non dubito. Cf. *Racodium*.

††† Hymenotrichi l. Geogenii. — *Inomycetes terrestres*. Fr. Nees. Rad. Mycet. p. 7.

Genera pluriina; typi sunt:

— 2. *Ozonium*. Lk. (MM<sup>2</sup>HM).

— 5. *Rhizomorpha*. Roth. MM<sup>2</sup>HU!).

— 4. *Xylostroma*. Tod. (MM<sup>2</sup>HH).

Medium inter *Rhizomorpham* & *Xylostroma* *Rhizostroma* Fr. — Horum natura quam reliquorum magis dubia, non videtur.

Ord. III. STILBOIDEI. Sarcocephali Nees p. 87.

Huc pertinet vastum *Stilborum* genus, quod proprium ordinem necessario constituet. Genus ad *Hymenotrichos* abiens est *Chordostylum* Tode & ad *Cephalotrichos* *Periconia*. Tode,

Ord. IV. CEPHALOTRICHI. Nees Syst. p. 84.

- Genera: 1. *Cephalotrichum*. Lk. (MHE).  
 — 2. *Coremium*. Lk. (MHM).  
 — 3. *Ceratium*. A. S. (MHU).  
 — 4. *Isaria*. P. (MHH).

Observationes acumini Lectorum relinquo.

Ulterius hæc Classis progredi nequit; Stilbum unica dignitate auctum culminaret & Gasteromyces evaderet; sic & Cephalotrichi ad Hymenomycetes abirent. Ad formam summam clavatam & pileatam in ultimo Ordine quoque erecta.

---

### Classis III. GASTEROMYCETES.

CHAR. Uterus h. e. *Fungus totus clausus, in centro sporidia colligens. Sporangium componitur ex cellulis concretis, includitque cellulas discretas solutas (sporidia), saepe & elongatas contiguas (floccos ascos); quæ vero imperfectiores sunt, solutæ. quam in Coniomycetibus; & contiguae, quam in Hyphomycetibus; sed novum quod ex his formatur organum (uterus) in hac classe perfectissimum. Uterus iterum occurrat in reliquis classibus v. gr. Pezizis, Polyporis &c.; sed tum totius plantæ essentiam non constituit.*

Ordines duo priores ad antecedentes Classes abeunt; tertius centrum; quartus Hymenomycetibus proximus.

Ord. I. PERISPORIA. (UE) Uterus sessilis, tenuis, simplicissimus; sporidia absque receptaculis partialibus.

Ord. II. MUCOROIDEI. (*UM*) Uterus stipite floccoso, membranaceus; sporidia absque receptaculis partialibus.

— III. UTERINI VERI (*UU*) Uterus genuinus, receptaculum constituit (*concreti*); sporidia cum receptaculis partialibus.

— IV. ANGIOGASTRES. (*UH*) Uterus mox rumpens a receptaculo (*hymenio*) discretus. Sporidia in receptaculis collocata.

Ord. I. PERISPORIA. (1. Hunc locum forsitan melius occuparunt Xylomaceæ).

Genera: 1. *Perisporium* Fr. (*UEE*). —

— 2. *Eurotium*. Lk. (*UEM*).

— 3. *Amphisporium*. Lk. (*UEU*).

Ultimum genus non vidi. An hujus loci?

Ord. II. MUCOROIDEI. Mucedines vesiculiferi Nees Syst. p. 81. (Thallus subseptatus).

Genera: 1. *Hydrophora*. Tod. (*UME*).

— 2. *Thamnidium*. Lk. (*UMM*).

— 3. *Ascophora*. Tod. (*UMU*).

— 4. *Pilobolns*. Tod. (*UMH*).

Ordo naturalis, cum alio. non commutandus.

Centrum (5) ulteriore divisionem admittit.

Ord. III. UTERINI VERI. Centrum.

Subord. I. TRICHOSPERMI. P. Uterus mollior, subfaticans. Sporidia receptaculis partialibus (floccis) inspersa.

‡ LICEOIDEI (*UU'E*) Flocci obsoleti.

† FULIGINOIDEI (*UU'M*) Uterus subdiformis, sessilis, junior fluxilis. Sporidia floccis discreta.

††† TRICHOCISTI (UU'X) Uterus regularis, junctus fluxilis. Sporidia floccis copiosis inspersa.

††† LYCOPERDINEI (UU'G) Uterus determinatus, junior carnosus. Flocci copiosi.

† Liceoidei. Gasteromyci diffuentes. Nees Syst. p. 104. Ni rationem haberes uteri perfectioris, cum UE facile conjungendi.

Genera: 1. *Dichosporium*. Nees (MU' EC).

— 2. *Licea*. Schrad. (UU' EU).

— 3. *Dermodium*. Lk. (UU' EH).

‡ Fuligineidei. Aërogastres ! sporomesti. Nees Syst. p. 98, — (Fungi caloris aërei ! ).

Genera: 1. *Pittocarpium*. Lk. (UU' ME).

— 2. *Aethalium*. Lk. (UU' MM).

— 3. *Lycogala*. Mich. (UU' MU).

— 4. *Spumaria*. P. (UU' MH).

*Pittocarpium* non vidi. *Lycogala* quattuor admittit subgenera *Lignidium*. Lk. (E), *Strongylium* Dittm. (M) &c.

†† Trichocisti (Trichioidei) Nees Syst. p. 110.

Sectio centralis, inde formarum numero ditissima, admittit subdivisiones, characteribus facile circumscriptas !

1. (MU' XE) *Craterium*. Trent. (si placet subdividendum).

2. (UU' XM) *Diachea*. Fr. (E), *Stemonitis* Gled. (M) *Cibraria* Schrad. (U), *Dictyidium* Schrad. (H).

3. *UU'XU*) *Arcyria* P. (*E*), *Trichia* (*M*), *Physarum* P. (*U*), *Cionium* L. (*H*).  
 4. (*UU'XH*) *Diderma* P. cum *Didymio*. Schrad.,  
*Leocarpus*. Lk. cum *Leangio*. Lk.

Plurima observanda offert!

†††† *Lycoperdinei*. Geogastri! Nees *Syst.* p. 128.

- Genera:** 1. (*Asterophora*. Ditt. — *Epiphytum*.  
*Onygena*. P. — *Epizoum*.  
 — 2. *Tulostoma*. P. (*UU'GM*).  
 — 3. *Lycoperdon*! Mich. (*UU'GU*).  
 — 4. *Polysaccum*. Dec. (*UU'GH*).

*Asterophora* tantum in fungis vivis occurrere debet. Cf. p. xxix, lin. ultima. — Genus centrale, peridio duplice non frustra distinctum, secundum exteriorius in quattuor genera iterum abit. *Scleroderma* P., *Bovista*. P., *Geaster* Mich.) Restant intermedia varia. - *Polysaccum* intime cum *Sclerodermate* (medium est *Rhizopogon* Fr.) cohæret, hoc loco omnino necessarium!, abitque evidentissime ad sequentem ordinem (non subordinem) e. s. p.

Subord. II. PYRENOMYCETES. Uterus magis clausus, induratus. Rec. partialia includentia. Cf. Fries *Scler. exsicc. Fasc. II.*

† XYLOMACEI (*UU<sup>2</sup>E*) Rumpentes; asci obsoleti; sporidia innata.

†† CYTISPORI (*UU<sup>2</sup>M*). Clausi: asci dissoluti; sporidia diffluentia (sæpe cum utero).

†† SPHÆRIACEI (*UU<sup>2</sup>U*) Peritheciū clavatum, osticulatum, intus nucleo subthecigero,

+++ PHACIDIACEI UU<sup>2</sup>H) Peritheciū rumpens, de-  
mum apertum; asci fixi.

‡ Xylomacei. (Cf. Nees p. 25).

Genera: 1. *Depazea*. Fr. (UU<sup>2</sup>EE).

— 2. *Actinothyrium*. K. (UU<sup>2</sup>EM).

— 3. *Xyloma*. P. (UU<sup>2</sup>EU).

— 4. *Leptostroma*. Fr. (UU<sup>2</sup>EH).

Genera intermedia plura. *Schizoderma* Ehrenb.  
est *Leptostroma* mihi; Ejusd. *Leptostroma* (Ecto-  
stroma) vegetabile non censeo.

†† Cytispori. Ehrenb. *Silv. Myc.* p. 15.

Genera: 1. (*Apiosporium*?)

— 2. *Chætomium*. Kz. (UU<sup>2</sup>MM).

— 3. ? *Coccopleum*. Ehrenb. (UU<sup>2</sup>MU).

— 4. *Sphaeronæma*. Fr. (UU<sup>2</sup>MH).

+++ Sphæriacei. Fr. *Exs. II*! Centrūm.

Genera: 1. *Phoma*. Fr. (UU<sup>2</sup>UE).

— 2. *Bostrychia*. Fr. (UU<sup>2</sup>UM).

— 3. *Sphæria*. Hall. (UU<sup>2</sup>UX).

— 4. *Dothidea*. Fr. (UU<sup>2</sup>UH).

Præcipue genus centrale subdivisiones admit-  
tit: *Cordyceps* Fr. (H) *Poronia* Fr. (U) e. s. p.  
*Dothidea* est genus hymeninum ob ascos fixos. Re-  
stant genera plura intermedia, omnia in sequenti  
volumine plane reformata. Nescimus sane quare  
Mycologi antecedentem subordinem tantum subdivi-  
serunt, & hunc conjunxerunt. In hac sectione  
primum perspexi, quæ p. xxix, de loco natali allata.

††† Phaciacei. Fr. l. c.!

- Genera: 1. *Excipula*. Fr. (UU<sup>2</sup>HE).  
 — 2. *Actidium*. Fr. (UU<sup>2</sup>HM).  
 — 3. *Phacidium*. Fr. (UU<sup>2</sup>HU).  
 — 4. *Thelebolus* Tod. (UU<sup>2</sup>HH).

Centrum admittit subgenera: *Hysterium* Tod. (E) *Solenaria* Spreng. (M) *Rhytisma*. Fr. (H). — Vidimus heic novum exemplum, sectionem quartam ad primam abire. Quare unica tantum Phacidiis species geogenia, explicat sequens ordo, ad quem per Excipulam turgidam & *Thelebolum* Tod. evidentissime abit.

Ord. IV. ANGIOGASTRES. Ordo maxime memorabilis.

- Genera: 1. *Sphaerobolus*. Tod. (UHE).  
 — 2. *Polyangium*. Lk. (UHM).  
 — 3. *Cyathus*. Hall. (HHU).  
 — 4. (clavatus : *Clathrus*. Mich. (UHH<sup>1</sup>);  
 — (pileatus . *Phallus*. Veter. (UHH<sup>2</sup>).

Genera intermedia varia. *Polyangium* non vidi. Ultima maxime tangunt Hymeninos, ut Phalloes in statu perfecto jam culminasse, facile crederes.

Classis IV. HYMENOMYCETES.

CHAR. Hymenium h. e. *Fungus mox aperitus, sporidiis in superficie nidulantibus, in perfectioribus ascis inclusis. Sporangium componitur fere, ut in*

*Gasteromycetibus, sed cellulæ discretæ (Sporidia) ad lucem tendentes superficiales; hinc hymenium numquam rumpitur \*).*

Repetuntur prime antecedentes classes prius quam ad centrum attingimus.

Ord. I. SCLEROTIACEI (*HE*) Hymenium cum receptaculo carnoso sporidiisque confusum \*\*). Asci nulli.

— II. TREMELLINI (*HM*) Hym. cum receptaculo gelatinoso confusum, Sporidia discreta. Asci nulli.

— III. UTERINI (*HU*) Hymenium distinctum, superum, marginatum. (*Receptaculum urceolatum l. reflexum, semper inferum*).

— IV. HYMENINI (*HH*) Hymenium distinctum, superum immarginatum l. inferum. (*Receptaculum elongatum l. expansum superum*).

\* ) Inter Protophyta *Filices hymenina* & *Musci uterina* l. capsularia. Ulterius non adscendit analogia fungorum. Numerus vero fungorum reliquorum plantarum verosimile major derivatur ex unius cuiusvis organismi nisu reproductivo ejusque multiplici modificatione ex elementorum varietate. 5 *Sphaeriæ Sorbo* propriæ, 5 *Pyrenomycetes Vaccinio vitis idea* privi e. s. p.

\*\*) In Systemate naturali construendo nil antiquius erit quam observare, utrum partes discretæ, an concretæ. Apud inferiores eademi occurrere solent organa, modo nondum explicata. E partibus concretis omnes irregularitates oriuntur v. gr. *Corollarum* e. s. p. An Compositæ sint *Umbelliferæ* concretæ?

## Ord. I. SCLEROTIACEI. Semina terræ. Nees!

Genera : 1. *Erysiphe*. Dec. (HEE).— 2. *Rhizoctonia*. Dec. (HEM).— 3. *Sclerotium*. Tod. (HEX).— 4. *Tuber*. Mich. (HEG).

Forma subglebosa, polis nullis discretis, inde omnes partes confusæ.

## Ord. II. TREMELLINI. Fungi aërei! Nees p. 155.

Genera: 1. *Agyrium* Fr. (HME).— 2. *Dacrymyces*. Nees (HMM).— 3. *Tremella*. Roth. (HMX).— 4. *Hygromitra*. (Nees (HMG)).

Typus *Agyrii* est Trem. cinnabarrina. Restant genera intermedia.

## Ord. III. UTERINI. — Uter. calycini. Nees p. 258.

Genera: 1. *Cyphella* Fr. (HME).— 2. *Solenia* Hoffm. (HUM).— 3. *Peziza* (HUU).— 4. *Mitrati* (HUH). Cf. p. 598.

Duo priora genera ascis destituta \*). Peziza abit in duas series, ascis fixis & liberis, etiam subgenera admittit: *Stictis* est *Epiphytum* (Cf. *Aecidium*) *Byssisedæ* (M), *centrum* (X), *Aleuria* (G) e. s. p. Sic & Mitrati.

\*) Non tamen separo. Eodem modo inter plantas Vasculares, quarum singula series e plantis aquaticis ascendit, infimæ vasis subdestitutæ.

Ord. IV. HYMENINI. Regni mycetoidei fastigium.

Subord. I. Clavati. Fries Syst. p. 461.

Genera: 1. *Pistillaria* Fr. (HH'E).

— 2. *Typhula* Fr. (HH'M).

— 3. *Spathularia* P. (HH'U).

— 4. *Clavaria* Vaill. (HH'G).

Subord. II. Pileati. Fr. Syst. p. 8, 455-461.

Genera: 1. *Thelephora* Ehrh. (HH<sup>2</sup>E) *Lejostroma*!

— 2. *Hydnus* L. (HH<sup>2</sup>M) *Diopogon*!

— 3. *Polyporus*, Mich. (HH<sup>2</sup>X) *Apus*!

— 4. *Agaricus*. L. (HH<sup>2</sup>G) — \*).

Ulterius regnum Mycetoideum (*Nachtseite der Pflanzen-welt*) ad formam umbellarem & fructificationem verticillatam evectum, limites suos extenderne nequit. In altero vero orbis vegetabilis hemisphaerio restant quasi coloni (novae formationis sexualis prototypi) *Cynomorium* & *Aphyteja*, quarum haec floribus hermaphroditis maxime abnormis \*\*). Semper parasiticæ (*Hysterophyta*!) sunt herbae fungosæ *Lathraea*, *Monotropa*, *Epipogium* &c.

\*) Contradiccio, quæ inter es, quæ de Agario pluries & Boletu ut perfectissimo p. 386 attuli, apparet, facile explicatur ex diverso respectu quo considerantur. Boleti ut fastigium Uterinorum inferioribus Agaricis perfectiores &c. Cf. p XIV (Fungi Mitrati.)

\*\*) Perfectissima animalia sexu distincta & infima hermaphrodita; perfectissimæ plantæ hermaphroditæ, infimæ dicline. *E plantis radicis* Oken (a quibus nunc semotos gaudeo Fungos. Isis 1820. VI. p. 556) unice sexuales (Musci) diclines. Fere omnes Plantæ caulis

Rei peritis, nisi tota constructio displiceret, hæc sufficiunt. Omnes mutationes in contextu, forma & loco natali ex hoc me explicare posse spero. In ipso libro leviter subinde discessi; Ordinum centralium subordines distinguo, ut & sectionem hymeninam Hymenomycetum Uterinorum & Gasteromycetum Hymeninorum ob habitum delineantem. Neque receptam seriem Pileatorum reformare volui.

*Hæc in rerum copia ad Systematis cognitionem maxime necessaris, in præsenti annotare volui. Valeas igitur Libelle! Mitto te per orbem non sine metu & spe. Conferas, quantillum fuerit, ad naturæ ejusque Conditoris, cognitionem, tum quotannis, redeunte telluris pomona, nova mihi subministratur lætandi materies.*

(*Palmae, Coniferæ, Amentaceæ &c.*) diclines; inter Culmiferas infimæ Cyperoidæ (*Amentaceæ*) sæpe diclines, raro Gramineæ; numquam summæ *Juncaceæ* glumis verticillatis e. s. p. *Plantæ foliorum Oken.* (*Urticeæ, Euphorbiaceæ*) subdiclines. Vix umquam diclines *Plantæ Corollinæ, Fructus* e. s. p.



ERRATA GRAVISSIMA, hactenus observata. Plurima in introductione, typis maxime festinanter exscripta.

Pag. X. l. 11. læve lege: *leve*. P. XVI. l. 25. lege: *singuli organismi*. P. XX. l. 17. *duse*. - Ib. l. ult. lege: *debet*. P. XXV. l. ult. lege: *probaremus*. P. XXVI. note \* & \*\* commutatæ. P. XXXVIII. l. 21, 23. privi lege: *privati*.

Pag. 8. lin. 14. longitudinaliter l. *utrinque*. P. 11. l. 22. l. *adnatæ*. *Stipes subæqualis*. P. 119. l. 6. lege: *radice*. P. 271. l. 24. basi lege: *postice*. P. 320. l. 2. *delesyn*. Dittmari. P. 326. l. 31. *Merulios* lege: *Cantharellos*. P. 327. l. 2. lege: *triga*. P. 331. l. 16. lege: *contextos*. P. 426. l. 11. *albidi* lege: *alibi*. P. 454. l. 26. *Thelephora* lege: *Tubercularia*. P. 502. l. 21. lege: *disponendi*. — Cum pluribus, quæ indulgentiæ observatoris committo,

---



# FUNGORUM

## ORDINES, GENERA, SPECIES.

### CLASSIS PRIMA.

## HYMENOMYCETES.

**C**HARACT. Hymenium nudum.

EVOLUTI. *Link. diss. 1. p. 35.* Asci in superficie collocati, immersi, plerumque fixi. Sporidia in ascis seriatim disposita. — Radix e fibris mucosiss, tenuibus, subinde simplex, fusiformis. Receptaculum carnosum, (suberosumve), annuum, forma varium, contextu solido, subfloccoso.

PROTOTYPI. *Nees Syst. p. 146.* Asci haud evoluti. Sporidia in ambitu nidulantia, emergentia. — Forma globosa, in cupulatam, clavæformem l. pileatam tendit. Substantia vesiculosæ, extus intusque homogenea.

UTRIQUE optime a reliquis Classibus hymenio — sporidiis in superficie collocatis, non vero nudis, differunt — l. — ut negativis notis exprimam, defectu peritheciæ nucleique fructificantis a *Pyrenomycetibus*; defectu peridii, sporidia, massam fungi constituentia, includentis a *Gasteromycetibus*; sporidiis non denudatis ab *Hyphomycetibus* et *Protomycetibus*.

ADSCENDIT hæc classis ab Ordine summo (Exosporii) *Protomycetum*, quos infimæ in singulo ordine tangunt. Prototypus epiphyllus est *Erysiphe*.

## Conspectus ordinum :

†. *Evoluti*. Ascis perfectis.

**I. PILEATI.** Receptaculum dilatatum, subinde ramosum, in formam orbiculatam tendens. Hymenium inferum. Asci fixi.

Centrum: *Agaricus*, *Boletus*. Radii: *Cantharellus*, *Theleph. ramosæ*.

**II. CLAVATI.** Receptac elongatum, simplex l. ramosum in formam cylindricam tendens, immarginatum. Hymenium superum. Asci fixi.

Centr. *Clavaria*, *Typhula*. Rad. *Sparassis*. — *Mitrula*.

**III. MITRATI.** Receptaculum bullatum, pileiforme marginatum. Hymenium superum, numquam clausum. Asci fixi.

Centr. *Helvella*, *Leotia*. Rad. *Morchellæ cont.* — *Rhizina*.

**IV. CUPULATI.** Receptac. patellæforme, marginatum. Hymenium superum, junius clausum, urceolatum. Asci erecti. α) fixi. β). liberi, emergentes.

Centr. *Peziza*, *Ascobolus*. Rad. *Helotium*. — *Burcardia*.

††. *Prototypi*. Ascis imperfectis, nullis.

**V. TREMELLINÆ.** Receptaculum varium vesiculoso-gelatinosum. Sporidia libera, emergentia.

Cent. *Tremella*. Rad. *Auricularia*. — *Nematelia*.

**VI. SCLEROTIACEÆ.** Recept. varium, vesiculoso-carnosum. Sporidia libera, subemergentia.

Cent. *Sclerotium* — Rad. *Phyllopta* — *Erysiphe*. — Affin. *Aegerita* &c. inter *Protom.*

*Obs.* Centrum indicat genera naturaliss. Radii genera ad antec. & sq. ordinem transeuntia.

---

## ORDO. I.

## PILEATI.

**Fungus & Agaricum.** Tourn. J. R. H. p. 556. **Fungi pileati.** Dill. Giess. p. 172. Nees. Syst. p. 178. **Agaricoid-i, Boletoidi, Hydnoidi & Gymnodermata.** Pers. Syn. p. XVI. sq. **Iidem & Chantarelloid.** Pers. Ch. comest. Fungorum ser. 1. Link. l. c. p. 36.

**STAT.** nat. Hymenium inferum, subeffigatum, raro lave. Ascii lineares, fixi, vix paraphysophori. — Stipes erectus l. adscendens, subcylindricus, cum pileo plus minus contiguus, saepe obliteratus. Pileus horizontalis, dilatatus, in formam orbiculatam tendens, sensim magis magisque explanatus, marginatus. Velum in duobus generibus occurrit.

**STATT.** aberrant. Pileus passim obliteratus, nunc resupinatus (pagina superiori adnatus), effusus, crustæformis; nunc in ramos sursum plerumque dilatatos ahiens, qui nisus præcipue inter genera ad fungos clavatos accendentia observatur. Utique hæc aberratio in formam genuinam facile transit, saepe ex ætate et loco solum pendens.

**AFFINIT.** Ordo vastissimus, maxime naturalis, nec amplius dividendus, fungos perfectissimos continet. Ab inferiori parte affines sunt *Clavati*; sed differunt hymenio supero lèvissimo nec ut in *Hydnis*, *Thelephoris* etc. ramosis subtus præcipue thecigeris. Extima genera quoque *Exosporiis* affinia, nec dubito, quin nonnullæ species in diversis statibus ad utrumque ordinem pertineant, utriusque modo fructifcent. Quales metamorphoses frequentes inter organisma imperfectiora observantur, inter Algas et animalia infusoria, inter Lichenes et Algas (conf. *Ag.* *Syn. Alg.*) etc.

**HISTOR.** Dioscorides duos modo seorsum commemorat, reliquos inter edules et perniciosos com-

prehendit. (*Lib. 4. C. 83*). Plinio "numerosa fungorum genera" paucissimos vero notat. C. Bauhinus 60 fere, plurimos e Clusio, hic spectantes colligit. Tournefort gen. 2, spec. 87. Michelius gen. 6, species prope 800. Linnæus genera 5, spec. 50. Gleditsch genera 2, sp. 44. Persoon in *Synopsi genera* 9, species 683. Link. gen. 15. Nos gen. 4 primæ, totidemque sec. et tert. dignitatis, species ultra mille, totidem nondum determinatis ad veras species relatis plurimisque dubiis simul indicatis. Sporidia Porta (*Phytogn. VI. c. 2.*), hymenii essentiam Vaillant, ascos Link primi observarunt. De Systemate Nees, de speciebus præcipue conferendi Clusius, J. Bauhin, Sterbeck, Rajus, Buxbaum, Battarra, Haller, Scopoli, Persoon etc. Icones nitidissimas Michelio, Schæffero, Bulliardo, Batschio, Boltonio, Sowerby, Flora Danica editoribus etc. debemus. Synonyma collegerunt C. Bauhin, Gleditsch; hæc vero Mycologia pars maxime neglecta fuit.

PATRIA, locus, tempus, duratio. Extra-Europæi, pauci scilicet quos rite novimus, specie plenumque, raro tribu, numquam genere ab Europæis differunt. Hi vero, exceptis quibusdam regione mediterranea privis, a Svecia in Italiam, a Ruthenia in Angliam communes videntur. Qui horum nomine in Floris Extra-europæis occurruunt omnino dubii, exceptis forsitan Americæ boreal. Incolunt terram et ligna putrida similiaque, numquam saxa. Individua l. species in cryptis tantum provenientia meras esse monstrositates in sequenti demonstrabimus. Vigent optime tempestate pluviosa simulque calida, æstivali et autumnali, pauci tantum vernalis, paucissimi hiemales. Horum preventus anomalus quidem videtur, est tamen observatu jucundus. Alii certo anni tempore, neglectæ cœli temperie protrudunt; alii ex aëris conditio ne plus minusve humida præcoce l. serotini sunt; alii tandem, meteorici dicendi, annis valde pluvi-

osis (v. gr. 1813, 1817) suis locis tantum resurgent. Exempla in sequentibus. Quod ad durationem attinet Agaricus unus alterve ephemerus est, plurimi hujus ordinis per 7 (Plin.) — 14 dies vegetant, sed multi diutius, immo dimidium per annum persistunt. Multæ autem Dædaleæ & Polypori perennes dicuntur, horum vero substantiam suberosam esse emortuam novumque porium carnisve stratum quottannis superimpositum vivum tantummodo esse, multis experimentis nixus judico. Radicem vero, quam negavit Theophrastus, multis & præcipue truncicolis esse perennem, aliis, ut Coprinis, modo annuam, nunc compertum habemus.

VIRES &c. Crudi plerumque venenati, sapore mucido, saepe acri, sed coctione mitiores. A Galeni (*Al. 2.*) usque temporibus anceps cibus visus. Alii semper perniciosi dicuntur, forsan ob larvas infestantes. Usus in Medicina (*Polyporus officinalis &c.*), pro fomite & in cibariis multiplex, accuratius investigandus!

SYNOPSIS generum, ex hymenii indole distinguendorum:

I. AGARICUS. Hymenium lamellatum. Lamellæ simplices, parallelæ.

A. *Coprinus*. Asci segregati, quaterna sporidiorum serie. Lamellæ diffluentes.

B. *Gomphus*. Lamellæ longe decurrentes ramosæ. Pileus turbinatus subumbonatus.

II. CANTHARELLUS. Hymenium venosum. Plicæ l. rugæ dichotomæ, subparallelæ.

III. MERULIUS. Hymenium venosum. Plicæ subporiformes, flexuosaæ, interrupte ascigeræ.

IV. SCHIZOPHYLLUM. Hymenium lamellatum. Lamellæ longitudinaliter bifidae revolutæ.

5. DÆDALEA. Hymenium sinuosum e lamellis anastomosantibus l. poris elongatis.
6. POLYPORUS. Hymenium porosum. Pori concreti, subrotundi, subinde lacerati.
  - B. *Porotheleum*. Pori distantes, papillosi, superficiales.
  - C. *Polysticta*. Pori superficiales, punctiformes. Ascii nulli.
7. BOLETUS. Hymenium tubulosum. Tubuli discreti, connexi.
8. FISTULINA. Hymenium tubulosum. Tubuli liberi, juniores clausi.
9. HYDNUM. Hymenium subulosum. Subulæ liberae.
  - B. *Diopogon*. Ascii nulli, in floccos soluti.
10. SISTOTREMA. Hymenium lamellis interrupptis flexuosis dentatum.
11. PHLEBIA. Hymenium rugosum e papillis elongatis l. confluentibus.
12. THELEPHORA. Hymenium papillosum l. læve.
  - B. *Phylacteria*. Sporidia quaterna serie disposita. *Resupinatae*.
  - C. *Himantia*. Junior & in ambitu byssina. Ascii nulli.
  - D. *Lejostroma*. Glabra absque ascis.

Genera accedentia sunt plurima genera hymenina reliquarum Classium & ordinum. (*Coniophora?*)

DIGNITATES. Primæ dignitatis sunt Agaricus, Polyporus, Hydnum, Thelephora; secundæ *Cantharellus*, *Dædalea*, *Boletus*, *Merulius*; tertii *Schizophyllum*, *Fistulina*, *Sistotrema* Mihi nec Pers., *Phlebia*. Confer. insuper ordinis revisionem ~~an~~ <sup>an</sup>q[ue]m.

**CRITICA.** Simplex series oritur sequ. modo : Thelephoreæ, Merulii, Agaricoidei, Dædaleæ, Polyporoid, Hydna, Boleti, qui saltim respectu hymenii perfectissimi. Valde superflua mihi videtur divisio Persooniana in quinque ordines. — Generum characteres, unice ex hymenio, neglecta pilei forma, sumendi. Hinc factitia sunt genera e forma pilei clavata (*Merisma, Hericium, Gomphus* etc.) l. resupinata (*Poria, Corticium* etc.) Neque genere distinguendæ species lamellis aculeisve incisis, poris laceratis e s. p. Hinc genus *Sistotrema*, e Meruliis, Polyporis, Hydnis, Dædaleis conflatum, plane delendum.

Subdivisiones generum ubique, quantum sec. natur. fieri potuit, eadem. Probe vero distingendum inter genera discreta (*Agaricus, Boletus*) et concreta (*Cantharellus, Polyporus, Hydnum* etc.). Illis enim sapius velum, hymenium a pileo discreturn, forma non aberrans (resupinata), substantia carnosa etc.

Determinatio tribuum naturalium Systematis basis, synonymorum decus, specierum robur; harum vero in hoc ordine e notis mere superficialibus erronea. sine synonymorum studio vitiosa, varietatibus et formis onusta tædiosa.

---

## I. AGARICUS Linn.

Fungi spec. C. Bauh. pin. 370. Tourn. 536. Fungi Ord. VI. Vaill. par. p. 61. Fungus! & Agar. ord. VII. Mich. p. 133. 122. Amanita. Dill. Giess. p. 172. Lam. Encycl. p. 103. Juss. gen. p. 6. Agaricus. Linn. gen. 1074. Gled. meth. p. 81. Nees. Syst. p. 188. Petrona, Keuma, Gelona. Amanita, fungus, Volva. Adans. fam. Pl. Amanita, Russula, Agaricus, Lactarius, Coprinus. Pers. disp. meth. Link. diss. p. 36.

CHAR. Lamellæ e centro l. basi radiantes, simplices, parallelæ, immixtis plerumque brevioribus, e membrana dupli arcte connexa compositæ, transversim planæ, a pileo subdiscretæ, longitudinaliter ascigeræ. — Stipes numquam reticulatus, raro obliteratus. Pileus carnosus l. membranaceus, horizontalis in adultis, determinatus, margine libero juniori inflexo, numquam effusus, crustaceus etc. Velum varium, nullum.

ABERRATT. Coprinus et Gomphus. — Reliquæ præternaturales, quia species resupinatae adultæ reflectuntur; et lamellæ thecis rarius privæ l. e statu morboso, l. in individualis a Sepedonio, Sphaeriis etc. farctis. Alio procul dubio pertinet Asterophora, ut etiam Phalloidastrum. Batt. t. 40. f. A. — D.

HISTOR. Vastissimum genus in tota reherbaria! Nomen ab Agaria Sarmatiæ regione. Diosc. Species e variò principio determinatae; alii diversissimas commutarunt (Gleditsch); alii formas individuales modo descripserunt (plurimi); pauci veras indigitarunt species. (Bulliard, Persoon). In plura genera divelli nequit, nisi Boletos etiam lacerares. Methodus autem certa et facilis maximi momenti. Plurimæ propositæ. Artificiales e magnitudine (Villars), colore pilei (Linné), lamel-

larum (Haller); a stipite farcto lamellarumque colore (Withering) pileive (Schumach.), e situ lamellarum (Otto) etc., quas non curamus. Naturales a Micheli, Battarra, Scopoli, Persoon, Nees etc., quas diligenter citabimus.

DIVIS. e velo, lamellis, sporidiis — nec non pilei indole; inde series sequentes et tribus:

Ser. I. LEUCOSPORUS. Volum varium l. nullum. Lamellæ immutabiles. *Sporidia alba.*

\* Stipite centrali, velato.

I. AMANITA. Volum duplex; universale discretum, partiale annuliforme subpersistens.

II. LEPIOTA. Volum simplex, universale, concretum, annuliforme, subpersistens.

III. ARMILLARIA. Volum simplex, partiale, discretum annuliforme, subpersistens.

IV. LIMACIUM. Volum fugacissimum, viscosum. Lamellæ adnato-decurrentes.

V. TRICHOLOMA. Volum fugacissimum, flocculosum, marginale. Lamellæ emarginatæ l. rotundatæ.

\*\* Stipite centrali, nudo.

VI. RUSSULA. Pileus carnosus, demum depresso. Lamellæ æquales, exsuccæ. (*Sporidia in nonnullis lustescunt*).

VII. GALORRHEUS. Pileus carnosus, demum depresso. Lamellæ inæquales, lactescentes.

VIII. CLITOCYBE. Pileus carnosus, junior convexus. Lamellæ inæquales, exsuccæ. *Variae.*

IX. COLLYBIA. Pileus carnosomembranaceus, planiusculus. *Parvæ, aridae.*

X. MYCENA. Pileus membranaceus, campanulatus. *Graciles. Stipes fistulosus.*

XI. OMPHALIA. Pileus membran. l. carnosomembranaceus, junior umbilicatus. *Variae.*

\*\*\* Stipe excentrico, nullo.

XII. PLEUROTUS. Pileus excent. lateralisve. Varii.

Ser. 2. HYPORHODIUS. Velum nullum. Lamellæ decolorantes. Sporidia rosea.

Stipes omnibus centralis. Conf. 1\*\*.

XIII. MOUCERON. Pileus carnosus, demum depresso. Lamellæ longe decurrentes. Odor farin. recent.

XIV. CLITOPILUS. Pileus carnosus, convexus. Varii.

XV. LEPTONIA. Pileus carno-membranaceus, e convexo-plano. Parvæ.

XVI. NOLANA. Pileus membranaceus, campanulatus. Graciles Stipes fistulosos.

XVII. ECCILIA. Pileus umbilicatus. Lam. adnatae.

Ser. 3. CORTINARIA. Velum præsens. araneosum. Lamellæ decolorantes, arescentes. Sporidia ochracea.

Stipes omnibus centralis. Conf. 1\*.

XVIII. TELAMONIA. Velum annuliforme contextum, subpersistens. Lamellæ distantes.

XIX. INOLOMA. Velum fugax. Lamellæ emarginatæ. Stipes bulbosus Color subviolaceus.

XX. PHLEGMACIUM. Velum fugax, viscosum. Lamellæ adnato-decurrentes. Color acyan.

XXI. DERMOCYBE. Velum fugax. Lamellæ convergentes. Stipes æqualis. Variae.

Ser. 4 DERNINUS. Velum præsens, non araneosum. Lamellæ decolorantes, subpersistentes. Sporid. ferruginea.

\*. Velo distincto. Conf. 1\*.

XXII. PHOLIOTA. Velum siccum, annuliforme. Variae.

XXIII. MYXACIUM. Velum viscosum, fugax. Lamellæ adfixæ.

XXIV. HEBELOMA. Velum marginale, fugax. Lamellæ emarginatæ.

\*\*. Velo fugacissimæ, i. spurio. Conf. 1 \*\*  
et \*\*\*.

XXV. FLAMMULA. Pileus carnosus, convexus, glaber,  
subviscosus. Lamellæ non emarginatæ.

XXVI. INOCYBE. Velum e pilei carni convexitate fibril-  
lis longitudinalibus. Lam. albidae.

XXVII. NAUCORIA. Pileus carno-membranaceus pla-  
ninsculus, squamulosus. Parvæ. Lamellæ cinnamo-  
meæ.

XXVIII. GALERA. Pileus membran., campanulatus.  
Graciles. Stipes fistulosus.

XXIX. TAPINIA. Pileus umbilicatus, margine villosus.  
Variae.

XXX. CREPIDOTUS. Pileus excentricus, l. sessilis. Varii.

Ser. 5. PRATELLA. Velum præsens, non  
araneosum. Lamelle decolorantes, nebulosæ, dis-  
solubiles. Sporid. fuscopurpurea.

#### Omnes centrales.

XXXI. VOLVARIA. Velum universale, discretum. Volva.

XXXII. PSALLIOTA. Velum annuliforme.

XXXIII. HYPHOLOMA. Velum marginale fugax. Lamel-  
læ emarginatae. Stipes bulbosus.

XXXIV. PSILOCYBE. Velum fugaciss. Pileus subcarno-  
sus stipesque æqualis tenaces.

XXXV. PSATYRA. Pileus submembranaceus stipesque  
fragiles.

XXXVI. Coprinarius. Lamellæ subdiffuentes. Velum  
partiale. Sporid. nigra.

\* COPRINUS. Asci ut supr. Velum univer-  
salis. Lamellæ liberæ cum pileo diffuen-  
tes. Sporid. nigra.

\* GOMPHUS. Lam. ut supr. Spor. nigra.

CRITICA. Singula series, a natura fixe de-  
terminata, clausa est, reliquis parallela, nullibi af-  
finis. — E tribibus Persoonii Galorrhœus, Ru's-

sula et ad partem Amanita naturales; reliquæ mixtæ et artificiales; nostras vero esse absolutas speramus. Ne autem numerus nimis augeretur et ut omnes æqualiter distarent parallelasque representarent, plures affines sub generali (*Varii dicto*) subinde junximus.

Tribus diversarum serierum analogas, diu eodem nomine salutavi. In multis placet; at quæ obstant graviora. Majoris momenti sunt quam genera *Hyphomycetum* Mycologæ recentioris. Genius hoc, in statu, quo Cel. Flörke Cenomyc., accipi. Species vagæ, definitiones inadæquatæ, descriptiones habituales, synonymon vix decimum fixe determinatum. En, candide Lector!, decem annorum laborem et fructum.

---

### Series prima.

#### Trib. I. AMANITA.

Fung. ord. *Mich. gen.* p. 185—188. Fungi Cap. IV.  
Batt. p. 27. Ag. tuberosi. †. Scop. Carn. p. 415.  
A. volvati. G. Batsch. El. p. 57. Amanitæ spec.  
Pers. Syn. p. 246. Nees Syst. p. 189.

CHAR. Velum duplex; universale volva, a pileo discreta, fungum juniorem ovatum totum involucrans, dein stipite protruso rupta, partim ad basin, partim in pileo remanens verrucæformis; partiale annulus superus, membranaceus, reflexus. Stipes e floccis plus minus contextis farctus, dein subcavus, squamoso-fibrillosus, basi incrassatus. Pilus disco carnosus, margine tenuis, e campanula-to-planus, subverrucosus; verrucis discretis, molibus, secedentibus; epidermide diu irrigata viscosa. Caro alba. Lamellæ postice attenuatæ, liberæ, antice latiores, ventricosæ, confertæ, parum inæquales, sub anthesi denticulatæ. — *Color varius, lamellarum albus, in una specie luteus.*

Obs. Nomen, fungo cuidam eduli a Galeno tributum, hic transtulit Persoon. Plurimæ species venenatæ. Diu persistunt. Amant loca silvarum umbrosa temperaturam minus frigidam. solum humosum, numquam ligni — l. simicolæ. Aestatis fine optime vigent.

\* *Volva laxa, pilei marg. lævi. Noxii.*

*Mich. gen. p. 184. Gled. p. 90.*

1. *A. vernus*, pileo subsquamoso, margine lævi, stipe farcto subæquali, volva libere vaginato.

Ag. spec. V. Gled. l. c. Ag. *vernus*. Bull. ch. t. 108. Am. *verna*. Pers. Syn. p. 250.

Candidus, odore ingrato. Stipes 3-6 unc. long., 4 lin. crass. et ultra, laceratus. Pileus junior ovatus, subrepandus, etiam nudus et demum subdepressus, 2-4 unc. lat. Lamelle lanceolatae. In silvis, solo humoso, sat frequens. Vere et æstate. (v. v.)

2. *A. Phalloides*, pileo subsquamoso, margine lævi, stipite apice cavo, volva connata bulboso.

Fung. phalloid. Vaill. par. p. 74. t. 14. f. 5. *A. bulbosa* & verrucos. Bull. t. 2. 577. Decand. fr. 2. p. 210. *A. vernalis*. Bolt. t. 48.

a. pileo albo. Linn. Svec. 1237. Hall. helv. 2355. *A. bulbosus*. Schæff. t. 241. Am. Pers. l. c. *A. insipidus*. Vill. p. 1012.

b. pil. flavo. Ag. citrinus. Schæff. t. 20. Nees l. c. f. 165. Am. Pers. p. 251. Ag. verrucos. Curt. 2. t. 312. fig. dextr. A. Mappa. Willd. Ber. 381.

c. pil. pallide viridi. Roz. Obs. Jul. 1775. t. 1. f. 6, 7. t. 2. f. 1-4. Ag. viresc. Fl. Dan. f. 1246.

d. pil. olivaceo-viridi. Am. viridis. Pers. l. o.

e. pileo fusco. Mich. t. 78. f. 1. *A. sinuat*. Schum.

Colore varius, inodorus. Stipes demum cavus, 3 unc. longus, firmus, fibrillosus, volva bulbiformi nunc laxa, nunc marginata. Pileus irregulariter

squamatus, 2 unc. et ultra; subinde fuscus et viridi varius. *A. S.* p. 143. Ad hujus formas quoque pertinent *Ag. stramineus* et *pustulatus*. *Scop.* *Carn.* p. 418. 419. excl. syn. *A. viridis*, *viridescens*, *mappa*, *citrinus*, *sinuatus*, *irroratus*. *chum* p. 248-250. *Ubique in silvaticis, a. b. locis subapricis. c. d. umbrosis humidis inter folia decidua. e. in pinetis.*  
*Jul. — Oct. (v. v.)*

3. *A. porphyrius*, pileo nudo, margine laevi, stipite subfistuloso aequali, volva ocreata.

*Mich. gen. t. 76. f. 5. A. gracilis. Schum. p. 252.*  
*Am. porphyr. A. S. p. 142. t. 11. f. 1. Fries Obs. 2. p. 4.*

Antecedentis formæ e. nimis affinis. Statura tenuior. Stipes vix bulbosus volva semper laxa. Colore variat griseo, livido, purpurascente. Inodorus. *In pinetis muscosis humidis, frequens Jul. — Oct. (v. v.)*

\*\* *Volva ut supra, pilei marg. striato. Edules.*

*Mich. p. 185, 183. Gled. meth. p. 84.*

4. *A. vaginatus*, pilei margine sulcato, lamellis albis, stipite fistuloso attenuato subnudo, volva vaginali.

*Buxb. Cent. IV. p. 12. t. 19. — Mich. t. 76. f. 1. Batt. fung. t. 5. A. C. A. vaginat. Bull. t. 512, 93. Am. vag. et involut. Lam. Encycl. 1. p. 106, 109. Am. livida, spadicea c. var. Pers. syn. p. 247, 248.*

- a. pileo albido. *A. fungites. Batsch. f. 79.*
- b. pil. griseo, livido. *Ag. lividus Auct. A. plumbeus. Schæff. t. 85, 86. Fl. Dan. t. 1014.*
- c. pil. cæsio. *A. hyalinus. Schæff. t. 244.*
- d. p. spadiceo. *A. pulvin. Bolt. 49. A. badius. Schæff. 245.*
- e. p. fulvo. *A. fulvus. Schæff. t. 95. A. trileb. Bolt. 38. f. 2.*
- f. pil. viridi. *Hall. Helv. 2375.*

Species a Bulliardo optime constituta. Stipes  
4-7 unc. longus, sursum aequaliter attenuatus, fra-  
gilis, sericeo-squamulosus. Pileus junior canipanu-  
latus, aut nudus, aut squamis latis membranaceis  
secedentibus. Moscowita comedunt: sec. Gen. Litt.  
Zeit. 1819 venenatus. Ubique ad terram incultam.  
f. vernal., a. b. autumn. reliq. estate. (v. v.)

5. *A. ovoides*, pilei margine striato, lamellis can-  
didis, stipite farcto æquali, volva laxa

Cæsalp. XVI. c. 47. Coccoïa. Mich. p. 185. — Batt.  
t. 4. D. Fung. alb. Magn. Bot. p. 103. A. 2.  
Gled. p. 84. A. ovoid. Bull. t. 364. Decr. 6. p.  
53. Am. alba. Pers. Ch. Com. A. coccoïa. Scop. p.  
429.

*B.* Leucomyc. pectin. alter. Batt. p. 28.

Candidus, admodum deliciosus Dec. Stipes  
crassus, palmaris, externe villosus, interne medul-  
la gossypina, in *B.* ventricosus. Pileus crassus,  
junior oris incurvis. Lamellæ ventricosæ Batt. In  
silvis et agrorum limitibus opacis Europæ austr. au-  
tumno. (v. ic.)

6. *A. cæsarcus*, pilei margine striato, lamellis lu-  
teis, stipite farcto, volva laxa.

Boletus. Plin. XXII. c. 46. Cæsalp. p. 616. Fung.  
esc. 9. XVII. Clus. hist. p. 272. Jaseran. J. Bauh.  
XL. c. 23. — Mich. t. 77. f. 1. — Magn. l. c.  
p. 102. — Sterb. t. 4. D. E. F. Elv. Cæsaronis.  
Batt. p. 27. t. 4. c. A. cæsareus. Schæff. t. 258,  
247 (male). Host. syn. p. 637. A. speciosus.  
Gouan Monsp. 461. — Hall. Helv. 2430. A. au-  
reus. Batsch. A. aurantiac. Bull. t. 120. Am. au-  
rant. & cæsar. Pers. Syn. p. 252.

Volva et annulus albus. Stipes subæqualis, al-  
bsoluteus, medulla gossypina. Batt. Pileus junior  
hemisphericus, aurantiacus Lamellæ in liquamen  
(quid?) diffluentes. Scopoli Habitus sequentis,  
odor Syringæ. Tratt. essb. Schw. p. 37. t. c. De-  
liciosus. Sporidia inquirenda. In silvis Eur. austr.

*autumno; rarissime in Norvegia?* Gunn. II. p. 181.  
(v. ic.)

\*\*\* *Volva obliterate, pil. ut supra. Venenati.*

*Mich. p. 188. Ag. spec. 1. Gled. p. 82.*

7. *A. muscarius*, pilei margine striato, lamellis candidis, stipite subfarcto bulboso, volva squamosa.

*Fung. pern. g. XII. spec. 4. Clus. p. 280. F. muscar.*

*Trag. — J. Bauh. XL. c. 51. Parkins. 1321. 8. Mel. musc. Sterb. t. 22. A. Mich. t. 78. f. 2. Ag. musc. Linn. Svec. 1255. Hall. H. 2375. Schäff. t. 27, 28. Kern. Schw. t. 33. Scholl. barb. p. 257. A. pseud-aurant. Bull. t. 122. A. imperialis. Batsch. — Fl. Dan. t. 129. Am. muscar. Pers. Syn. p. 253.*

b. verruc. stipiteque rubentibus. *A. rubens. Scop. p. 416.*

c. eisdem flavesce. *Am. formosa. Pers. l. c.*

Species tritissima. Variat pileo sanguineo, miniatu, aurantiaco, luteo, albido, hepatico. Verrucæ albae, regulariter dispositæ; subinde nullæ (Am. puella Rec.) Angli cum reliqu. commutant. Conf. With. — Sow. t. 286. (*A. fulvus*). Notus Entomologis veterum (*List. ap. Goed. t. 136, 142, 143*) oeconomique ad muscas et cimices pellendas. Liquorem inebriantem ab hoc et Epilobio angustif. parant Kamtschatkenses. Ruthenis cibarius; vix autem Gallis, ut apud Popow. *In silvis, ubique, Aug. — Oct.* (v. v.)

B. *regalis*, major, pileo hepatico glutinoso, verrucis flavis, stipite subsolido.

Vulgari duplo major, subcapitosus. Stipes 1 - 2 unc. crassus, basi squamis squarrosis reflexis concentricis. Pil. 6 unc. latus. *In fagetis aestate* (v. v.)

8. *A. pantherinus*, pileo æqualiter verrucoso, margine striato, stipite subfarcto æquali, volva ocreata - adnata,

J. Bauh. XL. c. 8. Dorsum buf. Sterb. t. 19. G. — Linn. Suec. 1236. Am. Hall. helv. 2597. A. maculat. Schœff. t. 90. A. verrucos. Pers. comm. p. 36. Am. umbrina. Pers. syn. p. 254. A. ruderat. Batsch A. pustulat. Schum. p. 251. A. pantherinus. Decand. fr. 6. p. 52.

Stipes 2 3 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, firmus, albus, demum pro more cavus. Volva non squamosa; sed ocreate-adnata, marginata separabilis. Annulus sepe distans, perraro deciduus. Pileus 2-3 unc. latus, subviscosus, olivaceus, fuscus, lividus. Verrucæ minutæ, alba, subinnatae; hinc ab A. vaginato b. (Hall. helv. 2393) diversus. In silvis montosis post pluvias sat frequens. Aug.-Oct. (v. v.)

9. *A. solitarius*, candidus, pilei margine substria-to, stipite solidio squamoso-bulboso.

Batt. t. 6. A. Agar. d. Gled. meth. p. 84. A. albellus. Scop. carn. p. 417. A. solitar. Bull. t. 48, 593. Dec. fr. 2. p. 208. Am. nitida. Fries Obs. 1. p. 4.

Medius inter A. muscarium et excelsum, ab A. procero abunde diversus. Stipes firmus, aqua-lis, spithameus usque,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus. volva bulbo-sa. Pileus 3 unc. et ultra, nunc nudus subviscosus, nunc squamis sparsis floccosis in qualibus. Vix edulis, ut apud Pers. l. c. In dumetis alibique. Aug. Sept. (v. v.)

\*\*\*\* Volva u. s. pilei margine laevi. Noxii.

Mich. p. 187. Ag. sp. 5. Gled. p. 86.

10. *A. excelsus*, pileo inqualiter verrucoso, mar-gine laevi, carne immutabili, stipite solidio, squamoso-bulboso.

Am. ampla. Pers.

Solitarius, firmus, sapore grato. Stipes 4-6 unc. longus, 1 unc. fere crassus, radicatus, volva crassa subteranea. Annulus, ut in sqq., amplius,

striatus, subtus subvillosus. Pileus 4 unc. et ultra, subviscosus, griseo-fuscus, margine dilutior. Verrucæ angulatae, facile secedentes. Lam.  $\frac{1}{2}$  unc. latæ, *A. ampla* Pers. Syn. p. 256 tamen eadem videtur. In terra montosa declivi, Aug. Sept. (v. v.)

11. *A. rubescens*, pilei verrucis farinosis inæqualibus, margine lævi, carne rubescente, stipite farcto squamoso subbulboso.

*Mich.* p. 138. — *Batt.* t. 6. f. *B.* *A. scandice*. *Scop.* p. 417. *A. crassipes* *Fl. Dan.* t. 831. (mala). *A. pustulatus*. *Schæff.* t. 91. *A. margaritif.* *Batsch.* alior. q. *A. verrucosus*. *Curt.* l. c. fig. sin. *A. circinat*. *Schum.* l. c. *Am. rubesc.* *Pers.* syn. p. 254.

b. *Schæff.* t. 261, sequ. affin.

Color carnis rubescens criterium. Stipes 2-4 unc. longus, firmus, rubescens. Pileus 3-5 unc. latus, obtusus; colore pallescente, alutaceo, rufescente, rubello, fusco. Lam. in stipite striato-prominentes. *A. maculat.* et *adnatus* *Schum.* p. 258, 260. h. l. Sapor non gratus. In silvis et campis sterilibus ubique, Jul.-Sept. (v. v.)

12. *A. asper*, pileo subumbonato, verrucis acutis scabro, margine lævi, stipite farcto attenuato squamuloso.

*Buxb. cent.* V. t. 48. f. 1. *Am. Hall. helv.* n. 2365. *A. verrucos.* *Bull.* t. 316. *A. myodes.* *Bolt.* t. 139. *Ag. asper.* *Abb. d. Schw.* 3. *Decand. fr.* 2. p. 203. *Am.* *Pers.* syn. p. 256.

Subolidus. Stipes vix bulbosus, 2-3 unc. longus, furfuraceus. Pileus 2 unc. latus, rubescente-fuligineus, verrucis minutis, confertis sordide albis; "sæpe albo-lineatus" Caro alba l. in cute leviter rubens. In silvis apricis, sæpe locis deustis. Jul-Oct. (v. v.)

Sectiones 1 et 4, 2 et 3 præcipue affines. Species diversarum sectionum analogæ; nempe typi

(*varii-colores*) n. 2, 6, 7, 11; solidiores (*candidantes*) n. 1, 5, 9, 10; gracilescentes (*pileo subfusco l. griseo*) n. 3, 4, 8, 12. — Datur forsan tribus (*Mich. p. 186.*) inter Amanitam et Lepiotam media, velo univ. discreto et partiali o. Species nullæ certæ; apud veteres, annulum sæpius negligentes (Cf. Bauh. l. I. c. c.), non quærenda, nisi *Sterb. t. 7. c.* et *Mich. t. 80. f. 4.* Huic vero annulum asserit *Gled. spec. VII, p. 94,* quæ tum ab jam allatis non differt. Ag. *vaginatus* velo partiali, fugaci licet, gaudet et de *A. lejoceph.* *Decand.* Cf. *Volvariam.*

### Species inquirendæ:

1. *A. muscarius* Kamtschaticus. *Langsd. Reis.* Pileus umbonatus. Lam. flavæ. De usu cf. l. c.
2. *A. cinereus* Otto p. 39. Colore & carne immutabili ab *A. rubesc.* recedit.
3. *A. virescens*. Pers. *Syn. p. 255.* Vix nisi colore viresc. ab eodem differt. Verrucæ polyedræ.
4. *A. guttatus*. Schæff. t. 240. Similis *A. aspero*; sed margo striatus.

Erroneæ sunt icones *A. verrucosi*, *nobilis* & *muscariæ* Bolt. t. 47, 46, 27. (hujus stat. exhib. volva laxa.) *Sterb. t. 22. C.* nec distinctæ species.

---

### Trib. II. LEPIOTA.

*Fung. cap. V. Batt. p. 29 ad part. Ag. volvati. B. Batsch. p. 51 a. p. Lepiotæ spec. Pers. *Syn. p. 257.* Aman. spec. Nees *Syst. p. 189.**

CHAR. Velum universale, simplex, cum epidermide pilei contiguum et concretum; ruptum annulum inferum, subinde fugacem, sistens. Stipes cavus!, intus floccis plus minus contextis farctus, æqualis l. basi incrassatus, fibrillosus. Pileus plus minus carnosus, non vero compactus, junior

ovatus, mox campanulatus, dein expansus umbonatus!, epidermide a velo formata. Caro alba, molis. Lamellæ inæquales. numquam distante: l. decurrentes. Color lamell. albus, in varietatibus quibusdam flavus.

Obs. Fungi gentiles, terrestres, solitarii, persistentes, autumnales, haud noxii. Tribus admodum naturalis. Nomen a *λεπίς*, squama.

\* *Velo demum libero, lamellis remotis. Edules.*

*Mich. p. 177. cui 6 spec.,! Ag. sp. 20. Gled. p. 114.*

1. *A. procerus*, elatus, pilei epidermide in squamas secedente, lamellis remotis, stipite cylindrico, basi bulboso, arinulo mobili.

Fung. quere. Column. Part. I. p. 317. Cf. Rupp. Jen. p. 358. F. esc. g. XVIII. Clus. p. 274. J. Bauh. hist. XL. c. 10. — Sterb. t. 7. A. Schlotterb. Act. Helv. t. 5. f. 1. — Hall. helv. n. 2371. Ag. n. 34. Reyg. Ged. p. 257. A. procerus. Seop. l. c. p. 418. Schæff. t. 22, 23. Fl. Dan. t. 772. Curt. Lond. 2. 15. Saw. t. 190. Pers. Syn. p. 257. A. coiubrin. Bull. t. 78, 583. A. antiquat. Batsch. A. squamosus Vill. p. 1015. A. annul. Bolt. 23. A. marmorea. Lam. Enc. I. p. 112. — Absque annule: A. extinctor, Linn. Suec. 1196. A. amanit. (Schum.) p. 268.

b. Mastoc, alter. Batt. 30. Bocc. Mus. p. 305. f. 3.

Stipes 8-12 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus firmus, squamulis fuscis variegatus. Annulus basitumidus, cartilagineus. Pileus 3-7 unc. latus, disco et squamis fuscis versus marginem fibrillosus albidus. Variet. B Pers. e vitiosa lectione. In hortis, sapibus & silvis, locis graminosis, vulgaris. Aug—Nov. (v. v.)

2. *A. mastoideus* tenuis, pilei epidermide in papillas secedente lamellis remotis, stipite attenuato debili — Batt. p. 30 t. X. A.

Stipes 3-4 unc. longus, basi 4, apice 1 lin. crassus, æquilater attenuatus, albidus, flexilis nec fragilis. Pileus tenuis, 1  $\frac{1}{2}$  unc., superne albidus,

squamulis granulosis adspersus. Lam. albæ. In  
nemoribus Italiæ, vere. (v. ic.)

3. *A. excoriatus*, medius, pilei epidermide continua, lamellis remotis, stipite æquali, annulo mobili. — Schæff. t. 18, 19.

Primæ speciei variet. censet Pers. l. c., et affinitas evidentissima; sed constanter minor, stipes brevior nec bulbosus, lœvis; pileus obsoletius umbonatus, lœvis, umbone fuscescente; lamellæ latæ. *A. vulnerat* Batsch. Utraque species in cibariis frequens. In arvis, campestribus, præcocior. Jul-Aug. (v. v.)

Allatæ species conveniunt stipite longo, basi crasso, submaculato, intus fibrillis arachnoideis laxis, in acetabulum pilei profunde immisso; velo a stipite discreto, cum pileo vero juniori contiguō, hinc demum libero, annulato, crasso persistente; pileo molli, obtuse umbonato, sicco, epidermide nuda, rigida; lamellis postice evanescentibus, inde collarium stipitem cingens, confertæ, ventricosæ, albæ. Cf. char. trib.

\* \* Velo fixo, pilei epid. secedente, lamellis liberas.

Mich. p. 170. Ag. spec. 26! Gled. p. 129.

4. *A. clypeolarius*, inodorus, pilei epidermide in squamas rupta, lamellis approximatis, stipite floccoso squamoso, annulo fugaci.

a. umbone squamisque rufo-fuscis. Mich. t. 78. f. 6. male. Hall. helv. 1372. A. clypeolar. Bull. t. 405, 506. f. 2. Sow. t. 14. var. Desc. franc. 2. p. 206. A. obscurus. Vill. p. 1015. A. colubr. Pers. syn. p. 258.

b. squamis ferrugineis, lam. lutesc. Pers. l. c. β.  
c. umbone squamisque nigresc. A. felinus. Pers. p. 261.

Habitus A.. proceri, sed minor. Stipes 2 unc. long., 2 lin. crassus, albidus, floccis squarrosis subfuscis. Pileus umbonatus, 2 unc. latus, albidus.

Variat magnitudine, stipite nudo farcto (*A. Melagris*. Sow. t. 171. Pers. Syn. p. 347 vix differt) etc. Odor saporve nullus. In fagetis locis umbrosis. b. in vaporariis etc. c. in pinetis. Aug—Oct. (v. v.)

5. *A. cristatus*, graveolens, pilei epiderm. in squamulas secedente, lamellis remotis, stipite laevi, annulo fugaci.

a. squamis fuscis, ferrugineis. *Mich.* t. 78. f. 8. *Am. Hall. helv.* 2356. *A. subantiquat.* *Batsch. Cont.* 2. f. 205. *A. cristatus.* *Bolt.* t. 7. *A. conspurcat.* *Willd. Ber.* 382. *A. colubrinus.* *γ. Pers.* p. 259.

b. totus albus. *Mich.* t. 78. f. 7.

Antec. minor. Stipes 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 1-1  $\frac{1}{2}$  lin. crassus, argentatus l. rubescens, absque squamis. Pileus uncialis circiter, albidus, squamis minutis, subinde granulæformibus. Lamellæ connexæ, confertæ, candidæ. *Ag. concentricus* Pers in Abb. d. Schw. 3 H. hujus forma absque annulo. Variat insuper stipite fibrilloso, pileo planiusculo etc. Odor saporque fortis ingratus. *Locis graminosis et muscosis ad terram.* Aug. — Nov. (v. v.)

6. *A. ermineus*, inodorus, pilei sicci epidermide versus marginem sericea, lamellis approximatis, stipite glabro, annulo fugaci.

Medius inter 4 et 5. *A. excoriato simillimus.* Candidus, sapore Raphani forti. Stipes valde fragilis, 2-3 lin crassus, intus floccis obsoletis. Pileus 2 unc. latus et ultra, umbone subobscurens vix prominente, epidermide margine in fibrillis velutinis soluta. Lamellæ utrinque obtusæ, 3 lin. latæ, minus confertæ, libere, sed stipitem attingentes. In aggeribus graminosis Lundæ, sero Octobri. (v. v.)

Speciebus 4-6 communia: Stipes tenuis, subequalis, fragilis, intus flocculosus; velum eum pileo

stipiteque contiguum, annuliforme, laceratum, fatiscente-fugax; pileus leviter carnosus, siccus, ab epidermide secedente squamulosus, unibone minuto, lamellæ liberae, ventricosæ, postice haud evanescentes, inde etiam collarium desideratur.

\*\*\* *Velo lamellisque u. s., pilei epid. contigua.*

7. *A. illinitus*, pileo glutinoso, margine striato, lamellis liberis, stipite e velo viscoso.

*Ag. Linn. Suec. 1198. Fl. Dan. t. 600. male. A. pratorum. Afzel. in V. A. H. 1788. A. illinit. Fries 2. p. 8. (b.)*

Diversissima species, habitu A. mucidi et subcavi, quem Cf. Var. A) major. immaculati candoris. Stipes 3 unc. longus, 2-3 lin. crassus, subfistulosus, laevis. Velum (vix annulus) ut in A. collinito; sed magis distinctum quam in Limaciis, a quibus statura plane recedit. Pileus carnosus, ovo-to-campanulatus, mox planus, 2-3 unc. latus, obsolete umbonatus. Caro mollis mucida. Lamellæ valde approximatæ!, 2 lin. latæ, confertæ, molles, subvenoso connexæ.

B. Antecedenti A. minor, tenuior. Stipes farctus, 2 unc. longus. Umbo distinctus discolor. Lamellæ confertæ, remotæ!. Distincta species videtur. Meteoricus. In pratis colliculosis & ericetis Eur. borealis, Jul. — Oct. (v. v.)

8. *A. delicatus*, pileo viscoso laevi, lamellis liberis, stipite e velo fugaci floccoso.

Species pulcherrima, *A. mesomorphus*. B. A. S. p. 146. Stipes 2 unc. longus, 1 lin. crassus, fistulosus, roseus, floccis flavo-albis vestitus. Pileus convexo-planus, subumbonatus, uncialis, flavus, miti suffusa rubedine. Lamellæ magis ventricosæ. Tenuis, odore saporeve nullo. In abiegnis madidis Lusatiae, Smolandia. Aug., Sept. (v. v.)

9. *A. mesomorphus*, pileo sicco laevi, lamellis liberis, stipite glabro, annulo erecto. — Bull. t,

506. f. I. Pers. Syn. p. 262, Dec. Fr. 2. p. 205.  
Nees l. c. f. 169.

Gregarius, parvus. Stipes 2 unc. longus, 1 lin. crassus, tenuis, pileo concolor. Pileus submembranaceus, campanulatus, dein expansus, acute umbonatus,  $\frac{3}{4}$  unc. latus, flavus. Lamellæ ventricosæ, antice latissimæ. Locis graminosis Galliae-prope Berlinum. Ehrenb. Jul. sq. (v. ie.)

Species 7-9, Mycenæ inter Lepiotas, parvæ; stipite fistuloso, vix fareto, aquali, frâgili; velo cum epidermide plane confluentे; pileo campanulato, mox expanso umbonato, tenui, subviscoso, glaberrimo, numquam squamoso l. rupto; lamellis liberis, ventricosis, candidis, confertis, postice haud evanescéntibus.

\*\*\*\* Velo u. s., pileo vestito, lamellis subadnexis.

10. *A. sistratus*, pileo sicco pruinoso, lamellis subliberis, stipite subfistuloso aquali, velo fibriloso.

Stipes fibris araneosis tenuissimis farctus, 2-3 unc. longus, 1-2 lin. crassus, firmulus, albidus. Pileus campanulatus, obsolete umbonatus, subtilissime pruinatus, 1  $\frac{1}{2}$  - 2 unc. latus flavescent, disco saepe obscurior. Lamellæ lanceolatae, fere liberæ, candidæ, confertæ, 2 lin. late. Locis graminosis Suecæ, rarissime. Aug. Sept. (v. v.)

11. *A. granulosus*, pileo furfuraceo granuloso, lamellis adfixis, stipite subcavo infra annulum patulum squamoso. — Pers. Syn. p. 264. Swartz V. A. H. 1808. p. II.

a. pileo luteo. Ag. ochraceus. Bull. t. 362, 530. f. 3. A. amianth. Scop. l. c. p. 434. A. flavo-flocosus. Batsch. f. 97. A. croceus. Bolt. t. 51. f. Sowerb. t. 19. A. muricatus. Fl. Dan. t. 1. A. spinulosus. Lumn. Pos. p. 514. A. fimbriata. Schum. p. 261.

- b. pileo ferrugineo. *Batsch. El. f. 24. Schum. Sæll.*  
p. 261.
- c. pil. cinnabarrino. *A. S. p. 147. Fl. Dan. t.*
- d. pil. incarnato. *A. carcharias. Pers. Syn. p. 263.*  
*Ic. pict. t. 5. f. 1-3. A. albomarginat. Schum. l. c.*
- e. pileo albido. *A. lanuginosus. Fl. Dan. t. 1248. f. 1.*

Stipes 2 unc. longus, 2-3 lin. crassus, basi su-  
-incrassatus, ad medium usque ab annulo vaginatus,  
pileo concolor. Pileus convexus, dein planiuscu-  
lus, obtuse umbonatus, 2-uncialis, epiderm. conti-  
guia exasperata. Lamellæ 1  $\frac{1}{2}$  lin. latæ, demum fl-  
-ventes. Varietates existant plures. *In pinetis* &  
*ericetis, inter muscos, ubique. Jul.—Dec. (v. v.)*

12. *A. ramentaceus*, pileo albido disco squamulis-  
que nigrescentibus, lamellis subadnexis, stipite  
farcto æquali, infra annulum erectum squamu-  
loso. — *Bull. t. 595. f. 2 Decand. 2. p. 205.*

Transit ad Armillarias; sporidia inquirenda.  
Stipes 2 unc. longus, 3-4 lin. crassus, albidus l.  
flavo-maculatus, apice levis, annulo angusto. Pi-  
leus planiusculus, obtuse umbonatus, 2 unc. et ul-  
tra. Lamellæ fere liberæ, convexæ, 2 lin. latæ, sor-  
dide albidae. *In Gallæ graminosis. (v. ic.)*

Sectio ultima (10-12) continet species minores,  
sed firmas; stipite intus flocculoso, subfarcto, squa-  
muloso; pileo vere carioso, obtuse et obsolete  
umbonato, sicco, epidermide semper contigua, sed  
furfure l. squamulis tecta; lamellis lanceolatis,  
confertis, stipitem attingentibus e. s. p. Velum in  
n. 12 margine pilei forsitan adfixum? — Typi (*squa-  
mipedes*) sunt n. 1, 4, 8, 11; gracilescentes n. 2,  
5, 9, 10; semidenudati (*albi*) 3, 6, 7, 12.

### Species inquirendæ:

1. *A. clavatus. Batsch. Mich. t. 81. f. 1. Simillimus A.*  
*procero; sed epiderm. in filamenta lacerata, annu-*  
*lus apice tumidus,*

# AGARICUS.

2. *A. dilutus*. Pers. *Syn.* p. 261. Affinis dicitur *A. co-lubr. c.*; sed pileus lœvis roseus, lam. griseo-fusca (Pratella ?) &c.
  3. *A. roseus*. Scop. 436. Pileus lœvis roseus; annulus filamentosus &c.
  4. *Mastoleucomyces*. Batt. t. 7. G. Affin. *A. ramentaceo*; sed pileus umbonatus, albus, lœvis &c.
- 

## Tri. III. ARMILLARIA.

Batt. l. c. *Lepiotæ spec.* Pers. l. c.

CHAR. Velum partiale, simplex, annuli-forme, persistens, stipiti innatum margineque pilei in statu juniori adnexum. Stipes solidus!, firmus, subfibrillosus, inæqualis. Pileus carnosus, convexus, expansus, obtusus!, epidermide semper contigua (etiam in squamosis), a velo plane discreta. Caro alba, firma. Lamellæ latæ, inæquales, postice subacutæ. Color lamell. albus l. pallescens.

Obs. Species autumnales, diu persistentes, firmæ, esculentæ, habitu inter se sat diverso. Annulus nunc superus h. e. ab apice stipitis reflexus, nunc inferus h. e. ad medium cum epiderm. stipitis contiguus: vel etiam proprius, supra medium insertus. Nomen ab Armilla.

\* *Solitarii, annulo amplio, lamellis liberis.*

1. *A. robustus*, compactus, pilei margine fibrillose, lamellis liberis, stipite curto fibrilloso, sursum incrassato. — *A. S. p. 147.*

Sparsus l. subcspitosus, sapore grato. Stipes firmus, basi  $\frac{1}{2}$  —  $\frac{3}{4}$  unc., apice 1 unc. crassus, nec multo longior; rarius 2-3 unc. et flexuosus, albescens. Annulus floccosus, ut videtur inferus. Pileus hemisphæricus, subinæqualis, late umbonatus, glaber, badio-ruber, margine albicante. Lam. albo-

pallentes. In silvis acerosis montosis Lusatiae, Norvegiae. Sept. Oct. (v. ic.)

2. *A. Persoonii*, compactus, pileo sicco glabro, lamellis liberis, stipite elongato aequali glabro, annulo supero. Fries Obs. 2. p. 7.

Speciosus. Sapor subacidus. Stipes radicatus, 3-5 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  — 1 unc. crassus, albidus, epidermide rigida. Pileus planus, obtusus, 3-5 unc. latus, glaberrimus, disco cinereus, margine albo. Lam. candidæ. In silvis montosis rasis Smolandiae. Aug. (v. v.)

3. *A. guttatus*, compactus, pileo sicco glabro, lamellis liberis, stipite elongato subbulboso, annulo supero guttato. — Pers. syn. p. 265. Abb. d. Schle. 3.

Anteced. affinis Stipes 4 unc. longus, 1 unc. crassus, albidus, apice guttatus. Guttulae atro-virides, exsiccatæ in maculas sordidas abeunt. Pileus planiusculus, late gibbus, 4 unc. latus, pallide lateritius. Lam. pallescentes. Odor subingratus. In pinetis montosis Germaniae. (v. ic.)

Transit hæc sectio ad Amanitas (i etiam ad Lepiot.), cum quibus convenient annulo, lamellis liberis, ventricosis, confertis etc. Species terrestres, solitariæ, robustæ, pileo compacto, convexo explanato, sicco, nudo, lavi etc.

\* \* *Solitarii, annulo tenui, lamellis adnexis.*

4. *A. bulbiger*, pileo sicco glabro, lamellis emarginato-adnexis, stipite marginato-bulboso rufo-fibrilloso, annulo depauperato. — A. S. p. 150.

Bulbi forma singularis et constans, subglobosa, supra depresso-concava, margine annulari cingente. Stipes 2 unc. longus, 3-4 lin. crassus, sat firmus, annulo albo recto etc. Pileus regularis, convexo-planus, 3 unc. fere, e cinnamomeo-rufus.

Lam. aquose albidæ. In dumetis Lusatiae inter folia & muscos Sept.

5. *A. constrictus*, pileo sicco glabro, lamellis adnatis, stipite subbulboso glabro, annulo infero.

Totus albus, odore grato subcumeris. Stipes firmus, uncialis, apice 3, basi 3-5 lin. crassus; annulo angustissimo, obliquo, lævi. Pileus 1—1  $\frac{1}{2}$  unc., planus, obtusus, demum pallescens, etiam margine striatulus. Lam. 2 lin. In campis Scaniae perraro, Oct. (v. v.)

6. *A. subcavus*, pileo striato glabro, lamellis decurrentibus, stipite æuali punctulato, annulo infero patulo. — Schum. Sæll. p. 262.

Cum A. illinito commutatus; sed omnino differt. *A. mucidus* y. A. S. p. 148. potius h. 1. Stipes 3  $\frac{1}{2}$  anc. long., 3 lin. crass., supra annulum erecto-patulum laciniatum lævis, apice subcavus. Pileus tenuis, 2 unc. latus, subviscosus, albus, umbo umbrino. Inter folia Pini Abietis Sællandiæ, raro. Sept. (v. ic.)

Spec. 4-6 solitariæ, terrestres, mediæ magnitudinis, haud compactæ; annulus inferus, tenuis; pileus glaber, nudus; lamellæ confertæ, albæ etc. Ultima species ad Limacia transit.

\* \* \* Subcæspitosi, pileo lævi.

7. *A. mucidus*, sub-cæspitosus, pileo tenui glutinoso, lamellis adnexis distantibus, stipite bulbo. annulo reflexo iterumque erecto sulcato.

J. Bauh. XL. c. 34. *A. valens*. Scop. carn. p. 430. *A. nitidus*. Fl. Dan. t. 773. *A. splendens* Ib. t. 1130. *A. olivaceo-fuscus*. Ib. t. 1372. *A. mucidus*. Schrad. spic. p. 116. Pers. syn. p. 266. Swartz l. c. 1808 p. 12. — *A. chrysospermus*, venosus, *splendens* Schum. p. 268. varietates.

Magnitudine maxime variat; vidimus specimina 6 et vix 1 unc. lata, Stipes basi incrassatus,

durus, 1  $\frac{1}{2}$  — 5 unc. longus, basi 4 apice 1-2 lin  
crassus, curvatus, albus, basi saepe fuligineo-squamo-  
sus. Pileus 2 unc. plerumque, diaphanus, rugu-  
losus, muco adhesivo; plerumque candidus, etiam  
fuligineus. Lamellæ rotundatae, lineatim decurren-  
tes, latæ, laxæ, antice evanescentes, e sporidiis al-  
bis farinaceæ, putrescentes luteo-maculatae. Annu-  
lus superus, arcte deflexus, margine tumido saepius  
fusco. In truncis vetustis, apprime Fagi, vulgaris,  
Jul. — Dec. (v. v.)

8. *A. vagans*, subcæspitosus, pileo lævi albido, la-  
mellis decurrentibus arcuatis, stipite glabro,  
deorsum attenuato, annulo patulo. — Batt. t.  
8. C. D. E.

Stipes solidus, lævis, 2-3 unc., annulo tenui.  
Pileus 3 unc. usque latus, brevi larvis scatens et  
putrescens. Lamelle albae, longe decurrentes, ita  
ut pileum tanquam conum apice inversum consti-  
tuant. Dantur specimina triplo tenuiora. Ad Po-  
pulos albas candidissimus. *Ad trunco arborum*  
*Eur. austr. autumno.* (v. ic.)

9. *A. griseo-fuscus*, subcæspitotus, pileo griseo di-  
scoideo, lamellis decurrentibus, stipite aequali  
glabro, annulo persistente. — Dec. Fr. 2. p. 52.

Stipes 3-5 unc. longus, sublævis, sordide cine-  
reus. Pileus mediocriter carnosus, 2 unc. latus,  
convexus, cinereo-fuscus, præsertim disco. Caro  
filamentosa, dein odore ingrato Lamellæ albae.  
*Ad trunco & radices emortuas prope Monspelium.*  
Oct.

Spec. 7-9 truncicola, plerumque cæspitosae;  
sed dantur etiam specimina solitaria. Color albus  
1. griseus. Pileus tenuis, convexo-expansus, abs-  
que squamis. Lamellæ decurrentes.

\*\*\*\*\* *Cæspitosi, pileo non lævi.*

*Mich. p. 197. q. Polymyc. Batt. p. 33.*

10. *A. denigratus*, cæspitosus, pileo campanulato nigrescente-umbrino, maculis latiusculis obscurioribus, stipite tenui subincurvo, annulo subfugaci. Pers. Syn. p. 267.

Stipes 3 unc. fere longus, 1-2 lin. crassus. Pileus  $\frac{3}{4}$  unc. latus, carnosus rigidus, annuli reliquiis instructus. Lamellæ albido-fuligineæ. Color peculiaris. Pers. Ad truncos Germaniæ, rarior, apud nos semel. Sept. (v. v.)

11. *A. rhagadiosus*, cæspitosus, pileo planiusculo albo, disco atro-flavo rimoso-squamoso, lamellis subdecurrentibus confertis, stipite brevi, annulo tenui. — Batt. t. 10. D.

Stipites 1 unc. et ultra longi,  $\frac{1}{2}$  unc. crassi, albidi, annulo angusto. Pileus carnosus, rigidus, 2-3 unc. latus, obtusus. Lamellæ latæ, albidae. Odorem graveolentem spirat. Ad Ulmos, Populos, Moros, Sambucos, palos &c. Italiæ vulgaris, vere, Aut. (v. ic.)

12. *A. melleus*, cæspitosus, pileo sordide luteo, squamis pilosis nigricantibus echinato, lamellis adnato-decurrentibus distantibus, stipite fibrilloso, annulo tumido patulo.

Mich. t. 81. f. 2. Batt. t. 11. B. — F. (varietates plur.) A. putrid. Scop. p. 420. A. obscurus. Schæff. t. 74. A. annul. Bull. t. 377, 540. f. 3. A. melleus. Fl. Dan. t. 1013. Bolt. t. 141. A. fusco-pallid. Bolt. t. 136. A. congregatus. Id. t. 140. A. pistillar. & occultans. Batsch. Ag. cumulatus. With. 4. p. 164. A. stipitis. Sowerb. t. 101. A. Polymyces. Pers. Syn. p. 269. Am. Hall. n. 2599!

Species dense cæspitosa, in cibariis frequens. Tratt. esb. Schw. p. 46. t. D. Stipites firmi, spongiosi, vix squamosi, basi subincrassati, juniores pallidi, mox olivaceo-cinerei. Annulus amplius. Pileus 2-5 unc. latus, margine striatus, variat gibbus et subumbilicatus. Lamellæ palescentes, dein rubiginoso-maculatae. Sporidia copiosa, inde cæspites

albo-farinosi. Quintuplex apud Battaram, Bolton etc. *Ad truncorum radices earumque in vicinitate ubique copiose.* Aug.—Oct. (v. v.) .

Spec. 10-12 vere cæspitosæ semper truncicolæ; stipite elasto. subæquali; pileo carnosæ, non lævi etc. — Hujus tribus sectiones cum antecedentis eximie analogæ; ex ultimis plures species in Europa australi occurrere videntur. Conf. Batt. l. c.!

### Spec. inquirendæ:

1. A. leccinus. Scop. p. 454. Pil. planus, glaber, albo-flavus. Lam. continuæ. Stip. 3 unc. basi rubellus. Annulus amplus &c.
  2. Calantica albida &c. Batt. p. 30. t. 7. B. Affinis A. constricto.
  3. Chamæmyces odoratus l. c. p. 32. t. 7. E. Subcæspitosus, parvus, candidus, annulo lacerato. In Ace-re campestri.
  4. A. laricius Bolt. t. 19. With. l. c. — Vix nisi mellei varietas, ut etiam A. elasticus t. 15. Falsus est Ag. XIII Gled. p. 105. pileo viridi. Quid A. subannul. Batsch; f. 75?
- 

### Trib. IV. LIMACIUM.

Monomyce. sp. Batt. p. 40. Gymnop. sp. Pers. Syn. p. 302,

CHAR. Velum viscosum, tenue, fugacissimum, universale. Stipes sat firmus, aequalis l. basi attenuatus, solidus l. farctus, squamulosus! l. maculatus, nec lævis. Pileus carnosus, convexus, explanatus, firmus, junior et irrigatus a velo viscosus. Caro alba. Lamellæ constanter adnato-decurrentes!, crassiusculæ, distantes, inæquales, integerrimæ, albæ, in una specie luteæ.

Obs. Fungi mediæ magnitudinis, solitarii, terrestres, autumnales, persistentes, sæpe serotini. Tribus, ut longe naturalissima, ita et analogæ op-

time declarata. Nomen ab *A. limacino*, nomen variis hujus et analogarum tribuum speciebus commune.

\* *pileo lavi, margine flocculoso.* Noxii.

- I.** *A. ligatus*, albus, pileo lavi subsicco, margine inflexo appendiculato, lamellis strictis, stipite fareto longo fibrilloso.

Gregarius, sapore miti. Stipes 3 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, basi attenuatus, villosus. Pileus 1-2 unc. latus; margine æqualiter inflexo, floccis in velum contiguum annulatum contextis, ut nisi rationem totius structuræ haberes, hoc ex capite facile Armillaria. Variat maculis rubellis. Meteoricus. In silvis abiegnis muscosis umbrosis. Aug. Sept. (v. v.)

- 2.** *A. chrysodon*, pileo lavi albido, margine stipitisque apice flavo-floccosis, lamellis crispis.

a. *Batt. t. 15. A. A. chrysod. Batsch, cont. 2. f. 212. Pers. Syn. p. 365.*

b. *leucodon, A. S. p. 181.*

Stipes 2 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, flavo-maculatus, apice villo flavo annulari squamosus. Pileus demum subdepressus, 1  $\frac{1}{2}$  unc. latus, margine involuto discoque flaventibus. Lam. variant incarnatae margineque floccosæ. In fagetis, dumetis. Sept. Oct. (v. v.)

- 3.** *A. erubescens*, pileo lavi albo-rubescente, margine involuto tomentoso, lamellis strictis, stipite sursum incrassato squamuloso.

*A. carnosus, Sowerb. t. 246. Curt. 5. t. 71. Swartz. l. c. 1809, p. 84. A. rubescens. Pers. 6yn. p. 366.*

Antec. speciosior, robustus. Stipes 2-3 unc. longus  $\frac{1}{2}$  unc. crassus et ultra, subviscidus. Pileus planiusculus, 3 unc. et ultra. Lamellæ distantes. In fagetis, nemoribus graminosis. Sept. Oct. (v. v.)

Velo quasi dupli, viscoso fugaciss., partiali floccoso marginali sect. i a sqq. differt. Stipes solidus, squamulosus. Pileus minus viscosus, convexo-explanatus, lăvis.

\* \* pileo lăvi, stip. squamuloso. Edules.

4. *A. eburneus*, candidus, pileo lăvi, lamellis lati, stipite farcto albo-squamuloso.

Buxb. Cent. IV. t. 30. f. 2. Ag. n. 42. Dórr. Nass. p. 321. A. lacteus. Schæff. t. 39. A. nitens. Sowerb. t. 71. A. jozzelus. Scop. 431. A. eburneus. Bull. t. 118. 55<sup>1</sup>. f. 2. Pers. syn. p. 364. A. virginicus. Batsch. f. 12. Am. alba. Lam. Enc. I. p. 107.

b. disco flavescente, stipite longo. Batt. t. 21. F. A. nitens. With. arr. 4. p. 156. A. cossus. Sowerb. t. 121. A. elongat. Schum. Sæll. p. 310. A. discoxanth. Fries Obs. 1. p. 13.

Stipes denum cavus, statura admodum varius, in elongatis flexuosus. Pileus exsiccatus nitens, 2-3 unc. Lamellæ distantes. In silvis frondosis & acerosis, frequens. Aug.-Nov. (v. v.)

5. *A. discoideus*, pileo lăvi albo-flavente discoideo, lamellis tenuibus, stipite farcto albo-squamuloso. — Pers. Syn. p. 365. Batt. t. 13. f. F.

Minor, gregarius. Stipes uncialis et ultra, 2 lin. crassus, æqualis. Pileus planus, uncialis, colore albo-flavo, disco gilvo l. ferrugineo. Lam. subconfertæ. In silvis abiegnis. Sept. Nov. (v. v.)

6. *A. pudorinus*, pileo lăvi incarnato, stipite solido punctato-scabro, apice subcoarctato.

Stipes 2-4 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, glaber, albidus. Pileus convexus, deum depresso, viscosus, 2-4 unc. latus, margine omnino nudus. Lam. distantes. *A. purpurasc.* Scop. Carn. p. 424. et *A. crassipes* Otto. p. 77. h. 1., sed descriptiones pro more mutilatae. In abiegnis montosis Smol. editioris ad Barnörp, Skärstad Ec. Jul. Aug. 1817. (v. v.)

\* \* \* pileo stipiteque squamulosis.

7. *A. purpurascens*, pileo subsiccō squamuloso albo, disco purpurascente, margine initio involuto villoso, stipite squamuloso æquali. — *A. S.* p. 182.

Subcæspitosus. Stipes 2 unc. fere longus, 3-6 lin. crassus, albus, squamulis purpureis variegatus, subinde annulo pictus. Pileus 1  $\frac{1}{2}$  — 3 unc. latus, squamulis purpureis disco pictus, margine candidus dein evolutus nudus. *Locis similibus Lusatiae Sept. Oct.*

8. *A. pustulatus*, pileo livido, papillis discoideis albidis, stipite tenui albo-squamuloso.

*Am. Hall, helv. 2379. A. pustul. Pers. Syn. p. 354.  
A. agathosm. Fries Obs. I. p. 16.*

*b. squamulis stipitis cinereis. Pers. l. c.*

Gregarius. Stipes 1-3 unc. longus, 1-2 lin. crassus, æqualis, subflexuosus, albidus l. cinerascens. Pileus obtuse umbonatus, dein rarius depresso,  $\frac{1}{2}$  — 1  $\frac{1}{2}$  unc. Lam. latæ. *In pinetis præcipue abiegnis, juve piuvio, abunde. Sept. Oct. (v. v.).*

*B. brevis, solitarius, glaber, pileo nigrescente, stipite brevi albo. Pers. l. c. γ.*

Stip. 3 lin. crassus, vix 1 unc. longus. Lamellæ tenues, 2 lin. latæ. *In pinetis Sept.*

9. *A. tephroleucus*, pileo squamuloso cinereo, stipite tenui nigro-squamoso. *Pers. l. c. p. 351.*

Elegans, sq. similis. Stipes 2-3 unc. longus, 2-3 lin. crassus, albus, superne præcipue squamulis fibrillosis punctiformibus nigris exasperatus. Pileus convexus, obtusus, dein obsolete umbonatus,  $\frac{3}{4}$  — 1 unc. latus, disco obscurior. Caro tenuis. Lamellæ 1 lin. et ultra latæ. *A. discors* Batsch. Cont. 2. f. 196 habitu; sed nullo charactere reddit. *Locis humidis in silvis abiegnis, passim, Sept. Nov. (v. v.)*

In spec. 7-9 stipes solidus, æqualis; pileus non depresso; lam. distantes, distinctæ, candidæ.

\*\*\*\* pileo demum depresso, stipite maculato.

10. *A. olivaceo-albus*, pileo umbonato glabro olivaceo-fusco, lamellis connexis candidis, stipite solido fusco-maculato. *Fries Obs.* 1. p. 5.

*A. limac.* Schæff. t. 512. *A. lim.* *B. A. S.* p. 173.  
*A. striatus* Schum. l. c. p. 321.

Stipes 2-5 unc. longus, 3 lin. fere crassus, basi fere attenuatus, albidus, e velo maculatus et viscidus. Pileus circa umbonem demum depresso, 1-2 unc. latus, margine substriatus. *In pinetis solitarius, frequens. Jul.-Oct.* (v. v.)

11. *A. hypothecus*, pileo obtuso lavi flavidus, glutine olivaceo oblinito, lamellis distinctis stipiteque submaculato flavis. *Fr. l. c. 2.* p. 8.

*J. Bauh.* XL. c. 72. *Euxb. Cent.* IV. t. 2. *A. limac.* *Sowerb.* t. 8. *A. vitell.* *A. S.* p. 179. t. 10. f. 3.  
*A. pyxid.* Schum. l. c.

Optime varians. Stipes 2-3 lin. crassus, firmus, æqualis. Pileus e convexo-depresso, totus demum infundibuliformis, sensim flavescens. Lam. variant pallidæ et incarnatæ. Vidi specimina magnitudine *A. fibulae*, alia 4 unc. etc. *In pinetis ericetosis gregarie, ubique. Oct.-Dec.* (v. v.)

12. *A. aromaticus*, pileo lavi cinnamomeo, lamellis subdecurrentibus stipiteque cavo maculato rufescens. — *Sowerb.* t. 144. *Pers.* p. 306.

Stipes 2-3 unc. longus, 3-4 lin. crassus, æqualis, cinnamomeo-carneus, albo-maculatus. Pileus 3 unc. latus, fragilis, glutinosus, ad tactum nigromaculatus. Lamellæ demum attenuato adnexæ. Sapor demum aromaticus. An *Myxacii* species? *In silvis Angliæ.* (v. ic.)

Sectio ultima utique ad hanc tribum pertinet; a reliquis distat stipite non squamoso, sed a velo

tantum maculato; pileo tenui, demum depresso, laevi, margine nudo etc. In pinetis.

### Spec. inquirendæ:

1. *Galericulus Monachi.* Batt. t. 7. F. Velo contiguo, albidus, edmodum tenuis.
2. *Monomyces leucophæus.* l. c. t. 21. C.
3. *A. Magnaius.* Scop. p. 429. Gled. 22. a. p. 118. albus, stipite cavo, pilei margine nudo, lamellis crispis.
4. *A. limacin.* Scop. p. 422. Stipes bulbosus. Pileus fuscescens. Lamellæ ramosæ.

Erroneus Ag. *limac.* Pers. p. 355. Confusæ Am. Hall n. 2341, 2342. Hybridus *A. glutinosus* Batsch. Sequentis, ut videtur, status *A. glutinosus* Bull.

---

### Trib. V. TRICHOLOMA.

Fung. Cap. VII. a. p. Batt. p. 32. Cortinar. & Gymn. sp. Pers. Syn. p. 502. Ag. f. Pers. disp. p. 20.

CHAR. Velum fugacissimum, partiale, fibrilosum l. floccosum. Stipes carnosus, firmus, sursum subattenuatus, non laevis; sed squamosus, fibrillosus l. e fibrillis concretis striatus. Pileus carnosus, nunc compactus hemisphericus dein explanatus obtusus; nunc tenuior junior companulatus; margine tenui, juniori inflexo cum velo contiguo. Lamellæ inæquales, exsuccæ, postice obtusæ, emarginatæ l. rotundatae. Ascii majusculi, sporidiis albis. Color diversus, plerumque constans.

Obs. Tribus, a Δρις & Λαμπα dicta, species numerosas, optime inter se et affines et distinctas continet. Fungi majores, robusti, diu persistentes, solitarii l. gregarii, terrestres; multi esculenti, sapore grato; aliis acri felleo.

+ TRICHOLOMATA LIMACINA (1-12). Pileus vere carnosus, subobtusus, humidus viscosus!,

margine involuto pubescente. Caro firma. Lamelle plus minus emarginatae, albæ l. luteæ. Stipes vestitus! a pileo subdiscretus. (A. unctuos. spec. Batsch. p. 81). In regionibus præcipue montosis acerosisque.

- \* 1. *A. albo-brunneus*, pileo lævi viscoso umbrino, lamellis adnexis albis, stipite farcto glabro, apice squamuloso.

Am. Hall. helv. n. 2398. *A. striatus*. Schæff. t. 38.  
*A. albobrun.* Pers. syn. p. 293. Fries Obs. 2. p. 118.

- b. *A. glutinosus*. Bull. t. 258, 539, 587. f. 1.

Stipes dein cavus, 2-3 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus et ultra, subventricosus, pileo paulo dilutior, apice candidus. Pileus convexo-planus, obtusus, 3 unc. latus, etiam rufus. Lam. dente decurrentes, hinc summa cum Limaciis affinitas. *Supra folia Pinuum. Aug—Oct. (v. v.)*

2. *A. fulvus*, pileo viscoso virgato rufofulvo discoideo, lamellis adnexis flavis, stipite cavo æquali fibrilloso.

*A. incertus*. Schæff. t. 62. *A. fauve*. Bull. t. 555. f. 2. 574. f. 1. *A. fulvus*. Desm. fr. 2. p. 186. *A. trichoppi* var. *A. S.* p. 163. (optime) *A. flavo-brunneus*. Fries l. c. p. 119.

- b. *A. fulvus*, lamellis pallidis. Retz. V. A. H. 1769. p. 272.

Odor farinæ recentis. Stipes 3-4 unc. longus, rufescens, intus flavus!, apice nudus. Pileus subsquamulosus, 3-6 unc. latus, passim late umbonatus. Lam. latæ, sape rufo-maculatae. In dumetis, nemoribus humidis alibi, frequens. Aug. Sept. (v. v.)

3. *A. ustalis* pileo lævi viscoso badio-rubro, lamellis emarginatis albis, stipite farcto æquali fibrilloso. Fr. l. c.

Huc *A. leucophyllus* A. S. p. 163 et *A. permutteratus* Otto p. 84. Inodorus. Stipes 2-3 unc. lon-

gus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, subradicatus, apice nudus. Pileus planiusculus aequalis, Lam. latae. In Scania subspecies stipite cavo, fibrillis squamoso-squarrosis etc. In fagetis, betuletis &c. passim. Aug.-Oct. (v. v.)

Sequentes tres species a n. 1-3 differunt pilei indole, lamellis liberis, stipite solido squamuloso.

\*\* 4. *A. nictitans*, pileo lavissimo subviscoso badio-rufo, lamellis liberis flavis, stipite solido aqua-li glabro, apice squamuoso.

Stipes solidus, 2-3 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, albido-flavescens, intus albus. Pileus subtenuis, obtusus, planiusculus, 2 unc. latus. Lam. immaculatae, confertae, 4 lin. late. Sapor mitis, nauseosus; larvis gratus. In ericetis sub betulis Smolandiae raro. Sept. (v. v.)

5. *A. pessundatus*, pileo compacto repando viscoso rufescente, lamellis liberis stipiteque solido curto villoso-squamuloso albis. Sterb. t. 6. D.

Gregarius, compactus, odore farinæ recentis. Stipes totus bulbiformis, 1 unc. longus, sæpe crassior, raro productus. Pileus convexus, undulatus, junior infractus, disco obscurior, 3 unc., subinde granulatus, glebulis foliisque acrosis sæpe tectus. Lam. perangustæ. In pinetis Sueciæ siccis, passim. Aug.-Oct. (v. v.)

6. *A. Russula*, pileo subdepresso viscoso granulato stipiteque solido aequali apice squamuloso roseis, lamellis subliberis candidis.

a. stipite brevi. A. Russ. Schæff. t. 58. Pers. Comm. p. 23. Syn. p. 338.

b. stipite longo, A. roseus. Schæff. t. 75. Pers. Obs. 2. p. 51.

Antecedenti affinis; differt forma pilei, superficie granulato-squamosa, lamellis minus confertis, 3 lin. lati, stipite apice tantum villoso-pruinato.

Species deliciosa. *Tratt. l. c. p. 57. t. G.* In silvis,  
rario. Autumno. (v. v.)

\*\*\* 7. *A. aurantius*, pileo squamuloso viscoso flavo-  
aurantio, lamellis adnexis candidis, stipite so-  
lido aurantio-squamoso. *Schæff. t. 37. Pers.*  
*Syn. p. 292.*

Stipes 2 unc. longus, 4 lin. crassus, æqualis,  
albidus. Pileus junior hemisphæricus, dein leviter  
convexus, 2-3 unc. Odor fortis, sapor amarus, fel-  
leus. In abiegnis, muscosis, serotinus. (v. v.)

8. *A. prasinus*, pileo squamoso viscido luteo-viridi,  
lamellis liberis luteis, stipite solido crasso tu-  
beroso. *Schæff. t. 218.*

Statura A. luridi. Pileus subcompactus, pla-  
no-convexus. *A. olivascens* Batsch et, fide Allionii,  
Am. 2434. Hall. hely. p. 177, de qua: "Stipes - - -  
superne crassior, flavescens. Pileus pulvinatus, co-  
lore viridi, rhamneo, sed debiliori. Caro crassa,  
ut posset edulis esse. Locis muscosis, initio autum-  
ni. (v. ic.)

9. *A. miculatus*, pileo granulato-squamoso cinereo-  
livido, disco umbrino, lamellis adfixis distan-  
tibus lacteis, stipite farcto æuali fibrilloso.  
*Fries Obs. 2. p. 120. A. granul.* *Schæff t. 21.*

Stipes demum cavus, 2-3 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. et  
ultra crassus, albido-fuscescens. Pileus planus, 3-4  
unc., glaber, (hinc humidum viscosum suspicor).  
Lam. subadnatae, 2-3 lin. latæ. In quercetis alibique  
raro, Aug. Sept. (v. v.)

\*\*\*\* 10. *A. portentosus*, pileo umberato lavi visci-  
do, lamellis emarginatis latis stipiteque solido  
æuali glabro candidis.

Magnus, subcæspitosus, *A. tumidi* var.? Melius  
certe inter Trichol. spuria militaret; sed obstat  
pileus viscosus. Stipes 4-5 unc. longus, 1 unc. cras-

sus, basi villosus. Pileus leviter carnosus, demum planus, 4-5 unc., cinereo et violaceo variegatus. Lam.  $\frac{3}{4}$  unc., latæ. In pineto denso montoso semel Oct. (v. v.)

Differt cum sequentibus duobus ab antecc. pileo lavi lurido, lamellarum habitu et præcipue velo tenui, mox obsoleto.

II. *A. fucatus*, pileo flexuoso virgato viscido lurido, lamellis emarginatis latis stipiteque solido subsquamuloso flavescenti-albis.

Sapor mitis. Stipes difformis; sœpius curtus, bulbosus, raro elongatus. Pileus disco carnosus, margine tenuis, 2-3 unc., glebulis sape inquinatus. Lam. 4 lin. latæ, subconferte. Siccus nitet. In pinetis siccis & viarum arenosarum marginibus, frequens. Sept. Oct. (v. v.)

12. *A. luridus*, pileo flexuoso glabro e virescente-subcinereo, lamellis emarginatis angustis lutescentibus, stipite solido squamuloso pallescente. Schœff. t. 69. Pers. Syn. p. 381.

Ex habitu huc locavi, non reperi. Subgregarius, magnitudine mediocri. Stipes 1-2 unc. longus, crassiusculus, inæqualis, varie adscendens; variat cinereus et maculis rubellis variegatus. Pileus luridus, pallidus, subinde sordide rubescens. In pinetis. Sept. Oct. (v. ic.)

†† TRICHOLOMATA GENUINA (13-24).  
Pileus semper siccus, squamosus (rarissime lavis), margine juniori involuto tomentoso l. villoso Lam. liberæ l. emarginata. Stipes subsquamulosus, a pileo subdiscretus. — *Aman. punctata* Lam. Enc. 1. huc spectat. In regionibus silvaticis, præcipue pine-tomontanis. (*A. miculatus* n. 9.)

Congruunt inter se spec. 13-15 (compactæ) pileo carnose obtuso, sape flexuoso, squamulis obsecce!, lamellis confertis flavescentibus, stipite firmo

squamuloso; spec. 16-18 (*squamosæ*) pileo minus compacto obtuse umbonato, squamis innatis! (non adflatis quasi) lacerato, lamellis vix confertis albis, stipite farcto l. cavo squamuloso-fibrilloso etc.; spec. 19-21 (*squamulosæ*) pileo tenui obtuso fibrilloso l. minutis squamulis tecto, lamellis sordidis, stipite solido fibrilloso; spec. 22-24 (*calvæ*) pileo vere carneso, glaberrimo nec nisi rimoso-squamoso, lamellis, stipite plerumque glabro etc.

- \* 13. *A. luteo-virens*, pileo compacto flexuoso pulverulento lutescenti-viridi, lamellis rotundatis pallidis, stipite solido brevi squamuloso albo. A. S. p. 168.

Substantia dura. Stipes 6 lin. longus, totidemque apice crassus, deorsum attenuatus. Pileus 2—2  $\frac{1}{2}$  unc., sape anomale rimoso-tessulatus, pulvere tenui tectus; tomento marginali albo. Lam. lineares, vix adnexæ. In pinetis siccis Lusatiae. Sept. Oct.

14. *A. flavo-virens*, pileo compacto flexuoso subsquamoso flavo-rufescente, lamellis emarginatis confertis stipiteque solido squamuloso sulphureis.

Buxb. Cent. IV. t. 10. A. equestris. Linn. Suec. 1219. A. aureus. Schaff. t. 41. A. luteus. Batsch. A. flavo-virens. Abb. d. Schw. — Pers. Syn. p. 319.

Statura A. pessundati. Sapor mitis. Stipes brevis, uncialis et ultra, crassus, durus, intus albus. Pileus difformis, etiam depresso, siccus, fulvo l. fusco-flavus, tempestate hiemali virescens, 3-5 unc. — Occurrit tenuior, stipite 2 unc. longo, pileo regulari æqualiter squamoso etc. In pinetis siccis & ad viarum margines, glebulis inquinatus, ubique. Sept.—Dec. (v. v.)

15. *A. rutilans*, pileo obtuso sicce flave, villo squamuloso rubello tecto, lamellis rotundatis confertis luteis, stipite subfarcto variegato,

*Buxb. Cent. V. t. 46. Ag. n. II. Dörr. 'Nass. p. 315.*  
*A. rutilans. Schæff. t. 219. Pers. Syn. p. 320. A.*  
*aurantiac. a. Batsch. A. variegatus. Schum. p. 294.*  
*A. xerampel. Sowerb. t. 31.*

b. *Monomyces flavo-rufus. Batt. t. 15. f. F.*

Stipes firmus, inæqualis, in majoribus bulbosus, pileo concolor. Pileus vere carnosus, sed non durus, 2-4 unc. latus, junior purpureus, dein villo secedente magis flavus. Caro flava. Lamellæ latæ, liberæ, dein flocculoso-serratæ. — *Icon Fl. Dan. t. 1610 lamellas male adnatas sistit, inde et ob situm epixylum A. lateritio similior. Ag. xerampel. Swartz l. c. p. 83. pileo viscoso, sporidiis brunneis perperam describitur. Pessime pro vero A. cæsareo habet Withering. In silvis, locis cœduis, circa truncorum radices &c. frequens. Aug.-Oct. (v. v.)*

\* 16. *A. imbricatus*, pileo sicco squamuoso umbrino rufo, margine pallidiori pubescente, lamellis albido-rutilis, stipite farcto, apice albo-pulverulento. *Fries Obs. I. p. 27.*

Hallerus solus (*helv. n. 2438*) a sequente rite distinxit. Major, firmior, habitu Boleti. Stipes inæqualis, attenuatus, rufescens. Pileus 2-4 unc. latus, convexus, obtusus; dein planus valde obtuse umbonatus, rimuloso-squamosus. Lam. latæ, confertiusculæ. In umbrosis totus pallescit. *In Smolandia in silvis, ericetis; Hollandia ad vias; in Scaniæ campestris graminosis. Aug.-Nov. (v. v.)*

17. *A. vaccinus*, pileo umbonato rufo, epidermidè squamis pilosis lacerata, margine tomentoso, lamellis adfixis albido-rutilis, stipite cavo fibriloso.

*Hall. helv. 2400. A. vaccinus. Schæff. t. 25. Pers. Syn. p. 293. Fries Obs. 2. p. 126. A. impuber. Batsch. Cont. 1. f. 216. A. rufus. Pers. ic. & descr. t. 4. f. 4.*

Stipes 3 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, subinde ventricosus, rufus; velo lanuginoso. Pileus 1-2 unc. vix ultra, squamis adpressis, junior campanu-

latus. Caro tenuior. Lamellæ fere adnatæ, subdistantes. In pinetis montosis, locis subhumidis & declivibus, non rarus, serotinus. (v. v.)

18. *A. polyphyllus*, pileo obtuso, margine revoluto, squamis adpressis nigro-fuscis, lamellis irregularibus albis stipite solido? apice striato, basi minute squamuoso. — *Decand. fr. 6. p. 50-*

Aptiorem locum adsignare non potui. Stipes 12-18 lin. longus, 3-4 lin. crassus, æqualis, cortina araneosa alba, rupta persistens, etiam ad marginem pilei adpendiculata. Pileus convexo-planus orbicularis, etiam centro depresso, 2-3 unc. latus, squamis mollibus, marginem versus imbricatis. Lam. angustæ, numerosæ, 15-16 usque breviores inter integras, sepe interruptæ. *In cortice vapor. Horti Monspel.*

- \*\*\* 19. *A. gausapatus*, pileo obtuso repando seticeo-fibrilloso cinereo, lamellis emarginatis confertis griseis, stipite solido fibrilloso candido.

Similis *A. virgato*, at distinctissimus. Odor et sapor nullus. Stipes æqualis, 1  $\frac{1}{2}$  — 2 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus et ultra. Pileus leviter carnosus, junior campanulatus, 2.3 unc.; fibrillis superficialibus, non nigris; Oris primo tomentosis. Lam. liberae, 2 lin. latæ. *Inter nemorum gramina prope Lund, Malmö etc. Oct. (v. v.)*

20. *A. opicus*, pileo obtuso sicco squamuoso griseo, lamellis emarginatis distantibus canis, stipite fibrilloso-squamioso cinereo. *Fries. 2. p. 112.*

Stipes  $\frac{1}{2}$  — 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 2-3 lin. crassus, fragilis. Pileus e convexo-explanatus, obsolete umbo-natus, 1 — 1  $\frac{1}{2}$  unc. latus, junior subglevis. Lam. ventricosæ. Odor nullus. *In silvaticis mixtis Smolandiæ raro. Aug.-Oct. (v. v.)*

21. *A. atro-virens*, pileo tenui obscure viridi, squamuulis scabro, lamellis pallidis, stipite solido longo nigricante. *Pers. Syn. p. 319.*

Stipes 4 unc. longus, 1 unc. crassus. Pileus flexuosus, demum subfatiscens, 3-4 unc. Hac Persoon, e quibus affinitas cum n 19 et 20 patet. — Singulo fere verbo, pileo subfatiscente excepto, quadrat in varietatem sequentis, similibus locis a me lecta. In fagetis rarius.

\*\*\*\* 22. *A. Myomyces*, oolidus, firmus, pileo sicco glabro subsquamuloso fusco-livido, lamellis e. marginatis subdistantibus albidis, stipite solido inæquali.

**a. terreus.** Schæff. t. 64. Sowerb. t. 76. *A. lividus*. Huds. p. 616. *A. pullus*. a. g. Batsch. *A. madreporeus*. Batsch. Cont. 2. f. 203. *A. myomyces*. Pers. Syn. p. 345? *A. fusiform*. Schum. p. 318. *A. saponac*. Fries Obs. 2. p. 191.

**b. pileo albido, squamis obscurioribus.** *A. argyrae*. Bull. t. 423. f. 1., 513. f. 2. Dec. Fr. 2. p. 190.

Valde variat. Stipes compactus, 2-3 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, intus albus, dissecitus hinc inde testaceo-rubescens!; fibrillosus, subinde squamosus. Pileus subirregularis, convexo-explanatus, 2-4 unc., velo (Pers. disp. p. 20) tenui. Variat albus, lividus, fuscus; obtusus et umbonatus; lavis et squamulosus. Odor murinus. In pinetis ubique, fagetis passim. Oct.-Nov. (v. v.)

**β. myomyces alter**, lamellis luteis.

Eisdem de cetero ac α. occurrit formis, inter quas *A. albo-umbrinus* Schum. p. 337. Stipes lutescens, nunc glaber, nunc nigro-squamosus. In nemoribus Sept.; copiosius in pinetis ad Skärstad. Jul. Aug. 1817. (v. v.)

23. *A. Columbetta*, candidus, pileo irregulari, demum sape rimoso-squamoso, lamellis emarginatis confertis, stipite solido obeso glabro.

**a. Columbettes.** J. Bauh. XL. c. 17. Chabr. Ic. p. 581. Ag. spec. 22. Gled. p. 118. *A. albus*. Pers. excl. syn. *A. S.* p. 181.

**b. A. leucoceph.** Bull. t. 428. f. 1, 536.

Inodorus, s<sup>æ</sup>p<sup>e</sup> rubello-maculatus; b. etiam lutescens. Stipes compactus, l<sup>e</sup>vis, 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, raro productus,  $\frac{3}{4}$  — 1 unc. crassus. Pileus subdiscretus, flexuosus, convexo-explanatus, 2-3 unc. latus, margine juniori tomentoso. Lam. subliberæ, 3 lin latæ. Edulis. *Inter Ericas & gramine, locis sabulosis, passim. Aug.-Oct. (v. v)*

24. *A. maculatus*, subcæspitosus, candidus, rufescenti-maculatus, pileo compacto l<sup>e</sup>vi, lamellis emarginatis, stipite farcto longo glabro. *A. S. p. 186.*

E majoribus. Stipes 3-4 unc. longus, 4-6 lin. crassus, æqualis l. deorsum attenuatus, demum caviusculus, nudus, sub-striatus; sed a sequ. sectione margine juniori tomentoso recedit. Pileus hemisphæricus, dein planus disciformis, 5-4 unc. latus et ultra, post pluvias dilute rufescens. Lam. angustæ, confertissimæ. *In pinetis Lusatiae, locis subhumidis muscosis, præcipue Sphagnosis, copiose. Sept. Oct.*

††† TRICHOLOMATA SPURIA (25-36.) Pileus semper siccus, l<sup>e</sup>vis, glabriuscus; sed s<sup>æ</sup>p<sup>e</sup> virgatus l. fibrillosus, margine nudo!, mox evoluto. Lamellæ liberae l. emarginatae. Stipes solidus, validus, glaber, striatus!, a pileo discretus. Rigi, silvestres, plures Meteorici & Eur. austr. privi. (A. portentos.)

Obs. Statura plane antecc.; sed velum aut nondum observatum, aut cum ipso fungo concretum, tum fibrillæ in strias abeunt, ut in spec. variis observatur. Lamellæ multis latæ fragiles, Russularum instar. Primo attuli species (25-27) pileo compacto nudo; mox (28-30) variegato l. subfibrilloso; dein (31-33) lineolis nigricantibus virgato, tenuiori; tandem (34-36) tenuiori, unicolori, lurido.

\* 25. *A. graveolens*, pileo crasso subhemisphærico glabro fuligineo-cinereo, lamellis emarginatis

confertis sordide albis, stipite solido rivuloso.  
Pers. Syn. p. 361.

Sapore et odore fortis, et gravis quoad pondus.  
Stipes albidus, externe quasi fibrillosus. Pileus 2 unc. fere latus, 3-4 lin. crassus, superficie quasi rivulosus. Lamellæ dilute fuligineaæ, angulo acuto versus stipitem prominente. *Graminosis Germaniae.*

26. *A. canaliculatus*, pileo lavi glabro cinereo-livido, lamellis truncatis confertis luteis, stipite solido bulboso cinereo-striato. Schum. t. c. p. 331.

Stipes 3 unc. usque longus, 1 unc. et basi ultra crassus, albus. Pileus primo globosus, dein convexus, 3 unc. Lam. angustissimæ, canalicul. stipitem circa formantes. In fagetis Daniae. Oct. (v. ic.)

27. *A. cartilagineus*, pileo subundulato glabro nigrescente, lamellis subliberis alutaceis, stipite solido æquali rufescenti-striato. Bull. t. 589. f. 2. Pers. p. 356. Decand. fr. 2. p. 188.

Solitarius, compactus Stipes 1  $\frac{1}{2}$  unc. et ultra, 4 lin. crassus, albidus. Pileus 2-3 unc., convexus, difformis. Lam. 3 lin. latæ, postice latiores. In Gallia. (v. ic.)

\*\* 28. *A. frumentaceus*, pileo convexo obtuso glabro rufescente-vario, lamellis liberis lutescentibus, stipite solido æquali rufo-striato. Bull. t. 371. f. 1. Decand. p. 187.

Affinis videtur *A. Myomyci*, (junior forte margine villosus). Color lutescens. Stipes 2 unc., carnosus, crassus. Pileus 2-3 unc., demum etiam leviter depresso. Gregarius. In Gallia. (v. ic.)

29. *A. phajocephalus*, pileo campanulato subreundo badio fibrilloso, lamellis liberis lutescentibus, stipite solido tuberoso fuligineo, lituris rufis. Bull. t. 555. f. 1, Pers. Syn. p. 302. Decand. p. 186.

Stipes 4 unc. longus, basi albicans. Pileus late umbonatus, 3 unc. usque latus, leviter sericeus. In Gallia. (v. ic.)

*B. furvus*, lamellis albidis, stipite æquali. Fr. Obs. 2. p. 126.

Priori de cetero simillimus. In Scania semel. Oct. (v. v.)

30. *A. æstuans*, pileo umbonato sicco flavo-rufescente, versus marginem fibrilloso, lamellis emarginatis latis stipiteque farcto striato luteis.

Elegans, sapore maxime ureanti. Stipes 3 unc. longus, 3-6 lin. crassus, subventricosus, sursum attenuatus, obsolete fibrillosus, intus albus. Pileus leviter carnosus, junior glandiformis, mox campanulatus, dein explanatus, fragilis, 3-4 unc. latus, versus marginem tenuem subirregularē fibrillis concoloribus. Lamellæ fere liberæ,  $\frac{1}{2}$  unc. late. Similis *A. sulphureo*, sed colores intensiores. In colliculosis muscosis sub Abietibus densis, gregarie. Aug.-Sept. (v. v.)

\*\*\* 31. *A. sejunctus*, pileo subumbonato sicco flavo, pilis nigris virgato, lamellis emarginatis latis stipiteque solido candidis. Sow. t. 126.

Huc etiam *A. leucoxanthus* Pers. Syn. p. 319. et *A. candidus* Schäff. t. 225, ut varietates. Sapor amarus. Stipes 2-3 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, subequalis, glaber, striatulus. Pileus 3 unc., albus, pallidus l. plerumque flavus. Lam. fragiles, subdistantes. In pinetis siccis ericetosis. Sept. Oct. (v. v.)

32. *A. hordus*, pileo fragili sicco virgato lurido, lamellis emarginatis latissimis stipiteque farcto æquali striato candidis.

Valde affinis antecedenti. Subcæspitosus, sapore grato. Stipes validus, 3-6 unc.,  $\frac{1}{2}$  — 1 unc. crassus, glaber. Pileus leviter carnosus, convexus, explanatus subinde umbonatus, 3-4 unc. latus, opa-

cus. Lam. ventricosæ,  $\frac{3}{4}$  unc. latæ, confertæ. In nemoribus silvaticis Scaniæ, præcipue Oct. (v. v.)

33. *A. virgatus*, pileo umbonato sicco griseo nigro-virgato, lamellis emarginatis latis canis, stipite solido striato albido. *Fries Obs. 2. p. 113.*

A præcedentibus diversissimus. *A. atrociner.*  
*var. A. S. p. 175 h. 1. Sapor felleus, æstuans. Stipes*  $\frac{3}{4}$  unc. longus et ultra,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, æqualis 1. ipsa basi tuberosa. Pileus convexus, 2-4 unc., lineolis confertis. *In ericetis sabulosis sub pinubus & betulis frequens, appriune Sept. (v. v.)*

- \*\*\*\* 34. *A. urbus*, pileo tenui subumbonato fusco-coeruleo, lamellis subattingentibus albido-coeruleis, stipite solido, supra bulbum coeruleo-striato. *Schum. l. c. p. 333. (A. incurvus)*

Affinis *A. portentoso*. Stipes incurvus, albidus, inferne  $\frac{3}{4}$  unc., superne 2 lin. crassus, 2 unc. et ultra longus. Pileus campanulatus, striis obscurioribus interruptis variegatus,  $1\frac{1}{2}$  unc latus. Caro pilei coerulescens. Lam. lata. *In Dania in humo truncorum. Sept. (v. ic.)*

35. *A. tumidus*, pileo obtuso lævi sicco cinereo, lamellis emarginatis latis, stipiteque solido tumido striato candidis. *Pers. Syn. p. 350. Fries Obs. 1. p. 17.*

Stipes ventricosus, crassus,  $\frac{3}{4}$  unc. et ultra, subradicatus. Pileus convexo-planus, 3-4 unc. latus, glaber. Sapor mitis. *In silvis perraro. Sept. (v. v.)*

36. *A. multicolor*, pileo convexo-plano lævi fuligineo-cinereo, lamellis rotundatis pallidis, stipite solido subbulboso candido. *Pers. l. c.*

Magnus. Stipes 4 unc. longus, 1 crassus, fibrillosus (striatus?). Pileus 4 unc. latus. Lamellæ subadnexæ,  $\frac{1}{2}$  unc. latæ. Ob staturam, stipitem candidum etc. in hac, nec seq. sectione locavi. *In Germaniae silvis.*

††† TRICHOLOMATA PERSONATA (37-48).  
 Pileus semper siccus, lœvis, glaberrimus; *margine tenui inflexo flocculoso-pruinoso*. Caro mollis. Lamellæ subrotundatæ, confertæ, antice evanescentes! Stipes nunc apice squamosus (37-39), nunc villosopulverulentus (40-45), nunc nudus glaber (46-48); in pileum magis diffusus, inde lamellæ in senescentibus spurie decurrentes apparent. *Plerumque serotina, locis graminosis campestribus obvia.*

\* 37. *A. molybdinus*, subcæspitosus, pileo subumbonato glabro fusco-cinereo, lamellis rotundatis latissimis stipiteque solido apice squamoso griseos pallidis. *Bull. t. 523.*

Est *A. molybdocephalus* Bull. Dec. fr. 2. p. 181. *A. œneus* Pers. Syn. p. 502. Stipes 4-6 unc. longus, 1 unc crassus, firmus, flavescens, basi lœvis. Pileus 5-6 unc. latus, carne pro tanta latitudine tenui. Lam. 1 unc fere latæ. *In Gallia - Germaniaæ pinetis prope Halam.* Sprengel. (v. ic.)

38 *A. acerbus*, subcæspitosus, pileo obtuso glabro helvole, lamellis emarginatis angustis pallidis, stipite solido subbulboso punctato-squamoso. *Bull. t. 571. f. 2. Dec. fr. 2. p. 175.*

Stipes 2 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. et ultra crassus, flavescens, squamulis nigris. Pileus convexus orbicularis, 4 unc. latus. Lamellæ confertæ, postice attenuatæ, demum (Cf. supra) spurie decurrentes. *In Gallia.* (v. ic.)

39. *A. decastes*, subcæspitosus, pileo glabro inæquali cinereo, lamellis rotundatis albis, stipite solido apice albo-pulverulento. *Fries Obs. 2. p. 105.*

*A. fumoso revera affinis*, sed pileus compacter. Stipes 3 unc. et ultra longus, æqualis, albus. Pileus sape sinuatus, expallens, margine te-

zui. Lamellæ latiusculæ, confertæ. *A. cinerascens.* Bull. t. 428. ab hoc distinguere nequeo, sed habitus (subalutaceus) recedit. Variat lam. emarginatis stipite fere nudo. In fagetis & quergetis. Aug. Sept. (v. v.)

\*\* 40. *A. dasypus*, subcæspitosus, pileo compacto glabro murino, lamellis emarginatis stipiteque solido tonientoso candidis. Pers. Syn. p. 348.

Vidi quidem antecedentis specimina in hujus characterem quadrantia. Obs. Myc. l. c.; sed Persoonii fungus odore et sapore forti, amaricante insuper distinguitur. Pileus 3 unc., durus, nonnumquam eleganter tessulatus. Lam. 3 lin. lata. Stipes tenax, 2 unc. *Ad trunco! quercinos.*

41. *A. gambosus*, subcæspitosus pileo compacto undulato glabro alutaceo, lamellis emarginatis stipiteque solido apice villoso albidis. Clus. p. 264. 3.

Statura A. pessundati; sed pileus siccus, mollius, maculatus, demum etiam rimosus, irregularis. Lamellæ liberae, 2-3 lin. latæ. Stipes 2 unc. et ultra longus,  $\frac{1}{2}$  — 1 unc. crassus, basi subcurvatus. Hunc pro vero *A. Georgii*, quo nil magis confusum, et ob odorem farinæ recentis edulem suspicor. Solo calcareo, in pratis ex. gr. ad Limhamn prope Malmö. Mayo, Jun. (v. v.)

42. *A. personatus*, pileo subcompacto glabro, margine villose-pruinoso, lamellis rotundatis liberis stipiteque solido subbulboso villoso subviolaceis. Fries Obs. 2. p. 89-91. cum var.

Fungus cœruleus major. Buxb. Cent. IV. p. 7. t. 11.

*A. bulbosus*. Huds. II. p. 611. Bolt. t. 147. *A.*

*violaceus*. Scholl. Supl. p. 344 Vill. Delph. p. 1020.

*Fl. Dan.* t. 1133. Sowerb. t. 209 — forma: *A. bicolor*. Pers. Syn. p. 281.

Proteus hujus sectionis. Stipes validus, 1.3 unc. longus, 1 unc. fere crassus, junior totus squamuloso-villosus, dein vero nudus fibrillosus. Pileus

obtusus, lœvis, contiguus, 2-6 unc. ; variat violaceus, purpureo-lilacinus, hepaticus, lividus, albidus. Lamelle latæ, confertæ, violaceæ, variant incarnatae et albidæ. In nemoribus, hortis alibique locis graminosis, ubique. Sept.-Nov. (v. v.)

Commentationem peculiarem hujus formæ et varietates merentur. b.) *sævus*, omnium maximus, pallide fuscus, margine subnudo, lamellis aquose fuscis stipite fibrilloso sulcato longo, basi albo-tomentoso-sistit indiv. gigantea in statu senescenti, vulgaria Novemb. circa Lund. Stipes enim demum flocculos secedit; indeque *A. tyrianthinum* Fr. l. c p. 91 et *A. Bissettam* (album) distinguere non audeo. — Sequentes 3 spec. pileo tenui dignoscuntur.

\*\*\* 43. *A. sordidus*, cœspitosus, pileo obtuse umbonato glabro umbrino-fusco, lamellis rotundatis dilute violaceis, stipite solido lœvi subbulboso. Schum. l. c. p. 541.

Stipes 2 unc. et ultra longus, superne 3, inferne 4  $\frac{1}{2}$  lin. crassus, pileo concolor. Pileus 2 unc. latus, margine involuto subrepando obscuriori. Caro violacea. In sterquilinio repertus. Jul. Aug. (v. ic.)

44. *A. humilis*, pileo planiusculo molli fuscescente, lamellis rotundatis albidis, stipite farcto brevi æquali pulverulento-villoso.

Fungus superficie murini coloris &c. Raji Hist. III, p. 19. Buxb. Cent. JV. t. 31. f. 1. A, hum. Pers. syn. p. 360. Fries Obs. 2, p. 111.

Vulgaris, indeque variabilis. Gregarius, sœpe cœspitosus. Stipes 1-2 unc. longus, 4-6 lin. crassus, fragilis, cinerascens. Pileus 2-5 unc., lœvis, subrepandus, nunc umbonatus, nunc depresso; nigricans, fuscus, lividus, pallidus. Lam. 2-4 lin. latæ. Margo, stipes et lamellæ antice evanescentes summam cum A. personato indicant affinitatem; car-

ne molli etc. ad A. melaleucum accedit. Var. tota fragillima, pileo flavescente, stipite fibrilloso notabilis. In arvis, areis hortorum, pratis & collibus. Sept.-Nov. (v. v.)

45. *A. oreinus*, pileo convexo glabro fusco-livido, lamellis liberis albis, stipite solido pallido, apice albo-pulverulento. *Fries l. c. p. 98.*

Minimus in hac tribu, stipite unciali basi in-crassato; pileo unciali obtuso. Sat firmus. In montibus ericetosis Hallandiae, Oct. (v. v.)

\*\*\*\* *Heteroclitii*, pileo tenui, planiusculo, margine infexo stipiteque subnudis. — Velum tamen non plane desideratur! Simillimi Clitocyb. \*\*\* Omphaliisque \*\*; vix nisi lamellis rotundatis diversi. (*A. metachrous.*)

46. *A. nudus*, gregarius, pileo tenui glabro lilacino-rufescente, lamellis rotundatis dilute violaceis, stipite solido æquali nudo.

*Fung. cœrul. minor. Burb. l. c. t. 12. f. 1. A. nudus. Bull. t. 439. Pers. Syn. p. 277. Dec. fr. 2. p. 195. b. A quadrifarius. Schum. p. 295.*

Stipes 2 unc. longus, 3-4 lin. crassus, lævis, glaber. Pileus leviter carnosus, obtusus, 2 unc. et ultra, planus; etiam depresso et undulatus. Lamellæ latiusculæ, confertæ. Variat magnitudine, colore ochraceo-violaceo, rufescente, violaceo-fuscescente, margine substriato. A. S. p. 152. In silvis; in Suecia magis in hortis & graminosis. Sept.-Nov. (v. v.)

47. *A. persicinus*, pileo obtuso glabro incarnato, lamellis rotundatis albis, stipiteque cavo aqua-li glabriusculo pallido.

Caute inquirenda species ob similitudinem cum A. diatreto, metachroo incarnato aliisque. Stipes 2 unc. longus, 3 lin. crassus, apice sæpe pruinatus. Lamellæ valde confertæ, liberae, planæ, li-

neares. Pileus planus. uncialis et ultra. In graminosis muscosis perraro. Aug.-Oct. (v. v.)

48. *A. albus*, albus, immaculatus, pileo æquali glabro, lamellis rotundatis confertis, stipite farcto elasticœ. Schæff. t. 256?

Stipes glaber, sæpe interrupte striatus, 2-3 unc. longus, 4 lin. crassus, basi vix incrassatus. Pileus dein planus, 3 unc. circiter. Lam. confertæ, latitudine æquali, demum pro more spuriæ decurrentes. In nemoribus & quercetis, solo humoso. Sept.-Nov. (v. v.)

Almas sectionum, subdivisionum et specierum analogias loci angusties exponere vetat. E dispositione ipsa satis, et cuique observatori in natura præcipue patent. Æqualis vero specierum in omni sectione numerus neutquam definitus; sed e casu mere pendet. Transit hæc tribus ad Russulas, Clitocyb. et Omphal.

### Spec. inquirendæ:

1. Fung. nox. gen. 9. Clus. l. c. Affin. A. pessund.
2. Fungus major aureus perniciousus. Buxb. Cent. IV. p. 22. t. 33. "vellere pilei fusco-luteo subhirsuto."
3. Leucosphæroceph. Batt. p. 32. t. 7. D.
4. Sphæroceph. Batt. l. c. t. 8. f. F. Pileus rufus, compactus, non lævis. Lam. confertæ.
5. Myomyces pedunculo lemniscato. Batt. p. 48. t. 7. D.
6. A. variegatus. Scop. p. 434. A. rutilanti minor, lamellis albis.
7. A. tigrinus. Schæff. t. 89. A. frittilarius. Batsch. Pileus canus, undulatus, maculis obscurioribus. Lamellæ sordide albæ. Stipes brevis bulbosus.
8. A. mutabilis. Schum. l. c. p. 54!. Similis A. nudo. An Leucosporus?
9. A. splendens. With. p. — Pileus conicus, splendens, Lam. liberæ albæ. Stipes solidus albus.
10. A. brevipes. Bull. t. 521. f. 2. Pers. Syn. p. 360. Simillimus A. curtiped. (vide infra); sed lam. emarginatæ-anvelatus?

Erroneæ icones: *Fungi Georgii*. Antiquor. *A. multiformis* Schæff. t. 14. ad A. Myomyc. *A. serratis* Bolt. t. 14. ad A. rutilantem spectat. *Ag. xerampelinus* Schæff. t. 214, 25 & *olivaceus* Ejusd. ad primam Russulæ speciem pertinere videntur.

---

### Trib. VI. RUSSULA.

**Fung. esc. gen. XIII. Clus. Fung. umbilicum** refe-  
rens variegat. *Bauh. pin.* p. 370. *Omphalom. sp.*  
*Bait.* p. 36. *Ag. sp. X. d. Gled. meth.* p. 100. *Ain.*  
*Hall.* n. 2374. *A. integer.* *Linn.* & *Auct.* *A. Russu-*  
*la.* *Scop.* p. 435. *A. pectinaceus.* *Bull.* t. 509.  
*Russula. Pers. Obs.* 1, p. 100-105. *Nees Syst.* p. 199.

**CHAR.** Velum plane nullum. Stipes æqua-  
lis, lœvis, glaber, validus, intus spongiosus. Pile-  
us disco carnosus, margine tenuis, junior campa-  
nulatus, mox hemisphæricus, dein planus, centro  
depressus, nudus, glaber; epidermide irrigata vi-  
scosa. Margo ne in. prima umquam infantia in-  
volutus. Caro firma, exsucca, alba, contextu  
subvesiculoso. Lamellæ exsuccæ; l. omnino æqua-  
les l. brevioribus irregulariter immixtis, subinde  
furcatæ, crassiusculæ, rigido-fragiles, antice latio-  
res; postice attenuatæ, acutæ, proprie liberæ; sed  
ob stipitem in pileum diffusum spurie adnato-de-  
currentes apparent. Asci tenues, sporidiis sub-  
ochraceis l. albis. *Color lamellarum albus l. luteus,*  
*stipitis subalbus.*

**Obs.** Fungi majores l. medii, rigidi, persi-  
stentes, solitarii, terrestres, æstatis fine præcipue  
obvii. Color pilei quam maxime varius, nec ad  
varietates, multo minus species distinguendas va-  
let. Nomen a colore *russulo* originario fixit Sco-  
poli; verum vero characterem primus vedit Rajus.  
Inter avelatos cum Amanita, prima velatorum tri-  
bu, analogi. Cf. Charact.

\* *lamellis omnibus æqualibus, sporidiis lutescen-*  
*tibus. Mites, esculenti. Stipes albus, variat flavus,*

2. *A. alutaceus*, pileo subcompacto, margine demum sulcato, lamellis latis æqualibus alutaceis.
- a. pileo rubro. Fung. esc. sp. 3. *Magn. Bot.* p. 103. *Batt.* t. 15. C. Schæff. t. 16. f. 6. *Bull.* t. 509. Q. *Scop.* l. c. g. *A. camp.* & *alutac.* Pers. *Syn.* p. 440, 441. *Fries Obs.* 1. p. 71.
  - b. pileo griseo-purpurascente. *Omph. sordidus*, *Batt.* p. 37. *A. griseus*. Pers. p. 445.
  - c. pil. cœruleo. *A. cœruleus*. Pers. l. c.
  - d. pil. olivaceo. *A. olivac.* Schæff. t. 204? Russ. *Pers. Obs.* 1. p. 103. Ag. *olivace.* *Syn.* p. 447.
  - e. pil. vitellino. *A. ochraceus*. Pers. *Syn.* p. 443.

Major, saepe miti grato. Stipes firmus, crassus, plenus. Pileus saepe viscosus, margine demum subtuberculatus. Lam  $\frac{1}{2}$  unc. usque late, venoso-conjunctæ, juniores concretæ. Formas allatas synonymorum caussa citavi, de cetero quovis occurrit colore, exalbicante, crustallino, fusco, viridi etc. *In silvis nemorosis.* Aug. Sept. (v. v.)

*B. xanthopus*, stipite flavo. *Fries l. c.*

Magnus. Colore variat, ut antecedens, rubro (*Russ. l. Ag. esculentus* Pers. l. l. c. c.), fulvo (*Russ. l. Ag. aureus* Pers. l. l. c. c., *A. auratus* With.) crustallino, olivaceo etc. Utraque varietas deliciosa. *Cum priori.* (v. v.)

2. *A. luteus*, medius, pilei margine lœvi, lamellis angustis confertis aequalibus vitellinis.

*A. inanis*. *Scop. Carn.* p. 441. *A. luteus*. *Huds.* II. p. 611. Pers. *Syn.* p. 442. *A. S.* p. 213. *A. leucotheus*. *Fries Obs.* 1. p. 66.

Species elegans, fragilis, saepe miti. Stipes subcavus, tenuis, 1  $\frac{1}{2}$  unc longus, albus. Pileus plano-depressus, subviscosus, 1-2 unc. latus, flavus, expallens, raro albus. Lamellæ venoso-connexæ. *In fagetis, alibique Aug. Sept. (v. v.)*

3. *A. nitidus*, pileo tenui, margine sulcato, lamellis latis subdistantibus æqualibus flavis.

- a. pileo purpurascente, rufo. *A. purpur.* Schäff. t. 254. *Ag. nitidus, purpureofulig.* Pers. Syn. p. 444.
- b. pileo subolivaceo. *Ag. nauseosus.* Pers. Syn. p. 446.
- c. pil. luteo, subincarnato. *A. risigallinus.* Batsch. Cont. 1. f. 72. *Russul. crocea.* Pers. Obs. 1, p. 101. *A. vitellinus.* Pers. Syn. p. 442.

Antecedentibus minor, fragilis, sapore non quidem acri, sed subnauseoso. Stipes spongioso-farctus, 1 unc. longus, tenuis, albus l. flavescens. Pilus disco, saepe obscuriori, carnosus; margine membranaceus, subtuberculatus; planiusculus, depresso, 1 — 1  $\frac{1}{2}$  unc. latus, quovis colore gaudens; saepe difformis. Lamellæ venoso-connexæ, nitidæ. In silvis, frequens. Aug.-Oct. (v. v.)

4. *A. decolorans*, pileo lavi rubro, dein aurantiaco, lamellis subfurcatis albidis, dein flavescentibus, stipite elongato, intus dein cinereo. Mich. p. 155. n. 1.

Peculiaris species, sub *A. integro* cum *A. alutaceo* et *emetico* frequenter confusa. Sapor mitis. Stipes 3 unc. et ultra, albus, valde spongiosus. Pileus planiusculus, -siccus, colore non varius, sed mutabilis. Lamellæ confertæ, venoso-connexæ; *A. alutacei*, ut etiam sporidia, pallidiores. Caro dein cinerascit et subinde fungus adustus evadit. In pinetis, passim. Jul.-Sept. (v. v.)

— \* \* lamellis subæqualibus, sporidiis albis. Noxiæ, acres. Stipes albus, variat rubellus.

5. *A. emeticus*, major, pilei compacto margine demum sulcato, lamellis latis subæqualibus candidis.

Fungus major, pediculo longo modice crasso, lamellis albis creberrimis &c. Raji Hist. III. p. 18. Tourn. J. R. H. t. 327. Aman. Hall. 2374. *A. integer.* Bolt. t. 1, (bene) Sowerb. t. 201. *A. pe-*  
*ctin.* Decand. fr. 2. p. 139. exel. &c. Ag. Linnei.  
Fries Obs. 1. p. 67.

- a. pileo roseo, sanguineo, rubro. J. Bauh. XL. c. 11. Læs. Pruss. p. 81. VII. Sterb. t. 22. F. Buxb. Cent. V. t. 47. f. 1. Batt. t. 15. f. E. Bull. l. c. f. O. P. Q. U. A. emeticus. Schæff. t. 15. Krapf. Schw. t. 2. 3. Fl. Dan. t. 1009. A. sanguin. Batsch. El. f. 15. Russ. emet. Pers. Obs. 1. p. 100. Syn. p. 439.
- b. pileo livido, purpurasc., cæsio, cœruleo. Clus. l. c. sp. 2. Ag. cyanoxanthus. Schæff. t. 93. Pers. Syn. p. 445.
- c. pileo fusco, olivaceo, viridi. Clus. l. c. sp. 1. Sterb. t. 5. C. A. virescens. Schæff. t. 94. Russ. lurida. Pers. Obs. 1. p. 103. —
- d. pileo flavo. Buxb. l. c. t. 45. f. 2. A. Georgii. Linn. Bull. t. 509. f. R. Russ. ochroleuca. Pers. Obs. p. 102. Ag. Syn. p. 443.
- e. pileo albo. A. horizontal. Vill. p. 1016.

Statura A. alutacei, sed sapor acris. Stipes firmus, plenus, nec elongatus, intus constanter albus. Pileus 2-6 unc., junior campanulatus, senescens saepe exalbicans; omnicolor est. Lamellæ latæ, subdistantes, venoso-connexæ, constanter candidæ; brevioribus perpaucis. *Omnium frequentissimus in silvis. Æstate & primo autumno. (v. v.)*

*B. fallax*, pileo spadiceo, lamellis stipiteque aquose albidis. Fr. l. c. — In paludosis. (v. v.)

6. *A. felleus*, stramineus, pileo plano, margine demum striato, lamellis confertis subæqualibus pallidis.

Medius, statura A. lutei, a quo vero diversissimus. Sapor valde acris, astuans. Stipes fragilis, subcavus, 2 unc. fere longus, stramineo-albus. Pileus colore constanti, disco vero saepe obscurior, fragilis, margine plerumque lævi! Lamellæ obsolete venis connexæ, paucæ dimidiatae, non candidæ; sed sporidia alba. In fagetis. Aug. Sept. (v. v.).

7. *A. fragilis*, minor, pileo tenui, margine sulcato, lamellis latis simplicibus candidis,

- a. pileo rubro, purpurascente. *A. fragilis*. Pers. Syn.  
p. 440. A. S. p. 212.
- b. pileo flavo, viridi &c. Hall. n. 2376. *A. ochrol.* var.  
A. S. l. c.
- c. pileo albo. *A. niveus*. Pers. l. c. p. 438. Ag. chion-  
neus. Fries Obs. 1. p. 66.

Differt omnino ab *A. emetico*, ut ab *A. alutaceo* *A. nitidus*, cui statura simillimus. Sapor valde acris. Stipes uncialis l. parum ultra, fragilis, plenus. Pileus subirregularis, saepe undulato-difformis, margine tuberculatus. Color plerumque e purpureo exalbicat; vel e variis intertextus. Datur varietas odore et colore ad *A. foetentem* accedens, sed lamellæ aquales. *In silvis minus copiose.* Aug.-Oct. (v. v.)

8. *A. depallens*, pileo difformi opaco expallido, margine demum striato, lamellis distinctis albidis, stipite demum cinerascente. Pers. Syn. (ad partem) p. 440.

Species revera distincta; sed plurimæ species depallentes sunt et cum hac commixta, *A. roseo-  
ceus* Nees Syst. f. 184. hujus formam quoque exhibet. Statura media. Sapor; acritudine inertis, modo nauseosus. Stipes brevis, crassus, deorsum saepe attenuatus. Pileus sordidus, rubello-fuscescens, dein, præcipue disco, expallens; depresso, reflexus, inæqualis; der im etiam lutescens. *In ericetis locisque similibus.* Jul.-Sept. (v. v.)

\*\*\* lamellis furcatis pluribusque dimidiatis. Sporidia alba. Sapor acris, unius speci iners. Venenata.

9. *A. ruber*, acerrimus, pileo roseo-sanguineo, margine lavi, lamellis furcatis candidis.

*A. sanguin.* Bull. t. 42. *A. silvaticus*. Lam. fr. 2. p. 106. *Am. rubra*. Lam. Enc. l. p. 105. Ag. Decand. fr. 2. p. 140. Ag. rosaceus. Rec.

Amarissimus, omnino felleus. Stipes firmus, 2 unc, longus, saepe roseo-tinctus. Pileus compa-

etus, siccus, lœvis, vix fragilis, contextu vesiculoso. Lamellæ confertæ. Secundum Decand. major, lamellæ crassiores et stipes subinde nigro-striatus. *A. rosaceus* l. *Russula rosea* Pers. l. c. ad partem huc spectare videtur. *In silvis, Jul.-Sept. (v. v.)*

**X.** *A. fœtens*, acris, solidus, pileo flavo, margine tuberculato sulcato, lamellis connexis stipiteque cavo albis.

*A. piperat.* Bull. t. 292. *A. fastidiosus.* Pers. in Ust. Ann. 9. p. 9. Russ. *fœtens.* Obs. p. 102. Ag. Syn. p. 445. Dec. fr. 2. p. 139. Fries Obs. 1. p. 73.

Odor fortis, peculiaris, quasi adustus. Totus admodum rigidus. Pileus convexo-depressus, viscosus, plus minus pallidus, 4 unc. et ultra, margine juniori fornicato. Lam. plures dimidiatae, aliæ basi furcatæ. *In silvis, frequens. Aug. Sept. (v. v.)*

**XI.** *A. rectatus*, inodorus, pileo subviridi, margine lœvi, lamellis furcatis candidis.

Burb. Cent. V. t. 47. f. 2. *A. bifidus.* Bull. t. 26. Am. *furcata.* Lam. Enc. l. p. 106. Russ. Pers. Obs. 1. p. 102. Ag. Syn. p. 446. Dec. fr. 2. p. 140.

Amaricans quidem dicitur; sed equidem intertem, modo subnauseosum reperi. Stipes farctus, sat firmus, albus. Pileus junior planiusculus, margine deflexus, dein subinfundibuliformis, viridis. Sequentem varietatis loco tantum pono. *In silvis, varior. Aug. Sept. (v. v.)*

*B. hetero-phillus*, mitis, pileo planiusculo, margine lœvi, lamellis furcatis dimidiatisque candidis.

a. pileo albido. Bull. t. 509. f. L. *A. lacteus.* Pers. Syn. p. 439. *A. S.* p. 212. *A. galochr.* Fries Obs. 1. p. 65.

b. pileo sordide virescente. Bull. l. c. f. M. Russ. ærug. Pers. Obs. l. c. Ag. virescens. Syn. p. 447. Ag. ærugin. Schum. p. 246.

c. pileo livido. Bull. l. c. f. N. Ag. livescens, Batsch. f. 67. *A. lividus,* Pers. Syn. p. 446.

Sapor constanter mitis. Stipes longiusculus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, plenus, firmus, candidus. Pileus piano-depressus, 2-3 unc., disco saepe obscurior, passim peculiari modo rimose-ruguloso. Lam. confertæ, angustæ, venis connexæ. Variat pileo purpurascente, incarnato etc.; sed bene diversus. In ericetis & silvis frondosis, vulgarissimus. Jul.-Nov. (v. v.)

12. *A. consobrinus*, felleus, pileo griseo, margine levavi, lamellis confertis distinctis aliis furcatis dimidiatisve candidis. Fr. Obs. 2. p. 195.

Species valde diversa, *A. adusto* quodammodo affinis. Sapor acerrimus. Stipes validus, candidus, demum cinerascens. Pileus viscosus, etiam olivaceo-griseus, 3 unc. Lamellæ multæ dimidiatae, confertæ nec venis connexæ. In silvis abiegnis densis. Jul.-Sept. (v. v.)

13. *A. adustus*, pileo depresso olivaceo, dein adust-nigrescente, margine levavi, lamellis inæquilibus distantibus albis, stipite solido obeso.

Fung. gen. XIII. sp. 4. Clus. p. 270. & Compil. A. nigricans. Bull. t. 212.; 370. f. 2.; 579. Dec. fr. 2. p. 156. (male sub Pratella.) *A. adustus*, Pers. Syn. p. 459. Fries Obs. 1. p. 78.

Oder debilis, subdulcis. Totus compactus, demum nigrescens. Pileus junior pallidus, humidus viscosus, 3-6 unc. latus, demum diffractus. Caro alba, fracta aut immutabilis, aut passim rubescit. nigrescit. Sequentes varietates totidem forte species. In silvis & ericetis, ubique. Jul.-Oct. (v. v.)

B. lamellis tenuioribus, confertioribus. Batt.

t. 13. C. *A. nigricans* Otto.

γ. *crassus*, lamellis valde distant. *A. S.* p. 220.

δ. *elephantinus*, pileo fusco-luteo, lamellis flavo-albis, stipite solido albo. Bolt. t. 28. Sow. t. 36.

Habitus *A. foetentis*. Stipes basi angustatus, 2-3 unc. longus, 2 unc. crass. Pileus depresso, vi-

scidus. With. l. c. 4. p. 197. excl. syn. In *Anglia*. (v. ic.)

Heteroclita species. "Succus fungi ruber, qui nisi adeo parcus adesset, ad lactifluos referenda foret" A. S. l. c. E charactere ad Clitocyb. pertineret; sed vidi individua lamellis omnibus integris et in quovis individuo unum alterumve paræquale reperitur. In utriusque tribus limine, statura enim omnino Russulæ, optime locata.

Specierum analogiæ evidentissimæ et e dispositione optime patent.

### Spec. inquirendæ:

1. *A. lepidus*, mitis, major, pilei margine lævi, lamellis æqualibus candidis.
2. *A. palomet*. *Thore Chl. Land. Russula Pers. Ch. com. Gymnop. Dec. fr. 6. p. 49.* Pileus tenuis, fragilis, margine albus, disco rubens. Odor saporque grat. Circa Dax.
3. *A. albus acris &c.* *Gled. p. 99.* Vid. infr.

*A. Kremlinga* ad formas vagas pertinet virides. De *A. rosaceo* & depall. vide supra. Occurrunt insuper apud Oecon. icones mixtæ (*Krapf, Kerner, Ellroth &c.*), mere habituales, quas non citavimus.

---

### Trib. VII. GALORRHEUS.

**Lactescentes.** Mich. p. 141. Scop. p. 449. Omphalom. sp. Batt. l. c. Lactiflui. Hoffm. Pers. Syn. p. 429. Nees Syst. p. 204.

CHAR. Vellum nullum. Stipes nudus, æqualis, teres, firmus, in pileum diffusus. Pileus vere carnosus, firmus, plano-depressus, umbilicatus, margine lævi juniori involuto. Caro firma, succulenta. Lamellæ lactescentes, inæquales, sape furcatæ, angustæ, postice attenuatæ, adnato-decurrentes. Asci parvi. Sporidia alba, unius speciei lutescent.

Obs. Fungi majores l. mediæ magnitudinis, solitarii, terrestres, firmi, persistentes, aromatici, sapore acri, aestivales l. autumnales. Stipes et pileus itidem plerumque lactescunt; sed dantur etiam variarum specierum individua omnino exsucca.

†. GALORRHEI TRICHOLOMOIDEI I. *Torminosi*, (1-9) Margo pilei involutus, tomentosus. *Acres, venenati.*

\* 1. *A. controversus*, albus, pileo villoso sanguineo-variegato, margine tomentoso; stipite solidi. *Vaill. par. p. 61 n. 8.*

*Mich. gen. p. 143! Lactar. controv. Pers. Obs. 2. p. 39. Ag. Syn. p. 430. (A. sanguin. Batsch. Cont. 2. f. 20x. & A. acris. Bull. t. 538 ad p. variet.)*

Gregarius, subcæspitosus, meteoricus. Stipes unc. longus, fragilis, subvillosus. Pileus maculis Zonisque irregularibus variegatus, subviscosus, explanatus, rigidus, ut Russula. Lamellæ tenues, confertæ. pallide, incarnatae. In fagetis, ilicetis aliquie. Sept. Oct. (v. v.)

2. *A. scrobiculatus*, pileo azono flavo, margine barbato, lacte lutescente, stipite cavo maculato.

Fung. CCV. n. 2. *Læs. Pruss. p. 82. Mich. p. 141. Gled. p. 101. a. Ag. n. 18. Reyg. ged. p. 176. A. scrobicul. Scop. p. 450. Schæff. t. 227, 228 (A. crinitus.) A. delic. Z. Batsch. A. torminos. Vill. p. 108. A. crassus. Braun. — Schrank. p. 594. A. luteus. A. S. p. 208. A. thejogal. Swartz. l. c. 1809. p. 91. A. intermed. Fries Obs. 1. p. 57. A. foveolar. Otto Ag. p. 67.*

Magnus. Stipes apice scrobiculato-maculatus, flavus. Pileus perlatus, adglutinato-villosus, viscosus, demum evolutus rigidus, A. foetenti admodum similis. Lac album, mox sulphureum. Lam. albidae. In silvis abiegnis humidis muscosis, frequens. Aug.-Oct. (v. v.)

3. *A. aspideus*, pileo glabro azono flavo, margine tomentoso, carne purpurascente, stipite cavo maculato. *Fries Obs. 2. p. 189.*

Huc et *A. sulphureus*, Otto l. c. p. 53. Maxime antecedenti affinis; sed lac non sulphureum, pileus glaber, lamellæ pileusque fracta mox purpurascunt. Pileus 2-4 unc., subinde umbonatus. In dumetis & silvis, rarer. Aug. Sept. (v. v.)

- \*\* 4. *A. torminosus*, pileo glabro zonato pallido, margine barbato, stipite cavo lavi.

*Buxb. Cent. IV. t. 16. Gled. p. 102. b. A. piperatus.*  
*Linn. Suec. 1195. A. barbatus. Retz. V. A. H. 7<sup>9</sup>9.*  
*p. 252. A. torminos. Schaff. t. 12. Sow. t. 103 Fl.*  
*Dan. t. 1063. Sv. Bot. 184. Pers. Syn. p. 430. A. pseudonym. Schrank. p. 595. A. necator. Bull. t. 529. f.*  
*1. Am. perniciosa. Lam. Enc. 1. p. 104.*

Medius. Lac album, omnino immutabile. Pileus rubescens l. pallide ochraceus, plerumque siccus, sed variat viscosus. Lam. albida "Hic, sale conditus, tempore jejunii, aceto et oleo adiectis, crudus a Ruthenis commeditur" Buxb l. c. In ericetis, versuris locisque apricis, ubique. Jun.-Oct. (v. v.)

Duplex forte apud Clusium ejusque compilatores, nempe a) Esculent. Clus. gen. X sp. 1. p. 268. J. Eauh. XL. c. 20. Sterb. t. 6. f. c. (ic. bona). b.) pernicios. Clus. gen. XXI. sec. Sterb. t. 23. A.

5. *A. Cilicioides*, pileo tomentoso sordide incarnato, lamellis flavescentibus, stipite subcavo. Otto l. c. (Ag. tomentos.)

Stipes 2-3 unc. longus, 1 unc. crassus, pileo concolor. Pileus depresso, pallidus, 4-5 unc. valde tomentosus. Forte Ag. necator var. 2. With. In Saxonice pinetis Sept.

6. *A. crampylus*, pileo viscoso subzonato rugoso-tomentoso fuligineo-rubro, lamellis flavis, stipite solido cinereo. Otto l. c.

Stipes 1 unc. longus, 6 lin. crassus, saepe excentricus. Pileus flexuosus, 2-3 unc. latus. Lac immutabile. In Saxonie.

\*\*\* 7. *A. necator*, pileo glabro zonato olivaceo-umbro, margine villoso, stipite farcto.

*Krapf* t. V. f. 1-4. *A. nec.* *Bull.* t. 14. *Pers. Syn.* p. 455. *Fries Obs.* 1. p. 59. *Lact. Pers. Obs.* 2. p. 42. *Am. venenat.* *Lam.* l. c. *A. plumbeus.* *Schum.* p. 345.

Certe ab *A. terminoso* distinctus. Stipes brevis, attenuatus, pileo dilutior, intus albus. Pileus regularis, saepe plano-disciformis, viscosus, firmus, margine demum evoluto Lamelle albidæ, variant lutescentes et incarnatae. In silvis & nemoribus, passim. Aug.-Oct. (v. v.)

8. *A. pannucius*, pileo azono glabro subumbrino margine tomentoso, lamellis luteis, stipite solido undulato. *Schum.* p. 346. (*A. planus.*)

Stipes 2  $\frac{1}{2}$  unc. longus,  $\frac{3}{4}$  unc. crassus, undulato-flexuosus, carnosus. Pileus 5 unc. fere latus, planus, colore, sec. icon. Auct., peculiari testaceo-cinnamomeo. Caro lamellis concolor. In pineto *Sællandiae*, Oct. (v. ic.)

9. *A. fascinans*, pileo azono glabro testaceo-fusco, margine pubescente, stipite cavo laevi.

Sequenti affinis. Stipes 2 unc. longus, subfragilis, laevis, immaculatus, pallidus. Pileus depresso, leviter viscosus, junior umbrinus, 2-3 unc. Caro albida. Lac album, immutabile Lamelle lutescentes, basi dichotomæ. In pratis muscosis subnemorosis. Aug.-Oct. (v. v.)

Constanter diversas puto, maxime licet inter se affines statura, pileo subviscoso etc., hujus sectionis species, quarum 1-3 mutabiles, pileo albo 1. flavo; 4-6 pileo rufescente; 7-9 pileo umbrino. Omnes noxii; primam speciem, in fallor, ex errore edulem perhibet Persoon. Ch. Comest. Taceo *A. terminosum*, Ruthenis cibarium; aliis enim Scavorum stirpi gustus et natura; fungos, observantes jam Buxbaumio Cent. IV. p. 10, 14., vulgo cibares rejiciunt et venenosos in deliciis habent,

† GALORRHEI LIMACINI l. *deliciosi* (10-21). Pileus glaber, viscosus, margine nudo. *Acres; Edules.*

\* 10. *A. trivialis*, pileo viscoso azono lurido, lamellis lacteque albis, stipite cavo longo. Fr. l. c.

A priori margine nudo lamellarumque colore; a subsimili A. flexuoso a. substantia laxa, multo fragiliore, lamellis non rigidis confertis etc. differt. A sequente statura et lacte immutabili. Stipes amplius, pileo fere concolor. Pileus dein expallens, albidus l. incarnato-alutaceus, ad quem statum *A. Listeri* Swartz l. c. 1808. p. 210. excl. syn., 3 unc. et ultra latus In pinetis Sueciæ, locis humidis muscosis, abunde. Jul.-Oct. (v. v.)

11. *A. luridus*, pileo viscoso zonato lurido, lamellis albis, lacte rubescente, stipite cavo.

Fung. fuseus, lacte acri. Buxb. Cent. IV. t. 17. f. 2.  
A. fuscus. Schæff. t. 235. Ag. zonar. With. arr. 4.  
p. 193. Sowerb. t. 205. Am. zonar. Lam. l. c. A.  
luridus. Pers. Syn. p. 436. Sw. l. c. p. 212.

Antecedenti minor. Stipes 1  $\frac{1}{2}$  unc. et ultra longus, pallidus. Pileus planiusculus, 2-3 unc. latus, e cinereo-rufescens, zonis fuscis. Lac primo album. In ericetis, locis graminosis, Sept. Oct. (v. ic.)

12. *A. acris*, pileo viscoso azono cinereo-fuligineo, lamellis flavis, lacte ex albo rubescente, stipite farcto.

Fung. lividus, lacte acer. Buxb. l. c. f. 1. (descr. transpos.) Batt. t. 13. E! A. pudibund. Scop. p. 452. A. delicios. var. Batsch. Cont. I. f. 63. Krapf. t. 4. f. 4. A. acris. Bolt. t. 60. With. l. c. p. 175. Pers. Syn. p. 437.

Similis *A. pyrogalo*, sed pil. viscidus. Stipes deorsum attenuatus, brevis, pallidus. Pileus semper fere excentricus!, emarginatus, inæqualis, fascio-lividus. Lam. subdistantes. Lac acerrimum,

albidum, mox roseum, dein flavescens; raro immutabile. In fagetis & nemoribus frondosis. Aug.-Nov. (v. v.)

\*\* 13. *A. uvidus*, pileo viscoso azono incarnato-livido l. fuscescente, lamellis albis, lacte ex albo-lilacino, stipite cavo. *Fries Obs. 2. p. 191.*

Huc *A. livido-rubescens* Batsch Cont. 2. f. 202. et *A. acris*, variet. A. S. p. 210, ut formæ. Cum duobus sequ. reliquis tenuior. Stipes fragilis, æqualis. Pileus depresso regularis, valde viscosus. Lam. confertæ, fractæ cum carne lacteque lilacino-sanguineæ. In nemoribus humidis frequens, Aug. Oct. (v. v.)

14. *A. vietus*, pileo tenui lœvi subviscoso azono livido expallente, lamellis lacteque albidis, stipite subcavo fragili. *Gled. p. 103. d.*

Huc potissimum *A. acris* Schum. p. 343. Indorus, sapore acri-nauseoso. Lac album, dein subgriseum. Stipes glaberrimus, pileo concolor, junior farctus. Pileus leviter carnosus, subinde umbonatus, semper opacus. Variat colore incarnato-livido et albido; latitudine 1-5 unc.; forma regulari et undulate-lobata. Lam. tenues, confertæ. Varietates non paucæ. In betuletis, populetis dumetisque humidis muscosis, vulgaris. Aug.-Nov. (v. v.)

*B. cyathula*, parvus, pileo umbonato, zona obscuriori, incarnato, lamellis candidis. Cum priori.

15. *A. jecorinus*, pileo tenui viscoso ruguloso carneo, lamellis luteis, lacte albo, stipite cavo immaculato.

Parva species. Stipes 1-2 unc. longus, 3-4 lin. crassus, æqualis, fragilis, apice obsolete pruinatus. Pileus 2 unc., pallidus; etiam hepaticus, fragilis. Lam. luteæ, subdistantes, 2 lin. latæ. In ericetis & sabuletis, perraro. Sept. Oct. (v. v.)

\*\*\* 16. *A. hysginus*, pileo viscoso lœvi azono carneo, lamellis lacteque albis, stipite cavo maculato. *Fries l. c. p. 192.*

Antecedentibus major, stipite, ut in prima sectione, apice scrobiculato; ceterum glabro, incarnato, longitudine varius. Pileus 2-3 unc., firmus, umbilicatus, carneo-ruber. Lam. demum pallide flavent. *In graminosis, pinetis alibique. Aug.-Oct. (v. v.)*

17. *A. blennius*, pileo viscoso subguttato azono virescente, lamellis lacteque albis. *Fr. 1. p. 60.*

*Sterb. t. 5. E. ! Krapf Schw. t. 4. f. 11-13. A. viridis. Schrad. spic. p. 123. Am. ærugin. Lam. Enc. 1. p. 105. A. xyloph. var. viscos. Pers. Syn. p. 438. A. Listeri var. 5. With. l. c. p. 160. A. curtipes & affinis. Schum. p. 344, 345.*

Stipes farctus, subinde cavus, brevis, firmus, cinerascenti-viridis. Pileus firmus, depresso, pallide et sordide virens, marg. juniori inflexo omnino glabro. *Lactar. xyloph. Pers. disp. p. 66. forma. Lac. acerrimum. In fagetis, jove pluvio, frequens. Jul.-Oct. (v. v.)*

18. *A. pallidus*, pileo viscoso lœvi azono stipiteque brevi cavo firmo pallidis, lamellis lacteque albidis. *Pers. Syn. p. 431.*

*Gregarius. Stipes 1-2 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  — 1 unc. crassus, lœvis. Pileus 2-3 unc. latus, flavidus, argillaceus l. incarnatus, semper pallidus, marginè involuto. Lam 2 lin. latæ. Lac immut., minus acre. In fagetis, haud raro. Aug.-Oct. (v. v.)*

\*\*\*\* 19. *A. deliciosus*, pileo viscoso obsolete zonato aurantio-expallente, lamellis lacteque aurantiacis, stipite cavo glabro scrobiculato.

*Capreolini. Tabern. Fung. esc. g. XII. Clus. p. 269. J. Bauh. XL, c. 26. ubi syn. veter. ! Sterb. t. 4. C. Buxb. Cent. V. t. 45. f. 1. Batt. t. 16. H. Ag. XI. Gled. p. 101. A. delicies, Linn. Suec, 1211, Schaff.*

t. 11. Sowerb. t. 202. Fl. Dan. t. 1131. Am. Hall. helv. n. 2419. Am. sanguin. Lam. l. c. A. zonarius. Bolt. t. 141. Lactar. laterit. Pers. disp. p. 64.

Statura præcedentis. Pileus plano-depressus, primo aurantiacus, mox soide pallidus, dein virens, leviter viscosus. Vulnera lamellarum eleganter sæpe virent, quod in alia specie non observatur. De usu cf. Tratt. p. 82. f. M. etc. Lactis colore ab omnibus Agaricis differt; sed sporidia alba nec viridia, ut apud Hall. l. c. In pinetis, frequen-  
tissimus. Jul.-Nov. (v. v.)

20. *A. insulsus*, pileo viscoso obsolete zonato lute-  
scente, lamellis confertis lacteaque pallidis, stipe brevi crasso.

b. Am. pallide lutea &c. Dill. Giess. p. 179.

Acris, statura et magnitudine A. deliciosi, sed lac albidum l. aquosum mitius. Stipes junior farctus, dein cavus, deorsum attenuatus l. æqualis,  $\frac{1}{2}$   
— 1 unc. crassus, pallidus, subinde scrobiculatus. Pileus infundibuliformis, rigidus, testaceo-lutescens, 4 unc. latus, circa margines præcipue zonatus. Caro pilei subzonata! Lam. basi furcatæ, albidæ. Prope Malmö in dumetis Oct. Nov. (v. v.)

21. *A. aurantiacus*, pileo subviscoso azono aurantiaco, lamellis confertis lutescentibus, lacte albo, stipite elongato lævi.

Batt. t. 16. f. A. — A. hybridus. Scop. p. 452. Ag. testac. v. aurant. Pers. Syn. p. 432. A. rufus. Schum. Sæll. p. 348. A. testaceus. Swartz l. c. 1808.  
p. 210.

Simillimus A. mitissimo; sed lacte acri insuper dignoscitur. Stipes 3 unc. longus, farctus, subattenuatus. Pileus planiusculus, azonus, non virescens. Lam. angustæ. In silvis & pinetis mu-  
stosis. Aug.-Oct. (v. v.)

†† GALORRHEI RUSSULARES I. subdul-  
ces (22-53). Pileus siccus, margine nudus. Lamel-

**læ confertæ juniores albidae, dein lutescentes l. rufescentes. Substantia laxior. In cibariis recepti, juniores mites, dein etiam acres. (Species hujus sectionis A. lactiflui sub nomine apud Auctores commutantur.)**

In specierum serie sequuntur primum dulces, pileo lævi (22-25); dein subacres, pileo lævi (26-29); tandemque species subacres, pileo impolito h. e. squamuloso l. pruinoso. (30-33).

\* 22. *A. volemus*, magnus, dulcis, pileo obtuso sicco lævi nitido fulvo-expallente, lamellis albo-lutescentibus, stipite solidō obeso.

*Ag. lactifluus. vulgo. Ellr. t. VI. A. testaceus. A. S. p. 209.*

b. *A. rubescens. A. ed matopus. Scop. p. 453. A. fruber. Tratt. Essb. Schw. p. 89. t. N.*

Compactus, firmus, non acris Stipes 1  $\frac{1}{2}$  — 2 unc. longus, 1 unc. crassus et ultra, durus, lævis. Pileus planus, leviter depresso, 3 unc. et ultra latus, demum rimosus testaceus. Lamellæ latæ, fragiles, non decurrentes, albidae Vulnera lamellarum sordide fuscescunt. In fagetis passim, silvis abiegnis rario. Aug. Sept. (v. v.)

23. *A. mitissimus*, dulcis, pileo papillato sicco lævi aurantiaco, lamellis dilutioribus, lacte albo, stipite cavo longo.

Formæ sunt *A. testac. B. Pers. Syn. p. 432. et A. sororius Otto p. 36.* Antecedente, cui colore simillimus, tenuior. Stipes 2-3 unc. longus, 3-4 lin. crassus, fragilis, lævis, glaberrimus. Pileus leviter carnosus, depresso, 1-2 unc. latus, opacus, testaceo-fulvus, uti stipes. Lam. confertissima, 1 lin. latæ, pallidiores. In silvis vulgaris, frondosis & aceriosis, Aug.-Nov. (v. v.)

24. *A. quietus*, dulcis, pileo obtuso lævi sicco opaco, lamellis testaceo-rufescensibus, stipite solido firme rufescente.

Fung. sextus. *Trag.* — *J. Bauh.* XL. c. 17. eum syn. vet. ! *A. lactescens.* *Spec. Pl.* 2. p. 164. *A. testaceus.* *Scop.* p. 453. *A. rubescens.* *Fl. Dan.* t. 1069. f. 2. *A. serosus.* *With.* p. 167.

Stipes 2-3 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. et ultra crassus, demum mollior spongiosus, sed non cavus. Pileus 3 unc. latus, margine deflexo. Lam. basi subfucatæ. Odor nullus. Color mutabilis; pileus junior obscure cinnamomeus, lamellis stipiteque pallidioribus; dein pileus expallens, lamellis concolor, stipes vero obscure rufus. *In Quercetis & silvis mixtis nemorosis, autumno.* (v. v.)

25. *A. subdulcis*, innocuus, pileo glabro polito sieco rufescente, lamellis incarnatis, demum ferrugineis, lacte immutabili albo, stipite dein cavo glabro.

*A. lactifl.* *Bolt.* t. 3. *Sowerb.* t. 204. *A. rubescens.* *Schæff.* t. 73. (vix ad rufum). *A. Bulliardii.* *Fl. Dan.* t. 1069. f. 1. (stat. exsue.) *Ellr.* t. 7. f. 2. *A. subdulcis.* *Pers.* *Syn.* p. 455. *Bull.* t. 224. *A. B.*

Antecedente constanter minor, tenuior, substantia magis compacta præcipue diversus. Pileus depresso, sape umbonatus, azonus. Sapor mitis, demum nauseosus. Formæ plurimæ: a) pileo lævi firmo stipiteque subfarcto castaneo-rufis. b) pileo fragili cinnamomeo l. rufogilvo, stipite longiusculo. *Lact. innoc.* *Pers.* l. c. Pileus 2-3 unc. latus. c) colore carneo-flavo. *A. rufo-flavidus* *Ott.* p. 43. d) pileo carneo, lamellis pallidis, stipite cavo elongato, e) pileo tenui papillato ruguloso, margine striato, stipite fistuloso. *In silvis, ubique, c. in graminosis humidis. d. in pinetis, locis humidis muscosis, & e. siccis. Æstate & autumno.* (v. v.)

*B. camphoratus*, olidus, pileo obsolete zonato, lamellis lutescentibus.

*A. camph.* *Bull.* t. 567. f. 1. *A. subdulcis*, *Dec. fr.* 2, p. 144.

b. *A. cimicarius*, *Batsch.* *Cont.* 1, f. 69.

Videtur propria species, sed habitus idem et eum A. glycosmo non commutanda. Sapor ingratius. Pileus rufo-spadiceus, umbonatus, 1-2 unc. latus. In silvis, præcipue pinetis. Autumno. (v. v.)

\*\* 26. *A. thejogalus*, subacris, pileo sicco glabro subzonato rufi-fulvo, lacte flavo, stipite solido.

*A. thejog.* Bull. t. 567. f. 2. Dec. fr. 2. p. 142. Pers. syn. p. 431. Schum. Sæll. p. 347. A. cimicar. var. 3. With. p. 174. (A. deliciosa. Bolt. t. 9. colore luteo.)

Stipes mediocris, demum pileo obscurior. Pileus junior convexus obsolete umbonatus, dein depresso obtusus, 2 unc. latus. Priori admodum affinis, lactis colore præcipue dignoscendus. Veneratus Pers. Ch. comest.; an e commutatione cum A. scrobiculata? In silvis nemorosis. Sept. Oct. (v. v.)

27. *A. flammeolus*, pileo sicco azono flammeolo, lamellis flavis, lacte rubescente, stipite fistuloso croceo. Pollin. pl. nov. p. 34.

Stipes 3-pollicaris, cylindricus. Pileus convexus, demum depresso, 3 pollic., margine integro; in helvolum l. rubrum colorem vergens. Lam. non decurrentes. Caro flavescens. Lac leviter acre. Circa Veronam.

28. *A. Tithymalinus*, acris, pileo sicco glabro obsolete zonato pallide luteo, lamellis incarnato-pallidis, stipite solido.

*A. Tithym.* Scop. p. 452. *A. ichoratus*. Batsch. Cont. 1. f. 60. Swartz. l. c. 1809. p. 89. *A. testaceus*, Pers. Syn. p. 431. ad part.

Stipes 3 unc. longus, subcompressus, inæqualis, pallidus, albescens. Pileus demum depresso, centro sape rubescens, 2-3 unc. latus, rugulosus. Lac copiosum album. SW. In nemorosis silvarum, rarior. Sept.-Oct. (v. v.)

29. *A. rufus*, acerrimus, pileo umbonato sicco polo badio-rubro, lamellis rufescens, lacte albo, stipite farcto.

Fung. esc. gen. VIII. sp. 3. Clus. p. 267. Rette Pfiff-ferl. J. Bauh. XL. c. 13. Sterb. t. 8. f. D. Fun-gus lact. piper. rufus. Vaill. par. p. 61. A. rufus. Scop. 451. A. rubescens. Rec. — Schrad. — With. A. ruher. Swartz. l. c. 1808. p. 211.

Inodorus, major. Stipes rufescens, 2 unc. longus, haud firmus, basi pubescens. Pileus semper lavis, glaber, umbonatus, plano-depressus, dein totus infundibuliformis, 2-4 unc. latus. Caro albida. Lam. juniores albo-incarnatae. In pinetis, vulgatissimus. Jul.-Oct. (v. v.)

\*\*\* 30. *A. helvus*, acris, pileo sub-obtuso squamulo-so sicco ochraceo-rubro, lamellis ochraceis, stipe subfarcto.

Priori utique affinis. Stipes 2-3 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, subpruinatus. Pileus testaceus, villososquamosus, fragilis, statura prioris. Lam. saepe dichotomae. Odor debilis, sapor acris, lac album immutabile; sed variat mitis, lacte aqueo, non colorato. Synonyma difficile extricantur: Clusio videtur Fung. esc. g. XX. spec. I.; sed esc. g. X. sp. I. sub torminosa nominata, ex descriptione hoc facile preferres. Inde pendent dubia Bauhini, Sterbeckii etc. *A. ruher* Pers. syn. p. 433 ex deser ad unguem quadrat, sed *A. lactifluo* Schæff. t. 5 habitu valde dissimilis e. s. p. In pinetis, locis humidis, vulgaris. Jul.-Nov. (v. v.)

31. *A. glycosmus*, oolidus, pileo tenui squamuloso sicco opaco sublurido, lamellis lutescentibus confertis, lacte albo, stipite glabro. Fries Obs. 2. p. 194.

Optima, sed maxime varia species. Odor ejus criterium. Fragilis, antecedente tenuior. Lac album, demum acre. Color variat luridus, fusco-testaceus, incarnatus, rufescens; junior obscurior. Pileus planiusculus, saepo umbonatus! Lam. opacæ, juniores pallidæ. Sporidia alba. Evidens cum A. vieto analogia. — Formæ dux præcipue seorsim

notandæ: a) pileo zonato lurido 3 unciali et ultra, stipite cavo 2-3 unc. b) pileo pallido sericeo-livè acute umbonato, stipite fistuloso unciali. *Ubique in pinetis dumetisque. Jul.-Oct. (v. v.)*

32. *A. plumbeus*, pileo sicco azono nigro-fusco, fuliginoso, lamellis flavescentibus, lacte alb.<sup>o</sup>.

*A. plumbeus*. Bull. t. 282, 559. f. 2. Pers. Syn. p. 435. Dec. fr. 2. p. 144. A. Listeri. Sowerb. t. 245.

*b. nigrescens*. Pers. l. c. p. 436. Krapf. t. 4. f. 1-3.

*c. elongatus*, Ag. pyrogali. var. 3. Fries l. c.

Antecedente major, firmior Stipes lutescente-fuligineus, junior farctus, dein pro more cavus. Pileus perlatus, e convexo-depressus; numquam ob fuligineum zonatus l. viscosus. Caro compacta, alba. — In forma c. pileus rugosus, minor, lamelle albidæ, stipes longus olivaceo-reticulatus. *In silvis, præsertim acerosis; c. locis humidis inter Polytricha. Aug. Sept. (v. v.)*

33. *A. fuliginosus*, pileo azono sicco umbrino, fuligine fusca consperso, lamellis ochraceis, lacte ex albo-crocato.

Krapf t. 4. f. 5-7. A. azonit. Bull. t. 557. f. 3. A. pyrogal. b. Fries Obs. 1. p. 64. A. plinthogal. Otto p. 75. (ut videtur.)

Cum A. acri commutatus, a quo vero diversissimus Stipes farctus, mollis, demum cavus, 2-3 unc. longus, 3-5 lin. crassus, fragilis, laxis, fuligineus, intus albus. Pileus 1-3 unc. latus, e convexo-planus, demum depresso et subalutaceus. Caro alba, dein crocato-rubra. Lamelle juniores albæ, minus confertæ. Sporidia lutescunt! *In fagatis umbrosis vulgaris, silvis abiegnis passim. Aug.-Oct. (v. v.)*

††† GALORRHEI PROPRII l. piperati (34-42). Pileus siccus, margine nudus. Lamellæ immutabiles, l. expallentes. Substantia compacta, rigida, *Acerrimi, edules?* (una spec. dulcis dicitur.)

Distinguuntur insuper species 34-36 pileo non albo, lamellis distantibus, lutescentibus, lacte acer-  
rimo immutabili; spec. 37-39 pileo albido, lamel-  
lis albis, lacte mutabili; spec. 40-42 colore omnino  
albo, lacte acerrimo immutabili.

\* 34. *A. pyrogalus*, pileo sicco glabro subzonato li-  
vido, lamellis distantibus flavis, stipite cavo  
cinerascente.

a. pileo regulari. Fung. lactesc. prægnantissimus.  
*Vaill. par. p. 61.* *A. rusticanus. Scop. p. 452.*  
*Krapf. t. 4. f. 8.* *A. pyrogalus. Bull. t. 519. f. 1.*  
*Pers. Syn. p. 436.* *Dec. fr. 2. p. 142.* *Fr. l. c. var. 1.*

Stipes primo, ut in omnibus farctus, sed mox  
cavus, 1  $\frac{1}{2}$  unc. et ultra longus, 3-5 lin. crassus,  
deorsum saepe attenuatus, glaber, laevis l. scrobicu-  
latus. Pileus planus, 2-3 unc., firmus, sed sequen-  
tis tenuior, absque fuligine; demum sordide lute-  
scens; in umbrosis pallidus subazonus. Lac copio-  
sum, acerrimum. In nemoribus & pratis inter gra-  
mina vulgaris. Aug.-Oct. (v. v.)

35. *A. flexuosus*, compactus, pileo repando sicco  
glabro, lamellis distantibus pallidis, stipite so-  
lido brevi. *Fries Obs. I. p. 58.*

a. pileo umbrino. *A. azonites. Bull. t. 559. f. 1.* *A.*  
*umbrinus. Pers. Syn. p. 435.* *A. Persoonii. Otte*  
*p. 44.* — *Batt. t. 13. D.*

b. pileo incarnato-vitelline. Fung. lignosus &c. *Vaill.*  
*par. p. 61. t. 12. f. 7.* *A. zonarius. Bull. t. 104.* *A.*  
*flexuos. Pers. Syn. p. 430.*

c. pileo carneo. *Batt. t. 16. E.*

Equidem in plures species, summa interceden-  
te affinitate, divellere nequeo. Totus valde durus,  
compactus, aeris, lactescens. Stipes deorsum atte-  
nuatus, 1 unc. longus, crassus, pileo pallidior, sub-  
inde excentricus. Pileus infractus, nunc convexus,  
nunc depresso; variat zonatus et omnino azonus;  
umbrinus, cinereo-rufescens pallidus etc. Lam.  
crassæ, lignæ, venoso-connexæ. Etiam statura va-

riat. In pinetis locis graminosis & juxta vias, vulgaris. Jul.-Oct. (v. v.)

36. *A. serifluus*, brunneo-fulvus, pileo flexuoso siccо glabro, lacte sericolori, stipite solidо aqua-li. Dec. fr. 6. p. 45.

Antec. affinem suspicor. Subfirmus, lacte diluto, parco. Stipes 1-2 unc. longus, 2-3 lin. crassus. Pileus planiusculus, infractus, diam. stipitis longitudinem superante. Lam. pallidiores, lutescentes. Ad terram humidam in ericetis & illetis circa Monspelium.

- \*\* 37. *A. violascens*, dulcis, pileo glabro cinereo, zonis fuligineis picto, lamellis stipiteque solido albis, lacte violascente. Otto p. 34.

Nil saltim recedit *A. ermineus* Scop. p. 453. — Affinis dicitur *A. pyrogalo*. Stipes lavis, 2 unc. longus, 5-6 lin. crassus. Pileus depresso, 2-3 unc. latus. In pinetis Saxoniae, Sept.

38. *A. resimus*, pileo glabro albo flavo-maculato, lamellis stipiteque cavo albidis, lacte sulphureo.

Fung. esc. g. VIII. sp. 2. Clus. l. c. forte. *A. intermedii* var. Fries Obs. 1. p. 58.

Stipes lavis, 1 — 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 1 unc. fe-re crassus, sub lente pube tenui, quasi tectus. Pileus infundibuliformis, lavis, 3-5 unc. latus, margine nudus. Lam. latjuseulæ, haud admodum confertæ. Affinis *A. scrobiculato*. In ericetis & betu-etis asperis Smolandiae, bis tantum. Sept. (v. v.)

39. *A. argematus*, albus, pileo glabro plano, lacte rubescente, stipite farcto. Fr. 2. p. 190.

Parva species. Stipes 1 unc. longus, 4-5 lin. crassus, lavis. Pileus planus, 1  $\frac{1}{2}$  unc. latus. Lam. tenues, confertæ. In silvis abiegnis, raro. Jul. Aug. (v. v.)

Sunt 37-40 minus compacti.

\*\*\* 40. *A. pargamenus*, pileo planiusculo lento glabro albido, lamellis confertis, lacte albo, stipite fareto longiusculo obscuriori.

*Clus. l. c. sp. 1. J. Bauh. XL. c. 13. Sterb. p. 116.*

*Fung. n. 2. Mich. p. 141. Ag. a. Gled. p. 93. A. piperat. Batsch. Cont. 1. f. 59. A. urens. Schum. p. 343. A. parg. Swartz l. c. 1809. p. 90. Fries Obs. 1. p. 55.*

Sequenti similis. Stipes longior, 2-3 unc., glaber, demum coerulescens l. fuscescens. Pileus convexus, dein depresso. corii instar elasticus, 2 unc. et ultra. Lam. angustæ. *In silvis frondosis, Aug. Sept. (v. v.)*

41. *A. piperatus*, pileo infundibuli-formi rigido glabro albo, lamellis angustissimis confertis, lacte stipiteque solido obeso albis.

*Fung. piperis sapore. Cord. in Diosc. p. 68. Fung. tert. Trag. — J. Bauh. XL. c. 6 ubi veter. syn. ! Sterb. t. 8. f. C. Ag. n. 1194. Linn. Suec. A. piperat. Scop. p. 449. Bolt. t. 21. Fl. Dan. t. 1132. Pers. Syn. p. 429. A. amarus. Schäff. t. 83. A. acris. Bull. t. 200. Am. Hall. n. 2538. ad part. Am. piperit. Lam. Enc. 1. p. 104. A. Listeri. I. With. p. 158.*

Lacte copiosissimo et acerrimo scatet. Totus durus, firmus, glaber. Stipes 1-2 unc. longus et fere crassus, laevis. Pileus 4-6 unc. latus, siccus, subinde flavesiens, margine deflexo, juniori involuto. Lam. confertissimæ, angustissimæ, lineares, substictæ, repetito-dichotomæ — Edulis est. "Lacus cum Syrupo de Althæa sumtum, experimento certo calculum frangit et urinam citat" Loes. Pruss. p. 82. n. 9. *In silvis, passim. Sept. Oct. (v. v.)*

42. *A. vellereus*, albus, pileo umbilicato tomentoso rigido, lamellis angustis distantibus, lacte albo, stipite solido obeso.

*A. Listeri. Sow. t. 104. A. piperat. Auct. var.*

Vix nisi status antecedentis mutatus (Cf. *Lact. piper.* Pers. Obs. 2. p. 40.); sed cum venenatus

dicatur nec merus ætatis filius, distinguere necessarium duxi. Gregarius, statura antecedentis, minus lactescens. Stipes pubescens. Pileus totus lanatus, subconvexus. Lac immutable. Odor saepe ingratus. *Ag. pubescens*. Schrad. spic. p. 122. Fries 1 c p. 56, varietas minor. *In fagetis, dumetis &c.* abunde. Aug.-Nov. (v. v.)

*B. exsuccus*, exsuccus, pileo infundibuliformi, tomento depresso, lamellis latis crispis pallescentibus.

Fung. n. 5. *Læs.* p. 89. n. 83. *Wulf. Pruss.* p. 81. — *Buxb. Cent. IV.* t. 1. Ag. b. *Gled.* p. 99. *Am. Hall. helv.* 2339. *A. piper.* v. *Pers. Syn.* p. 429. *A. exsuccus.* *Otto.*

Adhuc fere major, minus evidenter villosus, quisquiliis saepe tectus. Pileus junior umbilicatus, demum totus infundibuliformis. *In pinetis alibique, passim. Autumno.* (v. v.)

Capri, æstu flagrantes, fungos acres tantum et in specie Galorrhœos manducant,

Accedunt ad primam et secundam, uti omnia ad principium redeunt, ultimæ species, non minus ad sequentem tribum transeuntes. Analogie dispositione quodammodo patent; sed hae dispositionis delicia melius perspiciuntur, quam paucis verbis delineantur.

### Spec. inquirendæ:

1. Fungus parvus, piperatus, lacteum succum fundens, pileo griseo mammoso &c. *Mich. gen.* p. 142. t. 80. f. 1.
2. *A. dulcis.* *Huds.* p. 614. *A. lactescens.* *Villars.* Totus albns, dulcis, pileo convexo, stipite longo.
3. *A. dycomgalus.* *Bull.* t. 584 sec. *Dec. fr.* 2. p. 141. (in nostro specim. deest). Forte idem ac *A. dulcis* *Huds*; sed pileus griseo-zonatus. (auratus?)
4. *A. griseus.* *Schum.* p. 347. Affin. *A. subdulci.*
5. *A. depressus.* *With.* p. 181. Stipite solido unice ab *A. hysgino* recedit.

*Erroneus A. Georgii.* Wither. — *A. sublactescens*, Schum. p. 345 ad *A. helvum* potissimum referrem. *De A. lactifluo* Schæff. t. 5. Conf. Obs. Myc. 2, p. 194.

---

### Trib. VIII. CLITOCYBE.

Tereticaul. sp. *Scop.* p. 429. *Gymnop & Omphal.* spec. *Pers.* *Syn.* p. 302, 448.

CHAR. Velum nullum. Stipes æqualis l. sursum attenuatus, nec bulbosus, lăviusculus, sat firmus. Pileus plus minus carnosus, junior convexus, aut persistens, aut demum depresso, subinde totus infundibuliformis. Lamellæ inæquales, exsuecæ, immutabiles, tenaces, varie adfixæ l. liberæ. Ascii subtenues, sporidiis albis. *Color varius.*

Obs. Tribus, a κλίτος & κύβη dicta, e variis composita, inde character negativus magis, quam definitus. Fungi majores l. medii, persistentes, submites, innocui. Subtribus sequentes, maxime naturales:

#### A. Lamellis postice æqualiter attenuatis, acutis.

1. DASYPHYLLI. Pileus siccus, glaber. Lam. confer-tæ decurrentes l. acute adnatæ.
2. CAMAROPHYLLI. Pileus subcompactus, siccus. Lam. valde distantes, arcuatæ, decurrentes.
3. HYGROCYBI. Pileus tenuis, humidus viscosus. Lam. variæ, Stipes cavus. *Terrestres.*

#### B. Lamellis postice inæqualibus. (h. e. dente l. arcuato-decurrentes, sinuatæ, emarginatæ etc.)

4. OESYPII. Pileus siccus, minute squamulosus. Lam. plerumque arcuato-decurrentes, raro adnatæ. *Firmi.*
5. CALODONTES. Pileus glaber, subhumidus. Lam. arcuato-adnexæ, reticulato-connexæ, margine appendiculatæ.
6. THRAUSTI. Pileus tenuis, siccus, Lam. emarginatæ, *Subfragiles.*

## C. Lamellis postice æqualibus, obtusis.

7. RHIZOPODES. Pileus carnosus, viscosus. Lam. sub-adfixæ. Stipes radicatus. *Epixyli*.
8. CHONDROPODES. Pileus tenax, siccus. Lam. sub-liberæ, confertæ, candidæ.
9. SCORTEI. Pileus subcoriaceus, siccus. Lam. liberæ, subdistantes, pallescentes.

## Subtribus 1. DASYPHYLLI.

CHAR. Stipes plenus, sub-elasticus, firmus, in pileum diffusus. Pileus vere carnosus, firmus, siccus, glaber, sublævis, margine tenuiori, juniori involuto. Caro alba, molliuscula. Lamellæ confertæ, angustæ, sublineares, integrerrimæ; utrinque æqualiter attenuatæ, acutæ; ob pilei formam nunc longe decurrentes, nunc adnatæ; vix arcuatæ. Color varius, lamellarum albus, raro lutescens.

Obs. Fungi terrestres, solitarii, æstivales et autunnales, raro vernales, firmi, sape mucido. Majores et stipite solidō gaudentes præcipue edules. Lamellæ in *A. melizeo*, *clavipede* etc. minus quidem confertæ, non ita tamen ut in *Camarophyllis* distantes. — Accedunt spec. heteroclitæ capitosæ.

†. OMPHALARII (1-12.) Pileus plus minus carnosus, junior convexo-deflexus, dein depresso infundibuliformis, Lam. vere decurrentes. Stipes multis farctus, hi vix cibarii; aliis solidus, qui esculenti. Habitus Galorrhæi.

Obs. In quavis hujus seriei tribu species pileo juniori convexulo, dein depresso, etiam infundibuliformi, occurunt. Referendæ neutiquam ad Omphalias, quarum longe alia structura, pileo jam ab infantia vere umbilicato, dein magis explanato. Quod in specie ad hanc sectionem attinet, a sequente (Cf. A. Cardarellam, clavip. etc.) ægerrime dignoscitur; melius autem in omni æstate ab Omph. Collybariis: 1. lamellis postice acutis, vero decur-

rentibus. 2. pileo vere carnoso nec diaphano. 3. stipite in pileum magis diffuso etc. —

Sequuntur primum species magna, rigide, demum infundibuliformes, lamellis subcoloratis (1, 2); mox mediæ, elasticæ, flaccidæ, infundibuliformes, stipite farcto attenuato, basi villoso (3-6.); dein tenuiores, pileo leviter carnoso umbilicate, stipite farcto l. cavo, aquali (7-9.); tandem firmiores, pileo magis carnoso depresso, stipite solido, quæ ad sq. sectionem transuunt. (10-12.)

\* 1. *A. giganteus*, vægrandis, albidus, pileo dein infundibuliformi, lamellis decurrentibus confertis dein rufescens, stipite solido obeso.

a. *Fungus maximus*, pileolo pyxidato. *Raji Hist.* III. p. 18. *A. gigant.* *Leyss. Hal.* 1213. *Vill. Delph.* p. 1017. *A. maximus.* *Fl. Wett.* III. p. 329. *A. S. p. 215.*

b. *Batt. t. 7. f. A.* *A. giganteus.* *Sowerb. t. 244.* *Swartz l. c. 1808.* p. 240. (*A. concavus.* *Vill.* p. 1015. forte.)

Species plures latere videntur. Synonyma ab ultimo Galorrhœo difficillime insuper discernuntur. — a. *Alutaceo-pallidus.* Stipes 2  $\frac{1}{2}$  unc. latus et altus, firmus, demum fuscescens. Pileus sesquipedalis usque, pro ratione subtenuis, late infundibuliformis, in fundo obsolete umbonatus, lævis, nisi quod passim squamulosus l. rimulosus sit; margine in nonnullis lobato. *A. S. l. c.* — b. *minor.* Pileus 3-6 unc. latus, subnitens, junior convexus, dein concavus, margine sæpe fissili. Stipes  $\frac{1}{2}$  unc. crassus. *Sie. l. c.* *In dumetis frondasis.* b. in pinetis. Sept. (v. ic.)

2. *A. gilvus*, magnus, pileo convexo obtuso, dein infundibuliformi lævi rigido, lamellis decurrentibus e pallido-gilvis, stipite farcto subradicato, basi villoso.

*Fungus major*, pediculo brevi crasso &c. *Raji Hist.* II. p. 95. *A. subinvolut.* *Batch. Cont.* 2. f. 204. *A. inversus Scop.* *A. cinnamomeus.* *Bolt. t. 22.* A.

*castaneus, sordidoflavus.* With. l. c. p. 166, 197.  
*A. pileolar.* Sow. t. 61. Swartz l. c. *A. cyathif.*  
*Fl. Dan.* t. 1011. *A. gilvus.* Pers. *Syn.* p. 448. *Fl.*  
*Dan.* 1606.

Statura Ag. Galorrhæi, præcipue *A. pallidi*. Stipes variat longus et perbrevis,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, molles, nunc æqualis nunc sursum i. deorsum attenuatus, basi villosus; dein, ut in stipite farcto solet, cavus. Pileus subcompactus, 3-4 unc. latus, submaculatus, *humidus*, sed non viscosus. Lam. confertissimæ, angustæ, sepe ramosæ, juniores pallidæ. Pileus variat cinnamomeus, testaceus, alutaceus (*A. S.* p. 216.) incarnatus etc. *Inter muscos & folia, in pinetis fagetisve, frequens.* Aug.-Nov. (v. v.)

Optimæ revera sunt hujus sectionis species; sed synonyma genuina & characteres acuti, ob statu ram coloresque mutabiles, (quare primo obtutu specierum prompuarium potius apparent) difficile eruuntur. Sequentes species apud Cel. SCHUMACHER (*Fl. Sæll.*) medium inter hunc & sequentem occupant locum nec e principio, quod in præsenti opere sequor, distinguendæ: *A. lactifluus, ferrugineus, pallescens, limbatus, subcyathus, pileolarius, infundibuliformis, crucibuliformis* — *A. circinans, convexus, cornucopioides.*

\*\* 3. *A. flaccidus*, pileo tenui infundibuliformi obtuso laxi flaccido, lamellis decurrentibus albidis, stipite farcto basi incrassato villoso.

*A. infundibuliformis.* Schaff. t. 212. Bull. t. 286, (albus). 553. *A. flacc.* Sow. t. 185. Swartz l. c. 1808. p. 242.

*B. A. membran.* Fl. Dan. t. 1012, seq. sim.

Pulchra species, media inter *A. gilvum* et *gibbum*, ab illo pileo tenuiori, flaccido, tenaci præcipue distinguendus. Color variat candidus, pallescens, ferrugineus, eleganter incarnatus etc. De syn. Schum. vide supr. *In pinetis, fagetis &c. vulgaris.* Sept. Oct. (v. v.)

4. *A. gibbus*, pileo umberonato glabro, demum infundibuliformi, lamellis decurrentibus candi-

dis, stipite farcto elasticō sursum atteruato.  
Pers. Syn. p. 449. Swartz t. c. 1809. p. 93.

Stipes vix bulbosus, i  $\frac{1}{2}$  — 2 unc. longus, tenax, basi albo-lanatus. Pileus minus flaccidus, pallidus, 1-2 unc. latus, margine subinvoluto. Lam. albæ. Odor gratus. Fermæ sunt: pileo alutaceo, stramineo, incarnato, albo!, fuligineo (A.S. p 217) etc. In campis & silvis muscosis &c. vulgaris. Jun.-Oct. (v. v.)

B. major, pileo firme planiusculo late et obtuse umbonato.

*A. geotropus*, Bull. t. 573. f. 2.

Formam candidam Bulliardii, a Decand fr. 2. p. 172 descriptam, hactenus non reperimus; sed pileo incarnato et alutaceo-pallescidente in silva Alnarensi Scaniæ. Stipes subæqualis, fibrillosus, 3 unc. longus, 1 unc. crassus, vere solidus. Pileus 3-4 unc. latus. In nemoribus frondosis graminosis. Oct. (v. v.)

5. *A. cervinus*, pileo infundibuliformi obliquo obtuso lavi cervino, lamellis decurrentibus albis, stipite farcto basi tuberoso tomentoso.

Hoffm. Nomencl. p. 119. t. 2. f. 2. Pers. Syn. p. 451.  
Nees Syst. f. 174. Aman. Hall. helv. 2359.

Stipes 3 unc. fere longus, 4 lin. crassus, basi tuberosa excepta æqualis. Pileus 1 unc. latus, oblique reflexus, cum stipite evidenter contiguus. Lam. 1  $\frac{1}{2}$  lin. latæ, apice pileo subconcolores. In silvaticis montosis, sero autumno. (v. ic.)

6. *A. squamosus*, pileo furfuraceo-squamuloso obtuso sordide alutaceo, dein infundibuliformi, lamellis decurrentibus albis, stipite farcto subbulboso. Pers. Syn. p. 449. Fries Obs. 2. p. 199. c. varr.

Antecedentibus cognatus. Stipes tenax, elasticus, 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus. Pileus obtusus, subflaccidus,

1 — 1  $\frac{1}{2}$  unc. latus. Species aestivalis, post primas pluvias redux. Var. *rufo-cinnamomea* A. S. p. 217 sequenti affinior. In pinetis montosis, frequens. Jun.-Aug. (v. v.)

\*\*\* 7. *A. sinopicus*, pileo tenui umbilicato. lœvi subcinnabarinio, lamellis decurrentibus candidis, stipite farcto æquali. Fr. l. c. p. 197.

b. multo major, pileo rimoso-squamuloso.

Stipes 1 unc. longus, 1-2 lin. crassus, pileo concolor. Pileus leviter carnosus, expallens, 1 — 1  $\frac{1}{2}$  unc. b. vero 3 unc. latus. — Huic affinis, sed adhuc tenuior, pileo flexuoso pallido *A. turfosus* Sow t. 210. In humidis. b. *silvaticis deustis*. Majo, Jun. (v. v.)

8. *A. diatretus*, pileo planiusculo subumbilicato lœvi subincarnato, sicco albido, lamellis decurrentibus stipiteque farcto æquali candidis. Fr. b. c. p. 200.

Ambigit inter hanc sequentem sectionem, pileus enim saepe convexo-planus et lamellæ insuper minus decurrentes. Stipes 1-2 unc. longus, 1-2 lin. crassus, tenax. Pileus non l. profunde umbilicatus, 1 unc. fere latus. In silvis muscosis, passim. Sept.-Nov. (v. v.)

9. *A. phyllophilus*, gregarius, albus, pileo lœvi umbilicato demum infundibuliformi, lamellis subdecurrentibus, stipite cavo, basi incurvo villosso. Pers. Syn. p. 457. Fries Obs. I. p. 78.

Plerumque odorus, subcæspitosus. Stipes lœvis, 2-3 unc longus, basi oblique radicatus. Pileus leviter carnosus, 2-3 unc. latus, junior planiusculus; etiam repandus. Lam. plus minus confertæ. Huc *A. subulatus* et *A. hydrogrammus* Schum. p. 266, 300. Inter folia decidua, præcipue faginea, frequens; item in pinetis. Aug.-Oct. (v. v.)

\*\*\*\* 10. *A. melizeus*, pileo subdepresso lœvi albo, lamellis decurrentibus distantibus luteis, stipite solido crassiusculo albo.

*Am. Hall.* n. 2416. — *Fries Obs.* 2. p. 201.

Lamellis magis distantibus a reliquis speciebus recedit. Pileus vere carnosus, 2 unc. fere latus. Stipes 1 unc. longus — Ag. Bulliardii (*mollens*) inter Omphalias retineo. *In silva abiegnat muscosa, mihi semel. Sept. (v. v.)*

11. *A. splendens*, pileo plano-depresso glabro cristallino splendente, lamellis decurrentibus albis, stipite solido deorsum villoso. *Pers. Syn. p. 452.*

Stipes sublongus, flexuosus, elasticus, ex albicans pileo subconcolor. Pileus carnosus, 2-3 unc., splendore cerineo opaco. Lam. tenues, congestæ. Sapor non ingratus. *In fagetis, varius.*

12. *A. Cardarella*, pileo convexo subdepresso laevi atro-rufo, lamellis decurrentibus stipiteque solido obeso candidis. *Batt. p. 58. t. 16. G.*

Esculentus, Arimini "Cardarella nostrana" dicuntur. Stipes uncialis, 5 lin. crassus, lavis. Pileus leviter depresso, 2 unc. et ultra, sublucidus. Lam. confertæ, latiusculæ. *In pascuis ad litus maris Adriatici. Autumno. (v. ic.)*

†† GENUINI (13-24.) Pileus compacte carnosus, convexus, dein explanatus. Lamellæ vere decurrentes. Stipes validus. *Esculenti.*

\* 13. *A. Marzuolus*, compactus, obesus, pileo planiusculo laevi cinereo, margine repando, lamellis decurrentibus stipiteque crassissimo albis. *Mich. N. Gen. p. 154. t. 74. f. 9.*

Habitus admodum singularis. Stipes ultra unciām crassus et longus. Pileus vix nisi stipes apice dilatatus, disco, ut videtur, depresso, 2 unc. lat. Esculentus. *In alpibus Italicæ, sub nive latens & vigens. Martio. (v. ic.)*

14. *A. Eryngii*, pileo subirregulari convexo-plano & griseo-rufescente, lamellis decurrentibus stipiteque solido obeso albis.

Fung. - - ex Acarna. Column. Part. I. 29? Fungi E. ryngii. Magn. Bot. 103. Gar. Aix. 196. Mapp. Als. p. 118. — Mieh t. 73. f. 2. A. Eryngii. Dec. fr. 6. p. 47. (Oreille de chardon. Paulet Ch. 2. p. 135).

Species non minus memorabilis; esculenta.  
*Pers. Ch. comest.* Stipes sape etiam excentricus, aequalis (ex ic. Mich. deorsum attenuatus, 1  $\frac{1}{2}$  unc. fere longus.) Pileus subirregularis, margine involutus, 3 unc. usque, etiam depresso. In radicibus emortuis Eryngii. Oct. (v. ic.)

15. *A. auricula*, pileo convexo lævi griseo, margine subinvoluto, lamellis decurrentibus candidis stipite solido brevi aequali.

Am. auric. Dub. Fl. Orl. p. 168. Ag. Dec. fr. 6. p. 48.

Antecedentibus, ut videtur. Cognatus. Esculentus, boni saporis; nomine "Oreilette" notus. Stipes albidus. Pileus raro exacte rotundatus, colore plus minus intenso. Frequens in graminosis circa Orleans, autumno.

- \*\* 16. *A. piniarius*, pileo hemisphærico lævi brunneo, margine violaceo, lamellis decurrentibus pallidis, stipite solido aequali. Bosc. in Mag. Naturf. Berl. 1811. p. 84. t. 4 f. 5.

Solitarius, diu persistens. Stipes validus, 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 4 lin. crassus, glaber. Pileus vix uncialis. Lamellæ utrinque valde acutæ, subæquales. In pinetis Carolinæ. (v. ic.)

17. *A. coffeatus*, pileo planiusculo lævi fusco-cervino, lamellis decurrentibus confertis stipiteque farcto elongato albidis.

Specimina 2-3 subinde juncta. Stipes 3 unc. longus, 4 lin. crassus, lævis, glaber, sordide albidus. Pileus 2 unc. latus, politus, margine juniori inveluto. Lam. arcuatæ, medio 1 lin. latæ. Sapor non distinctus. Locis subhumidis in pinetis Suecicæ, raro. Sept. (v. v.)

18. *A. comitialis*, pileo convexo-plano lăvi stipite que farcto conico fuligineis, lamellis decurrentibus confertis niveis. Pers. Syn. p. 352.

*Solitarius l. circinnatus*. Stipes 2-3 unc. longus, elasticus, glaber. Pileus 2 unc. latus, glaber, nigrescens l. lividus. Lam. planæ, angusta. In montosis subuliginosis, raro. Oct. (v. v.)

- \*\*\* 19. *A. clavipes*, pileo planiusculo lăvi fuligineo-livido, in margine subalbicante, lamellis decurrentibus subdistantibus albis, stipite solido molli conico. Pers. Syn. p. 353. A. S. p. 177.

Cum sequente specie, rariori, sāpius commutatur. Substantia mollis. Odor sat gratus. Stipes 1  $\frac{1}{2}$  — 2 unc. longus, 3 lin. apice, basi  $\frac{1}{2}$  unc. et ultra crassus, subfibrillosus, fuligineo-lividus. Pileus obconicus, rarius infundibuliformis, 1  $\frac{1}{2}$  unc. latus. Lam. longe decurrentes, non distantes ut in *A. pratensis*; variant flave. In pinetis fagetis aliquique inter gramine & muscos Germaniae, Sueciae vulgaris. Aug-Oct. (v. v.)

20. *A. nebularis*, pileo compacto lăvi cinerascente, lamellis leviter decurrentibus confertis albidis, stipite farcto sursum attenuato.

*A. pileolarius*. Bull. t. 400. Dec. fr. 2. p. 173. *A. mollis*. Bolt. t. 40. *A. casens*. With. 4. p. 158. *A. nebul.* Batsch. Cont. 2. f. 193. (justo minor) Pers. Syn. p. 349.

*b. lam. crispis*. Hall. helv. n. 2358.

Gregarius, leviter odorus. Stipes obclavatus, fibrillosus, 3 unc. et ultra longus, superne  $\frac{1}{2}$ , basi villosa 1 unc. crassus, demum etiam cavus. (*A. cellululosus* Schum. p. 299.) Pileus pulvinatus, 2-5 unc. latus, junior obtusus fuligineo-cinereus, dein expansus umbonatus livido-cinereus. Lam. tenues, pallescenti-albæ. Nostrates pro *A. gilvi* varietate habent. Infausta ave ad Pratellas MARTIUS. Eduis PERS. Ch. Com. In pinetis, ericetis muscosis aliquique, passim. Sept. Oct. (v. v.)

21. *A. Schumacheri*, pileo convexo-explanato obtuso subfuscō, margine albicante, lamellis decurrentibus confertis albīs, stipite farcto striato, basi incrassato.

*A. pullus*. Pers. Syn. l. c. (romen incongruum). *A. S.* p. 176. *A. fagin.* Schun. Sæll. p. 330. Ag. Schuin. Fries Obs. 2. p. 109.

Nimis antecedenti affinis, forte e loco differentia. In cibariis præstat. Stipes 3-4 unc. longus, subinde squamulosus, albo-cinerascens. Pileus 3-6 unc. latus, dein plano-disciforinis; senescens hybos alit; margine etiam undulatus. In silvis frondosis, apprime fagetis, non rarus. Oct. Nov. (v. v.)

\*\*\*\* 22. *A. luscinus*, minor, pileo convexo lœvi lido, lamellis leviter decurrentibus pallidis, stipite solido farinoso albo.

*A. nimbatus*. Batsch. Cont. 1. f. 65. *A. luscin.* Fries l. c. p. 108.

Stipes 2 unc. longus, 3 lin. crassus, subincurvus, basi non incrassatus. Pileus obtusus, 1-2 unc. latus. In pascuis montosis. Legi in Hallandia. Oct. (v. v.)

23. *A. rivulosus*, compactus, pileo convexo-plano ex albido subrufescente, demum rimoso-rivuloso, lamellis leviter decurrentibus confertis stipiteque subtomentoso albidis. Pers. Syn. p. 369.

Sapor et odor non ingratus. Stipes strictus, 1 unc. longus, 3 lin. crassus, basi villosus. Pileus glaber, 1 unc. latus et ultra. Lam. 1  $\frac{1}{2}$  lin latæ, pallescentes. In pinetis hercynicis prope Clausthal.

24. *A. amarus*, compactus, candidus, pileo planiusculo rimoso-rivuloso, disco rufo, lamellis leviter decurrentibus, stipite solido subtomentoso.

Est *A. rivulosus* B. A. S. p. 185. Sapor valde amarus, astuans, quod in hac tribu rarissimum. Stipes aequalis, 1-2 unc. longus, 3-4 lin. crassus,

strictus. Pileus junior convexus, obtusus, 2-3 unc. fere latus, squamulosus. Lam. plano-decurrentes, valde confertæ et angustæ. In dumetis mixtis Lusatiae. Sept. Oct.; in Smolandia semel, exeunte vere. (v. v.)

Ultimæ tres species reliquis minores, stipite subvestito distinctæ, pileo tenuiori et lamellis levius decurrentibus ad seq. sectionem transeunt.

††† COLLYBARI. (25-42). Pileus vere, sed non compacte carnosus, planiusculus, l. leviter depresso, non expallens. Lamellæ adnatae, nec proprie decurrentes. Stipes tenuior, in pileum minus diffusus. In cibariis vix recepti.

Præter aliis notis dignoscuntur 25-28 pileo cinereo l. fusco; 29-32 flavo l. virescente; 33-38 colore albo. Magis differunt reliquisque majores 39-42, colore mutabili.

\* 25. *A. bufonius*, pileo obsolete umbonato rugoso stipiteque longo subiomentoso umbrinis subnigrescentibus, lamellis alutaceo-pallidis. Pers. Syn. p. 359.

Stipes 3 unc. longus, 2 lin. crassus, basi albidus. Pileus 1 unc. latus. Lam. subdecurrentes, nitente-pallidæ. Inter Andreasberg & Oderbrück in Hercynia. Pers.

26. *A. curtipes*, pileo obtuso laxe griseo, lamellis adnatis confertis albis, stipite solido brevi extus intusque fusco.

Primo obtutu A. brevipedem. Bull. (vid. p. 53) revocat, sed tenuior et lamellæ, quæ latiusculæ, ob formam pilei planam l. subdepressam subdecurrentes. Stipes vix uncialis, 2-3 lin. crassus, rigidus, fragilis, testaceo-fuscescens, subinde fibrillosus. Pileus 2-3 unc latus. In Scania campestri, locis graminosis, Oct. Nov. (v. v.)

27. *A. fumosus*, pileo glabro fuligineo-livido, lamellis adnatis confertis, stipiteque farcto lige-

vi sordide albis. *Pers. Syn.* p. 348. *Fries Obs.* 2. p. 102.

Plerumque gregarius; substantia subcartilaginea, rigida. Stipes 2-3 unc. longus, 2-3 lin. et ultra crassus, glaber, apice plerumque albo-pruinitus. Pileus planiusculus, etiam difformis, 1-3 unc; junior fuligineo-nigricans, dein cinereo-lividus. Lam. varie adnatæ. Occurrit pileo rimoso-squamuloso — irregulari excentrico, stipite brevi, lamellis obscurioribus. *In pinetis, betuletis similibusque, locis asperis, Aug.-Oct.* (v. v.)

*B.* *A. polius*, densissime cæspitosus, pileo griseo, lamellis stipitibusque inæqualibus albidis. *Fries Obs.* 1. p. 19.

Stipites (40-50) in corpus carnosum basi connotati, flexuosi, glabri. Pilei  $\frac{1}{2}$  — 2 unc., convexo-planii. Mirabilis antec. monstruositas. *In pinetis & fagetis, passim. Aug.-Oct.* (v. v.)

28. *A. obolus*, pileo laxe livido, lamellis adnatis confertis stipiteque fistuloso æquali striato dilutioribus.

Subgregarius. Stipes 2 — 2  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 2 lin. crassus, glaber, lividus. Pileus regularis; convexo-planus, non depresso, obtusus, 1  $\frac{1}{2}$  unc. latus. Lam. planæ, albo-lividæ, distinctæ. *In pinetis ericetosis, raro. Sept. Oct.* (v. v.)

\*\* 29. *A. cerinus*, flavo-cerinus, pileo laxe opaco, lamellis adnatis confertis stipiteque farcto brevi substriato flavidioribus. *Pers. Syn.* p. 321.

Gregarius. Stipes uncialis, 2 lin. et ultra crassus; nunc æqualis, unicolor; nunc deorsum attenuatus nigrescens, firmus. Pileus plano-convexus, obtusus, saxe depresso, non politus, 1 - 1  $\frac{1}{2}$  unc. latus; variat fuscescens. Caro et sporidia alba. Lam. 1 lin. latæ, planæ. *In pinetis montosis, rario.* *Aug.-Oct.* (v. v.)

*B. vernicosus*, pileo plano-depresso splendente, lam. subdistantibus stipiteque farcto aquali dilute flavis. *A. S. p. 169.* (splendens). In abiegnis mucososis Lusatiae. Sept. — Dist. species?

30. *A. subalutaceus*, pileo lavi pallescente, lamellis adnatis subdistantibus albidis, stipite farcto elastico pallido. *Batsch. f. 194.* *Fries Obs. 2. p. 138.*

Stipes uncialis et ultra, 2-3 lin. crassus, lavis, glaber. Pileus planiusculus, variat depresso et umberatus, 1-2 unc. latus Variat odore aniseo. In nemorosis, rario. Aug. Sept. (v. v.)

31. *A. viridis*, pileo glabro viridi, lamellis adnatis angustis stipiteque solido glabro albis.

*Sterb. t. 5 D. A. virens. Scop. Carn. p. 437* (bene quadrat; Decand. sub *A. palomet.*) *A. cœruleus. Bolt. t. 12! A. viridis. With. arr. 4. p. 198. Pers. Syn. p. 524.*

Species minus nota; saltim cum Russulis viridibus et *A. aruginoso* (Huds. Curt. etc.) frequenter confusa. Stipes 2-3 unc. longus, 2-3 lin. crassus, albūs. Pileus carnosus, obtusus, convexus, rugosus, 2-3 lin. latus. In silvis Anglice &c. rario. Aug. sq. (v. ic.)

32. *A. odoratus*, fragrans, ex albo sordide virens, pileo lavi, lamellis decurrenti-adnatis subconfertis, stipite farcto in aquali glabro.

a. pileo viridi, lamellis albidis. *Bull. t. 176, 556. f. 3. Humb. Frib. p. 86. Sowerb. t. 42. Pers. Syn. p. 523. Dec. fr. 2. p. 175. Flor. Dan. t. 1611. A. æruginous. Schum. Sæll. p. 298.*

b. totus glauco-æruginous. *A. anisatus. Pers. Obs. 1. p. 44. Schum. l. c. p. 335. A. S. p. 170.*

c. pileo albo, lamellis viridibus. *A. fragrans. var. Fries Obs. 1. p. 76.*

Odor aniseus speciei criterium, qui cum *A. sva-*  
*veolente et fragrante summam indicat affinitatem,*

Color variat, subinde totus cinereus. Statura admodum mutabilis, stipes nunc longus tenuis flexuosus, nunc brevis tuberosus difformis; pileus (planiusculus) depresso l. umbonatus, regularis l. repandus, 1-3 unc. latus, plus minus carnosus. Lamella strictæ, proprio habitu distinctæ. Edulis. Pers. Ch. com. Swartzius l. c. 1808. p. 84 in hoc describendo specimen A. aruginosi ante oculos habuit; inde 'pileus coerulescens viscosus, lamellæ violaceo-fuscescentes' etc. In silvis frondosis densis, frequens. Aug.-Nov. (v. v.)

\*\*\* 33. *A. svaveolens* Schum., fragrans, albus, pileo convexo lævi, lamellis leviter decurrentibus confertis, stipite subfarcto, basi incrassato villoso.

*Descriptio Schumacheri* (*Sæll.* p. 337.) ad nostrum fungum non omnino adæquata. A priori, nisi A. fragrantem, cui affinior, etiam conjunxissem, distinguere coactus fui. Odore et sapore gratus. Color, etiam humidi fungi, albus. Pileus carnosus, raro depresso, nec vere umbilicatus, neque flaccidus. Stipes dein cavus, 1 — 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 3 lin. et ultra crassus. Inter muscos, passim. Aug.-Oct. (v. v.)

34. *A. tornatus*, inodorus, albus, pileo regulari lævi, lamellis decurrenti-adnatis minus confertis, stipite farcto æquali glabro.

Proximus et lamellarum habitu A. odoro similissimus, regularite et odoris defectu notus. Ab A. albo (p. 53) differt statura minori, lamellarum forma pileique margine. Pileus planus, uncialis et ultra. In silvis, solo humoso. Sept.-Nov. (v. v.)

55. *A. candicans*, minor, albo-nitens, pileo lævi convexo, dein umbilicato, lamellis adnatis, dein decurrentibus, stipite fistuloso lævi.

*A. umbilicatus*. Bull. t. 411. f. 2. Dec. fr. 2. p. 167. A cyathif. Lumn. Pos. p. 509. A. candic. Pers. Syn. p. 456. A. S. p. 219. Fries Obs. I, p. 77. Bolt, t. 17.

Stipes subæqualis, basi incurvus radicatus villosus, de cetero glaber, 1-2 unc. longus, 1-2 lin. crassus. Pileus leviter carnosus, tenax, vix uncialis, margine regulariter deflexus, raro subdifformis. Lamellæ subconfertæ. Formæ aberrantes non paucæ. *Inter folia decidua Quercus, Betulæ; Fagi &c. ubique. Aug.-Nov. (v. v.)*

36. *A. olorinus*, candidus, pileo convexo lævi, lamellis decurrenti-adnatis, stipite cavo squamuoso, basi tomentoso. *Fries Obs. 2. p. 143.*

Priori affinis. Stipes 2-3 unc. longus, 2 lin. crassus, albo-pulverulentus, basi tomento gyssopino. Pileus uncialis, siccus, sat carnosus, hinc lamellæ arcuatæ. *Inter folia decidua. Sept. Oct. (v. v.)*

37. *A. dealbatus*, inodorus, albidus, pileo subinæquali tenui lævi, lamellis adnatis confertis, stipite farcto æquali glabro.

Subgregarius, vulgatissimus, polymorphus. Stipes tenuis, lævis, tenax, brevis. Pileus leviter carnosus planiusculus, sæpe depresso, 1-2 unc. latus. Lam. angustæ. Variat colore fuscescente, incarnato etc. *In pratis, versuris, arvis, juxta vias ubique. Aug.-Nov. (v. v.)*

*B. aggeralis*, pileo subexcentrico!, stipite elongato tenui pallido. *In aggeribus humosis circa Lundam, vulgaris. (v. v.)*

γ. pileo repando lobatoque, stipite brevi. *A. dealbatus. Sow. t. 123. Swartz. l. c. 1808. p. 247.*

Plures ut reticeam formas; forte huc *A. agrestis* With. 4. p. 162. *A. michelianus*. Fries Obs. 2. p. 146. Mich. t. 74. f. 3.

38. *A. cerussatus*, inodorus, albus, pileo carnosø lævi, lamellis adnatis confertis, stipite solido lævi basi tomentoso.

Sæpe gregarius. Stipes basi subincrassatus, sæpe radiculis fibrillosis, ut in *A. polyrrhizo* (dubio)

Otto, 2-3 unc. longus. Pileus convexulus, mox planus, obtusus, 2-3 unc. latus, subnitens. Lamellæ parum decurrent. In silvis umbrosis, præsertim acerosis, inter muscos. Sept.-Nov. (v. v.)

B. *difformis*, pileo repando lobatoe etc. A. *difform.* Schum. Sæll. p. 335. Ex habitu huc retuli.

\*\*\*\* 39. *A. grammopodius*, major, pileo obsolete umbonato lavi, lamellis adnatis confertis albis, stipite solido sulcato glabro. Dec. fr. 2. p. 178.

a; albus. Bull. t. 548. f. A., 585. f. 1. (A. graveolens. With. Sow. t. 281 ex syn. - non vidi icon.)

b. pileo rufescente. Bull. t. 548. f. B. C.

c. pileo livido, pallido.

Major, sed lamellæ non decurrentes, insuper angustæ, subinde divisæ. Pileus carnosus, margine tenuis, 3-5 unc. latus, subfragilis, e campanulato-convexus, dein planiusculus, etiam depresso et repandus. Stipes 3 unc. circiter longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, firmus, colore pilei, basi incrassatus villosus. In nemoribus graminosis. a. b. Galliæ. (v. ic.) c. Scaniæ. Oct. (v. v.)

40. *A. millus*, pileo subumbonato lævi fuscescente, lamellis adfixis, apice postico soluto recurvato, stipite solido æquali strigoso. Sow. t. 184.

Species paradoxa. Stipes 2-3 unc. longus, digiti crassit., fuscus, radice reticulata. Pileus carnosus, junior convexus, dein planiusculus, demum depresso et repandus, 2 unc. latus, glaber, pallide lurido-fuscus. Nomen ob lamellas recurvatas, collarium spinulosum referentes, optimum. In Anglia. Jan. (v. ic.)

41. *A. inornatus*, pileo obtuso lævi subrepando virente-livido, lamellis adnatis, stipite solido lævi glabro. Sow. t. 342.

Pulcher. Stipes 2 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus et ultra, basi incrassatus, pallescens. Pileus car-

nosus, planiusculus, dein depresso, 3 unc. latus. Lamellæ subconcolores, juniores planæ adnatæ, dein decurrentes. *Ad terram in Anglia.* (v. ic.)

42. *A. fimbriatus*, sordide albidus, pileo demum infundibuliformi lævi, marginè sinuato lobatoque, lamellis adnatis tenerrimis, stipite farcto brevi.

*Auricula leporis alba.* *Sterb.* t. 15. *B. B. Am.* *Hall.* *helv.* 2340. *A. fimbriat.* *Bolt.* t. 61. *Pers.* *Syn.* p. 465. *Fries Obs.* 2. p. 204. *A. infundibulif.* *Liljebl.* *Sv. Fl.* 2. p. 447. *A. lobat.* *Swartz l.* c. 1803. p. 241. c. sq. var.

Gregarius, immo cæspitosus, difformis; nulla tamen monstrosa progenies. Stipes vix uncialis, glaber. Pileus leviter carnosus, junior plano-convexus, sæpe excentricus, 3 unc. latus; expallens ut *Omph. Collybariæ*. Lamellæ confertissimæ, perangustæ, sæpe furcatæ. *Ad terram; in ligno e carie madido, rario.* *Aug.* *Sept.* (v. v.)

In individuis infundibuliformibus lamellæ neque decurrentes (ut etiam sapor mitis), hinc non *Ag. e. Gled.* p. 99; neque secedenti-liberæ, ut in *Buxb. Cent.* IV. t. 32.

B. *A. lobatus*, pileo tenui spadiceo, lamellis fuscescentibus, stipite farcto sursum incrassato. *Sow.* t. 106. *Pers. Syn.* p. 450.

Simillimus priori; in fallor, mera varietas. Colore præcipue distat. Stipes 2 unc. longus, 3.4 lin. crassus, glaber. Lam. "decurrentes." *Swartz. Circa radices arborum Angliae; prope Stockholm, raro. Initio autumni.* (v. ic.)

††† HETEROCLITI. Cæspitosi, varii. *Alii lignatiles; alii terrestres.* (*A. fumosus* β.; etiam *A. phyllophilus* etc.)

\* *lamellis adnatis.*

43. *A. lignatilis*, cæspitosus, pileo irregulari subexcentrico villosulo albido, lamellis adnatis confertis candidis, stipite farcto flexuoso basi villose.

**Irregularis.** Stipes varie tortus, 2 unc. longus, 1  $\frac{1}{2}$  — 3 lin. crassus; variat glabriustulus et sursum pruinatus, etiam striatulus. Pileus planiusculus, etiam convexus et umbilicatus, 1-2 unc. latus. Caro alba tenax, haud crassa. Lam. angustæ. Odor farinæ recentis. Huc certe *A. cretaceus*, B. Fries. Obs. 1. p. 13; etiam *A. lignatilis* Pers. Syn. p. 368, sed descr. erronea. In cryptis flæ elliformis, pileo obliterate, villosus evadit. *In ligno putrido Fagi* &c. frequens. Aug.-Dec. (v. v.)

**B. A. lachnopus,** irregularis, pileo repando subnudo cinereo, lamellis subvenosis confertis candidis, stipite farcto villoso. Fries Obs. 1. p. 18.

Priori et *A. fimbriato* affinis. Substantia tenax. Stipes brevis. subcavus. Lam. saepe furcatæ. Locis similibus, sed valde umbrosis. Oct. (v. v.)

**44. A. cretaceus,** cæspitosus, albus, pileo convexo piano, lamellis adnatis subconfertis, stipite solidio inæquali subtomentoso. Pers. Syn. p. 39.

Stipes 2-3 unc. longus, subcompressus, præser-tim basi curvatus et 5-8 specimina connata. Pileus carnosus, 1  $\frac{1}{2}$  unc. latus. Lam. tenues, angustæ, aquosæ. *In pinetis montosis rarius.* Sept.

**45. A. ramosus,** cæspitosus, albus, pileo convexo æquali glabro, lamellis adnatis angustis, stipitibus solidis glabris.

*A. ram.* Bull. t. 102. Dec. fr. 2. p. 178. Am. ram. Lam. Enc. 1. p. 108.

E tubculo radicali connato stipites numerosi, æquales l. sursum leviter attenuati, longi, in carnem pilei diffusi protrudunt. Pileus junior hemisphæricus, 2 unc. latus, siccus. Caro tenax, nec crassa. *Ad truncos vetustos, autumno.* (v. ic.)

**46. A. amplius,** cæspitosus, pileo convexo glabro ni-grescente-fuligineo, lamellis adnatis confertis aquoso-cinereis, stipite ampio glabro albo. Pers. Syn. p. 360.

Stipes 6 unc. longus, 1 unc. crassus, basi subtomentosus. Pileus subcarnosus, 4-5 unc. latus. Lam. subdecurrentes, serrulatæ, 3 lin. latæ. Ab A. fumoso amplitudine tantum recedit. In pinetis, rarius.

\*\* lamellis decurrentibus.

47. *A. adhærens*, cæspitosus, adglutinans, pileo inæquali lacunuloso sordide pallente, lamellis tenuissimis lineatim longe decurrentibus albis, stipite cavo subradicato. *A. S.* p. 187.

Analogus *A. lignatili*; sed non affinis. Totus fungus paene siccus, et glutine tamen quodam parco tenace persistente obductus, nonnumquam veluti pulvérulentus. Substantia mollis, lenta; gustata insipida, sed paulo post vehementer adstringit; inodora. Stipes firmus, mediocris, pileo concolor. Pileus  $\frac{3}{4}$  — 1  $\frac{1}{2}$  unc. latus, primo convexus subumbonatus, dein subdepressus, interdum subinfundibuliformis. Ad trunços putridos abiegnos. Lusatiae, Sept. in Apr. usque superstes.

$\beta$ . *A. adhæsivus*, pileo plano discoideo viscoso, lamellis decurrentibus stipiteque solido attenuato albis. *With. arr.* 4. p. 160.

Pileus 1  $\frac{1}{2}$  — 2  $\frac{1}{2}$  unc., fuscescenti-albidus. Stipes 3 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus. In Angliae plantariis. Sept.

48. *A. œdematopus*, subcæspitosus, pileo conico pulvérulento rufo, lamellis decurrentibus stipiteque solido ventricoso pulvérulento rufescensibus.

*A. œdem.* Schæff. t. 259. *Sibth. ox.* 350. Am. œdematosa. *Lam. l. c.* p. 108. *A. fusiform.* Bull. t. 76. Dec. fr. 2. p. 177. (lam. adnat.)

Ab *A. fusipede* longe differre videtur. Stipes 2 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus. Pileus ultra uncialis. Forsan typus novæ tribus, cui etiam accedunt *A. elasticus* W. et Batt. t. IX. C.; XX. B. In silvis, vere & autumno. (v. ic.)

*B.* pileis exiguis rufis convexis, lamellis angustis stipiteque albis.

*Batt. t. IX. f. F. A. coralleid. Scop. Subt. 35. Dicks. Crypt. Brit. 1. 16.*

Status prioris, e' loco, ut solet, mutatus. Stipes fere prioris, pluribus emarcidis cinetus. Pilus  $\frac{1}{4}$  unc. latus. In arboribus cavis. (v. ic.)

49. *A. hebepodius*, cespitosus pileo umbilicato inaequali lavi griseo, lamellis longe decurrentibus stipiteque lanuginoso albis. *Mich t. 79. f. 1.*

Magnus, 4 unc. altus. Stipites vase et irregulariter ramosi,  $\frac{1}{2}$  unc. crassi, basi connati. Pilus 1  $\frac{1}{2}$  unc. latus. Lam. longissime decurrentes. In silvis Italicae. Oct. (v. ic.)

50. *A. connatus*, cespitosus, albus, pileo umbonato inaequali subviscoso, lamellis decurrentibus, stipitis cavis amplis tuberoso-conjunctis. *Schum. Sæll. p. 500.*

Magnus. Stipites saepe flexuosi, sursum attenuati; 3-5 unc. longi,  $\frac{3}{4}$  — 1 unc. et ultra crassi; tubere radicali magno crasso carnoso radicoso. Pilus primo conicus, 2  $\frac{1}{2}$  — 3  $\frac{1}{2}$  unc. latus, tuberculosus, margine repandus. Ad fossam silvae Sællandiae, rarissime. Aug. (v. ic.)

Exoptanda foret maxime specierum hujus subtribus reductio NB. iusta; vereor tamen potius, ne et ipse in speciebus affinibus conjungendis iusto rigidius progressus sim. Sectionum trium priorum affinitates et analogiae clare patent. Ad Omphalias Collybarias, facile subjungendas, undique transeunt. Differentia suo loco indicabitur. Heterogena magis sectio quarta, e qua primam modo reperi speciem; reliquis vero, mihi nondum obviis, locum adsignare non potui aptiorem.

### Species inquirendæ:

5. *Fungus pratensis* albus rugatus perniciousus, *Sterb.* f. 16. *A.* (20. *A.*)

2. *A. obesus*. *With.* arr. 4. p. 137. *Stipitis solidi* ~~ebco-~~  
*nici apice vix latior pileus albo-fuscescens*, Lamel-  
læ decurr., ramosæ, albæ.
3. *A. opacus*. *With.-Sow.* t. 142. *A. cerussatus?*
4. *A. pistillaris*. *With.* l. c. p. 157. *Albidus*. *Pileus 1 1/4*  
*unc. convexus*. Lam. decurr. *Stipes solidus, subconci-*  
*cus*.
5. *Omphalom. margine eoccineo*. *Batt.* t. 12. F.
6. *Omph. nanus, albidus*. *l. c. t. 16. f. F.* *Habitus tri-*  
*vialis. (t. 12. E.; t. 19. M. forte Galorrhæ, Russu-*  
*læ &c.)*
7. *A. adscendens*. *Schum.* p. 323. *Subumbrinus*.
8. *A. neptuneus*. *Pallidus, ochraceo-rufescens*. *Pileus*  
*tripartitus. (v. v.) Batsch. C. 1. f. 1'8.*
9. *A. pulverulentus*. *Scop.* p. 324. *Ag. lignatili affinis,*  
lam. decurrentibus.
10. *A. glandifer*, *pileo campanulato umbonato cinereo-*  
*livido, lam. distantibus plano-decurrentibus candi-*  
*dis, stipite solido longo*. *Pers. Syn.* p. 552.

*Stipes 3 unc, longus, 3 lin. crassus, varie attenua-*  
*tus. Lam. lineatim decurrent, crassiusculæ. Pileus 1 1/2*  
*unc. — In pinetis Hercynicis. Forte potius Camaroph.*  
*species.*

### Subtrib. 2. CAMAROPHYLLI.

**CHAR.** *Stipes firmus, farctus, demum subca-*  
*vus, deorsum subattenuatus. Pileus carnosus, rigi-*  
*dus, convexus, expansus, non viscosus l. expallens,*  
*margine juniori inflexo; variat umbonatus et de-*  
*pressus. Caro non succulenta. Lamellæ utrinque*  
*attenuatae, longe decurrentes, fornicatae, valde di-*  
*stantes, latæ, crassæ, integerrimæ, sœpe venoso-con-*  
*nexæ, plerumque albæ.*

**Obs.** *Fungi terrestres, solitarii, autumnales,*  
*mites, esculenti, majores l. mediae magnitudinis.*  
*An cum Oesypiis conjungendi? Saltim A. ovinus*  
*potius huc pertineret, sed ex charactere ad illos*  
*referendus.*

**2.** *A. camarophyllus*, pileo subcompacto virgato fuligineo, lamellis decurrentibus albis glaucescentibus, stipite longo valido fibrilloso.

*A. eam.* *A. S.* p. 177. *Fries Obs.* 2. 107. b. *A. elixus*. *Sowerb.* t. 172. *Pers. Syn.* p. 460.

Esca Limacum. Stipes 3-4 unc. longus, subæqualis,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, cinerascens, intus albus. Pileus convexus, explanatus, fibriloso-striatus, 3-6 unc. latus, demum fragilis, variat niger et coeruleascens. In pinetis montosis subudis, frequens. Aug.-Oct. (v. v.)

- 1.** b. *A. ovini* var. lamellis vere decurrentibus, pileo glabro — h. 1.
- 2.** *A. nemoreus*, pileo compacto glabro fulvo-rubescente, lamellis decurrentibus albis, stipite solido longo basi lanato. *Pers. Syn.* p. 505.

Sequenti affinis. Stipes 3-4 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, pallescens. Pileus 3 unc. fere latus, late umbonatus. Lam. 2-3 lin. latæ, minus distant. In silvis umbrosis, raro.

- 3.** *A. pratensis*, firmus, pileo subcompacto convexo-expanso glabro, lamellis decurrentibus crassis, stipite farcto brevi, deorsum attenuato. *Fries Obs.* 2. p. 116.

a. totus fulvus, flavescens &c. *Sterb.* t. 20. L. A. miniatu. *Schæff.* t. 513. A. ficoid. *Bull.* t. 587. f. 1. A. fulvosus *Bolt.* t. 56. A. fulvus. *With.* l. c. p. 179. A. prat. *Pers. Syn.* p. 304.

b. pileo rufescente, lamellis albis. *A. vitulinus*. *Pers.* p. 305.

d. totus cinereus. *A. cinereus*. l. c.

e. totus albus, A. clavæformis. *Schæff.* t. 307. *With.* p. 176.

Stipes sursum demum cavus, 1  $\frac{1}{2}$  unc longus, pallescens. Pileus uncialis et ultra, compactus, sed margine tenuis, omnino siccus. Lamellæ alternantes, basi venis connexæ. In versuris, pratis alibique, communis. Aug.-Nov. (v. v.)

- B. ericosus*, pileo tenuiori, margine striato.  
 a. *flavescens* &c. A. *turbanat*. Schum. p. 317.  
 b. *cæruleoscens*. A. *Lacmus*. Schum. p. 333.  
 c. *cinereus*. A. *meisneriens*. Pers. Syn. p. 304.  
 d. — *albus*, — ? A. *ericetosus*. Bull. t. 467. A. *ericetus*. With. l. c. p. 173. A. *transformis*. Holmsk. II. t. 33. A. *subradiat*. Schum. p. 267.

A priori differt ut *Russula fragilis* ab A. *emeticus*. Cum A. *sciophano* non commutandus. Synonyma inter hunc album et sequ. vix certe distribui possunt. In ericetis, passim. Sept. — Nov. (v. v.)

4. *A. virgineus*, candidus, pileo tenui humido convexo, dein umbilicato, lamellis decurrentibus venoso-connexis distantibus, stipite fistuloso tenui, deorsum attenuato.

a. Gled. p. 119. c. A. *niveus*. Scop. 2. p. 430. Schæff. t. 232. With. l. c. p. 235. A. *ericeus*. Bull. t. 183. Schum l. c. p. 266. A. *virgineus*. Pers. Syn. p. 456. Dec. fr. 2. p. 168.

b. A. *virg.* Wulf. in. Jacq. Coll. 2. t. 15. f. 1. (Stipes solidus æqualis, pileus siccus) Sow. t. 32. Sw. l. c. 1803. p. 246. — A. *conoceph.* Schum. p. 267. (stip. cavus).

Edulis, ut antecedens. Pers. Ch. Comest. Stipes 2 unc. circiter longus, 1-2 lin. crassus, glaber. Pileus fere membranaceus, disco interdum rimosus, uncialis fere, senescens Mucedinem umbrinam alit. E charactere pilei subviscosi ad *Hygrocybos* accedit, sed substantia rigidior firmior, nec succulenta etc. In ericetis & pratis muscosis, ubique. Sept.-Nov. (v. v.)

Latent, in fallor, plures species intermediae (v. c. *Monomyces platyceph.* Batt. t. 19. H. A. *præaltus* Fl. Dan. t. 850); ipse vero ob copiam, quasi arbores in silva densa, distinguere non valo. Quibus determinatis specierum numero aucta erit subtribus naturalissima, sequ. licet contigua.

## Subtr. 3. HYGROCYBI.

**Hydroph.** spec. *Eatt.* p. 51. **Ag.** spec. XVII. **Gled.** *meth.*, p. 109. **A.** *dentatus*, *Linn.* *Suec.* 1206. **Decor-**  
**lores.** *Scop.* p. 442. **Am.** *viscosa*. *Lam.* *Enc.* I. p.  
108. **Nitentes.** *Pers.* *Syn.* p. 554.

**CHAR.** Succulenti, subfragiles. Stipes cavus, glaber, a pileo sat discretus, raro aequalis. Pileus leviter carnosus, glaber, e campanulato l. convexo-expansus, saepe etiam depresso, humidus viscosus diaphanus; siccus nitens, decolorans. Caro tenuis, aquosa. Lam. latæ, postice attenuatæ, dente terminate. Color plerumque luteus, coccineus, livido-nitens &c.

**Obs.** Fungi elegantes, medii, terrestres, solitarii, in pratis muscosis post pluvias intensiores præcipue (et hinc serotini plures) vigentes. Mites, sed in cibariis non recepti. Lam. nunc decurrentes, nunc liberæ, (quo in eadem tribu nil rarius), quod vero e pilei forma unice pendet. (*A. virgineus.*)

\* 1. *A. irrigatus*, pileo campanulato lævi stipiteque aequali viscoso lividis, lamellis fornicatis distinctis albidis. *Pers.* *Syn.* p. 361.

*A. virgineo proximus* Stipes subtenax, teres, lævis, 2 unc. longus, 2-3 lin. crassus, "albidus" *Pers.* Pileus uncialis et ultra, expansus late umbo-natus, glutine adhærens. Caro tenuissima. Lamellæ distantes, 1-2 lin. latæ, adnatae, dente decurrentes. In pinetis Germaniae; Smolandiae pratis. Sept. (v. v.)

2. *A. unguinosus*, pileo campanulato-convexo obtuso lævi stipiteque inæquali glutinosis lividis, lamellis adnatis venoso-connexis albis.

Stipes cavus, basi apiceque subattenuatus, subinde flexuosus, 2 unc. longus, 3 lin. crassus. Pileus uncialis et ultra, glutine tenaci collinitus. Lam. distantes, latæ, ventricosæ. In Scaniæ nemoribus graminosis humidis. Oct. Nov. (v. v.)

3. *A. psittacinus*, e viridi lutescens, viscidus, pileo campanulato expanso, humido striato, lamellis adnatis subdistantibus, stipite æquali lævi.

*Mich. p. 150. Hydroph. psittacoides. Batt. t. 21. f. E.*  
*A. chamaeleo. Bull. t. 545. f. 1. Dec. fr. 2. p. 180.*  
*Am. Hall. n. 2453. A. psittacin. Schæff. t. 301.*  
*Sowerb. t. 82. Pers. Syn. p. 335.*

- b. compressus nigrescens. *Sw. l. c. 1808. p. 85.*

Colore virescente eminus dignoscitur, dein magis lutescit. Pileus subcarnosus, uncialis, subumbonatus, coloris intensitate varius. Lamella crasse, medio latissimæ. *In pratis, versuris Sept.; frequenter Oct. Nov. (v. v.)*

- \*\* 4. *A. sciophanus*, subtestaceus; pileo convexo obtuso humido, margine striato, lamellis decurrentibus distantibus, stipite æquali lævi.

Affinis *A. pratenti*, medius inter *psittacinum* et *lætum*. Color non latus, sordide fulvescens. Stipes cavus, 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 1-2 lin. crassus. Pileus leviter carnosus et viscosus, uncialis. *In graminosis. Oct. Nov. (v. v.)*

5. *A. latus*, pileo convexo-plano lævi viscoso fulvo, lamellis decurrentibus distantibus incarnatis, stipite longo tenaci fulvo

*Pers. Obs. 2. p. 48. Syn. p. 334. Fries Obs. 2. p. 140<sup>f</sup>*

Stipes 3 unc. fere longus, tendit, apice sape obscurior. Pileus leviter carnosus,  $\frac{1}{2}$  — 1 unc. latus, margine demum striato. Lamelle subtenues, plerumque venoso-connexæ. *In pratis muscosis. Sept.-Nov. (v. v.)*

6. *A. ceraceus*, pileo convexo-plano viscoso substriato luteo, lamellis adnato-decurrentibus distantibus stipiteque subinæ quali flavis.

*J. Bauh. XL. c. 69. Buxb. Cent. IV. t. 28. f. 3. Am. Hall. helv. 2420. A. cerac. Sowerb. t. 20. Pers. Syn. p. 337. formæ variæ. A. hypoxanth. Otto p. 87.*

b. A. cer. Wulf, in Jacq. Coll. 2.t. 15. f. 2. Swartz. l.  
c. p. 87.

Gregarius, minus tenax. Stipes tenuis, varius,  
sæpe compressus. Pileus obtusus, nitens,  $\frac{1}{2}$  — 1  
unc. et ultra. Lam. latæ, triquetra, distinctæ plus  
minus decurrentes. b. colore sequentis, pileo sicco  
etc. recedit. In pratis & pascuis, vulgaris. Aug.-  
Nov. (v. v.)

\*\*\* 7. *A. chlorophanus*, pileo submembranaceo con-  
vexo striato viscoso stipiteque æquali lævi fla-  
vis, lamellis adnexis albidioribus.

Numquam viret l. nigrescit. Fragilis. Stipes  
2-3 unc. longus, 2 lin. crassus, glaber, nitidus Pi-  
leus uncialis, demum planus subrimosus, variat lo-  
batus. Lamelle ventricose, distinctæ, subdistantes,  
flavidæ. Inter muscos passim. Aug.-Oct. (v. v.)

8. *A. conicus*, pileo conico acuto sublobato, lamel-  
lis adcurrentibus confertis ventricosis attenua-  
to-liberis, stipite cylindrico striato.

Tourn. J. R. H. t. 327. f. A E. Vaill. p. 67. n. 48, 49.  
Ain. Hall. helv. n. 2421. A. dent. Spec. Plant. 2. p.  
1641. Lumn. Pos. p. 516. A. conicus. Schäff. t. 2.  
Pers. Syn. p. 335. A. croceus. Bull. t. 50, 524. f. 3.  
Dec. fr. 2 p. 191. A. aurant. Sow. t. 381. With. l.  
c. p. 261.

- a. citrinus, flavus, virescenti-flavus. Fl. Dan. t. 599.  
(mala). A. hyacinthus. Batsch. f. 28.
- b. demum nigrescens. A. tristis. Pers. Obs. 2. p. 49.
- c. pileo fuligineo. A. inamœnus. Pers. Syn. l. c.
- d. pileo aurantio, coccineo. Scop. p. 443. A. aurantius. Lightf. Scot. p. 1025. Curt. Lond. 2 t. 208.  
Bolt. t. 67. f. 2. (nitide, sed non accurate), A. aurantio-crocat. minor. Schum. p. 291. bene. Fl.  
Dan. t. 1009. f. 2. dextr.

Substantia aquosa. Stipes 2-4 unc. longus, 2-4  
lin. crassus, saepe tortilis. Pileus leviter carnosus,  
demum expansus acute umbonatus, difformis et  
sæpe lateraliter elongatus; humidus viscosus, margine

*striatus.* Lam. subconnexæ. Color variat; sed *fractus nigrescit!*, quod nulla in affini specie vidimus. Lam. albidæ, flavæ, fuligineæ; in d., qui a sequentibus certe distinctus, basi purpurascentes. Aliud singulare phænomenon, lamellas nempe lac sulphureum A. scrobiculati instar copiose fundentes, aliquoties observavimus. *In pratis clatioribus muscosis alibique, frequentissime.* *Majo-Oct.* (v. v.)

9. *A. obrusseus*, aureo-luteus, pileo expanso lævi, sicco lucido flavo, lamellis adnatis ventricosis distantibus, stipite crasso compresso.

*Hydroporus incide luteus.* Batt. p. 51. t. XIX. D. Am. Hall. helv. 2423.

Elegans. Stipes inæqualis 2 unc. circiter longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, cavus, levis, glaber. Pileus junior convexus, obtusus, fragilis, 2-4 unc. latus, saeppe inæqualis, lavis, humidus obsoletè viscosus. Lam. crassæ, 3 lin. latæ, transversim venosæ. *In nemoribus graminiosis.* *In Scania reperi.* Oct. Nov. (v. v.)

\*\*\*\* 10. *A. puniceus*, pileo campanulato obtuso lobato aurantio-coccineo, lamellis adfixis adseen-dentibus flavis, stipite crasso ventricoso, basi albo.

Sterb. t. 22. D. E. (non descr.) A. surantius. Auct. Vahl. N. H. S. Skr. 3. p. 166. Ag. Fl. Dan. t. 833. f. 1. (erronea.) A. rigidus. Bolt. t. 43. (male.) A. aurantio-crocatus. v. major. Schum. Sæll. p. 291. bene.

b. multo minor. A. coccineus. Bull. t. 202. ad part. Dec. fr. 2. p. 186. aliorumque.

Certe ab A. conico d. et A. coccineo diversus. Stipes junior farctus, dein cavus, 3 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  — 1 unc. crassus, utrinque attenuatus, siccus, striatus, apice saeppe squamulosus, flavescens 1. pileo concolor. Pileus primo campanulatus, dein ex-plano-convexus, late et obtuse umbonatus, 2-4 unc. latus, laevis, undulatus et lobatus, irregularis, humidus subviscosus sanguineus, dein siccus et præci-

pue disco expallens. Lam. ventricose, 2-4 lin. latæ, demum venoso-connexæ, totæ adnatæ, sed ob pilei formam liberæ apparent; variant albo-flavæ et basi purpurascentes. *Cum prioribus, vulgaris.*  
*Aug.-Oct. (v. v.)*

11. *A. coccineus*, pileo convexo expanso viscoso, demum depresso, lamellis adnatis dente decurrente connexis versicoloribus, stipite compresso coccineo.

*Mich. gen. p. 150. Hydropor. multicolor. Batt. t. XIX. f. B. A. miniatus. Scop. p. 442. Am. Hall. helv. 2421. b. A. kermesinus. Fl. Dan. t. 715. Vahl. l. c. 2. p. 186. A. scarlatinus. Bull. t. 570. f. 2. A. aurant. fig. cocc. Sowerb. t. 381. A. coccineus. Pers Obs. myc. 2. p. 49. Syn. 334. Wulf. in Jacq. Coll. 2. p. 106. Schum. Sæll. 2. p. 290. Swartz l. c. p. 85.*

b. *A. fulvus*, *Pers. Obs. 2. p. 50.*

Magnitudine etiam maxime hic variat; plerumque Stipes 2 unc. circiter longus, 3-4 lin. crassus, cavus, striatus, saepe undulatus, sursum dein coccineus, inferne semper flavescens. Pileus leviter carnosus, subinde umbonatus, primo viscosus læte coccineus, dein expallens siccus, uncialis et ultra. Lamellæ planæ, postice latæ, adultæ basi purpurascentes, medio flavæ, margine glaucescentes. *In pratis, collibus & silvis, frequens. Aug.-Oct. (v. v.)*

12. *A. miniatus*, pileo convexo sicco, demum umbilicato stipiteque subfarcto æquali tereti miniatis, lamellis adnatis distinctis lutescentibus.

*Fungus parvus coccineus. Vaill. p. 66. A. flammeus. Scop. Carn. p. 445. A. glutinosus. Fl. Dan. t. 1009. f. 2. sinistra. (bene.) A. coccin. var. Auct.*

Longe a priori, ceterum simillimo, distat. Stipes 2 unc. circiter longus, 1 lin. crassus, fragilis, lævis nitidus, apice demum cavus. Pileus obtusus, lævis,  $\frac{1}{2}$  — 1 unc., vix ultra, humidus quidem, sed non vere viscosus, expallens. Lamellæ non de-

currentes, neque venis connexæ, distantes, latæ, planæ, flavo-miniatæ, etiam luteæ. Sæpe odor adest ingratus. Medius inter A. coccin. et laceat., quorum affinitatem perspexit Bulliard. In silvis locis graminosis; frequentior in paludosis apprime Oct. Nov. (v. v.)

### Species inquirendæ:

1. A. fastigiatus. Schæff. t. 26. Vix nisi A. conicus.
2. A. laceratus. Bolt. t. 68. Pers. Syn. p. 336. A. flavus. With. A. conici monstruositas stipite torto.
3. A. spadiceus. Scop. p. 443. Pil. convexus spadiceus l. pallide rufus. Lam. liberæ stipesqve citrinæ.

### Subtrib. 4. OESYPII.

CHAR. Rigidi, exsucci. Stipes farctus l. ca-vus, pileo contiguus. Pileus plus minus carnosus, e campanulato l. convexo explanatus, demum de-pressus, opacus, siccus, epidermide squamosa l. seri-cea. Lamellæ latæ, integerrimæ, crassiusculæ, sub-distantes, planæ, e sporidiis copiosis demum sæpe farinaæcæ, in plurimis postice arcuate-decurrentes, aliis adnatæ dente decurrente etc. Color sæpe lute-scens &c. (A. atrovirens forte.)

- \* 1. *A. turundus*, pileo subcarnoso depresso, mox luteo cinereo-squamuloso, lamellis decurrentibus distinctis flavo-albis, stipite fistuloso aqua-li fulvo. Fries 2. p. 199.

A. miniato proximus; differt stipite longiore, cavo, pileo vere squamuloso, lamellis decurrentibus omniumque partium colore. In silvaticis inter fru-tiees & gramina, jam prima æstate, item Sept. Oct. (v. v.)

2. *A. laccatus*, gregarius, pileo subcarnoso tenaci squamuloso expallente, dein disco depresso, lamellis subdecurrentibus distinctis distantibus, stipite tenaci elongato.

Ag. laccat. Scop.-Schæff. t. 13. A. amethyst. Bull. t. 570. f. 1. Aman. carnea. Lam. Enc. I. p. 108.

a. pileo rufo l. carneo, sicco subochraceo. Vaill. par. n. 36. p. 66. Batt. t. 18. G. Am. Hall. helv. 2436, 2439. A. carneus, A. rubellus. Schæff. t. 303, 304. A. farinac. Huds. Bolt. t. 64. Sowerb. t. 208. Pers. Syn. p. 453. Sw. l. c. p. 245. Fl. Dan. t. 1249. — minor: A. rosellus, A. subcarneus, Batsch. Cont. 1. f. 99, 100.

b. pileo amethystino, sicco canescente. Vaill. par. n. 43. p. 67. Am. Hall. 2457. A. amethyst. Huds. Bull. t. 198. Dec. fr. 2. p. 172. Bolt. t. 63. Sow. t. 187. Fl. Dan. 1250. Pers. Syn. p. 465. Sw. l. c. 1809. p. 94. A. yoides. Vill.

Species distinctissima. Humidus totus unicolor est; lamellæ vero et stipes non expallent, sed colorem carneo-roseum l. obscure violaceum servant. Lam. latæ, sæpe furcate, demum albo-farinaceæ. Pileus rimulosus, non politus, valde varius; in paludosis sæpe mycenoideus, campanulatus, humidus striatus; raro ultra uncialis. Stipes subfibrillosus. Ad terram, præsertim humosam; b. locis umbrosis, longe vulgatissimus. Jun.-Nov. (v. v.)

Singularem nisum in formas monstrosas abeundi habet; inde *A. monstrosus* Schum. aliorumque, *A. impolitus* Schum., *A. fasciatus* Schæff. t. 223. *A. ferruginatus* Batsch. *A. roseus*, With.

3. *A. jonioides*, pileo carnoso e campanulato plano demum subdepresso expallente, lamellis arcuato-adnatis albidis, stipite solido sursum attenuato glabro roseo.

Bull. t. 535. f. 3. Pers. syn. p. 338. Dec. fr. 2. p. 182.

Speciem hue locandam esse multa suadent; statuta nempe, lamellæ et color humidus ruber (subinde violascens), siccus alutaceus; sed pileus laxis pingitur. Stipes 2-3 unc. longus, 2-3 lin. crassus. Pileus 2 unc. fere latus, demum concavus subsinuatus. Lam. albida l. lutescentes, 3 lin. latæ. In Gallia. (v. ie.)

\*\* 4. *A. bellus*, pileo subcarnoso depresso squamuoso aureo, lamellis distantibus dentate-con-

nexus stipiteque tenaci dilutioribus. Pers. Syn. p. 452. A. S. p. 218.

A. laccato valde affinis. Solitarius l. cæspitosus. Stipes uncialis et ultra, 2 lin. crassus, rivulosus. Pileus carnosò-membranaceus, in minoribus convexus umbilicatus uncialis, in perfectionibus 2-3 unc. latus, explanatus, obsolete depresso, squamu-  
lis obscurioribus innatis. Lam. adfixa, dein albo-  
farinaceæ. In truncis pineis cariosis in pinetis monto-  
sis, rario. Aug.-Oct. (v. v.)

5. *A. trichæus*, pileo carnosò umbilicato piloso-  
squamoso alutaceo, lamellis dentato-decurrenti-  
bus stipiteque cavo luteis. Pers. Syn. p. 451.

Stipes incurvus, glaber. Pileus sordide ochra-  
ceus subviscosus quasi, 1-2 unc. latus. Lam. latiu-  
sculæ — Conf. *A. chrysophyllum*. Ad ligna pu-  
trida Pini in Hercynia.

6. *A. decorus*, luteus, pileo carnosò explanato sub-  
depresso, squamulis nigricantibus scabro, lamel-  
lis confertis distinctis, stipite farcto æquali.

Est *A. flavo-virens* Fr. Obs. 1. p. 25; elegantia  
nemini cedens. Stipes demum cavus, 1-2 unc. et  
ultra longus, 2 lin. et ultra crassus, incurvus, nunc  
fibrillosus, nunc squamulosus, apice etiam albo-fa-  
rinaceus. Pileus vere, non vero compacte carno-  
sus, junior convexus, subfragilis, 2-5 unc. latus, sub-  
inde irregularis, squamis disco confertis, margine  
raris. Lam. non decurrentes. In truncis cariosis  
Pini in Smolandia silvis, copiose. Aug.-Oct. (v. v.)

$\beta$  *inundatus*, major, pileo fuligineo-flavido, la-  
mellis albidis, stipite pallido demum compresso. In  
trabibus inundatis. (v. v.)

- \*\*\* 7. *A. ectypus*, pileo carnosò convexo-plano sor-  
dide flavo, disco minute squamuloso, lamellis  
adnatis distantibus pallidis, stipite cavo fibril-  
losò deorsum olivaceo-fusco.

Species maxime memorabilis; singulari naturæ lusu A. melleum exacte refert, modo differens squamis obsoletis, annuli vestigio nullo et odore svavi aniseo, dein vero nauseoso. Gregarius, subinde capitosus. Stipes 2-5 unc. longus, 3-5 lin. crassus subbulbosus, elasticus, sordide flavescentia, mox olivaceus, basi nigrescens. Pileus non compactus, junior convexus, dein planiusculus depresso, margine striatus, squamulis l. filis tenerrimis e centro radiatis fuliginis instar conspersus; 1  $\frac{1}{2}$  — 4 unc. latus; dein rufescens, in putrescentibus fere brunneus. Lamelle dente tenello etiam decurrentes, venoso-connexæ, albæ mox pallescentes, dein rufo-maculatæ; e sporidiis copiosis subfarinaceæ. In pratris uliginosis circa Femsjö, nec alibi visus, vulgaris. Jun. Oct. (v. v.)

8. *A. arcuatus*, pileo carnoso expanso testaceo subrufescente, disco squamuoso, lamellis arcuato-decurrentibus subconfertis pallidis, stipite farcto striato basi incrassato. *Bull. t. 443*, 589. f. 1. *Dec. fr. 2. p. 181.*

Parum abfuit, ne cum priori conjunxissem, præcipue cum magnitudine, colore et forma maxime variabilis dicatur. Stipes 1  $\frac{1}{2}$  — 5 unc. longus, albidus, sæpe rufo-virgatus. Pileus junior campanulatus (?), demum pro more depresso, 2-4 unc., colore varius. *Ad terram Galliæ, vulgaris. Autumno.* (v. ic.)

9. *A. ovinus*, pileo carnoso e convexo plano sub-squamulo fuscenscente, lamellis arcuato-adfixis connexis albidis, stipite farcto brevi firmo.

*A. ovin. Bull. t. 580. (fig. a, b. excl.) Dec. fr. 2. p. 177. Pers. Syn. p. 303. A. metapodium. Fries Obs. 2. p. 110.*

Odor farinæ recentis; sapor mitis, hinc edulem facile crederem. Stipes deorsum attenuatus, 1-2 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. et ultra crassus, glaber, cinerascens. Pileus obtusus, 1  $\frac{1}{2}$  — 2  $\frac{1}{2}$  unc. latus, sub-

fragilis, s<sup>e</sup>p<sup>i</sup>us irregularis, margine inciso. Color variat umbrinus, rufescens, griseus etc. Substantia compacta, alba, fracta rubescens. Lam. attenuato-adnatæ, subdecurrentes, crassæ, transversim venosæ, albido-griseæ l. rufescentes. Huc ex charactere, pone A. pratensem ex habitu locandus. In pratis muscosis, tam apricis, quam nemorosis, haud infrequens. Aug.-Oct. (v. v.)

\*\*\*\* 10. *A. sulphureus*, pileo carnoso subumbonato leviter sericeo testaceo-luteo, lamellis arcuato-adnatis subdistantibus stipiteque farcto æquali sulphureis.

*Am. Hall. helv.* 2422. *A. sulphur.* *Bull.* t. 168, 545. f.  
2. *Sowerb.* t. 44. *Dec. fr.* 2. p. 183. *A. S.* p. 170.  
*A. luteus.* *Schum.* p. 318. — *b. Pers. Syn.* p. 322.  
*Sw. l. c.* 1808. p. 83.

Odor foetidus, peculiaris, quodammodo Philadelphi coronari. Sæpe gregarius. Stipes 2-4 unc. longus, 3-4 lin. et ultra crassus, firmus. Pileus e globoso-explanatus, ohtusus l. umbonatus, demum depresso, levis apprens, sed sub lente evidenter sericeus subsquamulosus, sordide l. rufescenti sulphureus. Lam. postice attenuata l. horizontaliter emarginata, crassiusculæ, distinctæ. Varietates plures; forma tenuiori, stipite subfistuloso flexuoso b. ravior. In fagetis, Quercetis ad terram, etiam ad truncos, frequens. Sept. Oct. (v. v.)

11. *A. lascivus*, pileo carnoso obtuso leviter sericeo alutaceo-pallido, lamellis arcuato-adfixis confertis stipiteque solido æquali basi radicato tomentoso albis.

An *A. sulph.* *B. Pers. l. c.* Quamvis odore pileique superficie cum priori conveniat, distinguendus. Stipes rigidus, apice subpruinatus, basi radice auctus. Pileus 1  $\frac{1}{2}$  — 2 unc. latus, planus, demum depresso, pallescens. Caro alba, prioris sulphurea. Lam. fragiles, 3 lin. latæ, candidæ; subinde fare liberae. In Quercetis &c. Sept. Oct. (v. v.)

12. *A. inimænus*, pileo carnoso subumbonato glabro albido, lamellis varie adfixis distantibus stipiteque solido æquali radicato albis. *Fries Obs.* 1. p. 10.

Transit ad *A. radicatum*. Stipes teres, 5-6 lin. crassus. Pileus compactus, 1-2 unc. latus, siccus; hinc *A. graveolens* Schrad. spic. p. 120 diversus videtur. Lamellæ latæ, planæ, distinctæ, nunc vere decurrentes, nunc emarginatæ!! Odor priorum l. Geran. Robertiani. *In pinetis Smolandice, vulgaris. Jul.-Oct. (v. v.)*

Series specierum, habitu priorum et ultimarum licet deflectente, omnino contigua: 1-3 terrestres, subgraciles, pileo subcarnoso rimoso-squamoso de-colorante, ob affinitatem cum *Hygrocyb.*; 4-5 truncicola, firmi, lutei, pileo haud compacto, vere squamoso etc.; 7-9 iterum terrestres, validi, subsvaeolentes, pileo subsquamuloso carnoso, stipite inæquali etc.; 10-12 præ ceteris inter se affines, terrestres, foetidæ, pileo carnoso sericeo-adpresso, lamellis, stipite subradicato etc. Differentiæ analogæ e stipe farcto, lamellis plus minus distantibus etc.

### Species inquirendæ:

1. *A. pachyphyllus*. *Fries Obs.* 1. p. 76.
2. *A. tortilis*. *Bolt*, t. 41. *A. Persoon*, ut videtur recte; sub laccato. Lignatilis, pusillus.
3. *A. ovalis*. *With*, arr. 4. *A. ectypus forte*.

### Subtr. 5. CALODONTES.

CHAR. Rigi, sat firmi. Stipes gracilis, æqualis l. basi incrassatus, subfistulosus. Pileus leviter carnosus, convexo l. campanulato-explanatus, glaber, humidus, non vero viscosus, siccus expallens, margine tenui. Lamellæ arcuato l. attenuato-adnexæ, latæ, subdistantes, in visis venoso-connexæ!, margine denticulis l. floccis obscurioribus appendiculata, Color purpurascens, umbrinus &c.

Obs. Elegans tribus, colore et lamellis distincta; sed omnes species a me ipso non examinatas admodum doleo.

- \* 1. *A. denticulatus*, pileo convexo-explanato umbri-no-badio, lamellis sinuato-adnexis umbrinis, stipite farcto æquali. Schum. p. 347.

Stipes 4 unc. fere longus, 2 lin. crassus, fuscus, fibrosus. Pileus leviter carnosus, lævis, 1  $\frac{3}{4}$  unc. latus, demum depresso, humidus. Lam. latæ, laxæ, dentibus obscurioribus. Caro fusca. In muscosis Pineti. Sept. (v. ic.)

2. *A. pelianthinus*, pileo convexo livido-purpurecente, margine striato, lamellis areuato-adnexis purpureis, dentibus nigris, stipite fistuloso æquali.

*A. denticul.* Bolt. t. 4. f. 1. (icon mala; descr. erronea.) Pers. Syn. p. 423. certe.

Eximum Agaricorum decus. Stipes 2-3 unc. longus, 1  $\frac{1}{2}$  — 2 lin. crassus, glaber, pallens. Pileus disco carnosus et lævis, subobtusus, 1-2 unc. latus, humidus diaphanus, siccus purpurascens — albidus. Caro alba. Lamellæ elegantissime reticulato-connexæ, distantes, purpureæ, in siccis fere umbrinæ. Sporidia alba. Velum nullum. Circa radices Quercus, locis umbrosis, quotannis reducem habui. Aug. Sept. (v. v.)

3. *A. crenulatus*, pileo hemisphærico-campanulato badio-purpurascente, margine striato, lamellis adnexis crenulatis dilutioribus, stipite fistuloso glabro. Schum. l. c. p. 293.

Priori utique videtur affinis, sed Auctor de lam. reticulo nullam fecit mentionem. Stipes 3-4 unc. longus, 3-4 lin. crassus, basi attenuatus, subflexuosus. Pileus humidus, umbonatus, 1-2 unc. latus, 1 — 1  $\frac{1}{2}$  unc. altus. Caro dilute purpurascens. Lam. latæ, triquetrae. In muscasis Pineti. Oct. (v. ic.)

- \*\* 4. *A. marginellus*, pileo campanulato albido-umbro discoideo, lamellis arcuato-adnexis albis, margine fimbriato umbrino, stipite basi subtuberoso piloso. Pers. Syn. p. 599.

De loco nullum restare videtur dubium. Stipes 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 1 lin. fere crassus, nitidus. Pileus 3-4 lin. altus et latus, carnosomembranaceus, disco glabro umbrino. Lamellæ subdistantes, reticulato-connexæ, alternis majoribus. Ad truncos abietinos, Sept.

5. *A. pristoides*, pileo campanulato obtuso livido-incipnato, lamellis attenuato-decurrentibus pallidis, margine denticulato purpureo, stipite fistuloso basi incrassato strigoso.

Simillimus *A. rubro-marginato*, sed pileus leviter carnosus laevis, stipes brevior et firmior, lamellæ denticulatae venoso-connexæ; omnino Calodontium. Ita et sequens ab *A. elegante* differt; autem varietates, aut in diversa tribu locandas. In truncis abiegnis, rarissime. Oct. (v. v.)

6. *A. aurantio-marginatus*, pileo campanulato laevi olivaceo-fusco, lamellis attenuato-adnexis viridi-pallidis, margine flocculoso aurantio, stipite fistuloso basi ventricoso strigoso.

*A. marg.* Schum. Sæll. p. 298. Fl. Dan. t. 1292.

Stipes 1 — 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, basi 2-4 lin. crassus, vix radicatus, pallidus. Pileus carnosus, dein explanatus obtuse umbonatus, uncialis, expallens. Lam. ventricosæ, dein fere liberae. In pinetis borealibus, raro. Sept. Oct. pluviosis. (v. v.)

Abit ultima subdivisio (characteres harum facile patent!) in Mycenas margine discolori. Analogi sunt *A. serrulatus*, Linkii sub Hyporhodio. In sequ. subtribubus etiam occurunt species lamellis serratis, sed candidis non appendiculatis etc.

## Subtrib. 6. THRAUSTI.

CHAR. Fragiles. Stipes farctus, saepius cavus, carnosus, basi non incrassatus. Pileus leviter carnosus mollis aut carnosomembranaceus, siccus, subglaber; junior campanulatus l. convexus, dein planiusculus, umbonatus saepe, sed numquam depresso. Lamellæ adnexæ, emarginatae, saepe ventrigo. saepe, margine concolori, haud appendiculato. Color pilei cinerascens, lamell. albus l. griseus.

Obs. Fungi vix edules, subtenues, solitarii, magnitudine varii. Leucospori firmiores lamellis emarginatis ad Tricholomata pertinent.

\* *pileo carnoso lœvi stipiteque regularibus. Terrestres.*

1. *A. excissus*, pileo carnoso lœvi cinereo, lamellis linearibus confertis stipiteque solido & quali glabro candidis.

Parva, sed admodum diversa species; reliquis minus fragilis, stipite solido lamellisque angustis insuper recedens. Stipes 1-2 unc. longus, 2 lin. crassus, teres. Pileus junior subcampanulatus, mox planus, umbone demum prominentem, siccus, uncialis. Caro haud crassa, alba. Lam. emarginatae. In graminosis pinguibus ad pagos, aliquoties repertus. Aug. Sept. (v. v.)

2. *A. melaleucus*, pileo carnoso molli planiusculo lœvi, lamellis confertis subventricosis candidis, stipite subcavo longo tenui.

Am. Hall. helv. 2587. Ag. mel. Pers. Syn. p. 355. 4  
S. p. 179. Fries Obs. 2. p. 114.

Admodum distincta, elegans et fragilis species. Stipes 2-3 unc. longus, 1-2 lin. crassus, striatus, lividus, basi subincrassatus, intus primum fibrilloso-farctus. Pileus 1  $\frac{1}{2}$  — 3 unc. latus, convexus, dein exacte planus, rarius obtuse umbonatus, humidus nigrescente-fuligineus, fuscus l. lividus, siccus expallens griseus. Lam. late emarginatae, distinctæ,

2 lin. latæ; variant serratæ. In pinetis montosis, locis subhumidis & deustis, vulgaris; alibi rarer. Aug.-Nov. (v. v.)

$\beta.$  *porphyroleucus*, pileo campanulato-expanso fuligineo purpurascente, lamellis albidis, stipite farcto fibrilloso.

Firmior. Stipes 4 lin. crassus, albidus. Lam. varie emarginatæ. Inter gramina, locis montosis. (v. v.)

$\gamma.$  *polioleucus*, pileo griseo-livido, lamellis sordide albis, stipite subfarcto brevi, apice albo-pruinito.

Constanter utique ab  $\alpha.$  diversus nec elegans; sed e solo locoque diverso ortum puto; plurimæ enim utriusque speciei communia. Stipes 2 unc. longus, 2-3 lin. crassus, æqualis, sat firmus. Pileus obtuse umbonatus. Lam. latæ. Accedit ad A. oreinum, ut A. melaleuc. ad A. humilem. In regionibus depressis, campestribus, locis graminosis. (Lund, Alnarp etc) Oct. Nov. (v. v.)

3. *A. murinus*, pileo leviter carnoso obtuso lævi brunneo-fusco, lamellis latissimis albis, stipite cavo longo æuali. Batsch. f. 19. Fr. l. c. p. 415.

Priori affinis, lamellis crassiusculis, minus confertis, pileo convexo angustiore etc. diversus. In graminosis, mihi semel. Aug. (v. v.)

\*\* pileo subcarnoso stipiteque arrhizo subirregularibus. Terrestres. Cf. Trichol.

4. *A. compressus*, pileo subcarnoso irregulari glabro fusco, lamellis distantibus stipiteque cavo compresso albis.

*A. compr.* With. arr. p. 354. Sowerb. t. 66, Pers. syn. p. 363. Swartz l. c. 1808. p. 89.

Stipes 2-3 unc. longus, subtortuosus compresso-sulcatus, fissilis, junior farctus, 3-4 lin. crassus. Pileus junior campanulatus, dein planiusculus, discoideus, pellucidus, 2-3 unc. latus. Lam. fere liberæ;

*latiusculæ. An conici var., quærit Withering. In graminosis Angliæ, Suecæ. Fun. (With.) Nov. (Sw.) (v. ic.)*

5. *A. murinaceus*, pileo subcarnoso difformi rimoso-squamuloso cinereo, lamellis collinitis distantibus stipiteque cavo difformi cinerascentibus.

*A. murin.* Bull. t. 520. Dec. fr. 2. p. 188. Sowerb. 106. *A. nitrat.* Pers. syn. p. 356. Fries Obs. 2. p. 99.!

*b. aglidius*, pileo glabro, regulari. l. c. p. 101.

Hujus varietates numerosæ; sed certi non dantur limites et odore nitroso facilime dignoscuntur. Rigidus, fragilis; major et minor. Stipes junior raro farctus, ventricosus, lacunoso-compressus, ejusdem indolis ac *A. coccinei*! Pileus primo campanulatus, dein planus, 1-4 unc. Lam. emarginatæ, latæ, crassæ, albide, dein cinereæ. In pratis & paucis montosis inter gramina & muscos, haud infrequens. Aug.-Oct. (v. v.)

6. *A. nitens*, pileo subcarnoso ruguloso subtomentoso nigrescente-umbrino, margine inæquali, lamellis ventricosis glauco-cinereis, stipite brevi albicante. Batsch. C. 2. f. 192. Pers. Syn. p. 359.

Pileus irregularis, planiusculus, undulatus, substriatus, lente illustratus e papillis numerosis constat, et tamen nitens dicitur, quod admodum singulare. Lam. contortæ quasi, ob pileum flexuosum, mox a stipite decedunt. Fragilis. In montosis siccas, sero autumno. (v. ic.)

7. *A. cuneifolius*, pileo subcarnoso glabro fuligineolivido, denum rimoso, lamellis ventricosis albis, stipite cavo deorsum attenuato, apice pruinato. Fries l. c. p. 99.

*A. ovinus.* Bull. t. 580. a. b.! *A. cinereo-rimos.* Batsch Cont. 2. f. 206. *A. pratens.* var, Pers. syn. p. XXIX,

Species distinctissima, admodum parva, fragilis, odore farinæ recentis. Stipes 1 — 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 1-2 lin. crassus, raro æqualis, pallidus. Pileus convexo-planus,  $\frac{1}{2}$  — 1 unc. latus, colore fusco, lido etc. varius. Lam. latissimæ, simplices, fragiles, truncatæ, subdecurrentes. Ad terram, locis graminosis sterilibus, v. gr. Smolandiæ, vulgaris. Aug.-Oct. (v. v.)

*B. spurcus*, pileo subumbonato fusco (1  $\frac{1}{2}$  unc.), lamellis arcuato-adfixis, stipite æuali glabro.

Stipes 3 unc. fere longus, albidus, non pruinitus. Singulare quanta differentia e loco in montosis et campestribus. In nemoribus graminosis Scaniæ campestris. Oct.-Nov. (v. v.)

8. *A. semitalis*, pileo subcarnoso tenui glabro livido-griseo, lamellis postice latissimis stipiteque deorsum attenuato albis.

Stipes uncialis, apice 2 lin. crassus, glaber, sat firmus. Pileus fere membranaceus, planus, obtusus, levius, uncialis, fragilis. Lam. triquetrae, emarginatae, subdistantes. Forte sequ. varietas nana! Juxta semitam in pineto, bis legi. Sept. Oct. (v. v.)

\*\*\* pileo subcarnoso stipiteque radicato regularibus. Lignatilis.

9. *A. platyphyllus*, pileo subcarnoso plano subvirgato cinereo-albido, lamellis latissimis distantibus stipiteque fareto æuali striato radicato albis.

*Buxb. Cent. IV. t. 18. Am. Hall. helv. 2386. A. gramocephalus. Bull. t. 594. Dec. fr. 2. p. 186. A. platyph. Pers. Obs. 1. p. 47. Syn. p. 562. Fries Obs. 2. p. 104. A. S. p. 180.*

Magnus, tamen fragilis; stipes evidenter striatus, non tamen Tricholoma spurium. Radix præmorsa, brevis. Stipes 3-4 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, firmior. Pileus 3-4 unc., margine membranaceus. Lamellæ leviter adnexæ, truncatae,  $\frac{1}{2}$  unc. et

ultra latæ. *A. repens* Fr. l. c. r. p. 14 aliæque subspecies ulterius inquirendæ. *Ad truncos, apprime Fagi, ubique. Jul.-Oct. (v. v.)*

### Species inquirendæ:

1. *A. pallus*. Schæff. t. 250!
2. *A. atro-cinereus*. Pers. Syn. p. 348. *A. cuneifolii* var. 2 Obs. Stipes 1 lin. (non "unc.") crassus, quia pileus tantum uncialis.

### Subtrib. 7. RHIZOPODES.

CHAR. Stipes junior spongioso-farctus, demum cavus, tenax, firmus, siccus, extus subcartilagineus, basi radicatus. Pileus vere, sed leviter carnosus, e convexo-planus, sepe inæqualis, glaber, glutinosus, tenuis, plerumque rugosus l. striatulus. Caro mollis, tenax, subacidula. Lamellæ postice obtusæ, nunc adnatæ nunc fere liberæ in eadem specie!, latæ, planiusculæ, integerrimæ. *Lignatiles, radice perenni*.

Obs. Attuli tantum duas species, in America boreali etiam obvias (Mühlenb.), quas tamen pro sectionibus facile sumeres. E stipite pleno l. cavo in duas species divisorunt, illam Otto (*A. radicatus* et *A. rhizophilus* Ag. p. 86); hanc Withering (*A. velut.* et *sulcatus* Arr. 4. p. 232.) In nostris speciminiibus hoc ab ætate modo pependit. Utriusque tamen varietatem observavi quadruplicem, facile constantem et separandam.

1. *A. radicatus*, pileo rugoso glutinoso, lamellis adfixis candidis, stipite procero rigido, radice longa fusiformi.

*A. macrourus*. & Scop. p. 423. *A. longipes*. Bull. t. 55 A. imbracul. Batsch, f. 4. *A. rad* Relh. Cant. 1040. Sowerb t. 48. Pers. syn. p. 313. Swartz l. c. 1808. p. 80. *A. macrorrhizus*. Pers. Obs. 1. p. 47.

Stipes spitham., sursum æqualiter attenuatus, glaber, rectus, sed tortilis; ex indole Chondropodium. Pileus 3-4 unc. latus, convexus, mox planus,

obtuse umbonatus. Lam. non decurrentes, subinde liberae l. margine fuscescentes. Magnit. tam varia, ut subinde Mycenam refert. Color candidus l. pileo cinereo, fusco, fuligineo, vaccino, olivaceo, virescente, "flavo" (Schum.), stipite dilutiore. In silvis circa truncorum radices, quibus radix infixus, ut Monotropa, vulgaris. Jun.-Sept. (v. v.)

$\beta$ . gracilior, lam. sinuatis, dente decurrente, stipite prælongo. — Accedit A. gracilis. With. p. 189.

$\gamma$ . humilis, firmus, pileo leviori. Monomyces jububinus. Batt. p. 42 t. 17. C.

$\delta$ . pudens, pileo leviori, margine stipiteque villosis. Pers. syn. l. c. — Bull. t. 232. Colore variat.

2. A. velutipes, pileo inæquali fulvo glutinoso, lamellis ventricosis albo-lutescentibus, stipite incurvo velutino nigrescente-badio.

Raji Syn. p. 9. n. 51. Vaill. par. t. 22. f. 8. 9. A. mutabilis. Huds. 615. A. nigripes. Bull. t. 344; 519. f. 2. Dec. fr. 2. p. 159. A. velutipes. Curt. Lond. 4. t. 70. Bolt. t. 135. Sowerb. t. 384 f. 3. Pers. p. 314. Sw. l. c. p. 81. Id. & A. æsculi. Schum. p. 306.

Cæspitosus, magnitudine varius. Stipes brevis, inæqualis, mollis, laxus, tenax, apice pallidus et sœpe compressus. Pileus tenuis, mollis, planiusculus, levus, saltim non rugosus; sed margine subinde pellucente striatus, etiam pallidior, repandus et sinuatus varians, junior involutus. Lamellæ juviiores albæ, dein luteæ, distinctæ; breviores posticæ truncatæ, longiores rotundatae, plus minus adnexæ. In arboribus cavis laxus, pallidior, stipitibus elongatis flexuosis, qualis Sowerb. t. 263.; ad truncorum bases subepigeus firmior, radice verticali longa. A. S. p. 165 etc. Copiose in Fago, Salice fragili, alba, caprea; rarior in Æsculo, Alno &c. Oct.-Mart. (v. v.)

$\beta$ . Sphinx, pallidior, pileo discoideo, stipite glabriuscule squamuloso, radice longissima. Batsch, Cont. I. f. 112, Swartz l. c. 1809. p. 86. (A. Sphinx.)

*γ. atropes*, solitarius, robustior, pileo umbrino ferrugineo, stipite brevi subbulboso. *A. atropes*. Schum. l. c. p. 285.

*δ. fuscipes*, gregarius, parvus, pileo luteo striatulo, stipite glabriusculo, basi attenuato. *Fl. Dan.* t. 1194 f. 2. (ut videtur.) *In radice Pini reperi*.

Uti antecedens ad Chondropedes, hæc species ad Scorteo accedit. — Dubii loci est *A. longissimus*, pileo submembranaceo plano lamellisque ventricosis lacteis, stipite rigido rufo-velutino. *Batt. t. 9. J.*

### Subtr. 8. CHONDROPODES.

**CHAR.** Stipes farctus l. fistulosus, rigidus, tenax, extus cartilagineus, striatus l. villosus, sursum plerumque attenuatus, basi radicatus. Pileus leviter carnosus, convexus, dein expansus, siccus, glaber, laevis. Substantia laxa. Lamellæ liberae, postice obtuse, (raro ob formam pilei spurie adnexæ), angustæ, tenues, sublineares, albæ; aliis serulatae, aliis integerrimæ.

**Obs.** Fungi gregarii, sæpe cæspitosi, tenaces, epiphyti h. e. e truncis l. inter folia decidua putrescentia enati. Sapor mitis; sed in cibariis non recepti. Tribus admodum naturalis; differunt quidem primo obtutu v. g. *A. butyraceus* et *A. dryophilus*; sed specimina reperimus intermedia, ut ad neutrum tute referre potuerim.

\* 1. *A. prolixus*, pileo carnoso laxo testaceo-ferrugineo, lamellis liberis integerrimis, stipite solidō scrobiculato testaceo. *Fl. Dan. t. 1608.*

Magnus, spithameus, sequ. justo forsan affinis. Stipes deorsum attenuatus, interrupte sulcatus, radiculas exserens,  $\frac{1}{2}$  unc. et ultra crassus. Pileus 4 unc. et ultra, subrepandus. *In silvis Daniæ. (v. ic.)*

2. *A. fusipes*, gregarius, pileo carnoso laxo, lamellis subliberis serratis, stipite cavo ventricoso sulcato albido radicato.

- a. pileo rufescens-brunneus. A. crassipes. Schæff. p. 87, 88. Sowerb. t. 129. A. fusipes. Bull. t. 56. f. 2. Pers. syn. p. 312. Swartz l. c. 1808. p. 80. Am. attenuata. Lam. Enc. 1. p. 106.
- b. pallido, albo; etiam rubiginoso-maculato. A. rubiginosus. Schum. Sæll. p. 275.
- c. pileo flavo. (Sat similes, de cetero non definitiendi, A. mollis & Rudolphi. Batsch f. 14, 23.)

Sapor acidus; magnitudo varia. Stipes firmus fissilis, basi subattenuatus, nec tomentosus; rectus l. tortus. Pileus 1.5 unc. latus, convexus, marginè inflexo, subobtusus, numquam pulverulentus. Lam., ut in tribus sequ., proprie et sèpius liberæ nigh visæ sunt, nec nisi spurie adfixæ. Quales Bull. p. 106 numquam observavi. Edulis. Tres in silvis circa truncos, inter lignea ramenta, frequens. Jul.-Nov. (v. v.)

3. *A. butyraceus*, pileo carnoso, dein umbonato, lameulis subliberis crenulatis, stipite farcto cartilagineo-corticato striato rufescente, basi in-crassato tomentoso.

Batt. t. 16. f. C. — Buxb. Cent. IV. t. 5. f. 1. A. butyr. Dec. fr. 2. p. 181. Fries Obs. 2. p. 13 125. cum varr.! — A. leucophylius & trichopus. Pers. syn. p. 308, 309. A. lejapi var. A. S. p. 181. A. spongios. Schum. p. 311. — Bull. t. 572.

Antecedenti subinde simillimus; certe tamen distinctus. Stipes subconicus l. totus attenuatus, 2-3 unc. longus, cortice cartilagineo a medulla spongiosa soluta admodum notabilis; variat totus villosus. Pileus 2-3 unc. latus, siccus, marginè patente, plerumque badius l. rufus, sed variat albus, fuscus etc. Caro alba. In silvis inter folia decidua, apprime pinea, ubique. Jun.-Oct. (v. v.)

4. *A. asemus*, pileo subcarnoso umbonato stipite que cavo attenuato striato basi villoso lividis expallentibus, lamellis liberis. Fries l. c. 26

Nunc a priori distinguo; huc quoque pertinet  
*A. lejopus*, Pers. Syn. p. 362. Ic. pict. t. II. f. 1-3;  
 sed nomen stipitem levem, nec striatum, indicat.  
 Color junior fuligineo-lividus, dein humidus livi-  
 dus, siccus expallens albidus; carne vero prope la-  
 mellas obscuriore. In fagetis praeципue antec. te-  
 nuior, pileo margine striato, stipite elongato et fe-  
 re æquali. Lam. integerimæ. *Inter folia decidua,*  
*frequens. Jun.-Nov. (v. v.)*

5. *A. phajopodius*, pileo carnoso obtuso stipiteque  
 farcto utrinque incrassato glabro atrofuscis. la-  
 mellis subliberis. *Bull. t. 532. f. 2. Dec. fr. 2.*  
*p. 184.*

Robustus apparet. Stipes 2-3 unc. longus, sur-  
 sum attenuatus, sed apice dilatatus. Pileus junior  
 convexus, dein planus et depresso, subrepandus;  
 diametro stipitis longitudinem fere superante. Lam.  
 spurie, ut in antecedentibus, quibus affinis, adnexæ.  
*Ad terram Galliæ. (v. ic.)*

- \*\* 6. *A. contortus*, cæspitosus, pileo carnoso obtuse  
 umbonato stipiteque farcto contorto rufe-brun-  
 neis, lamellis liberis. *Bull. t. 36. Dec. fr. 2.*  
*p. 185.*

Stipes 4 unc. longus, æqualis, glaber, demum  
 cavus. Pileus 1  $\frac{1}{2}$  unc. latus, convexus. Lam. an-  
 gustæ. *Ad arborum truncos in Gallia. (v. ic.)*

7. *A. acervatus*, fasciculatus, pileo subcarnoso in-  
 carnato, lamellis liberis, stipite fistuloso rubro,  
 sursum attenuato glabro, basi tomentoso.

Est *A. erythropus* γ. A. S. p. 184. Stipatus. Sti-  
 pites 2-4 unc. longi, læves; raro compressi. Pileus  
 convexus, dein explanatus, humidus, margine infle-  
 xo. Lam. latiusculæ. *Circa truncorum radices, in*  
*pinetis abunde. Aug. Sept. (v. v.)*

8. *A. erythropus*; subcæspitosus, pileo subcarnoso al-  
 bido, lamellis liberis connexis, stipite fistuloso  
 elongato glabro atro-rubente. — *Pers. Syn. p.*  
*367.*

Ob lamellas latiores laxas et pallidas ad Scorteos accedit. Stipes 2 unc. et ultra longus, tenax, substriatus, basi strigosus, intus ad latera villosus. Pileus obtusus, rugulosus, uncialis circiter, pallens. Lam. secedenti-liberae. Inter folia decidua arborum frondosarum. Sept. Oct. (v. v.)

$\beta$ . *repens*, pileo subdepresso, stipitibus flexuosis flaccidis. A. S. l. c.

• *A. repens*, Bull. t. 90. Dec. fr. 2. p. 185. Am. rep. Lam. Enc. 1. p. 109.

Fascicularis. Pileus disco rubedine afflatus, primo convexus. Ad trunco Fagi, Betulæ; etiam inter folia decidua. Sept. Oct.

Huic speciei insuper proxime accedit *A. dispar* Batsch. Cont. 2. f. 210; ut & sequenti *A. tremulus* Batsch. Cont. 3. f. 104.

9. *A. confluens*, confluenti-cæspitosus, pileo subcarnoso albido, lamellis liberis confertis, stipite fistuloso subcompresso rubro villoso-pulverulento.

*A. confluens*. Pers. Obs. Myc. 1. p. 8. Ic. & descr. t. 5. f. 1. Syn. p. 568. Fries Obs. 1. p. 11.

Stipes 3-5 unc. longus, totus villosus, complanatus, apice subdilatatus. Pileus etiam umbonatus, humidus, striatulus, flaccidus, uncialis et ultra; tempestate pluviosa rufescens. Lam. lineares, demum remotæ. In silvis umbrosis variis, communis. Aug.-Oct. (v. v.)

$\beta$  *rufo-cinnamomeus*, pileo rufo-cinnamomeo, lamellis subadnexis, stipite farcto tereti. A. S. p. 184.

Stipes substrigosus. Lam. incarnatæ. Etiam variet. solitariam etc. reperi. In pinetis. (v. v.)

10. *A. ingratus*, cæspitosus, pileo subcarnoso umbonato stipiteque fistuloso compressiusculo tortili fusco-alutaceis, lamellis liberis. Schum. p. 304.

Inter numerosas antecedentium formas haud aptum sibi vindicat locum. Stipites 3-5  $\frac{1}{2}$  unc.

longi, 4-6 lin. crassi, subflexuosi, superne pulvere albo conspersi, dein inferne umbrini. Pileus i  $\frac{1}{2}$  unc. latus. Lam. confertissimæ, lineares, postice truncatæ, Odor subingratus. In pinetis. Aug. (v. ic.)

\*\*\* 11. *A. collinus*, pileo subcarnoso campanulato expanso umbonato pallidescente, lamellis liberis, stipite fistuloso laevi glabro.

**A. pratensis.** Batsch. f. 5. *A. arundinaceus*. Bull. t. 403. f. A. Dec. fr. 2. p. 159. *A. collinus*. Scop. p. 452. Schæff. t. 220. Lunn. Pos. p. 502. Fries Obs. 2. p. 155.  
**b.** Fl. Dan. t. 1609.

Mycenis affinis Stipes 3-4 unc. longus, rigidus, teres, basi leviter pubescens. Pileus dein planiusculus, laevis, uncialis et ultra. Nunc solitarius, nunc cæspitosus. Ad terram graminosam, Sept. Oct. (v. v.)

12. *A. xanthopus*, pileo subcarnoso subumbonato laevi flave-pallidescente, lamellis liberis latiusculis, stipite fistuloso aequali luteo. Fries Obs. 1. p. 12.

Bene hunc sistit *A. tremulans* Batsch. f. 209., nec male cum *A. confluentii* comparatus; sed a sequente difficilius charactere separatur. Stipes 3 unc. longus, rigidus, basi strigosus. Pileus tenax, subconvexus, expalliens. In pinetis, raro. Aug.-Oct. (v. v.)

13. *A. dryophilus*, variabilis, pileo subcarnoso explanato laevi, interdum depresso, lamellis subliberis, stipite fistuloso glabro lutescenti, basi incrassato.

**A. oehrae.** Schæff. t. 255. *A. dryophilus*. Bull. t. 434. optime! Sowerb. t. 127. Pers. syn. p. 452. Dec. fr. 2. p. 66. Swartz t. c. 1808. p. 244. Schum. Sæll. p. 187.

**b.** stipite basi tuberoso, inflate. *A. tuberosus*, Schum. t. c. p. 276.

Variat solitarius et cæspitosus; major et minor; pileus albidus, alutaceus, flavescentia, testaceus,

ruf scens, lividus; lamellæ integerrimæ et serratæ; stipes rarius rufescit l. basi pubescit. Lamellæ proprie liberae, sed in d. pressis individuis adnexæ apparet. Odor l. sapor nullus. Lam. albæ, confertæ, distinctæ, carne pilei latiores. Pluribus speciebus plus minus accedit. *Ubique in silvis. Mayo.-Oct. (v. v.)*

*B. funicularis*, major, cæspitosus, pileo stipite que tuoso inæqualibus, lamellis liberis sulphureis. *In fôliorum acervis. Oct. Nov. v. v.)*

14. *A. aquosus*, pileo subcarnoso planiusculo albo-lutescente, margine striato, lamellis liberis, stipite fistuloso fulvo.

*A. melleus*. Schæff. t. 45. *A. aquosus*. Bull. t. 17. (12. Decand.) Dec. fr. 2. p. 154. (Pratella.)

Stipes æqualis, fibrillas emitens radiculosas. Pileus junior convexus, dein planus, subinde depresso aut centro papillatus, leviter sinuatus. Caro aquosa, mollis. Lam. fragiles, leviter serratæ. Equidem a priori acute distinguere non valeo. *In silvis umbrosis inter muscos, æstatis fine. (v. ic.)*

15. *A. hariolorum*, cæspitosus, pileo subcarnoso planiusculo lævi alutaceo-pallido, lamellis liberis, stipite subfistuloso toto hirsuto deorsum in-crassato.

*Ag. har.* Bull. t. (56?) 585. f. 2. Dec. fr. 2. p. 182.  
Am. numularia. Lam. Enc. 1. p. 107. *A. sagarum*.  
Pers. syn. p. 182.

Statura precedentis. Stipes 2-3 unc. longus, junior farctus. Pileus junior convexus, dein planus, ultra uncialis, siccus. Lam. confertæ, angustæ, pallescunt (in iconæ) Sapor gratus. *In Gallia inter folia putrida. (v. ic.)*

Subdivisiones, valde naturales, representant *A. butyraceus*, *erythropus* et *dryophilus*. Abeunt in Scorteos et Collybiam.

#### Species inquirendæ:

- Fung. esc. gen. VI. Clus. — Fungi plures simul albi &c. J. Bauh. XL. c. 32. *A. umbilicatus*. Scop. p. 431.

2. Fung. multiplex, albus, coriaceus. *Buxb. Cent. IV. t. 25. p. 15.* Vix ab *A. confluente* diversus. — Conf. quoque obs. post *A. erythrop.*

### Subtrib. 9. SCORTEI.

CHAR. Valde tenaces, subelastici. Stipes plenus l. fistulosus, aqualis; sed deorsum strigoso-tomentosus, subradicatus. Pileus carnosus-coriaceus, æqualis, convexus, explanatus, levis, glaber, siccus, expallens. Lamelle postice truncatae, secedentilibet crassæ, lineares, (non ventricosæ), distantes, distinctæ, integerrimæ, pallescentes.

Obs. Maxime inter se affines, tamen certe distincti. Fungi aridi, flexiles, mites, epiphyti h. e. foliis l. radicibus gramineis innarentes; plerumque gregarii, non vero caspitosi. (*A. erythropus.*)

\* *pileo carnosus, stipite solidi.*

- I. *A. chrysenterus*, pileo carnosus hemisphærico subumbonato lamellisque liberis flavis, stipite solido, basi albostrigoso.

*A. chr.* *Bull. t. 556. f. 1. Pers. syn. p. 321. Dec. fr. 2. p. 183. Spreng. Mant. Hal. 1. p. 17.*

A. aryophilam p. l. sequentis statum juniorum potissimum refert. Stipes 2 unc. et ultra longus, 2-3 lin. crassus, glaber, lavis, flavus, pilis radicalibus albis. Pileus deum planus, obsolete umboatus, 1  $\frac{1}{2}$  — 2 unc. latus. Lamelle juniores stipiti approximatae. *Inter folia decidua; inque ramis aridis. Sept. Oct. (v. v.)*

2. *A. peronatus*, pileo carnosus convexo, dein subcoriaceo explanato, lamellis distantibus flavis pallescentibus, stipite solido, deorsum radicato flavo-strigoso.

*A. peronat.* *Bolt. t. 58. Sow. t. 37. Pers. syn. p. 331. Dec. fr. 6 p. 48. Fries Obs. 1. p. 23. A. lanatus, Schum. Sæll. p. 327.*

Status junior ab adulto habitu non parum reddit. Accedunt insuper varietates non paucæ. Sti-

pes 2-3 unc. longus, teres, albo-flavescens; basi incurvus, tomento strigoso, dein expallente albido. Pileus 1-2 unc., demum tenuior rugulosus. Lam. plus minus remotæ. Color, qui in junioribus flavus, dein expallens, ligneus; etiam testaceus et umbrino-nallidus. *Inter folia decidua silvarum frondosarum & acerosarum, vulgaris.* Jul.-Nov. (v. v.)

*B. tomentellus*, stipite basi tomento tenui obducto. Ag. tom. Schum. p. 314. — Schrad. spic. p. 24.

Habitus a priori quedammodo recedit; non tam distingo. *In fagetis.* (v. v.)

3. *A. oreades*, pileo carnoso tenaci subumbonato e rufo pallescente, lamellis distantibus, stipite que solidio tereti villosso-corticato pallidis.

*Raji* Syn. p. 6. n. 27. *A. coriacens*. Lightf. *aliorumque*. *A. pratensis*. Huds. — Sowerb. t. 247. *A. caryophyllaeus*. Schæff. t. 77. *A. pseudo-moueeron*. Bull. t. 144, 5 8. f. 2. *A. oreades*. Bolt. t. 151. With. arr. 4. p. 221. Swartz l. c. 1809. p. 87. *A. peronat.* var. 2. With. p. 213. *A. tortilis*. Dee. fr. 2. p. 194. *A. collinus*. Pers. syn. p. 330. excl. syn. *A. corticatus*. Fries Obs. I. p. 22.

Gregarius, elasticus, expallens, odore debili, sed grato; edulis. Pers. Ch. Comest. Pileus convexo-planus, subinde umbonatus,  $\frac{1}{2}$  — 2 unc. latus, dein fere albidus; humidus margine pellucente-striatus. Stipes 2-3 unc. longus, peculiari modo corticatus; epigaeus quidem, sed radicatus radicibusque gramineis emortuis plerumque innatus. Mycologis crux fait species longe vulgatissima. *In graminosis, versuris, passuis ubique.* Maio-Nov. (v. v.)

4. *A. plancus*, pileo carnoso obtuso pallescente, lamellis distantibus obscurioribus, stipite subcaavo compresso albido-villoso.

Analogus *A. confluentii*; antecedentibus proxime affinis. Stipes 2 unc. longus, 1 lin. crassus, tenacissimus, pallidus; tota superficie albovillosa; basi non strigosus. Pileus planus, levius, uncialis.

*Caro alba. Lam. ligneæ, subbrunneæ. In silvis frondosis inter folia, non ubique. Sept.-Nov. (v. v.)*  
*\* \* pileo subcarnoso, stipite fistuloso.*

5. *A. porreus*, graveolens, pileo subcarnoso lœvi lamellisque subliberis albis, stipite fistuloso longo tomentoso rufescente.

*Fungus minor, Allii odore. Juss. Act. Par 1728. p. 539.*  
*A. peronat. var. 3. With. l. c. p. 213. A. alliaceus. Bull. t. 158. 524 f. 1. Sow. t. 81. Dec. fr. 2. p. 160. A. allicinus. Schum p. 270. A. porreus. Fries Obs. 2 p. 152! (Pers. syn. p. 376. mixtus. Swartz l. c. 1808. p. 92.)*

Optima hujus subtribus species, cum *A. alliaceo*, *Isorodonio*, *prasiosmo* non comparanda. Odor fortis, alliaceus. Stipes 3 unc. longus, 1-2 lin. crassus, basi (sæpe dilatata) inter folia radicatus, obsolete pubescens, basi tomentosus; junior pallidus, adultus rufus, senescens rufo-fuscus, apice pallidus. Pileus disco carnosus, obtusus,  $\frac{1}{2}$  — 1 unc. et ultra latus. Lam. secedenti-libere. *In fagetis, Quercetis diversarum regionum, frequens.* Oct.-Nov. (v. v.)

6. *A. terginus*, inodorus, pileo subcarnoso incarnato expallente, lamellis liberis pallidis, stipite fistuloso elongato deorsum rubente albo-villoso.

Priori similis. Stipes 2-5 unc. longus, 1-2 lin. crassus, subattenuatus, longitudinaliter fissilis, lœvis; apice glaber, pallidus; inferius atrorufus albo-villosus. Pileus convexus, mox planus, obtusus,  $\frac{3}{2}$  — 1  $\frac{1}{4}$  unc. latus, siccus albus, demum margine striatus. Lam. confertiusculi, angustæ; inde ab *A. erythropod.* diversus. *In folia inter muscos humidos. Sept.-Nov. (v. v.)*

7. *A. fusco-purpureus*, pileo subcarnoso ruguloso atro-purpureo expallente, lamellis liberis rufescentibus, stipite fistuloso rubiginoso, basi caudato strigoso. *Pers. Syn. p. 451. Ic, & Descr. t. 4. f. 1.*

Duplex forma; altera a Persoonio I. e. depicta minor, sed cæspitosa; altera major, solitaria, stipite decumbente. Stipes 1-3 unc. longus, 2 lin. fere crassus, rufus; villis rubiginosis. Pileus hemisphæricus, obsolete umbilicatus, dein planus albidus,  $\frac{1}{2}$  — 1 unc. latus. Lam. distantes. In folia faginea, passim. Jul.-Sept. (v. v.)

8. *A. putillus*, pileo subcarnoso humido rufo, margine striato, lamellis liberis stipiteque fistuloso rufescentibus, basi albo-villoso. Fries Obs. 2. p. 130.

Minor, elegans, gregarius. A præced. differt stipite stricto, attenuato, basi albo-tomentoso, nec caudato; pileo non depresso, sicco lævi; lamellis minus distantibus; præcipue vero loco et tempore. In Suecice pinetis, passim copiose. Oct. Nov. (v. v.)

Cum Chondropod. facile jungenda subtribus, quam tamen ut analogam retinere malui. Transit utraque ad Collybias.

### Species inquirendæ:

1. *A. coriaceus*. Batsch. f. 109. Videtur *A. oreades*, sed stipes glaber pictus.
  2. *A. cepaceus*. Fries Obs. 1. p. 29 Mich. t. 98. f. 5. Certè ab *A. porreo* differt stipite luteo (solido, an cavo?) locoque in fimo.
- 

### Trib. IX. COLLYBIA.

*Gymnopi*, *Mycenæ* & *Omphaliæ* sp. Pers. syn. p. 302, 375, 466.

CHAR. Stipes fistulosus, sèpius vero tam leviter, ut in centro linea dilutior modo appareat, tenuis, æqualis, teres, firmus, sèpe radicatus. Pileus carnoso-membranaceus, tenax, convexus, dein planus, subinde centro depresso, glaber, siccus.

Lamellæ postice obtusæ, liberæ l. adfixæ, numquam decurrentes, in rquales, exsuccæ, planæ, integerimæ. Color lamell. albus, raro griseus l. lutescens.

Obs. Nomen a κολλυβο.. Fungi parvi, aridi, persistentes, sæpe gregarii, terrestres l. plerumque epiphyti. Nonnullæ species tamen cibariæ. Pileus vix unquam unciam attingens.

†. GENUINÆ. Pileus leviter carnosus, lævis, vix umbilicatus. Lamellæ genuinæ. Stipes ca-vo - l. obsolete fistulosus.

\* 1. *A. scorodonius*, graveolens, pileo subcarnoso lamellisque adnatis crispis albidis, stipite fistuloso brevi glabro rufo.

( Mich. t. 77 f. 2. Meuseron. Reyg. Danz. p. 376 A. Apicci. Retz. A. alliatus. Schæff t. 99. Pers. syn. p. 373. Sw. Bot. t. 173. A. Schæfferi. Pers. Obs. 2. p. 55. A. scorod. Fries Obs. 1. p. 29.

Odor Allii fortis. Stipes i unc. et ultra longus, vix lin. crassus, vix radicatus. Pileus planus, rugulosus,  $\frac{1}{2}$  unc. et ultra. Lam. venoso-connexæ, secedentes. Edulis. Ubique in ericetis, collibus apricis versurisque, sæpe stipulis insertus. Aug.-Oct. (v. v.)

2. *A. calopus*, inodus, pileo subcarnoso lævi lamellisque adnexis albidis, stipite fistuloso glabro badio-rubro. Pers. Syn. 573. Fries Obs. 2. p. 151.

Priori simillimus. Lam. emarginatæ. Duplum affinem legi speciem; alteram lamellis adnatis, stipite apice pruinato; alteram pileo toto plicato-striato albo-rufescente, lamellis subliberis. In graminosis, fagetis alibique. Aug. Sept. (v. v.)

3. *A. carneus*, pileo subcarnoso lævi carneo rubro, lamellis adnexis candidis, stipite subfarcto brevi squamuoso.

*A. carneus*. Bull. t. 533. f. 1. Pers. syn. p. 340. Decr. fr. 2. p. 183. Schum. Sall. p. 342. (A. humilis Vill. p. 1031 & A. puniceus With. l. e. p. 196 ex descr. incompl.)

Parum heteroclita species. Stipes basi farctus, firmus, 1 unc. longus, 1 lin. et ultra crassus; sursum subincrassatus, villoso-squamulosus, dein cavus. Pileus ex convexo planus, reliquis magis carnosus,  $\frac{1}{2}$  unc. et parum ultra, interdum flexuosus. Lam. confertæ postice latiusculæ rotundatæ, denticulo subdecurrente. In pinetis locisque graminosis, Aug. Sept. (v. v.)

4. *A. macilentus*, pileo subcarnoso lavi luteo, lamellis subliberis linearibus stipiteque subfistuloso nudo flavis.

Elegans species; statura prioris; colore A. cernini, cui revera quodammodo affinis. Stipes 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 1 lin. crassus, equalis glaber, tenax, basi fistulosus leviter radicatus, apice farctus; variat flexuosus. Pileus planus, obtusus.  $\frac{3}{4}$  unc. latus. Lamelle confertissimæ, elegantes. In pinetis densis montosis. Sept. Oct. (v. v.)

- \*\* 5. *A. esculentus*, pileo subcarnoso obtuso argillaceo, lamellis adnexis laxis albis, stipite fistuloso radicato glabro flavescente.

Vaill. par. t. 11. f. 16-18. *A. clavus*. Linn. ad part. Schaff. t. 59. *A. perpendicularis*. Bull. t. 4-2. f. 2. Dec fr. 2. p. 163. *A. esculentus*. Wulf. in Jacq. Collect. 2. t. 14. f. 4. Pers. syn. p. 389. *A. S.* p. 196. Tratt. Essb. Schw. p. 65. t. F. Fries Obs. 2. p. 134.

In Austria præcipue frequens commeditur. Stipes, ut in sequentibus obsolete, fistulosus. Radix plerumque glabra. Pileus  $\frac{1}{2}$  unc. et ultra latus, subinde striatus; variat fuscescens. Lam. subconfertæ, latæ. Sapor amaricans. In ericetis pascuis, versuris &c. frequens. Aprili, Majo. (v. v.)

6. *A. tenacellus*, pileo subcarnoso fusco-expallente livido, lamellis adnexis niveis, stipite fistuloso longissimo fulvente, basi villoso radicato,

*A. tenac.* Pers. Obs. 1. p. 50. Syn. p. 387. Io. pict. t. 1. n. 2, Fries l. e, p. 135. *A. longicaudus*, Schum. p. 275.

Priori valde affinis. Stipes 2-5 unc. longus, flexilis, non pulverulentus. Pileus laevis, 3- lin. latus, saepius umbonatus; etiam candidum reperi. Lamellæ latæ, subdistantes. In pinetis, frequens. Sept.-Nov. (v. v.)

7. *A. myosurus*, pileo subcarnoso obtuso laevi rufo, lamellis liberis albis, stipite fistuloso rufo, apice pulverulento, radice glabra. Fries l. c. p. 129.

Sequenti proximus. Stipes subtiliter fistulosus, 1 unc. longus, radice elongata. Pileus regularis,  $\frac{1}{2}$  unc. latus, colore varius. Lam. angustæ. In pinetis. (v. v.)

8. *A. conigenus*, pileo subcarnoso inæquali, lamellis liberis linearibus albidis, stipite fistuloso pulverulento, basi radicato strigoso.

a. pileo fuligineo-livido. Buxb. Cent. I. t. 67. f. 2.  
A. conig. Pers. syn. p. 388. Fries l. c. I. p. 36.

b. pallens. A. S. p. 195.

Plerumque gregarior, sat variabilis. Stipes tenax, pileo concolor, filiformis. longitudine varius. Pileus subumbonatus, laevis, 1  $\frac{1}{2}$  — 8 lin. latus, saepe angulatus, et demum depresso; livido-cinereus, pallidus. Lam. perangustæ, confertæ. In conis Pinuum, ut etiam inter folia decidua, frequens. Sept.-Dec. (v. v.)

$\beta$ . *porcinus*, pileo umbonato striatulo luteofuscescente, stipite subnudo.

Color admodum peculiaris; lamellæ stipesque dilutiores nec albæ. Stipes 2-3 unc. basi fibrillosus. Inter plures varietates hanc solam notavimus. In cryptis stipites, Clavariae filiformes. absque pileis occurunt. In pinetis muscosis. Sept. Oct. (v. v.)

- \*\*\* 9. *A. tylicolor*, pileo subcarnoso cinereo, lamellis liberis distantibus, stipiteque fistuloso æquali pulverulento griseis. Fries l. c. 2. p. 128.

Stipes vix radicatus, uncialis. Pileus subumbonatus,  $\frac{1}{2}$  unc. latus. Lam. distinctæ. In silvis frondosis, raro. Oct. (v. v.)

10. *A. reductus*, pileo subcarnoso angulato lævi virescente, lamellis adfixis subgriseis, stipite farcto flavescente, superne pulverulento. Fries l. c. p. 137.

Elegans. Stipes 2 unc. fere longus, fragilis, æqualis, basi pubescens. Pileus  $\frac{2}{3}$  — 1 unc. fere latus. siccatus flave cens. Lamellæ latiusculæ distantes. In foliis Syringæ repertus. Aug. (v. v.)

11. *A. tuberosus*, albus, pileo subcarnoso dein umbonato, lamellis adnatis confertis, stipite fistuloso subnudo, Sclerotiis innato.

*A. tuberos*. Bull. t. 256, 522. f. 4. Pers. syn. p. 574. Fries Obs. 1. p. 38. Fl. Dan. t. 1613. Ag. Amani. tæ. Batsch. Cont. 1. f. 93. Pers. Obs. 2. p. 52. A-alumnus. Bolt. t. 155. *A. bulbosus*. Schum. p. 507.

Gregarius, parvus. Stipes obsolete fistulosus, glaber; sed passim leviter pulverulentus, brevis; variat flexuosus et rubescens, basi cum Sclerotiis omnino contiguus. Pileus lævis, 1-2 lin. latus, convexulus. In Sclerotio cornuto, fungorum, muscorum &c. supra fungos pileatos putridos; item inter muscos vulgatissime. Aug.-Nov. (v. v.)

Hujus! semel reperi individuum monstrosum (in Sclerotio cornuto) stipite prolifer-racemoso, 3-4 unc. longo, albo-pulverulento; capitulis laterilibus  $\frac{1}{2}$  lin. latis subvillosis; sed pileus omnino glaber, albidus, 3 lin. latus erat \*).

\*) Agaric. racemosum Pers., quem ego (cf. *A. rotula*) quoque monstruosam progeniem suspicatus sum, mox in memoriam revocat, sed notis aliquot differt. Addita vero nova specie, peculiarem e speciebus stipite racemoso condere tribam (*Cleoporus dictam*) Cl. SADLER apud Nees ab Esenb. in Act. Nat. Cur. IX. p. 251. proposuit. Loco vero adhuc dubio, duas istas species huc subjungam;

12. *A. ocellatus*, pileo subcarnoso plano albo, dein umbilico obscuriore, lamellis adnatis albis stipite fistuloso subpulverulento rufescente, basi fibrilloso-radicate.

*A. clav.* (clavus.) *Bull.* t. 569. f. 1. *A. tuberos.* *cirrhat.* *Pers.* l. l. c. c. *A. ocellatus.* *Fr.* l. e. 1. p. 83.

*b. A. pallor.* *Eatsch.* *Cont.* 1. f. 95.

Tam ab *A. clavo*, quam *A. tuberoso* diversissimus. Stipes obsolete fistulosus, 1-3 unc., longus, subfiliformis, apice dilutior. Pileus lavis, glaber, subinde repandus; discus variat flavus, fuscus et rufus. Lam. confertæ, angustæ. *Ad terram, inter folia Ec. frequens.* Aug.-Nov. (v. v.)

\*\*\*\* 13. *A. clavus*, pileo subcarnoso planiusculo aurantio-rubescente, lamellis adfixis latiusculis stipiteque farcto brevi glabro albidis.

*Vaill. Bot.* t. 11. f. 19, 20. *A. clavus.* *Bull.* t. 148. *Bolt.* t. 59. *B. Pers. syn.* p. 392. *Dec. fr.* 2. p. 165. (ad part.)

*Gregarius*, parvus; sed elegans. Stipes vix uncialis, filiformis, intus linea modo dilutiori subnotatus; de cetero solidus. Pileus 1-2 lin. latus, disco subpapillato et saepe obscuriori. *Ad ramulos & stipulas deciduas, rarior.* Aug.-Oct. (v. v.)

2. *A. racemosus*, pileo membranaceo papillato griseo, lamellis albis, stipite racemoso. *Pers. disp. meth.* t. 3. f. 8. *Syn. p. 389.* *Sowerb.* t. 287. *Nees Syst.* f. 190.

Racemum Ribis baccis erbatum exakte simulatur. Rami laterales simplices, capitulis exiguis hyalinis. Pileus terminalis, subtomentosus, 2 lin. latus. *In Sclerotio laeunoso.* (v. ic.)

2. *A. Aueri*, pileo membranaceo umbonato subtomentoso sordide flavo, lamellis flavis, stipite tenui ramoso-racemoso. *Nees Act.* l. c. t. 6. f. 19.

Stipes 3-4 unc., sulcatus, supra basin parce ramosus, pallide flavi; ramulis inæqualibus, capitulo trigono-orbiculari opaco terminatis. Pileus terminalis 2-3 lin. *In foliis quercinis Pannonicæ, autumno.* (v. ic.)

14. *A. ramealis*, gregarius, pileo subcarnoso planiusculo albido subrufescente, lamellis adnatis albis, stipite farcto brevi pulveraceo.

*Mich. gen.* t. 74. f. 7. *A. candidus*. *Bolt.* t. 39. f. D. *Schrad. spic.* p. 126. *A. ramealis*. *Bull.* t. 336. *Sibth. Oxon.* p. 360. *Pers. Obs.* 1. p. 45. *Syn.* p. 375. *Dec. fr.* 2. p. 193.

Stipes in centro linea alba, quæ proprie fistulosum indicat, 3-5 lin. longus, vix lineam crassus, tenax, albidus l. rufescens, furfuraceo- (sub lente piloso-) squamulosus. Pileus opacus, lævis; sed vetustus rugulosus et depresso, 3-4 lin. latus. Lam. distinctæ, subdistantes, angustæ nec basi latiores. Situ admodum gregarius et elegans. In ramis aridis *Coryli*, *Quercus*, *Fagi*, *Pini*, *Juniperi* &c. copiose. Perennis. (v. v.)

15. *A. amadelphus*, gregarius, pileo subcarnoso deinde depresso fulvo pallido, lamellis adnatis rufescens distantibus, stipite farcto. *Bull.* t. 550. f. 3. *Dec. fr.* 2. p. 169.

Statura prioris; inde in hac serie, quamvis lam. rufescentes depingantur, ad interim locavi. Stipes brevis, incurvus, albidus, basi leviter pubescens. Pileus e convexo-planus, lævis, 3 lin. circiter latus, sape excentricus. Lam. postice latiores, subdecurrentes. In arborum truncis, Galliae. (v. ic.)

16. *A. parasiticus*, pileo subcarnoso convexo, mox piano pruinoso griseo-pallescens, lamellis adnatis crassis distantibus obscurioribus, stipite fistuloso villoso.

*A. parasit.* *Bull.* t. 574. f. 2. *Sowerb.* t. 343! *Pers. syn.* p. 371. *A. S.* p. 187. *Fries Obs.* 2. p. 150.

*b. minor*, albus. *Schum.* p. 308.

Gregarius, ut plurimum cæspitosus. Stipes subtiliter fistulosus, longitudine eximie varius, sursum leviter attenuatus l. omnino æqualis, 1-2 lin. crassus. Pileus irregularis, unc. haud attingens. La-

mellæ tumidæ, etiam ramosæ; subinde gyroso-intricatae. Ad *A. adustum*, *blennium*, *vellereum exsucum* &c. *passim*. *Meteoricus*. Aug.-Oct. (v. v.)

†† OMPHALARIAE Pileus lento-membranaceus, planus, demum depresso; plicato-rugosus. Lamellæ subvenosæ, cum pileo homogeneæ. Stipes gracilis, non laevis, subcorneus, nigricans. (*A. alliaceus*.)

*Gled.* p. 108. sp. *XV*. *Crispati*. *Scop.* p. 456. *Merul.* sp. *With. arr.* 4. p. 126. sq.

\* 17 *A. Vaillantii*, pileo plano plicato lamellisque postice latissimis adnatis distantibus candidis, stipite solido glabro spadiceo, sursum incrassato pallidiori.

*Vaill. Bot. par.* t. II. f. 21-24. *A. nitidus*. *Gunn. Norv.* II. p. 126. *Merul. androsac.* *With. arr.* 4. p. 148. (*Pers. syn.* p. 472 sub *A. ericetorum*.)

Species distinctissima, *A. rameali* etiam affinis. Stipes 1 unc. longus, tenacissimus, junior flavescent; basi glaber, laevis, splendens, niger; medio badius, apice albidus subtiliter pruinatus. Pileus planus, passim depresso, patentissimus, striato-rugosus,  $\frac{1}{2}$  unc. latus. Lamellas distinctas, simplices, ob formam triquetram facile decurrentes diceres. *Ad ramosos folios deciduos in fagetis*. Aug.-Sept. (v. v.)

18. *A. Rotula*, pileo convexulo umbilicato plicato lamellisque collario stipitem libere cingente adnatis albis, stipite fistuloso striato glabro nigrigente.

*Mich. Gen.* t. 74. f. 5. *Raji Syn.* p. 9. n. 49. *A. Rotula*. *Scop.* p. 456. *excl. syn. Michel. Sowerb.* t. 95. *Pers. syn.* p. 467. *Swartz l. c.* 1808. p. 249. *Dec. fr.* 2. p. 158. *A. androsac.* *Bull.* t. 64, 569. f. 5. *A. nigripes*. *Schrad. spic.* p. 129. *Fl. Dan.* t. 1134. f. 1. *Merul. collariat.* *With. l. c.*

Species admodum notabilis, gregaria, sarmensis ramosis (Rhizomorpha) sape cæspitosa. Variat colore albo et flavo-pâlescente, umbilico concolori l.

fuscescente; lamellis æqualibus l. aliquot brevioribus. Pileus margine crenulatus. Lam. distantes, simplices. Collarium, ob quod ex hoc et A. torquato peculiarem constituit tribum *Decand. fr. l. c.*, in A. foetente et collariato minus distinctum, e lamellis postice connatis et dein a stipite solutis oritur. In A. galericulato aliisque idem observamus et haæ species inter se de cetero haud affines. — Hujus specimina stipite proliferò-racemoso misit EURENBERG Cf. Sylv. Myc. Ber. p. 31. In silvis, præsertim frondosis, ad folia, stipites & truncos, ubique. *P. rennis.* (v. v.)

19. *A. androsaceus*, pileo convexo plicato fuscescente-albo, lamellis stipiti adnatis simplicibus distinctis, stipite fistuloso sulcato glaberrimo nigro.

*Bocc. Mus.* t. 104. *Batt.* t. 27. Q. ! *A. androsac.* *Linn.* *Suec.* 1193. *It. Wgoth.* p. 215. *Scop.* 451. *Bolt.* t. 52. *Fl. Dan.* t. 1551. f. 1. *Willd. Ber.* p. 589. *A. epiphyllus.* *Bull.* v. 569. f. 3. *Dec. fr.* 2. p. 164.

*A. androsaceum* Mycologi varie vexarunt, nec hactenus tamen rite cognoverunt. Stipes 1  $\frac{1}{2}$  unc. et ultra longus, filiformis, tenacissimus, exsiccatus tortus. Pileus vix depresso reperitur, 2-3 lin. lat. Lam. pileo concolores, distantes. *Rhizomorpha setiformis* Pers. *Syn.* p. 705. Ach. *syn. Iich.* p. 289. hujus radices; differt tamen *Hypoxylon loculif.* *Bull.* t. 405 aliorumque. *In foliis deciduis Pini silvestris* (in Abiete numquam!), frequentissime; etiam in *Betulæ*, *Quercus*, *Fagi*, *Juniperi* earumque cortice. *Perennans.* (v. v.)

20. *A. Splachnoides*, pileo submembranaceo leviter convexo striatulo lamellisque adnatis siniplicibus albis. stipite glaberrimo roseo-rubro. *Hornem.* in *Fl. Dan.* t. 1678 f. 1.

Sub hujus plagulæ impressione *Flor. Dan.* fasc. 28 accepi, ex quo insero speciem antecedenti proximam, sed colore et stipite lævi farcto? satis distinctam. *Statura eadem.* *In foliis Pini Abietis.* (v. ic.)

- \*\* 21. a. *A. stipitarius*, pileo planiusculo umbilicato albido, lamellis leviter adnexis, stipite subfistuloso fibrilloso spadiceo.

Maxime memorabilis species, gregaria, subcæspitosa, sat variabilis. Stipes 1-2 unc. longus, haud lin. crassus, æqualis, tenax, fuscus, totus extus fibrillosus. Pileus 4-5 lin. latus, disco obscuriori, non l. margine plicatus, glabriusculus; sub lente squamuloso-velutinus. Lamellæ secedenti-liberæ, distantes, distinctæ, numerosæ, alii dimidiatae, albæ. In Scania campestri circa radices Salicis, ad stipulas putrescentes in aggeribus &c. Oct. Nov. (v. v.)

- B. *A. caulinialis*, pileo glabro albido-rufescente, stipite farcto sursum glabro, inferne velutino. Bull. t. 522. f. 2. Dec. fr. 2. p. 192.

Stipes 2 unc. et ultra longus, apice attenuatus pallens. Pileus  $\frac{1}{2}$  unc. latus, lavis, junior obtuse umberatus. In plurimis cum priori congruit. Ad folia & stipites, Galliæ. (v. ic.)

21. b. *A. fastidius*, pileo convexo-plano umbilicato plicato badio-fulvo, lamellis annulato-adnatis pallidioribus, stipite fistuloso spadiceo velutino.

Merul. fastidius. Sowerb. t. 21.

b. *A. venosus*. Pers. syn. p. 467.

Hujus collarium a stipite non secedit, ut in *A. rotula*. Gregarius, odore ingratu, uti sequens cui proximus; sed etiam ad *A. campanellam* accedit. Stipes uncialis, basi membranulæ radiatae (exacte *A. picti*!) sape innatus. Pileus submembranaceus, glaber, in b. "quasi pulverulentus"  $\frac{1}{2}$  unc. circiter latu. Ad ramos dejectos &c., raro. Aug. Sept. (v. v.)

22. *A. perforans*, pileo planiusculo ruguloso pallidente, lamellis adnatis simplicibus pluribus dimidiatis, stipite fistuloso lævi velutino nigro-badio.

Batt. t. 27. f. R. Am. Hall. helv. n. 2351. A. androsac. Schæff. t. 239. Pers. syn. p. 468. Sowerb. t. 94. A. Abietis. Batsch. Et. f. 10. (junior.) A. perforans. Hoffm. Nomencl. fung. t. 4. f. 2.

*S*i es uncialis, vix ultra, tenax, pubescens, apice dilutior. Pileus glaber, vix plicatus, (subcaenosus enim est), raro depresso, 4 lin. latus, rufescenti-albus. Lam. crassiuscula, alternæ, numerosæ. Odor ingratus. A. scorodonio affinis. *In foliis Abietis dejectis*, ubique. *Peregrinans*. (v. v.)

23. *A. epiphyllus*, pileo planiusculo rugoso lamellosque adnatis paucis venosis albis, stipite fistuloso subtiliter velutino, deorsum spadiceo.

Batt. t. 28. f. D. A. lacteus. Bull. t. 601. f. 2. (ex Pers.) A. squamula. Batsch. Sowerb. t. 93. Merul. squam. With. l. c. p. 151. A. umbellifer. Bolt. t. 59. A. rugatus. Fl. Dan. t. 1194. f. 1. A. epiphyll. Pers. syn. p. 468. ad part. Swartz l. c. 1808. p. 249. Schum. p. 307.

b. *Helotium melanopus*. Pers. Ic. & descr. t. 9. f. 7. 8.

Cum Mycenis tenerrimis commutavit Persoon. Inoderus, gregarius, tenax. Stipes  $\frac{1}{2}$  — 1 unc. longus, tenuis, apice albidus, nudo oculo fere glaber apparet. Pileus e convexo-planus, dein umbilicatus, 2-5 lin. latus, candidus. Lam. raræ, ramosæ, 6-10, totæ basi lata adnatae. *In foliis deciduis frequens*; etiam jore pluvio locis graminosis. Sept.-Dec. (v. v.)

24. *A. Hudsoni*, pileo convexo-explanato albido stipiteque rufo pilis strictis rubris obsessis, lamellis albidis.

A. pilosus. Huds. 11. p. 622. Sowerb. t. 164. A. Hudsoni. Pers. syn. p. 390. Dec. fr. 2. p. 164.

A. androsaceo affatim affinis. "Stipes fere uncialis, filiformis albidus aut rubescens, ad basin pilosus." Huds. Sowerby stipitem 1-2 unc. obscure rufum pingit, pileum 3 lin. latum. — Decand. expresse cum A. rotula comparat, stipite nigricante splendente, pileo pilis nigricantibus obsesso. *In foliis Ilicis*, autumno. (v. ic.)

## Species inquirendæ:

1. *A. arecarius*, cæspitosus, albus, pileo orbiculato plane glabro, lamellis alternis crassioribus, stipite brevi. *Lour Coch.* p. 692. — *In caudice Arecæ.*
  2. Michel t. 74. f. 4. *A. angulatus*. *Batsch.* *A. stellatus*, *Retz. Vet. Ac. Handl.* 1769. p. 252.
  3. *Bulla &c.* *Batt.* t. 28. f. J.
  4. *A. cestatus*. *Fries Obs.* 2. p. 219. Pileus stipesque solidus sulcatus nigrant. *Lam.* albae.
- 

## Trib. X. MYCENA.

*Bullæ spec.* *Batt.* p. 55. *Mammisi.* *Scop.* p. 454. *Glyptati ad part.* *Batsch.* p. 68. — *Schrad. spic.* p. 1:6. *Mycenæ spec.* *Pers. syn.* p. 375. *Nees Syst.* p. 280.

**CHAR.** Stipes eximie fistulosus, gracilis, subcartilagineus, a pileo discretus, basi villosus plerumque radicatus; numquam bulbosus. Pileus membranaceus, conicus (in tenellis subglobosus), dein campanulatus, raro magis expansus, substriatus, glaber (duab. spec. exceptis) absque squamis, plus minus diaphanus. Lam. inæquales, subexsuccæ, adscendentes, postice acutæ. Asci distincti. Sporidia alba. *Color varius.*

**O b s.** Fungi minores, saltim tenues, graciles, sat persistentes, plerumque gregarii l. cæspitosi, in cibariis non recepti. Odor multis fortis et ad species optime, numquam vero subdivisiones distinguendas valet.

†. **MYC. GENUINÆ.** Siccæ. Pileus sæpe umbonatus, non depresso. Lamellæ liberæ l. adnatae, nec decurrentes.

\* *Stipes radicatus, lævis, exsuccus.* *Lam.* liberæ, *margine concolori.* *Color fuscescens.*

1. *A. alliaceus*, olidus, pileo lento albo-fuscescente, lamellis liberis albidis, stipite procero pruinito-velutino nigrescente.

*Mich.* t. 78. f. 4. A. all. *Jacq.* *Obs.* p. 100. *Austr.* t. 82. *Pers.* *Obs.* 2. p. 54. *Syn.* p. 575. *Fl. Dan.* t. 1251.

Odor alliaceus, fortis, persistens. Stipes spithameus, sursum attenuatus, rigidus, subcorneus ut in Leptoniis, basi incurvus radicatus. Pileus dein planiusculus, subumbonatus, laevis l. obsolete striatus, expallens, uncialis et ultra. Inter folia, rarius ad ligna; copiose in fagetis, parce in pinetis. Jul.-Nov. (v. v.)

2. *A. rancidus*, olidus, firmus, cinereus, pileo umbonato laevi, lamellis liberis confertis, stipite laevi radicato.

Odor farinæ recentis, subrancidus. Stipes 2-6 unc. longus, 2 lin. crass., rigidus, lividus, glaber; radice fusiformi villosa. Pileus disco carnosus, dein convexus, late et obtuse umbonatus, fuligineus, mire core peculiari albescente. Lam ventricosæ, cinereæ. Rara et insignis species. In Scania ad truncos; Smolandia in pinetis l. pratis muscosis declivibus ad terram. Sept.-Nov. (v. v.)

3. *A. atro-albus*, inodorus, pileo lavi nigricante, in margine lamellisque liberis albicantibus, stipite basi tumido strigoso. *Bolt.* t. 137.

Solitarius l. gregarius, sat firmus. Stipes 2-3 unc. longus, subinde apice pruinatus. Pileus obtusus, e nigro circa margines albicat. *Boltonii* icon quadrat; alienus tamen *A. S.* p. 191. (cæspitos., radicatus, in truncis abiegnis serotinus etc.) Alia forma, adhuc minor, stipite pruinato etc. quodammodo refert *A. pusillum*. *Batsch.* t. 66. (stipes erron depictus.) Ad terram & stipites locis umbrosis saepè uidis. Aug.-Nov. (v. v.)

4. *A. amictus*, pileo obtuso striato livido-virente, lamellis liberis linearibus, stipite filiformi villoso-pulverulento, basi glabro.

*Am. Hall. helv.* n. 2394. — Cf. *A. S.* n. 552.

Pulcher, gregarius. Stipes longissimus, flexilis, lividus; radice prælonga, tortuosa, fere glabra. Pileus elegans, etiam cæsius et pruinatus, 3-6 lin. latus. Lam. confertæ, distinctæ, cinereæ, margine pallidiores. In fagetis umbrosis passim; pinetis raro. Sept. Oct. (v. v.)

5. *A. filopes*, pileo obtuso striato livido-fusco, lamellis liberis ventricosis albis, stipite longo lævi, radice pilosa.

*Am. Hall. helv. n. 2391.* (ad part.) *A. filop.* *Bull. t. 320.* *Schum. p. 269.* *Dec. fr. 2. p. 161.* *A. membran.* *Hoffm. l. c. t. 6. f. 1.* *A. pilosus.* *Batsch. El. f. 1.* *A. S. p. 193.*

Cum *A. galericulato* γ. non commutandus. Stipes 3 unc. longus et ultra, tenuis, subfragilis, albo-lividus 1. fuscus. Pileus campanulatus, junior conicus, colore varius,  $\frac{1}{2}$  unc. circiter latus. Stipes passim succo aqueo refertus. Locis humidis silvarum, frequens. Aug.-Oct. (v. v.)

6. *A. supinus*, parvus, pileo obtuso striato griseo, lamellis subliberis ventricosis stipiteque brevi incurvo glabro albis.

*A. pusill.* *Hoffm. l. c. t. 6. f. 3* *A. griseus.* *Fl. Dan.* *t. 1551. f. 2.*

Longe ab *A. corticola* distat. Gregarius, persistens, nec exsiccatus corrugato-flaccescens. Stipes uncialis, lævis, subtenax. Pileus campanulatus, 2 lin. latus, disco subobscurior. Lamellæ adscendentæ, latæ. *Ad truncos vetustos Fagi &c.* Sept.-Nov. (v. v.)

\* \* *Stipes lævis, exsuccus, subradicatus. Lam. adnatae, margine concolori. Color fuscens.*

7. *A. alcalinus*, olidus, pileo obtuso striato cinereo, lamellis adnatis ex albo glaucis, stipite lævi firme, basi villoso. *Fries Obs. 2 p. 153.*

*Vail. par. t. 12. f. 1, 2.* *A. sulphur.* *Scop. p. 454.*

Odore forti nitroso et sapore ingrato facile distinguitur. Statura de cetero, modo tenuior et minus firma, A. galericulati, nec varietates pauciores. Occurrit solitarius, gregarius, cespitosus; rigidus et tenuis; colore pilei nigricante, rufo — et flavolivido, pallido; stipitis luteo!, cinereo; b.) etiam tenuis, totus albidus. *Ad terram & truncos, ubique; b. locis humidis silvarum. Mayo-Oct. (v. v.)*

*B. A. leptocephalus, cinereus, pileo umbonato tenui, lamellis crassis, stipite glabro brevi.*

*Pers. ic. & descr. t. 14. f. 4. Syn. p. 381. Fr. l. c. 1. p. 31.*

Forte distinctus, sed odore convenit. Lam, subsinuatæ. *Ad truncos, rarissime. (v. v.)*

**8.** *A. galericulatus, inodorus, pileo non lævi fuscescente, lamellis albidis adnatis, dente decurrente, stipite lævi tenaci, basi radicato stri-goso.*

*Vaill. par. t. 12. f. 3, 4. Mich. gen. t. 79. f. 5. t. 75. f. 9. A. campanul. Linn. Suec. 1. n. 1054. Vill. &c. A galericulata Schäff. t. 52. Sowerb. t. 165. Pers. Obs. 2. p. 57. Syn. p. 376. Fries Obs. 2. p. 159. A. fistulosus. Bull. t. 518. ad part. Dec. fr. 2. p. 160. A. conicus. Willd. A. varius. With n. p. A. pseudoclypeata Bolt. t. 154. A. mamillata Hoffm. t. 4. f. 1.*

*b. amœne albus. A. eucullat. Fr. l. c. p. 147.*

Maxime variabilis, inodorus, insipidus, exsucus, tenax. Stipes rigidus, vix splendens, basi excepta glaber. Pileus plus minus membranaceus, subrugosus, plus minus striatus. Lam, subdistantes, demum cinerascentia, incarnatæ, sed sporidia alba. Color varius, plerumque cinereus, spadiceus etc. Stipitis e ligno sæpe pendet ex. gr. in ligno carioso Quercus spadiceo-sulvus etc. *In truncis vel juxta eosdem, ad terram &c. longe vulgatissimus (v. v.)*

*B. solitarius, major, terrestris, pileo carnoso-membranaceo rugoso, stipite rigido. Schäff. l. c. f. 7—9.*

*Am. Hall, helv.* n. 2388. *Am. sulcata. Lam. l. c. p.*  
*Ios. A. aestivus. Pers. syn. p. 378. Obs. 1. p. 9. A.*  
*galeric. præmorsus. Syn. p. 577.*

*V. solitarius, gracilis, terrestris, pileo subhe-*  
*mispharico papillato, stipite filiformi prælongo*  
*flaccido.*

*Mich. t. 73. f. 4. Bull. l. c. t. 518. f. P. A. pilosus.*  
*Pers. syn. p. 380. A. tenuis. Auct. fistul. gracilis*  
*Dec. l. c. — proxime accedit A. cucullat. Schum.*  
*p. 269. Fl. Dan. t. 1670. f. 1.*

Occurunt utique longe plures varietates, sed  
 haec præcipuae. Ultima crescit ad terram inter muscos  
 subhumidos, ubique. (v. v.)

Monstrositatem insuper vix limites. In cellis abire  
 vidi in *Buxb. Cent. IV. t. 13. f. 1.*; in fodinis evadit *A. Myurus Hoffm. Veg. Subt. t. 3.* In arboribus cavis stipi-  
 tes imp'exi, tomentosi. In cavo stipitis tubulus tortus,  
 medullam pennæ referens, saepè reconditur, ut in *A. lævi*  
*Schum. p. 271.* Locis valde umbrosis humidis basi dilata-  
 tata foliis innascitur e. s. p. His adde *A. proliferum Sow.*  
*t. 169., A. fissum, quercinum, muscorum, incarnatum, & te-*  
*nellum. Schum. Sæll. l. c.* Variae quoque apud antiquiores  
 hujus occurunt icones, valde paradoxæ v. gr. apud  
*Lobel Belg. p. 306. Aldrov. Dendr. p. 119. (Ragagna) &c.*

9. *A. uranius*, pileo striato obscure violaceo, la-  
 melliuncinatis albis, stipite flaccido lævi ar-  
 rhizo atrocyaneo. *Fries l. c. p. 157.*

Bene pinxit *Buxb. Cent. IV. t. 8 f. 2.*; de ce-  
 tero vix a precedente, quamvis omnino constans vi-  
 sus, distinguendus. Stipes atrocyaneus, filiformis.  
 Pileus expallens, 3-4 lin. Inter folia decidua. Aug.-  
 Nov. (v. v.)

10. *A. metatus & lævigatus*, inodorus, pileo obtuso striato, sicco expallente lævi, lamellis adnatis albis, stinite lævi subfragili basi fibrilloso.

*Buxb. Cent. IV. t. 15. f. 3. A. tener. Scop. p. 456. A.*  
*lævig. Pers. syn. p. 390. A. S. p. 192. Fries Obs.*  
*1. p. 35. A. pilosus. Fl. Dan. t. 1615. f. 2.*

Certe ab *A. gatericulato* distinctus. Gregarius,  
 mediocris, terrestris, exsuccus; colore varius, plerum-

que cinerascente, sicco albido; sed occurrit s<sup>æ</sup>pe argillaceus, *flavus!*, incarnato-pallidus e. s. p. Stipes rigidus, 2 unc. et ultra longus, pallidus, basi fibrilloso-radicatus. Pileus membranaceus, campanulatus,  $\frac{1}{2}$  unc., submollis. Lam. distantes, distinetæ, breviores angustiores, *A. collariatu*s Fr. Obs. 2. p. 164, in hujus consortio vigens vix nisi status mutatus. In pinetis ad terram, præcipue sero autumno, vulgatissimus. (v. v.)

*B. plicosus*, pileo lineato-striato, lamellis crassiusculis stipiteque griseis.

Stipes basi villosus. Pileus fragilis, subinde fissus, umbone lato obtuso. Lam. latæ, fragiles. Varietates ad species suas nullibi difficilius referuntur, quam inter Mycenas. *A. griseus* Batsch. f. go. ad hunc potius, quam *A. griseum* pertinet. *Ad terram.* (v. v.)

II. *A. erosus*, pileo hemisphærico griseo-expalente, lamellis emarginatis dente decurrente stipiteque lævi, basi compresso! dilutioribus.

Notæ certissimæ sub trita facie. Stipes junior flocculosō-farctus, attenuatus, 3 unc. usque longus, subfragilis, glaber, albido-cinereus. Pileus junior subinde papillatus, dein explanatus subdepressus, humidus striatus griseus, siccus lævis canus, 1 unc. latus. Lam. 2 lin. latæ, subdistinctæ, albido-griseæ. In pinetis junioribus montosis, raro. Sept.-Dec. (v. v.)

12. *A. muscigenus*, tenellus, albus, pileo hemisphærico lævi, lamellis adnatis subconfertis linearibus, stipite setaceo flaccido.

Mich. p. 147. n. 35. *A. trichopus*. Scop. p. 432. 4<sup>o</sup> muscig. Schum. Sæll. p. 307.

Solitarius l. gregarius. Stipes ob tenuitatem obsoleto fistulosus, subradicatus, uncialis. Pileus junior glebosus, dein hemisphæricus, demum convexo-planus, 1 lin. cūciter latus. Ab *A. capillari*

dif fert stipite, lamellis confertioribus pileo que num-  
quam depresso. *Ad truncos arborum muscosos. Aug.-*  
*Nov. (v. v.)*

\*\*\* *Stipes exsuccus, striatus, Lam. margine*  
*concolori. Color subfuscescens.*

13. *A. plexipes*, pileo umberato striatulo fuligineo, lamellis attenuatis albis, stipite e fibris implexis sericeo-striato livido.

Fung. parvus, ped. tenui longo firmo &c. *Raji Hist.*  
*II. p. 98. Fung. - ped. in superficie lacero. Mich.*  
*t. 79. f. 8. A. inodor. Schum. p. 270.*

b. *A. fuliginar.* *Batsch. El. f. 40.*

Analogus A raneido; nulli affinis. Inodorus, firmus. Stipes vix radicatus, 3 unc. circiter longus, 1-2 lin. crassus, sordidus, fibrosus, obsolete striatus. Pileus campanulatus, subrugosus, 1-2 unc. latus. Lam. ventricosæ, postice valde attenuatae, fere liberae, subconfertæ, candidæ l. glaucescentes. *In fagetis, locis graminosis & circa truncos, haud raro. Sept. Oct. (v. v.)*

14. *A. polygrammus*, pileo obsolete striato subcinnereo, lamellis attenuato-adnexis albis, stipite longo rigido striato splendente.

*A. conic.* *Huds. II. p. 620. A. cynoph.* *Batsch. Cont.*  
*I. f. 85. A. fistulos.* *Bull. t. 518. f. H. A. polygr.*  
*I. c. t. 395. Dec. fr. p. 161. Pers. syn. p. 377. Sw.*  
*I. c. 1803. p. 94. Fl. Dan. t. 1615. f. 1. A. fusci-*  
*pes & galericul.* *Schum. I. c. Fl. Dan. t. 1498.*  
*b. amœne niveus.* *Pers. I. c.*

Plerumque gregarius, immo cæspitosus, striatus, rigidus, sat firmus. Stipes saepe spithameus, basi strigosus; colore argenteo, cæsio, rarius livido. Pileus tenax, demum subumbonatus,  $\frac{1}{2}$  unc. latus, margine saepe dentatus. Lam. subliberæ. *Inter fo-*  
*lia decidua & truncos (b. præcipue Coryli), vulgaris.*  
*Sept.-Dec. (v. v.)*

15. *A. vitreus*, pileo obtuso lineato-striato livido-fusco, lamellis adnatis linearibus albidis, stipe striatulo livido splendente.

**Gregarius, inodorus, exsuccus, totus fragilis.**  
**Stipes 2-4 unc. longus, glaber, sub lente striatus,**  
**deorsum fibrillosus. Pileus tenuis, campanulatus,**  
**etiam cæsius. Lam. distinctæ, subdistantes, margi-**  
**ne concolori. Proximus A. galopodi et avenaceo.**  
*Locis subhumidis in pinetis. Sept. Oct. (v. v.)*

16. *A. atrocyaneus.* pileo obtuso stipiteque [brevi] subpruinaatis striatis nigricantibus, margine lamellisque subadnexis, albidioribus.

*Batsch. C. I. f. 87. A. Batschii. Fr. Obs. I. p. 47.*

*A. atroalbi formam minimam refert. Stipes 1-2 unc. longus, vix radicatus. Pileus dein expallens, cinerascens, 3 lin circiter altus et latus. Lam. basi obscuriores. Locis umbrosis ad terram. Aug.-Oct. (v. v.)*

17. *A. janthinus, janthino-purpureus, expallens,*  
*pileo subumbonato, margine striato, lamellis*  
*attenuato-adnexis antice latioribus, stipite gla-*  
*bre striato.*

*A. purpurascens. Schrad. spic. p. 127?*

*Sparsus, fragilis, inodorus. Stipes 2 unc. lon-*  
*gus, sursum attenuatus, non expatiens, basi fibril-*  
*losus, in minoribus levis. Pileus membranaceus,*  
 $\frac{1}{2}$  unc. et ultra altus. numquam convexus, sed cum  
*demum expandeter margine fissus. Lam. distinctæ*  
*l. venis connexæ. In muscosis abiegnis, raro. Sept.*  
*Oct. (v. v.)*

18. *A. Zephyrus, pileo obtuso albo-incarnato, mar-*  
*gine striato, lamellis adnatis linearibus albis,*  
*stipite striato squamuoso lilacino.*

*A. galeric. E. rubella. A. S. p. 191. A. spinipes. Swartz*  
*l. e. 1809. p. 83. a. p. A. zeph Fries l. c. 2. p. 161.*

*Admodum gregarius, pulcher, fragilis, inodo-*  
*rus, cum A. puro forte commutatus. Stipes basi*  
*incurvus lanatus, sursum albo-quamulosus. Pileus*  
*etiam livido-roseus, disco fuscescens, diaphanus,*

uncialis. Lam. etiam secedunt, s<sup>æ</sup>pe venis conne-  
xæ. In hortis, alnetis, fagetis & præcipue pinetis,  
ubique. Jul.-Nov. (v. v.)

\* \* \* \* Stipes lœvis, lactescens, subradicatus. Lam.  
subattenuato-adnexæ.

19. *A. prasiosmus*, oolidus, pileo hemisphærico ci-  
nereo, lamellis subliberis, stipite elongato suc-  
co croceo referto.

*A. alliac.* Scop. p. 454. *A. porreus.* Pers. ad part.  
Schum. p. 271. *A. pras.* Fries Obs. 2. p. 153.

Sequenti simillimus, sed odor alliaceus. Pileus  
disco olivaceo-umbrinus. Scopoli descr. ad *A. al-  
liac.* quoque adaptata: "Junior pileus flavicat, stria-  
tus, conicus, adultus fuscescens, convexus, strias  
perdit. In hac ætate stipes nigricat! etc. Ad folia  
decidua autumno. (v. ic.)

20. *A. crocatus*, inodorus, pileo obsolete striato  
cinereo, lamellis attenuato-adnexis albis stipi-  
teque succo crocato refertis.

Schrad. spic. p. 127. Pers. syn. p. 380. Schum. Sælt. p.  
272. Fries Obs. 1. p. 52. Fl. Dan. t. 1550. f. 1.

Stipes longus, croceo-sanguineus, strigoso-radi-  
catus. Pileus umbonatus, colore varius. In nemo-  
ribus humidis, præcipue inter folia dejecta Fagi, fre-  
quens. Aug.-Oct. (v. v.)

21. *A. galopus*, pileo striato nigrescente-glauco,  
lamellis adfixis albis, stipite succo albo referto.

Fung. minimus, ped. longo tenuissimo lactesc. Rajt  
Hist. II. p. 99. *A. lactesc.* Schrad. spic. p. 128. *A.  
galop.* Pers. l. l. c. c. Fries Obs. 1. p. 34. Fl. Dan.  
t. 1550. f. 2.

Succo lacteo mox dignoscitur. Odor nullus.  
Stipes gracilis, inter muscos valde elongatus et  
basi fibrillosus. Lam. subattenuato-adfixæ, etiam  
glaucescentes. Pileus variat obtusus et umbonatus,  
nudus et pruinosis, colore livido etc. In silvaticis,  
communis. Aug.-Nov. (v. v.)

22. *A. hæmatopus*, cæspitosus, pileo carnosò-membranaceo albo-rubescente, lamellis adfixis stipiteque succo atrosanguineo refertis.

*Pers. Obs.* 2. p. 56. *Syn.* p. 379. *Fr. Obs.* 1. p. 53.

Analogus *A. galericulato*. Stipites rufescentes, basi strigosi, superficie tota plerumque villoso-pulverulenta. Pileus albidus, habitu *A. sandicini*, margine saepius dentato. Lam. albae, dente decurrentes, margine concolori, antice evanescentes. *Ad truncos Fagi, Abietis &c. copiose. Aug.-Oct. (v. v.)*

23. *A. cruentus*, solitarius, pileo striato badio-rubro, lamellis adnatis margine concolori, stipite succum rubrum stillante.

Medius inter n. 22, 24. Stipes basi villosus, de cetero glaber laevis, 2-3 unc. longus, firmulus. Pileus membranaceus, conicus, dein expansus obtusus, 3-4 lin. altus et latus, margine integerrimo. Lam. confertæ, lineares, albidae. *Inter folia Abietis. Aug.-Nov. (v. v.)*

24. *A. sanguinolentus*, tenuis, pileo striato rubello, lamellis adfixis atropurpureo-marginatis, stipite succum rubellum stillante *A. S. p. 196. Fr. l. c.*

Admodum gracilis. Stipes 2-4 unc. longus, debilis. Pileus subhemisphæricus, 2-5 lin. latus. Lam. attenuato-adnexæ, distantes. *In paludosis silvaticis, nemoribus humidis, passim. Aug.-Oct. (v. v.)*

\* 5. *Stipes laevis, exsuccus, subradicatus. Lam. adnatæ, margine discolori.*

25. *A. elegans*, pileo striato livido-flavescente, lamellis adnatis linearibus lividis, margine croceo, stipite rigido laevi, basi fibrilloso.

*A. eleg.* *Pers. syn. p. 391. A. S. p. 176. Fries Obs. 2. p. 167. A. fœniculac. congener. Schum. p. 287, 288.*

Odor debilis, fœniculi, etiam nullus. Stipes sat firmus, 1-2 unc. longus, lividus, succo aqueo. Pileus  $\frac{1}{2}$  unc. et ultra latus, variat obtusus et co-

loris intensitate. Lam. adnatæ, dente decurrente, latere subcæsiis. *In pinetis, passim. Aug.-Nov. (v. v.)*

26. *A. cimmerius*, pileo striatulo flavo-fusco, lamellis adnexis ventricosis croceis, margine pallido, stipite flaccido basi fibrilloso.

A priori differt statura tenuiori, gracili, stipite 3 unc. longo, pileo minori subhemisphærico, lamellis latioribus aliter coloratis, margine albidis, locoque. *In fagetis, raro. Oct. (v. v.)*

27. *A. avenaceus*, pileo obtuso fuscescente, lamellis adnatis linearibus candidis, margine fusco, stipite lœvi fragili splendente.

Elegans, gregarius, fragilis. Stipes 3 unc. et ultra, 1 lin. circiter crassus, radicatus, cinereus, basi fibrillis laxis pilosa. Pileus eximie campanulatus, cæsio-lividus, leviter striatus. 4-6 lin. altus. Lam. confertæ, distinctæ. *In fagetis inter folia decidua, jove pluvio. Sept.-Nov. (v. v.)*

28. *A. rubromarginatus*, pileo obtuso striato rubescente-livido, lamellis adnatis albidis, purpureo-marginatis stipite rigido glabro.

*Am. Hall, helv. n. 2441. — Fr. l. c. 1. p. 42.*

Habitus A. galericulati, sequ. proximus. Subfragilis, inodorus, exsuccus. Stipes lœvis, 1-2 unc. longus, sœpe incurvus. Pileus campanulatus, membranaceus, expallens. Lam. distantes, distinctæ, demum griseæ, dente decurrente. *In silvis abiegnis, alnetis &c. ad ligna, ramos, strobilos, non raro. Jul.-Oct. (v. v.)*

29. *A. strobilinus*, coccineus, pileo acute umbonato, margine striato, lam. adnatis, margine obscuriori, stipite exsucco firmo, basi albo-striato.

*A. coccin. Sow. t. 197. A. strobil. Pers. syn. p. 393. A. S. p. 190. Sw. l. c. 1808. p. 96. A. rosaceus, Schum. p. 291.*

**Gregarinus, subfascicularis.** Stipes utique fistulosus, 2 unc. longus, rigidulus. Pileus campanulatus, 3-6 lin., disco carnosulo umbonato lævi saepe obscuriore. Lam. adnatæ dente tenui decurrente, distantes, distinctæ, rubellæ, margine obscure sanguineo. In pinetis ad ramulos &c.; frequentior in fagetis umbrosis. Aug.-Nov. (v. v.)

30. *A. rosellus*, roseus, pileo obtuse umbonato striato, lamellis adnatis, margine obscuriori, stipite exsucco tenui, basi albo-villoso.

Bull. t. 518. P. sat simil. — *A. roseus*. Pers. syn. p. 393. t. 3. f. 5. Schum. l. o. Dec. fr. 2. p. 165. Fr. l. c.

Maxime antecedenti cognatus. Tenuior, dilutior, sero autumno omnino expellens. Pileus totus membranaceus, subhemisphericus. In pinetis locis subhumidis gregarie, abunde. Aug.-Nov. (v. v.)

- \* 6. *Stipes lævis, exsuccus, vix radicatus. Lam. adfixæ, margine concolori.* Color purus.

31. *A. purus*, pileo carnoso-membranaceo obtuso subroseo, lamellis rotundatis ventricosis pallidioribus, stipite lævi basi villoso.

*A. janthinus*. Batsch. El. f. 20. *A. incarnatus*. Relh. Supl. 2. n. 1092. *A. roseus*. Bull. t. 162, 507. Sowerb. t. 72. Sw. l. c. 1808. p. 87. Fl. Dan. t. 1673. f. 1. *A. purus*. Pers. syn. p. 339. Dec. fr. 2. p. 180. Fl. Dan. t. 1612. *A. purus*, *lilacinus*, dilutus & purpurasc. Schum.

Subolens, (adore Raphani), gregarius, magnitudine saepe spectabilis, sed ad Mycenas procul dubio pertinet. Stipes fistulosus, 2-4 unc. longus, sursum attenuatus, glaber, sed basi incurvus substrigosus. Pileus etiam omnino membranaceus, tandem planiusculus, obtuse umbonatus, marginè striatus, 1-3 unc. latus. Color pilei stipitisque purpureus, roseus, lilacinus, fusceccens, pallescens, etiam disco flavus visus. In fagetis, quergetis, ericetis muscosis, ubique. Jun.-Nov. (v. v.)

32. *A. adonis*, pileo obtuso lævi, lamellis adnatis albis, stipite lævi glabro arrhizo.

*A. adon.* Bull. t. 560. f. 2. (Sow. t. 385. f. 2, 3. minus apte.) Pers. syn. p. 391. Dec. fr. 2. p. 164. Fries l. c. p. 160.

Colore variat roseo, albo, flavescente, viridi. Stipes 2 unc. et ultra. Pileus campanulatus, 3-4 lin. altus et latus. Lam. non decurrentes. In silvis ad terram, raro. Sept.-Nov. (v. v.)

33. *A. chloranthus*, pileo obtuso striato viridi, lamellis adnexis albis, stipite lævi glabro viren-te. Fr. l. c. p. 156. t. 5. f. 2. Fl. Dan. t. 1614. f. 2.

Parvus. Stipes uncialis, arrhizus. Pileus subcucullatus, 2-4 lin. altus. Lam. latiusculæ. In nemoribus graminosis, jove pluvio. Aug. Sept. (v. v.)

34. *A. lineatus*, pileo obtuso lineato-striato flavo, lamellis adfixis albis, stipite basi albo-villoso.

Bull. t. 522. f. 3. Pers. syn. p. 383. A. S. p. 193. Dec. fr. 2. p. 162. Fries l. c. p. 163.

Stipes 2 unc. longus, tenuis, flavescentia, basi tomentulo niveo subvelutino obductus. Pileus 3-5 lin. latus et altus. Lam. subventricosæ. In fagetois & locis graminosis. Aug. Sept. (v. v.)

35. *A. luteo-albus*, pileo umbonato striato stipiteque tenui luteis, lamellis adnatis albis.

Bolt. t. 38. f. 1. Pers. syn. l. c. A. S. p. 194.

Parvus, siccus, sed pulcher. Stipes 1-2 uncialis, filiformis, subflexuosus. Pileus acute campanulatus, 3-4 lin. altus et latus. Lam. latæ, distinctæ. Inter muscos in pinetis. Aug.-Sept. (v. v.)

36. *A. lacteus*, pileo subumbonato striatulo albo-flavescente, lamellis adfixis distinctis stipiteque rigidulo lævi albis.

Raji Syn. p. 19. n. . . Buxb. Cent. IV. t. 31. f. 1. Am, Hall, helv, 2348. ad part. A. nanus, Bull. t. 563.

*A. papillat.* Hoffm. nomencl. t. 5. f. 2. *A. lacteus.* Pers. syn. p. 394. *Fries Obs.* 1, p. 38. (*A. tenuis.* Bolt. t. 37. *Sow.* 1. 385. f. 5. *A. tener.* Schum. p. 268. *proximi.*)

Mycenæ colore lacteo variantes plurimæ, hinc caute inquirenda species. Gregarius, varius. Stipes 1  $\frac{1}{2}$  - 3 unc. longus, vix lin. crassus; in ericetis totus glaber arrhizus; in pinetis et inter folia decidua subradicatus basi fibrillosus. Pileus campanulatus, dein expansus, subrimosus, 3-7 lin. latus. Lam. adscendentes, subdistantes, absque collario; passim ventricosæ; adnatæ sed secedente-liberæ. Ad terram in ericetis; ad ramulos et folia in pinetis, vulgaris. Jul.-Nov. (v. v.)

*B. pumilus*, pileo flavo, lam. liberis. stipite brevi arrhizo. Ag. pumil. *Bull.* t. 260. *Dec.* p. 165.

\* 7. *Stipes exsuccus, arrhizus; sed basi in orbem dilatatus. Pileus obtusus.*

57. *A. torquatus*, albus, pileo obtuso plicato glabro, lamellis collario adnatis venoso-connexis, stipite basi membranula orbiculari plana.

*A. nanus.* *Bull.* t. 563. f. S. *A. stylob.* *Dec.* fr. 2. p. 153.

Admodum peculiaris collario, cui lamellæ insertæ. Pileus exacte campanulatus, tenax, albidus, disco lèvis, de cetero lineatus. Lam. inæquales, adscendentes, candidæ. Ad stipites & ramulos deciduos, raro. Sept. (v. v.)

38. *A. stylobates*, tener, pileo obtuso striato subpiloso, lamellis liberis distinctis, stipite basi membranula orbiculari striata.

a. *candidus.* *A. S.* p. 196. *Fr. Obs.* I. p. 39.

b. *grisellus.* *Pers. syn.* p. 390. t. 5. f. 4. *Dittm. epud.* *Sturm.* t. 29. *Nees Syst.* f. 139.

c. *cœruleesc.*, orbe fusca, *Schum.* I. c. p. 267.

*Solitarius.* Stipes 1-2 unc. longus. Pileus campanulatus, dein convexus, 2-3 lin. latus et altus,

raro glaber, plerumque cum stipite pilosus (A. Hudsoni analogus.) Lam. alternæ, distantes, latae, præsertim antice. In foliis, & lignis &c. frequens. Jul.-Oct. (v. v.)

β. *A. dilatatus*, pileo unciali, disco lævi glabro, membranula glabra. Fr. l. c. p. 40. Dist. spec. videtur!

39. *A. pilipes*, cæspitosus, pallide fuscus, pileo conico lævi glabro, lamellis liberis confertis, stipite crassiusculo piloso. Sow. t. 249.

Stipes 2 unc. longus, totus pilosus, non radicatus, neque basi distincte dilatata (ex icon.) instructus, sed locum aptiorem non video. Pileus subcarnosus, dein expansus, obtusus, 5-8 lin. altus et latus. Lam. adscendentes, subtenues. Ad Agaricos putridos in Anglia. (v. ic.)

40. *A. trachelinus*, fuscus, pileo convexo fibrillis liberis strigoso, lamellis adnatis distantibus crenatis, stipite basi floccoso radioso. Fr. Obs. 2. p. 165. 374

Species delicata, diversissima Solitarius l. gregarius, totus obscure fuscus. Stipes 1  $\frac{1}{2}$  unc., filiformis, junior tenax, dein fragilis, totus villo subtilissimo squamuloso vestitus; basi leviter ineras-satus, strigoso-radiatus. Pileus tenuis, 3-6 lin. latus, humidus diaphano-striatus, siccus lævis. Lam. dente decurrente, ventricosa, margine sub lente floccoso-fasciculato. Ad terram humidam nudam, in rivulorum alveis exsiccatis &c. locis umbrosis, iteratis vicibus. Aug. Sept. (v. v.)

41. *A. platypus*, canescenti-albus, pileo hemisphærico sublævi, lamellis adnexis confertis, stipite brevi, basi floccoso-dilatato. Nees Syst. p. 202. f. 188. Mart. Erl. p. 450.

Minimus, 2 lin. altus, junior verrucæformis. Pileus 1  $\frac{1}{2}$  lin. latus, habitu fere Collybiæ. Ad ramulos exsiccatos ad Basel &c. Aug. (v. ic.)

42. *A. Mucor*, minimus, griseus, pileo glabro pliato, lamellis adnatis paucis distantibus, stipite glabro basi dilatato.

Batsch. Cont. 1. f. 82. A. integr. Nees l. c. f. 187.

Ab A epiphylo substantia neutiquam tenaci l. arida etc. differt Summa vero cum A. capillari, integrello etc. affinitas; sed basis vere dilatata nec strigosa; pileus junior conicus, dein explanatus, non depresso; lamellæ latæ, non decurrente etc. Ad folia decidua & rario. Sept.-Nov. (v. v.)

Specierum dispositio in quavis sectione, ut etiam subdivisione, immo etiam cum Leptoniis, omnino analoga.

++ HYGROCYBOIDEÆ. Pileus Stipesve viscosi. Lamellæ adnatæ l. decurrentes. (*A. chlorophanus.*)

43. *A. epipyrgius*, pileo obtuso striato stipiteque elongato flavo viscosis, lamellis uneinatis.

Fungi parvi &c. Raji Hist. II. p. 99. Vaill. par. 69. Ag. epipt. Scop. p. 455. Pers. syn. p. 382. Sw. l. c. 1808. p. 93. Dec. fr. 6. p. 46. A. flavipes. Schäff. t. 31. Pers. l. c. Id., A. rufoccephal. & lævigat. Schum. Sæll. A. clypeat. With. l. c. p. 253. A. nutans. Sowerb. t. 92.

b. totus cinereus, A. strigos. Schum. p. 272.

Similis A. alcalino, sed odoris defectu et viscositate omnino diversus Color admodum variat albus, cinereus, cæsius, flavus, rufus; lamellarum albidus, cæsius, subcarneus etc. Pileus  $\frac{1}{2}$  — 1 unc., numquam depresso, margine sœpe dentatus, membrana viscosa in humidis secernibili tectus! Ad terram muscosam silvarum, pratorum &c. abunde. Aug.-Nov. (v. v.)

44. *A. citrinellus*, pileo umbonato striato stipiteque brevi subviscoso citrinis, lam. uncinatis albis.

Pers. ic. & deser. t. 11. f. 5. Syn. p. 384. A. S. p. 194. Fries Obs. 1. p. 44. Fl. Dan. t. 1614. f. 1.

b. *A. tenellus*. Batsch. f. 88, Mart. Erl. p. 427.

*Gregarius, parvus. Stipes uncialis, filiformis, basi fibrillosus. Pileus 2-3 lin. latus, hemisphæri-co-explanatus, disco s̄epe obscurior, b. tenuior, graciilior. In pinetis inter folia, strobilos &c. Sept.-Nov. (v. v.)*

45. *A. vulgaris*, pileo umbonato, demum depresso striato cinereo, lamellis decurrentibus candidis, stipite brevi firme viscoso.

*A. papill. Schrad. spic. p. 128. A. vulg. Pers. syn. p. 394. A. S. p. 198. Fr. l. c. p. 57. A. cucullat. Fl. Dan. t. 1678. f. 2.*

*Gregarius, parvus, subinde totus eximie nivus. Stipes 1-2 unc. longus, 1-2 lin. crassus, plerumque cinereus, basi albostrigosus. Pileus convexus, 2-3 unc. lin. et ultra, humidus subviscosus, etiam circa marginem albicans. Inter folia Pini copiose. Aug.-Nov. (v. v.)*

46. *A. roridus*, pileo campanulato dein umbilicatic, lamellis decurrentibus candidis, stipite tenui flaccido glutinoso. *Fr. l. c. p. 84.*

*Totus candidus. Stipes ob tenuitatem vix fistulosus, capillaris, glutine copiosissimo nitido obductus, uncialis et ultra. Pileus junior fere conicus, sublaevis, siccus, 2-3 lin. Ad folia, surculos &c. Mayo-Sept. (v. v.)*

*B. stillans*, pileo convexo plicato flavido, stipite longissimo. *Inter muscos &c. (v. v.)*

*Aliam quoque ex hac sectione semel reperi speciem, galericuleto similem, rigidam, albam, pileo striato viscoso, lamellis absque dente adnatis, stipite radicato glaberrimo &c. Ad truncum Fagi.*

††† OMPHALARIAE Siccæ. Pileus demum depresso. Lam decurrentes.

\* *Firmiores, persistentes, stipite firma.*

47. *A. pellucidus*, rufescens, pileo submembranaceo c. impanulato margine striato, lamellis decurrentibus latissimis, stipite farcto tenui.

*A. pelluc.* Bull. t. 550. f. 2. Dec. fr. 2. p. 172. *A. biconus*, Pers. syn. 317.

Stipes  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 1 lin. crassus, basi leviter incrassatus. Pileus  $\frac{1}{2}$  unc. fere latus, demum ut videtur obtuse umbonatus. Locus hinc vacillat. *Ad terram in Gallia.* (v. ic.)

48. *A. demissus*, rufescens, pileo convexo striato, lameliis subdecurrentibus latis distantibus, stipite farcto brevi.

Stipes laevis, glaber, hepatico-rufescens, vix uncialis. Pileus submembranaceus, semper obtusus, quin potius demum leviter umbilicatus, 4-5 lin. latus, fusco-rufescens. Lam. distinctæ, triquetra, eleganter purpureæ. *In terra nuda montis silvaticæ in Smolandia.* Aug. (v. v.)

$\beta$ . *sandicinus*, purpureo-lilacinus, lamellis adnatis, stipite fistuloso flaccido basi fibrilloso. Dist. species? *Inter folia Pini.* Aug. (v. v.)

49. *A. umbratilis*, pileo convexo dein umbilicato nigro-fusco, lamellis adnato-decurrentibus confertis albo-fuscescentibus, stipite flocculosofarcto glabro. *Vaill. n. 59. p. 66.*

Gregarius, subaqueus. Stipes tenax, 1-2 unc. longus, 1 lin. crassus, laevis. Pileus submembranaceus, obtuse! campanulatus, mox convexus, et umbilicatus, margine substriatus, uncialis circiter. Lam. late. *Ad margines fossarum, locisque similibus Scaniæ campestrīs.* Sept.-Nov. (v. v.)

$\beta$ . *A. ambustus*, pileo convexo-plano papillato, demum subdepresso, stipite fistuloso subcompresso.

Omnino constans, quanquam priori affinis. Stipes valde tenax, pileo concolor, 1 - 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, vix 1 lin. crassus, glaber. Pileus  $\frac{1}{2}$  - 1  $\frac{1}{2}$  unc. latus, papilla centrali minuta, planiusculus, junior fuscus, dein margine lividus striatus. Lam. dente decurrentes, confertæ, albo-fuscescentes. *Ad terram locis deustis Smolandiae, vulgaris.* Aug.-Oct. (v. v.)

50. *A. griseus*, pileo demum subdepresso cinereo expallente, lamellis decurrentibus stipiteque longo fistuloso dilutioribus. Fries 1. p. 47.

Species ab omnibus antecedentibus \*) (lævigate, eroso, umbratili) diversissima. Stipes 2-3 unc. longus, lævis, glaber, teres, sepe flexuosus, albido-cinereus, longitudinaliter fragilis. Pileus campanulatus, dein convexus obtusus,  $\frac{1}{2}$  unc. latus. Lam. expallentes, simplices, distinctæ. Loco graminoso in silva abiegnæ pluries, Aug. Sept. (v. v.)

51. *A. clavicularis*, pileo convexo striato pallido, lamellis decurrentibus distantibus, stipite leviter fistuloso glabro.

Stipes tenax, siccus, uncialis, pallidus. Pileus obtusus, dein planus, obsolete depresso, subflaccidus,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. latus, subflavidus. Lam. albidiiores, distinctæ, postice latiores. In pinetis subhumidis raro. Sept. (v. v.)

52. *A. variegatus*, pileo campanulato lævi variegato, lamellis decurrentibus stipiteque longo glabro albis.

\*) Duas huic subjungam species, semel bisve modo observatas ideoque suspectas: a) *A. replexus*. Stipes fistulosus,  $1\frac{1}{2}$  - 2 unc. longus, basi fibrillosus, griseus. Pileus campanulatus, dein tetus inversus, lævis, obscure griseus, 5-5 lin. latus. Lam. longe decurrentes, ramosæ, cornexæ, albæ, antice venosæ! In horto 4 l. 5 specimen Sept. vidi.

b) *A. devexus*, Stipes subfasciatus, uncialis, glaber, griseus. Pileus leviter carnosus, griseo-fuligineus, expallens, cucullatus, expansus. Lam. adnato-decurrentes, distantes, distinctæ, crassæ, simplices, griseæ. Ad terram, bis Nov. (v. v.) -- Ad hanc sectionem quoque potissimum referendi videntur:

c) *A. eucullatus*, candidus, pileo campanulato lævi, lamellis arcuatis decurrentibus, stipite cavo basi strigoso. Pers. syn. p. 372. Stipes 2 unc., attenuatus; Pileus 3-4 lin. altus & latus. Inter muscos.

d) *A. pyriformis*, umbrinus, pileo plano cum lamell. decurrentibus obconico, stipite cavo. Pers. l. c. p. 317. Stipes  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{3}{4}$  unc. longus. Pileus 4 lin. latus, substantia tenui subcompacta. In graminosis.

*A. tentatula*. Bull. t. 560. f. 3. *A. varieg.* Pers. syn. p. 391. Dec. fr. 2. p. 164.

Stipes fistulosus, 2 unc. et ultra longus, vix 1 lin. crassus. Pileus glaber, submembranaceus, 4-6 lin. latus, dein umbonatus l. depresso; circa marginem albicans, disco striis rubellis (flavescens-tibus) varius. *In Gallia ad terram gregarie.* (v. ic.)

53. *A. setipes*, pileo convexo striato fusco, lamellis decurrentibus albidis, stipite longo filiformi griseo. Fr. Obs. 2 p. 162.

Statura praecedentis. Stipes 3 unc. et ultra longus, tenax, strictus, basi fibrillosus. Pileus 3-4 lin. latus, passim pubescens. Lam. valde decurrentes, subdistantes. *In umbrosis roridis. Aug. Sept.* (v. v.)

54. *A. speireus*, pileo planiusculo striato cinerascente, disco demum depresso fuseo, lamellis decurrentibus candidis, stipite albido. Fr. l. c. I. p. 90.

Affinis *A. galericulata* et supina; crescendi modus sequentis. Stipes uncialis et ultra, subradicatus, laevis, tenax. Pileus junior convexus, obtusus, 3 lin. latus. Lam. distantes, subconnexæ; juniores planæ. *Ad truncos muscosos Quercus, Fagi. Sept. Oct.* (v. v.)

\* \* *Tenelli*, flaccescentes, stipite subcapillari, (*A. Mucor.*)

55. *A. corticola*, pusillus, pileo tenui hemisphaerico, dein umbilicato striato, lamellis uncinato-decurrentibus distantibus stipiteque brevi incurvo glabro.

a. fuscescens. Mich. t. 74. f. 8. *A. corticalis*. Bull. t. 519. f. 1. Sowerb. t. 243. Dec. fr. 2. p. 165. *A. corticola*. Pers. syn. p. 394. Swartz l. c. 1808. p. 96.

b. albidus. *A. umbellif.* Scop. p. 457. *A. clavular.* Batsch. Cont. 1. f. 81. *A. hirtalis*, Retz. Supl. 2. p. 19.

Disseminatus, jove sicco mex corrugatus flaccidus, pluvio vero iterum redivivus. Color quoque variat incarnatus, rufescens, cyaneus etc Stipes 3-7 lin. longus. Pileus 2-4 lin. latus. Ad cortices arborum frondosarum lichenosas, ubique. Oct.-Febr. (v. v.)

56. *A. juncicola*, tenellus, pileo convexo striato rufescente, lamellis distantibus albidis, stipite capillari fusco. — Mich. t. 80. f. 9.

Gregarius, valde subtilis. Stipes  $\frac{1}{2}$  unc. longus, glaber. Pileus 1 lin. latus, dein subdepresso. Lamellæ integræ. In foliis putrescentibus Junci articulati. Legi ad Alnarp. Oct. (v. v.)

57. *A. stipularis*, tenellus, pileo convexo lævi lamellisque distantibus integris roseis, stipite capillari flavescente.

Stipes uncialis, sub lente pubescens, subflaccidus. Pileus 1-2 lin. latus, glaber, demum depresso. Lam. subaddecendentes, latæ, plerumque 6. In nemoribus humidis ad stipulas &c. Oct. (v. v.)

58. *A. pterigenus*, tenuis, roseus, pileo campanulato lævi, lamellis latis distantibus, stipite capillari, bulbillo strigoso. Fr. l. c. p. 43.

Fung. minimus, capitello conico &c. Raji Hist. III. p. 19. *A. rosellus*. With. l. c. p. 257.

Pulcherrimus Stipes in perfectis eximie fistulosus, 1-3 unc. longus, basi tomento strigoso radicato patentissimo plerumque insidens. Pileus dein umbilicatus, 1-3 lin. altus. Lam. 6-8, adnato-decurrunt. In stipitibus filicum & inter muscos locis undis abunde. Aug.-Oct. (v. v.)

B. *A. saccharinus*, pileo plicato lamellisque albis, stipite glabro roseo. Batsch. Cont. 1. f. 83. Forte distinctus. Ad folia, stipites &c. (v. ic.)

59. *A. capillaris*, albus, pileo campanulato tenerimo, lamellis adnatis distantibus, stipite capillari apice subfuscescente,

- a. Mich. t. 80. f. 11. Hall. helv. n. 2346. A. capill. Schum. p. 268.  
 b. Mich. t. 80. f. 10. Hall. n. 2349. A. acicul. Hoffm. t. 5. f. 2.

Stipes sat tenax, flacidus, uncialis circiter, glaber, basi subinde radiata. Pileus junior capitulum acicula refert, dein umbilicatus, humidus striatus, siccus laviusculus,  $\frac{1}{2}$  - 1 lin. latus. Lam. adscendentes, simplices, subinæquales. Ad folia decidua in specie Fagi, vulgaris. Sept.-Nov. (v. v.)

60. *A. integrillus*, candidus, pileo hemisphærico margine striato, lamellis rugæformibus decurrentibus distantibus, stipite deorsum piloso.

Raji. Syn. p. 19. t. 1. f. 2. Am. Hall. helv. n. 2348. Pers. ic. & descr. t. 13. f. 5. Syn. p. 393. A. S. p. 197. Fries Obs. 1. p. 41.

Parvus, subfascicularis, lamellis facile dignoscendus. Stipes uncialis circiter, basi subinde tomento bulbilloso. Pileus 1-3 lin., dein expansus, demum et depresso. Specimina lignatilia firmiora; lamellis vero rosaceis, ut Otto p. 25., non vidi. In umbrosis ad terram, folia, ligna &c. Jul.-Sept. (v. v.)

1. Fungi multi ex uno pede clypeiformes lutei & rubri. Clus. - J. Bauh. XL. c. 35. Lob. ic. p. 272.
2. Fungus exiguum &c. Buxb. C. II. t. 50. f. 5.
3. Fung. candidus &c. Mich. t. 73. f. 5. Ad Ilices.
4. A. coccineus. Seop. p. 436. Lam. stipesque albæ.
5. A. citrinus. Gunn. Norv. II. p. 126. t. 7 f. A. B. A. norveg. Gmel. Pileus sinuat. Ad Loppen W-finmark.
6. A. umbellifer. Schæff. t. 309. Æquivocus.
7. A. spinipes. Sowerb. t. 206. Cf. supr. Stipes, ut in aliis ex errore solidus &c.
8. A. præcox. Fl. Dan. t. 130. f. 2.
9. A. clavatus. Schum. p. 277. Locandus post A. alliac. Stipes nigrofuscus, longus, basi clavatus, Lam. liberæ, ovatae. Pileus lœvis, alutaceus.
10. A. tenellus. Meyer Essequ. p. 300. Fragilis, sordida albus, pileo piano medio fusco, lineis luteis striatæ.

lam. æqualibus, stipite gracili bulboso. Inter folia decidua. Majo.

Restant apud veteres icones nonnullæ rudes nimis & æquivocæ omnino, quas non citavi, etiam Mich. t. 75. f. 7. t. 79. f. 10 (Coprinus forsan); Batt. t. 27. A. 28. L (e sexcentis forsan galeric.) Cf. A. griseum, galericul.

---

### Trib. XI. OMPHALIA.

Omphalom. et Bullæ spec. Batt. p. 36, 55. Omphal. spec. Pers. syn. p. 448.

CHAR. Velum plane nullum. Stipes farctus, dein vero plerumque cavus, non bulbosus. Pileus membranaceus l. carnosο-membranaceus, etiam carnosο-coriaceus, subsuberosus; junior umbilicatus, dein expansus; l. totus infundibuliformis, margine reflexo l. patente. Lamellæ adnatæ l. decurrentes, numquam adnexæ tantum l. liberae, inæquales exsuccæ. Ascii producti. Sporidia alba. Color varius.

Obs. Tribus, ab ἡμίφαλος dicta, admodum varia, subtribus continet sequentes:

1. MYCENARIA. Pileus submembranaceus, Lam. decurrentes.
2. COLLYBARIA. Pileus carnosο-membranaceus, Lam. adnatæ.
3. LENTISCYPHI. Pileus carnosο-coriaceus, subsuberosus, lentus. Lam. decurrentes.

Agaricos omnes pileæ in ætate senescente depresso hue non referendos esse cuique observatori facile patet. Occurrunt tales formæ præcipue inter Limacia (*A. hypothecus*) Tricholomata (*A. nudus* &c.) Dasyphyllos! Camaroph. (*virgineus*) Hygrocybos (*A. ceccin., miniatus*) Oesypios! Mycenas &c.

### Subtrib. I. MYCENARIA.

Bullæ sp. Batt. l. e. Omphal. minor. ad part. Pers. syn. p. 466. Micromphal. spec. Nees Syst. p. 203.

CHAR. Stipes flaccidoso-farctus, dein cavus, æqualis, teres, brevis, vix fragilis, apice nudus, nec

pruinatus. Pileus membranaceus l. submembranaceus, a prima infantia umbilicatus l. infundibuliformis, dein explanatus, margine saepius patente; humidus striatulus, siccus laeviusculus expallens. Substantia tenuis, aquosa. Lamellæ posticæ acutæ, vere decurrentes.

Obs. Fungi minores; solitarii l. gregarii, terrestres l. epiphyti, inodori, insipidi, ob tenuitatem in cibariis rejecti. Differunt praeter alias notas. 1. MYCENÆ Omphalariæ, pileo campanulato, in statu juniori numquam umbilicato, in senescenti modo leviter depresso. 2. COLLYBIÆ Omphalariæ, pileo planiusculo dein obsolete depresso, stipite fistuloso corneo, lamellis, substantia arida sica. 3. CLITOCYBI pileo carnoso laevi, etiam per atatem depresso, substantia firma etc.

#### † MINORES. Pileo membranaceo.

- \* 1. *A. stellatus*, candidus, pileo convexo glabro, lamellis distantibus, stipite basi membranulae convexæ radiatæ innato. Fr. Obs. 1. p. 85.

*A. buccinal.* Sowerb. t. 107. excl. syn.

Gregarius. Stipes farctus, incurvus, fragilis, vix uncialis. Pileus striatus, 4 lin. latus. Lam. tenues, quibus hic et sq. ab *A. ericetorum* differt. Ad truncos vetustos putrescentes. Jul. Aug. (v. v.)

2. *A. scyphoides*, candidus, pileo inæquali sericeo, lamellis subpliciformibus, stipite villoso.

b. *A. buccinalis*. Batsch. Cont. 2. f. 214.

Stipes farctus, 2-5 lin., basi incrassatus. Pileus subrepandus, villoso-sericeus, 2-4 lin. latus, subindotus infundibuliformis. Lam. confertæ, angustæ, sape dichotomæ. b. glaber fere pingitur. Ad terram, locis humosis graminosis. Sept. (v. v.)

3. *A. fibula*, tenellus, pileo convexo glabro aurantio-flavo, lamellis albidioribus distantibus, stipite subluteo.

Batt. t. 28. Y. A. fibula. Bull. t. 186, 550. f. 1. Sowerb. t. 45. Pers. syn. p. 471. Sw. l. c. 1808. p. 250. Dec. fr. 2. p. 169. Am. Hall. n. 2370. A. parvus. With. l. c. p. 347. A. clavus. Schum. Sæll. p. 524.

b. niveus. Mich. t. 73. f. 6. Cf. Fries Obs. 2. p. 221.

Stipes junior farctus, dein cavus, uncialis et ultra, tenuis, sub lente subinde pubescens. Pileus 2-5 lin. latus, senescens albicans, humidus striatus. Lam. latr. distinctæ, longissime decurrent. Formæ plures quoad colorem, formam, marginem crenulatum etc. Subspecies sequentes omnino distingui possunt. Inter muscos, graminæ, ad terram locis deustis &c. ubique. Majo-Oct. (v. v.)

*B. hydrinus*, major, pileo subinfundibuliformi radiato-striato. Fr. l. c. 1. p. 89.

Pileus uncialis. In paludosis. (v. v.)

γ *Swartzii*, firmior, pileo lævi albido, disco fusco, stipite albido, apice subviolaceo. Fr. l. c. p. 90.

Stipes 1-3 unc. longus. Locis udis silvarum. (v. v.)

δ. *A. nivalis*, flavus, pileo carnoso-membranaceo. Fl. Dan. t. 1072. f. 2. Pers. Syn. p. 454.

Simillimum reperi ad scaturiginem vere. Lam. minus decurrent. In Norvegiae montibus. (v. ic.)

¶ *A. pyxidatus*, testaceo-rufescens expallens, pileo infundibuliformi, disco lævi, lamellis angustis, stipite firmo.

a. *A. pyx.* Bull. t. 568. f. 2. Nees Syst. f. 192. Pers. syn. p. 171. Dec. fr. 2. p. 171. A. ventosus. Fries Obs. 2. p. 221.

b. *A. subhepat.* Batsch. f. 211. Fries l. c. 1. p. 86.

Stipes junior farctus, dein cavus, basi incrassatus albido-villosus, subattenuatus. Pileus disco submembranaceus, glaber. Lamellæ longe decurrentes, subdistantes, omnium affinum angustiores, albido-rufescentes, dein pileo concolores. Magnitudo valde variat, etiam colore incarnato, testaceo,

sordide fulvo, rufo etc. Ad terram, tam locis montosis, quam campestribus, ubique. Majo-Nov. (v. v.)

\*\* 5. *A. muralis*, pileo convexo umbilicato radiostriato stipiteque farcto fusco-rufescens, lamellis latis pallidis. Sowerb. t. 322. Swartz l. c. 1809. p. 94.

Subgregarius. Stipes  $\frac{1}{2}$  unc., lassis, elasticus. Pileus  $\frac{1}{4}$  -  $\frac{3}{4}$  unc. latus, fragilis, margine subcrenulato. Lam. distantes. Sie. l. c. Ex ic. Sowerb. pileus subcarnosus, testaceo-rufescens etc. In graminosis, serotinus. (v. ic.)

6. *A. ericetorum*, pileo subturbinato plano umbilicato striato, lamellis distantibus postice latissimis albis, stipite brevi, basi pubescente. Fries Obs. 1. p. 87.

Ag. minimus, capitulo turbinato &c. Linn. It. Öl. p. 38! A. umbellif. Linn. Suec. 1192. A. pseudo-androsacens. Bull. t 276. A. niveus. Fl. Dan. t. 1015. f. 1. Hedw. fil. Obs. Eot. 1. t. 3. f. A. A. valgus. Holmsk. II. t. 34.

b. griseellus. A. S. p. 125. A. sagittula. Hedw. l. c. f. B. A. ericet. Pers. Obs. 1. t. 4. f. 12. Syn. p. 472.

c. late viridis. Fl. Dan. t. 1672, f. 1.

Color plerumque albus l. stramineus. Stipes haud unciam superans. Pileus  $\frac{1}{3}$  unc. et ultra latus. Lam. basi crassiores. Ad terram, præcipue locis uliginosis. b. in ericetis. Majo-Nov. (v. v.)

B. pileo subserriceo. Buxb. C. 11. t. 50. f. 4.

Memorabilis, antec. tenuior, albido-griseus. Stipes firmus. Pileus fusco-radiato-striatus. Hanc varietatem materiæ (Algæ forte) cuidam viridi, Cl. mucidæ instar, innascentem reperi. Copiose ad sœpes umbrosas Scaniæ etc. Sept.-Nov. (v. v.)

C. velutinus, pileo griseo stipiteque velutinis, lamellis dichotomis. Ad terram deustum. Nov. (v. v.)

D. myochrous, obscure fuscus, basi strigoso-radiato.

Cum priori Cantharellum refert; est quoque  
*Mer. fuscus*. With. l. c. p. 149. *Ad trunco Fagi*  
*madios*. Aug. sq. (v. v.)

\*\*\* 7. *A. tricolor*, pileo plano-umbilicato glabro  
 ochraceo-flavo, lamellis distantibus subramosis,  
 postice latissimis aurantio-roseis, stipite farcto.  
*A. S.* p. 224. t. 9. f. 5. *Fr. l. c. p.* 88.

Stipes tenax, vix uncialis, deorsum pubescens.  
 Pileus sublavvis, 3-4 lin. latus. Lam. pruinatae. Du-  
 ples forma; altera præcocior stipite deorsum oli-  
 vascente; altera serotina stipite unicolori flavo. pi-  
 leo subinfundibuliformi. *In versuris, pascuis &c.*  
*rario*. *Jun.-Oct.* (v. v.)

8. *A. pictus*, pileo campanulato striato subfuscen-  
 scente, umbilico subflavo, lamellis latissimis  
 pallidis, stipite farcto spadiceo. *Fr. l. c. p.* 83.

*A. phiala*, Schum. *Sæll.* II. p. 297.

Maxime singularis species, omnino constans.  
 Stipes 2 unc. longus, glaber, basi membranula ra-  
 diato-laciniata, superne dilutior. Pileus cucullat-  
 us, 2-3 lin. altus. Lamellæ distantes, albidæ, fla-  
 ventes, parum decurrent (nempe ob formam pilei),  
 latitudine longitudinem superante. *In pinetis, per-*  
*raro*. *Aug Sept.* (v. v.)

$\beta$  *concolor*, pileo obscuro unicolori. *Fr. 2. p. 220.*

Stipes basi non radiatus. Huc pertinet *A. glandifer* Batsch. f. 86., sed lam. perperam liberæ.  
*Ad terram in fagetis, silvis abiegnis &c.* (v. v.)

9. *A. campanella*, subcæspitosus, pileo convexo um-  
 bilicato striato ferrugineo, lamellis flavescen-  
 tibus, stipite fistuloso spadiceo deorsum villoso.

*A. fragilis*, Schæff. f. t. 230. *A. camp.* Batsch. Pers.  
 syn. p. 469. *Nees Syst.* f. 191. *Fries Obs.* I. p. 88.  
*Dec. fr. 6. p. 47.*

Accedit cum antecedente ad *A. fætidum* etc.  
 inter Collybias. Stipes radicatus, firmus, 2 unc.

fere longus. Pileus 3-7 lin. latus, tenax. Lam. venis connexæ. nudæ. *Ad truncos Pini, vulgaris, etiam Americ. borealis. Majo-Oct. (v. v.)*

*B. badipus*, solitarius, stipite farcto basi incrassato ferrugineo-tomentoso.

*A. caulinatal.* Sowerb. t. 163. Sw. l. c. 1808. p. 82, §

Magis ad præcedentem *A. badipus* Pers. Syn. p. 318 accedere videtur, tamen et ab hujus statu senescente ægre dignoscitur. *In pinetis ad terram. Jul.-Oct. (v. v.)*

10. *A. muscorum*, pileo convexo-plano umbilicate striato stipiteque brevi basi incrassato flavofuscis, lamellis pallidioribus.

Hoffm. l. c. t. 5. f. 3. Pers. syn. p. 470. Mart. Erl. 431.

Stipes arcuato-adscendens. Pileus 1 unc. fere latus. Lam. horizontaliter sitæ. *Inter muscos ad arborum radices. Autumno. (v. ic.)*

### †† MAJORES. Pileo submembranaceo.

11. *A. chrysoleucus*, pileo glabro albido, marginè reflexo striato, lamellis confertis luteis, stipite farcto.

Ag. d. Gled. meth. p. 107. *A. excavatus*, Leyss. Hal. n. 1215. Willd. Ber. p. 389. *A. mollis*. Bull. t. 38. Dec. fr. 2. p. 170. Am. Lam. Enc. I. p. 107. *A. chrysoleucus*. Fries Obs. 1. p. 77. (Pers. syn. p. 457 ad sequent. petius!)

Gregarius. Stipes uncialis et ultra, teres, lutescenti-albus, basi subincrassatus. Pileus profundo umbilicatus, ita ut centro conum inversum referat, 1-2 unc. latus. Lam. angustæ. *In silvis. Aug. Sept. (v. v.)*

12. *A. chrysophyllus*, pileo flocculoso, humido luteo-fusco, sicco alutaceo-canæ, lamellis distantiibus stipiteque subfistuloso luteo-vitellinis.

*A. trichaeus*, Fries l. c. p. 75! *A. epichys*, d. A. s. p. 222,

Ab *A. trichæo* Pers. (*vid. p. 108*) differt pileo submembranaceo, lamellisque longe decurrentibus. Stipes 1-2 unc. longus, 2 lin. crassus, æqualis, glaber, basi radicatus villosus. Pileus 1-2 unc. et ultra latus, flacidus, margine subreflexo. Admodum pulcher, sporidijs albis. *Ad truncos cariosos pineos, frequens. Jul.-Oct. (v. v.)*

13. *A. ochraceo-fuscus*, pileo convexo ochraceo fuscо-squamato, lamellis pallidioribus, stipite gracili. *Mey. Essequ. p. 301.*

*In terra humida Amer. meridional. Aprili.*

14. *A. maurus*, pileo convexo, humido striato subfuligineo, sicco lævi sericeo-nitente livido, lamellis confertis candidis, stipite subfistuloso rigido. *Buxb. t. 3. f. 1. (male.)*

Species valde distincta. Stipes 1-2 unc. longus, 1 lin. vix crassus, pileo concolor, fragilis, junior farctus. Pileus forma *A. chrysoleuci*, profunde umbilicatus,  $\frac{1}{2}$  - 1  $\frac{1}{2}$  unc. circiter latus, glaber. Lam. fornicatæ, acutissime et longe decurrentes, medio late. *In paludosis alibiique præcipue locis humidis adustis. Aug.-Nov. (v. v.)*

15. *A. atratus*, pileo planiusculo glabro lævi nigro, lamellis albido-griseis, stipite fistuloso tenaci glaucescente. *Fries Obs. 2. p. 215.*

Huc *A. nigrella* A. S. p. 222. Affinis *A. ambusto*; subsimiles species vide etiam sub *Hyphodio*. Stipes uncialis, glaber. Pileus subnitens. Lam. leviter decurrentes. *Locis graminosis, ericetosis; etiam deustis. Sept. Oct. (v. v.)*

16. *A. parilis*, pileo subconvexo lævi cano, umbilico villoso, lamellis griseis, stipite subfarcto nigricante-cinereo. *Fries l. c. p. 214.*

Stipes 2 unc. longus, 2 lin. crassus, firmus. Pileus uncialis. Lam. vere decurrentes. *In pineto, semel. Jul. (v. v.)*

17. *A. affricatus*, pileo subinfundibuliformi albido, squamulis pilosis cinereis, lamellis latis stipiteque fistuloso griseis. *Fries l. c. p. 213.*

Videtur *A. tigrinus* A. S. p. 220; statura A. ericetorum majoris. Stipes uncialis, 1 lin. crassus. Pileus  $\frac{1}{2}$  unc. latus, margine deflexo. *In paludosis sat frequens. Majo, Jun. (v. v.)*

18. *A. Epichysium*, tener, cinereo-nigricans, pileo infundibuliformi striato, lamellis linearibus, stipite subfarcto tenaci, basi villosa.

*Pers. syn. p. 462. Ie. pict. t. 13. f. 1. Fr. l. c. I. p. 82.*

Fungus exsiccatus expallens cano-opacus, pileo laevi (etiam flocculoso-subsquamoso) subsericeo. Stipes 1 unc. longus et ultra, ~~equalis~~. Pileus  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. latus, margine deflexo. Lam. angustae, subdistantes, albido-cinereæ. Occurrit etiam multo major, pileo flexuoso, etc. *Ad trunco madidos Salicis, Fagi &c. vulgaris. Jul.-Oct. (v. v.)*

*B. icmadophilus*, tener, fragilis lamellisque plano-decurrentibus obscure cinereis.

*Inter Sphagna. (v. v.)*

19. *A. obliquus*, tenuis, pallide cinereus, pileo subinfundibuliformi glabro obliquo, stipite crasse.

*Pers. ic. pict. t. 13. f. 3.*

Solitarius. Stipes subfarctus. Species quoad locum dubia et ulterius, an constans sit, inquirenda. *Ad terram. (v. ic.)*

20. *A. hydrogrammus*, lividus, exalbicans, pileo glabro margine striato, lamellis confertis, stipite fistuloso subcompresso, basi radicato strigoso. — *Bull. t. 564. f. A.*

Gregarius l. cæspitosus, in statu sicco albidus et cum *A. phyllophilo* facile commutatus. Stipes tortus, subundulatus, glaber, tenax, 2-3 unc. longus. Pileus submembranaceus, profunde umbilicata.

tus, flaccidus, 2 unc. latus, margine patente. Lam. longe decurrentes, medio latiores. Variat forsitan rufus; de cetero diversissimas admiscet Bulliard. Inter folia decidua locis subhumidis. Sept.-Nov. (v. v.)

### Subtr. 2. COLLYBARIA.

CHAR. Stipes spongioso-farctus, dein cavus elasticus, firmus, æqualis l. sursum attenuatus, saepè compressus, fibrillosus l. apice squamuloso-pruinatus. Pileus carnosò-membranaceus (e membrana duplice compositus!) plano-depressus l. infundibuliformis; humidus pellucido-striatus, siccus lævis expallens, margine juniori involuto. Substantia tenax, humida aquosa. Lam totæ adnatæ, nec nisi ob pileum saepè profunde depresso spurie decurrentes, postice obtusiusculæ, integerrimæ. Color lividus, fuscus &c. (A. fimbriatus, inornatus etc.)

Obs. Fungi medii, l. majores, solitarii, plerumque terrestres et serotini, haud esculenti. Utrum cum CLITOC. (Dasyph.) Collyb., an cum OMPHALIIS Mycen. major sit affinitas, dijudicare vix audeo; cum utrisque certe maxima.

\* 21. *A. difformis*, pileo subumbilicato glabro, livo exalbante, lamellis albidis, stipite caavo æquali nitido. Pers. p. 462. Fr. I. p. 81.

Proximus A. fumoso. Stipes 2-3 unc. longus, 1-2 lin. crassus, tenax, albus! glaber, sed saepè apice pruinatus; in majoribus etiam undulatus et compressus. Pileus convexo-planus, uncialis circiter, margine passim undulato, demum rimoso; humidus striatus lividus, siccus lævis albido-nitens. Lam. planæ, adnatæ, raro subdecurrentes, distantes, late. In pinetis, locis humidis, vulgaris. Aug.-Nov. (v. v.)

22. *B. stygius*, pileo campanulato umbilicato, lamellis adnexis ventricosis, stipite tenui gracili longissimo. Inter Sphagno profundiora. (v. v.)

22. *A. incomitus*, pileo planiusculo fibrilloso-piloso griseo, lamellis attenuatis lividis, stipite fistuloso æquali obscure cinereo. *Fr.* 2. p. 212.

Stipes 2 unc. fere longus, inferne fibrillosus. Pileus tenuis,  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{3}{4}$  unc. latus, fibrillis obscurioribus, margine striatus reflexus. Lam. obovatae, sordide albæ. *In Sphagnosis profundis. Majo, Jun. (v. v.)*

- \*\* 23. *A. brumalis*, inodorus, pileo infundibuliformi lævi glabro griseo, lamellis subdecurrentibus lutescentibus, stipite farcto æquali. *Fries l. c. p. 206.*

Videtur *A. cinerascens* Batsch f. 101, immo et varietas *A. obconicus* Schum. p. 329. Color e livido lutescens. Stipes dein cavus, 1-2 unc. longus, 2 lin. et ultra crassus, glaber, lividus. Pileus uncialis lacteus, margine reflexus. *In pinetis. Oct. Nov. (v. v.)*

24. *A. fragrans*, oolidus, pileo planiusculo sordide pallido, sicco albo, lamellis distinctis stipiteque cavo attenuato albis.

*Sowerb. t. 10. With. 4. p. 161. Pers. syn. p. 455. Swartz l. c. 1808. p. 245. A. gratus. Schum. p. 277.*

Odore grato aniseo mox dignoscitur. Stipes 2-3 lin. crassus, basi villosus, apice rarius pruinitus. Pileus 1-2 unc. latus, subflaccidus; humidus margine striatus, colore vario pallido livide, lutescente, fuscescente etc. Lam. subconferta. *In grammosis muscosis, arvis &c. frequentissimus. Aug.-Dec. (v. v.)*

25. *A. ditopus*, oolidus, pileo infundibuliformi glabro cinereo, dein undulato-lobato, lamellis confertis, stipite cavo subpresso. *Fries l. c. 1. p. 91.*

Odor farinæ recentis! Stipes æqualis, lævis. Pileus tenax, lævis, fuscus, 1-2 unc. latus, sepe omnino regularis, margine inflexo; sed subinde excentricus etc. Lam. tenues, conferta, cinerea.

Omnium hujus tribus distinctissima, habitu trivialis. Sero autumno, quo reliqui optime vigent, modo putrescens reperitur. In pinetis. Jul.-Sept. (v. v.)

26. *A. metachrous*, inodorus, pileo subconvexo glabro lavi dein planiusculo, lamellis confertis albidis, stipite dein cavo æquali sursum pruinato.

Am. Hall. helv. 2466. *A. cyathif.* Bull. t. 248. *A. bicolor.* Pers. syn. p. 462.

Fallacissima species, nisi ex professo observetur; sed optime distincta. Stipes tenax, 1  $\frac{1}{2}$  unc. et ultra longus, nunc teres 2 lin., nunc compressus, 3-4 lin. crassus. Pileus leviter carnosus, primo vix depresso!, dein umbilicatus, uncialis et ultra; humidus dein pellucidus, striatus; siccus laevis subalbicans. Lam. non decurrent, immo poste subinde secedunt (Fries Obs. I. p. 80.) a) pileo juniori cinereo; dein livido, sicco albido. Herum formarum extremitates dissimillimas! sistunt *A. met. mortosus* Fr. 2. p. 210 et *A. vibecinus* L. c. p. 209 b) lutescens. *A. obsoletus* Batsch. f. 103. c) incarnatus, caute ab A persicino et diatreto distinguendus! Huc et referri posset *A. obsolescens* Batsch. f. 104. Vulgatissimus ad terram. e. in pinetis densis. Sept.-Dec. (v. v.)

\*\*\* 27 *A. oniscus*, lividus, pileo submembranaceo plano striato, lamellis distantibus, stipite fistuloso. Fries l. c. p. 209.

Hunc *A. cespitosus* Bolt t. 41. f. C. refert, sed de cetero dubius et *A. tardi* forsitan var. tenuis. Stipes uncialis, subadscendens, laevis, 1-2 lin. latus. Pileus sparsim striatus, 1-1  $\frac{1}{2}$  unc. latus. Lam. non decurrent. Inter muscos ad terram l. truncos vetustos, raro. Oct.-Dec. (v. v.)

28. *A. expallens*, pileo subcarnoso umbilicato, humido striato, lamellisque distantibus cinereis, stipite farcto æquali tenaci.

Buxb. Cent. IV. t. 3. f. 2. Pers. syn. p. 461. Fries  
Obs. 1. p. 80.

Medius inter antec. et sequentem, a quo differt magnitudine minori, substantia tenuiori, colore e. s p. Pileus expallens, planiusculus. Lam. subdecurrunt, distinctæ, obscure cinereæ etc. In silvis ad terram & inter muscos. Aug. Oct. (v. v.)

29. *A. cyathiformis*, pileo subcarnoso infundibuliformi lævi glabro nigrescente-umbrino, margine reflexo, lamiellis distantibus cinerascentibus, stipite elasticо sursum attenuato.

Vaill. par. t. 14. f. 1—3. *A. concavus*. Scop. p. 449.  
*A. sericeus*. Plan. Erf. p. 276. *A. infundibulum*.  
Leyss. Hal. p. 217. Am. Hall. n. 2449. *A. cyathif.*  
Bull. t. 575, 568. f. 1. Dec. fr. 2. p. 170. *A. sordidus*. Dicks. Cr. 16. t. 3. f. 1. Bolt. t. 59. Sowerb.  
t. 363. (justo minor & pallidus.) *A. tardus*. Pers.  
syn. p. 461. *A. cyathif.*, obcampanulatus & umbrinus. Schum.

Stipes 2-4 unc. longus, subfibrillosus, basi villosus, farctus, demum etiam cavus, umbrinus. Pileus 1  $\frac{1}{2}$  - 3 unc. latus, etiam humidus lævis, siccus vero expallens. Lam. tantum adnatæ, sed ob pilei formam decurrentes apparent, distinctæ, subinde furcatæ. In ligno putrido, locis umbrosis, colore incarnato et lutescente reperi! Insuper sequentes synonymorum caussa formæ notandæ: b) *purpurascens*, pileo fusco-purpurascente, stipite æquali striato. *A. purpureus*, Schum. Säll. p. 325. c) *macrocyathus*, pileo umbrino demum undulato, stipite reticulato. *A. cyathoides*. Bolt. t. 145. Pers. syn. p. 460 Fr. Obs. 2. p. 205. d) *aithopus*, minor, pileo fusco, margine involuto, stipite reticulato. *A. clavatus*. Wither. *A. aithop.* Holmsk. 2. t. 41! Nees Syst. f. 192. e) pileo in siccis rimoso-squamoso pallido. *A. dicolor* b. A. S. p. 221. Plures ut reticeam. Ubique ad terram & truncos mucidos, parce Aug. Sept. pluviosis; copiose Oct. Nov. saepe per hiemem mitem persistens. (v. v.)

Obst. Organisma motu carentia tarda dici nequeunt.

30. *A. trullæformis*, pileo carnoso infundibuliformi lœvi subviloso cinereo, margine patente, lamellis connexis candidis, stipite striato.

Stipes prioris; sed brevior, cinereus, deorsum totus villosus. Pileus magis carnosus, 2 unc. latus, siccus. Caro nivea. Lam. latiusculæ, subdistantes. In dumetis Scaniæ, raro. Oct. (v. v.)

### Species inquirendæ:

1. *A. murinus*. Sow. t. 162. Ad plures (ex. gr. *A. metachrorum*) citari posset; etiam ad *Hyporrh. incanum*.
2. *Hydrophorus luxurians* &c, Batt. t. 21. f. D. A. tardividetur monstrositas.

### Subtrib. 3. LENTISCYPHI.

CHAR. Substantia carnoso-coriacea, lenta!, qualis in nullo antec. Agarico. Stipes solidus, firmus, in pileum diffusus. Pileus subinfundibuliformis (sæpe inæqualis et squamosus), duriusculus. Lamellæ decurrentes, margine tenues et hinc sæpe laceratæ. *Lignatiles*.

Obs. Tribus distinctissima, olim forsitan propria series!, cui etiam adnumerandæ Pleuroti non nulli v. gr. *A. flabelliformis*, quibus proxime accedit. Vacillat vero adhuc character et specierum series, cum plurimæ species regionibus calidioribus privæ, in quibus vero præ ceteris vulgares videntur, saltim ab substantiam lentam conservabilem nobis præ ceteris notæ. Sic et paucæ apud nos obviæ semper vernalæ l. æstivales sunt. Sæpe odoræ etc.

- \* 1. a. *A. Tuber regium*, pileo infundibuliformi tuberoso glabro cinereo, lamellis tenuibus, stipite æquali glabro, tuberibus innato. Rumpf. Amb. XI. p. 120. t. 57. f. 4.

Memorabilis, ample l. c. descriptus! Matrix est corpus (*Scleroderma?*) pugni magnitudine et ultra. Stipes 3-4 unc. Pileus oris primo reflexis,

dein fissis, 1-2 unc., junior mollis et coctioni aptus; sed vetustus latus etc. Radix in diarrhoea et aliis morbis laudatur. In Omœ, Goromœ, Ternatœ aliarumque insul. Moluccarum montibus. Apr. Oct. (v. ic.)

1. b. *A. Sajor caju*, pileo convexo profunde umbilicato glabro, lamellis tenuibus æqualibus, stipite brevi glabro. *l. c. p. 125. t. 56. f. I.*

Priori affinis Stipes vix uncialis, 2-3 lin. crassus. Pileus dein fissus, magn. numini imperialis, substriatus. Variat albus, gilvus, ruber et cinereus. Adultus coriaceus, junior esculentus. In ramis deciduis, ad radices vetustas Amboinæ. (v. ic.)

\*\* 2. *A. Essequiboënsis*, ochraceus, pileo infundibuliformi piloso-tomentoso, margine reflexo, stipite tenerrimo lævi. *Mey. Essequ. p. 301.*

Sequenti videtur nimis affinis. Lam., ut in reliquis, decurrentes. pileo pallidiores. In ligno putrido Americæ meridionalis. Aprili.

3 *A. crinitus*, pileo infundibuliformi villoso purpureo, lamellis æqualibus dentatis, stipite filiformi lxxvi.

*Brown. jam. t. 15. f. 1. Plum. Cat. fil. p. 227. f. B.  
A. crin. Linn. Spec. Pl. 2. p. 1644. Aubl. Guaj. p. 972.*

Stipes pennæ crassitie. Pileus turbinatus, marginibus replicatis, undique pilis tenuissimis adscendentibus. Lam. tenuissimæ. Cum priori. (v. s.)

4. *A. Bertieri*, pileo infundibuliformi squamoso hirsutissimo cervino, lamellis concoloribus, stipite brevi furfuraceo pallido.

*A. crinit. Bert. ap. Spreng. V. A. H. 1820. n. 19.*

Stipes vix uncialis. Pileus unciām haud superans, pilos habet longissimos rigidos, squamulis interstinctos. Lam. subdecurrentes. In cortice putrido Bignonie pentaphyllæ, Guadelupæ.

\*\*\* 5. *A. Battaræ*, pileo inæquali depresso albido; squamis obscurioribus, lamellis squamisque stipe tenuis rufescens. *Batt. t. 28. H.*

*Stipes rigidus, uncialis, squamis imbricatus. Pileus rigidior, uncialis, subconvexus, squamis vire-scentibus et rufis permixtis ornatus. Lam. con-fertæ. Ad Populos nigras Italiæ, vere. (v. ic.)*

6. *A. Dunalii*, pileo inæquali albido, squamulis nigricantibus, lamellis inæqualibus albis, stipite æquali basi squamuoso. *Dec. fr. 6. p. 47.*

Specimina 5-6 grægaria, basi leviter cohæren-tia. *Stipes molliusculus, albidus, inferne squamu-lis nigricantibus perexiguis. Pileus, etiam excen-tricus, margine revolutus. Caro tenuis; odore gra-to. Ad truncos Salicis vetustos prope Montpellier, vere.*

7. *A. tigrinus*, pileo regulari umbilicato albido, squamis pilosis nigricantibus, lamellis denticu-latis albis, stipite tenui minute squamoso

*Batt. t. 12. A. - D. formæ varizæ. — Ag. c. Gled. p. 131. Ag. tigr. Bull. t. 70. Sowerb. t. 68. Pers. syn. p. 458. Dec. fr. 2. p. 169. Ann. Lam. Enc. 1. p. 107.*

Similis *A. affricato*, sed substantia et loco di-versissimus. *Stipes albidus, 1-2 unc. longus. Pi-leus tenuis, 2 unc circiter latus, denum margine fissus. Ad truncos arborum frondosarum, Europæ præsertim australioris. In Scania semel. Majo, Jun. (v. v.)*

8. *A. lepidus*, pileo compacto inæquali dilute ochraceo, squamis maculæformibus obscuriori-bus, lamellis laceris, stipite valido squamoso.

*Buxb. Cent. IV. t. 25. A. squamosus, Schæff. t. 29, 30. Dicks. Crypt. 2. p. 24. Ann. crispa. Lam. Enc. 1. p. 105. A. tessulati var. A. S. p. 226. A. tigri-nus. Schum. p. 313. A. lepid. Fries Obs. 1. p. 21.*

*b. monstrositas, stipite longe curvo, pileo parvo &c. Fung. anguinus. Androv. Dendrol. p. 117. ic. A. tubæformis. Schæff. t. 248, 249. Sowerb. t. 382. Fl. Dan. t. 1438.*

*c. totus ramosus, absque pileo. F. gallipes. Androv. l. c. Fucus. Fl. Dan. t. 405. Cl. cornuta. Retz. Elv. serpentif. Batsch, Ramar. ceratoid. Holmsk. 1. p. 101, e. ic.*

Nisum fungorum præcipue epixylorum in formas monstrosas abeundi optime perspicies e comparatis icon. Buxbaumii et Holmsköldii. Magnitudo variat; ut et situs solitarius et gregarius. Stipes brevis, durus. Pileus variat convexus et depresso, centralis et lateralis, 2-4 unc. latus. Legi specimina pileo hemi-phærico diffracto-squamoso albo etc. Ad truncos pineos, copiose. Majo, Jun. sed in Aug. usque emortuis persistit. b. &c. in cryptis, cellis, canaliculis ligneis &c. (v. v.).

\*\*\*\* 9. *A. jugis*, albas, perennis, sublobatus, stipite squamoso, lamellis raris dentatis.

*A. odorus*, Vill. *Delph.* 2. p. 1015.

Ob pileum juniorem viscosum et, ut videtur, levem distincta species Odore grato cum *A. cochleato* aliisque hujus tribus convenit. In *Delphinatu-*

10. *A. flos*, flavus, pileo subinfundibuliformi sub-5-lobo, lobis inæqualibus, lamellis inæqualibus undulatis, stipite brevi crasso subviloso. Meyer l. c.

Faciem floris Didynamiæ refert hæc peculiaris species, cuius plura specimina exsiccata eadem struæta gaudent. Lobi tres majores margine reflexi. In ramis emortuis Americae. Jul.

11. *A. suffrutescens*, pileo convexo dein infundibuliformi sublateritio, stipite ramoso sublignoso albovirescente. Brot. *Lus.* p. 466.

Solitarius l. gregarius. Stipes 4-6 unc. longus, spongioso-lignosus, unde per multos annos persistens, valde ramosus, ramis pileoliferis 12-20. Lam? In lignis humidis cellarum oleariarum & viviarum Conimbricæ. Aut. hieme.

12. *A. cochleatus*, cæspitosus, pileo tenaei sublobato contorto glabro rufescente, lamellis dentatis pallidis, stipite firmo sulcato rufescente.

- Dill. in Raji. Syn. p. 5. n. 23. A. cornucopioïd.* Bolt.  
t. 8. (non accurate.) *A. confluens.* Sowerb. t. 168.  
*A. cochl.* Abb. Schw. 3. Pers. syn. p. 450. *A. S. p.*  
218. *Fries Obs.* 1. p. 74.  
*b. minor, pileo excentrico.* *A. dentatus.* Abb. Schw.  
3. Pers. syn. p. 476. *A. S. p.* 227. *A. intermed.*  
*Schum.* p. 561.

Odor gratus, aniseus, persistens. Stipes 1-3  
tenuis longus et ultra, raro laevis. Pileus variat re-  
gularis, colore albido, flavescente; uncialis et ul-  
tra. Lam. albidæ, subincarnatae. *Ad truncos vetu-*  
*stos varios vere & autumno. (v. v.)*

### Species inquirendæ:

1. *Fungus ramosus, albus &c.* Mish. t. 79. f. 3.
  2. *Polymyc. luxurians.* Batt. t. 23. B.
  3. *A. plumatus.* Walt. Car. p. 261.
  4. *A. ramosus.* Lour. Cochin. II. p. 692. *Pileus villosus,*  
*cinereus, stipite ramoso.* *Ad truncos.*
- 

### Trib. XII. PLEUROTOPUS.

*Fung. esc. gen. V. Clus. &c. Agarici spec. Veter.-*  
*ord. VII. Mich. p. 122. Agar. acaules. Linn. &*  
*Auct. Aman. sessiles ad part. Hall. helv. 5. p. 151.*  
*Ag. dimidiati annui. Scop. p. 458. Ag. obliqui &*  
*dimid. ad p. Batsch. El. p. 87, 95. Pleuropi sp.*  
*Pers. syn. p. 472. Pleuropus, Crepidotus, Apus,*  
*Resupinatus ad p. Nees Syst. p. 194-197.*

CHAR. Statura admodum varia; sed pileus  
constanter inæqualis, excentricus l. lateralis. Stipes,  
quando præsens, solidus, firmus. Lamellæ inæqua-  
les, exsuccæ, immutabiles, postice acuta. Spori-  
dia alba.

Obs. Nomen a πλευρον. Fungi persistentes,  
arborei, innocui, multi cibarii; de cetero maxime  
discrepantes, ut Leucospori subseriem potius, quam  
tribum efficiant. Subtribus maxime vero datu-  
tales:

1. LEPIOTARIA. Velum universale. Pileus compactus, horizontalis.
2. CONCHARIA. Velum nullum. Pileus carnosus. Lamellæ decurrentes.
3. ÆGERITARIA. Velum nullum. Pileus carnosus, junior horizontalis. Lam. determinato-desinentes.
4. OMPHALARIA. Pileus carnosus, junior resupinatus. Lam. in puncto excentrico concurrentes.
5. MYCENARIA. Pileus membranaceus. Lam. adnates. I. in puncto concurrentes.

Tribus Illuſtriss. NEESII, cum Polyporis &c. eximie analogas, lubentissime retinuisse, nisi utpote artificiales species maxime affines nimis separarent ex. gr. Mycenias; & plurimæ species simul stipite excentrico, laterali & nullo occurrerent. Resupinati omnes adulti reflexi e. s. p.

#### Subtr. I. LEPIOTARIA.

CHAR. Velum simplex, subuniversale, concretum, fugax. Stipes durus, excentricus lateralis, squamosus. Pileus carnosus, compactus, epidermide sicca in squamas secedente, e convexo explanatus. Lamellæ decurrentes, subdistantes, distinctæ, albæ.

Obs. Fungi compacti, autumnales, tam affines, ut de specifica differentia dubia non possim non movere. Velum Lepiotæ, statura magis Armillariæ v. gr. A. mellei. Leucomyces reniform. Batt. t. 7. D. h. 1.?

1. *A. corticatus*, cæspitosus, amplius, pileo floccoso-villoso squamoso cinereo, stipite excentrico incurvo fibriloso, velo lacero albo. Fries Obs. I. p. 92.

*b. tephrotrichus*, minor &c. l. c. p. 94.

Stipes 1-2 unc. longus, 1 unc. crassus. Pileus 2-6 unc. latus, margine involutus, albicans. Lam. latæ, postice anastomosantes. Ad truncos Fagi cariosos, b Coryli. Sept.-Nov. (v. v.)

2. *A. Albertini*, cæspitosus, pileo dilute fuligineo, squamis pilosis nigricantibus, stipite laterali

squamoso, annulo fuligineo. A. Lepiota. A. S. p. 229.

Pileus convexus, 4-5 unc. latus, squamis latissimis adpressis Lam. latæ, candidæ. Stipes brevis, crassus, subverticalis. Ad truncum abiegnum Lusatiae. Sept.

3. *A. dryinus*, solitarius, durus, pileo obliquo subglabro albido, squamis fuscescentibus, velo fugaci

*A. dimidiata*. Schæff t. 233 (non bene.) *A. dryinus*. Pers. syn. p. 478. A. S. p. 228. Nees Syst. f. 177.

In adultis velum non observatur. Stipes uncialis, subradicatus, albus, subsquamulosus, fere ligneus. Pileus valde excentricus l. marginalis, planiusculus, 2 unc. circiter. Lam. angustæ, postice simplices, albi l. exsiccatæ flavescentes. Ad truncos Quercus, Mali &c. Aug.-Nov. (v. v.)

### Subtr. 2. CONCHARIA.

CHAR. Velum nullum! Stipes præsens lævis l. nullus. Pileus carnosus, tenax, epidermide contigua. Lamellæ decurrentes, subinde divisæ.

Obs. Fungi firmi, lignatiles, persistentes, plures esculenti. Substantia tenax.

\* *pileo semper integro.*

2. *A. pulvinatus*, pileo pulvinato subrepando excentrico albido sub-incarnato, lamellis confertis integerrimis, stipite glabro brevi. Pers. Syn. p. 370.

Substantia compacta, suberoso-carnosa. Stipes  $\frac{1}{2}$  unc. longus et crassus, albus. Pileus 4 unc. latus, dein planus, glaber, subinde rugulosus. Lam. tenues, fornicatae, 2-3 lin. late. Edulis forsitan. Ad truncos, rarissime. Sept. (v. v.)

2. *A. Orcellus*, pallidus, pileo depresso subexcentrico maculato, lamellis confertis integerrimis, stipite glabro deorsum attenuato albo.

*Orcella*. Batt. t. 39. f. A. B. ? A. *orc.* Bull. t. 573.  
f. 1., 591. Pers. syn. p. 473. Dec. fr. 2. p. 138.

*Gregarius*. Stipes 1-2 unc. longus, lœvissimus, saepe adscendens; etiam omnino centralis. Pileus leviter sinuatus, junior convexus, saepe ellipticus, 2-4 unc. latus. Color alutaceus l. incarnatus, "flavocinereus l. plumbeus" Batt. *Ad truncos Gallæ*. (v. ic.)

3. *A. Chama*, subsessilis, albus, pileo valde concavo, lamellis serratis sordide albis. *Bosc in Mag. Naturf. Fr. Ber.* 1811. p. 83.

Cara albissima mollis, sicca lenta. Pileus saepe  $\frac{1}{2}$  pedalis; 3 unc. crassus. Lam. nonnullæ crispæ. *Ad truncos Quercus, Carolinæ*.

4. *A. torulosus*, pileo tenaci depresso alutaceo-rubescente, lamellis subcrispatis pallidioribus, stipite brevi griseo-tomentoso.

*A. carneo-tomentosus*. *Eatsch. El. f. 33. Nees Syst. f. 176. A. torul.* Pers. syn. p. 475. *A. S.* p. 227.

Substantia tenacissima. Stipes crassus, tomento subinde violascente etiam mihi obvius. Pileus demum fere infundibuliformis, colore varius, subinde maculatus, 2-3 unc. latus. *Ad truncos Betulae. Jul.-Oct* (v. v.)

5. *A. inconstans*, pileo tenaci depresso subintegro flexuoso subrufescente, lamellis subramosis basi crispis pallidis, stipite brevi fuligineo.

*A. dimidiata*. Bull. t. 517. f. O. *A. flabelliformis*. Schaff. t. 43, 44. *A. inc.* Pers. syn. p. 475.

Stipes radicatus, vix uncialis,  $\frac{1}{2}$  unc. usque crassus, lœvis, subinde lateralis. Pileus etiam dilute ferrugineus, substriatus, 3-4 unc. latus. *Ad truncos v. g. Fagi, jam præcox; etiam Amer. borealis.* (v. ic.)

\* \* pileo integro dimidiatoque!

6. *A. conchatus*, pileo tenaci difformi cinnamomeo-incarnato, lamellis integerrimis stipiteque brevi irregulari basi pubescente pallidis.

Bull. t. 298. With. p. 301. Fries Obs. 2. p. 224. A. salignus. Sw. 1808. p. 252.

A priori omnino diversum censeo. Cf. Dec. fr. 2. p. 157. Gregarius. Stipes haud uncialis, subinde nullus. Pileus flacidus, lavis. Lam. basi non anastomosantes, crassiusculæ, haud confertæ. Variat colore ochraceo, præsertim in siccis. Ad truncos vetustos Betulæ, Populi &c. Jul.-Sept. (v. v.)

7. *A. spodoleucus*; subsolitarius, pileo plano subæquali cinereo, lamellis simplicibus albis, stipite glabro. Fries 1. p. 93.

Simillimus sequentibus. Pileus subinteger. Lamelleæ non anastomosantes, eglandulosæ, angustæ. Forte cum tribus sequentibus unius speciei forma. Ad truncos Fagi, raro. Sept. Oct. (v. v.)

8. *A. glandulosus*, cæspitosus, pileo compacto sublaterali dilute badio, lamellis glandulosis candidis, stipite glabro.

Bull. t. 426. Pers. p. 476. A. S. p. 223. Dec. p. 136.

Magnus, horizontalis, raro verticalis. Substantia compacta, molliuscula. Stipes brevis, crassus, subinde nullus. Pileus subinde lobatus, lævis, 4-6 unc. latus. Lam latæ, basi etiam anastomosantes. Ad truncos Populi, Juglandis, "Sambuci racemosæ", non ubique. Oct.-Dec. (v. v.)

9. *A. ostreatus*, cæspitosus, pileo carnosò glabro e nigricante-cinereo expallente, lamellis postice anastomosantibus eglandulosis albis, stipite sublaterali.

Fungus arboreus, mollis. Raji Hist. III. p. 18. Syn. p. 5. *A. dimidiatus*. Bull. t. 508. *A. nigricans*. Flor. Dan. t. 892. *A. ostr.* Jacq. Austr. t. 288. Curt. Lond. I:6. Sowerb. t. 241. Pers. syn. p. 477. Id., *A. glaucoumbrius*, crispatus. Schum. *A. atro-albus*. Otto p. 102.

Pileus junior nigrescens, mox fuscus l. cinereus, dein expallidus, tandem flavescens, inde va-

riæ apud Auctores varietates. Stipites breves, firmi, basi strigosi, etiam nulli. Imbricatus, variabilis. Edulis. Tratt. essb. Schle. t. O. Ad caudices arborum, ubique. Vere & Autumno. (v. v.)

$\beta.$  *flavocinereus*, pileo cinereo-subrufescente, lamellis margine flavis. Pers. Ad trunco Quercus.

$\gamma$  *dryadeus*, pileo cinereo-lutescente, squamuoso. Fl. Dan. t. 1616.

$\delta.$  *A. reticulatus*, lamellis fuscо-violaceis. Schum. p. 363.

10. *A. salignus*, gregarius, pileo dilatato, basi depresso substrigoso, lamellis subramosis albidis, stipite tenaci albo-tomentoso.

*A. sal.* Pers. syn. p. 478. Tratt. Oest. Schw. t. 4. f. 8.

a. *A. ochraceus*. Abbild. Schw. 3.

b. *A. fuligineus*. Pers. Obs. 2. p. 45. A. S. p. 229.

Tres occurunt forma; fuliginea, alba et ochracea, etate modo diversæ. Stipes excentricus l. lateralis, subinde nullus. Pileus convexus, 4-6 unc. latus. Ad trunco Fagi, Salicis, Alni &c. Oct.-Jan. (v. v.)

\*\*\* pileo constanter dimidiato, subadscendente.

11. *A. petaloides*, adscendens, pileo spathulato albido fuscescente, disco stipiteque subvillosis, lamellis confertis linearibus albis.

Batt. t. 9. f. E. A. pet. Bull. t. 226, 557. f. 2. Dec. fr. 2. p. 136. A. spath. A. S. p. 229.

Gregarius, statura varius, distinctissimus. Stipes teres l. compressus,  $\frac{1}{2}$  unc. circiter longus, etiam subnullus. Pilus carnosus, planiusculus, uncialis circiter, subglabriusculus. Lam. 1 lin. latæ, distinctæ, confertissimæ. Ad trunco Fagi "Abietis" &c. Sept. Oct. (v. v.)

$\beta.$  *spathulatus*, erectus, spathuliformis, pileo alutaceo pallido, disco spongioso-squamuloso, stipite canaligulato.

*A. anomala*. Pers. Obs. 1. t. 4. f. 1. *A. spathulata*. Pers. syn. p. 479. Sw. l. c. 1808. p. 256. Nees Syst. f. 178. (Mich. t. 65 f. 2. ?)

Major. Stipes tomentosus. Pileus margine reflexus, striatus. Locis umbrosis terrestris! (v. s.)

12. *A. dorsalis*, adscendens, subsessilis, fulvus, pileo spathulato floccoso. Bosc l. c. t. 4. f. 4.

Stipes brevis, 2 lin. circiter longus. Pileus 1-2 unc. latus, demum lobatus, majorum reniformis, pilis floccosis pallidioribus squamosus. Substantia tenax. In Pinu australi Carolinæ. (v. ic.)

13. *A. lamellirugus*, pileo oblongo plano sordide albo, lamellis connexis transversim venosis creceis. Dec. fr. 6. p. 44.

Statura A. petaloidis. Stipes brevis, subinde obsoletus. Pileus horizontalis, marginibus revolutis. Lam. aurantio-pallidae, anastomosantes. Ad ramos vetustos Galliae, Oct.

14. *A. porrigens*, candidus, pileo adscendente sessili auriformi subglabro, lamellis angustis linearibus integerrimis.

*A. abietinum*. Schrad. spic. p. 134. *A. palmatum*. Schum. p. 362. *A. porrigerum*. Pers. Obs. 1. p. 54. Syn. p. 480. A. S. p. 250. Fries Obs. 2. p. 250.

Species distinctissima, A. petaloidi proxima. Imbricatus, magnitudine varius, subflaccidus; basi porrecta, saepe tomentosa, rarissime stipitem exsertente. Pileus laevis, margine tenui inflexo, in majoribus lobato. Lam. juniores venosæ, subdivisæ. Ad truncos Pini, ubique. Jul.-Nov. (v. v.)

25. *A. pinsitus*, explanatus, candidus, pileo molli sessili sericeo-villoso, lamellis sublatis obscurioribus.

Huc *A. mollis* Schæff. t. 213. f. 2. Mollis, flacidus, leviter carnosus, haud tenax, 1  $\frac{1}{2}$  unc., ante latior, margine evolutus. Lam. latiusculæ, simplices, ad basin decurrentes. Sporidia albida?

Odor farinæ recentis. Ad truncum quercinum. Sept.  
Oct. (v. v.)

16. *A. Djamor*, imbricatus, pileo glabro subpunctato rubente, dein albilo, lamellis lati, stipite glabro aut nullo. Rumpf. Amb. XI. p. 125. t. 56. f. 2, 3.

Esculentus, carnosus, varians colore et forma.  
Margo demum fissus. Aliæ ibidem descr. species  
vix definiendæ. In arboribus Amboinæ. (v. ic.)

17. *A. ursinus*, imbricatus sessilis, pileo laterali adscendente tenaci rubescente, basi plerumque fusco-tomentoso, lamellis crenatis albidis.

Substantia tenuis, coriacea, concolor. Stipes semper deest. Pileus difformis, sublobatus, rugosus, testaceo-incarnatus, aut glaber aut ad medium tomento rufofusco tectus. Lam. ad basin decurrentes, 4-5 lin. latæ, laceræ. Ad trunco cariosos Fagi. Per totum Aut. (v. v.)

18. *A. flabelliformis*, pileo planiusculo glabro cervino, margine lamellisque crenatis, stipite brevi aut nullo.

Mich. t. 65. f. 1. (huc citatur, at male congruit.)  
Bolt. t. 157. Pers. syn. p. 479. *A. reniform*. With.  
p. 304.

Priori affinis, at distinctus. Pileus 2-3 unc.  
latus, lacerus, dilute fuscus. Lam. latiusculæ. Ad truncorum latera. (v. ic.)

### Species inquirendæ:

1. Am. Hall. helv. n. 2380.
2. Bolet. v, auris muris dictus. Rumpf. p. 126. t. 56. f. 4.
3. Agaric. excentricus. Schum. p. 361.
4. *A. forniciatus*. Pers. syn. p. 474. Similem vidi torulosi formam; sed *A. carnosus* Bolt. t. 146. *A. serotino*, affinior.

Icones Michelianæ hujus "ordinis" minus fidæ,

## Subtr. 3. HÉGERITARIA.

CHAR. Vellum nullum. Stipes excentricus l. lateralis, rare obsoletus. Pileus carnosus, tenax, irregularis, junior etiam horizontalis. Lamellæ non decurrentes, etiam quando ch. stipitis pileive formam fornicatæ, determinato-desinentes.

Obs. Fungi serotini, lignatiles, inodori, una species sapore stiptico notabilis. Plures esculenti videntur; larvis valde infesti.

1. *A. ulmarius*, pileo compacto glabro pallescente, lamellis emarginatis albis, stipite valido adscendente subtomentoso

Batt. p. 44. t. 9. *A. A. ulm.* Bull. t. 510. Sowerb. t. 67. Dec. fr. 2. p. 138. Pers. syn. p. 473. Sibth. ox. p. 345. Swartz l. c. p. 251. *A. S.* p. 226.

*b. epiphegus*, minor, albidio-lividus, lamellis rotundatis. Fries Obs. I. p. 92.

Solitarius l. cæspitosus. Stipes incurvus, radicatus, subbulbosus, mollis, elasticus, hinc inde villosus, 2-3 unc. longus, 1 unc. circiter crassus. Pileus obtusus, sepe maculis lividioribus rotundis eleganter marmoratus, leviter excentricus, 3-5 unc. et ultra latus. Lam. confertæ, planæ, distinctæ, medio latissimæ. Ad trunco "Ulni" Populi nigrae, Fagi &c. Oct.-Dec. (v. v.)

2. *A. tessulatus*, pileo convexo tenaci subobliquo guttato-marmorato dilute ferrugineo, lamellis adnatis albis, stipite brevi excentrico.

Bull. t. 513. f. 1. Pers. syn. p. 474. Dec. fr. l. c.

Præcedenti videtur subaffinis. Stipes incurvus, albus. Pileus carnosus, glaber. 2-3 unc. latus. Lam. integerrimæ, confertæ, nec decurrentes, hinc ab *A. lepideo* diversissimus. Ad trunco Quercus & Pini silvestris in Gallia. (v. ic.)

3. *A. palmatus*, pileo lævi glabro rufescente, lamellis adnatis concoloribus, stipite excentrico glabro albidiori.

Barr. Ic. 1269. — Bull. t. 216. Sowerb. t. 62. With. p. 302. Pers. syn. p. 474. Dec. fr. 2. p. 137.

*Cæspitosus.* Stipites æquales, adscendentes, 1-2 unc. longi,  $\frac{1}{2}$  unc. crassi, albidi l. rufescentes. Pileus carnosus, junior convexus, 2-4 unc. Caro alba. Lam. latæ, non decurrentes. *Ad truncos Quercus rarior; etiam ad ligna fabrefacta.* Oct. Nov. (v. v.)

4. *A. craspedius*, pileo depresso glabro cinereo-fusco, lamellis adnatis stipiteque excentrico brevi albis.

*A. fimbriat.* Fl. Dan. t. 891.

*Cæspitosus*, imbricatus, horizontalis, magnitudo varius. Pilei 3 unc. usque, lœves, margine elevato. Stipites recti, glabri, crassi. *Ad truncos Danicæ.* (v. ic.)

\*\* 5. *A. pulmonarius*, pileo obovato molli glabro cinereo-alutaceo, lamellis adnatis lividis, stipite laterali brevissimo villoso.

Substantia mollis, sed tenax alba. Pileus siccus ferè alutaceus, 2-3 unc. latus, etiam subreniformis. Lamelle simplices, latæ, distinctæ, ob situm cum stipite rectilineum! decurrentes apparent; sed æqualiter et determinato-desinentes. *Ad Betulæ truncos prostratos.* Oct. (v. v.)

6. *A. serotinus*, pileo compacto subviscoso olivaceo-viridi, lamellis adnatis confertis pallidis, stipite brevi sublaterali fuligineo-squamoso.

Buxb. Cent. V. t. 2. f. 2. *A. crassipes.* Plan. Erf. p. 5. *A. ser.* Abb. d. Schw. 3. Pers. syn. p. 481. Schrad. spic. p. 140. *A. S.* p. 229. Fries Obs. 2. p. 226! *A. lateralis.* a. Schum. Sall. p. 364. *A. stiptici var.* Fl. Dan. t. 1293. f. 2.

*Vulgaris*, distinctissimus et varius. Stipes haud unciam superans, etiam obsoletus, lutescens. Pileus lœvis, crassus, dein mollior. Lam. angustæ, simplices plerumque flave; variant albidae et incarnatae. Loris cryptis stipites flabelliformes eva-

dunt, pileis obliteratis. *Ad truncos Fagi, Betulae, Alni &c. ubique. Oct.-Jan. (v. v.)*

7. *A. stipticus*, cæspitosus, pileo coriaceo-carnoso reniformi subalutaceo, epidermide in squamulas furfuraceas secedente, lamellis venoso-connexis, stipite laterali pruinoso.

*Port. phytogn. p. 250. fig. inf. Ray. syn. p. 25. n. 23. Buxb. Cent. V. t. 10. f. 1. Am. Hall. n. 2358. A. lateralis. Huds. Otto A semipetiolat. Schæff. t. 203. A. flabelliformis. Wulf. in Jacq. Coll. 1. p. 341. Sow. t. 109. A. stiptic. Bull. t. 140, 557. f. 1. Fl. Dan. t. 1292. f. 1. Pers. Obs. 1. p. 52. Syn. p. 481. Sw. l. c. p. 254. Des. fr. 2. p. 136. A. betulinus. Bolt. t. 72. f. 1. A. ficoides. With. p. 303. A. granin. Fl. Dan. t. 832. f. 1. A. cucullat. Rutstr. Crypt. p. 18.*

Gregarius, sapore stiptico. Stipes brevis, ascendens, sursum dilatatus. Lamellæ angustæ, ele- ganter reticulato-connexæ, adnatae, subcinnamomeæ. Pileus siccus, forma (etiam integra) et coloris intensitate variat, hinc duplex apud Witheringium, forte cum *A. serotino* commixtus. *Ad truncos arborum frondosarum Quercus, Fagi, Alni &c. ubique; etiam Amer. boreali. Oct.-Apr. (v. v.)*

8. *A. farinaceus*, cæspitosus, pileo flexuoso cinnamomeo-umbrino, furfure albido casio consperso, lamellis liberis distinctis, stipite brevi laterali. *Schum. Sæll. p. 365.*

Simillimus priori. Stipes pileo concolor. Pileus subcarnosus,  $\frac{1}{2}$  - 2 unc. latus, margine evolutus. Lam. dilutiores. *Ad truncos. Aut. (v. v.)*

9. *A. mitis*, pileo subcarnoso glabro lævi sicco, lamellis adnatis confertis distinctis stipiteque laterali sursum dilatato squamuoso albis.

*Pers. syn. p. 481. A. S. p. 231. Swartz. l. c. p. 256. b. pileo rufescente. A. laccatus. Schultz sturg. p. 480.*

Gregarius, totus albus l. pileo rufescente, firmus, insipidus. Lam. a stipite horizontali discre-

te, valde conferta, lanceolato-lineares, albido-pallidæ; hinc icon in Pers. Obs. 1. t. 3 f. 5. omnino erronea, quoad' colorem. Pileus reniformis,  $\frac{1}{2}$  unc. circ. latus, subinde fere sessilis. Ad truncoſ Grammos Pinir, Abietis, Laricis ubique; etiam Amer. boreal. Oct.-Febr. (v. v.)

10. *A. fluxilis*, subsessilis, pileo gelatinoso fluxili reniformi umbrinó, lamellis distantibus albidis, paucissimis integris.

Omnium diversissimus. Solitarius, inodorus, substantia tenui viscida mollissima grisea diaphana. Pileus unico puncto laterali leviter adfixus, reniformis, planus, lœvis, membrana tenuilla fugaci rugulosa junior tectus, dein glutinosus, uncialis, spadiceo-umbrinus. Lam. lutescenti-albidæ, persistentes, distinctæ, 3 l. 5 tantum integræ, reliquæ breviores, (32 plerumque inter integras!) lineares, postice rotundatæ, 1 lin. latæ. Ad truncoſ dejectos muscosos Fagi, raro. Oct. (v. v.)

#### Species inquirendæ:

1. *Fungus spadiceus*, arvensis. Buxb. Cent. IV. t. 8. f. 1.
2. *Ag. squamosum*, rufescens &c. Mich. t. 65. f. 7.

#### Subtr. 4. OMPHALARIA.

CHAR. Vellum nullum. Pileus carnosus, strato superiori sæpe gelatinoso, junior resupinatus, dein reflexus, horizontalis, sessilis. Lamellæ primum in puncto excentrico concurrentes. Lignatiles, serotini.

1. *A. nidulans*, pileo carnoso reniformi tomentoso lutescente, lamellis aurantio-luteis.

'A. lateral. Nonnull. A. nidul. Pers. ie. & descr. t. 6. f. 4. Syn. p. 482. A. S. p. 231. Sw. l. c. 255.

Gregarius, subinde imbricatus, junior pro more cupularis, tomento adnatus. Pileus 1-2 unc. latus, margine involutus, tomento subinde squamu-

loso l. albidiori. Lam. strictæ, subconfertæ, simplicissimæ, 4-8 natæ, 1-2 lin. latæ. Sporidia omnino alba. *Ad truncos prostratos "Pini", Fagi frequens.*  
*Oct.-Dec. (v. v.)*

2. *A. mastrucatus*, pileo carnoso squamoso murinogriseo, strato superiori gelatinoso, lamellis griseo-albidis

*A. echinat.* Sow. t. 99. opt. Fr. Obs. 2. p. 229.

Subimbricatus. Pileus difformis, in majoribus lobatus, flacidus, 1-4 unc. latus. *Ad truncos Fagi &c. Sept.-Nov. (v. v.)*

3. *A. atrocœruleus*, pileo carnoso villoso atro-coeruleo, strato superiori gelatinoso, lamellis albidis. *Fries Obs. 1. p. 95.*

Hunc *A. alnei* Schæff. t. 246. f. 3. 9 referunt; reliquæ figuræ ad *A. serotinum*, *Schizophyllum spectant*. Mollis, obovatus, 1-2 unc. Lam. confertæ, etiam flaventes. *Ad truncos Fagi, & raro. Oct. (v. v.)*

4. *A. algidus*, pileo carnoso lævi glabro umbrino, strato superiori gelatinoso, lamellis pallidis dein lutescentibus.

*A. lateralis.* Fl. Dan. t. 1556. f. 2. (junior.) *A. subsessilis.* Fl. Dan. t. 1552. f. 1. (evolutus). Schum. Sæll. p. 564.

Sæpe imbricatus, subreniformis, 2 unc. latus, dein repandus. Lam. confertæ, lineares, juniores albidæ. Affinem speciem colore cæsio, lamellis candidis vidi. *Ad truncos Betulæ, raro. (v. v.)*

### Subtr. 5. MYCENARIA.

CHAR. Vellum nullum. Pileus membranaceus, humidus sæpe, striatus, arescens. Lam. adnatæ l. in puncto excentrico concurrentes.

Obs. Ad muscos, stipulas, ramulos dejectos, etiam ad terram tenerrimæ hujus species autumno præcipue seniori nascentur. Odor, sapor et usus

nullus. Dermnis Crepidotis, sporidiis et velo exceptis, simillimæ.

- \* 1. *A. reniformis*, pileo reniformi pleno sulcato crenato lacteo, lamellis teneris, stipite laterali incrassato rubro. *Mey. Essequ. p. 302.*

Pileus tener, fragilis, medio paululum concavus. Lam. inæquales, pellucidæ. Stipes brevis, saturatus striatus. *Inter corticem & lignum ad truncos Amer. merid. Aprili.*

1. b. *A. acerosus*, pileo lobato striato griseo expaliente, lamellis linearibus stipiteque excentrico brevi strigoso concoloribus.

Stipes 3 lin. circiter longus. Pileus membranaceus, humidus striatus griseus, siccus sericeus canus, 1-2 unc. latus, profunde lobatus, quasi plures dimidiati in uno stipite. Lam. non decurrent. distinctæ, subconfertæ. *Supra folia & ramos Abietis in silvis densis. Sept.-Nov. (v. v.)*

2. *A. tremulus*, griseus, pileo reniformi diaphano, lamellis linearibus, stipite marginali adscendente villoso.

*A. tremulus*. Schæff. t. 224. Sowerb. t. 242. *A. glaucus*. Batsch. Cont. I f. 125. *A. epigenus*. Sw. l. 6. 1808. p. 258. *A. tephromelas*. Pers. Obs. 2. p. 47.

Hunc cum plurimis diversissimis sub *A. epigeno* commiscet Persoon. Lam. distantes, distinctæ. Pileus  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{2}{3}$  unc. latus, expallens, subinde subsestilis, disco villoso. *Ad terram & muscos. Aug.-Dec. (v. v.)*

B. *A. planus*, erectus etc. Bolt. t. 72. f. 3.

3. *A. mutilus*, albus, pileo reniformi subsericeo; lamellis subdecurrentibus confertis, stipite excentrico glabro adscendente.

*Gregarius*, subiculo quodam effuso byssaceo tenuissimo plerumque insidens. Stipes 3-4 lin. longus, tenax. Pileus tenax  $\frac{1}{2}$  unc. usque latus, irregularis, subumbilicatus. Lam. tenues, confertæ, decurrentes! *Ad terram locis umbrosis, autumno. (v. v.)*

4. *A. dictyorkizus*, candidus, pileo subsessili semiorbiculari candido, basi fibrilloso, radicibus tomentosis albis retiformibus. *Dec. fr.* 2. p. 594.

Stipes, quando præsens, brevis, velutinus. Pileus margine sinuatus. Substantia delicata. *In argilla humida Gallicæ.*

\* \* pileo juniori resupinato, dein reflexo. Lamellæ primum in puncto excentrico concurrentes.

5. *A. septicus*, candidus, pileo e resupinato reflexo lævi pubescente, lamellis radiantibus, stipite tenui incurvo pubescente, radiculis hyssoides.

*Am. Hall. helv.* n. 2335. *A. pubescens*. *Sow.* t. 321.  
(multo major.) *A. flabellatus*. *Bolt.* t. 72. f. 2 &  
*A. niveus*. *Ehrenb. silv. Ber.* p. 31. formæ videntur.

Color A. variabilis, forma et radiculæ A. hyssoidi; sed sporidiis ab utroque differt. Stipes 2 lin. fere longus, sursum attenuatus, quoad insertio nem peculiaris, subinde cum radiculis obsoletus. Pileus demum liber, leviter carnosus, 3-5 lin. et ultra. Lam. latiusculæ, distinctæ. *Ad truncos pretrescentes, passim. Aug.-Oct. (v. v.)*

6. *A. perpusillus*, tenuis, albus, pileo subsessili e resupinato reflexo lævi glabro, lamellis distinctis.

*Buxb. Cent. V.* t. 7. f. 5. *A. cucullatus*. *Brot. Lus.* p. 469. *A. perpusillus*. *Lumn. Pos.* p. 523. *A. applicatus*. *Fl. Dan.* t. 1295. f. 1. *A. subversus*. *Schum.* p. 366.

Admodum parvus; tenuis, junior obcampanulatus,  $\frac{1}{2}$  unc. latus, raro ultra; demum vero reflexus. Stipes brevis l. nullus. Lam. variant lutescentes. *Ad ramos, truncos Ec. vulgaris. Sept.-Dec. (v. v.)*

7. *A. applicatus*, pileo subsessili e resupinato-reflexo pruinato basi villoso obscure cinereo, lamellis laxis.

*A. applicatus*. *Batsch.* f. 125. *Sowerb.* t. 301. *Nees Syst.* f. 183. *A. epixylon*. *Bull.* t. 581. f. 2. *Schum.*

p. 366. Dec. fr. 2. p. 135. A. epigaei var. Pers. syn.  
p. 484. A. striat. b. hirsutul. A. S. p. 232.

Junior cupulæformis, 2-4 lin. tatus, leviter carnosus, humidus striatus; plus minus villosus. Lam. latæ, distantes, radiantes, griseæ, etiam margine albidores. "Coeruleo-nigricans, lamellæ albocoeruleo-scentibus" Dicks. Cr. Ad truncoS putridos varios, autumno, vere. (v. v.).

8. *A. striatulus*, pusillus, dilute cinereus, pileo & resupinato sessili striato glabro, lamellis distantibus.

*Ag. membranac.* Scop. p. 459. *A. striato-pellucidus.*  
*Pers. Obs.* 2. p. 48. *A. striat.* Syn. p. 485. *A. S.*  
p. 232. a.

Sparsus l. gregarius, persistens; pileus 3-4 lin. latus, convexus, siccus corrugatus, indole et colore A. corticola. Lamellæ paucæ, iniquales, distinctæ. Variat lamellis sordide albis, etiam totus fuscus. Ad ligna pinea, ramos Coryli, Betulæ &c. Ma-jo-Dec. (v. v.)

*A. sublamellosus* Mey. l. c. ad quam subtribum?

---

### Series secunda.

#### Trib. XIII. MOUCERON.

CHAR. Stipes solidus, firmus, inæqualis, in pileum diffusus. Pileus vere carnosus, convexo-planus, demum depresso, laevis, glaber, siccus, semper irregularis. Odor farinæ recentis. Lamellæ longe decurrentes, postice acuminatæ, confertiusculæ. Sporidia pallide rubent. Terrestres, cibarii.

1. *A. Prunulus*, pileo compacto planiusculo albo, lamellis albis dein incarnatis. Fries 2. p. 202.

*Prunulus*. Cœsalp. p. 617. Mouceron. J. Bauh. XL. c.

2. cum syn.? Tourn. inst. p. 557. Am. Hall. 2344.

- A. albellus.** Schæff. t. 78. Dec. fr. 2. p. 176. nec Sow. — Am. odora. Lam. Enc. p. 107. A. mouceron. Bull. t. 142. A. pallidus. Sow. t. 143. A. prunulus. Pers. syn. p. 457 & Recent. A pallescens. Swartz l. c. 1809. p. 85.  
**b. spodoides,** pileo cinereo. Ag. c. Gled. p. 311. Am. Hall. 2378. A. prunul. Scop. p. 437.

Magnitudine et forma varius, sed odore facile dignoscitur. Stipes 3-6 lin. crassus, 1 unc. et ultra longus, basi villosus. Pileus 2-4 unc latus, saepe excentricus, margine angulato l. undulato. — b. ab A. nebulari distinguendus. Inter fungos sapidissimos numeratur *Vulgaris in silvis, praesertim graminosis.* Fun.-Oct. (v. v.)

Fung. esc. gen. XI. Clus. p. 259, ab Hallero huc relatim, ex icone differt! An idem *A. mouceron* Tratt. pro certo non affirmo. Melius convenit *A. pallidus*. Schæff. t. 50. Am. stramin. Lam. l. c. p. 106. Fungus tam memorabilis, ut merito propriam constituet tribum.

- 2. A. popinalis,** griseus, pileo tenuiori inaequali, lamellis obscurioribus.

Antecedenti proximus; sed tenuior et colore præcipue diversus. Variat valde cæspitosus et parvus. Odor fribinæ recentis. *Aliquoties in aggeribus Scaniæ. Oct. Nov. (v. v.)*

#### Trib. XIV. CLITOPILUS.

Gymnopi spec. Pers. syn. p. 302.

CHAR. Stipes sat firmus, subæqualis, a pileo discretus. Pileus carnosus, campanulatus l. convexus, dein planiusculus, siccus, regularis, haud umbilicatus. Lamellæ inaequales, decolorantes, numquam longe decurrentes. *Color varius.*

Obs. Clitocybi analogæ tribus, sed specierum numero inferior. Fungi medii, subinodori, mites, in cibariis non recepti. Subtribus due:

- 1. RHODOPOLII.** Lamellæ adfixæ. *Terrestres.*  
**2. PLUTEI.** Lam. plane liberæ. *Epiphyti.*

## Subtr. 1. RHODOPOLII.

- \* 1. *A. hortensis*, cæspitosus, pileo subumbonato fuligineo subnigrescente, lamellis plano-decurrentibus subcontortis albidis, stipite cavo deorsum incrassato. — Pers. syn. p. 362.

Stipes subundulatus, subelasticus, 2  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 2-3 lin. crassus. Pileus 2 unc. latus, colore varius. Lam. 3 lin. fere late, subincarnatae, margine erosulae. In hortis & silvis ad terram.

2. *A. angustus*, pileo subumbonato glabro livido-cæsio, lamellis plano-deurrentibus incarnatis, stipite farcto basi incurvo villoso. Pers. syn. p. 345.

Solitarius, A. rhodopolio subaffinis. Stipes 2 unc. longus, 2 lin. fere crassus, pileo dilutior, æqualis. Pileus convexus, uncialis regularis. Lam. confertæ, angustæ. Inter folia decidua, locis nudis, raro. Aug. Sept. (v. v.)

3. *A. atropunctus*, parvus, pileo subcarnoso dilute cinereo, lamellis decurrentibus distantibus, stipite nitido, squamulis punctiformibus nigris. Pers. syn. p. 353.

Gregarius Stipes subtenax, 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 1 lin. crassus, livescens. Pileus hemisphæricus, mollis, 4-6 lin. latus. Lamellæ parcæ, arcuatæ, crassi-cultæ, incarnato-cinereæ s. pallidæ. In fagetis, rarissime.

4. *A. qdstringens*, pileo subcarnoso glaberrimo fuligineo-cinereo, lamellis subdeurrentibus confertis candidis, stipite solido substriato basi subtuberoso. Pers. syn. p. 350.

Stipes 2-3 unc. longus, elasticus, demum sub-tortus, pileo concolor. Pileus 1 unc. et ultra, convexo-planus, obsolete umbonatus, substantia sub-spongiosa, sapore substyptico. Lam. 1  $\frac{1}{2}$  lin latæ, demum incarnatae. *A. placenta* Batsch. El. f. 18? Rarius in silvis.

\*\* 5. *A. elodes*, pileo leviter carnoso umbonato glabro fuligineo, lamellis adfixis incarnatis, stipite cavo griseo fibrilloso.

*A. adstring.* *B. A. S. p. 176.*

Odor fortis, farine recentis. Stipes 2-4 unc. longus, 3 lin. crassus, basi leviter incrassatus. Pileus planiusculus, 2 unc. latus, fragilis, sapore aquoso, vetustus expallens. Lamellæ planæ, raro adnatae, sed plus minus emarginatæ, distinctæ, subdistantes, 3 lin circiter latæ. In paludosis silvicis, cum Rubo chamæmoro &c., frequens. Aug.-Oct. (v. v.)

6. a. *A. jubatus*, pileo leviter carnoso subumbonato villosa lamellisque emarginatis fuligineis, stipite fistuloso fibrilloso æquali.

*Gregarius.* Stipes 2 unc. longus, 2 lin. circiter crassus, fragilis, fuscescens. Pileus planiusculus, 1-2 unc. latus, murinus, carne tenui concolor; passim squamosus. Lam. planæ, ventricosæ, distinctæ, purpurascenti-griseæ. Odor nullus. Locis humidis, inter Polytrichâ & Carices passim. Aug.-Oct. (v. v.)

6. b. *A. sericellus*, pileo subcarnoso obtuso sericeo stipiteque fistuloso tenui fibrilloso albis, lamellis adnatis incarnatis. *Fries 2. p. 145.*

Parvus, subgregarius, nulli alii affinis, hinc ubi insererem, dubitavi. Stipes 1-2 unc. longus, 1 lin. crassus, æqualis, sæpe pallidus. Pileus e campanulae-convexus,  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{3}{4}$  unc. latus; variat glabriusculus et lutescens. Lamellæ perlatæ, raro decurrentes. *A. sericeus A. S. p. 183* hoc potissimum. Ad terram locis graminosis vulgaris. Jun. Oct. (v. v.)

*B. A. sericeus*, major, pileo campanulato piloso-squamoso. *Pers. syn. p. 366. Ic. & descr. t. 6. f. 2.*

Stipes 3 unc. basi subbulbosus. Pileus 1  $\frac{1}{2}$  unc. latus. Lam. adnexæ rubræ. Æstatis fine rarissime. (v. ic.)

7. *A. rhodopolius*, pileo subumbonato subsericeo livido, lamellis adnatis albido-roseis, stipite cavo glabro albo. *Fries* 2. p. 103.

*Fung. nox. gen. VI. Clus. J. Bauh. XL. c. 55. - Sterb. t. 16. G. ! A. hydrogramm. Bull. t. 564. f. C. D. E. A. repandus. Bolt. t. 6. A. flexuosus. Schum. p. 276.*

Pulcher. Stipes 2-4 unc. longus, in minoribus æqualis, in majoribus sursum attenuatus, fragilis, apice passim albo-pruinatus. Pileus junior campanulatus fuscescens fibrillosus, dein expallens, planiusculus; in majoribus undulatus. Locis humidis in silvis frondosis, præcipue *Coryli*, *vulgaris*. Jul.-Nov. (v. v.)

8. *A. fertilis*, pileo subumbonato glabro livido-pallescente, lamellis adnexis incarnatis, stipite farcto glabro subbulboso.

*Burm. Cent. IV. t. 6. Am. Hall. helv. n. 2417. A. phenospermus. Bull. t. 534, 547, fig. 1, 590. Dec. fr. 2. p. 187. A. fertilis. Pers. syn. p. 328.*

Gregarius, subcæspitosus. Stipes 3 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. fere crassus, albus, in cæspitosis sæpe curvatus l. undulatus, similis *A. platyphilli*. Pileus campanulatus, dein planiusculus, 5 unc., variat undulatus, fuligineus etc. Caro haud crassa. Lam. emarginatæ, facile secedentes, serrulatae, 4-6 lin. latæ. Ad sœpes, in pratis Ec. Autumno, raro vero. (v. v.)

- B. intybaceus*, pileo griseo virgato, lamellis stipeque griseo-pallidis. *Bull. t. 534. f. G. H.*

Huc et *A. mammosus*, Bolt. t. 69. Stipes subæqualis fibrillosus. Lam. subliberæ. Cum priori. (v. v.)

9. *A. sinuatus*, amplius, pileo glabro albo-lutescente, lamellis leviter adnexis latissimis rufescentibus, stipite solido æquali candido.

*A. grandis. Pers. syn. p. 529. - var. ?*

*b. A. sin. Bull. t. 579. f. 1, Dec. fr. 2. p. 182. !*

Speciosissimus, odore grato, fere Sacchari adusti. Stipes validus, 3-6 unc. longus, 1 unc. crassus, durus, subfibrillosus. Pileus vere carnosus, 6 unc. et ultra latus, expansus obsolete umbonatus, deinde depresso-depressus, sinuatus; etiam diffracto-squamulosus. Lam.  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{3}{4}$  unc. late, cinnamomeo-l. gillovo-rufescens, conferte, distincte. b. Stipes brevior. pileus rufescens. In silvis humosis. Copiosissime in silva Reften prope Lund. Oct. 1819. (v. v.)

10. *A. ardosiacus*, pileo glabro demum subdepresso vidente-cinereo, lamellis subliberis latis, stipite cavo glabro.

Bull. t. 348. Pers. syn. p. 466. Dec. I. c. p. 167.

Stipes 4-5 unc longus. 2-3 lin. crassus, attenuatus, pileo concolor. Pileus carnosus, junior campanulatus. 3 unc. latus, margine subsinuatus. Lam. 4 lin. late, rufescentes. In pratis humidis Galliae. (v. v.)

1. *A. aggregatus*. Schæff. t. 505, 306. Cæspitosus &c.  
2. *A. maritimus*. With. p. 182. Parvus, pileo convexo stipiteque unciali albis, lam. adnatis.

### Subtr. 2. PLUTEI.

1. *A. Prunuloides*, pileo carnosu umbonato glabro stipiteque solido lævi albis.

Odor farinæ recentis. Stipes 3 unc. longus, 2-3 lin. crassus, glaber, inter muscos quasi radicatus. Pileus convexus, dein explanatus, margine demum striato, 1-2 unc latus; variat viscosus, flavescens l. canescens. Lam. ut in omnibus affinis Conf. n. 9. Obs. *A. pellitus* Mart. Erl. luc pertinere conjicerem. In pratis muscosis. Aug. Sept. (v. v.)

2. *A. pellitus*, pileo carnosu villoso stipiteque solido glabro albis. Pers. syn. p. 366.

Inodorus. Stipes 2 unc. longus, 3 lin. crassus, aqualis. Pileus dein planiusculus, 2 unc. latus,

carne, ut in aliis hujus subtribus, molli aquosa.  
In fagetis circa truncos, rario. Aug. Sept. (v. v.)

3. *A. roseo-albus*, pileo subcarnoso lavi stipiteque solido glabris albo-roseis. *Fl. Dan. t. 1679.*

Gregarius. Stipes 3 unc. et ultra longus, 4 lin. crassus, sursum attenuatus, albidus. Pileus convexus, 3 lin. latus. Lam. carneæ. In Dania. (v. ic.)

4. *A. leoninus*, fragilis, pileo submembranaceo glabro luteo, stipite solido striato.

*A. pyrospermus*. *Eull. t. 547. f. 3. Dec. fr. 2. p. 192.*  
*A. leoninus*. *Schæff. t. 48. Pers. ic, & descr. t. 7. f. 3, 4. Syn. p. 337.*

Stipes 3 unc. circiter longus, 2-4 lin. crassus, saepe basi incrassatus, albidus, flavescens. Pileus e campanulato expansus, 1  $\frac{1}{2}$  - 3 unc. latus, margine substriato. Lamelle margine plerumque flavescent. In fagetis umbrosis ad ligna mucida. Aug.-Oct. (v. v.)

B. *A. chrysophæus*, minor, firmior, pileo obscuriori subrugoso, lam. carneis. *Schaff. t. 253.*

A priori, ut *A. phebophorus* ab *A. vascipede* differt. *Cum priori.* (v. v.)

5. *A. Pluteus*, pileo carnoso glabro nigrescente-fuligineo, stipite firme nigro-fibrilloso.

*Euxb. Cent. IV. t. 5. f. 2.* *A. clypeatus*, *Suec. & forste Linn. Am. Hall. helv. n. 2417.* *A. cervinus*. *Schæff. t. 10.* *A. lividus*. *Bull. t. 382. Dec. fr. 2. p. 188.* *A. latus*. *Bolt. t. 2. Sowerb. t. 18.* *A. striatipennis*. *Batsch. f. 76.* *A. pluteus*. *Batsch.-Pers. syn. p. 357.* *Sw. l. c. 1808. p. 88.* *Nees Syst. f. 201.* *A. cervin.*, *A. rimosus*. *Schum. p. 312.*

Reliquis major. Stipes solidus, albus, æqualis, 3 unc. longus. Pileus campanulatus, 3-5 unc. latus. Caro mollis alba. Varietates plures; b) fusco-lutescens (*A. leonino affinis*) *Fl. Dan. t. 1663 f. 2.* *Fries Obs. I. p. 18. c.)* pileo mollissimo viscoso pallido, stipite plumoso. d,) pileo albido sicco virgato.

*A. luridus* Schum. et *A. fuliginatus* Batsch. f. 26  
hanc formam juniores sistant. e.) parvus, pileo  
rugoso etc. *Ubique ad truncos. Mayo-Nov. (v. v.)*

*B. rigens*, minor, pileo cinereo, disco squamu-  
loso, stipite tenui cavo. *Pers.-l. c.*

6. *A. umbrosus*, pileo carnoso rugoso-lacunoso um-  
brino-villoso; margine ciliato-fimbriato lamel-  
lis margine fuligineis, stipite solido villosa-  
squamoso.

b. *Pers. ic. & descr. t. 2. f. 5, 6. Syn. p. 358. Fries  
Obs. 1. p. 18.*

Statura prioris, habitu peculiari tristi. Stipes  
2 unc. et ultra longus, 3-4 lin. crassus, incurvus,  
fuligineus. Pileus rugosus tuberculatusque, fuligineus,  
dense umbrino-villosus, 2-3 unc. et ultra; sa-  
pe ellipticus. b. minu. spectabilis, lamellis unicoloribus  
*Ad truncos Fagi, Pini &c. locis umbrosis.*  
*Aug.-Oct. (v. v.)*

7. *A. nigrescens*, pileo subcarnoso rugoso umbrino, fu-  
ligine consperso, stipite solido tenui incurvo  
glabro argenteo. *Pers. syn. p. 357.*

Stipes 1 - 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 1 lin. crassus, æqua-  
lis, obsolete striatus. Pileus planiusculus, obsole-  
te l. vix umbonatus,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. latus, margine  
striatulus. *Ad ligna putrida Fagi. Aug. Oct. (v. v.)*

8. *A. phlebophorus*, pileo subcarnoso glabro venoso-  
rugoso umbrino, stipite fistuloso incurvo glabro.

*A. reticulatus. With. arr. 4. p. 289. A. phleboph.*  
*Dittm. l. c. t. 15. Nees Syst. f. 202.*

Omnia de cetero, ut in priori, nec multo ma-  
jor. — Similibus locis etiam occurrit aliis (*A. va-*  
*scipes*) statura *A. leonini*, pileo submembranaceo  
discō lævi, margine striato, 2 unc. lato, dilute  
umbrino, stipite cavo, 3 unc. et ultra longo, 3-4  
lin. crasso; constans quidem, sed in tanta affini-  
um copia non distinguo. *Uterque in ligno putrido*  
*Fagi, passim. Jul.-Oct. (v. v.)*

9. *A. hispidulus*, minor, pileo subcarnoso sericeo griseo, stipite fistuloso glabro incurvo. Fries 2. p. 97.

Utique praecedentibus cognatus, sed præclarus distinctus. Stipes 1-2 unc. longus, 1 lin. crassus, argenteus, fragilis. Pileus planiusculus, obtusus,  $\frac{1}{2}$  unc. nec ultra. *A. hispidus* Batsch. f. 25. et *A. sericellus* Pers. syn. p. 358, erronee quamvis descripsi, huc pertinere videntur. In ligno Fagi udo locis umbrosis. Jul.-Oct. (v. v.)

In omnibus Pluteis (1-9) lamellæ ne minimum quoad formam quidem variant; sunt nempe plane liberae, postice eximie retundatae, ventricosæ, confertæ, distinctæ, molles, ex albo-incarnatae, subroseæ. His inspectis facile dignoscuntur species seqq. tribuum.

---

### Trib. XV. LEPTONIA.

*Gymnopi* spec. Pers. syn. p. 343-345.

CHAR. Stipes a pileo discretus, junior floccoso-farctus, dein subcavus, æqualis, tenuis, sat firmus, cyanescens! Pileus carnoso-membranaceus, campanulato-l. convexo-expansus, siccus, numquam striatus, superficie fibrillosa l. squamulosa, subinde umbilicatus. Caro tenuissima, sed sat firma. Lamellæ postice subobtuse, liberæ l. adfixæ, nec decurrentes, inæquales, latiusculæ, demum incarnatae. Color coerulescens l. griseus.

OBS. Dicitur a Λεπτος. Fungi parvi, persistentes, elegantes, inodori, insipidi, nec in cibariis recepti. Æstatis fine optime vigent. Collybiis analogi; et ut Coll. Omphalaria stipite nigricante, Leptonia coerulecente insignes. Spec. 1-4 distinguuntur pileo absque umbilici rudimento, lamellis non adnatis, integerrimis, ex albido-roseis unicoloribus, stipite vestito; 5-7 pileo cum umbilici rug-

dimento, lamellis subserrulatis, stipite glaberrimo; 8, 9 pileo umbilicato, lamellis adfixis, margine denticulato nigro. In quavis sectione terrestres et lignatiles occurunt.

- \* 1. *A. dichrous*, pileo umbo-nato violaceo, lamellis subadnexis, stipite farcto subfarinaceo. Pers. syn. p. 343.

Stipes duriusculus, 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 1  $\frac{1}{2}$  lin. crassus, pileo dilutior. Pileus 4-6 lin. latus, late vi laceus, umbone subrufescens. Lam. confertæ, incarnato-griseæ. Ad terram rarius.

2. *A. griseocyaneus*, pileo squamuoso lilacino-griseo, lamellis liberis, stipite cavo fibrilloso cæsio.

*A. purpureus*. Bolt. t. 41. *B. A. atrocyaneus*. Pers. syn. p. 344. *A. globosus*. Schum. p. 296. — omnes minus heus. Fr. Obs. 2. p. 96.

Stipes 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, reliquis crassior (2-3 lin.), junior etiam albidus, cæsio-fumatus, nec nitens. Pileus campanulato-convexus, obtusus, unciam haud superans. In collibus graminosis, vulgaris. Aug. Sept. (v. v.).

3. *A. salicinus*, pileo cæsio-cinereo, disco ruguloso, lamellis liberis, stipite farcto fibrilloso albido-coeruleo.

Pers. ic. & descr. t. p. 9. Syn. p. 344.

Stipes tenuis, 1 lin. crassus, 1-2 unc. longus. Pileus convexus, subumbonatus, beryllus, putrescendo cinereus, uncialis et ultra. Ad Salices. Sept. (v. v.)

*B. beryllus*, pileo cinereo stipiteque brevi albidò vittis virescentibus etc. Ad Alnos. Pers. l. c.

4. *A. placidus*, pileo villoso-squamuoso griseo, lamellis adfixis, stipite violaceo, spice subfarinaceo.

*A. elegans*, Scop. Carn. p. 438. *A. virgat*. Pers. ic. & descr. t. 6. f. 5. nec in Syn. *A. plac*. Fr. 2. p. 94.

Stipes farctus, dein etiam cavus, 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, glaber. Pileus 1 unc. latus, convexo-planus.

Lam. ventricosa, plana. Ad truncos Fagi, [passim.  
Aug.-Oct. (v. v.)

\*\* 5. *A. lampropus*, pileo demum umbilicato fibrilloso griseo, lamellis adnatis albido-griseis, stipite fistuloso coeruleo. *Fries Obs. 1.* p. 19.

Primo obtutu simillimus priori, sed accuratius examinatus sequentis crederes statum senectentem; tamen differt. Stipes uncialis, 1-2 lin. crassus, fragilis, apice nudus. Pileus convexus,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. latius, disco tantum squamulosus. Lam. integerrima, ventricosa, 2 lin. late, denticulo decurrente. In elvis & campis muscosis. Jul.-Sept. (v. v.)

6. *A. chalybeus*. pileo squamoso cyaneo, lamellis adnatis cæsio-albis, dein purpurascens, stipite farcto glabro cyaneo.

*Aman. parva*, capitulo conico violacei &c. *Dill. Giess.* p. 181. *Am. Hall. helv.* n. 2459. *A. columbarius*. *Sow.* t. 161. *A. nigricans*. *Schum.* p. 334. *A. chalyb.* *Pers. syn.* p. 343. *Ic. pict.* t. 4. f. 3, 4. *Fries Obs. 2.* p. 92.

b. *A. glaucus*. *Bull. t. 521. f. 1. Dec. fr. 2.* p. 179.

Pulcher. Stipes 1  $\frac{1}{2}$  - 2 unc. longus, 1 lin. crassus, subfragilis. Pileus campanulatus, obtusus, demum et depresso visus, uncialis nec ultra. Caro concolor, tenuis. Lam. subserrulata, distincta. Inter gramina &c. frequens. Jul.-Sept. (v. v.)

7. *A. euchrous*, pileo squamoso-fibrilloso violaceo, demum purpureo-fuligineo, lamellis adfixis violaceis et pite farcto glabro obscure violaceo.

*Am. Hall. helv.* n. 2458. *A. euchrous*. *Pers. syn.* p. 343. *A. S.* p. 174.

"Cæpitocus, stipite crassissculo" Pers. Noster solitarius, stipite 1 lin. crasso, 1  $\frac{1}{2}$  unc. circiter longo, tenaci, apice nudo. Pileus convexus, obtusus, uncialis. Lam. valde ventricosa, plana, demum expallentes, sed margine obscuriori persistente. Sporidia rosea. Ad truncos coryleos, "alnos". Sept.-Nov. (v. v.)

\*\*\* 8. *A. serrulatus*, pileo umbilicato subsquamoso nigrescente, dein fuliginoso, lamellis adnatis nigro-marginatis, stipite fistuloso atro-coeruleo.

*A. cyanipes*. Fl. Dan. t. 1071. f. 3. male. *A. leptopremnus*. Holmsk. 11. t. 38. *A. cœruleus*. Schum. p. 296. *A. serrula*. Pers. syn. p. 463. *A. S.* p. 222. Fries Obs. 2. p. 216.

Elegans Stipes 1-2 unc. longus, glaber, basi albicans. Pileus convexus,  $\frac{1}{2}$  unc. et ultra, glabriuscus. Lam. non decurrentes, cæsio-incarnatae. In collibus graminosis alibiique locis apricis ubique. Jun.-Oct. (v. v.)

β. *A. columbarius*, pileo planiusculo griseo nigro-virgato, lamellis subliberis, stipite elongate. Bull. t. 413 Dec. fr. 2. p. 190.

Hujus speciminiibus tandem inventis de praesenti fungo omnia sublata mihi dubia. Est prioris varietas! e solo umbroso, quamvis habitus magis *A. lamprop.* Stipes subfibrillosus, virescens l. coerulescens. Pilens magis expansus, inde lamellæ sedunt! Ad terram in silvis. Aug. Sept. (v. v.)

9. *A. Linkii*, pileo griseo virgato, umbilice obscuriori, lamellis adfixis albidis nigro-marginatis, stipite solidò fumato. Fries l. c. p. 217.

Ad prioris variet. nimis accedit. Pileus semi-globatus, expallens, siccus canescens. Lam. planz, 4 lin. latæ Stipes glaber, basi incurvus. Ad trun-  
cos vetustos Fagi. Sept. Oct. (v. v.)

Fung. pervus elegans, cantharidum colorem &c.  
Mich. p. 168. t. 75. f. 5. — inquirendus.

### Trib. XVI. NOLANEA.

Hydrop. spec. Batt. p. 51. Pratellæ spec. ex Pers. syn. p. 427.

CHAR. Fragiles. Stipes fistulosus, rarissime floccoso-farctus, a pileo discretus. Pileus submem-

branaceus, campanulatus, dein expansus, absque squamis fibrillosis, humidus striatus subpellucidus, siccus expallens, saepe quasi sericeo-nitens; numquam umbilicatus. Lamellæ liberae l. leviter adnexæ, latæ, ventricosæ, subadscendententes. Sporidia rosea.

*Obs.* Fungi terrastri, varii, substantia tenui subaquosa, insipidi, non esculenti. Habitu facillime dignoscuntur. Nomen a *Nola*.

\* 1. *A. turbidus*, pileo carnosio-membranaceo umbrinato fusco, margine striato rimoso, lamellis subliberis griseis, stipite cavo torto basi ventricoso.

Statura Clitopili. sed hujus tribus species, licet distinctissima. Stipes 2-3 unc. longus, 2-4 lin. crassus, sursum attenuatus, undulatus, fragilis, glaber, humidus griseus, siccus argenteo-nitens. Pileus convexus, expansus, 2-3 unc. latus. Lam. latæ, erosæ, juniores adnexæ. b) regularis, pileo subcarnoso minori, lamellis rotundatis. c) pileo fuligineo, lam. emarginato-liberis, stipite intense coeruleo. d) pileo eleganter nigro, lam. albidis, stipite coeruleo. *Vulgaris in Smolandiae pinetis b. in Sphagnosis. c. d. abiegnis umbrosis. Aug.-Oct. (v. v.)*

*B. A. conoideus*, pileo cinereo-ochraceo fuscostriato, lam. ovatis etc. Schum. p. 279. (v. ic.)

2. *A. majalis*, cæspitosus, pileo irregulari levi subcinnamomeo, lamellis liberis dentatis roseis, stipite fistuloso tortili striato. Fries 2. p. 172.

*B. solitarius*, pileo virgato &c. *A. molliusc*. Sow. t. 174.

Stipes 3-4 unc. longus, 2-3 lin. crassus, albidus, basi tormentosus. Pileus 2 unc. latus, subrepandus, siccus subochraceus. Sporidia copiosa. In silvis abiegnis, rarissime. Vere. (v.v.) Var. in Anglia (v. ic.)

3. *A. pascuus*, pileo campanulato expanse nigrescente-fuligineo, sicco expallente sericello, lamellis subliberis sordide incarnatis, stipite fistuloso tenui substricto.

*Dill.* in *Raji Syn.* p. 3. n. 45. *Hydrophor.* *einereus.*  
*Batt.* t. 21. f. 1. *A. sericeus.* *Bull.* t. 413. f. 2. 526.  
*Dec. fr.* 2. p. 189. *A. pascuus* & *fuliginosus.* *Pers.*  
*syn.* p. 427. *Fries Obs.* 1. p. 52. — *Formæ* sunt:  
*Buxb. Cent.* IV. t. 21. f. 1. *A. pyramidat.* *Schäff.*  
 t. 229. *A. fissus.* *Bolt.* t. 55. *A. melinoides,* tor-  
 tilis, altipes, *fuliginosus.* *Schum.*

*Proteus* *hujus sectionis,* quem in decem spe-  
 cies distinguere posses. *Stipes* 1-3 unc. longus, 1-2  
 lin. *crassus,* *fragilis,* *griseus,* *subfibrillo-us,* *basi*  
*leviter incrassatus.* *Pileus*  $\frac{1}{2}$  - 1  $\frac{1}{2}$  unc. *latus,* *hu-*  
*midus striatus,* *forma variabilis.* *Lam.* *confer-*  
*ta,* *sæpe serrulata,* *tantum quoad formam variæ in*  
*nulla alia visæ.* b) *albo-pallens.* c) *isabellinus,* *lute-*  
*scens.* d) *A. luridus* *Batsch.* etc. *In montosis &*  
*campestribus,* *apricis & umbrosis,* *locis siccis & humi-*  
*dis,* *ubique.* *Jun.-Dec.* (v. v.)

β. *costatus,* *magnus,* *cæspitosus undulatus,* *sti-*  
*pite brevi* etc. *In paludosis.* (v. v.)

4. *A. hirtipes,* *pileo striato livido-fusco,* *lamellis*  
*subliberis obovatis,* *stipite fistuloso lævi deor-*  
*sum hirto.* *Schum.* p. 272. *Fries* 2. p. 171.

*Stipes* *gracilis,* 3-4 unc. *longus,* *subradicatus,*  
*sursum leviter attenuatus.* *Pileus*  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. *Lam.*  
*roseæ.* *In pinetis.* *Aug.-Oct.* (v. v.)

\*\* 5. *A. clandestinus,* *umbrinus,* *pileo umbonato*  
*striato,* *lamellis liberis latissimis,* *stipite fistu-*  
*loso glabro,* *basi pubescente.* *Fries l. c. p.* 166.

*Solitarius,* *unicolor.* *Stipes* 1-2 unc. *longus,*  
 1 lin. *crassus,* *sat firmus.* *Pileus* 3-6 lin. *latus,* *con-*  
*vexus,* *explanatus.* *Lam.* *distantes!* *Ad terram nu-*  
*dam in fagetis.* *Aug.-Oct.* (v. v.)

6. *A. exilis,* *pileo obtuso striato cinereo,* *lamellis*  
*leviter adnexis incarnatis,* *stipite fistuloso gla-*  
*bro cæsio.* *Fries l. c. p.* 95.

Affinitas adest cum *A. salicino*, quod a disco pi-  
 lei  $\frac{1}{2}$  unc. lati minuto obscuriori patet. *Lam.* *dein*

liberæ. Stipes 2 unc longus, virescenti-cæsius. Inter folia Ec. in fagetis, raro. Aug. Sept. (v. v.)

7. *A. cetratus*, pileo obtuso striato stipiteque fistuloso longo glabris flavidis, lamellis adfixis pallidis. Fries l. c. 218.

Cum A. pascuo e. non commutandus. Stipes 3-5 unc. longus, valde fragilis. Pileus e campanulato exacte planus, vix umbilicatus, 1-2 unc latus, margine crenulato. Cum priori, locis humidis raro. Aug. Sept. (v. v.)

8. *A. pleopodius*, pileo lævi flavescente, lamellis liberis roseis, stipite farcto stricto glabro.

Bull. t. 556. f. 2. Des. fr. 2. p. 194.

Stipes gracilis, albidus. Pileus campanulatus, explanatus  $\frac{1}{2}$  unc. latus. subargillaceus; demum et depresso. Ad terram Galliæ. (v. ic.)

9. *A. icterinus*, pileo subumbonato flavo, disco squamuoso, lamellis adfixis ventricosis stipiteque farcto brevi pruinato pallidis.

Priori affinis. Stipes uncialis, 1 lin. crassus, firmus, pubescenti-pruinatus. Pileus convexus, numquam umbilicatus, firmus, uncialis, disco obscuriori, margine pellucido-striatulo. Lam. distantes, crassiusculæ. Variat cæpitoous et simplex. Hic in Scanie nemoribus, ille in Smolandæ cultis. Oct. Nov. (v. v.)

1. Mich. t. 78. f. 3. Cæspitosus, roseus &c.

2. *A. fasciatus*. Scop. p. 458.

3. *A. Musæ Mey.* Ess. p. 300. Pileus fuscus, striis albidis notatus. Lam. æquales. Stipes solidus, albus. Ad truncos Musæ paradisiacæ.

### Trib. XVII. ECCILIA.

*Omphalium* sp. Pers. syn. p. 463-466.

CHAR. Stipes junior flocculosu-farctus, dein etiam fistulosus, tenuis, teres, aqualis, in pileum

leviter diffusus; pileo dilutior nec coeruleoscens. Pileus tenuis, membranaceus, e convexo planus, umbilicatus, striatus, glaber l. minute squamulosus. Lam. adnatae, subdecurrentes, postice subacutæ, latæ, subdistantes. *Color lividus, fuscus &c.*

Obs. Nomen ab *εκκοληω*, excavo. Fungi minores, terrestres, inodori, insipidi, Omphaliis analogi.

\* 1. *A. formosus*, pileo cerineo, squamulis minutis fusciscentibus, lamellis deute decurrentibus albidis, stipite farcto glabro luteo.

Stipes 2 unc. longus, vix lin. crassus, laevissimus, intus floccis albis farctus. Pileus uncialis, leviter convexus, tenax, fuligine quasi adflatus, umbilicatus. Lam. dein roseæ. *In pinetis in Vaccinia, raro. Aug. (v. v.)*

2. *A. asprellus*, pileo fibrilloso-squamoso livido-griseo, lamellis adnatis stipiteque fistuloso basi albo-lanato dilutioribus.

Gregarius. Stipes 1  $\frac{1}{2}$  - 2 unc. longus, 1 lin. crassus, subfragilis, griseus. Pileus convexus,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. latus, fragilis, disco præcipue fuligineo-squamulosus. Lam. latæ, distinctæ, integerrimæ. *In campis graminosis jam æstate. (v. v.)*

3. *A. junceus*, pileo squamuloso fuligineo, lamellis adnatis stipiteque fistuloso longo dilutioribus.

Stipes 3 unc. longus, tenuis, tenax, laevis, glaber, fuscus; exsiccatus compressus. Pileus tenuis, conicus, dein convexus, striatus, umbilico profundo e squamulis obscurioribus nigrescente; siccus convolutus. Lam. oblongæ, adacententes. *In paludosis Sphagnosis, raro. Aug. (v. v.)*

4. *A. aquilus*, pileo squamuloso umbrino, lamellis sinuate-adfixis purpurascientibus, stipite fareo brevi.

Diversissimus lamellis omnium latissimis, hinc convexis, postice sinuatis, hinc cordatis! distinctis, junioribus pallide umbrinis. Pileus convexo-planus, profunde umbilicatus, spadiceus,  $\frac{1}{2} - 1$  unc. Stipes uncialis, 1 lin. crassus, obsolete fibrillosus; apice subincrassatus, dein cavus. Solo limoso & arenoso, ad ripas lacuum & annuum. Aug. Sept. (v. v.)

\*\* 5. *A. nefrens*, pileo glabro stipiteque fistuloso brevi umbrino-lividis, lamellis plano-decurrentibus.

Similis *A. pascuo*. Stipes uncialis, 1 lin. crassus, fragilis, apice pruinatus, pileo concolor. Pileus membranaceus, planus, uncialis, margine tantum striatus. Lam. albido-cinereæ, subincarnatae. In clivis graminosis. Aug. Sept. (v. v.)

6. *A. insanus*, pileo glabro incano', lamellis subdecurrentibus, stipite fistuloso glabro vidente.

*Elegans*, *gregarius*. Stipes 1-2 unc longus, 1 lin. crassus, lœvis, cinereo-viridis, apice nudus. Pileus submembranaceus, fragilis, uncialis, colore cinereo et viridi variegatus, striatus; sub lente quasi sericeus. Lam. dente decurrentes, medio 2-3 lin. latæ, planæ, distantes, albido-cinereæ, dein incarnatae. In graminosis montis silvaticæ, semel, ac copiose. Aug. (v. v.)

7. *A. politus*, pileo glabro margine striato stipiteque fistuloso æquali lividis, lamellis decurrentibus.

*A. lividus*. Pers. disp. p. 23. *A. polit*. Syn. p. 465.

Proximus *A. rhodopolio*. *Gregarius*. Stipes 2-3 unc. longus, teret, fragilis, apice subinde albo-pruinatos. Pileus submembranaceus, nec subearnosus, 1-1  $\frac{1}{2}$  unc. latus, profunde umbilicatus, humidus obscure lividus nitidus; siccus expallens, sape polito-nitens. Lam. medio 2 lin. et ultra latæ, albida, dein incarnatae. In paludosis graminosis, vngaricis. Aug.-Oct. (v. v.)

8. *A. calophyllus*, pileo hemisphærico substriato umbrino-fuligineo, lamellis decurrentibus purpureo-rubris, stipite subviscoso. Pers. syn. p. 464.

An ad hanc seriem? Stipes uncialis, crassiusculus, attenuatus, primo purpurascens-nitidus. Pileus 3-4 lin. latus. Lam. formosæ. Ad truncos putridos, rarior.

1. Fung. palustris, luteus, lam. carneis. Buxb. IV. t. 30. f. 1.

2. *A. carneo-albus*. With. p. 170. Pileus albus,

3. *A. nigrellus*. Pers. syn. p. 463. Quem ita olim dixi ad *A. undal*. pertinet.

Cf. Tapinias, Crepidotos, PRATELLAS, ubi etiam lam. incarnatae occurunt.

### Series tertia \*).

#### Trib. XVIII. TELAMONIA.

*Lepiotæ & Cort. sp.* Pers. syn. p. 273. sq.

CHAR. Velum e fibrillis araneosis in annulum, obsoletum quidem, sed sat persistentem contextum. Stipes solidus, dein intus mollior (subinde e larvis erosus), firmus, fibrillosus; bulbosus l. longus gracilis. Pileus plus minus carnosus, margine tenuis, campanulatus l. convexus, dein expansus, siccus, squamulosus l. fibrillosus. Substantia siccata. Lamellæ adnatae l. emarginatae, late, distantes, decolorantes. Sporidia copiosa. Color expallens.

\*). Species hujus seriei determinatu & definitu difficillimæ; non statura solum, sed & coloribus non minus in diversis aetatibus, quam in statu sicco & humido, diversis variant. Ludent insuper colores inter fulvum, cinnamomeum, testaceum &c. intermedii, de scriptu difficiles. Mycologos quoque maxime vexarunt. Notæ constantes: odor; superficies pilei fibrillosa l. viscosa; iam illarum situs confertus l. distans & color in statu juniori, quem semper in diagnosibus intelligo.

**Obs.** Fungi majores, terrestres, firmi, in cibariis non recepti. Genuini medo sunt priores species lamellis adnatis, crassis, junioribus obscuris, vel obliquo &c.

- \* 1. *A. torvus*, pileo obtuso fibrilloso canescens-testaceo, lamellis adnatis purpureis, annulo stipitem apice violaceo-cortinatum vaginante.

*A. araneos.* Bull. t. 600. Q. R. S. A. umbrinus. Pers. syn. p. 280. *A. torvus.* Fries Obs. 2. p. 80.

**Ag** violaceo proximus; sed longe diversissima species, cuius plur. varr. Odor et sapor pecularis. Stipes compactus, junior brevis subbulbosus, dein elongatus, 3-5 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. crassus, saepe aequalis, fibrillosus, proprie violaceus; sed ad medium usque ab annulo albo infero vaginatus. Pileus vere carnosus, junior convexus, margine infracto, saepe umbrinus; dein totus planus, sordido ferrugineus etc., sub lente canescente fibrillosus, 3 unc. et ultra. Lam. planae, obscurae, dein umbrino-cinnamomeae. In humo silvarum, ubique. Jul.-Ott. (v. v.)

2. *A. scutulatus*, pileo squamuoso testaceo-umbrino, lamellis adnatis violaceo-purpureis, stipite rigido bulboso violaceo, annulo patulo.

Nulli affinis. Odor peculiaris. Stipes 3-5 unc. longus, durus, firmus, 3-4 lin. crassus, basi oblongo-bulbosa, intus obscure violaceus. Annulus submembranaceus, lacerus. Pileus leviter carnosus, plano-convexus, firmus, obsolete umbonatus, 2 unc. latus, disco rimoso, margine fibrilloso-squamulosus. Lam. distinctæ, 3-6 lin. latæ; raro secedunt. In umbrosis inter Muscos humidos, gregarie, at raro. Aug. Sept. (v. v.)

3. *A. brunneus*, pileo obtuse umbonato subfibrilloso umbrino expallente, lamellis adnatis umbrinis, stipite subbulboso striate dilutiori, velo contexto.

*A. spongiosus*. With. arr. p. 200. Ag. brunn. Pers. syn. p. 274. A. S. p. 171. Fries l. c. p. 56.

Odor debilis. Stipes farctus, 3-5 unc. longus, 3-5 lin. crassus, dilute brunneus. Volum albidum. Pileus disco carnotas, 2-3 unc. latus, demum planiusculus. Lam. detrita passim umbrino-purpureo-scutant. Variabilis. In pinetis, vulgaris. Jul.-Nov. (v. v.)

4. *A. evernius*, pileo subcarnoso purpurascenti-badio. dein fibrilloso testaceo canescente, lamellis violaceo-purpureis, stipite longo æquali violaceo.

*A. impuber*. Sowerb. t. 125. excl. syn. (forma junior.)  
*A. evern*. Fries l. c. p. 79.

Stipes 3-6 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, non striatus, subinde deorsum attenuatus, velo albo transversim adnato-squamoso, fere ut in *A. collinito*. Pileus fere membranaceus, convexo-explanatus, fragilis, 2-4 unc. Lam latissime omnium, hinc ad medium modo adfixæ, decolorantes. Locis humidis pinorum copiose, in fagetis rarer. Jul.-Nov. (v. v.)

5. *A. flexipes*, pileo subcarnoso acute umbonato cinnamomeo-fusco expallente canescente-fibrilloso, lamellis adnatis e purpureo-cinnamomeis, stipite tenui fibrilloso undulato.

Pers. syn. p. 275. A. S. p. 151. Fries l. c. p. 78.

Sequentis varr. nimis accedit. Otidus. Stipes 4 unc. longus, æqualis, 2 lin. crassus, infra annulum distantem squamułosus, apice violaceus. Pileus conicus, dein explanatus,  $\frac{1}{2}$  unc. et parum ultra, jove sicco alutaceus etc. b) lam. olivaceis. Cum priori, passim. (v. v.)

6. *A. gentilis*, pileo subcarnoso umbonato subcinnamomeo expallente, lamellis adnatis cinnamomeis, stipite tenui æquali substricto.

*A. helvolus*. Pers. syn. p. 273. nec Bull.

Humidus unicolor fulvo-cinnamomeus, siccus stipes et pileus expallent, lutescunt. Stipes deit.

et cævus, 3 unc. et ultra longus, 2.3 lin. crassus, fibrillosus, annulo contexto obliquo distante. Pileus junior conicus, dein explanatus, sub-acute umbonatus, subrimosus, obsolete fibrillosus,  $\frac{1}{2}$  - 3 unc. latus. — Non est *A. himmuleus* With.; forte Sow. t. 173; Quid *A. helvolus* Sw. l. c. viscosus, lamellis liberis? In pinetis præcipue; sed ubique frequens. Jul.-Dec. (v. v.)

*B. glandicolor*, umbrinus, lamellis minus distan-  
tibus. Color *A. brunnei*. forma prioris. In pinetis.  
(v. v.)

*C. A. punctatus*, pileo obsolete umbonato ca-  
nescente umbrino. Pers. syn. p. 274. Affinis *A. flexip.* (v. v.)

*D. A. incisus*, pileo squamuoso fulvo-ferrugineo,  
lam. ferrugineis, stipite brevi. Pers. syn. p. 310.

Velum sæpe obsoletum. Stipes firmus uncialis etc.  
Certe varietas e loco. In ericetis, sterilibus. (v. v.)

*E. helvelloides*, pileo obtuse umbonato fulvo, lam.  
umbrino-purpureis, stipite flexuoso. In nemoribus  
humidis. (v. v.)

*F. A. spurius*, pileo stipite albido-pallidis. Pers.  
syn. p. 288.

\*\* HETEROCLITI (Raphanoideis affiniores)  
lamellis adfisis, distantibus; pileo disco præcipue car-  
noso innato-fibrilloso, velo colorato zonæ instar stipitem  
sæpius cingente &c.

7. *A. limonius*, pileo obtuso aurantio-fulvo expal-  
lente, lamellis flavis mox fulvo-cinnamomeis,  
stipite æquali, velo floccoso. Fries l. c. p. 56.

Color fere præcedentis &; de cetero non af-  
finis. Stipes firmus, 2-3 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. cras-  
sus, fibrillosus, luteus, interdum croceo-rubens.  
Pileus mox planus, siccus ochraceo-luteus, subsqua-  
mosus, 2-4 unc. latus. Lam. nunc adnate, nunc  
emarginatae! Velum rarius perfecte annulatum.  
Huc *A. hermesin*. Holmsk. II. t. 49. In pinetis mon-  
tosis vulgaris. Jul.-Nov. (v. v.)

8. *A. croceofulvus*, pileo plano aurantio-fulvo, lamellis adnatis pallide rufis, stipite aequali linea aurantiaca cincto. *Dec. fr.* 6. p. 49.

Stipes 3-4 unc. longus, 4 lin. crassus, solidus, flavorufescens, apice pallidus. Pileus 4 unc. latus, laevis (?) pallide aurantiacus, dein fulvus l. rufescens. *Ad terram silvarum circa Montpellier.*

9. *A. armillatus*, pileo squamuloso testaceo-rubro, lamellis pallide cinnamomeis, dein ferrugineis, stipite bulboso, velo contexto rubro.

*A. Bulliardii. B. A. S. p. 157. — Fries l. e. p. 61.*

Odor Raphani Stipes 3-5 unc. longus, apice 3-4 lin. crassus, albido-rufescens. Pileus junior campanulatus, dein explanatus, 2-3 unc. latus. Lam. adnatae l. leviter rotundatae. — *A. aimatochelis* Bull. t. 596. f. 1 huc certe pertinet; alnidum vero (t. 527 f 1.) numquam vidi. *Inter vulgatissimos Aug.-Oct. (v. v.)*

10. *A. sublanatus*, pileo squamuloso testaceo-olivaceo, lamellis e lutescente-cinnamomeis, stipite bulboso squamuloso, velo fusco

*A. sublanatus*, Sowerb. t. 214. Swartz. l. e. 1808. p. 90.  
*Fries Obs.* 2. p. 77.

b. *A. notatus*. Pers. syn. p. 296.

Odor et statura praeceps; sed pilei et veli colore certe diversus. Stipes 3 unc longus, lutescenti-pallidus; interdum apice violaceus. Pileus dein late et obtuse umbonatus, 3 unc. latus: colore vario lutescente-fusco; squamulis subfuscis l. canis, interdum sericeo-adpressis. Lam. adnatae, sed et emarginatae. *In pinetis, fagetis &c. Aug.-Oct. (v. v.)*

11. *A. bulbosus*, pileo obtuse umbonato glabriuscule spadiceo, sicco testaceo, lamellis cinnamomeis tipite longo bulboso veloque albido

*Am. Hall. helv. n. 2445. A. bulbos*, Sow. t. 230, *Pere*,  
syn. p. 195. *Fries l. e.*, p. 60.

Odor et statura priorum; habituque illorum  
laxo mox a sequentibus dignoscitur. Stipes 3-4  
unc. longus, subfibrillosus, basi in adultis fer-  
ruginascens. Pileus 2-3 unc. latus, sub lente fibril-  
losus, margine tenuis, fragilis. Lam. rotundatae,  
subadnatae, distinctæ, 3-5 lin. latæ. Inter gramina,  
folia &c. Aug.-Oct. (v. v.)

\*\*\* HETEROCLITI (Leucopodis affiniores)  
*lamellis emarginatis, subconfertis; pileo carnoso obtuso*  
*adflat-fibrilloso; velo stipiteque albis.*

12. *A. macropus*, pileo crystallino, squamulis pilo-  
sis canescentibus, lamellis distantibus aquose  
cinnamomeis, stipite elongato æquali annulo-  
que albidis.

Stipes 3-6 unc. latus,  $\frac{1}{2}$  unc. et ultra crassus,  
firmus, fibrillosus, demum pileo subconcolor; an-  
nulus tenuis, remotus, albus. Pileus non compac-  
etus, junior convexus, margine inflexo, dein expla-  
natus, 3 unc. circ. latus, testaceo-ferruginascens etc.  
Lam.  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. late, adnexæ. Cf. A. (Derm.) ca-  
peratum. In silvis, minus frequens. Aug.-Sept. (v. v.)

13. *A. latus*, pileo crystallino, lamellis emarginata-  
tis confertis argillaceo-cinnamomeis, stipite pale-  
lescenti-albo cortinato. Pers. syn. p. 276.

Inter annulatos Auctor l. c. locavit. Grega-  
rius, subcespitosus. Stipes 2-3 unc. longus, 1 unc.  
fere crassus, fibrillosus. Pileus convexo-planus, 4  
unc. et ultra, disco obscuriore. Lam. 3 lin. late.  
In paludosis silvaticis Hercynicis.

14. *A. bivelus*, pileo obtuso fulvo l. testaceo, la-  
mellis emarginatis subdistantibus fulvis subni-  
tidis, stipite brevi subbulboso, annulo fugaci.

*A. araneos*. Bull. t. 598. f. 2. b. Am. Hall. helv. n.  
2132. A fulg. A, S. p. 16'. A bivelus Fr. Obs. 2.  
p. 58 — *A. sericeus*. Schæff. t. 24. (colore subre-  
cedit.)

*Gregarius.* Stipes compactus, 2 unc. longus, albidus. Annulus albus, angustus, in cortin. continuatus. Pileus junior convexus, dein planus, obtusissimus, 2-3 unc. latus, nunc nitidus, nunc opacus, raro squamulosus, sed fibrillis margine adflatue. Lam. distinctæ, 2-5 lin. latæ, elegantes. In ericetis & silvis, ubique. Jul.-Oct. (v. v.)

*B.* *A. fulgens*, pileo aureo-nitido, bulbo marginato. Pers. syn. p. 294.

15. *A. urbiclus*, pileo glabro argillaceo-albo, lamellis emarginatis confertis aquose ferrugineis, stipite æquali, supra annulum fugaceim villoso.

Priori sat affinis. Stipes 2-3 unc. longus, 4 lin. crassus annulusque albi. Pileus 2 unc latus, obtusus, numquam squamosus. Locus a vulgari Cortinariarum recedit. In suburbicis Lundæ, solo pingui ad radices Salicium &c. Oct.-Nov. (v. v.)

### Trib. XIX. INOLOMA.

*A. araneosus*. Bull. - Des. fr. 2. p. 198. Am. Lam. Enc. 2. p. 106. Certinariæ spec. Pers. syn. p. 276.

CHAR. Vellum in filis liberis araneosis solutum, marginale, fugax. Stipes solidus, bulbosus, fibrillosus, in pileum subdiffusus, carnosus. Pileus carnosus, junior convexus, dein explanatus, fibrillosus l. viscosus, regularis. Substantia succulenta. Lamelle emarginato-adnexæ, late, decolorantes. Sporidia copiosa. Color pilei aut lamellarum violaceus.

Obs. Fungi majores, firmi, subsucculenti, autumnales, terrestres, haud cæpitosi, neque, quantum novimus, edules. Odor multis peculiaris. Species certissime differunt contra Bulliardis assertionem! Tricholomatibus analogæ nomenque ejusdem significationis,

† INOL. GENUINA. Pileus semper siccus, squamulosus l. sub lente fibrillosus, obtusus l. umbo-natus, numquam depresso. Hall. helv. n. 2455, 2456.

1. *A. violaceus*, obscure violaceus, pileo villoso-squamoso, lamellis distantibus connexis, stipite spongioso, intus violaceo-cinereo.

Fungo-Boletus violac. Bocc. Mus. t. 301. f. 5. A. violac. Linn. Suec. p. 448. Lam. fr. 1281. n. 8. Hedw. fil. Obs. Bot. t. 4. Bolt. t. 52. (male) Sv. Bot. t. 288. Fries Obs. 2. p. 87. Id. & A. hercyniens. Pers. syn. p. 277, 278. A. araneos. violac. Bull. t. 250!, 598. f. 2. A.

Speciosus, magnus. Stipes junior subfomentosus, 4 unc. plerumque longus. Pileus obtusus, ex-planatus 3-6 unc. latus. Lam. juniores fere atro-violaceæ. Plurimi cum diversissimo, at simili, A. personato commutant, ad quem varia syn., v. gr. Raji Syn. p. 3. n. 19 etc. referenda. In nemoribus frondosis major, in pinetis minor. Aug.-Oct. (v. v.)

2. *A. violaceo-cinereus*, pileo umbrino-violaceo, squamu-lis punetiformibus cinereis ruguloso, lamel-lis distantibus purpurascente-umbrinis.

Boletus fuscus, basi glebosa. Bocc. t. 301. f. 4 Am. pediculo bulbiformi, pileo fusco &c. Dill. Giess. p. 87. A. violaceus Schæff. t. 3. A. viol. cin. Pers. syn. p. 279. A. S. p. 152.

Priori proximus. Stipes 2-3 unc., fere glaber, pileo dilutior. Pileus 2-3 unc., colore varius. Lam. ad latera cinnamomeæ. In silvis mixtis. Aug.-Oct. (v. v.)

3. *A. traganus*, foetidus, pileo fibrilloso lilacino-pallido expallente, lamellis distantibus ochra-ceis. stipite albo-violaceo, intus croceo.

*A. amethyst.* Schæff. t. 56. - Fries 2. p. 82.

Magnus, odore peculiari, a sequentium vero diverso. Stipes etiam expallens, fuscescens. Pileus obtusus, 3 unc. circiter, disco demum flavescens

etc. Lam. crenatæ, saepe adnatae, colore juniorum diversissimæ. In silvis abunde. Jul.-Oct. (v. v.)

4. *A. argentatus*, oolidus, pileo sericeo-nitente lilacino argenteato, lamellis confertis cinnamomeis, stipite intus concolori. Pers. syn. p. 286.

Odor et sapor peculiaris. Priori minor, stipite 1-2 unc. longo,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. crasso; pileo 1  $\frac{1}{2}$  - 2 unc. lato. Pileus obtusus, expallens. In pinetis, nobis rarer. Sept. Oct. (v. v.)

5. *A. albo-violaceus*, pileo demum late et obtuse umbonato sericeo-fibroso violaceo-exalbicante, lamellis subconfertis dilute violaceis. Pers. l.c.

Optima species, odore nullo distincto. Stipes obclavatus (leviter bulbosus), 2 unc. longus, extus intusque violaceo-albidus. Pileus 1-3 unc. latus, argenteo-pallens. Lamellæ serrulatæ, cinereo-violaceæ, dein aquose cinnamomeæ, leviter emarginatæ, 2-3 lin. late; variant cinereæ, stipite conico etc. In silvis frondosis, fagetis &c. passim. Aug.-Oct. (v. v.)

6. *A. camphoratus*, oolidus, pileo obtuso sericeo lilacino expallente, lamellis subadnatis confertis coeruleis purpurascensibus.

Majer. Stipes mollis, bulbosus, non vero marginatus, 2-5 unc. longus, violascens, basi intusque albidus. Pileus 2-4 unc. latus, diseo demum lutescens, i. dilute testaceus quod in priori numquam. Caro crassa Lam. adnata, subareuato-decurrentes, juniores amethystinæ, dein purpurascentes pallidiores. Odore et sapore ab omnibus fungis differt! In pinetis vulgaris. Aug.-Oct. (v. v.)

7. *A. malachius*, pileo subcarnoso lilacino, mox subtestaceo, villo squamuoso canescenti tecto, lamellis confertis purpurascensibus mox cinnamomeis. Fries Obs. 2. p. 71.

Cum A. armeniaco facilis commutatu. Variat major et minor; præcipue, ut in quam pluribus affinibus observavi, supra folia humida putrescentia pinea stipite valde ventricoso. Stipes spongiosus, sublilacinus. Pileus junior dilute lilacinus, adultus humidus fusco-ferrugineus, siccus testaceus, plus minus canescens, raro obtusissime umbonatus, 2-4 unc. latus. Lam. emarginatae, serratae, margine sape albidæ. In pinetis frequens. Aug.-Nov. (v. v.)

8. *A. saturninus*, pileo glabro obscure badio expalente, lamellis purpurascientibus confertis, stipite violaceo.

Subcæspitosus, odore debili, sed subdistincto. Stipes spongiosus, deorsum incrassatus, 2-3 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus. Pileus siccus, glaber et junior tantum versus marginem sericeus, carnosus; margine tenuis, dein incisus; junior campanulatus, dein expansus, obtusus; expallens testaceus, 2-5 unc. latus. Lam. rotundatae, 4 lin. latæ, demum aquose ferrugineæ. Ad sæpes humidas, in Salicetis graminosis Scaniae. Oct. Nov. (v. v.)

9. *A. conopus*, pileo obtuse umbonato piloso ex olivaceo subferrugineo, lamellis emarginatis confertis, stipite conico. Pers. syn. p. 285.

"Ingenus, validus, speciosus, sapore vix ullo." A. S. p. 156. Stipes longus sensim attenuatus, in medio velatus. Pileus 4 unc. latus, explicatus planiusculus. Lam. 3 lin latæ. In silvis, v. gr. Lusatiae copiose. Sept. Oct.

10. *A. pholidæus*, pileo umbonato cervino, squamis pilosis fuligineis squarroso, lamellis confertis violaceis ex argillaceo cinnamomeis, stipite transversim nigricante squamoso, apice levi.

*A. psammocephalus*. Bull. t. 586. f. 1. 531. f. 2. Dec. fr. 2. p. 196. (vix differt, sed nomen incongruum).  
*A. araneatus*. Pers. syn. p. 293. *A. lepidomyces*. A. S. p. 155. t. 12. f. 1. *A. pholidæus*. Fr. 2. p. 21.

Ab *A. sublanato* subsimili differt lamellis confertis, primo violaceis etc. Stipes sursum attenuatus, vix bulbosus, 2-4 unc. longus, supra velum fuscum subannulatum violaceus. Pileus 1-4 unc latus. Lam. 2-4 lin. latæ. In silvis ericetosis subhumidis, betuletis &c. vulgaris. Aug.-Oct. (v. v.)

II. a *A. spilomeus*, pileo umbonato glabriusculo fuscescenti-pallido, lamellis confertis violaceis decolorantibus, stipite attenuato, squamis fulvis variegato.

*A. aran.* Sow. t. 384. f. 1. — *Fries l. c. p. 83.*

Sequenti nîmis cognatus. Stipes 2-4 unc. longus, 2-3 lin. crassus albo-lilacinus. Pileus leviter carnosus, uncialis; color varius, junior subcanescens, dein ferrugineo-fuscescens, siccus lutescens. Lamellæ dein lilacinae, demum cinnamomeæ. In silvis muscosis abiegnis, raro. Aug. Sept. (v. v.)

II. b. *A. anomalus* & *proteus*, pileo obtuso glabriusculo canescente-fuligineo, dein fuligineo-fulvo, lamellis confertis cæsio-purpurascens, stipite tenui squamuloso, basi incrassato.

*A. eumorphus.* Pers. syn. p. 342, forma. — *Fr. l. c. p. 73.*

Optima species, sed determinatu et descriptu difficultis. Stipes 3-5 unc. longus, 1-3 lin. crassus, fragilis, subadscendens, albido-violaceus, expallens, dein albido-lutescens; sœpe cavus. Pileus vere carnosus, tenuis, mollis, junior eleganter convexus, dein planus. 1-4 unc. latus; colore varius. Lam. tenues, serratae, emarginatae, dente decurrente, demum argillaceo-cinnamomeæ. *A. olivascens* Batsch t. 31. f. 185, quoad statu ram convenit. In silvis frondosis &c., ubique. Aug.-Oct. (v. v.)

B. *A. incurvus*, pileo subumbonato lilacino ex-pallente, lamellis lilacini, dein ochraceis, stipite caudato-tomentoso. Pers. ic. & descr. t. 7. f. 5. Syn. l. c.

Stipes incurvus, sursum etiam minute squamu-  
losus. Pileus dein planiusculus, etiam pallide lu-  
tescens. Inter folia. (v. v.)

γ. *A. tabularis*, firmior, pileo lato demum pla-  
no, lam. fugacissime cæsiis, mox argillaceo-cinna-  
momeis, stipite pallido — Bull. t. 431. f. 5.

Plurimæ formæ stipite lævi et variegato-squa-  
moso; pileo obtuso et subumbonato, colore argil-  
laceo-pallido, alutaceo, testaceo-livido etc. In fa-  
getis. (v. v.)

δ. *A. diabolicus*, pileo fibrilloso subrimoso fu-  
scescenti dein olivaceo, sicco ferruginaescenti, lam.  
minus confertis fugacissime cæsiis. — Bull. t. 431.  
f. 4?

Ag. anomalam cum *A. Raphanoide* quasi jun-  
git; sed dantur et specimina stipite *A. pholidei* in-  
star squamoso. Variat cæspitosus, stipite crasso et  
tenui etc.; sed vix colore. Pileus junior subcam-  
panulatus. Cum priori. (v. v.)

ε. *A. caninus*, robustus, pileo plano lateritio-  
rufescente, lamellis purpurascentibus, stipite bul-  
boso pallido. — Bull. t. 544. f. 1.

Quis hunc forte Mich. t. 74. f. 1. et Buxb. C.  
IV. t. 23, priorum crederet varietatem? certam  
tamen sequor experientiam. Otidus. Stipes solidus,  
2-3 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, sursum violaceus.  
Pileus 2-4 unc., variat zonatus, maculatus, repan-  
dus. In fageto. Aug.-Oct. (v. v.)

Cum species n. 1-9 vix ullis, nisi quæ ex ætate &  
statu humido siccoque pendent, hæc species infinitis ob-  
noxia mutationibus. Hic genuinus *A. araneosus* Bull.;  
sed ex ejus indole polymorpha seductus alios distinctissimos  
admisceret. Species magis affines, quam quæ in  
præsenti sectione contineantur, certiusque distinctas!  
in tota re herbaria non invenies.

12. *A. Bulliardii*, pileo sicco glabriusculo rufescen-  
te, lamellis distantibus cinnamomeis, stipite  
firmo, bulbo cinnabarrino.

Bull. t. 431. f. 3. — Pers. Obs. 2. p. 43. Syn. p. 289.

Distinctus ab A. armillato; numquam tamen violascit Stipes 2-4 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, subradicatus, albidus, sanguineo-maculatus. Pilus convexus, obtusus, 2-3 unc. Lam. emarginatæ. In fagetis. Aug. Oct. (v. v.)

† IN. PHEGMACIOIDEA. Pileus glaber, humidus viscosus, semper obtusus, demum depresso. Stipes coeruleo-vires, mox expallens albidus. *Fung. pernicios. gen. XV. Clus.* — *J. Bauh. XL. c. 59.*

13. *A. variecolor*, pileo rufo-spadiceo, margine subtomentoso violaceo, lamellis confertis albido-fuligineis, stipite crasso bulboso. Pers. syn. p. 280.

An viscosus sit, reticet Auctor, sed pileus 3-4 unc. latus, margine nitidus. Lam. 3 lin. latæ, margine albidæ et nitidæ, ad latera sordide cinnamomeæ. Stipes 2 unc. et ultra longus, 1 unc. crassus, subbulbosus. "Variat disco dilutiore ex alutaceo-rufescente etc." A. S. p. 153. Videtur affinis A. glaucop. In silvis Sept. Oct.

14. *A. centrifugus*, pileo viscoso, margine æruginoso, lamellis crenatis incarnato-violaceis, stipite solido.

Stipes 2-3 unc. latus, 1 unc. crassus et ultra, glaber, albidus. Pileus 3-5 unc., planus, subdepresso, fusco-lutescenti-violaceus, dein magis lutescit. Caro-alba. Lam. leviter emarginatæ, 4 lin. latæ, pallide, dein cinnamomeæ. In silvis abiegnis muscosis ad Skärstad Ec. Jul. Aug. 1817. (v. v.)

15. *A. subtortus*, pileo molli inæquali viscoso pallido, lamellis latis olivaceo-cinereis, stipite demum cavo subtorto inæquali. Pers. syn. p. 284.

A sequenti molli substantia etc. distinguitur. Stipes 2-3 unc. longus, subbulbosus, valde inæqualis, obsoleta violascens. Pileus e convexo-plani-

sculus, subdepressus, 2 unc. latus, subirregularis; variat pallide stramineus, alutaceus, olivascens, fuligineo-fuscus. Lam. subrotundata,  $\frac{1}{2}$  unc. latus, subdistantes. Sapor nauseosus. *In silvis abiegnis, alnetis, raro.* Aug.-Oct. (v. v.)

16. *A. infractus*, pileo compacto inaequali subviscoso, lamellis confertis olivaceo-umbrinis, stipite solido. — *A. S.* p. 155.

b. pileo infacto, lam. crispis. *Pers. syn.* p. 283.

Colore lamellarum peculiari praecipue distinguitur. Stipes 2-3 unc longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, bulbosus, fibrillosus. Pileus convexo-planus, 3 unc, fere; olivaceo-fuligineus, subluridus, disco lutescentiluridus etc. Americanus. *In fagetis umbrosis, raro.* Aug.-Oct. (v. v.)

17. *A. scaurus*, pileo aequali viscoso, lamellis confertis olivaceo-purpurascens, stipite attenuato bulboso.

a. pileo fulvo-fuligineo, secco sordide ochraceo &c. A. fulvo-fulig. & subsimilis. *Pers. Obs.* 2. p. 43. *Syn.* p. 284. A. orichalceus. *Batsch. Cont.* 2. f. 184. A. defossus. C. 1. f. 73. A. curvatus. *Schum.* p. 519. A. glaucop. b. *With.* p. 297.

b. totus olivaceus, viridis. Am. *Hall, helv.* n. 2466. A. scaurus. *Fries Obs.* 2. p. 75.

c. pileo umbrino &c. Ag. spadic. *Batsch. El.* f. 16. A. turb. inquinatus. *Pers. l. c.* p. 294.

Mollis, insipidus; sed junior valde compactus, leviter americanus. Stipes nunc marginato-bulbosus, nunc inter muscos humidos subaequalis, 3 unc. circiter, fibrillosus. Pileus etiam depresso, 2-3 unc latus. Lam. subtenues, denum cinnamomeæ. Ubique, sed praesertim in silvis abiegnis subhumidis omnium præcocissimus. Jun.-Oct. (v. v.)

18. *A. rufo-olivaceus*, pileo plano viscoso subrufo, lamellis confertis olivaceis, stipite aequali, basi bulboso. — *Pers. syn.* p. 285.

*Magnus, sed difficilis ab aliis determinatus! Stipes 3 unc. firmus. Pileus demum depresso, 4 unc. latus, "variat stramineus, olivascens" A. S. p. 156. Lam. antice latiores, 3 lin. Mihi in ericetis raro; locis similibus & pinetis v. gr. Lusatiae ubique nimius. In Amer. boreali. Torrey. Aug.-Oct. (v. v.)*

19. *A. callochrous*, pileo æquali lævi viscoso, lamellis confertis violaceo-purpureis, stipite bulboso & violaceo albido. *Spreng. Mant. 1. p. 16.*

a. carne fracta stipiteque subtenui purpureo-violaceis. *A. purpurase. Fr. Obs. 2. p. 68. A. porphyrop. A. S. p. 153. A. subpurpurascens. Batch. C. 1. f. 74. A. badius? Pers. syn. p. 279.*

b. carne stipiteque albidis. *A. callochrous, A. decolorans. Pers. syn. p. 282, 283. Obs. 1. p. 52. A. call. Fries l. c.*

Inodorus, insipidus, colore lamellarum eleganti sat persistenti, demum vero cinnamomeo mox dignoscitur. Stipes solidus, longus, nunc marginato-bulbosus, nunc tantum attenuatus. Pileus non compactus, planiusculus, 1-3 unc., variat pallidus, argillaceus, luteus, lilacinus, purpureus, (*A. hamatus Schum. p. 350 nullo recedit charactere*), fu- scescens, badius, lividus; coelo sereno, ut in omnibus! siccus. — a. junior est forma, tempestate plu- via nata; jam post aliquot siccus dies minus suc- cosa. *In dumetis, silvis, pratis &c. Aug.-Oct. (v. v.)*

20. *A. decoloratus*, pileo æquali lævi viscoso, lamellis confertis fugacissime cæsiis subargilla- ceis, stipite subbulboso albo.

Colore lamellarum numquam purpurascenti et pilei, qui mihi constans albidus l. argillaceo-albus visus, a prioribus distinguitur. Succosus, minor; caro et stipes numquam coerulescentes. *In pinetis montosis, raro. Sept. Oct. (v. v.)*

21. *A. glaucopus*, compactus, pileo subolivaceo-fu- ligineo, juniori viscoso, demum rivuloso-inæqua- bili, lamellis coerulescenti-argillaceis, stipite exasso coerulescenti,

*A. glauca*, Schæff. t. 53. Sowerb. t. 223. Pers. syn. p. 282. Swartz l. c. 1809. p. 83. *A. araneos*. Bull. t. 96.

Magnus, compactus, insipidus, plerumque gregarius. Stipes 2-3 unc. longus, i unc circiter crassus, junior sublanatus, e cœruleo-albus. Pileus 2-5 unc. latus, colore varius, margine saepius cœruleo-scente villoso. Lam. non tenues, serrulatae, demum cinnamomeæ. In silvis, ericetis *Eg. vulgaris*. Aug.-Oct. (v. v.)

23. *A. varius*, firmus, pileo luteo subsquamoso, humido viscoso lamellis confertis serratis albo-cæsiis, stipite attenuato albo.

*A. varius*. Schæff. t. 42. Pers. Comm. p. 17. *A. subgranulata*, Batsch. El. f. 22. male. *A. turbinatus*, Sowerb. t. 102. Swartz l. c. 1808. p. 19. *A. glaucop.* var. Pers. syn. p. 282. *A. pachypus*. Holmsk. 11. t. 39. Schum. p. 322. *A. multiformis*. Fries Obs. 2. p. 63.

b. *A. truncatus*, Schæff. t. 251.

Quoad statuam omnium maxime variabilis, ut *A. anomalus*; sed color sat constans. A præcedentibus differt stipite numquam cœruleo-scente. Lam. juniores pallide, albæ "purpurascentes" Schæff., demum dilute argillaceo-cinnamomeæ. Stipes brevis et elongatus, marginato-bulbosus et subæqualis, laevis et squamosus etc. etc. Apparent certe hujus monstrositates variis locis in mycologorum scriptis, quæ o descript. numquam determinandæ ex gr. *A. pansa*, *balteatus*. Fries Obs. 2. Aug.-Oct. Ubique nimius. (v. v.)

24. *A. turbinatus*, mollis, pileo viscoso laevi flavo fulvo, lamellis confertis integerrimis e flavescenti cinnamomeis, stipite bulboso albo.

Am. Hall. helv. n. 2411. *A. turbinat.* Bull. t. 110. Fries Obs. 2. p. 66. Am. Lam. Enc. 1. p. 106.

b. pileo subrepando. *A. subrep.* Pers. p. 300.

Quamvis color nullo modo violascens, ob totam statuam, substantiam succulentam inter Inc.

Iomata referri debet. Bulbus s<sup>e</sup>pe marginatus, h<sup>e</sup>c vero nota, ut jam satis superque demonstravi, nullo modo constans l. essentiali. Stipes 3-4 unc. longus. Pileus pro more antecedentium demum depresso, 2-3 unc., colore plus minus intenso, siccus nitidus. In Quercetis, fagetis &c. passim. Sept.-Nov. (v. v.)

Species hujus non æque acute ac prioris sectionis distinguuntur. Quæ inquirendarum loco ponendæ essent, aut status vetustos decoloratos (*A. ferruginasc.* Batsch. f. 187 & *A. angustatus* Schum. p. 320) exhibent, aut in plures species (Buxb. Cent. IV. t. 22 & *A. cyaneus* Pers., *A. cœruleescens* Schœff. t. 34. — potissimum *A. callochroa* formæ!) quadrant.

---

## Trib. XX. PHLEGMACIUM.

CHAR. Velum viscosum, tenue, fugacissimum, in fila arachnoidea s<sup>e</sup>pe solutum. Stipes solidus, firmus, attenuatus. Pileus carnosus, convexus, mox planus, levis, firmus, siccus nitidus, junior et irrigatus viscosus. Caro alba, succulenta. Lamellæ adnate, subdecurrentes, subconfertæ. Color numquam cœruleescens; pileus lutescens, stipes albidus.

Obs. Nomen, a Κλεψυχ πιπίτα, analogiam cum Limacio, Myxacio et Gompho indicabit. Fungi terrestres, firmi, persistentes, in cibariis haud accepti. (Var. *A. varii*.)

**1.** *A. saginus*, pileo obtuso luteo, lamellis decurrentibus pallidis, stipite subbulboso flavente.

Valde gregarius, subæspitosus. Stipes 3 unc. longus. 1 unc. crassus et ultra, fibrillosus, intus molliusculus. Pileus subirregularis, 4-5 unc. latus. Lam. 3-5 lin. late, minus conferta, margine erosulae, sordide (olivascenti?) pallidæ dein cinnamomeæ. In pinetis densis muscensis Smolandiaæ superioris. Jul. Aug. (v. v.).

2. *A. coruscans*, pileo obtuso ochraceo-luteo, lamellis dente decurrentibus ochraceis, stipite æquali albo.

Subgregarius. Stipes 3-6 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, fibrillosus, striatus. Pileus regularis, deum depresso, 4 unc. circiter latus. Lam. confertissime, 1-2 lin. latæ, lineares, integerim, late ochraceæ. Odor l. sapor nullus. *Locis nemorosis, raro. Aug.-Sept. (v. v.)*

3. *A. vibratilis*, oolidus, pileo fulvo-luteo, lamellis pallidis, stipite molli niveo basi incrassato.

Nulla cum A. vario affinitas. Magnitudo valde variat; substantia mollis; odor et sapor peculiares. Stipes longus, 2-4 unc. longus, saepe incurvus et flexuosus. Pileus disco carnosus, margine tenuis patens, passim late obtuse umbonatus, levis, 1-2 unc. latus, vere viscosus; exsiccatus nitens, expallens. Lam. pileo dilutiores, tenues, adnatae, raro subdecurrentes, confertæ, ochraceæ l. dilute cinnamomeæ; variant emarginatae. *In pinetis Sueciae vulgaris; fagetis passim. Aug.-Nov. (v. v.)*

## Trib. XXI. DERMOCYBE.

Cortin. & Gymnop. sp. Pers. syn. l. c.

CHAR. Velum siccum, araneosum, fugacissimum. Stipes subæqualis, nec vere bulbosus, fibrilosus, firmus, in junioribus farctus, dein sèpius cavus. Pileus plus minus carnosus, immo submembranaceus, margine tenuis, e convexo l. conico-expansus, subumbonatus, fibrillis (raro glutine) vestitus. Lamellæ inæquales, latiusculæ, subconferte. Color varius.

Obs. Tribus a Δερμ. & κυβη dicta, Clitocybi analogæ, varia. Fungi persistentes, medii & minores, vix cibarii. Subtribus sequentes:

1. RAPHANOIDEI. Pileus squamulis l. fibrillis innatis. Stipes pileo concolor l. dilutior. Terrestres.
2. LEUCOPODII. Pileus glaber, sed fibrillis superficialibus obductus. Stipes albus. Terrestres.
3. LYSIOPHYLLI. Pileus viscidulus l. villosus. Lam. liberae. Epiphyti.
4. LIGNATILES. Pileus glaber, siccus, Lam. adfixe.

Subtr. I. RAPHANOIDEI.

Differunt a Leucopodii stipitis indole, pilei superficie odore et sapore plerumque Raphani — et facillime ex habitu. Telamoniae † † proprie-  
huc pertinent, sed velum contextum, stipes subbul-  
bosus, lamellae distantes.

\* *pileo carnoso, primo convexo.*

1. *A. callisteus*, pileo carnoso subobtuso minute squamoso fulvo, lamellis subdecurrentibus stipiteque farcto subbulboso flavis. Fr. 2. p. 51.  
Affinis *A. limonio*; similis *A. sulphureo*. Stipes 2-3 unc. longus, 3-5 lin. crassus, firmus, de-  
mum fulvescens. Pileus 2 unc., absque facie seri-  
cea. Lam. lat., subconfertæ, arcuato-decurrentes.  
*In pinetis montosis. Sept. Oct. (v. v.)*

2. *A. bolaris*, pileo carnoso obsolete umbonato ru-  
fescente, squamulis maculæformibus obscuriori-  
bus, lamellis subdecurrentibus, stipite æquali  
variegato.

*Pers. syn. p. 291. Fries Obs. 2. p. 52.*

- Elegans Stipes 2-3 unc. longus, 3-5 lin. cras-  
sus, apice albidus. Pileus 1-3 unc., convexus, epi-  
dermide rupta flavescentia. Lamellæ admodum con-  
fertæ, testaceo-cinnamomeæ. *In fagetis, non raro.*  
*Aug.-Oct. (v. v.)*

3. *A. purpureus*, pileo carnoso obtuse umbonato squamuoso stipiteque brevi æquali coccineo-  
rubris, lamellis adnatis obscurioribus.

*Bull. t. 598, f. 1. Pers. syn. p. 290. Dec. fr. 2, p. 197.*

Eximie pulcher, odore pro more Raphani. Stipes 1  $\frac{1}{2}$  - 2 unc. longus, 3-4 lin. crassus, firmus; intus navescens. Pileus junior campanulatus, dein expansus, 2 unc. et ultra, margine subsericeus. Lam. subinde decurrent, 3 lin. latæ, detritæ obscure puniceæ. In fagetis v. gr. Smålandiæ. Sept.-Nov. (v. v.)

4. *A. sanguineus*, pileo leviter carnoso subsquamuloso stipiteque tenui æquali obscure sanguineis, lamellis adfixis obscurioribus.

*A. santal.* Scop. p. 444. *A. sanguin.* Wulf. in Jacq. Coll. 2. p. 107. t. 15. f. 3. Sowerb. t. 43. Pers. syn. p. 289. Fries Nov. Suec. p. 13. *A. rubens*, Bolt. t. 56.

Colore unice a sequente tenuiore distinguendus. Stipes pro more junior farctus, dein cavus; lamelleæque nunc adnatæ, nunc emarginatæ. Pileus convexus, uncialis l. parum ultra. In fagetis, abiegnis &c. frequens. Jun.-Nov. (v. v.)

5. *A. cinnamomeus*, pileo leviter carnoso obtuse umberato sericeo subcinnamomeo, lamellis adfixis confertis, stipite tenui æquali lutescente.

a. *semisanguineus*, firmior, lam. nitidissimis sanguineo-ruberrimis (Pileus cinnam., helvolus &c.) Am. Hall. n. 2447. *A. cinnam.* Linn. Suec. 1205.

*A. sanguin. medius.* A. S. p. 158.

b. *cinnamomeus*, firmior, pileo lamellisque rubro-cinnamomeis. Bolt. t. 150. Sowerb. t. 205. Pers. syn p. 297. Fries Obs. 2. p. 35. *A. betulin.* Scop. p. 445.

c. *conformis*, pileo helvolo-cinnamomeo, lam. nitidis croceo-fulvis! Mich. t. 75. f. 4. *A. toment.* Hoffm. t. 2. f. I.

d. *croceus*, medius, lamellis flavo-eroceis. (Pileus colore variat.) Hall. helv. n. 2431. *A. icterin.* Scop. p. 439. *A. croceus.* Schæff. t. 4. Pers. syn. p. 297. Swartz l. c. 1808. p. 19. *A. squamulosus.* Batsch. f. 117. *A. iliopodius.* Bull. t. 586. fig. inf.

e. *pileo stipiteque luteis*, lam. flavis. Vail. t. 12. f. 12-14.

f. *paludosus*, pileo squamuloso olivascente, lamellis stipiteque olivaceis — aliaeque.

Hoc sub nomine junxi seriem formarum constantium (*Inolom. phlegmacioiosa* vix magis diffe-

runt, sed maxime affinum. Stipes 3 unc. longus, 2-3 lin. crassus, fibrillosus, æqualis, demum cavus. Pileus planiusculus, obsolete squamosus, 1-3 unc. latus. Lam. latæ, nitidæ. In silvis ubique; etiam locis paludosis &c. Jun.-Dec. (v. v.)

6. *A. Raphanoides*, subolivaceus, pileo leviter carnoso obtuse umbonato sericeo, lamellis adfixis minus confertis, stipite farcto deorsum incrassato.

*Mich. t. 75. f. 2. — Pers. syn. p. 524. A. S. p. 170.*

Præcedenti affinis. Stipes 3 unc. longus, 4 lin. crassus, subascendens, fibrillosus, basi villosus. Pileus humidus fuscescenti —, siccus lutescenti-olivaceus, junior convexus, dein explanatus, 2 unc. latus. Lam. latæ, obscuriores, variant pro more adnatae et emarginatae. In fagetis, pinetis passim. Jul.-Oct. (v. v.)

*B. venetus*, pileo irregulari demum subdepresso tomentoso flavo-viridi, lamellis ex olivaceo-ferrugineis, stipite subcavo inæquali. *Fries Obs. 2. p. 76.* (v. v.)

7. *A. depexus*, pileo leviter carnoso obtuso fibriloso testaceo-pallido, lamellis adfixis croceis dein ferrugineis, stipite æquali pallido.

Stipes sæpe adscendens, 2-3 unc. longus, 2-4 lin. crassus, apice nitens. Pileus demum umbonatus, sericeus, 1-2 unc. latus, isabellino-flavus etc. Caro alba. Lam. minus confertæ. latæ; variant emarginatae. — b. *A. subsquamulosus*. Batsch. f. 191. sec. Fr. Obs. 2. p. 54. *Rarius in silvis. Aug.-Oct. (v. v.)*

\* \* pileo subcarnoso, primo campanulato.

8. *A. hemitrichius*, pileo subcarnoso dein acute umbonato canescens-tomentoso, lamellis adnatis argillaceis, stipite pallido. *Pers. syn. p. 206.*

Gregarius; odore Raphani, sapore amaricante. Stipes farctus, dein cavus, 2-3 unc. longus, 2-3 lin. crassus, subnitens, etiam albo-squamosus. Pileus

junior fuscescens, dein fusc-lutescens, expallens, uncialis, Lam. confertæ, late, serratae, dein cinnamomeæ. In pinetis, fagetis, pratis muscosis &c. pas- sim. Aug.-Nov. (v. v.)

9. *A. flabellus*, pileo subcarnoso dein obtuse um- bonato sericeo, lamellis adnatis olivaceo-ferru- gineis, stipite undulato floccoso pallido.

Odor fortis; sapor Raphani. Stipes 3 unc. lon- gus, 2 lin. crassus, e farcto cavus; floccis fibrillo- sis adpressis albis squamosus etc. ut *A. flexipedis*. Pileus  $\frac{3}{4}$  - 1  $\frac{1}{4}$  unc. latus, obsolete fibrillosus, hu- midus olivaceo-fuscus, siccus alutaceus. Lam. con- fertæ lineares. In pinetis Smolandice montosis; fa- getis Scaniae. Sept. Oct. (v. v.)

10. *A. iliopodius*, subcinnamomeus expallens, pileo subcarnoso dein umbonato, lamellis adnatis la- tis, stipite æquali tenui.

*A. iliopod.* Bull. — sed diversissimos admiscet. For- mæ: *A. dulcamarus* & *cervicolor*. Pers. syn. p. 324, 325.

Proteus in hac subdivisione, ut *A. cinnamo- meus* in priori; sed hujus formæ infinitæ undique confluentes seorsim proponi nequeunt. Olidus, sa- pore Raphanoideo accedens. Stipes e farcto cavus, 2-4 unc. longus, 1-2 lin. crassus, basi præcipue fi- brilloso-squamosus, cinnamomeus, siccus pallidus; raro fuscus, lilacinus etc. Pileus expansus subacu- te umbonatus,  $\frac{3}{2}$  - 1 unc. latus, subsericeus, etiam- rimosus et squamulosus, humidus margine striatus, siccus alutaceus livis; variat fuscescens, cervinus etc. Lam. latæ, juniores pallide, dein obscure cin- namomeæ. In Quercetis, fagetis, ubique; pinetis raro. Jul.-Nov. (v. v.)

11. *A. Cucumis*, pileo subcarnoso dein umbonato glabriasculo purpureo-fusco, lamellis adfixis ventricosis ferrugineis, stipite fusco.

*A. nigripes*. Sowerb. t. 344. *A. cucumis*. Pers. Obs. 1. p. 45. Syn. p. 316. *A. S.* p. 166, Fr. Obs. 2. p. 40.

Cognatus priori. Odor fere cucumeris. Stipes farcto cavus, 2-3 unc. longus, 1-2 lin. crassus. Pileus uncialis et ultra, acute umbenatus, fuscus etc. Lam. etiam secedunt. Major, pileo obtuso umbonato, 2 unc.; stipite crasso etc. in humidis pineti. Cum priori. Aug.-Oct. (v. v.)

12. *A. urens*, pileo subcarnoso obtuso glabriuscule, lamellis adnexis ferruginea, stipite longo pallido.

*Bull. t. 528. f. 1. Pers. syn. p. 333. Dec. fr. 2. p. 185.*

Sapor sec. nomen urens videtur. Stipes farctus, 4-5 unc. longus, 2 lin. crassus, maculatus, basi villosa subincrastata. Pileus 1  $\frac{1}{2}$  - 2 unc. latus, humidus — ?, siccus pallidus. Lam. confertæ, 1  $\frac{1}{2}$  lin. latæ. Inter folia decidua Gallicæ. (v. ic.)

\* \* \* pileo submembranaceo, primo subconico. (*A. decipiens*.)

13. *A. detonsus*, pileo submembranaceo dein obtuso umbonato glabriuscule subalutaceo, lamellis adnexis croceis, stipite longo pallido.

Statura prioris, affinis *A. hemitricho* etc. Subfragilis, odore Raphani. Stipes 3-4 unc. longus, 2 lin. crassus, sursum leviter attenuatus, basi villosus. Pileus subhemisphæricus, 1  $\frac{1}{2}$  unc. latus, testaceo-alutaceus, expallens. Lam. latæ, subdistantes, demum obscure testaceæ. In silvis humidis inter Polytricha. Sept.-Nov. (v. v.)

14. *A. saniosus*, pileo submembranaceo dein obtuso umbonato glabriuscule lamellisque ventricosis testaceis, stipite deorsum sanguineo sublactescente.

*A. crocatum* revocat; sed cum seqq. *A. helvolo* subaffinis. Stipes subfarctus 3 unc. longus, 1 lin. crassus, subtortus, compressus liquorem sanguineum fundit. Pileus  $\frac{1}{2}$  unc. et ultra, subconvexus, levis. Lam. latæ, sinuate-adfixæ, minus confertæ. In silva abiegnæ colliculosa semel. Sept. (v. v.)

15. *A. acutus*, pileo submembranaceo dein acute umbonato ferrugineo, sicco ochraceo, lamellis adnatis linearibus, stipite tenui æqualis;

Pers. syn. p. 316. Fries Obs. 2. p. 37.

Gregarius, tenuis. Stipes dein fistulosus, 3-5 unc. longus, 1-2 lin. crassus, æqualis; pileo concolor, siccus albidus. Pileus humidus striatus, siccus laevis,  $\frac{1}{2}$  unc. latus; Lam. angustæ, subdistantes; obscure ochraceæ. "Umbonem nigrum" A. S. p. 166 non vidimus. Locis humidis silvarum, copiose. Aug.-Nov. (v. v.)

16. *A. obtusus*, pileo submembranaceo obtuse umbonato ferrugineo, sicco ochraceo-alutaceo, lamellis adnatis latis, stipite brevi.

Priori affinis, nec cum *A. leucopodæ* commixtus. Gregarius, parvus, subolidus. Stipes dein cavus, subventricosus, 2 unc. longus, 3 lin. crassus, mollis, fragilis, fibrillosus; pileo dilutior siccus albus; velum subinde contextum. Pileus 1-2 unc. latus, mollis, campanulatus; humidus dilute cinnamomeus, margine striatus. Lam. 2-4 lin. latæ, non confertæ, dilute cinnamomeæ. In pinetis, jove plus raro, abunde. Aug.-Oct. (v. v.)

### Subtr. 2 LEUCOPODIÆ.

CHAR. Velum sericeum, album; Stipes albus, raro violascens. Pileus politus, glaber, sed fibrillis superficialibus (veli) recedentibus passim obductus. Odor non Raphani, subnullus. (*A. turbinatus*.)

- i. *A. vespertinus*, pileo carnoso obtuso molli-luteo, lamellis emarginatis, dein cinnamomeis, stipite longo subtenui basi incrassato.

Proximus *A. turbinato* et vibratili, colore at substantia molli laxa Phlegmatorum. Stipes solidus, 3-6 unc. longus, 1-4 lin. crassus, basi leviter incrassatus villosus. Pileus convexus, dein planus,

glabriusculus; colore pallescente. l. ochraceo-flavo. Lam. latissimæ, confertæ. In Quercetis Scaniae. Sept.-Nov. (v. v.)

2. *A. ochroleucus*, pileo carnoso subobtuso albo-pal-  
lescente, lamellis subliberis argillaceo-ochra-  
ceis, stipite subventricoso firmo.

Pers. syn. p. 295. — Schæff. t. 54.?

Odor nullus, sed sapor amaricans. Stipes 3 unc.  
longus, 4-5 lin. crassus, apice e cortina fibrillosus,  
albus. Pileus disco præcipue carnosus, ut in sequ.,  
campanulato-convexus, dein obtusissime umbona-  
tus, 2 unc., sub lente obsolete sericeus. Lam.  
juniores leviter adnexæ, postice latiores, confertæ,  
3 lin. latæ, demum cinnamomeæ. In Quercetis &c.  
infrequens. Sept.-Nov. (v. v.)

3. *A. subferrugineus*, pileo carnoso glabriuscule fer-  
ragineo testaceo, lamellis emarginatis subdi-  
stantibus fulvo-ferrugineis, stipite inæquali  
pallido. Fries Obs. 2. p. 62.

Medius inter A. bivelum et armeniacum. Sti-  
pes subnudus, sape curvatus, non albus. Pileus  
plerumque obtusus, margine tenuis, lamellæ quo-  
latæ, opacæ, nec nitidæ. Variat uti sequ. In silvis,  
passim. Aug.-Oct. (v. v.)

4. *A. armeniacus*, pileo subcarnoso dein obtuse  
umbonato fulvo-cinnamomeo expallente, la-  
mellis confertis cinnamomeis, stipite farcto  
sursum attenuato albo.

*A. helvolas*. Bull. t. 531. *A. armeniac*. Schæff. t. 81.  
Pers. syn. p. 299. *A. S.* p. 161.

*b.* pileo badio, ferrugineo &c. *A. badius* & *castaneus*.  
Schum. p. 326, 327, (sæpe cum *A. castaneo* confusus). Fries Obs. 2. p. 44. Bolt. t. 10.

Multiformis, subolidus. Stipes submollis, fi-  
brillosus, 2-3 unc. longus, apice subinde violascens,  
Velum rarius contextum. Pileus campanulatus,  
mox convexus expansus, margine tenui patente, 2-4  
unc. latus, humidus, nec viscosus, exsiccatus hel-

volo-alutaceus etc. Lam. distincte, 2-3 lin. latæ, juniores aquose cinnamomeæ. 1. *Vægrandis*, pileo obtusissimo umbonato, stipite conico 1-2 unc. crasso. 2. *medius*. 3. *tenuis*, pileo acutiuscule umbonato, stipite elongato 2-3 lin. crasso. *Ubique in silvis* 1. *inter folia Pini*. 3. *locis muscosis humidis*. *Jul.-Nov.* (v. v.)

*B. falsarius*, pileo subobtuso humido lamellis que ventricosis flavescentibus, stipite obeso duro.

*γ. A. dilutus*, rigidus, expallens, pileo subobtuso, lamellis latiæ dente decurrentibus. *Pers. syn. p. 300. In pinetis.* (v. v.)

5. *A. lucidus*, ferrugineus, pileo carnoso obtuso unibonato nitente, lamellis decurrentibus obscurioribus, stipite farcto subincurvo.

*A. lamproc.* *Bull. t. 544. f. 2. A. luc.* *Pers. syn. p. 299.*

Priori valde affinis; subcæspitosus. Stipes 2  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 3-4 lin. crassus. Pileus 2  $\frac{1}{2}$  - 3 unc. latus. Lam. latiusculæ. *In Gallia.* (v. ic.)

*A. nitidulus* *Dec. fr. 6. p. 50.* pileo fulvo-luteo nitente, lamellis liberis, stipite æquali prioribus videtur magis affinis.

6. *A. tortuosus*, pileo subcarnoso dein umbonato ferrugineo expallente, lamellis adnatis latiæ fulvis, stipite subcavo torto argenteo.

Stipes fragilis. 3-4 unc. longus, 3 lin. crassus; striatulus, basi haud incrassatus. Pileus 2 unc., tenuis, fragilis, siccus ochraceus etc. Lam. 2-3 lin. latæ, subconfertæ, detritæ purpurascentes l. obscure sanguineæ. *In silvis abiegnis montosis subuliginosis.* *Sept. Oct.* (v. v.)

7. *A. castaneus*, pileo subcarnoso convexo dein obtuse umbonato castaneo, lamellis adfixis confertis e violascenti-testaceis, stipite brevi firmo.

*Bull. t. 268, 527. f. 2. Pers. syn. p. 298. A. S. p. 161.*

*Fr. Obs. 2. p. 42. exsl. var. *A. leucopesus*, Holmsk. II. t. 37.*

Gregarius, inodorus, sat firmus, edulis. *Pers. Ch. com.* Stipes junior pro more farctus, dein cavus, rigidus, 1-2 unc. longus, 2-4 lin. crassus, fibrillosus, albus, subviolascens. Pileus subglaber, late et obtuse umbonatus, coloris intensitate varius, expallens testaceus etc. Lam. ventricosæ, purpurascentes; variant adnatæ. *Ubique ad terram; copiose in fagetis, quercketis &c. Jul.-Nov. (v. v.)*

*B.* *A. cæsius*, pileo depresso obtuso castaneofusco, lamellis adnatis aquose cinnamomeis, stipite gracili etc. *Fl. Dan. t. 1010 (v. v.)*

8. *A. decipiens*, pileo submembranaceo umbrino, umbone conico nigrescente, lamellis adnatis cinnamomeis, stipite tenui pallido.

*Pers. syn. p. 298. Fries 2. p. 42. (A. mammosus. Linn. Succ. 2. n. 1218. desc. ad p.)*

Gregarius. Stipes junior farctus, 3-4 unc. longus, 1-2 lin. crassus, tenax, albus, superficie sæpe undulata. Pileus subglaber, etiam dilute castaneus, 1 unc. fere latus. Lam. confertæ, 2 lin. latr. *In silvis & pratis muscosis, vulgaris. Aug.-Nov. (v. v.)*

9. *A. leucopus*, pileo subcarnoso dein acute umbo-nato helvolo, sicco alutaceo, lamellis subliberis cinnamomeis, stipite æquali candido.

*Bull. t. 533. f. 2. Dec. fr. 2. p. 193. Pers. syn. p. 533.  
Fries Obs. 2. p. 39. exel. g.*

Stipite candido insignis, qui junior farctus, dein cavus, uncialis et ultra. Pileus conicus, dein expansus, uncialis fere Lam. ventricosæ, dilute cinnamomeæ, sed pileo expallente obscuriores. *In pinetis. Sept. Oct. (v. v.)*

10. *A. pluvius*, pileo submembranaceo campanula-to helvolo-pallido viscidulo, lamellis adnatis pallidis, stipite molli albo.

Stipes farctus, 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 2-3 lin. crassus, glaber, raro basi incrassatus. Pileus valde te-

pnis, disco tantum carnosulus, obtusus, glaber, non expansus,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. latus. Lam. adscendentes, postice arcuatæ. In abiegnis muscosis roridis, raro. Sept. (v. v.)

### Species inquirendæ subtr. 1 & 2:

1. *Monomyces aromatics*. Batt. t. 21. T.
2. 3. *Mon.* &c. Batt. t. 19. L.; 9. B.
4. *A. Zinziberatus*. Scop. p. 455. olidus, flavus.
5. *A. sideroides*. Bull. t. 588. similis *A. acuto*.
6. *A. holosericeus*. Plan. Erf. p. 17.
7. *A. rigens* Pers. syn. p. 283. Pileus glaber, 2 unc. & ultra, pallidus-albus. Lam. subdecurrentes. Stipes longus basi bulbosa.
8. *A. decumbens*. Pers. l. c. p. 286. Fries Obs. 2. p. 49. Pileus albidus. Stipes adscendens, bulbosus. Species non, sed affinitas dubia.

Apud Halier, Scopoli &c. species mance descriptæ restant. Sic ex. gr. *A. albipes* Scop. in plures e Leucopodiis, *A. filamentosus* Ejusd. in Raphanoideos varios, *A. trignus* Ejusd. in *A. limonium*, *A. rigidus* & *longipes* in *A. iliopod*, &c. quadrare possent.

### Subtr. 3 LYSIOPHYLLI.

CHAR. Velum fugacissimum. Stipes subcavus, æqualis Pileus leviter carnosus, obtusus, viscosus l. villosus. Lam. liberæ, ventricosæ, confertæ. Odor nullus. Plurimi epiphyti.

1. *A. barbatus*, pileo lœvi stipiteque longo viscosie candidis, lamellis ochraceo-fulvis. — Batsch. El. p. 163. f. II.

Stipes cavus, 3 unc. longus, 3 lin. crassus, basi villosus Pileus planiusculus, 1  $\frac{1}{2}$  unc. latus. Lam. rotundatae. In silvis, locis humidis. (v. ic.)

2. *A. semiglobatus*, flavidus, pileo lœvi, lamellis latissimis, stipite brevi striato. *A. S.* p. 169.

Stipes tenuis, uncialis, strictus. Pileus carnosso-membranaceus, hemisphæricus, subviscosus,  $\frac{3}{4}$  lin. latus. Lam. postice truncatae, subconvexæ. In pinetis siccis Lusatiae. Sept. (In arvo similem vidi.)

3. *A. croceo-caeruleus*, pileo lævi dilute violaceo, lamellis emarginatis, stipite glabro albo.

*Pers. ic. & descr. t. 1. f. 2. Syn. p. 341. Fr. 2. p. 85.*

Stipes cavus, 2 unc. longus, 2-3 lin. crassus. Pileus leviter carnosus, convexo-planus, subviscosus. Lam. croceæ. *In fagetis umbrosis, Sept. (v. v.)*

4. *A. reticulatus*, pileo reticulato dilute violaceo, lamellis rotundatis, stipite fibrilloso albo.

*Pers. ic. & descr. t. 4. f. 4-6. Syn. p. 341.*

Stipes fistulosus, fragilis, apice striatus. Pileus tenuis, subviscosus, disco demum umbilicatus nigrascens, 1-2 unc. latus. Lam. dilute croceæ. *Ad truncos Fagi &c., locis montosis. Aug. Sept. (v. v.)*

5. *A. aleuriatus*, pileo tenui livido, margine striato, lamellis rotundatis, stipite pulverulento, albo. *Fr. Obs. 1. p. 49. excl. syn.*

Proximus priori; totus fragilis, tenuis. Stipes fistulosus, 2 unc. longus, 1 lin. crassus. Pileus obtusus, planiusculus, haud uncialis, valde viscosus; variat cæsius et roseus, etiam ellipticus (*A. ellipticus Pers. syn. p. 406.*) Lam. vere liberae, croceo-argillaceæ. *Cum priori, sed frequentior. Jul.-Oct. (v. v.)*

6. *A. ephelbeus*, pileo villoso purpureo-violaceo, lamellis rotundatis, stipite farcto albo. *Fries 2. p. 187.*

*A. villosus. Bull. t. 214. Dec. fr. 2. p. 189.*

Stipes 2 unc. longus, 2-3 lin. crassus, incurvus. Pileus campanulatus, expansus, 1-2 unc. latus, minus tenuis. Lam. ochraceæ. *Cum prioribus, raro. Sept. (v. v.)*

Statuta, substantia, pileus, lamellæ, locus &c. eximis am cum *Hyporhodiis Pluteis* indicant analogiam (color vero Leptoniæ). Cf. *A. ephebeum* & *hispid.*, *A. aleuriat.* & *nanum*, *A. reticulatum* & *phleboph.*, *barbatum* & *Prunuloidem &c.*

## Subtr. 4. LIGNATILES.

CHAR. Vellum fugacissimum. Stipes firmus, subæqualis, radicatus. Pileus carnosus, obtusus, siccus, glaberrimus. Lam. adfixæ. Color lutescens &c.

Obs. Habitus potius DERMINI, quam CORTINARIAE, sed lamellis et sporidiis dignoscuntur. Fungi medii, gregarii, subcæspitosi, persistentes, subamaricantes, lignatiles, valde varii hinc duas modo attuli species, sensu latiori sumtas. Cf. *Flammulas*.

\* 1. *A. sapineus*, pileo carnoso lutescente, lamellis adfixis albido-flavis, passim fulvo-cinnamomeis, stipite subfarcto striato pallido.

*A. penetrans*. Fries Obs. 1. p. 23. *hujus forma*.

Admodum variat. Solitarius l. subcæspitosus. Stipes subæqualis, 2 unc. circiter longus, 5-5 lin. crassus, dein cavus, fibriloso-striatus, basi albido-vilosus. Pileus convexus, dein planus, obtusus, 1-2 unc. et ultra, proprie lævis, sed saepe rimosus diffracto-squamulosus!; variat aurantiacus, fulvus etc. Caro pallida, subamarata. Lam. 2-3 lin. latæ, demum passim fulvo-cinnamomeo-maculata, nec more consueto decolorantes. Ad trunco Pini, abunde, Mayo-Nov. (v. v.)

B. *A. hybridus*, pileo convexo humido aurantiaco l. fulvo, lam. luteis, stipite subcavo.

Sowerb. t. 221. Swartz, l. c. 1809. p. 90. Fr. Obs. 2. p. 312

Pileus magis carnosus; colores saturiores. (v. v.).

\* 2. *A. picreus*, cæspitosus, pileo leviter carnoso lævi cinnamomeo, lamellis tenuibus luteis, stipite fistuloso umbrinæ.

Pers. ic. & deser. p. 14. t. 4. f. 7. Syn. p. 515. A. S. p. 165. Fries Obs. 1. p. 28.

Formæ minores A. campanellam fere referunt, vapor amaricans, sed etiam mitis. Stipites tenues, subpruinosi, demum compressi. Pileus e campanulato convexus, lævis, variat rufus, badius, fulvus.

cinnamomeus. Legi varietatem ferrugineo-luteam, lam. subdecurrentibus, sporidiis ferruginascentibus. *Ad truncos pineos, ubique. Jul.-Nov. (v. v.)*

Dubius: *A. incurvus*, pileo carnoso demum infundibuliformi flavo-ferrugineo, lamellis decurrentibus stipiteque fareto inaequali pallidioribus. Schæff. t. 65. *A. testaceus*, With. p. 176; *A. flavidus*, Sowerb. t. 366;

### Series quarta.

#### Trib. XXII. PHOLIOTÆ.

Lepiotæ & Gymnopi spec. Pers. l. c.

CHAR. Velum siccum, annuliforme, nunc membranaceum, nunc floccoso-radiatum: Stipes teres, subsquamosus, vix bulbosus. Pileus convexus, demum planiusculus, non umbilicatus. Lamellæ, ut in tota serie, inaequales, exsuccæ, decoloratæ. Sporidia ferruginea, raro fulvo-ferruginea:

Obs. Nomen a *Qolias*, squama. Tribus valde variis (distinetas quoque) continet species; sed series ita cohærens, ut subtribus vix admittenda. Spec. 1-4 terrestres, arrhizi, majores, pileo carnoso, lamellis leviter adnexis; 5 lignatilis, radicatus, pileo carnoso lævi, stipite squamoso, lamellis subliberis; 6-11 lignatiles, subcæspitosi, pileo carnoso subsquamoso, lam. adnatis; 12-15 pileo leviter carnoso, stipite fistuloso; 16 est Galera annulata.

\* 1. *A. Vahlii*, aurantio-ferrugineus, pileo carnoso glabro, lamellis liberis, stipite solido lævi, anulo erecto albo-punctato.

Schüm. Sæll. 2. p. 258. Fl. Dan. t. 1496:

Speciosus, amplius, solitarius. Stipes basi incrassatus, 8 unc. usque longus, i unc. crassus, pallidior. Annulus amplius, undulatus. Pileus hemisphæricus, lævis, 3-4 unc. Caro alba. Lam. postice latiores, secedenti-liberae. In Sællandia fageti. Oct. (v. ic.)

2. *A. aureus*, fulvus, pileo carnoso, squamis rario-ribus pilosis, lamellis adnexis, stipite farcto glabro, annulo parvo.

*Matusch. Sil.* p. 331. *Lumn. Pos.* p. 517. *Bull. t.* 92.  
*Sowerb. t.* 77. *Pers. syn.* p. 269. *Swartz l. c.* 1803.  
p. 13.

Magnus, subcæspitosus. Stipes æqualis, 4-5 unc. longus, sepe ascendens, intus fibrosus. Pileus 2-4 unc. latus, convexo-planus, carne sulphurea amari-cante. Lam. olivaceo-pallidæ, dein ferrugineæ. Annulus patulus striatulus. *Ad terram humosam.* Sept. Oct. (v. v.)

3. *A. caperatus*, pileo lacunoso citrino, villo albi-do disco uniformi, marginem versus squamu-loso consperso, stipite solido albo, supra annu-lum reflexum squamuloso.

*Pers. Obs.* 1. p. 48. *Syn.* p. 273. (Pileus ex errore glaber) *Fries Obs.* 1. p. 5 *Fl. Dan.* t. 1675! *A. macropus.* *A. S.* p. 151. *A. incrustatus.* *Schum.* p. 254.  
b. *pallidus.* *A. pudicus.* *Bull. t.* 597. f. 2.

Solitarius, amplius. Stipes validus, 4-5 unc. longus, 1 unc. crassus, æqualis, raro bulbosus. An-nulus magnus, superus, striatus. Pileus convexo-explanatus, 4 unc. latus, disco carnosus, de cetero tenuis. Lam. adfixæ, secedentes, argillaceæ, raro violascunt, ut in *A. collinito*, affini. Ob descr. man-cam Persoonii potius *A. macrop.* Pers. crederes; hunc tamen p. 215 attulimus. *In silvis montosis ubique.* Jul.-Oct. (v. v.)

4. *A. togularis*, pileo carnoso glabro subargillaceo, lamellis rotundatis, stipite cavo glabro, annu-lo reflexo.

*Bull. t.* 595. f. 2. *Pers. syn.* p. 262. *Dec. fr.* 2. p. 206.

Potius prope *A. blattarium* locandus et forsitan *A. præcocis* varietas. Stipes 3 unc. longus, 3 lin. crassus, subæqualis, fragilis, pallidus, annulo albo. Pileus mox planus, 3 unc., pallescens. Caro te-nuis mollis alba. Lamellæ ventricosæ, subliberæ,

pallidæ, dein dilate cinnamomeæ. Inter gramineæ aestate. (v. v.)

\*\* 5. *A. radicosus*, pileo carnoso glabro pallido, lamellis rotundatis, stipite solidò concentricè squamoso, basi incrassato radicato.

*Bull. t. 160. Pers. syn. p. 266. Des. fr. 2. p. 204.*

Nemini affinis, gregarius; odore forti, subdulci, sat grato, sapore peculiari. Stipes firmus, 3-4 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc crassus, albus, intus spongiosus; infra annulum distantem erectiusculum (deum subliberum) squamis erectis floccosis vestitus, apice pruinatus. Pileus convexo-planus, lævis, subsiccus, 3-5 unc., subargillaceus, dein e sporidiis ferrugineis rufo-maculatus. Lam. subliberæ, confertissime, 3 lin. fere latæ, pallidæ, demum rufescenti-ferrugineæ. In silvis umbrosis, truncis infixus. Oct. (Reftén. 1819. v. v.)

\*\*\* 6. *A. aurivellus*, compactus, pileo luteo, squamis sparsis adpressis, lamellis rotundatis, stipite solidò fibrilloso radicato.

*A. filamentosus. Schæff. t. 209. A. auriv. Batsch. C. I. f. 115. Fries Obs. 2. p. 17. A. villosus. Bolt. t. 42. male. A. squarros. var. Pers. — A. salicinus. Schum. p. 262. var.*

Plerumque solitarius. Radix præmorsa, subvillosa. Stipes durus, longitudine varius, incurvus, subbulbosus, albidos. intus basi rhabarratinus, ipso apice velatus. Velum annulatum l. floccoso-radiatum! Pileus junior hemisphæricus, 2-3 unc., dein explanatus 4 unc. et ultra; variat pallidus, luteus, fulvus. Lam. adfixæ, latissimæ, planæ, oliveo-pallidæ, demum ferrugineæ. Ad trunco Betulae, Salicis &c. Oct. Nov. (v. v.)

β. *A. heteroclitus*, pileo excentrico etc. Fries Obs. 2. p. 223!

7. *A. adiposus*, cæspitosus, pileo carnoso viscoso luteo, squamis concentricis ferrugineis, lamellis primo flavis, stipite squarroso basi incrassato.

*A. squarros., adiposus & imbricatus.* Batsch. f. 31;  
113, 114. *A. squamosus.* Schum. p. 264.

Diversissimus ab *A. squarroso*. Stipites farcti,  
læte flavi, viscidi. Velum subfloccoso-radiatum.  
Pileus squamis superficialibus secedentibus!, valde  
viscidus, nitens. Lam. adnatæ, demum ferrugineæ.  
Plerumque giganteus; vetustus obscurior, absque  
squamis, fere ut *A. macroceph.* Schum. l. c. *Ad*  
*fagos copiose & frequens.* Jul.-Oct. (v. v.)

**S.** *A. squarrosus, cæspitosus, pileo carnosò sicco*  
*croceo-ferrugineo, squamis confertis revolutis,*  
*lamellis olivaceo-pallidis, dein ferrugineis, sti-*  
*pite squarroso, deorsum attenuato.* Fries Obs.  
2. p. 19.

Am. Hall. helv. 2412. *A. floccosus.* Schæff. t. 61. Curt.  
Lond. I. t. 264. *A. squamos.* Bull. t. 266. Dec. fr.  
2. p. 201. *A. squarros.* Fl. Dan. t. 491. male. Pers.  
syn. p. 268. Schum. Sæll. p. 256. Swartz. l. c.  
p. 12.

Magnitudine varius. Odor nunc fortis putri-  
dus, nunc fere nullus. Stipes farctus, velo inte-  
gro l. floccoso-radiato. Pileus obtuso umbonatus,  
squamis minoribus innatis, nec secedentibus. Caro  
flava. Lam. dente decurrent, confertiores. *Ad ra-*  
*dices truncorum, nimius.* Aug.-Dec. (v. v.)

**B.** *A. Mülleri*, pileo obtuso pallido. lam. pal-  
lidis fuscescentibus, stipite æquali. Fl. Dan. t. 831.  
f. 3. (*A. scaber.*)

Præcocior, valde oolidus. Stipites flexuosi, annu-  
lo integro. Pileus albidus etc. : subhumidus, neu-  
tiquam vere viscosus. *In ligno Fagi.* (v. v.)

**y.** *A. reflexus*, pileo cuspidato-umbonato piloso-  
squamoso ochraceo. stipite longo subcavo æquali.

*A. pilosus.* Schæff. t. 80. *A. reflex.* Pers. syn. p. 311;

Utique distinctus; sed *A. squarroso* affinis. Oli-  
dus, Pileus leviter carnosus, subcampanulatus.  
Lam. olivaceo-argillaceæ, dein pallide cinnamomeæ.  
*Loci umbrosis.* Aug. Sept. (v. v.)

9. *A. flammans*, cespitosus, pileo carnoso sicco luteo, squamis pilosis sparsis, lamellis primo flexivis, stipite æquale squarroso.

*A. flammans*. *Batsch. El. f. 50.* [*A. Rheoides. With. arr. 4. p. 214.* *A. rhabarbar. Pers. syn. p. 271.*

Priori minor, elegantior. Stipes farctus, demum cavus, subflexuosus, 3 unc. longus, .2-.3 lin. crassus, flavissimus, annulo integro approximato. Pileus obsolete umbonatus, margine juniori inflexo, dein repando, 1  $\frac{1}{2}$  - 3 unc. latus, squamis concentricis flavis, vix innatis. Lam. subtenues, confertæ, absque dente adnatæ, demum ferrugineæ. Sapor amarus. *Ad truncos pineos, passim. Jul.-Oct. (v.v.)*

10. *A. Junonius*, pileo carnoso obtuso sicco stipite que solido levibus luteis, lamellis adnatis luteo-fulvis.

Solitarius, minor, pulcher. Stipes incurvus, 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 4 lin. crassus, æqualis, subexcentricus. Annulus inferus, reflexus, pileo approximatus, supra quem stipes furfaratus. Pileus glaber, 2 unc. Lam. planæ, confertæ, latiusculæ. *Ad truncos putridos, raro. Oct. (v. v.)*

11. *A. tuberculosus*, gregarius, pileo carnoso obtuso sicco adpresso-squamoso, lamellis primo flavis, stipite cavo subbulboso incurvo.

*Schæff. t. 79. figg. inf.* (reliquæ potius ad *A. caudic.*) *A. curvipes. Pers. syn. p. 312.* absque velo.

Stipes obsolete squamosus,  $\frac{3}{4}$  - 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 2-3 lin. crassus, flavus; variat excentricus et æqualis. Annulus submembranaceus, reflexus, raro cortinæformis. Pileus 1-2 unc. latus, squamis minutis adpresso-squamulosis. Lam. latæ, serrulatæ, emarginatæ, passim flexuosa. *Ad truncos Sorbi, Betulae &c. Aug.-Oct. (v. v.)*

\*\*\* 12. *A. muricatus*, pileo leviter carnoso obtuse fulvo-luteo, squamulis stipatis villoso, lamellis adnatis primo flavis, stipite fistuloso.

- a. regularis, pileo stipiteque squarrosis, annulo distincto. *Fr. Obs.* 1. p. 12. *A. scariosus?* *Witt.* p. 206.
- b. inæqualis, stipite fibrilloso velato. *Batt.* t. 22. **A.** luteus. *Bolt.* t. 50. *A. flammula.* *A. S.* p. 149.
- c. inæqualis, pileo stipiteque cortinato villosis. **A.** limulatus. *Fries l. c.* p. 28,

Distinctissimus, valde varius, solitarius l. cæspitosus. Stipes 1-2 unc. longus, 1-2 lin. crassus, sordide luteus. Velum in a. simile *A. granulosi*. Pileus campanulate-convexus, dein planus, etiam depresso, 1-2 unc. latus, luteus, squamulis minutis obscurioribus. Lam. latè serrulata. *Vulgaris ad truncos varios.* *Jul.-Oct.* (v. v.)

- 13.** *A. mutabilis*, pileo leviter carnoso glabro cinnamonomeo expallente, lamellis subdecurrentibus confertis pallide ferrugineis, stipite fistuloso tenui.

- a. *caudicinus*, cæspitosus, stipite squamoso. Fungi multi &c. spec. 3. *J. Bauh.* XL. c. 33. Ag. 28. *Gled.* p. 131. *Linn. Suec.* 1103. *A. mutab.* *Schaff.* t. 9. *A. xylophilus.* *Bull.* t. 530. f. 2. *A. annul.* *Bull.* t. 543. f. O. *P. A. truncigen.* *Schrink Bav.* p. 598. *A. polymorph.* *Baung. Lips.* p. 618. — *Ellr.* t. 2. f. 3. *A. caudic.* *Pers. syn.* p. 271. *Swartz l. e.* p. 15. *A. ochroleucus.* *Vahl. N. H. S. Skr.* 2. p. 200.
- b. *denuudatus*, subcæspitosus, ochraceo-ferrugineus, stipite fibrilloso lævi. *A. mutabilis* & *marginat.* *Batsch. C. II.* p. 207, 208. *A. acutus.* *Schum.* p. 257. — *Mich. t. 80. f. 7?*
- c. solitarius, minor, pallens, stipite fibrilloso &c. *A. unicolor.* *Schum.* p. 277.

*Eduli.* *Pers. Ch. comest.* Stipites tenaces, æquales, longitudine varii, inferne umbrini, superne pallidi. Annulus distinctus, sed etiam fugax. Pileus planiusculus, siccus alutaceo-pallens, subumbonatus, lævis; rarissime squamosus. Lam. conferter, juniores pallidæ, adnatæ; "sinuatae" *Tratt. Essb. Schie.* p. 50. t. E. Formæ allatæ cum quam plurimis! aliis utique confluunt. — d. minimus solitarius, pileo badio lamellis rotundatis, stipite glabro. *Ad truncos ubique;* b. c. etiam *ad terram.* *Majo-Noi.* (v. v.)

14. *A. erebius*, pileo leviter carnoso ruguloso lurido, lamellis adnatis, stipiteque cavo lævi pallidioribus, annulo subcampanulato.

Gregarius, fragilis, raro solitarius firmior. Stipes basi cohærentes, obsolete adpresso-squamulosi, 2 unc. longi, 3 lin. crassi, substriati, pallescentes. Annulus superus, sulcatus, albus, dein lacertus. Pileus obtusus, 2 unc. latus, glaber, ferruginosus-luridus, expallens, margine striatus. Lam. subdistantes, sordide cinnamomeæ. In graminosis umbrosis, raro. (Lund, Femsjö) Sept. Oct. (v. v.)

15. *A. blattarius*, parvus, pileo subcarnoso glabro ferrugineo expallente, lamellis liberis, stipite fistuloso lævi, annulo reflexo.

Solitarius l. gregarius. Stipes 2 unc. longus, 1 lin. crassus, æqualis, sericeus, albus. Annulus distans, lævis, albus. Pileus planiusculus, disco subumbonato obscuriore lævi, margine striato,  $\frac{1}{2}$ -1 unc. latus. Lam. rotundatae, ventricosæ, aquose cinnamomeæ. In cultis, graminosis &c. Aug. Sept. (v. v.)

- \*\*\*\* 16. *A. Mycenoides*, pusillus, ferrugineus expallens, pileo membranaceo striato, lamellis adnatis, stipite fistuloso lævi, annulo integro.

Gregarius, tenellus, fragilis, pulcher. Stipes vix  $\frac{1}{2}$  lin. crassus, 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, glaber, fulvo-ferrugineus. Pileus campanulatus, mox hemisphæricus, subobtusus, centro subinde obscuriore, glaber,  $\frac{1}{2}$  unc. latus. Lam. planæ, subdistantes, dente decurrente. Annulus albus, persistens ab omnibus Galeris tute distinguit. Occurrit major, pallidior. In paludosis silvaticis. Aug.-Oct. (v. v.)

Cum inter hujus tribus species distinctissimas, exoticas, a me non visas, inserere nolui, specierum inquirendarum numerus ingens evasit. Præcipue plures species pileo lævi in Europa austr. occurrere; nostri vero squarrosi desiderari videntur:

1. Fung. Mich. N. G. t. 30. f. 6. Cæspitosus, rufo-aureus, dein fulvus, lævis, stipite fistuloso bulboso,

2. *Polymyc. tomentosus*, rufus, Batt. t. 10. f. E. Major, stipite solido brevi, annulo angusto.
3. Fung. vagus &c. Batt. t. 8. A. Pileus convexus laevis albidus. Lam. subadnexæ, ex albido-rufæ. Stipes laevis. Huic proximi (Dec. fr. 6. p. 50, 51.) videntur, forsitan mere formæ:
- a. *A. attenuatus*, pileo sordide albo, stipite sursum incrassato apice annulato. Lam. & annulus (e sporiad.) fulvæ.
  - b. *A. cylindricus*, pileo disco fusco, lamellis albidis (juniorib.) stipite æquali, apice annulato. Cum priori ad Salices.
  - c. *A. cortinatus* stipite cavo & cortinato a priori differt, quas vero notas supra sæpe varias vidimus. In Ilicetis.
  - d. *A. cortinellus* differt a priori: stipite basi tomentoso, pileo magis convexo flavente, lam. rufescens.
4. Fung. Batt. t. 9. *D. Suhrifus*, solitarius, pileo tomentoso, stipite valido &c. Ad arbores.
5. A. unicolor. Fl. Dan. t. 1071. f. 1. Habitus A. Mycenoides; sed st pes solidus, lam. liberae &c.
6. A. constrictus. With. p. 190. Ab A. caudicino stipite farcto differre videtur.
- Polymyc.* Batt. t. 6. f. C. D. E., t. II. A. distincti; sed forte Leucospori. Cf. p. 31.

## Trib. XXIII. MYXACIUM.

CHAR. Vellum universale, viscosum, fugax. Stipes farctus, validus, longus, æqualis, mollis, primo velato-ubviscosus, dein protritus in squamas adpressas floccoso-gelatinosas ruptus, a pileo discretus. Pileus plus minus carnosus, campanulato-explanatus, glaber, viscosus. Caro non firma, mueida. Lam. adnatae, facile secedentes, subdecurrentes, non tenues, demum obscure ferrugineæ. *Stipes albus!*

Obs. Nomen a μύξα, mucus. Fungi majores, solitarii, terrestres, mucosi, inodori, non cibarii. Cf. *Flammulas viscosas*.

1. *A. collinitus*, pileo carnoso lœvi aurantio-fulvo; lamellis purpurascentibus, dein ferrugineis, stipite transversim in squamas cœrulecentes getinasas rupto.

*Buxb. Cent. IV. t. 9. A. mucosus. Bull. t. 596. f. 1.!*  
*Dec. fr. 2. p. 200. A. collin. Sowerby t. 9. Pers. syn.*  
*p. 281. Swartz l. c. 1809. p. 83. A. S. p. 154.*

Stipes firmus, 4-8 unc. longus, 4 lin. crassus, et ultra!, tomento adglutinato viscoso, dein in squamas adpressas (rarius albidas i. ferruginea) rupto. Pileus 2-4 unc. latus, obtusa umbonatus, valde glutinosus. Lam. adnatæ, serrulatæ, distinctæ, subconfertæ, 3-5 lin. latæ; juniores etiam violascunt. *A. caperato* certe affinis. *In silvaticis mixtis vulgaris. Jul.-Nov. (v. v.)*

β. *A. mucosus*, robustior, lamellis albidis, dein ferrugineis, stipite firmo lœvi albo subsericeo. — *Bull. t. 519. f. D. E. F.*

À propria specie parum abest. Stipes 2-4 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. crassus, firmus. Pileus multo carnosior, obtusus. Lam. obsolete emarginata. *In pinetis ubique. (v. v.)*

2. *A. elatus*, pileo subcarnoso plicato-rugoso sordide ochraceo, lamellis brunneo-ferrugineis, stipite albo-squamuloso longissimo.

*Batsch. Cont. II. f. 188. Pers. syn. p. 332.*

Priori procul dubio proximus. Stipes farctus, 5-8 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. et ultra crassus, utrinque subattenuatus, longitudinaliter fibrosus, squamulis disruptis subviscosis. Pileus disco tantum leviter carnosus campanulatus, explanatus subreflexus, 2-3 unc., fragilis, humidus viscosus livido-flavus. Lam. venoso-connexæ, subdistantes, adnatæ, latitudine maxime variæ. *In pinetis frequens. Aug.-Nov. (v. v.)*

3. *A. longicaudus*, pileo subcarnoso lœvi subalutaceo, lamellis cinnamomeis, stipite longe sublœvi. *Pers. l. c.*

**Priori affinis.** Stipes 4 unc. longus, 3-4 lin. crassus, albus, vix squamosus. Pileus margine ferre membranaceus, convexus, mox planus, obtusus, 1  $\frac{1}{2}$  unc. latus, viscosus; variat fulcescens. Lam. facie secedunt, confertæ, opacæ. In pinetis montosis. Oct. (v. v.)

*A. flexuosus.* With. p. 174. *A. repandus.* Schum. p. 322.  
*Fl. Dan.* t. 1497. — Forsan sequentis varietas.

### Trib. XXIV. HESELOMA.

**CHAR.** Velum marginale, floccosum, siccum, tenue, fugax. Stipes farctus, mediocris, firmus, fibroso-squamosus. Pileus carnosus, convexus, dein planus, glaber, laevis, humidus viscosus. Lamellæ emarginatae l. rotundatae, confertæ, aquose cinnamomeæ. Sporidia ferrugineo-argillacea, reliquis pallidiora! *Terrestres, clidi, venenati.*

I. *A. fastabilis*, olidus, pileo subrepando opaco, stipe squamuoso albo, sporidiis subargillaceis.

*A. gilvus.* Schæff. t. 221. Pers. comm. p. 9!. *A. crustuliniformis.* Bull. t. 308 546. *A. ceraceus,* latitius, subtestaceus, clavus. Batsch. f. 195, 198, 199. *A. offa.* Gmel. *A. circinans.* Pers Obs 1. p. 10. *A. fastabilis.* Syn. p. 326. *A. obesus.* Schum. p. 512.

Odor nauseosus, sapor ingratus. Stipes 1  $\frac{1}{2}$  - 3 unc. longus, subæqualis, demum etiam cavus. Pileus firmus, obtusus, humidus viscosus. Lam. sæpe serratae l. guttulas stillantes. — Varietates infinitæ. Conf. Pers. syn. l. c., Fries Obs. 2. p. 54. nec dubium videtur, hunc fungum, qui peculiarem tribum non potest non constituere, eodem jure in plures species esse dividendum ac Russula etc.! Color pilei albus, stramineus, pallidus, ochraceus, testaceus fulvus, rufus, spadiceus; lamellarum pallidus, subincarnatus, terreus etc. — In silvis, ubique. Jul.-Nov. (v. v.)

*Ag. punctatus.* Schæff. t. 40. valde affinis.

## Trib. XXV. FLAMMULA.

Cortin. & Gymn. spec. Pers. l. e.

CHAR. Velum marginale, fibrillosum, fugacissimum, non glutinosum. Stipes junior farctus, dein plerumque cavus, non bulbosus, firmus, fibrilosus, (nec e velo transversim rupto adpresso squamosus), in pileum leviter diffusus. Pileus carnosus, convexo-expansus, laevis, glaber; (rarissime squamulis superficialibus, non innatis), siccus l. viscosus. Caro non crassa, sed firma. Lam. non emarginatae, variæ.

Obs. Fungi gregarii, subcæspitosi, firmi, persistentes, subamaricantes, esculenti, colore subluteo (unde nomen) facile distincti. *Cortinar. lignatiles* colore sporidiorum unice differunt.

†. PHOLIOTIS proximi. Pileus siccus. Lamellæ adnatæ. *Cæspitosi, lignatiles.*

1. *A. alnicola*, cæspitosus, pileo flavo, marginem versus fibrilloso, lamellis adnatis e pallido-ferrugineis, stipite radicato squamuoso.

Valde diversus ab *A. aurivello* etc., subosimilibus. Stipes farctus, demum cavus, 2-3 unc. longus, 3-5 lin. crassus, curvato-flexuosus, flavus, dein ferrugineus. Pileus obtusus, irregularis, subhumidus, neutiquam viscosus, 2-3 unc. et ultra. Lam. latæ, planæ. Velum neutiquam radiatum, ut in Pholiot. — *A. velatus*, Schum. h. l. *Ad trunco alneos, pas-*  
*sim. Sept.-Nov. (v. v.)*

2. *A. flavidus*, cæspitosus, pileo laevi flavido, lamellis adnatis e luteo-ferrugineis, stipite fibrilloso.

Fungi multi &c. sp. 1. *Bouh. Hist. XL*, c. 53. *A. testacea*. *Huds. p. 615*. *A. flavidus* *Schæff. t. 35*. *Pers. syn. p. 295*. *Rouc. Fl. Nord. fr. 11. p. 481*. *Fr. Obs. 2. p. 29*. *Aman. Lam. Enc. 1. p. 110*. *A. liguatilis*. *Bull. t. 55 f. 1*. *Dec. fr. 2. p. 176*.

Magnitudine admodum variat. Stipes farctus, dein cavus, basi ferrugineus; etiam attenuatus. Pileus obtusus, 1-2 unc. et ultra, numquam viscosus, humidus sordide flavus. Lam. obtuse adnatae. Cortina tela a, subinde annulata! *Ad truncos, præcipue Pini, abunde.* Aug.-Nov. (v. v.)

3. *A. ilicinus*, cæspitosus, pileo lævi sicco rufo-fulvo, lamellis adnatis rufescens, stipite glabro basi incrassato. *Dec. fr. 6. p. 48.*

Stipes pro more farctus et cavus, latus, rufescens; 10-20 conjuncti. Pileus convexus, dein planus, glaber. Lam. pallidæ. In Gallia meridionali cibarius. *Ad truncos Quercus Ilicis. Autumno.*

4. *A. socialis*, cæspitosus, pileo fulvo, disco subsquamuloso, lamellis decurrentibus rufis, stipite æquali pallido. *Dec. fr. 6. p. 48.*

Stipites 15-20, subtorti, basi rufescentes l. nigrescentes. Pileus planus, margine involutus. Utī prior editur Monspelii, et nomine *pivoulade deouse, frigoule* notus. *Ad truncos Ilicis.*

5. *A. astragalinus*, cæspitosus, pileo lævi sicco aureo-incarnato, lamellis adfixis pallidis, demum ferrugineis, stipite flexuoso squamoso-fibrilloso.

Eximia species. Sapor americans, peculiaris. Stipes tenuis, elongatus (2-4 unc.), 2-3 lin. crassus, subfistulosus, æqualis l. deorsum attenuatus, pallidus. Cortina alba. Pileus 1-2 unc. et ultra, obtusus, etiam sub pluviis siccus, circa marginem obsolete sericeum pallens. Caro in junioribus vulnerata passim nigrescit! Lam. confertæ, latæ, juviniores pallide flavæ, basi sape incarnatae, varie adfixæ. Colores omnes peculiares, sic et sporidiorum! *Ad truncos Pini Suecæ, non raro. Aug.-Nov. (v. v.)*

6. *A. inopus*, subcæspitosus, pileo lævi glabro flavescente, lamellis adfixis flavis, stipite farcto fibrilloso pallido. *Fries Obs. 2. p. 32.*

*A. radicato-ram.* Bolt. t. 148. *A. connat.* With.

Majorem formam i. c. descripsi. Occurrit aliis minor subochraceus, stipite 2 unc. longo, 2 lin. crasso, aequali. Pileus recens humidus, non viscosus, 2 unc. Lam. latæ, confertæ, planæ, pallidæ. *Ad trunços a. frondosarum. b. acerosarum arborum, raro ad terram. Sept. Oct. (v. v.)*

††. *MYXACIIS* similes. Pileus viscosus. Lam. adnatæ. *Non vere cæspitosi, lignatiles & terrestres.*

7. *A. spumosus*, flavidus, pileo lævi viscoso, lamellis adnatis, stipite cavo basi attenuato.

Bait. t. 22. C.! *A. silacei* var. *A. S.* p. 205.

Gregarius, subcæspitosus. Stipes tenuis, 2-4 unc. longus, 2 lin. crassus, obsolete fibrillosus. Pileus leviter carnosus, subumbonatus, planiusculus, 2 unc. circiter latus, disco obscurior. Caro flavo-virens, sapore subaquoso. Lam. e flovo ferruginea. *Ad trunços & terram, in pinetis &c. vulgaris. Aug.-Nov. (v. v.)*

8. *A. carbonarius*, pileo lævi viscoso fulvo, lamellis adnatis argillaceo-fuscescentibus, stipite rigido squamoso. *Fries Obs. 2. p. 33.*

Gregarius, parvus, priori maxime affinis. Stipes subfistulosus, uncialis et ultra, 1 lin. crassus, pallidus. Pileus planus, nunc umbonatus, nunc depresso, uncialis. Caro lutea. *Ad terram deuestam & carbones, frequens. Majo-Nov. (v. v.)*

9. *A. thelephorus*, pileo viscoso-papillato crustallino, lamellis aquose cinnamomeis, stipite solido subferrugineo utrinque pallido. *Pers. syn. p. 307.*

Stipes 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 3-4 lin. crassus. Pileus convexo-planus, unc. et ultra, disco papillis difformibus viscosis. Lam. confertæ, 2  $\frac{1}{2}$  lin. latæ. Caro compacta, pallida. *In pinetis hercynicis.*

10. *A. lubricus*, pileo viscoso fulvo, lamellis adnatis argillaceis, stipite solido fibrilloso albo.

*Pers. syn. p. 307. Fries Obs. 2. p. 139.*

Major. Stipes 2-4 unc. longus, 3-5 lin. crassus, siccus, sursum leviter attenuatus. Pileus obtusus, 2-4 unc., cinnamomeus. Caro alba. Lam. subdecurrentes, latiusculæ. In silvis ad terram, circa bases truncorum &c. Aug.-Oct. (v. v.)

B. pileo dilatato, disco fulvo squamoso, margine pallido, lam. albidis. Inter gramina pinguis.

II. *A. lento*s, albidus, pileo lavi viscoso, lamellis adnatis. stipite farcto squamoso.

*Pers. syn. p. 287. Fries Obs. 2. p. 30! A. S. p. 157.*

Gregarius, subcæspitosus. Stipes dein cavus, 2-3 unc. Pileus planus, obtusus, 2-3 unc., jove pluvio valde glutinosus; variat disco flavente, lividopallens. Ad ramenta ligneæ & terram, ubique. Sept.-Nov. (v. v.)

12. *A. maculosus*, pileo subviscoso albido umbrinosquamoso, lamellis adnatis, primo albis, stipite squamoso albo. *Pers. syn. p. 288.*

Cæspitosus, fragilis. Stipes 3 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. et ultra crassus, fibrillosus, apice striatus. Pileus obtuse umbonatus, 2 unc., squamis latis difformibus. Lam. tenues, confertæ, demum incarna-to-cinereæ. In silvis rarius.

+++. HEBELOMATI analogi. Pileus siccus. Lamellæ subliberæ. Stipes politus. Terrestres, gregarii

13. *A. cohærens*, pileo molli rugoso cinnamomeo, lamellis subadnexis aquose cinnamomeis, stipite cavo nitente-badio.

*Pers. syn. p. 306. A. S. p. 163!*

Ex elegantissimis, admirabile naturæ artificium. Stipites basi membrana communi uniti, subfasciculati, rigidi, cornei, glaberrimi, (4 unc.) lucidi, pulcherrime castanei, sursum pallidi. Pileus subcarnosus, hemisphæricus, obtuse umbonatus,

I - I  $\frac{1}{2}$  unc., velutinus quasi. Lam. ventricosa, basi venis connexae. Inter folia putrida, rarius ad truncos. Aug.-Oct.

14. *A. lugubris*, e pallido ferruginascens, pileo subirregulari laevi, lamellis liberis, stipite radicato glabro, intus spongioso.

Gregarius. Stipes 4 unc. longus, 3-4 lin crassus, intus spongiosus albus, extus cartilagineus, rigidus, glaber, pallens, dein ferrugineus. Pileus carnosus, campanulatus, expansus, 2-3 unc., ex isabellino ferrugineus. Lam. latæ, confertæ, distinctæ, serratae. In betuletis montosis declivibus (Barnarp) inter gramina. Jul.-Aug. (v. v.)

15. *A. hilaris*, pileo æquali laevi fulvo, lamellis liberis flavo-ferruginascentibus, stipite cavo nitente-flavè.

*A. xanthopodius*. Dec. fr. 6. p. 49. ut videtur.

Gregarius, cæspitosus. Stipites 1-2 unc. longi, 3 lin crassi, æquales, glabri; (etiam badii visi.) Pileus leviter carnosus, primo campanulatus, glaber, uncialis, margine subinfuso. Lam. postice obtuse, confertæ, distinctæ. In pinetis ad terram. Sept. Oct. (v. v.)

Obs. A liquiritiæ Pers. syn. p. 506. ad *A. astragalinum* L. sapinum pertinere videtur.

H. l. videtur *A. striatus* Mey. Ess. p. 300.

Trib. XXVI. INOCYBE.

Cortin. & Gymnopi spec. Pers. l. e.

CHAR. Velum e fibrillis pilei continuatum, fugacissimum. Stipes solidus, raro cavus, subæqualis, firmus, squamulis l. fibrillis vestitus, a pileo discretus. Pileus plus minus carnosus, e campanulato-convexus, dein expansus subumbonatus, siccus, firmus, totus e fibrillis longitudinalibus innatis sericeus l. squamosus. Caro alba. Lamellæ proprie-

liberæ, sed ob pilei formam mutatam sæpius adnexæ, confertæ, ventricosæ, albidae, decoloratae sepe denticulatae l. margine discolori. Color albidus, subfuscus &c.

Obs. Tribus vix alii affinis, ab iis & *vß* dicta. Fungi medii l. minores, solitarii, terrestres, aestivales, persistentes, non, quantum novimus, venenati; sed ob odorem subnauseosum suspecti. Radix annua.

†. Stipes fibrosus l. fibrilloso-squamosus.

\* 1. *A. repandus*, pileo leviter carnoso laxe lutecente, margine infracto flexuoso, lamellis liberis, stipite longo solido, apice fibroso squamoso.

*Bull. t. 423. f. 2.* (habitu quidem recedit, sed vix ullo charaktere.) *Pers. syn. p. 319. Dec. fr. 2. p. 192.*

Odor nauseosus. Stipes 2 unc. et ultra, 3 lin. crassus, æqualis, striatus, albidus. Pileus præstimum disco carnosus, campanulatus, irregularis, longitudinaliter rimosus, sericeus, sordidus, 3 unc. usque latus. Lam. semilanceolatae. 2-3 lin. latè, pallidi. In pinetis ericetosis arenosis. *Jul.-Sept. (v. v.)*

2. *A. pyriodorus*, pileo carnoso umbonato fibrilloso subsquamoso fuligineo-pallescens, lamellis adnexis, stipite cavo fibroso.

*A. surfuraceus. Bull. t. 532. f. 1. Dec. fr. 2. p. 190.*  
*A. pyriod. Pers. syn. p. 300. A. S. p. 162.*

Odor peculiaris, "pyrinus" l. "Violæ odoratæ". Stipes 2 unc. longus, 4 lin. crassus, albidus. Pileus rarius repandus, nec infractus. Lam. albido-fuscantes. Varietatem exhibet *A. pallidus* Sowerb. t. 365. In pinetis juxta vias arenosas &c. *Jun.-Aug. (v. v.)*

3. *A. scaber*, pileo carnoso obtuso squamoso fuligineo pallescens, lamellis subliberis, stipite solido fibrilloso.

*Fl. Dan. t. 832. f. 3? Sowerb. t. 207. Fries 1, p. 70.*

Stipes æqualis, 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 3-4 lin. crassus, albidus. Pileus 1  $\frac{1}{2}$  unc. latus, squamis lamellisque demum obscurioribus. In pinastretis Et. Aug. (v. v.)

4. *A. relicinus*, pileo carnoso conico-expanso squarrosocomentoso stipiteque solido fibrilloso fuligineis, lamellis adnexis lutescentibus.

Gregarius. Stipes 2 unc. longus, 2 lin. crassus, utrinque dilutior. Pileus primo conicus obtusus, 4 lin. altus, expansus uncialis et ultra. Lam. confertæ, alternæ, demum olivaceo-fuligineæ. In silvis abiegnis paludosis inter Sphagna, non raro. Jul.-Sept. (v. v.)

\*\* 5. *A. plumosus*, pileo subcarnoso hemisphærico stipiteque solido tenui longo squamoso-squarrosis murinis, lamellis subliberis.

Bolt. t. 33. Pers. syn. p. 347.

Ab affinibus videtur diversus. Stipes 4 unc. longus, 1 lin. et ultra crassus, sœpe undulatus. Pileus 1  $\frac{1}{2}$  unc. Lam. albidæ. Batt. t. 20. H. similimus, sed pileus lutescens. In silvis ad Halifax. (v. ic.)

6. *A. calamistratus*, pileo subcarnoso campanulato stipiteque solido basi cœruleo fuscis squamoso-squarrosis, lamellis adnexis.

Odor fortis, admodum peculiaris. Stipes durus, subradicatus, intus rubescens, sœpius 2 unc. longus, 2 lin. crassus. Pileus obtusus, 1-2 unc.; margine primo infracto, dein explanatus. Lam. latæ, secedentes, albidæ, demum ferrugineæ, margine albicantes. In pinetis locis sabulosis, sœpe ularinosis, frequens. Jul.-Oct. (v. v.)

7. *A. cincinnatus*, pileo subcarnoso convexo-plano villosocomentoso fusco, lamellis adnexis stipiteque solido squamoso fusco-violaceis.

*A. cristatus*, Scop. Carn. p. 449.

*Suogregarius.* Stipes rigidus, gracilis, 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, fibrilloso-squamosus, Pileus obtusus l. obsolete umbonatus,  $\frac{1}{2}$  unc. et ultra. Lam. secedentes, ventricosæ. In nemoribus frondosis, Smolandiae, Scaniae &c. Aug.-Oct. (v. v.)

8. *A. lanuginosus*, pileo subcarnoso convexo squamuloso-villoso, lamellis liberis stipiteque solido tenui fibrilloso pallidis.

Vaill. par. t. 13. f. 4-6. — Bull. t. 370. With. arr. 4. p. 232. Dec. fr. 2. p. 199. Fries Obs. 1. p. 20.

Sequenti proximus, sed magis gracilis, firmus, lamellis angustioribus, primo adfixis, dein secedentibus. Pileus umbonatus, subuncialis. In silvaticis, juxta vias &c. Jul.-Sept. (v. v.)

9. *A. lacerus*, pileo subcarnoso fibrilloso subsquamoso murino, lamellis adnexis ventricosis stipiteque solido fibrilloso ex albido-concoloribus.

b. *A. rimosus*. *B. vialis*. Pers. syn. p. 310. A. S. p. 164.  
c. *A. maritimus*. Fries Obs. 2. p. 41.

*Inodorus.* Stipes tenax, 1-2 unc. longus, 1-2 lin. crassus, deorsum attenuatus, rarius æqualis, apice neutiquam pulverulentus; intus rubescens. Pileus convexus, obtuse umbonatus, uncialis, dein subrimosus squarroso-squamosus; colore sordido, umbrino etc. Ad terram humidam, rivulorum margines, limum exsiccatum &c. b. ad vias. c. in arenosis maritimis, ubique. Mayo-Oct. (v. v.)

†. Stipes apice squamulis albis farinaceus.

- \* 10. *A. sambucinus*, pileo carnoso obtuso sericeolævi stipiteque solido obeso subnudo albis, lamellis adnexis.

*A. obesus*. Pers. syn. p. 350. excl. syn. (*A. obesus* Batsch. f. 216. pileo glabro viscoso — dubiæ tribus; forsitan Phlegmacium) *A. candidus*, Fries Obs. I. p. 8. excl. syn.

**Olidus.** Stipes æqualis l. basi incrassatus, 1-1  $\frac{1}{2}$  unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. et ultra crassus, striatus, apice subtiliter albo-pulverulentus. Pileus convexus, saepe repandus, etiam rimosus, 1  $\frac{1}{2}$  - 2  $\frac{1}{2}$  unc. latus; variat lutescens. Lam. latiusculæ. Analogus & affinis A. repando. *In silvis arenosis, passim. Jul.-Sept. (v. v.)*

**11.** *A. rimosus*, pileo carnoso campanulato, expanso longitudinaliter rimoso fusco-lutescente, lamellis adnexis, stipite solidō apice albo-farinaceo

*A. rimosus.* Bull. t. 388, 599. Sowerb. t. 323. Pers. syn. p. 310. *A. aurivenius.* Batsch. f. 107.

Stipes 1-2 unc. longus, 2 lin. circiter crassus, basi subtuberösus, pallidus. Pileus primo obtusus, tandem obtuse umbonatus, 1-2 unc. latus; variat levius & squamosus; lutescens, rufescens, spadiceus &c. — Occurrit etiam multo major. *Ad terram nudam in silvaticis ubique. Jun.-Sept. (v. v.)*

**12.** *A. lucifugus*, pileo leviter carnoso convexo-plano fibrilloso, lamellis adnexis, stipite solidō æquali apice albo-farinaceo. Fries 2. p. 50.

Medius inter antecedentem & sequentem. Stipes 2-3 unc. longus, pallidus, numquam basi incrassatus. Pileus subobtusus, non rimosus, 1 unc. latus; variat colore albido, rufescente, luteo &c. Vix distincta species! *In umbrosis, paludosis &c. Aug.-Oct. (v. v.)*

\*\* **13.** *A. geophyllus*, pileo subcarnoso conico, dein expanso umbonato sericeo, lamellis adnexis, stipite farcto tenui albo-pulverulento.

a. pileo albo. *A. inodorus.* Bull. t. 524. f. 2. Dec. fr. 2. p. 193. *A. argillac.* Pers. syn. p. 372. Fr. Obs. 2. p. 47. *A. albus.* Schum. p. 309.

b. pileo lilacino. *A. illepodius.* Bull. t. 578. f. L. *A. geophyll.* Sowerb. t. 124. Ag. affinis. Pers. ic. & descr. t. 1. f. 1. *A. geophil.* Syn. p. 340. Fries 4, 6. p. 86.

c. pileo fuscescente.

d. pileo lutescente. A. geophyll. Bull. t. 522. f. 2.  
Dec. fr. 2. p. 194. A. auricomus. Batsch. El. f. 21.

Gregarius. Stipes 2 unc. longus, 1-2 lin. crassus, subæqualis. Pileus  $\frac{1}{2}$  unc. & ultra, demum rimosus. Lam. argillaceo-fuscescentes, non cinnamomeæ, latiusculæ, facile secedentes. *Ubique in silvis. Jul.-Oct. (v. v.)*

B. stipite decumbente, subbulboso. A. candidus. Batsch. Cont. I. f. 106. (Affinis A. furfurös. With. p. 183.)

14. *A. vatricosus*, pileo subcarnoso convexo-plano lævi albido, lamellis adnexis, stipite fistuloso contorto albo-pulverulento. *Fries Obs. 2. p. 46.*

Odor non ingratus. Stipes uncialis, 1 lin. crassus, basi villosus. Pileus  $\frac{1}{2}$  unc., subumbonatus. Lam. latæ, albido-fuscescentes. *In pinetis humidis, raro. Aug. Sept. (v. v.)*

15. *A. scabellus*, pileo subcarnoso planiusculo umbonato albido rufo-piloso, lamellis liberis albidis, stipite farcto rufo furfuraceo. *A. S. p. 189.*

Odor vix distinctus. Stipes strictus, 1-2 unc. longus, lin. vix crassus, striatulus, apice pallens. Pileus admodum tenuis, demum depresso, 4 lin. latus; variat zonatus. *In versuris graminosis. Jul.-Sept. (v. v.)*

16. *A. petiginosus*, pileo subcarnoso convexo rufo-fuscescente cano-sericeo, lamellis liberis ciliatis flavis, stipite farcto rufo pulverulento. *Fr. 2.*

**A. rufipes.** Pers. ic. & descr. t. I. f. 5. nec in Syn.

Pulcherrimus, sed oppido ex hac tribu. Gregarius. Stipes deorsum subattenuatus albido-villosus, 1-2 unc. longus, 1 lin. crassus, etiam fuscescens, testaceus &c. Pileus 4-8 lin. latus, fuscescenti-pallidus, demum rimosus; variat minute umbonatus. Lam. juniores subadnexæ, ventricosæ, confertæ, pallidæ, demum spadiceæ. *Ad terram silvarum nudam frequens. Aug.-Oct. (v. v.)*

1. Monomye. totus villesus. Batt. t. 18. A.
  2. M. pileo descisso. Batt. t. 19. C.
  3. Ag. obscurus. Pers. p. 347. (neutiquam A. S. p. 175) vix a calamistrato l. lacero diversus.
- 

## Trib. XXVII. NAUCORIA.

CHAR. Velum cum integumento (epidermide) pilei squamuoso homogenum, fugacissimum. Stipes subfistulosus, æqualis, tenuis, squamuclus, intus flocculosus. Pileus carnosomembranaceus, e campanulato-planiusculus, squamuclus l. fibrillis innatis adpressis, raro secedentibus, tectus. Lamellæ cinnamomeæ.

Obs. Fungi minores, gregarii, epiphyti, (*in stipulis, lignis, foliis, humo limoso &c.*), persistentes, fragiles, inodori. Statura quidem Collybiæ; sed velum ejusdem inodolis ac Lepiotarum, naucum (unde nomen) referens. — Spec. 1-3 pileo subcarnoso obtuso, lamellis adfixis secedentibus; 4-6 pileo submembranaceo minute umbonato, lamellis adnexis; 7-8 pileo subcarnoso demum umbilicato, lamellis subdecurrentibus &c. dignoscuntur. — Accedunt aliæ species pileo glabro.

## †. Genuini.

- \* 1. *A. escharioides*, pileo subcarnoso obtuso squamuoso pallido, lamellis adfixis latis alutaceo-pallidis, stipite fistuloso apice glabro. Fries Obs. 2. p. 131.

Gregarius, cæspitosus. Stipes 1 unc. & ultra; ut totus fungus pallidus, etiam in statu recenti. Pileus  $\frac{1}{2}$  unc. circiter, e convexo explanatus. Lamellæ primo subdeurrentes, dein secedunt; in b. naucoso l. c. emarginatæ, stipite fuscescente. In terram humosam locis humidis umbrosis. Sept.-Nov. (v.v.)

2. *A. conspersus*, pileo subcarnoso furfuraceo-squamuoso rufo-cinnamomeo, lamellis emargina-

tis linearibus cinnamomeis, stipite apice squamuoso.

*Pers. ie. & deser. t. 12. f. 3. Syn. p. 318.*

Gregarius, fragilis, lamellis exceptis expallens ochraceus, in quo statu var.  $\beta$ . A. S. p. 166. Stipes fistulosus, æqualis, fibrillosus, apice squamulis furfuraceis, 1 - 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 1 lin. crassus, pileo concolor. Pileus e campanulato-explanatus  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. latus. Lam. vix 1 lin. latæ, subconfertæ. — b. uliginosus, pileo umbonato squamoso fusco-rufescente, stipite longo torto, basi albo-tomentoso. Vulgari 2-3-plo major. In silvis humidis, graminosis, sphagnosis &c. frequens b. locis limosis. Jun.-Oct. (v. v.)

3. *A. siparius*, rufo-ferrugineus, pileo subcarnoso obtuso stipiteque farcto villoso-squamosis, lamellis adnatis latis, margine villosis.

Gregarius, statura A. inquilini. Ductus cavi in stipite unciali, apice pulverulento, oculo armato tantum observatur. Pileus 3-5 lin. latus, convexus, dein planus, obtusus. Lam. quaternæ, subdistantes. Ad stipites Aspidii filicis feminæ, locis humidis, per raro. 7, 10 Sept. (v. v.)

\*\* 4. *A. pannosus*, pileo submembranaceo fuscescente, pilis albis sericeo, lamellis adnexis ventricosis, stipite glabriuscule pallidiori.

Inter Agaricorum delicia eximum sibi occupat locum. Gregarius, pusillus. Stipes obsolete fistulosus, uncialis, tenuis, subfragilis, undulatus, sublente fibrillosus. Pileus convexus, planiusculus, plerumque umbonatus, 3-4 lin. latus, vix striatus, tenellus. Lam. subconcolores, obovatæ, distantes, paucæ inæquales, facile secedentes. Ad terram humosam locis uidis umbrosis, raro. Aug. Sept. (v. v.)

5. *A. graminicola*, pileo convexo papillato sericeo fuscescente, lamellis adnexis pallidioribus, stipite tenui hirsuto. Nees Syst. p. 202. f. 186.

Priori utique affinis. Sparsus, solitarius, et stipe  
te unciali filiformi, basi floccis adnexo; pileus vi-  
detur submembranaceus, 2-3 lin. latus. *Ad culmos*  
*gramineos emortuos, autumno.* (v. ic. — & forte v.)

Affinem vidi speciem colore pallido distinctam  
supra folia faginea.

\*\*\* 7. *A. furfuraceus*, gregarius, pileo subcarnoso  
dein umbilicato squamoso sericeove, lamellis  
subdecurrentibus cinnamomeis, stipite fistuloso  
furfuraceo.

a. pulverulent. Schæff. t. 226. (forte; sed sporidia  
pallidae.) *A. viridarius*. With. *A. furfurac.* Pers.  
syn. p. 454. *Fries Obs.* 2. p. 24.

b. gracilior, rigidior, colore obscuriore, stipite squar-  
roso. *A. squarrosus*. Bull. t. 538. f. 3. Dec. fr. 2.  
p. 163!

Velum squamuolum totius fungi, in pileo se-  
cedens & præcipue circa marginem perspicuum, al-  
bidum. Stipes 1-2 unc. longus, rigidus, basi albo-  
pubescens; in b. fere spadiceus. Pileus junior con-  
vexus obtusus, humidus cinnamomeus, siccus ex-  
pallens canescens-alutaceus,  $\frac{1}{3}$  - 1 unc. latus. In  
ramentis, foliis dejectis, ad terram &c. ubique. Aug.-  
Oct. (v. v.)

7. *A. segestrius*, pileo subcarnoso subdepresso se-  
riceo, sicco alutaceo, lamellis adnatis dilute  
cinnamomeis, stipite fistuloso fibrilloso. *Fries*  
2. p. 29.

Cæspitosus I. solitarius. Stipes 1-2 unc. lon-  
gus, 1 lin. crassus, flexus, basi byssoides. Pileus  
humidus alutaceo-testaceus,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc., non squa-  
mosus. Lamellæ non decurrent, confertæ. *Ad ra-*  
*menta lignea, raro.* Aug.-Oct. (v. v.)

††. *Species inter priores & Galeras mediae, pileo*  
*subcarnoso convexo-plano cum illis, nudo vero & veli*  
*indole cum his convenientes.* Olim propria tribus.

\* 8. *A. centunculus*, pileo subcarnoso planiusculo  
obtuso sublurido, lamellis adfixis stipiteque  
fistuloso pulverulento cinereo-flavis.

Stipes uncialis, 1-2 lin. crassus, firmus, apice albo-pulverulentus. Pileus 4-8 lin. latus, laevis, colore peculiari inter luteo-viridem & cinereum medio. Lam. secundum subdistantes. *Ad trunco in umbrosis, raro. Aug.-Oct. (v. v.)*

*B. concolor*, pileo submembranaceo, lamellis liberis ventricosis stipiteque flavo-griseis.

Priori minor, tenuior, sed color idem. Pileus margine striatus, saepe excentricus. *Ad ligna putrida madida, frequentior. (v. v.)*

\*\* 9. *A. arvalis*, pileo subcarnoso tenaci glabro, ochraceo, lamellis adnexis fusco-albis dein ferrugineis, stipite fistuloso radicato.

Sparsus. Stipes 2-3 unc. longus, 1 - 1  $\frac{1}{2}$  lin. crassus, aequalis, tenax, pileo dilutior, apice albo-pulverulentus, sub lente quasi sericeus. Pileus convexus siccus, rugosus, margine subobscurens, uncialis. Lam. leviter ventricosæ, distinctæ. *In arvis, graminosis pinguibus. (Femsjö). Aug. Sept. (v. v.)*

10. *A. vervaeti*, pileo subcarnoso fragili lavi luteo, lamellis adnatis subferrugineis, stipite glabro albo.

Gregarius. Stipes 1 - 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 2-3 lin. crassus, laevis, subfragilis. Pileus convexus, mox planus, obtusus, uncialis & ultra. Caro alba. Lam. subdecurrentes, confertæ, latæ. *In arvis, aggeribus prope Lund. Sept.-Nov. (v. v.)*

11. *A. pumilus*, pileo subcarnoso lavi ochraceo, lamellis adnexis distantibus dilute cinnamomeis, stipite cavo tenui. Pers. syn. p. 317.

Solitarius, parvus. Stipes uncialis, 2 lin. crassus. Pileus subhemisphaericus, tenuis, 4 lin. latus. Lam. 2-3 lin. latæ, planæ, distantes. Pers. *In agnum versuris & montosis sabulosis. Sept.-Nov. (v. v.)*

12. *A. pygmaeus*, pileo subcarnoso glabro pallescente, lamellis libris ventricosis ferrugineis, stipite fistuloso albo.

*Bull. t. 525. f. 2. Dec. fr. 2. p. 166. (ex syn. Schum; Sæll, p. 320; sed male quadrat.)*

Gregarius. Stipes uncialis, æqualis, basi pubescens. Pileus planiusculus,  $\frac{1}{2}$  unc. latus, margine striatus. *Circa truncos putridos in Gallia* (v. ie.)

13. *A. pusillus*, pileo submembranaceo lavi luteo, lamellis adnatis planis confertis, stipite fistuloso flavo.

Pusillus, pulcher. Stipes vix uncialis, nec lin. crassus, tenax, flexilis, glaber. Pileus 4-6 lin. latus, subhumidus, hemisphæricus, obtusus; variat viridi-flavus. Lam. latæ, aquose cinnamomeæ. *In versuris graminosis, raro. (Sularp.) Oct. (v. v.)*

\*\*\* 14. *A. inquilineus*, pileo subcarnoso lævi subtestaceo, lamellis subdecurrentibus, demum fuscis, stipite brevi tenaci spadiceo. *Fr. 2. p. 170.*

Species valde diversa. Gregarius. Stipes uncialis & ultra, deorsum attenuatus, fibrillosus, interdum flexuosus. Pileus e convexo planus, subumbonatus, 3-6 lin., colore varius, humidus fuscescens, subtestaceus; siccus pallidus, ochraceus &c. Lamellæ ad stipitem latissimæ, ferrugineæ. *Ad terram, stipites, ligna frequens. Aug.-Oct. (v. v.)*

1. Bulla pileolo tomentoso. *Batt. 28. F. G.*
  2. *A. hippopinus. With. p. 204.*
  3. *A. punctulatus. Schum, Sæll, 2. p. 281.*
- 

### Trib. XXVIII. GALERA.

*Bullæ spec. Batt. p. 55. Mycen. sp. Pers. l. e.*

CHAR. Velum floccosum, fugacissimum, sed in omnibus certe adest. Stipes fistulosus, æqualis l. sursum attenuatus, gracilis, a pileo discretus; raro nudus, sed plerumque pruinatus l. fibrillosus. Pileus membranaceus, conicus, mox campanulatus, raro magis expansus, humidus substriatus, siccus

lævis expallens, omnino absque squamis l. fibrillis adnatis. Lamellæ adnexæ l. adnatae, variae. Color ferrugineo-ochraceus &c.

Obs. Fungi graciles, fragiles, sat persistentes, plurimi terrestres. præcipue loca humida eligentes. Odor & uetus nullus. Nomen a Galea.

\* 1. *A. ravidus*, pileo submembranaceo hirto griseo-flavo, lamellis adnatis ochraceis, stipite pubescente æquali. Fr. Obs. 2. p. 132.

Gregarius. Stipes 1 - 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, fragilis. Pilei striæ obsoletæ. Cum *A. teneri* var. non commutandus. Ad truncos, Aug. 1815. (v. v.)

2. *A. apaius*, pileo submembranaceo glabro pallidente, lamellis subliberis croceis, stipite longo villoso albo. Fries Obs. 2. p. 142.

Stipes spithameus, sursum attenuatus, strictus, fragilis. Pileus campanulatus, obtusus, lævis, 1 unc. altus & latus. Lam. lineares, angustæ, distinctæ, dein ferruginer. *A. colus* With. p. 282 huc spectat; forte & *A. tener vaporarius* A. S. p. 194. In ruderatis, graminosis pinguibus ad pagos &c. Jul.-Oct. (v. v.)

3. *A. lateritius*, pileo submembranaceo lævi ferrugineo-expallente, lamellis subliberis subcinnamomeis, stipite longo glabro albido.

Bulla lateritia. Batt. p. 58. t. 28. T. *A. cinnamomeus*. Schum. Scell. p. 359.

Stipes 3 unc. & ultra, sursum attenuatus, lævis, strictus, fragilis. Pileus primo grandiformis, dein campanulatus, obtusus, 1 unc. altus, humidus striatus. Lam. ut in priori, sed obscuriores. In fitostosis silvaticis rarer. Jul.-Oct. (v. v.)

4. *A. tener*, pileo obtuso, humido striato, sicco lævi ochraceo, lamellis adnatis linearibus, stipite longo glabro stricto.

*Fungi vulgares perniciosi. Clus.* — *Buxb. C. IV. t. 34.*  
*Batt. t. 28. Z. A. tener. Schœff. t. 70. Sowerb. t.*  
*33. Pers. syn. p. 386. A. foraminulosus. Bull. t.*  
*535. f. 1, 403. f. b. c. Am. Hall. helv. n. 2426.*

Humidus totus unicolor pallide ferrugineus, siccus pileus stipesque præcipue expallent. Stipes 3-4 unc. longus, sursum striatus, fragilis. Pileus conico-campanulatus,  $\frac{1}{2}$  unc. circiter altus Lam. 1 lin. latæ. In aquosis totus aquose ochraceus. *In graminosis alibique vulgaris. Majo-Nov. (v. v.)*

β. *A. pilosellus*, pileo stipiteque pilosis. *Pers. syn. p. 387.* Priori tenuior. *Ad truncos udos, in fimo equino &c. (v. v.)*

γ. *A. pilosus*, pileo glabro obscuriori, stipite inferne piloso *Schum. p. 282. (v. v.)*

δ. *A. silagineus*, tenuior, stipite toto albo-pulverulento. *Fries Obs. 2. p. 168. In umbrosis humidis fagetorum. (v. v.)*

\*\* 5 *A. melinoides*, pileo obtuso, margine striato ochraceo-helvolo expallente, lamellis adfixis ventricosis stipiteque subruinato dilutioribus. *Bull. t. 560. f. 1. Pers. syn. p. 387. Dec. fr. 2. p. 162. Fries Obs. 2. p. 169. (A. circumseptus & lacrimalis, Batsch, affines.)*

Gregarius. Stipes 2 unc. longus, demum compressus. Pileus submembranaceus, hemisphæricus, explanatus,  $\frac{1}{2}$  unc. latus. Lamellæ valde ventricosæ, serrulatæ demum aquose cinnamomeæ. *In pratris muscosis sat frequens. Oct.-Dec. (v. v.)*

6. *A. sparteus*, pileo obtuso lævi subcinnamomeo, lamellis postice latioribus adnatis confertis, stipiteque glabro pallidis.

Stipes subtiliter fistulosus, 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, æqualis; glaber, pallide cinnamomeus, non strictus. Pileus submembranaceus, campanulatus, expallens, numquam striatus, 5 lin. altus, 5 lin. latus. *In campis graminosis, raro. Oct. (v. v.)*

7. *A. Hypnorum*, pileo campanulato subpapillato, humido sulcato subochraceo expallente, lamellis adnatis sublati distantibus, stipite flexili apice pruinoso.

*Mich. nov. gen. t. 80. f. 8. A. campanul. Schäff. t. 63. Am. Hall. helv. n. 2429. A. plicatus, Fl. Dan. t. 1009. f. 3. (male) A. hypni. Batsch. f. 96. A. hypnor. Schrank. - Pers. syn. p. 385. Swartz l. c. 1808 p. 95.*

Minor. Stipes uncialis & ultra, non strictus, tenuis, pileo dilutior, expallens. Pileus membranaceus. campanulatus, 3-5 lin. latus, humidus etiam ferrugineus. Lam. adscendentis, latitudine ubique aequali, non expallentes, margine sub lente flocculose. Legi formam colore aurantio-ochraceo, forte *A. acicula* Auct.-Schäff. t. 222. Varietates sqq. potius distinctæ species! *Inter muscos vulgaris. Jul.-Nov. (v. v.)*

β. *A. Bryorum*, pileo obtuse umbonato expallente, lamellisque ventricosis cinnamomeis, stipite longo pallido, apice pruinoso. *Pers. l. c. Schum. p. 283.*

Priori major, pileo  $\frac{1}{2}$  unc. & ultra. *Inter muscos humidos. (v. v.)*

γ. *A. Sphagnorum*, pileo convexo umbonato flavo-ochraceo expallente, lamellis planis subtriquetris stipiteque longo glabro laxo pallidis. *Pers. l. c.*

Stipes 2-4 unc. longus, fragilis, obsolete fibrilosus, apice nudus. Pileus  $\frac{1}{2}$  unc. latus, humidus striatus, papilla laevi. Lamellæ (& subinde stipes) demum fulvæ *In paludosis. (v. v.)*

δ. *A. aquatilis*, pileo convexo-planiusculo aquoso melleo, lamellis lati, stipiteque elongato stricto glabro apice nudo pallidis. *Cum priori. (v. v.)*

ε. *A. rubiginosus*, pileo subobtuso lamellisque ferrugineis, stipite longo rubiginoso. *Pers. syn. p. 385.*

Huc *Mich. t. 75. f. 8. Omnes allatae varietates pileo campanulato, humido sulcato a sequenti differunt. Inter muscos. (v. v.)*

8. *A. stagninus*, pileo hemisphærice obtusissime badio-ferrugineo expallente, circa marginem squamoso, lamellis decurrentibus, stipite longo rubiginoso.

Stipes 4 unc. longus, 1 lin. crassus, æqualis, sat tenax, subspadiceus, basi villosus; variat apice pruinosis. Vellum st̄epe persistens. Pileus submembranaceus, 3-5 lin. latus, humidus leviter striatus, siccus leviter subochraceus, s̄æpe circa marginem squamis albis superficialibus tectus. Lam. pileo concolor, latissimæ, triquetrae. Varietas est *A. brunneus*. Schum. p. 283. *A. atrorufus* Bolt. t. 51. f. 1. quoad colorem & formam cum hoc præcipue convenit. In paludosis silvaticis, abunde. Aug.-Oct. (v.v.)

- \*\*\* 9. *A. temulentus*, pileo convexo substriato ferrugineo, sicco lævi ochraceo, lamellis adnatis umbrinis, stipite undulato.

Stipes 2  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 1 lin. crassus, albidus, ferruginascens, tenax, apice subpruinatus, basi fibrillosus. Pileus disco leviter carnosus,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. latus, subhumidus, explanatus subumbonatus. Lam. primo concolor, antice attenuatae, dein planæ obscure umbrinæ. Habitus *A. callosi*, sed sporidia ferruginea. In humidis silvarum. Sept.-Nov. (v. v.)

10. *A. pityrius*, pileo viscoso striato lurido, lamellis adnexis aquose cinnamomeis, stipite argenteo spicè albo-pulverulento.

Stipes 2 unc. & ultra, 2-3 lin. crassus, æqualis, vix fibrillosus. Pileus submembranaceus. junior campanulatus, dein expansus, 1 unc. latus, siccus lævis expallens. Lam. confertæ, subferruginea. In nemoribus humidis, raro. Aug. Sept. (v. v.)

1. *A. nuceus*. Bolt. t. 70 Gracilis, pileo umbilicato.  
2. *A. canerinus*. Mey. Essequ. p. 300, pileo striato flavescente, lamellis dilute ochraceis, stipite bulbose, tordido albo. In cavernis Canerorum. Aprili.

Cf. quoque *A. melinoidem*, *Hypnerum* &c.

## Trib. XXIX. TAPINIA.

Omph. spec. Pers. syn. p. 447.

CHAR. Velum marginale, villosum, fugax. Stipes aequalis, in pileum subdiffusus. Pileus plus minus carnosus, laevis, nudus; junior plano-convexus, margine involuto villoso; dein depresso, late umbilicatus. Lamellæ adnato-decurrentes, subconfertæ. *Color varius.*

Obs. Fungi varii, a ταπενιω̄ dicti, subterrestres, persistentes, vix cibarii. Subtribus tres continent, quas vero ab minorem specierum numerum non separo. (*A. furfuraccus.*)

\* 1. *A. fragilis*, pileo leviter carnoso glabro fragili, stipite solido brevi subfibroso.

Batsch, C. II. f. 215. Pers. syn. p. 455. Mart. Erl. l. e.

Tener, fragilis, subodus. Stipes uncialis, 1 lin. crassus, teres, pallidior. Pileus convexus, umbilicatus, inaequalis, 1  $\frac{1}{2}$  unc. fere latus (humidus ferruginaseens, siccus ochraceus, margine albente?). Lam. "luridæ, carneo-rubellæ." Ad terram Germaniæ. (v. ic.)

2. *A. cupularis*, pileo subcarnoso laevi flavescente, stipite cavo longo albicante.

Bull. t. 554. f. 2. Pers. syn. p. 454. Des. fr. 2. p. 171.

Figg. C. H. apud Bull. l. c. fungum humidum subfulvum, reliquæ siccum expallentem sistere suspicor. Stipes 3 unc. fere longus, ultra lineam crassus. Pileus vix unciā attingens. Lam. 1  $\frac{1}{2}$  lin. latæ, obscurores (non expallentes) conferta. Ad terram Galliæ. (v. ic.)

3. *A. hirneolus*, cinereus, pileo subcarnoso glabro albescente, stipite tenui basi albo-villoso.

*A. nigrella*. Pers. syn. p. 463. (forma minor, junior?) *A. ericetorum*. Schum. Sæll. p. 529. *A. hirneol.* Fries Obs. 2. p. 211.

Species valde diversa, habitu omnino Omphaliæ l. potius Ecciliæ. Gregarius, major & minor. Stipes junior farctus, tenax, 1-2 unc. longus, demum cavus, apice pruinatus, pileo concolor. Pileus plano-umbilicatus, tenax, humidus margine striatus, junior subfuscus, dein magis magisque albescens, nitens, etiam zonatus. Lam. cinereæ, subconfertæ. Ad terram, inter muscos &c. non raro. Aug.-Oct. (v. v.)

**B.** *A. undulatus*, pileo inæquali undulato, lamellis stipiteque cavo griseis.

*Bull.* t. 535. f. 2. (color non quadrat) *Pers.* syn. p. 571. *Schum. Sæll.* p. 274. (bene.)

- Prioris varietas luxurians; major, gregarius, subfragilis. Stipes sœpe compressus & undulatus. Pileus  $\frac{1}{2}$  - 2 unc. latus, obscure griseus, dein cum micore albescens, zonatus. Sporidia supra lamellas sparse rubescunt, uti *A. variabilis*. Cum priori. (v. v.)

\*\* 4. *A. Tricholoma*, albidus, pileo subcarnoso, pilis adpressis, margine strigosis ciliato, stipite tenui farcto squamuoso. *A. S.* p. 188.

Cum sq. Inocybis proximus. Solitarius. Stipes 1-3 unc. longus, 1-2 lin. crassus, attenuatus, sursum præcipue fibroso-squamosus. Pileus planiusculus, depresso,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. latus, viscosus & siccus nitens, pilis demum obsoletis. Lam. decurrent, tenues (1 lin. vix latæ), argillaceo-fuscescentes. In nemorosis silvaticis, passim. Aug.-Oct. (v. v.)

5. *A. strigiceps*, albidus, pileo carnoso subdepresso sericeo, margine strigoso, stipite farcto villoso.

Sparsus, inodorus. Stipes firmus, 1  $\frac{1}{2}$  - 2 unc. longus, 2 lin. fere crassus, albus, junior præsertim villosus. Pileus convexus, explanatus, non semper depresso,  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{3}{4}$  unc. latus, siccus, pilis longis strigosis hinc inde rufescens; margine juniore pilis longis deflexis eleganter ciliato. Lam. confertæ, albide. In fagetis inter folia, rarior. Sept. Oct. (v.v.)

*B. A. eriocephalus*, pilei margine villoso, lamellis subferrugineis, stipite rufescente. *Dec. fr.* 2. p. 174.

Icon Bulliardii (*A. gnaphalioccephalus* Bull t. 576. f. 1.) nostro major pauloque aliter coloratus, de cetero non differre videtur. *In Gallia*. (v. ic.)

6. *A. subreflexus*, pileo carnoso subinvoluto candido, lamellis subumbrinatis, stipite solidi tenui flavescente. *Otto Ag.* p. 77.

Stipes 1 - 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 1-2 lin. crassus. Pileus uncialis, depresso. Statura videtur prioris, colores sequentis. *In Saxonia*.

7. *A. Lepista*, pileo carnoso glabro albo, margine involuto, lamellis obscurioribus, stipite subcaovo attenuato subrufescente.

Major, statura sequentis. Stipes 2-3 unc. longus, 3 lin. circiter crassus, basi villosus. Pileus laevis, uncialis & ultra, subhumidus, non vero viscosus, demum depresso. Lam. decurrentes, confertae, basi simplices, fuscantes; in b. argillaceo-olivaceo. *In silvis a. frondosis b. acerosis, raro. Sept. Oct.* (v. v.)

\*\*\* 8. *A. involutus*, compactus, pileo depresso subferrugineo, margine involuto tomentoso, lamellis dichotomis basi poriformibus, stipite obeso.

a. *resupinata*, terrestris. *Buxb. Cent.* IV. t. 26. (bene.) *Schæff.* t. 72. *A. involutus*. *Batsch. C.* I. f. 61. *Pers. syn.* p. 448. *Swartz. l. c.* 1808. p. 241. *A. contigata*. *Bull. t. 240,* 576. f. 2. *Sowerb. t. 98.* *A. adustus*. *With. arr. 4.* p. 177.

b. *subhexcentricus*, truncicola. *A. cyathif.* *Schæff. t. 252.* *A. lateralis*. *Id. t. 72.* (*A. adscendens*. *Bolt. t. 55.*)

Tactus colorem mutat & sordidus evadit. Stipes 2-3 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. crassus, sepe maculatus. Pileus 3 unc. & ultra, subhumidus. Lamella dilutiores, subinde simplices. b. magis ex-

plicatus, margine subnudo. *In silvis ad terram. b. ad truncos; vulgaris; in Amer. boreali Torrey. Aug.-Nov. (v. v.)*

1. *Fungus albus, oris conniventibus. Buxb. IV. t. 36. f. 1.*
  2. *A. planus. Sowerb. t. 362. pallide testaceus, pileo piano inflexo biunciali, stipite æquali glabro. An genus Hebeloma, sed lam. adnatæ.*
- 

### Trib. XXX. CREPIDOTUS.

#### Synonyma vid. sub Pleuroto.

CHAR. Velum tenuissimum, fibrillosum. Statura varia, sed pileus inæqualis, excentricus l. lateralis. Lamellæ inæquales, decoloratae. Sporidia ferruginascentia nunc pallidiora subargillacea, nunc subrufa.

Obs. Fungi varii, ad duas tresve subtribus pertinentes, quas vero ob specierum numerum exiguum & seriem contiguam non separo. Lignatiles l. epiphyti, vix cibarii. Transeunt ad Pratellas.

†. Majores, pileo carnoso glabro.

1. *A. atrotomentosus, pileo carnoso excentrico rivuloso ferrugineo, lamellis basi ramosis, stipite firmo elastico velutino.*

*Batsch. El. f. 32. Pers. syn. p. 574. A. S. p. 226. Swartz in Vet. Ac. Handl. 1809. p. 95. Nees l. t. f. 175.*

Affatum cognatus priori, sed sporidia pallidiora subargillacea, ut in Hebelomati. Stipes solidus, mollis, firmus, curvatus, radicatus, 2 unc. circiter longus, ultra  $\frac{1}{2}$  unc. crassus; tomento denso molli violaceo-fusco, atropurpureo l. griseo obductus; dissecitus intus passim coerulescit. Pileus siccus, margine involutus; variat regularis infundibuliformis, & resupinatus, vertice porrecto. Lam. vix decurrent, basi subanastomosantes, lutescentes, venoso-connexæ, 5 lin. usque late. *Ad truncos pinæ, "Salicis" &c., rarer. Aug.-Oct. (v. v.)*

Antecedenti proxime accedunt. a) *A. aurantio-ferrugineus*, pileo convexo squamoso rimoso (3-5 unc.) lamellis que irregulariter adfixis aurantio-ferrugineis, stipite valido ( $1\frac{1}{2}$  - 3 unc.) sublaterali. *With. arr. 4. p. 30.* (*Ad radices Quercus*) — & b) *A. fætidus*, pileo convexo visuoso, dein corrugato sordide fusco ( $1\frac{1}{2}$  -  $2\frac{1}{2}$  unc.), margine involuto lamellis adnatis intercentibus, stipite duro crasso nigrescente. *With. t. e.* (*Ad cortices Salicium*) — sed distinctæ omnino videntur species.

2. *A. olearius*, varius, rufo-aureus, pileo carnoso lævi, lamellis inæqualibus decurrentibus, stipite curvato.

**Fungus perniciousus, intense-aureus &c.** Mich. gen. p. 191. Oreille de l' olivier. *Paulet Champ. 2. p. 112.* — ex *Dec. fr. 6. p. 44.* (*A. olearius*.)

Quoad formam admodum variabilis, cæspitosus, raro solitarius. Stipes plus minus longus, solidus, lateralis, excentricus & raro centralis ("deorsum attenuatus" Mich.). Lam. valde decurrentes. Colore intenso, subinde superne obscuriori, distinguitur. Venenatus; etiam phosphori instar lucere fertur. (Simile phænomenon Rumphius in Agarico quodam epipylo Amboinæ observavit.) *Ad Oleas aliasque arbores Europæ australis.* Vere & autumno.

3. *A. panuoides*, luteus, pileo carnoso sessili obovato glabro, lamellis decurrentibus subramosis crispatis.

*Buxb. C. II, t. 49. f. 2.* — *Fries Obs. 2. p. 228.*

Prope ad *A. atro-tomentosum* accedit sporidio-rum colore & pileo subinde rivuloso. Solitarius. Pileus postice porrectus. Colore pallidiori variat. *Ad truncos pineos rarior.* Aug. Sept. (v. v.)

4. *A. vulpinus*, imbricatus, sessilis, fulvus, pileo carnoso obovato marginem versus squamoso. *Sow. t. 361.*

Pallide fulvus, 1-2 unc. longus, disco lævi. Ca-ro sordide alba. Lam. carne angustiores, non decurrentes. Sporidia? In cavis arboribus Angliae. (v. ic.)

5. *A. mollis*, pileo subsessili laxe flaccido pallido, lamellis aquose cinnamomeis

*A. mollis*. Schæff. t. 213. f. 1. Sowerb. t. 98. Pers.  
syn. p. 480. Swartz l. c. 1808. p. 253. A. canescens.  
Batsch. Et. f. 38. A. lateralis. g. Schum. Sæll p. 364.

- b. pileo e sporidiis rufo. *A. parietinus*. Scop. Carn.  
p. 459. *A. violaceo-fulvus*. Fl. Dan. t. 1073. f. 1.

Gregarius, mollis; carne plus minus crassa, subgelatinosa, aquose pallida. Stipitis rudimentum subtrigosum subinde adeſt, Pileus 1-3 unc., glaber, albido-canescens, deinceps e sporidiis rufo-maculatus; in majoribus saepe luxurians, lobatus. Lam. confertæ, lineares, (1-2 lin.) primo albidæ l. griseæ. Ad truncos varios, passim. Aug.-Oct. (v. v.)

6. *A. proboscideus*, ochraceus, pileo carnoso resupinato vertice porrecto stipitiformi, lam. concurrentibus.

*A. resupinat*. Fl. Dan. t. 1072. — Fr. Obs. 2, p. 232.

Cum in cryptis tantum crescat, monstrosa tantum videtur progenies. Extus pubescens, basi tomentosus,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. Ad ligna pinea. Exeunte Aug. repertus. (v. v.)

††. Minores, pileo submembranaceo (villoso.)

7. *A. haustellaris*, pileo reniformi villoso alutaceo-pallido, lamellis rotundatis ferrugineis, stipite laterali sursum attenuato albo.

*A. Flurstedtensis*. Batsch. C. I. p. 171. (icon pessima) *A. resupinat*. With. p. 304. *A. haust.* Fr. Obs. 2, p. 232.

Parvus, sporidiis ferrugineis. Stipes 2-4 lin. longus, villosus, junior ascendens. Pileus leviter carnosus,  $\frac{1}{2}$  unc. & ultra. In ramis putridis Populi tremulæ &c. Aug.-Oct. (v. v.)

8. *A. translucens*, subsessilis, lateralis, sordide albus, lamellis liberis rufescentibus. Dec. fr. 6,  
p. 43.

Stipes nullus, l. brevissimus lateralis. Pileus rotundatus, irregularis, pellucidus; dein, ut in affinibus, e sporidiis rufescens. - Lam. inæquales, juviniores pallidæ. Jejunus cibus pauperis Monspelii. *Ad Salices Galliæ.*

9. *A. variabilis*, pileo membranaceo e resupinato reflexo sericeo tomentoso albo, lamellis albido-rubiginosis.

*Petiv. Gaz.* 95. 8. *A. niveus*. *Jacqu. Fl. Austr.* t. 288.

*Sowerb.* t. 97. *A. sessilis*. *Bull.* t. 152, 581. f. 3.

*Schum.* p. 366. *Fl. Dan.* t. 1556. *A. pubescens*. *Fl. Dan.* t. 1073. f. 2. *A. variab.* *Pers. Obs. myc.* 2.

- p. 46. t. 5. f. 12. *Syn. p. 483. Swartz.* l. c. 1808. p. 257. *Dec. fr.* 2. p. 135.

β. *A. albidus*. *Balb. misc.* p. 67. t. 11. f. inf.

γ. *Ag. squamosum &c.* *Mich. t. 65. f. 4.* multoties major.!

δ? *Ag. sinuatus*. *Pers. Obs.* 2. p. 48. (lam. spadiceis.)

In hoc & sequentibus pileus junior integer, sæpius stipitem incurvum e centro exserens, dein reflexus, stipite obliterato & lateralis. Radiculae nullæ. Valde variat, sed colore facile distinguitur. Sporidia in fundo albo rufa, in nigro ut in *A. atrotoment.* apparent. *Ad truncos putridos, cortices, stipites & terram, ubique præsertim autumno.* (v. v.)

20. *A. epibryus*, pileo tenui verticali sericeo candido, lamellis confertis gilvis.

Videtur a priori diversus, sed *Bull.* t. 152. f. C.

D. *E. nostrum* quoad lamellarum colorem referunt. Pileus levis, 2-3 lin. latus & ultra. Lam. tenues, confertæ, parallelæ. *In muscis majoribus, præcipue Trichostomo heterosticho.* Oct.-Dec. (v. v.)

21. *A. depluens*, pileo tenui reniformi rufescente cano, basi villoso albido, lamellis distinctis divergentibus rufescens.

*Batsch. Cont.* I. f. 122. *Lumn. Pos.* p. 523. *Nees Syst.*

f. 179. *A. epigeus*. *Pers. Obs. Myc.* 2. p. 47. *Syn.* p. 484. *A. gramineus*, *Otto Ag.* p. 103.

Valde ab *A. applicato* & *tremulo* diversus, & prioribus nimis affinis. Aquosus, fragilis, uncialis usque, obsolete tomentosus, margine substriatus. Lam. latæ, juniores griseæ. Stipes in junioribus adest, villosus; dein evanescens. *Ad terram supra muscos* &c., passim; *autumno pluvioso*. (v. v.)

- 12.** *A. violaceo-fulvus*, pileo tenui reniformi tomentoso, lamellisque ventricosis violaceo-fulvis.

Batsch. El. f. 39. Pers. syn. p. 483. Nees syst. f. 180.

In statu vetustissimo modo observatus videtur; inde omnino sessilis, planus, absque stipitis rudimento. Tonus tenpis, fragilis, fusco-purpurascens. *Ad trabes humidas*. (v. ic.)

- 13.** *A. byssisedus*, pileo tenui villoso griseo, lamellis adnato-decurrentibus ventricosis, stipite incurvo, radiculis byssoideis.

Am. Hall. helv. n. 2334. — Pers. ic. & descr. t. 14. f. 4. Syn. p. 482.

Junior resupinatus, demum horizontalis, stipe magis distincto, sursum attenuato,  $\frac{1}{2}$  unc. Pilus expallens. Lam. latiusculæ, albido-cinereæ. *Ad truncos cariosos præcipue Fagi*, passim. Jun.-Oct. (v. v.)

- 14.** *A. Pezizoides*, cyathiformis, sessilis, olivaceo-fuscus, extus granulosus, lamellis concurrentibus. Nees Act. Nat. Cur. IX. p. 249. t. 6. f. 18.

Gregarius, tremelloso-carnosus, 1 lin. altus & latus, basi fibris tenuissimis albis affixus. Lam. crassæ, ventricosæ, 12<sup>circiter</sup>. Sporidia? *Ad asperes subputridos Helvetiæ*. (v. ic.)

- 1.** Ag. squamosum adiposum fœtidum . . . supra Balæna ossa, adhuc pinguedine referta. Hort. Pis. t. 3.  
**2.** Agaric. Mich. t. 65. f. 5. (6-7?)  
**3.** Ag. ochraceus. Jacqu. Coll. p. 100. t. 16. f. 9. Preximus videtur *A. molli*.

---

Sporidiis fusco-ferrugineis, inter hanc & sq. seriem mediæ, instructi suat *A. præcox*, *pediades-arvalis*, *vervacti*,

---

## Series quinta.

## Trib. XXXI. VOLVARIA.

Fung. ord. Mich. gen. p. 181—183. Ag. spec. 6. Gled. p. 92. ad p. Volvati. a. Batsch. El. p. 51. Aman. spec. Pers. syn. p. 246.

CHAR. Velum simplex, universale, discre-  
tum; junius fungum totum ovatum involucranc,  
dein stipite protruso laciniato-rupta. Pileus car-  
nosus, campanulatus, dein expansus, sericeus l. vi-  
scidulus, a stipite discretus. Caro haud compacta,  
mollis. Lamellæ liberæ, ventricosæ, latæ, e thecis  
prominulis denticulatæ, confertæ; &, ut in tota  
serie, inæquales, decolorantes, nebulosæ. Sporidia  
obscura, copiosa. Lamellæ ex albo-carnicæ, dissolubiles.

Obs. Oppido ad hanc seriem, ante A. cam-  
pestrem locanda, pertinet naturalissima tribus.  
Fungi majores minoresve, locis pinguibus stercora-  
tis l. ligno innascentes, æstivales, molles, minus  
persistentes; majores edules perhibentur.

\* 1. *A. lejocephalus*, candidus, pileo sericeo siccо,  
stipite brevi basi crasso, volva ampla. *Dcc. fr.*  
6. p. 53.

Odor gratus. Stipes absque annulo. Pileus con-  
vexo-planus, 7-8 unc. latus, levigatus, carne firma. De  
lamellis decolorantibus nulla mentio, sed & *A. cre-  
taceus* inter Psalliotas diu immutabilis persistit,  
& demum tamen dissolubiles evadunt lamellæ, hinc  
huc retuli. *Circa Montpellier.*

2. *A. bombycinus*, pileo sericeo candido, lamellis  
carneis, stipite solido attenuato incurvo, vol-  
va laxa.

*Mich. Nov. Gen. t. 76. f. 2. Ag. bombycinus. Schæff.*  
t. 98. *Ag. incarnatus. Batsch. Am. Pers. syn. p.*  
*248. Fries Obs. I. p. 1. Am. calyprata. Lam. Enc.*  
*I. p. 105. A. denudat. Schrad. spic. p. 115.*

Volva ampla, laxa. Stipes 3-6 unc. longus,  
glaber. Pileus 3-7 unc. latus, e globoso-explana-  
tus, subumbonatus. Caro mollis. Edulis. *Pers. Ch.*

Comest. Ad trūcos (Aceris & Fagi) a Suecia in Italianam usque. Jul. Aug. (v. v.)

3. *A. volvaceus*, pileo adpresso piloso virgato, lamellis carneo-rubris, stipite solido subæquali glabro, volva laxa.

Bull. t. 262. Sowerb. t. 1. Dec. fr. 2. p. 211. Aman, virgata. Pers. syn. p. 249.

Volva inæqualiter divisa, fuscescens. Stipes 3-5 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, albus. Pileus obtusus, pallide cinereus, lituris cinereis nigrisque, 3 unc. latus. Lam. postice obtusa, fere remotæ. In hortis inter pulverem coriarium. Jul. Aug. (v. v. Hafnia &c.)

- \*\* 4. *A. speciosus*, pileo glabro viscoso albo-griseo, lamellis incarnatis, stipite solidō attenuato volvaque laxa villosis.

Mich. gen. p. 183. Am. incarnata. B. A. S. p. 142. A. pubesc. Schum. Sæll. p. 227. A. spec. Fr. Obs. 2. p. 1.

Stipes subbulbosus, 4-8 unc. longus, dein glabriusculus, volva magis concreta. Pileus lavis, subumbonatus, absque volvæ squamulis, 3-5 unc. In finmetis (Femsjö), ruderatis (Malmö), silvis humosis (Esperöd), supra ramenta cannabina (Skärstad) &c. reperi. Majo-Aug. (v. v.)

5. *A. glojocephalus*, pileo glabro viscoso albo-griseo, lamellis rufescentibus, stipite solidō æquali, volva oblitterata. Dec. fr. 6. p. 52. Mich. l. c.

A priori distinguendus videtur volva parva, membranacea, tuberis instar adnata (glabra?); pileo minore (2 unc.), margine leviter striato, & a reliquis volvæ squamulosis tecto. Circa Montpellier. Oct.

6. *A. medius*, pileo glabro viscoso albo, lamellis roseis, stipite solidō glabro, volva vaginata.

Schum. Sæll. 2. p. 227. Fl. Dan. t. 1676. f. 1.

Medius inter antec. & seq. Stipes 2 unc. longus, volvaque 4-5-fida libera albi. Pileus leviter carnosus, demum subumbonatus, 1  $\frac{1}{2}$  unc. latus. Ad folia Pini Abietis Sællandiae. Nov. (v. ic.)

\*\*\* 7. *A. pusillus*, pileo tenui sicco albido, lamellis roseis, stipite fistuloso, volva laxa.

*Mich. g. p. 182. A. volvac. B. Bull. t. 530. Am. pus. Pers. Obs. 2. p. 36. Syn. p. 249. Fries Obs. 1. p. 2. Dec. fr. 2. p. 211.*

Parvus, subgregarius. Stipes tenuis, uncialis, fragilis, albus; volva 4-5 fida, extus sericea. Pileus 4 lin. latus, planiusculus, obsolete pilosus, umbonatus, pellucidus, demum deliquescens. In domesticis, hortis &c., raro. Aug. (v. v.)

8. *A. coprinus*, pileo tenui subviscoso flavo, lamellis fusco-purpureis, stipite fistuloso, volva laxiuscula. *Fries Obs. 2. p. 2.*

Similis *A. semiglobato*. Volva extus glabra, exigua. Stipes 2-3 unc. longus, albidus. Pileus hemisphæricus, subumbonatus, glaber; raro e volvæ fragmentis squamulosus. Lam. juniores adnexæ. Ad vias rarissime. Aug. (v. v.)

*Obs. Leucomyc. Batt. t. 4. E. — inquirendus. Huxley videtur Fung. nox, gen. 13. Clusii.*

### Tribus inquirenda: VAGINATA.

*Fung. ord. Mich. gen. p. 189. — Nees Syst. p. 191.*

CHAR. Velum universale, concretum. Stipes subcavus. Pileus carnosus, haud compactus, ovato-campanulatus, mox expansus obtusus, epidermide a velo formata, in squamas secedente. Lam. liberæ, alternæ, vix ventricosæ. Analogi Lepiotis; certe a Volvariis diversi. Forsan vero Coprini species; nullam enim vidi.

\* 1. *A. ocreatus*, pileo convexo adpresso squamoso, stipite farcto inferne vaginato. *Holmsk. II. p. 64. t. 56, Nees Syst. f. 168.*

Stipes 3 unc., supra vaginam (cum pilei epidermide primo contiguam) lœvis, albus. Pileus 2-3 unc., erubro-gilvus. Lam. cinereæ. Ad Aarhus Jutlandicæ in silvis graminosis. Sept. Oct. (v. ic.)

\*\* 2. *A. cepæstipes*, pileo campanulato sparsim squamoso stipite cavo ventricoso, inferne lœvi. Sowerb. t. 2. Pers. syn. p. 416. excl. syn.

Cæspitosus, albus l. luteus. Stipites 3-4 unc., basi angustata, annulo infero erecto. Pileus 1-2  $\frac{1}{2}$  unc. Lam. 2 lin. latæ. In cortice vaporario, æstate. (v. ic.)

3. *A. præaltus* Gmel., pileo ovato floccoso fulvo-ferrugineo, stipite fistuloso æquali, Mich. t. 81. f. 3. Ag. spec. 8. Gled. p. 95.

Velum annuli instar stipitem tantum cingit, cum lamellis griseum. Pileus vix uncialis, dein nudus. In Italia, Majo. (v. ic.)

Huc & *A. echinatus* B. A. S. — forsitan & aliæ e sequente tribu.

### Trib. XXXII. PSALLIOTA.

Fung. ord. Mich. gen. p. 170. ad p. Pratella A. & Lepiotæ spec. Pers syn. PRATELLA Lepiota. Nees Syst. p. 208!

CHAR. Velum annuliforme, subpersistens, proprie partiale. Stipes firmus, subæqualis, a pileo discretus. Pileus plus minus carnosus, e convexo l. campanulato-expansus, non-nudus (viscosus aut squamis l. fibrillis tectus). Lam. liberæ l. adfixæ, latæ, fuscescentes.

Obs. Fungi varii, sat persistentes; priores edules. Nomen a Ψαλλιον ab analogium cum Armillaria. Veli subuniversalis rudimentum adest in *A. cretaceo*, *campestri*, *echinato*, *æruginoso*.

\* 1. *A. cretaceus*, albus, pileo sicco sublœvi, lamel·lis liberis antice latioribus, stipite cavo lœvi, annulo adscendente.

Fung. totus albus edulis. Vaill. Bot. p. 75. Raji Syn. 2. 334. *A. cretaceus*, Bull. t. 374. Am. Hall, helv. n. 2355.

Sequenti utique proximus. Stipes firmus, sursum attenuatus, 3 unc. longus, 3-6 lin. crassus, glaber, intus medulla araneosa. Pileus lentiformi-convexus, mox planus obtusus, epidermide nunc lœvi, nunc in squamulas secedente, 3 unc. latus & ultra. Caro ut in sequente. Lam. dein remotæ!, diu albæ, persistentes (hinc simillimus A. excoriato), demum vero fuscæ & dissolubiles. Annulus variat laceras, apice insertus reflexus, iterumque erectus. Locis ruderatis pinguibus; copiose in aggeribus Lundæ. Aug.-Nov. (v. v.)

2. *A. campestris*, pileo carnoso sicco subsquamoso sericeove, lamellis liberis ventricosis, demum fuscis, stipite farcto annulato albo.

*M. unius sðððim* Dioso, Hist. I. c. 109. *Callo rubens*.  
Plin. Hist. XXII. c. 47. Prateoli. Cœsalp. p. 618.  
Fung. esc. gen. IX. sp. 1. Clus. p. 268. — *Lob. ic.*  
p. 271. — J. Bauh. XL. c. 4. cum syn! Pradell.  
spec. Sterb. t. 1. f. D. C. Mich. gen. t. 75. f. 1. 3.  
Batt. t. VII. A. C. Ag. spec. 21., a, b, c. Gled.  
Meth. p. 116. Hall. helv. 2443. *A. campestris*. Linn.  
Suec. 1203 & Auct. Fl. Dan. t. 704. Schæff. t. 35.  
Sowerb. t. 305. Bolt. t. 45. Pers. syn. p. 418. Nees  
Syst. f. 195 *A. edulis*. Bull. t. 154, 514. Pers. l. c.  
*A. alutar*. Pers. Swartz. l. c. 1809. p. 82.

Odor nullus, sapor gratus. Stipes firmus, raro squamulosus; variat longus & brevis, tenuis aqua-  
lis & amplius marginato-bulbosus. Annulus albus;  
nunc amplius persistens, nunc imcompletus fugax;  
subinde omnino cortinæformis. Pileus carnosus,  
convexo-explanatus, magnitudine admodum varius;  
albus, flavescentia, rufescens, subumbrinus; sericeo-  
lævis, diffracto — l. piloso-squamosus. Caro mol-  
lis, alba; subinde rubens. Lamellæ approximatæ,  
confertæ, juniores carneæ l. rubræ, dein fuscæ sub-  
nigrescentes, raro cinereæ. *A. candidus* Schum. Sall.  
p. 253. Usus in cibariis præstans, multiplex. Cf.  
Retz. Fl. Oec., Tratt. Essb. Schw. t. K. L., Pers.  
Champ. comest. &c. — In arvis, campis & silvis per  
omnem Europam, (Lapon. — Ital.) Asiam in Japo-

niam usque (Thunb. Jap.); in Barbaria (Desf. Atlant. p. 433) & Amer. boreali. (Mühlenb.) Major. Oct. (v. v.)

Distinguunt Micheli species permultas; Schæffer quattuor (*A. camp.*, *pratensem* t. 96, *silvaticum* t. 242, *arvensem* t. 310, 311); Scopoli (*Carn.* n. 1467, 1478) & Persoon dues; nulli vero limites constantes reperiuntur, neque characteres acuti.

3. *A. coronillus*, minor, pileo carnoso umbonato glabro, lamellis liberis demum fuscis, stipite cavo annuloque erecto albis.

*Bull.* t. 597. f. 1. *Dec.* fr. 2. p. 202. *Syn.* p. 41.

Stipes æqualis, uncialis, annulo parvo integro. Pileus lævis, 1 - 1  $\frac{1}{2}$  unc., convexus, fulvus l. brunneus. Lam. rotundatæ, ventricosæ, juniores albae, dein rubræ. *In Galliæ silvis.* (v. ic.)

4. *A. hæmatospermus*, tenuis, pileo umbonato glabro argillaceo-rufescente, lamellis liberis demum fuscis, stipite fistuloso, annulo erecto.

*Bull.* t. 595. f. 1. *Pers. syn.* p. 26x. *Dec.* fr. 2. p. 206,

Stipes æqualis, 2 unc. longus, 1 lin. crassus. Pileus submembranaceus, campanulatus, mox explanatus, 2 unc. latus, subsquamulosus, demum circa umbonem depresso. Lam. rubræ. — Variat pileo nigrescente squamuloso. *In Gallia.* (v. ic.)

- \*\* 5. *A. sagatus*, pileo carnoso lævi fulvo, lamellis liberis umbrinis, stipite cavo, annulo patente.

*A. mutabilis.* *Fl. Dan.* t. 1008. f. 2. excl. *syn.*

Stipes æqualis, 2-3 unc. longus, 2-3 lin. crassus, fragilis, demum subcompressus. Annulus persistens, albus. Pileus planus, obtusus, siccus, glaber, 2-3 unc. latus. Lam. confertæ, distinctæ. Sequ. valde affinis. *In pratis humidis post fœniseicum.* Aug. Sept. (v. v.)

6. *A. præcox*, pileo carnoso lævi alutaceo-lutescente, lamellis adnexis dente decurrente & pallido fuscis, stipite subfarcito glabro albo.

- A. *candicans*, Schæff. t. 217. A. *cerosolus*, Schæff. t. 51. *minor*. A. *aestivus*, Auct. - Schum. p. 259. A. *præcox*, Pers. syn. p. 420. A. S. p. 205. Swartz, l. c. 1808. p. 206.  
 b. *annulo lacerato*. Batt. t. 20. C. A. *appendiculatus*, Sowerb. t. 324.  
 c. *pusillus*, pileo flavente (vix  $\frac{1}{2}$  unc.), lamellis albidis, stipite tenui nudo.

Variat ut A. campestris. Stipes æqualis, sat firmus, sed dein cavus, 2-3 unc longus. Annulus subpatulus, striatus, albus, fugax, subinde lacera-tus l. nullus. Pileus convexo-planus, glaber, obtusus, 2 unc. circiter. Caro variat tenuis & compacta. Lam. emarginata. — Huc forte & A. durus. Bolt. t. 67. f. 1., A. *delicatus* With. p. 169. In graminosis vere & æstate vulgaris. (v. v.)

β? A. *sphaleromorphus*, lamellis lutescentibus, stipite clavato. Bull. t. 540. f. 1. Pers. syn. p. 266.

Species antecedens vulgatissima Bulliardo late-re non potuit, hinc præsentem proximam huc re-tuli, formis aliquot intermediis visis. Lam. decur-rentes. In Gallia. (v. ic.)

7. A. *melanospermus*, pileo carnoso lævi flavo, la-mellis rotundato-adnexis & flavescenti-nigris, stipite cavo albido deorsum incrassato.

Mich. gen. t. 74. f. 11. A. *bulbular*. Batsch. C. I. f. 108. — Bull. t. 540. f. 2! Pers. p. 420. Dec. fr. 2. p. 157.

Præcedentem & sequentem inter medius. Sti-pes 2 unc. longus, annulo albo persistente. Pileus convexus, dein repandus & subdepressus, glaber, 2 unc. In graminosis pinguibus & arvis. Sept. Oct. (v. v.)

8. A. *obturatus*, pileo glabro sicco flavo, lamellis adnatis purpurascenti-umbrinis, stipite farcto brevi deorsum attenuato.

Stipes firmus, lævis, albus, 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 2 unc. circiter crassus. Annulus superus, deflexus, albus. Pileus sèpius compactus!, obtusus, convexo-

planus, 1-2 unc. latus, lævis; variat rimoso-squamosus. Caro candida. Lam. absque dente, planæ, confertæ. — Occurrit forma abortiva lamellis angustis distantibus, candidis. *In aggeribus Scaniæ, ubique. Sept.-Nov. (v. v.)*

9. *A. semiglobatus*, pileo hemisphærico lævi viscoso flavo, lamellis adnatis nigro-nebulosis, stipite fistuloso glabro, apice nigro-punctato.

**Fungus parvus, albus, cum luteola parte &c. J. Bauh.**  
**XL. c. 69. (ie. bona.) Fungus minor ex albido**  
**subluteus pileo hemisphærico. Raji Hist. II. p.**  
**97. ! A. lustre. Bull. t. 566. f. 4. A. glutinosus.**  
**Curt. Lond. I, t. 144. A. semiglobatus. Batsch. C.**  
**I. f. 110. Sowerb. t. 248. Pers. syn. p. 407. Swartz.**  
**l. c. p. 203. A. præcox. Schum. p. 315.**

Vera omnino Pratella, sporidiis eleganter fuscopurpureis. Gregarius. Stipes 3 unc. circiter longus pallidus, strictus, annulatus; in silvis rotundis filiformis. Pileus carnosus, obtusus,  $\frac{1}{2}$  unc & ultra. Lam. planæ, latæ. *In fine in pratis & silvis, frequens. Majo-Nov. (v. v.)*

10. *A. nitens*, pileo umbonato subviscoso flavo, marginem versus squamoso, lamellis adfixis nigris, stipite cavò glabro. *Fl. Dan. t. 1057.*

Gregarius, sat firmus. Stipes 2-3 unc. longus, 2-3 lin. crassus, æqualis, apice subpulverulentus. Annulus integer, patulus. Pileus leviter carnosus, junior conicus, mox hemisphæricus, 1-2 unc. latus. Lam. latæ, planæ, postice angustatae. *In fine locis umbrosis, raro. Jul. Aug. (v. v.)*

- \*\*\* 11. *A. squamosus*, pileo subviscoso luteo, squamis sparsis concentricis, lamellis adnatis nigricantibus, stipite farcto, infra annulum villososquamoso.

a. stipite squamis fibrilosis reflexis. *Pers. syn. p. 409. Fr. Obs. 2. p. 23. A. subcern. Schum. p. 255.*

b. stipite tomento strigoso obductus. *A. distans Pers. disp. p. 23. A. sphaleromorph. Schum. l. e.*

*Stipes* dein *cavus*, *æqualis*, 3-4 unc. *longus*, 2 lin. *crassus*, supra *annulum integrum* distantem *pulverulentus*. *Pileus* leviter *carinosus*, *hemisphæricus*, dein *planus*, *subobtusus*, 1-3 unc. *latus*, *humidus obscurior*, *siccus ochraceus*. *Lam.* *cinereo-maculatae* l. *olivaceo-nigræ*, *margine albidæ*. *In silvaticis*. b. *inter folia decidua Fagi*, *sæt frequens*: Sept.-Nov. (v. v.)

12. *A. Hornemannii*, *magnius*, *pileo compacto glabro subcinnamomeo*, *lamellis subdecurrentibus*, *stipite solidio infra annulum squarroso*.

*A. squarros*. *Fl. Dan.* t. 1191. — *Fries Obs.* 2. p. 13.

*Speciosus*, *amplus*. *Stipes* 4-5 unc. *longus*,  $\frac{1}{2}$  unc. *crassus*, *æqualis*, *squamis confertis revolutis albis*. *Pileus* *convexus*, *obtusus*, *subhumidus*, 3-5 unc. *latus*, *e livido-lutescens*, *sed e sporidiis cinnamomeus*. *Lam.* *latæ*, *primo albidæ*, *dein e sporidiis copiosis nigræ*. *quibus vero detritis iterum alblicant*. *In pinetis Sueciæ & Norvegiæ copiose*. Sept.-Nov. (v. v.)

β. *A. depilatus*, *pileo stipiteque glabris*. *Buxb.* IV. t. 4. fig. major \*)! (minor potius ad priorem speciem.)

13. *A. Gunnieri*, *atropurpureus*, *pileo compacto stipiteque solidio squamoso-squarrosis*, *lamellis adnatis*.

*A. echinat*. *Gunn.* *Norv.* II. p. 125. t. 7. f. 6.

Priori affinis & *pileo compacto & statura robusta* a sequenti valde diversus. Antecedenti minor. *Pileus* *convexus*, *squamis aculeiformibus erectis*. *Ad trunca Fraxini in Nordlandia, autumno*. (v. ic.)

\*) Hoc synonymon in *Fl. Dan.* t. 1192. relatum ad *A. subluteum*, qui e descriptione ad hanc tribum, ex ico-ne ad Pholiotas pertinet. Utcumque sit — *pileo umbo-nato squamuoso luteo margine striato*, *lamellis decurrentibus*, *stipite solidio lævi* — *distincta species*.

14. *A. echinatus*, pileo subcarnoso squamoso-echinato fuliginoso, lamellis adnatis miniatis, stipite fistuloso squamoso.

Roth, Cat. 2. p. 155. t. 9. f. 1. Pers. syn. p. 419.

Stipes 1  $\frac{1}{2}$  - 2 unc. longus, 1  $\frac{1}{2}$  - 2 lin. crassus, basi incrassatus nigricans, squamis reflexis fuligineis, supra medium glaber purpureus. Annulus incompletus (ni fallor, velum universale). Pileus junior hemisphaericus, dein convexo-planus, uncialis, pulvere copioso cinereo-fusco adsperso. In vaporariis. (v. ic.)

15. *A. versicolor*, pileo squamoso virescenti-brunneo, lamellis decurrentibus dein rufo-brunneis, stipite farcto bulboso. With. arr. 4. p. 166.

Stipes spongiosus, 2 unc. longus, crassitie penxa cygnea, albido-brunneus. Pileus convexus, margine inflexo, dein planiusculus, 1-4 nnc. latus, squamis centro confertioribus. Lam. primo lutescenti-albae. Annulus persistens. In Anglia nemoribus. Jul. repertus.

16. *A. aeruginosus*, pileo carno flavo, glutine cœruleo secedente collinito, inde viridi, lamellis adnatis planis purpureo-fuscis, stipite cavo squamoso.

Fung. medius, pileo muco æragineo &c. Raji Hist. III. p. 19. Am. Hall. helv. n. 2444. A. acuminat. Scop. p. 447. A. viridulus. Schæff. t. 1. A. cyaneus. Bull. t. 530, 170. Bolt. t. 143. Am. Lem. Enc. I. p. 113. A. politus. Bolt t. 30. Fl. Dan. 1248. A. ærug. Curt. Lond 2. t. 309. Sowerb. t. 264. Pers. syn. p. 419. Swartz l. c. 1808. p. 207. Fl. Dan. t. 1373. A. beryllus. Batsch. Cont. 2. f. 213. A. spilotus. Holmsk. Ot. II. t. 42.

Junior glutine denso involutus cœrulescens, dein æragineus, tandem glutine secedente flavescentia, quare & ob annulum incompletum fugacem pro Myxacio hujus seriei haberi posset. Pileus convexus, subinde etiam eleganter squamosus. Ma-

gnitudine admodum variat, solitarius & cæspitosus, lamellis purpureis & fuscis; hinc duplex apud Bolton, triplex apud Schumacher (*A. beryllus*, *viride-marginatus* & *bicarnosus*); quadruplex apud Michelium &c. In silvis, campis & ad truncos, vulgaris. Aug.-Nov. (v. v.)

1. *F. albidus*, sulcis subrufis. Batt. t. 10. B.
  2. *A. hispidus*. Seop. Carn. p. 444.
  3. *A. litoreus*, With. arr. 4. p. 216. Stipes solidus, albus, uncialis. Annulus persistens. Pileus flavo-brunneus. Lam. adnatae, rubesceni-griseæ. Ad Teignmouth, Oct.
- 

### Trib. XXXIII. HYPHOLOMA.

Prat. Cortin. Nees Syst. p. 208. ad p.

CHAR. Velum: cortina telæ instar contexta, fugax, margini pilei & stipiti adfixum. Stipes subcavus, firmus, a pileo discretus. Pileus carnosus, convexus, dein explanatus. Lamellæ adnatae, confertæ, subliquecentes. Asci, ut in tota serie, magni.

Obs. Nomen a υφα & λωμα. Species prima ad Psalliotas \* & Psatyras, reliquæ ad Psalliotas \*\*\* & Psilocybes magis accedunt. Lignatiles, cæspitosi.

\* 1. *A. lacrymabundus*, pileo carnoso piloso-squamoso albo-fusco, lamellis umbrinis, stipite cavo fibrilloso.

Bull. t. 525. f. 3. Sowerb. t. 41. Des. fr. 2. p. 146.

Cæspitosus, fragilis. Stipites 2 unc. longi, 3-4 lin. crassi, basi subincrassati, squamoso-fibrillosi, albido-fuscescentes. Pileus obtusus, junior albidus, dein fuscus, 2-3 unc., saxe irregularis. Lam. albidae, dein fusco-purpureæ, 3 lin. latæ. Ad truncos & terram in silvis frequens. Aug.-Nov. (v. v.)

*B.* *A. velutinus*, pileo umbonato ferrugineo, lamellis fusco-nebulosis &c. Pers. syn. p. 409.

*b.* major, solitarius. Abbild. d. Schwo. 3. (A. macrourus) A. pyrrotrichus Holmsk. Ot. II. t. 35.

Forsan diversus. In silvis. (v. ic.)

\*\* 2. *A. lateritius*, pileo carnosu obtuso fulvo-lateritio, lamellis subvirescentibus, stipite farcto valido, cortina nigrescente.

*a. cæspitosus.* Fung. mediæ magnit. Raji Hist. III. p. 17. A. lateritius. Schæff. t. 49. f. 6. Pers. syn. p. 421. A. amarus. Bull. t. 30; 262. Dec. fr. 2. p. 155. Am. Lam. Enc. I. p. 106. A. auratus. Fl. Dan. t. 890. Hedw. Crypt. t. 38. A. mutabilis. Scop. p. 440. A. pomposus. Bolt. t. 5.

*b. major, solitarius, stipite subbulboso.* Batt. t. 22. f. E. — an A. silac. Pers. syn. p. 421.?

Sequenti, cum quo facile confluit, on. nibus partibus robustior. Pileus vere carnosus, disco fulvus, margine pallido, juniore sericeo; variat viscosus & squamosus. Sapor amarus. Lam. totæ adnatæ, latæ; dein nigrescunt minus virent. Ad truncos, frequens, etiam cum sequ. in America boreali. Majo-Oct. (v. v.)

3. *A. fascicularis*, pileo subcarnoso umbonato ochraceo, lamellis virescentibus, stipite cavo tenui, cortina nigrescente.

*a. cæspitosus.* Fungi multi &c. sp. 4. J. Bauh. hist. XL. c. 53. Sterb. t. 24. M. Batt. t. 22. D. G. N. A. laterit. Schæff. t. 49. f. 1. &c. Am. Hall. helv. n. 2482. Am. flavigena. b. Lam. Enc. I. p. 110. A. pulverulentus. Bull. t. 178. A. fascicularis. Hudson. — Bolt. t. 29. Sowerb. t. 285. Pers. syn. p. 421. Swartz, l. c. p. 207. Nees Syst. f. 198. A. jenensis. Batsch. f. 29. A. olivacea. Hoffm. A. lucidus Otto Ag. p. 35.

*b. solitarius, minor, stipite tendi.* Pers. l. c.

Intense amarus. Stipites tenues, æquales, flavi, apice fere virentes. Pileus  $\frac{1}{2}$  - 2 unc., margine valde tenuis, pallidior. Lam. tenues, nebulosæ. Ad truncos putridos, ubique. Majo.-Nov. (v. v.)

B. *A. marginatus*, gregarius, pileo campanulato, subferrugineo, margine pallido villoso, stipite fibrilloso argenteo nitido. Pers. Obs. 1. p. 11.

Stipes strictus, 2 unc., basi villosus Lam. obsolete virent. Cortina fugax. In pinetis. Aug.-Oct. (v. v.)

4. *A. capnoides*, pileo carnoso sicco luteo, lamellis cæsii, dein purpurascens, stipite fistuloso glabro. Fries Obs. 2 p. 27.

*A. hybridus*. Bull. t. 398? *A. turfos*, Schum. p. 205.

A prioribus valde recedit sapore dulci, cortina fugaci non nigrescente, lamellis numquam virescentibus. Stipes æqualis, pallidus, deorsum ferrugineus. Pileus glaber; variat flavus, fulvus; lamellæ junioribus albidis, flavidis, fomatris. Cum prioribus, præcipue in pinetis copiose. Aug.-Nov. (v. v.)

Quid Am. Hall. helv. n. 2446. spor. cœruleis?

### Trib. XXXIV. PSILOCYBE.

Coprini spec. Pers. syn. p. 407. Pratella Gymn. Noss Syst. p. 209.

CHAR. Velum marginale, tenue, flocculosum, fugacissimum. Stipes cavus, raro junior farctus, tenax, æqualis, subfibrillosus, saepè viscidus, ex conico l. convexo expansus, a stipite subdiscretus. Lamellæ latiusculæ. Substantia tenax, persistens, numquam deliquescens.

Obs. Tribus naturalissima, a  $\psi\lambda\sigma\varsigma$  &  $\beta\eta$  dicta. Species plurimæ terrestres, loca pinguis l. paludosa incolentes, solitariæ l. gregariæ, minores, persistentes, non cibariæ, valde variantes; hinc pauciores tantum distinguere ausus sum. (*A. arvalis*, *inquilin.*) .

†. Lamellæ adnatæ.

- \* 1. *A. compactus*, pileo carnosu umbonato viscoso badio, lamellis adnatis badio-purpureis, stipite longo sericeo. Schum. Sæll. p. 285.

Stipes cavus, 5 unc. longus, 3-5 lin. crassus, basi attenuatus farctus, fuscescens. Pileus 2 unc. & ultra. Caro albido-badia, stipitis subrosea. Inter muscos pineti. Oct. Nov. (v. ie.)

- $\beta$  *A. sароcephalus*, pileo flavo &c. Fries Obs. 1. p. 51.

2. *A. pediades*, pileo obtuso sicco ochraceo-pallidente, lamellis subadnatis ferrugineis, stipite pallido.

Gregarius, proximus *A. vervacti*, sed cresendi modo & statura *A. oreadi* similis. Stipes 2-3 unc. longus, 1-2 lin. crassus, obsolete sericeus, tenax; basi saepe bulbillo spurio. Pileus planus, 1-2 unc. latus, laevis. Lam. planæ, sporidiis ferrugineofuscis. *Ali vias Ec. regionum campestrium. Jul.-Sept.* (v. v.)

3. *A. tenax*, pileo campanulato obtuso, sicco ochraceo, lamellis adnatis demum umbrino-ferrugineis, stipite longo glabro. Fries Obs. 1. p. 54.

Sparsus. Stipes subfistulosus, 2-4 unc. longus & ultra, 1 lin. crassus. Pileus subcarnosus, dein expansus, uncialis & ultra, numquam viscosus, in statu humido cinnamomeus, circa marginem aquose flavescentia. Lam. primo olivaceo-fuliginea, margine albæ, dein umbrino-ferruginea. Sporidia, ut in seqq., fusco-purpurea. *Inter folia Abietis. Aug.-Dec.* (v. v.)

4. *A. Myosotis*, pileo convexo viscoso viridi-olivaceo, lamellis adnatis ex albido ferrugineis, stipite longo fibrilloso. Fries Obs. 2. p. 34.

Gregarius. Stipes 3 unc. longus, 2 lin. crassus, albidus, apice leviter pruinatus. Pileus subcarnosus, explanatus leviter umbonatus,  $\frac{3}{2}$  unc. & ultra, colore peculiari. Lamellæ denticulo decur-

rente, serrata, margine sape albida. In fagetia  
graminosis & ad margines paludum, Sept.-Nov. (v. v.)

5. *A. merdarius*, pileo convexo-plano sicco, dein  
ochraceo, lamellis adnatis umbrinis, stipite  
brevi glabro.

*Buxb. Cent. IV. t. 15. f. 2.* (sat convenit.)

Prioribus affinis; forsitan sub *A. fimicola* Pers.  
comprehensus. Stipes primo farctus, dein cavus,  
pallidus, aequalis, uncialis l. parum ultra, 1 lin.  
crassus. Pileus obtusus, non viscosus, humidus fu-  
sco-luteus l. cinnamomeus, siccus lutescens; mar-  
gine striatus. Lam. latæ, nigricantes; variant  
emarginatæ. In fine passim. Oct.-Nov. (v. v.)

6. *A. stercorarius*, pileo obtuso lævi viscido livi-  
do-flavo, lamellis latis decurrentibus fuscis, sti-  
pite stricto fibrilloso.

*A. adnatus*. *Huds.* p. 691. *A. stercor.* *Schum.* p. 386.  
(quamvis lam. liberæ &c.)

Similis A. semiglobato; reliquis minus tenax.  
Stipes 2-4 unc, longus, 1 lin. crassus, subfragilis,  
albidus, dein pallescens, apice sub velo pruinatus,  
basi albo-villosus. Pileus junior hemisphæricus  
livido-flavus, adultus planus luteus, subnitens, der-  
mum expallens, discoideus,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. latus. Lam.  
juniores adnatæ, planæ, fuscantes, margine al-  
bido, dein decurrentes, convexæ, triquetrae, ad la-  
tera olivaceo-nigræ. In fine vaccino, locis paludosis  
silvaticis. Jul.-Oct. (v. v.)

7. *A. ericæus*, pileo convexo lævi nitente, lamel-  
lis latis adnatis nigricantibus, stipite elongato  
nudo.

a. pileo ferrugineo-fulvo, siccо fulvo-luteo. *A. hel-*  
*volus*. *Schäff* t. 210. *A. eric.* *Pers. syn.* p. 413.  
*Fries Obs.* 2. p. 177.

b. pileo subspadiceo. *A. nitidus*. *Pers. l. c.* — forte  
& *A. fusco-purp.* *With.* p. 249.

Stipes firmus, 3-4 unc. longus, lutescens, subglaber, sed locis limosis etiam pallidus sericeus. Pileus humidus subviscosus, præsertim b., vix umboatus, uncialis & ultra. Lam. subdistantes, margine albicantes. Varietates plures. *Ad terram locis humidis vulgaris. Jul.-Oct. (v. v.)*

8. *A. udus*, pileo convexo sicco testaceo-falvo expallente, lamellis adfixis ventricosis e pallido-purpurascensibus, stipite fibrilloso ferrugineo.

*Pers. syn. p. 414. A. obscurus. Schum. p. 279.*

Stipes 2-3 unc. longus, inter muscos valde productus, minus tenax, apice dilutior. Pileus subcarnosus, dein explanatus subochraceus rugulosus, vix striatus, subobtusus,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. latus. Lam. planæ, dein convexæ, laxæ, latissimæ, juniores albidae. *In paludosis turfosis, frequens. Jun.-Oct. (v. v.)*

*B. A. Polytrichi*, pileo obtuso flavo albicante, lam. albido-nebulosis, stipite subfulvo apice pallido. *Fries Obs. I. p. 51.*

Stipes longior, subflexuosus. Pileus dein depresso,  $\frac{1}{2}$  unc. Lamellæ non purpurascunt. *Ibidem. (v. v.)*

*γ. A. elongatus*, pileo submembranaceo obtuso, humido striatulo livido-flavo, sicco lævi flavo, lamellis pallido-nebulosis, stipite tenui.

*Pers. ic. & descr. t. 1. f. 4. Syn. p. 384. Fr. I. p. 44.*

Stipes flexuosus. Pileus humidus etiam viret. Sporidia, ut in prioribus. *Inter Sphagna. (v. v.)*

9. *A. callosus*, pileo conico sicco, lamellis adnatis adscendentibus atropurpureis, stipite tenaci glabro pallido.

a. pileo albo l. albido. *Bussb. Cent. IV. t. 15. f. 2.*  
— *Fries Obs. 2. p. 180.*

b. pileo luteo. *A. semiglabrat. Sowerb. t. 240. f. 1.*  
*3. A. semilanceat. Fries l. c. 178.*

c. pileo livido. *A. varius. Eolt. t. 66. Pers. syn. 414.*

d. pileo spadiceo.

**Gregarius**, admodum tenax. Stipes 2-3 unc. longus, tenuis, saepe flexuosus, demum a sporidiis inquinatus. Pileus  $\frac{1}{2}$  unc. & ultra latus, margine substriatus. Est *A. campanul.* Linn. Suec. 2., sed non ed. i. *Ad vias alibique locis graminosis, vulgaris.* Aug.-Nov. (v. v.)

10. *A. nucisedus*, pileo convexo laevi flavescente, lamellis adnatis fusco-nebulosis, stipite subfragili glabro. *Fries Obs.* 2. p. 176.

Stipites 2 unc. longi, pallidi, basi subfuscescentes. Pileus obsolete umbonatus, 3-5 lin. latus. Lam. margine albicant. Ulterius inquirendus. *Semel in calycibus Fagi.* Autumno. (v. v.)

11. *A. montanus*, pileo convexo obtuso subspadiceo expallente, lamellis adnatis planis umbrinatis, stipite brevi glabro.

*Pers. Obs.* 1. p. 9. *Syn.* p. 428. *Fries Obs.* 2. p. 175.

Parvus. Stipes uncialis, pileo concolor; apice pallidior, subpruinatus. Pileus humidus striatulus, siccus laevis, 2-4 lin. latus, expallens alutaceus, pallescens. Lam. subdecurrentes. *Ad terram sterrilem apricam ubique.* Per totum annum. (v. v.)

- $\beta$ . *A. atrorufus*, stipite longo fibrilloso. *Schœff.* t. 234.

Stipes 2 unc. longus, albido-fibrillosus. Pileus 4-8 lin. latus, exsiccatus albidus. *In silvis.* (v. v.)

12. *A. obtusatus*, pileo campanulato obtuso nitido dilute badio, lamellis adnatis umbrinatis, stipite basi incrassato villoso. *Pers. syn.* p. 428.

Stipes crassiusculus, pallescente-albus. Pileus  $\frac{3}{4}$  unc. altus, demum subrugosus. Lam. lineares, margine albidiiores. *Ad truncos putrescentes, rarissime.*

- $\beta$ . *A. hebes*, pileo convexo-plano lurido expallente, lamellis latis triquetris, stipite glabro.

Stipes 1  $\frac{1}{2}$  unc., firmus, striatulus. Pileus tenuis, humidus subviscosus striatus, siccus laevis alutaceo-ochraceus. Lam. rigidæ, albido-fuscæ. Ad trunco, rarissime. Sept. (v. v.)

††. Lamellæ adnexæ l. liberæ. Rigidæ.

13. *A. ventricosus*, pileo conico expanso, laevi umbrino expallente, lamellis adnexis pallide umbrinis, stipite ventricoso radicato.

*Bull. t. 411. f. 1. (habitu parum deflectente) Dec. fr. 2 p. 160. Schum. Sæll. 2. p. 278!*

Sæpe gregarius. Stipes cavus, 2 unc. longus, testaceo-alutaceus, radice fusiformi. Pileus subcarnosus, 2 unc. latus, junior ovato-conicus, mox campanulatus, demum expansus subdepressus, siccaus alutaceo-pallens. Lam. latæ. Ad terram fitosam, æstate. (v. v.)

14. *A. tegularis*, pileo campanulato alutaceo, vertice subtegulatim rimoso, lamellis adnexis fusciscentibus, stipite farcto subbulboso. *Schum. p. 317.*

Caro alba. Stipes 2  $\frac{1}{2}$  unc. longus, apice 1 lin. crassus. Pileus subcarnosus tenuis, junior glandiformis, 1 unc. latus  $\frac{3}{4}$  altus. Lam. postice attenuatae. In graminosis fageti Sællandiæ. Sept. Oct. (v. ic.)

15. *A. canobrunneus*, pileo convexo-plano lavi fuscente expallido, lamellis subliberis fuscoc-purpureis, stipite radicato squamuoso.

b. *A. canobrunn.* Batsch. C. I. f. 105.

Sordibus plerumque inquinatus. Stipes firmus, rigidus, cavus, 2 unc. longus, 3 lin. crassus, albido. Pileus carnosus, glaber, humidus subviscosus incarnato-fuscus, siccus alutaceo-pallens, 1  $\frac{1}{2}$  unc. latus. Lamellæ latæ, confertæ juniores pallidæ, aquose fuscæ. Ad terram, præcipue locis denustis. Sept. Oct. (v. v.)

16. *A. campanulatus*, pileo submembranaceo campanulato lœvi brunneo, lamellis liberis ferrugineis, stipite lœvi obsolete annulato

*Bull. t. 552. f. 1. Dec. fr. 2. p. 154. Pers. syn. p. 426. Fries Obs. 2. p. 173.*

Stipes fistulosus, 4 unc longus, tenuis, levis. Pileus siccus pro more lutescens, uncialis usque. Lamellæ perlatæ. *Ad terram in silvis. Aug. Sept. (v. v.)*

17. *A. fœnisepii*, pileo subcarnoso glabro dilute umbrino expallente, lamellis adnexis umbrinis, stipite nudo glabro rufescente.

*Buxb. IV. t. 28. f. 1. Pers. & deser. t. 11. f. 1. Syn. p. 411.*

Stipes 1-2 unc. longus, minus tenax. Pileus e campanulato convexus obtusus, demum planus, rugulosus.  $\frac{1}{2}$  unc. & ultra. Lam. forsan adnatae potius, sed valde ventricosa, inde emarginatae apparent. *In graminosis pinguibus, arcis hortorum &c. Mayo-Oct. (v. v.)*

1. *Mich. gen. t. 73. f. 1.*

2. *Buxb. Cent. IV. t. 14. Major, albicans.*

3. *Fungus igneus. Rumpf. p. 150. t. 56. f. 5. (Memorabilis, nocte lucet stellæ instar igne cæruleo-fuliginea.)*

4. *A. extenuatus. Scop. p. 448.*

*Obs. A. cinctulus. Bolt. t. 152. ad varios semies pallidos referri potest.*

### Trib. XXXV. PSATHYRA.

*Pratelle b. ad part. Pers. syn. p. 423. Pratella Mycen. Nees Syst. p. 209.*

CHAR. Velum marginale, fugacissimum. Stipes fistulosus, æqualis, fragilis, albus, subpruinatus. Pileus submembranaceus, junior glandiformis, dein e campanulato-expansus. planiusculus, obtusus, fragilis, siccus, tactu mollis, vix glaber,

sed plerumque fibrillis l. atomis innatis tectus.  
Color albido-fuscens, in statu sicco expallens.  
Lamellæ adfixæ, rarius liberæ, fuscescentes. *Sporidia fuscopurpurea.*

Obs. Tribus admodum naturalis. a ψευδος-  
dicta ob fragilitatem insignem. Plurimæ species  
incolunt ligna uda, terram graminosam pingue e.  
s. p. Sporidia omnium specierum, a me non vi-  
sarum, hujus & sequentis tribus inquærenda!

† Lamellæ adfixæ. (*A. lacrymab.*)

1. *A. stipatus*, pileo subcarnoso glabro fusco-spa-  
diceo expallente, lamellis adnatis confertis in-  
carnato-fuscis, stipite glabro.

a. cæspitosus. *J. Bauh. XL. c. 33. spec. 5. A. spadi-*  
*ceus. Schæff. t. 66. A. spadiceo-griseus. Schæff. t.*  
*233. A. hydrophilus. Bull. t. 51. Dec. fr. 2. p.*  
*201. A. eoncinnus. Bolt. t. 15. A. xylophilus. Qui-*  
*busd. A. appendicul. Pers. comm. A. stipatus. Pers.*  
*syn. p. 423. Fr. Obs. 1. p. 48. Fl. Dan, t. 1675.*

b. solitarius, *A. fuscus. Schum. p. 280.*

Plerumque valde cæspitosus. Stipites 2-3 unc.  
longi, 2-3 lin. crassi, æquales, apice striatuli & ob-  
solete farinulenti. Cortina fimbriata, alba. Pileus  
1-3 unc. latus, siccus rugulosus. Valde variat: ma-  
gnus, solitarius, stipite annulato (*A. macropus* Pers.  
syn. p. 402?), pusillus e. s. p. *Ad E. juxta trun-*  
*cos in silvis frondosis, communis. Jul.-Nov. (v. v.)*

B. *A. hydrophilus*, major, pileo 3-5 unc., la-  
mellis ad dimidium adfixis lineatim decurrentibus  
fusco-umbrinis, stipite valido (6 poll. altus,  $\frac{1}{2}$  unc.  
crassus) rigido. *Circa Fraxini truncos in Scania. Oct.*  
(v. v.)

c. γ. *A. fatuus*, solitarius, pileo submembranaceo  
argillaceo-albido, lamellis albidis, stipite inæquali.  
*In dumetis ad terram. Sept. Oct. (v. v.) Stipite gla-*  
*bro, lamellarum colore E. & sqq. distinguendus.*

2. *A. Candolianus*, pileo subcarnoso lævi, demum  
albido, lamellis adfixis violaceis decolorantibus,  
stipitibus fibrillosis, cortina fimbriante.

*A. appendicul.* Bull. t. 392. Schum. p. 302. *A. mutabilis* Fl. Dan. t. 774. (bene) *A. violaceolamell.* Dec. Fl. fr. 2. p. 145. *A. cand.* Fr. Obs. 2. p. 182.

Cæspitosus. Stipites basi subincrassati, 3 unc. longi, apice striati. Pileus junior spadiceus, mox albidus, 2-4 unc. Lam. rotundato-adfixæ, juniores margine albicante, dein spadiceæ. *Ad terram infagatis.* Sept. Oct. (v. v.)

3. *A. fibrillosus* Pers., pileo submembranaceo striatulo albido, lamellis adnatis purpureo-nigris, stipite elongato fibrilloso-squamoso. Fries Obs. 2. p. 181.

Admodum fragilis. Stipes 3-4 unc. longus, 2-3 lin. crassus, totus squamulis villoso-fasciculatis obsitus. Pileus humidus livescens, siccus albus, non striatus; sed saepe fibrilloso-squamulosus. Lam. primo cinereæ. *Inter folia decidua.* Aug.-Oct. (v. v.)

4. *A. pennatus*, pileo submembranaceo subtestaceo albo-squamoso, lamellis adfixis lividis nigricantibus, stipite brevi villoso apice pulverulento.

Gregarius, fragilis. Stipes unsialis & ultra, equalis, 1-2 lin. crassus. Pileus  $\frac{1}{2}$  unc. altus & latius, non striatus, colore varius. Lam. ventricosæ, subsecuentes, margine subalbicantes. *Ad terram locis deustis &c.* Aug.-Oct. (v. v.)

5. *A. coprophilus*, pileo subcarnoso lævi rufescente-fuligineo, lamellis arcuato-adfixis lividis, stipite hirsuto cinerascente.

Bull. t. 566. f. 3. Pers. syn. p. 412. Dec. fr. 2. p. 152.

Stipes 2-3 unc. longus, 1 lin. crassus, sensim glaber. Pileus, pro more affinum, junior ovatus (tum etiam lanuginosus), dein expansus obtuse umbonatus. Lam.  $\frac{1}{2}$  unc. latæ. *In fimetis Gallæ.* (v. ic.)

6. *A. bullaceus*, pileo submembranaceo rufo, margine striato, lamellis planis latissimis cinnamonomeis, stipite brevi tomentoso.

*Bull. t. 566. f. 2. Pers. syn. l. e. Des. l. e.*

Stipes 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, basi subincurvus. Pileus hemisphaericus, minor. Lam.  $\frac{1}{2}$  unc. latae. Sporidia? Cum priori, gregarius. (v. ic.)

\*\* 7. *A. cernuus*, pileo submembranaceo hemisphaerico livido, sicco albido, lamellis adnatis cinereo-nigricantibus, stipite glabro apice albo-pulverulento.

*A. farinulentus*. Schœff. t. 205. *A. cernuus*. Fl. Dan. t. 1068. f. 1. Fries Obs. I. p. 50. *A. alneti*, Schum. p. 280.

Stipes 2 unc. longus, 1 lin. crassus, sape curvatus. Pileus humidus striatus, sero expanditur, rugulosus,  $\frac{1}{2}$  unc. & ultra latus. Lamellæ distantes, latæ, margine albicant. In silvis ad terram Ec. Aug.-Nov. (v. v.)

8. *A. atomatus*, pileo submembranaceo obtuso albido-roseo, atomis nitentibus furfurato, lamellis adnatis cinereo-nigricantibus, stipite squamuoso.

Gregarius, pulcher. Stipes 2 unc. longus, plus minus pulverulento-squamulosus. Pileus campanulatus, dein convexus, obtusus,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. latus, pallidus, siccus rugulosus. Lam. latæ, fragiles, prioris similes. Ad terram graminosam, juxta vias Ec. Jul.-Sept. (v. v.)

9. *A. corrugis*, pileo submembranaceo campanulato umbonato roseo, lamellis adnatis violaceo-nigricantibus, stipite glabro.

*A. carbonar.* var. Batseh. C. I. f. 91. *A. limbat.* Holmsk. Ot. 11. t. 32. *A. corr.* Pers. syn. p. 424. *A. S.* p. 206. — Forte *A. pellosp.* Bull. t. 561.

Stipes 2-4 unc. longus, 1-2 lin. crassus, glaber, basi pilosus. Pileus expallens, siccus pro more corrugatus, uneialis & ultra. Lam. latæ. Plures affinis species sub hoc commutatae. In hortis, silvorum umbrosis Ec. Aug.-Oct. (v. v.)

10. *A. murcidus*, pileo subcarnoso convexo obtuso spadiceo expallente, lamellis adnatis umbrinis, stipite nudo glabro.

Admodum fragilis. Stipes 3-4 unc. longus, 1 lin. crassus, non pruinatus. Pileus valde obtusus, humidus striatus subspadiceus, siccus levius alutaceus, raro rosellus, 1  $\frac{1}{2}$  unc. usque latus. Lam. planæ, subdistantes, segmentum circuli referentes, margine concolori. In fageto umbroso reperi. Oct. (v. v.)

- \*\*\* 11. *A. gracilis*, pileo submembranaceo campanulato obtuso, lamellis postice latissimis adnatis cinereo-nigricantibus, margine roseo, stipite tenui glabro.

*A. gracilis*. Pers. syn. p. 425? *A. diffusus*. Batsch. C. 2. f. 111. (minus quadrat.) *A. tentaculum*. Sowerb. t. 385. f. 1. quoad habitum.

Gregarius, valde fragilis. Color eximie variat; naturalis in statu humido fuscescens, siccus ochraceus, alutaceus & saepe eximie albido-roseus. Stipes 3 unc. & ultra, aequalis, vix 1 lin. crassus, basi villosus. Pileus mollis, tenuis, semper obtusus, uncialis, glaber, margine striatulus. Lam. denticulo decurrente, distinctæ, distantes, integerrimæ. In hortis, silvis alibiique inter folia decidua, frequens. Aug.-Nov. (v. v.)

B. *A. caudatus*, major, radicatus &c. Fr. 2. p. 187.

12. *A. torpens*, pileo submembranaceo leví pallecente, lamellis adnatis basi angustatis fuscis margine albidis, stipite glabro.

Gregarius, fragilis. Stipes 3 unc. longus, aequalis, 1 lin. crassus, nudus, albus. Pileus glaber,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. latus, argillaceo-pallescens, incarnatus &c., junior campanulatus, dein hemisphericus. Lam. confertæ!, adnatæ, subventricosæ, 3 lin. latæ. Ad terram graminosam Lundæ Ec. Oct. (v. v.)

Species lamellis non adnatis vide sub Coprinario.

1. Bulla. Batt. t. 27. L.
  2. A. cuspidatus. Bolt. t. 55. Varietas A. gracilis, secundum Persoon.
  3. A. ligays. Spreng. Maut. 1. p. 20.
- 

## Trib. XXXVI. COPRINARIUS.

Coprini & Pratellæ spec. Pers. l. c.

CHAR. Velum margine adfixum, raro annuliforme, plerumque fugacissimum. Stipes fistulosus, tenuis, subfragilis, a pileo discretus. Pileus leviter carnosus aut membranaceus, glaber, subpersistens. Lamellæ subliquescentes. Sporidia nigra. (In speciebus examinatis.)

† Lamellæ adnatæ, cinereo & nigro variegatae. Pileus leviter carnosus, lævis, conico-campanulatus l. hemisphæricus, obtusus, nec adultus expansus, senio corrugato-contractus. Fimicolaræ.

1. *A. semiovatus*, pileo subcarnoso campanulato viscoso argillaceo-albido, lamellis adnatis cinereo-atris, stipite longo albido, annulo integro.

*A. separatus*. Linn. Suec. n. 1220. *A. nitens*. Bull. t. 84. Dec. fr. 2. p. 202. Am. Lam. Enc. I. p. 113. *A. ciliaris*. Bolt. t. 53. Pers. syn. p. 416. *A. semiovat.* Sowerb. t. 151. Pers. syn. p. 408. Swartz. l. c. 1808. p. 180. *A. coronat*. With. p. 270. (ex descr.)

Stipes spithameus, strictus, 2 lin. fere crassus, subbulbosus, nitens, superne e pulvere seminali atro punctatus, sub lente striatus. Annulus distans, albus, persistens. Pileus obtusissimus, 1 unc. altus. Lam. 2-3 lin. latr., adscendentes, antice evanescentes, facile secedunt. In fine vaccino &c. per totam aestatem. (v. v.)

2. *A. fimiputris*, pileo subcarnoso campanulato humidu[m]o cinereo expallente, lamellis adnatis cinereo-atris, margini concoloribus, stipite longe rufescente, annulo lacerato.

*A. fimiputris*. *Bull.* t. 66. *Dec. fr.* 2. p. 151. *A. semiovatus*, *Schum.* p. 359. *A. clypeatus*, *Bolt.* t. 57.

Stipes 2-4 unc. longus, æqualis, fragilis, superne lævis, cinerascens, pulverulentus. Pileus humidus nigricante-cinereus, siccus lividus, e velo appendiculatus. Caro sordida. Lam. adscendentæ, ventricosæ, deliquescentes. *In fino equino* &c. Aug.-Oct. (v. v.)

3. *A. papilionaceus*, pileo subcarnoso campanulato sicco nigrescente-fuligineo expallente, lamellis adnatis cinereo-atris, margine albis, stipite longo rufescente, apice striato atro-pulverulento.

*Fung. buf.* sp. 1. *Clus.* p. 278. *Bauh. l. c.* e. 73. ic. *Fungus parvus galericulatus*, *striis lividis &c.* *Raji Hist. II.* p. 98. *Vaill. par.* p. 65. — *Buxb. Cent. IV.* t. 13. f. 2. *A. acuminat.* *Schæff.* t. 202. *A. papilionac.* *Bull.* t. 58, 561. f. 2. *Dec. fr.* 2. p. 152. *Pers. syn.* p. 410. *A. carbon.* *Batsch.* f. 6. *A. semiovat.* b. *Schum.* l. c. *A. varius.* *Pers. ic.* & deser. p. 40.

b. minor. *Buxb. C. V.* t. 48. f. 2. *A. equinus.* *Abb. d.* *Seh.* 3.

c. stipite guttulis aqueis. *Fries Obs.* 2. p. 184.

Stipes 3 unc. longus, æqualis, 1-2 lin. crassus, rufescens. Pileus demum convexus, exsiccatus subrufescens, lævis,  $\frac{1}{2}$  - 1 uncialis, numquam viscosus. Lamellæ adscendentæ, confertæ, integerrimæ. Veilum fugacissimum. *In fimetis, silvaticis pinguibus* &c. *Majo-Nov.* (v. v.)

4. *A. fimicola*, pileo subcarnoso hemisphericō fuscamente-alutaceo, lamellis adnatis latis cinereo-atris, stipite glabro apice albo-pulverulento.

*Buxb. Cent. IV.* t. 28. f. 4. — An *Pers. syn.* p. 412?

Valde affinis priori, sed minor. Stipes 2-3 unc., æqualis, pileo concolor. Pileus  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. latus, humidus margine striatus, siccus futescens, rufescens l. disco fulvus. Lam. 2-3 lin. latx. *In pastuis, hortis* &c. *vere, raro autumno.* (v. v.)

5. *A. nutans*, pileo hemisphærico subcerno albidō, lamellis adnatis cinereo-nigris, stipite attenuato nudo. *Batt. t. 28. R.*

Stipes 2 unc. longus, lœvis, albidas, basi sub-incrassatus ascendens, apice curvatus. Pileus lœvis, uncialis, e velo leviter denticulatus. Lam. confertæ. *In fimo, vere. (v. ic.)*

6. *A. subtilis*, pileo submembranaceo campanulato lœvi albidō, lamellis adnatis nigris, margine albis, stipite glabro albo.

Tenellus. Stipes 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, filiformis, nudus, lœvis, fragilis. Pileus 3 lin. altus & latus, obtusus, lœvis. Lamellæ latiusculæ, ascendentes, cinereo-nigricantes. *In fimo locis uidis silvaticis. Sept. Oct. (v. v.)*

†† Lamellæ adfixæ l. liberæ, liquecentes. Pileus membranaceus, demum striatus l. fissus, vix revolutus. *Gregarii, fragiles.*

- \* 7. *A. impatiens*, pileo obtuso glabro furcato-sulcato pallido, lamellis adnatis cinereis, stipite glabro fragili nudo.

Stipes 4-5 unc. longus, 1 - 1  $\frac{1}{2}$  lin. crassus, albus. Pileus campanulatus, mox convexus, uncialis & ultra, disco lœvis, humidus lividus, siccus lutescens. Lam. lineares, distantes, fragiles, albidae, sed e sporidiis nigriæ, (quibus ab A. gracili distinctus) cinereæ. *In dumetis humidis. Oct. Nov. (v. v.)*

8. *A. striatus*, pileo campanulato, disco lœvi rufescente, margine furcato sulcato pallido, lamellis rotundatis brunneis, stipite albo.

*Bull. t. 552. f. 2. Dec. fr. 2. p. 153. a.*

Ab A. plicato P. certe diversus, de cetero dubius mihi visus. Stipes 4 unc. longus, æqualis. Pileus aspectu elegans. *In Gallia. (v. ic.)*

9. *A. hiascens*, pileo campanulato fisso-sulcato luteo-scente, lamellis adnatis nigris, stipite glabro fragili.

Gregarius, valde fragilis. Stipes 3 unc. longus, laevis, nudus albus. Pileus membranaceus, obtusus, mox fisso-hiascens, demum margine subrevolutus, glaber, uncialis. Lam. lineares, antice attenuatae, angustae, distantes, ex albido-nigricant. Sporidia atra. In scepibus humidis Scaniae Oct. (v. v.)

10. *A. tergiversans*, pileo conico mox sulcato-hia-  
scente fusco-ferrugineo, lamellis adnatis con-  
fertis e cinnamomeo-nigricantibus, stipite  
glabro.

Huc pertinent synonyma nonnulla infra ad *A. ferrugineum* allata. Stipes æqualis, nudus, 5 unc. longus, 2-3 lin. crassus, fragilis, apice sulcatus. Pileus disco laevi spadiceo, demum transversim squarroso-rimosus, tandem lacerato-fissus, 1-2 unc. latus. Lam. postice latæ, sensim antice attenuatae, deliquescentes. Ad terram pinguem &c. Oct. (v. v.)

- \*\* 11. *A. vitellinus*, pileo campanulato viscido vi-  
tellino subfisso, lamellis adnexis argillareis,  
stipite æquali squamuoso pulverulento. Pers.  
p. 402.

Stipes 2-3 unc. longus, 2-3 lin. crassus, æqua-  
lis, apice farinaceus. Pileus disco carnosulus, ob-  
tusus, 1-2 unc. latus, demum minus viscosus. Lam.  
adscendentes, distantes, non fuscescunt, sed dif-  
fluunt In fine equino locis campestribus. Vere. (v. v.)

12. *A. Boltonii*, pileo convexo subumbonato visco-  
so flavo, lamellis adnexis pallidis, stipite atte-  
nuato glabro luteo.

*A. flavid.* Bolt. t. 149. Sowerb. t. 96. *A. Boltoni*,  
Pers. syn. p. 415. Fries Obs. 2. p. 186. — (*A. eques-  
tris*, Bolt. t. 65. junior videtur.)

Valde affinis priori. Stipes 3 unc. longus, fra-  
gilis. Pileus 2 unc. usque latus, etiam difflit,

Lam. ex albido-lutescunt, dein lividæ. In fimo locis humidis, vere reperi. (v. v.)

15. *A. titubans*, pileo tenui plicato viscoso flavo, lamellis adnexis purpurascens, dein incarnato-fuscis, stipite æquali nitido.

*Bull. t. 425. f. 1. Sowerb. t. 128. With. arr. 4. p. 286.  
Pers. syn. p. 415. A. S. p. 202. Dec. fr. 2. p. 152.*

Admodum pulcher & delicatus, totus glaber. Stipes 2-3 unc. longus, tenuis, luteus. Pileus junior ovato-campanulatus lævis; mox explanatus, diaphanus, uncialis, disco flavo lævigato, margine pallidiori plicato, demum diffluens. Lam. distantes, 1 lin. latæ. Sporidia hujus & duorum antece. non examinavi. In fimo vaccino, "equino" &c. passim. Aug. Sept. (v. v.)

14. *A. subliquezens*, pileo conico subviscido pallido, demum explanato fusco-striato, lamellis subliberis albido-fuscis, stipite attenuato. Schum. p. 358.

Stipes 5 unc. & ultra, 1  $\frac{1}{2}$  lin. crassus, fibrosus, fusco-pallidus. Pileus subcarnosus, 1 unc. altus, explanatus 2 unc., margine integro. Lam. liquecentes. In fimo. Nov. (v. ic.)

- \*\*\* 15. *A. conocephalus*, pileo conico striato livido-pallescente, lamellis liberis fusco-nigrescentibus, stipite longo albo, basi incrassato.

*Bull. t. 563. Dec. fr. 2. p. 153. Pers. p. 427. A. S. p. 206.!*

Statura A. teneri l. potius apali. Noster fungus cum A. S. eximie convenit stipite spithameo stricto glabro, pileo obsolete striato obtuso sordide albo &c. Bulliardi fungus pileo plicato livido-cinereo, lamellis rufis &c. pingitur. In domesticis, pinguibus &c. Jul. Aug. (v. v. Lundæ in horto Retziano.)

16. *A. hydrophorus*, cæspitosus, pileo convexo, disco lævi rufescente, margine fisso griseo, lamellis liberis, stipite subradicato glabro.

*Bull. t. 553. Dec. fr. 2. p. 150. Syn. p. 30.*

Magis magisque hæc tribus in Coprinos abit. Glaber quidem, sed valde tenuis, pileo primo campanulato, deum expando margine striato lacero subreplicato. Stipes elongatus albus. *In pascuis silvaticis & hortis.* (v. ic.)

17. *A. papyraceus*, pileo hemisphaerico sublævi albido, lamellis liberis purpurascenti-nigricantibus, stipite nudo albo.

*Pers. syn. p. 425. A. membr. Bolt. t. 11.*

Stipes 3 unc. longus, æqualis, crassitie pennæ cygneæ. Pileus 2 unc. latus, diaphanus. Lamellæ primo albæ, diffuentes. *Ad truncos Quercus.* (v. ic.)

18. *A. disseminatus*, gregarius, parvus, pileo ovato-campanulato plicato, lamellis adnexis albido-cinerascens, stipite incurvo glabro.

*Mich. nov. gen. t. 79. f. 5. Batt. t. 27. C. A. minutulus. Schæff. t. 308. A. tintinnabulum. Batsch. C. I. f. 3. A. disseminatus. Pers. syn. p. 403.*

b. *A. striatus. Sowerb. t. 166.*

c. *A. digitaliformis. Bull. t. 22, 525. f. 1. A. congregatus. Bull. t. 94. forte.*

Mox flaccescit & dissolvitur, sed vix more Coprinorum diffuit. Junior pallide ochraceus, mox albodus, demum cinerascens. Magnitudo varia; stipes plerumque uncialis, incurvus, vix lin. crassus; pileus digitaliformis, 3 lin. altus & latus. Lamellæ angustæ, distantes, in c. liberae. *Ad truncos, præsertim Salices, Populos, Tilias &c. vulgaris. Vere & autumno.* (v. v.)

Species inquirendæ nullibi plures, quam inter Coprinos & in sectione ultima Coprinarii, restant. Excusent, procor, Mycologi, me summa licet adhibita diligentia omnia synonyma ad species suas referre non posuisse; quin potius species a me ipso lectas omisisse.

L. Fungus &c. Mich. t. 74. f. 10.

2. *Bulla rictu nigricante.* Batt. t. 22. F.
3. *A. androsaceus.* Lour. Cochin. p. 691. *Pileus conicus,*  
*plicatus, cinereo-rufus.* Lam. *nigræ.* *Stipes filiformis pallidus.* *In paleis oryzæ.*
4. *A. confertus.* Bolt. t. 18. *Cæspitosus, stipite solido?*  
— de cetero ab allatis ægre dignoseitur.
- 5-6. *Alternatus, bubalinus.* Schum. Sæll. p. 351 & sq.  
(omnino distinctæ!)
7. *A. arenarius.* Dec. fr. 6. p. 45. *Stipes glaber, 4-5 unc.*  
*Pileus convexus, griseus, 2 unc.* Lam. *nigræ &c.* *In sabulosis maritimis.*
8. *A. flocculosus.* Dec. l. c. *Pileus hemisphæricus, striatus, disco rufo, margine cinereo.* Lam. *liberæ, violaceo-fuscæ, nigrescentes.* *Stipes undique floccosus, cum rudimento volvæ.* *Ad terram.*
- A. aquosus* Bolt. t. 7. f. 1. *Videtur junior A. titubans & A. prominens* Schum. l. c. *A. Boltonii proximus.*

### I. B. COPRINUS. Link.

*Fungi sterquilinii. Veterum. Hydrophori spec.* Batt.  
p. 54. *Ag. atramentarii.* Scop. p. 425. *Fugaces.*  
Batsch. El. p. 61. *Ag. Coprinus.* Pers. syn p. 395.  
Nees Syst. p. 210. *Coprin.* Pers. disp. p. 62. *Link*  
*diss. 1. p. 37!*

CHAR. *Lamellæ liberæ, inæquales, tenues, simplices, decolorantes, tandem liquecentes.* Asci magni, segregati, quaterna sporidiorum serie. *Velum universale, concretum, flocculosum, fugax.* — *Stipes fistulosus, strictus, elongatus, fragilis, subsquamulosus, albidus.* *Pileus membranaceus, raro subcarnosus, junior ovato-conicus, mox campanulatus, demum lacerus revolutus, deliquescens; flocculis (veli reliquiis) subsecedentibus tectus; a stipite discretus.* *Lamellæ albidae, demum nigrescentes.* *Sporidia nigra.*

Obs. Subgenus Agarici admodum naturale, quamvis limites stricti, mediantibus Coprinariis, ægre determinantur. Nomen ob locum natalem imposuit Persoon; verum characterem, e situ spo-

ridiorum, jam a Michelio observatum, indicavit Link. Fungi fugaces, saepe gregarii, inquinantes, radice annua. Incolunt simeta, loca graminosa pinguis & truncos cariosos; rariores in regionibus montosis & arenosis; frequentes in campestribus & argillaceis, tempestate autumnali l. pluviosa. Sapor aquosus nauseosus, non cibarii \*), usus ad ulceram adusta sananda.

\* 1. *A. COPR. comatus*, pileo subcarnoso squamoso albo, lamellis albis dein purpurascientibus, stipite subbulbosco, annulo mobili.

Fung. nemorum. *Lob.* ic. p. 272. Fung. non vesc. 7  
*Lös.* pruss. p. 89. Fung. typhoid. *Vaill.* p. 72. —  
*Buxb.* Cent. IV. t. 27. *Hydr. comatus*. *Batt.* t. 26.  
*B.* *A porcellan*, *Schäff.* t. 46. 47. *A. masse*. *Bull.*  
 t. 16. *A. typhoid*. *Bull.* t. 582. f. 2. *Ag. Mees. Fris.*  
 n. 546. *A. fimetar*. *Auct. Bolt.* t. 44. *Curt. Lond.* 1.  
 t. 93. *A. cylindric*. *With.* - *Sowerb.* t. 189. *A. comat*. *Fl. Dan.* t. 834. *Schmid.* Ic. t. 10. *Pers. syn.*  
 p. 395.

*Gregarius*, magnus. Stipes intus araneosus, sursum attenuatus, fibrillosus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, basi tumidus farctus. Pileus junior cylindricus continuus, mox vero expansus, superficie in squamas comatas secedente, numquam sulcatus, 3 unc. fero altus, margine saepe inæqualis; vertice subpersistente livido. Lam. cohærent, 3 lin. latè. In hortis, ruderatis, ad sapes Ec. etiam Americæ. Aug.-Oct. (v. v.)

*B.* *A. ovatus*, pileo campanulato dense & minute squamoso cinereo, lamellis umbrinis. dein nigris, stipite radicato. *Schäff.* t. 7. (*J. Bauh.* XL. c. 76.)

\*) *Boletus moschocaryanus* (ad nuces Moschatæ in Bandensibus insulis) & *B. saguaricus* (in furfure Sagi) *Rumpf. Amb.* XI. p. 124 huc tamen pertinere videntur & deliciosissimi perhibentur. In regionibus caridis Cœprinos magis superbire divinor.

Omnino constantem reperi. Lam. ventricosæ, in prima infantia umbrinæ. Cum priori, Lundæ &c. (v. v.)

Antec. proximus videtur *A. molybdites*, pileo bruno-squamoso, lam. albocærulescentibus. Mey. Ess. p. 300.

2. *A. COPR. sterquilinus*, pileo submembranaceo sulcato disco squamoso, lamellis purpurascens, stipite attenuato, basi annulato.

*F. sterquilinus &c.* Mich. t. 80. f. 3.

Egregie distinctus. Stipes 5 unc. longus, 3 lin. crassus, basi solidus, fibrillosus, albus, tactus nigrescens. Annulus exiguus. Pileus ovato-conicus, dein campanulatus, 3 unc. altus, sericeo-villosus, disco imbricato-squamulosus; demum profunde sulcatus, fissus. Lam. 3 lin. In fine vaccino. Sept. Oct. (v. v.)

3. *A. COPR. picaceus*, pileo membranaceo albido, in squamas latas demum rupto, lamellis nigrescentibus, stipite bulboso nudo.

Bull. t. 206. Sowerb. t. 170. Pers. syn. p. 397. Des. fr. 2. p. 146. Schum. Sæll. p. 349. Fr. Obs. 2. p. 185.

b. Batt. t. 26. C. — Fl. Dan. t. 1499.

Stipes 5 unc. & ultra, 3 lin. crassus, sursum attenuatus, glabriuscus. Pileus tenuis, ex ovato-campanulatus, epidermide erupta fuscus, 2 unc. circiter. Lam. ventricosæ. Legimus quoque formam triplo minorem. In silvis umbrosis, hortis &c. Sept. Oct. (v. v.)

Statum quasi intermedium inter antecc. & sequ. si-  
stunt *A. extinctor*. Bolt. t. 24. *A. cylindric*. Schæff. t. 8.

- \*\* 4. *A. COPR. atramentarius*, cæspitosus, pileo subcarnoso fuscescente, vertice squamose, lamellis ventricosis ex albo purpureo-fuscis, stipite æquali nudo.

Fung. pernic. g. XIV. sp. 3. Clus. & Sterb. t. 22. A. Vaill. t. 12. f. 10, 11, optime! Batt. t. 26. D. E. F.

*A. fugax.* Schæff. t. 67, 68. Am. Hall. n. 2479. *A. atramentar.* Bull. t. 164. Dec. fr. 2. p. 147. Am. einer. Lam. l. c. p. 109. *A. ovatus.* Curt. Lond. t. 100. *A. striatus.* Huds. *A. Inridus.* Bolt. t. 54. *A. fumetarius.* Sowerb. t. 133. *A. plicatus.* Lightf. — Pers. syn. p. 396. Swartz V. A. H. 1808. p. 199. *A. deliquesc.* Fl. Dan. t. 1370. *A. sobolif.* Hoffm. nom. t. 3. f. 1.

Velum fugaeissimum, tamen adest; subinde volvam exiguum referens. Stipes firmus, spithameus, 4 lin. crassus, intus zonatus. Pileus diu campanulatus persistens, inæqualis, 2 unc., demum explicatus revolutus, 4 unc. latus; albidus, squamu-lis adpressis fuscescentibus. *Ad pagos, truncorum radices &c. copiose.* Jun.-Dec. (v. v.)

*A. strictus* Pers. syn. p. 399. pileo subfarinaceo inter hunc & sq. quasi medius. (v. v.) *A. rufocandidus* Schæff. t. 201. *A. cinereo affinior.* Certe hoc spectant *A. obliterat.* *atramentarius* & *tubereulosus.* Schum. p. 555, 356.

5. *A. COPR. deliquescens*, subcæspitosus, pileo membranaceo striato fuligineo, lamellis linearibus lurido-nigris, stipite æquali subnudo.

*A. fuscescens.* Schæff. t. 17. *A. bicolor.* Fl. Dan. t. 1070. *A. deliquescens.* Bull. t. 558. f. 1? sed 447. f. 2. sequenti simillimus.

A priori distinguendus, sequenti afffinior, sed nondum extra omne dubium non positus! Stipes 4 unc. longus, 3-4 lin. crassus. Pileus tenuis, vix squamosus, subrepandus, 1-2 unc. Lam. margine saepe albicant. *Ad terram & truncos.* Aug.-Oct. (v. v.)

6. *A. COPR. micaceus*, cæspitosus, pileo membranaceo sulcato squamuloso-furfuraceo, lamellis pallido-nigrescentibus, stipitibus tenuibus æquilibus.

Lob. belg. 306. fig. sup. sinistra. (sæpiissime repetita!) — Raji Hist. II. p. 100. — Batt. t. 27. G. H. A. micaceus. Bull. t. 246, 565. Dec. fr. 2. p. 148. Fl. Dan. t. 1193. Schum. p. 357. *A. lignor.* Scop. — Schæff. t. 66. Am. Hall. helv. n. 2485. Am. rufesc.

*Lam. I. c. A. ferrug. Pers. syn. p. 400. — Fungi minimi & Raji II. p. 100.*

**b.** lamellis linearibus. *A. truncorum. Seop.-Schæff. t. 6.*

**c.** *A. congregatus. Sowerb. t. 261. Swartz l. c. p. 204.*

**d.** *A. extincterius. Bull. t. 437. f. 1. A. ferruginos. Schum. A. digitellus. Batsch. f. 1. Fl. Dan. t. 1371.*

Stipites 3 unc. & ultra, 2 lin. crassi, subglabri, subfragiles, sursum saepe attenuati. Pileus siccus, uncialis & ultra; variat ferrugineus, ochraceus & pallidus, disco concolori l. livido, badio &c. Lam. juniores albæ l. roseæ, confertæ. Formæ alatae forsitan diversæ. *Circa truncos alibique, ubique. Majo-Nov. (v. v.)*

\*\*\* 7 *A. COPR. gossypinus, cæspitosus, pileo subplicato ochraceo, lamellis ventricosis, stipite villoso basi incrassato.*

*Bull. t. 425. f. 2. Pers. syn. p. 402. Dec. fr. 2. p. 149.*

Habitus A. apali Junior totus velo tomentoso albicante obductus, dein glaber & pallescens-rufus. Pileus campanulatus, 3 unc. fere latus. *Ad terram Galliæ, exeuinde vere. (v. ic.)*

8. *A. COPR. cinereus, pileo sulcato subtomentoso cinereo, vertice calvo lævi, lamellis linearibus, stipite subtomentoso squamoso.*

*Sterb. t. 22. f. J. K. L. F. minor &c. Raji II. p. 98.*

*Mich. gen. t. 80. f. 5. A. fimetarius. Linn. Suec.*

*n. 445. Gort. Belg. p. 350. A. cinereus. Bull. t. 88.*

*Schæff. t. 100. Fl. Dan. t. 1195 (totus furfuratus)*

*Pers. syn. p. 398. Dec. fr. 2. p. 147. Swartz l. c. p. 200. Vahl Nat. Hist. Skr. 3. p. 175.*

Stipes elongatus, 3 lin. circiter crassus, basi incrassatus, candidus. Pileus membranaceus, conicus, demum etiam nudus (*A. pullatus* Bolt. t. 20) revolutus, 1-2 unc. latus. Tomentum nunc plumosum, nunc modo furfuraceum. Lam. lineam latæ, punctatæ, subflexuosa. *In fimo & in silvis ad truncos, vulgaris. Jul.-Oct. (v. v.)*

- B. A. macrorhizus*, radice fusiformi. *Mich. t.*  
 80. *f. 2!* *Pers. syn. p. 398.* (v. v.)  
*y. A. tomentosus*, stipite brevi tenui. *Mich. t.*  
 73. *f. 3.* (color sequentis!) *Bull. t. 138.* *Bolt. t. 156.*  
 (v. v.)

Varietates l. species affines adhuc multæ v. gr. *A. margaritaceus* Schæff. *t. 216*, *A. strictus* P. e. s. p.

9. *A. COPR. niveus*, pileo campanulato squamuloso-farinoso, stipiteque tomentoso niveis, lamellis angustis fusco-nigricantibus.

*Fung. nox. g. III. Clus. p. 287.* *J. Bauh. XL. c. 63.*  
*A. niv. Pers. syn. p. 400.* *Schum. p. 351.* *Fl. Dan. t. 1671.*

Magnitudine variat. Stipes 1-3 unc. longus, 2-3 lin. crassus, attenuatus. Pileus clavatus mox expansus, demum revolutus.  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. latus. Lam. stipitem attingentes, subdistantes. *In fimo equino, frequens.* *Aug.-Nov.* (v. v.)

Huic proximus *A. oblectus* Bolt. *t. 142*, stipite & squamulis volvæ ad basin annulato. (v. v.)

- \*\*\*\* 10 *A. COPR. domesticus*, pileo obtuso squamuloso furfuraceo undulato-sulcato fuligineo, lamellis confertis linearibus nigricantibus, stipite subsericeo.

*Dill. in Raji Syn. p. 5. n. 25.* *A. domest.* *Bolt. t. 26.*  
*Pers. syn. p. 404.* *A. sociatus.* *Schum. p. 353.*

Pulchella species, valde fragilis, sæpe cæspitosa. Stipes 2-3 unc. longus, 3 lin. crassus, laxis, sursum attenuatus. Pileus membranaceus, campanulatus, vertice sublævi spadiceo, 2 unc. latus. Lam. stipiti approximatæ, juniores albi, mox rubellæ, dein brunneo-nigrescentes. *Ad muros, pagos &c. jove pluvio.* (v. v.)

11. *A. COPR. narcoticus*, pileo obtuso squamulis recurvatis villoso albo, dein nudo striato, lamellis nigricantibus, stipite subviloso.

Batsch. C. I. f. 77. Pers. syn. p. 405.

Odore omnium gravissimo, alias ab A. niveo aliisque ægre diagnoseitur. Stipes 2 unc. fere longus, æqualis, "subulatus", demum glaber. Pileus junior conico-cylindricus, explanatus denudatus, uncialis usque. Lam. ex albo-nigricantes. In fine, locis nemorosis. Sept. Oct. (v. v.)

12. *A. COPR. papillatus*, pileo papillato furfuraceo griseo, margine striato, lamellis atris, margine albis, stipite æ quali.

Batsch. C. I. f. 78. Pers. syn. p. 406.

Stipes 1  $\frac{1}{2}$  unc longus, apice furfure atro inquinatus. Pileus primo oblongus, 3 lin., dein campanulatus lacerus. Ad viam repertus. Oct. (v. ic.)

13. *A. COPR. astroideus*, pileo ovato squamoso, dein explicato inverso nudo griseo, lamellis nigricantibus, stipite glabro, basi stellata.

Mich. t. 79. f. 6. *A. stellat.* Hoffm. Nom. t. 6. f. 2.

Certe peculiaris species. Stipes gracilis, 3 unc. longus, lin. vix crassus, albus. Pileus tenuis, obtusus,  $\frac{1}{2}$  unc., demum striatus. Lam. liberæ. In viridariis, nemoribus, Majo. (v. ic.)

14. *A. COPR. lagopus*, pileo flocculoso albido-cinereo, dein nudo radiato-sulcato, lamellis remotis linearibus nigris, stipite longo lanato.

Stipes admodum debilis, 5 unc. & ultra longus, 1 lin. crassus, utrinque attenuatus. Pileus tenuis, campanulato-explanatus, uncialis, junior eleganter floccosus, dein fissus, disco livido. Lam. subdistantes. In silvis umbrosis inter folia. Oct. (v. v.)

15. *A. COPR. plicatilis*, tener, pileo umbilicato sulcatoplicato, lamellis annulato-adnexis remotis nigricantibus, stipite glabriusculo.

Mich. t. 79. f. 7. Batt. t. 27. f. D. *A. plicatilis*, Sow. t. 364. *Coprinus subsimilis*, Pers. syn. p. 405.

b. *Buxb. C. II.* t. 50. f. 1. *justo major!* A. plicatilis. *Curt. t. 200.* A. semistriat. *Fl. Dan. t. 1134.* A. pulcher. *Pers. l. c.*

Valde fugax, magnitudine varius. Stipes 1-3 unc. longus, gracilis, lœvis, pallidus. Pileus junior cylindricus, furfuratus; dein expansus subnudus, in plicas cæsias subfurcatas fissus,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. latus. Color cinereus, ochraceus, fuscescet, albidus. Lam. lineares, juniores confertæ, dein pro more distantes, a stipite remotæ. *Locis humidis subgraminosis, vulgaris.* (v. v.)

16. *A. COPR. ephemeroïdes*, pileo squamuloso albido, disco luteo, lamellis nigricantibus, stipite subbulboso, annulo integro.

*Bull. t. 582. f. 1. Dec. fr. 2. p. 145.*

Parvus. Stipes intus filum hirsutum recondens, basi nunc glabra, nunc hirsuta. Annulus primo fixus, dein mobilis. Pileus cucullato-ovatus, conicus, dein revolutus, margine striatus. *In fimeis Galliae.* (v. ic.)

17. *A. COPR. ephemerus*, tenuis, mox glaber, pileo campanulato expanso fisso-striato subcinerreo, lamellis distantibus, stipite nudo.

*Fungus pusillus &c. Raji Hist. II. p. 98. Buxb. C. II. t. 50. f. 2. Mich. t. 75. f. 9. Batt. t. 27. f. B. Hall. helv. n. 2484. A. stellaris. Gunn. Norv. t. 7. f. 8. A. crenulat. Fl. Dan. t. 832. f. 2. A. moment. Bull. t. 128. A. stercoreus. Scop. - Sowerb. t. 262 ex Swartz l. f. 1808. p. 202.*

b. *A. ephem.* *Bull. t. 542. f. 1. Pers. syn. p. 149.*

Stipes 2 unc. & ultra, tenuis, 1 lin. haud crassus, glaber, albidus. Pileus circiter  $\frac{1}{2}$  unc., campanulatus, dein fissus, disco lœvi, sapius rufescente fusco &c., mox involutus diffluens. Lam. parum ventricosæ. *In stercoreis. Mayo-Oct.* (v. v.)

18. *A. COPR. radiatus*, tenerrimus fugax, pileo cinereo-tomentoso, dein radiato-fisso glabro, disco ochraceo, stipite filiformi,

- J. Bauh. XL. e<sup>t</sup> 73. — nee icon rite monente Raji Hist. II. p. 98. — Burb. C. II. t. 50. f. 3 rufus.*  
*A. stercorar. Bull. t. 63, 542. f. 2. A. radiatus. Bolt. t. 39, f. C. Pers. syn. p. 407. A. S. p. 200.*  
*b. Mich. gen. t. 79. f. 9.*

Priori valde affinis, sed omnium tenerrimus, ut halitu flaccescat. Pileus junior ovatus, sordide ochraceus, dein planus, 1-2 lin. latus. Lam. paucæ, pileo fisso distantes. *Copiose in fimo. Mayo-Oct. (v. v.)*

1. Fung. hirsutus, albicans &c. *Raji Hist. III. p. 19.*
2. *Burb. Cent. IV. t. 24. Magnus.*
3. *A. botrytes. Mich. t. 79. f. 4. Hall. helv. n. 1559.*
4. *A. giganteus. Schæff. t. 84. A. mitrat. Hoffm.*
5. *A. lacunosus Pers. syn. p. 401. (Vail. par. t. 12. f. 5; 6?) pileo ( $\frac{1}{2}$  unc.) subfirmo expallente rugoso, lam. purpurascens-cinereis, stipite tenui deorsum squamu-losa. Ad truncos.*
6. *A. Aster, pileo sulcato cinereo, umbone albido, lam. purpureo-atris, stipite tenui. Mey. ess. p. 301. Argila. Apr.*

*A. tenellus Huds. est Pilob. roridus. Erronea icon A. camp. Bolt. t. 31, qui A. exaratus With. Sub Ag. sp. 24, 25 varios confundit Gleditsch. Species inter Copri- nos caute distinguendæ!*

---

### I. B. GOMPHUS. Fries.

CHAR. Lamellæ longe decurrentes, ramosæ, distantes, distinctæ, decolorantes, persistentes, molles, tenaces, integerrimæ. Velum subuniversale, glutinosum, concretum, in stipite fugacissimum, velleris instar pileum tegens. Stipes solidus, fir-mus, sape squamosus, cum pileo contiguus. Pileus carnosus, e convexo-turbinatus, viscosus, glaber, margine inflexo. Asci majusculi. *Sporidia nigra, fusiformia.*

Obs. Analogi Limaciis &c.; nomen ob formam. Fungi majores, solitarii, terrestres, persistentes, vix cibarii, subinsipidi, inodori.

3. *A. GOMPH. glutinosus*, pileo obtuso glutinoso purpureo-fusco, lamellis albido-cinereis.

*A. lubricus*. Scop. Carn. p. 447. Am. Hall. helv. n. 2369. *A. glutinos*. Schäff. t. 36. Sowerb. t. 7. Fl. Dan. t. 1247 Schum. p. 259. *A. limacinus*. Dicks. *A. velatus*. With. l. c. p. 163. Swartz V. A. H. 2808. p. 17. *A. viscid*. Pers. syn. p. 291.

Stipes 2-3 unc. & ultra, diametro  $\frac{1}{2}$  unciali, albidus, basi incrassatus luteus; variat nigro-squamosus. Pileus 2-5 unc. Lam. vere ramosæ. In pinetis, frequens. Jul.-Nov. (v. v.)

*B. roseus*, minor, pileo roseo, stipite deorsum attenuato subcarneo. — Nees Syst. f. 197. (v. v.)

2. *A. GOMPH. rutilus*, pileo umbonato subviscoso fuoco-rufo, lamellis purpureo-umbrinis.

*A. viscidus*. Linn. Suec. 1229. *A. rut*. Schäff. t. 55. Sowerb. t. 105. With. p. 180. Pers. Comm. p. 22. *A. hepatic*. Batsch t. 15. *A. jeorinus*. With. p. 171. *A. Gomph*. Pers. ic. & descr. t. 13. f. 1-3. Syn. p. 18. Sw. l. c.

Stipes 3 une. & ultra,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus, deorsum attenuatus, intus rhabarbarinus, squamoso-fibrillosus. Velum primo annulatum. Pileus 2-3 unc. & ultra, siccus nitens. Lam. breviores longioribus adnexæ. In pinetis. Aug.-Oct. (v. v.)

1. *A. maculatus*. Scop. p. 448. Pilens albus, nigro-maculatus. Lam. ramosæ, umbrinæ. Stipes flavus.

2. *A. viscidus*. l. c. Totus flavescentia. Schäff. t. 97.

---

Sunt forsitan, qui nimis frequentes judicant nostras sectiones, quæ tamen, utpote specierum affinitatem indicantes, dispositionis nucleum consti-tuunt & ad fidam determinationem specierum maxime conferant. In Floris autem specialibus, ubi specierum numerus inferior, sequentes, minus quidem absolutas sed tironibus faciliores, proponere sufficit. *A. LEUCOSPORUS* a) volvati b) annulati (II, III.) c) subnudi pileo carnosio, (IV, V, VIII) \* Lam. postice æqualibus acutis. \*\* postice inæqualibus.

\* \* \* postice obtusis. d) *pileo plano carnosso-membranaceo* (IX) e) *pileo membr. campanulato* (X) f) *umbilicato* (XI) g) *excentrici* XII. — B. HYPORHIDIUS. C. CORFINARIA. D. DERMINUS. E. PRATELLA. Cf. A. F. COPRINUS. G. GOMPHUS. H. GALORRHEUS. J. RUSSULA, quæ lamellis subfurcatis non parum *Cantharellis* affinis.

De cetero observent velim, has series eodem differre modo ac Collema a Parmeliis sensu latiori (inclusis Lecanora, Borrera, Sticta &c.) — & tribus, uti allata Parmeliæ subgenera Collematumque sectiones. Omnes certe vituperarent, si quis Collomatum sectiones sub generibus Parmelioideis (Lecanora-Cornicular. Ach.) disponeret; sic & inter Agaricos, dispositione primaria & secundaria inversis, improbanda tribuum diversæ seriei confusio ex. gr. LEPIOTA \* sporidiis albis, \*\* ochraceis, \*\*\* ferrugineis e. s. p. Cf. priores tres maxime affines Coprinarii species.

## II. CANTHARELLUS. Adans.

Fung. ord. V. Vaill. p. 60! - Mich. gen. p. 144 & Fungodastri sect. 2. l. c. p. 201. *Cantharell. Adans.* Juss. gen. p. 6. Pers. disp. p. 26. Link diss. 1. p. 38! Merulii sp. Hall. - Pers. syn. p. 488. Nees p. 288. Ag. spec. Linn. & Auct. Pezizæ sp. Eorund. Helvellæ Gled. Bull.

CHAR. Plicæ radiantes, ramosæ, subparallelae, raro anastomosantes, obtusæ, cum hymenio unidique thecigero homogeneæ & concretæ. — Pileus carnosus l. membranaceus, adultus subhorizontalis, determinatus, margine liber, cum stipite, quando præsens, contiguus. Velum nullum. Ascii majusculi. Sporidia alba.

ABERR. Plicæ (nunc lamellas dichotomas strictas, nunc rugas tumidulas vagas referentes) subinde obsoletæ (*Ch. cornucop.*, *pusillus*, *lævis*) in

quo statu substantia a Thelephoris distingueat. Occurrit pileo confuso claviformi (Trib. II); sed species vere resupinatas effusas non reperimus.

HIST. Est Agaricus in Thelephoreas abiens. Nomen gallicæ originis J. Bauhinus primus attulit. Characterem primus perspexit Vaillant; genus cum Meruliis miscens distinxit Haller; dispositum optime Schrader; charactere legitime circumscr. psit Link. Species haud numerosæ; rite cognitæ europeæ; nomina dubia vid. apud Mühlb. &c.

DIVIS. cum reliquis generibus concretis analogæ:

- I. MESOPUS. Stipes centralis, in pileum expansum distincte marginatum infundibuliformem l. demum depresso diffusus. Plicæ decurrentes.
  - II. GOMPHUS. Stipes perpendicularis cum pileo clavæformi vix marginato confusus, latere tenuissime venosus. — I & II Terrestres.
  - III, IV. PLEUROPUS & APUS. Stipes lateralis, verticalis l. nullus, brevis. Pilens expansus, tenuis, submembranaceus, inæqualis. Epiphyti.
- 

### Trib. I. MESOPUS. Char. ut supr.

Vaill. l. c. - Schrad. spic. p. 135. Canth. Pers. syn. l. c. Gymnop. Omphal., Lactifluus. Nees l. c.

1. *C. umbonatus*, pileo leviter carnoso umbonato cinereo-nigricante, stipite farcto dilutiori, plicis strictis candidis.

A. muscoid. Wulf. in Jacq. Coll. 2. t. 16. f. 1. M. umb. Gmel. - Pers. syn. p. 491. A. S. p. 234. Swartz. in V. A. H. 1809. p. 175. Cant. umb. Pers. disp. p. 26.

Sæpe gregarius. Stipes 3 unc. longus, elasticus, basi villosus. Pileus junior convexus, dein depresso, uncialis, lavis, sub lente villosus. Plicæ latiusculæ, confertæ. Inter muscos humidos, vulgaris. Aug.-Nov. (v. v.)

*B. M. carbonarius*, radicatus, fasciculatus pileo striato-squamuloso e spadiceo-nigro &c. *A. S.* p. 375.

Reliquæ notæ (caro rubescens & immutabilis &c.) neutri propriæ. *In carbonariis, muscosis.* (v. v.)

*2. C. aurantiacus*, pileo carnoso subdepresso tomentoso stipiteque farcto aurantio-ochraceis, plicis strictis aurantiacis.

*A. alectoroloph.* Schæff. t. 206. male. Ag. aurant. Wulf. l. c. t. 14. f. 3. Merul. Pers. syn. p. 488. Swartz. l. c. p. 173. A. S. p. 233. Nees Syst. f. 233. — Stipite putredine nigrescente: Ag. cantharelloid. Bull. t. 503. f. 2! M. nigrip. Pers. l. c. p. 489. Dec. fr. 2. p. 129.

Stipes subincurvus, 2 unc. circiter, varius, demum cavus; nigrescentem sæpe vidi. Pileus 2-3 unc., mollis, sæpe excentricus & undulatus, margine involutus. Plicæ repetito-dichotomæ, conformatæ, basi sæpe crispæ. Venenatus. Pers. Ch. Com. Non solum in pinetis vulgaris, sed & in graminosis, arvis. Aug.-Nov. (v. v.)

*B. C. lacteus*, pileo glabro stipiteque albidis, plicis albis. Certe prioris varietas. Passim. (v. v.)

*3. C. cibarius*, vitellinus, pileo carnoso subrepando glabro, plicis tumidis, stipite solidò deorsum attenuato.

Gallinacei. Cæsalp. p. 619. Fung. esc. XIV. sp. 2. Clus. p. 271. — Lob. ic. p. 273 (sæpe repetita!) J. Bauh. XL. c. 27. cum syn. Veter. ! Sterb. t. 4. B. F. vesc. VI. Løs. p. 80. — Vaill. t. 11. f. 14, 15. Ag. 12. Gled. p. 103. Batt. t. 14. B. C. A. cantharell. Linn. Suec. 1207. Schæff. t. 82. Bull. t. 62. 505. f. 1. Fl. Dan. 264. Bolt. t. 62. Sowerb. t. 40. Merul. Hall. helv. n. 2326. Pers. syn. p. 488. Sv. Bot. t.

Reliquis firmior, subcompactus, inodorus, sapore miti; jure inter sapidissimos fungos numeratur. Cf. Pers. Ch. Comest., Tratt. Essb. Schw. t. P. Pileus sæpe admodum luxuriat, demum depresso. Plicæ crassæ, angustæ, subdistantes. Huc & A. luteolus & pseudo-unctuos. Batsch. f. 37, 120. In pinetis, etiam Americæ, ubique. Jul.-Nov. (v. v.)

4. *C. violaceus*, purpureus, pileo carnoso repando glabro, subtus plicato-venoso, stipite solido.

Mer. viol. *Hall. helv.* n. 2327. *Fries Obs.* 2, p. 285.  
M. Ottonis *Spreng.* pug. 1, p. 66, \*

Gregarius, violaceo-purpureus, subtus pallidior. Stipes sursum incrassatus, firmus. Pileus demum infundibuliformis. *Icon Fl. Dan.* t. 655 f. 3 justo minor, & habitu fere Peziz. sareoid., hinc non citata. Specimina perfecta non habui. *In pinetis. Sept. Oct.* (v. v.)

5. *C. albidus*, pileo leviter carnoso repando glabro pallido, plicis divergentibus stipiteque solido albis.

Mer. undulatus. *Fl. Dan.* t. 1293.

Elegans, gregarius, substantia non coriacea Ch. crispi. Stipes 2 unc. fere longus, 2 lin. crassus, subæqualis, glaber. Pileus 1-2 unc. latus, subinfundibuliformis, irregularis, rufesceni-albus. *In fagetis Daniæ.* (v. ic.)

6. *C. sinuosus*, pileo submembranaceo undulato floccoso-villoso fusco-griseo, plicis implexis, stipite farcto pallidioribus.

*Vaill. t. II. f. 11—13!* Mer. fulig. *A. S.* p. 234!

Gregarius, subcæspitosus, magnitudine varius. Stipes intus floccis farctus, difformis, glaber, 1 unc. & ultra longus, 2 lin. crassus, plicis concolor. Pileus infundibuliformis, dein valde undulatus, villoso-squamulosus, humidus fuscus, siccus griseus, uncialis. Plicæ fere C. lutescentis, tumidæ, cinerascentes. *In nemoribus humidis, quercetis &c. Sept. Oct.* (v. v. Reften &c.)

7. *C. tubæformis*, pileo submembranaceo umbilicato ruguloso-squamoso, plicis rectis cinereo-flavis, stipite cavo luteo.

*Vaill. t. II. f. 9, 10!* Merul. hispid. & infundib. *Scop. Carn.* p. 462. *Helv. tubæf.* *Bull.* 2, 461. *Peziz.* un-

dul. Bolt. t. 105. f. 2. Mer. villosus. Pers. ie. & descr. t. 6. f. 1. Dietm. ap. Sturm. t. 30. M. tabæf. Pers. syn. p. 489. (nec Schæff.) Fries Obs. I. p. 97.

b. plicis cinereis. A. pruinatus. Batsch. El. f. 35. Mer. fuligineus. Pers. syn. p. 490.

Gregarius, subcæspitosus. Stipes inæqualis, deorsum subincrassatus, lævis, semper flavus. Pileus  $\frac{1}{2}$  - 2 unc. latus, demum undulatus, humidus lutescenti-cinereus, fuscescens, fuligineus, siccus expallens e. s. p. Plicæ strictæ, dichotomæ, distantes, flavæ l. cinereæ. Huc potissimum Sowerb. t. 47. *A. cantharelloid.* Ad terram & ligna putrida vulgaris. Aug.-Nov. (v. v.)

$\beta$  C. zonatus, pileo zonato &c. A. degener. Schæff. t. 243. — A. cornucop. Bull. t. 208.

8. C. lutescens, pileo submembranaceo infundibuliformi undulato subfloccoso, venis implexis, stipite cavo luteo.

Elv. 5. a. Gled. p. 41. Elv. tubæf. Schæff. t. 157. Helv. Cantharell. Bull. t. 473. f. 3. Mer. reflexus Gmel. Mer. lutesc. Pers. syn. p. 489. A. S. p. 234. Fl. Dan. t. 1617. M. catharelloid. Sw. l. c. p. 172. (nide specim.) Schum. p. 368.

b. plicis rutilis, A. aurora. Batsch. f. 36.

Odor subspirituosus. Stipes sape compressus, 2 unc. circiter, inæqualis. Pileus 1-4 unc. latus, mollis, demum lobatus, fusco-lutescens, siccus expallens, sape ad basin pervius. Venæ (vix plicæ lamellæformes) decurrentes, implexæ, flexuose, confertæ, flavæ, luteo-cinereæ &c. Variat uti prior pileo glabro; inde de synonymis hallucinatus Persoon. Locis silvarum uidis, sphagnosis frequens. Jul.-Nov. (v. v.)

9. C. cinereus, cæspitosus, pileo infundibuliformi pervio squamuoso stipiteque cavo nigrescentibus, plicis distantibus cinereis.

Helv. hydrolips. Bull. t. 465. f. 2. Merul. fissus. Roth. Germ. 1, p. 534. M. hydrolips. Gmel. - Dcc.

*Fr. 2. p. 130. Mer. ciner. Pers. ic. & descr. t. 3.  
f. 3. Syn. p. 490. A. S. p. 234. (A. infundib. Bolt.  
t. 34.)*

Medius inter antecedentem & sequentem, pileo pervio cum stipite cavo tubiformi, demum undulato e. s. p., sed plicæ manifestæ, crassæ, distantes, fere ut in *C. tubæformi*. *In silvis muscosis, subapricis. Oct. (v. v.)*

10. *C. cornucopiodes*, subcæspitosus, pileo tubæformi pervio squamuoso umbrino-nigro, rugis obsoletis.

*Vaill. par. t. 13. f. 2, 3. Mich. gen. t. 82. f. 5, 6. Elv.  
5. b. Gled. p. 41. Peziza. Hall n. 2216. P. cor-  
nucop. Linn. — Fl. Dan. t. 388, 1260. Bolt. t. 103.  
Sowerb. t. 74. Helv. corn. Scop. — Schæff. t. 165,  
166. Bull. t. 150, 498. f. 3. M. purpur. With. 4.  
p. 152. M. corn. Pers. syn. p. 491. Swartz l. c. p. 174.*

Magnitudine varius. Stipes elasticus, nigricans. Pileus membranaceus, flaccidus, subundulatus, margine reflexus, humidus nigricans, siccus fuligineus. Hymenium laxe, cæsum, roseum &c., demum rugulosum. *In silvis Europæ, Asiæ, Ameri-  
bor. Aug.-Nov. (v. v.)*

11. *C. pusillus*, parvus, pileo subvilloso griseo, sub-  
tus laxe cæsio, stipite solido cinerascente. *Fr.  
Obs. 2. p. 234.*

Solitarius, unciam haud superans. Stipes 1 lin.  
crassus, deorsum attenuatus. Pileus  $\frac{1}{2}$  unc. nec ul-  
tra. Hymenium demum rugulosum. *In terra nu-  
da, raro. Sept. (v. v.)*

12. *C. undulatus*, pileo coriaceo-membranaceo de-  
presso undulato pallescente, subtus rugoso, sti-  
pite solido.

*Elv. floriform. Schæff. t. 273. Sowerb. t. 75. Helv.  
crispa. Bull. t. 465. f. 1. Craterella crisp. Pers.  
Obs. 1. p. 30. Merul. crisp. Ic. & deser. t. 8, f. 2,  
3. Mer undul, Syn. p. 492. Sw. l. c. p. 176.*

Stipes tenuis, firmus,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. longus. Pilus 1-2 unc. latus, margine demum erecto crispo; substantia fere Thelephoræ. Hymenium glabrum, spurie venosum, pallidum. In terra nuda, passim. Fere perennis. v. v.)

1. Fungus. Mich. gen. t. 79. f. 2.!
  2. Fungoidaster &c. t. 82. f. 2.
  3. *M. canaliculatus*. Albide-pallens subumbilicatus obliquus, plicis canaliculatis simplicibus, stipite solido (vix uneiali) Pers. syn. p. 492. — Ad truncos. (v. ic.)
  4. *M. tortilis*. Subviscidus, pileo carnoso viridi-flavo fuscostriato, plicis crassis liberis pallidis, stipite subeavo fusco. Schum. p. 369. (v. ic.)
- 

### Trib. II. GOMPHUS. Ch. ut supra.

Pers. comm. de fung. clav. p. 28!

1. *C. clavatus*, turbinatus, truncatus.
    - a. e violaceo-spadiceus. *M. violaceus*. Pers. l. c. — Mer. clavatus. Obs. 1. p. 21. Syn. p. 498.
    - b. *M. carneus* Pers. l. c. (disco in siccis ochraceo.) Elv. carnea. Schæff. t. 164. Cl. truncata. Schmid. Ic. II. t. 60. Nees f. 239.
    - c. *M. purpurasc*. Pers. l. c. Elv. Schæff. t. 276.
    - d. *M. umbrinus* Pers. l. c. Cl. Elvelloid. Wulf. in Jacq. Coll. II. p. 99, t. 12. f. 3. (senilis.)
- Solitarius l. cespitosus, 2 unc. altus, subadscendens, subinde ramosus. Discus demum depresso, non politus, margine obtuso, demum repando. Plicæ tenues. In silvis abiegnis &c. passim. Aug.-Oct. (v. v. a. & d.)
- 

### Trib. III, IV. PLEUROPOUS & APUS.

Schräd. spic. p. 136. Nees Syst. p. 229!

- I. *C. alveolaris*, horizontalis albidus, plicis anastomosantibus, stipite laterali brevi.
- Merul. alv. Des. fr. 6. p. 43.

Siccus, subcoriaceus, sordidus, 1-2 uncialis, stipite crasso, pileo orbiculari tenui, subtus plicis valde prominentibus, sinulis profundis. Vix hujus generis. In Gallia.

2. *C. crispus*, subimbricatus difformis villosus rufescens, margine plicisque dichotomis crispis albidis.

*Euxb. Cent. V. t. 7. f. 2.* *M. fagineus*, *Schrad. spiz.* p. 137 (*albidus*) *M. crispus*. *Pers. ic. & descr. t. 8. f. 7.* *Syn. p. 495.* *A. S. p. 237.* *Swartz l. c. p. 179.* *Fries Obs. 2. p. 236.* *Dec. fr. 2. p. 43.*

Carnoso-membranaceus, tenax, persistens, junior pezizoideus, dein horizontalis,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. latius, lobatus, sub lente praeipue villosus. Variat stipitatus & sessilis. Plicæ tumidae; etiam mihi virentes obviae. Ad ramulos Betulæ, Fagi, Coryli &c. vulgaris. Oct.-Febr. (v. v.)

3. *C. muscigenus*, horizontalis pallescente-fuscus, plicis ramosis, stipite brevi laterali.

*Ag. foliolum*, *Afzel. Obs. p. 17.* *Ag. muscig.* *Bull. t. 288.* *Helv. dimidiat.* *Bull. t. 498. f. 2.* *Mer. musc.* *Pers. syn. p. 493.* *Dec. fr. 2. p. 131.* *Nees Syst. f. 236.*

b. *Elv. verticalis!* *Vahl N. H. S. Sk. 2. p. 26.*

Membranaceus, tenax, unguicularis, glaber, subzonatus, leviter undulatus; albidus, cinereus l. fuligineus. Plioæ tumidae, divergentes, vix anastomosantes, postice confluentes. Stipes basi villosus, subinde nullus. Ad muscos, tecta straminea &c. Oct. Nov. (v. v.)

4. *C. lobatus*, horizontalis, sessilis, lobatus, fuscus, venis ramosis subanastomosantibus.

*Helv. membr.* *Dick. Cr. I. p. 21.* *Bolt. t. 177.* *Holmsk. Ot. II. t. 28.* *Vahl. l. c. p. 61.* *Fl. Dan. t. 1077. f. 1.* *M. lobat.* *Pers. syn. p. 494.*

Multi cum priori commutarunt. Stipes plane nullus, Pileus uncialis, planus, puncto lateral i ad-

fixus, fuscus l. rufofuscus, siccus expallens. Venæ vagæ. In paludibus montosis supra Hypna, vere. (v. v.)

5. *C. retirugus*, verticalis, sessilis, lævis, albido-cinereus, venis obscurioribus reticulatis.

Helv. Bull. Ch. p. 289. t. 498. f. 1. Merul. Pers. syn. p. 494. Dec. fr. 2. p. 131. M. reticulat. Gmel.

Membranaceus, tenuissimus, subrotundus, 5 lin. latus, pagina superiori fibrillis adfixus, margine primo integro, dein varie fisso Subtus cinereo-fuligineus, plicis tenellis. Supra muscos, stipulas &c. (v. ic.)

6. *C. galeatus*, vertice porrecto adfixus, galeatus, cinereo-pallidus, venis obsoletis. Schum. p. 371.

Gregarius, membranaceus, tenuis,  $\frac{1}{2}$  unc. usque latus, pilis raris brevissimis adpressis obsitus, margine crenulatus. In statu perfecto observatus videtur. Ad muscos silvarum. Oct. (v. ic.)

7. *C. lævis*, subverticalis, sessilis, planus, candidus, venis obsoletis.

*Thelephora muscigena*. Pers. syn. p. 572.

Ob substantiam caruoso-membranaceam omnino hujus generis, demumque hymenium leviter rugulosum evadit. Exiguus (3-5 lin. latus), tenuis, mollis, parte supina sub lente obsolete sericeus. Ad *Polytrichum commune*, non raro. Sept.-Nov. (v. v.)

Huc forsan inserenda. *Peziz. Neckeræ. Fr.*

8. *C. fissilis*, vertice porrecto stipitatus, campanulatus, dein multifido-lacerus, disco rugoso.

*Peziza membranac.* A. S. p. 316. t. 1. f. 5.

Pezizam minutam erectam, 2-3 linearem exacte refert, sed hujus omnino generis, ascis suis exiguis oligosporis & substantia. Pileus (cupula) membranaceus, obverse campanulatus, demum *C. retirugi* instar fissus & revolutus. Noster lævis albi-

dus; sed etiam "flavus" l. "intus albus, extus cum stipite tenui cinereo-nigricans, fibrillis subtilissimis adpressis nigris striatulus." In ramentis vitis, truncis Fagi, raro. Jun.-Nov. (v. v.)

9. *C. bryophilus*, vertice porrecto-stipitatus, pezizoides, candidus, plicis distinctis.

Agar. Pers. Obs. 1. p. 8. t. 3. f. 1. Mer. Syn. p. 495.  
A. S. p. 233! Balb. Misc. p. 68. Swartz l. c. p. 178. Nees Syst. f. 237. Dec. fr. 6. p. 43.

Statura fere prioris; adultus 2-3 linearis; extus subtomentosus. Plicæ latiusculæ, acutæ, e centro radiatæ, apicem versus bi-trifidæ. A. septico affinis. Ad muscos, terram & "cornu bovinum." Oct.-Nov. (v. v.)

10. *C. muscorum*, sessilis, auriformis, gelatinosus, sordide rufescens, intus venis crispis.

Roth. Cat. 1. p. 238. Ust. Ann. 1. t. 1. f. 4. Pers. p. 495.

Fungus parvus, diversæ pro ætatis ratione magnitudinis,  $\frac{1}{2}$  unc. non superans, solitarius, fragilis, extus convexus glaber, intus concavus venosus, venis basi obsoletis, versus marginem divisus. Junior albidus, siccus plumbeus. In muscis Quercuum annosarum, autum. & hieme. (v. ic.)

11. *C. tenellus*, sessilis subgelatinosus nigrescens, venis prominulis inæqualibus radiantibus.

Mer. Dec. fr. 2. p. 132. Syn. p. 27.

Fragilis, supra niger, infra fuscescens, 1 centim. circiter. An huc Fl. Dan. t. 1295. f. 2? pileo margine sinuato. Ad trabes putridas.

12. *C. cupularis*, verticalis, sessilis, cupulæformis, griseus, versus marginem plicis simplicibus.

Mer. Wahlenb. Fl. Lapp. p. 530. t. 30. f. 6.

Magnitudo seminis cannabini. Junior pustulam sphæricam, umbilicatam sistit, disco magis magisque dilatato concavo cupulæformem; demumque

(ut in *A. variabili* &c.) reflexam, basi byssو albidо. Plicæ strictæ, centro evanescentes. In ligno *Salicis phyllofoliæ Finmarkiæ*. (v. ic.)

2. Batt. t. 24. B. Amethystinus, *sapra saxa*.
2. M. pezizoideus. Pers. p. 493. Obeonicus, glauco-albus, disco depresso venoso. Est forsitan inter numerosa fungorum in folidinis monstra.
3. Mer. - - - Schrank hæv. p. 575.

Distinctæ procul dubio species, sed de affinitate nihil constat, forsitan propriæ tribus:

1. *M. castaneus*, substipitatus gelatinosus, pileo irregulariter lobato lacunoso castaneo, subtus carneo venis obscurioribus, stipite brevi albo. Mey. Ess. p. 302. In truncis arborum. Jan.
  2. *M. cuneiformis*, subacaulis, flavus, pileo cuneiformi, margine retuso, venis vage anastomosantibus, stipite laterali brevissimo. l. c. In ligno putrido, Aprili, Majo.
- 

### III. MERULIUS. Haller.

*Merul.* sp. Hall. helv. p. 150. Schrad. spic. l. c. Pers. l. c. Nees l. c. Xylephag. Link diss. 1. p. 38.

CHAR. Hymenium venosum l. sinuoso-plicatum. Plicæ poriformes, absque tubulis, saepè gyroso-dentatae, inæquales, angulatae l. flexuosaæ, cum pileo concretæ & homogeneæ, interrupte ascigeræ. — Stipes nullus. Pileus sessilis, resupinatus, effusus, raro reflexus & determinatus, tenuis. Substantia subfloccosa, tenuis, numquam suberosa.

ABERR. Sporidia, que in reliquis alba, cinnamomea in *M. lacrimante*.

HIST. Genus Merulios inter & Boletoides Hydnaque intermedium; Polyporis eximie analogum, tamen, ut e speciminibus junioribus & sene-

scentibus patet, distinguendum. De cetero utpote infimum in prima generum tiga abit in *Hyphomycetes* v. gr. *Mesentericam* e. s. p. — Incolunt ligna putrida & cariosa, quæ emolliendo destruunt species omnes. — Nomine ad *Morchellas* (*meras-tute cibarias*) denotandas veteres usi sunt, huc transtulit Haller. Characterem emendavit Link, indolem exposuit Nees.

- \* 1. *M. tremellosus*, pileo carnoso-tremelloso reflexo tomentoso albo, plicis subporiformibus acutis rubicundis.

*Hall. helv. n.* 2329. Ag. betulin. *Fl. Dan.* t. 776, f. 1.  
*Wulf. in Jacq. Coll.* 1. p. 338. Mer. *Gmel.* M.  
*trem.* *Schräd. spic.* p. 139. *Pers. syn.* p. 496. *Obs.*  
*2.* p. 92. *A. S.* p. 236. *Dec. fr.* 2. p. 132. *Fl. Dan.*  
*t. 1553.*

Substantia cartilagineo-gelatinosa. Junior totus resupinatus, orbicularis, pallidus, in ambitu radiosus & liber, demum reflexus, magnitudine & forma varius. *Ad truncos, vulgaris. Aug.-Dec. (v. v.)*

2. *M. rufus*, effusus, carneo-rufus, plicis porosis oblongis obliquis laceris. *Pers. syn.* p. 498.

Totus resupinatus, adnatus l. immersus, cartilagineo-membranaceus, glaber. Plicæ fere ut in sequente sectione uno latere productæ, hinc obliquæ, decumbentes. præsertim in statu vegeto. *Ad ligna "Carpini", Fagi. Autumn.* (v. v.)

3. *M. serpens*, effusus, rubescens, margine fimbriato albo, plicis primo rugæformibus, dein poris minutis angulatis.

*Tode in Abhandl. Hall. Nat. Ges.* 1. p. 355. *Pers. syn.* p. 497. *A. S.* p. 237.

Resupinatus, carno-membranaceus, siccus, persistens, glaber, margine subfimbriato, neutiquam bombycino-floccoso; subtus albus, glaber, adnatus. Plicæ primo obsoletæ, siccæ collabescentes. Variat totus albus, pileoque reflexo! *Ad ligna varia, ap- prime pinea. Perennis.* (v. v.)

4. *M. crispatus*, effusus, persistens, albidus, plicis anastomosantibus. *Fl. Dan.* t. 716, f. 2.

Medius videtur inter priorem & sequentem. *Resupinatus*, adnatus, tenuis, indeterminatus, nec fimbriatus, i unc. latus aliquotque unc. longus. *In lignis putridis.* (v. ic.)

5. *M. fugax*, effusus, detritus evanescens, candus, plicis reticulatis. *Fries Obs.* 1. p. 100.

*B. Mucilago reticulata*, *Hoffm. Germ. Cr.* t. 12. *Bol. ret. Pers.* syn. p. 548. *A. S.* p. 259.

Glaber, humidus;  $\alpha$ . plicis elongatis reticulatis — Var. vero albida, poris cupuliformibus, lævibus, pulverulentis distincta — diversa videtur; sed hujus potissimum generis. *Ad ligna putrida pinea. Perennis.* (v. v.)

- \*\* 6. *M. lacrimans*, effusus, magnus, flavo-ferrugineus, margine tomentoso albo, plicis amplis poroso-sinuatis.

*Bolet. lacrymans*. *Wulf. in Jacq. Misc.* 2. p. 111. t. 8. f. 2. *Sowerb.* t. 113. *Bolt.* t. 167. f. 1. *Merul. lacr.* *Schum.* p. 371. *Dec. fr.* 2. p. 132. *B. arbor.* *Sowerb.* t. 346. *M. destruens.* *Pers. syn.* p. 496. *Swartz l. c.* p. 179.

*b. plicis in dentes abeuntibus. B. obliquus. Bolt t. 74.* (ipso teste) *Sistotr. cellare.* *Pers. syn.* p. 554.

Cum sequentibus convenit statu juvenili bysino, absque distincto hymenio; demum denudato, margine vero villoso persistente, plicis demum gyrosis, valde inæqualibus, productis subdentatis e. s. p. Hæc vero species reliquis multo major, (4-5 unc.), margine lato fornicate hinc inde guttulas aqueas exstillante, poris aurantiacis & præcipue sporidiis cinnamomeis. — Occurrit pileo reflexo, præcipue in *b. muscigeno* *A. S.* p. 236, qui parvus 4-6 lin. tantum latus. — Fungus valde perniciosus, ligna domestica destruens; humore sublato acidoque Sulfer. diluto collinito (V. A. H. 1742. p. 278) evanescens. Cf. *Fries de fung. nox. Suetice.* Ad

*ligna putrida, asseres &c. locis humidis, præcipue domesticis. Per annum. (v. v.)*

7. *M. vastator*, effusus, aureus, margine villosus, venis crispis gyroso-plicatis.

*Tode l. c. p. 351. t. 2. f. 1, 2. Pers. syn. p. 497. A. S. p. 236. Schum. p. 371. Fr. Obs. 2. p. 100. (variet. epiphylla.)*

- b. *Mer. crucibulum. Fries l. c. p. 99!*

Odor plerumque ingratus, sed etiam nullus. Antecedenti minor, 1-2 unc. latus, tenuior, margine tenui sicco pubescente. E centro tubercula caulescentia subinde exserit. Colore latissimo mox dignoscitur. *In ligno pineo putrido vulgaris, ad fo-*  
*fij &c. Jul.-Dec. (v. v.)*

8. *M. molluscus*, effusus, tenuis, carneus, margine byssino albo, plicis gyroso-porosis.

Membrana mollis, laxe adhærens, sicca, sub-  
tus villosa albida. Plicæ confertæ, crispæ, subtu-  
berculosæ. Color carneus, fulvo-carneus, in siccis  
subaurantiacus, sed sporidiis albis facile ab A. la-  
crymante dignoscitur. *Ad ligna prostrata Pini.*  
*Jul.-Nov. (v. v.)*

9. *M. Himantoides*, effusus, molliissimus, subtus fi-  
broso-sericeus violaceo-lilacinus, plicis demum  
gyrosis subolivaceis. *Fr. Obs. 2. p. 238.*

Totus hombycinus, laxe adhærens, variabilis,  
margine tomentoso laxe. Plicæ juniores exaratae,  
adultæ vero priorum similes, poriformes, tuberculata-  
to-crispæ, flexuosaæ, colore griseo-violaceo, olivaceo,  
sordide luteo &c. variantes. *Ad ligno putrida pi-  
nea. Jul.-Nov. (v. v.)*

10. *M. Porinoides*, effusus, adnatus, margine byssi-  
no albo, plicis poriformibus flavo-sordidis. *l. c.*

Arcte adnatus, crustaceus, tenuis, persistens,  
junior totus villosus albus, demum hymenium de-

nudatum, plicis rotundis & linearibus flexuosis.  
*Cum prioribus.* (v. v.)

Ag. Cantharell. *Batsch. El. f. 34* (A. explicat. Hoffm.)  
 vix A. tremellosi var. — inquirendus.

---

#### IV. SCHIZOPHYLLUM. Fries.

*Agar. spec. Linn.* — n. 31. *Gled. meth. p. 134.* *Merul. spec. Gmel. Link. Schizophyll. Fries Obs. 1,* p. 103. *Mey. l. c. p. 303.*

CHAR. Lamellæ (*e basi*) radiantes, flabellatæ, subparallelæ, numquam anastomosantes, immixtis brevioribus, omnes longitudinaliter bifidæ; scilicet *e membrana duplice*, Agaricorum instar, sed non connexa, compositæ. Lamellulæ margine involutaæ, in superficie tantum exteriori ascigeræ. — Pilus suberoso-coriaceus, determinatus, margine involutus (*dimidiatus, subsessilis*). — Velum nullum. Sporidia alba.

HIS I OR. Nomen a σχιζω & οὐλον composui. — Incipit novam generum trigam, præcipue coriacea l. suberosa substantia a prioribus, quibus singulum eximie analogum, diversam. Quo plures in priori serie species, eo pauciores analogi generis in præsente. Sic & huic unica, per omnes orbis plagas reperta.

##### 1. SCHIZOPHYLLUM commune.

Vaill. par. t. 10. f. 7. Buxb. Cent. V. t. 7. f. 1. Batt. t. 38. f. D. Am. Hall. n. 2333. Ag. alneus. Linn. Suec. 1242. Schæff. t. 246. f. 1. Bull. t. 346, 581. f. 1. Weig. Obs. 2. 6. Nomencl. fung. t. 1. Sowerb. t. 183. Pers. syn. p. 485. Holl & Schmidt ext. n. 44. A. multifid. Batsch. f. 126. Nees f. 181. A. radiatus. Swartz Prod. p. 148.

Gregarius, unciam vix superans, tomentosus, albido-griseus, margine lebatus, sæpe multifidus. Lamellæ purpurasceni-ginereæ, villosæ; non pro-

prie ramosæ. Subinde stipitem brevissimum exserit. Per omnem Europam, Asiam; in Africa ad Guineam (Afzelius) & C. B. spei (Thunb. Prod. p. 182); in America boreali (Mühlenb.), Antillas (Swartz), Am. meridional. (Meyer), supra truncos arborum frondosarum. Tempestate pluviosa. (v. v.)

---

### V. DÆDALEA. Pers.

*Agarici dædaleis sinibus.* Tourn. J. R. H. p. 562. — Batt. p. 72! *Agarici & Boleti spec.* Linn. & Auct. *Merulii spec.* Gmel. — Pers. disp. p. 26. Dædal. Pers. syn. p. 499. Link l. c. Nees Syst. p. 224. *Agarici suberosi & Sistotrem.* sp. Pers. l. c.

**CHAR.** Hymenium sinuosum. Sinuli cum pilo suberosa substantia homogenei & concreti, firmi, subprofundi, varii; nunc lamellas anastomosantes l. contertas, nunc poros elongatos flexuosos referentes. Asci tenues. — Pileus suberosus l. coriaceus, tenax, margine patente, raro stipitatus l. effusus. Substantia floccosa. Velum nullum. *Sporidia alba* &c.

**ABERR.** Lamellæ fere simplices in Dæd. betulina, trabea &c. ab Agaricorum dignoscuntur substantia, ascis, nec e dupli membrana compositæ. Difficilius limites a Polyporïs stricti determinantur.

**HISTOR.** Genus procul dubio Polyporïs proximum, ad Agaricos abiens; Cantharello in hac serie analogum. Quando hic ab Agaricos distinguuntur, etiam Dædalea a Polyporïs. Species omnes fere lignicolæ; plurimas determinavit Battarra; Persoonio 5, nobis 30, quarum 1 ex Asia, 1 ex Africa, 3 Americanæ, reliquæ Europeæ. Nomen ob singulos, dædalea quasi arte constructos.

## Trib. I. STIPITATÆ.

1. *D. maxima*, pileo suberoso depresso villoso fuscō-fasciato, poris labyrinthiformibus fuscis, stipite crasso.

*Bolet. maximus. Brot. Lus.* 11. p. 408.

Pileus suborbicularis, infundibuliformis, semipedalis & ultra, fasciis e lateritis-fuscis. Pori decurrentes. *In solo humoso pineti prope Conimbricam aut. & hyeme.*

2. *D. biennis*, pileo suberoso depresso subvelutino subferragineo, poris labyrinthiformibus cinereis, stipite obeso.

*Bol. Bull. Ch.* p. 333. t. 449. f. 1. *Sistotr. Pers. syn.*  
p. 550. *Nees Syst.* f. 228. *Hydn. Dec. fr.* 2.  
p. 112.

Stipes vix uncialis, ferrugineus, inferne lanatus. Pileus junior globosus, undique perosus, demum cyathiformis, 3 unc. lat.; margine reflexus, repandus, albicans. Pori irregulares, sinuosi, demum lacerati, albidi l. cinerei. Valde affinis *Pol. perenni*. *Ad terram & ligna putrida Galliae.* (v. i.)

*B. D. Sowerbei*, pileo subdimidiato hispido, sinulis amplis integris carneis. *Sowerb.* t. 190.

Nisi præcedentem citaret Auctor, longe diversam crederem. Tota rufescens. Stipes sublateralis,  $1\frac{1}{2}$  unc. inæqualis. Sinuli ut in optimis Dædaleis! *Anglia.* (v. ic.)

3. *D. Brasiliensis*, pileo suberoso tenui glabro albo, lamellis tenuissimis densis anastomosantibus, stipite laterali brevissimo.

*Merul. dædaleus. Link diss.* 1. p. 37.

Stipes 4 lin longus, crassus, basi dilatatus. Pileus 2-3 unc. latus,  $1\frac{1}{2}$  unc. longus, tenax, superne inæquatus, margine acuto. *E Brasilia.*

## Trib. II. DIMIDIATÆ, sessiles.

\* AGARICINÆ, lamellatæ.

4. *D. quercina*, sessilis, ligneo-pallens, pileo suberoso ruguloso glabro, lamellis contortis implexis sinuosæ.

Fung. IV. C. Bauh. pin. 372. Strigiliformes. Androv. Dendr. p. 173. — Bocc. Mus. t. 305. f. 5. Buxb. C. V. t. 4. f. 1. — Batt. t. 38. A. Am. Hall. helv. 2330. Ag. querc. Linn. Suec. 1241. Bolt. t. 73. Sowerb. t. 181. Ag. labyrinthiformis. Bull. t. 352, 442. f. 1. A. dubius. Schæff. t. 331. Merul. querc. Pers. disp. Dædal. querc. Syn. p. 500.

b. *nigricans*, Batt. t. 38. B. Dec. fr. 2. p. 133.

Magnitudine & forina varia. Substantia nunc mollior subflexilis, nunc dura crassa rigida. Lamellæ crassæ ramoso-anastomosantes, sibi invicem implexæ, hinc inde poris immixtis. Ad sanguinem stillandum usus fuit; etiam pro fomite. *Ad truncos, apprime Quercus. Perennis.* (v. v.)

5. *D. betulina*, sessilis pallescens, pileo coriaceo zonato tomentoso, lamellis rectis subramosis.

Batt. t. 38. f. D. C. A. betulinus. Linn. Suec. n. 1244. Sowerb. t. 182. Scholl. barb. p. 260. A. flabellif. Scop. p. 460. A. quercin. Schæff. t. 57? A. coriac. Bull. t. 537. f. 1. - F. Bolt. t. 158. Pers. syn. p. 486. A. labyrinth. Wilk. Gryph. p. 141. Dæd. betul. Rebent. Neom. p. 371. Fries Obs. 1. p. 104. Fl. Dan. t. 1555.

b. *A. versicolor*, Plan. Erf. p. 4. Pers. l. c.

Antecedente minor & tenuior, zonis concoloribus l. obscurioribus, demum uti plures Dædaleæ species virore suffusa. Lamellæ coriaceæ, non raro etiam anastomosantes & sinuosæ, demum margine laceratae. *Ad truncos Betulæ, Quercus &c. Perennis.* (v. v.)

6. *D. sepiaria*, sessilis, pileo coriaceo zonato stri-goso-tomentoso spadiceo, margine lamellisque ramosis anastomosantibus lutescentibus.

*Vaill. par. t. 1. f. 1-3* (status resupinat.) *Buxb. C. V.* t. 6. Am. *Hall. helv.* 235t. *Ag. Linn. Svec.* 1243. *A. hirsut.* *Sohæff.* t. 76. *A. betulin.* *Allion.* p. 339. *A. sepiar.* *Wulf.* in *Jaeq. Coll.* 1. p. 347. *A. quer-*  
*ein.* *Humb. Frib.* n. 125. — var. *Liljebl. Fl.* 2. p.  
451. *Merul. squamios.* *Schrad.* sp. p. 140. *Merul.*  
*sepiar.* *Schr. Pers. Obs.* 2. p. 93. *Ag. Syn.* p. 487.  
*Dædal.* *Swartz in V. A. H.* 1810. p. 2.

b. *A. tricolor.* *Bull.* t. 541. f. 2. *Dec. fr.* 2. p. 133.

Pileus durus, planiusculus, elongatus, sæpè se-  
riato-confluens, tomento demum squamuoso quasi  
scrobiculatus, nigrescens. Lamellæ frequenter in  
sinulos & poros concrescunt, margine acuto den-  
ticulato; demum ferrugineæ, subumbrinae. *A. undulatus* Hoffm. Subt. p. 7. t 4, teste Persoonio  
hujus monstrositas. *Ad ligna pinea putrescentia,*  
ubique. *Perennis.* (v. v.)

7. *D. abietina*, sessilis, pileo suberoso-coriaceo sub-  
zonato glabrescente umbrino, lamellis rectis  
subramosis glaucis. *Fries Obs.* 2. p. 239.

*Ag. abietin.* *Bull.* t. 442. f. 2, 541., f. 1. *Pers. syn.*  
p. 486. *Dec. fr.* 2. p. 135. *A. S.* p. 233. *A. asser-*  
*cularum Schrad.* sp. p. 134 (nec Batsch, qui præ-  
ced.)

Junior tomento umbrino obductus, dein gla-  
ber, nigrescens, zonis concoloribus, ad 1  $\frac{1}{2}$  unc. &  
ultra elongatus. Lam. convexæ, cinereo-pruinose,  
subinde anastomosantes. *Ad trabes abietinos &c.*  
*Perennis.* (v. v.)

8. *D. striata*, sessilis, pileo coriaceo pubescente  
ferrugineo, lamellis rectis subanastomosantibus  
cinereis.

*A. striat.* *Swartz Prod.* p. 148. *Fl. Ind. Occ.* p. 1920.

Ægre a priori dignoscitur. Pileus reniformis,  
postice brevissime attenuatus, 1-2 unc., molliuscu-  
lus, tenuis, obsolete zonatus. Lamellæ inæquales,  
tenues, fragiles, margine passim crenulatæ. *Ad*  
*truncos Jamaicæ.*

9. *D. trabea*, sessilis, pileo suberoso glabro sordide fusco, lamellis subsimplicibus carneo-rutilis. Pers. syn. p. XXIX. (Ag.)

Dæd. quercinæ affinis, sed tenuior, lamellis non reticulatis. Pileus subimbricatus, rugulosus, sub lente tomento tenui tectus. *Ad træbes.*

10. *D. elegans*, sessilis, pileo coriaceo glaberrimo albido, subtus alutaceo, lamellis anastomosantibus. Spreng. in V. A. H. 1820. p. 51.

Lignosa, lamellis margine in poros abeuntibus. In arboribus Guadelupæ.

\*\* GENUINÆ, sinuosæ porosæque.

11. *D. Palisoti*, sessilis, pileo hemisphærico zonato glabro albido, lamellis simplicibus, porosisque.

*D. Amanitoid.* *Palis. Fl. Ow. I.* p. 44. t. 25.

Elegans, reniformis, 4 unc. lata, substriata, ochraceo-albida, zonis subconcoloribus; margine lobato. Sinuli inæquales; centro lamellosæ, parallelæ, simplices; basi vero porosæ. *Ad truncos regni. Oware.* (v. ic.)

12. *D. Bulliardii*, sessilis, rufescens, pileo molle dein coriaceo glabro, poris latis irregularibus "lacunis interjectis."

*Bol. suberos.* *Bull. Ch.* p. 354. t. 482. *Dec. l.c.p. 116.*

Junior motili, subaquosa; quoad formam varia; superne plerumque rugosa l. zonata, intus concolor. Tres allatæ varietates (*fulva*, *rutila*, *alba*) atate forsitan tantum differunt. *Ad truncos Galliae.* (v. ic.)

13. *D. Thunbergii*, sessilis ferruginea, pileo coriaceo lævi glabro, sinulis linearis-oblongis undulatis.

*Bol. Agaricoid.* *Thunb.* *Jap.* p. 347.

Rotundata l. oblonga, superiori convexa pagina rimis adnata. "Pori in inferiori pagina pro diversa atate variantes, minuti & maiores, angulati & lamellati, lamellis undulatis, intra marginem abruptis." *In rimis tectorum Japoniae.*

14. *D. confragosa*, sessilis, pileo suberoso-coriaceo zonato-scabro lateritio-fusco, sinulis labyrinthiformibus cinereis.

*Bolet. labyrinth.* *Bull. Champ.* p. 357. t. 491. f. 1.  
*Dec. fr.* 2. p. 117, *Dædal. conf. Pers. syn.* p. 561.

b. *sinulis rufofuscis*, *Bol. confrag.* *Bolt.* t. 160.

Fere lignosa, subimbricata, zonis concoloribus, intus obscure badia. Sinuli lati, varie contorti; in b. rotundi, oblongi, angulati, lati l. angusti in eodem individuo. *Ad truncos Sorbi terminalis &c. Perennis.* (v. ic.)

15. *D. Pini*, sessilis, pileo pulvinato fusco, fasciis elevatis inæqualibus aspera, poris inæqualibus sublabyrinthif. lateritijis.

*Bol. pini. Brot. Lusit.* II. p. 468.

An a prioris b. satis distincta? *Ad Pinus annosas & putrescentes Portugaliæ.*

16. *D. cinerea*, sessilis, pileo suberoso zonato tomentoso cinereo, sinulis angustis, aliis poriformibus, aliis longissimis flexuosis.

*Batt.* t. 38. f. G. — *Fries Obs.* 1. p. 105.

Imbricata, crassiuscula, lignosa, subundulata, 1  $\frac{1}{2}$  - 3 unc. lata, zonis paucis latis subconcoloribus. Hymenium, ut ita dicam, valde compactum ob sinulos perangustos sed tortuosissimos & valde intricatos, qui cinerei, l. albidi, semper integerrimi. *Ad Fagi truncos, raro. Perennis.* (v. v. Femsjö in Hågngen.)

17. *D. unicolor*, sessilis, cinerea, pileo coriaceo villosi zonato, sinulis inæqualibus subflexuosis, demum laceratis.

**Bolet.** *Bull. champ.* p. 365. t. 408, 501. f. 3 (non bon.)  
*Bolt.* t. 163. *Sow.* t. 325. *Dec. fr.* 2 p. 175. *Eol.*  
*decip.* *Schrad. spic.* p. 169. *Sistotr. ciner. Pers.*  
*syn.* p. 551. *Swartz in V. A. H.* 1810. p. 240.

**b.?** *Sistotr. versicolor.* *Tratt. Öst. Schw.* t. 5. f. 10.

Tenax, flexilis, imbricata, humida saepe fuliginea, sicca albido-grisea, zonis concoloribus, margine in juniori albido. De genere nullum dubium ob affinitatem (*D. betulinam* lamellis in dentes fissis reperi!) & sinulos in juniori statu integros omnino Dædaleos gyrosos. *Ad truncos Europæ & Amer. borealis, autumno.* (v. v.)

**18.** *D. variegata*, sessilis, pileo coriaceo zonis glabris villosisque discoloribus fasciato, sinulis elongatis flexuosis albis.

*Bull. t. 537. f. I, K, L. — Fries Obs. 2. p. 240.*

Similis Polyp. versicolori, nec *D. betulinæ* affinis, quamvis figg. Bull. cit. habitu bene convenient. Imbricata, reniformis, unciam vix superans, zonis depressis glabris cinereo-fuscis, elevatis albis l. canis villosis. Sinuli perangusti, demum dentati. *Ad truncos Fagi, raro. Aut.* (v. v.)

**19.** *D. saligna*, sessilis, albida, pileo suberoso coriaceo pubescente azone, sinulis elongatis angustis flexuosissimis. *Fries l. c.*

**b.** pileo tuberculoso, sinulis brevioribus. *Batt. t. 38. f. E. F.*

Inodora, imbricata, mollis, dilatato-reniformis, uncialis, lævis, sed prope marginem strigosum depresso. Sinuli alii poriformes. *Ad Salices vetustas, raro. Hyeme.* (v. v.)

\*\*\* **POLYPOROIDEÆ.** Sinulis porosis, uniformibus.

\*\*\* **20.** *D. suaveolens*, sessilis, pileo coriaceo-subero-so glabro e niveo-subfulvo, poris elongatis irregularibus rufescientibus,

Bolet. Bull. Ch. p. 342. t. 310. Dec. fr. 2. p. 118. Dædal. Pers. syn. p. 502. Rebent. Neom. p. 377.

Odore suavi aniseo facile dignoscitur. Junior alba; dein rufescens, superne zonata, scabra; intus stramineo-fuliginea. — "E pulvrefacto fungo præparatur electuarium bono successu in Phtisi usum. Dosis 1 scrupul — 1 drachma." *Ad truncos salicinos; In Scania semel. Nov. (v. v.)*

21. *D. gibbosa*, sessilis, albida, pileo suberoso villosa, basi porrecto gibboso, poris linearibus subrectis.

*Fungus arboreus villosus albus, foraminulis oblongis &c. Raji Hist. III. p. 19. Bolet. suberos. Linn. Suec. p. 453. (ob poros!) B. sinuos. Sowerb. t 194. Merul. gibbos. Pers. Obs. 1. p. 21. Dæd. Syn. p. 501. Schum. Sæll. p. 373. Rebent. Neom. p. 372. Fries Obs. 1. p. 106.*

Inodora, subsolitaria, dura, elastica, 3-5 unc, & ultra, obsolete zonata, vetusta cinerascens & putrescens virore pulverulento suffusa; intus alba. Margo obtusus. Pori breves, angusti, recti; variant reniformes (Gort. Fl. ingr. p. 184) & leviter sinuosi (Sow. l. c.) *Ad truncos Fagi, Betulae, Salicis &c. Viget autumno. (v. v.)*

22. *D. albida*, sessilis alba, pileo suberoso tenui subglabro, poris subelongatis angulatis. *Fries Obs. 1. p. 107.*

Inodora, subsolitaria, tenuis, basi æqualis; junior sericea, dein glabra rugulosa, subtus concava. Variat zonis concoloribus. Pori elongati, prioris latiores; juniores & margine angulato-æquales. *Ad Betulas. Forsander. (v. s.)*

23. *D. angustata*, sessilis, pileo suberoso pubescente zonato fuscescenti-cinereo, poris longis angustis olivaceo-flavis.

Bolet. angust. *Sowerb. t. 193.*

Subimbricata, obovato-reniformis, planiuscula, sublobata, 1-2 uncialis. Pori subflexuosi intus fla-

vi Bolet. albus. Bolt. t. 78 loco, pororum forma & colore affinis videtur. *Ad trunco Populi in Anglia.* (v. ic.)

24. *D. aurea*, sessilis, pileo suberoso velutino aureo, poris longis flexuosis flavis.

*Agaricus aureus* &c. Batt. p. 72.

Ob colores distincta species. Imbricata, 2 unc. lata. Hujus varietates in colore & hirsutie non paucæ. *Ad Quercus obtruncatas.*

25. *D. rubescens*, sessilis, junior pruinosa, pileo subsuberoso levavi & pallido-rubescente, poris longis rectis angustis. A. S. p. 238.

Totus initio fungus & præcipue subtus pruina albida detersili l. demum evanescente obductus, qua sublata rosello-rubescens l. subpurpurascens, dein opacior; etiam in fulvum l. rufum vergens. Pileus subcarnoso-suberosus, subtenuis, 2-3 unc., vix tomentosus, adultus zonatus. Pori in hac præcipue marginem versus elongati. *Ad Salices capræas &c. Autumno.* (v. s.)

26. *D. fusca*, sessilis, pileo suberoso zonato obscure fusco, lamellis ubique anastomosantibus, sinulis angustatis. Link l. c.

Valde ad Polyp. accedit. Cæspitosa, dura, firma, uncialis. Pori magni. *Brasilia.*

27. *D. ferruginea*, effuso-reflexa, coriacea, zonata, flavo-ferruginea, junior margineque villoso alba, poris difformibus. Schum. p. 373.

Imbricato-connata, primo effusa albido-incarna-ta, margine byssino; demum horizontalis, 3 unc. usque lata, 1  $\frac{1}{2}$  lin & ultra crassa, postice tuberculosa, margine tumido flexuoso. "Lam. angustæ, flexuosæ, anastomos., antice obsoletæ" Habitus Merul. tremellosi. *In ligno Fagi Daniæ. Nov. Dec.* (v. ic.)

1. *Oreochivole, Ferr, Imp, Hist, Nat, p. 634.*

2. *Fungo villosa*. *Ferr. Imp. l. c. p. 635.* Ad pannos luteos tingendos Neapoli utitur. (*Subtus sinuosus. Michel.*)
3. *A. rufo-velutinus*, *coriaceus*, *rufescens*, *mollis*, *tomentosus*, *lam. paucis*. *Dec. fr. 2. p. 134.* — Ut omnes in *cryptis*, *dubius*. Cf. *Dæd. sæp.*
4. *Bol. imberbis*, *coriaceus*, *glaber*, *flavo-albidus*, *zona-tim sulcatus*, *tubis sinuosis*. *Bull. Ch. p. 339. t. 445. f. 1.* — Cf. *Obs. ad n. 30.*

A antiquus *Willd. Ber. p. 376* e synon. est *Dæd. quer-cina*, e descr. *D. sepiaria*. — Plura anteced. synonyma & novæ species latent sub *Agar.* ord, III. *Mich. gen. p. 119—121.*

Trib. III. RESUPINATUS. (Dæd. sepiar.)

28. *D. latissima*, *effusa*, *suberosa*, *crassa*, *undulata*, *ligneo-pallens*, *poris subrotundis longissimisque flexuosis*. *Fries Obs. 1. p. 128* (Pol.)

Resupinata, 5 unc. — 2 pedes lata, junior absque poris, margine hinc inde libero. Pori primo nulli, mox puncta sparsa superficialia (*Polysticta*); dein conferti varii, alii subrotundi, alii longissimi perangusti &c. Substantia dura, lignea, intus subzonata. *Ad paginam supinam! truncorum muscosorum Fagi. Aut. (v. v.)*

29. *D. serpens*, *effusa*, *suberoso-tenuis*, *confluens*, *ligneo-pallens*, *margine villosa*, *poris magnis inæqualibus*. *Fries Obs. 2. p. 265.* (Pol.)

Color *D. quercinæ*. Margo tenuis, pubescens. Sinulorum dissepimenta crassa. Inter corticis rimas per lineas elongatas seriatas & confluentes serpit. *Ad trunco Quercus mortuæ, sed non prostrato!* *Aut. (v. v.)*

30. *D. heteromorpha*, *effusa*, *submembranacea*, *sordide lutescens*, *margine byssino*, *poris irregularibus flexuosis*. *Fries Obs. 1. p. 108.*

Dæd. ferruginea forsitan proxima. Margo albicans. Sinuli longi, obliqui, non vero plicato-dentati, ut apud *Merulios*. *Ad truncum pineum. Aug. 1814. (v. v.)*

Ad hoc genus referuntur I.) AGARICI Auct. suberosi  
 I. coriaeae, lamellis plus minus anastomosantibus II.)  
 BOLZTI Auct. poris vere labyrinthiformibus, l. elongatis  
 flexuosis aut lacunosis III.) BOLETI Auct. poris constanter  
 (plus minus) longis; simul subdistantibus, dissepimentis  
*crassiusculis obtusis firmis*. Dantur etiam veri Poly-  
 pori (substantia insuper diversi!) poris nunc regulari-  
 bus, nunc longis flexuosis, semper vero confertissimis,  
*dissepimentis tenuissimis, acutis* — & ex his laeferatis (ple-  
 rumque ob situm obliquum!) oriuntur illi pori elongati;  
 ex. gr. *Pol. citrini, mollis, borealis, liquiritiae* &c. Alio-  
 modo strictos limites horum generum non invenio.

---

## VI. POLYPORUS. Michel.

*Agarici spec. Veter.* — Ord. II, IV, V & Polyp. *Mich.*,  
*nov. gen.* p. 118, 129. *Agaricus.* *Dill. l. c. Lam.*  
*Enc. I.* p. 49. *Boleti sp.* *Linn. gen. n.* 1075. *Gled.*  
*meth.* p. 62. *Pers. syn.* p. 514. *Nees Syst.* p. 1217.  
*Sistotri. sp. l. c.* *Mison, Agaricon, Poria. Adans.*  
*Polyp. Fries Obs. r.* p. 121. *Favolus & Micro-*  
*por. Pal. Beav. Fl. Ow.* p. 12.

**CHAR.** Hymenium cum pilei substantia homogeneum & concretum, poris subrotundis pertusum, dissepimentis tenuibus simplicibus ascigeris. Asci tenues, sporidis exiguis. — Pileus carnoe-lentus l. suberosus, subsessilis, passim stipitatus, substantia floccosa sicca. Velum plane nullum.

**ABERRATT.** Hymenium duorum secedit, sed in *P. betulino* saltim pileo homogeneum, absque tubulis. In aliis, præcipue ob situm obliquum, dissepimenta lacerantur, ubi pori dentati l. elongati evadunt, quos vero status cautus & peritus cum sinulis l. subulis numquam confundit. Pileus in nonnullis multiplex ramosus, multis resupinatus.

**HISTOR.** Nomen a πολύς & πόρος formavit Michelius, species modo stipitatas hic trahens. Recentiores dein, excepto naturæ interprete summo Jussieu, cum Boletis ob similitudinem mere habitualem conjunxerunt. Quantum vero differunt,

respectu hymenii, nunc proposui. Inter illos, qui in genera plura divisorunt, eminet Belvisius. Species numerosæ, plures exoticæ, sublignicolæ.

DIVIS. ex hymenio — pilei forma & substantia. Sporidia tenuia ægre secedunt, hinc ad hymenii colorem interiorem (exterior vagus) attempendum.

A. FAVOLUS. Pori ampli, 4-6 goni, favum imitantes (*Mesopus*, *Pieuropus*, *Apus*.)

B. MICROPORUS. Pori minuti, subrotundi.

I. MESOPUS. Stipes distinctus, simplex, subcentralis. (*Suberosi* & *carnosi*.)

II. PLEUROPUS. Stipes lateralis, simplex. *Duri*.

III. MERISMA. Stipes curv. ramoso l. multiplici pileo confluens, l. obsoletus. *Carnosa*.

IV. APUS. Pileus sessilis, lateralis.

V. RESUPINATUS. Pileus resupinatus, effusus.

C. POLYSTICTA. Puncta superficialia.

### FAVOLUS. Pal. l. c.

CHAR. Ut supra: Genus inter Dædaleas & Polyporos genuinos medium, sed ab his limites stricti desunt: Species regionibus calidioribus, bene monente Palisot, plurimæ propriæ l. æstivales, uti analogi Agarici lentiscyphi!, 6 priores tantum differunt, ut singula propria subtribus. Sporidia P. squamosi, unici a me observati, alba.

\* 1. P. FAV. *tessulatus*, cinereus, pileo carnoso convexo rimo-tessulato, poris tetragonis, stipe centrali squamoso. *Fries Cbs.* 2. p. 254.

*Mich.* t. 71. f. 2. *Hall. helv.* n. 2294—2296.

Totus cinereus. Stipes 4 unc longus, crassus, æqualis, villosus. Pileus in squamas latas fissus. *In silvis subalpinis Eur. Austr. Aut.* (v. ic.)

2. P. FAV. *arcularius*, pileo subero-flavescente, marginè deflexo hispido, poris rhombis albis, stipe centrali lavi.

*Mich. t. 70. f. 5. Bol. arcular. Batsch. - Pers. syn. p. 518. B. exasperat. Schrad. sp. p. 153.*

*Stipes  $\frac{1}{2}$  unc. & ultra, teres, dilute fuscis. Pileo  $\frac{1}{2}$  unc. Sub tantia pallida (carnoso-lenta?) Ad truncos Italiæ, Germaniæ. Majo. (v. ic.)*

3. P. FAV. *alveolarius*, pileo coriaceo brunneo, poris hexagonis oblongis albis, stipite glabro centrali. *Bosc. in Bert. Naturf. Mag. 1811. p. 84. t. 4. f. 1.*

*Stipes spongiosus, 2 unc. longus, 5 lin. crassus, basi subincrassatus. Pileus disco depresso, 3 unc. latus, margine irregularis. Pori 1 lin. longi & profundi, lati, in stipite decurrentes. Ad truncos varios Carolinæ. (v. ic.)*

\*\* 4. P. FAV. *Michelii*, candidus, pileo carnoso lævi, poris oblongis amplis, stipite glabro laterali. *Mich. t. 61 f. 2.*

*Esculentus, cæspitosus; stipite 1  $\frac{1}{2}$  unc. longo, crasso; pileo flabelliformi, 2-3 unciali. Pori favum imitant; in iconæ distant. In Italia. Jun. (v. ic.)*

5. P. FAV. *squamulosus*, amplus, pileo carnoso-lento subochraceo, squamis obscurioribus, poris pallidis, stipite sublaterali obeso.

*Sterb. t. 13, 14. - Batt. t. 37. A. B. - Hall. helv. n. 2278. Bol. squamos. Huds. - Schæff. t. 101, 102. Bolt. t. 77. Fl. Dan. t. 1196. Kölz. suppl. p. 126 (salsquam.) B. caudicin. 1. Scop. p. 469 Bol. celulos. Lightf. Scot. p. 1032. B. juglandis. Bull. champ. p. 344. t. 19, 44 (B. polymorph.) B. platypor. Pers. syn. p. 521. Swartz V. A. H. 1810. p. 14.*

Nunc solitarius, nunc & sæpius quam maxime cæspitosus; junior tuberculum difforme sistit. Stipes junior subcentralis, dein lateralis, demum nigrescens, intus spongiosus albus. Pileus 3 unc. sesquipedalis usque, variat pallidus & subfuligineus, larvis valde infestus. Pori subdentati, variant "flavi" A. S. p. 245. "flexuosi" P. Ad truncos Fraxini, Populi nigræ, Fagi, Quercus, Salicis, Juglandis, Acerum &c. Jun. seqq. (v. v.)

Valde variat, inde in tres species divisit Cel. Schü macher (*E. squamosus*, *maximus*, *platyporus*. Sæll. p. 381, 382. In cellis monstrositas sæpe occurrit (Weig. Fl. Pom. p. 214) *Ag. lepidei*, cui hæc species analoga. similis. Cf. *Philos. transact. X. 20. f. 109*; *Backst. spec. Bot. p. 2. t. 1.* *Bolet. rhangif.* *Bolt. t. 138.* *B. squamos.* *Sowerb. t. 266.* — *Fung. esc. g. V. Clus.* huc citari solet,

6. P. FAV. *tenuiculus*, pileo coriaceo lævi, poris hexagonis regularibus, stipite brevi laterali. *Palis. l. c. t. 42. f. 2.*

Stipes vix 2 lin. longus, basi subincrassatus. Pileus reniformis, 1  $\frac{1}{2}$  unc. & ultra latus, dimidiatus, margine sinuatus; poris oblongis profundis ob substantiam tenuem pelluentibus. *Ad truncos regni Oware Africes* (v. ic.)

- \*\*\* 7. P. FAV. *Mori*, sessilis, pileo coriaceo-suberoso glabro luteo, poris hexagonis.

*Hexagona Mori.* *Poll. pl. nov. p. 35.*

Pileus planiusculus, subtus in cellulas hexagonas exfossus. *Ad Morum albam montis Baldi. Aug.*

8. P. FAV. *heteroclitus*, sessilis aurantiacus, pileis imbricatis lobatis villosis, poris magnis diffor- mibus.

*Bol. Bolt. t. 164. Pers. syn. p. 528.*

E radice dura & coriacea, intus alba, parcos lobos, terræ incumbentes, protrudit. Pilei 2  $\frac{1}{2}$  unc. — *Bol. heterocl.* *Sowerb. t. 367* (*salicinus*) superne flavus & glaber pictus. *In Anglia ad terram.* (v. ic.)

9. P. FAV. *villosus*, sessilis, pileo coriaceo zonato villoso griseo, poris angulatis.

*Bolet. villos.* *Swartz Fl. Ind. Occ. p. 1923.*

Pileus tenuis, variæ figuræ, cinereo-albidus, 1-2 unc., junior sæpe resupinatus, deinde reflexus. Pori majusculi, inæquales, albidi, dein fuscescentes. *Ad truncos Jamaicæ.*

10. P. FAV. *hirtus*, sessilis, pileo suberoso zonato strigoso nigrofusco, poris griseis

*Plum. fil.* p. 169. A. ? Fav. *Palis.* l. c. t. 1.

Magnus, 1-2 pedalis, reniformis, supra accrescentis zonatus, pilis rigidis & ramosis. Alveolarum subregularium latera inaequalia. *Ad ligna mortua, Africæ.* (v. ic.)

11. P. FAV. *Sinensis*, sessilis fusca, pileo plano, setis erectis ramosis, poris angulatis.

*Bol. favus. Linn. Spec. II.* p. 1615. Ag. *Lam.* Enc. I. p. 50.

Fungus vix pulvinatus; pagina superior undique setis compressis fuscis quasi *Lichene rhangiferino hispida*. Pori magni, basi saepe inaequales. *In China.* (v. s.)

12. P. FAV. *Gallicus*, effuso-reflexus fuligineo-fuscens, pileo subtriquetro strigoso-squamoso, poris amplis.

*Bol. favus. Bull. ch.* p. 363. t. 421. *Pers. syn.* p. 542. *Dec. fr.* 2. p. 114. *Nees Syst. f.* 222.

Maxime affinis precedentibus, tamen diversus apparet. Coriaceus, elongatus, subzonatus, ex ico-  
ne squamis imbricatis palmato-inceisis rigidis se-  
caber. Pori profundi, subrotudi. *Ad trabes Pini &c.*  
*in Gallia.* (v. ic.)

*Bol. favus. Fl. Dan.* t. 983. P. squamoso proximus.

### Trib. I. MESOPUS.

**Polyporus.** *Mich.* p. 129! — petiolati. *Hall. helv.* p. 144. *Milleporei. Batsch. El.* p. 103. *Bol. E. \* Pers. syn.* p. 514. *Microporus. Palis.* l. c. p. 12. *Gymnop., Omph., Mycen. Nees Syst.* p. 218.

**CHAR.** Stipes solidus, firmus, cum pileo con-  
tiguus, perpendicularis. Pileus latus, plus minus  
X 5

depressus, centralis l. excentricus; non ramosus multiplex. Pori cum stipite contigi, tenues.

Obs. Substantia, nec forma, affinitates indicat. Inde etiam sequentem tribum natura non distinxit; & Pol. varii var. numularia e charactere hoc omnino pertineret. Species caute distinguenda.

+ Subcarnosi, sed demum plerumque valde lenti evadunt; tamen substantia & sporidiis albis distinguuntur. *Edules.*

I. *P. subsquamosus*, pileo carnoso lento albido, plerumque diffracto squamoso, poris flexuosis niveis, stipite obeso.

Bol. Linn. Suec. 1250. Wulf. in Jacq. Coll. I. p. 342. Jacq. Fl. Vind. p. 198. Polyp. Fries. Obs. 1. p. 122. Bol. caranth. Pers. syn. p. 514.

Stipes  $\frac{1}{2}$  unc. & ultra longus & crassus, glaber, albidus l. cinerascens. Pileus compactus, inaequalis, 2-5 unc. latus. Pori exigui. In Carinthia undique in cibum recipitur. Wulf. In pinetis montosis, autumno. (v. v.)

β. *P. repandus*, pileo cinereo fibrilloso, poris subrotundis, stipite obeso. Mich. t. 70. f. 2. — Stipes saepe squamosus. Pileus repandus, margine villosus. Cum priori. (v. v.)

γ. *P. leucomelas*, pileo sublævi stipiteque fuligineo-nigricantibus, poris æqualibus.

Mich. t. 70. f. 3. Bol. Pers. syn. p. 515. A. S. 241.

Stipes longior, 1  $\frac{1}{2}$  unc. fere, æqualis. Pileus planiusculus subregularis. Cum priori.

2. *P. ovinus*, pileo carnoso fragili albido, poris subrotundis ex albo-citrinis, stipite brevi inæquali.

Bol. Schæff. t. 121, 122. Fl. Dan. t. 1618. Nees Syst. f. 210. Mart. Erl. l. c.

β. *B. albidus*. Pers. syn. p. 515. Obs. 1. p. 84. A. S. p. 242. Tratt. l. c., t. S.

Stipes crassus, unciam & ultra longus, passim tuberosus l. excentricus. Pileus 5 unc. fere latus, subrepandus, primo lævis, dein cœlo sicco rimosus; etiam lutescens, rufescens & fuscescens. Pori exigui. Variat uti prior, cui affinis, sed fragilitate & poris flaventibus differt. In pinetis montosis, etiam Americæ. Aut. (v. v.)

3. *P. Tuberaster*, pileo carnoso repando squamuoso flavescente, poris subrotundis stipiteque lento pallidis.

Fung. in lapide &c. *Mathiol.* - *Cœsalp.* p. 618. *Ferr.*  
*Imper.* p. 634. - *J. Bauh.* XL. c. 36. *Bocc. Mus.* t.  
300. *Mich. gen.* p. 131. ! (ubi syn.) t. 71. f. 1.  
*Batt. Hist.* p. 59-62. t. 24. *A. Bol. tuberaster.*  
*Jacq. coll. Suppl.* t. 8, 9. *Pers. syn.* p. 514. *Nees*  
*Syst.* f. 211.

Stipes coriaceus, non edulis, stipitibus sterilibus cingitur. Pileus centro depresso l. infundibuliformis, subvillosus, 2-4 unc. latus. Pori flavescentes. "Matrix non lapis est, sed radix perennis, spongiosa, quæ, dum successive crescit amplectitur & tenaciter implicat glebas terræ, lapillos, carbones & quæcumque in terra sparsa reperiuntur" *Mich. l. c.* Hæc alibi translata & irrigata plures per annos producit fungos. In Suecia habuit Gadd, qui analysin dedit (*V. A. Handl.* 1797. p. 94.) Cf. *I. l. c. c.* & *Marc. Aur. Severini* epistola de lapi- de fungifero Patav. 1649. In cibariis laudatissimus, præcipue Neapoli in usu frequens. In montibus Italicae variis locis per regnum Neapolitanum, Pontificatum Sc. (v. ic.)

4. *P. melanopus* & *infundibulum*, pileo carnoso len- to infundibuliformi albido-fuligineo, poris al- bidis, stipite firme basi nigrescente.

*Bol. Pers. syn.* p. 516. *Ic. piæt.* 4. *f. 1.*

Stipes 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 3-4 lin. crassus, deor- sum sape incrassatus. Pileus glaber, lævis, 2-3 unc. latus. Pori minuti, rotundi. In silvis circa trun- torum radices Sc. Aut. (v. v.)

*B. cyathoides*, pileo umbilicato fuligineo, stipite tenui nigro.

Hall. n. 2299. B. umbilic. Scop. p. 466. Bol. Pers. syn. p. 517. Ic. piæ. t. 4. f. 2. A. S. p. 242. Swartz in V. A. H. 1810. p. 10! Dec. fr. 6. p. 42.

Antecedente minor & tenuior, stipite sœpe excentrico. *Ad ramulos dejectos.* (v. v.)

5. *P. fuligineus*, pileo carnosolento cupulari lavi fuligineo-cinereo, poris albidis, stipite glabro.

Bol. polyporus. Bull. Champ. p. 331. t. 469. Dec. fr. 2. p. 123. B. fuligineus. Pers. syn. p. 516.

Stipes centralis, gracilis, ventricosus, pileo dilutior, basi plerumque ferrugineus. Pileus orbicularis, tenuis porique primo albi, demum subcinerei. *Ad terram Galliæ. Aut.* (v. ic.)

6. *P. brumalis*, pileo carnosolento subumbilicato viloso fuligineo expallente, poris subangulatis albis, stipite pallido.

a. autumnalis. Elv. pileus. Schæff. t. 281. Bol. laetus. Batsch. El. f. 42. B. pusillus. Schrad. spic. p. 152. (status infantilis) B. hypocraterif. & umbilicatus Schrank. bav. p. 621. B. brumal. Pers. syn. p. 517! Fries Obs. 2. p. 255. B. trichoceph. Ehrenb. silv. Ber. p. 31.

b. vernalis. Bol. 5 a. Gled. meth. p. 75. B. polypor. Retz. in V. A. H. 1769. B. fasciculat. Schrad. l. c. p. 154. B. ciliatus. Fl. Dan. t. 1297 (forma singularis) B. pictus. Ehrenb. l. c.

Tenax, firmus, odore debili acidulo; colore, forma & magnitudine eximie varius, præcipue status senilis (vernalis) a juvenili maxime recedit. Stipes durus, 1-2 unc. longus, 2-4 lin. crassus, subæqualis, albido-fuscescens; hirsutus, squamulosus, raro glaber. Pileus planiusculus, centro depresso, 1-4 unc. latus, junior fusco-fuligineus villosus; senescent glabriusculus squamosus cervinus, flavescent 1 pallidus. Caro alba. Pori angulati l. juniores oblongi, lactei, dein pallidi l. flavescentes, denticu-

lati. *Ad truncos v. gr. Fagi, ubique; etiam ad terram humosam Europæ & Amer. bor. Junior Aug.-Oct., adultus hieme, redivivus vere, in aestate persistens.* (v. v.)

7. *P. ciliatus*, pileo lento glabro fuscescente, margine ciliato, poris minimis subrotundis pallidis, stipite tenui glabro. *Fries Obs. I. p. 123.*

A priori caute distinguendus statura minori & regulari & præcipue poris integris, obtusis, neutiquam angulatis. *Ad truncos, autumno.* (v. v.)

8. *P. leptocephalus*, pileo earnoso-coriaceo tenui glabro cervino, poris minimis subrotundis albis, stipite brevi pallido.

*Bol. lept. Jacq. Misc. I. p. 142. t. 12. Dicks. Crypt. 3. p. 21. Pers. syn. p. 519. Swartz l. c. p. 466.*

Stipes vix uncialis, interdum excentricus. Pileus planiusculus, subuncialis, azonus, margine subrepando glabro. Pileus expallescere videtur; & hinc non differre *Bol. fuscidulus* & *pallescens* Schrad. l. c., Mich. t. 70. f. 1. (albus.) Hall. helv n. 2300. *Ad ligna. Aut.* (v. s.)

†† Coriacei l. suberosi, demum lignosi. Pileus infundibulif. Substantia & sporidia (*in examinatis*) subferruginea. *Non cibarii.*

9. *P. carbonarius*, pileo coriaceo zonato nigricante, poris stipiteque brevi albis. *Mich. t. 70. 6.*

Crepitosus Pileus infundibuliformis, unciam vix attingens, margine repandus. Cf. Rupp. Jen. p. 361. Gled. meth. p. 68. a. Hall. helv. n. 2298, qui vix rite a *P. perenni*, a quo forma recedit, distinxerunt. *In carbonariis Italæ autumno.* (v. ic.)

10. *P. perula*, pileo coriaceo subzonato striato rufo-fusco, poris minimis rotundis, stipite excentrico brevissimo.

*Microp. Perula. Palis. Fl. Ow. p. 13. t. 8.*

Stipes (ex iconē) 2 lin. longus. Pileus tenuis infundibuliformis, striis plicisque nonnullis longitudinalibus notatus, marginibus inæqualibus. Pori æquales, sordide albescentes. *Ad ligna putrida, Oware & Benin.* (v. ic.)

II. *P. xanthopus*, pileo coriaceo glabro zonato fulvo-badio, poris minimis rotundis, stipite brevi glaberrimo flavo. *Fries Obs. 2. p. 255.*

Stipes 2-3 lin. longus, centralis, basi dilatatus, superficie polita & lucida, *P. lucidi* instar. Pileus tenuis, profunde umbilicatus, i  $\frac{1}{2}$  unc. latus, lævis. Pori integerrimi, pallidi, subtestacei. *Ad ramos.* (v. s.)

12. *P. concinnus*, pileo coriaceo velutino zonato rufescenti-cinereo, poris exiguis æqualibus, stipite longo tenui

*Microp. concinn.* *Palis. l. c. p. 73. t. 43. f. 1.*

Stipes elongatus, tenuis, attenuatus. Pileus infundibuliformis, orbicularis, dilatatus; zonis alternis rufescens & cinereis, velutinis & lævibus eleganter fasciatus. *In regno Oware ad truncos.* (v. ic.)

13. *P. perennis*, pileo coriaceo velutino zonato stipeque cinnamomeis, poris minutis demum laceris concoloribus.

*Sterb. t. 27. J. Buxb. Cent. V. t. 15. f. 1. Bol. sp. 4. Glcd. meth. p. 72. Bol. perennis. Linn. Suec. 1145. Fl. Dan. t. 1075. f. 1. Scherb. t. 192. Pers. syn. p. 518. Nees Syst. f. 212. B. coriaceus. Scop. Carn. p. 466. Schäff. t. 125. Bull. Champ. p. 334. t. 28, 449. f. 2. B. cyathif. Vill. Delph. p. 1040. B. infundibulum. Roth. Cat. 1. p. 240. B. subtomentos. Bolt. t. 87. — junior, poris albidis: Hall. helv. n. 2298. B. leucoporus. Holmsk. Ot. II. t. 30. Nees Syst. f. 213. B. confluens. Schum. p. 378.*

b. fimbriatus. Roth. l. c.  $\beta$  — Mich. t. 70. f. 8. Bol. fimbriat. Bull. t. 254. Dec. fr. 2. p. 122.

c. nanus. Mich. l. c. f. 10.

*Stipes inæqualis, subtuberous, plerumque velutinus. Pileus tenuis, junior cyathiformis, dein planiusculus concrescens, coloris intensitate varius. Pori angulati l. subrotundi, hinc B. cinnamomeum Jacq. Coll. 1. p. 116. t. 2. diversum non censeo. Ad terram arenosam & truncos Europæ, Asiae, Americæ, frequens. Autumno, nec vere redivivus. (v. v.)*

14. *P. rufescens*, pileo coriaceo hirto stipiteque sub-brevi rugosis rufescens, poris majusculis flexuosis laceris.

Sistotr. ruf. Pers. syn. p. 550. Ic. pict. t. 6.

Priori videtur admodum affinis. *Stipes subtuberous, crassiusculus. Pileus 2-4 unc. latus, infundibuliformis. Pori primo albidi, dein concolores. — Variat, uti duo sequentes, pileo subdimidiato. Ad terram graminosam in Quercetis. Aut. (v. ic.)*

Huc melius inseruntur *Dædal. maxima & biennis*, quarum sinuli forsitan a poris laceratis orti. Ex hac regione Mich. t. 70. f. 4.

15. *P. tomentosus*, inæqualis, pileo suberoso azono stipiteque tomentosis fulvis, poris minutis æqualibus albido-cinnamomeis.

Valde irregularis; plerumque cæspitoso-concrescens, imbricatus, subexcentricus, stipite brevi, sed & solitarius, stipite longiori; nunc centrali, nunc lateral. Substantia primo spongioso-mollis, priorum crassior. Pori semper rotundi, obtusi, integri. In silvis ad terram, raro. Aut. (v. v.)

16. *P. Schweinizii*, inæqualis, substipitatus, pileo suberoso tomentoso fusco-ferrugineo, marginè subitusque sulphureo-virescente, poris magnis difformibus laceris.

Bol. Sistotrem. A. S. p. 243. optime! — Mich. t. 70.  
f. 1. & B. perennis var. 2. Scop. p. 466. affines.

Statura ingens, sed curta. Pileus nonnumquam pedalis & ultra, sæpe integer infundibuliformis, sed

propter situm arcte cæspitosum plerumque imbricatus; etiam plus minus dimidiatus; tomento molli, dein substrigoso. Pori pruina sulphurea evanescente pileo concolores. *In silvis umbrosis ad basim truncorum. Aut. in ver persistens.* (v. v.)

- a. *Mich. gen. t. 70. f. 9. (fulvus &c.)*
2. *Bol. strobiliformis. Dicks. Cr. Br. 1. t. 3. f. 2.*
3. *B. pellacidus. With. arr. 4. p. 309. aff. P. subsquam.*
4. *B. canarium. Lour. Coch. 2. p. 693. Minimus, glaber. Pileus umbilicatus, viscosus, lævis. albus. Pori angulati, marginales minimi. Stipes longus, tenuis, reflexus. In tubis ligneis pluviam tectorum evacuantibus Cochinchinæ.*
5. *Pol. lepideus Fries Obs. 2. p. 256. (Unicus.)*

*Bol. substrict. Bolt. t. 170. (Persoonie P. ovini variet.) P. vario v. numulario proximus. B. deformis Sch. t. 264 Pol. ovini potissimum monstrositas. — Cf. quoque Pol. leptceph. — E descriptionibus synonyma negre determinantur; tamen B. pictus Schult. Starg. p. 485 vix a P. perenni differt.*

### Trib. II. PLEUROPOUS.

*Pers. l. c. p. 520. - Pleur. Nees Syst. p. 220!*

CHAR. Omnia ut in priori tribu, sed stipes proprie lateralis, subhorizontalis. *Diformes, deinceps duri, truncicoli.*

1. a. *P. varius, pileo rigido glabro lævi, poris minutis subrotundis pallidis, stipite brevi lævi pallido, deorsum abrupte nigro.*
  1. a. *pileo badio, lateritio &c. Buxb. Cent. V. t. 16. f. 2. B. aurant. Schæff. t. 110. B. elegans. Bull. t. 46. B. perennis. Batsch. Cont. 1. f. 129. B. durus. Timm. meg. p. 271. B. badius. Pers. syn. p. 523. B. variegat. Sowerb. t. 368.*
  - b. *pileo pallide fuscescente, subgriseo & subvirgato. Schæff. t. 109. B. calceol. Bull. Champ. p. 338. t. 360, 445. f. 2. Dec. fr. 2. p. 120. Bolt. t. 168.*
  - c. *pileo ochraceo, albido. B. lateralis. Bolt. t. 83. Fl. Dan. t. 1075. f. 1. optime. B. numul. major. Sowerb. t. 89. B. varius. Pers. Obs. 1. p. 85. Syn. l. c.*

Maxime variabilis, sed præter notas allatas defert: substantia albida, juniori molli carnosa, dein valde dura; pileo non laccato; poris subinæqualibus curtis, sub lehte denticulatis, intus demum aquose cinnamomeis, sed sporidia alba. — Præsens varietas valde diffinis, 2-4 unc. circiter stinno sublaterali horizontali, subinde nullo, solitaria l. cæspitosa. *Ad truncos, frequens. Perennis (v. v.)*

*B. numularius*, tenuior, pileo regulari subcentrali pallescents, stipite perpendiculari.

*B. numular*. *Ball. champ.* p. 335. *Sow. l. c. fig. minor*. *Schrad. sp.* p. 152. *Pers. syn.* p. 519. *Nees f. 214.*

Certe prioris varietas. *Ad ramos. (v. v.)*

*γ. minimus*, &c. *Fr. Obs.* 1. p. 123. ! *Ad stipites*

Medius inter hunc & sequentem *Agaricus fulvus*, *co-mipateram* referens Batt. p. 69. t. 35. Hinc similissimus fungus in Scania aliquoties repertus: *Imbricatus*, *tenax*, *subflaccidus*, pileo lateralí (lobis circumscriptis quasi infundibuliformi) lœvi sublivido, disco castaneo, stipite perpendiculari brevi punctato atro. *Ad Sulices.*

2. *P. lucidus*, pileo suberoso stipiteque glabris nitentibus, poris minutis rotundis pallidis.

*Fung. ventilabri &c.* *Andr. Dandr.* p. 120. *Roji syn.* p. 11. n. 9. *Batt.* t. 56. *A. - D. Gled. meih.* p. 8. *d. Hall. helv.* n. 2293. *Bol. flabelliform.* *Scopol.* & *Auct. Vet.* *B.* *variegat.* *Schaff. t. 263.* *B. nitans.* *Batsch. f. 225.* *B. obliquatus.* *Bull. t. 7.* 459. *B. vernicos.* *Berg. phyt.* 1. t. 99. *Agar. pseudo-bileatus.* *Jacq. Aust.* t. 41. *B. rugosus.* *l. c. t. 169.* *aliorumque.* *B. crustatus.* *Plan.* *B. laceatus.* *Tinum B. eastan.* *Web. hols. suppl.* p. 13. *B. dimidiat.* *Thunb. Jap.* t. 39. *B. verniceus.* *Brot. Lus.* p. 468. *B. lucidus.* *Leyss.-Curt. Lond.* t. 224. *Schrad. sp.* p. 162. *Sowerb.* t. 134. *Pers. syn.* p. 522. *Fl. Dan.* t. 1253. (*B. resupinat.* *l. c. t. 844.* - *t. 1557 monstros.*)

Forma nulla constans; variat stipite cent' ali, nullo & verticali; saepius tamen lateralis, stipitatus, reniformis. Color junior albido-luteus, nō *sanguineo-puniceus*, dein castaneus, tandem nigres-

scens. Substantia dura, tenacissima, poris concolor & tenuior. Pileus rugosus stipesque laccato-nitentes. Pori æquales, tubulos longissimos formantes, demum pallide cinnamomei. *Ad trunco Quercus &c., Europæ, Asiae in Japoniam, Amer. boreal.* (Swartz l. c. p. 15\*) Aestate. (v. v.)

3. *P. Amboinensis*, pileo tuberoso glabro cinereo dein nigro, poris exiguis albidis, stipite longissimo.

*Fungus elatus cochl.* Rumph. amb. XI. p. 128. t. 57.  
f. 1. Ag. amb. Lam. Enc. I. p. 49.

Priori affinis, itemque forma varius. Stipes spithameus l. pedalis, tenuis, nunc obscure cinereus, nunc niger, interne spongiosus. Pileus lateralis, obliquus; saepe oblongus, 8 unc. longus, 6 latus, valde contractus. Stipes ramulos ambit, inde ramosus l. c. f. 2, 3. *Ad ligna Amboinæ.* (v. ic.)

4. *P. pes Capræ*, pileis rotundatis atrofuscis, pluribus in stipite laterali cum poris amplis viridiflavo. Pers. Ch. Commest. t. 3.

Stipes simplex, pileos plures dimidiatos, poste gibbos, margine involutos sustinet. Caro alba, crassa. Forsan Favolus potius l. Merisma. In pinetis Vosgesiis, autumno.

Variant ultimi Mesopodes subinde dimidiati, & priora Apodum sectiones stipitati.

### Trib. III. MERISMA.

CHAR. Fungi ramosissimi, imbricati, multiplices, sublobati; stipite sublaterali, passim obsoletæ. Substantia carnosa, alba, sapore acidulo; demum fragiles. Pori decurrentes, tenues, inæquales, locis obliquis lacerati. Sporidia alba. Maximi, cespitosi, annui, ad bases truncorum ovii.

\* 1. *P. umbellatus*, ramosissimus, pileis integris umbilicatis, poris stipiteque albis.

a. pileo fuligineo-pallido. B. ramosiss. Scop. Carn. p. 470. Schaff. t. 111, 265, 266. Jacq. aust. t. 172. Lunn. Pos. p. 327. B. umbellatus & polycephalus Pers. syn p. 519, 520. Schult. starg. p. 485. Tratt. Essb. Schw. t. T. Nees syst. f. 215.

b. pileo fusco-ochraceo, subrufo. B. ramosus. Fl. Dan. t. 1197. Schum. Sæll. 2. p. 383.

c. pallide luteus; albus. Barr. Ic. 1269, 1270.

Cæspites squarrosi, densi, spithamæi, forma variæ, stipitibus ramosissimis, basi coalitis. Pilei plus minus depresso,  $\frac{1}{2}$  - 1  $\frac{1}{2}$  unc. lati, numerosissimi, majores repandi l. incisi. Pori inæquales, etiam stipitem & ramos occupant. Caro mollis, esculenta. In fagetis nemorosis, raro. Exeunte Sept. (v. v.)

2. *P. frondosus*, ramosissimus, pileis dimidiatis rugosis fuligineo-griseis, poris albis.

Fung. esc. gen. XXI. monstrosum. Clus. p. 265. J. Bauh. XL. c. 45, 46. Boce. Mus. t. 304. f. 1. Barr. ic. 1272. Sterb. t. 28. A. Bol. spec. 9. Gled. p. 75. Hall helv. n. 2276. Fung. intybac. Raji & Veter. Bol. intyb. Baumg. &c. B. ramosiss. Schaff. t. 127-129. B. cristatus. Gouan Monsp. p. 462. B. frondosus. Schrank. Fl. Dan. t. 952. Schrad. p. 159! Pers. syn. p. 520. Tratt. l. c. t. U.

Pilei numerosissimi, dimidiati, in cæspitem convexum  $\frac{1}{2}$  - 1 pedalem condensati, imbricati, varie concrescentes, irregulares; primum tomentosi obscure fuliginei, dein glabri griseo-lividi; disco depresso, sursum dilatati ( $\frac{1}{2}$  - 2 unc.) convexi; basi in stipitem porrecti, in radicem crassam confluentes. Pori vix fuscescentes ut Sowerb. t. 87. Caro & usus prioris, odor murinus. Ad radices Quercuum. Sept. Oct. (v. v.)

\*\* 3. *P. confluens*, ramosus, pileis dimidiatis levibus carneo-rufescibus, poris albidis.

Bol. A. S. p. 244. Bol. frondos. Swartz l. c. p. 13.

Cæspites pedales & ultra, pileis fere ut in præc.; sed multo latioribus (5-6 unc.) lobatis, postice connatis; in stipites breves, pauciores, magis

distinctos, basi conjunctos productis. Cœlo siccœ tessulato-rimosi evadunt. Substantia carnosο-fibrosa, sat tenax. Pori subæquales, expallentes. In pinetis montosis Suecicæ & Lusatice. Aut. (v. v.)

4. *P. giganteus*, imbricato-multiplex, pileis latissimis subzonatis rivulosis spadiceo-pallidis, poris inæquilibus pallescentibus.

*Bocc. Mus.* t. 302. 2. *Barr. Ic.* 1268. Ag. multiplex. *Dill. giess.* p. 23. *Bol. Sp.* 8. *Gled. l. c. Hall. helv.* 2297. *B. mesentericus.* *Schæff.* t. 267. *B. Acanthoides.* *Bull. Ch.* p. 466. t. 486. *Des. fr.* 2. p. 121. *B. elegans.* *Bolt.* t. 76. *B. imbricatus.* *Sowerb.* t. 86. *B. gigant.* *Pers. syn.* p. 521. *Schum.* p. 583. 4. *S.* p. 244.

b. Clav. æquivoca. *Holmsk. Ot.* 1. t. 13.

Caro prioris, odore acidulo. Cæspites maximi, 1-2 pedales & ultra, ramoso-imbricati, sublaterales. Stipes crassus, brevissimus, inæqualis, tuberosus, radicatus. Pilei flaccidi, spithamei, forma varii; superficie floccis subtilibus fuscis granulosa, rigida; hinc sicca squamoso-fibrillosa; colore primo pallido, dein spadiceo discoque depresso nigricante. Pori minuti, tacti obscuriores, dein lacerati. Ad basin truncorum Fagi &c. Aest. (v. v.)

5. *P. cristatus*, imbricato-multiplex, pileis difformibus subtomentosis virescentibus, poris niveis dein laceratis sulphureis.

*Bol. intyb. Mapp. Als.* p. 9. *Hall. helv.* n. 2291. *B. flabelliformis.* *Schæff.* t. 113. *mala.* *B. cristatus.* *Schæff.* t. 316, 317. *Pers. syn.* p. 522. *A. S.* p. 245. *Nees syst. f.* 217.

Substantia priorum, color sequentis. Stipes laterali, irregularis, pruinatus, albus, demum fuscus. Pilei subcarnosi, irregulares, lobati, involuto-concrescentes, villoso-pulverulenti, 3 unc. circiter lati, flavo-virentes. Pori inæquales, albidi, lacerati plus minus virentes. In Fegetis umbrosis, rare. Aut. (v. ic.)

\*\*\* 6. *P. sulphureus*, multiplex, subsessilis, pileis latis imbricatis glabriusculis flavo-rubellis, poris minutis planis sulphureis.

a. stipitatus. Batt. t. 34. B!

b. Fung. pern. gen. V. Clas. Hist. p. 277. Sterb. 2, 12. A. Buxb. C. V. t. 1. Dill. in Raji syn. p. 22. n 5. Hall. helv. n. 2277. Bol. caudic. 2. Scop. Carn. p. 524. Schäff. t. 151, 152. Fl. Dan. t. 1019. B. coriac. Huds. B. tenax. Bolt. t. 75. B. lingua cervina. Schrank. B. citrinus. Plan. - Pers. syn. p. 524. Nees syst. f. 219. B. sulph. Bull. Ch. p. 347. t. 429. Sowerb. t. 155. With. arr. 4; p. 331. Sistotr. Rebent. Neom. p. 376.

Cæspites 1-2 pedales & ultra, pileis imbricatis, connatis, undulatis lobatisque, spithameis & ultra, senio albescensibus. Substantia carnosa, junior saepe lac sulphureum fundens, vetusta friabilis, nec "coriacea tenax." Duplex Schradero spic. p. 158, 162, Lumn. pos. p. 526, 527 &c. Ad trunco Quercus, Fagi, Prunorum &c. frequens. Aest. (v. v.)

7. *P. imbricatus*, multiplex, subsessilis, pileis imbricatis glabriusculis luteo-fulvis, poris minutis pallidis.

Bol. Bull. Ch. p. 349. t. 366. Dec. fr. 2. p. 119. Schum. Sæll. p. 382. Bol. amaric. Pers. syn. p. 531.

b. B. ramosus. Bull. Ch. p. 349. t. 418. Dec. fr. 2. p. 114. Pers. syn. p. 549. Nees syst. t. 226.

Proximus *P. sulphureo*, statura fere *P. giganteo*; carne, ut in reliquis, alba, amara, demum friabili. Pilei latissimi, concrecentes, sinuati undulatique, margine pallido; variant stipitati. Poris subæquales, pallescentes, dein rufescentes & pileo concolores. b mera monstrositas in cryptis. Ad trunco vetustos Fraxini &c. rarior. Aut. (v. v.)

Agar, tubæ fallopianæ &c. Batt. p. 66. t. 32. B. (Buxb. C. V. t. 5. f. 2.) — *P. giganteo proximus*.

## Trib. IV. APUS.

**Ag.** Ord. II. *Mich. gen.* p. 118. *Batt.* p. 66. *Bol. acaul.*  
*Linn.* — *Schrad spic.* p. 166. — *Hall. helv.* III.  
*p. 159.* *Retiporei.* *Batsch. El.* p. 107. *Apus.* *Nees*  
*syst.* p. 220.

**CHAR.** Pileus dimidiatus, sessilis, lateralis,  
horizontalis l. effuso-reflexus, marginatus, subtus  
porosus. *Varii, lignatiles.* A) Annui. B) Perennes.

A. ANNUI. Substantia annua, quamvis non-  
numquam per hiemem persistit. Pori stratu sim-  
plici; nec novum stratum quot annis super impo-  
nentes.

†. CARNOSI. *Schrad.* Annui; substantia car-  
nosa, molli, fragili, alba; junior succulenta, vetu-  
sta fatiscente. Pileus azonus, subinde cum stipitis  
rudimento. Pori parvi, subirregulares, tenues, nu-  
di, extus intusque albi. *Sporidia alba.*

\* 1. *P. betulinus*, pileo carnoso glabro fusco-rufe-  
scente, vertice obliquo brevissime stipitato, po-  
ris inæqualibus albis.

B. subetosus. *Wulf. in Jacq. Coll.* I. p. 544. *Bol. bet.*  
*Bull. Champ.* 348. t. 312. *Bolt.* t. 159. *Sowerb.* t.  
212. *Fl. Dan.* t. 1254. *Pers. syn.* p. 535. *Dec. fr.*  
2. p. 123. *Schum.* p. 388. *A. S.* p. 251.

Odor & sapor acidus. Pileus epidermide se-  
parabili rufescente tectus, magnitudine & forma  
varius, junior mollis subovatus absque poris, adole-  
scens subreniformis, margine tumido succulento,  
Pori quidem separabiles, sed non tubulosi & a pi-  
lei substantia formati, ore dentato. *Ad Betulas,*  
*frequens.* *Aest.* (v. v.)

\*\* 2. *P. spumeus*, albidus, pileo carnoso rugoso hi-  
spido obtuso, poris curtis subrotundis.

*Bol. Sowerb.* t. 211. (stipitatus.)

Major, 3 uncialis, crassus, junior mollis dein  
firmior. Pori mediæ magnitudinis; æquales, inte-

gri, non profundi. *Ad truncos Fagi, Betulæ. Aut.*  
(v. v.)

5. *P. chioneus*, albus, pileo carnoso lævi glabro, poris curtis exiguis æqualibus integerrimis. *Fr.*  
*Obs. 1. p. 125.*

Affinis priori. Caro mollis, aquosa, acidula, sapore stiptico. Pileus subtenuis, uncialis & ultra, azonus (junior pubescens?), margine tenui acuto, subinde stipitem lateralem brevem (*B. candidus* Pers. syn. p. 524?) exserens. Pori rotundi, demum convexus. Candidus, sed humore bibulus aquose-albidus. *Ad truncos Betulæ. Aut. (v. v.)*

4. *P. destructor*, albidus, pileo inæquali rugoso glabro, poris subrotundis obtusis.

*Bol. Schrad. spie. p. 166. Pers. syn. p. 543. A. S. p. 254.*  
*b. B. sebaceus. Leyss. Hall. 1250. (albido-spadiceus.)*

Fungus variæ figuræ, magis l. minus effusus, substantia molli, fibrosa; fungo exsiccato friabilis. Pori integri & laceri Odor gravis, sed non ingratus. *Ad "ligna putrida domestica." l. in silvis ad truncos udos pineos; etiam Amer. bor. Per annum.*  
(v. v.)

5. *P. lacteus*, candidus, pileo carnoso lævi pubescente, poris inæqualibus lacerisve.

Inedorus, parvus, triqueter, mollis, sapore stiptico. Pori plani, flexuosi, sed valde subtiles & profundi, in dentes omnino Sistotremoideos lacera-ti. Substantia poris angustior. *Ad truncos Fagi*  
*Ecc. Aut. (v. v.)*

6. *P. stipticus*, albidus, pileo carnoso glabro, mar-gine rufescente, poris subrotundis.

*Bol. Pers. syn. p. 525. A. S. p. 247.*

Major, imbricatus, pileis 4 unc. circiter, basi gibbosis, 1 unc. fere crassis, subrepandis. Caro re-cens subtenax, odore nauseoso, sapore ingrato. Subinde virens l. flavescens. *Ad truncos Pini Ecc.*  
*Aut. (v. v.)*

7. *P. mollis*, pileo carnoso rugoso finearnato, poris inæqualibus subflexuosis albis.

Bol. Pers. Obs. Myc. I. p. 22. Syn. p. 526. A. S. p. 247. Dædalea. Fries Obs. I. p. 109.

Caro fibrosa, mollis. Pileus triqueter, subhumidus, basi effusus, margine acutus; variat imbricatus. Pori tenues, angusti, alii rotundi, alii longi flexuosi, dentati, etiam pallide incarnati. Ad truncos Pini. Aest. &c. (v. v.)

β. *Substrigosus*, minor, pileo convexo æquali, poris majoribus subæqualibus. A. S. p. 247.

8. *P. cæsius*, pileo carnoso subsericeo albido-cræsio, poris exiguis laceratis albis.

Bol. albidus. Schæff. t. 124. Sowerb. t. 226. B. cæsius. Schrad. spic. p. 167. Pers. syn. p. 526. Schum. Sæll. p. 389. A. S. p. 247. Swartz l. c. p. 83.

ε. albus, poris cœrul. B. candid. Roth. Cat. I. p. 144.

Caro tenuis, tenax. mollis. Pileus  $\frac{1}{2}$  - 2 unc. latus, cæsius l. cœruleus, forma varius, nunc effuso-reflexus, nunc triqueter, subinde "stipitatus, pileo integro infundibuliformi." Pori plani, exigui, lacerati, ut in Sistotremate Pers. — b. crassior, margine obtuso. Ad truncos Pini, Aut. b. Fagi. (v.v.)

β. *P. cœruleus*, pileo glabro cœruleo-glaucō, subtus cinereo-pallido &c. Schum. l. c. p. 387. Quercu.

9. *P. tephroleucus*, pileo carnoso villoso griseo, poris rotundis elongatisque integris albis.

Antecedentibus major. Caro primo subgelatinosa, dein firmior, sed mollis fragilis. Pileus sæpe seriato-confluens, inæquabilis azonus, subtus planus. Pori prioris majores, tubulos longos formant, numquam lacerati. Ad truncos Pini, Fagi. Aut. (v. v.)

10. *P. alutaceus*, alutaceus, pileo carnoso subvelutino, poris exiguis rotundis æqualibus.

Substantia obsolete zonata, mollis, fragilis. Pilei saepius connati, triquetri, reniformes, obtusi, 1 unc. lati & crassi. Pori integerrimi, tubulos longos formant. *Ad truncos Fagi, Pinii. Aut. (v. v.)*

\*\*\* II. *P. resinosus*, pileo carnoso dein suberoso subtomentoso fuscoc-rubiginoso, poris minimis pallidis.

*Bol. velutinus. Fl. Dan. t. 130. B. resinosus & rubiginosus. Schrad. p. 171, 168. B. fuscus. Pers. syn. p. 527. Swartz l. c. p. 87.*

b. *flavo-ferrugineus. B. velut. Schum. p. 386.*

Pileus crassus, rugoso-rugulosus, junior rubiginosus, etiam succum resinosum fundens. Pori rotundi, aequales, obtusi, tubulos longos formant, intus demumque fuscescentes. Major in arboribus frondosis, minor in pinetis — Ambigit inter hanc & sqq. 2 sectiones. *Ad truncos. Aut. (v. v.)*

††. SUBCARNOSI. \*) Annui; substantia carnosolenta, tenaci, pileo concolor, vetusta putrescente. Pileus subazonus, villosus, pilis brevibus, simplicibus. Pori parvi, subrotundi, extus intusque colorati, juniores pruinati.

\*) SETOSI his maxime affines; at substantia suberosa, pileus setis rigidis longis subramosis densissime obsitus. — Species omnes tropicæ, Favolis 10-12 proximæ, subfuscæ l. ferrugineæ. Sequentes apud Auctores allatae vix omnes integræ distinctæ:

a. *P. ursinus*, fuscus, pileo suberoso tenui, setis longissimis, poris minutis elongatis flexuosis Link diss. I. p. 38. (Bol.)

Strigæ  $\frac{1}{2}$  unc. & ultra longæ, crassæ, opacæ, e floccis funium instar compositæ. Fileus 3 unc. latus, longusque. E Brasilia.

b. *P. vulpinus*, ferrugineus, pileo suberoso tenui, setis longis fuscis, poris minutis rotundis distantibus. Link l. c. (Bol.)

Reliqua prioris, E Brasilia.

- \* 1. *P. hispidus*, pileo carnosso-fibroso crasso villoso ferrugineo, poris secedentibus pallidis.

*Batt.* t. 35. f. D. - *H. B.* *villosus*. *Huds.* *B. hirsutus*, *Scop.* *B. spongiosus*. *Lightf.* *B. hispidus*. *Bull. Ch.* p. 551. t. 493. (*ruber*) 210 (*luteus*) *Bolt.* t. 161. *Pers. syn.* p. 526. *Dec. fr.* 2. p. 120. *A. S.* p. 248. *B. velutinus*. *Sowerb.* t. 345.

Substantia spongiosa, hamida, concolor. Pileus 4-6 uncialis, variat lutescens & fuscus. Pori subrotundi, æquales, exigui, tubulos longos (an genuinos?) formant. *Ad trunco Quercus, Malii &c.* raro. Aestate. (v. v.)

- \*\* 2. *P. nidulans*, pileo suberoso-carnoso molli villosi, poris inæqualibus fulvo-testaceis.

*B. versicolor*. *Schæff.* t. 136.

Color varius, plerumque ochroleueus (*Schæff.* l. c. f. 2, 3, 5); sed etiam rubens (l. c. f. 1, 4, 6) ferrugineo-fulvus &c. Substantia mollissima, elastica, concolor. Pileus plerumque elongatus, magnitudine varius, (etiam resupinatus)  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. crassus. Pori profundi, rotundi, oblongi quadranguli, flexuosi. *Ad Fagos, Betulas.* Aut. (v. v.)

3. *P. erinitus*, badius, pileo pilis rigidis flexuosis fuscis, poris minutissimis. *Spreng.* in *V. A. H.* 1820. p. 51. E Portorico.

4. *P. Hydnoides*, subferrugineus, pileo plano, setis longis ramosis nigris, poris tenuissimis. *Bol. Swartz Fl. Ind. Occ.* p. 1924.

Subreniformis, versus marginem leviter repandus floccosus, squamis adpresso-lacinatis ferrugineis. In truncis Jamaicæ.

5. *P. hydnatinus*, pileo suberoso piano fuso, setis brevibus ramosis, poris per exiguis distantibus ferrugineis. *Bose.* l. c. t. 4 f. 2. (Bol.)

Reniformis. Fibrae (setæ) adplanatae. Pori rotundi, Idem ac d? *Ad trunco Carolinæ.* (v. ic.)

6. *P. pellitus*, pileo coriaceo piano strigoso zonato atro, poris tenuissimis fuscis. *Mey.* *Ess.* p. 304.

3. *P. rutilans*, pileo carnoso-fibroso molli glabro rufescente, poris nitidis ferrugineis.

Bol. *rutilans*. Pers. ie. & descr. t. 6. f. 4. Syn. p. 525.

Antecedentis forsan varietas. Pileus mollis, subfragilis, convexus, basi subeffusus, margine obtuso inæquali. Pori juniores albido-micantes, mox pileo concolores, medii, interdum flexuosæ. *Ad truncos "Quercus," Sorbi &c. Aut. (v. v.)*

4. *P. cuticularis*, pileis carnoso-suberosis tomentosis ferrugineis, poris nitidis griseo-ferrugineis.

Bol. *cutic.* Bull. Ch. p. 350. t. 462. Dec. fr. 2. p. 119.

B. impuber. Sowerb. t. 195. B. triqueter & alneus. Pers. syn. p. 528. Obs. Myc. 1. p. 85. A. S. p. 248, 249. Swartz l. c. p. 83, 84.

Imbricatus, concrescens, obsolete zonatus, inæqualis, subtriqueter, basi subeffusus; variat "stipitatus" & resupinatus; tomento strigoso l. velutino, denum evanescente. Pori parvi, subrotundi, cinereo-pruinosi, versus lucem inspecti micantes; demum nudi, laceri. Substantia fibrosa dura; sed non nisi emortua persistit. *Ad truncos Pini, Quercus, Fagi & præcipue Alni, ubique. Aut. (v. v.)*

\*\*\* 5. *P. crispus*, pileis carnoso-tenacibus rugosis, cinereo-nigricantibus, margine tenui criso, poris majusculis argenteo-cinereis.

Bol. Pers. Obs. 2. p. 8. A. S. p. 249. — Syn. p. 529.

Imbricatus, tenuis, subinde resupinatus, obsolete zonatus. Pori sequentis multo maiores, acuti, inæquales. Color fuligineus, margine nigrescente. *Ad truncos. Aut. (v. v.)*

6. *B. adustus*, pileis carnoso-tenacibus villosis pallidis, margine stricto nigrescente, poris minutis rotundis cinereis.

B. fuscoporus. Plan. Erf. p. 26. B. suberosus. Batsch. Cont. 2. f. 227 (226) B. pelleporus. Bull. Champ. p. 165. t. 501. f. 2. Dec. fr. 2. p. 115. B. adustus. Willd. Ber. p. 392. Linn., Pers. p. 526. Schrad.

*spic.* p. 168. *Pers.* II. ec. A. S. l. c. *Swartz.* l. e. p. 85. *B. concentricus.* *Schum.* *Sæll.* p. 387. — *Poria argentea.* *Ehrenb.* *silv.* *Ber.* p. 17. (status junior.)

*b. pileo flavescente. B. carpin.* *Sowerb.* t. 251. *Pers.* l. c. *Swartz* l. c.

Imbricatus, magnitudine varius, subrugosus, obsolete zonatus, tomento tenui obductus. Pori curti, rotundi, obtusi, æquales, primo argenteo micantes, dein obscure cinerei subnigricantes. *Ad truncos, ubique. Aut. in ver persistens.* (v. v.)

7. *P. dichrous,* pileis carnoso-tenacibus effusis reflexis sericeis albis, poris rotundis fusco-cinnamomeis. *Fries Obs.* I. p. 125.

Bulliard aliisque sub priori comprehendere videtur, tamen certe distinctus. Valde effusus, imbricatus, mollis, tenax, obsolete zonatus, totus candidus, præcipue intus. Pori curti, æquales, obtusi. *Ad truncos Fagi, Betulae. Aut.* (v. v.)

8. *P. amorphus,* pileis carnoso-tenacibus effuso-reflexis sericeis candidis, poris minutis flavis.

*Poria nitida.* b. A. S. p. 253. — *Fries Obs.* 2. p. 258.

Bella atque diversissima species, *P. nitido* non affinis, quamvis resupinata reperitur. Pilei imbricati, molles, subzonati, demum postice obscuriores. Pori priorum, lâte flavi, sed juniores rorè albido obducti. *Ad truncos Pinæ & Abietis frequens. Aut. seniori.* (v. v.)

9. *P. croceus,* pileo carnoso-suberoso effuso-reflexo tomentoso lutescente, poris majusculis inæquilibus croceis.

*Buxb. C. V.* t. 3. f. 1? *Eol. Pers. Obs.* I. p. 87. *Syb.* p. 525. *Poi. Fries Obs.* I. p. 124.

Sectio singula magis magisque in Resupinatos transit. Junior resupinatus, demum reflexus, 3 unc. & ultra latus, tomento croceo evanescente tectus. Substantia fibrosa, humida. "Exsiccatus subnigre-

scens." *Ad truncos cariosos Quercus varo. Aut.*  
(v. v.)

+++. SUBSUBEROSI. Annui; substantia carnososuberosa firnia, elastica, alba. Pileus crassus, rarissime effusus, aut glaber in speciebus poris intus lutescentibus, aut subvillosus, quando pori intus albidi. Pori pallescentes, nudi (nec juniores pruinati.)

1. *P. soloniensis*, pileo suberoso-carnoso fusco, epidermide laerata, poris flavescentibus.

*Ag. Dub. Fl. Orl. 177. Bol. Det. fr. 6. p. 41.*

Species incomplete descripta, sed huc locandam vix dubito, ob substantiam siccum plus carnosa, quam lignosam, exsiccatam non putrescentem; tamen annuam. Semiorbicularis, diametro pedali. Incoli *Chavancelle* dicunt & ad fomitem parant. *Ad truncos circa Sologne Galliae.*

2. *P. ulmarius*, pileo carnososuberoso azono glabro pallido, poris exiguis helvolis.

*Bol. Sowerb. t. 88.*

Sessilis, dilatatus, crassus, 3-4 uncialis, tuberosus. Pori tenuissimi, æquales, intus lutescentes. Huc, nec ad Suberosos referto ob substantiam albam & similitudinem cum sequenti *Ad truncos Ulmi campisstris.* (v. ic.)

3. *P. officinalis*, pileo suberoso-carnoso ungulato zonato glabro, poris lutescentibus.

*Ayæpikor. Diosc. Hist. III. c. 1. Agaricus. Mathiol. p. 413. Cæsalp. p. 620. Dod. pent. 486. Sterb. t. 27. C. p. 246-250! Mich. gen. t. 61. f. 1. Seg. Verron. 1. p. 21. Hall. helv. n. 2284! Bol. Agaric. All. ped. p. 2748. Berg. mat. med. p. 860! B. Lacticis. Jacq. misc. II. p. 164-210. c. ic! Bull. Ch. p. 353. B. purgans. Pers. syn. p. 531. B. officinal. Vill. Delph. p. 1041.*

Odor farinæ recentis, sapor amaricans nauseous. Substantia mollis, lenta, alba; sicca spongiosa.

sa, demum friabilis. Pileus varius, crassus, tuberosus, zonis lutescentibus & fuscescentibus variegatus. Pori tenues, colore argillaceo, fuscescente &c. Usus, præcipue apud veteres, in medicina multiplex, frequens. Conf. ll. cc.! In montibus subalpinis ad Larices Europæ australis, &c. (v. s.)

4. *P. borealis*, albus, pileis fibroso-suberosis molibus subvillosis, demum subfulventibus, poris tenuibus inæqualibus.

Recens inodorus, siccus odorem aniseum debilem spargit. Imbricatus, subconcrecens, 2 unc. & ultra latus & crassus, superne convexus, nunc velutinus, nunc strigosus, margine acuto, subtus planus. Pori albi, lacerati, sinuosi & subrotundi, angustissimi, tubulos longos formant — Multa cum priori communia ejusque forsitan succedaneū! Forsan *B. albus*. Schæff. t. 314. Ad truncos Abietis in montosis uliginosis Smolandiae. Aut. (v. v.)

5. *P. suaveolens*, pileo carnososo-suberoso azono villoso albo, poris majusculis fuscescentibus.

Sterb. t. 27. D. ("Odor Iridis florentinæ"). Buxb. Cent. V. t. 5. — Hall. helv. 2280. Bol. suav. Linn. Suec. Wulf. in Jacq. Coll. II. p. 147. Enslin. diss. c. ie. Sowerb. t. 228. Willd. Ber. p. 392. Pers. syn. p. 530. B. suberosus. Bolt. t. 162.

Odor gratus, aniseus. Pileus subsolitarius, crassus, azonus, 2-4 unc. latus. Pori obtusi, opaci; in superficie plana rotundi æquales, in declivī inæquales. Usus in medicina forsitan; & ad odorem gratum conciliandum. Cf. Linn. Fl. lapp. Ad Salices v. gr. albam, capream &c. Aut. hieme. (v. v.)

B. *P. salicinus*, submollis, glaber, albidus, poris demum rufis. Bull. t. 433. f. 1. Sowerb. t. 227.

Fide Persoonii huc retuli, diversus tamen videtur nec ulla de odore mentio. Cf. Bull. Ch. p. 540. Huc & *B. albus*, Huds. Cum priori. (v. is.)

6. *P. populinus*, albus, pileis carnosο-suberosis azonis velutinis, poris parvis rotundis.

Bol. Schum. Sæll. p. 384. varietas videtur.

Antecedenti, cui affinis, minor, subinodorus, imbricatus, concrescens, poris curtis minoribus æqualibus albis. Pileus singulus  $\frac{1}{2}$  unc. latus. Ad truncos Populi nigræ, 'albæ' Aut. (v. v.)

7. *P. fumosus*, fuligineo-pallidus, pileis carnosο-fibrosis undulatis, poris curtis minutis.

Bol. Pers. syn. p. 530. A. S. p. 250. Fr. Obs. 2. p. 257.

Cæspitosus, imbricato-connatus, albidus, fumo griseo quasi obductus. Substantia subzonata, odore nullo distincto. Pilei crassiusculi, 2-4 unc. lati, superficie glabra l. sericea. Pori aquales. — b.) minor, pileis griseo-lividis, poris albis. — c.) tenuis, pileis sordide testaceis, margine lato porisque albis. Ad Salices. b. Fagum silvaticam Autumno. (v. v.)

8. *P. pubescens*, albus, pileis carnosο-suberosis zonatis villosis, poris planis subrotundis.

Ag. favoginos. Batt. p. 70. Bol. pubesc. Schum. p. 384. — Polyp. Fries Obs. 1. p. 126.

Imbricatus, raro solitarius,  $1\frac{1}{2}$  unc. & ultra, demum presertim margine lutescens. Pori curti, minuti, subrotundi. Ad truncos Betulæ. Aest. (v. v.)

†††. CORIACEI. Substantia suberoso-coriacea, tenax, elastica, alba, annua. Pileus saepius zonatus & villosus. Pori rotundi l. angulati, parvi, intus albi. Sporidia alba. (Juniores non succulent; neque vetusti fatiscentes l. friabiles, sed putrescentes.)

- \* 1. *P. hirsutus*, albidus, pileo coriaceo-suberoso stri-goso-zonato, poris rotundis obtusis fuscescentibus.

Raji syn. p. 24. n. 17. B. Favus. Nonnull. B. hirsutus. Schrad. spic. p. 169. Wulf. in Jacq. Coll. II. p. 149.

Utrinque fere planus, reniformis, s<sup>e</sup>pe imbricatus, 2 unc. circiter longus, 1  $\frac{1}{2}$  unc. latus, zonis concoloribus, strigis demum obscurioribus. Substantia tenax, mollis. Pori medii, æquales, demum cinerei; variant lutei, sed intus semper albi. *Ad truncos frequens. Aestate, Aut. (v. v.)*

2. *P. velutinus*, albidus, pileo suberoso-coriaceo tenui velutino subzonato, poris rotundis albis.

a. albus. *B. velutinus. Pers. syn. p. 539. Swartz in Vet. Ac. Handl. 1810. p. 90. Cf. A. S. p. 253.*

b. lutescens. *B. lut. Pers. l. c. Swartz l. c.*

Pileus junior convexus, dein depresso, tenuis, albus l. lutescenti-pallidus, 2 uncialis circiter. Pori parvi, æquales, sordide albi l. lutescentes. *Ad truncos varios. Etiam Americæ. Vere, Aut. (v. v.)*

3. *P. zonatus*, pileo suberoso-coriaceo subzonato villoso. basi tuberculoso, poris subangulatis albicantibus.

a. pileo griseo, margine albo. *Batt. t. 35. B. Hall. helv. n. 2231. B. angul. Schum.*

b. pileo cinereo, margine lutescente. *Hall. helv. 2283. B. placenta, Schum. p. 587.*

c. ochraceus, fasciis cinereis (poris luteis) B. multicol. *Schäff. t. 269. B. zonat. Nees syst. f. 221.*

d. pileo ochraceo. *B. ochr. Pers. syn. p. 539.*

Colore admodum variat, tamen a sequenti affini certe distinguitur pileo crassiore, convexo, postice tuberculoso, minus cæspitoso. Tomentum evanescens. *B. versicolor Scop. huc potissimum. Ad Populi tremulæ Sc. truncos. Aestat. Aut. (v. v.)*

4. *P. versicolor*, pileis coriaceis villosis subcœruleis variegatis, poris rotundis albis.

*Fung. nox. g. 4. Clus. p. 277. Bocc. t. 8. n. 5. Sterb. t. 27. K. Fung. arb. &c. Raji Hist. II. p. 109. Batt. t. 35. A. Hall. helv. 2282. B. vers. Linn. Suec. 1254. Bull. Ch. p. 367. t. 86. Bolt. t. 81. Fl. Dan. t. 1554. Sowerb. t. 229, 387. f. 7. Pers. syno.*

p. 540. B. atro-rufus. Schäff. t. 268. B. imbricat.  
Scop. Carn. p. 463. B. plicatus. Schum. p. 389.

Cæspitosus, subimbricatus, tenuis, velutinus nec strigosus, margine saepe glabriuscule pallido. Pori albidi, nitidi. Variat colore alutaceo; etiam zonis rufis, ferrugineis, lutescentibus, albis; in fodinis stipitatus e. s. p. Humb. fr. p. 74. Ad truncos Europœ, Asiæ, Americæ ubique. Aestate, Aut. (v. v.)

B. P. fuscatus, azonus, fuscus, poris dentato-laceris luteis. Fries Obs. 2. p. 257.

5. *P. Stereoides*, pileo coriaceo pertenui pubescente zonato griseo, poris minutis difformibus albis. Fries Obs. 2. p. 259.

Proximus *P. abietino*. Vix cæspitosus, tamen imbricatus,  $\frac{1}{2}$  unc., zonis depresso-eonecoloribus. Ad truncos abiegnos. (v. v.)

\*\* 6. *P. radiatus*, pileis coriaceis radiato-striatis subvelutinis fusco-lutescentibus, poris exiguis.

Batt. t. 35. C. Bol. radiat. Sowerb. t. 190. Swartz in Vet. Ac. Handl. 1810. p. 86.

Imbricatus, uncialis, e basi ferruginea radiatus, versus marginem sinuosum pallidiorem subzonatus. Pori minimi, rotundi, albi l. sordide flavi. Ad truncos arborum. Aut. (v. v.)

7. *P. castaneus*, pileo subcoriaceo planiusculo glabro castaneo, poris minimis luteolis.

B. populneus. Poll. pl. nov. p. 34.

Caro alba. Sapor amarus, gratus. Pileus reniformis, vix 2 lin. crassus, in centro obscure, in ambitu languide castaneus. Pori curti, marginales obsolete spadicei. Affinitas dubia. Ad Populos migras Italiae. Vere.

8. *P. pallens*, pileis subcoriaceis glabris azonis pallide ochraceis, poris æqualibus.

*Bol. pellepor.* Sowerb. t. 250. — *Fr. Obs.* 2. p. 256.

Imbricatus, 2 uncialis, lævis, subinde zonatus &  
*B. imberbi* Bull. (vide sub Dæd.) simillimus. Pori  
curti, minuti, rotundi, alboflavi. *Cum P. radiato.* (v. v.)

9. *P. membranaceus*, albus, pileis tenuibus radiatis,  
demum glabris, poris difformibus erosionis.

*Bol. Swartz. Fl. Ind. Occ.* III. p. 1922.

Imbricatus, uncialis & ultra, planus; junior ra-  
diatim striatus, villosus. Substantia tenuissima,  
alba. Pori curti, albidi, margine laceri. *Ad truncos*  
*Jamaicæ.*

10. *P. Neesii*, albus, pileis coriaceis lævibus gla-  
bris, poris subrotundis exiguis.

Ab antecedentibus diversissimus. Substantia  
suberosa, tenacissima, vix lineam crassa. Pilei sub-  
effuso-reflexi, imbricati, varie concrecentes, sub-  
azoni. Pori semper integri, obtusi, sed vix æqua-  
les. *In fagetis, rarius.* Aut. (v. v.)

11. *P. serialis*, seriato-confluens effuso-reflexus, pi-  
leo suberoso tenui scrobiculato testaceo, mar-  
gine porisque inæqualibus albis.

Nulli affinis. Pileus molliusculus, flexilis, ru-  
gosus, obsolete strigosus,  $\frac{1}{2}$  unc. latus, sed in ser-  
ries 1-3 pedales confluens. Pori adscendentes, in  
parte reflexa subrotundi, in effusa irregulares, la-  
tere hiante. Odor Pol. marginati. Junior totus  
albus, obsolete zonatus. *Ad truncos abiegnos.* Aut.  
(v. v.)

12. *P. abietinus*, effuso-reflexus, pileo coriaceo vil-  
loso albido, poris dentatis subviolaceis.

*Buxb. Cent.* V. t. 8. *B. dubius.* *Plan. Erf.* p. 27. *Hydn.*

*parasiticum.* *Timm.* *Willd. Ber.* p. 1149. *Agar.*  
*decipiens.* *Willd. in Ust. Ann.* IV t. 2. f. 5. *Röm.*  
*Fl. Eur.* p. 39. c. ic. *Bol. decip.* *Liljebl.* *Hydn.*  
*decipiens.* *Schrad. spic.* p. 180. *Dec. fr.* 2. p. 112.  
*Bol. abietin.* *Dicks. Cr.* 3. t. 9. f. 9. *Pers. Obs.* 1.

p. 24. *Syn.* p. 541. *Dec. fr.* 6. p. 40. *Sist.* violaceum. *Pers. syn.* p. 551. *Swartz.* l. c. 1810. p. 241. *Bol. incarnat.* *Schum. Sæll.* p. 391. *Fl. Dan.* t. 1298.

*Imbricatus*, tenuis, superne cinereo-albus, putrescens virens, margine saepe undulatus. Variat totus resupinatus. Pori juniores integri, angulati, dentati, subpurpurei; dein expallentes lacerati. *Ad truncos dejectos abiegnos, ubique.* Aut. (v. v.)

1. *Agaricus pulvinar.* Batt. t. 69. Albus, glaber.
2. *B. coriaceus.* Batsch. Cont. 1. f. 127. glaber, ochraceofuscus, subfasciatus, postice atrofulvo, poris majusculis griseis.
3. *B. purpurascens.* *Dec. fr.* 2. p. 41. Merulius?

+++++ SUBCORIACEI. Omnia ut in Coriaceis, sed substantia & pori intus rubri.

1. *P. sanguineus*, miniatus, pileo coriaceo tenui piano glabro, poris minutissimis.  
*B. sang.* Linn. Sp. Pl. II. p. 1646. *Swartz. Obs. Bot.* p. 408. t. 11. f. 4. *Pers. syn.* p. 541. *B. ruber.* Lam. Enc. I. p. 50. *Polyp. sangu.* Mey. Essequ. p. 304. \*

Subreniformis, nitens, obsolete zonatus, uncialis usque pedalis. Pori nudo oculo vix conspicui, versus marginem evanescentes. — b. pileo zonis flavis variegato Mey. l. c. *Ad truncos Surinami, Indiæ occidentalis, Cap. B. S.* (Thunb.) Ec. (v. s.)

2. *P. cinnabarinus*, cinnabarinus, pileo suberoso ruguloso, poris rotundis conspicuis.

*Fung. nox.* g. 24. sp. 2. *Clus. l. c.* (coccineus). *Fung. colore chermes no.* Androv. *Dend.* p. 119. *Hall. helv.* n. 2285. *Bol. cinn.* Jacq. *Austr.* t. 304. *Pers. syn.* p. 540. *A. S.* p. 254. *Swartz l. c.* p. 90. *B. coccina.* Bull. Ch. p. 364. t. 501. f. 1. *Dec. fr.* 2. p. 115.

Pileus crassiusculus, leviter convexus, 4 unc. usque latus, obsolete zonatus, junior pubescens, dein glaber. Pori mediae magnitudinis. *Ad truncos "Pruni," Betulæ, Fagi, Sorbi* Ec. passim; etiam *Amer. borealis.* Aut. (v. v.)

Ab utroque antecedentium differt *B. sanguineus* Vill. Delph. p. 1041 (superne ruber, membrana papillata viscosa tectus, poris fulvis.)

**B PERENNES 1. SUBEROSI.** Substantia siccata, firma, lignosa i. suberoso-ffoccosa, poris concolor, per plures annos persistens. Pileus. pulvinatus, durissimus, obsolete zonatus. Pori minimi, semper æquales, intus colorati, stratosi. *Sporidio* plerumque ferruginea. (Bol. sp. 12. Gled. meth. p. 78.)

\* 1. *P. roseus*, durus, pileis triquetris lavibus roseis fuligineis, poris intus roseis.

Bol. roseus. A. S. p. 251.

Totus roseus, etiam intus, sed undique fuligine, præsertim secus fascias pilei (2-4 unc. lati,  $\frac{1}{2}$ -1 unc. crassi) conspersus. Margo subacutus. *Ad truncos abiegnos in montosis Lusatiae, Smolandiae, raro. Perennis.* (v. v.)

2. *P. marginatus*, durus, pileo pulvinato tuberoso fulvo, margine stillante porisque pallidis.

Bol. fulvus. Schæff. t. 262. B. margin. Pers. Obs. 2. p. 6. Syn. p. 534. Swartz l. c. p. 87.

Ungulæformis, 4 uncialis fere, etiam rufus, semper glaber. Pori minimi, rotundi, primo albidi nudi, dein intusque citrini, tubulos longos formant. *Ad truncos Fagi, Betulæ, Pinæ, Pyri &c.; etiam Americae. Perennis.* (v. v.)

3. *P. pinicola*, durus, pileo pulvinato-dilatato inæquabili nigrescente, margine cinnabarrino, poris rotundis ochroleucis.

Bol. semiovoides. Schæff. t. 270. B. igniar. Fl. Dan. t. 953! Pers. Obs. 2. p. 5. Syn. p. 534. B. elliptic. Pers. Comm. B. sanguin. Liljebl. B. pinicola. Swartz l. c. p. 88.

Plerumque solitarius, valde dilatatus, postice gibbosus. Pori curti!, æquales, exigui; juniores albidi, mox citrini; demum emortui (quales in sta-

tis interioribus) pallide cinnamomei. *Ad truncos Abielis, Betulæ &c. Perennis.* (v. v.)

4. *P. odoratus*, durus, pileo pulvinato rugoso rubiginoso, basi umbrino-nigrescente, margine porisque subtetragonis cinnamomei.

*Bol. annulatus.* Schaff. Fung. t. 106. *B. odoratus.* Wulf. in Jacq Coll. II. p. 150. Pers. syn. p. 552.

b. *monstrosus*, in ramos corniculatos abiens. Cera-tophora Fribergensis. Humb. Frib. p. 112. t. 1. *B. ceratoph.* Hoffm. Comment. Gott. XII. p. 35. t. 6. Veg. Crypt. Subt. p. 1. t. 1—5. Helv. subterranea. Houtt. Pflanz. syst. XIII. t. 105. f. 3.

c. *monstrosus*, *pulvinatus* &c. *B. polymorph.* Hoffm. l.c.

Odor gratus. Superne obsolete zonatus, subinde resinosus, 2—3 uncialis. Pori plani, æquales, denticulati, primo lutescentes albo-pruinosi. Monstrositates in cryptis (A. S. p. 250) & fodinis; huc pertinere detexit Schrader (spic. p. 170). *Ad truncos abiegnos. Perennis.* (v. v. in Blekingia.)

5. *P. annosus*, durissimus, pileo pulvinato glabro fusco-nigricante, margine porisque pallidis.

Lente increscit, non tamen poris stratosis, 3 unc. fere crassus, & 4 unc. latus. Substantia suberoso-floccosa, fomiti inepta. Margo obtusus. Pori majusculi ut in priori, sed rotundi, ligneo-pallidi. Membra, a serpentibus vulnerata, hoc fungo fumant Rustici nostrates. Hædum, in ore ictum, brevi exinde sanatum vidi. *Ad truncos Betulæ. Perennis.* (v. v.)

6. *P. fasciatus*, durus, pileo lævi fuscoc-ferrugineo nigro-fasciato, poris tenuissimis albidis.

*Bol. Swartz. Fl. Ind. Occ. p. 1922.*

Pulvinatus l. planus, depresso-solitarius, sed ab uno alterove minore supra quasi acreto inæqualis; intus pallide fuscus. Pori oculo armate subpubescentes. *Ad caudices Jamaicæ.*

\*\* 7. a. *P. fraxineus*, durus, pileo crasso glabro ex albido sublateritio, poris minutis subferrugineis.

Bol. Bull. Ch. p. 341. t. 433. f. 2. Dec. fr. 2. p. 118.

Substantia crassa, subrutila, antecedentis mollior. Pileus junior & margine albus, subzonatus. Pori curti, rotundi. — In Suecia, ubi semel legi, multo minor, mollior (junior forsitan) uti sequens. *Ad Fraxinos. Perennis.* (v. v.)

7. b. *P. dryadeus*, pileo explanato molli tuberculoso subcinnamomeo, margine tumido porisque parvis albidis, dein fuscescentibus.

Bol. pseudo-igniarius. Bull. t. 458. Dec. fr. 2. p. 116.

Bol. dryad. Pers. Obs. 2. p. 3. Syn. p. 537.

Odor acidulus. Passim imbricatus, 3 unc. laetus, 1 unc. crassus, zonis ferruginascentibus obsoletis. Pori curti, sequentis paulo majores, intus ferruginei. A sequenti, cui maxime affinis, differt, ut *P. marginatus* a *P. pinicola*; etiam margine stillante observatur. *Ad trunco Quercus. Perennis.* (v. v.)

8. *P. fomentarius*, pileo subtriquetro glabro fuligineo-canescente, intus molli, margine porisque minimis pallido-glaucis, dein ferrugineis.

Igniarii. Cæsalp. p. 620. J. Bauh. Hist. XL. c. 48. Tourn. Inst. R. H. t. 330. Batt. t. 37. E. Hall. helv. 2288. B. fomentar. Linn. Suec. p. 453. Willd. Ber. p. 390. Sowerb. t. 133. Pers. Obs. 2. p. 1. B. igniarius. Scop. 2. p. 469. B. ungulatus. Bull. t. 491. Dec. fr. 2. p. 216.

b. dilatatus, planiusculus, rufescens. B. lipsiens. Batsh. C. I. f. 130. B. appan. Pers. l. c. p. 2.

c. monstrosus, cylindricus. Batt. t. 37. F.

Magnus, extus durus, obsolete fasciatu, præcipue versus marginem zonis cinereis & nigricantibus. Pori stratosi, tubulos longos tenuissimos formant, nudi. Substantia spongiosa, fulva; pro fornicite aptissima. In Hæmoragiis laudatus, Cf. Berg. Mat.

*Med. p. 863, Betz. Fl. Oec. e. s. p. Ad truncos Fagi, copiose. Perennis. (v. v.)*

9. *P. nigricans*, durissimus, pileo pulvinato crasso concentrica sulcato nigro, margine porisque exiguis ferrugineis.

Substantia durissima, lignosa, pro fomite omnino inepta, tenuis; tamen pileus ob poros stratosq; longissimos crassus, obtusus, zonis concoloribus, 2-3 unc. — Variat totus resupinatus. — Bull. t. 401. hunc satis refert. Descr. *B. ungulati* Pers. hoc fare, locus sequentis. *Ad truncos Betulæ, nec alibi Perennis* (v. v.)

10. *P. ignarius*, durus, pileo crasso obtuso sublevi e ferrugineo-cinereo, marginie porisque convexis exiguis cinnamomeis.

*Marsig. diss. t. 24. Ag. ignarius. Batt. t. 37. H. Bol. ign. Linn. Suec. 1256. exclus. descr. Hydnii imbricati. Bull. Champ. p. 361. t. 454. Sowerb. t. 132. B. fulvus. Willd. Ber. p. 391. B. ungulatus? & obtusus. Pers. Obs. 2. p. 4, 5. Cf. A. S. p. 252. — Mich. t. 62. resupinatus.*

b. minor, subperpendicularis. *Mich. t. 61. ord. 2. B. fulvus. Scop. Carn. 2. p. 469. B. pomaceus. Pers. Obs. 2. p. 5. B. strigosus. Schult. Starg. p. 488. (Junior enim fungus fulvo-strigosus!)*

Certe a *P. fomentario* diversus substantia tenui duriori & pro fomite longo viliori, incremento lento, forma, colore e sordide ferrugineo fuscescente l. cano, superficie tam fungi junioris quam adulti, poris e. s. p. *Ad truncos Salicum, Fraxini &c. b. in Ceraso, Pruno insititia, spinosa &c., frequens. Perennis. (v. v.)*

11. *P. Ribis*, fulvo-ferrugineus, pileo subtenui applanato subvelutino, poris curtis exiguis æquilibus.

*Polyp. Hall. helv. 2286. Bol. Ribis. Schum. Sæll. 2, p. 386. Dec. Fr. 2. p. 41. Ag. Dub. Orl. p. 178.*

Imbricatus, inæqualis. 4 unc. usq; latus, substantia spongiosa molli luteo-fulva, haud crassa &

basi saepe marginaque tenuioribus. Junior velutinus sublutescens, dein glabriuscatus, subzonatus, demum virore suffusus. Pori plani, r. lin. longi. Fomitii inservit. *Ad radices Ribis rubri &c. frequens. Perennis.* (v. v.)

12. *P. conchatus*, durus, pileo tenui effuso-reflexo sulcato spadiceo, poris exiguis cinnamomeis.

*Bol. Pers. Obs. Myc. I. p. 24. Syn. p. 538. A. S. p. 252. Dec. fr. 6. p. 42.*

Polyporo igniaro maxime affinis, sed tenuior minor fasciis concentricis quasi imbricatis sulcatus, subtus concavus, margine acuto. *Ad truncos Salicis, "Fagi." Perennis.* (v. v.)

- \*4\* 13. *P. microporus*, durus, pileo effuso-reflexo rugoso pallido, poris pallidis fuscisve.

*Poria IV. Brown Jam. p. 77. Bol. microp. Swartz Fl. Ind. Occ. III. p. 1925.*

Difformis, rigidissimus, marginibus reflexis undulatis, intus albescens. Pori nudo oculo non distinguendi; sub lente inaequales, angulati, acuti. *Ad truncos Jamaicæ.*

14. *P. supinus*, durus, resupinatus, marginatus, pallidus, poris minimis cinereo-fuscis.

*Pol. Swartz Fl. Ind. Occ. III. p. 1926.*

Semirotundatus, effusus, 2-uncialis, subtus minute tuberculosus, margine obtuso, intus ferrugineus. Pori sub lente rotundi obtusi. *Cum priori.* (v. s.)

15. *P. salicinus*, durus, late effusus, resupinatus, submarginatus, undulato-rugosus, cinnamomeus. — *Pers. syn. p. 543. (Bol.)*

Pedalis & ultra, saepe interruptus, glaber, lignosus. Pori rotundi, aequales, alii ob situm obliquum hiantes. *Ad Salices. Perennis.* (v. v.)

16. *P. cryptarum*, coriaceo-spongiosus effuso-reflexus tenuis fuligineo-ferrugineus, poris aliis rotundis aliis hiantibus.

Bol. Bull. Champ. p. 350. t. 473. Pers. syn. p. 542.  
Dec. fr. 2. p. 114. Nees syst. f. 221.

Pilei imbricati, basi effusa concrecente, tenues, laeves, poris pallidioribus. Sericeo-tomentosus, subzonatus, lacrimans. Schum. Sæll. p. 389. — Similem in Suecia lectum dedit b. m. Acharius, sed substantia lignosa, pileo rubiginoso. — In Galilia ad trabes in cryptis. Perennis. (v. ic.)

1. *P. Gelsorum*. Ag. stratosus. Batt. t. 57. *D. Truncatus* obtusus fuscus, poris albis. Ad Moros.
2. Ag. ignarius; margine aureo. Batt. t. 35. E.
5. *P. Pandani*, pileo pulvinato, poris tenuissimis ruberrimis. B. igniar. Lour. Cech. p. 693.
6. *P. verruculosus*, coriaceus, cano-brunneus, pileo planè tuberculoso zonato tomentoso. Mey. Ess. p. 303.

Dubiæ tribus sunt *B. fuliginosus*. Scop. *B. carolinianus*. Walt. p. 262. *E. fibula*. Sow. t. 387. f. 8. Monstrositates dubias e locis subterraneis (*B. fodinalis*, pulvinatus &c. Humb. Frib. p. 96 sq.) studio omissimus.

### Trib. V. RESUPINATUS.

Superne porosi. Hall. helv. p. 139. Sohrad. sp. p. 172.  
*Poria*. Hill. Pers. disp. p. 29. Resup. Nees Syst. p. 222.

CHAR. Resupinatus, effusus, totus fare poris pertusus, pileo obliterate ubique adnato, immarginato, in ambitu sepe byssino. Species nulla a me visa suberosa l. vere perennis.

Obs. Ponendi sunt limites tribuum, quæ naturales insuper esse debent, neglecta forma externa sepius fallaci, stricti & acuti; hinc quodque individuum resupinatum huc referri nequit. Plurima jam attuli exempla.

† Poris intus coloratis. \* fuscis, ferrugineis &c.

2. *P. spongiosus*, effusus, coriaceo-spongiosus, ferrugineus, poris rectis rotundis minutis.

Bol. Pers. syn. p. 543. B. resupin, Belt, t. 165,

"Nunc in cespitem crassum crescit, nunc fere crustaceus. Pori tubulos longissimos formant, totum fungum constituunt. In Anglia circa Halifax. (v. ic.)

2. *P. contiguus*, longe effusus, crassus, glaber, ferrugineus, poris majusculis æqualibus.

Bol. Pers. syn. p. 544.

Tres unc. fere longus, 1 unc. latus,  $\frac{3}{2}$  unc. crassus. Pori ad latera maiores. — Si A. S. p. 255 idem (pileo marginato), potius ad Apodes subcarnosos pertinet. Ad palos, &c.

3. *P. ferruginosus*, effusus crassus, ferrugineo-spadiceus, poris subrotundis inæqualibus.

Bol. Schrad. spic. p. 172. Pers. l. e. Fr. Obs. 2. p. 264.

Inæqualis, saepè interruptus, durus,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. crassus, omnino excarnis. Pori medie magnitudinis, subobliqui, acuti. Ad truncos alneos. Aest (v. v.)

4. *P. obliquus*, latissimus, spadiceus, margine erecto cristato, poris minutis.

Bol. Pers. syn. p. 548. Swartz l. e. p. 91.

Durus, contiguus integros truncos saepè incrustans, 2-4 lin. crassus, margine admodum peculiari, sed omnino spurio, in perfectis cinctus. Junior pallidus, dein brunneus, tandem niger. Pori totum fungum constituunt, nulla membrana juncti, ex situ nunc longissime decumbentes sparsim prominuli, nunc regulares, pentagoni, obtusi integri. In genere notæ inde desumptæ nihil valent. Ad truncos. Aest. (v. v.)

5. *P. subspadiceus*, effusus, tenuis, albido-fuscus, ambitu tenui byssino albo, poris minutis inæqualibus. Fries Obs. 2. p. 263.

A priori diversus tenuitate & margine, poris curvis rectis etiam inæqualibus, membrana junctis. Ad truncos dejectos Fagi. Aest. (v. v.)

6. *P. rufus*, effusus coriaceus rufus, poris minutissimis rotundatis. Schrad. l. c.

Pori 2-lineares, subrotundi, acuti. Color testius fungi rufus. Ad cortices putridos.

\*\* poris intus luteis, violaceis, rubellis.

7. *P. xanthus*, elongatus, immarginatus, luteus, poris minutis subrotundis. Fries Obs. 1. p. 128.

Totus e poris subhorizontalibus, P. obliqui similibus, constitutus, 2-3 unc. longus, 2 lin. crassus. Ad asperes putridos. Aest. (v. v.)

8. *P. nitidus*, effusus confluens, flavus, in ambitu sterilis sublobatus pallidior, poris rectis subrotundis.

Bol. Pers. Obs. Myc. 2. p. 15. t. 4. f. 1. Syn. 547. Fr. Obs. 1. p. 262.

Pori membrana arcte adnata coriacea glabra juncti. Margo junior pubescens, non genuinus. Ad ligna Fagi. Aest. (v. v.)

9. *P. violaceus*, effusus, dilute violaceus, in ambitu integer pallidior, poris mediis subrotundis. Fr. l. c. p. 263. (A S. p. 258.)

Subrotundus, uncialis, laevis, margine subpubescente. Pori membrana impositi. Ad ligna. (v. v.)

10. *P. purpureus*, latissimus purpureus expallens, in ambitu inæqualis albus, poris mediis inæqualibus obtusis. — Hall. helv. 2274!

Valde elegans, 4-12 unc. longus & latus, saepè interruptus, membranaceus, in ambitu vix glaber. Pori vix lineares. Ad truncos dejectos cariosos Fagi. Aest. (v. v.)

11. *P. incarnatus*, effusus, coriaceus, persistens, glaber, incarnatus, poris inæqualibus.

Bol. Pers. syn. p. 546. Dec. fr. 6. p. 40. Polyp. Fries Obs. 2. p. 262.

Lævis, firmus, 1-4 unc. longus, vix unc. latus, immarginatus. Pori recti obliquique. Vix A. S. p. 258 hujus loci. *Ad ligna Pini. Aest.* (v. v.)

12. *P. rhodellus*, effusus, membranaceus, subfugax roseus, in ambitu leviter pubescens, poris subrotundis obtusis. *Fries Obs. 2 p. 261.*

Albido-roseus, tactu obscurior, 2 unc. longus & ultra, arcte adnatus, digito tritus evanescens. *Ad ligna faginea, raro. Aest.* (v. v.)

†† Poris intus albisi. \* Firmiores, ambitu simplici.

13. *P. medulla panis*, effusus, subundulatus, durus, glaber, siccus, albus, poris mediis.

*Hall. helv. 2272. Bol. Jacq. Misc. I. p. 141. t. 11. Bolt. t. 166. f. 1. Pers. syn. p. 522. A. S. p. 256.*

b? *Schum. Sæll. p. 590. B. firmus. Spreng. Mant. 1. p. 23.*

Quot auctores hanc speciem memoraverunt, tot fere diversæ species. Pori subrotundi, e situ nunc recti, nunc obliqui. Noster crassus, subexternis, e poris elongatis compositus. *Ad ligna prostrata, rarior.* (v. v.)

Varietatem terrestrem subhumidam molliusculam difformem commemorant A. S. I. c.; alias distinctum censerem Mich. t. 63. f. 2. & Batt. t. 33. f. D., quorum hic radicibus maximis instructus & tactu rubet.

14. *P. tuberculosus*, effusus, carnosus, tuberculosus, glaber, albidus subincarnatus, poris mediis.

*Bol. Dec. fr. 6. p. 40.*

Crusta sat crassa, ovalis, usque 4-5 unc. longa, adnata, in ambitu inæqualis subsinuosa, glabra. Superficies hinc inde tuberculosa, poris in tuberculorum apicibus nullis, ad latera eorum obliquis. — *Poria tuberculosa* Pers. Obs. I. p. 14, in fodiinis lecta, dubia. Cf. D. d. latissima. — *Ad truncos Quercus inter muscos in Fura.*

15. *P. vitreus*, effusus, carnosus, undulatus, aquoso albidus, subhyalinus, poris minimis.

Bol. sp. XI. Gled. meth. p. 77. *Poria vitrea*. Pers. Obs. 1. p. 15. Bol. Syn. p. 545. Polyp. Fr. 2. p. 265.

Late & inæqualiter effusus, crassiusculus, humidus glaber, margine tenui villoso candido. Pori e situ recti l' obliqui. *Ad truncos cariosos Fagi. Vere in autumnum.* (v. v.)

16. *P. vulgaris*, longe effusus, tenuis, siccus, lævis, albus, poris exiguis æqualibus.

B. medulla panis. Auct. - Lumn. pos. p. 526. B. papryae. Schrank Bav. p. 618. B. inversus. Vill. B. cellulosus. Fl. Dan. t. 716. f. 1. B. proteus. Bolt. t. 166. B. tunicatus. Schum. p. 391.

Ad longitudinem usque pedalem effusus, lævis,  $\frac{1}{2}$  lin. crassus, detritus immutabilis, nec nisi in frustulis a ligno separabilis; margine præcipue juniores tenuissime pubescente. Pori recti l' obliqui, subrotundi. *Per vulgatus ad ligna dejecta pinca Ec.; etiam supra folia. Per totum annum.* (v. v.)

B. *P. calceus*, late effusus, innatus, tenuis, candidus, poris exiguis longissime hiantibus.

Potius propria species. Latissime & irregulatiter effusus, a matrici neutiquam solubilis,  $\frac{1}{2}$  lin. vix crassus; sed durissimus, ferme perennis; margine nullo. Proprie lævis, nisi alia corpora v. gr. Lichenes incrustat. Pori vix tubulos formant, toti hiant. *Ad truncos Pini.* (v. v.)

17. *P. callosus*, longe effusus, tenax, secedens, glaber, albus, poris rotundis obtusis.

Odor acidulus. Crusta tenuis, coriacea, adnatæ quidem, sed integra a ligno separavi potest, lævis, immarginata. Pori æquales, obtusi, mediæ magnitudinis. *Ad asseres Ec.* (v. v.)

18. *P. sinuosus*, effusus, tenuis, tenax, secedens, glaber, pallidus, poris variis flexuosis.

Valde effusus, subcoriaceus persistens, ligneo-pallidus l. albidus, subtus glaber fuscescens radicatus, in ambitu junior leviter pubescens. Pori majusculi, pauci angulati, plurimi elongati flexuosi, sub lente dentati, sed non laceri. Odor gratus subdulcis. *In ligno Pini, raro. Aest. &c. (v. v.)*

19. *P. vaporarius*, seriatus, tenuis, siccus, albo-palescens, poris magnis laceris.

Bol. Pers. syn. p. 546. A. S. p. 256. Pel. Fries 2. p. 260!

Firmus, persistens; sed vix integer a ligno separabilis, glaber, inodorus. Immersum nondum reperi, sed pileum formantem, totum tamen a tubulis compositum & a priori tribu facile distinctum. Pori angulati. *Ad ligna Pini; rarius Populi &c. (v. v.)*

20. *P. Cerasi*, orbicularis, dein confluens, albus, in ambitu tomentosus, hymenio sinuoso-poroso, poris laceratis.

Bol. XI. a. Gled. meth. p. 77. Odontia. Pers. Obs. 2. p. 16. Sistotr. Syn. p. 552. Fries Obs. 2. p. 267. Hydn. Dec. fr. 6. p. 36.

Adnatus, sat tenuis, elegans. Tam affinitas, quam hymenii junioris indeles huc referendum esse suadent. *Ad trunco "Cerasi," Betulæ albae. Aestate, autumno. (v. v.)*

\*\* *Tenuiores; juniores byssacei; dein centro porosi & in ambitu subfimbriati.* (Porothelia! Merulii \*\*)

21. *P. mucidus*, effusus, mollis, candidus, ambitu byssino, poris subrotundis.

Pers. Obs. Myc. I. p. 87. Syn. p. 546. 4. S. p. 256.

Suberoso-carnosus, plerumque humens, 5-6 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. crassus; sed variat etiam minor & tenuior. Pori etiam angulati, mediae magnitudinis; demum & laceri. *Ad trunco cariosos pincos, ravior. Per annum. (v. v.)*

22. *P. Radula*, effusus, mollis, albus, subtus villosus, poris angulatis dentatis.

*Poria. Pers. Obs. Myc. 2. p. 14. Bol. Syn. p. 547.*

Indeterminatus, 1-5 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. & ultra latus, secedens, margine byssino haud admodum late. Substantia subtomentosa persistens. Pori medii l. majusculi, congesti, acuti. — Varietas plures: b. *virgineus*, tenuis, niveus, immutabilis, poris pubescentibus e. s. p. *Ad ligna & ramos. Aest. sq. (v. v.)*

23. *P. micans*, effusus, tenuis, carneo-pallidus, ambitu byssino albicante, poris variis acute angulatis. *Ehrenb. silv. Ber. p. 30*

Suborbicularis, confluens. Pori saepe hexagoni, micantes, margine tenuissimis acutis crenatis. *In ramo quercino Aug.*

24. *P. sanguinalentus*, effusus confluens albidus, ad tactum cruentatus, ambitu byssino evanescente, poris parvis. — *A. S. p. 257.*

Specimina plura conferte nascuntur, orbicularia, dein in crustam latam confluunt. Junior byssinus, dein disco glaber, tandem totus villo obductus; variat tenuis & sat crassus. Pori minuti, subrotundi, integri demum vero sublacerati. *Ad truncos varios & terram uadam sat frequens. Vere-Aut. (v. v.)*

25. *P. terrestris*, effusus, byssinus, delicatus, albus, centro poris perexiguis, dein rufescentibus.

*Bol. Pers. ic. pict. t. 16. f. 1. Dec. fr. 6. p. 39!*

Substantia byssina, adeo delicata, ut ad aëris contactum convolvitur & digate pressa faciem mutat. *Ad terram locis humidis &c. (v. ic.)*

26. *P. Vaillantii*, effusus, byssinus, costatus, albus, poris hinc inde conglomeratis majusculis, saepe oblongis irregularibus.

*Vaill. Est. Par. p. 41. n. 8. (t. 8. f. 1.) Hall. helv. 2273. Ag. cryptarum. Palis. Beauv. in Ann. Mus. 8.*

p. 346. t. 57. f. 2, 3. Bol. Vaillantii. Dec. fr. 6.  
p. 38. B. macrorhizus. Ach. in litt.

Membrana late effusa, tenuis, byssacea, continua, hinc inde costis (Rhizomorpham acrustaceam eximie referentibus) percursa & radicata, alba "aut parum rufescens." Ad truncos vetustos & terram. Aest. (v. v.)

27. *P. molluscus*, effusus, tenuis, mollis, albus, ambitu fibrilloso, poris tenuibus inæqualibus.

Bol. Pers. syn. p. 547. A. S. p. 259. Schum. Sæll. p. 391. Fl. Dan. t. 1299. Bol. medulla panis. Swartz in V. A. H. 1810. p. 91.

b. tenuissimus. B. med. pan. Sowerb. t. 526. P. epiphylla. Pers. Obs. 2. p. 15. A. S. p. 259.

Junior & in ambitu Himantiam eandam Pers. refert, fibrillis longis fimbriatus, demum pallescens l. flavescens. Pori medii, subrotundi & angulati, ob tenuitatem sublaceri. Formæ plures; b. diversa forsitan species. Uterque in truncis, folia putrida &c. Per annum. (v. v.)

28. *P. farinellus*, pulverulentus tenuis fugax albus, poris inæqualibus.

Exacte refert Theleph. cretaceam, cruxta pulverulenta tenuissima dispersa interrupta, trita evanescens; sed poris subrotundis & variis integris, tenuissimis, nudis dignoscitur. Ad ligna Fagi. Aestate. (v. v.)

1. B. molluscus Nees Syst. f. 223. poris rubris.

2. Bol. latus. Sowerb. t. 387. f. 9.

## VI. C. POLYSTICTA.

CHAR. Resupinatus, effusus, tenuis, subimmarginatus, poris superficialibus, nullos tubulos formantibus. Pori etiam distant, ut in Porotheliis; sed in superficie lœvi nec papillis siti.

**I.** *P. P. corticola*, effusus, firmus, glaber, albus, punctis confertis nudis.

Duplex status lectus: a) *populneus*, seriato-elongatus, confluens, crassior, adhærens, tuberculosus, pallescens, margine spurio tunido villoso, punctis rotundis æqualibus. b) *fagineus*, latissime effusus, adnatus, tenuis, levis, candidus, ambitu extenuato, punctis integris. *Ad cortices putridos.* a. *Populi.* b. *Fagi.* Per annum. (v. v.)

**2.** *P. P. reticulatus*, tenuissimus, byssinus, fugax albus, poris distantibus cupulæformibus pulvulentis Nees syst. f. 225.

Vide *Synonym.* sub *Merul. fugaci* var. *B.*, quæ delenda. *Elegantula*, subdeterminata, superficie reticulato-scorbiculata, recens candida, deinde expallens. *Ad ligni Pini &c. Aest.* sq (v. v)

Huc spectat forte *Agar.* ord. V. Mich. gen. p. 121. — cuius species inquirendæ. De prima vide p. 380; secunda (l. c. t. 63. f. 2.) nigra, radices plantarum incrustat,

## VII. BOLETUS. Dill.

*Fung. esc. gen. XVI.* (pern. XIX) *Clus.* p. 272. *Fungor.* ord. IV. *Vaill.* p. 58. *Suillus.* *Mich* gen p. 126! *Juss.* gen. p. 6. *Ceriomyces.* *Batt Hist* p. 62. *Boleti spec.* *Linn.* gen. 1075. — *A.* *Pers.* syn. p. 505. *Nees Syst.* p. 213. *Polyporus.* *Haller.* *Agarici sp.* *Lamark.* *Hypodrys Pers.* *Ch. Com.*

**CHAR.** Hymenium e propria substantia formatum, a pileo discretum, totum e tubulis in statum porosum connexis compositum. Tubuli integri a se invicem separabiles, longi, cylindrici l. angulati, pervii, intus ascigeri. Ascii cylindrici, sporidiis exiguis subglobosis. — Stipes centralis, sepe reticulatus. Pileus carnosus, mollis, hemisphærico-explanatus. Pori, ut ex errore optico dici solent, dissepimento dupli. Velum multis præsens.

A A

HIST. Plinius, Cæsalpinus, Porta aliquæ Su-  
illos vocant; Boleti (a voce græca Βωλος) vero Ro-  
manorum fungi terrestres & speciatim Ag. cæsa-  
reus; Tournefortio Phalloidei; Michelio Morchel-  
læ. Fungi solitarii, terrestres, succulentæ, partibus  
eximie discretis & regularibus omnium, me judice,  
perfectissimi. Genus illustravit Michelius, obfu-  
scarunt (Neesio in multis excepto) reliqui. Fistu-  
linæ unice affine. Ut Berberideæ a Rhamnoideis,  
ut Potentillæ a Ranunculis, sic a Polyporis differt.  
Species omnes junxit Gleditsch Meth. fung. p. 62  
sp. 1.) ; distinguunt duas annulatam & exannula-  
tam Buxbaum (*Ephem. Nov. Nat. Cur.* 1. p. 34) &  
Scopoli (Fl. Carn. p. 43) ; genuinas Bulliard &  
Schrader; e notis superficialibus plurimi.

A. CORTINARIÆ. Velum prasens, saepius  
fugacissimum. Stipes solidus. Tubuli lutei l. fer-  
ruginæ. Sporidia subochracea; in argillaceum, vi-  
rescentem l. ferruginascentem colorem simul ten-  
denta. — Spec. 1, 2. *tubulis in stipite adnatis, velo*  
*annulato*; 3, 4 *tubulis adnatis, velo viscoso fugaci*;  
5-12 *tubulis adnatis, velo fugacissimo marginali*; 12-6  
*tubulis subliberis (a stipite discretis), velo obsolete*  
(Pratellinæ.)

\* 1. *B. luteus*, pileo glutine fuscœ secedente oblini-  
to, tubulis adnatis rotundis luteis, stipite fir-  
mo annulato apice punctato.

*Buxb. Cent. V. t. 14. B. luteus. Linn. Suec. 1247.*  
*Schæff. t. 114. Sowerb. t. 265. Schrad. sp. p. 142.*  
*Fries Obs. 2. p. 242. B. annulatus. Bull. Ch. p.*  
*216. t. 332. Bolt. t. 169. Fl. Dan. t. 1135. Nees*  
*syst. f. 204. Id. & B. cortinatus. Pers. syn. p. 503.*  
*B. flavus. With. B. annul., decurrent, elegans.*  
*Schum. Sæll. p. 373, 374.*

Stipes 2 unc. circiter longus,  $\frac{1}{2}$  unc. & ultra  
crassus, æqualis, pallidus, præcipue supra annulum  
membranaceum albo-fuscescentem punctis scabro.  
Pileus compactus, 2-4 unc. latus, glutine secedente  
flavescens, virgatus & maculatus. Tubuli demum

obscurores, ore minuto æquali. Sporid'a ochraceo-ferruginea. In pinetis alibique, sæpe viarum comes, Europeæ, Asiae, Americae. Autumno. (v. v.)

2. *B. flavidus*, pileo viscoso sordide flavo, tubulis adnatis angulatis sordide flavis, stipite tenui lævi, annulo viscoso.

*Hall, helv. 2501. B. luteus. Lumn. Pos. 526, ex descr.*  
— *B. flav. Fries Obs. 1. p. 110.*

Stipes 2-3 unc. longus, 2-3 lin. crassus, deorsum attenuatus, supra annulum glandulis fugacibus modo notatus. Pileus 1-2 unc. latus, glaber, minus viscosus, raro virgatus, variat planus & umbo-natus. Tubuli plani, subdecurrentes, e brevioribus compositi, ore angulato, prioris duplo majori. Sporidia pallidiora In pinetis locis subhumidis, præcipue ad paludum margines. Aug.-Oct. (v. v.)

\*\* 3. *B. granulatus*, pileo glutine fusco secedente collinito, tubulis adnatis majusculis subsimplicibus luteis, stipite punctato-cabro.

*Mieh. t. 69. f. 1. B. granulatus. Linn. spec. Plant. II. p. 1647. B. flavo-rufus, aureus, ferrugineus. Schæff. t. 125, 115, 126. B. inquinans. Schrad. spic. p. 144. B. cirrinalans. Pers. syn. p. 505. Nees syst. f. 205. p. 215 eximie!*

Gregarius. Stipes 2 unc. & ultra longus, 3-6 lin. crassus, sæpe deorsum attenuatus, junior albidus, dein flavescens, squamulis primo pallidis dein nigris superne scaber. Pileus compactus, 2-3 unc. latus, mollis, flavus, junior vero glutine fusco collinito subrufus, glutine secedente stramineus subvirgatus. Caro luteo-alba, immutabilis. Tubuli plani, angulati, ore sæpe granulato l. guttato. Sporidia ochraceo-ferruginea. Edulis. PERSOON. In silvis passim copiose (v. gr. Ölandia, Visingsö); etiam Americæ. Aest. Aut. (v. v.)

Huic utique proximus *B. lactifluus*. With. arr. IV. p. 220, *Vaill. par. p. 59. n. 2, Hall, helv. n. 2505.*)

4. *B. bovinus*, pileo subviscoso gilvo, tubulis adnatis compositis, primo griseo-flavis, dein ferruginea-centibus, stipite laevi.

*B. bovin.* Linn. Suec. 1246. Fries Obs. 1. p. 112. *B. gregarius.* Fl. Dan. t. 1018. *B. circinans.* A. S. p. 239.

*Gregarius.* Stipes 2 unc. longus, æqualis, sub-tenuis, glaber, pileo dilutior. Pileus prioris tenuior, planiusculus, humidus viscosus; sed gluten tenuer, nec ut in priori coloratum, 2 unc. latu'. Caro albida, immutabilis. Tubuli 2-3 lin. longi, sub-grisei, leviter decurrentes, convexi, angulati, magni, e 3-4 minoribus compositi. Sporidia pallide ochracea. In pinetis borealibus, vulgatissimus. Aest., aut. (v. v.)

\*\*\* 5. *B. piperatus*, pileo glabro flavo-gilvo, tubulis adnatis majusculis ferrugineis, stipite laevi intus basique flavissimo.

Bol. n. 6. Nonne Erf. p. 331. *B. piperatus.* Bull. Ch. p. 318. t. 451. f. 2. Sowerb. t. 34. Schrad. spic. p. 143. Pers. syn. p. 507. Dec. fr. 2. p. 125. Swartz in V. A. H. 1810. p. 9. Nees syst. f. 207. *B. ferrugineus.* Batsch. Cont. 1. f. 28.

Sapor acris; caro flava, immutabilis. Stipes  $\frac{1}{2}$  unc. longus, 3-4 lin. crassus, fragilis, apice subpruinatus, sordide flavescens, basi compressa succum luteum fundit. Pileus primo convexus, deinde planus, subirregularis, 1-3 unc. latus, humidus etiam viscosus. Tubuli subdecurrentes, plani, angulati. Sporidia subferruginea. In silvis, ericetis &c., vulgaris; etiam Americæ. Aest. aut. (v. v.)

6. *B. variegatus*, pileo fasciculato-piloso obscure luteo, tubulis adnatis rotundis minutis ferrugineis, stipite laevi firme.

*B. reticulatus.* *B.* A. S. p. 240 bene! *B. varieg.* Swartz l. c. p. 8. Fries Obs. Myc. I, p. 117.

Stipes firmus, 2-3 unc. longus,  $\frac{1}{2}$  unc. & ultra crassus, aequalis, flavus, caro rufescens. Pileus com-

vexo-planus, 3-5 unc. latus, saepe humidus, margine acuto, in juniori evidenter cortinato. Caro lutea, plus minus cœrulescens. Tubuli angusti, obtusi, ore inæquali. Sporidia ochracea, subargillacea. In pinetis, frequens. Jul.-Oct. (v. v.)

*B. reticulatus*. Pers. syn. p. 508 species omnino dubia. Schœfferi t. 108 tubulis liberis *B. edulis* varietatem sistit.

7. *B. Sistotrema*, pileo plano glabro castaneo-rufo, tubulis inæqualibus dentato-gyrosis luteo-fulvis, stipite longo lævi. Fries l. c. p. 120.

Stipes 2-4 unc. longus, tenuis, subrufescens. Pileus 2-3 unc. latus, mollis, utrinque planus. Hymenium Merulii fere lacrimantis, Tubuli 1 lin. tantum longi. In silvis gregarie, at raro. Aut. (v. v.)

8. *B. parasiticus*, pileo convexo glabro fuligineo, dein tessulato-rimoso, tubulis decurrentibus minutis aureis, stipite lævi incurvo.

Bull. Ch. p. 317. t. 451. f. 1. Dec. fr. 2. p. 127.

Stipes tenuis, 2 unc. longus, basi subattenuatus, luteus, cute elastica ætate rupta lacerata. Pileus fuscescens, subvaccinus, 1-2 unc. latus. In Sclerodermate verucoso Galliae. (v. ic.)

9. *B. lividus*, pileo convexo-plano glabro, carne lutea virescente, tubulis decurrentibus brevibus luteis, stipite lævi.

Bull. Ch. p. 327. t. 490. f. 1.

Stipes 2 unc. longus, gracilis, deorsum subattenuatus. Pileus tenuis, subcomplanatus, demum depresso, nunc cinereo-fulvus, nunc sordide rufescens, plerumque fuligineo-lividus. Tubuli rotundi, æquales. Locis humidis paludosis, rario. Aug.-Oct. (v. v.)

10. *B. subtomentosus*, pileo pulvinato sicco subtomentoso, tubulis adnatis magnis angulatis luteis, stipite firme lævi.

*Vaill. par. p. 59. n. 5. Ceriomyces corticem mali p. nici &c. Batt. p. 64. Hall. helv. 2311. B. subtom. Linn. Suec. 1251. Pers. Obs. 2. p. 9. Syn. p. 506. Fries Obs. 1. p. 113. Tratt. Essb. Schw. p. 100. t. Q. Nees syst. f. 206. Mart. Erl. p. 444 B. cypreus & crassipes. Schæff. t. 133 111. B. communis. Bull. t. 393. B. chrysenteron. Bull. Ch. p. 328. t. 490. f. 3. Schrad. spic. p. 144. Schum. Sæll. p. 376. B. bovinus. Schum. l. c. Fl. Dan. t. 1074. B. luteus. Bolt. t. 84. fig. media.*

*B. pileo sanguineo glabro. Hall. helv. 2313. B. sanguin. With. 4. p. 319. B. commun. Sow. t. 225.*

Magnitudo & color pilei gilvus, olivaceus, fuscus, vaccinus, æneus e. s. p. variat. Stipes subæqualis, flavo-ruber, rigidus, glaber. Pileus siccus in areolas polygonas dehiscit, in cute subrubens. Caro flava, sæpe cœrulescens. Tubuli obtusi, sporidiis subochraceis. Edulis. *Ubique in silvis Europæ, Asiae, Americæ. Jun.-Oct. (v. v.)*

10. b. *B. radicans*, pileo pulvinato flavescente-cinerreo, margine involuto tomentoso, tubulis stipiteque lævi radicato tomentoso citrinis. *Pers. syn. p. 507.*

Substantia cœrulescit. Radix crassa, dura villosa, citrina. Sapor amarus Forte Mich. t. 69. f. 3; sed *B. appendicul.* Schæff. t. 130 mihi forma *B. edulis*. *In Quercetis; etiam America. Aut.*

11. *B. calopus*, pileo pulvinato subolivaceo, tubalis adnatis angulatis flavis, stipite subæquali reticulato coccineo.

*B. terreus. Schæff. t. 315. B. calopus. Pers. syn. p. 513. Fries Obs. 1. p. 119. Nees syst. f. 208.*

A *B. subtomentoso* differt stipite crassiore, rubro, reticulato tubulisque angustioribus. Caro plus minus cœrulescens. *In silvis & ericetis. Aug.-Oct. (v. v.)*

\*\*\*\* 12. *B. pachypus*, pileo pulvinato subtomentoso alutaceo, tubulis liberis rotundis flavis, stipite crasso reticulato flavo-rubro.

*Mich. gen. t. 69. f. 2. Bol. vitellinus. Pers. Obs. 2, p. 11. B. amarus? Syn. p. 51. (sed non amarus est). B. pachypus. Fries Obs. 1. p. 118.*

*b. pileo olivaceo. B. olivaceus. Schäff. t. 105. - Hall. helv. 2308. B. mutabilis. Schrad. spic. p. 145. (excl. syn.) B. bovinus. Schult. Aust. 1. p. 199.*

Stipes semper crassus, saepius brevis ovato-bulbosus, sed & 2-5 unc. longus, subaequalis. Pileus 5-8 unc. latus, crassus, mollis, semper siccus. Caro albida, parum coeruleascit. Tubuli mediocres, acuti, juniores albidi, tacti coerulecentes. Sporidia ochraceo-pallida. — b. constans per istit. *In silvis abiegnis, fageticis. Aestate & aut. (v. v.)*

13. *B. luridus*, pileo pulvinato subtomentoso olivaceo, dein subviscoso fulvo-fuligineo, tubulis subliberis rotundis luteis, ore rubris, stipite crasso reticulato rubro.

*Suillus perniciosus. Cæsalp. p. 617. Buxb. Cent. V. t. 13. Batt. t. 29. A. B. Hall. helv. 2307. B. luridus. Schäff. t. 107 Pers. syn p. 512. Swartz l. c. p. 5. B. rubeolarius. Bull. Ch. p. 326 t. 100, 490. f. 1. Sv. Bot. t. 246. B. tuberosus. Schrad. spic. p. 148. B. subvescus. Schrank. B. nigrescens. Pall. Reis. 1. p. 31. B. mutabilis. Schult. l. c. B. fre. Ell. app. Ped. p. 73.*

*B. stipite curto, obsolete reticulato. Hall. helv 2303, 2304. B. bovinus. Bolt. t. 85. Bol. rubeol. Sowerb. t. 150. Id. & sanguin. Pers. syn. p. 52, 513. B. tuberosus. Schum. p. 377.*

Stipes 2 unc. & multo ultra longus, bulbosus, etiam flavescens. Pileus succosus, saepe ingens spithameus, sed & parvus 2-3 unc. reperitur, junior fusco-olivaceus. Caro lutea, mox coerulescens. Tubuli  $\frac{1}{2}$  unc. longi & ultra, ore subrotundo minuto obtuso, demum aurantiaco. Sporidia ochraceo-virgentia. *In silvis nemorosis frequens. Aestate, aut. (v. v.)*

*B. erythropus, pileo fusco-umbrino, decolorante, stipite attenuato furfurato.*

*Pers. syn. p. 415. Fries Obs. 2. p. 245.*

Stipite tenuiori, punctis minutis squamuloso nec reticulato a priori differt. *B. cinnamomeus* Schum. Sæll. p. 387 status carne immutabili. Cum priori. (v. v.)

14. *B. castaneus*, pileo subvilloso castaneo-lateritio, tubulis semilibericis minutis ex albo flavis, stipite sublævi.

*Bull. Ch.* p. 324. t. 328. *Dec. fr.* 2. p. 124. *Pers. syn.* p. 509. *Fries Obs.* 2. p. 246.

Stipes 2-3 unc. longus, sursum attenuatus, subfulvus. Pileus 2-3 unc. latus, margine obtuso. Caro albida, immutabilis, l. in superficie rubescens. Tubuli rotundi. Sporidia sordide lutescunt. *In fagatis. Aest. aut.* (v. v.)

*B. Badius*, pileo molli villoso, dein viscosa badio-fulvo, tubulis angulatis, stipite furfurato.

Bol. erytropodi simillimus, sed castanei varietas. Stipes totus brunneo-pruinatus. Pileus 3-5 unc. latus, carne cœrulecente. Tubuli longi, prioris majores. *In pinetis sat frequens.* (v. v.)

15. *B. edulis*, pileo pulvinato glabro, tubulis semilibericis subrotundis minutis albis mox flavis, stipite crasso reticulato.

*Suillus esculentus*. Cœsalp. p. 617. *Vaill. par.* p. 59. n. 4. *Mich. gen.* t. 68. f. 1. *Buxb. C. V.* t. 12. *Batt.* t. 30. *A. B. aestivus*. *Slotterb. Act. helv.* 4. p. 54. t. 5. f. 2. *Hall. helv.* n. 2302. *B. bulbosus*. Schæff. t. 134. 135. *B. edulis*. *Bull. Ch.* p. 322. t. 60, 494. *Schrad. spic.* p. 149. *Pers. syn.* p. 510. *Sowerb.* t. 111. *Sv. Bot.* t. 197. *Swartz l. c.* p. 4. *B. esculent.* *Pers. Obs.* 1. p. 23. *B. crassipes*. Schum. p. 378.

Stipes compactus, carnosus; nunc brevis ova-to-bulbosus, nunc 4-5 unc. longus, subæqualis, pallide fuscescens. Pileus amplius, hemisphæricus, dein dilatatus, fere nitens, mollis, variat vaccinus, badius, fuligineus, albidus; etiam "margine coccineo" (*B. tuberosus* Pers. l. c.), jove sicco diffretus (*B. reticulatus* Schaff.) Caro alba, immutabilis l. rufescens, sapore grato. Tubuli longi, primo

farcti albi, dein lutei convexi, obtusi; demum virant, ore rubro. (*Fl. Dan.* t. 1296!) Sporidia sordide ochracea, subvirentia, in charta alba fere nigrificant, (an hinc n. 13-16 *Pratella* dicenda?), Species in cibariis laudatissima i f. O. F. Müller *Rörsamp.* *Hafn.* 1705. Tratt. *Esb. Schie.* p. 194 *Firs. Ch. Comest. &c,* In suavis ubique, etiam *Americæ Aest.*, aut. (v. v.)

16. *B. æreus*, pileo compacto glabro æneo-nigricante, tubulis subliberis sulphureis, stipite reticulato luteolo.

*Bull. Ch.* p. 321. t. 385. *Pers. syn.* p. 511. *Dec. fr.* p. 124. (*B. cravetta Bull. app.* *B. cepa Thore variet.*)

Priori affinis, etiam edulis, *Ceps noir* dictus. Stipes longus, subæqualis, variat subfuscus & vix reticulatus. Pileus nunc fuligineo-fuscens, nunc fusco-nigricans. Caro crassissima, firma. a) nivea, sub cute vinoso. b.) dilute sulphurea, rupta viridiuscula. *In Gallia.* (v. ic.)

*B. DERMINUS.* Velum præsens, fugax. Stipes solidus, squamosus. Tubuli albi, demum espordiis obscure ferrugineis colorati.

17. *B. floccopus*, pileo pulvinato griseo, tomento fasciculato, tubulis subliberis candidis, stipite velato squamoso.

*Vill. delph.* p. 1036. *Bol. floccop.* *Fl. Dan.* t. 1252. *Schum.* p. 378. *B. cinereus.* *Pers. syn.* p. 504.

Tomentum griseum juniores fungum obvolvens, in explicato in squamas crassas sparsas floccosas erectiusculas abit. Stipes 4 unc. longus, 1 unc. crassus & ultra, subæqualis. Pileus compactus, 4 unc. latus, demum nigrescens. Caro alba, rubescens. Tubuli longi. *In fagetis umbrosis.* Aug.-Oct. (v. v.)

18. *B. scaber*, pileo pulvinato glabro, tubulis libris rotundis albis, stipite firmo attenuato squamoso-scabro.

- J. Bauh. hist. XL. c. 29. Buxb. Cent. V. t. 11. Hall. helv. 2310. B. viscidus. Linn. Suec. p. 452. B. convexus. Retz. V. A. H. 1769. p. 253.*
- a. candidus, æruginosus, olivaceus. B. chionens. Fr. Obs. 1. p. 111. B. procerus. Bolt. t. 86.*
- b. pileo fulvo, squamulis stipitis albis. B. leucopodium. Pers. Obs. 2. p. 11.*
- c. pileo squamulisque subaurantiacis. Sterb. t. 15. A. Vaill. par. p. 59. n. 3. B. aurant. Bull. Champ. p. 320. t. 236. Pers. l. c. p. 12.*
- d. pileo squamulisque cinnabarrimis. Mich. p. 128. n. 16.*
- e. pileo subrufa, squamulis nigris. B. rufus. Schæff. t. 103. Pers. l. c. p. 13. B. aurant. Bull. l. c. f. 2. Sowerb. t. 710.*
- f. pileo subfuligineo, squamulis nigris. Hall. helv. 2312. Fl. Dan. t. 833. f. 2. B. bovinus. Schæff. t. 104. B. scaber. Bull. Ch. p. 319. t. 132. 489. f. 1. Sowerb. t. 175. Schrad. spic. p. 150. Pers. syn. p. 505.*

Stipes longus, sarsum attenuatus, subrobinaceus, intus albus. Velum flocculosum, marginale, fugacissimum. Pileus utrinque convexus, 2-4 unc. & ultra, humidus viscosus; variat squamosus & siccus rimosus. Caro alba, immutabilis, subinde nigrescens. Tubuli longi, demum sordidi, ore minuto obtuso. Sporid. u. s. *Ubique in silvaticis. Aest. aut. (v. v.)*

C. HYPORHODIUS. Velum nullum. Stipes solidus, subreticulatus. Tubuli albidi, dein e sporidiis roseis incarnati.

19. *B. felleus*, pileo molli glabro, tubulis subadnatis angulatis albis subroseis, stipite attenuato reticulato.

- a. pileo castaneo. Fries Obs. 1. p. 144.*
- b. pileo fulvo. Bull. Ch. p. 325. t. 379. Dec. fr. 2. p. 125.*
- c. pileo fulvo-fulgineo. A. S. p. 241.*
- d. pileo alutaceo, pallido. B. alutaceus. Fries l. c.*

Stipes 3 unc. & ultra longus, subolivaceus, intus albus. Pileus demum planus, siccus, 3-4 unc.

Latus, carne alba, fracta rosea. Tubuli longissimi, inaequales. Sapor amarus. In pinetis, passim. Aestate, aut. (v. v.)

D. LEUCOSPORUS. Velum nullum. Stipes cavus, medulla spongiosa repletus. Tubuli albi l. citrini, sporidiis albis. Vaill. par. p. 60. n. 8!

20. *B. cyanescens*, pileo compacto subtomentoso, tubulis liberis rotundis squilibus, stipite facto laevi ventricoso.

Fung. - - superficie sordidissime alba. Vaill. l. c. Bull. Ch. p. 319. t. 369. Dec. fr. 2. p. 125. Sibth. Ox. p. 376. Fries Obs. 1. p. 116. *B. constrictus*. Pers. syn. p. 508.

Nulli attinis. Stipes a pileo discretus, inde apice constrictus fragilis & superficies numquam reticulata, sed villosopinnosa. Pileus rigidus, 2-5 unc. latus, pallidus, stramineus, subfuligineus, margine acuto. Caro alba, fracta mox pulcherrime cyanea, compressa succum cœruleum fundit. Tubuli breves, juniores vix 1 lin. longi; variant albi & citrini. In silvaticis, haud raro. Aest. aut. (v. v.)

21. *B. fulvidus*, pileo subfulvo, carne immutabili.

F. - superficie orecea. Vaill. l. c. - Fr. Obs. 2. p. 247.

Statura omnino prioris, sed differt colore fulvo l. rufo, carne omnino exsucca & immutabili. Omnino constans. Pori variant albi & citrini. Inversuris, rarer. Copiose in ericetis territorii Sunnerbo Smol. Forsander. (v. v.)

Synonyma Boletorum (ita descriptorum, ut determinari possint) fere omnia ad suas species referruntur mihi contigit, quamvis characteres primi ordinis (sporidia, adnexione potorum &c.) omnes neglexerint. Quæ restant, æquivoca v. g. Fung. esc. g. XVI. Clus. p. 272 (sp. 1. forte *B. pachypus*; sp. 2 *B. luridus*; sp. 3 *B. scaber*), & pern. gen. XIX Clus. Hos repetit Sterbeck t. 13, 17. — Battara, alias adcuratissimus, hujus species vagè nimis, ideoque omittendas, descripsit. Sporidia Pol. Hell. helv. n. 2306 (tubulis violaceis) & *B. rubiginosi* Fr. Obs. 3. p. 246, (*B. fusca* With.) dubia; hinc & species omissæ,

## VIII. FISTULINA. Bull.

*Agar.* Ord. I. *Mich. gen.* p. 117. *Bolet.* *Huds.* - *Pers.*  
*syn.* p. 549. *Nees syst.* p. 216. *Fistulina.* *Bull. Ch.*  
*p.* 314. *Pers. disp.* p. 29. *Link. diss.* I. *p.* 39.

CHAR. Hymenium e propria substantia formatum, sed cum fibris receptaculi concretum, primo verrucosum. Verrucæ floccis radiatis primo velatæ, dein protrudunt tubulos a se invicem liberos, cylindricos, primo clausos, mox apertos, intus ascigeros. Ascii minuti. — Pileus carnosus, determinatus, dimidiatus, spurie stipitatus l. sessilis. Velum universale nullum. *Sporidia subfuscæ*

HIST. Nomen a tubulorum fistulis. Charakterem primus exposuit Michelius, sed analysis accuratior hymenii desideratur. Medium omnino genus inter Boletum & Hydnum, ad illos, ut *Schizophyllum* ad Agaricos, accedit. Soleniae, excepto receptaculo, simillimæ; differunt, ut *Hydn. calvum* A. S. a reliquis Hydnis. Species unica, lignatilis, annua.

## I. FISTULINA hepatica.

Linguæ in caudicibus. *Cœsarp.* p. 619. - *Boec. Mus.* 304. f. 3. *Raji Hist.* III. p. 23. *lin.* 33. *Buxb. Cent.* 1. t. 56. f. 2. *Mich. gen.* t. 60. *Batt. t.* 34. *A. Hall. helv.* n. 23:5. *Bol. spec.* IX. *Gled. meth.* p. 77. *B. hepaticus* *Huds.* - *Schäff.* t. 116—120. *Schrad. spic.* p. 157. *Sowerb.* t. 58. *Bolt.* t. 79. *Pers. syn.* p. 549. *Swartz l. c.* 1810. p. 92. *E. Buglossum.* *Retz.* — *Fl. Dan.* t. 1039. *Fistul. Buglossoides.* *Bull. Ch.* p. 314. t. 74. 464. 497.

Forma admodum varia, integra l. lobata, sessilis l. oblique stipitata; plures sëpe in circulum l. cæspitem digestæ. Substantia crassa, mollis, succosa, viscida, fibris tenacibus percursa, rubro-marmorata. Pileus spithameus usque, sanguineus, dein rufus-fuscus, obsitus papillis, quæ tubulorum rudimenta (quæ vero in charactere generico ingredien debent; simile enim observatur in *Polyporis*, *Hydnis diversidente*, *cirrhato*, *Erinaceo!* *Agaricis per-*

multis, e. gr. Schæff. t. 260; subtus planus. Tubuli albidi, lutei, rufescentes, cum fibris carnis contigui, confertissimi, 4-5 lin. usque longi, ex subdenticulato. Esculentus Pers. Ch. Comest. — Tratt. essb. Schie. t. V. Ad truncos Quercus præcipue, sed & Fagos, "Castaneas" &c. etiam Americæ. Aut. (v. v.)

---

## IX. HYDNUM. Linn.

Fung. ord. III. Vaill. par. p. 58. Erinaceus & Ag. ord. VI. Mich. gen. p. 132. 122. - Dill. giess. p. 188. Lam. Enc. II. p. 385. Hydnum. Linn. gen. 1076. Link diss. 1. p. 39. f. 60. Nees syst. p. 231. Boletti spec. Gled. meth. p. 62 Echinus. Hall. helv. III. p. 148. B dona, Mertella &c. Adans. fam. p. 5. Hericius. Juss. gen. p. 7. Sistotrematis sp. Hydnum, Hericium, Odontia. Pers. Disp. meth. p. 28-30.

CHAR. Hymenium cum pilei substantia homogeneum & concretum, aculeatum. Aculei (Tubuli semper clausi) liberi, juniores l. basi non porosi, nunc aquales subulati, nunc e connatis incisi, extus ascigeri. Asci tenues, raro obsoleti. — Pileus stipitatus l. sessilis, raro regularis, substantia floccosa exsuccea. Velum plane nullum.

ABERRATT. In H. repando aliisque paucissimis aculei in tubulos incompletos abire visi. Pileus subinde cum stipe confusus oblitteratus, ramosissimus, l. in truncis crassum abiens; quam plurimis resupinatus immarginatus.

HISTOR. Τύπαι & ἄρθραι (ab ἄρθρῳ, tumeo) Græci (Theophrastus, Galenus, Dioscorides-Athæneus) Tubera Romanorum dixerunt. Nomen, inde vagum, huc transtulit Linnæus. In genera plura plurimi distinguunt. Sistotremata, etiam exclusis Dædæleis & Polyporis, nullo modo stricte determinanda; in plurimis aculei integri & incisi in eodem individuo, v. gr. H. repando, observantur. Summa cum Polyporis analogia & suo principio

omnino constans fuit Gleditsch, qui, generibus con-junctis, species utriusque generis analogas, v. gr. Polyporum perennem & Hydn. cyathiforme, pro-varietatibus habet. Cf. quoque Polyp. & Hydn. sub-squamosum, P. ovinum & H. repandum, P. carbo-narium & H. melaleucum, P. tomentosum & H. velutinum. P. abietinum & H. ochraceum &c., re-supinatos ut reticeam. Accedunt & Dædales (acu-leis seriatis in laminas confluentibus) Merulique.

DIVIS., ut inter Polyporos:

- I. MESOPUS. Stipes perpendicularis. Pileus distin-ctus, rotundatus, subintegerr. *Terrestres.*
- II. PLEUROPUS. Stipes simplex, subhorizontalis. Pi-leus dimidiatus l. excentricus. *Carnosi, lignatiles.*
- III. MERISMA. Pilei cum stipite confusi, obliterati; ramosissimi l. in truncum crassum aheuntes. *Carnosa, lignatilia.*
- IV. APUS. Pileus sessilis, lateralis. *Lignatiles.*
- V. RESUPINATUS. Pileus resupinatus, effusus. *Ligna-tiles.*

### Trib. I. MESOPUS.

*Erinaceus. Mich. l. c. Scop. Carn. p. 471. - periolati;*  
*Hall. helv. III. p. 149. Gymnopus, Russula, Om-phalia, Mycena. Nees syst. p. 232.*

CHAR. Stipes solidus, firmus, cum pileo con-tiguus, subcentralis, perpendicularis; saepè brevis-simus. Pileus carnosus l. suberosus, planus sub-depressus, centralis l. excisus, non ramosus, sape vero concrescens. Aculei subulati. *Terrestres.*

†. Carnosa, exsucca. Pileus subconvexus, sa-pe repandus. Sporidia albida. *Eculenta.*

¶ 1. *H. imbricatum*, pileo carnoso plano tessulato-squamoso azono umbrino, aculeis albido-cine-reis, stipite brevi.

Fung. 1. Loes. Pruss. p. 87. Mich. gen. p. 133. n. 9.  
*H. imbric.* Linn, Suec. 1257. (excl. descr.) Schäff.

f. t. 140. Fl. Dan. t. 176, 1500. Sowerb. t. 73. Pers.,  
syn. p. 554. Fries Obs. 1. p. 137. Hyd. <sup>et</sup> vin. Pers. Obs. 1. p. 74. (cum syn. Holm., Rupp 1!) Dec. fr. 6. p. 58. H. squarrosum. Nees syst. f. 240.

Stipes uncialis, deorsum attenuatus, firmus,  
albido-cinereus. Pileus palmaris & ultra, regularis,  
demum umbilicatus, squamis disco crassissimis  
obsecurioribus. Aculei teretes, integri. Esculentum.  
*In pinetis, ubique, etiam Americæ bor. Sept.*  
*Oct. (v. v.)*

2. *H. subsquamulosum*, pileo carnoso irregulari dif-  
fracto-squamoso subzonato testaceo-ferrugineo,  
aculeis albido, stipite crasso.

**Fung. erinaceus.** Vaill. par. 58. *H. squamosum*, Bull.  
Ch. p. 510. t. 409. Dec. fr. 2. p. 112. *H. subsquam-  
osum*. Batsch. Et. f. 43. 1. S. p. 264. *H. imbricatum*. Schum. Sæll. p. 392.

Sequenti proximum. Stipes uncialis & ultra,  
inæqualis, subcompressus, demum rimoso-squamulosus,  
pileo concolor, dein obscure ferrugineus; deorsum  
subattenuatus. Pileus convexus, mox explanatus,  
fragilis, subrepandus, in squamas haud crassas dif-  
fractus; colore rufescente, "ochraceo," ferrugineo  
&c. Caro cinereo-alba, zona una alterave tenuissi-  
ma variegata. Aculei æquales, longi, fuscescentes.  
*In pinetis, rarius. Sept. Oct. (v. v.)*

3. *H. lavigatum*, pileo carnoso subrepando rugulo-  
so azono rufo-cinereo, aculeis albido-cinereis,  
stipite inæquali lævi.

Mich. gen. t. 72. f. 1. *H. imbricatum*. Vill. Delph.  
p. 1042. *H. lavigatum* Swartz in V. A. H. 1810.  
p. 243. Fries Obs. 1. p. 140. *H. pulvinatum*. Schulz.  
Starg. p. 491.

Stipes crassus, firmus, albido-cinereus, sèpius  
brevis, sed & elongatus. Pileus fragilis, prioris  
minus rigidus, quare in squamas non secedit, 3-12  
unc. latus, irregularis; junior ut antec. villosus.  
Caro albida. Aculei longi, æquales, in fungo vivo  
fragiles. Cum priori, sed præcocius & frequentius,  
(v. v.)

*B. H. gracile*, pileo tenui subtenaci, stipite elongato gracili æquali. *Fries l. c.* (v. v.)

4. *H. fuligineo-album*, pileo carnosò lobato difformi roseo-albo, aculeis albis, stipite crasso fuligineo. *Schmidt Myc. Häft. I.* p. 88.

Gregarium, raro concrescens. Stipes 2-3 unc. longus, scaber. Pileus 4-5 unc. latus, albus, marginem versus in roseum l. fuscescentem colorem vergens; junior disco verrucis rubellis secedentibus. Caro alba, fracta carneæ, crassiuscula, sapore subdulci. *In pinetis Silesiæ, Saxonie. Aut.*

\*\* 5. *H. candidum*, pileo carnosò-gelatinoso convexo-plano candido, aculeis hyalinis, stipite crasso tuberoso albo. *Schmidt l. c. p. 89*

Gelidum, valde fragile. Stipes 2-3 unc longus, carne compressa purpurascente. Pileus 2-5 unc. latus, superne pruina alba tenui facile detergenda conspersus. Caro lactea, sapore subdulci nauseoso. Aculei breves, diaphani, sparsi. *In sagetis Saxonie inter folia decidua rarissime. Aut.*

Fungus pæne candidus, prona perte erinaceus *J. Bauh. Hist. XL. c. 14. Raji Hist. II. p. 101* potius sequentis varietas alba. — Dubium *Mich. t. 72. f. 2.*

\*\*\* 6. *H. repandum*, pileo carnosò subrepando glabro azono, aculeis inæqualibus stipiteque difformi pallidis.

*Dill. giess. p. 183. t. 1. Vaill. par. t. 14. f. 6-8. Mich. t. 72. f. 3. H. repand. Linn. Suec. 1258. Fl. Dan. t. 310. Bull. t. 172. Sowerb. t. 176. Pers. syn. p. 555. Fries Obs. I. p. 138! Hell. helv. 2325. Hydn. flavidum & rufescens. Schæff. t. 318, 141. H. carnosum & clandestinum. Batsch. f. 136, 44. H. medium. Pers. Obs. 2. p. 97.*

*H. squamosum. Hydn. squamosum. Schæff. t. 278. H. imbricat. Bolt. t. 87. Willd. Ber. p. 594.*

Solitarium l. gregarium, fragile, esculentum. Stipes glaber, grassus. Pileus irregularis, 2-6 unc.

*latus. Caro pallida, immutabilis, sapore grato. Aculei alii æquales integri, alii compressi & incisi; immo subinde tubulosi. Color albus, flavus l. rufescens. In silvis ubique; etiam Amer. boreal. Aestate, aut. (v. v.)*

7. *H. rufescens*, pileo carnoso orbiculari subtomentoso rufescente-carneo, aculeis subæqualibus, stipite tenui æquali.

*H. repandum. Bolt. t. 88. H. rufescens. Pers. Obs. p. 95. Syn. p. 555. Fries Obs. 1. p. 140.*

Prioris varietas insignior. Stipes 1-3 unc. longus, regularis, pallidus. Pileus 2 unc. circiter latus, planiusculus, obsolete zonatus, minus fragilis. Aculei rarius incisi, incarnato-ochracei. *In fagetis Ec., cum priori. (v. v.)*

8. *H. violascens*, pileo fibroso-carnoso repando tomentoso sordide violaceo, aculeis æqualibus albis, stipite inæquali. *A. S. p. 265.*

Stipes firmus, subtuberous, nunc brevis, nunc 3-4 uncialis; plures saepe in truncum communem connati. Pileus 1-4 unc. latus, ad tactum velutinus, quasi subpulverulentus; *H. repandi*, cum quo substantia & difformitate convenit, planior & tenuior. Color pilei stipitisque • griseo rufove sordido violaceus, margine albicante. *In silvis abiegnis Lusatiae; etiam Smolandiae ad Tofteryd, jove pluvio. Jul.-Oct. (v. v.)*

9. *H. infundibulum*, pileo carnoso-lento infundibuliformi lævi spadiceo, margine flexuoso-plicato, aculeis æqualibus albis demum badiis, stipite inæquali.

*Swartz I. c. p. 244. Sv. Bot. t. 4. Fr. I. c. p. 135.*

Stipes 2-3 unc. longus, unciam saepe crassus, torulosus, glaber, exalbido-badius, deorsum attenuatus. Pileus fere spithameus, azonus, margine eret-

cto; substantia lenta, exsucce. Aculei  $\frac{1}{4}$  unc. longi, tenues, fragiles. In pinetis Sueciæ, raro. (v. s.)

††. Suberosi l. coriacei, demum lignosi. Pileus turbinatus l. infundibuliformis, intus zonatus l. striatus. Sporidia varia, multis ferruginea. Non cibaria, meteorica.

\* 10. *H. suaveolens*, pileo suberoso molli tomentoso albido, intus albo & cœruleo-variegato, aculeis violaceis, stipite brevi cœruleo.

*H. suaveol.* Scop. Carn. p. 472. Pers. syn. p. 558. A. S. p. 267. *H. pullum*, Fr. Obs. 1. p. 153!

Odore fragrante, subaniseo distinctissimum. Stipes uncialis & infra, inæqualis, subtomentosus. Pileus compactus, junior obconicus; dein valde dilatatus, spithameus, supra planus, undulatus, colliculosus, tomento demum depresso. Aculei tenues, æquales. In silvis montosis abiegnis Carnioliae, Lusatiae, Smolandiae in par. Fryeled, Tofteryd, Skärstad &c. Jul.-Oct. (v. v.)

β. *H. cœruleum*, pileo obconico albo-cœruleo, stipite fusco. Fl. Dan. t. 1574. (icon potius *H. suaveolentis*.) — *E. Norvegia*. (v. ic.)

11. *H. fraceolens*, pileo spengioso-suberoso velutino inæquabili viridi-lateritio, dein fusco, aculeis concoloribus, stipite brevissimo fusco.

Brot. Lus. p. 470. Phyt. fasc. 1. n. 35.

Solitarium, fere acaule; basi radicali acutiuscula, obliqua. Pileus primo lentiformis, repandus, fossulis irregularibus excavatus, nonnullis guttula lucida oleum redolenti repletis; senescens fuscus, plano-infundibuliformis sublanatus. Aculei margine brevissimi. Usus tam pro tintili, quam pro fomite. Ad terram humosam in pinetis prope Conimbricam. Aut., hieme. (v. ic.)

12. *H. compactum*, pileo suberoso undulato tomentoso olivaceo-cinereo, intus fusco & cœruleo-variegato, stipite brevissimo.

Buxb. Cent. II. t. 49. f. 1. H. floriforme. Schäff. t. 146. H. compact. Pers. syn. p. 556. A. S. p. 266. Swartz l. c. p. 245. Wahlenb. lapp. p. 1552. Fries Obs. I. p. 132.

Difforme, concrescens, inodorum, s<sup>a</sup>pē crustæ crassæ amorphæ simile. Stipes nullus l. crassus, tuberosus. Pileus durus, 1-6 unc. latu<sup>s</sup>, crassus, pluvie avide bibulus, tomento concolori l. albido obductus. Aculei æquales, fuscantes, castanei. Ad terram in pinetis & ericetis præcipue. Aut. (v. v.)

13. *H. aurantiacum*, pileo suberoso inæquali tomentoso aurantiaco alboque, intus zonato stipiteque inæquali aurantiacis.

Hydn. floriforme. Schäff. t. 146. f. 4. &c. H. suberous aurant. Batsch. Cont. 2. fr. 222. H. aurantiacum. A. S. p. 265. Swartz l. c. p. 247. Fl. Dan. t. 1439. Dec. fr. 6. p. 38. Fr. Obs. I. p. 131. Cf. Pers. syn. p. xxx.

Nimis affine præcedenti; sed de differentia recentiores omnes convenient. Statura & magnitudo maxime varium, sed semper compactum, stipitatum; stipite subbulbose, radicato, tomentoso, brevi; pileis junioribus turbinatis, dein dilatatis, colliculosis, aurantiacis, sed tomento albo præcipue margine obductis. Aculei albi, dein sordide spadicei, aquales. In pinetis siccoribus passim. Aest. aut. (v. v.)

14. *H. ferrugineum*, pileo suberoso molli velutino ferrugineo, intus azono, aculeis stipiteque inæquali concoloribus.

*H. striatum*. Schäff. t. 271. *H. hybridum*. Bull. Ch. t. 453 f. 2. Dec. fr. 2. p. 111. *H. ferrugineum*. Fries Obs. I. p. 133.

Cum *H. compacto* plurimi commutant. Stipes s<sup>a</sup>epius longus, sed & brevis variat, intus concolor. Pileus obconicus, dein dilatatus, supra planus l. depresso. 2-4 unc. latus, tomento nunc depresso obsoleto, nunc albicante ut in prioribus. Substantia mollis!, ferruginea. Aculei fusco-ferruginei.

Junius vidi colore sanguineo, guttis sanguineis in fossulis scatens. Huc potius *H. suberosum spongiosum* Batsch. f. 221. Cum prioribus. (v. v.)

\*\* 15. *H. cinereum*, pileo coriaceo-suberoso repando pubescente aculeisque griseis, stipite crasso ventricoso intus ferrugineo.

*Bull. Ch.* p. 309. t. 419. *Des. fr.* 2. p. 110.

Stipes difformis, glaber. Pileus primo globosus undique aculeatus, demum infundibuliformis, supra subcolliculosus, subsquamosus, pubescens. Aculei tenues, æquales. In Gallia pinetis ad terram. (v. ic.)

16. *H. nigrum*, pileo coriaceo-suberoso tomentoso azono cœruleo-nigro, intus stipiteque atris, aculeis albidis.

*Mich. t. 72. f. 5. — Fries Obs. I. p. 154! Schmidt l. e.*

b. pileo olivaceo-cinereo. *Hydn. suberosum cinereum.* Batsch. Cont. II. f. 221. *H. pull.* Sw. l. e. p. 248. ad p.

Sparsum, sed saepius cæspitosum, varie concrescens; in genere forma nulla constans, sed colore interno atro azono distinctissimum. Stipes uncialis, sed radice subbulbosa saepè producta auctus, priorum tenuior rigidus, inæqualis, basi præcipue tomentosus. Pileus inæqualis (Cf. Obs. Myc. I. c.), priorum tenuior, plano-depressus, tuberculosus, margine saepè albido. Aculei deinde cinerei, tenues, æquales. b est forma, annis siccis nata, tenuior, pileo stipiteque cinereo-tomentosis. In pinetis monosisis, passim. Aut. (v. v.)

17. *H. velutinum*, pileo subcoriaceo infundibuliformi lævi v. lutino azono, aculeis stipiteque tomentoso testaceo-ferrugineis.

*Mich. gen. t. 72. f. 4. (icon bona) Pol. n. 50. var. 2<sup>a</sup>  
Böh. Fl. Lips. p. 325. Gled. meth. p. 69. d.*

Optime distinctum. Gregarium, odore fere farinæ recentis. Stipes uncialis, basi radicatus sub-

ventricosus, primo æqualis, dein difformis, 2-4 lin. erassus, tomento demum spongioso vestitus. Pileus  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. latus, disco suberoso, margine tenui striato flaccido concolori. Substantia suberosa, concolor, azona, longitudinaliter striata. *In silvis abiegnis colliculosis. Aut. pluvios. (v. v.)*

18. *H. cyathiforme*, pileo coriaceo plano-infundibuliformi zonato glabrescente stipiteque ferrugineis, aculeis rufescentibus.

a. minus, vertice scrobiculato squamoso. *Mich. gen. t. 72. f. 7. Hall. helv. 2520. H. cyathiforme. Bull. Ch. p. 308. t. 156. Dec. fr. 2. p. 290. H. scrobiculatum. Fries Obs. 1. p. 143.*

b. pileo latiori, radiato, glabro. *Mich. gen. p. 152. n. 6. Hydn. zonatum. Batsch. Cont. II. f. 224. Nees syst. f. 242. H. cencrescens. Pers. syn. p. 556. Obs. 1. p. 74. Fries Obs. 1. p. 145. Swartz l. c. p. 246.*

Species procul dubio distinctissima, sed ex diversa ætate forma & colore mutabilis. Gregarium, uti sequentia, ut plurimum concrescens. Stipes uncialis & infra, subtenuis, inæqualis, vix nisi sublente tomentosus apparet. Pileus  $\frac{1}{2}$  - 2 unc. latus, glaber, junior subclavæformis, demum planiusculus. Aculei juniores pallidi, dein obscuriores subfuscii, tenues, æquales. *In silvis ericotosis, frequens; etiam Americæ boreal. Aut. (v. v.)*

19. *H. connatum*, pileo coriaceo infundibuliformi fasciato spadiceo, aculeis ochraceo-cinereis, stipe tenui nigro nitente-glabro. *Schult. Starg. p. 491.*

Inter numerosas antecedentis formas equidem nullam in hoc quadrantem reperi. Gregarium, confluens. Aculei tenues. *In pinetis densis. Sept.*

\*\*\* 20. *H. tomentosum*, pileo coriaceo plane-infundibuliformi zonato dilute cinereo, disco villosso, margine aculeisque albis.

*H. toment. Linn. Suec. 1259. Pers. syn. p. 556. A. S. p. 266. Fries Obs. 1. p. 143. H. cyathiforme. Schaff. t. 139. Fl. Dan. t. 1020. f. 2.*

*Concrescens. Stipes distinctus, glaber, cincus, basi saepe crustaceo-effusus. Pileus disco excepto glaber. Aculei in stipite decurrentes, breviusculi, nec uti priorum decolorantes. In pinetis, ericetis, haud raro. Aut. (v. v.)*

21. *H. melaleucum*, pileo coriaceo irregulari striato nigricante, disco colliculoso, margine aculeisque albis.

*Mich. gen. t. 72. f. 6?* (stipes nimis rudis.) *H. pullum*, *Schæff. t. 272.* *H. zonatum*, *Gmelin.* *H. tomentosum*. *g. A. S. l. c. H. mel.* *Fries Obs. I. p. 142.*

*Concrescens, imbricatum, quam maxime difforme. Stipes nunc æqualis, nunc concrescens ramosus, nunc etiam distinctus nullus. Pileus vix zonatus. Color primo fusco-purpureus, dein jove pluvio cœruleo-niger, sicco ater. In silvis abiegnis montosis. Aest. aut. (v. v.)*

\*\*\*\* 22. *H. Auriscalpium*, pileo coriaceo horizontali exciso tomentoso, aculeisque subspadiceis, stipite laterali tomentoso.

*Mich. gen. t. 72. f. 8. Buxb. Cent. I. t. 57. f. 1. Hall. helv. n. 521. H. aurisc. Linn. Succ. 1260. Schæff. t. 143. Bull. Ch. t. 481. f. 3. Curt. Lond. t. 190. Bolt. t. 90. Sowerb. t. 267. Fl. Dan. t. 1020. f. 1. Nees syst. f. 243. Fries Obs. I. p. 146.*

Ad hanc tribum referto ob substantiam. stipitem perpendicularem regularem, pileum subrotundum demumque lobis circumscriptis fere integrum. Stipes 2-3 unc. longus, spadiceo-niger, passim ramosus. Pileus aculeique æquales colore pallidiori variant. *Ad strobilos Pinuum, frequens. Per annum.* (v. v.)

*H. cœruleum Thore* forsitan idem ac *H. violascens*. *Erinaceus esculentus albus*. *Mich. gen. t. 72. f. 2.* vero simile propria species. *Spectatum nimis H. lactescens*. *Hall. helv. 2323. H. tomentosum*. *Fl. Dan. t. 554* potissimum *Polyp. adustus*. *H. spadiceum Pers.* *Dædalaæ species.*

## Trib. II. PLEUROPOUS.

CHAR. Pileus inaequalis, mollis, excentricus, lateralis. Aculei aequales. Stipes irregularis, brevis, saepe horizontalis. Sporidia alba. (*H. auriscalpium*.)

\* 1. *H. orientale*, candidum, pileo dimidiato planolati, stipe brevi crasso.

*H. auriscalp.* Lour. Coch. p. 693.

Magnum, totum candidum. pileo crassissimo, "subtus villis duris aspero." In *Cochinchina ad arborum radices*.

\*\* 2. *H. pusillum*, album, pileo compresso infundibuliformi glabro, stipite solido brevi excentrico. *Brot. Fl. Lus. II.* p. 470.

Solitarium, sesqui-unciale. Pileus "latere altero altiori" — *Sequentis* varietas, querit auctor. *In silvis prope Conimbricam, autumno.*

3. *H. gelatinosum*, pileo gelatinoso papuloso, aculeis mollibus pyramidatis glaucis, stipite brevi laterali.

*Fung. erinaceus candidus, substantia gelatinea.* Hoffm. Alt. - Hall. helv. 2219. *H. gelatinosum*, Scop. Carn. p. 472. Jacq. Austr. t. 239. Pers. syn. p. 249. Dec. fr. 2. p. 110. Fries Obs. 1. p. 147. *H. crustallinum*. *Fl. Dan.* t. 7:7.

b. undique aculeis tectum. Jacq. Coll. I. 139. t. 9.

Forma & magnitudine (etiam colore pilei albidio, glauco, fusco, murino &c.) valde variat, sed substantia aculeisque distinctissimum. Stipes minute papulosus, raro obsoletus. Pileus  $\frac{1}{2}$  - 3 unc. latutus, tremulus. Aculei tenacelli. *Ad truncos abiegos &c. vetustos, passim; etiam Amer. borealis.* (Torrey.) Aut. (v v.)

*H. clandestinum*, Gmel. *H. gelatinosum*. Schäff. t. 144. varietas insignior l. species diversa. Nees Syst. p. 254.

\*\*\* 4. *H. Erinaceus*, maximum, cordiforme, album, lutescens, pileo subsessili fibrilloso-lacero, intus subcancellato, aculeis longissimis.

- Bocc. Mus.* 303. f. b. *Buxb. Cent. I.* t. 56. f. 1. H.  
*Erinac. Bull. Ch.* p. 304. t. 34. *Dicks. Cr. 2.* p. 24.  
*Pers. syn.* p. 360. *Dec. fr. 2.* p. 108. *Tratt. Essb.*  
*Schw.* t. Y.  
**b.** *subterraneum*, *lobatum*, *Manina cordiformis*. *Scop.*  
*Pl. subterrani.* t. X.

Transit ad sequentem tribum. Formæ plurimæ. Substantia crassa, carnosa, tenax, mollissima, elastica, alba, immutabilis. Pileus spithameus & ultra, basi plus minus porrecta, mollis, fibrillis subfasciculatis (aculeis abortivis) lacerus, pileis minoribus sæpe imbricatus, margine obtuso, in aculeos abeunte. Aculei  $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$  unc longi, penduli, confertissimi, maxime regulares, molles, æqualiter attenuati, basi terni l. gemini passim connati, fastigiati. b) subcoralloideum, ramis densissime anastomosantibus. c) magnum, hemisphæricum, undique aculeatum. d) pileo minore, lacero, stipite horizontali longiore. *Ad truncos Fagi, Quercus.* b. *in arboribus cavis.* c. *horizontaliter prostratis.* Oct. (v. v. Femsjø)

1. *H. auriscalpium.* *Vill. Delph.* p. 1025. Exiguum, obliquum, pallide luteum, pileo convexe, stipite crasso.
2. *H. - minutum, cæspitosum, carnosum, luteolum, pileo lœvi, stipite laterali.* *In Pado semel.* (v. v.)
3. *Mich. gen.* p. 122. n. 3. *Maximum, cervinum, aculeis longis teretibus, stipite brevi.* *Affine H. Erinaceo.*

### Trib. III. MERISMA.

*Hericium. Pers. Comm. Clavæf.* p. 28.

CHAR. Pileus manifestus nullus; Clavariæ-formis; nunc ramosissimus, aculeis verticalibus pendulis; nunc crassus simplex, in aculeos longissimos superne fissus. Aculei aquales, graciles. Substantia carnosa. Sporidia alba. *Lignicola, esculenta.* (*H. Erinaceus* b.)

\* **GENUINA.** *Ramosissima, aculeis pendulis.*

4. *H. Coralloides*, ramosissimum, candidum, demum lutescens, ramis intricatis attenuatis, aculeis unilateralibus subulatis.

- Fung. nox. gen. XXV.** *Clus.* - *ic.* *In app. ult.* *J. Bauh.*  
*Hist.* *XL.* *c.* *40.* *Bocc. Mus.* *3<sup>o</sup> 5.* *f. 7* *Sterb* *t* *27.*  
*G. Mich. gen.* *t.* *64* *f. 2.* *Hall helv.* *n.* *2517.* *H.*  
*coralloid.* *Scop. Carn.* *p.* *472.* *Schœff.* *t.* *142.* *Sow-*  
*werb.* *t.* *252.* *Pers. comm.* *p.* *23.* *Swartz l.* *c.* *p.* *252.*  
*H. ramosum.* *Bull. Ch.* *p.* *305.* *t.* *390* *H. laciniat-*  
*um.* *Leers Herb.* *p.* *276.* — *Junius:* *Bocc. Mus.*  
*304.* *2.* *Barr* *1257* *H. crisnum* *Scop. l* *e p.* *473.*  
*H. abietinum.* *Schrad. spic.* *p.* *81.* *Pers. comm.*  
*Clavæf.* *p.* *24.* *H. muscoid s.* *Schum.* *Sæll.* *p.* *394.*  
**b.** *subterraneum,* *undique aculeatum.* *Mamna mu-*  
*scoides.* *Scop. Subt* *t.* *16* *H. mucoid.* *Pers. comm.*  
*p.* *26.* *Clavar.* *madreporæform.* *Retz. Supl. Scand.*  
*1.* *p.* *19.*

Status junior a perfecto habitu valde recedit,  
hinc duplex apud auctores. Cf. *A. S.* p 272. Ex-  
spites adulti pedales & ultra, ramis angustis flexu-  
osis angulatis, ramulis incurvis; latere inferiori  
aculeatis. Aculei æquales. Esculentum. Cf. *Tratt.*  
*Essb. Schie.* p. 133. (icon rufescens.) Pers. Ch.  
com. &c. *Ad truncos Fagi, Abietis, passim. Aut.*  
(v. v. & b. in cellis.)

- 2.** *H. Clathroides*, ramosissimum cinereum, ramis  
anastomosantibus, aculeis unilateralibus filiformi-  
bus. *Pall. Russ. Reis.* *2.* *t. k. f.* *3.*

Substantia mollis, lenta. Truncus a basi mul-  
tifidus, ramis fasciculatis, crebre anastomosanti-  
bus, superne papillis minutis muricatis, subtus acu-  
leis aliquot lineas longis confertissimis hirtis. *Ad*  
*truncos putridos in pineto Kosmalensi circa Obum flu-*  
*vium.* (v. ic.)

- \*\* GOMPHI. *Truncus brevis, simplex, apice*  
*subulis congestis obsitus.* Potius proprium genus in-  
ter Clavates. (Clav. ornithopod.)

- 3.** *H. Caput Medusæ*, albidum, trunco obliquo cras-  
so, apice dilatato, aculeis undulatis.

Clavar. *Bull. Ch.* *p.* *210.* *t.* *412.* Heric. Pers. Comm. Cl.  
*p.* *26.* Hydn. Syn. *p.* *564.* Dec. fr. *2.* *p.* *108.* Nees  
*syst.* *t.* *33.*

Carnosum, magnum, primo niveum, dein eineo-fuligineum. Truncus dilatatus quasi in pileum, qui vero undique tectus aculeis longis gracilibus, prima aëtate strictis, proiecta decumbentibus undulatis. *In ligno putrido Gallicæ.* (v. ic.)

4. *H. Hystrix*, album, trunco tereti erecto, aculeis erectis longissimis plenis.

*Bocc Mus.* 307. f. 1. *Mich. gén.* t. 64. f. 1. *H. hystrix.* *Batsch. El.* p. 113. *Heric. Pers.* l. e.

Nostrum *H. Erinaceo* affine, carnosum, molle, tenax; sed differt forma clavata perpendiculari, aculeisque (plenis) robustioribus, parum divergentibus. *Ad truncos, raro.* *Mihi in Fago. Oct.* (v v)

5. *H. Echinus*, flavum, trunco crasso, aculeis erectis longis fistulosis.

*Martella. Scop. Fung. Hung.* p. 151. *Heric. Pers.* l. e.  
Reliqua prioris. *Ad Schemnizium*

6. *H. Ramaria*, purpureum, pendulum, trunco nullo, aculeis ramosissimis intricatis.

Affine *H. Erinaceo*, cuius pileus e ramis & præcipue aculeis connatis oritur, sed in hac specie nullus pileus formatur. Sat firmum, 2 unc. longum, basi tenui. Aculei ramosissimi, de cetero cum *H. Erinacei* bene convenient, læves, glabri, æqualiter, attenuati, acuti, pleni. *In ligno putrido Fagi, semel. Aug.* (v. v.)

1. *H. stalactitium.* *Schrank Bay. Reis.* p. 150. An *H. coralloides?* Truncus crassus, remis conicis.

2. *Ag. coralloidi similis.* *Batt.* t. 33. A.

3. *H. carolinianum*, ovatum supra subtusque echinatum. *Walt. Car.* p. 263.

#### Trib. IV. APUS.

CHAR. Pileus dimidiatus, sessilis, latere adfixus, horizontalis, planus, marginatus, subtus aculeatus. *Truncicoli, annui.*

1. *H. diversidens*, pileo carnoso molli albido, superne dentibus sparsis variis incisis, subtus aculeis confertis brevibus æqualibus.

Caro mollis, sat crassa, alba, haud fibrosa. Forma vix ulla constans; plerumque laterale adscendens; rarius excentrico-umbilicatum in stipitem perrectum. Pileus 2 unc. latus, margine acuto. Dentes elongati, compressi, difformes, subpalmati, non adpressi. Aculei simplices, subulati. *Ad truncos Betulæ. Nov. v. v.*)

2. *H. cirrhatum*, pileis carnosis albidis, superne aculeis sparsis decumbentibus fibrilloso, aculeis longissimis.

*Pers. syn. p. 558. Schum. Sæll. p. 393.*

b. *rufescens*. *H. paradoxum. Schult. Starg. p. 492.*

Sessile, imbricatum, subreniforme, 1-2 unc. latum, subflexuosum, exsiccatum persistens, flexible; basi muricatum, cirrhis adpressis, versus marginem liberis 2-3 lin. longis; aculeorum procul dubio rudimentis. Margo inflexus, fimbriatus. Aculei 5-8 lin. longi, æquales, tenaces, graciles, vetusti & exsiccati rufescentes. Colora flavo misit ASPEGREN. *Ad truncos Fagi, Quercus. Aut. (v. v.)*

3. *H. discolor*, pileo carnoso lævi pallido, aculeis subulatis æqualibus ferrugineis.

*H. Agaricoid. Swartz Fl. Ind. Oce. III. p. 1927.*

Pileus postice attenuatus, semirotundus, crassus, supra convexus, subtus planiusculus, diametro 2-unciali & ultra. Substantia recens fragilis albida; dein lenta. Aculei confertis imi, 3 lineares, subsucculenti, diaphani; subinde obtusi, juniores forte albescentes. *In truncis semin.ortuis Jamaicæ temperatarioris*

4. *H. leoninum*, pileo carnoso lævi glabro flavo, aculeis subulatis albidiорibus.

*Esculentum, oolidum, primo tuberculiforme, obtusum, basi lata adnatum. Magnitudo 2 unc. & ul-*

tra; formā varia. Caro mollis, alba, sat crassa.  
Aculei longiusculi, conferti, æquales, acuti. *Ad truncos Betulæ. Jul.-Sept. (v. v.)*

5. *H. minutum*, pusillum, pileo carnoso lævi albi-do-ochraceo, dentibus longis inæqualibus concoloribus. *Schum. Sæll. p. 394.*

Habitus quidem *H. ochracei*, sed carnosa substantia aculeisque longis *H. cirrhato* proximum. Pileus planiusculus, 1 lin. latus. Caro alba. *In pælo abietino Sællandiae repertum. Oct. (v. ic.)*

6. *H. orbiculatum*, imbricatum, pileis conchatis villosis albis, aculeis tenuibus griseis.

*Mich. gen. t. 64. f. 5. H. pectiniform. Batsch. H. orbiculat. Pers. syn. p. 559. Balb. El. rec. Stirp. p. 5.*

Pilei suborbiculati, leviter repandi, 2 unc. lati. Aculei tenuissimi. *In Italia ad truncos mense Martio &c. repertum. (v. ic.)*

7. *H. pectinatum*, imbricatum, pileis effuso-reflexis hisutis albis, aculeis subulatis concoloribus. — *Mich. gen. t. 64. f. 4.*

Ab *H. cirrhato*, ad quod citat Persoon, omnino diversum. Pilei videntur tenues, concrescentes, unciales & ultra. Aculei breves, acuti. *Ad Vitium pedamenta, Februario repertum. (v. ic.)*

8. *H. occarium*, imbricatum, pileis dimidiatis villosis albis, aculeis crassis planis.

*Mich. gen. t. 64. f. 3. H. occar. Batsch. - Pers. syn. p. 559. Balb. misc. p. 61.*

Pilei plani, basi lata ad 3 unc. elongata adnati. transversim 1 - 1½ unciales. Substantia hujus & duorum antecedentium forsitan carnosa? Aculei longi, validi, plani, obtusi. *Ad truncos Italiæ. Nov. (v. ic.)*

9. *H. lacteum*, album, pileis coriaceis conchatis villosis, aculeis confertis seriatis acutis subincisis. *Fries Obs. 2. p. 265. (Sist.)*

Pilei sessiles, basi subinde effusi, imbricati; concrecentes, leviter suberosi, azoni, unciales & infra. Aculei neutiquam porosi, sed in series dispositi, subinde connati, longi, compresi; alii teretes integri. Passim ad truncos & ramos Fagi. Aut. (v. v.)

10. *H. papyraceum*, niveum, pileis membranaceis glabris levibus, aculeis acicularibus simplicibus multifidisque. Wulf. in Jacq. Coll. I. p. 345.

Membrana tenuis, exsiccatione rigidescens, in bracteas l. squamas semicirculares aut oblongo-ovatae conformata. Pilei convexi, humidi flexiles, siccii coriacei rigiduli, interdum crispi, margine integro. Ad truncos prope Clagenfurt.

11. *H. pendulum*, pileis membranaceis plicatis flavis, postice porrectis, margine aculeisque distantibus magnis variis incisis candidis.

Sistotr. A. S. p. 261. t. 6. f. 7. Sist. conchatum. Ehrenb. silv. Ber. p. 30. forma minor.

Maxime inemorabilis species, optime ab A. S. descripta. Pilei tenuissimi, subpapyraci, plicabiles & distensiles, e basi stipitiformi conchati l. infundibuliformes, unciales & infra; squamis pilosis longis levibus arcte adeo adpressis, ut superficies tota ruguloso-leuviuscula appareat. Aculei in hymenio levi distant, praecipue basi productae demum fuscescenti insidentes, varii, subseriati &c. Ad ligna Pini foco destinata, rarius. Aut., hieme. (v. v.)

12. *H. crispum*, pileis coriaceis lobatis squamosis plicatis rufofuscis, postice subporrectis aculeis imbricatis pallide rufis.

Schæff. Fung. IV. p. 98. t. 147. f. 1. Sibth. Ox. p. 832.

Videtur priori affine; sed multo majus, pileis planiusculis dilatatis crassis irregularibus imbricatis. Stipes nullus aut brevis crassus rufofuscus. Aculei incomplete descripti. Ad truncos & ligna putrida. Oct. (v. ic.)

13. *H. septemtrionale*, pileis fibrosis latissimis sub-tenuibus inaequabilibus, aculeis longis gracili-bus lutescentibus.

Substantia lenta, albo-lutescens, haud crassa. Pilei imbricati, concrecentes, spithamei, non laevigati, recentes forte lutei, sicci fuscescentes, margine tenui undulato inflexo. Aculei conferti imi-setacei, aequales, raro geminatim connati,  $\frac{1}{2}$  unc. longi. In caudicibus Suecæ superioris. Swartz. (v. s.)

14. *H. corrugatum*, pileo carnosso-suberoso crasso corrugato tomentoso nigro, aculeis longissimis subulatis albis. Fries Obs. 2. p. 269.

Distinctum, sed forsitan in statu decrepito ob-servatum. Crassum, tuberculosum, undulatum, intus album. Aculei unciales, exacte H. Erinacei. In truncis Betulæ, vere. (v. v.)

15. *H. strigosum*, pileo coriaceo rugoso squamulo-so-strigoso nigrescente, aculeis longis cinereis.

Hall. helv. 2318. H. parasit. Pers. ic. & descr. t. 14. f. 1. Syn. p. 558. Nees syst. f. 245. H. strigos. Swartz l. c. p. 250.

Pilei solitarii l. imbricati, planiusculi, squamis adpressis palmato-incisis fusca setosis (fere ut in Pölyp. Favolo Gallico) scabri, margine lobato. Substantia crassiuscula, sicca, fusca. Aculei conferti, aequales, rigidi, albo-variegati, dein grisei, marginales sape connati. Ad arbores frondosas languidas Suecæ, prope Berolinum (Ehrenberg) &c. Vere, Aut. (v. s.)

16. *H. ochraceum*, effuso-reflexum, pileo coriaceo tenui zonato ochraceo, aculeis minutis confer-tis ochraceo-carneis.

*H. Daviesii*. Sowerb. t. 15. *H. ochrac.* Pers. Obs. Myc. 1. p. 73. Syn. p. 559. A. S. p. 268.

Parvum, junius totum effusum; dein margine reflectuntur pileis subrepandi, primo albido-subto-mentosi, dein rugosi; 1-3 unc, latum. Aculei bre-

ves, acuti, integri, expallentes. Variat integrum stipite centrali *A. S. l. c.* forte & immarginatum, aculeis longioribus tomento effuso innatis. *Ad ligna Pini, Abietis.* Per annum. (v. v.)

1. *H. albovirens. H. parasiticum*, pileo spongioso plane albo, subtus virens. *Vill. Delph. p. 1023.*
2. *H. populinum*, pileis longis glabris leucophæis, aculeis teretibus purpareis. *Mich. nov. gen. p. 122. n. 8.*
3. *H. ilicinum*. pileis coriaceis glabris ferrugineis, aculeis albis. *Mich. l. c. n. 7.*
4. *H. minimum*, coriaceo-lignosum, sphæricum, auranticum, aculeis brevibus erectis. *Bolt. t. 171.*

Micheli aliana speciem terrestrem colore obscuro, aculeis longis minorat. — Ipse legi semel *H. terrestre*, sessile, luteum, villosum, aculeis brevibus.

#### Trib. V. RESUPINATUS.

*Odontia. Pers. disp. p. 30. Hydnæ & Sistotr. resupinat. Pers. syn. p. 552. Nees syst. p. 226, 234.*

CHAR. Resupinatus, effusus, pileo tenui obliterato ubique adnato *immarginato*, in ambitu sæpe byssino. *Tenues, lignatiles.*

† Aculeis æqualibus, teretibus, integris. \* *coloratis.*

1. *H. macrodon*, rufescens, pileo obliterato, aculeis obliquis longissimis pendulis. *Pers. p. 560.*

Ad ultima Merismata accedit. Subiculum ferre nullum. Aculei (primo albidi?) basi connati, deorsum spectant & ligno longitudinaliter adnati, omnium longissimi. *Ad truncos pineos Misniae.*

2. *H. membranaceum*, effusum, tenue, glabrum, fulvo-ferrugineum, aculeis mediis rectis.

*Bull. Ch. t. 481. f. 1. Sowerb. t. 327. Fr. l. c. p. 270.*

Nostrum a Sistotr. quercino P. certe differt receptaculo, colore aculeisque æqualibus integris. Ambitus vix distinctus. Junius pallidius, demum subfuscum. *Ad ligna Pini Ec. Aest. (v. v.)*

3. *H. fusco-atrum*, effusum, glabriuscum, junius glaucum, dein ferrugineo-fuscum, aculeis nigricantibus. *Fries Nov. Suec.* p. 39.

Junius exacte orbiculare,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. latum, margine saepe hyssino cæsio; mox confluens, latisime effusum, glabrum, tenue. Aculei minus conferti, subbreves, obtusiusculi, juniores cervini. *In ligno Fagi, persistens.* (v. v.)

- $\beta.$  *H. castaneum*, subvillosum, glaucum, dein badium, aculeis longis confertis. *A. S.* p. 269. —

Certe prioris varietas. *Ad truncos "Populi tremulæ"; frequens in Betula.* (v. v.)

4. *H. aterrimum*, effusum, strigosum, atrum, aculeis elongatis subcompressis acutis nigris.

*Sphæron?* hydnoid. in *V. A. H.* 1818. p. 358. *Exs. n. 39.*

Maxime memorabile, cortici interiori Bétulæ albæ innascens, epidermidem Sph. stigmatis l. Thelophoræ comedentis instar solvens, ramos & truncos undique saepe ambiens crusta sua lata tenui spinulosa. Aculei subconferti, minus æquales, cornei, rugulosi, sed numquam incisi l. villosi. *Ad Fem-sjö copiose. Persistens.* (v. v.)

5. *H. Sacchari*, effusum, luridum, aculeis brevibus subcurvatis. *Spreng. V. A. H.* 1820. p. 51.

Accedit ad *H. ferrugineum*, sed hoc totum tomentosum ac ferrugineum. *In foliis Sacchari officinarum, Guadeloupæ.*

6. *H. ferruginosum*, effusum, tomentosum, ferrugineum, aculeis acutis subintegris.

*H. tomentos.* *Schrad. spic.* p. 177. t. 4. f. 2. *H. ferrugin.* *Pers. syn.* p. 562. *A. S.* p. 270. *Nees syst.* f. 248.

Membrana tota e tomento dense contexta, adpressa, ambitu simplici; 2-3 unc. longa. Aculei erecti, rarius obliqui subcompressi, etiam villosi. *Ad truncos.* *Aut.* (v. v.)

7. *H. bicolor*, effusum, tomentosum, album, aculeis minutis rectis acutis e rufo-spadiceis, apice nudis. *A. S.* p. 270.

Subiculum spithamæum & ultra, tenue, adnatum, e tomento contextum. Aculei  $\frac{1}{2}$  lin. longi, distincti, circa basin albo-lanati. *Ad ligna putrida abiegnæ. Aut. — vere. (v. v.)*

8. *H. pinastri*, effusum, flavum, ambitu hyssino albo, aculeis acutis glabris obliquis. *Fries Nov. l. c. Obs. myc. I. p. 149.*

Membrana laxe adhærens, tenuis, junior tota tomentosa, dein disco glabra. Aculei æquales, integri, sed subiculo adpressi & fere adnati. *In cortice, ligno Pini. Aestate, aut. (v. v.)*

9. *H. microdon*, effusum, coriaceum, ochraceo-carneum, aculeis congestis tenuibus. *Pers. syn. p. 561.*

Ultra spithamam longum, subtus tomentosum, ambitu subinfexo. Aculei acuti, nonnulli compressi. *In fodina lithantracina in monte Meisner lectum.*

10. *H. alutaceum*, effusum, glabrum, pallide ochraceum, aculeis minutis acutis.

Subiculum varium, longitudinaliter plerumque effusum, 3-5 unc. longum, persistens, arcte adnatum. Aculei conferti, erecti, glabri, integri. *Ad ligna putrida Pini. Aest. (v. v.)*

\*\* *Aculeis albidis.*

11. *H. fragile*, effusum, albidum, aculeis fragilibus longissimis flexuosis. *Pers. l. c.*

Subiculum tenue, membranaceum, a ligno liberum. Aculei  $\frac{1}{2}$  unc. longi, opaci, recti, subflexuosi, conferti. *In Misnia.*

12. *H. fasciculare*, albidum, subiculo nullo, aculeis fasciculatis longis pendulis.  
*A.* S. p. 269. t. 10. f. 9. *Dec. fr.* 6. p. 35.  
 Aculei 4-12, basi connati, teretes, acuti, 3-4 lin. longi fasciculum pendulum constituunt. *Ad truncos putridos pineos, frequens. Aut. (v. v.)*
13. *H. subcarnaceum*, effusum, subglabrum, albo-rufescens, aculeis longis acutis. *Fr. Obs. 2.*  
 Latum, membranaceum, arcte adnatum, ambitu vix byssino. Aculei conferti, 3 lin. longi, regulares, erecti l. obliqui. *Ad truncos prostratos Betulæ. Aest. aut. (v. v.)*
14. *H. mucidum*, effusum, membranaceum, album, subtus margineque villosum, aculeis longis confertis acutis. *Pers. syn. p. 561.*  
 Latissimum, saepè pedale & ultra, a ligno integrum solubile. Aculei maxime æquales, subulati, recti, fastigiati, molles. Subinde flavescens. *Ad truncos Fagi, Sorbi &c. frequens. Vere - aut. (v. v.)*
15. *H. diaphanum*, effusum, tenuè membranaceum, glabriuscum, pellucens, albidum, aculeis subulatis distinctis mediis.  
*Schrad. spic. p. 178. t. 3, f. 3. Pers. syn. p. 563. A. S. p. 271.*  
 Papyraceum, laxe adhærens, in ætate juniore tomento subtili conspersum, in adultiori glabrum diaphanum, margine per ætatem involutum. Aculei 1 - 1  $\frac{1}{2}$  unc. longi, erectiusculi, per siccitatem albo-flavi. *Ad truncos Fagi, Betulæ. Aut. (v. ic.)*
- β. *H. pellucens*, subiculo tenerimo diaphano l. nullo, aculeis tenuibus flaccescentibus. *Ad cortices Betulæ. Aestate. (v. v.)*
16. *H. Agardhii*, effusum, subcarnosum, glabrum, albidaum, intus viridescens, aculeis minutis obtusis apice rubris. *Fries Nov. Suec. p. 39.*

. Late effusum, arcte adnatum, numquam villosum, ne ambitu quidem. Aculei breves, juniores unicolores. *Ad truncos abiegnos. Aest. aut. (v. v.)*

17. *H. obtusum*, effusum, candidum, aculeis brevibus teretibus obtusis, apice villosis.

*Schrad. spic. p. 178. Pers. syn. p. 562.*

Subiculum membranaceum, inæqualiter expansum, s<sup>e</sup>pe 2 unciale, appressum, margine s<sup>a</sup>pius per ætatem, introflexum. Aculei vix  $\frac{1}{2}$  lin. longi, erecti, conferti, inferne glabri. *Cum H. diaphano.*

18. *H. crustosum*, effusum, crustæforme, subfarinaceum, album, aculeis minimis obtusis.

*Odont. Pers. Obs. Myc. 2. p. 16. Hydn. Syn. p. 562.  
A. S. p. 270. Schum. Sæll. p. 394. Nees syst. f. 247.*

Subiculum non membranaceum cohærens, sed indeterminate effusum adnatum, crustæ instar Lichenosæ. Aculei nudo oculo vix conspicui, glabri, subinde apice excavati. *Ad truncos Salicum, ligna pinea &c. Persistens. (v. v.)*

19. *H. farinaceum*, effusum, crustæforme, pallidum, ambitu subbyssino, aculeis tenuissimis subdistantibus acutis.

*Pers. syn. p. 562. A. S. p. 270. Dec. fr. 6. p. 35.*

Notis allatis satis differt ab antec. & sq., cum quibus jungit Cl. Ehrenberg; tamen fatendum plures occurrere formas intermedias haud striete circumscriptas. Subiculum arcte adnatum, farinam stratam refert. Aculei acutissimi. *Ad truncos frequens. Persistens. (v. v.)*

20. *H. niveum*, effusum, submembranaceum, album, ambitu byssino, aculeis confertis brevibus.

*Odont. Pers. disp. meth. t. 4. f. 6, 7. Hydn. Syn. p. 563. A. S. p. 271. Swartz. l. c. p. 251. Nees syst. f. 246.*

Recens colore pulcherrime candido distinguiatur, dein pallescit. Subiculum tenuer, 2-3 unc.

"usque spithamæum." Aculei minuti, subacuti, glabri. *Ad truncos. Persistens.* (v. v.)

**3.** *H. fimbriatum*, candidum, fugax, ambitu radioso-fimbriato, aculeis granulosis.

Junius Himantiam candidam dendriticam refert, dein margine fibrillosum. *Ad lignum Fagi.* (v. v.)

†† Aculeis compressis, subincisis, variis l. angulatis. \* *coloratis.*

**21.** *H. squalinum*, majus, villosum, aculeis confertis elongatis compressis acutis integerrimis fuscescens.

Subiculum subrotundum, mox confluens irregulare, firmum, adhærens, sed a matrice solubile, ligneo-fuscens; subtus & ambitu tenui villosis albis. Aculei recti, firmi; juniores obtusi, villo albidio obducti; dein glabri, 2-3 lin & ultra, acuti, subdivisi, sed non incisi. *Ad cortices prostratos Fagi. Persistens.* (v. v.)

**22.** *H. carneum*, effusum, submembranaceum, rubescens, ambitu simplici, aculeis difformibus obliquis obtusis integris. *Fries Obs. 2. p. 268.*

Meruliis subaffine, adnatum, 1-3 unc. longum, confluens, difforme, glabrum, junius subvenosum. *Ad cortices dejectos Fagi, haud frequens. Autumno.* (v. v.)

**23.** *H. Hollii*, effusum, membranaceum, lilacino-fuscum, in ambitu album, aculeis erectis difformibus incisis. *Schmidt l. c. p. 87. (Sist.)*

Junius orbiculare, dein confluens, 2-3 pedale. Aculei subfasciculati, 1-2 lin. longi. — Hoc statum siccum senescentem *Sist. carnei* (primo carnosofloccosi carni, dein membranacei fuscescens) *Ehrenb. silv. Ber. p. 30 ipse inventor suspicatur. Illud in Pino picea, hoc in P. silvestri? lectum.* (v. s.)

24. *H. fusco-violaceum*, effusum carnoso-floccosum violaceo-fuscum. ambitu fibrilloso albicante aut violaceo, aculeis incisis variis.

Sist. fusco-viol. Ehrenb. silv. Ber. p. 30.

Forsan potius pone *H. ochraceum* locandum, cum etiam reflexum dicitur, pileis dimidiatis, imbricatis, superne albo-tomentosis, interdum zonis variegatis. Ambitus vero Resupinati. In tignis pinneis putridis.

25. *H. viride*, effusum, tomentosum, mollissimum, viride, aculeis erectis crassiusculis difformibus subincisis.

Sist. viride, A. S. p. 262. t. 6. f. 4.

Subiculum tenerum, digito tritum evanescens, e tomento tenui in membranam nunc totam adpressam, nunc margine passim reflexam conflatum, quandoque spithameum. Color dein expallens, flavicans. Aculei subconici, 1 lin. fere longi, satis conferti. Ad ligna alnea. Aest. aut. (v. ic.)

26. *H. Barba Jovis*, effusum, tomentosum, pallido-album, aculeis teretibus pubescentibus, apice aurantio-barbatis.

Bull. Ch. t. 481. f. 2. With. arr. IV. p. 337. Sowerb. t. 328. Dec. fr. 2. p. 109. Swartz l. c. p. 251.

Subiculum membranaceum, ad latitudinem pedalem & ultra expansum, a tomento tenuissimo contextum, ambitu byssino albidiori; junius album, dein flavo-rufescens. Aculei simplices, 2 lin. fere longi, subpenicillati. Ad cariosos truncos Aestate vere. (v. s.)

27. *H. fimbriatum*, effusum, membranaceum, subcostatum, incarnato-rufum, ambitu fimbriato, aculeis granulosis dein multifidis.

Sist. fimbriat. Pers. Obs. Myc. I. p. 88. Syn. p. 553. A. S. p. 263. Fries Obs. 2, p. 268. Hydn. Dec. fr. 6. p. 37.

Species inter insigniores, Polyp. Vaillantii in memoriam revocans. Costæ radiciformes elongatæ junctæ membrana expansa, tenui, truncо laxius adhærentes. Margo elegantissime radiato-fimbriatus, albus. Aculei minuti, dein elongati. *Ad trunco prostratos Fagi, Betulæ, "Abietis."* Persistens. (v. v.)

28. *H. cristulatum*, effusum, tenue, rubescens, ambitu candido byssino, aculeis granulosis elongatis villosis, apice cristulatis.

Specimina plura in crustam latissimam confluent, quæ ob discum mox rubescensem versicoloria evadunt. Subiculum primo album, ecostatum, adnatum; digito pressum persistens, sed aculei conferti recti minimi evanescunt. *Ad trunco Betulæ.*  
Aut. (v. v.)

29. *H. udum*, effusum, tenue, subgelatinosum, glabrum, lutescenti-aquosum, aculeis confertis inæqualibus furcatis fimbriatisque.

Latissimum longissimumque, mucidum, a ligno neutiquam solubile, in ambitu sæpe nudo gelatinoso-membranaceo glabrum. Aculei vix lin longi, molles, glabri, pallidi, plurimi teretes 2-3 furcati, alii compressi fimbriati. *Ad lignum putridum Alni.*  
Aut. (v. v.)

30. *H. fallax*, effusum, interruptum, tenue, ambitu byssino albo, aculeis minutis confertis incisis flavidis. *Fries Obs. 1. p. 150.*

Subiculum tenue, villoso-furfuraceum, digito pressum fugax, etiam nullum. Aculei inæquales, compressi, acuti, vix  $\frac{1}{2}$  lin longi. *Ad hymenium Polypori fomentarii; rarius ad ligna vetusta.* Aest., aut. (v. v.)

\*\* Aculeis candidis, albis.

31. *H. Radula*, orbiculatum, lacteum, margine sub prominula byssino, aculeis distantibus elongatis difformibus integris, *Fries Obs. 2. p. 271.*

Affinitas cum H. pendulo adest, præcipue quoad aculeorum indolem; qui demum etiam basi lutescunt, firni, raro incisi. Subiculum primo tuberculiforme villosum, dein disco marginato, nisi confluens. *Ad truncos Betulæ passim. Aut. hieme (v.v.)*

32. *H. fagineum*, subeffusum, glabrum, albo-pallidescens, aculeis confertis elongatis connato-fasciculatis obtusis integris.

Sistotr. Pers. syn. p. 552? Fries Nov. Suec. p. 38.

Affine H. squalino, a sequentibus valde diversum. Subiculum primo orbiculare, dein confluens late effusum, ramulos ambiens stalactitium, adnatum, e floccis tomentosis dense contextum. Aculei erecti l. ob situm obliqui, e pluribus concretis ramosi & compressi, laves, glabri, "nec plicate-annulati." *Ad ramos & truncos Fagi frequens. Persistens. (v. v.)*

33. *H. quercinum*, effusum, glabrum, albo-pallidum, aculeis crassis difformibus incisis subadpressis.

*H. candidum*, Willd. in Bot. Mag. 4. f. 7. Odont. quercina. Pers. Obs. 2. p. 17. Sistotrema. Syn. p. 552. A. S. p. 262. Fries Nov. Suec. p. 38. Nees syst. f. 230.

Nostrum dein lutescit, nec rufescit, ut apud Persoon. Subiculum arcte adnatum, persistens, subtenue, 2-3 unc. longum. Aculei obliqui, subcompressi, nunc integri, nunc plus minus incisi, sublutescunt. *Ad ligna Quercus. Persistens (v. v.)*

34. *H. spathulatum*, effusum, candidum, aculeis spathulatis subintegris apice villosis.

Sehrad. spic. p. 178. t. 4. f. 3. Sistotrema. Pers. syn. p. 553. A. S. p. 263. Nees syst. f. 231.

Subiculum 1-2 unciale, tenerrimum, in ambitu adpressum byssaceum; demum flavescens. Aculei conferti, 2 lin. longi, obliqui. *Ad truncos praesertim abiegnos. Persistens. (v. v.)*

35. *H. paradoxum*, effusum, candidum, aculeis confertis digitatis apice villosis.

*Schrad. spic. p. 179. t. 4. f. 1. Dec. fr. 6. p. 37.  
Sistotr. Pers. syn. p. 553. A. S. p. 263. Swartz  
Summ. Sc.*

Subiculum membranaceum, inæqualiter expanseum, glabrum, ambitu byssino. Aculei sæpe fasciculati, 1½ lin longi, recti l. curvati &c. *Ad cortices Fagi, Betulæ, Salicis.* (v. ic.)

36. *H. argutum*, effusum, tomentosum, candidum, aculeis obliquis acutis serratis.

Subiculum tenue, irregulariter effusum, adnatum, constanter absque ambitu sterili byssino, quia subiculum oriri videtur tantum e basibus aculeorum villosis connexis. Aculei sub lente examinandi, concrescentes, inæquales, ad latera minute denticulati, longiusculi. *Ad ligna & cortices Betulae. Aut. (v. v.)*

37. *H. obliquum*, effusum, candidum, ambitu byssino, aculeis compressis inæqualibus villosis.

*Schrad. spic. p. 179. Sist. A. S. p. 263. Fr. Nov. l.c.*

Accedit ad Polyporos, cum hymenium in juniori ætate poros acutos fere referat; cum vero in statu perfecto aculei satis liberi, conferti, subtruncati, more Hydnorum villosi & incisi hujus potissimum generis. Subiculum tenue, vix contiguum, arcte adnatum. Color expallens. *Ad trunco passim. Persistens. (v. v.)*

38. *H. pseudo-boletus*, subrotundum, albido, ambitu pubescente niveo, aculeis obliquis acutis subconfluentibus. *Dec. fr. 6. p. 34.*

Maculæ tenues, carnosæ, rotundatæ l. oblongæ, etiam leviter rufescentes; ambitu sub lente byssino. Aculei deflexi, alii integri Hydnorum instar prominentes, alii in poros confluentes. *Ad trunco Quercus, Fura. (Ni fallor & ipse reperi.)*

39. *H. subtile*, latissime effusum, tenerrimum, glabrum, aquose albido, aculeis distantibus granulæformibus tenuissime incisis.

Subiculum indeterminatum, a matrice neutram solubile, dito tritum evanescens. Color albidus, subhyalinus. Aculei minuti, brevissimi, sublente acute incisi. *Ad cortices Betulae Aut.* (v. v.)

40. *H. stipatum*, latissime effusum, villoso-furfuraceum, albido, dentibus confertis granulæformibus obtasis.

Polyp. farinello analogum; indeterminatum, adnatum, tenui, ut dito tritum evanescat; in ambitu saepe sterile, byssinum, furfuraceum. Aculei dein elongati, integri l. minute dentati, glabri. A ligno neutriam solvi potest. *Ad lignum prostratum Alni. Aut. vere.* (v. v.)

In ultimis speciebus Hydni asci quaque submersi l. in floccis soluti (n. 6, 7, 26, 27 &c)

1. *Agaricus barbatus*. Batt. t. 336. Merismati affine.
2. Sist. *cellare*. var. *obtusum*. A. S. p. 264. Subiculum tenui, villosum l. obsoletum. Aculei glabri, firmi, varie angulati, recti, crassiusculi, congesti.
3. *H. byssinum*. Schrad. spic. p. 177 tomentosum, candidum, aculeis subulatis glabris. *Ad Salices.*
4. *H. sudans*, pallidum, subiculo laevi effuso, subulis distantibus teretibus brevibus crassiusculis obtusis, apice excavatis, guttula viscosa pellucida ovata persistente coronatis. A. S. p. 272. Dec. fr. 6. p. 35. — *Ad lignum putridum.*
5. Sist. *membranaceum*. Nees syst. p. 227 f. 252. fibrosum, tenui, candidum, dentibus erectis flaccidis fibroso-laceris. *In ligno pineo.* (*In icone rufum.*)

In hoc aliisque antecedentibus desiderantur asci, tamen ad aliud genus vix referenda. Cf. *Thelephora*. Obs. ad fin. — *H. calvum* Isariæ species.

## X. SISTOTREMA. Fries.

CHAR. Hymenium a pileo subdiscretum, densato-lamellosum. Lamellulæ (aculei explanati) interruptæ, irregulariter dispositæ, breves, planæ, flexæ & gyrosæ, sæpe characteri-formes, utrinque ascigeræ. — Pileus carnosus, irregularis, cum stipe, quando præsens, contiguus. Velum nullum.  
*Sporidia alba*

HIST. Medium inter Agaricos & Hydnæ & ab homonymo genere Persoonii diversum; cum vero ad hoc relatum fuit ejusque species albidi disposui, nomen retinendum putavi. Analogæ sunt præcipue Dædaleæ nonnullæ; sed hoc *numquam poros l. sinulos format*, substantia ascisque majoribus insuper diversum. De cetero hoc loco inter Hydnæ irregularia & Phlebias non male militat.

1. SISTOTREMA *confluens*.

*Hydnum sublamellosum*. Bull. Ch. p. 306. t. 453. f.  
 1. Sowerb. t. 112. Dec. fr. 2. p. 112. Sistotr. confl.  
*Pers. syn. p. 551. A. S. p. 260. Swartz in Vet. Ac.*  
*Handl. 1810. p. 239.*

Gregarium, concrescens, fragile, inodorum, candidum, demum flavescens. Stipes deorsum attenuatus, centralis l. lateralis, e situ horizontalis l. verticalis, uncialis & infra, etiam obsoletus. Pilei tenues, subfragiles,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. lati, subdepressi, flexuosi, concrescentes. Lamellulæ variant integræ & incisæ. In pinetis ad terram, præcipue ad latera viarum arenosa. Aug.-Nov. (v. v.)

## XI. PHLEBIA. Fries.

CHAR. Hymenium cum pileo homogeneum & concretum, glabrum, venoso-rugosum. Rugæ (Papillæ elongatae) interruptæ, irregulariter dispositæ, prominentes, recti & flexuosi, cum hymenio unidique ascigeræ — Stipes nullus. Pileus sessilis, re-

cupinatus, effusus. Substantia subfloccosa, plerumque carnosο-lenta, tenax. (*Asci in n. 4 nulli.*)

HIST. Nomen a Φλεψ, vena. Ut prius genus medium inter Agaricum & Hydnum, hoc inter Cantharellum & Thelephoram proximam; ut illud differt a Dædalea, hoc ab analogo Merulio. Species corticolæ, serotinaæ, annuæ; nulla ab Aucto-ribus descripta.

1. *P. Merismoides*, effusa, incrustato-ramulosa, carneo-rubea, subtus villosa alba, margine aurantio-piloso, plicis rectis.

Merul. Merismoid. *Fries Obs. 2. p. 235.*

Elegans species, præcipue coloribus nitidis. Radius supra ligna & cortices levigatas reperitur effusa, contorta, subtuberculosa, non vero ramulosa; sed etiam tum marginibus penicillato-pilosus Merisma refert. Sipius muscos ambit, ramulis papilloso-venosis. *Supra muscos & ligna Fagi. Oct.-Jan.* (v. v.)

2. *P. radiata*, orbicularis, utrinque glabra, obscure carneæ, plicis confertis seriatis versus ambitum radiatum evanescentibus.

Substantia carnosο-membranacea, tenax, persistens. Forma junior orbicularis, dein dilatata, confluens, 1-3 unc. lata. Ambitus liber, brevis, glaber, sed eximie fibroso-radiatus, fere ut in M. tremelloso juniori. Plicæ e centro radiantes, breves, flexæ, implexæ, confertissimæ. *Ad trunco Betulæ. Oct.-Dec.* (v. v.)

3. *P. contorta*, effusa, utrinque glabra, fusco-rubra, plicis distantibus irregularibus subflexuosis.

Maxime antecedenti affinis, sed magis effusa, tuberculosa & contorta, substantia firmior (fere Thel. quercinæ) & præcipue plicis non radiatis, sed nunc sparsis, nunc hinc inde conglomeratis, magis prominulis diversa. *Ad cortices Sorbi, rarius. Aut.* (v. v.)

\*\* 4. *P. vaga*, effusa, mollis, sulphurea, ambitu expanso byssino, plicis distantibus vagis.

Substantia Himant. sulphureæ a prioribus longe recedit. Membrana expansa, leviter adhærens, gravius trita fugax, 2 unc. & ultra, supra glabra, subtus villosa concolor. Plicæ rectæ, breves, raræ, dñormes, pallide luteæ. — Occurrit varietas alba.  
*Ad cortices Alni. Sept.-Nov. (v. v.)*

---

## XII. THELEPHORA. Ehrh.

*Agar.* ord. VIII. ad part. *Mich.* gen. p. 124. *Hall.* *helv.* III. p. 134. *Helveliæ spec.* *Linn.* *aliorumque.* *Auricularia* *Bull. Ch.* p. 284. *Thelephora*. *Willd.* *Ber.* p. 396. *Pers.* *syn.* p. 565. *Link diss.* I. p. 39. *Nees syst.* p. 246! *Merisina.* II. cc.

**CHAR.** Hymenium cum pileo homogeneum & concretum, papillis subrotundis obtusis sparsis obsitum l. omnino læve, undique ascigerum. Ascii subimmersi, tenues, raro obsoleti. — Stipes rarisimus. Pileus coriaceus, persistens, rarius regularis, contextu fibroso-floccoso. Velum plane nullum.

**ABERRATIONES** Pileatorum infimi generis plures, quam status naturales. Ex hymenio *Stereum*, *Phylacteria*, *Lejostroma*. — Receptaculum, ut in generibus analogis *Merulio*, *Polyporo*, *Hydro*, nunc clavæforme, nunc, ut sæpius, oblitteratum resupinatum.

**HISTOR.** Nomen a Θηλη & Φερω compositum Fhrhart; characterem stabilivit Willdenow; indolem illustrarunt Link & Nees. E receptaculi indole Persoon, hymenii Schumacher, ascorum Link in plura genera disposuerunt. — Optime meritè Schrader & Persoon de cognitione specierum, quæ vero ob notas acutas sæpius deficientes ægre definitur. (Me has minus quam reliquorum generum curasse, studioque novæ omisisse fatendum est) —

A superiore parte Phlebiis Cantharellisque proxima; ab inferiore non solum ad Hymenomycetum Prototypos (Tremellinas Cf. Nees p. 238.); sed & ad fungos elementares (Protomycetes & Hypomycetes) descendunt; per analogiam ad Anthinas, Isarias, Sporotricha &c.; per affinitatem ad Xylostromata, Hypochnos, Ozonia e. s. p. Hos enim, quorum constantiores in alia semovere cogimur classe, in natura confluunt; non solum in Thelephoras solum, bene monentibus Linkio & Belvisio, sed & in Polyporos & Hydna abeunt. Suo loco, auctis ut spero observationibus, plenius persequar; etiam ad Tuberculariam singularem afferram experientiam. — Cum Pezizis affinitas ne minima quidem.

DIVIS. ut inter Hydna, Polyporos &c.

- I. MESOPUS. Pileus integer, stipitatus. *Terrestres.*
- II. PLEUROFUS. Pileus lateralis, substipitatus. *Terrestres.*
- III. MERISMA. Pileus stipesque confusi, in ramos compressos l. tuberosos abeunt. *Terrestres.*
- IV. APUS. Pileus sessilis, lateralis. *Lignatiles.*
- V. RESUPINATUS. Pileus obliteratus, resupinatus. *Lignatiles.*
- B. STEREUM. Hymenium velutinum. Theca sæpe emersæ. *Hujus species inter priores disposui.*
- C. PHYLACTERIA. Sporidia quaterna serie dispositæ. *Resupinatæ, terrestres.*
- D. LEJOSTROMA. Glabré, absque thecis. *Lignic.*  
Accedunt Auricularia — Sarcopodium, Cenophora, Hypochnus, Conisporium &c. &c.

### Trib. I. MESOPUS.

Fungoidast. sp. *Mich.* p. 201. *Craterella. Pers. disp.* p. 32. *Th. Omphalia. Nees syst.* p. 237.

CHAR. Stipes perpendicularis, solidus, firmus, brevis sæpe, sed distinctus, cum pileo contiguus. Pileus integer, subcentralis, infundibuliformis, sub-

*coriaceus, celluloso-floccosus.* Acci distincti. *Terrastres.* (*Species carnosas vide sub Cantharello — Canth. undulatus.*)

1. *T. elegans*, carnosο-coriacea, pileo glabro dilute fusco-fasciato, subtus albescente-carneo pruinoso. *Mey. Ess. p. 305.*

*Gregaria, subcarnosa, tenuis.* Pileus substipitatus, 1-2 unc., infundibuliformis, subcompressus, undulato-plicatus, margine irregulariter crenatus, interne rufescens, & fasciis dilute fuscis eleganter variegatus, nitens. *Ad terram Essequeboæ. Jun.*

2. *T. pannosa*, suberosa, pallida, pileo depresso squamoso, subtus lœvi subpiloso.

a. *Helv. pannosa. Sowerb. t. 155. stip. longo.*

b. *Craterella pallida. Pers. ic. & descr. t. 1. f. 3. Theleph. Syn. p. 565. stipite brevi.*

*Gregaria, subcæspitosa, lignoso-tenuis, mihi 2 unc. alta. Stipes subvillosus, distinctus. Pileus excavato-infundibuliformis lacerus, fimbriatus, subtus sub lente hispidus. Ad terram in fagetis umbrosis &c. raro. Aut. (v. v.)*

3. *T. caryophyllæa*, coriacea, fusco-purpurea, pileo inæquali fibroso striato, subtus lœvi.

*Hall. helv. 2267. Elv. caryoph. Schæff. t. 325. Merulius. With. arr. 4. p. 153. M. radiatus. Holmsk. Ot. II. t. 29. Crater. ambigua. Pers. Obs. 1. p. 39. t. 6. f. 8-10. Thel. Syn. p. 565. Nees syst. f. 250.*

*Varia, tenax, 1½ unc circiter alta. Pileus superne fibroso-floccosus, unciam usque latus, expalens. Bene monente Persoonio (*Obs. Myc.!*) ambigua species; triplicem legi formam, quæ ad totidem sequentium species pertinere videtur; prima hymenio glabro subpapilloso purpureo-fusco, stipite sepe ramoso ad Th. flabellarem; secunda hymenio subpruinoso fusco-ferrugineo ad T. foetidam; tercia pileo eleganter lacero ad Th. laciniatam. Addi posset quarta, sequentis b. — Ad terram a. locis*

*graminosis nemorosis. b. in pinetis. c. locis uidis. Aut.*  
(v. v.)

Trib. II. PLEUROPOUS. (Syn. ad IV.)

CHAR. Stipes lateralis, brevissimus, vix distinctus. Pileus dimidiatus, horizontalis, planus, fibrosus, coriaceus. Substantia sat mollis, e floccis ramosis, annulatis, intricatis contexta. Papillæ & asci distincti. Sporidia fusco-purpurea. *Terrestres, imbricati.*

1. *T. terrestris*, obscure fusca, pileis planis fibroso-strigosis, stipite brevissimo.

*Agar. tristis. Batsch. f. 121. Auricul. caryophyll Bull. Ch. p. 284. t. 268. Thel. mesenteriformis. Willd. Ber. p. 397. t. 7. f. 15 Th. terrestris. Ehrh. Cr. n. 178. Pers. syn. p. 566. Swartz in V. A. H. 1811. p. 74. Nees syst. f. 251.*

- b. pileo integro umbilicato. *Pers. l. c. 4. S. p. 273.*

*Gregaria*, sæpe imbricata. horizontalis, 1-2 uncæ lata, sequentibus obscurior & mollior. Papillæ sparsæ. *Ad terram. Aut. (v. v.)*

2. *T. laciniata*, ferrugineo-fusca, pileis fibroso-squamosis, margine laciniato-crispis.

*Helv. pineti. Linn. Spec. Pl. II. p. 1649. H. caryophyll. Bolt. t. 175. Auricul. Sowerb. t. 213. Thel. mesenterif. Fl. Dan. t. 1198. Cortic. lacin. Pers. Obs. 1. p. 39. Th. Syn. p. 567. Swartz l. c. p. 75.*

- b. *Fl. Dan. t. 949. (effuso-reflexa.)*

Priori affinis, sed stipes magis obsoletus, pileus latior, tenuior, margine eleganter incisus fimbriatus, papillæ confertiores. Color pallidior, margine subtusque primo albidus. Legi cæspitibus omnino Merismoideis, maxime laciniatis. *Ad terram & radices truncorum, frequens. Aut. (v. v.)*

3. *T. intybacea*, cæspitosa, pileis subdimidiatis fibroso-squamosis pallidis, subtus cincteo-fuscæ scendentibus. *Pers. syn. l. c.*

Species dubia; ut videtur valde Merismoidea. Pilei imbricati, subtriquetri, cæspitem efformant obconicum. Stipites elongati, basi uniti. In fagis rarissime.

*H. acaulis Lour. Coch. p. 694. Alba, subtus levigata.*

### Trib. III. MERISMA.

*Merisma. Pers. Comm. p. 92. Nees p. 168!*

CHAR. Ramosa, laciñiata, compressa, inæqualia, apice sèpe pilosa. Rami subtus præcipue ascigeri. Ascii plurimis distincti. Terrestria. Occurrunt & *Stereum*.

Obs. Merismata huc pertinere haud longa èget demonstratione. Taceo substantiam omnesque characteres communes, taceo analogiam antecedentium generum reliquaque; præcipue enim ob affinitatem naturalem huc locavi & limites ab affini- bus tribubus déficientes. Bene vero differt ANTHI- NA Fries Nov. Suec. V.

\* *Erecta, ramosissima, ramis distinctis.*

1. *T. Coralloides*, erecta, nigrescens, ramis striatis dilatatis, apicibus fimbriatis albis.

*Clavaria coriacea. Bull. Ch. p. 198. t. 452. f. 2. Dec. fr. 2, p. 102. Merisma umbr. Pers. Comm. p. 94.*

Certe a sequente diversa, ramis gradatim majoribus pulchra. Apices tomentosi, sinuosi, dentati, ad normam petalorum Dianthi dispositi. a) fuligineo-cinerea, dein fusco-nigricans. b) fusco-nigricans, dein atra. *Ad terram & inter folia Gallicæ. Aut. (v. ic.)*

2. *T. palmata*, erecta, purpureo-fusca, ramis complanatis dilatatis palmatis pubescentibus, apice albicantibus.

*Clav. palmata. Scop. Carn. p. 483. Cl. tomentosa. Lam. Enc. II. p. 38. Merisma. Pers. Comm. p. 38. M. fœtidum. Pers. (sed glabrum dicit.) Swartz l. e. p. 83. Schmidt & Kuntz exs. n. 96.*

**Odor fœtidus.** Tota 1-2 unc. alta, subtiliter pubescens, basi attenuata villosa subradicata; exsiccata cinereo-ferruginea, putrescens nigricans. Rami nunc truncati, nunc laciniati cristati. *In pine-tis subhumidis, Aut. pluvios.* (v. v.)

**B.** *T. anthocephala*, subferruginea, ramis glabris (?) obtuse laciniatis fastigiatis.

**Clav.** *Bull. Ch.* p. 197. t. 452. f. 1. *Sowerb.* t. 156. **Cl. cornuta.** *Liljebl.* Merisma. *Swartz* t. c. p. 84.

Ramuli sæpe in pileolos cyathiformes concrescunt; analogi Polyp. umbellato. Glabram non reperi. *Cum priori.* (v. v.)

**y.** *T. clavularis*, rufofusca, pruinosa, basi tuberosa, ramulis acutis concoloribus.

**Merisma.** *Fries Obs.* I. p. 156. t. 1, f. 1.

**Odor** vix distinctus. Sicca colorem servat. Raro in pileum integrum abit. *Ibid.* (v. v.)

**d.** *T. diffusa*, diffusa, fusca, ramis imbricatis adscendentibus pruinoso-villosis incisis.

Junior decumbens, dein in cæspites latos confluens. Odor mucidus. Primo obtutu diversissima apparet, sed priores varr. ex eadem stirpe certe enatae. *Ad vias arenosas. Aut.* (v. v.)

**3.** *T. flabellaris*, erecta, fusco-purpurea, ramis paucis sublinearibus incisis variis.

**Clavar.** *Batsch. Cont.* II. f. 159. **Merisma.** *Pers. Comm.* p. 93. *Syn.* p. 584.

Valde affinis Th. caryophyllææ. Omnino indora, coriacea, flexilis, subglabra, priori multo minor, ramis paucis divergentibus striatis. hinc inde papillosis. *Ad terram in fagetis, versuris &c. rario-* *Aut.* (v. v.)

**B.** *T. strigosa*, cæspitosa, rufo-canescens, ramis brevibus divergentibus subtomentosis.

**Merisma.** *Pers. Comm.* Cl. p. 94. *Syn.* p. 584.

Nostra vix nisi status junior luxurians prioris.  
Cum Th. laciñiata b. non confundenda. Cum pri-  
ori. (v. v.)

4. *T. Küttlingeri*, erecta, inferne crocea, superne  
flava, nitens, ramis approximatis basi filiformi-  
bus, apice dilatatis. *Mart. Erl.* p. 396.

Gæspites format fere pollicares, oblongos, r-  
unc. altos. Textura subfibrosa. Stipites basi te-  
nues, superne dilatati, compressiusculi, inæquales,  
fibrillis e basi adscendentibus sæpe connexi. For-  
san potius Anthinæ species. *In terra nuda Sept.*

\*\* *Decumbentia, subcrustacea.*

5. *T. cristata*, subdecumbens, incrustans, tubercu-  
losa, pallida, ramis planis dilatatis fimbriato-  
cristatis.

*Mich. gen. t. 66. f. 5. Elv. spec. 12. Gled. p. 52. Hall.  
helv. 2202. Clav. laciñiata. Bull. Ch. p. 208. t.  
415. f. 1. Sowerb. t. 158. Dec. fr. 2. p. 102. Me-  
risma cristatum. Pers. Comm. p. 96. Syn. p. 583.  
Swartz l. c. p. 83. (non Nees syst. f. 149.)*

Primo effusa, crustæformis, cum corporibus vi-  
cinis concrescens, ramos valde differentes, nunc te-  
retes subglabros obtusos, nunc planos fimbriatos  
protrudens. Substantia mollis, dein firmior subfu-  
scens. Odor & sapor mucidus *Ad terram in*  
*fagetis & pinetis locis subhumidis. Aug.-Oct. (v. s.)*

B. *T. spiculosa*, decumbens, fusco-purpurea pru-  
nata, ramis linearibus lăvibus villosis acuminatis  
albis. (*A. S. p. 284.*)

Forsan a priori distinguenda. Valde gregaria,  
confluens, fasciculata, carnosa, mollis, tenax, ramis  
divergentibus, in subulos 4-5 divisus, l. apicibus at-  
tenuatis;  $\frac{3}{4}$  - 1  $\frac{1}{2}$  uncialis. Junior hyssacea, alba,  
in classe *Hyphomycetum* certe militat! *In pinetis in*  
*rivulis exsiccatis &c. passim Aut. (v. v.)*

6. *T. penicillata*, albida, subculo effuso tenui, ra-  
mis parcis obconicis incisis,

*Merisma. Pers. Comm. p. 96. Syn. p. 583. t. 3. f. 16.*

Species ignobilis, priori affinis. Subiculum coriaceo-membranaceum, glabriuscum, irregulare, albido-pallidum, cui passim incident clavulae ascendentes, obtuse, penicillatae, vix unciales. Asci desunt. *Ad terram in fagetis, rarissime. Aut. (v. v.)*

7. *T. stabularis*, crustacea, junior byssina alba, dein vinoso-fusca tuberculosa e ramis brevibus obtusis integris.

Odor fortis, acidus. Junior crista latissime effusa, fibrosa, extus byssum album referens. Adulta tota carnosa, glabra, ramos crassos, neutiquam laciati, connascentes protrudens. Abit cum sequentibus ad Resupinatos. *In stabulis bovinis ad terram & asseres fino tectos, Martio reperi. (v. v.)*

8. *T. fastidiosa*, effusa, incrustans, candida, e ramis laminosis variis constans.

*Hall. helv. n. 251. Merism. Pers. Comm. p. 97. Syn. p. 582.*

Odor fortis, fastidiosus. Cæspites primo absque distincta forma, in circulum pedalem usque inter se & cum corporibus vicini confluentes; substantia dein laminosa evadit & "ad latera hymenium manifestum subrufescens, hinc inde papillosum." *In fagetis umbrosis. raro. Aut. (v. v.)*

9. *T. mollissima*, subeffusa, carnosa, laciata, superne subtomentosa albida, subtus obscure fusca. *Pers. syn. p. 572.*

Vix i unc. longa, colore subtus purpurascens-fusco. Ad tactum mollis. Fersan Phylacteria. *Graminibus ramulisque ad crescere ad terram. Aut.*

1. *Cl. deformis*. *Lam. Enc. II. p. 37.*

2. *Merisma serratum*. *Pers. syn. p. 583. Comm. t. 4. f. 4.* cæspitosum, viscosum, fuligineo-album, ramis latiusculis serratis, ramulis obtusis. — An petius Clavaria? — *Icon Fl. Dan. t. 1302.* propriam exhibere vietur speciem.

3. *St. damæcorne*. Link, l. c. hadium, ramis deplanatis, undique ascis emersis obsitis.

Synonyma Micheli (t. 88. f. 1, 3) a Persoonio ad Th. flabellarem & palmatam citata nimis recedunt. Species subterraneas Scopoli Hallerique sciens omisi.

Trib. IV. APUS.

*Stereum*, Hill. - *Pers.* Th. Apus. Nees syst. p. 237!

CHAR. Pileus dimidiatus, sessilis, latere affixus, l. effuso-reflexus, horizontalis, planus, marginatus. Substantia coriacea sicca, contextu floccoso l. intus grumoso. Asci tenues. *Lignatiles*.

† Hymenium (sub lente) velutinum. STEREUM.

1. *T. frondescens*, incrustans, imbricata, mollior, azona, rugosa, glabriuscula, fusca.

Substantia ad Pleurop. accedit, minus rigida, flexilis, contextu fibroso. Forma maxime varia, inæqualis, subeffusa, margine lacera, sed neutiquam fimbriata; facile vero dignoscitur crescendi modo, cæspitibus nempe effusis, muscos, ramulos aliaque corpora ambientibus. Papillæ obsoletæ. In pinetis densis supra *Hypnum proliferum*, raro; at simul in magna copia. Aut. pluv. (v. v.)

2. *T. rubiginosa*, imbricata, rigida, subfasciata, rubiginoso-spadicea, subtus papillosa velutina.

*Hall. helv.* 2263 (ex Schrad.) Th. fragilis. *Ehrh. Cr.* n. 238! *Auricul. ferruginea*. *Bull. Ch.* p. 281. t. 378. *Dec. fr.* 2. p. 104. *Sowerb.* t. 26. Th. rubiginosa. *Schrad. spic.* p. 185! *Pers. syn.* p. 567. *Swartz l. c.* p. 76! *Fl. Dan.* t. 1619. f. 2.!

Substantia fere lignosa, admodum rigida. Pilei concrescentes, plano-concreti, juniores velutini, margine pallidiori; dein glabrescentes inæquales, fusco-nigricentes. Hymenium velutinum. Variat tota resupinata. Ad trunços vetustos quercinos, fagi-neos frequens. Persistens. (v. v.)

Dubia, quæ de hac specie movet Illustr. Nees syst. p. 237 non omnino selvere valeo, — Th. rubiginosa Ejusd.

f. 252 subtus glabra dicitur indeque ad sq. sectionem pertinet.

3. *T. tabacina*, effuso-reflexa, tenuis, sericea, ferruginea, marginata, subtus pubescens.

*Auricul. nicotiana*. Bolt. t. 174. *A. tabacina*. Sowerb. t. 25. *Thel. variegata* Schrad. spic. p. 185. *T. ferr. Pers. syn.* p. 569. *Fries Obs. 2. p. 274.*

Elegans species, ad ramulos longissime effusa, utrinque libera, non rigida; ob novas accretiones subzonata & margine pallidior. Hymenium nudo oculo pruinatum apparet, colore variat. Bene monentibus A. S. p. 273 nomen Sowerb. restitui. *Ad ramulos varios, praecipue Coryli; saepe cum Ag. ramalii. Aest. aut. (v. v.)*

4. *T. crispa*, effuso-reflexa, pileo undulato zonis criso opaco spadiceo, subtus pubescente subcincereo. *Pers. syn. p. 568.*

b. *Th. striata*. Schrad. spic. p. 186.

"Pulchra species. Pileus 2-3 lobis imbricatis, repandus, rugosus, villo denso albicante subtomentosus. Hymenium cinereo-pallidum, subvillosum laeviusculum." *Ad truncos Pini, at raro. Aut. vere. (v. s.)*

4. b. *T. chartacea*, "cæspitosa chartaceo-membranacea glabra, subtus farinosa, lobis rotundatis subimbricatis zonatis iucanis marginem versus subtusque pallide ochraceis." *Ad arborum truncos. Persistens. Mey. Ess. p. 305.*

†† Hymenium glaberrimum. *Theleph. propria.*

5. *T. atrata*, sessilis, rigida, laevis, fasciata, subfuscata, subtus nigra.

*Swartz Fl. Ind. Occ. III. p. 1933.*

Coriacea, tenuis, pollicaris, versus marginem integrum undulatum pallidior, fasciis aliquot angustis nigris. Hymenium oculo armato scabriuscum, concentricè rimosum. *Ad truncos Jamaicæ.*

6. *T. glabrata*, suborbicularis plana sessilis zonata cinereo-pallida, utrinque lœvis. *Spreng in Vet. Ac. Handl.* 1820. p. 51.

Duos fere pollices lata, undique glabra, membranacea, zonis cinereis notata. *Muscis innascitur Guadelupæ. Perrin.*

7. *T. versicolor*, effuso-reflexa, rigida, zonata, subtomentosa, subfuscata, subtus glaberrima albida. *Swartz l. c.*

Subimbricata, basi subeffusa. aurito-reflexa, semirotunda, planiuscula, membranacea, fasciis concentricis numerosis approximatis angustissimis, ferrugineo l. fusco-violaceis; hirsutie brevi adpersa. Margo subundulatus, raro incisus. *Ad truncos Jamaicæ. (v. s.)*

8. *T. bicolor*, imbricata, mollior, tenuis, subtomentosa, spadicea, subtus glabra alba.

*Th. fusca. Schrad. spie. p. 184. T. bicolor. Pers. l. e.*

Substantia membranacea, tenuis, non rigida. Superficies superna obsolete zonata, primo tomentosa, dein glabrescens, non lœvis. Hymenium lœve & glabrum. *Ad truncos Pineos, rario. Aut. (v. v.)*

9. *T. spadicea*, imbricata, rigida, zonata, subtomentosa, fusca, subtus glabra fusco-pallens. *Pers. syn. p. 568.*

"Pileus 1 unc. latus, crassiusculus, subolivascens, opacus, tomento tenui obtectus. Hymenium aut lœve, aut tuberculis sparsis obtectum." *In Misnia. Ludwig.*

10. *T. conchata*, effuso-reflexa, tenuis, supra glabra sordide lutescens, subtus glabra fusca.

Subimbricata, coriacea, omnium minima, 2-3 lin. lata; superne obsolete zonata (sub lente etiam pili adpressi observantur) Hymenium lœve. *Ad cortices abiegnos rario. Aut. (v. v.)*

11. *T hepatica*, subimbricata, azona, utriq[ue] lævis glauca rufum obscure rufescens.

Auric. lævis. Sowerb. t. 588. f. 2.

Colore & habitu proprio omnino gaudet. Ad trunco in Anglia lecta. (v. ic.)

12. *T rugosa*, effuso-reflexa, rigida, flexuosa, glabrescens, fusca, subtus cinereo-pallida.

Stereum. Pers. Disp. p. 50. Thel. Syn. p. 569. A. S. p. 274. Swartz in V. A. H. 1811. p. 77.

b. basi effusa subtusque lutescens. St. coryli. Pers. l. e.

Basis plerumque late effusa (etiam incarnato-pallida visa), saepius rimosa!, margine reflexo, tenui, subspadiceo, duro, primo fusco-tomentoso, mox glabro subzonato nigrescente. Papillæ raræ. Ad ligna Quercus, Coryli &c. Persistens. (v. v.)

13. *T hirsuta*, effuso-reflexa, coriacea, strigoso-hirsuta, subtus glabra lavis lutescens.

Raji syn. p. 21. n. I. Mich. t. 66. f. 2. — Hall helva 2265. Helv. acaulis. Huds. H. villosa. Relh. H. versicolor. Liljebl. Sv. Fl. 2. p. 454. Auricul. reflexa. Bull. Ch. 274. Sowerb. t. 27. Bol. auriform. Bolt. t. 82. fig. sin. Th. papyrac. Fl. Dan. t. 199. Th. hirsuta, Willd. Ber. p. 397. Pers. Obs. 2. p. 90. Syn. p. 570. Swartz l. e. p. 78. Auric. aurantiac. Schum. p. 398.

Species vulgarissima, firma, sed non rigida, planiuscula, superne passim zonata, tomento lutescente, pallido l. griseo obdueta. Junior resupinata, dein reflexa. Formæ infinitæ b. alnea, fasciata argillacea, subtus cinerea. c. faginea, zonata, subtus demum spadicea, margine luteo. d. dryina, pileo villoso azono subferrugineo, subtus testaceo-gilvo, margine albo. (Reliquis memorabilior!) e. ramealis, minor, pendula, hymenio zonato (etiam in a. obvium). Ad arborum frondosarum trunco, ubique Persistens. (v. v.)

14. *T. ochroleuca*, effuso-reflexa, submembranacea, striata, pubescens, subtus glabra ochracea.

*Auricul.* papyrin. *Bull.* t. 402. *Sowerb.* t. 349. *A. pallida.* *Schum.* l. c. *Th. ochrol.* *Fries Obs.* 2. p. 276.

*b. Th. sericea.* *Schrad.* l. c. *Ster.* nitidum. *Pers.*

Maxime cognata priori, sed tenuior, tomento brevi, (in b., quæ minor, adpresso sericeo), colore albo l. pallido nitido. Plerumque zonata, zonis impressis paulo obscurioribus. *Ad truncos apprime pineos, sed & Betulæ &c.* Aut. (v. v.)

15. *T. purpurea*, imbricata, coriaceo-mollis, zonata, strigoso-hirsuta, subtus glabra purpurea.

*Mich. gen.* t. 66. f. 4. *Hall. helv.* n. 2264. *Fl. Dan.* t. 534. f. 4. *Auric.* reflexa. *Bull.* t. 483. f. 1-5. *A. persistens.* *Sowerb.* t. 383. f. 1. *Th. purpurea.* *Schum.* *Sæll.* 2. p. 398! (& *fagin.* *Ejusd.*) *Swartz.* l. c. p. 79! *Holl.* & *Schmidt.* exs. n. 46! *T. vor-ticosa.* *Fries Obs.* 2. p. 275.

Pilei vix effusi, convexo-undulati, zonis concentricis depressis variegati, pallidi (albidi, lutescentes &c.) Substantia flexilis, sed non tremello-sa, qualem describit Persou. Hymenium etiam fu-scescens l. expallens, læviuscum. *Ad truncos arborum frondosarum, ubique.* Aut. (v. v.)

*B. betulina*, effuso-reflexa, minor, azona, villosa, alba, subtus fuscopurpurea. *In Betula.* (v. v.)

*y. pinea*, minor, tomentosa, pallida, zonata l. azona, subtus dilute purpurea.

*Elv. lilacina.* *Batsch. Cont.* 1. f. 131. *Stereum.* *Pers.* *Obs.* 2. p. 91. *Thel. Syn.* p. 592. *Fl. Dan.* t. 1619. f. 1.

*d. epiphega*, zonata, exigua, fusca, subtus pallide lilacina. *Ad Fagos.* (v. v.)

16. *T. sanguinolenta*, dimidiata effusaque, ad tactum cruentata, tenuis, hirsuta, pallida, subtus glabra griseo-fusca; *A. S.* p. 274.

Imbricata, coriaceo-mollis, marginibus subreflexis, undulatis, subzonatis, l. tota effusa, 2-3 un-

cialis. Hymenium tantillum pruinatum, sordidum; papillis raris. Ad trunco pineos passim. Persistens, (v. v.)

1. T. pallida. Swartz Ind. occ. l. c. An bicolor?
2. T. lacera. Spreng. l. c. p. 51. suberecta, serpens, lobulato-lacera, ferruginea, subtomentosa. Guadelupe.

Auricul. crispata Schum. est Canth. crispus, Thel. tremellina. Swartz vide sub Auricul.

### Trib. V. RESUPINATUS.

Cortic. Pers. disp. p. 50. Resupin. Nees syst. p. 238:

CHAR. Pileus resupinatus, obliteratus, plerumque effusus, adnatus, immarginatus, paucis ambitu determinato libero submarginatus. Lignatiles.

Obs. Simplices, e quacumque etate desumptae, descriptiones nil sane ad harum plantarum cognitionem conferunt. Affinia separantur, diversa confunduntur. Observandæ potius tota evolutionis historia, metamorphoses & mores, multis sane peculiares! Quantum enim non differunt ex. gr. subcorticalis *Thel. comedens* a superficialibus *T. polygonia*, *fallaci*, &c., quæ Sphæriis originem suam debent! vel Tubicularioidea *T. quercina* a *Himantia laevi* e. s. p.

A. R. SPURII. Pileus determinatus, in ambitu liber, submarginatus. Substantia rigida, contextu floccoso. Numquam byssini, 4-6 Sterea.

1. *T. evolvens*, junior subrotunda clausa, dein evoluta cupulæformis, extus tomentosa pallida, disco glabro obscuriore.

Eries Obs. Myc. I. p. 254, t. 4, f. 5; — Fl. Dan. 2, 340. f. 1.

Junior sistit tuberculum erumpens, convexum, clausum, undique villosum, album (subinde guttas aquæas exsudans), passim confluens; mox evolutum,

*disco sèpius lævi, rarius papillis vagis dentiformibus. Ad cortices Betulæ. Aut. (v. s.)*

2. *T. salicina*, resupinata, subtus libera villosa alba, supra glaberrima sanguineo-rubra.

Elegans species, coriacea, firma, tenuis, centro affixa, 5-6 lin. lata. Hymenium læviuscum, papillosumve. Occurrit forma minor, omnino pezizoidea, vix 2 lin. lata, in Lapponia a Wahlenbergio reperta. *Ad Salicum truncos. Aut. hieme. (v. v.)*

3. *T. quercina*, resupinata, subtus libera nigrescens, margine involuta, supra glabra carnea.

*Lichen carneus. Willd. Ber. p. 358. Auricul. corticatis. Bull. Ch. p. 285. t. 436. f. 1. Thel. Dee. fr. 2. p. 106. Th. carnea. Humb. frib. n. 207. Schrad. spic. germ. p. 187. Th. quercina. Pers. syn. p. 573. Swartz in V. A. H. 1811. p. 80.*

Junior, Tubiculariæ instar, sèpius e subjacente Sphæria circinata, per epidermidem ramulorum erumpit; mox dilatata, coriacea, adpressa; dein subtus libera, rugosa, umbrino-nigra, nunc pubescens, nunc glabra; longitudinaliter effusa. Hymenium subpapillosum, etiam rugosum & rimosum, expallens. *Ad ramos Quercus, Aceris, Betulæ, Tiliæ & Fagi. Vere — Aut. (v. v.)*

- \*\* 4. *T. avellana*, resupinata, dura, ferrugineo-palens, ad tactum cruentata, margine obtuso liberò, hymenio subpruinoso.

A Th. sanguinolenta distineta. Substantia sat crassa, lignosa, dura. Forma junioris subrotunda, peltata, dein irregularis, margine excepto rugoso tota adnata. Papillæ nullæ. Color sordidus. *Ad truncos Coryli, persistens. (v. v.)*

5. *T. abietina*, resupinata, dura, inferne subtomentosa umbrina, superne fusco-purpurascens.

*Pers. syn. p. 573. Ster. Fries Obs. 1, p. 272.*

Substantia coriacea-rigida, sicca. Forma subrotunda peltata, sed & longitudinater confluens, 2-4 unc. longa, subtus margineque piano (nec involuto) libera. Hymenium læve, subvelutinum. *Ad truncos Abietis. Persistens. (v. v.)*

6. *T. Pini*, resupinata, dura, subtus glabra pallida, superne purpureo-fuscescens papillosa.

*Th. abietina. B. pinea. A. S. p. 276. Th. Pini. Schleich.  
— Fries Obs. 1. p. 154. Dec. fr. 6. p. 31.*

Substantia & crescendi modus, ut in priori. Hymenium "carneo-purpurascens, dein fuscescens." Papillæ majuscule, irregulares. Nostrum specimen subtenue, frequenter rimosum, ferrugineo-fuscum. *Ad ligna Pini silvestris. Persistens. (v. s.)*

7. *T. disciformis*, resupinata, subrotunda, subtus libera pubescens sordida, supra papillosa alba. *Dec. fr. 6. p. 31.*

Tenuis, coriacea, sicca, alba, centro adnata, in ambitu libera & elevata, discos irregulares rotundatos (6-8 lin. diam.) formans. Superficies sterilis pube molli curta adpressa, fructifera glabra, papillis hinc inde prominulis. *Ad Quercus Galliae.*

B. R. GENUINI. Effusi, adnati, glabri, immarginati, ambitu subnudo. Substantia firma, contextu floccoso. Ascii (& saepius papillæ) distincti. Non byssini & vix ulla Sterea.

- \* 8. *T. mollis*, effusa, carnosso-membranacea, rubescenti-pallida, subtus tomentosa, papillis prominulis majusculis.

Singularis sane in hac sectione pagina inferiori tomentosa, a ligno facile solvenda & substantia molli persistente, tamen non byssina & ambitus omnino glaber. Forma subrotunda, inaequalis. Color pallescens, incarnatus, ut plurimum rubromaculatus. *Ad truncos pinacos, raro. Aut. (v. v.)*

9. *T. incarnata*, effusa, coriacea, glabra, incarnata, ambitu subbyssino, papillis raris.

*Pers. syn. p. 573. A. S. p. 276. Swartz l. c. p. 80.*

Matrici arete adnata, crassiuscula, 2 unc. & ultra longa, firma, leviuscula, utrinque glabra, ambitu vero byssino abnormis — b. tenuis, sicca, sepe interrupta, papillis spuriis. *Ad ligna & cortices. b. Populi. Autumno. (v. v.)*

10. *T. cruenta*, effusa, coriaceo-membranacea, utrinque glabra, sanguinea, papillis tuberculosis confertis.

*Pers. syn. p. 575. A. S. p. 278. B. ut videtur.*

Adnata, 2-6 unc., glaberrima, persistens, sublente pruinosa; nostra saepius carneae. Papillæ majusculæ, sepe obscuriores in centro conglomeratæ. Var. a) *A. S. l. c. potius Phlebia radiata*, quam *Th. salicina*, cum glabra sanguinea. *Ad trunco Fagi Eccl. Aut. (v. v.)*

11. *T. polygonia*, subeffusa, adnata, glabra, incarnata, tuberculis magnis polygoniis.

*T. colliculosa. Hoffm. germ. 2. t. 6. T. polyg. Pers. syn. p. 574. A. S. p. 276. Dec. fr. 6. p. 32.*

Sicca, glaberrima, matrici omnino innata, papillis spuriis confertis tuberculosis. Color incarnatus, opacus, deleta adspersa subtili pruina carneo-ruber. — Oritur a *Sphæria nivea* & affinibus, e quarum tuberculis primo erumpit, tum brevissima determinata glaberrima, mox vero confluens late effusa. E pustulis Sphærularum formantur tubercula. *Ad ramulos varios arborum frondosarum, præcipue Populi; etiam Amer. boreal. Persistens. (v. v.)*

Obs. *T. Ribesia* (subrotunda, in ambitu radiata, ludo-incarnata, tuberculo centrali magno) media inter haec & *T. maculæformem*. — Plures affines sciens admissi.

\*\* colore luteo, flavo, pallescente;

12. *T. Hydnoides*, erumpens, glabra, subaurantia-  
ca, papillis sœpe elongatis inæqualibus.

*Pers. Obs.* 1. p. 15. *Syn.* p. 576. *A. S.* p. 279. *Dec.*  
*fr. 6.* p. 34.

More Hydn. aterimi aliorumque sub epider-  
mide, quam vero mox solvit & exuit, crescere in-  
cipit, ad longitudinem 4 unc. & ultra extensa, ma-  
trici innata. Color etiam in carneum tendit. Pa-  
pillæ aliæ subrotundæ, aliæ valde elongatæ diffor-  
mes. *Ad ramos Fagi, Carpini.* *Persistens.* (v. v.)

13. *T. aurantia*, oblonga, glabra, crassiuscula, au-  
rantia, papillis raris.

*Cortic. Pers. disp.* p. 21. *Th. Syn.* p. 576. *A. S.* p. 279.

Minor, uncialis & ultra, 3-4 lin. lata, erum-  
pens, sicca pruina "subcarnea" obducta. Papillæ  
paucæ. *Ad Rosæ caninæ ramos.* *Persistens.* (v. v.)

14. *T. frustulata*, effusa, durissima, crassa, glabra,  
pallida, tessulato-rimosa.

*Pers. syn.* p. 577. *Swartz l. c.* p. 81. *Dec. fr. 6.* p. 51.  
b. cinnamomea, pulverulenta. *Fries Obs.* 1. p. 153.

Colore & substantia lignea facile dignoscitur.  
Late effusa, sed in areolis crassis angulatis diffra-  
cta, subtus nigricans. Hymenium absque papillis.  
*Ad ligna durissima Quercus;* etiam *Americæ.* Peren-  
nis. (v. v.)

15. *T. odorata*, effusa, suberosa, glabra, lœvis, con-  
tingua, confluens, pallida. *Fries l. c.*

Priori subaffinis, odore aniseo facile distincta.  
Color variat albidas, in alutaceum l. rufescens  
vergens, primo 1-2 unc., dein confluens. *Ad trun-  
cum abiegnum quondam magna habui copia.* *Persistens.*  
(v. v.)

16. *T. serialis*, elongata, carnosò-membranacea, gla-  
berrima, subtestacea, albido-pruinosa, papillis  
sparsis difformibus.

In series angustas elongatas, pedales usque, crescere solet. Substantia firma,  $\frac{1}{2}$  lin. crassa, arcte adnata. Utrinque glaberrima, colore pallescente, detrita gilvo l. testacec. Papillæ accidentales. *Ad trunco prostratos Pini. Aut. (v. v.)*

17. *T. concentrica*, effusa, crassiuscula, alutacea, ambitu subalbescente, papillæ majusculis subhemisphæricis concentricis. *A. S. p. 279.*

Papillarum situs prorsus peculiaris; orbes nimirum adsunt varie contigui aut sese invicem truncantes, papillis toti obsiti. Vigens humida, molles, laevis, alutacea, senescens dura rimosissima rufescens, 3-4 unc. lata, spithamam longa. *Ad sepes pineas putres dejectas. Aut. vere.*

18. *T. granulosa*, effusa, tenuis, glabra, papillis minutis confertis prominulis granulosa.

Cortic. alutac. *Pers. Obs. 1. p. 16 Th. granulosa.*  
*Syn. p. 576. (a. & b. albicans.) A. S. p. 279. cum var.*

Substantia tenuis, humida submollis, contigua. Color pallidus "albicans," alutaceus, ochraceus, incarnatus, lividus, sub lente sape pruinosus. Forma "elongata" l. late effusa. Facile dignoscitur superficie granulosa. *Ad trunco varios. Jove pluvio. (v. v.)*

19. *T. ochracea*, late effusa, tenuis, glabra, subochracea, papillis sparsis spuriis.

*Fries Obs. 1. p. 151. Th. fallax. B. A. S. p. 277.*

Longe latissimeque effusa, pedalis & ultra, ligno omnino innata, in ambitu vero passim byssina. Papillæ e granulis ligni oriri videntur. Substantia fere Th. comedentis. *Ad trunco decorticos valde putridos Pini & Abietis, frequens. Jove pluvio. (v. v.)*

20. *T. alnea*, late effusa, utrinque glabra, pallenscenti-gilva, papillis sparsis subrotundis.

Membrana crassiuscula, firma, adhærens, sed separabilis, indeterminata, latissima, supra pallens pruinosa, detrita obscurior. Papillæ parum prominent; adsunt quoque aliæ spuriæ. *Ad truncos putridos alneos.* Legi Aut. (v. v.)

21. *T. comedens*, effusa, subcorticalis, erumpens, tenuis, glabra, lutescenti-carnea, lævis, demum rimosa.

*Nees syst. p. 239. f. 255. T. carnosa. Ehrenb. Ber. p. 30.*

Primo subcorticalis, mox cortice soluto marginata, dein longitudinaliter confluens, spithamea usque. Substantia subcarnosa, tenuis. Junior in ambitu floccosa, ramis, quos ambit, omnino innata; humida subviscosa, sicca expallens rimosa. Papillæ nullæ, sed, "asci breves moniliformes." *Ad ramos exsiccatos frequens, præcipue Coryli. Persistens.* (v. v.)

22. *T. nuda*, effusa, innata, carnosa, glabra, carneæ expallens, lævis, dein rimosa.

*Ad ramos decorticatos nascitur, indeque non erumpens; floccoso-carnosa, indeterminata, exsiccata irregulariter rimosa & scrobiculata. Color plerumque lutescenti-carneus. Asci cylindrici. — Accedunt nonnullæ formæ similes tenuiores. Ad ramos exsiccatos v. gr. Padi. Persistens.* (v. v.)

23. *T. confluens*, subrotunda, confluens, submembranacea, contigua, lævis, glaberrima.

*T. lucida. Achar. T. confluens. Fries Obs. I. p. 152.*

Præsens species superficialis, supra cortices adnata, junior determinata, uncialis; dein confluens, tenuis, plane absque verrucis. Occurrit alba, lutea &c. *Ad cortices Betulæ, rarior.* (v. v.)

\*\*\* colore livido, fusco, albido.

24. *T. livida*, effusa, glaberrima, tenuis, subviscosa; livida cœrulescensve, papillis sparsis.

*Cort. Pers. Obs. I. p. 38. Thel. Fr. Obs. 2. p. 276.*

*Arcte adnata* l. potius innata, 4-6 unc. usque lata, sicca contigua; substantia & ascis fere Th. comedentis, sed adhuc tenuiores. Color variat quoque incarnatus &c. Papillæ forsitan spuriæ. *Præamat ligna decorticata Pini. Jovē pluvio.* (v. v.)

25. *T. viscosa*, effusa, subgelatinosa, glaberrima, viscosa, cæsia, papillis sparsis.

*Cort. Pers. Obs.* 2. p. 18. *Thel. Syn.* p. 580. *Schum.* p. 397.

Priori valde affinis. Color varius, albido-cinerous, hyalinus & sordide fuscescens. Papillæ vix essentiales, majusculæ. Ambitus leviter floccosus quoque observatur. *Ad truncos. Aut.* (v. v.)

26. *T. puteana*, effusa, carnosο-gelatinosa, glabra, olivaceo-virescens, ambitu subhyssino tenui candido, papillis majusculis. *Schum.* l. c.

Suborbicularis, 5 unc. lata, 1-2 lin. crassa, intus dilute fusco-ochracea; extus hinc e punctis numerosis elevatis umbrinò-maculata. *Ad asseres in puteo. Oct.* (v. ic.)

An varietas: *Th. fætida*, carnosο-gelatinosa, rugosa nigricante-fusca, albo-pruinosa, zonis dilutioribus, ambitu lato albido, papillis maximis discoideis pruinosis. *Ehrenb. Ber.* p. 30.

27. *T. incrustans*, effusa, subcarnosa, rugosa, tuberculosa, pallida, ambitu subfibroso.

*Hall. helv.* 2253. *Cortic. incrust. Pers. Obs.* 1. p. 39. *Thel. Syn.* p. 577. *A. S.* p. 289. *Fr. Nov. Suec.* I.

Ad uncias 2-3 lata, supra truncos mucidos, l. ad terram supra folia & ramulos putrescentes effusa reperitur, leviter adhærens, mollis, subpapillosa, opaca, in ambitu dilutior. Hæc & sequens ad Phylacterias accedunt. *Post intensas pluvias.* (v. v.)

28. *T. gigantea*, latissima, difformis, sublibera, glabra, lactea, absque papillis.

*Fries Obs.* 1. p. 152, nec obstat *T. lactea*, *Schrud.*

Forsan proprii generis, sequenti tamen sat similis. Membrana subcarnosa, tenax, undulata, flexibilis, contigua, laxè adhærens. (5 unc. & ultra), Hymenii analysis exoptanda, *Supra corticem Pini silvestris. Post pluvias.* (v. v.)

*Th. applanata* Schrad. spic. 188 e descriptione brevissima nihil a *T. hirsuta* resupinata recedit. *Th. ferruginosa* (supra albida, subtus tomentosa ferruginea) & *T. undulata* (supra glabra carnea, subtus undulata purpurea) l. c. vix determinandæ. -- *T. corium* (magna crassa, pallida, superficie obsolete reticulata) Pers. syn. p. 574 forsitan potius *Polysticta* l. *Xylostroma*; *Xyl. giganteum* enim equidem quoque cum Cel. Schraderero glabratum legi, tamen ad *Hyphomycetes* pertinet.

---

Restant Thelephorarum subgenera, secundum recepta scilicet principia, sequentia, ad reliquas Classes abeuntia:

## XII. B. PHYLACTERIA. Pers. Ch. Comm.

CHAR. Sporidia quaterna serie, Coprinorum instar, disposita. *Hymenium* sublæve glabrum. *Terrestres, resupinatae.* (*Thel. caryoph.*)

Obs. Analogia cum Coprinis Phylacterias ascis imperfectioribus, sed sporidiis multiplicatis, *Fungos Uterinos* representare edocet.

1. *T. P. biennis*, membranacea, glabra, basi plicata, albida, dein nigrescens.

*Auricul. phylactaris.* Bull. Ch. t. 436. Thel. Dec. syn. p. 21. Fl. Franc. 2. p. 106.

In toto genere maxima, primo albo-lutescens (antecedenti similis), dein fusca & nigrescens. Sporidia distincte quaternata. *Ad terram Galliæ, biennis.* (v. ic.)

2. *T. P. cæsia*, subcarnosa, orbicularis, læviuscula, cæsio-cinerea.

**Tortic.** Pers. Obs. 1. p. 15. t. 3. f. 6. Thel. Syn. p. 579. Swartz in V. A. H. 1811. p. 81. Nees syst. f. 254.

Substantia subcompacta, mollis. Plerumque uncialis, sed & ad 2-3 unc. irregulariter effusa reperitur, passim papillis spuriis obsita. Sub lente sporidia facile observanda. *Ad terram serotina.* (v. s.)

5. *T. P. crustacea*, subcarnosa, effusa, subtuberculosa, fusco-umbrina. Schum. Sæll. p. 399.

Antecedenti proxima videtur; 1-4 unc. lata. Papillæ minutæ, sparsæ, obscuriores. Caro nigricans. *Ad terram locis umbrosis, aut* (v. ic.)

An & huc *T. sanguinea* P. (effusa, lævis, subtremellosa)? *T. umbrinam* Pers. citat ad Rhizinam prætextam Cl. Ehrenberg.

CONIOPHORAM Dec. examinare magnopere desidero. An Thelephora in Gasteromycos abiens (ob pulvix eepiam) Phylacteriæ affinis?

## XII. C. HIMANTIA. Fries.

Thelephoræ & Himant. (*in statu juniori*) spec. Auct.

CHAR. Effusa, resupinata, junior tota byssina, dein hymenium læve glabrum in centro denu-dans, subitus vero subvelutina & in ambitu byssina manet. Contextus fibrosus, qui ascis formare nequit. Sporidia hymenio innata, parca.

Obs. Est Thelephora in Hyphomycetes abiens. Ob nisum hymenium formandi, qui Hymenomyctum essentia, huc locanda. Evolutionis historia, contextus & fructificationis processus absque ascis cum DIOPOGONE (Hydnis ascis in floccis solutis), POLYSTICTA, POROTHELIO omnino conveniunt. Idem observamus inter clavatos reliquosque ordines. HYPOCHNOS (Theleph. villosas, sporidiis in glomerulis collectis l. floccis inspersis) vero inter Hyphomycetes hymeninos explanatos (Pileatis analogos), eodem modo ac Isariam sub Hyphe hymen. clavatos, locamus.

- I. *T. H. lævis*, effusa, membranacea, lævis, pallida, subtus araneoso-tomentosa alba.

Theleph. papyracea & alutacea. Schrad. spic. p. 186, 187. Cortic. læve. Pers. disp. p. 575. Thel. Pers. syn. p. 575. A. S. p. 277. Th. Pruni. Schum.

Late effusa, s<sup>æ</sup>p<sup>e</sup> spithamea & ultra, mollis, contigua, demum & margine soluta. Color variat carneus, alutaceus, albidos; passim & maculatus. Ad ramos præsertim populneos, pineos; immo s<sup>æ</sup>p<sup>e</sup> domestica cum sequenti. Aut. - vere. (v. v.)

2. *T. H. domestica*, effusa, membranacea, mollis, fuscescens, subtus araneoso-tomentosa violacea.

Himant. dom. Pers. syn. p. 703.

Spithamea & ultra, lævis, contigua; sed præter colorem a priori differt contextu minus compacto. In domesticis humidis, tempestate pluvia. (v.v.)

3. *T. H. fusca*, effusa, subrugosa, mollis, e violaceo-fusca, margine subtusque tomentosa.

Cortic. Pers. Obs. 1. p. 38. Hyp. Fr. Obs. 2. p. 280. Th. vinosa. Pers. syn. p. 578. A. S. p. 281. c. var.

Oppido e tomento contexta, quamquam glebriuscula primo aspectu, ut Hypochnis non parum affinis, 2 unc. lata. Papillæ spuriæ. Ad truncos passim, Aut. Et. (v. v.)

4. *T. H. violascens*, effusa, bombycina, violaceo-alba, subtus araneoso-tomentosa. Fries Obs. 1. p. 211.

Priori multo minor, discus vero glabratus demum omnino contiguus. Affinis Merul. Himantiodi. Ad terram & truncos raro. Aut. (v. v.)

5. *T. H. rosea*, effusa, membranacea, læviuscula, rosea, margine subtusque tomentosa.

Cortic. roseum. Pers. disp. p. 31. Thel. Syn. p. 575. Dec. fr. 6. p. 31. Himant. Fries Obs. 1. p. 211.

Primo radioso-fibrosa, dein membranacea, contigua, disco glabro subpapilloso. Vix ultra 2 unc.

lata. *Margo subalbicans*, *Ad cortices & ligna, frequens*. Aut. (v. v.)

6. *T. H. sulphurea*, effusa, fibrosa, sulphurea, dein disco compacto lœvi, margine fibrilloso.

*Cortic.* Pers. Obs. 1. p. 38. *Himant.* Disp. p. 122. Syn. p. 703. *Theleph.* ib. p. 579. A. S. p. 282, 373! *Dec.* fr. 6. p. 34. *H. ochracea*. Fr. Obs. 1. p. 210.

Huic peculiare est quod sepe in fibris Ozonio similibus) soluta manet; tamen rite explicata evidenter hunc sibi vindicat locum. Discus tum ex-pallens, fere cinerascens. Huc & *Rhizomorpha crocea* Achar. &c. *Ad terram, ligna & cortices, ubique. Perennis.* (v. v.)

7. *T. H. lactea*, effusa, membranacea, tenuis, fibrosa, lactea, margine fibrilloso.

A priori colore & disco tenerrimo, passim rugoso, differt. *H. albida*, Pers. disp. *Rhizom. fibrilosa*, Ach. & *Fibrillaria stellata*, Sowerb. t. 387. f. 1. huc quoque spectant. *Ad ramos & truncos.* Aut. (v. v.)

8. *T. H. Byssoides*, irregulariter effusa, byssina, ochroleuca, dein disco nudo subcompacto pulverulento flavo. Fries Obs. 2.

Pers. syn. p. 577. A. S. p. 280. *Dec.* fr. 6. p. 33.

Omnino byssina, margine albido subtomentosa persistente. An huic affinis *Coniophora*? Optime dignoscitur crescendi modo. *Supra muscos, folia pinæa, ramulos &c., passim post pluvias intensiores.* (v. v.)

Species inquirendæ sub Hypochno. — Præcipue *Thel. cærulea* Schrad. 1. *Auricul. phosphorea* Sowerb. t. 350. *Himantiis affinis.*

## XII. D. LEJOSTROMA.

CHAR. Resupinatum, subeffusum, subcontiguum, glabrum, lœve 1. spurie papillosum, Con-

*textus subgrumosus, vix cohærens l. fibrosus. Ascii nulli. Arcte adnatum, non carnosum l. fibrosum.*

Obs. Theléph. in Epiphytas abiens; alii crescendi modo cum Conisporio, alii cum Stilbospora v. gr. Th. fallax convenient. Paucas modo attuli species. — Occurrit, etiam ut videtur, vera Telephora, sed tam depauperata, ut ascos formare nequit — tenuis, innata, glaberrima, lœvis, sicca vero rimosissima, quovis colore gaudens (*Th. calcea* Pers. ad part., *Th. hyalina*, Schrad. *T. nigrescens* Schrad. *T. corrugata* Fr. &c), ab his substantia modo carnosο-membranacea diversa. — Analogi Lejostromati sunt *Mer. fugax*, *Polyporus farinellus*, *Hydnium farinaceum* &c.

1. *T. L. acerina*, tenuis, interrupta, spuriæ papillosa, sicca, lactea subctesiave.

Cortic. Pers. Obs. 1. p. 57. Thel. Syn. p. 581.

Crustæ Lichenosæ instar supra cortices effusa, brevis, innata, superficie inæquabili, parum rimosæ. Junior contigua, subpruinosa apparet. — Forte & huc b) *Abietis*, rimosissima, candida. c) *Quercus*, contigua, opaca, pallens. d) *Ulmi*, albida, opaca, papillosa. Supra cortices. a) *Aceris campestris*, ubique. (v. v.)

Obs. Occurrit quidem subpulverulenta, tamen diversam, Aleurismati affinem, censeo *Th. sambuci*.

2. *T. L. cinerea*, late effusa, tenuis, siecca, lœvis, glabra, cinerea.

Cortic. Pers. disp. p. 31. Thel. Syn. p. 579. A. S. p. 282. Dec. fr. 6. p. 32. Auric. Sowerb. t. 288.

Nunc uncialis, nunc spithamea usque, exsiccata rimosæ, passim & papillis spuriis irregularibus inæquabilis. Ad ramos & truncoſ *Sambuci*, *Aesculi* &c. Vere, Aut. (v. v.)

3. *T. interrupta*, cinereo-fusca, suborbicularis, interrupte effusa, papillis sparsis. l. c.

E papillis. 1 lin. latis, sensim ad  $\frac{1}{2}$  unc. & ultra accrescit; demum nigrescit. Inde sequenti proxima. *Ad ramos Fraxini excels.*

3. *T. L. fallax*, effusa, glabra, ex alutaceo-incarna-ta, papiilis spuriis magnis. *Pers.* p. 574.

Fallacissima Th. genuinæ æmula, tamén & origine & substantia diversa. Circa ostiola Sphæria-rum, sub cortice nidulantium, primum formantur papillæ crustaceæ (quales & in *Stilbosporis* videre licet), quæ mox confluunt in crustam latiusculam. Color plerumque ut supra, sed & pallide testaceus in *Acere*, purpurascens in *Populo* e. s. p. Papillæ quoque variæ, in *Fago* supra Sph. quaternatam tu-berculosæ, in *Acere* majores, subrotundæ, ostiolo instructæ. *Ad ramos arborum.* (v. v.)

4. *T. L. maculæformis*, tenuissima, subrotunda, cæ-sio-rosea, papilla centrali solitaria spuria, dein confluens. *Fries Obs.* I. p. 150.

E Sphæria l. Bostrychia simplici sub ramulo-rum epidermide latente profluit materia, dein spon-te vegetante, tota 1 lin. dein vero 4 lin. lata. Sub lente simplici e pruina subvelutina quasi compo-sita. An gelatina Nemasporæ ita efflorescere potest? *Ad ramulos, raro.* (v. v.)

Huc commemoranda alia species sub epidermide la-tens, eamquæ solvens, demum vero in Theleph., suo lo-co describendam, abiens.

5. *T. L. amphibolia*, tenuissima, glabriuscula, lu-rido-cinnamomea, papillis spuriis. *Fries l. c.*

Sub lente simplici subvelutina, Sterei (l. Fusi-dij) nec Hypochni instar appetet, in ambitu pul-verulento-pruinosa pallidior. Sub auctis vitris e pulvere grumoso arctissime aggregata. *In Polypora fomentario, passim.* (v. v.)

6. *T. L. sterilis*, effusa, macularis, glabra, lavis-sicca, rosea;

Tenerrima, innata, trita autem persistens, 1-3  
unc. lata, non membranacea. Alia similis violaceo-  
fusca. Ad cortices dejectos Abietis. (v. v.)

---

### REVISIO HUJUS ORDINIS:

I. Quæ de prominentia hymenii in hac classe  
& receptaculi in hoc ordine statui, exponenda sunt.

Cum ultimus finis hujus Classis in *hymenio efformando* consistat, facile patet hoc quoque *in praesenti ordine*, qui *Hymenomyetes* autonomos (*Hymenio-hymenomycetes*) continet, si dispositio fida, *perfectissimum fore*. Hymenium *perfectissimum* procul dubio id, quod *a receptaculo discretum* (quia ubique in regnis naturæ *perfectiora* sunt organismæ partibus *discretis*, quam *concretis*) & porro, *quod laminam fructificantem maxime multiplicat*. Hoc exemplo illustrabo. Quando hymenium abit in lamellas utrinque ascigeras facile patet superficiem fructificantem multo magis esse multiplicatam, quam inter læves Clavarias. — Reliquarum Classum ordo, *Hymeninus* dictus, hymenio? semper lævi gaudet. Hujus classis ordines omnes in hymenii superficiem effigurandam tendunt, sed leviter modo corrugatum in *Hymenomyc. epiphytis* (SCLEROTIACEIS) *perfectissimis*; gyrosum tantum apud summos *Hymucedineos* (TREMELLINOS). *Hym. uterini*, (CUPULATI & mitrati), præsertim *hi* reversi, hymenium ut infima Pileatorum genera effiguratum quidem habent, nempe gyrosum, plicato-venosum & cellulosum; numquam vero vere discretum lamellosum. Inter *Clavatos* vero, qui modo Pileatorum prototypi, tantum Sparassis hymenium passim effiguratum habet.

Receptaculum dicimus *perfectissimum*, quod partibus plurimis discretis & regularitate summa instructum. Pileati hoc respectu reliquos hujus, ut & reliquarum Classum, ordines facile antecel-

Iunct. SCLEROTIACEI & TREMELLINI summi in formam explanatam quidem tendunt; sed immarginati, partibus nullis discretis — Etiam hoc respectu UTERINI mitrati maximam cum pileatis habent analogiam (neutquam affinitatem), sed horum mitra est tantum cupula reversa, mere hymenium constituens, absque partibus ullis discretis & forma verticillari.

II. In dispositione & formatione generum hujus ordinis receptam, quantum fieri potuit, seriem & normam servare volui. Reformationes magis essentiales, primo Mycologorum conjuncto examini subjiciendas, huc *ad interim* proponam. Series recepta quidem non omni caret significacione, quamvis passim abrupta, qualis evadit in libro, ubi simplex erit, cum in natura multiplex. — Veram vero dispositionis normam \*) ipsa Systematis constructio manifestat. Omnis sectionalis (Classe, Ordo &c.) ab ipsis elementis adscendit & primo antecedentes inferiores formas repetit, eodem modo ac perfectior organismus a primis aetatis statibus integrum seriem inferiorum *eiusdem stirpis* percurrit. Infimi igitur sunt Pileati, qui ad *Epiphytos* proxime accedunt; sequuntur mox, qui in *Mucedineos* abeunt; dein *Xylariis* proximi, tandem Hymenomycetes perfectissimi. — Sequentes inde oriuntur Hymenomycetum pileatorum sectiones:

1. Epiphyti (*Coniomycetoidei.*) 2. Mucedines (*Hypomyctoidei.*) 3. Xylarii (*Gasteromycoidi.*) 4. Geogenii (*Genuini.*)

Hoc *a priori* didicimus; ut & sequentia, quæ in natura omnia amice conspirant. Quo magis a genuinis l. geogeniis semoti, eo imperfectiores, eo pauciores formæ. Sic

---

\*) Systematici quo magis Systemati artificiali addicti fuerunt, eo magis in forma acquieverunt. Inter fungos methodum Vaillantii, Micheli (diversus evolutionis gradus servantium) generibus Linneanis præfero e. s. p.

1. ORIGO *Epiphytorum ex organismis languidis, morientibus.*  
 — *Mucedinum ex org. putrescentibus.*  
 — *Xylariorum ex iisdem putrefactis l. exsiccato-induratis.*  
 — *Geogeniorum ab ipsa humo educenda.*
  
2. SUBSTANTIA *Epiphytorum subpulveracea, contextu grumoso.*  
 — *Mucedinum laxa, contextu fibroso-floccoso.*  
 — *Xylariorum firmior, saepe indurata; contextu floccoso, in ascos abeunte.*  
 — *Geogeniorum carnosa, contextu floccoso-celluloso l. vesiculoso, ascos perfectiores formante.*
  
3. RECEPTACULUM *Epiphytorum nullum? effusum, forma indeterminata.*  
 — *Mucedinum effusum, raro reflexum, forma expansa.*  
 — *Xylariorum subeffusum, dimidiato-sessile \*) raro stipitatum, in formam rotundatam tendens.*  
 — *Geogeniorum numquam resupinatum, raro cimidiatum, sspius integrum stipitatum, umbelliforme.*
  
4. HYMENIUM *Epiphytorum accidentale; ascis nullis; sporidiis suspectis.*  
 — *Mucedinum spurium; aseis in floccis solutis, sporidiis parcis.*  
 — *Xylariorum genuinum, cum receptaculo (quod inde uterinum evadit!) concretum, ascis sporidiisque exiguis.*  
 — *Geogeniorum genuinum, a receptaculo discretum, ascis majusculis, sporidiis copiosis.*

\*) Etiam quoad formam Polypori & Thelophoræ sessil. non male uterinis analogi — immo has ad Pezizatum familiam refert Ehrenberg.

III. Demonstrato igitur quodammodo sectionum ordine, ad ipsa genera progredior. Desumenda e forma hymenii. Quo magis superficiem fructificantem multiplicat, eo perfectius hymenium & genus. Infima igitur hymenio *lævissimo*; sequuntur dein hymenio in ipsa superficie papilloso, rugoso, reticulato l. punctato, quod *inæquabile* dicimus; perfectiora sunt hymenio in unam directionem protenso (aculeato, *tubuloso* \*), poroso; perfectissima hymenio in duas directiones, latitudinem & longitudinem extenso, *lamellato* \*\*). — Quo inferiores allatae sectiones, inde imperfectior hymenii quoque forma. v. gr.

**EPIPHYTI.** Hymenium nullum?, *læve*, *inæquabile*, vix tubulosum, non lamellosum.

**MUCEDINEI.** Hymenium *læve*, *inæquabile*, tubulosum, non lamellosum.

**XYLARII.** Hymenium vix *læve*, *inæquabile*, *tubulosum*, vix lamellosum.

**GEOGENII.** Hymenium non *læve*, vix *inæquabile*, tubulosum, lamellosum. His solis velum.

Quod in quavis sectiones maxime naturale literis cursivis notavi.

IV. Hinc sequitur generum primariorum ordin ut & numerus, naturalissimus.

+ Ascis nullis. **EPIPHYTI.** 1. *Lejostroma*. (Cf. p. 452, 3.) 2. *Polypor. farinellus*.

**MUCEDINEI.** 3. *Himantia*. 4. *Diopogon* & *Porotheleum*.

\* ) Hydnum & Polyporum eundem sistere evolutionis gradum multa confirmant. Species analogarum tribuum ntriusque generis magis inter se affines, quam cum speciebus aliarum tribuum sui generis, quod in nullo genere naturali!! Jungunt Gleditsch, Battara, & judiciosissimus Ehrenberg.

\*\*) Perfectissimæ inde sunt lamellæ omnino æquales & a stipite discretæ v. gr. *Russulæ*, *Amanitæ*.

**+** Ascis præsentibus. XYLARII. 1. Thelephora:  
2. *Polyporus* & *Hydnum*.

GEOGENII. 3. *Boletus*. 4. *Agaricus*.

Reliqua genera sunt intermedia, secundaria,  
hybrida quasi.

**AGARICUS** abiens in *Boletum*: — *Schizophyllum*.  
(lamellis fissis in tubulis involutis.)

— abiens in *Hydnum* — *Sistotrema*. Fr.

— abiens in *Polyporum*: — *Dædalea*.

— abiens in *Thelephoram* — *Cantharellus*.

**BOLETUS** abiens in *Hydnum* — *Fistulina*.

— abiens in *Polyporum* — *Hypodrys*.

— abiens in *Thelephoram* — *Merulius*.

**POLYPORUS** abiens in *Hydnum* — *Porodon*.  
(*Sistotremat.* sp. Pers. *Dædalea* sp. Mihi.)

— abiens in *Thelephoram* — *Phlebia*.

**HYDNUM** abiens in *Thelephoram* — *Stereum*.  
(*Hydn. sericeum* *Swartz* est *Stereum*.)

Sic & inter inferiores. *Polysticta* est *Porotheleum* in *Himantiam* abiens e. s. p. — Plurima ejusdem generis facile adderem, sed jam allata forsan superflua.

V. Rationem dein veli, quod in perfectissimis, *Agaricis* & *Boletis*, tantum occurrit, ut exponamus necesse est. Vidimus inter *Cotyledoneas* plantas, quo perfectiores, eo delicioris \*) contextus esse organa fructificationis; eo magis necessarium, ut ante anthesin ab injuriis externis arceantur. Hic

\*) Hoc derivatur insuper ex illa plantæ nota, secundum quam organa fructificationis post anthesin evanescant. Contraria in regno animali; quæ vero in regno animali perfectionem, imperfectionem semper in regno vegetabili indicant. Hinc organa fructificationis in infimis plantis v. gr. *Lichenibus*, *Muscis* &c. persistentia, & in infimis animalibus v. gr. *Sepiis*, *Gonchis* &c. fugacia.

finis calycis & corollæ; hinc perigonum apud perfectissimos duplicatum. Quæ omnia inter fungos perbelle correspondent. Sic fungi, quos demonstravimus perfectissimos, partes quoque fructificationis delicatissimas habent; hi soli velo instructi sunt. Est igitur velum universale calyx, partiale (annulus) corolla; sed partes ipsæ fructificationis mole reliquarum plantarum antecellunt, quia tota fungi essentia fructus — Natura vero, quæ nil sine ratione, neque aliquid frustra. Nullum fungum suberosum l. lentum velatum invenies; nullum etenerrimis hymeninis (Pratella, Coprino &c.) velo destitutum. Hinc diversarum serierum Agariei & Boleti ratio explicatur; hinc patet, qua ratione fungo adulto, cuius velum evanuit, velo tribuamus l. denegemus \*)! Nec dubitamus sporidiorum colorēm sublimiorem hanc (at quare?) exprimere rationem. Hec, quæ ex intimis fungi organis segregantur (ut sanguis inter animalia!), numquam mutantur, cum color exterior e lucis influxu facillime mutatur, in umbra viridis, in aprico lutescens & s. p., quod notissimum. (Inter Lichenes utrumque magis comprobatum invenimus.)

\*) Sine hoc adminicule nullas Agaricorum species, a me non visas, suæ seriei inserere potuisse. E minimo quoque frustulo lamellarum Agarici vivi primo obtutu, licet color varius exterior, ex occulto habitu perito color sporidiorum patet. — Aliud exemplum, inter innumera, quomodo ex ipso habitu l. constructione firmiore l. delicate, utrum pars velata sit an nuda, concludere possumus, afferam. Amenta Amentacearum nunc & mascula & foeminea delicata — tum utraque species gemmis ante explicationem inclusa v. gr. in Salice, Populo. Nunc mascula delicata & velata (v. gr. Pini) foeminea rigida, & nuda — Nunc mascula firma & nuda, foeminea delicata & tecta (v. gr. Coryli). Nunc & mascula & foeminea rigida & nuda, ut in Alno. Sie folia delicata & velata, ut plurimarum arborum frondosarum in nostris regionibus; sed & alia rigida, gemmis destituta (Hedera, Juniperus, Erica.)

VI. Inter genera concreta occurrit tribus receptaculo clavæformi, in sequentem ordinem abiens; indeque & Mesopod. proxima! Quo perfectius genus, eo magis pileata evadit. Mihi in hoc ordine omnino necessaria videtur forma transitoria. Cui vero generice distinguere placet, ad Clavatos transponat. — De formæ clavatæ in pileatam transformatione vide ad Clavatos.

Hæc in præsenti sufficient. Sublimiorem organorum evolutionis ideam speciose exposuit Nees Syst p. 178 & sq., a cuius vestigiis discedere, periclitari non audeo.

---

## ORDO II.

# CLAVATI.

*Fungi clavati. Dill. l. e. Nees Syst. p. 193. (excl. mitratis.) Clavaria. Linn Gen. 1077. Clavæformes & Helvelloid. ad part. Pers. syn. p. XVIII.*

STAT. *nat.* Hymenium superum, lœve. Asci sublineares, fixi, vix paraphysophori — Receptaculum clavæforme, perpendiculare, in formam cylindricam tendens, simplex l. ramosum, immarginatum; stipite haud distincto. Velum nullum. *Substantia carnosa.*

STATT. *aberr.* Receptaculum dilatatum in genere primo ad Pileatos abiens & a stipite sat discretum in Mitratis affinibus. Asci tantum paraphysophori inter eosdem observantur; ut etiam obsoleti in Epiphytis & Mucedineis proximis.

AFFINIT. Est ramus inferior Hymenomyctum genuinorum, quod in revisione ordinis exponam. — Assurgit, neglectis analogis antecedentium classium, a prototypis hujus classis, SCLE-ROTIACEIS nempe, mediante Xyloglosso Pers.

(*Clavaria* herb. olim., quæ vero proprium genus non constituere debet, cum forma inter Prototypos adhuc vaga est) & TREMELLINIS Acrospermo. P. — Abit ad pileatos duplii ratione. *Simplices* primo æquales, ad hymenium amplificandum tendentes, mox clavatæ evadunt (*Clav. pistillaris*); magis apicem dilatantes, ibidem dehiscant necesse est (*Cl. pistill. var. hercylanea*) & umbilicatae (*Clav. ligula*, quam *Gomphum* exakte referentem reperi) evadunt. Hoc modo hymenium mox superum inferum evadit, *Gomphus*! Inde magis magisque expanditur in pileum, primo cum stipite contiguum, dein magis magisque explanatum. — Sed & alia via superficies hymenii multiplicatur, in ramulos nempe abientis — Rami primo vagi, irregulares, demum, ut summus in regno vegetabili nisus!, verticillati evadunt (*Clav. pyxidata*, *apiculata* &c.) qui numero aucti pileum formant, forma umbellari distinctum. Nec desunt status intermedii, *Merisma* &c., hoc oppido demonstrantes.

HISTOR. Clavatorum vestigia apud antiquiores obsoleta. Clusius aliquot sub escul. gen. XIX descriptsit. Alii cum Coralliis, alii cum Lycoperdineis commutarunt, v. gr. Tournefort, qui 12 circiter species. huc spectantes, in Institut. R. H. enumerat. Vaillantius primus retulit ad proprium genus, quod in duo (*Corolloides* & *Clavarias*, quæ solus adaptavit Holmskold) divisit, speciesque, exclusis peregrinis, 30 enumerat Michelius. Haec duo genera jure revocavit Linnæus, cui species 5, quæ Gleditschio 3 tantum. Species inter recentiores ample descriptsit nitidissimeque delineandas curavit Holmskold neque negligendi de pileatis scriptores; easdem vero generaque (3) pulcherrime stabilivit Persoon Secuti recentiores omnes; Nees modo Mitratos huc traxit. Nos genera 8, ad nostri Systematis constructionem adaptata, reformavimus. Hymenii situm Michelius, ascos Schmidel primi indicarunt.

PATRIA, locus, tempus, duratio. Genera & species rite cognitæ fere omnes Europææ. Genuina terrestres, quæ ad inferos ordines & classes transeunt epiphytæ. In cryptis, ad lucem tendentes, valde producuntur ascique, ob humoris mucidinei copiam expansi & in floccis soluti, superficiem tomentosam reddunt. Cf. *Clav. tomentosam P.* Hall. helv. 2195 &c. — Species simplices serotinæ; ramosæ præcoceæ & sâpe meteoricæ. Duratio per 14 dies & ultra, nulla vero species persistens (perennans) l. rediviva. Radix plerumque perennis.

VIRES & usus. Mites, sapore nonnullis amaro, plurimis nullo l. aquoso. Odor nullus distinctus neque succi colorati. In cibariis plurimi majores recepti; neque ab animalibus herbivoris sumpnuntur.

SYNOPSIS Generum, quæ e forma & hymenio indole distinguuntur:

- \* *Hymenium totam superficiem occupans. Ascii distincti. Stipes nullus distinctus.*
- 1. SPARASSIS. Ramosissima, complanata, e lambris duplicatis composita.
- 2. CLAVARIA. Ramosa l. simplex, cylindrica, homogenea.
- B. *Phalaorea. Primo byssina villosa, dein glabra; Lignatiles.*
- C. *Calocera. Corneo-gelatinea, viscosa. Lignatiles;*
- \*\* *Hymenium apicem tantum occupans. Ascii longi, Clavula a stipite discreta, simplex.*
- 3. GEOGLOSSUM. Clavula subdiscreta, cylindrica l. compressa, undique ascigera.
- 4. SPATHULARIA. Clavula discreta, compressa, utrinque in stipitem decurrens, superne ascigera.
- 5. MITRULA. *Hymenium clavatum (ovatum) basi stipitem discretum arcte ambiens,*

- B. *Heyderia*. Stipes clavulam penetrans.
- \*\*\* *Hymenium apicem tantum occupans. Asci obsoleti.*  
Stipes a clavula discretus.
6. CRINULA. Hymenium apicem receptaculi cornei cingens, deliquescens. Stipes rigidus.
7. TYPHULA. Hymenium tenuē, (subcylindricum) persistens, stipitem capillarem terminans.
- \*\*\*\* *Hymenium totam superficiem occupans, sed apice tantum sporigerum absque ascis.*
8. PISTILLARIA. Simplex, contigua, linearis l. clavata. Sporidia apice emergentia.

CRITICA: Series hujus ordinis omnino erit simplex ob hymenii superficiem tantum levem. E receptaculo tantum simplici l. ramoso genera numquam distingui possunt. — *Clavaria penicillata* Bull. est typus novi generis (*Pterula*), in sectione tertia militantis, sed e specimine sicco determinare nolui. Crinula in Systemate absoluto Clavarilis affinior. Species e colore tantum distinctæ suspectæ, multæ albæ & luteæ simul occurrunt.

---

### XIII. SPARASSIS. Fries.

CHAR. Receptaculum carnosum, ramosissimum. Rami dilatati, plani, leviusculi, e membra-  
na duplice (Agaricorum instar lamellarum) conne-  
cta compositi, utrinque ascigeri. Asci elongati.  
*Sporidia alba!*

HIST. Genus, a σπαράσσω dictum, medium inter Clavatos & Pileatos, sed ab omnibus adeo di-  
versissimum, ut cum nullo alio fungo, quin poti-  
us cum *Millepora reticulata* \*), comparandum.

---

\*) Formam Agaricoideam, Boletoideam, Hydnoidream,  
Clavatam &c. inter Lithophyta etiam occurtere omni-  
no peculiare.

Quibus insuper addendum superficiem, præcipue inferiorem, sœpe esse rugosam, venoso-reticulatam & aculeataam. Species unica, subterrestris.

### I. SPARASSIS crispa.

*Elvella ramosa.* Schæff. fung. t. 163. ! Clav. crispa.  
Wulf. in Jaeq. Misc. 2. p. 100. t. 14. f. 1. A. S. p. 285 ! ! Schult. Starg. p. 494.

Omuium, quotquot vidi fungorum, speciosissimus, pedalis & ultra, colore pallide flavescente l. albido. Substantia carnosa, fragilis, tenuis, insipida & inodora, alba. Basis tuberosa. crassa. Rami primarii 1-2 unc. lati, serobiculato-rugosi, ramosissimi; ramulis omniibus latis, planis, glabris, sublævibus, in cæspitem subglobosum intricatis, crispato-complicatis, margine subintegro, apicibus obtusis serratis dentatisve. Admodum deliciosa. gula blandiens, Silesiae in usu frequens. In pinetorum siccorum penetralibus, rarer. Sept. Oct. (v. v. Femsjö.)

### XIV. CLAVARIA. Vaill.

*Coralloides* & *Lycoperd.* spec. Tournef. J. R. H. 564.  
Id. & *Clavaria.* Vaill. par p. 59. Mich gen p. 208.  
*Clavaria.* Gled. meth. p. 20. Pers. Comm. p. 41.  
(excl. *Typhulisia* &c.) Link diss. 1. p. 40, Nees syst.  
p. 168 !

CHAR. Receptaculum erectum, cylindricum, homogeneum, cum stipite confusum. Hymenium concretum, leve, superficiem totam occupans, sed superne tantum ascigerum. Asci subtenues. — Carnosa; ramosæ, ramis plerumque attenuatis, l. simplices, sursum inerassatae. *Sporidia* ohracea l. alba.

ABERRATT. *Phalacrea* & *Calocera.* In *Cl. flavipede*, *fistulosa* &c. hymenium totam superficiem non occupat, inde adeat stipes discolor. Hymenium paucis rugosum,

HISTOR. Centrum constituit hujus ordinis, inde specierum, saepissime terrestrialium, numerus reliquas simul sumtas longe superat. Nomen a simplicium forma clavata sumtum. Dispositionem sequor Persoonii & Neesii, reformato paulo ipso genere.

DIVIS. e forma.

1. BOTRYOIDEÆ. Ramosissimæ, caule crasso.
2. RAMARIÆ. Ramosæ, caule tenui.
3. CORYNOIDEÆ. Simplices, clavatæ.
- B. CALOCERA. Corneo-gelatinosæ, ramosæ, simplices, viscosæ, ascis tenuissimis.

Trib. I. BOTRYOIDEÆ. Nees.

CHAR. Caulis crassus, ramis simul sumtis vix tenuior, ramulis obtusis fastigiatis l. brevibus difformibus. Magnæ, terrestres, præcoces, meteoricæ, sapidæ, an varietates? (Hall. helv. 2201.)

1. *C. Botrytis*, difformis, caule decumbente crassissimo pallido, ramis brevibus subrugosis, apicibus rubris.

Fung. esc. gen. XIX. sp. 2. Clus. p. 274. Harr. ic. 1259. Cl. Coralloides. Scop. Fung. Hung. p. 150. C. acroporphyria. Schæff. t. 176. Cl. plebeja. Wulf. in Jacq. Coll. 2. p. 101. t. 13. — Helmsk. Ot. p. 117. c. ic. Cl. Botrytis. Pers. Comm. Clav. p. 42. Syn. p. 587. Swartz in V. A. H. 1811. p. 146. Nees syst. f. 150. Fl. Dan. t. 1303.

b. lutea, apice rubra. *C. rubesc.* Schæff. t. 288.

Ingens plerumque, 3 unc. alta & ultra, sed & minor. Cœlo siccœ ramos paucos breves valde obtusos & irregulares tantum protrudit; sed sub pluvias continuas explicantur ramosi, elongati, stricti, rugosi. Truncus 1-2 unc. crassus. Variat alba, incarnata, intense lutea, apicibus rubris. In fagis alibique. Aestate, aut. (v. v.)

2. *C. formosa*, caule subdecumbente albido, ramis aurantio-roseis, ramulis flavescentibus.

*Cl. fastigiata*. Batsch. El. f. 48. mala. *Cl. coral*.  
purpur. Holmsk. Ot. 1. n. 13. Pers. Comm. Cl. p.  
41. Ic. & descr. p. 1. t. 3. f. 5.

Caulis subventricosus, 1 unc. & ultra crassus.  
Rami prioris magis elongati, stricti, ramulis sub-  
fastigiatis. — h. caule deorsum villoso, tenuiori,  
ramis fuligineo-rufescens, subrugosis, inæquali-  
bus, leviter pruinosis, apice flavis. *In silvis fron-*  
*dosis. b. aceriosis. Aest. aut. (v. v.)*

3. *C. flava*, erectior, caule crasso albo, ramis re-  
ctis teretibus fastigiatis flavis.

Fung. esc. gen. XIX. sp. 1. Clus. p. 274. J. Bauh.  
Hist. XL. c. 59. ubi syn. vet. ! — Barr. ic. 1260.  
*Coralloid. flava*. Tourn. J. R. H. t. 332. Batt. p.  
22. Sterb. t. 11. Cl. fastigiata. Linn. Suec. n.  
1269. Cl. *Coralloid*. Bull. t. 222. & Auct. var. lu-  
tea. Holmsk. Ot. 1. n. 14. *Cl. flava*, *flavescens*, au-  
rea. Schœff. t. 175, 285, 287, Cl. *flava* & *dichotoma*.  
Pers. Comm. Cl. p. 43. Syn. p. 586. Swartz l.  
c. p. 146.

Fragilis, cæspites densos 3-4 unc. altos latosque  
format. — Caulis unciam crassus & longus, deor-  
sum attenuatus, glaber. Rami erecti, læves, deor-  
sum simplices, sursum fasciculato-ramosissimi, ra-  
mulis obtusis, subinde luteis Coloris intensitate  
variat Deliciosa. Cf. Tratt. Essb. Schw. p. 143 &c.  
*In silvis, ubique. Aug. sq. (v. v.)*

4. *C. Coralloides*, erecta, alba, caule crassiusculo,  
ramis elongatis inæqualibus.

J. Bauh. hist. l. c. Gled. meth. p. 31. a. Batt. t. 1. A,  
B. Clav. arbuscula. Scop. Carn. 2. p. 484. Cl. co-  
ralloid. Linn. Suec. 1268. Cl. Holmskold. Fr. Obs.  
2. p. 287. Sowerb. t. 278. fig. sup. Ram. corall. al-  
ba. Holmsk. Ot. 1. p. 113. c. ic. opt. !

Colore & crescendi modo a prioribus sat diver-  
sa & Cl. rugosæ forsitan affinior. Caulis tenuior,  
sempre elongatus, ramis teretiusculis ramosis acutis.  
*Ad terram, post intensas pluvias, annis calidis, raro.*  
(v. v.)

5. *C. cinerea*, murina. ramis dilatatis coralloideis obesis glabris solidis, apicibus depressis.

*Bull. Champ.* p. 204. t. 354. *Pers. syn.* p. 586. *Dec. fr. 2.* p. 100.

Obconica, fragillima. Rami videntur sinuato-serrati, ramulis obtusis subfastigiatis. In Gallia frequens comeditur. *Ad terram in Gallia.* (v. ic.)

6. *C. grisea*, cinerascens, caule crasso. ramis subrugo-*sis*, ramulis obtusis inaequalibus.

*Pers. Comm.* p. 44. *Syn.* p. 586. (*Cl. cinerea*, *Vill.*?)

"Caulis 1 unc. crassus, erector, 1  $\frac{1}{2}$  unc. longus, basi albicans. Rami 3 unc. longi, sensim attenuati, margine integri, sporidius brunneo-rufis tecti!" *Ad terram in fagetis raro.*

7. *C. spinulosa*, erecta, ramosissima, subcinnamomea, caule crasso, ramis strictis attenuatis.

*Pers. Obs. Myc. 2.* p. 59. t. 3. f. 1. *Syn.* p. 587. *Swartz l. c.*

Truncus brevis, 1 unc. crassus, glaber, pallidior. Rami conferti, laterales adscendentes, alii breves obtusi, alii producti acuti. Sporidia ochracea. *Ad terram silvarum.* Aug. Sept. (v. v.)

Inquirendæ *Corall. Mich.* t. 88. f. 2. & *Cl. sanguinea.* *Pers. Obs. l. c.* p. 61. t. 3. f. 3. — *Cl. pomacea* *Nees monendum* *descripta.*

### Trib. II. RAMARIÆ.

CHAR. Truncus tenuior, erector, basi subfibrillosus. Rami graciliores.

- \* *Colore subluteo.* Sporidia subochracea (exceptis 15, 16 &c.)

8. *C. stricta*, ramosissima, pallida, subfuscescens, ramis ramulisque strictis adpressis acutis.

*Cl. pallida.* *Schäff.* t. 286. *C. stricta.* *Pers. Comm.* p. 45. *Syn.* p. 588. *Schum. Sæll,* p. 401. *Swartz l. c.* p. 148. *Fl. Dan.* 1302.

Caulis sat tenuis, adscendens, basi fibrillis ra-

dicatus, firmus, 3 lin. circiter longus & crassus. Rami arcuato-divisi, iterumque convergentes, opaci, plerumque pallide flavi, sed triti fuscescentes. Sporidia cinnamomea. *Ad truncos passim. Aug.-Oct. (v. v.)*

9. *C. palmata*, pallescens, subalutacea, caule tenui, ramis subcompressis palmatis, ramulis acuminatis. *Pers. syn. p. 588.*

"Caulis 2 lin. crassus, teres, rami 2-3 unc. longi, apice digitato-dilatati; ramuli pungente-acuminati. Caspes 3 unc. longus & latus. *Pers. Comm. p. 45.* A sequenti, ad quam syn. cit. Schäfferi (*lege t. 177*), hinc differre videtur. *C. palmata* Nees *Syst. f. 151* potius *Theleph. palmata*. *Karius in fagetis.*

10. *C. Suecica*, ramosissima, mollis, incarnata, mox alutaceo-pallida, caule tomentoso, ramis laxis distantibus, ramulis acutis.

*Fries Obs. I. p. 156!* *C. rubella*, *Schäff. t. 177. junior.*

Caulis inter muscos demersus, nunc decumbens, nunc rectus, 3-4 lin. crassus, tomento albo obductus. Rami erecti, laves, flexibles, angulati, sursum incrassati subverticillato-ramosi; ramuli brevissimi, acuti. Substantia mollissima, tenax, alba, amara. Altitudo 3-4 unc. Numquam viret. *In pinetis Suecicæ copiosissime. Aug.-Oct. (v. v.)*

11. *C. abietina*, ramosissima, obscure ochracea, caule albo-tomentoso, ramis strictis confertis sultato-rugosis, ramulis acutis.

*Schum. Sæll. p. 402. A. S. p. 286.*

b. *minor*, contrita virens. *Pers. Comm. p. 46. Syn. p. 588. Swartz l. c. p. 148.*

A priori distinguenda. Color obscure ochraceus, vix nisi in junioribus contritus viret. Caulis brevis, 4 lin. crassus, subtuberous. Rami sube- quales, teretes, sparsim ramosi, præcipue in fungo sicco sultato-rugosi; ramuli attenuati, acuminati.

Altitudo 2-3 unc. Substantia alba, sapore amaro, dein acri. In silvis abiegnis, frequens. Aug.-Nov. (v. v.)

12. *C. apiculata*, ramosissima, alutaceo-rufescens, caule glabro, ramis subverticillatis repetito-furcatis, ramulis attenuatis acutissimis.

b. ramulis verticillatis &c. Fries Obs. 2. p. 288.

Sapor amarissimus. Altitudo 1-2 unc. Color in humidis l. tactus rufescens, in siccis subalutaceus, apicalis passim virecentibus. Caulis mox & irregulariter divisus, sursum subincrassatus e ramis subverticillatis; hi multoties 2-3 furcati, ramulis levibus strictis longitudine inaequalibus. Ad truncos vetustos abiegnos. Sept. Oct. (v. v.)

13 *C. pyxidata*, ramosissima, e pallido rufescens, ramis ramulisque subverticillatis in tubum dilatatis, ultimis brevissimis.

Pers. Comm. p. 47. t. 1. f. 1. Syn. p. 286. Fl. Dan t. 1304. f. 1. Swartz l. c. p. 148. A. S. p. 286.

Priori sat affinis; caulis adhuc magis obsoletus, ramosior; ramuli plures, omnes fere verticillati, nec ultimi longi simplices, sed ipso apice plerumque apiculis verticillatis; hinc *Cen. degenerantem* Fl. bene refert. Color junior albidus, dein fusco-rufescens. "Sapor non ingratus" P. Ad truncos vetustos pineos. Aug.-Oct. (v. v.)

14. *C. crispula*, ramosissima, ex alutaceo ochracea, caule tenui, ramis flexuosis multifidis, ramulis divaricatis.

Cl. muscoides. Bull. t. 358. f. a. b. c. Cl. muscigena. Schum. p. 400.

Radiculae fibrillosae, albæ, longissimæ, constanter præsentes. Caulis albido-villosus, ramis ramosissimis confertis incurvis flexuosisque acuminatis, unde facies eleganter crispata. Tota 1-3 unc. alta, flaccida, sapore mucido. Inter muscos ad truncos arborum (*Fagi* & *Quercus*) vulgaris. Jul.-Oct. (v. v.)

15. *C. pratensis*, cæspitosa, lutea, caule tenui, ramis brevibus geniculatis divaricatis, ramulis subfastigiatis.

*Vaill.* par. t. 8. f. 4. *Hall. helv.* 2198. Clav. muscoid. *Fl. Dan.* t. 856. f. 2. *Bolt.* t. 114. (var.) Cl. fastigiata. *Bull.* t. 358. f. D. E. & *Linn.* ad part. *Holmsk.* *Ot.* 1. p. 90. *C. pratensis.* *Pers. Comm.* p. 51. t. 4. f. 5. *Syn.* p. 590. *Swartz l. c.* p. 150.

Statura curta, subobconica, vix unciam superans, recens, monentibus A. S. p. 287, lubrica, subviscosa. Rami molles, inæquales, obtusi. Graminibus plerumque intricata. *Inter muscos in pratis.* Sept.-Nov. (v. v.)

16. *C. corniculata*, erecta, ramosa, gracilescens, lutea, bis terve furcato-divisa, ramis lunulatis acutis.

*Raji syn.* t. 24. f. 5. *Hall. helv.* 2199. Cl. muscoides. *Linn.* *Suec.* 1270. *Fl. Dan.* t. 775. f. 2. *Holmsk.* *Ot.* 1. p. 87. c. ie. *Sowerb.* t. 157. *C. cornicul.* *Schæff.* t. 173. *Pers. syn.* p. 589. *Nees syst.* f. 152. *Swartz l. c.* p. 149. Clav. furcata. *Pers. Comm.* p. 184.

Antecedenti longior, solitaria, minus ramosa, sicea, excepta basi tomentosa, glaberrima, colore nitido subvitellino. Ramuli elongati, attenuati, subcompressi alii acuti, alii obtusi. *In graminosis silvaticis, autumno seriori.* (v. v.)

Oecurrunt apud veteres duarum antec. iacnes nonnullæ rudes nimis, inde omissæ.

17. *C. flaccida*, flaccida, tenuis, ochracea, caule tenuissimo subnudo, ramis inæqualibus convergentibus acutis.

Radix fibrillosa, ramosissima, supra folia dejecta pinea serpens. Caulis 1 lin. crassus, basi rarius albo-villosus. Rami 4-6, rare ramosi, ramulis ultimis inæqualibus, haud caule tenuioribus, 1-1 ½ unc. longa. Colore immutabili ochraceo distincta. *In pinetis Smolandiae, raro. Oct. Nov.* (v. v.)

18. *C. crocea*, minuta, tenuis, crocea, caule nude pallido, ramis congestis ramulisque conformibus subfureatis.

*Ie. & deser. p. 36. t. 11. f. 6. Pers. syn. p. 595.*

Exigua, 2 unc. longa, flaccida, sicca, colore pulcherrime croceo. Caulis ramis gracilibus vix crassior. Affinis Cl. subtili, sed præter formam & colorem rami minus stricti. *Ad terram in fagetis, rarissime. Oct. Nov. (v. v.)*

\*\* *Colore violaceo, fuligineo, albo. Sporidia alba. (Cl. coralloides.)*

19. *C. amethystina*, ramosissima, violacea, ramis elongatis teretiusculis obtusis.

*Barr. ic. 1262. C. purpurea. Schæff. t. 172. C. amethystina. Bull. t. 496. f. 2. Pers. syn. p. 286. Decr. fr. 2, p. 101. Fries Obs. 12 p. 286! Nees syst. f. 151. Ramaria. Holmsk. Ot. 1. p. 110. c. ic.*

Cæspitosa, lævis, glabra, 3 unc. alta, colore pulcherrimo, basi & exsiccato albidiiori. Rami inferne simplices, apice multifidi, læves, ramulis brevissimis. Esculenta. — In umbrosis altior, ramis subdistantibus & flexuosis. *Ad terram in ericetis passim. Aug. Sept. (v. v.)*

Aliam speciem (*Cl. brachyeeram* Pers. Comm. p. 61.) exhibent Barr. ic. 1261 & Batt. t. 1. C., colore quoque violaceo, sed ramis compressis &c. nisi Cl. cristatæ var. *Italica insola*.

20. *C. tenacella*, fasciculata, fuligineo-rufa, subtenax, ramis elongatis congestis fureatis obtusis.

*Pers. Comm. p. 47. t. 3. f. 5. Syn. p. 591.*

“Cæspites fasciculares, subcylinurici, 2-3 unc. longi, basi albantes. Substantia cartilaginea quasi, (hinc cum subsequentibus maxima affinitas.) Color ad violaceum tendens. *In ericetis silvaticis Germanicæ. (v. ic.)*

21. *C. virgata*, glabra, albido-fuliginea, ramosissima, ramis elongatis sulcatis, ramulis attenuatis æqualibus acutis.

Tota 3 unc. alta, glabra, fragilis, intus alba solida, extus fuliginea, dein e sporidiis albis pruinosa. Caulis tenuis, albus. Rami repetito-ramosoi, subæquales. Ramuli terminales simplices. *Ad truncum Pini, semel modo. Ineunte Oct. (v. v.)*

22. *C. cristata*, cæspitosa, ramosa, lævis, glabra, nivea l. albida, dein fuliginea, ramis superne dilatatis cristatis acutis.

*Buxb. Cent. IV. t. 66. f. 1. Hall. helv. 2200. Ram. cristata. Holmsk. Ot. 1. p. 92. c. ic. Cl. albida. Schæff. t. 170. Cl. fallax. Pers. Comm. p. 48. Fl. Dan. t. 1304. f. 2. (colore subtestaceo) Cl. crist. Pers. syn. p. 591. Swartz l. c. p. 151.*

Substantia hujus & sequentis, quæ omnium specierum maxime variant, rigida, sat tenax. Statura admodum varia, 1-2 unc. alta. Rami inferne simplices, plerumque eleganter fimbriati, raro obtusi. *Ad terram humosam in silvis frequens. Aut. (v. v.)*

*β. fallax*, subramosa, cinerea, nigro-punctata. *l. c.* Colore obscuriore, ramis paucioribus, caule inferne (ob Sphæriam parasiticam?) nigro-punctato.

*γ. C. fimbriata*, candida, caule longe, ramis compressis lævibus apice palmatis, ramulis setaceo-spinulosis. *Pers. ll. cc.*

Plurimi cum a. dantur status intermedii, sed specimina, quæ describo 3-4 unc. longa, caule bunciali decumbente (variat glaber & villosus) ramulis fere setaceis &c. — *Ram. ornithopodiooides* Holmsk. l. c. p. 84 c. ic. huc quoque spectare videtur; non vero *Vaill. par. t. 8. f. 3*, quæ Cl. ornithop. Bull. — *In silvis. (v. v.)*

23. *C. rugosa*, simplex ramosaque, tenax, incrassata, rugosa, albida, ramis paucis difformibus obtusis.

*Plot. Hist. Staff. t. 14. f. 2. Vaill. par. t. 8. f. 2. Mich. t. 88. f. 5. (status abnormis) C. laciniata. Schæff. t. 291. — Hall. helv. 2202. C. damæcornis, Schrank.*

*C. rugosa*. Bull. Ch. p. 206. t. 443. f. 2. Pers.  
*Comm.* p. 57. t. 2. f. 4. *Syn.* p. 594. *Fl. Dan.* t.  
 1301. *Fries Obs.* 1. p. 158. *C. elegans*. *Bolt.* t. 1150.  
*C. coralloid*. *Sowerb.* t. 278. fig. inf. (*Cl. digitata*  
 & *palmata*. *Schum.* ad varietat. sqq.)

Omnis huc relatas formas communi sub descriptione comprehendere nequeo, quare notabiliores seorsim afferam. a) Satis tenax, extus intusque, ubi demum cava, alba. Superficies nuda, glabra, parum rugosa. Forma valde variat, nunc omnino simplex claviformis (*Cl. pistillaris alba veterum*), nunc in ramos 2-4 inaequales varios divisa. b) Alba, subfragilis, inferne in ramos plures rugosissimos turgidos divisa. c) candida, obconica, caule deorsum attenuato, ramis confertis brevibus turgidis pruinosis, alii acuti, alii obtusi e. s. p. Proxima videtur *Cl. grossa* Pers. *Comm.* p. 50. t. 2 f. 2. *Ad terram frequens, præcipue locis humidis. Aug.-Oct.* (v. v.)

*B. hercynica*, majuscula, fuligineo-alba, subtenax, ramis obsoletis obtusis. Pers. ll. cc. - *In pinetis.* (v. v.)

*y. grisea*, cæspitosa, fuliginea, ascendens, ramis difformibus rugosis subcristatis. *Fries Obs.* 2.

Abit ad *C. cristatum* Caulis basi albovillosum, cum ramis planiusculis 1-2 unc. alta, fragilis. Color fuligineus, cœlo sicco expallens. *Cl. rimosa* Villars forte. *In fagetis umbrosis ad terram.* (v. v.)

24. *C. trichopus*, majuscula, nivea, caule elongato basi hirsuto, ramis crassiusculis furcatis. Pers. syn. p. 590. *Comm.* p. 50. t. 4. f. 3.

Gregaria, 3 unc. longa. Caulis  $\frac{3}{4}$  unc. longus, 3 lin. crassus. Rami glaberrimi, equidem non congesti; ramuli non cristati aut setacei, sed furcati aut palmatim divisi. *In silvis ad terram.* (v. ic.)

25. *C. Kunzei*, cæspitosa, ramosa, candida, caule glabro, ramis repetito-furcatis subfastigiatis, axillis compressis,

*C. dubia*, Pers. Comm. p. 50?

Species distinctissima, valde elegans. Cæspites densi gregarii, 1  $\frac{1}{2}$  - 2 unc. alti, 1 unc. lati. Caules plures basi coaliti, glaberrimi, ad basin plerumque divisi. Rami confertissimi, numerosissimi, subintricati, lœves, glabri, erecti, stricti, tenacelli. *Ad terram locis nemorosis, aut. seriori.* (v. v. Alnarp copiose &c.)

26. *C. mastropus*, sparsa, gracilis, albida, caule tenui elongato, ramis furcatis subulatis.

Pers. Comm. p. 51. t. 1. f. 2. Syn. p. 393. Swartz l. c. p. 152.

Erecta, incilenta, bis terve furcellato-ramosa, axillis acutis, nec pro more aliarum arcuatis, glabra, subtenax, albido-pallida, 1  $\frac{1}{2}$  unc. & ultra. Rami teretiusculi, longitudine subæquales, acuminati, caule haud crassiores. *In fagetis umbrosis, raro.* (v. v. Femsjö.)

27. *C. gracilis*, flaccida, albo-pallescens, caule tenui nudo, ramis multifidis æqualibus subincarnatis. — Pers. ll. cc.

Radiculis fibrillosis muscis plerumque adhæret. Caulis decumbens, 1-2 lin. longus, 1 lin. crassus, una cum ramis flacidus, subtenax, glaber, 1-2 unc. altus, ramosissimus. Ramuli teretes, acuti. Odore debili aniseo insuper dignoscitur. *In pinetis, rario.* Aug.-Oct. (v. v.)

28. *C. subtilis*, albido-pallens; crassitutine ubique subæquali, ramis furcatis subfastigiatis.

Pers. Comm. p. 51. t. 4. f. 2. Syn. p. 592.

Forma grata distincta; 1  $\frac{1}{2}$  unc. longa, ramis pauci sensim modo subattenuati — Ex iconæ axillæ arcuatae & habitus a sequenti aliquantulum diversus, sed novas ex his affinibus distinguere nolo. *In fagetis ad terram.* (v. ic.)

β. *C. delicata*, inferne villosa, candida.

Tota uncialis, alba, tenella, mox e basi frequenter ramosa, ad medium usque pubescens. Rami teretes, longi, acutissimi. — A. S. p. 287 eadem forte. *Ad ligna putrida Fagi, frequens. Aug.-Nov.* (v. v.)

29. *C. byssiseda*, varia, ramulosa, junior villosa alba, dein glabra pallide rufescens, radiculis byssoidaeis.

Ram. fimbriata. Holmsk. Ot. 1. p. 98. c. ic. Cl. byssiseda. Pers. Obs. 1. p. 52. Comm. Clav. t. 3. f. 1. var. Syn. p. 595. Fries Obs. 1. p. 157. Schum. Sæll. p. 400.

Phalacréæ species, sed huc locanda, donec hymenium accuratius examinatum fuerit. Junior tota byssina, Himantia instar lignis & foliis præcipue Quercus innascitur, alba, dein glabriuscula, pallide rufescens, ramis paucis divergentibus. Sporidia? In Quercetis, æstate & aut. (v. v.)

30. *C. mucida*, gregaria, minuta, albida, simplex ramosave, apice subinciso lutescente.

Hall. helv. 2197. C. mucida. Pers. Comm. p. 55. t. 2. f. 3. Syn. p. 595. A. S. p. 288. Swartz l. s. p. 153. Cl. pallida. Fl. Dan. t. 1376.

Semper supra crustam tenuem virescentem reperi. Minima in hac tribu, vix  $\frac{1}{2}$  unc. longa, carnosa, alba, sed sicca lutescens, basi tomentulo cincta; forma varia, nunc linearis, simplex l. vase ramulosa, nunc apice complanata cristata. Varr. plures: b) simplex, uncialis, clavula cylindrica subrosea, stipite albo. c) simplicissima, clavula alba, stipite distincto squamoso atro-viridi. d) sublinearis, stipite distincto sulphureo &c. *Ad ligna putrida & terram umbrosam, frequens. Ferme perennis.* (v. v.)

Icones Michelianæ t. 88. maxime rudes, nec citandæ. Cl. fastigiata Bolt. t. 112. f. 2. erronea videtur. Cl. phosphorea Sewerb. t. 100 est Rhizom. phesporea. Mihi. — Cl. Gorgonia (magna, purpurascens, ramis ramulisque dichotomis fastigiatis) Plum. fil. t. 168. f. L. inquirenda.

## Trib. III. CORYNOIDEÆ. Nees.

CHAR. Simplices, solitariæ l. cæspitosæ, basi attenuatæ. *Terrestres, raro epiphytæ.*

\* 3'. *C. pistillaris*, solitaria, magna, glabra, e flavo-subrufescens, sursum incrassata obtusa.

*Fungus clavatus &c.* Boce. *Mus* t. 507. *Euxb. Hal.* p. 102. *Mich. gen.* t. 87. f. 1. (junior.) f. 2. *vetusta*. *Hall. helv.* 2204. *Cl. spec.* 1. a, b, c, d. *Gled. meth* p. 26–28. *Cl. pistillaris.* Linn. *Suec.* 1266. *Schæff* t. 169, 270. (rimosa.) *Batsch. El.* f. 46. *Bull.* t. 244. *Sowerb.* t. 277. *Fl. Dan.* t. 1255. *Holmsk.* *Ot.* 1. p. 12. *Pers. Comm.* p. 61. cum var.! *Syn.* p. 597. *Schmid. ic.* t. 4. f. sup. *Sv. Bot.* t. 504. f. 1.  
b. major, apice dehiscens l. depressa. *Mich. l. c. f.* 3. *Cl. herculan.* *Lightf.* & *Auct.* *Holmsk.* p. 14. c. *ic.* *Sv. Bot.* t. 504. f. 2.

Omnium maxima, subsolitaria, junior cylindrica dilutior, dein eximie clavata, lavis; senescens obscurior, mollis, plicato-regosa; in luxuriantibus apice depressa l. tripartita. Varietates e formæ mutationes non constantes, præstantiores Bulliardii e colore. a) *rufida*, primo lutea, dein rufo-fuliginea. b) *fuliginea*, primo pallida, dein subfuliginea. c) *ferruginea*, primo sordide lutea, demum ferrugineo-lateritia. *In fagetis, præcipue calcareis, sed & solo arenoso.* Aug.-Nov. (v. v.)

Diversa *Cl. pistillaris* Lour. *Coch.* p. 696, albida, sapida, edulis, in fimo *Elephantum nascens*.

32. *C. ligula*, gregaria, oblongo-clavata, obtusa, junior luteola, dein rufescenti-pallida, basi villosa.

a junior. *Schmid. ic.* t. 5. f. sup. *Fl. Dan.* t. 837. f. 1. *Cl. cæspitosa.* *Wulf. in Jacq. Misc.* 2. p. 98. t. 12. f. 2. *Cl. luteola.* *Pers. syn.* p. 598. *Swartz l. c.* p. 154. *Sv. Bot.* t. 504. f. 3. — *Holl. & Schmidt exs. n.* 47.

b. *vetusta*. *Cl. ligula.* *Schæff.* t. 171. *Cl. pistillaris.* *Schrantz &c.* *Cl. Schmid. ic.* t. 4. fig. inf. *C. ligula* & *pulvinata.* *Pers. Comm.* p. 65, 66. *A. S.* p. 289. (*C. cochlearif.* *Schum. Sæll.* p. 404. *monstrosa.*)

Certe a priori diversa, constanter multo minor,  
 2-3 uncialis, subcæspitosa, sursum incrassata, solida; basi albido-villosa subfibrillosa; demum corrugata, apice compressa, immo divisa. Color ex atate mutabilis; etiam apicibus viridibus occurrit. Constanter, at vulgatissima in silvis abiegnis. Jul.-Dec. (v. v.)

33. *C. contorta*, erumpens, difformis, rugosa, subtorta, obtusa, glabra, aquose luteola.

*Holmsk. Ot. 1. p. 29. c. ic. Tremella ferruginea.*  
*Schum. Säll. p. 443. etiam hujus loci.*

Prioribus cognata, sed optime distincta. Substantia carnosa, fragilis, mollis, post pluvias fere spongiosa. Forma nunc spathulata, compressa; nunc turgida subtorta; deorsum attenuata, 1 unc. longa, 3-4 lin. circiter crassa, plus minus irregulariter curvata; solitaria 1. cæspitosa. Superficies rugosa, pruinosa. Erumpit e ramis uidis *Alni* & *Betulæ*. Oct.-Dec. (v. v.)

34. *C. macrorhiza*, glabra, fistulosa, subæqualis, obtusa, flavo-fusca, inferne torta, radice longissima fibrillosa.

*Swartz l. c. p. 155. t. 6. f. 1. Fries Obs. 2. p. 292.*

Radix 3 uncialis & ultra, cylindrica, clavula crassior, undique fibrillis albidis villoso-strigosa. Clavula 2-3 unc. longa, glabra, inferne sulcata, apice leviter incrassata. In Suecia ad terram arenosam, aut. (v. s.)

35. *C. Ardenia*, longissima, cava, sursum incrassata, spadicea, basi tomentosa.

*Sowerb. t. 215. Pers. syn. p. 599.*

Ultra spithamam longa; inferne flexuosa; sursum sensim incrassata, glabra, opaca; apice juniorum acuto, dein obtuso & rumpente. — Legimus specimina nondum explicata, quæ huc referimus, colore juniore rufescente & basi non radicata a se-

quenti diversa. *Ad ramos "Coryli"*, *Tiliæ*. Sept. sq.  
(v. v.)

36. *C. fistulosa*, longissima, fistulosa, gracilis, stricta, glabra, flava l. pallide rufescens, radice villosa.

*C. fistul.* *Fl. Dan.* t. 1256. *C. pilipes.* *Ib.* t. 1100. f.  
3. *Pers. syn.* p. 599. - *Swartz l. c.* p. 154, 156. *C.*  
*strigosa.* *Schum. Sæll.* p. 403.

h? *ricens.* *Holmshk. Ot.* x. p. 15. c. ic.

Solitaria, erecta, teres, 4-10 unc. longa, 1-2 lineas  
crassa, æqualis, sursum leviter incrassata, apice ob-  
tuso. Difficilis mihi species, cuius formæ plures  
mihi obviæ, sed præter vulgarem minus rigidam &  
b. (forsan distinctam) humectatam pristinam for-  
mam resumèntem, nullas distinguere valeo. Color  
pallidus, alutaceus, flavus, rufescens, & obscurus  
nullas offert differentias fidias. *C. fistulosa* & *pilipes*  
*Fl. Dan.* nil differunt. *Ad terram* & *inter folia*  
*decidua*, *ramulis* & *stipulis innata*, *frequens.* *Oct. Nor.*  
(v. v.)

37. *C. juncea*, gregaria, tenuis, subæqualis, flacci-  
da, pallida l. rufescens, basi repente fibrillosa.

*Mich. t. 87. f. 7. C. triuncialis juncea. A. S. p. 289.*  
*Cl. hirta. Fl. Dan. t. 1257. Cl. juncea, Fries Obs.*  
*2. p. 291. ubi reliqua syn.!*

Antecedentibus multo tenuior, debilis, segetis  
instar gregaria, obsolete fistulosa, 2-5 unc. longa,  
glabra, basi ipsa repens, fibrillis sparsis albidis l.  
lutescentibus cirrhosa. Color variat. *Inter folia*  
*decidua locis nemorosis, autumno serotino pulvioso, nix*  
*vulgatius.* (v. v.)

B. *C. vivipara*, filiformis, fibrillis lateralibus  
brevibus deciduis virgata.

Huc procul dubio *Cl. fistulosa* Bull. Ch. p. 215.  
t. 463. f. H. (*Cl. pilosa Pers. Comm.*), quæ subfuliginea,  
basi villosa dicitur. Nostra lutescenti-palli-  
da, valde gracilis, tenacella, basi fere glabra. *Fi-*  
*brillæ deciduae germinant & novas producunt plantas!*

asci vero desunt. Revocat hoc in memoriam plantas bulbiferas & viviparas, capsulis abortivis. *Inter folia decidua locis uliginosis rarior. Oct. Nov. (v. v.)*

\*\* *Colore purpureo, luteo, roseo, argillaceo. Terrestres, gregaria.*

38. *C. rufa, gregaria, rufa, incrassata, compressa, subinde bifida.*

*Fl. Dan. t. 775. f. 1. Pers. syn. p. 600.*

Habitu proprio omnino distincta, sed a nullo recentiorum observata species. Difformis, 1½ unc. longa, 2 lin. crassa, utrinque attenuata, intorta, emarginata l. simplex. *In graminosis Daniæ. (v. ic.)*

39. *C. purpurea, cæspitosa, simplicissima, cava, compressiuscula, acuta, purpurea*

*Fl. Dan. t. 837. f. 2. Pers. syn. p. 600. Swartz l. e.*

Plerumque 3 unc. longa, sed & solitaria tum magis producta & decumbens; linear-lanceolata, canaliculata, purpureo-cæsia, fragilis, inferne albido-villosa. Colore lilacino misit Acharius. *In pinetis Sc. Suecicæ superioris, annis pluviosis, sat frequens. Jul.-Sept. (v. v. Skärstad, Barnarp &c.)*

40. *C. anomala, connato-cæspitosa, incarnata, ex-pallens, ramis fusiformibus simplicibus.*

*Cl. digitellus. Schæff. t. 326. Cl. silvestris & anomala. Pers. Comm. p. 71, 73. — affines!*

Simplex est, sed clavulæ plurimæ in corpus crassum connatæ, hinc difformis & rami passim e duobus connatis divisi; ceterum subcavi, leviter incurvi. obtusiusculi. Cf. Fries Obs. 2. p. 290. *Ad radices Quercuum inter gramina. Aug. Sept. (v. v.)*

41. *C. fusiformis, congesto-fasciculata, lutea, clavulis subæqualibus incurvis lœvibus.*

*Cl. pistillaris. Bolt. t. 110. (minus bene) C. fusiformis Sowerb. t. 224. Pers. syn. p. 601. Cl. fascicul. Pers. Comm. p. 72.*

Tota lutea, glabra, 3 unc. circiter, plurimæ in cæspitem regularem conjunctæ. Clavulæ erectiusculæ, subfragiles, utrinque attenuatæ, teretes, apice subobscuri. *Ad terram inter gramina & muscos, rario. Sept. sq. (v. v.)*

42. *C. Ceranoides*, fasciculata, inæqualis, subdivisa, cava, flavescentia, apice fusca.

*C. rugosa*, Sowerb. t. 255. *C. cer.* Pers. syn. p. 594.

Nulla inter ramosas species affinis, hinc hunc potissimum sibi vindicat locum. Valde cæspitosa, 3 unc. alta. Clavulæ deorsum attenuatæ, curvatae, subventricosæ, ad latera dentato-ramosæ. *In Anglia. (v. ic.)*

43. *C. inæqualis*, fasciculata, inæqualis, fragilis, lutea, clavulis difformibus acutis.

*Cl. fasciculata*. Villars. *C. inæqualis*. Fl. Dan. 873. f. 1. Pers. Comm. p. 75. Fries Obs. 2. p. 293. *C. bifurca*. Bull. Champ. p. 207. t. 364. Swartz l. c. p. 157. *Cl. vermiculata*. Sowerb. t. 253.

Irregularitate præcipue a *C. fusiformi* dignoscitur; cæspites minus densi; clavulae fragiles, compressæ, angulatæ l. eanaliculatæ, saepè bifidæ. An sati disticta? *Ad terram cum priori. (v. v.)*

44. *C. angustata*, cæspitosa, elongata, gracilis, teretiuscula, lutea, deorsum flexuosa.

*C. elongata*. Ehrh. ! *C. angust.* Pers. Comm. p. 72. t. 1. f. 3. Syn. p. 602. A. S. p. 290. Swartz l. c. p. 158.

Clavulæ basi vix junctæ, erectiusculæ, subtenacei, deorsum angustatæ, 2-3 unc. longæ, vix lineam crassæ, acutiusculæ. *Ad terram inter muscos præcipue locis montosis. Sept.-Nov. (v. v.)*

B. *C. obtusa*, gregaria, lutea, clavula compressa obtusa, stipite teretiusculo recto.

Raji Hist. II. p. 104. Mich. gen. 87. f. 5. Hall. h[er]b. p. 2207.

Priori, cui colore & substantia proxima, vulgarior,  $1\frac{1}{2}$  unc. tantum alta, clavula 2 lin. latius curvata. Persoon sub *Cl. falcata* posuit. *Ad terram muscosam.* (v. v.)

45. *C. rosea* l. *Swartzii*, gregaria, teretiuscula, rosea, apice lutescente, deorsum angustata albida.

*Cl. rosea*. *Dalman in V. A. H.* 1811. p. 157. *Fries Obs.* 2. p. 290. t. 5. f. 2. *C. Swartzii*. *Sv. Bos.* t. 558.

Stipes nullus distinctus, sed clavula basi angustata albida, sesquiangularis, solida, simplicissima, fragilis, glabra, recta l. curvata exsiccata, in mucronem lutescentem contracta. Nostra subcylindrica 1 lin. crassa; Cel. Dalmanni clavata. *In graminosis muscosis*. Aug.-Oct. (v. v.)

46. *C. aurantiaca*, gregaria, subcompressa, rugulosa, aurantiaca, deorsum villosa.

*Bull.* t. 463. f. B.? *Pers. Comm.* p. 70. *Syn.* p. 598.

Colore pulchre luteo-rubente l. aurantiaco praecipue dignoscitur. Clavulae nunc strictæ, nunc decumbentes, 2 unc. longæ, 1 lin. crassæ, fragiles, demum plerumque cavæ, compressæ, rugosæ. *In nemoribus*. Oct. Nov. (v. v. Reften &c.)

*Cl. bulbosa* Schum. p. 405. (ferruginea=aurantiaca &c.) satis videtur diversa, sed affinium specierum numerum augere non audeo.

47. *C. helvola*, gregaria, teres, aequalis, levigata, soridide lutea, apice dein cinnamomeo.

*Cl. teres*. Baumg. *Lips.* p. 69. *C. simplicissima*. Willd. *Ber.* p. 406. *C. helvol.* *Pers. Comm.* p. 69. *Sv. Bot.* t. 504. f. 4.

Vix nisi colore opaco a priori diversa, tamen constans visa; haec quoquo multo rarius intus evanescula & compressa reperitur, sublinearis, leviter flexuosa, 1-2 unc. alta. *Ad terram humosam*. Oct. (v.v.)

48. *C. argillacea*, subcaespitosa, varia, clavulis incrassatis subcompressis obtusis alutaceo-pallidis, stipitibus nitentibus flavis,

*Mich.* t. 87. f. 11. *Schmid.* ic. t. 15. *Cl. ericetorum Pers.*  
*syn.* p. 600. *C. argillacea Pers. Comm.* p. 74. *Nees*  
*syst.* f. 155. *Geoglossum Fr. Obs.* 2. p. 295. t. 5. f. 3.

Optime a precedentibus diversa forma constanter sursum incrassata nec non colore argillaceo, stipite vero sat distincto glabro luteo, ut sepiissime Geoglossum referat. Fragilis,  $\frac{1}{2}$  - 1 unc. alta, maxime difformis. *Ad terram variis locis. In ericetis Suecice meridionalis nil vulgatus. Oct. Nov. (v. v.)*

49. *C. flauipes*, subcæspitosa, cylindrica, acuminata, argilleo-pallida, inferne flava.

*Pers. Comm.* p. 75. t. 1. f. 4. *Syn. p. 602. A. S. p. 290.*  
*Swartz l. c. p. 153. (Schum. Sæll, p. 402. var.)*

Proxima precedenti, tamen facile distincta clavulis gracilibus, 1-2 unc. longis, teretibus, subfalcatis, quasi pruinosis. Apex in exsiccatis obscurior. *Ad terram in versuris graminosis, raro. Oct. Nov. (v. v.)*

\*\*\* *Colore nigro, cinereo, albo.*

50. *C. striata*, "cæspitosa, subfuliginea, clavulis longissimis flexuosis subtorquatis sparsim striatis. *Pers. syn. p. 602.*

*Pers. Comm.* p. 78. *Ic. ♂ desc. p. 11. t. 3. f. 5.*

Fasciculus 3-4 unc. longus, 2-3 unc. latus. Clavulae utrinque attenuatae, medio subventricosæ, 2 lin. crassæ, cavæ, subcompressæ. *In silvis ad terram rarior. (v. ic.)*

51. *C. fumosa*, cæspitosa, fragilis, laevis, subflexuosa, e fuligineo-cinerascens.

*Pers. Obs.* 1. p. 31. *Comm.* p. 76. *Syn. p. 602.*

Vix nisi colore a Cl. eburnea distincta, ut & sequens; cum vero constantes videntur, ut tales secundum Persoonium propono. Subfistulosa, passim divisa. *In fagetis ad terram. Sept. (v. v.)*

52. *C. nigrata*, cæspitosa, fragilis, fistulosa, laevis, nigra. *Pers. syn. p. 604.*

Duplex forma: a) sequenti major, 3-4 unc. longa, subcompressa, rugulosa, apice saepe reflexo Pers. Comm. p. 78. c) sequenti minor, vix uncialis. Swartz l. c. p. 159. Ad terram graminosam.

53. *C. fragilis*, cæspitosa, fistulosa, fragilis, varia, alba, raro lutescens.

Holmsk. Ot. 1. p. 7. c. ie. Schum. Sæll. p. 404. Cl. vermicul. Auct. G. eburnea. Pers. syn. p. 603.

a. *gracilis*, clavulis subæqualibus 1. sursum attenuatis, Mich. t. 87. f. 13. Fl. Dan. t. 775. f. 2. C. simplex. Retz. V. A. H. 1769. p. 254. G. acuta. Sibth. C. fistulosa. Tode. Cl. fragilis. Pers. Comm. p. 77. ubi syn. ! G. gracilis. Bolt. t. 111. f. 1. Sovverb. t. 232.

b. *cylindrica*, stipite tenui, clavulis turgidis obtusis. Vaill. t. 7. f. 5. Mich. t. 87. f. 10. Hall. 2203. Cl. cylindrica. Bull. t. 463. f. 1. Pers. Comm. p. 76. ubi syn. !

c. *subsolitaria*. Mich. t. 87. f. 6. C. gracilis. Pers. Comm. p. 80.

Gregaria, subcæspitosa, 1-3 unc. longa, subinde furcata, junior farcta, teres, stricta; dein cava, compressa, torta, saepe rugosa; inferne attenuata, dilutior absque stipite distincto; apice demum lutescente. Forma valde variat, hinc apud Auctores multiplicata. Antecedentes colore tantum diversæ videntur Ad terram a. præcipue in ericetis. b. c. in silvis, ubique. Aug.-Nov. (v. v.)

54. *C. vermicularis*, cæspitosa, cylindrica, subulata, flexuosa, solidæ, albissima.

Mich. t. 87. f. 12. Swartz l. c. p. 159. t. 6. f. 2.

"Cæspitosa, tripellicaris. Stipites vix distincti; clavæ cylindricæ, crassitie pennæ columbinæ, arcuatæ, solidæ, sed medio perforatæ" An distincta? In graminosis ad terram, Aug. (v. ic.)

55. *C. canaliculata*, solitaria, alba, clavula compressa, utrinque canaliculata, dein apice obtuso nigrescente, stipite æquali. Fries Obs. 2. p. 294.

Lævis, glaberrima, tota alba. Stipes teres, sat distinctus, subtenax. Clavula stipite duplo longior, linearis, 2 lin. lata, flexuosa l. falcata. Affinis Cl. rugosæ. *Ad terram humidam. Oct. (v. v.)*

56. *C. acuta*, recta, alba, clavula distincta tereti acuminata stipitem æquante. *Sow. t. 333.*

Gregaria, simplicissima, 1-3 unc. alta, lævis, glabra. Pulchra & satis distincta videtur. *In Anglia. (v. ic.)*

57. *C. falcata*, sparsa, incrassata, falcata, obtusa, albida, stipite contiguo pellucido.

*Mich. gen. t. 87. f. 9. Cl. delicatula. Tode. Cl. falcata. Pers. Comm. p. 81. t. 1. f. 3. (ubi syn.) Syn. p. 604. A. S. p. 291.*

Solitaria l. passim geminata, uncialis & ultra. Stipes solidus, subflexuosus, æqualis, lineam haud crassus, basi leviter pubescens, cum clavula continua. Clavula crassior & brevior, intus niveo facta. *Ad terram humosam in fagetis umbrosis, Sept. Oct. (v. v.)*

1. *C. nivea*, simplicissima, cylindrica, apice attenuata alba, radice fibrosa. *Humb. frib. p. 116.*

2. *C. fimbriata*. *With. arr. iv. p. 453.*

3. *C. rubella*. *Pers. Comm. p. 81. (aquose rubella.)*

Quæ restant ad alia genera (Sphæriæ &c.) aut mere monstrositates sunt v. gr. *Cl. ascendens Fl. Dan.*, scilicet stipites Agaricorum &c. Reliqua nomina dubia collecta videas in *Pers. Comm.*, quem in hoc genere stricte sapius secutus sum.

PHALACREÆ species inter genuinas disposui.

### XIII. B. CALOCERA.

CHAR. Ramosa l. simplex, corneo-gelatinosa, tenax, viscosa, radicata; absque stipite discreto. Ascii tenues. Lignatiles, fulvæ l. luteæ; sed sporidia albo videntur, saltim *Cl. viscosæ* &c.

Obs. Nomen a καλος & κερα. Facile, pæ:

cipue si ad differentias microscopicas refugerem, distinctum genus limitesque in natura constantes. Abit contigua fere serie in Acrospermum.

1. *C. C. viscosa*, tenax, viscosa, vitellina, ramis ramulisque furcatis, caule tenui radicato.

*Cl. flammea* & *C. cornuta*. Schäff. t. 174, 289. *Cl. aurea*. Ehrh. exs. n. 28. *C. gelatinosa*; Holmsk. Ot. p. 81. c. ic. *Cl. viseosa*. Pers. Comm. p. 53. t. 1. f. 5. Syn. p. 594. Swartz L. c. p. 152. Dec. st. 6. p. 30.

Cæspitosa plerumque, uncialis & ultra. radice longa pallidiori. Rami teretes l. compressi, æquales, parum divisi. Colore pulcherrimo aureo dignoscitur. *Ad truncos vetustos pineos, ubique. Jul.-Dec. (v. v.)*

2. *C. C. Lauri*, ramosa, striata, sublateritia, ramis vage angulatis obliquis apice obtuso ibique obtuse subcrenatis. Brot. Lus. II. p. 415.

Huc pertinere videtur, præcipue cum polline albo tecta dicitur. *In cortice Laurorum annosarum circa Conimbricam Mayo, Jul.*

3. *C. C. tuberosa*, tenax, flavescens, subsimplex, caule tuberoso radicato. Sowerb. t. 199.

Radix tuber subglobosum, crassum, strigosum. Clavulæ  $1\frac{1}{2}$  - 2 unc. longæ, lineares, simplices, subacutæ, sed 2-3 ex eadem basi proveniunt." Pers. syn. p. 594. *Sub cortice ramorum in Anglia. (v. ic.)*

4. *C. C. furcata*, minor, ramosa, viscosa, lutea, ramis vagis furcatis acutis.

*C. mucida*. Fl. Dan. t. 1305. f. 1.

Sequenti paulo major,  $\frac{1}{2}$  unc. longa, sed tre mellosa gracilior & mollior, ut exsiccata non cornea, sed chartæ adhæreat. Caulis tenuis, subpubescens, radicatus, solitarius. Rami vagi, simplices, laxi. *Ad truncos abiegnos legi, Nov. Dec. (v. v.)*

5. *C. C. cornea*, cæspitosa, minor, simplex ramosa, viscosa, lutea, basi connata,

Batsch. Cont. 1. f. 161. Fl. Dan. t. 1305. f. 2 Pers.  
 Comm. p. 54. Syn. p. 596. Sowerb. t. 40. Swartz l.  
 c. p. 153. C. aculeiformis. Bull. Ch. p. 214 t. 463.  
 f. 4. Dec. Fr. 2. p. 98. C. medallaris. Holmsk.  
 Ot. p. 80. c. ic.

b. conica, exsiccata striata. C. striata. Hoffm. 2. t.  
 7. f. 1.

c. major, gelatinosa, saepe medio coalita. Müll. Eschäft. Berl. Naturf. 3. p. 351.

d. basi tomento annulari cincta. Pers.

E truncorum rimis protrudit radicata, cæspitosa, 2-3 lin. alta & ultra, proprie simplex, sed e pluribus conglutinatis furcata, acuta; recens mollis, sublutea; sicca cornea, rigida, aurantiaca. Stipes vix nullus distinctus. Ad trunco variis, frequens. Jul.-Dec. (v. v.)

6. C. C. Glossoides, gregaria, subtremellosa, flavescentia, clavula compressa, stipite terezi.

Pers. Comm. p. 68. Syn. p. 596. A. S. p. 289.

Vix cæspitosa, molles, simplex, ligulata, subobtusa, stipite distincto, basi nigricante Antecedenti, cui affinis, major ( $\frac{1}{2}$  unc.) & forma diversa. Ad trunco Quercus, passim. Aug.-Nov. (v. v.)

## XV. GEOGLOSSUM. Pers.

Fungi Ophioglossoides. Veter. — Pers. Obs. Myc. I  
 p. 11. Syn. p. 607. Link diss. 1. p. 40. Nees syst.  
 p. 172.

CHAR. Receptaculum erectum, clavæforme, subcompressum, deorsum in stipitem productum. Hymenium concretum, clavulam incrassatam ambiens, undique ascigerum, a stipite vero discretum. Ascii elongati. — Carnosa, tenacella (neutiquam coriacea), simplicia, stipite tenuiori Sporidia 'G. glabri nigra' Bull.; in G. glabro aliisque mihi alba!

HIST. Nomen a γη & γλοσσα. Genus Clavariis nimis affine, ægre admittendum. Ultius

Clavariæ stipite sterili & ab hymenio distincte quoque gaudent, ut habitu magis, quam certo di-  
gnoscitur charactere. Species novem circiter, con-  
stanter terrestres, autumnales, subgregariæ, colore  
nigricante l. viridi tincta.

I. *G. hirsutum*, hirsutum, nigrum.

Fung. ophiogloss. *Raji Hist.* II. p. 104. Cl. ophio-  
gloss. *Schmid.* ic. t. 25. *Holmsk. Ot.* I. p. 18. c.  
ic. *Sowerb.* t. 83. *Schæff.* t. 327. Cl. atra. *Schrad.* -  
*Pers.* *Comm.* p. 37. *Syn.* p. 608. *Swartz in V. A. H.*  
1811. p. 163. *Nees syst. f.* 157. *Schmidt & Kunz.*  
*exs.* 122.

b. *G. capitatum*, *Pers.* l. c. — *Mich.* t. 87. f. 8!

Forma varia, 1-3 unc. alta. Clavula perumque  
elongata, compressa; in b. subrotunda, capitata,  
plicata. Asci paraphysophori. In graminosis, palu-  
dosis alibique, autumno, frequens. (v. v.)

2. *G. glabrum*, glabrum, siccum, nigricans, stipite  
subsquamuloso.

*Vaill. par.* t. 7. f. 3. *Mich. gen.* t. 87. f. 4. Cl. ophio-  
glossoid. *Linn.* - *Bull. Ch.* p. 166. t. 372. *Bolt.* t.  
211. f. 2. *Fl. Dan.* t. 1076. f. 2. *G. glabrum.*  
*Pers. Obs.* 2. p. 61. *Syn.* p. 608. *Swartz l. c. Holl.*  
*& Schmidt exs.* n. 47.

Plures occurunt formæ, quarum forsitan non-  
nullæ distinctæ. a) Gregarium. Stipes elongatus,  
1-3 lin. crassus, tenax, punctato-squamosus, demum  
cavus, basi albido-villosus. Clavula uncialis, sub-  
canaliculata, 2-5 lin. lata, opaca, nigra, sub lente  
reticulata, intus cava cinerea. b) differt colore  
aterrimo, fere nitido, stipite breviori glaberrimo,  
olivaceo-nigro, clavula lœvi. c) ubiginosum P. te-  
nue, colore aquose nigro, stipite imbricato-squamoso.  
*Obs. Myc.* t. 3. f. 4. d) *G. Sphagnoplum* Ehrenb.  
*Ber.* p. 30, magnum, clava olivaceo-atra, stipite  
purpureo-atra. e) colore spadiceo-nigro, superficie  
quasi pingui. *Habitat in graminosis ad terram, fre-  
quens c. d. e. locis paludosis. Aestate, aut.* (v. v.)

3. *G. difforme*, glabrum, laxe, subviscosum, atrum, clavula compressa distincta. *Fries Obs. 1.* p. 150. Gregarium, 2 unc. altum, totum leviter viscosum; sed jove sereno siccum, opacum, stipite brevi. Clavula diffinis, complanata, torta, obtusa. *Ad terram graminosam.* *Sept. Oct.* (v. v.)
4. *G. glutinosum*, glabrum, nigricans, clavula compressa distincta, stipite viscoso. *Pers. Obs. 1.* p. 11. *Comm. p. 38.* *Syn. p. 609.* *A. S. p. 294.* *Fries Nov. Succ. p. 20.*
- Stipes subæqualis, uncialis & ultra, glutine tenaci obductus, spadiceo-nigrieans. Clavula sublanceolata, obsolete viscosa, magis nigra. *Ad terram graminosam, præcipue locis paludosis.* *Aut.* (v. v.)
5. *G. viscosum*, glabrum, viscosum, nigrum, clavula tereti cum stipite confluente. *Pers. Comm. p. 39.* *Syn. p. 609.* *Fries l. c.*
- Antecedentibus minus, angustius, totum viscosum, teres, apice tantum leviter incrassatum, inferne olivaceo-nigrum. *In pratis montosis, fagetis rarius.* *Aut.* (v. v.)
6. *G. olivaceum*, glabrum, siccum, fuligineo-olivaceum, clavula compressa distincta. *Pers. Obs. Myc. 1.* p. 40. t. 5. f. 7. *Syn. p. 616.* *Kunze & Schmidt Myc. Häft. 1.* p. 103!
- Stipes glaber, lutescenti-fuscus, basi leviter incrassatus albidus. Clavula stipite ut plurimum longior, colore in statu senescenti virescente-nigro; intus alba. *In silvaticis.* *Aut.* (v. s.)
7. *G. viride*, subfasciculare, viride, clavula distincta, stipite squamuloso. *Mich. gen. p. 208. n. 7.* *Hall. helv. 2285.* *Cl. serpentina.* *Mull. Zool. Dan. p. 256.* *Cl. viridis.* *Schräd. Fl. Dan. t. 1258. f. 1.* *G. mitrata viridis.* *Holmsk. Ot. 1.* p. 24. c. ic. *G. viride.* *Pers. Comm. p. 40.* *Syn. p. 616.*

Varietates plurimæ: a) *aeruginosum*, siccum, olivaceo-viride, viride l. lutescens, clavula compressa obtusa, stipite distincto squamuloso brevi. b) *atrovirens*, siccum, atrovirens, subcœrulescens, clavula acuta, stipite distincto squamoso. — Prius exsiccatum expallens, hoc fusco-nigrescens. Cf. Kunze & Schmidt l. c. p. 104. c) *viscidum*, olivaceo-viride, viscosum, clavula compressa obtusa, stipite distincto squamuloso. G. viride Schum. p. 408! Nees Syst. f. 159. d) *gracile*, viride, siccum. clavula cum stipite elongato lævi contigua. Nees Syst. f. 158. Ad terram in fageis, paludosis umbrosis &c. Aut. (a. b. d. v. v., c v ic.)

g. *G. atropurpureum*, glabrum, atropurpureum. P.

Clav. *atropurpurea*. Batsch. El. f. 47. Cl. mitrata. Holmsk. Ot. 1. p. 21. e. ic. G. purpurasc. Pers. Comm. p. 39. G. *atropurp.* Obs. Myc. 2. t. 3. f. 5. Syn. p. 609. A. S. p. 294.

*Unciale circiter*, gregarium. Stipes fibrillosus l. squamulosus, firmus, pallidior. Clavula nunc teres, nunc compressa l. bifida & præcipue autumno seriori ventricosa & difformis, a stipite distincta. In graminosis, autumno. (v. v. in Hallandia.)

g. *G. carneum*, tenue, compressum, carneum, stipite albidiori. Schult. Starg. p. 496.

Forsan varietas Clavariæ cujusdam. Clavula subincurvata. Ad vias cavas silvaticas in terra argillacea gregarie, at rarius. Aut.

## XVI. SPATHULARIA. Pers.

Clav. spec. Linn. Elvellæ. Afzel. Spathul. Pers. Comm. p. 54. Link diss. 1. p. 40. Nees syst. p. 171.

CHAR. Clavula (hymenium) verticalis, compressa, utrinque in stipitem discretum decurrens, superne aëcis tectum. Aëci subelongati. — Carnose-membranacea, simplex, distincte stipitata. Sporidia tenuissima, elastice avolantia, ut in Pezizis,

HISTORIA: Genus omnino distinctum, ad Mitratos abiens. Nomen a forma spathulata. Species unica hactenus, epiphyta, autumnalis.

## 2. SPATHULARIA flava.

*Elvella clavata*. Schæff. t. 149. Cl. spathulata. Fl. Dan. t. 653. Schmied. Ic. t. 50. f. 1. Helv. Afzel. in V. A. H. 1773. Sowerb. t. 35. H. feritoria. Bolt. t. 97. Spath. flava. Pers. Comm. p. 34. Schmidt & Kunz. exs. 194. Spreng. Grunz. Bot. p. 597. Sp. flava & rufa. Swartz V. A. H. 1812. p. 10, 11. Nees syst. f. 156. A. B.

Color primo pallidus, dein luteus l. subferrugineus, stipite albidiore. Varietates plurimæ, Cf. Schum. l. c. forsan distinguendæ: a) *lævissima*, clavula plana ovata stipiteque tereti lævissimis. b) *cava*, clavula crassa, ventricosa, stipite deorsum incrassato subcavo. c) *vulgaris*, stipite compresso subæquali, clavula plana sæpe bifida rugulosa. d) *undulata*, pileo inflato lacunoso, stipite lævi deorsum attenuato pallidiori. *Frequens ad folia dejecta, mucos putrescentes* &c. Aut. (v. v.)

---

## XVII. MITRULA. Fries.

*Leotias* spec. Pers. syn. p. 611.

CHAR. Clavula (hymenium) ovata, lævis, unidique ascigera, basi stipitem discretum arcte ambiens. Asci elongati. — Carnosa, simplex, distincta stipitata. Sporidia elastice avolantia.

HISTOR. Medium genus inter Spathulariam & Typhulam, sed bene distinctum. Nomen a forma mitrata. Species minores, epiphytæ, stipite simplici. Clavula in genuinis cava, nec a stipite percursa, ut in aberrante HEYDERIA.

2. *M. paludosæ*, media, clava obtusa lutea, stipite pallido. Fries in Liljebl. Sv. Fl. 3. p. 664.

Fungus fontanus &c. Raji syn. p. 23. Cl. phalloides. Bull. Ch. p. 214, t. 463, f. 3. Cl. epiphylla. (So-

*werb.* t. 293. non vidi). *Dicks.* Cr. 3. p. 22. t. 9.f. 20. *Helv.* laricina. *Vill.* Delph. t. 55. teste Dec. - *Leotia Ludwigii*, *Dicksconii*, *Bulliardii*, laricina. *Pers.* syn. p. 611—614. t. 3. f. 13. *Swartz l. c.* p. 21, 22. *A. S.* p. 296! *Fl. Dan.* t. 1377. *Helv.* *Bulliardii*. *Dec. fr.* 2. p. 95.

**Gregaria**, subcæspitosa, fragilis, glabra, intus tota cava, aqua sæpius repleta. Stipes nunc rectus uncialis, nunc elongatus flexuosus, albus, dilute incarnatus l. flavescens. Clavula forma varia, 2-4 lin. longa, raro bifida. *Supra folia putrida in paludosis, frequens.* *Majo-Aug.* (v. v.)

2. *M. minuta*, minima, clavula lanceolata lutea, stipite æquali pallido.

**Cl. minuta.** *Sowerb.* t. 391.

Tota vix 2 lin. alta, indeque a priori distinguenda videtur. *In Anglia ad bracteas Dipsaci pilosi, gregarie.* (v. ic.)

3. *M. mucerdaæ*, minutissima, clavula subglobosa rubro-carnea, stipite albido.

**Cl. mucerdaæ.** *Schum.* *Sæll.* p. 405.

Sparsa, carnosa, mucoriformis, stipite subbrevis cylindrico, clava etiam subovata & tuberculata. *In mucerdis locis paludosis Sællandiæ lecta.* Sept. (v. ic.)

## XVII. B. HEYDERIA.

*Mitrula.* *Pers.* *disp.* *Leotia.* *Link.* *diss.* l. c. *Nees syst.* 1. p. 173.

**CHAR.** Stipes clavulam, inde solidam, penetrans. Hymenium basi subsolutum.

**O b s.** Habitu, loco natali omnibusque reliquis characteribus cum *Mitrula* convenit, hinc hoc loco subjunxi. Occurrunt quoque *Morchellæ* stipite pileum non & totum penetrante.

1. *M. HEYDERIA Abietis*, parva, clavula einnamomea, stipite badio.

*Elv. cueullata*, Batsch. Cont. I. f. 132. Cl. ferruginea. Sowerb. t. 84. M. Heyderi. Pers. disp. p. 36. t. 3. f. 12. Fl. Dan. t. 1670. f. 2. Leotia Mitrula. Pers. syn. p. 611, A. S. p. 295. Schmidt & Kuniz. exs. n. 98.

Gregaria, sicca, tenacella,  $\frac{1}{2}$  unc. & ultra. Stipes subflexuosus, filiformis, nigricans, glaber l. deorsum præcipue tomentosus. Clavula conica l. ovata, 1-2 lin. longa, obtusa, lævis, expallens. In foliis Abietis, frequens, fere perennis. (v. v.)

2. *M. HETDERIA pusilla*, minima, clavula ferruginea, stipite pallidiore.

Leot. mitrula. V. A. S. p. 295. L. pusilla. Nees syst. p. 173. f. 160.

Priori maxime affinis, sed notas allatas constanter servat & loco insuper differt. Tota 1-3 lin. longa. Stipes capillaris, flaccidus, glaber, expallens, basi floccis adfixus. Clavula ovata l. subrotunda, obtusissima. In acubus Pini silvestris. Oct. Nov. (v. v.)

### XVIII. CRINULA. Fries.

*Crinium*. Fries Nov. V. p. 79.

CHAR. Receptaculum erectum, cylindricum, hymenium apicem cingentem penetrans. Hymenium heterogeneum, discretum, capituliforme, deliquescent, sporigerum. — Stipes subsimplex, cornutus; capitulum gelatinosum.

HIST. Nomen a κρινω, oblineo. Ex altera parte Mitrulis, ex altera Periconijs l. Cephalotrichis sat affinis. Species unica, corticola, perennis.

1. CRINULA *Caliciiformis*.

Gregaria, inter fibras corticis eximie radicata, nigricans, cornea, tenax, glaberrima, 2-5 lin. longa. Stipes sursum attenuatus, teres, lævis, lineam vix erassus, firmus, opacus, aterrimus, intus cavus, flo-

eis cinereis laxis farctus. Clavula (l. hymenium apicem stipitis cingens) minuta, ovata, obtusa, 1 lin. vix alta, lœvis, mollis, olivacea; dein jove pluvio gelatinosa, alba, deliquescens. Ascis nullos observo, sed parcos floccos; non tamen quales in Cephalotricho. In cortice dejecto Tiliae. (1815—1817 unico loco) Perennis. (v. v.)

---

### XIX. TYPHULA. Fries.

Fries Obs. Myc. 2. p. 296. Clav. spec. Aut.

CHAR. Hymenium (Clavula) subcylindricum, undique sporigerum, ascis ob tenuitatem plerumque oblitteratis, discretum a stipite capillari. — Clavula carnosa; stipes tenacellus, saepe pubescens, variat simplex & ramosus.

HIST. Genus Clavariz in Mucedines abiens. Species quoque ad Himantiam, Chordostylum & Clavariam relatæ fuerunt; omnes tenellæ, in foliis l. stipulis putrescentibus nascentes, aliæ Sclerotis simul innascentes. Nomen a Typha derivatum.

1. *T. Todei*, clavula flava, stipite glabro albo, tuberculo nullo. Fries l. c. p. 298.

Tenuis, flaccida, uncialis usque. Chordostylum Clavaria Tod. Meckl. t. 6. f. 55, si non hujus loci, maxime saltim affine. In stipitibus & frondibus Pteridis aquilinæ putrescentibus frequens. Aut. (v. v.)

2. *T. gyrans*, simplex, alba, stipite pubescente, basi tuberculo innato. Fries l. c.

*Clav. gyrans*. Batsch. Cont. 1. f. 194. Pers. syn. p. 606. A. S. p. 292. Swartz in V. A. H. 1812. p. 162. Dec. fr. 6. p. 29.

3. *Cl. granulata*. Willd. Ber. t. 7. f. 17. Pers. l. c.

Tuberculum radicale Sclerotium omnino refert, globosum l. oblongum, lœve, pallidum, dein fuscescens, etiam rugosum. Stipes debilis, subdecurrentis, sub lente pubescens. Subinde tubercu-

Num radicale deest. Ad folia putrescentia, stipulas  
Ec. frequens. Aut. (v. v.)

3. *T. phacorrhiza*, simplex, pallida, glabra, stipite  
fuscescente, tuberculo innato. Fries l. c. p. 298.

Clav. Reichard in Schrift. Naturf. Fr. Berl. t. 9. f. 4,  
5. Sowerb. t. 253. Pers. syn. p. 607. Swartz l. c. p.  
162. A. S. p. 293.

Tuberculum radicale primo laxe & pallidum,  
dein corrugatum fuscescens, exsiccatum nigrum,  
non constanter præsens. Stipes subrectus, 2-4 lin.  
longus, glaber. Clavula longior, linearis-subulata.  
Magnitudo variat. In folia decidua ad terram. Aut.  
(v. v.)

4. *T. erythropus*, simplex, clavula glabra alba, sti-  
pite stricto atro-rubente. Fries l. c. p. 297.

Clav. gyrans. Bolt. t. 112. C. erythropus. Pers. Comm.  
p. 84. Syn. p. 297. t. 2. f. 14. A. S. p. 293. Dec.  
fr. 6. p. 29.

Tuberculum depresso, corrugatum, nigrum.  
Stipes  $\frac{1}{2}$  unc. longus, subcorneus, vix nisi sub len-  
te pubescens, apice dilutior. Clavula cylindrica,  
glabra, 2-3 lin. longa. Desideratur etiam in hac  
subinde tuberculum. Ad stipites, folia Ec. passim.  
Aut. (v. v.)

5. *T. villosa*, simplex, clavula turgida pallida vil-  
losiuscula, stipite glabro rubente-badio.

Cl. capillaris. Holmsk. Ot. 1. p. 3 cum. ic. ? Cl. vil-  
losa. Schum. Sæll. p. 406. (quem sequor.)

Habitus omnino prioris; gregaria, minima;  
stipite elongato basi crassiusculo, sursum attenuato;  
clavula ovata l. obovata, albido-pallida. Inter folia  
decidua Alni, Aut. (v. s.)

6. *T. tenuis*, simplex, glabra, atra, apice incrassata.  
Sowerb. t. 586. f. 5. (Clav.)

Tuberculum nullum. Gregaria, tenuissima, ca-  
pillaris, 2-3 lin. alta. An hujus generis? In An-  
glia. (v. ic.)

7. *T. filiformis*, subramosa, spadicea, clavulis incrassatis albidis.

*Clav. Bull. Champ. p. 205. t. 448. f. 1. Sowerb. t. 387.  
f. 4. Dec. fr. 2. p. 98. Himantia lateritia. Pers.  
syn. p. 704.*

Decumbens, serpens, libera, subflexuosa, modo fusca, modo cinereo-fuscescens, ut plurimum lateritia. An & huc *Cl. filiformis* Schum. Sæll. p. 407. albido-umbrina, undique albo-sericea? *Ad folia decidua. Aut. (v. ic.)*

8. *T. ramentacea*, ramosa, decumbens, capillaris, alba, apicibus incrassatis.

Tota candida, glabriuscula. Stipes capillo fere tenuior, 2 unc. longus circiter, ramosus; rami vagi, pauci, erecti, laxi, 1½ unciales, cum clavula confluentes. Admodum delicata, ut conservari nequeat. *Supra finum vaccinum loco silvatico semel. Sept. (v. v.)*

*Clav. penicillata*, exigua, elongata, gracilis, glabra, lutea, apice penicillatim dissesto. — *Vail. par. t. 8. f. 3. Bull. Ch. p. 207. t. 448. f. 3. Dec. fr. 2. p. 99* — genus inquirendum. (Altera species *C. penicillata*. Schum. l. c. atrofusca.)

*Cl. thermalis*, coriacea, siccatione durissima, ramis cylindricis acuminatis simplicibus l. irregulariter divisis. *Dec. syn. p. 20.* Non ad hunc ordinem pertinet!

*Cl. felina*, *Dec. fr. 6. p. 30.* aliæque species ad Ixias spectant.

## XX. PISTILLARIA. Fries.

CHAR. Receptaculum tenue, cylindricum, absque stipite discreto. Hymenium concretum, totam fere superficiem occupans, lave; sed superne tantum sporigerum. Asci oblitterati. Sporidia emergentia. — Carnosæ, simplicissimæ, clavatæ l. linearæ; ob hymenium inferne sterile basi dilutiores subinde evadunt, quasi stipitatae.

HIST. Clavaria in Epiphytos abiens. A Typhulis proximis differt ut Mitrula a Clavaria. Nomen a forma pistillari. Species exiguae, tenues, epiphytæ, subserotinæ.

1. *P. micans*, obovata, micante-rosea, stipite brevissimo albicante.

Clav. acesospermum. Hoffm. Fl. Germ. Crypt. t. 7. f. 2. Cl. micans. Pers. Comm. p. 85. Syn. p. 604. A. S. p. 291. Dec. fr. 2. p. 96.

Sparsa, subgregaria, minuta, vix lineam superans, proprie glabra, sed e sporidiis emergentibus pruinosa. Stipes non discretus, modo dilutior ob hymenium deficiens ut in ultimis Clavariis. Ad stipites & folia, vere. (v. v.)

2. *P. ovata*, obovata, candida, stipite brevissimo pellucido.

Pers. Comm. p. 85. Syn. p. 605. A. S. p. 292. Cl. pumilla. Swartz in V. A. H. 1811. p. 161.

Cognata priori, sed major 2-3 lin., intus casæ Mitrula instar, subinde compressa & lobata (Sowerb. t. . . ). Etiam hæc e sporidiis pruinata. In stipulis, foliis deciduis. Forsander. "Jun." Oct.-Dec. (v. s.)

3. *P. quisquiliaris*, sursum incrassata, candida, cum stipite confluens. Fries Obs. 2 p. 294.

Clav. obtusa. Sowerb. t. 334. f. 1.

Gregaria, 3-4 lin. longa, apice incrassata passim complanata l. bifida, tota lævis & glabra. Sowerb. l. c. f. 2. alia species stipite hispidulo, quam in filicibus, hanc vero in ramulis nascentem pingit. In stipitibus & frondibus Pteridis emortuis autumno. (v. v.)

4. *P. Sclerotiooides*, sursum incrassata, rufescens, basi tuberculo atro innata. Dec. fr. 6. p. 29. (Clav.)

Sub epidermide nascuntur tubercula compacta  
Sclerotioidea nigra, intus alba, superficie punctata &  
granulata, e centro protrudentia clavulam 2-3 lin.  
longam, carnosam, deorsum attenuatam, glabram,  
obtusam, recentem ut videtur albam. In Gentianæ  
luteæ caulis exsiccatis, in monte Jura. Aestate.

5. *P. muscicola*, subfiliformis, sursum leviter in-  
crassata, alba, basi dilatata.

Clav. Pers. Obs. Myc. 2. p. 60. t. 3. f. 2. Syn. p. 606.  
Swartz l. c. p. 161. Nees syst. f. 154. Cl. uliginosa.  
Wallr. Ann. Bot. — sec. Kunze.

Tuberculum radicale, quod Persoon pingit, non  
observamus, tantum basin dilatatam fibrillosam.  
Gregaria, 2-4 lin. longa, subcurvata, obtusa, glabra.  
*Inter folia viva Hypni triquetri* (Persoon), *Leskeæ polyanthæ in Suecia*. (Wrangel, Lib. Baro.) (v. s.)

6. *P. diaphana*, bulbosa, sursum attenuata, alba.

Clav. Schum. Sæll. 2. p. 405.

Sparsa, pusilla,  $1\frac{1}{2}$ -2 lin. fere longa, basi bul-  
bo ovato flavescenti-pellucido; sursum sensim atte-  
nuata, incurva, candida, diaphana. *Supra folia de-  
jecta Fagi. Oct. Nov.* (v. ic. & s.)

7. *P. pusilla*, linearis, glabra, alba.

Clav. Pers. Comm. p. 86. t. 3. f. 6. Syn. p. 605.

Gregaria, minima, 1 lin. haud attingens, hinc  
nudo oculo vix observanda. Recens alba recta, ex-  
siccata pallida, marcescens A. S. p. 292. Intus so-  
lida & absque stipite, hinc a P. ovato diversa. *Ad  
folia delapsa Betulæ Ec.*, sero autumno, passim. (v. v.)

## REVISIO HUJUS ORDINIS:

I. Fungi *Pileati* & *Clavati* unicum modo proprie constituant ordinem, nempe *Hymenomycetes hymeninos* l. genuinos, (centrum hujus classis, quare & reliquos ordines simul sumtos specierum numero antecellunt.) Abit vero hic ordo, ut & centrum reliquarum Clasium, in duas series, *Hymenomycetes verticales* (*Clavatos*) & horizontales (*Pileatos*.) Hos esse perfectiores docet non receptaculum solum, sed & hymenium in Clavatis semper laxe.

II. At prius ulterius progredior, genera Clavatorum exponenda. Quæ p. 456 & sq. de dispositione Pileatorum disserui, etiam de his valent. Quamvis enim in diversis ordinibus diversas sequi videamus rationes, tamen ex eodem principio derivantur, mutatis modo, quæ ab ipsius ordinis charactere pendent. Sic Clavatorum hymenium semper laxe nullas offert differentias. Quæ inter Pileatos sectiones, genera modo inter Clavatos indicant aut potius unicum tantum genus in quavis sectione. Quattuor igitur Clavatorum genera primaria, nempe

**CLAVATI** proprii — *Clavaria*.

- in Uterinos abientes — *Spathularia*.
- in Mucedines abientes — *Typhula*.
- in Epiphytos abientes — *Pistillaria*.

Reliqua genera l. subgenera secundæ dignitatis, intermedia.

**CLAVARIA** abiens in Spathulariam — *Geoglossum*.

- abiens in Typhulam — *Phalacrea* (*Crinula*).
- abiens in Pistillariam — *Calocera*.

**SPATHULARIA** abiens in Typhulam — *Mitrula*.

- abiens in Pistillariam — *Heyderia*.

**TYPHULA** abiens in Pistillariam — *Pterula*.

Restat genus maxime memorabile: *Sparassis*, quod est Fungus *Clavatus* in pileatum abiens. Eo-

dem modo est MORCHELLA fungus mitratus in Clavatos abiens. Ulterior significatio unicujus generis ex idea classis, quam representat, elicienda.

III. Hæc, quæ a priori quodammodo didicimus, omnia in natura confirmant. *Pistillaria*, quæ Epiphytis correspondet, in organismis vivis l. sæpius emortuis nascitur. *Typhula* inter organismata putrescentia & *Spathularia* in putrefactis vigent. *Clavariæ* tandem potissimum Geogeniæ RECEPТАCULUM in *Pistillaria* vix ullum, in *Typhula* mucidineum, in *Spathularia* Uterinis (Morchellis) proximum & in *Clavaria* perfectissimum. Tandem & HYMENIUM *Pistillariæ* terminale tantum (sed contiguum), ascis destitutum, sporidiis suspectis; *Typhulæ* terminale, discretum, ascis obliteratis (subinde forsan in floccis solutis v. gr. *T. villosa*) sporidiis parcis; *Spathulariæ* terminale, discretum, ascis & sporidiis omnino Pezizæ; *Clavarie* totam fere superficiem occupans, ascis & sporidiis distinctis e. s. p. Genera secundaria etiam in his intermedia.

IV. Fungi Mitrati, a recentioribus hue relati, certe ad Hymenomycetes Uterinos pertinent. Affinitatem inter Pezizas & Helvellas omnes perspexere; veteres sub eodem genere (*Fungoides Michel. Eivella Gleditsch.*) jungunt. Vidimus quoque in natura Pezizas stipitatas perfectissimas (geogenias) v. gr. *P. macropodem*, *craterellam*, *bulbosam*, *acetabulum* &c. contigua serie in Helvellas v. gr. *H. fistulosam*, *albidam* & Leotias abiere. Eodem modo Pezizæ sessiles perfectiores (geogenix, *P. leporina*, *alutacea* &c.) mediante *Discina* (genere novo & maxime peculiari) in Rhizinam transeunt \*). Tendunt enim Hymenomycetes uterini (Cupulati) etiam ad hymenium dilatandum (infimæ v. gr. *Soleniæ* constanter urceolatae), hinc primo planæ, dein convexæ eva-

---

\*) Etiam apud inferiores Pezizas occurunt convexæ, quale inter stipitatas genus *Helotium* P. & inter sessiles *P. convexula* &c. — Inter Pileatos inferiores forma cupulata etiam obvia e. s. p.

dunt. Est igitur Mitra tantum cupula reversa, quæ in perfectissimis ad superficiem fructificantem multiplicandam tendens gyrosa & rugosa evadit. Ut fungus clavatus ad summam perfectionem tendens perit (p. 462.) & pileatus evadit, sic & ctipulatus in formam mitratam transmutatur. Analogia quidem, sed nulla affinitas, inter formas pileatas Hymenomycetum Uterinorum (Mitratos) & Hymeninorum (Pileatos veros) Exiguus illorum & ingens horum numerus ex eo pendens, quod forma pileata inter illos peregrina, sed inter hos naturalissima, e. s. p. Qua ratione Fungos Clavatos Mitratis, quamquam hi per se perfectiores, anteposui, in Conspectu Systematis demonstravimus.

V. Sed ad originem Clavatorum revertamur. Formam *globosam* esse simplicissimam & elementarem novimus. Hæc in duas directiones horizontaliter (*dilatando*) & verticaliter (*elongando*) ad ultiore evolutionem primo tendit. Vidimus hoc in infimis hujus Classis, Sclerotii nempe, quæ proprie globosa, sed perfectioria collabunt (*Scler. scutellatum &c.*) 1. elongantur (*Xyloglossum P.*) & infimum typum Fungi Uterini & Clavati in hac classe constituant. — At in his ascis & sporidia cum receptaculo confusa; per chemicam decompositionem secedent sporidia in Tremellinis & primum ad tertiam dignitatem erecti flocti in ascis abeunt.

VI. Hoc modo oriuntur Fungi clavati genuini. Fungus (qui totus est fructus) in his adhuc modo *caulis*, primo brevis & simplex, dein magis inagisque elongatus l. in ramos ramulosque abiens. Ulterius hæc forma progredi nequit: neque caulis in plantis perfectioribus, secundum theoriam Linnaeanam de origine floris; ut vero, secundum Eundem (Cf. *Linn. Detic. Nat.*) e foliis verticillatis & caule apice rumpente flos emergit, sic & inter Clavatos e ramulis verticillatis & clavula apice rumpente formatur pileus, forma omni respectu perfectissima in regno Mycetoidæ.

VII. Hunc modum, quo fungi Clavati in Pileatis transmutantur, in limine hujus ordinis exposui. Simplices ad hymenium amplificandum tendentes apice dehiscunt & umbilicatae evadunt. Infimi igitur sunt e Pileatis, qui umbilicati. Hos in juniori statu clavatos esse optime evincit descriptio *Hydnia cinerea*, *cyathiformis*, *Boleti biennis* &c. apud Bulliardum; ipse in omnibus comprobatum vidi. — Sed & alia fuit ratio. Hymenium, quod Clavatis superum, hoc modo in Pileatis inferum non frustra evadit. Est enim Clavatis hymenium laxe & aquæ atmosphoricæ aliarumque externarum injuriarum non impatiens; sed apud Pileatos (ob substantiam delicatorem & perfectiorem), pluviis &c. infestatum, asci & sporidia, immo pori & lamellæ aqua refertæ; destruuntur. Necesse igitur fuit, ut pluteo quodam superne tegerentur. Hinc, mediante luce, formatur Pileus — Ulterius hoc confirmatur e mutatione pilei s. fungorum pileatorum nisi paginam sterilem versus lucem (horizontaliter) disponere. Si enim fungum, facilime epixylum, cum matrici in situ præternaturali, resupinato puta, collocaveris, hunc, petiolo curvando, formam horizontalem resumere invenies; eodem modo a folia perfectiorum plantarum resupinata &c. Hinc explicatur non solum stipitis e situ horizontali l. verticali forma, sed & quare fungi pileati, locis horizontalibus resupinatis, resupinati evadunt.

VIII. Data hac occasione de fungorum Pileatorum in cryptis nascentium, monstrositatibus paucissima addere, a re haud alienum puto. Plurima attuli exempla pileum in fodinis, arboribus cavis &c. oblitteratum totumque fungum Clavæformem evadere Cf. *Polyporum imbricatum* b. (Genus *Cladoporus* Pers.), *P. odoratum* b. c., *P. squamosum*, *Agaricum lepideum*, *lignatilem*, *serotinum*, *conigenum* &c. Ad lucem, mœre plantarum perfectiorum, tendentes valde elongantur & pileus, luce privatus, formari nequit. Fungi vulgo sessiles in cryptis stipitatae evadunt. Cf. *Polyp. versicolorem* &c. Hymeni-

um tum totam superficiem occupare facile patet; inde oritur *Hydn. corolloides b. etc.*; præcipue singularis *B. fodinalis* Humboldt. — De his plura alibi afferam experimenta. — Cf. de Patria *Clavatorum* p. 453; simile quoque in aquosis. Cf. p. 479. *Clav. vivipara*).

IX. Reliqui Clavati, in quibus hymenium præ reliquis organis non eminet, ad suas Classes referendi. Sic ob sporidia perfectissima *Podisoma* ad Coniomycetes hymeninos, ob floccos exosporios *Isaria* ad Hyphomycetes, ob uterum *Onygena* &c. ad Gastromyces pertinent.

Quæ exponenda restant, ad finem hujus classis I. Systematis explicare conabimur. Quamdiu enim ratio quædam latet, quamdiu phænomenon quoddam non explanatum restat, tamdiu Systema nondum absolutum putamus,

---

## OMISSA.

- p. 28. 5. *A. constrictus*. Perfectiora specimina reperta (ad Saundby). Stipes etiam equalis, squamulosus. Pileus compactus, junior margine involutas. Lamæ le etiam emarginatæ.
- p. 105. 12. *A. miniatus*. Variat lamellis decurrentibus. *A. coccinellus* Ehrenb. silv. p. 31. sec. iconem Aucteris.
- p. 188. 7-8. Ag. *copulatus*, subimbricatus, pileo subcoriaceo hirsutulo fusco-pallido, basibus angustis temento tenui copulatis, lamellis confertis intensius coloratis. Ehrenb. Fung. Chamiss. n. X. t. 18. f. 5.  
 "E fibris brevibus dilute fuscis, tomentum late effusum tenue efficientibus, emergunt globuli, qui in pileos abeunt. Pileus tenuis subcoriaceus, qualis *A. stiptico* P. hoc minor, basi angustus, sectorem circuli deformem refert. Lam. tenuissimæ, rarius connexæ decurrentes. Medius inter *A. stipticum* & *mollem*, forte Crepidotus. In truncis Brasilicæ (v. ic.).
- p. 263. *A. arvalis*. Videtur *A. semiorbiculatus* Bull. t. 422. f. 1.
- p. 279. 5-6. Ag. *Scambus*, pileo subcarnoso sericeo albido, lamellis argillaceis, stipite squamuoso albido, basi villoso. Fries Obs. 2. p. 45!
- p. 304. 14-15. *A. conocephalus* A. S. & noster a Bulliardi diversus pileo lævi albo, lamellis adnexis, fuscis. Dicendus *A. conopilus*. — Sequentes (16-18) videntur potius Coprini, præcipue *A. disseminatus* (*A. micaceo proximus*), cui etiam velum universale.
- p. 320. 8. *C. lutescens* Adde: *Merulius villosus* Dittm. apud Sturm. t. 30. optime!
- p. 330. SCHIZOPH. *commune*. Adde: Scaphophorum Agaricoides. Ehrenb. l. c. p. 18. (ex insula Radack maris pacifici), qui peculiarem de hoc fungo attulit conjecturam, Hysteris nempe esse proximum ideoque nec pileum nique lamel-

Ias esse genuinas. Receptaculum autem illud tomentosum omnino, quale in pileatis dimidiatis multis Meruliis, Hydnis &c. & resupinatis plurimis. Lamellas esse genuinas descriptio facile evincit; nullibi asci in ipsis valvulis perithecia immersi &c. &c. &c. Etiam vero si spuriæ essent, nomen ab harum habitu optimum foret &c. Sic & res & nomen salva manent.

- P. 332. 1-2. DÆDALEA *spadicea*, pileo suberoso planiusculo tomentoso spadiceo, sinulis labyrinthiformibus dentato-laceris, stipite brevissimo.  
Hydn. spadic. Pers. ic. & descr. p. 34. t. 9. f. 1-3.  
Syn. p. 557. A. S. p. 267. Wahlenb. Ups. p. 461.  
Sistotr. Swartz in V. A. H. 1810. p. 238.

Stipes vix uncialis, crassus, difformis, subtuberous, scabrosus. Pileus spithameus, pedalis & ultra, repandus, simplex l. imbricatus, superficie demum secura. Sinuli primo gyrosi lutescentes, dein laceri concolores. Color coffeoideus. substantia & sporidiorum subferrugineus. An satis differunt *D. maxima* & *biennis*? Ad terram in pinetis, aut. sed perennans. (v. ic.)

- P. 350. 11. *P. xanthopus*. Huc & B. Katui Ehrenb.  
l. c p. 17. f. 12. (margine repando.) — Ex insula Radack maris pacifici.

- P. 366. 4-5. POL. *suberosus*. Apus, utrinque convexus, pileo aspero margineque obtuso pallide lutescente, poris albidis.

Boletus. Wahlenb. Ups. p. 457.

"Forma pulvinata tam crassa, ut diametros perpendicularis radio horizontali neutquam duplo minor sit Margo etiam crassus, obtusissimus." Affinis Dæd. gibbosæ, sub qua ob poros angulatos & flexuosos synonymon Linnæi relinqu. Ad trun-  
cos arborum frondosarum.

- P. 370. 12. b. *P. sector*, apus, pileis membranaceis cuneatis zonatis striatis pallide fuscis, poris minutis fusco-brunnis.

Boletus. Ehrenb. Fung. Cham. p. 10. t. 18. f. 6..

Pilei fere trianguli, basi valde angustati, se-  
torem circuli adæquantes, vix  $\frac{1}{2}$  lin. crassi, e to-  
mento adpresso striati & margine fibrosi. Pori bre-  
ves, dissepsimentis prominulis. In corticibus emor-  
tuis Brasilicæ. (v. ic.)

p. 584 insere: VI. B. POROTHELEUM.

Fries Obs. Myc. 2. p. 272.

CHAR. Resupinatum, effusum, immarginatum,  
ambitu byssino subfimbriato. Pori in papillis di-  
stinctis superficialibus Ascii nulli. (*Solenia*)

1. *P. P. fimbriatum*, candidum, ambitu laciniis te-  
retibus fimbriatum, poris centro confluentibus.  
*Fries l. c.*

*Bolet. byssinus*. Schrad. spic. p. 172. t. 3. f. 1. Pers.  
syn. p. 548. *Bol. fimbriatus*. Pers. syn. p. 546.

Fungus elegantissimus, late effusus, membrana-  
ceus, centro glabriusculus. Pori centrales confer-  
ti, marginales magis distantes, omnino superficiales,  
*Ad cortices Quercus Fagi, &c. Aut.* (v. v.)

2. *P. P. subtile*, nivolum, subfimbriatum, poris di-  
stantibus demum obliquis.

*B. subtilis*. Schrad. spic. p. 173. t. 3. f. 2. Pers. syn.  
p. 548. *A. S.* p. 259.

In statu juniori subrotundum, ambitu laciniis  
planis fimbriatum, poris brevibus obtusis (*Poroth.*  
*tacerum* Fr. Obs. l. c.); dein late effusum, mem-  
branaceum, laxe, subnitidum, ambitu oblitterato.  
poris elongatis horizontalibus. *Ad cortices Juniperi*  
*&c. Aut.* (v. v.)

p. 369. FISTUL. Adde *Buglossus* Wahl. Ups. p. 459!

Sequentes icones e Svensk Botan. addendæ:

- p. 16. *Ag. muscarius*. Sv. Bot. t. 108.
- 22. *A. ermineus*. Sv. Bot. t. 596. f. 1.
- 244, 246. *A. Junonius* & *erebius*. Ibid. t. 584.
- 280. *A. cretaceus*. Sv. Bot. t. 596. f. 2.
- 366. *Pol. suaveolens*. Sv. Bot. t. 221.
- 572. *P. pinicola*. Sv. Bot. t. 480.
- 574. *P. fomentarius*. Sv. Bot. t. 167.
- 575. *P. ignarius*. Sv. Bot. t. 125.
- 401. *Hydn. infundibulum*. Sv. Bot. t. 492

## Index Generum et Specierum.

<b>AGARICUS.</b> Linn.	p. 8.	asper P.	p. 18
acerbus Bull.	- 49	aspideus Fries	- 63
acerosus Fries	- 191	asprellus Fr.	- 268
acervatus Fr.	- 122	astragalinus Fr.	- 25
acris Bolt.	- 65	astroideus Fr.	- 312
aeratus Pers.	- 253	atomatus Fr.	- 298
adhwærens A. S.	- 96	atramentarius Bull.	- 303
adiposus Batsch. Fr.	- 242	atratus Fr.	- 168
Adonis Bull.	- 151	atroalbus Bolt,	- 141
adstringens Pers.	- 195	atrocœruleus Fr.	- 190
adustus Pers.	- 60	atrocyanus Batsch.	- 147
æruginosus Curt.	- 286	atropunctus Pers.	- 195
æstuans Fries	- 47	atrotomentosus Batsch.	- 272
affricatus Fr.	- 162	atrovirens P.	- 43
Albertini Fr.	- 179	Aueri Sadl.	- 154
albobrunneus Pers.	- 37	aurantiacus Fr.	- 68
alboviolaceus P.	- 218	aurantius Schæff.	- 39
albus Schæff.	- 53	aurantiomargin. Fr.	- 115
alcalinus Fries	- 142	aureus Matt. Bull.	- 241
aleuriatus Fr.	- 238	auricula Dec.	- 85
algidus Fr.	- 190	aurivellus Batsch.	- 242
alliaœus Jaq.	- 140	barbatus Batsch.	- 237
alnicola Fr.	- 250	Battaræ Fries	- 175
alutaceus P. Fr.	- 55	bellus P.	- 107
amadelphus Bull.	- 135	Bertieri Fr.	- 176
amarus Fries	- 87	hivelus Fr.	- 215
ambustus Fr.	- 158	blattarius Fr.	- 246
amiotus Fr.	- 141	blennius Fr.	- 67
amplus Pers.	- 95	bolaris P.	- 228
androsaceus Linn.	- 137	Boltonii P.	- 303
angustus Pers.	- 195	bombycinus Schæff.	- 277
anomalus Fries	- 220	brumalis Fr.	- 172
apalus Fr.	- 268	brunneus P.	- 211
applicatus Batsch.	- 192	bufonius P.	- 83
aquilus Fr.	- 203	bulbiger A. S.	- 27
aquosus Bull.	- 125	bulbosus Sow.	- 214
arcuatus Bull.	- 103	bullaceus Bull.	- 297
ardosiaeus Bull.	- 198	Bulliardii P.	- 221
argematus Fries	- 75	butyraceus Bull.	- 121
argentatus P.	- 218	byssisedus P.	- 276
armeniaeus Schæff.	- 234	cæsareus Schæff.	- 15
armillatus Fries	- 214	calamistratus Fr.	- 256
aromaticus Sow.	- 55	callisteus Fr.	- 223
arvalis Fries	- 263	callosus Fr.	- 292
æsemus Fr.	- 221	calochreus P.	- 229

<i>calephyllus</i> P.	p. 210	<i>cohærens</i> P.	p. 253
<i>calopus</i> P.	- 130	<i>collinitus</i> Sow.	- 248
<i>camarophyllus</i> A. S.	- 99	<i>collinus</i> Scop.	- 124
<i>campanella</i> Batsch.	- 167	<i>Columbetta</i> Fr.	- 44
<i>campanulat</i> Bull.	- 296	<i>comatus</i> Müll.	- 307
<i>campestris</i> Linn.	- 281	<i>comitalis</i> P.	- 86
<i>camphoratus</i> Fr.	- 218	<i>compactus</i> Schum.	- 290
<i>canaliculatus</i> Schum.	- 40	<i>compressus</i> With.	- 115
<i>candicans</i> P.	- 91	<i>conchatus</i> Bull.	- 181
<i>Candelarius</i> Fr.	- 296	<i>confleus</i> P.	- 123
<i>canobrunneus</i> Batsch.	- 299	<i>conicus</i> Scop.	- 105
<i>caperatus</i> P.	- 241	<i>conigenus</i> P.	- 132
<i>capillaris</i> Schum.	- 160	<i>connatus</i> Schum.	- 97
<i>capneides</i> Fr.	- 289	<i>conocephalus</i> Bull.	- 304
<i>carbonarius</i> Fr.	- 252	<i>conopilus</i> Fr.	- 504
<i>Cardarella</i> Fr.	- 84	<i>conopus</i> P.	- 219
<i>carnieus</i> Bull.	- 130	<i>consobrinus</i> Fr.	- 60
<i>castaneus</i> Bull.	- 236	<i>conspersus</i> P.	- 260
<i>cartilagineus</i> Bull.	- 46	<i>constrictus</i> Fr.	- 28
<i>centrifugus</i> Fr.	- 222	<i>contortus</i> Bull.	- 122
<i>centunculus</i> Fr.	- 262	<i>controversus</i> P.	- 62
<i>ceraceus</i> Wulf.	- 102	<i>Coprinus</i> Fr.	- 279
<i>cerinus</i> P.	- 82	<i>coprophilus</i> Bull.	- 297
<i>cernuus</i> Vahl.	- 298	<i>copulatus</i> Ehrenb.	- 504
<i>cerussatus</i> Fr.	- 92	<i>coronillus</i> Bull.	- 282
<i>cetratus</i> Fr.	- 207	<i>corrugis</i> P.	- 298
<i>chalybæus</i> P.	- 203	<i>corticatus</i> Fr.	- 179
<i>Chama</i> Bosc.	- 181	<i>corticola</i> Bull. P.	- 159
<i>chloranthus</i> Fr.	- 152	<i>coruscans</i> Fr.	- 227
<i>chlorophanus</i> Fr.	- 103	<i>crampylus</i> Otto	- 65
<i>chrysenterus</i> Bull.	- 126	<i>craspedius</i> Fr.	- 187
<i>chrysodon</i> Batsch.	- 32	<i>crenulatus</i> Schum.	- 112
<i>chrysoleucus</i> P.	- 167	<i>crétaceus</i> Bull.	- 280
<i>chrysophyllus</i> Fr.	- 167	— Pers	- 195
<i>Cilicieides</i> Fr.	- 65	<i>crinitus</i> Linn.	- 175
<i>cimmerius</i> Fr.	- 150	<i>cristatus</i> Batsch.	- 32
<i>cincinnatus</i> Fr.	- 256	<i>crocatus</i> Schrad.	- 148
<i>cinereus</i> Bull.	- 310	<i>croceocœruleus</i> P.	- 238
<i>einnamomeus</i> Linn.	- 229	<i>croceofulvus</i> Dec.	- 214
<i>citrinellus</i> P.	- 155	<i>cruentus</i> Fr.	- 149
<i>clandestinus</i> Fr.	- 206	<i>cucullatus</i> P.	- 158
<i>clavicularis</i> Fr.	- 158	<i>Cucumis</i> P.	- 231
<i>clavipes</i> P.	- 86	<i>cuneifolius</i> Fr.	- 116
<i>Clavus</i> L. Bull.	- 134	<i>cupularis</i> Bull.	- 269
<i>clypeolarius</i> Bull.	- 21	<i>curtipes</i> Fr.	- 88
<i>coccineus</i> Wulf.	- 108	<i>cyathiformis</i> Bull.	- 173
<i>cochleatus</i> P.	- 177	<i>dasyurus</i> P.	- 50
<i>effeatus</i> Fr.	- 85	<i>dealbatus</i> Sow.	- 98

<i>decastes</i> Fr.	P. 49	<i>erubescens</i> Fr.	P. 32
<i>decipiens</i> P.	- 236	<i>Eryngii Dec.</i>	- 84
<i>decolorans</i> Fr.	- 56	<i>erythropus</i> P.	- 122
<i>decoloratus</i> Fr.	- 224	<i>escharioides</i> Fr.	- 260
<i>decorus</i> Fr.	- 108	<i>esculentus</i> Wulf.	- 131
<i>deliquescens</i> Bull.	- 309	<i>Esqueboensis Mey.</i>	- 175
<i>delicatus</i> Fr.	- 25	<i>euchrous</i> P.	- 203
<i>deliciosus</i> Linn.	- 67	<i>evernius</i> Fr.	- 202
<i>demissus</i> Fr.	- 157	<i>excelsus</i> Fr.	- 17
<i>denigratus</i> P.	- 50	<i>excoriatus</i> Schæff.	- 21
<i>denticulatus</i> Schum.	- 112	<i>exilis</i> Fr.	- 206
<i>depallens</i> Pers.	- 58	<i>expallens</i> P.	- 179
<i>depxus</i> Fr.	- 230	<i>exscissus</i> Fr.	- 114
<i>depluens</i> Batsch.	- 275	<i>farinaceus</i>	- 189
<i>detinus</i> Fr.	- 252	<i>fastibilis</i> P.	- 249
<i>devexus</i> Fr.	- 158	<i>fascicularis</i> Huds.	- 288
<i>Dj-mor</i> Fr.	- 188	<i>fascinans</i> Fr.	- 64
<i>diatretus</i> Fr.	- 85	<i>felleus</i> Fr.	- 57
<i>dichrous</i> P.	- 202	<i>fertilis</i> P.	- 197
<i>dictyorkizus</i> Dec.	- 192	<i>fibrillosus</i> P.	- 297
<i>difformis</i> P.	- 170	<i>fibula</i> Bull.	- 163
<i>discoideus</i> P.	- 23	<i>filipes</i> Bull.	- 142
<i>disseminatus</i> P.	- 305	<i>fimbriatus</i> Bolt.	- 44
<i>ditopus</i> Fr.	- 171	<i>fimicola</i> (P.?)	- 301
<i>domesticus</i> Bolt.	- 311	<i>fimiputris</i> Bull.	- 300
<i>dorsalis</i> Bosc.	- 184	<i>flabellaris</i> Fr.	- 231
<i>dryinus</i> P.	- 180	<i>flabelliformis</i> Bolt.	- 185
<i>dryophilus</i> Bull.	- 124	<i>flaecidus</i> Sow.	- 81
<i>Dunalii</i> Dec.	- 176	<i>flammans</i> Batsch.	- 244
<i>eburneus</i> Bull.	- 33	<i>flammeolus</i> Poll.	- 71
<i>echinatus</i> Roth.	- 286	<i>flavidus</i> Schæff.	- 250
<i>ectypus</i> Fr.	- 108	<i>flavovirens</i> P.	- 41
<i>elatus</i> Batsch.	- 248	<i>flexipes</i> P.	- 212
<i>elegans</i> P.	- 149	<i>flexuosus</i> P. Fr.	- 74
<i>elodes</i> Fr.	- 193	<i>Flos Mey.</i>	- 177
<i>emeticus</i> Schæff.	- 56	<i>fluxilis</i> Fr.	- 189
<i>ephebeus</i> Fr.	- 238	<i>fœnisecti</i>	- 225
<i>ephemeroides</i> Bull.	- 313	<i>fœtens</i> P.	- 54
<i>ephemerus</i> Bull.	- 315	<i>fœtidus</i> Sow. sub Mer.	- 158
<i>epibryus</i> Fr.	- 278	<i>formosus</i> Fr.	- 206
<i>epichysium</i> P.	- 169	<i>fragilis</i> P.	- 57
<i>epiphyllus</i> P.	- 139	— Batsch.	- 269
<i>epipterygius</i> Scop.	- 155	<i>fragans</i> Sow.	- 171
<i>erebius</i> Fr.	- 246	<i>frumentaceus</i> Bull.	- 46
<i>ericens</i> P.	- 291	<i>fucatus</i> Fr.	- 40
<i>ericetorum</i> P. A. S.	- 165	<i>fuliginosus</i> Fr.	- 73
<i>erminens</i> Fr.	- 22	<i>fulgens</i> P.	- 216
<i>erosus</i> Fr.	- 145	<i>fulvus</i> Dec.	- 37

<i>fumosus</i> P.	p. 38	<i>Hypnorum</i> Schrank p. 267
<i>furcatus</i> Lam.	- 59	<i>hypothejus</i> Fr. - 35
<i>furfuraceus</i> P.	- 262	<i>hysginus</i> Fr. - 67
<i>fuscopurpureus</i> P.	- 128	<i>Icterinus</i> Fr. - 207
<i>fusipes</i> Bull.	- 120	<i>jecorinus</i> Fr. - 66
<i>galerieulatus</i> Scop.	- 143	<i>ilicinus</i> Dec. - 257
<i>galopus</i> P.	- 148	<i>iliopodium</i> Bull. - 231 (p. 258, 229 &c.)
<i>gambosus</i> Fr.	- 50	<i>illinitus</i> Fr. - 23
<i>gausapatus</i> Fr.	- 43	<i>imbricatus</i> Fr. - 42
<i>gentilis</i> Fr.	- 212	<i>impatiens</i> Fr. - 244
<i>geophyllus</i> Bull.	- 253	<i>inamoenus</i> Fr. - 111
<i>gibbus</i> P.	- 81	<i>incanus</i> Fr. - 209
<i>giganteus</i> Sow.	- 80	<i>incomitus</i> Fr. - 171
<i>gilvus</i> P.	- 80	<i>inconstans</i> P. - 181
<i>glandulosus</i> Bull.	- 182	<i>ingratus</i> Schum. - 123
<i>glaucopus</i> Schäff.	- 224	<i>infractus</i> P. - 223
<i>glojocephalus</i> Des.	- 278	<i>inopus</i> Fr. - 251
<i>glatinosus</i> Schäff.	- 315	<i>inornatus</i> Sow. - 93
<i>glyciosmus</i> Fr.	- 92	<i>inquilinus</i> Fr. - 264
<i>gossypinus</i> Bull.	- 310	<i>insulsus</i> Fr. - 68
<i>gracilis</i> Pers.	- 299	<i>integrellus</i> P. - 161
<i>graminicola</i> Nees	- 261	<i>involutus</i> Batsch. - 270
<i>grammopodius</i> Bull.	- 93	<i>Jonides</i> Bull. - 107
<i>granulosus</i> Batseh.	- 24	<i>irrigatus</i> P. - 101
<i>graveolens</i> P.	- 45	<i>jubatus</i> Fr. - 196
<i>griseo-cyanus</i> Fr.	- 202	<i>jugis</i> Fr. - 177
<i>griseo-fuscus</i> Des.	- 29	<i>junceus</i> Fr. - 208
<i>Gunneri</i> Fr.	- 285	<i>juncicola</i> Fr. - 160
<i>guttatus</i> P.	- 27	<i>Junonius</i> Fr. - 244
<i>hæmatopus</i> P.	- 149	<i>Laccatus</i> Scop. - 106
<i>hæmatospermus</i> Bull.	- 282	<i>lacerus</i> Fr. - 257
<i>hariolorum</i> Bull.	- 125	<i>lacteus</i> P. - 152
<i>haustellaris</i> Pr.	- 274	<i>lætus</i> P. - 102
<i>hebepodium</i> Fr.	- 97	<i>lacrymabundus</i> Bull. - 287
<i>helvus</i> Fr.	- 72	<i>lagopus</i> Fr. - 312
<i>hemitrichus</i> P.	- 280	<i>lamellirugus</i> Des. - 184
<i>hiascens</i> Fr.	- 303	<i>lamprepus</i> Fr. - 203
<i>hilaris</i> Fr.	- 254	<i>lanuginosus</i> Bull. - 257
<i>hirneolus</i> Fr.	- 206	<i>lascivus</i> Fr. - 110
<i>hirtipes</i> Schum.	- 269	<i>lateritius</i> Fr. - 265
<i>hispidulus</i> Fr.	- 201	— Pers. - 288
<i>hordus</i> Fr.	- 285	<i>latus</i> P. - 215
<i>Hornemannii</i> Fr.	- 47	<i>lejocephalus</i> Dec. - 277
<i>hortensis</i> P.	- 195	<i>lentus</i> P. - 253
<i>hybridus</i> Bull.	- 239	<i>leoninus</i> Schäff. - 199
<i>hydrogrammus</i> Bull.	- 197	<i>lepidus</i> Fr. - 176
<i>hydraphorus</i> Bull.	- 304	<i>Lepista</i> Fr. - 265

<i>leucopus</i> Bull.	P. 236	<i>multicolor</i> P.	P. 48
<i>ligatus</i> Fr.	- 32	<i>muralis</i> Sow.	- 165
<i>ligatilis</i> P.	- 94	<i>murendus</i> Fr.	- 299
<i>limonius</i> Fr.	- 213	<i>muricatus</i> Fr.	- 244
<i>lineatus</i> Bull.	- 152	<i>murinaceus</i> Bull.	- 110
<i>Linkii</i> Fr.	- 204	<i>murinus</i> Batsch.	- 115
<i>longicandus</i> P.	- 248	<i>muscarius</i> L.	- 16
<i>lubricus</i> P.	- 252	<i>muscigenus</i> Schum.	- 145
<i>luedius</i> P.	- 235	<i>muscorum</i> Hoffm.	- 167
<i>lucifugus</i> Fr.	- 258	<i>mutabilis</i> Schæff.	- 244
<i>lugubris</i> Fr.	- 254	<i>mutilus</i> Fr.	- 191
<i>fuscinus</i> Fr.	- 87	<i>mycenoides</i> Fr.	- 246
<i>luteoalbus</i> Bolt.	- 152	<i>myomyces</i> P.	- 44
<i>luteovirens</i> P.	- 41	<i>myosotis</i> Fr.	- 250
<i>luteus</i> Huds.	- 55	<i>myosurus</i> Fr.	- 132
<i>luridus</i> P.	- 65	<i>Nanus</i> P.	- 200
- Schæff. (A. Schæfferi)	- 40	<i>narcoticus</i> Batsch.	- 31
<i>macilentus</i> Fr.	- 131	<i>nebularis</i> Batsch.	- 86
<i>maeropus</i> P.	- 215	<i>necator</i> Bull. p. 64,	- 63
<i>maculatus</i> A. S.	- 45	<i>nefrens</i> Fr.	- 209
<i>maculosus</i> P.	- 253	<i>nemoreus</i> P.	- 99
<i>mejalis</i> Fr.	- 205	<i>nictitans</i> Fr.	- 38
<i>malachius</i> Fr.	- 218	<i>nidulans</i> P.	- 189
<i>marginellus</i> P.	- 113	<i>nitens</i> (glauco-) Batsch.	- 116
<i>marzuolus</i> Fr.	- 84	- (lateo-) Vahl.	- 284
<i>mastoideus</i> Fr.	- 20	<i>nitidus</i> P.	- 55
<i>mastrucatus</i> Fr.	- 190	<i>niveus</i> P.	- 311
<i>maurus</i> Fr.	- 168	<i>nucisedus</i> Fr.	- 295
<i>medius</i> Schum.	- 278	<i>nudus</i> Bull.	- 52
<i>melaleucus</i> P.	- 114	<i>nutans</i> Fr.	- 302
<i>melanospermus</i> Bull.	- 283	<i>obliquus</i> P.	- 169
<i>melinoides</i> Bull.	- 206	<i>obolus</i> Fr.	- 89
<i>melizeus</i> Fr.	- 13	<i>obrusseus</i> Fr.	- 104
<i>melleus</i> Vahl.	- 30	<i>obturatus</i> Fr.	- 283
<i>merdarius</i> Fr.	- 291	<i>obtusatus</i> Pers.	- 293
<i>mesomorphus</i> Bull.	- 23	<i>obtusus</i> Fr.	- 235
<i>metachrous</i> Fr.	- 144	<i>ocellatus</i> Fr.	- 134
<i>metatus</i> Fr.	- 172	<i>ochraceo-fuscus</i> Mey.	- 168
<i>micaceus</i> Bull.	- 509	<i>ochroleucus</i> Schæff.	- 234
<i>millus</i> Sow.	- 92	<i>odorus</i> Bull.	- 90
<i>miniatus</i> Fr.	- 105	<i>œdematopus</i> Schæff.	- 96
<i>mitis</i> P.	- 188	<i>olearius</i> Dec.	- 275
<i>mitissimus</i> Fr.	- 69	<i>olivaceo-albus</i> fr.	- 35
<i>mollis</i> Schæff. p. 274	- 184	<i>olorinus</i> Fr.	- 92
<i>molybdinus</i> Bull.	- 49	<i>oniscus</i> Fr.	- 172
<i>montanus</i> P.	- 293	<i>opicus</i> Fr.	- 43
<i>mucidus</i> Schrad.	- 28	<i>orcellus</i> Bull.	- 180
<i>mucor</i> Batsch.	- 156	<i>oreades</i> Bolt.	- 117

oreinus Fr.	p. 52	platypus Nees	p. 154
ostreatus Jacq.	- 182	pleopodium Bull.	182
evinus Bull.	p. 109,	plexipes Fr.	124
ovoideus Bull.	- 116	plicatilis Sow.	312
pallidus P.	- 15	plumosus Bolt.	256
palmatus Bull.	- 67	plumbeus Bull.	73
pannosus Fr.	- 186	Pluteus Batsch.	199
pannucius Fr.	- 261	pluvius Fr.	236
pantherinus Dec.	- 64	politus P.	209
panuoides Fr.	- 16	Polygrammus Bull.	146
papilionaceus Bull.	- 273	polyphyllus Dec.	43
papillatus Batsch.	- 301	popinalis Fr.	194
papyraceus P.	- 312	porphyrius A. S.	14
parasiticus Bull.	- 505	porrens Fr.	128
pargamensis Sw.	- 135	porrigens P.	184
parilis Fr.	- 76	portentosus Fr.	39
pascuus P.	- 168	præcox P.	282
pediades Fr.	- 205	prasiosmus Fr.	148
pellanthinus Fr.	- 290	pratensis P.	99
pellitus P.	- 112	proboscideus Fr.	274
pellucidus Bull.	- 298	precerus Scop.	80
pennatus Fr.	- 156	prelixus Fr.	120
perforans Hoffm.	- 297	Prunuloides Fr.	198
peronatus Bolt.	- 138	Prunulus Scop.	191
perpusillus Lunn.	- 126	psittacinus Schæff.	102
persicinus Fr.	- 192	pterigenus Fr.	100
personatus Fr.	- 52	pudorinus Fr.	33
Persoenii Fr.	- 50	pulmonarius Fr.	187
pessundatus Fr.	- 27	pulvinatus P.	180
petiginosus Fr.	- 133	pumilus P.	263
Pezzoides Nees.	- 259	puniceus Fr.	104
phajocephalus Bull.	- 276	purpurascens A. S.	54
phajopodium Bull.	- 46	purpureus Bull.	228
Phalloides Fr.	- 122	purus P.	151
phlebophorus Dittm.	- 13	pusillus (Derm.) Fr.	264
pholideus Fr.	- 200	pusillus (Volv.) P.	279
phyllophilus Pers.	- 219	pustulatus P.	54
picaceus Bull.	- 85	putillus Fr.	129
picreus P.	- 308	pygmeus Bull.	263
pictus Fr.	- 239	pyriformis P.	158
pilipes Sowerb.	- 166	pyriodorus P.	255
piniarius Bosc.	- 154	pyrogalus Bull.	74
pinsitus Fr.	- 85	pyxidatus Bull.	185
piperatus Schæff.	- 184	quietus Fries	69
pityreus Fr.	- 76	racemosus P.	134
placidus Fr.	- 268	radiatus Bolt.	313
planus Fr.	- 202	radicatus Relh.	113
platyphyllus P.	- 127	radicosus Bull.	242
	- 117		

<i>alios Bull.</i>	p. 135	<i>seyphoides Fr.</i>	p. 165
<i>mentaceus Bull.</i>	- 25	<i>segestrinus Fr.</i>	- 262
<i>ramosus Bull.</i>	- 95	<i>sejunctus Sow.</i>	- 47
<i>rancidus Fries</i>	- 147	<i>semiglobatus Batsch.</i>	- 384
<i>ravidus Fr.</i>	- 265	<i>semiglobosus A. S.</i>	- 237
<i>reductus Fr.</i>	- 151	<i>semiovatus Sow.</i>	- 300
<i>relicinus Fr.</i>	- 250	<i>semitalis Fr.</i>	- 117
<i>reniformis Mey.</i>	- 191	<i>sericellus Fr.</i>	- 196
<i>repandus Bull.</i>	- 255	<i>serifluus Dec.</i>	- 75
<i>replexus Fr.</i>	- 158	<i>serotinus P.</i>	- 187
<i>resimus Fr.</i>	- 75	<i>serrulatus P.</i>	- 204
<i>reticulatus P.</i>	- 238	<i>setipes Fr.</i>	- 159
<i>rhabadiosus Fr.</i>	- 50	<i>sinopicus Fr.</i>	- 83
<i>Rhaphanoides P.</i>	- 230	<i>sinuatus Bull.</i>	- 197
<i>rhodopolius Fr.</i>	- 197	<i>siparius Fr.</i>	- 262
<i>rimosus Bull.</i>	- 258	<i>sistratus Fr.</i>	- 24
<i>rivulosus P.</i>	- 87	<i>socialis Dec.</i>	- 252
<i>robustus A. S.</i>	- 26	<i>solitarius Bull.</i>	- 17
<i>ruber Fr.</i>	- 156	<i>sordidus Schum.</i>	- 51
<i>roseolus Fr.</i>	- 151	<i>sparteus Fr.</i>	- 266
<i>roseo-albus Horn.</i>	- 199	<i>speciosus Fr.</i>	- 278
<i>Rotula Scop.</i>	- 136	<i>speireus Fr.</i>	- 159
<i>rubescens P. (sub Am.)</i>	- 18	<i>Sphlachnoides Horn.</i>	- 137
<i>ruber Lam.</i>	- 58	<i>spilomeus Fr.</i>	- 220
<i>rubro-marginat. Fr.</i>	- 150	<i>splendens P.</i>	- 84
<i>rufo-olivaceus P.</i>	- 223	<i>spodoleucus Fr.</i>	- 182
<i>Russula Schæff.</i>	- 58	<i>spumosus Fr.</i>	- 252
<i>rutilans Schæff.</i>	- 41	<i>squamosus P.</i>	- 284
<i>rutilus Schæff.</i>	- 315	<i>squamulosus P.</i>	- 82
<i>sagatus Fr.</i>	- 282	<i>squarrosus Müll.</i>	- 245
<i>saginus Fr.</i>	- 226	<i>stagninus Fr.</i>	- 268
<i>Sajor Caju Fr.</i>	- 175	<i>stellatus Fr.</i>	- 163
<i>salicinus P.</i>	- 202	<i>stercorarius Schum.</i>	- 291
<i>salignus P.</i>	- 183	<i>stequilinus Fr.</i>	- 308
<i>sambucinus Fr.</i>	- 257	<i>stipatus P.</i>	- 296
<i>sanguineus Wulf.</i>	- 229	<i>stipitarius Fr.</i>	- 137
<i>sanguinolentus A. S.</i>	- 145	<i>stipticus Bull.</i>	- 188
<i>saniosus Fr.</i>	- 232	<i>stipularis Fr.</i>	- 160
<i>sapineus Fr.</i>	- 239	<i>striatulus P.</i>	- 193
<i>satirinus Fr.</i>	- 219	<i>striatus Bull.</i>	- 302
<i>scabellus A. S.</i>	- 259	<i>strigiceps Fr.</i>	- 270
<i>scaber (Müll.) Sow.</i>	- 255	<i>stroblinius P.</i>	- 150
<i>secaurus Fr.</i>	- 223	<i>stylobates P.</i>	- 153
<i>Schumacheri Fr.</i>	- 87	<i>subalutacens Batsch.</i>	- 90
<i>seiophanus Fr.</i>	- 102	<i>subcavus Schum.</i>	- 28
<i>seodonius Fr.</i>	- 130	<i>subdulcis Bull.</i>	- 70
<i>scrubieulatus Scop.</i>	- 62	<i>subferrugineus Batsch.</i>	- 257
<i>seutulatus Fr.</i>	- 211	<i>sublanatus Sow.</i>	- 214

subliquescens Bull.	p. 504	umbrosus P.	p. 280
subreflexus Otto	- 271	unguinosus Fr.	- 102
subtilis Fr.	- 302	uranius Fr.	- 144
subtortus P.	- 222	urbicus Fr.	- 292
suffrutescens Brot.	- 177	urbus Fr.	- 48
sulphureus Bull.	- 110	urens Bull.	- 232
supinus Fr.	- 142	ursinus Fr.	- 185
svaveolens Schum.	- 91	ustalis Fr.	- 34
tegularis Schum.	- 294	uvides Fr.	- 66
temulentus Fr.	- 268	Vaccinus Schæff.	- 42
tenacellus P.	- 131	vagans Fr.	- 29
tenax Fr.	- 290	vaginatus Bull.	- 14
tener Schæff.	- 265	Vahlii Schum.	- 240
tephroleucus P.	- 54	Vaillanti Fr.	- 156
terginus Fr.	- 128	variabilis P.	- 275
tergiversans Fr.	- 303	variecolor P.	- 222
tessulatus Bull.	- 186	variegatus P.	- 153
thejegalus Bull.	- 71	varius Schæff.	- 225
telephorus P.	- 252	vaseipes Fr.	- 200
tigrinus Bull.	- 176	vatriacus Fr.	- 259
tithymalinus Scop.	- 71	vellereus Fr.	- 76
togularis Bull.	- 241	velutipes Curt.	- 119
terminosus Schæff.	- 69	ventricosus Bull.	- 294
tornatus Fr.	- 91	vernus Bull.	- 13
torpens Fr.	- 299	versicolor With.	- 286
torquatus Fr.	- 153	vervacti Fr.	- 263
tortuosus Fr.	- 235	vespertinus Fr.	- 233
torulosus P.	- 181	vibratilis Fr.	- 227
trachelinus Fr.	- 154	vietus Fr.	- 66
zraganus Fr.	- 217	violaceo-cinereus P.	- 217
translucens Deo.	- 274	violaceo-fulvus Batsch.	- 276
tremulus Schæff.	- 191	violaceus L.	- 217
trichæus P.	- 103	violascens Otto	- 75
tricholoma A. S.	- 270	virgatus Fr.	- 48
tricolor A. S.	- 166	virgineus Wulf.	- 200
trivialis Fr.	- 65	viridis With.	- 90
trullæformis Fr.	- 184	vitreus Fr.	- 146
tuberculosus Schæff.	- 244	volemus Fr.	- 69
tuberous Bull.	- 133	volvaceus Bull.	- 273
Tuber regium Fr.	- 174	vulgaris P.	- 156
tumidus P.	- 48	vulpinus Sow.	- 273
turbidus Fr.	- 205	xanthopus Fr.	- 121
turbinatus Bull.	- 225	zephirus Fr.	- 147
turundus Fr.	- 106	AMANITA P.	- 12
tylicoler Fr.	- 132	ARMILLARIA Fr.	- 26
uidus P.	- 292	AFUS Nees &c.	- 322
ulmarius Bull.	- 186	(P. 333, 353,	- 410
umbratilis Fr.	- 157	)	- 436

BOLETUS Dill.	P. 385	CLAVARIA Vaill.	P. 466
<i>aeneus</i> Bull.	- 393	<i>abietina</i> P. A. S.	- 469
<i>badium</i> Fries	- 392	<i>acuta</i> Sow.	- 485
<i>bovinus</i> L.	- 388	<i>amethystina</i> Bull.	- 472
<i>calopus</i> P.	- 390	<i>angustata</i> P.	- 482
<i>castaneus</i> Bull.	- 392	<i>anomala</i> Fr.	- 480
<i>cyanescens</i> Bull.	- 395	<i>spiculata</i> Fr.	- 470
<i>edulis</i> Bull.	- 392	<i>Ardenia</i> Sow.	- 478
<i>felleus</i> Bull.	- 394	<i>argillacea</i> P.	- 482
<i>flavidus</i> Fr.	- 387	<i>aurantiaca</i> P.	- 482
<i>floccopus</i> Vahl.	- 393	<i>Botrytis</i> P.	- 466
<i>granulatus</i> L.	- 387	<i>byssiseda</i> P.	- 476
<i>lividus</i> Bull.	- 389	<i>canaliculata</i> Fr.	- 484
<i>luridus</i> Schæff.	- 391	<i>ceranoides</i> Sow.	- 481
<i>pachypus</i> Fr.	- 390	<i>cinerea</i> Bull.	- 468
<i>parasiticus</i> Bull.	- 389	<i>contorta</i> Holmsk.	- 478
<i>piperatus</i> Bull.	- 388	<i>Coralloides</i> L. Fr.	- 467
<i>radicans</i> P.	- 390	<i>cornea</i> Batsch.	- 486
<i>saber</i> (E.) Fr.	- 393	<i>corniculata</i> Schæff.	- 471
<i>Sistotrema</i> Fr.	- 389	<i>crispula</i> Fr.	- 470
<i>subtomentosus</i> L.	- 389	<i>cristata</i> (Ram.) Holmsk.	- 473
<i>variegatus</i> Sw.	- 388	<i>crocea</i> Pers.	- 472
<b>CALOCERA Fr.</b>	- 485	<i>delieata</i> Fr.	- 475
<b>CANTHARELLUS Ad.</b>	- 316	<i>falcata</i> P.	- 485
<i>albidus</i> Fr.	- 319	<i>fistulosa</i> Holmsk.	- 479
<i>alveolar.</i> (Mer.) Dec.	- 322	<i>flaccida</i> Fr.	- 471
<i>aurantiacus</i> (Ag.) Wulf.	- 318	<i>flava</i> Tournef.	- 467
<i>bryophilus</i> (Mer.) P.	- 325	<i>flavipes</i> P.	- 483
<i>cibarius</i> Fr.	- 318	<i>formosa</i> P.	- 466
<i>einereus</i> (Mer.) P.	- 320	<i>fragilis</i> Holmsk.	- 484
<i>clavatus</i> Fr.	- 322	<i>fusiformis</i> Sow.	- 480
<i>Cornucopioïd.</i> (Pez.) L.	- 321	<i>fumosa</i> P.	- 483
<i>crispus</i> (Mer.) P.	- 323	<i>furcata</i> F.	- 486
<i>eupularis</i> (M.) Wahl; b.	- 325	<i>Glossoides</i> P.	- 487
<i>fissilis</i> Fr.	- 314	<i>gracilis</i> P.	- 475
<i>galeatus</i> (M.) Schum.	- 324	<i>grisea</i> P.	- 468
<i>lobatus</i> (Mer.) P.	- 323	<i>helvola</i> P.	- 482
<i>lutescens</i> (Mer.) P.	- 320	<i>inæqualis</i> Müll.	- 481
<i>muscigenus</i> (Ag.) Bull.	- 323	<i>juncea</i> Fr.	- 479
<i>Muscorum</i> (M.) Roth.	- 325	<i>Kunzei</i> Fr.	- 474
<i>pusillus</i> Fr.	- 321	<i>Lauri</i> Brot.	- 486
<i>retirugus</i> (Helv.) Bull.	- 324	<i>ligula</i> Schæff.	- 477
<i>sinuosus</i> Fr.	- 319	<i>macropus</i> P.	- 475
<i>tenellus</i> (Mer.) Dec.	- 325	<i>macrorhiza</i> Sw.	- 478
<i>tubæformis</i> (H;v.) Bull.	- 319	<i>mucida</i> P.	- 476
<i>umbonatus</i> P.	- 317	<i>nigrita</i> P.	- 483
<i>violaceus</i> Fr.	- 319	<i>palmata</i> P.	- 469
<i>undulatus</i> (Mer.) P.	- 321	<i>pistillaris</i> L.	- 477


<i>Pratensis</i> P.	p. 471	<i>saligna</i> Fr.	p. 337
<i>purpurea</i> Müll.	- 480	<i>sepiaria</i> (Ag.) Wulf.	- 333
<i>Pyxidata</i> P.	- 470	<i>serpens</i> Fr.	- 340
<i>rosea</i> Dalm.	- 482	<i>spadicea</i> Fr.	- 505
<i>rugosa</i> Bull.	- 473	<i>striata</i> (Ag.) Sw.	- 334
<i>rufa</i> Müll.	- 480	<i>svaveolens</i> (Bol.) Bull.	- 337
<i>spinulosa</i> P.	- 468	<i>Thunbergii</i> Fr.	- 335
<i>striata</i> P.	- 489	<i>trabea</i> P.	- 335
<i>stricta</i> P.	- 468	<i>unicolor</i> (Bol.) Bull.	- 336
<i>subtilis</i> P.	- 475	<i>variegata</i> Fr.	- 337
<i>suecica</i> Fr.	- 469	<i>DERMINUS</i> Fr.	- 240
<i>tenaeella</i> P.	- 472	<i>DERMOCYBE</i> Fr.	- 226
<i>trichopus</i> P.	- 474	<i>DIPPOGEN</i> Fr.	- 6
<i>tuberosa</i> Sow.	- 486	<i>ECCILIA</i> Fr.	- 207
<i>vermicularis</i> Sm.	- 484	<i>FAVOLUS</i> Palis.	- 342
<i>virgata</i> Fr.	- 472	<i>FISTULINA</i> Bull.	- 396
<i>viscosa</i> P.	- 488	<i>hepatica</i>	- 16
<b>CLITOCYBE</b> Fr.	- 78	<i>GALERA</i> Fr.	- 264
<b>CLITOPILUS</b> Fr.	- 294	<i>GALORRHEUS</i> Fr.	- 6r
<b>COLLYEA</b> Fr.	- 129	<b>GEOGLOSSUM</b> P.	- 487
<b>COPRINARIUS</b> Fr.	- 300	<i>atropurpureum</i> (Cl.) E.	- 490
<b>COPRINUS</b> P.	- 566	<i>carneum</i> Schulz.	- 490
<b>CORTINARIA</b> P. p. 10. 249	- 586	<i>disforme</i> Fr.	- 489
<b>CREPIDOTUS</b> Fr.	- 272	<i>glabrum</i> P.	- 488
<b>CRINULA</b> Fr.	- 493	<i>glutinosum</i> P.	- 489
<i>Caliciformis</i> Fr.	- 493	<i>hirsutum</i> P.	- 488
<b>DÆDALEA</b> Pers.	- 331	<i>olivaceum</i> P.	- 489
<i>abietina</i> Bull. sub Ag.	- 534	<i>viride</i> (Clav.) Schrad.	- 489
<i>albida</i> Fr.	- 558	<i>viscosum</i> P.	- 489
<i>angustata</i> Sow. s. Bol.	- 338	<b>GOMPHUS</b> p. 322,	- 314
<i>aurea</i> Batt.	- 339	<i>HEBELOMA</i> Fr.	- 279
<i>betulina</i> L. s. Agar.	- 335	<i>HEYDERIA</i> Fr.	- 492
<i>biennis</i> (Bol.) Bull.	- 332	<i>HIMANTIA</i> P. & F.	- 450
<i>Brasilensis</i> Fr.	- 332	<i>HYDNUM</i> L.	- 397
<i>Bulliardii</i> Fr.	- 538	<i>Agarohii</i> Fr.	- 418
<i>cineraria</i> Fr.	- 336	<i>alotaceum</i> Fr.	- 417
<i>confragosa</i> (Bol.) Bolt.	- 536	<i>ergatum</i> Fr.	- 424
<i>elegans</i> Spreng.	- 335	<i>aterimum</i> Fr.	- 416
<i>ferruginea</i> Schum.	- 639	<i>aurantiacum</i> Batsch.	- 403
<i>fusca</i> Link.	- 559	<i>Auriscalpium</i> L.	- 406
<i>gibbosa</i> P.	- 338	<i>Barba Jovis</i> Bull.	- 421
<i>heteromorpha</i> Fr.	- 340	<i>bicolor</i> A. S.	- 407
<i>latissima</i> Fr.	- 540	<i>candidum</i> Schmidt.	- 400
<i>maxima</i> (Bol.) Brot.	- 332	<i>Caput Medusæ</i> Bull.	- 409
<i>Palisotti</i> Fr.	- 535	<i>carnaeum</i> Fr.	- 420
<i>Pini</i> Brot. sub Bol.	- 336	<i>cirrhatum</i> P.	- 411
<i>quercina</i> (Ag.) L.	- 333	<i>cinereum</i> Bull.	- 404
<i>rubescens</i> A. S.	- 339	<i>Clathroides</i> Pall.	- 409

<i>cæruleum</i>	p. 402, - 406	<i>paradoxum</i> Schrad.	p. 424
<i>compactum</i> P.	- 402	<i>papyraceum</i> Wulf.	- 415
<i>connatum</i> Schult.	- 405	<i>pectinatum</i> Fr.	- 412
<i>Coralloides</i> Sop.	- 408	<i>pendulum</i> A. S. s. Sist.	- 414
<i>corrugatum</i> Fr.	- 414	<i>pinastri</i> Fr.	- 417
<i>crispum</i> Schaff.	- 4'3	<i>pseudoboletus</i> Des.	- 424
<i>cristatum</i> Fr.	- 422	<i>pusillum</i> Brot.	- 407
<i>crustosum</i> P.	- 419	<i>Radula</i> Fr.	- 422
<i>cyathiforme</i> Bull.	- 405	<i>Ramaria</i> Fr.	- 410
<i>daphnum</i> Schrad.	- 418	<i>repandum</i> L.	- 400
<i>discolor</i> Fr.	- 411	<i>rufescens</i> P.	- 400
<i>diversidens</i> Fr.	- 412	<i>Sachari</i> Spreng.	- 416
<i>Echinus</i> Scop.	- 410	<i>septentionale</i> Fr.	- 414
<i>Erinaceus</i> Bull.	- 407	<i>spatulatum</i> Schrad.	- 423
<i>fagineum</i> P. sub Sist.	- 423	<i>squalinum</i> Fr.	- 420
<i>fallax</i> Fr.	- 422	<i>stipitatum</i> Fr.	- 425
<i>farinaceum</i> P.	- 419	<i>strigosum</i> Sw.	- 414
<i>fusciculare</i> A. S.	- 418	<i>subcarnosum</i> Fr.	- 418
<i>ferrugineum</i> Fr.	- 403	<i>subsquamosum</i> Batsch.	- 399
<i>ferruginosum</i> Schrad.	- 416	<i>staveolens</i> Scop.	- 402
<i>fimbriatum</i> (Sist.) P.	- 421	<i>tomentosum</i> L.	- 405
<i>fraceolens</i> Brot.	- 412	<i>udum</i> Fr.	- 422
<i>fragile</i> P.	- 417	<i>velutinum</i> Fr.	- 404
<i>fuligineoalbum</i> Schm.	- 400	<i>violaceens</i> A. S.	- 401
<i>fusco-atrum</i> Fr.	- 416	<i>viride</i> A. S. sub Sist.	- 411
- <i>violae</i> . (Sist.) Ehrenb.	- 421	<b>HYTHOLOMA</b> Fr.	- 287
<i>gelat notum</i> Scop.	- 427	<b>HYPORHIDIUS</b> Fr. p. 193,	- 394
<i>Hollii</i> (Sist.) Schm.	- 420	<b>INOXYE</b> Fr.	- 289
<i>Hyrtix</i> Batsch.	- 410	<b>LEJISTROMIA</b> Fr.	- 452
<i>imbricatum</i> L.	- 398	<b>LEPIOTA</b> P.	- 19
<i>infundibulum</i> Sw.	- 401	<b>LEPTONIA</b> Fr.	- 201
<i>lacteum</i> Fr.	- 412	<b>LUCOSPORUS</b> Fr. p. 9, 12,	- 395
<i>lævigatum</i> Sw.	- 599	<b>LIMACIUM</b> Fr.	- 31
<i>leoninum</i> Fr.	- 411	<b>MERISMA</b> p. 584, 403,	- 432
<i>maerodon</i> P.	- 415	<b>MERULIUS</b> Hall.	- 326
<i>melaleucum</i> Fr.	- 406	er spatus Müll.	- 328
<i>membranaceum</i> Bull.	- 415	<i>fugax</i> Fr.	- 328
<i>microdon</i> P.	- 417	<i>Himantiodes</i> Fr.	- 329
<i>minutum</i> Schum.	- 412	<i>lacrimans</i> Wulf. (Bol.)	- 528
<i>mucidum</i> P.	- 416	<i>molluscus</i> Fr.	- 329
<i>nigrum</i> Fr.	- 404	<i>Perinoideas</i> Fr.	- 329
<i>niveum</i> P.	- 419	<i>rufus</i> P.	- 327
<i>obliquum</i> Schrad.	- 424	<i>seipens</i> Tode	- 327
<i>obtusum</i> Schrad.	- 419	<i>tremelloides</i> Schrad.	- 327
<i>occarium</i> Batsch.	- 412	<i>vastator</i> Tode	- 329
<i>ochraceum</i> P.	- 414	<b>MESOPUS</b> A. S. p. 517,	- 545
<i>orbiculatum</i> P.	- 412	(p. 398,	- 429
<i>orientale</i> Fr.	- 407	<b>MITRULA</b> Fr.	- 494

<b>Abietis Fr.</b>	p. 492	<b>ciliatus Fr.</b>	p. 549
<i>minuta Sow. (Clav.)</i>	- 492	<i>cinnabarinus Jacq.</i>	- 571
<i>mucerdæ Schum. (Cl.)</i>	- 492	<i>conchatus P.</i>	- 376
<i>paludosa Fr.</i>	- 491	<i>concinnus (Mier.) Pal.</i>	- 550
<i>pusilla Nees sub Leot.</i>	- 493	<i>confluens A. S.</i>	- 358
<b>Mougeron Fr.</b>	- 193	<i>contiguus P.</i>	- 378
<b>MYCENA P.</b>	- 140	<i>corticola Fr.</i>	- 385
<b>NAUCORIA Fr.</b>	- 260	<i>crinitus Spreng.</i>	- 362
<b>NOLANEA Fr.</b>	- 204	<i>crispus Fr.</i>	- 363
<b>OMPHALIA P.</b>	- 162	<i>cristatus Schaff.</i>	- 356
<b>PHALACREA Fr.</b>	- 403	<i>croceus P.</i>	- 364
<b>PHLEBIA Fr.</b>	- 426	<i>cryptarum Bull.</i>	- 376
<i>centerta Fr.</i>	- 417	<i>cuticularis Bull.</i>	- 363
<i>Merismoides Fr.</i>	- ib.	<i>destructor Schrad.</i>	- 359
<i>radiata Fr.</i>	- 427	<i>dichrous Fr.</i>	- 364
<i>vaga Fr.</i>	- 428	<i>dryadeus P.</i>	- 374
<b>PELEGMAKUM Fr.</b>	- 226	<i>farinellus Fr.</i>	- 584
<b>PHOLIOTA Fr.</b>	- 240	<i>fasciatus Sw.</i>	- 373
<b>PHYLACTERIA P.</b>	- 449	<i>favus</i>	- 345
<b>PISTILLARIA Fr.</b>	- 496	<i>ferruginosus Schrad.</i>	- 378
<i>diaphana Schum. (Cl.)</i>	- 498	<i>fimbriatus P.</i>	- 306
<i>micans P. (Clav.)</i>	- 297	<i>fomentarius L.</i>	- 374
<i>musicola P. (Cl.)</i>	- 298	<i>fraxineus Bull.</i>	- 374
<i>ovata Fr.</i>	- 298	<i>frondosus Sehrank.</i>	- 355
<i>pusilla P. (Clav.)</i>	- 298	<i>fuligineus P.</i>	- 348
<i>quisquiliaris Fr.</i>	- 297	<i>fumosus P.</i>	- 367
<i>Sclerotioides Dec. (Cl.)</i>	- 297	<i>Gallicus Fr.</i>	- 345
<b>PLEUROFUS P.</b> 392, 352, 407	- 431	<i>giganteus P.</i>	- 356
<b>PLEUROTUS</b>	- 178	<i>heteroelitus Bolt.</i>	- 344
<b>POLYPORUS Mich.</b>	- 341	<i>hirsutus Wulf.</i>	- 367
<i>abietinus Pers. sub</i>		<i>hirtus (Favol.) Pal.</i>	- 345
<i>Boleto, ut sequ. Auct.</i>	- 370	<i>hispidus Bull.</i>	- 362
<i>adustus Willd.</i>	- 363	<i>Hydnatinus Bosc.</i>	- 362
<i>alutaceus Fr.</i>	- 360	<i>igniarius L.</i>	- 378
<i>alveolarius Bosc.</i>	- 343	<i>imbricatus Bull.</i>	- 357
<i>amboinensis Fr.</i>	- 554	<i>incarnatus P.</i>	- 379
<i>amorphus Fr.</i>	- 364	<i>lacteus Fr.</i>	- 359
<i>annosus Fr.</i>	- 373	<i>leptocephalus Jaeg.</i>	- 349
<i>arcularius Batsch.</i>	- 342	<i>lucidus Leyss.</i>	- 353
<i>betulinus Bull.</i>	- 358	<i>marginatus P.</i>	- 372
<i>borealis Fr.</i>	- 366	<i>medulla panis Wulf.</i>	- 380
<i>brumalis P.</i>	- 348	<i>melanopus P. Dec.</i>	- 347
<i>cæsius Schrad.</i>	- 360	<i>membranaceus Sw.</i>	- 370
<i>callosus Fr.</i>	- 381	<i>micans Ehrenb.</i>	- 383
<i>carbonarius Fr.</i>	- 549	<i>Micheli Fr.</i>	- 343
<i>castaneus Fr.</i>	- 369	<i>microporus Sw.</i>	- 376
<i>Cerasi Fr.</i>	- 382	<i>mollis P.</i>	- 364
<i>chieneus Fr.</i>	- 359	<i>molluscus P.</i>	- 384

Mori (Hexag.) Pöll.	p. 544	Schweinizii Fries	p. 351
mucidus P.	- 382	tenuicaulis (Fav.) Pal.	- 344
Neesii. Fr.	- 370	tephroleucus Fr.	- 360
nidulans Fr.	- 362	terrestris P.	- 383
nigricans Fr.	- 375	tessulatus Fr.	- 342
nitidus P.	- 379	tomentosus Fr.	- 351
obliquus P.	- 378	Tuberaster Jacq.	- 347
odoratus Wulf.	- 373	tuberculosus Dec.	- 380
officinalis Fr.	- 365	ulmarius Sow.	- 365
ovinus Schäff.	- 346	umbellatus P.	- 354
pallens Fr.	- 369	ursinus Lb	- 361
pellitus Mey.	- 562	Vaillantii Dec.	- 383
perennis L.	- 350	vaporarius P.	- 382
perula (Micr.) Pall.	- 349	varius F.	- 362
pes Caprae P.	- 354	velutinus P.	- 368
pinicola Sw.	- 372	versicolor L.	- 368
populinus (Schum?)	- 367	vilosus Sw.	- 344
pubescens Schum.	- 367	violaceus Fr.	- 379
purpureus Fr.	- 379	vitreus P.	- 381
radiatus Sow.	- 369	vulgaris Fr.	- 381
Radula L.	- 383	vulpinus Lb	- 361
resinosus Schrad.	- 361	xanthopus Fr.	- 560
reticulatus	- 385	xanthus Fr.	- 379
Ribis Schum.	- 375	zonatus Nees	- 368
rhodellus Fr.	- 380	POLYSTICTA Fr.	- 384
roseus A. S.	- 371	POROTHELEUM Fr.	- 505
rufescens P.	- 315	PRATELLA P.	p. 3, - 277
rufus Schrad.	- 379	PSALLIOTA Fr.	- 280
salicinus P.	p. 376,	PSATHYRA Fr.	- 295
sanguineus L.	- 366	PSLOCYBE Fr.	- 289
sanguinolentus A. S.	- 383	RAMARIA Holmsk.	- 468
sector Ehrenb.	- 505	RESUPINATUS Nees	- 340
serialis Fr.	- 370	(P. 377, 418, - 441	
Sinensis Fr.	- 345	RUSSULA P.	- 511
singuosus Fr.	- 381	SCHIZOPHYLLUM Fr.	- 330
Soloniensis Dub.	- 365	commune Fr.	- ib.
spongiosus Bolt.	- 577	SISTOTREMA Fr.	- 426
spumeus Sow.	- 358	confluens P.	- ib.
squamulosus Huds.	- 343	SPARASSIS Fr.	- 464
Stereoides Fr.	- 369	crispa Wulf.	- 465
stipticus P.	- 359	SPATHULARIA P.	- 490
subtilis Schrad.	- 506	flavida P.	- 491
suberosus Wahlenb.	- 505	STEREUM	- 429
subspadiceus Fr.	- 378	TAPINIA Fr.	- 269
subsquamulosus L.	- 346	TELAMONIA Fr.	- 209
sulphureus Bull.	- 357	THELEPHORA Ehrh.	- 423
supinus Sw.	- 376	abietina P.	- 442
svaveolens L.	- 366	acerina P.	- 456

<i>alnea Fr.</i>	P. 446	<i>livida Fr. (Cert.)</i>	P. 447
<i>amphibolia Fr.</i>	- 454	<i>maculæformis Fr.</i>	- 454
<i>atrata Sw.</i>	- 437	<i>mollis Fr.</i>	- 443
<i>aurantiaca P.</i>	- 445	<i>mollissima P.</i>	- 435
<i>avellana Fr.</i>	- 442	<i>nuda Fr.</i>	- 447
<i>bicolor P.</i>	- 438	<i>ochracea Fr.</i>	- 446
<i>biennis Fr.</i>	- 449	<i>ochroleuca Fr.</i>	- 440
<i>byssordes P.</i>	- 452	<i>odorata Fr.</i>	- 448
<i>cæsia P.</i>	- 449	<i>palmata Fr.</i>	- 432
<i>caryophyllæa Schæff.</i>	- 430	<i>pannosa Sow. (Helv.)</i>	- 430
<i>chartacea Mey.</i>	- 437	<i>penicillata Fr.</i>	- 434
<i>cinerea P.</i>	- 435	<i>Pini Schleich.</i>	- 434
<i>comedens Nees</i>	- 447	<i>polygouia P.</i>	- 444
<i>concentrica A. S.</i>	- 446	<i>purpurea P.</i>	- 440
<i>conghata Fr.</i>	- 438	<i>puteada Schum.</i>	- 448
<i>confluens Fr.</i>	- 447	<i>quereina P.</i>	- 442
<i>Coralloides Fr.</i>	- 432	<i>rosea P.</i>	- 451
<i>crispa P.</i>	- 437	<i>rubiginosa Schrad.</i>	- 436
<i>cristata Fr.</i>	- 434	<i>rugosa P.</i>	- 439
<i>cruenta P.</i>	- 444	<i>salicina Fr.</i>	- 442
<i>erustacea Schum.</i>	- 450	<i>sanguinolenta A. S.</i>	- 441
<i>disciformis Dec.</i>	- 445	<i>serialis Fr.</i>	- 445
<i>domestica P. sub Him.</i>	- 451	<i>spadicea P.</i>	- 438
<i>elegans Mey.</i>	- 430	<i>stabularis Fr.</i>	- 435
<i>evolvens Fr.</i>	- 441	<i>sterilis Fr.</i>	- 454
<i>fallax P.</i>	- 454	<i>sulphurea P.</i>	- 452
<i>fastidiosa Fr.</i>	- 435	<i>tabacina Sow.</i>	- 437
<i>flabellaris Fr.</i>	- 433	<i>terrestris Ehrh.</i>	- 431
<i>fœtida Ehrenb.</i>	- 448	<i>versicolor Sw.</i>	- 438
<i>frondescens Fr.</i>	- 436	<i>violascens Fr.</i>	- 451
<i>frustulata P.</i>	- 445	<i>v. s.osa. P.</i>	- 448
<i>fusca P.</i>	- 451	<b>TRICHOLOMA Fr.</b>	- 36
<i>gigantea Fr.</i>	- 448	<b>TYPHULA Fr.</b>	- 494
<i>f'abrata Spreng.</i>	- 433	<i>erythropus P. (sub Cl.)</i>	- 495
<i>granulosa P.</i>	- 446	<i>filiformis Bull.</i>	- 496
<i>hepatica Fr.</i>	- 439	<i>gyrus Batsch.</i>	- 494
<i>hirsuta Willd.</i>	- 439	<i>phacorrhiza Reich.</i>	- 495
<i>Hydnoidæa P.</i>	- 445	<i>ramentacea Fr.</i>	- 496
<i>iuntybacea P.</i>	- 431	<i>tenuis Sow.</i>	- 495
<i>Küllingerii (Mart.)</i>	- 434	<i>Todei Fr.</i>	- 494
<i>lactea Fr.</i>	- 452	<i>villosa Schum.</i>	- 495
<i>Jaciniata P.</i>	- 431	<b>VAGINATA Nees</b>	- 297
<i>lævis P.</i>	- 451	<b>VOLVARIA Fr.</b>	- 277





QK603 .F7 c.2 v.1  
Fries, Elias Magnus/ *Systema mycologicum*



3 5185 00168 7712

