

*CANARIUM LITTORALE*, Bl.

*C*: foliis pinnatis, foliolis elliptico-oblongis acuminatis denticulatis in venis infra tomentosis, stipulis nullis, panicula terminali effusa, floribus dense glomeratis bracteatis.

*Crescit*: in sylvis littoralibus insulae Nusae Kambangae.

*Floret*: Novembri.

*RHUS*, Tourn., Linn.

*Flores* ex abortu saepe monoeci aut dioeci. *Calix* brevis, quinquesidus, persistens. *Petala* quinque, patentia, rarius nulla. *Stamina* quinque, petalis alterna. *Antherae* introrsum affixae. *Ovarium* disco angusto cinctum, 5-loculare (loculis forte 1-ovulatis). *Stigmata* 5, subsessilia, approximata. *Fructus* bacatus, nucleo submonospermo.

\* Foliis pinnatis integerrimis.

*RHUS SUCCEDANEA*, Linn.

*R*: foliolis sub 7-jugis ovato-lanceolatis longiter acuminatis basi oblique attenuatis glabris supra nitidis infra glaucis, petiolis teretibus (ex Japonia et China allata).

*RHUS NODOSA*, Bl.

*R*: foliolis 3-4-jugis ovato-oblongis obtuse acuminatis basi parum oblique attenuatis glabris, petiolis

terq-