

CONFISTULINA HEPATICA, EL NOMBRE CORRECTO DE LA FASE MITOSPÓRICA DE *FISTULINA HEPATICA*

por

F. D. CALONGE

Real Jardín Botánico, CSIC, Plaza de Murillo 2, 28014 Madrid

En una publicación reciente (CALONGE & PASABÁN, 1999) se daba cuenta del hallazgo de esta fase mitospórica en España, incluyendo una descripción completa del material encontrado, exactamente en la localidad navarra de Urrizola, creciendo bajo *Quercus robur*, y con la denominación de *Ptychogaster hepaticus* (Sacc.) Lloyd.

Recientemente, de forma casual, hemos tenido conocimiento de un trabajo en el que se recombina este hongo (STALPERS & VLUG, 1983) pasándolo a un género nuevo *Confistulina* Stalpers, creado para albergar esta única especie *Confistulina hepatica* (Sacc.) Stalpers \equiv *Ceratomyces hepaticus* Sacc. \equiv *Ptychogaster hepaticus* (Sacc.) Lloyd.

Confistulina hepatica ha sido observada sobre madera de *Quercus*, *Castanea* y en una

ocasión sobre *Pinus virginiana* (STALPERS & VLUG, 1983).

En cuanto a su distribución, se halla repartida por los cinco continentes (SIGLER & CARMICHAEL, 1976).

A la vista de esta información, nos ha parecido necesario actualizar la nomenclatura.

BIBLIOGRAFÍA

- CALONGE, F.D. & P. PASABÁN (1999). Adiciones al catálogo de hongos de Guipúzcoa y Navarra (España). Registro de cinco especies nuevas. *Bol. Soc. Micol. Madrid* 24: 179-185.
- SIGLER, L. & J.W. CARMICHAEL (1976). Taxonomy of *Malbranchea* and some other hyphomycetes with anthroconidia. *Mycotaxon* 4: 349-488.
- STALPERS, J.A. & I. VLUG (1983). *Confistulina*, the anamorph of *Fistulina hepática*. *Can. J. Bot.* 61: 1660-1666.