

І ЖИЛД
**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ
ҚИЗИЛ КИТОБИ**
ЎСИМЛИКЛАР

ТОМ I
**КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
РАСТЕНИЯ**

VOLUME I
**THE RED DATA BOOK OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN
PLANTS**

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ
ЎСИМЛИК ВА ҲАЙВОНОТ ОЛАМИ ГЕНОФОНДИ ИНСТИТУТИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТАБИАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ
ДАВЛАТ ҚЎМИТАСИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНинг ҚИЗИЛ КИТОБИ

2 жилдли

I ЖИЛД

КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

В 2-х томах

ТОМ I

ТОШКЕНТ - 2016

ББК 42(5Ў) Ў 32
УДК 502.172:582(575.1) Ў 32

**Биология фанлари доктори
Фурқат Ҳасановнинг умумий
таҳрири остида**

Ў 32

Ўзбекистон Республикасининг
Қизил китоби, I жилд: Ўсимликлар;
Ф. Ў. Ҳасановнинг умумий таҳрири
остида. Т.: «Chinor ENK» экологик-
ноширлик компанияси. - 000 б. - Тит.
в. ўзбек, рус ва инглиз тилларида.

Ўзбекистон Республикасининг Қизил
китоби I жилдида ўсимликлар оламининг
камёб, йўқолиб кетиш хавфи остида тур-
ган турлари тўғрисидаги маълумотлар
жамланган бўлиб, унда ҳар қайси турнинг
қисқача тавсифи, тарқалиши, ўсиш шаро-
ити, сони, кўпайиши, ареалининг ўзгариш
сабаблари, маданийлаштирилиши ва муҳо-
фаза чоралари кўрсатилган.

Китоб табиатни муҳофаза қилиш ор-
ганлари ходимлари, ботаниклар, ўсимлик
дунёси билан қизиқувчилар ҳамда кенг ки-
тобхонлар оммасига мўлжалланган.

ББК 42(5Ў) Ў 32
УДК 502.172:582(575.1) Ў 32

Тақризчилар:

Т. А. Мадумаров,
биология фанлари доктори, профессор
Л. Х. Ёзиев,
биология фанлари доктори, профессор

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

Б. Х. Абдусаматов,
Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза
за қилиш давлат қўмитаси раиси

Ф. Ў. Ҳасанов,
биология фанлари доктори

К. Ш. Тожибаев,
биология фанлари доктори

Ў. П. Пратов,
биология фанлари доктори, профессор

И. В. Белолипов,
биология фанлари доктори, профессор

Х. Ф. Шомурадов,
биология фанлари номзоди

Н. Ю. Бешко,
биология фанлари номзоди

**Под общей редакцией доктора
биологических наук Фурката Ҳасанова**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Б. Х. Абдусаматов,
председатель Государственного комитета
Республики Узбекистан по охране природы

Ф. О. Ҳасанов,
доктор биологических наук

К. Ш. Тожибаев,
доктор биологических наук

Ў. П. Пратов,
доктор биологических наук, профессор

И. В. Белолипов,
доктор биологических наук, профессор

Х. Ф. Шомурадов,
кандидат биологических наук

Н. Ю. Бешко,
кандидат биологических наук

КИРИШ

Атроф-мухитни, ўсимликлар оламини муҳофаза қилиш инсоният учун жуда катта ҳаётий аҳамиятга эга. Инсоният табиатдан фойдаланар экан, унинг асрлар давомида шаклланган табиий манзарасини ўзгартирмоқда, унга салбий таъсир кўрсатмоқда. Саноат тармоқлари ва қишлоқ хўжалигининг ривожланиб бориши, табиий майдонларнинг кенг миқёсда ўзлаштирилиши экологик мувозанат бузилишига олиб келмоқда. Натижада ўсимликларнинг камайиб кетиш хавфи туғилмоқда. Бу эса ўсимликлар дунёси генофондининг қисқаришига сабаб бўлмоқда. Ҳар қандай турнинг йўқолиши бошқа ноҳуш оқибатларга олиб келиши аниқ. Таъкидлаш жоизки, ёввойи ўсимликлар қишлоқ хўжалигида экиладиган маданий навларни яратища бирламчи асос сифатида муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикаси худудида ҳозирда 4500 га яқин олий ёввойи ўсимлик ва 2000 дан зиёд замбуруғ турлари мавжуд. Улар орасида жиддий муҳофазага муҳтоҷ кўп камёб эндемик ва реликт турлар ҳам бор. Бундай турларнинг сони 300 дан ортиқ бўлиб, улар Ўзбекистон флорасининг 10–12 % ини ташкил этади.

Республика қўриқхоналарида муҳофаза қилинаётган ўсимликларнинг умумий ҳолати нисбатан яхши бўлишига қарамай, кўплаб ёввойи турларнинг табиий захиралари кескин камайиб кетмоқда. Дунёга донғи кетган лола ва саллагуллар, қимматбаҳо ўсимлик – етмак, доривор ўсимлик – бозулбанг кабилар кейинги йилларда кескин камайиб кетди. Бир қанча турлар йўқолиб кетиш ҳолатига келиб қолди.

Аҳолининг табиатга нотўғри муносабати ҳам ўсимликларнинг камайиб кетишига сабаб бўлмоқда. Айниқса, шаҳар ва қишлоқлар атрофида қизил лола, саллагул, ширач ва шунга ўхшаш нафис гулли ўсимликлар жуда камайиб кетган.

Табиатга, ўсимликлар дунёсига нисбатан беписанд муносабатда бўлишга чек қўйиш, табиат бойликларини муҳофаза қилиш ва кўпайтириш ҳаммамизнинг асосий бурчимиздир.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгач, атроф-мухитни, ҳайвонот ва ўсимликлар дунёсини муҳофаза қилишга алоҳида эътибор қаратилди. 1992 йил

9 декабрда «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида», 1993 йил 7 майда «Алоҳида муҳофаза қилинадиган худудлар тўғрисида», 1997 йил 26 декабрда «Ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида», 1999 йилда эса «Ўрмон ҳақида»ги қонунлар қабул қилинди. 2016 йил 21 сентябрда эса «Ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилиб, Қонун янги таҳрирда қабул қилинди. Бу қонунлар барча ўсимлик турларини сақлаб қолиш, уларни асраб-авайлаш ва муҳофаза қилишда муҳим ҳужжат ҳисобланади.

Ўзбекистонда Қизил китоб илк бор 1979 йилда таъсис этилган. Мазкур Қизил китобга наботот оламининг камёб, йўқолиб кетиш хавфи остидаги турлари ҳақида маълумотлар киритилган. Бундан кўзланган мақсад, жамоатчилик ва давлат идоралари эътиборини табиат муҳофазаси масалаларига жалб этишдан ва турлар генофондини сақлаб қолишга кўмаклашишдан иборат эди.

Қизил китобнинг 1984 йилги нашрига Ўзбекистон флорасининг йўқолиб кетиш хавфи остида қолган 163 та тури киритилган. Бу турларнинг тақдирни билан республика мутахассислари, олимлари муттасил шуғулланиб келмоқда. Ўтган йиллар мобайнида олиб борилган кузатишлар айrim ўсимлик турларнинг сони ва майдони анча кенгайганлигини кўрсатмоқда. Масалан, анзур ва Суворов пиёзлари олдинги ҳолатига келмаган бўлса-да, маълум даражада кўпайди. Энг камёб ўсимликлардан саналган Минквиц тезиуми турларининг сони 7 тадан 17 тагача ортди. Қурама тизмасида камёб ўсимликлардан ҳисобланган Коровин ширач ўсимлигининг мавжудлиги аниқланди. Айни вақтда айrim ўсимлик турларининг сони кескин қисқариб кетган. Омонқора ўсимлиги, Писком пиёзи, Маргарита мармараги кабилар шулар жумласидандир.

Кейинги йилларда олиб борилган изланишлар ўлқамиз флорасига мансуб яна 138 турдаги ўсимликни Қизил китобга киритиш лозимлигини кўрсатмоқда. 1998 йил маълумотларига кўра, Ўзбекистон Республикасининг Қизил китобига киритилган ўсимлик турларининг сони 301 тани ташкил этган бўлса, янги нашрдан 48 оиласига мансуб 313 турдаги ўсимлик ўрин олди. Қизил китобига киритилган ўсимлик турларига Таби-

атни муҳофаза қилиш халқаро уюшмаси томонидан ишлаб чиқилган таснифга биноан камёблигига кўра 4 та мақом (статус) берилди.

0. Йўқолган ёки йўқолган бўлиши мумкин. Бир неча йиллар давомида табиатда учратилмаган, лекин йиғиб олиш қийин бўлган айrim жойлардагина ёки маданий шароитда сақлаб қолиш эҳтимоли мавжуд бўлган турлар.

1. Йўқолиш арафасида турган. Йўқолиб кетиш хавфи остида қолган, сақлаб қолиниши учун маҳсус муҳофазани талаб этадиган турлар.

2. Камёб. Маълум кичик майдонлардаги на ўзига хос шароитларда сақлаб қолинган, аммо тез йўқолиб кетиши мумкин бўлган ва жиддий назоратни талаб этувчи турлар.

3. Сон жиҳатдан камайиб бораётган. Сони ва тарқалган майдонлари маълум вақт ичida табиий сабабларга кўра ёки инсон омили таъсири остида камайиб кетаётган турлар. Айни вақтда, бундай ўсимликларни ҳар томонлама назоратга олиш талаб этилади.

Ўсимликларнинг мақоми турғун эмас, балки ўзгарувчандир, яъни, вақт ўтиши билан муайян ўсимлик бутунлай йўқолиши ёки кўпайиб, муҳофаза қилиш даражасидан чиқиб кетиши мумкин.

Қизил китобда ҳар бир турнинг ўзбекча, русча, лотинча номлари ва уларнинг қайси оила ҳамда туркумга мансублиги кўрсатилган. Шунингдек, турларнинг қисқача тавсифи (ҳаётин шакли, бўйи, шоҳшаббаси, барги, гули, меваси ва фенологияси), тарқалиши ва чизма харитада уч-

райдиган жойлари келтирилган. Табиий шароитда ўстириш усуllibарига ҳам тўхталиб ўтилган. Баъзи ўринларда муайян турни тажриба майдонларида ёки саноат асосида етиштириш имкониятлари баён этилган. Муҳофаза чоралари масаласига алоҳида эътибор қаратилган. Турларга тавсиф берилар экан, соҳага доир адабиётлар ва гербарий маълумотларидан, шунингдек, кўп йиллик кузатишлар натижаларидан ҳам фойдаланилди.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти илмий ходимларининг кейинги йиллар ичida вилоятлар бўйича олиб борган илмий-тадқиқот ишларининг самараси ўлароқ, Қизил китобнинг аввалги (2009) нашридаги маълумотлар янгиланди, яъни, Қизил китобнинг янги нашрига айrim ўзгартишлар киритилди. Жумладан, табиатда нисбатан қўпайганлиги ва ареалининг кенгайланлиги сабабли, Корольков заъфарони, ноксимон нормушк, Суворов пиёзи, анзор пиёзи Қизил китобга киритилмади. Жами 23 та тур эски рўйхатдан чиқарилди, бироқ 11 та янги олий ўсимлик турлари йўқолиб кетиши хавфи остида қолган деб топилиб, Қизил китобга киритилди. Камёб деб топилган 7 та турнинг табиатдаги популяцияси кенгайланлиги муносабати билан улар 2-мақомдан 3-мақомга ўтказилди. Изланишлар туфайли 10 та турнинг бошқа тоғ тизмаларида ва ўзига хос экологик шароитларда ҳам ўсиши аниқланди. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Қизил китобнинг ушбу янги нашрига 0-мақомга мансуб 18 та тур киритилди. Бу флорамизга антропоген омиллар таъсири кучли эканлигидан далолат беради.

Қизил китобнинг мазкур янги нашри мутахассислар, давлат идоралари ҳамда жамоат ташкилотлари олдига қўриқхоналар ва буюртмахоналарни кенгайтириш, ёввойи ўсимликлар сотишини тақиқлаш, хом ашё учун йиғиладиган ўсимликлар териш учун лицензиялар жорий этиш каби бир қанча долзарб масалаларни қўяди.

Ўсимликлар дунёсини муҳофаза қилиш бу жараёнда кенг жамоатчилик иштирок этган тақдирдагина ижобий самара беради. Барча яқдиллик билан ҳаракат қилсагина, наботот оламининг бебаҳо бойликларини сақлаб қолишга, уларни асрраба-авайлаб, муносиб равишда келгуси авлодларга қолдиришга эриша оламиз.



ВВЕДЕНИЕ

Проблема охраны окружающей среды, растительного мира имеет огромное, жизненно важное значение для всего человечества. Пользуясь природными ресурсами, человек отрицательно влияет на формирующиеся ве- ками природные ландшафты. Развитие промышленности и сельского хозяйства, широкое освоение природных территорий приводит к нарушениям экологического равновесия, в результате которого постепенно возрастает опасность исчезновения видового состава флоры и утраты генофонда растений.

Исчезновение любого вида влечет за собой необратимые последствия, так как дикорастущие растения являются исходным материалом для создания ценных сортов многих сельскохозяйственных культур.

На территории Узбекистана насчитывается около 4500 видов дикорастущих высших растений и более 2000 видов грибов. Среди них более 300 редких, эндемичных и реликтовых видов (10–12 % флоры), для охраны которых необходимы эффективные меры. И хотя состояние флоры, охраняемой в заповедниках, относительно благополучно, природные запасы многих дикорастущих видов резко сократились. Так, вследствие усиленной промышленной заготовки уменьшились ареалы тюльпанов и пионов, мыльного корня, зайце-губа опьяняющего. Значительное число видов находится на грани исчезновения.

Большой ущерб дикорастущей флоре наносит бесконтрольный сбор редких лекарственных и пищевых растений (особенно луковичных, клубнелуковичных и корневищных, выкапываемых вместе с подземными органами), принимающий все более угрожающие масштабы.

Потребительское отношение к живой природе, в том числе к растительному миру – недопустимо. Сохранять и приумножать природные богатства страны обязанность всех граждан.

Обретение Республикой Узбекистан политической и экономической независимости дало принципиально новый импульс в деле охраны окружающей среды, растительного и животного мира. 9 декабря 1992 года был принят Закон «Об охране природы», 7 мая 1993 года – Закон «Об особо охраняемых природных территориях», 26 декабря 1997 года – Закон «Об охране и использовании растительного мира» (Настоящий Закон принят в

новой редакции в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 21 сентября 2016 года "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об охране и использовании растительного мира""), 1999 года – «О лесе», которые являются документами государственной важности, способствующими сохранению растительного мира страны во всём его многообразии.

В 1979 году была учреждена «Красная Книга Узбекистана», где собраны основные сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах флоры. Задача «Красной книги» – привлечь внимание общественности и государственных органов к проблемам охраны живой природы, помочь сохранить генофонд.

В издание «Красной книги» 1984 года были включены 163 находящихся под угрозой исчезновения вида растений, судьба которых находилась и находится в центре внимания учёных и специалистов республики. В последние годы многое изменилось. Установлено, например, что площадь и численность некоторых видов растений увеличилась (лук стебельчатый, лук Суворова и др.). А количество экземпляров очень редкого вида тезиума Минквица возросло с 7 до 17. Впервые на Кураминском хребте обнаружена популяция редчайшего вида – ширача Коровина. В то же время численность унгернии Виктора, лука Пскемского, шалфея Маргариты и др. резко сократилась.

На основании исследований последних лет сделан вывод о необходимости дополнения «краснокнижников» ещё 138 редких таксонами. Таким образом, в изданную в 1998 году «Красную книгу» независимого Узбекистана был включен 301 вид растений. А в новое издание занесены 313 видов растений, принадлежащие 48 семьям.

В соответствии с классификацией Международного Союза охраны природы (МСОП) виды растений, включенных в «Красную книгу» Узбекистана, распределены по 4-м статусам.

0. Исчезнувшие или, вероятно, исчезнувшие. Виды, не встреченные на протяжении нескольких лет, но, возможно, уцелевшие в некоторых труднодоступных местах или в культуре.

1. Находящиеся на грани исчезновения. Виды с количеством, близким к критическому уровню, и близкие к исчезновению.

2. Редкие. Виды, не находящиеся под непосредственной угрозой исчезновения, но встречающиеся в таком небольшом количестве или в таких ограниченных по площади и специфических местах обитания, что могут быстро исчезнуть. Требуется тщательное наблюдение.

3. Сокращающиеся в численности. Виды, численность и ареал которых уменьшается в течение определенного времени по естественным причинам из-за вмешательства человека или в результате того и другого. Необходима регулярная оценка их состояния.

По многим причинам статус вида изменяется как в одну, так и в другую сторону: растения могут и исчезнуть и выйти из категории охраняемых.

В настоящем издании принят алфавитный порядок расположения семейств, а также родов и видов внутри них. Названия многих таксонов (видов, родов, семейств), длительное время употреблявшиеся в специальной литературе, согласно последним исследованиям, заменены на новые. Каждый вид снабжен узбекским, русским и латинским названиями с указанием семейства. Даётся краткое описание вида (жизненная форма, высота, габитус, листья, цветок, плод, фенология), распространение. Перечисляются места обитания, на схематической карте точками нанесены их местонахождения. Отмечаются способы размножения в естественных условиях. В некоторых случаях говорится о возможности культивирования вида на опытных участках или в промышленном масштабе. Описываются принятые и необходимые меры охраны. В видовых очерках использованы гербарные и литературные материалы, опросные данные и результаты многолетних полевых исследований отдельных авторов.


Как результат научно-исследовательских работ по виляятам республики, проведённых учёными ИГРЖМ АН РУз в течение 8 лет после первого издания, в Красную книгу Республики Узбекистан, внесены некоторые изменения. Например, в связи с увеличением количества особей шафрана Королькова, бересклета Коопмана, лука Суворова, лука стебельчатого и расширения их ареалов, эти виды были исключены из «Красной книги». Всего исключено 23 вида. С другой

стороны, вновь включен новый 11 вид высших растений, признанные редкими, 7 видов переведены из статуса 2 в статус 3 в связи с расширением их популяций в природе.

В результате исследований выявлено, что 10 видов растений встречаются также и на других хребтах и в своеобразных экологических условиях. Особо следует подчеркнуть наличие в новом издании 18 видов со статусом 0. Это документальное свидетельство мощного антропогенного прессинга, оказываемого на нашу флору.

Новое издание «Красной книги» попутно поднимает перед специалистами-ботаниками, представителями административных органов, а также общественными организациями вопросы охраны редких видов, создания заповедников и заказников, усиления контроля за заготовкой дикорастущих декоративных и сырьевых растений.

Только при участии всех граждан республики в деле охраны природы, её растительного мира, можно достичь желаемых результатов. Только таким образом можно сохранить живую природу для грядущих поколений.



АЙИҚТОВОНДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ЛЮТИКОВЫЕ – RANUNCULACEAE

1. КНОРРИНГ ИСФАРАГИ

Живокость Кнорринга / *Delphinium knorringianum* B. Fedtsch.



Мақоми 2. Олой тизмасидаги кичик майдонда тарқалган камёб эндемик ўсимлиқ.

Қисқача тавсифи. Бўйи 35–45 см га етадиган ўқ илдизли, кўп йиллик ўт. Барглари, асосан, поясининг пастки қисмида жойлашган. Барганди узун, пастки қисми бироз кенгайган, япроғи юмалоқ-бўйраксимон, 5 та панжасимон бўлакка ажралган, бўлаклари тескари тухумсимон, улар ҳам, ўз навбатида, бироз қирқилган. Пояси камшох, 5–7 гулли. Гулкосаси оч бинафша рангли, кенг эллипстухумсимон, пихлари ингичка, узунлиги 2,5 см, учи иккига ажралган. Июнь ойида гуллаб, июль ойида мева тугади.

Тарқалиши. Фаргона вилояти: Шоҳимардан дарёси ҳавзаси, шунингдек, Қирғизистонда ҳам учрайди (Ўш вилояти).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмидаги ёнбағирларда ва қояларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ёки тўп-тўп бўлиб ўсади. Умумий сони аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Ўсимликнинг умумий сонини аниқлаш, табиатда ва ботаника боғларида биоэкологик хусусиятларини ўрганиш тавсия этилади.

Манбалар. [281, 389, 453, 461].

К. Т. Тойжанов.

Статус 2. Редкий узкий эндемик Алайского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 35–45 см, со стержневым корнем. Листья на длинных, при основании рас-

ширенных черешках, сосредоточены в нижней части стебля, с округло-почковидной пластинкой, пальчато-рассечённой на 5 обратно-яйцевидных долей, которые, в свою очередь, неглубоко надрезаны. Стебель маловетвистый, с 5–7 цветами. Листочки околоцветника светло-фиолетовые, широко-эллиптически-яйцевидные, с тонким шпорцем длиной до 2,5 см, на конце обычно раздвоенные. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Ферганская область: бассейн реки Шахимардан, а также за пределами Узбекистана: Кыргызстан (Ошская область).

Места обитания. Слоны и скалы в нижнем и среднем поясах гор.

Численность. Общая численность не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сведений нет.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Рекомендуется уточнить общее количество растения, изучать в природе и в ботанических садах его биоэкологические свойства.

Источники. [281, 389, 453, 461].

К. Т. Тойжанов.

Rare endemic species of the Alay mountain range. It is spread at the Shakhimardan valley (the Ferghana region). Inhabits slopes or rocks in the lower and middle belts of mountains. Single or small clumps can be found. Total number is unknown. Measures of protection: not protected.



2. ОҚ ПАРПИ

Аконит таласский / *Aconitum talassicum* Popov

Мақоми 3. Тянь-Шань ва Помир-Олой тизмасидаги сон жиҳатдан қисқарип бораётган, ареали бўлинган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1,5 м га етадиган, кўп йиллик, тугунак илдизпояли ўт. Илдизпояси тугунакларнинг ёнма-ён қўшилишидан ҳосил бўлган. Поялари оддий, тик ўсувчи. Поянинг юқори қисмидаги барглари бандсиз, қолганлари бандли, япроғи асосигача йирик тишли бўлакларга ажралиган. Ёрқин қўқимтири рангли гуллари поянинг юқори қисмida йирик шокила ҳосил қиласди. Июнь-июлда гуллаб, меваси июль-август ойларида етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Фарғона, Жиззах, Қашқадарё вилоятлари: Писком, Чотқол, Курама, Фарғона, Туркистон, Зарафшон, Ҳисор тизмаларида тарқалган. Тожикистонда, Қозогистон ва Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва юқори қисмларидаги нам ерларда ва ёнбағирлардаги булоқларнинг атрофларида ўсади. Баъзан булоқ бўйларида кичик бутазорлар ҳосил қиласди.

Сони. Бутун ареали бўйлаб бир-биридан анча узоқ жойлашган унча катта бўлмаган тўплар ҳосил қиласди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Халқ табобатида доривор ўсимлик сифатида ишлатилади.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Чотқол, Зомин қўриқхоналарида, Угом-Чотқол ва Зомин миллий табиат боғларида ўстирилади.

Манбалар. [214, 215].

К. Т. Тойжанов.

Статус 3. Эндемик западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая с сокращающейся численностью и разорванным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее клубнекорневищное травянистое растение высотой до 1,5 м. Корневище представлено цепочкой

сросшихся клубней. Стебель прямой, простой. Листья черешковые (кроме самых верхних), почти до основания рассечённые на крупнозубчатые доли. Цветки – в верхушечной кисти, крупные, светло-синие. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Ташкентской, Ферганской, Джизакской, Кашкадаръинской областях: Писком, Чаткальский, Кураминский, Ферганский, Туркестанский, Зарафшанский, Гиссарский хребты. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан.

Места обитания. Влажные места у родников, на склонах и в долинах среднего и верхнего поясов гор. Иногда у родников образует небольшие заросли.

Численность. По всему ареалу встречается в виде отдельных, иногда значительно удалённых друг от друга небольших популяций.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. В народной медицине употребляется как лекарственное средство.


Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского, Зааминского заповедников, Угам-Чаткальского и Зааминского национальных парков.

Источники. [214, 215].

К. Т. Тойжанов.

Endemic species with reducing area at the western Tien-Shan and Pamir-Alay. It is spread at the Pskem, the Chatkal, the Ferghana, the Turkestan, the Zaravshan, the Hissar Ranges (the Tashkent, the Ferghana, the Djizakh, the Kashkadarya regions). Inhabits wet places near springs, on the slopes and in valleys of the middle and upper belts of mountains. Sometimes, forms brushwoods near springs. Sometimes, separate small populations are met all over the area. Limiting factors: used as medicine in national medicine. Measures of protection: protected in the Chatkal and Zaamin state nature reserves, the Ugam-Chatkal and Zaamin National Parks.



3. БОЙСУН ПЎФАНАГИ

Ветреница байсунская / *Anemone baissunensis* Juz.



Мақоми 3. Кўхитанг ва Ҳисор тизмаларида ўсувчи камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Чўзиқ тугунакли кўп йиллик ўт. Илдизолди барглари бандли, уч карра бўлинган, бўлаклари юмалоқ ёки ўткир тишли. Ён бўлаклари бандсиз ёки қисқа бандли, ўрта қисмидаги банди 1,5 см узунликка эга. Ўрама барглари 2–3 тани ташкил этади, юқори қисми уч карра бўлинган. Гулбанди 1–4 тагача туклар билан қопланган. Гулларининг диаметри 1–2, 3–4 см, сариқ рангли. Чангдони ва чангчи иплари сариқ, уруғчиси эса қора. Уруғи 0,3–0,35 см узунликда. Тумшуқласининг узунлиги 0,2 см, сертуқ. Март–апрель ойларида гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг тизмасида – Шалқонсой атрофида; Ҳисор тизмасида – Бойсун, Шўрчи, Денов атрофларида ўсади. Тоҷикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғ ёнбағирларидаги сариқ ва майда тупроқларда ҳамда тоғ этакларидаги ола тупроқлarda ўсади.

Сони. Табиатда кам учрайди. Одатда, кичик-кичик тўйчалар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан, айрим ҳолларда вегетатив йўл билан ҳам кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари йиғиб, тугунаклари қазиб олиниади. Чорва моллари томонидан пайҳон қилинади.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1965 йилдан бўён экиб ўстирилади.

Мухофаза чоралари. Табиатда сақланиб қолган тупларини назорат остига олиш лозим. Сурхон давлат кўриқхонасида мухофаза қилинади.

Манбалар. [98, 99, 129, 354].

К. Т. Тойжанов.

Статус 3. Редкий эндемик Гиссарского хребта и Кугитанга.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с продолговатыми клубнями. Прикорневые листья на черешках, трижды рассеченные на сегменты с закругленными или заостренными зубцами. Боковые сегменты сидячие или на коротких черешках, средний на черешке длиной до 1,5 см. Листочки обёртки (2–3) в верхней части трижды рассеченные. Цветоносы (1–4) покрыты волосками. Цветки с диаметром 1–2, 3–4 см, жёлтые. Пыльники и тычиночные нити жёлтые, пестики чёрные. Семянки до 0,3–0,35 см, с загнутым носиком, длиной до 0,2 см, шерстисто-волосястые. Цветёт в марте-апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Сурхандарьинская область: Кугитангский хребет – окрестности Шалкансая; Гиссарский хребет – окрестности Байсана, Шурчи, Денав. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Лёссовидные и мелкоземистые склоны, выходы пестроцветных пород в предгорьях.

Численность. Встречается редко, небольшими группами.

Размножение. Семенное, редко – вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветов и клубней, вытаптывание скотом.

Культивирование. С 1965 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходим контроль за популяциями. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [98, 99, 129, 354].

К. Т. Тойжанов.

Rare endemic species of the Hissar and Kughitang mountain ranges. It is spread at the Kughitang ridge: the Shalkansay, the Hissar range: nearby Bayssun, Shurchi, Denau (the Surkhandarya region). Inhabits loess-like and gypseous slopes of the foothills and lower mountain belt. The quantity is unknown. Limiting factors: flowers and tubers collection, trampling down by cattle. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve.



4. БУХОРО ПҮФАНАГИ

Ветреница бухарская / *Anemone bucharica* Regel

Мақоми 3. Ўзбекистонда кам учрайдиган, Жанубий Помир-Олойда ўсадиган эндемик ўсимлик.

Қисқача тасифи. Тугунағи юмалоқ ёки узунчоқ кўринишдаги кўп ийллик ўт. Илдизолди барглари бандли, оч яшил, юмалоқ-юраксимон, уч карра бўлинган, сийрак тукли. Япроғининг ён бўлаклари бандсиз, ўрта қисмидагилари эса қисқа бандли. Ўрама барглари 3 та, уч карра бўлинган. Гулпоялар 1-3 та. Гуллари йирик, диаметри 3-4 см, тик турувчи, очиқ, ликопчастимон. Гулкосаси қизил, ички томони ялтироқ, ташқи томони ётиқ тукли. Уруғи қалин тукли. Апрель-июн ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўҳитанг тизмасида – Шалқонсой атрофи, Боботоғ тизмасида тарқалган (Тожикистанда ҳам учрайди).

Ўсиш шароити. Тоғ ёнбағирларидаги сарғиш тусли ва майда заррали тупроқларда ҳамда тоғ этакларидаги ола тупроқларда ўсади.

Сони. Табиятда кам тарқалган, тўп-тўп ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гул ва тугунакларининг маҳаллий аҳоли томонидан йиғиб олиниши ва чорва моллари боқилиши натижасида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. 1962 йилдан буён ЎзРФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Табиятда мавжуд популациялари қатъий назорат остига олиниши лозим. Сурхон давлат кўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [98, 99, 129, 354].

К. Т. Тойжанов.

Статус 3. Эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с клубнями от круглой до про-

долговатой формы. Прикорневые листья на черешках ярко-зелёные, округло-сердцевидные, трижды рассечённые, рассеянноволосистые. Боковые сегменты почти сидячие, средний – на коротком черешке. Листочки обёртки (3) трижды рассечённые. Цветоносы в количестве 1-3. Тычинки и пестики многочисленные. Цветки крупные, до 3-4 см в диаметре, прямостоячие, открытые, блюдцевидные. Листочки около цветника красные, внутри блестящие, снаружи прижато-волосистые. Семена густоволосистые. Цветёт и плодоносит в апреле-июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг – окрестности Шалкансая, хребет Бабатаг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Лёссовидные и мелкоземистые склоны, выходы пестроцветных пород в предгорьях.

Численность. Встречается редко, небольшими группами.

Размножение. Семенное, редко – вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветов и клубней местным населением, выпас скота.

Культивирование. С 1962 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [98, 99, 129, 354].

К. Т. Тойжанов.

Endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Kughitang and Babatag ranges (the Surkhandarya region). Inhabits loess-like and fine earth slopes, on gypseous rocks. Rarely, small groups can be found. Limiting factors: collection of flowers and tubers by population, cattle pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve.



5. ТУКСИЗ СУФУРҮТ

Горицвет голочашечный / Adonanthe leiosepala (Butkov) Chrtek et Slaviková



Мақоми 3.

Жануби-ғарбий

Тянь - Шана да
тарқалган ареали
бўлинган, камёб энде-
мик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи
15–20 см, попуксимон илдиза-
ли, кўп йиллик ўт. Илдизпоя
бўғзидан чиқсан қўнғир барг-

лари қисқа, бир нечта поялар ўсіб чиқади. Новда-
лари сершоҳ, сербарг. Барглари патсимон бўлинган,
юпқа, майда. Гуллари йирик, якка-якка, тўқ сариқ
рангли. Меваси юпқа илмоқсимон учли, хиёл
қайрилган. Май ойида гуллаб, меваси июль-август
ойларида етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол тизма-
сида – Паркент, Заркент қишлоқлари атрофларида,
Сўқоқсой, Бошқизилсой ва Келинчаксойда; Курама
тизмасида – Қамчиқ довонида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмидаги
тошли, шағалли, майда жинс тупроқларда ва
қояларда ўсади.

Сони. Бу тур тарқалган ерлар 3,5–4 минг гек-
тарни ташкил қиласди. Умумий сони 30–40 минг туп
атрофида.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

**Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаб-
лари.** Униб чиқиши қобилияти 1–2 фойизни ташкил
этади. Етилган уруғлари 2–3 йилдан сўнг униб
чиқади. Рақобатга чидамсиз. Кўриқхона шароитида
якка ҳолда ўсан катта ёшдаги туплари аниқланган.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чотқол давлат биосфера
қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [84–87, 130, 247].

К. Т. Тойжанов.

Статус 3. Редкий эндемик юго-западного Тянь-Шаня с разорванным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее кистекорневое травянистое растение высотой 15–20 см. От шейки корневища отходит несколько стеблей, покрытых бурыми, редуцированными листьями. Стебли ветвящиеся, густооблиственные. Листья перисто-рассеченные, тонкие. Цветки крупные, одиночные, ярко-желтые. Плоды с тонким крючковато-изогнутым носиком. Цветёт в мае, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский хребет: в окрестностях посёлков Паркент, Заркент, Суок, а также в Башкызылсае, Келинчексае; Кураминский хребет: перевал Камчик.

Места обитания. Щебнистые, каменистые и мелкоземистые склоны, выходы скал субальпийского пояса.

Численность. Известные участки ареала охватывают 3,5–4 тыс. га. Общая численность: 30–40 тыс. экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала.

Очень низкая всхожесть (1–2 %). Семена всходят после 2–3-летнего периода покоя. Низкая конкурентоспособность. На заповедной территории вид представлен одиночными, старовозрастными экземплярами.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском государственном биосферном заповеднике.

Источники. [84–87, 130, 247].

К. Т. Тойжанов.

Rare endemic species of the south-western Tien-Shan with reducing area. It is spread at the Chatkal range: the surroundings of Parkent, Zarkent, Sukok and also in Bashkyzylsay, Kelincheksay; the Kurama range: the Kamchik passage (the Tashkent region). Inhabits, stony and fine earth slopes, rocks of the Alpine belt. Known area plots occupy 3.5-4 thousand ha. Total number: 30-40 thousand specimens. Limiting factors: very low germination (1-2%). Seeds spring up after 2-3 years of dormancy. Low competition capacity. In the territory of state reserve the species are represented by single, old specimens. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere state reserve.



АНОРДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ГРАНАТОВЫЕ – PUNICACEAE

6. ЁВВОЙИ АНОР

Гранат обыкновенный / *Punica granatum* L.

Мақоми 3. Ўзбекистонда табиий ҳолда жуда кам сақланиб қолган, ареали бўлинган реликт тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 2 м га етадиган бута. Барги чўзиқ, тескари тухумсимон, узунлиги 6–8 см, эни 7–15 мм, чармсимон, қисқа шохларда тўп-тўп, узун шохларда эса қарама-қарши ўрнашган. Гули калта новдаларда жойлашган. Косачаси қайишсимон мустаҳкам, тожбарги оч қизил рангда. Меваси юмалоқ, йирик. Май–августда гуллаб, сентябрь–октябрь ойларида мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Хисор тоғининг жануби-гарбий қисмида Тўпаланг, Сангардак дарёлари ҳавзаларида тарқалган. Тожикистон, Туркманистон, Кавказорти, Туркия, Шимолий Эрон, Афғонистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмида – денгиз сатҳидан 1000–1600 м баландлиқдаги салқин ва нам дараларда ўсади.

Сони. Кўпинча якка ҳолда, баъзан бошқа дараҳт ва буталар билан биргаликда ўсади. Айrim жойларда соф анорзорларни ташкил этади. Тупларининг умумий сони аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан ва илдиз бачкисидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Анорзорларнинг бузиб юборилиши ва мевалари пала-партиш йиғиб олиниши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Анор одамлар томонидан 4000 йилдан бўён етиштириб келинади.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [156–159, 274].

И. В. Белолипов.

Статус 3. Очень редкий, исчезающий в Узбекистане реликтовый вид с разорванным ареалом.

Краткое описание. Кустарник высотой до 2 м. Листья продолговато-обратнояйцевидные, кожистые, длиной 6–8 см, шириной 7–15 мм, на укороченных побегах сидят пучками, на удлинённых – супротивно. Цветки на укороченных побегах. Чашечка кожистая. Лепестки ярко-красные. Плод шаровидный, крупный. Цветёт в мае–августе, плодоносит в сентябре–октябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: юго-западные отроги Гиссарского хребта – бассейны рек Тупаланг, Сангардак. За пределами Узбекистана – Таджикистан, Туркменистан, Закавказье, Турция, Северный Иран, Афghanistan.

Места обитания. Увлажнённые и защищённые места в небольших ущельях и расщелинах гор на высоте 1000–1600 м.

Численность. Встречается редко, одиночными кустами или небольшими зарослями вместе с другими древесными и кустарниковыми породами, очень редко – небольшими чистыми зарослями. Точные учёты не проводились.



Размножение. Вегетативное (отпрысками) и семенное.

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственное освоение территории и нерегулируемый сбор плодов местным населением.


Культивирование. Культура граната обыкновенного известна более 4000 лет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [156–159, 274].

И. В. Белолипов.

Very rare endangered in Uzbekistan relict species with reducing area. It is spread at the south-western outskirts of the Hissar range: the Tupalang and Sangardak valleys (the Surkhandarya region). Inhabits wet and protected places in small defiles and clefts of mountains at the altitude of 1000–1600 m. Seldom, single or small brushwoods with other woody and shrubby plants, very seldom, small pure brushwoods. Total number was not calculated. Limiting factors: the economic development of the territory and irregular harvest by local population. Measures of protection: not protected. Some populations are protected in forests.



БИГНОНИЯДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО БИГНОНИЕВЫЕ – BIGNONIACEAE

7. ОЛЬГА ИНКАРВИЛЛЕЯСИ Инкарвиллея Ольги / *Incarvillea olgae* Regel



Мақоми 3. Помир-Олойдаги жуда камёб, ўйқолиб кетиш арафасидаги қадимги тур.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик ўтсимон ўсимлик, бўйи 1,5 м га етади. Пояси унча кўп эмас, тик ўсади. Барглари оддий, узунлиги 6–10 см, патсимон қирқилган. Гуллари ўсимликнинг учидаги рўваксимон тўпгулларда ўрнашган. Косачаси туксиз, узунлиги 3–4 см, кенг учбурчак тишчали. Гулточи воронкасимон, йирик, беш бўлмали, пушти-тўқ қизил рангли, баъзан оқ, узунлиги 4 см, ташқи томони туксиз, ички томони сийрак тукли. Чангчиларининг иплари туксиз, чангдони икки қанотчали, сийрак тукли. Уруғдони узун, туксиз устунчали. Меваси кўп уруғли, чўзиқроқ, пўсти қалин, узунлиги 5–10 см, эни 1 см келадиган сал қайрилган ўтсимон кўсақча. Уруғи 1 см гача узунликда, ярим пардасимон, оқ қанотчали. Июнь–август ойларида гуллаб, август–сентябрда мева тугади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Помир-Олой (Олой тизмаси)нинг Сўх ва Шоҳимардан дарёлари ҳавзасида тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Қирғизистон ва Тожикистанда ҳам тарқалган.

Ўсиш шароити. Адир ва тоғларда 1500–2500 м баландлиқдаги майдо чағир тошли, тошли ёнбағирларда шағалли дарё ўзанларида ўсади.

Сони. Кичик гурухлар ҳосил қилиб ўсади. Популяцияларининг умумий сони аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғдан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Антропоген омиллар таъсирида ва чорва моллари боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. ЎзРФА Ботаника бοғида 1961 йилдан буён муваффақиятли ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [25, 156–159, 210].

И. В. Белолипов.

Статус 3. Очень редкий, находящийся под угрозой исчезновения древний вид Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 1,5 м. Стебли немногочисленные, прямостоячие. Листья простые 6–10 см длины, перисто рассеченные. Цветы в верхушечном, метельчатом соцветии. Чашечка голая, 3–4 мм длины с широко треугольными зубцами. Венчик воронковидный, крупный, пятилопастной, розово-пурпуровый, редко белый, до 4 см длины. Тычинки с голыми нитями и рассеянно опущенными двукрыльными пыльниками. Завязь с длинным голым столбиком. Плод многосемянная удлиненная кожистая, слегка согнутая коробочка 5–10 см длины и 1 см ширины. Семена до 1 см длины с полупрозрачными белыми крыльями. Цветет в июне–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. Ферганская область: Памиро-Алай (хребет Алайский – бассейны рек Сох и Шахимардан). За пределами Узбекистана: Кыргызстан, Таджикистан.

Места обитания. На галечниковых поймах и конусах выноса, щебнистых мелкоземистых, каменистых склонах предгорий и гор, на высотах 1500–2500 м.

Численность. Встречается небольшими группами. Общая численность популяций не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности. Антропогенное воздействие и выпас скота.

Культивирование. Успешно выращивается с 1961 г. в Ботаническом саду АН РУз. В культуре устойчива.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [25, 156–159, 210].

И. В. Белолипов.

Very rare end angered relict endemic species of the Pamir-Alay. It is spread at the Pamir-Alay (the Alay range: the Sokh and Shakhimardan valleys). Inhabits stony meadows in the middle mountainous zone (1500-2500 m.s.l.) Growing in micro-groupings. Total number is unknown. Limiting factors: antropogenic factors and pasturing. Measures of protection: not protected.



БУРЧОҚДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО МОТЫЛЬКОВЫЕ (БОБОВЫЕ) – FABACEAE (LEGUMINOSAE)

8. БИНАФША ГУЛЛИ АРГУВОН Багрянник Гриффита / *Cercis griffithii* Boiss.

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шань ва Помир-Олой тизмаларида ўсадиган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 3–4 м келадиган, кенг шох-шаббали дараҳт. Бир йиллик новдаларининг пўстлоғи қўнғир-қизил рангли. Барглари юмалоқ, буйраксимон, туб қисми кенг ўйилган, устки томони яшил, пастки томони кўкимтирик рангда. Гуллари калта-калта шокилаларга тўплланган. Тожбарги қирмизи-бинафша рангли. Дуккагининг узунлиги 6–8 см, эни 1 см. Май ойида гуллаб, июнда мева беради. Манзарали дараҳт.

Тарқалиши. Тошкент ва Сурхондарё вилоятлари: Фарбий Тянь-Шань – Уғом, Курама тизмалари; Помир-Олой – Ҳисор ва Боботоғда ўсади. Тоҷикистон ва Афғонистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмларида тошли, тошли-шағалли ва майда заррари тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди. Баъзан кичик аргувонзорлар ҳосил қиласи.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Курилиш материаллари ва ўтин учун кесиб олиниши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [89, 156–159, 297].

Р. И. Қозоқбоев.

Статус 2. Редкий вид в западном Тянь-Шане и Памиро-Алае.

Краткое описание. Дерево высотой 3–4 м, сильно ветвистое, образует широкую крону. Годичные побеги с красно-буровой корой. Листья округлые, почковидные, при основании широко-выемчатые, верхняя поверхность листа зелёная, нижняя – синевато-сизая. Цветки собраны в укороченные кисти. Венчик пурпурно-фиолетовый. Бобы длиной 6–8 см, шириной до 1 см. Цветёт в мае, плодоносит в июне. Декоративен.

Распространение. В Ташкентской и Сурхандарьинской областях: Западный Тянь-Шань – Угамский, Кураминский хребты; Памиро-Алай – Гиссарский хребет, Бабатаг. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Афганистан.

Места обитания. Мелкоземистые, каменисто-щебнистые южные склоны в нижнем поясе гор.

Численность. Встречается одиночными особями, реже образует небольшие рощицы.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Заготовляется населением на топливо и древесину.



Культивирование. Культивируется.

Меры охраны. Не разработаны.

Источники. [89, 156–159, 297].

Р. И. Казакбаев.

Rare endemic of the western Tien-Shan and southern Pamir-Alay. It is spread at the western Tien-Shan: the Ugam, the Kurama ranges; the Pamir-Alay: the Hissar range, the Babatag (the Tashkent and Surkhandarya regions). Inhabits fine earth, stony-southern slopes in the lower belt of mountains. Single specimens, rarely forms small groves can be found. Limiting factors: using as firing and wood. Measures of protection: not protected.



9. АБОЛИН АСТРАГАЛИ

Астрагал Аболина / *Astragalus abolinii* Popov

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шанда кичик майдонда тарқалган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик ўт. Қисқа танасидан осилиб турувчи ингичка, кўплаб бурама поялар ўсиб чиққан. Барги мураккаб, 5–6 см узунликда, баргчалари 4–6 жуфт, чўзиқроқ юмалоқ шаклда, узунлиги 7–14 мм, эни 5–8 мм. Гуллари ёйиқ, момиқ гулпопугида 3–9 тадан жойлашган. Косачаси (гуллаган даврда) бироз каттаяди, кейинчалик тухумсимон-қабариқ шаклга киради. Дуккаги 8–12 мм узунлиқда, оқиши, ҳурпайган, қалин тукли. Июнда гуллаб, июлда мева беради.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол, Уғом, Писком ҳамда Қоржонтов тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1000–1200 м баландлиқдаги қуёш нури тик тушмайдиган қоятошларнинг ёриқларида ва дараларнинг салқин ёнбағирларида ўсади.

Сони. Чотқол тизмасида бир-биридан ажралган ҳолда кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади. Оқбулоқ атрофларида 10 та жойда борлиги аниқланган. Писком дарёси ҳавзасида 150–250 атрофидаги туплардан иборат 20 дан ортиқ популяциялари мавжуд.

Кўпайиши. Фақат уруғидан кўпаяди. Оқбулоқ атрофларида панароқ ёнбағирларда ёш ниҳоллари учрайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Янги униб чиққан майсалари ва ёш ниҳолларининг камлиги ўсимликнинг секинлик билан кўпайишидан далолат беради. У ўзига хос шароитда ўсишни талаб қиласи ва турлароро рақобатга дош бера олмайди.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.


Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера кўриқхонасида ва Уғом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [343, 345].

F. М. Шерматов.

Статус 2. Редкий узкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с укороченным стволиком, от которого ответвляются многочисленные извилистые свисающие тонкие стебли. Листья длиной 5–6 см, листочки 4–6-парные, округло-овальные, закруглённые, длиной 7–14 мм, шириной 5–8 мм. Цветки собраны в 3–9-цветковые рыхлые кисти. Чашечка при цветках



слегка вздутая, позже яйцевидно-вздувающаяся. Бобы длиной 8–12 мм, оттопыренно-белые шерстисто-мохнатые. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский, Угамский, Пскемский хребты и Каржантай.

Места обитания. Трещины отвесных скал на высоте 1000–1200 м, преимущественно северные, тенистые склоны ущелий.

Численность. Встречается разрозненно, образует небольшие популяции на Чаткальском хребте. В районе Акбулака отмечен в 10 пунктах. В бассейне реки Пскем имеется более 20 популяций, с численностью по 150–250 растений.

Размножение. Только семенное. В районе Акбулака на защищенных склонах встречаются молодые всходы.

Причины изменения численности и ареала. Малочисленность ювенильных растений и всходов, свидетельствующая о слабой воспроизводительности; приуроченность к характерным местообитаниям и низкая конкурентоспособность.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском биосферном государственном заповеднике и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [343, 345].

Г. М. Шерматов.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal, the Ugam, the Pskem, the Karzhantau ranges (the Tashkent region). Inhabits cracks of sheer rocks at the altitude of 1000-1200 m above sea level, mainly, the northern shady slopes of gorges. Can be met separately. Forms small populations at the Chatkal Range. In Akbulak, is observed in 10 points. At the Ugham, the Pskem river basins, the Karzhantau, 150-250 plants can be observed. Limiting factors: scarcity of juvenile plants and seedlings, i. e., weak ability for reproduction; thrived in typical habitats and low competition capacity. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere state reserve and the Ugam-Chatkal national park.

10. БАРАНОВ АСТРАГАЛИ

Астрагал Баранова / *Astragalus baranovii* Popov

Мақоми 1. Чотқол тизмасидаги эндемик түр.
Қисқача тавсифи. Бўйи 4–10 см келадиган деярли поясиз, ер бағирлаб ўсадиган кўп йиллик ўт. Асосий поясининг ер остида жойлашган ёғоч қисмидан бир йиллик, ингичка, 2 см узунликдағи ётиқ оқ туклар билан қопланган поялар ўсиб чиқади. Барги 2,5–6 см узунликда, баргчалари 4–6 жуфт, тухумсимон ёки юмалоқ-тухумсимон 4–6 мм узунликда, тўмтоқроқ, ҳар икки томони ётиқ оқ туклар билан қопланган. Гулпопуги қисқа, соябонсимон, ғовак ва момиқ, 1,5–2 см узунлиқдаги 4–5 та гули бор. Тожбарги оч пушти рангли. Дуккаги чўзиқ-наштарсимон, узунлиги 10–11 мм, эни 3 мм, бироз хурпайган оқ тукли, икки уяли. Июлда гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол тизмасида ҳамда Катта Чимён тоғида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ минтақасининг юқори қисмida, оҳактошли қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Фақат икки жойда ўсиши аниқланган.

Кўпайиши. Одатда, уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Дам олиш масканларининг қурилиши ва чанғи учиш учун трассалар барпо этилиши ўсимлик сонига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [156–159, 343].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 1. Эндемик Чаткальского хребта.

Краткое описание. Многолетнее высотой 4–10 см приземистое растение с подземным деревянистым длинноветвистым стволиком, почти бесстебельное или с тонкими, прижато-белопушистыми годичными стеблями длиной до 2 см. Листья длиной 2,5–6 см, листочки 4–6-парные, яйцевидные или округло-яйцевидные, длиной 4–6 мм, закругленно-тупые, с обеих сторон седовато-прижато-волосистые. Кисти – укороченные, зонтиковидные, рыхлые, 4–5-цветковые, длиной 1,5–2 см. Венчик бледно-розовый. Бобы ланцетно-продолговатые, длиной 10–11 мм, шириной 3 мм, полууттопыренно-беломохнатые, двугнёздые. Цветёт в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский хребет: Большой Чимган.

Места обитания. Расщелины известняковых скал в субальпийском поясе гор.

Численность. Отмечен только в двух пунктах.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. В связи с созданием зон отдыха и лыжной трассы численность вида резко сократилась.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [156–159, 343].

К. Ш. Тожибаев.



Endemic species of the Chatkal range. It is spread at the Chatkal range: the Great Chimgan (the Tashkent region). Inhabits clefts of calcareous rocks in the subalpine belt of mountains. In 2 localities can be observed. Limiting factors: reducing due to creation of the rest zones and ski-tracks. Measures of protection: not protected.



11. БИНАФШАРАНГ АСТРАГАЛ

Астрагал центральный / *Astragalus centralis* E. Sheld.

Мақоми 2. Қизилқумдаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 5–10 см орасидаги оқ туклар билан қопланган бутача. Пояси кумушранг, бироз тарвақайлаган, қалин, ипаксимон тукли. Баргининг узунлиги 2–5 см, баргчалари 3–5 жуфт, эллипссимон, ўткир учли, узунлиги 8–14 мм, ҳар икки томони қалин кумушранг-ипаксимон туклар билан қопланган. Тўғпугу юмaloқ ёки тухумсимон, узунлиги 2–3,5 см, зич жойлашган, кўргулли. Косачасининг узунлиги 8–10 мм, қалин ва майда, кенг ёйилган, юмшоқ тукли. Гултожи бинафша ранг. Дуккаги майда, бандсиз, юмaloқ-чўзиқроқ шаклда, қирралари ўткир, пўстї қалин, бир уяли. Май ойида гуллаб, май-июн ойларида мева беради.

Тарқалиши. Бухоро ва Навоий вилоятлари: Қизилқумда (Кулжуктоғ, Оқтоғ, Оқтошли ва Оёқғужумди атрофларида) тарқалган.

Ўсиш шароити. Кояларнинг ёриқларида, оҳактошли ва тошли, тош-шағалли, баъзан майда тупроқли-шағалли қолдиқ тоғларнинг ёнбағирларида ўсади.

Сони. 1200 га яқин тупдан иборат бешта популацияси аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Қизилқум чўл станцияси коллекция майдонида кўпайтиришга қаратилган уринишлар натижага бермagan.

Мухофаза чоралари. Махсус мухофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Кулжуктоғни мухофаза этиладиган ҳудудлар қаторига киритиш тавсия этилган.

Манбалар. [266, 267, 3350, 351].

К. Ш. Тожибаев, Ш. У. Сарибаева.

Статус 2. Редкий эндемик останцов Кызылкума.

Краткое описание. Кустарничек, опущенный белыми волосками, высотой 5–10 см. Стебли серебристые, густо-полуоттопыренно-шелковистые. Листья длиной 2–5 см, листочки 3–5 парные, эллиптические, острые, длиной 8–14 мм, с обеих сторон густо-серебристо-

шелковистые. Соцветия шаровидные или яйцевидные, длиной 2–3,5 см, плотные, многоцветковые. Чашечка длиной 8–10 мм, густо и довольно мягко-оттопыренно-короткомохнатая. Венчик фиолетовый. Бобы сидячие, мелкие, овальные, на спинке и брюшке килеватые, кожистые, одногнездные. Цветёт в мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. В Бухарской и Навоийской областях: Кызылкумы (горы Кульджуктау, Актау, Актасты, окрестности Аяк-гужумды).

Места обитания. Трецины скал, известняковые и каменистые, каменисто-щебнистые, изредка мелкоземисто-щебнистые склоны останцевых горок.

Численность. Отмечены около 1200 особей в пределах 5 популяций.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Попытки введения в культуру на территории Кызылкумской пустынной станции АН РУз не увенчались успехом.

Меры охраны. Кульджуктау рекомендован к утверждению в качестве охраняемой территории.

Источники. [266, 267, 350, 351].

К. Ш. Тожибаев, Ш. У. Сарибаева

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Kuldjuktau mountains, the Aktau, the Aktasty, the Ayak-guzhumdy (the Bukhara and Navoi regions). Inhabits cracks of rocks, calcareous and stony, stony-, seldom, fine earth-slopes of the low hills. There are 5 populations with about 1200 plants can be found. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: the Kuldzhuktau recommended as a protected area.



12. БОРИС АСТРАГАЛИ

Астрагал Бориса / *Astragalus borissianus* Gontsch.

Мақоми 1. Олой тизмасидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30 см, деярли поясиз ёки жуда қисқа пояли, барг қолдиқлари билан уралган кўп йиллик ўсимлик. Барги 10–23 см узунликда, баргчалари 10–13 жуфт, чўзиқ, эллипс шаклида ёки ўткир наштарсимон, узунлиги 7–15 мм, қаттиқ, япроқчаларининг ҳар икки томони ётиқ оқ тукли. Гулпопуклари қисилган, қисқа, 6–8 гулли. Дуккаги бандсиз, чўзиқтухумсимон, 14–15 мм узунликда, қаттиқ, хурпайган оқ туклар билан қопланган, икки уяли. Июнда гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Олойтизмасининг Шоҳимардан дарёси ҳавзасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Арчазорларда ва тошли тоғ ёнбағирларида ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.


Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Махсус чора-тадбирлар ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [2, 156–159].

Ф. Ў. Ҳасанов



Статус 1. Редкий эндемик Алайского хребта.

Краткое описание. Многолетнее, почти бесстебельное растение, высотой 30 см, с короткими, сильно укороченными стеблями, одетыми старыми черешками листьев. Листья длиной 10–23 см, листочки 10–13-парные, продолговато-эллиптические или ланцетные, острые, длиной 7–15 мм, жесткие, с обеих сторон прижато-беловолосистые. Кисти – сжатые, короткие, 6–8-цветковые. Бобы сидячие, продолговато-яйцевидные, длиной 14–15 мм, жестко-оттопыренно-беломохнатые, двугнёздые. Цветёт в июне, плодоносит в августе.

Распространение. Ферганская область: Алайский хребет: бассейн реки Шахимардан.

Места обитания. Каменистые склоны среди арчовников.

Численность. Встречается одиночными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [2, 156–159].

Ф. О. Ҳасанов

Rare endemic species of the Alay range. It is spread at the Alay range: the Shakhimardan river basin (the Ferghana region). Inhabits stony slopes, among the juniper stands. Single specimens can be found. Measures of protection: not protected.



13. БУТКОВ АСТРАГАЛИ

Астрагал Буткова / Astragalus butkovii Popov

Мақоми 1. Ҳисор тизмасидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 4–6 см келадиган кўп йиллик ўт. Поялари оқ, қиррали жўякларга эга бўлиб, ётиқ, ғадир-будур, момиқ оқ туклар билан қопланган. Баргининг узунлиги 7–8 см, баргчалари 3 жуфт, тескари чўзиқ-тухумсимон ёки эллипс шаклида, узунлиги 7–15 мм, эни 4–7 мм, ҳар икки томони момиқ туклар билан қопланган. Гулпопуги ғоваксимон, 5–8 гулли, узунлиги 4–5 см. Тожбарги сарғиш. Дуккаги қисқа бандли (0,75 мм), чўзиқ наштарсимон, узунлиги 9–19 мм, эни 2,5–3 мм. Май–июнда гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ҳисор тизмаси Қашқадарё ҳавзасида – Тошқўрғон қишлоғи атрофида учрайди.



Ўсиш шароити. Арчазорлардаги кумтошларда ўсади.

Сони. Табиятда ниҳоятда кам тарқалган. Онда-сонда якка тупларини учратиш мумкин.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат қўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [156–159, 343].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. Стебли высотой 4–6 см, угловато-бороздчатые, прижато-шероховато-пушистые,

белые. Листья длиной 7–8 см, листочки 3-парные, продолговато-обратнояйцевидные или эллиптические, длиной 7–15 мм, шириной 4–7 мм, с обеих сторон, пушистые. Кисти рыхлые, длиной 4–5 см, 5–8-цветковые. Венчик желтоватый. Бобы на короткой (0,75 мм) ножке, продолговато-ланцетные, длиной 9–19 мм, шириной 2,5–3 мм. Цветёт и плодоносит в мае-июне.

Распространение. Кашкадарьинская область: Гиссарский хребет – бассейн реки Кашкадарья, окрестности селения Ташкурган.

Места обитания. Краснопесчаники в арчовнике.

Численность. Встречается очень редко, единичными особями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники.
[156–159, 343].

Ф.О.

Ҳасанов.

Rare endemic species of the Hissar range. It is spread at the Hissar range: the Kashkadarya river basin, nearby the Tashkurgan village (the Kashkadarya region). Inhabits sandstones, juniper stands. Very rare, isolated specimens can be found. Measures of protection: protected in the Hissar state nature reserve.



14. БУХОРО АСТРАГАЛИ

Астрагал бухарский / *Astragalus bucharicus* Regel

Мақоми 2. Жануби-ғарбий Помир-Олойда тарқалган камёб эндемик ўсимлиқ.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–25 см, деярли поясиз ёки жуда қисқа пояли (2–3 см), кўп ийллик ўт. Барглари оддий ёки мураккаб, учта баргчадан ташкил топган, барг банди узун, яrim ётиқ туклар билан қопланган. Баргчалари кенг эллипс ёки кенг тухумсимон, баъзан юмалоқ. Гулпояси 15 см узунилқида, попуклари момиқ ва ғовак. Гули яшил-сарғиши рангли. Дуккаги чўзиқ-юмалоқ шаклда. Апрелда гуллаб, меваси май ойида пишади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўҳитанг ва Ҳисор тизмаларида (Хўжагургур-Ота, Чўлбайир, Фозимойлик, Оқбоштоғ, Қозикўрғон), Хондиза дарёси ҳавзасида ҳамда Боботоғнинг Чагам қишлоғи яқинида тарқалган. Тожикистанда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Ола-була, лойқа ва гипсли тупроқларда, қизил қумли жойларда ўсади.

Сони. Якка ҳолда, 3–4 тури биргаликда ёки кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқ маълумотлар йўқ. Лекин гипсли жинслардан ташкил топган ўзига хос тупроқ шароитида ўсишга мослашганлиги учун ареали кенгаймаслиги мумкин.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида экиб ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [156–159, 342].

F. M. Шерматов.

Статус 2. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение, почти бесстебельное или с коротким (2–3 см) стеблем, высотой до 20–25 см. Листья тройчатые или простые, на длинных черешках, полуупряжато-опущенные. Листочки широко эллиптические, широкояйцевидные, реже округленные. Кисти рыхлые, цветоносы длиной 15 см. Цветки зеленовато-жёлтые. Бобы продолговато-овальные. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Сурхандарьинская область: Кугитангский и Гиссарский хребты (горы Ходжа-Гур-Гур-Ата, Чульбаир, Газимайлик, Акбаштау), бассейн реки Хандиза; Бабатаг (близ кишлаков Чагам и Ходжакульсун). За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Пестроцветные гипсоносные глины и красные песчаники.

Численность. Небольшие популяции, одиночно или изолированными группами по 3–4 растения.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к гипсоносным пестроцветным условиям препятствует расширению ареала.

Культивирование. Выращивалось в Ботаническом саду АН РУз.


Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [156–159, 342].

F. M. Шерматов.

Rare, endemic species of the Kughitang range.

It is spread at the Kughitang and Hissar ridges (the Khodja-Gur-Gur-Ata, the Chulbaир, the Gazimaylik, the Akbashtau mts.), (the Surkhandarya region). Inhabits stony-slopes of the middle belt of mountains, among the juniper sparse growth. Small populations form isolated single groups of 3-4 plants among the juniper stands. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve.



15. ВИЛЛИС АСТРАГАЛИ

Астрагал Виллиса / *Astragalus willisii* Popov

Мақоми 2. Кўҳитангда кам тарқалган, эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи қисқа (4–10 см), пояси йўғон, сершох, кўп йиллик ўт. Поясининг пастки қисмини ўтган йилдан қолган барг бандлари ўраб туради. Барги 18 см узунлиқда, баргчалари эллипссимон ёки чўзиқ наштарсимон, 8–18 жуфт, 4–10 мм узунлиқда, ўткир учли, икки томони майин ипаксимон, қалин тукли. Гул поясининг узунлиги баргига тенг. Гуллари бинафша ранг. Дуккаги чўзиқ, узунлиги 8 мм, икки ёнидан сиқилган. Май ойида гуллаб, меваси июнда пишади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўҳитанг тизмасидаги Қизил олма қышлоғининг шимолида ва Каттақурчук теваракларида учрайди.

Ўсиш шароити. Тофнинг ўрта қисмидаги шағалли-тошли ёнбагирларда ва сийрак арчазорларда ўсади.

Сони. Асосан, якка ҳолда, баъзан арчазорлар орасида кичик-кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик ўсиб турган ерларда чорва молларининг ҳаддан ташқари кўп боқилиши туфайли ўсиш майдонлари қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [73,171].

Ф. ў. Ҳасанов.



Статус 2. Редкий эндемик хребта Кугитанг.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с коротким (4–10 см), толстым, ветвистым стеблем с густыми остатками черешков листьев прошлых лет. Листья длиной до 18 см. Листочки 8–18-парные, эллиптические или ланцетно-продолgovatые, длиной 4–10 мм, остроконечные, с обеих сторон мягко-шелковисто-мохнатые. Цветоносы по длине равны листьям. Цветки фиолетовые. Боб продолговатый, длиной 8 мм, с боков сжатый. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Кугитангский хребет – севернее кишлаков Кызыл-Алма и Катта-Курчук.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны среднего пояса гор, среди арчового редколесья.

Численность. Встречается единичными экземплярами, образует небольшие заросли среди арчовников.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [73,171].

Ф. О. Ҳасанов.



Rare, endemic species of the Kughitang range. It is spread at the Kughitang: nearby the Kyzyl-Alma and Katta-Kurchuk villages (the Surkhandarya region). Inhabits stony-slopes of the middle belt of mountains, among the juniper sparse growth. Small populations form isolated single groups among the juniper stands. Limiting factors: grazing. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve.

16. ЁНГОҚСИМОН АСТРАГАЛ

Астрагал ореховый / *Astragalus nucleosus* Popov

Мақоми 1. Ғарбий Тянь-Шанда кам тарқалган энде-мик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–12 см узунлиқдаги, поясиз, кўп йиллик ўт. Барги 5–14 см узунликда. Баргчалири 11–15 жуфт, наштарсимон ёки эллипс-наштарсимон, учи ўткир, қалин туклар билан қопланган. Гулпоясининг узунлиги 5–8 см. Гули йирик, узунлиги 25–30 мм. Дуккаги бандсиз, 4 см узунлиқда, чўзиқ тухумсимон, қалин, майин, ярим ётиқ тукли. Апрель–май ойларида гуллаб, май–июнда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Курама ва Чотқол тизмаларида тарқалган. Тожикистанда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1600 м гача баландлиқдаги шағал-тошли очик (яланг) тоғёнбағирларида ўсади.

Сони. Кўпмича якка-якка ҳолда, баъзан эса кичик майдонларда тўп-тўп бўлиб учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.



Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг муттасил боқилиши туфайли ўсимлик майдонлари қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус чора-тадбирлар ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [156–159, 318].
Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Узкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение высотой 10–12 см. Листья длиной 5–14 см. Листочки 11–15-парные, ланцетные или эллиптическо-ланцетные, острые, войлочно-мохнатые. Цветоносы длиной 5–8 см. Цветки крупные, длиной 25–30 мм. Бобы сидячие, длиной до 4 см, яйцевидно-продолговатые, густо-мягко-полуприжато-мохнатые. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Ташкентская область: хребты Кураминский и Чаткальский. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Открытые каменистые, каменисто-щебнистые склоны предгорий и среднего пояса гор до высоты 1600 м.

Численность. Встречается небольшими группами, чаще всего одиночно.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [156–159, 318].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Kurama, the Chatkal ranges (the Tashkent region). Inhabits open stony, stony-slopes of foothills and middle belt of mountains up to 1600 m. Small groups, frequently, isolated specimens can be found. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



17. ЗАРҲАЛ АСТРАГАЛ

Астрагал позолоченный / *Astragalus auratus* Gontsch.

Мақоми 2. Олой ҳамда Туркистан тизмаларида ўсадиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15 см га етадиган деярли поясиз кўп йиллик ўт. Пастки барглари оддий, якка, юқоридагилари эса икки жуфтли, баргчалари тескари тухумсимон, ҳар икки томони ётиқ тукли. Гулпояси баргига деярли тенг, 6–8 гулли, гуллари оч қизил. Июлда гуллаб, уруғ беради.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Олой тизмасининг дengiz сатҳидан 1600–1800 м баландликдағи Шоҳимардон, Кўли Куббон, Ёрдан қишлоқлари атрофида, Увлардисойда ҳамда Сўх, Пешкаут дарёларининг ҳавзаларида тарқалган. Тожикистанда ва Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тошли қуруқ қияликларда, ола тупроқли ёнбағирларда, тошлоқларда ва суримлаларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди, баъзан кичик-кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади. Асан, Шоҳимардон, Сўх ҳамда Пешкаут дарёлари ҳавзаларида кўпроқ сакланиб қолган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши туфайли ўсимлик майдонлари кескин қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [156–159, 343].

F. M. Шерматов.

Статус 2. Редкий эндемик Алайского и Туркестанского хребтов.

Краткое описание. Многолетнее, почти бесстебельное травянистое растение высотой до 15 см. Нижние листья простые, одиночные, верх-

ние – двупарные, обратнояйцевидные, с обеих сторон прижато-волосистые. Цветоносы почти равны листьям, 6–8-цветковые, цветки ярко-желтые. Цветёт и плодоносит в июле.

Распространение. Ферганская область: Алайский хребет (окрестности Шахимардана, Кули-Куббона, Иордана, Увлардисай, бассейн реки Сох, долина реки Пешкаут на высоте 1600–1800 м). За пределами Узбекистана: Таджикистан, Кыргызстан.

Места обитания. Сухие каменистые склоны, пестроцветные толщи, галечники, реже осьпи.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [156–159, 343].

Г. М. Шерматов.

Rare, endemic species of the Alay and Turkestan ranges. It is spread at the Alay range: nearby the Shakhimardan, the Kuli-Kubbon, the Iordan, the Uvlardisai, the Sokh, the Peshkaut valleys at the altitude of 1600-1800 m (the Ferghana region). Inhabits dry stony slopes, pebbles, rarely mounds. The quantity is unknown. Limiting factors: grazing. Measures of protection: not protected.



18. ИККИРАНГ АСТРАГАЛ

Астрагал двухцветкововидный / *Astragalus dianthoides* Boriss.

Мақоми 2. Олой тизмасида тарқалган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 3–4 см келадиган, ётиқ қалин туклар билан қопланган, деярли поясиз, кўп йиллик ўт. Барги 1–2 см узунлиқда, барг банди ингичка, узунлиги 2–5 мм, баргчалари 4–5



жуфт, чўзиқ, узунлиги 2–7 мм, эни 1 мм, иккала томони қалин тукли. Гулпопуги 2–3 гулли. Косачаси найсимон, узунлиги 12–16 мм. Тожбарги сариқ, баъзан қизғиши рангда. Дуккагининг узунлиги 20–25 мм, эни 3 мм, учига ва тубига қараб торайган, тумшуқаси қисқа, кўндаланг томирли, майда ётиқ тукли, икки томонидан қисилган. Апрель ойида гуллаб, апрель-май ойларида уруғ беради.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Олой тизмасининг Чимён, Шоҳимардан, Садқоқ, Водил, Оқбилол, Қадамжой ва Сўх қишлоқлари атрофалида тарқалган. Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларидаги жарликларда, шағалли бўз тупроқлар ва конгломерат тоғ жинсларида ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Мухофаза қилинмайди.

Манбалар. [65, 156–159].

Ш. К. Тожибаев.

Статус 2. Редкий эндемик Алайского хребта.

Краткое описание. Многолетнее, почти бесстебельное растение высотой 3–4 см, густо-прижато-опущенное. Листья длиной 1–2 см с тонкими черешками длиной до 2–5 мм. Листочки 4–5-парные, продолговатые, длиной 2–7 мм, шириной около 1 мм, с обеих сторон густоволосистые. Кис-

ти с 2–3 цветками. Чашечка трубчатая, длиной 12–16 мм. Венчик жёлтый, иногда краснеющий. Бобы длиной 20–25 мм, шириной 3 мм, суженные к основанию и верхушке, с очень коротким носиком, поперечно-жилковитые, сжатые с боков, мелко-прижато-волосистые. Цветёт в апреле, плодоносит в апреле-мае.

Распространение. Ферганская область: Алайский хребет – окрестности поселков Чимён, Шахимардан, Садқак, Кадамжай, Вуадиль, Акпилиль и Сох. За пределами Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. Щебнистые сероземы, конгломераты и сланцы, овраги в предгорьях.

Численность. Встречается редко единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [65, 156–159].

К. Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the Alay range. It is spread at the Alay range: near the villages Chimion, Shakhimardan, Sadkak, Kadamzhai, Akpilal, Vuadil, Sokh (the Ferghana region). Inhabits grey soils, conglomerates and shales, ravines in foothills. Rare, isolated specimens can be found. Measures of protection: not protected.



19. КНОРРИНГ АСТРАГАЛИ

Астрагал Кнорринга / *Astragalus knorrtingianus* Boriss.

Мақоми 2. Шимоли-ғарбий Помир-Олойда ўсадиган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 5–7 см узунлиқдаги кулранг-яшил, ётиқ тукли, деярли поясиз кўп йиллик ўт. Барги 2–5 см, банди эса 5–15 мм узунлиқда. Баргчалари 7–9 жуфт, тасмасимон ёки узун тиғсимон, узунлиги 5–11 мм, эни 0,5–1,5 мм, ўткир учли, пастки томони қалин ётиқ тукли. Гулпояси 2–5 см узунлиқда. Гуллари 2–3 та, оч сариқ, 32–37 мм узунлиқда. Косачаси 17–20 мм узунлиқда. Дуккаги 7 см гача узунлиқда, эни эса 4 мм, калта тумшуқчали, ётиқ оқ ва қора туклар билан қопланган. Март-апрель ойларида гуллаб, меваси апрель-май ойлари етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота, Молгузар ва Туркистон тоғларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларидан тоғнинг ўрта қисмигача чўзилган емирилган туб тоғ жинсларида, шағалли-тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кам учрайди, якка-якка ҳолда, баъзан кич-кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.


Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши туфайли қисқариб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота ва Зомин давлат кўриқхоналарида муҳофаза этилади.

Манбалар. [65, 156–159].

Ф. Ў. Ҳасанов.



Статус 2. Редкий эндемик северо-западного Памиро-Алая.

Краткое описание.

Многолетнее почти бесстебельное травянистое растение высотой 5–7 см, серо-зелёное, прижато-опущенное. Листья длиной 2–5 см, черешки длиной 5–15 мм. Листочки 7–9-парные, линейные или линейно-ланцетные, длиной 5–11 мм, шириной 0,5–1,5 мм, острые, снизу густо-прижато-

волосистые. Цветоносы длиной 2–5 см. Цветки в количестве 2–3, светло-желтые. Флаг 32–37 мм дл., чашечка 17–20 мм дл. Бобы линейные, прижато бело и черно волосистые, длиной до 7 см, шириной 4 мм, с коротким носиком. Цветёт в марте-апреле, плодоносит в апреле-мае.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской и Навоийской областях: Нуратинские горы, хребты Мальгузарский и Туркестанский.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны, разрушенные коренные породы, от предгорий до среднего пояса гор.

Численность. Встречается редко, спорадически, единичными экземплярами или небольшими группами по несколько растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Нуратинского и Зааминского государственных заповедников.

Источники. [65, 156–159].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare, endemic species of the north-western Pamir-Alay. It is spread at the Nuratau mountains, the Malguzar and Turkestan ranges (the Djizakh, the Samarkand and Navoi regions). Inhabits stony-slopes, destroyed native rocks in the foothills, lower and middle belt of mountains. Single specimens or small populations occur sporadically. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau and Zaamin state nature reserves.



20. КОМАРОВ АСТРАГАЛИ

Астрагал Комарова / *Astragalus komarovii Lipsky*

Мақоми 2. Ҳисор тоғининг гарбий тармоқларида тарқалган камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м га етадиган пўстлоғи қўнғир рангли бута. Баргчалари 6–9 жуфт, чўзиқ ва чўзиқдумалоқ шаклда, учи бироз ўткир, устки томони деярли туксиз, пастки томони сийрак тукли. Гулпопуги тифиз, тухумсимон, узунлиги 5 см атрофида. Дуккаги бандсиз, чўзиқ ёки тасмасимон, узунлиги 12–18 мм, эни 4 мм, майда-майда, ўткир учли, қалин ва қора ярим ётиқ ҳамда узун ва сийрак оқ туклар билан қопланган. Июнь-июлда гуллаб, июль-августда мева беради.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ғарбий Ҳисор тизмасининг Кўл ва Шут қишлоqlари тева-ракларида тарқалган. Тожикистанда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Майда жинс тупроқли ёнбағирларда тоғларнинг ўрта қисмидаги наъматак ва арчазорларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Ҳисор давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [109, 159].



А. С. Эсонқулов.



Статус 2. Редкий вид западных отрогов Гиссарского хребта.

Краткое описание. Кустарник высотой до 1 м с коричнево-буровой корой. Листочки 6–9-парные, овальные или продолговато-овальные и несущие остроконечия на верхушке, сверху почти голые, снизу рассеянно-волосистые. Кисти плотные, яйцевидные, длиной около 5 см. Бобы сидячие, продолговатые или линейные, длиной 12–18 мм, шириной 4 мм, острые, густо-полу-прижато-мелко-черноволосистые и, кроме того, с редкими более длинными белыми

волосками. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Кашкадарынская область: Гиссарский хребет – окрестности кишлаков Куль и Шут. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Мелкоземистые склоны, арчовники и розарии в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [109, 159].

А. С. Эсанкулов.

Rare endemic species of the Hissar range. It is spread at the Hissar range: nearby the villages Kul and Shut (the Kashkadarya regions). Inhabits fine earth slopes, juniper stands and rosaries in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Hissar state reserve.



21. МАССАГЕТОВ АСТРАГАЛИ

Астрагал Массагетова / Astragalus massagetovii B. Fedtsch.

Мақоми 1. Фарбий Помир-Олойда учрайди-ган энг камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–30 см оралиғида, диаметри 80 см гача етадиган тиканли, сершоҳ, зич ёстиқчалар ҳосил құлувчи бутача. Барги 4–9 см узунликда, қалин тукли, барг банди қисқа. Баргчалари 8–13 жуфт, эллипс шаклида ёки тескари тухумсимон, узунлиги 10–15 мм, ўтқир учли, икки томони ипаксимон қалин туклар билан қопланган. Ко-сачаси 9–11 мм узун-ликда, найсимон, оқ-қора қалин туклари бор. Гултоғи сарик, тук-сиз. Дуккагининг узунлиги 17–27 мм, эни 7–11 мм, икки уяли, кўп уруғли. Июнда гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Бойсун тоғи ва Ҳисор тоғ тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори қисмидаги тошли-шағалли ва гипсли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган,

Манбалар. [71, 252].

О. Т. Тургинов.

Статус 1. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Сильноветвистый колючий кустарничек высотой 15–30 см, образующий довольно плотные подушки до 80 см в диаметре. Листья густо-волосистые, длиной 4–9 см, с короткими черешками. Листочки 8–13-парные, эллиптические, обратнояйцевидные, длиной 10–15 мм, остроконечные на верхушке, с обеих сторон густо-шелковисто-волосистые. Чашечка трубчатая, длиной 9–11 мм, бело и черно-густо-волосистая. Венчик жёлтый, голый. Бобы длиной 17–27 мм, шириной 7–11 мм, двугнёздый, многосеменной. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: горы Байсунтау (около перевала Бельяуты), Гиссарский хребет.



Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны и выходы гипсированных пород в верхнем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [71, 252].

О. Т. Тургинов.

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range (the Surkhandarya region). Inhabits stony-slopes and gypseous rocks in the upper part of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



22. МИХАИЛ АСТРАГАЛИ

Астрагал Михаила / Astragalus michaelis Boriss.

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шанда тарқалган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бүйи 15–40 см бўлган ярим бута. Пояси йўғон, сершоҳ, тўқ кулранг. Гулпояси зич, рўваксимон. Барги 5,5–11 см узунликда, барг банди жуда қисқа, баргчалари 10–13 жуфт, узунчоқ тасмасимон ёки чўзиқ, узунлиги 5–8 мм, эни 1–1,5 мм, икки томони сийрак тукли. Гулпопуги чўзиқроқ-фоваксимон, 5–8 гулдан иборат. Тожбарги оч пушти рангли, узунлиги 15–17 мм. Дуккаги 17–22 мм



узунликда, қорамтири, узун тумшуқчали. Уруғининг узунлиги 4 мм, эни 1,8 мм, сарғиш-қўнғир рангли. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Уғом ва Писком тизмаларида учрайди.

Ўсиш шароити. Қояларда, тошли-шағалли ва майдада заррали тупроқлардан иборат ёнбағирларда ҳамда дарё қирғоқлари бўйлаб тоғнинг юқори қисмигача чўзилган жойларда ўсади.

Сони. Жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсиш жойлари Уғом-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида жойлашган.

Манбалар. [26, 66].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Растение высотой 10–26 см. Бесстебельное или почти бесстебельное многолетнее травянистое растение. Листья длиной до 20 см, непарноперистые, с 14–18 парами листочков, беловолосистые, листочки длиной 1–2 см, шириной 0,4–1,2 см, линейные, продолговато- или широко-эллиптические, с клиновидным основанием, наверху округлые или заостренные, сверху голые, снизу оттопыренно-беловолосистые. Кисть длиной 4–10 см, продолговатая, рыхловатая, 5–9-цветковая. Чашечка длиной 1,3–1,7 см, узкотрубчатая, прижато-черно- и оттопыренно-беловолосистая. Бобы длиной 2,2–2,5 см, шириной 5–8 мм, продолговато-ланцетные, коротко- и длинно-белоопущенные, 10-семянные, почти двугнёздые. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле–августе.

Распространение. Ташкентская область: Западный Тянь-Шань (Угамский и Пскемский хребты).

Места обитания. Скалы, каменистые, щебнисто-мелкоземистые склоны, берега рек в среднем и верхнем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [26, 66].

К. Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the western Tien-Shan: the Ugam and Pskem ranges (the Tashkent region). Inhabits rocks, stony, -fine earth slopes, river banks in the middle and upper mountain belt. The quantity is rare. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



23. НУРОТА АСТРАГАЛИ

Астрагал нуратинский / *Astragalus nuratensis* Popov

Мақоми 1. Нурота тизмасидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Серпояли кўп йиллик ўт. Пояси анча йўғон, узунлиги 8–15 см, сийрак, хурпайган тукли, улар кейинчалик тўкилиб кетади. Барги, асосан, поянинг юқори қисмида жойлашган. Баргчалари 4–6 жуфт, юқори қисми тўмтокроқ, деярли тескари юраксимон, узунлиги 1–2 см. Гуллопузи сийрак, 5–10 гулли. Гултожи оч сариқ рангли. Дуккагининг узунлиги 10–20 мм, ўткир учли (тумшуқчали), сийрак, узун, хурпайган тукли, икки уяли. Уруғи кулоқсимон, сиқилган, узунлиги 5 мм, сирти силлиқ, тўқ жигаранг. Июнь ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота тоғларининг Оқтоғ тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмидаги тошли ёнбағирларда, қояларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [77, 136].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий эндемик Нуратинских гор.

Краткое описание. Многолетнее, многостебельное травянистое растение. Стебли довольно толстые, длиной 8–15 см, скудно-оттопыренноволосистые, позже почти голые. Листья расположены, главным образом, на верхушке стеблей, листочки 4–6-парные, на верхушке притупленные, почти обратносердцевидные, длиной 1–2 см. Кисти рыхлые, 5–10 цветковые. Венчик бледно-жёлтый. Бобы длиной 10–20 мм, с остроконечием (носиком), рыхло-оттопыренно-длинно-волосистые, двугнёздые. Семена уховидные, сжатые, длиной 5 мм, гладкие, черно-коричневые. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Самаркандской и Навоийской областях: Нуратинские горы (хребет Актау).

Места обитания. Каменистые склоны и скалы в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [77, 136].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare endemic species of the Nuratau mountains. It is spread at the Nuratau mountains: the Aktau range (the Samarkand and Navoi regions). Inhabits stony slopes and rocks in the lower and middle mountain belts. Single specimens and small isolated populations occur very rarely and sporadically. Measures of protection: not protected.



24. ПАТСИМОН АСТРАГАЛ

Астрагал перистый / *Astragalus plumatus* Boriss.

Мақоми 3. Помир-Олойнинг ғарбий тармоқлари ва Жануби-ғарбий Қизилқумнинг камёб эндемик тури.

Қисқача тавсифи. Бўйи 60 см гача етадиган, шохлари тарвақайлаган, тўғри ва йўғон, оқ тукли, узунлиги 4–8 см, қалин тиканлар билан қопланган бута. Баргчалари 5–6 жуфт, чўзиқроқ-тухумсимон, ёйилган майнин тукли. Гуллари барг қўлтиғида 8–10 тадан жойлашган, эни 3 см келадиган юмалоқ шаклли зич тўпгул ҳосил қиласди. Дуккагининг узунлиги 5 мм, тухумсимон, оқ момиқ тукли. Уруғи буйраксимон, сирти силлиқ. Апрель-май ойларида гуллаб, меваси май-июнда етилади.

Тарқалиши. Навоий, Бухоро вилоятлари: Қизилқумда – Конимех шахри атрофида; Помир-Олода – Зирабулоқ-Зиёвуддин тоғларида ва Нурова тоғларида (Қоратоғ тизмаси) тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ ёнбағирларида, адирларда, юзага чиқиб қолган қумтошли тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ёки унча катта бўлмаган тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [26, 28, 29].

Н. Ю. Бешко.

Статус 3. Редкий эндемик западных отрогов Памиро-Алая и Юго-западного Кызылкума.

Краткое описание. Кустарник высотой до 60 см, ветви густо покрыты торчащими толстоватыми, прямыми бело-пушистыми колючками длиной 4–8 см. Листочки в количестве 5–6 пар, овальнояйцевидные, оттопыренно-мягкоопущенные. Цветки в пазухах листьев до 8–10, скучены в округлые многоцветковые соцветия шириной около 3 см. Боб длиной около 5 мм, яйцевидный, беломохнатый. Семена почковидные, гладкие. Цветёт в апреле-мае, плодоносит в мае-июне.

Распространение. В Навоийской, Бухарской областях: Кызылкум – окрестности города Канимех; Памиро-Алай – Зирабулак-Зиэтдинские горы; Нуратинские горы (хребет Карагатай).

Места обитания. Склоны гор, предгорья, выходы песчаников.

Численность. Встречается единичными экземплярами или небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [26, 28, 29].

Н. Ю. Бешко.

Rare endemic species of the western branches of the Pamir-Alay and the south-western Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Kokchatau hill nearby Kanimekh town; the Pamir-Alay: the Zirabulak-Ziaetdin mountains; the Nuratau range (the Samarkand, the Bukhara regions). Inhabits mountain slopes, foothills, sandstones. Isolated specimens or small groups can be found. Measures of protection: not protected.



25. ПАХМОҚТУКЛИ АСТРАГАЛ

Астрагал ложноязвенниковый / *Astragalus pseudanthylloides* Gontsch.

Мақоми 2. Ҳисор тизмасининг ғарбидаги тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–25 см, поясиз кўп йиллик ўт. Барглари 6–12 см узунликда, барг банди яхши тараққий этмаган. Баргчалари 10–16 жуфт, эллипссимон, баъзан тескари тухумсимон, ўткир учли, қаттиқ, устки томони томирли, кулранг, пастки томони оқ тукли ёки ипаксимон тукли, узунлиги 4–12 мм. Гулпоялари баргларининг узунлигига teng ёки улардан бироз узунроқ, қисқа, оқиши момиқ тукли. Гулпопуги момиқ вағовак, узунлиги 10–17 см, 18–25 гулли. Гултожи оқ ёки нимпушти. Уруғдони қалин ётиқ оқ туклар билан қопланган. Май ойида гуллаб, июлда мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг ғарбий тармоқларида (Бойсун Кетмончопти ва Чўлбайир тоғларида) тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва пастки қисмларида тошли-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. 1984 йилдан 2001 йилгача фақатгина 30 тутий ийғилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.



Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [71, 171].

О. Т. Тургинов.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Гиссара.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение, высотой 15–25 см. Листья длиной 6–12 см, с почти невыраженными черешками. Листочки 10–16-парные, эллиптические, реже обратно-яйцевидные, коротко-остроконечные, жесткие, сверху жилковатые, сероватые, снизу беловолосистые или шелковисто-волосистые, длиной 4–12 мм. Цветоносы по длине равны листьям или длиннее их, коротко-беломохнатые. Кисти рыхлые, длиной 10–17 см, 18–25-цветковые. Венчик белый, чуть розоватый. Завязь густо-прижато-беловолосистая. Цветёт в мае, плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: западные отроги Гиссарского хребта (горы Байсунтау, Кетмень-Чапты и Чульбаир).

Места обитания. Каменисто-щебнистые и глинистые склоны в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. С 1984 по 2001 года собрано всего 30 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культтивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [71, 171].

О. Т. Тургинов.

Rare endemic species of the western branches of the Hissar range. It is spread at the western branches of the Hissar range: the Baysuntai and Chulbair mountains (the Surkhandarya region). Inhabits stony- and clay slopes in the lower and middle mountain belts. From 1984, only 30 plants were found. Measures of protection: not protected.



26. ПИСКОМ АСТРАГАЛИ

Астрагал пскемский / *Astragalus pskemensis* Popov

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шанга хос камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Ер ости пояси жуда қисқа бўлган ярим бута. Ўсимлик шохчалари бир йиллик, ингичка, қисқа, 5 см гача узунлиқда, ётиқ тукли. Баргининг узунлиги 5–8 см, ётиқ ва йўғон оқ тукли. Баргчалари 5–8 жуфт, чизиқли, баъзан чизиқлари тасмасимон шаклга киради, узунлиги 7–12 мм, учи тўмтоқ, ёки салгина ўйилган, икки томони ётиқ оқ туклар билан қопланган. Гулпопуги зич жойлашган бир нечта бошчалардан иборат. 5–10 гулли, узунлиги 2–2,5 см. Гултожи оқиш. Дуккаги чўзиқ, бандсиз, ўтқир учли, узунлиги 12–20 мм, эни 3–4 мм, ётиқ қора ва оқ туклар билан қопланган, икки уяли. Июль ойидагуллаб, меваси август, сентябрда этилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Писком дарёси ҳавзаси – Тепарсой ва Испайсойларнинг юқори қисмида учрайди.

Ўсиш шароити. Шағалли ва тошли тоғ ёнбағирларида ўсади.

Сони. Жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус чорарлар ишлаб чиқилмаган. Ўсиш жойлари Уғом-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудитабиатда жойлашган.

Манбалар. [67, 69, 106, 109].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Полукустарник с толстым сильно укороченным подземным стволиком. Годичные веточки тонкие, короткие, длиной до 5 см, прижато-пушистые. Листья длиной 5–8 см, прижато-белопушистые; листочки 5–8-парные, линейные, реже линейно-продолговатые, длиной 7–12 мм, туные или слегка выемчатые, с обеих сторон прижато-беловолосистые.

Кисти плотноголовчатые, 5–10-цветковые, длиной 2–2,5 см. Венчик беловатый. Бобы продолговатые, сидящие, острые, длиной 12–20 мм, шириной 3–4 мм, прижато-белые и чернопушистые, двугнёздые. Цветёт в июле, плодоносит с августа до сентября.

Распространение. Ташкентская область: Бассейн реки Пскем, верховья Тепарсая и Испайсая.

Места обитания. Щебнистые и каменистые склоны гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала.

Не установлены.



Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [67, 69, 106, 109].

К. Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Pskem valley, the heights of the Teparsay and Ispaisay (the Tashkent region). Inhabits skeleton and stony slopes of mountains. The quantity is rare. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



27. ПУФАК АСТРАГАЛ

Астрагал тонкопузырчатый / *Astragalus leptophythus* Vved.

Мақоми 2. Фарбий Помир-Олойда кичик майдонларда тарқалган реликт, эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик поясиз ўт. Ингичка новдалари фақат тупроқ остида ривожланади. Тоқ баргли бандида 15–35 жуфт япроги бор, узунлиги 10–20 см, бандининг узунлиги 3–7 см, хурпайган оқ туклар билан қопланган. Баргчалари чўзиқ-тухумсимон, баъзан япроқчалари бир-бирига тегиб туради, узунлиги 10–17 мм, эни 6–9 мм. Гулпояси хурпайган оқ тукли. Косачаси узун найсимон, узунлиги 2,5 см, эни 3–4 мм. Гуллари йирик, узунлиги 3 см гача оқ, кейинроқ тўқ қизил тусга киради. Дуккаги юмалоқ-тухумсимон, узунлиги 4 см гача етади, эни 3 см. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Жиззах вилоятлари: Туркистон тизмалари ва Нурота тоғида тарқалган. Тожикистанд (Фатмовут қишлоғи атрофларида) ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Ҳар хил ўтлар, шувоқлар ва арчазорлар орасида ҳамда тошли-шағалли ёнбағирларда ва сурималарда ўсади.

Сони. Жуда кам. Якка-якка ҳолда, шунингдек 10–20 та ўсимликдан иборат кичик тўплар, ҳолида учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши ўсимликларга салбий таъсир кўрсатмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.


Муҳофаза чоралари. Нурота давлат кўриқхонасида муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [55, 252, 289].

Н. Ю. Бешко.

Статус 2. Редкий реликтовый эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое бесстебельное растение. Развиваются только тонкие побеги под землей. Листья непарноперистые в количестве 15–35 пар, длиной 10–20 см, черешки длиной 3–7 см, оттопыренно-беловолокнистые. Листочки продолговато-яйцевидные, иногда налегающие краями друг на друга, длиной 10–17 мм, шириной 6–9 мм.



Цветоносы оттопыренно-беловолосистые. Чашечка длиннотрубчатая, длиной 2,5 см, шириной 3–4 мм. Цветки крупные, длиной до 3 см, белые, в конце цветения темно-красные. Бобы шаровидно-яйцевидные, длиной до 4 см, шириной 3 см. Цветёт в апреле-мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Самаркандской и Джизакской областях: Туркестанский хребет и Нуратинские горы. За пределами Узбекистана – Таджикистан (окрестности кишлака Фатмовут).

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны и осыпи, среди разнотравно-полынной растительности и арчовников.

Численность. Встречается редко, спорадически, единичными экземплярами или небольшими группами до 10–20 растений. Общая площадь распространения популяций около 5 тыс. га.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота негативно влияет на численность растения.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [55, 252, 289].

Н. Ю. Бешко.

Rare relict endemic , species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Turkestan range and the Nuratau mountains (the Samarkand and Djizakh regions). Inhabits stony- slopes and mounds, among wormwood and other herb species and junipers. Single specimens and small populations (up to 10-20 plants) occur sporadically. Distribution area is about 5000 hectares. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau state nature reserve.



28. СОХТА ЧҮЛ АСТРАГАЛИ

Астрагал ложноэрекомофиза / Astragalus pseudoeremophyza Popov


Мақоми 2. Жанубий Помир-Олойдаги камёбтур.

Қисқача тавсифи. Бүйі 15–30 см оралығидаги поясиз ёки пояси 7 см га етадиган күп үйлік үт. Барги 15–30 см узунликда. Баргчалари 8–14 жуфт, юмалоқ, узунлиги 13–20 мм, юмалоқ, тұмтоқ ёки сал үйилған, устки томони түксіз, пастки томони қалин тукли, четлари киприксимон қалин тукли. Гулпояси баргидан анча қисқа, гулпопуги 6–10–15 гулдан иборат, узунлиги 7–10 см, қалин тукли. Косачаси узун найсимон, 18–22 мм узунликда, қалин тукли, косачасининг барглари наштарсимон тишлилар билан қолланған. Дүккаги тухумсимон чүзикрөк шаклда, банди 3–7 мм узунликда, пастга қараб осилған, қалин тукли, деярли иккі уяли. Март–апрель ойларыда гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояты: Жанубий Помир-Олойда – Боботоғ тизмаси ва Тожикистаннинг жанубидаги пастқам тоғларда тарқалған.

Үсиш шароити. Тоғ этаклари ва пастки қысмларидаги құмлайларда, бўз ва соз тупроқларда, қизил құмли тошларда, гипсли жинсларда ўсади.

Сони. Кам учрайди. Чагам қышлоғи атрофлари-да 50 тури топилған.



Күпайиши. Уруғидан күпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Махсус чоралар ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [31, 135].

А. С. Эсонкулов.

Статус 2. Редкий вид Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение с короткими (не более 7 см) стеблями, высотой 15–30 см. Листья длиной 15–30 см. Листочки 8–14-парные, почти округлённые, длиной 13–20 мм, округло-тупые или едва выемчатые, сверху голые, снизу густопушистые, по краю густо-пушисто-реснитчатые. Цветоносы намного короче листьев, рыхлые, 6–10–15-цветковые кисти длиной 7–10 см, густо-волосистые. Чашечка длиннотрубчатая, длиной 18–22 мм, густо-мохнатая, с ланцетными зубцами. Бобы овальные, на ножке длиной 3–7 мм, поникающие, бархатисто-пушистые, почти двугнёздные. Цветёт в марте–апреле, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Южный Памиро-Алай, хребет Бабатаг. За пределами Узбекистана – Таджикистан.

Места обитания. Пески, лёссы, выходы красных песчаников, глин, гипсонасные обнажения в предгорьях и нижнем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко. Зарегистрировано 50 растений рядом с кишлаком Чагам.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [31, 135].

А. С. Эсанкулов.

Rare species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the southern Pamir-Alay, the Babatag range (the Surkhandarya region). Inhabits sands, loess, red sandstones, clay, gypseous outcrops in foothills and lower belt of mountains. Very rarely, single specimens and small populations occur sporadically. 50 plants were found nearby the Chagam village. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.

29. СУР АСТРАГАЛ

Астрагал сплошь серебристый / *Astragalus holargyreus* Bunge

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Қызылқум қолдиқ тоғларида ўсадиган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25 см келадиган поясиз кўп йиллик ўт. Барги мураккаб, баргчалари 3–5 жуфт, ўткир учли, узунлиги 15 мм гача, икки томони ётиқ оқ тукли. Бир нечта тўпгулдан иборат. Тожбарги қизил. Дуккаги тухумсимон, майда. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Навоий вилояти: Қизилқумдаги қолдиқ тоғ (Бўкантоғ)да ва Чингелди кудуғи атрофларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тошли-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Қолдиқ тоғларда 1000 га яқин туплари аниқланган.

Кўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши натижасида камайган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Камайиб кетиш сабабларини чуқурроқ ўрганиш лозим.

Манбалар. [32, 159].

Г. А. Серекеева.

Статус 1. Редкий узкий эндемик останцов Кызылкума.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение высотой до 25 см. Листья сложные, листочки 3–5-парные, острые, длиной до 15 мм, с обеих сторон прижато-беловолосистые. Соцветия головчатые. Венчик красный. Боб яйцевидный, мелкий. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Навоийская область: Кызылкум – останцовые горы Букантау, окрестности колодца Чингельды.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны.

Численность. 1000 растений.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [32, 159].

Г. А. Серекеева.

Rare, endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Bukantau range and Chingeldi (the Bukhara region). Inhabits stony-rocky slopes. 1000 plants can be found. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



30. ТУК КОСАЧАЛИ АСТРАГАЛ

Астрагал волосисточашечечный / *Astragalus lasiocalyx* Gontsch.

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шандаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 8–15 см га етадиган кўп йиллик ўт. Ер остида жойлашган қисми ёғочсимон қисқа поядан иборат. Бир йиллик поялари жуда қисқа, узунлиги 0,3–1 см, тифиз жойлашган ётиқ оқ туклар билан қопланган. Баргларининг узунлиги 4–7 см, ётиқ оқ тукли, баргчалари 1–2 жуфт, тухумсимон, ҳар икки томони сийрак ётиқ туклар билан қопланган. Гул – попуги нозик, момик, кўп гулли, узунлиги 3–6 см. Тожбарги қизғиш-сариқ тусли. Дуккагининг банди 4 мм узунлиқда, кам уруғли, туксиз. Май ойида гуллаб, меваси июлда пишади.

Тарқалиши. Тошкент вилоятининг Писком, Угом, Майдонтол ва Чотқол тизмаларида тарқалган. Қозогистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги шағалли-майдада тупроқли, тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Номаълум.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Угом-Чотқол миллий табиат боғи худудидаги популяциялари муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [75, 343].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 8–15 см, с укороченным подземным деревянистым стволиком. Годичные стебли длиной 0,3–1 см, густо-прижато-белопушистые. Листья длиной 4–7 см, прижато-беловолосистые, листочки 1–2-парные, яйцевидные, с обеих сторон рассеянно-прижато-волосистые. Кисти рыхловатые, длиной 3–6 см, многоцветковые. Венчик красновато-желтоватый. Бобы на ножке длиной около 4 мм, малосеменные, голые. Цветёт в мае, плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: хребты Пскемский, Угамский, Майдантальский и Чаткальский. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Щебнисто-мелкоземистые, каменистые склоны, осыпи и галечники в среднем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.


Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [75, 343].

К. Ш. Тожибаев.



Rare, endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Pskem, the Ugham, the Maidantal and Chatkal ranges (the Tashkent region). Inhabits fine earth, stony and pebble slopes and debris in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.




31. ТҮПОЛОН АСТРАГАЛИ

Астрагал тупаланский / *Astragalus tupalangi* Gontsch.

Мақоми 1. Помир-Олойда ўсадиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 35 см атрофида, поясиз, ер ости пояси йўғон, қисқа шохли кўп йиллик ўт. Баргининг узунлиги 20–30 см, баргчалари 12–13 жуфт, тухумсимон, 20–27 мм узунликда, устки томони туксиз, фақат пастки томонидаги томирлари сийрак, дағал туклар билан қопланган, четлари дағал, киприксимон тукли. Гулпопуги момиқ ва ғовак, кўп гулли, узунлиги 6–7 см. Гулбандининг узунлиги 2–3 мм. Косачаси найсимон, узунлиги 20 мм, туксиз, фақатгина косача баргларининг четлари дағал киприксимон тукли. Гултожи оч сарик рангли. Дуккаги деярли бандсиз,



чўзиқ-тухумсимон, узунлиги 11–12 мм, эни 7 мм. Май ойида гуллаб, меваси июнь ойида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси: Тўпаланг дарёси ҳавзасида тарқалган. Тоҷикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки ва ўрта қисмидаги тошлоқ ва юзага чиқиб қолган харсанг тошларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийластирилиши.

Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари.

Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [109, 133].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий эндемик Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение высотой около 35 см, с толстым коротким подземным стволиком. Листья длиной 20–30 см, листочки 12–13-парные, яйцевидные, длиной 20–27 мм, сверху голые, снизу с редкими жесткими волосками по жилкам, по краю редко жесткореснитчатые. Кисти рыхлые, длиной 6–7 см, многоцветковые. Цветоножки длиной 2–3 мм. Чашечка трубчатая, длиной 20 мм, голая, лишь на зубцах жесткореснитчатая. Венчик ярко-жёлтый. Бобы почти сидячие, продолговато-овальные, длиной 11–12 мм, шириной около 7 мм. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет, бассейн реки Тупаланг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Каменистые склоны, галечники и гранитные скалы в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Встречается единично.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [109, 133].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare endemic species of the Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range, the Tupalang river basin (the Surkhandarya region). Inhabits granites, stony slopes and pebbles in the lower and middle mountainous zone. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



32. ЮЛИНГАН АСТРАГАЛ

Астрагал оборванный / Astragalus rhacodes Bunge

Мақоми 2. Олой тизмасида ўсадиган камёб ўсимликтен.

Кисқача тавсифи. Пастки қисми ёғочсимон ярим бутача. Баргининг узунлиги 7–12 см, барг бандининг узунлиги эса 15–17 см, оқ туклар билан қопланган. Гулпоясининг узунлиги барига тенг, баъзан эса ундан сал узунроқ. Гулпопуги момиқ вағовак, 10–25 гулли. Косачаси мевалаган пайтида шишади. Гули сариқ. Дуккаги ярим думалоқ ёки чўзиқ ярим тухумсимон шаклда. Май–июнь ойида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Олой тизмасида (Шоҳимардон, Садқоқ, Қизилтоғ қишлоқлари атрофларида) тарқалган. Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1200–1600 м баландлиқдаги тоғ ёнбағирларида қизил қумтошларда, майда жинсли ва шағалли тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ёки бир нечта туп ўсимлиқдан ташкил топган кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Янги ерларнинг ўзлаштирилиши ва кўплаб чорва молларининг боқилиши унинг кўпайишига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Табиатда камайиб кетиш сабабларини аниқлаш учун унинг биологиясини ва экологиясини ўрганиш лозим.

Манбалар. [156–159, 342].

Ф. М. Шерматов.

Статус 2. Редкий вид Алайского хребта.

Краткое описание. Полукустарничек в нижней части древеснеющий. Листья длиной 7–12 см, черешки длиной 15–17 см, беловолосистые. Цветоносы равны листьям, иногда длиннее их. Кисти рыхлые, 10–25-цветковые. Чашечка при плодах вздувается. Цветки желтые. Бобы полуовальные или продолговато-полуовальные. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. Ферганская область: Алайский хребет – окрестности кишлаков Шахимардан, Садқак и Кизилтаг. За пределами Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. Краснопесчаники, каменистые и мелкоземисто-щебнистые склоны на высоте 1200–1600 м.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение территорий, выпас.

Культивирование. Выращивалось в условиях Ботанического сада АН РУз.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Необходимо изучение биоэкологических свойств в природе.

Источники. [156–159, 342].

Г. М. Шерматов.

Rare endemic species of the Alay range. It is spread at the Alay range: nearby the villages Shakhimardan, Sadkak and Kiziltag (the Ferghana region). Inhabits red sands, stony and fine earth-slopes at the altitude of 1200–1600 m. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



33. ЮМАЛОҚ ТҮПГУЛЛИ АСТРАГАЛ

Астрагал почти шахимарданский / Astragalus subschachimardanus Popov

Мақоми 2. Кўхитанг тизмасидаги ўта камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15 см гача етадиган поясиз, йирик чим ҳосил қилувчи кўп йиллик ўт. Барги мураккаб, 5–7 жуфт баргчали. Гулпояси баргидан бироз узун. Тўпгули шарсимон. Косачаси гуллаган пайтида найсимон бўлиб, меваси этилиши билан кенгайиб боради ва шар шаклига киради. Дуккалари майдо, оқ тукли. Июлда гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг тизмасининг жанубидаги адиirlарда тарқалган (Туркманистанда ҳам учрайди).

Ўсиш шароити. Жанубий ёнбағирларда – харсангтошлар орасида ўсади.

Сони. Жуда кам учрайди. Аниқланган тупларининг сони атиги 1000 тага тўғри келади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу ҳақда маълумотлар йўқ, аммо шу атрофда яшайдиган аҳолининг чорва моллари ўсимлик ўсган майдонларни пайҳон қилиб кетади.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Мухофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқхонасида мухофаза этилади.

Манбалар. [32, 159].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Узколокальный эндемик Кугитанга.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение высотой до 15 см, образующее крупные дерновины. Листья сложные, листочки 5–7-парные. Цветоносы немного длиннее листьев. Соцветие шаровидное. Чашечка вначале трубчатая, при плодах шаровидно-пузырчатая. Бобы мелкие, беловолосистые. Цветёт и плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Южные склоны, конгломератовые отложения.

Численность. Встречается очень редко. Задокументированная численность не превышает 1000 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [32, 159].

Ф. О. Ҳасанова.

Very rare endemic species of the Kughitang range. It is spread at the Kughitang range (the Surkhandarya region). Inhabits the southern slopes, conglomerate deposits. About 1000 plants were registered. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



34. ҚИЗИЛТОМИР АСТРАГАЛ

Астрагал красножилковый / Astragalus rubrivenosus Gontsch.

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шанда жуда кичик майдонларда сақланиб қолган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 3–4 см келадиган, ер бағирлаб ўсувчи кўп йиллик, деярли поясиз ўт. Баргининг узунлиги 10–12 см, баргчалари, асосан, эллипс шаклида, ўткир учли, устки томони сийрак, пастки томони ётиқ тукли. Гулпояси 12–15 см узунлиқда, мустаҳкам, баргидан узун. Косачаси шишган, тўрсимон томирли. Дуккагининг узунлиги 13–14 мм, эни 0,5 см. Июнда гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол тизмасидаги Оқсоқотасой, Бошқизилсой, Эртошой ҳамда Серкалисойларда тарқалган.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1800–2000 м баландликдаги тошли-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Жуда кам учрайди. Аниқланган популяцияларидаги тупларнинг сони 3,5–4 мингтани ташкил этади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсимлик популяциясининг катта қисми Чотқол давлат биосфера кўриқхонасида ва Угом-Чотқол миллый табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [32, 159, 293].

А. С. Эсонқулов.

Статус 2. Очень редкий узколокальный эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее, почти бесстебельное приземистое травянистое растение высотой 3–4 см. Листья длиной 10–12 см. Листочки эллиптические, острые, сверху с рыхлыми, снизу с прижатыми волосками. Цветоносы крепкие, длиннее листьев (12–15 см). Чашечка вздутая, сетчато-неровная. Бобы длиной 13–14 мм, шириной 5 мм. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский хребет (Аксакатасай, Башкызылсай, Эрташсай и Серкелисай).

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны на высоте 1800–2000 м.

Численность. Встречается очень редко. В известных популяциях общая численность достигает 3,5–4 тысячи экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.



Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Большая часть популяций охраняется на территории Чаткальского государственного биосферного заповедника и Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [32, 159, 293].

А. С. Эсанкулов.

Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal range: the Aksak-Atasay, the Bashkyzylsai, the Ertashsai and Serkelisai (the Tashkent region). Inhabits stony slopes at the altitude of 1800-2000 m 3,5-4 thousand specimens within 6 populations can be found. Measures of protection: main populations are protected in the Chatkal state biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park.



35. ҚИЗИЛ ТУПРОҚ АСТРАГАЛИ

Астрагал красноземный / *Astragalus terra-e-rubrae* Butkov

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойда тарқалган камёб эндемик ўсимлиқ.

Қисқача тавсифи. Бўйи 60 см келадиган, пояси тик мустаҳкам, 6–7 мм йўғонликдаги кўп йиллик ўт. Баргининг узунлиги 20 см, баргчалари 2 жуфт, учбурчак-тухумсимон, узунлиги 6–8 см, эни 4–6 см, ҳар икки томонида томирлари бўртиб турди. Гули сариқ. Дуккаги тухумсимон ёки чўзиқ тухумсимон, пуфаксимон шишган, узунлиги 8 мм, тўғри тумшуқчали. Май ойида гуллаб, июнда мева беради.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор тизмасида – Хўжагургур-Ота, Қизилсув, Оқсув дарёларининг ҳавзаларида ҳамда Кўҳитанг тизмасида – Кампиртепа ва Тангидевол бўйимида тарқалган. Туркманистанда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1400–1500 м баландликдаги ер юзасига чиқиб қолган тубжинсли тупроқларда ва турли хилдаги тупроқларда ҳамда тошли тик ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кўҳитанг тизмасида 200 тути аниқланган. Ҳисор тизмасидаги сони аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Сони ва уларнинг ўзгариши ҳақида аниқ маълумотлар йўқ. У фақат маҳсус тупроқ жинсларида ўсишга мослашганлиги учун тарқалиши че-гараланган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1979 йилдан буён ўстириб келинади.

Муҳофаза чоралари. Сурхон ва Ҳисор давлат қўриқхоналарида муҳофаза этилади.

Манбалар. [159, 172, 310].

О. Т. Тургинов.

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с крепким стеблем высотой до 60 см. Стебель прямостоячий, толщиной 6–7 мм. Листья длиной до 20 см, листочки двухпарные, треугольнояйцевидные, длиной 6–8 см, шириной 4–6 см, с выступающими сверху и снизу жилками. Цветки жёлтые. Бобы яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, длиной 8 мм, вздутые, с прямым носиком. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский хребет



– Ходжагургур-Ата, бассейны рек Аксу, Кызылсу, Катта-Уру-Дарья; хребет Кугитанг – Кампиртепа, Танги-Дувал. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Пестроцветные толщи и выходы коренных пород, крутые каменистые склоны на высоте 1400–1500 м.

Численность. Около 200 растений в Кугитанге. Численность на Гиссарском хребте неизвестна.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала.
Не установлены.

Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз с 1979 года.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском и Гиссарском государственных заповедниках.

Источники. [159, 172, 310].

О. Т. Тургинов.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Khoja-Gur-Gur-Ata, the Aksu, the Kyzylsu, the Katta-Uru-Darya river basins; the Kughitang mountains (the Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits gypseous and native rocks, steep stony slopes at the altitude of 1400-1500 m.s.l. 200 plants were counted at the Kughitang. At the Hissar range the magnitude of populations is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan and Hissar state reserves.



36. ҚИЗФИШ АСТРАГАЛ

Астрагал красноватый / *Astragalus rubellus* Gontsch.

Мақоми 1. Фарғона водийсидаги ниҳоятда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 35 см гача етадиган оқ момиқ тукли, поясиз, кўп йиллик ўт. Барги 30–35 см узунлиқда, хурпайган қалин тукли, баргчалари 14–18 жуфт, юмaloқ-тухумсимон. Гулпояси 15 см узунлиқда, қисқа хурпайган қалин тукли. Гулпуни 11–18 см, 8–15 та қизил гуллардан таркиб топган. Дуккаги шишган, тухумсимон, узунлиги 2 см, қайишсимон, сирти бўртиқ чокли. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Фарғона водийсининг Ёзёвон чўлида, Кўқон шахри атрофидаги бўз ерларда ва Қорақалпоқ қишлоғи теварағида ўсади.

Ўсиш шароити. Қум уюмлари орасида, шўрланган қумларда кўпроқ ўсади.

Сони. Жуда кам учрайдиган тур. У фақат ўзлаштирилмай қолган қум уюмлари орасидаги на сақланиб қолган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Қишлоқ хўжалиги учун ўзлаштирилган майдонлар ҳисобига ареалида ўзгаришлар юзага келиб, сони кескин камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумот йўқ.

Мухофаза чоралари. Махсус мухофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [31, 135].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Чрезвычайно редкий эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение высотой до 35 см. Стебли беломохнатые. Листья длиной до 30–35 см, оттопыренно-мохнатые, листочки 14–18-парные, округлоязывидные. Цветоносы длиной 15 см, коротко-оттопыренно-опущенные. Кисти длиной 11–18 см, состоят из 8–15 цветков. Цветки красные. Бобы длиной до 2 см, вздутые, яйцевидные, кожистые, с выступающими швами. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Ферганская долина: Ферганская область – близ города Коканда, в окрестностях кишлака Кара-Калпак и в песках Язъявана.

Места обитания. Межбарханные понижения. Предпочитает слабозасоленные пески.

Численность. Чрезвычайно редкий вид, сохранился только на ограниченной площади неосвоенных песчаных массивов.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение земель под сельхозкультуры.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [31, 135].

Ф. О. Ҳасанов.

Extremely rare, endemic species of the Ferghana valley. It is spread at the Ferghana valley, nearby Kokand, the village Kara-Kalpak and the Yazyavan sands (the Ferghana region). Inhabits sandy hills and slightly saline sands. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of sandy area. Measures of protection: not protected.



37. ҚҮРФОШИН АСТРАГАЛИ

Астрагал свинцовый / *Astragalus plumbeus* (Nevski) Gontsch.

Мақоми 2. Күхитанг тизмасидаги эндемик ўсимликтің.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–23 см оралигидаги поясиз кўп йиллик ўт. Баргининг узунлиги 5–8 см, баргчалари 4–5 жуфт, эллипссимон ёки чўзиқ эллипссимон, қаттиқ, ўткир учли, узунлиги 10–14 мм, ҳар икки томони қалин ётиқ туклар билан қопланган. Гулпояси баргидан 2 марта узун, қаттиқ, деярли тўрт қиррали, ётиқ тукли. Бошчаси 15–25 гулли, юмалоқ ёки тухумсимон, 3–4 см узунликда, зич жойлашган, гуллари деярли бандсиз. Гултожи сариқ. Тугунчаси бандсиз, ётиқ оқ тукли. Июнь–июлда гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Күхитанг тизмасида учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмларидаги оҳак тошли ва майдада жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. 2001 йилда 2000 туп ўсимлик қайд этилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг тартибсиз боқилиши ўсимликларнинг кўпайишига салбий таъсир этмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Сурхон давлат кўриқхонасида муҳофаза қилинади.


Манбалар. [32, 159, 310].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Редкий эндемик Кугитанга.

Краткое описание.

Многолетнее бесстебельное травянистое растение высотой 20–23 см. Листья длиной 5–8 см, листочки 4–5-парные, эллиптические или продолговато-эллиптические, жесткие, острые, длиной 10–14 мм, с обеих сторон густо-прижато-пушистые. Цветоносы вдвое длиннее листьев, крепкие, почти четырехгранные, прижато-пушистые. Головки шаровидные или яйцевидные, длиной 3–4 см, плотные, 15–25-цветковые, с почти сидячими цветками. Венчик желтый. Завязь сидячая, прижато-беловолосистая. Цветёт и плодоносит в июне–июле.



Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг.

Места обитания. Известняки и мелкоземистые склоны в нижнем и среднем поясах гор.

Численность. 2000 растений зарегистрировано в 2001 году.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Безсистемный выпас скота.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Охраняется на территории Сурханского государственного заповедника.

Источники. [32, 159, 310].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare endemic species of the Kughitang range. It is spread at the Kughitang range (the Surkhandarya region). Inhabits lime-stones and slopes in the low and middle mountainous zone. 2000 plants were revealed in 2001. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



38. ОДИЛОВ АСТРАГАЛИ

Астрагал Адылова / Astragalus adylovii F. O. Khass., Ergashev et Kadyrov

Мақоми 1. Қизилкүмнинг қолдиқ тоғлари-даги реликт, камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик ўтсимон ўсимлик, бўйи 20–30 см. Пояси 5–10 см. Барглари 8–12 см узунликда, япроқчалари 4–6 жуфт, ингичка чўзиқроқ шаклда, учи ўткир, пастки томони оқиш, чалкаш тукли, устки томони деярли туксиз. Гулбанди 10–20 см узунликда, оқиш, қалин тукли. Гулпопуги момиқ, икки тарафлама жойлашган 10–15 тача гулдан иборат. Косачаси найсимон, оқ ва қора тукли, узунлиги 10–12 см, тишчалари 2–3 мм узунликда. Байроқчаси сариқ, узунлиги 20–23 мм, қайиқчасидан узуунроқ. Қанотчаси (эшкаги) байроқчасидан қисқа. Дуккаги осилиб туради, узунлиги 12–15 мм, оқиш қалин тукли, банди 2–3 мм узунликда.

Тарқалиши. Навоий ва Бухоро вилоятлари: Кулжуқтоғнинг шарқий қисмида тарқалган.

Ўсиш шароити. Шимолий юмшоқ ёнбағирларда ўсади.

Сони. 20 туп ўсимлиқдан иборат 2 та популяцияси мавжуд.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [313].

Э. Э. Эргашев.

Статус 1. Реликтовый эндемичный вид останцов Кызылкума.

Краткое описание. Многолетнее растение 20–30 см высоты. Стебель 5–10 см высоты. Листья 8–12 см длины, 4–6 парные, листочки узко-ovalные острые, снизу оттопырано бело волосистые, сверху почти голые. Цветоносы 10–20 см высоты, густо бело-волосистые. Кисти рыхлые, двусторонние, 10–15 цветковые. Чашечка трубчатая, бело и черно волосистая, 10–12 мм длины, зубцы 2–3 мм длины. Флаг желтый, 20–23 мм длины, крылья короче флага и длиннее лодочки. Боб повислый, 12–15 мм длины, густо беловолосистый на ножке 2–3 мм длины. Цветет в мае, плодоносит в июне. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Навоийской и Бухарской областях: горы Кульджуктау (восточная часть).

Места обитания. Северные мягкие склоны.

Численность. Известно 2 популяции (около 20 растений).

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.



Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не разработаны.

Источники. [313].

Э. Э. Эргашев.

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the eastern part of the Kuldzhuktau range (the Navoi and Bukhara regions). Inhabits the northern grassy slopes. 2 populations with 20 plants can be found. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



39. АЛЕКСЕЙ АСТРАГАЛИ

Астрагал Алексея / *Astragalus alexeji* Gontsch.

Мақоми 0. Жануби-ғарбий Ҳисор тизмасининг эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Поясиз, кўп йиллик ўт, баландлиги 20 см. Баргларининг узунлиги 18–30 см, баргчалари 16–20 жуфт, юмалоқ, четлари ўйилган, пахмоқ тукли. Гулбанди 4–5 см узунлиқда, гулпопугининг узунлиги 4–5 см, 3–5 гулдан иборат. Косачаси найчасимон, узунлиги 12–13 мм, пахмоқ тукли. Байроқчаси сариқ, кейинроқ қизил тусга киради, узунлиги 25 мм, қанотчаси (эшкаги) 23 мм узунлиқда, қайиқчаси 21 мм узунлиқда. Дуккаги текис, сал пастга қараб эгилган, банди 4–5 мм узунлиқда, нишлари бор, узунлиги 17–20 мм, эни 5–6 мм, тумшуқчаси 2–3 мм узунлиқда, пўсти қалин, пахмоқ тукли.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Келиф-Шерабаддаги қатор тепаликларда (Тошқоқ дарасида) тарқалган.

Ўсиш шароити. Кулранг, бўз тупроқларда ўсади.

Сони. Гербарий материаллари йўқ, ҳатто на-
мунавий нусхаси ҳам йўқолган. Уни топиш учун олиб борилган тадқиқотлар натижага бермаган. Бутур бутунлай йўқолиб кетган бўлиши мумкин.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайган бўлиши мумкин.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмаган.

Манбалар. [32, 159, 310].

А. С. Эсонкулов.

Статус 0. Эндемик пестроцветных толщ Юго-западного Гиссара.

Краткое описание. Бесствельный многолетник 20 см высоты. Листья 18–30 см длины, листочки 16–20-парные, округлые и мелко выемчатые, бархатисто-мохнатые. Цветоносы 4–5 см длины, кисти 4–5 см длины с расставленными 3–5 цветками. Чашечка трубчатая, 12–13 мм длины, бархатисто-мохнатая.



Флаг желтый, позже краснеющий, 25 мм длины, крылья 23 мм длины, лодочка 21 мм длины. Бобы горизонтально отклоненные, поникающие, на ножке 4–5 мм длины, ланцетные, 17–20 мм длины и 5–6 мм ширины, с носиком 2–3 мм длины, твердокожистые, бархатисто-мохнатые. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: (эндемик Келиф-Шерабадской гряды – уроцище Ташкак).

Места обитания. Серые глины.

Численность. Нет ни одного гербарного образца и даже типовой экземпляр утерян. Многочисленные попытки найти вид не увенчались успехом. Вид по-видимому исчез.

Размножение. Видимо семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охранялось.

Источники. [32, 159, 310].

А. С. Эсанкулов.

Rare endemic species of the south-western Hissar range. It is spread at the Kelif-Sherabad low mountainous range (the Surkhandarya region). Inhabits gray clays. There are no one specimen in herbaria (specimen type is also lost). Probably disappeared. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



40. БЕЛОЛИПОВ АСТРАГАЛИ

Астрагал Белолипова / Astragalus belolipovii Kamelin ex F. O. Khass. et N. Sulejm.

Мақоми 1. Шимолий Помир-Олойдаги камёб тур.

Қисқача тавсифи. Поясиз ўтсимон ўсимлик, бўйи 30–40 см. Барглари тикансиз, узунлиги 20–30 см. 15–20 жуфт оқ тукли баргчалари ён-атрофига ёйилиб тушган. Гулбанди гулидан узун. Гулпопуклари момиқ, 15–20 та гулдан иборат, узунлиги 10–15 см. Косачасининг пастки қисми кўк, дастлаб найсимон бўйлиб, кейинроқ пуфаксимонга айланади, оқ тукли, узунлиги 12–15 мм, тишчаларининг узунлиги 2–4 мм. Байроқчаси яшилсимон-тўқ қизил рангли, узунлиги 25–30 мм,



учи думалоқ айлана шаклида ўйилган, қанотчаси 25–30 мм узунлиқда, қайиқчасидан сал узун. Дуккаги номаълум.

Тарқалиши. Фақат Туркистон тизмасидаги Қулсой дарасида ўсиши аниқланган (Жиззах вилояти, Зомин кўриқхонаси).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг марказий қисмидаги арчазорларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Мадданийлаштирилиши. И. В. Белолипов томонидан ЎзРФА Ботаника боғида экиб ўстирилган.

Мухофаза чоралари. Зомин давлат кўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [312].

Н. О. Сулаймонов.

Статус 1. Редкий эндемик Северного Памира-Алая.

Краткое описание. Бесстебельное растение 30–40 см высоты. Листья неколючие 20–30 см длины, оттопыреные, бело-волосистые, 15–20 парные. Цветоносы длиннее листьев. Кисти рыхлые 15–20 цветковые, 10–15 см длины. Чашечка внизу синеватая, вначале трубчатая позже вздувающаяся бело-волосистая 12–15 мм длины, зубцы 2–4 мм длины. Флаг зеленовато-пурпуровый, 25–30 мм длины с округлой пластинкой сверху выемчатый, крылья 25–30 мм длины чуть длиннее лодочки. Боб неизвестен. Цветет в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Джизакская область: Туркестанский хребет (Зааминский государственный заповедник). Известно одно местонахождение вида в урочище Кульсай.

Места обитания. Средний пояс гор, в арчовнике.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Вид культивировался проф. И. В. Белолиповым в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Зааминском государственном заповеднике.

Источники. [312].

Н. О. Сулайманов.

Rare endemic species of the northern Pamir-Alay. It is spread at the Turkestan range: the Zaamin state nature reserve, the Kulsay (the Djizakh region). Inhabits within juniper forests in the middle mountain belt. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Zaamin state nature reserve.



41. ЖАНУБИЙ ФАРФОНА АСТРАГАЛИ

Астрагал южноферганский / Astragalus austroferganicus Kamelin et R. M. Vinogr.

Мақоми 0. Фарфона водийсидаги ниҳоятда камёб эндемик үсимлик.

Қисқача тавсифи. Күп йиллик ўт, бўйи 10–20 см. Пояси ингичка, оқ тукли. Барги 1–2–3 жуфт баргчали, узунлиги 1–2–6 см, япроқчалари юмалоқ. Косачаси 12–18 см узунлиқда, оқ ва қора тукчалари тарқоқ. Байроқчаси сарик, узунлиги 20 мм, қанотчаси 17–18 мм узунлиқда, қайиқчасининг узунлиги 18–20 мм. Дуккаги 20–50 мм узунлиқда, бандининг узунлиги 2–3 мм, тўғри, текис оқ тукли тумшуқчасининг узунлиги 8–10 мм.

Тарқалиши. Фарфона водийси: Фарфона вилояти (Янгиарик)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Шўрхок тупроқларда ўсади.



Сони. 1928 йили бир мартағина А. Йоффе томонидан йигилган. Бу тур йўқолиб кетган бўлиши мумкин.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайган.

Үсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Үсимлик тарқалган жойларда хўжалик ишлари юритилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмаган.

Манбалар. [65, 159].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 0. Эндемик предгорий Северного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетник 10–20 см высоты. Стебли тонкие беловолосистые. Листья 1–2–3-парные, 1–2–6 см длины, листочки округлые. Чашечка 12–18 мм длины, бело- и чернорассеяно-волосистая. Флаг желтый 20 мм длины, крылья 17–18 мм длины, лодочка 18–20 мм длины. Бобы 20–50 мм длины, на ножке 2–3 мм длины, прямые с носиком 8–10 мм длины, беловолосистые. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Ферганская долина: Ферганской область (Янгиарык).

Места обитания. Соленосные глины.

Численность. Собран один раз А. Йоффе в 1928 году. Вид по-видимому исчез.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственная деятельность.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охранялось.

Источники. [65, 159].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare endemic species of the Ferghana valley. It is spread at the foothills, nearby Ferghana city (the Ferghana region). Inhabits salty clays. The plants were collected by A. Joffe in 1928. Probably disappeared. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



42. ҚИЗИЛ ХЎРОЗ АСТРАГАЛИ

Астрагал кызыл-хураззский / Astragalus rubri-galli Popov

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойда тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик ўтсимон ўсимлик, бўйи 10–20 см. Барглари 5–7 жуфт узунлиги 5–7 см, туклари қаттиқроқ. Гулбанди қисқа, узунлиги 3–4 см. Косачаси найсимон, узунлиги 15–17 мм., оқ ва қора тукли. Байроқчаси 25 мм узунликда, учи ўйилган, қанотчаси 25 мм узунликда, қайиқчаси 22 мм узунликда. Дуккаги бандсиз, кенг чизиқлари бор, узунлиги 25–30 мм, ёйсимон букилган, оқ, қаттиқ тукли, икки уяли.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Келиф-Шеробод тепаликларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Қизил қумли ёнбағирларда ўсади.

Сони. 2001 йили 12 туп ўсимлик борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва боқилиши, турнинг реликтлиги ва ола тусли тупроқларнинг қисқариб кетаётганилиги натижасида қисқарган.

Маданийластирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [3, 310].

Н. Т. Очилова.

Статус 1. Реликтовый эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее растение 10–20 см высоты. Листья 5–7-парные, 5–7 см длины, жестковато-пушистые. Цветоносы короткие, кисти 3–4 см длины. Чашечка трубчатая, 15–17 мм длины, бело- и черно-волосистая. Флаг 25 мм длины, на верхушке выемчатый, крылья 23 мм длины,



лодочка 22 мм длины. Бобы сидячие, широколинейные, 25–30 мм длины, дуговидно изогнутые, бело-жестковолосистые, двугнездные. Цветет в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Сурхандарьинская область: Келиф-Шерабадская грязда.

Места обитания. Краснопесчанниковые склоны.

Численность. В 2001 году было зарегистрировано 12 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас, реликтовость вида и сокращение пестроцветов.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [3, 310].

Н. Т. Очилова.

Rare relict endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Kelif-Sherabad low mountainous range (the Surkhandarya region). Inhabits red gypseous slopes. In 2001, 12 plants were found. Limiting factors: pasturing, relict characters and decreasing of gypseous areas. Measures of protection: not protected.



43. ШУЪЛАЛИ ЗИРАҚҮТ

Эспарцет таверниерелистный / *Onobrychis tavernierifolia* Stocks ex Boiss.



Мақоми 1. Жануби-ғарбий Қызылқұмда жуда оз миқдорда сақланиб қолган камәб тур.

Қисқача тасиғи. Бүйи 3–7 см келадиган, ер бағирлаб ўсуви, деярли поясиз, туклар билан қопланған бир йиллик үт. Барги, асосан, битта, йирик, тескари-тухумсімон ёки 1–2 жуфт ёнбарғчали, устки томони калта ётиқ, пастки томони хурпайған оқ тукли, банди 5 см узунлиқда. Гулпояснинг узунлиги 2–3,5 см. Гулпопуги момиқ, 3–7 гулли. Косачасининг узунлиги 3–3,5 мм. Дуккаги ғадир-бұдур катақчали, узунлиги ва эни 1 см атрофида. Май ойда гуллайди, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Бухоро вилоаты: Қызылқұмдаги қолдиқ тоғли жойларда (Кулжүқтоғ этакларида жойлашған Чуруқ, Оёқгужумли құдуқлари атрофидан) тарқалған. Эронда ҳам учрайди.

Үсиш шароити. Қолдиқ тоғлардаги шағаллитошли ва тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Бир-биридан узоқда якка-якка ҳолда, баъзан эса 2–3 туп бўлиб ўсади. 2009 йили 94 туп ўсимлик қайд этилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди. Уруғи қаттиқ қобиқ ичида жойлашған. Шунинг учун ёғин кўп бўлған йиллари яхши униб чиқади.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши натижасида ўсимликнинг сони камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. 1962–1964 йилларда ЎзР ФА Қызылқұм чўл станциясида экиб ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чорала-ри ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [138, 153].

Х. Ф. Шомурадов.

Статус 1. Очень редкий и малочисленный вид в Юго-западном Кызылкуме.

Краткое описание. Однолетнее приземистое, высотой 3–7 см, почти бесстебельное, опущенное растение. Листья с верхней стороны покрыты короткими прижатыми, а снизу длинными торчащими белыми волосками, расположены на длинных (до 5 см) черешках, оканчивающихся крупной долькой-листочком обратнояйцевидной формы. Цветоносы длиной 2–3,5 см. Кисти рыхловатые, 3–7

цветковые. Чашечка длиной 3–3,5 см. Бобы морщинисто-ячеистые, длиной и шириной около 1 см. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Бухарская область: останцовные низкогорья Кызылкума – Кульджуктау, близ колодцев Аяк-Гужумды и Чурук. За пределами Узбекистана – Иран.

Места обитания. Каменистые и каменисто-щебнистые склоны останцовых гор.

Численность. Сильно разбросаны единичными экземплярами, реже по 2–3. В 2009 году найдены 94 растений.

Размножение. Семенное. Семена покрыты твердой оболочкой, поэтому в годы с обильными осадками отмечается интенсивное прорастание.

Причины изменения численности и ареала. Нарушение среды обитания в результате чрезвычайного выпаса.

Культивирование. В 1962–1964 гг. были выращены в коллекционном питомнике на Кызылкумской пустынной станции АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [138, 153].

Х. Ф. Шомурадов.

Very rare species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Kuldzhuktau, near Ayak-Guzhumdy and Churuk (the Bukhara region). Inhabits stony and gypseous slopes. There are three small populations can be found. Limiting factors: violation of habitat as a result of overpasturing. Measures of protection: not protected.



44. БУРЧОҚСИМОН КАЛИСПЕПЛА

Калиспепла эгакантовая / *Calispepla aegacanthoides* Vved.

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойда йўқолиб кетиш арафасида турган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–40 см, йиллик поялари тикансимон, ётиқ оқиш туклар билан қопланган ёстиқсимон ярим бута. Барглари уч бўлакли, ёнбаргиз, пастдагиси бандли, юқоридагилари деярли бандсиз. Гули сариқ. Дуккаги нишли-чизиқли, ўткир учли, қалин, ётиқ тукли. Май–июнъ ойларида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Бойсун тоғидаги Мачайдарё ҳавзасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги юзаси очилиб қолган ола тусли тупроқларда, нураган тошли ёнбағирларда ва сийрак арчазорларда ўсади.

Сони. Ўсимлик ўсан майдонлар учта жойда борлиги аниқланган. 2009 йилдаги изланишлар ўсимлик популяциясининг Дарбанд қишлоғидан 8–10 км юқоридаги тоғли худудларда сақланиб қолганлигини кўрсатди. Ўсимликнинг мазкур популяциясида туплар сони 500 та атрофида.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тўлиқ ўрганилмаган. Антропоген омиллар таъсирида тарқалиш майдонлари қисқарив бораётганлиги кузатилмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1982 йили табиатдан олиб келиб ўтқазилган икки туп ўсимлик куриб қолган. 2009 йилда Ботаника боғига ўсимликнинг туплари қайта экилган. Аммо бу уриниш ҳам натижга бермаган.

Мухофаза чоралари. Мухофаза қилинмайди.

Манбалар. [56, 169, 294].

И. В. Белолипов.

Статус 1. Редчайший эндемичный вид монотипного рода Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Подушковидный полукустарник высотой 20–40 см. Все растение седоватое от прижатых волосков. Годичные стебли с почти колючими ветвями. Листья без прилистников, тройчатые, нижние на черешках, верхние почти сидячие. Цветки жёлтые. Боб линейно-ланцетный, острый, густо-прижато-волосистый. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: Бассейн реки Мачайдарья в Байсунских горах.

Места обитания. Каменистые эродированные склоны и обнажения пестроцветов, разреженные арчовники среднего пояса гор.

Численность. Отмечен в трех пунктах. Исследования 2009 года

выявили одну популяцию 8–10 км выше от кишлака Дарбанд, с численностью не более 500 экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Изучено недостаточно. Под влиянием антропогенных факторов наблюдается сокращение площадей популяции.



Культивирование. Попытка интродукции 2-х взрослых растений в Ботаническом саду АН РУз в 1982 году оказалась неудачной. В 2009 году приступили к повторным попыткам вырастить растение в Ботаническом саду.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [56, 169, 294].

И. В. Белолипов.

Unique relict endemic species and monotypical genus of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Baysun mountains (the Surkhandarya region). Inhabits stony eroded slopes and outcrops of gypseous rocks, thinned juniper stands in the middle belt of mountains. In 2009, 1 large population (about 500 plants) was revealed. Limiting factors: low competition capacity, seed abortion, damage caused by insects. Measures of protection: not protected.



45. ҚОРАПОЯ МОЙҚОРАФОН

Майкараган сетчатый / *Calophaca reticulata* Sumnev.

Мақоми 1. Фарбий Помир-Олой тизмаларидағи камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Унча баланд бўлмаган сершох бута. Барглари кумушранг, ҳар икки томони ётиқ қалин туклар билан қопланган, баргчалари 4–5 жуфт, чўзиқроқ. Ёнбаргчаларининг асоси учбурчаксимон. Тўпгуллари бошчасимон, тифиз. Дуккагининг узунлиги 35–40 мм. Июнда гуллаб, меваси июль–август ойларида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг Бойсун тоғларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги шағалли ёнбағирларда ва арчазорларда ўсади.

Сони. Табиатда онда-сонда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши ва ўсимлиқдан ўтин сифатида фойдаланилиши натижасида сони камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Мухофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [273, 310].

О. Т. Тургинов.



Статус 1. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Невысокий сильноветвистый кустарник. Листья серебристо-белые, с обеих сторон густо покрыты прижатыми волосками, с 4–5 парами продолговатых листочков. При-



листники при основании треугольные. Соцветие головчатое, скученное. Плод – боб длиной до 35–40 мм. Цветёт в июне, плодоносит в июле–августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет (Байсунские горы).

Места обитания. Щебнистые склоны в среднем поясе гор, среди арчовников.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас, заготовка на топливо.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [273, 310].

О. Т. Тургинов.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Baysun mountains (the Surkhandarya region). Inhabits slopes in the juniper zone. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing and cutting as fuel wood. Measures of protection: not protected.



46. ЙИРИК НЎХАТ

Нут большой / Cicer grande (Popov) Korotkova

Мақоми 1. Помир-Олойдаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Баландлиги 20–45 см. Пояси салгина буралган, безчали туклар билан қопланган кўп йиллик ўт. Баргининг узунлиги 4–7 см, барг бандининг учи оддий ёки 3–5 та гажаги бор. Баргчалари 4–7 жуфт, чўзиқроқ-эллипс шаклида, узунлиги 10–25 мм, эни 6–12 мм, ҳар икки томони калта, безчали туклар билан қопланган, гулпоясининг узунлиги 2,5–3,5 см, гулбанди 4–6 мм узунлиқда. Косачасининг узунлиги 10 мм, тугунчаси туклар билан қопланган. Май ойида гуллаб, июнь ойида мевалайди.

Тарқалиши. Жиззах ва Сурхондарё вилоятлари: Помир-Олойда, Нурота ва Кўҳитанг тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмларидаги тошли ва майда заррали тупроқлардан иборат ёнбағирларда ўсади. Нурота кўриқхонаси ҳудудидаги учта тоғ дарасида тарқалганилиги аниқланди. Умумий сони бир нечта юз ўсимлиқдан иборат, популяцияси 5–6 гектарга яқин майдонда тарқалган.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди, баъзан унча катта бўлмаган тўплар ҳосил қиласди.

Қўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг тартибсиз боқилиши натижасида ўсимлик сони камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота ва Сурхон давлат кўриқхоналарида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [151, 154, 181, 184].

Н. Ю. Бешко.

Статус 1. Редкий эндемик Памиро-Алай.

Краткое описание. Многолетнее растение высотой 20–45 см, стебли слегка извилистые, опущенные железистыми волосками. Листья длиной 4–7 см, черешки заканчиваются простым или 3–5-ветвистым усиком; листочки 4–7-парные, овально-эллиптические, длиной 10–25 мм, шириной 6–12 см, с обеих сторон коротко-железисто-опущенные. Цветоносы длиной 2,5–3,5 см, цветоножки – 4–6 мм, чашечки длиной 10 мм, завязь покрыта волосками. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Джизакской и Сурхандарьинской областях: Памиро-Алай, хребты Нуратау и Кугитанг.

Места обитания. Каменисто-мелкоземистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами, реже образует небольшие групп-

пы. На территории Нуратинского заповедника отмечен в 3-х уроцищах, общая численность составляет несколько сотен растений, занятая популяциями площадь около 5–6 га.

Размножение. Семенное.


Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском и Сурханском заповедниках.

Источники. [151, 154, 181, 184].

Н. Ю. Бешко.



Rare endemic species of the western branches of Pamir-Alay. It is spread at the Pamir-Alay: the Nuratau and Kughitang ranges (the Djizakh and Surkhandarya regions). Inhabits stony slopes in the middle mountainous zone. Single specimens and small populations can be found. On the territory of Nuratau nature reserve 3 populations are known (several hundred plants), distribution area is about 5-6 hectares. For Kughitang range, there is no information about the magnitude of populations. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau and Surkhan state nature reserves.



47. ҚУДРОЙИ НҮХАТ

Нут седой / Cicer incanum Korotkova

Мақоми 1. Фарбий Помир-Олойнинг камёб эндемик тури.

Қисқача тавсифи: Узунлиги 20–30 см келадиган ярим бутача. Бўртма, тўлқинсимон поясининг ранги кўкимтири. Барглари жуфт-патсимон, узунлиги 2,5–4 см. Баргларининг банди ўзагига томон тикансимон туклар билан қопланган бўлади. Япроқчалари 4–6 жуфт, учли понасимон ёки тухумсимон, калта тукчалар билан қопланган. Гулпояси 10–15 мм узунликдаги туклар билан қопланган, 1,5–2,5 см узунликдаги 1–2 та гулдан иборат. Гулкосаси тукли, 8–10 мм узунликда. Байроқчасининг узунлиги 20 мм, ташқи томони тукли. Қанотчалари 14–15 мм, қайиқчаси 13–14 мм. Дуккаги тукли, 2,5 см узунлика. Июль ойида гуллаб, августда мева тугади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Қизилдарё ҳавзаси (Тошқўрғон қишлоғи).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидағи қояларда ўсади.

Сони. 1996 йилда 20 та ўсимлик қайд қилинган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тарқалиш доираси тор бўлган стенобионт эндемик тур.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат қўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [151, 154, 181, 184].

И. И. Мальцев.

Статус 1. Редкий эндемик Западного Памира-Алая.



Краткое описание. Полукустарничек с сизыми, извилистыми, железистыми стеблями 20–30 см высоты. Листья парноперистые 2,5–4 см длины, с осью, переходящей в колючку. Листочки 4–6-парные, клиновидные или яйцевидные, коротко опущенные. Цветоносы 1–2

цветковые, 1,5–2,5 см длины, с осью 10–15 мм длины. Чашечка опущенная, 8–10 мм длины. Флаг снаружи опущенный, 20 мм длины, крылья 14–15 мм длины, лодочка 13–14 мм длины. Боб опущенный 2,5 см длины. Цветет в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Кашкадарьинская область: бассейн реки Кызылдарья (кишлак Ташкурган).

Места обитания. Скалы в среднем поясе гор.

Численность. В 1996 году было зарегистрировано 20 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Узколокальный эндемичный стенобионт.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [151, 154, 181, 184].

И. И. Мальцев.

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Kyzylarya valley, nearby the village Tashkurgan (the Kashkadarya region). Inhabits rocks in the middle mountainous zone. Seldom, single or small brushwoods with other woody and shrubby plants can be observed, very seldom, small pure brushwoods can be found. Total number was not calculated. Limiting factors: endemic species. Measures of protection: protected in the Hissar state reserve.



48. ВВЕДЕНСКИЙ ОКСИТРОПИСИ

Остролодочник Введенского / *Oxytropis vvedenskyi* Filim.

Мақоми 3. Ҳисор тизмасида тарқалган эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 5–10 см, ёғочсимон, йўғон ўқ илдизли яримбута. Баргининг узунлиги 1,5–3 см, банди ярим ётиқ, оқ тукли. Баргчалари 5–6 жуфт, тиғсимон-чўзиқ, ҳар иккала томони сийрак, ётиқ оқ туклар билан қопланган, узунлиги 3–5 мм, эни 1–1,5 мм. Гулпопуги 6–8 гулли, ғовак. Гултожи бинафша рангли. Дуккаги чўзиқ ёки думалоқ-чўзиқ, узунлиги 10–12 мм, эни 0,3–0,4 мм, банди 1,5 мм узунлиқда, майда, ётиқ қора ва оқ тукли. Июнь–август ойларида гуллаб, меваси август–сентябрь ойларида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг жанубий ёнбағрида, Бойсун тоғларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва юқори қисмларида майда заррали тупроқлар, шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиятда кам тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 3. Эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Полукустарник высотой 5–10 см с толстым деревянистым стержнем. Листья длиной 1,5–3 см с полуприжато-беловоло-

sistymiами черешками. Листочки 5–6 (7)-парные, ланцетно-продолговатые, с обеих сторон негусто-прижато-беловолосистые, длиной 3–5 мм, шириной 1–1,5 мм. Кисти 6–8 цветковые, рыхлые. Венчик фиолетовый. Бобы продолговатые или продолговато-овальные, длиной 10–12 мм, шириной 0,3–0,4 мм, на ножке длиной 1,5 мм, мелко прижато бело- и черноволосистые. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: южные отроги Гиссарского хребта, Байсунские горы.

Места обитания. Пологие мелкоземистые, скалистые и каменистые склоны в среднем и верхнем поясах гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф. О. Ҳасанов.

Endemic species of the Hissar range It is spread at the southern outskirts of the Hissar range (the Surkhandarya region). Inhabits gentle fine earth, rocky and stony slopes in the middle and upper mountainous zone. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



49. МАЙДА ГУЛЛИ ОКСИТРОПИС

Остролодочник мелкоцветный / *Oxytropis tyttantha* Gontsch.

Мақоми 3. Ҳисор тизмасида тарқалган эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–20 см, поясиз кўп ийллик ўт. Баргининг узунлиги 8–10 см; баргчалари 15–25 жуфт, тухумсимон чўзиқ, баъзан кенг ёйилган, ўткир учли, узунлиги 5–12 мм ли нишлар билан, баъзан тўмтоқ, дағал оқ туклар билан қопланган. Гулпопуги калта, зич, тухумсимон ёки юмалоқ, узунлиги 1,5–2 см, эни 1–1,5 см, 10–15 гулли. Косачаси кўнғироқ ёки найсимон кўнғироқ, узунлиги 5 мм, дағал ярим ётиқ тукли. Дуккагининг банди 2 мм атрофида, чўзиқ, узунлиги 10–15 мм, тумшуқчаси 2–3 мм узунлиқда, сал эгилган, бигизсимон. Август-сентябрь ойларида гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор тизмасида Қашқадарё, Тўпаланг, Сангардак дарёлари ҳавзаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта ва юқори қисмларидаги тошли ва майда тупроқли ёнбағирларда, юзаси очилиб қолган қизил тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 3. Эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное растение высотой 10–20 см. Листья длиной 8–10 см. Листочки 15–25-парные, яйцевидно-продолговатые или широколанцетные, длиной 5–12 мм, острые, реже туповатые, рыхлые или густо-жёстко-шероховато-прижато-беловолосистые. Кисти укороченные, плотноватые, яйцевидные или почти округлые, длиной 1,5–2 см, шириной 1–1,5 см, 10–15-цветковые. Чашечка колокольчатая или трубчато-колокольчатая, длиной 5 мм, полуприжато-жёстковолосистая. Бобы продолговатые, длиной 10–15 мм, плодоножка длиной около 2 мм, со слегка вниз изогнутым шиловидным носиком длиной 2–3 мм. Цветёт в августе–сентябре, плодоносит в сентябре.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский хребет, бассейны рек Кашкадарья, Тупаланг, Сангардак.

Места обитания. Каменистые и мелкоземистые склоны, реже выходы красных глин в среднем и верхнем поясе гор.

Численность. Сведений нет.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф. О. Ҳасанов.

Endemic species of the Hissar range. It is spread at the Hissar range, the Kashkadarya, the Tupalang, the Sangardak river basins (the Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits stony and fine earth slopes, rarely, red clay in the middle and upper belts of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



50. МАЙДОНТОЛ ОКСИТРОПИСИ

Остролодочник майдантальский / *Oxytropis maidantalensis* B. Fedtsch.

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шанда ўсувчи камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик, калта, ўқ илдизли, деярли поясиз, сийрак чим ҳосил қилувчи, оқ пахмоқ тукли ўсимлик. Баргининг узунлиги 2,5-7 см, 5-12 жуфт, баргчалари чўзиқроқ. Гулпоясининг узунлиги баргига тенг ёки ундан узунроқ. Гулпопуги бошчасимон, зич жойлашган қизил гуллардан иборат. Дуккаги пухфасимон, чўзиқ тухмисимон, узунлиги 15 мм, қаттиқ, тумшуқчали, қалин ҳурпайган тукли. Июль ойларида гуллаб, авгуистда мева беради.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Майдонтол дарёсининг ҳавзасида. Ўзбекистондан ташқарида эса Қозоғистон ва Қирғизистонда тарқалган.

Ўсиш шароити. Тошли-шағалли тоғ ёнбағирларида ўсади.

Сони. Саноқли даражада учрайди. Ўзбекистондаги умумий сони 3000 дан ортмайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Утом-Чотқол миллий табият боғи худудидаги ўсиш жойлари мухофазага олинган.

Манбалар. [10, 47, 76, 212, 304, 305].

Ф. ў. Ҳасанов.

Статус 2. Редкий узколокальный эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее, коротко-стержневое, многоглавое травянистое растение, почти бесстебельное, рыхлодерновинное, бело-мохнатое от опушения. Листья длиной 2,5-7 см, 8-12-парные, с овальными листочками. Цветоносы равны листьям или длиннее их, с густой головчатой кистью красных цветков. Бобы вздутые, удлиненно-яйцевидные, длиной около 15 мм, с прямым твердым носиком, густо-оттопыренно-шерстистые. Цветёт в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Ташкентская область: бассейн реки Майдантал. За пределами Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны.

Численность. Встречается одиночно. Общая численность в Узбекистане не превышает 3000 экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [10, 47, 76, 212, 304, 305].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Ugam range: the Maidantal river basin (the Tashkent region). Inhabits stony-slopes. Single specimens can be found. The number is about 3000 plants in Uzbekistan. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



51. НИМРАНГ ПУШТИ ОКСИТРОПИС

Остролодочник ложнорозовый / *Oxytropis pseudorosea* Filim.

Мақоми 2. Нурота тоғларида тарқалган эндемик түр.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–40 см, поясиз, ёғочсимон кўп йиллик ўт. Баргининг узунлиги 10–15 см, яшил, ётиқ ипаксимон тукли. Асосий банди ва баргчаларининг банди кумушсимон тукли. Гулпопуги момик, ғовак, чўзиқроқ, узунлиги 7–15 см, кўп гулли, гуллари сийрак жойлашган. Косачаси қўнғироқсимон, узунлиги 12–14 мм, оқ тукли. Гултожи пушти-бинафша рангли. Дуккаги чўзиқ, узунлиги 10–15 мм, эни 4–5 мм, тумшуқласининг узунлиги 5–6 мм, қалин оқ туклар билан қопланган, деярли икки уяли. Май-июнь ойларида гуллаб, меваси июнь-июлда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота ва Оқтоғ тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки ва ўрта



қисмидаги шағалли-тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ва кичик тўплар ҳолида учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши натижасида ўсимликнинг сони камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Нурота қўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [10, 47, 76, 304, 305].

Н. Ю. Бешко.

Статус 2. Эндемик Нуратинских гор.

Краткое описание. Бесстебельное растение высотой 30–40 см с деревянистым стержневым корнем. Листья длиной 10–15 см, прижато-шелковисто-опущенные, зеленые; черешки, как и ось, шелковистоволосистые. Кисти рыхлые, длиной 7–15 см, многоцветковые, с расставленными цветками. Чашечка колокольчатая, длиной 12–14 мм, прижато-белово-опущенная; с шиловидными, равными трубке зубцами. Венчик розово-лиловый, в сухом виде фиолетовый. Бобы продолговатые, длиной 10–15 мм, шириной 4–5 мм, с носиком длиной 5–6 мм длины, густо-прижато-белово-олосистые, почти двугнездые. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июне-июле.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской и Навоийской областях: хребты Нуратау и Актау.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны нижнего и среднего пояса гор.

Численность. Встречается редко, единично или небольшими популяциями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Основную угрозу представляет чрезмерный выпас скота.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [10, 47, 76, 304, 305].

Н. Ю. Бешко.

Endemic species of the Nuratau mountains. It is spread at the Nuratau and Aktau ranges (the Djizakh, the Samarkand and Navoi regions). Inhabits stony-slopes of the lower and middle belts of mountains. Single specimens and small populations occur sporadically. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



52. ФЕДЧЕНКО ОКСИТРОПИСИ

Остролодочник Федченко / Oxytropis fedtschenkoana Vassilcz.

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шанда кам тарқалган эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик, қисқа ўқ илдизли, поясиз, юмшоқ чимли, қалин туклар билан қопланган ўсимлик. Баргларининг узунлиги 2-3 см, баргчалари 3-8 жуфт, чўзиқроқ думалоқ шаклда. Гулпояси баргидан узун. Дуккаги пўстлоқли, юмалоқ пуфаксимон, узунлиги 15 мм. Июн ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол ва Курама тизмаларининг фарбий қисмларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг қуруқ шағалли тошли ёнбағирларида ва майда тошли ярим мустаҳкамлашган сурilmалардан, дараҳт ва бутали юқори камари бўйлаб ўсади.

Сони. Бу турнинг бир-биридан алоҳида жойлашган 6 та популяцияси маълум. Лекин уларнинг сони ва майдони унча катта эмас, яъни, 100 м² майдонга 1-2 тури тўғри келади, умумий сони тахминан 4,5-5 минг атрофида.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Рақобатга чидамсиз. Мунтазам радиша чорва моллари боқиладиган ерларда ўсади. Ёввойи ҳайвонлар ҳам истеъмол қиласи.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида ўсади.

Манбалар. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Редкий узколокальный эндемик Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее, бесстебельное, мелкодерновинное, короткостержневое растение, седое от густого опушения. Листья длиной 2-3 см, 3-8-парные, с овальными листочками. Цветоносы длиннее листьев. Бобы кожистые, шаровидно вздутые, длиной до 15 мм. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: западные оконечности Чаткальского и Кураминского хребтов.

Места обитания. Сухие крупнощебнистые склоны и мелкощебнистые полузакрепленные осьпи вдоль верхнего древесно-кустарникового пояса гор.

Численность. Отмечен в 6 удаленных друг от друга популяциях. Каждая из них невелика по площади и немногочисленна по составу. Растения неравномерно удалены друг от друга, единичны, в среднем по 1-2 особи на 100 м². Общая численность ориентировочно оценивается в 4,5-5 тысяч экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Низкая конкурентоспособность. Произрастает

в зоне интенсивного летнего выпаса, поедается дикими и домашними животными.



Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Произрастает на территории Чаткальского биосферного заповедника.

Источники. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare endemic species of the Tien-Shan. It is spread at the western outskirts of the Chatkal and Kurama ranges (the Tashkent region). Inhabits dry large slopes and small semi-fixed mounds along the upper woody-shrubby belts of mountains. 6 populations were revealed. Each of them occupies a small area and is not numerous. Plants irregularly distant one from other, single, an average 1-2 specimens per 100 m² can be observed. Total number is approximately evaluated at 4500-5000. Limiting factors: low competition capacity. It grows in the zone of intensive summer pasturing. It is eaten by wild and domestic animals. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere state reserve.



53. ЙОПҚА ПАРДАЛИ ОКСИТРОПИС

Остролодочник ложнотонкопузырчатый / *Oxytropis pseudoleptophysa* Boriss.

Мақоми 2. Күхитанг тизмасидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 4–10 см, қалин бурама туклар билан қопланган, поясиз, кўп йиллик ўт. Баргларининг узунлиги 2–10 см, чўзиқ, банди хурпайган оқ туклар билан қопланган. Баргчалари 5–8 жуфт, учли, ҳар икки томони пахмоқ тукли, узунлиги 5–7 мм, эни 3–5 мм. Гулпопуги ғовакроқ, 8–12 гулли, косачасининг узунлиги 5–7 мм. Гултожи кўк ёки ҳаворанг. Дуккаги пухфаксимон шишган, тухумсимон-юмалоқ, юмшоқ, хурпайган оқ тукли, узунлиги 13–18 мм, эни 10–15 мм гача етади. Май–июнь ойларида гуллаб, июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Күхитанг тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмларидаги тошли-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маданийлаштирилмаган.

Мухофаза чоралари. Махсус мухофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Сурхон давлат кўриқхонасида мухофаза қилинади.

Манбалар. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Редкий эндемик Кугитанга.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное растение, 4–10 см высоты, все густомахнатое от длинных отклоненных белых волосков. Листья продолговатые, 2–10 см длины, с оттопыренно-волосистыми черешками. Листочки в числе 5–8 пар, островатые, с обеих сторон густомахнатые, длиной 5–7 мм, шириной 3–5 мм. Кисть рыхловатая, 8–12-цветковая.

Чашечки длиной 5–7 мм. Венчик синий или голубоватый. Бобы вздутые, яйцевидно-ша-

ровидные, мягко-оттопыренно-беловолосистые, длиной 13–18 мм, шириной около 10–15 мм. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Сведений нет.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Не культивируется.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare endemic species of the Kughitang range. It is spread at the Kughitang range (the Surkhandarya region). Inhabits stony slopes in the middle mountainous zone. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



54. АНГРЕН ТАНГАҮТИ

Копеечник ангренский / *Hedysarum angrenicum* Korotkova

Мақоми 1. Фарбий Тянь-Шаннинг Чотқол тизмасида учрайдиган камёб эндемик ўсимлиқ.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20 см га етадиган поясиз, қишида ер усти қисмлари қуриб қоладиган кўп йиллик ўт. Барги мураккаб, узунлиги 10–16 см, баргчалари 3–4 жуфт, чўзиқроқ айланга шаклида, ҳар икки томони тукли, устки томони сийрак, пастки томони қалин тукли. Тўпгули баргига тенг, баъзан ундан узунроқ, 16–18 см. Косачаси узун тукли. Дуккаги туксиз, бир-икки, баъзан уч бўғимли. Июнь ойидаги гуллаб, меваси июль–августда етилади.



Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Чотқол тизмаси (Оҳангарон дарёси ҳавзаси) ва Фарғона воидиси (Оқсув ва Қорасув дарёлари ҳавзалари)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги тошли шимолий ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.


Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан ташқари кўп боқилиши туфайли ўсимликнинг уруғ бериши пасайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.
Мухофаза чоралари. Мухофаза қилинмайди.
Манбалар. [137, 150].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 1. Редкий узколокальный эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение высотой до 20 см с отмирающими на зиму надземными частями. Листья



длинные (10–16 см), сложные, 3–4-парные. Листочки овальные, сверху слабоупущенные, снизу густоволосистые. Цветоносы равны листьям, иногда чуть длиннее их (до 16–18 см). Чашечка длинноволосистая. Бобы без щетинок, одно-, двух-, реже трёхчленистые. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Ташкентской и Наманганской областях: Чаткальский хребет – бассейн реки Ахангаран; Ферганская долина – бассейны рек Аксу и Карасу.

Места обитания. Каменистые северные склоны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Нарушение среды обитания, снижение семенной продуктивности в результате чрезмерного выпаса.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [137, 150].

К. Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal range: the Akhangaran; the Ferghana valley: the Aksu and Karasu river basins (the Tashkent and Namangan regions). Inhabits stony northern slopes in the middle mountainous zone. The quantity is unknown. Limiting factors: destruction of habitats, reduction of seed productivity as a result of overpasturing. Measures of protection: not protected.



55. БУХОРО ТАНГАҮТИ

Копеечник бухарский / *Hedysarum bucharicum* B. Fedtsch.

Мақоми 2. Жануби-ғарбий Ҳисор тизмасида учрайдиган камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бүйи 10–30 см орасидаги күп үйиллик ўт. Барглари мұраккаб, баргчалари 5–8 жуфт, узунлиги 14–18 мм, эни 2–8 мм. Гулпояси баргидан узун. Байроқчаси қайиқчасидан калтароқ. Дуккаги 2–3 бўғимли, 5–8 та кўндаланг кесимли бўртмалари бор. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши.

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбида, Қизилмозор, Тошқўрғон қишлоқлари атрофларида ҳамда

Яккабоғ дарёсининг юқори оқимида, Ҳўжагургур-Ота тоғларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Гипсли, оҳак-тошли тупроқларда ҳамда сийрак арчазор, пистазорларда, шунингдек, ёвшан ва бошқа ўтлар орасида ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда, баъзан кичик туплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан зиёд кўп бокилиши туфайли камайиб кетган. Қурғоқчилик йиллари уруғи яхши унмайди.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [137, 150].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий вид Юго-западного Гиссара.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение со стеблями высотой 10–30 см. Листья сложные, 5–8-парные, листочки длиной 14–18 мм, шириной 2–8 мм. Цветоносы превышают листья. Флаг немного короче лодочки. Бобы 2–3-членные с 5–8 по-перечными ребрами. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: юго-западные отроги Гиссарского хребта, окрестности

кишлаков Кызыл-Мазар, Ташкурган, верховья Як-кабаг-Дары, горы Ходжа-Гур-Гур-Ата.

Места обитания. Гипсы и известняки, среди арчового редколесья, в разреженных фисташниках и полынно-разнотравных сообществах.

Численность. Встречается единично, реже небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сильно страдает от выпаса мелкого рогатого скота. Плохо возобновляется в засушливые годы.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [137, 150].

К. Ш. Тожибаев.

Rare species of the south-western part of the Hissar range. It is spread at the south-western outskirts of the Hissar range, the surroundings of the villages Kyzyl-Mazar, Tashkurgan, Yakkabag-Darya, Khoja-Gur-Gur-Ata (the Kashkadarya and Surkhandarya region). Inhabits gypseous slopes and lime-stones, within juniper forests, pistachios and sagebrush-grasslands. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Hissar state reserve.



56. ДРОБОВ ТАНГАҮТИ

Копеечник Дробова / *Hedysarum drobovii* Korotkova

Мақоми 1. Фарбий Тянь-Шанда учрайдиган кам-ёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бүйи 30–60 см, ўқ, илдизли күп бошчали, күп йиллик ўт. Пояси күп, баъзан 2–3 та, тўпгули пояларининг учида жойлашган. Ўсимликтин барча қисми ётиқ, кумушранг туклар билан қопланган. Барги мураккаб, узунилиги 7–10 см, баргчалари 2–3 жуфт. Гулбанди барг қўлтиғидан чиққан, гуллари пуштиранг, эгилган, тўпгули ёйиқ. Дуккаги деярли бандсиз, узунилиги 6–8 мм, томирлари бўртиб чиққан. Июнда гуллаб, меваси июнь-июль ойларида етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Уғом (Хумсон қишлоқ атрофи) ва Чотқол тизмалари (Бурчмулла ва Янгиқўрон қишлоқлари атрофи)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тошли-шагалли ҳамда бўз тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Саноқли даражада учрайди, умумий сони 200 тупдан ошмайди. 2009 йили Бурчмулла қишлоғи атрофида 50 тупдан ошмайдиган кичик популяцияси қайд этилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорвоқ сув омбори курилиши муносабати билан ўсимлик ареали кескин қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсиш жойлари Уғом-Чотқол миллий табиат боғи худудида жойлашган.

Манбалар. [137, 150]

К. Ш. Тожибаев.

Статус 1. Очень редкий узколокальный эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 30–60 см с многоглавым стержневым корнем. Стебли многочисленные, реже 2–3, оканчивающиеся цветоносом. Всё растение опущено прижатыми серебристыми волосками. Листья длиной 7–10 см, сложные, с 2–3 парами боковых листочков. Цветоносы пазушные, цветки розовые,

поникающие, собраны в рыхлое соцветие. Боб почти сидячий, длиной 6–8 мм, с резко выступающими жилками. Цветёт в июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение.

Ташкентская область: Угамский хребет – окрестности кишлака Хумсан; Чаткальский хребет – окрестности Бурчмуллы и Янги-Кургана.


Места обитания. Каменисто-щебнистые и глинистые труднодоступные склоны в нижнем поясе гор.

Численность. Встречается единично, общая численность около 200 экземпляров. В 2009 году отмечена маленькая популяция с 50 особями в окрестности к. Бурчмуллы.

Размножение.

Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Строительные работы и затопление Чарвакского водохранилища.



Культивирование.

Сведений нет.
Меры охраны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [137, 150]

К. Ш. Тожибаев.

Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Ugam range: nearby the village Khumsan; the Chatkal range: nearby the villages Burchmulla and Yangi-Kurgan (the Tashkent region). Inhabits stony and clayish almost inaccessible slopes in the lower belt of mountains. Single specimens occur sporadically. Total number of plants does not exceed 200 specimens. In 2009, a population of 50 plants was found near the Burchmulla village. Limiting factors: building works and flood of the Charvak reservoir. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.

57. ОМОНҚҮТОН ТАНГАҮТИ

Копеечник аманкутанский / *Hedysarum amankutanicum* B. Fedtsch.

Мақоми 0. Бу ўсимлик йўқолиб кетган бўлиши мумкин. Зарафшон тизмасидан атиги бир марта терилган.

Қисқача тавсифи. Бўйи 70–85 см га етадиган кўп йиллик ўт. Барги мураккаб, баргчалари 3–5 жуфт, чўзиқроқ думалоқ. Гулпоёси ингичка, узунлиги 20–22 см. Гуллари 25–40 тагача, оч пушти рангли, бандсиз. Дуккаги қандай экани номаълум. Май ойида гуллайди.

Тарқалиши. Самарқанд вилояти: Зарафшон тоғининг Тахтақорача довонида учрайди.



Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1500 м ба-
ландликкача бўлган довонда ўсган.

Сони. Мазкур тур Тахтақорача довонидан 1913 йили биринчи бор йифилган ягона нусхаси бўйича тавсиф этилган. Айни вақтда бу нусха Россия Фанлар академияси-



нинг Комаров номидаги Ботаника институти гербарийсида сақланади (Санкт-Петербург). Сўнгги йилларда бу турни топиш учун уюштирилган экспедициялар самарасиз тугади.

Кўпайиши. Маълум эмас.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.
Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.
Манбалар. [137, 150].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 0. Возможно, исчезнувший эндемик За-
рафшанского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 70–85 см. Листья сложные, 3–5-парные, листочки овальные. Цветоносы тонкие, длиной до 20–22 см. Цветки бледно-розовые, сидячие, в числе 25–40. Бобы не известны. Цветёт в мае.

Распространение. Самаркандская область:
Зарафшанский хребет – перевал Тахта-Карача.

Места обитания. Перевал на высоте 1500 м.

Численность. Единственный экземпляр, по которому описан этот вид, найден в 1913 году на перевале Тахта-Карача и хранится в гербарии Ботанического института РАН в Санкт-Петербурге. Последующие поиски не дали результатов.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [137, 150].

К. Ш. Тожибаев.

Probably disappeared species of the Zaravshan range. It is spread at the Zaravshan range: the Takhta-Karacha passage (the Samarkand region). Inhabits the passage (1500 m). The only specimen was found in 1913, on the Takhta-Karacha passage and is kept in the Herbarium of the Botanical Institute of RAS in Saint-Petersburg. Recent collecting missions had no success. Measures of protection: not protected.



58. ТИЗМА ТАНГАЎТ

Копеечник великолепный / *Hedysarum magnificum* Kudr.

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 70 см га борадиган кўп йиллик ўт. Пояси ғовак, оч яшил рангли. Баргларининг узунлиги 3-8 см, эни 5 см, чўзиқроқ думалоқ шаклдаги учта баргчадан ташкил топган, учидаги баргчаси йирикроқ. Гули хира бинафша ранг, баъзан эса оқиш тусда товланади. Гуллопуғининг узунлиги 15 см, ғовак ва момиқ. Дуккаги 1-2 бўғимли. Май-июнъ ойларида гуллаб, меваси июнъ-июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари: Ҳисор (Деҳқонобод, Оқравот, Лангар, Тошқўргон атрофлари, Шўроб ва Дарбанд оралиғидаги Оқсуроттоғ, Оқсув, Мачай дарёлари водийисида, Қизилқишлоқ ва Қизилмачит қишлоғи орасида) ва Кўҳитанг (Тўлгашсой ёқалари, Кампиртепа, Тангидевол довонида) тизмаларида тарқалган, Туркманистон (Кўҳитанг-Хўжаифил) да ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Қўйи ва ўрта тоғларнинг сийрак ўсимликлар билан қопланган тошли-шағалли, ола тусли ва гипсли ёнбағирларида ўсади.

Сони. Маълумотлар йўқ.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди. Табиатда кузатилишича, намлик кўп бўлган йиллари яхши унибчиқади.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўзига хос тупроқда ўсишга мослашган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.



Муҳофаза чоралари. Сурхон ва Ҳисор давлат қўриқхоналарида муҳофаза этилади.

Манбалар. [137, 150, 208, 310].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 70 см. Стебли светло-зелёные, полые. Листья тройчатые, длиной от 3 до 8 см, шириной 5 см. Листочки овальные, конечные дольки крупные. Цветки грязно-фиолетовые,





реже белые. Кисти рыхлые, длиной 15 см. Бобы одно-двухленистые. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Сурхандарьинской и Каракалпакской областях: Гиссарский хребет – окрестности Дехканабада, Акрабата, Лянгара и Ташкургана, горы Аксурат между Шурабом и Дербентом, долины рек Аксу, Мачайдарья, между кишлаками Кызыл-кишлак и Кызыл-Мечеть; Кугитанг – по реке Тулгашсай, Кампиртепе, перевал Танги-Дувал. За пределами Узбекистана: Туркменистан – горы Кугитанг (Ходжа-Филь).

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны, пестроцветные и гипсоносные обнажения низкогорий и среднегорий с разреженным растительным покровом.

Численность. Сведений нет.

Размножение. Семенное. Дружные всходы наблюдаются во влажные годы.

Причины изменения численности и ареала. Растения требовательны к субстрату.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском и Гиссарском государственных заповедниках.

Источники. [137, 150, 208, 310].

К. Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the south-western branches of Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the surroundings of Dekhanabad, Akrabat, Langar and Tashkurgan, the Aksurat mountains between Shurab and Derbent the valleys of Aksu and Machaidarya rivers, between the villages Kyzylkishlak and Kyzyl-Mechet; the Kughitang: along the Tulgashsay river, the Tangi-Duval passage (the Surkhandarya and Kashkadarya regions). Inhabits stony slopes, gypseous and gypsum-bearing outcrops of low and middle mountains with thinned vegetation. The quantity is unknown. Limiting factors: plants are sensitive to substrate. Measures of protection: protected in the Surkhan and Hissar state nature reserves.



59. ЛАНГАРСИМОН ЧЕЗНЕЯ

Чезнея якорцевидная / *Chesneya tribuloides* Nevski

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойнинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бакувват илдизли, ер бағирлаб ўсуви пояларининг баландлиги 30 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Барглари 2-3 жуфт юмалоқ баргчалардан ташкил топган. Гулдор поялари баргларидан калта, алоҳида гулли. Гулкосачасининг узунлиги 5 мм, майда тишчали, қўнғироқсимон. Гултожи тўқ сариқ, кейинчалик қизгиш тусга киради, дуккаги 11-12 мм. Май-август ойларида гуллаб, июнь-сентябрь ойларида мевалайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўҳитанг ва Келиф-Шеробод тизмаларида учрайди. Туркманистанда ҳам тарқалган.

Ўсиш шароити. Қизил қумли тупроқларда ўсади.

Сони. Мамлакатимизда 140 тупи қайд қилинган.

длины. Цветет в мае-августе, плодоносит в июнь-сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг и Келиф-Шерабадская гряда. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Краснопесчанники.

Численность. Зарегистрировано 140 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас и сокращение площади пестроцветов.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [159, 310].

Ф. О. Хасанов.



Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўп боқилиши ва ола тусли ер майдонларининг қисқариши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза этилади.


Манбалар. [159, 310].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетник с мощным корнем и стелющимися стеблями до 30 см выс. Листья 2-4 парные с округлыми листочками. Цветоносы короче листьев, одноцветковые. Чашечка 5 мм длины, колокольчатая с мелкими зубцами. Венчик оранжевый, позже краснеющий, 11-12 мм длины. Бобы яйцевидные, волосистые, 9-10 мм

Endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Kughitang and Kelif-Sherabad ridges (the Surkhandarya region). Inhabits red sands. 140 plants were registered. Limiting factors: pasturing and degradation of gypseous slopes. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve.



60. БОЧАНЦЕВ ЭВЕРСМАННИЯСИ

Эверсманния Бочанцева / *Eversmannia botschantzevii* Sarkisova



Мақоми 1. Жануби-гарбий Помир-Олойнинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Шохлари тукли, 60–70 см ли тиканак бута. Барглари 4–7 жуфт, баргчалари тухумсимон, учи кемтик, тукчалари зич жойлашган. Гулбандлари 7–10 см узунлиқда. Гултожи сиёҳранг, 15–17 мм. Дуккаги 3–5 см, туксиз. Май-июн ойларида гуллаб, июлда мевалайди.

Тарқалиши. Қашқадарё вилоятидаги Элликбош тоғ тизмаси (Кўргонтош қишлоғи атрофи)да учрайди.

Ўсиш шароити. Қизил қумли тупроқларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши ва ола тусли майдонларнинг қисқариши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза этилмайди.

Манбалар. [159, 264].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Колючий кустарник 60–70 см высоты с опущенными ветвями. Листья 4–7 парные, листочки яйцевидные, на верхуш-

ке выемчатые, густо опущенные. Цветоносы 7–10 см дл. Венчик фиолетовый, 15–17 мм длины. Боб 3–5 см длины, голый. Цветет в мае–июне, плодоносит в июле.

Распространение. Кашкадарьинская область: хребет Элликбош (окрестности кишлака

Курганташ).

Места обитания. Краснопесчанники.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение площади пестроцветов и выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 264].

Ф. О. Ҳасанов.

Endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Ellikbosh range: nearby the village Kurgantash (the Kashkadarya region). Inhabits red sands. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing and degradation of gypseous slopes. Measures of protection: not protected.



61. ОСИЛУВЧАН (ЭГИЛУВЧАН) ҚУЛОНҚҮЙРУҚ

Эремоспартон обвислый / Eremosparton flaccidum Litv.

Мақоми 2. Қизилқумда тарқалган камёб ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Шохлари ингичка туклар билан қопланган, баландлиги 5–6 м гача етадиган сершох бута. Барглари яхши ривожланмаган,



майда, ўткир тиғсимон-чизиқчали тангачалар шаклида. Гуллари тўқ бинафшаранг, бир-биридан муайян оралиқда жойлашган. Дуккаги икки томондан қисилган, тухумсимон, тумшуқаси қисман ўроқсимон қайрилган, калта тик тукчалар билан қопланган. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Бухоро, Навоий вилоятлари: Қизилқум – Калла, Янгиқазган ва Оқтошли қудуклари атрофларида тарқалган. Туркманистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Қум барханларида ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг йил давомида муттасил боқилиши ва қулонқүйруқдан ўтин си-

фатида фойдаланилиши ўсимликка салбий таъсир кўрсатади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Чорва молларининг боқилишини тартибга солиш ва ўсимликдан ўтин сифатида фойдаланишни тақиқлаш лозим.

Манбалар. [1, 272]

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Редкий вид Кызылкума.

Краткое описание. Кустарник высотой до 5–6 м, сильно ветвистое, с тонкими войлочно-опущенными обвислыми ветвями. Листья недоразвитые, в виде мелких, острых ланцетно-линейных чешуек. Цветы темнофиолетовые, расставленные. Бобы сжатые с боков, яйцевидные, полукруглые, со слегка серповидно изогнутым носиком, опущенные короткими отстоящими волосками. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Бухарской и Навоийской областях: Кызылкум – окрестности колодцев Келле, Янгиқазган и Ак-тасды. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. На барханных песках.

Численность. Не установлено. Встречается редко на небольших участках.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Территория усиленно используется под пастбища. На распространение вида отрицательно влияет заготовка на топливо.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Необходимо регулировать выпас и запретить заготовку на топливо.

Источники. [1, 272].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: Kelle, Jangikazgan and Aktasdy (the Bukhara and Navoi regions). Inhabits sand dunes. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



БҰҒДОЙДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО МЯТЛИКОВЫЕ (ЗЛАКОВЫЕ) – РОАСЕАЕ (GRAMINEA)

62. ОҚТОФ ЧАЛОВИ

Ковыль актавский / *Stipa aktuensis* Roshev.

Мақоми 2. Марказий Қызылқұмдаги жуда камёб әндемик үсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25–30 см га етадиган, чим ҳосил қиуловчи, кўп йиллик ўт. Барглари ингичка, юқоридагилари бироз кенгайиб, тўпгулларини ўраб олган. Тўпгулининг узунлиги 6–10 см, ингичка, кам бошоқли. Бошогининг ўзаги деярли 13,5 см узунликда, бўғим-бўғим бўлиб қайрилган, бутун юзаси майда патсимон туклар билан қопланган, туклари 4–5 мм узунлиқда. Апрель–июн ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Марказий Қызылқұмдаги пастқам қолдиқ тоғларда тарқалган (Қарақалпакистон, Навоий ва Бухоро вилоятлари).

Ўсиш шароити. Қуруқ тоғ ёнбағирларида, қояларнинг ёриқларида учрайди.

Сони. Маълумотлар йўқ.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари боқилиши туфайли қисқарган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Табиатда ва маданий шароитда бу турнинг биологиясини ўрганиш лозим. Уни назорат остига олиш учун Оқтоғ ва Томдитоғда буюртмахоналар ташкил қилиш тавсия этилади.

Манбалар. [159, 219, 316].

Х. Ф. Шомурадов.

Статус 2. Очень редкий узкий эндемик Центрального Кызылкума.

Краткое описание. Многолетнее плотно-кустовое дерновинное травянистое растение, высотой до 25–30 см. Листья узкие, верхние расширенные, обхватывающие соцветие. Соцветие длиной 6–10 см, узкое, малоколосковое. Ость зерновки длиной около 13,5 см, коленчато согнутая, по всей длине перистая, волоски пера длиной 4–5 мм. Цветёт и плодоносит в апреле–июне.

Распространение. В Каракалпакстане, Навоийской и Бухарской областях: останцовье низкородья Центрального Кызылкума.

Места обитания. Сухие щебнистые склоны, трещины скал.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Необходимо изучение биологии в

природе и культуре, организация комплексного заказника в Актау или Тамдытау.

Источники. [159, 219, 316].

Х. Ф. Шомурадов.

Very rare endemic species of the central Kyzylkum. It is spread at the central Kyzylkum (the Karakalpakistan, the Navoi and Bukhara regions). Inhabits gypseous slopes. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: it is necessary to study biology in nature and in culture, to establish the protected area in the Aktau or Tamdytau.



63. ҚОРАТОФ ЧАЛОВИ

Ковыль каратавский / *Stipa karataviensis* Roshev.

Мақоми 2. Нурота тоғи ва Шимоли-ғарбий Тянь-Шаннинг ареали қисқариб бораётган камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–30 см га етадиган зич пояли, чим ҳосил қилиб ўсуви кўп йиллик ўт. Барглари ингичка, чизиқли, четлари ичкарисига букилган, дағал тукли, юқори қисми бироз кенгайган, тўпгули ингичка, кам бошоқчали бўлиб, гирдини ўраб туради. Бошоғининг узунлиги 8–9 см, бир марта бўғим-бўғим бўлиб букилган, пастки қисми



туксиз, бўғимидан юқориси патсимон тукли, туклари 5–7 мм узунлиқда. Июнь–июль ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Навоий вилояти: Нурота тизмасининг ғарбий қисми, Қоратоғ ва Оқтоғ тизмаларида ўсади. Қозогистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва пастки қисмларида тошли, соз тупроқли ва оҳактошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кам тарқалган, кичик-кичик туплар ҳосил қиласи.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Саноат корхоналари ва бошқа иншоотлар қурилиши ҳамда чорва молларининг боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 219, 316].

Н. Ю. Бешко.

Статус 2. Эндемик Нуратинских гор и северо-западных отрогов Тянь-Шаня с сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Многолетнее, плотнокустовое, дерновинное травянистое растение, высотой до 20–30 см. Листья узколинейные, свернутые, щетиновидные, верхние расширенные, обхватывающие соцветие; последнее узкое, малоколосковое. Ость зерновки длиной 8–9 см, один раз коленчатосогнутая, в нижней части голая, выше колена перистоволосистая, волоски пера длиной 5–7 мм. Цветёт и плодоносит в июне–июле.

Распространение. Навоийская область: Хребты Нурагау (западная часть), Карагау и Актау. За пределами Узбекистана: Казахстан (Чу-Ильские горы и Сырдарьинский Карагау).

Места обитания. Каменистые, глинистые и известняковые склоны в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Сведений нет.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Разведка и добыча полезных ископаемых, перевопас.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [159, 219, 316].

Н. Ю. Бешко.

Endemic species of the Nuratau mountains and the north-western branches of the Tien-Shan with the reducing area. It is spread at the Nuratau (the western part), the Karatau and Aktau ranges (the Navoi region). Inhabits stony, clayish and lime-stony slopes. The quantity is unknown. Limiting factors: crushed stone and rubbly quarrying, mining operations, overpasturing. Measures of protection: not protected.



64. ГНЕЗДИЛЛО ЧАЛОВИ

Ковыль Гнездилло / Stipa gnezdilloi Pazij

Мақоми 1. Кўҳитанг тизмасининг камёб, петрофит ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Поялари тукланган, кўп ийллик ўт, бўйи 50–60 см. Барглари туксиз. Тилчаси 1–2 мм, киприкчали. Гултўпи 11–17 см узунлиқда. Бошоқлари деярли бир хил, 3–4 см узун-

ликдада. Сабаблари. Тарқалиш доираси тор бўлган стено-бионт ўсимлик.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат кўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [159, 219, 316].

Х. Ф. Шомурадов.



ликда. Пастки гул қобиги 11–13 мм. Бошоғи 12–13 см узунлиқда, икки бўғимли, туклари 0,2–0,3 мм. Май–июнь ойларida гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўҳитанг тизмаси. Ўзбекистондан ташқари Туркманистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта камаридаги тошли-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш

Статус 1. Редкий петрофильный эндемик Кугитанга.

Краткое описание. Многолетник с опущенными стеблями 50–60 см высоты. Листья голые. Язычок 1–2 мм длины, с ресничками. Метелка узкая 11–17 см длины. Колоски почти равные 3–4 см длины. Нижняя цветковая чешуя 11–13 мм длины, верхняя с 7 линейными волосками. Ость 12–13 см длины, двухколенчатая, волоски 0,2–0,3 мм длины. Цветет и плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Стенобионтный узколокальный эндемик.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [159, 219, 316].

Х. Ф. Шомурадов.

Endemic species of the Kughitang range. It is spread at the Kughitang range (the Surkhandarya region). Inhabits stony, rocky slopes in the middle mountainous zone. The quantity is unknown. Limiting factors: endemic stenobiotic species. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



ГИАЦИНДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ГИАЦИНТОВЫЕ (ЛИЛЕЙНЫЕ) – HYACINTHACEAE (LILIACEAE)

65. ТУРКИСТОН ДИПКАДИЙСИ

Дипкади туркестанский / *Dipcadi turkestanicum* Vved.

Мақоми 0. Жанубий Ўзбекистонга хос жуда камёб эндемик ўсимлиқ.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–20 см га етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи кулранг, юпқа қобиқли. Илдизолди барглари (2–3 та) чизиқли, новсимон, серэт. Пояси камгулли. Гулбарглари этли, ўроқсимон эгилган, ташқи томони хира кўкимтири, оқ ҳошияли, ички томони оқиш рангли. Меваси кўсакчага ўхшайди. Уруғи ингичка. Апрелда гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Шеробод водийсидаги Ховдак қолдиқ тоғида учрайди.

Ўсиш шароити. Мустаҳкам кум уюмларида ва уларнинг оралиқларидағи текисликларда ўсади.

Сони. 1975 йили ўсимлиқдан икки нусха йиғилиб, гербариј қилинган. Сўнгги 30 йил мобайнида ўсимликтинг бирорта тури ҳам топилмаган. Тур йўқолиб кетган бўлиши мумкин.

Кўпайиши. Аниқланмаган. Эҳтимол, уруғидан кўпайса керак.



Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ховдак тоғида, айниқса, баҳор мавсумида чорва моллари кўплаб боқилиши натижасида йўқолиб кетган.

Маданийлаштирилиши. 1938 йил САГУ (ҳозирги ЎзМУ) Ботаника боғида ўсимлик пиёзидан экиб ўстирилган. Кейинчалик эса у қуриб қолган, 1975 йили бу турнинг 2 дона пиёзи кавлаб олиниб, ЎзР ФА Ботаника боғида экилганида ҳам қуриб қолган.

Мухофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [156–159, 223].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 0. Редчайший узкий эндемик Южного Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 15–20 см. Луковица с серыми бумагообразными оболочками. Прикорневые листья (2–3) линейные, желобчатые, мясистые. Стебель с немногочисленными цветками. Листочки околоцветника слегка мясистые, серповидно отогнутые, снаружи грязновато-зелёные, белоокаймленные, внутри беловатые. Плод – коробочка. Семена узко-крылье. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Сурхандарьинская область: Шерабадская долина – останцовье горы Хаудактау.

Места обитания. Закреплённые барханные пески, котловины выдувания.

Численность. В 1975 году собрано лишь 2 экземпляра. В последние 30 лет ни одного растения не найдено, несмотря на неоднократные поиски. Вид видимо исчез.

Размножение. Не установлено: вероятно сеянное.

Причины изменения численности и ареала. Район Хаудактау интенсивно используется под весенний выпас.


Культивирование. В 1938 году был выращен в Ботаническом саду САГУ (НУУЗ) из луковиц, затем высох. Две луковицы, собранные в 1975 году, после высадки в Ботаническом саду АН РУз погибли.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [156–159, 223].

Ф. О. Ҳасанов.

Very rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the Sherabad valley: the Khaudaktau remnant mountains (the Surkhandarya region). Inhabits fixed sand hills, kettles of blowing. In 1975, only 2 specimens were collected. During last 30 years collecting missions, none plant was found. Species probably disappeared. Limiting factors: the Khaudaktau region is intensively pastured during spring time. Measures of protection: not protected.



ФОВЗАБОНДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО БУРАЧНИКОВЫЕ – BORAGINACEAE

66. МАЙДА МОВИЙГУЛ

Lipupula parvula Nabiev et Zakirov

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг шимолида тар-қалган, ареали қисқариб бораётган эндемик ўсимлиқ.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–15 см, пояси оддий ёки бироз шохланган бир йиллик ўт. Барглари учли наштарсимон ёки чўзиқроқ нишли, дағал туклар билан қопланган, асосан, поясининг пастки қисмида жойлашган. Тўпгули сийрак мевали, 2–3 см узунлиқда, мева банди узунроқ (пасткилари 1,5 см гача боради), асосан, пастга қайрилган. Косачаси 1–2 мм узунлиқда. Тожбарги кўк, 2–3 мм узунлиқда, эгилган қисми нозик қўнғироқсимон. Меваси пирамида шаклидаги 2,5–3 мм ли ёнғоқчалардан иборат. Ёнғоқчаларидан 1 мм кўтарилиб турувчи устунчалари бор. Апрелда гуллаб, май ойида мевалайди

Тарқалиши. Корақалпакистондаги Султон Увайс тоғида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларида, кумлоқ тупроқларда ўсади.

Сони. Жуда камёб, кичик-кичик тўплари онда-сонда учрайди.

Кўпайиши. Ургидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг муттасил боқилиши ўсимлик кўпайишига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [24, 201. 209, 246].

О. К. Ҳожиматов.

Статус 2. Эндемик Северного Узбекистана сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Однолетнее растение с простым или слабоветвистым стеблем, высотой до 10–15 см. Ланцетные или продолговато-ланцетные волосисто-щетинистые листья сосредоточены в основном в нижней части стебля. Плодущие завитки рыхлоплодные, длиной 2–3 см, плодоножки удлинённые (нижние достигают 1,5 см), отклонённые, часто дуговато вниз отогнутые. Чашечка длиной 1–2 мм. Венчик синий, длиной 2–3 мм, с узким колокольчатым отгибом. Плоды – орешки пирамидальные, длиной 2,5–3 мм, яйцевидно-продолговатые, с продолговатым диском. Столбик поднимается на 1 мм над верхушками орешков. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Каракалпакстан: горы Султан-Увайс.

Места обитания. Супесчаные почвы в предгорьях останцовских гор.

Численность. Очень редок, встречается спорадически небольшими популяциями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивный выпас скота.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [24, 201. 209, 246].

О. К. Ҳожиматов.

Endemic species of the northern Uzbekistan with the reducing area. It is spread at the Sultan-Uizdag mountains (Karakalpakstan). Inhabits sandy loam in foothills of remnant mountains. Very rare, sporadically small populations can be found. Limiting factors: intensive pasturing. Measures of protection: not protected.



67. НУРОТА МОВИЙГУЛИ

Липучка нуратинская / *Lappula nurativica* Nabiev et Zakirov

Мақоми 2. Нурота тоғида учрайдиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тасвиғи. Бўйи 30–40 см, бир йиллик ўт. Илдизолди барглари кўп ва қалин, кенг наштарсимон, узунлиги 3–6 см, эни 3–5 мм, чизиқли поясининг узунлиги 1,5 см, кулранг тукли. Мевалайтган гажак тўпгули 10–15 см узунлиқда, рўваксимон зич жойлашган. Мева банди тўғри ёки бироз орқага қайрилган, 2–3 мм узунлиқда. Мевалардаги тўмтоқ косача бўлаклари мева асосига ёпишган. Гултожи ҳаворанг. Ёнгоқчаси тез тўкилувчан, чўзиқроқ, гардишида майда тиканли бўртмачалари бор. Устунчаси пишиб етилган ёнгоқчалар орасида бутунлай кўринмайди. Июнь–июль ойларида гуллайди ва мевалайди.



Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмида тошли-шағалли ёнбағирларда ва қояларда ўсади.

Сони. Жуда кам микдордаги тўплари бирбиридан узоқ бўлган кичик майдонларни эгаллади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг муттасил боқилиши ўсимлик кўпайишига салбий таъсир кўрсатади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.
Мухофаза чоралари. Нурота давлат қўриқ-хонасида ўсади.

Манбалар. [24, 201. 209, 246].

Н. Ю. Бешко.

Статус 2. Узкий эндемик хребта Нуратау.

Краткое описание. Однолетнее растение, высотой 30–40 см. Листья прикорневые в густой розетке, широколанцетные, длиной 3–6 см, шириной 3–5 мм, стеблевые линейные, длиной 1,5 см, сероволосистые. Плодущие завитки длиной 10–15 см, густые, метельчато расположенные. Плодоножка длиной 2–3 мм, прямая или слегка отогнутая. Доли чашечки на плодах прижаты к основанию плода, тупые, венчик голубой. Орешки быстро опадающие, продолговатые. Диск усеян мелкими шиповатыми бугорками. Столбик скрыт между свободными верхушками орешков. Цветёт и плодоносит в июне–июле.

Распространение. Хребет Нуратау (Джизакская, Самаркандинская и Навоийская области).

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны и скалы в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Встречается редко, спорадически, единичными экземплярами или небольшими группами по несколько растений. Локальные популяции занимают очень малую площадь и удалены друг от друга.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивный выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [24, 201. 209, 246].

Н. Ю. Бешко.

Endemic species of the Nuratau range. It is spread at the Nuratau range (the Djizakh, the Samarkand and Navoi regions). Inhabits stony-slopes and rocks in the lower and middle belts of mountains. Single specimens or small populations occur sporadically. Limiting factors: intensive pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



68. ОҚТОФ МОВИЙГУЛИ

Липучка актуаская / *Lappula aktaviensis* Popov et Zakirov

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Қызылқұмдаги қолдиқ тоғларда үсадиган эндемик үсімлік.

Қисқача тавсифи. Бүйі 30 см, тик ўсуви, поясининг юқори қисми рўваксимон шохланган икки йиллик ўт. Илдизолди барглари кенг кураксимон, уруғлаш вақтида қуриб қолади. Поядаги барглари кенг чизиқли, пояси каби кулранг дағал туклар билан қопланган. Мевалаёттан гажак тўпгули зич рўваксимон, 3–5 см узунлиқда, мева банди ва косачаси кулранг. Гули ҳаворанг, қайрилма қисми ясси. Ёнгоқчasi чўзиқ, 2,5–3 мм узунлиқда, усти майдада тиканли бўртмалар билан қопланган. Устунчалик деярли кўринмайди. Гинофори (уруғдони) очиқ ҳолда кўриниб туради. Апрель ва май ойларida гуллаб мева беради.

Тарқалиши. Навоий вилояти: Жануби-ғарбий Қызылқұмдаги Оқтоғ ва Бўкантоғ қолдиқ тоғларida учрайди.

Ўсиш шароити. Тошли-шағалли ёнбағирлардаги қоятошлар орасида ва ола тусли асосий тупроқларда үсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг муттасил боқилиши ўсимлик сонининг кўпайишига салбий таъсир кўрсатади.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [24, 201, 209, 246].

О. Қ. Ҳожиматов.

Статус 1. Узколокальный эндемик останцовьых гор Кызылқума.

Краткое описание. Двулетнее растение с прямостоячим, вверху метельчатоветвистым стеблем, высотой до 30 см. Прикорневые листья широколопатчатые, к плодоношению засыхающие, стеблевые широколинейные, серые, как и стебель, от щетинистого опушения. Плодущие завитки метельчатые, густые, длиной 3–5 см, плодоножка и чашечка серопушистые. Венчик голубой с плоским отгибом. Орешки длиной 2,5–3 мм, продолговатые, усеяны мелкими шиповатыми бугорками. Столбик еле заметен, генофор открытый. Цветёт и плодоносит в апреле-мае.

Распространение. Навоийская область: Кызылкум – останцовые горы Актау и Букантау.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны, скалистые и пестроцветные выходы коренных пород.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивный выпас.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [24, 201, 209, 246].

О. Қ. Ҳожиматов.

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the low mountains Aktau and Bukantau (the Navoi region). Inhabits stony slopes, gypseous outcrops of bed-rocks. The quantity is unknown. Limiting factors: intensive pasturing. Measures of protection: not protected.



69. ЙИРИК ҲАЛҚАГУЛЛИ ТАНГАБАРГ

Риндера крупносводковая / Rindera fornicate Pazij

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шаннинг ўта камёб эндемик тури.

Қисқача тавсифи. Бўйи 60 см, поясининг юқори қисми тарвағайлаб шохланган кўп йиллик ўт. Поядаги барглари бандсиз, 4–9 мм узунликда, четлари ва уч қисми сийрак кипприксимон тукли. Тўпгули ғовак-рўваксимон, гулли шохчалари қисқа, юқори қисмидаги зич гажак гули сертук, гулбанди 5–7 мм узунликда. Косачаси чалкаш тукли, қиррали пирпираклари тожнайчасидан калта. Гули сарғиши-ҳаворанг, 13–16 мм узунликда, най-часи сарғиши 7–10 мм узунликда, тож бўлаклари тўғри, чўзиқ чизиқли. Устунчаси узун, сершоҳ. Ён қирралари майдада тишли, учидаги лангарсимон тиканчалари бор. Май–июн ойларида гуллайди ва мевалайди.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол тизмасида Сўқоқ дарёси водийсида (Мисконсой); Қурама тизмасида Тўқмоқ довони, Абжаз сойининг юқори қисмидаги; Уғом тизмасида, Майдонтол дарёси ҳавзасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги қоятош ёриқларида ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг муттасил боқилиши ўсимликнинг кўпайишига салбий таъсир этган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Ўсимлик ўсаётган жойлар Уғом-Чотқол миллий табиат боғи худудида қўриқланади.

Манбалар. [175, 211].

О. К. Ҳожиматов.



Статус 2. Узколокальный эндемик Западного Тянь-Шана.

Краткое описание. Многолетнее, в верхней части растопыренно-ветвящееся растение, высотой 60 см. Стеблевые листья сидячие, длиной 4–9 мм, по краю и на вершине рыхлореснитчатые. Соцветие рыхлометельчатое. Цветущие ветви короткие, в верхней части с густыми завитками, паутинистоопущенные. Цветоножка длиной 5–7 мм. Чашечка паутинистовойлочная, с ланцетными лопастями, короче трубки венчика. Венчик желтовато-голубоватый, длиной 13–16 мм с желтоватой трубкой длиной 7–10 мм, лопасти венчика прямые, продолговато-линейные. Столбик длинноветвящийся. Орешки яйцевидные: диск голый, гладкий; крыло по краю мелкозубчатое с якорными шипиками на зубчиках. Цветёт и плодоносит в мае-июне.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский хребет – долина реки Сукок (Мискансай); Кураминский хребет – перевал Токмак, верховья реки Абжассай; Угамский хребет – выше устья реки Майдантал.

Места обитания. Расщелины скал в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Часть популяций произрастает на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [175, 211].

О. К. Ҳожиматов.

Endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal range: the Sukok river valley (Miskansay); the Kurama range: the Tokmak passage, Abdzhassay, the Ugam Range: Maidantal (the Tashkent region). Inhabits clefts of rocks in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: some populations protected in the Ugam-Chatkal national park.



70. БУХОРО ГИЧМОЛАСИ

Гелиотроп бухарский / *Heliotropium bucharicum* B. Fedtsch.

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойга хос, сони қисқариб бораётган, эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–50 см, бир йиллик ўсимлик. Пояси тик, қалин оқ тукли. Барглари бандсиз ёки қисқа бандли, юмaloқ-тухумсимон, узунлиги ва эни 3–5 см атрофида, оқ момиқ тукли, асоси юмaloқ ёки юраксимон. Гажак тўпгули бир томонга қайрилган, гуллари жуфт ёки 3–4 тадан иборат, икки уяли, 2–6 см узунликда, мевалаганда яна ҳам узаяди, оқ қалин туклар билан қопланган. Гулкосачаси қалин тукли, узунлиги 3 мм атрофида, косача бўлаклари тўмтоқ. Гули сарик. Устунчалик қисқа ва туксиз. Тумшуқчалик конус-бигизсимон, устунчадан 2–3 марта узун. Ёнгоқчалик силлиқ, туксиз, чўзиқ, 1–5 мм узунлиқда. Май-июнда гуллаб, июль-августда мевалайди.

и почти такой же ширины, белошерстистые, при основании округлые или сердцевидные. Завитки односторонние, парные или по 3–4, густые, двугнёздые, длиной 2–6 см, при плодах удлиннёные, белошерстистые. Чашечка войлочная, длиной около 3 мм, с тупыми линейными долями. Венчик жёлтый. Столбик голый, короткий. Рыльце конически-шиловидное, в 2–3 раза длиннее столбика. Орешки гладкие, голые, продолговатые, длиной 1–5 мм длины. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: юго-западные отроги Гиссарского хребта.

Места обитания. Коренные породы, пестроцветы и гипсоносные почвы.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение площади гипсоносных толщ и выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [265, 310].

О. К. Хожиматов.



Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилюятлари: Ҳисор тоғларининг жануби-ғарбий қисмида тарқалган.

Ўсиш шароити. Туб жинсли, ола тусли ҳамда гипсли тупроқларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Асосан туб жинсли ва ола тусли тупроқ қатламларидагина ўсиши бу ўсимлик турининг тарқалишини чеклайди.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза йўллари ишлаб чиқилмаган.


Манбалар. [265, 310].

О. К. Хожиматов.

Статус 1. Сокращающийся эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Однолетнее растение высотой 20–50 см. Стебель прямостоячий, густо-белошерстистый. Листья сидячие или короткочешковые, округло-яйцевидные, длиной 3–5 см

Endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range (the Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits bed-rocks, gypseous and gypsum-bearing soils. The quantity is unknown. Limiting factors: degradation of gypseous slopes and pasturing. Measures of protection: not protected.



71. ЙИРИК ИЛДИЗЛИ МЕҲРИГИЁХ

Оносма крупнокорневая / Onosma macrorhiza Popov

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Илдизи кўп бошчали. Серпоя, баландлиги 30–50 см. Дағал туклари оқиш. Барглари қиррали, узунлиги 2–4 см, эни 5–10 мм, учи ўткирроқ, барқутсимон. Тўпгули чўзиқроқ гажакли. Косачаси оқиш дағал тукли, узунлиги 7–10 мм. Гултожи сариқ, узунлиги 10–12 мм, кейинроқ қизил, қора-қўкиш тусга киради. Ёнгоқчаси қорамтири-кулранг, товланувчи, тумшуқчали.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг жануби-гарбий тармоқларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Қизғиши кумлоқларда, қумтошларда ўсади.

Сони. Шўроб қишлоғи атрофида 2000 тупи борлиги аниқланган.

Қўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик ўсиб турган ерларнинг ўзлаштирилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийластирилиши. Ўсимликни ўстириш бўйича олиб борилган ишлар натижасиз тугаган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [265, 310].

О. К. Ҳожиматов.

Статус 1. Редкий эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Корень многоглавый. Стебли многочисленные 30–50 см высоты, беловатые от щетинистого опушения. Листья ланцетно-лопатчатые 2–4 см длины, 5–10 мм ширины, островатые, бархатистые. Соцветие – удлиняющийся завиток. Чашечка бело щетинистая 7–10 мм длины. Венчик 10–12 мм длины, желтый (позже краснеющий и черно-синеющий). Орешки 3 мм длины, темно-серые, блестящие с носиком. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: юго-западные отроги Гиссарского хребта.

Места обитания. Краснопесчанники.

Численность. 2000 растений в окрестностях кишлака Шуроб.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Разрушение естественных местообитаний.

Культивирование. Многочисленные попытки культивирования не увенчались успехом.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [265, 310].

О. К. Ҳожиматов.



Rare endemic species of Uzbekistan. It is spread at the south-western Hissar range (the Surkhandarya regions). Inhabits gypseous slopes. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.



72. БОШМАЛДОҚСИМОН НОНЕЯ

Нонея башмачковидная / *Nonea calceolaris* Nikif. & Pazij

Мақоми 1. Ўзбекистон учун камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик ўтсимон ўсимлик, хурпайган қалин безчали ва узун, дағал, сийрак тукли, баландлиги 30 см. Поялари бир нечта, асосидан шохланган. Барглари бутун ёки билин-билинмас тишчали, қиррали-нишли, кенг ва тор қиррали, учи ўткір, узунлиги 2,5–4,5 см, эни 5–10 мм. Мева тугувчи гажаги 10–14 см узунлика, зич жойлашган, ғовакроқ. Мевабанди 1–2 мм узунлиқда. Косачаси гуллаганда құнғироқсимон шаклга киради, узунлиги 7–8 мм, гултожи найчасидан деярли 2 баробар узун ва қиррадор ўткір тишчалари бор. Гултожи сарғыш, узунлиги 7–8 мм, найчасининг узунлиги 4 мм. Мева-ёнғоқчаси 3–4 мм узунлиқда, текис жойлашган, тукли, ён томонлари тиришган. Март–апрель ойларида гуллаб, меваси апрель–май ойларида етилади.

Тарқалиши. Мирзачұл ва Ҳисор тиэмаси (Жоилма)да тарқалған (Сирдарә ва Сурхондарә вилоятлари).

Үсиш шароити. Соз тупроқли чүлларда ва адирларда үсгандығы аниқланған.

Сони. Узоқ давом этган қидируг ишлари на-тижасиз тугаган. Бу тур бутунлай ійүқолған бўлса керак.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайған бўлиши мумкин.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ерларнинг хўжалик мақсадида ўзлаштирилиши, хўжалик фаолияти оқибатида сони кескин қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 209].

О. Қ. Ҳожиматов.

Статус 1. Редкий эндемик Узбекистана.

Краткое описание. Однолетнее растение с густо оттопырено коротко-железисто волосистыми, с рассеянными длинными щетинками, высотой до 30 см. Стеблей несколько, простертых, восходящих от основания. Листья цельноокрайние или неясно зубчатые; лопатчато-ланцетные, широко- или узколанцетные, острые, 2,5–4,5 см длины, 5–10 мм ширины. Плодущие завитки 10–14 см длины, густые и рыхловатые. Плодоножки 1–2 мм длины. Чашечка при цветах колокольчатая, 7–8 мм длины, почти в 2 раза длиннее трубки венчика с ланцетными длинно заостренными зубцами. Венчик желтоватый, 7–8 мм длины, с трубкой 4 мм длины. Плод-орешек 3–4 мм длины, почти горизонтальный, пушистый по бокам грубо морщинистый. Цветёт в марте–апреле, плодоносит в апреле–мае.

Распространение. В Сырдарьинской и Сурхандарьинской областях: Мирзачуль и Гиссарский хребет (Джаильма).

Места обитания. Глинистые пустыни и предгорья.

Численность. В ходе многочисленных поисков не обнаружен. Вид вероятно исчез.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственная деятельность человека, распахивание земель.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [159, 209].

О. Қ. Ҳожиматов.

Rare endemic species of Uzbekistan. It is spread at the Syrdarya and Surkhandarya regions. Inhabits argillaceous deserts and foothills. The quantity is unknown. Limiting factors: economic human activities. Measures of protection: not protected.



ГУЛСАФСАРДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО ИРИСОВЫЕ - IRIDACEAE

73. ИТАЛИЯ ГЛАДИОЛУСИ Шпажник посевной / *Gladiolus italicus* Mill.

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойга хос камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Барглари қиличсимон, узунлиги 18–20 см, ўткир учли, кам томирли. Тўпгули бошоқсимон, 6–8 гулли (баъзан 10 тагача). Гулолди барглари наштарсимон, гуллари тик, гулқўрғони пушти рангли. Меваси юмалоқ-тухумсимон қўсак шаклида, узунлиги 1 см гача. Тугунак пиёзчиши тухумсимон, қўнгир рангли қобиқ билан ўралган. Июнь ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилояти: Ҳисор, Бойсунтоғ ва Кўҳитанг тизмаларида тарқалган. Тожикистон, Туркманистон ва Афғонистонда, шунингдек, Ўрта Ер денгизи мамлакатларида ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Булоқлар атрофида, соз ва юмшоқ тупроқли ёнбагирларда ва тоғ дарёлари бўйларида яйловлар ҳамда бутазорларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ёки тўп-тўп бўлиб ўсади.

Кўпайиши. Ургидан кўпаяди.



Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари гулдасталар учун териб олиниши ва ёш ниҳолларининг оёқости қилиниши туфайли камайиб бормоқда.



Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилмоқда.

Мұхофаза чоралари. Сурхон ва Китоб давлат қўриқхоналарида мұхофаза этилади.

Манбалар. [156–159, 335].

О. Т. Тургинов.

Статус 3. Редкий вид Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 80 см. Листья мечевидные, длиной 18–20 см, остроконечные, с немногими жилками. Соцветие колосовидное, с 6–8, реже до 10 цветками. Прицветные листья ланцетные, цветки прямостоячие, околов цветник розовый. Плод – шаровидно-яйцевидная коробочка длиной до 1 см. Клубнелуковички яйцевидные, с коричневыми обертками. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский хребет, Байсунские горы, Кугитанг. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Средиземноморье.

Места обитания. Лёссовые и мелкоземистые склоны, ближе к родникам, среди зарослей кустарников, в долинах горных рек.

Численность. Встречается спорадически единичными особями и группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Собираются на букеты, всходы вытаптываются скотом в ювенильной стадии.


Культивирование. Культивировался в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском и Китабском государственных заповедниках.

Источники. [156–159, 335].

О. Т. Тургинов.

Rare species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar, the Baysun, the Kughitang ranges (the Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits loess and soft slopes, near springs, among shrub woods, in valleys of mountain rivers. Single specimens and groups sporadically can be found. Limiting factors: picking of flowers, seedlings are trampled down at juvenile stage. Measures of protection: protected in the Surkhan and Kitab state reserves.



74. ВИНКЛЕР ГУЛСАФСАРИ

Ирис Винклера / *Iris winkleri* Regel

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шанга хос жуда камёб, ареали бўлинган тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20 см гача етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзининг қобиғи қора, қоғозсимон. Илдизолди барглари 4 та, чизиқли, эни 1–2 мм, ўроқсимон эгилган. Гули якка, гулқўргони баргларининг узунлиги 4 см атрофифа, бинафша рангли. Апрель–май ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Чотқол ва Курама тизмалари – Ангрен дарёсининг юқори оқимида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмидағи майсазорларда ўсади.

Сони. 15 та жойда ўсиши аниқланган. Умумий сони ҳақида маълумотлар йўқ.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу турнинг камёблиги сабаби, унинг муайян тупроқ ва иқлим шароитига мослашганлигига бўлса керак.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Махсус мухофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Ареали ва сонини аниқлаш лозим.

Манбалар. [159, 170].

И. Г. Левичев

Статус 2. Очень редкий вид Западного Тянь-Шаня с дизъюнктивным ареалом.

Краткое описание.

Многолетнее луковичное растение высотой до 20 см. Кроющие чешуи луковицы чёрные, бумагообразные. Прикорневые листья в количестве 4, узко-линейные, шириной 1–2 мм, серповидные. Цветок одиночный, листочки околоцветника длиной 4 см, фиолетовые. Цветёт и плодоносит в апреле–мае.

Распространение. В Ташкентской и Наманганской областях: Чаткальский и Кураминский хребты – верховья реки Ангрен.

Места обитания. Альпийские лужайки.

Численность. Известно 15 местонахождений. Общая численность не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к специфическим местообитаниям.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 170].

И. Г. Левичев

Very rare species of the western Tien-Shan with the reducing area. It is spread at the Chatkal and Kurama ranges: the upper part of the Akhangaran river basin (the Tashkent and Namangan regions). Inhabits alpine slopes. Known from several locations. Total number is unknown. Limiting factors: stenobiont ecology. Measures of protection: not protected.



75. АНТИҚА ГУЛСАФСАР

Ирис великолепный / *Iris magnifica* (Vved.) F.O. Khass. & Rakhimova

Мақоми 2. Зарафшон тизмасида ўсувчи жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25–40 см га етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Илдизи йўғон, урчуқсимон, пиёзи яхши ривожланган. Пояси йўғон, барглари бир-биридан муайян оралиқда жойлашган, ўроқсимон, оч яшил рангли, ялтироқ, пастки қисмидаги баргларининг эни 3,5–5 см. Гуллари 3–7 та. Гулқўргон найининг узунлиги 4,5–5 см, яшил-бинафша рангли, ички гулқўргони баргчалари оч бинафша рангли, узунлиги 22–27 мм. Чангдонлари оқишиб. Уруғи йирик, ғадир-будур, ялтироқ. Апрель–май ойлари гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмасининг ғарбий қисми ва Омонқўтон довонида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмидаги майда тупроқли ерларда ва қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Кичик-кичик туплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари ва пиёзларининг йиғиб олиниши сабабли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилмоқда. Маданий шароитда гуллаб, уруғ бермоқда.

Муҳофаза чоралари. Ўсимлик ўсадиган айрим худудлар Китоб давлат қўриқхонаси томонидан

муҳофазага олинган. Омонқўтон довони худудида ўсимлик муҳофазасини ташкил қилиш ва популяция мониторингини юритиш лозим.

Манбалар. [53, 59, 283, 366].

Н. К. Рахимова.

Статус 2. Чрезвычайно редкий эндемик Зарафшанского хребта.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 25–40 см. Корни сильно утолщённые, веретеновидные, луковица хорошо развита. Стебель мощный с расставленными листьями и хорошо заметными междуузиями. Листья светло-зелёные, блестящие, серповидные, нижние шириной 3,5–5 см. Цветки в количестве 3–7. Трубка околоцветника длиной 4,5–5 см, светло-сиреневые; внутренние листочки околоцветника бледно-сиреневые, длиной 22–27 мм, пыльники беловатые. Семена крупные, морщинистые, блестящие. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Самаркандской и Кашкадарьинской областях: западная часть Зарафшанского хребта, перевал Аманкутан.

Места обитания. Мелкоземистые площадки и трещины скал в нижнем поясе гор.

Численность. Встречается небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветов на букеты и выкапывание луковиц.

Культивирование. Успешно интродуцируется. В Ботаническом саду АН РУз цветёт и плодоносит.

Меры охраны. Часть популяций охраняется в Китабском государственном заповеднике. Необходима организация охраны растений и мониторинг популяций в районе перевала Аманкутан.

Источники. [53, 59, 283, 366].

Н. К. Рахимова.

Extremely rare endemic species of the Zaravshan range. It is spread at the western part of the Zaravshan ridge, Amankutan passage (the Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits clefts of rocks. The quantity is unknown. Limiting factors: picking of flowers and digging out of bulbs. Measures of protection: some populations protected in the Kitab state nature reserve. The preservation and monitoring of populations at the Amankutan passage is required.



76. ОРХИДЕЯНАМО ГУЛСАФСАР

Ирис орхидный / *Iris orchioides* Carrière

Мақоми 3. Фарбий Тянь-Шаннинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Илдизи урчуксимон шаклда бироз йўғонлашиб кетган кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи 1,5–2,5 см қалинликда. Пояси 15–25 см узунлиқда, бир-биридан муайян оралиқда жойлашган барглари оч яшил тусда, ўроқсимон, чети оқ ҳошияли, бироз дағалроқ. Гуллари (1) 3–5 та, оч сариқ тусда, гуллаш даври ниҳоясида бинафшаранг тус олади. Ташқи гулбаргчалари 3,5–4,5 см, оч-сариқ, Ички гулбаргчалари 1–1,5 см, япроқлари учли. Апрель ойида гуллаб мева беради.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Курама (Оҳангарон дарёси ҳавзаси), Чотқол (Одамтош, Сўқоқ, Чотқол биосфера қўриқхонаси, Чимён), Коржонтов (Оқтош), Писком (Ойгайнинг, Майдонтол ҳавзасида учрайди) тизмаларида тарқалган. Ўзбекистондан ташқарида: Қозогистон (Сариоғоч, Жилға, Дарбоза, Сирдарё Қоратоғи) ва Тожикистонда (Мўғултоғ) тарқалган.

Ўсиш шароити. Адир ва тоғ минтақаларининг тошли-шағалли ёнбағирликларида ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғи ва бошқа мамлакатларнинг ботаника боғларида ўстириб келинмоқда.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида ва Уғом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [53, 59, 283, 366]

Н. К. Раҳимова.

Статус 3. Редкое, эндемичное растение Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Клубнелуковица 1,5–2,5 см толщины. Стебель 15–25 см высоты. Листья светло-зеленые, серповидные, по краю окаймленные, более-менее шероховатые. Цветки в количестве (1) 3–5, бледно-желтые, по отцветании приобретают фиолетовый оттенок. Наружные листочки околоцветника 3,5–4,5 см длины. Внутренние листочки околоцветника 1–1,5 см длины, с острой пластинкой. Цветет и плодоносит в апреле.

Распространение. Ташкентская область: Кураминский (бассейн реки Ахангаран), Чаткальский (Адамташ, Сукок, Чаткальский биосферный заповедник, Чимган), Каржантау (Акташ), Пскемский (Ойгайнинг, Майдантал) хребты. За пределами Узбекистана: Таджикистан (Моголтау), Казахстан (Сары-Агач, Джилга, Дарбаза, Сырдаринский Карагату).

Места обитания. Мелкоземные и каменистые склоны в предгорьях, нижнем и среднем поясах гор.

Численность. Не установлена

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование.

Успешно выращивается в Ботаническом саду АН РУз, а также в ботанических садах других стран.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского биосферного заповедника и Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [53, 59, 283, 366]

Н. К. Раҳимова.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Kurama (the Akhangaran valley), the Chatkal (the Adamtash, the Sukok, the Chimgan, the Chatkal reserve), the Karzhantau (Aktash), the Pskem (Oygaing, Maydantal) ranges. Inhabits stony and fine slopes in the low and middle mountainous zone. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park.



77. ИППОЛИТ ГУЛСАФСАРИ

Ирис Ипполита / Iris hippolyti (Vved.) Kamelin

Мақоми 1. Қызылкүм қолдик тоғларининг эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Тугунак пиёзи 1,5 см йўғонлиқда. Поясининг баландлиги 10 см. Барглари ўроқсимон, эни 1–1,5 см, силлик, четлари оқ ҳошияли, ўткир учли. Гуллари биттадан, оч бинафшаранг тусда. Ташқи гулбарглари 2 см узунлиқда, ичкилари 15 мм узунлиқда, ромб шаклида, учи қиррали. Март–апрель ойларида гуллаб, меваси апрель–майда пишади.

Тарқалиши. Навоий вилояти: Кўкчатоғ.

Ўсиш шароити. Сув ҳавзаларини иккига ажратувчи қоятошли жойларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан ва тугунак пиёzlаридан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза этилмайди.

Манбалар. [53, 59, 283, 366].

Х. Ф. Шомурадов.

Статус 1. Узколокальный эндемик низкогорий Кызылкума.

Краткое описание. Клубнелуковица 1,5 см ширины. Стебель 10 см высоты. Листья серповидные, 1–1,5 см ширины, гладкие, по краю бело окаймленные, острые. Цветки бледно-фиолетовые, по одному. Внешние листочки околоцветника около 2 см длины, внутренние 15 мм длины, ромбовидные, островатые. Цветет в марте–апреле, плодоносит в апреле–мае.

Распространение. Навоийская область: Кокчатау.

Места обитания. Скалы в приводораздельной части.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение естественных местообитаний и выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [53, 59, 283, 366]

Х. Ф. Шомурадов.

Extremely rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Navoi region: the Kokchatau relic mountain. Inhabits clefts of rocks. The quantity is unknown. Limiting factors: picking of flowers an digging out of bulbs. Measures of protection: not protected.



78. СВЕТЛАНА ГУЛСАФСАРИ

Ирис Светланы / Iris svetlanae (Vved.) F.O. Khass.

Мақоми 2. Фарбий Помир-Олайдаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Қулранг қопламали тугунак пиёзининг эни 2–2,5 см. Поясининг баландлиги 10–15 см. Барглари ўроқсимон, эни 3–4 см, силлиқ, четлари (атрофи) оқ ҳошияли, учи ўткир. Гуллари 1–2 та, сариқ тусли. Ташқи гулкўргон бўлаклари 12–16 см узунлиқда, ромб шаклида, учи ўткирроқ. Апрель ойида гуллаб, май ойида мева тугади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ҳисор тизмасининг ғарбий қисми – Қашқадарё ҳавзаси (Қизилча, Кўргонтош, Торқопчиғай қишлоқлари атрофи)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Қизил қумтошли тупроқларда ўсади.

Распространение. Кашкадаръинская область: западные отроги Гиссарского хребта – бассейн реки Кашкадарья (окрестности кишлаков Тойча, Кызылча, Курганташ, Таркапчигай).

Места обитания. Краснопесчаники.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение естественных местообитаний и выпас скота.

Культивирование. Успешно культивировался в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [53, 59, 159, 283, 366].

Н. К. Раҳимова.



Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиий ўсиб турган жойларининг қисқариши ва чорва боқилиши туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФАНИНГ Тошкентдаги ботаника боғида ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.


Манбалар. [53, 59, 159, 283, 366].

Н. К. Раҳимова.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Клубнелуковица 2–2,5 см ширины с серыми чешуями. Стебель 10–15 см высоты. Листья серповидные, 3–4 см ширины, гладкие, по краю белоокаймленные, острые. Цветки желтые 1–2. Внешние листочки околоцветника 4–5 см длины, внутренние 12–16 мм длины, ромбовидные, островатые. Цветет в апреле, плодоносит в мае.

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Kashkadarya region: the western branches of the Hissar range, nearby the villages Tarkapchigay, Kurgantash, Toycha and Kyzylcha. Inhabits red sands. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.



79. ВИКТОР ГУЛСАФСАРИ

Ирис Виктора / Iris victoris E.O. Khass. et al.

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойга хос камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Дағал ва күлранг пүстлоқли тугунак пиёзининг эни 2–2,5 см. Поясининг баландлиги 10–15 см. Барглари ўроқсимон, эни 3–4 см, силлик, гирди (атрофи) оқ ҳошияли, учи ўткір. Гуллари 1–2 та, сарық тусли. Ташқи гулкүрғон япроқлари 4–5 см, ички гулкүрғон япроқлари эса 12–16 мм узунликда, илгаксимон. Февраль–март ойларида гуллаб, меваси апрелда пишади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхи-тангда (Келиф-Шеробод тизмаси, Оқтош қишлоғи) тарқалган.

Ўсиш шароити. Бўз тупроқларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиий ўсиб турган жойларининг қисқариши ва чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Мухофаза қилинмайди.

Манбалар. [366].


Н. К. Раҳимова.

Статус 1. Редкий эндемик Южного Памира-Алая.

Краткое описание. Клубнелуковица 2–2,5 см ширины с серыми чешуями. Стебель 10–15 см высоты. Листья серповидные, 3–4 см ширины, гладкие, по краю бело-окаймленные, острые. Цветки

желтые 1–2. Внешние листочки околоцветника 4–5 см длины, внутренние 12–16 мм длины, булавовидные. Цветет в феврале–марте, плодоносит в апреле.

Распространение. Сурхандарьинская область: Келиф-Шерабадская гряда (пос. Акташ).



Места обитания. Серые глины.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение естественных местообитаний и выпас скота.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [3, 366].

Н. К. Раҳимова.

Extremely rare endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Surkhandarya region: the Kelif-Sherabad range (near Aktash). Inhabits grey clays. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.



**ЗИРАДОШЛАР (СОЯБОНГУЛДОШЛАР) ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО
СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ (ЗОНТИЧНЫЕ) – АРИАСЕАЕ (UMBELLIFERAЕ)**

80. МАЙДА МЕВАЛИ ДОРЕМА

Дорема мелкоплодная / Dorema microcarpum Korovin

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шань ва Шимолий Помир-Олойда ўсуви ўта камёб эндемик ўсимлиқ.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1-2 м гача етадиган кўп йиллик ўт. Барглари кулранг тусда бўлиб, қиррали бутун ҳамда ярмигача кесилган кичик бўлакчаларга тўрт карра патсимон шаклда бўлинган. Баргининг ҳар икки томони калта-калта тукчалар билан қопланган. Соябончалари қисқа шохчаларда биттадан ёки иккитадан бўлиб, кетма-кет ўрнашган. Соябончаларидаги гуллари 10 тадан. Меваси майда-майдада, узунлиги 6-7 мм. Май ойида гуллаб, июнда мева беради.



Тарқалиши. Намангандаги Фаргона вилоятлари: Фарбий Тянь-Шанда – Чотқол тизмасида (Қўқонбий ва Тергачи қишлоқлари оралиги); Олой тизмаси (Шоҳимардан)да тарқалган. Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларидаги соз тупроқли ва шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кичик-кичик майдонларда якка-якка ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимликнинг камайишига ерларнинг қишлоқ хўжалиги мақсадлари учун ўзлаштирилиши ва чорва молларининг боқилиши сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1961 йилдан бошлиб муваффақиятли ра-вишда ўстириб келинмоқда.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [140, 159].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Статус 2. Очень редкий эндемик Западного Тянь-Шана и Северного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 1-2 м. Листья сероватые, четырежды перисто-рассеченные на ланцетовидные цельные и до половины надрезанные долики, с обеих сторон с коротким опушением. Зонтики расположены на коротких веточках по 1 или по 2 друг над другом. Цветков в зонтичках по 10. Плоды мелкие, длиной 6-7 мм. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Наманганской и Ферганской областях: Западный Тянь-Шань – Чаткальский хребет – по дороге от селений Куканбия и Тергачи (Наманганский вилоят) и Алайский хребет (Шахимардан). За пределами Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. Глинисто-щебнистые склоны в предгорьях.

Численность. Встречается единичными экземплярами на небольших площадях.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение мест естественного произрастания под сельхозугодья, выпас скота.

Культивирование. С 1961 г. успешно выращивался в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [140, 159].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Rare endemic species of the Naryn river basin in the western Tien-Shan and northern Pamir-Alay. It is spread at the western Tien-Shan: the Chatkal ridge - along the road from the villages of Kukanbiya and Tergachi (the Namangan region) and the Alay ridge (Shakhimardan). Inhabits clayish slopes in foothills. Single specimens in small areas can be observed. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



81. ДЕНОВ ЖУФТУРУГИ

Шарозонтичник денауский / *Sphaerosciadium denaënsse* (Schischk.) Pimenov et Kluyukov

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги йўқолиш арафасида турган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м га етадиган поликарп ўсимлик. Пояси тўғри, туксиз, юмалоқ, тўлиқ. Поядаги барглари бандли, асосидан 3 см гача кенга-йиб кетган пояни ўраб турувчи қулоқсимон қинга эга, бандларнинг узунлиги 20 см гача, мураккаб барглар уч карра патсимон бўлинган. Ўсимликнинг марказий соябончаси каттароқ, 10 та худди шундай кичик соябончаларни жамлаган, ён тарафдаги соябонлар 5–7 та. Уруғлаган вақтида шуълаларининг узунлиги 9–12 см га етади, деярли туксиз. Ўрама барглари марказий соябонда 3 та (1 таси майда – узунлиги 2,5 см, эни 0,5 см; 2 таси йирик – узунлиги 9 см, эни 0,6–1 см), ён тарафдаги соябонларда 2 та (узунлиги 5,5 см, эни 0,3–0,4 см). Меваси икки бўлакли, юмалоқ. Апрель–майда гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасидаги Сангардак дарёси водийси (Нилу қишлоғидан Хондиза дарёсининг кўйи оқимигача) ва Тўпаланг дарёсининг ўрта оқимида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги қояларда ўсади.


Сони. 2014 йилда Сангардакда 180 тури топилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу тур ўсадиган ерларда кўплаб чорва моллари боқилади.

Мухофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Бу турнинг биологик хусусиятларини ўрганиб чиқиш лозим.

Манбалар. [142, 159].



Д. Хамраева.

Статус 1. Редчайший реликтовый эндемичный вид и род Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Поликарп высотой около 1 м. Стебель прямой, голый, округлый, полный. Стеблевые листья на черешках, при основании сразу расширенных в ушковидное стеблеобъемлющее влагалище, расширенное до 3 см, черешки до 20 см длины, сложные листья трижды перисторассеченные, листья голые, отсутствуют сидячие стеблевые листья. Центральный зонтик более крупный до 10 зонтиков, боковые зонтики до 5–7 зонтиков, при плодах с широко раскинутыми, длинными (9–12 см), почти голыми лучами. Обёртки в центральном зонтике 3 (1 мелкий – 2,5 см длины, 0,5 см ширины; 2 крупные – 9 см длины, 0,6–1 см ширины), в боковых зонтиках 2 (5,5 длины и 0,3–0,4 см). Оберточки отсутствуют. Плод двойчатый, шаровидный. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае.

Распространение.

Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – долина реки Сангардак, от кишилака Нилю до низовьев Хандизы и реки Тупаланг в среднем течении.

Места обитания. Скалы в среднем поясе гор.

Численность. В 2014 году зарегистрировано 180 растений в Сангардаке.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [142, 159].

Д. Хамраева.

Rarest relict endemic species and genus of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar ridge: the Tupalang and Sangardak valleys, from the village Nilyu to Khandiza (the Surkhandarya region). Inhabits rocks in the middle mountainous zone. In 2014, 180 plants were registered in the Sangardak valley. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



82. ПОПОВ ЖЎЯКМЕВАСИ

Бороздоплодник Попова / *Aulacospermum popovii* (Korov.) Kljukov, Pimenov et V.N.Tikhom.

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шандаги ареали бўлинган, камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40–50 см, ўқ илдизли қўп йиллик монокарп ўсимлик. Илдизининг йўғонлиги 1 см га етади. Илдиз бўғизи эски қуриган баргларининг бандлари билан қопланган. Ёпрма барглари патсимон, бўлинган, барг банди ингичка қанотчали, тўқ яшил рангли. Пояси бакувват, жўякли, асосидан бошлаб шоҳланган. Соябони кўп, 10–18 та шуъвали камончаси бор, эни 5–7 см. Тожбарглари сарғиш. Меваси чўзиқ, ён томонидан қисилган. Август ойида гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Фарбий Тянь-Шанда – Уғом, Писком ҳамда Чотқол (фарбий қисми) тизмаларида тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Қирғизистонда учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан баландлиги 1600–2000 м бўлган тоғларнинг шимолий ва шимоли-шарқий ёнбағирларида оҳактошли қояларда ўсади.

Сони. Табиятда якка-якка ёки тўп-тўп бўлиб ўсади. 7 та популацияси аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик фақатгина бир марта гуллаб, мева бериши (монокарп) ва уруғининг яхши унмаслиги ҳамда алоҳида шароит (оҳактошлар)га мослашганлиги туфайли сони жуда кам.

Маданийлаштирилиши. Қисқа вақт давомида ЎзРФА Ботаника боғида экиб ўстирилган.


Муҳофаза чоралари. Уғом-Чотқол миллий табият боғида муҳофаза қилинади. Биологик хусусиятларини ўрганиш лозим.

Манбалар. [140, 159].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Статус 2. Редкий узкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетний стержнекорневой травянистый монокарпик высотой 40–100 см. Корень толщиной до 1,8 см, корневая шейка одета остатками черешков отмерших листьев. Прикорневые листья перисторассеченные, с узко крылатыми черешками, темно-зелёные. Стебель крепкий, бороздчатый, от самого основания ветвящийся; верхние ветви мутовчатые. Зонтики многочисленные, с 10–18 лучами, 5–7 см в поперечнике. Лепестки



желтоватые. Плод продолговатый, слегка сжатый с боков. Цветёт в августе, плодоносит в сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Западный Тянь-Шань – Угамский, Пскемский хребты и западная оконечность Чаткальского хребта). За пределами Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. Трецины и уступы отвесных известняковых скал северной и северо-восточной экспозиции в среднем поясе гор (1600–2000 м).

Численность. Встречается единичными экземплярами на небольших площадях. Известно 7 популяций.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала.

Редкое монокарпическое растение с узким экологическим диапазоном.

Культивирование. Непродолжительное время культивировался в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Произрастает на территории Угам-Чаткальского национального парка. Необходимо изучение биологических особенностей.

Источники. [140, 159].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Rare endemic species of the western Tien-Shan with the reducing area. It is spread at the western Tien-Shan: the Ugam, the Pskem and Chatkal ranges (the Tashkent region). Inhabits clefts and ledges of plumb lime-stony rocks of the northern and north-eastern expositions in the middle belt of mountains (1800-2000 m above sea level). Only 7 populations are known. Limiting factors: rare monocarp plant with strict ecology. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



83. ТЯНЬ-ШАНЬ КАМЕЛИНИЯСИ

Камелиния тяньшанская / Kamelinia tianschanica F.O. Khass. et I.I. Malzev

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шань худудига мансуб жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–50 см, кўп тугунакли, кўп йиллик поликарп ўсимлик. Илдиз бўғизидаги барглари узун бандли, япроғи уч карра бўлинган, бўллаклари чўзиқроқ-думалоқ, нишлари бор. Поядаги барглари бандли, юқоридагилари қисқариб новга айланган. Соябонидаги 5 та ўрама баргчали камонлари 5–10 та, узунлиги 10 см. Коқаси пардасимон тишли. Гултожи оқ. Меваси юмалокроқ, узунлиги 4 мм, эни 5 мм. Май ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Фарбий Тянь-Шанда – Оҳангарон дарёси ҳавзасида иккита ўсиш жойи маълум: Дукентсой ва Қорабоғсой.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан баландлиги 1200–1600 м бўлган жойлардаги кўчиб тушган тошлар уюми орасида ўсади.

Сони. Дукентсойдаги популяцияси ўрганилган. 80 га майдонда 600 дан ортиқ ҳар хил ёшдаги туплари маълум.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Махсус шароитга мослашган, атроф-муҳитнинг ўзгарувчан шароитларига чидамсиз (стенобионт) ва реликт тур.

Маданийлаштирилиши. 2009 йили ЎзР ФА Ботаника боғига экилган.

Муҳофаза чоралари. Ўсиш жойлари Угом-Чотқол милллий табиат боғи худудида жойлашган.

Манбалар. [159, 311].

И. И. Мальцев.

Статус 2. Редкий реликтовый эндемичный вид и род Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое растение с пальчато ветвящимися клубневидно вздутыми корнями. Стебли 30–50 см высоты. Прикорневые листья на удлиненных черешках, пластинки их трижды рассеченные на ланцетно-овальные доли. Стеблевые листья нижние на черешках, верхние редуцированные до влагалищ. Лучей зонтика 5–10 до 10 см длины, с обверточками из 5 листочков. Зубцы чашечки пленчатые. Лепестки белые. Плоды черные, округлые, 4 мм длины, 5 мм ширины. Цветет в мае, плодоносит в июле.

Распространение. Западный Тянь-Шань – в долине реки Ахангаран известны популяции из Дукентсая и Карабау.

Места обитания. Каменистые осыпи в диапазоне высот 1200–1600 м.

Численность. Изучена популяция в Дукентсая. На площади около 80 га произрастает более 600 особей различного возраста.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Стенобионтный и реликтовый вид.


Культивирование. Высажен в Ботанический сад АН РУз в 2009 г.

Меры охраны. Находится на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [159, 311].

И. И. Мальцев.

Rare, relic, endemic species and genus of the western Tien-Shan. It is spread at the western Tien-Shan: the Chatkal range (the surroundings of Yangiabat, the Karabau and Dukantsai rivers). Inhabits stony slopes at 1200-1600 m. Population in the Dukantsay was studied On the area of 80 hectares, more than 600 plants were registered. Limiting factors: relict and stenobiont taxon. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



84. СУМБУЛ КОВРАК

Ферула мускатная / *Ferula sumbul* (Kauffm.) Hook. f.

Мақоми 3. Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 150 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Поялари 2–5 та, ингичка, юқори қисми сершох. Барглари қаттиқ бўлиб, илдиз бўғизида ўрнашган. Япроги уч карра патсимон бўлинган, узунлиги 2–3 см, кенглиги 1–1,5 см, учидаги бўлаклари тухумсимон нишли. Узунлиги 2–3 см, кенглиги 1–1,5 см. Гуллари сариқ рангда. Косача барглари тишчали. Меваси майда, узунлиги 7 мм, эни 4 мм. Июнь ойида гуллаб, меваси июлда этилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Нурота, Туркестон, Зарафшон ва Ҳисор тизмаларида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.



Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги тошли ёнбағирларда, бутазорларда ўсади.

Сони. Ниҳоятда камёб, тўп-тўп бўлиб учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маҳаллий аҳоли томонидан муттасил ва нооқилона тарзда атир-упа саноати учун ҳамда доривор хом ашё сифатида йиғиб олиниши ва урганинг турли ҳашаротлар томонидан зарарлашиши унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Ўзбекистон Миллий университетининг Ботаника боғида бундан бир неча йиллар олдин ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Нурота, Зомин, Китоб, Ҳисор давлат қўриқхоналарида, Зомин миллий табиат боғида муҳофаза этилади.

Манбалар. [141, 159, 237].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Статус 3. Редкий эндемик Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое травянистое растение высотой до 150 см. Стебли в количестве 2–5, тонкие, в верхней части ветвящиеся. Листья жёсткие, в прикорневой розетке. Пластинка трижды перисто-рассечённая, конечные доли яйцевидные, ланцетные или продолговатые, 2–3 см длиной, 1–1,5 см шириной, зубчатые. Цветки жёлтые. Зубцы чашечки заметные. Плоды мелкие, длиной 7 мм и шириной 4 мм. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Хребты Нуратау, Туркестанский, Зарафшанский и Гиссарский. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Каменистые склоны среднего пояса гор, среди зарослей кустарников.

Численность. Крайне редок, встречается небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивная и нерациональная заготовка местным населением в качестве лекарственного и парфюмерного сырья. Семена сильно повреждаются насекомыми-вредителями.


Культивирование. Ранее успешно культивировался в Ботаническом саду Национального Университета Узбекистана.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском, Зааминском, Китабском, Нуратинском государственных заповедниках и Зааминском национальном парке.

Источники. [141, 159, 237].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Rare endemic species of the Pamir-Alay. It is spread at the Nuratau, the Turkestan, the Zaravshan, the Hissar ranges (the Samarkand, the Navoi, the Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits stony slopes in the middle belt of mountains, among shrubs. The quantity is unknown. Limiting factors: stocking by local population as medicinal plant, mentioned by Avicenna. Most of seeds are damaged by insects. Measures of protection: protected in the Hissar, the Zaamin, the Nuratau, the Kitab state reserves and the Zaamin national park.



85. ТУГАНАКЛИ КОВРАК

Ферула клубненосная / *Ferula tuberifera* Korovin

Мақоми 3. Ўзбекистоннинг жануби-ғарбида ўсадиган камёб тур.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик монокарп ўсимлик. Илдизи қисқа, бир нечта бутоқларга бўлинган, ён томирлари тугунакли. Поясининг бўйи 50–60 см, оч яшил рангда, бўғим оралиқлари пуфаксимон шишган, ўрта қисмидан шохланган. Поянинг пастки қисмидаги шохлари кетма-кет, юқоридагилари эса ҳалقا шаклида ўрнашган. Илдиз бўғизидаги барглари ромб шаклида, банди қисқа, уч карра патсимон бўлинган, тишчали, 1,5–2 см узунлиқда. Соябони ҳар хил: ўртасидагилари деярли бандсиз, 7–13 шуълали, диаметри 8 см атрофида, ён томондагилари 2–3 тадан бирлашган. Соябончалари 10–15 гулли. Тожбарги сариқ рангли, чўзиқ-думалоқ шаклда. Мевалари чўзиқроқ-думалоқ, оқиши-сариқ рангли. Май ойида гуллаб, июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқларида (Кўхитанг, Чўлбайир) тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги тошли ва тошли-шағалли ерларда, арчазорларда тарқалган.

Сони. Кўпинча якка-якка ҳолда, баъзан тўп-тўп бўлиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Уруғи етилмаган пайтда ўсимликни чорва молларининг барча турлари яхши истеъмол қиласиди. Шунингдек, ем-ҳашак сифатида ўриб олинади.

Маданийлаштирилиши. Экиб ўстирилмайди.

Мухофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [141, 159, 237].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Статус 3. Редкий вид Юго-западного Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее монокарпическое растение. Корень короткий, разветвленный, с клубнями на боковых корнях. Стебель бледно-зелёный, высотой 50–60 см, в узлах вздутый, от середины ветвящийся. Нижние ветви очередные, верхние – мутовчатые. Прикорневые листья в очертании ромбические, трижды перисторассеченные; конечные дольки обратной-цевидные, 1,5–2 см длиной, зубчатые. Зонтики разные: центральные почти сидячие, 7–13-лучевые, около 8 см в диаметре, боковые собраны по 2–3. Зонтики 10–15-цветковые. Лепестки жёлтые, продолговато-овальные. Плоды овальные, бледно-жёлтые. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: юго-западные отроги

Гиссарского хребта – Кугитанг, Чульбаир. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Каменистые и щебнисто-галечниковые субстраты в среднем поясе гор, в арчовниках.

Численность. Часто встречается единичными экземплярами, реже образует небольшие группы.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас (в стадии незрелых плодов хорошо поедается всеми видами животных) и сенокосы.

Культтивирование. Не культивируется.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [141, 159, 237].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Rare and endemic species of the south-western Uzbekistan. It is spread at the south-western outskirts of the Hissar range: the Kughitang, the Chulbair (the Surkhandarya region). Inhabits stony and pebble substrates in the middle belt of mountains, in juniper stands. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



86. ҚИЗИЛҚУМ КОВРАГИ

Ферула кызылкумская / Ferula kyzylkumica Korovin

Мақоми 3. Қизилқұмдаги қолдиқ тоғларда үсадиган камёб әндемик түр.

Қисқача тавсифи. Бүйі 50 см га етадиган поликарп ўт. Пояси ўрта қисмидан рўваксимон шохланади, кейинчалик қизил тусга киради. Шохлари кетма-кет жойлашган. Илдиз бўғизидаги барглари қисқа ва йўғон бандли, кенг новли. Япроғи кенг ромбсимон, учтадан бўлакка ажралган, бўлаклари, ўз навбатида, уч карра пат шаклида бўлинган, учидағи паллачалари тухумсимон, 5-10 мм узунликда. Поядаги баргларининг япроқлари жуда қисқа. Сояблари ўрама баргчаларсиз, 7-10 гулли. Косача барглари тишиз, тожбарглари сарқиқ рангда. Меваси чўзиқ-думалоқ шаклда. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Бухоро, Навоий вилоятлари: Қизилқұмдаги қолдиқ тоғларда (Томдитоғ, Белтоғ, Сангрунтоғ, Бўкантоғ, Кулжуқтоғлар) ва ола тусли тупроқларда тарқалган.

Ўсиш шароити. Тошли-шағалли ёнбағирларда, ола тусли тупроқларда ва юзага чиқиб қолган туб жинсларда тарқалган.

Сони. Табиятда якка-якка ҳолда үсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан ташқари кўп боқилиши сабабли сони камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Қизилқұм чўл станциясининг тажриба майдонида синааб кўрилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [141, 159, 237].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Статус 3. Редкий эндемик останцовых гор Кызылкума.

Краткое описание. Поликарпическое растение высотой 50 см. Стебель в средней части ветвящийся в неширокую метёлку, позднее краснеющий. Ветки очередные. Листья прикорневые, на коротких и толстых черешках, расширенных во влагалище. Пластинка листа в очертании широкоромбическая, тройчаторассечённая, конечные доли яйцевидные, 5-10 мм длиной, перистонадрезанные. Стеблевые листья с сильно уменьшенной пластинкой. Зонтики без обёрточек

7-10-цветковые. Чашечка без зубцов, лепестки желтые. Плоды продолговато-овальные. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Бухарской и Навоийской областях: останцовые горы и пестроцветы Кызылкумов – Тамдытау, Бельтау, Сангрунтау, Букантай, Кульжуктау.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны, пестроцветы и выходы коренных пород.

Численность. Встречается единичными особями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас.


Культивирование. Испытывается в коллекционном питомнике Кызылкумской станции АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [141, 159, 237].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Rare and endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Tamdytau, the Beltau, the Sengruntau, the Bukantau, the Kuldjuktau (the Bukhara and Navoi regions). Inhabits stony and pebble belts of the mountains. Single specimens can be found. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: not protected.



87. ПРАТОВ КОВРАГИ

Ферула Пратова / *Ferula pratovii* F.O. Khass. et I.I. Malzev

Мақоми 1. Фарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Күп йиллик поликарп үсимлик, бўйи 30–60 см. Пояси туксиз. Баргларининг аксарият қисми илдиз бўғизида жойлашган, уч карра бўлинган, оқ тукли, ён томонидаги паллачалари тухумсимон – чўзик, 3–5 бўлакли. Соябони 4–8 шуълали, узунлиги 2–3 см. Соябонининг шуъласи 8–10 та. Ўрама баргли ва ўрама баргасиз. Косачасининг тишлари тўмтоқроқ. Гултожи оқиш, овалсимон. Стилоподи ясси. Тугунча ва меваси туксиз. Июнда гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ҳисор тизмасининг жанубигарбий тармоқларида тарқалган (Вуари қишлоғи атрофида).

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 2400 м баландликдаги гипсли ёнбағирларда ўсади.

Сони. 60 туп үсимлиқдан иборат 2 та популяцияси аниқланган.

Кўпайиши. Уруғи орқали кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиий ўсиб турган жойларининг бузилиши ва кўплаб мол боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [159, 308].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое растение 30–60 см длиной. Стебли голые. Листья все трижды перисто-рассеченные, с вздутым черешком, грубо волосистые, латеральные доли овальные, 3–5 раздельные. Зонтик с 4–8 лучами, 2–3 см длины, зонтички 8–10 лучевые. Прицветников и прицветничков нет. Чашечка тупозубчатая. Лепестки белые, овальные. Стилоподии сплюснутые. Завязь и плоды голые. Цветет в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Кашкадарьинская область: юго-западные отроги Гиссарского хребта (окрестности кишлака Вуары).

Места обитания. Гипсированные склоны на высоте 2400 м.

Численность. Известны 2 популяции (60 растений).

Размножение. Семенное.



Причины изменения численности и ареала. Разрушение естественных местообитаний и выпас.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 308].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare species of the western Pamir-Alay. It is spread at the western part of the Hissar range: nearby the village Vuary (the Kashkadarya region). Inhabits gypseous slopes (2400 m.s.l.). 2 populations are known (60 plants). Measures of protection: not protected.



88. ФЕДЧЕНКО КОВРАГИ

Ферула федченковская / Ferula fedtschenkoana Koso-Pol.

Мақоми 2. Фарбий Помир-Олайдаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Мутлақ туксиз кўп йиллик поликарп ўт ўсимлиқ. Пояси якка ёки бир нечта бутоқчадан иборат ингичка, бинафшаранг, юқори қисми кўпинча қалқонсимон шохланган. Шохлари кетма-кет, юқоридагилари супротив. Баргларининг ранги оч кўк, юмшоқ, туксиз, беш карра бўлинган (кесилган), учидағи паллачалари торайиб кетган, 10–20 мм узунлиқда. Соябони 4–8 шуълали. Соябонасининг шуъласи 8–10 та. Косачаси калта, тишчали. Гултожи сарик, овалсимон, 1,4 мм узунлиқда. Меваси узунчоқ-овалсимон, туксиз, 6 мм узунлиқда, эни 3,5 мм. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё, Сурхондарё ва Жиззах вилоятлари: Ҳисор тизмаси (Қизилдарёнинг юқори қисми), Туркистон ва Молгузар тизмалари. Ўзбекистондан ташқарида: Тожикистон.

Ўсиш шароити. Тоғлардаги арчазор ҳудуднинг шимолий ёнбағирликларида майда тупроқли-шағалли жойларда ўсади.

Сони. Саноқли даражада учрайди, 10 x 10 м² майдонга 2–3 та ўсимлик тўғри келади.

Кўпайиши. Уруғи орқали кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Ҳисор ва Зомин давлат қўриқоналарида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [141, 159, 237].

М. Г. Пименов, Е. Клюиков.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое совершенно голое травянистое растение. Корень веретеновидный. Стебель одиночный или их несколько, тонкий, нередко фиолетовый, в верхней части щитковидно ветвящийся; ветви очередные, верхние супротивные. Листья сизоватые, мягкие, голые, 5-перисто рассеченные;

конечные доли узкие, 10–20 мм длиной. Зонтики конечные 4–8 лучевые. Зонтички 8–10-цветковые. Чашечка коротко зубчатая. Лепестки желтые, овальные, 1,4 мм длины. Плоды продолговато овальные, сжатые со спинки, голые, 6 мм длиной, 3,5 мм шириной. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский

(верховья Кзылдары), Туркестанский и Мальгузарский хребты. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Мелкоземисто-щебнистые северные склоны в арчовом поясе.

Численность. Встречается одинично, по 2–3 растений на 10 x 10 м².

Размножение. Семенное.


Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Не культивировался.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском и Зааминском заповедниках.

Источники. [141, 159, 237].
М. Г. Пименов, Е. Клюиков.

Rare species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Djizakh, the Kashkadarya and Syrkhendarya regions: the Hissar (the Kzyldarya river basin), the Turkestan and Malguzar ranges. Inhabits the rubbly northern slopes in juniper belt. Single or by 2-3 plants at 10m x 10m plots can be observed. Measures of protection: protected in the Hissar and Zaamin state reserves.



89. КОРЖИНСКИЙ КОВРАГИ

Ферула Коржинского / Ferula korshinskyi Korovin

Мақоми 2. Шимолий Помир-Олойга хос камёб эндемик ўсимликтар.

Қисқача тавсифи. Күп йиллик, пояси түккіз поликарп ўсимлик. Илдизіда шарсімөн йүғонлашған жойлари бор. Пояси, одатда, бир нечта ингичка новдадан иборат, новдаларининг ранги күкимтири, узунлиги 2 м гача етади, япроқларсиз, юқорига қараб иккі ёки уч тармоққа ажралиб кетген. Барглари уч-тұрт карра учга бўлинган. Учидағи бўлаклари наштарсімон-чўзиқ ёки узунчоқ, узунлиги 1,5–6 см, кенглиги 6–15 мм, четлари бир текис, бус-бутун. Учидағи соябончалари 5–11 шуълали бўлиб, диаметри 6–8 см. Косачаси калта тишилардан иборат. Баргчалари майды, чўзиқроқ, сариқ тусда. Мевалари күкимтири, пастки тарафи кичрайиб кетген, чўзиқроқ шаклда, узунлиги 6–7 мм. Июль ойида гуллаб, августда мева беради.

Тарқалиши. Фарғона вилояті: Олой тизмаси (Шоҳимардон). Ўзбекистондан ташқарида: Қирғизистон.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларидан тошлоқларда, гипсли туб жинсларда ва бошқа тоғ жинсларida ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тоғ этакларидаги ерларнинг тинимсиз ўзлаштирилиши ҳамда чорва молларининг кўплаб боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [141, 159, 237].

Статус 2. Редкое растение Северного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое совершенно голое травянистое растение с вертикальным реповидно вздутым корнем. Стеблей обычно несколько; они сизые, тонкие, до 2 м высоты, безлистные, вверху дважды или трижды ветвящиеся. Листья трижды-четырежды тройчато-рассеченные; конечные доли ланцетно-овальные или продолговатые, 1,5–6 см длины, 6–15 мм ширины, цельнокрайние. Зонтики конечные 5–11 лучевые, 6–8 см в диаметре. Чашечка с короткими зубцами. Лепестки желтые, мелкие, овальные. Плоды сизые, сжатые со спинки, овальные, 6–7

мм длины. Цветет в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Ферганская область: Алайский хребет (долина реки Шахимардан). За пределами Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. Лесовые, мелкоземисто-каменистые склоны в нижнем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.


Причины изменения численности и ареала. Освоение горных ландшафтов, сокращение площади ореховых лесов.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [141, 159, 237].

М. Г. Пименов,
Е. Клюиков.



Rare species of the northern Pamir-Alay. It is spread at the Fergana region: the Alay range, Shashimardan.

Inhabits loess, clayey-stony slopes in lower mountain belt. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of walnut forests, economic activity in mountain landscapes. Measures of protection: not protected.



90. ЎРИНБОСАР КОВРАК

Ферула замещающая / Ferula vicaria Korovin

Мақоми 1. Фарғона водийсининг жанубий адиrlарида ўсуvчи камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик монокарп ўт ўсимлик. Илдизида шарсимон йўғонлашган жойлари бор. Пояси, бир нечта бўлиб, кўкимтири рангда, ингичка, 2 м гача баландликда, қалқонсимон шохланган. Барглари калта, мустаҳкам тукли, 3–4 карра патсимон қирқилган, учидаги бўлаклари ингичка-узунчоқ, 0,5–2 см узунлиқда; поя барглари найсимон, ёпирига баргларгача редукцияланган. Соябони 2–5 шуълали; соябончалари 7–8 гулли. Косачаси тишчасиз. Гултожибарглари деярли яssi, кенг овалсимон, оч яшил-қўнғир. Меваси тескари тухумсимон, 4,5–6 мм узунлиқда. Июнь-июль ойларида гуллаб, мева ҳосил қиласи.

Тарқалиши. Туркистон ва Олой тизмалари этакларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларида, тошлоқларда, гипсли туб жинсларда ва бошқа тоғ жинсларида ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тоғ этакларидаги ерларнинг тинимсиз ўзлаштирилиши ҳамда чорва молларининг кўплаб боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [141, 159, 237].

М. Г. Пименов,
Е. Клюйков.

Статус 2. Редкий эндемик южных предгорий Ферганской долины.

Краткое описание. Многолетнее монокарпическое травянистое растение. Корни с шаровидными утолщениями. Стебель одиночный, тонкий, 20–60 см высоты, вверху щитковидно-ветвящийся. Листья слегка шероховатые от коротких жестких волосков, 3–4 перисто рассеченные; конечные доли узколинейные, 0,5–2 см длины; стеблевые листья

редуцированы до трубчатых влагалищ. Зонтики с 2–5 лучами; зонтички 7–8-цветковые. Чашечка без зубцов. Лепестки почти плоские, широко овальные, оливково-бурые. Плоды обратно-яйцевидные, сжатые со спинки, 4,5–6 мм длины. Цветет и плодоносит в июне-июле.

Распространение. Предгорья Туркестанского и Алайского хребтов.

Места обитания. Щебнистые и пестроцветные склоны, по сухим руслам и по галечникам.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Антропогенный фактор. Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [141, 159, 237].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Rare endemic species of the southern foothills of the Ferghana valley. It is spread at the Ferghana region: the Alay range, Shashimardan. Inhabits rubbly and gypseous slopes, dry stream beds, pebbles, at 900-1500 m s.l. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing under antropogenic pressure. Measures of protection: not protected.



91. ЕЛЕНА КОВРАГИ

Ферула Елены / Ferula heleneae Rakhm. et Melibaev

Мақоми 2. Нурота олди қолдиқ тоғларида (Балиқлитоғ, Эгарбелистоғ) ўсадиган камёб эндемик түр.

Қисқача тавсифи. Күп йиллик монокарп үсімлік. Илдизи цилиндрсімін, илдиз бүрзі куриган баргларнинг күп сонли толалари билан қопланған. Поясининг баландлығы 60–70 см, мустаҳкам, ингичка, юқоридан шохланувчи, бүрғинидан бир нечта шох ҳосил қиласади. Барглари оқишиш-күкимтириң қалин дағал туклар билан қопланған: түпбарглари калта, мустаҳкам, қалин бандли, япроқлари кенг ромбсімін, мураккаб патсімін. Поядаги баргларининг япроқлари жуда қысқа. Соябони иккі хил. Меваси кучли ҳидга зәг. Май ойда гуллаб, июнде етилади.

Тарқалиши. Жиззах вилояты: Нурота олди қолдиқ тоғлари (Балиқлитоғ, Эгарбелистоғ)да тарқалған.

Үсиш шароити. Тош-шагалли ва тошли қояларда тарқалған.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда ўсади. Бир нечта жойларда ўсиши аниқланған.

Күпайиши. Уруғи орқали күпаяди.

Үсімлік сони ва ареалининг ўзгариш саблары. Табиий ўсиб турған жойларининг бузилиши ва күплаб мол боқилиши туфайли камайиб кеттін.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақида маълумотлар йўқ.

Мұхофаза чоралари. Мұхофаза қилинмайды.
Манбалар. [141, 159, 237].

А. Р. Батошев.

Статус 2. Редкий эндемик останцовых гор при Нурату.

Краткое описание. Многолетний монокарпик. Корень цилиндрический, корневая шейка покрыта многочисленными волокнами отмерших листьев. Стебель 60–70 см высоты. Крепкий, тонкий, вверху ветвящийся, по несколько ветвей в узле. Листья сероватые от густо покрывающих жестких волосков: прикорневые – на коротких, крепких и толстых черешках, пластинка их широкоромбическая, тройчатая, многократно перисторассеченная на овальные перисто-надрезные, по краям курчавые, дольки 2–3 мм длины. Стеблевые листья с сильно уменьшенной пластинкой, верхние же сведены до яйцевидных, вздутых, стеблеобъемлющих влагалищ. Зонтики двоякие. Плоды с сильным скрипидарным запахом. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Джизакская область: останцовые горы при Нурату (Балыклитау, Эгарбелистаг).

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны.

Численность. Встречается единичными особями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Разрушение естественных местообитаний и выпас.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [141, 159, 237].

А. Р. Батошев.

Rare and endemic species of the Prinuratau. It is spread at the Prinuratau range: the Balyklitau and Egarbelistag. (the Djizakh region). Inhabits stony-rubbly mountain belt. Single specimens can be found. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: not protected.



92. ФЕДЧЕНКО ПИЛДИРОҚМЕВАСИ

Омежник федченковский / *Oenanthe fedtschenkoana* Koso-Pol.

Мақоми 0. Фарғона водийсига хос ниҳоятда камёб (балкий йўқолган), эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см гача етадиган (эҳтимол монокарп) кўп йиллик ўт. Пояси битта, юмалоқ, чуқурроқ, чизиқли, кам шохли. Барглари қисқа бандли, асоси кенг – новсимон, икки карра патсимон қирқилган, бўлаклари чўзиқ-қалами. Соябони 8–14 нурли, соябончалари кўп гулли, ўрама баргчалари 5–10 та, наштарсимон. Мевалари тухумсимон, узунлиги 2 мм. Май–июн ойларида гуллаб, меваси июн ойида етилади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Кўқон шаҳри атрофларида учраган. Ушбу ўсимлик Москва шаҳрида (MW) сақланмоқда деб келинган гербарий типи асосида тавсирланган. Бироқ MW (Губанов, 2002) ва МНА да бундай ўсимлик йўқ. Кўқон шаҳри атрофларида олиб борилган бир неча изланишлар натижага бермаган. Ўрта Осиёга мансуб гербарийларда ҳам ўсимликнинг қайта терилган нусхалари йўқ. Эҳтимол, мелиорация ва сугориш тизимларининг бир неча бор ўзгариши оқибатида ўсимликнинг ўсиш жойлари ўзлаштирилган бўлиши мумкин. Ўсимлик бир марта гина терилиган, холос. Шунда ҳам Қирғизистоннинг Кўқон шаҳрига яқин жойларидан терилган бўлиши ёки ўсимликка оид маълумотларда чалкашликка йўл кўйилган бўлиши эҳтимолдан йироқ эмас.

Ўсиш шароити. Бот-қоқланган ерларда ва эҳтимол, ариқ бўйларида ҳам ўслан.

Сони. Кўқон шаҳри атрофидан бир марта йигилган.

Қўпайиши. Уруғидан кўпайган деган тахмин бор.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу тур ҳақида маълумотлар етарли эмас.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Ўсимликнинг табиатда борлигини исботлаш зарур.

Манбалар. [147, 348].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Статус 0. Чрезвычайно редкий (возможно, исчезнувший) эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Многолетнее, травянистое (возможно, монокарпическое) растение высотой до 50 см. Стебель одиночный, округлый, сильнобороздчато-гранистый, слабоветвистый. Листья на коротких черешках, при основании расширенные во влагалище, дважды перисторассеченные на продолговато-линейные доли. Зонтики 8–14-лучевые, зонтички многоцветковые, обёрточки из 5–10 ланцетновидных листочков. Плоды яйцевидные, длиной около 2 мм. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне.



Распространение. Ферганская область: в окрестностях г. Коканд. Все указания основаны на единственном местонахождении в окрестностях г. Коканда, причем тип будто бы находится в Москве (MW). Однако в гербариях MW (см. Губанов, 2002) и МНА такого растения нет. Неоднократные поиски в болотах в окр. Коканда никаких результатов не дали. Нет повторных сборов и ни в одном из среднеазиатских гербариев. Вполне возможно, что местонахождение исчезло в процессе многократного изменения поливной сети и мелиорации. Не исключено также, что единственный сбор этого м.б. заносного растения был сделан на территории Кыргызстана близ Коканда или даже произошла путаница этикеток.

Места обитания. Заболоченные низины, возможно, по берегам арыков.

Численность. Известен по единственному сбору из окрестностей города Коканда.

Размножение. Возможно сменное.

Причины изменения численности и ареала. Сведения о виде крайне недостаточны.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [147, 348].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Extremely rare and probably disappeared endemic species of the Ferghana valley. It is spread at the surroundings of Kokand (the Ferghana region). All information was based on the only locality nearby Kokand town; and, the type of the mentioned specimen is stored in Moscow (MW). However, in MW (Gubanov, 2002) and MHA these species were not found. There is none specimen in all herbaria of Central Asia. Several collecting missions in surroundings of Kokand were unsuccessful. Probably, this locality disappeared during enlarged melioration system in the 20 century. Probably, the plant was collected in Kyrgyzstan or determination label was changed. Inhabits swampy valleys, along channels. The species known by single collection nearby Kokand. Limiting factors: information about it is incomplete. Measures of protection: not protected.



93. ЧИЗИҚПОЯЛИ ПИЛДИРОҚМЕВА

Омежник разноплодный / *Oenanthe heterococca* Korovin

Мақоми 0. Қашқадарё воҳасига мансуб, йўқолиш арафасида турган (балки йўқолган), эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Пояси ғовак, асосидан шохланган, юмалоқ, усти чизиқли. Поянинг пастидаги барглари бандли, юқоридагилари бандсиз, ингичка новли, уч карга патсимон қирқилган. Бўлаклари қалами, ўткир учли, узунлиги 7–8 мм. Соябони узун бандли, 10 та шуълали. Соябончалари кўп гулли. Ўрама баргчалари 7–9 та, ҳар хил узунликда, наштарсимон. Меваси пилдироқсимон, узунлиги 3 мм. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Шаҳрисабз шаҳри атрофидаги тоғ олди текисликларида тарқалган. Биз Тошкентдаги гербарий намуналарини бошқа *Oenanthe* турлари билан солиштиридик ва у *O. silaifolia* M. Bieb. турига яқинлиги, аникрофи, ундан барглари билан ҳам, илдизи билан ҳам фарқланмайди, деган хulosага келдик. Е. П. Коровиннинг «*heterococca*» эпитети меваларни ўрганишда орқали ўз тасдиғини топмайди. Улар эса *O. silaifolia* меваларига ўхшаш. *O. silaifolia* ўхшаш экологияга эга, Эрон, Кавказдан то Европа ва Шимолий Африкагача кенг тарқалган. Шаҳрисабзга ўсимликнинг уруғи гуруч билан бирга аралашиб келиб қолган бўлиши мумкин.

Ўсиш шароити. Сугориладиган далалардаги ботқокланган ерларда, сувҳавзаларининг атрофларидага ўсади.

Сони. Бундан 40 йил олдин бир марта терилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайган бўлса керак, деган тахмин бор.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу тур ҳақида маълумотлар жуда кам.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Мухофаза чоралари. Махсус мухофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [147, 348].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Статус 0. Чрезвычайно редкий (возможно, исчезнувший) эндемик бассейна реки Кашкадарья.

Краткое описание. Травянистое многолетнее растение высотой до 50 см. Стебель полый, от основания ветвистый, округлый, бороздчатый. Листья у основания черешковые, выше – сидячие, на узком влагалище, трижды перисторассеченные на линейные острые доли длиной до 7–8 мм. Зонтики на длинных цветоносах, 10 лечевые. Зонтики многоцветковые. Обёрточки из 7–9 ланцетовидных листочеков разной длины. Плоды кубаревидные, длиной 3 мм. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Кашкадарьинская область: подгорная равнина близ города Шаҳрисабз. Мы сравнили гербарий (TASH) с другими видами *Oenanthe* и пришли к выводу, что он очень близок к *O. silaifolia* M.Bieb., а точнее практически неотличим ни по листьям, ни по корням с продолговатыми вздутиями. Видовой эпитет Коровина «*heterococca*» не находит подтверждения при изучении плодов: мерикарпии у них одинаковые, как и у *O. silaifolia*. Материал все тот же, что и у Коровина – один сбор. *O. silaifolia* имеет сходную экологию и широкое распространение от Ирана и Кавказа до Европы и Северной Африки. В Шаҳрисабз он мог быть занесен, например, с семенами риса. Не исключено, что сюда же может быть отнесен и *O. fedtschenkoana*, материал по которому не найден до сих пор, так как Козо-Полянский никакой гетеромерикарпии не описывает.

Места обитания. Заболоченные участки среди поливных полей, по берегам водоёмов.

Численность. Известен по единственному сбору сороколетней давности.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сведения о виде крайне недостаточны.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [147, 348].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Extremely rare and probably disappeared endemic species of epy Kashkadarya valley. It is spread at the submontane plain near Shahrissabz (the Kashkadarya region). We compared herbarium material from TASH with other Oenanthe species and it was clear that it is very closed with O. silaifolia M.Bieb., there was no any difference in leaves and inflated roots. Korovin's epithet "heterococca" have no base, because mericarps of O. silaifolia are equal. Unfortunately, this species have the same ecolgy and grows naturally from Iran and the Caucasus up to Europe and the northern Africa presented by the single specimen as well. Probably, it was introduced here together with rice crops or so. Probably, O. fedtschenkoana,could be the same species as well, because Koso-Poljanskiy did not mentioned heterocarpic character. Inhabits swampy plots among fields requiring irrigation, on reservoir banks. Known by single collection made 40 years ago. Measures of protection: not protected.



94. ШАШИРСИМОН ПУФАКБҮГИМ

Комаровия неровносемянная / Komarovia anisosperma Korovin

Мақоми 1. Зарафшон тизмасининг тармоқларида тарқалган камёб, реликт ўсимлиқ.

Қисқача тавсифи. Бўйи 2–3 м гача етадиган, йўғонлашган илдизтуғунакли, кўп йиллик ўт. Пояси ингичка, бўғимлари бироз пуфаксимон шишган, юқори қисмидан шоҳланган. Ёпрма баргларининг узунлиги 70 см га етади, кўп марта патсимон бўлакларга ажралган. Япроғининг учидаги бўлаклари наштарсимон, узунлиги 4–5 см, эни 10 мм гача. Соғонлари 2–7 шуълали, соғончалари юмалоқ, ўрама барг ва баргчалари ўйқ. Тожбарглари сариқ, узунлиги 10 мм. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмасининг ғарбий тармоқларида ва унинг давоми Қоратепа тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1300–1700 м баландлиқдаги дараларда, шағалли тикёнбағирларда, сурималарда, қояларнинг ёриклирида ўсади.



Сони. Фақат бешта жойда борлиги маълум. Тўплари (10–100 тупдан бўлиб) бир-биридан ажралган ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимликнинг сернам жойларга қатъий мослашганлиги ва аҳоли зич жойлашган ҳамда қишлоқ хўжалиги учун фойдаланиладиган ерларда ўсанлиги ўсимлик сонининг камайишига олиб келган.

Маданийлаштирилиши. Москва давлат университетининг Ботаника боғида ўстирилади.

Мухофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралири ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [142, 156–159].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Статус 1. Редкий реликтовый вид и род Зарафшанского хребта.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое травянистое растение высотой до 2–3 м, с утолщенным ветвистым стеблекорнем. Стебель тонкий, в узлах слегка вздутый, метельчато ветвистый в верхней части. Листья в основном прикорневые, до 70 см длины и ширины, многократно перисторассеченные, с ланцетными конечными долями длиной 4–5 см и ширины до 10 мм. Зонтики 2–7-лучевые, зонтики шаровидные, без обёрток и обёрточек. Лепестки жёлтые, длиной до 10 мм. Плоды продолговато-яйцевидные. Цветёт в июне–июле, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Самаркандской и Кашкадарьинской областях: западная оконечность Зарафшанского хребта и его продолжение – хребет Каратепе.

Места обитания. Узкие ущелья и крутые щебнистые склоны, осьпи и трещины скал на высоте 1300–1700 м.

Численность. Отмечен в 5 пунктах. Встречается в виде сильно разрозненных немногочисленных популяций с разным числом особей (от 10 до 100).

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Реликтовая природа вида и антропогенный фактор.


Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду МГУ.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [142, 156–159].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Rare, relict species and genus of the Zaravshan range. It is spread at the northern and southern slopes of the Zaravshan range (the Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits narrow defiles and steep slopes, mounds and cracks of rocks at the height of 1300–1700 m. 5 populations (from 10 to 100 specimens) can be found. Limiting factors: relict nature of the species and antropogenic factor. Measures of protection: not protected.



95. ҲИСОР САРПОЯСИ

Головоног гиссарский / *Cephalopodium hissaricum* Pimenov

Мақоми 1. Ҳисор тизмасидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–50 см га етадиган кўп йиллик, монокарп ўт. Поясининг туби 2–3 см гача баргбандининг қолдиқлари билан қопланган, юқори қисми шохланган. Ёкирма барглари кўкимтири, патсимон бўлинган, япроқ учидаги бўлаклари қалами-наштарсимон, узунлиги 0,5–1,5 см, эни 0,1–0,2 см. Соябони 12–20 тача шуъзали, диаметри 5–7 см, ўрама барглари йўқ. Соябончалари юмалоқ. Тожбаргларининг ранги аниқ эмас. Меваси июль ойида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг жанубий ёнбағирлари (Тўпаланг дарёси ҳавзаси)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги дараҳт ва бутазорлар орасида, қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Аниқланмаган. Бир марта йифилган холос.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди деган тахмин бор.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159].

М. Г. Пименов, Е. Клюиков.

Статус 1. Редкий эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетний травянистый монокарпик высотой 30–50 см. Стебли при основании покрыты жесткими остатками черешков, тонкие, ветвящиеся в верхней части. Прикорневые листья сизоватые, 3–4-перисторассечённые, с линейно-ланцетными конечными долями длиной 0,5–1,5 см, шириной 0,1–0,2 см. Зонтики 12–20-лучевые, 3–4 см в диаметре, без обёрток, зонтички шаровидные. Лепестки не известны. Плоды (незрелые) голые, широколанцетные. Плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: южный макросклон Гиссарского хребта – бассейн реки Тупаланг.

Места обитания. Трещины скал древесно-кустарникового пояса.

Численность. Не установлена, известен по единственному сбору.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.



Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [159].

М. Г. Пименов, Е. Клюиков.

Rare endemic species of the Hissar range. It is spread at the southern slope of the Hissar range: the Tupalang (the Surkhandarya region). Inhabits cracks of rocks in woody-shrubby belt. There is the only locality. Measures of protection: not protected.



96. РЕГЕЛ ҚИРҚБОШИ

Зарафшания Регеля / *Zeravshania regeliana* Korovin

Мақоми 2. Фарбий Помир-Олойдаги ниҳоятда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м гача етадиган ўқ илдизли, кўп йиллик ўт. Илдиз бўғизи шохланган, эски барг қолдиқлари билан қопланган. Поялари кўп, деярли баргсиз, ўртасидан шохланган. Ёпирма барглари қалин, узун бандли, уч карра патсимон қирқилган, бўлаклари майда овалсимон. Поядаги барглари жуда майда, узунлиги 3–4 мм, поянинг юқори қисмидагилари эса майдалашиб, новга айланган. Соябонининг эни 4–8 см. Тожбарглари тескари тухумсимон, оқ. Июнь ойида гуллаб, меваси июлда этилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Зарафшон ва Ҳисор тизмаларининг фарбий қисмida тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг тошли ёнбагирлари (арчазорлар)да ўсади.

Сони. Учта ерда мавжудлиги аниқланган. Умумий сони ҳақида аниқ маълумотлар йўқ.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор ва Китоб давлат қўриқхоналаридаги муҳофаза этилади.

Манбалар. [159, 349].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое травянистое растение высотой до 1 м. Корень стержневой. Стеблекорни разветвленные, покрыты остатками черешков отмерших листьев. Стеблей несколько, они полые, округлые, от середины ветвящиеся. Прикорневые листья на длинных черешках, трижды перисторассеченные, конечные доли мелкие, овальные, лопастные, 3–4 мм длины, стеблевые листья сильно уменьшенные, верхние редуцированные до влагалищ. Зонтики 4–8 см в поперечнике, с обертками и оберточками. Лепестки белые, обратнояйцевидные. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: западная часть Зарафшанского и Гиссарского хребтов. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Каменистые склоны гор в поясе арчовников.

Численность. Известны 3 местонахождения, сведений об общей численности нет.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не известны.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском и Китабском заповедниках.

Источники. [159, 349].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Rare and endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the western parts of the Zaravshan and Hissar ranges (the Kashkadarya and Surkhandarya region). Inhabits stony slopes of mountains in the juniper belt. 3 populations are known. Total number is unknown. Measures of protection: protected in the Kitab and Hissar state reserves.



97. САРИҚ ҚИРҚГУЛ

Фергания многоцветковая / *Fergania polyantha* (Korovin) Pimenov

Мақоми 1. Фарғона водийсининиг тоголди худудларига хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40 см гача етадиган кўп ийллик, монокарп ўсимлик. Поялари якка, майда чизиқли. Ёпирма барглари (гуллаган пайтида) ясси ва кенг бандли. Япроғи учбурчак шаклида, уч карра қирқилган, бўлаклари ўз навбатида патсимон қирқилган. Соябони ён шохларда ва поянинг учида жойлашган, 7–10 шуълали кўп гулли (гуллар 36 тагача), юмалоқ. Гуллари сариқ, ко-сачасиз. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Олой ва Туркистон тизмаларининг Фарғона водийсига юзланган томонида тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Қирғизистон ва Тожикистанда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмида ва тоғ этакларида, соз тупроқли тубжинслар (сланец, конгломерат)дан ташкил топган ёнбағирларда, нураётган қоялар ва ўрнашиб қолган сурималарда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ёки тўп-тўп бўлиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 231].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Статус 1. Редкий эндемик предгорий Ферганской долины.

Краткое описание. Многолетние монокарпическое травянистое растение высотой до 40 см со стержневым корнем. Стебли одиночные, тонко-бороздчатые. Листья прикорневые, с расширенными черешками. Пластинка листа в очертании треугольная, тройчаторассечённая; конечные доли продолговато-эллиптические, лопастные, 3 см длиной, 1,5 см шириной. Зонтики 7–10-лучевые, зонтики шаровидные. Лепески жёлтые, чашечка без зубцов. Плоды сжатые со спинки. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Ферганская область: предгорья Алайского и Туркестанского хребтов, обращённые к Ферганской долине. За пределами Узбекистана: Кыргызстан, Таджикистан.

Места обитания. Сланцевые и глинисто-сланцевые конгломераты на склонах, разрушающиеся скалы и неподвижные щебнистые осьпи в предгорьях и нижнем поясе гор.

Численность. Одиночно или небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сведений нет.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 231].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Rare species of the Ferghana valley. It is spread at the piedmont zone of the Alay and Turkestan ranges in the Ferghana valley (the Ferghana region). Inhabits schistous and clayish-schistous conglomerates on slopes, destroying rocks and fixed mounds in piedmont zone. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



98. ПИЛДИРОҚ ҚҮШШОХ

Жабрица кубарчата / *Seseli turbinatum* Korovin

Мақоми 1. Фарбий

Тянь-Шань ва Помир-Олой-нинг жуда камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м гача етадиган кўп йиллик ўт. Пояси жўякли, туксиз, шохланган. Барглари уч карра патсимон қирқилган, бандли. Бўлаклари наштарсимон, учли, узунлиги 10–12 мм. Поянинг юқори қисмидаги барглари қалами наштарсимон новли. Сояблолари 4–5 нурли, сояблочалари тифиз, 20 та гулли, ўрама баргчалари 9–11 та, наштарсимон. Тожбарглари чўзиқ-овалсимон, юқори қисми ичига букилган. Меваси чўзиқ-овалсимон, тукли, узунлиги 5 мм га етади. Июль ойида гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Жиззах вилояти: Нурота тизмаси (Қўйтош тоғи, Устихон сой)да тарқалган. Тошкент вилояти, Курама тизмаси. Ўзбекистондан ташқари Қозогистонда учрайди.

Ўсиш шароити: Тошли ёнбағирлар ва қояларнинг ўркачларида, бодомзор ва арчазорлар орасида ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [148, 230].



Н. Ю. Бешко.



Статус 1. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое травянистое растение высотой до 1 м. Стебель бороздчатый, голый, ветвящийся. Листья на черешках, трижды перисторассеченные на ланцетные, острые доли длиной 10–12 мм, верхние стеблевые листья редуцированы до линейно-ланцетных влагалищ. Зонтики 4–5-лучевые, без обертоек, зонтички плотные, 20–цветковые, обёрточки состоят из 9–11 ланцетных, почти свободных листочек. Лепестки желтые, продолговато-овальные. Плоды продолговато-овальные, опущенные, длиной до 5 мм. Цветёт в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Джизакская область: Нурагинский хребет (горы Койташ, урочище Устахан; хребет Нурагау, урочище Гурдара); Ташкентская область: Кураминский хребет. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Каменистые склоны и скалистые гребни.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [148, 230].

Н. Ю. Бешко.

Rare endemic species of the western Tien-Shan and Pamir-Alay. It is spread at the Nuratau range: the Koytash mts., the Ustakhan valley; the Nuratau mts., the Gurdara valley (the Djizakh region), the Kurama range. Inhabits stony slopes and rocky ridges. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



99. ОВЧИННИКОВ ПАУЛИЯСИ

Паулия Овчинникова / Paulita ovczinnikovii (Korovin) Sojak

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойнинг эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Балаңдлиги 50–100 см бўлган кўп йиллик монокарп ўсимлик. Илдизи тугунаксимон, бармоқсимон тармоқланган. Поялари якка-якка ҳолатда, ичи ғовак, ўртасидан бошлаб юқорироқда шохланади. Илдизолди барглари тез қурийди; япроқлари кенг учбурчаксимон, икки, уч карра патсимон қирқилган; асос қисмидаги бўлакларининг бандчалари бор; учки бўлаклари кенг, ромбсимон, йирик тишчали. Гултожибарги оқ, косачасининг тишчалари йўқ. Меваси 2,5 мм узунликкача, тухумсимон, бир-бирига тенг бўлган қовурғалари туфайли сал ғадирбудур. Май ойида гуллаб, июнь-июлда мевалайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизаси, ғарбда Мачайдарёгача, Боботоғ. Тожикистанда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тош-шағалли, соз тупроқли ёнбағирликларда ўсади (д. с. б. 900–2000 м).

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан зиёд кўп боқилиши, ўсиш жойларининг деградацияга учраши, маҳаллий аҳоли томонидан зиравор сифатида териб олиниши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [141, 159].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Статус 1. Эндемичное растение Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетний монокарпик 50–100 см высоты. Корень клубневидный, пальчаторазветвленный. Стебли одиночные, полые, от середины ветвящиеся. Прикорневые листья рано увядающие; пластиника в очертании широкотреугольная, дважды-трижды перисторассеченная; базальные первичные сегменты на черешочках; конечные доли широкие, ромбические, крупнозубчатые. Зонтики 20–27 лучевые с оберткой и оберточками из цельных листочек. Лепестки белые; зубцы чашечки отсутствуют. Плоды до 2,5 мм длины, яйцевидные, слегка шероховатые с



короткими равными килевидными ребрами. Цветет в мае, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет, на западе до Мачайдарья, хребет Бабатаг.

Места обитания. Мелкощебнистые, мелкоземистые склоны (900–2000 м н. у. м.).

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота, деградация местообитаний, заготовка населением в качестве пряности.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [141, 159].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Endemic species of the Pamir-Alay. It is spread at the Surkhandarya region: the Hissar range(the Sangardak and Tupalang river basins), the Babatag range. Inhabits clay and rubbly slopes, among shrubs, at 900-2000 m.s.l. Can be found in small groups with limited areas. Limiting factors: Intensive pasturing, habitat degradation using by local population as spice. Measures of protection: not protected.



100. ФАРОЙИБ КУЗАКИ

Осенница неожиданная / Autumnalia inopinata Pimenov

Мақоми 1. Нурота тизмасидаги Қоратоғнинг ўта камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Баландлиги 1 м гача етадиган кўп йиллик поликарп ўсимлик. Поялари якка-якка, тифиз. Барглари икки карра уч бўлакли, учидаги бўлакларининг банди қисқа, тухумсимон, четлари бутун, учи ўткирлашган. Соядонлари кўп, майда шарсимон, 4–5 шуълали; ўрама барглари тухумсимон, пастга қайрилган. Гултожибарги оч сариқ; косачасининг тишчалари йўқ. Меваси туксиз, тухумсимон ёки сал юмaloқлашган. Август–сентябрда гуллаб, сентябр–октябрда мевалайди.

Тарқалиши. Навоий вилояти: Нурота тизмаси Қоратоғдаги Қорақарға довони атрофида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тош-шағалли ёнбагирларда ўсади.

Сони. 2009 йилда битта популяцияси аниқланган (50 та туп). 2012–2014 йилларда яна иккита популяцияси топилган (ўсимликларнинг умумий сони 150 га яқин). Тахминан 20 км² майдонда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиятда камёб эндемик ўсимлик. Ўсиш жойларида чорва моллари жуда кўп боқилади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.



Статус 1. Редчайший эндемик горы Карагату Нуратинского хребта.

Краткое описание. Многолетний стержнекорневой поликарпик до 1 м высоты. Стебли одиночные плотные с метельчато разветвленным соцветием. Листья дважды тройчатые; конечные доли на черешочках, яйцевидные цельнокрайние, на конце заостренные. Зонтики многочисленные мелкие шаровидные, 4–5 лучевые; листочки обертки яйцевидные, пленчатые, вниз отогнутые; оберточка отсутствует. Лепестки светло-желтые; зубцы чашечки отсутствуют. Плоды голые, яйцевидные или почти округлые сильно сжатые со спинкой мерикарпие; спинные ребра мерикарпие почти незаметные, краевые крыловидные. Цветет в августе–сентябре, плодоносит в сентябре–октябре.

Распространение. Навоийская область: Нуратинские горы, хребет Карагату, окрестности перевала Каракарга.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны, выходы сланцев, среди колючеминдальников на высоте 600–800 м н. у. м.

Численность. В 2009 году была обнаружена одна популяция с численностью не более 50 особей. В 2012–2014 гг. выявлено 2 популяции с общей численностью около 150 растений. Общая площадь распространения около 20 км².

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Естественно редкий узко эндемичный вид. Места обитания используются под выпас большого количества скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [159].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Very rare, endemic species of the Nuratau mountains, belonging to endemic Central Asiatic genus. It is spread at the Navoi region: the Nuratau mts., the Karatau range (near the Kara-karga passage). Endemic of Uzbekistan. Inhabits stony rubbly slopes, among the shrubs of Amygdalus spinosissima, at 600-800 m. s. l. In 2009 only one population (about 50 plants) was found. In 2012-2014, about 150 plants were counted in two localities. Distribution area is about 20 sq. km. Limiting factors: endemic stenotopic species. The habitat is used for pastures. Measures of protection: not protected.



101. ЧАКАМИГМЕВАСИМОН АСТОМАТОПСИС

Астоматопсис подмаренникоплодный / *Astomatopsis galicarpa* Korovin

Мақоми 2. Дарваз тизмаси ва Ҳисор тизмаси жанубий ёнбағирларининг эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Умуман түксиз, кўп йиллик поликарп ўсимлик, эфемероид. Тугунағи шарсимон. Пояси якка-якка, ингичка, 10–25 см баландлиқда. Илдизолди баргларининг япроқлари 2 карра уч бўлакли қирқиған; учки бўлаклари 1–2 см узунлиқда, эни 0,5 см, тухумсимон, уч бўлакли; поя барглар учидаги бўлаклар ингичка. Соябонлари ўрама барглар ва баргчаларсиз, 2–7 та ингичка, бир-бирига тенг 20 мм узунликдаги шуълалардан иборат. Косачаси тишчасиз. Гултожи оқ, 0,9 мм узунликда. Меваси икки бўлакли, кўшалоқ қўнғир, силлиқ, 1,5–1,9 мм узунликда, эни 3–4 мм. Июнь–июлда гуллаб, июль–августда мевалайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси, Тўпаланг дарёсининг ҳавзаси. Ўзбекистондан ташқарида: Тоҷикистон.

Ўсиш шароити. Майда шағалли тўқилмалар, қоялар остидаги майин тупроқлар тўпланган ёнбағирликлар, қор секин эрийдиган жойларда, дарё ёқаларида ўсади, д.с.б. 2200–2300 м.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғи ва тугунағидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [142, 233].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Статус 2. Эндемик южного макросклона Гисарского и Дарвазского хребтов.

Краткое описание. Совершенно голое многолетнее поликарпическое растение, эфемероид. Клубень шаровидный. Стебель тонкий, одиночный, 10–25 см высоты. Пластинки прикорневых листьев дважды тройчаторассеченные; конечные доли 1–2 см длиной, 0,5 см шириной, яйцевидные, трехлопастные; стеблевые листья с линейными конечными долями. Зонтики без оберточ и оберточек, с 2–7 тонкими, примерно равными лучами, 20 мм длины. Чашечка без зубцов. Лепестки белые, 0,9 мм

длины. Плоды двойчатые, бурые, гладкие, 1,5–1,9 мм длины, 3–4 мм ширины. Цветет в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет, бассейн реки Тупаланг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Мелкощебнистые осыпи, скопления мелкозема под скалами, местах позднего таяния снега, вдоль ручьев, д.с.б. 2200–3000 м.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенами и клубнями.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование.


Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [142, 233].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Rare endemic species of the southern slope of the Hissar and Darvaz ranges. It is spread at the Surkhandarya region: the Hissar range, the Tupalang. Inhabits screes, formed by small detrit stones, snow melting places under rocks, alongside streams. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



102. АНГРЕН ЗИРАСИ

Буниум ангренский / *Bunium angreni* Korovin

Мақоми 1. Оҳангарон дарёси ҳавзасининг кам-ёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик, туксиз, поликарп эфемероид ўсимлик. Тугунаги шарсимон. Пояси якка-якка, 15 см гача. Барглари ингичка-ланцетсимон бўлакларга уч карра патсимон қирқилган, бўлаклари 10 мм узунликкача. Соябони ўрама баргларсиз, 2–5 шуълали, шуълалар узунлиги 15–20 мм. Соябончаси ўрама баргчаларсиз. Косачасининг тишчалари йўқ. Гултожи оқ, бир хилда эмас, ташқаридагилари ичклиридан йирикроқ. Мева-



си эллипссимон, мева бандидан бир неча марта калтароқ. Май-иунда гуллаб, июнь-июлда мевалайди.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол ва Курама тизмалари (Оҳангарон дарёси ҳавзаси)да.

Ўсиш шароити. 1200–2300 м баландликдаги шағалли ёнбагирларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг бокилиши ва тоғли худудларнинг ўзлаштирилиши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [114, 145].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Статус 1. Редкий эндемик бассейна реки Ахангара.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое голое растение, эфемероид. Клубень шаровидный. Стебли одиночные, до 15 см высоты. Листья тройчато-перисто рассеченные на линейно-ланцетные, до 10 мм длины участки. Зонтики без обверток, 2–5-лучевые, лучи 15–20 мм длины. Зонтики без обверточек. Чашечка без зубцов. Лепестки белые, неодинаковые, наружные крупнее внутренних. Плоды эллиптические, во много раз короче плодоножек, 2,2 мм длины. Цветет в мае-июне, плодоносит июне-июле.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский и Кураминский хребты (в пределах бассейна реки Ахангара).

Места обитания. Щебнистые склоны в диапозоне высот 1200–2300 м.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота, освоение горных территорий.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского биосферного заповедника.

Источники. [114, 145].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Rare endemic species of Akhangaran river basin It is spread at the Tashkent region: the Chatkal and Kurama ranges, of the Akhangaran river basin. Inhabits scree slopes, 1200-1300 m s.l. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing, economic activity in the mountainous area. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere state reserve.



103. НОВБАРГЛИ ЗИРА

Буниум влагалищный / *Bunium vaginatum* Korovin

Мақомы 1. Фарбий Тянь-Шаннинг реликт, кам-еъб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик, умуман туксиз, поликарп ўт ўсимлиқ. Тугунаги шарсимон, диаметри 2 см гача. Пояси якка-якка, 25 см гача. Барглари 2 карра патсимон қирқилган, қалин, тухумсимон-ланцет шаклида кенгайган, ялтироқ новбарглари учидаги бўлаклари ингичка, 10 мм узунлиқда ва эни 1 мм. Соядони ўрама баргларсиз, 5-10 шуълали, шуълалар узунлиги 3-10 мм. Соядончаси 15-20 гулли. Косачасининг тишчалари йўқ. Гултожи оқ, тескари юраксимон, кемтикли, 1,5 мм узунлиқда. Меваси узунчоқ-овалсимон, 3 мм узунлиқда. Май-июнда гуллаб, мевалайди.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Қоржонтовдан бир марта И. И. Мальцев терган. Ўзбекистондан ташқарида: Қозогистон (Талас Олатоги, Сирдарё Коратоги).

Ўсиш шароити. Сувайирғичларнинг яқинидаги тошли-шағалли ёнбағирликлар.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Ўсиш жойлари Угом-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида жойлашган.

Манбалар. [114, 145].

М. Г. Пименов, Е. Клюиков.

Статус 1. Редкий реликтовый эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Совершенно голое поликарпическое травянистое растение, эфемероид. Клубень шаровидный, до 2 см в диаметре. Стебель одиничный, до 25 см высоты. Листья дважды перисто-рассеченные, с кожистыми, яйцевидно-ланцетными расширенными, блестящими влагалищами; конечные доли линейные, до 10 мм длины и 1 мм ширины. Зонтики без обертки, с 5-10 лучами, 3-10 см длины, зонтички 15-20 цветковые. Чашечка без зубцов. Лепестки белые, обратносердцевидные, выемчатые, 1,5 мм длины. Плоды продолговато-ovalные, сжатые со спинки, 3 мм длины. Цветет и плодоносит в мае-июне.

Распространение. Ташкентская область: Западный Тянь-Шань – Каржантау (один раз было собрано И. И. Мальцевым). За пределами Узбекистана: Казахстан (Таласский Алатау, Сырдарьинский Карагатай).

Места обитания. Каменисто-щебнистые приводораздельные склоны гор.

Численность. Сведений нет.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Нет сведений.


Меры охраны. Места произрастания находят-

ся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [114, 145].

М. Г. Пименов, Е. Клюиков.

Rare endemic relictual species of the western Tian-Shan. It is spread at the Tashkent region: the western Tian-Shan, the Karzhantau range (collected once by I.I.Maltzev). Inhabits stony and rubbly mountain slopes near water-sheds. The quantity. is unknown. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal National park.



104. ГАЙСИМОН ДИМОРФОСЦНАДИЙ

Диморфосцинадий гайевидный / *Dimorphosciadium gayoides* (Regel & Schmalh.) Pimenov

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шань ва Помир-Олой-нинг камёб ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик монокарп ўт ўсимлик. Илдизи – ўқ илдиз. Пояси ривожланмаган, кўп сонли шохлари илдиз бўғзи олдидан чиқади, 10 см узунликкача. Баргларининг ҳаммаси илдизолди баргларидан иборат; япроқлари патсимон ёки 2 карра патсимон қирқилган; учидағи бўлаклари овалсимон, тахминан 2 мм узунликда. Сояблонлари икки хил: марказийлари каттароқ, эгилувчан, ёнбошлари майдароқ. Ўрама барг ва баргчалари бутун япроқчалардан ташкил топган. Косачаси тишчаларсиз. Гултожи оқ, тухумсимон, 15 мм узунлиқда. Меваси тухумсимон, туксиз, 4 мм. Июль–августда гуллаб, август–сентябрда мевалайди.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Писком ва Чотқол тизмалари. Ўзбекистондан ташқарида: Қирғизистон, Тожикистон, Фарбий Хитой.

Ўсиш шароити. Баланд тоғларнинг очиқ, шағалли ёнбағирликларида ўсади (2900–3700 м).

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг бениҳоя кўп боқилиши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида ва Уғом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [235].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Статус 2. Редкое растение Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее монокарпическое травянистое растение. Корень стержневой. Стебель не развит, с многочисленными, выходящими из розетки приподнимающимися ветвями, до 10 см длины. Листья все прикорневые; пластинки перистые или дважды перисторассеченные; конечные доли овальные, около 2 мм длиной. Зонтики двойкие: центральные более крупные, сидячие, боковые более мелкие, на верхушках ветвей. Обертки и оберточки из цельных листочков. Чашечка без зубцов. Лепестки белые, яйцевидные, 1,5 мм длины. Плоды яйцевидные, голые, 4 мм длины. Цветет в июле–августе, плодоносит августе–сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Пскемский и Чаткальский хребты, за пределами Узбекистана: Кыргызстан, Таджикистан, западный Китай.

Места обитания. На открытых щебнистых склонах высокогорий (2900–3700 м).

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота.


Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского биосферного заповедника и Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [235].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Rare species of the western Tian-Shan and Pamir-Alay. It is spread at the Tashkent region: the Pskem and Chatkal ranges. Inhabits open rubbly slopes in the alpine belt (2900–3700 m.s.l.). The quantity is unknown. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Chatkal Biosphere state reserve.



105. КОРОВИН ЛОМАТОКАРПАСИ

Окаймленнoplодник Коровина / *Lomatocarpa korovinii* Pimenov

Мақоми 1. Фарбий Тянь-Шаннинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик поликарп ўт ўсимлик. Кўп сонли поялари баргсиз, 5–15 (20) см узунлиқда, туксиз. Баргларининг ҳаммаси илди золди баргларидан иборат, кўп сонли, бандли, туксиз, узунлиги 5–10 см, эни 1–2 см, япроқлари 2 карра патсимон қирқилган; учидаги бўлаклари овалсимон ёки тухумсимон, 3–4 мм узунлиқда, тишчалари бор. Соябонлари 3–10 шуълали, ўрама барг ва баргчалари 5–6 та ланцетсимон япроқлардан ташкил топган. Соябончаси 10 гулли. Косачаси тишчалари тухумсимон. Гултожи оқ, тухумсимон, 15 мм узунлиқда. Меваси тухумсимон, узунлиги 4 мм, эни 3–4 мм. Июнь–июлда гуллаб, июль–августда мевалайди.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Писком, Уғом, Чотқол, Қурама тизмалари. Ўзбекистондан ташқарида: Қирғизистон, Қозоғистон.

Ўсиш шароити. Баланд тоғларнинг шағалли ёнбағирликларида ўсади (3000–3600 м).

Сони. Кичик тўплар ҳолида ўсади. Бошқизилсой юқори қисми (Қўрғонтош ва Қизилнурा чўққиларининг атрофлари) ўсимлик доминантлигидаги кичик жамоалар қайд қилинган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг бениҳоя кўп боқилиши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера кўриқхонасида ва Уғом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [236].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Статус 1. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое травянистое растение с многоглавым каудексом. Стебли безлистные, многочисленные, 5–15 (20) см длины, голые. Листья все прикорневые, многочисленные, на коротких черешках, голые, 5–10 см длины и 1–2 см ширины, дважды перисторассеченные; конечные доли овальные или яйцевидные, 3–4 мм длиной, зубчатые. Зонтики 3–10-лучевые с обертками и оберточками из 5–6 ланцетных или линейных листочков. Зонтички 10-цветковые. Зубцы чашечки яйцевидные. Лепестки белые. Плоды яйцевидные, 4–5 мм длины и 3–4 мм шир. Цветет в июне–июле, плодоносит в июле–августе

Распространение. В Ташкентской и Наманганской областях: Чаткальский, Кураминский, Угамский и Пскемский хребты. За пределами Узбекистана: Кыргызстан, Казахстан.

Места обитания. На щебнистых склонах верхнего пояса гор (3000–3600 м).

Численность. Встречается группами. В верховьях Башкызылсая (окрестности Курганташа и Кызылнурлы) отмечены сообщества с доминированием вида.


Размножение. Семенное. Причины изменения численности и ареала. Летний выпас скота.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского биосферного заповедника и Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [236].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.



Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Tashkent and Namangan regions: the Chatkal, the Kurama, the Ugam and the Pskem ranges. Inhabits rubbly slopes in alpine zone, at the altitude 3000-3600 m.s.l. It grows in groups. In the Bashkizylsai river basin (the Kurgantash, the Kyzylnura mts.) large populations were revealed. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere state reserve and the Ugam Chatkal national park.



106. Ингичка баргли понапанжа

Клинопастник тонкорассеченный / *Sphaenolobium tenuisectum* (Korovin) Pimenov

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шаннинг камёб ва эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик монокарп ўт ўсимлик, баландлиги 40–100 см. Илдизпояси шохланган. Барглари узун барг бандларида жойлашган илдизолди баргларидан иборат; япроқлари кенг ромбсимон, икки ва уч карра қирқилган бўлаклари узун бандчаларда жойлашган, учидаги бўлаклари узунчоқ, узунлиги 10 мм, кенглиги 1,5 мм. Сояблари 5–10 шуъвали, ўрама барг ва баргчалари бутун япроқчалардан ташкил топган. Косачаси тишчалари калта. Гултожи оч сариқ, тухумсимон, 15 мм узунликда. Меваси 6,5 мм узунликкача, тухумсимон-ланцет шаклида, туксиз. Июлда гуллаб, август-сентябрда мевалайди.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Қоржонтов, Писком ва Уғом тизмалари. Ўзбекистондан ташқарида: Қозоғистон.

Ўсиш шароити. Шағалли ёнбағирликлар ва қояларнинг ёриқларида ўсади (д. с. б. 1500–2400 м).



Сони. Якка-якка ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсиш жойлари Уғом-Чотқол миллый табиат боғининг худудида жойлашган.

Манбалар. [234].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Статус 2. Редкое и эндемичное растение Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетний стержневой поликарпик 40–100 см высоты. Стеблекорень разветвленный. Стебли округлые, плотные. Листья преимущественно прикорневые на длинных черешках; пластиинка в очертании широкоромбическая, дважды-трижды тройчаторассеченная; сегменты на длинных чешечках; конечные доли линейные, до 10 мм длины и 1,5 мм ширины. Зонтики 5–10 лучевые с обертками и оберточками из цельных коротких листочек. Лепестки светло-желтые; зубцы чашечки короткие. Плоды до 6,5 мм длиной, яйцевидно-ланцетные, голые. Цветет в июле; плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Каржантау, Пскемский и Угамский хребты. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. На щебнистых осыпях и в трещинах скал (1500–2000 м).

Численность. Встречается одиночно.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не известно.


Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Произрастает на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [234].

М. Г. Пименов, Е. Клюйков.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Tashkent region: the Karzhantau, the Ugam and Pskem ranges. Inhabits rubbly slopes and rock crevices at the altitude 1500-2000 m.s.l. Occurs individually. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



ИСИРИҚДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО МОГИЛЬНИКОВЫЕ (ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ) – PEGANACEAE (ZYGOPHYLLACEAE)

107. ҚҮНФИР ҚУМУЗУМ

Мягкоплодник критмалистный / *Malacocarpus crithmifolius* (Retz.) C.A. Mey.



Мақоми 2. Ўзбекистонда ягона турга эга туркүмнинг реликт тури.

Қисқача тавсифи. Чирмашиб ўсадиган, қишида баргларини тўқадиган бута. Барглари этли, учли-наштарсимон, қирқилган, узунлиги 7 см, эни 6 см. Гули икки жинсли, кўш гулқўргони сариқ. Меваси 3 уяли, кўп уруғли, ясси-юмалоқ, диаметри 1–1,5 см, этли, сершира, қўнфир-қизғиш рангли. Уруғи майда, узунлиги 3 мм. Июнь–сентябрь ойларида гуллаб, меваси июль–октябрда пишади.

Тарқалиши. Қорақалпоғистон: Устюртда тарқалган. Қозогистон, Туркманистан ва Эронда ҳам ўсади.

Ўсиш шароити. Тошлиқларда, шўр тупроқларда, чучук ва маъданли булоқлар атрофида ўсади.

Сони. 2014 йили ўсимликнинг 6 та ценотик популацияси (5 та жанубий, 1 та шарқий чинкда) топилган. Улардаги тупларнинг умумий сони 200 та атрофида.

Кўпайиши. Уруғидан ва илдиз бачкилари орқали кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўзбекистон ҳудудига ўсимлик ўз ареалининг шимоли-шарқий чегараси орқали кириб келган. Аҳоли уни меваси учун йиғади.

Маданийлаштирилиши. Ашхобод ва Шевченко шаҳарларидаги ботаника боғларида кўп йиллардан бери муваффақиятли ўстириб келинмоқда.

Мухофаза чоралари. Махсус мухофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [196].

Ҳ. Ф. Шомурадав.

Статус 2. Редкий реликтовый вид монотипного рода.

Краткое описание. Лианоподобный листопадный кустарник. Листья мясистые, ланцетно-линейные, рассеченные, длиной 7 см и шириной 6 см. Цветки обоеполые, с двойным околоцветником, лепестки лимонно-желтые. Плод – трёхгнездная, многосеменная ягода округло-приплюснутой формы, 1–1,5 см в диаметре. Мякоть плода сочная, оранжево-красного цвета. Семена мелкие, длиной 3 мм. Цветёт в июне–сентябре, плодоносит в июле–октябре.

Распространение. Каракалпакстан: Плато Устюрт. За пределами Узбекистана: Казахстан, Туркменистан и Иран.

Места обитания. Галечники, засоленные почвы близ пресных и минерализованных родников.

Численность. В 2014 г. отмечено 6 ценотических популяций вида (5 на южном чинке и 1 в восточном чинке Устюрта), общей численностью около 200 особей.

Размножение. Семенное и вегетативное (отводками).

Причины изменения численности и ареала. В Узбекистане находится на северо-восточной окраине ареала. Интенсивный сбор местным населением.


Культивирование. Успешно выращивается в ботанических садах Ашгабада, Шевченко.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [196].

Ҳ. Ф. Шомурадав.

Rare, relict and genus species. It is spread at the Ustyurt Plateau (Karakalpakstan). Inhabits pebbles, saline soils near fresh and mineral springs. Limiting factors: Uzbekistan is the north-eastern limit of the distribution area. Intensive collection by local people. Measures of protection: not protected.



ИТУЗУМДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ПАСЛЕННЫЕ – SOLANACEAE

108. ОЛОЙ ХИЁЛИ

Пузырница алайская / *Physochlaina alaica* Korotkova ex Kovalevsk.

Мақоми 1. Олој ва Туркистон тоғларига мансуб жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см га етадиган, кўп йиллик ўт. Поялари кўп, тик, ёйик сийрак, оддий ва бечали туклар билан қопланган. Барглари узун бандли, кенг тухумсимон, япрогининг узунлиги 5–10 см, эни 4–8 см, устки томони деярли туксиз, пастки томони томирлари бўйлаб сийрак туклар билан қопланган. Гуллари қисқа (0,5 см), мевасининг етилишига қараб узайиб борадиган, безчасимон тукли бандларда ўрнашган. Тўпгули ёйик, юқори қисми каллакчасимон. Косачаси безчасимон тукли, узунлиги 0,5 см. Гултожи кўнғироқсимон, узунлиги 10–15 мм, хира пушти рангли. Меваси кўсакча, узунлиги 10–12 мм. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Олој тизмасида, Шоҳимардан ва Сўх дарёларининг ҳавзаларида учрайди. Қирғизистон, Тожикистон (Туркистон тизмаси: Ворух, Хўжабақирган қишлоқлари атрофлари)да ҳам тарқалган.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1800–2000 м баландликда қояларнинг соялари, бутазорларнинг таглари, арчазорлар ва очиқ ерларда ўсади.

Сони. Жуда сийрак тарқалган. Турли ёшдаги ўсимликларнинг умумий сони 8000 тупдан ошмайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маҳаллий аҳоли томонидан доривор ўсимлик сифатида кўплаб ишлатилиши сабабли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Табиий шароитда экиб ўстирилганда ижобий натижа бермаган. ЎзР ФА Ботаника боғида 1973 йилдан бўён ўстириб келинади.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [122, 159].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 1. Редчайший эндемик Алайского и Туркестанского хребтов.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 50 см. Стебли многочисленные, прямостоячие, рыхловолосистые, с примесью железистых волосков. Листья широкояйцевидные, с верхней стороны почти голые, с нижней по главной жилке рыхловолосистые, на длинных черешках, пластинка листа длиной 5–10 см, шириной 4–8 см. Цветки на коротких (0,5 см) и удлиняющихся при плодах железистых цвето-



ножках, собраны в рыхлое соцветие, на верхушке головчатое. Чашечка железистоволосистая длиной 0,5 см. Венчик колокольчатый, длиной 10–15 мм, грязно-кремовый. Коробочка длиной 10–12 мм. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Ферганская область: Алайский хребет – бассейны рек Шахимардан и Сох. За пределами Узбекистана: Кыргызстан, Таджикистан (Туркестанский хребет – окрестности кишлаков Ворух, Ходжабақирган).

Места обитания. В тени скал, под кустарниками, в арчовниках и на открытых полянах в среднем поясе гор, в пределах 1800–200 м над уровнем моря.

Численность. Встречается редко единичными особями. Общая численность разновозрастных растений не превышает 8000 экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Нерациональное использование вида местным населением в качестве лекарственного сырья.

Культивирование. Предпринята неудачная попытка культивирования в природных местах обитания. В Ботаническом саду АН РУз выращивалась с 1973 года.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [122, 159].

К. Ш. Тожибаев.

Rarest endemic of the Alay and Turkestan ranges. It is spread at the Alay range: the Shakhimardan and Sokh valleys (the Ferghana region). Inhabits rock shades, under shrubs, in the juniper stands on open glades in the middle belt of mountains, at a height of 1800-2000 m.s.l. Single specimens rarely can be found. Total number of plants of different age not exceeds 8000 specimens. Limiting factors: irrational use of these species by local population as medicinal raw material. Measures of protection: not protected.



КАРАМДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО КАПУСТНЫЕ (КРЕСТОЦВЕТНЫЕ) – BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

109. ҲИСОР ИСКАНДЕРАСИ

Искандера гиссарская / *Iskandera hissarica* N. Busch

Мақоми 1. Ҳисор тизмасидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30 см га етадиган, поясининг пастки қисми ёғочланган, кўп йиллик ўт. Ёпирма барглари тескари наштарсимон, қисқа бандли, узунлиги 1–8 см, эни 3–15 мм, юлдузсимон тукли. Гулпояси, одатда, баргиз бўлади. Косачабарглари чўзиқроқ, бинафша рангли, узунлиги 8 мм, эни 6,5 мм. Кўзоги юқорига қараган, 3–5 см узунлиқда, кенг наштарсимон ёки чизикли-узунчоқ, юлдузсимон ва безсимон туклар билан қопланган. Май ойида гуллаб, меваси июнъ–июлда етилади.



Тарқалиши. Сурхандарё вилояти: Ҳисор тоғи (Қорақўл, Хондизава Тўпаланг дарёлари-нинг юқори ирмоқлари)да тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори қисмида, қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Кам учрайди, кичик-кичик тўплар ҳосил қиласиди. Тўпаланг дарёси ҳавзасида 3000 тури қайд қилинган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.



Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [46, 263].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 1. Редкий узколокальный эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее растение высотой до 30 см с древеснеющими в нижней части побегами. Листья розеточные, обратноланцетные, короткочерешковые, длиной 1–8 см, шириной 3–15 мм, звёздчатоопущенные, многолучевые. Цветоносные стебли, как правило, безлистные. Чашелистники продолговатые, фиолетовые, длиной около 8 мм, шириной 6,5 мм. Стручки вверх торчащие, длиной 3–5 см, широколанцетно или линейно-продолговатые, опущены звёздчатыми и железистыми волосками. Цветёт в мае, плодоносит в июне–июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – Каракуль, верховья Хандизи и притоки реки Тупаланг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Трещины скал в субальпийском поясе гор.

Численность. Встречается небольшими куртинками. 3000 растений в Тупаланге.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Культивировался в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [46, 263].

К. Ш. Тожибаев.

Rare and endemic of the Hissar range. It is spread at the Hissar range: Karakul, Khan-diz and Tupalang (the Surkhandarya region). Inhabits. cracks of rocks in the subalpine zone. The quantity is 3000 plants in the Tupalang area. Measures of protection: not protected.

110. ТОШБУЗАР ПАРРИЯСИ

Паррия камнеломка / *Parrya saxifraga* Botsch. et Vved.

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шанда ареали бўлинган, эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10 см га етадиган, деярли поясиз кўп йиллик ўт. Қисқа пояси қуруқ барг қолдиқлари билан қопланган. Илдизи кўпбошчали. Ёпирма барглари чўзиқ тухумсимон, қаттиқ, четлари тишли. Гулпоялари баргсиз, оддий, узуналиги 3–7 см. Гуллари бинафша ранги. Меваси қўзоқ, юқорига қараб қарай илган. Уруғи ясси, юмалоқ, эни 2,5–5 мм, ўрта қисмидан учига ва асосига қараб ингичкалаша боради. Июнь ойида гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Наманган вилоятлари: Чотқол тизмасидаги Бетогалик, Кенгоз ва Қўйтош дараларида, Жирдон, Орашон довонларида ўсади.

Ўсиш шароити. Тоғларда 2600–2900 м баландликдаги шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда ёки кичик туплар ҳосил қилиб учрайди. Бу тур тоғларнинг чиқиш қийин бўлган жойларида сақланиб қолган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.


Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Уруғининг униб чиқиш даражаси паст бўлганлиги туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза қилиш тадбирлари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [36, 159].

К. Ш. Тожибаев.



Статус 2. Редкий узколокальный эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее, почти бесстебельное травянистое растение высотой до 10 см. Укороченные стебли покрыты сухими остат-

ками отмерших листьев. Корень многоглавый. Листья в прикорневой розетке, жёсткие, зубчатые, продолговато-яйцевидные. Цветочные стебли безлистные, простые, высотой 3–7 см. Цветки фиолетовые. Плод – стручок, косо-вверх-направленный. Семена плоские, округлые, шириной 2,5–5 мм, к основанию и верхушке суженные. Цветёт в июне, плодоносит в августе.

Распространение. В Ташкентской и Наманганской областях: Чаткальский хребет – урочище Бетагалик, Кенгсаз и Коиташ, перевалы Джирдан, Арашан.

Места обитания. Щебнистые склоны субальпийского пояса гор, в пределах 2600–2900 м.

Численность. Одиночно или небольшими группами. Сохранился в труднодоступных местах.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Слабое семенное возобновление.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [36, 159].

К. Ш. Тожибаев.

Rare and endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal range: Betagalik, Kengsaz and Koitash, the Djirdan and Arashan passes (the Tashkent and Namangan regions). Inhabits slopes of the subalpine belt of mountains at a height of 2600-2900 m s.l. Single specimens or small groups can be found. Reserved in almost inaccessible regions. Limiting factor: bad seed resumption. Measures of protection: not protected.



111. ҚУРАМА ПАРРИЯСИ

Паррия кураминская / Parrya kuramensis Botsch.

Мақоми 1. Фарбий Тянь-Шанда учрайдиган кам-ёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25 см гача етадиган поясиз, каудекси кўп бошчали, кўп йиллик ўсимлик. Барглари илдиз бўғзида тўп бўлиб ўрнашган, оддий, кенг бандли, безчасимон қалин туклар билан қопланган, ўткир учли, япроқчалари йирик тишли. Гулпояси тик, узунлиги 15–18 см, баргсиз, безчасимон тукли. Гуллари бинафша рангли. Кўзоги узунчоқ, ясси, тик, туксиз, бўғим оралиқлари бироз ингичкалашган. Уруғи эллипссимон, бир қатор ўрнашган. Июнда гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Курама тизмасидаги Қамчиқ довонида тарқалган.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 2200–2300 м баландлиқда, сийрак арчазорлар орасида, шағалли тик ёнбағирларда ўсади. Очик, шимоли-шарқий ёнбағирлар уларнинг ўсиши учун қулай жой хисобланади.

Сони. Якка-якка ҳолда ёки 3–5 тупдан иборат ҳолда ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Қамчиқ довони атрофида моллар боқиладиган ерларда ўстанлиги туфайли оёқости бўлиб, камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Матъумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Та-биатда ва маданий шароитда ўстириб, турнинг биологик хусусиятларини ўрганиш лозим.

Манбалар. [36, 159].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 1. Редкий узколокальный эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение высотой до 25 см с много-

главным каудексом. Листья розеточные, простые, с густожелезистым опушением, широкочерешковые, ланцетные, острые, по краю крупнопильчатые. Цветочные стебли высотой 15–18 см, прямостоячие, безлистные, с железистыми волосками. Цветки фиолетовые. Стручки голые, линейные, плоские, вверх направленные, с перетяжками между семенами. Семена эллиптические, однорядные. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Ташкентской и Наманганской областях: Кураминский хребет – перевал Камчик.

Места обитания. Крутые щебнистые склоны на высоте 2200–2300 м над уровнем моря среди разреженных арчовников; предпочитает открытые северо-восточные экспозиции.

Численность. Малочислен, встречается единично или небольшими (3–5 растений) группами.

Размножение. Семенное.


Причины изменения численности и ареала. Произрастает вблизи перевала на трассе скотопрогона, вытаптывается и поедается скотом.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [36, 159].

К. Ш. Тожибаев.



Rare, endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Kurama range: the Kamchik pass (the Tashkent and Namangan regions). Inhabits steep slopes at an altitude of 2200-2300 m, among thinned juniper stands; prefers the open north-eastern exposures. Not numerous, solitary specimens or small (3-5 plants) groups can be found. Limiting factors Grows near the passage on the route of cattle road, trampled down and eaten by cattle. Measures of protection: not protected.



112. ЗАРАФШОН СОХТА КЛАУСИЯСИ

Ложноклаусия зарафшанская / *Pseudoclausia sarawschanica* (Regel et Schmalh.) Botsch.

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг жануби-ғарбий минтақасига хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 60–70 см га етадиган оддий, узун ҳамда безчасимон туклар билан қопланган бир ёки икки йиллик ўт. Якка пояли, тубидан шохланган. Барглари тўмтоқ, чўзиқ, патсимон бўлакли. Гуллари оч бинафша рангли. Қўзоги туксиз ёки тукли, етилганда тасбехсимон. Апрель–май ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Жиззах, Навоий ва Самарқанд вилоятлари: Нурота, Оқтоғ тизмаларида, Зирабулоқ тоғларида ҳамда Зарафшон дарёси водийсидаги паст тоғларда учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмларида шағалли ва майда тупроқли жойларда, шувоқ, бута ва ярим буталар орасида ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда ёки 2–10 тадан тўп-тўп бўлиб учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши ва ургуининг яхши униб чиқмаслиги сабабли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Нурота давлат қўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [37, 159, 228].

К. Ш. Тожибаев.



Статус 2. Редкий эндемик Юго-западного Узбекистана.

Краткое описание. Одно-двухлетнее травянистое растение высотой до 60–70 см, опущенное простыми длинными волосками с примесью железистых. Стебель от основания разветвляется, одиночный. Листья тупые, продолговатые, перистолопастные. Цветки светло-фиолетовые. Стручки голые и опущенные, слабочетковидные. Цветёт и плодоносит в апреле–мае.

Распространение. В Джизакской, Навоийской и Самаркандской областях: хребты Нуратау, Актау, Зирабулакские горы, низкогорья в долине реки Зарафшан.

Места обитания. Щебнистые и мелкоземистые субстраты в нижнем и среднем поясах гор, среди полынников, кустарников и полукустарников.

Численность. Встречается единично и спорадически небольшими (от 2 до 10 экземпляров) группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала.

Выпас и низкая семенная продуктивность.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [37, 159, 228].

К. Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the south-western Uzbekistan. It is spread at the Nuratau, the Aktau ranges, the Zirabulak mountains, the low mountains in the Zaravshan river valley (the Djizakh, the Navoi and Samarkand regions). Inhabits and fine earth substrates in the lower and middle belts of mountains, among sage-brushes, shrubs and semishrubs. Single specimens and sporadically small (from 2 to 10 specimens) groups can be found. Limiting factors: pasturing and low seed productivity. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



113. ЧИМЁН СОХТА КЛАУСИЯСИ

Ложноклаусия чимганская / *Pseudoclausia tschimganica* (Popov ex Botsch. et Vved.) A.V.Vassil.

Мақоми 1. Фарбий Тянь-Шанга мансуб жуда камёб эндемик ўсимликтен.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–50 см, баъзан 100 см гача етадиган узун, оддий ва қисқа безчасимон тувлар билан қопланган икки йиллик ўсимлик. Пояси асосидан шохланган. Ёпирма барглари кўп, тескари наштарсимон, бандли. Гуллари кўнғир тусда, томирлари бинафша ранг, узунлиги 9–11 мм. Кўзоги ясси, тасбехсимон кўринишда, пояга ёпишган, узун тумшуқчали. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилоятини: Фақатгина Чотқол тизмасида тарқалган. Шунингдек, Қирғизистонда ҳам ўсади (Сандалош тизмаси).

Ўсиш шароити. Қояларда, тошли ва шагалли ёнбағирларда, дарё бўйларида тошлоқларда, эриётган қор ўюмлари атрофида ўсади.

Сони. Табиатда кам тарқалган. Якка-якка ҳолда ўсади.


Кўпайиши. Уруғидан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқ маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Аниқ маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Камайиб бориш сабаблари аниқланиши лозим. Ўсиш жойлари Угом-Чотқол миллий табиат боғининг худудида жойлашган.

Манбалар. [37, 159, 228].



К. Ш. Тожибаев.

Статус 1. Очень редкий узкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Двухлетнее растение высотой 30–50, реже до 100 см, с длинными простыми и короткими железистыми волосками. Стебель от основания ветвистый. Листья прикорневые, многочисленные, чешуйчатые. Лепестки коричневые, с фиолетовыми жилками, длиной 9–11 мм. Стручки уплощенные, слабочетковидные, прижаты

к стеблю, с длинным носиком. Цветёт в июне–июле, плодоносит в августе.

Распространение. Ташкентская область: отмечен только на Чаткальском хребте. За пределами Узбекистана: Кыргызстан (Сандалашский хребет).

Места обитания. Скалы, каменистые склоны и осыпи, песчано-галечниковые берега ручьев, вблизи тающего снега.

Численность. Немногочислен. Встречается спорадически единичными особями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [37, 159, 228].

К. Ш. Тожибаев.

Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal range (the Tashkent region). Inhabits rocks, stony slopes and mounds, sandy-pebble banks of streams, near melting snow. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



114. ЮРАКСИМОН ТОРОЛ

Клоповник почтисердцевидный / *Lepidium subcordatum* Botsch. et Vved.

Мақоми 2. Қизилқум ва Устюртда тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40 см гача етадиган, поялари кўп бошчали, кўп йиллик ўт. Илдиз бўғизи тўкилиб кетган эски барг бандларининг пардали қолдиқлари билан ўралган. Поялари 2–3 та ва ундан ҳам кўпроқ, туксиз, шохланган. Барглари қалин тукли, поянинг асосида ўрнашганлари кўп, тескари тухумсимон, тўмтоқ, йирик тишли ёки патсимон бўлинган, бандига қараб ингичкалашиб боради. Гуллаган пайтида шингили тигиз, мевалаш даврига бориб сийраклашади. Косача барглари юмалоқ, тўмтоқ, ташқи томони тукли. Тожбарглари оқ рангли. Меваси тухумсимон кўзоқ шаклида. Ургу майда, кўнғир рангли. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Қарақалпоғистон, Навоий ва Бухоро вилоятлари: Қизилқумдаги қолдиқ тоғлар (Кулжуктоғ, Бўкантоғ ва Султонувайс)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тоғлардаги ола жинсли, шағалли ва қумли тупроқларда тарқалган.

Сони. Маълум эмас. Якка-якка ва 3–5 тупдан иборат тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик уруғлаган вақтда чорва молларининг кўплаб боқилиши унга айниқса жиддий шикаст етказади.

Маданийлаштирилиши. Чўл яловлари унумдорлигини ошириш мақсадида кўп йиллик, сершира емашак ўсимликлари етиштиришни кўпайтириш ЎзРФА

Қизилқумдаги тажриба станциясида экиб ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [64, 159].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий эндемик останцов Кызылкума и Устюрта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение длиной до 40 см. Стебли формируются от многоглавой головки. Шейка корня покрыта пленчатыми остатками черешков отмерших листьев. Стебли от 2–3 до многочисленных, голые, разветвленные. Листья опушены густыми волосками, розеточные, многочисленные, обратнояйцевидной формы, тупые, крупнозубчатые или перисто-раздельные, постепенно суженные в черешок. Кисти при цветках очень плотные, при плодах рыхлые. Чашелистики почти округлые, тупые, по спинке пушистые. Лепестки белые. Стручки яйцевидные, семена коричневые, мелкие. Цветёт в конце апреля–мая, плодоносит в мае–июне.

Распространение. В Каракалпакстане, Навоийской и Бухарской областях: останцевые возвышенности Кызылкумов – Кульджуктау, Букантау и Султанвайс.

Места обитания. На щебнистых и каменистых склонах, на выходах пестроцветных пород, на опесчаниенных почвах по останцовым горкам.

Численность. Не установлена. Встречается одиночно и группами по 3–5 особей.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сильно страдает от перевыпаса в период созревания семян.


Культивирование. Имеются опытные посевы на Кызылкумской пустынной станции АН РУз. Испытывается как сочный многолетний корм с целью фитомелиорации пустынных пастбищ.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [64, 159].

К. Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the Kyzylkum and Ustyurt. It is spread at the Kyzylkum: the Kuldjuktau, the Bukantau and Sultan-Uizdag relict mountains (the Karakalpakstan, the Navoi and Bukhara regions). Inhabits and stony slopes, in outcrops of gypseous rocks, sandy soils on the hills. The quantity is unknown. Single specimens and groups of 3-5 specimens can be found. Limiting factors: suffers from over-pasturing when seed maturing. Measures of protection: not protected.



115. ОЛЬГА ЛЕПИДИУМИ

Клоповник Ольги / Lepidium olgae (R.M. Vinogr.) Al-Shehbaz et Mumm.

Мақоми 2. Нурота тизмасининг камёб эндемик тури.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик ўт ўсимлиқ, илдизпояси тик, йўғонлашган. Пояси 30–70 см баландликда, туксиз, анча йўғон, юқори қисми шохланган. Барглари туксиз, кулранг, этли. Илдиз бўғзидаги барглари йириқ, кенг тухумсимон ёки деярли юмaloқ, пастки қисми торайган, кенг қанотчали бандга эга. Поядаги барглари тухумсимон, бандсиз, секин - аста кичрайиб боради. Гуллари кўп гулли ўсимликнинг тепа қисмидаги шингилларда мураккаб рўвак ҳосил қилиб ўрнашган. Гултожи оқ, узунлиги 8–9 мм. Косачабаргларидан 2 баравар узун. Кўзоқчаси очилмайдиган, тескари тухумсимон, узунлиги 16–20 мм, эни 8–10 мм, сал қабариқли, пишганлари осилиб туради, узун ва қайрилган мева-бандида ўрнашган. Апрель ва майнинг бошларида гуллаб, меваси май-июнда етилади.

Тарқалиши. Жиззах вилояти: Нурота тоғ тизмасининг марказий қисмida тарқалган.

Ўсиш шароити. Тош-чағиртошли, тошли-майдада чағиртошли тоғларнинг ўрта қисмидаги шимолий ва гарбий ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиятда жуда кам, тарқоқ ҳолда бир неча тупдан то ўнлаб ўсимликкача таркиб бўлган кичик-кичик популяциялар учрайди. Умумий сони 1000 тупга яқин.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимликларнинг кичик майдонларда ўсиши, шароитга унча мослашмаганлиги, маҳаллий аҳоли томонидан илдизпояларининг кавлаб олиниб, доривор маҳсулот сифатида ишлатилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [64, 159, 289].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий эндемик хребта Нурагау.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с утолщенным вертикальным корневищем. Стебли высотой 30–70 см, голые, довольно толстые, в верхней половине разветвленные. Листья голые, сизоватые, мясистые. Цветки в многоцветковых верхушечных кистях, собранных в сложное метельчатое соцветие. Лепестки белые, 8–9 мм длиной, в два раза длиннее чашелистиков. Стручочки нераскрывающиеся, обратнояйцевидные, 16–20 мм длиной и 8–10 мм шириной, слегка вздутые, зрелые повислые, на длинных отогнутых плодоножках. Цветёт в апреле – начале мая, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Джизакская область: центральная часть хребта Нурагау.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны нижнего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко, спорадически, небольшими популяциями от нескольких экземпляров до нескольких десятков. Общая численность составляет не более 1000 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала.

Приуроченность вида к ограниченным местообитаниям и заготовка корневищ местными жителями в качестве народного лекарственного средства.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Нурагинского государственного заповедника.

Источники. [64, 159, 289].

К. Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the Nuratau range. It is spread at the central part of the Nuratau range (the Navoyi region). Inhabits stony-rubbish slopes in the lower mountainous zone. About 1 thousands of specimens were revealed. Limiting factors: stenobiont rare species, roots collected by local population for medicinal purposes. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



116. ГОРДЯГИН ҚАТРОНИ

Катран Гордягина / *Crambe gordjagini Sprygin et Popov*

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги жуда камёб эндемик ўсимлиқ.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50–70 см га етадиган, кўп пояли, поясинингасоси хурпайган, дағал тукли, кўп йиллик ўт. Поясининг остки қисмидаги барглари узун бандли, турли даражада ўйилган, тухумсимон ёки лирасимон, кичик бўлакларга аж-ралган. Тўпгуллари рўваксимон, узун шоҳчали. Гуллари тўқ сариқ рангли. Кўзоқчасининг юқори бўғими эллипссимон, силлиқ. Апрель ойида гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Фузор, Тўдадашт, Гулчадашт атрофидаги тепаликларда тарқалган.

Ўсиш шароити. Эфемер, эфемероидлар орасида, шағалли ва гипсли қизил тупроқларда ўсади.

Сони. Фузор атрофидаги тепаликларда бу турнинг мингга яқин туплари сақланиб қолган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.
Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тоғ этакларининг қишлоқ хўжалиги учун ўзлаштирилиши ва чорва молларининг кўплаб боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстириш учун қилинган ҳаракат натижасиз тугади.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [131, 336].

К. Ш. Тожибаев.



Статус 1. Очень редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 50–70 см. Стебли многочисленные, с торчащими югостками волосками у основания. Нижние листья длинно-черешковые, неправильно-выемчатые, яйцевидные или лировидные, с маленькими долями. Соцветие метельчатое, с длинными ветвями. Цветки ярко-жёлтые. Стручок эллипсоидальный, гладкий. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: низкие холмы в окрестностях Гузара, Туда-Дашта, Гульча-Дашта.

Места обитания. Щебнистые холмы и выходы гипсонасных красных глин, среди эфемеров и эфемероидов.

Численность. Около 1 тысячи особей в окрестностях Гузара.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственное освоение зоны предгорий, интенсивный выпас.


Культивирование. Попытка выращивать в Ботаническом саду АН РУз оказалась неудачной.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [131, 336].

К. Ш. Тожибаев.

Very rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the low hills nearby Guzar, Tuda-Dasht, Gulcha-Dasht (the Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits hills and outcrops of gypsum-bearing red loams among ephemeral plants. About 1000 of specimens in the around of Guzar can be found. Limiting factors: economic reclamation of submontane zone, intensive pasturing. Measures of protection: not protected.



117. ВИНКЛЕР СПРИГИНИЯСИ

Спрыгния Винклера / *Spryginia winklerii* (Regel) Popov

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги жуда камёб эндемик ўсимликтік.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик түксиз ўт. Пояси оддий, узунлиги 10–40 см. Барглари этли, бутун, бандлы, чўзиқ-ланцетсизимон, ўткир қирралы. Косачабарглари чўзиқ-чизиқли, бинафшаранг, юқори четлари оқиши пардали, узунлиги 7–10 мм. Гулбарглари қирмизи-бинафша рангда бўлиб, косачабарглардан 2–2,5 марта узун, узун бандли. Мевабандининг узунлиги 5 мм. Кўзоқчалари чўзиқ, ясси, ўроқсимон эгилган, узунлиги 4–8 см, эни 2 мм, калта тумшуқчаси томон ингичкалашган. Март–апрель ойида гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятнанда.

Ўсиш шароити. Кул ранг, бўз тупроқларда ўсади.

Сони. Оқтош атрофидаги тепаликларда бу турнинг 200 га яқин тупи сақланиб қолган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тоғ этакларининг қишлоқ хўжалиги учун ўзлаштирилиши ва чорва молларининг кўплаб боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Мухофаза қилинмайди.

Манбалар. [38].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 1. Очень редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Однолетнее голое, зеленое растение. Стебель простой, 10–40 см длины. Листья мясистые, цельные, черешковые, продолговато-ланцетные, острые. Чашелистики линейно-продолговатые, фиолетово-окрашенные, вверху по краю бело-перепончатые, 7–10 мм длины. Лепестки пурпурно-фиолетовые, в 2–2,5 раза длиннее чашелистиков, длинноноготковые, на верхушке округлые. Плодоножки 5 мм длины. Стручки линейные, четковидные, сплюснутые, серповидно отогнутые, 4–8 см длины, 2 мм ширины, суженные в короткий носик. Цветёт в марте-апреле, плодоносит в мае.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.

Места обитания. Серые глины.

Численность. 200 особей в окрестностях кишлака Акташ.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственное освоение зоны предгорий, интенсивный выпас.

Культивирование. Нет информации.


Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [38].

К. Ш. Тожибаев.



Very rare ornamental endemic species of the southwestern Pamir-Alay. It is spread at the low hills nearby Aktash (the Surkhandarya region). Inhabits grey clays. 200 specimens nearby Aktash can be found. Limiting factors: destroying of habitats and intensive pasturing. Measures of protection: not protected.



КАРМАДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО КЕРМЕКОВЫЕ – LIMONIACEAE (PLUMBAGINACEAE)

118. АННА КИРПИҮТИ

Акантолимон Анны / *Acantholimon annae* Lincz.

Мақоми 2. Ҳисор тоғидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Яримшар шаклидаги тиғиз, ёстиқсімөн, диаметри 10–12 см га етадиган ярим бута. Барғи яшил, деярли ясси-наштарсімөн, узунлиги 2–5 мм, эни 0,5–1,5 мм. Гулпоясі оддий, узунлиги 4–5 см, барғидан узунрок, тұксиз. Бошоғи бир гулли. Косачаси қирмизи, тожбарғи пушти рангли. Июль–август ойларыда гуллаб, сентябрь–октябрда меваси етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилоаты: Ҳисор тизмаси, Тўпаланг дарёси ҳавзасыда тарқалган.

Ұсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги тошли, қоя тошли, тик ёнбағирларда үсади.

Сони. Кам сонлы популяцияси табиатда жуда оз учрайди.

Күпайиши. Уруғидан күпаяди.

Үсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиатда үсимликнинг ҳолати ва сони маҳсус ўрганилмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Маҳсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [11, 177, 178].

И. В. Белолипов.

Статус 2. Редкий эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Полукустарник, образующий плотные полушаровидные подушки до 10–12 см в диаметре. Листья зеленовато-сизые, плоские, ланцетные, длиной 2–5 мм, шириной 0,5–1,5 мм. Цветоносы значительно превышают листья, высотой 4–5 см, простые, голые. Колоски

одноцветковые. Чашечка пурпурная, лепестки розовые. Цветёт в июле–августе, плодоносит в сентябре–октябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет, бассейн реки Тупаланг.

Места обитания. Крутые каменистые и скалистые склоны среднего пояса гор.



Численность. Немногочисленные популяции встречаются крайне редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Состояние популяций и их численность не исследовались.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [11, 177, 178].

И. В. Белолипов.

Rare species of the Hissar range. It is spread at the Hissar range, the Tupalang valley (the Surkhandarya region). Inhabits steep stony and rocky slopes in the middle belt of mountains. Not numerous, population is extremely rare. Limiting factors: population state and their number was not investigated. Measures of protection: not protected.



119. ЕКАТЕРИНА КИРПИҮТИ

Акантолимон Екатерины / *Acantholimon ekatherinae* (B. Fedtsch.) Czerniak.

Мақоми 2. Чотқол тизмасига хос камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Ерга ёпишиб ўсадиган, диаметри 15–40 см орасидаги ёстиқсимон, шохчала-ри бироз күтарилиб ўсуви ярим бута. Барги ясси, наштарсимон ёки учли наштарсимон, узунлиги 2 см, эни 4 мм. Гулпояси 5–20 см, баргидан узун. Гуллари, 3–8 тадан сийрак жойлашиб, бошоқча ҳосил қиласы. Косачаси пушки ёки қирмизи. Тожбарглари пушки рангли. Июль–сентябрь ойларида гуллаб, меваси сентябрь–октябрьда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол тизмасининг Чимён тоғида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори қисмидаги ёнбағирларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уругидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш саблари. Инсон омили таъсирида ҳамда чорва молларининг кўплаб боқилиши туфайли пайхон бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1962 йилдан бери муваффақиятли ўстирилмоқда. Экилганидан уч йил ўтиб, гуллайди, уруғ беради. Уруғидан униб чиқиши кузатилмаган. Нам шароитда яхши ўсади.



Мухофаза чоралари. Махсус мухофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Ўсиш жойлари Угом-Чотқол миллий табиат богининг худудида жойлашган.

Манбалар. [11, 177, 178].

И. В. Белолипов.

Статус 2. Редкий эндемик Чаткальского хребта.

Краткое описание. Подушковидный полукустарник с рапростертными и слегка поднимающимися ветвями 15–40 см в диаметре. Листья плоские, ланцетные или линейно-ланцетные, длиной до 2 см и шириной 4 мм. Цветоносы превышают листья, высотой 5–20 см. Цветки в редких 3–8-колосковых колосьях. Чашечка розовая или пурпурная. Лепестки розовые. Цветёт в июле–сентябре, плодоносит в сентябре–октябре.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский хребет – Большой Чимган.

Места обитания. Горные склоны субальпийского и альпийского поясов.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Антропогенное воздействие: вытаптывается человеком и скотом.


Культивирование. С 1962 года успешно выращивается в Ботаническом саду АН РУз. Цветёт и плодоносит на 3-м году жизни. Самосева не отмечено. Положительно реагирует на подпитывающий умеренный полив.

Меры охраны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [11, 177, 178].

И. В. Белолипов.

Rare endemic species of the Chatkal range. It is spread at the Chatkal range: the Great Chimgan mt. (the Tashkent region). Inhabits mountain slopes of the subalpine and alpine belts. The quantity is unknown. Limiting factors: anthropogenic press. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.




120. МАРГАРИТА КИРПИҮТИ

Акантолимон Маргариты / Acantholimon margaritae Korovin et Lincz.

Мақоми 2. Курама тизмасига мансуб камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Диаметри 25–50 см орасидаги бута. Ер усти қисми ярим шарсимон ғовак ёстиқча ҳосил қилади. Барглари яшил, деярли текис, узун бигизсимон, узунлиги 2–4 см, эни 1–2 мм. Гулпоясининг узунлиги 10–15 см. Бошоқчаси якка-якка жойлашган гуллардан ташкил топган. Ко-сачаси қирмизи, тожбарги пуштиранг. Июль-август ойларида гуллаб, меваси сентябрь-октябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Курама тизмасида Оҳангарон дарёсининг чап томонида тарқалган.



Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги арчазорларда, қояларда, тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Бутун ареали бўйлаб саноқли даражада ўсади ва жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиятда жуда кам тарқалган. Тупларининг ҳолати ва сони маҳсус ўрганилмаган.

Маданийлаштирилиши. ЎзРФА Ботаника боғида 1963 йилдан бошлаб ўстириб келинмоқда. Экилгандан сўнг иккинчи йили гуллаб, уруғ берган, боғ шароитида уруғидан кўпайиши кузатилмаган. Саккиз-тўққиз йилдан сўнг табиий қурий бошлаган ва 15-ийлга келиб барчаси қуриб кетган.

Мухофаза чоралари. Маҳсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [11, 177, 178].

И. В. Белолипов.

Статус 2. Редкий эндемик Кураминского хребта.

Краткое описание. Кустарник, имеющий форму рыхлой полушаровидной подушки 25–50 см в диаметре. Листья зелёные, линейно-шиловидные, длиной 2–4 см, шириной 1–2 мм. Цветоносы длиной 10–15 см. Колоски в одноцветковых колосьях. Чашечка пурпурная, лепестки розовые. Цветёт в июле-августе, плодоносит в сентябре-октябре.

Распространение. Ташкентская область: Кураминский хребет – левобережье реки Ахангаран.

Места обитания. Каменистые склоны среднего пояса гор, скалы, среди арчовников.

Численность. В пределах ареала растёт единичными экземплярами и встречается крайне редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала.

Встречаются малочисленные особи в нескольких популяциях. Их состояние и численность не исследовались.

Культивирование. С 1963 года успешно выращивается в Ботаническом саду АН РУз. Цветёт и плодоносит на 2-м году жизни. Самосева не наблюдалось. Естественное отмирание отмечено на 8–9 году выращивания, массовое – на 15-м.


Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [11, 177, 178].
И. В. Белолипов.

Rare endemic species of the Kurama range. It is spread at the Kurama range: the left bank of the Akhangaran river (the Tashkent region). Inhabits stony slopes in the middle belt of mountains, rocks, among juniper stands.

There are single specimens can be found within area. Limiting factors: not numerous specimens in several populations.

Their state and number were not investigated. Measures of protection: not protected.



121. НУРОТА КИРПИҮТИ

Акантолимон нуратинский / Acantholimon nuratavicum Zakirov

Мақоми 2. Нурота тизмасидаги камёб эндемик түр.

Қисқача тавсифи. Диаметри 20 см келадиган, яримшар шаклидаги поялари жуда тиғиз ёстиқча ҳосил құлувчи ярим бута. Барглари құқимтирашил, уч қирралы, чүзиқ наштарсимон ёки деярли бигизсимон, узунлиги 0,5–1 см, эни эса 0,5–1 мм, қисқа ва қалин туклар билан қолланган. Гулпояси баргидан узунрок, баландлығы 10–15 см. Гуллари бошоқсимон түпгүл ҳосил қиласы.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота тизмасида тарқалған.

Үсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги тошли ва шағалли қуруқ ёнбағырларда үсады.

Сони. Кам учрайди. Кичик популяциялар (20–30 тадан 100–200 тұпгача) ҳосил қиласы.

Күпайиши. Уруғидан күпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш саблари. Табиатан камёб эндемик түр. Чорва бөкіладиган ерларда үстенлигі туфайли оёқости бўлиб, камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Мухофаза чоралари. Нурота давлат қўриқхонасида мухофаза қилинади..

Манбалар. [11, 177, 178, 208].

Н. Ю. Бешко.

Статус 2. Редкий эндемик Нуратау.

Краткое описание. Полукустарник, образующий плотные, довольно высокие полушаровидные подушки до 20 см в диаметре. Листья зелено-вато-сизые, плоско-трёхгранные, узколинейно-ланцетные или почти шиловидные, длиной 0,5–1 см,

шириной 0,5–1 мм, густо и очень короткоопущенные. Цветоносы значительно превышают листья, высотой 10–15 см. Цветки в колосовидных соцветиях. Чашечка густоопущенная, розовая, лепестки розовые. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской и Навоийской областях: хребет Нуратау.

Места обитания. Каменистые и щебнистые сухие склоны среднего пояса гор.

Численность. Встречается спорадически. Образует локальные популяции численностью от 20–30 до 100 и более растений. Общая площадь распространения около 10 тыс. га.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Естественно редкий, узкоэндемичный вид. Страдает от чрезмерного выпаса скота из-за вытаптывания.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [11, 177, 178, 208].

Н. Ю. Бешко.

Rare endemic species of the Nuratau range. It is spread at the Nuratau range (the Djizakh, the Samarkand, the Navoi regions). Inhabits stony dry slopes in the middle belts of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: endemic stenotopic species. Trampling down because of the overpasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



122. Деярли сулисимон кирпийти

Акантолимон почтиосовый / *Acantholimon subavenaceum* Lincz.

Мақоми 2. Нурота тизмасидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Диаметри 30–40 см гача етадиган, яримшар шаклидаги тиканли ёстиқсимон ярим бута. Барглари яшил, ясси уч қиррали, энсиз қалами – бигизсимон, узунлиги 1,5–2,5 см, эни эса 1 мм га яқин, жуда қисқа тукли. Гулпояси баргидан узун, бўйи 10–15 см, туксиз, оддий ёки камшох. Гуллари сийрак бошоқсимон тўпгул ҳосил қиласди. Бошоқчалар 1 гулли. Гулён-баргчали туксиз. Косачаси сийрак тукли, пушти рангли, қирмизи томирли, гултожи ҳам пушти рангли. Июлда гуллаб, меваси август–сентябрь ойларида етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота тизмасининг марказий қисмida тарқалган (Сентабсой, Устуксой).

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги тошли, қуруқ ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда кичик майдонда (тажминан 20–25 км²) тарқалган. Якка ҳолда, баъзан кичик тўп бўлиб учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимликнинг умумий сони ва тўпларининг ҳолати махсус ўрганилмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Мухофаза чоралари. Махсус мухофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Нурота қўриқхонасидаги ҳимоя майдонида ўсади.

Манбалар. [11, 177, 178].

Н. Ю. Бешко.

Статус 2. Редкий эндемик Нурагау.

Краткое описание. Колючий подушковидный полукустарник. Подушки довольно плотные, высокие, полушаровидные подушки до 30–40 см в диаметре. Листья ярко-зеленые, плоско-трёхгранные, узколинейно-шиловидные, длиной 1,5–2,5 см, шириной около 1 мм, очень коротко опущенные. Цветоносы голые, простые или в верхней половине коротко ветвистые, значительно превышают листья, высотой 10–15 см. Цветки в редких колосовидных соцветиях. Колоски 1-цветковые. Прицветники голые. Чашечка 10–11 мм длины, воронковидная, розовая, с темно-пурпурными жилками. Лепестки розовые. Цветёт в июле, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Самаркандской и Навоийской областях: центральная часть хребта Нурагау (Сентабсай, Устуксай).

Места обитания. Каменистые сухие склоны среднего пояса гор.

Численность. Встречается редко, спорадически, немногочисленными популяциями. Площадь распространения примерно 20–25 км².

Размножение. Семенное.


Причины изменения численности и ареала. Естественно редкий степнотопный вид. Угрозу представляет чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Произрастает в буферной зоне Нурагинского государственного заповедника.

Источники. [11, 177, 178].

Н. Ю. Бешко.



Rare endemic species of the Nuratau ridge. It is spread at the central part of the Nuratau ridge: Sentabsay, Ustuksay (the Samarkand and Navoi regions). Inhabits stony dry slopes in the middle mountain belt. Single specimens or small populations occur sporadically. Distribution area is about 20–25 km². Limiting factors:



123. Тухумоёқ илдизбош, цефалоризум

Корнеглав яйценогий / *Cephalorhizum oopodium* Popov et Korovin

Мақоми 2. Жанубий Помир-Олойдаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Күп йиллик, 40–60 см баландлықдаги йўғон илдизли, тухумсимон каудексга ўтувчи ўсимлик. Барча барглари илдиз бўғзида жойлашган, бандли, серэт, ромбсимон, узунлиги 5–15 см, эни 1,5–2,5 см. Гулбанди 2–4 та, тўғри, шохланган, тўпгули бир томонлама жойлашган 5–15 гулли. Косачаси қалин тукли, узунлиги 7–8,5 мм, найчаси ўтсимон, қобирғали, юпқа, кўкимтири, кейинроқ оқарувчи қайтариқли. Гултоғи қизил-бинафша рангли.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Келиф-Шерабод тепаликларида тарқалган. Туркманистанда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Ола жинсли паст тоғлардаги бўз тупроқларда ўсади.

Сони. 2009 йили 13 туп ўсимлик борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ола жинсли ерларнинг қисқариши ва молларнинг боқилиши туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [179, 180, 310].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Редкий эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетник 40–60 см высоты с толстым корнем, переходящим в яйцевидный каудекс. Листья все прикорневые, черешковые, мясистые, сизые, ромбические, 5–15 см длины, 1,5–2,5 см ширины. Цветоносы 2–4, прямые, ветвистые с односторонними 5–15-цветковыми соцветиями. Чашечка густо опущенная, 7–8,5 мм длины, трубка ее травянистая, ребристая, с перепончатым с синеющим, позже белеющим отгибом. Лепестки красновато-фиолетовые. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Келиф-Шерабадская гряда. За пределами Узбекистана – Туркменистан.

Места обитания. Серые глины пестроцветных низкогорий.

Численность. В 2009 г. зарегистрировано 13 растений.

Размножение. Семенное.


Причины изменения численности и ареала. Сокращение площади пестроцветов и выпас.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [179, 180, 310].

Ф. О. Ҳасанов.



Rare endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Kelif-Sherabad range (the Surkhandarya region). Inhabits red sands. 13 plants were registered in 2009. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



КЕЛИНСУПУРГИДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ТИМЕЛЕЕВЫЕ – THYMELAEACEAE

124. АЛЬБЕРТ ҚИСРОНИ

**Викстремия Альберта (рестелла Альберта) / Wikstroemia alberti (Regel) Domke
(= Restella albertii (Regel) Pobed.)**

Мақоми 3. Помир-Олой ва Гарбий Тянь-Шань тоғларида учрайдиган камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1,5 м га етадиган бута. Эскирган шохлари қўнғир, кулранг, ёш новдалари ётиқ тукли. Барглари наштарсимон, 1,5–3 см узунлиқда, эни эса 0,5–1,5 см, асоси понасимон, учи тўмтоқ, ҳар икки томони тукли, пастдагилари бандсиз. Гуллари 5–13 тадан соябонсимон бошча тўпгул ҳосил қиласди. Гулбанди 1,5 см яшил, ётиқ тукли. Тожбарглари сариқ. Ёнғоқ мевали, қуриган гулқўрғон бўлаклари билан ўралган. Июнь–июль ойида гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Наманган ва Сурхондарё вилоятлари: Гарбий Тянь-Шань (Чотқол, Писком, Курама тизмалари) ва Помир-Олойда (Хисор тизмасининг жанубий ёнбағри, Бойсун тоғлари)да тарқалган. Тожикистон ва Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Арчазорлар орасида, сернам ва юмшоқ тупроқларда ўсади.

Сони. Кам учрайди, кичик тўплар ҳосил қиласди.



Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Чотқол давлат биосфера кўриқхонаси ва Уғом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [205, 239].

Р. И. Қозоқбоев.

Статус 3. Редкий вид Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Краткое описание. Кустарник высотой до 1,5 м. Старые побеги буро-серые, молодые прижато-пушенные. Листья ланцетные, длиной 1,5–3 см и

ширина 0,5–1,5 см, клиновидные при основании, тупые на вершине, с обеих сторон волосистые, короткочерешковые, нижние сидячие. Цветки по 5–13 в головчато-зонтиковидных соцветиях. Цветоносы длиной до 1,5 см, зелёные, прижато-пушенные. Венчик жёлтый. Плод-орешек, заключен в остающийся засохший околоцветник. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Ташкентской, Наманганской, Сурхандарьинской областях: Западный Тянь-Шань (Пскемский, Чаткальский, Кураминский хребты); Памиро-Алай (южный склон Гиссарского хребта, Байсунские горы). За пределами Узбекистана: Таджикистан, Кыргызстан.

Места обитания. Мягкие увлажненные субстраты, в арчовниках.

Численность. Встречается редко, небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском биосферном заповеднике и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [205, 239].

Р. И. Казакбаев.

Rare species of the western Tien-Shan and Pamir-Alay. It is spread at the western Tien-Shan: the Pskem, the Chatkal, the Kurama ranges; the Pamir-Alay: the southern slopes of Hissar range, the Baysun mountains (the Tashkent, the Namangan, the Surkhandarya regions). Inhabits soft wet substrates, in the juniper stands. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park.



КОВУЛДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО КАПЕРЦЕВЫЕ - CAPPARACEAE

125. РОЗАНОВ КОВУЛИ

Каперцы Розанова / *Capparis rosanowiana* B. Fedtsch.

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимликтік.

Қисқача тавсифи. Бүйі 1 м га етадиган серпоя ва сертикан күп йиллик ўт. Пояси ер бағырлаб ўсади. Барглари чўзиқ, наштарсимон. Гуллари барг қўлтиғида биттадан ўрнашган, тўғри, сариқ рангли, кўп чангчили. Меваси кўсақдай, наштарсимон, узунлиги 30 см га етади, кўнғир рангли, кўндаланг томирли. Май-июнь ойларида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: фақат Боботогда ўсади. Асосан, Жанубий Тожикистанда тарқалган. Мавжуд гербариyllарга қараганда, бу тур илгари Оқтоғ ва Хўжақозиёнда ҳам ўсан.

Ўсиш шароити. Очилиб қолган ола жинсларда, баъзан оҳактошларда ва нураган қум тошларда ўсади.

Сони. Табиатда онда-сонда якка-якка ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу турнинг камайишига у ўсадиган ерларнинг ҳар хил мақсадлар учун ўзлаштирилиши сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида экиб ўстириш учун қилинган ҳаракат натижа бермаган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [159, 262].

Т. Т. Раҳимова.

Статус 1. Редкий эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с многочисленными простертными, колючими побегами длиной до 1 м. Листья продолговато-ланцетные. Цветки в пазухах листьев одиночные, правильные, жёлтые, многотычиночные. Плод – коробочка, ланцетной формы, длиной до 30 см, бурый, с продольными жилками. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: встречается только в горах Бабатаг. Основная часть ареала находится в Южном Таджикистане. Сборы свидетельствуют о том, что этот вид раньше произрастал также на Актау и Ходжа-Казианне.

Места обитания. Обнажения песчанников, известняков и разрушенные песчанники.

Численность. Встречается спорадически единичными особями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение территорий под сельхозкультуры.


Культивирование. Попытки вырастить в Ботаническом саду АН РУз оказались неудачными.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 262].

Т. Т. Раҳимова.

Rare endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Babatag range (the Surkhandarya region). Inhabits the gypseous slopes. The quantity is unknown. Limiting factors: reclamation of area under crops. Measures of protection: not protected.



126. ГОРДЯГИН КЛЕОМАСИ

Клеоме Гордягина / Cleome gordjaginii Popov

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойнинг ўта камёб, реликт ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Поялари 50–120 см баландликдаги, сарғиш момиқ тукли бир йиллик ўт ўсимлиқ. Барглари тухумсимон, момиқ тукли, узунлиги 4–5 мм, эни 3–3,5 мм. Косачабарглари ланцетсимон, 3 таси бир хил, 4-си ийрикроқ, 7 мм гача. Чангчилари 6 та. Кўсаги 25–50 мм узунлиқда, эни 1,5–2 мм, ўткир бурунчали, безли туклари бор. Августда гуллаб, сентябрда мевалайди.

Тарқалиши. Сурхондарё: Келиф-Шеробод тепаликлари. Ўзбекистондан ташқарида: Туркманистон (Копетдоғ).

Ўсиш шароити. Гипсли ёнбағирликлар.

Сони. 2009 йилда 20 тути топилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўп боқилиши, турнинг реликтилиги ва ола жинсли майдонларнинг қисқариб бориши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [262, 310].

Т. Т. Раҳимова.

Статус 1. Редчайший реликтовый вид Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Однолетник с желтоватыми, волночно-опущенными стеблями, 50–120 см высоты. Листья яйцевидные, волночно-опущенные, 4–5 см длины. Чашелистики ланцетные, 3 одинаковые, 4-й крупнее до 7 мм длины. Лепестки желтые, 6–8 мм длины, 3–3,5 мм ширины.

Тычинок 6. Коробочка 25–50 мм длины, 1,5–2 мм ширины, железистые, с острым носиком. Цветет в августе, плодоносит в сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: Келиф-Шерабадская грязда. За пределами Узбекистана: Туркменистан (Копетдаг).

Места обитания. Гипсированные склоны.

Численность. В 2009 г. зарегистрировано 20 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас, реликтовость вида и сокращение пестроцветов.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [262, 310].

Т. Т. Раҳимова.

Rarest relict endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Kelif-Sherabad range (the Surkhandarya region). Inhabits the gypseous slopes. 20 plants were revealed in 2009. Limiting factors: relict species, decreasing of the gypseous habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.



ЛОЛАДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ЛИЛЕЙНЫЕ – LILIACEAE

127. ЛЮДМИЛА БОЙЧЕЧАГИ Гусиный лук Людмилы / *Gagea ludmilae* Levichev

Мақоми 1. Чотқол тизмасидаги кичик майдонларда тарқалған эндемик ўсимлик.

Қисқачатавсифи. Күп йиллик пиёзли ўсимлик. Пиёзининг диаметри 6–8 мм, ёш пиёзчаларидан 4–6 та, узуунлиги 1–5 см келадиган, учидаги биттадан пиёзчалар ўрнашган поячалар ўсиб чиқады. Илдизолди барғи новсимон, учи ўткирлашган. Поядаги барглари тўпгулининг пастки қисмида ҳалқа ҳосил қилиб жойлашган. Гулқўрғонининг узуунлиги 10–15 мм. Уруғи ясси. Апрелда гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: фақат бир жой (Паркент шаҳрининг жануби-шарқий қисми) да ўсиши маълум.

Ўсиш шароити. Соз тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кичик майдонда тарқалған, ёш ниҳоллар ҳисобига кўпдек туюлади. Гуллаб турган туплари ниҳоятда сийрак.

Кўпайиши. Асосан, вегетатив равишда кўпаяди, уруғидан кўпайиши кам кузатилади.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари.

Бу тур ўсиб турган ерлар (адир)да узлуксиз равишда деҳқончилик қилиниши ва чорва молларининг боқилиши оқибатида камайиб бормоқда. У, асосан, вегетатив усул билан кўпайиши ҳисобига сақланиб қолмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Мухофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Унинг тарқалишини ва эзма шароитда биологик хусусиятларини ўрганиш зарур.

Манбалар. [160].

И. Г. Левичев.

Статус 1. Редкий, узкий эндемик Чаткальского хребта.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение. Луковица 6–8 мм в диаметре, у ювенильных особей от луковицы отходят 4–6 стволов длиной 1–5 см с одиночными вегетативными луковичками на конце. Прикорневой лист желобчато-угловатый, постепенно заострённый. Стеблевые листья собраны в мутовку у основания соцветия. Листочки околоцветника длиной 10–15 мм. Семена плоские. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Ташкентская область: отмечен в 1 точке к юго-востоку от города Паркент.

Места обитания. Глинистые травянистые склоны.

Численность. Встречается на небольшом участке, где довольно обилен за счёт множества ювенильных особей; генеративные растения очень редки.

Размножение. В основном – вегетативное, в меньшей степени – семенное. Причины изменения численности и ареала. Произрастает в интенсивно эксплуатируемой адирной зоне (богарное земледелие и выпас). Сильно стравливается скотом. Только высокая эффективность вегетативного размножения спасает вид от уничтожения.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Необходимы уточнение распространения и изучение биологических особенностей в культуре.

Источники. [160].

И. Г. Левичев.

Rare, endemic species of the Chatkal range. It is spread at the 1 point to the south-east from Parkent (the Tashkent region). Inhabits clayish grassy slopes. Grows on a small area nearby reserve. Limiting factors: grows in the intensively used adyr zone (unirrigated crops and pasturing). Damage caused by pasturing cattle. Measures of protection: not protected.



128. ХОЛМОН ИСИРҒАГУЛИ

Рябчик Эдуарда / *Fritillaria eduardii* Regel

Мақоми 1. Ўзбекистонда камайиб бораётган ва ареали ажралган эндемик ўсимлик.

Кисқача тавсифи. Пояси баргли, 40–80, баъзан 150 см га етадиган пиёзли, кўп йиллик ўт. Барглари ялтироқ, яшил, пастки барглари кенг чўзиқ, баъзан поядга ҳалқа ҳосил қилиб жойлашади. Поянинг энг юқори қисмидагилари наштарсимон, ҳалқа шаклида ўрнашган. Гуллари кўнғироқсимон, пастга қараб осилиб туради, қизғиши, қирмизи-кўнғир рангли, 2–8 тадан бўлиб, соябонсимон тўпгул ҳосил қиласди. Меваси юқорига қараб тик турувчи, қисқа бандли, эни 4–5 см, энсиз қанотчали қутичага ўхшайди. Апрелда гуллаб, меваси май ойида етилади. Ажойиб, хушманзара ўсимлик.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари фоят чиройли, гуллаган пайтида маҳаллий халқ томонидан териб олинади, пиёзлари эса қазиб олинниб, истеъмол қилинади. Шу сабабли, кескин камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маданийлаштирилган. Кўплаб ботаника боғларида, жумладан, ЎзРФА Ботаника боғида 1955 йилдан буён экиб ўстирилиши лозим.

Манбалар. [187].

А.Х. Шарипов.

Статус 1. Редкий в Узбекистане вид с разорванным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение с облиственным стеблем высотой обычно 40–80 см, реже 150 см. Листья зелёные, блестящие; самые нижние иногда почти мутовчатые, широко-продолговатые; самые верхние – мутовчатые, ланцетные. Цветки колокольчатые, кирпично- или пурпурно-коричневые, поникшие, собраны по 2–8 в зонтиковидное соцветие. Плод – вверх торчащая коробочка на короткой ножке, шириной 4–5 см, с узкими крыльями. Цветёт в апреле, плодоносит в мае. Весьма декоративен.

Распространение. В Сурхандарьинской и Ферганской областях: Хребты Бабатаг, Гиссарский, Алайский; долина реки Сох. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Афганистан.

Места обитания. Среди кустарников под деревьями. Реже на каменистых, сырых россыпях известняка в среднем поясе гор, до 2100 м.

Численность. Сведений нет.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор растений на букеты и заготовка населением луковиц для употребления в пищу.

Культивирование. Введён в культуру. Интродуцирован многими ботаническими садами. С 1955 года выращивается в Ботаническом саду АН Руз.

Меры охраны. Необходимы организация заказников в местах массового распространения, массовое размножение в хозяйствах декоративного садоводства.

Источники. [187].

А.Х. Шарипов.

Rare endemic species of Uzbekistan with the reducing area. It is spread at the Babatag, the Hissar, the Alay ranges; the Sokh river valley (the Surkhandarya and Fergana regions). Inhabits shrubs under trees, rarely stony, wet chalk-stone fields in the middle belt of mountains, up to 2100 m.s.l. The quantity is unknown. Limiting factors: picking of flowers and laying-in of bulbs used in food. Measures of protection: it is necessary to create state reserves in places of mass distribution, mass reproduction in ornamental gardening.



Тарқалиши. Сурхондарё, Фарғона вилоятлари: Боботоғ, Ҳисор, Олой (Сўх дарёсининг ҳавзаси) тизмаларида тарқалган. Тожикистанда, Афғонистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 2100 м баландликда дарахт ва буталар орасида, баъзан сернам тошли ҳамда оҳактошли сурilmаларда ўсади.

Сони. Ўзбекистонда жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.



129. ВВЕДЕНСКИЙ ЛОЛАСИ

Тюльпан Введенского / *Tulipa vvedenskyi* Botschantz.

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Тянь-Шанда ўсувчи камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–35 см га етадиган кўп йиллик, пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 2–3 см, тўқ-қўнғир рангли, қобиғи қофозсимон. Барглари 3–4 та, эгри-бугри. Гуллари биттадан, қизил рангли. Гулининг туби сариқ, чангчий иллари сариқ ёки қўнғир, чангдонлари сариқ ёки қорамтирибинафша рангли. Апрель–май ойларида гуллаб, июнь–июлда меваси етилади.

Тарқалиши. Курама ва Чотқол тизмаларида, асосан, Оҳангарон дарё водийсида ўсади (Тошкент, Наманган вилоятлари).

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1600–2000 м баландликда туб жинсларда, шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда кичик гурухлар ҳосил қилган ҳолда тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан ва пиёзи орқали қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабабларни. Гул ва пиёzlари кўплаб йиғиб олиниши ҳамда чорва молларининг боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғида 1956 йилдан бўён экиб келинади.

Муҳофаза чоралари. Айрим популяциялари Чотқол давлат биосфера қўриқхонаси ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади. Табиатда ўсиб турган тупларини назорат остига олиш лозим.

Манбалар. [50, 60, 288, 291, 338].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 20–35 см. Луковица яйцевидная, 2–3 см в диаметре, с темно-коричневыми бумагообразными чешуями. Листья в числе 3–4, зеленоватые, волнистые. Цветок одиночный, красный. Центр цветка желтый; тычиночные нити желтые или ко-

ричневые, пыльники желтые или черно-фиолетовые. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в июне–июле.

Распространение. Кураминский и Чаткальский хребты, главным образом, бассейн реки Ахангаран (В Ташкентской и Наманганской областях).

Места обитания. Выходы коренных пород и маломощные щебнистые почвы в среднем поясе гор, на высоте 1600–2000 м над уровнем моря.



Численность. Встречается спорадически, в виде небольших популяций.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и луковиц, выпас.


Культивирование. С 1956 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Некоторые популяции охраняются на территории Чаткальского биосферного заповедника и Угам-Чаткальского национального парка. Необходим контроль за численностью.

Источники. [50, 60, 288, 291, 338].

К. Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Kurama and Chatkal ranges, mainly in the Akhangaran river basin (the Tashkent and Namangan regions). Inhabits outcrops of bed rocks and weak soils in the middle belt of mountains, at a height of 1600-2000 m. Single specimens and small populations occur sporadically. Limiting factors: mass picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park.



130. МИХЕЛ ЛОЛАСИ, ДИЛБАНД ЛОЛА


Тюльпан Михели / *Tulipa micheliana* T.M. Hoog**Мақоми 3.** Ғарбий Помир-Олойга хос камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–30 см оралиғидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, қорақўнгир чармисимон қобигининг ички томони ётиқ туклар билан қопланган. Барглари 3–4 та, йўл-йўл бинафша доғли. Гули якка, йирик, диаметри 10 см гача бўйлиб, қизил рангдан тўқ пушти рангача. Ўзига хос қадаҳсимон шаклда. Гулининг туби қора, сариқ гардишли, баъзан гардишсиз. Чангчи иплари қора, чангдонлари бинафша рангли, баъзан сариқ. Март–апрель ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Нурота тоғлари, Писталитоғ, Молгузар, Зарафшон, Кўхитанг, Ҳисор тизмаларида тарқалган (Жиззах, Навоий, Самарқанд, Қашқадарё, Сурхондарё вилоятлари). Тожикистон ва Туркманистонда ҳам тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоголди текисликлари ва адирлардаги тошли ва соз тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кам, якка ҳолда ва кичик туплар ҳолида учрайди. Нурота тизмасининг тоголди текисликларида бир гектар майдонда туплар сони бир нечадан 100–



200 донагача етади. Шунингдек, Нурота тизмасидаги Устуксойнинг юқори қисмида (1600 м) ҳам ўсиш жойи маълум.

Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари боқилиши ва ўсимлик гулининг тереб олиниши сабабли камаймоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1956 йилдан бўён ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Нурота ва Сурхон давлат қўриқхоналарида муҳофаза қилинади. Табиятда ўсиб турган жойлари қатъий назорат остига олиниши лозим.

Манбалар. [50, 60, 291, 339, 357].

А. Х. Шарипов.

Статус 3. Редкий вид Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 20–30 см. Луковица яйцевидная с кожи-

стыми, чёрно-бурыми, с внутренней поверхности прижатоволосистыми покровными чешуями. Листья в количестве 3–4, сизые, с полосатыми антоциановыми пятнами. Цветок одиночный, от ярко-красного до тёмно-малинового, очень крупный, до 10 см в диаметре, оригинальной бокаловидной формы. Центр цветка чёрный с жёлтым окаймлением, иногда без него. Тычиночные нити чёрные, пыльники фиолетовые, изредка жёлтые. Цветёт в марте–апреле, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Нуратинские горы; хребты Писталитау, Мальгузар, Зарафшанский хребет; Кугитанг, Гиссарский (Джизакская, Самаркандская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области). За пределами Узбекистана: Таджикистан, Туркменистан.

Места обитания. Подгорные равнины, каменистые и глинистые склоны предгорий и нижнего пояса гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами и небольшими популяциями. На подгорной равнине Нуратау, обилие от нескольких экземпляров на гектар до 100–200 на га. Известно также одно местообитание в среднегорье Нуратау, в верховьях Устук-сая, на высоте 1600 м.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветов, выпас.

Культивирование. С 1956 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском и Сурханском заповедниках. Необходим строгий контроль за состоянием популяций.

Источники. [50, 60, 291, 339, 357].

А. Х. Шарипов.

Rare species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Nuratau mountains; the Pistaletau, the Malguzar, the Zaravshan, the Hissar, the Kughitang ranges (the Djizakh, the Samarkand, the Navoi, the Kashkadarya, the Surkhandarya regions). Inhabits stony and clayish slopes of the submontane zone and lower belt of mountains. Single specimens and small populations can be found. Limiting factors: picking of flowers, pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau and Surkhan state nature reserves. Monitoring of populations is necessary.



131. ФАРФОНА ЛОЛАСИ, ЖАВФАЗА ЛОЛА

Тюльпан ферганский / *Tulipa ferganica* Vved.

Мақоми 2. Фарфона водийсининг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тасифи. Бўйи 15–40 см га етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, қобиғи қорамтири-кўнгир, қаттиқ-чармсимон, ички томонининг юқори қисми ва асоси ётиқ тукли. Барглари тукли, юқори қисмидагилари эгри-буғри. Гули якка, сарик, ташқи томони кўкимтири-пушти рангли, гул туби сап-сарик. Чангчи иплари қизғиши сарик, чангдони қизғиши рангли. Апрель-май ойларида гуллаб, меваси июнь-июлда етилади.

Тарқалиши. Чотқол, Фарфона, Олой тизмаларининг пастки қисмида тарқалган (Фарфона, Наманган ва Андижон вилоятлари). Қирғизистонда ҳам учрайди.



Ўсиш шароити. Адир ва тоғлардаги тошли ва майдада зарра тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиятда якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гул ва пиёzlари йигиб олиниши ва чорва молларининг боқилиши туфайли камайиб бормоқда. Илгари Фарфона шахри атрофларида ўстганилиги маълум.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1957 йилдан бўён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди. Табиятда ўсиб турган тупларини қатъий назорат остига олиш лозим.

Манбалар. [50, 60, 291, 292, 340].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 10–50 см. Луковица яйцевидная, с черно-коричневыми, крепкими, кожистыми,

с внутренней стороны у вершины и при основании прижатоволосистыми покровными чешуями. Листья сизые, пушистые, верхние – курчавые. Цветки в числе 1–3, жёлтые, снаружи сизовато-розовые, центр ярко-жёлтый. Тычиночные нити оранжево-жёлтые, пыльники оранжевые. Цветёт в апреле-мае, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Чаткальский, Ферганский и Алайский хребты (Наманганская, Андижанская и Ферганская области).

Места обитания. Каменистые и мелкоземистые склоны, от предгорий до среднего пояса гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветов и луковиц, выпас. Ранее растение произрастало в окрестностях г. Фергана.


Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУЗ с 1957 года.

Меры охраны. Не охраняется. Необходим строгий контроль за состоянием популяций.

Источники. [50, 60, 291, 292, 340].

К. Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the Ferghana valley. It is spread at the Chatkal, Ferghana and Alay ranges (the Namangan, the Andijan and Fergana regions). Inhabits stony and fine earth slopes, from foothills to the middle belt of mountains. Single specimens can be found. Limiting factors: picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: not protected. Monitoring of populations is necessary.



132. ЛЕМАН ЛОЛАСИ, ЖОВҚОСИН ЛОЛА
Тюльпан Леманна / *Tulipa lehmanniana* Mercklin ex Bunge

Мақоми 3. Ўзбекистондаги камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–25 см орасида-
ги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон,
диаметри 1,5–4 см. Қобиги чармсимон, қора-
қўнгир, ер юзасигача давом этади. Барглари
3–4 та, эгри-буғри. Гули якка, сариқ, тўқ сариқ
ёки қизил, туби қора, жигарранг доғли. Чангчи
иплари, чангдонлари сариқ. Март–апрель ойла-
рида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Бухоро, Навоий ви-
лоятлари; Нурота тоғларининг тоғолди те-
кисликлари; Қизилқумда: Конимех чўлида,
Кулжуқтоғ, Букантоғ, Оқтоғ, Томди ва Дар-
воза қолдик тоғларида, Жануби-шарқий
Қизилқумда тарқалган. Қозогистон, Туркманистон,
Тожикистон, Афғонистон, Покистон ҳамда
Эронда учрайди.

Ўсиш шароити. Қумли чўлларда, қолдик
тоғларда, қумли, тош-шағалли ёнбағирларда,
ола жинслари ер юзасига чиқиб қолган жойлар-
да ўсади.

Сони. 2014 йилда Қизилқум ҳудудида қайд
этилган 8 та ценотик популяциясида 4000 туп
атрофида борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан кўпаяди.

**Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш
сабаблари.** Гуллари териб олиниши ва чор-
ва молларининг боқилиши сабабли қисқариб
бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника
боғида 1956 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилин-
майди. Ўсиб турган жойлари назорат қилинмоғи
лозим.

Манбалар. [50, 60, 291, 357].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 3. Редкий вид в Узбекистане.

Краткое описание. Многолетнее лукович-
ное растение высотой 15–25 см. Луковица яй-
цевидная, 1,5–4 см в диаметре, с крепкими, ко-
жистыми, черно-бурыми, до поверхности земли
продолженными покровными чешуями. Листья
в количестве 3–4, курчавые. Цветок одиночный,
желтый, оранжевый или красный, с черно-ко-
ричневым пятном в центре. Тычиночные нити
и пыльники желтые. Цветёт в марте–апреле,
плодоносит в мае–июне.



Распространение. В Джизакской, Бухарской, Навоийской областях: подгорная равнина Нуратинских гор; Кызылкумы: Канимехчуль, горы Дарбаза, Тамдытау, Актау, Кульджуктау, Букантау, Юго-восточный Кызылкум. За пределами Узбекистана: Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Иран.

Места обитания. Опесчаненные каменисто-щебнистые склоны и выходы пестроцветных пород в останцовных низкогорьях, песчаные и супесчаные равнины.

Численность. В 2014 г. в пределах 8 ценотических популяций отмечено около 4000 особей.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и выпас.


Культивирование. С 1956 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники. [50, 60, 291, 357].

К. Ш. Тожибаев.

Nuratau mountains, the Kyzylkum: the Kanimekhchul, the Darbaza, the Tamdytau, the Aktau, the Bukantau, the Kuldjuktau relict mountains (the Djizakh, the Navoi and Bukhara regions). Inhabits sandy stony-slopes and gypseous rocks in remnant hills, sand and sandy-loam deserts. Single specimens and small populations can be found. Reasons of decreasing: mass picking of flowers and pasturing. Measures of protection. Do not protected. Monitoring of populations is required.



Very rare species of Uzbekistan with the reducing area. It is spread at the piedmont plains of the



133. КОРОЛЬКОВ ЛОЛАСИ

Тюльпан Королькова / *Tulipa korolkowii* Regel

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Тянь-Шань ва Помир-Олойдаги ажралган камёб эндемик ўсимлиқ.

Кисқача тавсифи. Бўйи 10-20 см га етадиган кўп иyllик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 2,5 см, қобиги ички томонининг юқори қисми сертук. Барглари 3 та, эгри-буғри. Гули якка, қизил, туви қора. Чангчи ипларининг пастки қисми қора, юқори қисми эса қизил. Баъзан чангчи иплари қора ёки қизил. Чангдони сариқ. Март-апрель ойларида гуллаб, меваси июнь-июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Жиззах, Самарқанд, На-воий, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Қурама тизмасида (Абжассой, Кендирадновон), Нурота тоғлари, Писталитоғ, Кўҳитанг, Бойсун, Боботоғда, Туркистон, Молгузар, Зарафшон, Ҳисор тизмаларида тарқалган. Қозогистон ва Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Қум-шағалли ҳамда тошли ёнбагирларда ва ола жинсли ерларда ўсади.

Сони. Табиатда тўп-тўп бўлиб ва якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари узиб ва пиёzlари қазиб олиниши ҳамда чорва молларининг боқилиши сабабли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1956 йилдан бўён экиб ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Нурота, Зомин, Китоб, Ҳисор, Сурхон давлат қўриқхоналарида ва Зомин миллий табият боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [50, 60, 291, 341, 357].

А. Ҳ. Шарипов.



Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая с разрозненным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 10–20 см. Луковица яйцевидная, до 2,5 см в диаметре, с внутренней стороны у верхушки с волосисто-шерстистыми покровными чешуями. Листья в количестве 3, очень курчавые. Цветок одиночный, красный, центр цветка черный. Тычиночные нити внизу черные, вверху ярко-красные, иногда все тычиночные нити целиком черные или красные. Пыльники желтые. Цветёт в марте–апреле, плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Ташкентской, Джизакской, Самаркандской, Навойской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Кураминский хребет (Абжассай, Кендырдаван), Нурагинские горы, хребты Писталитау, Байсунтау, Бабатаг, Кугитанг, Туркестанский, Заразшанский, Гиссарский. За пределами Узбекистана: Казахстан и Таджикистан.

Места обитания. Щебнистые, каменистые склоны и выходы пестроцветов.

Численность. Встречается немногочисленными популяциями и единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и луковиц, выпас.

Культивирование. С 1956 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Нурагинском, Зааминском, Китабском, Гиссарском и Сурханском заповедниках, Зааминском национальном парке.

Источники. [50, 60, 291, 341, 357].

А. Х. Шарипов.

Rare endemic species of the south-western Tien-Shan and Pamir-Alay with the reducing area. It is spread at the south-western Tien-Shan: Kurama range, the Pamir-Alay: the Nuratau, the Baysuntau and Babataq mountains, the Pistaletau, the Malguzar, the Turkestan, the Zeravshan, the Kughitang and Hissar ranges (the Tashkent, the Djizakh, the Samarkand, the Navoi, the Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits and stony slopes and outcrops of gypseous rocks. Not numerous populations, single specimens can be found. Limiting factors: mass picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: protected in the Zaamin, the Nuratau, the Kitab, the Hissar and Surkhan state reserves and the Zaamin national park. It is necessary to control number and to extend area of this cultivation.



134. ҚАРДОШ ЛОЛА, НУРОТА ЛОЛАСИ

Тюльпан родственный / *Tulipa affinis* Botschantz.



Мақоми 3. Фарбий Помир-Олайдаги камёб эндемик ўсимлиқ.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–25 см оралиғидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи чўзиқ-тухумсимон, диаметри 2–4 см. Қобиги қоғозсимон, узун, тўқ қўнгир рангли. Барглари 3 тагача, кўкимтири, сал эгри-буғри. Гули якка, қизил, туви қора, оч сариқ ҳошияли. Чангчиларининг или қора, чангдонлар билан бириккан жойи оқ. Чангдонлари қора бинафша ранг. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Туркистон ва Молгузар тизмалари, Нурота тоғларида тарқалган. Қирғизистон ва Тоҷикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Майда зарра тупроқли, шағалли ва тошли ёнбағирларда, дараларда ва қояларнинг ёриқларида, бутазор ва арчазорлар орасида, тоғларнинг пастки ва ўрта қисмида ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ва тўп-тўп бўилиб тарқалган. Баъзан бир неча юзлаб ўсимлиқдан иборат популяциялар ҳосил қиласи.

Қўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари кўплаб терилиши ва чорва моллари боқилиши ареалининг қисқариб кетишига олиб келган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1957 йилдан бўён экиб ўстирилади.

Мухофаза чоралари. Зомин ва Нурота қўриқхоналарида ҳамда Зомин миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [50, 60, 291, 357].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 3. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 15–25 см. Луковица продолговато-яйцевидная, 2–4 см в диаметре, с бумагообразными темно-коричневыми длинными чешуйками. Листья (3) сизые, слабоволнистые. Цветок одиничный, красный, центр цветка чёрный с ярко-жёлтым окаймлением. Тычиночные нити чёрные, в местах соединения с пыльниками белые. Пыльники черно-лиловые. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской и Навоийской областях: хребты Туркестанский, Мальгузар; Нуратинские горы. За пределами Узбекистана: Кыргызстан и Таджикистан.

Места обитания. Произрастает на каменистых, щебнистых и мелкоземистых склонах нижнего и среднего пояса гор, в ущельях, на скальных карнизах, среди кустарников и арчовников.

Численность. Встречается единично или небольшими группами, иногда образует популяции по несколько сотен растений.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов, выпас.


Культивирование. С 1957 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на Заминском и Нуратинском заповедниках, Зааминском национальном парке.

Источники. [50, 60, 291, 357].

К. Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Turkestan and Malguzar ranges; the Nuratau mountains (the Djizakh, the Samarkand and Navoi regions). Inhabits fine earth, and stony slopes, rock ledges, among shrubs and the juniper stands, in the lower and middle mountain belts. Single specimens can be found. Limiting factors: mass picking of flowers, pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau and Zaamin nature reserves, the Zaamin national park. It is necessary to control the state of populations and pasturing.



135. ФОСТЕР ЛОЛАСИ

Тюльпан Фостера / *Tulipa fosteriana* Irving

Мақоми 2. Фарбий Помир-Олойдаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бүйі 10–50 см га етадиган күп үйлік, пиёзли үт. Пиёзли тухумсімон, диаметри 2–6 см, қобиғи қорамтири-күнғир, чармасын, ички томони қалын, түфри, қаттық, тилларанг туклар билан қопланған. Барглари 3–5 та, бироз әгри-буғри, күкимтири ёки яшил рангли. Гуллари ялтироқ, қизил, якка, йирик, диаметри 10–12 см, туғи қора, сарық ҳошияли ёки сарық. Чангчи иллари түқ қизил ёки сарық. Чангдони қорамтири-бинафша рангли. Апрель–май ойларыда гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмасидаги Омонқұтон үрмөн хұжалигида, Тахтақорача довонида, Ургут, Оталиқ қишлоқлари атрофларыда тарқалған. Тожикистанда ҳам учрайди.

Үсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қысымдаги майин тупроқлы ёнбағырларда ва қояларнинг ёриқларыда үсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда тарқалған.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари ва пиёзларининг күп миқдорда йиғиб олиниши ҳамда чорва молларининг боқилиши оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1957 йилдан буён ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Китоб давлат қўриқ-хонасида муҳофаза қилинади. Табиатда үсиб турган тупларини назорат остига олиш лозим.

Манбалар. [50, 60, 291].

А. Х. Шарипов.

Статус 2. Очень узкий редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 10–50 см. Луковица яйцевидная, 2–6 см в диаметре. Покровные чешуи черно-бурые, кожистые, внутри покрыты густыми, прямыми, жесткими, золотистыми волосками. Листья (3–5) слабокурчавые, сизые или блестящие, зелёные. Цветок блестящий, красный, одиночный, очень крупный, 10–12 см в диаметре, центр цветка чёрный с жёлтым окаймлением или сплошь жёлтый. Тычиночные нити тёмнокрасные или жёлтые. Пыльники черно-фиолетовые. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Самаркандской и Кашкадарьинской областях: Зарафшанский хребет – Аманкутанское лесничество, перевалы Тахта-Карача, Ургут, Агалык. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Мелкоземистые склоны и карнизы скал в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и луковиц, выпас.

Культивирование. С 1957 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.


Меры охраны. Охраняется на территории Китабского заповедника. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники. [50, 60, 291].

А. Х. Шарипов.



Very rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Zaravshan range: the forestry of Amankutan, the Takhta-Karacha, the Urgut, the Agalyk passages (the Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits fine earth slopes and rocks in the middle belt of mountains. Single specimens can be found. Limiting factors: mass picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: protected in the Kitab nature reserve. Monitoring of populations is necessary.



136. ОҚЛОЛА

Тюльпан оритиевидный / *Tulipa orithyioides* Vved.

Мақоми 1. Фарбий Помир-Олойдаги йўқолиш арафасида турган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 7–12 см га етадиган кўп йиллик, пиёзли ўсимлик. Пиёзи тухумсимон, диаметри 1,5 см, қобиғи қоғозсимон, кўнғир кулранг, ички томони тўрсимон момиқ тукли. Барглари 2 та, яқин жойлашган, эгри-буғри. Гуллари якка, оқ, туби сариқ. Чангчи иплари сариқ, остки қисми узун киприксимон тукли. Чангдони хира бинафша рангли. Май-июнъ ойларида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Ҳисор тизмаси (Чўлбайир тоғи, Тўпаланг ва Оби-Заранг дарёлари ҳавзаси) да тарқалган (Сурхондарё вилояти).

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 2500–3000 м баландликда тош-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари узуб олинниши ҳамда чорва моллари боқилиши оқибатида камайиб бормоқда. 1980 йили қидириб топиш учун уюштирилган тадқиқот ишлари ижобий натижага бермаган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1975 йилдан бўён экиб ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Табиатда сакланиб қолган тупларини назорат остига олиш лозим.

Манбалар. [50, 60, 291].

К. Ш. Тожибаев.



Статус 1. Очень редкий эндемик Западного Памиро-Алая, находящийся на грани исчезновения.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 7–12 см. Луковица яйцевидная, до 1,5 см в диаметре, с бумагообразными буро-серыми, с внутренней стороны паутинисто-мохнатыми оболочками. Листья в количестве 2, сближенные, курчавые. Цветок одиночный, белый, центр желтый. Тычиночные нити желтые, внизу длиннореснитчатые. Пыльники грязно-фиолетовые. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле–августе.

Распространение. Гиссарский хребет: горы Чульбаир, бассейн рек Тупаланг и Оби-Заранг (Сурхандарьинская область).

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны в среднем и верхнем поясах гор, на высоте 2500–3000 м над уровнем моря.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и выпас. Поиски в 1980 году не дали положительных результатов.


Культивирование. С 1975 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники. [50, 60, 291].

К. Ш. Тожибаев.

Very rare endemicspecies of the western Pamir-Alay, it is on the verge of disappearance. It is spread at the Hissar range: the Chulbaир mountains, the Tupalang and Obi-Zarang river basins (the Surkhandarya region). Inhabits stony-slopes in the middle and upper belts of mountains, at a height of 2500-3000 m. The quantity is unknown. Limiting factors: mass picking of flowers, pasturing. The searches carried out in 1980 were unsuccessful. Measures of protection: not protected.



137. САРГИШ ЛОЛА

Тюльпан волосистотычиночный / *Tulipa dasystemon* (Regel) Regel

Мақоми 3. Фарбий Тянь-Шань ва Помир-Олойдағы ареали ажралган камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бүйі 10–20 см га етадиган күп үйлік пиёзли үт. Пиёзи тұхумсімон, диаметри 1,5 см гача. Қобиғи қоғозсімон, қора-қүнғир тусли ёки қүнғир, ички томонининг юқори қисми ётиқ түкли. Барғи 2–3 та. Гули якка, оч сарық, баъзан оқ, туби сарық. Чангчи или ва chanгдони сариқ. Май–июнь ойларыда гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Писком, Утом, Чимён, Чотқол, Курама, Олой, Туркестон, Молгузар, Ҳисор тизмаларида тарқалған (Тошкент, Фарғона, Жиззах, Сурхондарё вилоятлари). Қозғистон, Қирғизистон ва Тажикистонда ҳам учрайди.

Үсиш шароити. Денгиз сатқидан 2500–3000 м баландлықдаги тошли ва шағалли тоғ ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кичик түплар ҳосил қилиб ёки якка-якка ҳолда тарқалған.

Қўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Уруғининг ёмон униши ва чорва молларининг боқилиши ареалининг қисқарыб кетишига сабаб бўлган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1959 йилдан бўён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Чотқол ва Зомин қўриқхоналарида, Угом-Чотқол ва Зомин миллий табиат боғларида муҳофаза қилинади. Бу ўсимлик ўсадиган жойда мол боқилишини режалаштириш ва уни назорат остига олиш керак.

Манбалар. [50, 60, 291].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 3. Редкий вид Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 10–25 см. Луковица яйцевидная, до 1,5 см в диаметре, с чёрно-бурыми или бурыми-бумагообразными, с немногими прижатыми волосистыми у самой верхушки оболочками. Листья в числе 2–3. Цветок бледно-жёлтый, редко белый, с жёлтым центром. Тычиночные нити жёлтые, пыльники жёл-

тые. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле–августе.

Распространение. Пскемский, Угамский, Чимганский, Чаткальский, Кураминский, Алайский, Туркестанский, Мальгузарский, Гиссарский хребты (Ташкентская, Ферганская, Джизакская, Сурхандарьинская области). За пределами Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны в верхнем поясе гор, на высоте 2500–3000 м над уровнем моря.

Численность. Встречается единичными экземплярами или небольшими группами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас, отсутствие семенного возобновления.

Культивирование. С 1959 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.


Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского и Зааминского заповедников, Угам-Чаткальского и Зааминского национальных парков. Необходимы регулирование выпаса и контроль за состоянием популяций.

Источники. [50, 60, 291].

К. Ш. Тожибаев.



Rare species of the western Tien-Shan and Pamir-Alay with the reducing area. It is spread at the Pskem, the Ugam, the Chimgan, the Chatkal, the Kurama, the Malguzar, the Hissar ranges (th Tashkent, the Samarkand and Surkhandarya regions). Inhabits stony-slopes in the upper belt of mountains (2500-3000 m.s.l.). Single specimens or small groups can be found. Limiting factors: pasturing, seed regeneration is absent. Measures of protection: control of pasturing and state of populations are necessary.



138. ТУКЛИ ЛОЛА, СУРХОН ЛОЛАСИ

Тюльпан шерстистый / *Tulipa lanata* Regel

Мақоми 3. Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–40 см га етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 4 см гача, қобиги юпқа-чармсимон, кўнғир рангли, ички томони қалин, узун туклар билан қопланган. Барглари 4 тагача, четлари эгри-буғри. Гули якка, диаметри 5–6 см, гулқўргони қизил, асоси қўнғир ёки қора, оқ-сариқ ҳошияли. Чанги иплари қисқа, туби қора, учбуручак шаклда, чангдонлари қизғиш-қора, туб қисми оқ. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Ҳисор тизмаси, Кўхитанг, Бойсунтоф ва Боботоғда тарқалган (Сурхондарё вилояти). Тожикистанда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки қисмидаги соз тупроқли ва тошли ёнбағирлар ҳамда очик ола жинсли тупроқларда тарқалган.

Сони. Якка-якка ва кичик гурухлар ҳолида ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гул ва пиёзларининг кўп миқдорда йиғиб олинниши ҳамда чорва молларининг боқилиши туфайли қисқариб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1954 йилдан бўён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат кўриқ-хонасида муҳофаза қилинади. Ўсимликнинг сони ва популяцияси ҳолатини назорат остига олиш ҳамда чорва моллари боқилишини тартибга солиш лозим.

Манбалар. [40, 50, 60, 291].

А. Х. Шарипов.



Статус 3. Редкий эндемик Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 15–40 см. Луковица яйцевидная, до 4 см в диаметре, с нежными, тонкокожистыми покровными чешуями коричневого цвета, внутри обильно покрытыми длинными волосками. Листья в количестве 4, курчавые. Цветок одиночный, 5–6 см в диаметре, листочки околоцветника красные, при основании бордовые или черные с бледно-желтым окаймлением. Тычиночные нити короткие, при основании в виде чёрных треугольников, под пыльниками белые. Пыльники бордово-черные. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в июне.

Распространение. Гиссарский хребет, Кугитанг, Байсунские горы, Бабатаг (Сурхандарьинская область). За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Глинистые, реже каменистые склоны и выходы пестроцветных толщ в нижнем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами и немногочисленными группами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и луковиц, выпас.

Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз с 1954 года.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике. Необходим контроль за численностью и состоянием популяций, регулирование выпаса.

Источники. [40, 50, 60, 291].
А. Х. Шарипов.

Rare endemic species of the Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range; the Baysun mountains: the Kughitang, the Babatag ranges (the Surkhandarya region). Inhabits clayish, rarely stony slopes, outcrops of gypseous layers in the lower belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: mass picking off flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve. It is necessary to control number and state of populations and pasturing.



139. КАУФМАН ЛОЛАСИ, ТАРГИЛ ЛОЛА

Тюльпан Кауфмана / *Tulipa kaufmanniana* Regel

Мақоми 3. Фарбий Тянь-Шандаги камайиб бораттган эндемик ўсимлик.

Қисқача тасифи. Бўйи 10–50 см орасидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, чўзиқ ёки шолғомсимон, диаметри 1,5–6 см оралиғида. Қобиги тўқ қўнғир ёки тилларанг қўнғир, нафис, қофозсимон юпқа. Барглари 3–5 та. Гули якка, оқ, сариқ, оч сариқ, оч қизил. Гулининг туви сариқ. Чангчи иплари ва чангдонлари сариқ. Март–апрель ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Уғом, Писком, Қоржонтов, Чотқол, Қурара тизмаларида тарқалган. Ўзбекистондан ташқарида: Қирғизистон, Қозогистон, Тожикистон.



Ўсиш шароити. Тоғ этакларидан то юқори (яйловнинг пастки) қисмигача бўлган тошли ерларда ўсади.

Сони. Якка-якка ёки кичик туплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гулларининг кўп миқдорда териб олиниши ҳамда ўсиб турган ерларининг ўзлаштирилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1951 йилдан бўён экиб ўстирилади.

Мухофаза чоралари. Чотқол биосфера кўриқхонасида ва Уғом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади. Табиатдаги тупларининг ҳолатини назорат қилиш, гулларини теришни тақиқлаш, улар орасидан манзарали шаклларини ажратиб олиш ва экиб ўстириш зарур.

Манбалар. [40, 50, 60, 291].

А. Х. Шарипов.

Статус 3. Эндемик Западного Тянь-Шаня с сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Многолетнее луковичное

растение высотой 10–50 см. Луковица яйцевидная, удлиненная или репчатая, 1,5–4 см в диаметре. Покровные чешуи черно-бурые или золотисто-коричневые, нежные, бумагообразные. Листья в количестве 3–5. Цветок одиночный, листочки околоцветника белые, желтые, кремоватые, огненно-красные; центр цветка желтый. Тычиночные нити и пыльники желтые. Цветёт в марте–апреле, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Хребты Угамский, Пскемский, Каржантау, Чаткальский, Кураминский: бассейны рек Угам, Пскем, Чаткал, Чирчик, Ахангаран, Чадаксай (Ташкентская, Наманганская области). За пределами Узбекистана: Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан.

Места обитания. Каменистые местообитания от предгорий до субальпийского пояса.

Численность. Встречается небольшими популяциями и единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и хозяйственное освоение территории.


Культивирование. С 1951 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском биосферном заповеднике и Угам-Чаткальском национальном парке. Необходимы контроль за состоянием популяций, запрещение сбора цветков, выявление декоративных форм и размножение их в культуре.

Источники. [40, 50, 60, 291].

А. Х. Шарипов.

Endemic species of the western Tien-Shan with highly reducing area. It is spread at the Pskem, the Ugam, the Angren, the Chatkal river basins (the Tashkent region). Inhabits stony habitats from the submontane zone to subalpine belt. Small populations and single specimens can be found. Limiting factors: picking of flowers and economic use of territory. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere state reserve and the Ugam-Chatkal national park. It is necessary to control the state of populations, to forbid picking of flowers, to search for ornamental forms and their reproduction in cultivation.



140. ТУБЕРГЕН ЛОЛАСИ

Тюльпан Тубергенова / *Tulipa tubergeniana* T.M. Hoog

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олайдаги камёб, йўқолиш арафасидаги тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–30 см га етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 3–5 см, қобиғи жигарранг ёки қўнғир, ички томони тўрсимон-чалкаш, момиқ тукли. Барглари 3 та, гулидан узун. Гуллари якка, ийрик, диаметри 6–7 см, қизил, туви қора, оч сарик, гардишсимон доғли. Чангчи иплари қора, чангдонлари бинафша рангли. Апрелда гуллаб, меваси июнь–июль ойларида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасида (Бойсун тоғларида, Сина қишлоғи атрофи ва Тўпаланг дарёси ҳавзасида), Кўҳитанг ва Боботоғ тизмаларида тарқалган. Тожикистанда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Адирларда ва тоғларнинг пастки қисмидаги ола жинсли ва соз тупроқли ёнбағирларда, кўпинча, пистазорларда ўсади.

Сони. Табиятда якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан кўпаяди.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет, Байсунские горы, окрестности кишлака Сина, бассейн реки Тупаланг; Кугитанг, Бабатаг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Глинистые склоны в предгорьях и пестроцветных низкогорьях, часто среди фисташников.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и выпас.

Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз с 1955 г.

Меры охраны. Часть популяций охраняется на территории Сурханского государственного заповедника. Необходим поиск новых местонахождений.

Источники. [40, 50, 60, 291].

А. Х. Шарипов.



Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари кўплаб узуб олиниши ва чорва моллари боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1955 йилдан бери экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Айрим популяциялари Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади. Та-биатдан янги ўсиб турган ерларини қидириб топиш лозим.


Манбалар. [40, 50, 60, 291].

А. Х. Шарипов.

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая, находящийся на грани исчезновения.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 10–30 см. Луковица яйцевидная, 3–5 см в диаметре. Покровные чешуи с бурьими или коричневыми, с внутренней поверхности паутинисто-лохматыми оболочками. Листья (3) превышают цветок. Цветок одиночный, крупный, 6–7 см в диаметре. Листочки околоцветника красные, при основании с чёрным, бледно-желто-окаймленным пятном. Тычиночные нити черные, пыльники фиолетовые. Цветёт в апреле, плодоносит в июне–июле.

Very rare endemic species of the south-western Pamir-Alay, it is on the verge of disappearance. It is spread at the Hissar range: the Baysun mountains, the surroundings of village Sina, the Tupalang river basin; the Kughitang and Babatag ranges (the Surkhandarya region). Inhabits clayish slopes in gypseous low hills, often among the pistache-woodlands. Single specimens can be found. Limiting factors: mass picking of flowers, pasturing. Measures of protection: some populations protected in the Surkhan state nature reserve. It is necessary to search new locations.



141. УЛУҒВОР ЛОЛА

Тюльпан великий / *Tulipa ingens* T.M. Hoog

Мақоми 3. Фарбий Помир-Олойда камтарқалган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бүйін 12–25 см орасидаги күп үйлілік пиёзли ўт. Пиёзининг диаметри 2,5–4 см, чўзиқ-тухумсимон, устки қисми қора қўнғир ёки қўнғир юпқа чармсимон қобиқ билан ўралган. Барглари 3–4 та, тарвақайлаган, ўткир учли, наштарсимон, четлари эгри-бугри, кўкимтири рангли. Гули қизил, юлдузсимон, туви қора рангли. Чангчиси ва чангчи иплари қора, тим қўнғир ёки тўқ қизил рангли. Апрель-май ойида гуллаб, меваси июнь-июлда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Зарафшон, Кўҳитанг ва Ҳисор тизмаларида тарқалган. Тожикистанда ҳам учрайди.



Ўсиш шароити. Тоғларнинг денгиз сатҳидан 1600–2000 м баландлықдаги соз тупроқли ёнбағирларида ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ва тўплар бўлиб учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши, гуллари узилиб, ва пиёzlари қазиб олиниши сабабли сони камайган.

Маданийлаштирилиши. 1951 йилдан бошлаб ЎзРФА Ботаника боғида ўстирилади.

Мухофаза чоралари. Ҳисор, Китоб ва Сурхон кўриқхоналарида муҳофаза қилинади. Ўсиб турган тўплари назорат остига олиниши лозим.

Манбалар. [40, 50, 60, 291].

А.Х. Шарипов.

Статус 3. Редкий эндемик Западного Памира-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 12–25 см. Луковица продолговато-яйцевидная, 2,5–4 см в диаметре, с черно-бурыми или бурьими тонкокожистыми покровными чешуями. Листья в количестве 3–4, расставленные, ланцетные, иногда по краю слабо-крупноволнистые, сизые. Цветок красный, в форме звезды, центр черный. Тычиночные нити черные, пыльники черные, коричневато-черные или темно-бордовые. Цветёт в апреле-мае, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Заرافшанский и Гиссарский хребты, Кугитанг (Самаркандская, Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области). За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Глинистые склоны в среднем поясе гор, на высоте 1600–2000 м над уровнем моря.

Численность. Встречается единичными экземплярами и небольшими популяциями.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и луковиц, выпас.


Культивирование. С 1951 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Гиссарского, Китабского и Сурханского заповедников. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники. [40, 50, 60, 291].

А.Х. Шарипов.

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Zaravshan, the Hissar and Kughitang ranges (the Samarkand, the Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits clayish slopes in the middle belt of mountains, at a height of 1600-2000 m.s.l. Single specimens and small populations can be found. Limiting factors: mass picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: protected in the Hissar, the Kitab and Surkhan state reserves. Control of the state of populations is necessary.



142. ШУБҲАЛИ ЛОЛА, ЧИПОР ЛОЛА

Тюльпан сомнительный / *Tulipa dubia* Vved.

Мақоми 3. Фарбий Тянь-Шандаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 7–25 см оралиғидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи чўзиқ-тухумсизмон, қобиги тўқ жигарранг, ичи ётиқ тукли. Барглари учта, кўкимтири, четлари эгри-буғри. Гуллари ёпирма барглар орасида жойлашган. Гуланди сертук, кўкимтири ғуборли. Гуллари якка, сариқ, ташқи томони кўкимтири-пушти йўл-йўл, гул туви тўқ сариқ. Чангчи иплари тўқ сариқ, чангдонлари сариқ. Май-июн ойида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Уғом, Писком, Қоржонтов, Чотқол, Курама тизмаларида тарқалган. Қирғизистон ва Қозоғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта ва юқори қисмидаги майин зарра тупроқли, шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари ва пиёzlари йиғиб олиниши сабабли қисқариб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1951 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида ва Уғом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади. Биологик хусусиятларини ўрганиш ва маданийлаштирилиши лозим.

Манбалар. [50, 60, 291].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 7–25 см. Луковица удлиненно-яйцевидная, с тёмно-коричневыми оболочками, внутри прижатоволосистая. Листья (3) сизые, по краю волнистые. Цветки сидячие в розетке листьев. Цветоножка очень пушистая, с сизым налётом. Цветок одиночный, жёлтый, снаружи с сизо-розовыми полосками, центр оранжевый. Тычиночные нити оранжевые. Пыльники желтые. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Ташкентской и Наманганской областях: хребты Каржантау, Угамский, Пскемский, Чаткальский и Кураминский. За пределами Узбекистана: Казахстан и Кыргызстан.


Места обитания. Мелкоземистые и щебнисто-мелкоземистые склоны среднего и верхнего пояса гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветов и луковиц.

Культивирование. С 1951 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.



Меры охраны. Охраняется в Чаткальском биосферном заповеднике и Угам-Чаткальском национальном парке. Необходимы изучение биологических особенностей и введение в культуру.

Источники. [50, 60, 291].

К. Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Karzhantau, the Ugam, the Pskem, the Chatkal and Kurama ranges (the Tashkent and Naman-gan regions). Inhabits fine earth and -fine earth slopes in the subalpine and alpine belts of mountains. Single specimens can be found. Limiting factors: picking of flowers and bulbs. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park.

It is necessary to study biological characteristic features and the introduction into cultivation.



143. ЧҮЛБАЙИР ЛОЛАСИ, ПУШТАГЛИ ЛОЛА

Тюльпан килеватый / *Tulipa carinata* Vved.

Мақоми 3. Помир-Олойнинг жануби-ғарбидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–50 см орасидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 1,5–4 см, қобиғи чармсимон қора қўнғир рангли, ички томони қалин тукли. Барглари 3–4 та. Гули якка, қизил ёки пушти ранг. Гулининг туби сариқ ёки хирароқ сариқ. Чангчи иплари қора, чангдони



қора ёки қизғиш, баъзан сариқ. Май–июнда гуллаб, меваси июль–август ойларида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўҳитанг, Бойсун ва Чўлбайр тоғлари, Ҳисор тизмасида (Тўпаланг, Сангардак дарёлари ҳавзаси) тарқалган. Тоҷикистон ва Туркманистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидағи тошли ва майда тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Кўплаб гуллари териб олиниши сабабли ареали қисқариб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1966 йилдан бўён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқ-

хонасида муҳофаза қилинади. Ўсиб турган жойлари назорат остига олиниши лозим.

Манбалар. [40, 50, 60, 291].

А. Ҳ. Шарипов.

Статус 3. Редкий эндемик Юго-Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 15–50 см. Луковица яйцевидная, 1,5–4 см в диаметре, с черно-коричневыми, кожистыми, с внутренней стороны волосисто-шерстистыми покровными чешуями. Листья в количестве 3–4. Цветок одиночный, красный, центр цветка черный или грязновато-желтый. Тычиночные нити чёрные, пыльники чёрные с бордовым оттенком, изредка желтые. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле–августе.

Распространение. Кугитанг, Байсунские горы, горы Чульбаир, Гиссарский хребет: бассейн рек Сангардак и Тупаланг (Сурхандарьинская область). За пределами Узбекистана: Таджикистан, Туркменистан.

Места обитания. Каменистые и каменисто-мелкоземистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов.


Культивирование. С 1966 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники. [40, 50, 60, 291].

А. Ҳ. Шарипов.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Kughitang, the Baysuntau and Chulbair mountains, the Hissar range: the Tupalang, the Sangazdak river basins (the Surkhandarya region). Inhabits stony and stony-fine earth slopes in the middle mountainous zone. Single specimens can be found. Limiting factors: mass picking of flowers. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve. Monitoring of populations is necessary.



144. ЎЗБЕКИСТОН ЛОЛАСИ

Tulipa uzbekistanica Botschantz. et Sharipov

Мақоми 1. Йўқолиб кетиш арағасидаги Помир-Олойнинг жануби-ғарбидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–20 см оралиғидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 2,5 см, қобиги чўзиқроқ, қаттиқ, туксиз, фақат ичи сийрак ётиқ туклар билан қопланган. Барглари З та, яшил кўкимтириғуборли, чети бироз эгри-буғри. Гули қизил, туби тўқ кўнғир доғли, сариқ гардишли. Чангчи иплари ва чангдонлари оч сариқ, баъзан тўқ қизил. Мартда гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Куруқдагана тоғининг Толли довонида тарқалган.

Ўсиш шароити. Ола жинсли паст тоғлардаги кулранг шўрҳок бўз тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда тарқалган. Куруқдаҳана ва Толли довонида 40–45 га майдонда 1000 га яқин тути аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гулларининг кўп миқдорда терилиши ва чорва молларининг боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1967 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Унинг ўсиб турган янги жойларини қидириб топиш лозим.

Манбалар. [41].

А. Х. Шарипов.

Статус 1. Редкий эндемик Юго-Западного Памиро-Алая, находящийся на грани исчезновения.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 10–20 см. Луковица яйцевидная, до 2,5 см в диаметре, оболочки луковицы немного продолговатые, жёсткие, голые, изнутри покрыты редкими короткими, прижатыми волосками. Листья (3) зелёные с сизым налётом, по краю крупноволни-

стые. Цветок красный, в центре тёмно-коричневое пятно с жёлтым окаймлением. Тычиночные нити и пыльники светло-жёлтые, реже бордовые. Цветёт в марте, плодоносит в мае.

Распространение. Горы Куруқдагана, перевал Таллы (Кашкадарьинская область).

Места обитания. Серые соленосные глины пестроцветных низкогорий.

Численность. Встречается единичными экземплярами, на перевале Толли на площади 40–45 га отмечено около 300 экземпляров.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов, выпас.

Культивирование. С 1967 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходим поиск новых местонахождений.

Источники. [41].

А. Х. Шарипов.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Kurukdagana mountains; the Tally pass (the Kashkadarya region). Inhabits grey saline clay of gypseous low hills. Single specimens can be found. Limiting factors: mass picking of flowers, pasturing. Measures of protection: it is necessary to search new locations.



145. ҚИЗИЛ ЛОЛА (ГРЕЙГ ЛОЛАСИ)

Тюльпан Грейга / *Tulipa greigi* Regel

Мақоми 3. Фарбий Тянь-Шандаги камёб эндемик ўсимликтар.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–45 см оралиғидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон ёки юмалоқ, қобиги баъзан қалин чармсимон баъзан юпқа қофозсимон. Барглари 3–4 тагача эгри-буғри, устки қисмида бинафша ранг доғлари бор. Гуллари якка, тўқ сариқ, баъзан тўқ қизил, сариқ, қизгиш доғли. Гулининг туви сариқ тухумсимон қора доғли. Чангчи иплари қора ёки сариқ, чангдонлари сариқ, бинафшаранг, кулранг. Апрель-май ойларидаги гуллаб, меваси июнь-июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Фарбий Тянь-Шаннинг барча тизмаларида тарқалган. Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистанда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки қисмидаги шагалли ва соз тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда, баъзан 5–10 тупдан иборат тўплар ҳосил қилиб тарқалган. Тошкент вилояти худудида 100 000 тупга яқин ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан ёки қисман вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалинг ўзгариш сабаблари. Гули ва пиёзларининг кўп миқдорда йигиб олиниши ҳамда чорва моллари боқилиши ўсимликка салбий таъсир кўрсатмоқда.

Маданийлаштирилиши. Кўпгина ботаника боғларида муваффақиятли ўстирилади. Шу жумладан, ЎзРФА Ботаника боғида 1956 йилдан бўён экиб келинади.

Муҳофаза чоралари. Чотқол давлат биосфера қўриқхонасида ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади. Унинг ўсиб турган туплари назорат остига олиниши лозим.

Манбалар. [50, 60, 291].

А.Х. Шарипов.

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 10–45 см. Луковица яйцевидная или округлая с грубыми кожистыми или нежными бумагообразными чешуями. Листья в числе 3–4, курчавые, с антоциановыми пятнами. Цветок одиночный, оранжево-красный; встречаются формы с темно-красными, оранжевыми, желтыми, кремовыми цветками, центр цветка желтый с яйцевидными черными пятнами. Тычиночные нити или черные, или желтые, пыльники желтые, фиолетовые, сероватые. Цветёт в апреле-мае, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Все горные хребты Западного Тянь-Шаня (Ташкентская и Наманганская области). За пределами Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Места обитания. Глинистые и щебнистые склоны нижнего пояса гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами, очень редко – небольшими (5–10 особей) группами. В Ташкентской области встречается около 100 000 экземпляров.

Размножение. Семенное, реже вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов, выкапывание луковиц, выпас.

Культивирование. Успешно выращивается во многих ботанических садах, в том числе с 1956 года в Ботаническом саду АН РУз.


Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского биосферного заповедника и Угам-Чаткальского национального парка. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники. [50, 60, 291].

А.Х. Шарипов.



Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at all ranges of the western Tien-Shan (the Tashkent and Namangan regions). Inhabits clayish and slopes in the lower belt of mountains. Single specimens, very rarely small (5-10 specimens) groups can be found. Limiting factors: mass picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park. It is necessary to control the state of populations.



146. ШАРИПОВ ЛОЛАСИ, ГУЛБАРРА

Тюльпан Шарипова / *Tulipa scharipovii* Tojibaev

Мақоми 2. Фарғона водийсининг шимолий адиrlарида тарқалган эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–20 см га етадиган, пиёзи кўп йиллик ўт ўсимлик. Пиёзи тухумсизмон, қобиғи қаттиқ, жигарранг тусли, ички томонидаги туклари зич жойлашган, қобиқнинг туви ва юқорисида жамланган. Юқоридаги туклари қобиқдан ташқарига чиқиб туради. Барглари 3 та, ланцетсизмон, бир-бирига жуда яқин жойлашган, 7–10 см. Гули сариқ, тубида сариқранг қуюқлашади. Гул баргчаларининг учи кесилган ёки чукӯрчали. Чанг иплари ва чангдонлари сариқ. Март–апрель ойларида гуллаб, меваси майда пишади.

Тарқалиши. Наманган вилояти: Чотқол ва Курама тизмаларининг тоғ олди текисликлари ва адиrlарида тарқалган (Тўракўргондан Резаксой қишлоғигача).

Ўсиш шароити. Қўйи адиrlардаги бироз шўрлашган майин тупроқларда, юқори адиrlардаги тошли-шағалли ёнбағирликларда ўсади.

Сони. Якка-якка ва кичик тўплар ҳосил қилган ҳолда учрайди. Популяцияларда 100 × 100 м майдонда 50–80 та тупи учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гули ва пиёзларининг кўп миқдорда йигиб олиниши ҳамда чорва молларининг боқилиши.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 2009 йилдан бўён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Унинг ўсиб турган туплари назорат остига олиниши лозим.

Манбалар. [291, 292, 369]

К. Ш. Тожибаев.

Статус 2. Эндемичное растение северных предгорий Ферганской долины.

Краткое описание. Луковица яйцевидная, черно-коричневая, коричневая, крепкая, кожистая. Оболочки луковицы не продолженные, 3–3,5 см длины и 2–2,5 см ширины. Изнутри на основании и вверху волосисто-шерстистые. Густое опущение оболочки выступает наружу. Стебель (10) – 15–20 см высоты, вместе с цветоножкой голые. Листьев 3, ланцетные, сильно сближенные, образуют ложные мутовки, у живых растений змеевидно лежат на земле. По краю курчавые, голые, 7–10 см длины. Цветок одиночный, в бутоне поникающий, желтый, на основании без пятна. Листочки околоцветника на верхушке выемчатые, глубина выемки достигает 1 мм. Тычинки 9–10 мм длины, 2–2,5 раза короче околоцветника. Нити тычинок голые, темно-желтые. Пыльники желтые, вдоль всей длины одновременно открывающиеся. Цветёт марта–апреле, плодоносит в апреле–мае.

Распространение. Наманганская область: подгорные равнины и предгорья Чаткальского и Кураминского хребтов (от Туракургана до Резаксая).

Места обитания. В подгорных равнинах слегка засоленные лессовые почвы, в высоких адъярах каменисто-щебнистые склоны.

Численность. Встречается единичными экземплярами, и небольшими группами. В популяциях на 100 × 100 м встречается по 50–80 особей.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов, выкапывание луковиц, выпас.

Культивирование. С 2009 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.


Меры охраны. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники. [291, 292, 369].

К. Ш. Тожибаев.



Endemic species of the northern foothills of Ferghana valley. It is spread at the foothills and piedmont zone of the Chatkal and Kurama ranges: from Turakurgan to Rezaksay. Inhabits foothills with loess and saline soils and stony slopes. Single specimens and small groups can be found. Population consists of 50-80 plants on 100 square meter. Limiting factors: mass picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: it is necessary to control the state of populations.



147. ОРАЛИҚ ЛОЛА

Тюльпан промежуточный / *Tulipa intermedia* Tojibaev et J. de Groot

Мақоми 2. Фарғона водийсининг шимолий адирларида тарқалган камёб ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Пиёзи тухумсимон, диаметри 1,5 – 3,0 см, қобиғи энсиз, чармсимон, тўқ жигарранг тусли, бирмунча узун, баъзан ҳатто тупроқ юзасига чиқиб қолиши мумкин. Ички томонидаги туклари зич жойлашган ва асосан қобиғининг пастки қисми ҳамда юқорисида жамланган. Барги 3 та, улар бир-бирига жуда яқин ўрнашган, 5–7 см узунликда, наштарсимон қиррали, четлари буралган, тўлқинсимон. Яккагулли, гули сариқ, тўқ сариқ ёки қизил (var. korolkowioides), гул туби жигарранг ёки тўқ сариқ ранг. Гул баргчаларининг учи ўткир ёки бироз кемтиклишган. Чангчи иплари 1,0 – 1,3 см, сариқ, баъзан пастки қисми қора, юқориси алвон ранг (var. korolkowioides), четлари бир-бирига параллель, ўрта қисми бироз кенгайган. Чангдонлари сариқ. Тугунчаси бутилкасимон, ранги оч-сариқ. Март

оининг охири – апрель оининг бошларида гуллаб, уруғи апрель охири – май ойларида етилади.

Тарқалиши. Наманган вилояти (Чуст ва Поптуманлари): Курама тизмасида тарқалган.

Ўсиши. Адирларнинг қуи ва ўрта қисмидаги тошли-шағалли ёнбағирликларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг бетартиб боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институтининг Тошкент ботаника боғида экиб ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Чорва молларини тизимли равишда ўтлатиш ҳамда ўсиш майдонларида доимий кузатув тадқиқотларини амалга ошириш лозим.

К. Ш. Тожибаев.





Статус 2. Редкий вид адыров северной части Ферганской долины.

Краткое описание. Луковица яйцевидная 1,5 – 3,0 см в диаметре; покровные чешуи тонкокожистые, темновато-коричневые, продолженные, иногда выступающие на поверхность почвы, внутри у основания и на верху густо покрыты прижатыми волосками. Стебли 8 – 12 см высоты, гладкие. Листья в количестве 3, почти мутовчатые, 5 – 7 см длины, ланцетные, скрученные с волнистыми краями. Цветок одиночный, с желтыми, оранжевыми или красными (*var. korolkowioides*), иногда небольшими коричневатыми пятнами или темно-желтым цветом у основания, острым или с небольшим острием на верхушке. Тычинки 1,0 – 1,3 см, желтые, внизу – черные, вверху – пурпурные (*var. korolkowioides*), от основания почти параллельными краями, несколько расширенные в средней части. Пыльники желтые. Завязи бутылкообразные, бледно-желтые.

Цветет в конце марта и начале апреля, плодоносит в конце апреля и мае.

Распространение. Наманганская область (Чустские и Папские районы): Кураминский хребет.

Места обитания. Каменисто-щебнистые почвы низких и средних адыров.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Размножается семенами.

Причины изменения численности и ареала. Безсистемный выпас скота.

Культивирование. Выращивается в Ташкентском ботаническом саду Института генофонда растительного и животного мира АН РУз.

Меры охраны. Необходимо обеспечить системный выпас скота и постоянный контроль за состоянием популяций.

К. Ш. Тожибаев.

Endemic species of the northern foothills of the Ferghana valley. It is spread at the Namangan region (the Chust and Pap regions): The Kurama ranges. Inhabits stony slopes of low and middle foothills. Single specimens can be found. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: it is necessary to manage grazing and permanent control of the populations.



НАВРҮЗГУЛДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ПЕРВОЦВЕТНЫЕ – PRIMULACEAE

148. ҲИСОР ДИОНИСИЯСИ

Дионисия гиссарская / Dionysia hissarica Lipsky

Мақоми 2. Помир-Олойнинг жануби-ғарбидаги кичик майдонларда сақланиб қолган камёнб ёндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Қояларнинг ёриқларида осилиб ўсадиган ёстиқсимон, намчил ярим бутача. Илдиз бўғизидан ўсиб чиққан бир тутам пояларидаги барглар кетма-кет жойлашган. Эски ёпирма барглари сақланиб қолади. Барглари юмшоқ, юпқа, тишчали, безчали туклар билан қопланган, ўзига хос ҳидга эга. Гуллари сариқ, 2-3 та, гулолди баргчалари билан үралган, пастга эгилиб турувчи гулпояларда ўрнашган. Июнь-июль ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг жанубий ёнбағирлари (Сангардак дарёсининг ўрта оқими)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги сернам жойларда, шаршаралар яқинидаги қумтош қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. 2013 йилда 1250 тути аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Уруғ маҳсулдорлигининг пастлиги ва табиий ўсиш шароитининг чекланганлиги (стенобионт тур).

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида кўчкат қилиб ўтқазиш ва уруғи орқали кўпайтиришга қаратилган уринишлар натижада бермаган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [88, 269, 368].

О. Т. Тургинов.

Статус 2. Редкий узколокальный эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Подушковидный мезофильный полукустарник. Образует компактные подушки, свисающие из расщелин скал. От корневой шейки отходит пучок хрупких стеблей с очередными листьями. Старые розетки сохраняются. Листья мягкие, тонкие, зубчатые, с железистым опушением и нежным ароматом. Цветки на поникающих цветоносах, жёлтые, собраны по 2-3 и окружены прицветниками. Цветёт и плодоносит в июне-июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: южные склоны Гиссарского хребта – среднее течение реки Сангардак.

Места обитания. Влажные ниши и под карнизы, расщелины отвесных скал вблизи водопадов в среднем поясе гор.

Численность. В 2013 году зарегистрировано 1250 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Стенобионтность и низкая семенная продуктивность вида.


Культивирование. Посадка взрослых экземпляров и высев семян в Ботаническом саду АН РУЗ окончилась неудачей.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [88, 269, 368].

О. Т. Тургинов.

Rare and endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Sangardak valley (the Surkhandarya region). Inhabits the wet niches, clefts of sheer rocks near waterfalls in the middle belt of mountains. In 2013 about 1250 plants were revealed. Limiting factors: narrow ecological position and low seed production. Measures of protection: not protected.



ПИСТАДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО СУМАХОВЫЕ – ANACARDIACEAE

149. Ошловчи totim (Сирка дарахти) Сумах дубильный / *Rhus coriaria* L.

Мақоми 1. Ҳисор тизмаси ва Ғарбий Тянь-Шанга ҳос камёб тур.

Қисқача тавсифи. Баландлиги 3–4 м, баъзан 6–10 м га етадиган паст бўйли дарахт. Ноқулай шароитда ўсганда бута шаклида ҳам учрайди. Бир йиллик новдалари кулранг-кўнгир, кўп йиллик поялари эса жигарранг. Барглари мураккаб, тоқ патсимон, 7–9 жуфт, узунлиги 30 см га етади. Барг банди қанотчали. Гуллари яшилоқиши, поянинг учиди чўзиқ урчуқсимон тўпгул ҳосил қиласди. Меваси йирик, тифиз, юмалоқ, тўқ қизил рангли, нордон. Уруғи (данаги) овал шаклида, қаттиқ.

Тарқалиши. Сурхондарё, Тошкент вилоятлари: Ҳисор тизмаси (Тўпаланг ва Ҳондиза дарёларининг ҳавзалари) ва Ғарбий Тянь-Шанда, Чотқол тизмаси (Коронкулсой)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1200–1400 м баландлиқда қуруқ шағалли ва тошли ёнбағирларда ўсади. Очиқ жойларда ўсуви ёргувесвар ўсимлик.

Сони. Кам учрайди, онда-сонда кичик туплар ҳосил қиласди.

Кўпайиши. Уруғидан ва бачкисидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўтин сифатида ишлатилади ва ёш ниҳоллари чорва моллари томонидан оёқости қилинади.

Маданийлаштирилиши. Андикон ва Тошкент вилоятларида экиб ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [156–159, 139].

Р. И. Қозоқбоев.

Статус 1. Редкий вид Гиссарского хребта и Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Невысокое (3–4, реже 6–10 м) листопадное растение. В неблагоприятных условиях проявляет себя как кустарник. Однолетние побеги серо-коричневые, многолетние – коричневые. Листья

сложные, непарноперистые, 7–9-парные, длиной до 30 см, с крылатым черешком. Цветки зеленовато-белые, образуют на верхушках побегов вытянутое, веретенообразное соцветие. Плоды шаровидные, тёмно-бордовые, кислые, собраны в плотные крупные соплодия. Семена (косточка) овальные, твёрдые.

Распространение. В Сурхандарьинской и Ташкентской областях: Гиссарский хребет: бассейн рек Тупаланг и Хандиза; Западный Тянь-Шань (вероятно занесен и интродуцирован) – Чаткальский хребет – урочище Каранкуль.

Места обитания. Сухие каменистые горные склоны с мелкоземистыми маломощными почвами в нижнем поясе гор. Светолюбивое растение обитает на открытых местах на высоте 1200–1400 м.

Численность. Образует небольшие, часто разреженные рощицы.

Размножение. Семенное и вегетативное. Легко размножается корневыми отпрысками.

Причины изменения численности и ареала. Вырубается на топливо, страдает от вытаптывания скотом, особенно молодые всходы и ювенильные растения.


Культивирование. Культивируется в Андиконской и Ташкентской областях.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [156–159, 139].

Р. И. Казакбаев.

Rare species of the Hissar range and the western Tien-Shan. It is spread at the Hissar range: the Tupalang and Khandiza river basins; the western Tien-Shan (probably introduced); the Chatkal range: Karankul (the Surkhandarya and Tashkent regions). Inhabits dry stony slopes of mountains in the mountainous zone. Photophilous plant inhabits open places at 1200-1400 m.s.l. The quantity is unknown. Limiting factors: felled as firing, suffers from trampling down by cattle, especially young seedlings and juvenile plants. Measures of protection: not protected.



РАЪНОГУЛДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ - ROSACEAE

150. ЎРТА ОСИЁ НОКИ Груша среднеазиатская / *Pyrus asia-mediae* (Popov) Maleev

Мақоми 0. Фарбий Тянь-Шанга хос йўқолиб кетгган тур.

Қисқача тавсифи. Шоҳ-шаббали йирик дарахт. Барглари йирик, кенг тухумсимон ёки деярли юмалоқ, четлари йирик арасимон, баргининг пастки томони яшил, устки томони эса тўқ яшил, барг банди япроғидан қисқароқ. Гуллари майдा. Меваси йирик, юмалоқ, кўкиш ёки сарғиши рангли, кечпишар, серсув, ширин. Май ойида гуллаб, меваси октябрда пишади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Фақатгина Писком дарёси бўйидаги Испай ва Муллали қишлоқларида ўсганлиги маълум.

Ўсиш шароити. Боғларда ўсан.

Сони. Фақатгина бир марта М. Г. Попов томонидан йигилган. Кейинги изланишлар натижасиз тутаган.

Кўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Қариган туплари ўтин сифатида ишлатиб юборилган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсиш жойлари Угом-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида жойлашган. Махсус муҳофаза чоралари кўрилмаган.

Манбалар. [159, 164, 189, 256].

Ў. П. Пратов.

Статус 0. Исчезнувший вид Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Крупное дерево с раскидистой кроной. Листья крупные, широкояйцевидные или почти округлые, по краю крупнопильчатые, сверху тёмно-зелёные, снизу более светлые, черешки короче пластинок. Цветки мелкие. Плоды крупные, зеленоватые или желтоватые, чаще округлые, позднеспелые, сочные, сладкие. Цветёт в мае, плодоносит в октябре.

Распространение. Ташкентская область: известна только одна точка – долина реки Пскем в окрестностях кишлаков Испай и Муллали.

Места обитания. Сады.

Численность. Один раз собрана М. Г. Поповым в указанном пункте. Дальнейшие поиски оказались безрезультатными.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены. Возможно, старые деревья были использованы на топливо.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Места произрастания расположены в пределах Угам-Чаткальского национального парка. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [159, 164, 189, 256].

У. П. Пратов.

Disappeared endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Pskem valley in the surroundings of the village Ispai and Mullali (the Tashkent region). Inhabits gardens. Once it was collected by M.G. Popov in the mentioned place. Recent collecting missions had no success. Limiting factors: probably old trees were used as wood. Measures of protection: not protected.



РЎЯНДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО МАРЕНОВЫЕ – Rubiaceae

151. СИЛЛИҚ РЎЯН

Марена гладкая / Rubia laevissima Tscherneva

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Тянь-Шанга хос жуда камёб эндемик ўсимлиқ.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м га етадиган ярим бута. Пояси силлиқ, юмaloқ, баъзан тўрт қиррали, оч кулранг. Барглари қисқа бандли, туксиз, поядা 6 тадан ҳалқа ҳосил қилиб ўрнашган. Гули яшил-сарик, барг қўлтиғида ярим соябон шаклида ўрнашган. Меваси қора, ялтироқ, узунлиги 0,5 мм. Май-июн ойида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол дарёси ҳавзасида тарқалган. Қирғизистонда ҳам учрайди (Бешорол қўриқхонаси).



Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1000–1100 м баландликдаги йирик тошли сурималарда ўсади.

Сони. Жуда кам сақланиб қолган. Ҳозирча 12 жойда ўсиши аниқланган, умумий сони 800 га яқин тупни ташкил қиласди.

Қўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Эҳтимол, тошларнинг суримиши ва кўчкиласи туфайли камайиб кетган бўлса керак.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида экиб ўстирилганда ижобий натижага эришилмаган.

Муҳофаза чоралари. Угом-Чотқол миллий табиат боғида сақланади. Табиий ҳолда тарқалган тупларини сақлаш ва экиб ўстириш ишларини йўлга қўйиш керак.

Манбалар. [159, 323].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 3. Редчайший узкий эндемик Юго-западного Тянь-Шана.

Краткое описание. Полукустарник высотой до 1 м, с гладкими, округлыми, реже слегка четырёхгранными стеблями светло-серого цвета. Листья в мутовках по 6, на коротких черешках, голые. Цветки зеленовато-жёлтые, в пазушных простых полуцонтиках. Плоды чёрные, блестящие, длиной 0,5 мм. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле–августе.

Распространение. Ташкентская область: Бассейн реки Чаткал. За пределами Узбекистана: Кыргызстан (заповедник Бешарал).

Места обитания. Крупнообломочные каменистые осыпи нижнего пояса гор, на высоте 1000–1100 м.

Численность. Очень редок. Достоверно известно 12 местонахождений с общей численностью не более 800 экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены. Возможно, влияют камнепады, оползни и лавины.


Культивирование. Предприняты неоднократные и неудачные попытки интродукции в условиях Ботанического сада АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Угам-Чаткальского национального парка. Необходимы сохранение местообитаний, поиск путей введения в культуру.

Источники. [159, 323].

К. Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the south-western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal river basin (the Tashkent region). Inhabits stony mounds with large segments in the lower belt of mountains at a height of 1000-1100 m. There are 12 population with about 800 specimens recorded. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park. It is necessary to reserve locations, to work out methods of introduction into cultivation.



152. БОЧАНЦЕВ ПЛОКАМАСИ

Плокама Бочанцева / Plocama botschantzevii (Lincz.) M. Backlund et Thulin

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимликтік.

Қисқача тавсифи. Яримбутача, қалин, оқиши, бўғимли, шохлари туксиз. Барглари ясси, наштарсимон, туксиз, юпқа пардасимон ёнбаргчалари нов ҳосил қилади. Гуллари иирик гулёнбаргчали, косачаси бокалсимон, сал ғадир-будир, узунлиги 4 мм, 3–4 та киприксимон тишчали. Гултожи оқишишулранг, узунлиги 7–9 мм, 5 бўлакли, дағал тукли. Меваси цилиндрсимон, узунлиги 5–6 мм, қалин, дағал тукли. Кўшалоқ мевалари бир-бирига маҳкам ўрнашган.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Келиф-Шерабад тепаликлари (Оқтош қишлоғи атрофи)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Олажинсли паст тоғлардаги соғ тупроқларда ўсади.

Сони. 70 тути борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Олажинсли майдонларнинг қисқариши ва молларнинг кўплаб боқилиши туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [356, 367]

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редчайший эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Полукустарник с многочисленными беловатыми, членистыми, голыми ветвями. Листья плоские, ланцетные, голые с пленчатыми прилистниками, образующими влагалища. Цветы с крупными прицветниками. Чашечка бокаловидная, слегка шероховатая, 4 мм длины, с 3–4 реснитчатыми зубцами. Венчик беловато серый, 7–9 мм длины, 5-лопастной, щетинистый. Плод цилиндрический, 5–6 мм длины, сильно щетинистый, полуплодики плотно соединены друг с другом. Цветет в июле, плодоносит в сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: эндемик Келиф-Шерабадской гряды (кишлак Акташ).

Места обитания. Серые глины пестроцветных низкогорий.

Численность. Зарегистрировано 70 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение площади пестроцветов и выпас.



Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [356, 367].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare endemic species of the southern Pamir-Alay. Endemic of the Kelif-Sherabad range, nearby the village Aktash (the Surkhandarya region). Inhabits grey salty soils. 70 plants were revealed. Limiting factors: decreasing of gypseous slopes and pasturing. Measures of protection: not protected.



153. АЛШАХБОЗ ПЛОКАМАСИ

Плокама Альшахбаза / Plocama alshehbazii F.O. Khass., D. Khamr, U. Khuzh. et Achilova.

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқачатавсифи. Бўйи 20–45 см ли ярим бута. Илдиши қўнғир рангли. Пояси силлиқ, тўқ яшил. Барглари силлиқ, узунлиги 2–4 см, эни 1–1,5 мм, новдада қарама-қарши жойлашган, ёнбаргчасиз. Тўпгули монохазиалли, гули гулбандсиз. Гулён-баргия яшил, силлиқ, узунлиги 5–6 мм, эни 0,5 мм. Косачаси қорамтири, узунлиги 2,5–3 мм, 5 та бир-бирига тенг бўлмаган тишчали. Гулкўргонининг узунлиги 25–30 мм, у дастлаб сарғиши, кейинчалик пушти рангли, туксиз 5 қисмли. Чангчиси 5 та, тумшуқчаси билан бирга бўртиб чиқсан. Тугунчаси силлиқ. Мерикарпийси силлиқ, жигарранг, узунлиги 4–5 мм, эни 1,5 мм. Июлда гуллаб, сентябрда мевалайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Келиф-Шеробод тепаликлари (Бойсун атрофида тарқалган).

Ўсиш шароити. Олажинсли қолдиқ тоғлардаги соҳупроқларда ўсади.

Сони. 100 туп ўсимлик борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Олажинсли майдонларнинг қисқариши ва молларнинг кўплаб боқилиши туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Мухофаза қилинмайди.

Манбалар. [356, 367].

У. Хўжаназаров.

Статус 1. Редкий эндемик Южного Памира-Алая.

Краткое описание. Полукустарник 20–45 см высоты. Корни черно-коричневые. Стебли гладкие, темно-зеленоватые. Листья гладкие 2–4 см длины, 1–1,5 мм ширины, супротивные, без прилистников. Соцветие монокарпическое, цветки без цветоножек. Прицветники зеленоватые, гладкие, 5–6 мм длины, 0,5 мм ширины, без желтого острия. Чашечка черноватая, 2,5–3 мм длины, с 5 неравными зубчиками. Околоцветник 25–30 мм длины, сначала желтоватый, позже розовый, голый, 5-раздельный. Тычинок 5, выставленных вместе с рыльцем. Завязь гладкая. Мерикарпий гладкие, коричневые, 4–5 мм длины, 1,5 мм ширины. Цветет в июле, плодоносит в сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: эндемик Келиф-Шерабадской гряды (возле г. Байсун).

Места обитания. Серые глины пестроцветных низкогорий.

Численность. Зарегистрировано 100 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение площади пестроцветов и выпас.




Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [356, 367].

У. Хўжаназаров.

Rare endemic species of the southern Pamir-Alay. Endemic of the Kelif-Sherabad range, nearby town Baysun (the Surkhandarya region). Inhabits grey salty soils. 100 plants were revealed. Limiting factors: decreasing of gypseous slopes and pasturing. Measures of protection: not protected.



САВРИНЖОНДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО БЕЗВРЕМЕННИКОВЫЕ (МЕЛАНТОВЫЕ) – COLCHICACEAE (MELANTHIACEAE)

154. КЕССЕЛРИНГ САВРИНЖОНИ

Безвременник Кесселринга / *Colchicum kesselringii* Regel

Мақоми 3. Марказий Осиёда камайиб бораётган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Күп йиллик тугунак пиёзли ўт. Туганак пиёзи чўзиқ тухумсимон, диаметри 1–3,5 см, қобиғи дағал, қора қўнғир рангли. Барглари 3–6 та, чизиқли. Гуллари 1–4 та, оқ рангли. Тожбаргчаларининг ташқи томони тўқ бинафшаранг чизиқли, наштарсимон, тўмтоқ. Чанчилари қайтақисидан 2 марта қисқа, чангдони ингичка. Февраль ойида гуллаб, мева-си май–июнда етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Навоий, Самарқанд, Қашқадарё, Жиззах, Сурхондарё вилоятлари: Фарбий Тянь-Шань (Курама, Чотқол тизмалари)да, Помир-Олой (Туркистан, Зарабшон, Ҳисор, Нурут, Кўҳитанг тизмалари ва Чўлбайир тоғлари)да тарқалган. Қозогистон, Тожикистон, Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларидан то тоғнинг юқори қисми-гача бўлган жойларда майда жинс тупроқли ва шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда ва тўп-тўп бўйиб учрайди.

Кўпайиши. Ургудан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гулларининг кўп миқдорда йигиб олиниши ва чорва молларининг кўплаб боқилиши оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзРФА Ботаника боғида 1967 йилдан бўён экиб келинади.

Муҳофаза чоралари. Чотқол, Зомин, Сурхон, Нурут, Китоб, Ҳисор қўриқхоналарида, Зомин ва Угом-Чотқол миллий боғларида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [159, 221].

У.Х. Қодиров.

Статус 3. Эндемик Центральной Азии с сокращающейся численностью.

Краткое описание. Многолетнее клубневальное растение. Клубневница яйцевидно-продолговатая, сплюснутая, 1–3,5 см в диаметре, с чёрно-бурыми кожистыми оболочками. Листьев 3–6, линейные. Цветки в количестве 1–4, белые. Листочки околоцветника снаружи по спинке с тёмно-фиолето-

выми полосками, линейно-ланцетные, тупые. Тычинки в 2 раза короче отгиба, с линейными пыльниками. Цветёт в феврале, плодоносит в мае–июне.

Распространение. В Ташкентской, Самаркандской, Навоийской, Кашкадарьинской, Джизакской, Сурхандарьинской областях: Западный Тянь-Шань – Кураминский, Чаткальский хребты; Памиро-Алай – горы Чульбаир. Туркестанский, Зарабшанский, Гиссарский хребты, Нурут, Кугитанг. За пределами Узбекистана: Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан.

Места обитания. Мелкоземистые и щебнисто-мелкоземистые склоны от подгорных равнин до верхнего пояса гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами и небольшими популяциями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и выпас.

Культивирование. С 1967 года культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском, Зааминском, Сурханском, Нурутинском, Китабском, Гиссарском заповедниках, Зааминском и Угам-Чаткальском национальных парках.

Источники. [159, 221].

У.Х. Қадиров.

Endemic of Central Asia with the reducing populations. It is spread at the western Tien-Shan: the Kurama, the Chatkal ranges; the Pamir-Alay: the Chulbair the Mountains; the Turkestan, the Zaravshan, the Hissar, the Nuratau, the Kughitang ranges (the Tashkent, the Samarkand, the Navoi, the Kashkadarya, the Djizakh, the Surkhandarya regions). Inhabits fine earth and -fine earth slopes from submontane plains to the upper belt of mountains. Single specimens and small populations can be found. Limiting factors: picking of flowers, pasturing. Measures of protection: protected in the Chatkal, the Zaamin, the Surkhan, the Nuratau, the Kitab, the Hissar state reserves, the Zaamin and Ugam-Chatkal national parks.



САЛИБОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ОРХИДНЫЕ – ORCHIDACEAE

155. ТУРКИСТОН ЭУЛОФИЯСИ

Эулофия туркестанская / *Eulophia turkestanica* (Litv.) Schlecht.

Мақоми 3. Марказий Осиёнинг жанубий қисмидаги ареали ажралган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 35–50 см орасидағи туксиз, сариқ-бинафша рангли, кўп йиллик ўт. Илдизпояси бўғимли. Пояси 1–2 та. Барглари унча ривожланмаган, ўтқир учли, пардасимон, юқори қисми учбурчак шаклидаги новни эслатади, узунлиги 2–3 см. Кечроқ тараққий этадиган поялардаги барглари энсиз, узунчоқ, қаттиқ. Гуллари оч сариқ, пастга қараб эгилган. Кўсаги эллипссимон, узунлиги 2–2,5 см, эни 10–12 мм. Апрель ойидагуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Бухоро, Навоий, Самарқанд, Сурхондарё вилоятлари: Зарафшон дарёси водийсида, Муян, Кармана, Конимех қишлоқлари атрофига, Сурхондарё ҳавзасида, Жарқўрғон ва Сурхон қишлоқлари ўрталарида, Денов шахри атрофига тарқалган.


Ўсиш шароити. Тўқайларда, чийзорларда ҳамда ботқоқлашган ерларда ўсади.

Сони. Кам тарқалган, унча катта бўлмаган тўплар ҳосил қиласи.

Кўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниqlанмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.



Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [337].

О. Қ. Ҳожиматов.

Статус 3. Редкий эндемик южной части Центральной Азии с разорванным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение, желтовато-фиолетовое, голое, высотой 35–50 см. Корневище узловатое. Стебли в количестве 1–2, с редуцированными листьями в виде заострённых, перепончатых на верхушке, треугольных влагалищ длиной 2–3 см. Листоносные побеги развиваются позднее, с узкими, линейными, жёсткими листьями. Цветки ярко-жёлтые, поникающие. Коробочка эллиптическая длиной 2–2,5 см, шириной 10–12 мм. Цветёт в апреле, плодоносит в мае–июне.

Распространение. В Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Сурхандарьинской областях: Долина реки Зарафшан, у селений Муян, Кармине, Конимех, между кишлаками Сурхан и Джаркурган, окрестности города Денау.

Места обитания. Заболоченные участки, тугай и заросли чия.

Численность. Встречается редко, небольшими популяциями.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [337].

О. Қ. Ҳожиматов.

Rare endemic species of the southern part of Central Asia with reducing area. It is spread at the Zarafshon river valley, nearby the villages Muyan, Karmine, Kanimekh, Surkhan and Djarkurgan, nearby Denau (the Bukhara, the Navoi, the Samarkand, the Surkhandarya regions). Inhabits marshy places, tugais. It grows rarely in small populations. Measures of protection: not protected.



САЛЛАГУЛДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ПИОНОВЫЕ (ЛЮТИКОВЫЕ) – PAEONACEAE (RANUNCULACEAE)

156. ЁВВОЙИ САЛЛАГУЛ Пион степной / *Paeonia hybrida* Pall.

Мақоми 3. Ўзбекистондаги сони қисқарип бораётган камёб, манзарали тур.

Қисқача тасвиғи. Бўйи 25–75 см оралиғидаги кўп йиллик ўт. Илдизи урчуқсимон йўғонлашган. Барглари бандли, икки карра уч бўлакли, бўлаклари қалами-наштарсимон. Гуллари йирик, диаметри 6–10 см. Меваси тарвақайлаган, қалин тукли. Уруғи ялтироқ, қора рангли. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Самарқанд, Сурхондәрё, Қашқадарё вилоятлари: Чотқол, Курама, Зарафшон ва Ҳисор тизмаларида тарқалган. Қирғизистон, Қозоғистон, Фарбий Сибирда ва Шинжон музофоти шимолидаги Жунғория худудида ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1500–2000 м баландликдаги чириндили, майда жинсли тупроқларда ва дараҳтларнинг тагида ўсади.

Сони. Табиатда 200–250 популяцияси борлиги аниқланган бўлиб, улардан айримлари йўқолиб кетган. Улар фақат қўриқланадиган ва чиқиб бўлмайдиган жойларда сақланиб қолган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.


Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гулларининг узиб олиниши ва тупларининг илдизи билан қазиб олиниб, ҳовлиларга экилиши ҳамда чорва молларининг кўплаб боқилиши оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Кўргина ботаника бояларида муваффақиятли равишда экиб келинмоқда.

Муҳофаза чоралари. Чотқол, Китоб ва Зомин қўриқхоналарида ва Уғом-Чотқол миллий табиат боғида қўриқланади.

Манбалар. [226].

О. Қ. Ҳожиматов.



Статус 3. Редкий в Узбекистане декоративный вид с сокращающейся численностью.

Краткое описание. Травянистый многолетник высотой 25–75 см. Корни с веретенообразными утолщениями. Листья на черешках, дважды тройчаторасеченные на ланцетно-линейные доли. Цветки 6–10 см в диаметре, пурпурно-розовые. Плоды отклоненные, густоопущенные; семена блестящие, чёрные. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Ташкентской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской областях: Чаткальский, Кураминский, Гиссарский, Зарафшанский хребты. За пределами Узбекистана: Кыргызстан, Казахстан, Западная Сибирь, Джунгария (Северная часть Синьцзян-Уйгурской автономии).

Места обитания. Мелкоземистые гумусированные почвы, реже под пологом деревьев на высоте 1500–2500 м.

Численность. Отмечен в 200–250 популяциях, некоторые из них уже не существуют. Очень редко на охраняемых территориях и в труднодоступных местах образует заросли.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветков на букеты и пересадка растений на приусадебные участки, бессистемный выпас.

Культивирование. Успешно культивируется многими ботаническими садами.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском, Китабском и Зааминском государственных заповедниках, Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [226].

О. К. Ҳожиматов.

Rare in Uzbekistan ornamental species with the reducing quantity. It is spread at the Chatkal, the Kurama, the Hissar, the Zaravshan ranges (the Tashkent, the Samarkand, the Surkhandarya, the Kashkadarya regions). Inhabits fine earth humus soils, rarely under crown cover of trees at a height of 1500–2500 m. There are 200–250 populations, some of them do not exist by this time. Very rare on the protected territories and in almost inaccessible places it forms tickets. Limiting factors: picking flowers and replantation of plants into personal plots, unsystematic pasturing. Measures of protection: protected in the Chatkal, the Kitab and Zaamin state reserves and the Ugam-Chatakal national park.



САНТАЛДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО САНТАЛОВЫЕ - SANTALACEAE

157. МИНКВИЦ ТЕЗИУМИ

Ленец Минквица / Thesium minkwitzianum B. Fedtsch.

Мақоми 1. Фарбий Тянь-Шанга хос йўқолиб ке-тиш арафасида турган фоят камёб реликт ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см га етадиган кўп ийллик ўт. Илдизи кўп бошчали, ундан тик поялар ўсиги чиқади. Барглари кенг наштарсимон, чармасимон. Гуллари якка-якка, сарик, деярли бандсиз. Гулқўргони узун найсимон, учи 5 бўлакли. Уруғи (ёнчаси) эллипс шаклида, томирлари шохланиб катакалар ҳосил қиласди. Май-июн ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Фарбий Тянь-Шанда тўртта ўсиш жойи маълум – Бошқизилсой (Ўзбекистон), Боролдойтоғ, Талас Олатоғи (Қозогистон) ва Бешорол атрофлари (Қирғизистон).



Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1400 м ба-ландлиқда майдада жинс тупроқларда ўсади.

Сони. Ҳар хил ёшдаги 50 дан ортиқ тури маълум.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариши сабаблари. Табиятда камёб, реликт тур. Ўсимлик ўсиги турган жойларда қурилиш ишларининг олиб борилиши ва ерларнинг хўжалик мақсадида ўзлаштирилиши бу турнинг қирилиб кетишига сабаб бўлган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [160, 302].

О. Қ. Ҳожиматов.

Статус 1. Редчайший, находящийся на грани исчезновения реликтовый вид Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Травянистый многолетник высотой до 50 см, с многоглавым корнем, многочисленными прямыми стеблями, широко ланцетными

кохистыми листьями. Цветки одиночные, желтоватые, почти сидячие, околоцветник в виде длинной трубки, наверху неглубоко рассечён на 5 лопастей. Орешек эллиптический, ячеистый от густой сети ветвящихся жилок. Цветёт и плодоносит в маёне.

Распространение. Ташкентская область: две близко расположенных популяций имеются в западных отрогах Чаткальского хребта в бассейне Башкизилсай. За пределами Узбекистана: Казахстан (Боролдайтау, Таласский Алатау), Кыргызстан (Бешарал).

Места обитания. Мелкоземистые почвы в среднегорье (1400 м).

Численность. Более 50 разновозрастных особей в Башкизилсай.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Естественно редкий реликтовый вид. Застройка и интенсивное хозяйственное использование территории.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском биосферном государственном заповеднике.

Источники. [160, 302].

О. К. Ҳожиматов.

Rare relict species of the western Tien-Shan. There is one population spread at the western part of the Chatkal range in the Boshkizylsai basin (the Tashkent region). Inhabits fine earth soils in the middle belt of mountains (1400 m.s.l.). More than 50 plants were revealed. Limiting factors: relict species, distribution area and numbers decreasing under anthropogenic pressure. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere state reserve.



СЕМИЗДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ТОЛСТАНКОВЫЕ – CRASSULACEAE

158. ҚҮНФИРОҚГУЛЛИ СОХТАСЕМИЗАК

Ложноочиток колокольчикоцветный / *Pseudosedum campanuliflorum* Boriss.

Мақоми 2. Туркистан ва Қурама тоғ тизмаларининг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–15 см, тик илдизли, поялари сербарг кўп йиллик ўсимлик. Барглари қалами, узунлиги 1–1,5 см, эни 1–1,5 мм. Гултўдаси соябонли тўпгул. Гулёнбарглари чўзиқ – тухумсимон. Гуллари қисқа бандли, узунлиги 8–9 мм. Гултожи қўнфироқсимон, пуштиранг. Апрель–май ойларида гуллаб, май ойида уруғ ҳосил қиласди.

Тарқалиши. Жиззах вилояти: Туркистан тизмаси, Жиззах шаҳри атрофлари (Молгузар тизмасининг «Темур дарвоза» дараси) ва Қурама тизмалари (Қашқасой)да тарқалган. Ўзбекистондан ташқарида: Тожикистан (Қурама тизмаси ва Мўғилтоғ).

Ўсиш шароити. Тошли ёнбағирлар, тоғнинг пастки қисмидаги қоялар.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Чорва молларининг мунтазам боқилиши, йўл қурилиши оқибатида камайиб кетган бўлиши мумкин.

Маданийлаштирилиши. Маданийлаштирилмаган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [254, 289].

О. К. Ҳожиматов.

Статус 2. Редкий эндемик Памиро-Алая (Туркестанский хребет).

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 10–15 см, с мощным вертикальным корнем, густо облиственными многочисленными стеблями. Листья линейные, 1–1,5 см длины, 1–1,5 мм ширины. Соцветие зонтико-видно-щитковидное. Прицветники продолговато-яйцевидные. Цветы 8–9 мм длины, на коротких цветоножках. Венчик колокольчатый, розовый. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае.

Распространение.

Джизакская область: Мальгузарский хребет (ущелье Темирлановы ворота). За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Каменистые склоны, скалы в нижнем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сведений нет.


Культтивирование. Не культивировался.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [254, 289].

О. К. Ҳожиматов.

Rare endemic species of the Pamir-Alay (the Turkestan range). It is spread at the Malguzar range: the Timur's gate gorge (the Dzhizak region). Inhabits stony slopes and rocks. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



СИГИРҚҮЙРУҚДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО НОРИЧНИКОВЫЕ – SCROPHULARIACEAE

159. БУХОРО СПИРОСТЕГИЯСИ

Спиростегия бухарская / *Spirostegia bucharica* (B. Fedtsch.) Ivanina

Мақоми 2. Жануби-гарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлиқ.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–60 см оралиғидаги паҳмоқ туклар билан қопланган икки йиллик ўт. Поялари 1–4 та, оддий, баъзан шоҳланган. Барглари тухумсимон-чўзиқ, кетма-кет жойлашган, четлари айрисимон тишли. Гуллари якка-якка, поянинг юқори қисмидаги баргларининг қўлтиғида жойлашган. Ко-сачаси найсимон-қўнғироқсимон, узунлиги 12–15 мм, учбуручак наштарсимон тишли. Гултожи сап-сариқ, воронкасимон, узунлиги 25–45 мм. Кўсак меваси чўзиқ тухумсимон, узунлиги 15 мм. Уруғи майда. Июль–август ойларида гуллаб, меваси сентябрь–октябрда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё, Сурхондарё вилоятлари: Фузор, Дехқонобод, Қизилча, Оқрабод, Шўроб, Оқтош, Қораил, Чарқауқ ва Озод қишлоқлари атрофида тарқалган. Туркманистанда (Кўхитанг) ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Гипсли оҳактошларда, оҳакгилларда, гипсли қояларда, баъзан майда жинсли тупроқларда ўсади.

Сони. Тупларининг умумий сони 15 мингдан ошмайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ерларнинг қишлоқ хўжалиги учун ўзлаштирилганлиги ва чорва молларининг узлуксиз боқилиши ўсимликнинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстириш устида олиб борилган кўп йиллик тажрибалар натижасиз тугади.


Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [101, 156–159, 310].

Ф. Ү. Ҳасанов.

Статус 2. Редкий узкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Двухлетнее травянистое растение высотой 20–60 см, густо мохнато опущенное, клейкое от железистых выделений. Стебли в количестве 1–4, простые, реже ветвистые. Листья очередные, яйцевидно-продолговатые, по краю вильчато-зубчатые. Цветки одиночные в пазухах листьев верхней половины стебля. Чашечка колокольчато-трубчатая, длиной 12–15 мм, с тре-



угольно ланцетными цельными зубцами. Венчик ярко-жёлтый, воронковидный, длиной 25–45 мм. Коробочка удлинённо-яйцевидная длиной 15 мм. Семена мелкие. Цветёт в июле–августе, плодоносит в сентябре–октябре.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: окрестности Гузара, Дехканабада, Кызылчи, Акрабада, Шураба, Карайля, Чаркаук, Акташ, Азада. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Загипсованные известняки, скалы чистого гипса, реже мелкоземистые, сильно загипсованные субстраты.

Численность. Общая численность не превышает 15 тысяч экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Уменьшение площадей пестроцветов и выпас.

Культивирование. Многочисленные попытки вырастить в Ботаническом саду АН РУз оказались неудачными.

Меры охраны. Охраняется на территории Сурханского государственного заповедника.


Источники. [101, 156–159, 310].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: nearby Guzar, Dekhanabad, Kyzylcha, Akrabad, Shurab, Karail, Charkauk, Oktash, Azad (the Kashkadarya and Surokhndarya regions). Inhabits gypseous slopes. Total number does not exceed 15 thousand specimens.

Limiting factors: decreasing of gypseous area and pasturing.

Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve.



160. ЙИРИК ШЕРОЛЧИН

Мытник большой / *Pedicularis grandis* Popov ex Vved.

Мақоми 1. Фарбий Помир-Олойдаги камёб эн-демик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Попук илдизли ўсимлик. Пояси якка-якка, тик, наматсимон тукли, баланд-лиги 50–80 см. Барглари навбат билан ўрнашган, чўзиқ, патсимон қирқилган. Тўпгули 20–40 см узунлиқда. Косачаси наматсимон тукли, узун-лиги 30–33 мм, найчаси билан бўртиб туради. Қалпоқчаси ўроқсимон эгилган, узун тумшуқчали. Лабчаси тишли, 3 бўлакли. Иккита чангчисининг или қалин тукли, бошқа иккитасиники тускиз.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ҳисор тиз-маси (Филон қишлоғи атрофида тарқалган).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмида дарёларнинг қирғоқларида жойлашган ўрмон-ларда ўсади.

Сони. 25 йил мобайнида бу турни топиш устида олиб борилган ишлар натижасиз тугади. У бутунлай йўқолиб кетган бўлса керак.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайган бўлса керак. **Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари.** Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ. **Муҳофаза чоралари.** Муҳофаза қилинмайди. **Манбалар.** [159, 176].

О. К. Ҳожиматов.

Статус 1. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Корень мочковатый. Стебель одиночный, прямой, мохнато пушистый, 50–80 см высоты. Листья очередные, удлиненно продолговатые, перисто рассеченные. Соцветие 20–40 см длины. Чашечка серо мохнатая 12–14 мм длины. Венчик желтоватый 30–33 мм длины, с выставляющейся трубкой. Шлем серповидно согнутый с длинным носиком. Губа зазубренная, трехлопастная. Нити 2 тычинок мохнатые, 2 других голые. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Кашкадаръинская область: Гиссарский хребет, окрестности кишлака Гилян.

Места обитания. Пойменные леса в среднем поясе гор.

Численность. Многочисленные попытки в течении 25 лет найти этот вид в классическом местонахождении не увенчались успехом. Вид, по-видимому, полностью исчез.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 176]

О. К. Ҳожиматов.

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the western parts of the Hissar mountains, nearby the village Gilyan (the Kashkadarya region). Inhabits river forests. Several collecting missions during last 25 years to find these species were unsuccessful. Probably, species disappeared. Measures of protection: not protected.



СУТЛАМАДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО МОЛОЧАЙНЫЕ – EUPHORBIACEAE

161. ВВЕДЕНСКИЙ АНДРАХНАСИ Андрахна Введенского / *Andrachne vvedenskyi* Paziж

Мақоми 1. Ўзбекистоннинг жанубий худудларига хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40 см га етадиган ярим бута. Ёш поялари ғадир-будур. Ёғочланган кулранг ва қўнғир шоҳлари кўплаб сақланиб қолади. Барги қалин этли, кенг эллипссимон, юмалоқ, баъзан тескари-тухумсимон, тўмтоқ ёки учли. Гуллари айрим жинсли, барг қўлтиқларида 1–2 тадан жойлашган. Чангчи гули ингичка, уруғчи гули йўғон гул бандда жойлашган. Кўсакчаси деярли юмалоқ, З бўлакли. Мева бандининг узунлиги 8–10 мм. Июль ойида гуллаб, меваси пишади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Сурхон-Шеробод водийсида (Шакарли Остона) тарқалган.

Ўсиш шароити. Очиқ ола жинсларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ўсади. Бир жойдан 2 марта йиғилган.

Кўпайиши. Ургидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [159, 212, 257].

Т. Насимова.

Статус 1. Редкий эндемик Южного Узбекистана.

Краткое описание. Полукустарник высотой до 40 см. Молодые стебли очень шероховатые. В изобилии сохраняются одревесневшие старые серые и буроватые ветви. Листья мясистые, широко-эллиптические, округлые или реже обратно-яйцевидные, тупые или заостренные. Цветки разнополые, в пазухах листьев по 1–2. Мужские цветки на тонких цветоножках, женские – на толстых. Коробочка почти шаровидная, трёхлопастная. Плодоножка длиной 8–10 мм. Цветёт и плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: Сурхан-Шерабадская долина – Шакарлык-Астана.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород.



Численность. Встречается единично. Собран два раза.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 212, 257].

Т. Насимова.

Rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the Surkhan-Sherabad valley: Shakarlyk-Astana (the Surkhandarya region). Inhabits outcrops of gypseous rocks. Single specimens were collected two times. Measures of protection: not protected.



162. АЙРИШОХ СУТЛАМА

Молочай густоватый / *Euphorbia densiuscula* Popov

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 5–10 см орасидаги бир йиллик ўт. Пояси қисқа, қалин баргли, шохланган, хурпайган қисқа тукли. Барглари этили, тескари тухумсимон, асосига қараб ингичкалашиб боради ва барг бандига айланади. Тўпгули қалқонсимон, кўп марта айри бўлиб шохланган. Кўсаги тухумсимон, уч бўлакли, етилмагани қисқа тукли, пишгани деярли туксиз. Май–июн ойларида гуллаб, мевалайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўҳитанг тизмасида – Боғлидара довонида, Оқтош қишлоғи атрофида, Ҳисор тизмасида – Бойсун яқинидаги Каттақамиш қишлоғи атрофларида учрайди. Туркманистанда ҳам учрайди (Келиф атрофида).

Ўсиш шароити. Гипсли, ола жинсларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [159, 212, 257].

Т. Насимова.

Статус 1. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Однолетнее растение высотой 5–10 см. Стебель укороченный, густо облистенный, ветвистый, коротко оттопырано волосистый. Листья мясистые, обратнояйцевидные, к основанию постепенно суженные в черешках. Соцветие щитковидное, многократно дихотомически-ветвящееся. Коробочка яйцевидно-трёхлопастная, молодая – коротко опущенная, зрелая – почти голая. Цветёт и плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – окрестности Байсуга у селения Каттакамыш; хребет Кугитанг (ущелье Боглидара, окрестности кишлака Акташ). За пределами Узбекистана – Туркменистан (окрестности Келифа).

Места обитания. Гипсированные пестроцветы.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Часть популяций охраняется на территории Сурханского государственного заповедника.

Источники. [159, 212, 257].

Т. Насимова.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: around Baysun town near the settlement of Kattakamysh; the Kughitang range: the Boglidara gorge, around the Aktash village (the Surkhandarya region). Inhabits gypseous soils. Single specimens can be found. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



163. КУДРЯШЕВ СУТЛАМАСИ

Молочай Кудряшева / *Euphorbia kudrjaschevii* (Pazij) Prokh.

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20 см га етадиган, жингалак туклар билан қопланган кўп йиллик ўт. Пояси тик, оддий, барглари кўп. Поянинг пастки барглари тангачасимон, кўнғир рангли, чўзиқ, поядаги барглари эса чўзиқ қалами, узунлиги 2–4,5 см, эни 2–4 мм, асоси юмaloқ, учли, текис қиррали. Соябони 3–6 та, оддий нурли. Кўсакчаси юмaloқ, узунлиги 6 мм, жингалак тукли. Июнь-июль ойларида гуллаб, мевалайди.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ҳисор тизмасининг Бешнов тоғида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори (ялов) қисмида ўсади.

Сони. 1937 йили бир марта йиғилган. Ўсимликни топиш учун сўнгги йилларда олиб борилган изланишлар натижа бермаган. Тур бутунлай йўқолиб кетган бўлиши мумкин.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Уруғининг яхши унмаслиги, тоғнинг юқори қисмида учраши унинг кам тарқалишига сабаб бўлса керак.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [159, 212, 257].

Т. Насимова.

Статус 1. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 20 см, курчаво пушистое. Стеблей несколько, они прямостоячие, простые, густо облиственные. Нижние листья чешуевидные, бурые, продолговатые; стеблевые – продолговато-линейные, длиной 2–4,5 см, шириной 2–4 мм; в основании округлые, острые, цельнокрайные. Зонтик 3–6-лучевой, с простирами лучами. Коробочка шаровидная, длиной 6 мм, курчаво пушистая. Цветёт и плодоносит в июне–июле.

Распространение.

Кашкадарьинская область: Гиссарский хребет – горы Бешнау.

Места обитания.

Субальпийский пояс гор.

Численность. Собран один раз в 1937 г. Многократные попытки найти вид не увенчались успехом. Вид, по-видимому, исчез.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Пассивный способ распространения семенного материала, выпас и изоляция.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [159, 212, 257].

Т. Насимова.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Beshnau mountain (the Kashkadarya region). Inhabits subalpine zone. The quantity is unknown. Once it was collected in 1937. Several attempts to find out these species had no success. Limiting factors: passive way of seed material distribution, pasturing and isolation. Measures of protection: protected in the Hissar state reserve.



164. ТИГИЗ СУТЛАМА

Молочай ложногустоватый / Euphorbia densiusculiformis (Pazij) Botsch.

Мақоми 1. Ўзбекистоннинг жанубий худудига хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 8 см га етадиган бир ийлilik ўт. Пояси қисқа, шохланган. Барглари этли, кураксимон ёки чўзиқ-тухумсимон, қисқа бандли. Қалқонсимон тўпгули барг қўлтиғидаги гулли шохлар билан ўралган. Кўсакчаси, одатда, узун бандли, тухумсимон, уч бўлакли, силлик. Апрель-май ойларида гуллаб, мевалайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Бойсун ва Шеробод атрофларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Ола жинсли қолдиқ тоғларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 212, 257].

Т. Насимова.

Статус 1. Редкий эндемик Южного Узбекистана.

Краткое описание. Однолетнее травянистое растение высотой до 8 см. Стебель укороченный, ветвистый. Листья мясистые, лопатчатые или продолговато-яйцевидные, короткочерешковые. Соцветие щитковидное, окруженнное пазушными цветоносными ветвями. Коробочка обычно на длинной ножке, яйцевидно-трёхлопастная, гладкая. Цветёт и плодоносит в апреле-мае.

Распространение. Сурхандарьинская область: окрестности Байсона и Шерабада.

Места обитания. Пестроцветные низкогорья.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 212, 257].

Т. Насимова.

Rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the surroundings of Baysun and Sherabad towns (the Surkhandarya region). Inhabits gypseous low hills. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



165. УЧТИШЛИ СУТЛАМА

Молочай трёхзубчаторый / *Euphorbia triodonta* Prokh.

Мақоми 1. Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудига хос жуда камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 6–15 см, туксиз, кўк-яшил рангли, бир йиллик ўт. Пояси қисқа, деярли асосидан шохланган. Поядаги барглари бандсиз, текис қиррали, пастки 2 жуфт барглари қарама-қарши, қолганлари навбат билан жойлашган, узунлиги 4,5–5 мм, эни 1–1,5 мм. Гулолди барглари қарама-қарши жойлашган, қалами, узунлиги 10–15 мм, эни 1,5–4 мм, учта томирли. Тўпгули айри бўлиб шохланган, тарвақайлаган. Кўсақчасининг узунлиги 3–3,5 мм, эни 2–2,5 мм. Уруғи чўзиқ, олти қиррали, узунлиги 1,5–2 мм, оқиши ёки кулранг. Апрель ойида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Сурхон–Шеробод водийси (Шеробод атрофлари)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Гипсли ва шўр тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Махсус мухофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 212, 257].

Т. Насимова.

Статус 1. Редкий узкий эндемик Южного Узбекистана.

Краткое описание. Однолетнее растение, голое, сизоватое, высотой 6–15 см. Стебель укороченный, почти от основания ветвящийся. Стеблевые листья сидячие, цельнокрайние, 2 нижние пары супротивные, остальные-очередные, длиной 4,5–5 мм, шириной 1–1,5 мм. Прицветные листья супротивные, линейные, длиной 10–15 мм, шириной 1,5–4 мм, 3-нервные. Соцветие дихотомическое ветвистое, растопыренное. Коробочка длиной 3–3,5 мм, шириной 2–2,5 мм. Семена продолговато-шестигранные, длиной 1,5–2 мм, беловатые или серые. Цветёт в апреле, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Сурхон–Шерабадская долина – окрестности г. Шерабад.

Места обитания. Засоленные и гипсовые склоны низкогорий.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.



Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [159, 212, 257].

Т. Насимова.

Rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the Surkhan-Sherabad valley (the Surkhandarya region). Inhabits saline and gypsum slopes of low mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



166. ҚАДАҲСИМОН СУТЛАМА

Молочай твёрдобокальчатый / Euphorbia sclerocyathium Korovin et Popov

Мақоми 1. Орол ва Каспий атрофидаги чўлларда учрайдиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–40 см оралигидаги туксиз, кўк-яшил, кўп ийиллик ўт. Пояси кўп, тик, асосидан шохланган. Барглари этли, бандсиз, текис қиррали, наштарсимон, эллипс шаклда, баъзан қалами-наштарсимон. Кўсакчаси 4,5 мм узунлиқда, юмалоқ-тухумсимон, силлик. Уруғи тухумсимон, 2–3 мм узунлиқда, оч кулранг. Май–август ойларида гуллаб, меваси июнь–сентябрда етилади.



Тарқалиши. Коракалпакистон: Устюртда, Қоринёриқ, Шахбахта ва Борсакелмас қишлоқлари ҳамда Табансу, Қорабавур қудуқлари атрофларида тарқалган. Туркманистанда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тошли ва қумли чўлларда, шўрхок, шўрланган кулранг-қўнғир тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ёки тўп-тўп бўлиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши ва худудда нефть-газ саноатининг ривожланиши сабабли камайиб кетмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ. Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди. Манбалар. [159, 212, 257].

Х. Ф. Шомурадав.

Статус 1. Редкий эндемик Приаральских и Прикаспийских пустынь.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 20–40 см, сизое, голое. Стебли многочисленные, прямостоячие, от основания сильно-ветвистые. Листья мясистые, сидячие, цельнокрайние, ланцетовидно-эллиптические, реже линейно-ланцетовидные. Коробочка длиной 4,5 мм, шаровидно-яйцевидная, гладкая. Семена яйцевидные, длиной 2–3 мм, бледно-серые. Цветёт в мае–августе, плодоносит в июне–сентябре.

Распространение. Каракалпакстан: Устюрт, окрестности колодца Табансу, Карабаур, посёлок Карын-Ярык, селение Барсакельмас. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Каменистые и песчаные пустыни, солончаки, засоленные серобурье и гипсоносные почвы.

Численность. Встречается спорадически единично и небольшими группами.

Размножение. Семенное и вегетативное (за счет корневища).

Причины изменения численности и ареала. Развитие нефте-газового сектора в регионе и выпас.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 212]

Х. Ф. Шомурадав.

Rare endemic species of the Aral and Caspian deserts. It is spread at the Ustyurt Plateau, nearby Tabansu, Karyn-Yaryk, Barsakelmas (Karakalpakistan). Inhabits stony and sandy deserts, saline soils, saline grey-brown soils. Sporadically isolated or small groups can be found. Limiting factors: pasturing and increasing of oil-gaz operational infrastructures. Measures of protection: not pro-

tected.



ТАЛОҚДОРИДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО НАСТОЯЩИЕ ПАПОРОТНИКИ – ASPLENIACEAE

167. ҚОЯ ФОРҮТИ

Листовик сколопендровый / *Phyllitis scolopendrum* (L.) Newman

Мақоми 1. Фарбий Тянь-Шанга хос камёб тур.

Қисқача тавсифи. Қирқүлоқ (папоротник).

Барглари йирик, узунлиги 40 см га етади, эни 6 см, узун бандли. Япроги наштар-тасмасимон, четлари тўлқинсимон, асоси юраксимон. Сорусла-ри қалами, узунлиги 2,5 см, асосий томирнинг икки томонида сал қийшиқ жойлашган, пардали. Июль-августда споралайди.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Уғом тизмаси (Сижжаксай)да тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Туркманистон (Копетдоғ) ва Ўрта Ер денгизи атрофларида учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги қояларнинг сояларида ўсади.

Сони. Якка-якка ва кичик гуруҳлар хосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Споралари билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Уғом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [63, 159].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий вид в Западном Тянь-Шане.

Краткое описание. Папоротник. Листья крупные, до 40 см длины и 6 см ширины, длинночешковые; пластинка листа ланцетно-ремневидная, с волнистым краем, в основании сердцевидная; сорусы линейные, до 2,5 см длины, косо расположенные по обе стороны главной жилки, имеются покрывальца. Спороношение в июле–августе.

Распространение. Ташкентская область: Угамский хребет (Сиджаксай). За пределами Узбекистана: Копетдаг, Средиземноморье.

Места обитания. В тени скал среднего пояса гор.

Численность. Встречается спорадически единичными особями и группами.



Размножение. Спорами.

Причины изменения численности и ареала. Не известны.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [63, 159].

Ф. О. Ҳасанов

Rare relict species of the western Tien-Shan. It is spread at the Tashkent region: the Ugam range, Sijjaksay. Inhabits shadows of rocks. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



ТОРОНДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ГРЕЧИШНЫЕ – POLYGONACEAE

168. МАЙИН ТУКЛИ ҚАНДИМ

Қандым мягкий / *Calligonum molle* Litv.

Мақоми 2. Қызылкүмда кичик майдонларда тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50–100 см баландликдаги бироз тирсаксимон шохланган бута. Гули оч пушти. Гулқўрғони мевалаётганда пастга қараб эгилади. Меваси юмалоқ-тухумсимон, узунлиги 25–30 мм, эни 20–25 мм, қизғиш. Қанотчалари ингичка, эни 2–3 мм. Ёнғоқчаси тўғри, узунлиги 10–13 мм. Апрель–май ойларида гуллаб, май–июнда мевалайди.



Тарқалиши. Бухоро вилояти: Қызылкүмда (Денгизкўл атрофлари) тарқалган. Туркманистанда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Мустаҳкамланган қум уюмларида ўсади.

Сони. Аниқланмаган. Баъзан кичик-кичик тўплар ҳосил қиласиди.

Кўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу тур тарқалган ерларда муттасил чорва моллари боқиласиди. Шунингдек, ундан ўтин сифатида фойдаланилади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 204, 270].

М. М. Набиев.

Статус 2. Редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Кустарник высотой 50–100 см со слабоколенчато-извилистыми ветвями. Цветки светло-розовые. Околоцветник при плодах отогнут вниз. Плод округло-яйцевидный, длиной 25–30 мм и шириной 20–25 мм, красноватый. Крылья узкие, шириной 2–3 мм. Щетинки сидячие в 2 ряда, трижды-четырежды

ветвящиеся на нитевидные доли. Орешек прямой, длиной 10–13 мм. Цветет в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Бухарская область: Кызылкумы – окрестности озера Денгизкуль. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Закреплённые грядово-буристые пески.

Численность. Не установлена, редко образует небольшие популяции.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Использование массива под выпас. Заготовка на топливо.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 204, 270].

М. М. Набиев.

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: around the Dengizkul Lake (the Bukhara region). Inhabits fixed ridge-hilly sands. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing and use as wood. Measures of protection: not protected.



169. МАТТЕЙ ҚАНДИМИ

Кандым Маттея / *Calligonum matteianum* Drobow

Мақоми 1. Қизилқумдаги кичик майдонларда тарқалган камёб эндемик ўсимлиқ.

Қисқача тавсифи. Бўйи 70–150 см, бироз эгри-тирсаксимон шохланган бута. Гуллари пушти. Гулқурғони мевалаётганда пастга қараб эгилади. Меваси деярли шарсимон, эни 15–20 мм, очсариқ ёки қизғиши. Дағал тукларининг узунлиги 5–7 мм, 8 қатор бўлиб ўрнашган, ингичка, юмшоқ, эгилувчан. Ёнғоқчаси дағал туклар орасида жойлашганлиги учун деярли кўринмайди, узунлиги 7–12 мм, 90 даражага буралиган. Апрель–май ойларида гуллаб, май–июнда мевалайди.

Тарқалиши. Бухоро вилояти: Қизилқумда (Денгизкўл атрофига) тарқалган. Туркманистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Мустаҳкамланган қум тепаликлирида ўсади.

Сони. Аниқланмаган. Кичик майдонларда жуда кам миқдорда тарқалган.

Кўпайиши. Маълумотлар йўқ. Об-ҳаво қулай келган йиллари уруғидан чиққан ниҳолларни учратиш мумкин.


Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Ўсимлик тарқалган жойларда кўплаб чорва моллари боқиласди. Шуннингдек, ўтинг сифатида ишлатилиши ўсимлик кўпайишига салбий таъсир қиласди.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 204, 270].

М. М. Набиев.



Статус 1. Редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Кустарник высотой 70–150 см со слабоколенчато-извилистыми ветвями. Цветки розовые. Околоцветник при плодах отогнут вниз.

Плод почти шаровидный, шириной 15–20 мм, светло-жёлтый или красноватый. Щетинки расположены в 8 рядов, тонкие, мягкие, гибкие, длиной 5–7 мм. Орешек почти скрытый щетинками, длиной 7–12 мм, повернутый на 90 градусов. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Бухарская область: Кызылкумы – озеро Денгизкуль. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Грядово-буристые закреплённые пески.

Численность. Не установлена.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 204, 270].

М. М. Набиев.

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: around the Dengizkul Lake (the Bukhara region). Inhabits fixed ridge-hilly sands. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



170. НОЗИК ҚАНДИМ

Қандым изящный / *Calligonum elegans* Drobow

Мақоми 2. Фарғона водийсидаги туб ола жинсларда тарқалган камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50–100 см, тирсаксимон шохланган бута. Гулкўрғони мевалаётганда пастга қараб эгилган. Меваси овалсимон ёки шарсимон, узунлиги 10–15 мм, сариқ ёки қизил. Қанотчалари юпқа, ясси, четлари нотекис майда тишчали, қирралари майда тиши. Ёнгоқчаси 10 мм узунлиқда, 90 дараҷа буралган. Апрелда гуллаб, май ойида мевалайди.

Тарқалиши. Фарғона водийси: Фарғона вилояти Гумхона, Оқчўп, Оқбел, Супатоғ ва Қорақалпоқ чўлида тарқалган. Тожикистон (Вахш водийси)да ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Туб ола жинсли тупроқларда, туб жинслари ер юзига яқин жойлашган қумларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган. Кичик майдонларда сийрак ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг муттасил боқилиши ўсимликка салбий таъсир кўрсатади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 204, 270].

М. М. Набиев.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 204, 270].

М. М. Набиев.

Rare endemic species of the gypseous rocks in the Ferghana valley. It is spread at the Ferghana valley: Gumkhona, the Karakalpak Steppe, Akchop, Akbel, Supatau (the Ferghana region). Inhabits outcrops of gypseous rocks and sands with not deep bed of primary rocks. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



Статус 2. Редкий вид пестроцветных толщ Ферганской долины.

Краткое описание. Кустарник высотой 50–100 см с коленчато-извилистыми ветвями. Околоцветник при плодах отогнут вниз. Плод овальный или слегка шаровидный, длиной 10–15 мм, жёлтый или красный. Крылья нежные, плоские, по краю неравно-мелкозубчатые. Орешек длиной 10 мм, повернут на 90 градусов. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Ферганская долина: Ферганская область – Гумхона, Акчоп, Акбель, Супатау и Каракалпакская степь. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород и пески с не глубоким залеганием коренных пород.

Численность. Не установлена.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Выпас.



171. ОҲАҚТОШ ҚАНДИМИ

Кандым известковый / *Calligonum calcareum* Pavlov

Мақоми 1. Туркистон тизмасида кичик майдончаларда ўсадиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–40 см баландликдаги тирсаксимон эгри-буғри шоҳланган бута. Гуллари оқ. Гулқўргони мевалаётганида пастга эгилади. Меваси чўзиқ-овал шаклида, узунлиги 10–15 мм, эни 7–10 мм, сариқ ёки қипқизил. Қанотчалари кенг-наштарсимон, асоси ўйилган, юқори қисми ўтқир учли, қирраси нотекис ўтқир тишчали, устки қисми (сирти) оддий ёки айрисимон тиканли. Ёнфоқчаси тўғри, узунлиги 7–10 мм. Апрелда гуллаб, май ойида мевалайди.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Сўх ва Исфара дарёлари ҳавзаларида тарқалган. Тожикистанда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Очик оҳактошли ёнбағирларда ва дарё қирғоқларидағи гипсли кум-шағалли жойларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Айрим об-ҳаво қулай келган йиллари уруғидан чиқсан ниҳолларини кузатиш мумкин.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши ўсимликнинг кўпайишига салбий таъсир кўрсатади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [159, 204, 270].

M. M. Набиев.

Статус 1. Редкий эндемик Туркестанского хребта.

Краткое описание. Кустарник высотой 30–40 см с коленчато-извилистыми ветвями. Цветки белые. Околоцветник при плодах отогнут вниз. Плод продолговато-овальный, длиной 10–15 мм, шириной 7–10 мм, жёлтый или светло-красный. Крылья широко ланцетные, при основании с выемкой, наверху заострённые (не закруглённые). Края крыльев неравно-остро-зубчатые, на поверхности у края с простыми, реже вильчатыми щетинками. Орешек длиной 7–10 мм, прямой. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Ферганская область: Бассейны рек Сох и Исфара. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Открытые известняковые склоны и гипсированные песчано-галечниковые берега рек.

Численность. Не установлена.

Размножение. В отдельные благоприятные годы наблюдаются семенные всходы.

Причины изменения численности и ареала. Выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 204, 270].

M. M. Набиев.



Rare endemic species of the Turkestan range. It is spread at the Sokh and Isfara river basins (the Ferghana region). Inhabits open limestone slopes and gypseous sandy-pebble river banks. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



172. ПАЛЕЦКИЙ ҚАНДИМИ

Қандым Палецкого / *Calligonum paletzkianum* Litv.

Мақоми 3. Қызылқумдаги кичик майдонларда тарқалған камёб әндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 100–200 см баландликдаги эгри-буғри тирсаксимон шохланган бута. Гули оқ. Гулкўрғони мевалаётганда пастга қараб эгилган. Меваси эллипс-шарсимон ёки деярли шарсимон, эни 40–50 мм, қизил. Қанотчалари ту-



хумсимон, эни 3–5 мм, туксиз. Четлари 1,5–3 мм ўйилган. Ёнғоқчаси 12–15 мм узунликда, тўғри, ҳар томонидан кўриниб туради. Апрель–май ойларида гуллайди, май–июнда мевалайди.

Тарқалиши. Бухоро вилояти: Қызылқумда (Денгизкўл атрофларида) тарқалған. Туркманистон ва Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Мустаҳкамланган қум уюмларида ўсади.

Сони. Кам учрайди. Кичик-кичик тўплар ҳосил қиласди.

Кўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик ўсиб турган майдонлардан чорвачилиқда муттасил фойдаланилади, шунингдек, ўтин сифатида ишлатилади.

Маданийлаштирилиши. ЎзРФА Ботаника боғида ўстиришга уриниб кўрилган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 204, 270].

М. М. Набиев.

Статус 3. Редкий вид
Кызылкума.

Краткое описание.
Кустарник высотой 100–200 см с коленчато-извилистыми ветвями. Цветки белые. Околоцветник при плодах отогнут книзу. Плод эллиптически-шаровидный или почти шаровидный, шириной 40–50 мм, красный. Кры-

лья овальные, шириной 3–5 мм, голые. Края крыльев до 1,5–3 мм надрезанные. Орешек длиной 12–15 мм, прямой, видимый со всех сторон. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Бухарская область: Кызылкумы – озеро Денгизкуль. За пределами Узбекистана: Туркменистан, Таджикистан.

Места обитания. Закреплённые грядово-буристые пески.

Численность. Встречается очень редко, образуя небольшие популяции.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Усиленный выпас, заготовка на топливо.

Культивирование. Были попытки культивировать в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 204, 270].

М. М. Набиев.

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: around the Dengizkul Lake (the Bukhara region). Inhabits fixed ridge-hilly sands. Very rarely forming small populations can be found. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: not protected.



173. ЗОКИРОВ ҚАНДИМИ

Кандым Закирова / *Calligonum zakirovii* (Khalk.) F.O. Khass.

Мақоми 1. Қизилқумдаги кичик майдонларда тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 70–150 см, бироз эгри-тирсаксимон шохланган бута. Гуллари оқ. Гулқўрғони мевалаётганда пастга қараб эгилади. Меваси деярли шарсимон, эни 10–12 мм. Апрель–май ойларида гуллаб, май–июнда мевалайди.

Тарқалиши. Бухоро вилояти: Қизилқум чўл стансияси атрофида тарқалган.

Ўсиш шароити. Мустаҳкамлашган гипсли тепаликларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган. Кичик майдонларда жуда кам миқдорда тарқалган.

Кўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Ўсимлик тарқалган жойларда кўплаб чорва моллари боқиласди. Шунингдек, ўтин сифатида ишлатилиши ўсимлик кўпайишига салбий таъсир қиласди.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 204, 270].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Кустарник высотой 70–150 см со слабоколенчато-извилистыми ветвями. Цветки белые. Околоцветник при плодах отогнут вниз. Плод почти яйцевидный, розоватый, с плоскими чешуйками, 10–12 мм. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Бухарская область: Кызылкумы – окр. Кызылкумской пустынной станции.

Места обитания. Гипсы.

Численность. Не установлена.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 204, 270].

Ф. О. Хасанов.

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: nearby the Kyzylkum biostation. Inhabits gypseous slopes. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



ТОШБАҚАТОЛДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО РУТОВЫЕ - RUTACEAE

174. БУХОРО ТОШБАҚАТОЛИ

Цельнолистник бухарский / *Haplophyllum bucharicum* Litv.

Мақоми 2. Жанубий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп пояли ярим бута, бўйи 15–35 см, шохлари туксиз. Барглари сал этли, наштарсимон, бутун, деярли бандсиз. Тўпгули рўваксимон, ясси, камгулли. Косача барглари тўкилмайди, чўзикухумсимон, тўмтоқроқ, узунлиги 1–1,5 мм. Гултожи сарик, туксиз, кенг тухумсимон, тўмтоқ, қисқа 6–8 мм узунликдаги қайтақили. Чангчи иплари кўшилмаган, деярли тенг, безчали туклари йўқ, туксиз, асоси тўп тукли. Тугунчаси бандли, туксиз, бўртмали. Кўсаги бандли, очиладиган, туксиз, бўртмали, эни 4–5 мм. Май–июнда гуллаб, меваси июнь–августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари: Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқлари (Дехқонобод, Оқравот, Тойчи, Шўроб атрофлари) хамда Кўҳитанг тоғолди худудларида тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Туркманистанда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Қизил кумтошли тупроқлarda ўсади.

Сони. Шўроб атрофида 120, Келиф-Шеробод (Зараоб) тепаликларида 200 га яқин туп борлиги аниқланган. Ареалининг бошқа қисмида сони аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиий майдонларнинг ўзлаштирилиши ва молларнинг кўплаб боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [159, 310].

Н. К. Раҳимова.

Статус 2. Узколокальный эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многостебельный полукустарник 15–35 см высоты с травянистыми голыми веточками. Листья чуть мясистые, ланцетные, цельнокрайные, почти сидячие. Соцветие метельчато-щитковидное, малоцветковое. Чашелистики остающиеся, продолговато-яйцевидные, туповатые, 1–1,5 мм длины. Лепестки желтые, голые, широко яйцевидные, тупые вогнутые, с очень коротким ноготком, 6–8 мм длины. Нити тычинок свободные, почти равные, без железок, голые, при основании

ниии бородавчатые. Столбик толстый, голый. Завязь на ножке, голая, бугорчатая. Коробочка открывающаяся на ножке, голая, бугорчатая с придатками, 4–5 мм ширины. Цветет в мае–июне, плодоносит в июне–августе.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: юго-западные отроги Гиссарского хребта (окрестности поселков Дехканабад, Акрабад, Тойчи, Шураб), предгорья Кугитанга. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Краснопесчанники.

Численность. 120 растений в окр. Шуроб, 200 растений на Келиф-Шерабадской гряде (Зарабаг). На остальной части ареала численность не известна.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Деградация естественных местообитаний и выпас.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 310].

Н. К. Раҳимова.

Rare endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the south-western branches of the Hissar range (around Dehkanabad, Akrabad, Toychi, Shurab villages), the piedmonts of the Kughitang range (the Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits red sands. 120 plants were revealed nearby the village Shurob, and 200 plants-nearby Zarabag village. The magnitude of the other populations is unknown. Limiting factors: degradation of gypseous slopes and pasturing. Measures of protection: not protected.



ТОШЁРАРДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ТОЛСТАНКОВЫЕ – SAXIFRAGACEAE

175. УГОМ БАДАНИ

Бадан угамский / *Bergenia ugamica* V.N. Pavlov

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шанга хос камёб, реликт тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Илдизпояси ва пояси йўғон. Ёпирма барглари бандли, қалин, узунлиги 15 см гача, эни 13 см, четлари кунгурали ёки қўшалоқ тишли. Тўпгули зич рўвак-қалқонсимон, безчасимон тукли. Гуллари тўқ пушти рангли. Чангчилари 10 та. Устунчаси 2 та. Июль–август ойларида гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Уgom ва Писком тизмаларида тарқалган. Қозоғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 2300–2500 м баландликда қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Табиатда кичик тўплар ҳосил қилиб учрайди.

Кўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Уgom-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [19, 27, 159].

К. Ш. Тожибаев.


Статус 2. Редкий, узколокальный, реликтовый вид Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 30 см. Стебель толстый, переходящий в толстое корневище. Прикорневые листья черешковые, толстые, длиной до 15 см и шириной до 13 см, по краю неясно городчатые или двоякозубчатые. Соцветие плотное, метельча-

то-щитковидное, железисто опущенное. Цветки ярко-малиново-розовые. Тычинок 10, столбиков 2. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе.

Распространение. Ташкентская область: Угамский и Пскемский хребты. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Трешины скал в субальпийском поясе гор (2300–2500 м).



Численность. Встречается небольшими группами.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [19, 27, 159].

К. Ш. Тожибаев.

Rare, relict species of the western Tien-Shan. It is spread at the Ugam range: the Ugam valley (the Tashkent region). Inhabits cracks of rocks in the subalpine zone (2300-2500 m). The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



176. ҲИСОР БАДАНИ

Бадан гиссарский / *Bergenia hissarica* Boriss.

Мақоми 2. Ҳисор тизмасига хос камёб, реликт, эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Ёпирма барглари йирик, тескари-тухумсимон, тўмтоқ, четлари қаттиқ киприксимон тукли. Илдизпояси йўғон. Пояси ер бағирлаб ўсади, деярли баргиз. Тўпгуллари ёйиқ. Тоҷбарглари оқ рангли, йирик, юмалоқ. Уруғи майда. Май-июнъ ойларида гуллайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасида Тўпаланг дарёси ҳавзаси (Тамшуш)да, Муш ва Ҳурватан қишлоқлари оралиғида, Шотрут дарёсининг Тўпаланг дарёсига куилиши ерида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғлардаги қояларнинг ёриқларида ва тошли тик ёнбағирларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайса керак.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари томонидан истеъмол қилиниши, ўзига хос шароитда ўсганлиги учун ҳам камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [19, 27, 159].



К. Ш. Тожибаев.



Статус 2. Редкий, реликтовый эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение, с крупными розеточными обратнояйцевидными, тупыми, по краю жестко реснитчатыми листьями, высотой около 20 см. Корневище мощное. Стебель приподнимающийся почти безлистный. Соцветие рыхлое. Лепестки белые, крупные, округлые. Семена мелкие. Цветёт в мае-июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – река Тупаланг (Тамшуш) – между кишлаками Муш и Хурватан и по реке Шатрут у слияния с рекой Тупаланг.

Места обитания. Трещины скал и каменистые крутые склоны гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. По-видимому, семенное.

Причины изменения численности и ареала. Поедается животными. Приуроченность к местообитаниям.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [19, 27, 159].

К. Ш. Тожибаев.

Rare relict endemic species of the Hissar range. It is spread at the Hissar range: the Tupalang valley (Tamshush); between the villages Mush and Khurvatan and along the Shatrut river up to joining with the Kshutut river (the Surkhandarya region). Inhabits cracks of rocks and stony steep slopes of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: confinedness to habitat, eating by animals. Measures of protection: not protected.



ТУТДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО ТУТОВЫЕ - MORACEAE

177. ЁВВОЙИ АНЖИР Инжир дикий / *Ficus carica L.*

Мақоми 2. Марказий Осиё ҳудудига хос ниҳоятда камёб, ареали ажралган тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 5–8 м га етадиган да-рахт ёки бута. Барглари навбат билан жойлашган, 3–5 бўлакли, пастки томони тукли. Тўпгули барг қўлтиғида биттадан жойлашган, қисқа бандли, меваси ноксимон. Бир йилда икки-уч мартагача ҳосил беради. Апрель ойида гуллаб, меваси июль-август ойларида пишади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасида Сангардак ва Тўпаланг дарёларининг ҳавзаларида тарқалган. Тожикистон ва Туркманистанда ҳам ўсади.



Ўсиш шароити. Дарё ҳавзаларида тош-шағалли тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ёки тўп-тўп бўлиб ўсади.

Кўпайиши. Вегетатив йўл билан (қаламчасидан ва бачкисидан) кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Қишки совуқ, баҳорги селлардан зарар кўради. Шунингдек, ўтин сифатида ишлатилади.

Маданийлаштирилиши. Анжир навларини етиштиришда фойдаланилади.

Мухофаза чоралари. Махсус мухофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [205, 225].

Р. И. Қозоқбоев.

Статус 2. Крайне редкий вид в Центральной Азии.

Краткое описание. Небольшое дерево или кустарник высотой 5–8 м, с очередными 3–5-лопастными, снизу пушистыми листьями. Соцветия пазушные, на коротких ножках, одиночные, грушевидной формы. Плод грушевидный. В год плодоносит 2–3 раза. Цветёт в апреле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – бассейны рек Сангардак, Тупаланг. За пределами Узбекистана: Китай, Таджикистан и Туркменистан.

Места обитания. Каменисто-щебнистые субстраты в долинах рек.

Численность. Не установлена.

Размножение. Корневыми отпрысками, пневой посолью и черенками.


Причины изменения численности и ареала. Повреждение морозами, селевыми потоками, заготовка на топливо.

Культивирование. Используется для выведения новых сортов инжира.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [205, 225].
Р. И. Казакбаев.

Extremely rare species in Central Asia. It is spread at the Hissar range: the Sangardak and Tupalang river basins (the Surkhandarya region). Inhabits stony-substrates in the river valleys. The quantity is unknown. Limiting factors: damage by frosts, mud-streams. Measures of protection: not protected.



ТУЯТОВОНДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ – ZYGO-PHYLLACEAE

178. БУХОРО ТУЯТОВОНИ

Парнолистник бухарский / *Zygophyllum bucharicum* B Fedtsch.

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги паст тоғларда тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м га етадиган сершоҳ бута. Барглари 2 баргчали, 5–7 мм узунликдаги бандлари орқали шохларга ўрнашган. Япроқчалари қалами, серэт, узунлиги 5–7 мм, ёш япроқчалари майин тукли, вақт ўтиши билан туксизланади. Тожбарглари сарик, 10–12 мм узунлиқда. Меваси деярли шарсимон, туксиз, 5 уячали кутича, уячалари кенг қанотчали. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг тизмаси ва Сурхондарёнинг қуий оқимида тарқалган. Туркманистон ва Жанубий Тожикистанда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Паст тоғлардаги гипсли ола жинсларда ўсади.

Сони. Жуда сийрак тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Майдони қисқариб бораётган ола жинсли ёнбағирларда ўсадиган реликт тур.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [30, 159, 310].

Э. Э. Эргашев.

Статус 1. Редкий реликтовый эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Очень корявый кустарник высотой до 1 м. Листья с 2 листочками, на черешках длиной 5–7 мм, на коротких веточках. Листочки очень мясистые, линейные, длиной 5–7 мм, молодые – слегка пушистые, взрослые – голые. Цветки жёлтые, длиной 10–12 мм. Плод голая, почти шарообразная 5-гнездная, по гнёздам ширококрылая выемчатая коробочка. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Келиф-Шерабадская грязда (найден впервые на территории Узбекистана в 2009 г. в 5 км восточнее к. Акташ). За пределами Узбекистана: Туркменистан, Таджикистан. Викарный вид *Z. dumosum* Boiss. в Палестине.

Места обитания. Краснопесчанниковые породы.

Численность. Зарегистрировано 4 популяции (60 кустов).

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Реликтовый вид на сокращающихся пестроцветных склонах.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [30, 159, 310].

Э. Э. Эргашев.



Rare, relict endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Kelif-Sherabad range (found for the first time in Uzbekistan, in 2009, 5 km to the east of village Aktash) (the Surkhandarya region). Inhabits dry gypseous rocks in the low hills. 4 populations with 70 plants can be found. Limiting factors: relict species growing on the decreasing gypseous slopes. Measures of protection: not protected.



УЗУМДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ВИНОГРАДНЫЕ – VITACEAE

179. ЁВВОЙИ ТОК (УЗУМ)

Виноград винный (дикий) / *Vitis vinifera* L.


Мақоми 3. Ўзбекистондаги ареали ажралган камёб тур.

Қисқача тавсифи. Узунлиги 30 м гача етадиган ўралыб ўсувчи ўсимлик. Барглари оддий, деярли юмалоқ, 3–5 бўлакли ёки панжасимон қирқилган, асоси ўйилган, четлари ўткир тишли ёки кунгирали.



Тўпгули тифиз ёки ёйик рўвак. Меваси турли ранг ва шаклда. Май–июн ойида гуллаб, июль–октябрда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Сурхондарё, Тошкент вилоятлари: Нурота тизмаси (Гурдара ва Болосой даралари), Ҳисор тизмаси (Сангардак ва Тўпаланг дарёлари ҳавзалари)да; Фарбий Тянь-Шань – Писком, Уғом, Қоржонтов, Чотқол тизмаларида тарқалган. Тоҷикистон, Қирғизистон ва Қозоғистонда ҳам учрайди.



Ўсиш шароити. Дарё ёқалари, дараларда, шағал, майда зарра жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ёки кичик тўплар ҳосил қилиб тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан ҳамда вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари боқилиши ҳамда ўтин сифатида ишлатилиши натижасида қисқарип бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Марказий Осиёдаги барча ботаника боғларида, маҳсус боғдорчиллик тажрибида участкаларида, селекция станцияларида янги навлар етиштиришда фойдаланилади.

Муҳофаза чоралари. Нурота ва Чотқол давлат қўриқхоналарида ва Уғом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [91, 159].

Р. И. Қозоқбоев.

Статус 3. Редкий вид Узбекистана с разорванным ареалом.

Краткое описание. Стебельчатая лиана длиной до 30 м. Листья простые, почти округлые, 3–5-лопастные или пальчато рассеченные, при основании с выемкой, по краю с тупыми или заостренными зубцами. Соцветие – густая или рыхлая метелка. Плод различной формы, величины и цвета. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле–октябре.

Распространение. В Ташкентской, Джизакской и Сурхандарьинской областях: хребет Нурага – ущелья Болосай и Гурдара; Гиссарский хребет – бассейн реки Сангардак и Тупаланг; Западный Тянь-Шань – хребты Пскемский, Угамский, Каржантай и Чаткальский. За пределами Узбекистана: от Средиземноморья до Китая и Японии.

Места обитания. Мелкоземисто-щебнистые склоны и долины рек, ущелья.

Численность. Встречается единичными экземплярами или небольшими группами.

Размножение. Семенное и вегетативное. Причины изменения численности и ареала. Использование на топливо и выпас.

Культивирование. По всей территории Центральной Азии в ботанических садах, специализированных питомниках и на селекционных станциях; используется для выведения столовых, кишмишных и винных сортов винограда.

Меры охраны. Охраняется в Нурагинском и Чаткальском заповедниках и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [91, 159].

Р. И. Казакбаев.

Rare species in Uzbekistan with reducing area. It is spread at the Hissar range: the Sangardak and Tupalang valleys; the western Tien-Shan: the Pskem, the Ugham, the Karzhantau and Chatkal ranges (the Tashkent and Surkhandarya regions). Inhabits fine earth-slopes, river valleys, defiles. Single specimens or small groups can be found. Limiting factors: used as fuel, pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau and Chatkal nature reserves, the Ugam-Chatkal national park.

ХУРМОДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ЭБЕНОВЫЕ – ЕВЕНАСЕАЕ

180. САФСАН ХУРМО

Хурма кавказская / *Diospyros lotus* L.

Мақоми 2. Жуда камёб, ареали қисқариб бораёт-ган реликт тур.

Қисқача тасиғи. Бўйи 15–20 м га етадиган қўнғир қора пўстлоқли дараҳт. Барглари мустаҳкам, қайишсимон, чўзиқ, узунлиги 15 см. Гуллари сарғиши-қизил, қўнғироқсимон, икки уйли. Чангчили гуллари яримсоябонга тўпланган, уруғчи гуллари якка-якка ёки бир нечтадан ўрнашган. Меваси этли резавор, шарсимон, аввалига қизғиши, кейинчалик қўнғир-қорамтири рангга киради. Май–июнда гуллаб, меваси октябрь–ноябрда пишади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси (Тўпаланг ва Сангардак дарёлари ҳавзалари, Кўштут, Тамшуш, Хондиза қишлоқлари атрофлари)да тарқалган. Тожикистон, Кавказ, Кичик Осиё, Эрон, Хитой ва Японияда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки ва ўрта қисмларида дараларнинг шағалли ёнбағирлари, булоқларнинг бўйларида ўсади.

Сони. Кам учрайди, баъзан 5–15 тури бирга ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан (бачкисидан) кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш саблари. Хўжалик мақсадлари учун ерларнинг ўзлаштирилиши, қурилиш ҳамда ўтин учун ишлатилиши туфайли камайиб кетмокда.

Маданийлаштирилиши. Қадим замонлардан бери ареали доирасида экиб келинади. ЎзР ФА Ботаника боғида 1948 йилдан бўён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [82, 159].

Р. У. Қодиров.

Статус 2. Редкий реликтовый вид с сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Дерево высотой до 15–20 м с тёмно-серой корой. Листья продолговатые, длиной до 15 см, кожистые. Цветки желтовато-красные, колокольчатые, двудомные. Мужские цветки собраны в полузонтики, одиночные или по нескольку. Плод шаровидная, мясистая ягода, вначале красноватая, затем чёрно-бурая с сизым налётом. Цветёт в мае–июне, плодоносит в октябре–ноябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет: бассейны рек Сангардак и Тупаланг, окрестности кишлаков Күштут, Тамшуш и Хондиза. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Кавказ, Малая Азия, Иран, Китай, Япония.

Места обитания. Щебнистые склоны ущелий близ родников в нижнем и среднем поясах гор.

Численность. Встречается редко, небольшими (по 5–15 деревьев) группами.



Размножение. Семенное и вегетативное (отводками).

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственное освоение территории. Используется в качестве строительного материала и на топливо.


Культивирование. С древних времен культивируется в пределах ареала. С 1948 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [82, 159].

Р. У. Қадиров.

Very rare relict species with the reducing area. It is spread at the Hissar range: the Sandargak and Tupalang river basins, nearby the villages Kshtut, Tamshush and Khandiza (the Surkhandarya region). Inhabits slopes of gorges near springs in the lower and middle belts mountains. Growing in small groups (5-15 trees). Limiting factors: economic reclamation of the territory. It is used as building material and firing. Measures of protection: not protected.



ЧИЛОНЖИЙДАДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО КРУШИНОВЫЕ - RHAMNACEAE

181. ЁВВОЙИ ЧИЛОНЖИЙДА Унаби обыкновенная / *Ziziphus jujuba* Mill.

Мақоми 2. Ареали кескин қисқариб бораётган кам-ёб, реликт, субтропик тур.

Қисқача тасвиғи. Бўйи 12 м гача етадиган тарвақайлаган, мевасиз шохларида барглари икки қатор жойлашган, ёнбаргчалари йирик тиканлардан иборат дараҳт. Барглари чўзиқ тухумсимон, уч томирли, четлари тишсимон ўйилган. Гуллари майда, яшилроқ, ўткир ҳидли. Меваси чўзиқ-юмалоқ ёки юмалоқ, диаметри 1,5 см гача етади. Июнь-сентябрь ойларида гуллаб, мева беради.



Тарқалиши. Тошкент, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Фарбий Тянь-Шань (Уғом, Чотқол, Қоржонтов тизмалари), Қўҳитанг тизмаси - Боғлидара сойи ва Ҳисор тизмалари (Ғузор дарёси ҳавзасида, Шўроб, Қўштутсой, Зинчаб, Зарчов, Дуоба ва Тамшуш қишлоқлари атрофлари)да тарқалган. Тожикистон, Туркманистон, Кавказортида ҳам тарқалган. Бу тур Ўрта Ер денгизидан Япониягача тарқалган.

Ўсиш шароити. Куруқ, шағалли, тошли ва юмшоқ тупроқли ёнбағирларда ҳамда дарё ва сой бўйларида ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда ва кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан ва илдиз бачкиларидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Меваларининг териб олиниши, тупларининг ўтин учун кесилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Жуда қадимдан мевали ва доривор ўсимлик сифатида экиб келинган. ЎзР ФА Ботаника боғида 1958 йилдан бўён экиб келинади.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат кўриқхонасида ва Уғом-Чотқол миллий табиат боғида сақланади.

Манбалар. [83, 159].

Р. И. Қозоқбоев.

Статус 2. Редкий реликтовый субтропический вид с резко сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Дерево высотой до 12 м с простирающимися ветвями и двурядными листьями с крупными колючими прилистниками на стерильных побегах. Листья продолговато-яйцевидные, трёхнервные, по краю зубчатые. Цветки мелкие, зеленоватые, с сильным запахом. Плод удлинённо-шаровидный, до 1,5 см в диаметре. Цветёт и плодоносит в июне-сентябре.

Распространение. В Ташкентской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Западный Тянь-Шань: Угамский, Чаткальский, Каржантау; хребет Кугитанг: Боглидарасай, Гиссарский хребты; долина реки Гузар, окрестности кишлаков Шураб, Куштутсай, Зинчоб, Дуоба и Тамшуш. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Туркменистан и Закавказье, от Средиземноморья до Японии.

Места обитания. Сухие, щебнистые, каменистые и мягкие склоны вдоль саев и рек.

Численность. Встречается единичными экземплярами, редко – небольшими группами.

Размножение. Семенное и корневыми отпрысками.

Причины изменения численности и ареала. Сбор плодов, заготовка на топливо.


Культивирование. В культуре с древних времен как плодовое и ценное лекарственное растение. С 1958 года культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском заповеднике и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [83, 159].

Р. И. Казакбаев.

Rare relict subtropical species with reducing area It is spread at the western Tien-Shan: the Ugam, the Chatkal, the Korzhantau ranges, the Hissar range: the Guzar river valley, nearby the villages Shurab, Kushtutsai, Zinchob, Duoba and Tamshut, the Kughitang range: the Boglidara valley (the Tashkent, the Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits dry, stony and soft slopes along the rivers. Single specimens, rarely small groups can be found. Limiting factors: picking of fruits, laying-in as firing. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve and the Ugam-Chatkal national park.



ЧИННИГУЛДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ГВОЗДИЧНЫЕ – CARYOPHYLLACEAE

182. КАЧИМСИМОН ЕТМАК (БЕХ)

Аллохруза качимовидная / *Allochrusa gypsophiloides* (Regel) Schischk.

Мақоми 3. Марказий Осиё тоғларидаги ареали кес-кин қысқариб бораётган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бүйі 30–60 см орасидаги күп-йиллик ўт. Пояси ингичка, күп. Барглари 10–25 мм узун-лиқда, ясси, қалами, тикансиз. Гуллари пушти ранг, по-янинг тепасида ёйиқ рўваксимон тўпгул ҳосил қиласди. Меваси – кўсаксимон. Май–август ойларида гуллаб, ме-васи август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Намангандарё ва Сурхондарё вилоятлари: Қурама, Чотқол, Мол-гузар, Нурота, Ҳисор, Кўхитанг тизмаларида тарқалган. Тожикистон, Қирғизистон ва Туркманистанда ҳам уч-райди.

Ўзиш шароити. Денгиз сатҳидан 400–1400 м ба-ландликда тошли ва шагалли ёнбағирларда ва баъзан ташландик ерларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ёки кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.



Ўсимлик сони ва ареалининг ўзариш сабабла-ри. Маҳаллий аҳоли томонидан саноат хомашёси ва доривор ўсимлик сифатида кўплаб йиғиб олинади. Етмакдан тўқимачилик, мўйначилик, қандолатчилик саноатида, табобатда ва кундалик ҳаётда кенг фойдаланилади. Шунинг учун у камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Сурхон, Китоб, Чотқол қўриқхоналари ва Уғом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади. Саноат эҳтиёжи учун экиладиган майдонларни кенгайтириш керак. Табиатда етмакзорлар тикланганидан сўнг ҳам уни масъул идоралар ижо-зати билан йиғиш лозим.

Манбалар. [21].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 3. Эндемик горных районов Центральной Азии с сильно сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-тение высотой 30–60 см. Стебли тонкие, их несколько.

Листья длиной 10–25 мм, плоские, линейные, не колючие. Цветки бледно-розовые, собраны на концах веток в рыхлое, раскидистое, метельчатое соцветие. Плод – коробочка. Цветёт в мае–августе, плодоносит в авгу-сте–сентябре.

Распространение. В Ташкентской, Наманганская, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях: Кураминский, Чаткальский, Мальгузарский, Нурагинский, Кугитангский, Гиссарский хребты. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны на высоте 400–1400 м; иногда заброшенные пашни.

Численность. Встречается небольшими популяци-ями и единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Усиленная промышленная заготовка и сбор населени-ем в качестве лекарственного сырья. Широкое исполь-зование в быту, в текстильной, меховой, кондитер-ской и фармакологической промышленности.


Культивирование. Культивируется в Ботани-ческом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском, Китабском, Чаткальском заповедниках и Угам-Чаткальском национальном парке. Необходимо расширение промышленных плантаций. После вос-становления запасов следует ввести строго лицен-зионный сбор.

Источники. [21].

Ф. О. Ҳасанов.

Endemic of mountains of Central Asia with the strongly reducing area. It is spread at the Kurama, the Chatkal, the Malguzar, the Nuratau, the Hissar, the Kughitang ranges (the Tashkent, the Namangan, the Djizakh, the Kashkadarya, the Surkhandarya regions). Inhabits stony-slopes at a height of 400-1400 m ; sometimes neglected arable lands. Small populations, single specimens can be found. Limiting factors: industrial and local population stocking as medicinal plant. Measures of protection: protected in the Surkhan, the Kitab and Chatkal nature reserves and the Ugam-Chatkal national park. It is necessary to enlarge the industrial plantation. After the restoration of stocks it is necessary to introduce stringent licensed picking.



183. МИХЕЛЬСОН ЗЎРЧАСИ

Смолевка Михельсона / *Silene michelsonii* Preobr.

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги жуда камёб эндемик тур.


Қисқача тавсифи. Бўйи 25-30 см га етадиган кўп йиллик ўт. Пояларининг асоси жуда кўп қуриб қолган барг қолдиқлари билан уралган. Барглари чўзиқроқ тескари тухумсимон, уни ўткир. Косачаси сал пуфаксимон, юпқа, цилиндр қўнгироқсимон, 10 та томирли. Тожбарги оқ, туксиз. Июнда гуллаб, меваси июль ойида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Қояларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.



Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [22, 310].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Очень редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 25-30 см, с многочисленными сухими остатками листьев у основания. Листья продолговато-яйцевидные, на верхушке внезапно оттянутые в короткое остроконечие. Чашечка слегка вздутая, перепончатая, цилиндрическо-локольчатой формы, с 10 жилетками. Лепестки белые, голые. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет.

Места обитания. Скалы.

Численность. Встречается единично.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [22, 310].

Ф. О. Ҳасанов.



Very rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range (the Surkhandarya region). Inhabits rocks. Single specimens can be found. Measures of protection: not protected.



184. МОМИҚ ЗҮРЧА

Смолевка пушистая / *Silene tomentella* Schischk.

Мақоми 2. Қызылқұмдаги қолдиқ тепаликтердә тарқалған жуда камёб эндемик түр.

Қисқача тавсифи. Бүйі 30-40 см оралығындағы күп ийлілік ўт. Пояси күп, пастки қисми ёғочланувчи. Барглари ингичка наштарсімон, 4-6 см узунлиқда, эни 3-5 см, поянинг пастидагилари ингичкалашиб бориб, бандга айланған, юқорисидегі барглари анча майдада. Түпгули шингилсімін. Косачаси цилиндриксімін, түғнагиңсімін, узунлиғи 18-20 мм. Тожбарғи оқиши, косарадан бир ярим марта узун. Тожбарғиңнің 2/3 қисми қирқілған. Меваси күсакча, тухумсімін, узунлиғи 11 мм, эни 6 мм.

Тарқалиши. Бухоро, Навоий вилоятлары: Қызылқұмдаги қолдиқ тепаликтер (Оқтоғ ва Кулжуктоғ)да тарқалған.

Үсиш шароити. Қолдиқ тепаликтердә, тошларнинг бўллаклари орасида ва тошли қуруқ ёнбағирларда ўсади.

Сони. Умуний сони аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [22, 310].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Очень редкий эндемик останцевых возвышенностей Кызылкумов.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 30-40 см. Стебли многочисленные, при основании древеснеющие. Листья узколанцетные, длиной 4-6 см, шириной 3-5 см, нижние оттянутые в длинный черешок, верхние более мелкие. Соцветие кистевидное. Чашечка цилиндрическая, булавовидная, длиной 18-20 мм. Лепестки беловатые, в полтора раза длиннее чашечки. Пластина лепестка на две трети надрезанная. Коробочка яйцевидная, длиной 11 мм, шириной 6 мм. Цветёт в мае, плодоносит в июле.

Распространение. В Бухарской и Навоийской областях: Кызылкумы – останцевые возвышенности Актау, Кульджуктау.

Места обитания. Обломки камней, сухие каменистые склоны останцевых возвышенностей.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала.

Сведений нет.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [22, 310].

Ф. О. Ҳасанов.

Very rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Aktau, the Kuldjuktau (the Bukhara and Navoi regions). Inhabits fragments of stones, dry stony slopes of low hills. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



185. ПОПОВ ЗЎРЧАСИ

Смолевка Попова / *Silene popovii* Schischk.

Мақоми 2. Зарафшон тизмасидаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Баландлиги 20–25 см га етадиган сершох ва сербарг кўп йиллик ўт. Гулпоясининг узунлиги 15–20 см. Мевасиз пояси ва поянинг пастки қисмида барглари ингичка чизиқли, поянинг юқорисидагилари учли-наштарсимон. Гуллари поянинг учидаги 3–7 тадан жойлашган. Гулолди баргчалари ўтсимон, поянинг юқори қисмидаги жойлашган баргларга ўхшаш. Ко-сачаси цилиндрсимон, узунлиги 13–15 мм. Тожбарглари оч пушти рангли. Кўсакчаси чўзиқ, узунлиги 10 мм. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.



Тарқалиши. Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмаси (Кўхи-Сурх, Жонқора тоғлари ва Тахта-Қорача довони)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки қисмидаги шағалли ва оҳактошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Умумий сони аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [22, 97, 310].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Очень редкий эндемик Зарафшанского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 20–25 см с многочисленными бесплодными густооблиственными побегами. Цветоносные стебли высотой 15–20 см. Листья бесплодных побегов и нижние стеблевые узко-линейные, верхние стеблевые – линейно-ланцетовидные. Цветки на верхушке стебля в количестве 3–7. Прицветники травянистые, сходные с верхними листьями. Чашечка цилиндрическая, длиной 13–15 мм. Лепестки яркорозовые. Коробочка продолговатая, длиной 10 мм. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.



Распространение. В Самаркандской и Каракадарынской областях: Зарафшанский хребет – Кухи-Сурх, Джан-Кара, перевал Тахта-Карача.

Места обитания. Щебнистые и известковые скалы в предгорьях и нижнем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [22, 97, 310].

Ф. О. Ҳасанов.

Very rare endemic species of the Zaravshan range. It is spread at the Zaravshan range: the Kukhi-Surkh, the Djan-Kara, the Takhta-Karacha passage (the Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits and calcareous rocks in the submontane zone and lower mountain belt. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



186. ТОҒ ЗҮРЧАСИ

Смолевка горная / *Silene oreina* Schischk.

Мақоми 1. Зарафшон тизмасидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Күп йиллик, күп бошчали (каудексли) ва күп пояли, бўйи 10–15 см орасидаги ўт. Баргларининг учи чўзилган, жуда ўткир, безчасимон қалин туклар билан қопланган. Илдиз бўғизидаги барглари тескари наштарсимон, асосига қараб ингичкалашиб боради. Поядаги барглари кенг чўзиқ. Гуллари оқ, поянинг учида 1–3 тадан ўрнашган. Косачаси гулидан 2–3 марта узун, дастлаб цилиндричесимон, кейинроқ кўнғироқсимон шаклли. Карпофори туксиз. Кўсаги тухумсимон. Май ойларида гуллаб, меваси май-июнда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмаси (Аллапришан, Оқсой, Оғалик ва Тарагай қишлоқлари атрофлари) да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тошли, тошшағалли жойларда ва қояларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам учрайди. Якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари боқиладиган ерларда ўсимлик жуда катта зарар кўради.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.



Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [22, 310].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий эндемик Зарафшанского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с многоглавым каудексом и многочисленными стеблями длиной до 10–15 см. Листья на верхушке оттянутые, очень острые, густоопущенные железистыми волосками. Прикорневые листья – обратноланцетные, к основанию суженные, стеблевые широко-продолговатые. Цветки белые, на верхушках стеблей, по 1–3. Чашечка в 2–3 раза длиннее цветков, вначале цилиндрическая, позднее колокольчатая. Карпофор голый. Коробочка яйцевидная. Цветёт в мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. В Самаркандской и Кашкадарьинской областях: Зарафшанский хребет – Аллапришан, Аксай, Агалык, Тарагай.

Места обитания. Каменистые, каменисто-щебнистые и скалистые субстраты.

Численность. Сведений нет.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас.


Культивирование. В культуре не известен.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [22, 310].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare endemic species of the Zaravshan range. It is spread at the Zaravshan range: Allaprishan, Aksai, Agalyk, Taragay (the Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits stony, stony- and rocky substrates. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



187. НАТАЛИЯ ЗЎРЧАСИ

Смолевка Наталии / *Silene nataliae* F.O. Khass.

Мақоми 1. Кўхитанг тизмасидаги реликт эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Ярим бутача. Барглари илдиз бўғизида жойлашган, бўлмали, узунлиги 3–5 см, иккала томони оддий ёки безчали туклар билан қопланган. Гуллари 3–6 та. Косачаси оддий ва безчали туклар билан қалин қопланган, кенг қўнгироқсимон, пуштиранг, узунлиги 12–14 мм, тишчаларининг узунлиги 2–4 мм, гултожи сариқ, юқори қисми пуштиранг, қайтақиси 5–6 мм узунликда, икки бўлакли, тишчасиз. Чангчи ва устунчалиси туксиз. Карпофори 4–5 мм узунлиқда, туксиз. Кўсагининг узунлиги 6–7 мм, туксиз. Июлда гуллаб, меваси авгуистда етилади.

Тарқалиши. Кўхитанг тизмаси (Сурхондарё вилояти)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 2200 м ба-ландликдаги қояларнинг шимолий ёнбагирларида ўсади.

Сони. 60 туп ўсимлиқдан иборат 2 та популяцияси аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг

ўзгариш сабаблари. Қисқа ареалга эга маҳсус жойдагина ўшишга мослашган (стенобионт) реликт ўсимлиқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон кўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалари. [309].

Ф. Ў. Ҳасанов.



Статус 1. Эндемичный реликтовый вид хребта Кугитанг.

Краткое описание. Полукустарничек с прикорневой розеткой лопатчатых листьев 3–5 см длины, опущенных с обоих сторон простыми и железистыми волосками. Стебли 15–30 см длины, густо железисто волосистые.

Цветы 3–6. Чашечка густо покрыта простыми и железистыми волосками, широко колокольчатая, розоватая, 12–14 мм длины с зубцами 2–4 мм длины. Лепестки желтые, наверху фиолетово окрашенные. Тычинки и столбик голые. Карпофор 4–5 мм длины, голый. Коробочка 6–7 мм длины голая. Цветет в июле, плодоносит в августе.

Распространение.

Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг (Мачайлы).

Места обитания.

Скалы северных экспозиций на высоте 2200 м.

Численность. 3 популяции (60 растений).

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Узколокальный реликтовый стенобионт.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [309].

Ф. О. Ҳасанов.

Very rare relict endemic species of the Kughitang range. It is spread at the Kughitang range: Machayli (the Surkhandarya region). Inhabits rocks (2200 m). 3 populations (60 plants) can be found. Limiting factors: relict stenobiont. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



188. БЕЗЧАЛИ ЗҮРЧА

Смолевка почтижелезистая / *Silene paranadena* Bondarenko et Vved.

Мақоми 2. Шимоли-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Күп йиллик ўт ўсимлиқ, баландлиги 30–50 см, поялари күп, асосига яқын жойлари қаттиқ ёғочсимон. Барглари наштарсимон, узунлиги 3–6 см, эни 10–12 мм. Гуллари шохчаларининг учларида биттадан жойлашган, йирик, узунлиги 30–32 мм. Гултожи оқ-пуштиранг, чукур иккига бўлинган. Косачаси тўғнағичсимон цилиндр шаклида, шишмайди, узунлиги 22–25 мм, найчаси туксиз, тищчалари оқ тукли. Меваси кўсақ, узунлиги 10–12 мм. Апрель–июнда гуллаб, меваси етилади.

Тарқалиши. Нурота ва Молгузар тизмаларида тарқалган (Жиззах, Навоий ва Самарқанд вилоятлари).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмларида майда чағир тошли шимолий ёнбағирларда, бутазорлар орасида ўсади.

Сони. Кам тарқалган, якка-якка ёки кичик гуруҳлар ташкил қилиб ўсади.

К ў п а й и ш и .
Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Молларнинг кўплаб боқилиши ва табиий муҳитнинг салбий таъсирида камайиб кетган бўлса керак.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [17, 22, 310]

И. В. Белолипов.

Статус 2. Редкий эндемик Северо-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 30–50 см. Листья ланцетные, длиной 3–6 см и шириной 10–12 мм. Цветки на концах веточек одиночные, довольно крупные, длиной 30–32 мм, с бело-розовыми глубоко двураздельными лепестками. Чашечка булавовидно-цилиндрическая, невздвужающаяся, длиной 22–25 мм, с голой трубкой и бело-войлочными зубцами. Плод – коробочка длиной 10–12 мм. Цветёт и плодоносит в апреле–июне.

Распространение. В Джизакской, Навоийской и Самаркандской областях: хребты Мальгузар и Нура-тай.

Места обитания. Произрастает на мелкоземистых склонах преимущественно северной экспозиции в среднем поясе гор, среди кустарников.

Численность. Встречается спорадически, единично или группами по несколько растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны. Охраняется на территории Нура-тинского государственного заповедника.

Источники. [17, 22, 310].

И. В. Белолипов.



Rare endemic species of the north-western Pamir-Alay. It is spread at the Malguzar and Nuratau ranges (the Jizzah, the Navoi and Samarkand regions). Inhabits soil slopes of the northern exposition in the middle mountainous zone. Single specimens and small groups occur sporadically. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



189. БИГИЗСИМОН ОҚТИКАН

Колючелистник беловатый / *Acanthophyllum albidum* Schischk.

Мақоми 3. Фарғона водийси адирларида сақланиб қолган жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Баландлиги 30 см га етадиган, ёғочланувчи ярим бута. Барглари бигизсимон, пояды қарама-қарши жойлашган, узунлиги 2–4 см, эни 1,5 см. Гуллари пояларининг учидаги, диаметри 5 см га етадиган қалқонсимон тўпгул ҳосил қилиб жойлашган. Косачаси найсимон, узунлиги 6–7 мм. Тожбарглари оқ, асоси сал пушти ранг, эни 1,5 мм.

Тарқалиши. Фарғона, Наманганд вилоятлари: Фарғона водийсида денгиз сатҳидан 500–800 м баландликда тарқалган.

Ўсиш шароити. Тошли ва майдада зарра жинс тупроқли адирларда ўсади.

Сони. Поп адирлари (Чодаксой ҳавзаси)да якка-якка ҳолда тарқалган, 10 м² да ўртача 3–4 тупи ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариши

сабаблари. Оқтикан ўсиб турган ерларнинг қишлоқ хўжалик экинлари (фалла ва бошқалар) учун ўзлаштирилиши ареалининг қисқариб кетишига сабаб бўлди.

Маданийлаштирилиши. Бу тур ЎзР ФА Ботаника боғида маданий шароитда экиб ўстирилган. Уруғининг униб чиқиши 1 фоиздан кам эканлиги аниқланган.

Мухофаза чоралари. Мавжуд туплари қатъий назорат остига олиниши керак.

Манбалар. [21, 347].



Н. Ю. Бешко.

Статус 3. Очень редкий узкий эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Полукустарник высотой до 30 см, сильно древеснеющий. Листья игловидные, супротивные, длиной 2–4 см, шириной 1,5 см. Цветки собраны на конце стебля в щитковидные, до 5 см в диаметре, соцветия. Чашечка трубчатая, длиной 6–7 мм. Лепестки белые, у основания чуть розовые, шириной 1,5 мм. Цветет в мае, плодоносит в июле.



Распространение. В Ферганской и Наманганская областях: растёт на адырах на высоте 500–800 м.

Места обитания. На каменистых, каменисто-мелкоземистых почвах.

Численность. В Папских адырах встречается одиночными экземплярами, по 3–4 на 10 м².

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала.

Освоение территорий под зерновые и другие культуры.

Культивирование. Выращивался в культуре сотрудниками Ботанического сада АН РУз. Полевая всхожесть семян очень низкая – менее 1 %.

Меры охраны. Необходим строгий контроль за состоянием популяций.

Источники. [21, 347].

Н. Ю. Бешко.

Very rare endemic species of the Ferghana valley. It grows in adyrs at the height of 500-800 m (the Ferghana and Namangan regions). Inhabits stony, stony-fine earth soils. Populations are about 10 sq. m with 3-4 plants in the Pap hills. Limiting factors: development of the territories for crops cultivation. Measures of protection: strict control of the state of populations is necessary.



190. НИНАСИМОН ОҚТИКАН

Колючелистник горбатоприцветниковый / *Acanthophyllum cyrtostegium* Vved.

Мақоми 3. Қызылкүмдеги қолдиқ тепалик-ларда сақланиб қолган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–30 см га етадиган, поясининг пастки қисми ёғочланувчи, кўп пояли яримбута. Барглари игнасимон, уч қиррали, ти-канли. Гулолди баргчалари деярли қалами, ти-канли, асоси бўртиқли. Гуллари учтадан поянинг учидағи қуббасимон тўғулда, узун гулбандларда ўрнашган. Косачаси цилиндрсимон. Тожбарги 15–16 мм узунлиқда, пушти рангли. Тугунчаси 4 уруғ куртакли. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Бухоро, Навоий вилоятлари: Қызылкүмдеги қолдиқ тоғлар (Кулжуктоғ, Овмин-за тоғи, Қингиртоғ ва Кўкчатоғ)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Кумларда, тош-кумли ерларда ва ола жинсларда ўсади.

Сони. Сийрак ҳолда тарқалган, баъзан қумоқ ерларда 3–5 ўсимлиқдан ташкил топган кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ёш ниҳолларини чорва моллари теп-килаб ташлайди.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғи тажриба даласида 1979–1989 йиллари ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Мавжуд ўсимлик тўпларини назорат остига олиш ва ёш ниҳолларини чорва молларидан муҳофаза қилиш лозим.

Манбалар. [21].

Н. Ю. Бешко.

Статус 3. Очень редкий эндемик останцевых возвышенностей Кызылкумов.

Краткое описание. Многолетний, у основания древеснеющий, с многочисленными стеблями полукустарник высотой до 20–30 см. Листы игловидные, трёхгранные, очень колючие. Прицветники почти линейные, колючие, при основании горбатые. Цветки в трёхцветковых дихазиях на довольно длинных цветоножках в шишковидных соцветиях на верхушках стеблей. Чашечка цилиндрическая. Лепестки розовые, длиной 15–16 мм. Завязь с 4-мя семяпочками. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Навоийской и Бухарской областях: Кульджуктау, Ауминзатау, Кингиртау, Кокчатау.

Места обитания. Пески, каменисто- песчаные субстраты, выходы пестроцветных пород.

Численность. Встречается разрежено, единично, редко образует небольшие группы из 3–5 растений на песчаных местах.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Вытаптывание всходов скотом.


Культивирование. В 1978–1985 гг. культивировался на опытном участке Ботанического сада АН РУз.

Меры охраны. Необходимо ввести контроль за популяциями и охранять молодые всходы от вытаптывания.

Источники. [21].

Н. Ю. Бешко.

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Kuldjuktau, the Auminzatau, the Kingirtau, the Kokchatau (the Navoi and Bukhara region). Inhabits sands, stony-sandy substrates, outcrops of gypseous. Thinned, single, small groups of 3-5 plants in sandy places can be found. Limiting factors: trampling down of seedlings by cattle. Measures of protection: it is necessary to control populations and protect young seedlings from trampling down.



191. ЎЗБЕКИСТОН ЧИННИГУЛИ

Гвоздика узбекистанская / *Dianthus uzbekistanicus* Lincz.

Мақоми 3. Помир-Олойнинг ғарбий қисмидаги камёб эндемик ўсимлиқ.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Поялари кўп, оддий, баъзан юқори қисмидан шохланган, туксиз, пастки қисми ғадир-будир, узунлиги 20–35 см. Барглари кўкимтириши бил, ўткир учли. Гуллари якка-якка, асоси қалин тукли, пушти рангли. Меваси – кўсакча, кўп уруғли. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд, Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмаси (Тахта Қорача довони, Қизилолма ва Тарагай қишлоқлари атрофлари) ва Ҳисор тизмаси (Боғча қишлоғи атрофи)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тош-шағалли жойларда, тош ва оҳактош синиқлари ва ёриқлари орасида ўсади.

Сони. Бир гектар ерда 40–100 тагача тупдан иборат тўплар ҳосил қиласди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари гулдасталар учун узиб олиниади. Чорва моллари истеъмол қиласди.

Маданийластирилиши. 1965 йилдан бошлаб ЎзРФА Ботаника бобигида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Айрим популяциялари Китоб давлат кўриқхонасида муҳофаза қилинади. Гуллари юлинишининг олди олиниши лозим. Шунингдек, уруғи етилиб, тарқалиши учун гуллаган ва мевалаган пайтида чорва моллари боқишни чеклаш тавсия етилади.

Манбалар. [23, 159].

Н. Ю. Бешко.

Статус 3. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 40 см. Стебли длиной 20–35 см, многочислен-

ные, простые, в верхней части иногда ветвящиеся, голые, внизу шероховатые. Листья синевато-зелёные, острые. Цветки розовые, одиночные, у основания с обильными волосками. Плод – коробочка с многочисленными семенами. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Самаркандской и Кашкадарьинской областях: Зарафшанский хребет – перевал Тахта-Карача, окрестности кишлака Кызыл-Алма, Тарагай; Гиссарский хребет – окрестности кишлака Бахча.

Места обитания. Каменисто-щебнистые субстраты, среди камней и известняковых обломков, трещины скал.

Численность. Образует небольшие популяции от 40 до 100 экземпляров на 1 га.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветков на букеты. Выпас.

Культивирование. С 1965 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Часть популяций охраняется на территории Китабского заповедника. Необходимо ограничить выпас в периоды цветения и плодоношения растений с целью сохранения семян для расселения вида; запретить сбор цветков.


Источники. [23, 159].

Н. Ю. Бешко.

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Zaravshan range: the Takh-ta-Karacha passage, nearby the villages Kyzyl-Alma, Taragai; the Hissar range: nearby the village Bakhcha (the Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits stony- substrates, among stones and lime-stone fragments, clefts of rocks.

Forms small populations containing from 40 to 100 specimens per 1 hectare. Limiting factors: picking of flowers, pasturing.

Measures of protection: some populations protected in the Kitab state nature reserve. It is necessary to limit pasturing in the periods of plant flowering and fruiting to reserve seeds for the species distribution; to forbid picking of flowers.



ЧИНОРДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ПЛАТАНОВЫЕ – PLATANACEAE

192. ШАРҚ ЧИНОРИ

Платан восточный / *Platanus orientalis* L.

Мақоми 3. Ареали ажралган камёб, реликт тур.

Қисқача тавсифи. Бүйі 30 м га етадиган кенг шохшаббали дараҳт. Барғи панжасимон қирқилған, 5–7 бўлакли, эни 12–18 см. Бўлаклари чўзиқроқ, ўйилған, йирик тишчали. Гуллари бир жинсли, шарсимон тўпгулга йиғилған. Мевали каллакчиаси 2–7 тадан, диаметри 2–5 см атрофида. Меваси ёнгоқчасимон, тумшуқчали, ётиқ қалин туклар билан қопланган. Апрель ойидаги гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.



Тарқалиши. Сурхондарё, Қашқадарё вилоятлари: Ҳисор тизмасида Сангардак, Тўпаланг, Қашқадарё, Обизаранг дарёларининг ҳавзаларида ўсади. Ўрта Ер денгизи – Болқон яриморолидан Ҳимолайгача тарқалган.

Ўсиш шароити. Тогларнинг ўрта қисмидаги, дарё бўйларида, булоқлар атрофида, тошлоқларда ўсади.

Сони. Одатда якка-якка ҳолда ўсади. Баъзан кичик чинорзорлар ташкил қиласи.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив ўйл билан (илиди ва бачкисидан) кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Турли эҳтиёжлар учун кесиб кетилиши тобора камайиб кетишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Жуда қадимдан манзарали дараҳт сифатида барча суғориладиган ерлар (Марказий Осиё ва бошқа жойлар)да экиб келинади.

Мухофаза чоралари. Асрға тенгдош йирик чинорларнинг ҳар бири назорат остига олинган ва давлат томонидан қўриқланади.

Манбалар. [45, 159].

Р. И. Казакбаев.

Статус 3. Редкий реликтовый вид с разорванным ареалом.

Краткое описание. Дерево высотой до 30 м, с широкой, раскидистой кроной. Листья 5–7-лопастные, 12–18 см ширины. Лопасти продолговатые, выемчато-крупнозубчатые. Цветки однополые, собраны в шаро-

видные соцветия. Плодовые головки по 2–7, около 2–5 см в диаметре. Плоды орешкообразные с носиком, по всей поверхности опущенные жёсткими прижатыми волосками. Цветёт в апреле, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Сурхандарьинской, Кашкадаргинской областях: Гиссарский хребет – бассейны рек Сангардак, Тупаланг, Обизаранг, Кашкадарья. Общее распространение: Средиземноморье – от Балканского полуострова до Гималаев.

Места обитания. Берега рек, у родников, на наносных легких галечниковых почвах в среднем поясе гор.

Численность. Одиночные деревья, небольшие группы деревьев и очень редко рощи, не образующие сплошных массивов.

Размножение. Семенное и вегетативное (корневыми отпрысками).

Причины изменения численности и ареала. Отрицательно влияют на них хозяйственная деятельность человека, заготовка на топливо.


Культивирование. Очень популярная древесная порода, с давних времен используемая для озеленения поселений в Центральной Азии и других регионах.

Меры охраны. Большинство вековых деревьев и естественные рощи объявлены памятниками природы.

Источники. [45, 159].

Р. И. Казакбаев.

Rare relict species with the reducing area. It is spread at the Hissar range: the Sangardak, the Tupalang, the Obizarrang, the Kashkadarya basins (the Surkhandarya, the Kashkadarya region). Inhabits river banks, near springs, alluvial light pebble soils in the middle belt of mountains. Single trees, small groups of trees and very seldom groves not forming dense tracts. Limiting factors: antropogenic factor. Measures of protection: the majority of venerable trees and natural groves are nature sanctuaries.



ЧУЧМОМАДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО АМАРИЛЛИСОВЫЕ – AMARYLLIDACEAE

193. АРАЛАШ ПИЁЗ

Лук смешанный / Allium praemixtum Vved.

Мақоми 1. Нурота ва Ғарбий Тянь-Шаннинг жануби-ғарбий қисмида жуда кам тарқалган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 150 см га етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 5 см гача, чармсимон, қизил-кўнгир ранги қобиқ билан ўралган. Пояси ғовак, ярмидан пасти пуфаксимон шишган, асоси баргларнинг новлари билан ўралган. Барглари цилиндрически, наисимон, тўғри, учига қараб ингичкалашиб боради. Тўпгули шарсимон, тифиз. Юлдузсимон гулкўргон бўлакчалари оқ-яшил томирли. Июнда гуллаб, меваси июль ойида етилади.

Тарқалиши. Навоий, Самарқанд, Жиззах, Тошкент вилоятлари: Қурдама, Нурота ва Оқтоғ тизмаларида тарқалган. Тожикистанда учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 900–1200 м баландликда қоя тошларнинг ёриқлари, тошли ёнбағирлар ва оҳактошли ерларда ўсади.

Сони. 1000 га яқин тупи борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маҳаллий аҳоли томонидан озуқа сифатида ийғиб олинади. Унинг табиий ҳолда кўпайишига ҳам салбий таъсир қилувчи омиллар бўлса керак.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Нурота кўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [18, 58, 362, 364].


Н. Ю. Бешко.

Статус 1. Очень редкий эндемик Нуратинских гор и Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой до 150 см. Луковица яйцевид-

ная, до 5 см в диаметре, с красно-бурыми кожистыми оболочками. Стрелка полая, ниже середины вздутая, при основании одета расставленными влагалищами листьев. Листья цилиндрические, дудчатые, прямые, к верхушке утончающиеся. Соцветие густое, шаровидное. Листочки звёздчатого окольцетника белые с зеленою жилкой. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Ташкентской областях: горы



Нуратау, Актау, Кураминский хребет. За пределами Узбекистана: Таджикистан (Моголтау).

Места обитания. Каменистые склоны и трещины известняковых скал в среднем поясе гор, на высоте 900–1200 м .

Численность. Около 1000 особей.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор населением.

Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [18, 58, 362, 364].

Н. Ю. Бешко.



Very rare endemic species of the Nuratau mountains and the western Tien-Shan. It is spread at the Nuratau, the Aktau, the Mogoltau mountains and of the Kurama range (the Samarkand, the Navoi, the Djizakh, the Tashkent regions). Inhabits stony slopes and clefts lime-stony rocks in the middle belt of mountains, at the altitude of 900-1200 m. s. l. 1000 plants can be observed. Limiting factors: collecting by local people. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.

194. АФЛОТУН ПИЁЗИ

Лук афлатунский / *Allium aflatunense* B. Fedtsch.

Мақоми 1. Фарбий Тянь-Шанга хос ареали аж-ралган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80-200 см оралиғидаги кўп ийллик пиёзли ўт. Пиёзи йирик, диаметри 6 см гача етади. Қобиги қора-кулранг. Поясининг тубини эни 10 см келадиган тасмасимон барглари ўраб олган. Тўпгули шарсимон, гуллари кўп ва тифиз, юлдузсимон гулқўргон бўлакчалари оч бинафша рангли. Май-июн ойла-рида гуллаб, уруғи июн-июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Писком, Уғом, Чотқол тизмаларида тарқалган. Қирғизистонда, Чотқол ва Фарғона тизмаларида учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва юқори қисмларида ўтлар билан қопланган ёнбағирларда ва дарё бўйларида сизот сувлари унча кўп бўлмаган жойларда ўсади.

Сони. Бир-биридан ажралган ҳолда кичик-кичик тўплар ташкил қиласди.

Кўпайиши. Асосан уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Пиёзининг маҳаллий ахоли томонидан озуқа сифатида ишлатиш ҳамда доривор ва манзарали ўсимлик сифатида томорқа ерларига экиш учун қазиб олиниши, куз ва қишида турли ҳайвонлар томонидан пиёzlарининг ейилиши камайиб кетишига сабаб бўлмоқда.

Маданийластирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [58, 362, 364].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня с разорванным ареалом.

Краткое описание.

Многолетнее луковичное растение высотой 80-200 см. Луковица крупная, до 6 см в диаметре, с черновато-серыми оболочками. Стрелка у основания невысоко охвачена влагалищами ремневидных листьев шириной до 10 см. Соцветие почти шаровидное, многоцветковое, густое, листочки звёздчатого оклоцветника светло-фиолетовые. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июне-июле.


Распространение. Ташкентская область: Пскемский, Угамский, Чаткальский хребты. За пределами Узбекистана: Кыргызстан (Чаткальский и Ферганский хребты).

Места обитания. Травянистые склоны и прирусловые террасы в среднем и верхнем поясе гор.

Численность. Произрастает небольшими, значительно удалёнными друг от друга популяциями.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор луковиц местным населением как пищевое и лекарственное сырьё, для пересадки на придусадебные участки (декоративен).



Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского биосферного заповедника.

Источники. [58, 362, 364].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare, endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Pskem, the Ugam, the Chatkal ranges (the Tashkent region). Inhabits grassy slopes and attached to river-bed terraces with weak ground moistening in the middle and upper belt of mountains. About 1000 plants can be found. Limiting factors: picking of bulbs for medicinal traits and food by local population. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere state reserve.



195. ПИСКОМ ПИЁЗИ

Лук пскемский / Allium pskemense B. Fedtsch.

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шанга хос жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 60–120 см оралиғидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзининг диаметри 6–7 см, усти қўнғир қобиқ билан қопланган. Пояси 3–7 та, йўғон, шишган, узунлиги 40 см га етади. Тўпгули шарсимон, диаметри 7–10 см. Гулкўрғон бўлакчалари оқ рангли. Июлда гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилоати: Уғом, Писком, Чотқол ва Қурама тизмаларида тарқалган. Қозогистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1200–2000 м баландликда оҳактошли, чиқиб бўлмайдиган қояларнинг ёриқларида, баъзан сурималарда ўсади.

Сони. Умумий сони 60–100 минг туп атрофида бўлган 40 га яқин популяцияси борлиги маълум.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Уруғини турли ҳашаротлар заарлаши ва ёш ниҳолларнинг бошқа ўсимликлар орасида ўса олмаслиги, вояга этиш муддатининг кўплиги (3–7 йил) ҳамда маҳаллий аҳоли томонидан озиқ-овқат ва доривор ўсимлик сифатида йиғиб олиниши камайиб кетишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маҳаллий аҳоли уни томорқа ерларида экиб ўстиради. Хориждаги ботаника боғларида, селекция билан шуғулланувчи институтларда экимлоқда.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера давлат кўриқҳонасида ва Уғом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [58, 362, 168, 364].

И. Г. Левичев.

Статус 2. Очень редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 60–120 см. Луковица небольшая, 6–7 см в диаметре, оболочка красно-бурового цвета. Стрелка с 3–7 толстыми, дудчатыми листьями длиной до 40 см. Соцветие шаровидное, 7–10 см в диаметре, листочки околоцветника молочно-белые. Цветёт в июле, плодоносит в сентябре.


Распространение. Ташкентская область: Угамский, Пскемский, Чаткальский, Кураминский хребты. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Известковые недоступные скалы (трещины и уступы), реже осьпи в среднем поясе гор на высоте 1200–2000 м.

Численность. Около 40 популяций общей численностью 60–100 тыс. экземпляров.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Высокий процент повреждения семян насекомыми, низкая всхожесть, малая конкурентоспособность семенных всходов и длительный (3–7 лет) период ювенильной стадии являются лимитирующими факторами. К ним присоединяется антропогенный фактор: местное на-



селение интенсивно использует лук пскемский в пищу, считая его лекарственным растением, заготавливает луковицы.

Культивирование. В пределах ареала часто выращивается на огородах. Культивируется во многих ботанических садах, в некоторых селекционных институтах в нашей стране и за рубежом.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском биосферном государственном заповеднике и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [58, 362, 168, 364].

И. Г. Левичев.

Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Ugam, the Pskem, the Chatkal, the Kurama ranges (the Tashkent region). Inhabits calcareous inaccessible rocks (cracks and ledges), rarely mounds in the middle belt of mountains at the height of 1200-2000 m. About 40 populations, total number 60-100 thousand of specimens can be found. Limiting factors: high percentage of seed damage by insects, low germinating capacity, low competition capacity of seedlings and long (3-7 years) juvenile stage are the also the anthropogenic factor: native population intensively use Allium pskemense as food considering it to be medicinal plant digs up bulbs. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere state reserve and the Ugam-Chatkal national park.



196. ОЛОЙ ПИЁЗИ

Лук алайский / Allium alaicum Vved.

Мақоми 1. Олой тизмасидагы фоят камёб эндемик ўсимликті.

Қисқача тавсифи. Бош пиёзи 1-2 см кенглиқда, қорамтири, қоғозсімін қобиқұла (пүстлі). Пояси 30-60 см узунлиқда, пастки қисмі пасттаға әгилган, түкли. Барглари 2-3 та, қаламинаштарсімін, эни 10-15 мм, пасттаға қараб әгилган түклар билан қалин қопланған, поясидан қисқа. Соябони күп гулли, деярли шарсімін, диаметри 30-40 мм. Гул бандлари тенг, гүлёнбарғчалары йүк. Юлдұзсімін гулқұрғон бүлаклары оқиши, кирсімін қип-қызил рангли, узунлиғи 6 мм, қалами, тұмтоқроқ, кейинроқ пасттаға қараб әгилади. Чангчи ипи 6 мм узунлиқда, бигизсімін. Күсаги (кутичаси) шарсімін, диаметри 4 мм. Июнда гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Яқында Андижон вилояті (Имом-ата қышлоғыдан 10 км жануабдан топилған. Ўзбекистондан ташқары Қирғизистон (Ўш вилояті)да үсади.

Үсиш шароити. Қолдик тоғларнинг майин тупроқлы ёнбағирларыда үсади.

Сони. 50 туп ўсимлиқдан иборат 2 та популяцияси топилған.

Күпайиши. Уругидан күпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблары. Мол боқилиши сабаблы қисқарыб кеттін.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилған.

Мұхофаза чоралары. Мұхофаза қилинмайды.

Манбалар. [58, 362, 364]

Ф. Ү. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий эндемик предгорий Алайского хребта.

Краткое описание. Луковица 1-2 см ширины с черноватыми, бумагообразными оболочками. Стрелка 30-60 см высоты, в нижней части покрыта вниз отогнутыми волосками. Листья 2-3, линейно-ланцетные, 10-15 мм ширины,



густо опущенные вниз отогнутыми волосками, короче стебля. Зонтик многоцветковый, почти шаровидный, 30-40 мм в диаметре. Цветоножки почти равные без прицветников. Листочки звездчатого околоцветника беловатые с грязнопурпуровой жилкой, 6 мм длины, линейные, туповатые, позже вниз отогнутые. Нити тычинок 6 мм длины, шиловидные. Коробочка шаровидная 4 мм в диаметре. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. был Недавно обнаружен в Андижанской области (10 км южнее кишлака Имом-ата). За пределами Узбекистана - Кыргызстан (Ошская область).

Места обитания. Мягкие склоны в низкогорьях.

Численность. Обнаружено 2 популяции (около 50 растений).

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас.

Культивирование. Культивировался в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [58, 362, 364].

Ф. О. Ҳасанов.

Very rare endemic species of the Alay range. These species were found nearby the village Imomata, the Alay range (the Andizhan region). Inhabits soil slopes with shrubs 600 m. s. l. 2 populations with about 50 plants were found. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



197. БОЧАНЦЕВ ПИЁЗИ

Лук Бочанцева / *Allium botschantzevii* Kamelin

Мақоми 1. Помир-Олойнинг жануби-ғарби-даги эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бош пиёзи 1–2 см кенглиқда, қорамтири, қофосимон қобиқ (пүст) би-лан ўралган. Пояси 30–60 см баландлиқда, пастки қисми пастга эгилган тукли. Барглари 2–3 та, қалами-наштарсимон, эни 10–15 мм, пастга эгилган, қалин туклар билан қопланган, поясидан қисқа. Соябони кўпгулли, деярли шарсимон, диаметри 30–40 мм. Гулбандлари деярли тенг, гулолди баргчалари йўқ. Гулқўрғон бўлаклари юлдузсимон, оқиш, хира тўқ қизил рангли, узунлиги 6 мм, қалами, тўмтоқроқ, кейинроқ пастга қайрилади. Чангчи ипи 6 мм узунликда, бигизсимон. Кўсаги шарсимон, диаметри 4 мм.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Қашқадарёда – Деҳқонбоддан 20 км жанубда (Толли довони) тарқалган.

Ўсиш шароити. Бўз тупроқларда ўсади.

Сони. 20 га яқин ўсимлик топилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайган.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Мухофаза қилинмайди.

Манбалар. [58, 362, 364]

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редчайший эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Луковица 1–2 см ширины с черноватыми, бумагообразными оболочками. Стрелка 30–60 см высоты, в нижней части покрытая вниз отогнутыми волосками. Листья 2–3, линейно-ланцетные, 10–15 мм ширины, густо опущенные вниз отогнутыми волосками, короче стебля. Зонтик многоцветковый, почти шаровидный, 30–40 мм в диаметре. Цветоножки почти

равные без прицветников. Листочки звездчатого оклоцветника беловатые с грязно-пурпуровой жилкой, 6 мм длины, линейные, туповатые, позже вниз отогнутые. Нити тычинок 6 мм длины, шиловидные. Коробочка шаровидная 4 мм в диаметре. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Кашкадарьинская область: 20 км по дороге южнее Дехканабада (перевал Таллы).

Места обитания. Серые глины.

Численность. Найдено около 20 растений.

Размножение. Семенное.


Причины изменения численности и ареала. Выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [58, 362, 364].

Ф. О. Хасанов.



Very rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at 20 km southern of Dekhkanabad (the Tally passage) by the road (the Kashkadarya region). Inhabits grey clays. 20 plants were revealed. Seed and vegetative. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



198. БАКХАУЗ ПИЁЗИ

Лук Бакхаза / Allium bakhousianum Regel (= A. gulczense O. Fedtsch.)

Мақоми 1. Олой ва Фарғона тизмасида кичик майдонда сақланиб қолган ғоят камёб эндемик ўсимлиқ.

Қисқача тавсифи. Бош пиёзининг эни 3–5 см, қорамтири, қофозсимон пўстли (қобиқли). Поясининг бўйи 90–150 см, силлиқ. Барглари 5–6 та, қайишсимон, эни 4–8 см, силлиқ. Соябони кўпгулли, деярли шарсимон, диаметри 5–10 см. Гулбанди деярли тенг, узунлиги 3–5 см, гулён-баргчалари йўқ. Гулқўргон бўлаклари юлдузсимон, оқ, яшил томирли, узунлиги 10 мм, қалами, тўмтоқроқ, кейинчалик пастга қараб эгилади. Чангчи иплари 7–8 мм узунликда, бигизсимон, ичкаридагиларининг туби икки тишчали. Кўсаги шарсимон, диаметри 5–6 мм.

Тарқалиши. Фарғона вилояти (Шоҳимардан дарёси воҳаси)да тарқалган (Фарғона вилояти). Ўзбекистондан ташқарида Хитой ва Қирғизистонда учрайди.

Ўсиш шароити. Йирик тош бўлакларидан иборат сурималарда ўсади.

Сони. 1998 йили 30 тути борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Камайиб кетишига уруғлари унувчанигининг пастлиги сабаб бўлган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида экиб ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [58, 362, 364]

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий декоративный белоцветковый лук Алайского и Ферганского хребтов.

Краткое описание. Луковица 3–5 см ширины с черноватыми, бумагообразными оболочками. Стрелка 90–150 см высоты, гладкая. Листья 5–6, ремневидные, 4–8 см ширины, гладкие. Зонтик многоцветковый, почти шаровидный, 5–10 см в диаметре. Цветоножки почти равные без прицветников 3–5 см длины. Листочки звездчатого оклоцветника белые с зеленой жилкой, 10 мм длины, линейные, туповатые, позже вниз отогнутые. Нити тычинок 7–8 мм длины, шиловидные, внутренние при основании двузубые. Коробочка шаровидная 5–6 мм в диаметре. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Встречается только в Ферганской области в бассейне реки Шахимардан. За пределами Узбекистана: Китай и Кыргызстан.

Места обитания. Крупнообломочные осыпи.

Численность. В 2008 году зарегистрировано 30 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Низкая семенная всхожесть.


Культивирование. Культивировался в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [58, 362, 364].

Ф. О. Ҳасанов.

Very rare decorative white-flowering species of the Alay and Ferghana ranges. It is spread at the Shakhi-mardan valley (the Ferghana region). Inhabits stony slopes. In 1998, 30 plants were observed. Limiting factors: low seed germination. Measures of protection: not protected.



199. КАТТА ПИЁЗ

Лук большой / Allium majus Vved.

Мақоми 1. Помир-Олойдаги камёб, манзарали эндемик ўсимлик.

Қисқача тасифи. Бош пиёзининг эни 3–5 см, қорамтири, қофозсимон пўст билан қопланган. Пояси 60–80 см узунлиқда, силлиқ. Барглари 4–5 та, қайишсимон, эни 4–8 см, силлиқ. Соябони кўпгулли, деярли шарсимон, диаметри 5–10 см. Гулбандлари деярли тенг, гулёнбаргчалари йўқ. Гулқўрғон бўлакчалари юлдузсимон, оч бинафшаранг, узунлиги 6–7 мм, қалами, тўмтоқроқ,



кейинроқ пастга қараб эгилади. Чангчи иплари бигизсимон, узунлиги 4–5 мм. Кўсаги шарсимон, диаметри 5–6 мм.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Зарафшон ва Ҳисор тизмаларининг ёнбағирларида тарқалган эндемик тур.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмларидаги тошли ва олажинсли ёнбағирларда ўсади.

Сони. 30 тути Китоб геология кўриқхонаси яқинида, 100 тути Ҳисор қўриқхонаси атрофида ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Махаллий аҳоли томонидан пиёзининг ковлаб олиниши ва чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Китоб ва Ҳисор қўриқхоналарида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [58, 362, 364].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Высокодекоративный эндемик Западного Памира-Алая.

Краткое описание. Луковица 3–5 см ширины с черноватыми, бумагообразными оболочками. Стрелка 60–180 см высоты, гладкая. Листья 4–5, ремневидные, 4–8 см ширины, гладкие. Зонтик многоцветковый, почти шаровидный, 5–10 см в диаметре. Цветоножки почти равные без прицветников 3–5 см длины. Листочки звездчатого околоветника светло фиолетовые, 6–7 мм длины, линейные, туповатые, позже вниз отогнутые. Нити тычинок 4–5 мм длины, шиловидные. Коробочка шаровидная 5–6 мм в диаметре. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Кашкадарьинская область: эндемичный узбекистанский вид лука, произрастающий на каменистых склонах Зарабшанского и Гиссарского хребтов.

Места обитания. Каменистые и пестроцветные склоны в нижнем и среднем поясах гор.

Численность. Около 30 растений произрастают рядом с Китабским геологическим заповедником и около 100 растений в Гиссарском государственном заповеднике.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Заготовка луковиц населением и выпас.


Культивирование. Культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Китабском и Гиссарском заповедниках.

Источники. [58, 362, 364].

Ф. О. Ҳасанов.

Highly decorative endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the stony slopes of the Zeravshan and Hissar ranges (the Kashkadarya region). Inhabits stony slopes and red sands. In the Kitab state reserve, there are about 30 plants and in the Hissar state reserve about 100 plants. Limiting factors: digging of bulbs by local population and pasturing. Measures of protection: protected in the Kitab (Geological) and Hissar state reserves.



200. ЙИРИК ПИЁЗ

Лук гигантский / *Allium giganteum* Regel

Мақоми 3. Жанубий Помир-Олой ва Копетдоғдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бош пиёзининг эни 3–5 см, қорамтири, қофозсимон пўстли. Пояси 60–130 см узунлиқда, силлиқ. Барглари 4–5 та, силлиқ. Соябони кўпгулли, деярли шарсимон, диаметри 5–12 см. Гулбандлари деярли тенг, гулёнбаргчалари йўқ, узунлиги 3–6 см. Гулқўргон бўлаклари юлдузсимон, оч бинафша рангли, узунлиги 5–6 мм, овалсимон, тўмтоқроқ, эгилмайдиган. Чангчи иплари бигизсимон, узунлиги 4–5 мм. Кўсаги шарсимон, диаметри 5–6 мм.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўҳитанг тизмасида – Кампиртепа сойининг жанубий ёнбағри, Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий ёнбағирлари ва Боботоғ тизмасида тарқалган. Ўзбекистондан ташқарида Эрон, Афғонистон, Тоҷикистон ва Туркманистанда учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмларидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. 5–8 та тупдан иборат кичик тўплар ҳосил қиласиди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Мол боқилиши ва уруғининг паст унуччилиги туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилмоқда.



Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат қўрик-хонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [58, 362, 364].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 3. Редкий эндемик Южного Памира-Алая и Копетдага.

Краткое описание. Луковица 3–5 см ширины с черноватыми, бумагообразными оболочками. Стрелка 60–130 см высоты, гладкая. Листья 4–5, ремневидные, 4–8 см ширины, гладкие. Зонтик многоцветковый, почти шаровидный, 5–12 см в диаметре. Цветоножки почти равные, без прицветников 3–6 см длины. Листочки звездчатого оклоцветника светло фиолетовые, 5–6 мм длины, овальные, туповатые, не отгибающиеся. Нити тычинок 4–5 мм длины, шиловидные. Коробочка шаровидная, 5–6 мм в диаметре. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет и его юго-западные отроги, Бабатаг, Кугитанг. За пределами Узбекистана: Иран, Афганистан, Таджикистан и Туркменистан.

Места обитания. Каменистые склоны в нижнем и среднем поясах гор.

Численность. Образует небольшие группы (по 5–8 растений).

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас и низкая семенная всхожесть.


Культивирование. Культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [58, 362, 364].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare endemic species of the southern Pamir-Alay and Kopetdag. It is spread at the Hissar range and its southern outskirts, the Kughitang, the Babatag (the Surkhandarya region). Inhabits stony slopes in the low and middle mountainous zone. There are rare populations with 5–8 plants. Limiting factors: low seed germination and pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve.



201. ИСОҚУЛ ПИЁЗИ

Лук Исакула / Allium isakulii R. M. Fritsch et F. O. Khass.

Мақоми 1. Фарбий Тянь-Шань ва Помир-Олой-даги камёб эндемик ўсимлиқ.

Қисқача тавсифи. Пиёзининг эни 1–2 см, қорамтири, қофозсимон пўсти кўнғир рангда. Пояси 15–30 см узунликда, силлиқ. Барглари 2–3 та, тилсимон, 5–10 см узунликда, эни 2–4 см, силлиқ. Соябони кўпгулли, сийрак, деярли шарсимон, диаметри 10–15–35 см. Гулбандлари деярли тенг, гулёнбаргчалари йўқ, узунлиги 5–10–17 см. Гулқўргон бўлаклари юлдузсимон, қалин этли, очсиёхранг, узунлиги 10–12 мм, учбуручак-ланцетсимон, ўткирроқ. Чангчи иларининг узунлиги 4–5 мм, учбуручак. Кўсаги шарсимон, диаметри 3–5 мм.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота, Молгузар, Оқтоғ, Қоратоғ тизмаларида тарқалган. Ўзбекистондан ташқарида: Тожикистон (Мўғилтоғ).

Ўсиш шароити. Кўёш тик тушадиган тоғ ёнбағирларининг сувайирғичларга яқин қисмидағи қоялар остида ва қуруқ тошли-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ва кичик тўплар ҳолида учрайди. Нурота тизмасида (100 та туп), Қоратоғ ва Оқтоғда (20–50 та туп) популяциялари маълум.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.



Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Мол боқилиши ва уруғининг паст унувчанилиги туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Нурота давлат қўриқ-хонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [58, 362, 364]

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Краткое описание. Луковица 1–2 см ширины с черноватыми, бумагообразными оболочками. Стрелка 15–30 см высоты, гладкая. Листья 2–3, языковидные, 5–10 см длины, 2–4 см ширины, гладкие. Зонтик многоцветковый, рыхлый, почти шаровидный, 10–15–35 см в диаметре. Цветоножки почти равные без прицветников, 5–10–17 см длины. Листочки звездчатого околоцветника мясистые, остающиеся, светло фиолетовые, 10–12 мм длины, треугольно-ланцетные, островатые. Нити тычинок 4–5 мм длины, треугольные, высоко между собой спаянные. Коробочка шаровидная 3–5 мм в диаметре. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской и Навоийской областях: хребты Мальгузар, Нуратау, Актау, Карагатай. За пределами Узбекистана: Таджикистан (Моголтау).

Места обитания. Солнечные экспозиции на щебнистых склонах под скальными породами в приводораздельных частях.

Численность. Встречается единично или небольшими группами. Известны 3 популяции (около 100 экземпляров) в Нуратау и около 20–50 экземпляров в Актау и Карагатай.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Низкая семенная всхожесть и перевыпас.

Культивирование. Культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [58, 362, 364].

Ф. О. Ҳасанов.

Highly decorative endemic species of the western Tien-Shan and Pamir-Alay. It is spread at the Malguzar, the Nuratau, the Aktau, the Karatau ranges (the Jizzakh, the Samarkand, the Navoi regions). Inhabits shiny slopes under the rocks in upper part of the low mountains. Single specimens and small groups occur sporadically. There are populations with about 100 plants known in the Nuratau and about 20-50 plants in the Aktau and Karatau. Limiting factors: low seed germination and pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



202. ПУШТИ ГУЛЛИ ПИЁЗ

Лук розовоцветный / Allium rhodanthum Vved.

Мақоми 0. Жанубий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бош пиёзининг эни 2–3 см, қорамтири, қофозсимон пўстли. Пояси 15–30 см узунлиқда, силлиқ. Барглари 1–2 та, кенг наштарсимон, узунлиги 5–10 см, эни 2–4 см, силлиқ. Соябони кўпгулли, сийрак, деярли шарсимон, диаметри 10–15 см. Гулбандлари тенг, гулёнбаргчалари йўқ, узунлиги 5–10 см. Гулқўрғон бўлаклари юлдузсимон, этли, пуштиранг, узунлиги 7–10 мм, чўзиқ овалсимон, бальзан наштарсимон, тўмтоқ. Чангчи иплари пушти, узунлиги 16–13 мм, бигизсимон, анча қисми ўзаро бирлашган. Кўсаги шарсимон, диаметри 3–4 мм.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Хаудактоғ кумларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Кўмларда ўсади.

Сони. 20 йил давомида уни топиш устида олиб борилган ишлар натижасиз тугади. Бу тур бутунлай йўқолган бўлса керак.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ҳаддан ташқари кўп мол боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Мухофаза қилинмайди.

Манбалар. [58, 362, 364].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 0. Редкий эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Луковица 2–3 см ширины с черноватыми, бумагообразными оболочками. Стрелка 15–30 см высоты, гладкая. Листья 1–2, широко ланцетные, 5–10 см длины, 2–4 см ширины, гладкие. Зонтик многоцветковый, рыхлый, почти шаровидный, 10–15 см в диаметре. Цветоножки почти равные без прицветников 5–10 см длины. Листочки звездчатого околоцветника мясистые, интенсивно розовые, 7–10 мм длины, продолговато овальные, реже ланцетные, тупые.

Нити тычинок фиолетовые 10–13 мм длины, шилловидные, высоко между собой спаянные. Коробочка шаровидная 3–4 мм в диаметре. Цветет в апреле, плодоносит в мае.



Распространение. Сурхандарьинская область: пески Хаудактау.

Места обитания. Пески.

Численность. Многочисленные попытки в течение 20 лет найти этот вид в Хаудактау не увенчались успехом. Вид, по-видимому, полностью исчез.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Перевыпас.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [58, 362, 364].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare endemic plant of the southern Pamir-Alay. It is spread at the sands Khaudaktau (the Surkhandarya region). Inhabits sandy dunes. Several attempts to find out these species within last 20 years had no success. Probably disappeared. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: not protected.



203. Равен пиёзи

Лук Равена / Allium ravenii F.O. Khass. et al.

Мақоми 1. Устюртдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Пиёзининг эни 1 см, қорамтири, қофозсимон пўстли. Пояси 15–30 см узунлиқда, силлиқ. Барглари 1–2 та, узунлиги 5–20 см, эни 0,5 см, силлиқ. Соябони кўпгулли, сийрак, деярли шарсимон, диаметри 1–1,5 см. Гулбандлари тенг, гулёнбаргчалари йўқ, узунлиги 6 мм. Гулқўргон бўлаклари юлдузсимон, этли, пуштиранг, узунлиги 5–7 мм, чўзиқ-овалсимон.

Тарқалиши. Қорақалпоғистон: Устюрт платоси (шарқий чинк атрофлари)да.

Ўсиш шароити. Чинк атрофидаги гипсли тупроқларда ўсади.

Сони. 20 га яқин туплари топилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайиши мумкин.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ҳаддан ташқари кўп чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [365].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий эндемик плато Устюрт.

Краткое описание. Луковица 1 см ширины с черноватыми, бумагообразными оболочками. Стрелка 15–30 см высоты, гладкая. Листья 1–2, цилиндрические, 5–20 см длины, 0,5 см ширины, гладкие. Зонтик немногоцветковый, рыхлый, 1–1,5 см в диаметре. Цветоножки почти равные без прицветников 5–10 см длины. Листочки звездчатого околоцветника мясистые, интенсивно розовые, 6 мм длины. Нити тычинок короче листочеков. Цветет в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Каракалпакстан: плато Устюрт.

Места обитания. Гипсы наверху чинка.

Численность. Выявлено 20 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Пере выпас.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [365].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare endemic plant of the Ustyurt Plateau. It is spread at Karakalpakstan (the Ustyurt Plateau). Inhabits gypseous slopes of the Ustyurt Plateau. 20 plants were revealed. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: not protected.




204. МАНЗАРАЛИ ПИЁЗ

Лук декоративный / Allium decoratum Turginov et Tojibaev

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Пиёзбоши 1,5–2 (3) см диаметрда, қофозсимон қобиқ билан қопланган. Пояси 10–15 см баландлиқда, барглари 1–3 тадан, баъзан 4 тагача, узунлиги 9–10 см, эни 3–3,5 см. Тўпгули шарсимон, ҳар бир гулнинг узунлиги 2,5–3 см, гуллари юлдузсимон, оч қизғиш рангда, узунлиги 6–6,5 мм, ўткир ланцетсимон. Чангчи иплари тўғри, гулқўрғондан чиқиб туради, чангчилари бигизсимон. Кўсаги шарсимон, июнда гуллаб, уруғи июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Жануби-ғарбий Ҳисор тизмасида, Бойсун тоғининг Хўжа-Гургур-ота, Хўжа Кўчкор-ота, Санжар ва Чўлбайир тоғларида тарқалган.



Ўсиш шароити. Ўсиш минтақаси, денгиз сатҳидан 2500–3200 м баландлиқда майда тупроқли ва майда тошли ёнбағирликларда учрайди.

Сони. 4–5 га майдонда тарқалган 1000–1500 атрофида.

Кўпайиши. Уруғидан.

Маданийлаштирилиши: ЎзР ФА Ботаника боғига экилганда, натижалар самараасиз бўлган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [371].

О. Т. Тургинов.

Статус 1. Редкий эндемик юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Луковица шаровидная, 1,5–2 (3) см толщины, бумагообразными оболочками, беловатые. Стебель толстый, 10–15 см высоты. Листья в числе (1)–2–3 ланцетные, продолговатые или эллиптические, 9–10 см длины, 3–3,5 см ширины. Зонтик шаровидный, многоцветковый. Цветоножки равные 2,5–3 см длины, при основании без прицветни-

ков. Листочки звездчатого околоцветника бледно-крановые, и красные жилкой, 6–6,5 мм длины, ланцетные острые, после цветения вверх торчащие, жесткие. Нити тычинок короче равных, более длины листочеков околоцветником, наружные шиловидные; внутренние в 1,5 раза более широкие, треугольно-шиловидные. Цветёт в июне–июле, коробочка шаровидная.

Распространение. Сурхандарьинская область: юго-западной части Гиссарского хребта – Байсун, Ходжа-Гургур-ата, Ходжа Кочкар-ата, Санжар и Горы Чулбаир.

Места обитания. Мелкоземистые, каменистые в верхнем поясе гор на высоте 2650–3200 м.

Численность. около 1000–1500, на 4,5–5 га площади.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Посадка взрослых экземпляров и высев семян в Ботаническом саду АН РУз окончилась неудачей.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [371].

О. Т. Тургинов.

Rare and endemic, relict species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range (the Baysuntai) – the Khodja Kuchkorata and the Sanjar in the Khoja Gurgurata, the Khoja Kochkorata mts. and Besharcha in the Tschulbaир mts. (the Surkhandarya region). Inhabits subalpine and alpine zones (altitudes ca. 2650–3200 m) with stony and rocky soils, sometimes, sheltered by stones. The plants grow singly, 2–3 per 10 m². The total area of all populations is 4,5–5 gk. 1000–1500 Measures of protection: not protected.



205. САҲРО ПИЁЗИ, ЧҮЛ ПИЁЗИ

Лук пустынный / Allium egeroprasum Vved.

Мақоми 2. Помир-Олой ғарбий тармоқларининг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Пиёзи тухумсимон, эни 1 см га яқин, қулранг юпқа терисимон буришган пўстлоқли. Пиёзчаларининг сирти чукурчали. Пояси (10) 15–25 см, деярли ярмигача баргларнинг новлари билан ўралган. Барглари 2 та, ипсимон, эни 1–2 мм, гуллаш пайтида қуриб кетади. Со-ябони камгулли, сийрак. Гулбандлари 3–4 см гача узунликда, тенгсиз, гулёнбаргчалари бор. Гуллари қўнфироқсимон. Гулқўрғон бўлаклари оқиш ёки хира пушти ранг, қирмизи томирли, узунлиги (5) 6–7 мм, наштарсимон. Чангчи иплари гулқўргонидан 1,5 марта қисқа, учбурчак, ярмигаш

(10) 15–25 см высоты, примерно до $\frac{1}{2}$ одет влагалищами листьев. Листья в числе 2, нитевидные, 1–2 мм ширины, ко времени цветения увядают. Зонтик немногоцветковый, рыхлый. Цветоножки до 3–4 см длины, неравные, с прицветниками. Листочки колокольчатого околоцветника грязно-розовые или беловатые, с грязно-пурпуровой жилкой, (5) 6–7 мм длины, ланцетные. Нити тычинок в 1,5 раза короче околоцветника, до $\frac{1}{2}$ между собой и с околоцветником сросшиеся, треугольные, цельные, внутренние почти 3 раза шире наружных. Коробочка около 3 мм в диаметре. Цветет в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Самаркандской и Навоийской областях: хребет Актау, Зирабулак-Зиявуддинские горы.

Места обитания. Каменистые склоны и скалы в нижнем поясе гор.

Численность. Встречается редко, спорадически, одинично или небольшими группами по нескольку растений.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Естественно редкий стенофильный петрофильный вид. Основную угрозу представляют горные разработки (добыча мрамора, строительного камня, щебня и других полезных ископаемых).


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [58, 362, 364].

Н. Ю. Бешко.

Rare endemic species of the western branches of the Pamir-Alay. It is spread at the Aktau ridge, the Zirabulak and Ziadin mountains (the Samarkand and Navoi regions). Inhabits stony slopes and rocks in the lower mountain belt. Single specimens or small populations occur sporadically. Limiting factors: marble, crushed stone and rubbly quarrying, mining operations. Endemic stenotopic petrophyte species. Measures of protection: not protected.



ча ўзаро ва гулқўрғон билан бирлашган, ичкари-дагилари ташқилари деярли 3 марта кенг. Кўсаги юмалоқ, диаметри 3 мм га яқин.

Тарқалиши. Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Оқтоғ тизмасида ва Зирабулоқ-Зиёвуддин тоғларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмидаги тошли ёнбағирларда, қояларда ўсади.

Сони. Якка ва кичик гуруҳлар ҳолида учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиатда камёб, ўсиш майдонлари чекланган стенобионт петрофит ўсимлик. Мармар қазиб олиш, тош майдалаш ва тоғ-кон ишлари туфайли камайиб кетади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [58, 362, 364]

Н. Ю. Бешко.

Статус 2. Редкий эндемик западных отрогов Памиро-Алая.

Краткое описание. Луковичный многолетник. Луковица яйцевидная, около 1 см ширины, с сероватыми, морщинистыми тонко кожистыми оболочками. Луковички ямчатые. Стебель тонкий,

206. ЯШИЛ ГУЛЛИ ПИЁЗ

Лук зеленоватый / Allium viridiflorum Pobed.

Мақоми 1. Чотқол тизмасидаги ғоят камёб эндемик ўсимлиқ.

Қисқача тавсифи. Пиёзбоши 1–2 см кенгликда, кулранг, юпқа қобиқли (пүстли). Пиёзчалари қисқарған, кам сонли. Пояснинг узунлиги 20–23 см, эни 1,0 мм. Барглари бўлинган, 4 та, ипсимон, зич жойлашган, қалами новсимон бўлакли, қисқа пояли. Соябони сийрак, гуллаш давридан сўнг 7–9 см кенгликда. Гулбандлари тенг, ипсимон, узунлиги 4–5 см, тубида гулёнбаргчалари йўқ, қуидан юқорига букилган. Юлдузсимон гулқўргон бўлакларининг узунлиги 4–5 мм, яшил, тенг, тўмтоқ, гуллагандан кейин буралиб қолмайди. Чангчи иплари гулқўргондан калта, асосидан бошлаб бир-бiri билан кўшилган, тиҳсиз. Кўсакча гулқўргондан озгина узунроқ, деярли шарсимон, 3 уруғли. Уруғи юмалоқ, қора, чукурчали.

Тарқалиши. 2013 йилда Наманган вилоятидан (Поромон қишлоғидан 2 км шимол томонда) топилган. Ўзбекистондан ташқари, Қирғизистонда ўсади.

Сони. 20 туп ўсимлиқдан иборат 1 та популяцияси топилган.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва боқилиши сабабли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида экиб ўстирилмоқда.

Мухофаза чоралари. Мухофаза қилинмайди.

Манбалар. [58, 362, 364, 371].

Ф. Каримов.

Статус 1. Редкий эндемик Чаткальского хребта.

Краткое описание. Луковицы одиночные 1–2 см толщины, с перепончатыми серыми цельными оболочками. Луковички удлиненные, немногочисленные. Стебли 20–23 см высоты, 1,0 мм толщины. Листья, рассеченные на 4-нитевидные, скрученные, желобчатые доли, короче стебля. Чехол отстающийся, бело-перепончатый, короче зонтика. Зонтик рыхлый, после зацветания 7–9 см ширины, полусферический, немногоцветковый. Цветоножки равные, нитевидные 4–5 см длины, при основании без прицветников, нижние вверх изогнутые. Листочки звездчатого оклоцветника 4–5 мм длины, зеленые, равные, тупые, после цветения не скручивающиеся. Нити тычинок короче оклоцветника, с ним и между собой при основании сросшиеся, без зубцов. Коробочка немногоДлиннее оклоцветника, почти шаровидная, 3-х семянная. Семена круглые, черные, ямчатые. Цветет в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. В 2013 г. был обнаружен в Наманганская области (1 км к северу от кишлака Поромон). За пределами Узбекистана: Кыргызстан.



Места обитания. Каменистые склоны нижнего пояса гор.

Численность. Обнаружена 1 популяция (около 20 растений).

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала.
Выпас.

Культивирование. Культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [58, 362, 364, 371].

Ф. Каримов.

Very rare endemic species of the Chatkal range. These species have been recently found nearby the village Poramom, the Chatkal range (the Namangan region). Inhabits stony slopes in the lower mountain belt. Only 1 population (about 20 plants) was found. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



207. ВИКТОР ОМОНҚОРАСИ

Унгерния Виктора / *Ungernia victoris* Vved. ex Artjuschenko

Мақоми 2. Жануби-тарбий Помир-Олой тизмасидаги ареали жуда қисқарип бораётган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–25 см га етадиган кўп йиллик, пиёзли ўт. Пиёзининг эни 4–7 см, қорамтирик ўнгир рангли, кўп қаватли қобиқлар билан ўралган. Барглари 7–10 та, қалами, кўкимтирик, силлик. Гулпояси август ойида барглари куриб кетгандан сўнг ўсиб чиқади. Тўпгули соябонсизмон, 4–7 гулли. Кўсакчаси кенг юраксизмон паллали. Август ойида гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасида, Чўлбайир тоғларида, Хонақасув дарёсининг юқори қисмларида тарқалган. Ареалининг шимолий чегаралари Кўштут, Шура, Хонақа довонлари, жанубда эса Боботоғнинг шимолий ёнбағирлари орқали ўтади. Тоҷикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмида майда зарра жинс тупроқли ёнбағирлар, даралар ва баъзан сурilmалarda ўсади.

Сони. Бир-биридан узоқ масофаларда жойлашган, унча катта бўлмаган (1–1,5 га) майдонларни эгаллайди. Умумий майдони таҳминан 350 га етади.



Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан (уни бўлакларга ажратиб) кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Баргларининг ҳар йили узлуксиз доривор хом ашё сифатида йиғиб олиниши туфайли пиёzlари майдалашиб, ўсимликнинг ер усти қисми ҳам қурий бошлаган.

Маданийлаштирилиши. 1970 йилдан табиий ареалига яқин жойларда экиб ўстирила бошланди.

Муҳофаза чоралари. Табиатда сақланиб қолган майдонлари назорат қилиниши, рухсатсиз йиғмаслик талаб этилади. Шунингдек, маданий шароитда ўстириш бўйича илмий ишлар олиб борилиши лозим. Чўлбайир тоғида табиий ҳолда ўсувчи омонқораларни сақлаб қолиш ва уругини териш учун буюртмахона ташкил қилиниши керак.

Манбалар. [155–159].

И. И. Мальцев.

Статус 2. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая с сильно сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой до 20–25 см. Луковица толщиной 4–7 см с многочисленными чёрно-бурыми оболочками. Ли-

стья в количестве 7–10, линейные, сизоватые, гладкие. Цветок появляется в августе, после высыхания листьев. Соцветия зонтиковидные, 4–7-цветковые. Коробочка с широкосердцевидными створками. Цветёт в августе, плодоносит в сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – горы Чульбаир, бассейн реки Ханакасу. На севере граница ареала проходит вдоль перевалов Куштут, Шура, Ханака, на юге – по северным склонам Бабатага. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Мелкоземистые склоны, реже осыпи, ущелья среднего пояса гор.

Численность. На разобщённых участках образует небольшие (1–1,5 га) заросли. Общая площадь – примерно 350 га.

Размножение. Семенное и вегетативное – отпочковыванием луковиц.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивная заготовка листьев в качестве лекарственного сырья, в результате чего луковицы истощаются и заросли возобновляются медленно.


Культивирование. С 1970 года проводится посев вблизи естественных мест обитания.

Меры охраны. Необходимо усилить контроль за естественными местами обитания, ввести строгий лицензионный сбор, расширить изучение в культуре, организовать заказник в районе Чульбаира для сохранения естественных зарослей и сбора семян.

Источники. [155–159].

И. И. Мальцев.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay with reducing area. It is spread at the Hissar range: the Chulbaир mountains, the Khanakasu river basin. In the north, the area-line lies along the Kushtut, the Shura, the Khanaka passages, in the south - in the northern slopes of the Babatag (the Surkhandarya region). Inhabits fine earth slopes, rarely mounds, gorges in the middle belt of mountains. Forms small brakes (1-1.5 ha) in the separate lands. Total area is about 350 ha. Limiting factors: Intensive use of leaves as medicinal raw material; as a result, bulbs become weak; and, brakes revegetate slowly. Limiting factors: it is necessary to enhance monitoring of the natural locations, to introduce strict license tax, to integrate the study in cultivation, to organize the state reserve in the Chulbaир region in order to reserve natural brakes and to gather seeds.



208. САРИҚ ШТЕРНБЕРГИЯ

Штернбергия жёлтая / *Sternbergia lutea* (L.) Spreng.



Мақоми 3. Ўзбекистоннинг жанубида жуда камтарқалган тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20 см га етадиган кўп ийллик пиёзли ўт. Пиёзи иирик, деярли юмалоқ, эни 4 см га, узунлиги эса 5 см га етади. Барглари кенг наштарсимон, тўмтоқ, тарновсимон, четлари ўткир майда тишчали. Барги гули билан бир вақтда – кузда ўсиб чиқади. Гуллари бандсиз, сариқ рангли. Гулпояси наизасимон, чўзиқроқ. Сентябрь–октябрь ойларида гуллайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси ёнбағирларида жойлашган Шарғун қишлоғи атрофида тарқалган. Тожикистанда, Туркменистанда ва Кавказда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги қояларда ва тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Эҳтимол, манзарали бўлганилиги учун пиёзи қазиб олинса керак.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Табиатда ўсиб турган жойлари назорат остига олиниши ва маданий шароитда экиб ўрганилиши лозим.

Манбалар. [79, 159].

И. И. Мальцев.

Статус 3. Очень редкий спорадически встречающийся вид в южной части Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой до 20 см. Луковица большая, почти округлая, шириной до 4 см и длиной 5 см. Листья широколанцетные, тупые, вогнутые, по краю мелкозубчато-островатые, появляются осенью одновременно с цветками. Цветки жёлтые, сидячие. Цветочная стрелка удлинённая. Цветёт в сентябре–октябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – окрестности кишлака Шаргунь. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Туркменистан, Кавказ.

Места обитания. Карнизы скал, каменистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены. Вероятно, заготовка луковиц.

Культивирование. Культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходимы контроль за состоянием естественных местообитаний и изучение в культуре.

Источники. [79, 159].

И. И. Мальцев.

Very rare species sporadically found in the southern Uzbekistan. It is spread at the Hissar range: nearby the village Shargun (the Surkhandarya region). Inhabits cornices of rocks, stony slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



209. ФИШЕР ШТЕРНБЕРГИЯСИ

Штернбергия Фишера / *Sternbergia fischeriana* (Herb.) M. Roem.

Мақоми 3. Ўзбекистоннинг жанубий минтақаларига хос жуда кам учрайдиган тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10 см га етадиган кўп йиллик пиёзли ўсимлик. Пояси япасқи. Барглари 4–8 та, туксиз, қалами. Гуллари 8–10 мм узунликдаги гулбандда жойлашган. Гулқўрғонининг ташки баргчалари чўзиқ. Кўсакчаси очилмайди. Уруғи деярли юмалоқ. Март ойида гуллаб, меваси апрелда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ҳисор тизмасида Китоб, Шахрисабз шаҳарлари атрофларида, Оқсув дарёси ҳавзасида ҳамда Зарафшон тизмасининг ғарбий қисмида тарқалган. Шарқий Кавказортида ва шимолий Эронда ҳам тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ олди ёнбағирларидағи соз тупроқларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиатда бу ўсимлик тарқалган ерларнинг қишлоқ ҳўжалиги учун ўзлаштирилиши ва чорва молларининг боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида синаб кўрилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Китоб давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади. Табиатдаги тўплари устидан қатъий назорат ўрнатиш ва маданий ҳолда экиб ўрганиш лозим.

Манбалар. [79, 159].

И. И. Мальцев.

Статус 3. Очень редкий спорадически встречающийся вид в южной Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой до 10 см. Стебель сплюснутый. Листья в количестве 4–8, голые, линейные. Цветки на цветоножках длиной 8–10 мм. Наружные листочки околоцветника продолговатые. Коробочка нераскрывающаяся. Семена почти шаровидные. Цветёт в марте, плодоносит в апреле.

Распространение. Кашкадарьинская область: Гиссарский хребет – окрестности города Китаба, Шахрисабза, бассейн реки Аксу. Западная оконечность Зарафшанского хребта. За пределами Узбекистана: Восточное Закавказье, Северный Иран.

Места обитания. Лесовые склоны предгорий.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение территорий под сельхозкультуры. Выпас.

Культивирование. Испытывается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Китабском заповеднике. Необходимы строгий контроль за состоянием популяций и изучение в культуре.

Источники. [79, 159].

И. И. Мальцев.

Very rare species sporadically found in the southern Uzbekistan. It is spread at the Hissar range: nearby the Kitab, the Shakhrisabz, the Aksu river basin; the western part of the Zaravshan range (the Kashkadarya region). Inhabits loess slopes of the submontane zone. The quantity is unknown. Limiting factors: reclamation of lands under crops. Pasturing. Measures of protection: protected in the Kitab state reserve. The strict control of the state of populations and investigations in cultivation are required.



ШИЛВИДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ЖИМОЛОСТНЫЕ – CAPRIFOLIACEAE

210. ФАЛАТИ УЧҚАТ

Жимолость странная / *Lonicera paradoxo* Pojark.

Мақоми 1. Помир-Олойдаги жуда камёб, ареали ажралган, реликт эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Тарвақалайган шох-шаббали бута. Барглари эллипссимон ёки тескари-түхумсимон, бўлакли, узунлиги 20 мм, четлари қисқа киприксимон, ҳар икки томони қисқа тукли. Гуллари барг қўлтиғида жойлашган. Меваси юмшоқ, қизил рангли, майда. Уруғлари 4–5 та, оқиш. Июль-августда гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарқалиши. Жиззах ва Фарғона вилоятлари: Олой тизмаси (Шоҳимардан қишлоғи атрофи) ва Туркестон тизмасида тарқалган. Тожикистон ва Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва юқори қисмларида тошли-шағалли ёнбағирларда ва сийрак арчазорларда ўсади.

Сони. Табиятда жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғи ва илдиз бачкиларидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўтин сифатида ишлатилади. Чорва молларидан ҳам зарар кўради.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Буюртмахоналар ташкил қилиш ва ЎзР ФА Ботаника боғида биологик хусусиятларини ўрганиш лозим.

Манбалар. [20, 248].

Г. А. Лазьков.

Статус 1. Очень редкий узкий реликтовый эндемик Памиро-Алая с разорванным ареалом.

Краткое описание. Кустарник с растопыренными ветвями. Листья эллиптические или обратнояйцевидные, лопастные, длиной до 20 мм, по краю короткореснитчатые, с обеих сторон коротковолокнистые. Цветки в пазухах листьев. Плоды ягодообразные, красные. Цветёт в июле-августе, плодоносит в сентябре.

Распространение. В Джизакской и Ферганской областях: Алайский хребет – окрестности кишлака Шахимардан; Туркестанский хребет. За пределами Узбекистана: Таджикистан и Кыргызстан.

Места обитания. Щебнисто-каменистые склоны в верхнем и среднем поясах гор, среди разреженных зарослей арчи.

Численность. Встречается очень редко, единичными экземплярами.



Размножение. Семенное и корневыми отпрысками.

Причины изменения численности и ареала. Вырубка на топливо, выпас.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Необходимы организация заповедника, изучение биологических особенностей в условиях Ботанического сада АН РУз.

Источники. [20, 248].

Г. А. Лазьков.

Very rare relict endemic species of the Pamir-Alay with the reducing area. It is spread at the Alay range: nearby the village Shakhimardan; the Turkestan range (the Djizakh and Fergana regions). Inhabits -stony slopes in the upper and middle belt of mountains, among thinned juniper stands. Very rarely single specimens can be found. Limiting factors: cutting down as fuel, pasturing. Measures of protection: it is necessary to organize a state reserve, to study biological characteristic features under the conditions of the Botanical Garden (Tashkent).



ШИРАЧДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО КСАНОТОРОЕВЫЕ – XANTHORRHOEACEAE

211. АЛЬБЕРТ ШИРАЧИ Ширач Альберта / *Eremurus alberti* Regel

Мақоми 2. Ўзбекистонда кам учрайдиган тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25–80 см га етадиган кўп йиллик ўт. Илдизпояси қисқарган, панжасимон, бўлаклари урчуқсимон йўғонлашган, қалинлиги 7–10 мм. Барглари кенг қалами, ташқи томонидагиларининг кенглиги 1,5–2 см.

Шингиллари сийрак, кўп гулли, узунлиги 10–50 см. Гулолди баргчалари иирик, учбурчак наштарсимон. Тўпгулининг пастидаги гулбандлари гулкўргонидан 2–2,5 марта узун. Гулкўргон баргчалари бир томирли, оқиш-қизғиши рангли, асосига қараб чўзилган. Чангчилари гулкўргонидан 1,5 марта қисқа. Кўсакчаси юмалоқ, уч уяли, силлиқ, эни 2–2,5 см. Апрелда гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Боботоғ, Шеробод водийсида, Дехқонобод шаҳри атрофла-рида тарқалган. Тожикистон, Афғонистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 900–1200 м ба-ландлиқда паст тоғлардаги ола жинсларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган, баъзан 2–3 та тури биргаликда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллаш даврида кўп микдорда гулдасталар учун узиб олиниши натижасида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1960 йилдан бўён ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Табиатда ўсиб турган туплари назорат остига олиниши лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий в Узбекистане вид.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 25–80 см с укороченным корневищем и радиально расходящимися веретеновидными корнями толщиной 7–10 мм. Листья широколинейные, наружные, шириной 1,5–2 см. Кисть негустая, многоцветковая, длиной 10–50 см. Прицветники крупные, треугольно-ланцетные. Цветоножки нижние в 2–2,5 раза длиннее околоцветника. Листочки околоцветника с 1 жилкой, бледно-мясо-красные, к основанию оттянутые. Тычинки в 1,5 раза короче околоцветника. Коробочка шаровидная, с 3 гнездами, гладкая, шириной 2–2,5 см. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: горы Бабатаг, Шерабадская долина, окрестности города Дехканабада. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Афганистан.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород в низкогорьях на высоте 900–1200 м.



Численность. Встречается единично, редко по 2–3 растения.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор на букеты.


Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз с 1960 года.

Меры охраны. Необходим контроль за состоянием популяции.

Источники. [261, 279–282, 358].

К. Ш. Тожибаев.

Species rare in Uzbekistan. It is spread at the Babatag mountains, the Sherabad valley, nearby Dekhanabad (the Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits outcrops of gypseous rocks in the low-hills at the height of 900-1200 m. Single specimens, seldom 2-3 plants can be found. Limiting factors: mass picking of flowers. Measures of protection: control of the state of populations is required.



212. БЕШТОМИР ШИРАЧ

Ширач Ии / *Eremurus iae* Vved.

Мақоми 2. Жануби-ғарбий Помир-Олойга хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бүйі 60–80 см га етадиган күп үйлік ўт. Илдизпояси қисқа, нұрсимон жойлашган, илдизлари күп, йүғонлашган. Барғи кенг қалами, 15–20 мм кенглиқда, күкимтири рангли. Шингили цилиндрсімон, узунлиги 20–30 см, сийрак, кам гулли. Гулолди барғалары ингичка учбұрчак шаклда. Шингилининг пастдаги гулбандлар гулқұрғонидан иккі баробар узун. Гулқұрғон барғалары 3–5 томирли. Чанғчилари гулқұрғондан узунроқ. Меваси – күсакча, юмалоқ, йирик (эні 1 см дан ортиқ), силлиқ. Май-июнда гуллаб, меваси июнь-июль ойларыда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояты: Ҳисор тизмасининг Чүлбайир тоғларыда, Тұпаланғдарёси ҳавзасыда, Бойсунтоғнинг шимолий ёнбағирларыда тарқалған.

Үсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидеги шағаллы, тошли-соз тупроқли ёнбағирларда үсади.

Сони. Жуда кам учрайди. Якка-якка ҳолда ёки 2–3 тадан кичик түплар ҳосил қилиб үсади.

Күпайиши. Уруғидан, баъзан эса вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маҳаллий аҳоли томонидан йиғилиши ва чорва молларининг боқилиши туфайли камайиб кетмоқда.

Маданийлаштирилиши. 1962 йилдан бўён ЎзРФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Буюртмаоналар ташкил қилиш ҳамда уруғ олиш мақсадида экиб ўстириш лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий узкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 60–80 см с укороченным корневищем и радиально расходящимися слабоутолщенными многочисленными корнями. Листья широколинейные, шириной до 15–20 мм, сизые. Кисть цилиндрическая, длиной 20–30 см, негустая, немногоцветковая. Прицветники узкотреугольные. Нижние цветоножки в 2 раза длиннее околоцветника. Листочки околоцветника с 3–5 жилками. Тычинки длиннее околоцветника. Плод – коробочка шаровидная, гладкая, крупная (более 1 см). Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – горы Чульбаир, бассейн реки Тупаланг, северный склон Байсунтау.

Места обитания. Каменисто-глинистые, преимущественно северные склоны среднего пояса гор.

Численность. Встречается крайне редко, единично или небольшими (по 2–3 растения) группами.

Размножение. Семенное, редко – вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор населением, выпас.

Культивирование. С 1962 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходимы организация заказника, введение в культуру с целью размножения.

Источники. [261, 279–282, 358].

К. Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Chulbaир mountains, the Tupalang river basin, the north slope of the Baysuntau (the Surkhandarya region). Inhabits stony-clayish, mainly the northern slopes in the middle belt of mountains. Single or small groups (2-3 plants) extremely rarely can be found. Limiting factors: collection by the local population, pasturing. Measures of protection: it necessary to organize a state reserve, to introduce into cultivation for the purpose of its reproduction.



213. БОЙСУН ШИРАЧИ

Ширач байсунский / *Eremurus baissunensis* O. Fedtsch.

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойга хос камайиб кетган эндемик ўсимлик.

Қисқача тасвиғи. Бўйи 60–80 см оралиғидаги кўп йиллик ўт. Илдизпояси қисқа, урчуқсимон йўғонлашган илдизларининг эни 4–6 мм. Барглари ингичка қалами, эни 4–6 мм. Шингили сийрак, кўп гулли, узунлиги 25–45 см. Гулолди баргчалари йирик, учбурчак наштарсимон. Шингилининг пастидаги гулларининг бандлари гулқўргонидан 1,5 марта узун. Гуллари ҳидли. Гулқўргон баргчалари оқ, битта томирли. Чангилари нотекис ва гулқўргонидан қисқа. Меваси – кўсакча, чўзиқроқ силлиқ, эни 6–7 мм, узунлиги 15–20 мм, уруғлари ингичка қанотчали. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё, Сурхондарё вилоятлари: Кўҳитанг тизмаси, Дехканобод, Бойсун ҳамда Денов шаҳарлари оралиғидаги пасттоғларда тарқалган. Туркманистанда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Ола жинсли ва гипсли ерларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимликнинг алоҳида ўсиш шароитларини талаб этадиган субстрат турга мансублиги, шунингдек унинг одамлар ва чорва моллари томонидан пайхон қилинаётганлигидир.

Маданийлаштирилиши. 1964 йилдан бошлаб ЎзР ФА Ботаника боғида ўстиришга ҳаракат қилинган, аммо бу уринишлар натижага бермаган.

Мухофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади. Табиатдаги тупларининг ҳолатини ўрганиш лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

Ф. ў. Ҳасанов.

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 60–80 см с укороченным корневищем и веретеновидными корнями толщиной 4–6 мм. Листья узколинейные, шириной 4–6 мм. Кисть рыхлая, многоцветковая, длиной 25–45 см. Прицветники крупные, треугольно-ланцетные. Нижние цветоножки в 1,5 раза длиннее околоцветника. Цветки душистые. Ли-

сточки околоцветника с 1 жилкой, белые. Тычинки неровные, короче околоцветника. Плод – коробочка удлинённая, гладкая, шириной 6–7 мм, длиной 15–20 мм. Семена узокрыльные. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: хребет Кугитанг, низкогорья между городами Дехканабад, Байсун, Денав. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород и гипса.

Численность. Встречается крайне редко единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Требовательность растения к субстрату, сбор населением, выпас.


Культивирование. С 1964 года неоднократно предпринимались попытки интродуцировать вид в Ботаническом саду АН РУз. Через 2–3 года растения выпадали.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике. Требуются тщательные наблюдения и регулярная оценка состояния популяций.

Источники. [261, 279–282, 358].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the low hills between Dekhanabad, Baysun, Denau (the Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits outcrops of gypseous rocks. Single specimens extremely rarely can be found. Limiting factors: demand of plant to the substrate, picking by the local population, pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan nature reserve. Careful observations and estimation of the state of populations are required.



214. КОРОВИН ШИРАЧИ

Ширач Коровина / *Eremurus korovinii* B. Fedtsch.

Мақоми 1. Фарбий Тянь-Шанга хос ўта камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80 см га етадиган кўп ийллик ўт. Илдизпояси қисқарган, нурсимон жойлашган бўлаклари бироз йўғонлашган. Барглари 30 см узунликда, эни 2 см, ингичка қалами, тарновсимон, кўкимтири, қиррали, қисқа тукли. Тўпгули кенг цилиндрсимон шингилдан иборат. Гуллари кенг қўнғироқсимон, оч пушти рангли, тубида сарик доғи бор. Гулкўрғон баргчала-ри 15–18 мм узунликда. Меваси – қўсакча, юмалоқ, силлиқ, диаметри 10–15 мм. Июль ойида гуллаб, уруғ беради.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Курама тоғида ўсган. Бир марта 1880 йилда Маҳмуд Мусо томонидан Кандирдовондан йиғилган. Кейинги қидиришлар натижасиз тугаган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг тошли ёнбағирларида ўсган.

Сони. Аниқланмаган. Йўқолиб кетган бўлиши мумкин.

Кўпайиши. Аниқ маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Кандирдовон, асосан, чорва моллари ҳайдаб ўтиладиган йўл бўлганлиги сабабли, ўсимлик оёқ остида қолиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсимликни Курама ва Чотқол тизмаларидан излашни давом эттириш лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 293, 358].

К. Ш. Тожибаев



Статус 1. Очень редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 30 см с укороченным корневищем, радиально расходящимися слабоутолщенными корнями. Листья длиной до 80 см и шириной 2 см, узколинейные, желобчатые, кильеватые, сизые, коротко-опущенные. Соцветие в виде рыхлой цилиндрической кисти. Цветки ширококолокольчатые, светло-розовые, с жёлтым пятном у основания. Листочки околоцветника длиной 15–18 мм. Плод – гладкая шаровидная коробочка 10–15 мм в диаметре. Цветёт и плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: Кураминский хребет. Известен только по одному сбору. В 1880 году был собран Маҳмудом Мусой на перевале Кендырдаван. Дальнейшие попытки найти растение оказались безуспешными.

Места обитания. Каменистые склоны гор.

Численность. Не установлена. По-видимому, вид исчез.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Перевал Кендырдаван используется как скотопрогон, что могло явиться причиной исчезновения вида.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Необходимо продолжить поиски этого вида на Кураминском хребте и прилегающих склонах Чаткальского хребта.

Источники. [261, 279–282, 293, 358].

К. Ш. Тожибаев

Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Kurama range (the Tashkent region). It is known only by one specimen. In 1880, Makhmud Musa collected it in the Kendyrdavan pass. Further attempts to find this plant were unsuccessful. Inhabits stony slopes of mountains. Specimens has probably disappeared. Limiting factors: the Kendyrdavan passage is used as a pasture that could be the reason of the species disappearance. Measures of protection: it is necessary to go on searching of these species in the Kurama range and neiboring slopes of the Chatkal range.



215. МОМИҚ ШИРАЧ

Ширач пушистый / *Eremurus pubescens* Vved.

Мақоми 2. Жануби-ғарбий Помир-Олойга хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80–100 см қеладиган кўп йиллик ўт. Илдизпояси қисқа, нурсимон жойлашган, бўлаклари урчуқсимон йўғонлашган, эни 5–7 мм. Барги қалами, эни 2 см атрофида. Шингили сийрак, кўп гулли, узунлиги 40–55 см. Гулолди баргчалари ингичка учбурчак шаклда, момиқ тукли. Шингилидаги пастки гулларининг гулбанди гулкўрғонидан 2–2,5 марта узун. Гулкўрғон баргчалари оқиш-қизғиши рангда. Чангчилари гулкўрғон баргчаларидан қисқа. Кўсакчаси юмалоқ, эни 1,5 см, юпқа қобиқли. Май ойида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Тўпаланг, Сангардак дарёлари ҳавзасида, Бойсунтоғда ва Чўлбайир тоғларида тарқалган. Тожикистанда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кичик туплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ахоли томонидан териб кетилиши ва чорва молларининг боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. 1961 йилдан бошлаб ЎЗРФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари.

Чўлбайир ёки Бойсунтоғда буюртмахона ташкил қилиниши лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.


Краткое описание. Многолетнее травянистое густоопущенное растение, высотой 80–100 см, с укороченными и радиально расходящимися веретено-видно-утолщёнными (5–7 мм) корнями. Листья линейные, шириной около 2 см. Кисть рыхловатая, многоцветковая, длиной 40–55 см. Прицветники узкотреугольные, мохнатые. Нижние цветоножки в 2–2,5 раза длиннее околосветника. Листочки околосветника белые с розовым оттенком. Тычинки короче

листочеков околосветника. Коробочка шаровидная, тонкокожистая, шириной около 1,5 см. Цветёт в мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Бассейн рек Тупаланг и Сангардак, горы Чульбаир и Байсунтау. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Щебнистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается небольшими группами.



Размножение. Семенное, редко – вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор населением и выпас скота.

Культивирование. С 1961 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходима организация заказника Чульбаирских или Байсунских гор.

Источники. [261, 279–282, 358].

Ф. О. Ҳасанов.



Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Tupalang and Sangardak river basins, the Chulbaир and Baysuntau mountains (the Surkhandarya region). Inhabits slopes in the middle belt of mountains. Small groups of specimens can be found. Limiting factors: picking by population, cattle pasturing. Measures of protection: it is necessary to organize a protected area on the Chulbaир or Baysun mountains.

216. НОР ШИРАЧ (ХУЛКА БОЛА)

Ширач мощный / *Eremurus robustus* Regel

Мақоми 3. Тянь-Шань ва Помир-Олойдаги ареали ажралган ва қисқарып бораётган эндемик ўсимликтің.

Қисқача тавсифи. Бүйі 100–250 см га етадиган күп ийиллик йирик ўт. Илдизпояси қисқа, нұрсимон жойлашған, бүлаклари урчуқсімөн жүйгөнлашған. Барглари кенг қалами, эни 4–8 см, силлиқ. Шингили тиғиз, күп гулли, цилиндр шаклда, узунлиғи 35–120 см. Гулолди баргчалари учбұрчак шаклда. Шингилининг пастки қисмидаги гулларининг банди гулқұрғонидан 1,5–2 марта узун. Гулқұрғон баргчалари якка томирли, оч пушти рангли. Чангчилари гулқұрғонидан бироз қисқа. Меваси – юмалок, силлиқ күсакқа үхшайды, эни 1,5–2,5 см. Май-июлда гуллады, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Наманган, Жиззах, Самарқанд, Фарғона, Сурхондарё, Қашқадарё вилоятлари: Фарбий Тянь-Шань ва Помир-Олойнинг барча тизмалари, Тожикистан, Қозогистон, Қирғизистонда ҳам учрайди.

Үсиш шароити. Тогнинг ўрта қисмидаги майда-жинс тупроқыла тошли ёнбағирларда үсади.

Сони. Якка-якка ва кичик туплар ҳосил қилиб үсади. Тошкент вилояты худуди бүйіча 100 000 атрофида тури бор.

Күпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аҳоли томонидан териб олиниши ва чорва молларининг кўплаб боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. 1954 йилдан бүён ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Чотқол, Зомин, Ҳисор, Китоб, Нурота, Сурхон қўриқхоналарида, Уғом-Чотқол ва Зомин миллий табиат боғларида муҳофаза қилинади. Ботаника боғларида кўпайтириш лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 3. Сокращающийся эндемик Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое мощное растение высотой 100–250 см с укороченным корневищем и радиальнорасходящимися веретеновидными утолщёнными корнями. Листья широколинейные, наружные шириной 4–8 см, гладкие. Кисть очень густая, многоцветковая, цилиндрическая, длиной 35–120 см. Прицветники треугольные. Нижние цветоножки в 1,5–2 раза длиннее околоцветника. Листочки околоцветника с 1 жилкой, светло-розовые. Тычинки немного короче околоцветника. Плод – шаровидная, гладкая коробочка шириной 1,5–2,5 см. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Ташкентской, Наманганской, Джиззахской, Самаркандской, Ферганской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях: все горные хребты западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая. За пределами Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Места обитания. Мелкоземистые и мелкоземисто-каменистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами и небольшими группами. По Ташкентскому вилояту произрастает около 100 000 особей.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор населением.




Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз с 1954 года.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского, Зааминского, Гиссарского, Китабского, Нуратинского, Сурханского заповедников, Угам-Чаткальского и Зааминского национальных парков. Необходимо размножение в ботанических садах.

Источники. [261, 279–282, 358].

К. Ш. Тожибаев.

Reducing endemic species of the Tien-Shan and Pamir-Alay with reducing area. It is spread at all mountain ranges of the western Tien-Shan and western Pamir-Alay (the Tashkent, the Djizakh, the Samarkand, the Ferghana, the Surkhandarya and Kashkadarya regions). Inhabits fine earth and fine earth-stony slopes in the middle belt of mountains. Single specimens can be found only in the inaccessible for human places. Limiting factors: mass picking by the local population. Measures of protection: protected in the territory of the Chatkal, the Zaamin, the Hissar, the Kitab, the Nuratau, the Surkhan state nature reserves and the Ugam-Chatkal and Zaamin national parks. Reproduction in botanical gardens is required.



217. НУРОТА ШИРАЧИ

Ширач нуратинский / *Eremurus nurataicus* A.P. Khokhr.

Мақоми 1. Нурота тизмасидаги камёб энде-
мик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40–120 см га етади-
ган кўп йиллик ўт. Илдизпояси қисқа, бўлаклари
урчуқсимон йўғонлашган. Барглари ингичка
қалами, эни 10–30 мм. Шингили сийрак, узунли-
ги 15–25 см. Гулолди баргчалари оқ, узунлиги
12–14 мм. Гулбандларининг узунлиги 10–15 мм,
гулқўргонидан бироз узунроқ. Гулқўргон барг-
чалари З томирли, оч сариқ, қўнғир чизиқли,
узунлиги 8–11 мм. Чангчилари гулқўргонидан
узунроқ. Меваси – кўсақдай, юмалоқ. Уруғлари ин-
гичка қанотчали. Май ойида гуллаб, меваси июл-
да етилади.

Тарқалиши. Жиззах вилояти: Нурота тизма-
сида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта минтақасидаги
тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Умумий сони 1000 тадан ошмайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

**Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш
сабаблари.** Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. 1980 йилдан бўён
ЎзР ФА Ботаника боғида экилади.

Мухофаза чоралари. Нурота қўриқхонасида
мухофаза қилинади.

Манбалар. [18, 314].

Н. Ю. Бешко.

Статус 1. Редкий эндемик Нуратау.

Краткое описание. Многолетнее
травянистое растение высотой до 40–
120 см, с укороченным корневищем и
веретеновидно-утолщёнными корня-
ми. Листья узколинейные, шириной
10–30 мм. Кисть негустая, длиной
15–25 см. Прицветники белые, дли-
ной 12–14 мм. Цветоножки длиной
10–15 мм, немного длиннее околоцветника. Листочки околоцветника с
3 жилками, бледно-желтоватые, с ко-
ричневой полосой, длиной 8–11 мм.
Тычинки длиннее околоцветника.
Плод – коробочка, шаровидная. Семе-
на узкоокрыльные. Цветёт в мае, плодо-
носит в июле.

Распространение. Джизакская
область: Хребет Нуратау.

Места обитания. Каменистые
склоны среднего пояса гор.

Численность. Общая числен-
ность не превышает 1000 экземпля-
ров.

Размножение. Семенное.


**Причины изменения численно-
сти и ареала.** Не установлены.

Культивирование. С 1980 года вы-
ращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Ну-
ратинского заповедника.

Источники. [18, 314].

Н. Ю. Бешко.



Rare endemic of the Nuratau range. It is spread at the Nuratau range (the Djizakh region). Inhabits stony slopes in the middle of mountain belt. There are about 1000 plants can be found. Measures of protection: reserved in the Nuratau state reserve.



218. ОҚГУЛЛИ ШИРАЧ

Ширач молочноцветковый / *Eremurus lactiflorus* O. Fedtsch.

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шань ва Нуротадаги камайиб бораётган, эндемик үсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 45–100 см оралиғидаги кўп ийллик ўт. Илдизпояси қисқа, бўлаклари урчуқсимон йўғонлашган. Барглари кенг қалами, эни 13–25 мм, силлиқ. Шингили сийрак, кўп гулли, узунлиги 15–30 см. Гуллоди баргчалари ингичка учбурчак наштарсимон. Шингилининг пастидаги гулларининг банди гулкўрғонидан 1,5–2 марта узун. Гулкўрғон баргчалари бир томирли. Чангчилари нотекис, гулкўрғонидан қисқа. Меваси – кўсақдай, юмалоқ, 3 та бўртмали, силлиқ, эни 20–30 мм. Май–июнда гуллаб, меваси июнь–июль ойларida етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Жиззах ва Навоий вилоятлари: Қоржантов, Угом, Писком, Чотқол, Курама ва Нурота тизмаларида тарқалган. Қирғизистон ва Қозогистонда ҳам ўсади.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги тошли ва шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кичик тўплар ва якка-якка ҳолда тарқалган. Тошкент вилоятида олиб борилган тадқиқотлар давомида 40 000–50 000 тури аниқланган. Нурота тоғ тизмасида тахминан 100 та туп икки жойда ўсиши аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аҳоли томонидан териб олиниши, янги ерларни ўзлаштириш ва чорва моллари таъсирида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида экилади.

Муҳофаза чоралари. Чотқол ва Нурота қўриқхоналарида, Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади. Табиатдаги мавжуд туплари назорат остига олиниши лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

К. Ш. Тожибаев.


Статус 2. Сокращающийся по численности эндемик Западного Тянь-Шаня и Нуратау.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 35–100 см, с укороченным корневищем и веретеновидно-утолщёнными корнями. Листья широколинейные, шириной 13–25 мм, гладкие. Кисть негустая, многоцветковая, длиной 15–30 см. Прицветники узко-треугольно-ланцетные. Нижние цветоножки в 1,5–2 раза длиннее околоцветника. Листочки околоцветника с 1 жилкой. Тычинки неравные, короче околоцветника. Плод – шаровидная коробочка с 3 выпуклостями, гладкая, шириной 20–30 мм. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.





Reducing endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Ugam, the Pskem and Chatkal range, the Karzhantau mountains (the Tashkent region), the Nuratau range (the Djizakh and Navoi regions). Inhabits and stony slopes in the middle belt of mountains. Single specimens rarely can be found in the accessible for human places, in almost inaccessible regions grows in groups. The population number in the Tashkent region is about 40 000 – 50 000 plants, at the Nuratau range-about 100 pants were counted in two locations. Limiting factors: picking of flowers. Measures of protection: protected in the Chatkal and Nuratau state nature reserves and the Ugam-Chatkal national park. Regular control of the state of populations is required.



Распространение. В Ташкентской, Джизакской и Навоийской областях: все хребты Западного Тянь-Шаня и Нуратинский хребет. За пределами Узбекистана: Кыргызстан, Казахстан.

Места обитания. Щебнистые и каменистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Произрастает небольшими группами и единичными экземплярами. Последние исследования по Ташкентскому вилояту показали произрастание 40 000–50 000 особей. На хребте Нуратау учтено около 100 растений в 2 пунктах.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор на букеты, освоение земель и выпас скота.

Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз с 1966 года.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском и Нуратинском заповедниках, Угам-Чаткальском национальном парке. Необходим постоянный контроль за состоянием популяций.

Источники. [261, 279–282, 358].

К. Ш. Тожибаев.



219. САРИҚ ШИРАЧ

Ширач жёлтый / *Eremurus luteus* Baker



Мақоми 1. Ўзбекистондаги жуда камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 35–60 см оралигидаги кўп йиллик ўт. Илдизпояси қисқа, бўлаклари урчуқсимон йўғонлашган. Барглари ингичка қалами, эни 4–7 мм. Шингили сийрак, нисбатан кам гулли, узунлиги 20–30 см. Гулолди баргчалари йирик учбурчак наштарсимон, шингилининг пастки қисмидаги гулларининг банди гулқўрғонидан 1,5 марта узун. Гуллари ҳидли. Гулқўрғон баргчалари якка томирли, оч сариқ. Чангчилари нотекис, гулқўрғонидан қисқа. Меваси қўсакчадай, чўзиқ, силлиқ. Ургулари ингичка қанотчили. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё, Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор (Қизилча, Фузор, Дарбанд, Оқравот ва Деҳқонобод атрофлари) ва Кўҳитанг тизмалари оралигидаги паст тоғларда тарқалган. Туркманистон, Эрон ва Афғонистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Очиқ ола жинс ва гипсларда ўсади.

Сони. Жуда кам сақланган, табиатда якка-якка ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўзига хос тупроқ шароитига мослашганлиги ва чорва молларининг боқилиши ҳамда аҳоли томонидан териб олиниши унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. 1965 йилдан бўён ЎзР ФА Ботаника боғида экиб ўстиришга қаралтилган кўплаб уринишлар натижага бермаган.

Муҳофаза чоралари. Табиатдаги мавжуд туплари устидан кузатишлар олиб бориш лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 1. Очень редкий в Узбекистане вид.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 35–60 см, с укороченным корневищем и слабоверетеновидно-утолщёнными

корнями. Листья узколинейные, шириной 4–7 мм. Кисть негустая, сравнительно немногоцветковая, длиной 20–30 см. Прицветники крупные, треугольно-ланцетные. Нижние цветоножки в 1,5 раза длиннее околоцветника. Цветки душистые. Листочки околоцветника с 1 жилкой, бледно-жёлтые. Тычинки разной длины, короче околоцветника. Плод – коробочка, удлинённая, гладкая. Семена узрокрыльные. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: низкогорья в юго-западных отрогах Гиссарского хребта (окрестности Кзылчи, Гузара, Дербента, Акрабата и Дехканабада) и хребет Кугитанг. За пределами Узбекистана: Туркменистан, Иран и Афганистан.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород и гипса.

Численность. Встречается крайне редко, единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Требовательность растений к местам обитания, выпас скота, сбор населением.


Культивирование. С 1965 года неоднократно интродуцировался в Ботаническом саду АН РУз. Через 2–3 года растения выпали.

Меры охраны. Требуются постоянные наблюдения за состоянием растений в природе.

Источники. [261, 279–282, 358].

К. Ш. Тожибаев.

Very rare species in Uzbekistan. It is spread at the low hills of the western branches of the Hissar range, from Kyzylcha, Guzar and Dekhanabad to the Kughitang range (the Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits outcrops of gypseous rocks. Single specimens extremely rarely can be found. Limiting factors: exigence of plants to habitat, cattle pasturing, collection by the population. Measures of protection: regular control of the state of populations in nature is required.



220. СУВОРОВ ШИРАЧИ

Ширач Суворова / *Eremurus suworowii* Regel

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлиқ.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50–70 см келадиган кўп йиллик ўт. Илдизпояси қисқа, нурсимон жойлашган, бўлаклари йўғонлашган. Барглари ингичка қалами. Поясининг пастки қисми, одатда, ғадир-бутир тукли. Шингили деярли цилиндрсизмон, сийрак, кам гулли, узунлиги 15–50 см. Гулолди баргчалари тор учбурчак шаклда. Пастки гулларининг банди гулкўргонидан 1,5–2,5 марта узун. Гулкўргон баргчалари бир томирли, оч сарис рангда. Чангчилари гулкўргонидан қисқа. Кўсакчаси юмалоқ, текис, эни 1–1,4 см. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Хисор тизмаси (Тўпалаң ва Сангардак дарёлари ҳавзаси), Чўлбайр тоғлари, Кўхитанг ҳамда Боботоғда тарқалган. Тожикистон ва Афғонистонданда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори ва қуи қисмларидаги майда жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ва кичик туплар ташкил қилиб тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан, баъзан вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик ўсадиган жойларининг ўзлаштирилиши, чорва молларининг боқилиши ҳамда аҳоли томонидан иғилиши сабабли камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. 1960 йилдан бўён ЎзРФА Ботаника боғида экиб ўстирилади.

Мухофаза чоралари. Айрим популяциялари Сурхон давлат кўриқхонасида сақланади. Чўлбайр тоғларида ўсимликнинг ҳолатини кузатиб туриш учун буюртмахона ташкил этиш лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 50–70 см, с укороченным корневищем и радиально расходящимися немногочисленными корнями. Листья узколинейные. Стебель обычно внизу шероховато-пушистый. Кисть почти цилиндрическая, рыхлая, немногоцветковая, длиной 15–50 см. Прицветники узко-треугольные. Нижние цветоножки часто в 1,5–2,5 раза длиннее околосцветника. Листочки околосцветника с 1 жилкой, бледно-жёлтые. Тычинки короче околосцветника. Коробочка шаровидная, гладкая, шириной 1,4 см. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет (бассейны рек Тупаланг и Сангардак), горы Чульбаир, хребты Бабатаг и Кугитанг. За пределами Узбекистана:

Таджикистан, Афганистан.

Места обитания. Мелкоземистые склоны в высоких предгорьях и нижнем поясе гор.

Численность. Встречается одинично и небольшими группами.

Размножение. Семенное, реже вегетативное.


Причины изменения численности и ареала. Хозяйственное освоение территорий, сбор населением, выпас скота.

Культивирование. С 1960 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Сурхандарёского заповедника. Необходимы организация заказника в Чульбаирских горах и регулярная оценка состояния популяций.

Источники. [261, 279–282, 358].

К. Ш. Тожибаев.



221. ЯШИЛ ГУЛЛИ ШИРАЧ

Ширач зеленоцветный / *Eremurus chloranthus* Popov

Мақоми 0. Туркестон тизмасида жуда камтарқалган, эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бүйи 60–70 см дан ошмайдиган күп йиллик ўт. Илдизпояси қисқа, нурсимон жойлашган, урчуқсимон бўлаклари бироз йўғонлашган. Барглари кенг-қалами, эни 15 мм. Шингили қалин, кўп гулли, деярли цилиндри-мон, узунлиги 25–30 см, Гулолди баргчалари учбурчак наштарсимон, четлари киприксимон тукли. Шингилининг пастидаги гулбанди гулқўрғонидан қисқароқ. Гулқўрғон баргчалари якка томирли, яшилроқ рангли, узунлиги 14–15 мм. Чангчилари гулқўрғонидан 1,5 марта қисқа. Кўсакчаси номаълум. Июлда гуллайди.

Тарқалиши. Жиззах вилояти: Туркестон тизмасидаги Гуралашсойининг юқори қисмидаги тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмидаги нам соз тупроқли ёнбағирлар.

Сони. Фақатгина бир марта Гуралашсойдан йифилган (1926 йил 20 июля). 1980–1981 йилларда олиб борилган қидириш ишлари натижа бермади. Турйўқолиб кетган бўлиши ҳам мумкин.

Кўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Зомин давлат қўриқхонасида сақланади.

Манбалар. [261, 240, 279–282, 358].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 0. Очень редкий эндемик Туркестанского хребта.

Краткое описание. Растение высотой 60–70 см с укороченным корневищем и несильно-веретено-видно-утолщёнными корнями. Листья широколинейные, шириной около 15 мм. Кисть густая, многоцветковая, почти цилиндрическая, длиной 25–30 см. Прицветники узко-треугольно-ланцет-

ные, реснитчатые. Цветоножки нижние немного короче околоцветника. Листочки околоцветника с 1 жилкой, зеленоватые, длиной 14–15 мм. Тычинки в 1,5 раза короче околоцветника. Плод – коробочка, неизвестна. Цветёт в июле.

Распространение. Самаркандская область: Туркестанский хребет – верховья Гуралашсая.



Места обитания. Вероятно, произрастает на влажных склонах и сазах в верхнем поясе гор.

Численность. Найден один раз в ущелье Гуралаш (20 июля 1926 г.). Поиски в 1980 и 1981 гг. результатов не дали. Вид, по-видимому, исчез.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Зааминском государственном заповеднике.

Источники. [261, 240, 279–282, 358].

К. Ш. Тожибаев.

Very rare endemic species of the Turkestan range. It is spread at the Turkestan range: the Guralashsai (the Djizakh region). Inhabits probably, wet fine soils in the upper mountain belt. Found only in the Guralash Gorge (July 20, 1926). The research was carried out in 1980–1981 turned to be unsuccessful. Probably disappeared. Measures of protection: protected in the Zaamin state reserve.



222. ЭЧИСОН ШИРАЧИ

Ширач Эчисона / *Eremurus aitchisonii* Baker

Мақоми 3. Ўзбекистонда камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 70–120 см орасидаги кўп йиллик ўт. Илдиз пояси қисқарган, нурсимон жойлашган, бўлаклари урчуқсимон йўғонлашган. Барглари кенг қалами, эни 5–8 см, оч яшил рангли, туксиз. Пояси туксиз ёки пастки қисми ғадир-будир тукли. Шингили сийрак, камгулли, цилиндрсимон, 20–45 см узунлиқда. Гулолди баргчалари учбурчак шаклда, чўзинчоқ. Шингилининг пастидаги гулбанди гулкўргонидан икки марта узун. Гулкўргон баргчалари бир томирли, пушти ранг. Чангчилари гулкўргонидан 1,5 марта қисқа. Меваси – эни 1,5–2 см келадиган юмалоқ қўсакча. Май–июнь ойларида гуллаб, июнь–июлда уруғлайди.

Тарқалиши. Самарқанд, Сурхондарё, Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон ва Ҳисор тизмаларида, Чўлбайир, Бойсун, Кўҳитанг тоғларида тарқалган. Қирғизистон, Тожикистон, Афғонистонда ҳам тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмida майда жинс тупроқли ва шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка, баъзан кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан, баъзан вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аҳоли томонидан йиғиб олиниши ва чорва молларининг боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор ва Сурхон қўриқхоналарида муҳофаза қилинади, Чўлбайир тоғларида буюртмахона ташкил этиш лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 3. Редкий в Узбекистане вид.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 70–120 см с укороченным корневищем и радиально расходящимися веретеновидно-утолщенными корнями. Листья широколинейные, шириной 5–8 см, ярко-зелёные, голые. Стебель голый или при основании шероховато-опущенный. Кисть рыхлая, немногоцветковая, цилиндрическая, длиной 20–45 см. Прицветники треугольные, длиннооттянутые. Нижние цветоножки в 2 раза



длиннее околоцветника. Листочки околоцветника с 1 жилкой, розовые. Тычинки в 1,5 раза короче околоцветника. Плод – шаровидная коробочка, шириной 1,5–2 см. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Самаркандинской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях: Зарафшанский и Гиссарский хребты, горы Чульбаир, Байсунтау, Кугитанг. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан.

Места обитания. Мелкоземистые и мелкоземисто-каменистые склоны в нижнем поясе гор.



Численность. Встречается редко, единичными экземплярами, иногда небольшими группами.

Размножение. Семенное, редко – вегетативное.

Причины изменения численности и ареала.

Интенсивный сбор населением, выпас скота.

Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУЗ.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском и Сурханском государственных заповедниках. Необходима организация заказника в горах Чульбаир.

Источники. [261, 279–282, 358].

К. Ш. Тожибаев.

Rare species in Uzbekistan. It is spread at the Zaravshan and Hissar ranges, the Chulbaир, the Baysuntau, the Kughitang mountains (the Samarkand, the Surkhandarya and Kashkadarya region). Inhabits fine earth and fine earth-stony slopes in the lower belt of mountains. Single solitary specimens or small groups rarely can be found. Limiting factors: the intensive collection by local population, cattle pasturing. Measures of protection: protected in the Hissar and Surkhan state reserves. It is necessary to organize a protected area in the Chulbaир mountains.

ШОТАРАДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО ДЫМЯНКОВЫЕ - FUMARIACEAE

223. ТУРКИСТОН ШОТАРАЧАСИ

Дымяночка туркестанская / *Fumariola turkestanica* Korsh.

Мақоми 2. Олой тизмасидаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–15 см орасидаги кўп ийллик, кўкимтири ўт. Пояси битта, ингичка, асосидан шохланган. Барглари узун бандли, икки карра уч бўлакка бўлинган, туксиз. Япроқлари 2–3 бўлакли. Тўпгули соябонсизмон, кам гулли, шингили баргларидан қисқа. Гуллари майда, кўримсиз, сарғиш. Меваси ёнғоқча, узуунлиги 3 мм, эни 1 мм, қорамтири рангли, ғадир-будир. Май–июнь ойларида гуллаб, меваси июль–августда етилади.


Тарқалиши. Фарғона вилояти: Шоҳимардан ва Исфайрам дарёлари ҳавзаларида тарқалган. Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Оҳактошли қояларнинг ёриқларида ўсади.



Сони. Водил, Шоҳимардан ва Ёрдон қишлоқлари ўртасидаги қояларда 5 та тупи мавжуд. Тошқояларда ўсиши туфайли сони ҳам ниҳоятда кам.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.



Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсимлик ареалига аниқлик киритиш ва биологик хусусиятларини ўрганиш лозим.

Манбалар. [167, 242].

Г. А. Лазьков.

Статус 2. Редчайший эндемик Алайского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое сизоватое растение высотой 10–15 см. Стебель одиночный, тонкий, ветвистый от основания. Листья длинно-черешковые, дважды тройчаторассечённые, голые. Сегменты листа двух-трёхлопастные. Соцветие – зонтиковидная кисть, не выступающая из листьев, с мелкими, невзрачными, немногочисленными желтоватыми цветками. Плод – орешек, длиной 3 мм, шириной 1 мм, при созревании чернеющий, слабошероховатый. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле–августе.

Распространение. Ферганская область: бассейн реки Шахимардан. За пределами Узбекистана: Кыргызстан (Исфайрам).

Места обитания. Трецины известняковых скал.

Численность. Достоверно известно 5 небольших популяций на скалах между кишлаками Вуадиль, Шахимардан и Ярдан. В связи с приуроченностью к скалам запасы ничтожно малы.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Необходимы уточнение ареала, контроль за популяциями и изучение биологических особенностей.

Источники. [167, 242].

Г. А. Лазьков.

Rare endemic species of the Alay range. It is spread at the Shakhimardan river basins (the Ferghana region). Inhabits clefts of limestone rocks. Known for certain 5 small populations in rocks between the Vuadil, the Shakhimardan and Yordan villages. In connection with the coherence with rocks its stocks are insignificant. Measures of protection: it is necessary to define more exactly the area, to control populations and to study biological characteristic features.

ШЎРАДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО МАРЕВЫЕ – CHENOPodiACEAE

224. ЎТКИРБАРГ БАЛИҚКЎЗ

Climacoptera oxyphylla U.P. Pratov

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг жанубий қисмидаги кичик майдонда сақланиб қолган эндемик ўсимликтаридан.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–15 см, асосидан шохлаган, бир йиллик ўт. Ўсимликнинг пастки қисми қалин, юқори қисми эса сийра-клашган, узун, кўп хужайрали, чалкаш, ярим ётиқ туклар билан қопланган. Шохчалари ва барглари кетма-кет жойлашган, поядаги баргларининг банди поясига ёпишган. Барглари этли, қалами ярим цилиндрический, учи ўткир, баргининг учи ғуж тукли. Гуллари якка, рўваксимон тўпгулга йиғилган. Гулодди барги этли, учи ўткир, ёнбаргча ва гулқўргонлардан узурроқ. Гулқўргони 5 баргчали, узунлиги 6 мм, мевалаган пайтида юқори қисми тукли қанотчалар ҳосил қиласади. Чангчиси 5 та. Тумшуқчаси бигизсимон, гулқўргонидан қисқа. Уруғи ётиқ жойлашган.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ўзбекистоннинг жанубида Шеробод водийсидаги Майдон қишлоғи атрофларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Очиқ ола жинсли ерларда ўсади.

Сони. Кам учрайди, якка-якка ҳолда ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ола жинсли ерларда ўсиши ва у ўсган ерларда чорва молларининг боқилиши унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маданийлаштирилмаган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Чорва молларини боқишни (айниқса, ўсимликнинг уруғи етилган даврда) чеклаш лозим.

Манбалар. [159, 253].

Ў. П. Пратов.

Статус 2. Узколокальный эндемик южной части Узбекистана.

Краткое описание. Однолетнее растение высотой 10–15 см, ветвящееся от основания, опущенное внизу густыми, кверху редеющими, длинными, многоклеточными, спутанными или полуприжатыми волосками. Ветви и листья

очередные, стеблевые листья низбегающие, мясистые, линейные, полуovalковатые, на конце островатые, с волосками, собранными в кисточку. Цветки одиночные, собраны в метельчатое соцветие. Прицветные листья мясистые, на конце с остроконечием, длиннее прицветников и околоцветника. Листочек околоцветника 5, длиной до 6 мм, при плодах крылатые, над крыльями опушённые. Тычинок 5. Рыльца шиловидные, короче околоцветника. Семена горизонтальные.

Распространение. Сурхандарьинская область: юг Узбекистана, Шерабадская долина, окрестности кишлака Майдан.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород.

Численность. Малочислен, встречается единичными особями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к пестроцветным породам, поедание животными.

Культивирование. Не культивируется.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Необходимо ограничение выпаса скота в период созревания семян.

Источники. [159, 253].

У. П. Пратов.

Rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the southern Uzbekistan, the Sherabad valley nearby the village Maidan (the Surkhandarya region). Inhabits outcrops of gypseous rocks. Not numerous, single specimens can be found. Limiting factors: gypseous rocks, eaten by animals. Measures of protection: not protected.



225. МАЛИГИН БАЛИҚҚҮЗИ

Климакоптера Малигина / *Climacoptera malyginii* (Korovin ex Botsch.) Botsch.

Мақоми 2. Мирзачўлда тарқалган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик, ўт ўсимлик, бўйи 30–35 см, ёш ниҳол пайтида узун, ингичка, чалкаш тукли, кейинчалик туксизланада бошлайди. Барглари этли, қалами, учи тўмтоқ. Гулоди барглари поянинг пастида гулёнбаргчалардан узун, юқорисида улардан қисқа. Гулёнбаргчалари гулқўрғонидан қисқа, тухумсимон. Гулқўрғон бўлаклари наштарсимон, туксиз, меваси етилиши билан ярмидан пастида қанотчалар пайдо бўлади. Чангдонининг узунлиги 1,5 мм, ярмигача бўлинган, учидаги бўртмаси пуфаксимон. Уруғчиси гулқўрғонидан узун. Июнь–сентябрь ойларида гуллаб, меваси етилади.

Тарқалиши. Эндемик тур. Сирдарё воҳаси (Мирзачўл)да тарқалган (Сирдарё вилояти).

Ўсиш шароити. Шўрхок тупроқларда ўсади.

Сони. Сийрак ҳолда ўсади. Сони аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу тур тарқалган жойларда дехқончилик қилиниши ва мол боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [35, 159].

Ў. П. Пратов.

Статус 2. Редкий эндемик Голодной степи.

Краткое описание. Однолетнее растение, 30–35 см высоты, в молодом состоянии опущенное длинными, тонкими, спутанными волосками, в последствии голые. Листья мясистые, линейные, тупые. Прицветные внизу длиннее, вверху короче прицветничков. Прицветнички яйцевидные, короче околоцветника. Листочки околоцветника ланцетные, голые, ниже середины развиваются крылья. Пыльники около 1,5 мм длины, разделенные до половины, придатки пузыревидные. Пестик длиннее околоцветника. Цветет и плодоносит в июне–сентябре.

Распространение.

Сырдарьинская область: встречается в бассейне реки Сырдарья – Мирзачуль.

Места обитания. На солончаках.

Численность. Встречается спорадически на небольших участках.

Размножение. Семенное.


Причины изменения численности и ареала. Освоение территорий под сельхоз культуры и интенсивный выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [35, 159].

У. П. Пратов.



Rare endemic species of the Mirzachul. It is spread at the Syrdarya river basin: the Mirzachul (the Syrdarya region). Inhabits salty places. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.




226. ПЯТАЕВА БАЛИҚҮЗИ

Климатоктера Пятаевой / Climacoptera pjataevae U.P. Pratov

Мақоми 2. Фарбий Ҳисорда тарқалган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик ўт ўсимлик, бўйи 10–15 см, қалин, узун, чалкаш ва сийрак, қисқа, деярли тўғри тукли. 3-7 жуфт шохлари ва барглари қарама-қарши, қолганлари кетмакет ўрнашган. Поядаги барглари серэт, қалами, тўмтоқ, узунлиги 12–(14) мм, эни 1,5 мм. Гуллари рўвакда ўрнашган. Гулолди барги серэт, узунлиги 10 мм, гулқўрғон ва ёнбаргчаларидан узун. Гулён-баргчалари, гулқўрғонига тенг ёки гулқўрғонидан қисқа. Гулқўрғони 5 бўлакли, меваси етилганда ярмидан пастроғида пардасимон қанотчалар пайдо бўлади. Чангчиси 5 та, чангдонининг учida



пуфаксимон оқ тухумсимон бўртмаси бор. Уруғи текис ўрнашган.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Қашқадарё воҳасидаги Гуссари ва Сиряк қишлоқлари атрофларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғолди текисликларидағи майда чағиртошли ва шўрланган тупроқларда тарқалган.

Сони. Сийрак тарқалган. Сони аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзариш сабаблари. Чорва боқилиши ва антропоген омилларнинг салбий таъсири туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [159, 253].

Ў. П. Пратов.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Гиссара.

Краткое описание. Однолетнее растение, 10–15 см высоты, опущенное густыми длинными спутанными и рассеянными короткими волосками.

Листья супротивные, очередные. Стеблевые листья мясистые, линейные, тупые, 12–(14) мм длины, 1,5 мм ширины. Цветы собранные в метельчатое соцветие. Прицветные листья мясистые до 10 мм длины, длиннее прицветников и околоцветника. Листочек околоцветника 5, при плодах ниже средины развивающих пленчатые крылья. Тычинок 5, придатки пыльников пузыревидные, яйцевидные, белые. Семена горизонтальные.

Распространение. Кашкадарьинская область: Встречается в бассейне р. Кашкадарья в окрестах кишлаков Гуссари и Сиряк.

Места обитания. Мелкощебнистые засоленные почвы в предгорьях.

Численность. Встречается редко. Численность не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственное освоение земли и интенсивный выпас.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 253].

Ў. П. Пратов.

Rare endemic species of the western Hissar range. It is spread at the Kashkadarya river basin: nearby the villages Tussary and Syryak (the Kashkadarya region). Inhabits salty soils in the lower mountainous zone. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.




227. ТҮМТОҚ ГУЛЁНБАРГЧАЛИ БАЛИҚКҮЗ

Климокаптера тупоприцветниковая / *Climacoptera amblyostegia* (Botsch.) Botsch.

Мақоми 2. Қизилкүм ва Мирзачүлда тарқалған камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик ўт ўсимликті, бўйи 5–30 см, асосидан шохланган, ёш ниҳол пайтида тукли, кейинроқ туксизланади. Барглари этли, қалами, учи тўмтоқ. Гулолди барги кичикроқ, гулёнбаргчалардан узун. Гулёнбаргчалари тухумсимон, ўртасидан пастрофида қанотчалари бор. Чангдон бўртмаси пуфаксимон. Июль–сентябрда гуллаб, мевалайди.

Тарқалиши. Сирдарё вилояти: Мирзачўлда тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Қозоғистонда ҳам тарқалган.



Ўсиш шароити. Шўрхок тупроқларда ўсади.

Сони. Кичик-кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади. **Кўпайиши.** Уруғи орқали кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ерларнинг дехқончилик учун ўзлаштирилиши ва чорва боқилиши туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [35, 159].

Ў. П. Пратов.

Статус 2. Редкий эндемик Голодной степи и Кызылкума.

Краткое описание. Однолетнее растение, 5–30 см высоты, от основания кустиковидно ветвистое, опущенное в молодом состоянии длинными, тонкими, спутанными волосками, впоследствии голое. Листья мясистые, линейные, тупые. Прицветные длиннее прицветников.

Прицветники яйцевидные, тупые, короче окольоцветника. Листочки окольоцветника ланцетные, голые, ниже середины развивают крылья. Крылья вместе с окольоцветником 10–14 мм в диаметре. Придатки пыльников пузыревидные. Семена горизонтальные. Цветет и плодоносит в июле–сентябре.

Распространение. Сырдарьинская область: Долина реки Сырдарья, Кызылкум, Мирзачуль. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. На солончаках.

Численность. Немногочисленные, сильно разрозненные популяции.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сельскохозяйственное освоение земель, выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [35, 159].

У. П. Пратов.

Rare endemic species of the Kyzylkum and Mirzachul. It is spread at the Kyzylkum, the Mirzachul and the Syrdarya river basin (the Syrdarya, the Navoi regions).

Inhabits salty soils. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats, agriculture and pasturing. Measures of protection: not protected.



228. МЕРКУЛОВИЧ БАЛИҚҮЗИ

Климокаптера Меркуловича / *Climacoptera merkulowiczii* (Zakirov) Botsch.

Мақоми 2. Қизилқумда тарқалган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик ўт ўсимлик, бўйи 10–40 см, қалин, қисқа, тарвақайлаган, сийрак узун, чалкаш, кейинроқ камайиб кетадиган тукли. Асосидан шохланган. Барглари этли, қалами, ярим цилиндрсизмон, тўмтоқ, гулоди барги овалсимон, қайиқчасимон, гулёнбаргчалари ва гулқўргонидан қисқа ёки унга тенг, четлари



пардасимон ҳошияли. Гулқўргон бўлаклари кенг наштарсизмон, пуштиранг. Август ва октябрда гуллаб, мевалайди.

Тарқалиши. Бухоро вилояти: Қизилқумда тарқалган.

Ўсиш шароити. Шўрҳок тупроқларда ўсади.

Сони. Кичик-кичик майдонларда жамоалар ҳосил қиласди.

Қўпайиши. Уруғи орқали кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [35, 159].

Ў. П. Пратов.

Статус 2. Редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Однолетнее растение, 10–40 см высоты, опущенное короткими, торчащими и более редкими длинными, спутанными, позднее стирающимися волосками. Листья мясистые, линейные. Прицветные овальные, тупые, короче прицветников и окольцветника. Прицветнички овальные или равны ему, по краю узко пленчато окаймленные. Листочки окольцветника широколанцетные или яйцевидные, плёнчатые, опущенные. Пыльники с пузыревидным розовым придатком. Се-

мена горизонтальные. Цветет и плодоносит в августе–октябре.

Распространение. Бухарская область: Кызылкум.

Численность. Встречается единичными экземплярами и небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение земельных участков под сельхозкультуры и выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется

Источники. [35, 159].

У. П. Пратов.

Rare endemic species of the Kyzylkum desert. It is spread at the Kyzylkum (the Bukhara region). Inhabits salty soils. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.



229. ҚАНОТИ ТУКЛИ БАЛИҚКҮЗ

Климакоптера птилоптера / *Climacoptera ptiloptera* U.P. Pratov

Мақоми 2. Устюртда тарқалган камёб эндемик түр.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик ўт, бўйи 40–50 см, қисқа, тўғри, чалкаш ва узун қалин тукли. Шоҳ ва барглари навбат билан жойлашган. Поядаги барглари серәт, ингичка қалами, учи тўмтоқ, узунлиги 12 мм, эни 1,5 мм, гулёнбаргчалари ва гулкўрғонидан узун. Гулкўрғони 5 бўлакли, узунлиги 4,7 мм, эни 11 мм, меваси етилганда ўртасидан сал пастроғида усти тукли қанотчалар пайдо бўлади. Чангчиси 5 та, чангдонининг учида пуфаксимон бўртмаси бор. Уруғи текис ўрнашган. Меваси октябрь ойида етилади.

Тарқалиши. Қарақалпогистон Республикаси: Устюрт ва шарқий чинқда тарқалган.

Ўсиш шароити. Шўрланган, кулранг-қўнғир тупроқларда ўсади.

Сони. Сийрак тарқалган. Сони аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва боқилиши ва тупроқнинг шўрлиги туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Мухофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [59, 253].

Ў. П. Пратов.

Статус 2. Редкий эндемик Устюрта.

Краткое описание. Однолетнее растение, 40–50 см высоты, опущенное густыми, прямыми, оттопыренными и густыми длинными волосками. Ветви и листья очередные. Стеблевые листья мясистые, узколинейные, тупые, 12 мм длины, 1,5 мм ширины. Прицветные листья длиннее околоцветника. Листочек околоцветника 5, 4, 7 мм длины и 11 мм ширины, при плодах чуть ниже середины развивающихся пленчатые, сверху опущенные крылья. Тычинок 5, придатки пыльников белые или розовые, пузыревидные. Семена горизонтальные. Плодоносит в октябре.

Распространение. Каракалпакстан: встречается на Устюрте и на восточном чинке.

Места обитания. На серо-бурых засоленных почвах.

Численность. Встречается редко, небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас и засоление почвы.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [59, 253].

У. П. Пратов.

Rare endemic species the Ustyurt Plateau. It is spread at the Ustyurt Plateau: the eastern canyon (Karakalpakstan) Inhabits salty soils. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.



230. СЕРТУК БУЗОҚБОШ

Галимокнемис войлочноцветковый / Halimocnemis lasiantha Iljin

Мақоми 2. Фарғона водийсига хос ареали қисқариб бораётган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25 см га етадиган, асосидан шохланувчи, тарвақайлаган, қисқа туклар билан қопланган, бир йиллик этдор ўт. Барглари ингичка-қалами, узунлиги 20–40 мм, пастки томони қабариқ, устки томони ясси. Гулкўрғон

Муҳофаза чоралари. Табиий ҳолда ўсиб турган жойларини сақлаб қолиш лозим.

Манбалар. [35, 159].

Ү. П. Пратов.

Статус 2. Редкий с сокращающимся ареалом эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Однолетнее мясистое растение, ветвящееся от самого основания и редко достигающее высоты 25 см, покрыто короткими оттопыренными волосками. Листья узколинейные, длиной 20–40 мм, снизу выпуклые, сверху плоские. Листочки околоцветника (5) плёнчатые, длиной 6–7 мм, остроконечные. Плоды конические, основания плоские, покрыты длинными спутанными волосками. Цветёт и плодоносит в июле–сентябре.

Распространение. В Наманганской и Ферганской областях: Ферганская долина.

Места обитания. Каменисто-щебнистые почвы предгорий, сухие русла рек.

Численность. Встречается одинично-ми кустами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота и интенсивное сельскохозяйственное освоение территорий, где произрастает вид.

Культивирование. Предпринимались попытки выращивания вида в Ботаническом саду АН РУз, которые, однако, не дали результатов.

Меры охраны. Места произрастания вида необходимо сохранить.

Источники. [35, 159].

У. П. Пратов.

Rare endemic species of the Ferghana valley. It is spread at the Ferghana valley (the Namangan and Fergana regions). Inhabits stony-soils of foothills, dry river-beds. Single shrubs can be found. Limiting factors: Cattle pasturing and the intensive reclamation of lands of these species growing. Measures of protection: it is necessary to reserve these species locations.



баргчалари (5) юпқа, узунлиги 6–7 мм, ўткир учли. Меваси конуссимон, асоси ясси, узун чалкаш туклар билан қопланган. Июль–сентябрь ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Наманган, Фарғона вилоятлари: Фарғона водийсида тарқалган.


Ўсиш шароити. Тоғ этакларида, тошли-шағалли тупроқларда, куруқ ўзанларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари истеъмол қилиши ва ўсимлик тарқалган ерларнинг ўзлаштирилиши оқибатида камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғи тажриба даласида ўстириб кўрилганда ижобий натижага бермаган.



231. БОЧАНЦЕВ ТОШБИЮРГУНИ

Нанофитон Бочанцева / Nanophyton botschantzevii U.P. Pratov

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шанда жуда кичик майдонда сақланиб қолган ниҳоятда камёб, реликт, эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–40 см келадиган, тигиз ёстиқча ҳосил қилиб, ер бағирлаб ўсуви чи сершох бута. Барглари кетма-кет жойлашган, дағал, учи тиканли, узунлиги 6 мм. Гуллари 2–9 тадан, шохчаларнинг учларида жойлашган. Ҳар бир гул биттадан гулолди ва иккитадан гулёнбаргчага эга. Гулқўрғон баргчалари юпқа. Уруғлари тик, узунлиги 4–6 мм. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси октябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: денгиз сатҳидан 1600–2000 м баландликда Чотқол тизмаси (Нуракота, Белдирсой)да тарқалган.

нимаяющиеся, многократно ветвящиеся. Листья длиной до 6 мм, очередные, на верхушке с коротким шипком. Цветки собраны по 2–9 на концах ветвей. Каждый цветок с прицветным листом и 2 прицветниками. Листочки околоцветника плёнчатые. Семена вертикальные, длиной 4–6 мм. Цветёт в июне–июле, плодоносит в октябре.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский хребет (бассейны рек Нураката и Бельдирсай), на высоте 1600–2000 м.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны, среди арчовников и кустарников, преимущественно на открытых местах.

Численность. Сохранились небольшие заросли на площади около 3 га на водоразделе Уйнатай и пятна по 10–20 кустов в ущелье Иргайлисай.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Район интенсивно используется в качестве летних пастбищ.

Культивирование. Посевы семян не дали положительных результатов: всходы во второй половине лета засыхали.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [156–159, 260, 261].

У. П. Пратов.



Ўсиш шароити. Тош-шағалли ёнбағирлар арча ва бутазорларида, асосан, очиқ жойларда ўсади.

Сони. Ўйнатай сувайирғичида кичик майдон (3 гектар атрофи)да ва Иргайлисойда 10–20 тупдан иборат тўплар ҳосил қилиб учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик тарқалган жойлардан чорва моллари учун ёзги ўтлоқ сифатида фойдаланилади.

Маданийлаштирилиши. Уруғидан экилганда ижобий натижада бермаган. Униб чиққан ниҳоллари ёзниң иккинчи ярмида қуриб қолган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.


Манбалар. [156–159, 260, 261].

Ў. П. Пратов.

Статус 2. Чрезвычайно редкий, узколокальный, реликтовый эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Кустарник высотой 20–40 см, образующий довольно крепкую, плотную подушку. Стебли стелющиеся или слегка припод-

Extremely rare, relict endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal range (the Nurekata basin) at the height of 1600–2000 m (the Tashkent region). Inhabits stony-slopes, among the juniper stands and shrubs, mainly in the open places. Small brushwoods are reserved in the area of about 3 ha at the watershed of the Uinatau and patches of 10–20 shrubs in the Irgailisay gorge. Limiting factors: this area is intensively used as the summer pasture lands. Measures of protection: not protected.



232. ДРОБОВ ШЎРАГИ

Солянка Дробова / *Salsola drobovii* Botsch.

Мақоми 3. Фарбий Тянь-Шань ва Олой тизмасидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50–70 см келадиган ярим бута. Бир йиллик пояларининг узунлиги 20 см, оқиш, туксиз, баъзан ғадир-будир. Барглари кетма-кет жойлашган, туксиз, кўкимтири, этли, қалами, узунлиги 1,5–2,5 см, эни 1–1,5 мм, тўмтоқ. Тўпгули ёйик бошоқсимон. Гулкўрғон баргчалари чўзиқтухумсимон ёки чўзиқовал шаклида, узунлиги 4–6 мм, пардасимон, туксиз, рангиз. Уруғи ётиқ жойлашган. Июлда гуллаб, меваси октябрь ойида етилади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Фарғона водийси ва Олой тизмасида тарқалган. Қозоғистон ва Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тош-шағал тупроқли ёнбағирларда, баъзан ола жинсларда ва тоғларнинг қуи қисмида ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда, баъзан эса йирик тўплар ташкил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимликнинг кам уруғ бериси ва уруғидан яхши униб чиқмаслиги, шунингдек, у ўсган жойларда чорва моллари муттасил боқилиши сабабли сони қисқариб кетмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [35, 156–159, 249].

Ў. П. Пратов.

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня и Алайского хребта.

Краткое описание. Полукустарник высотой 50–70 см. Однолетние побеги длиной 20 см, беловатые, голые, реже шероховатые. Листья очередные, неопущенные, сизые, мясистые, линейные, длиной 1,5–2,5 см и шириной 1–1,5 мм, тупые. Соцветие рыхлоколосовидное. Листочки околоцветника удлиненно-яйцевидные или продолговато-ovalные, длиной 4–6 мм, плёнчатые, голые,

неокрашенные. Семена горизонтальные. Цветёт в июле, плодоносит в октябре.

Распространение. Ферганская область: Ферганская долина, Алайский хребет. За пределами Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан.

Места обитания. На каменистых и щебнистых склонах, реже на пестроцветах в нижнем поясе гор.

Численность. Встречается одинично, реже образует заросли.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Слабое плодоношение, низкая всхожесть семян, а также интенсивное использование территории под выпас скота.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не разработаны.

Источники. [35, 156–159, 249].

У. П. Пратов.

Rare endemic species of the western Tien-Shan and Alay range. It is spread at the Ferghana valley, the Alay range (the Ferghana region). Inhabits stony and slopes, seldom outcrops of gypseous rocks in the lower belt of mountains. Single specimens and rarely forms brushwoods can be found. Limiting factors: weak fruiting, low seed germination and also the intensive use lands under cattle pasturing. Measures of protection: not protected.



233. ТИТОВ ШЎРАГИ


Солянка Титова / *Salsola titovii* Botsch.

Мақоми 3. Помир-Олой ва Фарбий Тянь-Шанга хос реликт, эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см га етадиган ярим-бута. Бир йиллик новдалари 20 см га етади, ингичка, қалин туклар билан қопланган. Барглари кетма-кет жойлашган, қалами, узунлиги 0,3-1,5 см, эни 0,5-1 мм, қалин кулранг туклар билан қопланган. Тўпгули бошоқсимон, сийрак гулли. Гуллари кўримсиз, гулқўрғон бўлаклари ва чангчилари 5 тадан. Меваси етилгач, гулқўрғон бўлакларида қанотчалар пайдо бўлади. Меваси ётиқ жойлашган. Июнь-октябрь ойларида гуллаб, урургайди.

Тарқалиши. Тошкент, Самарқанд вилоятлари: Фарбий Тянь-Шанда-Чотқол ва Курара тизмалирида, Помир-Олойда (Гобдунтоғ, Омонқўтонда) тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва пастки қисмида, тош-шағалли ёнбағирларда ўсади.



Сони. Якка-якка ҳолда ёки тўп-тўп бўлиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари боқилишидан зарар кўради.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чотқол қўриқхонаси ва Уғом-Чотқол миллий табиат боғи худудида муҳофаза қилинади. Ўсимлик сақланиб қолган ерларни назорат остига олиш ва ботаника боғларида экиб ўстириш лозим.

Манбалар. [35, 156-159, 249].

Ў. П. Пратов.

Статус 3. Реликтовый эндемик Памиро-Алая и Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Полукустарник высотой 50 см. Однолетние побеги длиной до 20 см, тонкие, покрыты густым опушением. Листья очередные, сероватые от густого опушения, линейные, длиной 0,3-1,5 см, шириной 0,5-1 мм. Соцветия колосовидные с редко расположенными цветками. Цветки невзрачные, листочков околоцветника и тычинок по 5. При плодах на листочках околоцветника развиваются крылья. Семена горизонтальные. Цветёт и плодоносит в июне-октябре.

Распространение. В Ташкентской и Самаркандской областях: Западный Тянь-Шань – Чаткальский и Кураминский хребты; Памиро-Алай – Хобдунтау, Аманкутан.

Места обитания. На каменисто-щебнистых склонах в среднем и нижнем поясе гор.

Численность. Встречается одиночными экземплярами и небольшими зарослями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского заповедника и Угам-Чаткальского национального парка. Необходимо сохранить имеющиеся популяции и культивировать в ботанических садах.

Источники. [35, 156-159, 249].

У. П. Пратов.

Relict endemic species of the Pamir-Alay and western Tien-Shan. It is spread at the western Tien-Shan: the Chatkal and Kurama range; the Pamir-Alay: the Khoobduntau range, Amankutan (the Tashkent and Samarkand regions). Inhabits stony-slopes in the middle and lower belts of mountains. Single specimens can be found. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park. It is necessary to reserved populations and to cultivate in botanical gardens.



234. ХИВА ШЎРАГИ

Солянка хивинская / *Salsola chiwensis* Popov

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг шимолидаги реликт тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–60 см оралигидаги, туксиз ярим бута. Барглари кетма-кет жойлашган, этли, ясси. Тўпгули бошоқсимон. Гулқўргон баргчаларда мевалаган пайтида ҳосил бўладиган қанотчалари юпқа пардасимон, буйраксимон ёки тескари тухумсимон. Июль ойида гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарқалиши. Қоракалпоғистон: Устюрт ва Қизилкум (Султон Увайс тоғ)да тарқалган. Туркманистанда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Кулранг кўнғир гипсли ва оҳакчил тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ҳамда тўплар ҳосил қилиб тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари боқилиши, ҳайдаб ўтилиши натижасида камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чорва молларидан сақлаш керак.

Манбалар. [35, 156–159, 249].

Ў. П. Пратов.

Статус 2. Реликтовый вид Северного Узбекистана.

Краткое описание. Полукустарник высотой 30–60 см, голый. Листья очередные, мясистые, по-

лувальковатые. Соцветие колосовидное, при плодах на листочках развиваются полупрозрачные, почковидные или широко обратнояйцевидные крылья. Цветёт в июле, плодоносит в сентябре.

Распространение. Каракалпакстан: Встречается на склонах Устюрта и в Кызылкумах (Султан Увейсдаг). За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. На серо-бурых гипсованных и мергелистых почвах.

Численность. Встречается как единично, так и в зарослях.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота, скотопрогон.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Необходимо охранять от выпаса скота.

Источники. [35, 156–159, 249].

У. П. Пратов.

Relict species of the northern Uzbekistan. It is spread at the Ustyurt and Kyzylkum (Sultanuizdag), (Karakalpakstan). Inhabits grey-brown gypseous and marl soils. Single specimens as well as brushwoods can be found. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: it is necessary to protect from pasturing.



235. ТЯНЬ-ШАНЬ АНТОХЛАМИСИ

Антохламис тяньшанский / *Anthochlamys tianschanica* Iljin

Мақоми 2. Фарғона водийсида тарқалган кам-еъб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик, сершоҳ ўт ўсимлиқ, бўйи 30–90 см, пастки қисми туксиз, юқори қисми қисқа, жингалак тукли. Гуллари икки жинсли, рўваксимон тўпгулда ўрнашган. Чангчиси 5 та. Гулқўргони пардасимон. Барглари оддий, ясси, пасткилари наштарсимон, бандли, юқорисидагилари қалами, учи ўткир. Гулолди барги наштарсимон, учи ўткир, гулқўргонидан узун, мевасидан кичик. Мевасининг эни 3 мм, учи чуқурчали. Август ва сентябрда гуллаб, мевалайди.

Тарқалиши. Фарғона ва Наманган вилоятлари: Фарбий Тянь-Шань (Фарғона водийсининг шимоли-шарқий, шимоли-фарбий қисми)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмларидаги чағиртошли, тош-чағиртошли тупроқларда ўсади.

Сони. Асосан, якка-якка ҳолда ўсади. Айрим жойларда кичик-кичик тўплар ҳосил қиласди. Сони аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақида маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Кўриқланмайди.


Манбалар. [35, 156–159, 249].

Ў. П. Пратов.

Статус 2. Редкий эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Однолетнее травянистое растение, 30–90 см высоты, ветвящееся от основания, внизу голое, в соцветии густоопушённое короткими курчавыми волосками. Листья простые, плоские, нижние ланцетные, черешковые, верхние линейные, острые. Прицветные ланцетные, острые, длиннее оконоцветника, короче плодов. Цветы обоеполые, собранные в метелку. Тычинок 5. Листочки оконоцветника плёнчатые. Плоды 3 мм ширины с выем-

кой на верхушке. Цветет и плодоносит в августе–сентябре.



Распространение. В Ферганской и Наманганско-вой областях: Западный Тянь-Шань (северо-восточная, северо-западная части Ферганской долины).

Места обитания. На щебнистых и каменисто-щебнистых почвах в предгорьях.

Численность. Встречается одинично и небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [35, 156–159, 249].

У. П. Пратов.



Rare endemic species of the Ferghana valley. It is spread at the Ferghana valley, the western Tien-Shan (the Ferghana region). Inhabits stony and slopes in the lower mountainous zone. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.

236. ФАРГОНА ДОНАШЎРИ

Спайноцветник Ферганский / *Gamianthus ferganicus* Iljin

Мақоми 2. Фарғона водийсида тарқалган кам-ёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик ўт ўсимлиқ, бўйи 5–50 см, асосидан шохланган, қисқа, оддий, ингичка, жингалак тукли, кейинроқ пастки қисми туксизланади. Барглари қарама-қарши ўрнашган, қалами, йўғонроқ, учida узун, бўғимли, эрта тушиб кетадиган бир боғлам тукли, узунлиги 15–20 см, эни 2–2,5 мм. Гулолди барглари қарама-



қарши ўрнашган, қўшилмаган, гулёнбаргчаларидан узун. Гулёнбаргчалари гулқўрғонидан қисқа. Гулқўрғон бўллаклари наштарсимон, узунлиги 4–6 мм, сирти тукли. Чангдони қалами, узунлиги 2,5–3 мм. Июнь–июлда гуллаб, меваси етилади.

Тарқалиши. Наманган ва Фарғона вилоятлари: Фарғона водийсининг шарқий қисмida тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларидағи шўрланган, майда чағиртошли тупроқларда ўсади.

Сони. Табиятда якка-якка ёки кичик жамоалар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ерларнинг дехқончилик қилиш учун ўзлаштирилиши туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақида маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Мухофаза қилинмайди.
Манбалар. [35, 159, 249].

У. П. Пратов.

Статус 2. Редкий эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Однолетнее травянистое растение, 5–50 см высоты, ветвистое от основания, сероватое от густого войлочка из коротких, простых, тонких курчавых волосков, позднее стирающемсяся. Листья супротивные, линейные, толстоватые, на самом верху с туповатым кончиком, несущим пучок прямых, длинных, членистых, рано опадающих волосков, 15–20 мм длины и 2–2,5 мм ширины. Прицветные супротивные, несрастающиеся, длиннее прицветников. Прицветники короче околоцветника. Листочки околоцветника ланцетные, 4–6 мм длины, по спинке опущенные. Пыльники линейные, 2,5–3 мм длины. Цветет и плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Ферганской и Наманганской областях: на востоке Ферганской долины.

Места обитания. На засоленных щебнистых склонах предгорий.

Численность. Встречается одиночными экземплярами или небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение земель под сельхоз культуры.

Культтивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [35, 159, 249].

У. П. Пратов.

Rare endemic species of the Ferghana valley. It is spread at the eastern part of the Ferghana valley (the Ferghana region). Inhabits salty slopes in the lower mountainous zone. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.



ЯЛПИЗДОШЛАР (ЛАБГУЛДОШЛАР) ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО ЯСНОТКОВЫЕ (ГУБОЦВЕТНЫЕ) - LAMIACEAE (LABIATAE)

237. ОЛЬГА БОЗУЛБАНГИ Зайцегуб Ольги / *Lagochilus olgae* Kamelin

Мақоми 2. Нурота тизмасидаги камёб эндемик ўсимликтің.

Қисқача тавсифи. Яримбутача, бўйи 20–50 см. Поялари кўп, оддий ёки шохланган, барглари қалин. Барглари кенг тухумсимон, асоси понасимон, патсимон бўлмали, томирлари бўртиб туради. Гуллари бандсиз, узунлиги 25–28 мм, учки баргларининг қўлтиқларида 4–6 тадан ярим халқа бўлиб жойлашган. Гулолди баргчалари ўткир, бигизсимон, юқорига қараб қайрилган, косачага ёпишган. Косачаси тор қўнғироқсимон, узун, ўткир учли, қалами-наштарсимон, найдасига тенг ёки ундан сал узун, вегетациянинг охирида паст-

Статус 2. Редкий эндемик Нурагау.

Краткое описание. Полукустарничек высотой 20–50 см. Листья широкояйцевидные, в основании клиновидные, перисто-лопастные, с выступающими жилками. Цветки длиной 25–28 мм, сидячие, расположены в 4–6-цветковых полумутовках в пазухах верхних листьев. Чашечка узроколокольчатая, с длинными заостренными линейно-ланцетными зубцами. Венчик белый. Цветёт в конце мая–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Джизакской, Навоийской и Самаркандинской областях: хребет Нурагау.

Места обитания. Произрастает на каменисто-щебнистых склонах нижнего и среднего пояса гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Нурагинского государственного заповедника.

Источники. [18, 107, 159].
Н. Ю. Бешко.

га қараб эгилади, тишчали. Гултожи оқ. Май ойининг охири – июлда гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Нурота тизмасида ўсади (Жиззах, Навоий ва Самарқанд вилоятлари).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмларидаги тош-чағиртошли ёнбағирларда турли ўт-шувоқли, йирик ўт ва ярим буталардан иборат тўпларда ўсади.

Сони. Кам учрайди. Якка-якка ҳолда ёки кичик гурухлар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Табиатда ўта кам учраши тахмин қилинади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота давлат кўриқхонасида муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [18, 107, 159].

Н. Ю. Бешко.

Rare endemic of the Nuratau range. It is spread at the Nuratau range (the Djizakh, the Navoi and Samarkand regions). Inhabits stony slopes of the low and middle mountainous zone. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



238. ПРОСКОРЯКОВ БОЗУЛБАНГИ

Зайцегуб Проскорякова / *Lagochilus proskorjakovii* Ikramov

Мақоми 1. Нурота тизмаси учун ўта камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Ярим бутача, бўйи 20–35 см. Поялари оддий ёки шохланган, сийрак, қисқа тукли. Барглари майда, кенг тухумсимон, 3–5 бўлмали, асоси понасимон, тарвақалайган тукли, узун бандли. Гуллари 4–6 тадан шохларининг учидаги баргларнинг қўлтиқларида ярим халқа бўлиб ўрнашган. Гулёнбаргчаларининг учи ўткир, учбурчак бигизсимон, ташқарига қараб сал эгилган. Косачаси 10–15 мм узунлиқда, тор қўнфироқсимон, воронкасимон кенгайган, қайтақиси кенг қўнфироқсимон, тишчаси текис жойлашган, кенг учбурчаксимон, ташқарисига сал эгилган, қисқа хамда безчали туклар билан қопланган. Гултожи оқ. Июнь–июлда гуллаб, меваси июль–августда этилади.

Тарқалиши. Нурота тизмасида тарқалган (Жиззах ва Самарқанд вилоятлари).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги қуруқ, тош-чағиртошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Жуда кам тарқалган, якка-якка ҳолда ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Шароитнинг ноқулайлигидан кам учраса керак.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.


Муҳофаза чоралари. Нурота давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади. Ўсимлик популяциярини аниқлаш ва хариталаш, табиий ва маданий шароитда унинг биоэкологик хусусиятларини ўрганиш талаб этилади.

Манбалар. [104, 320].

Х. Ф. Шомурадов.

Статус 1. Чрезвычайно редкий, узкий эндемик Нуратау.

Краткое описание. Полукустарничек высотой 20–35 см. Листья мелкие, широкояйцевидные, 3–5-лопастные, в основании клиновидные, с оттопыренными волосками. Цветки расположены в 4–6-цветковых полумутовках в пазухах верхних листьев. Чашечка 10–15 мм длиной, узко колокольчатая, воронкообразно расширенная, с широко колокольчатым отгибом и почти горизонтально отклоненными широко треугольными зубцами, покрыта короткими волосками и еди-



ничными железками. Венчик белый с грязноватым оттенком. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Джизакской и Самаркандинской областях: хребет Нуратау.

Места обитания. Произрастает на сухих каменисто-щебнистых склонах среднего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко, спорадически, единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены. Вероятно, вид имеет низкую численность в силу естественных причин.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Нуратинского государственного заповедника. Требуется выявление и картирование локальных популяций вида, контроль за их состоянием и эколого-биологическое изучение вида в природе и в культуре.

Источники. [104, 320].

Х. Ф. Шомурадов.

Rare endemic of the Nuratau range. It is spread at the Nuratau mountains (the Djizakh and Samarkand regions). Inhabits stony slopes of the middle mountainous zone. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.

239. ВВЕДЕНСКИЙ БОЗУЛБАНГИ

Зайцегуб Введенского / *Lagochilus vevedenskyi* Kamelin et Zuckerw.

Мақоми 3. Фақат Қызылқұмда учрайдиган эндемик ўсимлик.

Қисқача тасифи. Бүйі 20–25 см га етадиган ярим бута. Барглари пояда қарама-қарши жойлашган, кенг-тухумсімон, бүртіб чиққан ійғон томирли, пастки қисми оддий, шаффоф тукли. Пояси оқ, оддий тукли. Гули оч пушти рангли, узунлиги 25–28 мм, 2–4 тадан бўлиб поянинг юқори қисмидаги баргларининг қўлтиқларида жойлашган. Косачаси қўнғироқсімон, учи тиканили. Июнда гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Бухоро, Навоий вилоятлари: Қызылқұмдаги қолдик тепаликлар (Кулжуктоғ, Қинғиртоғ, Бўкантот, Оқтоғ)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Якка-якка ҳолда ўсади.

Сони. Кам учрайди. Бир гектар ерда 1200 тупгача учратиш мумкин.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари боқилиши ва ҳайдаб ўтилиши натижасида камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши.

Маълумотлар йўқ.


Муҳофаза чоралари. Ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [116, 320].

Х. Ф. Шомурадов.

Статус 3. Узколокальный эндемик останцов Кызылкума.

Краткое описание. Полукустарник высотой до 20–25 см. Листья супротивные, широкояйцевидные, с выдающимися жилками, опущенные (нижняя сторона) простыми, прозрачными волосками. Стебель белый, опущенный простыми волосками. Цветки беловато-розовые, длиной 25–28 мм, по 2–4 в пазухах верхних листьев. Чашечка колокольчатая, оканчивается колючими шипами. Цветёт в июне, плодоносит в июле–августе.



Распространение. В Бухарской и Навоийской областях: останцовые возвышенности Кызылкума: Кульжуктау, Кингиртау, Букантау, Актау.

Места обитания. Эродированные склоны.

Численность. Нет сведений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Скотоводство и выпас.

Культтивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не разработаны.

Источники. [116, 320].

Х. Ф. Шомурадов.

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Kuljuktau, the Kingirtau, the Bukantau, the Aktau (the Bukhara and Navoi regions). Inhabits opened slopes. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



240. САРХУШ БОЗУЛБАНГ

Зайцегуб опьяняющий / *Lagochilus inebrians* Bunge

Мақоми 3. Фарбий Помир-Олой ва Жанубий Қизилқумнинг қолдиқ тоғларида камайиб бораётган эндемик ўсимлик.

Қисқача тасвиfi. Бўйи 30–60 см оралиғидаги поялари оддий ёки сершоҳ ярим бута. Барглари кенг-тухумсимон 3–5 бўлакли. Тожбарги оқиши. Гуллари пояларининг юқори қисмидаги 4–6 тадан бўлиб ўрнашган. Косачаси чўзиқ қўнғироқсимон. Ёнғоқчалиси туксиз, сарғиш кулранг. Июнь–августда гуллаб, меваси июль–сентябрь ойларида етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд, Навоий ва Бухоро вилоятлари: Нурота тоғи этаклари, Зирабулоқ, Зиёвуддин тоғи, Зарафшон ҳамда Туркестон тизмалари, шунингдек, Қизилқумдаги Кулжуктоғ, Кўкчатов ва Томдитоғда тарқалган.


Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1200 м гача баландликдаги соз ҳамда шағалли соз тупроқларда шувоқ ба бошқа турлардан ҳосил бўлган ўсимлик гурухларида учрайди.

Сони. Табиатда онда-сонда ва кичик туплар ҳосил қилиб тарқалган. Энг зич туплари Нурота ва Оқтоғларда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайди. Уруғи 5–7 йил мобайнинда унувчланлигини йўқотмайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Намгарчиликнинг этишмаслиги, чорва моллари томонидан пайхон қилиниши ва кўп йиллар мобайнинда катта миқдорларда йиғиб олининиши сони ва ареалига катта зарар етказган.

Маданийлаштирилиши. 1957–1960 йиллар мобайнинда Самарқанд вилоятида 2 га ерда экиб ўстирилган. 1960 йилдан бўён ЎзРФА Ботаника боғида экилиб келинади.



Муҳофаза чоралари. Нурота қўриқхонасида муҳофаза қилинади. Уни йиғиб олишни қатъий чеклаш, табиий ҳолда тикланишига кўмаклашиш зарур.

Манбалар. [103, 116, 320].

Н. Ю. Бешко.

Статус 3. Редкий узкий эндемик Западного Памира-Алая и останцовых гор Кызылкума.

Краткое описание. Прямостоячий полукустарник высотой 30–60 см. Стебли простые или ветвистые. Листья широкояйцевидные, 3–5-раздельные. Венчик белый, с грязноватым оттенком. Цветки расположены по 4–6 в верхней части стебля. Чашечка узкоколокольчатая. Орешки голые, желтовато-серые. Цветёт в июне–августе, плодоносит в июле–сентябре.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской, Навоийской и Бухарской областях: предгорья Нуратинских гор, Зирабулакские и Зиатдинские горы, Зарабшанский и Туркестанский хребты; Кызылкумы – Кульджуктау, Кокчатау и Тамдытау.

Места обитания. Глинистые, чаще глинисто-щебнистые почвы подгорных равнин и предгорий до 1200 м над уровнем моря.

Численность. В природе встречается спорадически и небольшими группами. Наибольшая плотность популяций в Нуратау и Актау.

Размножение. Семенное. Семена сохраняют всхожесть на протяжении 5–7 лет.

Причины изменения численности и ареала. Недостаток атмосферной влаги, вытаптывание скотом, усиленная заготовка.

Культивирование. В 1957–1960 гг. в Самаркандской области произведены опытные посевы на площади 2 га. С 1960 года успешно культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике. Необходимо строго ограничить сбор, содействовать восстановлению естественных запасов.

Источники. [103, 116, 320].

Н. Ю. Бешко.

Rare endemic species of the western Pamir-Alay and Kyzylkum. It is spread at the Nuratau, the Zirabulak and Ziadin mountains, the Zaravshan and Turkestan ranges; the Kyzylkum: the Kuldjuktau (the Djizak, the Samarkand, the Navoi and Bukhara regions). Inhabits clayish, frequently clay- soils of foothills up to 1200 m. In nature, it is found sporadically and in small groups. The most dense populations are in the Nuratau and Aktau. Limiting factors: lack of atmospheric moisture, cattle trampling down, intensive feedstocks. Measures of protection: reserved in the Nuratau state reserve. It is necessary to limit collection, to promote the reestablishment of natural stock.

241. АЖОЙИБ БЎЗБОШ

Змееголовник прекрасный / *Dracoscephalum formosum* Gontsch.

Мақоми 3. Ҳисор тизмасидаги кам учрайдиган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–40 см келадиган кўп йиллик ўт. Барглари юмалоқ ёки тухумсимон, четлари текис ёки кунгурали, ёпирма баргларининг банди япрогидан уч баробар узун. Пояси камбаргли. Гули пушти-бинафша рангли, устки томониг (сири) сертук. Гуллари поянинг учидаги зич тўпгул ҳосил қиласди. Июль-августда гуллаб, меваси август-сентябрда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор тизмаси (Қизилсув дарёси ҳавзаси – Қизилгаза довони, Чўлбайир тоги ва Тўпаланг дарёси ҳавзаси)да тарқалган. Тоҷикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғлардаги дарё ва ирмоқларнинг ёқаларида ҳамда булоқларнинг атрофларида ўсади.

Сони. Кам тарқалган, фақат еттита жойда борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг булоқ атрофларида ва дарё бўйларида кўплаб боқилиши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат кўриқхонасида муҳофаза қилинади. Ўсимликини

юлиш ёки қазиб олишни тақиқлаш ҳамда маданийлаштириш мақсадида унинг биологик хусусиятларини ўрганиш зарур.

Манбалар. [8, 159].

И. И. Мальцев.

Статус 3. Редкий эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 15–40 см. Листья округлые или яйцевидные, цельнокрайние, городчатые, прикорневые, на длинных (в 3 раза длиннее листьев) черешках. Стебли рыхлооблистственные. Цветки розово-лиловые, снаружи пушистые, в плотных головчатых соцветиях на верхушках стеблей. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский хребет – бассейн реки Кзылсу – около перевала Кзылгаза, горы Чульбаир, бассейн реки Тупаланг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Берега горных ручьёв, родников и речек в верхнем поясе гор.

Численность. Немногочислен, отмечен в 7 местах.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Вытаптывание берегов родников и рек, чрезмерный выпас скота. Высокодекоративное растение.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике. Необходимы: запрещение сбора и выкопки растений; изучение биологических особенностей с целью введения в культуру.

Источники. [8, 159].

И. И. Мальцев.

Rare endemic species of the Hissar range.

It is spread at the Hissar range: the Kyzylsu river basin: near the Kyzylgaza passage, the Chulbaир Mountains, the Tupalang river basin (the Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits watersides of mountain streams, springs and rivers in the mountain belt. Population is not numerous, found in 7 points. Limiting factors: overgrazing, trampling down of watersides of springs and rivers. Very ornamental plant. Measures of protection: protected in the Hissar state nature reserve. It is necessary to forbid collection and digging up of plants, to study biological characteristic features for the purpose of their introduction into cultivation.



242. КОМАРОВ БЎЗБОШИ

Змееголовник Комарова / *Dracocerphalum komarovii* Lipsky

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шань ва Помир Олайдаги ареали бўлинган, камайиб бораётган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–20 см оралигидаги кўп ийллик ўт. Барги учбурчак-тухумсимон, учи ўткир, асоси юраксимон, четлари текис, қалин, қисқа тукли, қисқа бандли, юқоридагилари бандсиз. Пояси кўп, пастки қисми ёғочланувчан, тик ёки бироз қийшайган. Гули поянинг юқори қисмидаги баргларнинг кўлтиғида биттадан қисқа бандларда ўрнашган. Тожбарги сариқ. Июль–августда гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Чотқол тизмаси (Қизилнурга тоғи, Майдонтол ва Қорабулоқ дарёлари воҳалари ҳамда Орашон донни), Қурама тизмаси (Лашкарак, Гушсой)да тарқалган. Қозогистон, Қирғизистон ва Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори қисмida, тошшағалли тупроқларда ўсади.

Сони. Табиий заҳиралари кам бўлиб, бир-биридан ажралган тўплар ҳосил қилган ҳолда ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маҳаллий аҳоли гуллаб турган пайтида доривор ўсимлик сифатида кўплаб йиғиб олади. Ёз фаслида эса бу ерларда чорва моллари боқилади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсимлик тарқалган майдонларнинг бир қисми Чотқол биосфера қўриқхонаси ва Угом-Чотқол миллый табиат боғи ҳудудида бўлиб, муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [8, 159].

И. И. Мальцев.


Статус 2. Эндемик Западного Тянь-Шана и Памиро-Алая с сокращающимся разорванным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 10–20 см. Листья треугольно-яйце-

видные, острые: при основании слабосердцевидные, цельнокрайные, очень коротко-густопушистые, кроткочерешковые, верхние – сидячие. Стебли многочисленные, при основании древеснеющие, прямые или слегка восходящие. Цветки по 1 в пазухах верхних листьев на очень коротких цветоножках. Венчик желтоватый. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Ташкентской и Наманганская областях: Чаткальский и Кураминский хребты – горы Кызылнур, верховья рек Майдантал, Карабулак и перевал Арашан, бассейны рек Лашкерек и Гушсай. За пределами Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Места обитания. Каменисто-щебнистые почвы в верхнем поясе гор.



Численность. Природные запасы незначительны. Встречается небольшими, изолированными друг от друга группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивный сбор населением надземной части растений во время цветения в качестве лекарственного средства. Усиленное использование территории под отгонное пастбище.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Часть площадей, занятых этим растением, расположена на территории Чаткальского биосферного заповедника и Угам-Чаткальского национального парка и находится под охраной.

Источники. [8, 159].

И. И. Мальцев.

Endemic species of the western Tien-Shan and Pamir-Alay with the reducing area. It is spread at the Chatkal and Kurama ranges (the Tashkent, the Namangan regions).

Inhabits stony- soils in the upper belt of mountains.

Natural stock is insignificant. Can be met in small, isolated from each other groups. Limiting factors: the intensive gathering of the above ground parts of plants by native population during its flowering as medicinal plant. The intensive use of lands under distant pastures. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere state reserve, the Ugam-Chatkal national park.



243. ТИКАНЛИ БЎЗБОШ

Змееголовник колючий / *Dracocerphalum spinulosum* Popov

Мақоми 3. Фарбий Тянь-Шанда кичик майдонларда сақланиб қолган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25 см га етадиган кўп йиллик ўт. Барглари тухумсимон, пасткилари барвақт сўлийди, қаттиқ, ғадир-будир, тукли, барг банди қисқа. Пояси тўрт қиррали. Гуллари 2-6 тадан поядга ҳалқа шаклида жойлашган, оқиш ёки оч қизғиши рангли. Июль-август ойида гуллаб, меваси август-сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Фарбий Тянь-Шаннинг Угом, Писком, Чотқол тизмаларида тарқалган. Қозоғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тошли ва нураган шағалли тоғ ёнбағирларда, сийрак арчазорлар орасида, кўпроқ очиқ жойларда ўсади.

Сони. Якка-якка, туплари бир-биридан ажралган ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бошқа ўсимликлар билан рақобатга бардош бера олмаслиги ва чорва моллари томонидан пайхон қилиниши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера кўриқхонасида ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза этилади.

Манбалар. [8, 159].


И. И. Мальцев.

Статус 3. Редкий узколокальный эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 25 см. Листья яйцевидные, нижние рано увядающие, жесткие, шероховато-опущенные, на очень коротких черешках. Стебли четырехгранные. Цветки (2-6) собраны в мутовки, беловатые или бледно-кирпично-красноватые. Цветёт в июле-августе, плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Западный Тянь-Шань: Угамский, Чаткальский, Пскемский хребты. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Каменистые, сильно эродированные ощебненные склоны гор, среди разреженных арчовников, преимущественно открытые места.



Численность. Встречается единично, спорадически, изолированно друг от друга.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Низкая конкурентоспособность, вытаптывание скотом.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется Чаткальском биосферном заповеднике и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [8, 159].

И. И. Мальцев.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the western Tien-Shan: the Ugam, the Chatkal and Pskem ranges (the Tashkent region). Inhabits stony, strongly eroded slopes on mountains, among thinned juniper stands, mainly opened places. Single specimens sporadically isolated from one another can be found. Limiting factors: low competition capacity, cattle trampling down. Measures of protection: protected in the Chatkal state biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park. Control of number and introduction into cultivation are required.

244. ИПАКСИМОН КЎКАМАРОН

Шлемник шелковистейший / *Scutellaria holosericea* Gontsch. ex Juz.

Мақоми 1. Фарбий Помир-Олайдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 45 см гача етадиган кўп пояли, қалин туклар билан қопланган ярим-бута. Барглари йирик, узунлиги 4 см, учбурчак тухумсимон, четлари тишсимон ўйилган, майин тукли. Тўпгули узун, шохланган. Гуллари қисқа бандли, биттадан гулолди баргларининг қўлтиғига ўрнашган. Тожи оч ҳаворанг, пастки лабида бинафша рангли доғлари бор. Июнь-июлда гуллаб, июль-август ойларида меваси етилади.

покрытой фиолетовыми пятнышками нижней губой. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – бассейн реки Тупаланг – правобережье её притоков (Хурватан, Шатрут), юго-западный склон Культепасая.

Места обитания. Гранитные скалы в верхнем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.



Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси (Тўпаланг дарёсининг Хурватан ва Шатрут ирмоқларининг ўнг қирғоқлари ҳамда Култепасойнинг жануби-тарбий ёнбағирлари)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмида гранитли қояларда ўсади.

Сони. Жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [4, 159, 355].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий узкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Полукустарник высотой до 45 см, стебли многочисленные, густоопущенные. Листья крупные, длиной до 4 см, треугольно-яйцевидные, городчато-зубчатые, бархатистоопущенные. Соцветие удлинённое, ветвистое. Цветки на очень коротких цветоножках, по 1 в пазухах прицветных листьев. Венчик голубовато-сиреневый,

Причины изменения численности и ареала.

Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [4, 159, 355].

Ф. О. Хасанов.

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Tupalang river basin - right-bank of its tributaries (Khurvatan, Shatрут), the south-western slope of the Kultepasay (the Surkhandarya region). Inhabits granite rocks in the upper belt of mountains. Specimens rarely can be found. Measures of protection: not protected.



245. МОМИҚ КҮКАМАРОН

Шлемник мохнатейший / *Scutellaria villosissima* Gontsch. et Juz.

Мақоми 2. Ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимликтің.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Поялари кўп, ингичка, узун бўғимли, ёпишқоқ, эгри-бугри туклар билан қопланган. Барглари деярли юмалоқ, четлари йирик тишли, ҳар икки томони узун тукли. Гуллари қисқа бандли, гулолди баргчалар қўлтиғида биттадан ўрнашган. Тожбарглари оч кўк рангли, узунлиги 25 см. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси (Сангардак дарё ҳавзасидаги Боғча қишлоғидан Қизилсойгача, Оқсув дарёсининг ўрта оқими)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларниниг юқори қисмидаги ёнбағирларида ўсади.

Сони. Маълумотлар йўқ.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.



Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [4, 159, 355].
Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Редкий узкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 30 см. Стебли многочисленные, тонкие, густо покрыты длинными, членистыми, извилистыми, клейкими волосками. Листья почти округлые, по краю крупнозубчатые, с обеих сторон покрыты длинными волосками. Цветки на коротких цветоножках, по 1 в пазухах прицветных листьев. Венчик светло-синий, длиной до 25 мм. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – бассейн реки Сангардак от кишлака Бахча до Кизилсая, правый берег реки Аксу в среднем течении.

Места обитания. Слоны в верхнем поясе гор.

Численность. Сведений нет.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры не разработаны.

Источники. [4, 159, 355].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Sangardak river basin nearby the villages Bakhcha to Kizilsay, the right bank of the Aksu river in the middle reaches (the Surkhandarya region). Inhabits slopes in the upper belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



246. ТОМЧИ КҮКАМАРОН

Шлемник капельный / *Scutellaria guttata* Nevska ex Juz.

Мақоми 2. Фарбий Помир-Олойдаги йўқолиш арафасида турган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп пояли, қалин тукли, ғовак ёстиқ шаклидаги ярим бута. Бир йиллик шохлари ингичка, узунлиги 10 см, сербарг, пастки қисми пахмоқ тукли. Барглари кенг тухумсимон, деярли текис қиррали, ҳар икки томони сийрак тукли. Гуллари биттадан барг кўлтиғида ўрнашган. Тожбарглари сариқ рангли, узунлиги 28 мм. Июнь-августда гуллаб, меваси июль-сентябрь ойларида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси – Тўпаланг дарёси ҳавзаси – Ҳурватан, Зевар, Қўштут қишлоқлари, Шатрут ва Тамшуш дарёларининг қўйилиши ҳамда Сангардак дарёси воҳасидаги Сангардак ва Боғча қишлоқлари атрофларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисми ёнбағирларида ва очиқ қумтошларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши унга салбий таъсир кўрсатмоқда.



Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [4, 159, 355].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Находящийся на грани исчезновения узкий эндемик западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Полукустарник рыхлоподушкообразный, многостебельный, густоволосистый. Годичные побеги тонкие (до 10 см), густолистственные, в нижней части мохнатые. Листья широкояйцевидные, почти цельнокрайные, с обеих сторон негустоволосистые. Цветки по 1 в пазухах листьев. Венчик жёлтый, длиной до 28 мм. Цветёт в июне-августе, плодоносит в июле-сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – бассейн реки Тупаланг – окрестности кишлака Ҳурватан, между кишлаками Зевар и Күштут, у слияния рек Шатрут и Тамшуш, бассейн реки Сангардак – окрестности кишлака Сангардак и Бахча.

Места обитания. Обнажения песчаников и склоны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры не разработаны.

Источники. [4, 159, 355].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Tupalang river basin – nearby the villages Khurvatan, Zevar and Kshtut, the Shatrut and Tamshush rivers, the Sangardak: nearby the villages Sangardak and Bakhcha (the Surkhandarya region). Inhabits outcrops of sandstones and slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: not protected.



247. ФЕДЧЕНКО КҮКАМАРОНИ

Шлемник Федченко / *Scutellaria fedtschenkoi* Bornm.

Мақоми 3. Жануби-гарбий Помир-Олой тоғларидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см га етадиган кўп йиллик ўт. Поялари кўп, ингичка. Барглари кўкимтири, деярли юмалоқ, тўмтоқ, туксиз. Гуллари қисқа бандли, поя ва шохларининг учларида бир томонлама сийрак тўпгул ҳосил қиласди. Тожбарги тўқ ҳаворанг. Июнь-июлда гуллаб, меваси июль-август ойларида етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор тизмасида (Ғузор ва Шеробод шаҳарлари оралиғи, Шўроб ва Дарбанд қишлоқлари атрофи, Бўзгалахона дараси, Тўпаланг дарёси воҳаси, Бойсунтоғ) тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмида оҳактош қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [4, 159, 355].

Ф. ў. Ҳасанов.

Статус 3. Редкий узкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 50 см. Стебли многочисленные, тонкие. Листья сизоватые, почти округлые, тупые, голые. Цветки на коротких цветоножках, образуют рыхлые однобокие соцветия на верхушке стеблей и ветвей; венчик тёмно-голубой. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.



Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский хребет; между городами Гузар и Шерабад, окрестности кишлаков Шураб и Дербент, ущелье Бузгалахана; долина реки Тупаланг, Байсунтау.

Места обитания. Трецины известняковых скал в среднем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры не разработаны.

Источники. [4, 159, 355].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range; between Guzar and Sherabad, the surroundings of the villages Shurab and Derbent, the Buzgalakhana gorge; the Tupalang valley, the Baysuntau (the Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits clefts of lime-stony rocks in the middle belt of mountains. Specimens very rarely can be found. Measures of protection: not protected.



248. ҚАЙРИЛГАН КҮКАМАРОН

Шлемник изогнутый / *Scutellaria colpodea* Nevski

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Хивчинсимон, кулранг поали ярим бутача, баландлиги 30–60 см. Барглари ажинли, тухумсимон, түмтоқ, бутун, узунлиги 1,5–2 см.

Гуллари биттадан гулолди баргларининг қўлтиғида ўрнашган, сийрак тўпгул ҳосил қиласиди. Косачаси 2–3,5 мм узунликда, 2 паллали бўртмаси бор. Гултожи сарик, қалин тукли, узунлиги 18–23 мм, ташқи томони қўнғир-тўқ қизил рангли. Ёнғоқчаси тукли.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор тизмасининг ғарбий тармоқлари, Бойсун тоғлари, Кўҳитанг ва Боботоғда тарқалган.

Ўсиш шароити. Ола жинсларда ўсади.

Сони. Кўҳитангда 500 га яқин тупи борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ола жинсли ерларнинг қисқариши ва кўп микдорда чорва боқилиши туфайли қисқариб кетган.

Маданийластирилиши.

Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [4, 159, 310, 355].



Ф. ў. Ҳасанов.

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Полукустарничек с серыми прутьевидными стеблями 30–60 см высоты. Листья от вдавленных жилок морщинистые яйцевидные, тупые, цельнокрайние 1,5–2 см длины. Цветы по одному в пазухах прицветных листьев образуют рыхлое соцветие. Чашечка 2–3,5 мм длины с двуловастным прицветником. Венчик желтый густо пушистый 18–23 мм длины, снаружи с коричнево-пурпурным оттенком. Орешки пушистые. Цветет в июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: западные отроги Гиссарского хребта, Байсунские горы, Кугитанг и Бабатаг.

Места обитания. Пестроцветные толщи.

Численность. В 2009 г. зарегистрировано около 500 растений в Кугитанге.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение площади пестроцветов и выпас.


Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [4, 159, 310, 355].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the western branches of the Hissar range, the Baysun mountains, the Kughitang and Babatag (the Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits gypseous slopes. 500 plants were registered in 2009. Limiting factors: decreasing of natural habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.



249. ЗЕБО МАРМАРАК

Шалфей замечательный / *Salvia insignis* Kudr.

Мақоми 1. Жаңубий Ўзбекистонда ўсадиган жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40 см га етадиган тик пояли кўп йиллик ўт. Барглари, асосан, илдиз бўғизида жойлашган, тухумсимон, четлари икки карра тишсимон бўлинган, узун бандли. Гуллари пушти рангли, узунлиги 30-35 мм. Меваси 4 та ёнгоқчага ажралади. Ёнгоқчаси эллипссимон, яшилроқ рангли, уч қиррали, узунлиги 3 мм. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Боботоғ ва Бешарча тоғларида (Гармбулоқ ва Қашқакудуқ атрофлари) тарқалган. Жаңубий Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиши шароити. Тоғнинг пастки қисмидаги ола жинсларда, оҳактошли ҳамда гипсли ёнбағирларда ва сурималарда ўсади.

Сони. Бу тур табиатда жуда кам сақланиб қолган бўлиб, умумий сони 1000 тупдан ошмайди. Йўқолиб кетиш хавфи остида.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик тарқалган ерларда чорва молларининг кўплаб боқилиши туфайли унинг сони қисқариб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Боботоғ ўрмон хўжалиги худудида (Бешарча тоғлар) буюртмахона ташкил қилиш ва ўсимликни маданийлаштириш лозим.

Манбалар. [111, 191-193, 238, 260].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 1. Очень редкий эндемик Южного Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 40 см. Стебель прямой. Листья почти все прикорневые, яйцевидные, по краю дважды городчатые, длинночерешковые. Цветки розовые, длиной 30-35 мм. Плод дробный, распадающийся на 4 орешка. Орешки зеленоватые, эллипсоидальные, трёхгранные, длиной 3 мм. Цветёт в мае, плодоносит в июне.



Распространение.

Сурхандарьинская область: Горы Бабатаг и Бешарча. За пределами Узбекистана: Южный Таджикистан.

Места обитания.

Выходы пестроцветных пород, известняковые и гипсированные склоны и осьпи в нижнем поясе гор.

Численность.

Вид малочислен, находится под угрозой исчезновения. Общее число особей не превышает 1000 экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Скотопрогон и выпас.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны.

Необходимы организация заказника на территории Бабатагского лесхоза (горы Бешарча), введение в культуру.

Источники. [111, 191-193, 238, 260].

К. Ш. Тожибаев.

Very rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the Babatag and Besharcha mountains (the Surkhandarya region). Inhabits outcrops of gypseous rocks, lime-stony and gypsum slopes and mounds in the lower belt of mountains. Species are not numerous, endangered. Total number of plants does not exceed 1000 specimens. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: it is necessary to organize the state reserve in the territory of the Babatag forestry (the Besharcha mountains), to introduce into cultivation.



250. КОРОЛЬКОВ МАРМАРАГИ

Шалфей Королькова / *Salvia korolkovii* Regel et Schmalh.

Мақоми 3. Фарбий Тянь-Шанга хос камёб энде-мик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см га етадиган, тик ўсуви, оқ момиқ тукли ярим бута. Барглари, асосан, ёпирма барглардан иборат, кенг наштарсимон поядагилари 2–3 жуфт, устки томони сийрак, остики томони эса оқ момиқ тукли. Гуллари 2–10 тадан мураккаб сохта ҳалқа ҳосил қилиб ўрнашган. Косачаси кенг қўнфироқсимон, икки лабли, пардасимон, йўғон томирли. Тожбарглари сарик, узунлиги 25–33 мм. Меваси 4 та ёнгоқчага ажралади. Июнда гуллаб, меваси июль ойида етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Қоржонтов, Уғом ва Кўксув тизмаларида ҳамда Чотқол тизмасининг молигарбидаги тарқалган.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1200–1500 м баландликда соз тупроқли нураган ёнбағирларда, тик қизил созларда ўсади.

Сони. Тарқалиш майдонларининг чегараланглиги сабабли, табиий захиралари кам. Умумий сони 20 000 тупдан иборат. 200 га яқин популяцияси мавжудлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши ва янги ерларнинг ўзлаштирилиши.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида экилган.

Мухофаза чоралари. Уғом-Чотқол миллий табиат боғида учрайди. Махсус мухофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [111, 191–193, 238, 260, 293].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Прямостоячий полукустарник высотой до 50 см. Стебли прямые, бело-паутинисто-войлочные. Листья преимущественно прикорневые, широколанцетные, стеблевых 2–3 пары, сверху рассеянно опущенные, снизу густо бело-паутинисто-войлочные. Соцветие ветвистое, цветки собраны по 2–10 в ложные мутовки. Чашечка двугубая, плёнчатая, с выдающимися жилками, ширококолокольчатая. Венчик жёлтый, длиной 25–33 мм. Плод дробный, распадающийся на 4 орешка. Цветёт в июне, плодоносит в июле.



Распространение. Ташкентская область: хребты Каржантау, Угамский и Коксуйский; северо-западные отроги Чаткальского хребта.

Места обитания. Глинистые эродированные склоны и крутие обнажения красных глин, где образует самостоятельные ценозы, на высоте 1200–1500 м.

Численность. Из-за ограниченности площади распространения природные запасы незначительны. Известно около 200 локальных популяций общей численностью не более 20 000 особей.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Основной фактор изменения численности – антропогенный.


Культивирование. Успешно индуцирован в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Встречается на территории Угам-Чаткальского национального парка. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [111, 191–193, 238, 260, 293].

К. Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Karzhantau, the Ugam and Koksu ranges; the Chatkal range (the Tashkent region). Inhabits clayish eroded slopes and steep outcrops of red clays, where it forms the independent cenoses (700-1500 m). Natural stock is insignificant, about 200 populations are known. Total number is about 20000 plants. Limiting factors: anthropogenic factor is the main factor of decreasing. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



251. МАРГАРИТА МАРМАРАГИ

Шалфей Маргариты / *Salvia margaritae* Botsch.

Мақоми 2. Олой тизмасидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см га етадиган ярим бута. Поялари кўп, асосидан шохланган. Барглари майда, наштарсимон, бандсиз. Косача баргларининг узунлиги 18 мм, бинафша рангли, безчасимон тукли. Тожбарглари тўқ бинафша рангли, безчасимон тукли, узунлиги 30–40 мм. Июнда гуллаб, меваси июль ойида етилади. Манзарали ҳамда доривор ўсимлик.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Олой тизмасидаги Шоҳимардон дарёси воҳасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмида

шешнанна, железистоволосистая. Венчик тёмно-фиолетовый, железистоволосистый, длиной 30–40 мм. Цветёт в июне, плодоносит в июле. Декоративное и лекарственное растение.

Распространение. Ферганская область: Алайский хребет – бассейн реки Шахимардан.

Места обитания. Каменистые и мелкоземисто-каменистые открытые склоны и скалы среднего пояса гор.

Численность. В бассейне реки Шахимардан насчитывалось 10–15 популяций. Общая численность не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Слабое семенное возобновление, скотопрогон и выпас, а также освоение территории под зоны отдыха.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны на разработаны. Необходимо изучение вида в культуре.

Источники. [111, 191–193, 238, 260]

К. Ш. Тожибаев.



тошли ва майда жинс-тошли очик ёнбағирларда ва қояларда ўсади.

Сони. Шоҳимардон дарёси ҳавзасида 10–15 тўпи борлиги аниқланган. Тупларининг сони но маълум.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Уруғидан яхши унмаслиги, чорва моллари боқилиши, дам олиш уйлари қурилиши унинг қисқариб кетишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.


Мухофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Бу турни маданий шароитда экиб ўрганиш лозим.

Манбалар. [111, 191–193, 238, 260].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий узкий эндемик Алайского хребта.

Краткое описание. Полукустарник высотой до 50 см. Стеблей несколько, от основания ветвистые. Листья сравнительно мелкие, ланцетные, сидячие. Чашечка длиной 18 мм, фиолетово-окра-



252. ТЯНЬ-ШАНЬ МАРМАРАГИ

Шалфей тяньшанский / *Salvia tianschanica* Makhm.

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шанга хос камёб эндемик ўсимлилк.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25–40 см га етадиган кўп ийиллик ўт. Поялари 1–3 та, тик ўсувчи, тўпгулига яқин қисмиди қарама-қарши шохланган, қалин безчасимон ва узун юмшоқ оддий туклар билан қопланган. Барглари чўзиқ наштарсимон, узунлиги 7–9 см, эни 3–4 см, ўткир учли, четлари патсимон бўлинган. Ёпрма барглари узун бандли, япрогининг узунлиги бандига тенг, поядагилари кичикроқ, бандсиз. Тўпгуллари 4–6 та (ҳар бири 2–3 гулли) сохта ҳалқадан ташкил топган. Гулбандининг узунлиги 12–14 мм. Гуллари пушти рангли, узунлиги 35–40 мм. Ёнгоқчаси уч қиррали, тескари тухумсимон, узунлиги 6 мм, силлиқ. Май–июнъ ойларида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Уғом тизмасида (Хумсон), Чотқол тизмаси (жануби-фарбий қисми), Курама тизмасининг шимолий ёнбағирлари, Олмалиқ шаҳри атрофларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмидаги қуруқ майдай жинс шағалли тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ёки ажралган кичик тўплар ташкил қилган ҳолда ўсади. Алоҳида тўп ҳосил қилмайди. Чотқол биосфера қўриқхонаси худудида кўпроқ учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Техноген омиллар таъсири ва чорва молларининг кўп боқилиши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ареалининг бир қисми Чотқол биосфера қўриқхонасида ва Уғом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.


Манбалар. [111, 191–193, 238, 260].

К. Ш. Тожибаев.



Статус 2. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 25–40 см. Листья продолговато-ланцетные, длиной 7–9 см, шириной 3–4 см, с заострёнными, глубоко перистораздельными лопастями; прикорневые на черешках, равных по длине пластинкам; стеблевые слегка уменьшенные, сидячие. Соцветия из 4–6 расставленных немногоцветковых (2–3) ложных мутовок. Цветоножки длиной 12–14 мм. Цветки розоватые, длиной 35–40 мм. Орешки трехгранно-обратно-яйцевидные, длиной 6 мм, гладкие. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле.



Распространение. Ташкентская область: Угамский хребет (Хумсан), Чаткальский хребет, северные склоны Кураминского хребта, окрестности города Алмалык.

Места обитания. Сухие мелкощебнистые и щебнисто-мелкоземистые склоны в нижнем поясе гор.

Численность. Единично и небольшими группами, популяции разобщены. Самостоятельных ценозов не образует. Наиболее часто встречается на территории Чаткальского биосферного заповедника.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Техногенные факторы и перевыпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Часть популяций охраняется в Чаткальском биосферном государственном заповеднике и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [111, 191–193, 238, 260].

К. Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Ugam, the Chatkal ranges, the Akhangaran river basin, the northern slopes of the Kurama range, nearby Almalyk (the Tashkent region). Inhabits dry small- and -fine earth slopes in the lower belt of mountains. Populations are isolated by single specimens and small groups. Does not form the independent cenoses. It is most frequently found in the territory of the Chatkal biospheric state reserve. Limiting factors: economic human activities, extraction of the minerals surroundings of Almalyk and Akhangaran. Measures of protection: several populations are protected in the Chatkal biosphere state reserve and the Ugam-Chatkal national park.

253. ТҮМТОҚ МАРМАРАК

Шалфей туповатый / *Salvia submutica* Botsch. et Vved.

Мақоми 2. Нурота тизмасидаги камёб, реликт, эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–40 см га етадиган кўп йиллик ўт. Пояси битта, тик, қалин безчасимон тукли. Ёпирига барглари кўп, бандли, чўзиқ, наштарсимон, патсимон бўлинган, бўлаклари, ўз навбатида, чукур-патсимон қисмларга ажралган. Поясининг пастки қисмидаги бир жуфт барг қисқа бандли, четларининг учи ўткир бўлакларга ажралган, поянинг ўрта ва юқори қисмидагилари эса бандсиз, бутун ва майдароқ. Гуллари узун (10–12 мм), гул бандда 4 тадан ҳалқа ҳосил қиласиди. Косачаси кенг қўнғироқсимон, бироз шишган, узунилиги 22–23 мм, деярли икки лабли, косачабарглари тўмтоқ. Тожи сарғиш. Июнь–июлда гуллаб, меваси июль–август ойларида етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота тизмасида тарқалган.



Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги сурнамалар, қояларда, шагалли ва тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда ва кичик тўплар ҳолида тарқалган. Кўпроқ Нурота давлат қўриқхонасида ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши турнинг камайиб кетишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилмоқда.

Мухофаза чоралари. Бу тур ўсадиган ерларнинг бир қисми Нурота қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [111, 191–193, 238, 260].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий узкий реликтовый эндемик Нураштая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 15–40 см. Стебель прямой, густожелезистоволосистый. Прикорневые листья многочисленные, черешковые, продолговато-ланцетные, перисторассеченные, с глубоко заостренными перисто-лопастными сегментами; стеблевые в нижней паре более коротко-черешковые, с более заостренными лопастями; средние и верхние сильно уменьшенные, цельные, сидячие. Цветки на длинных (10–12 мм) ножках в 4-цветковых мутовках. Чашечка ширококолокольчатая, слегка вздутая, длиной 22–23 мм, неясно-двугубая, все зубцы туповатые. Венчик кремовый. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской и Навоийской областях: Нуратинский хребет.

Места обитания. Осыпи, скалы, щебнистые и каменистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами и небольшими популяциями, наиболее часто – на территории Нуратинского заповедника.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Скотопрогон и выпас.


Культивирование. Успешно индуцирован в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Часть популяций охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [111, 191–193, 238, 260]

К. Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the Nuratau range. It is spread at the Nuratau range (the Djizakh, the Samarkand and Navoi regions). Inhabits mounds, rocks, skeleton and stony slopes in the middle belt of mountains. Single specimens and small populations most frequently can be found in the Nuratau nature reserve. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: some of populations are protected in the Nuratau state reserve.



254. ҲАВОРАНГ МАРМАРАК

Шалфей лиловоголубой / *Salvia lilacinocaerulea* Nevski

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойга хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Пояси 1–3 та, тик, беζчали туклар билан қопланган, баландлиги 30–60 см. Барглари лира кўринишли патсимон қирқилган, иккала томони оқиш тукли. Гуллари 1–2 тадан 1 см узунликдаги гулбандларда гулоди баргчаларнинг қўлтиғида ўрнашган. Косачаси кенг қўнғироқсимон, қабариқли, узунлиги 15–20 мм, туклари беζчали. Гултожи оч пуштиранг, 35–45 мм узунликдаги қорамтири қайтақили. Ёнғоқчаси ясси – эллипссимон, узунлиги 5 мм.

Тарқалиши. Кўхитанг тизмасида, Сувсизтоғ ва Бойсунтоғда тарқалган (Сурхондарё вилояти).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги қояларнинг сояларда ўсади.

Сони. 3000 тути борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Молларнинг боқилиши ва пичан ўрилиши туфайли камайиб кетган.



Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.
Мухофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [111, 192–193, 238, 260, 310].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 1. Редкий эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Стебли 1–3, прямые, железисто-опущенные, 30–60 см высоты. Листья лировидно-перисто-раздельные с обоих сторон беловолосистые. Цветы на цветоножках 1 см длины, по 1–2 в пазухах прицветных листьев. Чашечка широко-колокольчатая, вздутая 15–20 мм длины железисто-опущенная. Венчик бледно-сиреневый с темным отгибом 35–45 мм длины, голый. Орешки сплюснуто-эллиптические 5 мм длины. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Кугитанг, Сусыстау и Байсунтау.

Места обитания. Среди скал в тени в среднем поясе гор.

Численность. Около 3000 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас и сенокос.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [111, 192–193, 238, 260, 310].

К. Ш. Тожибаев.



Rare endemic species of the northern Pamir-Alay. It is spread at the Kughitang and Baysun ranges (the Surkhandarya region). Inhabits clefts in the shadow of the middle mountainous zone. 3000 plants can be found. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.

255. МАЙДА ГУЛЛИ ТОШБОСТИ

Зопниковник мелкоцветный / *Phlomidoschema parviflorum* (Benth.) Vved.

Мақоми 0. Шимоли-ғарбий Помир-Олойдаги камёб тур.

Қисқача тавсифи. Күп йиллик ўт, ҳалқасимон шохланган тукли, гулёнбаргчасиз. Пояси бир нечта, энг пастки қисми ёғочланувчи, тубидан шохланган, баландлиги 30–50 см. Барглари чўзиқ ёки юқоридагилари наштарсимон, учи ўткирлашган, бутун, бандсиз. Гуллари бандсиз, 2–4 тадан юқори баргларнинг қўлтиғида жойлашган, косачасининг узунлиги 4 мм, учбурчак, юмшоқ тишчали, найчасидан 3 марта қисқа. Гултожи оқиш, косачасидан сал узун. Ёнгоқчаси деярли шарсимон. Июнда гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд вилояти: Зарафшон тизмаси (Тошбоши, Ургут)да тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Афғонистон ва Шимоли-ғарбий Ҳиндистонда учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ва кичик гурухлар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Кўп миқдорда чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.


Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 300].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 0. Редкий вид Северо-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее растение, волочно-опущенное повторно мутовчато-ветвистыми волосками. Стебли в числе нескольких при самом основании деревенеющие, от основания ветвистые, 30–50 см высоты. Листья продолговатые или верхние ланцетные, островатые, цельнокрайние, сидячие. Цветы сидячие по 2–4 в пазухах верхних листьев. Чашечка 4 мм длины, с треугольными неколючими зубцами, в 3 раза более короткими, чем трубка. Венчик беловатый, едва длиннее чашечки. Орешки почти шаровидные. Цветёт в июне, плодоносит в июле.



Распространение. Самаркандская область: Зарафшанский хребет (Ташбashi, Ургут). За пределами Узбекистана – Афганистан, Северо-западная Индия.

Места обитания. Каменистые склоны среднего пояса гор.

Численность. Встречается спорадически единичными особями и группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [159, 300].

К. Ш. Тожибаев.



Rare species of the north-western Pamir-Alay. It is spread at the Samarkand region: the Zarafshan range, Toshboshi, Urgut. Inhabits stony slopes of the middle mountainous zone. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: special measures of preservation are not developed.

256. БУХОРО ОТОСТЕГИЯСИ

Отостегия бухарская / *Otostegia bucharica* B. Fedtsch.

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойнинг жуда кам сақланиб қолган, йўқолиш арафасида турган камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 120 см га етадиган кулранг пояси юқори қисмигача ёғочланадиган ярим бута. Бир йиллик новдалари ноаниқ тўрт қиррали, сарғиш-оқ рангли, тукли. Барглари кенг тухумсимон, бандсиз, тўмтотк, кўқимтиришадиган рангли, хурпайган қалин тукли. Гуллари бандсиз, барг қўлтиғида 5–8 тадан ҳалқа ҳосил қилиб жойлашган. Гулолди баргчалари кураксимон. Тожбарглари 10–14 мм узунликда, оқ рангли. Июнь–август ойларида гуллаб, меваси сентябрь–октябрда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Шўроб, Дарбанд ва Гўрхожи қишлоқлари атрофларида бир-бидан ажралган иккита популяцияси маълум.

Ўсиш шароити. Тоғ олди ва тоғ этакларида гипсли тепаликларда, гипсли қояларда, баъзан гипсли оҳактошларда ўсади.

Сони. Шўроб ва Дарбанд атрофларидағи популяцияда туплар сони 1800 дан ошмайди. Гўрхожидаги популяцияда 3000 атрофидаги туплар ўсиши аниқланган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди. Аммо кейинги тадқиқотлар давомида уруғидан қўпайган ёш туплари қайд этилмаган.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг қўплаб боқилиши ҳамда ўсимлик уруғига турли ҳашаротларнинг зарар келтириши ўсимликнинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстириш ишлари натижага бермади.

Муҳофаза чоралари. У ўсиб турган жойларда буюртмахона ташкил қилиш лозим.

Манбалар. [14, 15, 80, 159].

И. В. Белолипов.



Статус 1. Редчайший, находящийся на грани исчезновения эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Полукустарники высотой до 120 см, с высоко древеснеющими побегами серого цвета. Годичные побеги округло-четырехгранные, желтовато-белые, опущенные. Листья сизовато-зеленые, густооттопыренно-опущенные, широкояйцевидные, тупые, сидячие. Цветки в мутовках по 5–8, сидячие в пазухах верхних листьев, с лопатчатыми прицветниками. Венчик белый, длиной 10–14 мм. Цветёт в июне–августе, плодоносит в сентябре–октябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: существует две популяции вида в окрестностях кишлаков Шуроб, Дарбанд и Гурхожи. Площадь распространения примерно 2 км².

Места обитания. Слоны гипсовых холмов, гипсовые скалы, реже сильно-гипсированные известняки в предгорьях и нижней части гор.

Численность. Популяция в окрестностях кишлаков Шуроб и Дарбанд насчитывает не более 1800 особей. Популяция в окрестностях кишлака Гурхожи насчитывает около 3000 особей.

Размножение. Семенное. Во время последних обследований семенное возобновление не зафиксировано.

Причины изменения численности и ареала. Неумеренный выпас, скотопрогон, повреждение семян насекомыми.

Культивирование. Многочисленные попытки вырастить в Ботаническом саду АН РУз результатов не дали.

Меры охраны. Необходима организация заказника.

Источники. [14, 15, 80, 159].

И. В. Белолипов.

Rare, endemic, relict species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at only 2 locations: the surroundings of the villages Shurab, Derbend and Gurkhozhi about 2 square km (the Surkhandarya region). Inhabits slopes of gypsum hills, gypsum rocks, rarely, highly gypseous limestones in the foot-hills and lower belt of mountains. 1 population consists of 1800 plants. 2 population (Gurkhozhi) – single specimens or small groups. Number of plants of different age does not exceed 6 thousand. Limiting factors: overpasturing, seed damage by insects. Measures of protection: it is necessary to organize a state reserve.



257. АМУДАРЁ ОҚТҮШАСИ

Фломоидес заамударынский / *Phlomoides transoxana* (Bunge) Salmaki

Мақоми 2. Қызылкүмда учрайдиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25–40 см га етадиган кўп йиллик ўт. Илдизи тугунаксимон йўғонлашган. Пояси туксиз, юқори қисми шохланган. Ёпирма барглари узун бандли, патсимон бўлинган, қалами бўлакчалардан иборат, устки томони тукли, пастки томони туксиз. Поясидаги барглари нисбатан кичикроқ, камроқ, бўлинган ва қисқа бандли. Гуллари биттадан, узунлиги 5 см га етадиган гулбандларда гулолди баргчалари қўлтиғида ўрнашган. Гулолди баргчалари қалами, косачадан 1,5–2 марта қисқа. Косачаси тор қўнғироқсимон, узунлиги 17–20 мм, деярли туксиз. Тожбаргларининг узунлиги 23–25 мм, пастки лабининг ўрта қисми тўқ сариқ рангли. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Бухоро ва Навоий вилоятлари: Марказий ва Жанубий Қызылкүмда тарқалган.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тоғлар атрофларида унча мустаҳкамланмаган қумларда ўсади.

Сони. Тўртта жойда (Ойтим, Жириқ, Ўғиз, Сегетти қудуқлари атрофлари)да маълум. Бу ерда улар кичик-кичик майдонларда тўп-тўп бўлиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тугунаги маҳаллий аҳоли томонидан доривор ашё сифатида ишлатиласди.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [7–9, 159].

Т. А. Одилов.



Статус 2. Редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 25–40 см. Корни с клубневидными утолщениями. Стебель голый, вверху ветвистый. Прикорневые листья на длинных чешках, перисто-рассеченные на почти линейные сегменты, сверху опущенные, снизу голые, длинночешковые, стеблевые листья уменьшенные, менее рассеченные, короткочешковые. Цветки по 1 на длинных (до 5 см) цветоножках, в пазухах расставленных прицветных листьев. Прицветники линейные, в 1,5–2 раза короче чашечки. Чашечка длиной 17–20 мм, узкоколокольчатая, почти голая. Венчик длиной 23–25 мм, с оранжево-жёлтой средней лопастью нижней губы. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Бухарской и Навоийской областях: Центральные и Южные Кызылкумы.

Места обитания. Полуразбитые пески у подножия останцовых гор.

Численность. Известно четыре местонахождения в окрестностях колодцев Айтим, Джирек, Огуз, Сегетты, где он образует разреженные заросли.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Клубни этого растения используются местным населением как лекарственное средство.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [7–9, 159].

Т. А. Адылов.

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum (the Bukhara and Navoi regions). Inhabits sands at foot-hills of the remnant mountains. 4 locations are known in the surroundings of Aitim, Djirik, Oguz, Segetti. Limiting factors: native population use tubers of this plant as medicine. Measures of protection: not protected.



258. УЧПОЯЛИ ОҚТҮША

Фломоидес неравногубый / *Phlomoides anisochila* (Pazij et Vved.) Salmaki

Мақоми 2. Нурота тизмасидаги ниҳоятда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тасвиғи. Бўйи 20 см га етадиган кўп йиллик, қалин тукли ўт. Поялари учта, пастки қисмидан тарвақайлаб шохланган, қалин туклар билан қопланган. Ёпирма баргларининг банди қисқа, қалин ва узун тукли. Поядаги барглари ромб-тухумсизмон, четлари тишли, қалин тукли, томирлари ўйғон, поянинг юқори қисмидаги барглари эса бандсиз. Гуллари гулолди баргчаларининг қўлтиқларида ҳалқасимон шаклда ўрнашган. Гулолди баргчалари бигизсизмон, паҳмоқ тукли. Косачаси қўнғироқсизмон, узунлиги 20 мм атрофифа, найчаси қалин тукли. Тожи сариқ рангли, узунлиги 4 мм, найчасининг узунлиги 15 мм, туксиз, қайтақиси қисқа, қалин тукли, тожининг пастки



лаби устки лабидан икки марта узун. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Жиззах вилояти: Нурота тизмасининг марказий қисмida тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмida шағал-тошли қуруқ ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка ҳолда ва кичик тўплар ҳолида учрайди. Туплар умумий сони 1000 дан ошмайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Сонининг ўзгариш сабаблари аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Нурота давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [7-9, 18, 159, 289].

Т. О. Одилов.

Статус 2. Чрезвычайно редкий эндемик Нурагату.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой около 20 см. Стебли в количестве 3, от основания отклонённо-ветвистые, густошерстистые. Прикорневые листья на коротких, густошерстистых от длинных волосков черешках; стеблевые ромбически-яйцевидные, зубчатые, с выступающими жилками, густоволосистые, самые верхние листья сидячие. Цветки в многоцветковых сближенных мутовках в пазухах прицветников шиловидные, сильношерстистые. Чашечка длиной около 20 мм, колокольчатая, по трубке густошерстистая. Венчик длиной 4 мм, жёлтый, с голой трубкой длиной 15 мм, снаружи с густо-коротковолосистым отгибом. Нижняя губа венчика в 2 раза длиннее верхней. Цветёт в июнь-июле, плодоносит в августе.

Распространение. Джизакская область. В среднем поясе хлебта Нурагату.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны.

Численность. Общая численность до 1000 растений, общая площадь распространения около 2 тыс. га.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нурагинском государственном заповеднике.

Источники. [7-9, 18, 159, 289].

Т. О. Одилов.

Extremely rare endemic species of the Nuratau range. It is spread at the central part of the Nuratau range (the Djizakh region). Inhabits dry stony-slopes. About 1000 plants can be found. The distribution area is about 2000 hectares. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



259. ОРОЛ ФЛОМОИДЕСИ

Фломоидес аральский / *Phlomoides aralensis* (Bunge) Salmaki

Мақоми 2. Қызылкүмда учрайдиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Илдизи шолғомсимон. Пояси тик, юқори қисми шохланган, момиқ тукли, баландлыги 30 см. Барглари түмтоқ тищчали, ик-



кала томони оқиш тукли. Гуллари бандсиз, 1 тадан гулолди баргларнинг кўлтиғида жойлашган. Косачаси қўнғироқсимон, пуфаксимон, узунлиги 15–20 мм, қалин тукли. Гултожи оқ, пастки лаби сариқ, узунлиги 22–25 мм. Ёнгоқчасининг учи қалин тукли.

Тарқалиши. Навоий вилояти: Ёмонқум, Батқакум, Аяқагитма булоғи атрофи, Узунқудук, Янгикудуқ ва Ауманзада тарқалган.

Ўсиш шароити. Мустаҳкамланган қумларда ва қолдиқ тоғларнинг увоқларида ўсади.

Сони. 200 га яқин туплари борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Кўп миқдорда чорва боқилиши туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Мухофаза қилинмайди.

Манбалар. [7–9, 159].

Т. О. Одилов.

Статус 2. Редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Корень реповидный. Стебель прямой вверху ветвистый, мохнатый, 30 см выс. Листья городчато-зубчатые, с обоих сторон бело-волосистые. Цветы сидячие, по 1 в пазухах прицветных листьев. Чашечка колокольчатая, вздутая 15–20 мм длины густо-мохнатая. Венчик белый с желтой нижней губой 22–25 мм длины. Орешки на верхушке мохнатые. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Навоийская область: пески Джаманкум, Баткакум, окр. родников Аяқагитма, Узункудуқ, Янгикудуқ, Ауминза.

Места обитания. Закрепленные пески и шлейфы останцов.

Численность. В 2007 г. выявлено около 200 растений

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас.


Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [7–9, 159].

Т. О. Одилов.

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Dzhamankum, the Batkakum, the Ajakagytma, the Uzunkuduk, the Jangikuduk, the Auminza (the Bukhara region). Inhabits sands and slopes of the hills. 200 plants revealed in 2007. Measures of protection: not protected.



260. БОБУР ФЛОМОИДЕСИ

Фломоидес Бабура / *Phlomoides baburii* (Adylov) Adylov

Мақоми 1. Жанубий Ўзбекистондаги ғоят камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40–50 см га етадиган кўп ийллик ўт. Пояси бақувват, туксиз, пастки қисмидан тарвақайлаб шохланган. Ёпирма барглари чўзиқ, асоси кенг понасимон, қисқа бандли, туксиз; поядаги барглари кичикроқ, деярли бандсиз, ўткиртишили. Гуллари бандсиз, гулолди баргчаларининг қўлтиғида камгулли ярим ҳалқа ҳосил қилиб ўрнашган. Гулолди барглари бигизсимон, туксиз, косачадан 4 марта қисқа. Косачаси 16–20 мм узунлиқда, най-қўнғироқсимон, туксиз. Косачасининг четлари киприксимон. Тожининг узунлиғи 30 мм, оқиш ёки қуритилганда оч сарик ранга бўлса керак. Тожининг наий косачадан салгина чиқиб туради.

Май ойида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Келиф-Шерабадский район тепаликларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Очилиб қолган ола жинсларда ўсади.

Сони. 2009 йили 200 тури қайд этилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайса керак.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [6–9, 159].

Т. О. Одилов.

Статус 1. Очень редкий узкий эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 40–50 см. Стебель крепкий, от основания отклонённо-ветвистый, голый. Прикорневые листья продолговатые, при основании ширококлиновидные, короткочерешковые, голые; стеблевые уменьшенные, почти сидячие, с острыми зубцами. Цветки почти сидячие, в не-



многоцветковых, слегка расставленных полумутовках в пазухах прицветных листьев. Прицветники шиловидные, голые, в 4 раза короче чашечки. Чашечка длиной 16–20 мм, трубчато-колокольчатая, голая. Зубцы чашечки по краю снабжены густыми ресничками. Венчик длиной около 30 мм, видимо, белый или бледно-жёлтый (в сухом виде); трубка венчика едва выступает из чашечки. Цветёт в мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Келиф-Шерабадская гора (окрестности деревни Акташ).

Места обитания. Серые глины.

Численность. В 2009 г. зарегистрировано 200 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Поедается скотом.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [6–9, 159].

Т. О. Одилов.

Very rare endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Kelif-Sherabad range: nearby the Aktash village (the Surkhandarya region). Inhabits grey clays. In 2009, 200 plants were registered. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



261. ГИПСЛИ ФЛОМОИДЕС

Фломоидес гипсовый / *Phlomoides gypsaea* (Popov) Adylov, Kamelin et Makhm.

Мақоми 1. Фарбий Ҳисор тизмалариңаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 100 см га етадиган кўп ийллик ўт. Пояси шохланган, туксиз. Ёпирма барглари узун бандли, йирик, чўзиқ-эллипссимон, четлари йирик тишсимон ўйилган, ҳар икки томони сийрак-юлдузсимон туклар билан қопланган. Поядаги барглари қисқа бандли, энг юқори қисмидагилари эса деярли бандсиз. Косачасининг узунлиги 16–18 мм, қўнғироқсимон, сийрак тукли. Тожининг узунлиги 25–30 мм, оқ рангли. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ғузор шаҳрининг жануби-шарқидаги паст тоғларда тарқалган.

Ўсиш шароити. Очилиб қолган ола жинсларда ўсади.

Сони. Жуда камёб ўсимлик. Фақат бир марта 1935 йилда Ғузор шаҳрининг жануби-шарқи (Қоракамар атрофи)дан терилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайса керак.


Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.


Манбалар. [7–9, 159].

Т. О. Одилов.



Статус 1. Чрезвычайно редкий эндемик Западного Гиссара.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой около 100 см. Стебель ветвистый, голый. Прикорневые листья длинночерешковые, крупные, продолговато-эллиптические, крупнозубчато-городчатые, с обеих сторон с рассеянными звездчатыми волосками; стеблевые короткочерешковые; прицветные почти сидячие. Чашечка длиной 16–18 мм, трубчато-колокольчатая, с немногочисленными волосками. Венчик



длиной 25–30 мм, белый. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Кашкадаръинская область: пестроцветные низкогорья к юго-востоку от города Гузар.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород.

Численность. Очень редкий. Собран только один раз в 1935 г. к юго-востоку от города Гузар, в окрестностях зимовки Карап-Камар. Многократные попытки найти растение успехом не увенчались. Вероятно вид исчез.

Размножение. Возможно семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [7–9, 159].

Т. О. Одилов.

Extremely rare endemic species of the western Hissar range. It is spread at the gypseous low hills to the south-east of Guzar (the Kashkadarya region). Inhabits outcrops of gypseous rocks. It was collected only once, in 1935 to the south-east of Guzar, in the surroundings of the Kara-Kamar. Several attempts to collect the species had no success. Probably disappeared. Measures of protection: not protected.

262. СИЛЛИҚ КОСАЧАЛИ ФЛОМОИДЕС

Фломоидес гладкощечечный / *Phlomoides leiocalyx* (Pazij et Vved.) Adylov, Kamelin et Makhm.

Мақоми 1. Қарши чўлидаги ниҳоятда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50–60 см га етадиган пояси шохлаган, туксиз кўп йиллик ўт. Ёпирма барглари қисқа бандли, чўзиқ, четлари йирик тишсимон ўйилган, ҳар икки томони сийрак, юлдузсимон тукли. Поядаги барглари деярли бандсиз. Гуллари ярим ҳалқалар ҳосил қилиб, гулолди баргларининг қўлтиқларида жойлашган. Гулолди баргчалари бигизсимон, косачасидан 3 марта қисқа. Косачаси найсимон, туксиз, узунлиги 17–18 мм. Тожининг узунлиги 33–35 мм, оқ рангли, пастки лаби дастлаб бинафша, кейинроқ эса қўнгир рангга ўтувчи доғларга эга. Апрелда гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Қарши чўлларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғолди тепаликларидағи соз тупроқларда ўсади.

Сони. 1958 йил 22 апрелда Фузор-Қарши темир йўли четларидан бир марта терилган. Бу тур қайта учрамаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайса керак.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [7–9, 159].

Т. О. Одилов.

Статус 1. Очень редкий узкий эндемик Каршинской степи.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 50–60 см с голым ветвящимся стеблем. Прикорневые листья короткочерешковые, продолговатые, городчатолопастные с рассеянными звёздчатыми волосками с обеих сторон; стеблевые почти сидячие. Цветки в полумутовках в пазухах прицветных листьев. Прицветники шиловидные, в 3 раза короче чашечки. Чашечка голая, трубчатая, длиной 17–18 мм. Венчик длиной 33–35 мм, белый, сначала с фиолетовым, затем с коричневым пятном на нижней губе. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.



Распространение. Кашкадарьинская область: Каршинская степь.

Места обитания. Глинистые холмы в предгорьях.

Численность. Растение собрано 22 апреля 1958 года у полотна железной дороги между городами Гузар и Карши. Повторные сборы не известны.

Размножение. Возможно семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [7–9, 159].

Т. О. Одилов.



Very rare endemic species of the Karshy Steppe.

It is spread at the Kashi Steppe (the Kashkadarya region). Inhabits clayish hills. In April 22, 1958, the plant was collected at the permanent way between Guzar and Karshi. Another collections are unknown. Measures of protection: not protected.

263. ЧИМЁН ФЛОМОИДЕСИ

Фломоидес чимганский / *Phlomoides tschimganica* (Vved.) Adylov, Kamelin et Makhm.

Мақоми 1. Чотқол тизмасидаги деярли йүқолган тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40–50 см га етадиган кўп йиллик ўт. Пояси иккита, оддий. Ёпирма барглари кўп, кенг тухумсимондан то наштарсимонгача, четлари йирик тишсимон ўйилган. Поядаги барглари 1 жуфт, чўзиқ наштарсимон. Гуллари бандсиз, кўп гулли ҳалқа ҳосил қилиб ўрнашган. Гулолди баргчалари бигизсимон-қалами, косачасига teng. Косачасининг узунлиги 12 мм, қалин юлдузсимон туклар билан қопланган. Косачасидаги тишларининг узунлиги 4–5 мм. Тожининг узунлиги 20 мм, бинафша рангли. Июлда гуллаб, меваси август ойида етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Катта Чимён тоғида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ ёнбағирларида ўсади.

Сони. Бу тур 1926 йили Катта Чимён тоғидан терилган. Ягона нусха асосида тавсифланган.

Кўпайиши. Маълумотлар ўйқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.



Маданийлаштирилиши. Маълумот ўйқ. Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди. Манбалар. [7–9, 159, 293].

Т. О. Одилов.

Статус 1. Возможно, исчезнувший вид Чаткальского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 40–50 см. Стебли в количестве 2, простые. Листья прикорневые, в густой розетке, от широкояйцевидных до ланцетных, крупногородчато-зубчатые; стеблевые в количестве 1 пары, продолговато-ланцетные. Цветки сидячие, в многоцветковых расставленных мутовках. Прицветники шиловидно-линейные, равные чашечке. Чашечка длиной 12 мм, густо покрыта звёздчатыми волосками. Зубцы чашечки длиной 4–5 мм. Венчик длиной около 20 мм, лиловый. Цветёт в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Ташкентская область: горы Большого Чимгана.

Места обитания. Слоны среднего пояса гор.

Численность. Единственный экземпляр, по которому описан вид, найден в 1926 г. на Большом Чимгане. Больше растение никем не собиралось. Вид вероятно исчез.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [7–9, 159, 293].

Т. О. Одилов.

Rare endemic probably disappeared species of the Chatkal range. It is spread at the Great Chimgan (the Tashkent region). Inhabits slopes in the middle belt of mountains. Only one specimen was found in 1926, in the Great Chimgan. No one collected the species any more. Probably disappeared. Measures of protection: not protected.



264. БЎҒИЗТУКЛИ ЭРЕМОСТАХИС

Пустынноколосник опушонноглоточный / *Eremostachys eriolarynx* Pazij et Vved.

Мақоми 1. Қизилкүмдаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–30 см га етадиган кўп йиллик ўт. Илдизи шолғомсимон. Пояси қалин, оддий хурпайган туклар билан қопланган.



Ёкирда барглари кенг тухумсимон, қисқа бандли, япроғининг четлари тишсимон ўйилган, оддий тукли. Поядаги барглари ёкирда баргларга ўхшаш, лекин майдароқ. Гуллари майда, ярим ҳалқа бўлиб гулолди баргчалари қўлтиғида ўрнашган. Косачанинг узунлиги 20–25 мм, карнайсимон, қайтақиси кенг, оддий ва сийрак безчасимон туклар билан қопланган. Тожининг узунлиги 28–31 мм, оқ рангли, пастки лаби сариқ. Тож найининг ташқи томони туксиз, ичи эса тукли ҳалқага эга. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Бухоро вилояти: Қизилкүмда тарқалган. Қозоғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Текисликлардаги сур-қўнғир тусли тупроқларда ўсади.

Сони. Биринчи марта 1871 йил 5 майда Карак чўлидан ва шу йил Карак тоғининг шарқий этакларидан терилган (Чимкент вилояти). Охирги бор 1956 йили Фиждувон туманига қарашли Янгикудуқ яқинидан топилган (Бухоро вилояти). Сўнгги йилларда бу турни топиш учун уюштирилган экспедициялар натижасиз тугаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан ташқари кўп боқилиши унинг ўсишига салбий таъсир кўрсатади.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [6, 61, 115].

Т. А. Одилов.

Статус 1. Очень редкий эндемик Кзылкума.

Краткое описание. Многолетнее растение высотой 20–30 см с реповидным корнем. Стебель густо-опущенный длинными утолщёнными простыми волосками. Прикорневые листья широкояйцевидные, зубчато-городчатые, опущенные простыми волосками, короткочерешковые; стеблевые сходны с прикорневыми, но более мелкие. Цветки в полумутовках в пазухах прицветных листьев. Чашечка длиной 20–25 мм, воронковидная, с очень расширенным отгибом, опущенная простыми волосками с примесью одиночных, железистых. Венчик длиной 28–31 мм, белый, с жёлтой нижней губой. Трубка венчика снаружи голая, внутри снабжена волосистым кольцом. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Бухарская область: Кзылкумы. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Серо-бурые почвы равнин.

Численность. Впервые собрано 5 мая 1871 г. в Каракской степи (Чимкентская область). Последний раз собран в 1956 году в Гиждуванском районе в окрестностях колодца Янги-Кудук (Бухарская область). Неоднократные последующие поиски не увенчались успехом.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [6, 61, 115].

Т. А. Адылов

Very rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum (the Bukhara region). Inhabits grey-brown soils of plains. For the first time, it was collected in May 5, 1871, in the Karak Steppe (the Chimkent region). For the last time, it was collected in 1959, in the Gizduvan region, in the around of the Yangi-Kudduk water-well (the Bukhara region). Subsequent repeated searches were unsuccessful. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: not protected.



265. КҮРİMСИЗ ҚҰЗИҚУЛОҚ

Зопник мрачный / *Phlomis nubilans* Zakirov

Мақоми 3. Нурота тизмасидаги камёб эндемик ўсимликтің.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–40 см оралигидаги кўп йиллик ўт. Пояси бир нечта. Барги туҳумсимон, четлари текис ёки ноаниқ арасимон, устки томони юлдузсимон ва оддий туклар билан қопланган, пастки томони эса қалин юлдузсимон тукли ва йўғон томирли. Гуллари бандсиз, поянинг юқори қисмидаги барглар қўлтиғида 2–6 тадан сийрак ҳалқа ҳосил қилиб жойлашган. Гуллоди баргчалари бигизсимон, косача найдан 1,5 баробар узун. Косачаси 10–13 мм узунлиқда, қалин юлдузсимон туклар билан қопланган. Тожи пушти, узунлиги 23–27 мм. Июлда гуллаб, меваси август ойида етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота тизмаси ва Оқтогда тарқалган.



Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки ва ўрта қисмida майда жинс тупроқли, шағалли ва тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ва бир-биридан ажralган тўплари учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Қишлоқ хўжалик экинлари учун ерларнинг ўзлаштирилиши ва чорва молларининг боқилиши туфайли камайган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Популяциясининг бир қисми Нурота давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [94, 194, 195].

Р. У. Қодиров.

Статус 3. Редкий эндемик Нуратинских гор.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 30–40 см. Стеблей несколько.

Листья яйцевидные, цельнокрайные или неясно-пильчатые, сверху с рассечёнными звёздчатыми или простыми волосками, снизу с выступающими жилками и звёздчато-войлочные. Цветки сидячие, в немногоцветковых (2–6) расставленных мутовках в пазухах верхних листьев. Прицветники шиловидные, в 1,5 раза длиннее трубки чашечки. Чашечка длиной 10–13 мм, густо-звездчато-опущенная. Венчик розовый, длиной 23–27 мм. Цветёт в июле, плодоносит в августе.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской и Навоийской областях: хребет Нуратау и горы Актау.

Места обитания. Мелкоземистые, щебнистые, каменистые склоны нижнего и среднего пояса гор.

Численность. Встречается единично и группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение мест естественного произрастания под сельхозугодья и выпас.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Часть популяций охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [94, 194, 195].

Р. У. Қодиров.

Rare endemic species of the Nuratau range. It is spread at the Nuratau and Aktau mountains (the Djizakh, the Samarkand, the Navoi regions). Inhabits fine earth and stony-slopes in the lower and middle belt of mountains. Single specimens and populations occur sporadically. Limiting factors: reclamation of lands of natural growing under farming and pasturing. Measures of protection: some populations are protected in the Nuratau state reserve.



266. КУДРЯШЕВ АРСЛОНҖҮРУҒИ

Пустырник Кудряшева / *Leonurus kudrjaschevii* Kamelin et Tulyag.

Мақоми 2. Ҳисор тизмасидаги эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 35–55 см га етадиган, тўгри ўсувчи, оддий, баъзида бироз шохланган кўп йиллик ўт. Пояси қалин, кулранг туклар билан қопланган. Баргининг икки томони тукли, узунлиги 3–6 см, эни 2,5–4 см. Гул бандидаги барги кенг ромбсимон, асоси понасимон. Гуллари халқасимон ўрнашган, узунлиги 3,5–9 см. Гулёнбаргчasi қалами-наштарсимон, баъзида учи қайрилган, қалин туклар билан қопланган, гул косача баргидан бироз қисқа. Гулкоса баргининг узунлиги 6–6,5 мм, қалин тукли. Гултож барги майда, узунлиги 10–12 мм, рангли. Ёнгоқчаси оқиш-жигарранг, уч қиррали, учига томон қийшиқ, ўткирлашган, узунлиги 2 мм гача, июнда гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Фарбий Ҳисорнинг (Бешнов тоғи) шимолий ёнбағрида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори қисмидаги шимолий тошлоқ ёнбағирларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.


Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўп боқилиши туфайли камайиб кетган.



Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.
Мухофаза чоралари. Ҳисор давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [159, 298, 299].

М. Тўлаганова.



Статус 2. Редчайший эндем Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение до 35–55 см высоты. Все растение густо паутинисто-войлочно опущенное. Листья с обеих сторон опущенные в очертании широкоромбические, 3–6 см длины, 2,5–4 см ширины. Соцветии расставленные, 3,5–9 см длины. Чашечка 6–6,5 мм длины, густоволосисто-опущенные с зубцами. Венчик мелкий, сиреневый около 10–12 мм длины. Орешки светло-коричневые, опущенные около 2 мм длины. Цветет в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Кашкадарьинская область: Западный Гиссар – бассейн реки Кашкадарья, гора Бешнау.

Места обитания. На северных каменистых склонах в субальпийском поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас

Культивирование. Сведений нет

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском заповеднике.

Источники. [159, 298, 299].

М. Туляганова.

Rare endemic species of the western Hissar range. It is spread at the western outskirts of the Hissar range: the Kashkadarya river basin, Beshnau (the Kashkadarya region). Inhabits subalpine slopes. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Hissar state nature reserve.

ҚОВОҚДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ТЫКВЕННЫЕ – CUCURBITACEAE

267. ҚОРА СИРТТАН

Переступень черноплодный / *Bryonia melanocarpa* Nabiev



Мақоми 3. Жануби-шарқий Қызылқұмда кичик майдонда сақланиб қолған камёб әндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Чирмашиб ўсуви күп үйлікүт. Илдизи йүғон, узунлиги 75 см гача, йүғонлиги 15–30 см, оғирлиги 27 кг гача. Илдиз бүғизидан (25 гача) 2–4 м узунлиқдаги чирмашиб ўсуви поялар ўсиб чиқади. Пастки барглари йирик, этли, кенг юраксимон, чуқур беш бүлакли; юқоридаги барглари майда, наштарсимон учбурчакли, 2–5 бүлакли. Пастки шингиллари чангчили. Шингилининг ўрта қисмидаги гуллари аралаш (чангчи ва уруғчили); юқоридаги гуллари эса уруғчили. Тожи яшил-сариқ рангли. Меваси яшил-қора рангли, юмалоқ, силлиқ, диаметри 6–8 мм. Апрель–май ойларыда гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Сирдарё, Жиззах ва Навоий вилоятлари: Қызылқұмдаги қадимий Чордара шаҳри харобалари яқинида ва Айдаркүл атрофида тарқалған. Қозоғистонда ҳам учрайди.

Үсиш шароити. Мустаҳкамланған кичик күм уюмларыда ўсади.

Сони. Кичик-кичик түплар ҳосил қилиб ёки якка-якка ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Ургифдан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши, чўл бутазорлари деградацияси туфайли камайиб кетган.

Маданийластирилиши. 1958–1960 йиллар мобайнида ЎЗР ФА Ботаника ботаника тажриба даласида ўстирилган.

Мухофаза чоралари. Мухофаза қилинмайди.

Манбалар. [156–159, 199].

М. М. Набиев.

Статус 3. Редкий узкий эндемик Юго-восточного Кызылкума.

Краткое описание. Лиановидный травянистый многолетник. Корень толстый, длиной до 75

см, толщиной 15–30 см (масса до 27 кг). От корневой шейки отходят многочисленные (до 25) цепляющиеся стебли длиной 2–4 м. Нижние листья крупные, широкосердцевидные, глубоко-пятираздельные; верхние – мелкие, кольевидно-треугольные, 5-лопастные. Нижние кисти мужские; верхние смужскими и женскими цветками на коротких цветоносах; самые верхние – с женскими цветками. Венчики зеленовато-жёлтые. Плоды зеленовато-чёрные, шаровидные, гладкие, 6–8 мм в диаметре. Цветёт апреле-мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Сырдарьинской, Навоийской и Джизакской областях: Кызылкумы близ руин города Чардара, пески около озера Айдаркуль. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Закреплённые мелкобугристые пески.

Численность. Встречается единично и небольшими популяциями вокруг Айдаркуля.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Страдает от деградации пустынных экосистем, выпаса и выкопывания корней в качестве лекарства.


Культивирование. С 1958 по 1960 гг. успешно культивировался на экспериментальном участке Ботанического сада АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [156–159, 199].

М. М. Набиев.

Rare endemic species of the south-eastern Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum; near the ruins of the Chardara, around the Aydarkul Lake (the Syrdarya, the Navoi and Djizakh regions). Inhabits fixed small-hilly sands. Single specimens and small populations occur around of the Aydar Lake. Limiting factors: degradation of desert ecosystems, pasturing and digging the roots for medicinal purposes. Measures of protection: not protected.



**ҚОРАҒАТДОШЛАР (ТОШЁРДОШЛАР) ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО СМОРОДИНОВЫЕ
(КАМНЕЛОМКОВЫЕ) – GROSSULLARIACEAE (SAXIFRAGACEAE)**

268. ГУЛХАЙРИБАРГ ҚОРАҒАТ
Смородина мальвовидная / *Ribes malvifolium* Pojark.



Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м гача етадиган бута. Ўсимликнинг барча қисми (баргларидан ташқари) безчали туклар билан қопланган. Барглари 5 бўлакли. Бўлакларининг эни 1,5–4 см. Гуллари кўпгулли шингил ҳосил қилиб ўрнашган, оқиш рангли. Меваси кўп уруғли, резавор. Июль ойида гуллаб, меваси август ойида пишади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор тизмасида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмларидаги тошли ёнбағирлар, сурималар ва қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Табиятда якка-якка бўлиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Меваси дориворлик хусусиятига эга бўлганлиги учун кўплаб териб олинади.

Маданийлаштирилиши. Манзарали ва доривор ўсимлик сифатида оз бўлса ҳам боғларда ва ҳовлиларда экиласди.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор қўриқхонасида муҳофаза қилинади. Мавжуд тўплари устидан назорат ўрнатиш ва биологик хусусиятларини ўрганиш лозим.

Манбалар. [159, 188].

О. Т. Тургинов.

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание.

Кустарник высотой до 1 м. Всё растение, кроме листьев, покрыто стебельчатыми желёзками. Листья с 5 лопастями, шириной 1,5–4 см. Цветки в многоцветковых кистях, беловатые. Плод – многосеменная ягода. Цветёт в июле, плодоносит в августе.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский хребет. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Каменистые склоны, россыпи и трещины скал в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Не установлена, встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор плодов как лекарственного сырья.

Культивирование. Изредка культивируется в частных садах как декоративное и лекарственное растение.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском заповеднике.

Источники. [159, 188].

О. Т. Тургинов.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range (the Surkhandarya and Kashkadarya regions). Inhabits stony slopes, gorges in the lower and middle belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: harvesting offruits as medicinal raw material. Measures of protection: protected in the Hissar nature reserve.



ҚОҚИЙТДОШЛАР (МУРАККАБГУЛДОШЛАР) ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО АСТРОВЫЕ (СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ) - ASTERACEAE (COMPOSITAE)

269. ЯШИЛ АНУРА

Анура бледнозелёная / *Anura pallidivirens* (Kult.) Tscherneva

Мақоми 2. Нурота тоғларидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40–50 см га етадиган кўп йиллик ўт. Пояси чалкаш туклар билан қопланган, жўякли, асосидан шохланган. Барглари чармисимон, устки томони тускиз, пастки томони қалин оқ туклар билан қопланган. Илдизолди барглари бандли, тухумсимон, четлари текис ёки майда тикан тишли. Поядаги барглари пастдан юқорига қараб майдалашиб боради, бандсиз ёки пояни қамраб туради, пастки қисмининг икки томони йирик тикан тишли ёки текис. Саватчаси кўп, қисқа бандли, майда. Гуллари кўп, оқ. Уруғи майда, чўзиқовал шаклда. Июнь–июль ойида гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота, Кўйтош, Оқтоғ, ва Молгузар тизмалари (Темур дарвозаси атрофи)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки ва ўрта қисмида, тош шағалли, баъзан майда жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда, баъзан кичик тўплар ҳосил қилиб тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари учун яхши озуқа бўлганлиги туфайли уруғидан кўпайиши анча чегараланган.

Маданийлаштирилиши. Мъълумот йўқ.

Мухофаза чоралари. Нурота қўриқхонасида қўриқланади.


Манбалар. [18, 156–159, 289, 326].

Н. Ю. Бешко.

Статус 2. Редкий эндемичный вид и род Нурагинских гор.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 40–50 см. Стебель опущен паутинистыми волосками, бороздчатый, от основания ветвистый. Листья кожистые, сверху – голые, снизу – сероватово-ложечные, прикорневые листья черешковые,

яйцевидные, по краю – почти цельнокрайные или очень мелкоклюзубчатые, стеблевые к верхушке очень быстро уменьшающиеся, сидячие, полуостеблевые, объемлющие, при основании с обеих сторон крупноклюзубчатые или цельнокрайние. Корзинки многочисленные, на коротких ножках, мелкие. Цветки многочисленные, с белыми венчиками. Семянки мелкие, продолговато-овальные. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.



Распространение. В Навоийской, Самаркандской и Джизакской областях: Нурагау – Койташ, Мальгузарские горы (около Тамерлановых ворот), Актау.

Места обитания. Каменисто-щебнистые, мелкоzemистые склоны нижнего и среднего пояса гор.

Численность. Встречается спорадически, как единично и небольшими группами, так и довольно многочисленными популяциями (до нескольких сотен растений). Площадь локальных популяций составляет от 0,01 га до нескольких гектаров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас. Хорошо поедается всеми видами животных, что препятствует семенному размножению.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Нурагинского заповедника.

Источники. [18, 156–159, 289, 326].

Н. Ю. Бешко.

Rare endemic species and genus of the Nuratau mountains. It is spread at the Nuratau, the Koitash, the Aktau, the Malguzar mountains (nearby the Tam'erlan's gate gorge), (the Navoi, the Samarkand, the Djizakh regions). Inhabits stony-, fine earth slopes in the lower and middle belt of mountains.

It occurs sporadically, by single specimens, small groups, sometimes, large populations (up to several hundred plants). Limiting factors: pasturing. Well eaten by all kinds of animals that prevents seed reproduction.

Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



270. АЛЛОЛЕПИС КАРРАК

Кузиния инакочешуйная / *Cousinia alolepis* Tscherneva et Vved.

Мақоми 2. Ҳисор тизмаси ғарбий қисмидаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 55 см га етадиган кўп ийллик ўт. Пояси кўп, чалкаш тукли, асоси қалин тукли, ўрта қисмидан шохланувчан. Шохчалари якка саватчали. Баргларининг устки томони безчали тукли, пастки томони кулранг қалин тукли. Ташқи ёпирма баргларининг банди новсимон кенгайган, ичкилариники бандли, наштарсимон, патсимон бўлинган, асосига қараб пардасимон қанотчалар ҳосил қиласди. Поядаги барглари юқорига қараб кичрайиб боради, бандсиз. Саватчаси кенг цилиндрисимон, безчали ҳамда оддий туклар билан қопланган. Ўрама барглари 35 тага яқин. Тожи сарик рангли. Уруғи узун тескари тухумсимон, майда тишли. Август ойида гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ҳисор тизмасининг ғарбий қисмida Қашқадарё ҳавзасида тарқалган (Оқсув, Филондарё ва Танхоздарё ҳавзаларининг юқори қисми).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда камтарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқ маълумот йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Очень редкий эндемик Западного Гиссара.


Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 55 см. Стебли (их несколько), паутинистые, у основания войлочные, от середины ветвистые. Веточки несут по 1 корзинке. Листья сверху железистоволосистые, снизу – сероволосичные; наружные прикорневые – с влагалищно-расширенными черешками; внутренние прикорневые с черешками, к основанию плёнчато крылатыми, ланцетные, перисторассечённые; стеблевые кверху постепенно уменьшающиеся, сидячие. Корзинки широкоцилиндрические, опущенные железистыми и простыми волосками. Листочки обёртки в количестве 30–35. Венчики жёлтые. Семянки продолговато-обратнояйцевидные, мелкозубчатые. Цветёт в августе, плодоносит в сентябре.

Распространение. Кашкадарьинская область: западные отроги Гиссарского хребта, бассейн реки Кашкадарья, верховья Аксу, Гиландары и Танхаздарьи.

Места обитания. Каменистые склоны в верхнем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.



Причины изменения численности и ареала.

Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ф. О. Ҳасанов.

Very rare endemic species of the western part of the Hissar range. It is spread at the western outskirts of the Hissar range, the Kashkadarya river basin, the upper reach of the Aksu, the Gilandarya and Tankhazdarya rivers (the Kashkadarya region). Inhabits stony slopes in the upper belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Hissar state nature reserve.



271. Безчатукли каррак

Кузиния железистая / *Cousinia adenophora* Juz.

Мақоми 2. Зарафшон тизмаси фарбий қисмидаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бүйи 50 см га етадиган күп үйиллик ўт. Поялари күп, тарвақайлаган, тұксиз, юқори қисми безчасимон түкли. Шохчалари якка каллакли. Тұпгуллари сийрак. Баргларининг устки томони безчасимон түкли, пастки томони кулранг, қалин түкли, патсимон қырқылған. Поядаги барглары бандсиз, юқорига қараб кичрайиб боради. Саватчалари чүзик тухумсимон, безчасимон түкларға әга. Ўрама баргчалари 30–40 та, яссироқ-чармсимон, безчасимон түкли. Гули сарық рангли. Уруғи тескари тухумсимон, деярли уч қирралы, ингичка қанотчали, юқори қисми 2–3 тишли. Июль–август ойларыда гуллаб, уруғи август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмасида тарқалған.

Үсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмидаги тошли ёнбағирларда үсади.

Сони. Табиий ҳолда кам тарқалған.



Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқ маълумот йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ф. Ў. Ҳасанов.



Статус 2. Очень редкий эндемик западной части Зарафшанского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 50 см. Стеблей несколько, они голые, в верхней половинке железистоопущенные, оттопыренноветвистые, веточки одноголовчатые. Соцветие рыхлое. Листья сверху желестиволосистые, снизу – серовато-бледные, перисторассечённые, стеблевые листья к вершине стебля постепенно уменьшающиеся, сидячие. Корзинки узкояйцевидные, желестивые. Листочки обёртки в количестве 30–40, плосковатые, кожистые, желестиволосистые. Венчик желтый. Семянки обратнояйцевидные, почти трёхгранные, узокрылатые, наверху 2–3-зубчатые. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Самаркандской и Кашкадарьинской областях: Зарафшанский хребет.

Места обитания. Каменистые склоны в верхнем поясе гор.

Численность. В естественных условиях встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ф. О. Ҳасанов.

Very rare endemic species of the western part of the Zaravshan range. It is spread at the Zaravshan range (the Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits stony slopes in the upper belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.

272. БУТКОВ КАРРАГИ

Кузиния Буткова / *Cousinia butkovii* Tscherneva et Vved.

Мақоми 1. Зарафшон тизмасидаги камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40 см га етадиган пояси йўл-йўл чизиқли (жўякли), қалин тукли, сербарг, асосидан шохланувчан, якка каллакли, икки йиллик ўт. Барглари яшил рангли, устки ва пастки томони чалкаш тукли, қирраси тикансимон тишли. Ёпирма ҳамда поянинг пастки қисмидаги барглари қисқа бандли, патсимон бўлинган. Поянинг ўрта қисмидаги барглари чўзиқ, четлари бўлакли, юқори қисмидагилари эса юмалоқ, пояни ярим қамраб туради, учи қаттиқ, тиканли. Саватчаси ясси-юмалоқ (диаметри 2,5–3,5 см), кўп гулли. Ўрама барглари кўп, дағал. Тожи пушти рангли. Уруғи чўзиқ тухумсимон. Май–июль ойларида гуллаб, меваси июль–августларда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмаси (Ургут қишлоғи атрофлари, Самарқанд тоғлари, Оқсой қишлоғи атрофи)да тарқалган. Тожикистанда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити.

Тоғларнинг ўрта ва пастки қисмларида жарликлар, сурilmalap ҳамда шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан ташқари кўп боқилиши ва хашак учун ўриб олиниши сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Аниқ маълумот йўқ.


Муҳофаза чоралари. Китоб давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий вид Зарафшанского хребта.

Краткое описание. Двулетнее травянистое растение высотой до 40 см. Стебель полосатобороздчатый, войлочный, облистенный, от основания ветвистый, одноголовчатый. Листья светло-зелёные, сверху и снизу паутинистые, по краю – колючезубчатые; прикорневые и нижние – короткочерешковые, перисто-раздельные; средние стеблевые – продолговатые, лопастные; верхние – округлые, полуустеблеобъемлющие, кончаются крепкой колючкой. Корзинки сплюснут ошаровидные (2,5–3,5 см в диаметре), многоцветковые. Листочки обёртки многочисленные, грубые. Венчик розовый. Семянки продолговато-яйцевидные. Цветёт в мае–июле, плодоносит в июле–августе.



Распространение. В Самаркандской и Кашкадарьинской областях: Зарафшанский хребет, окрестности кишлака Ургут; Самаркандские горы, окраина кишлака Аксай. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Щебнистые склоны, осыпи и обрывы в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас, заготовки на сено.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Китабском заповеднике.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ф. О. Ҳасанов.

Rare species of the Zaravshan range. It is spread at the Zaravshan range, nearby Urgut; the Samarkand mountains, nearby the village Aksay (the Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits slopes, mounds and precipices in the lower and middle belts of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: overpasturing, hay-mowings. Measures of protection: protected in the Kitab state reserve.



273. ВВЕДЕНСКИЙ КАРРАГИ

Кузиния Введенского / *Cousinia vvedenskyi* Tscherneva

Мақоми 2. Ҳисор тизмаси жануби-ғарбий тармоқларининг эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20 см га етадиган икки йиллик ўт. Пояси йўл-йўл чизиқли (жўякли), чалкаш тукли, шохлари 1 ёки 2 та каллакли. Баргларининг пастки томони қалин оқиш тукли, устки томони сийрак чалкаш тукли, четлари тиҳсимон майда тиканли. Ёпирма барглари бандли, лирасимон. Поянинг пастки қисмидаги барглари ёпирма баргларга ўхшаш, банд-

сиз ёки қисқа бандли. Поянинг ўрта қисмидаги барглари ҳам бандсиз. Энг юқоридагилари эса қисқарип тиканга айланган. Саватчаси чўзиқ тухумсимон, юқори қисми сиқилган, сийрак чалкаш тукли. Ўрама баргчалари яшил, қиррали, ўткир учли, ўрта қисми қисилган. Тожи пушти рангли. Уруғи тескари тухумсимон, тўқ кулранг. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Помир-Олойда Чўлбайир, Бойсун тоғларида, Ҳисор тизмаси жанубий ёнбағридан Сангардак сув ҳавзасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги йирик тошли ва шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Фақат ўзига хос тупроқда ўсишга мослашганлиги унинг қисқаришига сабаб бўлган.

Маданийлаштирилиши. Аниқ маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Эндемик юго-западных отрогов Гиссарского хребта.

Краткое описание. Двухлетнее травянистое растение высотой до 20 см. Стебель полосатобороздчатый, паутинистый, ветви одно-реже двуголовчатые. Листья снизу беловатошерстистые, сверху умеренно-паутинистые, по краю – мелко-колючезубчатые; прикорневые листья черешковые, лировидные; нижние – стеблевые, подобны прикорневым, но сидячие или короткочерешковые; средние – стеблевые, сидячие; самые верхние иногда редуцированные до колючек. Корзинки продолговато-яйцевидные, наверху скатые, умеренно-паутинистые. Листочки обёртки зелёные, килеватые, короткозаострённые, в средней части скатые. Венчик розовый. Семянки обратной-яйцевидные, тёмно-серые. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.



Распространение. Сурхандарьинская область: Памиро-Алай: горы Чульбаир и Байсунтау, бассейн реки Сангардак на южном склоне Гиссарского хребта.

Места обитания. Каменистые и щебнистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.


Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к определенным местам обитания.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ф. О. Ҳасанов.



Endemic species of the south-western branches of the Hissar range. It is spread at the Pamir-Alay; the Chulbaир and Baysuntau mountains, the Sangardak river basin (the Surkhandarya region). Inhabits stony and slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



274. ЁПИРМА КАРРАК

Кузиния широкооберточная / *Cousinia platystegia* Tscherneva

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг жанубидаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Поялари кўп, тик, чалкаш тукли, юқори қисмидан шохланувчи, қисқа шохларнинг учидаги саватчалари 2-3 тадан бўлиб, зич жойлаш-



ган. Ёпирма барглари кенг бандли, поядаги барглари бандсиз, чўзиқ ёки наштарсимон, четлари тишисимон тиканли, юқори томони ингичка чалкаш тукли, пастки томони оқиш қалин тукли. Саватчалари цилиндриксимон. Гултожи сарик, ўрама баргларидан қисқа. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг ғарбий тармоқлари, Кўҳитангнинг жанубий тоғ этаклари, Шеробод водийсида тарқалган.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тоғлардаги ола жинсларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ф. Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Очень редкий эндемик Южной части Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 25 см. Стеблей несколько, прямостоячие, паутинистые, на верхушке слегка ветвистые, с укороченными ветвями, несущими на концах скученные по 2-3 корзинки. Прикорневые листья с расширенными черешками; все стеблевые-сидячие, продолговатые или ланцетные, по краю колючезубчатые, сверху м тонкопаутинистые, снизу – беловойлочные. Корзинки цилиндрические. Венчики жёлтые, не выдающиеся из листочек обертки. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: западные отроги Гиссарского хребта, южные предгорья Кугитанга, Шерабадская долина.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород в низкогорьях.

Численность. В 2013 г. было зарегистрировано около 120 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение площадей пестроцветов.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ф. О. Ҳасанов.

Very rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the western outskirts of the Hissar range, the southern foothills of the Kughitang range, the Sherabad valley (the Surkhandarya region). Inhabits outcrops of gypseous rocks in low-hills. In 2009, about 100 plants were revealed. Limiting factors: decreasing of gypseous habitats. Measures of protection: not protected.



275. ЖИЗЗАХ КАРРАГИ

Кузиния джизакская / *Cousinia dshisakensis* Kult.

Мақоми 3. Шимоли-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–40 см га етадиган, ўқ илдизли, икки йиллик ўт. Пояси якка каллакли шохчалардан иборат. Ёпирма барглари лирасимон, кенг бандли. Поядаги барглари чўзиқ, четлари йирик тишсимон тиканли, учи ҳам йирик тиканли, устки томони чалкаш тукли, пастки томони қалин кулранг тукли. Саватчаси йирик, диаметри 2–2,5 см. Тожи ўрама баргчалардан бироз узун, пушти рангли. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Навоий, Самарқанд ва Жиззах вилоятлари: Нурота, Туркестон ва Молгузар тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва пастки қисмларида тошли ва шағалли ёнбағирларда ҳамда қояларда ўсади.

Сони. Тўплари кам тупли (1 га да 20 тупгача), олис-олис жойлашган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан ташқари кўп боқилиши кўпайишига салбий таъсир қилмоқда. Камёблигининг табиий сабаблари ҳам бўлса керак.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1962 йилдан бошлаб экиб келинади.

Муҳофаза чоралари. Айрим популяциялари Зомин миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [289, 321, 324, 325, 327].

Г. У. Кодиров.

Статус 3. Редкий эндемик Северо-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Стержнекорневой травянистый двухлетник высотой 20–40 см. Стебель с одноголовчатыми ветвями. Прикорневые листья лировидные, широко черешковые, стеблевые – продолговатые, по краю – крупно-колючезубчатые, оканчиваются крупной колючкой, сверху – пятилистистые, снизу – серовойлочные. Корзинки крупные, 2–2,5 см в диаметре, венчики слегка выдающиеся из листочков обертки, розовые. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской и Навоийской областях: хребты Нуратау, Туркестанский и Малгузарский.

Места обитания. Щебнистые склоны и скальные выходы в нижнем и среднем поясах гор.

Численность. Популяции малочисленные, с единично расбросанными растениями (до 20 особей на 1 га).

Размножение. Семенное.


Причины изменения численности и ареала. Интенсивный выпас. Вероятно, имеются и естественные причины снижения численности.

Культивирование. С 1962 г. успешно выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Часть популяций находится на территории Зааминского национального парка.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Г. У. Кодиров.



Rare endemic species of the north-western Pamir-Alay. It is spread at the Nuratau, the Turkestan and Malguzar ranges (the Djizakh, the Samarkand and Navoi regions). Inhabits slopes and rock outcrops in the lower and middle belts of mountains. Populations are not numerous with single sparse plants (up to 20 specimens per 1 hectare). Measures of protection: some populations protected in the Zaamin national park.



276. КИНДИКЧАЛИ КАРРАК

Кузиния пупочковая / Cousinia umbilicata Juz.

Мақоми 2. Қизилқумга мансуб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Поясининг бўйи 60 см гача етадиган, деярли асосидан шохланувчи, шохчалари якка бошчали, тўп гуллари ёйик, кўп йиллик ўт. Баргларининг устки томони яшил рангли, чалкаш тукли, йўғон томирли, пастки томони қулранг қалин тукли. Ёпирма барглари чўзиқ наштарсимон, патсимон бўлинган, бандли, бандининг асоси бироз кенгайган, оқиш қалин тукли. Поядаги барглари бандсиз кенг наштарсимон, сийрак тишисимон тиканли. Саватчаси кенг цилиндрисимон. Тожи сариқ. Уруғи деярли тўрут қиррали, қулранг. Июнь–август ойларида гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Бухоро, Навоий вилоятлари: Қизилқумдаги қолдиқ тепаликлар (Кўнғиртоғ, Етимтоғ ва Оқтоғлар)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тепаликлардаги тошли, тош-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.



Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу тур алоҳида тупроқ шароитига мослашганлиги учун камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. 1964 йили ЎзР ФА Қизилқум чўл станцияси тажриба майдонида экиб ўстирилган. Ўсиб чиқсан нихоллар шу йилнинг ўзидаёт қуриб қолган.

Муҳофаза чоралари. Максус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 2. Эндемик Қызылкума.

Краткое описание. Многолетнее растение высотой до 60 см. Стебель почти от основания обильно ветвистый, веточки одноголовчатые, собраны в раскидистое соцветие. Листья сверху – зелёные, паутинистые, с выступающими жилками, снизу – серовато-бледные. Прикорневые листья черешковые, с беловатыми, у основания слегка расширенными черешками, продолговато-ланцетные, перистолопастные. Стеблевые листья сидячие, широколанцетные, расставленно-колючезубчатые. Корзинки широкоцилиндрические. Венчики желтые. Семянки почти четырехгранные, серые. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Бухарской и Навоийской областях: Қызылкумы – останцевые возвышенности Кингиртау, Джетымтау и Актау.

Места обитания. Каменистые, каменисто-щебнистые склоны останцевых возвышенностей.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас.


Культивирование. В 1964 г. был высеян в коллекционном питомнике Қызылкумской пустынной станции АН РУз. Всходы выпали в том же году.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [321, 324, 325, 327].

К. Ш. Тожибаев.


Endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Kingirtau, the Dzhetymtau and Aktau (the Bukhara and Navoi regions). Inhabits stony, stony-slopes of remnant hills. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



277. Нозикбош каррак

Кузиния изящноголовая / *Cousinia glaphyrocephala* Juz. et Tscherneva

Мақоми 1. Ўзбекистоннинг жанубида ки-
чик майдонларда ўсадиган жуда камёб эндемик
ўсимлик.



Қисқача тавсифи. Бўйи 20 см га етадиган кўп йиллик ўт. Поялари кўп, қалин тукли, ўрта қисмидан шохланувчи, шохлари ингичка, қисқа, якка каллакли. Баргларининг устки томони чалкаш тукли, пастки томони оқиш қалин тукли. Ёпрма барглари қисқа бандли, патсимон бўлинган. Поядаги барглари юқорига қараб кичи-
клашиб боради, бандсиз, наштарсимон, асоси 1-2 жуфт тишли. Саватчаси тухумсимон, чалкаш тукли. Ўрама барглари 40 та атрофида, қиррали. Тожи ўрама баргчаларидан узун, пушти рангли. Уруғи тескари тухумсимон, силлиқ. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тиз-
масининг жануби-ғарбий тармоқлари (Сувсизтоғ, Навобулоқ)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Умумий сони ҳақида маълумотлар йўқ.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [310, 321, 324, 325, 327].

Г. М. Шерматов.

Статус 1. Очень редкий эндемик южной части Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 20 см. Стебли (их несколько) тонковойлочные, от середины ветвистые. Ветви тонкие, укороченные, одноголовчатые. Листья сверху паутинистые, снизу - бело-войлочные; прикорневые - короткочерешковые, перисторассеченные; стеблевые - постепенно кверху уменьшающиеся, сидячие, ланцетные, у основания с 1-2 парами зубцов. Корзинки яйцевидные, паутинистые. Листочки обёртки (около 40) килеватые. Венчики выдающиеся, розовые. Семянки обратнояйцевидные, гладкие. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: юго-западные отроги Гиссарского хребта - Сусызтау (Наво-Булак).

Места обитания. Каменистые горные склоны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [310, 321, 324, 325, 327].

Г. М. Шерматов.

Very rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the south-western outskirts of the Hissar range: the Susyztau (Navo-Bulak), (the Surkhandarya region). Inhabits stony mountain slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



278. ОҚИШ КАРРАК

Кузиния белесоватая / Cousinia candidans Juz.

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудга хос жуда камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 70 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Пояси ётиқ-чалкаш тукли, асосидан шохланувчи, якка каллакли. Барглари чармсимон, ҳар икки томони кулранг қалин тукли, учи қаттиқ тиканли. Ёпрма барглари қисқа бандли, чўзиқ, япрогининг четлари йирик тишли ёки бўлакли. Саватчаси тухумсимон, диаметри 2 см гача, чалкаш қалин тукли. Ўрама баргчалари тарвақайлаган, қаттиқ, учи уч қиррали тиканли. Тожи тўқ қизил рангли. Уруғлари доғли, деярли



уч қиррали. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Боботоғ тизмасида тарқалган. Тоҷикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги оҳактошларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

F. M. Шерматов.

Статус 2. Очень редкий вид южной части Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 70 см. Стебель прижатопаутинистый, от основания ветвистый, одноголовчатый. Листья кожистые, с обеих сторон серовольчочные, оканчивающиеся крепкими колючками. Прикорневые – короткочерешковые, продолговатые, по краю – крупнозубчатые или лопастные. Корзинки яйцевидные, до 2 см в диаметре, густопаутинистые. Листочки обёртки оттопыренно-торчащие, крепкие, оканчиваются трехгранный колючкой. Венчики пурпурные. Семянки пятнистые, почти трёхгранные. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Бабатаг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Известняки в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единично.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Г. М. Шерматов.

Very rare species of the southern Uzbekistan. It is spread at the Babatag range (the Surkhandarya region). Inhabits limestones in the middle mountainous zone. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



279. ПАТТАНГАЧАЛИ КАРРАК

Кузиния перисточешуйчатая / *Cousinia pterolepida* Kult.

Мақоми 3. Фарбий Тянь-Шанга мансуб камёб эндемик үсимликтің.

Қисқача тавсифи. Илдизи ёғочланувчи, күп бошчали, пояси күп, бўйи 35–45 см га етадиган, чалкаш қалин тукли, якка каллакли кўп йиллик ўт. Барглари чармсимон, устки томони кулранг-яшил, чалкаш тукли, пастки томони оқиш қалин тукли. Ёпирма барглари ва поянинг пастки қисмидаги баргларининг узунлиги 14–25 см, энг юқоридаги барглари тиканли бўлакларга ажралган. Саватчаси цилиндрическимон, туксиз. Ўрама баргчалари кўп. Тожи пушти рангли. Уруғи тескари



тухумсимон, туксиз, силлиқ. Август ойида гуллаб, меваси авгуист-сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Уғом тизмасидаги Курушойл довонида, Тепарсойда тарқалган. Қозоғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмida майдада жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши сабабли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Ўсиш жойлари Уғом-Чотқол миллий табиат боғида жойлашган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Г. М. Шерматов.

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. Корень деревянистый, многоглавый. Стебли (их несколько) высотой 35–45 см, паутинисто-войлочные, одноголовчатые. Листья кожистые, сверху – серовато-зелёные, тонкопаутинистые, снизу – бело-войлочные; прикорневые и нижние стеблевые листья длиной около 14–25 см и самые верхние почти колюче-лопастные. Корзинки цилиндрические, голые. Листочки обёртки многочисленные. Венчики розовые. Семянки обратнояйцевидные, голые, гладкие. Цветёт в августе, плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Угамский хребет, перевал Курушюл, верховье Тепарсая. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Мелкоземистые склоны в субальпийском поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Г. М. Шерматов.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Ugam range, the Kurushyul passage, the Teparsay (the Tashkent region). Inhabits the northern slopes in the subalpine mountainous zone. The quantity is unknown. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



280. СИЛЛИҚТУКЛИ КАРРАК

Кузиния гладкощетинковая / *Cousinia glabriseta* Kult.

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойнинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25 см гача етадиган икки йиллик ўт. Пояси йўл-йўл чизиқли баргли, асосидан шохланувчи, шохлари якка каллакли. Барглари чармсимон, юқори қисми чалкаш тукли, пастки томони оқиши-қалин тукли, четлари йирик тишли. Поясининг ўрта ва юқори қисмидаги барглари бандсиз, юмалоқ, пояни ярим қамраб



туради. Саватчаси тухумсимон-юмалоқ, сийрак чалкаш тукли. Ўрама баргчалари нисбатан кам, тарвақайлаган, сийрак чалкаш тукли. Тожи пушти рангли, ўрама баргчалардан узунроқ. Уруғи тескари тухумсимон. Июнь ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўҳитанг тизмасида тарқалган. Туркманистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмидаги шағалли ва майда жинс тупроқли ёнбағирларда учрайди.

Сони. Табиатда бу тур кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [321, 324, 325, 327]

Ғ. М. Шерматов.

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Двухлетнее травянистое растение высотой до 25 см. Стебель полосато-бороздчатый, облиственный, от основания ветвистый, ветви одноголовчатые. Листья кожистые, сверху – тонкопаутинистые, снизу-беловойлочные, по краю-крупнозубчатые; верхние – стеблевые, средние – сидячие, округлые, полуостеблеобъемлющие. Корзинки яйцевидно-шаровидные, слабопаутинистые. Листочки обёртки, сравнительно, немногочисленные, оттопыренно торчащие, слегка паутинистые. Венчик розовый, выдающийся. Семянки обратнояйцевидные. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Мелкоземисто-щебнистые склоны верхнего пояса гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется Сурханским заповедником.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ғ. М. Шерматов.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Kughitang range (the Surkhandarya region). Inhabits stony slopes in subalpine zone. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



281. СОХТАТУКЛИ КАРРАК

Кузиния ложношерстная / *Cousinia pseudolanata* Popov ex Tscherneva

Мақоми 1. Оқтоғ тизмасининг жуда камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80 см га етадиган кўп ийллик ўт. Пояси битта, тик ўсуви, баргли, йўғон, қалин тукли. Ёлирма барглари патсимон бўлинган, бандсиз, ости томони туксиз, устки томони безчасимон тукли, ёки ҳар икки томони қалин тукли. Тўпгуллари ингичка бошоқсимон. Саватчаси қисқа бандли, йирик, тукли. Ўрама баргчалари кўп, силлиқ. Тожи сариқ. Уруғи тескари-тухумсимон, деярли уч қиррали. Июль ойида гуллаб, меваси июль-августларда етилади.

Тарқалиши. Навоий вилояти: Нурота тоғларида Оқтоғ (Лангар қишлоғи атрофи)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги тош-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка, баъзан кичик тўплар ҳосил қилиб учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.


Манбалар. [18, 289, 321, 324, 325, 327].

И. В. Белолипов.

Статус 1. Очень редкий эндемик хребта Актау.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 80 см. Стебли одиночные, прямостоячие, толстые, войлочно-опущенные, облистственные. Листья розеток перисторассечённые, сидячие, снизу-голые, сверху-железистые, или с обеих сторон густоопущенные. Соцветия узкоколосовидные. Корзинки на коротких цветоножках, крупные, опущенные. Листочки обертки многочисленные, гладкие. Венчики жёлтые. Семянки обратнояйцевидные, почти трёхгранные. Цветёт в июле, плодоносит в июле-августе.


Распространение. Навоийская область: Нурачинские горы, хребет Актау, окрестности кишлака Лангар.



Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами, реже образует небольшие группы.

Размножение. Семенное.



Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры не разработаны.

Источники. [18, 289, 321, 324, 325, 327]

И. В. Белолипов.

Very rare endemic species of the Aktau range. It is spread at the Nuratau mountains, the Aktau range, nearby the Langar village (the Navoi region). Inhabits stony slopes in the middle mountainous zone. The quantity is unknown. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: not protected.

282. ТИК КАРРАК

Кузиния торчащая / *Cousinia stricta* Tscherneva

Мақоми 2. Жанубий Ўзбекистоннинг жуда камёб тури.

Қисқача тавсифи. Бўйи 70 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Поялари бандсиз безчали, юқори қисми сийрак шохли, шохчалари кўп саватчали. Тўпгули рўваксимон. Барглари чармсимон, ҳар икки томони яшил, устки томони бандсиз безчали, пастки томони жуда сийрак чалкаш тукли. Ёпрма барглари бандли, чўзиқ наштарсимон,



патсимон бўлакли. Поядаги барглари бандсиз, наштарсимон, патсимон бўлинган. Саватчаси чўзиқ цилиндрический. Тожи сариқ ранга. Уруғи очкулранг, қора доғли, уч қиррали, уни уч тишли. Июль–август ойларида гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Боботоғда тарқалган. Тоҷикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги очилиб қолган ола жинсларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам учрайди, фақат бир жойда маълум.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайса керак.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тур маълум тупроқ шароитида ўсишга мослашганлиги оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

F. М. Шерматов.

Статус 2. Очень редкий вид Южного Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 70 см. Стебель с сидячими железами, в верхней половине рыхловетвистый; ветви несут многочисленные корзинки, собранные в метельчатое соцветие. Листья кожистые, с обеих сторон зелёные, сверху – с сидячими железами, снизу – очень незначительно-паутилистые; прикорневые листья черешковые, продолговато-ланцетные, перистораздельные; стеблевые – сидячие, ланцетные, перисто-лопастные. Корзинки продолговато-цилиндрические. Венчики жёлтые. Семянки светло-серые с чёрными точечными пятнами, почти трёхгранные, наверху трёхзубчатые. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Бабатаг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород в среднем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко, отмечен в 1 пункте.

Размножение. Видимо, семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к специфическим местам обитания.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не разработаны.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Г. М. Шерматов.

Very rare species of the southern Uzbekistan. It is spread at the Babatag range (the Surkhandarya region). Inhabits outcrops of gypseous rocks in the middle belt of mountains. Collected only once. Measures of protection: not protected.



283. УЗУНБАРГ КАРРАК

Кузиния длиннолистная / *Cousinia dolichophylla* Kult.

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шаннинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 90 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Пояси ноаниқ йўл-йўл чизиқли, чалкаш тукли, юқори қисми эса момиқ тукли. Ёкирма барглари узун бандли, чўзиқ наштарсимон, кўпинча йирик, узунлиги 25–30 см, кенглиги 5–8 см, чармсимон, устки томони сийрак чалкаш тукли, яшил, пастки томони оқиши қалин тукли, патсимон бўлакли, четлари тикан тишли. Поянинг пастки қисмидаги барглари ёкирма баргларга ўхшаш, ўрта қисмидаги барглари бандсиз, энг юқоридаги барглари майдада, маълум оралиқда жойлашган, бандсиз, четлари бўлинган, тиканли. Саватчалари кўп, кўп гулли, қисқа бандли. Тожи оч сарғиш, ўрама баргчаларидан узун. Уруғи тескари пирамидасимон, йирик, узунлиги 7 мм гача етади. Июль–август ойларида гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Қоржонтов, Уғом ва Писком тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги майдада жинс тупроқли, шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда, баъзан тўп бўлиб тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимликларни пичанга ўриб олиш оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Ўсиш жойлари Уғом-Чотқол миллий табиат боғида жойлашган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327]

К. Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 90 см. Стебель неясно-полосато-бороздчатый, паутинистый, наверху почти войлочный. Прикорневые листья длинночерешковые, продолговато-ланцетные, обычно крупные, длиной 25–30 см и шириной 5–8 см, кожистые, сверху – очень незначительно-паутинистые, зелёные, снизу – беловойлочные, перистораздельные, по краю колючезубчатые; нижние стеблевые – подобны прикорневым; средние такие же, но сидячие; самые верхние – расставленные, сидячие, колючелопастные, мелкие. Корзинки многочисленные и многоцветковые, на укороченных ножках. Венчики бледно-желтоватые, выдающиеся. Семянки обратнопирамидальные, крупные, длиной до 7 мм. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Каржантай, Угамский и Пскемский хребты.

Места обитания. Мелкоземисто-щебнистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единично, реже образует небольшие группы.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сенохожение.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Места произрастания расположены на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [321, 324, 325, 327].

К. Ш. Тожибаев.



Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Karzhantau, the Ugam and Pskem ranges (the Tashkent region). Inhabits fine earth-slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



284. ҲУРПАЙГАН КАРРАК

Кузиния вооруженолистная / Cousinia haplophylla Tscherneva

Мақоми 2. Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқларида тарқалган камёб эндемик ўсимлик.



Қисқача тавсифи. Бўйи 80 см га етадиган кўп ийллик ўт. Пояси кулранг қалин тукли, ўрта қисми қалин шохли, якка каллакли. Барглари чармсизмон, ҳар икки томони кулранг-яшил, қалин тукли. Поядаги барглари юқорига қараб кичрайиб боради, пастки қисмидаги барглари бандсиз ёки қисқа бандли, тескари наштарсизмон, патсизмон қирқилган, четлари жингалаксизмон. Саватчasi юмалоқ, диаметри 18–20 мм, чалкаш тукли. Ўрама баргчалари кўп, ҳурпайган, қиррали. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси авгуустда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Чўлбайир тоғларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва юқори қисмидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

F. M. Шерматов.

Статус 2. Редкий эндемик юго-западных отрогов Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 80 см. Стебель серовато-войлочный, в средней части обильно ветвистый, одноголовчатый. Листья кожистые, с обеих сторон серовато-зелёные, войлочные; стеблевые листья постепенно кверху уменьшаются; нижние – сидячие или коротко-черешковые, обратноланцетные, по краю-курчавые, перистораздельные. Корзинки шаровидные, 18–20 мм в диаметре, паутинистые. Листочки обёртки многочисленные, оттопыренно вверх торчащие, по спинке килеватые. Цветёт в июне–июле, плодоносит в августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: горы Чульбаир.

Места обитания. Каменистые склоны у верхней границы среднего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры не разработаны.

Источники. [321, 324, 325, 327].

F. M. Шерматов.

Rare endemic species of south-western branches of the Hissar range. It is spread at the Chulbair mountains (the Surkhandarya region). Inhabits stony slopes at the upper border of the middle belt of mountains. The quantity is unkown. Measures of protection: not protected.



285. ШУБҲАЛИ КАРРАК

Кузиния сомнительная / Cousinia haesitabunda Juz.

Мақоми 2. Фарбий Помир-Олойда тарқалган жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Пояси унча чуқур бўлмаган чизиқли, чалкаш тукли, сийрак баргли. Ёпирма барглари кам, чўзиқ наштарсимон, пастки томони оқиш қалин тукли, патсимон қирқилган, четлари тикансимон тишли. Поядаги барглари майдада, бандсиз, пояни ярим қамраб туради. Саватчаси тухумсимон, диаметри 10–12 мм, туксиз. Ўрама баргчалари кўп, қаттиқ чармсимон. Тожи сариқ, Уруғи тескари тухумсимон, деярли тўрт қиррали. Май-июнъ ойларида гуллаб, меваси июнъ-июлда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Навоий вилоятлари: Молгузар, Нурота тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги шағалли, майда жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсиб турган ерларининг ўзлаштирилиши ва чорва молларининг кўплаб боқилиши унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

F. M. Шерматов.

Статус 2. Очень редкий эндемик западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 50 см. Стебель неглубокобороздчатый, тонкопаутилистый, очень рыхлооблиственный. Листья в прикорневой розетке, немногочисленные, продолговато-ланцетные, снизу-беловойлочные, перисторассеченные, по краю колючезубчатые; стеблевые мелкие, сидячие, полустеблеобъемлющие. Корзинки яйцевидные, 10–12 мм в диаметре, голые. Листочки обёртки многочисленные, твердокожистые. Венчик жёлтый. Семянки обратнояйцевидные, почти четырёхгранные. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Джизакской, Навоийской областях: Мальгузарский и Нуратинский хребты.

Места обитания. Мелкоземисто-щебнистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение территорий под сельхозугодья, чрезмерный выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [321, 324, 325, 327].

G. M. Шерматов.

Very rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Malguzar and Nuratau ranges (the Djizakh, the Navoi regions). Inhabits fine earth-slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: not protected.



286. ЭГРИТИКАН КАРРАК

Кузиния согнутоколючковая / *Cousinia campyloraphis* Tscherneva

Мақоми 2. Ҳисор тизмасининг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–50 см га етадиган кўп йиллик ўт. Пояси тик, йўл-йўл чизиқли, қалин чалкаш тукли, ўрта қисмидан шохланувчи. Барглари чармсимон, ҳар икки томони қалин тукли. Ёпирма барглари бандли, чўзиқ эллипссимон, деярли бўлинган, тикан тишчали. Саватчаси кенг тухумсимон, диаметри 15–17 мм, тукли. Ўрама баргчалари кўп, қиррали, сиртидагилари пастга қараб эгилган. Тожи пушти. Уруғи кулранг. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Қашқадарё ҳавзасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги майда жинс тупроқли ёнбагирларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор ва Китоб қўриқхоналарида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Г. М. Шерматов.



Статус 2. Редкий эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. Стебли прямостоячие, полосатобороздчатые, паутинистовойлочные, высотой 3050 см, от середины ветвистые. Листья кожистые, с обеих сторон войлочные; прикорневые – черешковые, продолговато-эллиптические, почти лопастные, колючезубчатые. Корзинки широкояйцевид-



ные, 15–17 мм в диаметре, опущенные. Листочки обёртки многочисленные, килеватые, наружные – отогнутые. Венчик розовый. Семянки серые. Цветёт в июне–июле, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. Кашкадарьинская область: бассейн реки Кашкадарья.

Места обитания. Мелкоземистые склоны среднего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском и Китабском государственных заповедниках.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Г. М. Шерматов.

Rare endemic species of the Hissar range. It is spread at the Kashkadarya river basin (the Kashkadarya region). Inhabits fine earth slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Hissar and Kitab state reserves.

287. ҚИЗИЛГУЛЛИ КАРРАК

Кузиния красноцветная / *Cousinia rhodantha* Kult.

Мақоми 1. Ўзбекистоннинг жанубидаги камёб эндемик ўсимликтар.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25 см га етадиган икки йиллик ўт. Пояси йўл-йўл чизиқли, қисман чалкаш тукли, ўрта қисмидан шохланувчи, баргли шохчала-ри якка каллакли. Барглари оч яшил, устки томони тускиз, пастки томони қалин тукли, четлари йирик

ветвистый, ветви одноголовчатые, облиственные. Листья светло-зелёные, сверху-голые, снизу во-йлочные, по краю крупноколючезубчатые; прикорневые листья черешковые, перистораздельные, стеблевые – перисторассечённые, сидячие. Корзинки яйцевидно-шаровидные, паутинистые, до 3 см в диаметре. Листочки обёртки многочисленные, килеватые. Венчики розовые, не выдающиеся. Семянки обратнояйцевидные, светло-серые. Цветёт в июне, плодоносит в июнь-июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: юго-западные отроги Гиссарского хребта, Байсунские горы.

Места обитания. Суглинистые склоны в предгорьях.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к определенным местам обитания.

Культивирование. Сведения нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [310, 321, 324, 325, 327].

Г. М. Шерматов.



тикан тишли. Ёпирма барглари бандли, патсимон бўлинган. Поядаги барглари патсимон ўйилган, бандсиз. Саватчалари тухумсимон-юмалоқ, чалкаш тукли, диаметри 3 см. Ўрама баргчалари кўп, қиррали. Тожи пушти, ўрама баргчаларидан қисқа. Уруғи тескари тухумсимон, оч кулранг. Июнда гуллаб, меваси июнь-июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқларида, Бойсун тоғларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларидағи қумлок ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маълум тупроқ шароитига мослашганлиги унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.


Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [310, 321, 324, 325, 327].

Ф. М. Шерматов.

Статус 1. Очень редкий эндемик южной части Узбекистана.

Краткое описание. Двухлетнее травянистое растение высотой до 25 см. Стебель полосатобороздчатый, частично паутинистый, от середины



288. СПРИГИН КАРРАГИ

Кузиния Спрыгина / *Cousinia spryginii* Kult.

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Икки йиллик ўсимлиқ. Пояси 20–40 см баландликда, тик, түғри, қалин тукли, йўл-йўл, жўякли, шохлари баргли. Баргларининг устки томони ингичка, тўрсимон, пастки томони кулранг, қалин тукли, четлари тикансимон тишли, тескари тухумсимон. Саватчаси шарсимон диаметри 2,5–3,5 см (учи тўмтот) қалин тўрсимон тукли. Ўрама баргчалари ўткир, узун, учбурчаксимон, узунлиги 4 см, тиканли. Гул ўрнининг дағал туклари силлиқ. Гултожи оқиш-сариқ. Данакчаси тескари тухумсимон, қанотчаси қорамтири доғли. Май-июнда гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқларида, Кўҳитанг тизмасида ва Келиф-Шеробод тепаликларида тарқалган (Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари). Туркманистанда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Кулранг соз тупроқларда ўсади.

Сони. Оқтош қишлоғи атрофида 70 тупдан иборат 2 та популяцияси аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиий ерларнинг бузилиши ва молларнинг кўплаб боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.


Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [310, 321, 324, 325, 327].

Н. Т. Очилова.

Статус 1. Редкий узколокальный эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Двулетник. Стебель 20–40 см высоты, прямой, паутилистый, полосато бороздчатый, ветви одноголовчатые, облиственные. Листья сверху тонко паутилистые, снизу серо войлочные, по краю колючие зубчатые, обратно яйцевидные. Корзинки шаровидные, 2,5–3,5 см диаметре (без остроконечий),



густо паутилистые. Листочки обертки заострены в длинные, трехгранные до 4 см длины колючки. Щетинки цветоложа гладкие. Венчики бледно желтые. Семянки обратно яйцевидные, крылатые с темными точками. Цветет в мае-июне, плодоносит в августе.

Распространение. В Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях: юго-западные отроги Гиссарского хребта, Кугитанг, Келиф-Шерабадская грязда. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Серые глины.

Численность. 2 популяции в окрестностях к. Акташ (70 растений).

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Разрушение естественных местообитаний и выпас.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [310, 321, 324, 325, 327].

Н. Т. Очилова.

Very rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the south-western branches of the Hissar range, the Kughitang, the Kelif-Sherabad range (the Surkhandarya and Kashkadarya regions). Inhabits grey clays. 2 populations nearby the village Aktash (about 70 plants) were found. Measures of protection: not protected.



289. ГУЖТУК КАРРАК

Кузиния превосходная / *Cousinia praestans* Tscherneva et Vved.

Мақоми 2. Фарбий Помир-Олойда тарқалған жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бүйі 1 м гача етадиган икки йиллик ўт. Пояси ғуж-ғуж тукли, йүл-йүл чизиқли, барғли, асосидан тарвақайлаб шохланган. Барглари нисбатан юмшоқ тиканлы, устки томони чалкаш тукли, пастки томони күлранг қалин тукли. Поянинг пастки қисмидаги барглари бандсиз, пояни ярим қамраб туради, патсимон бўлакли, четлари нотекис тикансимон тишли; ўрта қисмидаги барглари бандсиз, бўлакли, четлари майда тикансимон тишли; юқоридагилари бандсиз, юмалокроқ, четлари тикансимон тишли. Саватчалари юмалоқ, ийрик, узунлиги 4 см, диаметри 3–3,5 см, қалин чалкаш тукли. Ўрама баргчалари қаттиқ. Тожи пушти рангли. Уруғи тескари тухумсимон, силлиқ, ялтироқ. Май–июнь ойларида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Қашқадарё сув ҳавзаси – Ҳисор тизмасининг фарбий қисмida, Зарафшон тизмасининг жанубий ёнбағридан Оёқчи дарё водийсизда тарқалған.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда кам тарқалған.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу турнинг маълум ўсиш шароитига мослашганлиги унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ф. М. Шерматов.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Двухлетнее травянистое растение высотой до 1 м. Стебель клюковато-войлочный, полосатобороздчатый, облиственный, от самого основания раскидисто ветвистый. Листья сравнительно мягкие, умеренно колючие, сверху-тонкопаутинистые, снизу-серовойлочные; нижние стеблевые – сидячие, полуустеблеобъемлющие, перистолопастные, по краю неравномерноколючезубчатые; средние – сидячие, лопастные, по краю мелколючезубчатые; верхние – сидячие, почти округлые, по краю колючезубчатые. Корзинки шаровидные, крупные, длиной около 4 см и 3–3,5 см в диаметре, густопаутинистые. Листочки обёртки жёсткие. Венчики розовые. Семянки обратнояйцевидные, гладкие, блестящие. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. Кашкадарьинская область: бассейн реки Кашкадарья – западные отроги Гиссарского хребта, долина реки Аякчи на южном склоне Зарафшанского хребта.

Места обитания. Каменистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлена.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ф. М. Шерматов.

Very rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Kashkadarya river basin: the western outskirts of the Hissar range, the Ayakchi river valley on the southern slopes of the Zaravshan range (the Kashkadarya region). Inhabits stony slopes in the middle belt of mountains. The quantity unknown. Measures of protection: protected in the Hissar state reserve.



290. ҚОЯ КСИЛАНТЕМУМИ

Ксилантемум скальный / *Xylanthemum rupestre* (Popov ex Nevski) Tzvelev

Мақоми 1. Кўҳитанг тизмасининг камёб, стенобионт ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. 10–20 см баландликдаги яримбутикача, шохлари қўнғир тусли туклар билан қопланган. Барглари кулранг-яшил, тукланган, 1–1,5 см узунликда, патсимон қирқилган. Саватчалари якка-якка, гуллари кам сонли, узунлиги 5–6 мм, эни 4–5 мм, цилиндр шаклида. Ўрама барглари тукланган, эллипс шаклида, учи тўмтоқ. Гуллари сариқ, без тукли. Уруғлари 2,5 мм узунликда. Попуклари 1,2 мм узунликда. Июлда гуллайди, августда мевалайди

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўҳитанг тизмаси.

Ўсиш жойи. 2600–3000 м баландликдаги қояларда ўсади.

Сони. 2001 йилда 50 тупи қайд этилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Реликт, петрофит эндемик.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [128, 310].

Ф. ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий стенобионтный эндемик Кугитанга.

Краткое описание. Полукустарничек 10–20 см высоты, с бурьми опущенными веточками. Листья серо-зеленые, опущенные, 1–1,5 см длины, перисто-рассеченные. Корзинки одиночные, малоцветковые, 5–6 мм длины, 4–5 мм ширины, цилиндрические. Листочки обертки опущенные, эл-

липтические, тупые. Цветы желтые, железистые. Семянки 2,5 мм длины. Хохолок 1,2 мм длины. Цветет в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: эндемик хребта Кугитанг.

Места обитания. Скалы (2600–3000 м).

Численность. Зарегистрировано 50 растений в 2001 году.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Реликтовый петрофильный эндемик.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [128, 310].

Ф. О. Ҳасанов.

Very rare endemic species of the Kughitang range. It is spread at the Kughitang range (the Surkhandarya region). Inhabits rocks. 50 plants were found in 2001. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



291. БОБОТОФ КҮКБОШИ

Мордовник бабатагский / *Echinops babatagensis* Tscherneva

Мақоми 3. Ўзбекистоннинг жанубидаги кичик майдонларда тарқалган жуда камёб эндемик ўсимликтада.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–30 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Пояси тик, жўякли, безчали ва момиқ тукли, шохланган, якка бошчали. Баргларининг устки томони безчали, пастки томони кулранг қалин тукли, йўғон томирли. Ёпирма барглари бандли, патсимон бўлинган, майдада тишсимон тиканли. Поянинг пастки ва ўрта қисмидаги барглари ёпирма баргларига ўхшаш, аммо бандсиз. Саватчаларининг узунлиги 10–20 мм. Ўрама баргчалари 28–30 та, ҳаворанг. Уруғи чўзиқ, қалин сариқ тукли. Июль–август ойларида гуллаб, меваси август–сентябр да етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Боботоф тизмасида тарқалган. Тожикистанда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги оҳактошларда ва гипсларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўзига хос тупроқ шароитига мослашганлиги унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [332, 333].

И. И. Мальцев.

Статус 3. Очень редкий эндемик южной части Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 20–30 см. Стебли прямостоячие, бороздчатые, железистые, с вильочным опушением, ветвистые, одноголовчатые. Листья сверху густожелезистые, снизу – с резко выдающейся средней жилкой, тонкосеровой лож-

ные. Прикорневые черешковые, перистораздельные, мелкоколючезубчатые. Нижние и средние стеблевые подобны прикорневым, но сидячие. Корзинки длиной 10–20 мм. Обёртка состоит из 28–30 голубоватых листочек. Семянки густожёлтоволосистые, продолговатые. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Бабатаг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Известняки и гипсы среднего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не разработаны.

Источники. [332, 333].

И. И. Мальцев.

Very rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the Babatag range (the Surkhandarya region). Inhabits lime-stones and gypses in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



292. ҚИСҚАМЎЙ КЎҚБОШ

Мордовник короткокисточковый / *Echinops brevipenicillatus* Tscherneva

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг жанубидаги жуда камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–60 см га етадиган кўп йиллик ўт. Пояси тик, баргли, юқори қисми шохланган, юза жўякли, оқиш қалин тукли. Барглари чармсимон, устки томони яшил, сийрак безчали, чалкаш тукли, пастки томони оқиш қалин тукли. Ёпирма барглари йирик, четлари бутун,

лиственний, в верхней части ветвистый. Листья кожистые, сверху – зелёные, рассеянно железистые, тонкопаутистые, снизу – беловойлочные; прикорневые – крупные, цельнокрайные, длинночерешковые, кожистые; стеблевые – постепенно кверху уменьшающиеся, сидячие. Нижние стеблевые листья с маленькими ушками, продолговато-ланцетные. Корзинки шаровидные, около

5 см в диаметре. Обертка состоит из 16–19 гладких листочек. Венчик беловатый, глубокорассечённый, с железистой трубкой. Семянки густоволосистые. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Бабатаг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород в предгорьях и нижнем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала.

Приуроченность к выходам пестроцветных пород.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [332, 333].

И. И. Мальцев.

Very rare species of the southern Uzbekistan. It is spread at the Babatag range (the Surkhandarya region). Inhabits outcrops of gypseous rocks in foot-hills and the lower belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: growing on gypseous rocks. Measures of protection: not protected.

узун бандли, чармсимон. Поядаги барглари юқорига қараб кичрайиб боради, бандсиз. Поянинг пастки қисмидаги барглари кичик ўсимтали, чўзиқ наштарсимон. Саватчаси юмалоқ, диаметри 5 см атрофида. Ўрама баргчалари 16–19 та, силлиқ. Тожи оқиш, чукӯр кесилган, найчаси безчали. Уруғи қалин тукли. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Боботог тизмасида тарқалган. Тожикистанда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмидаги ва тоғ этакларида очиқ ола жинсларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Очилиб қолган ола жинсларда ўсанлиги учун улар чекланган майдонлардагина сақланиб қолган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [332, 333].

И. И. Мальцев.

Статус 2. Очень редкий вид южной части Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 30–60 см. Стебель прямостоячий, неглубокобороздчатый, беловойлочный, об-



293. НУРОТА ЛЕПИДОЛОФАСИ

Лепидолофа нуратинская / Lepidolopha nuratavica Krasch.

Мақоми 3. Ғарбий Помир-Олойдаги ареали бўлинган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80–100 см га етадиган асосидан шохланувчи ярим бута. Йиллик шохчалари тўғри, қалин тукли, пастки қисми баргли, якка саватчали. Барглари кўкимтири-яшил, қисқа ётиқ тукли, нуқтасимон безчали, поянинг пастки қисмидаги ҳамда мевасиз шохларидаги барглар қисқа бандли, уч бўлакли, поянинг юқори қисмидаги барглари эса бандсиз. Саватчалари майда. Ўрама баргчалари цилиндрсизмон, қисқа, ётиқ тукли. Гуллари сариқ, безчали. Уруғи ҳам безчали. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд, Навоий, Сурхондарё вилоятлари: Нурота ва Кўхитанг тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмидаги тошли ва шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Тўп-тўп бўлиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маҳаллий аҳоли томонидан ўтин сифатида кўп миқдорда кесиб олиниши ва чорва молларининг боқилиши оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар ийқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон ва Нурота кўриқхоналарида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [12, 117, 127].

Н. Ю. Бешко.

Статус 3. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая с разорванным ареалом.

Краткое описание. Полукустарник, ветвящийся от основания, высотой 80–100 см. Годовые побеги прямые, прижато опущенные, в нижней части облиственны, с одиночными корзинками. Листья сизовато-зелёные, коротко прижато опущенные, точечно железистые, нижние стеблевые и листья стерильных побегов коротко черешковые, трёхрассечённые, выше по стеблю сидячие. Корзинки мелкие. Обертка цилиндрическая, коротко прижато опущенная. Цветки жёлтые, железистые. Семянки железистые. Цветёт в июне–июле, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской, Навоийской и Сурхандарьинской областях: Кугитанг и Нуратинский хребет.



Места обитания. Каменистые и щебнистые склоны в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Встречается небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Усиленная заготовка на топливо, выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском и Сурханском заповедниках.

Источники. [12, 117, 127].

Н. Ю. Бешко.

Rare endemic species of the western Pamir-Alay with reducing area. It is spread at the Kughitang and Nuratau ranges (the Djizakh, the Samarkand, the Navoi and Surkhandarja regions). Inhabits stony-slopes in the lower and middle belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: intensive feedstock as firing, pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau and Surkhan state reserves.



294. ФЕДЧЕНКО ЛЕПИДОЛОФАСИ

Лепидолофа Федченко / Lepidolopha fedtschenkoana Knorring

Мақоми 3. Фарбий Ҳисор ва Қўҳитанг тизмаларида камёб эндем ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см гача етадиган кўп пояли ярим бута. Барглари қалами, бутун, тукли. Саватчалари узун бандли. Гуллари сариқ, безчали. Уруғи майда. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси, Сурхондарё ҳавзаси (Токчиён), Қўҳитанг тизмаси (Тангидевор қишлоғи атрофи, Тарамхо булоғи атрофи ва Баглидара)да тарқалган. Туркманистанда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидағи қоя ёриқларида, тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиятда якка ҳолда ва тўп-тўп бўлиб тарқалган, 100 м² майдонга 15-20 та ўсимлик тўғри келади. Умумий сони аниқланмаган.

Места обитания. Расщелины скал, каменистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. В природе встречается единичными экземплярами и популяциями, в которых на 100 м² насчитывается 15-20 растений. Общая численность не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены. Территория используется под интенсивный выпас.

Культивирование. С 1971 г. культивируется в Ботаническом саду АН РУз. Продолжительность жизни в культуре 3-4 года.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [12, 117, 127].

И. В. Белолипов.



Қўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқ маълумотлар йўқ. Ўсимлик тарқалган жойларда чорва моллари кўплаб боқилади.

Маданийлаштирилиши. 1971 йилдан бўён ЎзР ФА Ботаника боғида экиб ўстирилмоқда. Маданий шароитда у факат 3-4 йил ўсади.

Мухофаза чоралари. Сурхон кўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [12, 117, 127].


И. В. Белолипов.

Статус 3. Редкий эндемик Западного Гиссара и Кугитанга.

Краткое описание. Многостебельный полукустарник высотой до 50 см. Листья линейные, цельные, опущенные. Корзинки сидят на длинных цветоносах. Цветки жёлтые, железистые. Семянки мелкие. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – бассейн реки Сурхандарья (Такчиян); хребет Кугитанг – окрестности кишлака Тангидувал, родника Тарамхо и Баглидара. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Rare endemic species of the western Hissar and Kughitang ranges. It is spread at the Hissar range: the Surkhandarya river basin (Takchiyan); the Kughitang range: nearby the village Tangiduvul and the Taramkho spring (the Surkhandarya region). Inhabits clefts of rocks, stony slopes in the middle belt of mountains. In nature, met with single specimens and populations (15-20 plants per 100 m²). Total number is unknown. Limiting factors: The territory is used for intensive pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



295. ВВЕДЕНСКИЙ ОЛИГОХЕТАСИ

Олигохета Введенского / Oligochaeta vvedenskyi (Popov) Tscherneva

Мақоми 3. Қизилкүм ва Ўзбекистоннинг жанубидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Поялари жуда қисқа, асосидан шохланган, бир ёки бир нечта саватчали, бир йиллик ўт. Шохлари 7-15 см узунликда, ер бағирлаб ўсади, ётиқ жингалак-чалкаш тукли. Барглари кулранг, яшил, устки қисми ётиқ жингалак тукли. Илдизолди барглари бандли, чўзиқ тухумсимон, четлари ўйилган тишли, тиканли. Саватчаси битта ёки бир нечта, чўзиқ. Ўрама баргчалари наштарсимон, устки қисми жингалак тукли. Тожи оқиши. Уруғи 3 мм узунликда, ялтироқ. Апрель-майдада гуллаб, мева-си май ойида етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё, Бухоро вилоятлари, Қорақалпоғистон: Помир-Олойда Шеробод водийси (Учқизил тепалиги) ва Жанубий Қизилкүмда тарқалган.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тоғларда ва тоғ этакларида, очилиб қолган ола жинсларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши, пичан ўрилиши ва маҳсус тупроқ шароитига мослашганлиги унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [329].

М. Тўлаганова.

Статус 3. Редкий эндемик юга Узбекистана и Кызылкума.

Краткое описание. Однолетнее травянистое растение. Стебель очень короткий, от основания ветвистый, с одной или несколькими корзинками. Ветви удлиненные, длиной 7-15 см, облистенные, стелющиеся, ребристые, прижато-курчавопапутинистые. Листья серо-зелёные, сверху-рассеянно-прижато-курчаво-волосистые. Прикорневые листья черешковые, продолговато-яйцевидные, по краю выемчатозубчатые. Корзинки одиночные или несколько, продолговатые. Листочки обёртки ланцетные, по спинке курчавоволосистые. Венчики беловатые. Семянки длиной 3 мм, блестящие. Цветёт в апреле-мае, плодоносит в мае.

Распространение. В Кашкадарьинской и Бухарской областях, Каракалпакстан: Памиро-Алай – Шерабадская долина, горки Учкызыл, Южные Кызылкумы.

Места обитания. Останцы и подгорные пустыни, выходы пестроцветных пород.



Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Усиленный выпас, заготовка кормов, приуроченность к определённым местам обитания.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [329].

М. Туляганова.

Rare endemic species of the southern Uzbekistan and Kyzylkum. It is spread at the Pamir-Alay: the Sherabad Valley, the Uchkyzyl hills, the southern Kyzylkum (the Kashkadarya and Bukhara regions, Karakalpakstan). Inhabits low mountains and submountane deserts, outcrops of gypseous rocks. The quantity is unknown. Limiting factors: the intensive pasturing, feedstock. Measures of protection: not protected.



296. ТАРОҚСИМОН ОЛЬГА

Ольга гребенчатая / *Olgaea pectinata* Iljin

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шаннинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тасиғи. Бўйи 30 – 70 см га етадиган кўп йиллик ўт. Поялари биттадан, йўғон. Барглари чармсимон, устки томони оч яшил, туксиз, пастки томони қалин тукли, узунчоқ ёки наштарсимон. Ёпрма ва поянинг пастки қисмидаги барглари аста-секин барг бандига айланади. Қолган барглари бандсиз. Саватчасининг узунлиги 6–7 см, эни 4–5 см. Ўрама барглари кўп. Тоҳи тўқ қизил, узунлиги 35–50 мм. Уруғлари узунчоқ қалами. Август ойида гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Фарбий Тянь-Шандаги Уғом тизмасида тарқалган. Қозоғистон ва Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги тошлоқ шағалли ерларда, бутазорларда ва даштларда ўсади.



Сони. Уғом тизмасидан бир марта йиғилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Асосан, чорва молларининг кўплаб боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Ўсиш жойлари Уғом-Чотқол миллий табиат боғида жойлашган.

Манбалар. [328].

М. Тўлаганова.

Статус 2. Редчайший эндемик Западного Тянь-Шана.

Краткое описание. Травянистый многолетник 30–70 см высоты. Стебли обычно одиночные толстые. Листья кожистые, сверху-светло-зеленые, голые, снизу – беловойлочные, продолговатые или ланцетные. Прикорневые и нижние стеблевые листья постепенно переходят в черешок. Остальные листья сидячие. Корзинки 6–7 см длиной, 4–5 см шириной. Листочки обертки многочисленные. Венчик 35–50 мм длиной, темно-красный. Семянки продолговато-линейные. Цветет в августе, плодоносит в сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Западный Тянь-Шань: Угамский хребет. За пределами Узбекистана: Казахстан и Кыргызстан.

Места обитания. По каменисто-щебнистым склонам гор в кустарниковом поясе и сухих степях.

Численность. Собран один раз на Угамском хребте.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Основным фактором является интенсивный выпас скота.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [328]

М. Туляганова.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the western Tien-Shan: the Ugam range (the Tashkent region). Inhabits stony-slopes of mountains in the shrubby belt and dry steppes. Once it was collected in the Ugam range. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



297. НАШТАРСИМОН СЕРРАТУЛА

Серпуха ланцетолистная / *Serratula lancifolia* Zakirov

Мақоми 2. Фарбий Помир-Олойдаги жуда кам-еңдемик ўсимликтің.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–30 см га етадиган кўп ийиллик ўт. Пояси кўп, баргли, ингичка, туксиз, саватчасининг остигина бироз тукли, якка саватчали. Барги чармсимон, иккала томони ҳам яшил, туксиз, четлари бутун, ўйилган ёки тишли. Илди-золди ва поядаги барглари бандли, наштарсимон,

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.
Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 221, 330].

М. Б. Тиркашева.

Статус 2. Очень редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 20–30 см. Стебли многочисленные, тонкие, голые, слегка опущенные под корзинкой, облиственные, одноголовчатые. Листья тонкокожистые, с обеих сторон зелёные, голые, цельные или реже выемчатые, зубчатые. Прикорневые и нижние стеблевые листья черешковые, ланцетные; остальные – к вершине стебля постепенно уменьшающиеся, узколанцетные, сидячие. Корзинки длиной до 20 см, продолговатые. Листочки обертки многочисленные, кожистые, наверху-округлые. Венчики розовые. Молодые семянки голые. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе.

Распространение. В Самаркандской и Джизакской областях: Мальгузарский и Зарабшанский хребты.

Места обитания. Каменистые склоны среднего пояса гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 221, 330].

М. Б. Тиркашева.



қолган барглари поя бўйлаб юқори кўтарилиган сари кичиклаша боради, ингичка наштарсимон, бандсиз. Ўрама баргчалари кўп, чармсимон, учи юмалоқ. Тожи пушти. Етилмаган уруғлари туксиз. Июль–августда гуллаб, август ойида мева беради.

Тарқалиши. Самарқанд ва Жиззах вилоятлари: Молгузар ва Зарабшон тизмаларида тарқалган.


Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги майдана жинс тупроқларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Very rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Malguzar and Zaravshan ranges (the Samarkand and Jizzakh regions). Inhabits stony slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



298. БУНГЕ ТАКАСОҚОЛИ

Козелец Бунге / *Scorzonera bungei* Krasch. et Lipsch.

Мақоми 2. Қизилқумдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Илдизи тугунаксимон йўғонлашган кўп йиллик ўт. Илдиз бўғизи қалин малла тукли. Пояси 2–3 та, баъзан битта, шохланган, шохчалари якка саватчали, тукли. Барглари юмшоқ, ҳар икки томони ётиқ тукли, четлари текис ёки эгри-бугри. Илдизолди барглари кенг наштарсимон, эни 1,5–2 см, бандли. Поядаги барглари қалами наштарсимон, бандсиз, пояни ярим қамраб олган. Саватчаси дастлаб цилиндри-симон, кейинчалик эса тескари чўққисимон. Мевалаганда саватчаси пастга қараб эгилади. Ўрама баргчалари кумушранг туклар билан қопланган. Гуллари сарғиши. Уруғи 6–7 мм узунликда, оқ момиқ тукли. Апрелда гуллаб, уруғи май ойида етилади.

Тарқалиши. Қорақалпоғистон: Қизилқумда Султон Увайс тоғида тарқалган.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тоғларнинг қояла-рида ва тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Жуда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маълум тупроқ шароитига мослаш-ганлиги сабабли кам тарқалган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Махсус муҳофаза чора-лари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [164, 186, 189].

Г. А. Серекеева.

Статус 2. Редкий эн-демик Кызылкума.

Краткое описание.

Многолетнее травянистое растение. Корень клубневидно-утолщенный. Корневая шейка рыжевато-серошерстистая. Стебли в количестве 2–3, реже одиночные, ветвистые, ветви с одиночными корзинками, опущенные. Листья мягкие, с обеих сторон прижато-опущенные, по краю плоские и слегка волнистые.

Прикорневые листья широколанцетные, шириной 1,5–2 см, с черешками; стеблевые линейно-ланцетные, сидячие, слегка стеблеобъемлющие. Корзинки в молодом состоянии цилиндрические, позже обратноконические, в период плодоноше-ния – поникающие. Листочки обёртки серебри-сто-опущенные. Цветки лимонно-жёлтые. Семянки длиной 6–7 мм, белошерстистые. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Каракалпакстан: Кызылкумы: останцовье горы Султан-Увейсадаг.

Места обитания. Каменистые склоны и скалы останцовых гор.

Численность. В 2009 г. отмечено всего 2 растения.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к гипсам.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [164, 186, 189]

Г. А. Серекеева.

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Sultan-Uizdag remnant hills (Karakalpakistan). Inhabits stony slopes and rocks of remnant hills. In 2009, 2 plants were revealed. Limiting factors: growing on gypseous slopes. Measures of protection: not protected.



299. БОЧАНЦЕВ ТАНАЦЕТОПСИСИ

Танацетопсис Бочанцева / *Tanacetopsis botschantzevii* (Kovalevsk.) Kovalevsk.

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг жанубида жуда кичик майдонларда сақланиб қолган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25–45 см орасида ги илдиз пояси йўғон, кўпбошчали кўп йиллик ўсимлик. Пояси кўп, пастки қисми сертуқ, камбарг. Илдизолди баргларининг узунлиги 10 см, эни 2 см, узун бандли, икки карра патсимон бўлинган. Поядаги барглари кичрайган ва камроқ бўлинган. Ҳар бир поядада 3–8 тагача саватча жойлашган. Саватчалар узун ва ингичка бандларда ўрнашиб, ёйик шингилсимон тўпгул ҳосил қиласиди. Ўрама баргчалари сарғиши яшил рангли, қалин ётиқ тукли. Гули сариқ, қалин тукли. Июль ойида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари: Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқлари (Бойсунтоғ, Яккабоғдарёсининг юқори қисми)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори қисмидаги ёнбағир ва сурилмаларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишраб чиқилмаган.

Манбалар. [125, 310].

F. M. Шерматов.

Статус 2. Очень редкий эндемик юга Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 25–45 см, с утолщенным многоглавым корневищем. Стебли многочисленные, у основания шерстистово-войлочные, слабооблистенные. Прикорневые листья длиной до 10 см и шириной 2 см, на довольно длинных черешках, дважды перисторассеченные. Стеблевые листья уменьшающиеся и менее рассеченные. Корзинки в количестве 3–8 на одном стебле, собранные на очень длинных тонких ножках в рыхлое кисте-

видное соцветие. Листочки обёртки светло-жёлто-зеленоватые, густоприжато-войлочно-опущенные. Цветки жёлтые, густоопущенные. Цветёт и плодоносит в июле.

Распространение. В Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях: юго-западные отроги Гиссарского хребта, Байсунтау, верховья реки Яккабагдарья.

Места обитания. Склоны и осыпи в верхнем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сведений нет.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [125, 310].

Г. М. Шерматов.

Very rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the south-western outskirts of the Hissar range, the Baysuntau, the Yakkabagdarya river basin (the Surkhandarya and Kashkadarya regions). Inhabits slopes and mounds in the upper belt of mountains. Population is very rare. Measures of protection: protected in Hissar state reserve.




300. БУТКОВ ТРИХАНТЕМИСИ

Трихантемис Буткова / *Trichanthemis butkovii* Kovalevsk.

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шаннинг жуда камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40 см га етадиган, йўғон, кўп бошчали, ёғочланган каудексли кўп йиллик ўт. Пояси кўп, камбаргли. Барглари қаттиқ, туксиз ёки якка-якка тукли, асосидан икки ёки уч карра патсимон бўлинган, бандиз. Саватчасида гуллари икки хил. Тилсимон уруғчи гуллари оқ, саватча ўртасидаги гуллари эса икки жинсли, сариқ. Ўрама баргчалари узун сийрак тукли. Уруғи узун оқ тукли. Июнда гуллаб, меваси июлда етилади.



Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол тизмаси (Оқбулоқ дарёсининг ҳавзаси)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта ва пастки қисмларидағи қояларда ўсади.

Сони. Кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Пичан тайёрлашда бу турнинг кўшиб ўрилиши унинг қисқариб боришига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Чотқол давлат кўриқхонасида ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [123, 315].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 2. Очень редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 40 см с толстым деревянистым многоглавым каудексом. Стебли довольно многочисленные, слабооблистственные. Листья жёсткие, голые или с единичными волосками, от самого основания дважды или почти трижды перисторассеченные, сидячие. Корзинки гетерогамные. Язычковые цветки женские, белые. Дисковые цветки обоеполые, жёлтые. Листочки обёртки с длинными редкими волосками. Семянки опушены длинными редкими волосками. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский хребет, бассейн реки Акбулак.

Места обитания. Скалы в среднем и нижнем поясах гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сенокошение.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском заповеднике и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [123, 315].

К. Ш. Тожибаев.

Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal range, the Akbulak river basin (the Tashkent region). Inhabits rocks in the middle and lower belts of mountains. Population is very rare. Limiting factors: hay-mowing. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park.

301. АНГРЕН УГАМИЯСИ

Угамия ангренская / *Ugamia angrenica* (Krasch.) Tzvelev

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шаннинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 2–8 см га етадиган яримбутача. Кўп сонли поялари зич жойлашиб, гиламсимон чим ҳосил қиласди. Барглари кўп, узунлиги 1,2 см, эни 0,6 мм гача бўлиб, зич жойлашган туклари қулранг-яшил тусга киради. Саватчалари якка-якка, жуда калта ва эгилган гулбандларда жойлашган. Гул баргчаларининг чети кўнғир, тўқ кўнғир ҳошияли. Най гулларининг тожибарги 4–5,5 мм узунликда. Уруғчалари 4м5,5 мм, кўндаланг жойлашган 10–15 та қовурғали бўлиб, улардан 5 таси сертуқ, алоҳида ажралиб турди. Июль–августда гуллаб, меваси август–сентябрда пишади.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Курама (Арашан, Жардан довони), Чотқол (Чотқол биосфера қўриқхонаси), Писком (Оқсарсой) тизмаларида тарқалган. Ўзбекистондан ташқарида: Қозоғистон (Талас Олатоги, Угом–Бахмалқўл тизмалари) ва Қирғизистонда (Санталаш тизмаси) тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори қисмидаги тошли, шағалли ёнбағирликларда, гранит бўлаклари орасида, тўкилмалар атрофида ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида ва Угом–Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [138].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкое эндемичное растение Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Полукустарничек 2–8 см высоты, с толстым, корнем. Стебли многочисленные. Листья серовато-зеленые от довольно обильного опушения, многочисленные, до 1,2 см длины и 0,6 мм ширины, на коротких черешках, продолговатые, перисто-рассеченные. Корзинки одиночные, расположенные на коротких, изогнутых ножках. Листочки их по краю с буроватой, перепончатой каймой. Венчик трубчатых цветков 4–5,5 мм длины. Семянки 4–5,5 мм длины, с 10–15 продольными ребрами, из которых 5 выдаются обычно сильнее других, обильно волосистые. Цветет в июне–июле, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Ташкентской и Наманганской областях: Кураминский (Арашан, перевал Джардан), Чаткальский (Чаткальский биосферный заповедник), Пскемский хребты (Аксарсай). За пределами Узбекистана Кыргызстан (Санталашский хребет), Казахстан (Таласский Алатау, Угамский хребет – Бахмаль-Куль).

Места обитания. На каменистых и щебнистых склонах, среди обломков гранитов, на осыпях сланцев в верхнем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Нет данных.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского биосферного заповедника и Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [138].

К. Ш. Тожибаев.



Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Tashkent and Namangan regions: the Chatkal (Akbulak), the Kurama (Arashan), the Pskem (Aksarsay) ranges. Inhabits rocks and stony slopes in the upper belt of the mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park.



302. БЕЖИРИМ ЮРИНЕЯ

Наголоватка стройная / *Jurinea gracilis* Iljin

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг жанубига хос эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см атрофидаги кўп йиллик ўт. Поялари кўп, асоси оқиш, пахмоқ тукли, пастки қисми чалкаш ва сийрак безчали туклар билан қопланган, тик чизиқли (жўякли),



шохчалари якка каллакли. Барглари чўзиқроқдан наштарсимонгача, четлари текис ёки сийрак тишли, ўткир, туксиз, безчали, устки томони ғадир будур. Ёпирма баргларининг япроқлари бандига қараб тораяйиб боради. Поядаги барглари бандизиз, поя бўйлаб пастга қараб ёпишган. Саватчаси косачасимон, туксиз ёки сийрак чалкаш тукли. Ўрама баргчалари 4–5 қаторли, яшил, ички томонидагилари қирмизи рангли. Тожи пушти рангли, саватчанинг четидаги гуллари пастга қараб осилган, қалин безчали. Уруғи силлиқ. Май-июнь ойларида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари: Ҳисор тизмасининг ғарбий тармоқларида, Бойсунтоғ ва Кўҳитангда тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки ва ўрта қисмларида тошли ёнбағирларда ва очилиб қолган ола жинсларда ўсади.

Сони. Жуда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўзига хос тупроқ шароитида ўсишга мослашганлиги учун кичик майдонларда сақланниб қолган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [105, 159, 331].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 2. Эндемик юга Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. Стебли многочисленные, у основания шерстисто-беловойлочные, в нижней половине паутинистые, рассеянно железистые, продольно-бороздчатые, высотой до 50 см. Ветви одноголовчатые. Листья от продолговатых до ланцетных, цельнокрайные или с расставленными зубцами, заостренные, голые, железистые, сверху-шероховатые; прикорневые – постепенно оттянутые в расширенный у основания черешок; стеблевые – сидячие, длинно и широко низбегающие. Корзинки чащевидные, голые или с отдельными паутинками. Листочки обёртки, 4–5-рядные, зелёные, внутренние – пурпурноокрашенные. Венчики розовые, краевые повислые, густожелезистые. Семянки гладкие. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях: Западные отроги Гиссарского хребта, Байсунские горы, Кугитанг.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород, каменистые склоны в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к специфическим местам обитания.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [105, 159, 331].

К. Ш. Тожибаев.

Endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the western Hissar, Baysun mountains, the Kughitang (the Surkhandarya and Kashkadarya regions). Inhabits outcrops of gypseous rocks, stony slopes in the lower and middle belt of mountains. Population is very rare. Limiting factors: stenobiont species. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



303. ДАҒАЛБАРГ ЮРИНЕЯ

Наголоватка шероховатолистная / *Jurinea asperifolia* Iljin

Мақоми 2. Фарбий Помир-Олойнинг камёб эн демик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80 см га етадиган кўп йиллик ўт. Поялари кўп, тик, оддий, юпқа қиррали, безчасимон тукли. Барглари яшил, устки томони бироз буришган ғадир-будир, пастки томони ингичка чалкаш тукли. Илдизолди ва поянинг пастки қисмидаги барглари бандли, лирасимон. Поянинг ўрта қисмидаги барглар пастидаги баргларига ўҳшаш, лекин бандсиз, поянинг юқорисидаги барглари майдароқ, деярли бутун, қалами. Саватчаси якка, кўп гулли. Сиртқи ва ўртадаги ўрама барглари наштарсимон, устки томонидагилари тўқ яшил. Тожи пушти-қирмизи, ташқи томони безчали. Уруғи тескари пирамида-



симон, силлиқ. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор ва Зарафшон тизмасининг ғарбий қисмida тарқалган (Қизилсув, Эгрисув, Тўпаланг сув ҳавзалари, Тахта Қорача довони).

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги оҳактошли ва тошли сурималарда ўсади.

Сони. Кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат кўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [105, 159, 331].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 80 см. Стебли (их несколько) прямостоячие, простые, тонкопродольноребристые, железистоволосистые. Листья зелёные, сверху морщинистые, шероховатые; снизу тонко-паутинистые; прикорневые и нижние стеблевые – черешковые, лировидные; средние стеблевые – подобны нижним, но сидячие; верхние – уменьшенные, почти цельные, линейные. Корзинки одиночные, многоцветковые. Листочки обёртки наружные и средние ланцетные, в верхней части темно-зелёные. Венчики розово-пурпурные, снаружи обычно с железками. Семянки обратнопирамидальные, гладкие. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский хребет, бассейны рек Кызылсу, Игрису, Тупаланг; Зарафшанский хребет (около перевала Тахта қарача).

Места обитания. Известняки и каменистые осыпи в среднем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [105, 159, 331].

К. Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the western part of the Hissar and Zaravshan ranges: the Kyzylsu, the Igrisu, the Tupalang river basins, the Takhtakaracha passage (the Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits lime-stones and stony mounds in the middle belt of mountains. Population is very rare. Measures of protection: protected in the Hissar state reserve.



304. ЗОКИРОВ ЮРИНЕЯСИ

Наголоватка Закирова / *Jurinea zakirovii* Iljin

Мақоми 1. Нурота тоғларида тарқалган жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Илдизи ёғочланувчи, кўп бошчали, кўп йиллик ўт. Поялари кам, узунлиги 50 см, оддий, тик чизиқли (жўякли), безчали, ярмидан юқориси баргсиз. Баргларининг устки томони ғадир-будир, пастки томони қалин безчали, йўғон томирли. Ёпирма ва поянинг пастки қисмидаги барглари қисқа бандли, чўзиқ, патсимон бўлинган ёки патсимон тишли. Поянинг ўрта ва юқори қисмидаги барглари бандсиз, япроғининг пастки қисми поя бўйлаб (пастга қараб) ёпишган, четлари текис. Саватчаси кўп гулли. Ўрама баргчалари тўрт қиррали, сарғиши-яшил рангли. Тожи пушти рангли, ташқи томони безчали. Уруғи тескари пирамидасимон, туксиз, силлиқ. Май ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Навоий вилоятлари: Нурота ва Оқтоғ тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги шағалли, майда жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Кўпайиши. Ургидан ва бачкисидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан ташқари кўп боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.


Манбалар. [105, 159, 331].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 1. Очень редкий эндемик Нуратинских гор.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. Корень деревянистый, многоглавый. Стебли малочисленные, высотой до 50 см,

простые, продольнобороздчатые, железистые, в верхней части безлистные. Листья сверху – шершавые, снизу – с сильно выдающейся центральной жилкой, густожелезистые; прикорневые и нижние стеблевые – короткочерешковые, продолговатые, перистолопастные или перистозубчатые; средние и верхние стеблевые – сидячие, низбегающие, цельнокрайные. Корзинки много-



цветковые. Листочки обёртки четырёхгранные, желтовато-зелёные. Венчик розовый, снаружи железистый. Семянки обратнопирамидальные, голые, гладкие. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Джизакской и Навоийской областях: хребты Нуратау, Актау.

Места обитания. Мелкоземисто-щебнистые склоны среднего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [105, 159, 331].

К. Ш. Тожибаев.

Very rare endemic species of the Nuratau mountains. It is spread at the Nuratau and Aktau ranges (the Djizakh, the Navoi regions). Inhabits fine earth-slopes in the middle belt of mountains. Population is very rare. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



305. МАРИЯ ЮРИНЕЯСИ

Наголоватка Марии / Jurinea mariae Pavlov

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шаннинг жуда камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 45 см гача етадиган кўп ийллик ўт. Пояси кам, тик қиррали, ғуж-ғуж чалкаш тукли. Барглари буришган, майда безчали, сийрак чалкаш тукли, пастки томони кулранг,

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Мадданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Ўсиш жойи Угом-Чотқол миллий табиат боғи худудига тўғри келади.

Манбалар. [105, 159, 331].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 2. Очень редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 45 см. Стебли многочисленные, продольноребристые, клюковатоподобные, облистенные. Листья морщинистые, мелкожелезистые, рассеянноподобные, снизу сероватые, тонкоподобные, железистые; прикорневые и нижние стеблевые – короткочерешковые, в нижней половине – крупнозубчатые или лопастные; средние – стеблевые подобны прикорневым, но сидячие; верхние – уменьшенные. Листочки обёртки прижатые, ланцетные, обычно все пурпурно окрашенные. Венчики пурпурно-розовые. Семянки обратнопирамидальные, гладкие. Цветёт и плодоносит в июле–августе.

Распространение. Ташкентская область: Пскемский хребет, посёлок Нанай. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Каменистые осыпи в верхнем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [105, 159, 331].

К. Ш. Тожибаев.

Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Pskem range, nearby Nanai (the Tashkent region). Inhabits stony slopes in the subalpine zone. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.


ингичка чалкаш тукли ва безчали. Ёпирма ва поянинг пастки қисмидағи барглари қисқа бандли, япроқлари ярмигача йирик тишли ёки бўлакли. Поянинг ўрта қисмидағи барглари ёпирма баргларга ўхшаш, бандсиз, юқоридагилари майдароқ. Ўрама баргчалари саватчага ёпишган, наштарсимон, қирмизи рангли. Тожи қирмизи-пушти рангли. Уруғи тескари пирамидасимон, силлиқ. Июль–август ойларида гуллаб, уруғ беради.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Писком тизаси (Нанай қишлоғи атрофи)да тарқалган. Қозоғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмидағи тошли сурилмаларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.



306. САНГАРДАК ЮРИНЕЯСИ

Наголоватка сангардакская / *Jurinea sangardensis* Iljin

Мақоми 1. Ҳисор тизмасидаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Поялари камроқ, тик, якка бошчали, тик чизиқли (жўякли), сийрак безчали. Баргларининг устки томони яшил, бироз ғадир-будир, пастки томони кулранг, чалкаш тукли. Ёпирма ва поянинг пастки қисмидаги барглари бандли, қолганлари бандсиз, япрогининг пастки қисми пояга ёпишган, тоқ патсимон, энг юқоридаги барглари ипсимон. Саватчаси цилиндрсизмон. Ўрама баргчалари саватчага ёпишган, йўғон томирли. Тожи қирмизи-пушти рангли. Уруғи тескари пирамидасимон, туксиз, силлиқ. Июнда гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари: Ҳисор тизмасидаги Қизилсув, Сангардак ва Тўпаланг дарёлари ҳавзаларида ҳамда Бойсун тоғларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги ёнбағирларда майда жинс тупроқларда, арчазорларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Ургифдан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Ҳисор давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [105, 159, 331].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 1. Очень редкий эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 80 см. Стебли немногочисленные, прямостоячие, одноголовчатые, продолгово-полосатобороздчатые, рассеянно-лезистые. Листья сверху зелёные, слегка шероховатые, снизу – сероватые, тонкопаутинистые; прикорневые и нижние стеблевые – черешковые, остальные стеблевые – сидячие, низбегающие, непарно перисторассеченные, самые верхние – нитевидные. Корзинки цилиндрические. Листочки обертки прижатые, с выступающими жилками. Венчики пурпурно-розовые. Семянки обратнопирамидальные, голые, гладкие. Цветёт в июне, плодоносит в июле-августе.

Распространение. В Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях: Гиссарский хребет, бассейн рек Кызылсу, Сангардак и Тупаланг, Байсунские горы.

Места обитания. Мелкоземистые склоны среднего пояса гор, арчовники.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском заповеднике.

Источники. [105, 159, 331].

К. Ш. Тожибаев.

Very rare endemic species of the Hissar range. It is spread at the Hissar range, the Kyzylsu, the Sangardak and Tupalang river basins, the Baysun mountains (the Surkhandarya and Kashkadarya regions). Inhabits fine earth slopes in the middle belt of mountains, juniper stands. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Hissar state nature reserve.



307. ҚУМЧИЛ ЙОРИНЕЯ

Наголоватка песколюбивая / *Jurinea psammophila* Iljin

Мақоми 3. Қизилқұмдаги жуда камёб эндемик ўсимликтік.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см гача етадиган кўп ийллик ўт. Пояси тик, кўп, кулранг чалкаш тукли, йўл-йўл жўякли, новдалари якка бошчали. Баргларининг ҳар икки томони кулранг-яшил, тукли, пастки томони қалин чалкаш тукли. Ёпирма ва поянинг пастки қисмидаги барглари бандли, патсимон бўлинган ёки патсимон ажралган. Поядаги бошқа барглари бандсиз, асоси пояга ёпишган, энг юқоридаги барглари қалами, бандсиз, четлари бутун, учи ўткір. Саватчаси қалин кулранг ётиқ тукли. Ўрама баргчалари саватчага ёпишган, наштарсимон четлари ғадир-будир. Тожи қирмизи пушти рангли, ташқи томони безчали. Уруғи тик жўякли. Май ойда гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Навоий ва Бухоро вилоятлари: Қизилқұмда Оқтоғ, Олтинтоғ, Қулжуқтоғ этакларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тоғларнинг пастки қисмидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиятда жуда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши ва ўтларнинг ўриб олиниши оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [105, 159, 331].

К. Ш. Тожибаев.

Статус 3. Очень редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 50 см. Стебли прямостоячие, многочисленные, сероватопаутинистые, полосатобороздчатые, одноголовчатые. Листья серо-зелёные с обеих сторон (но снизу гуще), паутинистоупущенные; прикорневые и нижние стеблевые – черешковые, обычно перистораздельные или даже перисторассеченные; стеблевые – сидячие, низбегающие; самые верхние – линейные, сидячие, цельные, заостренные. Корзинки прижато-серовой ложные. Листочки-обёртки плотно прижатые, ланцетные, по краю мелкощероховатые. Венчики пурпурно-розовые, снаружи железистые. Семянки продольнобороздчатые. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Навоийской и Бухарской областях: Кызылкумы – подножия гор Актау, Алтынтау, Кульджуктау.

Места обитания. Каменистые склоны подножия останцовых гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.


Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас и заготовка кормов.

Культтивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [105, 159, 331].

К. Ш. Тожибаев.



Very rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Aktau, the Altyntau, the Kuljuktau mountains (the Navoi and Bukhara regions). Inhabits stony slopes of foothills of low mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: intensive over-pasturing and feedstock. Measures of protection: not protected.

308. МАЙДАГУЛТОЖБАРГЛИ ЭРИГЕРАН

Мелколепестник триморфообразный / *Erigeron trimorphopsis* Botsch.

Мақоми 2. Чотқол тизмасидаги ғоят камёб ўсимлиқ.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–35 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Пояси кўп. Ёпирма баргларининг узунлиги 2,5–11,5 см, эни 6–9 мм, тескари наштарсимон. Ўрама баргчалари қалами наштарсимон. Саватчасининг узунлиги 0,9–1,3 см. Гули пушти ёки бинафша рангли. Уруғи узунчоқ наштарсимон, дағал, тукли. Июль ойида гуллаб, меваси август–сентябрь ойларида етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол тизмасида Кўксувда тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Қирғизистонда тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ минтақасининг юқори қисмидаги ўтлоқларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган, фақат бир жойда маълум.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши натижасида камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Ўсиш жойлари Угом-Чотқол миллий табиат бори худудида жойлашган.


Манбалар. [159, 295].
М. Тўлаганова.

Статус 2. Редчайший эндемик Чаткальского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение 15–35 см высотой. Корневище короткое, разветвленное. Стебли (их несколько) прямые, облистенные. Прикорневые листья 2,5–11,5 см длиной, 6–9 мм шириной, обратноланцетные, на длинных черешках. Корзинка длиной 0,9–1,3 см, листочки-обертки линейно-ланцетные. Цветки лиловые или розовые. Семянки продолговато-ланцетные, опущены жестковатыми волосками. Цветет в июле, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский хребет – Куксу. За пределами Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. На субальпийских лугах в верхнем поясе гор.



Численность. Известен из одного пункта.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивный выпас скота.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [159, 295].

М. Туляганова.

Rare species of the Chatkal range. It is spread at the Chatkal range: Kuksu (the Tashkent region). Inhabits subalpine meadows in the upper belt of mountains. Collected in one location. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



309. КРАШЕНИННИКОВ ВИКОАСИ

Викоа Крашенинникова / *Vicoa krasheninnikovii* Kamelin

Мақоми 3. Помир-Олой, Нурота тоғлари, Оқтөп тизмасининг камайиб бораётган эндемик ўсимлиги.

Кисқача тавсифи. Бўйи 5 – 8 см бўлган, пояларининг асоси сертук, бир бошчали, кўп йиллик сербарг ўсимлик. Барглари бандсиз, эллипссимон, узунлиги 9–11 мм. Саватчасининг узунлиги 8–10 мм, диаметри 8 мм гача. Ўрама барглари кўп қаторли, баргчалари ингичка, эллипс шаклида,

ромчатые. Все цветки трубчатые, светло-желтые, голые. Семянки около 2 мм длины, густо прижато волосистые, хохолок 6–7 мм длины. Щетинок 20–25. Цветёт и плодоносит в июне–августе.

Распространение. Навоийская область: горы Актау.

Места обитания. Трешины скал.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.



сиртқиларининг чеккаси қалинроқ (терисимон), ичкиларининг чеккаси қалин, пардасимон, попукли. Гуллари найсимон, очсариқ тусли, туксиз. Пистасининг узунлиги 2 мм, қалин ётиқ тукли. Июнь–август ойларида гуллаб, уруғ ҳосил қиласди.

Тарқалиши. Навоий вилоятининг Оқтөп тоғида тарқалган.

Ўсиш шароити. Қояларнинг ораларида, ёриқларида ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқ маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [110, 159].

Н. Ф. Русанов.

Статус 3. Узкий эндемик Нуратинских гор, хребет Актау.

Краткое описание. Многолетнее, 5–8 см высоты, с одноголовыми стеблями. Листья эллиптические, 9–11 мм длины. Корзинки 8–10 мм длины, до 8 мм в диаметре. Обвертки многорядные, листочки околоцветника узкоэллиптические, бах-

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [110, 159].

Н. Ф. Русанов.

Rare endemic species of the Aktau range. It is spread at the Aktau range (the Navoi region). Inhabits rocks. The quantity is unknown. Limiting factors: over-pasturing. Measures of protection: not protected.



310. ТУКСИЗ ҚАРФАТИРНОҚ

Коелпиния голоплодная / Koelpinia leiocarpa Popov

Мақоми 2. Фарбий Ҳисордаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–25 см оралигидаги бир йиллик ўт. Пояси пастки қисмидан шохланган, ғуборли ёки туксиз, баргли. Барглари ипсизмон. Саватчалари узун, ингичка гулпояларда ўрнашган. Гуллари сариқ. Ташқи ўрама барглари қалами-бигизсизмон. Уруғи сал эгилган, учига қараб торая боради, узунлиги 12–13 мм. Апрелда гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилюяти: Ҳисор тизмасининг ғарбий қисмидаги Яккабоғ дарёсининг юқори қисмида, Тошқўрғон қишлоғи теваракларида ҳамда Гузор тоғи этакларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларидан то ўрта қисмигача бўлган гипсли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Жуда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши натижасида камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [126, 159].

Н. Ф. Русанов.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Гиссара.

Краткое описание. Однолетник высотой 15–25 см. Стебель от самого основания разветвленный, с тонким налётом или голый, облиственный. Листья нитевидные. Корзинка на длинных тонких цветоносах. Цветки жёлтые. Наружные листочки обёртки линейно-шиловидные. Семянки слегка согнутые, к верхушке сужающиеся, длиной 12–13 мм. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Кашкадарьинская область: западные отроги Гиссарского хребта – верховья реки Яккабагдарья, окрестности кишлака Ташкурган, предгорья горы Гузар.

Места обитания. Гипсированные склоны от предгорий до среднего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [126, 159].

Н. Ф. Русанов.

Rare endemic species of the western Hissar range. It is spread at the western outskirts of the Hissar range: the Yakkabagdarya, nearby the villages Tashkurgan and Guzar (the Kashkadarya region). Inhabits gypseous slopes from foothills to the middle belt of the mountains. Population is very rare. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Hissar state reserve.



311. НУРОТА ЎЛМАСҮТИ

Бессмертник нуратавский / *Helichrysum nuratavicum* Krasch.

Мақоми 2. Нурота тоғлари учун камёб эндемик түр.

Қисқачатавсиfi. Кўпийиллик ўтсумлиқ, бўйи 10–20 см, наштарсимон тукли. Мевасиз поялари билан чим ҳосил қиласди. Поялари кўп эмас, оддий, тик ёки ёнбошлаб ўсади. Барглари бандсиз, навбат билан ўрнашган, қалами, узунлиги 1,5–2,5 см, эни 1–2 мм. Саватчасимон ёки ингичка кўнғироқсимон, 2–6 тадан тифиз бошчасимон қалқон тўпгулда ўрнашган. Ўрама барглари 5–8 қатор, тифиз кетмакет ўрнашган, ташқари қаватдагилари қалин тукли. Гуллари сариқ. Июнь–июлда гуллаб, меваси июль–август ойларида етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Навоий ва Самарқанд вилоятлари: Нурота ва Оқтоғ тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг 1200–2000 м баландликдаги пастки ва ўрга қисмидаги тошличағиртошли ёнбағирлардаги ҳар хил ўтли шувоқзорлар ва шувоқ-фаллали жамоаларда ўсади.

Сони. Сийрак ҳолда учрайди. Якка-якка ҳолда ва кичик гурухлар ташкил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимликнинг йиғиб олиниши ва чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Нурота давлат кўриқ-хонасида муҳофаза қилинади. Популяцияларини назорат қилиш керак.

Манбалар. [18, 113, 203, 289].

Н. Ф. Русанов.

Статус 2. Редкий эндемик Нуратай.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 10–25 см, покрытое густым войлокным опушением. Листья сидячие, очередные, линейные, 1,5–2,5 см длиной и 1–2 мм шириной. Корзинки мелкие, 4–5 мм длиной и 3–4 мм шириной, обратноконические или узко-колокольчатые, в числе 2–6, собраны в плотный головчатый щиток. Листочки оберки 5–8-рядные, плотно черепитчато расположенные, наружные по спинке, густо-паутинисто опущенные. Цветки желтые. Цветет в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Джизакской, Навоийской и Самаркандской областях: хребты Нуратай и Актау.

Места обитания. Произрастает на каменисто-щебнистых склонах (1200–2000 м).

Численность. Встречается спорадически, небольшими популяциями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор растений и чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны. Охраняется на территории Нурагинского государственного заповедника.

Источники. [18, 113, 203, 289].

Н. Ф. Русанов.



Rare endemic species of the Nuratau mountains. It is spread at the Nuratau and Aktau ranges (the Dzhizak, the Navoi and Samarkand regions). Inhabits stony slopes (1200-2000 m). The quantity is unknown. Limiting factors: collecting of plants and pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



ҚҮНФИРОҚГУЛДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ – CAMpanulaceae

312. УЛУҒВОР КҮЗАГУЛ

Островская величественная / *Ostrowskia magnifica* Regel

Мақоми 1. Марказий Осиёнинг камёб, реликт ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 170 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Пояси ғовак, тик. Барглари ҳалқа ҳосил қилиб ўрнашган, тухумсимон, чўзиқроқ, йириктиши, қўқимтири. Косачалари ингичка қалами-наштарсимон бўлакли, узунлиги 5 см гача. Тожи оч бинафша рангли, баъзан оқ, узунлиги 8–10 см, бўлаклари тухумсимон, найчасидан қисқа. Меваси кўсакчасимон. Уруғи чўзиқ тухумсимон. Май–июнь ойларида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси (Тўпаланг ва Шарғун дарёларининг ҳавзалари)да тарқалган. Тожикистанда, Қозогистонда ва Шимолий Афғонистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги йирик тошли сурималарда, қояларнинг сояларида ҳамда зарангзорларнинг чеккаларида ўсади.

Сони. Табиятда тўп-тўп (50 туп атрофида) бўлиб тарқалган. Умумий сони 30 000 тупдан ошмайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари ва илдизларининг йигиб олиниши ҳамда уруғ маҳсулдорлигининг пастлиги натижасида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Марказий Осиё республикалари ва чет эл ботаника боғларида муваффақиятли ўстирилмоқда. Уруғидан экилганда 4–5 или гуллайди.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [156–159, 303].

У. Х. Қодиров.


Статус 1. Редкий реликт Центральной Азии.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 170 см. Стебель голый, прямой. Листья в мутовках, яйцевидные, продолговатые, крупно-зубчатые, сизоватые. Чашечка с узколинейно-ланцетными долями, длиной до 5 см. Венчик грязновато-сиреневый, реже – белый, длиной 8–10 см с яйцевидными лопастями, намного короче трубки венчика. Плод – коробочка. Семена яйцевидно-продолговатые. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – бассейн реки Тупаланг и Шаргунь. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Казахстан, Северный Афганистан.

Места обитания. Крупнообломочные осыпи, в тени скал, опушки кленовых лесов в среднем поясе гор.

Численность. Встречается спорадически небольшими (не более 50 экземпляров) группами. Общая численность не превышает 30 тысяч особей.



Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветов, выкапывание клубней и низкая семенная продуктивность.


Культивирование. Успешно культивируется в ботанических садах Центральной Азии и за рубежом. При выращивании из семян зацветает на 4–5 году жизни.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [156–159, 303].

У. Х. Қодиров.

Rare relict species of Middle Asia. It is spread at the Hissar range: the Tupalang and Shargunj rivers basins (the Surkhandarya regions). Inhabits large-disintegrated rock mounds, in the shadow of trees, edges of maple forests in the middle of mountainous zone. Small groups can be met sporadically (up to 50 plants). Total number does not exceed 30 thousand specimens. Limiting factors: picking of flowers, digging up of bulbs and low seed productivity. Measures of protection: not protected.



ҚУМСҮТАДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ЦИНОМОРИЕВЫЕ – CYNOMORIACEAE

313. ЖУНГОР ҚУМСҮТАСИ, ЦИНОМОРИЙСИ Циноморий джунгарский / *Cynomorium songaricum* Rupr.

Мақоми 2. Ўзбекистон учун камёб тур.

Қисқача тавсифи. Қизил-бинафша рангли текинхўр ўсимлик. Бўйи 7–20 см, йўғонлиги 1,5–3 см, учбурчак тангачалар билан қопланган, узунлиги 3–5 мм. Тўпгули жуда тифиз, тўғнағичсимон, цилиндрсимон. Гуллари зич жойлашган. Гулқўрғон бўлакларининг узунлиги 2–4 мм. Чангчисининг чангдони билан узунлиги 2,5 мм, уруғчисиники 2–3 мм. Меваси шарсимон, эни 1,25–1,5 мм. Май–июнда гуллайди ва мева тугади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти, Қорақалпоғистон: Кўхитангнинг тоғолди қисмлари ва Устюртда тарқалган. Ўзбекистондан ташқари, Туркманистон, Тожикистон, Эрон, Афғонистон ва Мўғулистонда ҳам ўсади.

Ўсиш шароити. Кумли тупроқларда ва ола жинсларда ўсади.

Сони. 2009 иили Шўроб атрофида 10 та тури, Келиф-Шеробод тепаликларида 12 туп борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.


Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Мухофаза қилинмайди.

Манбалар. [134, 159].

Ф. Ў. Ҳасанов.



Статус 2. Редкий для Узбекистана вид.

Краткое описание. Пурпурно-фиолетовое паразитическое растение (на корнях *Salsola dendroides*). Стебель 7–20 см высоты, 1,5–3 см толщины, покрытый прижатыми треугольными чешуйками 3–5 мм длины. Соцветие очень плотное, булавовидное, цилиндрическое. Цветы тесно расположенные, не выдающиеся. Листочки околоцветника 2–4 мм длины. Тычинки с пыльниками 2,5 мм длины. Пестик 2–3 мм длины. Плод шаровидный 1,25–1,5 мм в диаметре. Цветет и плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская об-

ласть: предгорья Кугитанга; Каракалпакстан: плато Устюрт. За пределами Узбекистана – Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Иран, Афганистан, Монголия.

Места обитания. Песчаные почвы и пестроцветы.

Численность. В 2009 году зарегистрировано 10 растений в окрестности кишлака Шуроб, 12 – на Келиф-Шерабадской гряде.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [134, 159].

Ф. О. Ҳасанов

Rare species in Uzbekistan. It is spread at the Kughitang range, the Ustyurt Plateau (the Surkhandarya region, Karakalpakstan). Inhabits sands and gypseous slopes. 10 plants were found in 2009, nearby the village Shurob, 12 – on the Kelif-Sherabad range. Measures of protection: not protected.



МАНБАЛАР – ИСТОЧНИКИ – LITERATURE

1. Абдуллаева М. Н. Род *Eremosparton* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 51.
2. Абдуллаева М. Н. Секция *Tropidolobus* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 228–229.
3. Абдуллаева М. Н. Секция *Tamias* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. 1981. – С. 235.
4. Абдуллаева М. Н. Род *Scutellaria* L. // Определитель растений Средней Азии, т. 9, 1987. – С. 22.
5. Абдухамидов Н. А. Горицвет золотистый // Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. М.: ГУГК, 1976. – С.150, 225.
6. Адылов Т. А. Род *Eremostachys* // Определитель растений Средней Азии. Т. 9. Ташкент: ФАН, 1987, С. 78–82.
7. Адылов Т. А. Род *Paraeremostachys* // Определитель растений Средней Азии. Т. 9. Ташкент: Фан, 1987. – С. 59–66.
8. Адылов Т. А. Род *Dracoscephalum* // Определитель растений Средней Азии. Т. 9. Ташкент: Фан, 1987. – С. 78–82.
9. Адылов Т. А., Махмедов А. М. Род *Phlomoides* // Определитель растений Средней Азии. Т. 9. Ташкент: Фан, 1987. – С. 82–110.
10. Байтенов М. С. Род *Oxytropis* // Флора Казахстана. Т. 5. Алма-Ата: АН Каз ССР. 1961. – С. 330–410.
11. Белолипов И. В. Интродукция видов рода *Acantholimon* в условиях Ташкента // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 11. Ташкент: Фан, 1974. – С. 51–63.
12. Белолипов И. В. Интродукция видов рода *Lepidolopha* в условиях Ботанического сада АН УзССР // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 15. Ташкент: Фан, 1978. – С. 54–61.
13. Белолипов И. В. Современное состояние редчайшего вида флоры Средней Азии Отостегии бухарской.// Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 17. Ташкент: Фан Узб. ССР, 1980. – С. 90–100.
14. Белолипов И. В. Интродукция травянистых растений природной флоры Средней Азии. Ташкент: Фан Узб. ССР, 1989. – С. 80
15. Белолипов И. В. *Otosstegia bucharica* B. Fedtsch. Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: «Chinor ENK», 1996. – С. 256.
16. Белоусова Л. С., Денисова Л. В., Никитина С. В. Редкие растения СССР. М. 1979. – С. 161, 216.
17. Бешко Н. Ю. Редкие и эндемичные виды флоры Нуратинского заповедника // Труды заповедников Узбекистана.- Ташкент: Мехнат, 1997.- Вып. 2. – С. 18–24.
18. Бешко Н. Ю. Новые сведения о редких видах флоры Нуратинского заповедника // Сохранение биоразнообразия на особо охраняемых территориях Узбекистана.- Ташкент: Chinor ENK, 2000. – С. 17–20.
19. Благовещенская Н. С., Деревецкая Е. А. Род *Bergenia* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 242.
20. Бондаренко О. Н. Сем. *Caprifoliaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 559–577.
21. Бондаренко О. Н. Род *Acanthophyllum* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 297.
22. Бондаренко О. Н. Род *Silene* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 260, 266, 267, 269.
23. Бондаренко О. Н., Виноградова Р. М. Род *Dianthus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 301–310.
24. Бондаренко О. Н., Закиров К. З. Род *Lappula* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 229.
25. Бондаренко О. Н. Семейство *Bignoniaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 498–499.
26. Борисова А. Г. Новые бобовые флоры СССР // Бот.мат Герб.. Ин-та бот. АН СССР. Т. 10. Л., 1947. – С. 43–57.
27. Борисова А. Г. О видах рода *Bergenia* Moench. в Средней Азии //Бот. мат. Герб. бот. Ин-та АН СССР. Т. 16. М.-Л., 1954. – С. 97–103.
28. Борисова А. Г. Род *Tragacantha* // Бот. мат. Герб. Бот Ин-та АН СССР. Т. 10. М.-Л. 1947. – С. 57–79.
29. Борисова А. Г. Род *Tragacantha* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 672–686.
30. Борисова А. Г. Род *Zygophyllum* // Флора СССР. Т. 14. М.-Л.: АН СССР, 1949. – С. 152–193.
31. Борисова А. Г. Секция *Myobroma* рода *Astragalus* // Флора СССР Т. 12. М.-Л.: АН СССР, 1946. – С. 142–230.
32. Борисова А. Г. Секция *Laguropsis* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 12. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – С. 839–868.
33. Борисова А. Г. Секция *Polyanthos* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 12. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – С. 357–380.
34. Борисова А. Г. Секция *Proselius* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 12. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – С. 594–642.
35. Бочанцев В. П. Сем. *Chenopodiaceae* // Флора Узбекистана. Т. 2. Ташкент: АН УзССР, 1953. – С. 280, 288, 292, 322.
36. Бочанцев В. П., Введенский А. И. Новости систематики Гербария Института ботаники АН УзССР, Вып. 14. Ташкент, 1954. – С. 11.
37. Бочанцев В. П., Введенский А.И. Род *Clausia* //Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 121–122.
38. Бочанцев В. П. Род *Spryginia Popov* //Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 191.

39. Бочанцева З. П. Новый вид тюльпана из Западного Тянь-Шаня // Бот. Матер. Герб. Инст. Ботаники АН УзССР, 1954, вып. XVI. – С. 8–11.
40. Бочанцева З. П. Тюльпаны. Ташкент: Фан, 1962. – С. 408.
41. Бочанцева З. П., Шарипов А. Х. *Tulipa uzbekistanica* Z. Botsch. et Scharipov // Новости систематики высших растений. Т. 8. Л., Наука, 1971. – С. 109–111.
42. Бутков А. Я. Новые виды семейства Ranunculaceae // Бот.мат. Герб. Бот. ин-та Уз ФАН СССР. Вып. 3. Ташкент, 1941. – С. 21.
43. Бутков А. Я. Новые виды из Средней Азии // Бот. мат. Герб ин-та бот. Уз ФАН СССР. Вып. 6. Ташкент: 1941. – С. 6–8.
44. Бутков А. Я. Значение и пути охраны реликтовой флоры юга Средней Азии // Мат. совещ. по охране объектов растительного мира республик Средней Азии и Казахстана. Ташкент: Фан, 1971. – С. 165–170.
45. Бутков А. Я. О платановых лесах на территории Узбекистана // Узб. биол. журн., 1976, №3. – С. 42.
46. Буш Н. А. Род *Iskandera* // Флора СССР. Т. 8. М.-Л.: АН СССР, 1939. – С. 320.
47. Васильченко И. Т. Новые виды рода *Oxytropis* // Бот. мат. Герб. Бот.ин-та АН СССР, Т. 20. Л., 1960. – С. 231–250.
48. Васильченко И. Т., Васильева Л. И. Охрана реликтов среднеазиатской флоры в Западном Гиссаре // Мат. совещ. по охране объектов растительного мира республик Средней Азии и Казахстана. Ташкент: Фан, 1971. – С. 154–165.
49. Введенский А. И. Род *Allium* L. // Определитель растений Средней Азии. Ташкент: Фан, 1971. Т. 2. – С. 81.
50. Введенский А. И. Род *Tulipa* // Флора СССР. Т. 4. Л.: 1935. – С. 329–364.
51. Введенский А. И. Сем. Amaryllidaceae // Флора Узбекистана. Т. 1. Ташкент: АН УзССР, 1941. – С. 495–502.
52. Введенский А. И. Род *Juno*. // Флора Узбекистана. Т. 1, 1941. – С. 519.
53. Введенский А. И. Сем. Iridaceae // Флора Узбекистана. Т. 1. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1941. – С. 502–522.
54. Введенский А. И. Новые бобовые из Средней Азии // Бот. мат. Герб, ин-та бот. АН УзССР. Вып. 13. Ташкент, 1952. – С. 19–25.
55. Введенский А. И. Новые виды из Средней Азии // Бот. мат. Герб., ин-та Бот. АН УзССР, Вып. 14. Ташкент, 1954. – С. 7–12.
56. Введенский А. И. Род *Calispepla* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1955. – С. 412–413.
57. Введенский А. И. Новая секция рода *Astragalus* //Бот. мат. Герб, ин-та бот. АН УзССР, Вып. 15. Ташкент, 1959. – С. 10–12.
58. Введенский А. И. Род *Alliit* //Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971 а. – С. 39–89.
59. Введенский А. И. Род *Juno* //Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 132–140.
60. Введенский А. И., Ковалевская С. С. Род *Tulipa* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 94–109.
61. Введенский А. И., Пазий В. К. Заметки о среднеазиатских видах рода *Eremostachys* //Бот. мат. Герб, ин-та АН УзССР. Вып. 18. Ташкент: Фан, 1967. – С. 8–29.
62. Введенский А. И., Пазий В. К. Род *Eremostachys* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1967. – С. 319–345.
63. Введенский А. И., Пучкова Е. Г. Сем. Polypodiaceae // Определитель растений Средней Азии. Т. I. Ташкент: Фан, 1968. – С. 14.
64. Виноградова Р. И. Род *Lepidium* // Определитель растений Средней Азии Т. 4. Ташкент: Фан, 1971. – С. 197.
65. Виноградова Р. М. Секция *Aureophora* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 212–213.
66. Виноградова Р. М. Секция *Leptopi* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 274.
67. Виноградова Р. М. Секция *Xiphidium* рода *Astragalus* //Определитель растений Средней Азии. Т.6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 185–188.
68. Голосков В. П. Сем. Santalaceae // Флора Казахстана. Т. 4. Алма-Ата: АН КазССР, 1960. – С. 83–88.
69. Гончаров Н. Ф. Новые виды рода *Astragalus* // Бот. мат. Герб. ин-та бот. АН СССР. Т. 7. Л. 1938. – С. 145.
70. Гончаров Н. Ф. Новые астрагалы и островерхолики // Бот. мат. Герб. ин-та бот. АН СССР. Т. 9. Вып. 1. Л., 1941. – С. 85–105.
71. Гончаров Н. Ф. Новые и критические астрагалы // Бот. мат. Герб, ин-та бот. АН СССР. Т. 9. Вып. 4. Л., 1946. – С. 113–151.
72. Гончаров Н. Ф. Секция *Astenolobium* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 12. М.-Л: Изд-во АН СССР, 1946. – С. 382–383.
73. Гончаров Н. Ф. Секция *Halicacabus* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 12. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – С. 415–423.
74. Гончаров Н. Ф. Секция *Stipitella* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 1 М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – С. 21–22
75. Гончаров Н. Ф. Род *Astragalus* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1955а. – С. 488–671.
76. Гончаров Н. Ф. Род *Oxytropis* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 19556. – С. 686–715.
77. Гончаров Н. Ф., Борисова А. Г. Секция *Pendulina* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 12. М.-Л: АН СССР, 1946. – С. 136–231.

78. Гончаров Н. Ф., Борисова А. Г. Секция *Tropidolobus* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 12. М.-Л.: АН СССР, 1946. – С. 566–569.
79. Горшкова С. Г. Род *Sternbergia* // Флора СССР. Т. 4. М.-Л.: АН СССР, 1935. – С. 485–489.
80. Горшкова С. Г. Род *Otostegia* // Флора СССР. Т. 21. М.-Л.: АН СССР, 1954. – С. 182–187.
81. Горшкова С. Г. Род *Pentanema* // Флора СССР. Т. 25. М.-Л.: АН СССР, 1959. – С. 483.
82. Грубов В. И. Сем. Евпасеae // Флора СССР. Т. 18. М.-Л.: АН СССР, 1957. – С. 475–483.
83. Грубов В. И. Сем. Rhamnaceae // Деревья и кустарники СССР. Т. 4. М.-Л.: АН СССР, 1958. – С. 526–607.
84. Джалалов А. О произрастании семян горицвета золотистого в естественных условиях и в культуре // Тез. докл. 8-й профессорско-преподавательской конференции. Андижан, 1966. – С. 179.
85. Джалалов А. Горицвет золотистый (*Adonis chrysocytathus* Hook. f. et Thorns.) – перспективное лекарственное растение // Исследование естественных ресурсов Ферганской долины. Труды Андижанского гос. лед. ин-та. Ташкент, 1966. – С. 21–23.
86. Джалалов А. Горицвет золотистый (*Adonis chrysocytanthus*) и его биология // Автореф. канд. дисс. ... Ташкент, 1968. – С. 39.
87. Джалалов А. Об охране горицвета золотистого (*Adonis chrysocytathus*) // Мат. совещ. по охране объектов растительного мира республик Средней Азии и Казахстана. Ташкент: Фан, 1971. – С. 288–289.
88. Джангуразов Ф. Х. Новые местонахождения Дионисия гиссарской (*Dionysia hissarica* Lipsky) в бассейне р. Сангардак (Западный Гиссар) // Изв. Акад. Наук Таджикской ССР. Душанбе. 1965. 1 (18). – С. 43–45.
89. Дробов В. П. Род *Cercis* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: во АН УзССР, 1955. – С. 390.
90. Дробов В. П. Род *Sorbaria* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 263–264.
91. Дробов В. П. Сем. Vitaceae // Флора Узбекистана. Т. 4. Ташкент: АН УзССР, 1959а. – С. 157–158.
92. Дробов В. П. Сем. Celastraceae // Флора Узбекистана. Т. 4. Ташкент: АН УзССР, 1959б. – С. 132–134.
93. Дробов В. П. Сем. Евпасеae // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1961. – С. 85–87.
94. Закиров К. З. Новые виды рода *Phlomis* // Бот. мат. Герб. ин-та бот. и зоол. АН УзССР, Т. 9. Ташкент, 1947. – С. 3.
95. Закиров К. З. *Acatholimon nuratavicum* // Флора СССР. Т. 18. М.-Л.: АН СССР, 1952. – С. 334, 536.
96. Закиров К. З. Сем. Boraginaceae // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 218.
97. Закиров К. З. Флора и растительность бассейна р. Зарафшан. Т. 1. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 448.
98. Залевская Е. М. Сравнительное морфологическое изучение проростков видов родов *Anemone* L., *Pulsatilla* // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 6. Ташкент: Фан, 1970. – С. 164–169.
99. Залевская Е. М. К биологии прорастания семян некоторых интродуцированных ветрениц и прострелов // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 4. Ташкент: Фан, 1970. – С. 113–120.
100. Запрягаева В. И. Дикорастущие плодовые Таджикистана М.-Л: Наука, 1964. – С. 695.
101. Иванина Л. И. Род *Spirostegia* // Флора СССР. Т. 22. М.-Л: АН СССР, 1955. – С. 512–514.
102. Иващенко А. А. Тюльпаны и другие луковичные растения Казахстана. Алматы, 2005. 192 с.
103. Икрамов М. И. Зайцегуб опьяняющий, его распространение и запасы в Узбекистане // Ресурсы дикорастущих растений СССР. М., 1968. – С. 123.
104. Икрамов М. И. Род *Lagochilus* Средней Азии // Ташкент: Фан, 1976. – С. 184.
105. Ильин М. М. Род *Jurinea* // Флора СССР Т 27. М.-Л: АН СССР, 1962. – С. 609–814, 631–635, 641–642, 702–703.
106. Камелин Р. В. Флорогенетический анализ естественной флоры горной Средней Азии. Л.: Наука, 1973. – С. 356.
107. Камелин Р. В. К познанию флоры Нурачинских гор // Ботан. журн., 1973. Т. 58. № 5. – С. 625–637.
108. Камелин Р. В. Новый вид рода *Vicoa* Cass. и другие новинки флоры Нурачинских гор // Нов. сист. высш. раст. 1976. Т. 13. – С. 244–245.
109. Камелин Р. В. *Astragalus*. Род *Astragalus* L. // Определитель растений Средней Азии, т.6. – С.158.
110. Камелин Р. В. Род *Vicoa* Cass. – Викоа // Определитель растений Средней Азии. Т. Х. Ташкент: Фан, 1993. – С. 461–463.
111. Камелин Р. В., Махмедов А. М. О систематическом положении среднеазиатских видов *Salvia* из секции *Physosphae* // Бот. журн. 1980. Т. 65. №4. – С. 580–582.
112. Камелин Р. В., Цукерваник Т. И. *Lagochilus vvedenskyi* R.Kam. et Zuckerw.// Новости систематики. Вып. 20. Л.: Наука, 1983. – С. 167.
113. Кирпичников М. Э. Род *Helichrysum* // Флора СССР. Т. 25. М.-Л.: АН СССР, 1959. – С. 417–418.
114. Клюйков Е. М., Пименов М. Г. *Bunium* L. – Буниум. // Определитель растений Средней Азии. Т. VII. Ташкент: Фан, 1983. – С. 228–335 .
115. Кнорринг О. Э. Род *Eremostachys* // Флора СССР. Т. 21. М.-Л.: АН СССР, 1954а. – С. 1–56.
116. Кнорринг О. Э. Род *Lagochilus* // Флора СССР. Т. 21. М.-Л.: АН СССР, 1954. – С. 160–181.
117. Кнорринг О. Э. Материалы по систематике рода *Lepidolopha* // Бот. мат. Герб. Бот. ин-та АН СССР. Т. 10. Л., 1959. – С. 380–384.

118. Кнорринг О. Э. Род *Lepidolopha* // Флора СССР. Т. 26. М.-Л.: АН СССР, 1961. – С. 288–291.
119. Ковалевская С. С. *Dionysia* Fenzl - Дионисия. Определитель растений Средней Азии. Ташкент: Фан, 1986. Т.VIII. – С. 19–20.
120. Ковалевская С. С. Заметки о некоторых среднеазиатских видах *Anthemidea* // Бот. мат. Герб. Ин-та Бот. АН УзССР, Вып. 16. Ташкент, 1961, – С. 32–38.
121. Ковалевская С. С. Сем. *Primulaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 31–50.
122. Ковалевская С. С. Сем. *Solanaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 416–445.
123. Ковалевская С. С. Род *Trichanthemis* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 194.
124. Ковалевская С. С. Род *Scorzonera* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 444–445.
125. Ковалевская С. С. Род *Tanacetopsis* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 146.
126. Ковалевская С. С. Род *Koelpinia* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 419.
127. Ковалевская С. С. Род *Lepidolopha* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 195–197.
128. Ковалевская С. С. Род *Xylanthemum* // Флора Узбекистана. Т. 6. 1961. – С. 136.
129. Ковалевская С. С. Род *Anemone* // Определитель растений Средней Азии Т. 3. Ташкент: Фан, 1972. – С. 189–193.
130. Ковалевская С. С. Род *Adonis* // Определитель растений Средней Азии. Т. 3. Ташкент: Фан, 1972. – С. 228–231.
131. Ковалевская С. С. Род *Crambe* // Определитель растений Средней Азии. Т. 4. Ташкент: Фан, 1974. – С. 183–186.
132. Ковалевская С. С. Секция *Astenolobium*. рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 139.
133. Ковалевская С. С. Секция *Astragalus* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 121–123.
134. Ковалевская С. С. Семейство *Sympomoriaceae* // Определитель растений Средней Азии. Т. 7. Ташкент: Фан, 1983. – С. 167–168.
135. Ковалевская С. С. Секция *Myobroma* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 142–164.
136. Ковалевская С. С. Секция *Pendulina* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 164–167.
137. Ковалевская С. С. Род *Hedysarum* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 286–311.
138. Ковалевская С. С. Род *Ugamia* // Определитель растений Средней Азии. Т. 10. Ташкент: Фан, 1993. – С. 596–596.
139. Ковалевская С. С. Род *Rhus* L. // Определитель растений Средней Азии, 1983. Т.7. – С.18.
140. Коровин Е. П. Новые виды семейства зонтичных флоры Узбекистана // Бот. мат. Герб. ин-та бот. и зоол. АН УзССР, Вып. 8. Ташкент, 1947. – С. 3–24.
141. Коровин Е. П. Иллюстрированная монография рода *Ferula*. Ташкент: АН УзССР, 1947. – С. 33, 43, 64.
142. Коровин Е. П. Новые виды семейства зонтичных флоры Узбекистана // Бот. мат. Герб. ин-та бот. и зоол. АН УзССР, Вып. 12. Ташкент, 1948. – С. 13–32.
143. Коровин Е. П. Род *Ferula* // Флора СССР. Т. 17. М.-Л.: АН СССР, 1951. – С. 62–142.
144. Коровин Е. П. Addenda XVII // Флора СССР Т. 18. М.-Л.: АН СССР, 1952. – С. 735.
145. Коровин Е. П. *Bunium* L. – Буниум, зира. // Флора Узбекистана. Т. III. Ташкент: АН УзССР, 1959. – С. 340–348.
146. Коровин Е. П. *Ferula* L. – Ферула. Флора Узбекистана. Т. III. Ташкент: АН УзССР. – С. 399–439, 426, 490.
147. Коровин Е. П. Род *Oenanthe* // Флора Узбекистана. Т. 4. Ташкент: АН УзССР, 1959. – С. 378.
148. Коровин Е. П. Род *Seseli* // Флора Узбекистана. Т. 4. Ташкент: АН УзССР, 1959. – С. 372.
149. Коровин Е. П., Попов М. Г. *Euphorbia sclerocyathin* // Гербарий флоры Средней Азии. Т. 11-13. № 304. Ташкент, 1927. – С. 41.
150. Короткова Е. Е. Новые виды рода *Hedysarum* // Бот. мат. Герб. ин-та бот. и зоол. АН УзССР. Ташкент, 1947. – С. 6–14.
151. Короткова Е. Е. Новые виды рода *Cicer* // Бот. мат. Герб. ин-та бот. и зоол. АН УзССР. Вып. 10. Ташкент, 1948. – С. 17–19.
152. Короткова Е. Е. Род *Hedysarum* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 222–736.
153. Короткова Е. Е. Род *Onobrychis* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 737–744.
154. Короткова Е. Е. Род *Cicer* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 750–756.
155. Короткова Е. Е., Хамидходжаева С.А. Унгерния Виктора // Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. М.: ГУПС 1976. – С. 154, 317.
156. Красная книга Узбекской ССР. Ч. 2. Растения. Ташкент: Фан, 1984. – С. 150.
157. Красная Книга Республики Узбекистан: Редкие и исчезающие виды растений и животных: (в 2-х томах): Т.1. Растения. Ташкент: Chinor ENK, 1998.
158. Красная Книга Республики Узбекистан: Редкие и исчезающие виды растений и животных: (в 2-х томах): Т.1. Растения и грибы. Ташкент: «Chinor ENK», 2006.

159. Красная Книга Республики Узбекистан: Редкие и исчезающие виды растений и животных: (в 2-х томах): Т.1. Растения и грибы. Ташкент: «Chinor ENK», 2009.
160. Красовская Л. С., Левичев И. Г. Флора Чаткальского заповедника. Ташкент: Фан, 1986. – С. 168–169.
161. Крашенинников И. М. Новые сложноцветные // Бот. мат. Герб. Бот ин-та им. Комарова АН СССР. Т. 9. Вып. 4–12. М.-Л., 1946. – С. 152–184.
162. Крашенинников И. М., Липшиц С. Ю. *Scorzonerabungei* N. Krasch. et Lipsch. // Бюл. Моск. общ. испр. прир. Отд. биол. Вып. 43. № 1. М.: 1934. – С. 144.
163. Кудряшев С. Н. Материалы к изучению шалфеев Средней Азии. Ташкент: 1937. – С. 35.
164. Кудряшев С. Н. Род *Pyrus* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 271–275.
165. Кудряшев С. Н. Сем. Capparidaceae // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 58–64.
166. Культиасов М. В. Материалы к познанию Туркестанских видов рода *Cousinia* // Тр. Среднеаз. Гос. унив. Сер. 8. Вып. VI. Ташкент, 1929. – С. 7, 22, 26, 27.
167. Лазьков Г. А. Кенжабаева Н. О новых и редких видах флоры Киргизии. // Новости систематики высших растений, 2002. Т. 34. – С. 252–254.
168. Левичев И. Г., Красовская Л. Е. Пскемский лук в южной части своего ареала // Бюлл. МОИП, отд. биол. 86. 1982, №6. – С. 105–111.
169. Левичев И. Г. *Calispepla aegacanthoides* Vved. Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, ENK «Chinor», 1996. – С. 67.
170. Левичев И. Г. *Iridodictyum winklerii* (Regel) Rodionenko. Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, «Chinor ENK», 1996. – С. 81.
171. Ли А. Д. Секция *Halicacabus* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 171.
172. Ли А. Д. Секция *Alopecioides* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 120.
173. Ли А. Д. Род *Rochelia* // Определитель растений Средней Азии. Т. 8. Ташкент: Фан, 1986. – С. 150.
174. Ли А. Д. Род *Onosma* L. // Определитель растений Средней Азии, 1986. Т.8. – С. 110.
175. Ли А. Д. Род *Rindera* Pall. // Определитель растений Средней Азии. Ташкент: Фан, 1986. Т. VIII. – С. 151–155.
176. Ли А. Д. Род *Pedicularis* // Определитель растений Средней Азии, т.9, 1987. – С.266.
177. Линчевский И. А. *Acantholimon* Boiss. – Акантолимон // Флора Узбекистана. Т. 5. – Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 63.
178. Линчевский И. А. *Acantholimon* Boiss. – Акантолимон // Определитель растений Средней Азии. Т. 10. Ташкент: Фан, 1993. – С. 19.
179. Линчевский И. А. *Cephalorhizum* Popov et Korovin – Корнеглав // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 74.
180. Линчевский И. А. *Cephalorhizum* Popov et Korovin – Корнеглав // Определитель растений Средней Азии. Т. 10. Ташкент: Фан, 1993. – С. 32.
181. Линчевский И. А. Род *Cicer* // Флора СССР. Т. 13. М.-Л.: АН СССР, 1948. – С. 386–406.
182. Линчевский И. А. Сем. *Plumbaginaceae* // Флора СССР. Т. 18. М.-Л: АН СССР, 1952. – С. 226–474.
183. Линчевский И. А. Сем. *Plumbaginaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 52–63.
184. Линчевский И. А. Род *Cicer* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 323–331.
185. Липский В. И. Материалы для флоры Средней Азии // Труды Императорского С.-Пб. Ботанического сада. 1901. Т. XVIII. – С. 83–85.
186. Липшиц С. Ю. Род *Scorzonerabungei* // Флора СССР. Т. 29. М.-Л.: АН СССР, 1964. – С. 107–108.
187. Лозина-Лозинская А. С. Род *Fritillaria* // Флора СССР. Т. 4. Л.: АН СССР, 1935. – С. 302–320.
188. Лозина-Лозинская А. С. Род *Ribes* // Деревья и кустарники СССР. Т. 3. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1954. – С. 177–215.
189. Малеев В. П. Род *Pyrus* // Флора СССР. Т. 9. М.-Л.: АН СССР, 1939. – С 33–357.
190. Мальцев И. И. Дионисия гиссарская – *Dionysia hissarica* Lipsky. Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: Chinor ENK, 2009. – С. 168–169.
191. Махмедов А. М. Новый вид шалфея (*Salvia*) с Западного Тянь-Шаня // Новости систематики высших растений. Т. 17. М.-Л.: Наука, 1980. – С. 215–218.
192. Махмедов А. М. Распространение видов рода *Salvia* в Средней Азии и Южном Казахстане // Узб. биол. журн. 1982. №2. – С. 41–43.
193. Махмедов А. М. Шалфеи Средней Азии и Казахстана. Ташкент: Фан, 1984. – С. 50–56.
194. Махмедов А. М. Ботанико-географический анализ рода *Phlomis* L. флоры Средней Азии // Узб. биол. журн. 1986, №4. – С. 40–42.
195. Махмедов А. М. Роды *Phlomis* и *Salvia* // Определитель растений Средней Азии. Т. 9. Ташкент: Фан, 1987. – С. 107–113, 139–151.
196. Мурзаев Р. М. Мягкоплодник рассеченнолистный и возможности введения его в культуру. Ташкент, 1985. – С. 45.
197. Мухамеджанова Ф. И., Тожибаев К. Ш. Новые сведения о двух редких и эндемичных растениях Чаткальского заповедника // Труды Чаткальского Государственного Биосферного заповедника. Вып. V. Ташкент, 2004. – С.138–142.
198. Набиев М. М. Новое алкалоидоносное расление Узбекистана // Юбилейный выпуск Трудов ТашГУ. Ташкент, 1961. – С. 24–27.
199. Набиев М. М. Сем. *Cucurbitaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 600–618.

200. Набиев М. М., Закиров К. З. *Lappula nuratavica* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 631–218.
201. Набиев М. М., Закиров К. З. Сем. *Boraginaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 632, 222.
202. Набиев М. М., Левичев И. Г., Белоусова Л. С. Дионисия гиссарская – *Dionysia hissarica* Lipsky. // Красная книга СССР. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. М.: Лесная промышленность, 1984. – С. 334.
203. Набиев М. М. Род *Helichrysum* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 80.
204. Набиев М. М. Род *Calligonum* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 191–199.
205. Набиев М. М., Казакбаев Р. Ю. // Определитель деревьев и кустарников Узбекистана. Ташкент: Фан, 1975. – С. 116.
206. Набиев М. М. Секция *Oxyglottis* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 101–104.
207. Набиев М. М. *Astragalus terrae rubra* Butkov // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, «Chinor ENK», 2006. – С. 62.
208. Набиев М. М. *Hedysarum magnificum* Kudr. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, «Chinor ENK», 2006. – С. 87.
209. Набиев М. М. Сем. *Boraginaceae* // Определитель растений Средней Азии. Т. 8. Ташкент: Фан, 1986. – С. 130–135.
210. Набиев М. М. Семейство *Bignoniaceae* // Определитель растений Средней Азии, т. 9. Ташкент: Фан УзССР, 1987. – С. 270.
211. Набиев М. М. *Rindera fornicata* Pazij // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: «Chinor ENK», 1996. – С. 94.
212. Насимова Т. *Euphorbiaceae* // Определитель растений Средней Азии, т. 7. Ташкент: Фан УзССР, 1983. – С. 48.
213. Невский С. А. Род *Delphinium* // Флора СССР. Т. 7. М.-Л.: АН СССР, 1937. – С. 99–183.
214. Нигматуллаев А., Тайжанов К. К биологии некоторых среднеазиатских видов *Aconitum* L. // Биологические особенности перспективных лекарственных растений Узбекистана // Ташкент: Фан, 1981. – С. 4–28.
215. Нигматуллаев А., Тайжанов К. К биологии прорастания семян некоторых среднеазиатских представителей *Ranunculaceae* // Узб. биол. журн. 1983. №2. – С. 35–38.
216. Пазий В. К. Новые виды сем. *Euphorbiaceae* // Бот. мат. Герб. ин-та ботаники и зоологии АН УзССР. Вып. 11. Ташкент: АН УзССР, 1948. – С. 20–28.
217. Пазий В. К. Сем. *Papaveraceae* // Флора Узбекистана. Т. 4. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 33–58.
218. Пазий В. К. Сем. *Euphorbiaceae* // Флора Узбекистана. Т. 4. Ташкент: АН УзССР, 1959. – С. 82–123.
219. Пазий В. К. Род *Stipa* // Определитель растений Средней Азии. Т. 1. Ташкент: Фан, 1968. – С. 74.
220. Пазий В. К. Сем. *Amaryllidaceae* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 119–122.
221. Пазий В. К. Род *Colchicum* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 13–14.
222. Пазий В. К. Род *Petilium* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 92.
223. Пазий В. К. Род *Dipcadi* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1977. – С. 110.
224. Пазий В. К. Сем. *Papaveraceae* // Определитель растений Средней Азии. Т. 4. Ташкент: Фан, 1974. – С. 6–30.
225. Пахомова М. Г. Род *Ficus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 151.
226. Пахомова М. Г. Род *Paeonia* // Определитель растений Средней Азии. Т. 3. Ташкент: Фан, 1972. – С. 142.
227. Пахомова М. Г. Род *Delphinium* // Определитель растений Средней Азии. Т. 3. Ташкент: Фан, 1972. – С. 156–181.
228. Пахомова М. Г. Род *Pseudoclausia* // Определитель растений Средней Азии. Т. 4. Ташкент: Фан, 1974. – С. 103–108.
229. Пахомова М. Г. Секция *Erionotus* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 123–129.
230. Пименов М. Г. К систематике рода *Seseli* L. Конспект видов флоры СССР // Новости систематики высших растений. 15. Л.: Наука, 1978. – С. 193.
231. Пименов М. Г. *Fergania* - новый род семейства зонтичных (*Apiaceae*) // Новости систематики высших растений. Т. 19. Л.: Наука, 1982. – С. 119.
232. Пименов М. Г. Род *Lipskya* // Определитель растений Средней Азии. 1983, Т. 7. – С. 192.
233. Пименов М. Г. *Astomaea Reichenb.* – Астомея // Определитель растений Средней Азии. Т. VII. Ташкент: Фан, 1983. – С. 194.
234. Пименов М. Г. *Sphaenolobium Pimenov* – Клинопастник // Определитель растений Средней Азии. Т. VII. Ташкент: Фан, 1983. – С. 264–265.
235. Пименов М. Г. *Dimorphosciadium Pimenov* – Диморфосциадий // Определитель растений Средней Азии. Т. VII. Ташкент: Фан, 1983. – С. 267.
236. Пименов М. Г. *Lomatocarpa Pimenov* – Окамленноплодник // Определитель растений Средней Азии. Т. VII. Ташкент: Фан, 1983. С. 268.
237. Пименов М. Г. *Ferula L.* – Ферула, шаир // Определитель растений Средней Азии. Т. VII. Ташкент: Фан, 1983. – С. 276–313.

238. Победимова Е. Г. Род *Salvia* // Флора СССР. Т. 21. М.-Л.: АН СССР, 1954. – С. 284–278.
239. Победимова Е. Г. Род *Restella* // Флора СССР. Т. 15. М.-Л.: АН СССР, 1949. – С. 515.
240. Попов М. Г. Дикие плодовые Средней Азии // Тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции. Т. 22. Вып. 3. Л., 1929. – С. 241–483.
241. Попов М. Г., Андросов Н. В. Растительность заповедника Гуралаш и Зааминской лесной дачи. Ташкент, 1937. – С. 39.
242. Попов М. Г. Род *Fumariola* // Флора СССР. Т. 7. М.-Л.: АН СССР, 1937. – С. 716–717.
243. Попов М. Г. Новые виды бобовых из Средней Азии // Мат. Герб. ин-та бот. АН СССР, Л., 1937. – С. 15.
244. Попов М. Г. Сем. Сложноцветных // Материалы к флоре Заарафшанской долины. Тр. Узб. Гос. Унив. Н.С. 27. Биолог. Вып. 14. Ташкент, 1941. – С. 88–89.
245. Попов М. Г. Новые виды рода Астрагал // Бот. мат. Герб. бот. ин-та АН СССР, Т. 10. М.-Л., 1947. – С. 3–29.
246. Попов М. Г., Закиров К. З. *Lappula aktaviensis* // Флора СССР. Т. 19. М.-Л.: АН СССР, 1953. – С. 712.
247. Пошкурлат А. П. О видовой самостоятельности *Adonis leiosepala* // Бот. мат. Герб. ин-та бот. АН Уз ССР. Вып. 19. Ташкент: Фан, 1974. – С. 50–55.
248. Пояркова А. И. Новый вид жимолости для Средней Азии // Бот. мат. Герб. Бот. ин-та АН СССР, Т. 9. Вып. 4–12. М.-Л., 1946. – С. 210–212.
249. Пратов У. П. Сем. *Chenopodiaceae* // Определитель растений Средней Азии. Т. 3. Ташкент: Фан, 1972. – С. 92, 94, 133.
250. Пратов У. П. Второй вид рода *Nanophyton* (*Chenopodiaceae*) // Бот. журн. 1975. Т. 60. № 8. – С. 1164.
251. Пратов У. П. О систематике и филогении рода *Nanophyton* (*Chenopodiaceae*) // Материалы совещания по филогении центросеменных. М.: МГУ, 1977. – С. 44–46.
252. Пратов У. П. Секция *Leptophysa* и *Stipitella* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 86–89.
253. Пратов У. П. Род *Climacoptera* // Систематика, география, филогения и вопросы охраны. Ташкент: Фан, 1986. – С. 26.
254. Пратов У. П. Род *Pseudosedum* (Boiss.) Berger. – Ложноочиток. Определитель растений Средней Азии. Т. IV. Ташкент, 1974. – С. 226–228.
255. Пратов У. П. и др. Тюльпаны Западного Тянь-Шаня. Ташкент, «Chinor ENK», 2006. – С. 47–48.
256. Пратов У. П., Шерматов Г. М. Дикие яблони и груши Узбекистана. Ташкент: Фан, 1972. – С. 16–19.
257. Проханов Я. И. Систематический сбор молочаев Средней Азии. М.-Л: Госхимтехиздат, 1933. – С. 241.
258. Рожановская М. И. Островская величественная // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 4. Ташкент: Фан, 1965. – С. 137–143.
259. Рожевиц Р.Ю. Триба *Agrostidae* из сем. Gramineae // Флора СССР. Т. 2. Л.: АН СССР, 1934. – С. 63–234.
260. Романова А. С. и др. Хиноны *Salvia bucharica*, *S. dracocephaloides*, *S. korolkowii* // ХПС. 1980. № 4. – С. 564.
261. Рябова Т. И. Род *Eremurus* // Дикорастущие растения. Т. 2. Л., 1977. – С. 51–83.
262. Саркисова С. А. Сем. *Capparidaceae* // Определитель растений Средней Азии. Т. 4. Ташкент: Фан, 1974. – С. 30–34.
263. Саркисова С. А. Род *Iskandera* // Определитель растений Средней Азии. Т. 4. Ташкент: Фан, 1974. – С. 151.
264. Саркисова С. А. Род *Ewersmannia* // Определитель растений Средней Азии, т.6, 1981. – С. 358.
265. Саркисова С. А. Род *Heliotropium* // Определитель растений Средней Азии. Т. 8. Ташкент: Фан, 1986. – С. 95.
266. Сарибаева Ш. У. *Astragalus centralis* Sheld.-редкий эндемик Юго-Западного Кызылкума // 10-я Пущинская школа-конференция молодых ученых, посвященная 50-летию Пущинского центра РАН. 17–21 апреля 2006 года. Сборник тезисов. Пущино, 2006. – С. 310.
267. Сарибаева Ш. У. Оценка состояния популяций *Astragalus centralis* Sheld. // Вестник Каракалпакского отделения АН РУз. Нукус, 2008. № 3. – С. 34–35.
268. Семистрочева П. Л. Сем. *Santalaceae* // Иллюстрированный определитель растений Казахстана. Т. 1. Алма-Ата: Наука, 1969. – С. 235.
269. Смольянинова Л. А. Род *Dionysia* // Флора СССР. Т. 18. М.-Л.: АН СССР, 1952. – С. 208–217.
270. Сосков Ю. Д. Род *Calligonum* // Флора Таджикистана. Т. 3. Л.: Изд-во АН СССР, 1968. – С. 225, 230, 234.
271. Сосновский Д. И. Сем. *Vitaceae* // Флора СССР. Т. 14. М.-Л.: АН СССР, АН УзССР, 1949. – С. 674–704.
272. Сумневич Г. П. Род *Eremosparton* // Флора Узбекистана. Т.3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 452.
273. Сумневич Г. П. Род *Calophaca* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент, 1955. – С. 468–469.
274. Сумневич Г. П. Сем. *Punicaceae* // Флора Узбекистана. Т. 4. Ташкент: АН УзССР, 1959. – С. 239–240.
275. Тажетдинова Д. М. Краснокнижные виды *Capparis rosanowiana* B.Fedtsch. и *Cynomorium songaricum* Rupr. во флоре плато Устюрт / Узбекский биологический журнал. №5. Ташкент, 2013. – С. 30–31.
276. Тайжанов К., Короткова Е. Е. Ядовитые алколоидоносные растения Алая // Растительные ресурсы. 1969. Т. 5. Вып. 1. – С. 23–31.
277. Тайжанов К. Алколоидоносная флора горной Средней Азии. Автореф. дисс. ... докт. биол. наук. Ташкент.1994. –50 с.

278. Терехов В. И. Эндемичные и редкие растения флоры Чимкентской области // Охрана растительного мира Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1979. – С. 106–109.
279. Титова О. А. Изучение морфологии и биологии видов рода *Eremurus* Bieb. в условиях Ташкента // Автореф. канд. дисс. ... Ташкент, 1970. – С. 20.
280. Титова О. А. Влияние температурных условий на эремурусы в период летнего покоя и зимы // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 8. Ташкент: Фан, 1971. – С. 116–129.
281. Титова О. А. Спонтанные гибриды видов рода *Eremurus* // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 9. Ташкент: Фан, 1977. – С. 139–145.
282. Титова О. А. Результаты воздействия весеннего заморозка на некоторые однодольные растения природной флоры Средней Азии, интродуцированные в условиях Ташкента // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 10. Ташкент: Фан, 1973. – С. 116–118.
283. Титова О. А. К морфологии семян видов рода *Juno* // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 16. Ташкент: Фан, 1979 а. – С. 98–101.
284. Титова О. А. К семенному размножению видов рода *Juno* // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 16. Ташкент: Фан, 1979. – С. 98–101.
285. Титова О. А. *Eremurus alberti* Regel. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, «Chinor ENK», 1996. – С. 218.
286. Титова О. А. *Eremurus lactiflorus* O. Fedtsch. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, «Chinor ENK», 1996. – С. 218.
287. Тожибаев К. Ш. Дополнение к флоре Чаткальского Биосферного заповедника. / Труды Чаткальского Государственного Биосферного заповедника. Вып. V. Ташкент, 2004. – С. 143–146.
288. Тожибаев К. Ш. *Tulipa vvedenskyi* Z. Botsch. на классическом местонахождении / Матер. междунар. конф. «Развитие ботанической науки в Центральной Азии и ее интеграция в производство». Ташкент, 2004. – С. 66–67.
289. Тожибаев К. Ш., Бешко Н. Ю. Кадастр редких и эндемичных растений Джизакского и Навоийского вилоятов Республики Узбекистан // Биоразнообразие Узбекистана – мониторинг и использование. – Ташкент, 2007. – С. 200–208.
290. Тожибаев К. Ш., Тургинов О. Т. Новые и редкие виды флоры Узбекистана из Байсунтау (Гиссарский хребет) // Бот. журн. 2012. Т. 97. № 7. – С. 966–971.
291. Тожибаев К. Ш. Тюльпаны (*Tulipa* L.) в растительном покрове Западного Тянь-Шаня. Сборник Биоразнообразие Узбекистана – мониторинг и использование. Ташкент, 2007. – С. 194–200.
292. Тожибаев К. Ш. Лилейные (Liliaceae) Юго-Западного Тянь-Шаня (в пределах Узбекистана). // Узб. биол. журн., 2008. №6. – С. 26–30.
293. Тожибаев К. Ш., Мухамеджанова Ф. И. Новые сведения о некоторых редких видах Угам-Чаткальского Национального Парка // Вестник. «Тинбо». №1. Ташкент «Истиклол», 2005. – С.19–21.
294. Туляганова М. Род *Calispepla* // Определитель растений Седней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 19.
295. Туляганова М. Род *Erigeron* // Определитель растений Седней Азии. Т. 10. Ташкент: Фан, 1993. – С. 494–512.
296. Туляганова М. Секция *Macrothrix* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 180–184.
297. Туляганова М. Род *Cercis* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 12.
298. Туляганова М. Новый вид рода *Leonurus* из Средней Азии // Бот. журн. 1987. т. 72. №6. – С. 213–214.
299. Туляганова М. Род *Leonurus* // Опр. раст. Средней Азии т. 9, Ташкент: Фан, 1987. – С.119.
300. Туляганова М. Род *Phlomidoschema* // Определитель растений Средней Азии. Т.IX. Ташкент: Фан, 1987. – С. 137.
301. Федченко Б. А. Заметки о географическом распространении рода *Eremurus* // Изв. Петерб. Бот. Сада, Т. 7, вып.2, 1907, С.65–68
302. Федченко Б. А. Новый вид *Thesium* из Ташкентского региона // Бот. мат. Герб. Глав. бот. сада РСФСР. Т. 4, 1923. – С. 113–114.
303. Федоров А. А. Сем. *Campanulaceae* // Флора СССР. Т. 24. М.-Л.: АН СССР. 1957. – С. 126–449.
304. Филимонова З. Н. Новый вид из рода *Oxytropis* // Бот. мат. Герб. ин-та бот. АН УзССР, Т. 20, Ташкент: Фан, 1982. – С. 43.
305. Филимонова З. Н. Род *Oxytropis* // Определитель растений Средней Азии. Т. 7. Ташкент: Фан, 1983. – С. 323–367.
306. Фисюн В. В. Род *Jurinea* // Флора Казахстана. Т. 9. Алма-Ата: АН КазССР, 1966. – С. 299–316.
307. Хамидходжаев С. А., Короткова Е. Е. Естественные запасы унгерний Виктора // ДАН УзССР, 1966. № 7. – С. 39–40.
308. Хасанов Ф. О., Мальцев И. И. Новый вид рода *Ferula* L. из Гиссарского хребта. ДАН УзССР, 1990. – С.48–49.
309. Хасанов Ф. О., Мальцев И. И. Новый вид рода *Silene* L. из Кугитанга. Узб. биол. журн., 1991, № 3. – С.66–67.
310. Хасанов Ф. О. Эндемичные растения юго-западных отрогов Гиссарского хребта // Узб. биол. журн., 1991, № 2. – С. 41–45.
311. Хасанов Ф. О., Мальцев И. И. Новый род *Kamelinia* (Apiaceae) из Средней Азии. // Узб. Биол. журн. 1992, № 2. – С. 49–53.
312. Хасанов Ф. О., Сулейманов Н. А. Новые виды растений из северного Памиро-Алая. ДАН РУз.
313. Хасанов Ф., Эргашев Э., Кадыров Г. Новый вид рода *Astragalus* L. из Кызылкума. Узб. Биол. журн.

314. Хохряков А. П. Эремурусы и их культура. М.: 1965. – С. 127.
315. Цвелеев Н. Н. Род *Trichanthemis* // Флора СССР. Т. 26. М.-Л.: АН СССР, 1961. – С. 282-283.
316. Цвелеев Н. Н. Злаки СССР: Л.: Наука, 1976. – С. 594.
317. Цукерваник Т. Н., Грачев Г. Ф. Исследование *Salvia korolkovii* // Тр. ин-та химии АН УзССР, Вып. 1. Ташкент: 1948. – С. 41-43.
318. Цукерваник Т. И. Секция *Cytisodes* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981 а. – С. 216-219, 240-249.
319. Цукерваник Т. И. Секция *Eriopodus* // Определитель растений Средней Азии, 1981, т.6. – С. 219.
320. Цукерваник Т. И. Род *Lagochilus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 9. Ташкент: Фан, 1987. – С. 130.
321. Чернева О. В. Памироалайские кузинии секции *Homalochaetae* // Бот. мат. Герб., ин-та бот. АН УзССР, Вып. 15. Ташкент: АН УзССР, 1959. – С. 33-52.
322. Чернева О. В. Новые виды *Cynareae* (Compositae) // Бот. мат. Герб., ин-та бот. АН УзССР, Вып. 16. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 51-63.
323. Чернева О. В. Сем. *Rubiaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент, 1961. – С.530-559.
324. Чернева О. В. Род *Cousinia* // Флора СССР. Т. 27. М.-Л., 1962. – С. 108-357.
325. Чернева О. В. Опыт систематики рода *Cousinia* флоры СССР // Бот. мат. ин-та бот. АН УзССР, Вып.17. Ташкент, 1962. – С. 77-108.
326. Чернева О. В. Род *Apiga* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 334.
327. Чернева О. В. Род *Cousinia* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 246, 331, 510.
328. Чернева О. В. Род *Olgaea* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 380-381.
329. Чернева О. В. Род *Oligochaeta* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 412.
330. Чернева О. В. Род *Serratula* // Флора Узбекистана Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 388.
331. Чернева О. В. Род *Jurinea* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 359-367.
332. Чернева О. В. Род *Echinops* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 213-223.
333. Чернева О. В. Род *Echinops* // Флора СССР. Т. 27. М.-Л.: АН СССР, 1967. – С. 12.
334. Чернева О. В. Сем. *Iridaceae* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 122-141.
335. Черняковская Е. Г. Род *Gladiolus* // Флора СССР. Т. 4. М.-Л.: АН СССР, 1935. – С. 578- 581.
336. Черняковская Е. Г. Род *Crambe* // Флора СССР. Т. 8 М.-Л.: АН СССР, 1939. – С. 474-491.
337. Черняковская Е. Г. Сем. *Orchidaceae* // Флора Узбекистана. Т. 1. Ташкент: АН УзССР, 1941. – С. 522-532.
338. Шарипов А. Х. *Tulipa vvedenskyi* Z. Botsch. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: «Chinor ENK», 1996. – С. 141.
339. Шарипов А. Х. *Tulipa micheliana* Hoog. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, «Chinor ENK», 1996. – С. 142.
340. Шарипов А. Х. *Tulipa ferganica* Vved. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, «Chinor ENK», 1996. – С. 143.
341. Шарипов А. Х. *Tulipa korolkowii* Regel. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, «Chinor ENK», 1996. – С. 145.
342. Шерматов Г. М. Секция *Bucharica* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 220-222.
343. Шерматов Г. М. Секция *Macrocytis* *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 249-251.
344. Шерматов Г. М. Секция *Proselius* // Определитель растений Средней Азии. Ташкент: Фан, 1981. Т. VI. – С.211.
345. Шерматов Г. М. *Astragalus abolinii* Popov. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: «Chinor ENK», 1996. – С. 29.
346. Шерматов Г. М. *Astragalus baranovii* Popov. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: «Chinor ENK», 1996. – С. 31.
347. Шерматов Г. М. *Acanthophyllum albidum* Schischk. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: «Chinor ENK», 1996. – С. 209.
348. Шишкун В. К. Род *Oenanthe* // Флора СССР. Т. 16. М.-Л.: АН СССР, 1950. – С. 533. 357.
349. Шишкун В. К. Род *Zeravschania* // Флора СССР. Т. 16. М.-Л.: АН СССР, 1950. – С. 412.
350. Шомурадов Х. Ф., Сарыбаева Ш. У. *Astragalus centralis* Sheld. нинг морфогенези хусусида // Ўзбекистонда чўлланишнинг экологик муаммалиари: ҳалқаро илмий конференция материалари. Тошкент, 2008. – Б. 146-149.
351. Шомурадов Х. Ф., Сарыбаева Ш., Ахмедов А., Абдураимов О. Распространение и современное состояние редких видов растений Устюрта. Материалы международной конференции «Биоразнообразия, сохранение и рациональное использование генофонда растительного и животного мира». Ташкент, 2014. – С.150-155.
352. Штейнберг Е. И. Род *Aconitum* // Флора СССР. Т. 7. М.-Л.: АН СССР, 1937. – С. 183-236.
353. Шульгина В. В. Сем. *Vitaceae* // Деревья и кустарники СССР. Т. 4. М.-Л., 1958. – С. 607-645.
354. Юзепчук С. В. Род *Anemone* // Флора СССР. Т. 7. М.-Л.: АН СССР, 1937. – С. 236-280.
355. Юзепчук С. В. Шестьдесят новых шлемников // Бот. мат. Герб. Бот. ин-та АН СССР. Т. 14. М.-Л., 1951. – С. 356-435.
356. Backlund M. & Thulin. Revision of genus *Plocama* // Taxon 56, 2007, 2:323.
357. Beshko N. Y., Tojibaev K. Sh. & Batoshev A. R. Tulips of the Nuratau Mountains and South-Eastern Kyzylkum (Uzbekistan) // Stapfia: reports. - Linz (Austria), 2013.- Vol. 99.- Pp. 198-204.

358. Fedtschenko O. Trois especes nouvelles du Genre Eremurus Extrait du Bulletin de l'herbier Boissier, 2-me Serie. T. 4. 8, 1904.

359. Fritsch, R. M. & Abbasi, M. A Taxonomic Review of Allium subg. Melanocrommyum in Iran. Gatersleben, 2013. 240 pp.

360. Gregory M., Fritsch R., Friesen N., Khassanov F. O. & D. Mc Neal Nomenclator Alliourum: Allium names and synonyms-a world guide.- Royal Botanical Gardens, Kew , 1998. -83 p.

361. Jamzad Z. Primulaceae. Flora of Iran, 1999. - P. 19–58.

362. Khassanov F. O. A revision of the genus Allium L. in the flora of Uzbekistan.- In: Hanelt P., Hammer K.,& Knupffer H. (Eds.): The genus Allium -taxonomical problems and genetic resources. Gatersleben, 1992. – P.153–159.

363. Khassanov F. O. & R. M. Fritsch. New taxa in Allium L. subg. Melanocrommyum (Webb & Berth.) Rouy from Central Asia. Linzer biol. Beitr. 1994, 26/1, - pp. 965–990.

364. Khassanov F. O. Conspectus of the wild growing Allium species of Middle Asia. - In: Ozturk M., Secmen O. and G. Gork (Eds.) Plant Life in South West Asia. Ege Univ. Press, Izmir, 1997. - pp.141–159.

365. Khassanov F. O., Shomuradov H. & Kadyrov G. Taxonomic revision of Allium L. sect Allium s. l. in Central Asia. // Staphia: reports. - Linz (Austria), 2011. - Vol. 95. - pp. 171–173.

366. Khassanov F. O., Rakhimova N. Taxonomic revision of the genus Iris L. (Iridaceae Juss.) for the flora of Central Asia. // Staphia: reports. - Linz (Austria), 2012. - Vol. 97. - pp. 121–126.

367. Khassanov F. O. et al. A new species from genus Plocama L.(Rubiaceae Juss.) from Middle Asia. // Staphia: reports. - Linz (Austria), 2014. - Vol. 101. - pp. 23–26.

368. Liden M. The genus Dionysia (Primulaceae), a synopsis and five new species. Willdenowia 37: 2007. - pp.37–61.

369. Tojibaev K. Sh. A new Tulipa species from Fergan valley. Linz. biol. beitr, 2009. 49/2.

370. Tojibaev K. Sh., Beshko N. Y. Reassessment of diversity and analysis of distribution in Tulipa (Liliaceae) in Uzbekistan // Nordic Journal of Botany. - 2014.

371. Tojibaev K. Sh., Turginov O. & Karimov F. A new species and new records of Allium (Amaryllidaceae) for Uzbekistan (Central Asia) // Phytotaxa 2014. 177 (5): 291–297.

Ўсимликларнинг лотинча номлари Латинские названия растений

Amaryllidaceae

- Allium praemixtum Vved.
 Allium aflatunense B. Fedtsch.
 Allium pskemense B. Fedtsch.
 Allium alaicum Vved.
 Allium botschantzevii Kamelin
 Allium bakhousianum Regel
 Allium majus Vved.
 Allium giganteum Regel
 Allium isakulii R.M. Fritsch et F.O. Khass.
 Allium rhodanthum Vved.
 Allium ravenii F.O. Khass. et al.
 Allium decoratum Turginov et Tojibaev
 Allium eremoprasum Vved.
 Allium viridiflorum Pobed.
 Ungernia victoris Vved. ex Artjuschenko
 Sternbergia lutea (L.) Spreng.
 Sternbergia fischeriana (Herb.) M. Roem.

Anacardiaceae

- Rhus coriaria L.

Apiaceae (Umbelliferae)

- Dorema microcarpum Korovin
 Sphaerosciadium denaëNSE (Schischk.) Pimenov
 et Kljuykov
 Aulacospermum popovii (Korov.) Kljukov,
 Pimenov et V.N. Tikhom.
 Kamelinia tianschanica F.O. Khass. et I.I. MalzEV
 Ferula helenae Rakhm. et Melibaev
 Ferula sumbul (Kauffm.) Hook. f.
 Ferula tuberifera Korovin
 Ferula kyzylkumica Korovin
 Ferula pratovii F.O. Khass. et I.I. Maltzev
 Ferula fedtschenkoana Koso-Pol.
 Ferula korshinskyi Korovin
 Ferula vicaria Korovin
 Ferula helena Rakhm. et Melib.
 Mogoltavia sewerzowii (Regel) Korovin
 Oenanthe fedtschenkoana Koso-Pol.
 Oenanthe heterococca Korovin
 Komarovia anisosperma Korovin
 Cephalopodium hissaricum Pimenov
 Zeravschania regeliania Korovin
 Fergania polyantha (Korovin) Pimenov
 Seseli turbinatum Korovin
 Paulita ovczinnikovii (Korovin) Sojak
 Autumnalia inopinata Pimenov
 Astomatopsis galioarpa Korovin
 Lipskya insignis (Koso-Pol.) Nevski
 Bunium angreni Korovin
 Bunium vaginatum Korovin
 Dimorphosciadium gayoides (Regel & Schmalh.)
 Pimenov
 Lomatocarpa korovinii Pimenov
 Sphaenolobium tenuisectum (Korovin) Pimenov

Aspleniaceae

- Phyllitis scolopendrum (L.) Newman

Asteraceae (Compositae)

- Anura pallidivirens (Kult.) Tscherneva
 Cousinia allolepis Tscherneva et Vved.
 Cousinia adenophora Juz. 278
 Cousinia butkovii Tscherneva et Vved.
 Cousinia vvedenskyi Tscherneva
 Cousinia platystegia Tscherneva
 Cousinia dhisakensis Kult.
 Cousinia umbilicata Juz.
 Cousinia glaphyrocephala Juz. et Tscherneva
 Cousinia candicans Juz.
 Cousinia pterolepida Kult.
 Cousinia glabrireta Kult.
 Cousinia pseudolanata Popov ex Tscherneva
 Cousinia stricta Tscherneva
 Cousinia dolichophylla Kult.
 Cousinia haplophylla Tscherneva
 Cousinia haesitabunda Juz.
 Cousinia campyloraphis Tscherneva
 Cousinia rhodantha Kult.
 Cousinia sprygini Kult.
 Cousinia praestans Tscherneva et Vved.
 Xylanthemum rupestre (Popov ex Nevski) Tzvelev.
 Echinops babatagensis Tscherneva
 Echinops brevipenicillatus Tscherneva
 Lepidolopha nuratavica Krasch.
 Lepidolopha fedtschenkoana Knorrung
 Oligochaeta vvedenskyi (Popov) Tscherneva
 Olgaea pectinata Iljin.
 Serratula lancifolia Zakirov
 Scorzonera bungei Krasch. et Lipsch.
 Tanacetopsis botschantzevii (Kovalevsk.) Kovalevsk.
 Trichanthemis butkovii Kovalevsk.
 Ugamia angrenica (Krasch.) Tzvelev.
 Jurinea gracilis Iljin.
 Jurinea asperifolia Iljin.
 Jurinea zakirovii Iljin.
 Jurinea mariae Pavlov.
 Jurinea sangardensis Iljin.
 Jurinea psammophila Iljin.
 Erigeron trimorphopsis Botsch.
 Vicia krasheninnikovii Kamelin
 Koelpinia leiocarpa Popov.
 Helichrysum nuratavicum Krasch.

Bignoniaceae

- Incarvillea olgae Regel.

Boraginaceae

- Lappula parvula Nabiev et Zakirov.
 Lappula nurativica Nabiev et Zakirov.
 Lappula aktaviensis Popov et Zakirov

Rindera fornicata Pazij	Pseudosedum campanuliflorum Boriss.
Heliotropium bucharicum B. Fedtsch.	
Onosma macrorhiza Popov.	
Nonea calceolaris Nikif. & Pazij	
<u>Brassicaceae (Cruciferae)</u>	
Iskandera hissarica N. Busch	
Parrya saxifraga Botsch. et Vved.	
Parrya kuramensis Botsch.	
Pseudoclausia sarawschanica (Regel et Schmalh.) Botsch.	
Pseudoclausia olgae (Regel et Schmalh.) Botsch.	
Pseudoclausia tschimganica (Popov ex Botsch. et Vved.) A.V.Vassil.	
Lepidium subcordatum Botsch. et Vved.	
Lepidium olgae (R.M. Vinogr.) Al-Shehbaz et Mumm.	
Crambe gordjaginii Sprygin et Popov	
Spryginia winklerii (Regel) Popov	
<u>Campanulaceae</u>	
Ostrowskia magnifica Regel	
<u>Capparaceae</u>	
Capparis rosanowiana B. Fedtsch.	
Cleome gordjaginii Popov	
<u>Caprifoliaceae</u>	
Lonicera paradoxa Pojark.	
<u>Caryophyllaceae</u>	
Allocrusa gypsophiloides (Regel) Schischk.	
Silene michelsonii Preobr.	
Silene tomentella Schischk.	
Silene popovii Schischk.	
Silene oreina Schischk.	
Silene nataliae F.O. Khass.	
Silena paranadema Bondarenko et Vved.	
Acanthophyllum albidum Schischk.	
Acanthophyllum cyrtostegium Vved.	
Dianthus uzbekistanicus Lincz.	
<u>Chenopodiaceae</u>	
Climacoptera oxyphylla U.P. Pratov	
Climacoptera malyginii (Korovin ex Botsch.) Botsch.	
Climacoptera pjataevae U.P. Pratov	
Climacoptera ambylostegia (Botsch.) Botsch.	
Climacoptera merkulowiczii (Zakirov) Botsch.	
Climacoptera ptiloptera U.P. Pratov	
Halimocnemis lasiantha Iljin	
Nanophyton botschantzevii U.P. Pratov	
Salsola drobovii Botsch.	
Salsola titovii Botsch.	
Salsola chiwensis Popov	
Anthochlamis tianschanica Iljin	
Gamanthus ferganicus Iljin	
<u>Colchicaceae (Melanthiaceae)</u>	
Colchicum kesselringii Regel	
<u>Crassulaceae</u>	
<u>Cucurbitaceae</u>	
Bryonia melanocarpa Nabiev	
<u>Cynomoriaceae</u>	
Cynomorium songaricum Rupr.	
<u>Ebenaceae</u>	
Diospyros lotus L.	
<u>Euphorbiaceae</u>	
Andrachne vvedenskyi Pazij	
Euphorbia densiuscula Popov	
Euphorbia kudrjashevii (Pazij) Prokh.	
Euphorbia densiusculiformis (Pazij) Botsch.	
Euphorbia triodonta Prokh.	
Euphorbia sclerocyathium Korovin et Popov	
<u>Fabaceae (Leguminosae)</u>	
Cercis griffithii Boiss.	
Astragalus abolinii Popov	
Astragalus baranovii Popov	
Astragalus centralis E.Sheld.	
Astragalus borissianus Gontsch.	
Astragalus butkovii Popov	
Astragalus bucharicus Regel	
Astragalus willisii Popov	
Astragalus nucleosus Popov	
Astragalus auratus Gontsch.	
Astragalus dianthoides Boriss.	
Astragalus knorriganus Boriss.	
Astragalus komarovii Lipsky.	
Astragalus massagetovii B. Fedtsch.	
Astragalus michaelis Boriss.	
Astragalus nuratensis Popov	
Astragalus plumatus Boriss.	
Astragalus pseudanthylloides Gontsch.	
Astragalus pskemensis Popov	
Astragalus leptophysus Vved.	
Astragalus pseudoeremophysa Popov	
Astragalus holargyreus Bunge	
Astragalus lasiocalyx Gontsch.	
Astragalus tupalangi Gontsch.	
Astragalus rhacodes Bunge	
Astragalus subschachimardanus Popov	
Astragalus rubrivenosus Gontsch.	
Astragalus terrae-rubrae Butkov	
Astragalus rubellus Gontsch.	
Astragalus plumbeus (Nevski) Gontsch.	
Astragalus adylovii F.O. Khass., Ergashev et Kadyrov	
Astragalus alexeji Gontsch.	
Astragalus belolipovii Kamelin ex F.O. Khass. et N. Sulejm.	
Astragalus austroferganicus Kamelin et R.M. Vinogr.	
Astragalus rubri-galli Popov	
Onobrychis tavernierifolia Stocks ex Boiss.	
Calispepla aegacanthoides Vved.	
Calophaca reticulata Sumnev.	

Cicer grande (Popov) Korotkova
Cicer incanum Korotkova
Oxytropis vvedenskyi Filim.
Oxytropis tyttantha Gonsch.
Oxytropis maidantalensis B. Fedtsch.
Oxytropis pseudorosea Filim.
Oxytropis fedtschenkoana Vassilcz.
Oxytropis pseudoleptophysa Boriss.
Hedysarum angrenicum Korotkova
Hedysarum bucharicum B. Fedtsch.
Hedysarum drobovii Korotkova
Hedysarum amankutanicum B. Fedtsch.
Hedysarum magnificum Kudr.
Chesneya tribuloides Nevski.
Eversmannia botschantzevii Sarkisova
Eremosparton flaccidum Litv.

Fumariaceae

Fumariola turkestanica Korsh.

Grossulariaceae (Saxifragaceae)

Ribes malvifolium Pojark.

Hyacinthaceae (Liliaceae)

Dipcadi turkestanicum Vved.

Iridaceae

Gladiolus italicus Mill.
Iris winkleri Regel.
Iris magnifica (Vved.) F.O. Khass. et Rakhimova
Iris orchioides Carrière
Iris hippolyti (Vved.) Kamelin
Iris svetlanae (Vved.) F.O. Khass.
Iris victoris F.O. Khass. et al.

Lamiaceae (Labiatae)

Lagochilus olgae Kamelin
Lagochilus proskorjakovii Ikramov
Lagochilus vevedenskyi Kamelin et Zuckerw.
Lagochilus inebrians Bunge
Dracocephalum formosum Gontsch.
Dracocephalum komarovii Lipsky
Dracocephalum spinulosum Popov
Scutellaria holosericea Gontsch. ex Juz.
Scutellaria villosissima Gontsch. et Juz.
Scutellaria guttata Nevski ex Juz.
Scutellaria fedtschenkoi Bornm.
Scutellaria colpodea Nevski
Salvia insignis Kudr.
Salvia korolkowii Regel et Schmalh.
Salvia margaritae Botsch.
Salvia tianschanica Makhm.
Salvia submutica Botsch. et Vved.
Salvia lilacinocauerulea Nevski
Phlomidoschema parviflorum (Benth.) Vved.
Otostegia bucharica B. Fedtsch.
Paraeremostachys transoxana (Bunge) Adylov,
Kamelin et Makhm.
Paraeremostachys anisochila (Pazij et Vved.) Adylov, Kamelin et Makhm.
Paraeremostachys aralensis (Bunge) Adylov, Ka-

melin et Makhm.

Phlomoides baburii (Adylov) Adylov
Phlomoides gypsacea (Popov) Adylov, Kamelin et Makhm.

Phlomoides leiocalyx (Pazij et Vved.) Adylov, Kamelin et Makhm.

Phlomoides tschimganica (Vved.) Adylov, Kamelin et Makhm.

Eremostachys eriolarynx Pazij et Vved.

Phlomis nubilans Zakirov.

Leonurus kudrjashevii Kamelin et Tulyag.

Liliaceae

Gagea ludmilae Levichev
Fritillaria eduardii Regel
Tulipa vvedenskyi Botschantz.
Tulipa micheliana T.M. Hoog
Tulipa ferganica Vved.
Tulipa lehmaniana Merckl.
Tulipa korolkowii Regel
Tulipa affinis Botschantz.
Tulipa fosteriana Irving
Tulipa orithyoides Vved.
Tulipa dasystemon (Regel) Regel
Tulipa lanata Regel
Tulipa kaufmanniana Regel
Tulipa tubergeniana T.M. Hoog
Tulipa ingens T.M. Hoog
Tulipa dubia Vved.
Tulipa carinata Vved.
Tulipa uzbekistanica Botschantz. et Sharipov
Tulipa greigi Regel
Tulipa scharipovii Tojibaev
Tulipa intermedia Tojibaev et J. de Groot

Limoniaceae (Plumbaginaceae)

Acantholimon annae Lincz.
Acantholimon ekatherinae (B. Fedtsch.) Czerniak.
Acantholimon margaritae Korovin et Lincz.
Acantholimon nuratavicum Zakirov
Acantholimon subavenaceum Lincz.
Cephalorhizum oopodium Popov et Korovin

Moraceae

Ficus carica L.

Orchidaceae

Eulophia turkestanica (Litv.) Schlecht.

Paeonaceae

Paeonia hybrida Pall.

Peganaceae (Zygophyllaceae)

Malacocarpus crithmifolius (Retz.) C.A.Mey.

Platanaceae

Platanus orientalis L.

Poaceae (Graminea)

Stipa aktauensis Roshev.

Stipa karataviensis Roshev.

Stipa gnezdilloi Pazi.

Polygonaceae

Calligonum molle Litv.
Calligonum matteianum Drobow
Calligonum elegans Drobow
Calligonum calcareum Pavlov
Calligonum paletzkianum Litv.
Calligonum zakirovii (Khalk.) F.O. Khass.

Eremurus iae Vved.

Eremurus baissunensis O. Fedtsch.
Eremurus korovinii B. Fedtsch.
Eremurus pubescens Vved.
Eremurus robustus Regel
Eremurus nurataicus A.P. Khokhr.
Eremurus lactiflorus O. Fedtsch.
Eremurus luteus Baker
Eremurus suworowii Regel
Eremurus chloranthus Popov
Eremurus aitchisonii Baker

Primulaceae

Dionysia hissarica Lipsky

Zygophyllaceae

Zygophyllum bucharicum B Fedtsch.

Punica granatum L.

Ranunculaceae

Delphinium knorriganum B. Fedtsch.
Aconitum talassicum Popov
Anemone baissunensis Juz.
Anemone bucharica Regel
Adonanthe leiosepala (Butkov) Chrtek et Slaviková

Rhamnaceae

Ziziphus jujuba Mill.

Rosaceae

Pyrus asia-mediae (Popov) Maleev

Rubiaceae

Rubia laevissima Tscherneva.
Plocama botschantzevii (Lincz.) M. Backlund et Thulin
Plocama alshehbazii F.O. Khass. et al.

Rutaceae

Haplophyllum bucharicum Litv.

Santalaceae

Thesium minkwitzianum B. Fedtsch.

Saxifragaceae

Bergenia ugamica V.N. Pavlov
Bergenia hissarica Boriss.

Scrophulariaceae

Spirostegia bucharica (B. Fedtsch.) Ivanina.
Pedicularis grandis Popov ex Vved.

Solanaceae

Physochlaina alaica Korotkova ex Kovalevsk.

Thymelaeaceae

Wikstroemia alberti (Regel) Domke

Vitaceae

Vitis vinifera L.

Xanthorrhoeaceae (= Asphodelaceae)

Eremurus alberti Regel

**“ҚИЗИЛ КИТОБ” ГА КИРИТИЛГАН ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ЎЗБЕКЧА,
РУСЧА ВА ЛОТИНЧА НОМЛАРИ**

	ЎСИМЛИКЛАР	РАСТЕНИЯ	PLANTAE
Айиқтовордошлар оиласи – Семейство Лютиковые – Ranunculaceae			
1.	Кнорринг исфараги	Живокость Кнорринг	<i>Delphinium knorringianum</i> B. Fedtsch.
2.	Оқ парпи	Аконит таласский	<i>Aconitum talassicum</i> Popov
3.	Бойсун пўфанаги	Ветреница байсунская	<i>Anemone baissunensis</i> Juz.
4.	Бухоро пўфанаги	Ветреница бухарская	<i>Anemone bucharica</i> Regel
5.	Туксиз сүғурӯт	Горицвет голочашечный	<i>Adonanthe leiosepala</i> (Butkov) Chrtek et Slavíková
Анордошлар оиласи – Семейство Гранатовые – Punicaceae			
6.	Ёввойи анор	Гранат обыкновенный	<i>Punica granatum</i> L.
Бигнониядошлар оиласи – Семейство Бигнониевые – Bignoniaceae			
7.	Ольга инкарвиллеяси	Инкарвиллея Ольги	<i>Incarvillea olgae</i> Regel
Бурчоқдошлар оиласи – Семейство Мотыльковые (Бобовые) – Fabaceae (Leguminosae)			
8.	Бинафша гулли аргувон	Багрянник Гриффита	<i>Cercis griffithii</i> Boiss.
9.	Аболин астрагали	Астрагал Аболина	<i>Astragalus abolinii</i> Popov
10.	Баранов астрагали	Астрагал Баранова	<i>Astragalus baranovii</i> Popov
11.	Бинафшаранг астрагал	Астрагал центральный	<i>Astragalus centralis</i> E. Sheld.
12.	Борис астрагали	Астрагал Бориса	<i>Astragalus borissianus</i> Gontsch.
13.	Бутков астрагали	Астрагал Буткова	<i>Astragalus butkovi</i> Popov
14.	Бухоро астрагали	Астрагал бухарский	<i>Astragalus bucharicus</i> Regel
15.	Виллис астрагали	Астрагал Виллиса	<i>Astragalus willisii</i> Popov
16.	Ёнғоқсимон астрагал	Астрагал ореховый	<i>Astragalus nucleosus</i> Popov
17.	Зарҳал астрагал	Астрагал позолоченный	<i>Astragalus auratus</i> Gontsch.
18.	Иккиранг астрагал	Астрагал двухцветкововидный	<i>Astragalus dianthoides</i> Boriss.
19.	Кнорринг астрагали	Астрагал Кнорринг	<i>Astragalus knorringianus</i> Boriss.
20.	Комаров астрагали	Астрагал Комарова	<i>Astragalus komarovii</i> Lipsky
21.	Массагетов астрагали	Астрагал Массагетова	<i>Astragalus massagetovii</i> B. Fedtsch.
22.	Михаил астрагали	Астрагал Михаила	<i>Astragalus michaelis</i> Boriss.

23.	Нурота астрагали	Астрагал нуратинский	<i>Astragalus nuratensis</i> Popov
24.	Патсимон астрагал	Астрагал перистый	<i>Astragalus plumatus</i> Boriss.
25.	Пахмоқтукли астрагал	Астрагал ложноязвенниковый	<i>Astragalus</i> <i>pseudanthylloides</i> Gontsch.
26.	Пском астрагали	Астрагал пскемский	<i>Astragalus pskemensis</i> Popov
27.	Пуфак астрагал	Астрагал тонкопузырчатый	<i>Astragalus leptophysus</i> Vved.
28.	Сохта чўл астрагали	Астрагал ложноэремофиза	<i>Astragalus</i> <i>pseudoeremophysa</i> Popov
29.	Сур астрагал	Астрагал сплошь серебристый	<i>Astragalus holargyreus</i> Bunge
30.	Тук косачали астрагал	Астрагал волосисточашечный	<i>Astragalus lasiocalyx</i> Gontsch.
31.	Тўполон астрагали	Астрагал тупаланский	<i>Astragalus tupalangi</i> Gontsch.
32.	Юлинган астрагал	Астрагал оборванный	<i>Astragalus rhacodes</i> Bunge
33.	Юмалоқ тўпгулли астрагал	Астрагал почти шахимарданский	<i>Astragalus</i> <i>subschaachimardanus</i> Popov
34.	Қизилтомир астрагал	Астрагал красножилковый	<i>Astragalus rubrivenosus</i> Gontsch.
35.	Қизил тупроқ астрагали	Астрагал красноземный	<i>Astragalus terrae-rubrae</i> Butkov
36.	Қизғиши астрагал	Астрагал красноватый	<i>Astragalus rubellus</i> Gontsch.
37.	Қўрғошин астрагал	Астрагал свинцовый	<i>Astragalus plumbeus</i> (Nevski) Gontsch.
38.	Одилов астрагали	Астрагал Адылова	<i>Astragalus adylovii</i> F.O. Khass., Ergashev et Kadyrov
39.	Алексей астрагали	Астрагал Алексея	<i>Astragalus alexeji</i> Gontsch.
40.	Белолипов астрагали	Астрагал Белолипова	<i>Astragalus belolipovii</i> Kamelin ex F.O. Khass. et N. Sulejm.
41.	Жанубий Фарғона астрагали	Астрагал южноферганский	<i>Astragalus</i> <i>austroferganicus</i> Kamelin et R. M. Vinogr.
42.	Қизил хўроз астрагали	Астрагал кызыл-хуразский	<i>Astragalus rubri-galli</i> Popov
43.	Шуълали зирақўт	Эспарцет таверниерелистный	<i>Onobrychis tavernierifolia</i> Stocks ex Boiss.

44.	Бурчоқсимон калиспепла	Калиспепла эгакантовая	<i>Calispepla aegacanthoides</i> Vved.
45.	Қорапоя мойқорағон	Майкараган сетчатый	<i>Calophaca reticulata</i> Sumnev.
46.	Йирик нұхат	Нут большой	<i>Cicer grande</i> (Popov) Korotkova
47.	Қудройи нұхат	Нут седой	<i>Cicer incanum</i> Korotkova
48.	Введенский окситрописи	Остролодочник Введенского	<i>Oxytropis vvedenskyi</i> Filim.
49.	Майды гулли окситропис	Остролодочник мелкоцветный	<i>Oxytropis tyttantha</i> Gonsch.
50.	Майдонтол окситрописи	Остролодочник майдантальский	<i>Oxytropis maidantalensis</i> B. Fedtsch.
51.	Нимранг пушки окситропис	Остролодочник ложнорозовый	<i>Oxytropis pseudorosea</i> Filim.
52.	Федченко окситрописи	Остролодочник Федченко	<i>Oxytropis fedtschenkoana</i> Vassilcz.
53.	Юпқа пардали окситропис	Остролодочник ложнотонкопузырчатый	<i>Oxytropis pseudoleptophysa</i> Boriss.
54.	Ангрен тангаүти	Копеечник ангренский	<i>Hedysarum angrenicum</i> Korotkova
55.	Бухоро тангаүти	Копеечник бухарский	<i>Hedysarum bucharicum</i> B. Fedtsch.
56.	Дробов тангаүти	Копеечник Дробова	<i>Hedysarum drobovii</i> Korotkova
57.	Омонқүтон тангаүти	Копеечник аманкутанский	<i>Hedysarum amankutanicum</i> B. Fedtsch.
58.	Тизма тангаўт	Копеечник великолепный	<i>Hedysarum magnificum</i> Kudr.
59.	Лангарсимон чезнея	Чезнея якорцевидная	<i>Chesneya tribuloides</i> Nevski
60.	Бочанцев эверсманияси	Эверсмания Бочанцева	<i>Eversmannia botschantzevii</i> Sarkisova
61.	Осилувчан (әгилувчан) күлонқүйруқ	Эремоспартон обвислый	<i>Eremosparton flaccidum</i> Litv.
	Бүгдойдошлар оиласи – Семейство Мятликовые (Злаковые) – Poaceae (Gramineae)		
62.	Оқтоғ чалови	Ковыль актавский	<i>Stipa aktauensis</i> Roshev.
63.	Қоратоғ чалови	Ковыль каратауский	<i>Stipa karataviensis</i> Roshev.
64.	Гнездилло чалови	Ковыль Гнездилло	<i>Stipa gnezdilloi</i> Pazij
	Гиацинтдошлар оиласи – Семейство Гиациントвые (Лилейные) – Hyacinthaceae (Liliaceae)		
65.	Туркистан дипкадийси	Дипкади туркестанский	<i>Dipcadi turkestanicum</i> Vved.
	Фовзабондошлар оиласи – Семейство Бурачниковые – Boraginaceae		

66.	Майда мовийгул	Липучка мелкая	<i>Lappula parvula</i> Nabiev et Zakirov
67.	Нурота мовийгули	Липучка нуратинская	<i>Lappula nurativica</i> Nabiev et Zakirov
68.	Оқтоғ мовийгули	Липучка актуаская	<i>Lappula aktaviensis</i> Popov et Zakirov
69.	Йирик ҳалқагулли тангабарг	Риндера крупносводиковая	<i>Rindera fornicata</i> Pazij
70.	Бухоро ғичмоласи	Гелиотроп Бухарский	<i>Heliotropium bucharicum</i> B. Fedtsch.
71.	Йирик илдизли меҳригиёх	Оносма крупнокорневая	<i>Onosma macrorhiza</i> Popov
72.	Бошмалдоқсимон нонея	Нонея башмачковидная	<i>Nonea calceolaris</i> Nikif. & Pazij
Гулсафсадошлар оиласи – Семейство Ирисовые – Iridaceae			
73.	Италия гладиолуси	Шпажник посевной	<i>Gladiolus italicus</i> Mill.
74.	Винклер гулсафсари	Ирис Винклера	<i>Iris winkleri</i> Regel
75.	Антика гулсафсар	Ирис великолепный	<i>Iris magnifica</i> (Vved.) Vved. F. O. Khass.& Rakhimova
76.	Орхидеянамо гулсафсар	Ирис орхидный	<i>Iris orchoides</i> Carrière
77.	Ипполит гулсафсари	Ирис Ипполита	<i>Iris hippolyti</i> (Vved.) Kamelin
78.	Светлана гулсафсари	Ирис Светланы	<i>Iris svetlanae</i> (Vved.) F.O. Khass.
79.	Виктор гулсафсари	Ирис Виктора	<i>Iris victoris</i> F.O. Khass. et al.
Зирадошлар (Соябонгулдошлар) оиласи – Семейство Сельдерейные (Зонтичные) – Apiaceae (Umbelliferae)			
80.	Майда мевали дорема	Дорема мелкоплодная	<i>Dorema microcarpum</i> Korovin
81.	Денов жуфттуруғи	Шарозонтичник денауский	<i>Sphaerosciadium denaënsse</i> (Schischk.) Pimenov et Kljuykov
82.	Попов жүякмеваси	Бороздоплодник Попова	<i>Aulacospermum popovii</i> (Korov.) Kljukov, Pimenov et V.N. Tikhom.
83.	Тянь-Шань камелинияси	Камелиния тяньшанская	<i>Kamelinia tianschanica</i> F.O.Khass. et I. I. Malzev
84.	Сумбул коврак	Ферула мускатная	<i>Ferula sumbul</i> (Kauffm.) Hook. f.
85.	Туганакли коврак	Ферула клубненосная	<i>Ferula tuberifera</i> Korovin
86.	Қизилқұм ковраги	Ферула кызылкумская	<i>Ferula kyzylkumica</i> Korovin
87.	Пратов ковраги	Ферула Пратова	<i>Ferula pratovii</i> F.O. Khass. et I.I. Malzev
88.	Федченко ковраги	Ферула федченковская	<i>Ferula fedtschenkoana</i> Koso-Pol.
89.	Коржинский ковраги	Ферула Коржинского	<i>Ferula korshinskyi</i> Korovin

90.	Ўринбосар коврак	Ферула замещающая	<i>Ferula vicaria</i> Korovin
91.	Елена ковраги	Ферула Елены	<i>Ferula helenae</i> Rakhm. et Melibaev
92.	Федченко пилдироқмеваси	Омежник федченковский	<i>Oenanthe fedtschenkoana</i> Koso-Pol.
93.	Чизиқпояли пилдироқмева	Омежник разноплодный	<i>Oenanthe heterococca</i> Korovin
94.	Шаширсимон пуфакбўғим	Комаровия неровносемянная	<i>Komarovia anisosperma</i> Korovin
95.	Ҳисор сарпояси	Головоног гиссарский	<i>Cephalopodium hissaricum</i> Pimenov
96.	Регел қирқбоши	Зарафшания Регеля	<i>Zeravschania regeliana</i> Korovin
97.	Сариқ қирқгул	Фергания многоцветковая	<i>Fergania polyantha</i> (Korovin) Pimenov
98.	Пилдироқ қўшшоҳ	Жабрица кубарчатая	<i>Seseli turbinatum</i> Korovin
99.	Овчинников паулияси	Паулия Овчинникова	<i>Paulita ovczinnikovii</i> (Korovin) Sojak
100.	Ғаройиб кузаки	Осеннница неожиданная	<i>Autumnalia inopinata</i> Pimenov
101.	Чакамиғмевасимон астоматопсис	Астамотопсис подмареннико- плодный	<i>Astamotopsis galioarpa</i> Korovin
102.	Ангрен зираси	Буниум ангренский	<i>Bunium angreni</i> Korovin
103.	Новбаргли зира	Буниум влагалищный	<i>Bunium vaginatum</i> Korovin
104.	Гайсимон диморфосцинадий	Диморфосцинадий гайевидный	<i>Dimorphosciadium gayoides</i> (Regel & Schmalh.) Pimenov
105.	Коровин ломатокарпаси	Окаймленноплодник Коровина	<i>Lomatocarpa korovinii</i> Pimenov
106.	Ингичка баргли понапанжа	Клинопастник тонкорассеченный	<i>Sphaenolobium tenuisectum</i> (Korovin) Pimenov
	Исириқдошлар оиласи – Семейство Могильниковые (Парнолистниковые) – <i>Peganaceae (Zygophyllaceae)</i>		
107.	Қўнғир қумузум	Мягкоплодник критмолистный	<i>Malacocarpus crithmifolius</i> (Retz.) C.A. Mey.
	Итузумдошлар оиласи – Семейство Пасленовые – <i>Solanaceae</i>		
108.	Олой хиёли	Пузырница алайская	<i>Physochlaina alaica</i> Korotkova ex Kovalevsk.
	Карамдошлар оиласи – Семейство Капустные (Крестоцветные) – <i>Brassicaceae (Cruciferae)</i>		

109.	Хисор искандераси	Искандера гиссарская	<i>Iskandera hissarica</i> N. Busch
110.	Тошбузар паррияси	Паррия камнеломка	<i>Parrya saxifraga</i> Botsch. et Vved.
111.	Курама паррияси	Паррия кураминская	<i>Parrya kuramensis</i> Botsch.
112.	Зарафшон сохта клаусияси	Ложноклаусия зарафшанская	<i>Pseudoclausia sarawschanica</i> (Regel et Schmalh.) Botsch.
113.	Чимён сохта клаусияси	Ложноклаусия чимганская	<i>Pseudoclausia tschimganica</i> (Popov ex Botsch. et Vved.) A.V.Vassil.
114.	Юраксимон торол	Клоповник почтисердцевидный	<i>Lepidium subcordatum</i> Botsch. et Vved.
115.	Ольга лепидиуми	Клоповник Ольги	<i>Lepidium olgae</i> (R.M. Vinogr.) Al-Shehbaz et Mumm.
116.	Гордягин қатрони	Катран Гордягина	<i>Crambe gordjaginii</i> Sprygin et Popov
117.	Винклер спригинияси	Спрыгиния Винклера	<i>Spryginia winklerii</i> (Regel) Popov
Кармақдошлар оиласи – Семейство Кермековые – <i>Limoniaceae</i> (<i>Plumbaginaceae</i>)			
118.	Анна кирпиўти	Акантолимон Анны	<i>Acantholimon annae</i> Lincz.
119.	Екатерина кирпиўти	Акантолимон Екатерины	<i>Acantholimon ekatherinae</i> (B. Fedtsch.) Czerniak.
120.	Маргарита кирпиўти	Акантолимон Маргариты	<i>Acantholimon margaritae</i> Korovin et Lincz.
121.	Нурота кирпиўти	Акантолимон нуратинский	<i>Acantholimon nurataicum</i> Zakirov
122.	Деярли сулисимон кирпиўт	Акантолимон почтиовсовый	<i>Acantholimon subavenaceum</i> Lincz.
123.	Тухумоёқ илдиизбош, цефалоризум	Корнеглав яйценогий	<i>Cephalorizum oopodium</i> Popov et Korovin
Келинсупургидошлар – Семейство Тимелеевые – <i>Thymelaeaceae</i>			
124.	Альберт қисрони	Викстремия Альберта (рестелла Альберта)	<i>Wikstroemia alberti</i> (Regel) Domke
Ковулдошлар оиласи – Семейство Каперцевые – <i>Capparaceae</i>			
125.	Розанов ковули	Каперцы Розанова	<i>Capparis rosanowiana</i> B. Fedtsch.
126.	Гордягин клеомаси	Клеоме Гордягина	<i>Cleome gordjaginii</i> Popov
Поладошлар оиласи – Семейство Лилейные – <i>Liliaceae</i>			
127.	Людмила бойчечаги	Гусиный лук Людмилы	<i>Gagea ludmilae</i> Levichev
128.	Холмон исирғагули	Рябчик Эдуарда	<i>Fritillaria eduardii</i> Regel
129.	Введенский лоласи	Тюльпан Введенского	<i>Tulipa vvedenskyi</i> Botschantz.
130.	Михел лоласи, дилбанд лола	Тюльпан Михели	<i>Tulipa micheliana</i> T. M. Hoog

131.	Фарғона лоласи, Жавғаза лола	Тюльпан ферганский	<i>Tulipa ferganica</i> Vved.
132.	Леманн лоласи, Жовқосин лола	Тюльпан Леманна	<i>Tulipa lehmaniana</i> Merckl.
133.	Корольков лоласи	Тюльпан Королькова	<i>Tulipa korolkowii</i> Regel
134.	Қардош лола, Нурота лоласи	Тюльпан родственный	<i>Tulipa affinis</i> Botschantz.
135.	Фостер лоласи	Тюльпан Фостера	<i>Tulipa fosteriana</i> Irving
136.	Оқ лола	Тюльпан оритиевидный	<i>Tulipa orithyoides</i> Vved.
137.	Сарғиш лола	Тюльпан волосистотычиночный	<i>Tulipa dasystemon</i> (Regel) Regel
138.	Тукли лола, Сурхон лоласи	Тюльпан шерстистый	<i>Tulipa lanata</i> Regel
139.	Кауфман лоласи, Тарғил лола	Тюльпан Кауфмана	<i>Tulipa kaufmanniana</i> Regel
140.	Туберген лоласи	Тюльпан Тубергена	<i>Tulipa tubergeniana</i> T. M. Hoog
141.	Улугвор лола	Тюльпан великий	<i>Tulipa ingens</i> T. M. Hoog
142.	Шубҳали лола, Чипор лола	Тюльпан сомнительный	<i>Tulipa dubia</i> Vved.
143.	Чўлбайир лоласи	Тюльпан килеватый	<i>Tulipa carinata</i> Vved.
144.	Ўзбекистон лоласи	Тюльпан узбекистанский	<i>Tulipa uzbekistanica</i> Botschantz. et Sharipov
145.	Қизил лола (Грейг лоласи)	Тюльпан Грейга	<i>Tulipa greigi</i> Regel
146.	Шарипов лоласи, гулбарра	Тюльпан Шарипова	<i>Tulipa scharipovii</i> Tojibaev
147.	Оралиқ лола	Тюльпан промежуточный	<i>Tulipa intermedia</i> Tojibaev et J. de Groot
Наврӯзгулдошлар оиласи – Семейство Первоцветные – Primulaceae			
148.	Ҳисор дионисияси	Дионисия гиссарская	<i>Dionysia hissarica</i> Lipsky
Пистадошлар оиласи – Семейство Сумаховые – Anacardiaceae			
149.	Ошловчи totim (Сирка дарахти)	Сумах дубильный	<i>Rhus coriaria</i> L.
Ръянгудошлар оиласи – Семейство Розоцветные – Rosaceae			
150.	Ўрта Осиё ноки	Груша среднеазиатская	<i>Pyrus asia-mediae</i> (Popov) Maleev
Рўяндошлар оиласи – Семейство Мареновые – Rubiaceae			
151.	Силлиқ рўян	Марена гладкая	<i>Rubia laevissima</i> Tscherneva
152.	Бочанцев плокамаси	Плокама Бочанцева	<i>Plocama botschantzevii</i> (Lincz.) M. Backlund et Thulin
153.	Алшахбоз плокамаси	Плокама Аль-Шехбаза	<i>Plocama alshehbazii</i> F.O. Khass. et al.
Савринжондошлар оиласи – Семейство Безвременниковые (Мелантовые) – Colchicaceae (Melanthiaceae)			
154.	Кессепринг савринжони	Безвременник Кессепринга	<i>Colchicum kesselringii</i> Regel
Салибдошлар оиласи – Семейство Орхидные – Orchidaceae			

155.	Туркистан эулофияси	Эулофия туркестанская	<i>Eulophia turkestanica</i> (Litv.) Schlecht.
Саллагулдошлар оиласи – Семейство Пионовые (Лютковые) – Paeonaceae (Ranunculaceae)			
156.	Ёввойи саллагул	Пион степной	<i>Paeonia hybrida</i> Pall.
Санталдошлар оиласи – Семейство Санталовые – Santalaceae			
157.	Минквиц тезиуми	Ленец Минквица	<i>Thesium minkwitzianum</i> B. Fedtsch.
Семиздошлар оиласи – Семейство Толстянковые – Crassulaceae			
158.	Құнғироқгүлли сохтасемизак	Ложноочиток колокольчикоцветный	<i>Pseudosedum campanuliflorum</i> Boriss.
Сигиркуйруқдошлар оиласи – Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae			
159.	Бухоро спиростегияси	Спиростегия бухарская	<i>Spirostegia bucharica</i> (B. Fedtsch.) Ivanina
160.	Йирик шеролчин	Мытник большой	<i>Pedicularis grandis</i> Popov ex Vved.
Сутламадошлар оиласи – Семейство Молочайные – Euphorbiaceae			
161.	Введенский андрахнаси	Андрахна Введенского	<i>Andrachne vvedenskyi</i> Pazij
162.	Айришох сутлама	Молочай густоватый	<i>Euphorbia densiuscula</i> Popov
163.	Кудряшев сутламаси	Молочай Кудряшева	<i>Euphorbia kudrjaschevii</i> (Pazij) Prokh.
164.	Тифиз сутлама	Молочай ложногустоватый	<i>Euphorbia densiusculiformis</i> (Pazij) Botsch.
165.	Учишли сутлама	Молочай трёхзубчатый	<i>Euphorbia triodonta</i> Prokh.
166.	Қадаҳсимон сутлама	Молочай твёрдобокальчатый	<i>Euphorbia sclerocyathium</i> Korovin et Popov
Талоқдоридошлар оиласи – Семейство Настоящие папоротники – Aspleniaceae			
167.	Қоя ғорүти	Листовик сколопендровый	<i>Phyllitis scolopendrum</i> (L.) Newman
Торондошлар оиласи – Семейство Гречишные – Polygonaceae			
168.	Майнин тукли қандим	Кандым мягкий	<i>Calligonum molle</i> Litv.
169.	Маттей қандими	Кандым Маттея	<i>Calligonum matteianum</i> Drobow
170.	Нозик қандим	Кандым изящный	<i>Calligonum elegans</i> Drobow
171.	Оқактош қандими	Кандым известковый	<i>Calligonum calcareum</i> Pavlov
172.	Палецкий қандими	Кандым Палецкого	<i>Calligonum paletzkianum</i> Litv.
173.	Закиров қандими	Кандым Закирова	<i>Calligonum zakirovii</i> (Khalk.) F.O. Khass.
Тошбақатолдошлар оиласи – Семейство Рутовые – Rutaceae			

174.	Бухоро тошбақатоли	Цельнолистник бухарский	<i>Haplophyllum bucharicum</i> Litv.
Тошёраддошлар оиласи – Семейство Толстянковые – Crassulaceae			
175.	Угом бадани	Бадан угамский	<i>Bergenia ugamica</i> V.N. Pavlov
176.	Ҳисор бадани	Бадан гиссарский	<i>Bergenia hissarica</i> Boriss.
Тутдошлар оиласи – Семейство Тутовые – Moraceae			
177.	Ёввойи анжир	Инжир дикий	<i>Ficus carica</i> L.
Тятовондошлар оиласи – Семейство Парнолистниковые – Zygophyllaceae			
178.	Бухоро тятовони	Парнолистник бухарский	<i>Zygophyllum bucharicum</i> B Fedtsch.
Узумдошлар оиласи – Семейство Виноградные – Vitaceae			
179.	Ёввойи ток (узум)	Виноград винный (дикий)	<i>Vitis vinifera</i> L.
Хурмоддошлар оиласи – Семейство Эбеновые – Ebenaceae			
180.	Сафсан хурмо	Хурма кавказская	<i>Diospyros lotus</i> L.
Чилонжийдаддошлар оиласи – Семейство Крушиновые – Rhamnaceae			
181.	Ёввойи чилонжийда	Унаби обыкновенная	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.
Чиннигулдошлар оиласи – Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae			
182.	Качимсимон етмак (бех)	Аллохруза качимовидная	<i>Allochrusa gypsophiloides</i> (Regel) Schischk.
183.	Михельсон зўрчаси	Смолевка Михельсона	<i>Silene michelsonii</i> Preobr.
184.	Момик зўрча	Смолевка пушистая	<i>Silene tomentella</i> Schischk.
185.	Попов зўрчаси	Смолевка Попова	<i>Silene popovii</i> Schischk.
186.	Тоғ зўрчаси	Смолевка горная	<i>Silene oreina</i> Schischk.
187.	Наталия зўрчаси	Смолевка Наталии	<i>Silene nataliae</i> F.O.Khass.
188.	Безчали зўрча	Смолевка почтижелезистая	<i>Silena paranadena</i> Bondarenko et Vved.
189.	Бигизсимон оқтикан	Колючелистник беловатый	<i>Acanthophyllum albidum</i> Schischk.
190.	Нинасимон оқтикан	Колючелистник горбатоприцветнико-вый	<i>Acanthophyllum cyrtostegium</i> Vved.
191.	Ўзбекистон чиннигули	Гвоздика узбекистанская	<i>Dianthus uzbekistanicus</i> Lincz.
Чинордошлар оиласи – Семейство Платановые – Platanaceae			
192.	Шарқ чинори	Платан восточный	<i>Platanus orientalis</i> L.
Чучномаддошлар оиласи – Семейство Амариллисовые – Amaryllidaceae			
193.	Аралаш пиёз	Лук смешанный	<i>Allium praemixtum</i> Vved.
194.	Афлотун пиёзи	Лук афлатунский	<i>Allium aflatunense</i> B. Fedtsch.
195.	Пском пиёзи	Лук пскемский	<i>Allium pskemense</i> B. Fedtsch.
196.	Олой пиёзи	Лук алайский	<i>Allium alaicum</i> Vved.
197.	Бочанцев пиёзи	Лук Бочанцева	<i>Allium botschantzevii</i> Kamelin
198.	Бакхауз пиёзи	Лук Бакхауза	<i>Allium bakhousianum</i> Regel

199.	Катта пиёз	Лук большой	<i>Allium majus</i> Vved.
200.	Йирик пиёз	Лук гигантский	<i>Allium giganteum</i> Regel
201.	Исокул пиёзи	Лук Исакула	<i>Allium isakulii</i> R.M. Fritsch et F.O. Khass.
202.	Пушти гулли пиёз	Лук розовоцветный	<i>Allium rhodanthum</i> Vved.
203.	Равен пиёзи	Лук Равена	<i>Allium ravenii</i> F.O. Khass. et al.
204.	Манзарали пиёз	Лук декоративный	<i>Allium decoratum</i> Turginov et Tojibaev
205.	Сахро пиёзи, чўл пиёзи	Лук пустынnyй	<i>Allium eremoprasum</i> Vved.
206.	Яшил гулли пиёз	Лук зеленоватый	<i>Allium viridiflorum</i> Pobed.
207.	Виктор омонқораси	Унгерния Виктора	<i>Ungernia victoris</i> Vved. ex Artjuschenko
208.	Сариқ штернбергия	Штернбергия жёлтая	<i>Sternbergia lutea</i> (L.) Spreng.
209.	Фишер штернбергияси	Штернбергия Фишера	<i>Sternbergia fischeriana</i> (Herb.) M. Roem.
Шилвидошлар оиласи – Семейство Жимолостные – <i>Caprifoliaceae</i>			
210.	Ғалати учқат	Жимолость странная	<i>Lonicera paradoxa</i> Pojark.
Ширачдошлар оиласи – Семейство Ксанълроевые – <i>Xanthorrhoeaceae (=Asphodelaceae)</i>			
211.	Альберт ширачи	Ширач Альбера	<i>Eremurus alberti</i> Regel
212.	Бештомир ширач	Ширач Ии	<i>Eremurus iae</i> Vved.
213.	Бойсун ширачи	Ширач байсунский	<i>Eremurus baissunensis</i> O. Fedtsch.
214.	Коровин ширачи	Ширач Коровина	<i>Eremurus korovinii</i> B. Fedtsch.
215.	Момиқ ширач	Ширач пушистый	<i>Eremurus pubescens</i> Vved.
216.	Нор ширач (хулка бола)	Ширач мощный	<i>Eremurus robustus</i> Regel
217.	Нурота ширачи	Ширач нуратинский	<i>Eremurus nuratavicus</i> A.P. Khokhr.
218.	Оқгулли ширач	Ширач молочноцветковый	<i>Eremurus lactiflorus</i> O. Fedtsch.
219.	Сариқ ширач	Ширач жёлтый	<i>Eremurus luteus</i> Baker
220.	Суворов ширачи	Ширач Суворова	<i>Eremurus suworowii</i> Regel
221.	Яшилгулли ширач	Ширач зеленоцветный	<i>Eremurus chloranthus</i> Popov
222.	Эчисон ширачи	Ширач Эчисона	<i>Eremurus aitchisonii</i> Baker
Шотарадошлар оиласи – Семейство Дымянковые – <i>Fumariaceae</i>			
223.	Туркистан шотаракаси	Дымяночка туркестанская	<i>Fumariola turkestanica</i> Korsh.
Шўрадошлар оиласи – Семейство Маревые – <i>Chenopodiaceae</i>			
224.	Ўткирбартг балиққўз	Климакоптера остролистная	<i>Climacoptera oxyphylla</i> U.P. Pratov
225.	Малигин балиққўзи	Климакоптера Малигина	<i>Climacoptera malyginii</i> (Korovin ex Botsch.) Botsch.

226.	Пятаева балиқкўзи	Климаоптера Пятаевой	<i>Climacoptera pjataevaea U.P.Pratov</i>
227.	Тўмтоқ гулёнбаргчали балиқкўз	Климоаптера тупоприцветничковая	<i>Climacoptera amblyostegia (Botsch.) Botsch.</i>
228.	Меркулович балиқкўзи	Климаоптера Меркулова	<i>Climacoptera merkulowiczii (Zakirov) Botsch.</i>
229.	Қаноти тукли балиқкўз	Климаоптера птилоптера	<i>Climacoptera ptiloptera U.P.Pratov</i>
230.	Сертуқ бузоқбош	Галимокнемис войлоноцветковый	<i>Halimocnemis lasiantha Iljin</i>
231.	Бочанцев тошбиюргуни	Нанофитон Бочанцева	<i>Nanophyton botschantzevii U.P.Pratov</i>
232.	Дробов шўраги	Солянка Дробова	<i>Salsola drobovii Botsch.</i>
233.	Титов шўраги	Солянка Титова	<i>Salsola titovii Botsch.</i>
234.	Хива шўраги	Солянка хивинская	<i>Salsola chiwensis Popov</i>
235.	Тянь-Шань антохламиси	Антохламис тяньшанский	<i>Anthochlamis tianschanica Iljin</i>
236.	Фарғона донашўри	Спайноцветник Ферганский	<i>Gamanthus ferganicus Iljin</i>
	Ялпиздошлар (Лабгулдошлар) оиласи – Семейство Яснотковые (Губоцветные) – Lamiaceae (Labiatae)		
237.	Ольга бозулбанги	Зайцегуб Ольги	<i>Lagochilus olgae Kamelin</i>
238.	Прокоряков бозулбанги	Зайцегуб Прокорякова	<i>Lagochilus proskorjakovii Ikramov</i>
239.	Введенский бозулбанги	Зайцегуб Введенского	<i>Lagochilus vevedenskyi Kamelin et Zuckerw.</i>
240.	Сархуш бозулбанг	Зайцегуб опьяняющий	<i>Lagochilus inebrians Bunge</i>
241.	Ажойиб бўзбош	Змееголовник прекрасный	<i>Dracocephalum formosum Gontsch.</i>
242.	Комаров бўзбоши	Змееголовник Комарова	<i>Dracocephalum komarovii Lipsky</i>
243.	Тиканли бўзбош	Змееголовник колючий	<i>Dracocephalum spinulosum Popov</i>
244.	Ипаксимон кўкамарон	Шлемник шелковистейший	<i>Scutellaria holosericea Gontsch. ex Juz.</i>
245.	Момиқ кўкамарон	Шлемник мохнатейший	<i>Scutellaria villosissima Gontsch. et Juz.</i>
246.	Томчи кўкамарон	Шлемник капельний	<i>Scutellaria guttata Nevski ex Juz.</i>
247.	Федченко кўкамарони	Шлемник Федченко	<i>Scutellaria fedtschenkoi Bornm.</i>
248.	Қайрилган кўкамарон	Шлемник изогнутый	<i>Scutellaria colpodea Nevski</i>
249.	Зебо мармарак	Шалфей замечательный	<i>Salvia insignis Kudr.</i>
250.	Корольков мармараги	Шалфей Королькова	<i>Salvia korolkowii Regel et Schmalh.</i>
251.	Маргарита мармараги	Шалфей Маргариты	<i>Salvia margaritae Botsch.</i>

252.	Тянь-Шань мармараги	Шалфей тяньшанский	<i>Salvia tianschanica</i> Makhm.
253.	Түмтоқ мармарак	Шалфей туповатый	<i>Salvia submutica</i> Botsch. et Vved.
254.	Ҳаворанг мармарак	Шалфей лиловоголубой	<i>Salvia lilacinocaerulea</i> Nevski
255.	Майда гулли тошбости	Зопниковник мелкоцветный	<i>Phlomidoschema</i> <i>parviflorum</i> (Benth.) Vved.
256.	Бухоро отостегияси	Отостегия бухарская	<i>Otostegia bucharica</i> B. Fedtsch.
257.	Амударё оқтүшаси	Фломуидес заамударьинский	<i>Phlomoides transoxana</i> (Bunge) Salmaki
258.	Учпояли оқтүша	Фломуидес неравногубый	<i>Phlomoides anisochila</i> (Pazij et Vved.) Salmaki
259.	Орол фломоидеси	Фломуидес аральский	<i>Phlomoides aralensis</i> (Bunge) Salmaki
260.	Бобур фломоидеси	Фломуидес Бабура	<i>Phlomoides baburii</i> (Adylov) Adylov
261.	Гипсли фломоидес	Фломуидес гипсовый	<i>Phlomoides gypsacea</i> (Popov) Adylov, Kamelin et Makhm.
262.	Силлиқ косачали фломоидес	Фломуидес гладкочашечный	<i>Phlomoides leiocalyx</i> (Pazij et Vved.) Adylov, Kamelin et Makhm.
263.	Чимён фломоидеси	Фломуидес чимганский	<i>Phlomoides tschimganica</i> (Vved.) Adylov, Kamelin et Makhm.
264.	Бўғизтукли эремостахис	Пустынноколосник опушонноглоточный	<i>Eremostachys eriolarynx</i> Pazij et Vved.
265.	Қўримсиз қўзиқулоқ	Зопник мрачный	<i>Phlomis nubilans</i> Zakirov
266.	Кудряшев арслонқуйруғи	Пустырник Кудряшева	<i>Leonurus kudrjaschevii</i> Kamelin et Tulyag.
Қовоқдошлар оиласи – Семейство Тыквенные – Cucurbitaceae			
267.	Қора сирттан	Переступень черноплодный	<i>Bryonia melanocarpa</i> Nabiev
Қорағатдошлар (Тошёрдошлар) – Семейство Смородиновые (Камнеломковые) – Grossulariaceae (Saxifragaceae)			
268.	Гулхайрибарг қорағат	Смородина мальволистная	<i>Ribes malvifolium</i> Pojark.
Қоқиётдошлар (Мураккабгулдошлар) – Семейство Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae (Compositae)			
269.	Яшил анура	Анура бледнозелёная	<i>Anura pallidivirens</i> (Kult.) Tscherneva
270.	Аллолепис каррак	Кузиния инакочешуйная	<i>Cousinia alloeplis</i> Tscherneva et Vved.
271.	Безчатукли каррак	Кузиния железистая	<i>Cousinia adenophora</i> Juz.
272.	Бутков карраги	Кузиния Буткова	<i>Cousinia butkovi</i> Tscherneva et Vved.

273.	Введенский карраги	Кузиния Введенского	<i>Cousinia vvedenskyi</i> <i>Tscherneva</i>
274.	Ёпирма каррак	Кузиния широкооберточная	<i>Cousinia platystegia</i> <i>Tscherneva</i>
275.	Жиззах карраги	Кузиния джизакская	<i>Cousinia dshisakensis</i> Kult.
276.	Киндиқчали каррак	Кузиния пупочковая	<i>Cousinia umbilicata</i> Juz.
277.	Нозикбаш каррак	Кузиния изящноголовая	<i>Cousinia glaphyrocephala</i> Juz. et Tscherneva
278.	Оқиш каррак	Кузиния белесоватая	<i>Cousinia candidans</i> Juz.
279.	Паттангачали каррак	Кузиния перисточешуйчатая	<i>Cousinia pterolepida</i> Kult.
280.	Силлиқтукли каррак	Кузиния гладкощетинковая	<i>Cousinia glabriseta</i> Kult.
281.	Сохтатукли каррак	Кузиния ложношерстная	<i>Cousinia pseudolanata</i> Popov ex Tscherneva
282.	Тик каррак	Кузиния торчащая	<i>Cousinia stricta</i> Tscherneva
283.	Узунбарг каррак	Кузиния длиннолистная	<i>Cousinia dolichophylla</i> Kult.
284.	Ҳурпайган каррак	Кузиния вооруженноплистная	<i>Cousinia haplophylla</i> Tscherneva
285.	Шубҳали каррак	Кузиния сомнительная	<i>Cousinia haesitabunda</i> Juz.
286.	Эгритикан каррак	Кузиния согнутоколючковая	<i>Cousinia campyloraphis</i> Tscherneva
287.	Қизилгулли каррак	Кузиния красноцветная	<i>Cousinia rhodantha</i> Kult.
288.	Спригин карраги	Кузиния Спрыгина	<i>Cousinia sprygini</i> Kult.
289.	Ғұжтук каррак	Кузиния превосходная	<i>Cousinia praestans</i> Tscherneva et Vved.
290.	Қоя ксилантемуми	Ксилантемум скальный	<i>Xylanthemum rupestre</i> (Popov ex Nevski) Tzvelev
291.	Боботөг күкбоши	Мордовник бабатагский	<i>Echinops babatagensis</i> Tscherneva
292.	Қисқамүй күкбош	Мордовник короткокисточковый	<i>Echinops brevipenicillatus</i> Tscherneva
293.	Нурота лепидолофаси	Лепидолофа нуратинская	<i>Lepidolopa nuratavica</i> Krasch.
294.	Федченко лепидолофаси	Лепидолофа Федченко	<i>Lepidolopa</i> <i>fedtschenkoana</i> Knorrung
295.	Введенский олигохетаси	Олигохета Введенского	<i>Oligochaeta vvedenskyi</i> (Popov) Tscherneva
296.	Тароқсимон Ольга	Ольга гребенчатая	<i>Olgaea pectinata</i> Ilijin
297.	Наштарсимон серратула	Серпуха ланцетолистная	<i>Serratula lancifolia</i> Zakirov
298.	Бунге такасоқоли	Козелец Бунге	<i>Scorzonera bungei</i> Krasch. et Lipsch.
299.	Бочанцев танацетопсиси	Танацетопсис Бочанцева	<i>Tanacetopsis</i> <i>botschantzevii</i> (Kovalevsk.) Kovalevsk.
300.	Бутков трихантемиси	Трихантемис Буткова	<i>Trichanthemis butkovii</i> Kovalevsk.
301.	Ангрен угамияси	Угамия ангренская	<i>Ugamia angrenica</i> (Krasch.) Tzvelev

302.	Бежириим юринея	Наголоватка стройная	<i>Jurinea gracilis Iljin</i>
303.	Дағалбарг юринея	Наголоватка шероховатолистная	<i>Jurinea asperifolia Iljin</i>
304.	Зокиров юринеяси	Наголоватка Закирова	<i>Jurinea zakirovii Iljin</i>
305.	Мария юринеяси	Наголоватка Марии	<i>Jurinea mariae Pavlov</i>
306.	Сангардак юринеяси	Наголоватка сангардакская	<i>Jurinea sangardensis Iljin</i>
307.	Құмчил юринея	Наголоватка пескоЛюбивая	<i>Jurinea psammophila Iljin</i>
308.	Майдагултожбаргли эригеран	Мелколепестник триморфообразный	<i>Erigeron trimorphopsis Botsch.</i>
309.	Крашенниников викоаси	Викоа крашенниникова	<i>Vicoa krasheninnikovii Kamelin</i>
310.	Туксиз қарғатирноқ	Коелпиния голоплодная	<i>Koelpinia leiocarpa Popov</i>
311.	Нурота ўлмасүти	Бессмертник нуратавский	<i>Helichrysum nurataicum Krasch.</i>
Құнғироқулдошлар оиласи – Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae			
312.	Улуғвор күзагул	Островская величественная	<i>Ostrowskia magnifica Regel</i>
Құмсұтадошлар оиласи – Семейство Циномориевые – Cynomoriaceae			
313.	Жунғор құмсұтаси, циноморийси	Циноморий джунгарский	<i>Cynomorium songaricum Rupr.</i>

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ҚИЗИЛ КИТОБИ

2 жилдли

I жилд

ЎСИМЛИКЛАР

Илмий-оммабоп нашр

Муҳаррирлар Н. Абдуллаева, Х. Тешабоев, Н. Кисель

Компьютерда саҳифаловчи Ў. Тожибоев

Техник муҳаррир Т. Бўрибоев

Мусаҳҳиҳ Г. Менгзияева

Нашриёт лицензияси № AI 269, 15. 07. 2015 й.
100185, Тошкент шаҳри, Сўгалли ота кўчаси, 5-уй.

Босишга рухсат этилди 29.12.2016. Нашр бичими 60x84_{/16}.
Cambria гарнитураси. Офсет босма усули.
Босма табори 44,5. Шартли босма табоқ
Адади 1000 нусха.
Буюртма № Баҳоси келишилган нархда.