

## Orobanchaceae endémicas del Perú

Blanca León <sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Museo de Historia Natural,  
Av. Arenales 1256, Aptdo.  
14-0434, Lima 14, Perú

<sup>2</sup> Plant Resources Center,  
University of Texas at  
Austin, Austin TX 78712  
EE.UU.

[blanca.leon@mail.utexas.edu](mailto:blanca.leon@mail.utexas.edu)

### Resumen

La familia Orobanchaceae es reconocida en el Perú por presentar siete géneros y 48 especies (Brako & Zarucchi, 1993; Stevens, 2001; Ulloa Ulloa et al., 2004), principalmente hierbas parásitas. En este trabajo reconocemos 20 taxones endémicos en *Bartsia* y *Castilleja*. Los taxones endémicos se encuentran principalmente en las regiones Mesoandina y Páramo, entre los 2150 y 4600 m de altitud. Once taxones se encuentran representados dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.

**Palabras claves:** Orobanchaceae, *Bartsia*, *Castilleja*, Perú, endemismo, plantas endémicas.

### Abstract

The Orobanchaceae are represented in Peru by seven genera and 48 species (Brako & Zarucchi, 1993; Stevens, 2001; Ulloa Ulloa et al., 2004), mostly parasitic herbs. Here we recognize 20 endemic taxa in *Bartsia* and *Castilleja*. These endemic taxa are found mainly in Mesoandean and Paramo regions, between 2150 and 4600 m elevation. Eleven endemic taxa have been recorded in the Peruvian System of Protected Natural Areas.

**Keywords:** Orobanchaceae, *Bartsia*, *Castilleja*, Peru, endemism, endemic plants.

### 1. *Bartsia aprica* Diels

VU, B1ab(iii)



**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 37: 430. 1906.  
**Colección tipo:** P.C. Hutchison 640  
**Herbarios:** UC.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU, PA.  
**Regiones Ecológicas:** MA, PSH; 3000—4150 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba probablemente anual, conocida de sitios abiertos y ambientes de puna en el centro del país (Molau, 1990). Fue listada para Huánuco, pero el ejemplar que se atribuye a ese Departamento, en realidad corresponde a Pasco. Al igual que otras especies de los ambientes de puna y sitios abiertos está sujeta a modificaciones del hábitat por pastoreo y remoción de suelos.

### 2. *Bartsia canescens* Wedd.

LC



**Publicación:** Chlor. Andina 2: 123. 1860.  
**Colección tipo:** J. Dombey s.n.  
**Herbarios:** P.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AN, AP, AY, CU, HU, HV, JU, LI, LL.  
**Regiones Ecológicas:** MA, PSH, AA; 2150—4500 m.  
**SINANPE:** PNH  
**Herbarios peruanos:** CPUN (1), HAO (1), USM (2).

**Observaciones:** Hierba perenne, conocida de varias localidades en la vertiente del Pacífico. El ejemplar tipo fue recolectado por la expedición de Ruiz y Pavón, a fines del siglo XVIII, probablemente en la provincia de Oyón en Lima. Esta especie tiene un rango altitudinal amplio y hay registros botánicos continuos en los herbarios.

### 3. *Bartsia crisafullii* N. Holmgr. subsp. *acutiloba* Molau

VU, B1a



**Publicación:** Opera Bot. 102: 46. 1990.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride & W. Featherstone 1495  
**Herbarios:** F, PH.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AN, HU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2450—3900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón anual se conoce de cinco localidades, en los valles interandinos de las Provincias de Huari en Ancash y de Ambo y Pachitea en Huánuco. Al igual que otros taxones en este género, podrían haber ejemplares de herbario en las instituciones peruanas que representen otras poblaciones, pero que no están identificadas.

### 4. *Bartsia elachophylla* Diels

NT



**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 37: 431. 1906.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 2087  
**Herbarios:** G; MOL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM, AN, AY, HU, HV, JU, PA.  
**Regiones Ecológicas:** MA, PSH, PAR; 2450—4250 m.  
**SINANPE:** PNH, PNYC  
**Herbarios peruanos:** HUT (1), MOL (isotipo).

**Observaciones:** Hierba anual que logra alcanzar hasta 1 m de alto, conocida de más de diez localidades. La mayoría de las poblaciones conocidas están ubicadas en la cuenca del Santa y en los pajonales húmedos en la vertiente oriental. Molau (1990) mencionó que solamente una población está ubicada en la vertiente occidental. Por ello es probable que esta especie tenga otras poblaciones en lugares menos herborizados de los Andes.

**5. *Bartsia flava* Molau subsp. *minor* Molau****EN, B1ab(iii)**

**Publicación:** Opera Bot. 102: 62. 1990.  
**Colección tipo:** U. Molau & B. Eriksen 3337  
**Herbarios:** AAU, GB; CPUN.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AN, CA.  
**Regiones Ecológicas:** PSH, PAR; 3000—3600 m.  
**SINANPE:** PNH  
**Herbarios peruanos:** CPUN (isotipo), USM (5).

**Observaciones:** Esta subespecie no fue señalada como endémica en Brako & Zarucchi (1993); erróneamente se listó como tal la subespecie típica. Es una hierba terrestre de ambientes paramunos y de puna. Este taxón se conoce de tres poblaciones, en un área muy reducida y fragmentada en Cajamarca y Ancash.

**6. *Bartsia inaequalis* Benth. subsp. *duriplis* (Edwin) Molau****LC**

**Publicación:** Opera Bot. 102: 54—55, f. 15H. 1990.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 7553  
**Herbarios:** F, NY, U.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM, AY, HU, HV, JU, PA, SM.  
**Regiones Ecológicas:** MA, BMHM; 2800—3300 m.  
**SINANPE:** PNRA  
**Herbarios peruanos:** USM (2).

**Observaciones:** Arbusto conocido de más de 16 poblaciones fragmentadas y dispersas, casi a lo largo de las vertientes orientales. Es probable que su rango de distribución sea mayor, como señaló Molau (1990) las poblaciones conocidas sólo indican la necesidad de mayor herborización en la zona montaña oriental.

**7. *Bartsia integrifolia* Wedd.****VU, B1a**

**Publicación:** Chlor. Andina 2: 131. 1860.  
**Colección tipo:** F. Castelnau s.n.  
**Herbarios:** P, PH.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AP, AY, CU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2700—3500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Subarbusto de ambientes mesoandinos, restringido a cuatro localidades en el centro sur del país. La localidad original se atribuye dudosamente a Lima (Molau, 1990). Aunque es una especie de fácil reconocimiento, aparentemente, no ha vuelto a ser recolectada desde 1939. Probablemente la escasez de la representación en los herbarios refleje la falta de herborización en esa parte del país. Las localidades conocidas se encuentran en tributarios de las cuencas del Mantaro, Pampas y Apurímac. Amenazas potenciales a las poblaciones de esta especie podrían estar asociadas a los incendios intencionales en matorrales.

**8. *Bartsia pyricarpa* Molau****LC**

**Publicación:** Opera Bot. 102: 44. 1990.  
**Colección tipo:** U. Molau et al. 1681  
**Herbarios:** GB; CPUN!, HUT!.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM, AN, CA, HU, JU, LL, LI, PA.  
**Regiones Ecológicas:** MA, PSH, PAR, AA; 2400—4800 m.  
**SINANPE:** PNH, RNJ  
**Herbarios peruanos:** CPUN (isotipo+5), HAO (1), HUT (isotipo).

**Observaciones:** Hierba anual, localmente rara (Molau, 1990), pero conocida de numerosas localidades altoandinas y de valles interandinos. Habita ambientes abiertos en pajonales. Incendios intencionales podrían afectarla.

**9. *Bartsia rigida* Molau****NT**

**Publicación:** Opera Bot. 102: 78. 1990.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride & W. Featherstone 735  
**Herbarios:** F, PH.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HV, JU, LI.  
**Regiones Ecológicas:** MA, PSH, AA; 3200—5000 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** USM (5).

**Observaciones:** Hierba perenne, conocida de unas 15 localidades, en el centro del país, en las cuencas del Mantaro y Rímac. La mayoría de las poblaciones proceden de la cuenca del Rímac, una de las más afectadas por contaminación y modificación del paisaje. Por su rango altitudinal, amenazas potenciales a sus poblaciones probablemente ocurrían por modificación de su hábitat.

**10. *Bartsia sericea* Molau****VU, B1ab(iii)**

**Publicación:** Opera Bot. 102: 33, f. 9J-P. 1990.  
**Colección tipo:** U. Molau et al. 1682  
**Herbarios:** GB; CPUN!, HUT!.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CA.  
**Regiones Ecológicas:** PAR; 3400—3900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** CPUN (isotipo+3), HUT (isotipo+1).

**Observaciones:** Hierba perenne, conocida de unas cinco localidades aisladas en las Provincias vecinas de Cajamarca, Hualgayoc y Celendín, en el sur del departamento de Cajamarca. El área de presencia alcanza unos 3500 km<sup>2</sup>, hallándose en pajonales sobre laderas rocosas.

**11. *Bartsia strigosa* Molau****VU, B1a**

**Publicación:** Opera Bot. 102: 79, f. 19. 1990.

**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 21608

**Herbarios:** F, NY, PH, US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** AN, JU, LI, LL.

**Regiones Ecológicas:** MA, PAR; 3000—4100 m.

**SINANPE:** PNH

**Herbarios peruanos:** HAO (1).

**Observaciones:** Subarbusto o arbusto conocido de siete localidades, ubicadas en cuencas que drenan al Pacífico, como el Santa, Chillón y Rímac. Las subpoblaciones en la cuenca del Rímac han sido herborizadas con cierta frecuencia temporal, pero no existe material de herbario reciente.

**12. *Bartsia tenuis* Molau****VU, B1ab(iii)**

**Publicación:** Opera Bot. 102: 89—90, f. 25B. 1990.

**Colección tipo:** U. Molau et al. 1658

**Herbarios:** GB; CPUN!, HUT!.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** CA, LL.

**Regiones Ecológicas:** PAR; 2800—4200 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** CPUN (isotipo+4), HAO (1), HUT (isotipo), USM (2).

**Observaciones:** Hierba perenne, conocida de 10 localidades en el sur de Cajamarca y centro de La Libertad. El hábitat en la localidad original, así como en los alrededores de la ciudad de Cajamarca, está deteriorado por pastoreo intensivo. Su amplitud altitudinal y la presencia en sitios rocosos puede aminorar esta amenaza.

**13. *Bartsia tomentosa* Molau****LC**

**Publicación:** Opera Bot. 102: 55—56, f. 15K-Q. 1990.

**Colección tipo:** U. Molau et al. 1680

**Herbarios:** GB; CPUN!, HUT!.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** AN, CA, LI, PA.

**Regiones Ecológicas:** PSH, PAR; 3450—4600 m.

**SINANPE:** PNH

**Herbarios peruanos:** CPUN (isotipo+5), HUT (isotipo+4).

**Observaciones:** Hierba perenne conocida de varias localidades, en cuencas de ríos que drenan al Pacífico, con la excepción de la población en Pasco. En Ancash, se ha registrado tanto en la Cordillera Blanca como en la Negra. Probablemente su distribución sea más amplia que la obtenida de los datos de herbarios y literatura.

**14. *Bartsia tricolor* Molau****VU, B1a**

**Publicación:** Opera Bot. 102: 79—80, f. 19, 22L-O. 1990.

**Colección tipo:** U. Molau et al. 538

**Herbarios:** GB, S; USM.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** AN.

**Regiones Ecológicas:** PSH, AA; 3875—4700 m.

**SINANPE:** PNH

**Herbarios peruanos:** CPUN (3), HUT (8), USM (isotipo+1).

**Observaciones:** Hierba cespitosa, conocida de unas diez localidades, la mayoría en la cuenca del Santa. Esta especie ocupa tanto la Cordillera Blanca como la Negra; en esta última se conoce también de la vertiente occidental.

**15. *Castilleja alpicola* T.I. Chuang & Heckard****DD**

**Publicación:** Syst. Bot. 17(3): 420, f. 2D-F, 3. 1992.

**Colección tipo:** A. Sagástegui A. et al. 11969

**Herbarios:** GB; HUT.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** LL.

**Regiones Ecológicas:** PAR; 4000 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** HUT (isotipo).

**Observaciones:** Herba probablemente anual, conocida de una localidad, en la vertiente occidental de La Libertad. Aparentemente, no ha vuelto a ser recolectada desde 1984, debido probablemente a lo poco herborizado de la zona. Al igual que otras especies de la jalca, estudios en el futuro podrán contribuir a aclarar la biología y el estado de conservación de esta especie.

**16. *Castilleja peruviana* Chuang & Heckard****NT**

**Publicación:** Syst. Bot. 17(3): 426—427, f. 6A-C. 1992.

**Colección tipo:** T. Duncan 2846

**Herbarios:** F, GH, K, MO, NY, UC, US; USM.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** AM, CA, LL.

**Regiones Ecológicas:** MA, PAR; 2500—3500 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** CPUN (1), HUT (1), USM (isotipo citado).

**Observaciones:** Hierba anual conocida de diez poblaciones fragmentadas, en ambas vertientes andinas. Habita ambientes rocosos, con vegetación herbácea.

**17. *Castilleja profunda* Chuang & Heckard**

NT



**Publicación:** Syst. Bot. 17(3): 427, 429, f. 4D-F. 1992.

**Colección tipo:** A.S. Hitchcock 22404

**Herbarios:** US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** AN, AR, AY, CA, HV, LI.

**Regiones Ecológicas:** DST, MDE, MA; 100—3500 m.

**SINANPE:** PNH.

**Herbarios peruanos:** USM?.

**Observaciones:** Hierba anual conocida de más de diez localidades dispersas, tanto en las cuencas del Santa, Marañón y Mantaro, como en ambientes de lomas de la costa de Arequipa. No fue reconocida como un endemismo por Brako & Zarucchi (1993), pero aquí se la acepta como tal. Probablemente su distribución sea mayor que la conocida, pues presenta una amplitud ecológica grande.

**18. *Castilleja pseudopallescens* Edwin**

DD



**Publicación:** Phytologia 19(6): 404. 1970.

**Colección tipo:** C. Vargas C. 5800

**Herbarios:** F.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** AP.

**Regiones Ecológicas:** MA; 2700 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba perenne conocida solamente de una localidad, en la cuenca del Vilcabamba, un afluente del Apurímac. Esta localidad ha sido escasamente herborizada y esto contribuya tal vez a lo poco que se sabe de esta especie.

**19. *Castilleja vadosa* Chuang & Heckard**

LC



**Publicación:** Syst. Bot. 17(3): 429—430, f. 6 D-H. 1992.

**Colección tipo:** P.C. Hutchison et al. 6266

**Herbarios:** F, K, MO, NY, UC, US; USM.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** AM, AN, CA, LL, LI, PA.

**Regiones Ecológicas:** MA, PSH, PAR; 2500—4050 m.

**SINANPE:** PNH

**Herbarios peruanos:** USM (isotipo citado).

**Observaciones:** Hierba anual cercanamente vinculada a otra endémica *Castilleja peruviana*, con la que comparte el mismo hábitat en su rango de distribución. Se conoce de más de diez localidades en ambas vertientes andinas.

**20. *Castilleja virgatoides* Edwin**

NT



**Publicación:** Phytologia 19(6): 405—406. 1970.

**Colección tipo:** F.W. Pennell 13699

**Herbarios:** F, GH, NY, PH.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** AP, AY, CU, JU, LA, LL, LI.

**Regiones Ecológicas:** MA, PSH, AA; 2700—4600 m.

**SINANPE:** SNA

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba perenne conocida de varias localidades dispersas en el norte y centro del país, en ambas vertientes andinas, en las cuencas del Chusgón, Rímac, Urubamba, entre otras. Probablemente amenazas a sus poblaciones estén asociadas a incendios intencionales.

## Literatura citada

- Acevedo-Rodríguez, P. 2003. Melicocceae (Sapindaceae): *Melicoccus* and *Talisia*. Fl. Neotrop. Monogr. 87: 1—179.
- Aedo, C., J. J. Aldasoro & C. Navarro. 2002. Revision of *Geranium* sections Azorellloida, Neoandina, and Paramensis (Geraniaceae). *Blumea* 47(2): 205—297.
- Alegría Olivera, J. J. & A. Granda Paucar 2001 A new synonym for *Eragrostis pilgeri* (Poaceae: Eragrostideae) *Sida* 19(4): 1157—1161.
- Almeda, F. 1997. Systematics of the Andean genus *Centradeniastrum* (Melastomataceae) BioLlania, Ed. Especial 6:153—166.
- Anderson, C. 1993. *Stigmaphyllon* in the Amazon region. Contr. Univ. Michigan Herb. 19: 393—413.
- Anderson, E. N. 2001 The cactus family. Timber Press, Portland, Oregon.
- Anderson, G. J., C. T. Martine, J. Prohens & F. Nuez. 2006. Solanum *perlongistylum* and *S. catilliflorum*, new endemic Peruvian species of Solanum, Section Basarthrum, are close relatives of the domesticated Pepino, *S. muricatum*. *Novon* 16(2): 161—167.
- Anderson, W.R. 1987. Notes on Neotropical Malpighiaceae-II. Contr. Univ. Mich. Herb. 16: 55—108.
- Anderson, W.R. 2006. Eight segregates from the Neotropical genus *Mascagnia* (Malpighiaceae). *Novon* 16(2): 168—204.
- Andersson, L. 1997. A new revision of *Joosia* (Rubiaceae-Cinchoneae). *Brittonia* 49(1): 24—44.
- Anónimo. 1940. El Herbario Raimondi. Bol. Mus. Hist. Nat. Javier Prado 14: 323—336.
- Anónimo. 1942. El Herbario Raimondi. Bol. Mus. Hist. Nat. «Javier Prado» 6(22—23): 282—283.
- Anton, A. M. & M. A. Negritto. 1997. On the names of the Andean species of *Poa* L. (Poaceae) described by Pilger. *Willdenowia* 27: 235—247.
- Arakaki, M. & A. Cano. 2003. Composición florística de la cuenca del río Ilo-Moquegua y Lomas de Ilo, Moquegua, Peru. *Rev. Peru. Biol.* 10(1): 5—19.
- Arriagada, J. E. 2003. Revision of the genus *Clibadium* (Asteraceae, Heliantheae). *Brittonia* 55(3): 245—301.
- Arroyo-Leuenberger, S. & B. E. Leuenberger. 1996. Type specimens of names in American Amaryllidaceae at the Berlin-Dahlem herbarium (B and B-W). *Willdenowia* 25:693—702.
- Barringer, K. 1985. Revision of the genus *Basistemon* (Scrophulariaceae). *Syst. Bot.* 10(2): 125—133.
- Bayer, C. et al. 1998. Muntingiaceae, a new family of dicotyledons with malvaceous affinities. *Taxon* 47(1): 37—42.
- Becerra, E. 2006. El género *Brachonidium* (Orchidaceae) en el Perú, tres especies nuevas para la selva central peruana. *Arnaldoa* 12(1—2): 54—61. [2005]
- Beltrán, H. 1999. New combinations in *Dendrophorbium* and *Pentacalia* (Senecioneae-Asteraceae) from Peru. *Comp. Newsbl.* 34:50—52.
- Bennett, D. E. & E. Christenson. 1995. New species of Peruvian Orchidaceae III. *Brittonia* 47(2):182—200.
- Bennett, D. E. & E. Christenson. 2001. *Icones Orchidacearum Peruviarum*. Pl. 601—800.
- Berg, C. C. 2002. An account of the *Cecropia* species (Cecropiaceae) of Peru. *Caldasia* 24(2): 229—238.
- Berg, C. C. & P. Franco Rosselli. 2005. *Cecropia*. Fl. Neotrop. Monogr. 94: 1—230.
- Bernardi, L. 1963. Revisio generis *Weinmannia*. Pars I: Sectio *Weinmanniae*. *Candollea* 18(4): 285—334.
- Berry, P. 1982. The systematics and evolution of *Fuchsia* sect. *Fuchsia* (Onagraceae). *Ann. Missouri Bot. Gard.* 69(1): 1—198.
- Bohs, L. 2001. Revision of *Solanum* section *Cyphomandropsis* (Solanaceae) *Syst. Bot. Monogr.* 61: 1—85.
- Brako, L. & J. Zarucchi. 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms in Peru. Mongr. Missouri Bot. Gard. 45.
- Bridgewater, S. et al. 2003. A preliminary floristic and phytogeographic analysis of the woody flora of seasonally dry forests in northern Peru. *Candollea* 58(1): 129—148.
- Cano, A., K. R. Young & B. León. 1996. Áreas importantes para la conservación de fanerógamas en el Perú. Pp. 39—43. En L. O. Rodríguez (Ed.) *Diversidad Biológica del Perú. Zonas Prioritarias para su Conservación*.
- Chanderbali, A. S. 2004. *Endlicheria* (Lauraceae) Fl. Neotrop. 91: 1—141.
- Chatrou, L. W. 1998. Changing Genera. Systematic studies in Neotropical and West African Annonaceae 141.
- Chiron, G. 2002. Contribution à l'étude des Orchidées du Pérou - III *Oncidium* Sw. section *Heterantha* Kraenzlin. *Richardiana* 2(2): 63—73.
- Christenson, E. 1994. Significant collections of Orchidaceae conserved in Herbarium Hamburgense (HBG). *Brittonia* 46(4): 344—354.
- Christenson, E. 2002. *Cochlioda*: a taxonomic treatment of this New World genus. *Orchids* 71 (10): 110—121.
- Christenson, E. & B. Collantes. 2003. *Cyrtidiorchis stumpflei*: one of Peru's more unusual orchids. *Orchids*, May 378—379.
- Christenson, E.A. 1999. *Cycnoches carrii*, a new species from Peru. *Orchid Digest* 63(4): 173—175.
- Cialdella, A. M. 2003. *Piptochaetium*. En R.J. Soren et al. Catalogue of New World Grasses (Poaceae): IV. Subfamily Pooideae.
- Clark J. L. & E. A. Zimmer. 2003. A preliminary phylogeny of *Alloplectus* (Gesneriaceae): implications for the evolution of flower resupination. *Syst. Bot.* 28(2): 365—375.
- Clark, J. L. 2005. A monograph of *Alloplectus* (Gesneriaceae). *Selbyana* 25(2): 182—209.
- Clark, L.G. 1997 Diversity, biogeography and evolution of *Chusquea*. En G.P. Chapman (Ed.) *The Bamboos*, Capítulo 3: 33—44. Academic Press. New York.
- Clark, L. G. 2000. *Chusquea*. En E.J. Judziewicz et al. Catalogue of New World Grasses (Poaceae) I. Subfamilies Anomochlooideae, Bambusoideae, Ehrartoideae, and Pharoideae. *Contr. U.S. Natl. Herb.* 39: 36—52.
- Clemants, S. 1995. Bejaria. EN: J.L. Lutteyn (ed.) Ericaceae Part II.
- Crawford, D.J.; A. Sagástegui A., T.F. Stuessy & I. Sánchez. 1993. Variación aloenzimática en la rara especie endémica peruana *Chuquiraga oblongifolia* (Asteraceae) Arnaldoa 1: 73—76.
- Cribb, P. 2005. *Masdevallia* idea Bot. Mag. (Curtis)
- Dalström; S. 2001. A synopsis of the genus *Cyrtochilum* (Orchidaceae; Oncidiinae): Taxonomic reevaluation and new combinations. *Lindleyana* 16 (2): 56—80.
- Darbyshire, S. J.; R. J. Soren, D. Stancik & S. D. Koch. 2003. *Festuca*. En R. J. Soren et al. Catalogue of New World Grasses (Poaceae): IV. Subfamily Pooideae.
- D'Arcy, W. G. 1978. A preliminary synopsis of *Salpiglossis* and other Cestreae (Solanaceae) Annals. Missouri Bot. Gard. 65(2): 698—724. 1978
- de Roon, A. C. & S. Dressler. 1997. New taxa of *Norantea* Aubl. S.l. (Marcgraviaceae) from Central America and adjacent South America. *Bot. Jahrb. Syst.* 119(3): 327—335.
- Dillon, M. O. & A. Sagástegui A. 1991. Family Asteraceae. Part V. En J.F. Macbride and col. *Flora of Peru*. Fieldiana Bot., N.S. 26: 1—70.
- Dillon, M.O. & A. Sagástegui A. 1996. Revision of the dioecious genus *Chersodoma* Phil. (Senecioneae, Asteraceae), including a new species and status change. *Brittonia* 48(4): 582—604.
- Dodson, C. H. 1988. A list of the orchid species reported for Ecuador. 115—129.

- Eggli, U. 1987. A Type specimen register of Cactaceae in Swiss herbaria. *Trop. Subtrop. Pflanzenwelt* 59:1—124.
- Eggli, U. & N. Taylor. 1991. I.O.S. Index of Names of Cactaceae Published 1950—1990 from *Repertorium Plantarum Succulentarum*. 222 pp. Royal Botanic Gardens, Kew & Stadtliche Sukkulanten-Sammlung, Zürich.
- Eriksen, B. 1993. Phylogeny of the Polygalaceae and its taxonomic implications. *Pl. Syst. Evol.* 186(1—2): 33—55.
- Escobar, L. K. 1986. New species and varieties of Passiflora (Passifloraceae) from the Andes of South America. *Syst. Bot.* 11(1): 88—97.
- Ferreyra, R. 1995. Family Asteraceae: Part VI. Tribe Mutiseae. En J.F. Macbride et al. *Flora of Peru*.
- Ferreyra, R. 1997. Las Hydrophyllaceae en el Perú. BioLlania, Ed. Especial 6: 325—330.
- Forero, E. 1983. Connaraceae Flora Neotrop. 36: 1—208.
- Foster, R.C. 1958. A catalogue of ferns and flowering plants of Bolivia. *Contr. Gray Herb.* 184: 1—223.
- Freire, S. & L. Iharlegui. 2000. Ejemplares tipo de Asteraceae (= Compositae) de A.L. Cabrera. *Darwiniana* 38(3—4): 307—364.
- Funk, V. 1997. *Xenophyllum*, a new Andean genus extracted from *Werneria* s.l. (Compositae: Senecionae) *Novon* 7(3): 235—241.
- Garay, L. & G.A. Romero-González. 1998. *Schedulae Orchidum*. Harvard Pap. Bot. 3(1): 53—62.
- Gengler, K. M. & D. J. Crawford. 2000. Genetic diversity of four little-known species of *Malesherbia* (Malesherbiaceae) endemic to the arid inter-Andean valleys of Peru. *Brittonia* 52(4): 303—310.
- Gibson, D.N. 1967. Polemoniaceae. In: J.F. Macbride (ed.), *Flora of Peru*. Fiedl Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 15(5A/2): 112—131.
- Gómez-Sosa, E. 2004. Species of the South American *Astragalus garbancillo* (Leguminosae-Papilionoideae) complex. *Arnaldoa* 11(2): 43—6. [2005].
- Goodspeed, T.H. 1938. Three new species of *Nicotiana* from Peru. *Univ. California Publ. Bot.* 18(6): 137—152.
- Goodspeed, T.H. 1954. The genus *Nicotiana*. Origins, relationships and evolution of its species in the light of their distribution, morphology and cytogenetics. *Chron. Bot.* 16(1/6): 1—536.
- Govaerts, R. 2004. World Checklist of Monocotyledons Database in ACCESS: 1-54382. The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.
- Granda Paucar, A. 2000. *Diplostethium tovari Cuatrecasas*, a new synonym for *Parastrephia lucida* (Meyen) Cabrera (Compositae-Astereae) *Comp. Newsrl.* 35:44—46.
- Grant, J. R. 1993. True Tillandsias misplaced in *Vriesea* (Bromeliaceae:Tillandsioideae) *Phytologia* 75(2):170—175.
- Grant, J. R. 1995. The resurrection of *Alcantarea* and *Werauhia*, a new genus. *Trop. Subtrop. Pflanzenwelt* 91: 1—57.
- Grant, J. R. 2003. De Macrocarpaeae Grisebach (ex Gentianaceis) speciebus novis II: typification of the Ruiz & Pavon names. *Harvard Pap. Bot.* 7(2): 423—436.
- Grant, J. R. 2004. De Macrocarpaeae Grisebach (Ex Gentianaceis) Speciebus Novis V: Twenty-three new species largely from Peru, and typification of all species in the genus. *Harvard Pap. Bot.* 9(1): 11—49.
- Grant, J. R. 2005. De Macrocarpaeae Grisebach (ex Gentianaceis) speciebus novis VI: seed morphology, palynology, an infrageneric classification, and another twenty-three species largely from Colombia. *Harvard Pap. Bot.* 9(2): 305—342.
- Grayum, M. H. 1996. Revision of *Philodendron* subgenus *Pteromischum* (Araceae) for Pacific and Caribbean tropical America. *Syst. Bot. Monogr.* 47:
- Gross, E. 1999. *Tillandsia lymanii* and *Mezobromelia lyman-smithii*. A tribute to Lyman B. Smith. *Harvard Pap. Bot.* 4(1):129—134.
- Guerrero Gárate, N. S. 2005. Tratamiento y derivación de las aguas del tunel Kingsmill y su integración al proyecto Pomacocha-
- Río Blanco. Pp. 1—9. Libro XXVII Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental. II-077.
- Hágster, E. 2006. *Icones Orchidacearum* Fasc. 8. The genus *Epidendrum*. Part 5. Herbario AMO, Mexico. DF.
- Hágster, E. & L. Sánchez. 2006. *Icones Orchidacearum* Fasc. 8 (lam. 801-900). El género *Epidendrum* Parte 5.
- Harley, R. M. & A. Granda Paucar. 2000. List of species of tropical American *Clinopodium* (Labiatae), with new combinations. *Kew Bull.* 55(4): 917—927.
- Harling, G. & M. Neuendorf. 2003. *Alstromeriaceae* En Harling, G & L. Andersson (eds.)
- Hellwig, F.H. 1993. The genera *Pingraea* Cassini and *Neomolina* Hellwig (Compositae-Astereae) *Candollea* 48(1): 203—219.
- Henderson, A. 1995. The Palms of the Amazon. 362 pp.
- Hensold, N. 1999. Las angiospermas endémicas del Dpto. De Cajamarca, Perú. *Arnaldoa* 6(2): 141—184. [2000]
- Herrman, M. Arracacha (*Arracacia xanthorrhiza* Bancroft). Pp. 1—98. International Potato Center.
- Hickey, R.J. 1994. Isoetaceae. En R.M. Tryon & R.G. Stolze, *Pteridophyta of Peru*. Part VI. *Fieldiana Bot.*, n. s. 34: 88—97.
- Hill, A.W. 1906. Note on the genus *Nototrichie* Turcz. With an amended diagnosis and descriptions of new species. *Bot. Jahrb. Syst.* 37: 575—587.
- Hofreiter, A. 2005. The genus *Bomarea* (Alstroemeriaceae) in Bolivia and southern South America. *Harvard Pap. Bot.* 9(2): 342—373.
- Hofreiter, A. & E. Rodríguez. 2006. The Alstroemeriaceae in Peru and neighbouring areas. *Rev. peruv. biol.* 13(1): 5—69
- Hofreiter, A. & H.-J. Tillich. 2003. Revision of the subgenus *Wichuraea* (M. Roemer) Baker of *Bomarea* Mirbel (Alstroemeriaceae). *Feddes Repert.* 114(3—4):208—239.
- Holmes, W. C. & S. McDaniel. 1982. Familia Compositae. Part III. Genus *Mikania*-Tribe Eupatorieae. En J.F. Macbride. *Flora of Peru*. *Fieldiana Bot.*, N.S. 9: 1—56.
- Huaman, Z. & D. M. Spooner. 2002. Reclassification of landrace populations of cultivated potatoes (*Solanum* sect. Petota). *Amer. J. Bot.* 89(6): 947—965.
- Hughes, C. E., A. Daza Yomona. & J. A. Hawkins. 2003. A new Palo Verde (*Parkinsonia*-Leguminosae: Caesalpinoideae) from Peru. *Kew Bull.* 58: 467—472.
- Hunt, D. R. 1992. CITES. Cactaceae Checklist. 190pp. Royal Botanic Gardens, Kew.
- Hunt, D. R. (Comp.) 1999. CITES Cactaceae checklist, 2nd edition. Kew, Royal Botanic Gardens.
- Ibisch, P. L., C. Nowicki, R. Vásquez & K. Koch. 2001. Taxonomy and biology of Andean Velloziaceae: *Vellozia andina* sp.nov. and Notes on *Barbaceniopsis* (including *Barbaceniopsis castillonii* comb.nov.) *Syst. Bot.* 26(1):5—16.
- Infantes, J. G. 1962. Revisión del género *Cantua* (Polemoniaceae). *Lilloa* 31: 73—107.
- Jørgensen, P. M. & S. León Yanez. 1999. Catalogue of the vascular plants of Ecuador. *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 75: 1—1182.
- Judd, W. 1995. Agarista. En Luteyn, J.L. (ed.) *Fl. Neotropica* Monogr. 60:295—344.
- Katinas, L. 1996. Revisión de las especies sudamericanas del género *Trixis* (Asteraceae, Mutiseae). *Darwiniana* 34(1—4): 27—108.
- Klitgaard, B. 1993. *Browneopsis* *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 45: 1254.
- Klitgaard, B. 2005. *Platymiscium* (Leguminosae: Dalbergieae): biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. *Kew Bull.* 60: 321—400.
- Knapp, S. 2002. *Solanum* section *Geminata* (Solanaceae) Flora Neotrop. *Monogr.* 84: 1—404.
- Knapp, S. & T. Helgason. 1997. A revision of *Solanum* section *Pteroidea*: Solanaceae. *Bull. Nat. Hist. Mus. Lond. (Bot.)* 27(1): 31—73.

- Krapovickas, A. 1996. Sinopsis del genero Gaya. Bonplandia 9(1—2): 57—87.
- Kuijt, J. 1988. Revision of Tristerix (Loranthaceae) Syst. Bot. Mon. 19:1—61.
- Kurz, H. 2000. Revision der Gattung Licaria (Lauraceae) Mitt. Inst. Allg. Bot. Hamburg 28/29:89—221.
- Kvist, L. P. & L. E. Skog. 1996. Revision of Pearcea (Gesneriaceae). Smithsonian Contr. Bot. 84: 1—47.
- Leiva, S. & V. Quipuscoa. 2002. Larnax kann-rasmussenii y Larnax schjellerupii (Solanaceae: Solaneae) dos nuevas especies del Departamento de San Martín-Perú. Arnaldoa 9(1): 27—38.
- Leiva, S., P. Lezama & V. Quipuscoa. 2003. Iochroma salpoanum y I. squamosum (Solanaceae: Solaneae) dos nuevas especies andinas del norte del Perú. Arnaldoa 10(1): 95—104.
- Leiva, S., P. Lezama & M. Zapata. 2006. Primera especie de Deprea Rafinesque (Solanaceae: Solaneae) en Perú. Arnaldoa 12(1—2): 62—66. [2005]
- León, B. 2002. Significance of August Weberbauer's planta collecting for today's Río Abiseo National Park, northern Peru. Taxon 51: 161—170.
- León, B., K. R. Young & A. Cano. 1996. Observaciones sobre la flora vascular de la costa central del Perú. Arnaldoa 4(1): 67—85.
- León, B., K. R. Young, A. Cano, M. I. La Torre, M. Arakaki & J. Roque. 1997. Botanical exploration and conservation in Peru: the plants of Cerro Blanco, Nazca. BioLlania, Ed. Especial 6: 431—448.
- Leuenberger, B. E. 2002. Humboldt & Bonpland's Cactaceae in the herbaria at Paris and Berlin. Willdenowia 32(1):137—153.
- Loizeau, P.A. 1994. Aquifoliacées Péruviennes. Boissiera 48:1—306 pp.
- López A., E. Rodríguez & V. Medina. 2003. [2004]. Catálogo de los tipos e isótipos del Herbarium Truxillense (HUT) Parte II. Arnaldoa 10(2): 39—92.
- Lourteig, A. 1994. Oxalis l. subgenero Thamnoxys (Endl.) Reiche emend. Lourt. Bradea 7(1):1—199.
- Lourteig, A. 2000. Oxalis L. subgéneros Monoxalis (Small) Lourt., Oxalis y Trifidus Lourt. Bradea 7(2): 201—629.
- Luer, C. 1999. Icones Pleurothallidinaru, XVIII. Systematics of Pleurothallis. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 76: 1—182.
- Luer, C. 2000. Systematic of Masdevallia, Part One. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 77.
- Luer, C. 2002. Systematic of Masdevallia, Part Four. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 87.
- Luer, C. 2004. Pleurothallis subgenus Acianthera and three allied subgenera. Icones Pleurothallidiarum XXVI.
- Luer, C. 2005. Icones Pleurothallidinarum XXVII: Dryadella and Acronia section Macrophyllae-Fasciculatae. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 1—310.
- Luteyn, J. L. 1983. Ericaceae—Part I. Cavendishia. Fl. Neotropica 35: 1—290.
- Luteyn, J. L. 1987. New species and notes on neotropical Ericaceae. Opera Bot. 92: 109—130.
- Luteyn, J. L. 1996. Ericaceae Flora of Ecuador 54: 1—104.
- Luteyn, J. L. 1997. A review and taxonomic realignments within the Neotropical genus Macleania (Ericaceae: Vacciniae). BioLlania, Ed. Especial 6: 455—465.
- Luteyn, J. L. 1998. Redefinition of the neotropical genus Anthopterus (Ericaceae: Vacciniae), including one new species. Brittonia 48(4): 605—610.
- Luther, H. E. 2001. An unusual new species of Pepinia from southeastern Peru. J. Bromeliad Soc. 51(2): 71—72.
- Maas, P., E. A. Mennega & L. Y. Th. Westra. 1994. Index to species and infraspecific taxa of neotropical Annonaceae. Candollea 49(2): 389—481.
- Macbride, J. F. 1936. Araceae. En J.F. Macbride, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Hist. Nat., Bot. Ser. 13(Part 1, 3): 428—486.
- Macbride, J. F. 1936. Rubiaceae. En Flora of Peru. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(6/1): 3—261.
- Macbride, J. F. 1937. Convolvulaceae. Flora of Peru. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(6/2): 321—383.
- Macbride, J. F. 1938. Berberidaceae. Flora of Peru.
- Macbride, J. F. 1941. Melastomataceae. Flora of Peru, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(Part4, 1): 249—521.
- Macbride, J. F. 1948. Leguminosae. Flora of Peru, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(Part III, 1): 3—506.
- Macbride, J. F. 1949. Geraniaceae Flora of Peru.
- Macbride, J. F. 1956. Theaceae. En J.F. Macbride, Flora of Peru. Field Mus. Nat. Hist. Bot. Ser. 13(Part IIIA, 2): 726—741.
- Macbride, J. F. 1959. Ericaceae. Flora of Peru
- Macbride, J. F. 1960. Lamiaceae. En Flora of Peru. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13, 5(2): 721—829.
- Macbride, J. F. 1960. Nolanaceae. Em J.F. Macbride, Flora of Peru. Field Mus. Nat. Hist. Bot. Ser. 13(Part V, 2): 829—854.
- Macbride, J. F. 1962. Solanaceae. En J.F. Macbride, Flora of Peru. Field Mus. Nat. hist., Bot. Ser. 13(Part V-B, 1): 3—267.
- Madriñán, S. 2004. Rhodostemodaphne (Lauraceae) Fl. Neotropica 92: 1—102.
- Manzanares, J.M. 2002. Bromeliads of the Condor. J. Bromel. Soc. 52(2): 63—79.
- McVaugh, R. 1958. Myrtaceae. En J.F. Macbride, Flora of Peru. Field Mus. Nat. Hist. Bot. Ser. 13(Part IV, 2): 569—819.
- Meerow, A. 1987. A monograph of Eucrosia (Amaryllidaceae). Syst. Bot. 12(4): 460—492.
- Meerow, A. W. 2000. Phylogeny of the American Amaryllidaceae based on nrDNA ITS sequences. Syst. Bot. 25(4):708—726.
- Meerow, A. W. & H. van der Werff. 2004. Pucara (Amaryllidaceae) reduced to synonymy with Stenomesson on the basis of nuclear and plastid DNA spacer sequences, and a new related species of Stenomesson. Syst. Bot. 29(3): 511—517.
- Mena, P. 1990. A revision of the genus Arcytophyllum (Rubiaceae: Hedyotideae). Mem. New York Bot. Gard. 60: 1—26.
- Mesa M., A. 1997. Nolanaceae de distribución Chileno-Peruana: su status taxonómico. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile 46: 23—32.
- Mesa, A. 1981. Nolanaceae. Fl. Neotrop. 26: 1—197.
- Michelangeli, F.A. 2000. Systematic Revision of Tococa.
- Michelangeli, F.A. 2000a. A cladistic analysis of the genus Tococa (Melastomataceae) based on morphological data. Syst. Bot. 25(2): 211—234.
- Michelangeli, F. A. 2005. Tococa (Melastomataceae). Fl. Neotrop. Monogr. 98: 1—114.
- Mickel, J. T. 1990. Three new species of Elaphoglossum from Peru. Amer. Fern J. 80(3):110—112.
- Mickel, J.T. 1991. Elaphoglossum. En R.M. Tryon & R.G. Stolze, Pteridophyta of Peru Part IV. Fieldiana Bot. N.s. 27: 111—166.
- Mione, T. 1999. Jaltomata II: new combinations for five South American species (Solanaceae) Brittonia 51(1):31—33.
- Molau, U. 1988. Scrophulariaceae. Part I. Calceolarieae. Fl. Neotropica 47: 1-326.
- Molau, U. 1990. The genus Bartsia (Scrophulariaceae-Rhinanthoideae) Opera Bot. 102: 1—99.
- Morales, J.F. 2006. Estudios en las Apocynaceae Neotropicales XXVI: Una monografía del género Mesechites (Apocynoideae, Mesechiteae). Candollea 61(1): 215—277.
- Morton, C.V. 1973. Studies of fern types II. Contr. U.S. Natl. Herb. 38(6): 215—281.
- Muñoz Schick, M. 1995. Revisión del género Cristaria (Malvaceae) en Chile. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 45: 45—.
- Nordenstam, B. & J.F. Pruski 1995. Additions to Dorobaea and Talamancalia (Compositae-Senecioneae). Compositae Newslett. 27: 31—42.
- Ochoa, C. 1999. Las papas de Sudamerica: Perú (Parte 1).
- Øllgaard, B. 1994. Lycopodiaceae En R.M. Tryon & R.G. Stolze Pteridophyta of Peru.

- Ostolaza, C. 1998a. Nomenclatural adjustments in Peruvian Cactaceae. *Cactaceae Consensus Initiatives* 6: 8—9. England.
- Ostolaza, C. 1998b. The cacti of the Pisco, Ica and Nazca valleys, Peru. *British Cactus and Succulent Journal* 16(3): 127—136.
- Ostolaza, C. 2005. *Corynocactus melaleucus* Ritter emend. Ostolaza. Quepo 19: 70—75.
- Panero, J. & A. Granda. 2005. *Syncretocarpus*. *Phytologia* 87(2): 110—111.
- Panero, J. L. 1992. Systematics of *Pappobolus* (Asteraceae-Heliantheae). *Syst. Bot. Monogr.* 36: 1—195.
- Pennell, F.W. 1951. The united-leaved Calceolarias of the northern and middle Andes (Scrophulariaceae). *Notul. Nat. Acad. Nat. Sci. Philadelphia* 236: 1—2.
- Pennington, T. D. 1981. *Meliaceae*. *Fl. Neotrop.* 28: 1—470.
- Pennington, T. D. 1990. *Sapotaceae*. *Fl. Neotrop.* 52: 1—770.
- Pensiero, J. F.; F.O. Zuloaga & O. Morrone. 2003. *Pennisetum*. En F.O. Zuloaga et al. Catalogue of New World Grasses (Poaceae): III. Subfamilies Panicoideae, Aristidoideae, Arundinoideae, and Danthonioideae.
- Peterson, P. M., R. J. Soreng, G. Davidse, T. S. Filgueiras, F. O. Zuloaga & E. J. Judziewicz. 2001. Catalogue of New World Grasses (Poaceae): II. Subfamily Chloridoideae. *Contr. U.S. Natl. Herb.* 41: 1—255.
- Pettersen, U. 1967. El glaciar Yanainga. 19 años de observaciones instrumentales. *Bol. Soc. Geol. Peru* 40: 91—97.
- Philbrick, C. T. & A. Novelo B. 1995. New World Podostemaceae: ecological and evolutionary enigmas. *Brittonia* 47(2): 210—222.
- Pino Infante, G. E. 2004. Peperomias de Cajamarca. Cimagraf. Lima. 75pp.
- Pino, G. 1998. Cactus y suculentas del valle del río Utcubamba. Quepo 12: 36—41.
- Pino, G. 2002. The varieties of *Echeveria chilensis* (Crassulaceae), an endemic Peruvian species. *Haseltonia* 9: 51—61.
- Pipoly, J. J. 1998. The genus *Cybianthus* (Myrsinaceae) in Ecuador and Peru. *Sida* 18(1): 1—160.
- Plana, V. & G. T. Prance. 2004. A synopsis of the South American genus *Euplassa* (Proteaceae). *Kew Bull.* 59(1): 27—45.
- Planchuelo, A. M. & P. M. Peterson. 2000. The species of *Bromus* (Poaceae: Bromeae) in South America. *Grasses: Systematics and Evolution*. Pp. 89—101.
- Plowman, T. & N. Hensold. 2004. Name, types, and distribution of neotropical species of *Erythroxylum* (Erythroxylaceae). *Brittonia* 56(1): 1—53.
- Quijano-Abril, M. A., R. Callejas & D. R. Miranda. 2006. Areas of endemism and distribution patterns for Neotropical *Piper* species (Piperaceae). *J. Biogeogr.* 33: 1266—1278.
- Ranker, T.A., Smith, A.R., Parris, B.S., Geiger, J.M.O., Hau Xer, C.H., Straub, S.C.K., Schneider, H. 2004. Phylogeny and evolution of grammitid ferns (Grammitidaceae): a case of rampant morphological homoplasy. *Taxon* 53, 415—428.
- Ravenna, P. 1977. Neotropical species threatened and endangered by human activity in the Iridaceae, Amaryllidaceae and allied bulbous families. Pp. 257—266. En G.T. Prance. *Extinction is Foreve*
- Ravenna, P.F. 1988. Notes on Iridaceae. VII. *Phytologia* 64(4): 289.
- Ravenna, P.F. 1988a Six new species of *Anthericum* (Anthericaceae) from Bolivia and Peru. *Onira* 1(3): 24—30.
- Renner, S. S. & G. Hausner. 1997. 49B. *Monimiaceae*. *Fl. Ecuador* 59: 99—123.
- Renvoize, S.A. 1998. Gramíneas de Bolivia. Pp. 1—644. The Royal Botanic Gardens, Kew.
- Reynel, C. & T. D. Pennington. 1997. El género *Inga* en el Perú. 228 pp. Royal Bot. Gard. , Kew.
- Ricardi, M. 1967. Revisión taxonómica de las Malesherbiaceas. *Gayana*, Bot. 16: 1—139.
- Robinson, H. 1978. Studies in the Heliantheae (Asteraceae). XII. Re-establishment of the genus *Smallanthus*. *Phytologia* 39(1): 47—53.
- Robinson, H. 1993. A review of the genus *Critoniopsis* in Central and South America (Vernonieae:Asteraceae) *Proc. Biol. Soc. Wash.* 106(3): 606—627.
- Robinson, H. 2005. New species and new combinations in the tribe Vernonieae (Asteraceae) *Phytologia* 87(2): 80—96.
- Rodríguez, L. & K. R. Young. 2000. Biological Diversity of Peru: Determining Priority Areas for Conservation. *Ambio* 29(6): 329—337.
- Rohwer, J. G. 1993. Lauraceae:Nectandra. *Fl. Neotropica Monogr.* 60: 1—332.
- Romero, G. A. & R. Jenny. 1993. Contributions toward a monograph of *Catasetum* (Catasetinae, Orchidaceae) I: A checklist of species, varieties, and natural hybrids. *Harvard Pap. Bot.* 4: 59—84.
- Sagástegui, A. 1996. El «gashmin» (=Eugenia quebradensis): un nuevo recurso alimenticio. *Arnaldoa* 4(1): 47—56.
- Sagástegui, A. 1998. Seis nuevas especies de *Verbesina* (Asteraceae, Heliantheae) de los Andes del Perú. *Arnaldoa* 5(1): 35—50.
- Sagástegui, A. & S. Leiva. 1993. Malezas
- Sagástegui, A., I. Sánchez, M. Zapata & M. O. Dillon. 2003. [2004]. *Diversidad Florística del Norte del Perú. Tomo II. Bosques Montanos.*
- Sahley, C. T. 1996. Bat and hummingbird pollination of an autotetraploid columnar cactus, *Weberbauerocereus weberbaueri* (Cactaceae). *Amer. J. Bot.* 83: 1329—1336.
- Salinas, N. et al. 2003. Problemática de la Familia Orchidaceae en el Valle Sagrado de los Incas. *Lyonia* 4(1): 19—24.
- Sánchez V., I., G. Iberico, M. Zapata, L. Kawasaki & M. O. Dillon. 2002. Nuevos registros para la flora de San Martín. *Arnaldoa* 8(2): 45—52.
- Sawyer, N. W. 2001. New species and combinations in *Larnax* (Solanaceae) *Novon* 11(4): 460—471.
- Schlechter, R. 1921. Orchideenfloren der südamerikanischen Kordillerenstaaten. IV. Peru. *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 8: 1—182.
- Schneider, H., E. Schuettpetz, K. M. Pryer, R. Cranfill, S. Magallón, R. Lupia. 2004. Ferns diversified in the shadow of angiosperms. *Nature* 428, 553—557.
- Schneider, J. V. 2004. Sinopsis del género *Quiina* Aubl. (Quiinaceae) para el Perú. *Arnaldoa* 11(1): 45—73.
- Schubert, B. G. 1943. *Desmodium*. Pp. 413—439. En. J.F. Macbride. *Flora of Peru. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 13(3/1).
- Schulman, L. 2003. A geo-ecologically specialised new species of *Adelobotrys* (Melastomataceae: Merianieae) from Peruvian Amazonia. *Kew Bull.* 58: 459—466.
- Schweinfurth, C. 1959. *Orchidaceae Peruviana* VIII. *Bot. Mus. Leafl.* 15(3): 79—109.
- Schweinfurth, C. 1960. *Orchidaceae, Orchids of Peru. Fieldiana Bot.* 30(3): 533—786.
- Seibert, R. J. 1967. «*Cojomaria*»—Paramongaia weberbaueri Velarde, from Peru. *Pl. Life* 23: 42—45.
- Smith, A. R. 1992. *Thelypteris*. En Tryon, R.M. & R.G. Stolze. *Pteridophyta of Peru. Part III. Fieldiana Bot. n.s.*, 29: 1—80.
- Smith, A. R.; B. León, H. Tuomisto, H. van der Werff, R.C. Moran, M. Lehnert & M. Kessler. 2005. New records of pteridophytes for the flora of Peru. *Sida* 21(4): 2321—2342.
- Smith, A. R.; M. Kessler & J. Gonzales. 1999. New records of Pteridophytes from Bolivia. *Amer. Fern J.* 89(4): 244—266.
- Smith, C. P. 1948. Peru Eight-Seventeen. Species *Lupinorum* 34: 604—636.
- Smith, C. P. 1953. Peru Twenty. Species *Lupinorum* 44: 753—768.
- Smith, S. D. & S. Leiva. 2006. Recuento cromosómico y estado actual de *Dunalia spathulata* (Ruiz & Pav.) Braun & Bouché (Solanaceae: Solaneae) endémica de Perú. *Arnaldoa* 12(1—2): 68—71. [2005]
- Soreng, R. J. 2003. *Disanthelium*. Catalogue of New World Grasses (Poaceae): IV. Subfamily Pooideae.

- Soreng, R. J.; P. M. Peterson, G. Davidse, E. J. Judziewicz, F. O. Zuloaga, T. S. Filgueiras & O. Morrone. 2003. Catalogue of New World Grasses (Poaceae): IV. Subfamily Pooideae. *Contr. U.S. Natl. Herb.* 48: 1—730.
- Spencer, M. A. & L. B. Smith. 1993. Racinaea, a new genus of Bromeliaceae (Tillandsioideae). *Phytologia* 74: 151—160.
- Spooner, D. M., G. J. Anderson & R. K. Jansen. 1993. Chloroplast DNA evidence for the interrelationships of tomatoes, potatoes and pepinos (Solanaceae). *Amer. J. Bot.* 80(6): 676—686. 1993.
- Spooner, D. M., K. J. Systma & J. F. Smith. 1991. A molecular reexamination of diploid hybrid speciation of *Solanum raphanifolium*. *Evolution* 45(3): 757—764.
- Ståhl, B. 1993. The genus *Symplocos* (Symplocaceae) in Peru. *Candollea* 48(2): 351—382.
- Ståhl, B. 1995. New or noteworthy Andean species of the genus *Symplocos* (Symplocaceae). *Candollea* 50: 445—452.
- Stuessy, T. & A. Sagástegui A. 1993. Revisión de Arnaldoa (Compositae, Barnadesioideae), género endémico del norte del Perú. *Arnaldoa* 1(4): 9—21.
- Tago-Nakazawa, M. & M. O. Dillon. 1999. Biogeografía y evolución del clado Nolana (Nolaneae-Solanaceae) Arnaldoa 6(2): 81—116.
- Tamura, M. 1995. Ranunculaceae, Systematic Part. Die natürlichen Pflanzenfamilien 17(aIV):223—519.
- Tate, J. A. 2003. Andeimalva, a new genus of Malvaceae from Andean South America. *Lundellia* 6: 10—18.
- Taylor, D. C. & H. Robinson. 1999. A rejection of *Pepinia* (Bromeliaceae: Pitcairnioideae) and taxonomic revisions. *Harvard Pap. Bot.* 4(1): 203—217.
- Thiede, J. & H. 't Hart. 1999. Transfer of four Peruvian Altamiranoa species to *Sedum* (Crassulaceae). *Novon* 9(1): 124—125.
- Tortosa, R. D. 2005 Johnstonia, a new genus of Gouanieae (Rhamnaceae) from Peru. *Novon* 15(4): 642—645.
- Tovar Serpa, O. 1990. Tipos de Vegetación, Diversidad Florística y Estado de Conservación de la Cuenca del Mantaro. Centro de Datos para la Conservación.
- Tovar, O. 1993. Las Gramíneas (Poaceae) del Perú. *Ruizia* 13: 1—480.
- Trelease, W. 1936. Piperaceae. En J.F. Macbride, Flora of Peru.
- Trujillo Chávez, D. 2004. Notas sobre el genero *Masdevallia* (Orchidaceae) en San Pedro de Carpish, Huanuco, Peru. *Arnaldoa* 11(1): 75—84.
- Tryon, R. M. & R. G. Stolze. 1993. Pteridophyta of Peru. Part V. 18. Aspleniaceae-21. Polypodiaceae. *Fieldiana Bot.*, N.S. 32: 1—190.
- Tryon, R. M. & R. G. Stolze. 1989. Pteridophyta of Peru. Part I. Ophioglossaceae-12 Cyatheaceae. *Fieldiana Bot.*, N.S. 20: 1—145.
- Ulloa Ulloa, C.; J. Zarucchi & B. León. 2004. Diez años de adiciones a la flora del Perú: 1993—2003. *Arnaldoa*, Ed. Especial 7—242.
- Urtubey, E. 1999. Revisión del género *Barnadesia* (Asteraceae: Barnadesioideae, Barnadesieae) Annals Missouri Bot. Gard. 86(1): 57—117.
- Vargas, C. 1960. De novis Speciebus Flora Peruviana. *Bol. Fac. Ci. Univ. Cuzco* 1: 8.
- Vargas, C. 1984. The Peruvian species of the genus *Amaryllis*. *Herbertia* 40: 112—134.
- Vásquez, R. & P. L. Ibisch. 2004. Orquídeas de Bolivia. Diversidad y estado de conservación. Vol. II.
- Vásquez, R. 1997. Flórula de las Reservas Biológicas de Iquitos. *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 63:259.
- Vásquez, R., R. Rojas & E. Rodríguez. 2003. Adiciones a la flora peruana: especies nuevas, nuevos registros y estados taxonomicos de las angiospermas para el Peru. *Arnaldoa* 9(2): 43—110. [2002]
- Velarde, O. 1969. Catálogo de isótipes de la colección de plantas peruanas de A. Weberbauer que se conserva en el herbario de la Universidad Agraria del Perú. *Raimondiana* 2: 115—147.
- Villagrán, C., J. J. Armesto & M. T. Kalin Arroyo. 1981. Vegetation in a high Andean transect between Turi and Cerro León in northern Chile. *Vegetatio* 48: 3—16.
- Vision, T. J. & M. O. Dillon. 1996. Sinopsis de *Senecio* L. (Senecioneae, Asteraceae) para el Perú. *Arnaldoa* 4: 23—46.
- Wasshausen, D. 1997. A checklist of the Acanthaceae collected by John J. Wurdack in Amazonian Peru. *BioLlania* Ed. Especial 6: 541—550.
- Wasshausen, D. C. 1996. New species and new combinations in *Aphelandra* (Acanthaceae) from Ecuador and adjacent Peru. *Nordic J. Bot.* 16(4):389—407.
- Wasshausen, D. C. & J. R. I. Wood. 2001. Further discoveries in the genus *Stenostephanus* (Acanthaceae) in Bolivia. *Harvard Pap. Bot.* 6(2): 449—454.
- Wasshausen, D. C. & J. R. I. Wood. 2004. Acanthaceae of Bolivia. *Contr. U.S. Natl. Herb.* 49: 1—152.
- Weerbauer, A. 1945. El Mundo Vegetal de los Andes Peruanos p. 552.
- Weberling, F. 2003. Notes on South American Valerianaceae I. *Feddes Repert.* 114(7—8): 437—453.
- Webster, G. 2003. A synopsis of *Phyllanthus* section *Nothoclema* (Euphorbiaceae). *Lundellia* 6: 19—36.
- Weigend, M. 1998. Nasa y Presliophytum: los nombres y sus tipos en los nuevos géneros segregados de Loasa Juss. Senso Urabn & Gilg en el Perú. *Arnaldoa* 5(2): 159—170.
- Weigend, M. 2002. Las especies arbustivas de Nasa ser. *Grandiflorae* en el norte del Perú, con la descripción de una especie nueva de la Abra de Barro Negro (Callacalla), Dpto. Amazonas. *Arnaldoa* 9: 7—20.
- Weigend, M. & M. Ackermann. 2003. Los nombres antiguos en el género *Caiophora* (Loasaceas subfam. Loasoideas) y una clasificación infragenérica preliminar. *Arnaldoa* 10(1):75—94.
- Weigend, M. & M. Binder. 2001. *Ribes viscosum* Ruis & Pav. (Grossulariaceae), una especie ecológicamente importante de los Andes del Perú, y su sinonimia. *Arnaldoa* 8: 39—44.
- Weigend, M., A. Cano & E. Rodríguez. 2005. New species and new records of the flora in Amotape-Huancabamba Zone: Endemics and biogeographic limits. *Rev. Peru. Biol.* 12(2): 249—274.
- Wurdack, J. J. 1954. Certamen Melastomataceis I. *Phytologia* 5(1): 53—60.
- Wurdack, J. J. 1964. Certamen Melastomataceis VIII. *Phytologia* 9(7): 409—426.
- Wurdack, J. J. 1965. Certamen Melastomataceis IX. *Phytologia* 11(6):
- Wurdack, J. J. 1978. Certamen Melastomataceis XXVIII. *Phytologia* 39(5): 320—330.
- Wurdack, J. J. 1988. Certamen Melastomataceis XXXVIII. *Phytologia* 64(4): 293—301.
- Wurdack, J. J. 1988. New Melastomataceae from Peru and Bolivia. *Brittonia* 40(1): 7—15.
- Young, K. R. & B. León. 1990. Catálogo de las Plantas de la Zona Alta del Parque Nacional Rio Abiseo, Peru. *Publ. Mus. Hist. Nat. UNMSM (B)* 34: 1—37.
- Zuloaga, F. O., O. Morrone, G. Davidse, T. S. Filgueiras, P. M. Peterson, R. J. Soreng & E. Judziewicz. 2003. Catalogue of New World Grasses (Poaceae): III. Subfamilies Panicoideae, Aristidoideae, Arundinoideae, and Danthonioideae. *Contr. U.S. Natl. Herb.* 46: 1—662.