

3. Rostraria salzmannii (Boiss. & Reut.) Holub
= *Lophochloa salzmannii* (Boiss. & Reut.) H. Scholz

Th.fasc. Hasta 17 cm. Hojas diversamente pubescentes, con vainas ciliadas en el margen, cerca de la lígula; lámina 0,2–1,5 cm x c. 0,5 mm, plana o convoluta; lígula corta, truncada y dentada. Panícula 2,5–6,5 cm, cilíndrica, contraída, estrecha. Espiguillas 4,5–5 mm, comprimidas lateralmente, con 3–4 flores; raquilla con pelos de c. 0,3 mm; glumas 2,5–3 mm, subiguales, membranáceas, agudas, aquilladas, trinervadas, la inferior con los nervios laterales muy cortos; lema 2–2,8 mm, con 5 nervios, liso, a veces ciliado, bidentado en el ápice, con arista de 0,5–1,5 mm, recta. Anteras 0,8–1,5 mm. III–VI.

Pastizales terofíticos, sobre sustratos arenosos, 0–50 m (t). Íbero–magrebí. Almería, Axarquía. rr. VU [B2ab(i, ii, iii, iv, v)].

Observaciones: No se ha podido confirmar la presencia de esta especie con muestras recientes. De la cita de la Axarquía existe un testigo en el herbario de Willkomm (COI) bajo *Trisetum neglectum* var. *ciliatum* [cf. Romero Zarco, Anales Jard. Bot. Madrid 41(2):462–463]. Las citas de *R. phleoides* (Desf.) Holub [= *Koeleria pubescens* (Lam.) P. Beauv.] en Cabo de Gata (Almería), podrían corresponder a formas muy pubescentes de *R. salzmannii*.

45. AVELLINIA Parl.
(por A. T. Romero)



A. festucoides
(espiguilla)

1. Avellinia festucoides (Link) Valdés & H. Scholz
= *Avellinia michelii* (Savi) Parl.
= *Rostraria festucoides* (Link) Romero Zarco

Th.caesp. 4–28 cm. Lámina de las hojas 0,5–5,5 cm, plana; lígula < 1 mm, truncada. Panícula 1–10 cm, estrecha y ± laxa, finalmente contraída. Espiguillas 3–5,5 mm (excluida la arista), comprimidas lateralmente, con 3–4 flores; glumas muy desiguales, la inferior c. 2 mm, linear, uninervada, la superior 4–5,5 mm, lanceolada, 3–nervada; lema 2–4 mm, lanceolado, bifido, con arista de 1–3 mm, subapical; pálea 1,5–1,7 mm. Anteras c. 0,5 mm. 2n = 14. III–V.

Pastizales terofíticos, sobre sustratos pobres en bases, 600–800 m (m) Mediterránea. Granada, Trevenque–Almijara, Nevada–Filabres, Alpujarras, Ronda, Axarquía. oc. LC.

46. DESCHAMPSIA P. Beauv.
(por C. Romero Zarco & A. T. Romero)



D. caespitosa
(espiguilla)

1. Deschampsia caespitosa (L.) Trin. subsp. **subtriflora** (Lag.)
Ehr. Bayer & G. López
= *Aira refracta* Lag.

H.caesp. Hasta 70 cm. Cespitosa, con brotes intravaginales. Hojas con vaina glabra; lámina hasta 7 cm y más de 1 mm de diámetro, convoluta, con 7 costillas ± escábridas en el haz y de envés liso; lígula 4–7 mm, aguda. Panícula 6–20 cm, piramidal, laxa, multiflora, con las espiguillas situadas en 1/2–1/3 superior de las ramas. Espiguillas 4–4,5 mm, con 2 flores hermafroditas que se separan en la madurez; raquilla pelosa; glumas ligeramente desiguales, la inferior 2,5–3,5 mm, uninervada, la superior 3,2–4,5 mm, trinervada; callo obtuso, con pelos de c. 1 mm; lema 3,5–5,5 mm, lanceolado, con 4 nervios, de ápice truncado, con 4 dientes, los laterales iguales o algo más largos que los centrales, glabro salvo en el callo, con arista de c. 2 mm, subbasal, recta. Anteras 1,5–1,9 mm. 2n = 26. VI–VII.

Pastos vivaces sobre sustrato calcáreo, 1200–2000 m (m–o). Mediterránea occidental. Cazorla, Vélez–Baza. oc. NT.



Avellinia festucoides



Deschampsia caespitosa