

NEOSTIGMINA (PROSTIGMINA)

PRESENTACIONES HABITUALES

Amp 0,5 mg/1mL

INDICACIÓN TOXICOLÓGICA

Curarizantes, bloqueantes neuromusculares no despolarizantes.

POSOLOGÍA ADULTOS

1-2 mg IV lenta (1mg/min.)

Si no respuesta repetir hasta un máximo de 5 mg

POSOLOGÍA NIÑOS

0,025-0,08 mg/kg IV lenta.

Si no respuesta repetir hasta un máximo de 2,5 mg.

OBSERVACIONES

Puede utilizarse también en los síndromes anticolinérgicos, pero al no atravesar la barrera hematoencefálica no revierte ni el delirio ni las alucinaciones.

TRATAMIENTO PACIENTE DÍA (TPD)

5 mg = 10 ampollas

DISPONIBILIDAD HOSPITALES

- **Nivel A:** -
- **Nivel B:** 30 ampollas

BIBLIOGRAFÍA

1. Clerigué N, Herranz N. Antídotos y otros tratamientos en intoxicaciones pediátricas. En: Mintegi S. Grupo de Trabajo de Intoxicaciones de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría. Madrid: Manual de Intoxicaciones de Pediatría. 3ª ed; 2012. Pp405-54.
2. Kearney TE, Physostigmine and neostigmine In: Olson KR. Poisoning and drug overdose. 5th ed. New York: McGraw-Hill.2007:953-5.

