

*Paralopus* E. Wagner, 1957

*striatus* E. Wgn., 1957: Trip: 60 km östl. Nalut 30. 4. 65 1 ♀ — Bisher aus Iran und Arabien. Saharo-sindisch.

*Eurycolpus* Reuter, 1879

*dimorphus* E. Wgn., 1961: Trip: Kseia 3. 5. 61 15 ♂♂, 8 ♀♀, Gusbat 3. 5. 61 4 ♂♂, 4 ♀♀, Jebel Nefoussa Bir Nagi 28. 4. 65 10 ♂♂, Lichtanflug, 20 km südl. Azizia 29. 4. 65 1 ♀, Artemisia herbaalba-Steppe — Vorderasien, Ägypten, Arabien.

*Stenoparia* Fieber, 1870

*putoni* Fieb., 1870: an annuellen violettblühenden Matthiola-Arten regelmäßig. Trip: Leptis Magna 2. 5. 61 10 ♂♂, 13 ♀♀, Kseia 3. 5. 61 12 ♂♂, 15 ♀♀, Gusbat 3. 5. 61 4 ♂♂, 2 ♀♀, Jebel Nefoussa Tarhuna 28. 4. 65 2 ♀♀, 20 km östl. Tagiura 14. 4. 65 1 ♀, Jebel Nefoussa Garian 29. 4. 65 3 ♂♂, 2 ♀♀ an *M. humilis* D. C. Lit: Linnavuori (1965) zitiert die Funde Eckerleins von Gusbat und Kseia. — Mediterran.

*Conostethus* Fieber, 1858

*roseus* (Fall.), 1829: Trip: Jebel Nefoussa 1. 5. 61 1 ♂, 4 ♀♀, Gusbat 3. 5. 61 1 ♂, Kseia 2.—3. 5. 61 3 ♂♂, 14 ♀♀; Cyr: 10 km El Merj 22. 4. 65 1 ♀; Trip: Jebel Nefoussa Garian 29. 4. 65 2 ♂♂, 1 ♀, 60 km östl. Nalut 30. 4. 65 1 ♂ — Europa, Mittelmeergebiet, Sibirien.

*venustus* (Fieb.), 1858: häufig in Tripolitanien an dürrftigen Grasbeständen. Trip: Kseia 2.—3. 5. 61, Jebel Nefoussa Tarhuna 28. 4. 65, Jebel Nefoussa Garian 29. 4. 65, Jebel Nefoussa 10 km westl. Rumia, 20 km südl. Azizia 29. 4. 65, Jebel Nefoussa Jefren 1. 5. 65; Cyr: 10 km El Merj 22. 4. 65, Baiada 25. 4. 65 25. 4. 65. Lit: Cyr: Benghazi 10. 4. 35, Benina 11. 4. 35 (Mancini 1942a) — Mittelmeergebiet bis Kaukasien.

*Hadrophyes* Puton, 1874

*sulphurella* Put., 1874: Trip: Zuara 29. 4. 61 2 ♂♂, 1 ♀ an *Arthrocnemum glaucum* Ugn. — Westliches Mittelmeergebiet, Kanaren, Krim.

*Pronototropis* Reuter, 1879

*longicornis* Reut., 1900: Trip: 10 km südl. Tripoli 30. 4. 61 4 ♂♂, 3 ♀♀, Kseia 3. 5. 61 3 ♂♂, Tarhuna 3. 5. 63 1 ♀, 20 km östl. Tagiura 14. 4. 65 42 ♂♂, 61 ♀♀ an *Picris coronopifolia* D. C., Jebel Nefoussa Bir Niggi 28. 4. 65 2 ♂♂ (Lichtanflug), Jebel Nefoussa Garian 29. 4. 65 1 ♀. — Algerien, Palästina, Syrien.

*Roudairea* Reuter, 1886

*eckerleini* E. Wgn., 1965: Trip: Zuara 29. 4. 61 2 ♂♂, 3 ♀♀, 10 km südl. Tripoli 30. 4. 61 1 ♂, 3 ♀♀, Kseia 2. 5. 61 1 ♀, 20 km östl. Tagiura 14. 4. 65 6 ♂♂, 2 ♀♀, Jebel Nefoussa Bir Niggi 28. 4. 65 2 ♂♂ (Lichtanflug), 20 km westl. Gasr-el-Garabulli 3. 5. 65 72 ♂♂, 68 ♀♀ an *Launea resedifolia* O. K. Lit: Trip: Jebel Nefoussa 1. 5. 61 (Linnavuori 1965), unter dem Namen *R. crassicornis*