

**МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ**
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
**УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН**
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційне видання
Official publication

Бюлетень
Bulletin

11
2023



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
Ідентифікатор медіа
R30-01983

Видається
12 разів на рік

Заснований
24 січня 2003 р.

Випуск 11, 2023

Головний редактор
Віштак І. А.

Editor-in-chief
I. Vishtak

Редакційна колегія
Мельник С. І.
(заступник головного редактора)
Павлюк Н. В.
(відповідальний секретар)

Editorial board
S. Melnyk
(deputyies editor-in-chief)
N. Pavlyuk
(executive secretary)



Український інститут
експертизи сортів рослин
UKRAINIAN INSTITUTE FOR
PLANT VARIETY EXAMINATION

Каражбей Г. М.
Тиха Н. В.
Голіченко Н. Б.
Гринів С. М.
Сиплива Н. О.
Стариченко Є. М.
Хоменко Т. М.

H. Karazhbei
N. Tykha
N. Holichenko
S. Gryniv
N. Syplyva
Y. Starychenko
T. Khomenko

11 2023

м. Вінниця
ТОВ «ТВОРИ»
2023

УДК 347.77:633(055)

0-92

0-92 Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2023. Вип. 11. 312 с.

Бюлетень видається на виконання Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» з метою організації офіційної інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Розповсюджується для селекціонерів, власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів, володільців патенту, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-дослідних інститутів, ЗВО, технікумів. Становить також інтерес для господарств різної форми власності, городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)

Адреса видавця:

Український інститут експертизи сортів рослин,
вул. Горіхуватський шлях, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,
тел.: +38 044 290-40-45,
e-mail: sops@sops.gov.ua, sops@i.ua
веб-сайт: <http://sops.gov.ua>

ЗМІСТ

Офіційні відомості	6
Нормативно-правові документи	6
Відомості, внесені до Реєстру заявок	7
Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд	7
Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними	11
Інші відомості, внесені до Реєстру заявок	12
Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин	13
Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин	14
Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	17
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	17
Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати	22
Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин	26
Інші відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	27
Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	28
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	28
Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати	35
Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорти рослин та їх дублікати	40
Відомості щодо припинення чинності майнового права на поширення сорту	42
Відомості щодо відновлення чинності майнового права на поширення сорту	45
Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	46
Відомості про відмову у державній реєстрації сорту та/або у державній реєстрації прав на сорт	47
Відомості про відмову у державній реєстрації сорту	47
Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні	48
Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	48
Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності	56
Сільськогосподарські: злаки	56
<i>Кукурудза звичайна –</i>	56
<i>Кукурудза звичайна</i>	57
Арабелла	57
Валета	59
КВС АДНАНО	61
КВС АКАДО	63
КВС АМАТРІО	65
КВС БОЛІВІАНО	67
КВС ВОЛЬТАРІО	69
КВС ГАЛІЛЕО	71
КВС ГІПОЛІТО	73
КВС ЕСТРЕЛЛО	75
КВС КОРНЕЛІО	77
КВС МАУРІЛІО	79
КВС ОЛТЕНІО	81
КВС ФОРТУРІО	82
КС85ХП	83
КС94ХП	85
КС99ХП	87
Лізавета	89
НАТАЕЛО	91
Роланда	93
СТАЙН 9808ХП	95
<i>Кукурудза звичайна –</i>	97
<i>батьківський компонент</i>	97
1ПВНВ47	97
1ПТФТ47	98
3МГ1А01	99
3МГ2401	100
3МГ4403	101
3МГ4А03	102
3МГ5505	103
БГ03001	104
БГ1679	105
ГФ15	106
К17	107
К91	108
К93	109
К95	110
КВ 4ЕЦ2070	111
КВ 4ЕЦ2075	112
КВ 4ЕЦ2076	113
КВ 6ЕЙ0079	114
КВ 6ФД0043	115
КВ 6ФЮ1809	116
КВ 6ФЮ1906	117
КВ 7ЕР1723	118
КВ 7ФП1991	119
КВ 9ЕЙ0115	120
КВ 9ФД0047	121
КВ 9ФЮ1713	122
КС55	123
ПХ4ДЗС	124
ПХ4ДЗЦ	125
СГ124	126
Пшениця м'яка (озима)	127
Декастер	127
Ячмінь звичайний (озимий)	128
Єкатеріна	128
Юлія	129
Сільськогосподарські: бобові	130
Сочевиця харчова	131
РЕД	131
Соя культурна	132
Абіола	132
Аполліна	133
АТРАКТОР	134
ЕС Компетітор	135
Златопільська	136

Камея	137	СИ КОРСІКА АР	200	Персія Носівська	259
Кінгстон	138	СИ ЛАЗУРІ КЛП	202		
Кобуко	139	СТК101	204	Сільськогосподарські:	
КОМБІНАТОР	140	СТК102	206	овочеві	260
ОАЦ Камран	141	СТК103	208	<i>Гарбуз мускатний</i>	261
ОАЦ Хастингс	142	СТК104	210	Бертон	261
РЖТ СІГМА	143	СУЛІАНО	212	Спеллкаст	262
Санрайз	144	Сульфостар	214		
СТАЙН 02Н23	145	Супернова СУ	216	Капуста білоголова	263
СТАЙН 06Н02	146	СУРЕСТ	218	Слобожаночка	263
СТАЙН 12Н23	147				
СТАЙН 20Н23	148	Соняшник однорічний – батьківський компонент		Огірок посівний	264
			220	ГРАТЕН	264
Сільськогосподарські: круп'яні		БР004А	220	ГРИФОН	265
<i>Сорго звичайне (двокольорове)</i>	149	ЕХ500СУЛхМХ501	221		
КВС АТЛАНТУС	150	ЕХ933	222	Помідор	266
ТИГРУС	150	ЛС 3008 С	223	Арабат	266
	150	ЛЦ658АІР	224	Базилевс	268
	151	ПМ 678	225	Зухраза	270
		ПП 01	226	Презент херсонський	272
Сільськогосподарські: олійні та прядивні		РГА ІР ЗРФ	227	Сонцедар	274
<i>Гірчиця біла</i>	152	Рф1122	228	Спалах	276
Вероніка	153	Рф3144	229	ХАКІМАРУ	278
	153	РХ591	230		
Льон звичайний, довгунець	154	РХА 5Рф ІР	231	Салат посівний листковий	280
Жайворонки	154	ФА306ЛН00	232	Ліадін	280
		ФА754ХС05	233		
Ріпак (ярий)	155	ФР402ЛЦ00	234	Шпинат городній	282
Коктейль КЛ	155	ФР406ЛС00	235	Траверс	282
Ріплей	155	ФР407ЛН00	236	Траялбосс	283
	156	ФР84241	237		
		ФР84289	238	Плодові та ягідні	284
Соняшник однорічний	157	ФР842ЛН22	239	Актинідія пурпурова	
1025Л	157	ФС71549	240	х актинідія гостра	285
1044Л СУ	159	ХО2020А-КЛ	241	Славна	285
ЕС ТАНАІС КЛП	161				
ЕСХ20023	163	Сільськогосподарські: буряк	242	Калина звичайна	287
ЕС Авалон	165	Буряк цукровий	243	Ярославна	287
ЕС Пегас	167	БАЛАНСІЯ КВС	243		
ЕС Старк	169	Микеланджело	244	Персик звичайний	288
ЕС Тор	171	САЛЬВАТОРІКА КВС	245	П.Ф. 24–007	288
ІНСАН 110	173	СМАРТ ЛІЄННА КВС	246		
ІНСАН 222 КЛП	175	СМАРТ МАТЕРІЯ КВС	247	Суниця садова	290
ІНСАНХО 200 КЛП	177	СМАРТ МОДЕНТА КВС	248	АРІАННА	290
Ірінасол	179	Хаббл	249	САНДРІНА	291
ЛГ50321 КЛП	180	ЯНАСОФІЯ КВС	250	ФЕДЕРІКА	292
ЛГ50486	181				
ЛГ50554 КЛП	182	Сільськогосподарські:		Черешня	293
ЛГ50564 КЛП	183	картопля	251	Аніта	293
ЛГ50616	184	Картопля	252	Тайна	294
ЛГ50621	185	Марфуша	252		
ЛГ50639 СХ	186	Меланія	253	Яблуна домашня	295
ЛГ50648	187	Роставиця	254	АНАБП 01	295
ЛГ50689 СХ	188	Світана	255		
Ліон	189	Сонцедар	256	Виноград	296
Маріголдес	191	Фанатка	257	Виноград справжній	297
Маттіа	193			АРРАСЬОРТІ	297
Н4Л460 КЛ	195	Сільськогосподарські:		АРРАТВЕНТІНАЙН	298
Н4Х413 КЛ	197	кормові	258	АРРАФІФТІН	299
Пронтосол	199	Люцерна посівна	259		

Декоративні та лікарські	300	Лаванда вузьколиста	302	Троянда	303
Калістефус китайський	301	Айрін	302	Доросілпі	303
Яскрава	301				
Інші відомості					304
Інші відомості Міністерства аграрної політики та продовольства України					304
Інші відомості Українського інституту експертизи сортів рослин					305
Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту					306
Загальновживані скорочення термінів					310

Офіційні відомості

Official notifications

Нормативно-правові документи

Regulatory documents

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1981 від 16.11.2023 «Про затвердження Порядку проведення дореєстраційного сортовивчення» затверджено Порядок проведен-

ня дореєстраційного сортовивчення (<https://minagro.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-doreyestracijnogo-sortovivchennya>).

Відомості, внесені до Реєстру заявок Notification listed in the Register of applications

Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд

Applications for varieties of plants, for which the date of submission of the application for the variety can be set, and the fee for its submission and consideration has been paid

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
23009033	18.08.2023	1098B443 01 1098B443 01	1688	ПС PBR	Adriana Cristina Dobre
23009044	18.08.2023	1097B703 01 1097B703 01	1688	ПС PBR	Goran Drinic
23009046	18.08.2023	1083B183 01 1083B183 01	1688	ПС PBR	Benoit Revol
23009048	18.08.2023	1001B858 01 1001B858 01	1688	ПС PBR	Goran Drinic
23009056	18.08.2023	1085B666 01 1085B666 01	1688	ПС PBR	Benoit Revol
23009058	19.10.2023	Магнато Magnato	2011	РС, АС NLI, АС	Robert Taucher
23009059	19.10.2023	СЛ Енормо SL Enormo	2011	РС, АС NLI, АС	Robert Taucher
23009060	19.10.2023	Лігато Ligato	2011	РС, АС NLI, АС	Robert Taucher
23009061	06.11.2023	АКАНТО AKANTO	2715	РС NLI	Mykola Vlasyuk Goran Drinic
23009062	06.11.2023	АКАНТО AKANTO	1688	ПС PBR	
23009063	06.11.2023	КАБАРЕТТО KABARETTO	2715	РС NLI	Milorad Rosulj
23009069	20.11.2023	РЖТ АЛІККС ДУО RGT ALYXX DUO	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, АС	Stephane Melkior
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
23012027	26.07.2023	Розумниця Одеська Rozumnytsia Odeska	1771	ПС, РС, АС PBR, NLI, АС	Каштанов Олександр Сергійович
23012028	26.07.2023	Графиня Одеська Hrafynia Odeska	1771	ПС, РС, АС PBR, NLI, АС	Каштанов Олександр Сергійович
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)					
23020004	11.10.2023	Ювілейний Yuvileinyi	1669	ПС, РС, АС PBR, NLI, АС	Дорошук Василь Олексійович Маренюк Олександр Борисович Смолій Світлана Іванівна Корнійчук Олександр Васильович Нежбірська Людмила Іванівна
23020005	20.11.2023	СБ Скорє CB Score	1797	ПС, РС, АС PBR, NLI, АС	Paï Rosager Pedas
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
23039028	18.08.2023	Р64ЛЕ280 P64LE280	1688	ПС PBR	Anke Gehinger
23039031	18.08.2023	Р64ЛП271 P64LP271	1688	ПС PBR	Adriana Cristina Dobre
23039033	18.08.2023	Р64ЛЛ187 P64LL187	1688	ПС PBR	Adriana Cristina Dobre
23039034	18.08.2023	Р64ЛП273 P64LP273	1688	ПС PBR	Manuel Yruela
23039037	19.10.2023	Арунасан ІР Arunasan IR	2011	РС, АС NLI, АС	Elena Andreea Teodorescu
23039039	23.10.2023	МАС 850Б MAS 850B	2720	РС, АС NLI, АС	PETIARD Benoit
23039040	23.10.2023	НОРМАН КР NORMAN CR	2720	РС, АС NLI, АС	Petiard Benoit
23039041	07.11.2023	Н4Л102 КЛ N4L102 CL	1985	ПС, РС, АС PBR, NLI, АС	Jim Gerdes

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)					
23040049	23.11.2023	ЦЕОС CEOS	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Damien Dugue
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean					
23045015	27.10.2023	ОАЦ Бруно OAC Bruno	2557	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Istvan Rajkan
23045016	27.10.2023	ОАЦ Абердін OAC Aberdeen	2557	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Istvan Rajkan
23045017	27.10.2023	ОАЦ Київ OAC Kyiv	2557	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Istvan Rajkan
23045018	13.11.2023	ПРОЦЕРА 1020 PROCERA 1020	2788	РС NLI	SOYTEK S.R.L.
23045020	20.11.2023	САНКАРА SANKARA	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Amandine Gras
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet					
23069007	17.11.2023	Заппа Zappa	2552	РС, АС NLI, AC	Herve Caroff
23069008	17.11.2023	Ріголетто Rigoletto	2552	РС, АС NLI, AC	Herve Caroff
Аніс звичайний <i>Anisum vulgare</i> Gaertn. Anise					
23092001	27.10.2023	Маяк 50 Maiak 50	1708	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Чабан Леся Василівна Тризуб Зоя Анатоліївна Кондратенко Сергій Іванович Позняк Олександр Васильович
Морква <i>Daucus carota</i> L. Carrot					
23109002	23.11.2023	КУРОДА ПАУЕР KURODA POWER	1833	РС NLI	
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato					
23115026	15.11.2023	Хайнц5108 Heinz5108	3233	РС NLI	
Холодок лікарський (спаржа) <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparagus					
23124001	21.08.2023	Гуелф Еквінокс Guelph Equinox	2434	РС NLI	David Wolyn
23124002	21.08.2023	Гуелф Екліпс Guelph Eclipse	2839	РС NLI	David Wolyn
23124003	21.08.2023	Гуелф Мілленіум Guelph Millennium	2839	РС NLI	David Wolyn
Кріп пахучий <i>Anethum graveolens</i> L. Dill					
23125001	09.06.2023	Беллі Bellí	3216	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Храпатий Ігор Васильович
Шпинат городній <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinach					
23130002	27.09.2023	Матадор Matador	1163	РС NLI	
Капуста броколі <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch. Calabrese, Sprouting Broccoli					
23136001	22.11.2023	Тритон Triton	1833	РС NLI	Takeyuki Furihata
23136002	22.11.2023	Арес Ares	1833	РС NLI	
Гарбуз звичайний <i>Cucurbita pepo</i> L. Pumpkin					
23150001	19.10.2023	Енцо Enzo	2011	РС, АС NLI, AC	Gerold Fussel
Абрикос звичайний <i>Prunus armeniaca</i> L. Apricot					
23256001	09.11.2023	Голдріч Goldrich	3218	РС NLI	Washington State University
Груша звичайна <i>Pyrus communis</i> L. Pear					
23258001	30.10.2023	Особлива Osoblyva	2314	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Юрик Лариса Степанівна
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry					
23294003	18.10.2023	Полка Polka	2889	РС NLI	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
23294005	18.10.2023	Зенга Зенгана Senga Sengana	3231	PC NLI	Reinhold von Sengbusch
23294006	18.10.2023	Симфонія Symphony	2889	PC NLI	
23294007	18.10.2023	Ельсанта Elsanta	2889	PC NLI	
Калина звичайна <i>Viburnum opulus</i> L. Snowball Tree					
23303001	30.10.2023	Берегиня Berehynia	2314	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Буркут Оксана Сергіївна Тихий Тарас Іванович
Смикавець їстівний (чуфа) <i>Cyperus esculentus</i> L. Hufa Sedge, Nut Grass, Yellow Nutsedge					
23347001	27.10.2023	Екватор Ekvator	1708	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Позняк Олександр Васильович Тризуб Зоя Анатоліївна Кондратенко Сергій Іванович Чабан Леся Василівна
Кукурудза восковидна (батьківський компонент) <i>Zea mays var. ceratina</i> L.					
23358001	18.08.2023	1ПЗКК00 1PZKQ00	1688	PC PBR	Jean-Louis Dhautefeuille
23358002	18.08.2023	1ПРЕК08 1PREQ08	1690	PC PBR	Kelvin Grant
Вівсяний корінь <i>Tragopogon porrifolium</i> L. Salsify					
23391001	27.10.2023	Прометей Prometei	1708	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Чабан Леся Василівна Тризуб Зоя Анатоліївна Позняк Олександр Васильович Кондратенко Сергій Іванович
Скорзонера іспанська <i>Scorzonera hispanica</i> L. Black Salsify, Scorzonera					
23392001	27.10.2023	Сила Syla	1708	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Чабан Леся Василівна Кондратенко Сергій Іванович Тризуб Зоя Анатоліївна Позняк Олександр Васильович
Кукурудза восковидна <i>Zea mays var. ceratina</i> L. Corn					
23645001	18.08.2023	X03M321BX X03M321WX	1688	PC PBR	Jean-Louis Dhautefeuille
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
23909054	18.08.2023	1ПВДГ15 1PVDG15	1688	PC PBR	Benoit Revol
23909060	18.08.2023	1ПЗНВ83 1PZNV83	1688	PC PBR	Milorad Rosulj
23909061	18.08.2023	1ПКМТ93 1PQMT93	1688	PC PBR	Susanne Groh
23909071	18.08.2023	1ПРМЕ66 1PRME66	1688	PC PBR	Laurence Pauly
23909072	18.08.2023	ПХ2РФВ PH2RFFW	1688	PC PBR	Milorad Rosulj
23909076	18.08.2023	1ПСЦГ68 1PSCG68	1688	PC PBR	Benoit Revol
23909056	21.08.2023	1ППФС42 1PPFS42	1688	PC PBR	Christian Riedelsheimer
23909057	21.08.2023	1ПЦТВ01 1PCTW01	1690	PC PBR	Steven King
23909064	21.08.2023	1ПХХГ65 1PHHG65	1690	PC PBR	Thomas Kevern
23909065	21.08.2023	1ПХЕГ21 1PHEG21	1688	PC PBR	Benoit Revol
23909068	21.08.2023	1ПНДА25 1PNDA25	1688	PC PBR	Milorad Rosulj
23909070	21.08.2023	1ПФЙУ82 1PFJU82	1688	PC PBR	Benoit Revol
23909079	21.08.2023	1ПАБЦ82 1PABC82	1688	PC PBR	Benoit Revol
23909081	21.08.2023	1ПЛРФ93 1PLRF93	1688	PC PBR	Milorad Rosulj
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
23939025	21.08.2023	7ПАКЕ41Б 7PAQE41B	1688	PC PBR	Sedek Elsayed

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
23939026	21.08.2023	7ПАКЙ19Б 7РАQJ19В	1688	ПС PBR	Cemal Yucel
23939027	21.08.2023	7ПХБГ97Р 7РНВВ97R	1688	ПС PBR	Agota Fodor
23939028	21.08.2023	7ПАКЙ19А 7РАQJ19А	2715	РС NLI	Cemal Yucel
23939029	21.08.2023	7ПТБТ61Р 7РТВТ61R	1688	ПС PBR	Antoine Mezzarobba
23939030	21.08.2023	7ПМЙИ25Р 7РМЈУ25R	1688	ПС PBR	Agota Fodor
23939031	21.08.2023	7ПУАС84Б 7РУАС84В	1688	ПС PBR	Nathalie Bourbon
23939032	21.08.2023	7ПИБК03Р 7РУВК03R	1688	ПС PBR	Ion Sandu
23939033	21.08.2023	7ПИДН92Р 7РЈDN92R	1688	ПС PBR	Sadek Elsayed
23939034	21.08.2023	7ПЗЛІ47Р 7РZLY47R	1688	ПС PBR	Cemal Yucel
23939035	21.08.2023	7ППРЦ19Б 7РРRC19В	1688	ПС PBR	Agota Fodor
23939037	21.08.2023	7ППРЦ19А 7РРRC19А	2715	РС NLI	Agota Fodor
23939038	21.08.2023	7ПУАС84А 7РУАС84А	2715	РС NLI	Nathalie Bourbon
23939040	23.10.2023	ТФС5438Б ТФС5438В	2720	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	PETIARD Benoit
23939041	23.10.2023	ТRІ5032Р TRІ5032R	2720	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	PETIARD Benoit
23939042	06.11.2023	70004Рсуол 70004Rsuol	2890	РС NLI	Jean Pierre Dufourcq
23939043	06.11.2023	ЄС-211 YeS-211	2287	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бушулян Олег Володимирович
23939048	06.11.2023	ЄС-422 YeS-422	2287	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шацман Дмитро Олександрович
23939052	22.11.2023	СР1117МК0 SR1117MK0	2890	РС, АС NLI, AC	Бушулян Олег Володимирович Jean Pierre Dufourcq
Ріпак (ярий) – батьківський компонент <i>Brassica napus L. oleifera</i> Spring Rape Seed – parental component					
23941002	16.11.2023	ВНР 283 VNR 283	736	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Сидоров Андрій Валерійович Парій Мирослав Федорович Парій Ярослав Федорович

Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними

Withdrawn applications for plant varieties or those that considered as withdrawn

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) б: Представник (код) a: Applicant (code) b: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відкликання Date of withdrawal
Кукурудза звичайна Maize, Corn					
20009097	02.11.2020	АГСТЕЛЛАР AGSTELLAR	а: 844 б:	ПС, РС PBR, NLI	02.11.2023
Соняшник однорічний Sunflower					
23039046	16.11.2023	7042D062 11 7042D062 11	а: 2715 б:	РС NLI	27.11.2023
Ріпак (озимий) Rape Seed (Winter)					
22040055	08.06.2022	4106A182 05 4106A182 05	а: 2715 б:	РС NLI	02.11.2023
22040056	08.06.2022	4105A150 01 4105A150 01	а: 2715 б:	РС NLI	02.11.2023
22040058	08.06.2022	4105A112 01 4105A112 01	а: 2715 б:	РС NLI	02.11.2023
23040028	23.05.2023	4105B016 01 4105B016 01	а: 2715 б:	РС NLI	02.11.2023
23040032	23.05.2023	4105B018 01 4105B018 01	а: 2715 б:	РС NLI	02.11.2023
Буряк цукровий Sugar Beet					
21069018	01.12.2021	БАЛАТОН BALATON	а: 2550 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	09.11.2023
Капуста білоголова White Cabbage					
23096004	02.01.2023	СГВ0772 SGW0772	а: 2643 б:	РС, АС NLI, AC	10.11.2023
Горох посівний (озимий) Pea (Winter)					
20559001	17.12.2020	Вавилон Vavylon	а: 2751 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	13.11.2023
Кукурудза звичайна – батьківський компонент Maize, Corn – parental component					
15909027	05.10.2015	ПХ2ГС0 PH2GS0	а: 9 б:	РС NLI	02.11.2023
21909083	01.10.2021	1ПВГЛ76 1PVHL76	а: 2715 б:	РС NLI	02.11.2023
22909016	12.01.2022	1ПУГА40 1PUGA40	а: 2715 б:	РС NLI	02.11.2023

Інші відомості, внесені до Реєстру заявок Other notifications listed in the Register of Plant Variety Applications

Відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України № 21-1331-09/25430 від 01.11.2023 «Про погодження внесення змін» щодо сортів пшениці м'якої (озимої) Шамбері (заявка № 21012052), Антік (заявка № 21012053), Авіньюон (заявка № 21012054) у розділі 3 Заяви про визнання прав на сорт адресу для листування: вул. Академіка Проскури, буд. 1, м. Харків, 61070, змінено на: с. Красне, Кеґичівський район, Харківська область, 64032).

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 2009 від 20.11.2023 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, Державному реєстрі патентів на сорти рослин та Реєстрі заявок» внесено зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок, щодо ім'я (найменування) та адреси місця проживання (місцезнаходження) заявника стосовно сорту горошку посівного (вики) (ярого) Світлячок (заявка № 21177001), замінивши слова, букви та цифри «Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України (вул. Тролейбусна, 12, м. Тернопіль, 46027)» словами, буквами та цифрами «Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України (вул. Тролейбусна, 12, м. Тернопіль, 46027)».

Відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України № 21-1331-09/27282 від 23.11.2023 «Про погодження внесення змін» щодо сорту кукурудзи звичайної – батьківського компонента РВІ441 (заявка № 23909045) внесено зміну, а саме у розділі «Види прав» Заяви про визнання прав на сорт внесено позначку «майнове право на поширення сорту».

Відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України № 21-1331-09/27265 від 23.11.2023 «Про погодження внесення змін» щодо сортів кукурудзи звичайної АГН290 (заявка № 18009009), АГН340 (заявка № 18009010) та люцерни посівної АГН М72 (заявка № 18196001) внесено зміни щодо найменування представника та адреси для листування, а саме «Андрущенко Наталія Василівна (просп. Червоної Калини, 20Г, м. Київ, 02221, Україна, тел. +30993575956, е-пошта: natali42500@gmail.com)».

Відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України № 21-1331-09/27637 від 28.11.2023 «Про внесення змін» щодо послідовності батьківських компонентів сорту кукурудзи звичайної П9255 (заявка № 21009046) – вважати вірними батьківські компоненти у такій послідовності ПХ2РХ (РН2РН3) Х ПХ47ГВ (РН47ГВ).

Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин

Notification on changed and approved plant variety denomination

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Запропонована назва сорту при поданні заявки Plant variety denomination during order application	Змінена та ухвалена назва сорту Changed and approved variety denomination
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn				
22009009	2257	13.11.2023	КМ 3231	ГРОВІКС GROWIX
22009011	2257	13.11.2023	КМ 2380	КМ 2170 КМ 2170
22009012	2257	13.11.2023	КМ 2320	КМ 3131 КМ 3131
22009035	2788	13.11.2023	СТАЙН 9808Е	СТАЙН 9808ХП STINE 9808HP
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)				
21012028	807	06.11.2023	ЛЕУ 2029132	Делікат Delikat
21012028	807	06.11.2023	Делікат	Декастер Dekaster
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean				
22045023	2788	06.11.2023	СТАЙН 15СА30915	СТАЙН 12Н23 STINE 12N23
22045024	2788	06.11.2023	СТАЙН 16СА30072	СТАЙН 02Н23 STINE 02N23
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet				
21069033	796	07.11.2023	ФДР22Б4061	ФД Стартер Смарт FD Starter Smart
23069006	1751	27.11.2023	Білий	Подольничик Подольничик
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato				
23088004	2773	24.11.2023	Гібридна	Сульська Сульська
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato				
23115011	1802	13.11.2023	Морозко	Морозенко Morozenko

Відомості щодо ухваленної назви сорту рослин

Notifications on approved denomination for plant variety

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn			
23009022	1688	08.11.2023	П8902
23009023	1688	08.11.2023	Р8902 П9967
23009029	1688	07.11.2023	Р9967 П7655
23009049	1688	08.11.2023	Р7655 БРВ2770Б BRV2770В
23009051	1688	08.11.2023	П8317
23009058	2011	02.11.2023	Р8317 Магнато
23009059	2011	02.11.2023	Magnato СЛ Енормо
23009060	2011	02.11.2023	SL Enormo Лігато
23009061	2715	08.11.2023	Ligato АКАНТО
23009063	2715	08.11.2023	AKANTO КАБАРЕТТО
23009069	1783	23.11.2023	KABARETTO РЖТ АЛІККС ДУО RGT ALYXX DUO
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)			
23012027	1771	15.11.2023	Розумниця Одеська
23012028	1771	27.11.2023	Rozumnytsia Odeska Графиня Одеська Hrafynia Odeska
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)			
23020004	1669	13.11.2023	Ювілейний
23020005	1797	29.11.2023	Yuvileinyi СБ Скопе CB Score
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower			
23039028	1688	15.11.2023	П64ЛЕ280
23039030	1688	08.11.2023	Р64ЛЕ280 П64ЛЕ230
23039031	1688	24.11.2023	Р64ЛЕ230 П64ЛП271
23039037	2011	02.11.2023	Р64ЛР271 Арунасан ІР
23039039	2720	24.11.2023	Arunasun IR МАС 850Б
23039041	1985	10.11.2023	MAS 850В Н4Л102 КЛ
23039051	2890	28.11.2023	N4L102 CL ЛІД5038Х
23039058	2890	30.11.2023	LID5038H 1046X СУ 1046H SU
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)			
23040049	1783	29.11.2023	ЦЕОС CEOS
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean			
23045015	2557	15.11.2023	ОАЦ Бруно
23045016	2557	13.11.2023	OAC Bruno ОАЦ Абердін
23045018	2788	30.11.2023	OAC Aberdeen ПРОЦЕРА 1020
23045020	1783	30.11.2023	PROCERA 1020 САНКАРА SANKARA

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet			
23069007	2552	29.11.2023	Заппа
23069008	2552	29.11.2023	Zappa Rigoletto Rigoletto
Морква <i>Daucus carota</i> L. Carrot			
23109002	1833	28.11.2023	КУРОДА ПАУЕР KURODA POWER
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato			
23115022	1781	07.11.2023	Серпневий подарунок Serpnevuyi podarunok
23115025	3233	17.11.2023	Хайнц2123 Heinz2123
23115026	3233	17.11.2023	Хайнц5108 Heinz5108
Квасоля звичайна (овочева) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean			
23127003	1163	07.11.2023	Топкроп Topcrop
Шпинат городній <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinach			
23130002	1163	15.11.2023	Матадор Matador
Капуста броколі <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch. Calabrese, Sprouting Broccoli			
23136001	1833	28.11.2023	Тритон Triton
23136002	1833	28.11.2023	Арес Ares
Гарбуз звичайний <i>Cucurbita pepo</i> L. Pumpkin			
23150001	2011	02.11.2023	Енцо Enzo
Груша звичайна <i>Pyrus communis</i> L. Pear			
23258001	2314	15.11.2023	Особлива Osoblyva
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry			
23294002	2889	15.11.2023	Зенга Зенгана Senga Sengana
23294003	2889	15.11.2023	Полка Polka
23294004	2889	13.11.2023	Хонейо Honeyo
23294005	3231	13.11.2023	Зенга Зенгана Senga Sengana
23294006	2889	15.11.2023	Симфонія Symphony
Кукурудза восковидна (батьківський компонент) <i>Zea mays</i> var. <i>ceratina</i> L.			
23358001	1688	13.11.2023	1ПЗКК00 1PZKQ00
23358002	1690	27.11.2023	1ПРЕК08 1PREQ08
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component			
23909054	1688	27.11.2023	1ПВДГ15 1PVVG15
23909055	1690	07.11.2023	1ПГЗВ72 1PGZW72
23909064	1690	27.11.2023	1ПХХГ65 1PHHG65
23909068	1688	24.11.2023	1ПНДА25 1PNDA25
23909070	1688	24.11.2023	1ПФЙУ82 1PFJU82
23909071	1688	24.11.2023	1ПРМЕ66 1PRME66
23909075	1688	08.11.2023	1ППНК23 1PPNQ23
23909078	1688	08.11.2023	ПХ2Т03 PH2T03

Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L.			
Sunflower – parental component			
23939028	2715	15.11.2023	7ПАКЙ19А 7РАQJ19А
23939029	1688	27.11.2023	7ПТБТ61Р 7РТВТ61R
23939030	1688	27.11.2023	7ПМЙИ25Р 7РМЈУ25R
23939033	1688	24.11.2023	7ПЙДН92Р 7РЈDN92R
23939035	1688	24.11.2023	7ППРЦ19Б 7РРРС19В
23939037	2715	24.11.2023	7ППРЦ19А 7РРРС19А
23939040	2720	27.11.2023	ТФС5438Б ТFC5438B
23939041	2720	15.11.2023	ТPI5032Р TRI5032R
23939042	2890	08.11.2023	70004Pсуол 70004Rsuol
23939052	2890	28.11.2023	CP1117MKO SR1117MKO

Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин Information entered in the State Register of Patents for Plant Varieties

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and the State Register of Patents for Plant Varieties

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)							
19012079	30.07.2019	230653	03.11.2023	30.07.2019	Євразія Yevraziia	1571	бюлетень, випуск 10, 2023
20012044	03.12.2020	230697	09.11.2023	03.12.2020	НОВІК NOVIC	485	бюлетень, випуск 10, 2023
20012045	03.12.2020	230698	09.11.2023	03.12.2020	Соліфлор КС SOLIFLOR CS	485	бюлетень, випуск 10, 2023
21012003	15.02.2021	230654	03.11.2023	15.02.2021	Біла Bila	355	бюлетень, випуск 10, 2023
21012004	15.02.2021	230655	03.11.2023	15.02.2021	Трояна Troiana	355	бюлетень, випуск 10, 2023
21012005	15.02.2021	230656	03.11.2023	15.02.2021	Київська 22 Kyivska 22	355	бюлетень, випуск 10, 2023
21012006	15.02.2021	230657	03.11.2023	15.02.2021	Синтетик 240 Syntetyk 240	355	бюлетень, випуск 10, 2023
21012010	24.02.2021	230658	03.11.2023	24.02.2021	Бісквіт Biskvit	2783	бюлетень, випуск 10, 2023
21012028	18.05.2021	230711	14.11.2023	18.05.2021	Декастер Dekaster	807	
21012039	20.07.2021	230672	06.11.2023	20.07.2021	СТК21Г STK21G	2788	бюлетень, випуск 9, 2023
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)							
20019007	22.05.2020	230725	22.11.2023	22.05.2020	Єкатеріна Ekaterina	2524	бюлетень, випуск 6, 2022
21019001	24.02.2021	230663	03.11.2023	24.02.2021	Тур Tur	2783	бюлетень, випуск 10, 2023
21019008	18.05.2021	230717	14.11.2023	18.05.2021	Юлія Julia	807	
Сочевиця харчова <i>Lens culinaris</i> Medik. Lentil							
21027001	08.11.2021	230664	03.11.2023	08.11.2021	РЕД RED	2260	
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower							
20039050	06.11.2020	230730	29.11.2023	06.11.2020	Ірінасол Irinasol	1498	
21039057	22.11.2021	230731	29.11.2023	22.11.2021	ЛГ50486 LG50486	793	
21039058	22.11.2021	230732	29.11.2023	22.11.2021	ЛГ50648 LG50648	793	
21039059	22.11.2021	230733	29.11.2023	22.11.2021	ЛГ50689 СХ LG50689 SX	793	
21039060	22.11.2021	230734	29.11.2023	22.11.2021	ЛГ50554 КЛП LG50554 CLP	793	
21039061	22.11.2021	230735	29.11.2023	22.11.2021	ЛГ50564 КЛП LG50564 CLP	793	
21039062	23.11.2021	230736	29.11.2023	23.11.2021	ЛГ50616 LG50616	793	
21039063	23.11.2021	230737	29.11.2023	23.11.2021	ЛГ50321 КЛП LG50321 CLP	793	
21039064	23.11.2021	230738	29.11.2023	23.11.2021	ЛГ50621 LG50621	793	
21039065	23.11.2021	230739	29.11.2023	23.11.2021	ЛГ50639 СХ LG50639 SX	793	
21039067	07.12.2021	230740	29.11.2023	07.12.2021	Пронтосол Prontosol	1498	
21039102	23.12.2021	230741	29.11.2023	23.12.2021	Маріголдес Marigoldes	1219	

Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
21039106	28.12.2021	230742	29.11.2023	28.12.2021	Ліон Lion	2267	
21039107	28.12.2021	230743	29.11.2023	28.12.2021	Сулфостар Sulfostar	2267	
21039108	28.12.2021	230744	29.11.2023	28.12.2021	Маттіа Mattia	2267	
Ріпак (ярий) <i>Brassica napus L. oleifera</i> Rape Seed (Spring)							
21041004	23.12.2021	230728	29.11.2023	Ріплеї	2851 Replay		
Соя культурна <i>Glycine max (L.) Merr.</i> Soya Bean							
20045011	03.02.2020	230665	03.11.2023	03.02.2020	ОАЦ Дункель OAC Dunkel	2557	бюлетень, випуск 1, 2022
21045010	12.11.2021	230750	29.11.2023	12.11.2021	Абіола Abiola	1564	
21045011	12.11.2021	230751	29.11.2023	12.11.2021	Аполліна Apollina	1564	
21045012	16.11.2021	230752	29.11.2023	16.11.2021	Кінгстон Kingston	2739	
Лаванда вузьколиста <i>Lavandula angustifolia Mill.</i> Lavender							
22052001	07.06.2022	230722	15.11.2023	07.06.2022	Аїрін Airin	2876	
Льон звичайний, довгунець <i>Linum usitatissimum L.</i> Flax, Linseed							
20081008	29.12.2020	230723	15.11.2023	29.12.2020	Жайворонок Zhaivoronok	1936	
Картопля <i>Solanum tuberosum L.</i> Potato							
18088017	14.11.2018	230700	14.11.2023	14.11.2018	Сонцедар Sontsedar	1710	
20088017	26.11.2020	230706	14.11.2023	26.11.2020	Роставиця Rostavytsia	1710	
20088018	26.11.2020	230707	14.11.2023	26.11.2020	Фанатка Fanatka	1710	
20088019	26.11.2020	230708	14.11.2023	26.11.2020	Світана Svitana	1710	
20088020	26.11.2020	230709	14.11.2023	26.11.2020	Марфуша Marfusha	1710	
20088021	26.11.2020	230710	14.11.2023	26.11.2020	Меланія Melaniia	1710	
21088004	26.10.2021	230720	15.11.2023	26.10.2021	Роксоланівська Roksolanivska	2828	бюлетень, випуск 10, 2023
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea L. var. alba DC.</i> White Cabbage							
20096003	21.12.2020	230687	09.11.2023	21.12.2020	Слобожаночка Slobozhanochka	1781	
21096007	09.09.2021	230688	09.11.2023	09.09.2021	Ельза Elza	2819	бюлетень, випуск 10, 2023
22096002	18.01.2022	230669	06.11.2023	18.01.2022	Кората Korata	2841	бюлетень, випуск 10, 2023
22096004	08.02.2022	230689	09.11.2023	08.02.2022	Кабінет Kabinet	1997	бюлетень, випуск 10, 2023
Кукурудза цукрова <i>Zea mays L. ssp. saccharata Sturt.</i> Sweet Corn							
21103010	14.12.2021	230670	06.11.2023	14.12.2021	Мегаза Megaza	2841	бюлетень, випуск 10, 2023
Цибуля городня <i>Allium cepa L.</i> Onion, Echalion							
21106005	14.12.2021	230675	06.11.2023	14.12.2021	Болбул Bolbul	2841	бюлетень, випуск 10, 2023
Морква <i>Daucus carota L.</i> Carrot							
21109002	09.09.2021	230694	09.11.2023	09.09.2021	Нью Курода АС New Kuroda AS	2819	бюлетень, випуск 10, 2023
21109006	30.12.2021	230671	06.11.2023	30.12.2021	Карлав Karlav	2841	бюлетень, випуск 10, 2023
Огірок посівний <i>Cucumis sativus L.</i> Cucumber							
21110015	30.12.2021	230676	06.11.2023	30.12.2021	Модер Moder	2841	бюлетень, випуск 6, 2022

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
21110016	30.12.2021	230677	06.11.2023	30.12.2021	Батер Bater	2841	бюлетень, випуск 4, 2022
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika							
22113004	07.02.2022	230678	06.11.2023	07.02.2022	Тебека Tebeka	2841	бюлетень, випуск 5, 2022
22113005	07.02.2022	230679	06.11.2023	07.02.2022	Ребекка Rebekka	2841	бюлетень, випуск 5, 2022
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato							
18115007	21.02.2018	230695	09.11.2023	21.02.2018	Базилевс Bazylevs	1781	
20115017	02.11.2020	230651	03.11.2023	02.11.2020	Арабат Arabat	3221	
20115018	02.11.2020	230652	03.11.2023	02.11.2020	Презент херсонський Prezent khersonskyi	3221	
21115037	16.12.2021	230696	09.11.2023	16.12.2021	Сонцедар Sontsedar	1781	
22115003	07.02.2022	230680	06.11.2023	07.02.2022	Міхіто Mihito	2841	бюлетень, випуск 5, 2022
22115004	07.02.2022	230681	06.11.2023	07.02.2022	Баріто Barito	2841	бюлетень, випуск 4, 2022
22115005	07.02.2022	230682	06.11.2023	07.02.2022	Котіто Kotito	2841	бюлетень, випуск 6, 2022
23115023	10.10.2023	230727	29.11.2023	10.10.2023	Зухраза Zuhrasa	1730	
Редька посівна (редиска) <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> Pers. Radish, Garden Radish, European Radish							
21118007	22.12.2021	230673	06.11.2023	22.12.2021	Радіс Radis	2841	бюлетень, випуск 10, 2023
21118008	30.12.2021	230674	06.11.2023	30.12.2021	Марвіс Marvis	2841	бюлетень, випуск 10, 2023
Салат посівний листковий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>secalina</i> Lettuce							
23120005	13.09.2023	230729	29.11.2023	13.09.2023	Ліадін Liadine	1730	
Квасоля звичайна (овочева) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean							
20127009	17.12.2020	230721	15.11.2023	17.12.2020	ЕСКАДРОН ESCADRON	1959	бюлетень, випуск 10, 2023
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon							
21146006	09.09.2021	230686	09.11.2023	09.09.2021	Жако Zhako	2819	бюлетень, випуск 10, 2023
22146002	07.02.2022	230668	06.11.2023	07.02.2022	Медун Medun	2841	бюлетень, випуск 10, 2023
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon							
22147001	07.02.2022	230666	06.11.2023	07.02.2022	Мегарін Megarin	2841	бюлетень, випуск 10, 2023
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash							
21148002	09.09.2021	230685	09.11.2023	09.09.2021	Еклер Ekler	2819	бюлетень, випуск 10, 2023
22148001	18.01.2022	230667	06.11.2023	18.01.2022	Контак Kontak	2841	бюлетень, випуск 10, 2023
Конюшина лучна (червона) <i>Trifolium pratense</i> L. Red Clover							
20155002	23.06.2020	230650	03.11.2023	23.06.2020	Любава Liubava	1658	бюлетень, випуск 10, 2023
Горошок посівний (вика) (ярий) <i>Vicia sativa</i> L. Common Vetch (Spring)							
20177004	11.12.2020	230719	15.11.2023	11.12.2020	Ворскла Vorskla	1943	бюлетень, випуск 10, 2023
Гарбуз мускатний <i>Cucurbita moschata</i> Duch. Butternut, Butternut Squash, Cheese Pumpkin							
21228001	09.09.2021	230718	15.11.2023	09.09.2021	Бертон Berton	2819	
22228002	22.02.2022	230684	09.11.2023	22.02.2022	Баттернат де Люкс Batternat de Liuks	1163	бюлетень, випуск 10, 2023
Груша звичайна <i>Pyrus communis</i> L. Pear							
22258002	20.12.2022	230704	14.11.2023	20.12.2022	Вежа мускатна Vezha muskatna	1601	бюлетень, випуск 10, 2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Слива домашня <i>Prunus domestica</i> L. Plum							
23261001	23.05.2023	230699	09.11.2023	23.05.2023	Октябрь Сан 2 Oktober San 2	3208	бюлетень, випуск 10, 2023
Черешня <i>Prunus avium</i> L. Sweet Cherry							
22262003	20.12.2022	230715	14.11.2023	20.12.2022	Тайна Taina	1601	
22262004	20.12.2022	230716	14.11.2023	20.12.2022	Аніта Anita	1601	
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry							
21294002	12.11.2021	230712	14.11.2023	12.11.2021	ФЕДЕРИКА FEDERIKA	2832	
21294003	12.11.2021	230713	14.11.2023	12.11.2021	АРИАННА ARIANNA	2832	
21294004	12.11.2021	230714	14.11.2023	12.11.2021	САНДРИНА SANDRINA	2832	
22294002	13.07.2022	230724	22.11.2023	13.07.2022	Твіст Twist	2885	бюлетень, випуск 6, 2022
Калина звичайна <i>Viburnum opulus</i> L. Snowball Tree							
21303001	02.12.2021	230726	29.11.2023	02.12.2021	Ярославна Yaroslavna	1601	
Троянда <i>Rosa</i> L. Rose							
21339002	01.04.2021	230753	29.11.2023	01.04.2021	Доросіліп Dorosilpi	2441	
Вишня степова х вишня ланезіана (підщепи) <i>Prunus fruticosa</i> (Pall.) Woron. х <i>Prunus lannesiana</i> Steppe Cherry х Oshima Cherry							
23352001	21.07.2023	230683	09.11.2023	21.07.2023	ВСЛ 2.1 VSL 2.1	3218	бюлетень, випуск 10, 2023
Актинідія пурпурова х актинідія гостра <i>Actinidia purpurea</i> Rehd. х <i>Actinidia arguta</i> Planch. Purple Actinidia х Hardy Kiwifruit							
23368001	12.04.2023	230649	03.11.2023	12.04.2023	Славна Slavna	348	
Калістефус китайський <i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees China Aster							
23415001	07.02.2023	230705	14.11.2023	07.02.2023	Яскрава Yaskrava	1601	
Хризантема садова <i>Chrysanthemum x hortorum</i> Bailey Chrysanthemum							
16416006	04.07.2016	230703	14.11.2023	04.07.2016	Багряна осінь Bahriana osin`	2075	бюлетень, випуск 4, 2022
Хризантема шовковицелиста <i>Chrysanthemum x morifolium</i> Ramat Chrysanthemum							
22438004	05.12.2022	230660	03.11.2023	05.12.2022	Коралове намисто Koralove namysto	2075	бюлетень, випуск 10, 2023
22438005	05.12.2022	230661	03.11.2023	05.12.2022	Прометей Prometei	2075	бюлетень, випуск 10, 2023
22438006	05.12.2022	230662	03.11.2023	05.12.2022	Рожева діадема Rozheva diadema	2075	бюлетень, випуск 10, 2023
Лілійник гібридний <i>Nemercallis hybrida</i> hort. Daylily Hybrid							
16498003	04.07.2016	230701	14.11.2023	04.07.2016	Патріот Patriot	2075	бюлетень, випуск 4, 2022
16498004	04.07.2016	230702	14.11.2023	04.07.2016	Північне сяиво Pivnichne siaivo	2075	бюлетень, випуск 4, 2022
Пшениця спельта (озима) <i>Triticum spelta</i> L. Spelt, Dinkel Wheat, Hulled Wheat							
21539001	24.02.2021	230659	03.11.2023	24.02.2021	Білбері Bilberi	2783	бюлетень, випуск 10, 2023
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component							
21909097	19.10.2021	230690	09.11.2023	19.10.2021	ПХ4Д3Ц PH4D3C	1688	
21909098	19.10.2021	230691	09.11.2023	19.10.2021	ПХ4Д3С PH4D3S	1688	
21909104	19.10.2021	230692	09.11.2023	19.10.2021	1ПВНВ47 1PWNV47	1688	
21909105	19.10.2021	230693	09.11.2023	19.10.2021	1ПТФТ47 1PTFT47	1688	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component							
20939054	10.11.2020	230745	29.11.2023	10.11.2020	ЛЦ658AIP LC658AIR	2743	
20939057	10.11.2020	230746	29.11.2023	10.11.2020	РГА IP 3РФ RHA IR 3RF	2743	
20939058	10.11.2020	230747	29.11.2023	10.11.2020	РХА 5РФ IP RHA 5Rf IR	2743	
20939114	10.12.2020	230748	29.11.2023	10.12.2020	БР004А BR004A	2743	
21939068	30.11.2021	230749	29.11.2023	30.11.2021	Х02020А-КЛ H02020A-CL	2649	

Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати

Information on issued patents for plant varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
Пшениця тверда (яра) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Spring)					
21006001	04.01.2021	230647	Аурата Aurata	1581	13.11.2023
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
19012079	30.07.2019	230653	Євразія Yevraziia	1571	15.11.2023
20012042	02.11.2020	230606	Новинка Novynka	2706	07.11.2023
20012044	03.12.2020	230697	НОВІК NOVIC	485	17.11.2023
20012045	03.12.2020	230698	Соліфлор КС SOLIFLOR CS	485	17.11.2023
21012001	04.01.2021	230607	Мізинка Mizynka	1581	13.11.2023
21012002	04.01.2021	230608	Малуша Malusha	1581	13.11.2023
21012003	15.02.2021	230654	Біла Bila	355	06.11.2023
21012004	15.02.2021	230655	Трояна Troiana	355	06.11.2023
21012005	15.02.2021	230656	Київська 22 Kyivska 22	355	06.11.2023
21012006	15.02.2021	230657	Синтетик 240 Syntetyk 240	355	06.11.2023
21012010	24.02.2021	230658	Бісквіт Biskvit	2783	08.11.2023
21012022	12.04.2021	230484	ХАЙМАРС HIMARS	2788	22.11.2023
21012028	18.05.2021	230711	Декастер Dekaster	807	29.11.2023
21012039	20.07.2021	230672	СТК21Г STK21G	2788	22.11.2023
Пшениця м'яка (яра) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Spring)					
20013003	13.05.2020	230609	Танок Tanok	1626	01.11.2023
20013004	13.05.2020	230610	Колос Поліський Kolos Poliskyi	1626	01.11.2023
Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter)					
21015002	01.02.2021	230597	Нива волошкова Nyva voloshkova	1581	13.11.2023
21015010	24.06.2021	230598	ЗУ Перспектив SU Perspectiv	1900	24.11.2023
21015012	24.06.2021	230599	ЗУ Барезі SU Baresi	1900	24.11.2023
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)					
21019001	24.02.2021	230663	Тур Tur	2783	08.11.2023
21019005	12.04.2021	230494	АРТЕМ ARTEM	2788	22.11.2023
21019007	08.06.2021	230558	Тойто Teuto	1797	07.11.2023
21019008	18.05.2021	230717	Юлія Julia	807	29.11.2023
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)					
20020008	02.11.2020	230616	Генерал Heneral	2706	07.11.2023
20020009	02.11.2020	230617	Незламний Nezlamnyi	2706	07.11.2023
20020010	02.11.2020	230618	Шубін Shubin	2706	07.11.2023
21020005	03.11.2021	230635	Брант Brant	1669	13.11.2023
22020004	24.01.2022	230619	Покоління Pokolinnia	2706	07.11.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
Тритикале (озиме) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Winter)					
21022001	01.02.2021	230615	Златоуст Zlatoust	1581	13.11.2023
Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea					
21023001	04.01.2021	230636	Аякс Aiaks	1581	13.11.2023
Квасоля звичайна (зернова) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean					
21025001	07.09.2021	230625	Садгорянка Sadhorianka	2723	20.11.2023
Сочевиця харчова <i>Lens culinaris</i> Medik. Lentil					
21027001	08.11.2021	230664	РЕД RED	2260	15.11.2023
Нут звичайний <i>Cicer arietinum</i> L. Chick-Pea					
20028001	16.11.2020	230632	Октавіус Oktavius	1669	13.11.2023
Льон низький (олійний, кудряш) <i>Linum humile</i> Mill. Linseed					
21035001	11.02.2021	230605	Ланселот Lanselot	1626	01.11.2023
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)					
21040025	12.05.2021	230613	Марвін Marvin	2547	08.11.2023
21040026	12.05.2021	230614	Том Tom	2547	08.11.2023
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean					
20045011	03.02.2020	230665	ОАЦ Дункель OAC Dunkel	2557	16.11.2023
Лаванда вузьколиста <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. Lavender					
22052001	07.06.2022	230722	Айрін Airin	2876	24.11.2023
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato					
18088017	14.11.2018	230700	Сонцедар Sontsedar	1710	27.11.2023
20088017	26.11.2020	230706	Роставиця Rostavytsia	1710	27.11.2023
20088018	26.11.2020	230707	Фанатка Fanatka	1710	27.11.2023
20088019	26.11.2020	230708	Світана Svitana	1710	27.11.2023
20088020	26.11.2020	230709	Марфуша Marfusha	1710	27.11.2023
20088021	26.11.2020	230710	Меланія Melaniia	1710	27.11.2023
21088004	26.10.2021	230720	Роксоланівська Roksolanivska	2828	27.11.2023
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage					
21096007	09.09.2021	230688	Ельза Elza	2819	15.11.2023
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion					
20106011	23.12.2020	230338	Алмагро Almagro	751 2758	09.11.2023
20106013	23.12.2020	230339	Онеїда Oneida	751 2758	09.11.2023
20106016	23.12.2020	230340	Венеція Venecia	751 2758	09.11.2023
Морква <i>Daucus carota</i> L. Carrot					
21109002	09.09.2021	230694	Нью Курода АС New Kuroda AS	2819	15.11.2023
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon					
15146018	07.12.2015	230400	Целін Celine	2020	22.11.2023
21146006	09.09.2021	230686	Жако Zhako	2819	15.11.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Flou Vegetable Marrow, Squash					
21148002	09.09.2021	230685	Еклер Ekler	2819	15.11.2023
Конюшина лучна (червона) <i>Trifolium pratense</i> L. Red Clover					
20155002	23.06.2020	230650	Любава Liubava	1658	15.11.2023
20155003	29.09.2020	230603	Оплески Oplesky	1626	01.11.2023
20155004	15.10.2020	230626	Андріана Andriana	3232	16.11.2023
20155005	26.11.2020	230627	Атлант Носівський Atlant Nosivskiyi	1990	14.11.2023
Горошок посівний (вика) (ярий) <i>Vicia sativa</i> L. Common Vetch (Spring)					
21177002	02.11.2021	230620	Пірит Piryt	1669	13.11.2023
Гарбуз мускатний <i>Cucurbita moschata</i> Duch. Butternut, Butternut Squash, Cheese Pumpkin					
21228001	09.09.2021	230718	Бертон Berton	2819	27.11.2023
22228002	22.02.2022	230684	Баттернат де Люкс Batternat de Liuks	1163	15.11.2023
Льон звичайний (озимий) <i>Linum usitatissimum</i> L. Flax; Linseed					
21249001	09.07.2021	230604	ЛСЛ 1133 LSL 1133	2804	08.11.2023
Груша звичайна <i>Pyrus communis</i> L. Pear					
22258002	20.12.2022	230704	Вежа мускатна Vezha muskatna	1601	27.11.2023
Слива домашня <i>Prunus domestica</i> L. Plum					
23261001	23.05.2023	230699	Октобер Сан 2 Oktober San 2	3208	14.11.2023
Черешня <i>Prunus avium</i> L. Sweet Cherry					
22262003	20.12.2022	230715	Тайна Taïna	1601	27.11.2023
22262004	20.12.2022	230716	Аніта Anita	1601	27.11.2023
Вишня степова х вишня ланезіана (підщепи) <i>Prunus fruticosa</i> (Pall.) Woron. х <i>Prunus lannesiana</i> Steppe Cherry х Oshima Cherry					
23352001	21.07.2023	230683	ВСЛ 2.1 VSL 2.1	3218	14.11.2023
Калістефус китайський <i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees China Aster					
23415001	07.02.2023	230705	Яскрава Yaskrava	1601	27.11.2023
Хризантема шовковицелиста <i>Chrysanthemum</i> х <i>morifolium</i> Ramat Chrysanthemum					
22438004	05.12.2022	230660	Коралове намисто Koralove namysto	2075	14.11.2023
22438005	05.12.2022	230661	Прометей Prometei	2075	14.11.2023
22438006	05.12.2022	230662	Рожева діадема Rozheva diadema	2075	14.11.2023
Лілійник гібридний <i>Heimerocallis hybrida</i> hort. Daylily Hybrid					
16498003	04.07.2016	230701	Патріот Patriot	2075	27.11.2023
16498004	04.07.2016	230702	Північне сяйво Pivnichne siaïvo	2075	27.11.2023
Пшениця спельта (озима) <i>Triticum spelta</i> L. Spelt, Dinkel Wheat, Hulled Wheat					
21539001	24.02.2021	230659	Білбері Bilberi	2783	08.11.2023
Пшениця тураська <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>turanicum</i> (Jakubz.) A. Love & D. Love Khorassan wheat; Oriental wheat					
21663001	06.01.2021	230611	Сармат Sarmat	2706	07.11.2023
21663002	03.02.2021	230612	Пектораль Pektoral	2706	07.11.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
21909097	19.10.2021	230690	ПХ4Д3Ц РН4D3C	1688	27.11.2023
21909098	19.10.2021	230691	ПХ4Д3С РН4D3S	1688	27.11.2023
21909104	19.10.2021	230692	1ПВНВ47 1РWNV47	1688	27.11.2023
21909105	19.10.2021	230693	1ПТФТ47 1РТFT47	1688	27.11.2023
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) – parental component					
21915009	24.06.2021	230600	Л2177ПхЛ2184Н L2177PkhL2184N	1900	24.11.2023
21915010	24.06.2021	230601	ХЮР035 HYR035	1900	24.11.2023

Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

Information on the termination of intellectual property rights for plant varieties

Номер заявки Application number	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації припинення права Registration date of the right termination	Підстава On the basis of
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
09017324	140007	ЕС Аміс СЛ ES Amis CL	806	14.11.2023	Наказ Мінагрополітики від 14.11.2023 № 1961 (за клопотанням)
10017171	140273	ЕС Артїк ES Artic	806	14.11.2023	Наказ Мінагрополітики від 14.11.2023 № 1961 (за клопотанням)
11017095	150399	ЕС НОВАМІС СЛ ES NOVAMIS CL	806	14.11.2023	Наказ Мінагрополітики від 14.11.2023 № 1961 (за клопотанням)
13039071	160303	ЕС АНДРОМЕДА ES ANDROMEDA	806	14.11.2023	Наказ Мінагрополітики від 14.11.2023 № 1961 (за клопотанням)
13039073	160305	ЕС ВЕРОНІКА ES VERONIKA	806	14.11.2023	Наказ Мінагрополітики від 14.11.2023 № 1961 (за клопотанням)
14039093	180606	ЕС ІДІЛЛІК ES IDILLIC	806	14.11.2023	Наказ Мінагрополітики від 14.11.2023 № 1961 (за клопотанням)
15039064	180635	ЕС ДОЛЬЧЕВІТА ES DOLCEVITA	806	14.11.2023	Наказ Мінагрополітики від 14.11.2023 № 1961 (за клопотанням)
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)					
08016026	120380	ЕС Меркурій ES Merkurii	806	14.11.2023	Наказ Мінагрополітики від 14.11.2023 № 1961 (за клопотанням)

Інші відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Other notifications as listed in the State Register of Patents for Plant Varieties

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 2009 від 20.11.2023 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, Державному реєстрі патентів на сорти рослин

та Реєстрі заявок» внесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин, щодо ім'я (найменування) володільця патенту сорту стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК

сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) володільця патенту сорту	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Пшениця м'яка (озима)	18012073	Віталіна	2022	Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук	Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук
2	Конюшина лучна (червона)	20155004	Андріана	2023		
3	Горошок посівний (вика) (ярий)	21177001	Світлячок	2023		

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on varieties of plants for which a decision was made on state registration of the variety and which are included in the State Register of varieties of plants suitable for distribution in Ukraine

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn						
18009009	16.11.2023		АГН290 AGN290	2449	2449	
18009010	16.11.2023		АГН340 AGN340	2449	2449	
20009090	14.11.2023	02.11.2020	4111Ц 4111C	844	844	
20009202	14.11.2023	21.12.2020	Туран Turan	2655	2655	
21009112	29.11.2023	08.12.2021	КВС ВОЛЬТАРІО KWS VOLTARIO	2649	2649	
21009113	29.11.2023	08.12.2021	КВС ГІПОЛІТО KWS HYROLITO	2649	2649	
21009114	29.11.2023	08.12.2021	НАТАЕЛО NATAELO	2649	2649	
21009115	29.11.2023	08.12.2021	КВС ФОРТУРІО KWS FORTURIO	2649	2649	
21009116	29.11.2023	08.12.2021	КВС ОЛТЕНІО KWS OLTENIO	2649	2649	
21009117	29.11.2023	08.12.2021	КВС АМАТРІО KWS AMATRIO	2649	2649	
21009118	29.11.2023	08.12.2021	КВС БОЛІВІАНО KWS BOLIVIANO	2649	2649	
21009119	29.11.2023	08.12.2021	КВС КОРНЕЛІО KWS CORNELIO	2649	2649	
21009120	29.11.2023	08.12.2021	КВС ЕСТРЕЛЛО KWS ESTRELLO	2649	2649	
21009122	29.11.2023	08.12.2021	КВС ГАЛІЛЕО KWS GALILEO	2649	2649	
21009123	29.11.2023	08.12.2021	КВС МАУРІЛІО KWS MAURILIO	2649	2649	
21009124	29.11.2023	08.12.2021	КВС АКАДО KWS ACADO	2649	2649	
21009125	29.11.2023	08.12.2021	КВС АДНАНО KWS ADNANO	2649	2649	
21009143	16.11.2023	20.12.2021	СІКСТІНА SIXTINA	1783	1783	
21009144	16.11.2023	20.12.2021	РЖТ ЗАНЕТИККС ДУО RGT ZANETIXX DUO	1783	1783	
21009147	16.11.2023	20.12.2021	РЖТ Велюкксо RGT Veluxxo	1783	1783	
21009148	16.11.2023	20.12.2021	РЖТ ПРОДУККСІОН RGT PRODUXXION	1783	1783	
21009149	16.11.2023	20.12.2021	РЖТ ЕЛЕККС RGT ALEXH	1783	1783	
21009151	16.11.2023	21.12.2021	РЖТ Волкоккк RGT Volcoxx	1783	1783	
21009152	16.11.2023	21.12.2021	РЖТ ГЮККСО RGT HUXHO	1783	1783	
21009153	16.11.2023	21.12.2021	РЖТ Аксіональ RGT Axxional	1783	1783	
22009030	29.11.2023	18.02.2022	КС94ХП KS94XP	2829	2829	

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
22009031	29.11.2023	18.02.2022	КС99ХП KS99XP	2829	2829	
22009032	29.11.2023	18.02.2022	КС85ХП KS85XP	2829	2829	
22009035	29.11.2023	10.03.2022	СТАЙН 9808ХП STINE 9808HP	2788	2788	
22009045	29.11.2023	06.04.2022	Лізавета Lisaveta	2829	2829	
22009046	29.11.2023	06.04.2022	Валета Valeta	2829	2829	
22009047	29.11.2023	06.04.2022	Роланда Rolanda	2829	2829	
22009048	29.11.2023	06.04.2022	Арабелла Arabella	2829	2829	
22009091	16.11.2023	01.12.2022	ДКС4031 DKC4031	844	844	
22009130	16.11.2023	14.12.2022	РЖТ СЕДЕКС RGT CEDEXX	1783	1783	
23009058	08.11.2023		Магнато Magnato	2011	2011	
23009059	08.11.2023		СЛ Енормо SL Enormo	2011	2011	
23009060	08.11.2023	19.10.2023	Лігато Ligato	2011	2011	
23009061	16.11.2023	06.11.2023	АКАНТО AKANTO	2715	2715	
23009063	16.11.2023	06.11.2023	КАБАРЕТТО KABARETTO	2715	2715	
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)						
21012028	14.11.2023	18.05.2021	Декастер Dekaster	807	807	
Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum						
20018012	29.11.2023	18.12.2020	КВС АТЛАНТУС KWS ATLANTUS	2649	2649	бюлетень, випуск 1/2, 2023
21018001	29.11.2023	11.01.2021	ТИГРУС TIGRUS	2767	2767	бюлетень, випуск 1/2, 2023
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)						
20020022	06.11.2023	23.12.2020	Гінгко Gingko	2657	1223	бюлетень, випуск 6, 2022
20020023	06.11.2023	23.12.2020	Рут Ruth	2657	1223	бюлетень, випуск 6, 2022
21020003	16.11.2023	18.10.2021	РЖТ ОРБІТЕР RGT ORBITER	1783	1783	
21020004	16.11.2023	18.10.2021	РЖТ АСТЕРОІД RGT ASTEROID	1783	1783	
Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea						
21023008	30.11.2023		Симбіоз Symbios	912	912	
Сочевиця харчова <i>Lens culinaris</i> Medik. Lentil						
21027001	08.11.2023	08.11.2021	РЕД RED	2794	2260	
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower						
20039073	29.11.2023	03.12.2020	ЕС ТАНАІС КЛП ES TANAIS CLP	806	806	бюлетень, випуск 8, 2023
20039075	29.11.2023	03.12.2020	ІНСАН 222 КЛП INSUN 222 CLP	806	806	бюлетень, випуск 1/2, 2023
20039077	29.11.2023	03.12.2020	Супернова СУ Supernova SU	806	806	бюлетень, випуск 8, 2023
20039078	29.11.2023	03.12.2020	ЕСХ20023 ESH20023	806	806	
20039079	29.11.2023	03.12.2020	1025Л 1025L	806	806	бюлетень, випуск 1/2, 2023
20039080	29.11.2023	03.12.2020	ІНСАН 110 INSUN 110	2890	2890	бюлетень, випуск 8, 2023
20039081	29.11.2023	03.12.2020	1044Л СУ 1044L SU	806	806	бюлетень, випуск 1/2, 2023
20039082	29.11.2023	03.12.2020	ІНСАНХО 200 КЛП INSANHO 200 CLP	806	806	бюлетень, випуск 4, 2023

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
21039067	06.11.2023	07.12.2021	Пронтосол Prontosol	1498	1498	
21039068	29.11.2023		СИ КОРСІКА АР SY CORSICA AR	2643	1219	
21039071	29.11.2023		СИ ЛАЗУРІ КЛП SY LAZURI CLP	2643	1219	
21039072	29.11.2023		СУРЕСТ SUREST	2643	1219	
21039076	29.11.2023		СУЛІАНО SULTIANO	2643	1219	
21039078	22.11.2023	15.12.2021	Н4Х413 КЛ N4N413 CL	1985	1985	
21039092	16.11.2023	20.12.2021	Базаллт Basallt	1783	1783	
21039093	16.11.2023	20.12.2021	Овелл Owell	1783	1783	
21039094	16.11.2023	20.12.2021	Нобіліс КЛП Nobillis CLP	1783	1783	
21039097	16.11.2023	20.12.2021	Мілос КЛП Milos CLP	1783	1783	
21039099	22.11.2023	22.12.2021	Н4Л460 КЛ N4L460 CL	1985	1985	
21039102	22.11.2023	23.12.2021	Маріголдес Marigoldes	2643	1219	
21039104	06.11.2023		АРНЕТЕС СУ ARNETES SU	2643	1219	
21039106	22.11.2023	28.12.2021	Ліон Lion	2267	2267	
21039107	22.11.2023	28.12.2021	Сульфостар Sulfostar	2267	2267	
21039108	22.11.2023	28.12.2021	Маттіа Mattia	2267	2267	
22039009	22.11.2023	09.02.2022	ЄС Авалон YeS Avalon	2287	2287	
22039010	22.11.2023	09.02.2022	ЄС Перас YeS Pehas	2287	2287	
22039011	22.11.2023	09.02.2022	ЄС Старк YeS Stark	2287	2287	
22039012	22.11.2023	09.02.2022	ЄС Тор YeS Tor	2287	2287	
22039013	29.11.2023	10.03.2022	СТК102 STK102	2788	2788	
22039014	29.11.2023	10.03.2022	СТК101 STK101	2788	2788	
22039015	29.11.2023	09.03.2022	СТК104 STK104	2788	2788	
22039016	29.11.2023	09.03.2022	СТК103 STK103	2788	2788	
22039041	22.11.2023	28.11.2022	ЛГ58561 КЛ LG 58561 CL	793	793	
22039065	06.11.2023	26.12.2022	ДОВЕР КЛП DOVER CLP	2643	1219	
23039036	06.11.2023	13.10.2023	Н4Х404 КЛ N4N404 CL	1985	1985	
23039037	08.11.2023	19.10.2023	Арунасан ІР Arunasun IR	2011	2011	
23039041	22.11.2023	07.11.2023	Н4Л102 КЛ N4L102 CL	1985	1985	
Ріпак (ярий) <i>Brassica napus L. oleifera</i> Rape Seed (Spring)						
21041002	29.11.2023	23.11.2021	Коктейль КЛ Cocktail CL	912	912	
Соя культурна <i>Glycine max (L.) Merr.</i> Soya Bean						
17045055	29.11.2023		Камея Kameia	2606	2606	
17045056	29.11.2023		Златопільська Zlatorilska	2606	2606	
20045041	29.11.2023	03.12.2020	ЄС Компетітор ES Competitor	2890	2890	бюлетень, випуск 8, 2023
20045042	29.11.2023	03.12.2020	КОМБІНАТОР Combinator	806	806	бюлетень, випуск 1/2, 2023

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
20045043	29.11.2023	03.12.2020	АТРАКТОР Attractor	806	806	бюлетень, випуск 1/2, 2023
20045047	06.11.2023	03.12.2020	СЕЙЛОР Sailor	806	806	
21045008	22.11.2023	02.11.2021	Санрайз Sanraiz	2831	2831	
21045009	22.11.2023	02.11.2021	Кобуко Kobuko	1669	1669	
21045012	29.11.2023	16.11.2021	Кінгстон Kingston	2739	2739	
21045029	22.11.2023	20.12.2021	РЖТ СІГМА RGT SIGMA	1783	1783	
21045030	22.11.2023	20.12.2021	РЖТ СЕФОРА RGT SEFORA	1783	1783	
21045032	16.11.2023	20.12.2021	СТЕПА STEPA	1783	1783	
22045019	22.11.2023		ОАЦ Хастінгс OAC Hastings	2557	2557	
22045020	22.11.2023		ОАЦ Камран OAC Kamran	2557	2557	
22045021	29.11.2023	04.03.2022	СТАЙН 06N02 STINE 06N02	2788	2788	
22045022	29.11.2023	09.03.2022	СТАЙН 20N23 STINE 20N23	2788	2788	
22045023	29.11.2023	09.03.2022	СТАЙН 12N23 STINE 12N23	2788	2788	
22045024	29.11.2023	09.03.2022	СТАЙН 02N23 STINE 02N23	2788	2788	
22045029	16.11.2023	14.12.2022	СУПЕРНОВА SUPERNOVA	1783	1783	
22045030	16.11.2023	14.12.2022	СУЗА SUZA	1783	1783	
Лаванда вузьколиста <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. Lavender						
22052001	08.11.2023	07.06.2022	Айрін Airin	2876	2876	
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>attissima</i> Doell Sugar Beet						
21069010	29.11.2023	04.11.2021	Микеланджело Michelangelo	2552	2552	
21069012	29.11.2023	04.11.2012	Хаббл Hubble	2552	2552	
21069024	29.11.2023	23.12.2021	БАЛАНСІЯ КВС BALANCIA KWS	2649	2649	бюлетень, випуск 9, 2023
21069027	29.11.2023	23.12.2021	ЯНАСОФІЯ КВС JANASOFIA KWS	2649	2649	бюлетень, випуск 9, 2023
21069028	29.11.2023	23.12.2021	СМАРТ МАТЕРІЯ КВС SMART MATERIA KWS	2649	2649	бюлетень, випуск 9, 2023
21069030	29.11.2023	23.12.2021	СМАРТ ЛІЕННА КВС SMART LIENNA KWS	2649	2649	бюлетень, випуск 9, 2023
21069031	29.11.2023	23.12.2021	СМАРТ МОДЕНТА КВС SMART MODENTA KWS	2649	2649	бюлетень, випуск 9, 2023
21069034	29.11.2023	23.12.2021	САЛЬВАТОРІКА КВС SALVATORICA KWS	2649	2649	бюлетень, випуск 9, 2023
23069002	22.11.2023	06.01.2023	Фредерік Frederic	2552	2552	
23069003	22.11.2023	06.01.2023	Огест August	2552	2552	
Льон звичайний, довгунець <i>Linum usitatissimum</i> L. Flax, Linseed						
20081008	29.11.2023	29.12.2020	Жайворонок Zhaivoronok	1936	1936	
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato						
20088017	06.11.2023	26.11.2020	Роста́вця Rostavytsia	1710	1710	
20088018	06.11.2023	26.11.2020	Фанатка Fanatka	1710	1710	
20088019	06.11.2023	26.11.2020	Світана Svitana	1710	1710	
20088020	06.11.2023	26.11.2020	Марфуша Marfusha	1710	1710	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage						
20088021	06.11.2023	26.11.2020	Меланія Melaniia	1710	1710	
20096003	14.11.2023	21.12.2020	Слобожаночка Slobozhanochka	1781	1781	
Капуста червоноголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>rubra</i> DC. Red Cabbage						
23097001	06.11.2023		Тінті Tinty	2086	2086	
Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt. Sweet Corn						
23103006	14.11.2023		ВВВ8028 WAV8028	1960	1960	
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber						
21110012	06.11.2023	30.11.2021	ГРАТЕН GRATEN	1852	1852	
21110013	06.11.2023	01.12.2021	ГРИФОН GRYPHON	1852	1852	
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato						
18115007	14.11.2023	21.02.2018	Базилевс Bazylevs	1781	1781	
20115017	14.11.2023	02.11.2020	Арабат Arabat	3221	3221	
20115018	14.11.2023	02.11.2020	Презент херсонський Prezent khersonskyi	3221	3221	
21115003	08.11.2023	14.01.2021	Спалах Spalakh	1802	1802	
21115035	06.11.2023	30.11.2021	ХАКІМАРУ NAKUMARU	1852	1852	
21115037	14.11.2023	16.12.2021	Сонцедар Sontsedar	1781	1781	
23115023	29.11.2023	10.10.2023	Зухраса Zuhrasa	1730	1730	
23115024	06.11.2023		Родіон Rodion	2529	1418	
Салат посівний листковий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>secalina</i> Lettuce						
23120005	22.11.2023	13.09.2023	Ліадін Liadine	1730	1730	
Шпинат городній <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinach						
21130001	29.11.2023	13.10.2021	Траверс Traverse	840	840	
21130002	29.11.2023		Трайлбосс Trailboss	840	840	
Гарбуз звичайний <i>Cucurbita pepo</i> L. Pumpkin						
23150001	08.11.2023		Енцо Enzo	2011	2011	
Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne						
18196001	16.11.2023		АГН М72 AGN M72	2449	2449	
20196006	22.11.2023	26.11.2020	Персія Носівська Persiia Nosivska	1990	1990	
Гарбуз мускатний <i>Cucurbita moschata</i> Duch. Butternut, Butternut Squash, Cheese Pumpkin						
21228001	14.11.2023	09.09.2021	Бертон Berton	2819	2819	
22228001	29.11.2023		Спеллкаст Spellcast	840	840	
Персик звичайний <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch Peach						
23259001	29.11.2023		П.Ф. 24-007 P.F.24-007	3208		
Черешня <i>Prunus avium</i> L. Sweet Cherry						
22262003	08.11.2023	20.12.2022	Тайна Taina	1601	1601	
22262004	08.11.2023	20.12.2022	Аніта Anita	1601	1601	

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Яблуня домашня <i>Malus domestica</i> Borkh.						
Apple						
19263002	22.11.2023		АНАБП 01 ANABP 01	2628	2628	
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch.						
Strawberry						
21294002	29.11.2023	12.11.2021	ФЕДЕРІКА FEDERIKA	2832	2832	
21294003	29.11.2023	12.11.2021	АРІАННА ARIANNA	2832	2832	
21294004	29.11.2023	12.11.2021	САНДРІНА SANDRINA	2832	2832	
Виноград справжній <i>Vitis vinifera</i> L.						
Grape, Grapevine						
21304005	06.11.2023		АРРАФІФТІН ARRAFIFTEEN	2824	2824	
21304007	22.11.2023	13.10.2021	АРРАТВЕНТІНАЙН ARRATWENTYNINE	2824	2824	
21304008	29.11.2023	18.10.2021	АРРАСЬОРТІ ARRATHIRTY	2824	2824	
Актинідія пурпурова х актинідія гостра <i>Actinidia purpurea</i> Rehd. x <i>Actinidia arguta</i> Planch.						
Purple Actinidia x Hardy Kiwifruit						
23368001	06.11.2023	12.04.2023	Славна Slavna	348	348	
Гірчиця біла <i>Sinapis alba</i> L.						
White Mustard						
20380001	22.11.2023		Вероніка Veronika	2726	2726	
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L.						
Maize, Corn – parental component						
19909226	14.11.2023	24.12.2019	СГ124 CG124	2264	2264	
19909236	14.11.2023	24.12.2019	ГФ15 GF15	2264	2264	
21909163	29.11.2023	08.12.2021	КВ 6ЕY0079 KW 6EY0079	2649	2649	
21909165	29.11.2023	09.12.2021	КВ 4ЕЦ2075 KW 4EC2075	2649	2649	
21909166	29.11.2023	09.12.2021	КВ 4ЕЦ2076 KW 4EC2076	2649	2649	
21909167	29.11.2023	10.12.2021	КВ 4ЕЦ2070 KW 4EC2070	2649	2649	
21909168	29.11.2023	10.12.2021	КВ 6ФД0043 KW 6FD0043	2649	2649	
21909169	29.11.2023	10.12.2021	КВ 9ЕY0115 KW 9EY0115	2649	2649	
21909170	29.11.2023	10.12.2021	КВ 9ФД0047 KW 9FD0047	2649	2649	
21909171	29.11.2023	13.12.2021	КВ 6ФЮ1809 KW 6FQ1809	2649	2649	
21909172	29.11.2023	13.12.2021	КВ 6ФЮ1906 KW 6FQ1906	2649	2649	
21909173	29.11.2023	13.12.2021	КВ 7ЕР1723 KW 7ER1723	2649	2649	
21909174	29.11.2023	13.12.2021	КВ 7ФП1991 KW 7FP1991	2649	2649	
21909175	29.11.2023	13.12.2021	КВ 9ФЮ1713 KW 9FQ1713	2649	2649	
22909038	29.11.2023	18.02.2022	К91 K91	2829	2829	
22909039	29.11.2023	18.02.2022	К17 K17	2829	2829	
22909040	29.11.2023	18.02.2022	К93 K93	2829	2829	
22909041	29.11.2023	18.02.2022	КС55 KS55	2829	2829	
22909042	29.11.2023	18.02.2022	К95 K95	2829	2829	
22909075	29.11.2023	06.04.2022	ЗМГ1А01 ZMG1A01	2829	2829	
22909076	29.11.2023	06.04.2022	ЗМГ4А03 ZMG4A03	2829	2829	
22909077	29.11.2023	06.04.2022	ЗМГ2401 ZMG2401	2829	2829	

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
22909078	29.11.2023	06.04.2022	ЗМГ4403 ЗМГ4403	2829	2829	
22909079	29.11.2023	06.04.2022	ЗМГ5505 ЗМГ5505	2829	2829	
22909080	29.11.2023	06.04.2022	БГ03001 BG03001	2829	2829	
22909081	29.11.2023	06.04.2022	БГ1679 BG1679	2829	2829	
22909130	22.11.2023	12.12.2022	КЮЛД47ФФ QLD47FF	793	793	
22909204	22.11.2023	12.12.2022	ПДА14ФФ PDA14FF	793	793	
23909019	22.11.2023	17.01.2023	ДБ1 DB1	793 2649	793 2649	
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component						
20939048	29.11.2023		ЛС 3008 С LC 3008 C	736	736	
20939114	29.11.2023	10.12.2020	БР004А BR004A	2743	2743	
20939155	29.11.2023		ЕХ933 EH933	2267	2267	
20939157	29.11.2023		РХ591 RH591	2267	2267	
21939012	29.11.2023	27.01.2021	Рф1122 Rf1122	2537	2537	
21939013	29.11.2023	27.01.2021	Рф3144 Rf3144	2537	2537	
21939022	29.11.2023	07.04.2021	ПП 01 PP 01	2793	2793	
21939023	29.11.2023	07.04.2021	ПМ 678 PM 678	2793	2793	
21939068	29.11.2023	30.11.2021	Х02020А-КЛ H02020A-CL	2649	2649	
21939072	29.11.2023	08.12.2021	ФР406ЛС00 FR406LS00	2643	1219	
21939073	29.11.2023	09.12.2021	ФС71549 FS71549	2643	1219	
21939074	29.11.2023	09.12.2021	ФР84241 FR84241	2643	1219	
21939080	29.11.2023	09.12.2021	ФР84289 FR84289	2643	1219	
21939081	29.11.2023	09.12.2021	ФР402ЛЦ00 FR402LC00	2643	1219	
21939082	29.11.2023	09.12.2021	ФА754ХС05 FA754HS05	2643	1219	
21939111	29.11.2023	23.12.2021	ФР842ЛН22 FR842LN22	2643	1219	
21939112	29.11.2023	23.12.2021	ФА306ЛН00 FA306LN00	2643	1219	
21939113	29.11.2023	23.12.2021	ФР407ЛН00 FR407LN00	2643	1219	
21939114	29.11.2023	28.12.2021	ЕХ500СУЛхМХ501 EH500SULxMH501	2267	2267	
22939022	22.11.2023	28.11.2022	Л71234МІОА L71234MIOA	793	793	

Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати

Information on issued certificates of state registration of varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Баклажан <i>Solanum melongena</i> L. Egg Plant					
22093005	02.12.2022	230932	МІРАБЕЛЬ MIRABELLE	1852	03.11.2023
Виноград справжній <i>Vitis vinifera</i> L. Grape, Grapvine					
21304005	13.10.2021	230974	АРРАФІФТІН ARRAFIFTEEN	2824	14.11.2023
Гарбуз мускатний <i>Cucurbita moschata</i> Duch. Butternut, Butternut Squash					
21228001	09.09.2021	231004	Бертон Berton	2819	27.11.2023
Горох посівний (озимий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea (Winter)					
21559001	09.07.2021	230693	Балкан Balkan	2804	08.11.2023
23559001	22.09.2023	230920	Паддл Paddle	796	07.11.2023
23559002	22.09.2023	230921	Апперкот Uppercut	796	07.11.2023
23559003	22.09.2023	230922	Ескрім Escrime	796	07.11.2023
Груша звичайна <i>Pyrus communis</i> L. Pear					
22258002	20.12.2022	230878	Вежа мускатна Vezha muskatna	1601	27.11.2023
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon					
20147001	12.05.2020	220665	Мілан MILAN	2020	22.11.2023
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon					
22146006	09.03.2022	230940	АМІНА AMINA	2020	22.11.2023
22146009	01.12.2022	230930	БРІКСБЕРРІ BRYXBERRY	1852	03.11.2023
22146005	07.03.2022	230939	ЄЛОВ ЛАВ YELLOW LOVE	2020	22.11.2023
20146003	12.05.2020	220667	Епіка EPICA	2662	22.11.2023
20146011	10.11.2020	230879	СВ3807BT SV3807WT	1852	03.11.2023
20146012	10.11.2020	230880	ГРІН ДЖАР GREEN JAR	1852	03.11.2023
Капуста цвітна <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L. Cauliflower					
20101001	12.05.2020	220670	ДЮРОК DUROK	2020	22.11.2023
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato					
20088019	26.11.2020	230977	Світана Svitana	1710	27.11.2023
23088009	11.10.2023	230848	Дейзі Daisy	2584	10.11.2023
20088020	26.11.2020	230978	Марфуша Marfusha	1710	27.11.2023
20088018	26.11.2020	230976	Фанатка Fanatka	1710	27.11.2023
20088017	26.11.2020	230975	Ростаविця Rostavytsia	1710	27.11.2023
19088002	20.02.2019	230573	Блю Бель Blue Belle	2584	07.11.2023
20088021	26.11.2020	230979	Меланія Melaniia	1710	27.11.2023
Конюшина лучна (червона) <i>Trifolium pratense</i> L. Red Clover					
20155002	23.06.2020	230946	Любава Liubava	1658	15.11.2023

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
20155003	29.09.2020	230856	Оплески	1626	01.11.2023
20155004	15.10.2020	230888	Андріана	3232	16.11.2023
Костриця червона <i>Festuca rubra</i> L. Red Fescue, Creeping Fescue					
21377002	15.11.2021	230857	Деметра	1626	01.11.2023
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
23009061	06.11.2023	231026	АКАНТО	2715	27.11.2023
23009063	06.11.2023	231027	КАБАРЕТТО	2715	27.11.2023
18009010	15.01.2018	231015	АГН340	2449	23.11.2023
18009009	15.01.2018	231014	АГН290	2449	23.11.2023
21009142	17.12.2021	230933	ЛІД2020Ц	2890	10.11.2023
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
19909226	24.12.2019	231012	СГ124	2264	27.11.2023
19909236	24.12.2019	231013	ГФ15	2264	27.11.2023
Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt. Sweet Corn					
21103005	03.06.2021	230947	НІКОЛЬ	2662	22.11.2023
21103008	30.11.2021	230938	ПАССІОН	744	03.11.2023
21103009	01.12.2021	230928	ВІЛЛІНГЕР	1852	03.11.2023
Лаванда вузьколиста <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. Lavender					
22052001	07.06.2022	230992	Айрін	2876	24.11.2023
Ліщина велика (фундук) <i>Corylus maxima</i> Mill. Hazelnut					
22286002	07.12.2022	230858	Березокорій	3090	04.11.2023
Льон звичайний (озимий) <i>Linum usitatissimum</i> L. Flax; Linseed					
21249001	09.07.2021	230824	ЛСЛ 1133	2804	08.11.2023
Льон низький (олійний, кудряш) <i>Linum humile</i> Mill. Linseed					
21035001	11.02.2021	230859	Ланселот	1626	01.11.2023
Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne					
18196001	15.01.2018	231028	АГН М72	2449	23.11.2023
23196002	11.10.2023	230959	ІЗОЛА	2440	08.11.2023
Морква <i>Daucus carota</i> L. Carrot					
23109001	08.08.2023	230507	Кентон	751	09.11.2023
Нут звичайний <i>Cicer arietinum</i> L. Chick-Pea					
20028001	16.11.2020	230893	Октавіус	1669	13.11.2023
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber					
20110012	10.11.2020	230891	БРАНДІНО	1852	03.11.2023
21110012	30.11.2021	230980	ГРАТЕН	1852	14.11.2023
21110013	01.12.2021	230981	ГРИФОН	1852	14.11.2023
23110008	08.08.2023	230508	Альшани	751	09.11.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Помідор істівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato					
21115034	30.11.2021	230929	ИНСИПIT INCIPIT	1852	03.11.2023
21115003	14.01.2021	230993	Спалах Spalakh	1802	22.11.2023
21115016	03.06.2021	230948	ХМ 9903 HM 9903	2662	22.11.2023
21115017	03.06.2021	230949	ХМ 5900 HM 5900	2662	22.11.2023
21115035	30.11.2021	230982	ХАКІМАРУ HAKUMARU	1852	14.11.2023
21115018	14.06.2021	221065	ОЛІВЕНЗА OLIVENZA	2662	22.11.2023
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
20012042	02.11.2020	230860	Новинка Novynka	2706	07.11.2023
21012022	12.04.2021	230647	ХАЙМАРС HIMARS	2788	22.11.2023
21012028	18.05.2021	231011	Декастер Dekaster	807	29.11.2023
21012039	20.07.2021	230678	СТК21Г STK21G	2788	22.11.2023
23012034	21.08.2023	230621	АРКАХОН ARCACHON	2788	22.11.2023
23012035	21.08.2023	230622	КОМІЛЬФО COMILFO	2788	22.11.2023
23012039	22.09.2023	230923	Селебріті Celebrity	796	07.11.2023
23012040	22.09.2023	230924	Провіденс Providence	796	07.11.2023
23012041	22.09.2023	230925	Базіліо Basilio	796	07.11.2023
23012042	22.09.2023	230926	Престанс Prestance	796	07.11.2023
Пшениця м'яка (яра) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Spring)					
20013003	13.05.2020	230861	Танок Tanok	1626	01.11.2023
20013004	13.05.2020	230862	Колос Поліський Kolos Poliskyi	1626	01.11.2023
Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter) – parental component					
23940014	04.08.2023	230960	Сінді КС Cindi CS	2890	10.11.2023
Ріпак (ярий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Spring)					
21041003	21.12.2021	230956	ІНВ300 КЛ ПС INV300 CL PS	2602	09.11.2023
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
21039088	17.12.2021	230844	ІНСАН 288 КЛП INSUN 288 CLP	2890	10.11.2023
21039090	17.12.2021	230966	1047 Л КЛП 1047 L CLP	2890	10.11.2023
21039091	17.12.2021	230847	ІНСАН 299 СУ INSUN 299 SU	2890	10.11.2023
21039105	28.12.2021	230845	1018Л КЛП 1018L CLP	2890	10.11.2023
21039106	28.12.2021	231054	Ліон Lion	2267	27.11.2023
21039107	28.12.2021	231055	Сульфостар Sulfostar	2267	27.11.2023
21039108	28.12.2021	231056	Маттіа Mattia	2267	27.11.2023
23039002	06.01.2023	230834	КСІЛО XILO	2440	08.11.2023
23039003	06.01.2023	230965	НЕМО NEMO	2440	08.11.2023
23039010	13.01.2023	230846	ІНСАН 120 INSUN 120	2890	10.11.2023
21039087	17.12.2021	230962	ЛІД1015Л СУ LID1015L SU	2890	10.11.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
21939087	17.12.2021	230972	P8035M2ЖІ R8035M2ЖІ	1435	10.11.2023
21939102	17.12.2021	230967	Ф19002МЖСА F19002МЖСА	1435	10.11.2023
21939098	17.12.2021	230968	Ф7АХ2МЖКОА F7АХ2МЖКОА	1435	10.11.2023
21939089	17.12.2021	230971	Р8035М1ЖС R8035М1ЖС	1435	10.11.2023
21939091	17.12.2021	230970	Р9ТК6С R9ТК6С	1435	10.11.2023
21939094	17.12.2021	230969	Р15ЕІ2М R15ЕІ2М	1435	10.11.2023
Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum					
23018001	27.01.2023	230936	ЗЕАЛАНДІЯ ZEALANDIA	2890	10.11.2023
Сочевиця харчова <i>Lens culinaris</i> Medik. Lentil					
21027001	08.11.2021	230994	РЕД RED	2260	15.11.2023
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean					
20045047	03.12.2020	230988	СЕЙЛОП Sailor	806	17.11.2023
21045024	17.12.2021	230963	ЛІД Конструктор LID Constructor	2890	10.11.2023
21045026	17.12.2021	230964	ЛІД Промотор LID Promotor	2890	10.11.2023
Хризантема шовковицелиста <i>Chrysanthemum x morifolium</i> Ramat Chrysanthemum					
22438004	05.12.2022	230950	Коралове намисто Koralove namysto	2075	14.11.2023
22438005	05.12.2022	230951	Прометей Prometei	2075	14.11.2023
22438006	05.12.2022	230952	Рожева діадема Rozheva diadema	2075	14.11.2023
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion					
20106006	10.11.2020	230892	АЛМАНЗОРО ALMANZORO	1852	03.11.2023
22106005	01.12.2022	230931	СВ4774НВ SV4774NW	1852	03.11.2023
Черешня <i>Prunus avium</i> L. Sweet Cherry					
22262004	20.12.2022	230996	Аніта Anita	1601	27.11.2023
22262003	20.12.2022	230995	Тайна Taina	1601	27.11.2023
Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple					
19263002	29.07.2019	231066	АНАБП 01 ANABP 01	2628	27.11.2023
23263001	15.02.2023	230953	Градїска Gradisca	3205	06.11.2023
Ячмінь звичайний (дворучка) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (both winter and spring)					
20612001	01.12.2020	230954	Русин Rusyn	1591	08.11.2023
20612002	01.12.2020	230955	Еволюція Evoliuksiia	1591	08.11.2023
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)					
21019005	12.04.2021	230648	АРТЕМ ARTEM	2788	22.11.2023
21019007	08.06.2021	230686	Тойто Teuto	1797	07.11.2023
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)					
22020004	24.01.2022	230870	Покоління Pokolinnia	2706	07.11.2023
20020008	02.11.2020	230867	Генерал Heneral	2706	07.11.2023

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
20020009	02.11.2020	230868	Незламний Nezlamnyi	2706	07.11.2023
20020010	02.11.2020	230869	Шубін Shubin	2706	07.11.2023

Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорти рослин та їх дублікати

Information on issued certificates of authorship for plant varieties and their duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety	Дата видачі Date of granting
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
17012015	15.03.2017	200295	Шаховка Shakhovka	Артюшенко Наталія Павлівна Artiushenko Nataliia Pavlivna	28.11.2023
17012015	15.03.2017	200295	Шаховка Shakhovka	Артюшенко Петро Миколайович Artiushenko Petro Mykolaiovych	28.11.2023
17012015	15.03.2017	200295	Шаховка Shakhovka	Артюшенко Юлія Петрівна Artiushenko Iuliia Petrivna	28.11.2023
17012015	15.03.2017	200295	Шаховка Shakhovka	Артюшенко Артем Петрович Artiushenko Artem Petrovych	28.11.2023
17012016	15.03.2017	200296	Шестал Shestal	Артюшенко Артем Петрович Artiushenko Artem Petrovych	28.11.2023
17012016	15.03.2017	200296	Шестал Shestal	Артюшенко Наталія Павлівна Artiushenko Nataliia Pavlivna	28.11.2023
17012016	15.03.2017	200296	Шестал Shestal	Артюшенко Петро Миколайович Artiushenko Petro Mykolaiovych	28.11.2023
17012016	15.03.2017	200296	Шестал Shestal	Артюшенко Юлія Петрівна Artiushenko Iuliia Petrivna	28.11.2023
18012002	08.02.2018	200787	Крепиш Krepysh	Артюшенко Артем Петрович Artiushenko Artem Petrovych	28.11.2023
18012002	08.02.2018	200787	Крепиш Krepysh	Артюшенко Юлія Петрівна Artiushenko Iuliia Petrivna	28.11.2023
18012002	08.02.2018	200787	Крепиш Krepysh	Артюшенко Наталія Павлівна Artiushenko Nataliia Pavlivna	28.11.2023
18012002	08.02.2018	200787	Крепиш Krepysh	Артюшенко Петро Миколайович Artiushenko Petro Mykolaiovych	28.11.2023
18012003	08.02.2018	210694	Очаківка Ochakovka	Артюшенко Артем Петрович Artiushenko Artem Petrovych	28.11.2023
18012003	08.02.2018	210694	Очаківка Ochakovka	Артюшенко Наталія Павлівна Artiushenko Nataliia Pavlivna	28.11.2023
18012003	08.02.2018	210694	Очаківка Ochakovka	Артюшенко Петро Миколайович Artiushenko Petro Mykolaiovych	28.11.2023
18012003	08.02.2018	210694	Очаківка Ochakovka	Артюшенко Юлія Петрівна Artiushenko Iuliia Petrivna	28.11.2023
21012040	22.07.2021	230580	Пам'яті Горлача Pam'iaty Horlacha	Чайка Анатолій Миколайович Chaika Anatolii Mykolaiovych	21.11.2023
21012040	22.07.2021	230580	Пам'яті Горлача Pam'iaty Horlacha	Дубова Оксана Анатоліївна Dubova Oksana Anatoliivna	21.11.2023
21012040	22.07.2021	230580	Пам'яті Горлача Pam'iaty Horlacha	Бурденюк-Тарасевич Лариса Антонівна Burdeniuk-Tarasevych Larysa Antonivna	21.11.2023
21012041	22.07.2021	230581	Трембіта білоцерківська Trembita bilotserkivska	Дубова Оксана Анатоліївна Dubova Oksana Anatoliivna	21.11.2023
21012041	22.07.2021	230581	Трембіта білоцерківська Trembita bilotserkivska	Чайка Анатолій Миколайович Chaika Anatolii Mykolaiovych	21.11.2023
21012041	22.07.2021	230581	Трембіта білоцерківська Trembita bilotserkivska	Бурденюк-Тарасевич Лариса Антонівна Burdeniuk-Tarasevych Larysa Antonivna	21.11.2023
Агрис звичайний <i>Ribes uva-crispa</i> L. Gooseberry					
23295001	01.02.2023	230644	Кам'яніград Kam'ianhrad	Мартиненко Світлана Василівна Martynenko Svitlana Vasylivna	28.11.2023
23295001	01.02.2023	230644	Кам'яніград Kam'ianhrad	Лушпіган Ольга Петрівна Lushpighan Olha Petrivna	28.11.2023
23295002	01.02.2023	230645	Петрівка Petrivka	Лушпіган Ольга Петрівна Lushpighan Olha Petrivna	28.11.2023
23295002	01.02.2023	230645	Петрівка Petrivka	Мартиненко Світлана Василівна Martynenko Svitlana Vasylivna	28.11.2023
23295003	01.02.2023	230646	Холодний яр Kholodnyi yar	Лушпіган Ольга Петрівна Lushpighan Olha Petrivna	28.11.2023
23295003	01.02.2023	230646	Холодний яр Kholodnyi yar	Мартиненко Світлана Василівна Martynenko Svitlana Vasylivna	28.11.2023
Актинідія пурпурова x актинідія гостра <i>Actinidia purpurea</i> Rehd. x <i>Actinidia arguta</i> Planch. Purple Actinidia x Hardy Kiwifruit					
23368002	12.04.2023	230637	Фортуна Fortuna	Скрипченко Надія Василівна Skrypchenko Nadiia Vasylivna	03.11.2023
23368002	12.04.2023	230637	Фортуна Fortuna	Книш Віта Петрівна Knysh Vita Petrivna	03.11.2023
23368003	12.04.2023	230638	Галаретка Halaretka	Скрипченко Надія Василівна Skrypchenko Nadiia Vasylivna	03.11.2023

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety	Дата видачі Date of granting
Аллея лікарська <i>Althaea officinalis</i> L. Marsh-mallow					
21452001	29.03.2021	220431	ГАРДІАН Guardian	Куценко Наталія Іванівна Kutsenko Nataliia Ivanivna	08.11.2023
21452001	29.03.2021	220431	ГАРДІАН Guardian	Глуценко Людмила Анатоліївна Hlushcenko Liudmyla Anatoliivna	08.11.2023
Материнка звичайна <i>Origanum vulgare</i> L. Origanum					
21489001	29.03.2021	220084	АЛЬТА ALTA	Глуценко Людмила Анатоліївна Hlushcenko Liudmyla Anatoliivna	08.11.2023
21489001	29.03.2021	220084	АЛЬТА ALTA	Куценко Наталія Іванівна Kutsenko Nataliia Ivanivna	08.11.2023
Чорнушка дамаська <i>Nigella damascena</i> L. Devil-in-a-bush					
22548001	20.12.2022	230642	Різдвяна зірочка Rizdviana zirochka	Шанайда Марія Іванівна Shanaida Mariia Ivanivna	03.11.2023
22548001	20.12.2022	230642	Різдвяна зірочка Rizdviana zirochka	Корабльова Ольга Анатоліївна Korablova Olha Anatoliivna	03.11.2023
Первоцвіт <i>Primula</i> L. Auricula					
23680001	12.05.2023	230639	Чумацький Шлях Chumatskyi Shliakh	Гнатюк Алла Миколаївна Hnatiuk Alla Mykolaivna	03.11.2023
23680001	12.05.2023	230639	Чумацький Шлях Chumatskyi Shliakh	Перебойчук Оксана Петрівна Pereboichuk Oksana Petrivna	03.11.2023
23680002	15.05.2023	230640	Лісова пісня Lisova pisnia	Перебойчук Оксана Петрівна Pereboichuk Oksana Petrivna	03.11.2023
23680003	12.05.2023	230641	Веснянка Vesnianka	Перебойчук Оксана Петрівна Pereboichuk Oksana Petrivna	03.11.2023
23680003	12.05.2023	230641	Веснянка Vesnianka	Гнатюк Алла Миколаївна Hnatiuk Alla Mykolaivna	03.11.2023

Відомості щодо припинення чинності майнового права на поширення сорту

Information on the termination of the validity of the property right to spread the variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
05004104	01.01.2009	20.11.2023	PR39B76 PR39B76	767	767
05004108	23.01.2008	20.11.2023	PR39P20 PR39R20	767	767
13009102	16.03.2017	20.11.2023	P7412 P7412	9	2715
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
04017024	11.01.2007	20.11.2023	PR63A40 PR63A40	767	767
07017020	30.11.2010	20.11.2023	PR64Ф50 PR64F50	1055	1055
09017213	21.03.2013	20.11.2023	P64ЛЕ20 P64LE20	1055	1055
09017324	01.04.2013	14.11.2023	ЕС Аміс СЛ ES Amis CL	806	806
10017171	04.03.2014	14.11.2023	ЕС Артїк ES Artic	806	806
11017095	29.12.2014	14.11.2023	ЕС НОВАМІС СЛ ES NOVAMIS CL	806	806
12017259	03.04.2015	20.11.2023	P64ГГ98 P64HH98	1688	1688
13039071	15.02.2016	14.11.2023	ЕС АНДРОМЕДА ES ANDROMEDA	806	806
13039073	12.02.2016	14.11.2023	ЕС ВЕРОНІКА ES VERONIKA	806	806
14039093	22.03.2017	14.11.2023	ЕС ІДІЛЛІК ES IDILLIC	806	806
15039020	28.01.2019	20.11.2023	P64ГГ123 P64HH123	9	2715
15039036	24.01.2018	20.11.2023	P64ЛЕ121 P64LE121	9	2715
15039064	05.02.2018	14.11.2023	ЕС ДОЛЬЧЕВІТА ES DOLCEVITA	806	806
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)					
06016035	20.12.2011	20.11.2023	PR45D03 PR45D03	767	767
07016025	10.10.2011	20.11.2023	PR 46 B 20 PR 46 W 20	767	767
07016026	10.10.2011	20.11.2023	PR 46 B 21 PR 46 W 21	767	767
08016026	29.01.2013	14.11.2023	ЕС Меркурій ES Merkurii	806	806
11016056	15.02.2016	20.11.2023	PX111КЛ PX111CL	1688	1688
11016057	15.02.2016	20.11.2023	PT228КЛ PT228CL	1688	1688
13040049	03.07.2017	20.11.2023	PT234 PT234	9	2715
13040051	03.07.2017	20.11.2023	PX115 PX115	9	2715
13040056	03.07.2017	20.11.2023	PT240ЦЛ PT240CL	9	2715
15040036	28.01.2019	20.11.2023	PT269 PT269	9	2715
15040041	28.01.2019	20.11.2023	PX126 PKh126	9	2715
17040001	10.10.2019	20.11.2023	PT274 PT274	9	2715
19040037	01.10.2021	20.11.2023	PX135 PX135	2715	2715
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
08004292	18.12.2009	20.11.2023	PXTD5 PHTD5	1055	1055
08004300	04.04.2013	20.11.2023	PX2R4 PH2R4	1690	1690

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
08004301	04.04.2013	20.11.2023	ПХ5ФТ	1690	1690
08004304	18.12.2009	20.11.2023	РН5ФТ		
08004305	18.12.2009	20.11.2023	ПХ1М8	1055	1055
10004302	01.04.2013	20.11.2023	РН1М8		
10004311	01.04.2013	20.11.2023	ПХ185	1055	1055
11004298	02.07.2014	20.11.2023	РН185		
11004303	27.03.2014	20.11.2023	ПХДОГ	1055	1055
11004306	27.03.2014	20.11.2023	РНДОГ		
11004307	27.03.2014	20.11.2023	ПХ15КГ	1055	1055
12004308	27.03.2015	20.11.2023	РН15КГ		
12004309	27.03.2015	20.11.2023	ПХЕХР	1688	1688
12004311	27.03.2015	20.11.2023	РНЕНР		
13909033	23.04.2015	20.11.2023	ПХХЕН	1690	1690
13909037	27.03.2015	20.11.2023	РННЕН		
13909040	27.03.2015	20.11.2023	ПХХ2В	1688	1688
13909041	27.03.2015	20.11.2023	РНН2В		
13909043	27.03.2015	20.11.2023	ПХ3ПР	1690	1690
13909044	27.03.2015	20.11.2023	РН3ПР		
13909168	21.02.2017	20.11.2023	ПХЙ0Б	1688	1688
13909171	21.02.2017	20.11.2023	РНЙ0Б		
13909175	15.02.2016	20.11.2023	ПХ1ВСФ	1690 1688	1690 1688
13909181	15.02.2016	20.11.2023	РН1WSF		
13909188	21.02.2017	20.11.2023	ПХ1ВСХ	1690 1688	1690 1688
13909189	21.02.2017	20.11.2023	РН1WSH		
13909269	27.04.2015	20.11.2023	ПХР4В	1690	1690
13909273	11.09.2015	20.11.2023	РНР4В		
13909287	11.09.2015	20.11.2023	ПХИ79	1690	1690
15909021	28.01.2019	20.11.2023	РНУ79		
15909023	24.01.2018	20.11.2023	ПХІ4Е	1690	1690
16909044	24.01.2018	20.11.2023	РНІ4Е		
16909047	24.01.2018	20.11.2023	ПХВ9Х2	1690	1690
16909052	25.04.2018	20.11.2023	РНВ9Х2		
16909056	24.01.2018	20.11.2023	ПХИ7А	1690	1690
16909069	24.01.2018	20.11.2023	РНУ7А		
17909093	12.02.2019	20.11.2023	ПХ15ЙТ	1688	1688
18909018	12.02.2019	20.11.2023	РН15ЈТ		
18909019	12.02.2019	20.11.2023	АЛО295 АЛО306	918	918
			АЛО295 АЛО306		
			Р1437 АЛО134Б	918	918
			Р1437 АЛО134В		
			АЛО295	918	918
			АЛО295		
			АЛ6124Б	918	918
			АЛ6124В		
			СЛК20	918	918
			СЛК20		
			ТВА569	918	918
			ТВА569		
			ПХ15КФ	9	2715
			РН15КФ		
			ПХАНА	9	2715
			РНАНА		
			ПХЖТР	9	2715
			РНЖТР		
			ПХЙ32	9	2715
			РНУ32		
			ПХЗД4	9	2715
			РНЗД4		
			ПХ137К	9	2715
			РН137К		
			ПХГВД	9	2715
			РНГВД		
			ПХ181Ц	9	2715
			РН181С		
			ПХ2ВЙ3	9	2715
			РН2VJ3		
			ПХ1МЙ5	9	2715
			РН1MЈ5		
			ПХ20ДА	9	2715
			РН20ДА		
			АД6136	2094	2094
			АД6136		
			АП6143	2094	2094
			АР6143		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
18909021	12.02.2019	20.11.2023	АЛ6395	2094	2094
18909022	12.02.2019	20.11.2023	АЛ6395	2094	2094
18909023	12.02.2019	20.11.2023	АС3070	2094	2094
18909024	12.02.2019	20.11.2023	АС3070	2094	2094
18909026	12.02.2019	20.11.2023	ЗАРЛЕ0012	2094	2094
21909076	01.03.2023	20.11.2023	ЗАРЛЕ0012	2715	2715
21909086	01.03.2023	20.11.2023	АН1075 АЛ0454	2715	2715
			АН1075 АЛ0454		
			АС3512 АЛ0216		
			АС3512 АЛ0216		
			ПХ4ГР7		
			РН4НР7		
			ПХ2И57		
			РН2У57		
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L.					
Sunflower – parental component					
08017182	20.11.2009	20.11.2023	У9612ЛМ	1055	1055
08017188	26.02.2010	20.11.2023	У9612ЛМ	1055	1055
08017190	20.11.2009	20.11.2023	Х711М	1055	1055
10017224	04.04.2013	20.11.2023	Kh711М	1690	1690
12017235	05.02.2015	20.11.2023	В0524ЛМ	1688	1688
12017236	05.02.2015	20.11.2023	В0524ЛМ	1688	1688
12017238	15.02.2016	20.11.2023	У06ВВХМ	1688	1688
12017240	05.02.2015	20.11.2023	У06ВВХМ	1688	1688
12017241	05.02.2015	20.11.2023	Ф0009ЛМ	1688	1688
12017242	05.02.2015	20.11.2023	Ф0009ЛМ	1688	1688
13939079	25.02.2016	20.11.2023	У0458ХФ	9	2715
16939060	24.01.2018	20.11.2023	У0458ХФ	9	2715
17939028	17.07.2018	20.11.2023	Е0012ЛФ	9	2715
			Е0012ЛФ		
			Ф0143ЛМ		
			Ф0143ЛМ		
			Т1075ЛМ		
			Т1075ЛМ		
			Т0989ХМ		
			Т0989ХМ		
			У1255СУЛФ		
			У1255СУЛФ		
Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i>					
Rape Seed (Winter) – parental component					
21940004	02.09.2022	20.11.2023	4ПДБИ26А	2715	2715
21940006	02.09.2022	20.11.2023	4РДВУ26А	2715	2715
			4ПНКВ29Р		
			4РНҚW29R		

Відомості щодо відновлення чинності майнового права на поширення сорту

Information on revalidation of the property right to spread the variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L.					
Sunflower					
10017125	01.04.2014	24.11.2023	Талмаз	1510	3235
10017126	01.04.2014	24.11.2023	Талмаз	1510	3235
10017128	19.10.2015	24.11.2023	Зімбру	1510	3235
12017162	16.03.2017	24.11.2023	Кодру	1510	3235
			Кодру		
			Чезар КЛ		
			Cezar CL		

Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Other notifications listed in the Plant Varieties Register in Ukraine

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 2009 від 20.11.2023 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, Державному реєстрі патентів на сорти рослин та Ре-

єстрі заявок» внесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Боби кормові	58043005	Хоростківські	1962	Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України	Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України
2	Пшениця м'яка (озима)	90007012	Збруч	1994		
3	Конюшина лучна (червона)	91052005	Тернопільська 3	1997		
4	Тютюн справжній	94019008	Тернопільський 14	1999		
5	Конюшина лучна (червона)	97052001	Тернопільська 4	2001		
6	Тютюн справжній	97019002	Берлей 38	2001		
7	Тютюн справжній	06019001	Тернопільський перспективний	2008		
8	Горошок посівний (вика) (ярий)	07047001	Цвітана	2011		
9	Конюшина лучна (червона)	09052001	Павлина	2014		
10	Тютюн справжній	13071002	Берлей 46	2016		
11	Горошок посівний (вика) (ярий)	14177001	Подільська рання	2018		
12	Тютюн справжній	18071001	Український Новий	2020		
13	Пшениця м'яка (озима)	18012073	Віталіна	2023		
14	Конюшина лучна (червона)	20155004	Андріана	2023		

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 2040 від 24.11.2023 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміни до відомостей, що містяться в Держав-

ному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Соняшник однорічний	10017126	Зімбру	2014	Товариство з обмеженою відповідальністю «АМГ-АГРОСЕЛЕКТ КОМЕРЦ» (SRL AMG Agroselect Comert)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Сідеко Семенсес» (SRL «Seedeco Semences»)
2	Соняшник однорічний	10017128	Кодру	2015		
3	Соняшник однорічний	10017125	Талмаз	2014		
4	Соняшник однорічний	12017162	Чезар КЛ	2017		

Відомості про відмову у державній реєстрації сорту та/або у державній реєстрації прав на сорт

Information on refusal of state registration of a variety and/or state registration of rights to a variety

Відомості про відмову у державній реєстрації сорту

Information on refusal of state registration of the variety

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відмови Date of refusal
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
20012034	03.07.2020	Пульмон Pulmon	а: 2668 б:	РС, АС NLI, АС	24.11.2023

Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні

List of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on plant varieties entered into the State Register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Сільськогосподарські: злаки Agricultural: Field cereal											
Пшениця м'яка (озима) Triticum aestivum L.											
Soft Wheat (Winter) (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.; Triticum vulgare Host.; Triticum hybernum L.; Triticum cereale Schrank; Triticum sativum Lam.)											
® 21012028	Декастер Dekaster / Dekaster	C3	807	807	807		2023	ЛП			
Ячмінь звичайний (ярий) Hordeum vulgare L.											
Barley (Spring) (Hordeum distichum jessen; Hordeum lagunculiforme (Bachtcev) Bachtcev ex Nikif.; Hordeum vulgare L. convar distichon L.; Hordeum vulgare L. ssp polystichum Hall Schinz et Kell; Hordeum vulgare (L.) emend. Vav. et Bacht.; Hordeum distichum L.; Hordeum distichon L. emend. Lam.; Hordeum aestivum Hall; Hordeum zeocriton L.; Zeocriton distichon; Zeocroton commune Beauv.; Hordeum vulgare ssp. distichum grex culta Regel; Hordeum sativum Jessen; Hordeum hexastichum L.)											
® 20020022	Гінґко Gingko / Gingko	C3	2657	1223	1223		2023				
21020004	РЖТ АСТЕРОЇД RGT ASTEROID / RGT ASTEROID	C3	1783	1783			2023				
® 20020023	Рут Ruth / Ruth	C3	2657	1223	1223		2023				
21020003	РЖТ ОРБІТЕР RGT ORBITER / RGT ORBITER	C3	1783	1783			2023				
Кукурудза звичайна Zea mays L.											
Maize, Corn (Zea americana; Zea alba; Zea vulgaris Mill.; Mays zea Gaertn; Zea segetalis Salisb.; Mays americana Baumg.; Thalasia mays O. Kuntze.)											
® 20009202	Туран Turap / Turap	F1	2655	2655	2655		2023	СЛП			
21009115	КВС ФОРТУРІО KWS FORTURIO / KWS FORTURIO	F1	2649	2649			2023	СЛ			
21009122	КВС ГАЛІЛЕО KWS GALILEO / KWS GALILEO	F1	2649	2649			2023	СЛ			
21009151	РЖТ Волкокс RGT Volcoxx / RGT Volcoxx	F1	1783	1783			2023				
22009048	Арабелла Arabella / Arabella	F1	2829	2829			2023	С			
21009125	КВС АДНАНО KWS ADNANO / KWS ADNANO	F1	2649	2649			2023	СЛ			
22009045	Лізавета Lisaveta / Lisaveta	F1	2829	2829			2023	С			
22009046	Валета Valeta / Valeta	F1	2829	2829			2023	С			
22009032	КС85ХП KS85XP / KS85XP	F1	2829	2829			2023	С			
22009047	Роланда Rolanda / Rolanda	F1	2829	2829			2023	СЛ			
18009010	АГН340 AGN340 / AGN340	F1	2449	2449			2023	СЛП	зерн		
18009009	АГН290 AGN290 / AGN290	F1	2449	2449			2023	СЛП	зерн		
20009090	4111Ц 4111C / 4111C	F1	844	844			2023				
22009030	КС94ХП KS94XP / KS94XP	F1	2829	2829			2023	С			
22009031	КС99ХП KS99XP / KS99XP	F1	2829	2829			2023	С			
21009113	КВС ГІПОЛІТО KWS HYPOLITO / KWS HYPOLITO	F1	2649	2649			2023	СЛП			
21009114	НАТАЕЛО NATAELO / NATAELO	F1	2649	2649			2023	С			

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
21009123	КВС МАУРІЛІО KWS MAURILIO / KWS MAURILIO	F1	2649	2649			2023	СЛ			
21009124	КВС АКАДО KWS ACADO / KWS ACADO	F1	2649	2649			2023	СЛП			
21009152	РЖТ ГЮККСО RGT HUXHO / RGT HUXHO	F1	1783	1783			2023				
21009143	СІКСТИНА SIXTINA / SIXTINA	F1	1783	1783			2023				
23009059	СЛ Енормо SL Enormo / SL Enormo	F1	2011	2011			2023				
23009060	Лігато Ligato / Ligato	F1	2011	2011			2023				
23009058	Магнато Magnato / Magnato	F1	2011	2011			2023				
23009061	АКАНТО AKANTO / AKANTO	F1	2715	2715			2023				
22009035	СТАЙН 9808HP STINE 9808HP / STINE 9808HP		2788	2788			2023	СЛ			
21009153	РЖТ Аксіональ RGT Axxional / RGT Axxional	F1	1783	1783			2023				
21009144	РЖТ ЗАНЕТИХХ ДУО RGT ZANETIXX DUO / RGT ZANETIXX DUO	F1	1783	1783			2023				
21009148	РЖТ ПРОДУХХІОН RGT PRODUXXION / RGT PRODUXXION	F1	1783	1783			2023				
21009149	РЖТ ЕЛЕКС RGT ALEXH / RGT ALEXH	F1	1783	1783			2023				
21009116	КВС ОЛТЕНІО KWS OLTENIO / KWS OLTENIO	F1	2649	2649			2023	СЛ			
21009117	КВС АМАТРІО KWS AMATRIO / KWS AMATRIO	F1	2649	2649			2023	СЛ			
21009119	КВС КОРНЕЛІО KWS CORNELIO / KWS CORNELIO	F1	2649	2649			2023	С			
21009147	РЖТ Велюкксо RGT Veluxho / RGT Veluxho	F1	1783	1783			2023				
21009112	КВС ВОЛЬТАРІО KWS VOLTARIO / KWS VOLTARIO	F1	2649	2649			2023	СЛ			
21009118	КВС БОЛІВІАНО KWS BOLIVIANO / KWS BOLIVIANO	F1	2649	2649			2023				
21009120	КВС ЕСТРЕЛЛО KWS ESTRELLO / KWS ESTRELLO	F1	2649	2649			2023	СЛП			
22009091	ДКС4031 DKC4031 / DKC4031	F1	844	844			2023				
22009130	РЖТ СЕДЕКС RGT CEDEXX / RGT CEDEXX	F1	1783	1783			2023				
Кукурудза звичайна – батьківський компонент Zea mays L. Maize, Corn – parental component											
19909236	ГФ15 GF15 / GF15	С3	2264	2264			2023	СЛП			
19909226	СГ124 CG124 / CG124	С3	2264	2264			2023	СЛП			
21909172	КВ 6ФЮ1906 KW 6FQ1906 / KW 6FQ1906	С3	2649	2649			2023				
21909165	КВ 4ЕЦ2075 KW 4EC2075 / KW 4EC2075	С3	2649	2649			2023				
22909039	К17 K17 / K17	С3	2829	2829			2023				
22909041	КС55 KS55 / KS55	С3	2829	2829			2023				
22909038	К91 K91 / K91	С3	2829	2829			2023				
22909040	К93 K93 / K93	С3	2829	2829			2023				
22909042	К95 K95 / K95	С3	2829	2829			2023				
21909163	КВ 6ЕУ0079 KW 6EY0079 / KW 6EY0079	С3	2649	2649			2023				
21909168	КВ 6ФД0043 KW 6FD0043 / KW 6FD0043	С3	2649	2649			2023				

Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
21909170	КВ 9ФД0047 KW 9FD0047 / KW 9FD0047	C3	2649	2649			2023				
21909171	КВ 6ФЮ1809 KW 6FQ1809 / KW 6FQ1809	C3	2649	2649			2023				
21909173	КВ 7ЕР1723 KW 7ER1723 / KW 7ER1723	C3	2649	2649			2023				
21909174	КВ 7ФП1991 KW 7FP1991 / KW 7FP1991	C3	2649	2649			2023				
22909204	ПДА14ФФ PDA14FF / PDA14FF	C3	793	793			2023				
22909130	КЮЛД47ФФ QLD47FF / QLD47FF	C3	793	793			2023				
23909019	ДБ1 DB1 / DB1	C3	793 2649	793 2649			2023				
22909078	ЗМГ4403 ZMG4403 / ZMG4403	C3	2829	2829			2023				
22909079	ЗМГ5505 ZMG5505 / ZMG5505	C3	2829	2829			2023				
22909080	БГ03001 BG03001 / BG03001	C3	2829	2829			2023				
22909076	ЗМГ4А03 ZMG4A03 / ZMG4A03	C3	2829	2829			2023				
22909081	БГ1679 BG1679 / BG1679	C3	2829	2829			2023				
21909166	КВ 4ЕЦ2076 KW 4EC2076 / KW 4EC2076	C3	2649	2649			2023				
21909169	КВ 9ЕЙ0115 KW 9EY0115 / KW 9EY0115	C3	2649	2649			2023				
21909167	КВ 4ЕЦ2070 KW 4EC2070 / KW 4EC2070	C3	2649	2649			2023				
21909175	КВ 9ФЮ1713 KW 9FQ1713 / KW 9FQ1713	C3	2649	2649			2023				
22909075	ЗМГ1А01 ZMG1A01 / ZMG1A01	C3	2829	2829			2023				
22909077	ЗМГ2401 ZMG2401 / ZMG2401	C3	2829	2829			2023				
Сільськогосподарські: бобові Agricultural: Field pulse											
Горох посівний (зерновий) Pisum sativum L.											
Pea (Pisum arvense L.; Pisum sativum L. convar axiphium Alef; Pisum sativum L. convar medullare Alef Emend C. O. Lehm; Pisum sativum L. convar sativum; Pisum sativum L. Schrank; Pisum uniflorum Hort.; Pisum macrospermum Hort.; Pisum vulgare Jundz.; Pisum sativum L. (s. amplissima) Gov.)											
21023008	Симбіоз Symbios / Symbios	C3	912	912			2023				
Сочевиця харчова Lens culinaris Medik.											
Lentil (Ervum lens L.; Lens esculenta Moench; Lathyrus lens Bernh.; Lens vulgaris Delarbre; Cicer lens Willd.; Ervum camelorum Spr.; Ervum dispernum Roxb.; Lens sativa Heller; Lens camelorum Webb. et Berth.; Lens disperma (Roxb.) Webb. et Berbh.; Vicia lens Coss. et Germ.; Lens nummularia; Lens abyssinica Alef.; Ervum pilosissimum Schur.; Lens culinaris ssp. esculenta Briq.)											
® 21027001	РЕД RED / RED	C3	2794	2260	2260		2023	ЛП			
Соя культурна Glycine max (L.) Merr.											
Soya Bean (Glycine max (L.) Merrill; Glycine hispida var. lutea Skvortsov; Glycine soja (L.) Merr.; Glycine hispida var. brunnea Skvortsov; Glycine gracilis Skvortsov; Phaseolus max L.; Dolichos soja L.; Soja hispida Moench; Phaseolus sordilis Salisb.; Soja japonica Savi; Soja angustifolia Miq.; Glycine tabacina; Glycine tomentosa Benth.; Glycine hispida (Moench) Maxim.; Soja soja Karst.; Soja max Piper)											
® 20045042	КОМБІНАТОР Combinator / Combinator	C3	806	806	806		2023	СЛП			
® 20045043	АТРАКТОР Attractor / Attractor	C3	806	806	806		2023	СЛП			
20045047	СЕЙЛОР Sailor / Sailor	C3	806	806			2023				
21045008	Санрайз Sanraiz / Sanraiz	C3	2831	2831			2023	СЛ			
17045056	Златопільська Zlatopil'ska / Zlatopil'ska	C3	2606	2606			2023	С			
17045055	Камея Kameia / Kameia	C3	2606	2606			2023	СЛП			
® 20045041	ЕС Компетитор ES Competitor / ES Competitor	C3	2890	2890	2890		2023	СЛП			

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
21045032	СТЕПА STEPA / STEPA	C3	1783	1783			2023				
22045030	СУЗА SUZA / SUZA	C3	1783	1783			2023				
21045009	Кобуко Кобуко / Kobuko	C3	1669	1669			2023	СЛП			
22045020	ОАЦ Камран OAC Kamran / OAC Kamran	C3	2557	2557			2023	СЛП			
21045029	РЖТ СІГМА RGT SIGMA / RGT SIGMA	C3	1783	1783			2023	СЛП			
21045030	РЖТ СЕФОРА RGT SEFORA / RGT SEFORA	C3	1783	1783			2023				
® 21045012	Кінгстон Kingston / Kingston	C3	2739	2739	2739		2023	СЛП			
22045019	ОАЦ Хастингс OAC Hastings / OAC Hastings	C3	2557	2557			2023	СЛП			
22045029	СУПЕРНОВА SUPERNOVA / SUPERNOVA	C3	1783	1783			2023				
22045023	СТАЙН 12Н23 STINE 12N23 / STINE 12N23		2788	2788			2023	СЛП			
22045024	СТАЙН 02Н23 STINE 02N23 / STINE 02N23		2788	2788			2023	СЛП			
22045021	СТАЙН 06Н02 STINE 06N02 / STINE 06N02		2788	2788			2023	СЛП			
22045022	СТАЙН 20Н23 STINE 20N23 / STINE 20N23		2788	2788			2023	СЛП			
Сільськогосподарські: круп'яні Agricultural: Field groats											
Сорго звичайне (двокольорове) Sorghum bicolor L.											
(Sorghum bicolor (L.) Moench; Holcus sorghum; Holcus bicolor L.; Holcus arduini Gmel.; Andropogon bicolor Roxb.; Andropogon halepensis var. bicolor Vined et Druce.)											
® 20018012	КВС АТЛАНТУС KWS ATLANTUS / KWS ATLANTUS	F1	2649	2649	2649		2023	СЛ			
® 21018001	ТИГРУС TIGRUS / TIGRUS	F1	2767	2767	2767		2023	СЛ			
Сільськогосподарські: олійні та прядивні Agricultural: Oil and Fibre											
Соняшник однорічний Helianthus annuus L.											
(Helianthus annuus [unranked] lenticularis (Douglas) Cockerell; Helianthus annuus subsp. annuus L.; Helianthus annuus subsp. jaegeri (Heiser) Heiser; Helianthus annuus subsp. lenticularis (Douglas) Cockerell; Helianthus annuus subsp. texanus Heiser; Helianthus grandiflorus Wender.; Helianthus cultus Venzl.; Helianthus ruderalis Venzl.)											
20039078	ЕХ20023 ESH20023 / ESH20023	F1	806	806			2023	СЛ			
® 20039081	1044Л СУ 1044L SU / 1044L SU	F1	806	806	806		2023	СЛ			
® 20039075	ІНСАН 222 КЛП INSUN 222 CLP / INSUN 222 CLP	F1	806	806	806		2023	СЛ			
® 20039077	Супернова СУ Supernova SU / Supernova SU	F1	806	806	806		2023	СЛ			
® 20039079	1025Л 1025L / 1025L	F1	806	806	806		2023	СЛ			
21039104	АРНЕТЕС СУ ARNETES SU / ARNETES SU	F1	2643	1219			2023				
22039009	ЄС Авалон ЄС Авалон / YeS Avalon	F1	2287	2287			2023	СЛ			
21039078	Н4Х413 КЛ N4H413 CL / N4H413 CL	F1	1985	1985			2023	СЛ			
22039014	СТК101 STK101 / STK101		2788	2788			2023	СЛ			
22039010	ЄС Пегас ЄС Пегас / YeS Pehas	F1	2287	2287			2023	С			
22039012	ЄС Тор ЄС Тор / YeS Tor	F1	2287	2287			2023	С			
21039099	Н4Л460 КЛ N4L460 CL / N4L460 CL	F1	1985	1985			2023	СЛ			
22039016	СТК103 STK103 / STK103		2788	2788			2023	Л			
22039011	ЄС Старк ЄС Старк / YeS Stark	F1	2287	2287			2023	С			
22039013	СТК102 STK102 / STK102		2788	2788			2023	Л			

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
® 20039073	ЕС ТАНАІС КЛП ES TANAIS CLP / ES TANAIS CLP	F1	806	806	806		2023	СЛ			
® 20039082	ІНСАНХО 200 КЛП INSANHO 200 CLP / INSANHO 200 CLP	F1	806	806	806		2023	СЛ			
® 21039102	Маріголдес Marigoldes / Marigoldes	F1	2643	1219	1219		2023	С			
® 21039106	Ліон Lion / Lion	F1	2267	2267	2267		2023	С			
® 21039107	Сулфостар Sulfostar / Sulfostar	F1	2267	2267	2267		2023	С			
® 21039108	Мамміа Mattia / Mattia	F1	2267	2267	2267		2023	С			
22039041	ЛГ58561 КЛ LG 58561 CL / LG 58561 CL	F1	793	793			2023				
22039065	ДОВЕР КЛП DOVER CLP / DOVER CLP	F1	2643	1219			2023				
23039036	Н4Х404 КЛ N4H404 CL / N4H404 CL	F1	1985	1985			2023				
23039041	Н4Л102 КЛ N4L102 CL / N4L102 CL	F1	1985	1985			2023				
23039037	Арунасан ІР Arunasun IR / Arunasun IR	F1	2011	2011			2023				
® 20039080	ІНСАН 110 INSUN 110 / INSUN 110	F1	2890	2890	2890		2023	СЛ			
® 21039067	Пронтосол Prontosol / Prontosol	F1	1498	1498	1498		2023				
22039015	СТК104 STK104 / STK104		2788	2788			2023	Л			
21039092	Базаллт Basallt / Basallt	F1	1783	1783			2023				
21039093	Овелл Owell / Owell	F1	1783	1783			2023				
21039068	СИ КОРСІКА АР SY CORSICA AR / SY CORSICA AR	F1	2643	1219			2023	СЛ			
21039097	Мілос КЛП Milos CLP / Milos CLP	F1	1783	1783			2023				
21039071	СИ ЛАЗУРІ КЛП SY LAZURI CLP / SY LAZURI CLP	F1	2643	1219			2023	СЛ			
21039094	Нобіліс КЛП Nobillis CLP / Nobillis CLP	F1	1783	1783			2023				
21039072	СУРЕСТ SUREST / SUREST	F1	2643	1219			2023	СЛ			
21039076	СУЛІАНО SULIANO / SULIANO	F1	2643	1219			2023	СЛ			
Соняшник однорічний – батьківський компонент Sunflower – parental component			<i>Helianthus annuus</i> L. (<i>Helianthus annuus</i> [unranked] <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus erythrocarpus</i> Bartl.; <i>Helianthus multiflorus</i> Hook.; <i>Helianthus grandiflorus</i> Wender.; <i>Helianthus cultus</i> Venzl.; <i>Helianthus ruderalis</i> Venzl.)								
20939048	ЛС 3008 С LC 3008 C / LC 3008 C		736	736			2023	СЛП			
® 20939114	БР004А BR004A / BR004A	С3	2743	2743	2743		2023	СЛ			
21939012	Рф1122 Rf1122 / Rf1122	С3	2537	2537			2023	СЛП			
21939013	Рф3144 Rf3144 / Rf3144	С3	2537	2537			2023	СЛП			
20939157	РХ591 RH591 / RH591	С3	2267	2267			2023	СЛП			
21939113	ФР407ЛН00 FR407LN00 / FR407LN00	С3	2643	1219			2023	СЛП			
® 21939068	Х02020А-КЛ H02020A-CL / H02020A-CL	С3	2649	2649	2649		2023	СЛП			
20939155	ЕХ933 EH933 / EH933	С3	2267	2267			2023	СЛП			
21939023	ПМ 678 PM 678 / PM 678	С3	2793	2793			2023	СЛП			
21939114	ЕХ500СУЛxМН501 EH500SULxMH501 / EH500SULxMH501	F1	2267	2267			2023	СЛП			

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
21939022	ПП 01 ПП 01 / PP 01	C3	2793	2793			2023	СЛП			
21939073	ФС71549 FS71549 / FS71549	C3	2643	1219			2023	СЛП			
21939074	ФР84241 FR84241 / FR84241	C3	2643	1219			2023	СЛП			
21939080	ФР84289 FR84289 / FR84289	C3	2643	1219			2023	СЛП			
21939081	ФР402ЛЦ00 FR402LC00 / FR402LC00	C3	2643	1219			2023	СЛП			
21939082	ФА754ХС05 FA754HS05 / FA754HS05	C3	2643	1219			2023	СЛП			
21939111	ФР842ЛН22 FR842LN22 / FR842LN22	C3	2643	1219			2023	СЛП			
21939112	ФА306ЛН00 FA306LN00 / FA306LN00	C3	2643	1219			2023	СЛП			
21939072	ФР406ЛС00 FR406LS00 / FR406LS00	C3	2643	1219			2023	СЛП			
22939022	Л71234МІОА L71234MIOA	C3	793	793			2023				
Ріпак (ярий) <i>Brassica napus L. oleifera</i> Rape Seed (Spring) (<i>Brassica napus</i> var. <i>napus</i>; <i>Brassica napus</i> L. emend. Metzg. ssp. <i>napus</i>; <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk; <i>Brassica napus</i> L. var. <i>oleifera</i> Metzg.; <i>Brassica oleifera</i> Moench.; <i>Brassica oleifera</i> Delile; <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> Metzg.; <i>Brassica rapa</i> L. ssp. <i>napus</i> Briquet.)											
21041002	Коктейль КЛ Cocktail CL / Cocktail CL	F1	912	912			2023	Л			
Гірчиця біла <i>Sinapis alba L.</i> White Mustard (<i>Raphanus albus</i> Crantz; <i>Sinapis hispida</i> Tenore; <i>Bonnania officinalis</i> Presl; <i>Napus leucosinapis</i> Schimper et Sponner.; <i>Sinapistrum album</i> Chev.; <i>Eruca alba</i> Noulet; <i>Brassica alba</i> Rabenhorst; <i>Crucifera lampsana</i> Krause; <i>Sinapis dissecta</i> Lag.; <i>Brassica dissecta</i> Schmalh.)											
20380001	Вероніка Veronika / Veronika	C3	2726	2726			2023	СЛП			
Льон звичайний, довгунець <i>Linum usitatissimum L.</i> Flax, Linseed (<i>Linum usitatissimum</i> L. f. <i>elongata</i>, <i>Linum usitatissimum</i> L. var. <i>intermedia</i> Vav et Ell, <i>Proles elongata</i> Vav et Ell, <i>Linum humile</i> Mill.)											
20081008	Жайворонок Жайворонок / Zhaivoronok	C3	1936	1936	1936		2023	П			
Сільськогосподарські: буряк Agricultural: Beet Буряк цукровий <i>Beta vulgaris L. ssp. vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet (<i>Beta vulgaris L. ssp. europeae</i> convar. <i>saccharifera</i> (Alef.) Krass.; <i>Beta vulgaris</i> provar. <i>altissima</i> Doll.; <i>Beta alba</i> Langenthal.; <i>Beta vulgaris L. ssp. saccharifera</i> Alef.)											
21069024	БАЛАНСІЯ КВС BALANCIA KWS / BALANCIA KWS	F1	2649	2649	2649		2023	ЛП			
21069028	СМАРТ МАТЕРІЯ КВС SMART MATERIA KWS / SMART MATERIA KWS	F1	2649	2649	2649		2023	ЛП			
21069027	ЯНАСОФІЯ КВС JANASOFIJA KWS / JANASOFIJA KWS	F1	2649	2649	2649		2023	ЛП			
21069034	САЛЬВАТОРІКА КВС SALVATORICA KWS / SALVATORICA KWS	F1	2649	2649	2649		2023	ЛП			
23069002	Фредерік Frederic / Frederic	F1	2552	2552			2023				
21069012	Хаббл Hubble / Hubble	F1	2552	2552			2023	ЛП			
21069010	Микеланджело Michelangelo / Michelangelo	F1	2552	2552			2023	ЛП			
21069030	СМАРТ ЛІЕННА КВС SMART LIENNA KWS / SMART LIENNA KWS	F1	2649	2649	2649		2023	ЛП			
21069031	СМАРТ МОДЕНТА КВС SMART MODENTA KWS / SMART MODENTA KWS	F1	2649	2649	2649		2023	ЛП			
23069003	Огест August / August	F1	2552	2552			2023				
Сільськогосподарські: картопля Agricultural: Potato Картопля <i>Solanum tuberosum L.</i> Potato (<i>Solanum tuberosum</i> ssp. <i>tuberosum</i>; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>chiloense</i> DC.; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>cultum</i> DC.; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>sabini</i> DC.; <i>Solanum fonckii</i> Phil.; <i>Solanum chiloense</i> (DC.) Benth.; <i>Solanum cultum</i> (DC.) Berth.; <i>Solanum sabini</i> (DC.) Berth.; <i>Solanum subandigenum</i> Hawk.; <i>Solanum andigenum</i> var. <i>grauense</i> Varg.; <i>Solanum andigenum</i> var. <i>digitobatosum</i> Varg.; <i>Solanum andigenum</i> var. <i>carhua</i> Varg.)											
20088019	Світана Світана / Svitana		1710	1710	1710		2023	ЛП			

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
® 20088020	Марфуша Марфуша / Marfusha		1710	1710	1710		2023	П			
® 20088021	Меланія Меланія / Melaniia		1710	1710	1710		2023	ЛП			
® 20088018	Фанатка Фанатка / Fanatka		1710	1710	1710		2023	ЛП			
® 20088017	Роставиця Роставиця / Rostavytsia		1710	1710	1710		2023	ЛП			
Сільськогосподарські: кормові Agricultural: Fodder											
Люцерна посівна Lucerne <i>Medicago sativa</i> L.											
(<i>Medicago falcata</i> Lam. (non L.); <i>Medicago coerulea</i> Less.)											
18196001	АГН М72 AGN M72 / AGN M72	П	2449	2449			2023				
20196006	Персія Носівська Персія Носівська / Persiia Nosivska	С	1990	1990			2023	ЛП			
Сільськогосподарські: овочеві Agricultural: Vegetable											
Гарбуз звичайний Pumpkin <i>Cucurbita pepo</i> L.											
(<i>Cucurbita pepo</i> L. subsp. <i>ovifera</i> (L.) D. S. Decker var. <i>ovifera</i> (L.) Harz; <i>Cucurbita pepo</i> L. subsp. <i>pepo</i> var. <i>pepo</i>; <i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>montia</i> Duch; <i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>patisson</i> Duch; <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov; <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>meloepo</i> (L.) Harz; <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>styriaca</i> Greb.; <i>Cucurbita meloepo</i>; <i>Cucurbita marsupiiiformis</i> Haberle; <i>Citrullus variegatus</i> Schrad.; <i>Cucurbita succado</i> Naud.; <i>Cucurbita hybrida</i> Bertol.)											
23150001	Енцо Enzo / Enzo	F1	2011	2011			2023				
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC.											
White Cabbage (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>capitata</i> L. f. <i>alba</i> DC.; <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L.; <i>Brassica capitata</i> DC.; <i>Brassica oleracea</i> ssp. <i>capitata laevis</i> Metzg.; <i>Brassica oleracea</i> L.: <i>Brassica</i> (White Cabbage))											
® 20096003	Слобожаночка Слобожаночка / Slobozhanochka	С	1781	1781	1781		2023	СЛП	овоч		
Капуста червоноголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>rubra</i> DC.											
Red Cabbage (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>rubra</i> (L.) Thell.; <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>capitata</i> L. f. <i>rubra</i> (L.) Thell.; <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L.; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> L.; <i>Brassica capitata</i> DC.; <i>Brassica oleracea</i> ssp. <i>capitata laevis</i> Metzg.; <i>Brassica oleracea</i> L.: <i>Brassica</i> (Red Cabbage Group))											
23097001	Тінті Tinty / Tinty	F1	2086	2086			2023				
Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt.											
Sweet Corn (<i>Zea mays</i> L. <i>saccharata</i> Koern.)											
23103006	ВAV8028 WAV8028 / WAV8028	С3	1960	1960			2023				
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L.											
Cucumber (<i>Cucumis sativus</i> <i>chiar</i> Forsk.; <i>Cucumis esculentus</i> Salisb.; <i>Cucumis muricatus</i> Willd.)											
21110012	ГРАТЕН GRATEN / GRATEN		1852	1852			2023	ЗГр	свж		
21110013	ГРИФОН GRYPHON / GRYPHON		1852	1852			2023	ЗГр	свж		
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L.											
Tomato (<i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill.; <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.; <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst. ex Farwell; <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst.; <i>Lycopersicon lycopersicon</i> Britt. et Brown; <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. ssp. <i>esculentum</i> Prokh.)											
21115003	Спалах Спалах / Spalakh	С3	1802	1802			2023	Л	свж		
® 18115007	Базилевс Bazylevs / Bazylevs	С3	1781	1781	1781		2023	СЛ	свж, конс		
23115024	Родіон Rodion / Rodion	F1	2529	1418			2023	СЛ			
® 20115017	Арабат Arabat / Arabat	F1	3221	3221	3221		2023	С	свж, пер		
® 20115018	Презент херсонський Презент херсонський / Present khersonskiy	С3	3221	3221	3221		2023	С			
® 21115037	Сонцедар Сонцедар / Sontsedar	С3	1781	1781	1781		2023	СЛ	свж, пер, конс		
® 23115023	Зухраза Zuhrasa / Zuhrasa	F1	1730	1730	1730		2023	ЗГр	свж		
21115035	ХАКІМАРУ HAKUMARU / HAKUMARU		1852	1852			2023	ЗГр	свж		
Салат посівний листковий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>secalina</i>											
Lettuce (<i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>crispa</i> L.)											
® 23120005	Ліадін Liadine / Liadine	С	1730	1730	1730		2023	ЗГр	свж		

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Шпинат городній <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinach (<i>Spinacia domestica</i> Borkh.)											
21130002	Трайлбосс <i>Trailboss / Trailboss</i>		840	840			2023	СЛПЗГр	свж		
21130001	Траверс <i>Traverse / Traverse</i>		840	840			2023	СЛПЗГр	свж		
Гарбуз мускатний <i>Cucurbita moschata</i> Duch. Butternut, Butternut Squash, Cheese Pumpkin (<i>Cucurbita moschata</i> Duchesne; <i>Cucurbita moschata</i> (Duch.) Duch. ex Poir.)											
© 21228001	Бертон <i>Berton / Berton</i>		2819	2819	2819		2023	С	свж, пер		
22228001	Спеллкаст <i>Spellcast / Spellcast</i>		840	840			2023	СЛПЗГр	свж, пер		
Плодові та ягідні Fruit and Berry Яблуня домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple (<i>Malus pumila</i> Mill var. <i>domestica</i>; <i>Purus malus</i> L.; <i>Malus communis</i> Lam.)											
19263002	АНАБП 01 <i>ANABP 01 / ANABP 01</i>		2628	2628			2023	СЛ	свж	осін	
Черешня <i>Prunus avium</i> L. Sweet Cherry (<i>Prunus avium</i> (L.) L.; <i>Cerasus avium</i> (L.) Moench; <i>Prunus avium</i> Moench; <i>Prunus cerasus</i> var. <i>avium</i> L.; <i>Cerasus nigra</i> Mill.; <i>Cerasus dulcis</i> Gaertn.; <i>Cerasus ruscina</i> DC.; <i>Cerasus juliana</i> DC.)											
© 22262003	Тайна <i>Taina / Taina</i>		1601	1601	1601		2023	СЛ	ун	сс	
© 22262004	Аніта <i>Anita / Anita</i>		1601	1601	1601		2023	СЛ	ун	сс	
Персик звичайний <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch Peach (<i>Persica vulgaris</i> Mill.; <i>Prunus</i> L. subg. <i>persica</i>; <i>Amygdalus persica</i> L.; <i>Prunus persica</i> Stokes; <i>Prunus persica</i> var. <i>vulgaris</i> Maxim.; <i>Prunus persica</i> var. <i>desna</i> Makino.)											
23259001	П.Ф. 24-007 <i>P.F.24-007 / P.F.24-007</i>		3208	3208			2023	СЛП	ун	пс	
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry (<i>Fragaria × ananassa</i> Duch.; <i>Fragaria grandiflora</i> Ehrh. non (L.) Crantz)											
© 21294002	ФЕДЕРИКА <i>FEDERIKA / FEDERIKA</i>		2832	2832	2832		2023	СЛПЗГр	ун	рсдн	
© 21294003	АРИАННА <i>ARIANNA / ARIANNA</i>		2832	2832	2832		2023	СЛПЗГр	ун	рс	
© 21294004	САНДРІНА <i>SANDRINA / SANDRINA</i>		2832	2832	2832		2023	СЛПЗГр	ун	рс	
Актинідія пурпурова х актинідія гостра <i>Actinidia purpurea</i> Rehd. × <i>Actinidia arguta</i> Planch. Purple Actinidia x Hardy Kiwifruit (<i>Actinidia purpurea</i> × <i>Actinidia argute</i>)											
© 23368001	Славна <i>Slavna / Slavna</i>		348	348	348		2023	ЛП	ун	сс	
Виноград <i>Grapevine</i> Виноград справжній <i>Vitis vinifera</i> L. Grape, Grapevine (<i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>sativa</i> (DC.) Hegi; <i>Vitis vinifera spontanea</i> M. Pop.)											
21304008	АРРАСЬОРТИ <i>ARRATHIRTY / ARRATHIRTY</i>		2824	2824			2023	С	стл	рс	
21304005	АРРАФІФТИН <i>ARRAFIFTEEN / ARRAFIFTEEN</i>		2824	2824			2023	С	стл	сс	
21304007	АРРАТВЕНТИНАЙН <i>ARRATWENTYNINE / ARRATWENTYNINE</i>		2824	2824			2023	С	стл	рс	
Декоративні та лікарські Ornamental and Healing Лаванда вузьколиста <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. Lavender (<i>Lavandula officinalis</i> Chaix ex Villars; <i>Lavandula vera</i> DC.; <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. ssp. <i>angustifolia</i>; <i>Lavandula vulgaris</i> var. <i>a</i> Lam; <i>Lavandula fragrans</i> Jord.; <i>Lavandula spica</i> L. var. <i>a</i> Lam; <i>Lavandula vera</i> DC.)											
© 22052001	Айрін <i>Airin / Airin</i>		2876	2876	2876		2023	СЛП	ун		

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ЗЛАКИ

Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна – батьківський компонент
Пшениця м'яка (озима)
Ячмінь звичайний (озимий)



Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності

Official descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009048 Назва сорту: Арабелла Заявник (код): 2829 Власник сорту (код): 2829

Дата пріоритету: 06.04.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231174

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої кількості
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,87	8,06	6,73
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,09	7,18	5,89
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,22	-0,88	-0,84
+, - до усередненої урожайності, %	25,1	-10,9	-12,5
Довірчий інтервал, т/га	0,26	0,21	0,22
Тривалість періоду вегетації, днів	102	105	106
Висота рослини, см	181,8	221,5	212,8
Вихід зерна, %	80,7	80,5	81,6
Висота прикріплення качана, см	71,3	86,4	76,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	33	17,1	11,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,5	4,9	4,2
Вміст білка, %	9,7	8,7	8,6
Вміст крохмалю, %	71,3	72,8	72,8
Стійкість до посухи, бал	6	6	7
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	6	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	4	9	6
Група стиглості (ФАО)	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009046 Назва сорту: Валета Заявник (код): 2829 Власник сорту (код): 2829

Дата пріоритету: 06.04.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231172

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	дуже ранній	1	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,92	7,27	6,65
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,34	-1,24	-0,67
+, - до усередненої урожайності, %	6,1	-14,6	-9,2
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	112	116	118
Висота рослини, см	196,2	229,8	213,1
Вихід зерна, %	81,5	78,5	81,6
Висота прикріплення качана, см	69,5	85,3	73,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	35,8	6,4	10,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,9	3,8	3,7
Вміст білка, %	9,8	8,8	9,1
Вміст крохмалю, %	71,6	72,9	72,1
Стійкість до посухи, бал	6	6	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	5	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009125 Назва сорту: КВС АДНАНО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата пріоритету: 08.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231125

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,71	8,89	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	8,02	9,76	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,31	0,87	
+, - до усередненої урожайності, %	19,5	9,8	
Довірчий інтервал, т/га	0,38	0,24	
Тривалість періоду вегетації, днів	131	130	
Висота рослини, см	223,5	253,4	
Вихід зерна, %	82,9	83,2	
Висота прикріплення качана, см	74,3	83,6	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	27,3	11,3	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,3	5,1	
Вміст білка, %	9	7,9	
Вміст крохмалю, %	73,4	74,6	
Стійкість до посухи, бал	6	9	
Стійкість до вилягання, бал	8	7	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	
Група стиглості (ФАО)	4	4	
Напрямок використання	зерн	зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009124 Назва сорту: КВС АКАДО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата пріоритету: 08.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231124

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,51	8,67	7,41
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,93	0,16	0,09
+, - до усередненої урожайності, %	34,6	1,9	1,2
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	116	117	120
Висота рослини, см	202,2	246,3	238,8
Вихід зерна, %	84,4	80,4	81,9
Висота прикріплення качана, см	73	88,4	80,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	48,2	15,9	19,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,1	5,3	3,5
Вміст білка, %	8,8	7,9	8,3
Вміст крохмалю, %	73,3	74,4	73,8
Стійкість до посухи, бал	8	9	7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	6	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	5	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009117 Назва сорту: КВС АМАТІО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата пріоритету: 08.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231118

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,62	8,91	6,97
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,04	0,40	-0,35
+, - до усередненої урожайності, %	18,6	4,7	-4,8
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	113	115	118
Висота рослини, см	211	248,7	236,9
Вихід зерна, %	84,5	81,5	81,4
Висота прикріплення качана, см	79,2	96,4	88
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	45	30,6	19,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,2	4,8	3,6
Вміст білка, %	8,9	8,2	8,4
Вміст крохмалю, %	73	73,8	74
Стійкість до посухи, бал	6	7	6
Стійкість до вилягання, бал	8	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	4	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	5	9	6
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009118 Назва сорту: КВС БОЛІВІАНО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата пріоритету: 08.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231119

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,86	9,17	7,08
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,28	0,66	-0,24
+, - до усередненої урожайності, %	40,9	7,8	-3,3
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	114	116	119
Висота рослини, см	211,2	243,9	239,3
Вихід зерна, %	85,2	80,2	83,5
Висота прикріплення качана, см	77,5	88,6	88,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	30,8	12,3	17,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,3	5,7	4,1
Вміст білка, %	9,1	8,1	8,7
Вміст крохмалю, %	73,1	74,6	73,3
Стійкість до посухи, бал	7	9	6
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009112 Назва сорту: КВС ВОЛЬТАРІО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата пріоритету: 08.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231113

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої кількості
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,81	8,51	7,13
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,23	0,00	-0,19
+, - до усередненої урожайності, %	22,0	0,0	-2,6
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	115	120	117
Висота рослини, см	203,2	242,1	242
Вихід зерна, %	82,1	79,6	82
Висота прикріплення качана, см	79,3	88,6	84,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	28,3	14,1	12,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4	4,2	3,9
Вміст білка, %	8,7	7,8	7,6
Вміст крохмалю, %	73	74,7	74,3
Стійкість до посухи, бал	6	8	7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	6	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009122 Назва сорту: КВС ГАЛІЛЕО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата пріоритету: 08.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231122

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	8,96	9,59	7,62
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,93	0,66	-0,38
+, - до усередненої урожайності, %	48,6	7,4	-4,8
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, днів	122	126	129
Висота рослини, см	220,5	253,6	248,6
Вихід зерна, %	85,6	81,4	80,9
Висота прикріплення качана, см	75,5	90,8	94
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	46	22	10,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,4	3,9	3,8
Вміст білка, %	8,4	7,3	8,4
Вміст крохмалю, %	73	75,5	73,8
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009113 Назва сорту: КВС ГІПОЛІТО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата пріоритету: 08.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231114

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої кількості
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	8,30	9,73	8,42
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,27	0,80	0,42
+, - до усередненої урожайності, %	37,6	9,0	5,3
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, днів	124	127	129
Висота рослини, см	233,8	256,5	252,8
Вихід зерна, %	86,2	81,3	82,5
Висота прикріплення качана, см	80	93,8	94
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	44,8	8,9	7,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,5	4	4,3
Вміст білка, %	8,9	7,9	8
Вміст крохмалю, %	72,4	74,2	73,6
Стійкість до посухи, бал	7	9	7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	7
Стійкість проти гельмінтоспороюзу, бал	7	9	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009120 Назва сорту: КВС ЕСТРЕЛЛО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата пріоритету: 08.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231121

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,99	9,08	7,70
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,41	0,57	0,38
+, - до усередненої урожайності, %	25,3	6,7	5,2
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	117	119	118
Висота рослини, см	219,5	253,4	235,4
Вихід зерна, %	83,4	80,7	82,9
Висота прикріплення качана, см	80,3	91,4	85,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	47,8	15,9	11,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,3	3,7	3,8
Вміст білка, %	9,4	8	8,4
Вміст крохмалю, %	72,9	73,7	73,6
Стійкість до посухи, бал	7	9	6
Стійкість до вилягання, бал	6	8	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	7
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009119 Назва сорту: КВС КОРНЕЛІО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата пріоритету: 08.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231120

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,84	8,38	6,66
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,26	-0,13	-0,66
+, - до усередненої урожайності, %	4,7	-1,5	-9,0
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	115	116	119
Висота рослини, см	209,7	247,8	236,9
Вихід зерна, %	81,8	79	83
Висота прикріплення качана, см	76,3	89,3	82,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	59,8	25,4	14,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,7	3,7	4,1
Вміст білка, %	9	7,8	8,3
Вміст крохмалю, %	72,9	74,8	74,3
Стійкість до посухи, бал	6	3	6
Стійкість до вилягання, бал	9	7	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	5	6	6
Стійкість проти гельмінтоспороюзу, бал	7	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009123 Назва сорту: КВС МАУРІЛІО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата пріоритету: 08.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231123

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	9,57	9,09	7,84
+, - до усередненої урожайності, т/га	3,54	0,16	-0,16
+, - до усередненої урожайності, %	58,7	1,8	-2,0
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, днів	122	126	128
Висота рослини, см	216	254,1	242,6
Вихід зерна, %	85,1	80,3	82,9
Висота прикріплення качана, см	77,5	93,4	89,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	52,8	19	21,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,7	4,4	3,7
Вміст білка, %	8,5	7,5	8,1
Вміст крохмалю, %	73,4	75,4	74,5
Стійкість до посухи, бал	6	9	7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	6	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	6	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009116 Назва сорту: КВС ОЛТЕНІО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата пріоритету: 08.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231117

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	8,06	9,64	7,68
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,03	0,71	-0,32
+, - до усередненої урожайності, %	33,7	8,0	-4,0
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, днів	122	127	129
Висота рослини, см	211,5	247,6	236,9
Вихід зерна, %	85,3	80,9	82,6
Висота прикріплення качана, см	69	87,3	84,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	48	14,9	8,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,7	4	3,8
Вміст білка, %	9	7,6	7,6
Вміст крохмалю, %	73,2	75	74,4
Стійкість до посухи, бал	5	9	7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	7
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	4	7
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009115 Назва сорту: КВС ФОРТУРІО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата пріоритету: 08.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231116

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	8,30	10,32	7,85
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,27	1,39	-0,15
+, - до усередненої урожайності, %	37,6	15,6	-1,9
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, діб	121	127	128
Висота рослини, см	217,5	248,9	236,1
Вихід зерна, %	84,8	81,6	83,5
Висота прикріплення качана, см	68,7	87,5	83,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	49,3	6,8	6,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3	3,4	4,1
Вміст білка, %	9	7,3	8,2
Вміст крохмалю, %	73	74,5	74,4
Стійкість до посухи, бал	7	9	6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009032 Назва сорту: КС85ХП Заявник (код): 2829 Власник сорту (код): 2829

Дата пріоритету: 18.02.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231169

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	до помірного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,26	7,46	6,96
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,68	-1,05	-0,36
+, - до усередненої урожайності, %	30,1	-12,3	-4,9
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	116	115	118
Висота рослини, см	204,5	242,8	229,4
Вихід зерна, %	83,3	79,3	82,9
Висота прикріплення качана, см	81,3	91,1	79,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	35,8	18,7	6,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,5	4,1	3,9
Вміст білка, %	9,7	8,4	8,4
Вміст крохмалю, %	71,9	73,3	73,1
Стійкість до посухи, бал	7	5	7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	6	9	9
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009030 Назва сорту: КС94ХП Заявник (код): 2829 Власник сорту (код): 2829

Дата пріоритету: 18.02.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231167

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,21	8,83	6,91
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,18	-0,10	-1,09
+, - до усередненої урожайності, %	19,6	-1,1	-13,6
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, днів	123	125	127
Висота рослини, см	224,8	253,7	232
Вихід зерна, %	81,1	80	81,8
Висота прикріплення качана, см	84,3	100,1	89,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	37	20,3	6,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,8	3,8	3,5
Вміст білка, %	9,4	7,7	8,6
Вміст крохмалю, %	72,7	74,3	72,4
Стійкість до посухи, бал	6	9	7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009031 Назва сорту: КС99ХП **Заявник (код):** 2829 **Власник сорту (код):** 2829

Дата пріоритету: 18.02.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231168

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,71	8,89	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,70	7,76	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,01	-1,13	
+, - до усередненої урожайності, %	-0,1	-12,7	
Довірчий інтервал, т/га	0,38	0,24	
Тривалість періоду вегетації, днів	130	132	
Висота рослини, см	222	251,7	
Вихід зерна, %	81,8	79,9	
Висота прикріплення качана, см	78	92,6	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	43,7	27,2	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,6	4,5	
Вміст білка, %	9,1	8,2	
Вміст крохмалю, %	72,8	74,3	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	
Стійкість проти гельмінтоспороюзу, бал	7	9	
Група стиглості (FAO)	4	4	
Напрямок використання	зерн	зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009045 Назва сорту: Лізавета Заявник (код): 2829 Власник сорту (код): 2829

Дата пріоритету: 06.04.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231171

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,87	8,06	6,73
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,78	7,01	6,43
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,91	-1,05	-0,30
+, - до усередненої урожайності, %	18,7	-13,0	-4,5
Довірчий інтервал, т/га	0,26	0,21	0,22
Тривалість періоду вегетації, днів	104	106	105
Висота рослини, см	195	236,2	219,3
Вихід зерна, %	81,9	80,9	82
Висота прикріплення качана, см	76,2	93,9	86,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	43,7	24,3	9,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,5	5,2	3,8
Вміст білка, %	9,2	8,1	8,5
Вміст крохмалю, %	71,8	73,8	73,3
Стійкість до посухи, бал	6	5	6
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	6	9	7
Група стиглості (FAO)	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009114 Назва сорту: НАТАЕЛО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата пріоритету: 08.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231115

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,13	8,17	7,04
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,55	-0,34	-0,28
+, - до усередненої урожайності, %	27,8	-4,0	-3,8
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	115	119	116
Висота рослини, см	213,5	232,6	236,6
Вихід зерна, %	81,1	80	82,8
Висота прикріплення качана, см	78,8	87,3	88,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	35	12	18,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,3	4,7	3,5
Вміст білка, %	8,9	7,7	8
Вміст крохмалю, %	72,9	74,6	73,8
Стійкість до посухи, бал	6	6	6
Стійкість до вилягання, бал	8	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	6	9	9
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009047 Назва сорту: Роланда Заявник (код): 2829 Власник сорту (код): 2829

Дата пріоритету: 06.04.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231173

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	до щільного
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,35	8,51	7,02
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,77	0,00	-0,30
+, - до усередненої урожайності, %	13,8	0,0	-4,1
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	113	115	119
Висота рослини, см	194,8	228,1	213,8
Вихід зерна, %	82,2	78,4	81,2
Висота прикріплення качана, см	64,7	80,8	72,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	43,7	8	7,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,2	3,7	3,8
Вміст білка, %	9,6	8,8	9,1
Вміст крохмалю, %	72,3	72,8	72,2
Стійкість до посухи, бал	6	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	7
Стійкість проти гельмінтоспороюзу, бал	5	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009035 Назва сорту: СТАЙН 9808ХП Заявник (код): 2788 Власник сорту (код): 2788

Дата пріоритету: 10.03.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231170

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,43	9,76	7,17
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,40	0,83	-0,83
+, - до усередненої урожайності, %	6,6	9,3	-10,4
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, днів	126	129	129
Висота рослини, см	198,2	235,6	229,1
Вихід зерна, %	81,2	81,9	81,6
Висота прикріплення качана, см	74,3	84,7	82,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	31,7	6,3	6,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	7,3	4,3	3,9
Вміст білка, %	10,5	7,7	8,4
Вміст крохмалю, %	71,7	74	73,3
Стійкість до посухи, бал	4	9	6
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909104 Назва сорту: 1ПВНВ47 Заявник (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.11.2023 Патент № 230692

Дата пріоритету: 19.10.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909105 Назва сорту: 1ПТФТ47 **Заявник (код):** 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.11.2023 **Патент № 230693**

Дата пріоритету: 19.10.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	малий	3	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909075 Назва сорту: ЗМГ1А01 **Заявник (код):** 2829 **Власник сорту (код):** 2829

Дата пріоритету: 06.04.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231160

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	до округлої
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	до малого
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	до короткого
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	до проміжного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909077 Назва сорту: ЗМГ2401 **Заявник (код):** 2829 **Власник сорту (код):** 2829

Дата пріоритету: 06.04.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231162

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	до помірного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	до дуже довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909078 Назва сорту: ЗМГ4403 Заявник (код): 2829 Власник сорту (код): 2829

Дата пріоритету: 06.04.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231163

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	до сильної
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909076 Назва сорту: ЗМГ4А03 Заявник (код): 2829 Власник сорту (код): 2829

Дата пріоритету: 06.04.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231161

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильного
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вужька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусна	1	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	до зубовидноподібної
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909079 Назва сорту: ЗМГ5505 Заявник (код): 2829 Власник сорту (код): 2829

Дата пріоритету: 06.04.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231164

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909080 Назва сорту: БГ03001 **Заявник (код):** 2829 **Власник сорту (код):** 2829

Дата пріоритету: 06.04.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231165

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	до помірної
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірною
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	пром'язаний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909081 Назва сорту: БГ1679 **Заявник (код):** 2829 **Власник сорту (код):** 2829

Дата пріоритету: 06.04.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231166

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	до сильного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	до короткої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 19909236 Назва сорту: ГФ15 **Заявник (код):** 2264 **Власник сорту (код):** 2264

Дата пріоритету: 24.12.2019

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231013

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909039 Назва сорту: K17 Заявник (код): 2829 Власник сорту (код): 2829

Дата пріоритету: 18.02.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231156

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	до довгої
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909038 Назва сорту: K91 **Заявник (код):** 2829 **Власник сорту (код):** 2829

Дата пріоритету: 18.02.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231155

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	до малого
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	до циліндричної
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909040 Назва сорту: K93 Заявник (код): 2829 Власник сорту (код): 2829

Дата пріоритету: 18.02.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231157

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	до малого
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	до дуже довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	до проміжного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909042 Назва сорту: K95 Заявник (код): 2829 Власник сорту (код): 2829

Дата пріоритету: 18.02.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231159

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	до помірнього
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	до помірнього
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	до короткої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	до довгої
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909167 Назва сорту: KB 4EЦ2070 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата пріоритету: 10.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231104

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	до округлої
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	до помірної
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909165 Назва сорту: KB 4EЦ2075 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата пріоритету: 09.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231102

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	до помірної
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	до зубовидноподібної
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909166 Назва сорту: KB 4EЦ2076 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата пріоритету: 09.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231103

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	до помірної
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	до малого
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909163 Назва сорту: KB 6EY0079 Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата пріоритету: 08.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231101

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середнього
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	до зубовидноподібної
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	до оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909168 Назва сорту: КВ 6ФД0043 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата пріоритету: 10.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231105

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	до помірного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	до малого
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	до короткої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	до циліндричної
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909171 Назва сорту: KB 6ФЮ1809 Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата пріоритету: 13.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231108

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	до короткого
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	до проміжного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909172 Назва сорту: KB 6ФЮ1906 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата пріоритету: 13.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231109

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	до слабкого
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабкого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	до проміжного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909173 Назва сорту: KB 7EP1723 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата пріоритету: 13.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231110

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909174 Назва сорту: KB 7ФП1991 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата пріоритету: 13.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231111

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	до помірної
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	до циліндричної
31	Качан: кількість зернових рядів	ознака не визначалась	0	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	до зубовидноподібної
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909169 Назва сорту: KB 9EY0115 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата пріоритету: 10.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231106

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	до помірної
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909170 Назва сорту: KB 9ФД0047 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата пріоритету: 10.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231107

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	до помірної
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірної
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	до оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909175 Назва сорту: KB 9ФЮ1713 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата пріоритету: 13.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231112

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909041 Назва сорту: КС55 Заявник (код): 2829 Власник сорту (код): 2829

Дата пріоритету: 18.02.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231158

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабкого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабкого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909098 Назва сорту: ПХ4ДЗС Заявник (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.11.2023 Патент № 230691

Дата пріоритету: 19.10.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабке	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	довга	7	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909097 Назва сорту: ПХ4ДЗЦ **Заявник (код):** 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.11.2023 **Патент № 230690**

Дата пріоритету: 19.10.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	довга	7	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 19909226 Назва сорту: СГ124 Заявник (код): 2264 Власник сорту (код): 2264

Дата пріоритету: 24.12.2019

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231012

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 21012028 Назва сорту: Декастер Заявник (код): 807 Власник сорту (код): 807

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.11.2023 Патент № 230711

Дата пріоритету: 18.05.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231011

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
2	Рослина: габітус (форма куща)	прямий	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	дуже ранній	1	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	до дуже сильного
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	до сильної
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	до сильного
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: киль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	шилоподібні	3	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	слабкий	3	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,94	8,82	8,05
±, - до усередненої урожайності, т/га	2,61	1,85	1,79
±, - до усередненої урожайності, %	49,0	26,5	28,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, дів	272	267	265
Висота рослини, см	80,4	75,1	81,6
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,5	43,5	42,6
Вміст білка, %	13,8	13,4	12,9
Вміст сирової клейковини, %	28,6	26,2	28
Показник альвеографа (W), о.а.	282	275	278,3
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	920	910	896,7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість до обсипання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	9	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		5	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	9	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		9,0	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 20019007 Назва сорту: Єкатеріна **Заявник (код):** 2524 **Власник сорту (код):** 2524

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.11.2023 **Патент № 230725**

Дата пріоритету: 22.05.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.11.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220657

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	велика	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків	відсутнє	1	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	ознака не визначається	0	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	довгий	7	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	великий	7	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: забування внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	наявне	9	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	широкий (біля основи остюка напливи)	3	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	ознака не визначалась	0	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	розвинутий	2	
43	Квіткова луска: форма основи	скошена	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,24	6,65	6,29
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,17	6,49	6,80
+ , - до усередненої урожайності, т/га	1,93	-0,16	0,51
+ , - до усередненої урожайності, %	36,8	-2,4	7,7
Довірчий інтервал, т/га	0,19	0,19	0,13
Тривалість періоду вегетації, діб	270	267	263
Висота рослини, см	91,6	86,5	86,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	50,9	52	50,3
Вміст білка, %	13,5	13	11,7
Стійкість до вилягання, бал	8	7	8
Стійкість до обсипання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	9	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	9	8
Стійкість проти гелмінтоспоріозу, бал	7	8	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	8
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 21019008 Назва сорту: Юлія **Заявник (код):** 807 **Власник сорту (код):** 807

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.11.2023 **Патент № 230717**

Дата пріоритету: 18.05.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.09.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230632

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків	відсутнє	1	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	ознака не визначається	0	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення в просторі	пряме	1	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	шість	2	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	сильне	7	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	наявне	9	
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	ромбічна	7	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	наявне	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	ознака не визначалась	0	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	ознака не визначалась	0	
43	Квіткова луска: форма основи	скошена	2	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: БОБОВІ

Сочевиця харчова
Соя культурна



Вид: Сочевиця харчова *Lens culinaris* Medik.

Заявка № 21027001 Назва сорту: РЕД **Заявник (код):** 2794 **Власник сорту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 03.11.2023 **Патент № 230664**

Дата пріоритету: 08.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230994

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: забарвлення	оранжеве	1	
2	Рослина: габітус	прямий	1	
3	Рослина: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Рослина: за висотою (під час цвітіння)	середня	5	
5	Рослина: інтенсивність галузнення	сильна	7	
6	Листок: форма	еліптична	1	
7	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
8	Листок: кількість листочків	велика	7	
9	Листочок: розмір	малий	3	
10	Суцвіття: кількість квіток на вузлі	дві або три	4	
11	Квітка: розмір	середній	5	
12	Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
13	Квітка: фіолетові смуги на парусі	наявні	9	
14	Квітка: фіолетові смуги на крилах	відсутні	1	
15	Біб: інтенсивність забарвлення (перед збиральною стиглістю)	помірна	5	
16	Біб: кількість насінневих зачатків	два або три	4	
17	Біб: забарвлення за збиральною стиглістю	жовте	1	
18	Біб: за довжиною (без дзьобика) (як для 17)	середній	5	
19	Біб: за шириною	вузький	3	
20	Біб: форма верхівки (як для 17)	від заокругленої до загостреної	2	
21	Суха насіннина: за шириною	середня	5	
22	Суха насіннина: профіль у поздовжньому розрізі	еліптичний	1	
23	Суха насіннина: кількість кольорів	один	1	
24	Суха насіннина: основне забарвлення шкірки	вохристе	5	
25	Лише для сортів з двома і більше забарвленнями шкірки. Суха насіннина: тип орнаментатії	ознака не визначається	0	
26	Сухе насіння: маса	мала	3	
27	Час цвітіння	пізній	7	
28	Час досягання	пізній	7	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 2,41. Тривалість періоду вегетації, діб – 81. Висота рослин, см – 47. Висота прикріплення нижнього бобу, см – 16. Вміст білка, % – 26,2. Стійкість бобів до розтріскування, бал (1–9) – 7. Дружність досягання, бал (1–9) – 7. Маса 1000 насінин, г – 35,5. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (*Ascochyta ervicola* Syd., *Ascochyta lentis* Vassil.) – 7; фузаріоз (*Fusarium oxysporum* Schlecht.) – 5; в'янення бактеріальне (*Corynebacterium insidiosum* (Mc Cull.) Jons.) – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиця – 3.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 21045010 Назва сорту: Абіола **Заявник (код):** 1564 **Власник сорту (код):** 1564

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 **Патент № 230750**

Дата пріоритету: 12.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.09.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230627

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	прямий	1	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкоюйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 21045011 Назва сорту: Аполліна **Заявник (код):** 1564 **Власник сорту (код):** 1564

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 **Патент № 230751**

Дата пріоритету: 12.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.09.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230628

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 20045043 Назва сорту: АТРАКТОР **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 10.02.2023 **Патент № 230131**

Дата пріоритету: 03.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231099

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (тричастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,49	3,68	3,27
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,64	0,60	0,33
+, - до усередненої урожайності, %	34,6	19,5	11,2
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	98	110	117
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	157,9	184,7	180,6
Висота рослини, см	66,1	92,2	90,4
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,9	10,3	11,3
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	7	9	9
Стійкість до посухи, бал	6	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	7	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	7
Вміст білка, %	39,4	40	39,2
Вміст олії, %	23,2	22	22,4
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 20045041 Назва сорту: ЕС Компетітор **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.08.2023 **Патент № 230363**

Дата пріоритету: 03.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231097

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостреноїцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	біле	1	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінина: забарвлення сім'янтжки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від раннього до середнього	4	
20	Рослина: час досягання	від середнього до пізнього	6	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,20	3,00
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,85	3,96	3,20
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,78	0,76	0,20
+, - до усередненої урожайності, %	37,7	23,7	6,7
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	122	132	138
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	135,3	166,1	158,7
Висота рослини, см	75,3	103,3	111,6
Висота прикріплення нижнього бобу, см	17,9	19,3	20,9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість до обсипання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	6	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	6
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	5
Стійкість проти септоріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	41	41,5	40,3
Вміст олії, %	19,2	18,5	18,7
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 17045056 Назва сорту: Златопільська **Заявник (код):** 2606 **Власник сорту (код):** 2606

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231096

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	прямий	1	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкоюцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	біле	1	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,20	2,89	2,64
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,35	-0,19	-0,30
+, - до усередненої урожайності, %	18,9	-6,2	-10,2
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, днів	99	114	118
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	167,2	182,3	159,6
Висота рослини, см	73,2	84,5	85,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,4	10,8	11,2
Стійкість до вилягання, бал	8	6	8
Стійкість до обсипання, бал	7	8	8
Стійкість до посухи, бал	5	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	7	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	7	8	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	7
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	7	9	9
Вміст білка, %	40,3	40,3	38,4
Вміст олії, %	21,4	20,7	21,6
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 17045055 Назва сорту: Каменя **Заявник (код):** 2606 **Власник сорту (код):** 2606

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231095

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	біле	1	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,20	3,00
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	3,26	3,16	2,99
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,19	-0,04	-0,01
+, - до усередненої урожайності, %	57,5	-1,2	-0,3
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, дів	118	122	132
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	158,4	152,3	134,5
Висота рослини, см	71	89,2	99
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,9	12,7	14,5
Стійкість до вилягання, бал	8	6	8
Стійкість до обсипання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	7	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	37,3	39,2	35,9
Вміст олії, %	22,9	22,8	23,2
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, вл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 21045012 Назва сорту: Кінгстон **Заявник (код):** 2739 **Власник сорту (код):** 2739

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 **Патент №** 230752

Дата пріоритету: 16.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231100

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,69	3,51	3,59
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,84	0,43	0,65
+, - до усередненої урожайності, %	45,4	14,0	22,1
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	110	116	121
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	196	210	190,3
Висота рослини, см	52,4	75,7	75,6
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11	10,2	13,3
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсипання, бал	6	9	9
Стійкість до посухи, бал	6	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	7	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	7	7	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	6	9	9
Вміст білка, %	38,7	40,2	37,9
Вміст олії, %	22,3	21,3	23,2
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 21045009 Назва сорту: Кобуко Заявник (код): 1669 Власник сорту (код): 1669

Дата пріоритету: 02.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231062

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	прямий	1	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	3,03	3,68	3,42
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,18	0,60	0,48
+, - до усередненої урожайності, %	63,8	19,5	16,3
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	108	115	119
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	204,3	197,5	183,6
Висота рослини, см	65,8	84,8	90,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,7	12,7	14,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсипання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	6	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	9
Стійкість проти септоріозу, бал	8	9	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	7	9	8
Вміст білка, %	39	39,1	37,3
Вміст олії, %	22,4	22,3	22,9
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, вл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 20045042 Назва сорту: КОМБІНАТОР **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 10.02.2023 **Патент №** 230130

Дата пріоритету: 03.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231098

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,20	3,00
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,77	3,52	3,37
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,70	0,32	0,37
+, - до усередненої урожайності, %	33,8	10,0	12,3
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	115	117	126
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	169,1	176,2	171,7
Висота рослини, см	66,7	87,7	89,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,3	12,3	17,5
Стійкість до вилягання, бал	8	9	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	6	7	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	8
Вміст білка, %	41,8	43,2	42,8
Вміст олії, %	20,9	19,5	19,5
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 22045020 Назва сорту: ОАЦ Камран **Заявник (код):** 2557 **Власник сорту (код):** 2557

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231065

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	прямий	1	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від раннього до середнього	4	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,20	3,00
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,84	3,31	3,54
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,77	0,11	0,54
+, - до усередненої урожайності, %	37,2	3,4	18,0
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, дб	123	122	126
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	202,8	212,8	183,3
Висота рослини, см	62,6	82	86,7
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,4	10,5	12,2
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість до обсипання, бал	8	8	9
Стійкість до посухи, бал	8	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	7	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	7	9	8
Вміст білка, %	40,4	42,6	38,1
Вміст олії, %	22,4	20,6	22,5
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 22045019 Назва сорту: ОАЦ Хастингс **Заявник (код):** 2557 **Власник сорту (код):** 2557

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231064

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (тричастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від раннього до середнього	4	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,20	3,00
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,77	3,40	3,48
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,70	0,20	0,48
+, - до усередненої урожайності, %	33,8	6,3	16,0
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	122	123	129
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	183,3	214,1	191,1
Висота рослини, см	60,3	82,2	82,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,3	12	13
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсипання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	7	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	7	9	7
Вміст білка, %	38,4	40,6	37,5
Вміст олії, %	22,7	21,4	22,8
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 21045029 Назва сорту: РЖТ СІГМА **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Дата пріоритету: 20.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231063

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,49	3,02	2,88
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,64	-0,06	-0,06
+, - до усередненої урожайності, %	34,6	-1,9	-2,0
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	105	113	112
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	180,1	196,3	174,1
Висота рослини, см	58,8	70	75,1
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,5	11,2	12,5
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	5	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	6
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	39,4	39,8	36,7
Вміст олії, %	22,2	22,1	23,3
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, вл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 21045008 Назва сорту: Санрайз **Заявник (код):** 2831 **Власник сорту (код):** 2831

Дата пріоритету: 02.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231061

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричнєве	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,24	3,23	2,82
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,39	0,15	-0,12
+, - до усередненої урожайності, %	21,1	4,9	-4,1
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	105	107	116
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	207	216,4	189
Висота рослини, см	64	83,5	76,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,3	12,7	13
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість до обсипання, бал	7	9	8
Стійкість до посухи, бал	5	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	7	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	8
Стійкість проти септоріозу, бал	7	7	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	7	9	8
Вміст білка, %	40	40,6	37,9
Вміст олії, %	21,7	21,3	22,6
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 22045024 Назва сорту: СТАЙН 02Н23 **Заявник (код):** 2788 **Власник сорту (код):** 2788

Дата пріоритету: 09.03.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231154

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінневі оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінневі оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,20	3,00
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	3,08	3,40	3,68
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,01	0,20	0,68
+, - до усередненої урожайності, %	48,8	6,3	22,7
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, дб	124	126	129
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	189,7	202,9	185,7
Висота рослини, см	58,1	74,8	83,6
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11	11,5	12,2
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	9
Стійкість до посухи, бал	6	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	9
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	7	9	8
Вміст білка, %	36,9	38,3	36,2
Вміст олії, %	23,5	22	22,8
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 22045021 Назва сорту: СТАЙН 06Н02 **Заявник (код):** 2788 **Власник сорту (код):** 2788

Дата пріоритету: 04.03.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231151

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	коричневе	5	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,20	3,00
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,71	3,32	3,53
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,64	0,12	0,53
+, - до усередненої урожайності, %	30,9	3,8	17,7
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, днів	122	126	131
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	158,6	181	171,5
Висота рослини, см	56,4	70,8	85,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	7,8	9,5	13,8
Стійкість до вилягання, бал	9	7	8
Стійкість до обсіпання, бал	7	9	9
Стійкість до посухи, бал	4	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	7	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	7	9	9
Вміст білка, %	37,2	39,4	36,1
Вміст олії, %	23,1	21,2	22,6
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напряма використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 22045023 Назва сорту: СТАЙН 12Н23 Заявник (код): 2788 Власник сорту (код): 2788

Дата пріоритету: 09.03.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231153

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінневій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,20	3,00
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,86	3,31	3,34
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,79	0,11	0,34
+, - до усередненої урожайності, %	38,2	3,4	11,3
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	123	126	133
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	186,4	204,4	178,3
Висота рослини, см	58,5	77,5	85,6
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,7	12,3	14,3
Стійкість до вилягання, бал	9	7	8
Стійкість до обсипання, бал	8	8	7
Стійкість до посухи, бал	6	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	7	9	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	7	9	8
Вміст білка, %	37,7	39,2	36,7
Вміст олії, %	23,9	21,3	22,1
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 22045022 Назва сорту: СТАЙН 20Н23 **Заявник (код):** 2788 **Власник сорту (код):** 2788

Дата пріоритету: 09.03.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231152

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,20	3,00
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	3,05	3,25	3,40
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,98	0,05	0,40
+, - до усередненої урожайності, %	47,3	1,6	13,3
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, днів	126	129	141
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	156	155,8	154
Висота рослини, см	63,2	76,8	92
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,6	11,3	13,7
Стійкість до вилягання, бал	9	7	8
Стійкість до обсіпання, бал	7	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	36,6	39	35,1
Вміст олії, %	23	21,3	22,4
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напряма використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КРУП'ЯНІ

Сорго звичайне (двокольорове)



Вид: Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.

Заявка № 20018012 Назва сорту: КВС АТЛАНТУС **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.01.2023 **Патент №** 230103

Дата пріоритету: 18.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231176

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля	помірне	5	
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	пізній	7	
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	низька	3	
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	темне	7	
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	дуже сильне	9	
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	світліше	1	
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	зелено-жовте	4	
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	відсутній або дуже слабкий	1	
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	слабке	3	
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	коротка	3	
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною (як для 12)	дуже коротка	1	
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	щільна	7	
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	червоно-коричневе	6	
21	Рослина: за висотою (за досягання)	низька	3	
22	Стебло: діаметр (верхня третина рослини за досягання)	малий	3	
23	Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	середній	5	
24	Листок: за шириною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	середній	5	
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 21)	середня	5	
26	Волоть: гілочки за довжиною (у середній третині волоті)	середні	5	
27	Волоть: щільність (за досягання)	помірна	5	
28	Волоть: форма (за досягання)	симетрична	3	
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	коротка	3	
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	темно-червоне	6	
31	Колоскова луска: за довжиною (за досягання)	коротка	3	
32	Зернівка: забарвлення після досягання	сірувате	2	
33	Зернівки: маса 1000 шт.	мала	3	
34	Зернівка: форма зі спинки	округла	7	
35	Зернівка: форма в профіль	еліптична	5	
36	Зернівка: розмір зародка	дуже малий	1	
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	середня	5	
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
39	Зерно: структура ендосперму (у поздовжньому розрізі)	на 3/4 крохмалиста	7	
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	біле	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,44	6,11	
Довірчий інтервал, т/га	0,63	0,66	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,96	7,77	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,52	1,66	
+, - до усередненої урожайності, %	11,7	27,2	
Тривалість періоду вегетації, днів	121	120	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	22,1	26,3	
Висота рослини, см	108,9	128,4	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Вирівняність за висотою, бал	7,3	7,1	
Стійкість проти сажки, бал	9	9	
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	8	8	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	9	8	
Стійкість проти попелиці, бал	8	7	
Вміст білка, %	9,1	8,2	
Вміст крохмалю, %	76,5	78,6	
Блок (Група стиглості)	6	6	
Напрямок використання	зерн	зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.

Заявка № 21018001 Назва сорту: ТИГРУС **Заявник (код):** 2767 **Власник сорту (код):** 2767

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.01.2023 **Патент № 230104**

Дата пріоритету: 11.01.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231175

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	слабке	3	
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	середній	5	
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	низька	3	
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	помірне	5	
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	помірне	5	
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	світліше	1	
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	жовто-зелене	3	
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	відсутній або дуже слабкий	1	
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	слабке	3	
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	коротка	3	
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною (як для 12)	коротка	3	
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	щільна	7	
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	оранжеве	3	
21	Рослина: за висотою (за досягання)	низька	3	
22	Стебло: діаметр (верхня третина рослини за досягання)	малий	3	
23	Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	середній	5	
24	Листок: за шириною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	середній	5	
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 21)	середня	5	
26	Волоть: гілочки за довжиною (у середній третині волоті)	середні	5	
27	Волоть: щільність (за досягання)	щільна	7	
28	Волоть: форма (за досягання)	ширша у верхівковій частині	2	
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	коротка	3	
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	блідо-коричневе	4	
31	Колоскова луска: за довжиною (за досягання)	середня	5	
32	Зернівка: забарвлення після досягання	сірувате	2	
33	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
34	Зернівка: форма зі спинки	еліптична	5	
35	Зернівка: форма в профіль	вузькоеліптична	3	
36	Зернівка: розмір зародка	середній	5	
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	мала	3	
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
39	Зерно: структура ендосперму (у поздовжньому розрізі)	на 3/4 склоподібна	3	
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	біле	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,00	7,17	
Довірчий інтервал, т/га	0,73	2,01	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,45	8,65	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,45	1,48	
+, - до усередненої урожайності, %	29,0	20,6	
Тривалість періоду вегетації, діб	126	124	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	27	27,3	
Висота рослини, см	111,9	141	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Вирівняність за висотою, бал	6,3	6,9	
Стійкість проти сажки, бал	9	9	
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	9	9	
Стійкість проти попелиці, бал	8	6	
Вміст білка, %	9,9	9,3	
Вміст крохмалю, %	74,6	77,7	
Блок (Група стиглості)	7	7	
Напрямок використання	зерн	зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОЛІЙНІ ТА ПРЯДИВНІ

Гірчиця біла

Льон звичайний, довгунець

Ріпак (ярий)

Соняшник однорічний

Соняшник однорічний – батьківський компонент



Вид: Гірчиця біла *Sinapis alba* L.

Заявка № 20380001 Назва сорту: Вероніка Заявник (код): 2726 Власник сорту (код): 2726

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231048

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	наявна	9	
2	Плоїдність	диплоїд	2	
3	Сім'ядоля: за довжиною	ознака не визначалась	0	
4	Сім'ядоля: за шириною	ознака не визначалась	0	
5	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
6	Листок: кількість часток (за повного розвитку листка)	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка й черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Час цвітіння	середній	5	
12	Рослина: за висотою під час цвітіння	середня	5	
13	Квітка: жовте забарвлення пелюсток	світле	3	
14	Квітка: пелюстки за довжиною	від коротких до середніх	4	
15	Квітка: пелюстки за шириною	від середніх до широких	6	
16	Рослина: за загальною довжиною	довга	7	
17	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою і носиком)	середній	5	
18	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
19	Стручок: за шириною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Стручок: кількість насінин	велика	7	
22	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	
23	Розвиток генеративних органів у рік сівби для пізньолітнього обстеження	сильний	7	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Висота рослин, см – 95. Тривалість періоду вегетації, днів – 157. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість до осипання, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): філостиктоз (*Phyllosticta sinapis* V. Bond.-Mont.) – 9; борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev. f. *brassicae* Hammarl.) – 9; біла гниль (*Sclerotinia Libertiana* Fuck.) – 9; кила (*Plasmodiophora brassicae* Wor.) – 9; септоріоз (*Septoria sinapis* Rodigin.) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): гірчичний клоп (*Eurydema ornata* L.) – 9; гірчичний листоїд (*Colaphellus sophiae* Schall.) – 9; хрестоцвіті блішки (*Phyllotreta*) – 9. Тривалість періоду від сходів до цвітіння, днів – 92. Урожайність вегетативної маси (сухої речовини), т/га – 18,4. Вміст білка в зеленій масі, % – 13,5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Льон звичайний, довгунець *Linum usitatissimum* L.

Заявка № 20081008 Назва сорту: Жайворонок **Заявник (код):** 1936 **Власник сорту (код):** 1936

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.11.2023 **Патент № 230723**

Дата пріоритету: 29.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231136

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Пелюстка: забарвлення у фазі пуп'янка	блакитно-фіолетове	3	
2	Час початку цвітіння	середній	5	
3	Віночок: розташування пелюсток	перекриваються	3	
4	Віночок: забарвлення	блакитно-фіолетове	6	
5	Квітка: розмір віночка	малий	3	до середнього
6	За винятком сортів з білим віночком. Квітка: форма серединки віночка	від округлої до п'ятикутної	2	
7	Пелюстка: за довжиною	коротка	3	до середнього
8	Пелюстка: за шириною	середня	5	
9	Пелюстка: відношення довжина / ширина	середнє	5	до великого
10	Тичинка: забарвлення дистальної частини нитки	блакитне	2	
11	Тичинка: забарвлення базальної частини нитки	блакитне	2	
12	Пиляк: забарвлення	блакитнувате	4	
13	Маточка: забарвлення	жовте	3	
14	Рослина: за висотою	висока	7	
15	Коробочка: розмір	середній	5	
16	Коробочка: вітчатість несправжніх перетинок	відсутня	1	
17	Коробочка: за довжиною	середня	5	
18	Коробочка: за шириною	середня	5	
19	Коробочка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
20	Стебло: за довжиною від підсім'ядольного коліна до першої гілочки	коротке	3	
21	Стебло: за довжиною від підсім'ядольного коліна до верхівкової коробочки	середнє	5	
22	Насіння: маса 1000 шт	мала	3	
23	Насінина: забарвлення	коричнєве	3	
24	Насінина: за довжиною	середня	3	
25	Насінина: за шириною	вузька	2	
26	Насінина: відношення довжина/ширина	дуже велике	5	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Урожайність соломки, т/га – 5,4. Вихід волокна з соломки, % – 25,4. Номер волокна – 241. Вміст довгого волокна, % – 20,8. Гнучкість волокна, мм – 57. Розривне навантаження, даН – 27,5. Довжина жмені, см – 80. Урожайність насіння (за стандартної вологості 12%), т/га – 0,53. Маса 1000 насінин, г – 4,8. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): вертицильозне в'янення (вілт) (*Verticillium dahliae* Kleb.) – 7; фузаріозне в'янення (*Fusarium lini* Bolley.) – 7; іржа (*Melampsora lini* (Ehrenb.) Lev.) – 9; пасмо (*Phlyctaena linicola* Speg.) – 9; антракноз (*Colletotrichum lini* Manns et Bolley) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): льонова блішка (*Aphthona euphorbiae* Schrnk.) – 7; льоновий трипс (*Thrips lini* Ladurean.) – 8; льонова плодожерка (*Cochylis epilinaea* Duponchel) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 21041002 Назва сорту: Коктейль КЛ Заявник (код): 912 Власник сорту (код): 912

Дата пріоритету: 23.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231069

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5	
5	Листок: наявність часток	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	багато	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довгий	7	
11	Рослина: час цвітіння	середній	5	
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3	
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5	до довгих
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5	до широких
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	до високої
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7	
19	Стручок: довжина зубця	довгий	7	
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5	до довгої
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0	
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		2,07	1,73
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га		2,36	1,45
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,29	-0,28
+, - до усередненої урожайності, %		14,0	-16,2
Довірчий інтервал, т/га		0,15	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб		96	97
Висота рослини, см		91,5	93,8
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г		5,7	4,6
Вміст білка, %		23,1	23,9
Вміст олії, %		44,4	43,9
Вміст ерукової кислоти, %		0,4	0,3
Вміст глюкозинолатів, %		0,4	0,3
Стійкість до вилягання, бал		9	8
Стійкість до обсипання, бал		7	7
Стійкість до посухи, бал		9	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал		7	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал		7	5
Стійкість проти бактеріозу, бал		8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал		8	7
Блок		1	1
Напрямок використання		олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 21041004 Назва сорту: Ріплей Заявник (код): 2851 Власник сорту (код): 2851

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 Патент № 230728

Дата пріоритету: 23.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230556

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	наявна	9	
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7	
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5	
5	Листок: наявність часток	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довгий	7	
11	Рослина: час цвітіння	пізній	7	
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3	
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5	
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	дуже довга	9	
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5	
19	Стручок: довжина зубця	середній	5	
20	Стручок: довжина ніжки	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0	
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 20039079 Назва сорту: 1025Л **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 10.02.2023 **Патент № 230128**

Дата пріоритету: 03.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231074

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вухка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,32	3,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,00	4,16	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,68	0,78	
+, - до усередненої урожайності, %	29,3	23,1	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	56,7	63,6	
Діаметр кошика, см	17,5	19	
Висота рослини, см	151,3	168,7	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8,5	
Тривалість періоду вегетації, днів	113	116	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	7	
Стійкість проти вовчка, бал	7	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	49	52,1	
Вміст білка, %	15,7	14,9	
Лушпинність, %	25,3	27,5	
Блок (група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	9		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 20039081 **Назва сорту:** 1044Л СУ **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 10.02.2023 **Патент №** 230129

Дата пріоритету: 03.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231076

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретиноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,40	3,43	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,32	3,94	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,92	0,51	
+, - до усередненої урожайності, %	38,3	14,9	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	57,8	66	
Діаметр кошика, см	15,5	17,8	
Висота рослини, см	173	175,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	119	119	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	7	
Стійкість проти вовчка, бал	7	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	7	
Вміст олії, %	50,2	50,6	
Вміст білка, %	17,2	16	
Лушпинність, %	25,9	25,1	
Блок (група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	9		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 20039073 **Назва сорту:** ЕС ТАНАІС КЛП **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.08.2023 **Патент №** 230351

Дата пріоритету: 03.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231070

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вухка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,40	3,43	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,98	3,93	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,58	0,50	
+, - до усередненої урожайності, %	24,2	14,6	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	50,7	63,9	
Діаметр кошика, см	15,6	17,7	
Висота рослини, см	164,3	174,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,7	8,5	
Тривалість періоду вегетації, днів	119	119	
Стійкість до вилягання, бал	6	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	7	
Стійкість проти вовчка, бал	3	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	7	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	48,1	48,6	
Вміст білка, %	15,7	14,4	
Лушпинність, %	27,2	29,6	
Блок (група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал		5	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 20039078 Назва сорту: ЕСХ20023 Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата пріоритету: 03.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231073

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошністої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,32	3,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,14	3,86	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,82	0,48	
+, - до усередненої урожайності, %	35,3	14,2	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	54,3	62,4	
Діаметр кошика, см	18	18,8	
Висота рослини, см	151,8	174,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	5,9	7,8	
Тривалість періоду вегетації, днів	110	111	
Стійкість до вилягання, бал	9	7	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	7	
Стійкість проти вовчка, бал	7	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	48	47,5	
Вміст білка, %	16,2	16,5	
Лушпинність, %	27,7	28,9	
Блок (група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	9		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039009 Назва сорту: ЄС Авалон Заявник (код): 2287 Власник сорту (код): 2287

Дата пріоритету: 09.02.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231057

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,40	3,43	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,71	3,50	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,31	0,07	
+, - до усередненої урожайності, %	12,9	2,0	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	69,7	63,7	
Діаметр кошика, см	15,8	19,1	
Висота рослини, см	156,2	187,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,3	8,8	
Тривалість періоду вегетації, днів	116	115	
Стійкість до вилягання, бал	7	9	
Стійкість до обсипання, бал	8	8	
Стійкість до посухи, бал	6	6	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	48	46,5	
Вміст білка, %	16,3	15,7	
Лушпинність, %	25,9	27	
Блок (група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	8		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039010 Назва сорту: ЄС Пегас Заявник (код): 2287 Власник сорту (код): 2287

Дата пріоритету: 09.02.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231058

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cuman</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,42	3,59	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,76	3,04	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,34	-0,55	
+, - до усередненої урожайності, %	14,0	-15,3	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	59,7	60,8	
Діаметр кошика, см	16,2	17,5	
Висота рослини, см	180,1	200,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,6	8,8	
Тривалість періоду вегетації, днів	125	127	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	7	9	
Стійкість до посухи, бал	6	6	
Стійкість проти вовчка, бал	3	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	7	
Вміст олії, %	46,1	46,8	
Вміст білка, %	17,6	15,9	
Лушпинність, %	28,9	27,6	
Блок (група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	1		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039011 Назва сорту: ЄС Старк **Заявник (код):** 2287 **Власник сорту (код):** 2287

Дата пріоритету: 09.02.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231059

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,42	3,59	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,80	3,04	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,38	-0,55	
+, - до усередненої урожайності, %	15,7	-15,3	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	57,5	61,7	
Діаметр кошика, см	15,5	18	
Висота рослини, см	155	182,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,7	8,5	
Тривалість періоду вегетації, днів	123	127	
Стійкість до вилягання, бал	4	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	7	
Стійкість проти вовчка, бал	6	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	48,3	48,6	
Вміст білка, %	16,3	16	
Лушпинність, %	28,7	25,9	
Блок (група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	4		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039012 Назва сорту: ЕС Тор Заявник (код): 2287 Власник сорту (код): 2287

Дата пріоритету: 09.02.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231060

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cuman</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,32	3,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,33	3,15	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,01	-0,23	
+, - до усередненої урожайності, %	0,4	-6,8	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	62,2	55,5	
Діаметр кошика, см	15	17,2	
Висота рослини, см	130,6	167,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	5,9	8,3	
Тривалість періоду вегетації, днів	107	110	
Стійкість до вилягання, бал	6	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	7	
Стійкість проти вовчка, бал	6	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	45,5	44,8	
Вміст білка, %	16,6	16,7	
Лушпинність, %	29,2	27,6	
Блок (група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	6		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 20039080 **Назва сорту:** ІНСАН 110 **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.08.2023 **Патент №** 230353

Дата пріоритету: 03.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231075

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,40	3,43	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,46	4,25	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,06	0,82	
+, - до усередненої урожайності, %	44,2	23,9	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	58,3	66,9	
Діаметр кошика, см	16,2	18,4	
Висота рослини, см	163,2	170,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8,8	
Тривалість періоду вегетації, днів	119	122	
Стійкість до вилягання, бал	7	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	7	
Стійкість проти вовчка, бал	7	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	50,3	51,1	
Вміст білка, %	14,3	13,4	
Лушпинність, %	28	29,2	
Блок (група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	7		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 20039075 **Назва сорту:** ІНСАН 222 КЛП **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 10.02.2023 **Патент №** 230126

Дата пріоритету: 03.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231071

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	ознака не визначалась	0	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,40	3,43	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,08	3,72	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,68	0,29	
+, - до усередненої урожайності, %	28,3	8,5	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	63	73,9	
Діаметр кошика, см	16,7	17,8	
Висота рослини, см	169,7	181,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,4	9	
Тривалість періоду вегетації, днів	117	118	
Стійкість до вилягання, бал	5	7	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	7	
Стійкість проти вовчка, бал	6	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	7	
Вміст олії, %	47	47,6	
Вміст білка, %	17,7	17,5	
Лушпинність, %	27,7	27,5	
Блок (група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	7		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 20039082 **Назва сорту:** ІНСАНХО 200 КЛП **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.04.2023 **Патент №** 230259

Дата пріоритету: 03.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231077

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретиноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,57	3,79	
Довірчий інтервал, т/га	0,18	0,20	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,15	3,61	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,58	-0,18	
+, - до усередненої урожайності, %	22,6	-4,7	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	68,6	75	
Діаметр кошика, см	16,8	19,4	
Висота рослини, см	182	186	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,6	8,3	
Тривалість періоду вегетації, днів	118	120	
Стійкість до вилягання, бал	9	7	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	6	
Стійкість проти вовчка, бал	7	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	48,5	47,9	
Вміст білка, %	15,7	16,6	
Лушпинність, %	25,4	26,2	
Блок (група стиглості)	7	7	
Напрямок використання	ВОЛ	ВОЛ	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал		9	
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	85,5	86,6	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 20039050 Назва сорту: Ірінасол **Заявник (код):** 1498 **Власник сорту (код):** 1498

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 **Патент № 230730**

Дата пріоритету: 06.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 05.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230765

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вухка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно-коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Сійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Сійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039063 Назва сорту: ЛГ50321 КЛП **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 **Патент № 230737**

Дата пріоритету: 23.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230564

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямимстеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039057 Назва сорту: ЛГ50486 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 **Патент № 230731**

Дата пріоритету: 22.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230558

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вухка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039060 Назва сорту: ЛГ50554 КЛП Заявник (код): 793 Власник сорту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 Патент № 230734

Дата пріоритету: 22.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230561

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039061 **Назва сорту:** ЛГ50564 КЛП **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 **Патент №** 230735

Дата пріоритету: 2.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230562

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вухка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039062 Назва сорту: ЛГ50616 Заявник (код): 793 Власник сорту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 Патент № 230736

Дата пріоритету: 23.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230563

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039064 Назва сорту: ЛГ50621 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 **Патент № 230738**

Дата пріоритету: 23.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230565

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вухка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039065 Назва сорту: ЛГ50639 СХ **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 **Патент № 230739**

Дата пріоритету: 23.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230566

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039058 Назва сорту: ЛГ50648 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 **Патент № 230732**

Дата пріоритету: 22.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230559

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вухка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039059 Назва сорту: ЛГ50689 СХ **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 **Патент № 230733**

Дата пріоритету: 22.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230560

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039106 Назва сорту: Ліон **Заявник (код):** 2267 **Власник сорту (код):** 2267

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 **Патент № 230742**

Дата пріоритету: 28.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231054

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вухка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,40	3,43	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,55	2,89	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,15	-0,54	
+, - до усередненої урожайності, %	6,2	-15,7	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	56,4	58,6	
Діаметр кошика, см	15,2	17,5	
Висота рослини, см	150,7	173,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,7	8,3	
Тривалість періоду вегетації, днів	117	117	
Стійкість до вилягання, бал	5	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	5	5	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	7	
Вміст олії, %	45,9	45,1	
Вміст білка, %	16,7	16,2	
Лушпинність, %	28,3	28,9	
Блок (група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	7		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039102 Назва сорту: Маріголдес **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 **Патент № 230741**

Дата пріоритету: 23.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231053

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вухка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,40	3,43	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,90	3,37	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,50	-0,06	
+, - до усередненої урожайності, %	20,8	-1,7	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	59,1	61,9	
Діаметр кошика, см	15,6	17,3	
Висота рослини, см	150,6	175,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8,8	
Тривалість періоду вегетації, днів	115	118	
Стійкість до вилягання, бал	4	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	6	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	7	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	48,6	48,1	
Вміст білка, %	16,3	16,3	
Лушпинність, %	26,8	25,5	
Блок (група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	9		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039108 Назва сорту: Маттіа **Заявник (код):** 2267 **Власник сорту (код):** 2267

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 **Патент № 230744**

Дата пріоритету: 28.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231056

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вухка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галушення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,42	3,59	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,59	3,09	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,17	-0,50	
+, - до усередненої урожайності, %	7,0	-13,9	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	57,3	62	
Діаметр кошика, см	14,3	18,4	
Висота рослини, см	156,1	181,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,3	8,8	
Тривалість періоду вегетації, днів	124	124	
Стійкість до вилягання, бал	6	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	6	7	
Стійкість проти вовчка, бал	7	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	7	
Вміст олії, %	46	44,7	
Вміст білка, %	17,2	16,7	
Лушпинність, %	27,9	27,9	
Блок (група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	7		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039099 Назва сорту: Н4Л460 КЛ Заявник (код): 1985 Власник сорту (код): 1985

Дата пріоритету: 22.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231052

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильнае	9	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	дуже довга	9	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,47	3,71	
Довірчий інтервал, т/га	0,21	0,20	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,23	2,77	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,24	-0,94	
+, - до усередненої урожайності, %	-9,7	-25,3	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	57,8	58,8	
Діаметр кошика, см	14,4	17,3	
Висота рослини, см	140,5	170,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,9	8,5	
Тривалість періоду вегетації, днів	123	127	
Стійкість до вилягання, бал	5	6	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	6	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	6	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	49	51,2	
Вміст білка, %	16,8	16,3	
Лушпинність, %	24,4	25,1	
Блок (група стиглості)	8	8	
Напрямок використання	ВОЛ	ВОЛ	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал		9	
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	80,7	80,3	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039078 Назва сорту: Н4Х413 КЛ Заявник (код): 1985 Власник сорту (код): 1985

Дата пріоритету: 15.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231051

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,47	3,71	
Довірчий інтервал, т/га	0,21	0,20	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,66	2,90	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,19	-0,81	
+, - до усередненої урожайності, %	7,7	-21,8	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	57,1	54,5	
Діаметр кошика, см	16,2	17,3	
Висота рослини, см	135,1	169,8	
Ступінь нахилу кошика, бал	8,1	8,3	
Тривалість періоду вегетації, днів	122	126	
Стійкість до вилягання, бал	4	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	6	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	7	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	49,6	50,5	
Вміст білка, %	16,7	15,1	
Лушпинність, %	25,1	24,9	
Блок (група стиглості)	8	8	
Напрямок використання	ВОЛ	ВОЛ	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал		9	
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	85,8	84,6	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039067 Назва сорту: Пронтосол **Заявник (код):** 1498 **Власник сорту (код):** 1498

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 **Патент № 230740**

Дата пріоритету: 07.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230991

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вухка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Сійкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumana</i>)	відсутня	1	
44	Сійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039068 Назва сорту: СИ КОРСІКА АР **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231078

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпю	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,40	3,43	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,75	3,66	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	0,35	0,23	
+ , - до усередненої урожайності, %	14,6	6,7	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	58	67,4	
Діаметр кошика, см	15,5	18,2	
Висота рослини, см	152,8	183,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8,3	
Тривалість періоду вегетації, днів	117	119	
Стійкість до вилягання, бал	5	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	7	
Стійкість проти вовчка, бал	7	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	7	
Вміст олії, %	49,6	49,6	
Вміст білка, %	14,7	14	
Лущинність, %	25,4	25,8	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	8		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039071 Назва сорту: СИ ЛАЗУРІ КЛП Заявник (код): 2643 Власник сорту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231079

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	коричневе	3	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,40	3,43	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,86	3,44	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	0,46	0,01	
+ , - до усередненої урожайності, %	19,2	0,3	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	60	68,2	
Діаметр кошика, см	15,6	19	
Висота рослини, см	145,9	178,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,1	7,8	
Тривалість періоду вегетації, днів	118	117	
Стійкість до вилягання, бал	7	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	6	7	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	8	
Вміст олії, %	49,6	50,2	
Вміст білка, %	14,9	15,4	
Лущинність, %	29,4	28,7	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	9		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039014 Назва сорту: СТК101 Заявник (код): 2788 Власник сорту (код): 2788

Дата пріоритету: 10.03.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231148

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,40	3,43	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,41	3,27	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	0,01	-0,16	
+ , - до усередненої урожайності, %	0,4	-4,7	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	54,8	57,5	
Діаметр кошика, см	14,9	17,9	
Висота рослини, см	143,2	176,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,4	8,3	
Тривалість періоду вегетації, днів	117	118	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	6	
Стійкість проти вовчка, бал	4	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	7	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	7	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	50	50,5	
Вміст білка, %	17,6	15,9	
Лущинність, %	26,7	24,9	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал		3	
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	15,1	19,2	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039013 Назва сорту: СТК102 Заявник (код): 2788 Власник сорту (код): 2788

Дата пріоритету: 10.03.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231147

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,40	3,43	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,25	3,12	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,15	-0,31	
+, - до усередненої урожайності, %	-6,3	-9,0	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	53,8	62,8	
Діаметр кошика, см	15,3	17	
Висота рослини, см	147,7	175,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	117	118	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	7	
Стійкість проти вовчка, бал	4	7	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	6	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	49,8	50	
Вміст білка, %	17,4	16,4	
Лущинність, %	25,1	23,6	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал		3	
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	14,4	15,5	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039016 Назва сорту: СТК103 Заявник (код): 2788 Власник сорту (код): 2788

Дата пріоритету: 09.03.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231150

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,40	3,43	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,18	3,08	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,22	-0,35	
+, - до усередненої урожайності, %	-9,2	-10,2	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	58,5	54,8	
Діаметр кошика, см	15,7	17,9	
Висота рослини, см	147,5	177,7	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,4	8,5	
Тривалість періоду вегетації, дів	117	119	
Стійкість до вилягання, бал	7	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	5	
Стійкість проти вовчка, бал	4	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	7	8	
Вміст олії, %	48,1	50,4	
Вміст білка, %	16,2	15,8	
Лущинність, %	27,4	24,8	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал		3	
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	14,4	14,6	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039015 Назва сорту: СТК104 **Заявник (код):** 2788 **Власник сорту (код):** 2788

Дата пріоритету: 09.03.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231149

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,40	3,43	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,32	3,28	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	-0,08	-0,15	
+ , - до усередненої урожайності, %	-3,3	-4,4	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	55	58,9	
Діаметр кошика, см	15,1	17,2	
Висота рослини, см	146,5	175,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,7	8,5	
Тривалість періоду вегетації, днів	117	118	
Стійкість до вилягання, бал	7	7	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	6	
Стійкість проти вовчка, бал	4	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	8	
Вміст олії, %	48,5	50,7	
Вміст білка, %	16,9	15,8	
Лущинність, %	27	26,2	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал		2	
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	14	17,4	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039076 Назва сорту: СУЛІАНО **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231081

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпю	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,47	3,71	
Довірчий інтервал, т/га	0,21	0,20	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,84	3,39	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	0,37	-0,32	
+ , - до усередненої урожайності, %	15,0	-8,6	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	62,6	62,7	
Діаметр кошика, см	16,9	18	
Висота рослини, см	148,5	184,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	9	
Тривалість періоду вегетації, дів	123	127	
Стійкість до вилягання, бал	7	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	5	7	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	48,1	50,1	
Вміст білка, %	16,1	14,3	
Лушпинність, %	28,3	26	
Блок (Група стиглості)	8	8	
Напрямок використання	ВОЛ	ВОЛ	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал		8	
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	85,2	85,8	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039107 Назва сорту: Сульфостар Заявник (код): 2267 Власник сорту (код): 2267

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 Патент № 230743

Дата пріоритету: 28.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231055

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,40	3,43	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,43	3,15	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	0,03	-0,28	
+ , - до усередненої урожайності, %	1,2	-8,2	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	58,6	59	
Діаметр кошика, см	15,1	18,4	
Висота рослини, см	149,5	179,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,7	9	
Тривалість періоду вегетації, днів	116	117	
Стійкість до вилягання, бал	7	8	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	6	5	
Стійкість проти вовчка, бал	3	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	8	
Вміст олії, %	47,5	46,5	
Вміст білка, %	16,2	16,7	
Лущинність, %	27,1	26,4	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	2		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 20039077 **Назва сорту:** Супернова СУ **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.08.2023 **Патент №** 230352

Дата пріоритету: 03.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231072

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретиноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутих стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпю	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,32	3,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,24	4,02	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	0,92	0,64	
+ , - до усередненої урожайності, %	39,7	18,9	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	62,3	70,2	
Діаметр кошика, см	17,7	18,5	
Висота рослини, см	162,6	181,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,4	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	114	112	
Стійкість до вилягання, бал	9	7	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	7	
Стійкість проти вовчка, бал	6	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	48,7	49,3	
Вміст білка, %	16,4	16	
Лущинність, %	27,7	26,3	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	3		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039072 Назва сорту: СУРЕСТ Заявник (код): 2643 Власник сорту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231080

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,40	3,43	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,76	3,77	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	0,36	0,34	
+ , - до усередненої урожайності, %	15,0	9,9	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	59,8	70,5	
Діаметр кошика, см	14,5	18,7	
Висота рослини, см	136,7	183,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,3	8,5	
Тривалість періоду вегетації, днів	119	119	
Стійкість до вилягання, бал	7	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	5	7	
Стійкість проти вовчка, бал	7	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	52	51,4	
Вміст білка, %	14,3	15,6	
Лущинність, %	26	26,5	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	8		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 20939114 Назва сорту: БР004А **Заявник (код):** 2743 **Власник сорту (код):** 2743

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 **Патент № 230748**

Дата пріоритету: 10.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231177

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939114 Назва сорту: EX500СУЛхМХ501 **Заявник (код):** 2267 **Власник сорту (код):** 2267

Дата пріоритету: 28.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231146

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 20939155 Назва сорту: EX933 **Заявник (код):** 2267 **Власник сорту (код):** 2267
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 231142
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабо виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 20939048 Назва сорту: ЛС 3008 С **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231082

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжеве	5	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	деформований	6	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 20939054 Назва сорту: ЛЦ658AIP **Заявник (код):** 2743

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 **Патент № 230745**

Дата пріоритету: 10.11.2020

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	окремі або дуже дрібні	1	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939023 Назва сорту: ПМ 678 **Заявник (код):** 2793 **Власник сорту (код):** 2793

Дата пріоритету: 07.04.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231145

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжеве	5	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939022 Назва сорту: ПП 01 **Заявник (код):** 2793 **Власник сорту (код):** 2793

Дата пріоритету: 07.04.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231144

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	малі	3	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжеве	5	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плесканий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 20939057 Назва сорту: РГА ІР ЗРФ **Заявник (код):** 2743

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 **Патент № 230746**

Дата пріоритету: 10.11.2020

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошністої роси (<i>Plasmodium helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939012 Назва сорту: Рф1122 **Заявник (код):** 2537 **Власник сорту (код):** 2537

Дата пріоритету: 27.01.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231083

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939013 Назва сорту: Рф3144 **Заявник (код):** 2537 **Власник сорту (код):** 2537

Дата пріоритету: 27.01.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231084

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 20939157 Назва сорту: PX591 **Заявник (код):** 2267 **Власник сорту (код):** 2267
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 231143
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 20939058 Назва сорту: РХА 5РФ ІР **Заявник (код):** 2743

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 **Патент № 230747**

Дата пріоритету: 10.11.2020

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошністої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939112 Назва сорту: ФА306ЛН00 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Дата пріоритету: 23.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231093

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабо виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939082 Назва сорту: ФА754ХС05 Заявник (код): 2643 Власник сорту (код): 1219

Дата пріоритету: 09.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231091

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошністої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939081 Назва сорту: ФР402ЛЦ00 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Дата пріоритету: 09.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231090

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вужькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вужькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939072 Назва сорту: ФР406ЛС00 Заявник (код): 2643 Власник сорту (код): 1219

Дата пріоритету: 08.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231086

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	відсутні або дуже малі	1	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939113 Назва сорту: ФР407ЛН00 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Дата пріоритету: 23.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231094

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939074 Назва сорту: ФР84241 Заявник (код): 2643 Власник сорту (код): 1219

Дата пріоритету: 09.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231088

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошністої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939080 Назва сорту: ФР84289 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Дата пріоритету: 09.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231089

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939111 Назва сорту: ФР842ЛН22 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Дата пріоритету: 23.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231092

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	вузькояйцеподібна	3	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939073 Назва сорту: ФС71549 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Дата пріоритету: 09.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231087

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюяцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої поси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939068 Назва сорту: X02020A-КЛ **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 **Патент № 230749**

Дата пріоритету: 30.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231085

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Сійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Сійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: БУРЯК (КОРМОВНИЙ, ЦУКРОВНИЙ)

Буряк цукровий



Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 21069024 Назва сорту: БАЛАНСІЯ КВС **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2023 **Патент № 230434**

Дата пріоритету: 23.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231132

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	напівпохила	7	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	короткий	3	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	малий	3	
10	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	сильний	7	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	вузький	3	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	короткий	3	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		12,97	11,47
Збір цукру, т/га		17,37	15,99
+, - до усередненого збору цукру, т/га		4,40	4,52
+, - до усередненого збору цукру, %		33,9	39,4
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,18	0,30
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		67,16	63,85
Урожайність, т/га		87,57	81,83
+, - до усередненої урожайності, т/га		20,41	17,98
+, - до усередненої урожайності, %		30,4	28,2
Довірчий інтервал, т/га		0,83	1,25
Цукристість, %		19,8	19,2
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		83,7	84,2
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеплідом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		3	8
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 21069010 Назва сорту: Микеланджело **Заявник (код):** 2552 **Власник сорту (код):** 2552

Дата пріоритету: 04.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231126

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	червоно-пурпурове	6	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	біле	1	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		12,97	11,47
Збір цукру, т/га		14,99	13,68
+, - до усередненого збору цукру, т/га		2,02	2,21
+, - до усередненого збору цукру, %		15,6	19,3
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,18	0,30
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		67,16	63,85
Урожайність, т/га		79,32	71,26
+, - до усередненої урожайності, т/га		12,16	7,41
+, - до усередненої урожайності, %		18,1	11,6
Довірчий інтервал, т/га		0,83	1,25
Цукристість, %		19	18,9
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		83,2	69,3
Стійкість до цвітушності, бал		9	8
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		4	5
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 21069034 Назва сорту: САЛЬВАТОРИКА КВС **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2023 **Патент № 230439**

Дата пріоритету: 23.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231128

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	напівпохила	7	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	короткий	3	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	довгий	7	
9	Листок: за розміром пластинки	малий	3	
10	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	вузький	3	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	циліндрично-конічна	4	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		12,97	11,47
Збір цукру, т/га		16,41	16,61
+, - до усередненого збору цукру, т/га		3,44	5,14
+, - до усередненого збору цукру, %		26,5	44,8
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,18	0,30
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		67,16	63,85
Урожайність, т/га		83,37	84,95
+, - до усередненої урожайності, т/га		16,21	21,10
+, - до усередненої урожайності, %		24,1	33,0
Довірчий інтервал, т/га		0,83	1,25
Цукристість, %		19,5	19,2
Придатність до механізованого збирання, бал		9	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		89,3	66,2
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеплідом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		4	5
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 21069030 Назва сорту: СМАРТ ЛІЄННА КВС **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2023 **Патент № 230437**

Дата пріоритету: 23.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231127

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	напівпохила	7	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	короткий	3	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	малий	3	
10	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
11	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	сильна	7	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	вузький	3	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	короткий	3	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		12,97	11,47
Збір цукру, т/га		15,56	14,40
+, - до усередненого збору цукру, т/га		2,59	2,93
+, - до усередненого збору цукру, %		20,0	25,5
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,18	0,30
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		67,16	63,85
Урожайність, т/га		85,19	82,40
+, - до усередненої урожайності, т/га		18,03	18,55
+, - до усередненої урожайності, %		26,8	29,1
Довірчий інтервал, т/га		0,83	1,25
Цукристість, %		18,3	17,3
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		87,3	71,5
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		4	2
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 21069028 Назва сорту: СМАРТ МАТЕРІЯ КВС **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2023 **Патент № 230436**

Дата пріоритету: 23.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231130

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	сильна	7	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	вузький	3	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	короткий	3	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		12,97	11,47
Збір цукру, т/га		15,16	15,35
+, - до усередненого збору цукру, т/га		2,19	3,88
+, - до усередненого збору цукру, %		16,9	33,8
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,18	0,30
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		67,16	63,85
Урожайність, т/га		75,88	83,83
+, - до усередненої урожайності, т/га		8,72	19,98
+, - до усередненої урожайності, %		13,0	31,3
Довірчий інтервал, т/га		0,83	1,25
Цукристість, %		19,9	17,9
Придатність до механізованого збирання, бал		7	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		84,7	70,5
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеплідом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		4	6
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 21069031 Назва сорту: СМАРТ МОДЕНТА КВС **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2023 **Патент №** 230438

Дата пріоритету: 23.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231131

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	малий	3	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	сильна	7	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	сильний	7	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	вузький	3	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	вузькоконічна	2	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		12,97	11,47
Збір цукру, т/га		14,62	15,85
+, - до усередненого збору цукру, т/га		1,65	4,38
+, - до усередненого збору цукру, %		12,7	38,2
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,18	0,30
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		67,16	63,85
Урожайність, т/га		76,08	82,77
+, - до усередненої урожайності, т/га		8,92	18,92
+, - до усередненої урожайності, %		13,3	29,6
Довірчий інтервал, т/га		0,83	1,25
Цукристість, %		19,1	18,9
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		84,8	69,2
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		4	6
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 21069012 Назва сорту: Хаббл Заявник (код): 2552 Власник сорту (код): 2552

Дата пріоритету: 04.11.2012

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231133

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	зелене	2	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		12,97	11,47
Збір цукру, т/га		14,98	14,12
+, - до усередненого збору цукру, т/га		2,01	2,65
+, - до усередненого збору цукру, %		15,5	23,1
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,18	0,30
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		67,16	63,85
Урожайність, т/га		77,98	73,38
+, - до усередненої урожайності, т/га		10,82	9,53
+, - до усередненої урожайності, %		16,1	14,9
Довірчий інтервал, т/га		0,83	1,25
Цукристість, %		19,1	19,1
Придатність до механізованого збирання, бал		9	9
Заглиблення коренеплодів у ґрунт, %		85,4	65,7
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		4	6
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 21069027 Назва сорту: ЯНАСОФІЯ КВС **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2023 **Патент № 230435**

Дата пріоритету: 23.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231129

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	довгий	7	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	вузький	3	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		12,97	11,47
Збір цукру, т/га		15,73	15,35
+, - до усередненого збору цукру, т/га		2,76	3,88
+, - до усередненого збору цукру, %		21,3	33,8
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,18	0,30
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		67,16	63,85
Урожайність, т/га		82,91	82,65
+, - до усередненої урожайності, т/га		15,75	18,80
+, - до усередненої урожайності, %		23,5	29,4
Довірчий інтервал, т/га		0,83	1,25
Цукристість, %		19	18,3
Придатність до механізованого збирання, бал		9	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		88	60,3
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдомом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		6	3
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КАРТОПЛЯ

Картопля



Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 20088020 Назва сорту: Марфуша **Заявник (код):** 1710 **Власник сорту (код):** 1710

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.11.2023 **Патент № 230709**

Дата пріоритету: 26.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230978

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	великий	7	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	дуже сильна	9	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	велике	3	
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	дуже сильне	9	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	стебловий	1	
13	Рослина: габітус	прямий	3	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	дуже сильне	9	
15	Листок: загальний розмір	малий	3	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	сильне	7	
18	Листок: зелене забарвлення	темне	7	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	дуже сильне	9	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3	
23	Листочок: хвилястість краю	сильна	7	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	глянуватий	7	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	середнє	5	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: рясність цвітіння	помірне	5	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	сильне	7	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабке	1	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1	
36	Рослина: час досягання	середній	5	
37	Бульба: форма	короткоовальна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5	
39	Бульба: забарвлення шкірки	чорно-фіолетове	8	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	блакитне	4	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	частково блакитне	9	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		23,65	19,89
Урожайність, т/га		19,67	21,20
+ , - до усередненої урожайності, т/га		-3,98	1,31
+ , - до усередненої урожайності, %		-16,8	6,6
Довірчий інтервал, т/га		0,99	0,87
Тривалість періоду вегетації, днів		100	101
Середня маса товарної бульби, г		85,8	98
Вміст крохмалю, %		13,4	14,7
Збір крохмалю, т/га		26,36	31,16
Вміст сухої речовини, %		21,3	22,8
Дегустаційна оцінка, бал		3	4
Придатність до механізованого збирання, бал		8	8
Лежкість, бал		5	5
Товарність бульб, %		79,8	85,6
Стійкість проти макроспоріозу, бал		7	9
Стійкість проти фітофторозу, бал		7	4
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 – нестійкий, 9 – стійкий, бал		9	9
Блок (група стиглості)		8	8
Напрямок використання		стл	стл
Якість		ск	ск

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 20088021 Назва сорту: Меланія Заявник (код): 1710 Власник сорту (код): 1710

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.11.2023 Патент № 230710

Дата пріоритету: 26.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230979

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2	
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	сильне	7	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	сильне	7	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	листяний	3	
13	Рослина: габітус	розлогий	7	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	слабке	3	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3	
23	Листочок: хвилястість краю	помірна	5	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глясватість верхнього боку	помірно глясуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: рясність цвітіння	помірне	5	
30	Суцвіття: розмір	малий	3	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	сильна	7	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	велике	7	
36	Рослина: час досягання	середній	5	
37	Бульба: форма	видовженоовальна	4	
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5	
39	Бульба: забарвлення шкірки	червоне	3	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	червоне	3	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	біле	1	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		23,65	19,89
Урожайність, т/га		24,52	22,15
+ , - до усередненої урожайності, т/га		0,87	2,26
+ , - до усередненої урожайності, %		3,7	11,4
Довірчий інтервал, т/га		0,99	0,87
Тривалість періоду вегетації, днів		103	88
Середня маса товарної бульби, г		114,1	110,7
Вміст крохмалю, %		11,7	13,2
Збір крохмалю, т/га		28,69	29,24
Вміст сухої речовини, %		19,4	21,3
Дегустаційна оцінка, бал		4	4
Придатність до механізованого збирання, бал		8	8
Лежкість, бал		5	9
Товарність бульб, %		80,6	87,7
Стійкість проти макроспоріозу, бал		7	8
Стійкість проти фітофторозу, бал		7	5
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 – нестійкий, 9 – стійкий, бал		9	9
Блок (група стиглості)		8	8
Напрямок використання		стл	стл
Якість		нк	ск

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 20088017 Назва сорту: Роставиця **Заявник (код):** 1710 **Власник сорту (код):** 1710

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.11.2023 **Патент № 230706**

Дата пріоритету: 26.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230975

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	великий	7	
2	Світловий паросток: форма	конічна	3	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	сильне	7	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	велика	7	
7	Світловий паросток: форма верхівки	відкрита	5	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	сильне	7	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	стебловий	1	
13	Рослина: габітус	прямий	3	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	сильне	7	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	сильне	7	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3	
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глясуватість верхнього боку	помірно глясуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	середнє	5	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: рясність цвітіння	помірне	5	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	помірне	5	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	помірна	5	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середнє	5	
36	Рослина: час досягання	середній	5	
37	Бульба: форма	овальна	3	
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5	
39	Бульба: забарвлення шкірки	червоне	3	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	помірно жовте	4	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		25,09	19,88
Урожайність, т/га		24,06	23,73
+, - до усередненої урожайності, т/га		-1,03	3,85
+, - до усередненої урожайності, %		-4,1	19,4
Довірчий інтервал, т/га		9,32	10,51
Тривалість періоду вегетації, днів		130	126
Середня маса товарної бульби, г		95,7	101,1
Вміст крохмалю, %		13,9	15,3
Збір крохмалю, т/га		33,44	36,31
Вміст сухої речовини, %		21,8	23,8
Дегустаційна оцінка, бал		5	5
Придатність до механізованого збирання, бал		9	8
Лежкість, бал		7	9
Товарність бульб, %		80,4	88,6
Стієкість проти макроспориозу, бал		7	9
Стієкість проти фітофторозу, бал		6	4
Стієкість до звичайного патотипу раку, 1 – нестійкий, 9 – стійкий, бал		9	9
Блок (група стиглості)		9	9
Напрямок використання		стл	стл
Якість		ск	ск

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 20088019 Назва сорту: Світана Заявник (код): 1710 Власник сорту (код): 1710

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.11.2023 Патент № 230708

Дата пріоритету: 26.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230977

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	сферична	1	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2	
5	Світловий паросток: опушення основи	сильне	7	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	сильне	7	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3	
23	Листочок: хвилястість краю	помірна	5	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глясуватість верхнього боку	помірно глясуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: рясність цвітіння	помірне	5	
30	Суцвіття: розмір	малий	3	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє або дуже слабке	1	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабке	1	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1	
36	Рослина: час досягання	середній	5	
37	Бульба: форма	овальна	3	
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	кремове	2	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		23,65	19,89
Урожайність, т/га		28,18	26,04
+ , - до усередненої урожайності, т/га		4,53	6,15
+ , - до усередненої урожайності, %		19,2	30,9
Довірчий інтервал, т/га		0,99	0,87
Тривалість періоду вегетації, дів		102	89
Середня маса товарної бульби, г		111,4	111,6
Вміст крохмалю, %		12,7	15,2
Збір крохмалю, т/га		35,79	39,58
Вміст сухої речовини, %		21,1	23
Дегустаційна оцінка, бал		5	3
Придатність до механізованого збирання, бал		7	8
Лежкість, бал		6	9
Товарність бульб, %		80	89,3
Стійкість проти макроспоріозу, бал		7	9
Стійкість проти фітофторозу, бал		7	4
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 – нестійкий, 9 – стійкий, бал		9	9
Блок (група стиглості)		8	8
Напрямок використання		стл	стл
Якість		нк	ск

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 18088017 Назва сорту: Сонцедар **Заявник (код):** 1710

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.11.2023 **Патент № 230700**

Дата пріоритету: 14.11.2018

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	конічна	3	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2	
5	Світловий паросток: опушення основи	сильне	7	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5	
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	сильне	7	
10	Світловий паросток: кількість корневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	середні	5	
12	Рослина: тип розвитку	листяний	3	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	сильне	7	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	сильне	7	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	відсутні або дуже рідко	1	
23	Листочок: хвилястість краю	помірна	5	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: ясність цвітіння	помірне	5	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	помірна	5	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середнє	5	
36	Рослина: час досягання	середній	5	
37	Бульба: форма	овальна	3	
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	червоне	3	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	червоне	3	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	кремове	2	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0	

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 20088018 Назва сорту: Фанатка Заявник (код): 1710 Власник сорту (код): 1710

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.11.2023 Патент № 230707

Дата пріоритету: 26.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230976

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	сферична	1	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	слабке	3	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	велика	7	
7	Світловий паросток: форма верхівки	відкрита	5	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	листяний	3	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	слабке	3	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	помірне	5	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	середньо	5	
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глясуватість верхнього боку	помірно глясуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: рясність цвітіння	рясне	7	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3	
32	Віночок квітки: розмір	великий	7	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	сильна	7	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	велике	3	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	велике	7	
36	Рослина: час досягання	середній	5	
37	Бульба: форма	видовженоовальна	4	
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5	
39	Бульба: забарвлення шкірки	червоне	3	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	червоне	3	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	біле	1	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		23,65	19,89
Урожайність, т/га		24,43	21,69
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,78	1,80
+, - до усередненої урожайності, %		3,3	9,0
Довірчий інтервал, т/га		0,99	0,87
Тривалість періоду вегетації, діб		103	93
Середня маса товарної бульби, г		90	95
Вміст крохмалю, %		12,7	14,6
Збір крохмалю, т/га		31,03	31,67
Вміст сухої речовини, %		20,6	22,8
Дегустаційна оцінка, бал		5	4
Придатність до механізованого збирання, бал		7	7
Лежкість, бал		6	9
Товарність бульб, %		77,3	83,7
Стійкість проти макроспоріозу, бал		7	8
Стійкість проти фітофторозу, бал		7	4
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 – нестійкий, 9 – стійкий, бал		9	9
Блок (група стиглості)		8	8
Напрямок використання		стл	стл
Якість		нк	ск

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КОРМОВІ

Люцерна посівна



Вид: Люцерна посівна *Medicago sativa* L.

Заявка № 20196006 Назва сорту: Персія Носівська Заявник (код): 1990 Власник сорту (код): 1990

Дата пріоритету: 26.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231049

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	проміжний	5	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3	до середньої
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	коротка	3	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	середня	5	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	низька	3	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	довга	7	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	середня	5	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	середня	5	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	низька	3	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3	до середньої
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3	
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 4	4	
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9	
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	наявна	9	
19	Стійкість проти <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9	
20	Стійкість проти <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9	
21	Стійкість проти <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	наявна	9	
22	Стійкість проти <i>Therioaphis maculata</i>	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сухої речовини сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,48	10,52	10,75
Урожайність сухої речовини, т/га	5,64	13,85	12,83
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,84	3,33	2,08
+, - до усередненої урожайності, %	-13,0	31,7	19,3
Довірчий інтервал, т/га	0,78	1,42	1,34
Тривалість періоду вегетації, діб	100	163	112
Залистаність, %	51,6	66,5	45,9
Вміст білка, %	19,5	23,4	17,9
Стійкість до вилягання, бал	7	7	8
Стійкість до посухи, бал	7	6	7
Стійкість проти іржі, бал	8	7	9
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	9
Стійкість проти бурі плямистості, бал	9	7	9
Зимостійкість, бал	9	7	7
Урожайність насіння (середнє за 4 повторення), т/га	2,5	1,9	1,9
Блок	1	1	1
Напрямок використання	корм	корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОВОЧЕВІ

Гарбуз мускатний

Капуста білоголова

Огірок посівний

Помідор їстівний

Салат посівний листковий

Шпинат городній



Вид: Гарбуз мускатний *Cucurbita moschata* Duch.

Заявка № 21228001 Назва сорту: Бертон **Заявник (код):** 2819 **Власник сорту (код):** 2819

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.11.2023 **Патент № 230718**

Дата пріоритету: 09.09.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231004

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядоля: відношення ширина / довжина	середнє	5	
2	Рослина: головне стебло за довжиною	середнє	5	
3	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
4	Листкова пластинка: розсіченість краю	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
6	Листкова пластинка: сріблясті плями	відсутні	1	
7	Черешок: за довжиною	середній	5	
8	Черешок: діаметр	середній	5	
9	Жіноча квітка: чашолисток за довжиною	середній	5	
10	Чоловіча квітка: чашолисток за довжиною	середній	5	
11	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
12	Плодоніжка: діаметр	середній	5	
13	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	помірна	5	
14	Плід: за довжиною	середній	5	
15	Плід: діаметр	середній	5	
16	Плід: відношення довжина / діаметр	велике	7	
17	Плід: положення найширшої частини	ближче до верхівки	3	
18	Плід: форма поздовжнього розрізу	грушоподібна	7	
19	Плід: шийка	помірна або добре виражена	3	
20	Плід: шийка за довжиною	середня	5	
21	Плід: вигин (за поздовжньою віссю)	відсутній або дуже слабкий	1	
22	Плід: профіль базального кінця	слабко заглиблений	3	
23	Плід: профіль апікального кінця	заглиблений	1	
24	Плід: боріздки	відсутні	1	
25	Плід: відстань між боріздками	ознака не визначається	0	
26	Плід: боріздки за глибиною	ознака не визначається	0	
27	Плід: мармуровість	відсутня або дуже слабка	1	
28	Плід: основне забарвлення шкірки	кремове	2	
29	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки	помірна	5	
30	Плід: восковий наліт шкірки	відсутній	1	
31	Плід: бородавки	відсутні	1	
32	Плід: основне забарвлення м'якоті	жовтувато-оранжеве	2	
33	Плід: м'якоть за товщиною (на рівні насінної камери)	середня	5	
34	Плід: діаметр квіткового рубця	середній	5	
35	Насінина: за довжиною	середня	5	
36	Насінина: відношення ширина / довжина	середнє	5	
37	Насінина: забарвлення оболонки	кремове	1	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 35. Середня маса плоду, кг – 1,5. Тривалість періоду до досягання, діб – 100. Довжина головного стебла, см – 235. Тип стебла: індетермінантний – 2. Вміст сухої речовини, % – 8,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 9; антракноз (*Colletotrichum lagenarium* E. et H.) – 9; плямистість бактеріальна (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson) – 9; фузаріоз (*Fusarium nivium* E. Sm.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Гарбуз мускатний *Cucurbita moschata* Duch.

Заявка № 22228001 Назва сорту: Спеллкаст **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231137

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядоля: відношення ширина / довжина	середнє	5	
2	Рослина: головне стебло за довжиною	середнє	5	
3	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
4	Листкова пластинка: розсіченість краю	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
6	Листкова пластинка: сріблясті плями	наявні	9	
7	Черешок: за довжиною	середній	5	
8	Черешок: діаметр	середній	5	
9	Жіноча квітка: чашолисток за довжиною	довгий	7	
10	Чоловіча квітка: чашолисток за довжиною	довгий	7	
11	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
12	Плодоніжка: діаметр	середній	5	
13	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	слабка	3	
14	Плід: за довжиною	середній	5	
15	Плід: діаметр	середній	5	
16	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5	
17	Плід: положення найширшої частини	посередині	2	
18	Плід: форма поздовжнього розрізу	поперечно середньоеліптична	2	
19	Плід: шийка	відсутня або дуже слабко виражена	1	
20	Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
21	Плід: вигин (за поздовжньою віссю)	відсутній або дуже слабкий	1	
22	Плід: профіль базального кінця	слабко заглиблений	3	
23	Плід: профіль апікального кінця	заглиблений	1	
24	Плід: борізки	наявні	9	
25	Плід: відстань між борізками	середня	5	
26	Плід: борізки за глибиною	середні	5	
27	Плід: мармуровість	відсутня або дуже слабка	1	
28	Плід: основне забарвлення шкірки	кремове	2	
29	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки	помірна	5	
30	Плід: восковий наліт шкірки	відсутній	1	
31	Плід: бородавки	відсутні	1	
32	Плід: основне забарвлення м'якоті	жовтувато-оранжеве	2	
33	Плід: м'якоть за товщиною (на рівні насінної камери)	товста	7	
34	Плід: діаметр квіткового рубця	середній	5	
35	Насінина: за довжиною	середня	5	
36	Насінина: відношення ширина / довжина	середнє	5	
37	Насінина: забарвлення оболонки	жовте	2	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 50. Середня маса плоду, кг – 4,0. Тривалість періоду до досягання, діб – 105. Довжина головного стебла, см – 230. Тип стебла: індетермінантний – 2. Вміст сухої речовини, % – 14.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 20096003 Назва сорту: Слобожаночка **Заявник (код):** 1781 **Власник сорту (код):** 1781

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.11.2023 **Патент № 230687**

Дата пріоритету: 21.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231005

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	великий	7	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	розлоге	5	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	великий	7	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненояйцеподібна	5	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	сильний	3	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірний	5	
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно-еліптична	2	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	рівна	2	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	частково покритий	2	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	щільна	7	
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	довга	7	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	середній	5	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 85. Період від сівби до початку досягання, днів – 150. Лежкість, балів (1–9) – 7. Вміст вітаміну С, мг % – 38; загального цукру, % – 5,36; сухої речовини, % – 9,36. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 7; бактеріоз судинний – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка № 21110012 Назва сорту: ГРАТЕН **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

Дата пріоритету: 30.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230980

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	довга	7	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	мале	3	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	тупа	3	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5	
10	Листок: хвилястість краю	помірна	2	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	помірна	5	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3	
13	Рослина: виявлення статі	гіноєційність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2 або 3	4	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	середній	5	
18	Плід: діаметр	середній	5	
19	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	дуже мале	1	
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	округла	3	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	сильна	7	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	наявні	9	
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	дуже слабкий	1	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	нещільний	3	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	малий	3	
36	Плід: смужки за довжиною	відсутні або дуже короткі	1	
37	Плід: плями	наявні	9	
38	Плід: характер поширення плям	рівномірно поширені	3	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	виключаючи місце навколо плодоніжки	4	
40	Плід: щільність плям	помірної щільності	5	
41	Плід: наліт	слабкий	3	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовте	2	
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i> (Ccu)	наявна	9	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	помірно стійкий	2	
46	Стійкість проти борошністої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	високо стійкий	3	
47	Стійкість проти несправжньої борошністої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	сприйнятливий	1	
48	Стійкість проти бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	відсутня	1	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (<i>CVYV</i>)	відсутня	1	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (<i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus</i> (CGMMV))	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 180. Вміст сухої речовини в плоді, % – 2,5. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, дів – 33. Тривалість періоду плодоношення, дів – 75.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка № 21110013 Назва сорту: ГРИФОН **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

Дата пріоритету: 01.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230981

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	тупа	3	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темна	7	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3	
10	Листок: хвилястість краю	помірна	2	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	помірна	5	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5	
13	Рослина: виявлення статі	гіноеційність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2	3	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	середній	5	
18	Плід: діаметр	середній	5	
19	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	дуже мале	1	
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	округла	3	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірна	5	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	наявні	9	
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	дуже слабкий	1	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	помірний	5	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	малий	3	
36	Плід: смужки за довжиною	відсутні або дуже короткі	1	
37	Плід: плями	наявні	9	
38	Плід: характер поширення плям	рівномірно поширені	3	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	виключаючи місце навколо плодоніжки	4	
40	Плід: щільність плям	помірної щільності	5	
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовте	2	
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i> (Ccu)	наявна	9	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	помірно стійкий	2	
46	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	помірно стійкий	2	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	сприйнятливий	1	
48	Стійкість проти бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	відсутня	1	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	відсутня	1	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (<i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus</i>) (CGMMV)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 170. Вміст сухої речовини в плоді, % – 2,7. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, днів – 35. Тривалість періоду плодоношення, днів – 75.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Згр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 20115017 Назва сорту: Арабат Заявник (код): 3221 Власник сорту (код): 3221

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 03.11.2023 Патент № 230651

Дата пріоритету: 02.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231008

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	середній	5	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	еліптична	6	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насінневих камер	дві-три	2	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	слабка	3	
38	Плід: забарвлення (за досяганням)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досяганням)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час досягання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досяганням)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	ознака не визначалась	0	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 100. Вміст каротину, мг % – 0,26; сухої речовини в плоді, % – 5,8; вітаміну С, мг % – 22,4; загального цукру, % – 3,45. Загальна кислотність, % – 0,42. Маса товарного плоду, г – 100. Період від повних сходів до початку дозрівання, днів – 105. Тривалість періоду плодоношення, днів – 45.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 18115007 Назва сорту: Базилевс Заявник (код): 1781 Власник сорту (код): 1781

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.11.2023 Патент № 230695

Дата пріоритету: 21.02.2018

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231007

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	великий	7	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	дуже великий	9	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насінневих камер	чотири, п'ять або шість	4	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	дуже слабка	1	
38	Плід: забарвлення (за досяганням)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досяганням)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	м'який	3	
41	Плід: термін лежкості	короткий	3	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досяганням)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	ознака не визначалась	0	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 77,1. Вміст каротину, мг % – 0,3; сухої речовини в плоді, % – 7,1; вітаміну С, мг % – 18,1; загального цукру, % – 6,5. Загальна кислотність, % – 0,7. Маса товарного плоду, г – 132. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 103. Тривалість періоду плодоношення, діб – 50.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 23115023 Назва сорту: Зухраза Заявник (код): 1730 Власник сорту (код): 1730

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 Патент № 230727

Дата пріоритету: 10.10.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231068

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	поникле	9	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насінневих камер	чотири, п'ять або шість	4	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	дуже малий	1	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	слабка	3	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	слабка	3	
38	Плід: забарвлення (за досяганням)	рожеве	4	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досяганням)	рожеве	4	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час досягання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досяганням)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	наявна	9	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	наявна	9	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	наявна	9	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	слабка	1	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 180. Вміст каротину, мг % – 6,7; сухої речовини в плоді, % – 6,4; вітаміну С, мг % – 7; загального цукру, % – 5,4. Загальна кислотність, % – 0,5. Маса товарного плоду, г – 220. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 112. Тривалість періоду плодоношення, діб – 120.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 20115018 **Назва сорту:** Презент херсонський **Заявник (код):** 3221 **Власник сорту (код):** 3221

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 03.11.2023 **Патент №** 230652

Дата пріоритету: 02.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231009

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	середній	5	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	велике	7	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	еліптична	6	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насінневих камер	дві-три	2	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	слабка	3	
38	Плід: забарвлення (за досяганням)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досяганням)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час досягання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досяганням)	низький	3	
45	Чутливість до сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	ознака не визначалась	0	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 80. Вміст каротину, мг % – 0,25; сухої речовини в плоді, % – 5,7; вітаміну С, мг % – 22,1; загального цукру, % – 3,35. Загальна кислотність, % – 0,45. Маса товарного плоду, г – 75. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 108. Тривалість періоду плодоношення, діб – 40.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 21115037 Назва сорту: Сонцедар Заявник (код): 1781 Власник сорту (код): 1781

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.11.2023 Патент № 230696

Дата пріоритету: 16.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231010

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	середній	5	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	велике	7	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	еліптична	6	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насінневих камер	дві-три	2	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	дуже слабка	1	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	жовте	2	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	жовте	2	
40	Плід: за твердістю	м'який	3	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	низький	3	
45	Чутливість до сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	ознака не визначалась	0	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 8,6. Вміст каротину, мг % – 0,2; сухої речовини в плоді, % – 5,7; вітаміну С, мг % – 35,3; загального цукру, % – 3,5. Загальна кислотність, % – 0,59. Маса товарного плоду, г – 88,4. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 117. Тривалість періоду плодоношення, діб – 55.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 21115003 Назва сорту: Спалах **Заявник (код):** 1802 **Власник сорту (код):** 1802

Дата пріоритету: 14.01.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230993

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотыля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видалюють)	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпряме	3	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глясуватість (як для б)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	середній	5	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	велике	7	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	еліптична	6	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	дві-три	2	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	слабка	3	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час досягання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	ознака не визначалась	0	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глясуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 65,3. Вміст каротину, мг % – 7,86; сухої речовини в плоді, % – 9,4; вітаміну С, мг % – 32,6; загального цукру, % – 1,3. Загальна кислотність, % – 0,35. Маса товарного плоду, г – 74,9. Період від повних сходів до початку дозрівання, днів – 101. Тривалість періоду плодоношення, днів – 55.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 21115035 Назва сорту: ХАКІМАРУ **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

Дата пріоритету: 30.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230982

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотіля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видалюють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	довге	7	до дуже довгого
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	широкий	7	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	до великого
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	до сильної
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3	до помірної
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	до помірної
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	середній	5	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	до помірної
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	великий	7	
29	Плід: розмір квіткового рубця	великий	7	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	товстий	7	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	чотири, п'ять або шість	4	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	рожеве	4	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час досягання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7	
45	Чутливість до сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	наявна	9	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	наявна	9	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	наявна	9	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією наданою заявником:**– показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 200. Вміст каротину, мг % – 3,5; сухої речовини в плоді, % – 6; вітаміну С, мг % – 12; загального цукру, % – 4,5. Загальна кислотність, % – 1. Маса товарного плоду, г – 190. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 100. Тривалість періоду плодоношення, діб – 63.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

Заявка № 23120005 Назва сорту: Ліадін Заявник (код): 1730 Власник сорту (код): 1730

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 Патент № 230729

Дата пріоритету: 13.09.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231050

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	біле	1	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	напівпряме	3	
6	Листок: за цілісністю (як для 5)	цілісний	1	
7	Рослина: діаметр	середній	5	
8	Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків	відсутній або слабкий	1	
9	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: перекривання верхніх частин листків	ознака не визначається	0	
10	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: за щільністю	ознака не визначається	0	
11	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: розмір	ознака не визначається	0	
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: перекривання верхніх частин листків	ознака не визначається	0	
13	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
14	Листок: за товщиною	тонкий	3	
15	Листок: положення зовнішніх листків за збиральною стиглістю	напівпряме	3	
16	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма	поперечно широко еліптична	5	
17	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: забарвлення	зелене	1	
19	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глясுவатість верхнього боку	слабка	3	
25	Листок: пухирчастість	помірна	5	
26	Листок: розмір пухирців	малий	3	
27	Листок: хвилястість краю	сильна	7	
28	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка	наявна	9	
29	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка за глибиною	дуже мілка	1	
30	Листок: щільність надрізаності краю	щільна	7	
31	Листок: за типом надрізаності	правильно зубчастий	2	
32	Листок: жилкування	віялоподібне	2	
33	Пазушне галуження	відсутнє або дуже слабке	1	
34	Час збиральної стиглості	ознака не визначалась	0	
35	Час початку стрілкування	пізній	7	
36	Рослина: за висотою (під час квітання)	ознака не визначалась	0	
37	Рослина: фасціація (під час квітання)	наявна	9	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час квітання)	дуже слабка	1	
39	Стійкість проти збудника борошнистої роси – <i>Bremia lactucae</i> (Bl). Ізолят Bl: 16 EU, 17 EU, 20–27 EU, 29–31 EU, 33 EU, 35 EU	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип II	наявна	9	
41	Стійкість проти попелиць – <i>Nasonovia ribis nigr</i> (Nr). Біотип Nr: 0	наявна	9	
42	Стійкість проти збудника фузаріозу – <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i> (Fol). Паса 1	наявна	9	
43	Листок: відтінок антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
44	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: відсутній або слабкий. Рослина: кількість листків	середня	5	
45	Листок: кількість розчленувань	відсутня або дуже мала	1	
46	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала Листок: у поздовжньому перерізі	увігнутий	1	
47	Тільки для сортів дуболистого типу. Листок: лопаті за шириною	ознака не визначається	0	
48	Листок: площа антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
49	Тільки для сортів із Листок: вторинна надрізаність краю за глибиною для неправильно зубчастих, дво- або тризубчастих листків	ознака не визначалась	0	
50	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за довжиною	ознака не визначається	0	
51	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за шириною	ознака не визначається	0	
52	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
53	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення м'якоти	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 39,6. Тривалість періоду до досягання, діб – 51. Стійкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса – 9; борошниста роса – 8; біла гниль – 7; септоріоз – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Шпинат городній *Spinacia oleracea* L.

Заявка № 21130001 Назва сорту: Траверс **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

Дата пріоритету: 13.10.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231134

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: сім'ядолі за довжиною	середні	5	
2	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
3	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5	
4	Листкова пластинка: часточковість	відсутня або дуже слабка	1	
5	Черешок: положення	напівпохиле	3	
6	Черешок: за довжиною	середній	5	
7	Листкова пластинка: положення	напівпряме	3	
8	Листкова пластинка: форма (за винятком базальних часток)	трикутна	1	
9	Листкова пластинка: вигин краю	плескатий	2	
10	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
11	Листкова пластинка: форма поздовжнього розрізу	плеската	2	
12	Кількісне співвідношення однодомних рослин	відсутнє або дуже низьке	1	
13	Кількісне співвідношення жіночих рослин	високе	7	
14	Кількісне співвідношення чоловічих рослин	відсутнє або дуже низьке	1	
15	Час початку стрілкування (для сортів весняної сіви, 15% рослин)	ранній	3	
16	Насінина: колючки (стигле насіння)	відсутні	1	
17	Стійкість до <i>Peronospora farinosa</i> f. <i>spinaciae</i>	наявна	9	
18	Стійкість до <i>Cucumber mosaic virus</i> (CMV)	ознака не визначалась	0	
19	Листок: антоціанове забарвлення черешків і жилок	відсутнє	1	
20	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>spinaciae</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 4. Товарна врожайність, т/га – 3,7. Період від сходів до збирання врожаю, дів – 35. Маса 1000 насінин, г – 10. Вміст у листках: сухої речовини, % – 5; загального цукру, % – 17,5; вітаміну С, мг/100 г с. р. – 20; нітратів, мг/100 г с. р. – 155. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): *Peronospora farinosa* f. sp. *spinaciae* – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.

Вид: Шпинат городній *Spinacia oleracea* L.

Заявка № 21130002 Назва сорту: Траялбосс **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231135

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: сім'ядолі за довжиною	середні	5	
2	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
3	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3	
4	Листкова пластинка: часточковість	слабка	3	
5	Черешок: положення	напівпохиле	3	
6	Черешок: за довжиною	середній	5	
7	Листкова пластинка: положення	напівпряме	3	
8	Листкова пластинка: форма (за винятком базальних часток)	трикутна	1	
9	Листкова пластинка: вигин краю	плесканий	2	
10	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
11	Листкова пластинка: форма поздовжнього розрізу	плеската	2	
12	Кількісне співвідношення однодомних рослин	відсутнє або дуже низьке	1	
13	Кількісне співвідношення жіночих рослин	високе	7	
14	Кількісне співвідношення чоловічих рослин	відсутнє або дуже низьке	1	
15	Час початку стрілкування (для сортів весняної сіви, 15% рослин)	ранній	3	
16	Насіння: колючки (стигле насіння)	відсутні	1	
17	Стійкість до <i>Peronospora farinosa</i> f. <i>spinaciae</i>	наявна	9	
18	Стійкість до <i>Cucumber mosaic virus</i> (CMV)	ознака не визначалась	0	
19	Листок: антоціанове забарвлення черешків і жилок	відсутнє	1	
20	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>spinaciae</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 4,1. Товарна врожайність, т/га – 3,9. Період від сходів до збирання врожаю, дів – 35. Маса 1000 насінин, г – 10. Вміст у листках: сухої речовини, % – 5; загального цукру, % – 17; вітаміну С, мг/100 г с. р. – 20; нітратів, мг/100 г с. р. – 150. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): *Peronospora farinosa* f. sp. *spinaciae* – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.

ПЛОДОВІ ТА ЯГІДНІ

Актинідія пурпурова х актинідія гостра

Калина звичайна

Персик звичайний

Суниця садова

Черешня

Яблуня домашня



Вид: Актинідія пурпурова x актинідія гостра *Actinidia purpurea* Rehd. x *Actinidia arguta* Planch.

Заявка № 23368001 Назва сорту: Славна **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 03.11.2023 **Патент № 230649**

Дата пріоритету: 12.04.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230973

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: стать	жіноча	1	
2	Рослина: самоплідність	відсутня	1	
3	Рослина: за силою росту	сильна	7	
4	Молодий пагін: щільність ворсинок	дуже нещільні	1	
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
6	Стебло: за товщиною	тонке	1	
7	Стебло: забарвлення пагона з-під сонячного боку	зелено-біле	1	
8	Стебло: текстура кори	гладенька	1	
9	Стебло: ворсинки за щільністю	відсутні або нещільні	1	
10	Стебло: розмір сочевичок	середній	3	
11	Стебло: кількість сочевичок	велика	7	
12	Стебло: випуклість брунькового виступу	середня	3	
13	Стебло: покриття бруньки	наявне	9	
14	Стебло: розмір отвору в покритті бруньки	малий	1	
15	Стебло: листовий рубець	плаский	1	
16	Стебло: серцевина	шарувата	2	
17	Листкова пластинка: форма	яйцеподібна	2	
18	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
19	Листкова пластинка: форма верхівки	гострокінцева	2	
20	Листкова пластинка: базальні часточки	торкаються	4	
21	Листкова пластинка: кількість війчастих зубців	велика	7	
22	Листкова пластинка: волоски на верхньому боці за щільністю	відсутні або дуже нещільні	1	
23	Листкова пластинка: волоски на нижньому боці за щільністю	відсутні або дуже нещільні	1	
24	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
25	Листкова пластинка: забарвлення нижнього боку	помірно зелене	3	
26	Листкова пластинка: строкате забарвлення	відсутнє	1	
27	Листкова пластинка колір строкатого забарвлення	ознака не визначається	0	
28	Листок: відношення довжини черешка до довжини пластинки	мале	3	
29	Черешок: антоціанове забарвлення верхнього боку	помірне	5	
30	Суцвіття: тип	поодинокі квітка	1	
31	Суцвіття: кількість квіток	середня	3	
32	Генеративна брунька: положення першої луски	середнє	2	
33	Квітка: кількість чашолистків	середня	2	
34	Квітка: основне забарвлення чашолистків	біле	1	
35	Квітка: волосинки на чашолистках за щільністю	відсутні або дуже нещільні	1	
36	Квітка: діаметр	середній	5	
37	Квітка: розташування пелюсток	перекриваються	3	
38	Квітка: вигляд з боку	випукла	3	
39	Квітка: кількість маточок	мала	1	
40	Квітка: положення маточок	пряме	1	
41	Пелюстка: забарвлення адакського боку	зеленувато-біле	2	
42	Пелюстка: розподіл забарвлення	однорідний	2	
43	Пелюстка: вторинне забарвлення верхнього боку	відсутнє	1	
44	Пелюстка: розподіл вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
45	Пиляк: забарвлення	сіре	3	
46	Плід: маса	середня	5	
47	Плід: за довжиною	середній	5	
48	Плід: за шириною	середній	5	
49	Плід: відношення довжина / ширина	середнє	5	
50	Плід: форма	округла	4	
51	Плід: форма поперечного перерізу (посередині)	округла	1	
52	Плід: маточковий кінець	округлий	4	
53	Плід: ступінь загостреності	слабкий	1	
54	Плід: кільце чашечки	помірно виражене	2	
55	Плід: форма плеча базальної частини	зрізана	1	
56	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
57	Плід: довжина плодоніжки відносно довжини плоду	довга	7	
58	Плід: прояв сочевичок на шкірці	сильний	3	
59	Плід: ворсистість шкірки	відсутня	1	
60	Плід: ворсинки за щільністю	ознака не визначається	0	
61	Плід: забарвлення ворсинок	ознака не визначається	0	
62	Плід: з'єднання ворсинок із шкіркою	ознака не визначається	0	
63	Плід: забарвлення шкірки	зелене	2	
64	Плід: з'єднання шкірки із м'якоттю	помірне	2	
65	Плід: забарвлення зовнішнього оплодня	світло-зелене	1	
66	Плід: забарвлення камер	зеленувато-жовте	4	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
67	Плід: поширення червонуватого забарвлення вздовж камер	сильне	4	
68	Плід: інтенсивність червонуватого забарвлення на камерах	слабка	3	
69	Плід: відношення ширина серцевини / діаметр плоду	середнє	5	
70	Плід: основна форма серцевини в поперечному перерізі	сплюснута	2	
71	Плід: забарвлення серцевини	жовто-біле	3	
72	Плід: цукристість	середня	5	
73	Плід: кислотність	середня	5	
74	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
75	Час початку цвітіння	середній	5	
76	Час збиральної стиглості	середній	5	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Група стиглості: середня – 5. Самоплідність: відсутня – 9. Час збиральної стиглості: середній – 5. Урожайність, т/га – 16,5. Середня маса плоду, г – 11,7. Вміст у плодах: вітаміну С, мг/100 г – 48,5; каротину, мг/100 г – 0,54. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Транспортабельність, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): плямистість листків (*Septoria piricola* Desm) – 9; сіра плодова гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Калина звичайна *Viburnum opulus* L.

Заявка № 21303001 Назва сорту: Ярославна **Заявник (код):** 1601

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 **Патент № 230726**

Дата пріоритету: 02.12.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Кущ: за висотою	високий	7	
2	Кущ: за шириною	середній	5	
3	Кущ: відношення висота / ширина	середнє	5	
4	Кущ: кількість скелетних гілок	мала	3	
5	Пагін: за товщиною (однорічний)	товстий	7	
6	Пагін: забарвлення кори	зелене	2	
7	Листок: розмір	великий	7	
8	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листок: форма краю листкової пластинки	городчаста	2	
10	Листок: форма основи листкової пластинки	серцеподібна	3	
11	Листок: кількість лопатей	три	3	
12	Листок: прилистки	наявні	9	
13	Черешок листка: за довжиною	довгий	7	
14	Квітка: розмір	середній	5	
15	Зав'язь: опушення	відсутнє	1	
16	Зав'язь: форма	овальна	1	
17	Ягода: розмір	великий	7	
18	Ягода: форма	овальна	2	
19	Ягода: основне забарвлення	жовте	5	
20	Ягода: за твердістю	тверда	7	
21	Час розвитку бруньок	пізній	7	
22	Час початку цвітіння	пізній	7	
23	Тільки для сортів із жовтим забарвленням. Ягода: покривне забарвлення (рум'янець)	наявне	9	
24	Тільки для сортів із жовтим забарвленням. Ягода: інтенсивність рум'янцю	слабка	3	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Життєва форма: дерево – 9. Строк досягання: середній – 2. Ступінь самоплідності, % – 50,0. Урожайність, т/га – 16,3. Середня маса плоду, г – 0,75. Соковитість ягід, % – 68,0. Вміст у плодах: вітаміну С, мг/100 г – 96,0; загального цукру, % – 4,5. Загальна кислотність, % – 2,8. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 6,1. Транспортельність, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): плодова гниль – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиці – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Персик звичайний *Prunus persica* (L.) Batsch
Заявка № 23259001 Назва сорту: П.Ф. 24–007 **Заявник (код):** 3208
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 231067
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: розмір	великий	7	
2	Дерево: за силою росту	сильне	7	
3	Дерево: габітус	прямий	1	
4	Квітконосний пагін: за товщиною	середній	5	
5	Квітконосний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
6	Квітконосний пагін: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
7	Квітконосний пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
8	Квітконосний пагін: розміщення генеративних бруньок	помірне	5	
9	Квітка: тип	розетковий	2	
10	Віночок: основне забарвлення (із внутрішнього боку)	рожеве	4	
11	Пелюстка: форма	вузькоеліптична	3	
12	Лише сорти з дзвоникоподібним типом квітки. Пелюстка: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Лише сорти з розетковим типом квітки. Пелюстка: за шириною	середня	3	
14	Квітка: кількість пелюсток	п'ять	1	
15	Тичинка: розміщення відносно пелюсток	вище	3	
16	Приймочка: розміщення відносно пиляків	на одному рівні	2	
17	Пиляки: пилок	наявний	9	
18	Зав'язь: опушення	наявне	9	
19	Прилистки: за довжиною	короткі	3	
20	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
21	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
22	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
23	Листкова пластинка: форма поперечного перерізу	плоска	2	
24	Листкова пластинка: форма краю	городчаста	1	
25	Листкова пластинка: кут основи	гострий	1	
26	Листкова пластинка: кут верхівки	малий	3	
27	Листкова пластинка: забарвлення	зелене	3	
28	Листкова пластинка: почервоніння центральної жилки на нижньому боці листка	відсутнє	1	
29	Черешок: за довжиною	середній	5	
30	Черешок: нектарники	наявні	9	
31	Черешок: форма нектарників	округла	1	
32	Плід: розмір	дуже великий	9	
33	Плід: форма (вигляд збоку)	округла	3	
34	Плід: загострення маточкового кінця	відсутнє	1	
35	Плід: форма маточкового кінця (за винятком загострення)	плоска	3	
36	Плід: симетричність (вигляд з маточкового кінця)	симетричний	1	
37	Плід: помітність шва	помірна	5	
38	Плід: ямка плодоніжки за глибиною	середня	5	
39	Плід: ямка плодоніжки за шириною	вузька	3	
40	Плід: основне забарвлення шкірки	кремово-жовте	9	
41	Плід: відносна площа покривного забарвлення шкірки	велика	7	
42	Плід: відтінок покривного забарвлення шкірки	темно-червоний	6	
43	Плід: рисунок покривного забарвлення	суцільний рум'янець	1	
44	Плід: опушення шкірки	наявне	9	
45	Плід: щільність опушення шкірки	дуже нещільне	1	
46	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: глянуватість	ознака не визначається	0	
47	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: видимість сочевичок	ознака не визначається	0	
48	Плід: шкірка за товщиною	середня	5	
49	Плід: зростання шкірки із м'якоттю	слабке	3	
50	Плід: твердість м'якоті	тверда	7	
51	Плід: основне забарвлення м'якоті	жовте	5	
52	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті безпосередньо під шкіркою	відсутнє або дуже слабке	1	
53	Плід: антоціанове забарвлення в центральній частині м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
54	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті навколо кісточки	сильне	3	
55	Плід: волокнистість м'якоті	відсутня або слабка	1	
56	Плід: цукристість	середня	5	
57	Плід: кислотність	низька	2	
58	Кісточка: розмір у порівнянні з плодом	малий	3	
59	Кісточка: форма (вигляд збоку)	еліптична	3	
60	Кісточка: антоціанове забарвлення	помірне	5	
61	Кісточка: інтенсивність коричневого забарвлення	середня	5	
62	Кісточка: рельєфність поверхні	порівну ямки і борідки	3	
63	Кісточка: тенденція до розтріскування (розколювання)	відсутня або дуже слабка	1	
64	Кісточка: зростання з м'якоттю	відсутнє	1	
65	Кісточка: ступінь зростання з м'якоттю	слабкий	3	
66	Час початку розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
67	Час початку цвітіння	пізній	7	
68	Час споживої стиглості	від середнього до пізнього	6	

За інформацією наданою заявником:**– показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 30,0. Середній урожай з дерева, кг – 16,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової речовини – 6,5; загального цукру, % – 14,5; фенольних сполук, мг/100 г сирової речовини – 185,0; пектинових речовин, % – 3,0; сухих розчинних речовин, % – 9,4. Загальна кислотність, % – 0,5. Маса плоду (середня), г – 280,0. Маса плоду (максимальна), г – 400,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз – 5; моніліальний опік – 5; парша – 5; клястероспоріоз – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кісточкова муха – 5; попелиця – 5. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 4. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 3. Зимостійкість, балів (1–9) – 7. Схема садіння, м – 4 x 3. Група стиглості – пс. Напрямок використання – ун. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Суниця садова *Fragaria ananassa* Duch.

Заявка № 21294003 Назва сорту: АРІАННА **Заявник (код):** 2832 **Власник сорту (код):** 2832

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.11.2023 **Патент №** 230713

Дата пріоритету: 12.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231139

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
2	Рослина: щільність розміщення листків	середня	5	
3	Рослина: сила росту	середня	5	до сильної
4	Рослина: положення суцвіття відносно листків	на одному рівні	2	
5	Рослина: кількість вусів	середня	5	до великої
6	Вуса: антоціанове забарвлення	слабке	3	до помірного
7	Вуса: щільність опушення	середня	5	
8	Листок: розмір	великий	7	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	темно-зелене	4	
10	Листок: пухирчатість	помірна	2	
11	Листок: глясуватість	сильна	3	
12	Листок: строкатість	відсутня	1	
13	Верхівковий листочок: довжина відносно ширини	довша	3	
14	Верхівковий листочок: форма основи	тупа	2	
15	Верхівковий листочок: форма краю	зубчаста	1	
16	Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	до довгого
18	Черешок: положення волосків	горизонтальне	3	
19	Прилисток: антоціанове забарвлення	слабке	3	
20	Суцвіття: кількість квіток	мала	3	
21	Квітконіжка: положення волосків	злегка спрямоване догори	2	
22	Квітка: діаметр	середній	5	до великого
23	Квітка: розташування пелюсток віночка	торкаються	2	
24	Квітка: розмір чашечки відносно віночка	однаковий	2	
25	Квітка: тичинки	наявні	9	
26	Пелюстка: довжина відносно ширини	довша	4	
27	Пелюстка: забарвлення верхнього боку	біле	2	
28	Плід: довжина відносно ширини	довша	4	
29	Плід: розмір	великий	7	
30	Плід: форма	конічна	2	
31	Плід: різниця форми між верхівковими та іншими плодами	мала	3	до помірної
32	Плід: забарвлення	червоне	5	
33	Плід: рівномірність забарвлення	злегка нерівномірний	2	
34	Плід: глясуватість	сильна	3	
35	Плід: нерівність поверхні	слабко виражена	2	
36	Плід: ширина вільної від сім'янок зони	середня	5	
37	Плід: положення сім'янок	заглиблене	1	
38	Плід: положення чашечки	виступаюче	3	
39	Плід: положення чашолистків	догори	1	
40	Плід: діаметр чашечки порівняно з діаметром плоду	дещо більший	4	
41	Плід: прилягання чашечки до плоду	слабке	3	до помірного
42	Плід: твердість	помірна	5	до твердої
43	Плід: забарвлення м'якоті (за винятком серцевини)	червоне	5	
44	Плід: забарвлення серцевини	червоне	3	
45	Плід: повітряна комірка	середня	2	
46	Час початку цвітіння	ранній	3	
47	Час початку достигання плодів	ранній	3	
48	Тип плодоношення	неремонтантний	1	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 35,0. Середня маса ягоди, г – 27,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 64,0; загального цукру, % – 7,2; пектинових речовин, % – 0,7; сухих розчинних речовин, % – 7,8; фенольних сполук, мг/100 г сирової маси – 92,0. Загальна кислотність, % – 0,6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Sphaerotheca fragariae* Magn. f. Jacz) – 7; сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 6; бура плямистість (*Marssonina potentillae* (Desm.) P. Magn. f. *fragariae* (Lib.) Ohl.) – 7; біла плямистість (*Ramularia tulasnei* Sacc.) – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): малиново-суничний довгоносик (*Anthonomus rubi* Hrbst.) – 6; суничний кліщ (*Tarsonemus fragariae* Zimm.) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Стійкість квіток до пізньо-весняних заморозків, бал (1–9) – 7. Ремонтантність: відсутня – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Група достигання: рання – 2. Транспортабельність ягід, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 1,0 x 0,25. Загальна дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, 3Гр.

Вид: Суниця садова *Fragaria ananassa* Duch.

Заявка № 21294004 Назва сорту: САНДРИНА Заявник (код): 2832 Власник сорту (код): 2832

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.11.2023 Патент № 230714

Дата пріоритету: 12.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231140

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
2	Рослина: щільність розміщення листків	середня	5	до щільної
3	Рослина: сила росту	середня	5	до сильної
4	Рослина: положення суцвіття відносно листків	на одному рівні	2	
5	Рослина: кількість вусів	середня	5	до великої
6	Вуса: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
7	Вуса: щільність опушення	нещільна	3	
8	Листок: розмір	середній	5	до великого
9	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	3	
10	Листок: пухирчатість	помірна	2	
11	Листок: глясуватість	помірна	2	
12	Листок: строкатість	відсутня	1	
13	Верхівковий листочок: довжина відносно ширини	довша	3	
14	Верхівковий листочок: форма основи	тупа	2	
15	Верхівковий листочок: форма краю	зубчаста	1	
16	Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: положення волосків	спрямоване догори	1	
19	Прилисток: антоціанове забарвлення	помірне	5	
20	Суцвіття: кількість квіток	мала	3	
21	Квітконіжка: положення волосків	спрямоване догори	1	
22	Квітка: діаметр	середній	5	
23	Квітка: розташування пелюсток віночка	вільно	1	
24	Квітка: розмір чашечки відносно віночка	менший	1	
25	Квітка: тичинки	наявні	9	
26	Пелюстка: довжина відносно ширини	однакова	3	
27	Пелюстка: забарвлення верхнього боку	біле	2	
28	Плід: довжина відносно ширини	довша	4	
29	Плід: розмір	великий	7	
30	Плід: форма	конічна	2	
31	Плід: різниця форми між верхівковими та іншими плодами	мала	3	до помірної
32	Плід: забарвлення	червоне	5	
33	Плід: рівномірність забарвлення	злегка нерівномірний	2	
34	Плід: глясуватість	сильна	3	
35	Плід: нерівність поверхні	слабко виражена	2	
36	Плід: ширина вільної від сім'янок зони	середня	5	
37	Плід: положення сім'янок	нарівні з поверхнею	2	
38	Плід: положення чашечки	виступаюче	3	
39	Плід: положення чашолистків	горизонтальне	2	
40	Плід: діаметр чашечки порівняно з діаметром плоду	однаковий	3	
41	Плід: прилягання чашечки до плоду	слабке	3	до помірного
42	Плід: твердість	тверда	7	
43	Плід: забарвлення м'якоті (за винятком серцевини)	червоне	5	
44	Плід: забарвлення серцевини	червоне	3	
45	Плід: повітряна комірка	середня	2	
46	Час початку цвітіння	дуже ранній	1	до раннього
47	Час початку достигання плодів	ранній	3	
48	Тип плодоношення	частково ремонтантний	2	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 25,0. Середня маса ягоди, г – 20,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 61,0; загального цукру, % – 8,0; пектинових речовин, % – 0,8; сухих розчинних речовин, % – 8,5; фенольних сполук, мг/100 г сирової маси – 88,0. Загальна кислотність, % – 1,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Sphaerotheca fragariae* Magn. f. Jacz) – 7; сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 6; бура плямистість (*Marssonina potentillae* (Desm.) P. Magn. f. *fragariae* (Lib.) Ohl.) – 7; біла плямистість (*Ramularia tulasnei* Sacc.) – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): малиново-суничний довгоносик (*Anthonomus rubi* Hrbst.) – 6; суничний кліщ (*Tarsonemus fragariae* Zimm.) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Стійкість квіток до пізньо-весняних заморозків, бал (1–9) – 7. Ремонтантність: наявна – 9. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Група достигання: рання – 2. Транспортувальність ягід, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 1,0 x 0,25. Загальна дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.

Вид: Суниця садова *Fragaria ananassa* Duch.

Заявка № 21294002 Назва сорту: ФЕДЕРІКА **Заявник (код):** 2832 **Власник сорту (код):** 2832

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.11.2023 **Патент № 230712**

Дата пріоритету: 12.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231138

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
2	Рослина: щільність розміщення листків	середня	5	
3	Рослина: сила росту	середня	5	
4	Рослина: положення суцвіття відносно листків	на одному рівні	2	
5	Рослина: кількість вусів	середня	5	до великої
6	Вуса: антоціанове забарвлення	помірне	5	до сильного
7	Вуса: щільність опушення	середня	5	
8	Листок: розмір	середній	5	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	темно-зелене	4	
10	Листок: пухирчатість	сильна	3	
11	Листок: глясуватість	помірна	2	
12	Листок: строкатість	відсутня	1	
13	Верхівковий листочок: довжина відносно ширини	однакова	2	
14	Верхівковий листочок: форма основи	тупа	2	
15	Верхівковий листочок: форма краю	від зубчастої до городчастої	2	
16	Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
17	Черешок: за довжиною	короткий	3	до середнього
18	Черешок: положення волосків	горизонтальне	3	
19	Прилисток: антоціанове забарвлення	помірне	5	до сильного
20	Суцвіття: кількість квіток	мала	3	до середньої
21	Квітконіжка: положення волосків	горизонтальне	3	
22	Квітка: діаметр	великий	7	
23	Квітка: розташування пелюсток віночка	перекриваються	3	
24	Квітка: розмір чашечки відносно віночка	менший	1	
25	Квітка: тичинки	наявні	9	
26	Пелюстка: довжина відносно ширини	однакова	3	
27	Пелюстка: забарвлення верхнього боку	біле	2	
28	Плід: довжина відносно ширини	довша	4	
29	Плід: розмір	великий	7	до дуже великого
30	Плід: форма	конічна	2	
31	Плід: різниця форми між верхівковими та іншими плодами	мала	3	до помірної
32	Плід: забарвлення	темно-червоне	6	
33	Плід: рівномірність забарвлення	злегка нерівномірний	2	
34	Плід: глясуватість	сильна	3	
35	Плід: нерівність поверхні	слабко виражена	2	
36	Плід: ширина вільної від сім'янок зони	середня	5	
37	Плід: положення сім'янок	заглиблене	1	
38	Плід: положення чашечки	виступаюче	3	
39	Плід: положення чашолистків	догори	1	
40	Плід: діаметр чашечки порівняно з діаметром плоду	дещо менший	2	
41	Плід: прилягання чашечки до плоду	помірне	5	
42	Плід: твердість	тверда	7	
43	Плід: забарвлення м'якоті (за винятком серцевини)	червоне	5	
44	Плід: забарвлення серцевини	червоне	3	
45	Плід: повітряна комірка	середня	2	
46	Час початку цвітіння	середній	5	до пізнього
47	Час початку достигання плодів	ранній	3	до середнього
48	Тип плодоношення	неремонтантний	1	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 40,0. Середня маса ягоди, г – 34,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 62,0; загального цукру, % – 6,7; пектинових речовин, % – 0,7; сухих розчинних речовин, % – 7,2; фенольних сполук, мг/100 г сирової маси – 90,0. Загальна кислотність, % – 1,1. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Sphaerotheca fragariae* Magn. f. Jacz) – 7; сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 6; бура плямистість (*Marssonina potentillae* (Desm.) P. Magn. f. *fragariae* (Lib.) Ohl.) – 7; біла плямистість (*Ramularia tulasnei* Sacc.) – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): малиново-суничний довгоносик (*Anthonomus rubi* Hrbst.) – 6; суничний кліщ (*Tarsonemus fragariae* Zimm.) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Стійкість квіток до пізньо-весняних заморозків, бал (1–9) – 9. Ремонтантність: відсутня – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Група достигання: середньорання – 3. Транспортабельність ягід, бал (1–9) – 9. Схема садіння, м – 1,0 x 0,25. Загальна дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.

Вид: Черешня *Prunus avium* L.

Заявка № 22262004 Назва сорту: Аніта Заявник (код): 1601 Власник сорту (код): 1601

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.11.2023 Патент № 230716

Дата пріоритету: 20.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230996

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: габітус	розлогий	3	
3	Дерево: розгалуження	помірне	5	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (під час активного росту)	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Молодий пагін: опушення верхівки (під час активного росту)	слабке	3	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	типові	1	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	5	
8	Однорічний пагін: за товщиною (посередині)	середній	5	
9	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
10	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
11	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	велике	7	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	середня	5	
13	Листок: черешок за довжиною	короткий	3	
14	Листок: відношення довжина пластинки / довжина черешка	велике	7	
15	Листок: нектарники	наявні	9	
16	Нектарники: забарвлення	темно-червоне	4	
17	Квітка: діаметр	середній	5	
18	Квітка: форма пелюстки	кругла	1	
19	Квітка: розташування пелюсток	проміжне	2	
20	Плід: розмір	великий	7	
21	Плід: форма	серцеподібна	1	
22	Плід: маточковий кінець	плоский	2	
23	Плід: шов	сильно помітний	3	
24	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
25	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
26	Плід: відокремлюючий шар між плодоніжкою і плодом	наявний	9	
27	Плід: забарвлення шкірки	темно-червоне	7	
28	Плід: розмір сочевичок на шкірці	малий	3	
29	Плід: кількість сочевичок на шкірці	середня	5	
30	Плід: шкірка за товщиною	товста	3	
31	Плід: забарвлення м'якоті	помірно червоне	4	
32	Плід: забарвлення соку	червоне	4	
33	Плід: за твердістю	твердий	7	
34	Плід: кислотність	середня	2	
35	Плід: цукристість	середня	5	
36	Плід: соковитість	середня	5	
37	Кісточка: розмір	середній	5	
38	Кісточка: форма (вид з черевного боку)	широкоеліптична	2	
39	Плід: відношення ваги плоду / ваги кісточки	мале	3	
40	Час початку цвітіння	ранній	3	
41	Час початку достигання плодів	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Сила росту: середня – 5. Група стиглості: середня – 5. Рік вступу у плодоношення – 4-ий. Урожайність, т/га – 20,0. Середній урожай з дерева, кг – 35,0. Середня маса плоду, г – 8,6. Середня маса кісточка, г – 0,4. Відокремлення кісточка від м'якоті: відокремлюється – 5. Вміст у плодах: загального цукру, % – 8,03; вітаміну С, мг/100 г – 9,14; Р-активних речовин, мг/100 г – 246,6. Загальна кислотність, % – 0,42. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8,7. Транспортабельність, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз (*Blumeriella hiemalis* Poeldmaa.) – 7,5; моніліальний опік (*Monilia cinerea* Bonord.) – 8; клястероспоріоз (*Clasterosporium carpophilum* (Lev.) Aderh.) – 8,5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): вишнева попелиця (*Myzus cerasi* F.) – 8; вишнева муха (*Rhagoletis cerasi* L.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Черешня *Prunus avium* L.

Заявка № 22262003 Назва сорту: Тайна **Заявник (код):** 1601 **Власник сорту (код):** 1601

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.11.2023 **Патент № 230715**

Дата пріоритету: 20.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230995

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: габітус	розлогий	3	
3	Дерево: розгалуження	сильне	7	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (під час активного росту)	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Молодий пагін: опушення верхівки (під час активного росту)	слабке	3	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	типові	1	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	5	
8	Однорічний пагін: за товщиною (посередині)	середній	5	
9	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
10	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
11	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	середня	5	
13	Листок: черешок за довжиною	середній	5	
14	Листок: відношення довжина пластинки / довжина черешка	середнє	5	
15	Листок: нектарники	наявні	9	
16	Нектарники: забарвлення	світло-червоне	3	
17	Квітка: діаметр	середній	5	
18	Квітка: форма пелюстки	кругла	1	
19	Квітка: розташування пелюсток	проміжне	2	
20	Плід: розмір	великий	7	
21	Плід: форма	серцеподібна	1	
22	Плід: маточковий кінець	плоский	2	
23	Плід: шов	слабко помітний	2	
24	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
25	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
26	Плід: відокремлюючий шар між плодоніжкою і плодом	наявний	9	
27	Плід: забарвлення шкірки	темно-червоне	7	
28	Плід: розмір сочевичок на шкірці	малий	3	
29	Плід: кількість сочевичок на шкірці	середня	5	
30	Плід: шкірка за товщиною	товста	3	
31	Плід: забарвлення м'якоті	помірно червоне	4	
32	Плід: забарвлення соку	червоне	4	
33	Плід: за твердістю	середній	5	
34	Плід: кислотність	середня	2	
35	Плід: цукристість	середня	5	
36	Плід: соковитість	середня	5	
37	Кісточка: розмір	середній	5	
38	Кісточка: форма (вид з черевного боку)	широкоеліптична	2	
39	Плід: відношення вага плоду / вага кісточки	мале	3	
40	Час початку цвітіння	ранній	3	
41	Час початку достигання плодів	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Сила росту: середня – 5. Група стиглості: середня – 5. Рік вступу у плодоношення – 4-ий. Урожайність, т/га – 18,3. Середній урожай з дерева, кг – 27,5. Середня маса плоду, г – 7,2. Середня маса кісточка, г – 0,3. Відокремлення кісточка від м'якоті: відокремлюється частково – 3. Вміст у плодах: загального цукру, % – 10,7; вітаміну С, мг/100 г – 11,1; Р-активних речовин, мг/100 г – 309,8. Загальна кислотність, % – 0,56. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8,5. Транспортельність, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз (*Blumeriella hiemalis* Poeldmaa.) – 7,5; моніліальний опік (*Monilia cinerea* Bonord.) – 8; кластероспоріоз (*Clasterosporium carpophilum* (Lev.) Aderh.) – 8,5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): вишнева пелиця (*Myzus cerasi* F.) – 8; вишнева муха (*Rhagoletis cerasi* L.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 19263002 Назва сорту: АНАБП 01 Заявник (код): 2628 Власник сорту (код): 2628

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231066

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	розлогий	2	
4	Дерево: тип плодоношення	на коротких і довгих пагонах	2	
5	Однорічний пагін: за товщиною	товстий	7	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	короткі	3	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	темно-коричневе	5	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	слабке	3	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	3	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване догори	1	
11	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	пилчастий тип 1	3	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	помірне	2	
17	Черешок: за довжиною	короткий	3	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	велика	7	
19	Квітка: переважаюче забарвлення у стадії пуп'янка	темно-рожеве	4	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	середній	5	
21	Квітка: розташування пелюсток	проміжне	2	
22	Квітка: положення приймочок відносно пелюсток	вище	3	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	помірне	5	
24	Плід: розмір	від середнього до великого	6	
25	Плід: за висотою	середній	5	
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення висота / діаметр	мале	3	
28	Плід: основна форма	приплюснuto-куляста	7	
29	Плід: ребристість	помірна	2	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	помірні	2	
31	Плід: розмір чашечки	середній	5	
32	Плід: чашолисток за довжиною	середній	5	
33	Плід: наліт на шкірці	помірний	2	
34	Плід: маслянистість шкірки	помірна	2	
35	Плід: основне забарвлення	жовте	3	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	велика	7	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	пурпурово-червоний	4	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	сильна	7	
39	Плід: характер покривного забарвлення	тільки суцільний рум'янець	1	
40	Плід: смуги за шириною	ознака не визначається	0	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	відсутня або мала	1	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	відсутня або мала	1	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	відсутня або мала	1	
44	Плід: кількість сочевичок	велика	7	
45	Плід: розмір сочевочок	середній	5	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
47	Плід: плодоніжка за товщиною	товста	7	
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	середня	5	
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	середня	5	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	неглибоке	3	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	середнє	5	
52	Плід: твердість м'якоті	тверда	7	
53	Плід: забарвлення м'якоті	кремове	2	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	закриті або ледь відкриті	1	
55	Час початку цвітіння	середній	5	
56	Час збирання врожаю	дуже пізній	9	
57	Час споживчої стиглості	від пізнього до дуже пізнього	8	

За інформацією наданою заявником:**– показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 56,0. Середній урожай з дерева, кг – 30,0. Маса плоду (середня), г – 205,3. Маса плоду (максимальна), г – 245,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 5,0; загального цукру, % – 14,0; пектинових речовин, % – 1,7; сухих розчинних речовин, % – 14,0. Загальна кислотність, % – 0,45. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 8; парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 8; моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 8; яблунева плодожерка (*Carpocapsa pomonella* L.) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 3. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Група стиглості: осінній – 5. Напрямок використання: у свіжому вигляді – 1. Тривалість періоду зберігання, днів – 120. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 3,5 x 1,0. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Виноград

Виноград справжній



Вид: Виноград справжній *Vitis vinifera* L.

Заявка № 21304008 Назва сорту: АРРАСЬОРТИ Заявник (код): 2824 Власник сорту (код): 2824

Дата пріоритету: 18.10.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231141

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Час розпускання бруньок	дуже ранній	1	
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	широко відкрита	4	
3	Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці	нещільна	3	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці	відсутні або дуже нещільна	1	
6	Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки	жовто-зелене	1	
7	Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	нещільна	3	
8	Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
9	Пагін: положення (до підв'язування)	напіввертикальне	3	
10	Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів	зелене і червоне	2	
11	Пагін: забарвлення вентрального боку міжвузлів	зелене	1	
12	Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів	зелене і червоне	2	
13	Пагін: забарвлення вентрального боку вузлів	зелене	1	
14	Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлях	відсутні або дуже нещільна	1	
15	Пагін: вусики за довжиною	довгі	7	
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3	
17	Розвинений листок: розмір пластинки	великий	7	
18	Розвинений листок: форма пластинки	дельтоподібна	2	
19	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
20	Розвинений листок: кількість лопатей	сім	4	
21	Розвинений листок: верхні бічні вирізи за глибиною	середні	5	
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листових вирізів	слабко перекриваються	3	
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2	
24	Розвинений листок: зубці за довжиною	середні	5	
25	Розвинений листок: відношення довжина / ширина зубця	середнє	5	
26	Розвинений листок: форма зубців	один бік увігнутий, другий – випуклий	4	
27	Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням	висока	7	
28	Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
29	Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки	однакова	3	
31	Час початку достигання ягід	дуже ранній	1	
32	Гроно: розмір (без ніжки)	дуже великий	9	
33	Гроно: за щільністю	нещільне	3	
34	Гроно: ніжка первинного грона за довжиною	середня	5	
35	Ягода: розмір	дуже великий	9	
36	Ягода: форма	циліндрична	5	
37	Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)	зелене	1	
38	Ягода: відокремлювання від плодоніжки	помірно легке	2	
39	Ягода: шкірка за товщиною	середня	2	
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
41	Ягода: твердість м'якоті	дуже тверда	3	
42	Ягода: особливий аромат	відсутній	1	
43	Ягода: утворення насіння	відсутнє	1	
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	темно-коричневе	3	

**За інформацією наданою заявником:
– показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 30,2. Середній урожай з куща, кг – 20,1. Середня маса 100 ягід, г – 700,0. Середня маса грона, г – 630,0. Горощіння ягід, % – 0. Розтріскування ягід, % – 0. Лежкість при зберіганні, дів – 15,0. Вихід соку, % – 65,0. Вміст диглікозидів, мг/дм³ – 2,0; кислот у ягодах, г/л – 4,4. Цукристість соку ягід, % – 19,2. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 5; мілдью – 7; оїдіум – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): листокрутка – 5; філоксера – 5. Період від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості, дів – 100. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Рівень підмерзання бруньок, бал (1–9) – 3; лози, бал (1–9) – 3. Група стиглості – рс. Напрямок використання – стл. Схема садіння – 3,5 x 2,0. Транспортельність, бал (1–9) – 7. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Виноград справжній *Vitis vinifera* L.

Заявка № 21304007 Назва сорту: АРРАТВЕНТИНАЙН **Заявник (код):** 2824 **Власник сорту (код):** 2824

Дата пріоритету: 13.10.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231047

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Час розпускання бруньок	дуже ранній	1	
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	широко відкрита	4	
3	Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці	відсутні або дуже нещільна	1	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці	відсутні або дуже нещільна	1	
6	Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки	світло-мідно-червоне	4	
7	Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
8	Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
9	Пагін: положення (до підв'язування)	напіввертикальне	3	
10	Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів	зелене і червоне	2	
11	Пагін: забарвлення вентрального боку міжвузлів	зелене	1	
12	Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів	зелене і червоне	2	
13	Пагін: забарвлення вентрального боку вузлів	зелене	1	
14	Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлях	відсутні або дуже нещільна	1	
15	Пагін: вусики за довжиною	довгі	7	
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3	
17	Розвинений листок: розмір пластинки	середній	5	
18	Розвинений листок: форма пластинки	дельтоподібна	2	
19	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
20	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3	
21	Розвинений листок: верхні бічні вирізи за глибиною	середні	5	
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	слабко перекриваються	3	
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2	
24	Розвинений листок: зубці за довжиною	середні	5	
25	Розвинений листок: відношення довжина / ширина зубця	середнє	5	
26	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3	
27	Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням	низька	3	
28	Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
29	Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки	довша	4	
31	Час початку досягання ягід	дуже ранній	1	
32	Гроно: розмір (без ніжки)	великий	7	
33	Гроно: за щільністю	середнє	5	
34	Гроно: ніжка первинного грона за довжиною	середня	5	
35	Ягода: розмір	середній	5	
36	Ягода: форма	тупояйцеподібна	6	
37	Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)	червоне	6	
38	Ягода: відокремлювання від плодоніжки	помірно легке	2	
39	Ягода: шкірка за товщиною	середня	2	
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
41	Ягода: твердість м'якоті	дуже тверда	3	
42	Ягода: особливий аромат	відсутній	1	
43	Ягода: утворення насіння	рудиментарне	2	
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	жовтувато-коричневе	1	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 26,5. Середній урожай з куща, кг – 17,6. Середня маса 100 ягід, г – 600,0. Середня маса грона, г – 630,0. Горощіння ягід, % – 10,0. Розтріскування ягід, % – 0. Лежкість при зберіганні, дів – 30,0. Вихід соку, % – 71,0. Вміст диглікозидів, мг/дм³ – 3,0; кислот у ягодах, г/л – 3,4. Цукристість соку ягід, % – 21,4. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 5; мілдью – 5; оїдіум – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): листокрутка – ; філок-сера – 5. Період від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості, дів – 100. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Рівень підмерзання бруньок, бал (1–9) – 3; лози, бал (1–9) – 3. Група стиглості – рс. Напрямок використання – стл. Схема садіння – 3,5 x 2,0. Транспортабельність, бал (1–9) – 9. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Виноград справжній *Vitis vinifera* L.

Заявка № 21304005 Назва сорту: АРРАФІФТИН Заявник (код): 2824 Власник сорту (код): 2824

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230974

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Час розпускання бруньок	дуже ранній	1	
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	широко відкрита	4	
3	Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці	відсутні або дуже нещільна	1	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутні або дуже слабке	1	
5	Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці	відсутні або дуже нещільна	1	
6	Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки	темно-лідно-червоне	5	
7	Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
8	Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
9	Пагін: положення (до підв'язування)	горизонтальне	5	
10	Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів	зелене і червоне	2	
11	Пагін: забарвлення вентрального боку міжвузлів	зелене	1	
12	Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів	зелене і червоне	2	
13	Пагін: забарвлення вентрального боку вузлів	зелене	1	
14	Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлях	відсутні або дуже нещільна	1	
15	Пагін: вусики за довжиною	дуже довгі	9	
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3	
17	Розвинений листок: розмір пластинки	великий	7	
18	Розвинений листок: форма пластинки	п'ятикутна	3	
19	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
20	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3	
21	Розвинений листок: верхні бічні вирізи за глибиною	відсутні або дуже мілкі	1	
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листових вирізів	відкрите	1	
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	напіввідкрите	3	
24	Розвинений листок: зубці за довжиною	середні	5	
25	Розвинений листок: відношення довжина / ширина зубця	середнє	5	
26	Розвинений листок: форма зубців прямолінійними боками та обома випуклими	посіднання зубців із обома	5	
27	Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням	відсутня або дуже низька	1	
28	Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
29	Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки	коротша	2	
31	Час початку досягання ягід	середній	5	
32	Гроно: розмір (без ніжки)	великий	7	
33	Гроно: за щільністю	нещільне	3	
34	Гроно: ніжка первинного грона за довжиною	середня	5	
35	Ягода: розмір	дуже великий	9	
36	Ягода: форма	циліндрична	5	
37	Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелене	2	
38	Ягода: відокремлювання від плодоніжки	помірно легке	2	
39	Ягода: шкірка за товщиною	товста	3	
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
41	Ягода: твердість м'якоті	дуже тверда	3	
42	Ягода: особливий аромат	відсутній	1	
43	Ягода: утворення насіння	рудиментарне	2	
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	темно-коричневе	3	


За інформацією наданою заявником:**– показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 31,5. Середній урожай з куща, кг – 21,0. Середня маса 100 ягід, г – 1000,0. Середня маса грона, г – 650,0. Горішність ягід, % – 5. Розтріскування ягід, % – 0. Лежкість при зберіганні, діб – 60,0. Вихід соку, % – 66,0. Вміст диглікозидів, мг/дм³ – 2,0; кислот у ягодах, г/л – 5,7. Цукристість соку ягід, % – 21,7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 5; мілдью – 5; оїдіум – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): листокрутка – 5; філоксера – 5. Період від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості, діб – 125,0. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 5. Рівень підмерзання бруньок, бал (1–9) – 3; лози, бал (1–9) – 3. Група стиглості – сс. Напрямок використання – стл. Схема садіння – 3,5 x 2,0. Транспортабельність, бал (1–9) – 9. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

ДЕКОРАТИВНІ ТА ЛІКАРСЬКІ

Калістефус китайський
Лаванда вузьколиста
Троянда



Вид: Калістефус китайський *Callistephus chinensis* (L.) Nees

Заявка № 23415001 Назва сорту: Яскрава **Заявник (код):** 1601

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.11.2023 **Патент № 230705**

Дата пріоритету: 07.02.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сортогрупа: код	тріумф	40	
2	Час початку цвітіння	пізній	7	
3	Рослина: за висотою (масове цвітіння)	низька	3	
4	Рослина: форма куща	овальна	4	
5	Рослина: за міцністю	сильна	7	
6	Головне стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9	
7	Рослина: галузнення (кількість гілок I-го порядку)	слабке	3	
8	Рослина: наявність квітконосів 2-го та 3-го порядків	відсутні	1	
9	Рослина: кількість квітконосів	більше одного	2	
10	Рослина: залістяність	сильна	7	
11	Квітконос: за довжиною (1-го порядку)	середній	5	
12	Квітконос: за міцністю	міцний	7	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
14	Листок: опушеність	помірна	5	
15	Листок: за довжиною	середній	5	
16	Суцвіття: форма	куляста	4	
17	Суцвіття: за типом	дуже повне	4	
18	Суцвіття: за щільністю	щільне	7	
19	Суцвіття: діаметр	великий	7	
20	Суцвіття: забарвлення	фіолетово-синє	33	
21	Суцвіття: стійкість забарвлення	не вигорає	1	
22	Суцвіття: поширення інтенсивності забарвлення	рівномірне	2	
23	Язичкова квітка: форма	човникоподібна	3	
24	Язичкова квітка: за довжиною	довга	7	
25	Язичкова квітка: за положенням	горизонтальна	5	
26	Язичкова квітка: форма верхівки	округла	2	
27	Трубчаста квітка: за довжиною	коротка	3	
28	Обгортка суцвіття: діаметр	середній	5	
29	Рослина: інтенсивність плодоношення	помірна	5	
30	Насіння: забарвлення	сірувато-сріблясто-жовте	2	
31	Насіння: форма	ширококлиноподібна	2	
32	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	

**За інформацією наданою заявником:
– показники господарської придатності**

Декоративність, бал (11–99) – 97. Висота рослини, см – 30,0. Тривалість періоду від сходів до цвітіння, дів – 130,0. Тривалість періоду цвітіння рослини, дів – 50,0. Діаметр суцвіття (кошика), см – 7,0. Строк цвітіння: осінній – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 9; сіра гниль – 9; фузаріозне в'янення – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Лаванда вузьколиста *Lavandula angustifolia* Mill.

Заявка № 22052001 Назва сорту: Айрін **Заявник (код):** 2876 **Власник сорту (код):** 2876

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.11.2023 **Патент № 230722**

Дата пріоритету: 07.06.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230992

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сходи: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Рослина: за висотою (фаза повного цвітіння)	середня	5	
3	Рослина: габітус	компактний	3	
4	Рослина: гілкування	сильне	7	
5	Рослина: діаметр	великий	7	
6	Стебло: за діаметром	середнє	5	
7	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
8	Рослина: облиственість	середня	5	
9	Листок: за довжиною	середній	5	
10	Листок: за шириною	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
12	Листок: опушення	помірне	5	
13	Суцвіття: головна вісь за довжиною	коротка	3	
14	Суцвіття: суцвіття I-го порядку за довжиною	коротке	3	
15	Суцвіття: кількість квіток	середня	5	
16	Суцвіття: за щільністю	щільне	7	
17	Квітка: забарвлення	бузкове	4	
18	Час початку цвітіння	ранній	3	
19	Вміст ефірної олії	високий	3	
20	Ефірна олія: вміст ліналілацетату	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Висота рослин, см – 42,0. Діаметр рослини, см – 60,0. Довжина суцвіття, см – 5,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 670,0. Кількість квіток у суцвітті, шт. – 68,0. Вміст ефірної олії, % – 2,92–3,0. Збір ефірної олії, кг/га – 93,0–96,0. Вміст ліналілацетату в ефірній олії, % – 28,2. Тривалість періоду цвітіння, діб – 15,0. Урожайність суцвіть, т/га – 4,81–4,84. Морозостійкість, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Троянда *Rosa L.*

Заявка № 21339002 Назва сорту: Доросіліп Заявник (код): 2441

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.11.2023 Патент № 230753

Дата пріоритету: 01.04.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: тип росту	ознака не визначається	0	
2	Рослина: габітус (за винятком плетистих сортів)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: за висотою (під час другої хвилі цвітіння)	середня	5	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9	
5	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
6	Стебло: кількість шипів (за винятком дуже малих і тоненьких, як волосина)	середня	5	
7	Шипи: домінуюче забарвлення	червонувате	3	
8	Листок: розмір	великий	7	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Листок: антоціанове забарвлення	ознака не визначається	0	
11	Листок: глясуватість верхнього боку	помірна	5	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3	
13	Верхівковий листочок: форма пластинки	яйцеподібна	3	
14	Верхівковий листочок: форма основи пластинки	заокруглена	3	
15	Верхівковий листочок: форма верхівки пластинки	гостра	2	
16	Квітконосний пагін: квітучі бічні пагони	ознака не визначається	0	
17	Квітконосний пагін: кількість квітучих бічних пагонів	ознака не визначається	0	
18	Лише для сортів з неквітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток	ознака не визначається	0	
19	Лише для сортів з квітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток на пагоні	ознака не визначається	0	
20	Бутон: форма в поздовжньому розрізі	ознака не визначається	0	
21	Квітка: за типом	ознака не визначається	0	
22	Квітка: кількість пелюсток	велика	7	
23	Квітка: група кольору	рожева	8	
24	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: забарвлення середини	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: щільність пелюсток	ознака не визначається	0	
26	Квітка: діаметр	малий	3	
27	Квітка: форма	округла	1	
28	Квітка: профіль верхньої частини	плескатий	1	
29	Квітка: профіль нижньої частини	плескатий	2	
30	Квітка: аромат	відсутній або дуже слабкий	1	
31	Чашолистки: розчленування	слабке	3	
32	Пелюстка: послідовне розгортання	відсутнє	1	
33	Пелюстка: форма	яйцеподібна	3	
34	Пелюстка: зубчатість	слабка	3	
35	Пелюстка: завершення країв	відсутнє або дуже слабке	1	
36	Пелюстка: хвилястість	слабка	3	
37	Пелюстка: розмір	ознака не визначається	0	
38	Пелюстка: за довжиною	коротка	3	
39	Пелюстка: за шириною	вузька	3	
40	Пелюстка: кількість кольорів на внутрішньому боці (за виключенням плями на основі)	один	1	
41	Лише для сортів з одним забарвленням внутрішнього боку пелюстки. Пелюстка: розміщення забарвлення (за винятком плями на основі)	світліше біля основи	1	
42	Пелюстка основне забарвлення внутрішнього боку (основне забарвлення з найбільшою площею зайнятої поверхні)	фіолетове	28	
43	Лише для сортів з двома або більше кольорами на внутрішньому боці пелюстки. Пелюстка: вторинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
44	Лише для сортів з двома або більше кольорами на внутрішньому боці. Пелюстка: третинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
45	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
46	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
47	Пелюстка: пляма на основі внутрішнього боку	відсутня	1	
48	Пелюстка: розмір плям на основі внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
49	Пелюстка: забарвлення плям на основі внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
50	Пелюстка: основне забарвлення зовнішнього боку (тільки якщо чітко відрізняється від забарвлення внутрішнього боку)	ознака не визначається	0	
51	Зовнішня тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки	жовте	4	
52	Плід: розмір (пелюстки обпали)	ознака не визначається	0	
53	Плід (гіпантій): форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0	
54	Плід (гіпантій): забарвлення під час досягання	ознака не визначається	0	

Інші відомості Other notifications

Інші відомості Міністерства аграрної політики та продовольства України Other notifications of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1941 від 09.11.2023 «Про опублікування на вебсайті Мінагрополітики щорічних даних результатів кваліфікаційної експертизи у знеособленому вигляді» затверджено форму звіту про результати кваліфікаційної експертизи (<https://minagro.gov.ua/npa/pro-opublikuvannya-na-vebsajti-minagropolitiki-shchorichnih-danih-rezultativ-kvalifikacijnoyi-ekspertizi-u-zneosoblenomu-viglyadi>).

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 2005 від 17.11.2023 «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 грудня 2016 року № 540» внесено зміну до абзацу другого пункту 1 наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 грудня 2016 року № 540 «Про затвердження методик проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні», виклавши його в такій редакції:

«Методику проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність для поширення в Україні (загальна частина)».

Методику проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні.

Загальна частина, затверджену наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 грудня 2016 року № 540, викладено у новій редакції (<https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-agrarnoyi-politiki-ta-prodovolstva-ukrayini-vid-12-grudnya-2016-roku-540>).

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 2055 від 27.11.2023 «Про внесення змін до Методики проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні. Методи визначення показників якості продукції рослинництва» внесено зміни до Частини 5. «Методика з визначення типу крохмалю в насінневому матеріалі зернових і круп'яних культур (якісний метод)» Методики проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні. Методи визначення показників якості продукції рослинництва, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 грудня 2016 року № 540, виклавши її в новій редакції (<https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-metodiki-provedennya-kvalifikacijnoyi-ekspertizi-sortiv-roslin-na-privdatnist-do-poshirennya-v-ukrayini-metodi-viznachennya-pokaznikiv-yakosti-produkciji-roslinnictva>).

Інші відомості Українського інституту експертизи сортів рослин Other notifications of the Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

Робота Методичної комісії

Методична комісія Українського інституту експертизи сортів рослин провела засідання **15 листопада 2023 року**, в якому взяли участь: Присяжнюк Л. М., к. с.-г. н., с. д.; Лікар С. П.; Хоменко Т. М., доцент, к. с.-г. н.; Гринів С. М., к. с.-г. н., с. н. с.; Михайлик С. М., к. с.-г. н.; Цизь О. М., доцент, к. с.-г. н.; Рубцова О. Л., д. б. н.; Захарчук О. В., д. е. н., професор.; Башкірова Н. В., доцент, к. б. н.; Бобось І. М., доцент, к. с.-г. н.; Григор'єв В. М., к. с.-г. н., с. н. с.; Король Л. В., к. с.-г. н.; Бугайов В. Д., к. с.-г. н.; Щербина О. З., к. с.-г. н.; Байдюк Т. О., к. с.-г. н.

за Порядком денним:

1. Перегляд частини 5. Методики з визначення типу крохмалю в насіннєвому матеріалі зернових і круп'яних культур (якісний метод) Методики проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до по-

ширення в Україні. Методи визначення показників якості продукції рослинництва, затвердженої наказом Мінагрополітики № 540 від 12.12.2016 зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Мінагрополітики № 225 від 27.09.2021.

2. Обрання заступника голови Методичної комісії.

3. Обрання секретаря Методичної комісії.

Схвалено:

1. Частину 5. Методики з визначення типу крохмалю в насіннєвому матеріалі зернових і круп'яних культур (якісний метод) Методики проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні. Методи визначення показників якості продукції рослинництва, затвердженої наказом Мінагрополітики № 540 від 12.12.2016 зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Мінагрополітики № 225 від 27.09.2021.

Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту

List of applicants, supporters of varieties, owners of the property right to spread the variety, patent holders

Код Code	Назва Name	Адреса Address
9	Товариство з обмеженою відповідальністю «Піонер Насіння Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Pioner Nasinnia Ukraina»	вул. Спаська 30а, м. Київ, 04070, Україна vul. Spaska 30a, m. Kyiv, 04070, Ukraina
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України Natsionalnyi botanichnyi sad im. M. M. Hryshka Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Тимірязєвська, 1, м. Київ, 01014 vul. Timiriazivska, 1, m. Kyiv, 01014
355	Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України Instytut fiziologii roslin i henetyky Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Васильківська, 31/17, м. Київ, 03022 vul. Vasytkivska, 31/17, m. Kyiv, 03022
736	Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Vseukrainskyi naukovyi instytut selektsii (VNIS)»	вул. Ломоносова 30/2, кв. 36, м. Київ, Україна, 03022 vul. Lomonosova 30/2, kv. 36, m. Kyiv, Ukraina, 03022
767	Піонер Семена Холдінг ГезмбХ Pioneer Semena Holding GesmbH	Індустрігеланде, Піонерштрассе, А - 7111, Парндорф, Австрія Industriegelände, Pioneerstrasse, A - 7111 Parndorf, Austria
793	ЛИМАГРЕЙН ЮРОП Limagrain Europe	rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire
806	Євраліс Семанс Euralis Semences	Авеню Гастон Фоебюс, 64231 Лескар Седекс, Франція Avenue Gaston Phoebus, 64231 Lescar Cedex, France
807	Дойче Заатфедерелунг АГ Deutsche Saatveredelung AG	Вайсенбургер штр. 5, 59557 Липштатт, Німеччина Weissenburger Str.5, 59557 Lippstadt, Germany
840	Енза Заден Біхір Б.В. Enza Zaden Bihir B.V.	Халінг 1Е, 1602 ДБ, Енхуйзен, Нідерланди Haling, 1E, 1602 DB, ENKHUIZEN, The Netherlands
844	Монсанто Технологі ЛТД MONSANTO TECHNOLOGY LLC	800Н; бульвар Ліндберг, Сент Луїс, Міссурі, США, МО 636167 800N; Lindbergh blvd. St. Louis Missouri MO 636167
912	Норддойче Пфланцензucht Ганс-Георг Лембке КГ Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG	24363, Хохенліті, Хользісес, Німеччина 24363 Hohentlieth, Holtsee, Germany
918	Доу АгроСайенс В.м.б.Х. Dow AgroSciences V.m.b.H.	Kaerntner Ring 5-7, A-1010 Wien, Austria Kaerntner Ring 5-7, A-1010 Wien, Austria
1055	Піонер Хай-Бред Швейцарленд СА Pioner Hi-Bred Switzerland SA	Via Cantonale - Galleria 3, CH - 6928 Manno, Switzerland, tel. +1515/2484800, fax +1515/2484999 Via Cantonale - Galleria 3, CH - 6928 Manno, Switzerland, tel. +1515/2484800, fax +1515/2484999
1163	Товариство з обмеженою відповідальністю «Свитязь» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Svytiaz»	вул. Городоцька 174, м. Львів, 79022 vul. Horodotska 174, m. Lviv, 79022
1498	Пробстдорфер Заатцухт Гез.м.б.Х. енд Ко КГ Probstdorfer Saatzzucht Ges.m.b.H & Co KG	Parkring 12, 1010 Vienna, Austria Parkring 12, 1010 Vienna, Austria
1510	ТОВ «АМГ-АГРОСЕЛЕКТ КОМЕРЦ» AMG-AGROSELECT COMERTS STR.	МД-2012, Республіка Молдова, м. Кишинів, вул. Щусєва, 83 MD-2012, Republic of Moldova, Kishinev, str. Schuseva 83
1564	Заатцухт Донау Гес.м.б.Х. & КоКГ Saatzzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG	Заатцухтштрассе 11, 2301 Пробстдорф Saatzzuchtstrasse 11, 2301 Probstdorf
1571	Уманський національний університет садівництва Uman'skyi natsionalnyi universytet sadivnytstva	вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 20300 vul. Instytut'ska, 1, m. Uman, Cherkaska obl., 20300
1601	Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України Instytut sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	м. Київ, смт. Новосілки, вул. Садова, 23, 03027 m. Kyiv, smt. Novosilky, vul. Sadova, 23, 03027
1658	Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України Instytut silskoho hospodarstva Karpatskoho rehionu Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	с. Оброшине, Пустомитівський р-н, Львівська обл., 81115 s. Obroshyne, Pustomyitivskiy r-n, Lvivska obl., 81115
1669	Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Instytut kormiv ta silskoho hospodarstva Podillia Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	21100, м. Вінниця, проспект Юності, 16 21100, m. Vinnytsia, prospekt IUnosti, 16
1688	Піонер Оверсіз Корпорейшн Pioneer Overseas Corporation	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1690	Піонер Хай-Бред Інтернешнл, Інк. Pioneer Hi-Bred International, Inc.	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1708	Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Doslidna stantsiia «Maiaк» Instytutu ovochivnytstva i bashtannytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	Чернігівська обл., Ніжинський р-н, село Крути, вул. Незалежності, 39, Україна, 16645 Chernihivska obl., Nizhynskiy r-n, selo Kruty, vul. Nezalezhnosti, 39, Ukraina, 16645
1710	Інститут картоплярства Національної академії аграрних наук України Instytut kartopliarstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Чкалова, 22, смт. Немішаєве, Бородянського району, Київської області, Україна, 07853 vul. Chkalova, 22, smt. Nemishaieve, Borodianskoho raionu, Kyivskoi oblasti, Ukraina, 07853
1730	Рійк Цваан Зааттеелт ен Заадхандел Б.В. RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V.	Бурхеместер Крезеелаан 40, НЛ-2678 КХ, Де Лір, Нідерланди Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier, the Netherlands

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1771	Приватне акціонерне товариство «Селена» Pryvatne aktsionerne tovarystvo «Selena»	вул. Гаркавого, 5, с. Дачне, Біляївський район, Одеська обл., Україна, 67624 vul. Harkavoho, 5, s. Dachne, Biliaivskiy raion, Odeska obl., Ukraina, 67624
1781	Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Instytut ovochivnytstva i bashtannytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Інститутська, 1, селище Селекційне, Харківський р-н, Харківська обл., 62478 vul. Instytutska, 1, selyshce Selektiine, Kharkivskiy r-n, Kharkivska obl., 62478
1783	РАЖТ 2н RAGT 2n	Рюе Емил Сингла - Сіте де Бурран, БП 3336, 12033 Родез Седекс 9, Франція Rue Emile Singla - Site de Bourran, BP3336, 12033 Rodez Cedex 9, France
1797	Секобра речерчес С.А.С. Secobra recherches S.A.S.	Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France
1802	Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» Cherkaska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Natsionalnoho naukovoho tsentru «Instytut zemlerobstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy»	вул. Докучаєва 13, сел. Холоднянське, Смілянського району, Черкаської області, 20731 vul. Dokuchaieva 13, sel. Kholodnianske, Smilianskoho raionu, Cherkaskoi oblasti, 20731
1833	САКАТА ВЕДЖЕТЕБЛЗ ЄУРОП С.А.С. SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S.	Домеїн де Саблас, вул. Моулін, Ф-30620, Франція Domaine de Sablas Rue du Moulin, 30620 Uchaud, France
1852	Монсанто Веджітл ІП Менеджмент Б. В. Monsanto Vegetable IP Management B. V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands
1936	Інститут сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України Instytut silskoho hospodarstva Polissia Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Київське шосе, 131, м. Житомир, 10007 vul. Kyivske shose, 131, m. Zhytomyr, 10007
1943	Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М.І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України Poltavska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia imeni M.I. Vavylova Instytutu svynarstva i ahropromysloвого vyrobnytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Шведська, 86, м Полтава, 36014 vul. Shvedska, 86, m Poltava, 36014
1960	ван Ваверен Заатен ГмБХ van Waveren Saaten GmbH	Rodeweg 20 37081 Gottingen Rodeweg 20 37081 Gottingen
1985	НУСІД ЮРОП ЛТД. NUSEED EUROPE LTD.	5 TG, Manchester, United Kindom, 3000 Aviator Way 5 TG, Manchester, United Kindom, 3000 Aviator Way
1990	Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України Nosivska selektsiino-doslidna stantsiia Myronivskoho instytutu pshenytsi imeni V.M. Remesla Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Миру, 1, с. Дослідне, Носівського району, Чернігівської області, 17131 vul. Myru, 1, s. Doslidne, Nosivskoho raionu, Chernihivskoi oblasti, 17131
1997	МОРАВОСІД ЦЗ а.с. MORAVOSEED CZ a.s.	Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, Czech Republic Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, Czech Republic
2011	ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен SAATBAU LINZ eGen	Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria
2075	Прилуцька дослідна станція Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Prylutska doslidna stantsiia Instytutu sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Вавилова, 16, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17511 vul. Vavilova, 16, m. Pryluky, Chernihivska obl., 17511
2086	Хазера Сідз Б.В. Hazera Seeds B.V.	Schanseind 27, 4921 PM Made, The Netherlands Schanseind 27, 4921 PM Made, The Netherlands
2094	Дой АгроСайенс ГмБХ Dow AgroSciences GmbH	Im Rheinfeld 7, 76437 Rastatt, Germany Im Rheinfeld 7, 76437 Rastatt, Germany
2264	Норт Американ Планта Дженетікс North American Plant Genetics	19192, Sleepy Hollow Rd, Blenheim, Ontario, Canada 19192, Sleepy Hollow Rd, Blenheim, Ontario, Canada
2267	Хібрісол, С. Л. Hibrisol, S. L.	C/Genaro Parlade, 2 bajo 41013 Sevilla, Spain C/Genaro Parlade, 2 bajo 41013 Sevilla, Spain
2287	Товариство з обмеженою відповідальністю «Євросем» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «IEvrosem»	вул. Академіка Заболотного, буд. 154 Д, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, bud. 154 D, m. Kyiv, 03143
2314	Дослідна станція помолоті ім. Л.П. Симиренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Doslidna stantsiia pomolohii im. L.P. Symyrenka Instytutu sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	с. Мліїв-1, Городищенський р-н., Черкаська обл., 19512 s. Mliiv-1, Horodyshcenskyi r-n., Cherkaska obl., 19512
2441	Дюммен Груп Б.В. Dummen Group B.V.	Coldenhovelaan 6, 2678 PS De Lier, the Netherlands Coldenhovelaan 6, 2678 PS De Lier, the Netherlands
2449	АМЕРІКАН ГЕНЕТИКС С.А. AMERICAN GENETICS S.A.	Filellinon 17, P.C. 57013, Thessaloniki, Greece Filellinon 17, P.C. 57013, Thessaloniki, Greece
2524	Товариство з обмеженою відповідністю «РВА Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidnistiu «RVA Ukraina»	вул. Велика Кільцева, 7, с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н., Київська обл., 08130 vul. Velyka Kiltseva, 7, s. Petropavlivska Borshchahivka, Kyievo-Sviatoshyhnskyi r-n., Kyivska obl., 08130
2529	ІСІ Сементі С.п.А. ISI Sementi S.p.A.	Frazione Ponte Ghiara, 8/a, 43036, Fidenza (Parma)-ITALY Frazione Ponte Ghiara, 8/a, 43036, Fidenza (Parma)-ITALY
2537	Заатен Уніон Румунія Срл. SAATEN UNION Romania Srl.	Str. General Praporgescu Nr. 1-5, ap. 8, 020965, Bucharest, ROMANIA Str. General Praporgescu Nr. 1-5, ap. 8, 020965, Bucharest, ROMANIA

Інші відомості

Код Code	Назва Name	Адреса Address
2550	МарібоХіллесхог АпС MariboHilleshog ApS	Hojbygaardvej, 31, DK-4960 Holeby, Denmark Hojbygaardvej, 31, DK-4960 Holeby, Denmark
2552	Штрубе Д енд С ГмбХ Strube D&S GmbH	Hauptstrase 1, 38387 Sollingen, Germany Hauptstrase 1, 38387 Sollingen, Germany
2557	Кен-Гро Дженетікс Інк. Can-Gro Genetics Inc.	P.O. Box 1353, 75 Wellington st., Clinton, Ontario, ON NOM 1L0, Canada P.O. Box 1353, 75 Wellington st., Clinton, Ontario, ON NOM 1L0, Canada
2606	Інститут сільськогосподарства Степу Національної академії аграрних наук України Instytut silskoho hospodarstva Stepu Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Центральна, 2, с. Созонівка, Кіровоградський р-н, Кіровоградська обл., 27602 vul. Tsentralna, 2, s. Sozonivka, Kirovohradskiy r-n, Kirovohradska obl., 27602
2628	Вестерн Остреліен Агрікалче Ауторіті Western Australian Agriculture Authority	3 Baron-Hay Court, South Perth Western Australia 6151 3 Baron-Hay Court, South Perth Western Australia 6151
2643	Сингента Кроп Протекшн АГ Syngenta Crop Protection AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2644	Сингента Партісіпейшнз АГ Syngenta Participation AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2649	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА KWS SAAT SE & Co. KGaA	37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany 37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
2653	Коссад Семанс ЕС А Caussade Semences S A	Impasse de la Iere 82300 CAUSSADE France Impasse de la Iere 82300 CAUSSADE France
2655	Товариство з обмеженою відповідальністю «НК ДЕМАРКУС» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «NK DEMARKUS»	вул. Академіка Заболотного 154, корпус Д, офіс 202, м. Київ, Україна, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho 154, korpus D, ofis 202, m. Kyiv, Ukraina, 03143
2657	Нордзаат Заатцухт ГмбХ Nordsaat Saatzzucht GmbH	Bohnshauer Strabe 1, 38895 Langenstein, Germany Bohnshauer Strabe 1, 38895 Langenstein, Germany
2668	Товариство з обмеженою відповідальністю «Мірасол-Сід»-Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Mirasol-Sid-Ukraina»	вул. Валентинівська, буд. 22, м. Харків, Харківська обл., 61170 vul. Valentynivska, bud. 22, m. Kharkiv, Kharkivska obl., gh6170
2715	Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортева Агрісаенс Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Korteva Ahrisaiens Ukraina»	вул. Петра Сагайдачного, 1, м. Київ, Україна, 04070 vul. Petra Sahaidachnoho, 1, m. Kyiv, Ukraina, 04070
2720	МАС СІДС MAS SEEDS	Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE
2726	РВА Райффайзен Варє Австрія АГ RWA Raiffeisen Ware Austria AG	Вінербергштрассе 3, 1100 Відень, Австрія, ФН 159839х Wienerbergstrate Be 3, 1100 Wien, Austria, FN 159839h
2739	Серела Інк. Cerela Inc.	1133, 4th Ran, St-Hugues, Quebec, Canada, J0H 1N0 1133, 4th Ran, St-Hugues, Quebec, Canada, J0H 1N0
2743	ДОНАУ СААТ СРЛ DONAU SAAT SRL	Str. Jean Monnet, nr.35, bl. 35, Ap.1, Sector 1, 011956 Bucarest, Romania Str. Jean Monnet, nr.35, bl. 35, Ap.1, Sector 1, 011956 Bucarest, Romania
2751	Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України Odeska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Маяцька дорога, буд. 24, смт. Хлібодарське, Біляївський р-н, Одеська обл., 67667 vul. Maitska doroha, bud. 24, smt. Khlibodarske, Biliaivskiy r-n, Odeska obl., 67667
2767	Інновейтв Сід Солушн ЛЛС. Innovative Seed Solutions LLC.	19, sous main street, Zionsville, IN 46077 19, sous main street, Zionsville, IN 46077
2783	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрокрай» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahrkraï»	вул. Козацька, 1, м. Красилів, Красилівський р-н, Хмельницька обл., Україна, 31000 vul. Kozatska, 1, m. Krasyliv, Krasylivskiy r-n, Khmelnytska obl., Ukraina, 31000
2788	СОЙТЕК С.Р.Л. SOYTEK S.R.L.	Dinicu Golescu no2, Fundulea 915200, Calarasi County Dinicu Golescu no2, Fundulea 915200, Calarasi County
2793	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агронасінняпром» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahronasinniaprom»	вул. Северина Потоцького, 38-А, кімн. 42, м. Харків, 61075 vul. Severyna Pototskoho, 38-A, kimn. 42, m. Kharkiv, 61075
2794	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut zernovykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 49009 vul. Volodymyra Vernadskoho, 14, m. Dnipro, 49009
2819	ЕЙША СІД КО. ЛТД. ASIA SEED CO. LTD.	515, Tera Tower B, 167 Songpra-daero, Songpra-gu, 05855, Seoul, Republic of Korea 515, Tera Tower B, 167 Songpra-daero, Songpra-gu, 05855, Seoul, Republic of Korea
2824	ЕГРІКАЛЧЕРЕЛ РЕСЕРЧ ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД ЛАЙБІЛІТІ КАМПЕНІ AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED LIABILITY COMPANY	11220 Edison Highway, Bakersfield, California 93307, USA 11220 Edison Highway, Bakersfield, California 93307, USA
2828	Згірін Олексій Олександрович Zhirin Olexsii Oksandrovyuch	кв. 99, корп. А, буд. 64, вул. Академіка Корольова, м. Одеса, 65104 kv. 99, korp. A, bud. 64, vul. Akademika Korolova, m. Odesa, 65104
2829	Товариство з обмеженою відповідальністю «АКРІС АГРО ГРУП» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AKRIS AHRO HRUP»	вул. Жиліянська, буд. 106-Б, м. Київ, 01032 vul. Zhylianska, bud. 106-B, m. Kyiv, 01032
2831	Селянське (фермерське) господарство «Т.В.К.» Selianske (fermerske) hospodarstvo «T.V.K.»	вул. Першотравнева, 6, с.м.т. Рокитне, Рокитнянський р-н, Київська обл, 09601 vul. Pershotravneva, 6, s.m.t. Rokytno, Rokytnianskyi r-n, Kyivska obl, 09601
2832	БЕРРІ ЛАБ С.Л.Р. BERRY LAB S.L.R.	Via Luciano Lama, 231 IT - 47521 Cesena (FC) ITALY Via Luciano Lama, 231 IT - 47521 Cesena (FC) ITALY
2839	Юніверсіті оф Гвелф UNIVERSITY OF GUELPH	50 STONE ROAD EAST, GUELPH, ONTARIO, NIG 2W1, Canada 50 STONE ROAD EAST, GUELPH, ONTARIO, NIG 2W1, Canada
2841	Мінамі Поланд СП.З.О.О. Minami Poland SP.Z.O.O.	ul. Domaniewska nr. 37, lok. 2.43, kod 02-672, Warszawa, kraj Polska ul. Domaniewska nr. 37, lok. 2.43, kod 02-672, Warszawa, kraj Polska

Код Code	Назва Name	Адреса Address
2851	Ай Ді ГРЕЙН САС ID GRAIN SAS	Rue du Bourrelier., 41, 31330 Merville, France Rue du Bourrelier., 41, 31330 Merville, France
2876	Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРГАНІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРГАНІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ»	вул. Саксаганського, 123, приміщення 23, м. Київ, 01032 vul. Saksahanskoho, 123, prymishcennia 23, m. Kyiv, 01032
2885	Фреш Форвард Холдінг БВ Fresh Forward Holding BV	Hogewoerd 1C, 6851 ET Huissen. The Netherlands Hogewoerd 1C, 6851 ET Huissen. The Netherlands
2889	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРМЕР.УА» TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU «FARMER.UA»	вул. Деревообробна, будинок 9, місто Київ, 01013 vul. Derevoobrobna, budynok 9, misto Kyiv, 01013
2890	Лідеа Франсе САС Lidea France SAS	Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250 Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250
3208	Фермерське господарство «Відродження» Fermerske hospodarstvo «Vidrodzhennia»	вул. Нагорна, 23а, с. Хутірське, Петриківський р-н., Дніпропетровська обл., 51822 vul. Nahorna, 23a, s. Khutirske, Petrykivskiyi r-n., Dnipropetrovska obl., 51822
3216	Храпатий Ігор Васильович Khrapatyi Ihor Vasylovych	вул. Гореницька, буд.4/9, с. Гореничі, Бучанський р-н., Київська обл., 08114 vul. Horenytska, bud.4/9, s. Horenychi, Buchanskyi r-n., Kyivska obl., 08114
3218	Ярмолюк Іван Савич Yarmoliuk Ivan Savych	вул. Нагорна, 23 а, с. Хутірське, Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл., 51822, Україна vul. Nahorna, 23 a, s. Khutirske, Dniprovskiyi r-n, Dnipropetrovska obl., 51822, Ukraina
3221	Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України Instytut klimatychno oriientovanoho silskoho hospodarstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, м. Київ, 01010 vul. Mykhaila Omelianovycha-Pavlenka, 9, m. Kyiv, 01010
3231	Юрченко Олена Вікторівна Yurchenko Olena Viktorivna	вул. Левка Лук'яненка, 11-а, кв. 44, м. Київ, 04207 vul. Levka Luk'ianenka, 11-a, kv. 44, m. Kyiv, 04207
3233	Крафт Хайнц Фудз Kraft Heinz Foods	HeinzSeed 6755 CE Dixon Street Stockton, CA 95206 USA HeinzSeed 6755 CE Dixon Street Stockton, CA 95206 USA

Загальноживані скорочення термінів

Common abbreviations

<p>У перекладі з української на англійську мову скорочень термінів у бюлетені використано загальноживані скорочення термінів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV).</p> <p>ПС – патент на сорт рослин (згідно з термінологією UPOV – права селекціонера),</p> <p>РС – державна реєстрація сорту рослин (згідно з термінологією UPOV – національний перелік),</p> <p>АС – свідоцтво про авторство на сорт рослин.</p>	<p>The translation from Ukrainian to English of the aberrations in the Bulletin engaged common aberration of terms by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV).</p> <p>PBR – Plant Variety Patent (according to UPOV terminology – Plant Breeder’s Rights),</p> <p>NLI – Plant Variety State Registration (according to UPOV terminology – National Listing),</p> <p>AC – Plant Variety Authorship Certificate.</p>
<p>Скорочені назви, скорочення термінів, які вжиті в офіційних описах та показниках господарської придатності:</p> <p>П – Полісся,</p> <p>Л – Лісостеп,</p> <p>С – Степ,</p> <p>ЗГр – захищений ґрунт.</p>	<p>Short names, aberrations as appearing in the Descriptions and Indices of Value for Cultivation and Use:</p> <p>P – Woodlands,</p> <p>L – Forest-Steppe,</p> <p>C – Steppe,</p> <p>ZGr – covered ground.</p>

Розподіл ботанічних таксонів за блоками

Кукурудза звичайна

Група стиглості	ФАО	Тривалість періоду вегетації, діб
1 Ранньостигла	150–199	91–105
2 Середньоранньостигла	200–299	106–120
3 Середньостигла	300–399	121–130
4 Середньопізня	400–499	131–140

Соняшник однорічний

- 2 Ранньостиглий: 101–115 діб
- 3 Середньоранньостиглий: 116–125 діб
- 4 Середньостиглий: понад 125 діб
- 7 Високоолеїновий (середньостиглий: 116–125 діб)
- 8 Високоолеїновий (середньостиглий: понад 125 діб)

Ячмінь звичайний (ярий, озимий)

- 1 Без блоку

Ріпак (ярий, озимий)

- 1 Низькоеруковий

Сорго звичайне (двокольорове)

- 6 Середньостиглий (111–120 діб)
- 7 Середньопізній (121–130 діб)

Соя культурна

- 6 Ранньостиглий (91–110 діб)
- 7 Середньостиглий (111–130 діб)

Картопля

- 8 Середньостиглий 101–125 діб
- 9 Середньопізній 126–140 діб

Пшениця м'яка (озима)

- 1 Середньорослий

- © патент
- / значок рівнозначності

Характеристика 1 – Напря́м використання

цїн цїнний
зерн зерновий
олн олійний
ВОЛ високоолеїновий
тхн технічний
стл столовий
ун універсального призначення
корм кормовий

Характеристика 2 – Група стиглості

сс середньостиглий
рс ранньостиглий
пс пізньостиглий

Характеристика 3 – Якість

сбіл середньобілковий
ск середньокрохмальний
нк низькокрохмальний
вл високоолійний
сл середньоолійний

Характеристика 4 – Метод створення

С3 самозапилення
П перехресне запилення
С сорт-синтетик
F1 гібрид

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
OFFICIAL PUBLICATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН
PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
BULLETIN

Відповідальний за випуск: Павлюк Н. В.

Комп'ютерне верстання: Бойко А. І.

Номер підготували: Возна Т. Г., Каражбей Г. М., Костенко Н. П., Лашук С. О.,
Сиплива Н. О., Тиха Н. В., Худолій Л. В., Шкапенко Є. А.

Офіційні описи
та показники
господарської
придатності підготували: Баліцька Л. М., Гринів С. М., Данюк Ю. С., Дутова Г. А.,
Житомирець О. С., Ільченко Я. В., Курочка Н. В.,
Матус В. М., Михайлик С. М., Носуля А. М.,
Свинарчук О. В., Симоненко Н. В., Смульська І. В.,
Сонець Т. Д., Таганцова М. М., Хоменко Т. М.

Передплатний індекс видання – 86211.

Підписано до друку 13.12.2023

Дата друку

Формат 60x84 1/8. Папір офсетний.

Друк офсетний. Гарнітура Officina.

Умов. друк. арк. . Обл.-вид. арк..

Тираж 25 прим. Зам. №

Віддруковано з оригіналів замовника.

21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 62а.

Тел.: 0(800) 33-00-90, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852, (098) 46-98-043

e-mail: info@tvoru.com.ua

<http://www.tvoru.com.ua>

Бюлетень «Охорона прав на сорти рослин» – офіційне видання, що містить офіційні відомості щодо охорони прав на сорти рослин.

Видається 12 разів на рік. Розраховано для:

- науковців;
- викладачів;
- студентів;
- заявників;
- підтримувачів;
- представників з інтелектуальної власності;
- авторів та власників сортів тощо

Передплатний індекс 86211