

CAELII AVRELI-  
 ANI SICCENSIS TARDARVM  
 PASSIONVM LIBRI V.

D. ORIBASII SAR-  
 I IVLIANI CAESARIS  
 ARCHIATRI

Euporiston	lib: III.
Medicinae compen:	lib: I.
Curationum	lib: I.
Trochiscorū confect:	lib: I.

*Catal. Inscript.*

*Mon. <sup>reii</sup> Dionysii in francia 1690*



XCVDEBAT HENRICVS PETRVS  
 BASILEAE MENSE AVGV  
 STO, ANNO  
 M. D. XXIX.

*Cum gratia & priuilegio Caesareo.*



CATALOGVS AVTORVM QVORVM TESTI  
MONIIS PASSIM CAELIVS  
VTITVR.

Asclepiades.	Herodicus.
Euryphon.	Menecrates.
Hippocrates.	Praxagoras.
Asclepius.	Mnafeas.
Erophilus.	Niceratus.
Demarchus.	Philotimus.
Chrysippus.	Themison.
Diocles.	Soranus.
Demetrius Appameus.	Proculus.
Demetrius Attaleus.	Ptolemæus.
Erasistratus.	Parmenides.
Empedocles.	Philistion.
Euenor.	Serapion.
Apollonius Citienfis.	Silimachus.
Apollonius Memphites.	Thesfalus.
Apollonius Glaucus.	Tryphon.
Antiphanes.	Nicander.
Democritus.	Bachus.
Dionysius.	Cassius.
Antipater.	Clodius.
Zenon.	Milefius
Heraclides Tarentinus.	Lufius.

# CLARISSIMO EI-

DEM QVE DOCTISSIMO VIRO

PHILIPPO BVCHAMERO, REVEREN-

dissimi domini D. Alberti Cardinalis & Archiepi  
scopi Moguntini Medico, Ioannes  
Sichardus.



R A E T E R multas, easq; nec obscuras quidem, nec ita paruas summa cum benevolentia, tum uoluntatis erga me tuae significationes, ornatissime uir, cum non desinas me apud ALBERTVM Reuerendissimum Cardinalem, eundemq; clementissimum principem patronum meum & uerbis quam potest fieri honorificentissimis cohonestare, & tuis subinde muneribus ornare, efficis plane ut quo me uertam nesciam:

dum identidem dispicio, qua in re si non beneficiorum in me tuorum cumulum, hoc saltem assequar, quod bona interdum nomina solent: ut scilicet dum soluen do non sum, uel ingenua debiti professione non feram tacitum, quantum tibi uiro inter eruditissimos optimo, inter optimos uero etiam eruditissimo debeam. Cui rei documentum uelim sit haec qualiscumq; inscriptio: Neq; enim memoria excidit, quam tu grauius uereq; si quis nos casus in eum sermonem adduxisset, queri soleres, nullam studiorum partem aequae nostrae tempestate iacere, ac eam ipsam quam olim cum maximis praesidijs, tum summis ingenijs excultam, nisi deus alius, quis rebus humanis iniquior inuidisset, non esset cur tanto negotio disceremus, & experimeta per mortes, ut ille dicit, caperemus, impudentissimorum interim circulatorum personas induentes, qui cum diu nihil scire didicerimus, tandem audacia pro sapientia usi carnificina quamdam uerius quam medicinam in uita communi exerceamus. Nam sic ferè comparatum est, ut quo quidq; ad uitam mortalium plus adferat adiumenti, hoc capitalius obsit, si aut parum rite tractetur, aut alio quam institutum est modo. Nunc quis ulla religione ad hoc opus accedit? aut quotus demum quisque ex ipsis fontibus haurit? Imò ut apertius dicam, quid huius rei omnino reliquum est dignum lectu, quod non palam ausis cum negli gentia, tum & inscitia damnare? Nisi unum dicas Hippocratem, aut Galenum ex Graecis, Latinis uero Cor: Celsum & Plinium. Quos tamen sic legunt ple riq; tanquam plus allaturos momenti eloquentiae studioso, quam ei qui sit rei medicae destinatus. In Plinio uero audent etiam nihil dissimulantes in ore habere tragicum illud: o coelum, o terra. Cum quibus non admodum contenderim, qui repetis frugibus malis tamen cum Gryllo in glandium usu consensere. Hoc uero subit mirari, qui fiat ut tam grauate in medicorum album recipient, ut quosq; uiderint terribilissime locutos, eamq; ob causam numero eximant, qua uel imprimis digni fuerant, mea sententia, ut locum acciperent. Quod si aliquo pacto possent ab interitu reuocari Diocles, Aesclepiades, Euryphon, Demetrii Appa meus & Attaleus, Democritus, Erasistratus, Chrysippus, Empedocles, Ze non, Erophilus, Aesclepius, Antipater, Heraclides Tarentinus, Menecrates, Praxagoras, Mnaeas, Herodicus, Milesius, Parmenides, Niceratus, Themis on, Proculus, Soranus, Serapion, Apollonij Memphites Citiensis & Glau cus, Philistion, Thessalus, Tryphon, Socrates, Nicander, Philotimus, Lusius, Euenor, Cassius, Clodius, Bachius, Silimachus, quos ferè auctores habet Celsus

Aurelianus, quid putamus nonnullos habituros quod dicerent? Te uero dignè planè qui tanti Principis sis curam sortitus, amare nã uehemèter debeo, qui ex cõmentarijs nostratium, uelut ille aurum ex stercore cum selegeris, tantã omnium literarum cognitionem huic studio intulisti, quanta potest in huius ordinis homine uideri maxima, & ob hoc planè idoneus qui Cælij nostri patrociniũ suicipias, siquidem recte dictum sit antiquitus, patronum causis plerumq; esse argumentum. Quis enim aut rectius contra utilitigatos defendet, quàm is in cuius iam manu uelut mancipio esse Cælius incipit: aut libètius, cum iusto sacramento confirmare tibi ausim, huius generis nihil omnino apud Latinos extare, studio, diligentia, fide pari tractatum. De cuius tamen uita non satis quod in præsentia dicam occurrit, nisi quod cognomento satis diuinare licet Afrum fuisse, quod ipsum per se uel tacente me ipsa satis dictio clamat. Vt autem Galeno Plinioq; maiorem credam facit diligens illa seu in refellendo, seu in astruendo ueterum auctorum commemoratio, haudquaquam præteriturus eos si per ætatem meminisse potuisset. Hoc uero peculiariter sibi sumpsisse uidetur, ut græcæ literaturæ suis cognitionem cõmendaret, dum sic Græcis omnia acceptum refert. Quæ res sanè nobis summã attulit difficultatem, ut facile nos ab editio nis consilio depelleret, dum antiquissima quæq; huius professionis uel honorũ librorum inopïa, uel temporum incitã obsoleuerunt, nisi operam nobis suam strenue Ioannes Cornarius nauisset, uir non modo medicæ rei, uerum omnium literarum, quæ quidem sint libero homine dignæ, doctissimo. Edidit autem, ut ipse testatur Responsonũ, quibus chirurgiam tractat, Muliebrium passionum, Græcarum epistolarũ ad Prætextatum, Adiutoriorum, Medicaminũ, Celerum passionum libros, qui tamen temporum iniuria interciderunt, qui nobis casus propemodum & hos ipsos libros eripuisset iam ad interitum spectantes, nisi in lucem nobis asseruisset uir cum splendore uitæ, tum literarum studio præditus incredibili Philippus Furstenbergius Consul Francofurdienfis. In Oribasio autem cum multa deprehendissemus deprauata, usu tamen ac ueluti præscripti one quadam longi temporis usurpata, non libuit immutare, ne pandectarum dignitatẽ eleuaremus, quarum cum bona pars ex Oribasio sit conflata, tum eius loci apud nostræ tempestatis medicos, ut non secus atq; oraculum, sicubi scriptulus inciderit, ad eas confugiant. De quo ne plura dicam Suidas facit, cuius hæc sunt de Oribasio uerba:

*Οριβασίος σαρδικιὸς γυναικίος ἰατροῦ τοῦ παραβάτου, καὶ κηραίου καὶ αὐτοῦ Ἰατρικῆς Ἰουδαίων πόλεως. Ἐγραφε πρὸς τοὺς ἀποστόλους τῶν ἰατρῶν βιβλία δ', πρὸς ἑλληνικὴν βασιλία βιβλία οβ'. Ἐπιτομὴν αὐτῶν ἐν βιβλίοις θ' πρὸς ἰσθάρων τὸν ἥδην, καὶ πρὸς βασιλείαν, καὶ πρὸς παρθένον.*

Habes igitur clarissime uir sceturam hanc apud nos proxime renatam anti

mi erga te mei testimonium, qua si tibi emunctissimæ naris uiro satis

facio, uicini hoc enim uel maxime studui; tum si qua ad medi

cina Candidatos utilitas perueniet, in lucro ponam.

Vale & Principi me nostro diligenter etiam

atq; etiam cõmenda. Basileæ XXI

Augusti, Anno

M. D. XXIX.

Cælius Aurelii  
Siccensis.

Oribasius.

# I N D E X

E O R V M Q V A E

O P E I S P A R S I M

I N S V N T.

## A



Protanum tertio gradu ca-  
lescit 254. C

Abinthium primo gradu  
calescit 254. C

Abinthium urinam cit

247. B

Acetum scilinum 4. C

Acacia 261. B

Acetum narus molestum est 22. C

Aceti natura 61. A

Acopa 18.

Acopa unguenta quomodo faciendā

264. D

Acora 306. C

Adaxismus 293. A

Adeps pullius & anserinus malaxat

257. B

Adiantum mediæ est qualitatis inter ca-  
lidum & rigidum 253. B

Adiutoria recuperatiua 299. A

Adurentia 60. C

Aegrotante ex infueto labore 246. C

Aegrotante præactu 246. C

αιμαλωτα spua 67. A

Aëris qualitates 252. C. & 296. C

Aëstatis dies 249. A

Aetas quaphlebotomo conueniat

287. B

Agaricus cuius optimus 261. B

Agarici naura 291. A

Agnus hena quæ optima 265. B

Agni folia xiccant 255. B

Agni folia calesciunt 253. B

Agrestia vocamus omnia immitia

126. C

Agrostica 29. B

Aliptarun officium 1.

Alsi cui uale oluerint 316. D

Albz theiaz in Italia 73. A. &

78. D

Albugines oculorum ut tollantur  
309. A

Albulæ balnez 41. B

Alexandria à podagra immunis

126. D

Allium inflat 70. C

Aloë quæ optima 261. B

Aloë primo gradu calescit 254. C

Aloës natura 290. D

Allium tertio gradu calescit 254. D

Alopetiarum remediū 303. B

Alphitæ natura 256. C

Althea 4. B

Alther 40. D

Alumenschiston 51. A

Amaraci natura 254. C

Ambulacium uocatur caducum mali

punicî 129. A

Amoniicus 261. B

Amonius bonus quis 261. B

Amolenta emplastra 266. C

Amphora Italica quantum teneat

264. D

Amor autor est furoris nonnunquā

25. B

Amorem quidam furorem putau-  
erunt 31. A

Amorem quidam prodesse putant

furentibus 31. A

Amyctica medicamina 49. B

Amygdalæ ebrietatem prohibent

250. D

Amygdalæ dulces calesciunt 253. B

Amygdalæ purgant uiscera 275. B

Anacoeliasmi 69. B

αναφωσισ uocis exercitium est 49. A

αναφωσισ id est uocis exercitatio quādo,

& quibus adhibenda 7. B

Anaphoretica passio 67. B

αναφωσισ 53. B

Anastomatica 83. B

Anastomatica medicamina 54. D

Anatrosis testæ 43. A

Anchrisa 125. A

Ancones 41. A

Anethinum oleum 246. D

Ani pruritus si sit, aut inflammatio,

aut rhagadæ, aut hæmorrhoidæ,

327. B

Anisus urinam cit 247. B  
 Anodyna malagmata 9. B  
 Anodyna medicamina quæ, & curdi-  
 cantur 81. A  
 Anodyna medicamina quæ indoloria  
 uocare possumus 47. A  
 Anserina caro indigestibilis 273. A  
 Antilius medicus 265. A  
 Antipatri libri epistolarum ad Gal-  
 lum 60. C. & 65. A  
 Anthereon 50. D  
 Aperientia corpus & os 259. B  
 Aphronitrum quale optimum  
 264. C  
*ἀφρόνιτρον* 66. D  
 Apollo inspirator furoris diuini  
 25. B  
 Apollonius Citienis medicus 25. A.  
 & 80. D  
 Apollonius Pergamæus 248. C  
 Apollonius Memphites 88. D  
 Apollonij liber de herbis 243. A  
 Apolopharos 39. A  
 Apopherefis 287. A  
 Apophlegmatifinus 47. B  
 Apotelesma 56. D  
 Appetitum cibi prouocantia 76. D  
 Apprehensionis morbus 48. C  
 Aqua *συνεπιπλάσσεια* quæ aluminis habe-  
 at naturam 94. C  
 Aqua *συνεπιπλάσσεια* 94. C  
 Aqua optima quæ sit, & pessima  
 quæ 251. B  
 Aqua nitrosa 298. C  
 Aqua pluuiialis alia leuior est  
 252. C  
 Aquarum electio qualis 282. C  
 Aquarum naturaliter calidarum ua-  
 ria natura ex metallis 298. C  
 Aquarum qualitates & naturæ  
 251. B  
 Aquiduca medicamina quæ Græci  
*ὕδρα* uocant 91. B  
 Aquilonius aër capiti prodest 9. A  
 Arcigenes medicus 295. B  
 Arcionides purgant pingues humo-  
 res, & mordicationem faciunt  
 stomacho 274. C. & 275. A  
 Argagation medicamen 95. B

Arietum carnes quales 272. C  
 Aristolochiæ radices alesaciunt  
 254. C  
 Aristotelis sententia e furiosis  
 30. D  
 Aron 68. C  
 Aromatici calami natua 254. C  
 Arsenicon quomodo coquatur  
 265. B  
 Arsenicum quod optimum 263. B  
 Artemidorus grammacus territus  
 à Crocodilo omnium literarum  
 est oblitus 26. D  
 Artemisia calefacit secundo gradu  
 254. C  
 Arteria pulmonis cann est 59. A  
 Arteria est ueluti fumaium corporis  
 humani 7. A  
 Arterix quando incidenda 288. D  
 Arterica medicamina 49. B  
 Arteriotomia 21. A  
 Arteticorum curatio 33. D  
 Arthritis morbus 126. C  
 Articulorum dolor 126. C  
 Ascites unde nomen habeat  
 89. A  
 Asclepius unde nome. inuenerit  
 1.  
 Asclepiadis liber de cysteribus  
 64. D  
 Asclepiadis liber de hycope 123. A  
 Asclepiadis libri paraiceastici 65. A  
 Asclepiades libros celeum passio-  
 num conscripsit 24. C. &  
 52. C  
 Aselli auiculæ teneriore putantur  
 5. A  
*ἀσέλιος* species hydropis 88. C  
 Asmaticorum curatio 35. A  
 Asparagus temperatæ iaturæ est  
 253. B  
 Asparagi ictericis dantur salubriter  
 275. A  
 Aspastum 261. B  
 Aspergines quæ sympasnaata dicun-  
 tur 87. A  
 Asphodeli ictericis proficit 275. A  
 Asphodeli radix calefacit 254. C  
 Asplenos herba 81. A

- + *Atra bilis* 54. C  
 + *Atra bilis* quid sit in Tullio 31. B  
*Atriplex* 50. D  
*Atriplex* in frigidat primo gradu 255. A  
*Atrophia* 34. C 67. B & 86. D  
*Attalus medicus* 285. B  
*Aues* quæ sint bene digestibiles 273. A  
 - *Avena* digestibilior inter omnia leguminum genera 280. D  
*Auguria* thermæ aluminis qualitatem habent 134. D  
*Aurigo* morbus siue arquatus 82. D  
*Aures* si fuerint humidæ 313. A  
*Aures* si aliquid irrepserit 312. D  
*Aurium* dolor ex frigore, aut si aqua intrauerit, aut si inflammata fuerint, aut si ex pingui humore sit dolor, aut ulcerationes, percussuræ, fracturæ, inclinationes 311. B & 312. C  
*Aurium* purgatiua 258. C  
*Aurium* passionibus 310. D  
*Aurium* dolor 44. C  
 - *Antispasmi* quando fieri debeat 288. C  
 - *Autumni* diæta 249. A  
 - *Autumni* tempus quale 90. C

## B

- B** *Bacchius* medicus 54. C  
*Balani* 40. C  
*Balanis* quando utamur, & quomodo conficiantur 294. D  
*Balanon* collyrium 24. C  
*Balnea* quid profint 252. D  
*Balnea* diaphoretica 297. B  
*Balnea* excogitata 297. B  
 - *Balnea* calida sine periculo sunt 297. B  
*Balnea* frigida profunt 297. A  
*Balsami* natura 254. C  
*Beta* stomacho obest 274. C, & 275. A  
*Bdellium* quod optimum 261. B  
*Bouillacato* 74. C  
 - *Bouillacato* 273. A  
*Bradipora* quæ sint 276. C  
*Brassica* ebrietatem prohibet 250. D

- Bronchos* 34. D  
*Bronchos* uocatur fluxus faucium 49. B  
*Bregma* medium testæ 25. B  
*Broniæ* radices calefaciunt 254. C  
*Buccellati* catartici 338. C  
*Bucini* pisces 77. A  
*Bulbi* bis cocti fiunt bene digesti, biles 273. A  
 - *Butyro* quando utamur in clystere 293. B

## C

- C** *Achexia* quæ sit 15. A, & 84. D  
*Cachecti* color 85. A  
*Cachochyma* 248. C  
*Cachochyma* in cibis quæ sint 272. C  
 - *Cachochymum* quid dixerint ueteres 272. D  
*Cælij* libri chirurgum 38. C  
*Cælij* libri responsionum 8. D  
*Cælij* libri celerum passionum 48. C  
*Cælij* libri adiutoriorum 16. D  
*Cælij* liber multebrium passionum 38. C  
*Cælij* græcus liber epistolarum ad Prætextatum scriptus 43. B  
*Cælij* libri *γυναικίων* 15. A  
*Cælij* libri adiutoriorum specialium 25. A, & 40. C  
*Cadinia* herba optima quæ 263. B  
*Cadinia* quid sit 84. D  
*Calamus* aromaticus cuiusmodi esse debeat optimus 262. C  
*Calchantum* quomodo mittatur in coctione emplastri 265. B  
*Calchantodes* aquæ 298. C  
*Calcucua* menos 264. D  
 - *Calculorum* ludus furentibus prodest 29. A  
*Calcitheus* quomodo coquatur 265. A  
*Calefacientia* quæ sint 253. B  
*Calefacientia* primo gradu 254. C  
*Calefacientia* secundo gradu 254. C

Calefacientia tertio gradu 254. C  
 Calefacientia quarto gradu 254. D  
 Calefactiua in cibis 278. D  
 Caligo passionis etiam imaginem praese fert 17. A  
 Caligo oculorum quomodo tollatur 309. A  
 Caligini oculorum quid medeatur 307. B  
 Calx colata 124. D  
 Cancri si in ore fuerint 319. B & 321. A  
 Canis rabidi morsus curatio 335. B. & 337. A  
 Cani ne nascantur alicui 305. B  
 Caninus raptus 44. C  
 Cantilenam Asclepiades mederi furori credidit 31. B  
 Cantilenae ridentur in curationibus 125. B  
 Caprarum caro cachochyma 272. C  
 Caput carnis carens neruofum est 7. A  
 Caput laedentia quae sunt 274. D  
 Caput sacrum est, & templum animae II. B  
 Capitis diuersi morbi quomodo curantur 300. C  
 Capitis dolor ex frigore quomodo curatur 300. C  
 Capitis purgationes 294. D  
 Caphisophontes 39. A  
 Capilli si defluant 304. D  
 Capillos quae corrumpant 305. A  
 Capparis uim subtiliandi habet 275. A  
 Carabus piscis 77. A  
 Caraxatio tibiarum 289. A  
 Cardamomum quod optimum 262. C  
 Cardiacorum remedia 335. A  
 Caricæ malum sanguinem generant 272. D  
 Caria immunis est a podagra 126. D  
 Caricæ renes purgant 275. A  
 Caricæ epati & spleni phlegmonem faciunt 275. B  
 Caritanæ balneæ 41. B  
 Caro quae optima 271. B

Carpus 14. A  
 Cafeus uerus obest sanitati 272. C  
 Cafei natura 273. B  
 Cassia quae optima 262. C  
 Castaneæ natura 253. B  
 Cataclysmo quando utendum s. D  
 Catalepsis 48. C  
 Cataplasmata uaria 297. A  
*καταπρασις* 29. A  
 Catarrhus unde fiat 49. B  
 Catarrhus ex uinolentia uenit s. D  
 Catarrhi remedia 315. A  
 Catarticum remedium sanis obest 289. B  
 Catartica medicamina stomachum euerunt 21. A & 22. D  
 Catartica medicamina quae purgatiua 9. A  
 Catafarcia hydropis species 88. C  
 Catetherismus 37. A  
 Catether 35. B  
 Cedrus lac in mammillis auget 244. D  
 Celadonia uolutatio in palæstra 141. A  
 Celeres passionis etiam sine ope medicinæ nonnunquam soluantur I. *uicioris* 123. A  
 Cepe proiectorium est 275. A  
 Cephalæa quomodo curetur, & quomodo deprehendatur 301. B  
 Cephalæa passio, & unde nomen accepit 2. C. & D  
 Cephalæa laborantium diæta 5. A & B  
 Cephalæa maxime sunt mulieres obnoxiae 2. C  
 Cera quae optima 262. C  
 Cerebrum porcinum inter teneriores cibos habetur 5. A  
 Cerebri inflammati morbus 302. C  
 Cerebrum omne stomacho obest 274. C  
 Ceruini renes cochochymisunt 272. C  
 Chalmos 44. C  
 Chalinos 40. D  
*χαλινος* quid sit Græcis 14. C  
 Chelidones quae & lichenæ 24. D  
 Chemæ 264. D  
 Chiasmus 21. A  
 Chitrapia quam manutigium dicere possumus



- possumus 21. B  
 Chirurgiæ studium difficile 253. A  
 Cholera<sup>m</sup> uomentibus quid condu-  
 cat 281. B  
 Cholericum humorem generantia  
 269. B  
 Cholera fel est 31. B  
 Choricomachia 141. B  
 Chrysippus medicus 25. A &  
 48. C  
 Cibus euchymus 253. A  
 Cibi qui utilissimi 252. D  
 Cibi singulis temporibus conueni-  
 entes 249. A  
 Ciborum confectio 280. D  
 Cicatricantia quæ sint 259. B  
 Ciceris nigri natura 275. A  
 Clysteroticus 37. A  
 Clyster imagogofus 293. B  
 Clyster ad fungos mortales 294. C  
 Clyster ad paralyfin longaonis, lumbrici-  
 cos, ascaridas, tenisimum, ulcera inte-  
 stinorum in dysenteria 294. C. & D  
 Clysteris mensura 293. B  
 Clysteres acres qui & quando ute-  
 mur 293. B  
 Clysteris multæ formæ 292. D  
 Cnici natura 291. A  
 Coelacon 278. C  
 Cochleæ indigestibiles sunt 273. B  
 Cochlearum fuccus diductorius est  
 uentri 277. A  
 Cochlear mensura 264. D  
 Coelica diathesis 87. B  
 Coeliotica medicamina 30. D &  
 41. B  
 Coenotis 73. A  
 Coenum 35. A  
 Colon 35. A  
 Color ut bonus sit in facie 316. D  
 Colum patientibus remedia 296. D  
 Coli curatio 326. C  
 Colymbades oliuæ quæ 5. B  
 Conceptio quibus prohibeatur  
 332. C  
 Conceptionis remedia 331. B  
 Condensantia cutem corporis 259. B  
 Conditum mulsam appellamus  
 125. B  
 Confricamenta dentium 45. D  
 Constrictiua uentris in cibis  
 277. B  
 Congius 264. D  
 Conia 45. A  
 Constipatio si fuerit in poris 30. A  
 Constipantia in cibis 275. B  
 Coptarion catarticum 337. B  
 Coptaria platissmata 565. A  
 Corruptuntur quædam facillime in  
 stomacho 276. C  
 Corrupti cibi in uentre remedium  
 245. B  
 Coryza fluxus narium appellatur  
 49. B  
 Coryza ex uinolentia nonnunquam  
 uenit 8. D  
 Coryzæ remedia 315. A  
 Costus arabicus optimus est 262. C  
 Costi natura 254. D  
 Coxarum si fuerit inflammatio  
 332. C  
 Craton medicus 295. B  
 Crocus quis optimus 262. C  
 Crotafos morbus temporum est  
 capitis 2. C  
 Cucumeris semen est pro oleo non-  
 nunquam 280. D  
 Cucurbitæ quales sint 272. D  
 Cucurbitæ leues quæ sint 14. D  
 Cucurbita cupha 134. C  
 Cucurbitarum usus 7. B  
 Cucurbitarum usus quando proban-  
 dus 280. A  
 Cucurbitarum cibus utilis 280. C  
 Cyathus 264. D  
 Cyathus ægyptius & alexandrinus  
 264. D  
 Cyclamini succus ictericus prodest  
 295. B  
 Cyclus metasyncriticus quis sit  
 5. B  
 Cynicus spasmus 44. C  
 Cyprum quale optimum sit  
 262. D  
 Cyprinum oleum laudatum in  
 epilepsia 16. D  
 Cyriasis 306. C

Cystophilos 37. A

D

**D** Actyli constipant 275. B  
 Dactyli diuretici sunt 244. C  
 Defrigis herba 253. B  
 Demarchus medicus 25. A  
 Demetrius Attaleus 44. C  
 Demetrius Erophili sectator 54. C  
 Demetrius Apameus 88. D  
 \* Demetrii sententia de furore 26. D  
 Democriti liber incertus de elephantia 94. D  
 Dentes si laxi fuerint, nigri, uel reumatisimo laborantes, comesti uel forati, commissi 317. B & 318. C & D  
 Dentes ne à lacte laedantur 334. D  
 Dentes ut albi fiant 319. B  
 Dentes molares si doluerint 318. D  
 Dentes si fuerint imbecilli 319. A  
 Dentium dolor 45. B  
 Dentium uariae passiones 317. A  
 Dentium detractio improbat 47. B  
 Dentium detractio quidam moriuntur 47. B  
 Dentiducum plumbeum in templo Apollinis 47. B  
 Dentifricium ne dentes doleant 319. A  
 Diarrymaton reslantis naturae est 91. A  
*Διαρύματα* 88. D  
 Diacamentis antidotum 249. B  
 Diacardamum 80. D  
 Diacaepias 90. D  
 Diacentaureum 90. D  
 Diachylon malagma 4. C  
*Διάχυσις* animi laxatio est 27. A & 91. A  
*Διάχυσις* quae, & quibus adhibenda sit 5. A  
 Diadaphnion medicamen 78. D  
 Diadaphnidon 39. A  
 Diadion inter anodyna medicamenta 81. A  
 Diadictamnus 90. D  
 Diateon emplastrum 62. C

Diaglaucium collyrium 45. A  
 Diahalos 80. D  
 Diamelilotum reslantis naturae est 91. A  
 Diamori confectio 323. A  
 Diamyreplici balani 80. D  
 Dianitrum 90. D  
 Diaoriganum 80. D  
 Diapeganum 123. A  
 Diaporon medicamen 62. C  
 Diapipereon 69. B  
 Diaphoristica quae sint 260. D  
 Diaphragma discretorium appellatur Calius 57. B  
 Diaphragma quid dicatur 14. C & 35. B  
 Diaretismus 80. D  
*Διαρηκτικός* 85. B  
 Diaroos 60. C & 76. C  
 Diabestum 80. D  
 Diafermaton reslantis naturae est 91. A  
 Diapoleti electarium 337. A  
 Diasteaton medicamen 127. B  
 Diasycaminon medicamen 62. C  
 Diatapsias 80. D  
 Diatriton 36. D  
 Diacheon medicamen 3. A  
 Diechidnon medicamen 78. D  
 Dielectrum 61. B  
 Dieteticus liber Theffali 58. C  
 Digestibilia facile in cibis & contra 273. A  
 Digestiua mitigando quae sint 257. A  
 Diocles librum de passionibus scripsit 23. B  
 Diomoron 76. C  
 Dionysius medicus 65. A  
 Diptamnus calefacit 254. C  
 Distorta si fuerint palpebrae 310. C  
 Diuretica medicamina obsunt capitibus membranatis 21. A, & 22. D  
 Dorion ad furorem accendit 31. A  
 Drachma 264. D  
 Drimiphagia quid sit Graecis 6. C  
 Dropax 7. B & 298. D

- Dulcia obfunt hepatis & Spleni 275. B  
 Dysuria 132. C  
*ὑδρῶδες* 68. C  
*ἄσπιλον* difficulus spiritus 49. B  
 & 71. B

## E

E Brietatem prohibentia 260. D  
 Educentia & euocantia quæ  
 260. C

Egylopas quomodo curemus 310. D

Elephantialis 94. C

Elimicus mensura quid contineat

264. D

*ἔμφ* quid sit 3. D

*ἔμφ* 123. A

Emathites lapis 264. C

*ἔμβασις* 28. D

Empedoclis sententia de furore 25. B

Emplaftra enæma 38. C

*ἐμπυκνύματα* 91. A

Empiricorum ratio curandi 10. C

Empyca passio similis phthisi 67. A

Encathismata 37. A

Entera 71. B

Epatias 89. A

Epatica passio siue icerosa 79. A B

Epidosis 141. B

Epiglottis 34. D

Epilepsia unde dicitur, & quomodo cu-  
 retur 11. B

Epilepsia à scotomatica passione quo  
 discernatur 13. B

- Epilepsia in mulieribus plerunq; tolli-  
 tur noua purgatione, aut primo par-  
 tu 13. B

Epilepsia duæ sunt species 11. B

Epithymus uentrem comodissime sol-  
 uit 247. B

Epithymi natura 290. D

Erasistrati liber de paralyfi 42. C

Erasistrati libri salutarium præceptorū  
 52.

Erysipilæ si fuerint in cerebro factæ  
 303. A

Escharæ 124. D

Euchymum quid dixerint ueteres  
 272. D

Euchyma quæ sint 271. A

Euexia 141. A

Euenoris libri curationum 92. C

Euphorbium quale eligendum

261. B

Euphorbium quarto gradu calefacit

254. D

Euphorbij natura 291. A

Eunuchismus 21. A

Emplastrorum decoctio 265. A

Euriphon medicus 54. C

Eustathius filius Oribasij 283. A

Exanthemata 248. C

Exercitatio fortis, citata, & composita

quæ 284. D

Exercitationis modus quis sit 285. A

Exercitationes corpori quare adhibean-  
 tur 284. D

- Exhalationum receptaculum est caput  
 7. A

*ἔφι* habitudo est 84. D

Extenuantia in cibis 267. A

Extenuantia in cibis & constipata aperi-  
 entia 275. A

## F

F Abz farina testiculis medetur  
 325. B

Fabæ farina maxime inflat 274. D

Faciei claritas quibus remedijs procure-  
 tur 316. D

Frictiones excitant naturalem calorem  
 249. B

Fella *ἰαυρία* quare dicta 71. B

Felliduca medicamina 82. C

Fermentum tritici exsiccat 255. A

Ferreici altheres 47. A

Fex olei calefacit secundo gradu  
 254. C

Ficedulæ inter teneriores auiculas nu-  
 merantur 5. A

Ficus siccæ primo gradu calefaciunt  
 254. C

Fluor capitis facillimus curatione  
 57. B

Fluor de pulmone aliquando curabilis  
 est 57. B

Fluxus sanguinis muliebris sicui acci-  
 dat 350. D

Fluxus uentris infantum 245. A

Fœnigræci seminis natura 68. C

Fœnogræcum in clystere quando adhi-  
 bendum

bendum sit 293. A  
 Fomentationes 296. C  
 Frictiones quales sint 284. C  
 Frictionum diuersa genera 285. A  
 Fungus quidam non edunt 272. C  
 Fungis suffocati quid agere debeant  
 336. D  
 Furor protrepticus 25. B  
 Furor quidam est cum uaticinatione  
 26. D  
 Furor eroticus 25. B  
 Furoris curatio 27. B  
 Furoris siue insanæ curatio 25. B  
 Furorem duplicem Plato dixit 25. B  
 Furiosos quæ indicia præcedant 26. C  
 Furfuricæ unde in capite oriuntur, &  
 quomodo tollantur 305. B

## G

**G** Abatis lapis 264. C  
 Galbanus optima 263. B  
 Gargara quæ dicitur aspera arteria  
 323. B  
 Gargarismus dolentibus caput 7. B  
 Garum quid sit 40. C  
 Gingiua si reumate laborauerint, aut si  
 inflammata fuerint 329. B. & 320. C  
 Glumen quale legi debeat optimum  
 226. D  
 Gluten quod optimum sit 262. C  
 Glutinosum humorem generantia  
 269. A  
 Glycyrrhizæ succus mediæ temperatu-  
 ræ 253. B  
 Glycyrrhizæ radix calefacit 253. B  
 Gnidij cocci natura 290. C  
 Gonagra 126. D  
<sup>gymnasticis 67. A</sup>  
 Gymnasia & exercitationes quales esse  
 debeant 284. C  
 Gysara quæ melior 263. B

## H

**H** Aemorrhagia 132. D  
 Haptæ si fuerint generatæ 321. A  
 Hæterocopia 141. B  
 Heliosis cum sole corpus torretur 20. C  
 & 64. C  
 Helleborus quis melior 261. B  
 Hellebori sumendi ratio 18. C

Hellebori albi uis 42. C  
 Hellebori utriusque natura calida tertio  
 gradu 254. D  
 Helixine 51. A  
 Hemicanium quomodo curetur & un-  
 de dicitur 303. B  
 Hemicania dolor est dimidij capitis  
 2. C  
 Hemina 264. D  
 Heraclides Tarentinus medicus 47. B  
 Heraclides Tarentinus libros interiorum  
 passionum conscripsit 24. D  
 Herba quæ sint temperatæ ex calido &  
 frigido 253. B  
 Herbum 70. C  
 Heres medicamen 45. A  
 Herodicus medicus 111. B  
 Hiera 71. A  
 Hionti curatio 315. B  
 Hircorum carnes cacochymæ 272. C  
 & 273. A  
 Hominis morsus curatio 337. A  
 Hoplomachia 141. B  
 Humectantia & simul desiccantia  
 256. D  
 Humectantia primo, secundo, & tertio  
 gradu 256. D  
 Humectantia in cibis 279. B  
 Humorum abundantiam quæ faciunt  
 260. B  
 Humoris fluxus per aures 44. D  
 Humores frigidos generantia 269. A  
 Humores crudos generantia 269. A  
 Humores acres si dolorem fecerint ca-  
 pitis 300. C  
 Humores extrahentia per os & nares  
 257. B  
 Humorumeductio per diuersas corpo-  
 ris humani partes 258. D. & 259. A  
 Hydroleum quando in clysterem recipi-  
 atur 293. B  
 Hydroleo qui debeant lauare 299. A  
 Hydrops 87. B  
 Hydropsi duæ species 88. C  
 Hyemis tempore dieta 249. A  
 Hyenes belua in Africa 257. A  
 Hypoptia oculorum 315. B  
 Hypofarcia una species hydropis 88. C  
 Hypozygos 35. B  
 Hysopi natura 254. D

**I** Cesion emplastrum 90. D  
 Icore quæ curanda 264. D  
 Icrocolla quæ optima 262. C  
 Iecorosi qui dicantur 79. B  
*Interpior* 82. D  
 Impetigines equorū quæ sint 24. D  
 Incubus est epilepsia tentatio 10. D  
 Incubi morbum Silimachus contagio-  
 sam asserit, multosq; Romæ ueluti  
 lue peremit 11. A  
 Incubonis uaria nomina apud ueteres à  
 uarijs effectibus fuerunt 10. D  
 Incubonem unde dicamus, & cuiusmo-  
 di morbus sit 10. D  
 Indigestio in uenis unde deprehenden-  
 da 245. B  
 Indurantia quæ sint 257. B  
 Infantū qualia sint nutrimenta 244. C  
 Infantibus si doleant dentes 319. A  
 Infantia in cibus 274. D  
 Inflationi quæ resistant 274. D  
 Infrigidantia in cibus 278. D  
 Infrigidantia mediocriter 254. D  
 Infrigidantia primo gradu 255. A  
 Infrigidantia secundo gradu, tertio &  
 quarto 255. A  
 Impinguantia humectando 257. A  
 Impinguantia & repletia quæ sint 268. C  
 Intericapulæ quæ 14. C  
 Irinon ad caput purgandum 295. B  
 Isatidis natura exiccatiua 255. B  
 Ischiadicorū curatio 332. D. & 333. B  
*Ισχίον* quid Græcis sonet 126. C  
 Italicæ thermæ 41. A  
 Iudilus piscis aspratilis 267. B  
 Iuliani Cæsaris consiliū in LXXII me-  
 dicis, quos iussit comparari ex uniuersis  
 fo orbe 283.  
 Iulidæ inter teneriores auiculas nume-  
 randæ 5. A  
 Iusquiamus quo utilis, & quis optimus  
 Ixus calefacit 254. C (263. B)

## L

**L** Abia à uento si scissa sint 317. A  
 Labia scissa aut fissa si cui fuerint  
 Lac generantia quæ sint 261. A (317. A)  
 Laccetibus obest 282. C  
 Laccaseatum si fuerit in uentre 336. D  
 Lac coagulatum si fuerit in uentre 336. D

Lac potaturus quid cauere debeat 281. B  
 Lac quale sine periculo accipiatur 275. B  
 Lac frigidis natura obest 274. C  
 Lac ne coaguletur in mammillis 326. C  
 Lac muliebre quid augeat 244. D  
 Lac asininum 96. C  
 Lac amydatum 63. B  
 Lactis boni & mali discrimen 244. D  
 Lactis pinguedo subtiles reddit humo-  
 res 275. A  
 Lacte parce utantur senes 250. C  
 Lactuca mediocriter est frigida 279. A  
 Lactuca nutricibus solæ ex oleribus  
 dandæ 244. C  
 Lachrymas educuntia ex oculis 258. C  
 Ladanus primo gradu calefacit 254. C  
 Ladanus ubi optimus 262. C  
 Lana succida 43. A  
 Lapis acius 264. C  
 Lamanchian, id est, immodicam absti-  
 nentia quidam furiosis adhibendam  
 probant 30. C  
 Lateris dolores 325. A  
 Lauri folia & bacca calefaciunt 253. B  
 Laureolum quid sit 127. A  
 Laxatiua constipatorū quæ sint 258. C  
 Lectio nonnunquã prodest dolentibus  
 caput 4. D  
 Lecti pensiles 69. A  
 Lentigines in facie si fuerint 316. C  
 Lenticula pingues humores nutrit 253. A  
 Lenticulæ confectio 280. C  
 Leporis carnes quales 272. C  
 Leptomeris quæ sint herbæ 82. C. &  
 256. D  
 Lexypyreton inter anodyna medicami-  
 na 81. A  
*Λευκοφ* quid sonet 89. A  
 Leucophlegmantia & unde dicta 88. C  
 89. A  
 Libanus quis melior 262. D  
 Libanotis 81. B  
 Liber pater autor furoris cuiusdam 25. B  
 Libidinem reprimentia, & consumentia  
 semen 261. A  
 Libisticus calefacit 254. C  
 Lichenæ dicuntur, quas nos impetigi-  
 nes 24. D  
 Lienosi qui sint 79. B  
*Διχάριον* digitus 125. A  
 b Ligationes

Ligationes quare uulneribus adhibeantur 65. B.

Lini costi natura 290. C

Lini semen primo gradu calefacit 254. C

Lipothymia defectio animi 74.

Lipothymia cauenda in phlebotomatione 16. C

Lithargyrus quis optimus 264. C

Lithiasis uesicae 131. B

Liuores si fuerint in oculis 315. B

Lixiuum 45. A

Localia adiutoria quae 7. A

Longaon 35. B

Lumbricorum curatio 326. D

Lupinum stercus 326. D

Lusus de tardis passionibus scripsit 43.

*αυαίσις* quid sit 26. B

(A)

L

**M**acerinos emplastrum 124. C

Magnes lapis 264. C

Malaxantia quae sint 257. B

Malogranatorum natura 278. D

Malua aquosissima est inter olera 279. B

Mammillae si lacte turgescant 325. B

Mammillarum dolentium remedia 325. B

Mania quae & furor siue infantia 25. B

*μάγισ* graece quid sonet 26. C

Mantice dicta quae olim mania 25. B

Marinus uitulus calceamenta podagricis praebet 129. B

Maritima nauigatio capiti prodest 9. A

Marrubium stomachum affligit, purgatiua tamen uirtutis 68. C

Masculi plus melancholiae obnoxij quam foeminae 31. B

Mastichis natura calida secundo gradu

254. C

Matricis si fuerit suffocatio 329. B

Matricis si fuerit inflamatio, ulceratio, mordicatio 331. A. & B

Matricis si sint ulcera 328. C

Maurosis 309. A

Mediae materiae cibus quis, & quando adhibendus 5. A

Medicaminum frequentia quid generet morborum 128. D

Medulla quae optima est 262. D

Melana medicamina 38. C

Melana quae optima 262. D

Melancholia unde dicta sit 31. B. 32. C

Melancholiam quidam furoris speciem dicunt 27. A

Melancholicum humorem generantia 269. B

Melanteria 264. C

Melilotus optimus quis 262. D

Melones choleram gignunt 274. C

Melota 14. D

Menstrua constricta educentia 261. A

Mentae natufa 254. D

*μετάσπον* interscapulum 28. D

Metasyncritica curatio 44. D

Medici officium 333. B. & C

Mediana uena 288. D

Mel extenuandi uirtutem habet 275. B

*μίλαρ* Graeci nigrum dicunt 31. B

Melancholia unde deprehendat 287. A

Melotis 45. C

Meneceates Zeophletensis medicus

25. A

Meninga quae dicatur 302. D

Menstrua ut educantur 296. C. & 330. C

Mensurarum nomina 264. D

Menta obest nutricibus 244. C

Mentis intentio caput debilitat 9. A

Mercurialis herba uentre soluit 247. B

*μετάσπον* quid sit 32. C

Methodicorum erratis aliquid indulgentum 10. C

Millum infrigidat primo gradu 255. A

Mimicae lectiones adhibendae furiosis 29. A

Mynitica malagmata quae 8. C

Mithridatum, quae theriacam uocamus 96. C

Modulatio agonistica 141. A

Mnaseae secta 27. A

Molipdina quae eligenda 264. C

*μορία* quid sit 26. C

*μυρία* quid sit 20. C

Mordicationis facientia 260. C

Mulsa cholericis inutilis est 281. A

Mulsa febrientibus utilis est 281. A

Mulsae confectio 281. A

Mulsam quando iniiciamus per clysterem 293. B

Mustelarum morsus curatio 337. A

Mustum primo gradu calefacit 254. C

Mydriasis 34. D

Myrthi natura 279. A

Myfi herba 264. C

Myfi lacera fricatio 51. B

## N

Narcotica medicamina fugienda  
in dolore coli 326. C

Nardus celtica primo gradu calefacit

Nardus quæ optima 263. A (254. C)

Narium uariarum passiones 313. B

Necroses 22. D

Nepesinæ thermæ in Italia 73. A. 78. D

Nervos maiores uocamus Tenontas.

14. D

Nephritis renalis passio est 130. C

Nestis 35. A

Nicander medicus 25. A

Nicerati liber de catalepsi 48. C

Nileos 39. A

Nitrum quod legendum optimū 264. C

Nomina quædam à contraria significa-  
tione sunt indita 71. B

Nutrix qualis legi optima debeat 244.

Nutricum labores 244. C (C)

Nutrimenti cessatio, morbus 86. D

Nutrimenti plurimum dantia uel mini-  
mum 270. C

Nux mensuræ nomen 264. D

Nuces recentes faciunt ut, les secessus  
277. A

Nyctiloparum remedium 308. C

## O

O Bolus 264. D

Oculi ut pulchri fiant 309. B

Oculorum uarij dolores ex percussu, ex  
niue 308. C. & D

Oculos si quid læserit incidendo 310. C

Ocymus obest nutricibus 244. C

Oelypos lana succida est 43. A

Olca 264. D

Olei uicem quid gerere possit in confe-  
ctionibus medicamentorum 280. D

Olera syluatica mala sunt 272. D

Olera qualia sint in uniuersum 272. D

Olerum radices quales 272. D

Omphacium quod optimū sit 263. A

Oenomeli 125. B

Onifrogonos seminis lapsus semel con-  
tingens, non habet morbi loco 10. D

Onisci 21. B

Onyx bona quæ 263. A

Ophiasis 303. B

Ophis lapis 121. B

Opium thebaicum in frigidat quarto  
gradu 255. A

Opopanax optimus 263. A

Opos cyrenaicus lasar est 39. B

Ordei natura siccatiua 256. C

Ordeoli in oculis si nascantur 308. C

Orexis 76. D

Oribasij LXXXII libri medicinalium re-  
rum 283. A

Oris diuersi morbi 320. C

Oris ut fiat bonus odor 317. A

Orthopnoea 71. B

Oryza uentrem constringit 278. D

Os si in gutture cohæserit 323. A

Ostracoderma quæ 276. C

Oua hapala 51. B

Oua frigida obfunt sanitati 272. C

Ouilla caro malos humores generat

Oxibaphus 264. D (272. C)

Oxymel 81. A

Oxymel inflammationibus resistit 274. D.

&amp; 275. B. &amp; 277. B

Oxylappacij radices pediculos arcent

Ozana 34. D (306. C)

Ozinæ curatio 313. B

## P

Palpebræ pingues cui aut substan-  
guinea fuerint 310. C

Palpebræ duræ si cui fuerint 310. C

Palpebras qui sine pilis habeant 308. D

Panacis radices quæ optimæ 263. A

Panis quis optimus 271. B

Panis catarticus 338. C

Panis actopyrus 141. B

Pantherinæ balnea in Italia 41. B

Papauer quale legi debeat optimum  
262. D

Papaueris semen retentoriū est 275. B

Papaueris semen cataphoriticum est  
279. Aπαπακίτης & eius natura 30. C. & 91.  
B. & 92. C. & D. & 123. A

Paralyfis 34. C

Paralyfis cordis 36. C

Paralyfis uesicæ 134. D

Paralyfis duplex, motus &amp; sensus 33. B

Paralyfis linguæ 34. D

Paralysis hyemis tempore frequentior est 33. B  
 Parotidis quid medeatur 313. A  
 Paracchylis uocatur etiā hydrops 87. B  
 Paroptesis 7. B  
 Partus quibus iuuetur 332. C  
 Pastellus catarticus 338. C  
 Percussura si dolorem capitis fecerit 301. B  
 Pediculi si fuerint in palpebris 310. D  
 Pediculi ferales in phthiriasi 96. D  
 Pediculos quid prohibeat 306. C  
 Pellis caprina noxia aegrotantibus 21. A. & 22. D  
 Peucedanum optimum 263. A  
 Pepones cuius naturæ sint 274. C  
 Pericharacter 45. C  
 Periodici morbi 3. A  
 Peripleumonia 49. B. & 72. C  
 Peritoneum 35. B  
 Perolus 35. A  
 Persica præcocia facile corrumpuntur 276. C  
 Petroselinum urinam prouocat 247. B  
 Phagedæna stomachi passio 78. D  
 Pharmacodes 38. D  
 Philistionis frater medicus 123. A  
 Philosophorum disputationes quando aegrotis audiendæ sint 29. B  
 Philotimus medicus 25. A  
*φιλτρον* medicamina 26. C  
 Phlebotomia qui opus habeant 286. D  
 Phlebotomantibus quæ sint consideranda 286. D  
*φλέγμα* crassus humor est 89. A  
 Phlegma generantia 269. B  
 Phlegmon oculorū si fuerit 307. B  
 Phœnicobolani 81. B  
 Phœnigmos 39. A. & 45. A. & 64. C  
 Phrenesis quo discernatur à furore 26. C  
 Phrygion quidam probant in furiosis 31. A  
 Phthoe morbus quam & phthisin uocant 66. D  
 Phthiriasis passio & unde dicta 96. D  
 Phthiriasis morbus 131. B  
 Phthisis morbus & unde dicatur 34. D. & 66. D  
 Pigritia obest plurimū sanitati 253. A  
 Pilorum adulterorū in palpebris reme-

dium 308. D  
 Piper optimum quis 263. A  
 Pira duracina 76. D  
 Pisorum natura 278. D  
 Pisces aspratiles extenuant in cibis 267. A  
 Piscium delectus cuiusmodi habendus 271. B  
 Pistacia utilis sunt epati 275. B  
 Pitya 23. A  
*πίτυς* 72. D  
 Plumbo quomodo in emplastris utamur  
 Plethura exitialis est infantibus, & quomodo soluenda 244. D. & 248. D  
 Plethuræ signa 248. D  
 Pleuretiorum curatio 325. A  
 Pnigaliona appellat Themison incubum ed quod præfoet 10. D  
 Podagræ morbus hæreditarius est 126. D  
 Podagra & eius curatio 126. C  
 Podagricorum curatio 332. D  
 Polium quod optimum 263. A  
 Polyarchion medicamen 78. D  
 Polypodij natura 290. C  
 Polypodij natura exiccatiua 255. B  
 Polypus narium si fuerit 313. B  
 Polyfarcia 141. A  
 Pompholix quæ sit optima 264. C  
 Porci ueteres cacochymi sunt 271. B  
 Porcorum quæ sint optima 271. B  
 Poros grauantia in cibis 276. C  
 Pori 79. A  
 Pori spermatici 35. B  
 Pori uretici 130. D  
 Porphyra cochleæ 276. D  
 Potiones quæ infirmis dandæ sint 281. A  
 Praxagoras libros curationum scripsit 23. B  
 Praxagoræ libri 41. B  
 Praxagoræ famulus ternos bilibres panes singulis diebus comedit 74. D  
 Priapismus 35. B  
 Priapismi remedia 32. A  
 Proculus Themisonis sectator 88. C  
 Prognosticum ad aegrotos 335. A  
 Prochemia 59. A  
 Psilothrum 38. D. & 59. A  
 Psoriasis 131. B



Psychrolusia ne uos indurat 9. B  
 Ptarmicū quod sternutamentum dicitur  
 mus 8. C & 39. B  
 Ptisanæ confectio 227. B  
 Ptolemæus Erasistrati sectator 92. D  
 Ptygmata quæ sint 4. A  
 Ptyngia 309. B  
 Ptysis uocatur fluxus thoracis 49. B  
 Puerilis passio uocatur epilepsia 11. B  
 Pueri non sunt phlebotomandi 287. B  
 Puerorum quales sint euacuationes  
 244. D

Pulegium calefacit 253. B  
 Pulmo uulneratus nõ semper causa est  
 mortis 57. B  
 Pulsus formicalis quis sit 67. A  
 Pumex quis optimus 264. C  
 Purgantia uentrem in usu 290. C  
 Purgatiua mediocriter 277. B  
 Pus facientia 257. B  
 Putrefacientia carnes & adurentia  
 259. B  
 Putrefcētia facile non sunt ideo deterio  
 ra 282. D  
 Pythagoras 125. B

## R

**R** Anula sub lingua quomodo cure  
 tur 334. D  
 Rapæ crudæ malum sanguinem gene  
 rant 272. D  
 Raphani natura 254. D  
 Rarefacientia corpus humanum & cu  
 tem 259. B  
 Regius morbus 82. D  
 Renum purgatiua 259. B  
 Renalis passio quæ nephritis uocatur  
 130. C  
 Reprimētia quæ sint 260. D  
 Resina quæ maxime cōducibilis 263. A  
 Reuma 34. D  
 Reumatismus aurium 44. D  
 Reumatismus uesicæ 132. D  
 Rhinenchyton ferramentum 467. B  
 Rotulæ confectio, quæ agrotates in pa  
 ralyfi utantur 40. D  
 Rubrum uinum senibus conducit  
 249. B  
 Rubus *Partor* dicitur à Græcis 3. A  
 Ruborem inducentia in corpore 299. B

Rufus medicus 281. B  
 Rugæ uentris & mammillarum quibus  
 remedijs explicentur 332. C  
 Rumam uocamus latine partē gutturis  
 quæ Græcis *ἀρσενικόν* dicitur 11. B  
 Raphanus leptomeris est 275. B  
 Rupturis oculorum quomodo succur  
 rendum 309. B  
 Ruta ueneri obest 285. C  
 Ruta opposita ori matricis menstrua  
 prouocat 296. C

## S

**S** Acer morbus dicitur Epilepsia 11. B  
 Sacra uocamus magna 11. B  
 Salis confectio aduersus choleram  
 338. D  
 Salis usus contra putredinem 141. B  
 Samia terra 62. D  
 Sandaraca quæ quærenda 264. C  
 Sanguis qua mensura tollendus 287. B  
 Sanguinis fluoris differentia 54. C  
 Sanguinis fluoris differentias quomodo  
 cognoscamus 54. D  
 Sanguinis plurima missio inutilis & no  
 xia 289. A  
 Sanguinis missio qualis & quando  
 248. C  
 Sanguinis fluoris, & remedia eius 53. A  
 Sanguinis fluxus si nimius ex naribus  
 fiat 314. C  
 Sanguinis fluxus si de curibus fiat.  
 312. D  
 Sanguinem reijcientes 324. D  
 Sanguisugæ quādo apponendæ 289. A  
 Sanguisugæ si fuerint platæ 336. D  
 Sanitati subitæ nõ est fidendum 20. D  
 Scabies capitis quibus tollatur 307. A  
 Scabies si fuerit in oculis 310. C  
 Scamma 43. A  
 Scammonia 65. B  
 Scammonia natura 291. B  
 Scarosis 21. A  
 Scarotica medicamina 80. D  
 Scarotica quæ sint 10. C  
 Scarus inter tenerrimos pisces nume  
 ratur 5. A  
 Scirrholosis 132. D  
 Scolopendræ morsus 337. A  
 Scorpina piscis aspruillus 267. B

Scotomatica passio sine periculo est  
10. D  
Scotomatica passio quæ, & unde dicta  
10. C  
Scotomia denunciat plerumq; epilepsia  
ob id dicta est parua epilepsia 10. C  
Scroton si fuerit 328. D  
Scrupulus 264. D  
Scyllæ acrimonia 45. C  
Seminales uix 35. B  
Seminis spontanei lapsus remedium  
251. B  
Seminis spontaneum fluxum qui patitur  
antur 329. B  
Semperuiua herba 59. B  
Semperuiua in frigidat tertio gradu  
255. A  
Senes caligine oculorū præcipue laborant  
307. B  
Senum natura & diæta 249. A  
Senibus phlegma in stomacho congregatur  
250. C  
Senanæ balneæ 41. B  
Serapion libros curationum conscripsit  
24. D  
Serpentum morsus 336. C  
Serum primo gradu calefacit 254. C  
Sextarius quantum contineat 264. D  
Sextarius mellis 264. D  
Stagon, buccarū musculus dicitur 2. D  
& 7. B  
Siccatiua primo gradu 256. C  
Siccatiua secundo, tertio & quarto gradu  
256. C  
Siccatiua simpliciter 255. B  
Siccatiua absq; mordicatione 255. A  
Siccatiua in cibis 279. A  
Sicofes ficui sunt in barba 316. C  
Siderizontæ aquæ, id est ferræ 298. C  
Silmachus Hippocratis sectator 11. A  
Simiæ morsus curatio 335. B. & 337. A  
Simplicium electio 261. B  
Sinapismus 7. B  
Sinapitis 264. C  
Sinapismus dropacibus fortior est, &  
quando eo sit utendum, quomodoq;  
conficiatur 298. D  
*ουγγωρι* in icterosis 79. B  
*ουσιπ* lac asininū accuratum 96. C  
Smegmata 51. B

Smyrna quæ optima 263. A  
Socrates chirurgus 123. B  
Solum factum ex oleo 299. A  
Solutio adelos 74. C  
Somnus 135. A  
Soranus ceteros medicos diligentia superauit 1.  
Sorani libri ætiologumeni 11. A  
Sorani libri *ουιστηριου* 95. A  
Soranū præfert Cælius ceteris medicis  
50. C  
Sorbitionum coquendarū exactissima  
ratio 279. B  
*σπασμωδ* quid sit 20. C  
Spasmus qui latine raptus 123. B  
Sphæra italica 86. C  
Sphæra ludus epilepticis prodest 14. D  
Spicæ nardi folium primo gradu calefacit  
254. C  
Spina ægyptia 61. B  
Spina si in gutture cohaerit 323. A  
Splentis 89. A  
Splenetici uel splenici qui sint 79. B  
Spyncter 35. B  
Squilla piscis 77. A  
Stactys optima 263. B  
Stagni nauigationes caput in frigidant  
9. A  
Sternutamenti frequentis remedia  
315. A  
Sternutamenta sensus implent 24. C  
Schimeus 264. C  
Stoici duplicem furorem dicunt 25. B  
Stomachus inficitur purgatiuis medicamentis  
9. A  
Stomachus fumarium est corporis 7. A  
Stomachi & uentris dolores 74. C  
Stomacho quæ sint apta 273. B  
Stomachici 73. B  
Stomatica synanche 74. C  
Storax 263. B  
Strabi sape fiunt ex epilepsia 12. D  
Stranguria 132. C  
Strictura quæ 36. C  
Strobilus 68. D  
Stipteria quæ optima 59. B. & 264. D  
Stiptica & confortatiua quæ 257. A  
Stiptiriodes aquæ 298. C  
*στυπτηριου* quid sit 59. A  
Sudoris prouocatiua 296. C

Sudore fatigatos quō reficiamus 334. D  
 Sulphur calefacit 254. C  
 Sulphur optimum 263. B  
 Sulphuræ aquæ natura 298. C  
 Surdus siquis fuerit 310. D  
 Suspirium 71. A  
 Syccæ ulcus capitis 307. A  
 Sycionia, idest coloquintidæ natura  
 290. D  
 Sycodes capitis 307. A  
 Symila qua ratione coquatur 280. D  
 Sympasmata 18. C  
 συμφορῶν 127. B  
 Symptomata 50 C  
 Synanches curatio 322. D  
 Syntaxis uicina est phtisicæ passioni  
 67. A

## T

**T** <sup>αχθνοια</sup> 48. D  
 Araxi oculorum quibus succur-  
 ratur 307. A  
 Tardæ passiones medicis æternam glo-  
 riam conciliant 1.  
 Tempus quale sit eligendum phleboto-  
 mo 288. D  
 Tenaria insula aquas habet nitrosas  
 154. D  
 Tenontes nerui 7. B  
 Testiculorum si fuerit inflammatio  
 328. D  
 Testiculorum passiones 328. C  
 Tetracharmacum 311. B  
 Themison primus tardarum passioñi  
 curas ordinauit 1.  
 Themison successores Thessali 50. C  
 Themisonis libri epistolarū ad Diman-  
 tem 94. D & 10. D  
 Themisonis libri Salutarium 52. C  
 Themisonis tres libri Tardarum passio-  
 num 1.  
 Themistocles sanguine tauri potō inte-  
 rijt 23. A  
 Tenontagra 126. D  
 Theriac cotylia in Italia 73. A. & 78. D  
 Thessalus libros Regulariū scripsit 1.  
 Thoracis dolores si fuerint 325. B  
 Thymi natura calida tertio gradu 254. D  
 Tincturæ albuginum remedia 309. B  
 Tinnitus aurium si fuerit 312. D  
 Titus medicus 84. D

Titus medicus flagellat furiosos 31. B  
 Tonsillarum si fuerit inflammatio 322. C  
 Trigonon medicamen 51. A  
 Tracacantus 263. B  
 Trachea arteria 324. C  
 Trachelismus 141. B  
 Treclæ pisces aspratiles 267. B  
 Trigonus trochiscus 69. A  
 τροχισκῶν 40. D  
 Trombus 35. B  
 Trochiscus diaelectro 343.  
 Trochiscus diaachacia 345. A  
 Trochiscus hemicranicus 343. B  
 Trochiscus diaalcauus 345. B  
 Trochiscus diarnaglossus 343. B  
 Trochiscus ad scabiem 343. B  
 Trochiscus diacastoreus 343. B  
 Trochiscus ad capitis dolorem 343. B  
 Trochiscilicinius ad impetigines 344. C  
 Trochiscus ischiadicorum 344. C  
 Trochiscus hydropicorum 344. C  
 Trochiscus Galeni 344. D  
 Trochiscus laxatiuus 344. D  
 Trochiscus diamuseos 344. D  
 Trochiscus nimson 344. D  
 Trochiscus ad tussim 344. D  
 Trochiscus ad uomitum restringendū  
 345. A  
 Trochiscus dysentericorum 345. A  
 Trochiscus hæmoptoicorum 345. A  
 Trochiscus coeliacorum 345. A  
 Trochiscus ad pleureticos 345. A  
 Trochiscus diapeganum 345. B  
 Trochiscus asmaticorum 345. B  
 Trochiscus suspiriosorum 345. B  
 Tryphon medicus 25. A  
 Tubera infrigidant in cibis 278. D  
 Turdi inter teneriores auiculas nume-  
 rantur 5. A  
 Tussicularia medicamenta 63 B  
 Tussicæ origo, & remedia 53. A  
 Tussis remedia 324. C  
 Tympanites species hydropis 88. C  
 Tymis nascantur in ueretro 328. D  
 typhloteros 35. A  
 typici morbi 3. A

## V

**V** Arietas temporum inopinata in-  
 sidiosa est saluti 57. A  
 Vber euchimum est 271. B

Vectatio repleto uentre molesta 284. D  
 Vena capitalis 288. C  
 Venæ quales in singulis passionibus se-  
 cantur 288. C  
 Venæ tres in brachio 288. C  
 Venter facilis ad officium maxime pro-  
 dest 247. B  
 Ventrem educentia in cibis 276. D  
 Venter constrictus quomodo soluiatur  
 247. B  
 Venus obest è dentibus laborantibus  
 45. D  
 Venus melancholicis obest 286. C  
 Venus obest ei quæ lactat 244. C  
 Venus parua Epilepsia est dicta 22. D  
 Venus neruus uexat 84. D  
 Veneris incōmoda, & quando ea uten-  
 dum sit 251. A  
 Veneris tempus quod 286. C  
 Veneri quæ natura sit commodissima  
 286. C  
 Venerē prouocantia, & generantia mul-  
 tum semen 261. A & 286. C  
 Venerē excitantia & phibētia 329. A B  
 Venerē actus iuuamina 286. C  
 Venenorū antidota 335. A & B  
 Vermes in auribus si fuerint generati  
 315. A  
 Veretri ulcera si sint 328. C  
 Veretrum si tumens fuerit 328. D  
 Veruecum carnes quales 272. C  
 Veris dieta 249. A.  
 Veseuinæ balneæ 41. B  
 Vesicæ passiones quæ 131. B  
 Vesparum morsus curatio 337. A  
 Vincula non semper probanda quibus  
 furiosi coërentur 30. D  
 Vinum aquatum quid profit 274. D  
 & 279. A  
 Vinū dolētibus caput nocens est 301. A  
 Vinum dulce ad spura mouenda utile  
 Vinum hypausteron 77. A (275. B

Vinum nigrum in stomacho facile ace-  
 scit 274. C  
 Vinum protropum 50. D  
 Vini cortex 61. B  
 Vini natura 250. D  
 Vlcus si fuerit in arteria 323. B  
 Ulcera oculorū quomō curent 308. D  
 Ulcera si fuerint in ore facta 320. D &  
 334. D  
 Ulcera testiculorum si ex sudore fiant  
 328. D  
 Ulceroꝝ cauroꝝ remedia 308. D  
 Vinolentia obest laborantibus è denti-  
 bus 45. D  
 Umbilicus si infantibus pmineat 332. D  
 Vncia 264. D  
 Vociferationes 285. B  
 Vocis si fuerit amputatio 49. A 323. B  
 Volatilia quæ optima 271. B  
 Vomentium frequēter remedia 327. A  
 Vomica mouendæ ratio 292. C & D  
 Vomitus prohibentia 291. B  
 Vria 132. C  
 Vrina alba, rufa, quid significet 284. D  
 Vrinam non continentes 329. B  
 Vrinam mouentia quæ sint 258. C  
 Vrialia catapotia 122. D  
 Vstus à sole 316. D  
 Vualupina 51. A  
 Vua canina stipticū frigus habet 279. A  
 Vux remedia 321. B  
 Vulnere quando tumescant 62. D  
 Vulnerū quæ sint purgatiua 259. B  
 X  
 Xenophon medicus 65. A  
 Y  
 Y <sup>δασίδας</sup> 131. B  
 Y <sup>δασίδας</sup> 87. B  
 Y <sup>δασίδας</sup> quid dicantur 26. C  
 Y <sup>δασίδας</sup> 55. A  
 Z  
 Zopiriū 69. A



# CAELII AVRELI-

ANI SICCENSIS IN V LI

BROS CHRONION PRAE=

FATIO.



**P**RÆSCRIPTIS celerum passionū librīs, tardarum placet curationes ordinare, quæ solo suprapositionis tempore superioribus similes, in lenimento uero uaria recorporatione formantur, & peritis medicinae claram æternamque gloriam quærunt. Celeres enim, uel acutæ passionēs etiā sponte soluantur, & nunc fortuna, nunc natura fauente. Quo fit ut ignari homines elati sæpe medicos fugiant, cum hos prouetus incantationibus nouis ac ligamētis adscribant, aut fortunæ, cum quoties repentino nuntio læti aut territi ægrotantes, mutatione quadã corporis morbos excludunt, uel ea per intemperantiã gerunt, quæ ratione occulta sibi profutura nescientes, duce desperatione committunt: In utrunque enim faciles celeres passionēs accipimus; Pelluntur enim aut fluore sudoris, aut sanguinis per nares, aut uentris. Chroniæ autē uel tardæ passionis morbi, qui iam præiudicio quodam corpora possederint, solius medici peritiã poscunt, cum neque natura, neque fortuna soluantur. Podagrã denique, uel phthisin, aut elephantiasin, uel similes tarditate passionēs resolui nulli sectarū principes meminerunt, sicut sæpe febres acutæ soluantur. Hinc denique Græci ASCLEPIVM nomen sumpsisse dixerūt, quod durā curando primus superauerit uitia. Scribentium igitur medicinam nullus ante Themisonem tardarum passionū curationes principaliter ordinauit. Alij uero has omnino tacuerunt, tanquam impossibiles iudicantes, uel incurabiliū passionum: Alij Alyptarum officio transmittendas crediderūt: Alij disperse atque de alijs passionibus scribentes, ut podagra, sanguinis fluore, hydropismo, paralyti, alopecia, uel quartanis typis, ut Erasistratus & Asclepiades. Themison autem tardarum passionum III libros scripsit.

Item Theſſalus secundo libro Regulari earū curationem ordinauit. Dehinc Soranus plenissime cunctarum diligentiam tradidit, atque speciale corpus scripturæ formauit, de passione capitis initia sumēs, quod nos quoque faciendum assumimus.

*Asclepius unde nomen inuenit.*

*Themison.*

*Alyptæ.*

*Erasistratus.*

*Asclepiades.*

*Theſſalus.*

*Soranus.*

A

C A E L I I

# CAELII AVRELI-

ANI SICCENSIS CHRONION

LIBER PRIMVS.

CVI HAEC INSUNT.

- I De capitis passione, quam Graeci cephalæan uocant.
- II De scotomaticis.
- III De incubone.
- IIII De epilepsia.
- V De furore siue infania, quam Graeci manian uocant.
- VI De melancholia.

DE CAPITIS PASSIONE, QVAM GRAECI CEPHALÆAN NOMINANT.

CAPVT I.

κεφαλή.



ſcæmine obno  
xiæ cephalææ.

Πικρὸνικ.

Κρίταρος.

PARTÈ CORPORIS QVÆ PATITUR PASSIO NOMEN ACCEPIT: Nam cephalen Graeci caput uocauerunt. Generatur autè ſapius perfrictione aut frigiditate, aut è contrario ſolis exuſtione, aut continuatione uigiliarum: ſed uehementius ſcæminas tenet ob diligentiam capillorũ. Sequitur in paſſione conſtitutos dolor uehemẽs capitis totius, aut dimidij, quem conſueto nomine hemicraniam uocant, uel certe temporũ, quẽ dolorẽ crotaphon appellant. Occupat etiam oculorum radices, & occipitium atq; colla, tendens uſq; ad ſpinæ partes, ut cum ſe-

D

dere ægrotantes uoluerint uertigine adſciantur, atq; oculorũ caligine cum nauſa & fellis uomitu. Ac ſi paſſio uehemẽter cœperit, rubri atq; prominentes oculi ſiunt, deſectis & conſuſis palpebris euitantes lumen, cum lachrimarum fluore, cibi etiam iugi faſtidio, & obtuſione uiſus, aurium tinnitu, & difficili auditu. Sequentur etiam uigiliæ iuges, aut frequentes, dentiũ dolor, & acceſſionis initio ſanguinis è naribus paruiffimus guttarum fluor, nihil releuans. Erit igitur locandus ægrotans, ſi totum caput doluerit, ſupinus; Si autem ex parte, ea parte quæ patitur: mitigatur enim quodam blandimento ſtraminum pars in dolore conſtituta. Peiorante paſſione ſequitur uultus deprauatio, pulſus obſcuritas, & omnes ſenſus obtuſione afficiuntur. Hac paſſione alij celeriter atq; cum febribus; quem dolorem proprio nomine ſectarũ principes capitis uocauerunt. Alij tarde atq; ſine febribus per interualla temporum admoniti ſolo dolore capitis oppreſſi, quam paſſionem ueteres cephalæan uocauerunt. Pati autem aliqui membranam cerebri dixerunt, alij eam quæ teſtam circuntegit, alij omnem cutem capitis, alij temporũ atq; buccarum muſculos, quos ſiagonas appellant. Nos uero aliquando iſtorũ aliqua, ſecundum quod ſe ſenſus doloris extendit: aliquando omnia, ſecundum quod fomenta uel acceſſiones paſſionũ ordinate ſengerunt: ſimiliter etiam ſicut diſmiſſiones atque delinimenta conuariant, &

κεφαλαία.

πικρὸν.

**A** nunc longioras & puras, nunc angustas & sordidas accidentium malorum reli-  
 quias in accessionem reliquerint. Item secundum superpositionē tempore acces-  
 sionis. Item secundum quod nunc diurnas, nunc intercapedinas, interpositis  
 diebus uno uel duobus, sicut quos typicos, aut periodicos appellamus, aut he-  
 mitraiticos, pro responsione temporum habuerint variantes. Igitur de dolore ca-  
 pitis in acutis febribus accidenti prius de febribus memorauimus: De illo ue-  
 ro qui sine febribus, atq; tardus, & suæ passionis est, nunc dicemus. Cum itaq;  
 adhuc paruus fuerit sensus, oportet ægrotantē iacere loco mediocriter frigido,  
 atq; obscuro, paulo leuatius capite collocato, adhibito silentio, atq; corporis &  
 animi requie, cum abstinentia cibi usq; ad primam diatrium. Adhibenda etiā  
 articularū leuis fricatio, cum capitis fomento ex oleo frigido atq; uiridi, uel suc-  
 co quolibet admixto, qui sine percussu ualeat astringere, ut polygoni, arno-  
 glossæ herbarum, aut intybi, aut portulacæ, aut rubi, quem Græci batum appel-  
 lant, aut anulorum uitis, quos helicas uocant, uel uuæ lupinæ, aut anagallidis,  
 uel fideritis herbæ, aut muræ. Hinc etiā cataplasmata adhibenda ex horum sin-  
 gulis, aut admixta pulenta, uel compositum ex multis eius uirtutis medicamen-  
 fronti apponendum, ut est diatheon: Si uero uehementior fuerit dolor, erit lo-  
 candus ægrotans loco amplo, atq; calido mediocriter, & neq; plurimum lucido,  
 ne nimius splendor officiat: Apponendæ etiā lanæ lenes, ac tenues, & limpidx  
 ipsædem partibus, cum iugi fomæ ex oleo dulci atq; calido. Ac si coegerit dolor  
 ptygmata erunt uicissim lanæ æque mollia apponēda, ex oleo calido expressa tē-  
 poribus sub buccarū musculis immota. Tunc etiā uesicæ semiplenæ ex oleo ca-  
 lido, uel facelli ex pollinibus calidis cōfecti, manu etiā calida, atq; digitis mol-  
 li tactu loca dolentia contingenda, cum omni silentio ac requie ægrotantis. Si  
 autem dolor ad dentes tetenderit, mullum calidum uel oleum damus, quod in  
 ore sine ullo motu contineat: nisi quis hoc horrefcens in nauseam fuerit prouo-  
 catus. At si uehementius dolor conualuerit, & maiora exegerit, diu etiā per-  
 mittentibus uiribus in ipsa diatriu, uel ante ipsam sanguis erit detrahendus,  
 phlebotomia scilicet: sed totum caput dolentibus, ex eo brachio quod facilius  
 fuerit detractio facienda. Ac si altera pars capitis doluerit, ex eius contraria de-  
 tractionem faciemus, quo longius adiutorij commotio à parte patientis remota  
 uideatur. Tunc os colluere permittimus, & aquæ calidæ potum damus. In ipsa  
 uero diatriu unctionem adhibemus ex oleo dulci atq; calido. Tunc faciemus  
 foueri faciem ex aqua scilicet calida. Dehinc potum atq; cibum damus, ut est pa-  
 nis aquæ calidæ elutione purgatus, quo difficultate deposita politus fiat. Vel cer-  
 te aliqua similiter fiant, aut cum mullâ mediocriter cocta, aut ex panis pulticula  
 confecta, quam torineton Græci uocant, cum paruissimo anetho, aqua, sale, &  
 melle: item oua sorbilis: Quæ quidem cibatio erit altissimis diebus adhibenda do-  
 nec dolores declinent. At si passio durauerit, erit tondendus æger usq; ad cutem.  
 Hinc etiā patientes partes leuantur, cum ex alto reflatio quædam uiarum nu-  
 ditate permittitur, & localibus interea adiutorijs præparantur. Tunc nouacula  
 radendum caput, atq; cataplasmatibus, & leui cucurbita in accessione, sine sca-  
 rificatione autem & dimissione releuandum, ex illis scilicet partibus quæ plus  
 patiuntur, uel fortiore dolore ueuantur. Atq; ita sanguisugæ apponendæ, quas  
 hirudines appellamus, & magis si locorum inæqualitas cucurbitæ non fuerit ca-  
 pax, quo inhærere minime possit. Tunc uaporationes spongiarum ex aqua ca-  
 lida expressarum adhibendæ, uel calida aut oleo, aut decoctione hybisci, quam  
 altean uocant. Ac si uenter non fecerit officium plurimis diebus, tunc calidæ &

Diurnas dixit  
pro cōtinuas.Ταπεινοί.  
Παροδικοί.  
Ημιτρητικοί.

Διατρίτες.

Πολύγρον.

Βατίον.  
Εΰκλι.

Diatheon.

Πτύγματι.

**B**

C oleo rutæ admixto melle erit injiciendus ægrotans: sic enim & intestinorū fatus fiet, & stercoreum detractioe caput releuatur: quorum motu, ac expirationis ascensu amplius grauabatur. Quapropter etiam pridem, si officium uenter non agnouerat, oportuit adhibere clysterem, priusquam cucurbitæ usus accesserit: dehinc cataplasmatum genus nunc laxatiuū conuenit, ut est ex lini & foenigræ ci feminibus, atq; polline ex aqua & oleo admixto melle concocto, uel ex panico diligenter emollito. Declināte passione, cerotarijs atq; malagmatis simplicibus utendum, ut est diachylon. Tunc cibis uarijs dandus, prædictæ simpliciatu uicinus, ut est cerebrum porcinum, uel hoedinum, piscis teneri, turdi, columbarum pulli, uel domesticarum gallinarum: olera quoq; cucurbitæ, malux, betæ, nunc ex aqua cum oleo atq; garo curata, nunc concisa atque trita, & interius condita: magis enim ex hijs facilis uenter efficitur. Quod sæpe etiam sanitis tempore omnibus profuit, quibus unius diei uentris dilatio caput impleuit. Ante cibum præterea erit adhibenda gestatio, portatoria scilicet sella, sine uehementi motu, quo partes uehementer patientes releuētur. Tunc etiam deambulatione utendum, & post perunctionem capiti adhibendus fatus, cum toto corpore supradicto motu laxatū spiramentis facilibus agitātū sit: Etenim densa laxantur, & retenta tenuātur. Dehinc cum declinatio firmiore esse cœperit lauacrū adhibendum. Tunc in alia diatrīto quiddam uini aquati offerendū. Ita cum capitis pausauerit dolor, longo tempore horæ solitarum accessionum erunt euitandæ, atque è memoria eijciendæ: quibusdam etiam temporibus in requie seruemus ægrotos. Declinandum etiam omne quod potest accessionē in commemorationem reducere, ut est adustio, indigestio, uenus, meratus potus, uel plurima masticatio durioris cibi, aut curiose conditi, necnon etiam uapores uehemētes atque ignea lauacra, exclamatio uehemens, iracundiā, uel † uenter nimis adstrictus, & magis post cibum, aut spiritus retentio, & eius ad ilia descensus: sic enim oppressio quædam omne caput extendit, dein tardante passione, & nunc superpositionibus exasperata, nunc lenimentis leuigata. Oportet igitur superpositione temporis animaduersionem habere, hijs deniq; quæ supra scripsimus uti: Etenim quæ mitigant celeres uel acutas passiones, ea tardarum superpositioni non conueniunt. In lenimento uero paulo audacius resumendi sunt ægrotantes, & non, ut nuper, timoris adiuncta cautione tempore quo superpositionis asperitas declinabat. Adhibenda igitur uectatio pro uiribus ægrotātis, fertorio uel sella procurata: ac si purius occurrerit lenimētum, & neq; æger fuerit uiribus præuexatus, tunc hominū manibus, aut animalium actu uehiculum adhibemus, æquali uidelicet motu, sed perfecto atque æquabili, lucido & mediocriter calido loco: Ac si tēperata, & sine flatu aëris fuerit qualitas, tunc etiā sub cœlo erit adhibenda gestatio. Sed necessariō longitudo loci curanda, ne frequenti reuersione uehiculi circulus gressus uertiginem ingerat ægrotanti. Tunc etiam deambulatio adhibenda, sed primo tarda, dehinc medio tempore fortior, atq; paulo erectior extentis cruribus. Hijs uero quibus caput fuerit plurimum releuatum, etiam lectio ante deambulationem erit adhibēda, si studiosi fuerint ægrotantes, sed leuī exercenda uoce, tunc exercitium atq; unctio, quæ æqualiter corpus moueant atq; curent, ut uestitos faciamus currere: nudos uero cum defricatione perungī. Tunc manus suo motu exerere, uel certe luctationem iugem facere, adhibito doctore, cuius præceptis pareat: Adhibitis sanè hijs rebus quæ implere atque commouere caput ualent, ut sunt ea quæ cum obiectione plurima corporis fieri iubentur: necnon etiam circulos ductus, atq; retrogressus cum sal-

μαλακωμεν δεικ  
χλασπ.

D

† uenter ob  
scas abstractus

Lectio quando  
adhibenda.



A tibus. Tunc oralauanda, atque articuli fouendi, uel lauacrum per interualla dierum adhibendum. Deposita autem corporis turbatione erit aqua præpotanda ægrotus. Tunc cibum sumere succi facillioris, id est, mediæ materiæ, quam menses hylen uocant Græci. Dandum etiam uinum tenue paruim. Sed eo tempore quo cibamus adhibenda quoque animi laxatio, quam diachysin uocant: Quæ fiet aut ludicris rebus, aut ioculari facetia, quæ singula artis moderatione adhibita, cyclorum ductu augeri atque minui debent: prædatio initio, cui perfectio consummata respondeat. Est autem resumptiui cycli ordinatio formanda hoc modo: Prima die paruo cibo atque aqua nutritus ægrotans, uel si ferre ualuerit, ab omni nutrimento abstentus, alia die leui motu erit exercendus, atque oleo perungendus: tunc & cibo nutriendus, id est, totam accipiat partem solitæ quantitatis, quam facile percipere atque digerere solebat. Sed panem dabimus limpidum, fermentatum: pulmentum autem oua, uel holerum betas, aut cucurbitas, uel maluas aut lapathos, aut bulbos, uel pisces teneros, ut sunt scari: & auiculas, ut sunt turdi, aselli, iulidæ, ficedulæ: uel cerebrum porcinum aut hœdinum. In hac perseverantes qualitate atque quantitate duobus uel tribus diebus, iuxta uirium possibilitatem, quo neque parua dando debilitentur, neque adiectionibus perturbati opprimantur. Tunc detractæ partis partem tertiam adijcientes, pulmentum damus turdorum, ficedularum, aut ex pullis columbarum uel gallinarum. Tunc rursus post tres uel quatuor dies aliam tertiam partem panis adijciemus, & agrestia dabimus pulmenta, ut leporis, aut capræ: Atque ita æquali numero dierum peracto, ultimam partem panis addemus: pulmentum dabimus porcinum tenerum ex aqua, uel non curiose conditum ex anetho & sale. Præterea simili modo erit etiam uini faciendæ partitio, atque per singulas pulmentorum mutationes adiectio: ac si plus ægrotans bibere quam damus uoluerit, aquam sumat. Simili modo etiam gestatio, atque exercitium, siue motus erit augendus aut minuendus, ad comparationem quantitatis ciborum. Perfecto resumptiuo cyclo erit metasyncriticus adhibendus, primo ex parte, dehinc perfectus. Est enim passio facilis in motu, & natura caput iniurijs aptissimum: siquidem non facile rerum repentinas perferat mutationes. Prima igitur die erit cibo abstinentus ægrotans, tunc alia die parua adhibita gestatione, atque unctione corporis, uel si passio permiserit, lauacro. Rursus panis dabimus partem solitæ quantitatis, quam ante initium curæ facile accipere atque perferre solebat. Pulmentum dabimus salsum, assum, uel coctum, dabimus etiam cappares sinapi madidatas, atque oliuas ex uiriditate messas, quas colimbadas uocant, præcauentes ea quæ facile caput implent atque grauant, ut est porrum, allium, cepe. Potum dabimus uinum, & si perferre uoluerit æger, in iisdem duobus uel tribus perseverabimus diebus: sin minus, secunda die salsamentis admiscemus cerebrum uel piscem. Tunc sequenti die panis detracti partem tertiam addemus, pulmentum damus, holus, cerebrum, piscem tenerum, hoc tribus uel quatuor seruantes diebus. Tunc rursum aliam tertiam partem panis addentes, transimus ex mediæ qualitatis materia ad uolantum qualitatem, atque in eadem simili dierum numero perseverantes, ultimam partem panis addemus: pulmentum dabimus porcine carnis. Sed si multas mutationes facere uoluerimus, in quatuor partes medietatem panis diuidimus, ut singulas singulis mutationum pulmentis adijciamus: hoc est, unam mediæ qualitatis materiæ applicantes, aliam uolantum, aliam agrestium, aliam

Μίσην ἰατρ.  
Θουμῶν δισχυσίον.

Prædationem  
cibi abstracti-  
onem uocat.

Λέπην δειφ.

Κόλλας μετὰ κίτρων  
κρίτηδες.

Colimbades.

C porcinae carnis. Sed ne quid odiosum est quantitate multorum dierum fiat agrotanti, hoc est, pulmentorum similis oblatio, erit in communi qualitate specierum diuersitas uarianda, ut quibus diebus salsum damus, Graeci drimyphagian appellant, eiusdem speciei uariemus. Nunc exempli causa dantes pisces, nunc fardam, nunc cordulam: atque ita in usum medicae materiae, quam mesen hylen appellant, nunc turdos, nunc ficedulas, siue quas miliacas uocant, nunc eolumbarum pullos ac gallinarum. Hoc denique etiam in alijs qualitatibus pulmentorum, siue materiarum erit seruandum, ut eiusdem uirtutis pulmenta specierum mutatione uariantur: Erit praeterea pomorum quiddam adiungendum, quod inflare non ualeat. Sed tempore quo porcina utemur erunt etiam olera offerenda: solum seruandum, ne modum quantitatis excedamus, siue qualitatem rerum dataur: Augetur enim oblatio non solum si plurima fuerint diuersarum specierum, sed etiam si plura nutrire uauerint. In omni igitur mutatione, hoc est transitu ex qualitate ad quantitatem, primadie oportet curandum aqua uiuere, adhibita perungione. In alijs uero diebus etiam uinum accipere, & lauacro corpus recurrere: Sed non omnibus necessario diebus: siquidem facile caput iugi lauatione ad passionis uestigia reuocetur. Similiter autem oportet etiam motum corporis augeri atque minui. Tunc isto cyclo perfecto erit alius adhibendus solo ex uomitu, detracta drimyphagia: In quo oportet prima die paruo cibo, & aquae potu agrotantem reseruare: Tunc alia die leui deambulatione motum uomitum exagitari, ex radicibus raphani, uel hijs similibus speciebus, si loci aut temporis causa defecerit copia. Oportet igitur radicis cortices in frusta minui paruissima ad librae pondus, quod excedere fas non est. Tunc infuso mulso, & aceto confecto simpliciter, uel scillino hauriendum, atque medendo dare agrotanti. Sed paulo prius quam cibum libero tempore accipere solet, ut neque supinus adhuc stomachus, hoc est, cibi adpetitu non admonitus, sine ulla commotione reuomat: neque rursus appetentia soliti temporis excitus digestionem incitet accepta. Tunc tenuiter masticans iugiter ex illo mulso ex aceto confecto sorbens tranfluoret, atque cum omnem modum sumperit leui deambulans motu requiescat, donec ructante stomacho est retento spiritu mordicatione quadam, siue feruoris sensu sentiat altiora pulsari. Quod quidem interposita hora occurrere probamus. Tunc aquae tepidae sumens cyathos duos, ne plurimo potu acrimoniae radicis obundet, immixtis digitis uomitum prouocet, atque cum omnia reddiderit accepta, aquam superbibat plurimam, ut & stomachum lauet, & reliquias feruoris extinguat: atque ita prouocato uomitu reiecto potu rursus bibat. Hoc cum tertio aut quarto fecerit, & potum liquore limpido reddiderit, capiti leuis fovea est adhibendus, atque ora aqua calida fouenda. Tunc leui deambulatione mouendus est ob tranquillitatem capitis faciendam, nisi sit soluentis torporis ex nocimento uomitus illati causa perungendus: hoc est, ex superioribus ad inferiora membratim deductis manibus defricandus: Sic enim capitis densitas quae uidebatur illata soluetur, cum inspiratio facilis totum per corpus fuerit effecta. Tunc epotis duobus cyathis aquae calidae lecto recollocandus, & ab omni cibo uel potu abstinentus summa cum requie animi atque corporis. Dehinc laxata capitis strictura solo dimittendus: quoniam prius quam densitas ex adiutorij commotione illata soluta est, in somnum facile deueniunt, non solum suae causa capitis grauationem seruauerunt, sed etiam maiorem fecerunt, cum nullo spacio interiecto somnum adiutorio iungentes

Agrotantia  
T scarum  
librae un.

Anteriorum

Intra librae  
pondus

D

off.

2ni diuor.

videtur de

eff: admonen

duus est.

\*

**A** gentes densitatem corporis iunxerunt. Est igitur, ut dicimus, cibo abstinentus, ne sumpta corrumpat ex corporis remanente torpore post agitationem uomitus atque feruorem: quippe cum sæpe manentibus in stomacho squamulis uel folliculis radicum, requie superaddita, atque cibo nouo commixto, eius necessariò faciunt corruptionem: ex qua consequenter caput impletum, etiamsi sua passione præuexatum non fuerit, necessariò constrictum grauescit, cum ex illa putredine corruptionis exhalationes ascensu quodam caput obsidunt. Sicut enim Themison ait, est natura caput carnis pauperum & neruosum, & duris cunctibus & capillis obiectum, & spiramentis difficilibus natura: tum sensibus quoque uniuersis formatum, insidens corporibus, atque accipiens eorum cunctas exhalationes, cum spiritus naturaliter superna petens ex inferioribus trahit corpora ea per arteriam atque stomachum, quæ sunt corporis ueluti maiora fumaria. Dehinc alia die lauacro utemur, atque pulmento mediæ qualitatis: Tunc post duos uel tres dies cæteras cycli partes adhibemus. Ac si radices loci aut temporis causa defuerint, adfectandus ordine supradicto uomitus ex granis sinapis madidati, uel ex liquido sinapi potio, aut mulso ex aceto & pipere confecto, uel cardamomo, aut erucæ semine, aut decoctione thymi, uel origani, aut hyssopi, aut falfamenti, & multis ossibus, cum aceto, uel mulso ex aceto. Tunc profectu cedente, atque limpido lenimento perspecto, præsumpto etiam ægrotanti in grauem sententia perferre nunc uomitum, nunc drimyphagian, audemus integrum atque perfectum cyclum metasyncriticum adhibere, ut initium à uomitu sumentes, drimyphagian iungamus, ac deinde per cæteras cycli materias decurramus. Ordinantes præterea etiam localia adiutoria, quorum prima sunt adhibenda leuiora, & quæ longe remotis partibus admota transmissa patientibus ingerant curationem, tunc etiam uehementiora. Erit igitur radendum caput, nunc pro capillatura, nunc contra capillaturam, donec cutis rubore adficiatur: Ac deinde in balneo nitri puluere aspergi, & confricari paulo antequam in solium descendat ægrotans. Tunc etiam paroptesis adhibenda erit ex carbonibus æquali uapore medentibus, Alia etiam die cucurbitæ infingendæ plurimæ cum flâma, & primo dorso atque ceruici, uel cæteris neruis, quos tenontas appellant: tunc capiti. Quæ quidem capiti erunt magno raptu detrahendæ: Dehinc dropax adhibendus, primo cruribus, tunc thoraci, & dorso, ex primo ceruicis sphondylo usque ad clunes, uel earum ultimum sphondylum: Plurimi etenim nerui inferiora quæque communi natura complexi isdem paria faciunt superiora. Tunc partium propungentibus pilis capitis, atque buccarum, uel temporum musculis, quos siagonas appellant, collo uel mento cum subiectis gutturis, quæ ante rumam uocant, dropacem apponemus. Sed ne cæteri corporis partes nudæ interea perfrigescant, erunt à duobus ministris mediocriter unctione fricandæ, atque ita cum dropacem detraxerimus, totum perungi corpus oportebit. Ipso quoque capite manu leuiter pertractato, & lauacro dabimus ægrotantem. Hijs itaque adiutorijs relaxatis, atque lentescentibus capitis partibus, uocis quoque exercitium adhibemus, quod Græci anaphonesin uocant. Tunc frequentius sinapismum, ac deinde ptarmicum utile est. Plurimum denique prodest post deambulationem sinapi adhibitum in gargarismum, madidatum prius quam lauacro æger utatur, uel aridum, ac masticatum, ac deinde aqua calida sumpta, & in ore paulisper retenta, uel piper cum melle. Non quidem hæc humoris, siue phlegmatis de-

Pauperum di-  
xit pro carens

Ταριχισια.

Τίνοτες.  
Δρώμας.  
Σφόνδυλος.

Αναφώνησις.  
Συναρισμός.  
Ρταρμικόν.  
Παρρητισμός.

**C** trahendī causa methodus ordinavit, sed ut etiam oris interiora adiutoriorum agitatione capiti beneficium tradant: quippe cum dolor saepe ipsas quoque partes afficit. Ista igitur regula consequenter etiam in betæ nigræ, uel cyclaminis herbæ succo in cochlearis quantitate reclinato capite ægrotantis pollicis finistræ manus impressione inflatis narium cavernis infuso uti possumus: Etenim fit mucilenta humoris excussio, qua ægrotans releuetur, non ob detractionem, ut supra diximus, materiæ, sed quod adiuncta agitationis utilitas capiti beneficium tradat. Est etiam ex localibus adiutorijs usura corporum, ut sunt ea quæ consuevitur ex euphorbio, uel adarce, opobalsamo, aphronitro, murra, uel alijs similibus uirtute rebus. Utendum etiam malagmatibus, quæ ualeant ex alto causas inductione propria detergere, quæ Græci Minythica uocauerunt. Meminerimus tamen non prius esse ab adiutorio locali ad aliud transeundum, prius quàm turbatio corporis fuerit delinita, atque patientes partes aliam recte poscere cōmotionem adiutoriorū fuerint uisæ. Quapropter si plurimum uexata corpora uiderimus, sufficere intelligimus uno in cyclo unum locale adiutorium. In hijs uero quæ minus uexata noscuntur, uel uiribus depurgata etiam secundo uti licet. Singula igitur adiutoria adhibēda esse meminerimus sequenti die, quàm mutatio facta fuerit materialium, hoc est, qualitates pulmentorum in aliam transitus qualitatem, ut ex antecedenti abstinentia ductile atq; aptum corpus adiutorijs fiat. Specialiter autem erit dropax adhibendus tempore quo mediæ qualitatis utimur materia. Paroptesis uero & sinapismus, & ptarmicum, quod sternutamentum dicere poterimus, tempore quo uolantum utimur pulmentis: Etenim neque adhuc corpus post usum salamenti debile, neque rursum plurimum nutritibili qualitate uidetur esse confertum. Cauenda etenim uehementer est capitis commotio, quæ saepe corporis plenitudine fit. Quippe cum sanos homines plerunque uinolentia, uel indigestione confusos, capitis motu uexatos in catarrum, atque coryzam uenire uideamus. Solo igitur tempore, quo drimyphagia utemur, omne erit locale adiutorium prohibendum. Vel si quisquam omnī ex parte fuerit uiribus plenus leue quiddam addiderit: Sufficiens quippe cum drimyphagiæ uehementia atque recorporatio altiorum eo tempore totum penè habitum mutare uideatur, & sit timoris ita corpus adiutorijs exercere, ut eodem tempore superficies cum altioribus agitur. Utendum etiam fomentis siue uehementioribus illusionibus aquarum, quas Græci cataclysmos appellant: Et primo calidarum, deinde frigidarum. Ordinandæ etiam mutationes earum ad usum naturalium aquarum, scilicet earum quæ non odore percitant. Natationes uero sub diuo fieri reprobamus: Cæteris enim corporis partibus aqua complexis solum supernatās remanet caput, quod necessariò perfrigescens inæqualitatem corporis facit. Ac si minus cedere passionem uiderimus, post frequentiam eiusdem, iterataq; curatione & fortificato corpore ægrotantis querimonia permanserit, hellebori usus adhibēdus: sed primo ex eius insertatione radicibus penetratis, uel mulso ex aceto confecto infusis. Dehinc etiam coquis respondum est, atque diuersis ciborum pulmentis, quod quidem latius tertio Responsum libro iam dudum docuimus: Vehementi enim motu corpus apertum despuat, ut ita dixerim, passionis carnem, qua depulsa naturalis atq; noua succedit. Dehinc si etiam hijs gestis passio permanens erit, secundo uel tertio utendū helleboro, sed præsumptus uiribus ex corporis refectione. Tunc etiā naturalibus aquis utendū, uel siccis uaporatio-

nibus,

ΒΕΛΕΥΜΑΤΩΝ ΜΙ-  
ΝΥΤΙΚΩΝ

**D**

ΚΑΤΑΡΡΟΥΣ  
ΚΟΡΥΖΩΝ

ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΙΣ

Libri respon-  
sionum Celsij.

**A** nibus, & longa per maria nauigatione: Etenim fluminales uel portuosæ, atque stagni nauigationes incongruæ iudicantur, humectantes caput infrigidant exhalatione terrena: maritimæ uero latenter atque sensim corpus aperiunt, & falsæ proprietatis causa corpus adurunt, atque eius habitum quadam mutatione reficiunt: Affectandus etiam in aëres teneros atque aquilonios transitus, uel contrarios hijs qui passionem asperare ualent. Adhibenda præterea animi laxatio, & magis post cibum: Omnis enim mentis intentio caput implet. Hæc est secundum Methodicos ordinata curatio. Plurimi autem diuersarum sectarum principes fomenta probauerunt ex oleo rosaceo, atque aceto, & ruta, & herpyllo, peucedano, castoreo, sylphio, atque semine herbæ quam agnon appellant, famsuco, hederarum coma: ex quibus in accessione caput impletum augmentis asperimis agitatum atque grauatum totius passionis duplicat modum: Est enim supradictarum materiarum repercussibilis usus, & eo adhibitus tempore, quo mitigatio conuenire perspicitur. Utuntur etiam purgatiuis medicaminibus, quæ catartica uocauerunt, hoc est, uentrem deducentibus, ex quibus stomachus inficitur, & omnis neuositas uitatur. Item arteriotomiam probant, & usuram ex cauterijs ferratis, duorum digitorum spatio super ipsas uenulas effectam. Tunc longo tempore uulnerationis seruata ferri materia purulenta, ex alto atque superficie passionem releuare promittunt: quod nos in accessione noxium atque exitiale iudicamus ob uehementiam motus. In lenimento uero inutile atque adiutoriorum medelæ contrarij, siquidem prohibeat eorum beneficia penetrare: Non enim fricationes uel cucurbitæ, uel dropaces, aut sinapismi, aut ptarmica, aut cataclysmi, quos nos aquarum illisiones appellamus, uulneratis locis adhiberi aut perferri aptissime possunt. Utuntur etiam frigido lauacro, quod Græci psychrolusian appellant, quod necessariò neruos indurat, ac congelare consueuit ob densatione cutis ac totius corporis. Utuntur etiam locali uenarum diuisura, ex qua patientes partes implentur. Dant quoque mastichen mastilandam, ex quo in passione constituta densatus constrictiua uirtutis cassatur \*. Inter Themison primo libro tardarum passionum, quas chronias uocant, phlebotomat atque constrictiuis fomentis utitur ad laxamentum phlebotomiæ, frustratus errore sequenti ex fomentis incongruis. Item imminente augmento duas præcauens horas unctiones adhibet acerrimas, & durissimam fricationem atque constrictionem articulorum, tunc sinapissimum adhibet ultimis membrorum partibus, siue summitibus articulorum, ob auertendam materiam. Plurimas etiam fronti sanguifugas apponit, atque humeris & temporibus capitis, quod est contra sectæ ritum. Affectandam igitur corporis laxationem, non auersionem materiæ eius dicimus: quippe cum non concurrat, neque conueniat quod faciendum putat, ut eodem tempore articulorum constrictione, & sanguifugarum appositione utamur præseruatis horis duabus, antequam passionis implicent augmenta, cum illo tempore sit requies adhibenda, & saepe contingat, ut præueniens corpori occupato querela accessionem denuntians, ipsum quoque tempus quod elegisse uidetur, turbare noscatur: sitque nocens appositio sanguifugarum, ex quibus perfricatio atque commotio, uel ex earum moribus amentia, aut si aliud sanguinem detrahunt grauis ægros uexatio consequitur. Probat etiam apponenda malagmata dolori contraria quæ anodyna uocantur, uel castoreum, aut rutam, aut sphondylion herbam, cum cerotario ex oleo rosaceo atque pice liquida confecto. Ex iisdem iugiter iubet odorem capere ægotantem omnifariam caput implens: atque ita si dolores, inquit, mitigati non fuerint, ex calidis rebus

Maritima nauigatione.

Agricus.

Καταρτιὰ.

† Ferratis  
Αρτηριωσιμ.  
Καυτηριμ.

Ψυχρολουσιμ.

Themison.

Σταδύριμα. αὐτὸ  
δυσκον.

frigida

frigida spongiæ apponenda, ad empiricorū consilia deuolutus, qui ex contrariis ad contraria transeundum causis resistentibus probauerunt. Vitur etiam scario-  
 C ticus, hoc est, quæ cutem extendere uel corrumpere ualeant, & cessante accessi-  
 one imperat fricationē adhiberi atq; fomenta, quorū item usus non declinantis  
 est accessio nis, sed in toto recedentis. Deniq; peccatis indulgendū methodicorū  
 priniceps Soranus dignissime iudicauit: Adhuc enim, inquit Themison, Ascle-  
 piadis erroribus & rudimento temporis methodici falsebantur.

DE SCOTOMATICIS. CAP: II.



Scotomatica passio ab accidenti nomen sumpsit, quod repenti-  
 nas oculis ingerat tenebras. Afficit frequēter uacuos homines,  
 hoc est, sine aliquo exercitio uitā ducētes, & uiolentos, uel cō-  
 suetos uentrem purgare medicaminibus potis, & ab eorū usu  
 repente desistentes. Itē hæmorrhoidis longo tempore affectos,  
 & post earum amputationē nulla re incorporatione curatos. Ve-

hementescit autem hæc passio hyeme, uel uerni temporis initio: præterea sæpe su-  
 turam denuntiat epilepsiam. Veteres deniq; paruā epilepsiam uocauerūt: Nam  
 in passione constitutos repentina uisus tenebratio atq; nebula cum capitis uerti-  
 gine consequitur, ut omnia secum moueri existiment. Item ante oculos quos-  
 dam sentiunt marmorum maculis similes tractus, quos marmarygas Græci uo-  
 cauerunt, cum tamen conuersis oculis omni ex parte non deserant uisum. Item  
 capitis atq; oculorū grauatio, & sedere uolentibus timor: siquidem secū omnia  
 putent impelli, uel cadere: aurium tinnitus, superiorum corporis sudor, aut re-  
 pentinus casus cum celerissima surrectione. Asperatur præterea passio si ex alto  
 aspexerint ægrotantes uel meatum fluminis, aut rotæ uertiginē, siue ignis. Item  
 si proni quicquam gesserint, uel maiorem uocem auribus acceperint. Discerni-  
 tur ab epilepsia hæc passio, siquidem neq; sensibus priuat ægrotantes, neq; spas-  
 mo, id est diuerso raptu adficit. Item à capitis passione, quam cephalæan uo-  
 cant discernitur, quod dolorem non faciat. Separare autem ab ista passione uer-  
 tiginem, siue obscuritatem necessarium non est: Si quidem ex hijs ueluti parti-  
 bus scotomatica passio cōsecta esse uideatur. Est deniq; istius passionis affectio  
 salutis innocua, hoc est, sine ullo periculo, nisi quis maretenus, aut ex alto cadēs,  
 ratione casus potius quàm passionis uolentia perire uideatur. Curationem ue-  
 ro eandem adhiberi cōuenit, quæ nuper passioni capitis est ordinata, non solum  
 generali, sed etiam speciali ratione.

DE INCYBONE. CAP: III.



Incubonem aliqui ab hominis forma uel similitudine nomen  
 ducere dixerunt, aliqui à phantasia qua patientes afficiuntur: si-  
 quidem ueluti ascendere atq; insidere suo pectori sentiant quic-  
 quā. Themison uero in epistolarū libro pnigaliona uocauit,  
 siquidem præfocet ægrotantes. Item quidam ueteres ephialten  
 uocauerunt, alij epibolen, quod utilis patientibus perhibeatur:  
 afficit crapula uel indigestione iugū uexatos. Accidēs igitur semel ita ut nullam  
 uigilantibus querelam aut displicentē sanitatem faciat, sed solius somni turba-  
 tio noscatur, minime passio dici potest, sicut neq; semel effectus per somnū semi-  
 nis lapsus, quē Græci onirogon appellāt, passio nuncupat, nisi iugiter, atq; cū  
 corporis incommoditate fuerit effectus. Est autem supradicta passio epilepsia ten-  
 tatio; Nam quod neq; deus, neq; semideus, neq; Cupido sit, libris causarū quos  
 ætiologu

- A** etiologumenos Soranus appellauit, plenissime explicauit. Ista igitur passione Αιτιολογημένος possessio sequitur corporis tardissimus motus atq; torpor, & magis per somnium libri Sorani. grauedo atque pressura, & ueluti praefocatio qua sibi quenquam irruisse repente existiment, qui sensibus oppressis corpus exanimet, neq; clamare permittat. Quo fit ut saepe erumpentes non articulata, sed confusa uoce exclament. Quidam deniq; ita inanibus adficiuntur uisis, ut & se uidere credant irruentem sibi, & usum turpissimae libidinis persuadentem: cuius si digitos apprehendere nixi fuerint fugatum existiment. Tunc cum somno surrexerint, faciem atq; transrotationis partes uuidas & humectas sentiunt, attestante grauedine ceruicis, cum tussicula leui molli stimulatione commota. Plurimum autem possessis accidit pallor, & corporis tenuitas, quippe cum somnum timendo non capiant. Apparet igitur stricturae passio ex <sup>†</sup> grauedine, tarda autē ex temporis tractu, & non semper sine periculo salutis: Cum enim uehementer impulerit praefocatio quosdam interficit. Memorat deniq; Silimachus Hippocratis sectator, contagione quadam plurimos ex ista passione ueluti lue apud urbem Romam cōfectos. Quapropter curandos oportet iacere loco lucido atq; mediocriter calido, adhibita reuocae animi, & corporis abstinentia, usq; ad tertium diem, quem Graeci diastron uocauerunt. Tunc colla tegēda atq; caput, & stomacho lanis limpīdis ex oleo calido praecincto, adhibenda etiam oris collutio ex potu aquae calidae. Ac si plurima stomachi, uel capitis, uel colli fuerit querela, adhibenda phlebotomia, & post detractionem perunctio ex oleo calido. Tunc ora fouenda, cibus dandus simplex, succi facilioris, paruus, forbilis: & si passio perseuerauerit cataplasmata adhibēda: cucurbita quoq; nunc simplex, nunc adiūcta scarificatione ex utraq; parte gutturis, quam Graeci antheroeona uocant, nos rumam. Tunc uaporatio- Ανερίων. ne utendum, & alternis diebus cibus dandus. Illa uero adiutoria quae adhiben- Ruma. da diurnis erunt diebus, adhibēda, sed longe remotius à nocturno tempore. Tunc etiam gestatio atq; uarius cibus, & lauacrum, & aquatum uinum. Illis uero partibus quas curamus erunt primo cerotaria apponenda: tunc malagmata, ut diachilon, aut diamelilotum, aut diasamsucum. Fricatio etiam capitis, & densi pe- Diurnis dixit pro continuis ut supra capimur primo. ctinis capillorum decursio, suspiciones etiam siue metus imminentium somniorum auertendi procul fabularum lenitate robore adiecto. Pleriq; enim sibi fingentes uel formantes futura, uoluntarios penē causarum motus efficiunt: ac si passio tardauerit leuioribus admonita monitis, conuenit etiam radicum uomitibus atq; drimiphagia: capitis quoq; detonsio, ac corpori usus acriorum. Item dropax, sic enim aut ex supradictis adiutorijs ægritudo soluetur, aut si peiorauerit epilepsia necessarid sequetur.

## DE EPILEPSIA. CAP: IIII.



**I**pilepsia uocabulum sumpsit, quod sensum atq; mentē pariter πειληψία. apprehendat. Appellatur etiā puerilis passio, si quidem in ipsis Morbis sacer abūdet ætatibus: & sacra, siue quod diuinitus putetur immissa, siue quod sacram contamine animam, siue quod in capite fiat, quod multorum philosophorum iudicio sacrum atq; templū est partem animae in corpore natae: siue ob magnitudinē passionis: maiora enim uulgo sacra uocauit: sacrum dictū mare, sacra domus, uelut tragicus poeta sacra nocte, hoc est magna: Fit plerūq; uel nascitur ex uinolentia, aut indigestione, aut cōfusione: uel ut Aesclepiades, percussu atq; diuisura membrorum quae cerebrū tegūt, aut nimio timore. Sed eius passionis species duae esse probantur: una Sacra magna dicta sunt. quae

C

quæ somno similis altissimo uideatur: alia diuerso raptu corpus afficiat. Quarã prima grauior iudicatur, siquidem sit similis apoplexiæ: quarum quidem com- mixtio tertiam facere speciem potest, Pleriq; enim raptu atq; contractu corporis adfecti uel adprehensi secundo in altissimum soporem deueniunt. Sed horum differentia generaliter inuultis curationi inuenitur. Pronos autem seu decliues, aut uenturos in ipsam passionẽ sequuntur communia accidentia etiã cæterarum passionũ quæ ex membrana cerebri oriuntur, ut grauedo atq; uertigo capitis, & interior sonitus, consensus etiam occipiti, oculorum intentio, aurium tinnitus, aut difficilis auditus, & cum uertigine uisus obtusio, uel quædã præ oculis qua- si propendentia, macularũ marmoris similia, quæ Græci amarygmata, siue mar- marygas uocant, uel araneorũ cassibus, aut nubibus tenuissimis similia, aut par- uulis uolantum animalibus, ut sunt culices. Item uelut scintillarum micæ, aut circulos igneos circumferri præ oculis sentiunt ægrotantes: Linguam quoq; in- flexibilem cum saltu musculorum, & dolorem a tergo inter scapulas. Sequitur etiam gutturis durities, atq; præcordiorum iugis inflatio cum oscitatione, stertu- tamento, & saliuarum fluore, & cibi fastidio, aut immodico appetitu, uigilia iu- ges, aut plurimus & inanis somnus, insomniã turbata, & ciborum difficilis ege- stio, uel nulla, & manifesta causa ueretri tentigo, & frequens Veneris delecta- tio. Aliquãdo etiam per somnum seminis lapsus, quem Græci onirogonon uo- cauerunt; mens suspensa cum anxietate, & nullis ex maioribus causis facilis ira- cundia, atq; paulo ante gestorum obliuio, & eorum quæ caliginem facere ua- lent facilis sensus, obtinẽte passione occupato corpore, sensu priuatio accessio- ne dominante. Sequitur & quibusdam immobilitas perfecta cum ore demisso, atq; estante pallore cum aspiratione tarda & pulsus magno, atq; alti soporis simili oppressione.

D

Alios uero raptos diuersa diductio, atq; saltus, & uultus contor- tio, uel oculorum sequetur: quæ sæpe perseuerans etiam post accessionẽ strabos fingit ægrotantes, atque contrariõ quibus tarda fuerit correctio naturalis uisus simulat æquitatem. Sequitur etiam gutturis stridor, & singultus cum rubore uultus, & uenarũ inflatione, & aliquando pulsus atq; spirationis cessatio, tunc per interualla resumptio, palpebrarum quoq; suspensa positio, & illisio dentium atq; stridor, & linguæ prolapsio, quæ sæpe quassatione, sæpe incisura uexatur. Sequitur etiam præcordiorum ad superiora raptus, uel stercoreum & urinæ inuo- luntaria emissio, sudor roscidus rigenti corpore. Aliquibus etiam confusa uocis emissio, & ante dimissionem per os atq; nares spumarũ fluor, accessione cessan- te omnium gestorum ignorantia, atq; corporis dimissa uolucatio, cum incessitia uul- tus ægrotantis. Sequitur tunc oscitatio & distentio corporis ueluti uoluntaria, & insolitus uisus. Piger motus & totius corporis marcor: oculorum etiam per- manens turbatio, atque uenarum frontis extantia. Aliquibus etiam mentis alie- natio, & nulla notoriũ agnitio. Alio autem tempore plurima ex antecedentibus consequentur quæ supra memorauimus: hoc est, tenebratio uel caligo, cum proni quicquam gesserint ægrotantes, aut nauem, aut rotam figuli celeri motu ferri conspexerint: aut aquam fluentem, uel altitudinem, aut rupem uiderint, aut strepitum uel clamorẽ audierint, aut uehementer reflexerint, uel igneis lauacris uisi fuerint, aut odoribus nimium bonis uel malis adfecti, ut storacis incensi, aut thuris, aut bdellij, aut gagaris lapidis, uel bituminis, aut ceruini cornu. Præ- rea accessionum motus nunc ordinatos, nunc inordinatos ægrotantes accipiunt: & nunc interuallis longioribus, ut mensium duodecim, nunc angustioribus plu- rimũ uel parum, ut eodem mense uel die frequenter agitentur. Noctibus quidẽ

Amarygmata  
Marmaribus

Onirogonon

inquietati



A inquietati, & quidam antecedentibus signis accessionem fore denuntiant: quidam sine ullo denuntiatio motu, quo fiet ut magis periclitentur: Alij enim prænoscens futura, motibus solitis admoniti, in domibus se continendo tutantur, accessionē præuenientes: quam cum sentiunt propinquare, eligunt locos quibus tuto, ac sine ulla turpitudine iacentur. Alij uero istorum ignari publicis in locis cadendo fœdantur. Adiunctis etiam externis periculis, quæ passio nis non esse uideantur, loci causa præcipites dati aut in flumina uel mare, cadentes aut in balneis uentris solutione coacti. Signa autem sunt post lenimentum futuræ rursus accessionis, ex quibus affici in passione uenturos memorauimus, somnus turbatus, uel cibi corruptio sine ulla manifesta causa. Item ueretri sine ratione tentigo, & Veneris appetentia, uel seminis per somnum iactus, quæ onirogonon Græci uocant: iracundia, mœstitudo, & cætera quæ nuper posuimus. Item segnities cum pigro motu in officia solita, & grauius cum quodam somnifico mœrore uultus, decolor atq; maior inflatio, oculorum quoq; ueluti deprauiatio, cum defecto quodam uisu: Nam suspicere difficile est ægrotati, hoc est aërem supernum attendere. Quod si tentauerint, facile rursus abducti uicinas quoque oculorum partes ad inferiora conuertunt. Vel si repentino motu caput in alteram conuerterint partem, uertiginem sentient cum tremore atq; dolore, cum digitorum contractu uel dolore, aut crurum grauedine, & summitate manuum uel pedum. Ex quibus multis uel cunctis interrogatione acceptis passionē dicere poterimus, nisi præsentibus in accessione facilius nobis cognitio fuerit declarata, uel ætatis, aut aliquolibet causa æger sua narrare non potuerit accidentia, quæ supradicta ratione apprehendere poterimus, & accessionem futuram prænosceret: conijciantes etiam temporum responsionē, quamquam summam accessionum ordo saepe seruetur. Communiter autem hæc passio frequens est in pueris, & magis tempore quo dentium natiuitates habentur. Accidit etiā primæ uis, atq; medijs ætatibus: sensibus uero difficile: nam uehementius afficit proximis natiuitati infantes, quam pueros, aut uergenti ætate atque seniores: siquidem uiribus inualidi passionū impetum tolerare non possint. Solet denique hæc passio pubertatis tempore, siue nouæ purgationis in fœminis, aut primi partus quadam naturali nouitate facile detergeri corporis mutatione suffecta. Quod si minime uenerit, plerumque patienti consenescit, nisi aut longo tempore natura pugnante, aut medicinæ diligentia fuerit superata. Irruit autem omnitem pore corporibus, sed magis uerno. Frequenter simile pati epilepticis, & à matrice præfocata mulieri inueniuntur: siquidem non aliter sensibus priuantur, sed discernuntur quod in ultima accessionis parte per os atque nares spumarum fluore afficiantur. Hæc est passionis cuncta specialis significatio. Curationis autem adhibendæ causa erit necessariò adhibendum genus, quod sit passio stricturæ, atque uehemens, & difficulter frequentans, tarda, superpositionibus atque lenimentis uariata. Cuius quidem superpositiones nunc plurimis temporibus accessionis generalia superpositionis occurrerunt. Sed quæ forte superpositiones plurimis ex accessionibus fuerint confecta, nunc quotidianas, nunc tertianas, nunc hemitriticos faciunt typos. Difficile est enim hanc passionem in continuationem uenire: siquidem præuentu mortis interueniente minime continuatio intelligi possit, & sit impossibile, iugibus diebus aut sensibus priuatū, aut motu carentē, aut diuerso raptu affectum in uita manere. Item lenimentorum aliqua pura ac limpida, aliqua turbata concurrunt: & aliqua laetiora, aliqua angusta, aliqua horum mediocria. Patitur enim cõmuniter omnis

† MANUUM

Epilepsia quo discernatur à scotomatica passione.

C neruofitas, sed principaliter caput, sicut ex antecedentibus conſicere poterimus, & ex hijs quæ post acceſſionē remanere uidentur. Curandum autem oportet pri- mo cū tenebricoſitate uel uertigine uexatur, ſacere loco lucido atq; mediocriter calido, altioribus ſtramentis capite ſubleuato: Et ſi raptus fuerit conſecutus, di- gitis erunt palpebræ differendæ, atque iugiter ab omni motu ſeruandus ob ſpā- mi paſſionē: Iubendum etiam miniſtris manibus calidis nunc caput atq; frontē cum blanda fricatione, nunc collum atq; gutturis partē, quam anthereona uo- cant, contingere. Alijs etiam manuum ſummitatē atq; pedum tenere iubemus. Præterea frigefcentia corporis uaporari, corrigi etiā ea quæ forti raptu torquen- tur. Ac ſi minime conſenſerint, erunt in eodem ſchemate ſeruanda, ne ulterius torquantur. Tunc quodam laxamento captato corrigēda, ne nimio occurren- tia certamine ſuperare cupientes, neruorum quaſſationes faciamus. Linguam quoq; relocare curabimus, atq; mentum corrigere, uel coaquare. Tunc calidis pannis thoracem uaporare, atq; inter ſcapulas, quod Græci metaphrenon uo- cant: Laxatis enim diaphragmatis partibus, quod nos thoracis atq; uentris di- ſcrimen dixerimus: laxato etiam hypodymate, ſiue membrana quæ latera ex in- terioribus contegit, ſine ullo periculo poterit collectus ſpiritus exhalari. Appo- nenda etiā ueſica oleo calido ſemiplena pubetenus, atq; ueſicæ partibus, ut ipſæ quoq; mitigatæ cōquieſcant: Ac ſi dentes conciderint, ut præſocationis excitent meatum, immiſſione digitorum ſiniſtram compaginem, quam Græci chaliſion uocant, hiſcentes dimitemus, ne ſpumarum emiſſio tardetur. Tunc per inter- ualla ægrotantē inſclamantes excitamus, & eius ora ſpongia ex aqua calida ex- preſſa detergemus, dehinc caput fouemus iugiter. Cum ſtatum ſumpſerit acceſ- ſio, plurimo atq; dulci oleo calido, & lanis mollioribus inuſo omnia cōtegemus; magis autem occipitiū, & maiores neruos, quos tenontas appellant. Tunc gur- turis atq; rumæ partes, quas anthereonas appellant, cum temporibus & bucca- rū muſculis, quos ſiagonas appellant. Sudores etiā ſi fuerint ingruentes raptim detergemus, ne corpora perfrigeſcant. Tunc collectum humorem detrahimus appoſitione digiti, aut lanæ, aut ſpongiæ melotæ inuolutæ: perſeuerans enim longioris temporis facit acceſſionem. Ac ſi minime reſumentem uiderimus, erunt incurbitæ leues apponendæ, quas Græci ſicyas appellant, ſtomacho atq; thoraci, & interſcapulis atq; præcordijs. Sed ſi inſans ætas fuerit patiētis, erunt maiora prohibenda ob debilitatem uirium. Sed eum nutritæ amiſtū contegens, oleo fouens, concluſu corporis corrigere mediteur. Aut ſi ſpumarum quicquā comparuerit, quod in ore teneatur, muſum tenue deſtillet paulatim, & neq; iu- giter, quo commorationem faciat ſpirandi. Tunc lac offerat diſmiſſione perfe- cta, ſiquidē ſit craſſius, atq; maioris nutrimenti. Dehinc cum forte potuerit poſt acceſſione mammam ſumere, erit melle papilla linienda, quo facilior ſumptio fiat, atq; neruorum laxatio celebretur. Corpus quoq; neceſſariō nutriatur: tenu- atur præterea etiam liquidorum craſſitudo, & uenter mollitur: conſicientes etiā ſingula paſſioni accidentia, quæ ita corrigere debemus, ut à generali regula ni- hil diſſentire uideamur. Tunc etiam curationis diligentiam per nutriticem ægro- tantis præſtare tentabimus, iubentes & à lauacro abſtinendū, atq; ſine uino atq; eſu perſeuerare: Tunc deambulationibus atq; exercitiō leui geſtari, quo hume- ros magis exercent, ut eſt ſpharæ ludus, uel exultationis cuiuſpiā. Item iuben- dum cibum ſumere ſucci facilioris, uel interea muſum. Ac ſi forte ipſam quoq; hac paſſione uexari uiderimus, erit ab officio remouenda. Non aliter etiā ſi qua- libet paſſione affecta malo ſucco atq; corpore habituari uideatur: nam hoc Græ- ci cachexia

Αδύνη

Μετόφρων  
Διόφραγμα  
Χαλιſιον

Χαλιſιον

D

Τύροντι  
Ruma  
Σιαγόνη

Melota

Σικύα

Sphæræ ludus

A ci cachexian uocauerunt. Erunt igitur hijs perfectis alix nutrices exhibendæ, ex quorum sano lacte infans nutriatur. Quomodo autem sanum lac, uel com muniter nutrices bonæ probentur, muliebribus libris, quos Græci gynecion uocant, docebimus. Interea ipse quoq; infans erit à lauacro seruandus. Tunc post tertium diem in domo locandus, & primo oleo calido, tunc oleo & aqua calida fouendus. Vitanda præterea quorum timore infantes afficiuntur, ut sæpe sicæ formidines. In ætatibus uero quæ ferre maiora adiutoria possint, accessione trāsacta erit phlebotomia adhibenda. Aliqui enim medici statim phlebotomandos probant, sicut etiā Thessalus se uelle demonstrat. Aliqui prima diatrīto seruandū existimant, quo speculentur utrum post unam accessiōnem passio soluta recessisse uideatur. Sit præterea non solum inane, uerum etiā noxiū phlebotomiam adhibere: Quippe cum prædicendum probent ex accessiōne secunda, utrum passio augeatur, & hoc phlebotomiæ exigat adiutoriū, & phlebotomatus cibi refectiōe toleretur. Alij uero discernētē aiunt, hoc adiutoriij genus adhibendum, ut qui forte iam consueti passione afficiuntur, referuato ordine leni mentorum, statim accessiōne facta phlebotomentur. Hij autem qui in prima incursiōne passiōem accipiūt, in tertium diem, siue ut Græci uocant, diatrīton differantur, siquidem sit incerta accessiōnis recursiō. Nos uero, ut Soranus docuit, neq; omnes intra diatrīton phlebotomamus, & magis eos qui primo incur su passiōis afficiuntur. Plurimi enim ægrotantes corrupto cibo admonentur, & est præcauendū indigestiōne sauciatos phlebotomare. Neq; rursum omnes in tertium diem probamus referuandos: Cogente enim passiōe, nullo subiecto indigestiōnis obstaculo, erit arripienda phlebotomiæ commoditas, non solum hijs qui iam sæpe admoniti passiōe uideantur, sed etiā in illis qui primo inuasu afficiuntur. Cessante etenim accessiōne inesse passiōem conspiciamus: siquidem generaliter sit maligna, & frequētius tarda quam celer, nisi adiutoriij medicinalibus destructa à corpore depellatur, aut ullo naturæ, aut fortunæ beneficio: nisi tardādo corpus tenuerit, ut solius medicinx diligentia poscat: iudicare enim est incertum, utrū passio post accessiōnem primā inesse corpori, an soluta uideatur: siquidem ex occulta ueniat apprehensiōne causarum, & oportet methodicū sine ulla falsitate regulas intendere curationū. Videmus deniq; phlebotomiæ cōuenire: Nam passionales cœnotetes argui uidebuntur, si utrum passiōi cōueniat fuerit dubitatum. Sed quia sola temporū questio flagitari præcipitur, erit conspiciendum ante secundam passiōem adhiberi posse phlebotomiam: siquidem inītiū uehementiæ atq; magniti udnis causa passio transcendat, ut sæpe contusio corporis, aut fractura, uel ignis ustura: stare autem nec declinare poterit passio: horū enim difficilium morborum propriū est sine ullo destructiūo adiutorio non celeriter temporum nequitia transire, hoc est accessiōnis augmentum. Sed neque propter abstinentiam cibi, quam necesse est post phlebotomiam adhibere, erit hoc adiutorium declinandum, quando corporis uires ferre ualuerint, hoc est, ut & sanguinis detractiōne, & abstinentiæ tolerant. Deniq; etiā alijs passionibus affectos, ut exempli causa, synanchicos sine ulla ratione phlebotomamus. Quare sicut superius diximus, post casum rectos epilepticos cessante accessiōne paruo tempore differimus, quo turbore spiritus, atq; liquidarum materiārum deposita tranquillentur. Erit enim speculandum, ne qua indigestiō siue corruptio cibi subesse uideatur. Quod ita intelligere poterimus, si nauseantem uel ructantem fumosas exhalationes ægrotum uiderimus, attestante mordicatione atq; tormentis, intestinorūq; inflatiōe: quæ si non fuerint, perfecte digestum iudicabi-

Καχέξια.  
Τυραννίσις  
Κελίβιβρι.

Thessalus.

Soranus.

Καινοτήτες  
morborū.

**C** mus: Quippe cum forsitan praecipuo corpore iam dudum futurae accessionis causa aut partum sumperit cibum, aut in totum abstinerit. Sed si, ut supra dictum est, corruptus extiterit cibus, erit phlebotomia in tertium diem differenda, fouendū caput cum ceteris partibus, hijs adhibita collutione cum vini abstinentia. Tunc erunt somno dimittendi, atq; à cibo seruandi usq; ad primum diem. Sed si quicquam corruptionis ex indigestione superare uiderimus, erit per uomitum depurgandum; ac si nulla fuerit corruptionis uel indigestionis suspicio, erit statim adhibenda phlebotomia moderata detractio, ex brachio scilicet, sed cum praecautio defectus, quem Graeci Ipothymian uocant: si quidem facile passionis accessionem imitetur. Tunc post phlebotomiam erit adhibendus potus, atq; oris collutio cum paruissimo potu, & somno abstinentus: Ac si accessio in secundum diem durauerit, praedicto periculo eius propinquis uel ministris, atq; adiutoriorum ex ratione uenientiu exitum incertū, ne nobis quicquam male gestum imputetur, si forsitan uel passionis superatus aegrotans uitam finierit, & intemporaliter nos quiscquam adiutoriu adhibuisse arguat, phlebotomiam adhibemus, tanquam in continuationibus paruam indulgentiam pro dimissione accipientes: Vt si exempli causa parum requieuisse agitatione seposita aegru uiderimus, ut nullo raptu tentetur: Vel contrariò, si forte oppressis sensibus motu caruerit, aliquas partes corporis mouere uideatur, ut palpebras, quae iam dudum motus similitudine possessae fuerant. Dehinc post detractio sanguinis procurata facie, ex spongia calida erit mulsum in os aegrotantis distillandum: tunc secunda die dandi mulsi cyathi duo, uel tres: Tertia uero die ante horam solitam erit perungendus oleo calido atq; dulci, toto corpore sub stramentis. Tunc detectus aqua calida ora foueat, & post aequatū corpus accipiat succum paruum, luculentū, mollem, lenem, calidum, digestibilem, ut est panis, uel alica ex aqua confecta, aut pulicula ex pane, quam torfiniton uocant, ex oleo, aqua, sale, uel melle condita, ex prima diatrilo usq; ad declinationis tempus: quod probare poterimus ex minutione accessionu siue accidentiu. Alternis diebus cibum sumat, ne passione affecta neruositas etiam illatione cibi grauata digestionis officium sustineat, sed magis laxamentū ex abstinentia consequatur. Tunc si uenter non fecerit, uel si suum officium non impleuerit, ob detractioem grauatam quo corpus releuetur, erit iniiciendus calida & oleo per clysterē. Tunc praesentato uentris officio erit tendendus, atq; nouacula omnis capillatura radenda. Ita in alia diatrilo cucurbita occipitio apponenda collo, uertici & temporibus capitis, cum scarificatione, & comunibus cataplasmatibus utendum, quibus omne caput cum neruis maioribus, quos tenontas appellant, contegamus. Tunc buccarum musculos, quos siagonas appellant, atq; omnes inter scapulas partes cum stomacho, usq; ad locū quo discernitur uenter, quem diaphragma uocant, ac deinde praecordia, atq; uesicā simili curatione laxamus: Singula etenim passione raptus uexata accessionis tempore accipimus; ac si aliqua in parte corporis querela extiterit, cucurbita imponenda. Sed neq; coadueruatim, neq; uno tempore omnes erunt partes curandae, sed partiliter, atq; diuerso, ut nunc stomachus, nunc uesica, nunc inter scapulam releuetur, quo necessariò caput relaxatum ad quietem. Tunc spongiae euaporationibus, qui curationē labori sustinuerunt recuramus, atq; ungentes oleo comuni, siue quia iam licitū est cyprino uel irino. Tunc cerotarijs mollibus, ac deinde scarificatis locis inducta apponimus cerotaria. Conuenit etiam enuasim adhibere, de qua Adiutorioru libris docuimus. Dabimus cibū plurimū atq; panosum. Si aliqua in parte capitis graue

Auribus uis.

T. cibo

D

**A** tredo, uel dolor, aut punctio, aut torpor occurrerit, erunt sanguis & circulati  
 apponendæ: quæ si sufficienter fecerint detractionem, adiutoriorum modum da  
 bunt: sin minus, hijs detractis cucurbitas infigemus, ut per earum uulnera detra  
 ctio procuretur. Tunc rursus cataplasmatibus utemur, atq; uaporationibus  
 spongiarum, dehinc cerotario partes contegimus. Profectu accedente dabimus  
 olera non acriora, atq; ita gestationem adhibemus fellarem: etenim uehiculi mo  
 tus rotarum uertiginem caliginemq; facit ægrotanti, quæ passionis imaginē fe  
 rat. Tunc deambulatione mouendus pro temporis aëre, atque loque lucido, &  
 longo ductu, ne iugi conuersione uertiginem sentiat: Dehinc si ferre ualuerit,  
 etiam uocis atq; corporis exercitio utemur, monentes ut neq; spiritum retineat,  
 neq; pronus uel circumflexus, aut saepe conuersus aliquid gerat, sed pingui un  
 ctione defricatus stanti exercitio moueatur. Tunc cum facilitas corporis fuerit  
 accepta lauacrum adhibemus, caput fountes sine ullo percussu manibus sub  
 terpositis: implet enim sensum eius demersio. Tunc etiam in aqua calida, quam  
 pygolithon uocant, deponendi sunt ægrotantes, ne percussu frigoris neurosi  
 tas afficiatur. Post lauacrum uero tparum differentes, quo feruor ex capite re  
 leuetur, dabimus aquam præbendam. Tunc cibum uarium, simplicem, me  
 dia qualitate confectum. Et post primam uel secundam diatriton dabimus qua  
 dam in cibo quæ uinosæ sint qualitatis, ut sunt poma, quo corpus uinum datu  
 ri prætentemus, ut tutò dare possimus: Atq; ita seruandū, ne hijs gestis somnus  
 suspensus, uel concisus, aut adiuncta phantasia sequatur, & infomnia faciat tur  
 bulenta, quod ex relatione patientis discere poterimus. Item si grauedo uel tor  
 por in aliqua parte corporis fuerit, ut dolor, aut punctio, uel saltus, erit in aqua  
 calida perseverandum, atq; illa prohibenda, quæ uinosæ qualitatis danda præce  
 ptimus. Sin uero ex hijs nulla fuerint profecuta, dabimus lauacro remoto medi  
 ocriter uinum lene, parum, ut exempli causa, semunciam uel unciam, medio scilicet  
 cibo, aquatissime temperatum. Tunc in alia diatrito lauacro uinum iungemus:  
 Sed præ cæteris erit animi laxatio procuranda, quo corpus consentiens nullis ob  
 stantibus curis facile sanitatis repetat qualitatem. Ac si resumptio recurrere nihil  
 uirium perficere permiserit, quo etiam carnatum corpus ostendat bono attestante  
 colore, erit consuetudini dimittendus ægrotans. Eadem sanè curatione utendū  
 etiam in hijs qui cum nondum sunt epileptici, eo tamen ferri uideantur. Hoc e  
 nim solum seruabimus, quum signis ad passionem minantibus fuerint absolu  
 ti, eos consuetudini reuocemus: Facilius est enim imminentium auersionē, quam  
 præsentium depulsionem facere. Sin uero passio tardauerit, & propterea pluri  
 mis fuerit accessionibus uariata, erit partienda curatio secundum superpositio  
 nem & lenientur: ita ut superpositionis tempore iisdem utamur adiutorijs, qui  
 bus acutas passiones curari prescripsimus: Neq; enim phlebotomum reprobamus,  
 permittentibus uisibus: siquidem longo interstitio superpositiones occur  
 rere uideantur. In lenimento uero resumendos dicimus ægrotantes, cum recor  
 poratiua curatione dirigēdos iusta cyclorum regula, sicut latius cum de capitis  
 passione diceremus scripsimus. Quapropter ob resumendum corpus adhiben  
 da gestatio, sella uel cathedra, aut deambulatio, aut uocis exercitatio. Itē lectio  
 nem, perunctionē aliptarum præceptis ordinatā, sine ulla capitis inflatione gera  
 mus, ne immo dico labore affectū corpus uexare potius, quam reficere uidea  
 mur. Tunc lauacrum languorum interuallis adhibendū, uarium dandus cibus, pa  
 nis limpīdus, atq; studiose elaboratus. Pulmenis im uero ex mediæ qualitatis ma  
 teria, ut oua, pultes, olera, quæ non sunt acerrimæ uirtutis. Item uolantū leuiora,

Caligo passio  
 nis imaginem  
 fert.

Pygolithon  
 Tatum

credere

**C** & pisciū teneriora: dehinc post resumptiuū cyclum adhibendū recorporatiui, & primo ex parte, tunc perfecti, in quibus esse uomitus ex radicibus debet, uel simili-  
 bus materiarum rebus, ut nuper docuimus; atq; ita drimiphagian, exinde con-  
 tiguas sibi pulmentorū materias ordinamus. Item adiutoria localia, ut exem-  
 pli causa, primo capillos decurramus ex pectione, nunc pro capillatura, nunc  
 contra capillaturam: tunc tonsuram adhibentes, dehinc nouacula caput raden-  
 tes, & cucurbitas alijs atque alijs partibus recorporatiuas imponamus. Tunc  
 tropacis raptum adhibemus, sed longe primo remotis partibus, tunc uicinis,  
 dehinc patientibus: dantes etiam masticandum sinapi, uel piper, aut staphysa-  
 griam. Item sternutamentum ex helleboro uel astrutio, & pipere, & castoreo,  
 uel hijs similibus adhibemus. Nariū quoq; apophlegmatismū adijcientes, atq;  
 fricatione balnearum nitri pulueris, & ceteris sympasmatibus, quæ ruborem fa-  
 cere ualeant, ut sunt ex pyretro, staphysagria, adarce, euphorbio, pipere, calcis  
 gleba, & pumice. Tunc cataplasma ex sinapi, atq; malagmata, quæ detergere  
 & pabulis afficere corpus ualeant. Item acopa acriora, sed quæ tetri odoris non  
 sint, toto corpore illinienda: magis tamen capiti atq; ori, conclusis palpebris:  
 quæ immittenda sunt etiam aurium cauernis. Gargarizandum sinapi, adhiben-  
 da etiam in aquarum illisio, qua patientes partes percussæ mutari cogantur, quod  
 Græci cataclysmū appellant. Hijs deinde perfectis cyclis resumpto corpore hel-  
 leborū adhibemus, sed longe superpositionis seruantes occursum. In omnibus  
 quidē adiutorijs exercitioribus adhibendis, tunc magis in helleboro monemus  
 præcauendū. Deniq; si nullam accessionē denuntiauerint signa, hijs qui ordinē  
 seruato admonentur, ante decem uel duodecim dies, uel generaliter pro longi-  
 tudine lenimenti porrectius erit adiutoriorū regula dirigenda. In hijs uero qui  
 ordinate admonentur, eo tempore adhibenda curatio, quo conijcere possumus  
 medium præteritæ atq; futuræ accessionis. Sic igitur hoc genus diligentia intuen-  
 dum, ut cum æger somnum decusserit, primo requiescat paululum faciens, non  
 solum suspicans indigestionē cibi, uerum etiā donec perfectione quadam pro-  
 pria corporis fuerit facta digestio, ne ex uigilatione sequenti, atque laxamento  
 membrorū, & tenuitate, uel purgatione spiritus iamdidum somno turbati atq;  
 crassi fiant, quo etiam sæpe officia impediri noscuntur, cum nondum totum re-  
 currens occupauerit corpus. Vnde sæpe factum est, ut ex perrectis hijs quæ illico  
 intueatur fallantur, nisi perfricatis oculis intēderint. Neq; clamare uel currere fa-  
 cile possint: siquidem uel quadam somni nunc arteria, hoc est gutturis uia, aspe-  
 retur, & raucos faciat: nunc fatigata corpora densitate neruorū, irruente spiritu  
 crassiore, afficiat percussione uel quassatione similes plagas ingerendo. Has igi-  
 tur ob causas æger plurimo tempore somno deposito tardare debet, præcauens  
 lucis autoritatem, quam mox discussio somno intueri minime potest, ne repenti-  
 nō percutiatur uisus. Item disputationibus uehementibus animū exercere decli-  
 net. Tunc resumptus atq; releuatus somni plenitudine, sub stramētis leni uncti-  
 one tangatur semel, uel secundū corporis singulas partes laxamenti medicinis  
 causa, atq; frigoris cautione leuem & delectabilem gestationē, ut fertoria sella,  
 uel cathedra. Sed prohibenda erit exclamatio, siquidem uehemēter moueat par-  
 tes patientes. Tunc deposito turbore motus, unctio olei fricetur, cōductis &  
 extentis brachijs, flexo atq; extento motu releuans singula crura commoueat,  
 quo fortioribus motibus faciat aptiora. Fouēda etiā ora aqua calida: nunc enim  
 erit lauacrū prohibendum, atq; a post perunctionē cibum accipiat paruum, suc-  
 culentum & leuem, ut oua, pituis piscis teneri, quæq; ex uolantibus parua: ætatis

*Burtoni d. p. 12. 12. 12.*

*Acopa.*

*Hellebori su-  
mendi cautio.*

**D**

**A** atq; formæ, ut ficedula, turdi: declinans omne quod fuerit acrioris uirtutis, siue inflare ualentis, aut carnosa, uel grauis. Quapropter etiã a uino erit abstinentus, uel per interualla ab omni cibo seruãdus: Releuatur enim hoc genere corpus inuinitate reflatu. Sin uero aliqua signa accessionis futuræ apparuerint, ut somnus turbatus, uel cibi corruptio, uel iracundia inanis, ac sineratio, item mœstitudo uel sternutamentũ, aut aurũ tinnitus, uel præ oculis scintillarũ fingibilis uisus, aut inflatio præcordiorũ, & per somnum seminis inuoluntarius iactus, quẽ onirogonon uocant, & horũ similia, non solum ad uitæ regulam transeundũ est, uerum etiã initiũ ex abstinentia sumendũ. Tunc leuis adhibendus motus, atq; perunctio, & cibus, quo corpus salutaribus officijs non deseratur. Vt enim iisdẽ ciborum regulis perseuerare tutũ non est, sic è contrario iugis immobilitas, atq; cibi abstinentia uacuo corpore solitis nutrimentis, uires extinguit futuris temporibus necessarias. Quãsitum etiã utrũ contradicentibus signis accessione fore, an presentẽ siue factam iudicemus. Sed tunc erit accessio iudicanda, quoties ceciderint in ea ægrotantes: quo discere poterimus, quo tempore diatriiti tempus sit numerandũ, ut recte possint curationes suis reddi temporibus: Nam denuntiata signa iam presentia accessionis esse contendit. Nos uero prætangit nerositatẽ, atq; in accessione urgeri recte probamus, ut augmenti indicia tanquã præludere uideantur, ut sunt in hemitritacis febribus frequẽter accessio imminẽte corpora præoccupata, cum noctis anxietate pulsata diei fore asperitatem significent. Ita igitur uel simili ratione præmonitus epilepticus, tanq; si accessione uexaretur, erit usq; ad primã diem abstinentus, & neq; similiter agendus, ut pridie cum fuisset in lenimento purissimo. Quapropter abstentus una die, sequẽtib; leui motu, antecedente unctio, atq; paruo cibo nutriatur, aquã bibat. Tunc si rectius habuerit, ut laudabilior sanitas appareat, augẽda oblatio cibi, alternis scilicet diebus, nunc qualitate, nunc quantitatẽ. Tunc nisi ex omni parte signa supradicta erit rursus abstinentus una die. Sin uero fuerint expulsa uel depugnata, non erit illico reddenda ægrotanti consuetudo, tanquã nihil sit quod sollicitudini remansisse uideatur. Neq; rursus inani suspicione, tanquã iam imminẽtis superpositionis metuentes aduentũ, in tenui uitæ regularitẽ debemus patientẽ: Vt enim oportunitas adhibita abstinentiæ futuras amputat superpositiones, atq; earũ occasiones detrahit, sic importune adhibita corpus uexat, atq; fatigatione affectũ tarde surgere facit in solitas uires. Quapropter cum summa cautione, & sine ulla nimietate seruiati, blanda regula resumendi sunt ægrotantes, quõ asperatas accessiones fore metuamus. Tutius autẽ esse probamus, ut supradictum est, longe ante futurã accessiõẽ ad hellebori usum accedere: quo accēpto si irruerit accessio, erunt omnia mitigatiua adhibenda, quæ accessiõẽ ualeant temperare: In strictura enim constitutis altioribus, hoc est stomacho & uentre, mitigatiua laxatione adhibita, etiã medicamina excludendo præparat usum, & præfocationis amputat metũ. Sin uero post purgationẽ nullum periculum subierit præfocationis, causa refectionis adhibenda resumptio est, cum hijs quæ ualeant accessiõẽ temperare, ut odoramenta sine ullo percussu medentia, atq; nutribilia, ut est panis calidus, melo, cucumis, & hijs similia. Destillandus etiã helleborismus, sed ex melle decocto. Ac si in initio uomitus ex accessiõẽ emerit, cucurbita multa cũ supposita ori uentri infigẽda, tunc sequẽti parti, secundũ quod medicamen ad inferiora teneatur, donec accessio leuigetur tẽperamentis supradictæ rationis, ne cõcursus passionis & adiutorij præfocet ægrotantẽ. Erig igitur sustollẽdus ægrotas subiectione manũ ex utraq; alarũ parte cũ capitis

**C** sustentatione, atq; leuiter inclinandus. Tunc si medicamen ad superiora eue-  
 rit, & transuorationis ceperit partes, quo spiramenta obstruere uideatur, illi-  
 sis dentibus, atq; ore clauso, uel erumpens per naturales uias, quæ ad fauces de  
 capite feruntur, in nares defluxerit, ac rursum decurrens gutturis meatum clau-  
 serit, præsens præfocatio metuenda. Quapropter immixtis digitis, ex utraq; parte  
 buccarum circa maiores dentes oris facienda distantia. Tum imponenda ptygmata  
 multiplicia, quæ si forte defuerint, cuneos ex ferulis scissis mittere poterimus,  
 quod scientes ægrotantem seruemus, atq; medicamen ad faucium partes ueniens  
 spatium quoddam exceptum facilius excludatur. Seruanda etiam tempora, quibus  
 medicamen faucibus occurrit, adiuuantes eius exclusionem, in faciem inclinanti-  
 tes ægrotantem, atq; eius ora calida spongia detergètes; distillantem etiam in os  
 mulsum: sic enim ueluti despumans refumit, aut deponit accessionis pressuram  
 releuatus ægrotans. Ac si non sufficiens hellebori fuerit agitatio, quam Græci  
 sparagmon uocant, & paruo euentu successerit perseverante passione, erit etiã se-  
 cundo, uel tertio hellebori usus adhibendus, sed præsumpto uiribus ægro: quip-  
 pe cum non isdem uti omnibus necesse sit, & destruendæ passionis causa una  
 sola sufficiens & perseverans exhibitio approbetur. Utendū etiam aquis natura-  
 libus, hoc est, naturali uirtute medentibus, sed quæ nulla odoris uexatione ad-  
 ficiant ægrotantem. Adhibenda igitur natatio, & sole corpus torrendum, quod  
 Græci heliasin uocant, sed præfecto capite. Utendum etiam potabilibus medi-  
 caminibus, uel electarijs ex hyssopo, & origano, & thymo confectis: Principa-  
 liter enim corpus mutant recorporationē faciendo ob acrimoniam, dehinc etiã  
 corpus succorum naturalium tenuant qualitate: Emolliendus namq; uenter, &  
 peregrinatio imperanda terrena atq; maritima, si ferre navigationem potuerint  
 patientes. Tunc etiam exercitia uehementiora, quæ labore corpus afficiant af-  
 fectada, quo magis fortitudo quam corporis robur augeatur: Est enim semper  
 grauabilis carnatio, & magis si tenuibus fuerit imposita uiribus, & in hijs pas-  
 sionibus, quæ in neruis esse noscuntur. Vnde neq; facile curationis est credendus  
 effectus, quo depulsam passionem iudicemus, nisi legitima accessionum tempora  
 soliti concursus sine ulla inquietudine, atq; plurima transferint ægrotantes: So-  
 mnos quoq; sine ullo impedimento duxerint, & uigilias placidas, ac liquida fa-  
 nitate moderatas, nulla etiam difficultate officiorum animæ uel corporis impe-  
 ditatas, attestante cibi sufficienti appetitu, cum digestionem congrua, & corporis nu-  
 trimento mediocri, uel egestionum naturalium moderato exitu, bono attestan-  
 te uel immutato colore. Seruanda præterea multo tempore omnis nimietas, ut  
 frigus, ustio, indigestio, uinolentia, libido, lauatio, & magis ea quæ specialiter  
 passionē in commemoratioē ducunt, ut odores percussibiles, aut splendor ni-  
 mix lucis, aut resultantium materiartū. Item strepitus, clamatio, circulatorius  
 sus, extentio, aut ex alto despectio, siue fluminum celerrimus fluor. Ut enim ul-  
 cerū recentes cicatrices facili occasione soluantur, non aliter hæc passio, uel alia  
 quæq; similis nequitia paruo impulsu repetit corpus: quippe quod proxime di-  
 misisse uidebatur. Ac si forte neq; ita fuerit æger ab epilepsia liberatus, nihil mi-  
 nus adhibendum, sed magis perseverandum curatione probamus: Dabit enim  
 hæc diligentia uel ex parte beneficium, quo neq; frequentius admoneatur ægro-  
 tans, neq; longioribus accessionibus opprimatur, neq; turpiter in furore, uel pub-  
 licis in locis apprehensus etiam post passionis impetū animi luctatione uexetur:  
 Quibus enim prima uel optata non proueniunt, erit secunda mitigationis causa  
 capiēda. Hæc est secundum ordinē methodica epilepticorum curatio. Aliarū uero  
 sectarum

Non fidendū  
 subius sani-  
 tati.



A sectarū principes uaria rerum temperatione, siue experimento curationis adiutoria cumularunt, caput fouentes aceto atq; oleo rosaceo puro, uel immixto castoreo, in accessione frigidis utentes: Articulos quoq; omnes ligatione constringentes, sternutamento commoto ex aceto, naribus interius flato cum sinapi uel castoreo oleo irino infuso cum calchanto, uel sulphure uiuo, aut astruto incenso, uel hijs quæ ad matricis præfocationes incendenda posuerunt. Item hyssopum & origanum, & thymum, uel ignis flammam oculis offerentes, cum titillatu quodam & oppressione præcordiorum ad inferiores partes. Iubent præterea motum corporis adhibere, gestationem uel deambulationē, aut supra sindonem uolutari, sinapis andas etiam manus ægrotantium atque pedes, & ante accessionem perungi taspia caput, & spiritū continere. Alio uero tempore, hoc est dimissionis, uini atq; carnis imperant abstinentiam, & magis porcinae uel bubulae, & caprinae. Prohibent præterea supra pellem caprinam dormire siue iacere ægrotantem: siquidem passionis faciat motum. Adhibent etiam clysterem iugē atque acerrimæ uirtutis, & medicamina diurinalia, quæ diuretica uocant, atque purgatiua per uentrem, quæ catartica uocant, & horū magis cui nomen est hiera, quæ non erunt, inquit, tertio minus singulis mensibus offerenda. Tunc capitis diuisionem accuratā, quam chiasmum, dehinc scarosin uel medicamine, siue ignis uestura. Item trebrationē testæ, uel arteriotomiam, uel usum uenerēū, aut è contrario eunuchismum faciendum probantes. Dant etiam bibendum lac asinum, cum sale uel sanguine testudinis marinae uel humano, aut uiliti marini: & non solum sanguinem, uerum etiam coagula quæ lacti miscuntur. Item mandendam mustelam, sed longo desiccata tempore: & tunc corda hominum atque equorum, quorum crura quasi impetigines habent, siue asinorum, uel mulorum. Item testes uel ueretrum marini siue fluminalis cancri, & porcellionis, hoc est, animalia quæ humectis & aquosis locis sæpæ nascuntur, à Græcis appellata onisci: dehinc squamulas ferri, cum aqua in qua fuerit candens ferum præinctum. Dant etiam cameli cerebrum fumo siccatum atq; concisum, sed infantibus uel pueris odorandum: perfectis autē ætatibus bibendum ad modum cyathi cum mulso & aceto tribus cyathis. Similiter etiam leporis cor, & eorum gauia. Alij uero etiam ligamenta probauerunt, & magos adhibendos, atque eorum incantationes, quæ quantis sunt uexationibus confertæ, etiam per se probantur, sicut latius Adiutoriorum libris docuimus, nunc tamen paucis memorauimus. Constringens igitur fomentū, atq; terti odoris, uel aceto & oleo rosaceo, & castoreo percutit & grauatur, & tumores constringit: & si, ut putant, materiam redarguit, abactum tamen cutibus ad cerebrum, & eius membranas reuocat. Et sunt hæc exteriorum comparatione magis salutaria. Præterea est uehementer noxium, frigidat caput accessionis tempore fouere: quæ enim dimissione releuata mitescunt, eadem frigida densatione magis grauantur. Item ligationes neruos densant, atq; corporis oppressio, quam fieri iubent: Defricatio in temporalis, hoc est accessionis tempore geminat passionis: Accidentia enim si temporaliter quidem uidentur lacessitis sensibus in resumptionem uenire, totam tamen passionem peiorant, non aliter quàm si quisquam turbatos oculos manutigio, quod Græci chraptsiam uocant, temporaliter fricando releuare uideatur. Item non aliter sternutamenta medicaminibus commota accessioni non conuenire probamus: Quippe cum neq; in linimento passionis constitutos hoc adiutorio facile inquietare liceat: nisi certo regulæ ductu preparatos, quo caput releuetur gestatione tenui, ac deambulatione: siquidē hoc adiutorij genus

Διπρητικὸν  
Καταρητικὸν  
Γέρων

Χιασμὸς.  
Χιάσματι.  
Ἀρτηριότομία.  
Εὐνηχισμὸς.

Κύματα:

Manutigium  
Χιραψία.

C initio impleat caput, dehinc medeatur. Quod sperandum in hijs qui accessione agitati earum partium plenitudine uexantur, si etiam sternutamento fuerint cōuertiati, cum magis oporteat passionis illatam soluere turbationem. Est præterea acutum molestum naribus insufflare, siue solum, siue cum alia qualibet percussibili materia: Constringit enim atq; densat tumentia, & turbata perturbat, & ea concurrere compellit, quæ accessionis uolentia excludi coguntur. Item non aliter mutiles atq; fatiabiles sunt incensiones, siue fumigationes & odoramenta ex pice, bitumine, spondilio, castoreo, galbano, acerrimæ atq; grauabilis uirtutis causæ, & iniucundioris, adeo ut etiã recte ualentium impleant caput, & eorum qui nunquam, aut difficile earum partium querelam prodiderint. Nunc tamen hijs odoramentis acceptis uertigine atque grauedine urgeantur, & non aliter tumentes oculos fumigatio adficiat, quàm etiam tumentes cerebri membranas; necessariò enim cogit in similem uenire passionem. Percutit etiã ignis flamma, siue eius affectatus splendor multus: Deniq; etiam in lenimento epilepticos constitutos, lucis importunitas, atq; eminens percussio in commemoratiõem facit accessions uenire. Noxia etiam præcordiorum pressura, quam adhibendam probant, iudicatur; Mitiganda enim sunt accessione commota, & nõ uolenter atq; contrario conatu reprimenda. Grauis etiam sine dubio uidetur supra sindonem iussa uolutatio: quippe cum leui conuersione corpus affectum, non solum lenimenti tempore epilepticos in uertigine mittat, uerum etiã recte ualentes similiter afficere uideatur. Articulorum quoq; sinapismus accessionis tempore tumorem geminans, etiam passionem necessariò peiorem facit. Est item in temperabilis ante accessione punctio ferulaginis, quam Græci taphian uocant, cum oporteat motam passionem, atq; in peius coactam mitigare potius quàm prouocare: & quoties eius necessarius est usus lenimenti tempore, toties, atq; melius suæ uirtutis impleat beneficium, cum importune adhibitus partes faciat emori: Has deniq; Græci necroses uocant. Item spiritus retentio, quam faciendam probant accessions initio, sensus implet, non, ut quidam uolunt, repercussio spiritui futuram prohibet accessione. Premit etiam potius quàm discutit ea quæ iam suo motu densari uidentur. Abstinentia uero uini atq; carnis, quam iugiter fieri iubent, uel unius anni spatio, impedit recorporationis faciendam profectum, quem augere necessariò mutationis uarietas potest: Quod facile ignaris notum fiet ex uire consuetudine, quæ si eadem fuerit, procul dubio corpus infirmat; Quippe cum iugis potatio aquæ demissum faciat corpus, & nec numero dierum, uel mensium curandi regula sit constitutenda, sed passionis temporibus, quorum mutata regulæ commutantur, ut sub eorum rigore damnũ aquæ uel uini ministraretur, hoc etiam de carnis usu erit coniiciendum. Caprina uero pellis odoris tetri causa noxia capiti iudicatur, non speciali atque priuata ratione. Item iugis atq; acerrima clysteris iniectio intestina conradit, atq; neruòs uitiat: Vrinaria quoq; medicamina, quæ diuretica uocant, uesicæ infectione capitis membranas commouent. Item purgatiua medicamina, quæ catartica uocant, defluxionem corporis faciunt, atq; stomachum euertunt, capitis etiam accuratam diuisuram, quam chiasmum uocant, & testæ perforatio, & uisura cutis medicamine uel igne sufficta, quam scarotica uocant, & arteriotomia patientes partes insumit, & utilis renititur rebus. Siquidem nulla te comparatiua adiutoria ipsidem locis adhibere permittat. At uero concubitus, siue Venus, quam adhibendam probant, ab aliquibus parua epilepsia nuncupata est: Siquidem similem faciat membrorum motum diuerso contractu, anhelatione & sudore attestante, & oculorum

mei

D

Caprina pellis

Vrinaria medicamina.  
Purgatiua.

Venus parua epilepsia.

A forum conuersione cum rubore uultus, ac deinde post effectum displicere faciat sibi met corpus cum pallore, & quadam debilitate uel mœstitudine, adeo neruos afficere male uideatur, ut saepe imminente accessione per somnum iactu seminis ægri præpurgentur, quod Græci onirogonon uocauerunt. Item uenuchismus uires amputat, non epilepsiam soluit: Lac quoq; sumptū facile acescit, & propterea grauians epilepticos male probatum uidetur. Non aliter etiam potus sanguis testudinis, siue hominis, atq; uituli marini, & sumptio coaguli, quod Græci pityan uocant, Mustelæ quoq; siue hominum caro siccata, & equorū impetigines, uel ueretrum, atq; testes canis aquarij, uel porcellionis supra memorati, quos oniscos appellant, & aqua de squamulis siue tinctionibus ferri, & corleporis & cameli, siue gauriæ cerebrum male probatur: Etenim neq; ex occultis causis, quas Græci ἀπόκρυφαι αιτίαι uocant, rationes ducunt: Neq; ex aliqua contagione siue tentatione, ut empirici uolunt, approbata in usum uenerunt medicinx. Quippe cum intelligi, uel apprehēdi naturali aut fortuita rerum dominatione minime possit, uti hijs maxime ita insuetis atq; nouis, & odiosis generibus materiarum, quarum nihil usu grauius esse uideatur, ipsius quoq; comparatione passionis, sitq; admirandum quod de aëre atq; uisgij, uel somno & potu, & cibo, uel hijs quæ necessariō sumuntur, nihil experimenti utile collegerint, de hijs uero ita execrandis, & crudelibus, atq; inhumanis, plerumq; etiam periculosissimas curationes ordinare uoluerint: Non enim sanguinē tauri potum interficere, ut Themistoclem: lac coagulātū, uel caseum coctum, aut oratorem, & imaginē recte reprobauerunt, si quisquā humanum sanguinē facere minime crediderit, quo falsō memorata à ueteribus cætera uideantur. Accusatis igitur, siue nudatis summam ueterū curationibus, non est absurdum etiam cum nominibus erroros arguere singulorum. Hippocrates de epilepsia scribens communiter ait: Quisquis in humano corpore agnouerit siccandi uel humectandi, aut frigidandi, uel calefaciendi causas, idem etiam istius passionis poterit uidere rationē, & neq; quomodo, neq; ex quibus, neq; quando uel quousq; hæc fieri debeant tradere curabit. Item Diocles libro quo de passionibus scripsit, in hijs qui ex uino, ientia, uel carnali cibo istam passionem conceperint, phlebotomiā probat, antecedentes potius quàm præsentēs intuens causas. In hijs uero qui ex corporis habitudine in istam uenerint passionē, humoris crassi detractionē probat adhibendam, quem appellauit phlegma. Utitur etiam uirinalibus medicamentis, quæ diuretica uocant: item deambulatione ac gestatione. Quæ si etiā uera essent adiutoria, ob paruā tamen numerū & magnitudinis suæ, magnæ passioni difficile possent paria pronuntiarī, aut eius destructioni sufficere. Item libro Curationum phlebotomans utitur medicamine catapotio, quod stomachū euertit, atq; post cœnā uomitū facit, exhalationibus implens caput. Potat etiam aceto, sternutamentū commouens prius quàm in somnū ueniant ægrotantes, profecto in temporaliter cōmouet sensuales uias. Dat etiā absinthium, centaurion, & lac asininum, & equorū impetigines, uel mulorū: neq; tempus adijciens factis, & odiosis ægrotantes afficiens rebus. Praxagoras uero secundo libro Curationū caput imperat radendū, adhibens fricationes & cataplasma ex aceto sine Venere, dolentibus speciebus etiam sternutamentum commouens, & ieiunū uomitū per singulos dies, utens etiā potu lacte cum mulsio atq; sale. Item deambulationibus plurimis atq; uehemētī motu, celebratis & potionibus uirinalibus, & cibis uarijs, & agninx carnis, siue hœdinæ, atq; porcinx & catulorū, dans acetū bibendū atq; uinum, & post uomitū sternutamenta & odoramenta probans, & spiritus

P. TUL.

C. VIOL.

A. ΠΥΛΑΙ ΜΙΤΙΛΙΩ.

ΕΜΠΙΡΙΑΙΟΙ.

Themistocles  
poto sanguine  
taurino mor-  
tus est.  
Hippocrates.

Diocles

Virinalia mea  
dicamina  
διεπαρυσία

ΚΑΤΑΠΟΤΙΟΝ

Praxagoras.

retentionem.

**C** retentionem. Item ufturam atq; incisuram partibus, adhibens etiam uentris uae medicamina: & cum accessionem uiderit commoueri, deprimit partes quae fuerint in querela, atq; defricat castoreo, & uituli marini ueretro, siue uirilibus hippopotami, aut testudinis sanguine, uel rhombi marini, omnia cōfundens: Non enim initio ratio capitis est adhibenda, nec aceto densandum corpus, neque diurno uomitu uexandum, si quidem fortitudinē tollant: neq; plurimo sternu-  
*Sternuta-*  
*menta.* tamento, implet enim sensus: neq; urinalibus medicaminibus, siquidē corpus nimium laxent: neq; purgatiuis, si quidem non aliter uexent: neq; catulorū carni-  
*Asclepiades.* bus, propter suae qualitatis horrorem: neq; detentione spiritus accessione immi-  
*Kausis.*  
*Koδiγiop.*  
*Bā: auos.* nente, tunc enim tēpus est requiescendi: neq; cōpressionibus, asperant enim tu-  
 mores: neq; curiosis odoramentis, siquidem caput impleant: neq; incisura, ob  
 inutilem dolorem: neq; uftionibus, superpositionis enim tempore asperant ob  
 tumorem passionem. In lenimento uero resumendos uexatione doloris fatigāt,  
 & uisui recorporatiuorū adiutoriorum obfistunt: neq; coagulo uituli marini, uel  
 ueretro, aut testibus hippopotami, uel testudinis sanguine, aut rhombi marini.  
 Hæc omnia experta neq; ratione, neq; regula, sed tentatione probātur. Itē Ascle-  
 piades primo libro Celerum uel acutarum passionū, eos qui corporis raptu affi-  
 ciuntur solos imperat phlebotomari, non aduertens, quia ex eadem adstrictio-  
 ne generales quæq; species epilepsiae formantur, sed accessione grauior altera cō-  
 parabitur. Quapropter magis exigit phlebotomiae beneficium. Item phleboto-  
 matos inisci iubet clysteri, uel collyrio, quod balanon appellant, odoribus tetrīs  
 adhibitis, & fumationibus, & naribus acetī insufflati insufflatione, atq; uoluta-  
 tione in syndone praestita. Prohibet sanē carnales cibos & uinū, sed imperat Ve-  
 nerem, quorum acufationem atq; improbationem ex ante scriptis accipere po-  
 terimus. At Serapion primo libro Curationum multis ex rebus diligentiam cu-  
 randi confundit. Vngit enim residuum corpus oleo, colla uero aceto cum oleo  
 rosaceo, constringens ea quae laxatione indigeant. Tunc exercitio adhibito dat  
 mulsam bibendum, ex aceto confectum, ac deinde nihil accipere iubet agro-  
 tantes, sed quiescere. Tunc deambulare circa uesperam, ac rursum conuiescere,  
 & deambulationem repetere. Tunc lauari, & adhibita requie bibere hyssopi  
 decoctionem cum aceto, atq; mel in trium heminarum quantitate, tunc cibum  
 sumere, erroribus mille stomachum uexans, ut semel cibo reficiat. Utitur etiam  
 ante unum uel duos dies, si ordine certo accessiones occurrerint, nunc sangui-  
 nis detractioe, nunc purgatiuis medicaminibus: sed nunc per superiora, aut  
 albo helleboro, nunc per inferiora, aut scamonia, aut nigro helleboro, & hijs  
 similibus pernitijs turbationibus corpus adficiens eo tēpore quo requies ad-  
 hibenda est, ne ulla occasione accepta accessio generetur. Ordināt praeterea quae  
 specialiter passioni congrua medicamina nuncupauit, ex castoreo & equorum  
*Impetigines*  
*equorum.* impetiginibus. Sunt autem squamulae anteriorum crurum sub armorum parti-  
 bus in ipsīs animalibus natae, has Graeci lichenas uocant, siue chelidonas, nos  
 uero, ut supradictum est, impetigines uel hirundines. Dat etiam camelī cerebrū  
 atq; fellā, & coagulum uituli marini. Itē dat medicamen quod ex crocodili ter-  
 reni stercore confectum probat, & leporis corde, & lumbis, & testudinis mari-  
 nae sanguine, uel testibus apri, uel arietis, aut galli gallinacei. Adhibet etiā odo-  
 ramenta, & iniectiones clysteris, nō minus ab epilepticis in curationibus cadēs.  
*Heraclides*  
*Tarentinus.* Item Heraclides Tarentinus secundo libro Interiorum curationum eadem me-  
 dicamina conscripsit. Multi quoq; uetustiores istam curationem ordinantes ua-  
 rijs erroribus conciderunt, quos memorare superfluum est: Quippe cum eorū

**A** vires prodicione temporis expirasse uideantur, ex quibus est Menecrates Zeo-  
phletensis. Item Tryphon, Philotimus, Chrysipus, Demarchus, & horū plu-  
rimi: Quod est nudum atq; probabile ex conscriptione curationū Apolloniū Ci-  
tensis secundo libro de epilepticis: Item Nicandri tertio libro. Themison uero  
libro primo tardarum passionum Asclepiadis erroribus: Nondum purgatur  
ante accessionem phlebotomandus, inquit, si ordo fuerit augmentorum præfer-  
uatus: Sin uero errans fuerit perspectus, post accessionem imperat phlebotomiā  
adhibendam. Modum autem detrahendi sanguinis eius approbat mutationem.  
Quæ sunt uanissimæ inuentiones: sicut libris Specialium adiutoriorū docuimus.  
Tunc si in brachijs, uel in cruribus, inquit, aliqua querela extiterit, eandē par-  
tium uenas diuidendas: Sin minus, interforem uenā distringendā lino, consi-  
ciens melius esse ex partibus non patientibus sanguinis coadceruatā facere detractio-  
nē: siquidē patientes magis grauentur ob irruentē materiæ lapsum, qui detractæ  
superet modum. Tunc post phlebotomiā deambulatione utitur, & defricatio-  
ne alienis manibus adhibita, quo corporis motus conquiescat. Dat etiam cibū  
ex mediæ qualitatis materia, & nulla cogente ratione rursum sanguinem detra-  
hit. Sed si ordinem seruauerint accessiones, intra quinque dies secundo uel tertio  
detractio-  
nē facit. De alijs quoq; multis atq; omnibus corporis partibus, & talis  
& brachijs, nil metuens defectionem, sanguinem detrahit. In lenimento uero,  
ut exempli causa xxx dierum, post accessionem helleboro utitur, post qua-  
tuor uel quinque dies. Tunc sequenti inicit, atq; alia die adhibet lauacrum, & tri-  
bus uel quatuor diebus cæteris cursibus cyclum complet, ac deinde rursum ad-  
hibet helleborum post accessionem tranfactam, uel certe radicium adhibet phle-  
botomū discicans corpus; quod erat melius ordinare ante usum hellebori, quo  
Ieuiora maioribus præponerentur: quippe in recorporatiuis curationibus. Ad-  
hibet præterea clysterem, qui uires detrahat & grostantis, & propterea sequi non  
debuertit. Supra dicta utitur etiā localibus adiutorijs, & quidem multis, pro dif-  
ferentiā, & quibusdam falsissimis, ut est sub occipitio accurata diuisura, quam  
chiasmum uocari diximus: & ferro circumscripta in capite cutis uestura, qua testa  
squamulis despumatur. Item mediū testæ, quod Græci bregma appellant, tere-  
bri perforatione, & in accessione constrictione articularum, & odoribus tertris  
atq; male olentibus, ex pice, atq; ex spondylio castoreo, galbano, sinapi cum  
aceto, quæ ex ante dictis erunt protinus refellenda.

Menecrates  
Zeophle-  
tensis.  
Tryphon.  
Philotimus.  
Chrysipus.  
Demarchus.  
Apollonius Ci-  
tensis.  
Nicander.  
Themison.

**B** hibeat helleborum post accessionem tranfactam, uel certe radicium adhibet phle-  
botomū discicans corpus; quod erat melius ordinare ante usum hellebori, quo  
Ieuiora maioribus præponerentur: quippe in recorporatiuis curationibus. Ad-  
hibet præterea clysterem, qui uires detrahat & grostantis, & propterea sequi non  
debuertit. Supra dicta utitur etiā localibus adiutorijs, & quidem multis, pro dif-  
ferentiā, & quibusdam falsissimis, ut est sub occipitio accurata diuisura, quam  
chiasmum uocari diximus: & ferro circumscripta in capite cutis uestura, qua testa  
squamulis despumatur. Item mediū testæ, quod Græci bregma appellant, tere-  
bri perforatione, & in accessione constrictione articularum, & odoribus tertris  
atq; male olentibus, ex pice, atq; ex spondylio castoreo, galbano, sinapi cum  
aceto, quæ ex ante dictis erunt protinus refellenda.

Βρύμια

DE FVRORE SIVE INSANIA, QVAM GRÆCI  
CI MANIAN VOCANT. CAP: V.



Lato in Phædro duplicem furorē dixit: Vnum fieri mentis in-  
tentione, ex corporis causa uel origine: Alterum diuinū siue im-  
missum, eiusq; Apollinem inspiratorē esse, atq; nunc uocari di-  
uinationem: ab antiquis uero appellatum furorē. Magna Græ-  
corū uetustas manian appellabat, quæ nunc mantice dicta est.  
Item alium inquit ex Libero fieri patre, alium ex amore, & ap-  
pellauit eroticon: Alium ex Musis, quem appellauit protreptionem, quod carnē  
instruere uideatur. Item Stoici duplicem furorem dixerunt, sed alium insipien-  
tiæ genus, quo omnem imprudentem insanire probant: Alium ex alienatione  
mentis, & corporis compassione. Item Empedoclem sequentes alium dicunt  
animi purgamento fieri, alium alienatione mentis, ex corporis causa, siue iniqui-  
tate, de quo nunc scripturi sumus: Quem Græci, siquidem magnā faciat anxie-  
tatem,

Μανία

Plato.

Μαντιαν

Ερωτικόν  
Προπρητικόν  
Stoici.

Empedocles.

C tate, quā appellant maniam. Vel quod animū siue mentem ultra modum laxet  
 manon enim dimissum siue mollē appellant. Vel certe quod polluat ægrotātes:  
 nam pollui Græci lymen in uocant. Vel certe quod desertam, siue solitudinē eu  
 pientes faciat ægrotos: nam Græci destitui, atq; solitudinē petere monusthæ di  
 cunt. Vel quod perseverantius corpus teneat, & difficile pellatur, & ob id Græ  
 ci ueluti moniam dixerunt. Vel certe quod duros atq; perferētes faciat ægrotan  
 tes, quod Græci hypometicos uocant. Est autem alienatio tardans in febribus,  
 quo à phreneticis discernitur. Siquidem neq; celer, neque cum febricula esse ut  
 deatur. Vel si quisquam furiosus febricitauerit, discernatur à phrenetico tempo  
 ris consideratio: Nam præcedit in furiosis furor sequenti febricula, & non ita  
 paruo pulsū afficiuntur, quæ utraq; necessarid phreneticos sequuntur. Genera  
 tur autem frequentius in iuuenibus, ac medijs ætatibus, difficile in senibus, atq;  
 difficiliter in pueris, uel mulieribus: & nunc repente inuadēs, nunc paulatim in  
 crescens: & nunc ex occultis, nunc ex manifestis causis, ut est uisio, perfrictio,  
 indigestio, uinolentia frequens atq; immodica, quam Græci crapalen uocant.  
 Item uigilia iuges, & amor, uel iracundia, aut mœsttudo, uel timor, uel super  
 stitio nimia. Item concussio, siue percussio, & intentio nimia sensuum & intelle  
 ctus ob cupiditatē disciplinarum, uel quæstum pecuniam, aut gloriā. Item po  
 ta medicamina, uel magis ea quæ amorem facere uideantur, à Græcis philtropo  
 ta appellata. Item detractio hæmorrhoidarū ueterum, siue uaricum, aut abstinen  
 tia in foeminis solita purgationis. Sequuntur autem eos qui non repente hac pas  
 sione afficiuntur, priusquam morbus enitescat, ea quæ etiam epilepticos futuros  
 afficiunt, & apoplectos. Signa deniq; ex ante dictis sumenda memorauimus,  
 Sed hæc quidam discernunt, ut communibus propria iungentes: graues etenim  
 inquirunt, somni magis epilepsiam fore significant, atq; è contrario leues atque  
 parui, furorem. Sic etiam in iracundia constitutos capitis implemento affici atq;  
 æstimare se in furorē deuenisse, & rursum silentio opprimī ex inani timore. Item  
 mœsttudo, uel animi anxietas, & iactatio, uel plurima ciborum appetentia, &  
 oculorum frequens palpebratio, cordis saltus, & somni cum timore terribili uel  
 turbato effecti. Item uentris extantia, & frequens descensus uenti per podicem,  
 pulsus paruus atq; creber, & uehemens: Etenim in epilepsiam decliues ac pro  
 nos maior atq; rarus pulsus sequetur & imbecillus. Intuēdam etiam, inquirunt,  
 qualitatem aduenientū morborum: Sæpe enim quadam contagione ingerun  
 tur, quæ uniuersa secundum nos non tutissima atq; certam faciunt discretionem  
 supradictarum passionū: Etenim futuris epilepticis, uel in passionem pronis ui  
 gilia irruunt, & anxietates, & cætera. Item in aduentiis morbis aliqua ex hijs  
 eueniunt, necessarid omnia, uel certe aliqua quæ non enumerauerint signa.  
 Emergente enim siue prodita passione alienatio mētis fiet sine febribus, & qui  
 busdam uehemens, quibusdam leuis, & alijs alia specie atq; uisu differens, uirtū  
 te tamen atq; genere uno confecta: Nam furor nunc iracundia, nunc hilaritate,  
 nunc mœsttitudine, siue uanitate occupat mentem: nunc timore cōminante ina  
 nium rerum, sicut quidam memorauerunt, ut nunc speluncas timeant, nunc la  
 cunas, ne in easdem concidant, uel alia quæ terrori esse possunt. Item esse furo  
 rem cum quadam uaticinatione ueteres posuerit. Demetrius etiam parui tem  
 poris mentis textensionem furorē appellat. Item turbine repentino expauescen  
 tes atq; percussos quosdam, ut etiam obliuione prægestorum afficiantur. Sic de  
 niq; Artemidorū grammaticū Apollonius memorat nitente gressu crocodilum  
 in harena iacentem expauisse, atq; eius motu percussa mente, credidisse sibi fini  
 strum

C

Moyr.

Apothysip.

Moyr. J.

Moyr.

Apothysip.

Phrenetic.

E pueridm

Apothysip.

D

Demetrius.

7 excessionem

Artemidorus

grammaticus.

strum

**A** strum erus atq; manum à serpente comestam, & literarū memoria caruisse obliuione possessum. Item melancholiam inquit speciem furoris esse nuncupandam: Nos uero ipsam quoq; discernimus à furore. Est autem infans siue furor nunc iugis, nunc temporis interiecti requie leuigatus, efficiens ut ægri nunc non meminerint sui laboris, nunc obliuionē nesciant suam, & nunc omnium sensuū alienatione uexentur falsitate possessi, nec aliarum specierum errore fallantur. Sic deniq; furens alius se passerem existimauit, alius gallum gallinaceum, alius fictilem, alius laterem, alius deum, alius oratorem, alius tragœdum uel cômœdum, alius stipulam ferens mundi se censum tenere, alius se sustentandum manu poscebat, uagiens ut infans. Horum plurimam accessionis tempore oculi sanguinolenti fient atq; attenti. Accidunt etiam uigilia iuges, uenarum extensio, genarum rubor, corporis durities, atq; aliena fortitudo. Paritur autem omnis neruositas, ut ex hijs quæ sequuntur uel accidunt conijcere poterimus, magis tamen caput: Etenim antecedentes plurimæ querelæ eius partis existunt, cum grauedine atq; dolore afficiuntur, singulis quoq; sensibus patientibus, quos in capite nouimus constitutos: & præterea passio magna atq; tardissima superposita, onibus ac lenimentis uariata, ex constrictione confecta: Etenim hijs qui Mnaseam sectantes alium putant, ad quiescendum non est, suspicantibus eum furorem, qui hilaritate affecterit ægrotantes, solutionis appellandum. Falluntur etenim nominis uoce: siquidem Græci diachisin animi laxationem dixerunt, siue diffusionem, cum hoc animi, non corporis ostendat qualitatem: Nam quod omnino furens strictura afficiatur manifestum atq; probabile est ex oculis sanguinolentis, qui in lato constitutā stricturam denuntiant. Item quod ipsos oculos atq; uenas in uultu extatiōres habeat, totius corporis atque tante duritia, cum fortitudine præter naturam adueniente ob stricturæ consensum: deniq; lenimenti tempore fatigatos se sentiunt ægrotantes. Est item coniectura facienda ex hijs quæ mentis alienationē præcedunt, ut capitis grauedo uel dolor, & tardus membrorum motus, spinæ uel scapularum, uentris inflatio. Peccant deniq; etiam hijs qui animæ passionem principaliter, dehinc corporis esse concipiunt, cum neque quisquam philosophorum eius tradiderit curationem, & antequam mente falluntur accidentia substantia corporis habere uideatur. Hæc sunt quæ ad apprehendendum uel discernendum morbum methodus ordinauit. Curationē uero similem epilepticis accipimus adhibendam. Etenim principio conuenit iacere loco mediocriter lucido atq; calido, & nullo turbore pulsato: nulla quoq; picturæ distinctione, neq; fenestris humilibus luminato, neq; in superioribus potius quam in solo: pleriq; enim furore correpti sese præcipites dederunt. Est etiam lectus firmissime, atq; auersus ingressum cubiculi locandus, quo ingredienti minime uideant ægrotantes, ne uultus uarietate lacessiti furoris augeant uanitatem. Stramina præterea mollia sunt approbanda cum defricatione ac retentione articulorum, blando scilicet tactu: Et si qua pars corporis saltu fuerit agitata tepidus uaporationibus erit mitiganda, appositus lanis mollibus ac limpidis, atque capiti, collo, & thoraci circulatim: Fetus quoq; adhibendus olei calidi, admixto aliquando mitigatiuæ uirtutis causa fœnigraci liquore, & eius decoctione confecto, sed minime pingui, uel certe hibisci infusione aut lini seminis: Tunc oris collutio, atq; potus ex aqua calida. Erunt præterea multorū ingressus prohibendi, & maxime ignotorū. Mandandum quoq; ministris, ut eorum errores quodā consensu accipientes corrigant, ne aut omnibus cōsentiendo augeant furorem, eorum uisa confirmantes, aut rursum repugnando asperent passionis augmentum,

Μηασχολία.

Μηασεας.

Διάχυσις.

C

tum: sed inductiue nunc indulgant consentientes, nunc insinuanda corrigant uana, recta demonstrantes. Ac si exilire cœperint, ut difficile teneantur, uel solitudine potius exasperantur, oportebit plurimis uti ministris, & præcipere ægros latenter retineri, ad articulorum fricationem, quo minime prouocentur: si etiam uisu hominũ fuerint cōmoti, erit adhibenda ligatio sine ulla quassatione, præteritis articulis ex lana. Tunc fasciola ligatur, ac si quicquã timere uel reuereri cōfueuerint, non erit itidem frequenter inducendũ: continuatio enim contemptibilitatem parit: uel cum causã coëgerint, uel adiutorio adhibẽdo non succubuerint ægrotantes, tunc erit necessariõ inducendum, quo ægri terrore uel reuerentia opprimantur. Ac si etiam lucem animo contraria commouẽtem uiderimus, erunt eorum oculi adumbrandi, quo ceterum corpus luce tangatur: Adhibenda cibi abstinentia usq; ad primam diatriam, ac permittentibus uiribus phlebotomia, si passio coëgerit intra diatriam, & si ulla obstiterit causa detractionis cõgruã faciendã aliquoties adhibita detractione modus implendus. Si horum nihil obstiterit, in ipsa diatrio erit phlebotomia adhibenda; tunc perunctio: ora fo uenda, dandus cibus leuis, paruus, digestibilis, ut panis ex aqua calida, uel alica ex melle leuiter decocto confecta, uel sorbibile quicquam, aut tenerum. Exinde usq; ad passionis declinationẽ alternis diebus æger nutriendus, si uirẽs eius permiserint. Prouendus deniq; etiam clystere simplici, si passio poposcerit. Tunc etiam præcordia cataplasmatibus relaxanda, ob digestionis qualitatem, quo nulla constrictio spiritum abstentum capiti transmittat. Attendendã etiam species alienationis, cuius accidentia contrariorum coniectura erunt mitiganda, ut eum hilaritate relaxent, nuntiantes quicquam quod animum resoluat. Dehinc cum

D

status passionis apparuerit, de tono capite atq; raso cucurbitam infingimus, adiuncta scarificatione, & primo ex præcordijs; tunc inter scapulas, quas Græci metaphrenum uocant: consentiant enim facilius istis superiora. Dehinc etiam occipitũ ac uerticẽ, & temporibus capitũ, ac si uultus uel ora fuerint affecta plurimũ, totum corpus erit sanguifugis releuandum, quas hiruines appellamus.

¶

Tunc cataplasmandum ex pani ceteri laxatiuã uirtutis: dehinc spongijs uaporandũ, & si passio iisdem permanferit, secundo uel tertio iisdem perseuerabimus adiutorijs: Si uigilia fuerint cõsecutã adhibenda gestatio primo ex lectulo pendenti, tunc etiam fertoria sella. Adhibenda etiam aquã destillata crebra, cuius sonitu sæpe ægrotantes inducti somnos capiunt. Tunc etiã spongijs calidis oculi uaporandi, atq; palpebrarum duritia relaxanda, quo etiã per oculos usq; ad cerebri membranas beneficiũ perueniat curationis: ac si passio declinauerit, & propterea minime uigilare, atq; alienari cœperint ægrotantes, dabimus uariũ cibum ex mediã materia qualitate. Tunc si doloris sensum ægrotãtes acceperint, adhibenda embals ex oleo, uel admixto aliquanto liquore, quo fuerit hibiscus præcocta. Tunc capiti atq; scarificatis locis cerotaria apponẽda, & ex eis liquefactũ corpus omne perungendũ miti defricatione. Tunc acopis atq; malagmatibus ueterũ, quæ nulla nimietate percutiant, motũ quoq; gestationis adhibẽtes: & primo gestatoria sella, tunc uehiculo manibus actõ, atq; toto fortificato corpore erunt in deambulatiõẽ cogendi: & uocis exercitium quod cuiq; conuenit: Nam literalis etiam lectiõ adhibenda est; & quæ sit aliqua falsitate culpa ra, quo interius mentem exercent ægrotantes. Quapropter interrogationibus quoq; erunt fatigandi, ut nunc mendaciã causa, nunc promedi quod querimus exerceri uideantur. Tunc sibi dimittendi, data lectiõne quæ nõ sit intellectu difficilis, ne plurimo labore uexentur: Hæc enim si supra uires fuerint non minus

afficiunt



**A** afficiunt quàm corporis immodicæ gestationes. Item post lectionem aliqua cõ-  
 posita uel mimica sunt offerenda, si mœstitudine furentes laborent, aut rur-  
 sum tristitiam uel tragicum timorẽ habentia, si puerili luxu furentes afficiantur.  
 Oportet enim contrarietate quadam alienationis corrigere qualitatem, quo ani-  
 mi quoq; habitus sanitatis mediocritatem agnoscat. Tunc proficiente curatio-  
 ne erunt pro possibilitate meditationes adhibendæ, uel disputationes: sed nunc  
 quoq; similiter ordinatæ, ut principia leui uoce promantur: narratio uero & de-  
 monstrationes extenta atq; maiore: tunc epilogus dimissa & indulgenti, sicut hij  
 qui de exercenda uoce, quam Græci anaphonesin uocant, tradiderũt. Adhiben-  
 di deniq; auditores sunt ægrotanti consueti, qui fauore quodam atq; laude dicta  
 proficientes dicentis animum laxent: Etenim iucunda exercitamenta corpo-  
 ris adiuuant sanitatem. Tunc post meditationẽ uel disputationẽ ð deducendus  
 mox est, atque perungendus leuiter ægrotans, & deambulatione leui mouen-  
 dus: Et autem qui literas nesciat immittendæ quæstiones erunt, quæ sint eius artis  
 propriæ, ut rustico rusticationis, gubernatori nauigationis: ac si ex omni parte  
 iners fuerit curandus, erunt uulgaria quadam quæstionibus tradenda, uel cal-  
 culorum ludus: Habet enim quiddam quod animum exerceat, & magis si pe-  
 ritior ægrotanti colludat. Tunc post requiem adhibita deambulatione erunt di-  
 ligentius perungendi: & primo parua atq; simplici defricatione mulcendi, de-  
 hinc profectu apparẽte etiã de uexo ductu post humeros atq; colla defricatione  
 potiore, & leui deductione, quam Græci catapasmum uocant: ultimo fricandũ  
 etiã caput, quod fuerit releuatum, lauacrum erit adhibendum: & sicut de epi-  
 lepticis dictum est, uariis dandus cibus in hibito uino. Tunc addendum quicq;  
 pomorum, quo corpus prætentemus: Dehinc uinum dandum tenue, leue atq;  
 paruum medio cibi tempore: & primo inter quinq; dies, tunc inter quatuor, de-  
 hinc inter tres atq; duos: item alternis diebus: Ita quotidie interfecta uel uariata  
 a quæ potatione eodem contrario ductu quo uinũ uariabamus. Tunc cum nula  
 la cœperit æger nouitate seruari, & perferre singula didicerit, erunt addendæ æ-  
 ris mutationes. Et si quidem philosophorũ disputationes audire uoluerint, erũt  
 adhibendæ: Etenim timorem, uel mœstitudinẽ, aut iracundiam suis amputant  
 dictis, ex quibus non paruus profectus corpori cõmodatur: ac si passio perman-  
 serit, & corpus tarditate possederit, su perpositionibus ac lenimentis uarianda  
 erunt, & superpositiones mitigandæ eisdem adiutorijs, quæ initio furentibus  
 sunt ordinata. In lenimento uero prius adhibendus resumptiuus cyclus per ua-  
 riam gestationem, atq; uocis exercitiũ musico monitore compositum. Tunc de-  
 ambulatio atq; gestatio, & cibus uarius, & hijs similia: secundo recorporatiuus,  
 sicut superius docuimus. Utendum etiã localibus adiutorijs, hoc est, cucurbi-  
 tis recorporatiuis, & rasiõne capillorum: item sternutamento, & dropace com-  
 muni, atq; ð composito ex nitro, galbano, manna, pìetro, euphorbio & pipere:  
 tunc paroptesi atq; cataclysmo, & aspergine pulueris nitrei. Torrendum etiã  
 corpus seruore solis, præfecto capite: dehinc sinapismo & exercitio uario ac ue-  
 hementi. Sed hæc omnia cum adhibentur etiã localibus adiutorijs prius erunt  
 prætangendæ ac renouandæ, longe remouendæ à patietibus partibus. Tunc se-  
 cundæ ac uicinæ, dehinc ipsæ, uenim quoties longe remota præmo uentur trans-  
 missa commoditas sine partium curandarum commotione latenter aduenit, &  
 nullam facit capitis inflationem. Dehinc adhibendus uomitus ex albo hellebo-  
 ro radicibus inserto: Et magis si quisquam ex radice pura noluerit digitis uom-  
 tum prouocare: Fit enim ut inserto helleboro sponte uomitus nascatur, Tunc

Lectiones  
mimici.

Αναφώνησις.

† deducenda  
uox est,

Ludus calculi  
lorum.

κατακλιμαίσις.

† compositio  
παραπύσις.  
κατακλιμαίσις.

C etiam ipsum helleborum dabimus, & si oportuerit, non semel, sed saepius per intervalla temporum. Item aurium cavernis iniicere debemus aqua nitro aspersam, uel mulfum cum semine urticae, uel sinapiliquido, quo etiam per sensuales uias ad membranas cerebri recorporatiua uirtus adueniat: Quippe cum etiam aurium tinnitus saepissime aegrotantes afficiat. Dehinc erunt rursus resumendi aliptarum diligentia. Utendum quoque naturalibus aquis, ut sunt nitrosae, & magis si odoris non fuerint tetri, quo membranae capitis quatiantur. Utendum etiam peregrinatione terrena atque maritima, & animi auocamentis, quibus mentis laxatio fiat. Erit etiam conijciendum ex coestitudine quantum permaneat passio, quamquam soluta uideatur, non aliter quam si terebratis oculis, quod Graeci paracentesin uocant, ob tardam suffusionem quamquam sit perfecta curatio, uisus impedimenta perseuerant, quae quadam consuetudine potius, quam passionis praesentia fieri uidebantur. Solutam uero uel conuictam passionem intelligere poterimus ex hijs quae de epileptica curatione memorantes docuimus. Haec est secundum methodum furiosorum, siue insanorum curatio. Aliarum secliarum ueterum methodicorum plurimi, obscuris in locis habendos inquit aegrotantes, neque accidentia passionis conijciantes: siquidem saepe quidam obscuritatem odisse uideantur: neque ipsam passionem, quod sit ex strictura effecta: Etenim densata corpora aeris obscuritas minime reflari permittit: Abstinentis denique naturalibus officijs impletum caput magis grauatur. Adhibendam etiam immodicam abstinentiam, quam Graeci lamanchiam uocant, non aduerentes, quia immoderata cibi abstinentia uires corporis ueuat, & aegrotantem naturali fortitudine desertum adiutoria ferre non patitur. Perdit etiam cibandi tempora, ex quo densata corpora saepe laxantur. Non enim uere admittenda aut credenda sunt ea quae suspicantur, quibus ipsi insanire potius, quam curare uideantur: Aiunt enim ferarum similitudinem intuendam, quae deductione cibi, posita ferocitate mansuescunt: non aliter etiam furentes posse iugi abstinentia mitigari: quippe cum inter sanos homines facile sapere ieiunii uideantur: Post cibum uero affici hilaritate facilius, aut furore. Iubent praeterea uinculis aegrotantes coerceri, sine ulla discretionem, cum necessario deuinctae partes quatiantur, & facilius aegros ministrantium manibus, quam inertibus uinculis retinere. Cupiunt etiam certis medicaminibus somnos altos efficere, papaueris fontes, & pressuram potius atque grauationem capitis, non somnum ingerentes fouent. Etiam oleo rosaceo aceto admixto, serpillio & castoreo, & caeteris simillimae uirtutis caput obsidunt, costringentes ea quae laxatione indigeant. Item alij frigidis usi sunt rebus, passionis causam ex feruore uenire suspicantes, ut Aristoteles & Diocles, nescij quoniam feruor innatus sine dubio tumoris est signum, & non ut existimant, passionis est causa: Quare peiorare necesse est, & maiorem furorem fieri cum frigida curatione corpora densantur. Alij uero phlebotomia adhibendam probant ex duobus brachijs usque ad animae defectionem, ut saepe faciunt mori cupientes: Etenim defectio, aut uirium amputatio sequuntur immodicam sanguinis detractionem, quam non oportebit ex utroque brachio fieri. Dicunt praeterea usum esse clysteris addendum, ex acerrimae uirtutis liquoribus iniectione frequentia. Ex quibus nihil utile, sed potius dysenteria sequatur: Dantes etiam urinaria atque uentrisua medicamina potanda, quae diuretica uel coeliotica Graeci uocauerunt. Auertendam etenim e superioribus ad inferiora materiam dicunt, ex quibus corpora tabescunt, neruositas uitiat. Item alij inebriandos aiunt aegrotantes, cum saepe ex uinolentia furor atque insania generetur. Alij flagellis

**A** aiunt coërcendos, ut quasi iudicio mentis pulso resipiant, cum magis tumentia cæde laceffendo faciant asperiora, & adueniente lenimento passionis cum sensum recipiunt plagarum dolore tæxentur. Vel certe sic ut ratio poscit uicinis magis ac patientibus locis adiutoria sunt adhibenda: coguntur ergo ut ori uel capiti plagas imponant. Vtuntur etiam decantionibus tibiarum uaria modulatione: quarum alteram phrygiam uocant, quæ sit iucunda atq; excitabilis eorum qui ex mœstitudine in furore noscuntur: Aliam diram, uel quæ occupata mente pudorem suadeat, infecto rigore, ut in bello, quam dorion appellant: in hijs qui risu, uel puerilibus cachinnis afficiuntur, cum cantilenæ sonus caput impleat, ut etiam recte ualentibus apertissime uideatur: uel certe, ut pleriq; memorent, accendat aliquos in furore, quo sæpe uaticinantes deum accepisse uideantur. Alij uero amo rem furentibus afunt procurandum, quo mentis intectio conuersa furoris asperitate purgetur, non intuentes nudissimã ueritatem, quod pleriq; furoris amor fuerit causa. Sic deniq; alius amore Proserpinæ petit inferna, & sibi licitas alienæ ac diuæ coniugis credidit nuptias: Aliorum nymphæ ac desiderium Amphitritis sese deditum mari proiecit. Ferunt Græcorum cõmenta loquacia & hiereprolis sceminam humanis exercitatã fatis, & sæuo pœnitudinis dolore commotã sua manu suos extinxisse successus. Neq; aspernandos ceteros accipiamus, qui ipsum quoq; amorẽ generaliter furorẽ uocauerunt, ob similitudinem accidentiũ, quibus ægrotantes afficiuntur: Et est impitio atq; absurdum passioni adiutorium in idipsum probare quod curas: omittit quod sit impossibile, amorem furentibus persuadere: siquidem iudicio carentes pulchritudinẽ probare non possint: Nam sæpe homines feras existimant, uel ea quæ uiderint fingendo præsentia putant. Dehinc etiam si amor fuerit acquisitus quid magis probemus erit incertum, utrum ne prohibendus sit usus uenerere, an admittendus. Sed prohibitus indignari magis cogit ægrotantes, cum desiderata producantur. Itẽ permissus uexat, cũ corpore euirato animæ quoq; substantia turbatur. Itẽ alij arteriotomiam probauerũt, inutili uexatione caput afficientes. Hijs igitur omnibus experimẽtis inanibus conferta est furiosorũ curatio: Quæ ne falsa putentur erũt denunciandæ personæ, atq; librorũ nomina designanda. Asclepiades autẽ secundo libro adhibendam præcepit cantilenã. Quo etiã eius discipulus Titus adductus secundo libro de anima memorat flagellandos. Sed idẽ etiã officijs solitis amoueri iubet ægrotantes, & uinculis constringi, & abstinentia ciborũ nimia coëceti, & siti affici, tunc uino corrupi, uel in amorẽ induci, cetera primo libro tardarũ passionũ supradicta compleuit. Itẽ Themison phlebotomatos constrictius curat fomentis, qui se sua lege tenere non potuit: Adhibet etiã lauacrũ, atq; uinũ plurimũ, & amorẽ suadens adiuncta ciborũ copia: Alijs quoq; incongruis utens rebus, quæ magis Asclepiadi, quàm Themisoni sunt adscribenda: nondum enim sese eius liberauerat secta, sic hæc ordinasse perspicitur.

## DE MELANCHOLIA. CAP: VI.



Melancholia dicta, q; nigra fella ægrotatibus sæpe per uomitũ ueniãt: Græci enim nigrũ melan uocauerũt, sel autẽ cholē appellãt: & nõ ut pleriq; existimãt, q; passionis causa uel generatio nigra sit fella: hoc enim est æstimantiũ magis quàm uidentiũ ueritatẽ, uel potius falsum, sicut in alijs ostẽdimus: Nam Tullius a rã bilẽ dixit, ueluti altã iracundiã: Itẽ Vergilius: Hercule alta iracundiã moto, Hic uero, inq; Alcida furij exarserat atro Felledolor. Sigdẽ melancholicĩ semper tristes, ac nulla penẽ hilaritate laxati esse uideantur, Frequentat autẽ in masculis magis, & medijs

Asclepiades.  
Titus.

Themison.

Μελανχολία  
Μίλαν  
Χολή

VIII Aenci:

- C atatibus: difficile uero in foeminis, uel alijs atatibus: sed eius antecedentes cat  
 ſæ sunt hæc, indigeſtio, iugis uomitus, poſt cibum medicamina pota, acres cibi,  
 mœſtitudo, timor, & cætera quæ etiã ualent ſufficere. Sequuntur autẽ in ipſam  
 pronos uel uenturos ea quæ etiam inſanos fore denuntiant. Eos uero qui iam  
 paſſione poſſeſſi ſunt, animi anxietas atq; difficultas tenet, atteſtante mœſtitudi  
 ne cum ſilentio & odio conuiuentium. Sequitur etiam nunc uiuendi, nunc mo  
 riendi cupido, cum ſuſpicionibus uelut inſidiarum ſibi paratarum. Item inanes  
 fletus, atque murmura uacua, & ruruſum hilaritas, magis poſt cibum cum infla  
 tione præcordiorum, uel oris uentris uſq; ad interſcapulas, quas Græci metaphrenum  
 uocauerunt. Item capitis grauedo, color uiridis cum nigrore, aut ſubliuidus,  
 corporis tenuitas, uirium debilitas, & accepti cibi corruptio cum ruſtationibus  
 odoris terti, hoc eſt fumoſi, uel bromoſi, uel piſcoſi. Item inteſtinorum tormen  
 ta, uomitus, tunc inanis, nunc ſelloſus, uel ferrugineus, aut niger, & eiudem  
 qualitatís per podicem egeſtio. In lenimento uero eorum mitigatio, uel multo  
 rum depurgatio. Sed hanc paſſionem furoris ſpeciem alijs plurimi, atque The  
 miſonis ſectatores uocauerunt. Diſfert autem, ſiquidem iſta principaliter ſtoma  
 chus patiat, in furioſis uero caput. Et eſt cõmuniter ſtricturæ paſſio magna:  
 aliquando etiam complexa ob plurimas egeſtiones. Præterea eſt ex numero  
 D tardarum paſſionum, quas Græci chronias appellant. Curatio autem adhiben  
 da eſt, quã furioſis ordinauimus: Non enim phlebotomiam reprobendam  
 atteſtante dolore, aut hellebori purgationem atteſtante paſſione approbamus,  
 ſed exterius localia adiutoria, atque mitigatiua, ſiue corporatiua magis ori uen  
 tris, atque inter ſcapulas ſunt adhibenda. Ac ſi forte aut uomitus immodicus,  
 aut egeſtio uentris coëgerit, conſtrictiua ſunt cataplaſmata apponenda uentri  
 atque ſtomacho, ut ex palmulis thebaicis in fuſis uino uel puſca, admixtis etiam  
 malis punicis, uel cydonijs, & cenanthe, & alumine ſciſſo, aut hypocyſtide,  
 uel acacia, ſiue galla, & hijs ſimilibus. Dandi etiam cibi conſtrictiui, atque ap  
 ponendæ eius uirtutis cucurbitæ. Alia uero medicarum ſectarum præſe  
 ctis relinquamus, & hijs qui de furioſis ſcripſerunt. Adhibent etiã  
 bibenda medicamina, hoc eſt, aloẽ & abſinthium iugiter,  
 quæ propter uim ſuam, quam habent plurimam, ex  
 cludenda probamus: quippe cum ſit poſſi  
 bile ex conſuetis perficere  
 ſanitatẽ.

CAELII AVRELIANI SICCENSIS  
 CHRONION LIBRI PR  
 MI FINIS.

## CAELII AVRELI-

ANI SICCENSIS CHRONION

LIBER SECVNDVS.

CVI HÆC IN SVNT:

- I De paralyſi.  
 II De canino raptu, quem Græci cynicum ſpasmus uocant.  
 III De auriculæ dolore atq; humoris fluore per auditoriam cauernam.  
 IIII De dolore dentium.  
 V De apprehenſione, ſiue oppreſſione, quam Græci catalepiſin ap-  
 pellant.  
 VI De uocis amputatione, quam Græci phones acopen uocant.  
 VII De influxione, quam Græci catarrhum uocant.  
 VIII De tuſſicula.  
 IX De ſanguinis fluore, quot, uel quæ ſint differentiæ ſanguinis floris.  
 X Quomodo intelligamus differentiæ floris ſanguinis.  
 XI Quomodo intelligamus ex quibus locis ſanguis feratur.  
 XII De effectu ſiue exitu ſupradictarum paſſionum, quæ Græci apote-  
 leſmaton appellant.  
 XIII De curatione.  
 XIII De purifica paſſione.

Καταληψι-  
μός.Καταληψι-  
σώνος ἀπεναντι-  
κατάληψος.

Primo libro Tardarum paſſionū de capitis diximus curatione, & de scoto-  
 maticis, & de incubone: ſed & de epilepſia, & de furore, ſiue inſania,  
 & de melancholia; nunc cæterarum actiones ordinemus.

DE PARALYSI. CAP. I.



N ſenibus atq; hyemis tempore frequentat hæc paſſio: diſ-  
 ficile autem in calidis ætatibus: Sed generatur nunc ex oc-  
 cultis, nunc ex manifeſtis antecedentibus cauſis, ut quaſſa-  
 tione, uulneratione, uel alia qualibet paſſione: Item frigo-  
 re profundo, uinolentia, indigeſtione, luxuria, atque libi-  
 dine frequenti extenta: item medicaminibus potis. Sed eſt  
 uel fiet paralyſis nunc ſenſus, nunc motus, nunc utriuſq;.

Et intelligitur ſenſus paralyſis, quoties ſeruens atque frigidum non ſentiunt  
 ægrotantes manifeſte partium naturalium motu: motus autem, quoties ſer-  
 uens atque frigidum ſentiunt motu partium carentes: utriuſque uero paraly-  
 ſin factam accipimus, quoties motu atque ſenſu caruerint. Item hæc paſſio  
 nunc partis eſt, nunc paruum, nunc totius corporis cum apprehenſione men-  
 tis, quam apoplexiam uocantes, Acutarum paſſionum libris tradidimus.  
 Sed plurimis ſpecies duæ paralyſeos uisæ ſunt: Alia conductione effecta: alia  
 extensione. Sequuntur autem pronos & decliues in paſſionem, hoc eſt, qui  
 non repente fuerint percuſſi, ſi totum corpus paſſurum denuntietur, ea quæ  
 epilepſiam uel furorem denuntiant. Si uero ex parte, grauedo partis paſſuræ  
 ſequetur, ut tardus motus cum ſtupore & pallore, & torpedo cum ſenſu debi-

Παράλυσις.

Απopleξια.

C litate, quæ nunc perseverantia, nunc sine ratione recedentia intelliguntur, ac rursus recurrentia: Dehinc effecta passione torpor atq; stupor gelidus partium fiet plurimus, & parvus, & nunc uoluntario motu cessante, nunc ex parte manente, & nunc sensu amisso, nunc paruo remanente, nunc etiam dolore attestante, obscurato pulsu, & per profectum cessante pallore, & tenuatione partis uitiatæ, nutrimento cessante, quod Græci atrophian uocant. Sequentæ etiam rugatione cum adductione partium, uel extensione. Aliqui præterea paralysin uocauerunt eam quæ ex omni parte naturalem motum abstulerit, paralytin eam quæ ex plurima parte uitiauerit motum. Quibus minime consentire maiorum autoritas iubet: Non enim passionum differentiam ostendunt, sed magnitudinem generaliter passionis, ut sunt quædam partes duobus uel plurimis officiis aptatæ, quæ nunc omnium, nunc certorum amputatione uexantur. Lingua etenim transuorationis officium sustinens uerba distinguere non ualebit. Hæc sunt communes paralyseos significationes: sed ob singularem partium atq; particularum, quas supradiximus, communiter adprehensionem, specialiter locorum impedimenta tractabimus. Supercilium igitur paralyti uitiatum laxius prope debet circa superius palpebrum, uel certe sustollitur, ut etiam ipsum suspedit. Item palpebrum superius paralyti uitiatum laxius fiet, atq; motu caret, & oculi pupulam contegit, uel e contrario extantum sustollitur, & oculorum pupulam nudat. Item interius palpebrum paralyti uitiatum nunc intrinsecus flectitur, nunc in semet uel exterius refunditur, & motu caret, atq; oculum non contegit. Sequitur etiam inuoluntarius lachrimarum fluor, quod est utriq; palpebrorum uitio commune: Et si in risum uenerint ægrotantes contortum uel conductum simulant uultum. Oculorum uero tunica, siue membrana paralyti uitiatæ uisum impediunt latitudine facta pupularum: quæ passio uocatur mydriasis: Ac si conductio fuerit paralytis facta angustior pupula fiet, cessante nutrimento appellatur phthisis. Lingua paralyti uitiatæ uocem non differit, sed interius mouetur, & nunc nullius significationis uocem reddit; nunc amputatione facta medio tempore oppressis conatibus conticescit. Demonstrata tamen uerbi intelligibili prolatione, nunc imperfecta, nunc ex omni parte motu carens. Sed discernantur ab ista passione qui forte ex alia uocem amiserint, cum neq; colorem, uel superficiem lingua mutauerit, neque sensu caruerit, neque motu, neque schema suæ mutauerit positionis, quod fieri necesse est, cum fuerit paralyti uitiatæ. Item odoramenti officium paralyti uitiatum odorum non accipit sensum, sed discernitur ab hijs, qui narium uitio officium odoris amiserunt, quod appellant ozænan: quod neque torpor partium, neque pallor, neque nutrimenti desertio sequatur, quam Græci atrophian uocant. Labium superius paralyti uitiatum inuertitur forinsecus proditum magis cum risu aduenerit, aut locutio: conducitur enim sano cum inferiori. Item potu sumpto exterius facit fluere liquorem. Hoc quidam caninum raptum esse dixerunt nescij, sicut principaliter futuro docebimus schemate. Itæ siagon paralyti uitiatum, siquidem nos musculum qui buccas colligat dicere poterimus, conducitur aut laxatur. Vicinus deniq; oculus non ualebit perfectæ facere reclusionem conducto inferiore palpebro. Mentum paralyti uitiatum amisso motu laxatur, aut uehementer sustollitur. Fauces paralyti uitiatæ transuorationis difficultatē faciunt. Gutturis summitas paralyti uitiatæ, siue ut reuma, siue ut Græci bronchos, mortem facit, & paruum transuorationis tussiculam: siquidem non perfectam eo tempore faciat inductionem, ne superet radicē linguæ, quam Græci epiglottida uocant: quo

perfecto

**A** perfecto accepta conuuantur. Videbitur denique eius extantia plurimum relaxata. Item stomachum paralyti uitiatum difficultas transuorandi sequetur, uel omnino impossibilitas, unde etiam praesens periculum. Videbuntur etiam difficilia transuorantibus accepta, ueluti acriora, aut immaturo tempore come sta. Item sequitur praefocationis sensus cum frigore, in quacunq; eius parte fuerit paralytis: illic nanq; etiam transuorata sistuntur. Sed discernuntur ab hijs qui facilem paralytin ex difficultate transuorandi patiuntur: Siquidem etiam decolorationes nutrimento cessante, ac frigus, etiam immobilitas faucium necessario concurrat. Item hijs qui ex stomacho sunt humores supradictis quere his si fuerint adfecti discernuntur, quod etiam dolore atq; feruore partium uexantur. Si cœnum uel eius summitas paralyti uitiatum, quod nos commune dicere poterimus, quod arteria atq; stomacho interpositum uideatur, locorum grauedinem faciet, atq; sumpto cibo uel potu in praecordijs permanebunt, cum torpore sensuum ac tumore manuum, aliquando & crurum attestante singultu & inani timore: Aliqui etiam reuomunt accepta nulla corruptione mutata. Perulo paralyti uitiatum cibus nulla digestionem mutatur, sed tanquam per infundibulum ad inferiora descendit, & circum uentrem laxior locus efficitur inferius inflatio: quae per uentrem egeruntur, aspera atq; plurima erunt, & neq; fluida: Nestide paralyti uitiatum & typhlotero, quod nos caecum intestinum dicere poterimus, erunt ea quae per uentrem excluduntur plurima, & minus fluida: Videntur enim neque cum naturam seruauerint, uel nullo fuerit morbo tentata, tunc plurimum excrementorum acceptorum facere. Colo paralyti uitiatum inordinato motu atque inuoluntario stercorea descendunt, sine ulla humectatione, uel cum foetore maximo eorum fiet egestio sine ullo dolore, Longanone cum sphinctere atq; podice paralyti uitiatum, erit inuoluntaria egestio stercorum, nisi ex aliqua hoc fuerit circumuisione confectum. Aliquando etiam praecedit, uel certe egestio stercorum non sine tumore, uel aliqua simili causa fieri permittit. Vesica paralyti uitiatum inuoluntarius urinae exitus fiet sine ullo dolore, neq; incisura, neq; circūcisione antecedente. Aliquando etiam per interualla prohibitus, uel paulatim retardatus, aut omnino negatus, & saepe etiam pubetenus extantia partium fiet, extenta uesica, sed ex tumore, uel sanguinis gelati corpusculis, quae Graeci trombos appellant: aut lapide, uel uulnere difficultas fuerit mictus, aut in toto negatio discernitur, quod sine dolore atq; partium liuore, atq; sanguinis mictu, apposita manu oppressa pectine urina in paralyti excludatur. Praeterea etiam peritoneo paralyti uitiatum, ut Erasistratus ait, urina abstinetur, & neq; excluditur nisi adhibito catheteri: Non enim uesicae ambitus naturali consuetudine peritoneo imbuente opprimitur, neq; concluditur ad exprimendum liquorem radix uirilis paralyti uitiatum, sed multo maior aut minor efficitur, & nulla tetigine prouocatur. Seminales uisae, quas Graeci spermaticos poros uocant, paralyti uitiatum, si laxatione fuerit paralytis effecta sine ulla tetigine inuoluntarius fiet seminis lapsus, & uocatur haec passio gonorrhoea, quae nos seminis lapsum dicimus. Ac si conclusio ne fuerit paralytis effecta, iugis tetigine aegrotantis sequetur, sine ullo dolore atq; seminis lapsu, & uocatur haec passio priapismus. Crus paralyti uitiatum aut conclusionem breuius fiet, aut extensione longius, ut pleriq; putent articulorum delocationem hic factam. Sed discernitur hoc: si quidem concuuitas atq; distanti a loco motos aut eiectos articulos sequatur. Est autem ratione credibile, ceterorum quoq; interiorum singula paralyti uitiatum, ut pulmonem, cor, uel discrimen thoracis atq; uentris, quod Graeci diaphragma uocant, aut hypozygon, uel splenem, aut iecur praenitri

Kαίριρ.

τὴν ῥολοίαν

Νῆστιε.  
Τυφλωτέρου

Νηστίριρ.

Κώλον.

Longanoί

Τρομβίς.

Περιτόναιρ.  
Ερασίφρατῆρ.  
Καθητήρ.

Πέριε σπερματικῶν.  
Τορίπριου.

Πριπατισμοί.

Διαφραγμα.

adprehens

**B**

**C** adprehensione mortem patientis, quæ sæpe latent facta: cum nō propria possint  
 apprehensione signari. Herophilus deniq; repentinam mortem nulla ex mani-  
 festa causa uenientē, fieri inquit paralysis cordis. Item Erasistratus memorat pa-  
 ralyseos genus, & paradoxon appellauit, quo ambulantes repente sistuntur, ut  
 ambulare nō possint, tunc rursum ambulare sinūtur. Est autē passio generaliter  
 grauis atq; difficilis, sed grauior curatione fiet, quoties toto sensu caruerint par-  
 tes atq; motu, & in corporibus iam dudū debilibus, uel senibus, aut ex alio mor-  
 bo præuitiatis, ut epilepsia, febre: Item si plurimas tenuerit corporis partes, uel  
 uitiatæ necessarias. De nominibus autem specialiter elogiatis paralytica passio-  
 nis, ut mydriasis, phthisis, priapismo, gonorrhœa, & hijs similibus singula præ-  
 scribemus. De cæteris nunc dicemus. Hanc ergo passionem multi lectæ no-  
 stræ principes stricturem dixerunt, ob duritiam uitiatarū partium, atq; siccitatē,  
 & grauedinem, & torporē. Mnafeas uero conductione factam paralipsin uocat,  
 fieriq; etiā aliquando extētionē, aliquādo solutionē. Nos uero iuxta Sorani sen-  
 tentiā illam uocamus solutionē, cum plurimæ egestionēs corporis fuerint uitia-  
 tæ. Etenim manū, uel pedum, & horum similibus extentione facta, nulla egestio-  
 ne attestante, & in ligni similitudinē duratis partibus, stricturem dicimus esse pas-  
 sionem: Quippe cum frigesce, uel quadam rugatione crispari corpora cōmu-  
 ne cōtrarijs passionibus esse uideatur. Est autem passio generaliter tarda, & ac-  
 cessionibus atq; dimissionibus uariata, & superpositionibus ac lenimentis, cuius  
 prædata atq; demonstrata significatione necessariō curationē ordinamus. Mox  
 igitur effecta paralysis, lucido loco atq; mediocriter calido locandi sunt ægrotan-  
 tes, & usq; ad tertiam diem permittentibus uiribus abstinenti. Tunc nisi uiuio  
 fuerint pleni uel cibo, mox phlebotomandi, si copia fuerit, ex brachio: sin mi-  
 nus, ex qualibet patienti parte contraria, quo laquei constrictione, & phleboto-  
 mi diuisura in passione constituti non afficiantur. Si autem pleni fuerint cibo,  
 alia die erunt phlebotomandi. Sed partes paralysis uitiatæ fricatione atq; calefa-  
 ctionibus recurandæ, & lanæ limpidæ ex oleo dulci atq; calido expressæ, & cir-  
 cuntegendæ, & fomento relaxandæ. Tunc oris collutio permittenda, atq; potu  
 aquæ calidæ erunt prouidendi. Præterea accessionū ac dimissionum diligentius  
 tempora obseruanda, quæ adprehenduntur ex ægrotantiū pallore nunc aucto,  
 nunc minuto: uel sensu earundem partium, quibus plus aut minus inesse ui-  
 deatur. Item ex motu uel immobilitate, aut grauedine & leuitate, aut frigore &  
 feruore. Tunc diatriu tempore adhibenda perunctio ex oleo calido. Ora quoq;  
 fouenda ex aqua mediocriter calida, & dandus cibus paruus sordibilis, ut alica lo-  
 ta ex aqua calida infusa, aut oua. Ac si tranfurationis faucium partes paralysis  
 fuerint uitiatæ, erunt cucurbitæ obliquis partibus gutturis atq; ceruicis appo-  
 nendæ. Tunc cibus offerendus: etenim extantæ tranfurationis officio facile ser-  
 uire coguntur: exinde donec passio declinet alternis diebus dabimus cibum. Se-  
 quenti deniq; die post diatriu abstento ægro cataplasmatibus utemur ex polli-  
 ne lini seminis & scœnigræci. Tunc alia die, nisi passio creuerit, patientibus locis  
 cucurbitas infigentes scarificabimus: ac si plurimæ fuerint partes passione uitia-  
 tæ, cogentibus magis atq; urgentibus ordine præponimus curationē, uel hijs lo-  
 cis, quæ facile poterunt ægros in periculi deuocare, aut ex quibus cæteris par-  
 tibus facile possit curationis beneficiū dari. Sic deniq; stomacho laxato plurima  
 certe conlaxātur, utpote è contrario oppressis principalibus partibus cæteræ ne-  
 cessariō cōprimuntur. Tunc cæteris trinis diebus, quas diatriu Græci uocau-  
 runt, alias quoq; partes cucurbita releuamus. Si siagon, uel mentum paralysis  
 fuerit



**A** fuerit uitiatum, erunt cucurbitæ temporibus infingendæ, atque musculis buccarum, uel sub aurium lamnis. Ac si fauces fuerint uitiatæ, uel tranſuorationis partes, prædictis utemur adiutorijs. Itē manibus paralyſi uitiatas, erunt humeris uel eorum ſummitatibus atq; palis, & brachiorum musculis, aut cubitorum nodis hæc adhibenda. Item cruribus paralyſi uitiatas, uertebriſ atq; genibus cucurbitæ infingendæ, quarū quæ partes non accipiunt uſum, ut ſupercilia, labia, digiti, ſanguisugis erunt releuandæ. Item ſi nimia tenuitatis cauſa, aut uſus difficultate, neq; ſanguisugarū morſum tolerare potuerint, ut in palpebris, uel lingua, præfecta uaporatione ſcarificamus, & generaliter cataplaſmatibus utimur. Tunc ſi exegerit paſſio ſecundo ſcarificamus, & ſpongiarum uaporatione utemur, ex aqua & oleo ſolo expreſſis, uel ex oleo aut decoctione lini ſeminis atq; ſœnigræci, uel hibifci, aut malux communis uel agreſtis. Hijs uero qui ſecundum linguam, uel tranſuorationis partes paralyſi fuerint uitiatas, tempore cataplaſmatū atq; uaporationis iubemus in os dari oleum calidum, uel aquam calidam, & oleum continendū, aut muſſum; Simul enim atq; eodem tempore ex utraq; parte uaporata uehementius relaxantur. Si uenter fuerit retentus, clyſtere utemur prius quàm partes cucurbita releuamus, ut primo ex aqua muſſa. Tunc ſi oportuerit, etiam diurnis diebus ex oleo calido iniectiones adhibemus. Si inteſtina, uel eorum uicinitas paralyſi fuerint uitiatas, ac ſi etiam urina fuerit retenta, adhibitis cæteris adiutorijs atq; perfectis, encathifmata ſunt adhibenda. Tunc cathariſmus faciendus, quo urina detrahatur, ac poſt detractiōnem oleum calidum inſciendum, atq; adnexo folliculo catathere ex ea parte quæ cyſtophilos à Græcis eſt appellata, uel otico clyſtere, quem nos auricularem dicere poterimus, tenui exabilifco formatum, quo poſſit cauernam inuadere directum catathere. Tunc cucurbitas prædictis adhibemus locis, atq; uaporationibus & cataplaſmatibus eas partes cum podice & ueretrīs uicinis releuamus. Si ſtomachus fuerit paralyſi uitiatas omnia ſorbilia dabimus, quo facilius tranſuorētur. Ac ſi ea quæ ſumuntur aliqua ex parte ſubſtiterint impedito meatu, agrotantiū manus in aquam calidam mittimus, uel parua uacula aqua calida plena tenenda offeremus. Tunc ſtomacho leuem cucurbitam inſigemus ſub ea parte quæ premi uel impediti uidetur. Atq; ita ſenſim, uel paulatim eam detrahimus, quo ſtomachi partes deferendo accipere, uel tranſire faciamus illata, uel uacui officium in memoriā reducamus; ac ſi uomitus irruerit paralyſi facta nihil dentibus interponamus. Si uero † conductio immittimus ceram, uel tabellam alearem, aut feruleam, & ductu contrario ſcaciolæ corrigere tentabimus deprauata declinantur paſſione: Etenim ante id tempus difficiles in cōſenſu partes eſſe preſpiciuntur: & propterea quaſſatio potius quàm effectus ſequitur. Vtemur præterea eodem tempore etiam cerotarijs qualibet paralyſi uitiatas: & primo ſimplicibus, ut ex cera & oleo pingui, uel ſabina, & ſquinanto, admixta hibifci decoctione, uel ſœnigræci ſemine contuſo, atq; trito. Tunc ex oleo ueteri & refinate rebinthina adhibemus etiam embaſin ex oleo calido. Tunc calidam & oleum, cibum dantes diurnis diebus ex oleribus non acrioribus, at que piſcibus petrenſibus, & uolantum paruioribus. Vtemur etiam acopis, ut eſt diaſamſucū & diamelilotū, uel omnibus quæ ex adſipibus conficiuntur, & medullis, et irino oleo, uel malabatrino, et quirino, et hijs ſimilibus, et malagmatibus talibus, ex quibus eſt diachilon, atq; mnaſeum, et diamelilotū, et meline ſimplex. Tunc geſtatione corpus mouebimus pro uirium modo, fertoria ſella, ſiue cathedra, longiore tunc uehiculo manibus actō, dehinc animalibus; Sic enim cōſenſu perſuaſe

Ευκαθίσματα  
Καταφροσις  
Κυσιφίλος  
Οτικος καινός

† concludo

Κυβαρις

Κισσαρις

C altiores in corpore materia ad exteriora concurrunt, cum in embasi ex oleo fuerint constituta, motus beneficio praelaxato agrotante. Dehinc lauacrum adhibemus atque uinum paruum, & consequenter singula, quae passione fuerint uisitata, suo officio exercemus: explorantes etiam, uel intuentes si quid aliud in corpore passionis occurrerit, ex quo paralysis uideatur effecta, ut hoc quoque destruamus: non hac quidem quod antecedens causa esse uideatur, sed quo etiam eam ipsam passionem necessariò intelligamus. Quapropter si uulneratio ei fuerit cõgrua, gerere debemus sicut in Chirurgumenis, uel Responsonum libris demonstrauimus: Reminiscentes, siquidẽ ex uulneribus facta paralysis sit, diuisione partium necdum proprio nomine uocabulum teneat, sed appellari claudicationes uel tardationes possunt, siue alienationes. Sin uero cicatrix fuerit clausa, hanc mollire tentabimus. Item si spinæ contortio uel conuersio ex causa effecta, hanc corrigemus. Item si febricula, aut nimia capitis passio, quam cephalæan uocant, aut epilepsiam, ex ipsa eas quoque destruemus. Item si euersio, uel inclinatio fuerit matricis, eidem consequenter ordinata adhibebimus, sicut Muliebrum passionum libris docuimus. Sin uero articuli fuerit eiectio, quamquam longi temporis eum recolamus. Item si quis humoris fluor per quodlibet officium naturale ultra modum fuerit dimissus, cataplasmata constrictiua probamus, ut ex palmulis thebaicis, malis citonijs, acacia, hypocistide, alumine, & hijs simili bus, apponentes etiam emplastrorum ea quae constrictiuae uirtutis à Græcis enama appellata, uel si qua ualent concludere atque siccare fluentia, ut sunt uulnerum medicamina quae appellantur melana. Nunc similiter agros resumemus, ac si passio permanferit, cyclo ductu resumptionis regula dirigemus per uariam gestationem, deambulationem, uocis exercitium, lectionem, unctionem, lauacra. Tunc post hæc omnia partium adhibemus frictionem, dantes uarium cibum atque uinum, iuxta præscriptam disciplinam omnia augentes atque minuentes: & nunc usque ad piscium qualitatem ordinamus cyclum, nunc usque ad uolantum, tunc etiam agrestium, ultimo porcinae carnis, sicut superius De capitis curatione scribentes docuimus. Dehinc adhibemus etiam metafyncriticos cyclos, & primo partiles, tunc perfectos, nisi ex initio uires agrotantis eos perferre non ualuerint. Denique nunc drimyphagia utemur antecedente cibi paruitate, nunc uomitum prouocamus drimyphagian linquentes, & cæteras quoque cycli regulas complexus, & nunc uomitus adiungentes drimyphagian. Ipsum quoque uomitum primo ieiunium probamus, nunc ex radicibus, uel hijs similibus qualitate materijs. Atque ita post frequentem radicum uomitum helleboro utemur, primo radicibus inserto, uel aceto infuso: Quo detracto radices immixtae concisae ipso cum liquore forbeantur. Vtemur etiam localibus adiutorijs in hijs partibus quae sunt paralyti uisitatae, ut dropaci primo, tunc composito, quem Græci pharmacoden uocauerunt. Psylotro quoque, & cucurbitis recorporatiuis multa cum flamma admotis, atque uiolenter remotis, aut circumtractis nunc ex superioribus ad inferiora: Etenim spiritus iam dudum motu uacuatus ex alto adducetur, & quadam prouocatione excitus uel accurrens sua cubilia cognoscit, singularum uiarum motus inuadens, passionis deturbato languore. Hoc igitur facere tentabimus ex multis cucurbitis per spinam, recto scilicet ordine post inuicem adfigentes, atque sufficiens tempus adductioni largientes, primo primarum faciemus detractionem, tunc sequentium, quo sibi adductum spiratum tradunt, atque in soltos prouocant motus, atque uerso ordine inferiores primo affigentes eandem detrahemus primo. Post cucurbitationem atque dropacis usum, puluere nitri partes

aspergi

Libri Caelij  
de uulnibus

Libri Caelij de  
muliebribus  
passionibus.

Emplastra  
Medicamina  
melaena.

D

φρῶσαξ  
φαρμακὸν φαρ  
χίλωρορ

A aspergi facimus, & fricari uel sinapi, uel ex utroq. Tunc etiam hijs pulueribus quæ sunt ex calce uiua, fecla, pumice, pipere, pîretro, & hijs similibus uirtute rebus. Ordinamus etiam unctiões, gestationes uarias, acopa quæ mordicatione quadam corpus afficiant, uel accendant, & emolliant: ut sunt ea quæ conficiuntur ex oleo sicyonico, syriaco, castoreo, aphronitro, sulphure uiuo, agresti cucumere, ammoniaci gutta, squilla, quam uulgo uulum pluriosum uocant, urticae semine, pîretro, pipere, helleboro <sup>†</sup> albo, nigella, galbano, iri sillyrica, lemnida carie, & hijs similibus. Non aliter etiam malagmata sunt adhibenda, quæ corpus ualeant papulare laceffendo, ut sunt ex flore salis, uel ex nitro, & illud quod Nileos appellatur, uel diadaphnidon, uel apollophanos, & caphy sophontos: quorum compositiones Responfionum tradidimus libris, pro modo magnitudinis passionum adhibendas, atque lenimentorum alias augentes, alias indulgentes. Ordinamus etiam sole corpus torrendum, uel paroptesin ex carbouibus, aut parietibus calefactis, uel pauimeto, item lapidibus ac testis, hoc faciunt. Etiam ceromata sub sole ignita, uel terga præuncta, simili modo calefacta, quæ substrata accipiunt ægrotantes uoluntatione quadam conuertendi, ac defricandi, & mutandi: etiam loca quæ deseruerint repetenda, ut ueniant feruentiora: quippe cum naturaliter tergora oleo ac sole facile feruescant. Utemur etiam ob similem corporis curationem, quam Græci phœnigmon uocant, harena littori uicina, quæ sit sole ignita, ut circūtectâ gremio foueat ægrotantē. Tunc etiam fomentationibus ex aqua salsa, uel marina, aut decoctione baccarum lauri, uel omnium quæ ita corpus afficiunt: manente passione etiam cataplasma ex sinapi adhibemus, uel contusam atque liquatam ferulaginem, quæ Græci rapstan uocant, corpus uingemus usque ad cutis ruborem, atque medicrem partium inflationem: Etenim uulnerari, siue uexari quosdam ex istius herbe usû immoderationis est uitium, tanquam sinapismi usus immodicus. Generaliter autem similiter medentur etiam uaporationes ex facellis sale torrido repletis, atque in lauacro igneo usus flaborum. Ordinamus etiam si quid partialiter loco patienti poterit adhiberi, ut capiti passione uexato rasionem capillorum, nunc pro capillatura, nunc contra capillaturam. In mulieribus uero, quæ id fieri non facile permittunt, denso pectine exerceri capillos imperamus, supradicta scilicet diuersitate, & cum uehementi conatu, atque primo aliorum manu, & raro pectine: tunc magis denso, & ægrotantis manu. Ac si odorandi officium fuerit paralyfi uitiatum, erunt adhibenda acriora odoramenta, ut ex aceto & sale, aut adiuncto origono in aceto extincto, quo ex eo acriorem profecto exhalationem naribus sapiant ægrotantes. Nunc etiam sinapi, uel castoreo ex aceto soluto per interualla, uel lasare, quod Græci opon cyrenaicum uocant. Sed hæc erunt naribus quoque immittenda, uel sinapi cum aceto, donec prouocentur iubemus eos uolenter emungere. Probamus denique betæ nigrae, uel cyclaminis herbe succum cochleare plenum naribus infundendum, utentes ptarmicis uehementioribus, quæ nos sternutamenta uocamus, ex pipere, helleboro, castoreo, astrutio, & horum similibus. Post sternutationem uero magis odoramenta utenda probamus: Hæc enim uehementius odorationis mouent officium, & solas capitis partes in passione constitutas quadam mutatione reformant. Ac si lingua fuerit paralyfi uitiatâ, uel transuorationis partes, aridum sinapi dabimus mastilandum ante lauacrum. Tunc aqua calida os colluere præcipimus. Aliquando etiâ liquefactum ex aceto forbere ægrotantem imperauimus, & gargarizare. Hoc quidem etiâ de similibus

† alcionio

φαινίγμον

ὀπὸν κυρηναϊκόν

στέρμινά.

C liquoribus faciemus, ut ex fico, hyssopo, draganto, origono, thymo, pipere, pã retro, staphisagria: hæc etiam masticanda dabimus. Ipsam quoq; linguam lasa, re fricantes ex aqua soluto. Tunc etiam cornu cucurbitæ in modum adhibemus: adducit enim non aliter quam hæc spiritum, & insolitas prouocat uías, quæ sunt ex antecedentibus medicaminibus præpurgatæ. Item stomacho patiente atque uentre, magis frequentabimus drimiphagian: dantes etiam lasar cum aceto, ex quibus panis erit madidandus, adiuncto quolibet pulmento. Ac si pedes fuerint paralyti uitiatius, aut eius uicina, acriora facimus uel mordicantia iniijci collyria, quæ Græci balanos uocant, uel sinapi plurimum fico admixto, atq; in collyrium collectum longitudine aprum partibus iniijcimus, ut ea quæ in alijs ordinatimus fomenta, nunc pro encathisimatibus adhibemus, uel per clysterem inijcimus aliqua ex acrioribus, ut aquam falsam, uel marinam, uel garum, quod appellamus liquamen ex pisce siluro confectum, & si qua fuerint similis uirtutis: Quorum omnium dexterus usus, atque confectionis genus, & adhibendi rationem libro Adiutoriorum specialium docuimus. Oportet præterea singulas partes in passione constitutas, suis ac naturalibus motibus admonere, ut supercilium leuando ac deponendo, palpebram concludendo ac distinguendo, linguam produciendo atque conducendo. Hæc sunt ægrotantibus imperanda. Hortandi etiam locutionem tentare: Quod si minime facere potuerint, ex omni parte officio linguæ cessante, erunt suadendi, ut animo concepta uoluant quæ proferre non possunt: Sæpe enim quæ loqui uolentes mente perceperint, in alto formans spiritus accepto motu rumpit in uocem. Vel certe docendi sunt unius exprimendæ literæ curam suscipere, ut intra se exercendo manifestius probent, & magis ex uocalibus, ne difficultate sonitus multarum literarum uocis organa concludantur potius quam referentur. Tunc cum implere ualuerint dabimus lexes, atq; nomina, quæ sint ex multis uocalibus conscripta, ut est Pæan, & hijs similia: Sic etiam numeros dabimus, & ex hijs exclamare prouocabimus ægrotantes, ac deinde lectionem offeramus, uel disputationem. Hæc adhibenda sunt etiam si buccarum partes circa labiorum confinia, quem Græci chalinon uocant, fuerint in passione constitutæ. Dandum etiam masticæ masticanda, uel cera indulgentior mordenda, tunc ferulæ particula, uel per profectum uiliæ tabellæ: Plus enim illorum singula quodam cum certamine partes faciunt exerceri. Tunc danda etiam frangenda arida fabarum grana, uel amygdala molliora, ac nuces auellanæ primo, tunc etiam glandes paulatim aucto numero quantitatis. Ac si digiti fuerint in passione constituti, erunt commouendi oblatione ceræ emollientis, & malagmatum superscriptorum: Quo non solum motu, sed etiam tactu medicamina propria uirtute medentur. Præterea eodem exercitij tempore, & in illis quibus totæ manus paralyti fuerint uitiatæ, uel earum qualibet partes, aliter erunt offerendi: At enim pondere pro modo uirum ægrotantes, quodam labore mortes exercent. Sed erunt prædictis malagmatibus commouendi, ut primo teneant uel baiulent ægrotantes, tum demum ex ipsis simili ratione ferendi manus exercent. Ac si crura fuerint paralyti uitiatia, si fieri poterit per seipsos, sin minus, aliorum impulsu extensione atque conclusionem exercent eas partes, non tamen sine suasionem, qua non solum motibus exercentur, uerum etiam ipsi connitantur. Erunt deniq; ob uarietatem motus artis industria partes commouendæ hoc modo: Iacete ægrotato, cruribus imposita fasciola superpendenti rotula, quam Græci trochilion appellant, alterum ex sinibus fasciolæ inferendum, hinc tenendum dare; nunc ministro, nunc ægrotati demonstrato motu, ac partit.

βελανω.

Γαρυμ.

D

βίβω.

καλινω.

καλινω.

καλινω.

tiff.

A tili, qui nunc adducta fasciola subleuet crura, nunc indulta deponat. Sed cum non solum leuare ac deponere uoluerimus, sed etiam extendere, aut inflectere partes paralyti uitiatas, duz erunt fasciolæ imponendæ; altera genibus, altera talis: tunc per supradictam rotulam traiciendæ, & apprehensis iniitijs similiter offerendæ patientibus uel ministris, ut uicissim adducant, quo ea quæ genu continet adducta, & ea quæ talum continet indulgente, hoc motu crura flectantur: Rursus talari adducta, & indulta ea quæ genu continet cruris fiat, extensio. Ac si sedere poterint ægrotantes, erit fasciolæ medietas pedibus submittenda, cuius iniitia eidem tradita, cogatur labore proprio per seipsum adducendo atque indulgendo suis cruribus motum præstare. Simili etiam modo manus in passione constitutz moueri posse noscuntur, ut ex altera fasciola iubeat quæ oportet arteriam articulis digitorum uicinam, quam Græci carpon uocant, altera cubitum circumdari. Præmotoris igitur, uel exercitis, ut supra dictum est, dabimus ut sella tonforia sedeant ægrotantes, quæ sit obliqua anconibus fabricata, quibus incumbentes sese leuare nitantur: & nunc fulciti ex utroque alarum latere ministrorum officio deambulationem tentent, uel incumbentes baculo, aut uehiculo manibus acto, quod infantibus sæpe motum discentibus fabricatur, sed magnitudine tamen ægrotantibus coæquandum. Dehinc cum gestationis augmenta sufficimus, conficienda sunt ligna, quæ transgredi pedibus nitantur ægrotantes: Tunc etiam perfectis in terra lacunis deambulationem imperabimus, ac deinde calcamentis adiuncto plumbo prius paruo, ut exempli causa uncia, tunc plurimo, atque pro augmentorū gradu usque ad librā deducto, tum etiam itineris celeritas erit augenda: habet enim maioris laboris officium. Varianda etiam omnis regula, ut nunc resumptiuos cyclos in metasyncriticis deducamus, nunc è contrario uersa uice gradum reuocemus. Præterea perseuerante passione ad hellebori usum probamus accedendum: non solum semel, sed & cogentibus rebus secundo uel tertio: tunc resumendos, atque naturalibus aquis dandos, & magis calidioribus, ut sunt in Italia Pantherinæ, Vesuianæ, & Senanæ, & Caritanæ appellatæ: Etenim Albæ, siue Albulæ quæ sunt appellatæ, quod sint frigidæ uirtutis, solutione laborantibus, uel fluore quorūlibet officiorum naturalium à ueteribus sunt approbatæ. Utendum etiam natationibus marinis, uel supradictarum aquarum, & primo partibus passione uitiatas inflatæ uesicæ sunt adiungendæ, quo natandi laborem minuant. Item aquarum ruinis partes in passione constitutz sunt subiiciendæ, quas Græci cataclysmos appellant: plurimum etenim earum percussiones corporum faciunt mutationem. Peregrinatio quoque adhibenda, atque maritima, necnon castoreum potodamus, si quisquam eius odoris difficultatem perferre ualuerit: Recorporationem curationem, quam Græci metasyncriticam uocant, utilem approbamus, partibus in passione constitutis. Hæc est secundum methodon paralyticorum curatio. Veterum autem medicorum Hippocratis et Erophili sectatores, memorant ea quæ in passione constitutos sequuntur, curationem uero nullam tradiderunt. Item Diocles libro quo de passionibus atque causis, & curationibus scripsit, eandem dixit conducere curationem, quæ epilepticis est ordinata. Dehinc Praxagoras secundo libro Curationum primo uomitū probat, & hijs præfertim qui caput fuerint paralyti uitiatum, nunc ante cibum, nunc post cibum. Tunc reuocationes atque uentris flua, & urinaria medicamina, quæ coeliotica atque diuretica appellauit. Adhibet etiam clysterem iugem & acrorem: bibendum etiam cum aceto asininum atque bubulinum lac probat. Tunc

λαρπας.  
αγνους.

Cycli resu-  
mptiui et  
μετασυσπρητιου

Albulæ.

κατακλυσμος

Hippocrates.  
Erophilus.  
Diocles.

Praxagoras.

ασινοτιν-  
δινρητινα

C cataplasmata, & malagmata, & sudoris pouocationes: & si quis uomere facile potuerit, parum hellebori pulmentis interiectis diebus admiscet. Neque mox factam paralyfin curans, neque recta à uomitu incipiens, & in hijs magis qui caput paralyfi uitiati uidentur, priusquam ex alijs adiutorijs partes fuerint releuatae. Dehinc sensibilis post cibum omnis est uomitus, & multo grauius iugis. At Praxagoras iubet, quotidianis aut alternis diebus adhibitis suis dogmatibus sublatris erroribus, quanquam uentri sua arque diuretica, & clysteres iuges approbauerit: Non enim quod mutationem corporis hæc facere ualeant existimauit, sed quod materiarum facere detractionem, atque corpus liquidis uacuare. Item aceto potu dato lac repugnat, cuius magis grauis, de hinc qualibus cataplasmatibus, uel malagmatibus sit utendum, dicere negligit. Sed neque tempus adhibendi discruit: Non enim quando mitigatiuis uisumur cataplasmatibus, tunc erit malagmatibus utendum. At iste pariter utraque cōposuit. Item sudores laxatis corporibus fiunt, non ipsi laxamentum faciunt: Sed neque quemadmodum sint prouocandi docuit, aut memorauit. Item album helleborum paruum datum præfocationis ingerit periculum, & multo potius quoties sunt in uomitum difficiles ægrotantes: Mitto, communiter eum dixisse interpositis diebus offerendum, & tempus non memorasse, cum passio nem necesse sit superpositionibus, ac lenimentis uariare. Item Erasistratus de paralyfi scribens, differenter curandos ait eos qui conclusionem sunt paralyfi uitiati, ab hijs qui extensione uidentur affecti: Etenim neque cataplasmata, neque malagmata secundis inquit conuenire: non aduertens, quoniam etiam strictura densata quædam corpora uel maiore, non aliter quàm chorda tenduntur: Laxata denique medicinalium uirtute sæpe retenduntur. Item initio curationis clysterem probat, phlebotomia negligens potentiam: quo adiutorio maius nihil maioribus approbatur. Tunc, inquit, effecta febricula detrahendum cibum, & dandum mulsuum ex aceto confectum: Profecto densata constringent. Tunc obseruatis temporibus accessionum uel dimissionum, dandam præsanam probat aut olus: quorum alterum inflat, alterum facile corrumpitur. Dehinc aromatics approbat potiones, & alias mites, alias uehementes. Ventrem quoque facilem cupit, ex quo stomachus uentris uitiatur, & neque quanta, neque quando, neque quæ danda sint memorauit. Prohibet etiam unius anni spacio, uana intentione tempus definiens. Dat etiam lac cum melle, atque sale, quod est contrarium supradicto mulso ex aceto confecto. Vitur præterea uomitu post cibos, quod iam superius fieri damnauimus. Vitiat etiam deambulationibus harenosis in locis, ex sola intentione sui dogmatis: Etiam uentrem facilem cupit, cadau suspitione deceptus. Asclepiades uero principaliter de paralyfi nihil scripsit, sed Erasistrato respondit, eos inquit, qui non graui dolore in ista passione afficiuntur, phlebotomari non oportere: Eos uero qui priuatis sensibus petore strictura uexantur, abstinendos primo, tum initiandos probat: Adhibet etiam purgatiua medicamina, quæ Græci cartatica uocauerunt, cum sint hæc corruptiua uirtutis, & propterea corpus eliminando consumant potius quàm relaxent. Sed specialiter à laxatione paralyfi uitiatis aduentia inquit medicamina conuenire, & fomentationem paruum paulo feruentem temperatam: non aduertens quia plurima extenta conclusis similem exigunt laxationem, atque indulgentiam tensionis, & non ut existimant, conscriptionem: Vtraque etenim hæc passio subiecta sunt, ut etiam stupor corporis, uel frigidus torpor, quem non semper necessariis uaporationibus,

Praxagoras.

Erasistratus.

D

Asclepiades.

**A** porationibus, uerum etiam frigore adhibito releuamus: Siquidem contrarijs inter se passionibus hæc subiecta monstrantur. Ordinât præterea idem in harenæ spacio deambulationem, quod appellant scamma, atque transcensum lignorum, & inter plurimum tempus bibendum uinum. Item Themison primo libro Tardarum passionum in quibusdam peccare cognoscitur, nondum rectam methodon respiciens: etenim phlebotomat ex ea parte quæ passione uiriata est, si, inquit, sensu non caruerit: non curans, ut supra demonstrauimus uitanda omnia, quæ adiutorio quadam necessitate ueluti uexabilia uideantur esse coniuncta. Dehinc lanam succidam, quam celypon appellant, capiti iubet imponi, aceto atque oleo rosaceo infusam. Nervis autem ceruicis atque spinæ, & cruribus, & brachijs, uinū atque oleum cum sale imponendum iubet, constringens atque laceffens incongrue ea, quæ phlebotomia miti releuatione laxauerat. Tunc tertiâ die cibum probat, atque quarta die cucurbitam imponi adiuncta scarificatione, non interrogans passionis tempus, solum numerum dierum imprudenter attendens: Dehinc sequentibus gestationem probat, & neque in eo desiniens tempus, atque audaciter secundæ diatribitur expectationem spernens. Dat etiam aloë in potu, & ex aqua calida, & oleo intestinis dare laxamentum ordinat. Præterea anatresin testæ faciendam, quam nos perforationem uocamus, iam dudum quidem & in alijs methodicis exploram: & harenæ deambulationem conuenire existimat, atque plagis ferulæ cædendas partes in passione constitutas, profecto quæ falsæ aquæ mitigatione atque recorporatione uidentur esse curandæ. Item Lusius primo libro Tardarum passionum cum hijs omnibus, tum medicosis quoque fomentationibus utendum probat. Plurimi etiam alij aceto, atque oleo roseo fientes cum herpilio, & ruta, & hedera, & castoreo. Probant præterea iuges clysteres, atque purgatiua medicamina, quæ catartica uocauerunt, & magis hieram, cuius uisum græco libro Epistolarum ad Prætextatum damnauimus scribentes: Sunt enim ea quæ stomachum uitiant fugienda, ut sunt corpus insumentia, & quæ moderationis nostræ careant potestate. Item Theſſalus secundo libro de Regulis scribens, plurima recte dixisse probatur: quadam uero proterua festinatione caduca: Etenim post phlebotomiam usque ad tertium imperat abstineri, solum potum diurna cum luce offerendum. Tunc transacta tertiâ die atque hora qua sunt ægrotantes paralyti uitati cibum portat. Quibus respondere facile quisquam poterit, si querat, qua intentione Theſſalus oriente luce potum iubeat dari: Etenim si continuationis causa fieri responderit, oportebat etiam cibum eodem tempore approbare: Sin uero accessionum frequentia id existimat declinandum, uel suspitione futurarum, & propterea post tertium diem cibum transferendum, quo transacta hora passionis illatæ tertiâ die recte ægros nutrire uideamur, oportebat etiam potum non communiter, sed generaliter diurnis diebus, uel initio lucis offerre, sed horarum dimissione captata. Dehinc non semper, ac necessario tertio die cibum oportet dari, sed etiam quarta continuationis, quæ initium ex die sumpsisse uisa, uel ob typum eadem ratione currentem. Idem post hæc similiter ut Themison, quarta inquit die cucurbitas infingendas, non interrogans utrum passio sumpserit statum, quod est maxime seruandum. At præterea alternis diebus cibandus usque ad centum numerum dierum, quod infinitum reliquisse perspiciatur. Audaciter etiam, atque inuidiose acopa quædam, uel malagmata probat

Themison.

Lana  
ciourens.ad quod  
testæ.

Lusius.

Cely  
liber  
græcarum  
epistolam.  
Theſſalus.

C excludenda, solius moderationis neglecta arguens uitia. Hæc sunt quæ etiam  
 Soranus. Theffalo Sorani diligentia uidentur esse responfa.

θεωριος ορατος  
 his.

DE CANINO RAPTU, QVEM GRAECI CYNI  
 CON SPASMON VOCANT. CAP: II.



αελιος.

Niſta paſſione conſtitutos ſequitur conſuſio, ſiue contractio  
 repentinu motu ueniens, ac recedens ſine ulla corporis turba  
 tione, & nunc utriuſque labij in ultimo fine, ſiue oris angulo,  
 quem Græci chalinon uocant, ut etiam buccas adducat in po  
 ſterioſiorem partem crebriſſime, tanquam ridentibus, nunc pal  
 pebras, uel ſupercilia ac nares, ut etiam colla atque humeros ra  
 piat, & ita patientes faciat commoueri, tanquam onus humeris baiulantes tranſ  
 ferendi ponderis cauſa. Differt autem à ſpſmo, & paralyſi muſculorum qui  
 buccas conligant: Siquidem ſpſmus acuta atque celer paſſio perſpicitur, ca  
 ninus uero raptus etiam tarda. Item paralyſis ſupradictorum muſculorum, non  
 ut Demetrius ait Attaleus, eo differt, quod non ſit in canino raptu partium cõ  
 uerſio: hoc enim contra manifeſtam rationem intelligitur dictum, ſed quod  
 ipſa conuerſio coacta celeritate prius facta, quam fieri ſentiatur. Curationem  
 uero ex ante ſcriptis accipiendam ducimus, & magis quam de paralyſi monui  
 mus, oris partibus.

Demetrius  
 Attaleus.

DE AVRICVLAE DOLORE, ATQVE HVMORIS  
 FLVORE PER AVDITORIAS CA  
 VERNAS. CAP: III.



αριος ανασκου.

Enſuales aurium uitæ, ſiue auditoriæ cauernæ, quos Græci acu  
 ſticos poros appellant, difficilimis sæpe doloribus uexantur, ut  
 etiam occipitium teneant, & oculos atque buccarum muſcu  
 los, & perſeueratione quadã tardiſſima, tempora teneant & ca  
 put. Aliquãdo etiam humoris fluor per eaſdem cauernas fiat,  
 quem Græci reumatifmon uocant, & ita ſugis, ut sæpe uulneret  
 altiora, atque corrumpat, & oſſa contrebret, & propterea copiã fluentis humo  
 ris efficiat. Oportet igitur actionis tempore diſcernere curationem in lenimen  
 to communẽ magis, hoc eſt recorporatiuam, quam Græci metaſyncriticam uo  
 cant, adprobare, ut cum dolor fuerit in initio, adhuc nouam paſſionẽ iudicãtes,  
 quicquam deſtillari faciamus in has cauernas, conſtrictiuum medicamen, uel  
 ex lana limpida ſumentes auriculæ immittamus, ut eſt amygdalinũ, uel roſeum  
 oleum, uel acetum, & hijs ſimilia. Utendum etiam requie corporis atque abſti  
 nentia, & ſilentio ſuo: Etenim officio accepta uoce aures neceſſariõ cõmouen  
 tur, & propterea maiores dolores efficiuntur. Ac ſi paſſio fuerit augmẽtis aſpe  
 rata, erit immittendum oleum calidum ac dulce, ac mollibus lanis prætegen  
 da exteriora, atque uicina. Locandi præterea ægrotantes calido in loco, & ſi do  
 lor coëgerit, phlebotomandi, atque tertia die leui atque ſorbili cibo reficiendi,  
 & ob mitigationẽ doloris exterius admouẽda uaporatio tepidi uaporis, uel ſac  
 celli ex polline tenero conſecti. Tunc cataplaſmata laxatiua, & cum dolor  
 ſumpeſerit ſtatim erunt admouenda ſanguifugæ, quas hirudines appellant,  
 circa fines auriculæ, hoc eſt, circulatim auditoriã cauernam, habentes car  
 tilaginẽ prætermiſſam, uel certe eius poſteriora cucurbita admota ſcarifi  
 canda,

Curatio  
 αριος ανασκου.



**A** canda adhibita uaporatione spongiarum calidarum. Ipsam quoque cauernam inuoluta lana per melotida oleo calido tincta paulatim penetramus, atque illuc lana derelicta feramentum detrahimus. Tunc declinate passione cerotaria aponemus, dantes uariū cibum & uinum: ac si humoris fuerit fluor, quē reumatismū uocant, eadem adhibemus quæ initio doloris adhibenda probauimus. Dehinc eorum augemus potentiam, ut cauernæ ipsi faciamus infundi collyrium, quod appellamus diagaucium ex uino solutum, uel aceto, uel illud medicamen quod appellatur heren, uel mulsim ex uino factum: Quod sit præcoctum in mali punicæ cortice, cum nardo, uel amygdalis amaris, & aceto, croco, & myrrha, & alumine, uel ex herbarum succis constrictiue uirtutis, tum auriculæ uicinaria circulatim cataplasmata, ex cydonio malo, ac simili medentium uirtute contememus, uel medicamen quod appellatur diaiteo, quod est siccatiuæ uirtutis, uel icieso, aut diadictamno, & hijs similibus. Dehinc si passio coegerit, radendum est caput, & constrictiuis cataplasmatibus contegendum. Dandi etiam cibi constrictiui, & lenimenti temporibus, siue dolorum tardantium, siue humorū fluentium resumptiuus adhibendus cyclus, tunc recorporatiuus. Et localiter ipsis cauernis per clysterem modicum iniicienda, nunc destillatio aquæ cineribus liquata, quam uulgo lixiuum uocant, Græci coniam, nunc sinapi liquido, atque etiam admixto fico erunt exteriora cataplasmanda, donec rubor maximus fiat, quem Græci phoenigmon appellant. Item eundem immisione medicaminum ex garo confectorum, quod uulgo liquamen appellant, uel hijs uirtute similitum materiarum. Tunc etiam totius capitis curationem ex illusione aquarum supercadentium, quam Græci cataclysmum appellant. Quibus etiam aurium uicina sunt maxime concuranda. Dehinc acopibus & dropacis, & malagmatibus acrioribus, & aquis naturalibus utendum: Sic enim intardata corporibus emoueri, atque excludi mutatione poterunt curationis.

*Diagaucium.*  
*Heres medicina.*  
*camen.*

*Lixiuum.*  
*conia.*  
*phoenigmon.*

DE DOLORE DENTIVM. CAP: IIII.



**I**unt dolores dentium nunc omnium, nunc aliorum, nunc unius, cum sibi uicinantibus gingiuis, ut etiam contumescant, ac sæpe ora faciant subinflari, uel eorum aliquas partes crescere passione terebrari: Nam sæpe dentes & gingiue computrescunt, corruptis ossibus quibus natura inserti sunt, recedentibus tumore cogente gingiuis. Sed etiam nunc erit curationis diligentia partienda, ut initio doloris, uel certe si ita passio recurrendo tardauerit, superpositionis alia adhibeatur curatio, alia lenimenti. Quapropter adhuc recedentibus passionis motibus, uel in asperitate superpositionis doloris constitutis, conuenit abstinentia cibi, atque requies corporis, ut in initiorum causæ aqua quæ uirtute constringat collutioni oris adhibenda sit, ut est à plerisque conscripta decoctio in aqua & uino herbe syderitis, uel acaciæ, uel leuces, quam etiam posium uocant, aut mandragoræ, sed non sine cautione, ne quid ex ipso liquore transuorent ægrotantes. Item pentaphylli herbe, aut papaueris, necnon personatix, aut herba phlomon in pusca decocta, uel ex cornu ceruini drachmis quinque, & acetii hemina usque ad sui medietatem decocta, uel de pinguis cum aceto decocta, aut alterci radices cum uix lupinæ succo, & uino sufficienti simul cocta. Erunt præterea ex hijs, aliqua parte in doloribus constituta, apponenda uel lenientia, uel simili uirtute medentium materiarum. Tunc cum dolor uehementescere coeperit, lecto tradendus est æger, atque blando tempore

calescien-

C calefacientibus supino capite collocandus, sed paulo prominentius à cætero corpore subleuato. Tunc articulifricatione calefaciendi, atque musculi buccarum lana oleo calido infusa circumtegēdi, appositis saccellis ex pollinibus calidis confectis. Tunc oris collutio ex oleo adhibenda dulci atque calido, uel fœ nigraei succo, aut alica, aut ptisana, uel glycyrrhisa, aut lacte cum melle. Et si nimius fuerit dolor phlebotomia adhibenda. Tunc tertia die quo sanguinis facta detractio est, forbilibus atque calidis cibus ægri nutriendi, sed plus perungendi. Alia quoque die si dolor steterit atque durauerit, & officium cessauerit uentris, erit amouendus ex simplici clystere, & loca in dolore constituta ferro laceranda, appositis cucurbitis secundum buccarum musculos, atque ginguiarum locos. Aliquando etiam ipsæ gingiuæ scarificandæ, uel circumseparandæ à dentibus ferramento, quod pericharactera uocant. Est etiam mitigatiua ex oleo uaporatio, quæ fiet ex feruenti oleo, lanam melotidi inuolutam tingimus, tunc gingiuis altrinfecus imponemus, hoc est, interiori atque exteriori parti, & ipsis quoque dentibus, quantum æger ferre feruoris potuerit: Sed prætegenda uicina sunt, lana præmissa, ne facile pustulentur. Alia quoque uaporationum genera quæ sunt à ueteribus tradita erunt adhibenda, ut thuris granum igne calefactum tunc tenui linteolo inuolutum dolentibus dentibus apponatur, & ita mordeat ægrotantes, ut ex ipso uapore resumantur. Item thuris triti puluerem singularem linteolis pluribus illigamus, tunc eorū singula oleo calido præincta ægrotantibus offerimus mordenda, dentibus scilicet in dolore constitutis. Aliqui etiam scylla paruum modum aiunt oleo concoquendum, quod nos differendum probamus, ac lenitatis tempore adhibendum: Siquidem ob acrimoniam scylla recorporatiuam habeant uirtutem. Oportet præterea etiam mentum uaporari exteriori, & spongijs expressis ex aliqua coctione laxatiuæ uirtutis ad mitigandam materiam, uel ex ipsa adhibere fomentum. Tunc cerotaria apponenda probamus ex oleo ciprino, uel sirino: item malagmata sensim calefacientia: tunc lac uacro atq; uino, & cibo uario utēdum. Ac si tardi temporis dolor fuerit effectus, ut chronia passio uideatur, & nunc superpositionibus asperata, nunc lenimentis emollita, oportebit superpositionis tempore ipsdem adiutorijs perseverare: tunc uero corpus resumere, sicut frequenter docuimus. Præterea tempore exercitij erit offerenda cera, quam ægrotantes mordendo dentes exerceant, sicut nuper demonstrauimus de paralyti scribentes. Ultimo autem tempore gestationis erit adhibenda fricatio capitis atq; oris, sed ipsius manibus ægrotatis paruissima, plurima uero ex alienis, sed longitudine temporis potius quam uehementia, ne caput nimietate moueatur. Tunc ne partes refrigerant uel implantent etiam, à plurimis erit corpus confricandum, ut duobus ministris ab humeris latera, & alijs duobus ab inguinibus curata. Tunc resumptione paulo fortius erunt partes recorporatione curandæ, ut post fricationem strigili non obtuso uel aspero pannis buccarum musculos usque ad ruborem fricari faciamus, & nunc dropacem illiniri, tunc etiam ipsos dentes atque gingiuas uehementius fricari. Dantes præterea iugiter oleum calidum sorbendum, atque continendum & despuendum. Item aqua frigida tunc interpositis duobus uel tribus diebus, ex humore in quo fuerit decocta mali punici cortex, adhibemus oris collutionē, uel in quo sit præincta ignita galla, uel ex aquis sua uirtute medentibus. Inter dentium confricamentis utendū, quæ constringere, atq; fortificare ualeant, sicuti libris medicaminū ordinauimus. Vomitus uero post cibū factus omnibus est cōtrarius, & maxime in ista cōstitutis passione. Item non aliter Venus obesse probatur, & uinolentia.

περιχαρακτηρισμολογία.

D

Libri medicaminum Cælij.

**A** lentia. Multi autem ueterum medicorum accessionem tempore ea medicamina adhibenda iusserunt, quæ anodyna Græci uocauerunt, nos indoloria dicere poterimus, quæ aiunt nocturno tempore adhibenda, profectio sensum non dolorem auferentia. Adhibent etiam fumigationem dentibus, ut bitumen cum simili pondere myrrhæ uino conspersæ, mollibus prunis impositæ. Tunc iubentes ore aperto ægrotantem fumum accipere, cum fuerit melius hæc propter inflationem capitis prohibere, & offerre mullum calidum, uel quenquam mitigatiuum liquorem continendum, uel, ut aiunt, carbonibus infundendum, ut exinde exhalatione facta solatium capiant ægrotantes. Item iubent circundandos atq; inuoluendos dentes ex opio, galbano, pipere, uel lasere, & peucedano, & herba quam tithymalon uocant. Hæc quidem etiam corruptis dentibus adhibenda probauerunt. Necnon tenue linteolum apponendum, prælinitum oleo cocto, uel sale, & cedria, uel ex croco atq; pipere longo, & rosa recenti, & illyrica, galbano, cocco cnidio, styrace, nitro, cum melle medicamine confecto: quæ omnia ob acrimoniã lenimentis tempore locum potuerint inuenire: Quanquã sit etiam fugienda satietas medicaminũ plurima. Omitto quod tithymali succus appositus dentes infringat. Non aliter etiam ferreici altheres exhibiti, qui dentium dolores mitigent locorum mortẽ faciunt, & ipsorum dentium laxitatẽ, qui aiunt unguentas gingiwas accessionis tempore amurea, cum simili modo infecta lana ex oleo ueteri & myrrha, cum uino & oleo resoluta, atq; crassitudine mellis deducta, cum secundum methodon aliud sit tempus medicaminũ lacescentium. Item alij præsentẽ dolore in contrariã partis auricula aiunt balsami succũ mittendum, cum succis supradictis simili modo uel folio. Hijs omnibus resolutis, uel oleo decoctis, aut in quo decocta sint edera nigra facta sint decem, & squillæ medium in oliuæ magnitudine spe auocandæ materiæ, deprauati, uel maioris doloris illati causam anteriorem auocetes, obscurantes auocatis sensibus ægrotantes. Item alij eius partis, quæ dentis dolorem sustinet, nari edera succum infundentes, cum olei parte dimidia, ex ferramento quod rinchyton uocant. Adhibentes etiam sternutameta & apophlegmatismos, & odoris medicamina, quæ iugiter aiunt apponenda, & sint uirtutis lacescentis, quæ stomatica uocant: quorum singula tanquam recorporatiua non mitigatiua in lenimento adhibere probamus. Item alij statim ad auferendos dentes dolore pulsatos accurrunt, nescij quoniam detractio amissio partis est, non sanatio. Quapropter sicut alias quoq; partes in tumore constitutas non detractio, sed mitigatione curamus, sic etiam dentes concurandos accipimus: Etenim si quisquam dentium fuerit exfesus, exigit primo mitigationem, tunc sui detractioem faciendam. Quippe cum non sit à periculo remotũ doloris tempore dentes auferre, & maxime integros, hoc est, qui non fuerint exesi, uel corrupti, aut mobiles: Consensus etenim superiorum partium necessariò sequetur & musculorum, & oculorum. Erophilus deniq; & Heraclides Tarentinus mori quosdã detractioe dentis memorauerunt: Nam Erasistratus plumbeum inquit odontagogum, non dentiducum dicere poterimus, apud Delphum in Apollinis templo ostentationis causa propositum: Quo demonstratur, oportere eos dentes auferri, qui sint faciles, uel mobilitate laxati, uel quibus sufficiat plumbei ferramenti conamen ad summũ. Sic autem putant, quod omnis dens dolore uexatus, & qui necet sanos, est detrahendus, oportet etiam omnes auferri, si omnes fuerint dolore possessi, Quo modo autem sint auferendi dentes exesi uel moti, nisi seruari potuerint, libris medicinalium Responsionum docuimus. Ac si aliquando ex humore gingiua

Medicamina  
indoloria  
αἰδίου

Αλλοῖς  
ferreici

Instrumentũ  
σινίχτυον  
ἀποφλεγματισ-  
μοῖς

Erophilus  
Heraclides  
Tarentinus  
Easistratus  
ὀδονταγωγόν  
Dentiducum  
plumbeum

**C**rum uisi fuerint commoueri, oportet constrictiuis uti collutionibus, quarum materiae ex parte superius diximus adhibendum oleum lentiscinum, & aquas coelestes, & lac asininum: est enim densabile: Item decoctio mali punici, uel gallae, aut acaciae, aut rosae, aut murtæ nigrae, aut mali cydonij, uel platani baccae. Vnguentæ præterea gingiuarum medicamine, quod appellamus diamaron. Item diaporos & diarros, & diomphacion, & œnanthio. Item si quædã emerferit gingiuarum sanguinatio, corallij tusi puluis cretus, atque intus ponendus & alumen cum melle. Item eruca cum aceto apponenda. Sed hæc sunt primo concoquenda iugi motu uersata.

DE APPREHENSIONE, SIVE OPPRESSIO-  
NE, QVAM GRÆCI CATALEPSIN AP-  
PELLANT. CAP: V.

*Chrysoippus.  
Niceratus.*



*Celii libri cele-  
rum passionum*

**H**Anc passionem ueteres tanquam specialem, uel propriam tra-  
diderunt, quasi nullo ex genere uenientē, ut Chrysoippus me-  
morat, quod de ipsa Niceratus conscripsit librum, probans sci-  
licet etiam ueteribus medicis cognitam, quod nos confirma-  
mus. Sed quia nunc tarda, nunc celerà methodicis adproba-  
tur, quanquam sit à nobis celerum passionum libris plenissi-  
me tradita, etiam nunc erit ordinanda: Quippe sæpe in tardum ueniens mo-  
tum, & propterea chronia nuncupanda. Sequitur autem patientes febricula,  
et uocis amputatio cum oculis patientibus, atque in palpebratione: difficili-  
or eo tempore quo statum sumpserit accessio, & omnis immobilitas, cum palpe-  
brarum impossibili atque horrenti positione, quæ declinatione facta aliqua  
ex parte accipiat motum: Etenim admota manu ac digitis, contractis ocu-  
lis tenus palpebra recognoscitur ægrotantis, atque obtutu inter nota transla-  
tione manus in qualibet parte declinata sequetur conuerso scilicet uultu. \*  
Dehinc in clamati intendunt, lacrimantes sine ulla responsione: Et si odora-  
menta iucunda fuerint admota, declinatione quadam moueri intelliguntur,  
frequenter adducentes spiritum hauriendæ exhalationis causa. Ac si terra odo-  
ramenta fuerint admota, recufare uidentur ac fugere. Item dulcia atque amara  
ori admota labijs uel linguæ illita sentiunt: non aliter si ulla fuerint punctio-  
ne pulsati, ex nostro officio tentã manum suo replicant uel colligunt. Item la-  
cessiti colligent, ingemunt, attestante uultus rubore cum pulsu magno ex uehe-  
mentibus atque fortioribus saltibus confecto. In declinatione uero plurimus sæ-  
pe sudor sequetur, ac feruens, & in dimissione limpidae sinceritati proximi effi-  
ciuntur. Ac rursus in accessionem si redeunt ægrotantes, peiorante passione  
plurimus feruor accedit cutis, & spiratio celerrima, quam Græci tachypnoean  
uocant, oculorum conuersio, manuum contractio, sudoris ignei defluxio, ma-  
culis emergentibus in thoracem atque uultum, & primo rotundus in similitu-  
dine ulcerum, quæ iontus appellant. Item ab apoplecticis hæc discernitur pas-  
sio, quod in ipsis paruus atque creber pulsus inueniatur, & non ut in catalepti-  
cis maior atque percussibilis, & neque iucundum, siue tetrum odorem accipi-  
ant, neque dulcia & amara conspiciant. Item ab hijs qui ex stomachi passio-  
ne obmutescunt. Siquidem in hijs rursus paruus atque imbecillis pulsus in-  
ueniatur, attestante singultu cum manifesto tumore in stomacho apparente.  
Hæc est discretio similium passionum, sed ei curatio adhibenda est, quæ epi-  
lepticis dicta est.

*Tab. 111.*

A DE VOCIS AMPVTATIONE, QVAM GRÆCI PHONES APOCOPEN VOCANT. CAP: VI.



Ocis amputatio fiet ex clamore nimio, aut frigore, aut ardore; siue uisura faucibus asperatis, uel etiam tumore nimio. Fit autem obtusio sonitus emissæ per spiritum uocis, atque hirta, uel aspirationis tractu grauata locutio. Recenti deniq; passioni, atq; eius initio conuenit adhibita requies cum abstinentia cibi, & spongiarum cum aqua frigida expressarum admotio gutturis per ambitum faucium, quem anthereona uocant. Ac si passio uehementescere cœperit, ut maiora deponcat adiutoria, adhibenda phlebotomia. Tunc forbilibus cibis nutriendi, adhibitis etiam gargarismis ex oleo dulci atque calido, siue calida ex oleo uel aqua mulsa, aut decoctione uuarum, cantabri, ficuum pinguium, palmularum, glycyrrhizæ, necnon etiam succo alicæ, uel ptisanæ, ut ex eorum uaporatione, siue exhalatione accensum spiritum rapiant ægrotantes. Tunc etiam spongiarum adhibenda uaporatio, atque usus electariorum ex melle decocto, & nucleis, & lini semine, & ouorum uitellis, & draganto ex mulso & uino præmolliato. Dehinc forbili ex amygdalis medicamine utendum. In declinatione uero lauacro atq; uario cibo, & uino, deambulatione, uel gestatione. Ac si querela tardauerit ægrotantium, erit in lenimento adhibenda drimyphagia, dropacismus, defricatio. Tunc etiam uomitus ex radicibus, atq; uaria gestatione, & uocis exercitatione, quod Græci anaphonesin uocant, adhibito præceptore, sicuti iam dudum docuimus, temporum ordine seruato. Adhibenda etiam & arteriaca medicamina, quæ partes in passione constitutas exercent, à Græcis amyctica appellata. Quorum compositionem libris Medicaminum conscriptam dedimus.

κατάρσιος.

Medicina

αρωματική.

ουματική.

Libri medica-

minum Celii.

κατάρσιος.

B DE INFLUXIONE, QVAM GRÆCI CATARRHON VOCANT. CAP: VII.



Ilet influxio nunc ad nares, quæ appellatur coryza: nunc ad fauces, quæ appellatur branchos: nunc ad thoracem uel pulmonem, quæ appellatur ptysis. Sequitur autem eos qui coryza uexantur, grauedo narium & frontis, constrictio florum oris tenuissimi primo, tunc crassi atq; uiridis, sternutatio iugis, cum la chrymatione oculorum, acrioris qualitatis uel mordentis. Aliquando etiam tussicula impar atq; obtusa apprehensio. Item consensus sessio nis oculorum, cum capitis atq; uultus inflatione. Eos autem qui faucium influxione uexantur, siue quod Græci branchos, quam nos raucitatem uocamus, sequitur pruritus quidam secundum fauces, atq; titillatus, uox obtusa & grauis, & impedita locutio, ut se præfocari sentiant ægrotantes. Aliquando etiam tussicula, & transuoratio difficilis, ac si ad pulmones fuerit facta defluxio, thoracis grauedo sequetur, & tussicula uehementis, cum sputis spumosis atq; crassioribus, tum saniosis, attestante difficultate spiritus, quam Græci dyspnoean uocant. Aliquando etiam febricula, quæ noctis initio sumat exordium, cum uocis obtusione, & uomitu cibi. Sed hæc passio à peripleumonia discernitur. Siquidem sit una ex tardis passionibus, & neque celeri atq; acuta febricula corpus afficiat. Item discernitur à reumatismo thoracis, siue influxione, quod cæteris communibus signis sequentibus dolor etiam ineffe uideatur in ea parte thoracis quæ pati perple-

κορύζα.

βράγχος.

πύσις.

ήσθασια.

περπλευμονία.

ρευματισμός.

Citur. Sunt autem antecedentes, ex quibus influxiones supradictæ nascuntur, ut sæpe probatur perfricatio profunda, uel extensio uomitus. Veterum igitur methodicorum alij strictionem hanc passionem uocauerunt, uelut expressis humoribus atque coactis, in alia uenire loca eam fieri asserentes: Alij solutionem, ut

*Theſalus.*

*Themison.*

*Mnaseas.*

*Soranus.*

*et uisio pueri.*

Theſalus. Theſſalus manifestat, atque eius decessores, ut Themison. Mnaseas uero & Soranus, cuius etiam nos amamus iudicium, complexam inquit esse passionem, & nunc strictione superante, nunc solutione: Etenim constrictio atque dolor accidentia sunt strictionis, quæ Græci symptomata uocant. Multorum uero

liquidorum egestio solutionis est signum. Quapropter obtinente strictione conuenit ægrotos iacere loco lucido mediocriter, atque calido, adhibita abstinentia usque ad tertium diem, quem Græci diatriton uocant, cum requie corporis atque animi, appositis lanis limpidis ac mollibus, oleo dulci atque calido præinctis, colla circumdantis & thoracem. Tunc oris collutio adhibenda, siue fons ex aqua calida. In ipsa autem diatrito perungi ægrotantes oleo calido atque dulci, fouenda facies ex aqua calida. Cibus dandus sordibilis ex alica uel farre, oleo & anetho, uel paruo sale confecto, uel ex melle, aut alica ex mulso confecta sordibilis transuoratio non sine cautione atque coniectura utriusque passionis, ne alteram faciat superiorem. Ac si passio permanſerit, alia die cataplasmata laxatiua adhibemus, hijs scilicet partibus quæ fuerint in querela. Tunc cucurbitam infingentes scarificabimus, ac deinde spongijs uaporantes loca relaxamus, aut calidis lanis contegemus narium partes. Tunc gargarismum dabimus calidum mulsum, aut decoctione cantabri, & palmularum pinguium, & noxarum, & glycyrrhizæ, uel eius succo resoluto ex aliquo liquore laxatiuo. Itæ electarium

*Electarium.*

D

dabimus ex lini seminibus & sesami frixi acetabulis singulis, & oui elixi uitello, & nucleis numero uiginti, & amygdalis amaris expollitis decem amplius drachma una, fraganti drachma una, passo cretico demollito, & mellis decocti sufficientis: quod medicamen in auellanæ modum sumptum sub lingua teneant ægrotantes: Tum defluens ac deficcatum sensim atque paulatim transuoret, uel mel oleo concoctum: Multi autem sub fabam fractam, quod Græci etnos acton uocant, id est linguæ suppositum ac defluens transuoretur, quo asperitas arteria leniatur. Vel ex amilo, & ex menta, & amygdalis amaris confectum medicamen, quod habeat palmularum dulcium contritarum drachmas octo, & nucleorum drachmas quatuor, & amygdalæ purgatæ drachmas duas, glycyrrhizæ succi obolum unum, hoc est, drachmæ partem sextam, draganti drachmam

*Uinum pro-*

*tropium.*

unam, collectis omnibus atque infusis ex uino protropo. Ac si uenter officium non agnouerit, simplici uentris laxatiuo utendum: Et si fuerit caput grauatum, adhibenda deronsio, appositis deinde laxatiuis medicaminibus. Tunc cibus alternis diebus dandus. Cum autem passio mitescere cœperit, danda olera, ut malua, lapathum, atriplex, quam Græci andraphasin uocant, beta cum ptisanæ succo, uel alica, aut mulso, & pisces teneri, & uolantum teneriora. Ipsis etiam locis apponenda cerotaria ex meliloto cōcocto confecta, uel malagmata simplicia. Tunc lauacrum atque uinum adhibendum. Ac si superans fuerit defluxio, quæ Græci reumatismum uocant, simili abstinentia utendum est frequenter: Sed frigido atque obscuro mediocriter loco ægrotantes iacere iubemus, & abstinentiam à potu, quo sitiendo siccentur. Cuius usus cum fuerit permissus, uel oris collutio frigida ex aqua paulatim atque parua probatur. Tunc appositio spongiarum ex aqua frigida expressarum, uel pulsa iisdem partibus quæ fluore uexantur, hoc est thoraci atque gutturis summitati, quam Græci anthereona uo-

*et uisio pueri.*

cant.

**A** cant, nos rumam, aut lanx limpida infusa oleo uiridi conueniunt. Dehinc dabitur ore continenda, uel gargarizanda aqua frigida, uel puscum, aut succum herbæ calidaris, quam Græci helxinem uocant, aut plantaginis, quam ijdem arnoglissam uocant, aut uuam lupinam, quam strychnon nominant, aut intybi, aut endiuicæ decoctionem, aut buxi, aut rosarum. Item lenticulæ, palmarum thebaicarum, lentisci uirgultis aut rubi, quam bathon appellant, singulis, uel in unum mixtis pro passionis magnitudine. Aliquando etiam diamoron, siue diasycaminon, cuius nota compositio, atque Medicaminū libris tradita comprobatur, ex aliqua supradictorum liquore soluta. Tunc etiam epithemata cōstrictiua adhibemus, ut est mel decoctū cum alumine schisto æquis ponderibus, uel aceto & aloë, aut ex palmulis, & malis cydonijs, & hijs similibus. Item cucurbitam cōstrictiuam, & electaria, uel catapotia, ut est diacodon simplex, & uinum t̄ sciuelliticum coctum, donec mellis habeat crassitudinem, solum uel cum melle admixto etiam cumino. Item creticum uinum, uel passum similiter decoctum, aut tyrrhenum, uel protropum, & omne quod ad sancta dulcedine cōstringit, ut arteriam leniat, atque desicet humorem. Item mel admixto modico cumino concoctū, uel persicæ lachrymo, uel plantaginis aridæ contusæ, atque cretæ puluere, uel rosarum aridarum, & aluminis. Item troscisci medicaminis trigoni appellati. Tunc cibi ordinandi supradictis iam dudum temporibus, sed cōstrictiua qualitatis, ut est oryza, uel alica ex puscis, uel aqua frigida confecta, aut decoctio palmularum thebaicarum. Item oua hapala, uel pultes paruissimo atque uiridi oleo confectæ, oryza uel milio, aut puluere lentofrigo, aut alica, aut farre, aut ex amylo, uel ex ges ateros, & melle decocto admixto quiddam supradictis, quo coagulentur, & uirtutem medendi maiorem sumant. Item thebanarum palmularum decoctarum admixtione in pulmentis uti possumus, uel ex aridis palmulis pane confecto, & oleo uiridi, atque rore syriaco, uel aceto, & galla. Ipsa quoque pulmenta, aut cibos aridos dare debemus. Tunc hapala oua, uel lac, decocta cum amylo ad modum cotylæ, uel duarum, quod est pondus unciarum decem uel uiginti. Dehinc danda olera cōstringentia, ut intyba, plantago, cauliculi. Sed hæc omnia cocta, atque aceto condita. Tunc pisces durioris corporis, atque uolantia non pingua, sed magis torrida, uel ex aceto & aqua cocta. Tunc declinante passione uinum dandum est asperioris naturæ. Dehinc adhibenda gestatio præfecto ore, quo spiratio nulla tangatur iniuria, dehinc lauacro utendum. Ac si passio tardauerit, superpositionibus ac lenimentis uariata, erit in lenimento adhibenda deambulatio, & uocis exercitium mite. Tunc leuis unctio ac defricatio, & cibi ex mediâ materia dandi, scilicet pro qualitate passionis solutione aut strictura obtinente, qui erunt quodam profectu augendi aut minuendi per regulam cycli, usque ad uolantum atque agrestium, & porcine carnis percoctam partem tertiam: Sicq̄ panem ante pulmenti oblationem, si obtinens fuerit fluor, cum aqua. Dabimus etiam uuarum fabrilium uel pensilium siccatarum acinos, uel intybi thyrsum aceto præinctum, adhibito lauacro longo dierum intervallo, tum drimyphagia. Dandum etiam lasar cum aceto atque liquamine: ac deinde locis patientibus adhibendæ cucurbitæ re corporatiuæ, quas Græci metasyncriticas uocant, & maxime anthereoni, hoc est thoraci, uel gutturis circulo, quem rumam uocamus. Tunc resinæ cabialis, hoc est dicaminis illinimentum uel dropacis. Dehinc etiâ ex puluere nitreo lacera fricatio, quam Græci mixin appellat, uel sinegmata, quorum compositionem Responsonū tradidimus

Alumen

αλυσίον

Alias, etha

loo,

ardens.

Forte, squit

liticum,

Medicamen

τριγονον.

γιν ασις.

Oua ασαλα.

\*

μίσιν.

σινεγματα.

**C** libris, uel semida cum oleo, aut pietro cum pipere. Item unctioes ex syria  
 co, & opobalsamo, & laurino, atque irino oleo, & butyro, & pice liquida  
 apponenda naribus, atque narium cauernis. Tunc etiam sinapisimus, & gar  
 gurismata ex sinapi, uel aqua marina, aut decoctione thymi, origani, hyl  
 iopi, glaucij, quod nos pulegium uocamus, & horum similibus. Dehinc mu  
 tatio locorum appetenda, & magis maritimum, tum usus aquarum natu  
 raliu, ex quibus erit caput fouendum. Decessores uero medici, nondum  
 rigore methodico obtinente, in quibus est Erasistratus, secundo libro Saluta  
 rium praeceptorum, & Asclepiades tertio Celerum passionum, item The  
 mison Salutari libro, atque primo Tardarum passionum, quas chronias ap  
 pellant, meratum potum dari iusserunt. Ait enim Asclepiades duplicandam  
 uel triplicandam quantitatem uini solitae temperationis, adeo ut uni cyatho  
 unum admisceri iusserit, quo uini & aquae quantitas coequetur. Sed hoc fa  
 cit in tardante passione: Etenim recentem atque nouam curans, libris quos  
 ad Geminium scripsit salutarium, uinum prohibendum tradidit. Erasistra  
 tus uero etiam pileum uini calidi infusione inflatum capiti imponendum iubet.  
 Lateribus uero ac praecordijs lanas apponendas, uino atque oleo calido mada  
 factas: Quorum primo neruorum uitabilis est merata potio, atque capiti faciens  
 inflationem: Dehinc etiam abstinentis uino, uel solutae consuetudinis graua  
 bilis atque noxius est usus pilei uino calido praefusi, uel lanae tinctae lateribus ac  
 praecordijs circumpositae ob dolorum uehementiam. Item Lusius secundo li  
 bro Tardarum passionu, cum de his quae faucibus accidunt disputaret, hoc est  
 de supradictis fluoribus, etiam aridam ficum torridam, atque uino infusam an  
 te cibum dari iubet: Siquidem rudis atque noua difficilissima sit digestiois. Sed  
 hinc ait mixtum calidum sorbendum, hoc est, uinum cum aqua supradicta me  
 ratum. Idem admixtam sandaracham, quae sit ex ouis albore conspersa, in quan  
 titate oboli unius igni imponendam iubet, uel radicem herbae tunisularis,  
 quam uehion appellauit. Tunc per infundibulum ore rapere fumum adducto  
 uento imperat aegrotantes, cum sit capiti uehementer contraria supradictorum  
 incensa fumatio. Generaliter autem, atque communi repulsione arguendos  
 Erasistratum & Asclepiadem arbitramur, primo quod non uiderint pro passi  
 onis motu in curationibus urgentiora nimis praeponenda. Themisonem uero  
 & Theffalum, memorantes restrictiuam curationem libro haec \* demetico atque  
 secundo Regulari, quem dieteticu uocant, culpandos arbitramur, quod non  
 uiderint aliquando stricturam fieri superiorum. Item plurima sulphureosa ad  
 miscenda quod satis sit probauerunt, & lanis quibus thorax circumdatur asper  
 genda. Ordinantes etiam odoramenta yris illyricae arida contusa, atque eius  
 oleum. Item opobalsamum, & melantium linteolo ligatum naribus aiunt fre  
 quenter admouendum, & anisum, & cuminum, & rutam, & anisiflorum, uel  
 distillationem amaracini olei, & sansucum, & styracem, uel ex eo oleum con  
 factum, quod styracinum dicitur. Item hedicroum, uel murram cum thure &  
 sulphure, & radicibus sylphij, quae omnia caput implent, & propterea sunt cui  
 tanta magis accessionis tempore. In lenimento uero ratione re corporatiu: uit  
 tutis, atque interiecto tempore per interualla adhibita poterunt iudicari.

Erasistratus.  
 Asclepiades.  
 Themison.

Asclepiades li  
 bri salutarium  
 ad Geminium.

Lusius

D



A

DE TVSSICVLA.

CAP: VIII.



Viscula nunc arida, nunc humecta corporibus irruit, multos ac pingues humores excludens: & quibusdam sola, quibusdam adiuncta respirationis difficultate, quam Græci dyspnoean uocant: Item cum sanguinis egestione, aut phthistica passione, uel horum similibus affectis corporibus. Sed de his tussiculis quæ aliarum fuerint appendices passionum, singulatim scribentes

*Horreum.*

docebimus. De his uero quæ suæ sunt, atq; propria uexatione corpus afficiunt, nunc tradimus curationem: quæ ita erit adhibenda, ut de catarrho scribentes docuimus: discreta scilicet specie, quo possint electari, atq; pota medicamina, uel catapotia, siue alia quæq; sub regula medicinali recte mederi corporibus. Moneandi etiam ægrotantes, ne ultra modum competentem retinendo spiritum alterent potius tussiculam quàm mitigent. Quod quidem si fuerint moderati eius motu, facilius amputare quantum datum datur spiritum continendo. Tum apponendum per quod æger adducto spiritu accipiat uaporem ex mulso, uel alica, aut succo pitifanæ, uel eorum quiddam sorbeat, aut ex aqua calida uaporem accipiat. Videnda etiam uua, ne ob tumorem sui aut indulta laxitate tussiculam prouocet: Tum gargarismatibus, uel inunctionibus utendum, circa thoracem atq; gutturis summitatem, quam Græci anthereona uocant. Epithemata etiam apponenda, & nunc laxatiua, nunc constrictiua, quorum species ex antedictis erunt accipiendæ, ne sæpius eadem dicere uideamur.

DE SANGVINIS FLVORE.

CAP: IX.

B



Anguinis fluor occultis ex locis ueniens uelut sapesalutaris est, ita uehemens ingerit periculum, & quibusdam extemplo ob redundantiam fluoris celerem mortem corpore dissecto, & quibusdam in postremum effecta phthistica passione, uel uulnere non coeunte: siquidem primo tumeat, dehinc excorietur, atq; fluidum ex uapore fiat. Sunt autem quæ conuentum siue glutinationem uulnere impediunt plurimæ, uel innumerabiles causæ: Etenim natura altiora plurimum feruere necesse est, atq; fluida qualitate manare, & multo uel assiduo motu pulsari. Obstat etiam, quod occulta atq; alta, atque celata sint uisu, & à uicino medicaminum tactu remota: Frustrantur etenim frequenter eorum illatæ qualitates, priusquam locis patientibus aduenient itineris detrimendo, cum non statim, uel extemplo illibata partibus admodum ouentur. Sunt autem passionis antecedentes causæ, ut sæpe approbatum est, percussio uel casus: item exclamatio, uel ponderis perferendi conatio, uomitus uehemens, aut Venus plurima, & tussicula perseverans: Item abstinentia hæmorrhoidarum ueterum, quæ fuerint inertia amputatæ, nec iuxta methodicam rationem curatæ: item catarrhus. Sed non erit secundum has differentias curationis regula commutanda. Nominatur autem sanguinis fluor duplici significatione, propria, & abusua: Nam propria est, qua ex supernis partibus labens fluor significatur, ut de capite per sensuales uias: Abusua est, qua etiã ex inferioribus ascendens fluor significatur, ut expulmone uel stomacho, nausea aut tussicula exclusus: Impropiu est enim fluorem uocare id quod ascensu quodam, non lapsu fertur. Sed hæc Græci uersa uice posuerunt, deriuationem nominis intuentes: His enim anagogen uocant, quod magis ex inferioribus ad superiora fluorem significat. Differit præterea fluor sanguinis à sputo, quod neq; fluor sanguinis sputus

*Inertia dixit pro citra artem.**horreum.*

C nis sputus dici potest; Paruam enim materiae significationem sputus refert, fluo-  
 or plurimae; neque sputus sanguinis fluor, supradicta ratione; Parua enim ma-  
 teria sanguinis ex gingiuis, aut uua, aut faucibus emissam, sputu magis quam  
 fluorem recte nuncupamus.

QVOT, VEL QVAE SINT DIFFERENTIAE  
 FLVORIS SANGVINIS. CAP: X.



Differentias etiam floris sanguinis ueteres quaesierunt. Et quidam  
 aiunt unam solam esse uel intelligi, hoc est uulnerationis, ut The-  
 mison libro Tardarum passionum. Alij uero eruptiones, ut Hip-  
 pocrates, Euryphon. Sed Hippocrates solorum uenarum, Eury-  
 phon uero etiam arteriarum. Alij duas differentias posuerunt, eru-  
 ptionis & putredinis, ut Asclepiades. Alij tres, eruptionis, & putredinis, & oscu-  
 lationis, quam Graeci anastomosi uocant, ut Erasistratus. Alij quatuor, adij-  
 cientes expressionis, siue sudationis, ut Bacchius, adferens ex gingiuis sangui-  
 nem sine ulla uulneratione, uel in curationibus fracturarū saepe fasciolarum li-  
 gamenta maculis sanguinolentis aspersa reperiit. Item Demetrius Erophili  
 sectator duas inquit esse principales differentias floris sanguinis: unam incisurā,  
 alia sine ulla incisura. Speciales uero plurimas, quas principalibus subijcien-  
 das ordinauit: Etenim quam memorat incisurā fieri in duas diuisit partes: qua-  
 rum alteram uocauit eruptionis, alteram putredinis. Eam uero quae sine ulla di-  
 uisura est, in quatuor diuidit partes: quarū unam uarietate fieri dixit, aliam ex-  
 pressionem siue sudationem; tertiam defectiōne uel debilitate corporum, quā Graeci  
 atoniam uocant; quartam osculationem: uult enim eam differre à supradicta, id  
 est, expressionis, quam tertiam nominauit: Osculari enim inquit corpora nimia  
 plenitudine, siue uirtute medicaminū osculantū, quae Graeci anastomatica uo-  
 cant: & magis inquit uenarum ultimos fines, exprimit etiam sanguinē, siue ex-  
 cludi per uenarum latera. Item alij Asclepiadis sectatores unam esse dicunt diffe-  
 rentiam floris sanguinis, hoc est eruptionem: Si quidem omnem sanguinis solu-  
 tionem eruptione fieri Asclepiades memorauerit, negantes eam osculationis diffe-  
 rentiam: si quidem sit impossibile sanguinem crassum teneri fieri per oscula  
 uel excludi. Item putredinis esse differentias negant: si quidem ex hisdem non  
 ex alijs locis acrior humor fieri uideatur. Alij uero eundem Asclepiadem non  
 naturaliter putredinis differentiam ab Erasistrato constitutam expugnasse dixerūt:  
 non enim ex alijs locis acriore uenteliquore pulmonem fieri in putredine ac-  
 cepimus, sed eundem quadam passione in putredinem, uel acerrimos transire li-  
 quores. Nos autem iuxta Sorani iudicium hac quaestione nullis commodis cu-  
 rationes adiuuari probamus: sed dicimus tres esse differentias floris sanguinis,  
 hoc est, eruptionis, uulnerationis, & putredinis, siue lacerationis ex tussicula ue-  
 nientis, sicut operantium manus iugi frictione lacescunt uulnerantur. Item su-  
 dationis sine uulnere, siue ex uarietate uitarum effectus fluor osculationis diffe-  
 rentiam teneri, siue expressionis, uel cuiuslibet alterius causa.

QVOMODO INTELLIGAMVS DIFFEREN-  
 TIAM FLVORIS SANGVINIS. CAP: XI.



Vsatum etiam quomodo supradictae differentiae intelligantur, uel  
 apprehendantur. Sed discernuntur hoc modo: Nam eruptionis esse  
 intelligimus fluorem, quoties repente & grotantes atque limpidi sanguinem  
 fluunt, nulla querela uulneris praecedente. Vulnerationis

Themison.  
 Hippocrates.  
 Euryphon.

Asclepiades.  
 Erasistratus.  
 Bacchius.  
 Demetrius.  
 Erophilus.

arotign.

D

medicamina.

rationabili-  
 liter

Sorani.

**A** uero differentiã dicimus, siue putredinis, uel defricationis, cum adiuncto humo repurulento sanguis excluditur, & non repente uel coadceruatim: præterea antecedente longi temporis, uel multorum dierum tussicula uel catarrho. Item sudationis dicimus esse, cum nullus fuerit uulneris sensus, aut acceptorũ cibo uel potu acriorũ materiã mordicationis affectio. Qui sunt loci ex quibus sanguis fluit? Loci sunt plurimi, summitas faucium, arteria asperior, quæ etiã faux nuncupatur, pulmo, thorax, hoc est, membrana quæ interiũ latera cingit, à Græcis hypozygos appellata. Item membrana quæ thoracẽ à uentre discernit, à Græcis diaphragma appellata, quam nos discrimen dicere poterimus. Item stomachus, uenter, & secundum aliquos iecur, ac lien, & uena maior, quæ spinæ coniuncta est. Quomodo intelligimus ex quibus locis sanguis feratur? Intelligimus locos ex quibus sanguis, fluor, uel lapsus fertur: quod erit aptissimũ, ob adhibendam curationem ipsidem, uel eorum uicinis partibus: & non, ut quidam existimant, commutandæ curationis causa, cum generaliter eadem cunctis adhibenda probamus. De hijs igitur qui ex supernis faucium sanguinẽ fluunt, primo paruus intelligitur ferri, aut si plurimus, non spumofus. Præterea cum quodam excreatu despuitur, ipsæ quoq; partes sumpto cibo uel potu, aut gargarismate mordicantis materiæ dolore pulsantur, & insipientibus nobis expressa lingua uisu locorum probatur asperitas. Plerunq; etiã, ut Erasistratus ait, tubercula, quæ Græci condylomata uocant, uisibus occurrunt, quæ sint similia hæmorrhoidis, ex quibus sanguis fertur. Hijs uero qui ex arteria sanguinem fluunt, paruus atque flauus sanguis ferri perspicitur: & sæpe saluus uel humoribus complexus in imaginẽ capilli unius aut multorũ. Sequitur etiã pruritus uel mordicatio, & magis circa extantiam gutturis, cum quodam titillatu & tussicula leui. Tum deinde plurimus sanguinis fluor, uox hirta cum dolore, qui nunc tactu moueatur, nunc tussicula uehementi plurimus, tenuis, & spumofus, & plurimum feruens sanguis excluditur, attestante thoracis grauedine, & aliquando dolore cum uoce hirta, & sæpe cibo quodam cum infractio sonitu eo tempore quo sanguis excluditur. Hijs uero qui ex diaphragmate, quod iam dudum discrimen uocauimus, & cætera prædictos sequentur communia. Sed dolor inferius à pectore fiet rotunditate quadam thoracẽ pungens. Eos autẽ qui ex hypozygo sanguinem fluunt, multa similia supradictis sequentur, sed dolor secundum latera uel pectus, aliquando etiã inter scapulas fiet: ipse quoq; sanguis minus flauus minus excluditur. In eos qui ex stomacho sanguinẽ fluunt, sine ulla tussicula uomitus sanguinis sequitur nigri atq; gelati, & nunc solus, nunc cũ admixtione cibi, attestante dolore inter utraq; scapulas ad superiores tendentẽ, & magis eo tempore quo quadã remordentia transuauerint agrotantes. Accedit etiã animi desponsio cum fastidio cibi, & saluarũ fluor, & corpore frigidus, & pulsu obscuro uel demerso. Hijs uero qui ex uentre sanguinẽ fluunt, cum supradictis, quæ sunt cunctis cõmunia, sequetur etiã dolor & mordicatio, uel tormentũ inter præcordia, & aliquando sanguinis particula per officium uentris excludetur. Item hijs qui ex iecore uel splene sanguinẽ fluunt, uel ex uena magna, quæ spinæ coniuncta est, ut quidam memorant, sensu loca designantur: Nam in dextera parte præcordiorum dolorum dolore aurigineo sequetur eos qui ex iecore fluunt. Item in hijs sinistra parte præcordiorum hæc accidunt, quoties ex liene sanguis ferri perspicitur: uel secundum spinam, quoties ex maiore uena ferri dicitur. Sed hæc Soranus alta consideratione ex hijs locis per uentrem, uel per eius officium ferri sanguinẽ magis quàm per os posse credibilis

ὁ ὄργανος  
διὰ τὸ πρῶτον  
Discrimen.

ὁ ὄργανος

- C approbavit. Hijs uero qui ex gingiuis, uel uua, uel faucium lateribus, uel tonsillis sanguinem fluunt, supradictorum nulla sequuntur, sed locorum uulnerationem ore aperto oculorum approbat uisus. Item hijs qui ex capite sanguinē fluunt acceptum primo, uel exceptum internis uisceribus, atq; ita redditum, si in arteriam defluerit, excludunt. Deinde cum tussicula uehementi etiam, quam de pulmone feratur similitudinem dabit. Sin uero in stomachum defluerit, uel uentrem, commota nausea uomitur, etiam quam ex hisdem locis ferri uideatur similitudinem dabit. Sed discerni hoc facile potest, si quidem agrotantibus feruor igneus ora pertractans antecedit, & capitis grauedo uel dolor, & extensio uenarum, & magis earum quæ tempora uel frontē cingunt. Sequitur etiam faucium titillatus, & aliquando per narium quædam sanguinis distillatio, uel per eas cauernas quæ ad fauces ex capite descendunt. Quod aperto ore, atque experta lingua uisus probatur, & uicina loca quoq; sanguinolenta apparebunt. Aliquando etiam remeantis materię causa laxiora transuorantis efficiuntur loca, & agrotantes excreatu quodam sanguinem respuunt accipientes ex superius adducto spiritu, ut sæpe muculenta consueuerunt dormientes. Præterea in ore collectus excitat sanguis, uel transuoratus, & in stomachum, uel in uentrē ueniens premit permanens agrotantes, aut reiectus releuat. Et hijs qui passione afficiuntur, acceptis uel transuoratis remordentibus materijs nullam interiorū mordicationem sentiunt: Quod necessarium eos qui ex stomacho fluunt sequitur. Ac si in arteriam fluxerit, tussicula rursus excludetur. Quo reiecto agrotantibus tussicula mitigatur: Siquidem nulla inesse uideatur interioribus remansens causa, quæ tussire prouocet agrotantes: nisi forte, quod est rarissimum, aliqua corpuscula gelati sanguinis inhaereant interioribus locis. Item de pulmone fluens discernitur, quod iam præcedente tussicula in fluore ueniant, inde tussire non desinant. Communiter autem, cæteris inter se paribus signis, ex arterijs ueniens sanguis tenerior, ac rubri coloris, & spumofus esse perspicitur: ex uenis uero crassior, & atrii coloris. Hæc est locorum singulatim posita significatio.
- D

DE EFFECTV SIVE EXITV SVPRADICTARVM PASSIONVM QVEM GRAECI APOTELESMA VOCANT. CAP: XII.

ἀσπείλας.

Erasistratus.  
ἐκ τῆς ἀσπείλας.



Varium de euentu, siue exitu, uel effectu passionum: Nam Erasistratus facile curabiles succulentos homines dixit atq; fortes, & paruicolles, quos microtrachelos appellauit; hoc est, qui minimæ longitudinis habeant colla. Difficile autem curari posse tenues ac debiles, & porrecta collarū longitudine formatos: In hijs enim, inquit, summa cum difficultate sanguis & tussis plurimam per longitudinē tractus, & quod obsident uuida plurimo tempore habitudinem gutturis siue cannx, quam arteriam uocant, & ob hoc graues atque tardas tussiculas faciunt. Item Asclepiades difficile curabiles inquit succulentos atque carnosos, ob uehementiam spirationis. Eadem ratione etiam ætates medias, & pueros: celerius etenim inquit spiritum ferri, & in spuitis perficiendis offensione carniū retardari. Plurimi deinde etiam affectiones uitæ quæsierunt, & regiones, & temporū annales partes. Item per putredinē factum fluorem difficile curabilem dicunt, ab eo qui eruptione fuerit effectus: siquidem putrefactæ partes non coeant. Nos uero iuxta Sorani sententiam fluores sanguinis alios dicimus esse nouos corporibus atque recentes, alios tardi temporis atque

Asclepiades.

Sorani.

A atque inueteratos, & alios solos, alios cum tumore, alios etiam cum febricula & iussicula, & alios iuges, alios dimissionibus intercapedinos, ordine seruato, aut inordinatos, & in super positionibus aut lenimentis magnis, aut paruis, & detracta uirium fortitudine, ac seruata. Hæc sunt enim urgentiores differentia, secundum quas diligentiam uariamus curationis, siue seruata, siue incerto motu existente passione. Sed difficile curabiles fluores præ cæteris dicimus tardos magis recentibus, ob iugem perseverationem. Item cum tumore uel febribus, ab hijs qui soli esse perispiciuntur: Etenim supradicti spem futura conglutinationis negant: Et ob hoc complexionis cõtraria sepe adiutoria poscunt, quæ sint diuersis aduersa. Item iuges fluores ab hijs qui dimissionibus mitigantur: Etenim graue, atque minime tutum omne quod nulla fuerit mitigatione uariatum. Item inordinati ab hijs qui ordine seruato corpus afficiunt: Est enim infidiosa curationi temporum inopinata uarietas. Non aliter etiam superpositione asperati fluores curatione difficiles ab hijs qui in lenimento constituti sunt iudicantur, ob prædictam rationem uulnerum. Item hij qui plurimum corpus affecerint, atque uires ægrotantis insumpserint. Dat etiam adiutorijs medicinalibus fortitudo corporis uiam. Hæc denique etiam in uulneribus nudis, hoc est, in exterioribus partibus corporis constitutis fieri cernimus. Cum iuuenibus, uel ut specialiter dixim, athleticis, & laborantibus hominibus facilia uulnera fieri uideamus, Senibus uero, & omnibus imbecillibus difficilia. Quæ propter etiam uacuis, uel in exercitatis corporibus Asclepiadis dicta minime conueniunt. Item ulceratione facti fluores difficiles curatione ab hijs qui eruptione fuerint affecti iudicantur. Siquidem transceso, atque prætermisso initio nouitatis fructu caruerint, quo facilis glutinatio fieri solet: negat enim tarditas facultatem. Item eruptione facti fluores ab hijs qui sine eruptione fuerint difficiles sunt curatione: Eius enim factæ glutinationes alterius passionis initium referunt. Item ex partibus multis modis factos fluores, ab hijs qui paruo motu agitantur difficiles curatione accipimus: Est enim motus cohærentium partium diuisio. Item ex occultis partibus uenientes ab hijs qui proprias tenuerint partes: Etenim adhibita adiutoria occultis uel celatis partibus uitata suæ uirtutis sinceritate perueniunt, sanis primo locis excepta, ac deinde transmissa. Hij uero qui ex primis locis fluores indomita adiutoriorum uirtute curantur, denique à stomacho, uel uentre, aut faucibus uenientes, facile curabiles approbamus: Etenim pota medicamina patientibus primo locis adueniunt, & non ritio, aut iugis naturæ motu exercitatis. Hij uero qui ex hypozygo membrana fluores uenerint, difficiles curatione iudicantur: & magis si ex diaphragmate, quod nos iam dudum discretorium diximus: Item ex arteria, hoc est pulmone calamo. Omnium præterea difficilis atq; grauior curatione ex pulmone fluens accipitur, ob iuge spirationis officium: Hijs enim qui omnem fluorem de pulmone uenientem incurabilem dicunt, assentiendum non est: Sed iuxta Sorani sententiam difficilis est eorū curatio iudicanda: quippe cum uulnerationibus thoracis sepe pulmo penetratus non intulerit mortem, ut hijs exclusis uel cadentibus, febris adhibita decisio in cicatrice uulnera fecerit conuenire, ut omnes approbent Chirurghi, memorantes in bello quædam sagittarum penetrato pulmone conualuisse, sanguinem à sagitta uomuisse, nec tamen mortem fuisse consecuta. Hæc sunt quæ de effectu, siue de euentu fluorum credidimus ordinanda: Etenim ex capite ueniens fluor generaliter est curatione facillimus: siquidem non multos sustineat motus. Nunc nobis necessario dicendum remanet, ne cui cœnoteteli sanguinis fluor adscribat.

Discretorium  
discretorium

C Aliqui etiam Theſſali ſectatores recentis inciſuræ, ſiue uulneris paſſione ſubigiti dixerunt: Non enim oportet locorum differentia cœnoteton mutare uirtutem externam. Igitur corporis eruptionē recentem dicimus inciſuram; quo erit conſequens, ut etiam interiorum eruptio huic cœnoteti ſubiiciatur. Sed hijs reſpondemus, quoniam paſſio non chirurgia, ſed dieteticarum traditur cu ratione: Omne etenim adiutoriū, quod adhiberi uidetur ſupradictis fluoribus eſt dieteticæ partiſ, non chirurgiæ. Quapropter dieteticas ſcriptores libris regulis, quos dieteticos uocant, de hæmoptycis ſcripſerunt, quos nos ſanguinem ſpuentes nuncupamus. Chirurghi uero in chirurgumenis hoc memorare non auſi ſunt. Ipſe quoque Theſſalus ſecundo libro Dietetico de fluore ſanguinis ſcribens, nihil in chirurgumenis memorauit, & improprium, quod ſola diæta curetur, in adiutorijs adhibendis chirurgiæ cœnoteta ſcribere. Nos uero iuxta Sorani iudicium, ſiue in exterioribus, ſiue interioribus corporis eruptionem factam recentem diuiſuram recte dici probamus, atque etiam ſolutionē cognominamus, ſed in exterioribus attentionē recentis uulneris iudicamus: Hæc enim nos neceſſariō rapit, ſiquidem ſolutioni diuiſura dominetur, & ſigmentorum uel ſabularum coniunctionē ex initio depoſcat, atque hæc diuiſura aptiſſima uideantur, quæ non in omnibus ſunt congrua ſolutioni: Etenim ſagittarum diuiſuræ laxatiuæ neceſſariō accipiuntur. Interiorum uero eruptionum diuiſura ſurgente ſolutionis cœnotetam ipſam magis cogimur iudicare: Si quidem prior oculis occurrat ſolutio, ac deinde diuiſura ratione atque intellectu mentis apprehendi uideatur. Secundo, quod cum ſint multæ differentiæ fluoris ſanguinis, omnes uni ſubiici ſolutioni, hoc eſt, eruptionis & ulcerationis, & ſudationis, quæ non cogatur. Hæc cauſa fluoris differentias querere, aut alicæ cœnoteti eruptionem adſcribere: alia ulcerationem, & non eidem ſine ulcere uel ruptione, uel emiſſione emiſſum fluorem. Tertio, quod nullo adiutorio chirurgiæ uti cogamur, ſed omnibus congruis ſolutioni, qua ſæpe conſequenter etiam glutinationem partium perfeceſerunt. Ad ſummum quidem, eſt reſcens inciſura ſiue uulnus cœnotetes, ſed ex medicaminum regula, quam Græci pharmachian appellant, dieteticæ parti ingeſta apte curatur. Quibus etiam ſupradicta paſſio concuratur, obſtinate iudicio ſolutionis. Hæc ſunt fluoris ſanguinis cœnotetes: Eas enim qui hijs cognominari atque conſcribi poſſunt præſcripta lectione tradidimus. Nunc curationem neceſſariō ordinamus.

D

## DE CVRATIONE. CAP: XIII.



Portet igitur ex qualibet parte ſanguinem fluentes ſacere loco mediocriter frigido atque obſcuro, lecto immobili, & ſchemate declinato, ut paulo promptius caput leuatum habere uideantur, ſtamentis non nimie cedentibus, neque calidis, & ut potuerint uno atque eodem ſchemate perfeuerantes, hoc eſt, immobiles: præterea animi intentionibus reſolutos: uehementer enim motibus corporis animorū curæ ſapius turbationes addiderunt. Erunt etiam ſoſtfernenda folia atque rami lentifci, uitis, mali punici, talliæ, murte, ſalicis, pini, & horū ſimilium, & quibus ſine capitis iniuria conſtrictius aër adnatus atque conſectus congrue ægrotantibus inſpiramentis inſeritur: Non enim cibi atque potus ratio ac diligentia curanda eſt, quæ interuallis diſtantibus adhibetur, quo conſtrictionis faciant commodum, uel fluentiam retineant, potius quam aër, qui in pauſabiliorem inſpirationem adductus, omni parti atque

particulæ

**A** particulae corporis ingressu suo fluentia faciat cohiberi, miti densitate persuasa. Conuenit praeterea, aegrotantes delatiore lecti sessione declinari, ut omnifariam immobiles curandi perseverent. Prohibere etiam occasiones, quae poterint passionem in commemoratione perducere, ut locutionis uel uisus: ne aut eadem plurimis fabulis reuoluendo, aut inspiciendo quae exclusa sunt, uiso admoniti commoueantur. Conuenit denique etiam sanguineos colores parietum, uel straminum, siue operimentorum declinare. Adhibenda praeterea cibi abstinentia, permittentibus uiribus, usque ad tertium diem, non ob relaxanda corpora, sed quo altiora, quorum est officium accepta digerere, immobilia perseverent: Omnis etenim ciborum appropriatio motu quodam necessario perspicitur: Quo fiet, ut ea quae sunt aptissime conglutinanda, motu resoluta differantur. Quapropter ob acceptorum digestionem ciborum sumi prohibemus, & abstinentiam utilissimam iudicamus. Prohibendi denique aegrotantes ab officio locutionis, ut si quid uoluerint, uisibus nutus, uel scriptura danti significent: magis quando ex pulmonis cannula, quam Graeci arteriam uocant, uel ipso pulmone, aut thorace sanguinis nascitur fluor. Conuenit etiam articulorum tenacior ligatura, si uehemens fuerit: Densitati etenim articulorum patientes consentiunt partes. Item spongiarum mollium ac limpidarum, & leuium, ex aqua frigida, uel aqua & aceto, uel decoctione mali punici, uel rubi, aut lentisci, aut myrtae patientibus partibus appositio, hoc est, ex quibus sanguinem ferri agnouerimus. Et erunt haec iugiter commutanda, ne naturali corporis uapore tepescant. Ac si spongiae uisae fuerint aegrotantibus graues, erunt apponenda ptygmata ex supradictis liquoribus infusa, aut succo plantaginis, uel intybi, aut herbae calicularis, aut uuae lupinae, quam Graeci strychnon uocant: uel semperuiuae, quam aizoön appellant, aut polygoniae, & acaciae ex aceto solutae. Ac si ex capite fuerit sanguinis fluor, erit pilothro expoliandum. Tunc fomenta adhibenda ex oleo uiridi, aut roseo, aut lentiscino, aut melino, aut murtino. Sin uero plurimus fuerit floris lapsus, radendum caput, atque gypso illiniendum, uel acacia ex aceto, magis frontis atque temporum partes. Perseuerante fluore cucurbita quoque apponenda, subiecta flamma plurima occipitio. Si autem etiam per nares ferri uideatur, erunt stypteria immittenda siccata, uel aceto infusa, uel alia qualibet ex liquoribus supradictis. Ora quoque spongia ex aqua frigida expressa iugi tactu detergenda. Tunc etiam cataplasmatum adhibendus est usus ex rebus constrictiuis atque epithomatibus, quae paulo post cum suis nominibus ordinabimus. Danda etiam aqua frigida, uel pusca frigida, aut gargarismus sine ullo percussu: quoties ex proximis partibus gutturis sanguinem ferri uiderimus: Ac si per inferiora, uel altiora ferri sanguinem uiderimus, forbendos dabimus cyathos duos uel tres. Quod si minime mederi ualuerint, etiam succus plantaginis, aut intybi, uel uuae lupinae, aut polypodij, aut herbae calicularis, aut rosae erit offerendus. & neque plurimus iugiter, ne percussu partes non deantur, aut liquoridum influxione, quae quidem sint constrictiuae uirtutis, recondantia tamen laxare uideantur: neque rursus longioribus interuallis: Sic enim frigus a nobis illatum naturali uapore obtusum parui temporis medullam dabit uisitatam. Tunc tertia die transacta, hora accessionis solitae articulos leuiter ungemus frigido atque uiridi oleo. Dehinc detergemus faciem quoque, spongia aqua frigida expressa retangentes: cibum dabimus paruam constrictiuum, ut panem ex aqua frigida, uel pusca, aut alica similiter, uel oryza, decoctione thebaicarum palmularum confecta, uel eisdem ex aqua recenti confectas. Aut si plurimum ualere

**C** ualere hæc uoluerimus, aqua coelesti, donec liquor mellis habeat crassitudinem, aut ex malis cydonijs: Tunc etiam danda oua tremula ex pulca, aut rore syriaco aspersa. Dandus etiam panis simplex, aut infusus. Tunc interposito spacio temporis dandus potus aquæ frigidæ paruæ. Dehinc permittentibus uiribus alterius diebus æger nutriendus, etiamsi nondum repressis fluor uideatur, usque ad id tempus, quo cicatricem firmatam senserimus. Quod quidem Themisonis

*Themison.* atq; Thessali sectatores usq; ad septimum diem seruari dixerunt, hoc est, trium

*Thessalus.* diatritorum spacium: Vt enim Antipater ait tertio Epistolari libro ad Gallum

*Antipater.* scribens: Naturalis est ratio trini numeri, non solum, in diebus, sed etiam in omnibus diatritis. Sed est melius, ut Soranus ait, quoniã non æquali tẽpore, nec

*Soranus.* dierum numero cunctis poterit cicatricis firmari soliditas, ob alias causas, & ob fortitudinem corporis, ac debilitatem, pro differentia naturali uariatam: neq; nos unum atq; eundem signare poterimus finem. Dehinc sequentibus diebus aliqua erunt emplastrorum apponenda, aut epithematum confringentium atq; frigidantium: Quæ sunt plurima particulariter: Etenim Thebaicæ palmulæ uino acriori infusæ, uel aceto contritæ, admixtis malis cydonijs decoctis, aut mali punici corticibus, aut alumine, uel acacia, aut hypocistide, aut galla, aut cenanthe, aut aloë, aut cerotario ex oleo roseo confecto, uel melino, aut myrtino, aut lentiscino, aut cenanthino, aut mixto etiam mastiche trito, aut melle decocto, galla contrita, aut aspera, aut puluere mali punici, uel mannae thuris admixto alumine Liparo, quo malagmatis sumant omnia qualitatem, tum linteo, uel panino illinita patientibus partibus apponenda. Vel illud medicamen, quod libris Celerum passionum memorauimus, de cardiacis scribentes, & appellauimus diatroos, uel ex polento, & uirgultis rubi, uel arnoglossæ, aut herbae sideritis, uel uuae lupinæ, aut caliculariæ, aut anulorum uitis, aut semperuiuæ. Item intyba cum pane ex aceto, aut palmulis, aut murtæ mollibus folijs, aut eiusdem femine uiridi ante cibum offerenda, uel ante cibum elixum aut non coctum panẽ, & plantaginem ex aceto coctam, & uiridi oleo, asperso rore syriaco. Item bulbis ex aqua & aceto, & rore syriaco confecti dari poterint cibo. Non aliter etiam cochleæ erunt offerendæ: habent enim quiddam glutinis naturalis utraque, & compaginandæ uirtutẽ, cum proficiente curatione. Danda etiam pomorũ quædam, ut mala cydonia cocta recenti mulso: uel torrida, præsumpto tegmine, farina conspersa, aut sorba, aut mali punici grana, aut fabrilium uuarum. Item uolantium non pingua, ut sunt pectora turdorum, uel pullorum matrem sequentium. Item columbarum, aut phasianorum, aut attagenarum, aut perdicum, quarum erunt murta pectora penetranda. Tunc etiam porcinae carnes, cebrum, pedes, auriculæ, ora, uel auricularum summitates, quæq; uel fuerint nutritibilia, nec tamen difficilia digestionem. Dandum etiam catapotium ex melle decoctum, sub lingua detinendum singulare, aut admixto gummi, uel draganto: Etenim sufficienter decoctum mel, sicut in externis corporum glutinat diuisuras, non aliter etiã interioribus mederi necesse est, atque iam glutinata solidare proficiente curatione. Dabimus etiam uinum, & magis illud quod fuerit mordicantis uirtutis, hoc est quodam sensu linguam remordentis. Tunc ad summam paulatim erunt ægrotantes resumendi, cum præcautione uehementium commotionum: Sunt enim leuiter atque sensim mouendi, portatoria scilicet, uel cathedra longiore, & firmato corpore lauandi: Etenim lauacia feruoris causa atq; motus illati, quod corpora celerato spiritu agitantur recentium glutinationum, atq; mollium uulnerum redulcerantia probantur: Cum enim

oporteat



A oporteat coherceri atque densari patientia loca contraria qualitate, necessarid̄ ue  
xantur feruoris illati causa: Inflata etenim parua ex occasione, atque turgentia  
redulcerantur. Præcauenda deniq; etiã uehementia exercitia, & magis reten  
to spiritu peracta: Tunc utendum peregrinatione terrena atq; maritima: Et si  
corpus uiderimus non attestante fortitudine augmenta carnis accepisse, erit ab  
stinencia cibi imperanda. Tunc sequentibus diebus paruus dandus est cibus ui  
no detracto: Etenim cicatricis nouitas: quippe ex uenarum uasculis confecta  
atque nondum fortificata, si carnis pondere fuerit prægrauata necessarid̄, rum  
petur. Semper autem oportet uentrem mitius emollire: aciores etenim clyste  
res incongruis motibus lacerant cicatrices, atque recursum faciunt passionis: ac  
si uehemens atq; plurimus fuerit sanguinis fluor, erunt extendendæ adiutorij  
uirtutes. Acerum denique sincere dabimus ore retinendum, uel gargarizandũ,  
aut sorbendum, spreto quorundam iudicio, qui asperum, uel tussiculam com  
mouens, atque fluorem prouocans acetum dixerunt: si quidem etiã gelatum  
sanguinem soluat: Etenim asperat, uel tussiculam commouet, si iugiter atq; im  
modice fuerit datum. Soluit autem eius percussibilem uirtutem distantia tempo  
rum oblatione uariata, quæ non sensibili tactu, sed remissibili quadam digesti  
one longioribus actibus immoratur. Item quod fluorem non prouocet demon  
strandum non est: si quidem sit manifestum, in externis corporibus uulneribus  
constitutis necessarid̄ fecisse densitatẽ: & propterea conducibilis atq; glutinan  
tis uirtutis fuerit approbatum. Danda etiã acacia aceto soluta, aut pulsa, aut ex  
supradictis liquoribus: non aliter etiã hy pocystis, uel licitũ indicũ, aut ompha  
cium, uel balauftium, aut cenanthe, aut polios herba, aut gentiana, aut macis,  
aut ponticum, uel ægyptia spina, quam acanthan uocant: quarum nunc sunt ra  
dices infundendæ, uel decoquendæ, nunc earum succi uel lachrymæ admiscen  
dæ: si quidem sint frigidæ atque restrictiæ uirtutis conuenientia obturamen  
ta. Item corticis uasculi uetustissimi uini exusti triti puluerẽ asperum tribus cy  
this puscæ frigidæ, aut decoctionis, de qua supra diximus, bibendum dari, in mo  
dum cochleariorum duorum: Etenim constringit cortex inueteratus, & magis  
antiquissimi uini commutatus tarditate temporis aucta uirtute. Utendum etiã  
trochiscis confectis ex supradictis speciebus. Item ex rosæ seminibus trochiscos,  
quorum compositionem Responsum libris de medicaminibus dicentes tra  
didimus. Item quod appellatur dielectrũ: item cœnocraton, & alia similia: quo  
rum compositionem, ut supra dictum est, Medicaminum libris tradidimus. Ac  
si coadceruatus perseuerauerit sanguinis fluor, utendum etiã uehementioribus  
quibus obturentur altiora, sua & teneritudinis causæ, tamen erunt ocysus adhi  
benda, ne passionis ipsius impetu in manibus nostris uitam linquere cogantur  
ægrotantes. Prædicto igitur periculo eorum proximis aut ministris, uel quod  
producta uita spem sæpe dederint sanitatis, erunt hæc adhibenda supradicti cor  
ticis cinis exustus cum liquida pice spongiæ impressus, decoctio lentisci, & ro  
ris syriaci, & elygmaticum supradictorum suorum: Nam hæc conficiuntur hoc  
modo: Agmine uitis ustis uirgultis, atq; ex eorum cinere confecto liquamine,  
scilicet aqua imbriali admixta, quam uulgo cisterninam uocant, dabimus ex ipsa  
bibendos cyathos tres uel quatuor, nullis alijs speciebus admixtis: Nam quidã  
in hijs si febris adficiantur etiã uinum immiscuerunt uiuidum, uel spongiæ  
ustæ cinerem, qui conficitur hoc modo: Spongia expressa aceto, atque pice li  
quida madefacta uasculo nouo includitur testeo: tunc circumtegitur luto, &  
usque eo inuritur, donec carbonescat: Dehinc trita in puluerẽ, ex quo cochlea

Acetum.

Cris unius quantitas aquæ uel pulcæ frigida mixta datur bibenda. Vel si uirtutē medicaminis augere uoluerimus, tinctam, ut supra diximus, spongiam liquidæ picis puluere bituminis aspergimus. Decoctio autem lentisci conficitur hoc modo: Eius uirgultorum sumentes sufficientem modum aquæ imbralis infundimus festarijs duobus. Tunc decoquimus: & cum semel uel secundo scatere uiderimus, expressas detrahimus lentisci comas: Tunc liquorem decoquimus, donec ad tertiam partem deducatur, cuius cyathum admixtum duobus cyathis aquæ bibendum propinamus. Non aliter etiam electariorum decoctio conficitur. Ob electarium autem conficiendum erunt sumenda mala punica recentia uel infusa, nisi fuerint mollia: Quibus contusis atq; compressis, aliquantū detrahimus succum atque decoquimus, donec mellis crassitudinem sumat. Et quantum medicaminis uirtutem tendere uoluerimus, tanto ualentius mala exuccamus, quo expressa ultimum atque crassiore succum dimittant, ut etiam eorū cortex si quid humoris habuerit sudet. Conuenit etiā medicamen, quod Themison ordinauit hoc modo: Mali punici partibus duabus aloë admixta paruicohlearis quantitate cum aqua frigida offerendum. Ac si solutio perseverauerit, addenda etiam constrictiua cucurbita patietibus partibus: Tum diateon emplastrum, quod uehementer astringit, superimpositis spongijs aqua pulca infusus, ut supra scriptum, ciborum qualitate permanente. Dandum etiam noctis initio medicamen, quod diaporon appellant, uel diasycaminon, siue cataporta, quæ Medicaminum libris prædiximus. Nunc autem perficienda conscripsimus hoc modo: Gummi & acacia æquis pōderibus, admixto alumine scisso ad duplex pondus, quæ sunt colligenda decoctione papaueris, & danda quibusdam in duplicem modum. At si quisquam non plurimum sanguinem fluxerit, nec tamen materia ferri cessauerit, conuenit etiam tertia die phlebotomiam ahibere. Etenim ex eo quod sanguis ferri non quieuerit, manifeste cōiungimus glutinationem partū non fuisse perfectam diuisuræ, siue uulneris: Et propterea in tumorem uenisse perspicimus; Omne etenim uulnus, quod usque in tertium diem glutinari non potuerit, necessariō tumescit. Thessalum denique indigna accusatione appetitum Sorani sententia recte purgauit: Tertia etenim die phlebotomandos sanguine fluentes constituit, nutriens constrictiuo cibo, non in consequentia ordinans adiutoria, sed tanquam complexis passionibus apta, ut contrarijs contraria obijcere uideantur. Ac si etiā intra diatriu tempus fuerit at testata partium grauedo uel dolor, aut spiratio difficilis, uel tussicula sicca, phlebotomare conuenit, atque aërem loci paruissimi trepidare, & hjsdem partibus lanas oleo calido uiridi expressas apponere, uel ob sanguinis fluxorem ac ordinare, quæ glutinare ualent, sed uirtutis frigida non sint, neque transuorationis asperent loca, nec tumorem commoueant. Plurima dabimus etiam samix terræ, quam ges altera uocant, uncix partem tertiam cum duobus uel tribus cyathis aquæ tepida. Non aliter etiam amyllum, uel argallicam radicem, atque foliorum eius succum. Conuenit denique sub lingua retenta eius radices particula, siue amyli, siue terræ supradictæ. Danda etiam ex gummi siue dragantio, & thure, & opio, & hjs similibus confecta electaria. Tunc tertia die accepta diatriu temporis obseruatione, non solius fluoris, sed etiam febriam, erunt ægro tantes oleo calido atque plurimo, & uiridi perungendi. Facies quoque aqua tepida fouenda: Cibus dandus complexionis passionis aptus, & pulvis ex oryza uel alica frisa, siue simplici, uel milio, & decoctio calida, sed non oleosa, ac potius sicca, uel ex oleo uiridi confecta, aut cum palmulis, uel amylo, admixto ges

*Themison.**Diateon  
emplastrum.**Medicamen  
diaporon.  
Diasycaminon.**D**Thessalus.  
Soranus.**quæ altera.*

A asteros, aut argallicis radicem incoctam. Cæteris uero diatritis, hoc est interual-  
 lis dierum trino numero seruatis cogentibus doloribus erit utendum fomentis,  
 atque cataplasmatibus laxatiuis: nunc etiam cum scarificatione cucurbitis, si  
 ue hirudinū appositione, quas sanguifugas uocant: Tum uaporatio spongia-  
 rum apponenda. Sin uero etiam fluor periculosus fuerit sanguinis, cum tussicu-  
 la uel asperitate gutturis, erit utendum quidem cōstrictiuis epithematibus, sed  
 calidist: Dandum etiam sorbendum mulsū ex melle decocto, & à uīno absti-  
 nendum. Danda denique aqua potanda calida, sed paruo modo, tum sorbilia,  
 quæ passioni uirtute apta mederi possunt, ut est amygdala † ex pusca in mullo †  
 decocta quæ abijcēda, & admittendū amyli quantū ualeat mulsū in quandā  
 crassitudinem redigere. Deinde similibus electarijs, atq; sub lingua continen-  
 dis medicaminibus utemur tempore amissionis, ut est mel atque admixto gum-  
 mi, uel dracanto decoctum, aut glycyrriza, uel eius succo: nisi quīsq; uam ægro-  
 tantium hoc improbauerit nausea commotus, quo etus stomachus facile mo-  
 ueatur. Itē ex lini semine trito, & tracanto drachmis duabus, & amygdalis ex-  
 poliatis ꝛꝛv, & strobilorum granis ꝛꝛx, & oui unius tostī uitello, &  
 amyli drachmis duabus, infuso passo sufficētis quantitatē, quo medicamen ele-  
 ctarij crassitudinē sumat. Sin uero etiam rauci fuerint ægrotantes, erit mel deco-  
 quendum cum cæteris speciebus singulatim, resoluto tracanto, ex infusione pas-  
 si confecto: Terminatur etenim asperitas faucium, uel transuorationis partes le-  
 niuntur, & tussicula mitigatur, sputa sanguinolenta reprimuntur. Danda etiam  
 noctis initio, nisi febrium obstiterit accessio, simplex diacodion. Continū ue-  
 ro medicaminū usum, quæ tussicularia sunt appellata, siue eorum immodi-  
 cam quantitatem necessariō fugiendam mandamus: Est enim melius simplicibus  
 atque consuetis mederi rebus: Illa enim temporaliter quidem mitigare ui-  
 dentur tussientium motum, sed passionem totam faciunt deteriorem. Ac si atte-  
 stante tumore fluor perseverans produxerit tempus, in iisdem perseverare con-  
 uenit, quæ supra memorauimus, admixto etiam lacte. Si minū tumorem uide-  
 rimus, dandum quoq; lac amylatum, & panis laganum, pulitibus infusum, sed  
 ex fermento confectum, quo panis habeat qualitatem, faciat etiam medelam  
 meliorem. Strobilus deniq; cum suis fructibus, quod in semet habeat resinale,  
 ptisana decoctus. Dehinc profectu cedente erit panis cū malua decoquendus,  
 sed non exquisitè conditus. Danda etiam ptisana cum lenticula, quam Græci  
 psyfanxon uocant, & apponenda extrinsecus cerotaria ex murfino uel lentisci-  
 no, aut melino oleo confecta: Tum urgentius augenda resumptio, ut supra de-  
 monstrauimus: atque ita absente sanguine, quoad fiet glutinatione perfecta.  
 At irruente tumore erit coniiciendum, uel aduertendum, utrum glutinatio fe-  
 cerit retentionem, cum neq; grauedo, neque dolor, aut punctio, uel pulsatio,  
 uel saltus partium, aut extentio, uel febris cum arida tussicula, aut stridor, aut  
 singultus, uel quæpiā sanitati impedita saucietas ægrum sequi uidebitur: sed sit  
 æqualis atque ordinata spiratio perseverans. Tum si tumoris causa fuerit reten-  
 tio sanguinis temporaliter effecta, quæ necessariō sordidum atque humectum  
 uulnus efficiat, phthisicorum fluorem pronuntiamus. Tum cum producto tem-  
 pore sanguinis fuerit ruptio uariata, erit curatio pro motibus temporum uarian-  
 da, ut superpositionem emergentem eadem curatione curemus. In lenimento  
 uero leues atque quietos adhibemus motus, sub magisterio aliptæ uel musici,  
 quo etiam uocis exercitium artificis præcepta moderentur, cibus dandus ex me-  
 dia qualitatis materia, adhibitis resumptiuis cyclis, in quibus non erunt repen-

† expolita.

Tussicularia  
medicamina.

C
   
tinae mutationes facienda. Sed nunc ex media qualitate materia primus ordinari-
   
dus est cyclus, dehinc ex uolantum secundus; tunc ex agrestium tertius, atq; ex
   
porcinis carnibus ultimus: Et coniunctis deinde duobus contiguis ordo dirigen-
   
dus, atq; ita omnibus, sed singulis materiarum speciebus erunt magis constricti-
   
gentia procuranda, ut in oleribus intybum, plantago: in marinis squilla, mul-
   
li: in uolantibus perdices, phasiani, atragenae: in agrestibus, lepores, capreae: Et si
   
celeriter aegros crassificari uiderimus, erit abstinentia intercalanda: Tum uen-
   
ter emolliendus. Utendum praeterea partiliter nunc aquae potu, nunc uini leuiter
   
remordentis: deinde ueniendum ad re corporatiua: curationis materiam latenti
   
motu adhibita drimypthagia, ex pisce gobione, admixto melle. Dandi etiam pi-
   
scis & cerebrum una tantummodo die, atq; interuallatis diebus adhibitis loca-
   
libus adiutorijs re corporatiuis, ut dropace, partibus primo quae fuerint remotae
   
patientibus: Tunc uicinis, ac deinde ipsis addendus etiam ex sinapismo rubor,
   
quem Graeci phoenigmon uocant, atq; sicca fricatio. Tunc torrendum corpus
   
sole, quod Graeci heliosin uocant. Adhibenda quoq; paroptesis, & aliquando
   
sicca cibatio, aliquando cum pane palmulae offerenda, & imitanda consuetudo
   
frigida lauacri, atq; potus paruus scilicet primo, ac deinde auctus suggestione,
   
quo possint etiam hijs aegrotantes uti partiliter: Facit enim duriora corpora, atq;
   
ualentia, acceptorum uel gestorum differentiae contrariorum mutatione uariata:
   
quanquam sint ex eodem genere uenientia. Utilis praeterea nauigatio approba-
   
tur, & peregrinatio comprobatur: inde enim res salutare ueniunt. Prae caeunda
   
etiam Venus: facile autem haec passio refricatur. Haec est secundum methodicos
   
ordinata curatio. Apud ueteres uero dissonantia sunt ordinata: Etenim de sche-
   
mate iacendi, atq; phlebotomia, & ligatione, & constrictiuis, uel frigidis cata-
   
plasmatis, & aceto bibendo uaria disceptatione pugnatum est. De schemate
   
inquam, iacendi: siquidem alij supinos iubeant aegrotantes iacere: uel super eas
   
partes quae non patiuntur. Item Asclepiades consequenter approbat supra par-
   
tes quae patiuntur esse locandos aegrotantes: siquidem cum scriberet necessarias
   
esse curationes adprehensa causa sic fuerit elocutus, etiam sanguinem inquit flu-
   
entes ita esse locandos. Siquidem Erasistratus phlebotomari praecipit patien-
   
tes. Alij uero eius sectatores etiam fieri principaliter damnauerunt adiutorij ge-
   
nus tanquam uirium uexabile. Item plurimi nostrorum tanquam laxatiuum, &
   
propterea inconueniens fluori sanguinis ex solutione uenienti, & indignum ad
   
constrictionem. Alij adhibendum probauerunt, ut Hippocrates de morbis scri-
   
bens, Diocles libro quo de passionibus, causis uel curationibus scripsit, Praxa-
   
goras libro tertio de curationibus. Item Asclepiades libro, quo de clysteribus scri-
   
psit: Dehinc Themison secundo libro Tardarum passionum: & Theffalus se-
   
cundo libro regulari: sed adiecta discretionem: Etenim si tertia, inquit, die rursum
   
sanguinem fluxerint aegrotantes atq; plurimum, quod intelligitur tanquam in
   
complexis passionibus, hoc est, strictura obtinente, faciendum approbasse: Alij
   
uero omnes statim, atq; sine ulla dilatione phlebotomandos dixerunt: & magis
   
si ex thorace, uel pulmone sanguis fluxerit, uel plurimus auertenda materiae cau-
   
sa, quo patientibus partibus derelictis, aliorum feratur, hoc est ad eas quae non
   
patiuntur, uel ob educendam materiae multitudinem. Denique saepe inquit
   
faciendam consuetudinem, si oportuerit semel, & secundo, uel tertio, quo re-
   
currens ex brachio post abstinentiam sanguis iterum auocetur, uelut Themison
   
ait, secundum se, & laxamenti esse, & minutionis, ne initium toris efficiat. Item
   
ut alij ob euacuandas uenas, quo exant late celerius concedant atq; coeant di-
   
uifura,

φαινιμος

ηλιοςιν

πρωτωνισ

Asclepiades.

Erasistratus.

Hippocrates.

Diocles.

Praxagoras.

Asclepiades.

Themison.

Theffalus.

**A** uisuræ, uelut Asclepiades, ad minuendum cursum siue spirationē, quibus pas-  
 sio adiuuatur. Item de ligationibus pugnauerunt: Siquidē Xenophon & Dio  
 nysius, & Erophilus primo libro Curationum, & Erasistratus probent aricu-  
 lorum faciendam constrictionē. Erophilus uero capitis, & brachiorum, & fee-  
 morum: Erasistratus magis inguinum & alarum: Etenim laxationē sensus san-  
 guinis approbat fieri retentionem. Asclepiades uero ad ipsum scribens libros  
 Parascuasticos ligationem excludit, eamq; neq; Erasistrato congruam, dicens  
 osculari nō posse sub discrimine uenulas, quod Græci diaphragma uocant, uel  
 misceri eas quæ supra diaphragma esse uidentur. Omnes etiā nostræ secte prin-  
 cipes id approbasse uidentur: impressa etenim inquit ligaturæ uexat, non im-  
 pressa inutilis esse perspicitur. Item Anipater tertio libro Epistolarum ait tene-  
 ri materiam quidem ligatione, sed cum fuerit indulta uel relaxata, in repentinū  
 atq; immodicum fluxorem ueniat: siquidem abstinentiæ causa altiora pendendo  
 latere potius quàm teneri uideantur. Item de constrictis cataplasmatibus pluri-  
 mi dissenserunt: Nam si Erasistratus hæc approbavit, Asclepiades excludit, tan-  
 quam materiā imprimentiā, uel coercendo in latum reuocantiā. Item acetū aliq;  
 tanq; tussiculā uel fluorē cōmouens expulerunt, uel quod duras partes densan-  
 do faciat. Themison uero hijs repugnans adhibendū iudicauit, attestante etiam  
 Theffalo. Alij autē eius acrimoniam uel nimietatem temperandam admixtio-  
 ne aquæ. Plurimi uero contrariarum sectarum etiam clysteres, atq; urinales aiūt  
 uirtutes adhibendas. Item Diocles taurinū gluten bibendum dicit, farinae con-  
 coctum & rubo, uel cum nepita amyllum uel marrubium, uel rosmarinum in  
 aqua pusca dandum. Motus uero aliq; adhibuerunt, non solum fricantes, sed  
 etiam deambulationē imperātes post cibum, ut Erasistratus. Asclepiades uero  
 de communibus adiutorijs scribēs, gestationem in hæmopticijs prohibet. Vt un-  
 tur quidam præterea etiam purgatiuis medicaminibus expapauere uel hellebo-  
 ro, aut diagridio, quod Græci scammoniam uocant, ut Diocles. Item sudorē mo-  
 uentibus & uomitum, ut Praxagoras, qui etiam plurima urinaria ordinauit.  
 Sed hæc facile iudicantur ex hijs quæ secundum methodicos tradidimus. De-  
 monstranda tamen eorum contradictio, & breui ratione formanda. Peccaue-  
 runt igitur, qui supra patientes partes ægros iacere uoluerunt: Omnis enim im-  
 pressio siue affectio incongrua glutinationibus approbat. Ceciderunt etiam  
 falsa intentione decepti, qui non addita discretione phlebotomiæ memorauerūt  
 usum: Non enim in omnibus oportuit prohiberi, cum fluorē sæpe fuerit uehe-  
 mens strictura complexa: Et si secundum Erasistratum osculatio uenarum ex  
 redundantia materiæ ueniens fluxorem faciat, conuenit uti detractio: Facile  
 enim corrigi uel reparari parua uirium uexatio potest: plurima tamen ex adiu-  
 torio patientibus utilitas fuerit: Neq; item in omnibus erit approbanda phlebo-  
 tomia: Nam nullo tumore apparente uexabilis iudicatur: Etenim corporis for-  
 titudo necessariō depurgatur, & stomachus uitiatur, atq; debilitate irruente dif-  
 ficile coëunt diuisuræ, & eadem patienti uidebimur ingerere, quæ prohibenda  
 suscepimus: Quippe cum non auersio, sed potius partitio sanguinis fieri intelli-  
 gatur, & duplici egestione celerata, nullam mortis habeat dilationem. Dehinc  
 erit anceps, utrum irruente rursus tumore phlebotomandi, necne sint ægrotan-  
 tes: sed phlebotomati apertissime interficiuntur, non phlebotomati magno ad-  
 iutorio priuantur. Ligationes uero non tantum ad diuertendam materiam  
 adhibendæ sunt, ut supra memorauimus: quantum ad densitatem uero fa-  
 ciendam

Xenophon.

Dionysius.

Erasistratus.

Erophilus.

Libri Asclep:

περικλυσι-  
κόν.

Antipater.

σκιμασιαν.

Ciendam adhibendas adprobamus; siquidem imprimendo coercant: Sed mediocriter adhibere, ne moderatione cessante uexare potius quam curare uideantur. Peccat etiam Asclepiades, frigida uel constrictiua epithemata recusando. Sunt etiam inconsequenter Erasistrati placitis, sed officio congruæ curationis efficacia; Nam solutionem constringunt, diuisuras conglutinant: quod ex uulnibus in superficie constitutis, & sub uisum uenientibus usu approbatur: Quibus apposita apertissime profuerunt. Peccant etiam non aliter, qui bibendum acetum negant: Non enim in omnibus fluoribus sanguinis dandum probatur, sed in hijs qui approbato atq; largissimo fluore uexantur: In paruis enim aqua frigida sufficere potest, aut admixto paruissimo aceto. Ac si tumor fuerit attestatus, ut complexam passionem demonstrat, procul dubio constringentia fugienda, quantum res pati uel admittere possunt. Est igitur imperiosum, ut ea quæ incongrue adhibita nocere demonstrantur, etiam cum necessario conuenire fuerint uisa prohibenda existimentur: Etenim aduersantia solutioni tussiculâ ex fluore uenientem mitigant, atq; ipsum fluorem constringunt, & sanguinem retinent cohibendo, & neque inurunt; siquidem sæpe reddita per digestionis uias patientibus partibus adueniant temperata atque admixta, liquidis in alto constitutis: Et propterea obtusa uirtutis uolentia perdurant. Sunt etiam clysteres contrarij: siquidem commoueant corpus, eo tempore præterea, quo conglutinationem faciendam nitimur. Hac ratione etiam urinaria medicamina atque uentrisflua magis noxia iudicantur: siquidem turbent atque uexent, & uertant stomachum. Item proteruus omnibus uomitus, & propterea contrarius iudicatur: Rescindit enim uulnera, nisi quis eum iam solidatis cicatricibus ob recorporationem adhibendum probauerit. Est præterea affectatio sudoribus, quam Græci aphydrosin uocant, contraria: Cum enim superflua atq; redundantia tollere uideatur, laxatiuæ uirtutis causa coëntia distungit. Item taurinû glutin tensionem atq; duritiâ facit. Motus uero corporis neq; excludendos generatim approbamus, neq; approbandos: Siquidem prius quam passio declinauerit requiescere debeant ærotantes. In declinatione uero sint mouendi, sed non post cibum: Tunc enim ob digestionem celebrandum tempus est quiescendi: quo fiet, ut prius quam cibum sumperint ærotantes gestatione sint mouendi; secunda etiam deambulatione: Etenim parua adiectione neq; ulcerare refrigerantur, & in resumptione uirtus corporis excitatur.

## DE PHTHISICA PASSIONE. CAP: XIII.



Phthisis, siue ut pleriq; appellant phthoë, quod corporis faciat deflexionem, siue corruptionem, fit frequentius antecedente sanguinis fluore: Aliquando etiam longi temporis tussicula, siue catarrho thoracis cum altiora lacerantur, & primo leuius, tunc ulcerata, facientia collectionem intrinsecus: quæ cum siccata non fuerint, citius sumat passionis initium. Sed non secum dum has differentias erit efficacia curationis mutanda: Siquidem antecedentes causæ, quamquam diuersæ, unam facere passionem uideantur. Sequitur autem ærotantes febricula latens, & sæpe quæ initium declinante accipiat die, atque ueniente luce leuiget, attestante tussicula plurima initio noctis atque sine cum sputis saniosis, ac paruulis, primo in hijs, qui non ante sanguinis fluore uexantur: quæ quidem admixta salua latere uideantur, secundo etiam plurima ferri uideantur. Hijs uero qui ex fluore sanguinis in istam ueniunt passionem, pri-

A mo sanguinolenta sputa efficiuntur, hoc est cruenta, quæ Græci hæmalopa uocauerunt: tunc feculenta, dehinc liuida, uel prasina, & in ultimo alba atque purulenta, dulcia uel salsa, cū uoce rauca aut acuta, & difficultate inspirationis, atq; genarum rubore, & cæteri corporis cinereo colore. Item sequitur oculos exoletus aspectus, & corporis tenuitas, quæ nudatis membris proditur magis quam ex aspectu uultus. Quosdam etiam sibilatio uel stridor thoracis sequitur, cretense passiohe sudor superiorum partium usque ad pectoris finem, cibi fastidium, & maior appetitus sitis, & quibusdā grauedo uulnerati pulmonis, ut etiā eius expuant fibras. Quibusdā punctio, ulcera thorace, pulsus debilis, densus, ac deinde formicalis, quem Græci myrmæzonta uocant: Digitorū summitates crassescunt, obuncatis unguibus, quod Græci gryposin uocant. Sequitur præterea inflatio pedum, & nunc frigus, nunc feruor articularum, nasi summities pallescit, atque aurium laminæ frigescent. Tunc peiorante passione uentris efficitur fluor albidarum egestionum, & indigestarum, debilitatis, naturalibus digestionis officijs. Discernunt præterea plurimi purulentum liquorem, phlegmata carbonibus imponentes, quo exusta probentur: Nam tetri odoris esse necesse est omne quod natura fuerit mutatum, uelut ex defluxione carnis ueniens. Item in aquam mittunt ægotantium sputamina: Etenim naturalia facile soluiuntur: Vitata uero atq; mutata perseverant, quadam tenuitate coacta, & subsidunt: siquidem sint grauiā, & contra naturam ex defluxione carnis ueniētia. Vicinæ atque similes passiones sunt phthysicæ, syntexis, quam nos defluxionem dicere poterimus, atrophian, quam nos nutrimenti cessationem uocamus. Item empyca passio, siue anaphoretica, quam nos purulentam, siue uo omiffuam dicere poterimus, quod ex uomica interioris collectionis purulenta per tussiculam excludunt sputa. Sed hæc discernuntur: Si quidem ex hijs atrophian longo tempore faciat tenuari, nullis etiam attestantibus sputis: Sæpe etiam sine ulla tussicula: Etenim longo tempore febricitantes, atque tussientes limpids adhuc sputis affecti, necdum phthysici iudicantur, in phthysicam uero passionem proni ac decliues esse noscuntur. Item empyca passio, siue ut supra diximus, anaphoretica discernitur à phthysica, non aliter quàm ulcerum collectione: Quippe cum empycos sæpe antecedit pleuretis, uel peripneumonia, & tumor immensus, & febres uehementes cum horribis frigidis, & inordinatis. Dehinc quod sæpe coadceruata puris copiam excludant repente, ac deinde egestionem facta febribus atque horribis præteritis liberentur, ut aut omnino hijs careant, aut ex parte afficiantur: in phthysicis ea quæ supra diximus antecedant, & liquida paulatim non coadceruata excludantur, & pro modo auctæ passionis etiam febres augeantur. Communiter autem hæc passio stricturæ, atque solutioni erit adscribenda, & subiacentibus passioni temporalibus cœnotetis. In quibusdam etiam ulcerum differtentias monuimus promouendas: Sunt enim necessariò intuendæ: Si quidem complexa sit regulæ, quam diatan uocant, medicaminum ratio, quam pharmacian appellat. Denique si tumens ulcus fuerit, quod intelligitur ex dolore consequenti, & cæteris tumoris signis, conuenit ægotanti calidus locus, & abstinentia unius diei. Tunc fomentatio laxatiua, atque cataplasmata, & cucurbitæ appositio cum scarificatione, & uaporationibus spongiarum, & totius corporis perunctione. Cibis quoque forbilis, calidus, & magis panosus, obseruatis temporibus singulorum adiutoriorum,

Sputa  
αιμαλωπα

Pulsus  
μυρμηζων  
τρυπησις

σιντοξίς  
ἀτροφία

Passio  
ἐμπυκία  
ἀνωφορητική

πλευρητις  
περιπνευμονία

C ut saepe docuimus, ac si tumens non fuerit ulcus, ob purgationem fordis erunt aquæ mulsæ cyathi duo uel tres offerendi ante cibum, uel scœnigræci saepe torti decoctus succus, sed non ita ut uiscosus fiat, quod seruabitur: Si secundo uel tertio mollius scatere cœperit, deponatur, quod sit colore uinosus, ac deinde uni cyatho liquato admiscemus mellis coc hleare: habet enim uirtutem scœnigræci semen mitissimæ deterfionis. Vel certe mulsam dabimus ex lini semine fricto, atq; trito, admixto puluere, aut liquato linteolo limpido, uel farina meregmi. Si autem maior purgatio fuerit facienda, irin illyricam atq; herbū dandum probamus. Oportet etiam herbum rubrum aquæ infundere donec infletur. Tunc testa calefacta atq; ignita molere, terere, ac deinde tum tenuissimo cribello eius pollinem multo aspergere in cochlearij quantitatem, uel ex melle decocto electarium facere, admixto scilicet polline supradicto. Sed propter uehementiam herbi erit consiicienda fordis magnitudo, ut si fuerit putruosa, quam Græci dyfoden appellant, tunc solo herbi polline utemur. Sin uero non ita fuerit cogēs causa, admixto sesamo iri illyricæ æqualis ponderis aut superantis, pro passionis magnitudine: Ac si plurimum putruosum apparuerit ulcus, ex hijs quæ feruntur, non solum per os conuenit herbi pollinem dari, sed ex ipso confectum etiā cataplasma aceto atq; melle extrinsecus apponere. Tunc etiam lenticula simili usu adhibenda probatur: Et præterea purgatiuæ uirtutis aristolochia & dracontia herba, siue quæ appellatur aron: Eius generis etiam marrubium approbatur, quanquam sit stomachi uexabile, purgatiuæ tamen uirtutis, Oportet autem eius manipulum tribus aquæ sextarijs decoquere, donec ad partē redeant. Tunc marrubium detractum projicere, atq; admiscere mellis boni libram, & rursum decoquere, donec ad suam ueniat crassitudinem. Ac si marrubium uiridis fuerit, tundendum atq; exuccandum, & in unum cyathum succi libra mellis miscenda, & ita decoquenda, aut aquæ sextarij tres decoquendi, siue admiscendi, donec crassitudinem sumant. Faciunt etiam ex strobilis & amygdalis, & lini semine, uel supradictis electaria confecta. Item ex amygdalis, & pitana cum melle & lacte forbile medicamen, & primo cum pane acceptum infuso melle. Tunc etiam singulare sorbendum paruissime, ad modum unius cyathi uel duorū: de hinc plurimum, longe ante tempus alterius cibi: quanquam sit in quibusdam hoc solum cibo sufficiens: Etenim corpus nutriet, & uulnera reterget, & cruentus, uel purulentos: Dehinc cum tenuia sputa ferri uiderimus, facit etiam strobili decoctio, quæ conficitur hoc modo: Viridem strobilum sumentes fructuosum, qui in semet habeat quædam resinalia, quæ tribus sextarijs immixtum decoquimus, donec pars liquoris infumatur. Tunc detracto strobilo erit residuum parti liquoris miscenda mellis libra, uel glycyrrhiza. Tunc decoquendo donec crassitudinem sumat. Conuenit etiam ex squillitico uino electarium confectū, ex quo erit sextarius unus libræ mellis admiscendus, & gummi uino perfusi ses libra: tunc decoquendum mel donec uinum infumatur. Potest præterea etiam mellilotum linteolo ligatum tempore decoctionis immitti. Item succus glycyrrhizæ simili modo, atq; eodem tempore misceri probatur. Conuenit etiam diocodion medicamen cochlearis quantitate sumptum, uel butyrū cum melle electario datum: Et præterea purgatiuæ uirtutis atq; siccatiuæ hoc medicaminis genus marrubij succi uiridis sextarij tres, mellis libra una; Quæ cum fuerint coctione crassificata, irin illyricæ immittendæ sunt drachmæ duæ. Sed oportet neq; semel, atque eodem tempore omnia hæc ægrotantibus dari: Varias enim materias posuimus: siquidem iugis speciei unius oblatio satiat ægrotantes, &



**A** propterea recusetur, neq; accessionis tempore hæc danda mandamus. Quapropter etiam cætera in curationibus monemus intuen-  
 da, quo purgato ulcere humanioribus cibis utamur, hoc est ex mediæ materiæ qualitate. Conuenit  
 interea motus latens pensili primo lectulo cathedra longiore, atque in uicina  
 porticu. Adhibita etiam perunctione primo sedenti, ac deinde recepta fortititer  
 dine stanti, purgato ulcere dabimus uinum album, atque Iene mediocriter  
 remordens. Tum lauacrum adhibendum, quando etiam sicca conueniat ciba-  
 tio singularis, uel cum palmulis thebaicis, & pulmento in cibum dato, uel ar-  
 noglossa herba, & uolantum non pinguis. Item sub lingua amyllum datum,  
 quod retentum in defluxionem ueniens subiectis partibus patientibus iruat, &  
 paulatim adiuuet cicatricem, uel mel decoctum simili modo datum, aut paruo  
 ex amylo admixto: Tum etiam trochiscum, qui appellatur trigonos, uel mel  
 uino remordenti admixtum parti suæ quantitatis & decoctum, donec incoqua-  
 tur uinum. Tunc etiam antidotum, quod appellatur theriaca mithridatis, quæ  
 in semet habeat siccandi atq; recorporandi uirtutem. Item zopirios, & dieris-  
 mus. Apponenda præterea extrinsecus emplastra, quæ in cicatricem ducere ua-  
 leant, ut est melinon, ac deinde siccantia magis. Tum cum firmum apparuerit,  
 lenimentum erit amitaonion imponendum, uel polyarcyon malagma, admi-  
 xto cerotario ex oleo cyprino confecto parte tertia; siquidem hæc singularia pri-  
 mo tempore ægrotantes ferre minime possint. Tunc cyclica regula adhibenda,  
 sed quæ non repentinas habeat ordinum mutationes. Denicq; nunc uinum, nunc  
 aquam potare permittimus, iuxta cycli rigorem. Danda etiam drimiphagia,  
 quam despuentibus sanguinem memorauimus. Adhibenda etiam localia adiu-  
 toria, similiter cucurbita, dropaces, & sympasmata, & paropteis, & sinapismus,  
 & bibendum medicamen, quod diapipereon appellatur: Valet enim callosita-  
 tem ulceris tenuare, atq; siccare. Fugienda præterea bibendi medicaminis satie-  
 tas, & eligendus consueto usus: Magis siquidem inueta materia uexatus sto-  
 machus, atque fastidio supinatus prodat ægrotantes: Et propterea uehementer  
 utilis naualis gestatio, atque longa nauigatio, lectio, uocis exercitatio, & omne  
 quod dare corpori fortitudinem potest. Veteres autem medici alij nihil de ista  
 passione memorauerunt. Sed Diocles libris, quibus de passionibus atq; causis,  
 & curationibus scripsit, iubet initio cibos detrahi, nihil de fine abstinentiæ signi-  
 ficans, quousq; sint ægrotantes retinendi: Tunc sudores commouendos, quibus  
 necessariò uires auferantur, & neq; hoc quemadmodum faciendum sit ordina-  
 uit. Utitur etiam anaceliasmis, quorum qualitates non memorauit, adiiciens  
 uerendum, siue deducendum à pulmonibus humorem, quando fuerat mitigan-  
 dum potius ulcus quàm depurgandum. Item uomitum ex oxymelle adhiben-  
 dum, quo corpus disijciendo ulceratas lacerat partes: atque hoc iugiter, & post  
 coenam faciendum probat: dehinc proterua mentis cæcitate deceptus etiam psi-  
 chrolusian imperat adhibendam, & allium dandum, quod necessariò uexet æ-  
 grotantes inflando: Tum uino flauo utendum siue nigro, & propterea duro,  
 atq; post prandium deambulatione uexandos imperat ægrotantes, & nulli adiu-  
 torio sua tempora reddenda perspexit. Item Praxagoras secundo libro curatio-  
 nū, hijs qui pulmonis ulcere afficiuntur initio helleborū probat, atq; sitim facien-  
 dam: tum resumēdos: non aduertens primo resumptione, tunc helleboro uten-  
 dum, quo possint eius laborē perferre ægrotantes. Ad summā, non resumpto  
 uiribus deficienti helleborum non conuenit. Resumpto autem, uel fortificato  
 exclusa phthifica passione comprobatur, & propterea usus hellebori recte pro-  
 hibetur.

Lecti pensiles

προχριστός  
 τροχιστός

συμπασματα  
 διαπιπερον

Diocles.

ανακελιασμις

οξυμेलισ

ψυχρολουσιαν

Praxagoras.

C  
Themison.

Allium inflat.

habetur. At Themison secundo libro Tardarum passionū quaedam recte, quædam caduca proteruitate composuit. Ex quibus est etiam pendentes thorigestatio, quo plurima parte diei ac noctis motu exerceantur ægrotantes, cum necessario accessio uespertino tempore asperetur, atque luce surgente leuigetur; quo non solum laboriosus, uerum etiam intemporalis, & inordinatus motus ab eodem adhibitus approbatur. Etenim initio lucis, & dimissionis tempore nutriti cibo conuenit ægrotantes; Est etiam noxium allium, quod imperat dare: si quidem inflationem maximam faciat. Vnctio item ex feruentibus adhibita uirtutibus, quam circa uesperam probat adhibendam, cruribus atque brachijs contraria iudicatur; tunc enim febres ardescunt. Imperat præterea inter duos uel tres ægros lauandos, cum corpus elimatis uiribus debilitet lauacri frequentia, & sordidet atque humectet ulcera. Præterea herbum, dehinc intybum, & plantaginem, cum sit horum usus differentia temporum separatus; Herbum enim purgationis adhibetur causa: frigerantia uero cicatricis obducenda. Item imperat ulcera facienda extrinsecus iisdem quibus intus inesse senserimus, quod est perniciosum: Putat enim auersione humoris facta ad exteriores partes altiora ulcera præficari; & propterea diutissime differendam sanitatem exteriorum ulcerum, donec illa clauduntur. Imponenda nanque ait emplastra, quæ humoris prouocant defluxionem: cum humoris defluxio iuxta sapientia placita nullius commodi teneat fidem: sic etiam plurima localia adiutoria adhibenda conscripsit, quæ tamen multo tempore magnificas ulcerationes, hoc est, quas nos extrinsecus infiximus, in cicatricem uenire cohibeant, impediens plurima quæ congrue adhiberi possunt, ut defricationes, dropaces, cucurbitæ, sinapismi, paropteses, & alia quæ cum uehementissime profint, ulceratione cutis præfecta adhiberi non possint.

CAELII AVRELIANI SICCENSIS  
CHRONION LIBRI SE  
CVNDI FINIS.

C A E L I I

# CAELII AVRELI-

ANI SICCENSIS CHRONION

LIBER TERTIVS.

CVI HAEC INSUNT:

- De suspirio, siue anhelitu, quem Graeci asthma uocant.
- De stomachicis,
- De phagedæna.
- De iccorosis, quos Graeci epaticos uocant.
- De aurigine, siue arquato morbo, quem Graeci icteron uocant, Latini uulgo morbum regium.
- De liepticis, quos splenicis appellant.
- De cachexia.
- De nutrimenti cessatione, quam Graeci atrophian uocant.
- De hydropē.

ἄσμα.  
 φηγίσιαι.  
 ἰκταίναι.  
 ἰκτερός.  
 σπληνικοί, καὶ  
 σπληνικοί.  
 καχεξία.  
 ἀτροφία.  
 ὑδρωψ.

Secundo libro Tardarum passionū, quo paralytica passionis, & canini raptus, & auriculæ doloris, atq; fluentis humoris, & apprehensionis sensus, quā Graeci caralepsin appellāt, & uocis amputationis, & influxionis, quā catarrhon uocant, & tussiculæ, & sanguinis fluoris, & phthisicæ passionis tradidimus curationem; nunc cæterarum prosequimur ex ordine disciplinā.

DE SVSPIRIO, SIVE ANHELITU, QVEM  
 GRAECI ASTHMA VOCANT. CAP: I.

B



Nhelatio, siue suspirium ab accidenti nomen sumpsit. Vocatur præterea secundum aliquos spirationis difficultas, quā Graeci dyspnœan uocāt, siue orthopnœan: siquidē sese præfocari sentiant cum iacuerint ægrotantes, atq; erecti facilius spirēt. Itē, ut alij dicūt, cōtrario uocabulo suæ uirtutis nomē accepit: Nam cum sui ratione conuertat ac deprauet tanquā corrigat orthopnœa nuncupatur, quam nos spirandi dicere

ἰστανία.  
 ὀρθοπνœα.

correctionem poterimus: Multa enim contrariæ interpretationis uocabulū sumpserunt, ut fella, quæ Graeci glycea uocant, uelut dulcia, cum sint amarissima. Grauat autē atq; premit hæc passio magis mulieribus uiros, & iuuenibus senes, atq; pueros, & durioribus natura corporibus teneriora, hyberno atq; nocte magis, quàm die uel æstate: in quibusdam ex initio generatur: in quibusdam perfectis irruit passionibus: Sed magis ex profundo frigore sequitur patietes spirationis difficultas, & frequenter natura celerior magis quàm tarda. Item præfocationis sensus secundum thoracem, atque grauedo, & feruor igneus. Item enteron ad superiora conductio, & cum passio uehementescere cœperit, stridor atque sibilatio pectoris cum uocis debilitate. Tum extensio colli atque uultus cum rubore, & oculorum suspenso attentu, & iacēdi potestas schemate supino, tussicula nunc arida, nunc uuida, cum sputis tenuibus & spumosis, aut crassis & uiscosis, & sudoribus, & colore morbo, atque pulsu humili. At si grauior impetus superpositionis fuerit, ora ægrotantiū liuescunt; & quidē exclusio per nares humore mucilento releuantur, atq; præfocationis carent metu: quod non aliter cedit, etiam si super oculos lachrymarum fuerit fluor. Variantur autē tempora passionis superpositionibus & lenimentis, & unis limpidis atq; synceris, nunc

Fella  
 γλυκία.

ἰστανία.

ris, nunc

C ris, nunc fordidis, & passionis tractibus implicatis, ut etiam tunc leuis difficul-  
 tas inspirationis inesse uideatur: quæ facile prodetur, si ægrotantes itinere ascensi-  
 bili gradiatur, atq; ocyus pergant: uel indigestione, aut usu uenero affecti, uel  
 frigore, atq; puluere, siue fumo grauentur. Differt autem hæc passio à peripleu-  
 monia, quod neque cum febris necessariò fiat, & semper tarda esse uideatur.  
 Item secundum aliquos discernitur ab orthopnoea: siquidem hæc cum stridore  
 atq; præfocatione asperetur: Orthopnoea uero cum thoracis euerfione atq; sin-  
 gultu, aliquando etiam cum sanguinis fluore. Item secundum aliquos magni-  
 tudine discernitur: Vehementem enim dicunt orthopnoeam supradictis passio-  
 nibus. Sed est melius, ut uno atq; generali concursu passionum potentiam iudi-  
 cemus, ut nunc uehementem passionē dicamus, & magis accessionis tempore,  
 nunc leniorē & magis dimissionis tēpore. Est autē passio stricturna, quapropter  
 conuenit, ut mox corpus inuasert, siue cum repetendo superpositionem aspera-  
 uerit, iacere ægrotantes altioribus stramentis, thorace atq; capite subleuato, lo-  
 co lucido atq; calido, mediocriter adhibita requie, & abstinentia cibi usque ad  
 tertium diem. Et si uires permiserint, pectus tegēdum lana, atq; fouendum oleo  
 dulci calido: adhibita quoq; articularum blanda calidarū manuum fricatione, ut  
 etiam tenendo medeamur teporibus admotis tempore quo accessio uehemen-  
 tescit, & cucurbitæ lenissimis raptibus detrahendæ. At si præfocatio coegerit,  
 & uires permiserint ægrotantis, adhibenda phlebotomia, & diatrixi tempore un-  
 ctione antecedente sorbilis atq; calidus, & uariis in dimissione offerendus cibus,  
 atq; alternis diebus, donec passio declinet. Sin uero imbecilles uiribus fuerint  
 ægrotantes, diurnis diebus dabimus cibum: sed ea die qua abstinere oportue-  
 rat, paruum: Ea uero qua dare licebat paulo, plurimum. Sin uero officium non  
 agnouerit, simplex clyster adhibendus, & ante cibum mulsæ ex melle despuma-  
 to duo uel tres cyathi præbibendi. Tunc cataplasma laxatiuum, atq; cucurbita  
 cum scarificatione adhibenda thoraci, & in utraq; scapulas, ac magis paulo in-  
 ferioribus locis, quo sine ulla quassatione partium eius raptus efficiatur. Tum  
 uaporatio spongiarum, atq; cerotarū, & malagma quod diachylon appellant, Tum  
 uel mnaseum: Atq; ita lauacrum, & uinum, & uariis reddendus cibus. In leni-  
 mento uero si corpus passio tardauerit, erit adhibēda resumptio, gestatione, uo-  
 cis exercitio, deambulatione, unctiōne, fricatione, corporis retento spiritu: tum  
 lauacrum, atq; cibum expulmentis mediæ qualitatis: Dehinc ad re corporatiuā  
 curationem transeundum. Adhibenda drimyphagia, atque cæterarum transitus  
 mutationum, quas sæpe cyclos ordinantes docuimus. Tum etiam ex radicibus  
 uomitus, uel si passio coegerit, etiam helleboro prouocatus. Iubemus præte-  
 rea acetum scilliticum ægrotantes ante cibum sorbere, uel cum aceto nitrum, si-  
 ue laser, aut hyssopi decoctionem cum fico contritum, uel nucleo pineo, quem  
 Græci pityda uocauerunt admixto mulsō. Item abrotanum tritum cum sulphu-  
 re, atq; aceto ex mulsō confecto, uel urticæ semine, aut radicem, & horum limi-  
 lium electariorum, ut est melli admixta resina terebinthina, aut cartamū, quod  
 nasturtium uocamus, aut sesamum, cum aloë, & amygdalis amaris. Aliquando  
 etiam pipere, uel ouī uitello: Vel illud electarium quod diascyllis appellamus,  
 cuius confectionem de Medicaminibus scribentes tradidimus. Tum etiam cu-  
 curbitæ re corporatiuæ adhibendæ thoraci, atq; interscapulo: Dehinc dropax, pa-  
 ropetis, heliosis, sinapismū, acopa, re corporatiua malagmata, ut est diadaphni-  
 don, uel dialoë, uel diaeuphorbio: Dehinc nauigatio atq; peregrinatio terrena,  
 & portio theriacæ antidoti, & aquarum naturalium usus, quarū præstant in Ita-

μαλακμα

μαλακμα  
διεχυλορ  
μνεστορ

κίττι

**A** lia coryliæ appellatæ, siue albæ, uel nepesine. Tum etiam cataclismus, hoc est, aquarum illisio superne, ñsdem locis qui patiuntur: Vtilis deniq; maritima, & plurima mare tenus conuersatio, atq; consuetudo frigidi lauacri, quam psichrolusian appellat. Aliqui autem aduersarum sectarū principes etiam dauco cum aceto & melle ægros potauerunt, siue iri cum mulso, & uentrem plurimū deduxerunt, dando de diagridio, quod scammonian Græci appellant, obolos tres, cum duplici pondere aloës siue hieræ, quam catarticam uocant, uel ammoniac salis obolum, siue opoponacis simile pondus, uel cneoron, aut polion herbã, uel peplion, aut calchanthū, uel taspian, aut asininum lac, & castoreum, non solum lenimenti tempore, sed etiam in augmento, siue superpositione passionis. Alij uero etiam urendum thoracem, uel caput crediderunt. Themison quoq; secundo libro Tardarum passionum in quibusdam eisdem compeccasse uocetur, cum plurimū uentrem depurgandum credidit ex diagridio, atq; in ipsa accensione. Vtitur præterea constrictiuis, atq; hijs acrioribus, & imperat dari taspian succum cum opoponace, aut sagapeno, ex quibus stomachus necessariò uexatur. Hic deniq; erit memorandum, quia potis medicaminibus non sine cautionibus utendum est, ut neq; eorum plurima satietate uexandi ægros tantes. Itē in impetu uel asperitate passionis reparatoria adiutoria prohibēda: Erit enim cœnoteta consideranda, qua facile medicamina qualitatis ratione accedente correctius approbamus.

Balneum Italia.

Lentis.

## DE STOMACHICIS. CAP: II.

sequitur.

**B**

Parte corporis quæ patitur stomachica passio nomē accipit, sed non omnis stomachi querela illico passio nuncupatur, nisi fuerit ex multorum concursu signorum, & perseverantia confecta, atq; corporibus tardans repetendo superpositionibus lenimenta. Plurimi igitur singulatim speciales curationes eius tradiderunt: Nunc de stomachi duritia dicentes, nunc de uentositate, de reumatismo, & debilitate, & horrore ciborū, & fastidio. Themison quoq; primo libro Tardarum passionum solutionem circa stomachū, quam appellauit reumatismum, secundo libro uentositatē. Item Thessalus secundo libro regulari curationem separauit soluti stomachi atq; inflati. Nos uero communiter sub una propositione de omnibus dicere curabimus, qua uentositatē uel ex tumore duritiã confectam stricturæ iungimus; Fastidium uero, siue horrore ciborum, & corruptionem ambigūã utrisq; principalibus passionibus subijcietes. Antecedentes causæ quæ stomachi passionem faciunt, cæteris quoq; passionibus generandis communes esse probantur, sed magis ista iugis indigestio parit, siue post cibum gemitus, & perfrictio profunda: Item molestitudo & medicaminis insueti potatio. Sequitur autem in passione constitutos accessiones tempore animi defectio, articulorum frigidus torpor, aut uariatus per membra acrior naturali feruor, qui magis medias teneat manus: tum roscidus sudor, & animi angustia, iactatio, anxietas, siue concatenatio mentis, & desponsio, coloris mutatio, pulsus paruus, celer, imbecillus, corporis tabes, cibi fastidiosus, uel maior ciborum appetitus: Tum corruptio acceptorū cum acore in bromosam uel fumosam transeuntis qualitatem. Quibusdam etiam uocis amputatio, & dentium constrictio, siue concubitus, inseparabilis capitis grauedo, aurium tintus, & quibusdam sitis insatiabilis: cum in accessu tumor maior fuerit excelsus, oris siccitas, & saltus sub præcordiorū partibus: Tum dolor in eadem par-

Themison.

sequitur.

C

te, aut etiam inter palas tenens, siue latius, cum se tumor uberior infuderit: dehinc transuorandi difficultas cum praefocabili sensu. Quo denique comoti quidam nostrae sectae principes, Epistolarum libris hoc accidentia genus stomaticam synanchen uocauerunt. Durescente autem stomacho sine ullo seruore atque dolore, caetera communia signa sequuntur: Tunc ligneus earundem partium sensus, & magis inter palas, si omnis aruerit stomachus: Sin uero in superioribus erit transuorandi difficultas, donec ad eius fundum accepta perueniant, aut si in eodem fundo, quem Graeci basin appellant, fuerit durities, erit transuoratio facilis, sed post eius perfectionem grauatio sequetur, tum durities, atque extantia in interioribus praecordiorum. Ac si uentositas fuerit stomachi, tensio sequetur inflatione coniuncta: Tunc capitis plenitudo cum oppressis atque iugibus ructationibus, testante grauedine, quae magis accepto cibo sentiat. Tum sonus in interioribus liquidorum tanquam semipleni folliculi, errante uento per inania; atque ita tensione laxata erunt ructatione releuandi: Et si etiam intestina fuerint conflatata, rugitus interiorum sequetur, quem Graeci borborigmon appellant. Ac si solutio fuerit stomachi, quam reumatismum uocauerunt, sequitur saluarum fluor, & quibusdam iugis sputus, & oris humectatio nauseabilis, cum mordicatione interiorum: Quibusdam plurimum uomitus crassioris, uel tenacis, aut fellis, & prasini humoris, uel alterius cuiuslibet substantiae circa supradictos colores. Sin uero occulta fuerit solutio, quam Graeci adelon appellant, aut imensa signa uideantur, quae Graeci logothoeta uocauerunt, sequitur debilitas pulsus aegrotantis, & ueluti stomachi pendentis atque tremantis sensus, marcor ac defectio animi, quam Graeci lipothymian uocant, quae sumpto cibo temporaliter depellatur resumptione suffecta, nec tamen perseverabilis: Sed rursum in eandem relabent defectiorem, in imagine ultimae passionis. Quo fit ut nisi quis celerius sumperit cibum, summa defectiione iactetur. Sic denique plurimi impausabiliter tota die atque nocte cibum sumpsisse ueteribus traduntur: Nanque Asclepiades memorat Praxagorae famulum ternos biltres panes per singulos dies accepisse: quibus comestis non aliter passione afficeretur, quam si nihil acciperet. Sed ab ista passione phagedaena discernitur: siquidem in ipsa non insuamantur, uel digestionem tradantur accepta, sed grauatione sequente euomantur. Haec sunt quae stomachi reumatismo occurrunt: Sed circa regulam methodicam discernentes superpositionis tempore contrariarum adiutoria passionum stricturae ac solutionis, quae suis speciebus signis approbantur, in lenimento communi sapissime curatione utemur, quam recorporatiuam dicere poterimus, a Graecis metasyncriticam appellatam. Cum igitur primo stricturae passio corpus inuaserit, atque noua temporis causa fuerit aegrotantis, siue in superpositione constituta turbando, aut dolore, aut uentositate affecerit patientem, conuenit enim iacere loco lucido, atque calido mediocriter, adhibito straminum, atque operimentorum calidorum usu, & si uires permiserint, adiuncta abstinentia usque ad tertium diem, & accessiōnis tempore omnifariam requiem: Tum articulorum blanda conuenit defricatio, cum quodam calidarum manuum amplexu, ut etiam tenendo medeamur. Dehinc uaporations inter scapulas, siue palas adhibenda: pectori quoque sacelli calidi ex cantabro confecti, siue polline: nam Graeci omphacome li uocant, & harum similiu materiaru. Conuenit etiam multiplicati linteaminis uaporatio, siue pannorum, uel plagellarum, quae Graeci pygmata uocant, oleo tinctaru, cucurbitae igni externo uaporata, atque leniter apposita iugi atque frequentia mutatione. Aliquando etiam testea uascula, quae Graeci amphoras uocant, si

σοματικῆ συνάντησις.

Βασίς.

Βορβοριγμός.

Solutio  
ἀδελόν  
λογθοετα  
σημα  
λιποθυμία.

D

ὀμφακομήλι  
ἀβήματα.

**A** ue uitrea: Tum fomētatio studiosa ac iugis, ex oleo calido atq; dulci, uel in quo maluz agrestit radices decoctæ sunt: si singultus fuerit, sicyonio: si inflatio, ruta uel anetho. Ac si uocis fuerit amputatio, in accessionis affectu decubētibus erūt spongijs aqua calida expressis ora uaporanda, & distinctio dentium facienda digitis immixtis, quibus lenius gingiuas deprimamus. Tum capitis fomētatio, & resumptionum moderamenta adhibenda, ut panis calidus, uel cucumis, aut melo, uel terræ gleba aqua calida infusa, & oris collutio ex aqua calida, & accessione uergente parua potatio: ac si in uehementiam passio uenerit, adhibenda phlebotomia: Qua perfecta si tertia fuerit dies, quam Græci diatriton uocant, erit ægrotans unctiōe curandus, calido scilicet ac dulci oleo: tunc oris adhībēda collutio: cibus offerendus paruus, leuis, calidus, sumptione facilis, ut forbile quidquam ex pane atq; melle, & sale, & anetho confectum, siue pultrícula molli, uelut ex pane, aut alica, & oua forbilia: Tum alternis diebus permittentibus uiribus æger nutriēdus, donec passio declinet. Potus præterea dandus est plurimus, sed neq; maioribus haustibus hauriēdus, neq; coadceruatim atq; eodem tempore, quo potius ignotos impleri, quàm relaxari faciamus. Hijs autē partibus quæ fuerint in tensione constitutæ, cataplasmata conueniunt laxatiua, ut est præ cæteris ex foenigræci pollinibus, & semine maluz, ex solo melle, & paruo oleo admixto confectum, quod plurimo tempore corporis possit sine ulla grauatione immorari: Tunc cucurbita adiuncta scarificatione, siue hirudinū appositio, quas uelgo sanguisugas appellant: Deinde cataplasma, & uaporatio spōgiarum expressarum liquoribus sæpe memoratis. Declinante passione si ulla durities fuerit consecuta, erunt cataplasmata apponenda, ut nuper docuimus, admixta resina, siue in olei uicem liquida pice, uel ex radice hibisci, & adipe porcino, recentissimo, tum ueterato cōfecta, siue ex hordei pollinibus, aut lolij semine, & arido fico & hibisco: Tum etiam ex oleo calido embasis, siue ex uarietate eiusdem per diuersa uirtutis foenogræci decoctione, uel radice maluarū, uel lini semine. Dehinc cibus uarius dandus, sed qui nullam faciat inflationem, neq; digestionem tardius approbetur, sed omni facilitate conueniens, ut cerebrum porcinum, pisces teneri, atq; olera quæ uentrem mollire ualeant: Tum lauacra cōuenit adhibere, atq; uino ægrotantem resumere leni. Utendum etiam malagmate quod diachylon appellamus, siue mnafeum, uel diamelilotum. Et si uentositate fuerit stomachus affectus, adhibendum diasamfucū, siue diaspermaton: quorum compositiones de medicaminibus Responsonū tradidimus libris. Si reumatismus fuerit, quem nihil aliud quàm solutionem accipimus, conuenit ægrotantē iacere loco mediocriter frigido, supino schemate, attritis ac teneribus stramētis utentē, adhibita requie & abstinentia, sicut superius diximus, permittentibus uiribus, tum tenacior ligatio articulorum, uel si causa coegerit, restrictio facienda appositæ cucurbitæ stomacho, plurima flamma subiecta: dehinc solutione cogentes spongia frigida: atq; odorameta quæ percutere minus ualeant caput, ut exhalatione sui frigus ingerant ægrotanti, ut mala cydonia, pira, forba, mala punica, murta, lentiscum, rosa, uel pulentum infusum, & hijs similia, oris collutio ex aqua frigida siue pusca. Ac si plurimus fuerit saliuarū fluor, expure iubemus ægrotantem: Siquidem retentus stomachum soluat: trasuoratus autem humectet atque obducatur, & propterea geminet solutionem. Sed hoc conuenit facere urgenti tempore, ne meditatio potius expuendi fiat, atque exinde prouocatio floris augeatur. Perseuerantē passione gargarismata sunt adhibenda ex supradictis, uel ex aliquo succo ad fluorem sanguinis præscripto, qui ualeat frigore, atq; pro

C
   
pria uirtute mederi, uel si res coegerint, ex iisdem spongiæ expressæ, sicut in alijs
   
docuimus, gutturi ad mouendæ, siue pectori, & inter scapulo. Lenius autem atq;
   
idem faciunt ptygmata ex supradictis expressa liquoribus: Constringunt enim
   
saluarum fluorem, & nauseam releuant, quod non minus etiam masticata co-
   
nyza, atq; exputa, siue mastiche contrita, & lactuæ albæ semen facere ualent.
   
Possunt etiam potu dari ea quæ congrue medeantur, ut duobus aquæ frigidæ
   
cyathis seminis aspergantur cochlearia duo, siue masticis cochleare unum, uel
   
plantaginis, siue mali punici dulcis, uel acidi succus, cum particula menthæ par-
   
uissima, uel cucumeris semine contrito. Dandum quoque medicamentum conse-
   
ctum, quod dioporon appellamus: Item diomoron, siue diaroos, & hîjs similia:
   
quorum compositionem Medicaminū docuimus libris. Cauendæ præterea hor-
   
rentium materiarum fabulæ, quæ quadam commemoratione uomitum com-
   
mouere uideantur, utendum cataplasmatibus, quæ nuper de fluore sanguinis
   
scribentes docuimus: & diatriiti tepore adhibenda perunctio ex oleo Hispanso,
   
siue lentiscino, uel murtino, qua præcuratus ægrotans, ora fouenda aqua frigi-
   
da, uel spongijs ex ea expressis detergi: Tunc cibo reficiendū constrictiuo, sicut
   
de fluore sanguinis conscripsimus: atque ita parua interposita dilatione frigidæ
   
parum aquæ paulatim bibat. Quod si quisquam non ualuerit sustinere, calidâ
   
dabimus, ut nimio seruore constringat: Imitatione enim uelut uisuræ partium
   
perficit densitatem. Ac si cibum sibi in stomacho natate senserint ægrotantes,
   
conuenit articularum impressam ligationē facere, ita ut in aquam feruentē ma-
   
nus ægrotantium mittere, uel si maiora cogunt, etiam constrictiuum adhibere
   
cucurbitam: & primo ori uentris, dehinc inter scapulas, siue palas, quod meta-
   
phrenon Græci uocant: Et aliquando tertiam inferius à prima conuenit adhi-
   
bere. Ac si cibus fuerit reiectus, secundo nutriendi sunt ægrotantes: & si permi-
   
serit ut diatriiti rigorem seruemus, erit alternis plurimis paruus cibus offerendus,
   
quo quidem diurnis diebus, sed non simili modo ægri nutrirī uidentur. Sicut ue-
   
ro stomacho collectus humoris fluor mordicationē fecerit, ilico excludendus
   
si plurimum superare fuerit uisus: non quidem digitis immisissis, quo uomitum
   
prouocemus, ne magis influant acriora, & ex partibus sanis, uel quæ passione
   
contaminatæ non fuerint patientibus aduenire liquida faciamus: quippe cum
   
consuetudo sæpissime transeat in naturam. Ac si plurimum edax fuerit humor,
   
nec tamen ita superfluous, ut ex sua sponte per uomitum excludi uideatur, ob fa-
   
cultate reficiendi, quo minus euersio fiat stomachi, dabimus potum: & perse-
   
uerante solutione, cataplasmatum, siue medicaminum uirtutes augemus. Tum
   
si orexis, siue appetitio cibi fuerit impedita, dabimus ea quæ naturam ualeant
   
excitare, ut intybi thirsūm, uel lactuæ, & magis albæ, atque aceto tinctæ: Tunc
   
albas oliuas, & panem pusca infusum, cum paruo pulegio, & sale, & Hispa-
   
no oleo. Item pulmentum ex pane, uel tragoptisana, atq; pulca, & oleo, & sale par-
   
uo confectam, & anetho, uel porro capitato, uel tragoptisana, quæ ex lenticu-
   
la atque alica conficitur: sed erit assanda lenticula. Tunc immittenda mala cy-
   
donia, uel orbiculata, siue scaudiana, ut pleriq; uocant, uel mala pira, aut sorba,
   
aut pira duracina, quæ crustumina uocant, uel folia plantaginis mollia, aut inty-
   
bi. Aspergenda etiam alicæ siue oryzzæ grana mali punici, uel uiz fabriles: de-
   
hinc etiam uina quædam infundenda, ut murtinum, malinum, uel ex malo pu-
   
nico confectum, aut hydromel inueteratū, uel quod melimelon appellat, aut
   
hydromelon. Danda etiam damascena, & malum assum uel elixum, uel quid-
   
quam ex supradictis. Sic etiam uolantum, quæ nulla pinguedine accipientem
   
grauent,

D  
paradysus

Appetitio

Pira crustumina, uel duracina.



A grauent, ut passerum pectora, uel perdicum, aut attagenarum: Tunc etiam quadrupedum leuia, deinde porcina crura. Item maritima, quæ non sint contraria solutioni, ut squilla, mulli, carabi, bucini, spondylia, conchylia. Ac si cibus in acorem transferit, iisdem erit perseverandum, atque eodem potu, cui erunt aspergendæ coriandri seminis drachmæ duæ: Tunc etiam asperiori uino utendum, quod Græci hypausteron uocant. Perseuerante fluore, erit etiam trochiscis utendum, quos hamoptycis, & cœliacis potandos scripsimus. Lauacrū interea tardius ac serius ordinandum, & multo atque longo tempore prohibendi ægrotantes bibere priusquam cibum sumpserint, nisi aliqua forte maior necessitas intolerandæ sitis occurrerit: Erunt nanque dandi cogentibus rebus ex uino asperiore aqua commixti duo uel tres cyathi. Sed si forte complexionis passionum aliqua fuerint signa perspecta, erunt urgentiora consiicienda, quibus ordo magis seruiat curationum. Plurimi uero medici stomachicos putant eos qui duritia laborauerunt, & singultu, castoreum ex aqua multa solum quantitate pleni cochlearis tribus cyathis aquæ miscentes. Eos autem qui fluore stomachi, hoc est reumatismo laborauerint, aquam potant, miscentes aloës cochlearis pleni quantitatem, uel infusione, uel decoctione, aut succo. Sed erit præcauenda medicaminum dandorum satietas, ac magis inlocandæ qualitatis, quam non solum ægre perferant ægrotantes, uerum etiam officio appetendi cibi deserantur, & propterea passionis augeatur pernicietas. Hæc etiam de illo potando medicamine, siue antidoto, quod hieran appellant dixerimus. Facienda etiam laboriosa, atque dolore grauissima ignis ustura: Sed in lenimento oportebat ægrotantium fortificare corpora, atque resumere uaria gestatione, & pro modo uirium sub diuo deambulationes adhibere, siue lectionis exercitium, si fuerit literatus ægrotans, uel ut communiter dixerim, uocis: tum unctionem ac defricationem, & eos motus qui magis humeros ualeant exercere retento spiritu, & nunc palæstra corpus agitare, tum lauacro rarissimo, in hijs qui fluore uexantur stomachi: iugi autem ac frequenti in hijs qui strictura laborare uidentur. Vinum uero, atque uarium cibum constrictiuum prioribus, laxatiuum sequentibus ordinamus, ut pisces teneros, echinos, ostrea, & olera mollia, accedente regula methodicæ disciplinæ, minuendæ augendæque quantitatis. Dehinc adhibenda recorporatio, quam Græci metasyncriticam uocant, ex acriori cibo, quem Græci drimyphagian appellant, ex aqua capparis confecto, & aceto, & sale, & cepe: sed ex depositis, quæ temporis requie accepto marcore in flabilis uirtutis careant qualitate. Dandæ etiam rapæ sinapi madidatæ, atque salsum ex aceto & oleo conditum: uel aceto, & mullio, & sinapi: aut mullio ex uino confecto: quæ quidem erunt uarianda. Admiscendum etiam piper pro ratione uirium, atque passionis magnitudine, ut nunc uno, nunc duobus, nunc tribus acribus pulmentis utamur. Conuenit etiam sicca fricatio cum aspergine corporea facta. Tunc frigidi consuetudo lauacri, quam psichrolusiam appellant, & cibi sicciores magis in hijs qui fluore, hoc est reumatismo laborauerunt: Tum rubor cutis faciendus inter scapulas, & in thorace usque ad uentrem, nunc ex feruentis resinæ lenimento, nunc ex picis, nunc ex dropadis, primo communis ac lenioris, deinde compositi ac uehementioris: atque ita nitri fricandum utendum, & sole torrendum corpus, quod Græci heliosin appellant: aut paroptesis adhibenda ex carbonibus, uel parietibus ignitis, & ceromate: Aliquando etiam ex fico calefacto: tunc defricatio ex nitro, atque oleo,

Vinum  
υπερσπυριον.

Antidotum  
εργον.

ψυχρολουσιον.

C

αδάρου  
αδάρου

& adarce. Adhibenda quoque acopa ex euphorbio, & diagrudio, & piretro, & pipere, & sinapi, uel succo ferulaginis, quem Græci taphian uocant: ungen-  
da corpora, uel admixta cera imponenda, donec sufficienter inflari uel medicami-  
nis partes uideantur. Conuenit etiam uomitus arte affectatus, quo corpora dif-  
fecentur: & primo ex aqua mulsa, uel ex aceto squillitico melli admixto singu-  
lari, uel adiuncto semine eruce, aut cardami, aut urticæ, aut sinapi, aut falfamen-  
ti multi ex aceto & melle: tum etiã ex radicibus: ultimo quoq; helleboro len-  
ticulæ admixto, uel oryza, in hijs qui reumatismo fuerint affecti: cum forbili-  
bus uero succis qui stricturna. Adhibenda etiam ptarmica, quibus stomachus cõ-  
motione capitis contremiscat. Item forbendus, aut infundendus rhinenchyro  
ferramento naribus succus cyclaminis, aut eruce, aut anagallidis herbæ: garga-  
rizandum sinapi ex aceto & melle decoctio thymi, aut origani, uel pulegij, aut  
hyssopi, aut squillæ succus cum aqua mulsa, & cetera similia eius generis quæ  
fuerint, & magis cum initia atque summitas stomachi callosa uidebuntur, uehe-  
mentiore modo curationis indigentia. Tunc etiam adhibemus quædam acroio-  
ra, uel horum exhalatione ægrotantes haustu suo hortabimur adducto spiri-  
tu recipere, quo etiam altiora agitatione medicaminis demutentur. Sumpto  
igitur fictili uasculo immittimus pulsam: tum admixto nitro, origano, carda-  
momo, mastiche chia, carbonibus subiectis decoquimus. Sed erit primo os  
uasculi prægypsandum, immisso utraq; ex parte forato, cuius summitatibus uel  
uacuati imponimus testam, ex utroq; suo uertice perforatã, cuius altera cauerna  
calamo inseratur, altera uaporem fumet acceptum: Tum ægrotantẽ iubemus

D

ore aperto supradictam cauernam labijs amplecti, siue oui, ut supradiximus, uer-  
ticem, atque ita eius exhalationem excipere: cuius quidem feruor erit moderan-  
dus, ne nimietate partes exurat. Atq; ita si plurima & perseverans mordicatio  
affecerit ægrotantem, erit mitiganda simplicibus gargarismatibus, ut aqua cali-  
da, & oleo, siue lacte, aut decoctione cantabri, aut succo ptisanæ, uel noxarum  
decoctione, aut amyli cum aqua. Oportet præterea etiam partibus in passione  
constitutis apponere medicamen, quod polyarchion appellamus, uel diadaph-  
nion, & horum similitum, quorum compositionem Medicaminum tradidimus  
libris. Dandum quoq; medicamen theriacum bibendum, quod diechydnon ap-  
pellamus: cuius quoq; compositionem Responsorum dedimus libris. Tunc  
ægrotantes maritima natatione exercendi, atque cataclysmo curandi, hoc est a-  
quarum illusione, suppositis partibus patientibus. Animo præterea securo atq;  
facili esse conuenit curandos, & aquarũ naturalium usum adhibere, ut sunt in Ita-  
lia quæ Cotylitæ sunt appellatæ, & Nepefinæ: lauacro atq; potu aptissimo uten-  
dum, adhibita æris mutatione longa, terrena, maritima, exercitationibus uarijs  
palæstrarũ adhibito præceptore utendum, atque ita iisdem resumptionibus cor-  
pus conuenit recurrere: Sic enim perseveratione & uentositas excludetur sto-  
machi, & alia quoque supradictæ passiones depelluntur.

Medicamen

polyarchion.

Diadaphnion.

Diechidnon.

κατακλυσμός.

Balnea in Ita-

lia.

φάρμακον.

φάρμακον.

DE PHAGEDÆNA.

CAP: III.



St etiam phagedæna ex stomachi passionibus, qua affecto se-  
quetur cibi uehemens appetentia, quã Græci orexin appellant,  
& coadueruati accipiendi cupiditas, & immasticata transuora-  
tio: Tunc grauedo atque tensio, & propterea uomitus, quem  
sibi coacti atque oppressi prouocent ægrotantes, corporis ma-  
cies, pallor, Aliquando etiam uultus inflatio, oris pedor: qui-  
busdam

**A** busdam etiam gingiuarum putredo, cum scabro dentium detrimento tritus, uisus obrufio, sed passioni genus philonij in problematicis non daturos nos iterum pollicemur: Interpositio enim tempore digestionis rapiuntur accepta, atque repletis uijs, quos Graeci poros appellant, obtunditur appetitus. Erit praeterea curandum, tempore quo cibamus ea ministrare quae parum nutriant, sed quanta uiqueant appetentiam obtundant, ut sunt olera quae non relaxent, ne uomitum moueant, sed constringant potius: Sic enim sui quantitate famem sentiunt, atque uirtutem propria digestionem non grauando perficiunt. Bibere autem non prius quam solidus sumitur cibus, hijs qui fame urgentur utilissimum iudicamus: Siquidem potu impleti minus solidos appetunt cibos: phagedaenicis uero hoc conuenire negamus: humectatus etenim stomachus in uomitum facile prouocatur, & liquefactus atque supernatans cibus facilius nauisem prouocat aegrotanti. Erit igitur sensum uomitus differendus, atque eius consuetudo mutanda, ut interpositis diebus parum demus aliquando cibum, & appositione cucurbitarum eius adiuuemus descensum, qui solitis suis infertus teneatur. Alia uero uomitum permittamus, ac deinde paucis interpositis diebus prohibeamus, uel iterum adhibeamus, sed in adiutorij uicem, hoc est ex radicibus: Tum etiam ex helleboro, quo regulae curationis adiutoria localia concurrant re corporatiua uirtute medentia, & partes ad fortitudinem naturalem ducant: Quorum usu ex supradictis, atque in alijs passionibus ordinatis accipiendum ducimus.

DE IECOROSIS, QVOS GRAECI EPATITICOS uocant, & lienosis, quos splenicos dicunt.

CAPVT IIII.

**B**



Traque passio a locis patientibus nomen accepit: Siquidem sit in iecore, uel in liene constituta, tumore scilicet effecta siue collectione, uel duritia atque saxitate, quam schirrhosin uocant. Sed de tumoribus libris febrium docuimus. De collectionibus uero, siue uomicis specialiter docemus. De duritia uero aut saxitate, quae cedente tumore efficiuntur, nunc prosequemur: Sequentur enim quaedam communia iecorosae atque lienosae, quaedam specialiter propria, sed communia, grauedo, spirationis difficultas, & magis in itinere ambulationibus cliuosis. Tum piger motus, atque anhelatio, & sitis, & oris siccitas, coloris mutatio, pedum inflatio. Aliquando etiam febricula latens, & hydropisimi suffusio, cum continua cibi corruptione. Propria autem, uel specialia iecorosos haec sequuntur, extans durities, siue schirrhosis in dextera parte praecordiorum, schematero tundo costis ex aliqua parte subiecta, & propterea ueluti decisa. Ex alia uero parte circumscripta atque rotunditate terminata, color saepissime aruginosus, siue arquatii similis, quem Graeci ietheron appellant, urina turbata, uelut sandarachae colore. Et accessione tempore dolor tendens usque ad dexterum iugulum, atque palam, & difficilis supra latus sinistrum iacendi copia: Siquidem adducatur dexterae partes suo pondere pedentes, & propterea grauedine, atque doloris punctione aegrotantes afficiant. Tum fellofa stercore egestio. Lienosis uero extans duritia, atque saxea sub sinistra parte praecordiorum inuenitur schemate longo pectus in

**G** uadens, uel umbilici sapissime transgrediens finem, atque latitudine superans, nunc minime, nunc uehementer, ut omnia conata uideantur, & inspicientes eo falluntur, ut membranam tumere, siue extare putent, quam Græci peritonæon uocant, colorem plumbeum, atque accessionis tempore dolor tendens ad iugulum sinistrum, & palam, & difficilis supra dextrum latus iacendi copia. Memorant plerique etiam multitudine pediculorum ægotantes affici, & grauiore per somnum sudore, attestante ueretri in officium uentris erectione, & assidue enaribus sanguinis fluore: Præterea oris fœtor ægotantes afficit, cum gingiuarum putrefactione & defluxione. Sectarum principes meminerunt tenuari etiam cutem uentris, & uenas nigras apparere, atque crassiores, & in cruribus ulcera difficile in cicatricem, uel indecenter uenientia. In hijs igitur communiter oportet superpositionum tempore tanquam in tumore curando calidum iacētibus prouidere locum: Tum fomentis & cataplasmatibus, & cibus laxatiuis uti tempore, quo sapissime docuimus, sed tenuibus ac forbilibus: Tunc cucurbitæ atque scarificationes, & sanguifugarum conuenit appositio, quas hirudines appellant, & uaporationes: Ac si uehemens fuerit, adhibenda phlebotomia hijs omnibus anteposita: Tunc clyster, si uenter officium non agnouerit, sed ex dextione fici singularis, impressi patientibus locis: flectetur enim & exercitio quodam durities resoluet. Conueniunt etiam frequētes cyclorum mutationes: denique inter paucos dies adhibenda drimiphagia: tum radicum uomitus cum aceto squillitico, uel certe helleboro erunt disijciendi: Tum alia mutatione resumēdi ægotantes, adhibito usu aquarum naturalium, atque natatione maritima, & uaporatione locorum natura spirantium, quo etiam sudores moueantur, non ob uirium fatigationem, sed quo possit calida spiratione ac naturali corporatio fieri patientium partium. Conuenit præterea etiam in littore sicco ex harena sole ignita paropresis. Tunc malagmata quæ corpus ualeant papulare: & primo leuiora, ut est polyarthion, ex caphiso fonte & salibus confectum, quod diahalos appellant. Item ex tribus resinis, quod diaretismum uocant: Tum etiam, ut est quod appellant diamyrepfican balanum. Item diaorganum, & diacardamum, uel diatapsias, & diasbestum: Quorum omnium compositiones Responsum libris explicauimus. Sed hijs quæ sunt uehementia, ut est diatapsias, ita erit utendum, tanquam sinapismo uti solemus. Hæc est secundum nos curatio eorum qui duritiam, siue scirrhom in iecore uel in liene habuerint. Apud ueteres autem medicos plura, atque dissonans & turbulenta curationis ordinatio inuenitur: Alij enim phlebotomiam recusant in lienicis, ut Apollonius Citiensis: alij probauerunt. Atque horum alij ex dextro brachio iecorosos, & ex sinistro lienosos phlebotomandos dicunt: alij ex talo eius partis quæ patitur: alij ex medio digitorum omnifariam uarijs extimationibus tenati: Sumit enim atque deposcit ex hijs partibus, quæ facile diuidi possint, phlebotomiam faciendam, hoc est brachiorum uenis, nisi forte ipsæ tumuerint, & ob hoc oporteat longe à patientibus partibus phlebotomiam adhibere, quod iniuria lateat adiutorij. Item alij de uestionibus adhibendis certauerunt, & quidam solis aiunt lienosis conuenire: quidam autem iecorosos ex medicaminibus scaroticis adhibitis, siue cauteribus, & horum alij urenda, alij superurenda probauerunt, atque alius in lienicis cauteres insigendos: Quorum quidam simplices, quidam trifidos, quidam ferratos approbant frigidos: Tum uestionis ulcera humectantes, atque in fluore humoris longo tempore prouocantes scyrrosos in fluxu

μεμνησθη

καρπώθησις

διακρισιμὸς  
 διαμυρψικὸς  
 διάλατος  
 διασβησθῆναι

Apollonius  
 Citiensis.

Medicamina  
 scarotica.  
 καυτῆρες.

**A** xionibus auferendam crediderunt, ex quibus tumores atq; indignationes & cō  
 sensus cum uehementibus febribus necessariō sequentur: siquidem peritoneos  
 membrana, quæ est natura neruosa, ignis uisione uexetur. Fiet etiã secundo im  
 possibile plurimis atq; uehementibus adiutorijs uti medicantem, ut sinapismo,  
 cucurbitis rapidis, forti raptura motis frictionibus, dropace, & hñs similibus,  
 cum cicatrices cæcitate utæ, & hebetudine torpentes, tanquã mortuæ uim nullã  
 medicaminũ accipiunt. Diuiserunt præterea pleriq; etiã curationis officium,  
 ut aliã iccorosis, aliã lienosis conuenire probarunt. Hinc deniq; quasdam lien/  
 cas uocauerunt: lecori etenim cataplasmata aiunt adhibenda ex abrotano & se/  
 famo. Item bibenda medicamina, ut theriacam, quam diofcoridian uocauerunt,  
 diapatorion, uel diapyrion. Itẽ anodyna, quæ nos indoloria dicere poterimus, *indoloria*  
 ut ea quæ scribũt diadion, pipereon, & lexyppyreton, & chamæpityn, uel uiridis  
 pini decoctionẽ singulatim, uel cum melle. Item urinalia medicamina quæ diu/  
 retica uocant, ut est mulsum cum dauci decoctione, uel fœniculi radices, aut pe/  
 troselinĩ, aut absinthij, aut mali cydonij cum cœnanthe. Vtuntur etiã oleri/  
 bus, ut lactuca cocta uel incocta, asparagi, radicibus olufatri. Ventrem quo/  
 que deducentes antidoto quod hieran uocauerunt. In lienicis uero epithema aiunt  
 specialiter conuenire ex cappare & myrobalano & aceto, sale admixto, quod  
 oxyalmon uocauerunt, & herba cui nomen asplenos. Dant etiã bibendam a/  
 quam. Dicunt specialiter lienem deducere, uel defluxionẽ purgare, ex quibus *isphalmer*  
 est ad nutriẽdum noxiæ cuticulæ, & aquæ ex lacu, in quo sæpissime candens fer/  
 rum fabricatores tingunt; de qua iubent dari cyathos tres, cum aceti cyatho uno. *acathmer*

**B** Item polion herbam, aut tormini semen in cotylæ quantitatẽ, aut capparĩs radi/  
 cem cum squillæ drachma dimidia, aut chamædryos, uel herpillĩ acetabulum, ex  
 aceto mulso cyathis tribus, uel hipposelinĩ semen cotylas duas, cum uinĩ cyathis  
 tribus: aut libanotida herbam, quam nos rosmarinũ uocamus, cum fœniculi se/  
 mine in cotylæ quantitate ex uino mixto. Item ammoniacĩ guttæ drachmã unã,  
 cum mulso ex aceto confecto cyathis tribus, uel tamariscĩ ligno. Item cibũ uel  
 potũ sumere iubent ægrotantes in uasculis tamariscĩ ligno confectis. Quidam  
 etiã decidendum, uel auferendum lienem ordinare aui sunt: quod quidem uo/  
 ce dictum, nõ officio completum accipimus. Sequentibus autẽ atq; diuersis sese  
 implicantibus portionibus, medicaminũ uariorũ stomachum uexant, uel sicã cõ/  
 mouent, atq; totũ corpus cõmuniter in cachexiam mittunt, nescij quod quædã  
 ob acrimoniã propriã uirtutis, laceratione quadam cõmuni potentia medeãtur,  
 & nos per quasdam inerrabiles proprietates, & neq; aliã iccoris, aliã uenis esse  
 medicamina, recte senserint: omnia etenim omnũ corporis partium sunt cõmu/  
 nia, quando simili fuerint affectæ passione. Regulantur enim siue diriguntur eo/  
 rum uirtutes, non natura patientis loci genere passionis extenta atq; indulta pro/  
 modo morborũ, hoc est peccantũ iudiciũ, sed eorũ causa, qui rerũ magis histo/  
 rias amant. Cætera quoque à quibusdam probata, breui atq; concinna oratione  
 subiiciam. Diocles: gitor libro quo de passionibus atque causis, & curationi/  
 bus scripsit, phlebotomat iccorosos, & dextero brachio: Tunc uentrem resoluit  
 helleboro nigro, atq; papaueris succo. Dat etiã cum mulso rosmarinũ, quem *Diocles.*  
 Græci libanotida uocant, & murrã, & pini folia. Adhibenda quoq; cataplasma  
 ex phœnicobalanis cum uino atq; lini semine, & sesamo, & pollinibus, quos *λεβαντις*  
 omphacomeles appellant. Dat præterea aquam bibendã, in qua sit cantabrũ præ/  
 iorum, & pisana ex tritico: Quæ omnia sunt instantia, atq; stomachi uexatiua, *φινικιοβάλανος*  
 & digestionẽ difficilia. Lienosis uero, quorũ gingiuarũ sudauerint sanguinem, *ὀμφακόμελες*  
 phlebotomat

**C** phlebotomat: Et similiter uexat medicaminibus felliducis, quæ cholagoga uocant, atq; urinalibus, quæ diuretica appellant. Item Praxagoras primo libro Curationum iccorosis adhibet uomitum, & uentris sua medicamina, & sudorem mouentia, & urinalia, & phlebotomiam, atq; fricationem. Vitur etiam uino nõ aquato, & ustione cauteriũ, & hijs similibus: Lienicos uero phlebotomat & cataplasmatibus curat, utens digestibilibus cibis, & uino potat redolenti, & aceto, adhibita fricatione atq; unctione, & lauacro. Dat præterea bibendam mullam aceto admixto, daucio, aut hyssopo, uel thymo, aut capparidis radice, uel folijs, aut semine, aut ætheriæ herbæ semine, quam eryngionem appellant, aut chamælex, uel chamæpitys, aut absinthij, aut marrubij: adhibens etiam uomitum. Erasistratus autem in iccorosis præcens superpositas iccoris cutes atq; membranã, utitur medicaminibus quæ ipsam iccor late amplectantur: Tunc uentrem deducit audaciter partem patienti nudans. Item aliqui Asclepiadis sectatores gestationes & lauacra, & uaporationes cataplasmatum, atq; malagmatum excluderunt in iccorosis, suspicantes tenuissimorum corpusculorum fore consensum, hoc est spiritus, quem leptomeriam eorum Princeps appellauit, atq; in egestorum constrictione falsitate causerum adiutoria magna recusantes. Themison uero secundo libro Tardarum passionum plurima in hijs methodico rigore ordinauit, sed proterua atque caduca intentione, etiam ex talo eiusdem partis phlebotomari iubet ægrotantes, atq; alternis uel interpositis duobus diebus sanguinis interea fieri detractionem: Vulnerandam quoq; iccoris partem ex superficie medicamine uel cauteribus existimat: & concedit esse quædam propria lienis adiutoria, ob eius firmitatem, hoc est, quæ fuerint uehementia, ut cataplasmata, uel ustiones, eo concedens, ut etiam ipsum quoq; lienem igneo caute transpungendum probet tribus uel quatuor locis, non aduertens, quia pro magnitudine passionis ac uirium corporis extenduntur, atq; indulgentur adiutoria, & non pro specie patientis partis: Si quidem quædam quæ natura difficilem habuerint sensum, & propterea nõ facile tactum accipiant, morbo tentata sensibilia cæteris fiant, ut est plantæ cauum, quod tumore dolidum, atq; omnino sensibile & attentum fiet: Atq; rursum ea quæ natura facile sentiunt, difficilius sensus passionis efficiuntur causa. Quo fiet ut sit iuxta regulam methodicam explosum, ut qui intentione cœnotetarum ducitur, corporis facile ne aut difficile sentiant curent, sicut latius de cœnotetis scribentes docebimus. Theffalus uero secundo Regulari libro omni ex parte immutatam, atq; eandem iccorosis & lienosis formã tradidit curationis. Sed quia plurimæ atq; uariæ hijs uisceribus irruunt speciales passionis, ut arquatus, siue aurigo, quam Græci icteron uocant, & cachexia, uel atrophia, atq; hydrops, de hijs nunc ordinare curabimus.

DE AVRIGINE SIVE ARQVATO MORBO,  
quem uulgo morbum regium uocant, Græci icteron  
appellant. CAP: V.



Assio uocabulum sumpsit secundum Græcos ab animalis nomine, quod sit coloris fellei. Fit autem ex antecedenti iugi indigestione, uel medicaminibus uentris suis potu datis, atque permanentibus, & minime exclusis. Sequitur in passione constitutis mutatio coloris in fellis qualitate, quæ primo appareat, ac magis uideatur in albidis partibus oculorum, atque plantarum talis, uel uenis quæ sub lingua sunt. Ventris quoque abstinentia, nelectio

**A** uel egestio albida atque argilloſa. Vrina etiam craſſior & crocea, oris amarior  
 fitis, cibi faſtidium, grauedo, & piger atq; ſegnīs uiſus, inſolitus motus, animi  
 difficultas, pruritus & ariditas corporis, & ueluti ex uſtione ſolis aſpera cutis ſu-  
 perficies. Sæpe etiam iecoris tumentis inſtatio, ſiue ſaxea durities. Difficile autē  
 ac rariffime ſplenis, uel ſtomachi conſenſus etiam: Ex hijs enim plerifq; uiſum  
 & iſtam fieri paſſionem, quæ ſit quidem facile ſanabilis, cæterum neq; ita ſelleū  
 faciat corpus. Fit præterea nunc cum febribus, nunc ſine febribus, & nunc cele-  
 riter circunſcripta, nunc corporibus intardans, & propterea chronia appellata.  
 Conuenit igitur cum primum corpus inuaſerit ſiue tardauerit, & in ſuperpoſiti-  
 onem ueniens fuerit apprehenſa, eam adhibere curationē, quam de tumoribus  
 in corporibus in torpore conſtitutis ſæpe memorauimus. Deniq; ſi uehemens  
 fuerit, etiam phlebotomiæ uſus nō reprobatur. In lenimēto uero, corporis exer-  
 citio, atq; cibis digeſtibilibus reſumēdos ducimus ægrotantes: Tum ad recorro-  
 ratiuam ueniens curationē, prouidentes ut adiutores localibus, ſi qua durities  
 in uiſceribus fuerit, hoc eſt, in iecore, uel ſtomacho, aut liene, ſicut ſuperius do-  
 cuimus, deſtruatur: Sic enim cum paſſionis genus fuerit amputatū, etiam color  
 naturalis corpori reddetur. Conſiſcēda ſunt etius præterea accidentia, quæ Græci  
 ſymptomata uocant, cum generali congrua curatione, id eſt, ut ſel diſſuſum re-  
 corporatione adhibita detergentes uarie deducamus, nunc clyſteribus acerrimis, συμψύματα  
 nunc abſinthio pote dato, uel intybi agreſtis ſucco uno uel duobus cy-  
 athis ſingularibus. Ac ſi declinationis tempus permiferit, etiam cum uino ali-  
 quando ipſa quoq; intyba comedenda probamus cocta uel incocta. Item aſpa-  
 ragum uel daucum, aut ſeniculum, & ob plurimam oculorū infectionē erit ſter-  
 nutatio commouenda, medicaminibus ſcilicet, quæ Græci pharmica uocauerūt. πύριμα  
**B** Item naribus inſundendum, priuſquam in lauacrum ueniant ægrotates, ut qui-  
 dam probant, ſtruthium cum lacte, & ad ſpeciem referentes, aſinino uel huma-  
 no. Similiter etiam elaterium quod appellant, hoc eſt cucumeris agreſtis ſuccū,  
 Item cyclamini cum eodem lacte: Fertur enim ſtatim per nares, quæ uultū te-  
 nuerat fellis infectio, & magis ſi æger ingrediens calidas cellas feruens deſcen-  
 derit ſolium, atq; requieſcēs diurno tempore aqua calida fuerit uaporatus, adhi-  
 bitis aliquādo etiam apophlegmatifmīs, quorum materiā ſæpe memoratiſimus. πρωφλεγμα-  
τις μί  
 Item hijs quæ ſuperficiem corporis laceſſendo ſaculare uidentur, quæ appellata  
 ſunt anaſtomatica, & propterea reſcorporatiua, in ſudorē prouocantia fellis in-  
 fectionē, hoc eſt, dropax iugiter adhibitus, uel ſolis feruor torridus, quem Græci  
 helioſin appellant. Item naturalium aquarum exhalatio, uel medicaminū ſu-  
 dorem mouentium uſus. Aſpergendum deniq; corpus ſtruthio, nitro, ſulphure,  
 & hijs aſperſionibus quæ ob pruritus corporis adinuentæ ſunt, à Græcis ſym-  
 paſmata appellata, feruentiore aqua fouendi ægrotantes: Sic enim ſeruata regu-  
 la generali etiam accidentia paſſionis curabuntur: Non enim hæc ſolis in acu-  
 tis erunt paſſionibus obſeruanda, uerum etiam in tardis, quas Græci chronias  
 uocant. Utendum etiam æris mutatione & geſtatione uaria, & littoraria mora-  
 tione: animi quoque laxatione ac iucunditate, & aquarum naturalium uolu-  
 ptate, natatione uaria, & aſſiduo uomitu, ſimplici, atque radicibus commoto.  
 Item drimphagia, in qua præ cæteris capparīs magis uſus approbatur, & ace-  
 tum ſquilliticum, in quo ſit inſuſa anchuſa herba, & bulbi, & ſquilla igne tor-  
 rida, id eſt ſubafata, cum melle electario data. Vinum præterea tenue pro-  
 bamus, & perſeuerante paſſione helleboro decocto corpus agitandum, uel  
 ſi oportuerit, bibendum damus medicamen ex herbo & ceruino cornu, in  
συμψύματα  
 corylæ

C corylæ quantitatem cum tribus cyathis mullæ: in hijs qui adiuncta febre uexantur, uel conditi in hijs qui sine febre afficiuntur. Sed uitandum probamus frequentem, & uariam medicaminū potationē, quæ sella deducere promittuntur, siue uentrisflua, siue urinãlia: Etenim sitis extenditur, & solidioris cibi fastidium duplicatur, & corporis fortitudo minuitur, atq; cibi accepti corrumpuntur, & omnis corporis materia adulterio medicaminū deterior fit, cum habitudo, ut supra diximus, omnis fuerit immutata. Quod facere uidemus eos, qui sapissime ac iugiter herpillum dari probauerunt, & absinthium, & aloë, & diagridium, & coloquintida, uel ex aloë & coloquintida hieram confectã. Item ex amygdalis & absinthio, & aniso trochiscos confectos, & decoctiones recentis mulsi ex uino confecti, cum hyperico, uel aristolochia longa, uel herba adianto, quam Latini capillum Veneris uocant, uel cicere albo: Aliquando etiam hæc mandenda probauerunt. Item rubea, quam Græci erythrodanon uocant, uel struthium tritū cum fico arido, uel palmulis, aut sulphure in ouis sorbilibus in parui cochlearis quantitate: aut certe ceruini cornu elimatū puluerem drachmã unam, cum cyatho uno, & aquæ cyathis duobus, uel nepete, quã Græci calaminten uocant, aut radicibus pastinacæ, quam staphylen appellant, decoctis in uini heminã, & dimidiam, donec ad tertie partis liquoris ueniat quantitatē. Ex quo dandum probat cyathum unū cum aquæ cyathis tribus aut quinq; cum dauci semine: aut apii aut zingiber, meu, uel asarum, aut radicē herbæ brionie. Item feseli & libani herbæ infusionem uel decoctionē, & trochiscos ex herpillo uel foeniculo confectos, uel ex aristolochia, quos diherpillum, uel diamaratū, & diaristolochian appellant: Horum enim uaria multitudo, uel usus frequens, causa sæpe ipsius fuit faciendæ passionis: Non enim quoniam fellis detractio facta, illico curationis est causa, nisi totius quoq; passionis fuerit destructio consecuta: Sic igitur hijs utendum erit, ut supra demonstrauimus. Item quidã Veneris probauerunt adhibendum usum, laxatio nē carnis faciendam æstimantes. Ex quibus est Titus, Asclepiadis sectator, & Themison. Sed est hoc neruo sitatis uexabile: quippe cū fortitudinem corporis tollat, quæ magis est ægrotantibus adquirenda. Item alij aurum iugiter aspicere uel intueri ægrotos præceperunt, siue aureos colores. Hijs deniq; etiam operimentis utendum laudauerunt: si quidem similia rapiantur, & propterea morbi, siue colorū, aut fellis migrantia in alias possit transire materias earum concordantes colores, non conijcientes quod sit magis credibile externa in ægrotum facilius transire: Quippe cum uiarum densitate superficie corporis clausa interiora teneantur, uel certe similitudo magis passionis possit prouocare uirtutem occultæ suasionis admonitione superata: Semper enim memoratone passionū tristes ac inuesti necessariò fiunt ægrotantes: quæ maxima causa est augendæ passionis. Est autem maximū adiutorium, & magis utilis ægrotantibus animi purissima laxatio, siue serenitas. Erit præterea perseverante passionē etiam longa nauigatio curanda, & unctio, adhibito præcepto, quo assidua defricatione & plenissima fieri resumptio possit.

D

Titus.

Themison.

## D E C A C H E X I A . C A P : V I .

De Cachexia  
Lousia  
2311.



Achexia nomen sumpsit à quodam corporis habitu malo: Cacia enim uitium uel uexationem Græci uocauerunt, hexin habitudinem. Sed principaliter eius curationē ante Themisonem nullus ordinauit: Ipsam namq; secundo libro Tardarum passionū, itemq; primo atque quarto Epistolarum memorauit. Item Theffalus secundo



**A** cundo libro regulari, Fit autem siue nascitur hæc passio intemperantia ægrotantis, uel curatione mala medicantis, aut post ægitudine tardæ resumptionis causa. Item ex medicaminibus sæpissime potatis, uel ex saxea duritie iecoris aut lienis, hæmorrhoidis longissimi temporis, aut uomitu. Item ex febribus longo tempore corpus affectum, aut collectionibus, aut uomitu post uespertinos cibos, & hijs similibus. Est autem ipsa quoq; passio sæpissime hydropismi antecedens causa, aut macularum simili in superficie corporis accidentium. Sequitur cachecticos pallor subalbidus: aliquando etiam plumbeus color, debilitate tardus ac piger corporis motus, cum inflatione inani. Aliquibus etiam uentris fluor cum febricula in plurimis latente, quæ circa uesperam magis augetur: pulsus creber ac densus: Cibi fastidium, & uini magis appetentia, urina fellea, & extensio uenarum. Est autem passio sæpius stricturæ, sicut ex supradictis coniectum. Aliquando etiam complexa solutione ob plurimum uentris fluorem, uel simili quolibet fluxu. Quapropter conuenit complexa passione laborantis primo abstinere fluentia, & intemperantiã ægrotantis corrigere, uel curationes malas, aut medicaminã potationes prohibere. In iecore uero aut liene si qua fuerit durities, siue saxositas, destruere, ut nuper demonstrauimus: Aut si fluor sanguinis fuerit plurimus, abstinere: hæmorrhoidas uero auferre, febres quoq; soluere, ut de febribus scribentes docuimus, collectiones congrua curatione, sicut de ipsis scribentes monuimus, sanare, & consuetos eis post uespertinũ cibum uomitus paulatim detrahere, Ac si horum nihil fuerit accidens, & sola in corpore uisa fuerit cachexia, erunt eius superpositiones ac lenimenta prouidenda, & uigilante sine ulla ratione ægroto, aut cibo corruptente, animi attestante difficultate, cũ pigro ac segni corporis motu superpositionẽ cognoscere: & propterea in requie retinere ægrotum, cum abstinentia cibi, quo turbatio corporis resoluatur. Item ea quæ fuerint extenta lanis contegenda, atq; oleo calido fouenda, ac si uenter fuerit fluens abstinendus. Item si plurima fuerit corporis tensio cum grauedine erit adhibenda phlebotomia ex brachio mediocriter: sed non necessitariõ in hijs qui hæmorrhoidarum causa inanes uidentur: Ac deinde retentione facta constricti, sed non in omnibus qui communiter tanta, ac tali fuerint strictura possessi, tunc perunctos conuenit refici cibo digestibili ac leui, usque ad declinationis tempus, seruato genere accidentium, alia cataplasmatibus, alia curbitis recurrere: Cum declinatio apparuerit, plurimus ac uariis cibis erit adhibendus, & similibus superpositionem urgentem adiuuare, atque ita lenimento ueniẽte quod facile approbamus exercentibus asperitatibus passionis supradictis, hoc est, hijs quæ superpositionẽ designant, erunt corpora resumenda atq; fortificanda: Tum recorporatiuis utendum curationibus, quo reformata corpora, uel ut ita dixerim, relectis uitiosis carnibus, ac renascentibus nobis reparata ad memoriã redeant sanitatis. Quapropter æger somno discusso semet in lecto continere, iubendus etiam iacere paulisper, tum etiam nec repente consurgere, sed pratentato motu discere, utrum se leuem ac digestum sentiat: Etenim si fuerit occurrẽs, indigestio erit requies adhibenda plurimo temporis spatio, donec grauedo digeratur: dehinc mediocri gestatione, atque paruo cibo utẽdum, si non ex accessione, sed ex aliqua causa manifesta temporalis accidenti corporis displicentia, quam Græci diarecesin uocant. Ac si nulla fuerit ægrotantis querela, erit a lecto leuandus, & ob expugnandam frigiditatem in iuriã oleo leuiter perungendus: Tunc gestatio adhibenda, & si uires permiserint, uel aëris temperies, sub diuo, & magis intra muros motu uehiculi. Si uero aliqua fuerit obstans

C causa erunt hæc sub tecto adhibenda, & pro uirium modo aut uehiculo manu / ali, aut sella, aut cathedra exercendus ægrotus: Tum gestatione perfecta par / ua deambulatio adhibenda, uel uocis exercitium, atq; ad unctionem ueniendū, / sed præcalesfactio intra uestes ægro. Quoties calidum habuerit corpus, tum depo / sita ueste erit linteolis leui defricatione tergendus, atq; statim oleo paruo ungen / dus, & summo tactu fricandus: primo ab alio, postea à se: ipso, retento spiri / tu: ut etiam alia teneatur: Dehinc rursus ab alijs defricandus, tenacius quidē, / sed non impressius, quo possit carnis inflatio coagulari. Sed hæc erunt adhibito / unctionis præceptore faciendā, quo secundum proprias mutationes omnium / partium motus æqualiter, ac totius corporis integret exercitium: Tunc permit / tentibus uiribus etiam raptorio machinamēto gestetur, ac deinde recussabili tfe / ra, quam Italicam uocant: Aliquādo etiam harena asperso corpore, quā amon / appellant, defricetur per interualla dierum adhibito lauacro. Conuenit etiā psi / chrolusia nullis obstantibus causis, quæ eam prohiberi permittant: Tum uinū / claudum austerum album, leue: Dehinc iubendus superbibere, atq; siccum su / mere cibum, uel certe quartā partem panis siccā manducare, adhibito usu asso / rum pulmentorum, & neq; curiose conditorum, ut pisces, clunes, uel agrestium / leuiora, & hijs omnibus iuxta regulam methodicam auctis aut minutis, interie / cta uini abstinentia, & cibi parua sumptione: Utendum etiam locorum atq; aeris / mutatione: Tum heliosin, quam nos corporis torporem dicimus, ita dropacis / adhibēdus usus, & pulueris nitri fricatio, & sinapismus specialiter, & usus aqua / rum naturalium, uel natatio maritima. Item harena litoraria ignita circumtecto / corpore torrendi sunt ægrotantes: nunc inter paucos, nunc inter plurimos dies, / D ut uires permiserint: Tum nauiculæ exercitium atq; peregrinatio, quemadmo / dum in præcedentibus ordinauimus.

Tosphera  
mies.

halitus

DE NVTRIMENTI CESSATIONE, QVAM atrophian Græci uocant. CAP: VII.

Deerat quoque principium capitis in exemplari, quod nos ut potius sarfimus.  
diuulgis uescia



Vrimenti cessatio, quam Græci atrophian uocant, ab acciden / ti nomen sumpsit. Et contingit in passione cōstitutis plurimus / cibi appetitus, tum corruptio, quibusdam fastidium: Item te / nues atq; latentes tepore sunt, neq; febricula iugiter, & quibus / dam inter plurimos dies soluta. Ducitur præterea quædam etiā / per urinam corporis defluxio, quam syntexin uesciæ uocauit / runt, cum plurima fuerit poti liquoris egestio, atq; corporis subinde per dies sin / gulos extenuatio etiā: nunc igitur cōuenit, sicut in Cachectis diximus, proui / dere, ne qua pars corporis principaliter patiat, & oporteat congrua eidē mor / bo localia adhiberi adiutoria, ut iccoris, uel lenis duritie, uel fluori uentris, aut / intestinorū, uel uesciæ, uel ulceri in interioribus constituto, aut collectioni, quā / specialiter uomicā diximus. Ac si etiam febres fuerint cōsecutæ, ipsdem quoq; / adhibenda medeia. Si horum nihil in corpore uiderimus, sed sola fuerit atrophia / consecuta, conuenit ægrotum fortificari rationabiliter, atq; resumi gestatione, / pro uirium quantitate, scilicet quibus sæpe memorauimus generibus & unctio / nibus ordinatis, plurimo oleo superfuso, adhibita fricatione, & ministris corpu / lentis & mollibus, uel quales esse fricatoris Salutaribus præceptis docuimus, / quo contactu corporum laxiore ægrotantes exercitæ: membra soluantur: Tum / temperato utendum lauacro, atq; uino tenui, & pane limpido fermentato, & pu / mentis ex mediâ materia, atq; iuxta cycli regulam eorū augmenta ac detra / nes uaria

**A** nes uariare non repetitis, nec perfectis ilico cyclis, sed unius tantummodo qualitatibus, ut de cataleptico scribentes docuimus. Denique cum ex uolantibus solis adhibemus, initium ex paruulis ordinamus: Tum autem ex agrestibus, ex teneribus, cum porcina ex membrorum summitatibus. Conuenit præterea locorum atque aerum commutatio, & aliquando drimiphagia, uel simplex uomitus: tum etiam ex radicibus confectus, & localia alijs atque alijs locis adhibenda, & magis medianis partibus: Non enim sine plurima uexatione partium, quibus digestio celebratur, inesse corporibus atrophiam potest. Iplis igitur, frequentius adhibendus est dro pax, & cucurbita, uel paroptesis, aut sinapismus, & sympasmata acriora, quæ à nobis aspergines nuncupantur. Itē malagmata eiusdem quantitatis. Utiles præterea littoraria nauigatio, atque natatio maritima, uel naturalium aquarum: Tū post cibum animi laxatio, quam diachysin uocant, & articularum complexio adhibitis ministris, qui mollibus hoc manibus efficiant. Themison uero secundo libro Tardarum passionum plurima recte ordinasse probatur. Aliqua uero caduca intentione dixisse intelligitur. Iubet etenim ægros non æqualiter ægrotantes duodecim stadiorum spatium gressu conficere, æqualem modum cunctis definiens. Item igneo in loco uel feruenti fricari iubet præfatigatos sudoribus ægrotantes. Item sole torrenti, atque ita per interualla leuiter defricari, & in calida, atque oleo calido eorum manus infundi, ex quibus periculum perfiricationis necessarium sequitur. Item post interdianum cibum deambulationem probat adhibendam, atque fricationem & lauacrum. Tum post uespertinum cibum iungenda crura, atque brachia, quod est dormituris anxiosum. Præterea post cœnam imperat uomitum prædato passo, aut uino dulci, uel succo pitisanæ. Tum frequentato uomitu oua duo danda foribilia cum panis uncis duabus, ex quo incensa altiora, atque exercitatis uomitu uisceribus facile corrumpuntur accepta. Hæc igitur reculantes, alia quæ recte ordinasse perspicitur amplectenda iudicamus.

## DE HYDROPE.

## CAP: VIII.



**H**ydrops ab accidenti nomen sumpsit: siquidem aquosus humor hanc passionem necessarium comitetur: Nam Græci hydor aquam uocauerunt. Generatur autem ex accidentibus plurimis, atque diuersis causis, ut cachexia, febribus corpora tardantibus. Item duritia, uel saxea densitate iecoris, uel lienis, aut stomachi, uel peritonei membranæ aut matricis. Item spirationis difficultate, quam Græci dyspnoean uocant, uel uentositate stomachi, aut colici, aut uentris passionem, quam Græci coeliacen diathesin uocant. Item longitemporis dysenteria, uel in foeminis menstrualis fluoris retentione. Item hæmorrhoidarum ueterum repentina, atque incondita curatione, facta abstinentia, uel coadceruata bibentium transuoratione, & magis si salsa fuerit aqua. Item medicaminum frequentata portione, & horum similibus. Græci igitur, uel aliarum sectarum principes eius potestatem, uel differentiam nominibus uariandam crediderunt. Vocant enim hanc passionem etiam hyderon uel parecchysin, origini locorum specialia nomina tribuentes: nam parecchysin appellant sensibilem, & manifestam liquoris superfusionem, quæ fiet inter peritonei membranam, & intestinam: Hyderon autem, dispersum siue infusum per uisum raritatem, atque carnis spiramenta liquorem. Itē dicitur hyderon ex renibus generari: Hydropem uero ex duritate iecoris. Quod quidem nos iuxta sectam regulam reprobamus: Etenim infusio, siue superfusio liquoris est passio communis; & neque antecedentes causa passionis facere discre-

tionem recte creduntur: Siquidem etiam ex plurimis alijs partibus patientibus  
 hydropes generantur. Eius igitur differentiã Hippocrates, & Diocles duplicem  
 Hippocrates. dixerunt: Aliam enim hypofarcan uocauerunt, aliam asciten. Item Heraclides  
 Diocles. Tarentinus secundo libro Internarũ passionũ totius corporis inflationẽ, siue hu-  
 moris infusi perforationẽ catafarcan uocant. Inter peritoneũ uero & intestina  
 Heraclides Ta- asciten uel tympaniten appellauit. Itẽ Demetrius Erophili sectator undecimo  
 rentinus. libro de passionibus scribens, alium dixit hydropẽ constitui sine ulla humoris  
 infusione, sed sola inflatione turgente: alium ex humore diffuso, & eum nunc  
 Demetrius. per totum corpus, nunc inter peritoneũ & intestina, cuius differentiã nunc plu-  
 rimo uento tradidit: Et est uanũ atq; intellectu carens, sine ullo humore super-  
 fluo laborantẽ hydropem uocare. Item plurimi tres differentias tradiderunt: aliã  
 enim catafarcan, aliã asciten, aliã tympanite n uocauerunt. Asclepiades au-  
 tem alium celerẽ dixit, ut eum qui repente constituitur: aliũ tardum, ut eum qui  
 Asclepiades. tarda passione uexerit: & alium cum febribus, alium sine febribus. Hoc quidẽ co-  
 muniter etiam alijs specialibus passionibus adscribẽs, non aduertit quoniã pro-  
 prio nomine celer dicitur passio, non sola quã repente conficitur, uerũ etiam ea  
 quã celeriter solui posse mōstratur. Hydrops autẽ fit quisquam repente ex co-  
 adueruata bibẽdi transuoratione, uel falsi liquoris potu. Celerẽ autem passionis  
 Proculus. solutionẽ nullus ægrotantiũ meruit. Item Proculus Themisonis sectator secun-  
 dum plurimos inquit hydropis differentias temporibus passionis adscribendas.  
 Initiũ enim atq; augmentũ esse leucophlegmantiam, cum adhuc secunduũ carnẽ  
 fieri mutationẽ uiderimus: Statum uero tympaniten, cum summa tensio secun-  
 dum uentrem fuerit facta. Declinationẽ autem asciten, cum quadam indulgen-  
 tia fuerit inflatio relaxata. Non secutus uerĩ regulam, neq; aduertẽs quia omnis  
 D species passionis sua quãq; tempora percurrit. Deniq; etiam catafarca usq; ad  
 statum, uel declinationem perseverat. At tympanites, & ascites ex initio facti in-  
 augmentũ uenerint, & statu sumpto declinauerint, Item Apollonius Memphi-  
 tes aliũ dixit fieri hydropẽ cum retentione, ut si quid biberit, sine dilatione tan-  
 quam per fistulam transiens egeratur: Eius autem quẽ cum retentione fieri di-  
 xit, secunduũ plurimos tres esse differentias affirmat. Sed melius Demetrius Apa-  
 meus ab hydropẽ discreuit, eum qui sine dilatioe potum liquorẽ per urinaege-  
 rit, diabetem appellans, sicut specialiter de ipso scribentes docuimus. Melius igitur,  
 Apollonius Memphitis. quantum ad species hydropis, quamquam nõ generaliter, mutemus curatio-  
 nem, alium dicere in toto corpore constitutũ, tanquam in papyro uel spongia  
 inter uia: um raritatẽ insertum, à liquore uocari leucophlegmantiam, quam La-  
 tino nomine etiam intercutem recte dicemus: alium in parte corporis inter peri-  
 toneum & intestina, subiecto liquore solo, uel admixto uento plurimo uocari,  
 alterum asciten, alterũ tympaniten: Sequuntur quãdam cunctos præterea com-  
 munia, quãdam singularis propria. Communia autẽ, ut inflatio, uel extantiatu-  
 moris, & piger aut difficilis corporis motus, spirationis difficultas, quam Graeci  
 dyspnoeam uocant, somnus difficilis uel anxiosus, & magis post cibum sitis, &  
 urina comparatione sumpti potus paruior, fastidium, & aliquando febricula la-  
 tens in plurimis: Item quibusdam etiam uesicula, uel fistula, quibus eruptus hu-  
 mor feratur, ac deinde uulnera difficilia sufficiant, uel quã in cicatrice uenire pos-  
 sint. Specialia uero, uel propria singularis sequũtur, ut leucophlegmãtiam, uel in-  
 tercutem mollis atq; humida inflatio uentris ac uultus, & crurũ, & folliculi geni-  
 talis, uel præputij, relucente liquore per cutẽ albedo colore. Item cum oris uel spi-  
 ratione, siue anhelitus foetore totius corporis grauedo, & impressioni digitorum  
 cedens

**A** cedens tumor, ita ut paululum in caua permaneant loca. Aliquibus etiam alborum atq; crassorum humorum uomitus, uel per uentrem egestio; unde etiam nomen passio sumptissè à græca deriuatione uidetur: Leucon enim albidum, phlegma humorum crassum uocauerunt; uel quod ægrotantis color albidioris imaginem ferat. Alij uero tanquam ex superfluo humore generata passione, penetrans humor singula quæ spiramenta possederit; nos uero intercutem nominamus. Asciten deniq; sequitur uentris inflatio, uel extantia, & pro corporis motu liquoris conlusi sonitus, uel ad concussam palmæ resonans, tanquam semipleni utris, ex quo nomen sumpsit. Item proscematis mutatione, uel digitorum impressione demersio, uel resurrectio liquoris, & conclusio superiorum partium, atq; tenuitas tanquam extentæ cutis secundum ora uel colla, aut iugula, uel pectora. Iacentibus præterea ægrotantibus diffusa, atq; elatior tumoris extantia fiet; Surgenti uero uel stantium maior atq; extenta, & crescente passione corporis frigus atq; torpor accedit; Aliquando etiam tussicula, & stercoreum uel urinæ abstinentia, & per uentrem fluidior exitus, & apprehenso folliculo, atq; uirili ueretro extans inflatio reduplicata, & aliarum partium surgens tensio, sicut in leucophlegmantia. Vocatur autem hic hydropisimus, ut Diocles, etiam epatias, aut splenites à patientibus partibus nomen ducens, hoc est iecore uel liene. Item tympaniten sequitur rotunda atq; extans inflatio secundum gastera cum tensione plurima, & ad percussam palmæ resonans, uel ut tympani, unde etiam nomen accepit. Item rictationes, & aliquando intestinorum tormenta, quæ inclusæ uento per podicem digerantur, atq; grauedinis detrahant quicquam. Est autem passio communiter structuræ omnis hydropisimus, sed complexa aliquando solutione ex alijs accidentibus, ut uentris fluore. Præterea est naturaliter tarda passio: si quidem nunquam celeriter soluta, uel emota corporibus uideatur. Item generaliter magna; si quidem & difficultatem, & indecentiam, & periculum inferat ægrotanti. Denique semper difficilis curatione, nunc uehementer, nunc minime comprobatur: Etenim magnitudine uehemens, & uarietate accidentium, & corruptione uirium magis incurabilis iudicatur. Parua uero magnitudine comprobatione supradicta, atq; paucis & simplicibus accidentibus, quæ Græci symptomata appellant, & sine nimia uirium læsione minime curatione difficilis approbatur, & quæ secundum aliarum lectarum principes de effectibus uel exitibus passionum scripta sunt, ut etiam secundum causas ex quibus efficiuntur, & patientes locos, & naturas, & ætates, & annualia tempora, ut hyemis, uel æstatis, & eorum medijs temporibus generationes passionis; alij difficiles curatione, alij faciles curatione, alij faciles hydropes approbantur. Quæ quidem omnia magnitudini passionis adscribenda sunt, ne infinitus modus differentiarum uideatur accidentium numero uariatus: Etenim secundum causas difficiles aiunt curatione hydropes, qui ex saxitate magis quam ex duritia fuerint facti. Item eos qui ex dysenteria, uel coli passione, ad hijs qui ex coadætuato hauustu bibendo uitium conceperunt. Item secundum locos difficiles inquirunt eos qui ex iecore, faciles uero eos qui ex liene. Itē secundum naturam uel sexum difficiliore inquirunt curatione seminas maribus: Itē secundum ætates faciliores inquirunt curatione pueros, uel pubentes, difficiles uero ætatis mediæ, uel senes: non solum quod natura crescere uel auferi, alia minui uel declinare uideantur, sed etiam quod alij prohibeantur, alij cogantur, alij neq; suadere, neq; cogi posse probentur. Item secundum annualia tempora, quæ Græci horas appellant, difficiles inquirunt curatione æstatis tempore laborantes: Si quidem multa sui afficiantur: Alij uero è contrario faciles

C inquitur curacione: siquidem exitum liquorum fieri prouocet feruor ætatis, & corporis præterea faciat siccitatē: Difficiles uero hyemis tempore, ob corporis densitatē uel frigus. Item uerno tempore: siquidē humidiora, atq; liquorum redundantia fiāt corpora. Autumnū uero prima, similia ætati, ultima hyemi dixerunt. Item secundum generationē, siue fabricationē passionis difficilē inquitur curacione leucophlegmantian, facilem uero asciten, & horum medium tympaniten. Dissenserūt præterea etiam de patientibus partibus, quæ principaliter afficiantur. Erasistratus namq; iecur inquit pati: In apertionibus enim saxeum semper inueniri confirmat: alij uero colum, sed cōsentire iecur: alij splenē, ac iecur, & colum: Alij etiā peritoneum: alij renes quoq; & matricē principaliter pati dixerunt. Et apparet omnia necessariō prætangī: quod quidē etiam si lauerit nullus timor curacionis mutandæ medicantibus accedat: neque etiam ob locum adiutoriorum ordinem quicquam obesse monstrat, cum hæc eadem oporteat ceromate sole feruefacto iactari, uel pellibus sole ignitis inuolui. Adhibenda etiā acopa feruentia, & sudationes ex naturalī materia prouocare: habet enim recorporandi uirtutem ex quacunq; metallorum materia exhalatio naturalis. Item ex harena lititoris sole ignita torrenda corpora. Hyemis uero tempore igne prætorrenda, atq; ita corpori admouēda, ut ex ipsa, excepto capite, cætera corporis omnia contegantur. Item sinapifinus usq; ad cutis humorem adhibendus, qui maxime uehementem fortitudinem locis humore corruptis, atq; ut ita dixerim, habentibus admouet ac ministrat. Item locorum & aquarum mutatio adhibenda, & peregrinatio magis maritima: Est enim lacerantior, atq; corporis apertionibus efficacior ob salinitatē maritimus aēr. Conueniunt etiam uaporationes spongiarum ex aqua maritima expressarum, uel aqua salsa decocta. In tympanicis uero specialia, ut pleriq; uolunt, iuxta communē uirtutem recorporatiuæ curacionis, etiam decoctio centaureæ herbæ, & absinthij, & origani, & hysopi, & marrubij adhibenda, & similis uirtutis epithema, ut est quod appellatur dianitrum, ex fico atq; nitro, & absinthio confectum. Tundendum igitur aridum ficum, sed quod sit pingue ac succiduum. Item singulatim absinthiū & nitrum admiscendū duabus partibus fici, & quarta pars origani. Aliquando etiā rutæ admiscenda particula. Facit enim medicamen, quod appellamus diahyssopum. Itē uua passa cum cumino, uel farre, cum adipe ueteri, & uino. Hoc quidem plurimi magis intercutibus conuenire probauerunt. Item bubulo stercore unguendos cum aceto ærotantes dixerunt. Apponenda etiam malagmata, quæ fortificare, ac recorporatiua uirtute mutare ualeant corpora in meliorē habitudinē. Iniercutes autem & ascitas hijs curandos probant, quæ siccare atq; exicare ualeant corpus, uel sudorem commouere. Sed erit cauendum, ne immodico usu medicaminum corporis superficies ulceretur. Est autem nostrum medicamen quod ex herba chamæleonte nigra conficitur. Item ex stercore caprino, quod appellatur diacapregias. Item diacentauream, & diaoriganū, quæ ab herbarum nominibus uocabula sumpsērunt. Item icesion emplastrum, quod magis post humoris detractionem adhibendum probamus, quo partes roborētur.

Erasistratus.

Diapregias  
Diacentaurea  
Diaoriganū

D Oportet autem interpositis quinque diebus, uel eo pluribus detractio iam dudum posito medicamine perspicere profectum, ac rursum imponere omnibus locis ex anterioribus ac posterioribus corporis partibus: Singula enim medicamina erunt illinienda pellibus teneris, atque ita corpori addenda, superposita lana

Diacapregias  
Diacentaurea  
Diaoriganū  
Emplastrum  
icesion.

**A** mollicum leuibus fasciolis colliganda, & pro uiribus corporis adhibenda gestatio, atq; ungenta congrua, & defricatio. Tympaniten uero recorporatiua curandum probamus curatione, & consiicienda etiam inflationis medela, quam Græci empneumatosis uocant. Adhibenda deniq; resstantia, ut est quod appellamus diaspermation, uel polyarcion, aut diaartymaton, aut diasamsicum, aut diamelilotton: Hæc enim ualent etiam uentositatem tollere: Adhibenda præterea in hijs ea quæ superius ordinauimus. Tum profectu accedente regula cyclorem adhibenda natatio maritima, uel aquarum naturalium. Alij uero nõ absurde etiam aquæ marinæ uaporationem probant adhibendam, quo sudores pro uocantur: Inquunt enim implendum solum aqua marina feruenti: Tunc quadrangulam compaginem immittendam præligatam loris, in quam erit includendus ægrotans: sed præliganda compago pelle, ut aquæ prohibeant ingressum, quo exhalatione uaporis calefactus ægrotans in sudorem uenire cogatur. Sed erit aqua calefacienda in nouatione frequenti ferri candentis immisione massarum. Oportet autem semper ægrum adhibito animi laxamento curari, quam Græci diachysin uocant. Quærenda denique animi desideria, quæ sine uexatione corporis præueniant uoluntatem, & amicorum conuiuia, quæ ciborum paritate, animi tamen lasciuitate frequentent. Vtile etiam si longi fuerint dies partiri modum sumendi cibi: facilius enim accepta digeruntur duorum temporum oblatione diuisa. Ac si iuxta ordinem datum leuigati indulgentia passionis rursum fuerint accessionibus typicis ægrotantes affecti, quo iterum impleri uideantur erit melius uti prius radicum uomitu: dehinc ante diem radicem usus, album ueratum immittere, tunc sequenti die hoc detractio radices dare, uel certe hellebori decoctionem. Sed horum usum uel confectiorem dexteram, atque adhibendi modum Responsum libris de adiutorijs scribentes docuimus: & nunc exinde hæc accipienda monemus. Hæc est mundior, atq; uera hydropum curatio: Etenim potui medicamina danda cauere decet: Alia enim uesciam commouent, alia intestina lacerando ulcerant, uel dysentericam faciunt passionem: Alia stomachum uertunt, & fastidium generant cibi, & sitim extendunt. Quapropter si cogentibus rebus utendum uiderimus quibusdam aquiducis medicaminibus, quæ Græci hydragoga uocauerunt, ea dabimus hijs qui plurimo humore infusi aquoso corpore laborare uidentur. Habere etiam conuenit curam, ne rursum corpora repleantur: ex quibus est euphorbii mulso commixtum potio datum, uel ouis sorbilibus aspersum, duorum uel trium cochleariorum quantitate, uel decoctio radicum, aut squillæ. Oportet autem squillæ libras duas omni purgamento absolutas, quod ad unam libram redigatur, concisas in uas fictile nouum prælitum mitti, tum adiectis unis sextarijs tribus, quibus ad tertias decoctis, ex ipso liquore erunt ad duo cochlearia ægrotanti danda: & proficiente curatione usq; ad unciam unius accedere modum. Sed hoc erit post gestationem adhibendum, uel post perunctionem corporis, & ante sumptionem cum plurimo interiecto tempore. Ex decoctione autem radicū duos uel tres cyathos dandos probamus. Sin uero etiam urinam quis uoluerit commouere, erunt omnia aromatica prohibenda, quæ non curiosa, sed magis simplicia esse uideantur, ut est decoctio seminis cucumerū, uel fœniculi, aut dauci, aut apij, anesi, pefroselini. Itē mentæ, asari, nardi, squinanti, zinziberis. Hæc singula uel cū uino, uel ex ipsis confecta erunt offerenda. Ac si ex hijs humor detrahi non potuerit, oportebit tanq; alienū paracentesim auferre. Sed nunc decet prius quam ipsius

quædam sunt

si dicitur

Libri Respon  
sionum, siue  
Adiutoriorū  
Cælij.

si dicitur  
Aquiducam  
dicamina.

si dicitur sunt

G  
 Euenoris libri  
 curationum.  
 Erasistratus.  
 Theffalus.  
 Afclepiades  
 Soranus.

officij uſum doceamus, hijs reſpondere qui iuſtius curationis adhibendæ diſſo-  
 nantia iudicia poſuerunt. Antiquorum igitur aliqui congruam paracentefin di-  
 cunt, ut Euenor libro quinto Curationū, Eraſiſtratus libro quo de hydropē ſcri-  
 pſit, & Ceiſus ſectatores, Theffalus ſecundo libro regulari. Alij uero congruā lau-  
 dauerunt, ut Afclepiades libro quo de hydropē ſcripſit, & Themifon ſecundo  
 libro Tardarum paſſionū, quibus etiam nos iuxta Sorani ſententiam conſenti-  
 mus: Adſertores tamen primæ ſententiæ, hoc eſt, iſtius reprobandæ curationis  
 hæc dicunt: peritonei membrana à natura neruoſa eſſe perſpicitur, & eſt omne  
 quod neruoſa fuerit qualitatis punctiōibus inimicum, ſiquidem conſenſus in-  
 gerat. Præterea ſpirationis naturalis cauſa, qua nos aërem recipere, atq; reddere  
 hauſtu potili neceſſe eſt, inteſtina quoq; commouentur, quibus ſuperficiēs cor-  
 poris conſequenter tangitur. Et eſt periculum hanc paracentefin uulnerare lo-  
 ca: quippe cum non ſolum corruptus humor detrahi uideatur; uerum etiā natu-  
 ralis ſæpe ſpiritus excludatur, quod eſt uehementer corporibus noxiū. Dehinc  
 etiam poſt effectū punctiōis, aliqui ægris ſua uulnera reſoluētes uoto prius tor-  
 poris deponendi uitam quoq; liquerunt. Item neq; tempus ſibi conueniēs hoc  
 genus adiutorij habere uidetur: Etenim paſſione conſtituta, uel ſuperpoſitione,  
 ſiue lenimento aliud tempus mitigationē demonſtrat, aut aliam reſumptionem,  
 uel reſcorporatiōē. Paracentefis uero conturbat atq; uires corporis tollit, & nō  
 reſcorporatiua uirtute medetur, ſed uſum reſcorporatiuū impedit. Ad ſummam,  
 nemo, inquit, ſaluatus eſt eorum qui per paracentefin curati ſunt: quapropter  
 adhibenda negatur. Item Eraſiſtratus ait, quod iecore in duritia conſtituto ob-  
 eſſe paracentefis uideatur: ſiquidem grauatio iecoris tumentis toleretur humo-  
 ris ſubſtantia ſubleuata, atq; natans in liquidis, quibus effuſis omnis grauedo  
 partium tumentū, quæ diaphragmati ſunt natura cōnexa, atq; uenæ maiori, at-  
 que contendit, quam Græci quilen appellane, adductiōe ſui tumores ingerant  
 uicinariū, ac deinde celerem faciunt mortem. Item Ptolemæus Eraſiſtrati ſe-  
 ctator ait cauſam paſſionis eſſe iecoris duritiā, ſupercreatam uero humoris in-  
 fuſionē. Paracentefis igitur liquorem detrahens paſſionem minime detrahere  
 agnoſcitur: Siquidem non auferat cauſam, ex qua humor creatus eſſe uideatur.  
 Sed ſunt hæc omnia facile expugnabilia; tunc enim uulnerata neruoſitas in tu-  
 morem uenire recte iudicatur, quoties naturali habitu fuerit conſtituta. Nunc  
 autem morbo uitata, peritonei membrana contra naturam habere perſpicitur,  
 & non ſimilia, atq; eadem ſequitur naturaliter, uel contra naturam conſtituta.  
 Item inteſtinorum uulneratiōē metuere inanis timoris eſt: Etenim exercitatis  
 atq; prudentibus hoc genus officij cōmittitur: Dehinc plurimū peritonei mem-  
 brana diſtabit in: eriecta humoris cauſa ſubmota: ſpiritus uero etiam phleboto-  
 matis ſanguini ſunctus excluditur, nec ilico tamen reprobanda phlebotomia,  
 cum ſit ab omnibus rectiſſime adiutorium comprobata. Ferendum eſt enim le-  
 ue damñū naturalis officij, quoties maior utilitas excludendæ paſſionis promit-  
 titur. Soluere uero ligatiōē ægrotantes, & immoderato fluore acuto deponen-  
 dæ paſſionis in mortem uenire, ſimile quiddam eſt tanquā phlebotomatū ligatu-  
 ram medici ſoluere, ac deinde plurimo ſanguinis fluore uitam finire: Hæc enim  
 non adiutorij eſt curatio, ſed ſtultitiæ ægrotantis. Habet præterea paracentefis  
 etiam aptiſſimū tempus, quod illi inueniri negant, ſicut cucurbita ſcarificatione  
 adiuncta, atq; hirudinū appoſitio, quæ non in acceſſione aut lenimento, ſed in di-  
 miſſione ſuppoſitionis recte adhibēda probant, ſicut in alijs docebimus de adiu-  
 torijs ſpecialibus ſcribentes; Omnes enim paracentefi curatos, ut aiunt, mori  
 aperuſſimè

D  
 Ptolemæus  
 Eraſiſtrati  
 ſectator



**A** aperuſſime mentiuntur; nos enim quosdam uidimus euasiſſe: plurimi uero mo-  
 riuntur: ſiquidē medentū tardantes conſilia ſerius paracentiſis adhibeatur, ut q̄  
 alij adhuc tumētes peritonei membrana, & neq̄ uſu dextero operantes diuiſu  
 ram faciendo mōris periculum incurrunt. Ex quibus eſt etiam Aſclepiades,  
 qui diuiſo loco ſiſtulam relinquendam putauit. Ex qua ſtirpis in modum im-  
 preſſa, uel per puncta peritonei membranae graues coſenſus, atq̄ indignationes  
 adferat: Quippe cum ſape etiam gelati ſanguinis corpuscula in uentia uulnerū  
 diuiſuris, uel quæq̄ externa magnos tumores atq̄ indignationes cōmouerint.  
**E**raſiſtrato uero cauſanti, quod poſt detractiōnē humoris ex iecoris duritia in  
 paſſiōnē uenerunt ſuperiores partes, ac magis ſalutares, adductione quadā pon-  
 deris indignentur, erit reſpondendum, quia plurimi hydropes ſine ulla iecoris  
 duritiā in paſſiōnē uenire probantur: Etenim ex alijs cauſis fieri poſſe ſuperius  
 demonſtrauimus. Pleriq̄ etiam quanquam iecur duruerit non neceſſariō in hy-  
 dropem uenire contingit, ac ſape adductiōne partium, uel indignatione ſuperi-  
 orum uexari perſpicimus, quo ſape tumor etiam perdidit agrotantes. Omitto  
 quod ſuxta eius ſententiā oportebat ſupinis iacentibus agrotis nullam quere-  
 lam partiū atteſtari: Si quidem iecur nullo pondere ſuperiora diſtendat, hoc eſt  
 diſcrimen, quod Græci diaphragma appellant. Aſclepiades uero repentinā effu-  
 ſiōnē atq̄ coaduerſatam cum periculo fieri teſtatur: Si quidem uitæ, quas Græci  
 poros appellant, interiecta mora blando ſe tactu cōtigant, & propterea illæ ſi ma-  
 neant agrotantes. Detractiōne autem facta liquorū, aſpero ſe tactu contingāt,  
 atq̄ cōcidentes auſultentur: ac ſimili ratione etiam ſpiritus uehementer irruēs  
 carni dolorē faciat, atq̄ inflationē, & tormētā inteſtinorum. Eſt præterea facile  
 expugnabile Ptolemæi dictum, quod paracentiſis humorem detrahens paſſio-  
 nem non auferat: Etenim primo, neq̄ ex alio quolibet adiutorio ſingulari hæc  
 paſſio ſolui poſſe perſpicitur: quippe cū ſit magna atq̄ perſeuerans, dehinc quæ-  
 dam adiutoriorū ob releuanda accidentia paſſiōnū, quæ Græci ſymptomata uo-  
 cant, adhibenda probentur: quanquam non totū ſoluere morbum uideatur, ut  
 phreneticis luce commotis oculorū præteſtio. Item alia quædam, quæ quanquā  
 nihil per ſe medeantur, alijs tamen adiutorijs præparent corpus, uel patientem lo-  
 cum, quo facile adiutorij beneficiū ſumar. Ac conſura uel raſura capitis fluore  
 quolibet adfectis, quo detractis capillis illinienda medicamina conſtrictiua, uel  
 epithemata, aut cucurbitæ appoſitione nullis obſtantibus medeatur: Quanquā  
 ſit detractiō capillorum laxatiua: at uero paracentiſis etiam per ſe plurimū me-  
 detur: Releuat enim detractiōnem plenitudinis tenſionis, atq̄ ſpirationis diſ-  
 ficultatē, quam dyspnoeam uocant, & alijs adhibendis adiutorijs præparat partes:  
 Non enim potuerunt medicaminum illinimenta, uel appoſiti ſyncera uirtute  
 ad uiſcera, uel patiētes partes peruenire, cum interfecto humore peritonei mem-  
 brana plurimum à cutibus diſtet, tranſeant autem facile ad ea, ad quæ deſtinata  
 erant humoris interiecti ablatione permiſſa. Quapropter paracentiſin ad-  
 hibendam probamus, ſed non hijs qui uiribus fuerint fatigati, aut  
 adhuc in tumore peritonei membranae conſtituti: addentes  
 etiam, uel prædicentes periculum: Plurimi enim quan-  
 quam alterius ſupereſſe uitæ potuerint, & ſine  
 ullo dolore mortē capere, paracentiſis cu-  
 ra celerē mortē pertulerunt.

# CAELII AVRELI-

ANI SICCENSIS CHRONION

LIBER QVARTVS.

CVI HÆC IN SVNT:

De elephantiasi.

Dephthiriasi.

De uentriculosis, quos Græci coeliacos uocant, & cæteris defluxionibus.

De uentris debilitate.

De uentris tumore uel duritia.

De dysenteria.

De choliciis passionibus.

De lumbricis.

De mollibus, siue subactis, quos Græci malthacos uocant.

## DE ELEPHANTIASI. CAP: I.

Decet principium capitis.

heliosis, dropacismus, & lixiuñ calidi perfusio, & psichrolusia, atque cataclysmus, hoc est, aquarum è supernis illisio, natatio maritima, & aquarum naturalium, & magis frigidarum, quæ aluminis naturâ exhalent, quas styperiazas uocauerunt, siue ferrugineas, quas sideriazas appellant. Itè adhibenda smegmata alia, donec maculæ albescant, quas supra memorauimus, uel cymolia terra subassata, cū hordei polline, & nitri quispriam, uel alia quæ lacescere ualeant magis, ac leuius, ut est cinis ustarū bucinarum, uel halcyonum, aut cum eodem pumex assatus, uel sulphur uiuum, uel sapiarum testa exusta cum pumice & nitro, & cymolia subassata, atq; gummi, & galla, & qui hæc omnia ponderis. Item acopa & malagmata mediocriter lacescentia, præter cutis ulcerationem, & hijs unguenta similia, ut myrobalani cum aceto, aut uinum cum ammoniaci gutta, & alumine. Ac si ulceratio fuerit locorum consecuta, erunt congrua pro differentia ulcerum adhibenda. Quapropter ea quæ serpere per corpus uiderimus amputabimus. Tumentia uero mitigatiuè temperamus & laxatiuè uirtutibus. Item humecta atq; fluida densamus, & fordidâ purgamus, caua replemus, & æqualia in cicatricem ducimus, sicut Responsonum libris chirurgiam scribentes monuimus. Ea autem quæ in cicatricem uenerunt sinapismis roboramus, prælatiis metafyncriticis cyclis, & radicum uomitu, & cæteris quæ sua sunt. Tum resumpto corpore uehementer utilis hellebori albi datio probatur, quo corpora dissecuntur, quæ non semel adhibenda, sed etiam sapissimè per interualla præroborato corpore. Itè nauigatio, & in aëres meliores transitus: sic enim passio soluet, aut nō ex ea deformatus & grotans ad finē uitæ perueniet. Veterū autē medicorū nullus istius passionis curationē ordinauit, excepto Themisone, atq; ex philosophis Democrito, si uere eius de elephantiasis cōscriptus dicit liber, quo sanguinis corruptionis causas cōscribēs phlebotomados imperat & grotâtes, & dotâdos decoctione herbar, quâ in Syria memorat nasci & in Cilicia: Sed neq; hanc dicere possumus, neq; passio tam difficilis hijs duobus adiutoris solui credit posse. Themison uero secūdo libro epistolarū ad Dimantē scribens

ἐπιπρωσι.  
 ἡρωσιαισι.  
 καταλοισμοι.  
 Αχιμ.  
 σπιπριάζασα.  
 σιδριάζασα.  
 σπιπριμάσα.

D  
 ἄροσα καλα.  
 γματα.

Themison  
 Democritus

**A** scribens phlebotomari iubet, recte quidem, sed non scripturam considerans potius quam conuulſantē cauſam ſanguinis detrahēdam: quod eſt aſtimabile, atq; ut ita dixerim, dogmaticum, ſicut ſecundo libro de cœnotetis ſcribens Soranus docuit. Vtitur præterea uomitiuis ſeiunus, itemq; radicū eorum confuſus tempus: Oportet enim ſuperpoſitionis tempore adhibere phlebotomiam, in le nimento uero uomitum. Item uentrem inter paucos dies leuiter deduciam iubet, atq; ſuperficiē corporis conſtringendā ungento myrobalani, cum aceto & oleo roſaceo paruo, uel myrtino, & ammoniaci gutta cū alumine. Deponit etiā ægrotantes in decoctione frigida ex herba perdicia confecta, uel plantagine, aut murta, aut rubo, bis in die, atq; ſufficienti tēpore quadā tarditate ægrotantes imperat immorari. Dat cibos facile reſtabiles, & potu magis aquam: quæ ſunt incongrua: Phlebotomia enim ſimiliter laxatiuum genus eſt, & cibus reſtabilis, & ſingula ungenta quæ imperat adhiberi, conſtringunt. Item embasi, quā fieri ex decoctione herbarum iubet ſupradictarum. Item ungenta condenſant corpora. Sed hoc paſſus eſt cum nondum ſimpliciter methodicam perſpiceret diſciplina, & Aſclepiadis ſecta circumſeptus, paſſionis cauſam † in extaſin æſtima ret, quam præſtabat fieri † per ſenſem ſiue cutem: & ob hoc quarebat materiam à ſuperficie ad altiora, uelut latius patientia, reuocare. Vtitur denique conſtrictiuis extrinſecus, & rapit ad interiora ea quæ fuerint appoſitorum uirtute depulſa. Prouocat etiam uentris fluorem & uomitū, & utitur hellebori purgatione, adhibito pſilothro in tres uel quatuor dies, uel alio quolibet urenti medicamine uſq; ad cutis ruborem, quo magis perſeuerantem faciat paſſionē. Adhibet præterea cataplaſmata, ex quibus etiam ſuccos adhibuit arnogloſſæ, uel perdicij herba. Item malagata adhibet conſtrictiua, ex quibus nunc plurimi laudant argagation appellatum medicamen. Item exercitium probat, & deſiccans cutem, declinat ungere, ſed adhibet græcum, non conſiciens hoc quoq; eſſe laxatiuæ uirtutis. Adhibet etiam ammoniaci guttā cum aceto uel uino, aut quæ ſunt intra ſe contrariæ qual. tatis. Item poſt exercitium ſudationem faciendam igne uſincino, ſed aqua frigida fouendos imperat ægrotantes, & uſum hellebori geminū probat: Quæ ſunt quidem uera adiutoria, ſi tēpora quoq; ſeruentur, ut Reſponſionum docuimus libris. Item quidam Themifonis ſectatores inſitia quoq; paſſionis præuiſa, coërcentes pronos ac decliues, uel uenturos in eandem, quos uiderint phlebotomant, & helleboro purgant: Eos autem quos iam poſſiſſos ac ceperint, iſidem negat curandos adiutorijs: ſiquidem corruptione quadam uel laxatione extremæ cutis in corporibus hæc paſſio generetur, & ſit artiſica carnis atq; mollifica corporis phlebotomia. Quapropter inquirunt eſſe frigidandā uel ſiccandam corporis ſuperficiem, quo poſſit ei uſ humor ad inteſtina uel uentrē recurrere, ac deinde clyſteribus, uel purgatiuis medicaminibus, quæ catartica uocant, detrahēdo cibum. Præterea præpotandos probant ægrotantes ſucco nepetæ, ſeruata moderatione quātitatis, quæ neq; minuenda, neque ſuperanda ſit tribus cyathis uſque ad ſex. Cibum etiam dandum frigidum, atque conſtrictiuum & paruū: Potum frigidum, ſed meratum, ex uino uehementioris acrimoniæ, atq; albo, uel ueteri: & iape tenendos ægrotantes, uel ſiccandos abſtinentia bibendi, ſiccioribus reſiciēdos cibis: Quæ ſunt utraq; incongrua ac diſſonantia ſiccandæ cutis, ſecundum eorum intentionem: Sic enim, ut aiunt, eſt ſuperficie tranſmittendus eſt humor ad altiora, atque eò prouocandus, ut clyſteribus ac purgatiuis medicaminibus excludatur per uentrem: erit enim contrariū, ſiti atq; ſiccioribus cibis, & uino ſupradicto altiora ſiccare. Item aliqui horum multitudine

Libri Sorani  
lib. i. tit. v.

μυροβαλ.

† intrinſecam  
† ſuperficiem

ψιλοθρο.

Argagation me  
dicamen.

ωλετρησ  
καταρτισθ.

tudinem

C tudinem intuentes frequenter adhibendam phlebotomiam, atq; clysteres, & uentri flua medicamina, quæ catartica uocant, iubent: & magis diacameleos appellant, quibus necessariorum corruptos in peiorem habitudinem corporis uertunt, quem Græci cachexian uocant. Item alij corruptione hoc fieri, atq; mutatione ex uenenis effecta æstimantes, temperatiuis uti medicaminibus decreuerunt: Ex quibus magis asinino lacte ægrotantes potandos imperat sumplici, uel accurato, quod schiston appellant. Item uino dulci, & cibus similibus, quibus foeda digestionem corruptis maior efficitur corporis corruptio. Ordinant præterea theriacam dandam, quam cuncti Mithridatium appellamus: Quæ quidē recorporatiua uirtute mederi posse perspicitur. Dant etiam uiperas mandendas, sed amputato capite atq; cauda, mensura digitorum quatuor, cætera coquentes atq; obdulcates sale & oleo ægris offerunt comedenda. Alij etiam aqua ex labris quibus candēs tingitur ab operantibus ferrum potandos dicunt: cum sit hæc passio secundum plurimos scriptores ex aqua graui, quæ aut natura, aut aliqua corruptione foedata sit, sæpius generata. Alij quoq; etiam curis uulnerationem affectandam probant, qua corpus exhumoretur: neq; cunctis comune iudicium, & ignaris cognitum prouidentes, quod peiorante passione superficies corporis ulceretur. Itē alij ægrotum in ea ciuitate quæ nunquam fuerit isto morbo uexata, si fuerit peregrinus, cludendum probant, ciuem uero longius exulare, aut locis mediterraneis, & frigidis consistere ab hominibus separatam, exinde reuocari, si meliorem receperit ualeitudinem, quo possint ceteri ciues nulla istius passionis contagione lauciari. Sed hi ægrotantē destituendum magis imperant quam curandum, quod à se alienum humanitas approbat medicina.

## DE PHTHIRIASI

## CAP: II.

D

Pediculi fer

Pediculi fer  
rales.

Pediculi fer

Pediculi fer

Ntecedente cachexia etiam hoc symptoma generatur, quod nos accidens dicere poterimus. Sumpsit igitur nomen non à genere, sed à multitudine pediculorum: Plurimi enim creantur nunc per totum corpus, nunc per eas partes quæ capillatura cõceptæ sunt: & nunc consueti atq; simplicis formæ, nunc ignoti, hoc est latiores, & duri magis ac fruentes moribus uehementer, quos quidam ferales appellant: Nam sæpe etiam sub capillis inueniuntur corpora penetrasse. Sequuntur autem ægrotates uigilia & pruritus corporis, atq; pallor, cibi fastidium, & stomachi debilitas, & caluities: & est passio solutionis cholerae rubrae egestione plurima per tenues uias emergente, qua hæc animalia generantur. Deniq; superpositionis tempore iacere oportet ægrotos loco mediocriter frigido, atq; cibus constrictiuis, & temporibus iam sæpe demonstrosi refici. Fomenta uero & perunctiones, & cataplasmata membratim erunt adhibenda, qualia Themison elephantiacos curas ordinauit. Sed ea loca quæ capillatura uestita sunt erunt præterea radenda, superpositione resumptio adhibenda, atq; recorporatio, sicut in cachecticis, uel elephantiacis ordinauimus, sed iugia adhibenda smeigmata, quæ nos laceffentes, atq; purgatiuos pulueres nuncupamus. Item unctioes magis, cum mox fuerit capillatura derasa præfotis partibus aqua marina, uel aceto falso. Sunt hæc deniq; plurima speciatim posita, ut bulbi cum nitro atq; oleo contriti, quo mellis faciat crassitudinem, ex quibus corpus erit illinendum. Item staphysagria cum aceto atq; oleo trita, uel infusa aceto & oleo, tunc contrita cum falis flore, quem Græci halos anthos uocant, donec liquidum mellis similitudinē faciat. Nunc etiam cum sulphure uiuo atq; aceto: Vel ita ponderibus

A deribus composita medicamina, staphysagria drachmas duas, sandaracæ drachmas duas, nitri obolos duos, admixto oleo & aceto, donec in mellis crassitudine ueniat. Vel sandaraca cum oleo, & nunc staphysagria, & cabrotanum æquis ponderibus admixta calce, quam Græci conin uocant, & hijs similibus. Palpebris autem erunt adhibendi sicci pulueres, atq; collyria, quæ Græci phlepharica uocant, nos palpebraria dicere poterimus, ex are usto, atq; aneso affo: sed & lapide scisso, & pipere, & staphysagria confecta. Hæc etiam in hijs qui præter phthiria sin pruritu uexantur sunt adhibenda, adiectis magis feruentioribus aquis in usu lauacri, & asperginibus pulueris ex thure & nitro, & sulphure confecti. Item solutiones, quas Græci helioses uocant, adhibendæ sunt: Dropaces quoq; & uermis radicum, & ea quæ iam sæpe de alijs memorauimus scribentes passionibus, quæ corpus recorporatiua uisitate fortificare, atq; in meliorem habitudinẽ commutare ualeant: Sic enim detracta corporis cachexia, quam nos malam habitum dñem dicere poterimus, eius quoq; comitantia depellentur.

DE VENTRICVLOSIS, QVOS GRÆCI  
coeliacos uocant, & de cæteris defluxionibus.

## CAPVT IIII.



B Entriculosa passio, quam Græci coeliacen uocant, à parte corporis quæ patitur nomen accepit. Generatur ex antecedenti indigestione continua, uel tumore uehementi, aut dysenteria. Sequitur in hac passione constitutos uaria stercoreum egestio qualitate atque colore, nunc tenuis ac soluta, nunc aspera & inæqualis, uel constricta, & nunc alba, nunc similis urinæ camelorum, nunc flaua & spumosa, nunc prasina uel liuida, aut nigra, aut purulenta, aut sanguinea, cum graui foetore & rugitu intestinorũ, quem Græci borborismum appellant, atq; in exitu sonitũ, & post effusionem factæ uelut scatenis stercoreis uesiculæ: & nunc iugiter nocte atque die, nunc coadceruatim, sed interiecto spatio, ut per diem bis uel semel, aut interpositis uno uel duobus diebus, aut eo amplius: & nunc cum tensione atq; uentositate, & tormento, uel dolore aut singultu confidente, atque conducta cute quæ uentrem circumtegit, attestante siti, & ipsius uentris feruore, & leui in interioribus torpore frigido: Sequuntur etiam uigilæ, fastidium cibi, & aliquibus plurimus appetitus, uirũ debilitas, pallor subalbidus, & nũc febres, dehinc corporis odor teter plurimus, ut etiam quæ suis manibus tetigerunt computrescant, & difficile careant odore concepto. Tum uultus inflatio atq; pedum: Quibusdam etiam dysenteria congeneratur, cum facile fuerint intestina ulcerata, ob defluentĩ acrimoniam. Est autem passio solutionis, & aliquando stricturæ complexa: Siquidem aliqua eius uideantur esse coniuncta, ut ex supradictis conijctur: sed discernitur à speciali reumatismo uentris: Siquidem plurimæ in ipso fiant egestiones, sed non uariarum supradictis concurribus. Quapropter cum adhuc noua, uel emergens fuerit passio, nec plurimo temporis, sed in superpositione constituta, quam Græci epitalin uocant, erit eo tempore locandus ægrotans constrictiua ratio, ut sæpe docuimus, adhibita requie: & quantum uires permiserint, abstinentia: Etenim ad perferendum atq; corpori adpropriandum cibum sumptum: nunc uenter patiens indignatur, tanquam oculi patientes uisus officio: in qua ætati somnus etiam plurimus curandus, atque sitis, & lanis mollibus uenter contegendus leuiter oleo hispano præactus, uel melino, aut rosaceo, aut murtino, aut lentiscino oleo. Ac si uentositate quoq; uel tormento affecti fuerint ægrotantes, dulci oleo

C  
 ci oleo dimissionis tempore lanæ tingendæ sunt. Perunctio uero ex oleo uiridi  
 adhibenda: facies quoq; aqua tepida releuanda. Tunc cibus dandus, ut alica ex  
 aqua frigida ita curata, ut sua caruerit difficultate, quod fiet ex farris tepore, aut  
 decoctione palmularum thebaicarū. Dandus etiam panis solus, aut cum eo oua  
 hapala. Itē pulres ex oryza, uel alica, aut farre, aut milio, ex paruo hyspano oleo  
 confectæ, & paruo salis grano. Vel si dolor admonuerit, adhibēda cucurbita lon-  
 gior: procurādum tamē, ut si quid partis spongia ceperit solita, damnum moderat-  
 ioni nō sit: Tunc leuiter oppresso liquore, quo folliculi reflatio fiat, erit tentan-  
 dū ne clysteris cauerna fuerit clausa. Dehinc apponenda podici fistula dextera  
 manu usq; ad eius uerticulum, quæ Græci aspidicon uocāt, impulsu leui, & neq;  
 recto ductu contra oppositas partes, neque superiora repentino, uel cum pluri-  
 mo conatu: tumores etenim exinde atq; collectiones efficiuntur. Quapropter  
 sensim, atq; paulo inferius inclinato ductu iniectio fieri debet ad illam partē, in  
 qua constitutū est os sacrū, quod Græci quoq; uocāt hieron osteon. Tunc illic  
 enim spatium latius longæonis cū appositione facta erit digitis detrahendus, quo  
 cauerna fuerat obstruā, atq; sinistra manu continēda immobilitate seruata cly-  
 steris fistula, & dextra comprimēdus folliculus leniter ac moderate, quoties in-  
 feriora intestina ulcerata noscuntur. Erit deniq; parux longitudinis, atq; altio-  
 ris cauernæ fistula procuranda, qua possit facili effusione patientibus locis medi-  
 camen tradere, ne suspensum ab hijs quæ patiuntur non solum nihil afferat com-  
 modi, uerum etiam sanis irruens officiat. Erit autē folliculi impressio uehemen-  
 tius faciendā, atq; fistula longior procurandā in hijs quibus superiora intestina  
 fuerint ulcerata, quo medicaminis liquores eō ualeant peruenire. Et hortandus  
 ægrotans, ne retento spiritu quodam recurullus referat medicamen. Ac si ma-  
 gna fuerit putredō, quam menomen appellat, non erit inmodicum etiam ex  
 utraq; parte clysteris fistulam cauernare: quā Græci amphitreton uocant, quo  
 possint medicaminum liquida per utraq; partem intestinorum lateribus adue-  
 nire: Tum cum omnis fuerit folliculus complicatione uacuatus, siue oppressio-  
 ne manus reusus, quo medicamina peruenisse sentiamus, erit detrahenda fistu-  
 la suspensa manu, & distentis cruribus ægrotantis spongiæ commodāde podici  
 expressæ ex decoctione calidi liquoris, in quo præcocta sint mala punicā, quo  
 constrictione quadam uirtutis herbarum, quam Græci styphin uocant, atq; ser-  
 uido tactu densatis partibus longæonis iniecta teneantur. Tum modico tempo-  
 ris spatio intermisso erunt etiam illa quæ clunibus fuerant supposita detrahen-  
 da. Et si fuerit æger in uentris officium prouocatus, in inferioribus ulceratione  
 constituta, & magis si in longæone fuerit perspecta, erit hortandus paulisper res-  
 tere, & iniecta continere, tangentibus nobis eadēdem partē quæ pati noscuntur,  
 quoties prouocari ægrum in egestionem medicaminis uiderimus. Ac si in supe-  
 rioribus fuerint ulcera, erunt permittendi egerere cum uolent; Etenim medica-  
 men iam recurrens atq; defluens ad inferiora, longæonem sanum inuili uirtute  
 adficiendo exulcerat: Nam quibus alienatæ sordes detrahuntur, istēdem non ul-  
 cerata uitiantur exusta, cum admota corporibus tardius fuerint immorata. Ex-  
 clusis igitur cum medicamine post sufficiens temporis interuallum muculen-  
 tis humoribus, atque ramentis, & uarijs defluxionibus intestinorum, sufficien-  
 ter operatum medicamen accipimus: quanquam non de perfecta curatione tu-  
 to pronuntiare possimus, cum sæpe ulcerationis particula in superioribus consti-  
 tuta minime ualeat medicamen accipere, & propterea non omnibus commoda-  
 ta curatione uideatur. Vel si commixtum putredini medicamen cuncta purgauerit

**A** sit, hoc adprehendimus, cum solum præter aliqua purgamenta fuerit exclusum, At si hoc egestio secuta fuerit quædam aliena, minus quidem purgata, tamen accipimus ulcera, & propterea sanitatis spem pollicentia. Item si nihil fuerit exclusum, neque ipsius iniectionis quidquam, erit credendum necessarium medicamen inhæsisse, quantum sua ualuit potentia: & propterea sui operis integrasse uirtutem, quanquam non perfecisse uideatur. Nec recte culpanda uirtus est, quæ una iniectione non dedit sanitatem, cum plenam fecerit futuræ perfectionis fidem, perseverationem sui persuadens. Vnde si omnino nullum fuerit redditum, medicamen erit impauide accipiendum: atque è contrario si eius nulla particula fuerit retenta, & statim effusum, nullum sui demonstrauerit effectum, omnia desperanda: Est enim plurimæ debilitatis, atque alienatarum, uel mortuarum partium signum. Coniiciendum præterea, ne ut sæpe contigit, uetustate medicaminum efflata uirtute nullus sequatur effectus: & propterea sicut iniecta sunt limpidè reuocentur: Quapropter etiam hoc intuendum esse mandamus. Tum post egestionem factam spongijs erit postea detergendus: Vel si nihil fuerit exclusum, interiecto spatio unius horæ perunctum reficere ægrotantem cibus congruis, atque stomacho aptissimis, ut lactucæ thyrso, uel intybo cum aceto, quod sit ex murta confectum, aut oliuis fractis uel natantibus, quas colymbadas appelliant, & ouis hapalis, & uolantibus nuper memoratis, quæ sint nutrita constrictiuis, ut murta, rosa, lentisco: Etenim eorum pinguedo sic defluxit, atque caro constrictiua sufficitur: magis in eorum pectoribus quorum plus ossibus uicina aptiora probantur: sunt enim teneriora cæterorum. Danda etiam pomorum quædam constringentia, atque olerum cocta, quorum superius, atque de alijs scribentes passionibus memorauimus, potui dabimus aquam frigidam: Quod si minime tollerauerint ægrotantes, dabimus feruentem plurimum aquam uiscentinam: Et si sine febris fuerit ægrotans, dabimus uinum exercitioris paulo uirtutis, ut supra docuimus. Omnino enim inuitantes adpetitum, siue suscitantes, quæ Græci orexin uocant, stomachi robur debemus custodire, nisi cum nausea etiam uenter fuerit resolutus. Oportet etenim curare, ne rursus plurimum cibum demus aut potum: uel priusquam solidum cibum sumperint ægrotantes bibendum credant: Nam conuenit neque grauata, neque humecta intestina seruari. Si igitur medicaminis iniectione aliquo fuerit peccato uitata, ut non omnibus adiutorij partibus informata uideatur, mox medicamenti monstrabit errorem: Nam quidam iniectione aliqua ex parte uomuerunt, aliqui stomachi ac uentris dolorem sentierunt, singultibus atque nausea affecti, cum anxietate ac siti, & immitigabili ardore, & articularum frigido torpore, & pulsu maligno, atque sudore uel defectu, aut pressura capitis, siue grauatione, quam carolus uocant: si quidem sit nimia uirtutis medicamen iniectum in febris uel uiribus uitatis, aut in alto tumoribus constitutis. Vomitus autem medicaminis iniecti si ex tumore uentris fuerit factus, uel teneriorum intestinorum, tanquam in iliaca passione, sæpius ægrotantibus intulit mortem. Si autem nullo tumore subiecto fuerit effectus, ingerit uexationem atque metum: Aut ut sæpe contigit passionis significat depulsionem: Siquidem nulla pars ulcerum in intestinis à medicaminis contactu uideatur immunis. Tardante passione etiam re corporatiuis conuenit uti rebus. Quapropter oportet ea quæ feruntur per uentris officium celeriter auferre, & ora ægrotantium spongijs ex pulsa frigida siccatis reficere, articulos ligare, & stomacho cataplasma constrictiuum imponere, quod diadaphnidon dicunt, uel simile uirtutis. Oderaamenta quoque resumptiua adhibere, & frequentius cibo nutrire ex supradicta

**C** materia. Ac si accepta non tenerint, erunt secundo offerenda, adhibita articu-  
 forum fricatione, cucurbita ori uentris infixa: uel si potuerit etiam à tergo inter  
 scapulas. Ac si dolor occurrerit & singultus ob ardorem atque sitim, fomentis  
 utendum est, & cataplasmatibus, & spongiarum uaporatione, & olei iniectio-  
 ne, quo possit medicaminis uexatio celerius obtundi. Perseuerante incendio,  
 etiam calida, & oleo, & lacte sunt iniectendi: Et si nulla fuerit humoris signifi-  
 catio, eorum frigidus adhibendus est usus: & ob mitigandam sitim iugis adhiben-  
 da oris collutio: dandus interea potus. Item propter articulorum frigus adhi-  
 bendi tepores cum blanda manuum tenacitate, quam diacertosin uocant, item  
 unctio: Sudores autē si ex pressura fuerint apparentes, erunt detergendi ex dia-  
 phoresi, & asperginibus cohendendi, & congruo cibo, & cæteris quæ de caroti-  
 cis scribentes docuimus: quibus depulsis, hoc est, presentibus periculis eua-  
 dentibus ægrotis, si forte rursus in priscam dysenteriam uenerint, erit tentandū  
 multo tempore simplicibus uti iniectionibus, hoc est, hijs quæ sine calce, quam  
 asbeston uocant, uel auri pigmento, quod arsenicon appellant conficiuntur.  
 Tum si perseuerauerit passio, ad uehemētiora transeundum, sed ex simplicibus  
 rebus confecta, sollicitam habentes calcis, uel auri pigmenti iniectionē: Opor-  
 tet enim putredini etiam cataplasmatibus occurrere: quorum sunt erui pollinis  
 pusca decocti, & lentiscinum oleum acacia immixta, donec mellis sumat crassi-  
 tudinem, Item lenticula molita, cum melle, uel rosaceo, uel lentiscino oleo de-  
 cocta. Ac si putredinis causa sanguinis effusio fuerit consecuta, erunt spongiæ  
 expressæ ex aceto calido pubetenus, uel sub umbilico & coxarū summitatibus,  
 quas Græci ischia uocant, admoendæ: dehinc h̄sdem locis etiam cucurbitæ fer-  
 uefactæ adfigendæ, articuli ligandi, danq̄ digestibilis cibis, & qui facile cor-  
 pori insinuetur: Tunc uinum quod sit præcoctum in cortice mali puncti. Inij-  
 ciendum autem acetum, nunc solum, nunc cum thure masculino, uel eius manna  
 contrita, uel quod ex confectione superat diatheon emplastrū, cum sibi eius ma-  
 teriæ misceretur. Imponenda etiam similis uirtutis emplastrā, uel acacia aceto  
 soluta: Tunc donec scatere tenet coquenda, aut in amplo mali puncti cortice  
 supra tepentem cinerem sensim calefacienda, & ex ipso liquore partes contengi-  
 dæ. Dehinc cerotaria apponenda ex oleo murtino aut melino, aut uiridi contri-  
 ta acacia atque consoluta, uel ex omphacino, aut cenanthino, cum ruta aut ba-  
 laustio, aut aliquando hijs omnibus: uel ut Themison composuit, acaciæ partē  
 unam, rosæ aridæ partem unam, ammoniac guttæ partem dimidiā, ceræ par-  
 tes quatuor, & olei rosacei quod sit sufficiens. Hæc contrita in uino amineo,  
 & soluta cera cum rosaceo oleo miscenda: Ac si sanguis fuerit retentus, quod  
 fiet aliquando cum gelatur, aliquando densitate putrescentis uenæ, erunt dicer-  
 endæ causæ hoc modo: Nam densatam intelligimus uenulam, quoties pulsus  
 exurgit, atque frigus corporis resumpro feruore miscet, ægrotantis animus  
 melior, atq̄ spiratione corpus facillime releuatur: Ac si gelatus obstiterit san-  
 guis, quod Græci thrombosin uocant, & propterea fuerit fluor celatus, supra-  
 dictis contraria sequentur, ut pallor, iactatio, pulsus paruitas, uel amputatio,  
 quam Græci asphyxian uocant, grauedo, inflatio, frigidus torpor pubetenus,  
 ac paulo superius: tum defectio cum sudore. Quapropter erit acetū iniectio fa-  
 cienda tunc cum fluor fuerit abstinendus diurnis diebus cibo reficiendus æ-  
 grotans. Si autem plurima ex parte retenta putredine parua excluderint ægrotan-  
 tes, quæ sint sanguinolenta & ramentosa, & propterea profectu apparente me-  
 lior esse curatione, adiuncto tamen metu ne retenta soluantur, oportet etiam

διὰ τῆς τῶν  
 ἀκροπόρων  
 βαρύνει

Calce  
 asbeston

ischiæ  
**D**

Vinum ami-  
 neum.

σφύβωσι-  
 νεργία.



**A** secunda uel tertia die eundem trochiscum iniicere, sed solita, uel certe succum plantaginis, aut acacia cum aqua. Sin uero quibusdam diebus sine officio uentris fuerint  $\alpha$ grotantes, ac rursum iniectiōibus asperati, consicimus in hijs non cicatricem ulcers factam, sed medicaminum supraducto cortice fuisse obrusa: & propterea post effectum uentris nuda atque sordidata, rursum humorem fluere ordinabimus. Item tribus diebus lenticulæ coctionem crassioris succi iniiciendum: Erenim intestina ui propria medicaminis coercerunt, quam Graeci styphsin uocant, & ulcerum mitescit asperitas, & ex anterioribus medicaminibus facta conglobatio, siue cortex in saniem protocatus cadit, & subiecta ulcera in cicatricem uenire coguntur. Ac si plurimo tempore ulceratio perseverauerit cum corporis debilitate atque fastidio, erit frequentia medicaminum euitanda, siue iniectioum, siue potionum: Maior enim ex ipsis uexatio fiet, cum cibi appetitus extinguitur, & in fastidium ueniunt  $\alpha$ grotantes, nisi parua insectorum multis fuerint consuetis admixta. Decoctionem autem lenticulæ secundo uel tertio per singulos iniiciemus dies: Ex ipsa enim sufficienter intestina coercerentur, & latenter corpus nutritur, cum quadam particula digestionis usurpata uiribus profecerit  $\alpha$ grotantis: Tum cum limpida ulcera senserimus, erunt cohibenda ea quæ uehementius conficcare ualeant, quæ Graeci styphonta uocant, & iniicienda medioariter consringentia. Ac si quisquam eorum non tulerit uirtutem, erit diachylon medicamen oleo roseo soluendum, ac diligenter liquefactum iniiciendum, uel plumbeo mortario plumbeo pistillo circumducto immisso oleo rosaceo conterendum, donec in succum ueniat, atque crassius fiat. Horum quoque similibus utendum monemus. Tunc uino leni, atque carne uolantum uel marinorum utendum, ut squillæ, mulli, carani: & pro modo uirium gestatione resumptōnis causa. Dehinc cum omnia tuta uiderimus lauacrum adhibemus: sed non propter, & magis cum forte iniectio fuerit facta trochisci, nisi primo uentrem egresserint  $\alpha$ grotantes. Tardate passione superpositionis tempore iisdem uti conuenit. In lenimento uero erit fortificatio adhibenda corporibus per uariam gestationem, & uocis atque corporis exercitium. Post singulas egestionem adhibenda ex oleo & aqua calida, & decoctione lini feminis, aut foeniculi, aut maluæ agrestis, iisdem partibus, hoc est sessioni, quam Graeci hedram uocant, & specialiter admoenda uaporatio ex pollinibus cataplasmate calido, uel sacello. Dehinc etiam radix agrestis maluæ decocta atque contrita, & calida testa calefacta erit apponenda. Ac si iugis fuerit dolor, immittendus digitus usque ad altiora, praunctus adipe asserino cum foeniculi femine cocto atque contrito, aut aliquo medicamine ex hijs quæ appellamus lypara. Ac si hæc minime fuerint inuenta, erit hoc cerotario faciendum simpliciter atque limpidum: Et cum tempus cibi dandi occurrerit, adhibenda perunctio strituræ congrua. Tunc nutrimento dandus panis ex aqua calida, aut alica lota, aut pulicula ex melle confecta, aut oua forbilis cum pane. Potui autem aqua calida offerenda. Perseuerante autem tumore, adhibenda cucurbita adiuncta scarificatione locis tumētibus, & uaporatio spongiarum: Declinatione occurrere adhibenda cerotaria, & resumptio cauta: sic enim sedantur iuges egerendi uentris delectationes, um tumor mitigatione conuiescit: Atque ille qui putatur reumatismus indulgentia tumentium facilius abstinetur. Ac si æqualis tumori fluxor occurrerit, utriusque erit consicienda curatio. Quapropter si fomentum ex oleo hispano, uel melino, aut murtino, aut lentiscino adhibuerimus, & cataplasmata erunt ex aceto atque melle, uel stymmatibus præinfusis coquenda. Item

sili-

sugra-

sily-

Lypara mediciamina.

Stymmat.

C præscriptis iamdudum iniectionibus concoquenda quædam constrictiua, ut murta, uel rosa, aut mala punica: lacte autem & cæteris admiscendum amy- lum, & enatis matibus aliqua decoctio stymmatum adiungenda, aut mali puni- ci, & apponenda rursum sessioni uaporatio stymmatum, aut cantabri conligati, uel in aceto decocti, uel quam omellin uocant, ex pollinibus panno conligatis, at- que ex stymmatibus cõfectis: Perungenda etiam digito interiora longæonis ex cerotario oleo roseo confecto, aut adipe cum oleo roseo. Tunc post perun- ctionem ora lauanda aqua tepida: cibus dandus pulcrita calida, ut de uentricu- loli scripsimus, quos Græci coeliacos uocant, ex alica uel farre, aut oryza, aut milio, aut olyra, aut pane Alexandrino: Hæc singularia, uel aliquando amy- lo admixto, aut lacte, aut melle ex fauo expresso. Potus paruus dandus, sed calidus: Tum effecta reclinatone resumptio adhibenda. Ac si solutio fuerit ur- gentior, uel sola, frigidus conuenit locus ægrotanti, & supina iacendi positio, paulo leuius capite locato, & suppositione lanarum, clunes in inferiores lon- gaonis partes subleuandæ. Adhibenda etiam requies, & impressus articulis ma- nuum amplexus, uel ligatio paulo tenacior. Deponenda etiam omnis animi intentio, & magis cogitatio passionis auertenda: Admonet enim egestionem, ac prouocat inquietudinem in memoriam reducta conscientia. Erit denique persuadendum, ne quoties fuerint ægri in egestione commoti, ilico uentrem facere festinent, sed quantum potuerint resistendo differant motu: Fit enim quædam meditatio, atque frequens egerendi consuetudo, & oportet effugere laborem motus, ac nutandi corporis frigus, nisi forte acrior, aut incendiosa sit erit defluxio: Retenta enim sessionis in locis, quam Græci hedran uocant, lon- gaonem exurit. Conuenit denique si possibile fuerit ægros ad sessionem ege- stionis deportari, aut humilius è lecto scaphia posita ad egestionem producta- ciendam. Veli plurima fuerit corporis defectio, qua iacentes non ualeant su- entia retinere, erunt egestiones spongij suppositis excipiendæ, & medijs parti- bus apponendæ lanæ, nunc oleo constrictiuo præinctæ, uel decoctione buxi, uel murte, aut mali punici, & horum similium stymmatum, uel succorum con- stringentium, nunc asperso ruthergerinario, quem Græci byrsodepicon uocant, uel trita galla erunt media siccanda: hæc enim constrictionem sine ullo frigore fore promittunt. Dehinc apponenda ex palmulis epithemata, & malo cydo- nio, & balauitio, & alumine, & horum similium, sicut de coeliacis, uel sangui- nem spuentibus, aut stomachicis scribentes docuimus. Inijciendus etiam per- clysterem succus plantaginis, aut polygoni herbe, uel intybi, aut uix lupinæ, aut herbe caricaræ, uel semperuivæ, aut mespilæ, malæ, aut oryza, aut decocti- one mali punici, uel eius caduci, quod Græci cytinonrhoas appellant, nos am- pullagiū. Et aliquando hæc ipsa erunt cõterenda, uel rosa, aut rubus, quam Græ- ci bathon appellant, aut lentiscus, aut galla, aut thallia, aut rubi uirgulta, uel uti- tis anuli, quos helicas uocant, aut salicis folia, aut ex uino buniro hijs qui sine fe- bri adiciuntur: ex aqua uero hijs qui febricitant. Item ros syriacus, aut ompha- cium, aut acaciæ succus, uel hypocystidos herbe, aut balauitij drachmæ duæ, in- quatuor uel quinque cyathis coniiciendæ: Est enim ea quætitas iniectionis re- dundans, hoc est, siquidem plurima grauedine quadam prouocet uentrem. Item lenticulæ decoctio, aut licium indicum cum lacte. Sint autem amyli dra- chmæ quatuor, licij drachmæ duæ, lactis cyathi septem uel octo: Extendenda enim hæc singula atque minuenda sunt pro magnitudine solationis, ac uirium ægrotantia

Proposuit inop.

Uirum p̄or.

Uirum p̄or.  
Uirum p̄or.

agrotantis. Ac si plurimus fuerit in ulceribus sensus, ut medicamentum constrictione laeſa indignantur, erunt iniicienda ea quæ cum dulcedine admota partes ualeant praſficcare, quo neque ulcerationem prouocemus, neque fluxum negligamus. Ex quibus est in febricitantibus succus priſanæ cum adipe caprino, contrito atque commixto tracanto, uel gummi, aut argillirici radice. Sed illa duo infusione præmollienda: radix autem coquenda, aut rosaceo oleo ouum commixtum, aut lac coagulatum, uel cum amylo concoctum ad tertiam partem. In hijs uero qui sine febris fuerint, passum conuenit Creticum, & uinum squilliticum supradictis speciebus. Tum refectionis tempore unctio adhibenda ex oleo hispano, ac deinde ora lauanda pusa tepida. Cibus autem specialiter, ut in coeliaciis ordinauimus dandus. Similiter etiam potum conuenit dare. Lac quoque bibendum præcoctum, quod appellant diacoleon, siue singulare: Etenim fluores crassificando cohibet, & ulcera deterget, & acrimoniam humorum temperat, & sine ullo labore corpora nutrit. Est autem coctionis hic modus: Lac sumendum ex agresti pastu perfectum: Etenim in ciuitate nutritorum animalium reprobamus: siquidem capræ est salisore pascua sitientes plurimum atque coadueruatum bibant, & multum lac, sed aquatum faciant, quod est coaſtrictioni uentris incongruum. Quapropter magis ex caprea, quæ lentisci pascua, uel muræ, aut rubi, aut uitis folijs, uel quercus, aut salicis, uel hederæ, aut terebinthi, aut herbæ calicaris, uel polygonij, aut plantaginis, & horum similibus fuerit nutrita, erit lac accipiendum: Confluxit enim constrictiua qualitas herbarum in lactis qualitatem: Nam saepe diagridium, uel helleborum mandentes purgatiuæ uirtutis efficiunt lactem, sicut procolum comedentes lac generant, quod uisum præstet accipientibus abunde. Denique erit primo probandum, atque eligendum quod sit albidius, atque sine ullo odore, & neque globosum, hoc est, frustis coagulatis uariatum, quod Græci thrombodes appellant: neque in urina similitudinem mutatum, quod ipsæm uroides appellant, sed quod possit unguibus destillatum manere sua tenacitate collectum. Boni igitur, ut diximus, lactis quatuor uel quinque sextarios oportet in uas fictile mittere siue æneum, immittendæ & cochleæ, quas nos lapides marinos, uel fluminales accipimus, non marinæ igitur ob salitatem, sed fluminales inustæ: primo quo sint igne pellucidæ, tum auferendæ: & ex sufflatis omnibus, quæ de se forte dimiserint, ac depurgatis supradicto uasculo immittendæ, ac ferulis lac cum ipsæm cochleis mouendum, donec ad mediâ ueniat partem, siue tertiam: Dehinc reſuso lacte proiciendæ priores cochleæ, atque aliæ innouandæ similiter exustæ, sed per profectum numero, atque forma minores longa per interualla. Hæc confectio lactis diacoleon appellatur. Sine hijs uero confectio erit longe simplicior, quâ Græci aperiergon uocant: Vas enim lactis erit imponendum igni molliori, & immissa ferula metienda mensura totius ac dimidia, & tertie quantitatatis, quo non coniectura, sed uera dimensionum coctionis quantitatè sumamus. Tunc ipsa ferula circûlato ductu mouebimus coquētes, ne lateribus uel fundo iugi mansione insidant: Dehinc ultimo coctionis tempore plurimus detrahendus est ignis, & cū ad partem dimidiâ, uel tertiam uenerit, erit in aliud uas refundendū, exinde agrodandū, non frigidum, sed leuiter gelatum, quod galactodes appellant. Ac si forte stomachi fuerit euerſio cōmotacum accipere agrotantes horrescunt, erit frigidum dandum, præfecto uasculo niuisibus: Ut enim mel decoctum sit constrictium,

οἶνος κρηθιται  
105

Lac diacoleon.

Lac caprinū.

Lac  
θρομβῶδες  
αυροιδες

Cochleæ lapides.

Lac  
απειριεργον

γαλακτιδες

**C** sic etiam lac deposito atque excocto tenuissimo liquore, quem Græci orrhon appellant, & uapore concepto constrictiuum fieri necesse est. Conuenit denique etiam supra dictus ex regula motus. Est enim uirtute constrictiua, & sui corporis raritate, tenuitatem lactis, uel aquatum à liquore ebibens. Accipere autem ægrotantes debent pro passionis magnitudine, & sumendi uoluntate, quam Græci orexin uocant, quidam plurimum, quidam paruum, & primo ex ea decoctione, quæ sit ad dimidiam partem redacta. Tum ex ea quæ ad tertiam uenerit partem: siquidem sit paulo plus constrictiue uirtutis. Sed erit eius usus comparatione prioris minuendus. Tunc post bibitum lac nullum potum sumere debent ægrotantes: Est enim ratione carens lac decoctione constrictum, supermissio liquore in aquam uertere. Præterea in hijs qui sufficienter, uel quantum uoluerimus sumperint, nihil erit omnino superdandum: Hijs uero qui minus accepisse uidebuntur, sicut de coeliacis ordinauimus, erit superdanda pulchra ex lacte confecta, ut destinatus impleatur modus. Tunc post intermissionem mediocrem si quisquam nauseauerit, erunt danda mali punici grana, uel acinæ uuarum siccarum, quas fabriles appellant, aut mespila, uel sorba. Quidam igitur primam decoctionem probauerunt secundæ præponendam: Si quidem lac in semet uelut calcis qualitatem accepisse uideatur, qua possint putredines ulcerum abstineri. Alij uero secundam magis probauerunt, quibus etiam nos consentimus: Non enim admixtæ supradictæ qualitatis causa est abstinenda passio: Potest enim etiam quiddam calcis uiuæ, quam Græci asbeston appellant, lacti admisceri. Sed est incoctio siue infusio aquosi liquoris, quo amisso uisceriosior lactis qualitas fiat, quæ neque curiosa confectio, neque nidorosa, uel fumosa sufficitur, si simplici coctione fuerit procurata: Cum enim lac se à suo humore separauerit, quam Græci orrhon appellant, crassius effectum ac uiscosus insidens uentri, atque intestinis, & multo tempore immoratum liquida conrassat, & ulcera mitiganter amplectitur. Item alij tertiam partem aquæ lacti miscentes decoquunt, adferentes quod sit decoctio melior, ne ullo nidore siue fumo, aut uisione lactis natura uisitetur, ob aquæ admixtionem. Hij autem si usqueo coquendum iubent, donec ad modum præmixti redeat lactis, qui fuerat priusquam aqua misceretur, & liquidius conficiunt, & non sine suo naturali liquore, quem Græci orrhon appellant, ægrotantibus dabunt, præsertim lactis quantitate seruata. Sin uero ad partem dimidiam uel tertiam decoquent, non solum plurimum decoctionis tempus insumunt, uerum etiam tarditate coquendi diutina fumosum faciunt medicamen. Hæc sunt quæ in ipsorum erroribus respondemus: Eius autem datio erit discernenda: Nam primo gelatum bibi debet siue tepens, quod Græci galactodes appellant: tum feruens. Sed cum primo fuerit profectus aliquis ex ante dato: Hinc enim perfecta passionis fiet absentio. Ac si quisquam ægrotantium lac sumere noluerit, aut horrido uisu, aut stomachi supinatione recusans, erit alijs adiutorijs adiuuandus. Et si ulcus fuerit in superioribus ac densioribus intestinis, utendum medicaminibus potis, quæ Græci anoterica uocauerunt: Etenim quæ inferioribus clystere iniiciuntur hæc magis patientibus aptanda sunt locis. Et cum cibi fuerint adperentia seruati, nec ullo fastidio ægri uidebuntur adfecti, erit medicaminum consueta magis eligenda materia: ac si fastidium fuerit, sola probanda. Sed eorum compositionem atque ordinem ex hijs quæ de coeliacis ordinauimus sumi mandamus. Licet præterea cum hijs etiam acacis, uel cœnanthes ex aqua cisternina contrita, donec collyriorum faciat crassitudinem,

Calc  
æstos.

D

Medicamina  
æstosia.

**A**line rotundata frusta dare bibenda, aut resoluta cum uitello oui assi in quantitate dimidij cochlearij, aut aqua resoluta: in hijs qui febre afficitur tribus cyathis: in hijs uero qui sine febris sunt cum uino erit offerendum. Præterea communiter etiam hæc quæ sanguinem expuentibus dantur probamus: Quorum est succus plantaginis, uel una die ac nocte rhus syriaci infusus uino uehementiori: Quo detracto oryza immissa uino coquemus: Dehinc lenticulæ pulmentum decorticatæ atq; subassatæ in pulciculæ modum conficere. Item oua acetocotta, uel ouorum uitella, quæ sint carbonibus assata. Item decoctio ex plantagine, aut agresta, & intybo, quod cicorion Græci uocant. Sed hæc singula erunt duplici coctione curanda: Nam post primam coctionem erunt in aliam aquam transferenda cum alijs nondum coctis: Quorum coctione perfecta priorum secundum probamus effectum. Erunt præterea hæc condienda oleo uiridi, & aceto, & paruo sale, uel quod est melius, rhus. Et si sordidum tardauerit ulcus, iniectione mulsi perseverandum probamus, nisi solutio fuerit adiuncta: Vel decoctione mali punici etiam, si crebræ tem poraliter uentris egestiones: quæ quidē erunt terenda. Item corticis pini, aut subassatæ interioris tunicæ, siue corticis glandis, quam sardianam uocant, aut pulenti, aut cuiuslibet materiæ uehementius astringentis. Ac si quisquam harum uirtutum recusauerit usum, horrens oblatæ, siquidem sensu torqueant acriore, erunt hæc mellis decocti atque durati latitudine cingenda, quo sub dulcedine lateant acriora, & nihil eorum uirtuti derogetur: siquidem etiam mel coctum constringat. Item malorum puni-  
**B**corum trium mediæ magnitudinis corticem sumētes, admixto uino lymphato, hoc est, aqua temperato coquemus, in hijs qui sine febris afficiuntur, uel declinante causa melius habere uidentur: Cū cisternina uero heminas sex, quæ cotylas Græci appellant, in hijs qui etiam febris afficiuntur, donec ad tertiam partem liquor deueniat. Tum ex ipso duos uel tres cyathos ante cibū dabimus ægrotanti, uel eadem mala omnia contusa atque colata, uino aut aqua immixta erunt offerenda non plus cyathis duobus. Item mala cydonia cum malis punicis decocta in uino dulci, aut squillitico, tunc frictione siccata atque crassificata cum lacte dato conueniunt, uel aquæ cyathis sex. Item ges after cum aqua ducta curationi conuenit. Alia quoque plurima simillimæ uirtutis infinita specie concurrunt. Item cibo danda alica cum uino melino aut murtino aqua temperato. Tunc plurimo profectu accedente dandi turdi, atq; pulli gallinacii, uel columbarum atque uolantum quæq; sicciora, ut phasiani pectora, uel perdicis, aut attagenæ agrestis: Quæ singula erunt postea apte coquenda, aut mediocriter assanda, ne lignosa fiant, & digestioni officiant. Aliquando etiam erunt hæc ante mala reclusis pectoribus uirgultis murtæ penetranda, aut eis magis replenda. Tunc mediocriter coquenda, ac deinde farina conspersa tegenda, & cinere calido maturanda. Item maritima quæ sunt densioris carnis. Agrestium quoque, hoc est, leporis uel capræ conueniunt pulmenta, uel pomorum, quæq; uiuida uirtute constringere ualent, ut mala cydonia cocta uel assata. Item pira, sorba, mespyla, quæ nodum fuerint maturitate dulcia, pruna agrestia, mali punici grana cum exterioribus membranis exicata. Itē uua, & magis sumi uapore siccata, quam fabrilis appellant. Omnis præterea cibus erit diligenter masticatione exercendus, quo digestibilis fiat, ne uenter debilitate segnior plurimo labore nixu appropriando corpori quæ sumserit. Melius autē partibus erit apponendum diatheon medicamen, & omne quod fuerit siccatum malagma, uel aceto confectum. Tunc etiam uinum dandum, quod fuerit natura plurimum constringens,

Sardiana

Uua fabrilis

*Vina Italica  
cōstringentia.*

**C** gens, ac pro regionibus cognitum, ut in Italia Prænestinum appellatum, uel Surrentinū, & magis Signinum ac Marficum: Ex quo oportet etiam alicam myrocuratam dari. Ac si forte hoc uini genus minime fuerit repertum, erit quiddā aquæ calidæ admiscendum, quod eandem ualeat imitari uirtutem, ut haponticum, uel illud quod Græci appellant inter corticem quercus inhærens, perierā neruorum fila teneriora. Item rhus linteo ligato, uel galla uiridis, quæ appellata est omphacine, aut uitis amyli, quas elicæ appellant, aut uirga rubi, aut cerasia, aut mala punicæ, aut fabæ græcæ folia: Non hæc quidem erunt iugiter adhibenda, sed medicaminis uice. Tunc apparente magis profectu adhibendum lauarum, & corporum motus per gestationem, uel deambulationem insinuandus. Ac si passio perseverauerit transacta superpositione, erūt iisdem quæ supra memorauimus resumendi ægrotantes, adiecto uocis exercitio cum corporis uehementi defricatione, & magis uentris in locis. Item cycilus iuxta regulam, quæ aut qualitatis solius habeat ductum, ut æquali quantitate seruata descensus uel transitus ad parui nutrimenti mutationem ueniat, ut à tardis uel paruis uolantū animalibus ad palumbos uel perdices, & hijs similia. Aliquando per quantitatem solam, ut eodem pulmento seruato, exempli causa, perdices, & paruo modo ueniant ad plurimum. Tunc erunt utraq; iungenda, ut etiam qualitate ac quantitate uariatus formetur cycilus, cum uires ægrotantis ualentes uiderimus. Quo modo autem initium sumendum sit, uel panis fieri partitio: uel quia in pulmentorum mutationibus uinum uel lauacrum detrahimus, ex iam dudum dictis accipiendum probamus: Sed lauacra rara atque calida magis inuenimus aptissima. Tum confirmato corpore, ac resumptis uiribus uomitum cōuenit adhibere:

**D** & primo ex simplicis potu, secundo ex radicibus, quo partititer locale adiutorium uentri præstemus, & quodam uehementi motu, ueluti purgatione per uomitum effecta, omni impedimento digestionis officij liberetur. Tum transeundum ad mediæ qualitatis pulmenta, & cætera cyclorum ordine suo reddenda usque ad porcinæ pulmenta. Itaq; agre stium, hoc est, leporum atq; capræ danda iam dudum docuimus. Dehinc adiungenda drimphagia, quæ sine uomitu erit adhibenda uno uel duobus diebus, ac deinde cæteræ cycli partes integrandæ. Conuenit præterea oliuas nigras aceto decoctas, cum mali punice cortice contritas, admixto pipere albo, & oleo hispano modico, atque recentij ieiunio ægrotanti dare: nunc nulla addita specie, nunc adiuncto pane. Ordinanda etiam cætera resumptiua atq; recorporatiua uirtute medentia, ut gestatio uaria, deambulatione, uocis exercitium, perunctio, defricatio, quæ nunc exercitij tempore, atque unctio nunc arido uel sicco erit aptissima. Item sicca cibatio, & cucurbita recorporatiua uirtutis secundum medias partes, dropax illitus usque ad uentris cōfinitia atq; uerteborum, psilothra, sinapisini, & paroptesis usque ad cutis ruborē, cum defricatione ex oleo atque nitro. Item arena sole ignita, acopa acriora, ut ex euphorbio, & opobalsamo, & simili uirtute medentibus confecta. Item magma secundum uentrem, quod appellatur diatapsias, uel diacapaneos, & diaeuphorbium, & aliquando parua sumptio medicaminis poti, quod appellamus diatrion pipereon. Et sunt hæc cuncta medicaminum libro conscripta Responsionum. Item peregrinatio atque natatio maritima, & naturalium aquarum. Ac si fortificatum corpus rursus fuerit humoris fluore tentatum, quod Græci reumatismum uocant, conuenit hellebori dati decocti, uel radicibus inserti, quod cataplaston appellant: Dissecat enim corpus, & quadam nouitate confirmat. Culpandi præterea etiam nunc ueteres medicinarum conditores:

*Rotantur ueteres medici.*

Hippocrates

**A** Hippocrates enim libro quem ad sententias Cnidias scripsit, helleborandos principio ægros ordinauit, ultimū adiutorium cæteris anteponeus. Dat præterea panem ita curatum, ut neque ab hominibus recte ualentibus posse digeri facile uideatur. Item pulentum, atq; fœnigræci semina, cum sint hæc qualitate contraria; alia enim astringunt, alia relaxant, & nulli adiutorio tempus adiunxit. Diocles quoq; libro quo de passionibus atq; causis, & curationibus scripsit, prouidens siccandum corpus uisceribus medicaminibus, utendum iubet quibus non solum humor uentris siccarari minime posse perspicitur, uerū etiam uesica in morbos cogi inuenitur. Item Erasistratus tertio libro de uentre prohibet cibos digestibiles ac nutritibiles, æstimans hæc facile posse corrumpi, nō consiiciens quoniā omni ægrotanti digestibilium rerum usus conuenire perspicitur: quo minime & in laborē mediæ partes, quibus digestionis celebrantur officia, cogi uideantur officia. Prohibet præterea specialiter lenticulam, atq; mala cydonia, & si quæ similibus fuerint uirtutis, quo una uoce omnem congruam uideatur recusare curationem: Nutribilia etenim, quæ ob resumēdas uires principalē tenuerunt locū, superfluū est, ut æstimat, adhibere. Lisius etiā quarto libro Tardarum passionū principio adhibendum uomitū post cibum probat. Sed cum noua ac recens in corpore fuerit passio, sine dubio dupliciter nocens: primo quod intemporaliter, etenim nouellæ passiones suauis quodam, & non agitatione uehementi sunt de pellendæ: dehinc quod incongruæ, si quidem sit uomitus post cibum grauabilis capiti. Inquit præterea: si humoris perseverauerit fluor, atq; longō tardauerit tempore, & typico motu uentrē fecerit humectari, occurribus periodicis tribus uel quatuor interpositis diebus uentrem conuenit prouocare. Vnde plurimi etiam **B** lac offerendum probant, quod schiston appellatur, siue catarticum, quo in acutum potius, ac periculosum ueniant morbum: & exinde possit medicina tanquam celerem facilius curare passionem.

Hippocrates.

Diocles.

Erasistratus.

Fortasse Lusi  
suis legem  
dum est.Lac  
αχις

## DE VENTRIS DEBILITATE. CAP: IIII.



**I**am hoc quidam symptomatis genus, quod nos accidens appellare poterimus, scripserunt: & aiunt debilitate uentris accipitum cibum plurimo tempore in eodem permanere: aliquando corrumpi; & magis cum intestinum, quod Græci nestin uocant, fuerit quoq; debilitate uitiatum. Fieri etiam inflatione secundum uentrem existente, attestante paruo dolore & rugitu intestinorum, quem borborismon uocant, cum plurimo sputo ac ructatione iugis. Sed erit accipienda curatio ex hijs quæ cum dolore, atq; intestinorum tormento ægrotantibus adhibenda scripsimus.

vbi

Borborismon

## DE VENTRIS TUMORE AC DURITIA

&amp; uentositate, inflatione, ac saltu CAP: V.



**I**vmorem uentris extantia sequetur secundum præcordiorum media, resistens atque dolorosa, attestante feruore & iugi saltu, & aliquando febricula, cum fastidio & siti, anxietate, & inactione. Sequentur etiam uigiliæ, & cibi corruptio. Sed discernitur à superiorum tumore, hoc est peritonæi, siue cutis superpositæ. Primo quod transuoratus cibus uelut percussum præstet circa stomachi finem, uel uentris initium. Secundo quod adducta cutis digitis, conduplicata sequatur: Duritiam uero uentris sequetur extantia, plurimum resistens sine ullo feruore atque pulsu, uel dolore, sed sola spiratione difficili

peritonæi

&amp; dige

**C** & digestionis impedimento parvissimo. Item uentositatem sequitur tensio cum rugitu intestinorum, quæ facile relaxetur, ac rursus colligatur: Et si palma fuerint partes pulsatae, ut tympani resonum fingant: impressæ uero recessum faciunt tardum, & detracta manu facilius surgendo concaua repleant loca. Inflationem uero, quam Græci œdema uocant, sequetur extantia partium. Sed facile atq; plurimum impressioni cedens, & neq; tympani resonum fingens, neque feruoris ingerens sensum. Item saltus commotos iugis sequetur, sicut etiam cor salire perspicimus, cum nimio uel timore, uel gaudio afficimur. Sequitur etiam sensus tanquam uolantis interius ab hijs omnibus, attestante inani tussicula longa per interualla, & thoracis pungente tensione: Sed erit accipienda curatio ex hijs quæ de strictura stomachi conscripsimus.

## DE DYSENTERIA.

## CAP: VI.



**D**ifficultate officij passio nomen accepit dysenteria. Est autem intestinorum reumatismus cum ulceratione. Sed fit antecedente fluore, quem Græci diarrhœan uocant, aut cholera, aut tumore uentris. Et est difficile celer, frequentius tamen tardans passio. Sequitur in passione constitutos muculenta uentris egestio, atque è ramentis innexa, & humore crasso: primo cum naturalis intestinorū defluit corpulenta soliditas: dehinc uaria, atque sanguinolenta, & fellofa, aut saniosa, atq; feculenta, aut cū gelati sanguinis corpufculis, quæ thrombos appellant, & liuida, aut carnosa, & membranis plurimæ longitudinis innexa, attestante graui foetore, cum dolore ulcerum, & fastidio, & siti, atq; interiorum ardore. Sequitur etiam uigilia, & aliquando febricula, anxietas, iactatio, hebetudo, & aliquibus intestinorum rugitus, & tensio cum uentositate, & impedimento urinæ reddendæ. In quibusdam etiam uomitus, & saltus præcordiorum, aut torpor frigidus, lingua humecta, aut plurimū sicca, aut aspera, colore cinereo, aut liuido. Item corporis defluxio, & accepti corruptio cibi feruens, cum iugi atq; incessabili egerendi uentris desiderio, & in eadem admonitione mordicatio intestinorum omnium, uel podicis, aut uicinarum partium. Fit autem ulceratio aut in tenuissimis intestinis, ut pyloro, nestidi, typhlotero: aut in crassioribus, ut in colo, uel longaone; In omnibus enim eodem tempore fieri, uel esse ulcerationem minime posse accipimus: siquidem mors præueniat ægrotantes. Interioribus igitur intestinis factam ulcerationem adprehendimus ex doloris sensu supra umbilicum constituto, siue ex eodem loco initium fumentem, & egestionibus uentris semper tenuissimis. Ac si in crassioribus intestinis fuerit ulceratio constituta, sensus doloris secundum umbilicum efficitur, & egestiones uentris carnosæ apparebunt, & frequenter coagulata magis atq; coacta stercora egerentur, cum solus fuerit passione longao uexatus, & magis eius inferiora: Præuenit enim, atque non finit cibi digestionem in stercoris uenire qualitatē. Aliquando deniq; ultimo egestionis tempore ulcerū tactu sanguinatio fiet, ut guttarū distillatio appareat, & insignia teneſmi demōstret. Quod iuxta sessionis finem, quā Græci hedran appellant, longaonis pars ulcerata intelligatur, manifestis atque promptis concurrentibus signis: Nam delectatione frequenti ægrotantes afficiuntur uentris egerendi, atque ipsa egestio cum quadam uoluntate, & labore nimio efficitur tensio clunium, & peccinis pubetenus cum sensu, tanquā quiddam corporis solidioris inesse putetur. Ipsa quoq; stercora, uel eorum egestio parua, atq; leuiter muculenta uideatur.

& humore



**A** & humore crassiore cōfecta; Excluduntur enim primo pinguis, dehinc sanguinolenta cum stercore coagulato. Nos deniq; tenesmon dysenterix adiungendā probamus: siquidē sit ulceratio partis intestini, nisi quis uoluerit ante ulcerationē solum tumorē appellare tenesmon: quod est quidē inconsequens omnium scribentium ductus, quibus tenesmon necessariō fuit prouidendus, ut sola proteruitate medicamina pota danda alacri temeritate confingant: sed etiam nobilium multi, ut Diocles libris quos de passionibus atq; causis, & curationibus scripsit, lacordinat cum melle bibendū, uentrem prouocās in fluorē. Item murrhā cum ouis atq; uino cōmixtam, cū necessariō sto machū murrha euertere uideatur. Itē utitur ptisana cū adipe sorbēda; Itē galla cum opio, neq; discretione qualitātū, neq; temporū memorans usum. Praxagoras libro primo Curationum statuit uentrem deducendum peplo & lacte plurimo, cum mulso, potans & aqua salua, & succo betæ, & oleo cum mulso. Hoc condimento iniiciēs, & oleo, & liquido cerotario cum aqua, quibus uenter magis in fluorem prouocatur. Itē nutrit bis cocto pane, qui sit necessariō digestione difficilis, cum plurimū torretur. Itē piscibus saxatilibus, & carnibus teneris, cū debuerit densioribus magis ob stringendam solutionē: Dat aquam bibendā, & uinum dulce, quod etiam sanos inflare perspicitur. Offert farinā cum lacte coctā, quæ indigestibilis probatur: Sic etiam tritici ptisana cum cantabro. Ordinatur etiā secundam & tertiam curationē, nullam adijciens discretione. Item Erasistratus secundo libro de uentre plurima recte componens, solis utitur constrictiuis, cum sint plurimi dysenterici laxatione indigentes. Themison primo libro Tardarū passionū plurima recte memorauit, aliqua uero correctione indigētia: Laxamenti enim causa, atq; lapsus facienda quæ, & arnoglossæ succo iniectioē faciendam probat, & hoc aptum etiam tumoribus memorat, quod ob cōstrictionē siccare perspicit. Adhihet etiā naribus atq; auribus, & angulis oculorū sanguinis detractionē, nihil propositis profuturā, & post cibum unctionē, quo tempore quies est adhibenda, ob digestionis perficiendæ facilitatē. Dat etiam uinum asperius, cum fluorem uehementer uiderit atq; febrem. Et meratū probat offerendum, quo tempore ob augmentum passionis aqua uino infecta conueniat, maxime cum mierata potio uexare neruos approbetur, quos Græci cremasteras uocauerunt.

Tenesmon dysenterix iungitur.

Diocles, Myrrha.

Praxagoras.

Erasistratus.

Themison.

Erasmus.

DE COLICIS PASSIONIBVS. CAP: VII.

Principium huius capituli desest.

Concurrat præterea grauedo, sitis fastidium, & incessante passione, siue accessionis tempore articularum frigidus torpor & liuor, attestante sudore: & mentis hebetudo, cum pulsus paruitate ac densitate. Item sequitur singultus, & uentris abstinentia, aut cum dolore egestio urinæ reddendæ difficultas, capitis grauedo, intestinorum rugitus scatens, quem Græci borborigmon uocant, & augmento passionis uomitus humorum crassorum, quos Græci phlegmata uocant, tum felineorum, cum tensione membranæ quæ uentrem intra cutem circumtegit, & appellata est peritoneon, quæ perseuerans faciat inflationis causa resonū tympani, cum palma fuerint loca pulsata: Tum extantia cum rugitu plurimo, & dimissionis tempore uenti per podicem egestio cum magno sonitu. Ac si tumor fuerit insidens atque roboratus, erit extantia durior, ac puluoso attestante feruore, cuius circumspectio simplex, sed inæqualis esse uidebitur: quod discernitur.

Boerhaave.

K nitur

nitur à fecoris ac splenis, uel peritonei tumoribus, qui in peritoneo sunt & qua-  
 les: in iecore uero ac liene quadam circumspectione finiti. Est autem passio ali-  
 quando continua, ut plerumque tanquam ileicos interficiat: aliquando deficiens,  
 ut saepe tarditate perseverans difficile curabilis fiat. Sed eius curatio etiam nunc  
 stricturae conueniens probatur. Quapropter si acuta, uel celer fuerit passio, uel in  
 superpositione constituta, conuenit ægrum iacere loco calido, contactis parti-  
 bus in passione constitutis lana limpida atque calida. Adhibendus etiam fofus  
 olei dulcis calidi, & saepe memoratae uaporationes cucurbitae apponenda: leues,  
 quas Græci cuphas appellant. Item uascula, quæ ambigas uocant, & sunt ma-  
 teria testea, uel uitrea confecta: Tum requies atque abstinentia cibi usque ad  
 tertium diem, & si causæ poposcerint adhibenda phlebotomia. Ac si sumpto ci-  
 bo quiscquam dolore fuerit affectus, uel nausea, erit uomitus prouocandus su-  
 mpta primo aqua tepida, uel aqua & oleo, quibus potis immixtis digitis acce-  
 pra reddantur: Vexationem enim uomitus, sumptorum perseverans pondus  
 atque tensio, & mordicatio tumentium grauior uexatio iudicatur. Adhibenda  
 etiam clysteris iniectio ex olei calidi cyathis quatuor, admixto & consoluto ad  
 pe anserino, uel gallinaceo, uel ouorum utellis, aut decoctione lini seminis, uel  
 hybisci radicis, aut malux usualis, aut fœnigræci succo. Inijciunt autem aliarum  
 sectarum principes etiam rutatium, aut anethinū, aut panacinū, uel ex cymino  
 atque castoreo, & bitumine. Secundum Themisonem uero etiam cum absin-  
 thio: Castorei nanque uel bituminis duæ drachmæ cyathis olei quatuor miscen-  
 tur. Rutauero & anethum, & absinthium, & cyminum linteolo illigata oleo  
 coquentur. Sed sunt hæc acerrima, & propterea tardis passionibus congrua,  
 quas Græci chronias uocant, uel uentositate laborantibus, & non causa tumo-  
 ris dolentibus. Bitumen autem saepe etiam fastidium ingessit euerfo appetitu,  
 quem Græci orexin uocant. Cibus dandus conueniens dimissionis tempore,  
 atque alternis diebus, donec passio declinet, & forbilis, leuis, calidus. Dandus  
 etiā potus non plurimus, ne intestina grauentur, etiā ipse calidus. Tum post fo-  
 menta cataplasma adhibendum ex lini atque fœnigræci seminibus, & polline,  
 quod Græci magton appellant, aqua mulsa coctum mel decoctione fici pin-  
 guis, & hybisci radicis, & malux usualis, uel horum similium, cucurbita appo-  
 nenda adiuncta scarificatione, uel hirudines admouendæ omnibus partibus  
 in tensione constitutis: ac deinde uaporatio spongiarum expressarum in aqua  
 calida, & oleo, & decoctione fœnigræci, & malux. Tunc post unctionem ex  
 ipsa etiam encathisinata adhibent. Quidam medici in hijs qui uento fuerint in-  
 flat, ex decoctione stercoreum cum aromatibus coctorum uaporationem adhi-  
 bendā probauerunt, ex quo liquorē etiam oxymelitos miscuerunt cataplasma  
 cōficiētes, admixtis etiā tunc aromatibus, uel nepeta herba, aut pulegio, aut  
 hyssopo, aut cymino. Sed hæc in tardis passionibus adiuncta ratione locum fu-  
 munt perseverante morbo. Conuenit in accessionis statu etiam bibere cyathos  
 duos uel tres calido oleo diligenter admixto: Etenim incendia leuigar, & uen-  
 trem mollit, & tumorē mitigat. Quapropter magis hoc melius mulso proba-  
 mus: siquidem saepe conflagmet atque inflet. Dantur etiam plurima alia biben-  
 da composita uel simplicia, ut est Zenonis diasticon appellatum codicum me-  
 dicamen. Item Cassij ex gingibere confectum, quod diagingibereos appel-  
 lant: & mille præterea, quæ concurrenti tempore lacescendo medentur: præter  
 tempus uero grauationem ingredientia aliquos in periculum grauius mittant,  
 aliquos errore releuationis fallant, ob præsentis temporis perditum sensum,  
 quod

Cucurbita  
L. 2. p. 1.

Reser.

Hydrophora.

Uentositatis.

Zeno.  
Cassius.

**A** quod Græci anæsthesian appellant, hebetudine partium suffecta. Item simpli- ἀνεσθησιὰ  
 cia, ut decoctio apij, uel nardi celtiberici, aut herbæ saluix, aut polij, aut cymi-  
 ni ægyptij, uel rutæ, aut dauci, magis cretici, aut petroselinî tribus cyathis a-  
 quæ calidæ admixto cochleari, uel asperso succo polij, aut cymini ægyptij, aut  
 petroselinî, aut cochleari castorei, itemq; sceniculi. Sed est semper horum dato  
 in tumoribus uitanda: si quidem sint acria uel lacescentia uirtute. Conuenit præ-  
 terea cum totius passionis fuerit status, solio oleo calido pleno ægros dare, & fir-  
 mata declinatione gestationem adhibere, aucta moderatione ciborum. Tum  
 uinum, atque communiter resumptionem, & medijs partibus cerotaria ex oleo  
 sabino, uel cyprino, aut sicyonio, uel glaucino, aut amaracino, aut laurino, aut  
 panacino, aut rutino, aut anethino, samfucino, uel quod diatesaron appella- διατεςαρὸν  
 tur, resina terebinthina, cera, tri illyrica, hyssopo, omnibus æqualibus: siue διασώριον  
 quod diapente uocant, pice, nitro, alumine, sulphure, cera. Sumendæ denique  
 picis liquidæ heminæ duæ, & ceræ libra: Quibus solutis atque leuiter refrigera-  
 tis aspergendum nitrum rubrum tritum, & alumen scissum, & sulphur uiuum  
 singulæ leibræ. Cum autem in lenimento tardauerit passio, conueniunt ea quæ  
 fortificare ualeant corpus sine recorporatione demutare, ut uaria gestatio, &  
 deambulatio, uocis exercitium, atque perunctio, adhibito monitore, siue fri-  
 catio cum retentione spiritus, & sphæræ lusus, uel cursus, & humerorum addi- Ludus spheræ  
 tus motus. Item cibus qui inflare minime possit ex mediæ materiæ qualitate, &  
 tenuæ uinum, atque lauacrum longa per interualla: hinc enim facile corpora  
 perfrigescunt. Item rubor faciendus uentris in partibus, atque inter scapulas &  
 clunes ex dropacæ, uel sole, & flammæ paroptesi, uel parietibus, uel ceromate,  
**B** aut pellibus, uel arena littoris sole ignita. Item strigilis ratio adhibenda corpo-  
 ribus, & sicca defricatio ex asperis pannis, & cucurbita recorporatiua apponen-  
 da. Item unctio acopori feruentium acriorum, ut sunt diaeuphorbium, aut ca-  
 critum, niri fricatio, & sinapisimus, & uaporatio feruens ex aqua marina, uel  
 salsa, uel supradictarum acriorum uirtutum decoctionibus, uel sacellis sale re-  
 pletis: quibus præstitis uel corpori admotis erunt aliquando cautes superpo-  
 nendi, & circuminoluendi: Item farina circumclaudendus locus in passione  
 constitutus, & implendus item cauliculis, & oleo: tum immittendi cautes  
 igniti sensim, non usq; ad loci scarificationem, siue ustionis effectum, sed usq;  
 ad ruborem faciendum. Tum malagma quod appellatur diaspermaton, uel  
 polyarchion, aut diadaphnidon, diachylon, aut diaeuphorbium. Item aquarum  
 illius patientibus locis, quam cataclysmon Græci uocauerunt, & iniectio cly- κλυτακλυσμοί  
 steris rutacij, aut anethini, aut panacini olei, uel extenta uirtute aquæ salæ. Et  
 cum olim futuram superpositionem uiderimus, uomitus ieiunio adhibendus  
 ex radicibus. Tum perseverante passione etiam ex helleboro radicibus inserto:  
 tum infuso, ac deinde conciso iuxta ordinem cycli partium caterarum. Dandum  
 etiam potui medicamen, quod Græci theriacen antidotum uocant, uel diagin- θυριακή  
 gibericos. Peregrinatio quoque adhibenda, & longa nauigatio, & usus aqua-  
 rum naturali uirtute medentium, & magis sulphuris ac medicaminis uirtutem  
 redolentium. Item maritimarum, & primo feruentium, tum frigidarum. Ac si  
 retentio uentris fuerit, ob egestionem faciendam adhibenda iniectio ex melle  
 atque sale: Quæ si minime compleuerit effectum, etiam ex aloë admixto succo  
 coliculi agrettis uel usualis, uel lapatij: ex quibus erunt catapotia facienda in κλυτακλυσμοί  
 erui magnitudinem, quorum quatuor uel quinque dabimus transbibenda. I. c.  
 marinicoliculi offerendi, Erunt præterea præcauenda magis quæ passionem ua-

**C** leant refrigerare, ut frigus, indigestio, libido, uel quæ inflare ualeant cum sumuntur: item frigida plurimo scilicet tempore. Veteres autem, & magis Erasistratus sectatores uentrem mouere medicaminibus certauerunt uentrisflussis, quæ catartica uocant, uel pessulis, quos balanifimos dixerunt.

*Ventrisflussus.*  
*Catartica.*  
*Balanifimos*  
*pessuli.*

## D E L U M B R I C I S .

## C A P : V I I I .



*Asclepiades.*

Tem alij ad acriores clysteres confugerunt ex initio adhibendos, uelut Asclepiades: & aliquibus etiam fluxor uentris efficitur sine lumbricorum exclusione, aliquando attestante fastidio & debilitate, & pallore cum tenacitate corporis: & nunc tussicula arida leui ex occasione commota: nunc solutione atque defectu corporis & animæ, quem lipothymian appellant. Pueris uero dormientibus turbatio membrorum efficitur, gemitu attestante cum iactatione, & stridore dentium, & sæpe contra solitum morem prona positio iacendi: Tum clamatio sine manifestatione, exiliente cum uocibus ægrotante. Quibusdam etiam repentinus casus occurrit, ut oppressi obmutescant, nunquam similiter affecti. Item aliquando conductione uel contractu membrorum rapiuntur, & quidam per interualla conticescunt, & in febribus demerisione lethargorum simili premuntur. Item totius uultus paulatim nimia insinuatio, nunc detracto rubore mutantur, & aliquando articularum frigore cum difficili responsione, siquidem interrogentur, manibus elatis iactantur, attestante sudore. In pueris uero lumbricorum conuersio, siue connexio sæpe occurrit, ut etiam tactu sentiatur durities in ea intestini parte, quæ fuerit magis in ultima tenuitate. Tum denique eorum euerisione ægrotantes interficiuntur. Pulsus uero, ut etiam Themison libro nono Epistolarum designat, est inæqualis ac plurimum deficiens. Excluduntur autem nunc per uentrem, nunc per stomachum atque os, uel nares, & aliquando sponte connexi in spheræ similitudinem: plurimè amplexu mutuo uinculati, aliquando singulares. Itè sanguinolenti, uel fellofi, aut cū stercore per podicē, uel humore felleo, uiui aut mortui, pleni aut inanes, & omnes, aut ex parte, albi uel fului. Alia denique plurima sequentur ægrotantes, quibus designari supra memorata necesse est: Et nunc parua, nunc plurima pro quantitate animalium ac forma; uel quod nunc plurimum, nunc parum noceant, locorum differentia uariante, cum nunc ad stomachum ascendunt, nunc in intestinis perseverant, & ægrotantium uires nunc debilitate, nunc fortitudine habituantur, & nunc cum febribus, nunc sine febre. Sed quoniam multa ex accidentibus alijs quoque similia passionibus inueniuntur, ut alienatio mentis furori, atque phrenetidi, uocis amputatio, lethargo, & præfectioni matricis, & apoplexiæ, & epilepsiæ, atq; apprehensioni sensuū. Qui autem ex lumbricis patitur nunquā spumas excludunt. At uero præfocatio ex matrice cum ascensu matricis efficitur, quem Græci anadromen uocant, & magis in ætatibus perfectis, antecedente matricis ægritudine. Ex lumbricis uero facta uocis oppressio magis ætatibus imperfectis adseribitur, antecedente uentris atque intestinorum quereia. Item à catalepticis discernuntur lumbricis laborantes: siquidem illi in febribus obmutescant maiore atque percussibili pulsu testantes. Qui autem à lumbricis id patiuntur, etiam sine febribus uocis amputationem sustinent, cum pulsu paruo atque crebro. Item ab ileicis discernuntur, qui lumbricorum tormento uexantur: siquidem neque uentris officium in hijs abstineatur, uel palior antecedit, aut contra consuetudinem iaceant proni, uel dormiant cum ge-

*Themison.*

**A** mitu, & irrationabili exclamatione. Item à suo machinis discernuntur, cum nullus fuerit humor in stomachi partibus inuentus, & intestinorum tormenta sustineant. A syntecticis uero discernuntur, quod nulla querela tormentorum, uel conuersionis, aut doloris in intestinis, uel uentre afficiatur: quod necessario lumbricis laborantes sequetur. Item ab hijs qui naturaliter, uel ex multitudine cibi per somnum labia conducunt in similitudinem sorbentium, uel sine ulla ratione aut exiliunt, quod moderatione accedente, atq; cibi facta deductione releuantur. Hij uero qui lumbricis afficiuntur magis uexentur parcitate ciboru. Hæc est similitum discretio passionum. De exclusione uero siue egestione lumbricorum ueteres medici præsciam significationem posuerunt, & appellauerunt prognosin: in quo diuersa senserunt: Nam Hippocrates libro Prognostico significare inquit lumbricos interfectionem ægrotantis, quoties mortui fuerint exclusi omnibus in morbis. Item quidam communiter mortuos lumbricos aiunt grauiâ denuntiare: siquidem ostendant inesse corpori rupionem. Diocles libro Prognostico euomitos inquit lumbricos nihil alienum significare, nec esse absurdum: per inferiora uero excludi quoque lumbricos non admirandum, sed mortuos & inanes esse melius ac salutare: Viuos uero atque plenos & sanguinolentos perniciosum. Item libro de egestionibus scripto, uiuos uel plenos, ac sanguinolentos febribiles dixit. Erophilus uero libro quem ad Hippocratis Prognosticum scripsit, siue uiuos, siue mortuos excludi negat incongruum. Apollonius Glaucus libris quos de Interioribus scripsit, reiectos rotundos lumbricos initio significare indigestionum frequentiam, ultimo uero ægritudinis properare iudicium, quod crisin appellant. Item uiuos ac plenos, & sanguinolentos non recta portendere. Apollonius Memphis perunctatio, siue uniuersali modo, quem Græci catholicon uocant, omnia inquit in intestinis animalia nata in morbis grauiâ significare, & magis mortua, quàm si uiua excludantur. Item Antiphanes libro quem Panopten appellauit, melius esse per inferiora, quàm per uomitum lumbricos excludere, & solos magis quàm cum stercoribus. Chrysippus Asclepiadis sectator, libro tertio de lumbricis, solis in celeribus causis, siue periculosis mortuos inquit lumbricos egestos interfectionem ægro portendere: Ostendunt enim mortui aciem uehementem inesse, quando magis ægri periclitantur. Sic inquit denique Hippocratem ferri, dicentem suo libro, eos qui in ægritudinis declinatione cum stercoribus egerunt, nihil graue significare. Sed neque inquit Dioclem Hippocrati contrariam protulisse sententiam, dicendo mortuos uel inanes esse meliores: siquidem hic in febribus solutionum hoc dixisse uideatur: Hippocrates autem mortem significare, sed in febribus stricturæ. Nos uero communiter significari aliquam ex lumbricis dicimus corruptionem, quam lientericis irruentem bonum quicquam portendere iudicamus, de ipsis scribentes docuimus: in omnibus uero cæteris noxiam. Item sanguinolentorum exclusio etiam debilitatem significat: Albi etenim, & nondum mutata aut corrupta materia nutriuntur: Sanguinolenti uero uellendo ex ipso sanguine nutriuntur. Item in augmento accessionis febrium exclusio turborem aliorum partium ostendunt, & magis si fuerint sanguinolenti: declinatione uero laxamentum, sicut cætera, hoc est stercorum uel urinz, uel quorumlibet officiorum egestio: Etenim laxatis corporibus reddi uidentur: quippe cum quorum adiectio grauet, eorum detractio necessario releuet. Hæc est lumbricorum significatio, sed ob curationem in hijs quos alcaridas uocamus

OVERTHAKI.

ap. p. u. u. r. e.

Hippocrates.

Diocles.

Erophilus.

Apollonius  
Glaucus.  
L. p. i. o. r. e.Apollonius  
Memphites.  
L. u. e. n. d. u. r.  
m. o. d. u. s.Antiphanes.  
Chrysippus.

L. u. e. n. d. u. r. e.

C caufimus, si tumor in longaeone fuerit constitutus, oportet iniectionem olei adhibere: quae cum fuerit reddita, erit infusio aut decoctio centaureae, uel absinthij iniicienda: Ac si ramenta fuerint exclusa sanguinolenti coloris, decoctio mali punici corticis, uel gallae conuenit iniectioni. Aut si perseverauerit, chartae exustae, & auri pigmenti, quod Graeci arsenicon uocant, æquali pondere, quod sit in quantitate drachmarum sex, cum succo arnoglossae: Ac si putredo apparuerit, quam Graeci menomen appellat, erit aqua salsa iniicienda, atque congrua medicamina, sicut nuper docuimus: Ex hijs enim & animalia interficiuntur, & alij trochisci prohibentur, & ulcera cicatricantur. Ac si rotundi fuerint lumbrici, qui nunc stricture accidunt, nunc solutioni, nunc ulceribus intestinorum: & nunc in celeribus passionibus, nunc in tardis, quas chronias uocant, non ex supradictis, sed sua in corpore alienitate uacantes ex corruptione ciborum effecta, oportebit curationem pro supradicta curari differentia: Et si ipsa animalia corrumpeunda uiderimus, erunt medicamina adhibenda, aut tanquam aliena, atque indigentia detractioe auferantur. Ac si passionibus fuerint appendita, quae saepe generandorum animalium fuerunt causa, erunt congrua iisdem passionibus adhibenda: Hijs enim conuictis etiã animalia interficiuntur. Quapropter si stricture fuerit in corpore, fomentatio competens est adhibenda, atque cataplasma laxatiuum, & si ratio coegerit, phlebotomia: quae singula suis temporibus aptanda probamus. Tum cucurbita adiuncta scarificatione medianis partibus admouenda: Hijs enim laxatis sine ulla medicaminũ uirtute, atque facile animalia decidunt oleo poto, aut aqua calida, & oleo uel decoctione noxarum, aut glycyrrhizae, cuius libra infusa in aquae heminas sex, usque ad tertiam partem erit decoquenda: Et hijs praterea cibi tempore dari potest forbile quicquam, ut illud quod Graeci appellant oleoptisanon: Ex hijs enim & tumentia relaxantur, & animalia quae inesse uidentur, lapsu quodam ac desertione tumentium dimissa fundentur. At si solutio fuerit in corpore, erunt constrictiua adhibenda, & exercitatus cataplasma, sed ex lupini pollinibus confectum, & aceto cum melle tribus uel quatuor cyathis aquae commixtis, cum ceruini cornu ferragine aspersa, quam Graeci rhinen uocant, in cochlearis pleni quantitate, si tarda fuerit passio, quam Graeci chronian uocant, quoniam indiget recorporatione, atque laceffentium medicaminum uirtute. Sed in lenimento constituta erit uaria coniectura facienda, quo animalia excludantur. Quapropter adhibenda medicamina, harũ partiũ fomentatio ex oleo ueteri, & apponenda unctio fellis taurini agrotatis umbilico, uel lanx ex ipso tinctae partacula: Tum cataplasma ex polline lupini consperso ex decoctione absinthij aut santonici. Admiscendus denique etiam succus earundem herbarum. Si uero uehementius oportuerit animalia alia fauciare, conuenit etiam tanquam acriores cibos, & propterea aptos, uelut in drimyphagia, dare cepam, allium, quae nunc incocta, nunc mediocriter cocta, quo minima eorum uirtus erit offerenda: nunc enim urgente lumbricorum exclusione hijs uti cogimur rebus. Facit idem sinapi exuccatum, uel adiuncto pani comestum. Item nasturtium cum aceto contritum, siue ut Graeci uocant, cardamum, immisso atque infuso pani. Item laser aceto solutum, siue sinapi, quo comedenda tingantur, uel ouo forbili admixtus iste liquor detur in erui modo: Item absinthium cum uino poto datum. Ac si ulceratio fuerit intestinorum, congrua probamus adhibenda pro ulcerum differentia. Ac si febres non fuerint, neque alia quaelibet passio lumbricis conuerit, nihil oportet conserere, sed ex medicaminum uarietate eorum interfectionem atque

**A** detractiōnem efficiere: Sunt enim bestiolæ, quæ Græci theridia uocauerunt, sed <sup>εσθία</sup> producenda atque extendenda erit magnitudo curationis pro accidentium modo: Et quoniam aliquando sunt in uentre constitutæ, quod probatur ex ægro- tantium querelis, cum locorum sensus tanguitur: aliquando in intestinis, & necessario quæ in uentre sunt celerius afficit medicaminum cibus ac potus. Intestinis uero quæ per clysterem fuerint infecta: nam & ex uentre ad intestina hæc sepe animantia, & ex intestinis ad uentrem refugunt. Erit sanabilius ergo, ut ubi apprehenderitis esse copiam lumbricorum, usum primo adhibeamus cõgrui cibi ac potus, similiter epithematum usum seruantes, & cataplasmatum, deinde clysterem. Oportet igitur potum dari absinthij pontici decoctionem, siue marini, aut fantonici usq; ad modum duum cyathorum uel trium: & nunc nulla alia admixta materia, nunc oleo adiuncto, uel decoctione lupini, aut noxarum cum cornu ceruini ferragine, & laser aqua solutum uel aceto, & admixto sinapi, aut ouo sorbili transuoratum. Item alica in qua fuerit infusa aloë, siue ipsa transuorata: Nec non etiam trochiscus dandus, qui appellatur picros, uel illa hiera quæ <sup>προχρισθε μεν ηβερ- ηνρε δαλασθ.</sup> dialoës appellatur: quorum compositiones Responsum libris de medicamine scribentes tradidimus. Item cardamum quod nasturtium uocamus, torridum ac tritum cum aqua uel mulso, aut cum melle in electario datũ. Item lupini sicci decorticati atq; transuorati cum melle quindecim numero, uel uiginti: quod si minime quisquam transuorare ualuerit, eorum polline conspersum atq; tritum, quantum tres digiti capere potuerint aquæ bibendum admiscemus, siue mulso aut decoctione noxarum, aut electario admixto melle dabimus. Item gentianæ succum in cochlearij modum cum mulso conuenit dare, atque horum similibus uti uirtutibus. Item absinthium cum uino, & castoreum cum mulso. In paruís uero pueris, quo latere possint, nasturtium frixum siue tritum cum melle atq; late dabitur potui, uel comixtum pani. Hijs igitur rebus erunt cibi ponendi: pulchris enim atque sorbilibus conuenit absinthium concoquere, uel similes herbas. Hoc etiam si siccis atq; pingui, uel palmulis, quas patetos appellat, quæ concisæ atq; immisæ, & cibo datæ mederi ualebunt. Faciunt præterea mora <sup>Mora celsa.</sup> cibo data, quæ uulgo celsa Latini uocauerunt, Græci uero lycamina. Itẽ ex amigdalis amaris sorbilia cõfecta, quæ Græci trophemata uocauerunt, & cõmuniter cuncta quæ uentri deducere ualent. Hinc deniq; etiam pinna arida ueluti atq; <sup>τροφιματα</sup> trita potui sufficientem modum miscuerunt. Conuenit etiam urtica, siue sola, siue cum aliqua decoctione cõfecta: Nam ob celebrandam curationem uehementer utilia probamus catapotia ex squilla atque chamaelea cõfecta. Sumpta igitur <sup>καταποτια ex squilla.</sup> squilla erit acriori aceto concoquenda, ne fluida fiat. Tum terenda diligenter, ac deinde chamaelea, anchusa atq; creta admiscenda squilla, quantum res patitur, ut ad emplastrum ueniat qualitatẽ. Tum facienda catapotia in fabæ magnitudinẽ, & pro uiribus ægrotatis danda, ut fortibus octo uel nouẽ, imbecillis sex uel septẽ, pueris uero tres uel quatuor ex aqua calida. Potest etiã ipsius chamaeleæ cõcisæ atq; cõtrita cũ mulso quippiã dari transbibendũ, uel cũ lericula paruo modo sorbendũ: sed pueris obolus unus, maioribus uero oboli duo sunt dandi: Itẽ fortibus tres. Perfecta tamen potio drachmæ unius continet modũ. Utendũ præterea epithemate circa medias partes ex lupini pollinibus aut melanthio, & decoctione absinthij, aut fuluo liliõrum, aut cerotario cedriæ admixtis lupinis tritis, aut absinthio, aut agreffitis peponis interiora, quæ Græci colocyntida uocant, cũ melle atq; <sup>καταποτια.</sup> lupinis, aut centaureæ uel aloës paribus duabus, & diagridij parte una cũ melle & felle taurino, Erunt præterea oia quæ potui ordinauimus danda etiã per clysterẽ

Ciendi, & magis adiuncto uel admixto oleo plurimo calido, & succis præseriptis, quo plurima mordicatione intestina afficiantur. Ac si lati fuerint lumbrici, erit adhibendus uomitus ex oleo, non ex radicibus, & alia die clystere utendū, admixta nitri parte, uel salis. Danda etiam aqua salsa potui, aut glycyrrhizæ radicis decoctio, aut similiter incocta glycyrrhiza. Alij uero tres drachmas glycyrrhizæ cum nitro probauerunt. Alij diagridij obolos tres, cum polypodij herbæ drachmis duabus. Alij ex pinnis medicamen confectum. Sed erit semper tentandum, ubi res patiuntur, ut hijs utamur medicaminibus, quæ minime sto machum afficiant. Tum cum sensum acceperint ægrotantes animalium carentorum, ut interpellatione uentris admoneantur, subiicienda erit aqua calida, quo & loca relaxentur, & animalia procedant, ne frigore percussa fugiant. Erit præterea curandum, ne frequenter hæc animalia renascantur, ut unctioe regulari corpora fortificemus, adhibito præceptore, adhibita etiam recorporatione cyclica, quæ fit uomitu radicum, & drimyphagia, & dropace, & sinapismo, & paropteli, & horum similibus uirtute rebus.

DE MOLLIBVS, SIVE SVBACTIS,  
quos Græci malthacos uocant. CAP: IX.



Dolles, siue subactos Græci malthacos uocauerunt, quos quidem esse nullus facile uirorum credit: Non enim hoc humanos ex natura uenit in mores, sed pulso pudore, libido etiam indebitas partes obscœnis usibus subiugauit, cum nullus cupiditati modus, nulla satietati spes est, singulis spartanum sufficienti sua: Nam si nostri corporis loca diuina prouidentia certis destinauit officijs. Tum denique uolentes ueste atque gressu, & alijs scœminis rebus, quæ sunt à passionibus corporis aliena, sed potius corruptæ mentis uitia: Nam sæpe tumentes, uel quod est difficile, uerentes quosdam, quibus forte deferunt, repẽte mutati paruo tempore uirilitalis quærunt iudicia demonstrare, cuius quia modū nesciunt, rursus nimietate sublatis plus quoque quam uirtuti conuenit faciunt, & maioribus se peccatis inuoluunt. Constat itaque etiam hoc nostrò iudicio, hos uera sentire: Est enim, ut Soranus ait, maligne ac scœdissime mentis passio: Nam sicut foemina Tribades appellatur, quod utranque Venerem exerceant, mulieribus magis quam uiris misceri festinant, & easdem inuidenter penè uirili sectantur: Et cum passione fuerint desertæ, seu temporaliter releuatæ, ea quærunt alijs obijcere quæ pati noscuntur, iuuuimini humilitate duplici sexu confectam, uelut frequenter ebrietate corruptæ in nouas libidinis formas erumpentes, consuetudine turpi nutritas, sui sexus iniurijs gaudent: Sic illi comparatione talium animi passione iactari noscuntur: Nam neque ulla curatio corporis depellendæ passionis causa recte putatur adhibenda, sed potius animus coërcendus, qui tanta peccatorum labe uexatur: Nemo enim priuens corpus feminando correat, uel uiriliter ueretri tactu mitigauit. Sed communiter querelam siue dolorem alia ex materia tolerauit. Denique etiam à Clodio historia curationis data ascaridarum esse perspicitur, quos de lumbricis scribentes uermiculos esse docuimus longaonis in partibus natos. Parmenides libris quos de natura scripsit, euentu inquit conceptionis molles aliquando, seu subactos homines generari. Cuius quia græcum est

Soranus.  
ꝑꝑꝑꝑꝑꝑ.

Clodius.

Parmenides.



**A** cum est epigramma, & hoc uersibus intimo: Latinos enim, ut potui, simili modo compo sui, ne linguarum ratio misceretur.

Fœmina, uirque simul Veneris cum germina miscent

Venis informans diuerso ex sanguine uirtus

Temperiem seruans bene condita corpora fingit.

Nam si uirtutes permixto semine pugnent,

Nec faciant unam permixto in corpore diræ

Nascentem gemino uexabunt semine sexum.

**B** Vult enim seminum præter materias esse uirtutes, quæ si se ita miscuerint, & eiusdem corporis faciant, unam congruam sexui generent uoluntatem. Si autem permixto semine corporeo uirtutes separatæ per manserint, utriusque Veneris natura adpetentia sequatur. Multi præterea sectarum principes genuinam dicunt esse passionem, & propterea in posteros uenire cum semine, non quidem naturam criminantes, quæ suæ puritatis metas alijs ex animalibus docet: nam sunt eius specula à sapientibus nuncupata, sed humanum genus, quod ita semel recepta tenuerit uitia, ut nulla possit instauratione purgari, nec ullum nouitati liquerit locum, sitque grauior mentis culpa, ut cum plurimæ genuinæ, seu aduentitiæ passiones corporibus infractæ consenscant, ut podagra, epilepsia, furor: & propterea ætate uergente mitiores procul dubio fiant: Omnia etenim uexantia ualidos effectus dabunt firmitate opposita subiacentium materialium, quæ cum in senibus deficit passio quoque minuitur, ut fortitudo: sola tamen supra dicta, quæ subactos seu molles efficit uiros, senescenti corpore grauius inualescit, & infanda magis libidine mouet, non quidem sine ratione: In alijs enim ætatibus adhuc ualido corpore, & naturalia uentris officia celebrante, gemina luxuriæ libido diuiditur, animorum nunc faciendo, nunc facie iactata.

In hijs uero qui senectute defecti uirili Veneris officio caruerint, omnis animi libido in contrariam ducitur appetentiam: & propterea foemina ualidius Venerem poscit. Hinc denique conijciunt pluri metiam pueros hac passione iactari: Similiter enim senibus uirili indigent officio, quod in ipsis nondum & illos deseruit.

CAELII AVRELIANI SICCENSIS  
LIBRI QUARTI  
TI FINIS.

CAELII

## CAELII AVRELI-

ANI SICCENSIS CHRONION

LIBER QVINTVS.

C VI H A E C I N S V N T.

De ischiadicis &amp; pſœadicis.

De articulari passione, quam Græci arthritin uocant.

De podagra.

De renali, quam Græci nephritin uocant.

De tardis uesciæ passionibus.

De diabete.

De seminis lapsu, quem Græci gonorrhœan uocant.

De somno uenero, quem onirogonon uocant.

De debilitate seminarium uiarum.

De uomicis, siue internis collectiōibus, quas Græci empyemata uocāt.

De polyfarcia.

DE ISCHIADICIS ET PŒADICIS.

CAPVT PRIMVM.



D

io

io

Partibus quæ dolore uexantur hæ passionis nomina sumptè  
runt: Nam uerteborum summitas ipsorum initio termi-  
natur, Græci ischia uocauerunt. Item musculos clunium  
sub spinæ finem ex interioribus atq; exterioribus adharens  
tes pſœas uocauerunt. Generantur istæ passionis nunc ex  
manifestis, nunc ex occultis causis, ut est perfrictio profun-  
da, uel terrena cubatio, aut casus, uel repentinus percussus,  
aut iugis atq; immodicus usus ueneris, aut quilibet longissimi temporis mor-  
bus. Item uehemens abductio, uel raptus in exercitio factus, aut longissimi tem-  
poris hæmorrhoidarū fluoris tentus, uel insueta humi fossio, aut cuiusdam pon-  
deris leuandi ex interioribus conatio. Fit præterea in omnibus ætatibus, sed fre-  
quentius in medijs. Sequitur ischiadicos dolor uerteborum: quam passionem  
multi duplicè ischiada uocauerunt, attestante grauedine & difficili motu, contra  
solutum morè, & quibusdam cum leui torpore ac formicatione: quibusdam cum  
uehementi atq; pungenti, & feruido dolore, & ad sensum patientis, tanquā ser-  
pentis conuolutus motus: Aliquando etiā cum febribus, ut neq; in lecto suā cō-  
uentionē ferre ualeant ægrotantes, & primo in uertebro, dehinc partis suæ pene-  
trans loca, & usq; ad mediam natē, ac superius ad inguen, uel ad ancalen perue-  
niens atq; surā, dehinc etiā talum, & pedis summitatē. Tum cum passio tardaue-  
rit, cessante nutrimento cruris totius tenuitas fiet, quam Græci atrophian uocāt,  
incipiens à clunibus, siue ab inferioribus locis, attestante debilitate, & sæpe con-  
ductis partibus breuitate cruris, aut ultra naturā longitudine passionis distēsiō-  
ne suffecta, ut in paralyfin ueniat, aut ipsius uertebri duratæ partes extatiores su-  
ant. Constringitur præterea sæpe ac retinetur uentris officium, aut cum plurimo do-  
lore perficitur, ob tensionem atq; spiritus retenti percussum, & in itineris pressu,  
quibus forte permittitur, ut initia motus impediatur, feruore partium attestante:

**A** ac si perseverans fuerit motus facilius fiet: Tum rursus subsidunt, uel intenti resistunt repete, tanquam fuerant necdum gressu tentato. Tunc magis uehementem dolorem sentiunt, & ambulant quidam capitibus digitorum gradientes; alij extenti quidem, sed sinuatis clunibus, ut neq; se pronos inclinare ualeant: alij contracti atq; conducti, qui peius omnibus habere noscuntur: siquidem passio apprehenderit etiam spinæ musculos, & propterea duritia quadam hæc inuasisse uideatur loca. Patitur autem principaliter membrana quæ ossa circuegit, quam Græci periosteon uocant; Item musculorum capita, uel summitates. *periosiof.* Deniq; augmento passionis intercreatus humor, & frequenti dolore corruptus, in saniem transiens partes aliquas collectionibus afficit. Sed quoniam plurima sunt prædictorum sequentur etiam eas quæ matricis uexatione afficiuntur, & magis cum eius fuerit inclinatio facta, quam paracelsin uocant, facienda est discretio passionum; & primo quod matrice patiente in eadem potius causa inueniatur, atq; ex ipsa initium sumant. Pseudicis uero clunium dolore afficiuntur, & tardo motu, ut se renitente dolore nec inclinare ualeant, ac difficilius & dolentius subrigant. Plurimis igitur dolor cito conuiescit: aliquibus uero perseverat, partes durefcunt atq; conducuntur. Hijs deniq; usq; ad pene cutem unicus sequitur gressus. Si itaq; exteriores musculi fuerint in passione constituti, etiam tactu tentati dolescunt. Interiores autem ex interioribus dolorem accipiunt, tanquam in nephriticis contingit: Quos propterea deniq; similes discernimus: siquidem alia multa eisdem propria concurrant, quæ de ipsis scribentes memorauimus. Pseudicis autem, atq; ischiadicis, quorum nunc curationem scribimus, dolor efficitur nunciugis, nunc deficientes, ordinatus aut inordinatus, ac longis uel paruis interuallis recurrens, ac puris, limpidis lenimentorum uariatus ipatijs, aut mediocres reliquias seruans. *Dysenteria ischiadicis utilis.* Vitalem inquit Hippocrates ischiadicis dysenteriam: Habet enim imitationis quiddam recorporationis faciundæ: quanquam plurima uexatione corpus afficere uideatur. Item hæmorrhoidas, uel uarices, ut alij dicunt, laxamenti causa. Sunt autem difficiles curatione magis, qui plurimo tempore fuerint passione uexati, & multis atque uarijs accidentibus signis affecti. In ordine itaq; curationis hæc erunt intuenda, ut cum recens fuerit passio uel ueterata, Sed in superpositionis tempore constituta, iacere faciamus ægrotantem mollioribus stramentis calido in loco, adhibita abstinentia & requie usque ad primam diatriam. Tunc lanis mollibus ac limpidis oleo calido dulci præinctis dolentia loca contegenda. Adhibenda etiam fomētatio iugis ex oleo dulci calido. Item uaporationum commutatio, sicut in multis docuimus scribentes, & phlebotomia tempore consueto, atq; ex brachio dolenti parti è contrario, uel plurimum dolenti comparatione alterius. Ac si æqualis in utraq; fuerit parte dolor, ex eo in quo fuerit facilius uena erit detractio facienda. Si neq; hoc occurrerit, ex sinistro brachio adiutorium adhibendum: siquidem minus officijs domini necessaria pars esse uideatur: nisi forte sinistri, hoc est scæi fuerint ægrotantes. *periosiof.* Tum tertia die adhibenda perunctio ex oleo dulci atq; calido. Dehinc ora lauanda, cibus dandus nutritibilis, calidus, tener, tanquam stricturæ conueniens, & potius aqua calida usq; ad declinationis tempus. Seruanda etiam cibi alterna dierum oblatio. Tunc cessante dolore resumptio adhibenda. Perseuerante uero alia diatrium tempore, adhibenda iniectio ex decoctione foenigræci feminis, aut lini, aut hybisci, quam Græci althæan uocant: quo pariter foras atque uaporata interiora laxamento consentiant. Admiscendum denique oleum calidum. Item succus alicæ uel prisanæ, uel oleum solum, aut admixto adipe asferino, uel gallinaceo injiciendum.

**C** inijciendum, uel hijs quicquam simile consolutum. Ac si uenter fuerit absten-  
 tus, erit mulsum inijciendum. Tentanda denique & properanda sequentibus  
 diebus facilitas uentris: Quo cōuenit, si hoc minime perficere ualuerimus, etiā  
 lino zostin herbam nunc solam cibo dare, nunc adiuncta malua: item agreste  
 colicolum. Sed fugienda prædicimus quæcumq; fuerint uehementiora, quantū  
 quidem res admittunt, ut diagridiū, helleborū nigrum, chamælez semen, quod  
 Græci coccum Cnidium uocant, agaricum, agrestem peponem, quem colocyn-  
 tida dicunt, singularia uel coniuncta. Item hiera, quam diascāmonias appellant,  
 ne plurima uexatio pro parua commoditate sequatur: Nam post fomenta con-  
 uenit cataplasmata adhibere: quorum cōfectiones atq; species sæpe conscripsi-  
 mus. Ac si permanferit dolor, adhibenda scarificatio. Hirudines etiam adhiben-  
 dæ, quas Græci bdellas appellant. Hoc quidem secundo uel tertio faciendum,  
 si causæ poposcerint. Tunc uaporatio spongiarū ex aqua calida, uel aliqua de-  
 cocōne laxatiua uirtute mitigantium materiã adhibenda, quarum iam sæ-  
 pe species memorauimus. Ex ipsis quoq; encathismata facienda. Item cerotaria  
 dolentibus apponenda partibus ex oleo pingui, uel cyprino, aut sicyonio, uel ex  
 radice hybisci confecto, aut irino, aut malo batrino, singularibus atq; cōmixtis.  
 Ac si duritia emerferit ad miscendum adipem, aut medullam ceruinam, uel bu-  
 bulam, aut melilotum, aut hybisci radicē percocta in mulsã, ac diligenter contri-  
 tam, aut decoctionem eiusdem hybisci, uel foenigræci, & lini feminis triti in mel-  
 lis crassitudine confecti. Ac si difficile passionem declinare uiderimus, erit em-  
 basis adhibenda ex oleo, & aqua calidis. Tum cum fuerit plurimum inuentus  
 dolor, uariis offerendus est cibus, ex mediã qualitatis materia. Adhibendum  
 etiam lauacrum, dehinc lene uinum: Tunc malagmata partibus in passione con-  
 stitutis, ut diachylon, uel mnaseum, aut dioxeleum, uel nileos. Item unctiões  
 quæ mitiganter emolliant, & neque perfrigescere partes permittant. Cerotaria  
 quoq; limpida, aut diascamucum acopum, aut irinum oleum aut sansucinum.  
 Ac si passio fuerit tarditate inueterata, & plurimo tempore perseverans, & in le-  
 nimento constituta, si hoc limpida uiderimus, lenimentū erit pro modo per-  
 manentis doloris curationis faciendã moderatio: Tunc enim conuenit motus  
 quidem, sed fertorio lecto, dehinc cathedra uel sella usque ad inanem penetran-  
 dus, sicut in phlebotomandis facimus: sed ab umbilico inferius hijs qui leuius  
 afficiuntur, præcauentes uenarū diuisuras, ac deinde muliebris cathetere liquorē  
 detrahimus, qui sæpe aquosus, sæpe fuluus, aut sanguinolentus, uel spumosus  
 excluditur: quod quidem etiam ante factam diuisuram pleriq; futurum signis  
 apprehendere uoluerunt: Quorum alij talem fore dixerunt, qualis urina fuerit  
 ægotantis: Alij qualis color apparuerit cutis; alij quolibet uiscere patiente san-  
 guinolentum; non patiente uero ex causã auidissimi potus hydropisimo conce-  
 pto, uel salis potu mundum atq; perspicuum liquorē fore. Sed hæc præter quod  
 falsissimæ sunt opinionis, etiam ad mutationem chirurgicã inuuliter qualita uel  
 dentur, nisi solum quod recte probamus, per cathetera liquorem, si res patiuntur,  
 semel atq; eodem tempore omnem auferendum. Sin uero aliqua obstitierint,  
 post primam detractionem motarium aqua infusum supra diuisuram res imphi-  
 cantes, spongiam de super mollem apponemus; ac deinde leui fasciola ample-  
 xo loco paululū differimus, quo turbatio corporis resoluat; ac deinde resumpro  
 ægotante eodem die residuum detrahimus humorem: Sin minus, alia die ma-  
 nibus comprimentes subjectas partes congrue ægotante locato, hoc est sche-  
 mate competentĩ. Ac si forte rursus confluyente humore fuerit repletus, uel ui-

**A**riūm debilitas prohibuerit eodem tempore totum detrahi, tunc interiectis duobus diebus, uel quantum uires permiserint residuum retrahimus, sed alio in loco diuisuram facientes: uel si rursū oportuerit, tertio: Etenim prima diuisura seruata distans aut cohzrens soluta tumores uel consensus ingerit uehementes. Tum perfecta humoris detractio neque abstinentia utemur, ut Asclepiades, neq; plurimū damus cibum, sed pro modo uirū: etenim abstinentia omni ex parte adhibita uires uexat: quippe post plurimam detractionem. Multi item oblatio cibi grauius opprimit corpus potius quā resumit. Erunt autem ante cibum sensum perungendi atq; reficiendi facilibus, & potō sufficienti. Ac si dolores aliqui emerferint, uaporationibus soluendi, atq; cataplasmatibus mitigandi. Tunc indulgentia relaxatis, uel forte non emergentibus, adhibemus ea quz tumorem fieri non sinant, & superimpositis spongijs conligamus. Transacto tumoris metu magis uentris folliculum uel cutem intestinis cogimur adserere, atq; similiter cetera quz in tumore fuerāt constituta, ut nuper docuimus. Aegrotantes præterea nauicula exerceri hortamur, & paulatim recorporatiuæ subijcimus curationi. Ac si neq; ita fuerint resoluti, utemur helleboro iisdem curationibus insistentes, donec corpus reperat fortitudo, atq; densior uel coacta noscatur attestante rubore. Hæc est secundum methodum hydropum curatio. Plurimi autem earum sectarum principes, atq; nostræ ueteres, nihil ueri curantes, ac magis contemptu quodam astruções corporū asperrnates, solius detrahendi humoris intentione traducti quoquo modo id perficiendū crediderunt, immensa siti atq; fame ægros afficiētes, corpore concauo pectine decursio: & mille præterea urinalibus medicaminū, quz diuretica uocant, uesciam cōmouendam probāt, & uentrisfluis potionibus, quz catartica appellant, uentrē prouocandum dicunt cocco Cnidio, atq; lepida cyprina, & chamælex & hippophaë herba, & ex crotonibus confecto oleo cicino: item neoro. Ex quibus cunctis stomachus uexatur, atq; cibi appetitum amittit, sitis incenditur, corpus defluit, sanguis corrumpitur, atq; humor detractus renascitur, uires auferuntur: siquidem neq; potestas moderandæ detractionis sit in artificis manu. Item quidam tanquam licabile humoris ophiten lapidem ligauerunt, expertis ægrorum ordinamus. Herodicus. Singulatim deniq; nobilium medicorum historiam ordinamus. Herodicus igitur, ut Asclepiades memorat, uentris adhibet purgationem, atq; post cœnam uomitus, qui sint implebiles potius quā siccables. Tunc uaporationibus tepidis aceti decocti exhalatione confectis utitur, uel aquz marinz, admixta thalia herba, atq; hyssopo, & hijs similibus, uescijs bubulis repletis corpus uaporationum probat, uel alijs quibusq; maioribus inflatis tumētia loca pulsari iubet: Sic etiam antiquissimus Euryphon. Hippocrates uero libris, quos ad sentētiās Euryphon. Hippocrates. Cnidias scripsit, magis utendum dicit egestate atq; uaporatione, & continētia, & danda sicca uel arida quzq; & acriora mandenda: Si enim æquibilibis æger fiat, hoc est, urina facilior, ac si spiratio difficilis fuerit, quā dyspnoean uocant, & tempus æstatis, & ætas mediā, dicit ex brachio phlebotomandos, & post detractionem factam dat panem calidum uino infusum atq; oleo, & carnē suillam ex aceto decoctam. Dat etiam cantharidas tres detracto capite, & pedibus, & pinnis in tribus cyathis aquæ contritas: sed neq; quo tēpore exercitio utendum sit manifestans, neq; usque quo mandenda sint acriora, uel quando uaporationes adhibendæ. Dehinc si phlebotomare oportuerit, nō solum æstiuo tempore, ac mediā ætate, sed etiam omni tempore atq; ætati conuenire probamus. Est præterea importunum uinum, ac repugnans eo tempore commodis phlebotomiis. Item cantharides

Asclepiades.

 Euryphon.  
 Urinalia.  
 Ventrifluis.  
 Ventrifluis.  
 Ventrifluis.  
 Ventrifluis.
Ophis.  
Herodicus.Euryphon.  
Hippocrates.

**C** cantharides humorem comouent; carnis quoq; offerenda tempus significare neglexit. Diocles libro quo de passionibus & causis, & curationibus scripsit, siccan-  
**Diocl.** dos inquit, ac mediocriter uaporandos, & deambulationi tradendos & egrotantes,  
 & plurimos sudores comouendos, uel uomitū & urinam prouocandam diagra-  
 dio, & apij semine resolutio succo herbæ saluæ. Item cardamomū, quantum uen-  
 trem ualeat semel deducere, & in aceto panem solutum, & piscem salsum, uel  
 pisces elixos & assos, uel silurum piscem, olera, radices, allium, organū, rutam,  
 fatureiam, uinum album, & non aquatum, & ferarum carnem: in deambulatio-  
 nibus uentrem iubet contineri, cæteras corporis partes defricari, exceptis cruri-  
 bus. Sed hic quoq; communi cæterorū subijcitur accessioni: solum prædamna-  
 mus, quod humorem detrahens purgatiuis atq; urinalibus medicaminibus, &  
 uomitu, & sudoribus prouocatis, quibus ex rebus sudor mouendus sit tacuerit,  
 uel uomitus. Item deambulatio sæpe laboriosa, & piscis silurus bromosus, & al-  
 lium inflabile, & plurima ferarū carniū malos habere succos probantur. Inde  
 item quæ sint olera deligenda memorare neglexit, & neq; fortificari uentifica-  
 tionē, uel crura aut totū corpus recte potest, cum nullum modū uel tempus me-  
 morauit. Praxagoras secundo libro Curationū cataplasmatibus utitur, & malag-

**Praxagoras.**

**Uini spobis  
 uisui.**

**D**

matibus sudorē mouentibus, & urinalibus medicamentis alijs atq; alijs, & uen-  
 trem deducentibus. Similiter cono, & folijs hederæ, & semine coliculi agrestis,  
 aut nasturtij, aut centaurea, uel allio, pipere, & pseudodictamno, aut dauco, &  
 chamæpitys herbæ, & petroselinī semine, uel graminis, uel quolibet horum simi-  
 lium, & sudorum diurna prouocatione corpus deducit. Vitur uomitu non solū  
 ieiuno, uerum etiam post uespertinū cibum, & ægros plurimū potat, ex quibus  
 sensuales uix implentur. Vitur etiā cataplasmatibus aromaticis, quorū species  
 non designat, sed solum cum moromeli, uel lini semine adhiberi iubet, uel malis  
 cydonijs, aut caricis, uel adipe, & aqua, aut uux lupinæ, uel apij succo: equidē  
 uirtutis repugnatione omnia confundens: siquidem alia sint cōstrictiua, ut ma-  
 la, alia laxatiua, ut plurima cæterarū specierū. Deinde post oris collutionē sorbi-  
 les dat cibos, quibus uentrē facilem se facere pollicetur: Item potum repugnari-  
 tē mordacitatio: dat enim acetū uel pulcā, uel hjs rursū contraria, ut nullam,  
 quibus confusa regula etiā secundū ipsū approbatur Erasistratus libro quo

**Erasistratus.**

de hydropē scripsit, deambulationē ordinat adhibendā prius quā aëris ætus  
 ardeant, tanquā curans. Sed si uentris inquit facilitas non fuerit, prohibenda  
 medicamina atq; legumina, & olera, cum sint plurima olerū quæ molliant uen-  
 trem, sine ulla corporis uexatione. Item plurimo cibo ægros nutriendos probat,  
 cum sit ex paruo sæpe indigestionis metus, si neq; inquit, uenter fuerit motus,  
 adhibendū clysterē simplicē, hoc est, qui nulla sit acriori materia confectus: cibū  
 partitur cibo uel cœna, & ante uesperā ægros deambulatione moueri iubet. Tunc  
 initio noctis reficit, quando etiam sanis metus est digerendi. Post cibū præterea  
 perūgit in lectulo, & certo numero utitur frictionū: dat catapotia medicaminū  
 ante utranq; cibi refectionē in fauī modo pro uiribus ægrotātis, neq; plus decē,  
 neq; minus quinq; numero, & eorū materiam tacet, solum memorat quod seco-  
 rosis hæc catapotia congrua uideantur, atq; ad urinales partes uenientia plurimū  
 faciunt mictum: Tum post catapotia dari iubet cibo panē ex farina sesami, & sal-  
 sum obdulcatū, ne sitim faciat, non discernens tempus drimyphagiæ: Tum in-  
 quit dandos pisces, atq; carnē gallinarū, uel ferarum, & agnorū, & hœdorū, &  
 forbilia plurima cū melle uel lacte: non aduertens lactis & mellis qualitatem in  
 corruptionē facile uenire: nunc dat potum paruū, & non post prandij, sed post

**† fabæ**

**Uentris  
 uisalia.**

uespertinū

**A** uespertinum cibum hoc conuenite dicit, ut etiam similiter memorat Philistionis frater: Probat etiam ante alios cibos accipienda aridi fici pinguis duo uel tria, mox contusa atque oleo tincta. Sed hæc omnino digestionem difficilia iudicantur. Prohibet præterea lauacrum, uel plurimo temporis interuallo permittit, & non designat, quod illud, uel quantum sit tempus. Vitur etiam malagmatis cataplasmatibus, cum somno cubauerint ægrotantes, non tamen designans eos, qui coaceruatam ac uehementem humoris detractionem reprobant, quæ Græci cenosin uocant, & propterea etiam paracentesin, quod quidem congrue dictum superius docuimus. Item tumore in iecore constituto, attestantibus febribus ob tumoris medelam cataplasmatibus utitur ex malis cum uino, constringens ea quæ laxamentum poscere uidentur, & à digestionem faciendam ex ficu atque chamælea & chamæpity utitur cataplasmatibus. Item ad elicendum quicquam in locis constitutum utitur diæpago, quod ex ruta conficitur, & nihil de temporibus memorat adiutoriorum. Asclepiades etiam libro quo de hydropse scripsit paruo humore collecto, siue plurimo, necdum tamen pedibus aut cruribus infuso, athletarum regulam adhibendam probat, ex plurima deambulatione atque cursu, & refrigeratione retento spiritu. Tunc cibo dandum panem diligenter elaboratum atque exercitum cum piscibus natura duris. Ac si inferiores humor occupauerit partes, plurimos prohibet motus, & medicamina uentris illa atque urinaria. Vitur autem paracentesi, sed omnino ex angustis atque paruo foramine. In leucophlegmantia uero fricationes & cataplasmata frigerantia ex malo cydonio, & murra, & uitis anulis, quos helicas uocant, & malo punico, & lenticula, & herbo, atque pulento ueteri, & alumine, uel ruta, & bulbo, & melle, & origano, & thymo, & nitro, & caricis, & ueficis illusionem adhibendam probat. Laudat etiam punctiōem quatuor digitis à talo distantem faciendam superius ab interiore parte, sicut in phlebotomia seruatur, ut per eandem punctiōem humore effuso corpora releuentur: si minus, scarificatione altiore utendum referens, scilicet uehementiore atque efficaci adiutorio, & neque declinans uulnerationes, quæ necessario in huiusmodi passionibus difficiles curatione probantur. Socrates Chirurgus omni ex parte diuisuras faciens easdem adussit, ex templo corporis ingerens raptum, quem Græci spasmion appellant. Themison secundo libro Tardarum passionum utitur gestatione & defricatione, atque exercitio, uel communiter regula exercibili, salibus ac nitro fricans corpus, & frigida perfundens: ex quibus non æqualiter adficit: membra quippe cum interpositis tribus uel quatuor diebus aqua marina feruenti perfundat. Item iubet post gestationem tribus uel quatuor cyathis uino mixto ægrotantes potari. In ordine, inquit, medicaminum, non designans quem esse uelit ordinem medicaminum, aut nutrimenta digestionem difficilia. In uespertino inquit cibo utendum, mediocri potu, ut nec sitis ægros afficiat, neque plurima liquoris ingestio, sed uinum eligat acrioris uirtutis, & neque confusum: Sed temperandi moderationem tacet, ut medicocriter quidem dicat quod est improprie dictum: etenim extendit temperandi moderationem neruos, nocet, & ingerit sitim. Prohibet præterea idem uentris illa medicamina atque urinaria, quæ catartica atque diuretica uocant, & per singulos menses ternos radicum ordinat uomitus: Sed erat regulæ medicinali conueniens ad leniorem latitudinem, siue spatium uomituum designare quantitatem. Vitur etiam in utroque talo scarificatione, ut Asclepiades. In ascite uero initium ex uomitu uomitum, quem helleboro faciendum probat: si inquit metuerit quisquam radicem uomitum, & est præceps, atque ut ita dixerim, periculosum non medicatum corpus magno adiutorio discere: Aliam quoque regulam similem dicit ordinandam, sed passionis initio

Philistionis  
frater.Uinum  
paracentesis.Diæpaganum.  
Asclepiades.Λουκοφλεγμαν  
τις.

Λιμου.

Socrates chi  
rurgus.

Themison.

ασκίτις

**C** neq; ungentis tangi, neq; fricari uentrē permittit. Cæteras autem corporis partes si multa, inquit, fuerit humoris infusio, defricandas, initium ex uentris finibus augendum curationis modum: sed oportebat ob æquandū corpus totū fricatione curari. Item interpositis quatuor uel quinque diebus aqua calida, & magis marina tribus uel quatuor uasculis foueri: sed neq; hoc æqualiter. Item ante unctiōē utitur sinapismo: post singulas gestationes lambendam dicit scilam in electarij uicem: Et si plurima fuerit humoris infusio, utitur paracætesi. Sed primo die, si uires patiuntur, abstinet cibo. Quod si minime ferre potuerint ægrotautes, partem tertiam panis solitæ quantitatis aqua infusam offerendam dicit. Tum alia die articulos ungens, atq; ora lauans, simili panis reficit modo, cū pulmento uolantū: cæteris quoq; diebus omni æqualitate augens, atq; ægros refubat, sed quinque uel tribus cyathis uini aqua temperati, ante cibum potat ægrotautes, & paracætesin prohibet, \* tanquā Apollophanion, aut diacuphorbiū. Vile pleriq; ueteres huic passioni etiā macerinos emplastrum memorāt. Item icelson usq; ad quinque dies imposita linquentes laudauerunt. Conuenit recorporationi etiā solis igniti uaporatio. Oportet autē sacellum lineū implere sale torrido, & apponere patientibus partibus. Tunc superaspergere aquam balsam calidam, & superimponere cauteris latos, aut ex igne repletū congruæ latitudinis: Sic enim calefacto sacello instillans humor, & cum feruore acerrimo decedens, atq; artus singulos inuadens, quos Græci poros appellant, laceffendo demutant, recorporatiua sine dubio uirtute: Facit enim tanquā de sinapismo partium ruborē, quem Græci phœnigmon appellant. Prodest deniq; etiā ex oleo rubor effectus hoc genere farina cōspersa, atq; manibus exercitata, quo facilius fiat, erunt partes in passione constitutæ circulatim ambiendæ, cuius spatium, siue medium oleo replendum. Tunc cauteris longi atq; igniti immittendi, qui quidem cutem tangere minime debent: Hoc faciendum alterna uice, donec oleum calefactum feruorē corpori tradat. Iubendum præterea ægrotanti, ut se immobilem præbeat, cum oleum summo feruore coierit, ne se mutando adurat. Tentandum deniq; etiā cauteris sine olei motu submittere, atq; lauare supposita spongia statim, ne distillatione cauteris uicinæ partes adurantur. Tum cum medio crem senserit æger uisionē, ei uas erit supponendum, uel adiungendum, ut se repente inclinādo unam faciat olei refusionē, ne uicinantia uita pustulentur: Alij cacabuli, uel uasis fictilis fundum perforantes, labia uel ora pertusuræ patientibus locis adfixerunt, supradictō more farina cōspersa circundantes, sic oleo cacabulum impleuerunt, cætera supradictō ordine gerentes: Alij usq; ad uisionem uaporibus igneis usi sunt: Alij diuersis generibus pustulationē locorū faciendam probauerūt, uel extemplo escharas patientibus ingesserunt partibus: aliquando solo sinapi cataplasimantes, quo superficies cutis pustulescant. Item sinapi admiscentes glebæ calcis æquis ponderibus & sulphuris partē, atq; simul conterentes, paruo oleo & aqua admixta linteolo illita, prostrato alio linteolo tenui eidem parti quam curamus superimponemus illitum, quo sensum atque per triplicem materiā transiens uis medicaminis pustulationē faciat loci. Item non aliter etiā ex cinere salicis hæc facere poterimus: Eius enim corticem inuidentes, atq; ex eius cinere puluisculum facientes in umbra siccati sinimus, tunc locis præulceratis adponimus, super distillantes liquefactam calcē, quam uulgo colatam uocant, sed paulatim: cum enim fuerint humectati puluisculi cutis superficiem pustulabunt. Quod si quisquam plurimū perseuerauerit, etiā al-

Theſſalus.

Videtur aliqd  
deesse, ut for-  
tasse sit legen-  
dum: Victur  
etiā emplastrum  
frisis tanquam  
Apollophanion  
aut diacuphor-  
bio.

Uuirtus per  
p. 117. p. 118.

**D**

Colata calc.



A tiora inusta putrescunt, & ut Græci appellant escharam faciunt. Alij denique ex radice herbæ, quam struthium uocant, loca ulcerari præcipiunt: Vsta etenim radix concepta flamma cuti apposita pustulationē necessario facit. Sed alij hanc uisionē tanquam imbecillem reprobantes cauteribus aiunt faciendā: quos quidem primo tepidos probāt apponēdos, donec cutis pustuletur, tunc igneos: sed hijs omnibus interiecto spatio trium digitorū loca dicunt inurenda, & esse cauteses semper aduncos in modum gamma literæ. Sed alij hanc appositionē meruentes anchistris ex utraq; parte prætendunt, & inter eos cauteses imponunt, ne ulla uisione nerui tangantur. Alij ligneos fungos interius ac superius angustos formantes patientibus apponunt locis, quos summitate accensos sinunt concremari, donec cinerescant atq; sponte decidunt: Est enim hæc uistio leni penetratione moderata. Item alij linteolum aqua tingentes partibus resimplicatum apponunt. Tunc tabulæ tiliari apponentes struthium herbam concidunt in breues perticulas, ac deinde ferramēto † igneo singulas partes oleo tingentes accēsas imponunt tabulæ scilicet tiliæ, hoc secundo uel tertio facientes per interualla, donec materia carbonescat, atq; pustulas cutis efficiat. Item alij, ex quibus sunt Demetrii sectatores, eius partis quæ patitur manum inter pollicem & demonstratiuū digitum, quem Græci lichenon siue dicticon iuxta inferiorem articulum inuolutis inurunt cauteribus: quos quidem nunc nude cuti apponunt, nunc præmissis linteolo oleo tinctos. Modum autē uisionis constituunt, cum in alia manu, hoc est quæ sit contraria parti patienti sudor emergens apparuerit. Tum post supradictas uisiones imperant ulcera referuata in saniem prouocari. Alij deniq; statim lana succida eadem contexerunt loca: Alij marribij coma contrita cū sale uel oliua nigra, aut sesamo infuso, siue nucibus. Tum tertia die lenticula multa, atq; mulso decocta, donec ulceris cadat eschara. Tunc cœnomeli aiunt imponendum, uel ea quæ ualeant lacessendo puris exitū prouocare. Item florē æris cum nigro helleboro apponunt: Et quidem aliqui releuantur interuenientis recorporationis causa. Sed quoniam istiusmodi uisionibus plurima uexatio coniuncta est, erit melius alijs adiutorijs mederi. Ausi sunt præternas adhibendas probauerunt, ut etiam Philitionis frater idem memorat libro xxxii de adiutorijs, scribens quendam fistulatorē loca dolentia decantasse, quæ cum saltum sumerent palpitando discusso dolore mitescerent. Alij deniq; hoc adiutorij genus Pithagoram memorant inuenisse: sed Sorani iudicio uidetur hij mentis uanitate iactari, qui modulis & cantilena passionis robur excludi posse crediderunt. Item plurimi ex talo atq; ancala eiusdem partis quæ fuerit passione possessa uenam diuidentes sanguinē detraxerunt: sed magis partes impleræ grauantur, cum repente uacuata loca in semet materiæ fluxum inuitant, Nobilium uero principū Hippocrates libro quo de locis conscripsit, incurbitam iubet siue scarificatione apponi. Vitur etiam feruentibus medicaminibus potis, quæ si essent uere congrua passioni, minime tamen ad excludendam uetustatē ualere crederentur. Diocles libro quo de passionibus atq; causis & curationibus scripsit, item secundo libro de curationibus, regulam dixit siccam & frigidam & nubilem ægris cōuenire, cum humida atq; calida prodesse huic passioni demonstrauerimus. Vitur etiam urinalibus medicamentis, quæ diuretica appellauit, & probat conditū bibendum, quod pleriq; Latini mulsum uocant. Vitur etiam cibo ē uisceribus asinorū, & clysteribus sanguinē prouocantibus, & uino nunc

Cauteres for-  
ma T. r.  
ar. x. i. a.

† mydio

Demetrii se-  
ctatores.  
Digitus  
ar. x. i. a. d. u.  
et. i. i. i.  
index.

ar. i. i. i.

Philitionis  
frater.

Pithagoras.

ar. x. i. a.

Hippocrates.

Diocles.

Mulsum con-  
ditum.

**G** albo nunc nigro, neq; ordinis, neq; temporū, neq; congruæ qualitatis memor:  
*Themison.* Itē Themison secundo libro Tardarū passionū in quibusdē peccare perspicit,  
 phlebotomans talum uel ancalen, atq; lanis succidis cum oleo & aceto, & sale  
 statim patientia cōtegēs loca, articulos astringens, & intestina per clysterē exul  
 cerans, & os ipsum quod ischion Græci uocant. Ante hæc omnia & equitare im  
 perat ægrotantes, quo magis ob uehementiā motus partiū faciat uexationē. Itē  
 alternis sinapizat diebus, quod est immoderātū, & in omnibus ulcerationē cutis  
 existimat faciendā, qua plurima cōgrua prohibētur adiutoria adhiberi, cū par  
 tes ulceratæ apposta tolerare non possint. *Thessalus.* Thessalus uero uaporationē faciendā  
 improbe recusauit: est enim recorporatiuæ uirtutis, neq; initio recte constricti  
 ua probat adhibenda: Etenim ischiadica passio uehementi atque difficili strictu  
 ra confecta perspicitur.

DE ARTICVLORVM PASSIONE, QVAM GRAECI  
 arthritin uocāt, & de pedū dolore, quē podagrā appellāt. CAP: II.



**V** Traç passio à parte corporis quæ patitur nomen accepit: altera cō  
 muniter ab articulis omnibus, altera specialiter à pedibus. Sed po  
 dagrā Græci etiā ab impedimento, uel retentione pedū aūt nomī  
 natā, uel à ferali dolore: siquidē omne quod immite fuerit abusiue  
 agreste uocamus. Earum deniq; passionū discretio promptissima  
 atq; manifesta esse perspicitur: Nam podagra pedum tantūmodo dolor est. Ar  
 thritis uero etiā cunctorum articularū, siue multorū, & aliquando à pedibus su  
 mens dolor exordiu ceteros articulos implicauit: aliquando in alijs incipiēs pe  
 des inuasit: Nam quidā medici arthriticam passionē genus uocant, podagricam  
 uero speciē: Etenim quod Græcis hamarthritis recte nuncupatur: siquidē sit in ar  
 ticularis dolor, quāq; in pedibus cōstitutus: arthritidis uero nō ilico podagra dici po  
 test: siquidē genua uel manus tenens gonagra aut chiragra, uel tenontagra dici  
 porest, si maiores tenuerit neruos. Sed de hijs nominibus quæ locorū causa di  
 screta uidētur, unius tamē esse uirtutis intelligant, in curationibus certandū nō  
 est: Sunt enim harū passionū antecedētes causæ uariæ, ut uinolentia, frigus pro  
 fundū, cruditas, libido uenerea, labor immodicus, uel repētina desertio solitæ  
 exercitationis in ante actem morē: aut rursum non ex infantia, sed secūda & se  
 ra ætate affecta, cum mollibus neruis atq; insuetis fuerit illata quassatio. Itē per  
 cussio antecedēs ex palæstra forti exercitio: Frequentat autē in uirīs magis atq;  
 medijs ætatibus: difficile uero in mulieribus atq; in eunuchis, & pueris, & iuue  
 nibus fieri inuenitur. Videtur præterea plurimis antiquis medicis etiā genui  
 no cursu in posteros migrare cum semine, & propterea succedētes inuadere, de  
 qua re principaliter Responsionū docuimus libris. Itē per aliquos probatur fre  
 quentare regiones, ut Cariam, & Alexandriā Aegypti uicinā: nec non temporis  
 certis nasci, itē magis asperari uidetur, ut primo uerno, secundo autumno,  
 tertio hyeme, ætate uero difficile. Sequitur autē passione articulari tentatos, tor  
 por, atq; fornicatio eorū articularū qui tangūtur, & difficilis flexio, atq; rursum  
 extensio. Itē grauedo & uacandi dulcedo, & ad parū motū uehemēs labor, atq;  
 dormiētibus iensus quidā resonantiū articularū, & cum de somno surrexerint,  
 ueluti saltu earundē partiū afficiūtur. Tum horror uel rigor, atq; tremor sine ul  
 la manifesta ratione partiū sequentur. Dehinc cū passio se extollere cœperit, in  
 podagricis dolor alterius pedis, aut utriusq; cū pūctionibus nascetur, incipiēs à  
 uestigio aut plantæ cavitare, uel sæpius à maiore digito, attestante torpore & gra  
 uedine, & difficili motu cū horrore rigido, atq; inæquali per mēbra, & aliquādo  
 plurimo feruore, aliquādo frigore: ut aliū refrigerantia, aliū calida desideret ægro  
 tantes

*Agrestia que  
 dicimus  
 uel aggra*

*uol aggra dicitur  
 arthriti*

*D  
 uol aggra  
 uel aggra  
 uel aggra*

*Podagra hæ  
 reditaria est.*

*Caria  
 Alexandria*

**A**ntes, & propterea quædam altera calida, altera frigida podagra putauerunt nunc  
 pandam. In initio, ut sæpe contingit, similis color patientium atque sanarum uideatur par-  
 tium, attestante æqualitate, nullo emergente tumore. Dehinc inflatio partium fiet cum  
 rubore. Quapropter releuatio aliorum sæpe sequetur. Tum peiorate passione ar-  
 thritica sufficitur passio, cum in unum omnium cogitur articulorum consensus, & fa-  
 cile ex articulo in articulum uenit dolor, nec desines priusquam cunctos inuaserit no-  
 dos. Sæpe denique prioris articuli dolore declinante secundus inuaditur, atque eodem  
 similitur mitescente tertius sumit exordium, consentiente etiam uelica atque spinæ ma-  
 ioribus nervis, quos tenontas appellant, & in stomacho etiam nausea uel uomitu  
 iactantur ægrotantes. Tunc articuli tumetes inflantur, ac deinde durefcunt, & so-  
 lidati faxæ faciunt qualitatē. Tum etiam nigriores efficiuntur, atque conuertuntur in  
 obliquas partes digiti uertantur, aut reflexi lupinætur, aut uicinis adfixi incum-  
 bant, & aliquando humore purulento uel mucilento collecto, aut uiscoso generent  
 poros, quos nos transitus dicere poterimus, dehinc etiam lapides sufficiant, qui quædam  
 articulos soluant, & cutē distendant, atque erumpentes prominent, & chirurgi  
 detrahantur: aut exilientes cyathis, quo ferramenti tollantur, quod nos laureolum  
 dicere poterimus, & rursum renascantur. Tum crura dolentium partium cessante nutri-  
 mēto tenuata languescunt, & arida efficiuntur. Erunt præterea ægrotantes paruis  
 ex causis mobiles atque iracundi, siquidē motum uel actum non sine querela accipiant.  
 Principaliter autē hæc passio constituitur in nervis, uel eorum colligationibus, tum  
 cætera morbo consentiunt, atque cõiguos uel superpositos lacertos, & maiores ner-  
 uos pari demõstrant. Est præterea passio non facilis curatione, & aliquando magni-  
 tudine insanabilis, non ut plerique putant natura: Causæ autē difficillimæ curationis,  
 uel ut sæpe cõtingit impossibilis, manifestæ atque plurimæ reperuntur: est enim pas-  
 sio in nervis constituta quæ sint natura densissimi, & inter articulorum nodos constituta,  
 quorum angustia cõprimuntur, & ad omnem motum asperantur magis in pedibus: hinc enim  
 plurimas colligationes nodorum naturaliter habet, & totum corpus sustinendo laborat.  
 Præterea hæc passio initio paruitalis causa negligitur, & cõtempta cõualescit:  
 quippe cum à multis minime credatur emergere. Alij denique digiti luxati, aliqui pedis  
 uersione, aliqui cuiusdam rei calcata, uel offensa duritia aut feruore querunt: tum ne-  
 cessitate coacti augmenti temporibus in cõfessione ueniunt ægrotantes. Ob hoc igitur  
 passio pfeuerare, atque corpora possidere meditat. Non autē minus etiam longorum  
 lenimentorum causa, quibus recessisse putat, cum sanos ægrotantes fingendo pmit-  
 tatur, adiuuante etiam intemperantia, qua cum sæpe cõcipi passio pspicit, manere posse non du-  
 bitat: quod dicat diatribo, si ueter officium non agnouerit clyster adhibendus simplex  
 atque ita totius passionis status accepto, ut inflata uel tumetia loca uideantur, scarifi-  
 catio adhibenda: & ubi permiserint partes cucurbita figenda, uel hirudines admo-  
 uenda. Est autem omnium leuior præter cucurbita scarificatio: siquidē nulla quassa-  
 tio partium fiet, quæ necessario cucurbitæ cõiuncta est. In hirudinum moribus con-  
 sensus adiungitur, & propterea, ut supra dictum est, simplex cõflatio lenius probat.  
 Adhibenda etiam uaporatio spongiarum, tum aqua calida fomētatio, uel aqua & oleo,  
 aut decoctionis foenigræci, aut lini seminis, uel hybisci. In cataplasma mitigati-  
 uum, quod iam dudum minime posse adhiberi uidebat: siquidem tumetia pondere  
 grauari non debeant. Sit igitur panis diligētius emollitus solus, aut admixta radice ar-  
 gallici, quæ Græci symphyton uocant, uel hybisci decocta, uel cuiuscumque similis uirtu-  
 tis, quæ pbauius adhibendas uaporatiões. Tum cum firma declinatio fuerit constitu-  
 ta adhibenda lauacra, atque uarius cibus, & aqua potu danda, & propter passiois nequiti-  
 am adhibenda etiam cerotaria ex oleo dulci uel cyprino, aut ex adipe cõfectum medicamen-  
 tum. Græci diasteton uocant, tunc malagma diachylon uel mnafeum, aut quod appel-

Tumor.

Nisi.

Laurolum.

\*

Nisi.

Nisi.

**C**iant diateleos, uel dioxeleon, uel diathalaffestum, paulatim fortificandum corpus deambulatione liberis calciamento pedibus, & cum cautione aduersantium rerum, ut ne quid nimis, maxime uini, aut indigestionis, aut Veneris. Arthriticis uero conuenit etiam digitis ceram emolliendam dare, uel manipulos tenendos, quos palestritæ alteres appellant; tum mouēdos cereos, uel ligneos primo cum paruo plumbo interfuso: tum pro modo profectus grauiores, & in tardate passione superpositionis tempore supradicta seruanda simpliciores curationis. In lenimento uero adhibenda fortificatio, tum recorporatio. Sit igitur primo gestatio pro modo uirium, tum deambulatio molli stramine coæquato solo, adiecto uocis exercitio, cum corporis unctione: Etenim uacatio crassificat corpora, adeo etiam & in hijs qui ex alijs forte plurimo tempore iacuerint causis, hac ratione articuli commoueantur, cum nerui non exerciti ualidiores efficiuntur. Adhibenda etiam lauacra per interualla dierum, & uariis cibis ex mediæ materis qualitate, uinum paruum, lene, & semper post cibum: Tum dropax simplex atque compositus, paropresis ex igni uel ex sole, atque pellibus feruefactis, & ex arena litto ris: Tum aspergines, quas Græci sympasmata uocant, ex nitro & adarce, & euphorbio, & sæpe memoratis speciebus: Tum ungenta & acopa ex squilla confecta, & agrestis cucumere: Item euphorbio & adarce. Dehinc malagma adhibendum, ut est quod appellant diahalon, aut diadaphnidon, aut diadarces, aut diastactes conias, uel quicquã similitum. Item rubor cutis ex sinapi faciendus, quæ Græci phœnigmon appellant. Item drimyphagia, & cyclorum regula, & radicis uomitus, & hellebori, & embasis facienda, sicut de ischiadicis scribentes memorauimus: uel fomentatio ex decoctione artemisiæ herbæ, aut marinæ feruentis aquæ, dehinc natatio feruens uel frigida. Item usus adhibendus aquarum naturalium calidarum: tum frigidarum, ut sunt in Italia quæ appellatæ sunt Albulæ, uel Cotiliæ, & omnium supradictorum affectanda repetitio: dabit enim ratio alijs integram sanitatē, alijs raram doloris admonitionem, ne iugi superpositione uexentur. Veterum quidam annalia medicamina potanda probauerunt, ut est quod appellant diacentaurion. Item diafcordeon bibendum anno continuo iudicantes in hijs qui non plurimo tempore fuerint passione uitati, hoc est intra quinquennijs temporis constituti, adijcientes quod bibi debeat medicamentum prædigesto corpore, & omnino nullo obstaculo impedito: Sin minus, repræsentandum numerum dierum, quo integer compleatur annus, quanquã longo tempore porrectus. Secundum nos autem iuxta Sorani iudicium est metuenda diuturna medicaminis sumptio, cum neque soliti cibi iuges atque iidem utiles recte probentur. Sic denique legimus quosdam ueteres memorasse ex iugi medicamine potu in celeres, uel acutas uenisse passiones, & alios apoplecticos, alios pleureticos, alios peripneumonicos interisse. Item quosdam continua difficultate spirationis affectos, quam Græci dyspnoean uocant. Hijs uero qui se isto medicamine profecisse testantur, non aduertunt seruata digestionis causa id fuisse permittum: quippe cum cæterarum rerum excessus declinando quidam seruauerint sanitatem, cum interrompere metuerint sumptionem medicaminis sui: & propterea hijs intentionibus occupari alias sibi nesciuerint profuisse rationes. Item alij unctionem nodorum faciendam probant, quam nos reprobamus: siquidem consensus faciat tumorem. Item alij transeundum ex alijs in alia probant ungenta & cataplasmata, nunc specie, nunc genere differentia, donec ægrotantes releuentur: siquidem alia pro alijs corporibus uideantur conuenire, & propterea doloris mitigatio sequetur. Ordinauerunt denique etiam contrarias uirtute materias laxati-

A uas simul atq; constrictiuas, & re corporatiuas, ut mnafeum malagma, ſiel dia-  
 chylon. Item è contrarijs uehementius conſtringentia, ut diayteon, & cyzice-  
 nem, & Eraſiſtrion emplaſtrū. Itē ex panici polline, & lini ſemine cataplaſma,  
 & ex coliculo agreſti, uel herba erigeronte, & bramite, & mandragora, & alterco  
 & lenticula, & citri medio, uel peponis, & origani, uel thymi, aut uua lupinæ,  
 aut portulacæ, aut betæ, aut mali punici folijs uiridibus, uel eius caduco, quod  
 Latini ambulacium uocant, decocto cum aceto, aut ruta agreſti cum aceto ſin-  
 gulari, uel cum ſimplici alica, aut aceti ſedimine, cum apio: aut uitis folia, cum  
 ſimplici pulento, uel ex herbi polline, aut fabæ, uel hordei, aut lolij, aut lupini,  
 cum fece uini uel aceri, uel ex fico decocto cū aqua & uino cōtrito, donec mel-  
 lis ſumat craſſitudinē: Ex quo detractis durioribus partibus imperant coquēda  
 rursus reſidua. Item ex papaueris coliculis, quos Græci cocias uocant, uel eorū  
 folijs, & malis cydonijs & punicis in uino decoctis, & bulbis cum melle, uel al-  
 terci radicē cum ſtorace, uel iaquintio, & marrubij. Item calce melli concoctū, &  
 opioſtoraci, & amygdalis amaris cum cyprino oleo, & aceto iugiter coctis par-  
 tes ungendas docent, ex diſſimilibus rebus ſine ullo ordine materias ad mouen-  
 tes, inſanabiliter ſimul atq; indocte deſcenſum ab alijs in alias ſpecies faciēdum  
 iubent, donec ut æſt imant iudicia reperiātur: ſiquidem ſit pro corporibus alijs  
 ex alia ſpecie liberatus. Et eſt hæc experimenti tentatio, quam Græci ſchediaſti  
 cen piran uocant, quæ non deſtinata paſſionibus adhibeat adiutoria, ſed pro-  
 banda. Fit præterea ut acceſſiones tempora percurrant, & ſua ſponte leuigentur,  
 atque ita occurrens declinatio, uel paulo proximius lenimentum euentum cu-  
 rationis afferat: Quod ſi forte uere proſuiſſe putaretur declinationi adhiberetur,  
 rurſum iniurijs noxiarū neceſſariō comprobatur: ſiquidem non ſuo tempore ui-  
 deatur admotū. Alſos igitur ex alijs releuatos rebus exiſtimant. Sed hoc tempo-  
 rum fieri cauſa reſpondere debemus, quæ corpora urgentius obtinere neceſſe  
 eſt: Conueniūt enim in iſtis mediocriter conſtringentia. Augmentis uero atq;  
 ſtatui mitigantia uel laxantia, declinationibus emollientia, lenimētis fortiſſican-  
 tia, atq; re corporatiua: frigida uero uel coërcentia, quæ agroſtica uocant, etiam  
 igne ſacro uexatis admixta congrua efficiuntur. Sed aſunt aliqui nunc quoque  
 tanquam laxatiua inſenſos, nunc frigerantia releuare. Feruori etenim ex tumo-  
 re ueniēti admota eius factu tepefaſta conueniunt, & tunc temperata mitigāt,  
 tanquam a quæ feruenti admixta frigida. Sed eſt hoc falſa conſuſione collectū:  
 quā Græci ſophiſina uocauerunt: Oportebat enim, quantū ad hanc, ut putant,  
 rationē omni tumori frigidas conuenire materias. Igitur ſecundum paſſiones  
 ac tempora nos diſcretas aptamus. Alij uero acopum ex rana rubea in podagri  
 cis admirātur, alij marini uituli, alij pedes unxerunt ex eius tergo calciamenta fa-  
 cientes, alij uiuentē beluam oleo coxerunt, alij lupum, & ſpecialiter unctioſis  
 genus conuenire probauerūt. Multa enim ficta fide ſine ratione creduntur, cum  
 forte paſſio non fuerit inſidioſa, & cum corpus tardauerit, non in uno atq; eodē  
 tempore perfeuerans. Item plurimi uomitū poſt cibum laudauerunt, ſecundo  
 uel tertio per menſes ſingulos adhibendum: ſiquidem & materiā redarguat, &  
 indigeſtos eſſe nō ſinat, non aduertētes quod magis uexabilis approbetur, cum  
 hoc adhibito gingiua putreſcant, dentes moueantur, oculi confundantur, & to-  
 tum impleatur caput, ſtomachus quoq; grauiſter afficiatur, & propterea omnes  
 abſtinentia ciborum ſumendum curationis. Multi autem medicinæ ſcriptores  
 purgatiuis & acrioribus pollent clyſteribus, & urinalibus medicamentis, quæ  
 diuretica

Ambulacium.

Lonicera.

Schediaſti  
cen piran.

Agroſtica.

Sophiſina.

**G** diuētica uocauerunt. Sed oportet cauere stomachi uexationē, quæ uarietate facile medicaminū fiet. Item uescicam quæ sit neruosa qualitatis prouocare: tradit enim necessariū uniuerso corpori uexationē per sibi cognatā neruorum qualitatem. Specialiter autē ueterū pertransiēdo errores, uanū puto atq; prolixū quod de podagricis scripserūt, & propterea fastidiosum maxime, cū sufficiat cōmunis materiāū memoratio. suprascripta, tacitis dominis qui nunc dicent: Diocles libris quos de passionibus atq; causis & curationibus scripsit: Praxagoras tertio libro de morbis: Erasistratus libro quo de podagra scripsit, prohibēs tamen purgatiua adhiberi, quæ cataracta uocauerūt, malagma uero Ptolemæo regi promittens, cuius scripturam non edidit: quanquā quidam sibi uisum Erasistrati nomen medicamen. Item Erophili sectatores multi, atq; Asclepiades libris ad Erasistratum scriptis, & Heraclides Tarentinus, & Themison secundo libro Tardarū passionū aliqua ut methodicus, aliqua ut nō methodicus decurrerit: phlebotomiam enim ex pedibus, & nihil approbat, & cataplasmatū qualitates confundit, non discernens cōstrictiua laxatiua. Quibus respondere quid oportet: cum uinolentia neruos amputet, phlebotomia patientes impleat partes. Theſſalus autē secundo libro Regulari, imperfecte quidem, sed consequēter methodicis intentionibus curationem ordinauit.

## DE RENALI PASSIONE, QVEM GRAECI

NEPHRITIN APPELLANT. CAP: III.



D

Renalis passio à patientibus partibus nomen accepit. Est autē intellecta passio tarda renis aut renum: passio, in quā, tarda: siquidem cum insidenti atq; perseveranti querela renalem intelligamus passionē, & non ex nouello atq; recenti tumore, sicuti necq; cuiusquā osium coxæ, ni fuerit perseverans, ischiada intelligere poterimus. Item adieciui renis aut renum, siquidē nunc alterū, nunc utroscq; teneat renes tumentes ac duratos, & in saniem saepe uenientes, & ulceratos, & humore fluentes. Igitur de cunctis purulentationibus uel uomicis communiter secundo dicemus: nunc de cæteris supra memoratis scribemus, & primo de tumore. Antecedentes itaq; causæ, quæ renalem faciunt passionē, alix manifestæ, ut perfrictio, indigestio, percussus, casus uehemens super lunas, frequentata medicamina, aut uenena, quæ specialiter ipsas afficiāt partes, ut sunt ex cātharidis cōfecta. Afficiuntur autē hac passione, iuuenibus magis grauiōres atq; senes, & uiris mulieres, & habitudine plenis tensiores: siquidem sit in hijs grauior, & generaliter curatio difficilis, ob angustiam locorū, quæ passione uexantur, & ob acrimoniā urinae, quæ insuete aliquando renibus immorata in uescicam transit. Sequitur autē patietes, cum adhuc leuis fuerit tumor, dolor leuis, & magis cum proni fuerint inclinati secundū clunes circa ilia, alterius aut utriusq; partes, & priorum in clunibus nodorū. Cum autē tumor uehemētē scere cōperit, dolor etiā plurimus fiet cū grauedinē & seruore clunū omnīū, atq; iliorū, & pubetenus, uel umbilico cū consensu usq; ad uescicā tendentē, ob tumoreū urinaliū uiariū, quas Græci ureticos poros appellat: Quæ quidē à renibus usq; ad uescicā sunt porrectæ, attestante uirina tenui & aquata, & ita subalbida, ut colaturæ liquidæ colorem singat, quam Græci charopon uocāt, & primo parua, dehinc plurima, aut coaceruatim effusa, quæ nullam faciat releuationem, peiorante tumore in feculentum colorem ueniens, cum iam nimia tensione tenuissimæ uenulæ fuerint ruptæ. Item in uinū transiens qualitatem uiscosæ crassificationis causa: tum oleosum ueluti adipis

qualitatem

A qualitatē simulans cum renū flūor pinguis acceperit. Dehinc per incremen-  
 ta etiā febres accedunt, cum consensu iecoris, ut quidam etiā fellis colorem  
 sumant, attestante uentris abstinentia cum tormēto & ructatione inflatione co-  
 gente. Tum hebetudo sequitur, & articularum frigus & uomitus: & tardante  
 passione corporis tenuitas nimia, adeo ut quidam uncati permaneant, & semper  
 prouā ambulare supradictorum in contraria mutatio, ut urina aquata in crassitudi-  
 nem ueniens: crassior uero uel uiscosa in tenuitatem. Item quæ paulatim atque  
 cum mordicatione ferri solebat, sine labore adueniens, & si plurima, mediocris  
 effecta, & ad summū omnia cum naturæ solita uel similia fuerint uisa, aiunt alii  
 qui eos qui ex casu uel percussu, aut uehementi libidine fuerint tormenta, irru-  
 ille uideantur, colicos uero maior interior, uel uentri uicinarum partium dolor L. u. u. u.  
 sequatur, atque in colico exordium, consentientibus uel compatientibus cluni-  
 bus. Item renali uitio exemplo difficultas urinae coniuncta sit: Colicis uero per  
 consensum atque secundo concurrat. Hæc est similitudo passionum discretio. Ac-  
 cidunt hæc item similia etiā in uinalibus uis uisio constituto ex renibus, quæ  
 usque ad uesicam ducunt, quibus eadem quæ supra diximus recte concurrunt,  
 sed dolor uel eius sensus erit inter renes & intestina, & uesicæ fundum, nulla in-  
 fflatione uel extantia in externis renū partibus prominere. Hæc est omnis atque  
 perfecta significatio. Sed oportet sanguinis mictu adfectos similiter curari tan-  
 quam sanguinem spuentes. Alios uero qui cæteris fuerint passionibus adfecti,  
 sicut de uesica scribentes demonstrabimus, pro suis concursibus uel accidenti-  
 bus, quæ Græci symptomata uocant, partita curari ratione: Non enim sola ge-  
 neralis, sed etiā specialis eorundem conuenit adiutoriorum curatio, solum dif-  
 ferens, quod ea quæ localia sunt adiutoria in hijs qui renalibus laborant uisio-  
 nis magis clunibus adhibeantur. Illis uero qui uesicæ, pectini, uel pubetenus, quod  
 Græci peritoneon uocant.

DE TARDIS VESICAE PASSIONI  
 B V S. CAP: IIII.



IN uesica speciales plurimæ passionēs eueniunt, tumor, colle-  
 ctio, ulcus, durities, phthiriasis, item psoriasis, quam scabiem, de uesicæ passio-  
 nis signis  
 de uesicæ passio-  
 nis signis  
 de uesicæ passio-  
 nis signis  
 uel scabrum appellamus, capillatio, debilitas, paralysis, calcu-  
 latio, quam lithiasin uocant, sanguinis flūor, siue effusus, quæ  
 hæmorrhagiam appellant, mictus tarditas aut difficultas, aut in-  
 toto guttæ aquatiles, quas hydatidas uocant. Sed ne porrecta  
 longitudine fastidiosa curatio uideatur, una præceptione omnia apprehendere fe-  
 stinandum. De paralysis igitur superius docuimus, cū de ea specialiter diceremus.  
 De collectionibus uero & ulceribus secūdo dicemus, cum de singulis corporis  
 partibus cōmunem trademus curationē. Tumēte igitur uesica, sequitur dolor  
 secundū pectinē atque ueretri radicē, & ilia, & clunes, & magis initio ac sine urinae  
 reddendæ: tum feruor incendiosus: item pulsus & extantia partis in passione cō-  
 stituta, cū iugi ac frequenti urinae reddendæ desiderio, & repentina cessatio, ac rur-  
 sum egestio fiet cū dolore intolerabili per singulos mictus, ut extenti ægrotates  
 etiā uentū per podicē reddant, aut ipse podex præcadens excludat: & præterea  
 ægrotatibus supinus exitus urinae facilior. Quidā denique necessitate coacti defi-  
 xo capite super latus pedibus sese locauerunt, ut lapis angusta deserens loca, atque  
 uesicæ aditū reperens mictus tribuat facultatē. Mulieres denique etiā digitis im-  
 missis in muliebrem sinum sibi met ipsæ hortatione quadā lapidem prouocādo  
 dimiserunt.

**C** dimiserunt. Pueris autem magis prominens ueretrum fiet: Saepe etiam extan-  
 tia quaedam aegrotantibus occurrit, si suo digitum iniecerint podici. In ipsa pra-  
 terea urina sedimina inueniuntur, aliquando crassiora & calida, aliquando are-  
 nosa & saxosa. Item quibusdam asper lapis, aut sanguinolentus excluditur,  
 & saniosus. Sed quoniam signa communia sequentur ulceribus uesicae atque la-  
 pidibus generatis, & hijs qui gelato sanguine impediti mictus difficultate affi-  
 ciuntur, confirmabitur apprehensio lapidis generati, adhibita melotide, cuius ra-  
 tionem atque usum Responsorium libris chirurgiam scribentes plenissime tradi-  
 dimus. In quibus etiam auferendi lapides opus docuimus: Nunc enim correctio-  
 nem demonstramus cuiusdam in corpore morbi, quo uesica lapidum generatione  
 uexatur, & non ut alium masculum appellemus lapidem, alium foeminam, ut  
 quidam leuimum medicorum, sed quodam corporis uitio, non adhibita recopo-  
 ratiua curatione, cum solius auferendae alienitatis intentione medici capiantur,  
 cuius plurimae sunt differentiae. Est praeterea urinae reddendae impedimentum, quod  
 Graeci stranguriam uocant, mictus officium retardatum. Difficultas autem qua  
 idem dysuriam appellant, quae ad adiuncto dolore ingesserit. Impossibilitas au-  
 tem, qua urinae uocant, perfecta eius officij negatio. Sed haec tria accidentia quae  
 Graeci symptomata uocauerunt, nunc stricturae sunt appenditiae, cum tumor ue-  
 sicam tenuerit, siue durities, aut paralysis, uel tensio, ut quidam uolentes uri-  
 nam usu solito ac naturali deponere, obstantibus causis longo tempore continen-  
 tes officij dilatione uexantur: aliquando alienitatis obtrusione uesicae impedito  
 meatu, ut lapidis, aut arenae, aut capillorum, aut squamularum cantabri similia,  
 uel quocumque sedimine crassiore. Fluor autem sanguinis per uesicam, quem Graeci  
 haemorrhagiam uocantes manifestus, cum acuatim per urinae meatum san-  
 guis excluditur. Sed quoniam non solo ex ambitu uesicae fluor iste fiet, sed etiam  
 ex collo uel mictualibus uisio aceruatus sanguis excluditur: aliquando etiam  
 de renibus, erit locorum discretio facienda: Nam renibus patientibus dolor in  
 clunibus demonstratur. Vesicae autem ambitu patiente sub umbilico, uel pube-  
 tenus apparet dolor, & saepe urinae commixtus sanguis excluditur. Item collo  
 uesicae patiente circa ueretri initium, quod Graeci peritoneon uocant, dolor sen-  
 titur. Mictualis autem uia patiente, ipsam ueretri radicem dolor afficit, attestante  
 sanguinis puritate, cum iugi ac non intercapeditina emissione, etiam si digitus  
 loca, quae iuxta sessionem ueretri sunt, presserimus, quo in loco est ultima mi-  
 ctualis uia, quam, ut supra diximus, urinam Graeci uocauerunt: Nam si ex alijs  
 locis sanguis feratur, digitorum impressione magis abstinetur, cum supradictis  
 locis, hoc est, peritoneo, uel podici uicinis renitur impressio. Tunc ex uesicae  
 collo impedimento repressus feretur, ex superioribus uero abstinetur. Aliorum  
 autem medicorum signa de hijs discretionibus conscripta Responsorium libris  
 chirurgiam scribentes elogiauimus. Sunt autem uesicae uitia, uel passiones gene-  
 raliter curatione difficiles: Est enim natura neruosa, & altioribus insita locis, at-  
 que celata, & quae corporis superflua sustineat acriora. Sed ne rationem uariare  
 uideamur, erit demonstrandum, quoniam fluari siue solutioni uesicae, qua Graeci  
 reumatismos uocant, sunt adscribenda plurima, quae specie discrepare uiden-  
 tur, ut plurimus mictus cum arenoso uel capilloso sedimine: Item sanguinis flu-  
 or. Stricturae autem adscribendus tumor est, atque durities, uel saxea duritas, qua  
 Graeci scirrhosin uocant. Horum duplicem generaliter in superpositionibus cu-  
 rationem demonstramus. Fluente igitur uelica, hoc est, solutionem patiente,  
 locandus aeger frigido mediocriter in loco, adhibita requie cum abstinentia &  
 articulorum

melotis.

εμμηρία

δυσουρία

ουρία

συνίδημα

D

αιμορραγία

ουρία

ρευματισμός

vesicae

σκιρρωσιν



**A** articularum tenaci ligatione: Et si sanguinis fuerit fluor, clunibus prominētius subleuatis, & officio mictus admonente, quantum datur imperandum ægro, ut neq; id retento faciat spiritu, neq; ut quadam uel conatu excludi cogat aliena: Apponenda etiã spongia noua aceto tinctã secundum clunes uel umbilicum, ac pubetenus, quod Græci etron appellant, usq; ad ueretri initium, quod s̄dem peritoneon uocant, addita tenaci cum amplexu ligatione: Tum ep̄ibemata ijsdem locis, atq; cucurbita constrictiua: Potus dandus frigidus, paruus cibus: Species de sanguinis fluore & sputo scribentes docuimus. Similiter etiã quæ præbibenda conscripsimus, eiusdem scilicet qualitatis, & sessionem ex uino uehementiori confectam, quam encathisma uocant, in qua sint præcocta murtæ bacculæ cum rosis, uel in pusca, aut aceto facta decoctio herbæ talliæ, uel rubi, aut mali punicii corticis, & horum similitum, uel per ferramentum quod Græci cathetera uocant, iniectione secunda, quæ similiter medendo constringant, acaciæ, hypocyttidis, aut plantaginis succo, uel polygonij herbæ, aut intybi, uel puscæ frigidæ singularis, aut adiuncta thuris drachma una cū æquali pondere hypocyttidis, uel gallæ, cū nigro uino, uel talliæ herbæ aqua cœlesti concoctæ: quæ cum fuerit expressa & abiecta, erit aqua coquenda, donec ad mellis ueniat crassitudinem, Mulieribus uero etiã pessaria adhibenda, quæ ad fluorem matricis Respensionum conscripsimus libris, muliebria uitia curantes. Est autem curatione correctior, ac facilis eruptione factus, uel oscitatione sanguinis fluor, uel percussu, aut saltu confectus: Etenim influxio abstinetur, & rupta conglutinantur: difficilis uero correctione ex putredine effectus fluor: Retento enim sanguine, uel absento ulcus permanebit. Est præterea ex putredine sanguis ater, & male redolens, atq; purulentus ex ulcere præfecto, & dolore antecedente, qui putredinis causa aduenisse uideatur. In eruptione autem flauus, & non antecedentibus supradictis, sed excussu uel saltu, aut percussu effectus. Solent præterea sicut in podice uel sceminarum sinu, aut matricis collo etiã in uesica hæmorrhoides generari, quæ fluorem sanguinis præstent, quibusdam interuallis uariatum, quod oportet apprehendere prudentem, cum non coadueruata primo fuerit effusio, sed augmentis quibusdam promotã, interiectis defectionibus, ac sæpe retento sanguine doloris pubetenus admonitione cessante cum tensione inguinum, & grauedine clunium, uel renum consensu: & cum sanguis eruperit, supradictorum relatione sequente: siquidem aliquando inflatæ ac tumentes hæmorrhoides difficultatem, uel abstinentiam faciant mictus, quam Græci dysuriam uocant, uel uriam. Hæc sunt quæ de hijs necessariò dicenda credidimus. Declinante autem passione conuenit adhibere cerotaria, ex murtino, uel uiridi oleo, & alumine, cibum uarium dare atq; uinum, ac deinde lauacrum adhibere. Ac si strictura fuerit uentris uel uesicæ, conuenit iacere ægrotantẽ loco mediocriter calido atq; lucido, adhibita abstinentia usq; ad tertium diem cum requie. Item locis in dolore constitutis manuũ calidarum cum blando amplexu uaporato adhibenda, uel pubetenus, ac ueretri initio & clunibus calida linteamina, aut uascula ex aqua calida, uel saccelli ex pollinibus calidis, aut uesicæ oleo calido plenæ admouendæ. Ac si uehemens fuerit dolor phlebotomia adhibenda: & partes in passione constitutæ lanis limpidis oleo calido ac dulci infusis contegendæ, ex eo etiã totum corpus unguendum: tum ora fouenda. Adhibenda etiã encathisma ex aqua calida, uel aqua & oleo, aut decoctione laxatiua ex hijs quæ sæpe memorauimus. Tũc cibus dandus forbilis, & potui aqua calida moderatiõne dominatẽ, & usq; ad declinationẽ passionis interuallis dierũ nutrimenta offerenda.

ἔτρονον

καθήτερα

καθίστημι

ἡμorrhοειδὲς  
ἡσικῆ.

ἐνυαθίσματα

C renda, Ac si dolor minime cessauerit, conuenit usus cataplasmatum laxatiui, & cucurbitae appositio leuis, qua Graeci cuphen appellant, cum adiecta scarificatio, & uaporacione spongiarum aqua calida expressarum. Ac si uenter retentus fuerit, clyster conuenit simplex: & secundo cucurbita clunibus adhibenda, ac puberenus praeraris capillis. Tunc hirudinum appositio, quas sanguifugas uocant, atque embasis adhibenda ex calida & oleo: sic enim laxatis tensionibus non solum dolores soluentur uesicae, sed etiam consequens urinae difficultas, uel abstinentia. Cauendus praeterea usus urinalium medicaminum, quae diuretica Graeci uocant: Sunt enim quae uesicam prouocant, & propterea tumores faciant commoueri. Ac si minutis doloribus urinae fuerit retentio, uel in toto conquiescit dolor, tanquam factis superpositionibus repetant lenimenta, adhibenda fortificatio per uariam gestationem, & uocis exercitium. Vnctionibus quoque ac defricationibus admotis quae superiora corporis magis exerceant, interiecto lauacro, & uario cibo ac uino, & iuxta methodicum modum adiectiones cyclicae ac detractiones faciendae: Tum ad recorporatiua atque uehementia redeundum adiutoria, ut ex resina uel dropace, ac paroptesi, & solis torrore, uel arena ignita, & appositione cucurbitae, forti raptu atque tractu quodam circumducto remota corpora roboremus morborum pulsa segnitie, adhibito usu asperginum, quae sympathemata Graeci uocauerunt. Tunc malagmatum atque acoporum lacessentium usus adhibendus, adiecto etiam sinapismo, & fricatione partium quae passione afficiuntur. Tum encathismatibus utendum ex aqua marina, uel salsa calida, & magis hijs qui mordicatione quadam locorum in ipsidem passionibus tanguntur: tum cataclysmo utendum, cuius nominis uim praescriptis libris saepius latina uimus: ita natatio adhibenda aquarum uirtute medentium, quibus magis erit in solutionibus utendum. Eligendae sunt namque specialiter quae aluminis habeant qualitatem, ut sunt in Italia Albulae appellatae, & Nepesinae, & Cotiliae, & Auguriae: Hijs uero qui lapidibus, uel scabro uesicae afficiuntur erunt eligendae aquae saluae, uel quae niri habeant qualitate, ut apud Tenariam insulam, quae potandae, atque lauacro adhibendae sunt. Tum residuus adhibendus est cyclus, & acriora medicamina potanda, ut ex radice lapathi, & capparis, & struthij, uel polij herbae. Itaque panacis, & horum similitum, & lithotomia in hijs qui maiorem generauerint lapidem. Item in omnibus hellebori adhibendus est usus, si passiones supradictae permanferint. Tum nauigatio atque peregrinatio, & earum uarietas appetenda. Erunt praeterea longo tempore, ut caetera quae nimia, Venus praecauenda: hijs enim qui ob uesicae paralyin propter officium sciscitandum usum uenerem probauerunt, consentiendum non est: trahit enim secum totius corporis uexationem: Ob quam causam erit probanda etiam ferularum tenerarum, uel tabellarum, usque ad ruborem cutis ab hijs probata percussio. Itemque ustio, & scarificatio faciendae puberenus atque clunibus, & circa initium ueretri circulatim, quod Graeci peritonon uocant, debilitate afficiens. Sunt praeterea aquosa femina quae excluduntur, & magis cum se pronos fecerint & grotantes, uel celeri ambulauerint gressu. Irruit autem corporibus, cum longa fuerint debilitate uexata, aut immodico usu uenerem affecta. Sed esse accipienda curatio ex hijs quae uesicae sanguinem fluente memorauimus. Item ex hijs quae in lenimentis passionum fortificandi corporis causa, ac demutandis saepissime probauimus: Est enim haec passio seminalium uisum paralytis.

DE SOMNO VENEREO QVEM GRÆCI

onirogonon appellant.

CAP: VII.



Et somnos inanibus uisis affecti ægrotantes seminis lapsu uexantur. Nomen autem sumpsit ab accidenti: siquidem effectum ueneremum prouocando perficiat. Sed generaliter neq; illico passio est, neq; accidens passionis, quod Græci symptoma uocant, sed est consequens uisis, quam Græci phantasia uocauerunt, per somnum ægrotantes afficiens, ob desiderium ueneræ uoluptatis, uel iugem atq; continuam libidinem, siue è contrario longam usum dilationem uel continentiam. Sed hoc frequentius accidens in passione sæpe deueniet. Itemq; alterius passionis aliquando antecedens fiet, ut epilepsie, furoris, quam Græci maniam uocant, aut cuiusquam similis morbi: quoniam uexationem ostendere probatur, atq; pramoueri corpus, siue prætangi accessione uentura. Itè aliquando antecedens causa supradictæ passionis, quam seminis appellamus lapsum, fuisse probat, à qua discernitur: siquidem illa passio etiam per diem uigilantibus ægris fluere faciat semen, nulla phantasia in usum ueneremum prouocante. Somnus autem uereus eo solo tempore quo dormiunt ægrotantes inanibus uisis concubitum fingat. Aliqui etiam aiunt oniropolein ab onirogono discerni: siquidem oniropoleis illa sit quæ per somnum concubitum fingat, cum operantium sensu, sed sine seminis tactu. Onirogonos uero usq; ad defectum deducit seminis lapsum. Sed

Milesius nihil inquit supradicta differre: unum est enim, atq; eundem fluorem dicit esse seminalium uisum. Sed quod inquit nunc exclusio perficitur seminis, nunc impeditur, quamquam uisa per somnum eadem fingantur, ob alias inquit inuicem fieri causas, sed non est plurima discretio, nisi intentio adhibenda: quippe cum neq; necessaria comprobetur. Eos igitur qui ratione futuræ accessionis epilepsie, uel furoris, aut cuiusquam alterius morbi commouentur, ex his quæ suis sunt passionibus tribuenda mitigamus: Eos uero qui specialiter hoc uitio afficiuntur, tanquam parua gonorrhoea affectos curamus: Supradictorum enim augmentum in istam cadere passionem facit ægrotantes fluentium seminalium uisum, uel paralyti uisum, uel uisum. Quapropter conuenit primo ægrotanti ab intentione ueneræ uisæ mentis auertere, quæ Græci phantasmata uocauerunt, atq; aliorum applicare intentionibus externis admotis: siquidem facile quæ uigilantes accipiunt somniorum uisa ad actiua cum his motibus exercent ægrotantes, & propterea corpus seminis discussione uexetur. Rum stramenta duriora atq; frigerantia procuranda. Iubendi etiam supra latus iacere, cum se somno dederint, & ante se uel supponenda tenuis ac producta lamina plumbea clunibus, uel spongiæ circumdanda: pusca frigidæ infusa, uel inijciendo loca rebus frigidæ uirtutis ex anterioribus, ut balaustrum uel acacia, aut hypocythide, uel psyllio herba, quæ sunt singularia, uel cum palmulis adhibenda. Cibus etiam constrictius dandus, uel densabilis & frigidus, ut de sanguinis fluore constrictus. Poro quoq; frigidus nutriendi, uel constrictius, non quidem curiose constrictis constringendi. Tum adhibenda fortificatio ex communi resumptione, & facienda consuetudo frigidi lauacri, quod Græci psychrolusian appellant. Loca etiam in passione constituta forti impressione fricanda: Sunt enim hæc sufficientia constrictionis faciunda. Aliqui uero conuenire dixerunt etiam mictus dilationem tendere, ne frequenti officio causa refricetur. Sed completa uesica se somno ægrotantes dare, quo neq; in altum somnum uenire sinantur, & intercessu frequenti excitentur, quo uisa ueneræ uoluptatis, quæ somno finguntur, amittant.

B

C tant, & extenti uesica feminales uias sibi uicinas comprimendo semen retineat. Alij maiorem digitum ligandum atq; constringendum forti filo uel lino iussu-  
runt, quo dolore interueniente altior arceatur somnus: & neq; animorum uisa  
in uenerem uoluptatem soluantur. Sed erunt hæc utraq; à nobis excludenda:  
Vexant enim uigilia ægrotantem, & ultra modum urinæ retentio difficultatem  
mictus sæpe refecit, ut alterius passionis illatæ causa uideat, ut supra docuimus.

DE DEBILITATE SEMINALIUM VI  
ARVM. CAP: VIII.

Milesius.

ούρτη.



Milesius debilitatem fieri dixit seminalium uiarum, uel sequi in  
usu uenero pro semine sanguinis emissionē. Sed hoc commu-  
ne est etiam hijs qui in osculo uesicæ, quam uretan uocant, ul-  
cus habuerint: Et est harū manifesta discretio: In hijs enim qui  
ulcus habuerint cum mictum fecerint sanguis fluet, attestante  
mordicatione & dolore, & aliquando egestione corpusculorū  
quæ ephelydas Græci uocauerunt. In hijs autem qui debilitate seminalium ui-  
arum afficiuntur, solo tempore Veneris exercendæ sanguis excluditur, attestan-  
te iucunditate, nullis corpusculis, & cum mictum faciunt nulla mordicatione  
uexantur, sed etiam nunc curatio ex supradictis accipienda, ubi uesicam fluen-  
tem sanguine curari conscripsimus: Constrictione enim atque densitate fluen-  
tia retinentur. Tunc resumptio adhibenda, ac deinde recorporatio, ut sæpe me-  
morauimus.

εφελύδας.

πριπίσμος.

DE PRIAPISMO, CAP: IX.

D



Demetrius  
Apameus.

Ine ullo dolore uel consensu uertigo ueretri fiet, & appellatur  
priapismus, sed uocabulum sumptū à similitudine priaporum,  
quod ita formentur, ut recto ueretro singantur. Huius autem  
passionis meminit Demetrius Apameus libro Signorum: Ait  
enim semen in semet manu operantem nec quicquam potuisse  
peragere: tensionem autem fuisse ueretri nimiam cum paruo do-  
lore, ut cornu putaretur, & ita perseuassē multis mensibus. Nullo quoq; adiu-  
torio medicinali cessasse, ac tarde atq; longo tempore quieuisse: Quo fiet ut à sa-  
tyriasi discernatur priapismus: si quidem illa celer sit, & non taret in corpore, si-  
et sanè cum contractu neruorū, & stimulosō desiderio ueneræ uoluptatis: nam  
intelligitur priapismus paralysis esse seminalium uiarum, atq; aliorum neruorū  
ad ueretri partes ducentium: quorum contractu ægrotantes afficiuntur. Sed  
etiam nunc curatio sumenda est ex hijs quæ de uesicæ stricтура longo tempore  
tardante conscripsimus.

σατυρισμός.

DE VOMICIS SIVE INTERNIS COLLE-  
ctionibus, quas Græci empyemata uocāt. CAP: X

εμπύματα.

σπλάγχνα.

στέφανος.

επιτόμιος.



Lena igitur de hijs tradenda est ratio: Hæc enim sunt quæ in oc-  
cultis nata collectiones nuncupantur, ut in splanchnis, ac mem-  
brana, quæ latera cingit, uel in pulmone, aut discrimine thora-  
cis ac uentris, quod Græci diaphragma uocant. Item stomacho  
uel uentre, secore, liene, intestinis, renibus, uesica, aut mictuali  
uia, uel matrice, aut peritoneo. Sed de hijs quæ in matrice gene-  
rantur libris quos de muliebribus uitijs conscripsimus Responsum docui-  
mus, de cæteris uero nunc dicemus. Harum igitur alia solo medicamine curan-  
tur, at q;

**A** tur, atq; medicinali defectu gubernante usum chirurgiæ non exigunt: siquidem  
 sint occultis in locis, & plurimis superpositis mēbris, & sit impossibile atq; illi-  
 citū plurimas incidere partes, ne sanguinis pōpofus fluor periculum faciat & gro-  
 ranti: ut sunt quæ in pulmone generantur, uel diaphragmate intrinsecus, uel in  
 ipsa alteriore altitudine, aut in stomacho superius scilicet à diaphragmate, uel in  
 uentris sessione, aut intestinis, excepto sine longaonis. Itē in posterioribus uesi-  
 cæ, uel in renibus: alia uero accedente chirurgia curantur, quoties ad exteriora  
 corporis collectionū liquorē erumpendo feruntur, uel magis ab altioribus rece-  
 dunt, ut in hypozygo mēbrana, uel diaphragmate forinsecus, atq; stomachi fun-  
 do, & uentris circa eius superiore altitudinē. Item icore & liene, & longaone ad  
 eius exteriora, atq; sphinteri uicina, & uesicæ in anterioribus, uel sub umbilico  
 pubetenus, quod Græci etron appellant. Item in uesicæ collo, uel in prima eius  
 parte, quā Græci uretan uocant, & in peritoneo: Cōmuniter autē omnis uomica  
 uel collectio, antecedente tumore nimio, generatur deniq; empyicis, quos  
 nos uomicosos appellamus, alij ex pleuretico morbo, alij ex pleumonico in su-  
 pradictam passionē deuenerunt, sequentibus signis, nunc cōmunibus cū iustā  
 partis in uomica uentis, nunc specialibus pro singulis corporis locis. Sed ne  
 longa hac oratione extimemus omnium communia simul ordinanda probamus:  
 tum singulatim specialia designātes etiā munia adiungemus. Omnibus igitur  
 collectionibus generatis, uel cum tumor in liquore uertitur, sequitur febricula  
 uehemens, inordinata, & sæpe cū rigore & torpore frigido, uel iniquitate corpo-  
 ris. Tunc loci feruor incendiosus, grauedo, tensio: & exceptis quæ in pulmone  
 fiunt sæpe stimulans dolor, & puluofus. Tum celer pulsus, atq; humilis, & sæ-  
 pe sudor magis capitis, atq; collarū. Dehinc perfecta purulentatione rigor cor-  
 poris, atq; tremor circumscribetur, & febrili recedit in quietudo ac dolorū, sed spe-  
 cialiter ac proprie in cōmunibus, si in membrana quæ latera circūtegit, hypozy-  
 gos appellata fuerit generata collectio, difficultas spirationis sequetur, quā dyl-  
 pneæan uocauerunt, sed difficilis facendi potestas supra contrariū patientiatus,  
 hoc est, quod causa nō tangitur, cū sensu quodā interno ueluti pendentium mem-  
 brorū, & sæpe cōmotus corporis quasi sonus audis, uelut inclusi atq; collisi hu-  
 moris: nam Græci hydratimon appellāt. Sequitur etiā displicentia post acceptū  
 cibū, quā Græci dysarescesin uocant, & plurima tensio medij lateris, aut uentrico-  
 sa inflatio impressioni digitorū cedens ac resurgens. In pulmone uero emergente  
 uomica, spirandi plurima difficultas sequetur ægotantes, tussis uehēmēs, uox  
 obtusa uel rauca, & odoris tetræ spiratio, thoracis grauedo, & adductio superio-  
 rū ad inferiora. Itē grauatō atq; tensio supinatis ægotantibus, & reuatio seden-  
 tibus: deniq; se ipsi sustollunt ad partes lecti superiores, quo leuatius habeat ca-  
 put. Sequitur etiā cavitās oculorū, genarū rubor, & albedo sub lingua uenarū:  
 Et si eruptio tardauerit, inflatio quoq; articularū sequetur, uultus pallor, & ma-  
 cies oratio formans. Itē in diaphragmate emergente uomica dolor supra præcor-  
 dia sequitur, penetrans per latera utraq; usq; ad posteriora, & aliquādo inflatio  
 uel tensio iuxta sinē pectoris, uel sub extremis costis, atq; ossibus ultimis perse-  
 uerās usq; ad alia: Et si collectio forinsecus fuerit, sonitus aliquādo humoris in-  
 clusi sequetur. Tunc tussicula, & in spirationibus difficultas plurima, ac respira-  
 tio longa, & forinsecus spiritu attracto dolor, quod nunq; sequetur eos qui pul-  
 monis uomica uexantur. Etenim pleumonici hauriendo magis spiritū releuan-  
 tur. In stomacho autē emergente uomica ructationes tetræ, atq; difficultas spira-  
 tionis, sed minor ægotantes sequetur, & aliquando tussicula paruo sine ullo tu-

**C** moris excreatu: Tunc torpor frigidus articularū, animi defectio, sudor in sum-  
 mitate cutis, pulsus paruus, & corruptio sumpti cibi, atq; acidæ ructationes, &  
 nausea, & aliquādo uomitus, siccitas linguæ, uel asperitas sitis, transuoratio diffi-  
 cilis, plurima uel parua pro collectionis magnitudine. Quod si fuerit in superio-  
 ribus stomachi, donec cibis transuoretur pressurā sentient ægotates. Post esse-  
 ctus uero releuent. Ac si in inferioribus erit facilis transuoratio, ac deinde dolida  
 cibi pceptio sequetur, cum ad destinata peruenerint quæ sumant, dolore ex an-  
 terioribus partibus in ore uentris attestante, cum inflatione uel extantia quæ im-  
 pressione digitorū cedat ac resurgat. Si uero in superioribus fuerit collectio, nul-  
 la uidebitur prompta inflatio uel extantia, sed dolor atq; grauedo inter scapulas,  
 uel ex posterioribus cervicis partibus sentiet. Ac si in uentre fuerit collectio, &  
 magis in eius ambitu, erit inflatio inferius à diaphragmate, quod discrimen ap-  
 pellamus, circa mediū præcordiorū sinistrorsus flexa, & impressioni digitorū ce-  
 des ac resurgēs, attestante fastidio, nausea, siti post cibi sumptionē, cū ructatio-  
 nibus acidis, atq; sumptorū corruptione, & aliquādo liquidis per uentrē egestio-  
 nibus. Ac si in aliquo intestinorū fuerit collectio, erit extantia, uel inflatio uomi-  
 cæ secundū eius positionē in pyloro: deniq; constituta in ultima parte uētris sub  
 dextro latere, atq; ilio, uel sub iecore. Sin uero in nēstide fuerit collectio, erit in  
 sinistra parte extantia supradicta atq; inflatio uel uti sub liene. Alijs etiā intestinis  
 tenfioribus collectione uitiatas inter umbilici atq; pectinis regionē supradicta re-  
 peritur. Ac si in colo fuerit collectio, secundū illū dextrū, circa umbilicū usq; ad  
 sinistra loca, antecedentibus hijs quæ sunt solita colicos afficere, supradicta repe-  
 riant. Itē in longæone collectione suffecta clunū dolor sequetur, cū difficultate

νῆσται  
 ὄσται

**D** Inflatio autē uel extantia erit in superficie occulta: sed immixtis per podicē digitis  
 sentietur, & ad inferiora ueniētibus liquidis cōmixta stercora putria egerantur,  
 adeo ut plerūq; lateat, utrū ex pyloro uel nēstide, aut tenerioribus intestinis hæc  
 ferri uideant. Sed erunt purulenta separatoria à stercore, atq; discreta, cū ex colo  
 referunt, aut ex longæone. Itē in iecore uomica cōstituta, inflatio uel extantia, &  
 pulsuosa sequetur ægotates appositio, & tangētibus nobis sana principiter oc-  
 currūt: & circa cōfiniū interraneorū, quæ ut supra diximus Græci splanchna uo-  
 cant, circūscripta collectio sentietur, cum nunq; tantū latens, atq; ita submersa  
 in peritoneo collectio cōprobetur, neq; ita circūscripta ac decisa uideat, sed pau-  
 larim deficientes suos fines sanis partibus iungat, ut nō deiecta atq; decisa uideant.  
 Hæc est uomicarū omnium specialis significatio, sed earum eruptiones aliquæ ad  
 thoracis inania fiunt, aliquæ inter regionē peritonei & intestinorū, aliquæ ad sto-  
 machū uel uentrē, ut liquida atq; purulenta euomantur: aliquæ ad pulmonē, siue  
 arteriā maiore, uel rumā, quā Græci bronchon appellant, quo ligda & purulenta  
 effusantur: aliquæ ad intestina, uel eorū spacia, quo per podicē ligda excludant,  
 uel purulenta: aliquæ ad matricē, quo per muliebrē sinū profundant: aliquæ ad  
 renes uel mictuales uias, ac uesicā, quo per mictū ferant: aliquæ ad cor, ut Eras-  
 stratus ait, sed harū omnium eruptionū pleriq; alias rationabiles dicuntur: aliquæ  
 irrationabiles: sed rationabiles aiunt, ut ad stomachū uel uentrē ueniētes per os  
 excludi: ad pulmonē uero per arteriā maiore. Itē ad intestina uel uentrē, uel podi-  
 cē ferri, ad renes uero uel uesicā per mictuales uias. Itē ad matricē per muliebre  
 uereturū. Irrationabiles autē dicūt, eas quæ in diaphragmate, uel hypozygo mem-  
 brana, aut iecore, & liene generate rumpuntur per arteriā maiore, uel stomachū,  
 aut uesicā, aut matricē excludi credant, cum nullæ sint ab hijs partibus quæ colle-  
 ctione

ἠλῆται

ἠσῆται

**A**ffione affectæ sunt naturales uiz ad supradicta loca ducētes, Alij uero etiā in hīs se repertos quædā uascula demonstrant, anatomica ratione adprehensa, quæ ad hæc penetrā: loca. Alij autē uias esse latentes, quas logothoretas appellant, per quas limpida, uel purulenta quadam exudatione ferantur. Sed nō oportet de hīs plurimū disputare: Sufficit enim ad disciplinā significationis faciendā manifesta cōprobare. Itē aliqui etiā in singula loca ex alijs factā susceptionē puris, quā metalepsin uocauerūt, signis explicare conati sunt: quæ quidē nō necessaria, sed frequētia proba erūt. Etenim ad arteriā maiorē, siue gutturis canā, quā Græci bronchon appellant, facta eruptio spirationis ingerit difficultatē, & tussiculam: ad stomachū uero nauſeā atq; fastidiū, & euerſionē, uel uomitū ingerit ægrotanti, Itē ad intestina, uel uentrē tormentū facit partiū cū inflatione ac uentositate. Ad uesicā uero delectationē facit frequēter urinx reddendæ: Ad inania autē thoracis, atq; inter peritoneon membranā, & uitalia interna nulla sunt antecedētia eruptionis signa, sed utranq; factā intelligimus, sed pro ægrotantiū motu, uel cōuersione faciendū sonus quidā efficit uelut inclusi humoris, quē Græci hydatismon uocauerūt. Præstantius autē, si inter peritoneon atq; intestina id euenerit, Sequetur etiā prominētia partiū hydropē fingens, cū mordicationibus ac doloribus repetitis. Sed si inanis fuerit ruptio thoracis facta superiorū partiū à discrimine, quod Græci diaphragma uocāt, cū difficultate spiratiōis, ac tussiculæ quere la sequetur. Sin uero in regione, quæ intestinis atq; peritoneo interiacer, fuerit facta, inferiorū partiū querela sequetur cum intestinorū tormento: nouitate enim repentinæ effusionis acriorū humorū, atq; corrupti puris edacitate ea quæ naturali habitu custodita manebunt, uitalia uehementissime uexabant. Præterea re-  
**B**pendiā, atq; coadceruata ruptio fit, aliquādo paulatim, tenuatis primo uomicæ tegminibus, ut præliquatum, atq; paruum liquorem mittant, quod apprehēdimus, quum tussicula desuerit esse sicca, atq; sputa pollui admixtione puris uiderimus: uel in egestionibus uentris quicquā saniosi liquoris fuerit repertum, uel in egestionibus urinx sedimina purulenta fuerint inuenta: Sed post supradictas eruptiones, si omnis fuerit facta liquoris effusio, febres illico soluuntur, atq; loci prominentia reflatur, & grauedo circumscribitur. Sin uero ex parte fuerit effusa collectio, quod fiet debilitate ægrotantis, aut crassitudine liquidorū, aut non in fundo uomica osculatione suffecta, sed è lateribus, aut supernis partibus paulatim liquidam inuenturū: Sed erit approbanda significatio non in fundo factæ ruptionis, cum inter aliquos dies repleta uomica siue eruptio tenſionē rursum atq; grauedinem cum febre mouerit ægrotanti. Tunc post effusionē superflui liquoris omnia leuigantur, ac similiter per interualla dierum easdem difficultates præsentet. Communiter autem omnium eruptionū tuior est comparatione cærerarum illa quæ in uesicam uenerit, atq; mictuales uias: Etenim naturaliter creduntur hæc partes iugem acrimoniam liquidorum excipere ac reddere. Quapropter nec nunc ulla nouitate facile uexari posse uidentur, cum in se aliena atque acriora susceperint, quæ eruptione uomicæ descendunt. Dehinc quod naturalis urinx commixta purulenta, quæ collatione corrupta uidentur obrufa mitescunt: ultimo quod neque coadceruata, sed paulatim redditam ac requiescentem sumant egestionem urinx per exitum tractum. Item facilitate secunda est quæ ad intestina ruperit: hæc enim quoque creduntur transitum stercoreum sustinere, sed ad primā minus tuta iudicatur: si quidē possit coadceruata effusionis causa per podicem ægrotanti defectionem facere, & propterea mortem. Tertia est, quæ ad matricem ruperit, & magis in hīs quæ iam naturali lege purgantur:

**C** Didicerunt enim loca materię & transitũ sustinere, minus quidem à prioribus tuta est: si quidem neq; ex initio natiuitatis, neq; per dies singulos naturalē meatum ipsa sustineant partes, neq; ita acriter ferre consueuerint liquorum: si liquidē nihil in se sanguis habeat mordacissimę qualitatis, omnium tamen periculosis iudicatur, ut Erasistratus ait, quę ad cor fuerit facta, eius secunda quę ad arteriã gutturis, quam Gręci bronchum appellant, & eius repentina magis atq; coadueruata ab ea quę paulatim fuerit effusa: si quidem defectiones ingerat ægrotanti, atq; difficultatem spirationis, & tussiculam & præfocationē, cum neq; naturalibus liquidis ulla consuetudo per ipsam partem transeundi uideatur: tertia quę ad stomachum fuerit facta: si quidem præfocationē minus ingerat, minus quidem à supradicta appetitũ quoq; cibi extinguat: & propterea tamen ægrotantes afficiendo debilitet. Item post hanc secunda est, quę ad inanitatē thoracis fuerit facta: si quidē circumfundatur pulmōni humor corruptus: atq; cordi ultima est, quę inter regionē peritonei & intestinorũ uenerit: si quidē circumfundatur humor icori & lieni, & uentri atq; intestinis, quę cum fuerint uexata ingerant periculum. Communiter autē, siue uniuersim dicēdo, quod Gręci catholicon uocant, omniũ uomicarũ, uel eorũ qui hijs afficiuntur salutarē intelligimus du cū fore, si post eruptionē factã febris cessauerint, & magis extemplo, uel eadē die siti quoq; recedente, atq; perfecto appetitu cibi: uentris quoq; officio parua atq; congesta reddente, ipsius etiã puris albedo, atq; eodē colore apparente: & cum lenitate, ac sine dolore suarũ egestionũ: & si per superna egerit sine uehementi tussicula, neq; coadueruatum, sed per partes excluduntur liquida: pessima autē

**D** aut difficulter, aut ut sæpe contingit interfectiua ferri iudicamus eis quibus post eruptionē febris annexę pseuerauerint, attestante siti cum fastidio cibi, & uentris fluore, uel ipsius puris felloso, uel liuido colore, coadueruatis egestionibus, cum uehementi tussicula uiribus depurgatis. Hęc est uomicarũ significatio. Sed oportet ob earũ generationē fugiendã congruam tumoribus adhibere curationē: Horũ enim augmenta collectiones faciunt generari, ut sæpe in pleuriticis uel peripleumoniacis, uel similibus morbis, quibus ita formauimus curationes, ut minime sinantur initia fieri uomicarũ. At uero si iam perfectã uomicã uiderimus, & humore corrupto in toto aut ex parte tumoris caruerit nomine, oportebit similibus adhuc perseuerare adiutorijs, ut cataplasmatibus ex polline tritici, uel seminis lini, aut scenigręci, uel hordeacij confectis, uel ex aqua mulsa, aut hybisci decoctione, cuius etiã radix erit conterēda, addita uaporatione spongiarũ. Vel si inferioribus corporis partibus fuerit collectio, encathismatibus quoq; iugibus erit utendũ ex aqua & oleo calido, ac decoctione cuiusquã ex hijs cataplasmatibus cõgrua quę supra diximus. Ante cibũ præterea olei calidi quicq; potodandũ: dehinc etiã nulli mediocriter cocti: tũc sordibilis offerēdus est cibus, atq; calidus: est enim impropriũ ex parte adhuc manēte tumore quicq; acrius adhibere, quo magis labor ægrotantibus geminet, scilicet tumore asperato, unde maiores collectiones efficiuntur. Pausante igitur tumore omni ex parte, & nondũ erupta collectione oportet eius adiuuari celeritatē, ut primũ p̄scriptis cataplasmatibus ficti faciamus admisceri cũ hybisco: tũ resina terebinthina, adiuncto usu malagmatũ, quę cõgrua Respõsionũ docuimus libris, ut est mnaseũ: itē ex tribus resinis, quę Gręci diatrion retinõ uocāt: tũ etiã diagalbanes, uel melinen, uel quã appellat serapionos, aut dictamnũ, uel quicq; simili p̄missione cõscrip̄tũ. Cibo autē dādus succus pitane cũ melle. Itē porri capitati, uel atriplex, quã Gręci andraphasin uocāt: itemq; urticã. Iubēdi præterea ægrotātes magis supra latus iacere, si in superioribus

ἐπιπλεονεξία  
καταπλεονεξία

διὰ τὴν ἰσχυρίαν  
τὴν αἰσθητικὴν

ἀποδιδόσκει



**A**rioribus à diaphragmate partibus collectio fuerit generata: Cauenda etenim su-  
 pina iacendi positio: siquidem extenta arteria angustetur, quo & magna diffi-  
 cultas spirationis fiat, & minima liquidorū exclusio perficiatur. Sed si hijs adhi-  
 bitis collectionis non prouenerit eruptio, oportebit uehementioribus eam pro-  
 uocare, ne humo inclusus plurima tardando membra corrumpat. Quapropter  
 præparandi sunt ægri decoctione sici, uel hyssoi, ac ruta, & origani, & tragori-  
 gani, & thymi, uel fatureæ, aut absinthij, uel centaureæ, aut marrubij, aut semine  
 radicum, aut sinapi, aut nasturtij cum melle, quorum aliqua etiam uiridia erunt  
 mandenda. Item medicamen quod appellatur dia trion pipereon potu dandū,  
 uel diascordeon, aut zopirium: Multi tamen etiam hieram dandam probauerunt,  
 & magis illam quæ appellatur diacolocyntidos. Adiuuat quoq; eruptio-  
 nis celeritatem sternutatio adhibita, & aliquibus etiā excreatus quidam hinni-  
 bilis iugiter affectatus. Ac si neq; ita eruptio fuerit cōsecuta, erit ieiunus, uel da-  
 to potu, aut radicibus comestis uomitus adhibendus. Aliqui uero in hijs quæ su-  
 perioribus à diaphragmate partibus uexantur fumationes adhibuerunt: tardan-  
 te eruptione, hyssoium uel thymum, aut origanū incendentes, uel sulphur, &  
 sandaraca, aut aloë, uel storce impositis igni ægros hircere iusserunt, & raptu  
 quodam potili nidorem tranſuorare. Tunc dandum uel tymminum probant  
 per diem bis uel ter: simile enim inquitur curationis genus chirurgiæ: Sed ue-  
 hementer caput grauat implendo. Ac si in intestinis fuerit collectio, erunt per  
 clysterem iniicienda ea quæ præbenda nuper ordinauimus. Tum eruptione  
 facta specularandum, utrum per partes, atq; deposito liquida excludantur: an  
 uero coaceruata, aut omnino difficulter & paulatim. Sed si partim, & nullis ob-  
 stantibus excludi uiderimus, erit à cibo abstinendus ægrotus, uiribus permitten-  
 tibus. Tum alia die adhibita corporis unctione præpotandus hijs quæ supra me-  
 morauimus, cibus quoq; adiuuare collectionem, quo omnia liquida detrahan-  
 tur, dato mulso, uel solo melle bibendo, cum resina terebinthina, aut butyro nō  
 ueteri. Tum sorbilem dabimus succum ex alica uel ptisana melle admixto. Item  
 porros coctos cum oleo atq; garo & ptisana. Tum etiam ex tritico ptisana con-  
 fecta, aut cum protropo uino, aut squillitico: item lac cum mulso. Et si eruptio  
 liquidorum ad mictuales uias peruenerit, erunt adiungenda supradictis etiam  
 mictualia medicamina quæ urinā prouocent, à Græcis diuretica appellata, ut  
 asparagi, olus atrii, lactuca nunc coctæ, nunc incoctæ. Item radices & forbilia,  
 lacte quoq; confecta. Sin uero ad intestina eruptio peruenerit, quo per podicem  
 exitum habeat, cum supradictis communiter erunt adhibenda quæ uentris offi-  
 cium non densent, neq; plurimū laxent: Quapropter mictualibus prohibiti ci-  
 bo ordinauimus maluam dandam, betas, cauliculos, cucurbitas. Sed si coacer-  
 uatim, ac nimis liquida ferri uiderimus, erit abstinentia recusanda: Dandū mul-  
 sum potu sufficienter decoctum, & plurima sitis ægrotantibus indigenda. Man-  
 dus præterea cibus qui uentris teneat officium, ut oryza succus sorbilis, aut len-  
 ticula. Item pisces duri corporis, quos sclerosarcos Græci uocauerunt, & uolan-  
 tum sicciora, & potu aqua imbrialis offerenda, quam uulgo cisterninā uocant,  
 calida. Item medicamina quæ ad humectam tussiculam conscripta sunt. Tum ui-  
 nū mediocriter asperū, sin uero difficulter atq; paulatim liquida fuerint exclusa,  
 erit inquirenda causa, utrum ne ob debilitatē ægrotantis id euenerit, quo mini-  
 me ualeat excludere aliena: an uero ob crassitatem liquidorum, uel ob eruptionē  
 non in febris factā, uel in fundo collectionis: Etenim si ob debilitatē ægrotan-  
 tis id aduerterimus fieri, erunt subleuandæ uires per resumptionem. Si autem  
 ob crassi-

δια τριων πι-  
 περεων  
 τριον διακολο-  
 κυντιδος

Mictualia  
 διουρητικά

Pisces  
 σκληροσαρκεσι

**C** ob crassitudinē liquidorum, tenuantia adhibenda, atq; præpotanda quæ supra memorauimus, adiectis quoq; similibus electarijs, ut sunt ex melle, resina, uel lini semine cum melle confecta, ac nucleo pineo, uel strobilis, & urticæ semine, præhibendum sinapi cum paruo pipere longo. Runc helleb ori adhibemus purgationem. Ac si ex uomicis ulcera tardantia perseverauerint, ea quæ supra diaphragma fuerunt, quod discrimen appellauimus, ita curabimus, ut est de phthisicis scriptum: in stomacho uero uel uentre, ut de cœliacijs: item in intestinis, ut de dysentericis: in renibus uero ac uesica, uel mictualibus uijs potis medicaminibus atq; clystere iniectis, uel per cathetera immissa utemur: etenim si fordida apparuerint ulcera, lacte atq; melle potamus, semine cucumeris præfuso, aut mullo, aut pinguisbus palmulis cum passo, aut nucleis cum amygdalis & amylo. Similia etiam per cathetera immittenda, aut tetrapharmacū medicamen diligenter solutum. Sin uero limpida fuerint ulcera, erunt encathismata adhibenda, quibus præcocta fuerint aliqua constringentia, atq; extrinsecus apponenda emplastra, quæ cicatricem facere ualeant, à Græcis epulotica appellata, potius dandum lac cum amylo, & cucumeris semine, cum decoctione phœnicobalani, aut papaueris fixi, atq; constricti cum uino protropo, & amygdali decoctione, uel mali cydonij, sorbarum, & palmularum thebaicarum, uel succo mali punici, uel hijs quæ in pharmaceutico Responsum tradidimus libris, ex quibus est quod appellatur carui, & cenocraton, & ex trachanto atq; amylo, & glycyrrhiza. Ut edum etiã aquis sua uirtute medentibus, quas supra memorauimus: Itemq; hijs quæ in Aria insula, & Theanitorum prouincia esse perhibetur, cæterarum quoq; resumptiuarum materiarum usum adhibentes, ut nutribiliorum succos.

**D** Vbi uero iner intestina & peritoneum eruptio fuerit facta, siue ex icore, siue ex aliqua ueniens collectionis parte, quæ situm est quomodo puris detractio fieri possit: utrum ne per tenues uias uesicæ ueniens, atq; in intestina acceptum uideat, & propterea per urinã, uel per uentris officium excludi possit: an uero sectis inguinū locis detrahi facilius uideatur, quod quidē Erasistratus demonstrauit: Sed apparet nunc chirurgia exitum puris faciendū, incisa secundum inguen peritonei mēbrana, quo corruptis liquoribus prolapsio inferioribus aperte præbeat. Tunc congrua adhibenda curatio: Etenim incisa peritonei membrana, in cicatricē facile conducit, & sine ullo periculo ægrotantis sanitas dat, ut est conijciendū ex hydropū paracentesi, atq; chirurgia ramicis, quã Græci enterocelen uocant. Neq; impossibile putandū, etiã si quid remanserit, facta detractioe chirurgiæ per superficiē cutis, ac tenues uias, & per intestinorū cavitatē sudari: quippe cum etiam in hydropibus circumfusos humor intestinis sæpe fuerit exiccatus, quibusdam per uesicam, forminis per matricem, sed omnibus communiter fortitudinem cōuenit per nutrimenta præstare: facile enim corruptio partium depulsa passione fiet, cum corpus fuerit naturali fortitudine possessum.

DE SUPERFLVA CARNE, QVAM GRÆCI POLY SARCIAN VOCANT. CAP: XII.



Ceidunt corporibus superflua carnis incrementa, quæ Græci ob nimietatem polysarcian uocauerunt. Sed est hoc passionis genus contrarium nutrimento cessante: siquidem cessans nutrimentum tabida faciat corpora. Idem ultra naturæ modum uehementius elatū plurimā faciat carnē generari, ex qua corpora grauata premant. Præterea hoc quoq; speciē accipimus cachexiæ: siquidē indecens difficultas patiētes afficiat: nam sequitur nimia ac superflua multitudo

φθισιαί-  
λαιλαικοί-  
δυσεντεριαι-  
κατάρσις.

Medicamen-  
τη τετραφάρμακον.

Emplastrum  
ἐπιουλοτικόν  
φουκοβαλανίου.

Erasistratus.

ὁ Ἰπποκράτης παρα-  
κλήσειον  
ἐν τῇ ἐπιουλοτικῇ.

πολυσαρκία.

καχέξις.

A multitudo carnis, quæ in pinguem prominentiã erigatur cum tardo motu, atq; grauatione, & debilitate, & ex paruo gressu anhelatione ac sudore, ut suo se corpore præfocari sentiãt ægrotantes, quo neq; leuia ferre ualeant uestimenta. Multa igitur medicorum atq; aliptarum salutaribus præceptis adiungendam diligentiam detrahendæ carnis putauerunt, inuentus cœnoteta, quam epidosin uel euexian uocant, hoc est, habitudinis augmentũ: sed hoc à Sorano repulsum. Nos igitur solam habitudinẽ intelligimus, quæ fuerit cum modica carne fortitudo, & seruanda magis quàm repellenda. Polysarcia uero, quam nunc passionẽ dicimus, recte cachexian nuncupamus, quæ multis accidentibus denuntiet periculum: Etenim quæ sequetur animalia nutrimento dedita, uel custodia seruata, ut flato atq; extento & prominenti corpore uideantur: hæc eadem cuncta patientes sequetur. Similiter accidentia corporibus ulceratis, quibus uana caro cõ crescit, uel eorum labijs quæ fuerit acie circuncisa renascantur. Sed istius passionis duplex traditur differentia curationis: Alia quæ cohibeat fieri plurimum corporis nutrimentũ: quæ quidẽ ponitur in gestatione celeri, & cibis non multũ tribilibus, ac moderatis, ne plura corpus quàm insumit accipiat: alia quæ cyclica regula atq; operosa recorporatione formetur demutandi corporis causa. Sed ut docilis sermo, ac manifesta tradatur præceptio, partium erit memorãda curatio. Conuenit igitur corpus exercere gestatione plurima ac perseueranti, animalium iugo, uel curriculi motu, & equitatione ac nauicula. Item lectione & uocis exercitio uehemẽti, uel meditatione modulationis agonisticæ, & celeri gressu, quo magis labor surarum fiat. Item cursu, atq; sicca fricatione manibus puris, uel aspero linteamine, & arenæ aspergine. Tum uoluntatio in palestra uaria, quam

B Græci celadion, atq; choricomachian uocauerunt, quæ sunt specialiter ab ipsis artis præceptoribus imperanda. Tum hoplomachia, hoc est armorum sicca confrixio. Item alienis laboribus exercitiũ, hoc est colluctantium, uel cõexercitium, quam Græci heterocopian uel trachelismon uocant, atq; longo uel raptorio machinamento, quod macron (parton uocauerunt. Item Italica sphaera, & luctatione celeri, & dura atq; multa uel sicca fricatione: Etenim oleo labentibus manibus fortitudo soluetur exercitiũ. Conuenit etiã sole corpora torrere, quod Græci heliosin uocant: tum paroptesi ex flamma, uel carbonibus, & siccis uaporibus prouocatur sudor: & nunc feruentia lauacra, quæ plurimum detraherent, nunc frigida, quæ corpus in densitate cogant: deniq; psychrolutarũ corpora densa, ac ueluti testea sentiuntur. Conuenit etiã arenæ littorariæ adhibendus feruor: Tum natatione maritima, uel aquarum naturali uirtute medentũ, & in lauacris sudore perfecto asperginem salis adhibere: qua sæpe condita caro animalium ciborũ uoluntati sicca seruatur, atq; densior, nec collecta marcescit. Tum fricamentũ adhibendum, quod Græci zagma uocant, ex nitro tuso, atque in puluerẽ redactõ, & post lauacrum longa cibi dilatio, uel potus: Tunc enim appetitio minima marcescit, & eius acies temporis obtunditur dilatione, cum etiã digestionis parata proteruitas detractõ fomite languescit. Erit præterea potus semper ante cibum prohibẽdus, uel in toto paruus dandus, & magis cum cibi sumuntur: Etenim immisso liquore plurimo fluidantur accepta, atq; caro mollior, & digestionem facile solidiora propriantur. Sed si plurimũ quisquã sitierit, paruũ dabimus mediocriter asperum. Pulmentũ uero alicam, amyllum, lac, nucleos, cerebrum, oia: pisces autem teneros, uel pinguiã quæq; reprobamus: Panem dabimus frigidum, fermentatum, autopyrum: est enim minus nutritus: & magis, si fuerit ueteratus. Specialiter autem siccus probandus est cibus.

ἀλλήλων  
αὐτοῦ  
ἐπιδοσίαν  
εὐεξίαν  
Σοράνῳ.

Modulatio  
ἄγωνιστῶν.

ἑλαδίων  
χορικωμαχίαν  
ὁπλομαχίαν.

ἑτεροκοπίαν  
τραχελισμόν  
μακρόν σπάρτον  
Ἰταλικά  
σφαίραν  
πίλους  
σαρόβητον  
ψυχρολύτων.

ἄρτους.

ἄρτους  
ἀὐτοῦ.

Item

**C** Item pulmento danda sunt olera & pisces durioris naturæ, uel auis sicciora, uel agrestium, ut leporis, capreae, porcina ex deposito, hoc est, longo tempore sale siccata. Conuenit præterea unum cibum sumere, & post summptionē plurimum uigilare: In requie quidem, quo multa corpus exhalatione infumatur uigilando: additur enim plurimum somno: denique dormientium corpus ualidius fiet: Potus dandus frigidus: & persēueratē carnis multitudine erunt initia cycli adsumenda, nunc ab omni abstinentia, nunc à paruo cibo & aqua, nunc augmenta ordine regulari. Item à ieiuno uomitu sumendum est initium, uel ex radicibus: Tunc ad drimyphagian ueniendum, ac mediæ qualitatis materiam. Tunc uolantum atq; agrestium: quæ quidem erunt celeranda per dies minoris breuitatis, quo urgētius initia repetantur: & in oleribus erunt uirinalia prouidenda, ut asparagus, pastinaca, apium, sceniculus, daucus, porri capitati, & horum similia: sic enim communia feruantur corpus ualebimus demutare. Accidentium quoq; coniecturam facientes, quo eliminatio carnis atq; diductio procedat. Aliqui medici phlebotomiam probant, atq; purgatiua medicamina, quæ catartica appellant, & clysterem, & post lauacrum illico Veneream adhibendam ante cibum, atque ipsa die paruorum nutrimentū, potio aquam dandam. Item uomitum post uespertinum uinum. Alij quoque ueluti passioni contrariam corporis expansionem ex thalamo fieri probauerunt, & appellant antipalon. Itemq; nocturno ris auram ante solis ortum bibendam. Sed horum deliratio manifestis proditur rebus: Nam phlebotomia uires depurgatæ uexantur, & corpora pallefcunt: nam Græci raccolin uocant. Item purgatiuis medicaminibus ex clysteribus, cum sit prædictis etiam liquida corrumpantur, cum alius habitus corporis fiat: nam Græci cachexian uocant. Venereus uero usus effoeminat membra, atq; fortitudinem tollit. Item aliquibus bis in die ordinatum iuacrum, & somnum prius quam cibum sumatur: quod quidam uoluerunt: crassificat enim somnus, non tenuat corpora. Item uomitus post cibum: uires enim tollunt: & quanquam corpori detrahant carnem, implent tamen necessariò caput, atq; sensuales uias uexant, & gingiua in putredinem mittunt, atque os odore foetant, retro stomachum limant, & ipsum hominem sibi met faciunt displicere: nam Græci dysarescesin uocant, cum inæqualitate febribus uicina. Est & improprium, atq; praua ratione æstimatum, ob corruptionem paruorum maiores corporis uexationes inferre. Sed si forte uinorum fuerit excessa moderatio, tunc erit uomitus adhibendus: eius enim uexatione maior est immodicæ summptionis grauatio. Item præ cæteris uehemens, & maior quam ut oportet animi officijs siue curis applicatio: Videmus ob has causas etiam studētium corpora fieri tenuiora, limatione quadam animi iugium cogitationum atq; disputationum. Eorum uero qui segni ac pigro ductu uitam trahunt, solidiora atq; pleniora fieri corpora, ob contrariam rationē. Hijs de superflua carne conscriptis, omnium tardarum passionum curationes explicauimus, intentione neglecta.

Somnus saginat.

Uires uolant.

Uires nocturno.

D  
Uires uexat.  
Vires effoeminat.

Uires inæqualitate.

Literis uacantes macri sunt.



# D. ORIBASII SAR-

DIANI IN TRES EUPORISTON

LIBROS AD EUNAPIVM

PRAEFATIO.



ET IS à me Eunapii charissime, ut manifestas sanitatum curas faciam tibi ad singulas passiones, & diuersarum generum adiutoria, ad discendum simplicium uirtutes medicaminum, peregre proficiscenti, quæ facile inueniuntur in agris per uaria loca, ubi docti minime inueniuntur medici, qui curam impendere possint. De qua re mihi uidetur, ut nomen tantum medici, & non artis requiras industriam, in qua ocio fauente ad discendum minime sis imbutus. Vnde petitioni tuæ præbendo consensum, hexapla Galeni, quæ à † Dioscoro & Apollonio, uel ab alijs, qui de uirtutibus herbarum scripserunt, quæ per agros inueniri possunt, quæ ab ipso scimus esse probata, reuelantes per nos tradimus, & in hoc euporisto scripta dirigimus, quæ tibi uel alijs in longam ingredientibus peregrinationem prodesse poterunt. Experimentata igitur à nobis uel antiquis tentamus dicere de simplicibus medicamentis, quæ Græci hapla uocant, & ea in tres diuidunt partes. Vna quidem est, quæ unicuique infirmitati adhiberi possunt ex simplicibus medicamentis, & singulæ diuersas habent uirtutes, & particulares usus. Secunda uero pars est ad sanitatem ex electis singulis materijs adhibita. Tertia uero pars est, quando singulæ cum singulis uel alijs admiscentur, considerata passione. Transactis ergo hijs tribus tropis, quæ facilius inueniri possunt, addis etiam à me tibi quæ ad incolumitatem humanæ naturæ expediunt conseruandam, scribi debere. Incipiam ergo exordium à cunabulis infantum.

† Dioscoride  
legendum  
fortassis.

N


D. ORIBASII

# D. ORIBASII AR-

CHIATRI IULIANI CAESARIS, EVPORISTON ADEVNARIVM LIBER PRIMVS.

## DE INFANTVM NVTRIMENTIS.

C  
\*



A T O igitur infante, mox ab initio est nutrix eligenda, quæ lauacris & cibis competentibus ministra sit. Disponenda est, ut lac bonum abundantius ministrare possit. Labor enim sit ascensio collis, ut deambulando exerceat laborem, & lanificium faciendo telas texat, & maxime susales, & ad pilas pistet, & situlas de puteo aqua plenas leuet. Cibis autem utatur ptisanæ succis, & de tritico farina, & mellis succos accipiat. Pistum manducet, & pisces qui non sunt de pelago: Sed neq; eos qui duras carnes habent, Vinū uero dulce bibat, & quod boni sit odoris. Caeo autē & tragematibus, hoc est, pomis, uel ab oleribus omnibus abstineat, præter solas lactucas edat. Optimæ enim ad hæc sunt, & bonos in corpore succos faciunt, & somnū infantibus præstant. Accipiant etiam & dactylos, diuretici enim sunt, & purgant sanguinem, & utile præparant lac, & bene ministrant. Pessimæ autem ad hæc sunt menta & ocimus: Corruptunt enim fortiter lac. Similiter enim & cōmixtio uiri omnino prohibenda est, quia & hoc corruptibile generat lac, & omnibus rebus plus hoc nocet infanti, & amplius omnibus lædit.

Lactuca.  
Menta.  
Ocimum.

## DE LACTE IN MAMILLIS augmentando.

D

M Vltum facit lac, cedrus cruda aut cocta assumpta cum ptisanæ succo, faciunt enim suauē lac & sufficiens, anethi coma uiridis, & radix foeniculi. Similiter & eruca, & apium, & smirniō & cicer, & animonis herba extrahunt lac, & apposita abundantius faciunt.

## DE DISCRETIONE BONI lactis & mali.

Lac mellebr.

O Primum lac à pessimo hoc modo discernitur. Bonum lac & in odore, & in sapore discernitur, & in albedine, & in constitutione. In constitutione autem, cum medium inter pinguedinem & tenuitatem uel humectationem consistit. Pessimum uero est è contrario, si spissum est & insuauē in odore, in sapore, & in albedine.

## DE INFANTE NVTRIENDO.

Euacuationes puerorum quales.

A Paruo usque ad mediā ætatem crescente uelocius infante in membris, ita ut nutritus in corpore multum esse uideatur, timere oportet ne aliqua accedat plethura, & si in aliquā plenitudinem incidisse cognoscitur, tunc oportet ut diminutio fiat nutrimenti, & secundum ætatem omnimodo adinuentiones sunt euacuationes, modo per exercitia, ut huc atq; illuc per se seuiant, & ante quā cibentur exerceantur proprijs laboribus ante cibos quibus nutriuntur, & proprias actiones consuetudinarias agant, & proprijs uel consuetis cibis nutriantur, ut hij qui lædere possunt prohibeantur. Et hæc non opus habent à medicis discere, sed per experimenta infantium sollicitis, siue bene digesti sint infantes, siue non sint digesti, & hoc per obsequia uentris possunt cognoscere.

## DE INFANTIBVS, SI PLE-

nitudō sit ciborum.

**Q**uod si infanti ciborum accesserit plenitudo, & ex nimia acceptione uenter plenior & maior extiterit contra consuetudinem, & ea quæ per uentrem excernunt corrupta sunt, & quæ per sudorē manant non bono sunt odore, hijs agnitis oportet eis, si iam cibos fortiores accipiunt, non unum cibum, sed diuersos dare cibos, ut ipsa nouitas ciborum possit iuuare quo facilius fiat uentris dispositio: Nam si aliquis appetat absq; ratione cibos, facilius liberatur, si citius uomica generata euacuetur, antequam cibi corrumpantur, & post hæc accipiat tenues, & sic paulatim reuertatur ad pristinā consuetudinem sanus effectus. Quod si iam corruptis cibis permanentibus, multæ utique proueniunt ex hijs læsiones, & diuersis succumbentes ægritudinibus fatigantur, si uomica nō subuenerit in pectore, aut ceruicibus, uel circa faucium loca, & capiti stabiato proueniunt uulnera & glandulæ, & maxime ciradæ, fiunt difficiles ad sanandum.

## DE FLVXV VENTRIS INFANTIS.

**Q**uod si ex hoc etiam nec dormiant, conuenit eis potū dare calidam aquā frequenter. Hæc enim & mordicationes tollit, & lauando intestina digestionem procurat ciborū, & uentris egestionem: nam balneo uti necesse est, cibos uero mediocriter accipiant, & potione utantur aquosa.

## SI VENTER INDVRVERIT.

**Q**uod si cibi digerantur bene, & uentris constrictio sit cum grauedine corporis, & tardo membrorum motu pigrior sit, & mens ipsius obruta sit à pristina actione, & somno sit oppressus, scire oportet plenitudinem esse in uentris indigestam: in uentre uero digestio facta est: nam indigestio in uenis est, & cum uentositate repleta tenduntur, & constipata aliquoties tensæ rumpuntur. Sed & alia quamplurima mala ex hac efficiuntur plenitudine. Propterea quando hæc plenitudo accedit, quam Græci *νεμεσις* uocant, donec digestio in uentre ciborum fiat, quiescere debet homo. Post hæc autem exerceri, & post exercitacionem resoluitur plenitudo. Hoc enim est apud antiquos propositum, dicentes, *νεμεσις νεμεσις ἀγει*, id est, labor iste uentris soluit laborem, quia si indigestus sit uenter, multum laborat.

## DE HIS QVIBVS CIBVS

in uentre corrumpitur.

**Q**uando autē in uentre corrumpitur cibus, confestim si corrupti sint cibi, & per uentrem effundantur quæ corrupta sunt, nihil mali subsequitur. Non autem soluto uentre, irritari oportet ex hijs quæ melius soluant uentrem, qualis est diaspolites, nitrum æqualiter cum alijs speciebus habēs, aut de caricis, & cinico pastellis confectis hoc modo: Caricas xxx nitro candido 2 IIII. Cinico 2 II cum uino & melle cocto cōmiscet omnia, & utraque macerabis, ut exinde pastillos facias xxx, & dabis. Mouet enim uentrem, & omnem cibum corruptum projicit.

## DE HIS QVIBVS IN VENTRE

frequenter corrumpitur cibus.

**Q**uibus uero frequenter in uentre corrumpitur cibus, oportet eos antequam cibos accipiant uomere uino dulci potatos. Fugere autem oportet cibos, qui carboniculos, aut usturas, & fumosos generant ructus, & eos omnes qui nō facile corrumpunt. Assumere autē eos qui bonos nutriant succos, et eos eligere qui uentrē molliat, ut ex interuallo accipiant. Expedit enim et mediocriter data

**C** quæ soluât uentrē, quale est pigra medicamē, ut hijs abstinerē, quibus cocochymia congregatur, & faciunt ægritudines difficile sanabiles, aut insanabiles generant, quales sunt podagrica, & artetica uel nefretica. Sæpius autē & in acutis incidit.

DE HIS QUI EX LABORE IN SVETO AEGROTANT.

**S** I autem ex aliquo labore nimio, qui absq; mensura est, & absq; naturæ consuetudine, corporis accesserit passio, quiescere eum oportet, & abundantius uti frictione cum dulci oleo malaxatur: lauet enim in initio quidem mox post lahorē calidissimo lauacro, & accipiat tenues cibos. Soluit enim copodin passionē penuria cibi, sic ut nihil hoc aliud melius possit. Et ne peritiora aliquæ cōmotio nes fiant, conuenit eis qui copodin incurunt passionē, ut febres accedant, & hijs quibus hoc cōtingit, si negligātur pereunt. Soluere ergo oportet hanc passionē tenui cibo, & qui bene digerāt, euchymo utāq; cibo cū suauitate paulatim accepto.

DE HIS QUI IN NIMIO AESTU LABORANT.

**I** N æstatis tempore, si qui nimio labore exardescunt, & plus quàm uirtus permittit exagitantur, & natura ipsorū sit calida & sicca qui patiuntur, utantur hijs in cibo mala cerasia, & coccimelia, & persica, & cucumeres, & melones, & cucurbitas, & ficus, & mel edant. Hæc omnia quidē cacochymia sunt, sed ea quæ desiccata sunt, possunt infrigidare & humectare. Et post balneum aquā bibant in primis, & sic uinum mediocriter aquosum, & post hæc uomant quod acceperant. Assumant igitur in primis lactucas, & sic cum aceto & garo pedes porcinos accipiant bene discocchos, & gallorū & anserum uentres & alas, aut aliquid de piscibus asprasilibus molles carnes habentibus frixis. Gustent autem & si uoluerint olera, quæ nō possunt cacochymia generare, id est, cucurbitas, & post hæc bibant uinum frigidum, temperatū, & accipiant cum uino & melle alicam, aut cum uino frigido in æstu nimio siue cacochymia existentes sanantur. Aliquis autem prohibent ptisanæ succos nimios frigidos potui dari. Quod in hijs qui non laborant uerum est. Qui enim in occupationibus sunt obligati, hæc adhibentur. Nam qui uoluntariam degunt uitam, & exercitantur, infrigidari rarius habent opus. Non exercitantibus autem in mediæ ætate cauantibus, aqua de fonte frigida aut niuata non nocet laborantes, aut si iuuenes sint, si non sunt consueti, paulatim augmentando eis danda est: nam si infuetis iuuenibus militia procedente, & tēpore & ætate iam declinante, difficiles ad sanandum, & insanabiles consurgunt passionēs in articulis, & in neruis, & in uisceribus.

DE AEGROTANTIBVS, QVI

bus cutis condensatur.

**C** Ondensatur corpus per frigus, aut si stiptico utatur balneo. Cognoscitur autem hæc passio ex pallido colore & duritia cutis, & quod nō facile concalescit, neq; consuetos emittit sudores. Curabis igitur eum calefaciendo per exercitationem & balneum, ita ut eum uoluerē facias in astrago balnei. Oleo uero calastico eum perungēdo infundes, & neq; frigida aqua sit nimis in piscina, neq; multū ibidem remoretur, sed exinde cum exierit, ante quā uestiatur dulci & subtili oleo ueteri perungatur. Optimū autem & anethinum est oleū, & maxime de uiridi anetho confectum. Utillissimū etiam est quibus condensatur cutis, sed & hijs qui copode, ut supra dictum est, laborant, si de diapiro acopo perungantur.

DE HIS QUI ACCEPTO

cibo exercitati ægrotant.

**Q** VI post cibum repleti exercitantur, aut balneo utuntur, multæ læsiones & non paræ subsequuntur, & capitis repletio, & epatis ex hoc constipationes accedunt. Mox ergo de præsentī ita curabis caput cum deambulationibus.



bus, post cibos quidem mitius, ante cibos uero lenius quidem, sed uelociiores & acutiores faciat. Epato uero infraxifacto, id est, conspitato optimū medicamen est oximellis datus, & simplex diatriton pipercon datus. Dabis etiā in potione & absinthij comas infusas, & anisum, & amygdalas amaras cum oximelle ante balneū. Ventris uero facta digestionē, & diacalamētis dandus est cū oxymelle. Caue igitur eius frequēter usum in hijs qui sunt cholericī, & omnino eis omnibus prohibendī sunt pingues & spissi uel glutinosi cibi, donec passio quæ accersit fuerit amputata. Sed ea quæ extenuant ministranda sunt.

## DE HIS QUI NON EXERC

citantur, & sani sunt.

**P**urimi igitur sunt qui nō exercitantur, & aptis nutriuntur humoribus, & non cito aliquas passiones incurrūt, quia sunt natura raro corpore, uel eueniunt & digesto spiritu. Oportet ergo eos ad alias quasdam promouere consuetudines in actionibus. Hijs uero qui frequenter ægrōtare consueuerunt, ne stant sunt prohibendæ ægritudines hæ quæ ex corporali accedunt plenitudine, & ex malis congregantur humoribus. Quæ enim plenitudines uelociter congregantur, auferri conuenit ciborū qualitate: & hijs qui multum præsumunt, modicus ministrandus est cibus, & qui creuisse cognoscitur humor, seu cholericus, seu phlegmaticus, aut melancholicus augmentatus est, prohibendī sunt cibi, qui tales humores generant. In hijs autem omnibus uenter facilius est reddendus.

## Q U O D O M N I B V S E X P E D I T

ut uenter secundus sit.

**A**B initio igitur antiquorū semper uisum est pro sanitate, ut uenter secundus procuraretur diebus quotidianis, & inculpabilis urinarū emissio secundum ciborū aut potiorū ministratiōe reddatur. Quod si hæc minime proficiantur, tunc uti est necessariū eis quæ hæc expellant, & procurent uentris & urinae obsequia. Quod si urina minus fuerit ministrata, utantur apozimā, ubi candex, & apium, & sceniculus, & asparagus coquitur. Venter autem si constrictus fuerit, terebinthina danda est ad oliuæ magnitudinē glutinenda dormitū euntibus. Magis autē educere uolentibus, nitrum modice est admiscendū. Utilissima autē sunt olera ad deducendū uentrē, qualia sunt betæ, & malua, & brassica, semel cocta. Porcinæ uero carnis recentis iusculū, quod si hæc leuia uisa fuerint, & fortiora causæ desiderant. Ad urinā igitur prouocandam addendum est petroselinū, daucus, anisus, absinthiū, & gramen, & polytricum, & scolymbi radices, & cythifus, & calamētis, & organū. De unaquaq; earū, aut omnes simul admixtas in aqua discoctas dabis cum uino bibere. Purgant enim hæc omnia per urinas sanguinē, & fit corpori non parū adiuuentū. Ventrem autē sicut scripta sunt lenius mouent, & si amplius habere desiderat solutū, dabis ad uentrem herbā mercurialem in aqua cum sale coctam, & cum comederit, ipsam aquā bibat. Sed & sambuci folia similiter facta & accepta hoc modo operantur: nam & polypodij radices 2. ii. puluere minutatim facto super sardinas, aut in aqua discoctas dabis cum uino bibere, & si in pitifanæ succo coctæ sorbeantur, uentrē soluent. Aliqui autē & aloë dormitū euntibus dant, quantū ciceris tria sunt grana ad glutendum per singulos dies, & abundantius redditur eis uenter secundus. Alij autē cnicum mittunt in uiscellum, ut simul tritus coquatur. Omnium igitur prædictorū melior & utilior est epithymus in uino potatus: Oportet autē cum bibere. Habet cœnare quidē, sed minus quam consuetus est, & sic pausare. Mouet enim leniter uentrē. Quod si mouere amplius uentrē uult, ieiunus epithymi bibat 2. iiii in oxymelle: N 3 hoc autē

**C** hoc autē faciat in primo uere, anteq̄ ebulliscat & effundat collectus ex hyeme humor superabundans, & currat per aliqua membrorū loca, & periculosas generet passiones. Multi enim negligentes, aut paralyfin, aut apoplexiam defubito inciderunt, & in ipsa fracti defecerūt, & alij pati uidentur exanthematis similia, aut aspera, qualia sunt lepra, aut impetigines, alij acoras in capite, alij crispilas & erpitas. Vt ergo hæc prædicta aliqua, neq̄ aliud quicq̄ mali fiat, purgari oportet antequā ebulliscant collecti humores, & resoluātur, & currant per membra.

## DE SANGVINE AUFERENDO

Apollonius  
Pergamenus.

**E**Xpedit etiam in primo uere sanguinem detrahere, in quibus sanguinis abundat plenitudo: nam opus est qui exercitatur uenam ipsius incidere, multi enim sunt tales ubique qui sanguinem tollant, quod si non inueniantur, tibias scalpellari iube, sicut Pergamenus Apollonius fieri suadet hijs qui topus habent sanguinem detrahere. Hæc enim totum releuat corpus: nam & caput iuuat, & mulieribus non habentibus menstrua mouet.

## DE EXANTHEMATIBVS, DE CACOCHYMIA.

**I**Gitur ex acredine humorum exanthemata in cute corporis generantur, & mordicationem in uentre aut in ueretro, quando secessus faciunt uentris aut urinā, patiuntur. Hijs lac expedit ut bibant cum melle: nam & serus de lacte separatus coquitur, & cum bullierit, super sparges uinū aut mullam, & colabis. Sic enim caeco separato prius sale admixto potum dabis, ut plus purget aut larget uentrem salutus. Qui autem cum bibere uult sine sale, minus soluit. Sint autē de sero heminx quinque. Expedit igitur eis & hoc modo datus catarcticus, ut ex uereto gallo facta zema detur in potione. Multū enim iuuat, & uomitus euacuat phlegma multū. Sed nō oportet hæc inordinate fieri, neq̄ omnino eas euacuari, nec utiq̄ præter necessitatem admittenda est fortis euacuatio, ut læsionem adferre possit.

## DE PLETHURA.

**P**lethura igitur si est, oportet plus quam competit uomere, si a cibo & uino repleti sunt nimio, quia ex eo partuntur plenitudinem, quam Græci plethuram uocant. Signa autem plethurae hæc sunt: nihil delectantur, pigri etiam sunt, & sensus & ipsa mens ægrotant, & somnus plus est a consuetudine. Spasmi sunt in corpore, id est, subsiliunt membra, uenæ plenæ & densæ sunt, & inordinati horrores, & permixtos habent calores. Hæc etenim maxime per totū corpus esse inflammationē significant. Hij ergo si uolunt uomere, subtilius & largius phlegma est præparandum. Raphanos ergo manducet in cena, & porros, & cepas, & sardenas, & organū modicum, & aliquid de thymo & sinapi conditum. Sorbeant autem pistanae farinas. Carnes uero accipiant hoedinas, aut agninas, aut porcinas, manducent etenim omnia elixa. Post hæc uero edant pistacias & amygdalas integras in melle intinctas, & ipsum mel manducent. Bibant etiā uinum dulce nō parum nec frigidum, & post cenam tantū expectent, ut se cibis componat, & ante aquā tepidam defubito bibant, donec repleantur aqua, & sic euomant, & post uomitū de pusca faciē lauent, & os, & oculos, & dentes; hoc enim eis post uomitū de pusca utilissimū est; nam putrescent dentes eis qui uomunt, si non hoc post uomitū fecerint. Bibant autē post hæc calidam aquam, & pau sent. Pedes uero eis fricentur leniter. Si quis autē non facile, sed cū multa difficultate uomat, recusare melius est. Virgente tamen necessitate uomica est prouocanda cita, ut supra prædictos cibos comedant melones, & cucumeris semētes cum melle, aut radicē siccam, aut melones tundis cum melle. Hæc enim facile faciunt uomitū. Hæc nos de euacuationibus, ubi medicus nō inuenitur, dixisse sufficiat.

A. DE CIBIS QVALES SINGVLIS temporibus conueniant.

**B**onum est etiā & per singula tempora obseruare cibos in toto anno com-  
 plero. Hyemis igitur tempore laborare oportet, edere multum, & maxime  
 quādo aërum qualitas sub Boreæ dominatione consistit. Noto autē fante labor  
 similis sit, sed minor cibus & potus, & totū corpus in humido tempore siccum  
 reddere debet. Similiter quemadmodū & in frigido aëre calidius reddere per la-  
 borem. Abundāter autē edant carnes, & olera quæ sunt acrifora, & uino ampli-  
 us utantur. Intrante uero primo Vere, aut per uomitum, aut per uentrem eua-  
 cuentur. Sed & aliq̄ phlebotometur secundū consuetudinē uel animi uolunta-  
 tem: etenim perscrutāda sunt multorū sapientū dicta medicorū de phlebotomi-  
 ratione, ut quod unūcuiq̄ secundū naturā expedit, rationabiliter fiat. Dieta autē  
 in primo Vere & labor & cibus subducēdus est, potiones autē sunt addēdæ, pro-  
 pter quod calidius sit tēpus ab hyemis tēpore. In æstate autē requiescere à labo-  
 ribus expedit, & cibos minūere, & maxime frigidis uti cibus, & potiones abun-  
 dantius assumere, & omnia adhibere quæ in frigidare & humectare possunt. In  
 autumno autē, quia omnino est inæqualis & inordinatus, & quia diuersas in-  
 fert passiones, multa in eo debet esse obseruātia, ne aliqua indigestio fiat in cor-  
 pore, ne qui in matutinis horis frigidus est, & in meridie ignitus, laedatur. Po-  
 ma uero nō ad saturitatē edātur, quia cacochymia & uentositatē generāt, si nō  
 ea antea accipiāt quā alios cibos, & corrūpūt cibos: frigiditate autē facta aëre  
 cū ratiōe calefaciēdū est corpus. Adpropinquāte autē hyeme bene utiq̄ se haber,  
 & post æquinoctiū uomere oportet aut euacuari, ne aliqd̄ ex p̄dictis superflūū  
 sit cōprehensum, qđ in hyeme fieri possit nociuū. Sic enim & p̄ hæc sanus pote-  
 rit transigere annos.

Ver.  
 Aestas.  
 Autumnus,  
 Hyems.

DE DIETA SENVM.

**S**enes igitur quia natura sunt sicca & frigida, calefieri & humectari opus ha-  
 bent per balneas aquā habētes dulcē, & uinum rubeū bibant; purgat enim  
 tale uinum senibus per urinas ea quæ sunt superflua, & calefacit corpus, & ma-  
 xime si eos cibos qui humectare & calefacere possunt, accipiant. Frictionibus  
 uero utantur senes post somnum cum oleo. Hæc enim eis excitant innatum &  
 spiritalē uitæ calorē. Post hæc autē deambulent, aut quoquo modogestentur  
 à copis uncti, & exercitentur secundū eandē uirtutē quam habēt. Si autē imbe-  
 cilliores sunt, unctationibus utiq̄ ut possunt utant. Cito autē senes imbecilliores  
 sunt, & ideo melius est tales tertia die cibari paulatim. Tertia autē hora panem  
 cū optimo melle, aut alicā in aqua coctā, aut mixtū mel dare. In septima autē ho-  
 ra lauare, & sic prædere. In primis quidē ea quæ secundū faciant uentrē accipiāt,  
 & post hæc ea que euchyma sunt, & tertio loco panē in uino infusum maducēt,  
 uel ea quæ stomacho sunt apta, & nō facile corrūpunt. Neq̄ enim uinū pachy-  
 chymon bibere oportet senē, neq̄ cibos tales accipe, q̄ aut nephreticā aut hydro-  
 pem inferāt passionē. Si enim hijs senes multū utant, constipant epar, aut splen,  
 aut renes. Pomis autē si uolūt uti, de melle cōfectis utantur, & maxime si petras  
 in renibus habent, aut podagrā, aut arcticam passionem. Admiscendū est autē  
 arcticis in uino mulso petroselinū solū. Hijs uero qui lapides in renibus habēt  
 quos digerant admiscenda sunt, qualia sunt saxifraga. Utiles autem est & hæc  
 simplex confecta potio, quæ fit cum uino & cum melle, si ei addatur modicum  
 piperis & rutæ. Semper igitur, ut dictum est, oportet fugere senem cibos infra-  
 xim generales. Quod si aliqua necessitas facit, ut quæ infraxim generāt edant,  
 mox diacalamentis antidotū accipiant: sin minus, diatrion pipereon. Quod si  
 nec hoc, nec illud inueniūt, de pipere albo factō tenui puluere intinges in obso-  
 num

Senum natura  
 & dieta.

**C** nium & manducabis, & in potione super sparges. Expedi autē in tēpore ipso & cepas, & allia manducare, & uentrem subducere, interdū & theriacam bibendam dare. Interdum enim senes & frequenter congregat phlegmaticas in stomacho superfluitates, propter naturalē senectutis imbecillitatē. Ideoq; eis danda sunt quæ cibos extenuare possint, ut nulla in eis fiat tarditas digerendi, sed eis quæ humectare ualeāt senectutis siccitatem utantur. De pomis enim omnino sunt prohibendi, & ficis acerbis. Quæ autē maturæ sunt edant. Caricas uero in hyeme manducant. La cte uero quod eas digerat, bene uti debent. Suspecti sunt tamen, ne epati inferat passiones, propter sicum & phlegmaticam superfluitatē.

Senibus phlegma in stomacho congregatur.

† aprum.

† Apium & mel, & uinum tenue accipiāt, ut urinam per singulos dies deducere possint. Venter uero hijs si fuerit constrictus, ut secūdus reddatur oleum bibant anteq; cibū accipiāt, aut certe per interualla subducatur & mollis reddatur. Fugere autē oportet senes acres dlysteres, ne intestina desiccēt. Molliat autē uentrem oleribus, aut alijs assumptis cibis. Similiter & oleo ficis ante sumptis, & oxymellis, & hijs similibus ante acceptis. Hyeme autem caricis & oliuis † fale conditis & coctis, aut damascenis infusis ficis in mulsam bonū habēt mel & abundantius. Non autem sicut solent dari, aloē detur aut pigra, sine aliqua magna necessitate. Vtiq; enim si per singulos dies, aut alio die uētris nō subleuantur officia, nullū medicamen aliud adhibeatur, nisi si nimia fuerit uentris cōstrictio, sufficit dari herbā mercurialem & cinocum in pitfana coctas, & terebinthinam ad auellana magnitudinē. Sæpius autē & duo aut tria ad auellana magnitudinem sunt danda. Cum autem depouerint uentrem bene, tunc pulmones, & renes, & uiscera omnia purgātur. Optime autē faciunt de caricis pinguibus & cinoco, si auferas ambobus extrinsecus quæ sunt circūposita, & simul tundas multū. Plus autem erunt caricæ, quàm cinocus, & dabis ex eis duos aut tres ad caricarum magnitudinē. Mutare autē oportet hunc usum. Vnā enim natura in consuetudine facta contemneret solet. Tempore autē multo in iuuenibus permanet, in senibus autem negligit. Ut autem degeneratur, bene sub calore quæ superflua sunt in eis obseruantur.

† solc.

**D**

DE VIRTUTE VINI.

Vinum.

**O** portet autē cognoscere curiosius de sanitate humana & de uini uirtute, & uenerijs actibus, similiter & qualiter expedi docere. Vinū igitur recalcere facit qui in nobis est calorem naturalem, per quem digestiones in nobis fiunt, & sanguis bonus quo nutrimur ministratur ubiq; utiliter. Propter quod per ægritudines extenuatos pinguiores reddit, facit enim & apertionē acceptorum ciborū, & phlegma extenuat. Cholera autē per urinas expurgat, & animā suauem reddit, mentē & sensum alacriores facit, & uirtutē præstat si mensuratum bibatur. Quod si absq; mensura præsumatur uinū ut inebrientur, ita ut alienent & stomacho grauentur, læduntur mox. Fugere ergo oportet plus à mensura uini potationē, quia nimis ministratum non iam resuscitat calorem, sed extinguit ipsum calorem. Vinum etiā animi uigorem subducit. Per tempora enim multa leuiter oportet bibere propter urinarū curatiōis abundantia, & ut sudoris motionē faciat. Utillissimū autē est eis uomere mulsæ accepta, ut neq; modica ab eo læsio fiat in cōiuiuibentibus, & nō cibo satientur. Bibens autē intermixtam brassicam coctam māducat & amygdalas. Per hæc enim ebrietas releuatur. Sed & uomentibus nullo modo est nociuū. Optimū autē est absinthiū acceptū ante uini potionem. Utillissimū enim est quod digerit crapulam. Si autem mordicationē patiuntur de uino, a quam frigidam sorbeant, & postera die absinthium bibāt, & deambulent

Ebrietatē quæ prohibeant.

& deambulent

& deambulent, & fricentur, & balneo utantur, & minus cibo utantur, & inun-  
cti recuperabuntur.

## D E V E N E R E I S A C T I B V S.

**V**ENUS nociua est pectori, & pulmonibus, & capiti, & nervis. Mutat autē  
cognitio ad mānſuetudinē, ut etiam melancholiam amātis & manīā com-  
ponat, & eroton; animoſitatē minuit utiq; meretricēs. Qui autē utitur Venere,  
cauere oportet nimiam repletionē cibi, & magis uini, & inanitatē poſt uomitū  
factam, & poſt uentris purgationē factam, & quibus uoluntarie ſolutus eſt uen-  
ter. Cauent autē & indigeltionē poſt laborem factam, & ſi cui aliqua accedit  
agritudo, aut certe ſuſpecta eſt ut accedat. Nam & in autumno Veneri commi-  
ſceri oportet, & nō in alijs temporibus in quibus peſtilentia dominatur. Tem-  
pus autem utiliſſimū commixtionī eſt poſt cibum, ante ſomnum: poſt ſomnū  
enim mox componitur corpus, id eſt ciborum operatio in ſanguinē. Hoc etiā  
tempus & ad generandū eſt utile, propter quod mulier mox addormiſcens con-  
tinet ſemen. Ex uenereo igitur actu rarius, & frigidius, & ſiccus, & imbecillius  
fit corpus. Quæ cōſpiſſant ſcilicet, & calefaciunt, & humectāt, & corroborant,  
oportet hijs operibus ſociari. Aliqui autē ſemen multum calidū congregantes  
ſic urgentur ad uenereos actus, & emanantes nimīū, ipſum corpus imbecille ha-  
bent, & ſtomachum reſolutum, & extenuantur, & deſiccātur, & cauos faciunt  
oculos. Abſtinētes igitur à Venere capite grauantur, & indelectabiles fiunt.  
Poſt hæc iterum per ſomnū ſemen proijciūt. Oportet igitur quibus nimium  
ſemē abūdāt, nihil aliud adhibere, quā ea quæ corrūpūt, hoc eſt cibos & me-  
dicamēta. Hijs & poſt balneū ungātur oleo roſeo, & miluio, & omphacino. Me-  
lius autē eſt ſi impinguetur de cera oleum ut nō decurrat. Addere etiam & ſuc-  
cum aliquē frigidum. Fit autem celerius, ſi in mortario reſundatur, & ſic adda-  
tur ſuccus, & cum manu miſceatur diuīſſime. Eſt autē frigidus ſuccus de hier-  
ba ſemperuiua factus, aut de uua canina, aut corilidonibus & pſyllio. In æſtate  
uero aut lactuce ſuccus, aut lini ſemen, & in alijs temporibus alia ex alijs. Nam  
hæc cocta in aqua & frigidata faciūt ſuccū. Lamina autē plumbi lumbis ſuper-  
poſita, prohibet ſomniantibus ſemen, & herbæ ſubtus ſtrata quæ frigida ſunt,  
ſicut ruta, & ſummitates teneræ frondiū agni arboris, & mollia folia eius ſtrata:  
ſed & ſementis agni & rutæ comeſta. Cuſtodire autē oportet ne nimis fortiter  
lumbos inſrigidet, ne nimis inſrigidatis lædantur renes.

## D E A Q V A R V M Q V A L I T A T I B V S.

**O**portet autē & aquarū qualitates quæ ſunt utiles aut malicioſæ ſciri à me-  
dicis. Multū autē utiles aquæ ſunt in uſum noſtrū omnes, & magis ſunt  
in omnibus dietis neceſſariæ. Scire autē oportet optimā & bonam eſſe aquam  
quæ ſine qualitate aliqua eſt, & in guſtu, & in odore, & in potu ſuauiſ eſt, & in  
uſu munda & pellucida. Quādo autē bibitur, cito hypocondita tranſitur deor-  
ſum quæ talis eſt, alia melior nō eſt requirēda. Quæ autē in præcordijs diu reſi-  
det, & inflat, & grauāt præcordia, neq; cito caleſcit, neq; cito inſrigidatur, peſſi-  
ma eſt. Sed & ea quæ in ea coquunt grauiā ſunt, & malicioſa quæ cocta ſunt.  
Melius igitur eſt per experimentū tales iudicare aquas. Qui autē uult per cogni-  
tionē agnoſcere quæ dicta ſunt, hoc modo diiudicet. Quæ enim ad ſeptētrionē  
poſitæ ſunt, & à ſole auerſæ, hæc & grauēs ſunt & malæ, & nō cito ſerueſcūt, aut  
inſrigidant cito. Quæ autē ad ſolē ſurgentē ſunt per uenas miniſtrata, cito cale-  
ſcūt, & iterū celerius inſrigidant. Hæc autē ſperāda eſt bona eſſe & optima, quæ  
æſtate frigida, hyeme autē calida eſt. Aliqui autē & p̄penſa approbauerūt, ut quæ  
leuior

Ne ſemē pro-  
ſuat inuitis.

Optima aqua  
quæ.

*Aqua pluuialis.*

**C** leuior est melior sit. Hoc autem ad hæc pertinet quæ dicta sunt, & laudantur. Scilicet autem hoc non ab initio cōtemplatum est, ut bona leuior sit. Leuiorem igitur Hippocrates pluuialem dixit esse aquam, & dulciorem, & lucidiorem, & propter quod soli uicinior fuit, leuior & tenuior effecta est, propter quod & imputribilis est, pro quare ab eo omnibus aquis leuior est iudicata. Vnde ab alijs quibus reprehenditur, quare irritent tussēs, graues faciant uoces. Pro hoc autē pluuialis aqua æstiuua leuior est iudicata, quia æstium non facit. Nam in hyeme ubi crySTALLUS & niues abundant, grauātes sunt. Ex congelatione enim aquarum illud in hijs quod subtile est conspissatur. Bene utiq; quæ autem palustris sunt, & malum habēt odorem, quæ si coquantur, in melius mutantur, & sic eas bibant, & cū uino mixtas. Quæ stipticæ sunt cum dulci uino, alias autem cum stiptico uino. Nam & colari expedit eas ex paludibus quæ sunt aquæ, cū alica autem uel alphita dari. Colatam autē salis frigidam pustam bibant, & non impetu multo trahant. Quidam autem adiuuenerunt, comestis aut potatis malis aquis, cicoris decoctione apozimam ante ut bene bibant, & ipsum cicor comedant. Aliqui autē & caucalidas, ouaq; ipsarum cum aliquo pisce cocta & fœniculo. Aliqui autem & betas & cucurbitas ante manducant, cum sale & uino temperatas.

#### DE AERIS QUALITATIBVS.

**A**ër autē sanitosus est & optimus, qui est mundissimus. Morbosus autē est & pessimus nebulosus & turbulentus, de paludibus aut stagnis ascendens, aut si ex alijs aliquibus concauis locis ueniosus surgat. Pessimus est & de quibusdam cloacis purgantibus ciuitates, & ex oleribus aliquibus, & de stercorebus animalium accedunt fetores seu hominum. Similiter autem de fluminibus, aut paludibus, uel stagnis proximis nebulosis existentibus & non resistentibus, & in cauis locis undiq; a montibus circumdatis, & habētibus respiramentum pessimi sint, & omnes lædunt ætates similiter. Iuuant autē secundū qualitatem caloris aut frigoris, aut siccitatis, aut humectationis, diuersitatē aërum nō similes habentes in omnibus. Temperata igitur corpora temperatus aër iuuat. Distemperatus uero lædit, quia contrariam habent a se inuicem naturam.

#### DE BALNEIS.

**L**audō quidem in aqua frigida lauantibus. Non existimo autem expedire eis qui cibo repleti sunt, sed eis solū qui sunt actiphagia cibātes, qui utuntur in labore, & eis quæ expediūt utunt. Sufficiat autē multis opus habētibus ut in frigidentur, amplius in piscinā ingrediantur æstatis tempore iuuenes existētes, & carne repleti, ante calefacti frictione. Sint autē alieni a cōmixtione mulierū, neq; indigesti, neq; cibo sint repleti, neq; post uomitū, aut post uentris euacuationem uel fusionem sint, neq; uigilijs fatigati lauent. Omnibus autē utilissimum est calidum balneum. Calefacti enim mitigantur, & corpus soluit ciborum, & plethmones malaxat, & pneumata diffundit, & somnum facit, & bene nutrit carnes. Est autem aptissimum omnibus & uiris, & mulieribus, & pueris, & senibus, & idiotis.

#### DE CIBORVM VIRTUTE.

**O**portet autem super hæc & ciborum uirtutes scire, qui sanitatis suæ studet esse sollicitus. Qui enim extenuādi habet uirtutē, & aperit angustas portus transitus, & proijcit quæ infixæ sunt, & glutinosa subtiliat & extenuat pinguiā. Educit autem quæ diu tardantia sunt in uentre, quæ manducantur aut aquosa uel cholericā superfluitas est, utiq; & magis augmentatum melancholicum sanguinem

A sanguinem componit. Sed oportet prohibere frequenter eius usum, & maxime qui cholericæ sint temperatîa: Nisi forte ad eos solum, qui phlegmate, & crudis, & glutinosis, & pinguibus humoribus collectis repleti sunt. Pinguior quidem dieta nutrit etiam abundanter, attamen ventri & epati digestionem si compe- tens sit: & cibus euchymus bonum sanguinem generat, splen autem & epati constipat. Hoc autem faciunt quæ sunt pachychyma, id est quæ pingues nutriunt humores solos, ut est lenticula. Quæ autem glutinosa, quemadmodum malua. Aliquibus autem utraque contingit pacicimas esse, & glutinosas, sicut sunt ostracotermes. Cautior ergo est quæ extenuat dieta ad custodiam sanitatis eis quæ impinguat magis. Quæ autem non satis nutriunt, uirtutem non imponunt, neque fortitudinem in corpore. Unde oportet ea quæ multum nutrimentum præstant adhibere, sed mediocriter quando causam indigentis aliquis sentit. Maxime utique absque periculo assumitur illis, qui exercitantur competenter, & dormiunt in quo uolunt tempore. Omnes autem qui non possunt propter exercitationem dormire, fugiant pachychymos cibos, pigri autem neque ad istos cibos accedant. Maximum enim malum in sanitatis custodia omnino pigricia. Quemadmodum mediocris magis motio bonum est, ita inter spissos & tenues cibos, optimus hominibus mediocris, qui generat sanguinem secundum constitutionem competentem. Ergo talis cibus corporibus nostris ministrandus est, laxibilis enim est ea, cochymus cibus, quem semper oportet fugere. Custodienda est autem uarietas ciborum, optimum & magnum est ut de contrariis uirtutibus copulentur, & digestioni moderentur, quia & ea si non digeruntur, quæ assumuntur, competenter lædunt.

Pigricia

# D. ORIBASII SAR-

DIANI DE VIRTUTE SIM-  
PLICIVM MEDICAMENTORVM  
AD EVNAPIVM LI-  
BER II.

MEDIA INTER CALIDA

& frigida.

B



DIANTVS; asparagus, miachantinus, brion, & splenion, glicirizæ succus, oleum dulce, cera, faba, castaneæ nucleus qui manducatur, licius, lotus, uel ros quo caligarij utuntur, aut triphilus, citriæ cortex, ptereus, id est, filicis radices, lenticus, lenticula, terra cymolia, & terra famia, catinia & litargirus.

QV AE SINT QV AE  
calefaciant.

Agni folia & semē mediocriter, agalaphis semē & folia, amigdala dulcis, anagallides utrici, andragnis, tiles aut cincus agrestis, uux maturæ semen, lenticula, liquiriciæ radix, oliuæ fructus maturus, fermētum, oringium, resinæ omnis succus ficus, squinoantus, cochleæ uisus, aut cineres earum; caulis id est brassica, dactylorum fructus, ripus, coclim, calcucracamenon aut cnicus, cyrocrambi, butrachij radix, & tota herba, pulegium, lauri folia, magis bacca,

minus

**C** minus autē cortex eius radīcis, diptamnus, pseudodiptamnus, elelisfagus, eriffimus, lana uſta, zinziber, tapſia, cardamomus, capilli uſti, brionix radices, aristo, lochia radices, aſphodeli radices, daucus, catmedaphnis, dragonetæ radices, oleum raphaninū, cicer, ixus, id eſt uiſcus, caualidis, libiſticus, ferulæ ſemen, ſagapinnus, ſatyrión, ſion, ſinon, ſtorax, piper, lyſinon, ypiricon, alis, ſulphur, ſanguis, cholera, urina, ſputum, carnes ſerpentium, adipēs, ſalmoriades de ſaliſ piſcibus.

Q V A E S I N T Q V A E P R I M O  
gradu calefaciant.

**A** Loēs, antimifaron, abſinthium, ladanum, lini ſemen, folium ſpicæ nardi, nardus celtica, uinum dulce, id eſt muſtum, ſerum, triticum, ficus ſicca.

Q V A E S I N T Q V A E S E C V N D O  
gradu calefaciant.

**O** Lei feces, anethum uiride aut minus, artemiſia, baſſamū, elaphobus, calamus aromaticus, crocus libanotus, maſtiche, mel, uinum, picula, meliſphilon, praſſium, propoleus, cucumeris agreſtis ſuccus, ſcandix, ſquilla, ſcolimbus, paſtinacæ ſyluaticæ radix, ſmyrnis, terebinthi cortex & folia & fructus, ſoenogracum, cameleontis utriuſq; radices, camipiteas, ocimus.

Q V A E S I N T Q V A E T E R T I O  
gradu calefaciant.

**A** Brotanum & magis uſtum, egyri flores, id eſt populi & reſina, acorus, amomum, amaracus, ameus uſtus, anniſus, arciothidus, aſari radices, herba ſabina, ellebori utriq; epithymus, menta, calamentis, thymus, calamus, fraſcini cortex uſta, caceus, caſſia, citria utraq; cimici ſemen, coniſia, cyminum, libanotum, allium, ſceniculum, gitter, men, radix rutæ ſylueſtris, rododaphnis, uinum uetus, origani omnes, opopanax, petroſilinum, ruta, raphanus, ſamſucus, ſmyrnon, hyſſopus, galbanum, camitria.

Q V A E S I N T Q V A E Q V A R T O  
gradu calefaciant.

**A** Darcis, ampſion, praſſion, id eſt porrum ſyluaticum, euphorbiū, citria, oleum, coſtum, cepulla, lipidion, ſinapis, allium, ſtruthij radix, tithymali ſuccus, cauſtica ſunt omnia hæc.

Q V A E S I N T Q V A E I N F R I G I  
dent mediocriter.

**G** Ramen mediocriter, elxine, id eſt, uitrago, mediocriter atque ſuſpeus, apij mitreus, cataplaſma omne, balauſtion, rubi folia & comæ, & immaturus fructus ipſius, & flores, bromus mitreus, brion maritimus, glaucion mediocriter, dorignion nimis, calami fraginati folia mediocriter, comion nimis, licinus quæ in petris eſt, papaueres omnes, moleas fructus & folia, oliuarum comæ & immaturus fructus, oleum myrtite, ſiſaminum oleum, balaninū oleum, elxine quæ & perdition, uel uitrago dicitur, mediocriter, elimoſi folia, id eſt uiolæ & cortices eius propter dulcedinem, perſicus fructus, citri carnes, amantite ſufficienter, omphacij ſuccus ſufficienter, amilus triticeus mediocriter, oleum roſeū mediocriter, pathus de paleſtra, ſuccus crudus ſiccus, tribuli utriq; dactylorū comæ ſuccus, geſſamia terra mediocriter, cimolia terra, cotis acutatio, mollibidina mediocriter, plumbum, pſimithiū, ſcandix mediocriter, caſeus mollis & recens.



## QVAE INFRIGIDENT PRIMO GRADU.

**A** Catia non lota, atriplex absq; stipteus, figarta, milium, hordeum, platanus, ramnus, intuba.

## INFRIGIDANTIA SECVNDO gradu.

**A** Catia lota, plantago, bletum, galla asiana, cucurbita, melones, malum peponis, uua canina de hortis, lenticula de super aqua, ficus uirides, adueri maritimus, psylli semen.

## INFRIGIDANTIA TERTIO GRADU.

**S** Emperuiua utraq; portulata, mandragora, cidria cidonica, polygonium, flos uuiuz, cimæ, iusquiami & flores, & semen album habens.

## INFRIGIDANTIA QVARTO GRADU.

Opium thebaicum.

## DESICCANTIA ABSQVE mordicatione.

**A** Caliphis semen & folia, fex olei, anagallides, utraq; plantago, bromus olei dulcis cum ratione lauatus, omnibus magis tritici fermentum, extrahit de profundo & digerit, lupinus in poris fortiter, salicis folia, & plus cum alio quo stiptico, Alij autē & succos ex eis faciunt, & sine mordicatione desiccantium habēt medicamen in plurima utile. Nihil enim plus utilissimum est, & sine mordicatione desiccās, & stipticum modice medicamē. Nuces, lepus uetus leptomeris est, melius est centaurea tenuis modice fortis, cerasia gummi, lilium, fabæ cortex, id est babulia superposita, cupressi omnia, ciperi radices nodus in aqua infusus, nymphae radices, ireus satis, pētaophili radices, polypodium, myrina, sarcocula, stybis, tracacanti terra omnis, cathmia, alia petra & flos ipsius infusus carnes remittit, pompholix frequenter lotus, calx uiua extincta & lauata fortiter, ouorum album tenue. Similis autem naturæ est & uitellus eorum.

## SIMPLICITER DESICCANTIA.

**A** Gni folia & semen, graminis radices mediocriter, adiantus, id est herba capillaris, semperuiua utraq; populi flores & resina ipsius, sambucus, ebulus, amarantus, reuima desiccant potata. Brionia radices, egyptos sicca folia, de pyris cataplasma impositum mediocriter, aristolochia, asparagus achantinus, aspartum, asphodeli radices, & magis usta, aut cinis ipsarum, balaustion, strapias, rubi non maturus fructus, bulbus cataplasmatas, pionia radices, lauri folia uehementer, & magis bacca, roboris omnia loca, & ficus, oleum cyprinum, laurinum, dadinum, elimus cataplasmatas, eringion, isatis quam Gothi uisidlem uocant, tinctorum herbam uitrum, salicis cortex aut cinis fortiter, canopi semen, cardamomum, caucolis, daucus, cinis conia & magis de ficu, cinis de brassica usta; hæc enim fortius faciunt, desiccant enim cineres. Crinon, id est lili folia & radix linia desup petra, lucerna omnis, lotus, nymphae radix, omphacium, platani cortex & pilæ mediocriter, polypodium, amilum, sal, nitrum, gypsus ustus, magis cathmia oēs, & omnia metallica & lapidosa & terrestria uel usta de furno, testæ ostrearum, cribami, id est leporis coagulū & stercus omne. De anseribus uero inutilis est ex nimia acredine. Ripus, carnes serpentium, capita sardinarum ustarum, cornu ceruinum & caprinum ustum, castorei ossa cōbusta nimis, capilli usti, ossa sippiæ, lana usta, gambari usti cinis, garum sufficienter, salmoria.

Gothi.

C

## DESICCANTIA PRIMO GRADU.

**D**Esiccatiuus anthemis, arciotidus fructus, careus, ordeum, alphia, erocus, libanotus, foeniculum, rododaphnis, uinum album, cucumeris, melonis semen & radix sicca, foenogracum.

## SECUNDO GRADU DE

siccatiua.

**L**Ana, amaracus, aspastum, anethum, balsamum, gigaista, gingidion, elaphob, cion, calamus aromaticus, libanotus, cortex & folia arboris ipsius & fructus, mastice & amel, cedri cortex, & semen, & arboris ipsius folia, misi radix, spica nar di, celtica, uinum orobum, opopanax, pix, ramnus, raphanus, scandex, fabæ radix, scolymbo radix, smyrna, lentiscus, terebinthi semen & folia, lenticula, ficus uirides adhuc & humida folia, galbanum.

## DESICCANTIA TERTIO

gradu.

**A**Brotanum & magis ustum, acatia, acorus, aloë, anethum ustum, anisi semen, arciothidus, asarus, absinthium, herba sabina, helleborus albus, epithymus, calamentis calami, eragmitis cortex usta, carbo, cassia, cedrus, coniza, libanotus & thalus, gitter, citrium, quod sub semine est, uinum quanto plus uetustissimum est, acetum, origanum, pentaphili radix, petroselinum, smyrnion, ruta de horto, prassiu, ros, samfucus, eringion, hyssopus, camitrius, camaleontis utriusq; radix.

D

## DESICCANTIA QUARTO GRADU.

**C**Amipites, ampilon, prasson, citrinum oleum, sinapis, ruta agrestis, callium.

## MEDIAE DESICCATIVA ET

humectantia.

Graminis radix super sparsa oleo dulcissimo.

## HUMECTANTIA PRIMO GRADU.

**E**Lxine, buglossa, liquiritæ succus, lactuca mediocriter, oliuarum folia, acetum mediocriter, meleas, persicus fructus, ammanitas, oleum roseum, satyrion, stractiotis quæ in fluminibus & stagnis nascitur.

## HUMECTANTIA SECUNDO GRADU.

**P**Orcacla, atriplex, bletus, coloquintida, meleas, amoniacus, fructus cucumeris, melones, lenticula quæ super aquarum sit stagna.

## QUAE AQVOSA INFRIGIDENT

tertio gradu.

**A**Cacia, elxine, idest uitrago, porcacla, plantago, atriplex, rubi folia, bletus, brionia maritima, glaucion, dorignion, lactuca, uiolæ folia, cucurbita, cotydilon, conion, piccius arbor, malua domestica, papauer, mentha præcocia, amanithas, platanus, policonon secus fluuium proxime nata, sideritis, cucumeres qui comeduntur, succus elxicinus, tribulus, lenticula super aquas nata, psylli semen, plumbum.

## QUAE SINT LEPTOMERES,

id est, extenuandi habentes uirtutem.

**A**Brotanum ustum, agnus, scandex, populi folia uel flores, agaliphis fructus & folia, acorus, amomum, balcielæ radix, brionia, artemisia, palio, aristolochia

**A**ristolochia, plantago sicca, asphodeli radix, & magis ustra cinis, balsamus, rubi radix, herba sabina sacis, liquirizæ radix, diptamnus, dragōtæ radix, oleū uetus, oleū cicinū, elapholus, euphorbiū, fermētū, salicis opes, calamētis, calamus, aromaticus, calami fragmitis cortex ustra, cassia, cappasion, costus, citrix oleū, cocimeleas, gummen, mastice, gitter, opium cyrenaicū, opobalsamū, ruta passa, pisti enix fructus, propuleus, terebinthina, oleū roseum, sagapinū, samfucus, sylois, calx uiua, hyssopus, falis flos, nitrum alcionū, arsenicon ustrum, gypsus ustrus, sulphur, cathmia, pumex affios, asix petræ flores, melanetria, mifeus, calcanti, chryfocolla, scandex, ficus, adeps leonis, & pardī, & irenis multum extenuat, castoreū, ossa sippix & lana ustra. *Hycinan Afri uocāt beluā similās leonē. Hoc animal timet canis, ita ut si eum inuenerit ut ouem sic comedat. Vnde fugiunt eum canes, & in domibus se abscondunt. Quod si dentem eius habeat homo secum, non eum canes latrant.*

*Hycinan.*

IMPINGVANTIA HVMECTANDO.

**P**lantaginis radices, balauktion, zigasta, zinziber, cepe, cucumeres, lipidus, omnes rores, stipteria.

STIPTICA ET CONFORTATIVA.

Cassia, galla asiana, omphacium, tigadus, dactyla, absinthium.

QVAE DIGERANT MITIGANDO.

**A**Momus, uua domestica, cera, ladanus, glutites, crocus, libanotus, spica ægyptia, mastice, oleum roseum, myrrha, storax, galbanum aut alica, butyrum, hyssopus, adeps porcinius.

QVAE PVS FACIANT.

**B**Quæ calidæ fomentum adhibitum, hydroleum tepidum, oleum calidū, farina triticea, panis triticeus, alica, adeps porcinius & uitulinus, butyrū, libanotus, pices, resina.

QVAE MALAXENT.

**M**Alaxat caprinus scus & adeps pullinus, & anserinus, & hircinus, & taurinus, medulla ceruina & uitulina, amoniacus, storax, galbanum, bdellium, oleum sicyonium, & liliacium, & oleum dulce, anthemis, euiscæ radices, cucumeris agrestis radix, & maluæ agrestis folia, & de arbore maluæ, mastice, cera, terebinthina, colophonía, opopanax, ripes de statuis, stercus humanum, butyrum.

INDVRANTIA.

**S**emper uiua, porcacla, psyllion, lenticula, & desuper aqua quæ in stagnis generatur, uua canina. Indurat autem quæ sicca fuerit herba, & humectat ea ipsa si abundanter in usu sit, & euacuat ea aut coagulat. Ea quæ calefiunt, me diocriter resoluerè oportet, & malaxare de supradictis.

QVAE HVMORES EXTRAHANT PER OS.

**P**eretrum, lappacium, capparís, ficus maturæ, dadinus, mel, papauer, absinthium, origanum, raphanus, uua sine semine & caciús, sinapis, hellebórus albus, elaterius, thymus, sal, omphacium, anísus, piper, coconidiús, daphnidis, balsamus, animonis, amoniacus, storax, fex sicca ustra.

QVAE SINT QVAE PER NARES EDUCANT.

**E**laterius, betæ succus, cyclamini cortex de radicibus, mel, thilaspheus, cononidiús, anagallis, animonis, helleborus albus, omphacium, prassij, edera folia mollia.

QVAE DE OCVLIS EDVCANT LA  
chrymas uel humores.

**M**El, hyssopus, oleum uetus, anagallis, oleum laurinum, oleum nardinū, cassia, costum, opium, sagapinum, daucus, apium, malogranata, amygdala, prassiu, helleborus albus, animonis, ruta, castoreum, litus emathitis, anserinus adeps, fel, smyrna, calcitheus, sulphur, stipteria, scistis, ossa sippiz, & cortex libanotus, squilla, amoniacus, & sine omnibus alijs omphacion.

QVAE PER AVRES EDVCANT.

**M**El, piper, bouis fel aut tauri, mercurialis, linogustis herbæ succus, caparis radices, cocconidiū, bdellium, cassia, galbanus, helleborus albus, omphaciū. QVAE CONSTIPATA RELAXENT

& purgent.

**A**Nagyrops, folia sicca & radices ipsius cortex, agaricus, agaliphis semē, amygdala amara & arbor ipsa, adiantus, asari radices, pulegium, dragontea, daucus, gentianæ radix, sinapis, cicer nasutus, eupatorium sine calefactione, thymus, caricæ pingues, calamentis, cassia, coccimeleas, gummi, gitter, ruta, cucumeris, melones, spondilion semē & radix, stycas, camitrius, & quæcunq; alia in se continent amaritudinem qualitatis.

QVAE EXTRAHANT.

**C**Apræ stercus ustum & nō ustū, & ostracodernion, & omnia de ostreis & de sippijs ossa, ecinoni utriq; usti, aut cinis eorum, serum de lacte, mel, brionia radix, amygdala dulcis, & ipsa arbor, anagallidis, amniones omnes, aristolochia longa, plantaginis folia & magis succus, ireus, asparagus, miacantinus, staphisagria, alphodeli radices, atraphis semen, absinthij succus, bulbis superpositus, hellebori utriq; elxine quæ & perdition, salicis opes, calami fragmiti radix cum folijs sufficienter sine acredine, centaurea minor, & succus eius, brassicæ, critmon, ordeum mediocriter, lilij folia & radix trita mediocriter, fabæ caro, lapsami cataplasmati, lincinon de petris, uiola alba, omniami on, platani cortex, de radicibus mediocriter, porrum cataplasmatum, propuleus mediocriter, ptolex & folia, & cortex, & radix, ptisanæ, terebinthina plus a mastice, sagapinus mediocriter, cucumeris, melones omnes, cucumeris agrestis radix, smyrna, beta, titimali cortex, camipiteus, alcionia, omnis terracia & famia mediocriter & cretica, cathmia, pumex ustus & non ustus, lithargyrus mediocriter, ismeris terra de furno, cornu ceruinum & caprinum ustum.

VRINAS MOVENTIA.

**A**Pium, petroselinum, fœniculum, daucus, smyrnion, anisi semen, asarus, acoron, asparagus, basilicon & oximyrsinon, bdellium, brionia, terebinthina, calamus aromaticus, careus, carpesia, caucalis, costum, cyminiū, cyperi radices, liuisticū, mion, spica nardi, celtica, ruta, polion, silis, cucumeris, melo, pones, scandix, alliu, pastinaca, squinoantū, thermentū, carpus, absinthiū, herba sabina, sanguinē per urinas deducit, eritrodani radix, id est rubeæ, urinam pingue & multam & utiq; sanguineā educit, capinus cholera per urinam educit multā, orobus, amplius assumptus sanguinē per urinam educit male olentem. Si quis eum in uino coctum bibat, male olentes sanat urinas, & multā, & oximel, & uinum tenue, & aquosum.

QVAE PER VRINAS DE SPLENE EDVCANT.

**T**itimali semen, caragium, gitter, cyminum, thymus, ampilon, acrix radix, capparis radices, scolopendron, cithisus, dragontea, aristolochia radix, origanum.

**A** origanum, polion, coloquintida agrestis, brionia, ciclamini, porcacla, scorpi-  
on maritimus extentus suffocatus in uino, ipsa infusione uini potata.

QVAE PER VRINAS DR EPA  
te educant.

**A** Gni sperma, dauci folia, sceniculum, balsamum, capnion, anisus, dacty-  
lorum ossa, lauri folia, absinthium, smyrnion, anagallis, menta, enancij  
opes, sylphiu, eringion, trithion, decoctio, asarus.

QVAE PER VRINAS DE RENIBVS  
educant humores.

**A** Pij semen, piper, pastinaca, porrus, cnicus, brioniz radices cortex, gra-  
men, ossa sippiæ, sulphur & cicer albus.

QVAE PER VRINAM DEDVCANT  
de thorace humores, quæ adaperiunt omnia.

**N** Vculus pineus totus uiridis, pituinis, butyrum, castoreum super carbo-  
nes suffumigatum, & in os tractum intrinsecus cum spiritu, leuat autē  
maxime & pulmones & cerebrū humida & frigida existēte distemperātia: Spi-  
ca nardi capitis & thoracis reuma desiccatur; educit autē ex pulmonibus in electua-  
rio data & in catapotijs cnici semen, daucus, papauer niger, thymus, raphani  
succus, sinapis, anisus, sisanus, erisimus, squilla, orobus, cucumeris semen, pi-  
per, ruta, nardus, sulphur, polion, aron, dragontea, costum, sulphur, smyrnis,  
lauri baccæ, interiora capparidis radices, cortex, amygdala amara, pionia, castore-  
um, abrotanū, sthorax, bdellion, sylphiu, uua passa sine semine, nucleus pineus,  
omphacion, aristolochia, galbanū, prassion, eringij radices.

RENES PURGANTIA QVAE  
abscindunt omnia.

**B** Plantaginis siccæ radices & folia & semen eius, asparagus, miacantinus,  
licides, id est pionia radix, cicer, amygdala plus.

QVAE RAREFACIANT COR-  
pus, uel cutem.

Camimola, euistus, cucumeris agrestis radix, oleū uetus, abrotanū uisum.

QVAE ADAPERIANT ET ORA FACIANT.

**O** Mnia quæ sunt acra, animonis herba omnis, fel taurinum, allium, cepe,  
irini & amaracini olei feces.

CONDENSANTIA CVTEM CORPORIS.

**A** Qua frigida, semper uiua, porcacla, tribulus uiridis, psyllion, lenticula  
quæ super stagnantes nascitur aquas, & ut simpliciter dicam, quæcunq;  
infrigidare possunt, & non desiccare.

PVTREFACIENTIA CARNES, ET ADVENTIA.

**A** Vripimentū, sandaraca, chryfocolla, pitis campi, cidria, gitter, hellebo-  
rus niger.

QVAE PURGENT VVLNERA.

**E** Laterius, cucumeris agrestis radix, oca, mandragora, siue petra asia flos,  
& de ostreis omnia uisita purgant quæ carnis supercrescunt ulceri medio-  
riter, aut similiter utraq; uisita cū toto corpore: sed & ematit lapidis puluis tri-  
tus tenuissime, & uiolæ folia, & faba, & lipidis calculus, & chryfocolla.

QVAE CICATRICENT.

**S** Tipteria, galla asiana, omphacius, calcuci caumenon, & maxime lotus, ma-  
logranati cortices siccæ, scoria plumbi, lithargyrus, molipdinis, id est plum-  
bum

**C**bum uftum, cochlearū tefta omnia, purphira, uitrūm, pumices, fpeculare uftū, pfmithium, pompolix, fpondilion, chryfocolla, ftimeus uftus, defrigis, farcocula. Hæc omnia prædicta utiq; fi afpergantur uulneribus cicatricant.

## MORDICATIONES FACIENTIA.

**C**alcantum uftum, cathimia, lapidis calcus & ferri aciarij ferrugo. Sed & ius, & calx uiua fi urantur & affentur, fine mordicatione inducunt cicatricem.

## QVAE VL CERENT.

**R**ubi canini folia, beta, allium, pulegium, hyffopus, origanum, fippia, afphodeli radix, appij femen, & quæcunq; funt falfa & acra & amara.

## QVAE ADVRENT.

**C**Antaridæ, defrigis, fex ufta, aceti, animonis, dactyli flores, allium, cinis ficis, nitrum allum, calcucicaumenum, ftipteria, cyricus, tefta ufta, capita fardinarum uftarum, auripigmentum, caciurus, ftaphifagria, coconidium, poretri radix, finapis, calx fi quidem asbiftus, id eft calx uiua non extincta. Nam fi extincta eft, icaras facit, diuturna autem minus calefaciunt: calefaciunt enim & confumunt carnes.

## QVAE EVOCENT ET EDVCANT.

**A** Nimonis omnes, anagallides utriq; diptamnus, cicer, tapfia, terra malum, narciffi radix, propuleus fortiter, fermentum, ftercora omnia, fagapinum, opium quirinaicum, opium miconum, pfilphiū, radix eius, afparagi femen & uirgultorū ipfius fuccus fortiter, refina, terebinthina magis de alijs resinis, sulphur, ftercus boum, & magis quādo herbas comedunt, calamentis cataplasmata, coftum, lolium, herbum, euifcus fortiter extrahit.

## QVAE SINT DIAPHORITICA.

**A** Brotanum uftum, agaricus, adiantus, agilops, acalifis femen & folia nimis, fambucus, ebulus, antimis, anifi femen, aristolochiz radix, afphodeli radix & magis ufta, aut cinis eius, atrifex, bulbus, herba fabina, brionia, & fplagnon, daucus herba, euifcus, oleum dulce uetus, oleum raphaninum, tapfia, calamus fragmiti cortex ufta nimis, braffica, lilij folia & radix, cithiffi folia, ladanus, linoguftis, malua agreftis, maftice, cia, mel perfici, cimæ & folia, rofa, laurus, caprofici, opobalfamū, opium quirinaicū nimium, paliuri folia & radix, ruta, picula, praffion, thermentis, rofeum oleum, fordes de ftatuis, patus, famfucus, cucumeris agreftis radix, fmyrna, ficus ea quæ acriora funt, erimion, magis beta quæ fine calore eft, & fortior eft alba beta, galbanus, fal uftus, & magis falis flos aut nitrum, alcionia omnis, gellamia, iufquiamus, careus mollis, acidum lac mediocriter, nitrum, butyrum, coagulū omnes, ftercus omne, hyffopus mediocriter, carnes ferpentium fortiter, adeps leoninus omnibus plus & magis offa eius ufta, lana ufta de utrifq; illis aut cinis eius.

## REPRIMENTIA.

**O** Liua agreftis, rofa, lentifcus, apium, femperuiua, papauer, cithifus, aloes, acaliphes, gigarta, id eft uux femen, pira, crocus, euifcus, thermentum, balanum, iufquiamus, ciffus, id eft edera, nymphæa, dactyli, uitella ouorum affa, paliurus, hiporis, id eft caudā caballina, radix cyperi, euantis, braffica difcocta, coagulū leporis, fpongia ufta, ramnus. Multa quidem funt & alia ftiptica, quæ omnibus funt cognita.

## QVAE LAC GENERENT.

**E**Ruca, foeniculum, anetum. Dico autem herbam viridem adhuc & humidam. Smyrnion similiter & apium, sisanus, cucumeris semen, cacrius, smyrna, polypodion, cerebrū, succus foeniculi, brionia radix, critinum, cyminum.

## QVAE CONSTRUCTA EDVCANT MENSTRVA.

**P**otata igitur herba sabina, menireus, ruta, calamentis, pulegiū, diptamnus, asarus, id est, bacida, costum, cassia, aristolochia. Dabis unam quancq; herbam cum tritici decoctione, aut foeniculi cocti cum aqua, aut ptisanā succis. Caplasma uero impones de pulegio, gitter, smyrna hordei infusi succo expresso, foricis fimo, pocacia, adipe anserino, ptelox arboris folijs, cera, sulphure, taurocolla. Iterū apponuntur in pissaria seuum ceruinum recens, simul & adeps anserinus, sex sicca usta, fel taurinum, sal, oleum, cyperum, aphronitrum, sthorax, absinthium, artemisia, samfucus, helleborus niger, coccomidium, herba mercurialis, cyminum, foenogracum, uua passa, exollata citria.

## GENERANTIA SEMEN ET MOVENTIA LIBIDINEM.

**D**e cibis quæ nutriunt & inflant. De medicamentis autem ea quæ spumam mouent & calefaciunt. Bulbī igitur, cicer, & faba, & ficus comesti multum semen faciunt, cynicus & satyrion, medicamenta. Cibi autem simul & medicamenta sunt, lini semen, & eruca, & hijs similia.

## CONSVMENTIA ET REPRIMENTIA SEMEN.

**Q**uicunq; infrigidare possunt cibi, uel medicamenta impinguantia & desiccantia & condensantia, hæc repriment semen, qualia sunt lactuca & bleti, atriplex, cucurbita, mora, melo, pepones, cucumeris. Quæ autem desiccant principalem uirtutē, & non permittunt generari semen: utiq; quæ calida natura sunt, quemadmodum est ruta. Si autem non sint calida multū magis nymphaea.

## AD ELECTIONEM SIMPLICIUM MEDICAMENTORVM.

**A**garicus melior est, membrana nervosa habens recta. Acaciam existima esse modico rubeam boni odoris.

Aloës eligenda est pinguis, & non lapidea, sed lucida, subrubea, facilis ad resoluendum, epati similis, cito humectans, abundantem habens amaritudinem. Nigra autem & quæ uix ducitur, bona non est.

Amoniacus autem thimiamatus, qui sine lignis est & libanotizat in glebis mundus, densus, nullum habens odorem, & suauī odore est, & gustu amaro.

Amonius autem eligendus est recens & albus & subrubeus existens, non maturus, aut spissus. Resolutus autem & diffusus, semiplenus, similis botro, grauis nimis & boni odoris, absque apertione & acer in gustu, simplex in colore & non uarius. Adulterant autem eum aliqui amonio admixto.

Aspastum autem bonum est quod graue est, & cum flammeo colore, subrubeum, spissum, boni odoris, subamaricans in gustu. Aspastum autem bonū est purpuræ simile, flagrans luore, citatū in odore graui. Nigrū autē malū est, adulteratur enim pice mixta absinthio. Melius enim est in Ponto & in Cappadocia natum. Adulteratur autē succus eius fecibus olei, id est, amurca cocta comixta.

Bdellion optimū est, quod gustu amaro est, tauri collo simile, & pingue in pfundis, & bene molle, absque ligni mixtura & sordibus odoratum simile thimiamatis unice. Helleborus niger eligendus est boni nutrimenti, non satis interioris habens, acer in gustu & sordidus: Talis autem est, qui in Helicone, Parnasso & Italia nascitur. Euphorbium eligendum est, quod perlucidum est, & acre. Eruiscus bonus est prasino colore intrinsecus, extrinsecus autem subrubeus, nihil in se habens asperum, aut fursureum: Colligitur autem de quercu arbore,

- C quæ folia habet similia melario, & pyro, & ex alijs arboribus.  
 Icrocolla bona est alba, & subpinguis, & non scabiosa, & cito se resoluens.  
 Calamus aromaticus optimus est rubeus, spissus, geniculas habens, & in multas scissuras uadit cum frangitur, repleti araneis, fistula subalba: In masticatione uero glutinosus & stipticus est, & subamarus.  
 Cardamomum optimum est de Armenia comizonon: Eligitur autem quod non facile frangitur.  
 Cassia eligenda est quæ rubea est, boni coloris, corallio similis, tenuis, nitida, ualde longa & pinguis in fistulis, & in gustu dipticis & stiptica cum igne multo, uelut aromatum similis odore. Cera optima est pontica.  
 Ladanus utilis est qui bene olet, subuiridis, bene mollis, pinguis, absque participatione sablonis arenosus: Talis autem est in Cypro factus.  
 Glucen, quam aluxirocollam uocant, optima est rodiacis: Est autem alba perlucida. Nigra autem quæ est nitro similis, perlucida sine lignis: Ita & alba resinosa & pinguis inutilis est.  
 Costum optimum est arabicum, album & leue, & habens proprietatem odoris. Secundum autem est indicum, quod & leue est sicut ferula. Tertium est siriacum colore pixode, repercuiens in odore: Optimum est quod recens est & album, & plenum est omnino, spissum, siccum, gustu sine mordicatione, ignitum. Adulteratur autem radicibus enulæ mixtis: Certa autem cognitio eius est, quia neque ignita in gustu est enula, neque bonum costi odorem; neque uirtutem & repercussionem costi representat.  
 Crocus optimus est coricius regionalis, recens & bono colore, modicam subalbedinem habens, ætate in longitudine non se frangens.  
 D Crocomagma autem fit ex crocino mero, aromaton expressum & fictum. Est autem hoc bonum quod bene olet. Catafmyrnon, graue, nigrum, sine lignis.  
 Cyperum optimum est quod graue est & spissum nimis, & difficile frangitur, asperum, longum, bene olens, cum quadam acredine. Iumelinum optimum est.  
 Libanus præcedit masculus: Rotundus autem albus intus, pinguis. Adulteratur autem ex pituina resina.  
 Glumen facile cognoscitur, quod gummi non exardescit: Suffumigatum enim resinam in fumo spargit.  
 Libani cortex differt, quod plenus est & pinguis, odoratus, recens, leuis, nitidus, & licet leprodis aut membrana habens: Adulteratur autem mixta cortice pini, aut piceæ. Probat autem ignis: suffumigantes non accenduntur, Libanotus autem accenditur cum odore suauis.  
 Malana trifolia bona sunt, quod dicitur folium, si sit recens & subalbidum in ipsa nigredine, & non facile se frangit, sed integer est, repercuiens odorem, & permanet odor nardi similis & in gustu neque falsedine.  
 Mellilotus optimum est atticus, & qui in cigico nascit coricizon, & boni odoris est. Papaueris succus, id est, opium, optimum est spissus, & grauis in odore, somnum faciens, amarus in gustu. Facile soluitur in aqua, nitidus, albus, non asper, neque thromboidis, id est, neque conglomeratus in resolutione, neque indurescit in sole positus, incensus, & ad lucernam accensus terrestris flammam mittit. Adulterant autem eum glaucium miscentes, aut gummi, aut lactucæ agrestis succos. Si glaucium admixtum habet, crocizat in resolutione. Si autem lactucæ agrestis succus miscetur, odorem non habet similem, & asper est. Quod si gummi mixtum est sine uirtute imbecillis est & perlucidus.  
 Medulla optima est ceruina, post uitulina, deinde taurina, & post has caprina &



**A**na & uerucina. Bona autem est aestate collecta, aut autumnno: Alijs enim temporibus cum sanguine mixta est. Curatur autem medulla recens malaxata superfusa aqua, & sic cum linteo colas similiter & lauas, donec aqua munda fiat: Postea in duplici uase remittes & leuabis cum penna supernatantes sordes, & purgatam mittes in mortario, & cum se gelauerit repones in testeo uase subrafo diligenter. Si autem non curatam reponere uoueris, sic facies omnia, sicut de pulli, aut anferis adipibus fit.

Nardus tacijs bona est, leuis, recens. Policonus rubeus colore cum odore suauis nimis, & cyperum similat in odore, modicam habens spicam, amarus in gustu, & linguam desiccatur permanente odore. Venditur autem infusus, quod cognoscitur ex albumine, & spica.

Omphacium eligas rubeum & bene tritum, stipticum ualde, & mordicans lingua.

Onix bona est de etra gummi similis, subalba, rubra, pinguis. Panacis radices meliores sunt, siccae, & albæ, & rectæ, & non comestæ, & ignitæ in gustu, & aromaticant.

Opopanax differt, amarior est in gustu, interior alba, exterior crocizans, pinguis, lenis, & cito se frangens, & cito se soluens, & graui odore est.

Piper longum eligitur, qui grauis est & plenior, & niger, recens & non furaceus, & grano maiori.

Peucedanum optimum est quod fuerit grauiori odore, calefaciens gustu.

Polio quod rectum fuerit utilissimum est.

Resina terebinthina utilis est quæ lucet, uitro similis colore, & bono odore.

**B**Smyrna prima est troclites, minea, subuiridis, & perlucida existens. Amomias uero quæ uocatur eligitur recens, leuis, uno colore omnino, & rupta intrinsecus, habens colorem unicum. Item & amara est, & bene olet subacrum. Grauis autem & colore picis habens, inutilis est.

Stactys autem smyrna bona est, quæ boni odoris est, & nitida, & non est mixta oleo. Styrax differt, quæ est rubea, & pinguior, & resinosa, thrombos habens subalbos, permanens in bono odore quamplurimo, & cum eam malaxas, emittit ex se humorem mellis similem.

Terebinthina autem resina bona est, quæ perlucida est colore, & odorata est.

Tracacantum lachryma radices excisæ existens: Differt enim quæ est perlucida & leuis, & tenuis, & munda, & subalbida.

Iusquiamus autem utilis est in usu, qui album habet florem, & semen album. Si autem non inuenitur talis, uteris flauo: Nigrum uero reprobare oportet.

Galbanus optima est libano similis, condrodia, & munda, sine lignis, habens aliquid de femine & ferula mixta, non grauis, quæ neque nimis sit humida, neque sicca.

Agnus eligenda est lenis, & colore non æquali, & sine lapide, & odore bono.

Arsenicon optimum est placidum, auro simile, picis squamas similes habens. Gifara pilotidus nigra prouidenda est.

Peucedanis longa inferenda est pellucida.

Desfrigis eligendus est qui est in gustu aramenti, stipticus & desiccatus est multum in lingua.

Sulphur optimum est thinapiron, id est, quod ignem non est expertum. Flammæum est colore, & pellucidum, & non est lapidosum: Accensum autem uiride. Indicum uero optimum est cianoide.

Cadinia optima est botriodis, quæ uocatur grauis: Media habet epiphona botriodi colore cinereo rupta desinitus, inter fros & lotus. Secunda autem est extrinsecus cinizosa: Intrinsecus autem diarefes similans onycem lapidem.

**C** Pumex perquirenda est leuis, & non multum uacua, scissa, & non lapide mixta, adhuc magis & alba.

Lithargyrus optimus est chrysites qui uocatur, & qui pellucet.

Lapis acius eligendus est pumicis similem colorem habens, inflatus & leuis.

Lapis emathites optimus est, qui bene teritur. Durus autem, solidus, inutilis.

Lapis Gabatis perquirendus est qui cito apprehendit, & in odore asphaltizat.

Magnes autē lapis optimus est, qui ferrū trahit, & colore est cianeus, spissus.

Melanteria differt, thiciocus, ualde æqualis, munda, & in tinctura nigra, cito uirtutem habet causticam, similem ireus multum.

Sinopitis optimus est grauis & spissus, epatizofus, similans lapidē suo colore.

Misi assumendus est cyprinus, chrysophanes, durus, & in tritura chysizon.

Sic est causticus, aut calcitheus siue proricæ confectione.

Molipdina bona est, quæ est lithargyroidis, flaua, sublucida, & rubea cum teritur. Lauata uero & usta habet simile lithargyro.

Nitrum eligendum est leue, & rosæ colore, aut album colore in tritura.

Aphronitrum optimum est, quod uidetur leuissimum & placidum, facile teritur, & in porphyrum est spumofum.

Pompholix optima est Cypria: In aceto autem infusa, decurrit.

Sandaraca prouidenda est prouincialis, & rubea, bene florescens, munda, & cinnaborisans colore. Adhuc autem sulphurea, & opophoran habens.

Schimicus optimus est lucidus & relucens, in fractura terrestris, aut pinguis, facile se frangens.

**D** Stipteria optima est scistis, recens & alba nimis, & sine lapide.

Icore prouidenda est Aegyptia, & cum frangitur nigrior uidetur, fenestras multas habens, & subpinguis est, & substiptica: sex adhibenda est maxime de uino Italico ueteri, aut simili huius.

Calcuciacumenus ustus bonus est, rubeus, & in tritura cinnabari similis, la uatur sicut cathimia, quarta uice in die mutata aqua.

#### DE MENSURA CERAE ET OLEI.

Acopa  
unguenta.

**E**A uero quæ dicuntur acopa unguenta si uolueris facere, quartam partem mittere ceræ in oleum. Si autem uolueris in fracturis humidum cerotum facere, duplum mittere ceræ. Si autem medicamen emplastri uolueris facere, æquali pensio ceram & oleum mittere.

#### DE MENSURIS ET PENSIS.

**I**Talica amphora habet sextarios XLVIII. Sextarius habet libram I & VIII. Sextarius mellis pensat libras II & 2 XI IIII. Congius habet 59 VI. Sextarius habet heminas duas, cyathos duodecim: Olei pensat librā I & 5. Hemina habet cyathos VI. Vncia habet 2 VIII. Olca habet 2 III. Drachma habet siliquas XVIII. Obolus pensat siliquas III. Oxibaphum in mensura est hemina quarta pars. In pensa habet 2 XII, quod est uncia una. Cyathus pensat I & 5. Cheme maius habet Cyathos quatuor. Cheme minus habet cyathos duos, Mystron maius, cyathos habet tres. Digni pleni leuant 2 II. Cyathus Aegyptius, id est, faba Aegyptia, pensat obolos 4, quod est solidus medius. Alexandrinus autem obolos III, id est, siliquas IX. Elimicus obolos duos, id est, siliquas 6. Nux auellana magnitudinis pensat obolos 6. Nucis autem maioris magnitudo pensat drachmas VI. Cochlear uero pensat drachmas 4. Drachma habet obolos 6. Obolus habet siliquas 3. Vncia habet obolos 48. Scrupulus habet obolos 2. Ilarium est drachma dimidia, id est, scrupulus & semis.

## AD COPTARIA PLATISMATA.

conficienda.

**Q**uæ coptaria uocantur platismata, si medicre uolueris facere medicamen poloticon, id est, quod cicatricem ulceribus insanabilibus possit inducere, quartam partes mittes ceræ cum metallicis speciebus. Si autem fortius medicamen facere uolueris, tertiam scilicet partem de cera malaxata in sole, aut ad ignem, aut in aqua calida cõmiscebis cum metallicis speciebus.

DE COCTIONIBVS EMPLASTRO-  
rum ex Antilio autore.

**M**ittenda sunt sic medicamenta in coctionibus medicamentorũ: Lithargyrum cum oleo coquitur. Oportet autem tritum & cretum lithargyrum iterum cum oleo in mortario teri, ut molle fiat & lene, postea sic coquatur ad ignem lenem. Sine intermissione autem agitabis ab initio, ut non se inflet ebulliens ne foras exeat, & cum proximũ sit coctioni, ut non solum amolentum sit, ut iam non coinquinat digitos, sed etiam mutetur ex sordibus ad colorem rubeum nimium bene florens, lipidus. Calcum autem coques non ab initio missum, sed medio iam cocto emplastro: Mensura autem coctionis, si satis modice mittitur, tenet colorem, & rubeum fit emplastrum. Sorũ autem & defrigis, mittuntur uero & hæc medicæ decoctionis mensuræ: Mensura autem defrigis quemadmodum & lipidum continet colorem. Sorũ uero nullam habet mensuram. Hæc omnia amolentum præbent emplastrum.

**Calceus** autem coquitur simpliciter, & mensuratum coquitur rubicundius, ut dactylis simile fiat emplastrum, calcanti flos similiter calcij. Mensura autem eorum cõmunis est in coctione. Calcantum ergo mittitur in media coctione. Cocta uero frigida terantur, & faciet colorem emplastrum. Miseum autem quando uis mittes. Propriam autem mensuram nullam habet.

**Arsenicus** autem & sandaracis mittuntur effecta coctione. Plumbum uero combustum in media coctione mittitur. Psimithiũ mittitur in albis emplastris & magis albescent. In nigro autem ab initio, quia diu coctum amplius nigrum efficitur. Iu uero in utridibus emplastris mittitur post coctionem. In quibus autem non in initio mittitur in olla, sed cum aceto tritum & manente in mortario, supermittuntur alia quæ cocta sunt. In nigris autem emplastris, media cocta confectione Iu mittitur. In prosopo autem emplastro ab initio mox coquitur Iu. Superpensum igitur in coctione, primo quidem nigrum superaddere oportet. Prosopum rubeum fit colore. Stipteria mittitur quamplurime post coctionem. Propria uero coctionis nullam habet mensuram. Sinopidis uero transacta coctione mittitur. Cathmia & pompholix mittuntur in initio. Sal & nitrum mittuntur circa mediã coctionem. Sulphur perfecta coctione mittitur. Coctio autem eius nigrescere facit emplastrum. Terra omnis uel lapides mitti conuenit perfecta coctione quamplurime. Pumicem quoque & conchylia usta conuenit imperfecta coctione mittere: Oleum siquidem in initio non mittitur. Resina & pix liquida absque constitutione facit esse emplastrum. Oportet ergo post constitutionem in olla coctum sic mittere oleum. Cetera autem alta in media mittenda sunt coctione. Oleum autem irinum coctionem portat. Cyprini autem & roseum minus. Alia autem ex toto olea omnino non suffiunt coctione, propter quod perfecta coctione mittuntur. Cera non est coquenda: Proprietas eius sola incenditur, neque cum resina liquida, aut pice liquida sine constitutione

**C** constitutione manet. Sed mittitur cum oleo mundo, aut cum aliquibus metallicis coquitur, aut cum resina aut pice ante cocta, & prima coctione aliorum quae immittenda sunt, primo ceram mittes, & postea resina friza mittitur post ceram: Nam liquidam ante omnes alias species eam solam coques, sed non nimis, & sic mittes alias omnes species. Piculam mittes ante omnes mensuras, liquida quidem coquenda est, ut consistat, sicca autem maxime cum aceto coquitur, ut nullo modo bullifcat, leuet, aut infletur. Aspaltum coquitur missum ab initio. Non oportet autem teri id, asperitatem habens in colore. Similiter autem si teratur fortiter, & coquatur in aceto, non agitabis, ut nullo modo bullifcat aut leuet. Propuleum malaxari oportet & coqui. Sub coctione autem nullo modo ardeat. Amoniicum in media coctione mittendum est. Oportet autem si possibile est ut subtiliter teratur, & sic superaaspergatur. Si uero non potest, cum humore aliquo terendum est. Si autem ad sanguinolenta uulnera fiat emplastrum, cum aceto aut cum uino teratur. Si autem mollia loca sunt, qualis est anus, cum aqua. Sic mollientes eum habeant infrigidatum, ut non ebullifcat.

*Amolenta  
emplastra.*

**D**

Opoponax mittitur multum postea post amoniicum. Omnino autem modicum bulliat. Oportet autem & hoc ante teri cum uino aut cum aceto. Galbanum bullire nullo modo fert. Sed quando amolentum fit emplastrum, id est, quando iam non coinquinat digitos, leuas ab igne, & malaxatum eum mittes. Sagapinum uero contundis in pila, & molle factum commalaxa cum emplastro adproximatum igni. Aloë superaasperges post decoctionem, & sic commifces. Opium myconum infundes ante unam diem in aqua modica, & ita teres in mortario, & sic postea id super emplastrum mittes. Tapsum supersparges nouissime. Bdellium tritum supersparge post cum ab igne tuleris emplastrum. Quod si pingue esse uideatur, & non potest teri, similiter quo modo sagapinum tundes in pila, & facies emplastro simile, & sic commalaxabis cum emplastro post coctionem. Libanotum & mannis tritos post coctionem supersparges. Smyrna trita cum modico mellis, aut cum aceto, aut cum aqua, si humidum fuerit emplastrum, sic liquida emplastro liquido supermittes perfecta iam coctione, mittes conuenienter coctum. Semen autem, & radices, & herbae, nihil bullitioni conueniunt. Tritas ergo in mortario superfundes, quae soluta, aut liquida sunt.

**D. ORIBASII**

# D. ORIBASII SAR-

DIANI ARCHIATRI IULIANI

CAESARIS, DE CONFECTIONE

CIBORVM AD EVNAPI

VM LIBER III.

QVAE SINT QVAE EXTENVENT IN CIBIS.



LLIVM, cepe, cardamomus, porrū, sinapis, piper, smyrnion, peretrum, organū, calamentis, hyssopus, siumbrium, pulgēiū, thymus, faturegia uiridis ministrata: sicca enim iam ut medicamen danda est, & non est ut cibus. Vniuersaliter autem omnes sicciore fortiores sunt uiridibus, & ea quae in collium locis, & nō in aquosis, sed in siccis nascuntur & in campis, quāquam quae in hortis nascuntur, aut paludibus, fortiora sunt.

Hæc igitur omnimodo oportet medicū scire quae prædicta sunt. Deinde autem sunt quae sequentur, eruca, apium, petroselinū, ocimus, raphanus, brassica, beta, colimbus, eringius, acaliphis semen, foeniculū, coriandrū, ruta, anethum, libisticum, cyminum, capparis, & thermentū, & carpus, carei semen, anisus, sinosis, ameus, daucus, silis, tardillus, & omnes quae sunt boni odoris & acres, & calidae sunt apertissime. Fortiter autem desiccantes sunt & extenuantes, ruta semen, & canabis, & tus in farma codis. Ceterae enim sementes mediocriter extenuant in cibus sumptae. Leuiore ergo sunt de hordeo. Secundi sunt de tritico panes in furno cocti. Alia uero abstinere tentanda sunt, præterquam post longum tempus: Pisum aut lenticula gustanda est non ad saturitatem, qui per rationem uult extenuari per dietam. Similiter & pisces aspratiles, & ex montibus aues minutas, & quae in montibus nutriuntur, animalia sicciore & calidiora sunt quae sunt temperantia, & carnes eorum minus phlegmaticae sunt uel glutinosae, qualia sunt stutis, merulus, turdus: perdices sunt comedendae, & quae in turribus nutriuntur & uiuunt aues, & hæc quae in uuis per uites degunt, & palumbes per turre comorantes meliores sunt domesticis. Et uniuersa quae exercitantur, hijs quae minus exercitantur, & ea quae sicca esca utuntur hijs quae humida, & ea quae in mundum aërem possident, hijs quae in nebuloso & humido degunt, melius extenuant. Piscibus autem aspratilibus utantur, quales sunt iudilus & ficitus coctius, merolus, scarus: & ut simpliciter dicam, omnia quaecumque macerata & molles sunt carnes: Quae autem duras & glutinosas habent carnes, prohibenda sunt omnino. Molles enim unifici carnes, sed maceratae. Aspratiles sunt trecla maceratae, non autem molles. Hæc ergo habent utriusque cognitionis de omnium animalium carnibus, de mollibus & pratyris, id est, duris, hoc attendes intellectu, quod uteris quae sint ad saturitatem si comedantur. Aliorum autem nihil aliud est abstinendum omnimodis: nihil aliud nisi hoc solum comedatur aliquando ad horum amissionem, cum obseruatione nimietatis ciborum saturitate, qualia sunt onisci & stredas pelagarum piscium. Licet ad praesens non sint aspratiles pisces, & maxime hij qui cum sinape comedunt, quemadmodum scorpina est. Sunt autem quaedam genera animantium, quibus sunt quidem alia genera, quorum dicitur sunt cognitiones. Sed de hijs absque mensura utriusque custodiri oportet. Ex quibus est anguilla & alia plurima, quae sunt molles carnes habentes, qualis est cumbrus molles carnes habens, propter quod glutinosa est & phlegmatica nimis, & no-

**C** cina, qui extenuandi diæta uti opus habent. Vtilis autem ad hæc est turpidon, aut fecalidon, aut stræda sola utere aliquando, & hæc expediunt. Non autem piscibus aspratilibus inuentis ipsa uirtute sunt buglossa & siptace: gallinas quæ exercentur non prohibeo manducare, & columbas, & turtures, & maxime quæ in montanis degunt locis. Oportet autem non recentia, sed macerata uno die uel biduo, aut amplius, offerantur omnia quæ duras habent carnes. In salati uero pisces multum extenuant uel subtiliant. Eligere igitur & hoc conuenit, & ea quæ sunt molles habentes carnes. Pelagicus autem insalatus uetandus est. Adhuc etiã & porcinae similiter carnes sunt gustandæ omnibus cautius. Pomorum autem minus lædunt, quæ uentrem molliunt: Molliora autem magis comedenda sunt quam sicca, quia tardius digeruntur. Ex quibus nihil ad satietatē est edendum: & quæcunque sunt austera & stiptica, pessima sunt talia accepta in cibis: Proprie autē in omnibus sunt ficus, & nucis pistacia, & amygdalæ subamaræ. Oliuus autē nec laudo, nec uitupero: Dulces uero non solū cibi, sed & potiones, præter mel solis, multū tenuem consistentem generat humorem. Vinū autē sit album & subtile, quo extenuari possint pingues humores, & purgari corpus. Sed & lactis serum ad subtiliandum est utilissimum, & maxime ad hæc utilissimū est oxymelle.

Q V A E S I N T Q V A E I M P I N /  
 quant & replent.

**P** Anis non leuatus, id est, azymus, aut non bene confectus, pachychymus est, sed & qui uocatur tragus, id est, farris grossa, & de sapa, & similia pemmata, & lagana, & hydria, & omne azymū de tritico pemma, & quæ ex hoc ipso sunt, scilicet conficiuntur dulcia. Est autem & similia scilicet & alica, multum pachychyma. Amulus uero mediocriter & bulbi sunt pachychyma, & calidi, & lentacula, & faba fresa, sisami semen, & resimi semen, & quæ uocatur melochia, theutilis, sipia, & polypi, qui pelagici sunt pisces, nimis sunt pachychymæ ostrea & cynicis, & porphyra, oxymelopes, pectines, pennæ, & omnia ut simpliciter dicam, quæ sunt ostrea, coderina, anguilla, cochlea, ceruina raro, caprina, aprina, bouina, leporina, epar, renes, testiculi, cerebrū, medulla spinalis, ubera hoedina, lingua mediocriter, lac quo coctum plus fuerit a caseo omne recens & lac acidum: Minus uero acidum lac, quod ad ignem coquitur, & oua quæ ad perfectā coquuntur duritiam. Plus tamen assa adhuc: magis uero frigida sunt pachychyma, dactyli, castanæ, albi, rapæ, amanitæ, fungorum radix, terræ tuffora, nuclei pini, ficus non maturæ, citri caro, melones qui plus comederit, uinum dulce, sanguis pinguis ex hoc generatur, & magis adhuc quod uocatur gyrūm & defretum: Similiter & quod pingue & nigrum est uinum.

Q V A E S I N T M E D I A M A T E R I A I N T E R  
 ea quæ extenuant & impinguant.

**M** Edia sunt materia, gallorū pullorū, gallinarū, phasianorū carnes, & perdicum, & columbarū, actagenum, & turturum, merula, turdus, & minorum auium carnes omnium. Adhuc etiã aspratiles pisces circa littus & in pelago consistentes, gouus, murena, & boglassa, & omnes, ut simpliciter dicam, qui non glutinant aliqua, aut male olent, uel bromosi sunt dum eduntur, olera syluestria, aut intiba. Hoc enim commune genus est quamplurime. Quæ autem secundum species uniuscuiusque eorū proprium possident nomen apud Athenienses, qualia sunt lactuca, codrilles, & gingidria, & alia permulta huius generis sunt, qualis est asparagus, macantinus, & gamedapnis, asparagus, & de brionia. Vinū uero rubeum & dulce & placidum, qualia sunt ariusium, & lesbium, & falerite, & admolite.

**A** admolite. Vtilem enim talia uina sanguinem faciunt, & mediocriter pinguem,

QVAE SINT QVAE GLVTINOSVM

humorem generant.

**T**riticum quod grauius est & spissum, & in profundo rubeum est, glutinosos humores generat. Quod autem leuius est & rarum & albu intrinsecus, istud tale minus glutinosos humores generat. Simila autē & alica multū glutinosos generant humores in neruis & cauis locis membrorū, & callus porcinus, & tota caro, & agnina caro, & sesami semen, & bulbi, & dactyli pingues.

QVAE SINT QVAE CRVDOS HV

mores generant.

**D**actyli uirides crudi crudos generant humores residentes, ut calefaciant comprehensos à rigore, & rapa, quando amplius repletus fuerit cibo uenter, & ostragodermon, quae duras habent carnes amittentes carnis humores, sal, sedineta multa coctione & quae malitia uocantur, pollipodes, sipia, & quae hijs similia sunt omnia, qualia sunt in mari cete, animalium uenter, intestina, uulua quadrupedum, & duriores adenae indigestae, lac acidum, panis calidus, uua quae intus tenetur & tarde in secessu deponitur.

QVAE FRIGIDOS HVMORES GENERENT.

**Q**ui fatis succo cucumeris replentur, frigidum congregare humorem contingit, & non facile ostendi potest in sanguinem utilem transmutari. Venter enim & intestina, & uulua quadrupedum animalium, lac acidum, boleti, melatum, quod nondum ex maturis malis factum est, bulbi.

QVAE GENERENT PHEGMA.

**B** Phlegmaticū generant humorem ex animalibus quae neruosa sunt, cerebrū, pulmo, medulla spinalis, adenae, indigestio, & agnorū caro, boleti, amanita, & carnis ostragodarum, & melatum non ex maturis malis factum.

QVAE CHOLERICVM HVMOREM GENERENT.

**C**erratiatis, cennarū succus tenuis, piroculum, id est, amara generat cholera. Vtilius enim est qui eum coquunt & sic edunt, & mel facile echolotae, id est, in cholerico uertitur humorē, quibus corpus & natura est calida. Omnes enim dulcis succi materiae in rubea mutantur cholera, similiter & uinum dulce.

QVAE MELANCHOLICVM HV

morem generent.

**C**aro bouina, caprina, & magis hircina, & taurina. Adhuc autem magis asinina, & camelina, & uulpina, & canina, & leporina, & porcina insalata caro, uel ex alijs animalibus uiscera: Splenem autem dico. Ex maritimis uero, tinnis & balenis, coccicas, iulios, & ex pelagicis ceti. Omnes cochleae, brassicae, cimae, arborū cimae, de salicibus, & aut aceto, & sale conditae, & lentisco, & thermenino, & rubo, & canino rubo, & cardus, & lenticula, melanchotatonem cibum, & cum hoc suffuraceus panis, & de spelta, & ex aliorū pessimorum seminum, seu molles casei & uetusti, uinum pingue, & nigrum.

QVAE SINT PERITHOMATICA,

quae abundantiam humorum faciunt.

**A**bundantiam humorum facit anser, praeter ascellas, uiscera, medulla spinalis, cerebrium, & quae in paludibus & stagnis degunt, cicer, faba uiridis, faba Aegyptia, porcelli, ouium caro, & omni genere animalium pigre uiuentium, & ex piscibus qui sunt fluuiales & in limo nutriti, & omnia quae pelagica sunt in mari animalia uiuentia.

QVAE SINT APERICTA, QVAE

absq̄ humorum abundantia nutriunt.

**C**eruicales animalium caudæ, alæ, & agrestium animalium caro, & qui in siccis locis nutriuntur uel degunt.

QVAE MULTUM NUTRIMENTUM

dent in corpore.

**P**olitron, erasson, porcorum domesticorum carnes, omnium curuorum animantium cerebrum, testiculi, cor, medullæ spinales, & omnes medullæ, & alæ anserum, & magis gallorum, & omnium gallinarum, uel omnium auium, uentres & cochlea, magisq̄ ostragoderma, qualia sunt duras habentes carnes, quæ dicuntur quimía, porphyra, cirices, & pacori carnes, & hijs similia, multum præstant nutrimentum. Astracipagori carnes, & hijs similia, quæ malacia Græci uocant, polypodis, sapia, & eutedis, & hijs similia: scumbrus, narcis, turpido, pastinaca mediocriter, Bati autem, & renis, & liolimati magis, streclæ & gobij minus nutriunt. Lac uero pinguis magis, humidius minus nutrit. Panis autem minus nutrit filigineus: Deinde qui de similia fit. Tertio loco sincomedes cocti & triticum simulari alica, faba, carni imponit habitudinem, non constrictam & spissam carnem relaxat, & humidam facit: Magis cicer, quam faba nutrit: Magis phasolus, & pisum, & fœnogracus, plus dolici, quos Bolustri phasolos uirides uocant, nutriunt. Apiso, non minus lupini nutritiles sunt. Castanea, lenticula, dulces dactyli, & uua dulcis & pinguis, balani, rapæ, quas homidas Græci dicunt. Bulbi multum nutritiles, & magis discocti, mel dispumatum utilius facit anatosis, & nutrimentum præstat, & mulsæ bene coctæ, & omne uinum secundum rationem nutriunt pinguiora. Quæ enim rubra & pinguis sunt, hæc sanguinem multum generant, & ad hæc utilia sunt. Post hæc nigra & pinguis, & siccitica supra memoratis minus nutriunt. Album autem uinum, & spissum, aut pingue, & austerrum, omnibus minus nutriunt. Alba uero & tenuia, omnia autem quæ sunt pinguis si bene digerantur, & sanguinem faciunt, & pollytropa sunt.

QVAE MINUS NUTRIMENTUM

præstant.

**M**inus nutrimentum præstant in corpore quæ sunt in animalibus, id est, extrema membrorum, uulua, uenter, intestina, cauda, aures, pinguedo, seuum: omne genus pullorum minus nutrit, & paruum nutrimentum præstat, ad comparationem generis animalium terrestrium. Senum animalium carnes minus nutrimenta præstant hijs quæ iuuenta sunt. Piscium autem ad sanguinem nutrimenta minora sunt, ut neq̄ nutriant abundanter, & citius digerantur. De ostragodermis uero quæ mollibus sunt carnibus, qualia sunt ostrea, olygotropa sunt. Panes uero minus nutriunt de hordeo qui conficiuntur. Ex hoc olygotropi sunt omnes qui de hordeo fiunt. De aliphita hijs similibus panis, & fursuribus, cibarij omnes, & lota amila, & miga de aliphita hordei, auenæ, milij, & magis panicij orizæ uiridis, papaueris semine, ormena, siccamina, canini rubi fructus, arcuitidus, myrta, amygdala, pistacia mala, persica armenica, oliuæ, & maxime acerba, auellana & magis nuces syriacæ, corna, pruna, mora, rubi, præcocia, capparis, & maxime insalata thermento omnia, brassica, beta, lappacium, porcacla, uua canina, raphanus, sinapis, cardamonus, peretrum, asparagi omnes, staphilinus, daucus, cepe, allium, porrum, ampelon, prafon. Cruda quidem nullo modo nutrimentum præstant: coctæ autem bis aut ter, modicum nutriunt: malograna olygotropa sunt. Pyra autem & maxime maiora, habent aliquod nutrimentum. Cucurbitæ



**A** turbita minus nutriunt, & olygotropha sunt. Vux austeræ, & non pingues, medicæ sunt olygotropha, phasioli, pisum, lateriarchi, & ficus non similiter, ut alia poma, olygotropha sunt. Fungidas igitur carnes faciunt. Similiter uux faciunt. Minus autem hijs ficus nutriunt, & fluxam & infusam carnem faciunt. Omnia hæc in cibo utentibus pharmacodis alicuius habet qualitatem nimiam, quando deponit coctionem, quæ siue cocta siue assa, modicum nutrimentum præstat corpori. Prius autem nullum præstat nutrimentum.

QVÆ SINT EYCHYMA, IDEST,  
quæ sint boni succi.

**E** Vchyma bonos succos Græci appellat: Boni succi sunt lactis, ex omnibus animalibus mox ut mulgitur potatum, & ova abala & sorbilia optima sunt asserina, phasiana, & de gallinis, & struthionina, & auim. Pisces autem propè omnes euchymi sunt, præter eos qui in paludibus & stagnis & in fluminibus degunt limosi, & maxime quæ de ciuitate in fluminibus aqua fluunt, quæ purgat stercore, & de coquinis sordidis per cloacas in balneis uel fullonibus lauantibus decurrunt. Cautius ergo ex hijs semper adhibendi sunt pisces, qui admiscentur ex mari in fluminibus, quales sunt cephalo, pelagici, & saxatiles: etenim in bonis succis in sua uitate multa præcedunt aliorum. Si autem aliqui in utraq; aqua degunt, quemadmodum cephalus, laprax, id est, lupus, murena, & carcyn, & anguilla, considerare & interrogare quidem oportet prius unde sint capti: Post hæc autem & odore, & gustu cognitionem eorū facere: etenim mali sapore insuaui, & lutulento sapore sunt, quia tali cibo utuntur in aqua putrida & mala.

**B** Er quidem pingues sunt multo plus alijs & cito putrescunt, & de quibus sunt locis, & aliquibus qualis est cibus, & ubi nutriuntur, oportet cognoscere. Cognoscuntur autem facilius ex odore & gustu, quemadmodum strecla. Pessimiores sunt enim qui in esca caneros comedunt, & aliorū uero carnes quæ duriores sunt. Cacochymus autem & tharsus, & scrumbus, & epatus, & boglossa, & psitta, & saurus. Mediocres sunt apolo, sarcon, & duras carnes habentes: Cibi autem ex eis optimi sunt exercitantibus, & imbecillibus, & qui ex ægritudine tarde conualescunt. Hæc macerata, & molles cibi ad sanitatem sunt utilissimi, propter quod & euchymotati omnibus sunt carnes eorum piscium, quando bene digeruntur, quia sanguinē utilem & expedientem generant, & maxime euchymotatos, id est, bonos succos ad replendum in membris sanguinem facit porcinæ recens caro, non insalata. Optima est hæc caro ad sua uitatem, & ad digestionem data, & maxime qui media sunt ætate, hoc est, porcastrina. Peior enim est uetustus porcus, & post partum seropha mox cōmixta. Humectant enim supra mensuram, & porcellus tener similiter phlegmaticū & humidum generat sanguinem plurimū. Vber euchymum est. Epar, & uenter, & intestina, & uulua, & omnes extremæ partes, & cutis carnes, minus euchyma sunt. Adenæ digestæ bene dant simile nutrimentū. Proximum in carne cor non est cacochymum. Meliores sunt pedes porcini, gruma, & tota auris. Secundum quod possibile est carnes in uirtute ciborum desunt porcorum, in quantum extremæ sunt partes porcinæ uiuiscuiuscq; membri. Peius autē est secundum ipsum animal cerebrum.

De uolatilibus autem multo meliores sunt in campis, syluestris auis nutritæ carnes meliores sunt quàm domesticæ euchymo terræ. Panis uero mundus & bene confectus, euchymus est, alica, ptisana bene cocta, faba, castanea nō sunt cacochyma, ficus matura, uua matura appensa sine querela est, carica amatos

Piscium  
delectus.

Volatilia.

**C** quidem citata facta euchyima est: Residens autē in uentre diu cacochyma fit, & pediculos generat. Cum cibus autem non cōmixta, optimus fit cibus. Quicumque autem cum aliquibus alijs cibus manducant ficus aut carica, non paruo læduntur. Intuba trita xesin sanguinem generant, & post hæc intuba & uinum odoratum euchyimum est. Euchymotaton autem est salernum, & magis quod plus dulcius est, quale est aruifium, & rubeum cymolita.

Q V A E S I N T C A C O C H Y M A

in cibus.

**N** On una species est cacochymia: Alia enim sunt frigidiora, alia cholericā, alia melancholica. Omnia hæc sunt quæ sunt in cibus cacochyma. Suadeo quoque ut bene digestus aliquis accipiat in cibus. Latet enim in multo tempore pessimus in uenis humor collectus ex cacochymis cibus. Ex ipsa igitur occasione modica in putredinem totum conuertit sanguinem, & febres malignas operatur uel excitat. Est autem cacochyma ouium caro, & caprarum similiter, & cum acedine. Hircorū autem peiores carnes sunt, deinde autem ueruecum aut arietum, ita & taurorum. In omnibus autem hijs castratorū meliores sunt. Senum uero carnes pessimæ sunt. Leporis uero carnes sanguinem quidem generant: Meliores sunt autem ad bonos succos faciendos à bouinis carnibus & ouinis. Cacochyma autem nihil minus eorū est, quàm ceruini renes: amplius enim cacochymi sunt de faginatīs animalibus testiculi, præter gallorum, cerebrum, medulla spinalis, callus, splen. Minus autem sunt porcina uiscera omnibus aliorū animalium. Oua frixa, caseum uerustum, boletos & alios fungos, qui cautiore sunt non comedunt ex hijs aliquid. Lenticula, spelta, auena, & panis ex ipsis factus, non est euchyimus: Cicer & far, quemadmodum & auena, & spelta. Melius est enim milium nigrū, & hijs similia. Non sunt euchyima, aranea, piscis, mustela, scorpio, & dracotrecla, acermia, clauci, & quæcunq; alia in mari animalia grandia. Omnia cacochyma sunt quæ non sanguinem nutriunt, sed cholera, aut phlegmia. Et de montibus frumenta quæ sunt, omnia cacochyma sunt: Ficus autem minus illorum de montibus pomis. Caricæ autem si multum comedantur, non satis utilem sanguinem generant, unde eis pediculi multum nascuntur. Malata non de maturis malis facta, & pira antequam maturescant, & terebinthi fructus cacochymus est, cintrada, id est, cardum, & magis quando duriores sint cucumeres: melones uero minus. Cucurbitæ hijs meliores sunt, si non in uentre corrumpanantur, nam multū cacochymæ. Ex oleribus autem nihil fit euchymon, sed media sunt inter cacochymon & euchymon, lactuca, & intuba, & post hæc malua, & sic atriplex, & porcacla, & bletus, & lappaciū. Radices autē olerum, quæ sunt acria, cacochyma sunt, qualia sunt cepe, porrum, allium, raphanus, & daucus. Media uero sunt inter euchyima & cacochyma aaron & rapæ, quas napos appellant, cariota, ocymus. Cacochymotaton autē est rapa cruda, brassica, bulbi non bene cocti, Cepe, allium, & porrū, ampiloprassa cocta facta, cacochymiam deponunt. Nouissime autem pessima et cacochyma sunt omnia, quæ syluatica sunt olera, qualia sunt lactuca, condritis, scandix, gingida, intuba, cycomon. Vinum autem spissum & pingue, & non bene olens, sed in suaue & austerrum, cacochymon & peruersum est, quale est quod in maioribus lagenis reponitur. Quod autem in paruis, neq; euchyimum est, neq; cacochymum, sed medium est. Cacochymos autem uocant, qui non bonos succos, qui sanguinem nutriant, faciunt, sed humores. Euchymos dicunt, qui bonos succos, unde sanguis fit, generant.

Lepores.

Fungi.

D

Cacochyma.  
Euchyima.

A QVAE SINT QVAE BENE  
digerantur in cibis.

**B**ene digeruntur panes bene confecti, & pisces aspratiles omnes, guphur, generi quadrupedū. Melius & bene digestibiles sunt maxime pdicis, & attage- *Gallina.*  
nis, & columbarū pulli, & phasianorū. Alæ anserū bene digeruntur, & maxime  
gallinarū, & secundū totū. Optima autē sunt quæ pingua sunt, & recētia dabis:  
Pessima autē quæ macra sunt & seniora. Saginata uero de sero lactis, anseris epar  
similiter nutrit, & gallorū testes bene digerūtur. Extremæ porcorū partes ad di-  
gerendū utilissimæ sunt, de bubus, iuueni & uituli meliores sunt ad digerendū. *Bovina caro.*  
Hædorū carnes quam caprarū bimarū, & hæ digestibiliores sunt maioribus ca-  
pris, & ea animalia digestibilia sunt quæ in siccis locis nutrita sunt, q̄ quæ in  
humidis. De pomis autē digestibiliores sunt nuces auellanis. Bulbi digeruntur  
facile bis cocti. Oua apala & forbilia, lactucæ, intubæ, mala, cucurbitæ elixæ,  
quando nō corrumpuntur: digestibilis est dulce uinū austero: optimū autē ad  
digestionē esse sciendū est, quod ad bibendum fuerit suauē.

QVAE TARDE DIGERANTVR IN CIBIS.

**I**ndigesta uero sunt caprina, bubula, ceruina: pessima autē est hircorū caro *Hirci.*  
ad digestionē: deinde autē arietū, pessima autē & indigesta hircorū caro, post  
hæc arietū, deinde taurina, & de senioribus animalibus omnia indigesta sunt,  
& porci cū senuerint. Indigesti sunt uentres eorū, intestina, uulua, cor, epar, au-  
res, cauda, renes, & omnia uiscera indigesta sunt, cerebriū, medulla spinalis, &  
de maioribus animalibus testiculi omnes, sanguis. Anser præter alas, merulus,  
*B* turdus, sturnus, & paruularū auium dura est caro, & magis adhuc turdorum &  
anatis. Amplius autē pauo & cygnus, & uētres ex omnibus quibus digesti sunt:  
Fallunt enim in struthione & mergo, quasi digestibili medicamine. Neq̄ enim  
ipsæ digerunt tā facile, neq̄ aliorū ciborū est medicinalis digestio. Cochleæ in-  
digestibiles sunt. Lac acidū indigestibile est, & maxime hijs qui frigidū habent  
uentrē. Caseus uetustus & recēs, maxime uero ille qui de lacte acido factus est. *Casi.*  
Ex cochleis uero meliores sunt porphyre, & cirices. Ostrearū pelles, & quæ du-  
ras habēt carnes indigestæ sunt. Astacus, paburus, carcini, carabi, scylla, & alia  
hijs similia, polypi, sepiæ, thetides, uel quæ à Græcis uocantur malacosernia, id  
est molles habētes carnes, qualia sunt butilio, bater, medracōtes, cocci, gargalæ,  
omnes scorpij, tragoritz, cleorphi, id est acernia, glauci, gengines, congrī, fra-  
gri similes aquilæ. Oua elixæ, assa, frixa, triticū elixum, oriza, alphita, far, aue-  
na, uel si ex eis panis fiat, faba uiridis, cicer, phasioli, miliū nigrū, & hijs similia.  
Lenticula bis cocta, sisamum, erisimum, castanea, glādes, mala, pyra, ficus nō ma-  
tura, uua acidonica, & austera, dactyli omnes, corna, citriū quidē specialiter me-  
dicinale est, si quis uratur hoc q̄ de foris est, propter digestionē faciendā, quæ  
admodū & alia multa de acribus, qualia sunt ocymus, rapa cruda & subcruda,  
bulbi subcrudi, pastinaca, daucus, cariota, & omnes radices olerū, & omnia ole-  
ra præter lactucas & intubas. Vinū pingue & nouellū indigestū est. Indigestæ  
autem sunt & omnes aquæ.

QVAE SINT IN CIBIS APTA  
stomacho.

**D**actyli austeri, mala cidonia, oliuæ cum sale conditæ, utiliores sunt si  
cum aceto cōponantur, uua austera si cū ipsis folijs appendantur, nuces  
auellanæ magis, & multo plus si cum ficis comedantur: De spinis omnia quæ  
P 4 nascuntur.

C nascuntur, mediocriter sunt cacostoma, id est apta stomacho: quod est scolibis, id est pastinaca agrestis, adractilis, leuca, dipfacis, tragaganta, cnicus, adrastris quae alij cumaras, alij cardas uocant: arij radix cocta, gingidio similis est scandici: nimis est enim aptus stomacho coctus si edatur, diutius autem coctum non sustinet stomachus, napi, raphanus, rapa, cardamum, peretrum, asparagus, basiliscus, & eleus, & oximerisus, & camædaphni, oxus, achatis, & brionia & bulbi, ad apertione uentris faciunt, id est fastidium tollunt, caparis insalata, & citri quod extrinsecus est, id est cortex eius confortat inter medicamina partes assumptus. Vinum austerum confortat stomachum & uentrem, & maxime distemperantiam calidam passum, & in medicamentis, absinthium & aloë ponimus.

QVAE SINT QVAE NON SVNT

apta stomacho.

**A**rcioides mordicationem faciunt stomacho, & magis cetrides & succus amarathi, agni semen, & beta cacostomacha est, ita ut & mordicationem faciat quando amplius comesta fuerit, lappacium similiter euchymum est, rapa subcruda, bletus, atriplex cum aceto, & liquamine, & oleo accepta, foenogracum cum evertit stomachum, & sisamum similiter; lac uero qui frigidam habet uentris temperantiam acescit si manducauerint, Qui autem calidam habet uentris distemperantiam acescit, id est carbunculum patiunt: Propter hoc ergo merito & eis nocet qui februnt, amplius autem si lac cum melle mixtum accipiant. Melones non bene digesti cholericam passionem faciunt. Solent enim si antequam corrumpantur & uomitum excitent uelut multum manducari, & non euchyma super maducent, & sic mouet omnino uomitum. Sed & melo & pepones similiter faciunt. Cerebrum uero omne cacostomachum est, quemadmodum & ossorum medulla. Vinum nigrum & austerum facile in stomacho acescit, & uomicam excitat: pingue uero & nouellum, quemadmodum & in medicaminibus abrotanum erison, & aphonitrum.

QVAE CAPVT LAEDANT.

**S**camina, id est mora, & de rubo mora, capitis dolores excitat, poma arcioedis & citridis, canabi semine, men radices, dactyli omnes, eruca, foenogracum, lini semine, uinum rubeum & austerum capitis dolores facit, & intellectum tangit, & magis nigrum & austerum, & quod odoratum est, capitis excitat dolores. Quod autem aquosum est, quod Hippocrates albi uocat, neque capitis dolorum facit, nervos laedit uel tangit, & minus nutrit, & mitigat capitis dolores, qui ex humorum abundantia in uentre constituti generant capitis dolores. Lac inutile est capiti, praeter illud quod bregma habet forte. Uua uero quae in aceto fuerit missa, inutilis est capiti.

QVAE IN CIBIS NON INFLENT.

**C**yminum, libisticum, agni sperma & radix, canabi semen, & faba fracta, bulbi excocti & coditi cum oleo, & liquamine. Datur & cum aceto & mel dispumatur. Oxymel autem inflationes eicit: Panes hordeacei si conspergantur, & sic consiciant minus inflant; media autem sine inflatione sunt phasioli, pisum, laterina, races, & ciceris sunt genera.

QVAE IN CIBIS INFLENT.

**P**isum, phasiolus, lathirus, faba, fetidula, farum, cicer, lupi, phasioli uirides, milium & huiusmodi similia. De faba autem farina inflat magis, quam si integra coquat, aut alio modo cocta sumatur: Maza de alphita facta inflationem generat: conspersa autem & cotusa quam plurime magis per uentrem deducit, & maxime si mel accipiat. Opij oes, id est succi, & maxime cyrenaicus, sylphij opes, & radix, & ficus si in uentre tardauerint, uentositatem faciunt, propter quod cito exeunt. Quae autem bene maturae sunt prope nec laedunt. Similiter & carix uirides, & dactyli faciunt inflationem, quemadmodum & fici, & rapa cruda, lac facile in uentre

**A** uentre inflationem facit: bulbi crudi, mel non bene dispumatum, dulce uisum inflat, & tarde digestionem facit, dulce autem simul & auisere, neq; anadosin, id est per membra transmittitur, neq; digeritur, sed amplius manens in uentre superiori uentositatem cum spiritus abundantia generat, & mustum inflationem facit. **QV AE SINT IN CIBIS QV AE PRO-**

**ijciant, & extenuent, & aperiant constipata.**

**P** Tisanæ proijciunt & expellunt, scenogracum, melones, pepones, uiz dulces, faba, cicer, & maxime qui niger est in renibus lapides frangit manifeste. Capparis subtiliat humores, & maxime condita proijcit in uentrem, & educit phlegma consistens, & de splene & epate constipatos humores extrahit. Datatur autē capparis ad hæc cum oxymelle, aut cū oxylio, id est cum aceto & oleo, ante alios omnes cibos acceptus. Betarum succus proicetorius est, & in epate infraxin existentē soluit, & magis quando cū sinapi & aceto māducatur, similiter ut lappacium, acaliphis extenuandi habet uirtutē. In cenara & asphodeli radices, & bulbi uirtutē habent extenuatoriam, & laxatiuæ sunt locis constipatis. Propter quod & asparagos, & asphodelos ictericis aliqui ut magnū adiutoriū præstandū cum sapa dant. Cepe, allia, & porri, & ampeloprasson proijciunt, & extenuant ex corporibus pingues & glutinosos humores. Cocta autē bis, aut ter, deposita acredine subtiliant crudos humores. Serum de lacte subtiles reddit pingues humores. Multum ficus proijciunt, propter quod sablanosa multū quæ sunt in renibus, si comedantur expurgant. Caricæ uero extenuat & incidunt humores: unde & renes purgant. Arcioides purgat pingues, & glutinosos humores. Amygdalæ uero expellunt & purgant uiscerū loca, & de thorace & pulmone sputamēta humidā operādo purgant. Pistacia utilia sunt ad confortandum epat, & purgandū ea quæ in ipso cōstipata sunt, per decoctionē humorum. Raphanus leptomeris est, id est extenuatoriæ habet partem uirtutis. Mel maximā extenuandi habet uirtutem: Natura enim calidū & siccum est, propter quod & multa sputamina educit. Oxymel extenuat omnia quæ glutinosa sunt, & pinguiā facilius ab alijs educit, & uiscera sine molestia purgat. Multum etiā iuuat in thorace & in pulmone natas passiones, quæ fiunt ex humorū pinguiū cōgregatione. Vinū tenue utilissimū est. Si autē frigidū sunt humores, tenue & uetus uisū cum acredine; Albū uero utile est de pulmone uisū educationem faciens, confortādū humores, & humectādū, & extenuando mediocriter. Dulce autē uinum in acutis passionibus ad sputa mouenda utile est, & iam digestis peripleumoniceis & pleureticeis passionibus.

**CONSTIPANTIA IN CIBIS.**

**L** Ac quod multū serum habet sine periculo accipitur, utiq; semper eo uti oportet. Illud uero lac qd serum modicū habet, & caseū plus habet, inutile est & periculosum hijs q eo multū & frequēter utunt: lædit igit renes, lapides ibi generādo. Infraxin uero in epate facit, & pparat passionē. Caricæ epati & spleni phlegmonē faciūt pessimū, quæadmodū & ficus, nō secundū suā uirtutē, sed cōmuni ratione omniū dulcium: omnia enim dulcia lædūt splen & epat, obclusis enim eorū meatibus in duritiā uertunt. Hæc autē secundū seipsa nihil adiuuamēti neq; ad lædendū fiunt cū eis admisceat quæ subtiliat, & incidūt, & purgat medicamētis: in quibus nō minus medicamē est multa. Sed nō utilis est hijs gbus in tumore leuata sunt uiscera, & indurata, & tumentia, & phlegmonē habentia, Cito enim mel in cholericiū humorē transfertur. Papaueris uero semē retentoriū est in thorace pinguiū & glutinosorū humorū, Dactyli infractici sunt, & magis constipant

Ciceris nigri  
natura.

Beta.

Cepe:

Pinguedo  
lactis.

Caricæ.

Arcioides.  
Amygdalæ.

Raphanus.

Lac quale  
edendum.

Dulcia omnia  
obsunt epati  
& spleni.

Papaueris

**C**onstipant utrides. Omnia enim quæcunq; de itria & similia cõficiuntur, & in fractica sunt, & splenē maiore faciunt, & lapides in renibus nutriūt. Similiter & farina tritici cū lacte, & omne far inutile est quibus epar infraxin patitur, & qui bus in renibus lapides fiunt. Vinum dulce infraxin facit, & tumores uiscerum augmentat.

Q V A E S I N T I N C I B I S Q V A E

poros grauent.

**O**mnia quæ de itria & similia sunt, bradipora sunt, faba frixa, & panis mundus, lenticulæ corticibus sublatis, cerebellū, medulla spinalis, epar, nux, triticū coctum, oua cocta dura, & magis assa, & adhuc magis frixa, lupini, phasoli, pisum, sesamus, erysimus, balani, mala, pyra nondū matura, corna, uinum dulce & austerū, & nigrum, & pingue, & sine dulcedine, & nouellū, id est mustum, & omnes aquæ grauant poros, quod Græci bradipora dicunt.

Q V A E S I N T E V S T H A R T A, I D E S T

quæ facile corrumpuntur.

**P**ersica armenica & præcocia, & omnes æstiuales cibi qui humida sunt tēperantia, cõtingit ut corrumpātur in uentre, quādo non occurrit cito pertransire: propter quod ante ea manducari oportet alijs cibis. Sic enim ea cito transmittit uenter ante alios cibos. Impediunt enim postea retardata, & tūc corrumpunt secum & alios quos inueniunt cibos.

Q V A E S I N T D I S P A R T A, I D E S T

quæ intus corrumpuntur difficile.

*Porphyræ.*

**P**ruas cochleas, & porphyras, id est unde purpura tinguit à Tyrijs, & quæcunq; sunt alia, quæ ostracoderma uocātur, & duras habēt carnes, dāmus hīs quibus corrumpitur cibus in uentre, in aqua bona coquentes duabus aut tribus uicibus, rursus mutant in aliam mundam aquā, quando iam aqua salua esse uidetur, & astacus & paracorus, & cancrus, & carabus, & caredis, & alia hīs similia quæ habent carnes, quæ tamen facile corrumpuntur, similia sunt eis qui duras habent carnes, quas ostracoderma uocant.

Q V A E S I N T Q V A E V E N T R E M

educant in cibus.

**L**enticula, & brassica, & maritima penē omnia quæ à Græcis ostracoderma uel cochlex uocātur, cõmixtam habēt naturā de cõtrarijs uirtutibus. Ea ergo, quæ in eis firmiora sunt in uniuscuiusq; corpore, bradipora sunt & staltica, id est cõstringūt uentrē. Humor autē eorū iririt uentrem ad excernendum. Si quis ergo excoquat lenticulā aut brassicam, aut maritimā animalia, de quibus dictū est, si cõdiant, ubi cocta sunt, ius cū oleo & garo & pipere, & postea ipsum ius des bibere quantū uult, uidebis mollitū ex ipsa potione uentrē, & stercora purgare. Et maritimi irini, & cochlearū omnī iuscella, & uetusti & diuturni galli educunt uentrē. Brassica autē si uolumus ut educat uentrē, imponitur cacabis, & cū una aqua fuerit cocta, in qua utiq; coctione si mittatur oleum & liquamē, & accipiat, educit uentrē. Oportet enim nō satis excocta esse holera, ut succū suum secū habeāt. Nā si coquātur bis aut tertio mutata aqua, cõstringūt, si cū oleo & aceto comedātur: panes etiā triticeī educūt uentrē, propter quod in uentre multū sunt peritomaci, & quia fursuribus repulsiuā uirtutē participant, scæno-græci succū coctus & cum melle datus, utilissimus est: deducit enim ex intestinis per uentrē omnes pessimos humores simul cū stercore: modicū autē esse oportet mellis, ut nō facere possit intestinorū mordicationē. Oliuz cum sale cõditæ educūt uentrē, si ante cibū cū liquamine assuman, quæadmodum

**A**dum & ostracodermion uel cochlearū succus epipasticus, id est ductorius est uentris, propter quod multi condunt ea ex oleo & liquamine & uino, & facto suscello utuntur, ut facilius educat uentrem: lac aquosum deducit magis uentrem quam quod pingue est, serum autem lactis fortiter uentrem deducit: mittere autē in serum oportet mellis tantum, ut suauē sit ad bibendum, & non subuertat stomachum, & secundum hunc modum & salem quantum non acurizet in gustu. Si autem magis educere uolueris uentrem, amplius mites salem tritum de nimis. Iuuenum animalium caro facilius exit per uentrem, & quæ extrema sunt in ipsis. Similiter ceruina. De piscibus marcite & tricon exeunt mediocriter, & malacia mediocriter. De holeribus beta, & lappacium, urtica, acaliphis, quæ dicitur anicus. Caseus recens cum melle acceptus. Atriplex quæ dicitur semen eius tritum & potatum cholera educit, & ideo purgat ictericos: bletus, cucurbita, melones, ficus, carica, pepones, uæ dulces, & maxime recentes. Sycamina munda ante cibos sumpta exeunt citius per uentrem, & cibos secum deducunt, & si malos inueniunt humores in uentre, corrumpuntur cito: coloquintida similiter facit. Recentes autem nuces secessus utiles faciunt: sed & sicæ nuces, si ante infundant in aqua, & sic edantur, similiter operantur uiridibus nucibus. Cocta mala humida deducunt, sicca uero mulsâ infusa, & si amplius mel habuerint, satis molliunt uentrem. Vtque & si sola ea comedant, & superbiatur mulsâ, manifestum est quia expeditius uentrem deducunt. Post accceptionem uero expectandum est aliquot horis, & non mox prandendum est: mora, cerasia, præcocia persica, & omnia quæ humida uel aquosa sunt natura, & quæcunque sine qualitate aliqua in gustu uel odore sunt, utilius & citius ad inferiora per uentrem disponunt. Sin minus, nec uentrem mouent, nec costringunt. Interdum enim constringitur uenter, & de mulsâ solet constringi, quando anadosin fecerit, id est in uentris trahitur, & cum sanguine corpori ministrat, & propterea non deducit uentrem, sed admixta cibis anadosin facit, si uentrem non faciat secundum. Quod si non contingat ut anadosin faciat, cito irritat secessus uentris habes in se credendum. Solum autem mel si non coquatur dulcedo ipsa bene educit uentrem. Si autem modice, aut ullo modo coquatur mulsâ, educere uidetur prius quam anadosin faciat. Oxymel autem radit quæ sunt infirmiora intestinorum, uinum dulce aliquantum adiuuat uentrem ad excernendum. Sapa deducit uentrem, & oua recentia cum multo garoleo, id est cum liquamine & oleo mixto, si in primo ante cibum sorbeantur, deducunt uentrem.

Q V A E S I N T M E D I E P U R G A T I U A  
& malactica uentris.

**L**Inogustis, id est herba mercurialis, aut per se data sola, aut cum alijs holeribus comixta prius & cocta & in cibo sumpta, si primo, aut postea ipsum sorbeatur, soluit uentrem. Sed & polypodij similiter semē pistum, quantum unum cochleare est, aut in prisana, uel cum gallina coctus succus eius, purgat nigra cholera. Aut acaliphis semē, aut onicij semē tusum cum mulsâ, aut in succo gallinæ datum, & si admisceas amygdalas, & nitrum, & anisum, & mel, & caricas, melius facies.

Q V A E S I N T I N C I B I S Q V A E  
uentrem constringant.

**D**actyli austeri, uæ austera, sycamina, rubi mora, & rubi canini fructus, magis autem myrta syluestris, cocci mala & pruna. Melata quidē de malis stipticis facta constringunt uentrem: Acida autem melata, pingue inuenientia humorem in uentre, extenuant eum & educunt, & propterea humectant stercorea. Mundum autem inuenientia uentrem, constringunt magis eum. Quæ

**C** autem ex dulcibus malis melata fiunt, sine aliqua acredine, anadosin faciunt magis, & cum acredine exeunt. Aquosa autem mala, & pyra, & sine sapore, insuauia sunt, & nihil iuuaminis habent. Quae enim de malis dicta sunt, haec de malogra natis, & pyris dicere credendum est. Lac uero si serum eius decoquitur, ut consumatur, nullo modo deducit uentrem. Coclacon autem, quod fit de ardentibus lapidibus, aut laminis ferri immisissis, donec serum consummatum deficiat, costringit uentrem. Datur enim hijs qui ex acredine humorum mordicatione consolatione uentris patiuntur. Coclacon autem non solum fit de lapidibus, sed & de ferro cyclico factio, id est rotundis massulis ignitis, ut de lapidibus fit. Caseus ergo fit in uentre facile, & sic cocto lacte, propter quod admiscenda sunt ei mel & sal. Magis enim sine periculo est, si aquam mittens constringatur, & non mireris si serum consumatur, & iterum aqua supermittatur. Non enim humectationem seri fugimus, sed acredinem ipsius per quam soluitur uenter. Carides carabi, & hijs similia quaecumque sunt maritima, quae Graeci malacontracon uocant, minus quidem ab ostracodermon habent. Igitur & hijs si falsedine in coctura amiserint aquam, quemadmodum & ostracodermon, caro constrictiua fit uentris, sed & lenticula, & brassica bis cocta facta, & ex se humore amissa constrictiua fiunt uentris & deficcatiua. Volens ergo humorem uentris deficare, cum mediocriter uidetur esse cocta brassica, primum aquam effundes, & mox in aqua calida remittes, & iterum coques donec bene discocta sit. Oportet autem cum mutas aquam, neque aerem, neque aquam frigidam tangere, quod bis erit coquendum. Quod si ad aerem frigidum aut aquam proximetur, quam diu coquatur, non excoquetur. Nam si de lente auferas corticem, perdet stipticam uirtutem, & similiter deficcet uentris reuma. Si autem tundas eam, & bis coquas, effusa prima aqua, & sic cum modico salis aut liquaminis condias, & mittens aliquid de constrictiuis uentris speciebus, donec gustus suauis sit, utilissimum facies medicamen. Simul & cibus alphita cum uino austero potatus deficcet uentrem. Oryza constringit uentrem, & elimon, siue nigrum milium, caro leporina, uinum austerum & nigrum absque dulcedine, & rubeum, & austerum uinum.

QVAE CALEFACIANT IN CIBIS.

**C**alefacit frumentum elixum, & qui ex eo fiunt panes, spelta, auena, foenum graecum, arcotides, dactyli dulces, mala dulcia, sisamum, erisimum, & calefaciunt & sitim generant, canapi semen, uuae dulces, propterea & sitim faciunt, uuae magis molles, mediocriter, apium, smyrnion, eruci, raphanus, rapa, napi, cardamus, peretrum acre est & calidum, pastinaca, daucus, cariota: calefacit manifeeste & cepe, allium, porrum, ampelon prason nimis est acris, cocta in duabus aquis aut tribus amittit acredinem, caseus uetus calidus est, propter quod & sitim facit, uinum dulce mediocriter calidum est, propterea sitim facit, rubeum autem calidius est nigro, flauum uero calidius est ualde, ita cirrum, ita eritrum seu dulce, album omnibus est minus calidum, inueteratum autem minus calet.

QVAE INFRIGIDENT IN CIBIS.

**H**ordeum quouis modo in usu adhibeatur infrigidat in cibis, milium, panicum, tubera, cucurbitae elixae, melones, cucumeres, coccimela, sycomorae austerae & acidae, uuae austerae, malata de malis stipticis frigidum habent & terrestrem humorem, acidonia autem mala frigidum habent humorem, & praequosum. Hoc de pyris & malogranatis existimandum est, uel aliorum arborum



**A** arborum fructibus, qui stiptici sunt, aut acidi, & maxime qui reponuntur, Stiptici igitur dactyli frigidum habent succum. Lactuca, intuba mediocriter frigida sunt; porcacla amplius, papaueris semen, hoc & supra serum est frigidum. Si autem amplius assumatur, cataphoriticum est, id est nimis grauantur somno. Inuolat autē eos, quibus ex capite tenue in præcordiis fluit reuma. Melius est autem album papauer. Myrthus frigida est, sed non simul & stiptica: habet enim aliquiddi acedinis in se. Vua canina penē frigus stipticū habet. Atq; aquosum uinum non manifeste calefacit, propter quod sine periculo febrientibus datur: Vinum album & austerum minus secundum alia uina calefacit: uinum autem album & austerum & pingue & nouellum aperte infrigidat, infrigidat autem & acetū. Tenuius igitur est, & lumbos & neruos amplius alijs locis infrigidat & lædit, in alto eos dissoluendo: medius autem est inter calidum & frigidum panis lauatus, amilus uinosa, suauis.

Vinū diluū.

Acetum.

## QVAB DESICCANT IN CIBIS.

**L**enticula & camoris, id est brassica similiter adinucem desiccant, & propterea uisum obtundunt, præter si humidiores oculis esse cōtingat: minus autem brassica asparagus desiccant: omnibus autem oleribus caulibus ipsius sicior est: tē contrario autem raphani & rapæ, & napi, & cardamomus, & pererū, & omnia quæcunque acra sunt, paragoriorum esse similia contingit. Alphita desiccant, id est fructiua, agni sperma, herbus coctus si quis sapius cum aqua in cibo utatur, desiccatiuus fit: meliores sunt enim albi, & si assentur aut fixentur, & sic comedantur, sicciorem cibum præstant. Qui autem in aqua ante elixantur, humidiores sunt. Quæcunque autem in cacabo cum iure cōdiuntur, media sunt. Quæ autē in conditura habent abundantius uinum aut liquamen, sicciora sunt hijs quæ nō habent. Quæ autem saram habent simplicem solam, & in leucozomo coquuntur, multum prædictis humidiora sunt. Ex aqua autem sola cocta plus sunt humidiora: maxima enim in coctione ciborum fit differentia de hijs quæ supermittuntur eis uirtutibus seminum & olerum quæ desiccare possunt, alia plus, alia minus.

## QVAB HYMECTENT IN CIBIS.

**P**tisanæ, cucurbitæ elixæ, melones, melo, pepones, cucumeres, nuces uirides, coccimela, sicomera, sicamia, si non corrumpantur humectant omnino, infrigidant autem, sed non omnino, nisi frigida edantur. Lactuca, & intuba hoc ipsum præstant. Non imbecilliores sunt porcacla. Maluæ autem & bletus & atriplex aquosiora aliorum olerum sunt. Humidi igitur sunt & aliorum arborum fructus, & maxime qui non reponuntur. Humectant etiam lactuca, & papaueris semen, & faba uiridis, & ciceris uirides. Aqua humida est & frigida, calefacta autem humectat & calefacit.

## AD SORBIIONES COQUENDAS.

**P**tisanæ competenter conficiuntur, quando minus in bullitione inflatæ fuerint, sine odore sint: hoc illis proficit, qui post ægritudinem fastidium habent, siue duritiā uentris pariuntur: ea ratione, ut mittas in heminā ptisanæ decem heminas aquæ, & ad mollem ignem positas diutius agitādo coquas, donec succi fluant, & sic mittes mel & acetum, quando minus in bullitione inflatæ fuerint sine odore, & post hæc ad molles ignes donec multum suscipiat. Admiscendum est autem eis in illo tempore acetum, quando tam non inflatur. Coctis autem diligēter sic mitti oportet salem tenuissimum nō multum: ante uero pro sapore in initio mox oleū si mittatur in coctione nihil nocet. Sed

Ptisanæ.

Q &amp; si

**C** & si porrorū modice mittatur, & anethi, & hoc ipsum mox in initio. Lenticula autem si cum ptisana bene coquatur, ita ut amplius ptisanæ mittantur, & con-  
diantur saturegia, & pulegio, & cū cocta fuerint edantur, bonus autē & suavis  
est cibus. Est etiam cibus de cucurbitis cum sardinis uel in cetera in patella con-  
fectus, suavis est a utē cibus. Qui autem infirmiores sunt ad continendū, & nō  
possunt suscipere pinguiorē aquam, facies de pane infuso optimo & coques,  
& cum spissauerit, & factus fuerit, sorbitio multa uirtute manet. Cōficitur autē  
sic, panis quā calidissimus frangitur, & infunditur, & tritus cū aqua diligen-  
ter coquitur cū aqua, & facta sorbitio datur. Itē febrientibus oportet hordeū  
non in pila tundere, sed grana ipsa expressa extendere in latitudinē, & coquere  
in aqua. Prius enim tepidā mittere & effundere, & iterū aliā supfundere aquā.  
Coque utiq; bene ita ut una hemina hordei in decem heminis aquæ coquat.  
Coquatur ergo quousq; hordeū crepat. Inde deponat & coletur, & dabis bibe-  
re, si cholericus humor dominatur. Quod si nō est cholericus humor, addes po-  
tioni mel, & sic dabis. hoc & uentrem secundū reddet, & urinam prouocabit, &  
nutriet bene. Datur autē & sic in alphita, hordeū fricatur, quod glaucanin uo-  
cant. Oportet autē anteq; maceretur fricare leuiter quæ usta est paleam, & infu-  
sum coques. Venter enim magis malaxat illa coctione superiore. Coques utiq;  
& omnē penē cibū similiter qualescunq; existimaueris propriū infirmantis esse.  
Quæ autē subtrita sunt, spissa quidē infusione uidentur esse, & si cocta, & fort-  
ter subfricata. Quod utiq; penē omnis cibus similiter in danda portione. Item pa-  
nem siccū aut recentem infusum in aqua teres bene & colabis in linteo, & ad-  
miscbis ei, ut albus non uideatur, ex pane oua cū cucumeris semine friso, aut  
amygdalis, aut nucleis pini singulas, aut binas species uel totas. Cui addes mo-  
dicum anisi, aut seminis sceniculi. Febrientibus quidē in mulla dabis. Sine febrī-  
bus uero uinū superfundes. Miliū autē lene fricatum maxime & desiccātū ex-  
pedit utiq; cortice sublato, quibus uenter ex agriditudine cholera effusione labo-  
rat, uel quibus subtilis aut multus secessus est. Oportet autem aqua soluere fa-  
rinam, uel siccosta in mortario trita, oxibaphon scilicet uini in aqua oxibaphis  
decē, & colans per linteū, superfundes uinū austerū modice, & sic coques dabis  
sorbere. Oportet autē addere nuces cū membranis suis quæ intrinsecus habent  
in coctione succi. Item auena digestibilior est omnibus leguminibus, & sorbitio  
ex ea utilissima est. Coquetur quemadmodū de hordeo, auenæ hemina una  
in aqua heminis decem.

Q V A E P R O O L E O M I T T I O P O R T E T  
in sorbitionibus.

**P**ro oleo, præter in lenticulā, cucumeris semen crudū & tostum ad ignē, &  
tritum & colatum miscbis in ptisanis, & ceteris sorbitionibus, aut nuces,  
aut auellanas, aut amygdalas. Quibus autē uenter fluens molestat, mittes pa-  
paueris albi semen, leuiter frixum, ita ut robustus fiat. Mitti autē oportet ad uen-  
tris fluxū & castaneas cū mediā sua cortice, & magnifice iuuant; Mittes ma-  
logranatū cū fructibus suis subtritu lente, & aceto utant hij quibus nimiū sic-  
cantur corpora.

C O N F E C T I O C I B O R U M.

**C**oquitur similia hac ratione. Vna pars in decē corylis aquæ, cū oleo medio,  
cri & anetho. Sed lauabis similia pridie ante. Item panem frigidū infun-  
des in aqua calida, & frequēter mutabis aquā. Infundes autē de pane partē in-  
teriorē. Mensura autē lauati panis nō propter solam suauitatē fit ut aqua toties  
mutetur, sed ut facilius euentetur, ut digeratur, uel quod infermentatum in se  
habet

Auena.

Simila.

**A** habet amittat. Item de ptisanis uero mittes unam partē, & panis partes quindecim sicci, & trita sic coques donec nimis efficiatur subtile & tritum. Coques autem in aqua munda quamplurimū ut se colligat, & mittes modicum salis, & sine oleo. Fit autē & ex maluis forbitio: folia maluarū tenera cocta sine uino teres in mortario, & iterū coques in aqua, & sic mittes salem & oleū. Oua autem coquens in aqua, agitabis incessanter ea. Nō enim cōspillantur cōmota, neque durantur. Melius autē est in pusta ea coqui. Omnino enim magis humida permant. Dantur uero his, quibus nimum siccantur corpora.

## DE MULSA.

**M**ulsa nō satis cholericis utilis est. Cholera enim ex ea amplius augmentatur. Expediit igitur aquosam mulsam bibere, qui tali sunt natura. Sed & illis aquatissima danda est, quibus infirma uiscera sunt, id est epur aut splen. Conficitur autē mulsa, ut habeat aquarū partes VIII, & mellis I, & sic ad lentos ignes est coquēda. Cui spuma quam facit semper est auferenda cū penna, & mox ab igne cessandū cum fuerit despumata. Dabis autē phlegmaticis, melancholicis, catarrū parientibus, & quibus uenter constrictus est, Cholericis uero & quibus pręcordia sunt in tumore, contraria est.

## DE POTIIONIBVS QVAE INFIRMIS EXPEDIUNT.

**F**ebrientibus quidem utilis est mulsā, aut oxymel, uel aqua quæ absq; aliqua mordicatione cōficitur. Si uentris turbatio in febris fuerit uel tōmica, stiptica habens species. Sin minus cōstrictio, lenes & dulces. Infundes ergo æstatis tempore dulces. Mala incisa tenuiter infundes in aqua donec bene colorētur, aut mala citonia matura incisa similiter infundes. Dabis autē cholera uomentibus aquā quæ ex malis fit citonicis. Ad uentris uero solutionē ex pyris conficis aquā. Nam stiptica & dulcis est. Myrthæ igitur mollia folia infunduntur in dulci uino, & efficitur uinū absq; mordicatione, & lenis est potio. Infunduntur autē & gigarta, id est uuarū sementes sicca. Hæc autē coctio utilis est nullam habens acridinem, neq; in gustu acidonica potio efficitur.

## DE LACTIS POTIIONE, RVFVS AVTOR.

**Q**uod lac potaturus est, ab omnibus cibis est abstinendus, donec id digeratur, & uentris plenitudinem deponat. Utile etiā est si mane bibatur mox ut mulgatur, ita ut à cibo is qui biberit abstineatur, & nimio remoueatur labore: Nam si laborauerit, necesse est ut acescat. Sed quiescendum, & deambulandum leniter, & uigilandum est, & interdum quiescendum. Sic enim faciens qui bibit soluit illud, & deinde iterum lac bibit, & si & ipsum soluerit, tertio bibat. In primis ergo purgabit bene, & non multum. Aliud iam non. Quod uero in uentre remanserit, ducitur in uenas, & nutrit, & iam non purgabit. Quibus autem cholericum reuma est, & sintexis de uentre prouenerit, id est, desiccatio sit membrorum, coctū dabis lac. Coques autē hoc modo Mox ut mulges † & post modicum, ut pars quædam per uentrem deducatur, pars autē introducat. Post hoc adhuc magis coques, & obserua ne uratur, sed ad mollem ignem coques. Operet ergo leniter coquere ad ignem, & agitare sine intermissione, & spumam quæ se super colligit cum penna tollere omnino. Mouenda est autem cum ferula nitida & tenui, & de labijs cacabi tolles bromum qui se colligit cum spongia purgans. Sæpius enim ex ipso bromo, qui in ore uasis colligitur, totum lac corumpitur, & caseus efficitur, ut dictum est. Ergo tamdiu bulliat donec pinguius fiat æqualiter, & dulcius à crudo fiat.

† videntur nonnulla desesse.

## QVOD LAC DENTIBVS NOCEAT.

**L** Accedentes lædit, si frequenter in usu sit, & gingiuas rodit, hoc infundendo dentes & gingiuas putrefcere facit, etiam ut se comedant. Oportet ergo quando edendum est uino cum aqua calida temperato os lauare. Melius etiam est, si & mellis modicum illi addas.

## DE AQUIS ELIGENDIS, EX HERODOTO.

**O**portet autē aquarū diuersitates scire, quæ sint bonæ, uel quæ malitiôsæ, aut corruptæ sunt. Bona quippe aqua penè ab omnibus in usu humano est cognoscēda. Bona igitur aqua secūdū qualitatē suā & in gustu, & in odore, & in sapore suauissima, & uisū mūda, & tactu lenis, & leuis esse debet, ut etiā dum potata fuerit à præcordiis uelociter subducatur. Si talis inueniatur, non est melior hac ut quaratur aqua. Quæ autē in hypocōdriis diu residet, & uentrē percutiēdo grauat & inflat, nō est ad usum hæc talis utilis, sed mala erit existimāda: & ea quæ neque calefcit cito, neque infrigidatur. In hac igitur aqua quicquid fuerit coctū, grauior cibis efficitur si sumatur: melius est enim experimēto iudicare tales aquas. Quæ autē uoluerit per scientiā eas cognoscere, & per ea quæ ab antiquis dicta sunt iudicare, hæc aquæ quæ ad septentrionalē partē fluunt, & quæ ad solis partē non fluunt, bradiporæ sunt, id est, grauat poros, per quos spiritus uitalis transitū habet, & pessimæ sunt, & nō cito calefcunt, & cū tardius fuerint calefactæ, iterū tardius infrigidantur. Solis uero cursus quæcūque penetrauerit loca, quæ à parte sunt Lybyæ, quæ surgūt aquæ colatæ sunt & limpide, & cito calefcunt, & cito infrigidant. Itæ sperandæ sunt bonæ aquæ esse. Bona autē est quæ æstate frigida est, & hyeme calida. Nonnulli autē ex pondere & leuitate existimant iudicare, & meliōrē dicunt quæ leuior est. Nā quisquis iudicare de aquis uult, absque penso poterit iudicare. Leuem quippe Hippocrates dixit aquā pluuiālem, quæ est dulcis, lucida, & subtilis. Quia adducitur aqua in aëre, & propter ardorē leuior & subtilior efficitur. Nam in aëre nō ex dulcibus solis aquis, sed & ex mari adducitur in aëre, propter quod pluuiāles aliæ cito putrescunt, aliæ non facile putrescunt. Non ergo existimet aliquis malā aquam esse quæ cito putrescit. Quod enim cito mutatur magis uirtutis est quam malitiæ. At quæ cū habeat cōditiones bonarū aquarum, utique impruābilis sit, optima existimāda est esse. Si qua ergo cito putrescit, aqua bona existimāda est ipsa mutatione: Nam quædam aquæ faciunt uitia in gutture, & tusses mouent, & rauicitatē & grauedinē, & gutturosos faciunt. Pluuiales igitur aquæ in æstate ex tonitruis & tēpestatibus utiles sunt. Aquæ autē quæ ex crystallis sunt, & niuibus gelatæ, pessimæ sunt. Quæ enim se gelauerit aqua, amissa subtilitate sua, efficitur ipsa & fumosa, & qui ea utitur, in quibus locis incedit, generat passiones, maxime tamen in musculis gulæ residens, facit bronchocilas, id est gutturosos. Sed & tusses excitat, & rauicitatē facit. De paludibus uero aquæ coquendæ sunt, & sic potandæ. Sed cū cocta fuerit, mixta cū uino bibatur. Quæ autē stipticæ sunt aquæ, dulci uino tēperantur, interdū etiā & colatæ sunt. Quæ autē salis sunt sapore, cū stiptico tēperentur. Quæ autē nimium frigidæ sunt, post cibum bibi debent, & non desubito uel cū impetu, neque patentis satis ore. Quidam enim adinuenerūt per cibū & potū aquas malas posse uitari, id est ciceris coctā aquā antea bibant, & ipsum cicer edant. Cauca lidis autē similiter cū piscibus cocta, sed & fœniculū similiter coctum. Quæ autē betas & cucurbitas antequam bibant cum sale & uino temperatas edunt, ab aquis malignis non læduntur.

*Facile putrescētia nō sunt deteriora.*

# D. ORIBASII AR-

CHIATRI IULIANI CAESARIS IN MEDICINAE COMPENDIUM AD EUSTATHIUM FILIUM PRAEFATIO.



**H**IVSSIONE domini Iuliani Dni Augusti collecti sunt ex omni regione Archiatri, ex quibus elegit optimos & probatos medicos numero LXXII, inter quos & mea est electa paruitas, ut diuersis antiquorum autorum libris in unum congregatis, ea quae utiliora in curationibus posita erant ad sanitatem hominum, in paruis uoluminibus omnia continerentur. Quo facto in LXXII libris a nobis comprehensa sunt. Ex quibus libris, dulcissime fili Eustathi, Synopsis tibi fieri sperasti, considerans quia non inutile sit tibi peregre ambulanti, sed & alijs qui non negligunt discere medicinam. Qui prolixius laborando a doctore uiuo sermone audierunt, ad exercendam artem Synopsiton habebunt ad facilitatem actionum repetendarum, propter hoc quod compendiose, & ueraci doctrina a nobis sunt comprehensa, recapitulantes sibi in memoriam reuocabunt quae legerant, & discere uolentibus medicinam, & legentibus frequentius cum usu proficere potest. Scripsimus enim sola experimentata adiutoria ad praesens, quae facile inueniri possunt, & ea quae cara sunt, aut difficilium inueniuntur in omnibus confecta. Quae utilia sunt tradimus adiutoria, quae medicis in usu fuisse probauimus, & dietam competentem facere solent. Chirurgiae autem commemorationem nullam facientes, quia difficilior est ad faciendum, & magis in apozimis recusanda est. Usus autem ipsius quamplurima excogitat feramentorum genera, quae nullo modo euporista sunt, quemadmodum in fracturis saepius, & in luxatis articulis. Horum autem uel quaecumque possunt solis manibus recta fieri, & in locum suum reuocari, utiliter ab hijs fiunt, qui doctrinam & usum ab ineunte discunt aetate, & athleticam exercent artem. Haec ergo, & quaecumque talia sunt, ea manibus operari possunt, & ad sanitatem melius ab hijs qui a pueritia discunt fiunt. Propter quod hijs permittuntur haec urgente causa fieri absque dilatione, ad sanandum in medicaminibus, & dieta, sicut a me dicenda sunt.

LXXII mea  
dici Iuliani  
Caesaris.

LXXII libri  
Oriba. ij.

Chirurgia.

Q 3

D. ORIBASII

# D. ORIBASII AR-

CHIATRI IULIANI CAESARIS  
MEDICINAE COMPENDIUM AD  
EVSTATHIVM FILIVM.

## DE FRICATIONIBVS EX GALENO.



**A**NTE exercitationem calefacere moderate corpus oportet, & sic fricatione utatur cum sindone, & post hæc nudis manibus cum oleo fricetur, donec concalescat bene, & molle fiat corpus, & appareat subrubicundum subtiliter, & in tumorem ducatur. Hæc maxime fricatio illis necessaria est, qui paralyfism incurrun, & quibus membra stupida sunt.

## DE GYMNASIIS EX GALENO.

**G**ymnasia motiones sunt corporis per diuersa exercitia: fortissima est enim exercitatio citata. Est & tertia de hijs duabus composita. Fortissima autem exercitatio finis est, frequens respiratio & spissa, ita ut uix respirare possint currendo. Eis necesse est ut & sudor multus erumpat ex corpore. Hæc exercitatio illis est necessaria qui ocio uacant, & humecta uidentur habere corpora. Nam quis ignorat, quia uelocissimus cursus extenuat corpora, & omnes euacuat plenitudines, & fortiora reddit uiscerum membra, & rubicunda efficit, & digestionem fortiorum ciborum facile reddit; propter quod calefit corpus. Purgat etiam meatus, & omnem corporis digestionem præparat, expurgando quæ superflua sunt, propter spiritus fortissimam motionem. Sed melius est ut hac uectatione ieiunantur. Nam uentre repleto uectatio molesta est, quia omnis escam dum cruda fuerit si commoueatur, exinde epas & splen frequenter agrotare consueuerunt. Digestæ autem escæ in corpore per urinas esse cognoscunt. Alba ergo urina indigestam ostendit esse escam, Rufa uero & cholericam si sit, iam digestam in uentre indicat escam. Quæ autem modicum habet ruborem, initium digestionis esse significat, expurgando quæ superflua sunt propter spiritus fortissimam motionem. Tunc ergo debet incipere exercitari, aut uectari, uel currere. Sed prius depositionem uentris, uel urinae superfluitatis facere debet.

## DE GENERIBVS EXERCITATIONVM & uectationibus, ex Galeno.

**O**mnia uectationum uel exercitationum genera calorem corporis præstant. Fortis igitur exercitatio musculis & neruis dat uirtutem, & augmentum fortitudinis. Fortis autem exercitatio hæc est, quæ non est citata, sed cum fatigatione fortissima præparata, per quam musculi & nerui restaurantur. Hæc est uectatio fortis, id est fodere, aut grauium onera leuare, & cum eisdem ambulare, longum facere iter, & manere in agro, & longum ambulare iter, & saltus dare, & cum impetu currere, & contra cliuum salire, & cum fune in arbores ascendere, uel cum trochæa trahere pondus, & sphaerizare, & tam diu hæc faciat, donec renes & manus uel scapulae dolore sentiant. Mensura autem uectationum hæc est, cum sudores mouentur, & rubor in corpore apparet. Citata autem exercitatio est absque fortissima uiolentia, qualia sunt cursus cum luctationis manu, uel complexionis, uel rotationes, uel cum paruus ferulus iustus. Compositus autem tertius fit de forti & citato. Quæ autem sunt fortes exercitationes, hæc fortioribus utantur motionibus. Ad hanc adiungantur citatas

Uectatio repleto uentre molesta. Urina significatio.

Fortis exercitatio.

Citata exercitatio. Composita exercitatio.

**A** citatas exercitationes, ut pectus magis quam manus aut crura fatigetur. Sic autem spina, aut thorax, aut pulmo. Exereri autem oportet donec in tumorem leuetur corpus, & subrubeum fiat, ex ipsa preparatum motione, & mediocre & bene fiat ordinatum. Hoc autem & cum sudores uideris cum calido uapore esse permixtos, pausandum est tunc & cessandum ab exercitatione. Quando in aliquo, quae praedicta sunt apparuerint signa, & uideris tumorem cadere, qui se subleuauerat, qui iam in tumorem fuerat redactus, mox conuenit pausare. Similiter enim & colorem ruboris marcescere: etenim & cum motus est utique cessare iterum uidetur, mox erit pausandum, & si ex sudoribus fit aliquid, aut secundum multitudinem, aut secundum qualitatem mutationis. Si enim modice frigidior fiat, pausandum est, & perfundendum oleo. Curatur ab hinc, & post haec caput therapeutica fricatione inunges, ut consueti sunt ab infantia facere.

DE GENERIBVS FRICATIONVM EX GALENO.

**E**X forti confricatione soluitur corpus, de modica uero fricatione constringitur. Ideoque si soluta sunt membra, fortiter sunt confricanda. Quae autem constricta sunt corpora, leuius sunt confricanda: Modica uero fricatio nutrit corpora, fortis autem desiccatur & extenuat. Ideoque ubi euacuare uoluerimus aut extenuare, forti utemur fricatione. Vbi uero macies est in corpore, media utemur fricatione: Quibus nec nutrire nec extenuare opus est, leni fricatione utemur. Hijs tribus differentijs secundum qualitatem fricationum mutatis, teruo numero coniunctionum faciunt nouem mutationes. Item alio modo Celsus fricationem Hippocratis dicit, si uehemens sit, indurare corpus: si leuis, mollire: si multa, minuere: si modica, implere. Sequitur ergo ut tunc utendum sit, cum aut stringendum sit corpus quod lenes est, aut molliendum quod induruit, aut digerendum in eo quod copia nocet, aut alendum id quod tenue est & infirmum. Quas tamen species si curiosus existimet, quod iam ad medicum non pertinet, facile intelliget omnes ex una causa pendere quas demit. Hoc ergo certum est, quia neque lenis, sed quantum possibile est, ad successiones utraque custodienda sunt, quia multifricatio extenuat, & media secundum qualitatem fricationum transmutantur, & nouem faciunt mutationes.

Celsus libro  
2, capite 14.

DE VOCIFERATIONIBVS EX GALENO,

& ex Pado, id est, Attalo ex uociferationibus.

**S**iquidem uox bona, id est, lenis & dulcis, nihil praestat corpori ad sanitatem. Grauis autem & in magnitudinis sono uox utilissima est. Ergo huic studendum est. Haec enim multum aerem in corpore constitutum cum aspiratione ad ducta distendit thoracem, & uentrem, & diuersos in corpore meatus aperit, & tollit inflationem uentositatis, propter quod omnis fit in corpore digestio, clamantes & loquentes, uel diu legentes, multum expuentes, etiam sudores subsequuntur. Intendentes enim lectionibus largiorem uiam reddunt spiritui, & sensum augmentant. Ideo ubi multum spuitur, & mucci sequitur, ut facilius officium uentris efficiatur, hijs legere uel clamare expedit quibus cerebrum humectum est. Siccis uero contrarium propter subtilitatem. Contingit enim multum superflua expuentem, & saliuas currentes, & muccos, & phlegma euacuationem facit & consumitur. Qui autem calefactionem plus habent, propter frigus ut melius digerant competens fit adiutorium secundum spirationis officium. Oportet igitur hos legere sapiens, ut aperiantur membra omnia, & diffusus humor per membra rarefactus distendatur per arteriam, & omnis exitus spiritalis ex graui uociferatione loquelae uox sonitum praestat. Vti autem oportet uocis officio, neque sine causa, neque inconsiderate, sed neque prae corrupteque plenis humoribus repletis,

C neq; in magnas & manifestas stomachi indigestiones uocis exercitio perueniat, ne multa anadosis ex indigestionis ipsius uapore in corpore efficiatur.

DE VENEREO ACTV EX RVFO.

Veneri actus iuuamina sunt ista, ut qui multu sunt repleti humoribus euacuentur, & leuiore presententur corpore, & augmententur, ut uiriles appareant in corpore. Si uero freques sit, intellectum animi dissoluit; nam iracundos temperat & mites facit, propter quod melancholicis magis quam alijs sanitas utilissima est, & expediens comixtio Veneris. Componuntur autem ex hijs ad intergru sensum, & si ex alio modo insaniunt, & hijs qui ex phlegmate agrotant optima est Venus, & hijs qui crassi sunt corpore, si non repleti cibo misceant. Hii autem per somnu frequentius euacuati liberantur. Natura autem hac expediens est ad ueneros actus, quae calida est, & multiplex, ad luxuriam acta, & nimium cibante se, aut qui sicca & frigida sunt natura, & aetate non senes. Tempus autem autunus. Oportet autem dietam esse humidam & calidam. Sit autem labor mediocri & cibus. Quae admodum mediocres labores expediunt, tantum & ipsa libidine hortantur ad hoc opus ad cuiusdam habitudinis consuetudinem praestandam. Oportet autem & super haec cibos amplius accipere, qualia sunt de piscibus, polypodis, uel alia quae irritant. Ex oleribus autem mollia olera, maxime autem orminum, & erosinum, & erucam, & rapa. Et haec ut medicamenta assumenda sunt. Sicut & legumina prinson, & faba, & cicer, & lenticula, & phasoli, & pisum pruritum uentositatis replentia, & largus cibus. Ruta igitur quia uentositatem componit uel spargit, propterea comixtiones obtundit & reprimat. Magnifice autem laudo eius mensuram sanitatis uentositate repletis, sanguineo procedente humore ad luxuriam, & plenitudine recensata, ruta si abstineat. Custodienda ergo est indigestio, & ebrietas, & penuria. Malum enim in hijs superfluitatibus Veneri admisceri, uel ante exercitium & balneum. Utile autem est post cibos comisceri, non satis cibo repletis & potu: Nam fortitudini sic expedit, quia frigidus factus minor efficitur. Ex labore autem fatigato pessima est Veneris admixtio: pro qua re post laborem cauenda est, uel post uomitum factum similiter, aut post catarticum acceptum, aut post fluxum uentris exinde subito factum, & qui per multa dierum tempora desiccantur, uel hijs quibus sunt proluxa libidines, nec hoc laudo, sed iubeo ut amplius resistant, & maxime hijs, qui aegritudines corporis frequentius incurrunt.

DE PHEBOTOMIA EX GALENO.

Non solum hijs qui repleti sunt sanguine, uel abundant uirtute, quos Graeci <sup>ιμανασους</sup> appellant, phlebotomum dicimus expedire, uerum etiam & hijs quibus absque plenitudine inflammationes quaedam oriuntur in corpore, phlebotomus est adhibendus, uel hijs qui percutiunt, uel quolibet modo extrinsecus sic percussis, ut intrinsecus sanguine collecto per constrictionem laedant. Sed & si dolor grauis accedat, aut defectio alicuius membri accedat, ex quo magna credatur posse generari passio, phlebotomandi sunt omnino nulla existente plenitudine. Contemplari autem oportet tempus, & aetatem, & uirtutem, ut ex hijs phlebotomus abhiberi possit omnibus pro ratione plenitudinis, quando haec in aliquibus apparet, in hijs qui consueti sunt phlebotomo uti, uel hijs qui non sunt usi phlebotomia, cum nulla fuerit spes in magna passione. Sciendum autem est uniuersaliter de phlebotomia, in omnibus magnis passionibus necessariam esse phlebotomiam, & confestim adhibemus. Qui autem nihil tale patiunt, & totas membrorum partes inculpabiles habent, duobus modis euacuationibus componunt: Si enim in dieta obseruanda incontinentes sunt, phlebotomo curent. Quod si dieta obseruare possunt, salutare absque phlebotomo consistit quod remedium, id est, per frictionem multam, & balneum frequentes usus, & exercitationes, & uectationes, & deambulationes. Adhuc etiam & unctiones diapho-

Melancholicis Venus prodest.

Veneri quae natura conueniat.

Prouocantia Venerem.

Ruta obest Veneri.

D

Quae phlebotomantibus sint consideranda.



**A** riticas, eas quæ uelociter plenitudinem corporis euacuare possunt. Quod si hæc utiq; displiceant, & aliqua sanguinis plenitudo esse percipiatur, ut sit melancholici sanguinis plenitudo, tunc omnino necesse est uti phlebotomo. Sin uero spissus in eo sanguis dominatur ex melancholia, continuo phlebotomandus est sine intermissione. Melancholix autẽ abundantia hijs signis agnoscitur: Grauitas cõtensione sentitur in præcordijs uel thorace, & omnis pars quæ super umbilicum est, grauior est à consuetudine. Vrina uero multa & pinguis est. Sedimen autem turbidum, & spissum, & pingue habet. Sed & exanthimata, id est, pustulæ cum inflammatione nigrae apparent cum dolore. Hos tales confestim phlebotomabis, & catartics quæ melancholicũ deducãt humorem purgabis. Crudi autẽ existentes humores, antequã incipiant generare ægritudines, caute sunt euacuandi. Iam autẽ febrientes nullo modo. Quod si aliquis est cõprehensus ægritudine, nondum autẽ sit aliqua accidentia, hunc phlebotomari oportet in initio primi uersus. Qui autẽ per singulos annos in ætate ægrotare consueuerit de plenitudine passionis, eos phlebotomari oportet primo uere ingrediente. Similiter autem & qui in primo uere consuetus est ægrotare, ingrediente primo uere est phlebotomandus. In ætate autem frequenter ægrotans, primo uere deficiente mox phlebotomandus est, maxime antequã incipiat ætatis.

*Melancholia unde deprehendi possit.*

DE APOPHORESI EX GALENO.

**H**is quibus euacuatio multa necessaria est fieri, & uirtus non est fortis, conuenit differri euacuacionem, uel dilatarı, & si causa urgeat ut auferatur, in primis minor est faciẽda euacuatio, & apophoresin, si necesse sit fieri, secundo & tertio est faciẽda, quemadmodum exigit plenitudo indigestorũ humorum. Quando autem ex calore sanguis multũ exardescit, & acutam defubito excitat febrem, & euacuari est opus, & si oportet euacuatur usq; ad angustiam, contemplan-do fortitudinem uirtutis, sicut in quodam scio me corylas sex sanguinis detraxisse. Mox etiam per noctem non me piget uisitare & incidere uenas. Conuenit enim quæ euacuantur pulsum eis tenere currente adhuc sanguine, ut nõ eum ali quid læcat, ne subita angustia mors proueniat.

DE MENSURA SANGVINIS TOL

lendi ex Galeno.

**M**agnitudo ægritudinis, & fortitudo uirtutis plena est contemplatio phlebotomix. Hijs ergo augmentatis multa euacuatio fieri potest. Non augmentata autem uirtute, sed diminuta, in tanta quantitate euacuatio fieri debet, in quantum minuitur uirtus. Contemplandum est etiã post hæc, qualis sit natura hominis ipsius. Quorũ enim magna sunt uenæ, & corpore macri sunt medicocriter, & non sunt albi, & neq; fluxas & molles carnes habet, uel delicatas, hos securus amplius euacuas. Qui autem e contrario sunt, parcendo euacuas eos: sanguinẽ enim habent modicũ, & nimium euacuantes facilius deficiunt. Secundum hanc igitur rationẽ neq; pueri phlebotomandi sunt ante annos XIII ætatem habentes. Post XIII autem annos si congregata sit multitudo sanguinis, & tempus sit primi ueris, aut temperatus sit loci aer, & pueri abundans sanguine fuerit natura, phlebotomari debet, & adhuc magis, si passio uehemens superuenerit. Euacuabis ergo plerunq; usq; unã heminã in primis. Quod si tibi uideatur eum uirtutem habere fortẽ, adaugebis in apophoresi mediam heminã. Hijs uero qui iam LXX annos gerũt, si uirtute sunt fortes, & phlebotomari sunt consueti, phlebotomari debet. Attendere autẽ oportet currentẽ sanguinẽ, quali colore uel constitutio ne sit, si pinguis est, aut tenuis, & maxime quando inflammationis causa sanguis detrahitur.

*Pueri nõ sunt phlebotomandi.*

QVALES

C QVALES VENAE IN SINGVLIS PASSIONIBUS SINT INCIDENDÆ PER LOCA EX GALENO.

**A**ntispasis fit, quando ex ipsa parte quæ infirmatur proxima patienti loco inciditur uena. Splenem patienti de sinistra manu secus digitum minor incidenda est uena, aut de sinistro brachio, quæ est cubito proxima. Pleureticis autem ex ipsa parte quæ dolet, sanguis est auferendus. Ad oculorū uero dolores iuuat magnifice, si ex ipsa parte quæ plus dolet de brachio capitalis incidatur uena. Tres enim uenæ sunt in brachio, quæ phlebotomantur necessarīe: Vna quæ est proxima cubito, quæ anterior uocatur. Alia est mediā, quæ matricialis dicitur. Tertia est superior, quæ uocatur capitalis: nam anterior phlebotomatur quādo cunctæ sub ceruicibus surgunt passionēs. Inferior ergo quæ est, quā Græci endon uocant, hæc quæ in inferioribus partibus membra sunt posita: in collo si læsa sunt loca phlebotomus adhibetur. Capitalis autē phlebotomatur, si circa caput, aut faciem passio generetur. Mediā uero utrisq; partibus expediens est. Sub mediā igitur uena neruus subiacet coniunctus: sub inferiore uena arteria subiacet cōiuncta, & ideo caute phlebotomandæ sunt. Capitalis uero uena omnino sine periculo inciditur, si semel fuerit percussa: sed cum bis aut ter incidatur, contingit ut dolores in ea incisione confluant, & sint multo tēpore: Hoc enim patientibus ideo fit, quia uix de semel inciditur: sed bis aut tertio percussa dolorem facit. Semel autē percussa, neq; inflātionem, neq; dolorem facit. Propter quod oportet eam sine timore incidere, cum multa cautela. Secundum autem hunc modum, quæ inferiores sunt uenæ in talis uel plantis tanguntur in passionibus quæ circa fœmora, aut uescam, uel in matrice fiunt, uel in renibus. Oportet autem incipiente inflātionē antispasin facere. In diuturna autē inflātionē ex ipsis quæ patiuntur locis est tollendus de proximo sanguis. In quibus autem corporibus nihil patitur membrum, auferendus est sanguis primo uere intrante. Omnibus uena æqualiter mediā est incidenda, & hoc omnibus utilissimū est.

D QVALE TEMPVS VTILE SIT AD SANGUINEM TOLLENDUM EX GALENO.

**I**n omni die uel tempore phlebotomus adhiberi potest, & in nocte, contem-  
platione adhibita. Febrientes uero in declinatione phlebotomabis, deciden-  
te particulari cōmotione. Illis uero qui sine febre sunt, & hoc opus habent adiu-  
torio, ex magnitudine passionum, in quibus phlebotomari opus habent, non  
aliqua urgente aut prohibente causa, optimum est matutino tempore phlebotomum  
adhiberi, ut post somnū una hora uigilans sit, uel duabus, aut plus. Et post  
balneū utilis est phlebotomus, uel ante quā tollant deambulent. Aliquibus autē  
agentibus consueta actiones nō impedit post hæc phlebotomari. Apophoresis  
autem tempus est si post unam horā fiat. Quod si bis euacuare uolumus, in ipsa  
die facimus, quibus antispasis utiq; si altera die fiat apophoresis, utilissimus est.

DE ARTERIIS INCIDENDIS  
EX GALENO.

**A**rterias incidunt medici in temporibus propter reuma oculorum, quod  
cum calidis lachrymis & uentositate spiritus prouenit. De retro autē post  
aures scotomaticis fiunt, & hijs maxime, qui diuturnos capitis dolores cum  
calore uentositatis in arterijs patiuntur, etiam & in alijs passionibus circa caput  
accidentibus diuturnis. Aliqui autem arteriotomia utuntur de retro post aures.  
Alios autem incisuras arteriarum piget facere, propter nimiam effusionem san-  
guinis, & quia diuisio ipsa in cicatrice solet ante orisnam facere.

## DE CVCYRBITARVM VSV EX GALENO.

**V**entosa igitur neque in initio passionis, neq; plethuricis existentibus utiles sunt, sed antea totum euacuetur corpus, ut nullus iam supercurrat humor in ipso loco, tunc imponi oportet uentosas, & mouere cum uiolentia, & foras trahendo euellere. Cum cautela autem uentosa secus mamillas sunt imponenda: Affixa enim uentosa iuxta mamillas nimis caro mollis ducta intumescit, & repleta uentosa difficile euellitur. Quod si hoc euenerit, spongiam calidam super uentosam oportet imponi. Sic enim largari potest. Quod si largata non fuerit, pertundenda est.

Cucurbita.

## DE CARAXATIONE TIBIARVM

ex Apollonio.

**V**ena incisa sapius in anno utile non est existimandum, quia simul cum multo sanguine uitalis emanat spiritus. Hoc igitur diminuto frequentius, totum infrigidatur corpus, & omnis naturalis operatio deteriorata consumitur. Tentavi ergo ego, non in proprijs locis quæ pariebantur, sed tantum in tibijs auferre sanguinem per caraxationem, quam probaui utilissimum esse adiutorium ad sanitatem conseruandam, & ad reparationem totius corporis cum fuerit facta. Iuuat autem hæc incaraxatio in oculis diuturna facta reumatica passione, & ad capitis omnes quæ fiunt passiones iuuat, & thoracis, & synanchis, & constipationes omnium locorum factas dissoluit. Oportet etiam & per ipsa loca patientibus fieri incaraxationes.

Missio sanguinis.

## DE SANGUISUGIS EX ANTIPIO.

**S**anguisugas enim oportet abhiberi, ita ut abstineantur die una, & modicum sanguinem in esca accipiant. Quando uero imponenda sunt, ante cum nitro lauabis, & ipsa loca linies sanguine, aut fomentabis. Sanguisugas autem in aqua mittes tepida munda, & cum spongia deterges omnem bromum ex ipsis, & sic eas impones, & superpones spongiam, ut plene cadant. Quod si se ab ulcere non dimiserint, salem super os earum pones aut cinerem, & mox cadent, & cum ceciderint, fomentabis cum spongia loca. Quod si sanguis multum fluxerit, gallæ usæ, aut spongiæ nouæ infusæ in picula exusta puluerem superparges, & superpones chartam in aceto infusam.

Sanguisuga.

## DE CATARTICIS EX GALENO.

**S**ana corpora habentibus superfluum est dari catarticum: etenim strophis & doloribus nimis affliguntur, & difficile fit purgatio, & adhuc citius angustias patiuntur hij qui sani sunt. Aegrotantes autem si minime uacuerint, nocet: unde antecedere oportet, ut intrante primum uere purgentur epileptici, astmatici, phlegmatici, artetici. Qui autem calida natura sunt multum, quod amarum cholera deponat dabis. Oportet autem ante extenuare, & incidere pingues & glutinosos humores, & poros per quos isti percurrunt & trahuntur: & ut ad catarticum aperiantur, hæc uiliter fiant omnia. In initio igitur orodes, id est, ferrosimiles & adhuc tenues humores si fuerint, expetenda est digestio. Quod si pingues & glutinosi sunt, quales sunt phlegma & melancholicus humor. In agridudinibus autem diuturnis semper digestio expectanda est. In acutis autem passionibus cum urgent, etiam in initio possibile est catarticum dari, cum cautela multa, moris humoribus existentibus largis uel fluentibus. Sin autem alicubi in uno defixi sint loco, aliquo alio adiutorio oportet mouere, & neq; catarticum dare priusquam digestionem faciat, & in quolibet tempore determinatio fiat. Purgatiua autem medicamina non sustinens stomachus, admixtio inuenta est bene

C bene olentibus seminibus uel herbis, ut non sola, neque pura uirtus eorum tan-  
gat stomachum, & uomicam excitet.

QV AE SINT QV AE PURGANT VEN-  
trem in usu, ex Galeno.

**H**elleborus niger purgat uentris cholericum & phlegmaticum humorem.  
Datur autem mixta scamonia. Si autē mitius uolueris purgare, hellebori  
sufficit trita radix sicca, & supersarsa in dulci uino, aut in oxymelle, quantum  
pensus est 2 II. Sed & cum lenticula cocta, aut cum ptisana, aut cum iure gal-  
linæ forbere dabis; Si autem cum scamonia miscueris, scamoniæ obolum 1 cum  
21 hellebori admiscebis aniso, & petroselino, & dauco, ppter suauitatis gratiā.

DE CNIDIO COCCO.

**C**nidius coccus autem purgat phlegma & choleram, & aquosos multum  
humores. Est quidem ignitus, & acute purgat. Dabis autem grana nume-  
ro xxx. Si autem mitius uolueris purgare, dabis grana XXI purgata, & quæ  
intrinsicus sunt trita cum melle, & aliphita in mulsa bibere dabis. Melius autem  
facies si cum uino bibat: Vbi enim biberit, modicum olei forbeat, ut non incen-  
dat gulam. Accipiantur autem & cum melle cocto trita grana xx, aut quo-  
modo purgare uolueris.

DE LINEO COSTEO, ID EST,  
herba mercuriali.

**H**erbæ mercurialis folia molliter cocta, & comesta stercora sufficenter depo-  
nunt, sed minus. Plus uero deponit, si decoctionis eius bibatur cum uino  
temperatum.

DE POLYPODIO.

D **P**olypodium uero educit phlegma & cholera, & aquosos humores. Dabis  
autem radices penso 2 II incisas, non tritas. Trita autem cum mulsa aut  
aqua maliciosa non est, & cum sardinis incisam minutatim dabis manducare an-  
te prandium. Purgat autem & in ptisanis cocta, & cum iure gallinæ radix cocta.

DE SICYONIA, ID EST COLOQVINTIDA.

**C**oloquintida purgat phlegma & choleram, dantur autem penso 2 III  
interiora ipsius in mulsa. Mitius autem purgare uolentibus dabis 2 II  
Semen igitur sicyoniæ proiciens, implebis id de uino dulci cum lanugine sua,  
& calefacies in cineribus ita ut bulliat, donec bene calefiat, hoc dabis bibere  
quibus non uis deducere fortiter uentrē. Dabis autem hijs quibus cutis exan-  
thimatis liuida fit, & impetigines habet.

DE ALOE.

**A**loë autem acutum quidem non est catarticum, stomacho autem aptissi-  
mum. Dandum enim usq; ad 2 II cum mulsa bibendum. Educit autē  
phlegma & choleram. Optimum autē est, ut etiam per singulos dies sic accipia-  
tur, antequam dormitū quis uadat. Deducit autem cibos non corrumpendo, &  
stercora cum humoribus educit; unde nec sitim facit, & accepta esca bona effi-  
citur: unde si teratur, & cum succo brassicæ facias catapotia ad magnitudinem  
ciceris aut fabæ, & exinde accipiantur duæ aut tres post coenam, purgat uentrē.  
Utiliora autē sunt, si cum resina terebinthina, aut larice fiant catapotia de aloë  
aut cū melle cocto: melius est si scamonia admisceatur, in drachma scilicet una  
de aloë, de scamonia scrupulus unus.

DE EPITHYMO.

**E**pithymus nigram choleram purgat & phlegma, dabis autem sic: Teres  
epithymū & trilocinabis, & dabis cum uino dulci penso 2 III, & adhuc  
amplius

**A**mplius & cum melle salis admiscebis cochlearium medium. Expedi autē hijs quibus uentofitas est, & qui hypocondriaci sunt, uel indigesti sunt, & quibus epar grauatur, uel hijs qui difficile suspirant.

## D E A G A R I C O .

**A**garicus purgat phlegma & choleram, sed nō acute. Dabitur autem penso 2 ii cum sapa, aut mulla, aut oxymelle. Datur etiā hoc modo confectus per singulos menses, aut post decem ut satis dies. De agarico ꝝ viii cū aceri cochlearijs duobus fortiter, & admiscebis mellis despumati ꝝ iiii, & cum calida aqua dabis bibendum, dextro flante uento, facit autem podagricis & arcticis. Deponit enim spissos humores: Accipitur etiam & sic agaricus, scrupulos iiii, ex eo soluens cum aqua, addes laticis cochlearium unum, & cum calida aqua dabis mane bibere, & ieiunet usque horam sextam.

## D E E V P H O R B I O .

**E**vphorbium purgat aquosos humores, sapius & cholericos aquosos. Est etiam acutissimum & ignitissimū: facit autem ad hydropicos & cholericos, & quibus frigidissimus est uenter expedit. Alijs autem omnibus turbationem fortem facit cum siti. Pro qua re miseri oportet seminibus bene olentibus. Datur cum mulla penso trioboli unius.

## D E C N I C O .

**C**nicus purgat phlegma & choleram, nō quidem fortiter. Oportet autem semen teri cum aqua, & exprimi ex eo succum, & miseri cum uino & iure gallinæ, & sorberi. Si autē anisus, & mel, & amygdalæ simul admisceantur; ad ictericos sient catapotia expedientia: Datur enim penso 2 iiii sufficienter.

## D E S C A M O N I A .

**S**camonia autem nullo horum catarticorum minor est, neque hac aliquid seorum acutius est, neque in uirtute fortius. Est autem cardialga, id est, stomacho faciens dolores cum morsu. Habet etiā & malum odorem, & stomacho est odibilis & indelectabilis, & nimiam excitat sitim. Pro qua re nec malum est. Aliqui uero aloē ei admiscentes dant. Quidam autem thymi comas & salem. Alij uero sementes bene olentes admiscent. Deducit autem choleram rubeam & phlegma fortiter. Pura autem datur penso 2 i. Si autem amplius bibatur, uomicam mouet.

## V T N O N V O M A T Q U I S

catarticum.

**Q**uod si catartico accepto uomitus fiat, apium intinges in aceto, & dabis masticandum, sed & oliuas albas in sale conditas mastice, & salis acinū teneat in ore. Hac ergo prohibent uomitum fieri. Adhuc etiam & coriandrum odoratum & pulegium, & calamentis. Melius est autem requiescere modice in lecto, & tepesciat uentrem, & extremos pedes. Quod si mox deambulare uoluerit, multus uomitus, & stomachi dolor, & uertigines capitis accedent. Cum autem in compositionem solutionis uenter coeperit uenire, tunc tam ut deambulet iubendum est, & lente submouere se debet. Hoc enim magis irritatur uenter, quam si acute uel cum impetu ambulet. Veniente ergo euacuatione uentris, subleuet se, & requiescat uigilans: magis enim confluet. Tunc etiam sorbeat paulatim cum aceto modicum aquæ calidæ; etenim mordicationes in uentre delectabit, & euacuationes inuitabit. Qui autem nō purgantur mullam sorbeant, & nitrum tritum cum aqua dabis. Melius autem faciet, si balanum supponas de sale & nitro confectum.

C AD VOMICAM MOVENDAM EX RVFO.

**V**T facile quis uomat, multa consequenter solent euenire, ut bene habeat, modo ut dixi facile possit moueri. Vomica etenim phlegma euacuat, & caput leue reddit. Nam cum animositate manducantes, indigesti fiunt, & uinum multum accipientes laeduntur. Prohibenda sunt igitur quae dicta sunt hijs qui uomere uolunt, & ea accipere quae stiptica sunt, & sicca, sed quae quidem dulciosa & humida debent esse, & quae acra sunt. Videtur autem in hijs cum raphanis bene probabilis esse & eruca, & salsamenta. Vteris & origano uiridi, & cepis modice, & porris. Iuuant autem haec ad uomicam faciendam. Ex leguminibus autem pisanæ mel habentes, & de fabis farina, & abundantius carnes earum. Vnde non solum succos earum accipiant, sed & tota grana simul glutiant, neque mastitentur, & satis debent uomere. In coctione autem mollia omnia sint. Certum est autem, quod & uinum dulce eligendum est, istud enim supernat, & repidum est bibendum; Oportet autem & amygdalas in melle intinctas comedere, & quaecumque sunt dulciosa gustanda sunt. Tunc & melonis, & cucumeris semina infusa & trita cum melle offerenda sunt. Sed & radix cucumeris trita cum melle detur. Qui autem fortiter uoluerit uomere, narcissi bulbos coquens in aqua, eandem aquam temperatam cum uino hortaris ut bibat, & post haec uomicam prouocabis, intingens digitos in oleum irinum, & sic uomicam irritabis. Is uero qui uomere habet, non cesset, uel intermitat donec omnia peruomat, tunc os lauet, & faciem fomentet cum pulsa aquosa, hoc enim dentibus expedit, & leuius caput efficitur.

D AD VOMICAM DE RAPHANIS, AVT cum helleboro faciendam, ex Philomino.

**V**omicam facies ter aut quater post cibum. Ieiunus autem facies ex raphanis semel aut bis. Sint autem raphani acres nimis, id est, radices recentes ex fossa, & incidantur in petala tenuissima, & ante duas aut tres horas priusquam accipiantur in oxymelle infundantur. Postea autem dabis ad comedendum, quousque ad satietatem sufficere possint raphani manducando, & sorbeat saepius de oxymelle. Post haec usque ad horas duas deambulet. Tertia uero hora accipiat ad bibendum de aqua tepida multum, quantum potuerit, & sic digitis, aut peninis in os missis, irritanda est uomica, ita ut digito, aut penna in oleo cibario, aut oleo irino infundas. Conficiuntur autem raphani alio modo cum helleboro albo sic: Hellebori albi drachmae III in raphanis inferuntur. Ante enim pungitur cum calamo ipse raphanus, & sic postea in ipsis foraminibus hellebori mittuntur radices. Aliter autem immitti non possint, propterea quia molles sint radices hellebori, & una sic permaneant nocte. Alia uero die proiectis radicibus hellebori, raphanum ut supra incisum & infusum in oxymelle similiter ad edendum dabis, & uomicam facies. Oxymel uero facies sic, in quo raphanos dare debes. Mellis cyathum unum, aquae cyathos duos, aceti cyathos duos, aceti cyathos tres coques ad medietatem.

DE CLYSTERIBVS EX RVFO.

Lenes  
clysteres.  
  
Acres.

**I**niectiones quae cum clystere fiunt, sunt leues uel molles, sunt acres. Apalae autem & lenes sunt, aqua tepida & oleo mixta. Quae sunt necessaria ut prouocent uentrem causa stercoreis in synochis febribus, & causis malitiosis, & hijs qui sunt ex diuturna aegritudine detenti, ut recuperentur & infundantur. Acres uero sunt quae cum melle, & sale, & de apozima coloquintida, & centaurea, & nitro fiunt. Haec profunt colum, uel liliu, uel ischiam patientibus, ad soluendum uentrem

**A**uentrem, & ad infraxin epatis, siue ad mœstificationē capitis, & non solum squibala, sed & phlegma educunt. Ventositatem igitur patientibus, calidā, qui absq̃ ventositate sunt, tepidā iniiciendā sunt, & paulatim exprimendum est. Fœno græci uero decoctione utimur ad mulierū causas, uel qui delicati sunt corpore. Melius uero maxime ad eos utimur, qui siccitatē corporis patiuntur. Lini feminis, aut apozimam iniicimus, quibus mordicationes fiunt in intestinis. De furfuribus autem iniectioes fiunt, sed & de alica, uel pane, aut farre quadam ex se nutrimenta participant, & ideo sæpius cum euacuationes squibalorū, tum nutrimenta corpori præstant & adiuuant. Ad ulcera uero intestinorū quæ non sunt in alto, hæc iniectioes subueniunt. Iuuat autē ad hæc, si prædictis aut cum pitisanæ succis adeps admisceatur porcinus. Betarum autem succos, aut apozimam eis iniicimus, qui tortiones patiuntur intestinorū, aut dolores. Deponit enim squibala & phlegma fortiter, unde & ad epaticos facit, & ad spasmos. Educit autem squibala & diuturnis adaxifimus resistit. Adaxifimus dicitur mordicatio siue prurius. Porcaclæ autem succus utilis est ad eos quibus ignitæ aliquæ subsequuntur causæ, & quibus uenter squibala dura facit, ita ut meatus de ano nimium extendatur per squibala, & ad erysypilatides passiones, admixtis ei succo, ouo, & oleo, & iniicies ad omnes inflammationes. Hoc ipsum etiam iuuat, quibus strophis fiunt. Ad uentositates uero soluendas, quæ ex frigore nascuntur, facit si coquantur in oleo, ruta, aut cyminum, aut anethum, aut baccæ lauri. Iniiciuntur & qui ex frigore febriunt similiter. Magnifice autem iniicitur ad ulcera & inflammationes intestinorum lac, sed & ad tumores intestinorum, & renum, & uesicæ, & matricis: Cui admiscenda sunt confortandi causa & mel, & adeps asferinus, aut porcinus. Hydroleum autem iniicitur ad tenuram extremitatū partium stercoreis exeuntis. Similiter & aspaltum, si frigoris causa contingunt dolores, adhibetur. Quod si grandis fuerit infraxis, iniicies cum oleo & aspaltum, siue butyrum. Butyrum autem, quibus ex inflammatione continetur in longaone intestini no squibala, & sordida sunt intestini ulcera. Malux autem succus, aut decoctio ad diuturnos strophos, & feruores, uel tumores intestinorum, & ani compatiens indignationem adhibetur. Mulsā autem iniiciatur, quando sine dolore & uitio manent loca intestinorum, stercore instituto molli. Vinum autem & oleum, aut succum pitisanæ miscemus cum iure malux & iniicimus, qui opium accipiunt. Vinum autem cum oleo roseo, & uitellis ouorum, aut certe sapa, & oleum tunc iniicitur, quando tenisimum patiuntur in initio. Mulsam uero, aut lenticulæ decoctionem, & mel iniicimus, aut de herbo decoctione similiter, aut pitisanæ succos cum oleo roseo hijs, quibus apostema in stomacho aut coleruptum est, iniicimus.

## DE MENSURA CLYSTERIS.

**M**ensura autem iniectiois sunt hemina tres, media, duæ: minima, una. Sæpius autem duas iniicimus heminas aut tres, quibus maximæ inflammationes & ulcerationes in intestino sunt longaonis, & reprimat quæ superposita sunt squibala.

## DE CLYSTERIBVS ACRIBVS.

**C**lysteribus acribus utimur ad ischiadicos & suspirium patientes, & ut non ab stomacho sit oppressio uentositatis spiritus.

## DE CLYSTERE IMAGOGOSO.

**C**lysteris imagogofus fit de styris, de garo siluri piscis insalati ex aqua maritima. Est autem confectio eius hæc, mellis hemina media, aqua marina

**C** heminae duræ, aut succi salis tres, & aquæ dulcis olei, cotylæ tres aut quatuor. Admifcent autem aliqui oua duo.

CLYSTERIS AD MORTALES fungos.

**Q** Vi fungos adulteros comedunt, iniiciendi sunt de nitro & absinthio & raphani succo, & rutæ decoctioni.

CLYSTERIS AD PARALYSIN intestini longæonis.

**A** Dparalysin intestini longæonis cum iniicitur, non continet medicamentum. Quod si non contineatur, multi salmoriam iniecerunt. Alij autem salis amoniaci cochlearium minus admifcuerunt iniectiõni. Nos autem gomo & insalatis oliuis albis quantum cyathi sunt sex iniicimus.

DE CLYSTERE AD LUMBRICOS ascaridas.

**Q** Vibus autem nocent ascaridæ, salmoriam, aut centaureæ decoctio iniicitur, aut absinthij, aut lupinorum, aut aloë, aut cydris, cum aliquibus prædictis decoctionibus. A me autem experimentatum est, succus meotidos herbæ potatus per dies tres, quantum est quarta pars sextarij, & sæpius acceptus hijs quibus nocent ascaridæ, eos elidet.

CLYSTERIS AD LUMBRICOS.

**Q** Vi à lumbricis molestantur, lupinorū decoctionem iniicies, aut bregmæ ex hoc infundes, aut ros, aut salmoriam.

CLYSTERIS AD TENISMVM.

**Q** Vibus delectatio adfellationis frequenter fit, salmoriam modice puram iniicies. Quod si sanguinem fecerit, aut ulcerationem intestini, polygoniæ aut plantaginis succum, aut myrtæ nigre in uino decoctæ iniicies. Quibus etiam admifcemus aut libanū, aut acatiam, aut hypocistidam, aut psidia, aut stipteria.

CLYSTERIS AD VLCERA

intestinatorum in dysenteria.

**D** Ysentericis ergo si ulcerata sunt intestina, si sine reumate fuerit, cum lacte uaccino aut caprino admixtas licij 2 II iniicimus, aut gessamia 2 III. Quod si cum reumate multo, aut nimia effusio fuerit, chartæ combustæ cinerem, aut lentisci usti cinerem, aut diacarton trociscum cum aqua, aut ex decoctione stipiticarum specierum iniicies.

DE BALANIS.

**B** Alanis enim utimur sæpius propter squibala educenda, ad eos quibus clysteres propter aliquas causas non educunt stercora. Finguntur autem balani cum sale asfo, & melle cocto, & nitro. De thymo autem cum non cocto melle mixto. Fiunt etiã balani ex resina terebinthina, & nitro: & cocognidium admixtum mediocriter facit, sed inordinationem excitat, propter quod oportet loca ipsa oleo tangere. Adhuc autem & pîretum, aut piper admifcendum est, & fiet utilis ad paralyticos, & hijs quibus ex frigore hypneomatosis fit. Centaurea autem admifcetur cum pice & cæra, & fit utilis ad eos, quibus paralysin uirga patitur. Infantes autem & granum salis ano impositū iuuat. Fit autem & de fecibus cum nitro balanus, aut cum uua passa, & nitro, & cymino.

AD CAPVT PURGANDVM.

**I** Ncapite residentes humores per sputum educuntur. Si quidem parua fiat humectatio molesta, piper admifcebis cum mastiche, & dabis ad mastificandum. Si



**A** dum. Si autem amplius caput uolueris euacuare, peretrum & staphisagrias cum mastiche & liquiritia dabis ad masticandum. Sed & aminonis herbae utriusque radices masticatae phlegma educunt, & capparidis radicis cortice masticata, si est aliqua superfluitas educitur. Aquosa enim superfluitas ex hijs quae dicta sunt detrahitur. Pingue autem & glutinosum phlegma per gargarium extrahitur, id est, sinapis cum oxymelle aut sapa, & origani, aut hyssopi, eorum decoctio. Ego autem miscui cum oxymelle sinapem: nam gargarium de sinapi conficies licet Sinapis.  $\zeta$  I infundes pridie in aceti hemina, & alia die sublatu de aceto teres diligenter, paulatim addendo ipsum acetum, & cum fortiter ad subtilitatem triveris, addes mellis despumati heminam, & simul totum teres, & post haec singula quartaria per tres dies ad gargarizandum dabis. Aut certe hoc modo confectum: De origano, sinapi, liquiritia, peretro, hyssopo, thymo, ireo ana  $\zeta$  I. Staphisagria  $\zeta$  I, pulgilio  $\zeta$  I, caricis numero quinque, melle libram unam & semis, aceto ff I & .s. Sapa ff I & .s. coques & dabis ex hoc ad gargarizandum cantarum unum. Si autem per nares purgari oporteat, irritabis cerebrum medicaminibus acerbis, ex quibus aliqua sternutamenta moueantur. Purgat uero per nares anagallidis herbae succus, & utriusque aminonis succus, omnes succi infunduntur in nares, uel immittatur ipsi tantum per se uniuscuiusque succus. Sed & betarum, & cucumeris agrestis succus de folijs in nares missus per se ipsum, & cum betarum decoctione, aut succo ipsius, Ptharmia autem, id est, sternutamenta crudis humoribus, qui circa thoracem & pulmones sunt, & capitis continentur partibus, expediunt. Ideoque in linimenta oris fiunt: Ad haec saponem resfolues cum succo betae, & in linies palatum & circa uuam, & bene purgabit, hoc irinon dicitur, & cito inuenitur. De gitter autem saporis usi sumus irinon in naribus cum aceto acri trito, aut oleo cum aceto acri usi sumus. Ante unum autem diem infundatur in acetum acre, & sic post tres dies tritum colabis in linteo, & in naribus mittes. Similiter autem & cum oleo infusum, & tritum, uel colatum in naribus mittimus. Cum oleo enim Arcigenes ea usus est in constipatione narium. Cum aceto autem gitter usus est Criton autor.

Arcigenes.  
Criton.

DE CYCLAMINO AD ICTERICOS.

**C**yclamini succus cum melle ictericos bene purgat aequali mensura. Fit autem irinon puluis hoc modo confectum: Radicum sicci cyclamini puluere  $\zeta$  I, nitro eretro  $\zeta$  .s. Quod si pro nitro elaterium mittas, fortiore facies. Mixtum igitur puluerem cum canna aut fistula insufflabis in nares, & cum miseris, ad se trahit spiritum, & cum in naribus miseris puluerem, sursum deorsumque eum caput ut attendat facias, & sputet humores qui se in ore collegerint: Haec enim purgatio sine molestia fit. Item ad aurium causas, & surdos, hoc modo irinon facies: Cyclamini sicci puluere  $\zeta$  XXI, ireos  $\zeta$  IIII, nitri  $\zeta$  I. Haec enim euacuant caput, & aures in pristinum reuocant auditum.

IRINON AD CAPVT PURGANDVM.

**G**itter  $\zeta$  I. Salis amoniaci  $\zeta$  IIII. Elaterij  $\zeta$  IIII, tritis admiscebis oleum sicyonium, aut irinum, aut cyprinum, donec ceroti habeant spissitudinem, & repones medicamen in pyxide cornea, & cum opus fuerit inunge in trinfecus nares, & iube ut spiritum trahat ad se. Hoc autem irinon iuuat eos qui habent diuturnum capitis dolorem, & qui oculorum nimiam habent effusionem, & epilepticos iuuat: Educit enim de capite glutinosos & spissos fortiter humores de cerebro, qui ibidem sunt, & sani fiunt.

## AD MENSTRVA EDVCENDA.

**M**enstrua enim educunt omnia quæcumque sunt diuritica: Brassicæ radicis decoctio potata, & per se assa radix, & ruta, & aris, antimon, & diptamnus, & erucæ semen. Mouet autem menstrua apposita ori matricis ruta trita cum melle, aut anethi radices usæ, aut cinis earum cum melle, aut porrorum succus, aut allium tritum appositum, aut smyrna trita cum uino, aut leporis coagulum.

## AD SVDOREM PROVOcANDVM.

**A**d mouendum sudorem est camimola sicca trita cum oleo, si superficies corporis cum eodem fortiter defricetur. Sisileus, peretrus, caciurus, anisus, similiter cum oleo adhibiti faciunt. Nitrum assum non satis tenue, tritum cum oleo facit, & alosantus cum cyprino oleo, & opium cyrenaicum aqua resolutum, & in fricatione corporis assumptum, & potatum ad magnitudinem ciceris.

## DE AERVM QVALITATE

ex Galeno.

**O**ptimus aer est, si mundissimus est, & non sit in eo odor, neque ex lacis, aut paludibus ascendens turbulentus, neque ex aliquibus baratris uenenofo aurea percurrens appareat, aut ex cloacis quæ purgant ciuitatem. Turbati enim ex hijs aeres pessimi sunt, & qui nebulosi sunt similiter inuiles sunt. Quemadmodum & qui in cauo loco undique montibus altis circumuallatus, nullam in se excipit auram.

## DE FOMENTATIONIBVS EX GALENO.

**L**Argare consueuerunt omnes calefactionum fomentationes cutem corporis, & facile euentari faciunt loca quæ tu ment, & euentatione facta sanguis extenuatur, & si superfluitas multa quidem fuerit in toto corpore, amplius est ubi calefactus locus soluitur fomentando. Oportet ergo ante fomentationem euacuare totum corpus phlebotomo & catartico. Humida quidem calefactiones inflammationes iuuant, si ex cholericò humore sint generata. Sicca autem fomentationes, quæ ex subtili & aquoso sanguine sunt. Sine mordicatione uero calefactiones, quibus mordicant humores expediunt, mordicantes calefactiones, extenuant pingues & glutinosos humores. Calefacienda autem est hypocondria fomentatione & cataplasmate, sed non semper utile est: nam in hijs solis imbecillitatibus adhibetur, in quibus nulla superfluitas in toto habetur corpore. Alijs autem omnibus mala est in nouissimo: in initio autem adhibita in reumatica passione, quia in eis ut reprimatur stiptica adhiberi oportet, ut reprimatur quod desuper fluit, aut certe conspissatum reuma retineatur pinguius factum: & sic postea tempus esse iam perspiciendum est, ut laxetur quod continetur, & sic euacuetur, & maxime quando in epas, aut uentrem descendit superfluitas, stipticis utere proprie ad hæc loca, & sic postea tempus fiet, ut dia-phoritica adhibeantur, ut ea quæ constricta fuerant, relaxata digerantur. Ad hæc autem ex decoctione absinthij in oleo fomentari oportet, aut milino oleo, aut sicyonio, aut mastichino. Simili autem modo & cataplasma compositum ad hæc similem habet uirtutem ex calasticis leptomeris, id est, extenuantium habentibus partes & amaras uel stipticas. Colum autem patientibus, aut aliorum intestinorum, aut in præcordijs musculorum, aut peritono à Græcis nominato, miscenda sunt nullatenus quæ stiptica esse probantur. Quemadmodum neque uesicæ, aut matricis, neque ut dictum est, ubi supercurrit adhuc humor. Adhuc etiam si plenitudo inest superfluitatis in toto corpore. Ventosis autem uti oportet, sed corpore euacuato, & non in initio passionis utimur.

A DE CATAPLASMATIBVS, EX LICO.

**D**ispergit quæ congregata sunt hoc cataplasma, & spinas, & cannas uel silicem extrahit, & sciros & duritias mollit, & contritiones in pedibus solarum sanat. Oportet autem fermentum acidum malaxari cum sufficiente oleo, & sic illud impones. Fortius autem si id facere uolueris, nitrum admiscebis medicocriter. Si autem id cum aceto resoluas, & coquas ut impinguescat, utilissimum fiet ad splenis & epatis sciros. Si autem & thymum, & pulegium, & absinthium cum fermento admisceas, optimum fiet medicamentum. Ficus pingues fortiter in pila cum seminibus tunde, ita ut nihil ex eis non tusum inueniatur, nec aliqua portio, & hoc commisce cum irni olei modico. Facit autem hoc adiutorium ad neruorum ubi fuerint in articulis tumores, & remanserint, & ad sciros maxime splenis & epatis. Quod si addas & niri modicum, rumpe uulnus, & extrahet scolopas. Quod si admisceas cum ficis sic factis pulegium, aut origanum, aut cimi comam, aut absinthium tenuiter tritum, & tricocinatū, hydropticis expediens est. Nam & coctas sufficienter ficus, ita ut solui possint, resolutas iterum coquas cum aqua. In aqua coctis admiscebis hordei farinam aut tritici, & iterum coques, donec constitutio sit cataplasma uulnerū. Iuuat autem phimata, quæ non facile maturescunt. Quod si aliquid uncti uolueris adhibere, butyrum admiscebis. Si autem ruta folia admisceas trita, in intestinalis dolores ex uentositate generatos sanat, & cyminum similiter facit admixto oleo.

DE BALNEO.

**L**Audo in aquis frigidis lauari. Non existimo autem expedire hijs, qui quocumque modo ad saturitatem cibos accipiunt, sed hijs qui in laboribus degunt, & cibis sicut competit utuntur: sufficit autem hijs qui multum opus habent in frigidari. Amplius in frigida natate debent ætatis tempore iuuenes, & maxime qui carne sunt repleti, ante calefacti fricatione. Sint autem neque mulierum commixtione, neque ciborum nimietate repleti, neque indigesti, neque uomitū, uel uentris habentes solutionem, neque post uigilias. Periculosum est enim, si quis sic utatur aquarū frigidis lauacionibus. Calida autem lauacra optima sunt, & sine periculo corporis.

*Frigida balnea.*

DE CALIDIS BALNEIS

**C**alidum uero balneum gratissimum est, & sine periculo hoc opus soluens, id est indigestiones & plethuras digerit, id est plenitudines euertat, & quæ calefacta sunt mitigat, & malaxat, & uentositatem spiritus diffusam, & ubicumque inflata sunt relaxat, & somnum facit, & carnem replet. Est autem ad omnes causas sine periculo uiro & mulieri, puero, & seni, & idiora.

*Calida lauacra.*

DE BALNEIS EXCOGITATIS,

ex Antilio.

**E**xcogitatis igitur balneis calidam præparamus ad infrigidatum corpus, aut ad soluendum corpus, aut spasmos mitigandos, uel dolores, & perfricationes causarum. Fit autem ad calefaciendum lauacrum in aqua, qua decoquunt pulegium, aut origanum, aut hyssopus, aut thymum, aut satureia, aut laurus, & petri radix, uel quæ sunt hijs similia. Addimus autem & oleum. Diaphoriticæ autem balneæ sunt, quibus subtiliari uolumus totum corpus. Fiunt autem diaphoriticæ balneæ, ubi sal fuerit in aqua missus, aut aqua ex mari, aut nitrum in aqua mixtum. Melle autem admixto in aqua diaphoritica fit hæc aqua. Sed & de sarmentorum cinere, aut de arceotide decoctione facta. Malaxationis autem causa fit lauacrum, ad inflammationes uel duritias permanentes. Inflammatis locis utimur

**C** maluz decoctione, ubi admiscetur lini semen & foenogracum post multos labores dolentibus nodis, uel neruis, aut ossibus, & solent dare sanitatem.

Ad reumaticas uero passiones cum inflammatione existentes, ubi plantago & polygonia herba incoquantur, aut sidia, aut rosa, aut rubicina. Ad sperates autem spasmos utimur quidem uel eas quae sine reumate sunt inflammationes. Maxime iuuant ex hydroleo maluz & foenogracu decoctum. Ad duritias autem quae sine inflammatione sunt hijs ipsis utimur, quae ad diaphoresin opus sunt ut exhibeantur. Infrigidari, & constringi per balneas, quae frigida & stiptica sunt materia adhibeantur.

#### DE AQVIS NATURALITER CALIDIS.

*Aqua calida.*

**E** Stenim nitrosa, est & salsa, est stiptiriodis, & est sulphurea, est aspalto-dis, est chalcantodis, est & siderizonta, id est ferrea, est etiam & composita ex hijs omnibus. Igitur naturaliter aquae calidae, uirtute sunt calida & desiccatiua quam plurime, & maxime expediunt humidis & frigidis. Iam autem quae nitrodis est, uel salsa, expedit capiti & thoraci reumatizanti, & stomachum humidum & infusum habenti: faciunt & hydropicis, & tumores ex aegritudine patiensibus, uel phlegmaticis. Stiptiriodes autem aquae faciunt ad eos qui sanguinem reijciunt, & sanguinem stomachum habent, & mulieres quae non secundum ordinem purgantur, & frequenter abortiunt. Sulphurea uero aqua calida, neruis malactica est & calesfactoria, atque dolores omnes mitigat, & stomachum dissoluit & euertit. Aspalto-dis autem caput replet, & sensibilia loca laedit calefaciendo, & mollit. Chalcantodis enim ori, & tonsillis, & uisus, & oculis praecipue utilis est. Siderizonta, id est ferrea, stomacho & spleni utilissima est. Oportet autem lente in aqua piscinae ingressum facere, ut uirtus reparato corpore accedere proueniat.

*Nitrosa.*

*Stiptiriodes.*

*Sulphurea.*

*Aspalto-dis.*

*Chalcantodis.*

*Siderizonta.*

**D**

#### DE DROPACIBVS.

**D**ropaces igitur diuturnis maxime passionibus expediunt. Oportet autem admisceri, si calere uis super hijs, quae calefaciunt amplius, perentur, caerion, asphaltum, si autem desiccare opus est, sulphur uiuum, salem, & cinerem samentorum. Si autem aperire uis, limnice & euphorbium.

#### DE SINAPISMO.

**S**inapismus uero fortior est dropacibus, & in diuturnis factis passionibus multum iuuat. Oportet autem sinapismo uti in pigris passionibus, & in partibus carniuum, quae non facile sentiunt, & insensibiles sunt. Mensura autem fortitudinis sit, quo molestentur fortiter patientes, ut liuida caro fiat, & altiora sint circa ea loca, & post balneum uesicae in hijs leues mitius fiant in cute. Quae autem sentiunt loca, mitius utere sinapismo cum mensura, ut sit rubicunda cutis corporis. Conficies autem sinapismum hoc modo: Ficus aut caricae oportet ante diem in aqua tepida infundi, & post haec alia fortiter terri, & exprimi & terri, donec diligenter terantur, & sic postea acrem sinapem accipiens, qualis est syriacus & aegyptius, singillatim tritum admiscebis, & superfundes paulatim aquam ubi infusa fuerint caricae, & post bene collectas in unum caricae & sinapem simul permiscebis. Quod si nimis acrem uolueris facere sinapismum, duas partes sinapis, & unam partem ficuum admiscebis. Si autem mediam uolueris facere, aequales mittas partes, si autem leniore uolueris uti, mittes sinapis tertiam partem, & duas partes de ficis addes, cum autem tolles medicamentum iubes ad balneum, & in solio mittes, & postquam balneo usus fuerit, si dolores nimios, aut ruborem, uel uescas fecerit, lineum infusum in aqua, & oleo

**A** oleo roſeo mixto ſuperpones. Aqua autē ſit de maluis apozima, aut ſambuco, ubi foenogracū bullierit uel decoctum fuerit, & poſt hæc ceroto de oleo roſeo cum plimithio utimur. Sciendum uero, quia in acetū ſinapi inuſo imbecillius fit cataplaſma. Ego experimentaui cum aceto, ſed melius cum aqua ut dictū eſt. Optime autem iſchiadicis utilitatem facit.

D E S O L I O F A C T O E X O L E O.

**Q** Vos debemus in oleo calente deponere: Hos qui diuturnis cum rigore febris laborant, & hos qui copos patiuntur, id eſt quibus ex labore nimio oſſa & nerui dolent, & qui febrientes dolores patiuntur, & eos qui ſpasmus neruorum patiuntur, & hos qui diſuria uexātur. Oportet autem quinq; partes olei ad ignem calefacere. Cæterum autem in balneo. In folio uero ſufficienter caleſieri balneis.

D E H Y D R O L E O.

**Q**ui autem in hydroleū dimittuntur: Qui imbecilles ſunt cum ſindone in folio deponantur, id eſt quibus ex labore nimio oſſa & nerui dolent, aut febris calens, debent deponi: admiscebis autem in oleo aquam ſufficienter. Sit autem nihil minus ab eo.

D E R E C U P E R A T I U I S A D I U T O R I I S

ex Galeno.

**O**mnes autem diuturnas paſſiones quamplurime patientes, cum nihil ſuauare uidentur adiutoria recuperatiua, quæ Græci metaſyncritica uocāt, quam methodicā nominant, quam etiā omnes methodici ſolent facere. Ego autem in quibus diſtèmpantia fuerit humida, aut frigida, aut utrinq; mixta in patientibus locis conſiſtens, quæ de ſinapi & taſſia ſunt adhibeo medicamēta, uel quæ ſunt hijs ſimilia. Nam ſiccis & calidis talia non adhibeo. Sæpius autem lædunt qui non cognoscunt paſſiones, quia multis hominibus frigida & humida paſſionis moleſtia generantur, peſſima utentes diæta ciborum.

Q V A E S I N T Q V A E R V B O R E M

inducant in corpore.

**N**aſturtij ſemen ruborem inducit in corpore, & calorem facit, quod Græci *gourpuy* appellant, quemadmodum & ſinapis. Inulæ uero radix ſimiliter facit. Nam ſtercore ſylueſtrum columbarum ſatis frequenter uſus ſum, & cū naſturtij ſemine trito & creto pro ſinapi uſus ſum ad iſchia-dicos, & hemicranicos, & ſcotomáticos, & cephalæas, & catapleura, aut amoplasas, aut tenontas, aut partidas, dolentes diu, & adhuc ad nephreticas & coeliacas paſſiones, & ad podagricas, & arteticas, cum nondum conſtitutio fit pororū in articulis.

D. ORIBASII

# D. ORIBASII SAR-

DIANI IULIANI CAESARIS  
ARCHIATRI AD EVNAPIVM  
DE CVRATIONIBVS.

AD CAPITIS DIVERSOS DOLORES.



**S**I CAPITIS ex nimio aëris calore dolor obuenerit, conuenit sine sale oleo roseo & non ueteri inungere cutem capitis, & partius erunt unguenda posteriora capitis loca, in initio: Neq; enim hoc sine ratione præcipimus, quia nõ in initio medullæ spinali hæc passio accessit. Non inuento autem oleo roseo, de omphacino unges oleo. Si nec hoc adfu- erit, camimolo. Pueris, infantibus, uel mulieribus, & quibus molles sunt uel solux carnes, quibus expediunt infrigidari loca nimis, hoc modo offerenda sunt adiutoria. Tunc necesse est uti aqua nimis frigida, & si nitua- ta adfuerit, in ea uas in quo oleum est deponendum est. Quod si hæc non ad- sint, admisce acetum in oleo roseo quartam partem. Nimia autem accesa ex æstu inflammatione, superaddes oleo roseo succum semperuux herbæ, aut porca- ctæ, aut lactuæ, aut oxylappacij, aut sillion, aut omphacion, id est succum unæ acerbæ. Admisce interdum & de rafuris cucurbitæ succos.

SI DE FRIGORE CAPUT

doleat.

**S**I autem de frigore doluerit caput, fomentabis bregma capitis de oleo ru- stato aut laurino. Si autem opus habuerint nimis ut calefiant, euphorbij mites in oleo modicum, & unges caput oleo nardino aut amaracino, & frontes in linies de oleo ubi euphorbiũ sit tritum, simul & nares, & aurium poros. Qui- dam autem & pedum plantas unguunt & anũ, & ad uesperum lauet, & sic cibus euchymis utatur non calidis, quales sunt ptisanæ succus, & sorbitiones de alica, & oua sorbilla sine liquamine, & lactuæ frigida, & calida brassica. Siccant enim uapores: similiter autem & lenticula. Bibat autem omni tempore aquam. Quod si euertat stomachũ aqua, aquæ potioni mala granata immittes, aut malo aut piro ibidem coctis eam sumat. Post hoc autem factum sequen- ti die lauet calido lauacro, & aqua calida superfundatur sæpius.

DE DIUTERNA PASSIONE.

**D**iuturna uero iam effecta passione ex calore aut frigore, & generatis do- loribus ex distemperatã, radi oportet caput, & uti emplastris aut cerota- rijs ex proprijs medicaminibus. Infrigidare enim, quæ calefuit, Calidas uero infrigidare distemperatias per ea de quibus sanantur erysypilæ. Calefacere aut quæ frigida sunt per ea quæ calefacere possunt, qualia sunt simplicia, de euphor- bio unam quidem habens unciam, tres uero uncias ceræ, & olei libram unam.

DE ACRIBUS HUMORIBVS DOLORES  
capiti ingerentibus.

**Q**uod si ex acribus humoribus capitis dolores fiant, qui in stomacho sunt cõgregati, & uaporibus suis caput inquietent trãsmittendo hos, magis per uomitũ euacuari oportet eos qui lædunt humores. Quod si qui patitur, uo- mere non potest, nutrij eum uelocius oportet cibus bene digerentibus & aptis stomacho,

**A** stomacho, & hoc ipsum mediocri qualitate, & si post hæc absinthium ei dabis bibere, & cæteras dietas ei ministrabis digestarias, ita ut hora tertia aut quarta panis quid offeras, tantum quantum sufficiat, & post datum spatium penè horarum quatuor lauet. Si autè aliquis solum panem edere uoluerit, oliuas aut uuam passam, aut dactylos, aut hijs simile dabis quod suauius est. Malas igitur passiones, ex malis in stomacho consistentibus humoribus, ut etiã in tunicis uentris imbutantur, has euacuari oportet per aloiticum pigra. Si autem calore similis & uentositate spiritus capitis dolor efficiatur, initio quidem ex hijs quæ infrigidant & reprimunt curatio est adhibenda. Post hæc admiscemus aliquid ei quod reprimere potest mitigatiuum, uel quod digerere potest, & sic addimus aliquid dia-phoreticum, subducentes paulatim quæ reprimunt, aut amplius quod extenuat & digerit, modicum autem quod reprimat.

DE CONSTIPATIONE IN PORIS.

**S**æpius autem constipatio fit in poris uaporosis uentositate spiritus, sic & humor pinguis & glutinosus, sic ut uix in multo soluatur tempore facta sessione. Si autem supra mensuram febris capitis dolores extiterint, nõ manifestantes crism, frigidis qualitatibus & uirtutibus sunt adhibenda adiutoria, qualia sunt oleum oxyrodinum, id est oleum roseum cum aceti quarta parte, & papauer coctum in oleo. A uino autem abstineant qui dolorem capitis patiuntur, & quæ infrigidant adhibe. Si enim calidi sint uapores qui caput laedunt, roseum oleum eis sufficit, & nõ satis frigidum adhiberi debet. Expedit autè eis requiescere & dormire, & ad uesperum lauare, & sic cibis euchymis utantur, non calidis, quales sunt pitfanæ succus, & forbitiones de alica, & cæteri superius descripti. Post hæc iterum dormiant & requiescant. Lauent autem alia uice, & sic accipiant cibos similes. Quod si non sufferunt aquæ potionem, uinum album aquosum bibere permittas, & manducet pisces aspratiles, molles carnes habentes, & pipiones coctos sine liquamine, & uinum apozomum ex aqua sola & oleo & anetho, & porros modice coctos, & salem mediocriter supermittis. Remanentibus uero aliquibus in capite uaporibus humorum constrictis uel constipatis, dolorè generantibus, roseum oleum iam nõ adhibebis, sed carminolo oleo uteris calido mediocriter. Post hæc admiscebis ei interdum quidem amaracinum, interdum autem nardinum.

DE DOLORE CAPITIS EX PERCVSSURA.

**S**icut ex percussura caput doleat, uel ex aliqua ruina contigerit, cognoscendum est si nulla est inflammatio, aut tumor in testa capitis. Quod si intus inflammata sunt loca, non sine periculo erit talis capitis dolor. Existimare autem oportet, ut prius à phlebotomo & clystere ad hæc in initio faciat curationes, & fomentationè cum spongijs, & pilumitas molles lanarum oleo calido infusarum superponere, & alia facere, quæ ad inflammationes fieri expediunt.

DE CEPHALÆA DIUTRNA, ET

quæ difficilis est ad soluendum.

**C**ephalæam Græci uocant, quando commotiones accessionum nimis & parum occasiones incedunt, ut neque sonum, neque clamorem sustineant. Oportet autem cõtemplari prius si plenitudo est quæ hæc facit, aut inflammatio aliqua. Cognoscitur enim sic. Hæc enim quæ cum grauitate doloris fiunt, ex plenitudine generantur. Quæ autè cum mordicatione, ex uapore acris humorum. Quæ autem cum pulsu doloris fiunt, ex inflammatione membranarum capitis fieri.

**C** **VRATIO.** Si cum grauitate ex plenitudine fiat dolor, interiores membranas inflammatio tenet. Si igitur plenitudinis causa humor inuenitur, aut uapor sit, totius corporis plenitudo est. Totum ergo corpus euacuandum est phlebotomo & catartico. Si autem ex imbecillitate capitis accessiones fiant, antispasmi materia ex toto corpore facies, & sanabis caput. Antispasmi autem fit per clyster & ligaturas extremis partibus, & friciones similes. Sapius uero etiam per uomitum sunt euacuandi. Curabis autem loca aquosa quidem unguentis antispasmodicis, id est quae extrahant & non reprimant. Post haec autem quae euacuent, & sic quae corroborent. Reprimit igitur omphacini & roseum & oxyrodinum, & papaueris decoctio cum oleo: uel oliuae folia cocta cum oleo & hederæ, & de cinis mentae uiridis confectum oleum. Adhibebis autem haec tepida super frigidam & crudi humoris plenitudinem existentem. Frigidum autem adhibebis super calidum & cholericum; deferrum autem calidum oleum & magis uetus, & anethinum & sicyonium. Quod si pinguior est plenitudo, spondilion & herpillon coquenda sunt in oleo, aut pulegij comæ, aut calamentis, aut menta. Euacuant autem humorem pinguem haec, & uirtutem imponunt locis ipsis, propter quod usque ad integram sanitatem hijs uteris, & cum ex hijs iuari coeperit, purgabis caput per nares, & palatum, & sternutameta adhibebis, & in balneo fricari oportet caput cum sindone aspera, & superasperges salem, & nitrum, & sinapi sine oleo.

**DE CEREBRI INFLAMMATIONE.**

**D** **I** **N**flammatum cerebrum sapius & inflatur intantum, ut distendatur & aperiat sutura uel commissura testæ, & est ista passio pessima, ita ut in dies tres, aut septem moriatur. Si autem hos euaserit, saluabitur. Cerebrum autem cum intumuerit ab inflammatione consurgunt tempora altiora, & aurium auditus obtunditur, & uenae eriguntur, & pulsant febres. Interdum & rigor accedit, & dolores molestant. Nunc leuiores efficiuntur, nunc iterum consurgunt grauioribus, & nunc non sustinet uociferationes in dolore, & nunc surgit a lecto, & iterum mox ad lectum festinat se proijcere, & cum coeperit intumescere cerebrum, habet inflammationem. Rubor apparet nimis in uultu, & oculi foras propelluntur, sicut strangulati proueniunt, & intumescit facies, & totum caput interdum, & collum, & thorax. Quibusdam autem & dorsum intumescit, ita ut ex ipso tumore crepet cutis. Alijs autem non crepat, sed uesicae fiunt similes uelut ab igne. Haec autem passio fit, & non solum intrinsicus inflammatur cerebrum, sed & intumescit eius etiam extrinsecus meninges pertunditur & frangitur. Vocatur autem testæ membrana, ubi tales pessimae contingere solent passiones.

**VRATIO CEREBRI INFLAMMATI.**

**M**ox in primis phlebotomandus est de brachio, & maxime ut uena diuisatur incisura maiori, ut multo cum sanguine calor similis multus exeat. Post haec autem si gustus permittit, & secus nares & sub lingua uenas incidet. Similis quidem & apophoresin facies inflammato cerebro; & haec cum diligenter feceris, celerius ad alias curas, quas locales uocant, festinas succurrere. Erubrocas autem capiti de hydroleo aut uino & oleo, sicut & alijs membris inflammatis facies. Post haec uideris & cataplasmate quod infundere possit paulatim. Rades autem caput, & sic pones cataplasma de pane & farina in hydroleo factum, aut de lini semine similiter factum. Nihil uero nimis calidum adhibendum est. Sed & clysteris in primis mollis aut lenis sub reumatitante uentre, ut escæ deponantur, & quae latere uidentur in capite. Virgente igitur malo expulso, melius

Meninga.



**A**lius fiet & ad uocis admissionem, & oppressionem uel suffocationem, & acredinem expurgat & deponit. Oportet autem & uentrosas assumere, sicut consuetudo est facere in sinancicis. Vna enim est causa, sed locis differt. Quid enim distat inter gulam & cerebrum? Vti autem etiā medicamine, quod paulatim mitius soluere possit uentri, & post hæc declinatione accedente, & causam inflammationis minuente, uomicam per os faciet quodlibet medicamen. Optimam autē & urinā prouocare, & ab initio, & in extremo, nō acribus diureticis rebus,

## DE ERYSPILIS IN CEREBRO FACTIS.

**F**unt autem & in cerebro erysypilæ, quemadmodum in extrinsecis membris, sic & in cerebro. Hoc enim patitur, cui fit dolor capitis totius, & uidetur in eo esse ardor, & non sustinet posito uno loco capite, sed mutat de loco in locum, non ferens straturæ calorem, & adhuc infrigidare illud desiderat, & uultus in eo frigidus est, & pallidus, & sitis nimia, & desiccatur os.

**CVRATIO.** In primis mox phlebotomabis eum de brachio, & maxime sub lingua, & adhibebis quæ infrigidat, qualia sunt strychni succus cū oleo roseo cataplasmate. Sed & de uasis quæ de terra facta sunt, luto facto, in linies: hijs adhibitis euacuabis etiam uentrem forti medicamine, febre non existente. Sin minus, clystere: Sin uult uti uentosis, cum nimia flamma appones quæ possint extrahere erysypilas in summam cutem. Cibos autem dabis, qui neq; frigidus sint neq; calidi. Nam in capite adhibebis quæ infrigidet & humectent. Optimum autem est foris apparere erysypilas. Nam cognosces hoc ex rubore si uenerit in facie & collo, & non in primis, sed postea apparuerit.

## DE HEMICRANIO.

**B**Medij igitur capitis dolorem aliqui patiuntur, qui de superfluenta uapore & humore, aut permixtis ambobus fit. Purgari ergo eos aut phlebotomari oportet in primis, aut catastico, & sic localibus curæ uteris adiutorijs. Fricabis autem loca de sindone, & digitis manuū mediæ partis capitis & maxime temporum musculum ante accessionis horam, & post commotionis tempus hemicranicis adiutorijs. Si ex calore fit dolor, adhibebis quæ habent aliquid frigoris adiutoria. Sin uero ex frigore fit dolor, calidis uteris medicaminibus. Virisq; autem admiscenda sunt quæ corroborant, id est stipticam habentia uirtutem. Optima autem est inunctio calefaciens, quæ recipit euphorbij unciam unam, ceræ unc. III, olei libram unam, & aliquid de extenuantibus: Vngi autē oportet mediā frontem qui patitur, cum temporis musculo. Utillissimū enim est ad frigidā distemperantiam. Sæpius igitur illitus, & ante balneum semel illitus, dolorem amputabis. Inuat autem patientes si sit cum oleo tritum euphorbium, & tepidū in aurem infundatur: sit autem olei libra una, & euphorbij uncia semis. Ad sifocephalos, Sichoica iba dacū aqua aut mulsā bibere, aut cataplasinari.

## AD ALOPECIAS ET OPHIASIS.

**A**lopecia & ophiasis communis est, & cōmuni curatione opus habet. Vocatur autē ophiasis propterea, quia schema simile est coloris serpentis. Alopecia autem, quia uulpis similat colorem. Hæc autem passio frequenter comprehenditur ex pessimis humoribus in capite consistentibus, & latine tinea nominatur. Vnde speciem malitiæ ipsius coloris cutis capitis ipsius ostendit. Albida enim existens, de phlegmate fieri significatur. Subnigra autem, ex melancholico humore fit, pallida & subrubea ex cholericis humoribus generat. Vnde in primis malos humores euacuari oportet de aloë & coloquintide catapo-

Ophiasis.

Alopecia.

C **tijs.** Quæ recipiunt aloë patite 2 VIII, coloquintida 2 IIII, Scamonia 2 VII, absinthij succi 2 IIII. Cum succo autem brassicæ facias catapotia, & dabis secundum vires uel ætatem, aut certe gira. Si autem melancholicus humor generat, helleborum nigrum eis admiscebis, aut gira dabis. Si autem cholericus fuerit, scamoniã: purgabis autem totum corpus, & capiti adhibebis purgationem, deinde localibus adiutorijs subuenies eis, quæ diaphoreticæ, uel leptomenis sunt substantiæ. Si autem ea sunt quæ diaphoretica sunt, & extrahere sanguinem possunt, quemadmodum tapsia, optimum utiq; est adiutorium. Radiigitur oportet caput, & fricari considerando. Si enim cum modica fricatione rubuerit caput, cito sanabitur. Si autem post diu, difficiliter sanabitur. Contemplari autem oportet post adhibitum medicamen, ne utiq; per nimietatē plusquam oportet aut competit foris calefaciat cutem. Manifestum est autem hoc rubicundo colore apparente. Superfluari enim periculosum est cutem sapius hoc ipso utendo à nobis, sed transire debemus ut molli utamur medicamento, ut resoluamus uirtutem eius, cerotum aut adipem admiscentes. Adhibenda sunt autem hæc in aëre calido, omnino talia adiutoria sine aura ad solem: in hyeme autem, in balneo. Quæ expediunt medicamenta in tales passiones, calidius est euphorbiū, & post ipsum tapsia, & sinapis, & cardamomus, secundum utrunque modum nec in ullo est minor liministris, aut adarcis, & bernicaron, & ambo hellebori, & erucæ semen, & oleum laurinum, alcionia utraq; uita, & radices calami, & cortices uita, & pix, & cidria siue soricum steracus, & adeps anserinus, & amaræ amygdalæ totæ uita. Hijs ergo fortissimis medicaminibus liquidum cerotum admiscendum est. Imbecilliora autem infundenda sunt oleo laurino, aut liquida pice. Diuturnas autem passiones, & quæ difficile sentiunt, fortioribus medicaminibus curabis. Moderatas autem, & eas quæ facile sanantur imbecillioribus curabis adiutorijs.

#### AD DEFLVENTES CAPILLOS.

C **Adere capillos facit raritas cutis in capite, & unde nutriuntur substantia non supercurrente. Contemplatio autem est sanitatis ipsorum attrahendo sanguinem, & constringere largam pellem per aliqua talia medicamenta, qualia sunt ladanum, & lentiscinū oleum. Hæc per se faciunt: Heliccen enim, id est trahentem & continentem habent ambo uirtutem. Ad inueniri excogitando potest utile quidem medicamen ad capillos cadentes. Mixtus ladanum cum oleo scinino, id est lentiscino, manifestum est, raso capiti pinguis oportet adhiberi medicamentū, tonso uero humidius. Multa autem existente raritate cutis, existimandum est plus utile esse, admisceri pro scinino super ladanum myrtite oleum, & si hoc defuerit, nardinum in frigidis ætatibus, & tempore calido, & in hyeme. Ante medicamentū autem unctionem, fricationem adhibe capiti. Contingit autem ut cadat capilli ex ægritudine sapius: diæta autem ei opus est recuperatitia, absq; medicamine enim multos sanauit perfecte. Est autem & quando sine ægritudine cadunt capilli, in quibus quæ dicta sunt utimur. Aut corticē sambuci incendens, & carbones eius cum cerote admiscebis, & uteris, augmentat & spissat capillos. Quando iam non cadunt, githe in censo uteris, & cū aqua teres, & impones hæc ubicunq; uolueris nasci pilos: maxime autem in supercilijs si non sint, aut palpebris. Quod, si ex igne uitis locis capilli non fuerint, ficus folia uita trita & impofita cum oleo, faciunt nasci pilos.**

QVAE CORRVPANT PILOS  
aut capillos.

**T**Res sunt differentia, quæ corrupendo tollunt pilos, & nudant cutem, & dicuntur Græce psylotra, quæ euellunt & rumpunt pilos ut omnino non appareant. Sed hæc quidem cautam inunctionem habent. Sapius enim non solum si inliniantur loca nuda remanent pili, sed & cætera ex hijs conficiuntur ut nuda permaneant à pilis: alia uero uestiunt se, alia tenuiores pilos faciunt de grossis exire uel renasci, qualia sunt lixiuii à saponarijs. Utiles est & arsenicus, & sandaracis, & calx uiua: fortiora scilicet hæc quæ corrumunt imbecillioribus mixta. Tenuiores qui facit, proiectoria habet uirtutem: horum autem medicres sunt, hordei, & fabæ, & herbi farina, aphronitrum & nitrum. Vsti autem, ad grossos & longos uel duros pilos, uel capillos extenuandos. Vstum nitrum, & ciramidon & glibanum, & ossa ostrearum, & pumices non usti, & usti cirices, & porphyra, uel alia ostrea, uel cochlea usta supiorum, & non usta alcionum, & hellebori utriusq; & brionis radices. Volens autem hæc facere bene olere, admiscebis ciperum, & melilotum, & rosas, & amomum, & schinoantis, & cini ci syluestris semen, terens cum oleo suprafricabis, & cadent capilli, & melle non cocto dropacizas qualem uolueris locum, & non iam renascuntur, & nudum facient locum. Item aliud. De calce uiua partes duas, & arsenici partem unam, hæc mitte in mortario plumbeo, & aquam supermitte aut ptisanæ succum, & cum plumbeo pistillo tere, donec nigrum fiat, & calefacto, & inline. Item aliud. Oriza aut fabam siccam purgatam, aut ptisanas coques in aqua, & succis exinde uteris pro aqua, & admiscens arsenicum & calcem, coques psylotrum secundum consuetudinem, & post hæc admisce smyrnæ & mastiche & pumice asso & v. opobalsamo cochlearia duo, & uteris.

## VT CANI NON NASCANTVR.

**T**olle coloquintidam acrem, & pertunde eam, & de intus purga diligenter, & ita imple eam de oleo laurino, & adde iusquamum & arsenicum, & non teras, sed stet sic die una, & unge exinde semel in anno, & pueris faciet pulchros & spissos capillos. De nucis uero cortice usta & trita cum uino inline, loti uero arboris, quam ros uocant futores, folia eius cum cameli stercore usta, & cum oleo illita, rubeos faciunt capillos, lupini cortices infunde in oleo diebus VIII aut X, & postea inlinito balneo. Si fiat autem arboris ipsius quouis modo decoctio in nigros. Nigros autem capillos inline gallæ decoctione infusa, & chalcanti, & sidiæ, & ladani cum myrtis inunctio utilis sit. Oleum autem ex syluestribus oliuis quotidie illitum, & magis myrtite in hijs infusum, tardius facit augmentum ad crescendo capillos absq; pubertate: Illitum uitis lachrymam cum oleo, & uiridia sarmenta incensa sudantia humorè, cum fabæ farina ex eo cataplasmet.

## DE FURFURICVLIS IN CAPITE.

**F**urfuricula in capite de pessimis exurgit humorum liquoribus. Consideratio autem est ut consumatur hoc ex hijs quæ proiciunt & digerunt medicaminibus, ut purgetur corpus repletum quadam cacochymia. De hinc uolentibus confortare caput, admiscenda sunt stiptica, qualia sunt hijs competentia, furfures cinicos mela infundes in aqua sextario uno, & post fricabis manibus & colabis, & ex hijs succum coques cum acetis media hemina, donec uini pinguedinis fiat, & ex hoc totum caput infundes, & sic postea lauabis in aqua ubi beta fuerint decocta, aut foenogracum, aut lupinum. Unges autem caput olei

Cirini fecibus. Hæc uteris, quia utilissimum & operatiuū medicamen est. Item aliud. De terra cymolia & sulphure uiuo æqualia pondera tere cum aceto, & in balneo inline, & calida lauabis aqua: hoc autem inungi oportet non solum in balneo, sed & absq; hoc. Nam uirtus eius est ad hanc passionem multum necessaria. Item aliud. De lithargyrio, ruta, oleo, aceto corylas quatuor teres, & caput inline. Videtur mihi hoc multum esse utile experimento nimio.

## DE PEDICVLIS.

Generatur sapius in capite pediculorum multitudo de subito congregata in profunda cute, ex superfluitate humorum mediocriter calidorum surgentium. Oportet igitur adhibere desiccatiua medicamenta, & euacuare, & extrahere cōsuetā, qualia sunt cydria, pediculos & lentes occidit, & hederæ gummi uel succus similiter facit. Sed & staphisagria duabus partibus, sandarace & natri una parte, una cum aceto & oleo perungitur caput. Oxylappacij radices cū oleo similiter faciūt, aut helleboro albo & staphisagria, & nitro æqualiter in balneo cū oleo uteris, aut de aqua maritima, aut salmorina acri cū aceto fomētabis.

## DE ACORIS ET CIRIASI.

ILLæ uero quæ uocantur acoræ in capitis consistunt cute, tenues nimis pertusuras habentes, per quas fluit liquor, quod nos tabem existimamus esse: unde & acoræ nominantur. Humor autem qui exinde fluit glutinosus est mediocriter. Similis est etiā ei passio & ea quæ uocatur cyrion. Sed foramina maiora habet, humorē circumtententia meli similē. Cōtemplatio ergo est ut euacuentur qui sunt in locis ipsis humores, & quæ desuper fluunt prohibēda sunt. Euacuabis igitur caput, & ante omnia totum corpus, sicut in alopecijs dicta sunt. Parua enim existente passione, sufficiunt in tales passiones sapius localia adiutoria adhibita, qualia sunt quæ extenuant & digerunt pingues humores. Aliqua autem medicamenta ad eas quæ incipiunt acoras, quando sine aliqua superfluitate est totum corpus, quæ sunt stiptica uirtute, qualia sunt myrtæ, & picæ cortices, & rubus. Aliqua autem resistentes augmentāt acoras, ubi quidem reprimuntur quod supracurrit. Vbi digeruntur quæ continentur, miscendæ sunt eorum uirtutes, qualia sunt myrtite oleum, & rosēum, & sciminum, id est lentiscinū, ciperi, & lenticula. Aliqua autem & mediocriter si sunt in summa localia adiutoria quæ digerant, & projiciant sine sensibilitate caloris, qualia sunt betæ, & uista cymolia. Aliqua autem istis fortiori sunt uirtute, ut etiā euacuare possint pingues satis & glutinosos humores, unde acoræ sunt generatæ, & durissima sunt, & dissolunt eas, qualia sunt sal calceus, & fex uini uista, sandaraca, & calx uiua. Acetum autem utilissimū est in omni tempore ad acoras. Extenuat enim eas, & digerit, & reprimit. Oportet autem acre acetum esse, & nullum in se habeat uini saporem. Cum hoc enim admiscebis aliud ex alio de metallicis, ut farentur acoræ. Suscipere autem cōuenit ad imbecilliores, & maxime si cum doloresint, cymolia. Ergo in hijs utilis est & cidria, & samia, aut pompholix, & spodium, & lithargyrium. Nihil autem hijs peragentibus, diacasti puluis soluit, & linis infusam cum aceto acerrimo. Hijs, si tibi uisum fuerit, addes lithargyrii alterum tantum, & cum aceto miscebis. Non autem inuento diacasto, tūc incendes castam, & cinere illo cum aceto uteris. Hoc autem opus est illis fieri, qui scitofarci sunt, id est duras habent carnes, & non delicatas & molles. Quando autem inflammata acoræ cum dolore surgunt manifestæ, paragoritas eis prius quæ digerant, & malaxent absq; aliqua mordicatione, qualia etrica sunt, id est ad ani dolorem pertinentia.

**A** AD SCABIEM IN CAPITE, ET SYCO-  
des, & acoras generata.

**I**N capite scabies generata, rutam & stipteriam teres cum melle, & lines ab-  
latis capillis, aut sulphur uiuum & staphisagriam teres, & cum pice liquida  
miscibus & inlines. Ad parua autem & spissa & rubra ulcera in capite utili simi-  
lia ex quibus rabo fluit, rades caput, & lini semen teres, & cum melle catapla-  
sma impones. Cōchylia ustulabis, & trita cum aqua cataplasmate impones: Fit  
autem & aliud ulcus in capite, quod sycas uocant, & curabis illud sic: Capita *Sycæ.*  
sardinarum incendes, & bulbis coctis cum cinere suprascripto aceto mixto ute-  
ris illitis.

AD OCVLORVM CAVSAS, DE TARA=  
xi & splendore in oculis.

**T**Araxis, id est cōturbatio de fumo facta uel de caumate, aut puluera ut in-  
tus uisui incidat, requiescit facilius si discedat à fumo, & caput cooperi-  
ant, & discedāt, & in umbra deambulent. Fomentent autē oculos de coctione  
chonion: In primis quidem tepida ex aqua dulci, frigida autem postea, & si  
splendorem fugiāt, & succudant oculos in aëre, hoc modo componentur. Ni-  
hil aliud opus habent, nisi solum ut minus accipiāt cibos, potione uero utantur  
amplius propter æstum. Si autem somnus accidat profundus, & oculorū aliqua  
causa suspecta sit, hijs ergo neq; à balneis remouendus est usus: cibentur autē  
cautijs. Oculorum aliquibus accedentibus doloribus quiescere oportet, & su-  
perungere palpebras de rosis, aut croco medicamine confecto, & hijs non in-  
uentis, tunc lippes & in nocte factæ glutinationes purgantur, & leuigant bene  
depusca loti, & cum ipsa aqua frigida, & siccatum aliquid in oculis ex lachry-  
mis mitius faciendum est: iuuat autem eos & uentris subductio.

DE PHLEGMONE OCVLORVM.

**I**nflammatione cum dolore si oculi fuerint comprehensi, medicinerit labor  
ut sanet. Quod si artifex presens nō fuerit, interim subuenire eis quæ possi-  
bilia sunt beneficijs medicinæ p̄sentialibus, ut nō aliquid pessimum incurrāt. Ci-  
bis ergo abstinentia indicēda est, & requiē adhibere oportet, & ad caput altior si  
at appositio, & lucorē uitare & sonitus uocis, & neq; alijs aliquibus motibus  
dolores augmentet, & pedes fricentur, & cōstringantur ligaturis extremæ par-  
tes. Mitigatis autē doloribus: facit enim ad inflammationes oculorū herba ui-  
lax superposita, & lac mulieris recens cum ouo & oleo roseo extrinsecus im-  
posita. Reumate autē molestante, anacolimā talem facies in fronte: libanū tritum,  
& farinam tritici, & oui albumen mixtum, & altiore habeat appositionē ad  
caput, & requiescat, & ligaturis utatur in extremis partibus. Causa autē existen-  
te ex acirreumate, in chimatizas dulci lacte & oui liquore tenui: lippes autem  
absterges leniter & molli spongia. Magnis autem existentibus epiphoris, id est  
inflammationibus cum doloribus nimijs, cataplasma impones tale. De opio ʒ i.  
rosis siccis ʒ iiii. Croco ʒ i. & supermittes melisota decoctionē aut sapam.

DE CALIGINE.

**S**enioribus autē solet contingere caligo oculorū, & gubernare se debēt per  
frictiones & uectationes, & mediocriter uti cibis & acribus, & caput pecte-  
re, & absinthiū bibere anteq; cibos accipiat, & thymi & origani oxymelitos scil-  
liticos, & inungi hijs quæ ad caligines expediūt. Cōuenit autē & sternutamē-  
ta mouere & caput purgare per apophlegmatismū: de melle autē per singulos  
dies inlinere palatum; ut abundantius proſiciant phlegma.

C

## DE ORDEOLIS IN OCVLIS.

**O**rdeoli autē in oculis nascentes in palpebris fomētandi sunt cera alba ad diaphoresin faciendā. Oportet autem remissam ceram calefactā cum spato melle apponere; digerit enim & galbanus, cum modico nitri appositus. Quīdam autē de pane cataplasma imponūt, & cum soporati fuerint aperiunt.

## DE NYCTILOPIS.

**A**d nyctilopas autē patentes epar hirci assume, & eas ex humore qui ex ipso defluit, dum affatur inunge, & ipsum epar dabis ad edendum, & asinirecentem simum per linteam colabis, & inunges. Viuus autē est, quando in die inculpabiliter uidet, & nocte ueniente peius non uidet.

## AD PERCVSSVM OCVLI.

**Q**uibuscumque ex percussu oculi sanguinolenti fiunt, in initio adhuc in inflammatione existente, oculum columbi sanguis calidus aut turturis inchiomatizatus purgat, & fomentatio cū spongiā, salis modico cum aqua admixto, si non tunica oculi laxa est. Quod si aliquid tale contingat, aqua sola fomentabis. Bene utiq; fit, si cū lana ouum cum oleo roseo mixtum leuiter superponis oculo, & sibi iuridis folia cataplasmate iuuant. Facit autē & oui uitellū in focodurātū, & cum uino tritum cataplasmate impositū. Sed & de solijs brassicae cataplasma impositū similiter operatur. Diuturna autē eorum si permaneat causa hæmalops dicitur, hyssopi autē comam teres, & ligabis cum linteo, & depones eā in aquā feruentē, & leuabis, & appones oculis, & subsequet sanguis ipsum linteū expressum. Consistentem autē tumorem ex percussura, fomētabis cum spongiā frequēter, & sic postea in pusca infusam superpones. Inueterata uero passione facta, sinapē tritam cū aqua appones sine intermissione, & auferes.

D

## AD PILOS ADULTEROS IN PALPEBRIS.

**P**ilos adueros in palpebris nascētes quidā cum burseilla tollūt, & post modicū dolēt amplius renascentibus pingis & pungētibus. Prius ergo quam euellantur, utilius est glutinari eos ad ordinales pilos de pice & gummi. Optimum autē medicamen fiet hoc modo confectū. Mastiche, & cera, & libanū, & pix sicca in unū adunata masticant simul, donec se adunando permisceāt, & facies ex hoc trociscos, & repones, & cū opus fuerit tolles spato melle calefactū, ut resoluat medicamen, & tanges pilos ut glutinentur.

## AD OCVLORVM DOLOREM EX NIVE.

**S**patum melle mittētes in oleo ut coloretur, de succo eius inungimus. Tritum uero super laminam ferri igneam affantes, & terentes cum uino, inungimus palpebras.

## AD EOS QUI IN PALPEBRIS PILOS

non habent, aut quibus ceciderunt.

**S**oricum stercus, & de hirci stercus ure, & de calami graci cinere duplum cum melle miscens inunge. Hoc & melius iuuat, & reuocat pilos.

## AD VLCERA OCVLORVM.

**C**rocum infunde in lac mulieris & tere, admiscens, & gummi albo medicocriter ut contineat crocū, & conficiēs collyria cum lacte mulieris utere.

## AD CAVA VLCERA.

**Y**stineos tere quā tenuissime, & gummi alterum tantum adde, & cum aqua pluuiāli tere, & faciens collyria cum lacte mulieris utere.

A

AD LEUCOMATA, ID

est, albugines,

**A**lbugines cito sanat nitrum cum oleo tritum diligenter, & inunctum; aut sippiz ossa trita & melle conspersa & usta, & trita inunge. Aliqui autem & de succo aminonis utriusque inungunt.

AD MAVROSIN ET HYPOCISIN,

id est, cataractas.

**M**Aurosis autem omnis, & inchoata hypocisis, curantur ita: Vulturis felle partes duas, & prassij succo, & melle attico partem unam, aut maratri succo, & felle tauri recente æqualiter de succo cum duplo mellis, aut felle ursino cum aqua duplo.

AD CALIGINEM OCVLORVM.

**C**apno herbæ succus caliginem oculorum abstergit, ad se trahens non modicas lachrymarum effusiones. Libanotidus quoque & radicis eius herbæ succus melli mixtus caliginem factam ex pinguedine humorum curat, facit autem & prassij succus cum melle. Lactuæ uero syluaticæ succus à reumate & nebula abstergit, & ad usturas facit cum lacte mulieris inunctus: Malogranati dulcis granorum succum exprime, & mitte in uase æreo, & linteo circunda & liga, & pone in sole, donec pinguedinem habeat mellis, & æqualiter ad ipsam mensuram mitte de melle, & commiscens in uase testeo serua. Inueteratum enim melius fiet. Cum autem dormitum ambulaueris, inlines oculos de hoc medicamine leuiter. Hoc autem utilissimum est pictoribus, & aurificibus, & lectoribus, & scriptoribus.

Item aliud: Geenæ felle cum melle attico mixto utere. Hoc enim caliginis abstergit, & inchoantes cataractas reprimat. Inueteratum igitur melius fit.

AD PTYRIGIAM.

**P**Tyrgia, id est, unguicolum si inueteratum iam obduruerit, per chirurgiam curandum est. Parum uero existens, & adhuc molle, curari potest medicaminibus. Ignonoccos, id est, sinicionis succus cum duplo mellis inunctus, & sippiz ossa usta & mixta sali orictus, reliquat & sanat in oculis ptyrgia.

AD TINCTURAM ALBVGINVM,

id est, maculas.

**P**ingues igitur albugines hoc modo curabis: Malogranatorum dulces carnes teres addendo paulatim aquam, & facies ut sint bene tritæ, & ex his unges; nam & de iusquiami succo inunctæ, in xv diebus extinguunt, ita; ut nec uestigium appareat in uno anno.

AD PVLCHROS REDDENDOS OCVLVS.

**P**vlchræ fiunt palpebræ, & maxime hoc fit pueris, & molles habentibus carnes. Stimeos 2 xvi, plumbo usto 2 viii, lipidum calco 2 i, croco 2 i, rosarum floribus smyrnis, nardo indica, pipere albo, libano mafculo, ana 2 i, dactylorum ossa numero xxx. Omnia hæc mittens in olla rudi as fabis nimis, & teres in mortario, quibus addent opobalsami cochlearia 2, teres simul, & sicco puluere utere.

AD REXIN OCVLORVM,

id est, rupturam.

**L**ytho hamatiten fricabis incude cum lacte mulieris, & ex hoc in die sippius inunges. Item aliud: Agni folia teres cum aqua, & alphisæ, & cataplasma impones.

C AD PALPEBRAS PINGVES, ET SVB/  
fanguineas, & miligranij similia habentes.

I Nuerfas palpebras frica cum spato melle calido, aut cum folijs ficus, & cum melle inline, aut de uino austero cum melle mixto superinunge.

AD PSORAPHTHALMIAM, IDEST,  
scabiem in oculis.

M Alogranata dulcia & acydonica, succos eorum coques ad pinguedinem mellis, & linies. Distorticas autem palpebras sanat fici humor illitus, & sale aut nitro utere.

AD DVRAS PALPEBRAS HABEN/  
tes, & difficile mouentes.

M Edullam uituli & ceruiæ quali pondere mixtas, cum oleo roseo cata/  
plasmate superpones, aut terebinthinæ partes sex, & lithargyri partem  
unam cum cera & oleo resolues, & in linteo induces, & superpones.

SI ALIQUID IN OCV/  
los incidat.

A Qua aut lacte in chimatizas lauando, aut melle, aut oleo inunges, lachry/  
mas mouendo, attendat in uino, aut aqua. Quæ autem infixæ sunt, resina  
recenti ranges & tolles, aut capillus fit & maxime hominis, aut porcinus pilus.  
Quæ autem infixæ sunt cum bursella leuabis, & cum lacte mulieris lauabis.

D AD PEDICVLOS IN PAL/  
pebris generatos.

S I autem pediculi in palpebris, aut supercilijs fuerint generati, curabis cum  
melle & uino, inuncta sandarace & staphisagria.

AD EGYLOPAS.

E Gylopas curabis, quibus non in profundo ossis corruptio est, anthemis  
folia, id est, camimolæ, masticata & superposita bene faciunt, aut egyptopæ  
herbæ quæ in frumentis fit, succus eius cum farina tritici cataplasmatum sanat,  
Plantaginis uero folia masticata, & superposita bene faciunt. Post autem si eru  
perit, nucum maiorum nucleus masticatus & superpositus, donec cicatrici eru  
inducat & sanet, ipse ponatur, aut propuleus, & terebinthina cum alica in lin/  
teo inducta, aut stipteria cistis sufficienter resinæ terebinthinæ admixta empla/  
stris apposita sanabit.

AD CALIGIA.

C Aligiati autem euentant digere caprifici cocti, & cataplasmati, aut fici  
folia, aut sagapinum superpositum resolutum cum aceto.

AD AVRIVM PASSIONES.

DE SVRDIS.

H Vmor quidam in aurium poris constipatus, difficultiorem facit auditum,  
ita ut quidam nec audiant. Oportet ergo hos quotidie lauari cum auricu/  
lario clystere, eos quidem qui minus audiunt de aceto albo cum æquali men/  
sura calefacto cum nitro trito; & post hæc iterum lauari aqua calida, & sic inchi/  
matizari hijs quæ ad dyssicorias scripta sunt, qualia sunt hellebori nigri radices  
tritas cum aceto & melle in aurem mittes, & dimittes medicamen usque dies  
quinque intra aurem esse, aut cardamomo quod abunder, & nitro quod suffi/  
ciat, & confestim leuiabuntur.

AD DOLO,



## AD DOLORES AVRIVM

ex frigore.

**D**olores in auribus si ex frigore fiant, quæ calefaciunt sunt adhibenda adiutoria. Curabit citius, si cepe, aut allia in oleo coquantur, & in aurem ipsum oleum mittatur: nam & euphorbij modicum in oleo tepido mixtum, aut piperis puluis diligenter tritus, & cum oleo calido in aurem missus, iuuat. Iuuat autem & amaricinum oleum, & optime nardinum, & rutarium de extenuantibus, & non de oleo stiptico.

## SI AQUA IN AUREM INTRAVERIT.

**S**i autem intra aurem aqua introierit, frequenter oleum tepidum est in aurem mittendum, & sic cum lana molli detergendum, & iterum oleum mittendum est. Mitigat autem & oui albumen quod est lachrymum, & lac mulieris, si in aurem mittatur. Omnia autem quæ mittuntur in aurem calida esse oportet. Sed & adeps anserinus eos bene iuuat. Si autem aliquis in uno pede, qui ex ea parte est quæ patitur stet, & caput in parte ipsa inclinat, & sic cum illo pede facta fiat, multum iuuat: & si aliquis ipsam aurem in quam aqua intrauit, fugat alteri, liberabitur.

## DE AVRIVM INFLAMMATIONIBVS.

**I**nflammatōnes aurium oleum nardinum cum modico basilico resolutum, & in aurem missum, iuuat. Quod si nimij dolores surgunt, necesse est hijs uti quæ stuporem faciunt sensui. Muliebri ergo lacti admiscens oui lachrymum, opium miscebis. Misce autem & castoreum, ad nimios dolores æqualiter, ad leniores autem duplum. Liquida autem sit sapa in qua soluantur. Preparari autem utile est ex multorum admixtione medicamen. Oportet autem nullo modo tangi aurium poros, quando dolores insunt. Fouebis autem cum spato melle, ligatam habes in summo lanam mollem, & sic cum eo medicamen in aurem fluere facies tepidum, illitum spato melle super initium auris porotenus, ut sic in profundum decurrat. Hoc frequenter & sine intermissione facies, & quod cucurrit extrinsecus, in quantum possibile est non tangat, sed intro tantum penetret, quantum suscipit quod mittitur. Repleta autem aure medicamine, deforis lanam mollem super initium poris, & super totam aurem impones. Post fomentationem autem, sicut dictum est, cum nardino oleo mixto basilico, qui & tetrapharmacum dicitur, & extrinsecus cum molli lana appones. Aestatis autem tempore existente calore, pro oleo nardino roseum mittes oleum ad fomentandum.

## SI EX PINGVI HVMO

re sit dolor.

**Q**uod si pinguis humoris, aut glutinosi, aut ex uentositate spiritus suspicaris esse aliquam mixturam & constipationem in aure, artificiose conijcere debes in tali causa quæ precesserint dolorem, & quæ sint præsentia, multa agente aërum uel ciborum qualitate. Ad frigora autem præcedentia, uentositas inflans consistit, & diæta caco chymia & phlegmatica, & signa sunt, grauitate capitis existente, pingues inesse humores. Hijs accedentibus, nitrum & aphronitrum ad aurium passiones mixtis medicaminibus, & album, & nigrum helleborum, & amygdalas amaras, & aristologiam, & cucumeres syluestres, & brionia radices, & alarum, & draconteam, & ireos, & centauream minorem. Hæc enim purgant poros aurium & extenuant, quæ ex spissis humoribus constipata sunt. Leues autem & non pulsantes inflammationes abundantes, sanantur oxyrodino adhibito tepido, & glaucion si in cute medicinali fricatur cum aceto. Quæ autem extrinsecus

Tetrapharmacum.

**C**rinifecus aurium apparent inflammationes, uel tumores, aut rubores, ex superfluentibus humoribus, aut ex percussura facta, lenticulam in aqua coctam teres cum melle, aut cum adipe anferino, & butyro, & myrrha mixta superpones.

## AD AVRIVM VLCKERATIONES.

**V**ulnerata aures uel ulcerata, & pure ex eis fluente curantur glaucio cum aceto. Quando autem cum reumate fit passio, ex trociscis, id est, andronio, aut polido cum aceto ueteris. Quod si pus currat absq; dolore, non minus ipsis ueteris. Nihil autem iuuantibus, quæ fortiora sunt adhibebis, ferri squamas subtiliter tritas, & in aceto acerrimo coctas, donec glyum, aut mellis spissitudinem habeant, & sic ueteris.

## AD PERCVSSAS AVRES.

**V**ulneratis auribus uel ulceratis panis calidi interiora eius teres cum melle & pones, aut smyrnam cum uino ueteri teres, & inlinies, aut de cochleis carnes teres, & cum smyrnæ misceris medietate, & superpones. Oportet autem hæc non frequenter auferri, quæ superposita sunt.

## AD FRACTAS AVRES.

**A**D fractas autem aures, smyrnis, mannis, libano, aut gessamia bene aduata cerotum facies pingue & impones, nullo modo turbantes locum, aut sulphur uiuum, aut libanum cum pice liquida in linteo induces, & superpones.

## AD AVRES INCLINATAS.

**Q**Vorum autem inclinauerint se aures, de terra unde figulus uasa facit intrinsecus eas implebis. Cum autem siccauerit, uix caninæ succo cum psymithio inlinies, donec resideat & componat se causa.

## AD HAEMORRHOIDAS SANGVINIS fluxu de auribus factas.

**S**I sanguis de auribus fluat, ut non thrombos faciat, porri succo cum aceto in chimatizabis, deinde autem constringes sanguinem, rubum & gallas in aceto coquens, succum earum colabis & in chimatizabis, aut malogranata in aceto coquens, succum eius similiter misceris, & in chimatizabis.

## AD AVRIVM TINNITVM.

**Q**Vibus enim de subito sonus aurium fit, aceto cum oleo roseo in chimatizabis, aut cymino & oleo ad mellis spissitudinem facto, aut de succo radicum syluestris cucumeris in chimatizabis. Si autem perseverans sonus diu permanferit, inclinabis patientem in lecto, & nitri triti puluerem in ipsam aurem mittes, & acetum acre tepidum supermittes. Si autem ex ægritudine sonus aurium fuerit generatus, absinthij decoctione fomentabis, & oxyrodinum miscens inijcies in aurem, aut ex succo foliorum raphani cum oleo roseo, aut porrorum succo cum lacte muliebri, aut cum oleo roseo, aut succo foliorum agrestitis cucumeris in chimatizabis.

## SI IN AUREM ALIQUID fuerit ingressum.

**Q**Uod si in aurem lithargyrium, aut faba, aut foenum, aut aliquid huius simile fuerit ingressum, in uolues spatio melle summum de lana, & ligabis, & sic in terebinthina intinctum in aurem mittes, & leuiter quod in aure est adglutatum trahes. Non autem obaudienti, omnino sternutamenta mouebis, in naribus adhibito puluere. Hoc autem frequenter facies donec exeat: Donec autem intus est in aure, si inflammatio, aut spasmi accedant, & si animal fuerit quod ingreditur in aurem, scamoniâ resolues cum aceto, aut absinthij succo, aut peucedano: aut sulphur & nitrum cum succo raphani, & immittes.

**A** AD VERMES IN AVRE GENERATOS,  
aut in poris, aut in cæteris locis.

**A** Vrium vermes innatos mittes aut cappariss succum, aut calamentis succum, aut helleborum album cum uino multo inquinauizatos. Ad sordes uero factas in auribus nitri assis puluerem mittes in aure, & acetum non mittes, & cum lana claudes, & tota nocte sic permittes. Post triduum uero lauabis cum aqua & oleo calido.

AD AVRES HUMIDAS.

**M** Yssa os allum in linteo ligabis, & teres, & insufflabis, aut gallas teres assas similiter, & uteris; aut stipteria assabis, & teres, & oleo suffundes, & insufflabis. Si autem supercreuerit caro in auribus, auferet hoc citius sex uini cum calce uiua, & lixiua de saponarijs trita diodis modo cum lana & spato melle appones.

AD PAROTIDAS.

**N** On sicut in alijs membrs inflammationes habentibus utimur in parotidis quæ supprimunt; contrario autem ad parotidas adhibenda est curatio, sed ea quæ adtrahat, quod Græci electicium uocant. Festinamus igitur qui molestant humores ex profundo trahere ad cutem, & cooperari consentiendo nature ut apostema fiat, & erumpat foras, ut febris amputetur quæ molesta erat, ut requiescant: permittentes mitigantes tantum & digerentes humores in pus uersos, & euacuare festinantes. Duritia autem si uideatur esse, permiscemus malactica electicis. Mediocres autem parotidas, quibus neque plenitudo est quæ supercurrat, neque dolores sunt uiolenti, neque puris apparitio certat, sanamus fomentationibus de salibus, & cataplasmate, & medicamentis diaphoriticis, qualia sunt siue pnafeos, aut diachylon, & eorum quæ sunt malactica cerota de butyro & hyslopo confecta, citricis usita, & porphyrarum coctæ, & ostrea in tales duritias & diuturnas parotidas superposita iuuant: Fiunt enim sine putrefactione & sine mordicatione medicamenta, & non solum ipse cinis ipsarum, sed multo magis si uetus adeps porcinus absque sale admisceatur. Sine molestia enim digerit hoc omnes diuturnas inflammationes, utique reumaticas existentes sanat. Iuuant autem & scirominas parotidas carica cocta in aqua maritima, aut salmoria, similiter & lupinorum farina cocta cum mellis modico calcem uiuam admiscentes cataplasma imponimus.

AD NARIVM PASSIONES.

**C** ommunis curatio ozina & polyporum est, desiccare prius, & corroborare caput oportet. Superponenda sunt ergo aut dianimonis emplastrum, aut de cochleis, quod hoc modo conficitur: Smyrnis & lybano, ana  $\zeta$  i, cochleas minutas & albas de petris diacosias, id est, ducentas, & collectas seruabis eas die una, ut euacuentur stercora, & postea ouorum albumina duo mittes in pilam, & miscebis omnia simul, & inlinies caput, & pones linteum super, & sic sit usque dies viii, & postea localibus curis uteris.

AD POLYPOS.

**P** olypo igitur medicamen de succo malogranati utimur. Satis enim magnifice iuuat. Mittes autem æqualiter secundum magnitudinem, & numerum de austeris, & acidis, & dulcibus malogranatis recenter maturis, & confringuntur tota in pila, & exprimes succum eorum, & colatum mittes in uas stanneum. In primis modicum bulliat, ut appareat competens liquor. Illa uero quæ remanserint ex eis tundes diligenter, & teres iterum in mortario totum, & facies collyria similia qualia nares recipere possint eius qui patitur ubi polypus est. Sine mordicatione

C dicatione enim, & absq; passione eius operabitur: siquidem humidior & infu-  
sior esse uidetur, tantum malogranata austera amplius mittes. Si autem durius  
fuerit & acidum, & si grauamen fecerit collyrium adhibitum, aut semper accen-  
datur, incidere oportet secundum usum, & in quo tempore non mittitur colly-  
rium, expresso succo utere in patientibus locis. In linies interioris in ore palatum  
per uuam, si illic ipse apparebit polypus cum lana, aut cum penna. De lana uero  
inuolues spatium mellis, & sic in succo intinctum adhibebis, & diaphragis confe-  
ctum medicamen consumit polypum, quamuis spissus sit, diuturnis adhibitus  
temporibus. Si autem alicui nimis spissus est, & hæc mordicationem facit, rosæ  
tritæ puluis adhibitus mirabiliter iuuat. Qui molles & humidus habent carnes,  
manifestum quia frequenter oportet talia omnia adhiberi. Leuari autē ex ipsis  
liquidis humores necesse est. Quod si in poris narium ulceratio fuerit  
facta, acurabuntur andronio trocisco, aut poliodore solutis cum uino, quando qui-  
dem cum dulci, aliquando autem cum austero, sapius autem cum aceto. Si quan-  
do ergo acer humor supercurrit in narium poros, difficilius ad sanandum ulcus  
existit, etiam si sine odore malo sit. Si autem cum acredine & putredine sit quod  
supercurrit, ozinæ fiunt. Curabuntur autem hæc calamentis succo frequenter  
adhibito, aut ex ipsa calamenti sicca puluerem cum fistula insufflabis, aut pulue-  
rem cum melle in naribus adhibebis, & sternutamenta mouebis, ut crustæ ex ul-  
ceribus cadant, hellebori albi puluerem, ut sternutet, facies ad se naribus trahere  
patientem, & post hæc tanges de fecibus cum melle, & linies poros de calci-  
theo, & calcanto cum melle. Si autem uetusta sint ulcera, & acetum acre mittes.

A D F L V X V M S A N G V I N I S

D

de naribus.

Q uod si ex plenitudine sanguinis adaperiuntur uenæ narium, mouetur fluxus sanguinis mortem interminando: Hoc ergo tempore, uocant simpli-  
citer anagogen. Si igitur fluxus & facile ferat patiens, & sufficiat uirtus: Sim-  
minus, & defectio, & angustia fiat, iuuandus est. Quod si accedat fluxus sangui-  
nis, & sæpius releuatur ex fluxu sanguinis, & conturbatur, nulla est assumenda  
materia quæ reprimat, Si autem nimia sit effusio sanguinis, & angustietur, & fri-  
gidus fiat, & deficiat subtractus pulsus, & citatus fiat, oportet festinare ut ad-  
iuuetur infirmus celerius. In primis leuius agendi sunt à fortioribus adiutorijs,  
interdū & prohibenda aliqua. Non enim similiter pulsant in passione meningæ,  
sicut non patientibus. Si igitur passio augmentetur frequenter, & nihil sit quod  
prohibeat, phlebotomus adhibendus est, ut obtundatur uiolentia frequens effu-  
sionis sanguinis, consentiēte natura ex consuetis locis. Quod si aliquid sit quod  
prohibeat, & quædam plenitudo effusionis sit, multa cum spongia tentandum  
est reprimere sanguinem. In primis igitur cum aqua frigida, postea autem cum  
aceto admixto adhibeatur, & post hæc cataplasmas de rebus stipticis nares,  
& facies de samuco & aceto mixto, aut de uua, & libano, & mannis illita ea lo-  
ca quæ circa patiuntur, & in naribus adhibebis succum porrorum, aut cepearum  
cum ouo, aut libanum cum uino tritum, aut mannam in naribus mittes, aut lepo-  
ris pilos, habentes aliquot limnias, aut calcitheos affos, aut stiperia sciftis, aut  
miseum assum singillatim admixtum. Quando autem adinuem omnia sunt  
adhibenda, & membranam ouorum assabis, & sardinarem capita ures, & cinis  
earum cerebro imponatur, id est, in bregma & coopertura ollæ capillis subleua-  
tis de uertice: Vel ante, iuschiamo 2 I, castoreo 2 III, gummi 2 II utere.  
Sanguifugas quoque ures, & cinerem earum cum aceto ceres, & in linies.

## A D CATARRVM DE CA

píte fluentem.

**C**atarrus neglectus multas causas malas facit: Inflammantur enim garga-  
reon & antiada: de hijs mediocriter, & tussés accedunt diuturnæ, & passio-  
nes non parua. Aliqui etiam ex hoc sanguinem expuunt, multi ex catarro &  
pus iactant, & pusilli fiunt, & uoce turbantur. Oportet ergo curari omnes qui  
catarrum patiuntur, mox minus sunt accipiendi cibi, & potio minus est mini-  
strandâ, & oleo irino facies inungi bregma, & infundi ex decoctione rutæ &  
oleo laurino. Componit enim hoc & impinguat quod liquidum fluit. Iuuat au-  
tem ut inuoluatur caput, & cooperiatur, & supinus non dormiat. Supinis autem  
iacentibus facile in arterias liquidus humor descendit, & ad pulmonem uadit.  
Oportet autem eum gargari, quæ sunt stiptica, aut rosas in aqua coctis, aut  
lentisco, aut certe pusca. Non est autem malum in nares deriuare catarrum odo-  
ribus de gitter & aniso, & in nares infundere gitter cum aceto tritum, & betarū  
& anagallidis succos: Fluet enim ex hijs humor, qui in pulmonem fluens gene-  
rare habebat passionem. Coryza autem modice molestante, componitur facile  
oleo irino, aut laurino illita, & lygij semen in oleo coctum, & rutæ semen, &  
uelamen, & inedia.

## A D STERNVTVS FREQUEN

tes, &amp; coryza.

**G**itter teres, & puluerem in linteo raro ligabis, & fricabis manibus, & nari-  
bus ut odoret appones, & ad se ducat odore: Iuuat thymus in sinu inuo-  
lutus, & in cineribus coopertus, & cum se assauerint teres, & uidebis odorem  
ad se ducere naribus, aut smynam in uino odorato resolues, & inlinies nares  
pinguissime.

## A D LIVORES MAXIME IN OCVLIS.

**H**ypopiâ, id est, liuores fomentari oportet de mellilotæ & fenograci deco-  
ctione. Post fomentationem uero resolutum collyrium nilo diarodon ex  
fomentatione supra scripta, aut certe collyriū diasmyrnis, de uno ex eis collyriis  
inunges. Sic enim curabis hypopiam in oculis, si non fuerit diuturna omnino.  
Quod si nimis diuturna fuerit, oportet fortioribus diaphoreticis curari quæ in-  
scripta sunt.

## A D INITIANTEM HYPOPIAM CVRATIO.

**I**nitiantem hypopiam recens caseus superpositus cataplasmate curat, aut fa-  
rinx farina cum melle mixta, & oui uitellum similiter cum melle facit. Quæ  
autem diuturna, & iam nigra, aut liuida sunt, de raphanis cataplasma impones,  
& tolles liuorem: nam si quando incipiunt hypopiæ imponas, mordicationem  
facit. Qui autem cum inflammatione sunt liuores, fomentabis aqua calida, &  
cataplasma impones de lenticula cocta, & trita cum melle. Si autem cum incisura  
sint liuores diuresi facta, quæ cruentis mulieribus adhibentur appones, & ma-  
xime si pus mouere uis, tetracharmacum, & de foris cataplasmate impones ea,  
quæ sine uulneratione imponi diximus.

## A D IONTOS.

**T**vmores duri & spissi qui uocantur ionti in faciei cute consistentes, curan-  
di sunt ex hijs quæ molliunt & digerunt. Mellis igitur atticis cyathum unū,  
& aceti acris cyathum unū miscabis, & inunges diligenter iontos, & cum digito  
fricabis, aut stipteria sciftis teres diligenter, & supermittes terebinthinam, & ma-  
T laxabis,

C laxabis, & sic superpones. Ad diurnos autem iontos, & callosos factos saponis gallici 2 IIII, amoniaci 2 I, libani 2 I, aqua resolues, & facies ad spissitudinē cerotī, & inlines iontos, & una hora transacta lauabis cum aqua tepida.

Item aliud: Nitrum & gummi album æquali pondere cum aceto resolues, & terens diligenter facies trociscos, & siccabis in umbra, & cum opus fuerit cum aceto resolues & inlines. Cum autem siccauerint, cum saponē lauabis, facit hoc & ad octodes passiones, & ad pruritus in facie. Item aliud;

Libani 2 II, Lithargyri 2 IIII, Salis triti 2 II, Sandaracæ 2 II, Solues & ponēs cataplasma.

AD EOS QUIBUS IN BARBA

fycofes surgunt.

Lithargyrum & miseum crudum æqualiter teres, & inlines, ut glutinet, hinc tunica sola inlines caput, nimis ualidum elaterium salis orictus miscebis, & cataplasma impones, cum spato melle liquidū medicamen. Post medicamen autem superponi opus est lini semen tritum cum aqua: Liquidū autē existente ulcere, à quo aqua munda currat, utere andronio trocisco. Exantimata autem in facie, ferro calefacto superpones lignum paliuri, & quod ex illo defluet tolles & inlines, aut mirtū teres cum uino, & inlines, aut calcantū aceto solues & inlines.

AD EPHELIDAS, ET PILOS,

& lentigines.

Ampehuagias & ephelidas, id est, maculas & pilos, & quæcunq; talia sunt in cute summa, curat amygdala amara: maculas purgant & radices ipsius arboris coctæ, & cataplasmate impostæ. Costū ad maculas facit cum hydromelle, uitis syluaticæ botri, ephelidas & pilos, & quæcunq; hijs similia sunt in cutis summitate facta sanant. Brassica maculas & lentigines, & quæcunq; hijs similia sunt medicocria purgat. Ossis pippæ ustum, ad maculas & lentigines facit.

AD ILLUMINATIONEM ET CLARITATEM,

& bonum colorem in facie præstandum.

Cucumeris domesticus & maturus illuminat corpus, & maxime si siccetur semences eius, & postea tundantur & cernantur, & sic utaris. Crocodili terrei sterces lucidam & tenfam sine rugis facit faciem. Similis est autē ei & de sturnis sterces, quando solam oryzam manducant. Projiciunt igitur & maculas cucumeris agrestis radices contusæ, & coctæ cum aqua, & tritæ, & cataplasmatæ extensam faciunt cutem faciei & albā. Similiter autē & brionis radices in oleo coctæ & illitæ, lucidum uultū: de herbo farina cum uino odorato trita, cataplasma impones. Item de simila succos facies & colabis, & infundes liquorem, & ipsa mensura admiscebis ouī albumen donec fiat mellis consistitudo, & ex hoc lites faciem si uolueris in sole. Quod si ad solem feceris lauari facies aqua frigida multum, facit autem & terra alba illita, & maxime mastiche cum ipsa.

AD BONUM COLOREM FACIENDUM

in facie, uel in tota corporis pelle.

Cinere cupressi & ilicis simul seruefacto, inlines totum corpus.

SI A SOLE VRATUR.

Et si à caumate ustus fuerit, sanat bulbus albus cum melle tritus & illitus.

AD SUBASCELLAS MALE

olentes & sudantes.

Destipteria sciftis 2 I, smyrnis 2 II, acacia 2 III, mastiche 2 I, teres cum aqua & leuabis in attico uase, & cum opus fuerit deterges locum, & uteris.

**A** uteris: nam si smyrnion cum stipteria & uino odorato teras & in linas, sanabit.

AD ORIS BONVM ODOREM FACIENDVM.

**T**ollit malum odorem oris uinum cum smyrnio solutum, & ex eo uino os lauatur frequenter, & hynantius tritus & masticatus similiter. Masticant autem alij ireus, aut anisum.

AD LABIA SCISSA AVT FISSA.

**G**alla asiana trita puluerem superpones, terebinthina, aut yfopo, aut mele in lines. Quod si profunda fuerint scissurae, in lines caprino seuo curato, aut bouino, aut adipe anserino.

CEROTVM AD LABIA QVANDO A  
uento aut frigore scinduntur aut finduntur.

**D**Ecera  $\approx$  I, medulla ceruina  $\approx$  III, oleo roseo & nardino ana  $\approx$  V, remittes & utere. Item ut neq; labia, neq; facies ab hyeme scindatur, & exanthimata, dicitur enim hygiraton, terebinthina  $\approx$  III, cera terrena  $\approx$  I &  $\approx$ , oleo roseo  $\approx$  II. Conficies haec omnia & utere.

AD DENTIVM PASSIONES.

**Q**uando ex senectute dentes laxant, parua est ad haec curatio per stipticas species, quae gingiuas possint constringere circa dentes. Quando autem ex alia aliqua causa mouentur, contemplari oportet, si humectationes multae laxent neruos qui continent radices eorum, & si hoc est, oportet medicamentum adhibere quod desiccet. Stipteria ergo rotunda cum salis duplo asperges super dentes, aut pteleas arboris folia in uino coques, & facies teneri in ore.

PVLVIS AD DENTES LAXOS.

**B** **G**alla asiana  $\approx$  II, smyrni  $\approx$  I, malgranati corticibus  $\approx$  II, acedonica  $\approx$  II, facies puluerem & utere. Item alius puluis: Ossibus sippiae  $\approx$  III, stipteria scistis  $\approx$  I, acoris radice, libano, smyrnio ireus, ana  $\approx$  I. Haec puluerabis & utere.

AD DENTES LAXOS ET NIGROS  
factos, & ad reumatismum.

**G**alla asiana  $\approx$  II, stipteria scistis  $\approx$  I, ireus  $\approx$  I Terens puluerem facies & uteris. PVLVIS AD DENTES LAXOS & gingiuas commixtas.

**C**vm digitis appones salis amoniaci  $\approx$  II, stipteria scistis  $\approx$  II, smyrni  $\approx$  I, facies puluerem & uteris.

AD DENTES COMESTOS VEL FORATOS.

**D**esuper currente humore acre in dentibus efficitur. Manifeste igitur & hijs hoc expedit, quod eis desiccet cacochymum humorem. Plurimum enim existente tali humore, in primis capitis prouidenda est curatio, deinde corporis totius. Minuara igitur cacochymia localibus subuenimus adiutorijs. In initio ergo stipticis quae reprimant utimur super currentem humorem. Saepius enim ante inflammationem hoc si adhibeatur, sanus fit patiens. Inflammatione autem remota, quae sine mordicatione calefaciunt & euacuant utimur. Doloribus autem neq; remotis ab eis, ea quae nimis calefaciunt adhibemus, qualia sunt piper, fex uini uista, peretrum & euphorbium. Imponere autem aliquid ex hijs oportet in cauatura dentis, & aliquoties narcoticis eis, qui insomnietatem per nimios patiuntur dolores uteris. Gallam quoque tritam cum licio, aut terebinthinam supermittes, faciens quod possit in cauatura teneri, & ante purgabis foramen, aut carcius cum opio miscebis, & pones in foramine dentis, aut peretrum cum smyrnio,

**C** nio, aut opio cyrenaico, & pipere æqualiter cum galbano. Ad commixtos uero molares dentes gitter friges, & terens cum aceto acri cataplasma impones in foramine. Et si non adhuc cõmixtus est nimis, helleborũ nigrum ad herbi magnitudinem cum melle cocto superpones. Iam autem nigris uel liuidis factis dentibus, ex desuper fluente humore, pessimũ hoc uitium est. Sed hoc patientem similiter curabis, sicut & commixtos dentes. Dolore uero dentium cõmixtorum existente, caraxabis, & postquã caraxaueris dentes, sic apophlegmatizabis bene dentem dolentem ex hijs de quibus conluitur dens tepidis, & post hæc in balneo cidriam facies in ore tenere donec perlauet, & cum se deterferit, sic expuat medicamen, & mox sine dolore efficietur. Manifestum est enim.

PVLVIS AD DENTES COMMIXTOS.

**D** E cornu ceruino usto libram I, salis amoniaci librã I, mastiche ʒ II, squinoanto ʒ II, pipere ʒ I, costo ʒ III, folio ʒ III. Confrices omnia simul, & utere.

AD DENTIVM DOLOREM.

**D** olent igitur dentes sine inflammatione gingiuarum, quando quidem ipsum corpus dolorem habet. Quando autem nerui, qui dentes constringunt, uel ligant dolent, hijs fortiori opus habent medicamine, seu quod reprimat, siue quod digerat causam, siue humores, siue uentositatẽ spiritus ex speciebus & quamplurimæ earum cum aceto conficiuntur acri, quã cum uino aut aqua coquuntur. Plantaginis radix, & masticata, & cocta, & in ore tenta, & myrtæ cymæ cum aceto coctæ, aut quinq; folij radices coctæ in uino, aut galla asiana in aceto cocta, & in ore tenta, sed abundantius cocta, & helleborus niger cum aceto non satis coctus, & in ore tentus in parte ipsa, aut capparis de radicibus cortex. Quibus autem ex frigore dolent dentes, peretri radix, uini fex, pini cortex, hyssopus, staphisagria, pulegium cum oxymelle coctum, iusquiami semen & folia cum aceto, aut asinæ lacte in ore tentum, hoc & laxos dentes confirmat. Fomentatio autem extrinsecus fiat de salis saccellis aut milij, aut panitij, calefactis saccellis. Ipsum autem dentem fomentabis cum origano sicco in oleo feruente intincto, & super dolentemposito, aut origani triti cum nitro superasperges puluerem gingiuũ & dentibus qui dolent, & mox omnem auferet dolorem. Purgari etiam oportet caput de staphisagria masticata cum pulegio, aut alij spicis quinq;. Myrtæ nigra folia modico cum aceto agitabis cum spatula tedæ, & coques usque ad medietatem, & dabis ut gargarizet, & sic expuat ore apertop hilegma, & peretrum mastigatum similiter faciet.

AD DENTIVM DOLOREM.

**D** E pipere ʒ III, stipteria scisti ʒ III, peretro sicco ʒ II, iusquiami semine ʒ I, teres, & mittes acetum, & facies trociscos. Purgabis autem dentem, & trociscum tritum cum aceto dabis ad lauandum os tepidum. Probatum enim est.

AD MOLARIVM DENTIVM DOLORES.

**A** dmolares dentes, de tritici farina ʒ II, cum succo titimali miscebis, & super dentes pones, & superpones hederæ folia, & permittes una hora stare & tolles. Sponte enim componitur aut minutatur. Item aliud ad molarium dolores dentium, si sponte a seipsis cadant. De peretro & staphisagria ana ʒ I, cidria ʒ III, sulphure uiuo ʒ III, pipere grana XII. Hæc simul teres in sole, & mittes in pyxide lignea, & cum opus fuerit caraxabis dentem & superpones, & alleuabitur.



A

## AD IMBECILLOS DENTES

uel molares.

**M**El & ceram æquali pondere in sole calido cum aqua resolues, & picis mediã partem admiscebis, & dabis ad masticandum. Si autem minus terur medicamen, & siccum sit uel durum, modicum admiscebis olei. Bene autẽ facit & mastiche, qui illud masticat. Quibus autem terunt se dentes uel ut mollescant, indurandi sunt de stipticis medicaminibus & confortandi: Quod si dentes expauescant, sanat andragnis masticata, aut succus eius in ore tentus.

## AD INFANTES QVIBVS

nascuntur dentes.

**I**nfantibus quibus dentes nascuntur & dolent, lacte catulæ inlines gingiuas, Iaur de leporis cerebro inlines. Facit etiã & si manducetur. Si autem cum difficultate dentes nascuntur, cipro cum oleo rosino & butyro inlines ubi nasci habent dentes.

## AD DENTES DENTIFRI,

cium ne doleant.

**T**ritimali radices coques in uino, ut ad medietatem reuertatur, & bis in mense ex hoc lauabis os & dentes, & nunquam dolebunt. Optimum autem est, & ad conseruandos ut non doleant, & confirmentur, & honesti fiant, quod subter scriptum continetur smegma. Caput leporis ustum teres, & ex puluere ipso fricabis dentes: aut salem cum melle teres, donec ceroti habeat qualitatẽ, & in linteo mundo ligabis, & ustulabis, & sic admiscebis ireus modicũ, & utere.

## AD CLARIFICANDOS DENTES.

B

**O**strearum ossa, & ciricon, & porphyron ures, & cinere earum uteris non satis trito. Pumices autem, libanũ, & ostrea similiter cum sale usta faciunt. Facit autem & ad dentes hic puluis, & est multum operatiuus, et humiditas & infusas gingiuas desiccatur. Ossa sippiæ non usta trita, similiter illuminant dentes.

## PVLVIS AD NIGROS DENTES ILLUMI-

nandos, & putridos dentes, & gingiuas reumaticas  
condensat & desiccatur.

**D**e marmore cocto ʒ ii, ossibus sippiæ ʒ ii, pumice albo ʒ ii, staphisagria ʒ i, sulphure uiuo ʒ i, folio smyrni ana ʒ iii. Teres diligenter & utere.

AD GINGIVAS REVMATIZANTES, ET  
cõmixtos & laxos dentes, & ad cancos in ore facit.

**D**e calcitheus ʒ xii, cathmia ʒ viii. Calcitheus quidem in carbonibus assabis. Cum autem coeperit rubere, tolles, & miscebis cum cathmia, & addens acetum teres diligenter, & cum siccauerit, facies puluerem & utere.

Item cornu ceruinũ & caprinũ illuminat dentes, & infusas gingiuas desiccatur.

Item ad dentes smegma, quod illuminat & bene nitidos facit, & infusas gingiuas extenuat, & comestas replet. De cornu ceruino usto libras ii. Salis amoniaci libram i, & ʒ iii costõ, mastiche, libano, ana ʒ ii. Squinoanto ʒ iii, folio, smyrni, ana ʒ ii, rosis siccis ʒ i, cipro ʒ iii, & utere.

## AD GINGIVAS INFLAMMATAS.

**A**d gingiuarũ inflammationem cum dolore existentem, optimũ est oleum scyminũ, id est, lentiscinũ in calida aqua calefactum & in ore tentum. Sit autẽ oleum nouellũ, & duplici uase calefactũ; Reprimit enim sine asperitate, & digerit sine mordicatione. Horũ maximus usus est ad inflammationes. Facit autẽ

C & ad dentiū dolorem, ut supra, proprie acetū, in quo cocta est iulquiami radix,  
AD RHEUMATIZANTES GINGIVAS.

**A** Rheumatizantes autem & comestas gingivas, cum tumore & dolore, & putredine, optime facit fomentatio hæc: in spato melle lanā in capite eius circumuolutam ligabis, & in feruente oleo intinges, & appones gingiuīs donec foris æquetur, & albedo circa in gyro fiat. Sic enim caro quæ comesta erat nutritur. Post hæc autem uteris puluere dentifricio, quem conficies sic: Galla asiana trita. Cui addens mirrhæ ad fabæ magnitudinem, teres & puluere utere. Ad gingiuas autem adpones calcantū & smyrnis æqualiter cum melle & modico sciftis. Comestis autē gingiuīs optime facit stipteria humida cum duplo salis mixta & apposita: Sciftin & stipteriam & myrtam teres cum melle & inlines.

AD ORIS DIVERSAS PASSIONES.

**S** I in ore inflammatio fiat, & totū corpus uideatur esse plethoricum, hoc est, repletum sanguine, aut cacochymum, id est, repletum diuersis humoribus. Si plethoricus est, phlebotomandus est. Si cacochymus, catarticum secundum humorum qualitatem adhibebis. Sed & per clysterem uentrem subduces, & abstinentiam ciborū indices. Quod si nihil humorum fuerit aliquid tale, localium curarū adhibebimus medicamenta. In initio quidem quæ reprimant de stipticis & frigidis speciebus, qualia sunt diamoron, quod accipit omphacion, aut rosarum flores, aut ipsas rosas siccas, balauitiā & cytisum, & gallam asianam, & stipteria, & rorem, & glaucion, & decoctionem myrtæ, & gillum, & rubum. Post hæc autem initiante cura, cum iam restat quod supercurrerebat, solum sufficit diamoron, croco & smyrni admixtis, quod digerat inflammationem. Digesta autem iam inflammatione, diaphoretica admiscenda sunt, qualia sunt nitrum, & aphronitrum, & sulphur uiuum, quod est omnibus fortius. Interdum autem sapa, aut mullam ei admiscebis, aut in pulsa ubi coquatur origanum, aut hyssopus, aut pulegium, aut thymus, aut satureia, aut calamentis. Considerabis autem quæ media sunt uirtute medicamenta, aut in unū miscebis ea quæ expediunt. In statu autem inflammationis, modicū uti oportet ad os pertinentibus medicamentis, ad lauandum uel gargarizandum mitigatorijs, quæ digerant inflammationem: Qualia sunt quæ fiunt de caricis, & fursurum decoctione, & lentiscino oleo in duplici uase tepefacto. Sed & ea quæ stomachica sunt. In statu causa posita, quæ gargarizari possunt, quædam admiscenda sunt: Qualia sunt aquosa mulla, & calida sapa. Non autem hoc inuento, calidam aquam admiscebis. Hoc ergo memorauit, ut facilius de præsentī quæ inueniuntur materiæ faciliores, conficere ipse tibi possis medicamenta.

AD VLCERA IN ORE FACTA.

**S** I autem ulcera in ore, aut ex inflammatione, aut sine hac facta fuerint, si fue-  
rint infixæ, quæ fortiter deficcant medicamenta sunt adhibenda: Quale est defrigis, & per se siccum, & cum melle adhibitum, cuius confectio hæc est. Confectio enim defrigis quod dicitur medicamen, non est proprie species una, sed mixtū ex quatuor speciebus fit metallicis. Chalcanthū, chalcitheum, chalcecaumenū & miseum, æquali pondere singillatim trita cum aceto, & siccata penfabis, & miscebis in unum, & iterum teres cum uino donec glutinetur, hoc est, pingue fiat ut mel, & sic in ollam nouam mittes, & cooperulo claudes, & creta superlines ipsam cooperculum, & in furnum mittes, & assabis donec carbonnes fiant, & tolles foras, & iterum teres cum uino, & facies magdalia: & iterum secunda uice similiter assabis, & sic teres, & uteris puluere ubi necesse fuerit:

**A** Optimus autem est & Musæ trosciscus, cum uino mulso adhibitus, & rosarum succus & omphacium. Simplicia enim ad oris ulcera hæc sunt sufficientia, quæ sunt diamoron, & rubi, & hijs similia, quæ liquida sunt. Puluis autem ad hæc anthras sic per se siccus, aut mixtus cum melle, sicut defrigis.

## AD HAPTAS.

**Q**uæ autem in summitate in ore ulcera generant, quæ Græci haptas uocant, fiunt autem hæc maxime infantibus, sanantur ex hijs quæ mediocriter reprimunt. Quamplurimæ tamen diuturnæ effectæ putrescentes cancrum faciunt. Infantibus ergo si iam cibos comedunt lenticulas dabis cum modico pane, & medullâ uitulinam, aut ceruinam dabis. Oportet autem admisceri cibis & mala cydonia, & alia quæ sunt stiptica, pira, forbas & mepsilas, interdum & lactucas dabis mixtas cibis: lines autem infantibus si rubra fuerint ulcera, in initio quidem quæ mediocriter stiptica sunt, & frigida: deinde quæ digerant sine mor dicatione. Si autem subrubea sint ulcera, cholerae ingerentia molestias, hoc ipsum adhibebis, sed magis ea quæ in frigidant. Si autem subalbida sunt, phlegmate molestante, quæ magis proficiant uteris. Si autem nigra fuerint, ea expediunt quæ diaphorisi faciunt. Maioribus autem, & qui duris membris sunt, sufficit per omnia misceus aut chalcitheus, cum uino stiptico tritus. Si autem fordida sunt ulcera, cum uino mulso tritis lauet. Hæc enim fortia sunt, & nimis operatiua. Mediocria autem sunt, & maxime faciunt ad inchoantes haptas, omphacium cum uino, aut uinum, & mel, & ros, similiter faciunt. Ad infantes autem sufficit rosa sicca, aut flos eius cum uino.

## AD CANCRVM ORIS.

**B** Ex hijs & alijs ulceribus, ex humectatione & calore in ore cito putrescentibus cancer generat: pro qua re fortioribus medicamentis uti oportet sapientius. Ex hijs fortiora sunt, quæ scaras faciunt similiter cauterijs: Qualia sunt ex cartha combusta partes tres, ex arsenico partem unam teres, & utere. Supra autem linteam pones intinctum in oleo roseo & expressum. Sanat enim protegendo partem. Item aliud. Ad magnas putredines in ore factas, & quæcunque in alio membro corporis fiunt. Chalcitheum partem unam, & calcis alterum tantum, & arsenici partem mediam teres, miscebis & utere. Si autem desiccatur os, & saliuam non potest transglutire, ficus coques in uino austero, & purum dabis calidum forbere, & si non potest, paulatim urge.

## AD VVAE PASSIONES.

**Q**uod si gargalio fuerit inflammatus, quæ reprimunt adiutorijs uteris: stiptica ergo ea uirtute oportet esse, mediocri quidem existente superfluo humore, mediocres stipticas species adhibebis. Nimio autem supercurrente humore, stipticis utere. Mediocria autem sunt, gargarismata de dactylis cocta, interdum quidem in aqua sola, interdum & modico mellis admixto, & rosis, & uitis palmatis teneris, & rubi cymis, & lētisci, & thimento, & cipro, & hypocistide. Fortiora autem hijs sunt, myrtæ decoctio, & stiptici mali cydonij cymæ, & pruni, & roboris glâdes, & castanæ, & mepsilæ. Fortiora autem ex hijs sunt, galla asiana, & ros syriacus, & balauſtia, & malogranati tunica, Hæc unaquæque singillatim, aut cum alijs mixta coquantur, & exinde gargarizetur. Oportet autem post hæc puluere leuari uiam, lente educendo manu foras. Cum ergo desiccata fuerit uua, & pallida sit, & botro similis diu, post inflammationem transactam tunc erit incidenda. Post incisionem autem oportet defrigi medicamine solo, & usque dum cicatrice uti, ut ipsa incisura eo tangat. Cicatrice enim diligenter con-

C strictam facit, & totum membrum ipsum, & omnia quæ ulcerata fuerint.

AD TONSILLARVM IN  
flammationes.

**Q**Uæ autem circa gulam sunt tonsillæ si fuerint inflâmatae, & induruerint, faciunt antiadas. Quas exprimi oportet medicamine aliquo quod iuuare possit inliniri digitis. Maxime tamen adenas inflâmatas hoc modo curatio adhibita paristhmias, quas nos tonsillas dicimus, iuuat. Molles enim existêtes & humidæ uel stringodes, facile suscipiunt reuma, & pendêtes fiunt & inflantur. Quando autem competenti tempore inflàmatio iam digeritur, & aliquis humor glutinosus replet loca, admiscebis quæ ad oris uitia sunt, medicamenta nitrum aut salem, aut aliquid aliud tale quod euacuet phlegma admiscemus. Fauibus igitur inflâmatis, neq; medicamine ad hæc tali utimur, neq; premimus propter molliciem carnis. Iuuant autem paristhmias, id est tonsillas inflâmatas, seu indurescant, liquiritia simul, & tracacantû in fapa cocta, & ex ipsa fapa gargarizet bis aut ter in die. Gaudet enim loca tam ex hoc mitigata, quàm ex hijs quæ exasperât, qualia sunt diaphoritica. Exacerbata enim interdum ab acribus adiutorijs malitiosa fit inflàmatio. Duræ factæ tonsillæ fiunt difficiles ad sanandum, & dicunt eas antiadas, ad quas fit Aegyptia, quod recipe de melle libram unam, oleo.  $\times$  VIII, terebinthina  $\times$  VIII, croco 2 VIII, in duplici uase resolues, & ex hoc lines antiadas. Et si caninû stercus album cum Aegyptia addas, mirabiliter antiadas iuuabis. Sed & humanum stercus admisceas. Magnas ergo eius passiones magnifice sanat. Quod si trociscis bisafa simul admisceas, melius facies. Ad scarodes uero antiadas, ex omphacio puluerẽ factû appones. Item puluis ad antiadas. De galla asiana 2 VIII, stipteria scisti 2 VIII, sale amoniaco 2 VIII, puluerabis & utere. Item alius puluis. De galla asiana 2 VIII, miscus, salis alli ana 2 II, facies puluerem & utere.

AD SYNANGES.

**Q**Uando autem synanges suffocantur alicui, cognosci debet si periculum habeat passio. Nam si intrinsecus maior inflàmatio sit, ita ut extrinsecus nullus appareat tumor, & adhuc magis periculum est, si utriusque partis tonsilla tument, & si gargalisio simul patitur. Expedit ergo, si ista signa apparent, quam citius mox euacuari per phlebotomum corpus. Quod si non sit qui phlebotomare possit, geros dabis in tibijs. Subuenit enim quamplurime decurrens. Vteris autem & clysteri acri, & à cibo abstinebis ipsum qui patitur hominem, & post hæc circumdabis collum medicamine heloticæ uirtutis, hoc est quod extrahat humorem. Conspitata uero loca, uel constricta materia ad se tracta ut etiam intumescant extrinsecus loca, spes est quod euadat qui patitur. Dabis etiam ad gargarizandum ptisanæ succum tenuem, cum melle & caricarum decoctione, & hyssopo, & origano, & prassio. Digerunt enim in ipsis suffocatis & glutinosis pinguium humorum congregationem. Facit autem mirabiliter ad synanges stercus de cane album desiccatum, & tritum cum melle illitum. Generaliter hoc medicamen ad synanges inuentum est. Oportet autem canem ipsum ossa comedere, & ex hoc album fiet stercus, & magnum ad hoc est si luna plena colligatur, & nulla appareat insuauitas, & maxime ad hæc ualentissimæ sunt cochleæ, circumdata serpētis collo, aut ipsa serpēs si hanc appendas ad collum, mirabiliter iuuat tonsillas, & quicquid circa collum molestræ cecidit.

AD EOS QVIBVS OS AVT SPINA  
in gutture hæserit.

**Q**Uæ autē glutuntur, si inhæserint gutturi, siue os, siue spina, & infixa manent, spongiã hydroleo infusam, aut carnem mollem incisam, quantũ glutin potest ligabis cum lino, & coges ut glutiat, & cum glutierit extrahes de subito linum in quo ligata est: Solet enim infingere se, & sic extrahi. Oportet autem & panem mollem interius ablatũ dare ad glutendum, aut ficus siccas ad masticandum ut glutiantur.

AD DIAMORON CONFICIENDVM  
simplicem ad oris uitia.

**D**iamoron simplicẽ ac de mororũ succo heminis v, & ipse succus ante coquendus est ad clios spissitudinẽ, & sic addes mellis heminã unam, & coques donec ad mellis spissitudinẽ fiat. Cum autẽ opus fuerit admiscebis in initio, quemadmodũ dictum est, ea quæ reprimãt. In statu autẽ, ea quæ digerãt & mitigant. In declinatione uero inflãmationis, quæ digerẽdo extrahãt. Hoc ipso autem modo & de succo utridium nucum corticum facies ad oris medicamen, & de sapa, & de malogranatis, & alijs quæ austera sunt. Eis uero quæ habent pinguem succũ, mel minus mittes. Si autẽ aquosior fuerit, ante decoques. De piris autẽ aut malis succos, adhuc autẽ & cæterorũ pomorũ æquales cum melle facies. Stipticis autẽ nimisũ existentibus, qualia sunt corna, interdũ quidẽ dupliciter, interdũ autẽ & tripliciter mittendum est, qui nõ ferunt medicaminis qualitatẽ. Si autẽ mediocris fuerit inflãmatio in tonsillis, aut in uua, aut in alio aliquo loco, prædicti succi & ros marinus, qd̄ rhomen dicitũ Græci, aut libanotitũ uocant. Ad maiores autẽ inflãmationes, malogranati austeres succus oportet, aut mala cydonia, aut utrũq; secundũ prædictã rationem admiscebis mel, & fiet mediocris. Optimus autẽ & fortissimus fiet, si tota tundas malogranata, & coquas in sapa. Oportet autẽ non solũ ad reprimendũ fiat medicamen, sed & diaphoreticũ est, & forte esse uidetur, si in prædictis dum coquantur addas pulegiũ, aut hyssopum, aut origanũ, aut thymum, aut calamẽtim. Colatũ enim utriusque medicamen est.

AD EOS QVI IN ASPERA ARTERIA  
quæ dicitur gargala, ulcus habuerint,

**Q**ui in aspera arteria ulcus habuerit, intrinsecus tunicæ gargalæ curant si extrinsecus aliqd̄ desiccatiũ adhibeãt medicamen, & supinus iaceat in lecto. Dabitur aliquod liquidũ medicamen, qd̄ ad ulcera oris proficere potest, & in ore tenet dum supinus iacuerit, & exinde fluens in gargalã descẽdat, & sanentur ulcera.

AD VOCEM ABCISSAM.

**S**vecos brassicæ cum melle coques, & dabis ut electariũ. Item aliud quod ad tussim facit: Lini semen contritũ & cretũ, & uuam passam cretã sine semine, nucleos pineos frigos, auellanas purgatas æquali pondere teres, & mel non coctũ admiscebis, & dabis exinde cochleariũ unum. Item ad uocẽ sub lingua tenendã. Arteriaca ad uocẽ raucam, liquiricia 2 v III, smyrni 2 x x III, terebinthina 2 x x VI, tracacanto 2 x x x v III: unamquãq; siccã teres singillatim & cernes. Resinã uero in pilam mittes & rundes, & supasperges pulueres, & mixtas colliges, & fingens collyria ad fabæ magnitudinẽ Aegyptiæ, & siccabis in umbra, & cũ opus fuerit dabis unũ aut duos sub lingua tenendos, & dum resoluuntur liquores glutiri facies. Oportet autem hoc medicamen ut citius contundatur, quia dum contunditur, cito siccatur.

**T**VSSis est uitium humoris qui descendit de capite per palatum intra arteriā, quam nos asperā arteriam appellamus, & rustici gargalam uocant, & mo-  
 uet tussim, sicut in pletoricis, aut in peripleuonicis. Fit autem & si fauces fue-  
 rint exasperatæ, uel arteria trachea tussis initiū, aut si in ea aliquid cibi uel potus  
 fuerit ingressum, mouet tussim. Sed & distemperātia frigida facit tussim, simul  
 & organica per quam spiramus. Tussiunt autē mediocriter, qui ex distemperan-  
 tia tussiunt, & nihil proijciūt, & sic proijciūt absq; uolentia ut nō reprimant, &  
 sic cōtinent spiritū, sed etiā stare faciunt tussim cum spiritu intra se diutius si te-  
 nuerit. Nā & calefacta quæ infrigidata sunt loca amputant tussim. Signū autē  
 taliter tussientibus est respiratio subito nimia, irritante scilicet frigore extenso.  
 Nam mitius respirāt in domo manentes calida, & aut parue, aut certe nullo mo-  
 do tussiunt. In gargalio uero existente tussi, sic cognoscitur: quia manifeste de  
 capite descendit reuma in arteriā, & ad pulmones peruenit, non satis expuunt, &  
 qđ expuūt tenue est. Oportet autē cognoscere qđ expuūt, ab hijs qđ spissum &  
 glutinosum expuūt. Sanamus autē eos qđ ex tenui reumate tussiūt, quæ exaspata  
 sunt mitigādo uel impingūdo, diacodion dabis, aut aliqđ anodinū antidotū.  
 Quibus autē ex pinguibus & glutinosis humoribus tusses generant, quæ exte-  
 nuāt & incidunt dāda sunt medicamēta: Qualia sunt, centaureæ maioris radices.  
 Difficilius anhelantibus, & ad inueteratas tusses expediēs est gitter. Catarrhos sa-  
 nat calidū in linteo ligatū, & naribus appositū, ut odoret. Ex thorace uero tussim,  
 & catarrhū; & coryzā, & branchū curat decoctio hyssopi, & ireus uel pi-  
 nus, iuuat frequēter data. Electariū uero facies, pinum pingue tolles, maxime  
 quādo ppria resina circūuoluta est, coques in aqua cū prassio recēte, & sic postea  
 aqua ipsius decoctioni addes mediocriter mel, & coques iterū donec ad mel-  
 lis spissitudinē reuertat, & uteris. ad eos qđ de thorace & pulmonibus tussiunt.  
 Et si pinus non adsit, de solo prassio coques aquā, & cū melle electariū facies, &  
 iuuabis. Itē ad tussim Diacalamētis, Aniso ʒ III, feniculi semine ʒ III, cala-  
 mēti ʒ I, cymini ʒ II, pipere ʒ I, & 6, gingibere ʒ I, ruta uiridi ʒ I, nitro ʒ I, mel-  
 le qđ sufficiat. Dabis cochleariū I, aut II. Item aliud: Diabutyrū, De melle  
 ʒ III, butyro recente ʒ III, cymino ʒ III, addes melli despumato butyrum, &  
 iterū coques, & sic cyminū addes. Itē antidotū Phloxenis autoris ad tussim.  
 Facit em̄ ad tusses diuturnissimas, & ad omnia quæ de thorace nō facile pijsiunt,  
 facit & ad impijsos: purgat em̄ uulnus & cicatricat, & ad sanitatē pducit: facit  
 & ad uiscerā infraxin. De aristolochia longa & rotunda ana ʒ XII, gentiana  
 ʒ XXI, lauri baccis siccis ʒ XIX, rutæ semine, prassio ʒ XII, smyrnis trochilitæ  
 ʒ XXVIII, melle quod sufficit. Dabis autem ad auellanæ magnitudinem cum  
 mulsā, aut cum oxy mellito.

## AD SANGVINEM REICIENTES.

**M**Ox in primis periculosissima est sanguinis nimia reiectio, si sit absq;  
 possibilitate euacuatio. Iuuari ergo statim qui patiuntur possunt de hijs  
 quæ intra scripta tenent. Tota enim passione medicorū est operatio ad sanādū,  
 si portulaca māducef. Est enim ad hęc multū opatiua si succus eius bibat, aut  
 balaustrion, aut rubi mora, & flores roboris, & secunda cortex prini, & mem-  
 branæ quæ sunt in glande interiores. Coquentes ea maxime utantur. Ficus  
 autem ad primum multum opatiua est. Euisci radix, menta, ad recentes est  
 eruptiones, facit & centaurea maior ʒ LI, data febrientibus cum aqua, sine  
 febribus cum crine. Malo granata, lentisci foliorum succus, samnios, aster, ad  
 omnes

**A** omnes Similiter & Iemnia sphragis, ad thrombos autē factos de sanguine coagulatus potatus soluit, & maxime si de lepore fuerit. Soluit etiā thrombos de ficu facta lixiuua cum aqua potata, & thymus, aut fatureia cum aceto cocta.

## AD ASMATICOS.

**A** Ristolochia rotunda cum aqua potata asmaticos iuuat. Centaurea maioris radices, spondilion fructus & radix, calamentis, hyssopus, ireus, giteronū quæ sub situla sunt, ubi cū aqua stant inueniuntur unum mittes ff in uasē testeo & friges super carbones. Albos autē factos teres, & mel coctum superpones, & dabis cochleariū unum ieiuno & post cenam. Item aliud: Squilla crudæ succos colabis, & addes mellis alterum tantū, & coques super carbones, & dabis unum cochleariū ante cibum & post cibum.

## AD PLEURETICOS.

**P** Leureticis ex calefacientibus rebus nō soluantur dolores, euacuas totum corpus: fomentationibus uero uteris absq; periculo, & mordicatione, & quæcūq; sunt humida, siue aquā dulcē & oleum in uesicā bouis mittes, & sic fomētabis. Dabimus autē ad hāc passionē medicamēta quæ extenuādī habēt uirtutē, qui mediocriter inflāmationes patiunt, & qui fortiter inflāmationes patiuntur, in declinatōe inflāmationis, aut iam pfectius quietis. Mediocres ex hijs sunt prisanæ succus & mulsā. Fortia autē sunt acaliphis semē, & quādo admisceat paululū mel acribus herbis, quales sunt hyssopus, organū, calamentis, pulegiū, & ireus.

## AD LATERIS DOLORES.

**L** Ateris dolores si sine febre sint bdelliū & costū in potione datū sanat, brasice caulis ustræ cinis mixtus cū adipe porcino ueteri & appositus ubi doler, tollit dolorem. Diaphoreticum enim fortiter hoc medicamen.

## AD DOLORES DIUTURNOS IN THORACE

consistentes sine febre.

**S** imul coques fœnogræcum & pingues dactylos, & cum cocti fuerint colabis, & cum succo ipsorum mittes mel abundātius, & coques ad carbones, ut sit mediocriter pinguis, & uteris multo ante cibum.

## AD MAMILLARVM PASSIONES.

**I** nflammata māmilla sanant mirabiliter si spathos de palæstra, & si duriores esse uideris, cū oleo ciprino, aut roseo adponas. Quod si lac coagulatu fuerit in māmillis, & inflāmationē fecerit, utilissimū est si ouo integro utamur admixto oleo roseo. Non solū autē hæc ad māmillas inflāmas, sed in alijs plurimis locis læsis in palæstra sanitas est inflāmatis locis & māmillarū; etenim ignita eius extinguitur uiolentia, & qui superfluunt reprimunt humores, & qui intus residēt corrupti digerit. Fabæ etiā farina ad māmillas & testiculos optimū est cataplasma. Aufert enim ab hijs locis indignationes, & mediocriter infrigidat inflāmationes, & maxime quādo coagulat lac in māmillis. Noxiū uero agonis apostema māmillas puellarū phibet crescere, aut ad horā inflāmat & puerorū; testiculis porci incisis, de sanguine ipso illitæ māmilla nō crescunt. Si de lacte turgescunt māmilla, ad spargofas māmillas adhibebis lenticulā coctā in aqua maritima, & cataplasma impones de menta, uel cum alphita & sale fomētabis. Aut crocū cum lacte teres, & in lines, farinā fabæ per se cū alphita cataplasma impones. Aut mala cydonia cocta, & cū melle trita impones. Item aliud: Si de lacte turgescūt māmilla, aut quolibet modo inflantur, columbarum stercus terens cum melle, superaddito modico de cera remissa ut emplastrodis fiat, & indutum in linteo superpones, & mox subuenies.

C

Non dimittet in mamillis lac coagulari, si de cera alba ad milij aut phasio-  
li magnitudinem numero x, per singulos dies transglutiat.

AD COLVM CVRATIO.

In colici intestino, seu in alijs intestinis acer & mordicās insidet humor: lædun-  
tur igitur sub calidis cibus uel medicamentis, & a cibus abstinentes irritantur  
dolores. Cōstituendi sunt ergo, melius temperatis utantur. Oportet ergo in pri-  
mis clysterē adhiberi ex mulla, aut ex succo ptisanæ, & cibos euchymos, & qui  
non facile corruptantur accipiant. Fugienda autem sunt quæ extenuant, & ca-  
lesciant. Oportet autē & euacuari humores, aut temperari. Neutrū enim hoc  
fieri poterit. Fugiendū est & narcoticū medicamen in talibus passionibus cōsti-  
tutis, quia non solum qui stuporem sensui faciunt releuant dolorem, sed impin-  
guant qui extenuari habebant humores, & in frigidari calida magnifice iuuat  
pinguibus autem existentibus & glutimosis humoribus, doloris causa nullo  
modo adhiberi debent narcotica medicamenta, id est, quæ opium recipiūt. Re-  
leuari quidem uidentur hoc dato stupefacto sensu, & postea peius patiuntur,  
& impinguant amplius humores difficile absterguntur. Curantur autem tales  
passiones neq; nimium calidis: Augmentāt enim dolores subardentes, & fusis  
humoribus spiritus uentositatis augmentatur. Sed quæ sine nimio sunt calore,  
extenuantia & absq; inflatione sunt. Nam alijs omnibus, & speciebus primis  
absq; inflammatione si nullo modo sit febris hoc offerimus, & tiriaca medica-  
men fortiter iuuat tales passiones, quibus febres nō accedunt. Quibus sunt, nō  
de milio, aut panico ad fomentandū saccelli, & in oleo coques extenuandi par-  
tem habentia, & nō inflantia medicamina, & sic colicus admisceat in oleo ad  
pes pullinos, aut anserinos absq; sale & iniijcis. Non autē mitigatis ex hijs dolo-  
ribus iterum iniijcimus, admisceat oleo ipsi castorei aliquantū & opij, ad ma-  
gnitudinem uniuscuiusq; nō plus quā fabæ in una hemina olei. Oportet autē  
in ipso oleo lanæ floccos infusos ad anum imponere: oportet autem ligari forti-  
ter lanam ad anum appositam, ut facilius teneatur. Lycon, id est lupi stercus da-  
rum in portione, & maxime quod album est, cum aqua aut uino tenui secundū  
consuetudinem, bene iuuat colicos, nō solum in accessione, sed etiam in decli-  
natione. Si enim mitigata nō fuerit passio perfectius aut mitius, & diuturna effi-  
ciatur, dato stercore, melius & ualentius est si nō terram tangat, sed super cespi-  
tem cadat, & exinde colligatur stercus super cespitibus uel herbis inuentū. Sed  
& ossa quæ cum ipso stercore inueniunt data in portione, iuuant colicos.

Narcotica.

D

Stercus lupi-  
num.

AD LVMBRICOS.

Lumbricos igitur rotundos sufficiens est ad occidēdum absinthium, abro-  
tanum, calamētis, cardamomū, brassicæ semē, menta, lupini puluis ex hijs  
in portione, aut cum melle in electario, aut in pusca potatus. Gitter autem non  
solū comestus, sed & cataplasmatu uenter extrinsecus: persici quoq; folia, ad  
uentrem apposita. Ascaridis autem inuectioni de calamētis succum adhibe-  
bis, aut cidria. Latos autem lumbricos occidunt mori radicis cortices. Ptereus,  
quam nos filicem dicimus, radicis 2 IIII in mulla acceptæ, & cameleontis ar-  
boris radix, oxyphanum cum uino austero datum: Occidit autē eos & costum.  
Ego uero ex magistrorū experimento, & nostro longo probato iam tempore,  
hoc catartico in hijs semper utor. Scamonia scrupulo I, euphorbio scrupulo I,  
& 6, combustarū pennarum puluere scrupulo I. Nitro penso siliquæ unius, in  
mulla, aut cum uino dulci dabis bibenda. Salubrius autē continget, si ante allia  
uel cætera



**A** uel cætera acrimonia edat. Inijcias autem ad lumbricos molestantes aquã, ubi coquat abrotanũ cum melle & nitro & oleo. Irema iterius autoris emplastrũ ad lumbricos latos & rotũdos, & ascaridas, & serpẽtes in uentre: Lupinos, lauri baccas, & fel taurinum supermittes, & pones ad umbilicum, & fasciabis una die & nocte, aut certe duabus aut tribus. Item alterius autoris ad latos lumbricos: Abrotanum, cornu ceruini rasuram, coconidij, & sisami ana 2 I, cardamomum triobolon dabis cũ hydromellito bibere. Item ad lumbricos electariũ. Cornu ceruinum urens faciescum melle electarium, dabis ut accipiat. Item aliud: Malogranata acida, & radicis cortice mediana, ana 2 IIII, piperis 2 IIII, cardamomo 2 VI, prassio 2 II, dabis postea cum aliquo cibo comedere. Itẽ ad ascaridas. Axungiam ueterem intra anum mittes. Item aliud electariũ: ad latos lumbricos: Gummi arabico 2 I, pterea 2 III, cardamomo 2 I, nitro 2 III, dabis in hydromelle aut cizico. Item ad serpẽtes in uentre & lumbricos. Myrrha, cardamomo 2 IIII, nitro 2 I, scamonia tres obolos, aqua ff I, ut totĩ exeant, una est datio. Item ad latos lumbricos: Antidotũ diaptereon, pterea 2 VIII, scamonia, gitter, cardamomo, sale, nitro, ana 2 II, dabis bibere in hydromelle aut cizico. Item aliud: Pterea 2 IIII, dabis similiter sicut dictũ est, ante dabis omnĩno acres res manducare, Adde autem cardamomi 2 II, nitri 2 II, polypodij 2 IIII.

AD EOS QUI MULTVM VOMVNT,

& non continent cibos.

**R**orem & cyminum teres, & dabis 2 I in oxymelle cyathis duobus bibere, aut foliorũ uitis, aut palmitũ tenerarum succo calicẽ unũ colabis, & cum alphis dabis bibere.

AD ANI PASSIONES.

**C**oques gallam rubeam & teres, & cataplasma in ani inflammatione appones, & ad foras exiens intestinum, si fortius opus fuerit fieri adiutorium, in uino: Si autem leuius, cum aqua coques. Succus autẽ scinus, id est lentiscinus, facit appositus & ad ani, & ad matricis prouinam. Item aliud: Pini cortice 2 VIII, cyparissi pilis siccis 2 II, molipdinis 2 II, ante lauabis in uino stiptico, & tritas supersparges.

AD IGNITAS INFLAMMATIONES

cum dolore ani.

**O**ui assitellum teres cum uino albo, & de oleo roseo cerotum supermittes, & superlines. Item aliud: Panem mundum tritum & coctum in aqua, & rodinum oleum superpones cum oui uitello affo. Item aliud: Rosi siccis 2 IIII, ouorum in igne coctorum uitella duo cum uino albo teres, & de oleo roseo cerotum supermittes, & uteris.

AD ANI PRVRITVM.

Cretam cimoliam teres, & supermittes cerotum de oleo myrtite, & utere.

AD RAGADAS IN ANO VEL IN

ueretro.

**I**Nano aut ueretro scissuris membri factis quas Græci ragadas uocant, cineris de rasura lintei facti & usti, & amilixuales partes teres, & foliorum oliuz succos miscebis & lines.

AD HÆMORROIDAS.

**H**æmorrhoidas multũ effundentes sanguinẽ reprimit aloẽs superasperosa, aut ferri squama, aut plumbi usti puluis ex aceti aut uini decoctione fofus. Reprimit autẽ hæmorrhoidas myrta, quæ cõmiscet oleo amaracino aut

**C** irino illitas. Reprimunt autem confestim de acacia rubra 2 IIII, tracacanto 2 III, singillatim teres & miscebis cum aqua, & induces in linteo, & impones. Item aliud. Tollit enim hemorrhoidas mirabiliter, cocnio sicco 2 II, iusquiami succo 2 IIII, stipteria sciftis 2 II, calcanto 2 II, sinopide, psimithio, ana 2 I, cerotum roseum supfundes. Si autem interiores fuerint hemorrhoidae, ex medicamine interius lines: faciunt autem & ad hoc mirabiliter sandaracae, & arsenicum, & sciftis, ana 2 VIII: Superlines, & preparatus ponitur donec moriatur, & cadit in media hora desiccatus, & ab ipso base dissoluitur, in lines autem in circuitu, Resoluit autem ista stacte, & lixiuuum in circuitu lines ceroto, & hoc facies ad solem, aut ad ignem.

AD MATRICIS ET VERETRI VLCERA.

**I**n ueretro ulcera, nel in matrice, aut in ano sine inflammatione consistencia, desiccatiuis opus habent nimis medicamentis: Qualia sunt de cartha usta, & anetho usto, & de sicca cucurbita usta. Ad sicca autem, & quae recetia sunt ulcera, & aloes medicamen bonum est. Ad haec omnia autem eorum adynon est ad sicca ulcera, & in nullo minus operatiuus est pompholix. Si autem humectius fuerit ulcus, piceae cortex per se ipsam, sed & lithus haematites. Si autem profundum fuerit ulcus, praedictis manna admiscetur: facit autem ad ueretri ulcera panchristi ygron. Si autem in matrice aut uesica ulcus fuerit, hoc ipso opus habent medicamento. Nam & ferramenta opus sunt intus, effectus est & quae resoluunt medicamenta, & utiliora sunt siccioribus, qualia sunt crocus & pompholix, & aloes mixta oleo roseo, aut plantaginis, aut alicuius alterius succus.

AD TESTICULORVM ET SCROTON PASSIONES.

**D** Ad scroton & testiculorum dolores, butyro, resina terebinthina, & equali pondere mixtis uteris, aut lini seminis farina cum aqua cocta. Cui admiscebis smyrnae decimam partem, & resinae similiter, & cataplasma impones.

AD TVMENS VERETRV M.

**V**itis folia numero XXX, psimithio 2 V, libano 2 I, teres & cataplasma impones. Uteris uero & fomentatione de aqua maritima frigida, & mitigabitur si ueretrum sursum ad uentrem suspendas.

AD VLCERA SI EX SVDORE IN testiculis fiant.

**Q**uod si de sudore ulcera in scroto fiant, gallas tritas, aut stipteria superasperges. **SI IN VERETRO NA**

scantur tymi.

**E**X eo cadio melaterio superpones, aut piri semenes superpones tritas, aut fardinariu capita trita superpones, aut hirci fel superpones.

AD RAGADAS, ID EST FISSVRAS in ueretro.

**R**agadas in ueretro iuuat resina fixa cum oleo roseo trita, donec mellis crassitudo sit, admixto oui uitello cocto. Item aliud: Hederæ folia sicca & usta terens cum oleo in mortario plumbeo, ex hoc illita sciffura sanabitur.

AD TESTICVLORVM INFLAMMATIONES.

**V**am passam exossatam cum cymino teres & impones, aut ordei farina coques in mulsa & suppones, aut cyminum cum butyro aut resina equali pondere remissa impones. Ad testiculorum uero ruborem terra cymolia cum aqua ante inlines, & dimittes siccare, ante fomentatas aqua calida, aut resinam siccam

**A** siccam teres, & smyrnion paruo teres, & cataplasma impones. Si autē discortica ti fuerint testiculi, cinis de farmentis cum nitro & aqua admixtus sanat cataplasmate.

## AD PRIAPISMVM.

**P**riapismus est augmentatio ueretri, permanēs in longitudine & latitudine circūdatus sine aliqua cōmōtione libidinis. Inflatum autem uentositate spiritus, scilicet de quo inflatur ueretrū. Generatur ex humorū glutinosorū & pinguium submediocri calore. Prouidendū est ergo ut non possit calefieri ueretrum, sed ut infrigidetur leuiter cum oleo roseo, & aqua factō ceroto cōuso, & de oleo camimolo ueretro, & lumbis superpones. Dieta autē & medicamenta adhibenda sunt extenuantia uirtutē absq̃ calefacientia manifesta. Adhibenda sunt autē quæ naturæ sunt congrua, experimēto inuenta, & herbā nymphēā bibat & agni semen, & rutam uiridem cum pane mixtam comedat. Hoc ergo initio nō dabis, calefacit enim multū. Sed postq̃ usus extenuantibus euacuationibus fueris puomitū, & hoc oportet fieri; Etenim uētris reuma natū proximū est ueretro.

QVAE SINT QVAE VENEREOS  
actus excitent ad libidinem.

**A** Caliphis semen & bulbi, rapæ semē, dauci radices, & mediocriter semen eius, menta & cosum incitat cum uino & melle datum. Satyrion, cruca, cicer, faba, polypodiū, nucleus pineus, ornimi semē, anisus, asari radix cocta & comesta, & scincus qui & crocodilus quæ ei circa renes sunt, si bibātur, fortiter irritant libidinē. Sed & oua perdicis excitant. Porri uero semē in uino puro potum. Vulpis autē testiculis siccatis, & pulueris inde facti unum cochlear in portione cum uino datum, sine latione absq̃ siti tensionem ueretri facit.

**B.** QVAE SINT QVAE PROHIBEANT  
libidinis impetum.

**A**gni semen frixum & nō frixū, & folia eius, & flores: quia libidinē extinguit prohibita sunt, & non solū comestū, sed & in portione datū, siue etiā substratū in lecto. Ruta uero similiter prohibet, & lenticulæ decoctio potata mitigat tensionē ueretri, & porcacla comesta, & lactucæ semen potatum.

ADEOS QVIBVS SEMEN FLVIT,  
aut per somnum patiuntur.

**L**actucæ semē potū prohibet semen, unde & hijs quibus in somnis cōtingit datur hoc, & canāpos syluestris semē datur, & si frequēter fuerit potatum, deficcet generandi facultatē. Plumbi lamina lumbis supposita seminis lapsum retinet. Nymphææ uero radix & semē prohibet semē uel fluxum seminis, uel hijs quibus per somnū molestat exuberās plus quā oportet, cum nigro uino & austero potatum amputat anethi semen.

## ADEOS QVI VRINAM NON CONTINENT.

**V**escicam capræ aut ouis uistam bibat in pulsa, ad uesperū uero sitiens se colloct. Facit autē & aquilæ cerebrū ad magnitudinē ciceris cum adipe anterino æquali mensura & gummī tantundē contritū, si totū glutiaf facta catapotia aut mixta alphita comestum. Item leporis testones miscebis cū uino odorato, & dabis bibere anteq̃ dormitū uadat, & liberabis. Herbā quoq̃ calamētis, & smyrnā, & mentā dabis bibere anteq̃ dormitū uadat: lines ueretrum cymolia cum succo uitraginis.

ADMATRICES PASSIONES, IDEST  
suffocationes.

**A**dsuffocationē matricis iuuat potata de agarico 2 I, in allio 2 III, cum uino. Plantaginis semen aut succus cum uino. Onex, id est ungula de cochlea

**C**ochlea potata: acetum squilliticum sorbeat. Odorationes autem uel suffocatio-  
 nes excitant asphaltum, castoreum, galbanum, pix liquida, lucernæ stappa,  
 aut licinius extinctus, capillus uftus, ruta syluestris, silphium, allium. Suffumiga-  
 tio autē fit ad hæc gagate lapide, onyche quæ est in purpura, asphalto, castoreo,  
 galbano, silphio, cornu ceruino. Apponitur autem ad ueretrum ruta cum melle  
 trita & in lana suscepta.

AD MENSTRUA PROVOCANDA.

**E**ducere si uolueris menstrua ante dies tres aut quatuor uenam incidēs in  
 talo, aut in tibijs gerlis dabis, aut de ambobus talis uenas incidēs, ita ut  
 post unū diem de alio tollas talo, & iterum post hæc tenues dabis cibos, nunc &  
 ante v, aut vi dies curationis incipies. Post suffraginis autem euacuationem,  
 aut tali, dabis castoreū cum pulegiō, aut cum calamentis bibere. Euacuat enim  
 fortiter. Educit autē menstrua bene pulegiū & calamentis, id est mentastrū co-  
 cta in mulsā & potata, & sicca quidē trita & tenuis puluis in mulsā datus. Cala-  
 mentis autem fortiter operatiua est. Harum autē potionū tempus est utile post  
 balneū in sabanis. Sic enim data potio multo plus operatiua est. Diptamnus &  
 herba sabina similiter data. Vtiliter autē ad hæc datur & pigra quod aloē recipit  
 2 c, & de alijs speciebus ana 2 vi. Deducit mēstrua & ampilon prasson, quādo  
 ex frigidis & pinguibus continet humoribus. Cicer uero & lupinorū decoctio  
 cum myrrha & melle admixta appositio. Suffumigatio autē & de capparīs radi-  
 cis corticibus & cassia. Quādo autē ex plenitudine simul & pingui superfluitate  
 constricta excludunt menstrua, centaureæ maioris & minoris radicū succus ap-  
 ponetur, & maratū, & gitter. Quando autē glutinosi & pingues humores con-  
 stringunt, & prohibet menstrua, petroselinū, porrū, apium, allia, smyrnion, sto-  
 rax potata & apposita, raphani comesti, adiantus, amomū, Incatismata autem  
 educit mēstrua aqua ubi decoquunt sambuci folia, artemisia, diptamnus, lau-  
 rus, coniza. Cataplasma autē ad secundas & menstrua educēda de artemesia ad-  
 hibitū in hypocōdria, fortius autē educit, ita ut pecus educat, lolij farina cum  
 porri succo mixta & imposita, & cyclamini succus cū melaterio & lolij farina.  
 Medullā ceruinā, galbanum, amoniacū, & oleum æquali pondere teres, & ute-  
 ris. Opopanaci obolo uno collyriū faciens superpones: hoc enim sine periculo  
 est experimētātū. Educit autē mensibus tribus aut quatuor hæc. Bulliat autē  
 herba sabina, & uiuum pecus corrumpet, sed & mortuū extrahet. Et centaureæ  
 maioris radicū succus idem operat, & calamentis succus potatus & appositus,  
 Smyrna & cidria apposita, & splis si in cōmixtione linas ueretrū, non concipit.  
 Hoc medicamine utentibus nihil secundo uti opus est lupinorū decoctione cū  
 myrta & melle apposita, & ex lupinorū farina cataplasmata. Cui addes centau-  
 reæ minoris succū & appositus eijcit: cyclamini succus illitus sub uētrali: Etenim  
 est corruptio fortissimā in pefso cū melle appositus. Elateriū autē appositū quæ  
 cōcepta sunt corrumpit. Castoreū autē cum pulegiō, aut calamētī experimētātū  
 est ad educendū pecus, uel secundas obligatas brassicæ succus cū lolij farina ap-  
 positus.

AD FLUXVM SANGVINIS

mulierum.

**N**on propria passio est aut similis matricis, quæ uocāt fluxus sanguinis,  
 sed ex omni corpore ista euacuatio. Contingit autē hoc hijs quibus mol-  
 les sunt carnes, & phlegmatica est natura quam plurime. Fluit autē interdū qui-  
 dem rubrū, qd est sanguinis liquor. Interdū autē albū, qd fit à phlegmate. Hoc  
 non autē à phlegmate est. Sed rubeus si sit, ex cholerico humore augmētatus &  
 aquosus, interdū ex rubeis fit choleribus, & sapius sufficit ad sanitatē ex toto cor-  
 pore

**A** pore facta purgatio de super augmentato humore. Contemplatio aliqua est totius curationis ad desiccandū, sine nimia aliqua calefactione totius corporis, & circa matricis loca, si utatur ex interuallo ex hijs quæ stiptica sunt. Purgari ergo totum corpus cōuenit per uentrē, & urinas, ut digerat. Rarefaciendum est totū corpus fricando superficiem, & ungerē utilius ea quæ expediunt. Faciunt autē ad sanguinis fœminarū fluxum, porcacla si edatur, aut succus eius potatus, rubi semen, & flores eius, & de roboris uel castaneæ pomis, secūda quæ adharet glandibus cortex. Similiter quæ fiunt inter utrunq; mediæ, maxime coques eas, & sic uteris, facit autem & ilicis. Operatiua autē amplius est hipporis, & maxime quibus rubor fluit sanguinis, iuuat potatus cum aqua aut uino, schini semē frictum potatum cum uino; Rubra uero prohibet menstrua, gefasteras, aut lemnia sphragidis. Schinon, id est, lentisci radices decoctionem cum cornu ceruino usto cum pulca dabis. Fimus caprinus cum libano appositus reprimit; Oportet autem in uolui in lanis hæc & apponi. Licion cum lacte apponere oportet, Gallæ quæ intrinsecus sunt cum libano & aqua similiter, & sunt hæc incatismata & epistimata super uentreale imponenda. Quæ sunt stiptica incatismata fiunt ex decoctione plantaginis, & polygonis, & sidia, & rosis, & rubo, & hijs similibus.

AD MATRICIS INFLAMMATIONES  
& dolores.

**I**ncatismata ex decoctione facta iuuant ubi decoquantur artemisia utraq; laurus, ireus, cassia, centaureæ maioris radices, uiolæ flores sicci, maxime in diuturnis, malua, mellilotum, lilij flores, ficus sicca cum fœnogræco, aut prisanæ cum fœnogræco & lini semine. Suffumigationes autē expediuntur agni semine, cassia, bdellio, ladano, smyrni. Apponuntur etiā hybisci radices coctæ in mulla & malaxatæ cum adipe porcino, & terebinthina, & fœnogræci succo, & cum adipe porcino, & butyro recente. Lilij radices assæ cum oleo roseo, & flores eius cū ceroto, & medulla, & axungia, & hyssopo cum butyro & mellicrato.

AD VLCEA MATRICIS ET MORDICATIONES.

**A**d ulcera matricis expedit amurca circumlita, & cocta cum ceroto, aut allicium similiter cum succo acaciæ. Mordicationes autē, quas Græci odaximos uocant, quod nos pruritū uel mordicationem appellamus, mitigat porcacla succus inquitmatizatus. Iuuat lini seminis coctus succus in mulla; fœnogræci similiter succus. Tracacantum autem cum aqua adhibitum.

AD PRÆRVINAM IN MATRICE.

**M**atricis præruinā reprimit acaciæ succus, aut rubi succus, aut lentisci, aut malogranati rubei succus illitus. Violæ uero folia cataplasmate imposita aristolochiæ in pefso cū aliquibus stipticis succus, sed & decoctio ex eis facta incatismate, & fomentationes, gallæ, aut sidia, id est, malogranati, aut lentisci decoctione uteris.

AD CONCEPTIONEM.

**I**uuat autē ad concipiendū pastinacæ semen potatū, & radix data ad manducandum, & appositū cum medulla ante cōmixtionem leporis coagulatum, cū butyro. Vulpis fimus cū oleo roseo in pefso appositus, & sublinitus ut sic cōmiscēatur. Artemisiā appones trita & concipiet. De adipe anserino & terebinthina circūlines per duos dies, tertio die cōmiscēant, & concipiet puerū. Herba mercurialis semen, aut succus pro pefso ad puerū concipiendū semine post cōmixtionē mox appositus, puerū concipiet apparatū. Puellam aut fœminā mercurialis herba concipi facit, sic traditum est ab antiquis quia concipit. Continetur autem conceptio, appositus, & si in terra summa lapis inuentus fuerit, qui iaspis

C dicitur, & appensus, & malux syluestris radix similiter facit. Seruat autem conceptionem syderitis herba appensa, & infantem non permittit abortiri.

AD PARTVM IVVANDVM.

L Apidem iaspidem coxis appende, & mox pariet: cyclamini radix sicca similiter facit. Adiantus tritus, & cum uino & oleo potatus iuuat, & sternum factum in naribus, & diptamnus cum uino, aut aqua potatus, aut bulbus amarus cum sapa, aut scrophinum lac potatum in mulla. Pulegij autem fasciculos in aqua mitti facies, & superfedeat mulier.

VT NON CONCIPIAT MULIER.

F Illicis radices si dederis cum uino bibere, aut cum sapa non concipiet foemina. Similiter faciunt flores salicis, & brassicæ folia, & flores cum uino post conceptionem appositi: Apponit autem ut non concipiat ante comixtionem, mentam teres & uertrum de succo eius inlines. Brassicæ flores tritos in pisso post commixtionem appone, & non permittent condensari pellicino semen, ante comixtionem si se subleuet dicatur.

AD VENTRIS RUGAS ET MAMMILLARVM.

C Ochleas maritimas diuturnas uistas teres cum oui albumine, aut lacte asinino, & unges. Item aliud: Speculare tundes & cernes cum aceto & in balneum eunti cui inlines, antea lines per dies uiginti & curabis. Ut autem uenter & hypocondria non faciant rugas, cymolia & mannis æquali penso cum albumine oui inlines cum ceroto cyprino.

AD COXARVM INFLATIONES.

D Panis interiora & melanteria consperge, & superpone, & cū aqua ponatur.

AD VMBILICOS PROMINENTES.

G Allam uisam teres cum aqua, & cataplasmate superpones. Item aliud ad umbilicū prominentem: Imponendum est super umbilicū id quod ex hijs constat, cicuta & manna ana 2 I, cerofæ lotæ 2 VI, plumbi loti 2 VIII, oua duo, quibus herbæ soldanæ succus adijcitur. Hoc etiā diutius impositū esse oportet. Sed antea hijs uenter per clysterē euacuandus est, & medicamine posito cōquiescere hominē oportet, cibo modico utat, & uitanda sunt oīa quæ inflant.

AD PODAGRICOS, ET ARTETICOS, & ISCHIADICOS.

A D podagricos, & ad omnes reumaticas passiones per omnia imbecillia existentia loca oportet fieri quæ suscipiunt reuma. Quæ autem superfluitas si nō sit corporis, nullo modo nocet ubi nulla est superfluitas, propter quod oportet natiuitatem, quæ in illis offeruntur locis considerari: Quod si nullo modo superfluit humor, neq; passio consistere potest. De qua re prohibendum est, quod superministratur de toto corpore, & exercitatio sit mediocriter, & cibi digestionibus apti, fugientes ociositatem, in super & facietatem, augmentationem medullarū & inrationabiles uini potiones, & maxime ante cibos: Lædit enim neruos uinosa nimis potio ministrata, quemadmodum & actio Veneris importuna, quia in podagricis natiuitatibus mediocriter conuenit luxuriæ usus. In antiquo uero tempore paucos omnino à podagra tactos, abstinentes ab hijs fuisse curatos cognouimus. Quibus etiam oportet euacuari augmentatos humores, & si plethorici sunt, id est, abundantes sanguine, euacuabis primū, & sic localia impones adiutoria hæc, quibus reprimi pedum & manū reuma possit: In coxæ autem articulis nodo reumatizante, cauendum est quod reprimat medicamen. In profundum enim descendens humor comminatur insanabilem fieri passionem,

**A** nem, faciliusq; intus nocet superfluitas facta, si nō potest digestionem accipere. Mitigati uis ergo sunt ab initio adiutorijs releuandī hīj qui ischiāmi patiuntur. Quādo ergo ex plenitudine sanguinis sola causa fiunt dolores in coxa, uena est incidenda in talo, aut in suffragine, uel planta. Sufficit hoc ad cito sanandā ischiāmi: Nam si quis ante euacuationē totius corporis acerbis utatur medicaminibus, plenitudine constricta, insanibilis fit passio impinguata, & quodammodo concocta materia. In qua re per culpam talī facta constipatione uentosa in coxa ipsius loco figendæ sunt maiores, & purgatio per clysterem est faciendā de colloquintidis, & hījs similibus. Cognoscendī autē sunt hīj qui caste uiuunt, & continent se in dietis, & nimīū sunt remorantes in portionibus uini, podagricas passiones possunt quidem habere passim, sed facile releuantur à passione. Euacuandus in primo uere per phlebotomum, aut catarticum, frequentius tamen catartico bis in anno: Nam hīj qui nimis sunt uinolenti uel comestores, nihil ab hījs euacuationibus iuuantur, quā mox iterum replentur humoribus congregatis, incontinenter dieta uentes, de qua re generantur circa articulos pori: & si in antiquā qualitate uenire articularū non potest sanitatis curatio, uulpes uiuas, aut mortuas coquunt in oleo, aliqui autē hienas, & faciunt diaphoreticū oleum, & sic in tinam mittunt, & ibi deponūt arteticum totū ibidem corpus cooperientes, & diutius ibidem residentes, magnifice iuuati sunt euacuantes omnem morbum facientem ægritudinem. Materia quam pessimā dietæ si iterum eos repleuerit, fabæ farina in aqua cocta cataplasmas. Cui addes coctos adipēs porcinos, & bene faciet ad inflammationes, uiolæ herbæ albæ radices cum aceto, induratos articulos, & in inflammationes sanant diuturnas, & poros habentibus decoctioni carnis porcine infundes caseum uetustum, & in mortario teres, & cōmixtum bene super articulos impositum poros soluet & digeret, & currens reuma absq; incisione, & sine molestia desiccabit ipsa loca per singulos dies & poros. Platani folia uiridia trita, & cataplasmate imposita in genibus, inflammationes tollunt podagricis & arteticis. Anodina sunt autem sine dolore reddentia epithimata, quæ in accessionibus utenda sunt. Opio myconio & croco ana ʒ iiii, teres cum lacte uaccino, aut caprino, & interiora panis admiscebis & teres fortiter, ut æqualis sit mollis sit permixtus, & admixto oleo roseo uteris cataplasmate, & extrinsecus custodix causa betæ, aut lactucæ folia superpones. Est autem quando opium & crocum cum lactucis tritum cum ceroto oleo roseo mixto in linteo inductum superpones.

## A D I S C H I A E D O L O R E S .

**I** Schiadicis autē de farina lupinorū cataplasma impones cum aceto, aut oxymelle, aut pusca coquens. Calamentis autē trita & cataplasmate imposita, quam fortissimū fit adiutorium. Capparidis radicis cortices coxæ dolores iuuant extrinsecus appositæ, cū hījs quæ ad hæc expedire possunt admixta. Intrinsicus autē iniiciendus est garum ex insalitis piscibus, ut molestantes humores extrahat, & de intestinis euacuet. Maxime autē hoc facit de insalitis piscibus silurus, & de sardinis factū garum. Talphetū uero semen per clysterem ministratū iuuat, sanguineū euacuans humorē. Similiter autē & centaurea tenuis decocta facit.

D E Q V I B V S M E D I C O S V G G E R I T V R ,  
solicite tractanda sunt.

**H**æc omnia in tantum quæ diximus sanari possint, secundum medicinæ rationem non ignoro. Oportet igitur & de cæteris sollicitudinem præbere, & quæ significantur medico, quæ contingunt & antequam fiant, magnas & insanibiles

**C** insanabiles passiones futuras præuideat, quod ante delongius manifestantur. Sonitus igitur aurium, & inter se diuersi motus turbantes, & spasmi per aliqua membra facti, & si labium inferius subinde tremat, & sine uoce fiat, & si sit obliuiosus & odorem perdat, & somni profundi contra consuetudinem sint, profundi aut leues sint & phantastici, & in cibo subinde se opprimi querelentur, & actu uenereo plus à consuetudine frequentius compellentur, ita ut non semel, aut bis, sed maior eis motus contingat, hijs hoc patientibus, apoplexiam aliquã fieri necesse esse significat, & epilepsiam, aut apoplexiam, aut melancholiam, aut maniam. Oportet ergo scire medicum, ut cum rogatus fuerit, quam celerime succurrat: Forsitan enim necesse est phlebotomari, aut catarticum dari, aut utrunq; fieri, aut alia quædam expedire. Oportet ut prohibeantur nascensia mala: nam & hypocistis præcedunt signa, & ante oculos apparent caliginosa quædam uolare, qualia sunt cynicellæ, aut muscæ, uel capilli, & hijs similia cum capitis dolore. Hæc ergo omnia scire oportet medicum, & quæ oportet adhibere catartica, & cibos competentes, uel quæ aliter iuuare possunt. Labores autem spontanei, aut somnia profunda, aut phantastica, aut uigiliæ extra consuetudinem, & sudores post somnum, & sitis contra consuetudinem, & ciborum fastidium cum febricula. Omnia hæc scire oportet medicum, ut facere sciat, quæ ad hæc cõueniunt, & quæ circa thoracem contingunt. Si non suggerantur medico, ad hæc signa pericula eueniunt hæmopticæ passionis & impijci. Nigra autem urina nephrotica est, & interdum passio prosequitur, & magis si hæc senibus contingat. Sed medici est discere, atq; inuenienda custodia, quæ per urinas purget. Renes debent exercere caballicationes, & uectationes non multum existentes. Oportet autem neq; in doloribus, quando in articulis fiunt pedum negliger habere. Si enim semel cessauerit, & neglectum fuerit, reuertitur iterum: utique frequenter molestans, & maius malum mouens, insanabile efficitur. In initio autem melius est curationem adhibere, ut sanitatis remedium consequatur facilius: Frequenter enim factas indigestiones, & carrias ex ipsa indigestione generatas, uel habere debet suspectas & in pneumatosi. Indicanda sunt enim medico, & non sunt tacenda, quia sunt pessima quæ sunt inflationis, quas Græci physiodes appellant passiones, id est, hypocondrica fit; passio quæ fit cum timore & tristitia inrationabili accidente menti melancholia uocatur. Multa autem & alia per neglectũ inuictum malum antecedunt. Propter quod oportet nullo modo, neq; parua, neq; grandia, quæ contingunt contra consuetudinem tacere.

AD DENTES NE A LACTE LAEDANTUR.

**L**ac lædit dentes, si frequenter in usu fuerit, & gingiuas similiter. Hoc ergo infusas & molles reddit, & nigros facit dentes, & infusas gingiuas, & cometas. Oportet ergo post comestum lac de uino temperato cum calida os lauari. Melius autem fiet, si & mel mittatur in uino, & sic lauet.

PVLVIS QVI FACIT AD RANVLAM SVB

lingua, ad ulcera in ore, & ad dentes, & gingiuas reumatizantes.

**P**Umice asso 2 VIII, nitro usto, sale usto, ficis siccis ustis ana 2 VIII. Omnia æqualiter cum melle miscebis, & uteris.

AD EOS QVI NIMIO SVDORE

fatigantur.

**R**eprimuntur sudores superspars corpore gessamia, lithargyro, gipso, galla, cisto, myrta, oleo inantino, oleo roseo, oleo melino, oleo lentifino, oleo myrtitis inuncti. Item illita mannis, & amilo cum uino, & oui albumine.



## AD CARDIACOS.

**C**ardiacos autem iuuat cataplasma in stomacho de rubi folijs cum ceroti modico, aut pane, aut myrtæ folio, aut uitium palmites teneræ, aut folia plantaginis cum pane, aut ceroti modico, aut mala cydonia, aut dactyli, & enemata iuuant adhibita de ptyfanæ succo. Alligentur autem extremæ partes: iuuat & cerotum humidum cum sinapi tritum.

## P R O G N O S T I C V M D E A E G R O T I S.

**A**D omnes ægrotantes trochiscos facies de camimola herba trita & sicca bis. Quando autem opus habebis terēs cum oleo trochiscum perunges caput & totum corpus, & inuolues pannis, & dabis bibere calidam aquam, & ita expectabis modice. Reuertens enim si inuenieris cum sudantem, sanum fieri sperabis: Sin minus, morietur, & andragni succos da ei bibere.

## C O N T R A S I N G V L A V E N E N A.

**D**E uenenis quando sine discretione scribitur, aut quando dicuntur quæ sequuntur lsziones, scribere quidem curabo. Præstat enim hæc ipsa didactalia pessimis occasionebus chirurgiam. Quanta autem communia adiutoria credita sunt quæ mortales accipiunt.

## P O T I O N E S Q V I B V S B E N E

habeant qui uenenum accipiunt.

**O**portet eos mox uomere, absq; aliqua dilatione. Ante ergo quam uomant bibant hydroleum, & iterum diuersos cibos dabis ad saturitatem, & iterum uomant. Quod si adhuc nec sic euacuantur, aut quod biberint retineatur, tardiores uel obrusam habent uirtutem. Si autem & uenter incendatur post uomitum, oleum roseum cum aqua dabis bibere, & iterum uomere iubebis. Dabis autem & tyriacam cum uino potantibus: nam ipsa sola resistit uenenis. Non autem inuenta tyriaca, arceotidæ nouæ & ruta folia XXI teres & dabis bibere, aut herbam campithee cum uino dabis. Somnus autē omnino prohibendus est, fricationes in extremis partibus utendæ sunt utiq; palpationibus. Subducendum uenenū approbatur per mordicationem, & irritandus est & protocandus usu uenter per clysterem acrem, & unguendus melle abundanter, aut aliquid alio modo subducendis miscebis. Cōmune est ad omne uenenum medicamen hoc, quod recipit galbani mundi ʒ IIII, Smyrni ʒ IIII, teres & dabis bibere cum dulci uino. Item Ruta folia numero XX, nuces duas, salis acinum unū, caricas duas. Hæc si ante acceperit, & postea acceperit uenenū, nullo modo nocebitur. Facit autem & origanū cum gallina simul cocta, & conditū ius bibat.

## A D C A N I S E T H O M I N I S

ac simiæ morsum.

**C**inerem cum aceto distemperabis, & cataplasmate impones. Cepas tritas cum melle cataplasmate impones, aut ficus, aut amygdalas amaras teres, & superpones. Qui autem amplius habent herbum, quod Græci orobon dicunt, cum melle quam pinguisimo superpones, aut yrin illyricam tritam cum melle impones. Quæ autem fuerint inflammata ex morsibus lithargyrum teres cum aqua, & līnes loca inflammata.

## A D C A N I S R A B I D I M O R S V M.

**Q**uos canis rabidus momorderit, gambaros uiuos in olla rudī mittes, & in igne pones, & donec ex eis cinis fiat ardeant, ut facilius terantur. Incendantur uero in cynocaumata signo leonis luna XVIII, & facies medicamen. De gambarorum cinere mittes partes X. Gentiana autem partes V, libano

C partem unam, & cōmiscens in uinum dabis bibere eis quos canis momorderit rabiosus per singulos dies, usq̄ ad dies quadraginta cū aqua cochleari maior uno. Si autem post paucos dies aliquis transactos postq̄ momorderit canis ceperit bibere, duo cochlearia dabis. In plaga autem impones medicamen, quod recipit, pice brucia librā unam, aceti acerrimi ꝑ i italicum, opopanacis ꝑ iii. Hoc medicamine si quis utatur sanabitur si à cane rabido fuerit uulneratus.

Ad arthreticos autē & podagricos addo ego medicamini de gambaris superius factō. Rare quidem petroselinō partes octo addidi, Sapius autem decē, aut duodecim misī, interdum autē amplius, ut per urinas plus deduceret humores. Plus uero iuuat arthreticos, & maxime eos q̄ molles & albas habēt carnes. Das uero mensurā suprascripto mediocrē, interdum cum aqua, interdū cum mulla.

AD SERPENTIVM MORSVM.

Sicca calamentis ad serpentium percussum cito succurrit, & ex profundo trahit ad se omnem adiectum humorem, & cestrū herba contusa super plagam imposita adiuuat omnium serpentium morsus inlata uenena linteum inducta. In potionibus autem, dabis rutā agrestis semen, & spolion, & coagulum cetuinū, & leporinū, & betæ radicis succos. Hæc cum uino sunt danda: sed & dragonicæ herbæ radicibus si aliquis perungat manus suas, & teneat serpētes non eum laedunt. Hæc omnia scribimus, quia experimentata sunt. Ad hæc habemus de serpentibus factam theriacā, & cognoscas manifeste celeriter liberari qui à serpētibus fuerint percussi, & eos qui accipiunt uenenū si utiliter sit confecta cum diligentia multa: Quia plurimi ut uendant faciunt inutile non ex quilibet pigmentis.

D Item antidotum quod facit ad serpentium morsus & scorpionis, & ad canis rabidi morsum, & ad suspirium, ad colum, ad hominis morsum, & similia. Ante autem quam bibat, lines morsuram, & dabis ei bibere 2 i, si febricit, in calida aqua, & si sine febre fuerit, cum uino. Recipe autē hæc: piperis 2 viii, apij seminis 2 vi, anisi 2 iii, opij 2 i & ꝑ, castoreo 2 i & ꝑ, mellis non despurmati ꝑ i, & ꝑ, conficies & uteris. Extrinsecus uero super morsuras uel puncturas serpentium superponenda sunt quæ extrahant uenena. Utilia autem sunt ad hæc folia ficus trita & superposita, & surfures cum acri coctæ aceto: & picula imposita bene facit.

AD EOS QUI DE FVNGIS malis suffocantur.

O Pobalsamo cum lacte muliebris aut aqua, qui à fungis strangulatur, leuigantur, aut oxymel cum nitro bibat, & gallinarum domesticarum stercorea cum oxymelle dabis, et raphanos quam plurimum manducet, aut feces uini uistas & tritas cum aqua dabis bibere.

AD LAC COAGVLATVM ET caseatum in uentre.

A Cetum, aut sapam, aut coagulum quam plurime cum aqua fontina potui dabis, aut silphium, & sulphur æquali pondere terēs in pulca dabis bibere.

AD SANGVISVGAS POTATAS.

A D sanguisugas potatas acetū acerrimū potum dabis, aut oxyalum, id est, acetum cum sale. Utere autem & ea quæ uentrem soluant. Simul enim exire solent cum stercore & sanguisuga. Facit enim succus anagallidæ herbæ potatus. Nos autem allium manducare dedimus, & proiecimus eas, & nihil de prædictis usi sumus.

AD VESPARVM VEL APIVM MORSVRAS.

**A**D uesparū uel apium morsuras malux folia trita superpones, aut sisami folia, aut ipsum sisamum teres, & cataplasmate impones.

AD SCOLOPENDRÆ CVRAM.

**C**Vm sale & aceto acerrimo calidis fomentabis, & facies cataplasma, & superimpones.

AD MUSTELARVM MORSVM.

**A**llium teres cum sua cortice masticatum & cuminum, & superlines morsuram, & circa plagam quæ sunt loca. Si autem post passum mustela morderit & plagam fecerit, cum sale & aceto calidis foue, & hordeum ustum super sparge super plagam, & circa ipsam plagam loca tumentia inlines.

AD CANIS ET HOMINIS MOR-

sum, & simia.

Cinere aceto cōmiscens, cataplasmate superpones.

## D. ORIBASII SAR-

DIANI IVLIANI CAESARIS

ARCHIATRI MEDICAMI

NVM LIBER.

ELECTARIVM DIASPOLETI.



**H**OC medicamen non inutile exponam repertum in Aegyptia lousi ciuitate, atq; inde ob hoc Diaspoleti dictum diageganū. Cymini in aceto per triduum infusi, & iterū siccati & triti subtilissime pulueris. ℞ I, piperis longi, aut albi, uel si hij defuerint nigri ℞ I, ruta uiridis folia ante unam diem collecta ℞ I \* semuncias. Quod si uenter fuerit strictus ℞ I conficies, & utere. Stomachum enim excitat, uentositatē mitigat, digestionem accommodat, aluum mollit, phlegma & bilem educit & extenuat: uitia quoq; pectoris, lateris, epatis, splenis, ac renum curat, & mitigat. Interdum enim cum melle facies electarium, & proficiet phlegmaticis. Interdum autem cum succo puifanæ confice pro melle, & faciet cholericis & melancholicis. Accipitur enim mane & sero cochlearibus singulis.

CONFECTIO OXYMELLIS.

**M**ellis optimi heminam unam, & aceti in gustu nō satis acuti, nec satis dulcis heminam unam, coques simul donec reuertatur ad mellis crassitudinem; ita ut in gustu mel non uideatur esse crudum. Dabitur autē cum aqua calida temperatū. Mellus ergo est, accipientis sensu iudicari mediocritatem ipsius. Temperantia autem eius quam plurimis expediens est: Sed hoc modo oportet eius temperantiā fieri, ut aceti sit una pars, & duæ partes mellis despumati sint, & sic coquatur: Aut hoc modo conficitur cum aqua oxymellis: Mellis miscet bis duas partes, & unam aceti, & aquæ quartā partem. Hæc uero coques, ut ad tertiam aut quartā reuertantur portionem, & spumam dum coquitur auferes. Fortius autē si uolueris facere oxymellē, æquales partes aceti & mellis miscetbis.

CATARTICVM COPTARION.

**S**imila ℞ IIII, nucleis pineis 2 IIII, pipere 2 II, diagrīdio 2 IIII, melle despumato quod sufficit. Perfecta autē dosis 2 II datur maxime ictericis ad deponendum.

X 2 COPTA

## COPTARION CATARTICVM.

**S**imila, scamonia 2 I, nucleis pineis grana XL, pipere grana XX, melle quod sufficit: dosis autem est 2 I.

## PASTELIVS CATARTICVS.

**D**iagridio, euphorbio, ana 2 III, pipere folio, ana 2 II, melle libra I. Dosis autem est ʒ I. Item pastellus catarticus: Diagridio 2 III, pipere grana XL, nucleis pineis grana XL, melle despumato ʒ VI, facies autem pastellos III, aut VI, & dabis unum manducare.

## PANIS CATARTICVS.

**S**camonia 2 V, salis amoniaci ʒ I & ʒ, sparsi de simila libras II, de salmoria amoniaci salis conficiens spatium & scamoniam, facies buccellatos numero X. Item panis catarticus: Aniso, sale comuni, pipere, ana 2 III, diagridio ʒ I & ʒ, sparsi de simila confecto in uino & melle, hoc est, in uino mulso libras II, facies autem buccellatos XII, & dabis unū in dulci.

Item panis catarticus: Gariophilo I per I, cymino folio, aniso, foeniculi semine, spicanardi, ana I per I, scamonia ʒ II, de simila facto sparsi libras II, conficies cum fero lactis, & speciebus tritis puluerem earum admiscebis, & facies panes habentes singulas uncias, & dabis exinde unum in dulci: Quod si bene uolueris purgare facies panes XVI, aut XIX, & dabis ut supra.

## BVCELLATI CATARTICI.

**S**parso libram I, scamonia ʒ I, apij semine ʒ I & I, epithymo ʒ I & ʒ, agarico ʒ ʒ, pipere grana XV, facies autem buccellatos VII, conficiens eos cum uino & melle, aut cum hydromelle, & utere.

Item pastellus catarticus: Flore farinæ, nucleis pineis, ana ʒ VI, diagridio 2 III, mellis ʒ I.

## SALIS CONFECTIO AD choleram deponendam.

**S**camonia ʒ I, pipere 2 III. sale comuni frixo ʒ I, dabis aut in ouo, aut iure gallinæ, aut ubi uolueris dabis sine periculo.

Item Sal catarticus faciens cephalargicis, & hemicranicis, & scotomaticis, & quibus in auribus sit sonus, & oculorum uisionem acutiorem reddit, & hæmorroidas mouet, & menstrua prouocat, & paralyticos curat, & hydropicos iuuat, & ad epilepticos, & arthreticos, & podagricos, & ad phlegmatis abundantiam facit mirabiliter. Euphorbij, piperis, ana ʒ I, salis amoniaci ʒ II, dabis autem cum mulla 2 I, & iuuabit ad omnia quæ prædicta sunt, & cibum non corrumpet.

Item sal catarticum, ad omnes longas passiones quæ sunt in meninga cerebri, & ad epilepticos, scotomaticos, cephalargicos, hemicranicos, & ad aurium tinnitus, uel sonitum diuturnum. Satis etiam iuuat & ad oculos dolores, & caliginem tollit, & eos quos sanguis hædit multum iuuat: Sed & typicos iuuat. Mouet etiã menstrua in quibus constricta sunt, sed & hæmothoidas mouet similiter. Dabis autem semel in mense eis qui superscriptas patiuntur ægritudines. Cauendum uero est ne ipsa die detur, in qua ante acceperat. Dandus est etiam in declinatione passionis, dabis & in quarto mense. Recipiet autem hæc, euphorbij 2 III, piperis 2 II, salis amoniaci 2 I, cymini 2 I. Integra autem dosis 2 I est, dandus est in mulla, & quamdiu purgat uentrem, bibat calidam aquam.

## A P O Z I M A C A T A R T I C A .

**A** Quæ phialas III, aneti fasciculum unum, cymini quantū digitis semel leuare potueris, diagridij scrupulos III, coques ad tertias & dabis ad bibendum. Item apozima catartica, absinthij fasciculum unū, aquæ phialas III, coques ad tertias, & colabis, & terens aloë → III, & diagridij → II, dabis cum apozima suprascripta. Alia apozima catartica, ad eos qui colum patiuntur, ut in pedibus deponatur interius. Epithymi, ana → III, hellebori nigri, diagridij ana → I, coques in aqua phialis tribus, ut ad unam reuertatur, & dabis bibere. Hoc autē subinde accipiat, ita ut in omni mense, aut in alio, aut satis ut in tertio mense tranfponat, ut in anno quatuor bibat potiones.

## C A T A R T I C U M D I A C Y D O N I U M .

**D** E cydonijs coctis libram I diagridio ∞ II, pipere, gingibre, ana 2 V, conficies & utere. Aliud catarticum peculiare Oribafij, quod simbiocarion nominauit: Diagridio ∞ II, pipere, gingibere, sale frixo, petroselino, ana ∞ I, faciens puluerem, dabis in potione 2 II cum mulfa.

## C A T A R T I C U M A D P H L E G M A

deponendum.

**L** Iquiritia, cocco cnidio purgato, ruta uiridi, ana ∞ I, melle quod sufficit. Aliud. Aneti semine, opio, ameo, pipere, cocco cnidio, croco, lacteridis, ana 2 III, apij semine 2 I, cassia 2 III, melle quod sufficit. Dosis autem est cochleare unum aut duo.

## C A T A R T I C U M A D C H O L E R A M .

**A** Pij semine, pulegio, pipere, ana 2 III, diagridio 2 XII, melle quod sufficit. Dabis autem de electario cochleare unū, aut duo, aut tria, secundum accipientiū uirtutem. Aliud catarticum ad cholera deducendā: Aloë → II, diagridio ∞ I, mastiche, absinthij succo, ana 2 II cum succo cydri quod sufficit. Sin minus, cum melle dabis, ut supra.

## C A T A R T I C U M M E L A N C H O L I C I S .

**A** Niso → III, petroselino → II, pipere → II, epithymo → VII, melle quod sufficit. Dabis autē cochleare unū, aut duo, secundum accipientiū uirtutem. Item aliud: Epithymo → VIII, menta → II, ruta uiridi → II, Cum optimo uino dabis per dies tres bibere. Aliud: Epithymo → VIII, ifsin → III. Dabis autē in potione una cum mulfa tepida. Item ad melancholiam: Aloë 2 II, epithymi → II, diagridij obulum unum dabis bibere.

Aliud: Aloë → II, epithymo 2 I, diagridio triobolon, dabis in mulfa, aut cum calida aqua bibere.

## C A T A R T I C U M E L E P H A N T I O S I S .

**C** Oloquintidas duas mediocres caute desuper aperies, ita ut ex ipsis cooperacula facias, & semine omni euacuabis, lanuginē uero intro remittes, & implebis oleo dulci, & cooperacula sua superpones, & permanebis nocte tota. Alia autem die euacuabis coloquintidas de oleo, & coques coloquintidas in cacabo cum aqua, donec excoquantur, & sic eas tolles & proijcies, & in illa aqua remittes oleum quod fuerat in coloquintidis, & addes ibi hellebori nigri triobolon & scamonia 2 III, & ibidem in ipso cacabo pularium de simila facias, ex quo patiēti ante pridie leuiter cibato ad magnitudinē auellanae dabis XXXIII pilulas glutire, aut si potuerit manducare, & bibat aquā. Aliud catar: elephantiosis.

Accipiens unā coloquintidam maiorem, implebis eam de oleo, & stet plena nocte & die una, & ablato oleo coques coloquintidam in olla noua cum aqua,

X 3 donec

**C** donec remaneat pars tertia, & sublata coloquintida in aqua ipsa mittes similam quantum sufficiat, cui admiscebis hellebori nigri 2 I, scamoniæ 2 I, & agita bis cum surculo aneti, & cum fuerit coctum, faciens pilulas ad auellana magnitudinē, dabis ut glutiat. Cararticus de iure galli feris: Occidens gallum uetustum, omnia interiora eius tolles, & lauans implebis sale, & cum acu & filo confues, & coques cum aqua abundante, & olei modicū habēte. Anetum uero & porros mittes ex pleno, ut ibidem simul discoquantur. Cum enim perdiscoctus fuerit gallus, tunc ius fit suauē ad bibēdum, & est aptum stomacho, & purgatiuum fit ipsum ius, & non fit minus ad bibendum duabus heminis. Mirabiliter enim facit ad diuturnissimos reumatismos.

INVUNCTIO ANI AD EDUCENDAM  
uentositatem cum stercore.

**R** Vta uiridis teratur, & cum melle coquatur, ut unus succus fiat, & exinde interius anus perungatur, & bene faciet. Melius enim operabitur si admisceas cyminum & modicum nstri. Aliud: Cyclaminis succus in floccolana inuolutus iniiciat, aut succus cyclamini coquatur cum melle, & balanus inde factus iniiciatur, aut certe ex ipso cyclamino pastellus factus iniiciat. Venositates enim exeunt abundanter & releuantur.

CVRATIO RVFI.

**C** Oloquintidæ interioris 2 XX, camidrij, agarica, ana 2 X, sagapini 2 VIII, popanacis 2 VIII, petroselini, aristolochiæ rotundæ, piperis albi ana 2 V, Cynamomi aut cassiæ fistulæ duplo, spicæ nardi, croci, smyrtij polij, ana 2 IIII. Omnia enim trita & tricozinata cum melle miscens, dabis exinde quamplurime 2 III in mulla.

**D** CATARTICVS LICII AVTORIS,  
dulce ad accipiendum.

**S** Camoniam cum sale quam albissimo teres distissime, & sic eam in pyxide plumbea duplici uase coques. Modus autem coctionis hoc modo fiet: Pones in pyxide plumbea fistulam, aut cannam, per quam super aquam respiret. In qua pyxide mittes scamoniam, quæ cum sale trita est, & mittes pyxidem in uase aqua pleno, ita ut fistula caput foras teneat, quæ fixa fuerit in pyxidem. In aqua autem ubi bullierit mittes erum, id est, herbum, & quando herbū coctum fuerit, tolles desuper focum, & sublata pyxide cum se refrigerauerit tolles, & iterum teres ipsam solam, aut cum albo pipere tantum admixto, quo suauior fit ad accipiendum. Si enim sic confecta detur scamonia, neq; in ore, neque in stomacho insuaue erit catarticum, & nihil minus purgabit.

VNGENTVM CATARTICVM AD VNGENDVM  
anum quod mouet abundanter uentrem.

**S** Tipteriam cum melle teres, & coques donec rubeat, & ex hoc perlines anum. Vocatur autem hoc medicamen cezanagaci: Facile enim educit uentrem, & sine dolore protrahit.

CATAPOTIARVM CONFECTIOES  
ad uentrem laxandum.

**S** Camonia, coloquintida, euphorbio, aloë, bdellio, ana 2 IIII, cum succo caulis ea colliges, dosis est III, aut V noctū. Item alia.

Aloë 2 IIII, diagridio 2 I, cum succo caulis colliges: Dabis autem III, aut V, aut VII, noctū. Item catapotia ad typos, faciunt enim ad sanitatem stomachi, & apta sunt stomacho, & uentrem purgant quammaxime, & typos

**A** typos amputant. Aloë ꝑ II. absinthij succo ꝑ III. squillæ interioris ꝑ I. Squillam autem in pane mittēs coques ut bene sit cocta, & post tollens pensabis & mittes in pila, & fortiter tundes, & supermittens succos absinthij, super sparges tritam aloë, & facies spassum, ex quo faciens catapotia ad ciceris magnitudinē, dabis tarde conualescētibz ex ægritudine, & non cito recuperantibus, secundum uirtutem.

Item aliud catapotium, ad quod supra, scamonia ꝑ I. aloë ꝑ I. coloquintida interioris ꝑ III. bdellio ꝑ III. mastiche, absinthij succo, brassicæ succo, ana ꝑ III. facies autem catapotia orobicas, & dabis XIII. aut XV. aut XIX. aut XXI. Sin uero qui typos patiunt dederis, dabis VII. aut IX. aut XI. aut XIII. aut fatis XV. per dies V. aut VI. aut IX. Si autem uolueris ut phlegmaticū humorem educant, aut citius soluent, adde euphorbij ꝑ I. in tota massa.

Item catapotia, ad typos coactos, Agarico ꝑ II. euphorbio ꝑ II. helleboro ꝑ III. mitro ꝑ II. bdellio ꝑ I. diagridio ꝑ II. epithymo, coloquintida, aloë ana ꝑ II. facies autem catapotia.

Item alia catapotia. Scamonia ꝑ I. aloë, euphorbio ana ꝑ III. cum aqua autem pluuiali facies catapotia, & dabis VII. aut IX. aut XI. aut XIII. aut XV. aut XIX. aut XXI.

## OXYMELLIS CATARTICVS.

**A** Ceti ꝑ III. pulegij plenam manum, hyssopi plenam manū, hæc autem coquens cum aceto ad tertias, post hæc colabis & addes anisi ꝑ I. & ꝑ. polypodij ꝑ I. agarici ꝑ I. & ꝑ. folij —) III. I. spicæ nardi —) V. petroselinij, epithymi, diagridij ana ꝑ I. tenuem autem puluerem supermittes, & coques cum mellis ꝑ uno ad lenes prunas ad mellis spissitudinem, & postquam de foco tuleris, mittes diagridium, dabis autem cochlearia tria.

## CONFECTIOES DIVERSORVM

trochiscorum. Andronius.

**C**halcantho, smyrni ana ꝑ II. libano, stipteria scisti ana ꝑ III. galla asiana ꝑ VI. sidia, aristolochia ana ꝑ VIII. uino austero quod sufficiat, facies trochiscos & utere, cum aceto autem teres, & inlines.

## TROCHISCVS MVSÆ.

**S**tipteria scisti, aloë, smyrni ana ꝑ VI. crocomagnato ꝑ III. chalcanto ꝑ VI. cortice mali granati ꝑ VI. cum uino & melle mixtis copificies & utere. Trochiscus Vari autoris, facit ad hypopias, ad impetigines, ad maculas, & ad carnes supercrescentes, & syringia sanat, facit & ad alia multa, sino pida, iu. xistu, libano, areno, stipteria scisti, æquali pondere cum aceto facies trochiscos

Trochiscus eris, facit ad omnes nomas, maxime autem ad ueretrum, & oris cancos. Croco ꝑ VIII. stipteria ꝑ c. smyrni ꝑ VIII. resolues cum aceto, & melle mixtis & facies trochiscos. Ptsisanæ autem infusa teres.

Trochiscus diacartu ad nomas, id est, cancos, carta combusta ꝑ XXXII. calce uiua, arsenico, sandaraca ana ꝑ I. cū succo plantaginis facies trochiscos.

Trochiscus andronius. scisti, smyrni ana ꝑ III. chalcanto ꝑ II. libano ꝑ VIII. cetino ꝑ X. aristolochia ꝑ XII. aliqui ꝑ VIII. galla asiana ꝑ VIII. sapa quod sufficiat.

Trochiscus

C Trochiscus pollidos phragis. Sidia, smirni, aloë, ana 2 VIII. scisti 2 V. libano 2 5, chalcanto 2 V III. felle taurino I VI. uino dulci quod sufficiat.

Trochiscus melas. Sidia 2 X, aristolochia, galla asiana, scisti, ana 2 VIII. aloë, libano, ana 2 IIII. smyrni, chalcanto, ana 2 II. uino bono quod sufficiat, facies trochiscos, & uteris cum sapa.

Trochiscus ad lepras, & impetigines. helleboro albo, pipere longo, cacreo alcionio, sulphure uiuo, calamo aromatico, adarce, & qualia pondera teres & cernes, & cum aceto facies trochiscos: fricabis autem partem ipsam cum aspero panno, & unges cum digito, & in sole facies stare.

Trochiscus crocodis. Smyrni, cistoreo, ana 2 II. croco 2 III. opomicono 2 III. aniso, apij semine, daucifemine, storace, ana 2 IIII. iusquiami semine 2 VI. cum aqua facies trochiscos triobolos, id est siliquas octo aureas pensantes.

Trochiscus diaspermatus. facit ad dysentericos & coeliacos, & ad uentris fluxum, & ad tussim, & ad profluuium sanguinis, apij semine 2 III. feniculi semine, aniso, ameo, papaueris albi semine, iusquiami semine, opio, sidus, id est, floribus mali granati, quod si flores non habueris, mittes corticem, ana 2 I. croco, floribus rosarum, galla asiana, ana 2 IIII. Omnia semina in puluerem redigens, & opium in aqua infundens facies trochiscos habentes 2 I. & 5. Dabis autem ad tussim in mulsa, ad uentris fluxum, cum succo oryzae. Qui cum tussē reijciunt, cum pusca. Ad profluuium sanguinis, cum aqua de lentisco. Ad nauseam, cum aqua absinthij. Ad interaneorum dolorē, uel inflammationem stomachi, in mulsa. Ad dysentericos, in apozima rosarum dabis uinum trochiscum mane & sero.

D Trochiscus ad dysentericos, & hæmoptoicos, & ad fluxum sanguinis mulierum. hypocistide, gessamia, galla asiana, acacia, cirro, ana 2 VIII. & cum aqua pluuiali facies trochiscos. Uteris autem ad dysentericos iniiciens cum succo oryzae aut lentisci. Ad hæmoptoicos autem, in uino cyatho frigidæ aquæ mittes medicaminis 2 I. & dabis bibere. Ad fluxum sanguinis mulierum similiter iniicies cum aliquo succo arnoglossæ, aut polygoni, aut strigni, aut appones in crocide die lanam, & adijcies ad os matricis resolutum cum succo strigni, aut polygoni, aut arnoglossæ.

Trochiscus ad impetigines. Chalcitheo, misco, sulphure uiuo, calcantho, libano, ana 2 IIII. fici folijs uiridibus 2 VI. cum aceto facies trochiscos, & cum aceto resolues & uteris.

Trochiscus passionis. Lippidus chalco 2 XII. chalcucicaumeno, salis ammoniaci, stipteria, strangili, iu, xistu, ana 2 VIII. libano 2 VIII. teres chalcucicaumenum, alias cernes, lippidū & stipteria teres cum aceto ad solem. Cum autem omnia triueris, mittes libanū & teres diu, quando autem se collegerit, facies trochiscos ad omnes, ubi autē opus fuerit, cum aceto resolues & lines.

Trochiscus proculi podagricis. Sanat autem podagras, ischiadicos, & est uniuersalis ad omnes arthreticos, & omnes dolores, ita ut anno uertente bibatur, & omnem sensibilitatem acutiorem reddit, purgat mitius per urinas, & totum corpus sanius preparat, sanat & epilepsias, & sciros epatis & splenis. Conficitur autem sic. Camitrius 2 IX. centaurea tenui in carpo 2 VIII. aristolochia longa de montibus collecta 2 VI. gentiana non pertusa 2 VI. hypirico 2 V. petroselino 2 III. fu. s. I. agarico 2 I. in alio agarico 2 I. melle ff I. Singillatim autem tundes & cernes, & admiscabis



**A** Iſcebis cum melle, & tundes bene, & facies trochiſcos. Vſus autem ut bibantur ſit bene digeſtus, & bibat hora tertia, poſtea uentrem faciet reſolutum cum aqua calidã cyathis duobus, & cum acceperit deambulet uel exerciteſ. Si autem inchoare uult potionem, non in ætate accipiat, ſed in alio aliquo tempore. Interuallum ad balneum aut ad cibum poſtquam acceperit, trium horarum ſit. Diſgeſtionem autem & potionem uitet donec impleat totius anni dierum numerum. Sit autem diæta, boni ſucci, digeſtibiles. Non ſupra meſuram accipiat, ut indigeſtio ſentiat. Braſſicam enim comedere arthreticis non ſuadeo. Habet autem aliquid contrarium, uinum uero mediocriter bibant uti oportet, & medio-  
criter temperato cum cibo.

Trochiſcus Dia electro, id eſt, de ſuccino. Facit enim ad hæmoptoicos, & ad tuſſim lōginquã & recentẽ, & phthiſicos, & anaphreticos, empiyicos, coeliacos, dyſentericos, in pneumatominos. Eſt autem ad aurium cauſas bonus. Piſillio purgato 2 XL. quidã 2 XX. yreo ſillyrico, maſtice, electo, id eſt ſuccini limatura, croco, ana 2 XXX. opio 2 XY. piſillia, id eſt, herbæ pollicaris ſemẽ in aqua calida in fundes, & quãdo glutinoſa fiet aqua, exprimes eã, & ex liq̄re ipſo cõficietis medi-  
camẽ, ſinges trochiſcos, & dabis tres obolos dormitũ eunti. Sint autem aquæ ff III.

Trochiſcus Diaagatia, ad podagricos, arthreticos, & ad inflammatiões, & ad omnes pruritus initio illitus. Agatia nigra & rubea ana ʒ III. colli ſtrictoni-  
co perlucido ʒ III. ichthyocollis ʒ III. amoniaco amato ʒ II. glaucio, aloẽ, añ ʒ II. libano areno ʒ I. helleboro albo & nigro añ. ʒ I. acetũ ſquilliticũ ſupermittes, & facies trochiſcos, & cum opus fuerit teres cũ ſupraſcripto aceto trochiſcũ, & lines locũ, & cum ſe ſiccauerit, iubebis eum ad balneũ ambulare, & cum ſe lauerit, iterum ſuperunges de ipſo medicamine.

**C** Trochiſcus hemiceranicus. cardamomi ſemine 2 III. rutæ uiridis folijs 2 III. opio 2 I. aceto quod ſufficiat.

Trochiſcus, diaalicauus, qui & cirrus uocatur, qui facit ad eryſpilas, & tri-  
mata, & ad narium tumores reſolutus cũ aceto aut puſca aut aqua frigida. lythar-  
gyrio 2 XXIII. piſmithio 2 XII. ſtipteria ſciſti 2 III. calcanto 2 III. alica-  
caui cortice uiridi, aut pro alicacauo ſtrigno 2 VIII. ſinopidem ſi uolueris ad co-  
lorem faciẽdũ mittes, & facies trochiſcos cũ aqua, & uteris interdũ cũ uino aut

Trochiſcus diarnogloſſus, faciens ad rhagadas, & ſicodas, & ad ſy- (aqua,  
ringia & polipos: Hypociftidos cilo ʒ III. licio, balauſtio añ. ʒ III. opio, ro-  
ſis ficcis, ana ʒ II. gallis ʒ II. acatia ʒ III. plantaginis ſucco, guminis, ſul-  
phurẽ uiuo, roſis, floribus, cornu ceruino uſto ana ʒ II. facies trochiſcos, ſic-  
cabis in umbra, & uteris cum uino & melle muſcato, reſoluẽs in cote ocularia.  
Ad polipos autem cum ſtuppa intus mittes, & in die una tertio mutabis.

Trochiſcus ad ſcabiem. lithargyrio ʒ II. calce uiua, piſmithio, uermicario,  
ana 2 III. uino quod ſufficiat.

Trochiſcus diacaſtoreus, qui facit ad oris & ueretri ulcera, & ad dẽtes laxos,  
& gingiuas purgat, ſmyrni, caſtoreo, ſtipteria ſciſti, ſidia, iu, xiſto, ana ʒ II.  
multo ſynopico, miſeu ana lib. I. uino quod ſufficiat.

Trochiſcus ad capitis dolorẽ & oculorũ, in lines tẽpora & oculos iuuabis, &  
caput, libano, yreo, gumeo, ana 2 III. ſmyrni 2 I. ouorũ duorũ album ſimul te-  
res & facies trochiſcos, & cum opus fuerit cum aqua reſolues & lines.

Trochiſcus ad capitis diuerſos dolores. Mox ut linieris frontem, ampu-  
tabis dolorem, utique & ſi febrerint aut phreſim patiantur, mirabiliter fa-  
ciet, lauri baccis & uua uiridi, ana 2 VIII. yreus 2 II. opopañacẽ 2 I. & ʒ  
cum

Cum aceto facies trochiscos, & cum opus fuerit cū aceto & oleo roseo induces.

Trochiscus licinicus ad impetigines. Facit enim ad impetigines pessimas.  
 Re: de staphisagria, id est pera, folijs fici uiridi 2 II. misco 2 III. calcanto 2 II.  
 calcitheo, calce uiua, ana 2 VIII. libano 2 III. sulphure uiuo 2 X. aceto qd suffi-

TROCHISCVS AD QVARTANA S. (ciat.

OPIO, ruta, iusquiamo, ana 2 I. croco 2 III. cassia 2 III. sulphure uiuo 2 III. cum aqua facies trochiscos pensantes —) II. & dabis in pusca ante duas horas accessiois.

TROCHISCVS ISCIADICIS ETHY-

dropicis faciens mirabiliter, & per urinas depōnens.

Oloquintida 2 VII. peretro 2 III. pipere albo 2 II. smyrni 2 II. facies trochiscos pensantes 2 I. & 5. aut duas, & dabis cum dulci, aut in mullā cyathis duobus, in dies quinq; singulas portiones, sanant educendo phlegma.

Trochiscus ad uniuersas passiones, ad insomnietatem, dabis cum aqua calida ad faucium tu morem: prodest cardiacis, colicis, epaticis, splenicis, similiter in aqua calida. Ad mulieres quæ phantasiā patiunt, & quæ factū frequenter faciunt, in mullā dabis, Ad phthisicos in prima portione incidit frigus, in secunda incidit febrem, tertia potio tamdiu sudat, quamdiu incidat omnem typū. Ad percussum serpentis, ad morsum canis rabiosi, dabis in uino calente temperato. Ad reumatismum stomachi, ad reuma pulmonis, ad pectoris dolorem, ad tussim, & qui excreant sanguinem, si sine febre sunt, in uino calido, si febricitantes, in aqua calida. Ad ulcerationem uesicæ, ad stranguriam, curat tumore per omne corpus. Arthriticis & podagricis in uino temperato dabis. Rec. LL. pauer album 2 III. opium thebaicum 2 III. iusquiamū 2 II. liquiritiā 2 I. crocū 2 I. storacē calamitē 2 I. litium 2 II. castoreū 2 I. mandragoræ cortices 2 I. hypocistidæ succū 2 II. Has species tundis & cribellas, & facies trochiscos in modum pond. fabæ cappadociæ, & dabis in temperata.

D Trochiscus Galeni, ad reuma, ad hæmoptoicos, ad dentes reumatizatos & stranguriam patientibus, & uesicā dolētibus, ad omnes reumaticas passiones. Colicis, splenicis, phthisicis, & ad multas alias passiones. Re. LL. myrrha 2 I. libanum 2 I. opium 2 I. iusquiami 2 5. gariophila 2 5. cinnamomum 2 5. cuphita 2 5. liquiritiæ 2 5. Opium uero in aqua infundis, & fac trochiscos pensantes d. I. dabis cum aqua tepida aut cum mullā.

Trochiscus laxatiuus, febrem tollit & omnem molestiam, cinnamomū, gariophilum, crocum, aloē, cassiam, amoniacum, squinantum, diagrid, spicam, libanum, ana 2 I. mel quod sufficit.

Trochiscus Diamuseos, cardiacis, scotomaticis, abrotanū succum, castoreū, oppopanacē, ana 2 I. 5. myrrha, crocum orientale, rutæ agrestis semē, piper tinapurum, lithos magnetis, cuphita ana 2 I. trita cernis, cōficis cum aceto, & facies trochiscos ana 2 I. & das ieiunio in oxymelle.

Trochiscus Nimfon, dysentericis, pleurenticis, ad mēstrua deponēda. Rec. H. iusquiami 5. selinus sperma 5. anisi 5. hypocistidis 5. opii 5. colligis cum succo polygoni, aut cum succo plantaginis, aut cum uino stipico, fac trochiscos. ana 2 I. & utere.

Trochiscus ad omnem tussim. Rec. H. myrrha trochiten 2 VI. libanū 2 V. opium 2 III. iusquiamū 2 III. cynoglossæ herbæ de radicibus cortices ad solem siccatos 2 III. tundis, cernis, & opium in aqua infundis, & fac trochiscos pensantes 2 I.

**A** Trochiscus ad uomitum restringendū, & stomachum confortandum, & uentrem stringendum. Rec. ff. anisum, apij semen, ana 2 v i. absinthij pontici ʒ. piperis 2 vi. opij 2 ii. castorei 2 ii. Sicca tundis & cribras. Opium uero in aqua infundis per triduum, & post missum in mortario teres diligenter, & commisces omnia. Colliges autem ex aqua, & fac taxillos ampliores auellanz, quos siccas in umbra, & cum opus fuerit, in aqua calida dabis.

Trochiscus, dysentericis, hæmoptoicis, caliacis, pleureticis, ad tussim, & qui saniem uomunt. Rec. H. Ameos, anisum, apij semē, aneti semen, sceniculi semen, papaueris nigri semen, balaustia, ypocistides, opium, gumen. Omnia ana ʒ. i. collige cum succo plantaginis, & fac trochiscos pond. 2 i.

## ELECTARIVM DIAPRASSI VM.

**S**Anat uertiginem capitis, & caliginem oculorum abstergit, palatum & arteriā purgat, distillationē confringit, dolorē dentium mitigat, reumatismū faucium sedat, dolorem de thorace aufert, & pulmones facilius sanat, cordis dolorem tollit, lateris dolorē conspergit, maxime pleureticos mirifice sanat, sciironē epatis & splenis curat, stomachum corroborat, & ad pristinam sanitatē perducit. Omnibus uero interranis prodest, inflationē aufert, phthificos sanat, & peripleumonios curat, tussim soluit, nephriticos, calculos, stranguilia sedat, omnē dolorē colicis cōpescit. Qui habet pallidum colorē emendat, mathoicos sanat, menstrū deducit, ad ordinemq; suū reuocat. Qui autē hoc usus fuerit, à multis morbis cōseruat, nec aqua maligna, nec nebula, nec paludes illis nocent. Conseruat in itinere & sine ægrotatione, facit ad eos qui uenenū biberint, ad morsum serpentis, uel ictus scorpionis, & qui fungum malū comedunt. Stomachus, epas, splen, dolore liberantur. Typum quartanū mitigat, quotidianū & tertianum liberat.

**B** Rec. H. amomi xiiii. aristolochia rotunda xiiii. cassia fistula xi. garopholi xiiii. storacis cal. xi. myrrha, spice nardi, costi, piperian. xii. liquiritia xiiii. pul. xii. piperis nigri. xiiii. Reupont. xii. dragaganū xiiii. ʒ. ʒ. xiiii. peonia xi. saxifraga, yreos, capparīs radicis, ana xiiii. hyssopi xii. pulegij xii. gentiana unc. iiii. anacardi xii. galbani xii. terebinthina xii. petroselinū, maced. xiiii. mastichis xiiii. carea xi. libistini xi. galanga xii. sir, xilobalsami, carpobalsami, rasura eboris, basilici, satureia, añ. xi. aneti semen xii. apij semē xii. sceniculi semen xi. ossa de corde cerui xii. ligni aloē xii. cardamomi xii. corallij xi. squinant, xii. origani xi. diptami ʒ. i. uinci tosseu ʒ. ii. aron ʒ. i. sinona xii. diolo rubeo xii. amigdalæ purgata xiiii. nuclei pini xiiii. piperis albi xi. balsami xi. musci xi. Cuius confectio talis est, prius species teruntur.

Trochiscos, diæpeganum ad omnē typū quotidianū, & notho quartano, & notho tertiano. Rec. H. Crocū ʒ. ii. peretrū ʒ. ii. organum ʒ. ii. hyssopum ʒ. ii. ruta uiridis ʒ. ii. myrrha ʒ. ii. collige cum aqua & trochiscos fac 2 i. & utere cum aqua calida.

Trochiscus, asmaticis, & suspitiosis. Anisum, sulphur uiuum, ammoniacū, castoreū, melantium uel giptes, omnia ana ʒ. i. tusa & cribellata cum aqua collige, & trochiscos fac, dabis cum oxymelle.