

THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
LIBRARY

580.1

L64s16

VA²

BIOLOGY.


RECENT

BIOLOGY

JUL 17 1953

JUL - 3 1970 ;

~~JUL 17 1970~~



CAROLI LINNÆI,
EQUITIS STELLAE POLARIS, ARCHIATRI REGII, PROF. MED. ET
REI HERB. IN UNIVERS. UPSAL.

S Y S T E M A
VEGETABILIIUM.

EDITIO DECIMA SEXTA,

CURANTE

CURTIO SPRENGEL,
EQUITE STELLAE POLARIS ET AQUILAE RUBRAE, PROF. MED.
ET REI HERB. IN UNIVERS. HAL.

VOLUMINIS IV. PARS II.
CURAE POSTERIORES.

GOTTINGAE,
SUMTIBUS LIBRARIAE DIETERICHIANAE.

1827.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

ROBERT M. Y.
VEGETABLES

BY
ROBERT M. Y.

CHICAGO
1880

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

580.1

LB4a16

v.4²

CURAE POSTERIORES

IN

SYSTEMA VEGETABILIIUM.

261306

~~261306~~

Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

A D

V O L U M E N I.

CLASSIS I.

pag. 3.

- n. 5. *Phrynium* W. Anthera lateralis in filamento petaloideo. Stigma incurvum.

pag. 4.

- n. 18. *Ditmaria* *. Add. Stam. 3, 4 sterilia.
n. 21. *Cucullaria* Schreb. Caps. 3locularis. Sem. solitaria apice alata.
n. 22. *Qualea* Aubl. del. glandula. Petalum 1 obcordatum. Fructus 3locularis 3valvis, placenta columnari centrali libera.
Post n. 24. *Amphilochia* Mart. Cal. 5sepalus, sepalo summo breviter calcarato. Petalum 1 obcordatum unguiculatum. Anthera 4locularis. Capsula corticata 3locularis 3valvis, loculis sub-1spermis. Congruit quidem fructu cum *Agardhia* *, quam cuperem cum illa jungere, si modo calcar sepali et petalum unquam dispexissem, antherae etiam loculis binis, haud quaternis, adversantibus. Cum propter anthesin nondum in meis specimenibus evolutam rite contemplari perianthium nequeam, largior, sepalis subesse petalum unum vel alterum, ita ut character potius sit: Cal. 5sepalus. Petalum 1 vel 2. Et *Vochisicis* potius quam *Terebinthaceis* adnumeranda *Agardhia*. Quodsi forte olim cum *Amphilochia* conjungitur, prius tamen nomen meum est, etiamsi genus melius a Martio examinatum.

pag. 5.

- n. 26. *Salomonina* Lour., Donio suadente ad Monadelphiam ablegator.
n. 37. *Callitrichc.* Anthera 2locularis. Nux 4sperma.
n. 50. *Tristicha* Thuars. non Lour. melius *Junceis* adnumeratur.

pag. 7.

Canna indica Ait. *Indiam occidentalem patriam* habent.
Add. ad n. 10.

orientalis Rosc. 15. C. foliis oblongis glabris, floribus sessilibus, bracteis duplicibus, laciniis labii superioris erectis lanceolatis 2dentatis, labio inferiori revoluto 2fido. *Ind. or.* (C. chinensis W., *indica* Ro:

- pedunculata* Rofc. sic melius definitur: C. foliis oblongo-lanceolatis, floribus racemosis geminis longe pedunculatis, calyce reflexo, laciniis corollae emarginatis. *Ind. occ.* Deleatur synonym. W.
- pallida* Rofc. 16. C. foliis oblongis glaucis, bracteis pubescentibus, laciniis labii superioris erectis obtufiusculis, corolla maculata. *Inf. Carib.*
- Ad C. *patentem* Rofc. add. patriam *Inf. Helenae.*
- Ad C. *latifoliam* Rofc. add. caule villofo.
- Ad C. *luteam* Rofc. add. patriam *Amer. austr.*
- C. *speciosa* Rofc. habet flores pedunculatos, haud sessiles.
Add. ad n. 13.
- compacta* Rofc. 17. C. foliis ovato-oblongis late marginatis, spica compacta, laciniis corollae submarginatis.
Patria?

††† *Labium corollae superius* O.

- denudata* Rofc. 18. C. caule fruticoso, foliis subcoriaceis costatis, floribus sessilibus, labio corollae infer. lanceolato acuto erecto. *Patria?*
- brasiliensis* Rofc. 19. C. caule herbaceo, foliis ovato-oblongis costatis margine coloratis, floribus pedunculatis, labio corollae infer. spatulato erecto. *Brasil.* (C. *denudatae* var. Rofc.)

pag. 8.

Ad Calatream Meyer. accedunt:

- flavescens* Lindl. 4. C. foliis radicalibus oblongis costato-venosis subtus glaucis, capitulo sessili multifloro, sepalis exterioribus acuminatis. *Brasil.* Bot. reg. 932.
- violacea* Lindl. 5. C. caule tereti folioso, foliis ovali-oblongis acutis subtus purpurascensibus, capitulo multifloro, sepalis acutis. *Brasil.* Bot. reg. 961.

Ad Marantam.

- angustifolia* Sims. 11. M. caule nodoso, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis, panícula flexuosa, bracteis internis coloratis, calyce ovato. *Peru.* Bot. mag. 2398.
- bicolor* Ker. 12. M. acaulis, foliis ellipticis supra maculatis subtus purpurascensibus, petiolis medio paniculigeris, paniculae articulatae ramulis fasciculatis bracteatis, bracteis lanceolatis cuspidatis. *Brasil.* Bot. reg. 786.
- M. *Tonchat* Aubl. melius sic: M. caule fruticoso ramoso, ramis dichotomis pilosis, foliis ovatis glabris petiolatis, racemis terminalibus paucifloris. *Guiana.*
- furcata* Mart. 13. M. caule stricto dichotomo, foliis oblongo-lanceolatis subsessilibus glaberrimis, pedunculis geminis 2floris, germinibus pubescentibus. *Brasil.*
- cristata* Mart. 14. M. caule ramoso herbaceo, foliis longe petiolatis oblongis subtus pubescentibus, pedunculis cristato-paniculatis secundis, pedicellis 2floris. *Brasil.*

- spicata* Aubl. 15. *M. acaulis*, foliis oblongis acuminatis glaberrimis, spica imbricata lanceolata. *Guiana. Brasilia.*
M. zebrina Sims. a Roscoe Phryniis adnumeratur.

Ad Phrynium.

- grandiflorum* Rofc. 7. Phr. acaule, petiolis basi incrassatis medio floriferis, bracteis 1floris. *Brasil.*
 Ad Phr. *dichotomum* Roxb. accedit synonymon *Donax Arundastrum* Lour.
ovatum Mart. 8. Phr. foliis radicalibus oblongo-lanceolatis acuminatis subtus pubescentibus, scapo 1folio, spica ovata. *Brasil.*

pag. 9.

Ad Hedychium.

- flavescens* Carey. 12. *H. foliis lanceolatis elongatis subtus pubescentibus, spica imbricata, bracteis inferioribus obtusissimis ciliatis, superioribus cylindricis 2-3floris, filamento labellum bilobum subaequante. Bengal.*
maximum Rofc. 13. *H. foliis oblongis subtus pubescentibus, spica capitata, bracteis obtusis ciliatis, calyce villoso, labello amplo bilobo filamentum superante. Ind. orient.*
aurantiacum Rofc. 14. *H. foliis distichis linearibus, costa subtus villosa, spica imbricata, bracteis cylindricis sub-3floris, filamento labellum bilobum bis superante. Ind. or. (H. angustifolium Bot. mag. 2078.)*
glaucum Rofc. 15. *H. foliis lanceolatis acuminatis undulatis subtus glaucis, spica gracili, bracteis 1floris, labelli 2partiti laciniis linearibus, filamento longissimo. Ind. or.*
acuminatum Rofc. 16. *H. foliis lanceolatis subtus villosis, spica laxa, bracteis 1floris, labello acute 2partito filamentum incurvum superante. Nepal.*
heteromallum Ker. 17. *H. foliis oblongis subtus sericeo-villosis, spica laxa imbricata conica, bracteis ternis 1floris, labello 2partito, filamento longissimo. Ind. orient. Bot. reg. 767.*
Gardnerianum Wall. 18. *H. foliis oblongis acuminatis undulatis glabris, spica patula, bracteis 2floris, filamento labellum late ovatum 2fidum bis superante. Nepal.*
carneum Carey. 19. *H. foliis distichis lanceolatis glabris, spica laxa, bracteis convolutis ciliatis 1floris, filamento labellum 2fidum superante. Bengal. Bot. mag. 2637.*
longifolium Rofc. 20. *H. foliis lanceolatis elongatis glaucis, costa media subtus hirsuta, spica patente elongata, bracteis 2floris, labello 2lobo, filamento longissimo. Bengal.*
 Ad *H. angustifolium* notandum Roxb. descr. non ic. Icon enim Roxburghii refert *H. coccineum* Sm. n. 8.
 Ad *H. flavum* Roxb. — foliis lanceolatis marginatis subtus villosis, filamento labellum acquante.

- Ad *H. elatum* R. Br. — foliis oblongo-lanceolatis subtus villosis glaucis, spicis elatis multifloris, labello 2lobo.
 Ad *H. spicatum* Sm. — foliis lanceolatis subtus pubescentibus, spica terminali laxa foliis brevioris, labello 2fido filamentum superante.
 Ad *H. thyriforme* Sm. — bracteis convolutis reflexis 2-3floris, labello 2partito, filamento longissimo.
 Ad *Kämpferam rotundam* pertinet syn. *K. longa* Jacq.

pag. 10.

Ad Kämpferam.

- marginata* 7. *K.* foliis subrotundo-ovatis marginatis subtus
 Carey. glaucis pubescentibus, filamento labelloque 2lo-
 bis, lobis emarginatis. *Ind. or.*
 Ad *K. ovalifoliam* Roxb. — labello 2lobo, lobis mucronatis, fila-
 mento 3fido, lacinia media emarginata.
 Ad *K. angustifoliam* lege Smith. non Rofc.

Ad Curcumam.

- Post n. 9. *latifolia* Rofc. 18. *C.* tuberibus subrotundis pyriformibus, foliis lato-lanceolatis subtus pubescentibus, spica comosa, bracteis cucullatis flores superantibus, labello oblongo subintegro biltriato. *Ind. orient.*
 Ad *C. Zedoariam* Rofc. — foliis utrinque ad costam purpureis, spica radicali. (*Amomum Zerumbet* König., *Curcuma Zerumbet* Roxb.)
 Ad *C. aromaticam* Salisb. — foliis subtus sericeis, spica laterali. (*C. Zedoaria* Roxb.)
 Ad *C. ferrugineam* Roxb. — scapo solo (non foliis subtus) ferrugineo, laciniis corollae lanceolatis erectis.
 Ad *C. rubescentem* Roxb. nota, spicam subinde esse centalem.
 Ad *C. elatum* Roxb. — foliis subtus villosis, spica comosa, bracteis cucullatis corollas subaequantibus.
 Ad *C. Amadam* Roxb. — spica compacta comosa, coma rosea.

pag. 12.

Ad Zingiber Gärtn.

- Post n. 6. *chrysanthum* Rofc. 15. *Z.* spica sessili imbricata, bracteis oblongis, superioribus acumine torto hirsuto terminatis, labello 3lobo, lobo medio porrecto 2fido. *Nepal.*
 Ad *Z. officinale* Rofc. — spicis pedunculatis, bracteis obtusissimis, labelli 3lobi lobo medio latiori emarginato.
 Ad *Z. rubens* Roxb. — labello oblongo obtuso 3lobo.

pag. 13.

- Ad *Z. capitatum* Roxb. — bracteis interioribus oblongis obtusiusculis.

Ad Costum.

- Pisonis* Lindl. 13. *C.* foliis oblongis acuminatis carnosis glabris, capitulo terminali, bracteis obtusis, inferioribus foliaceis. *Brazil. Bot. reg. 899.*

- maculatus* Rofc. 14. C. caule hirsuto maculato, foliis lanceolatis subtus villosis, spica radicali imbricata, bracteis obtusis, labello obovato denticulato bistriato. *Afric. tropic.* (C. afer β . Ker. in bot. reg. 683.)
- nepalensis* Rofc. 15. C. foliis lanceolatis subtus villosis, vaginarum ore ciliato, spica terminali capitata, bracteis ovatis coloratis, labello latissimo undulato crenato hyalino. *Nepal.*
- Ad C. *spicatum* Sm. (non Sw.) — stigmatē 2lobo, lobis quadratis ciliatis, postice processibus lanceolatis acutis.

pag. 14.

Ad Helleniam W.

- Ad H. *coeruleam* R. Br. — racemo terminali inclinato, labello 3lobo basi 2calloso, lobo medio emarginato.

Ad Alpiniam.

- tubulata* Ker. 15. A. foliis remotis oblongis glabris, scapo radicali stricto villoso, bracteis scariosis flores subaequantibus, floribus tubulosis, labello incluso, anthera sessili. *Ind. occid.?* Bot. reg. 777.
- auriculata* Rofc. 16. A. foliis lanceolatis costa media utrinque ferrugineo-pilosa, racemo pendulo, labello subrotundo crenato, basi processibus auriculatis. *Inf. Molucc.*
- diffissa* Rofc. 17. A. foliis lanceolatis marginatis, spica pendula, labello panduriformi, filamento 2fido diandro. *Chinā.* Rofc. Scitam. t. 54.
- Ad A. *calcaratam* Rofc. — filamento 2fido, ramulo altero antherifero.

pag. 15.

Ad Globbam.

- Königiana* * 13. Gl. foliis ovato-oblongis glabris, racemi spicati pedicellis 3floris, antherae processibus retusis subcarnosis. *Ceylon.* (Hura Siamensium König apud Retz. obs. 3. p. 49.)
- Ad Gl. *subulatam* Roxb. — bracteis oblongis coloratis.
- cuspidata* Mart. 14. Gl. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, vaginis ciliatis, spica sessili foliorum vaginis involuta. *Brasil.*

Ad Lopeziam Cav.

- Lopeziae hirsutae* Jacqu. proxima L. pubescens W.

pag. 16.

Ad Ditmariam *.

- floribunda* * 1. D. foliis obovatis, ramulis stellato-pubescentibus, pedunculis paniculae brevissimis incrassatis. *Guiana.*
- violacea* * 2. D. foliis subcordato-oblongis acuminatis, ramis subferrugineis, pedunculis paniculae clongatis

gracilibus. *Brazil.* (*Erisma violaceum* Mart. nov. gen. t. 82., *Qualea calcarata* Link.)

Ad Cucullariam.

- rotundifolia* * 5. *C. foliis verticillatis subseffilibus cordato-orbiculatis emarginatis coriaceis glaucis, racemis solitariis, germinibus glabris. Brazil.* (*Vochoyfia* Mart. nov. gen. t. 83.)
- elliptica* * 6. *C. foliis verticillatis subseffilibus cordato-ellipticis emarginatis coriaceis glaucis, racemis solitariis, germinibus villosis. Brazil.* (*Vochoyfia* Mart. nov. gen. t. 84.)
- Tucanorum* * 7. *C. foliis verticillatis petiolatis spathulatis emarginatis glabris, racemis terminalibus, germinibus glabris. Brazil.* (*Vochoyfia* Mart. nov. gen. t. 85.)
- rufa* * 8. *C. foliis verticillatis petiolatis oblongis obtusis subtus parallele venosis, junioribus, pedunculis calycibusque ferrugineo-tomentosis, racemis longissimis sparsifloris, calycibus obtusiusculis, germinibus hirsutissimis. Brazil.* (*Vochoyfia* Mart. nov. gen. t. 86.) *C. tomentosa* Meyer. praeter folia decussatim opposita acuminata calycibus etiam acutis differt.
- grandis* * 9. *C. foliis verticillatis petiolatis spathulatis membranaceis utrinque glabris, racemis cylindricis elongatis aggregatis, germinibus glabris. Brazil.* (*Vochoyfia* Mart. nov. gen. t. 88.)
- Hänkeana* * 10. *C. foliis verticillatis longe petiolatis oblongis emarginatis basi attenuatis utrinque glabris, racemis terminalibus compositis aggregatis, germinibus tomentosis. Peru.* (*Vochoyfia* Mart. nov. gen. t. 89.)
- pyramidalis* * 11. *C. foliis verticillatis oppositisque petiolatis ovato-oblongis acuminatis subtus pedunculisque villosis, racemo terminali, germinibus glabris. Brazil.* (*Vochoyfia* Mart. nov. gen. t. 90.)
- floribunda* * 12. *C. foliis verticillatis oppositisque petiolatis ovato-lanceolatis cuspidatis subtus scabris, racemis aggregatis, germinibus glabris. Brazil.* (*Vochoyfia* Mart. nov. gen. t. 91.)
- ferruginea* * 13. *C. foliis oppositis petiolatis oblongis cuspidatis subtus reticulatis ramisque fusco-tomentosis, racemis strictis elongatis, germinibus glabris. Brazil.* (*Vochoyfia* Mart. nov. gen. t. 92.)
- alpestris* * 14. *C. foliis oppositis petiolatis oblongis obtusis utrinque glabris, racemis elongatis, germinibus laevibus. Brazil.* (*Vochoyfia* Mart. nov. gen. t. 87.)

pag. 17.

Ad Qualeam.

- multiflora* Mart. 5. *Qu. foliis oppositis ternisve oblongis acutis subtus subpubescentibus, racemis axillaribus cymosis abbreviatis pilosis, calycibus hirsutissimis. Brazil.*

- parviflora* Mart. 6. Qu. pulverulento-tomentosa, foliis alternis oblongis obtusiusculis venosis, racemis terminalibus subpaniculatis, calcare obtuso. *Brazil.*
- ecalcarata* Mart. 7. Qu. foliis oblongis acuminatis subtus venoso-reticulatis fulvo-pubescentibus, racemis lateralibus paucifloris, calyce ecalcarato, corolla 2petala 1andra vel 1petala 2andra. *Brazil.*
- grandiflora* Mart. 8. Qu. foliis breviter petiolatis ovato-lanceolatis acutis elongatis subtus reticulatis pubescentibus, floribus axillaribus subsolitariis, calycibus hirsutis, calcare elongato. *Brazil.*
- fasciculata* * 9. Qu. foliis ovato-oblongis obtusis subtus villosis, floribus axillaribus fasciculatis. *Brazil.* (Callisthene Mart.)
- disticha* * 10. Qu. ramis distichis patentissimis, foliis oppositis subseffilibus elliptico-oblongis utrinque glabris, floribus solitariis axillaribus. *Brazil.* (Callisthene major Mart. nov. gen. t. 75.)
- minor* * 11. Qu. ramis patentibus, foliis distichis lineari-oblongis glabriusculis glanduloso-mucronatis, floribus axillaribus solitariis, calcare obtuso. *Brazil.* (Callisthene minor Mart. nov. gen. t. 76.)

AMPHILOCHIA Mart.

- dichotoma* Mart. 1. A. ramis dichotomis divaricatis pubescentibus, foliis subcordato-oblongis obtusis subtus villosiusculis, racemis terminalibus verticillatis, calcare brevissimo. *Brazil.*
- cordata* Mart. 2. (Qualea cordata * n. 4.)

pag. 19.

Ad Hippurin.

- montana* Ledeb. 3. H. flaccida subramosa, foliis tenuis linearibus acutis. *Ora occid. Amer. bor.*

pag. 22.

Ad Blitum.

- maritimum* Nutt. 4. Bl. glomerulis axillaribus spicatis, calycibus membranaceis, foliis lanceolatis utrinque attenuatis inciso-dentatis. *Nov. Caesar.*

Ad Tristicham Thuar.

- hypnoides* * 3. Tr. caule brevissimo ramoso, foliis sparsis minimis ovato-singularibus, pedunculis terminalibus 2-spathaceis. *Brazil.* (Dufourea Hilar.)

C L A S S I S II.

pag. 24.

- Post n. 63. *Bolivaria* Schlechtend. Cal. 5partitus. Cor. infundibuliformis 5partita. Stam. tubo inferta. Stigma capitatum. Caps. didyma 2ocularis circumscissa, loculis 2spermis. Sem. reticulato-arillata.
- Post n. 66. *Labichea* Gaudich. Cand. Cal. 3partitus. Pet. 5 orbiculata. Antherae inaequales, altera apice producta. Stylus filiformis. Germen compressum 2ovulatum.

pag. 25.

- n. 70. *Henckelia* *. Add. ad characterem. Caps. filiquaeformis 2ocularis 2valvis dorso dehiscens, placentis revolutis, ut speciem 4ocularis faciat. Sem. nuda.
- Jyssonotus* Don. Cal. 5partitus. Cor. campanulata, limbo 5lobc. Stam. 2 sterilia. Stigma subinfundibuliforme. Caps. Henckeliae. Sem. muricata utrinque comosa.
- n. 73. *Sciuris* Schreb. deletur, reducenda ad *Galipeam* Aubl. p. 518. n. 856.

pag. 27.

- Post n. 102. *Aidelus* *. Cal. 4partitus. Pet. 4 calyce multo breviora. Stam. brevissima. Stigma sessile. Caps. compressa 1ocularis 2valvis, placenta libera centralis. *Caryophylleae*?
- Hemianthus* Nutt. Cal. tubulosus 4dentatus inferne fissus. Cor. lab. sup. obsoletum, inf. 3partitum, lacinia media ligulata. Filamenta 2fida, ramulo altero antherifero. Caps. 1ocularis 2valvis polysperma. *Primuleae*.
- Oncoma* *. (*Oxera* Labill.) Cal. 4partitus scariosus. Cor. tubulosa, fauce dilatata, limbo 4lobo inaequali. Stam. fertilia exserta, 2 sterilia. Stigma 2fidum. Germen 4lobum polyspermum disco 4lobo impositum. *Bignoniae*.

pag. 29.

- n. 139. *Lacistema* Sw. habet potius Capsulam 3valvem 1spermam.

pag. 30.

- Ad n. 10. *Jasminum trinerve* Vahl. Cor. limbus 6-8partitus. Laciniae corollae lanceolatae tubo multo breviores.
- stenopetalum* 46. J. scandens laeve, foliis ovato-lanceolatis acuminatis 3nerviis, laciniis calycis subulatis, corollae filiformibus tubo multo longioribus. *Ind. or.* (J. trinerve Roxb.)

pag. 31.

Ad n. 13. (*Mogorium myrtifolium* Lam.)Post n. 14. *nepalense* *. 47. J. foliis oppositis ellipticis acuminatis integerrimis glabris lucidis, pedunculis trichotomis 3floris, laciniis calycis subulatis abbreviatis, corollae linearibus obtusis. *Nepal.* (J. dichotomum Don.)Ad n. 15. *J. bracteatum* Roxb. est volubile, foliis ellipticis obtusiusculis.Ad n. 17. (*Nyctanthes grandiflora* Lour.)

pag. 32.

Post n. 39. *heterophyllum* Roxb. 48. J. foliolis subrotundo-ovatis acuminatis glabris, paniculis corymbosis pubescentibus, dentibus calycis obsoletis. *Nepal.*

pag. 33.

Post n. 44. *pubigerum* Don. 49. J. foliolis sessilibus pubescentibus ovato-oblongis acutis, pedunculis 1floris elongatis, ramis angulatis hirtis. *Nepal.**aureum* Don. 50. J. foliolis ovatis acutis glabris 3nerviis, paniculis lateralibus paucifloris, ramis 5angulis glabris. *Nepal.**Ad Ligustrum.*n. 2. *L. japonicum* Thunb. — paniculae pedicellis glabris.*bracteolatum* Don. 5. L. foliis ovato-lanceolatis acutis utrinque ramulisque glabris, paniculae ramis brachiatis pilosissimis bracteatis. *Nepal.*Ad *L. nepalense* Wall. (*L. spicatum* Don.)

pag. 35.

Ad Notelacum Vent.*Posua* Don. 6. N. foliis oppositis oblongis acuminatis, pedunculis axillaribus 1floris cernuis aggregatis, laciniis calycis aequalibus. *Nepal.**Ad Linocieram* Sw.Ad n. 3. (*Chionanthus ceilanica* L.)

pag. 36.

Post Fontanesiam:

BOLIVARIA Schlechtend.

integrifolia Schlechtend. 1. B. foliis lanceolatis integerrimis. *Brazil.**trifida* Schlechtend. 2. B. foliis linearibus pinnatifidis scabris. *Brazil.*

pag. 37.

Ad n. 12. (*Pisonia mexicana* W.)*Post Codarium:*

LABICHEA Gaudich.

caffioides Gaud. *Nov. Holl. occ.* Frutex foliis pinnatis, floribus racemosis luteis.

pag. 38.

Ad Schwencckiam.

- Post n. 4. *mollissima* Mart. 5. Schw. foliis cordato-ovatis obtusis mollissime villosis, racemis terminalibus compositis, floribus subsessilibus secundis. *Brasil.*
pubescens Mart. 6. Schw. foliis ovatis acuminatis pubescentibus, pedunculis filiformibus. *Brasil.*
Hilariana Cand. 7. Schw. caule gracili foliisque lanceolatis glabris, pedunculis laxè paniculatis filiformibus. *Brasil.*
 Cand. hort. genev. t. 10.

HENCKELIA *

* *Caulescentes.*

- barbata* * 1. H. fruticosa erecta, foliis oppositis ovatis acuminatis integerrimis hirsutis, pedunculis axillaribus paucifloris, staminibus apice barbatis. *Sumatra.* (Didymocarpus barbata Jack. Syst. veg. 2. p. 837.)
- frutescens* * 2. H. suffruticosa erecta, foliis oppositis longe petiolatis ovato-lanceolatis subserratis subtus incanis, pedunculis axillaribus aggregatis paucifloris. *Inf. Pulo-Pinang in freto Malaccæ.* (Didymocarpus frutescens Jack. Syst. veg. 1. c.)
- corniculata* * 3. H. suffruticosa erectiuscula, foliis alternis obovatis acutis serratis villosis, pedunculis axillaribus elongatis, floribus fasciculatis secundis. *Sumatra.* (Didymocarpus corniculata Jack. Syst. veg. 1. c.)
- aromatica* * 4. H. herbacea pubescens, foliis petiolatis oppositis subrotundo-ovalibus obtusis crenatis supra sericeis, supremis sessilibus subcordatis, pedunculis terminalibus paucifloris calycibusque glanduloso-pilosis. *Nepal.* (Didymocarpus aromatica Wallich. Don.)
- crinita* * 5. H. herbacea erecta, foliis alternis spathulatis acutis serratis pilosis subtus rubris, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris petiolo adnatis. *Inf. Pulo-Pinang in freto Malacc.* (Didymocarpus crinita Jack. Syst. veg. 1. c.)
- racemosa* * 6. H. herbacea erecta, foliis oppositis lanceolatis duplicato-serratis supra glabris subtus pilosis, pedunculis axillaribus 2fidis racemosis. *Sumatra.* (Didymocarpus racemosa Jack. Syst. veg. 1. c.)
- elongata* * 7. H. herbacea erectiuscula, foliis oppositis ovatis utrinque attenuatis serratis papilloso-pilosis, racemis axillaribus secundis, pedicellis binatis remotis, corolla elongata. *Inf. ad oram Sumatrae.* (Didymocarpus elongata Jack. Syst. veg. 1. c.)
- villosa* * 8. H. herbacea villosissima, foliis petiolatis ovalibus duplicato-crenatis, pedunculis solitariis multifloris, calycibus laevibus. *Nepal.* (Didymocarpus villosa Don.)
- oblonga* * 9. H. herbacea lanata, foliis breviter petiolatis elliptico-oblongis acutis duplicato-serratis rugosis subvillosis, pedunculis geminis paucifloris,

- calycibus glabris. *Nepal*. (Didymocarpus oblonga Wallich. Don.)
- primulaefolia* * 10. H. herbacea pubescens, foliis petiolatis cordato-ovalibus bicrenatis utrinque rugosis sericeis, pedunculis geminis multifloris calycibusque pilosis. *Nepal*. (Didymocarpus primulaefolia Don.)
- reptans* * 11. H. herbacea reptans, foliis ellipticis crenulatis villosis, pedunculis axillaribus subaggregatis 1floris. *Inf. Polo-Pinang in freto Malacc.* (Didymocarpus reptans Jack. Syst. veg. 1. c.)
- ** *Acaules, scapo subumbellifero.*
- incana* * 12. H. foliis radicalibus longe petiolatis ovatis obtusis inciso-crenatis rugosis dense lanatis, scapo elongato multifloro glabro, involucris calycibusque villosis. *Ind. or.* (Gratiola montana Rottl., Röttlera incana Vahl.)
- plicata* * 13. H. foliis radicalibus subsessilibus cordato-orbiculatis carnosis margine revolutis rugoso-plicatis candido-sericeis, scapo elato pubescente multifloro. *Nepal*. (Didymocarpus plicata Don.)
- macrophylla* * 14. H. foliis radicalibus cordato-ovalibus dentato-crenatis supra villosis subtus nudiusculis, scapo foliis breviori glabro, involucris calycibusque rotundatis. *Nepal*. (Didymocarpus macrophylla Wallich. Don.)
- cinerea* * 15. H. foliis radicalibus petiolatis cordato-ovalibus inaequaliter crenatis supra cinereo-tomentosis, scapo foliis breviori farinoso paucifloro, involucris subdentatis tomentosis. *Nepal*. (Didymocarpus cinerea Don.)

Henckeliae genus constitui 1817, Vahlins jam 1804 Röttleram, falso scriptam, cum Röttlera alia a Roxburghio 1795 jam optime constituta fuisset. Tandem 1822 Jackius Henckeliam Didymocarpus haud apto nomine insignivit.

LYSIONOTUS DON.

ferratus Don. *Nepal*. Herba perennis erecta glabra, foliis ternis lanceolatis coriaceis ferratis, floribus umbellatis roseis.

Ad Schizanthum.

pinnatus R. et P. 1. Sch. glanduloso-pubescens, foliis pinnatifidis, laciniis oblongo-linearibus obtusis dentatis, pedunculis erectis subracemosis. *Chili*.

porrigens Hook. 2. Sch. glanduloso-pilosus, foliis 2pinnatifidis, laciniis oblongo-linearibus obtusiusculis crenatis, pedunculis paniculatis divaricatis. *Chili*. Hook. exot. fl. t. 86.

Sciuris omnino p. 38. 39. deleatur.

pag. 39.

Ad Cyrtandram Forst.

Tres species enumeratae frutescunt, corollaque gaudent ringente. His accedunt novae:

frutescens Jack. 4. C. suffrutescens, foliis lanceolatis ferratis glabris, pedunculis axillaribus 3floris. *Sumatra*.

- rubiginosa* Jack. 5. *C. frutescens* erecta, foliis obovato-lanceolatis ferratis glabris, pedunculis axillaribus 1floris fasciculatis calycibusque viscoso-pilosis. *Sumatra*.
Ab his recedunt *Herbaceae*, foliorum altero minori, floribus saepe capitatis involucreis, corolla subirregulari.
- macrophylla* Jack. 6. *C. suberecta*, foliis amplissimis subrotundo-ovatis acutis ferratis glabris, altero stipulaeformi, pedunculis petiolo brevioribus, involucreo 1phyllo. *Sumatra*.
- maculata* Jack. 7. *C. humilis*, foliis cordato-subrotundis acutis ferratis supra glabris subtus villosiusculis, corollis maculatis. *Sumatra*.
- bicolor* Jack. 8. *C. erectiuscula*, foliis cordato-lanceolatis margine revolutis supra glabris subtus villosis purpureis, pedunculis petiolo brevioribus. *Sumatra*.
- hirsuta* Jack. 9. *C. ascendens* pilosa, foliis cordato-ovatis obtufiusculis crenatis, capitulis paucifloris hirsutis, involucreo 2partito. *Sumatra*.
- glabra* Jack. 10. *C. foliis late ovatis ferratis glabris*, pedunculis abbreviatis, involucreo 1phyllo. *Sumatra*.
- incomta* Jack. 11. *C. erecta hirsuta*, foliis ovato-ellipticis ferratis, pedunculis abbreviatis, involucreo 2phyllo. *Sumatra*.
- peltata* Jack. 12. *C. ascendens*, foliis longe petiolatis peltatis ovatis acuminate obtuse ferratis glabris, pedunculis abbreviatis. *Sumatra*.
- caruosa* Jack. 13. *C. scandens*, foliis inaequalibus carnosiss integerrimis subtus tomentosis, altero oblique oblongo-lanceolato, altero minimo cordato acuminato, pedunculis abbreviatis, involucreo 2phyllo. *Sumatra*.
- aurea* Jack. 14. *C. elata*, folio utroque perfecto subrotundo ovato acuminato ferrato sericeo, capitulis densis subsessilibus. *Sumatra*.

Ad Gratiolam.

- missuriana* Beck. 29. *Gr. caule tereti simplici*, foliis lineari-lanceolatis apice dentatis, pedunculis axillaribus 1floris folia superantibus, bracteis calyce longioribus. *Ad fl. Missuri*.

pag. 41.

Ad Bonnayam Link.

- pumila* * 15. *B. erectiuscula*, foliis inaequalibus obtufiusculis ferratis subtus rubris, pedunculis 2floris folia aequantibus 2bracteatis. *Nepal*. (*Chirita pumila* Don.)
- bifolia* * 16. *B. caule erecto gracili pubescente* 2phyllo, folio altero minimo petiolato, altero maximo cordato sessili, pedunculo terminali 1floro. *Nepal*. (*Didymocarpus* Wallich., *Chirita* Don.)

Ad *B. grandifloram* * (*Chirita urticaefolia* Don.)

pag. 43.

Ad Wulffeniam Sm.

- † *obliqua* Don. 2. W. caulescens pubescens, foliis petiolatis semicordatis ovatis acutis integerrimis, floribus remotis, labio corollae superiori duplo breviori, fauce nuda. *Nepal.*

pag. 50.

- n. 24. Ad *Urceolariam capensem* * (*Linaria aphylla* * Syst. veg. 2. 797.)

pag. 51.

- Post n. 47. U. *conservaeifolia* Jackf. Don. 65. U. foliis multifido-capillaceis, vesiculis 0, scapo paucifloro, calcari brevissimo conico, labio super. indiviso inferius 2lobum superante. *Nepal.*

pag. 53.

Ad Stachytarphetam Vahl.

- Post n. 7. *quadrangula* Mart. 16. St. fruticosa, foliis ovatis acutis crenato-ferratis subtus scabris, spicis laxis, bracteis subulatis calyce brevioribus, caule tetraquetro. *Brasil.*

- trispicata* Mart. 17. St. fruticosa, ramis compressis, foliis oblongis utrinque attenuatis crenato-ferratis glabris subtus venoso-reticulatis scabris, spicis ternis, bracteis calyce brevioribus. *Brasil.*

- elatior* Schrad. 18. St. herbacea, foliis lineari-lanceolatis remote ferratis subtus ad costam petiolisque pubescentibus, bracteis acuminatis calycem superantibus. *Brasil.*

- Ad *St. strigosam* Vahl. (St. hispida Mart.)

pag. 54.

- Ad *Cunilam Buchanani* * n. 6. (C. nepalensis Don.)

pag. 55.

Ad Monardam.

- Russeliana* Nutt. 15. M. caule laevi, foliis subsessilibus lanceolatis ferratis glabris, floribus capitatis, calycibus pubescentibus, tubo corollae longissimo, labio inf. undulato. *Ditio Arcansae Amer. bor.*

- Bradburiana* Beck. 16. M. caule glabro, foliis ovato-lanceolatis subsessilibus dentatis pilosis, involucreo colorato, calycis hirsuti dentibus divaricatis. *Ad fl. Missuri.*

- scabra* Beck. 17. M. caule glabriusculo, foliis ovato-lanceolatis ferratis punctato-scabris, calycis hirsuti dentibus erectis. *Ad fl. Missuri.*

pag.

pag. 66.

Ad Salviam.

- Post n. 143. *rubra* * 188. S. caule elato ramoso hispido, foliis omnibus amplexicaulibus oblongis bullato-rugosis dentatis subtus villosis, verticillis 6floris, calycibus pubescentibus, galea glandulosa stamina superante. *Patria?* Hort. hal.

pag. 67.

- Ad n. 160. S. *sylvestris* et in *Sibiria* obvia. (S. desertorum Schan- gin)

pag. 68.

- Post n. 170. *Simfiana* Schult. 189. S. caule herbaceo villoso, foliis cordatis acutis repando-crenatis rugosis, bracteis cordatis longe mucronatis coloratis, calycibus simpliciter dentatis, staminibus galeam angustam aequantibus. *Russia.* Bot. reg. 1003.

pag. 73.

Ad Veronicam.

- Post n. 40. *himalensis* Don. 91. V. caule erecto piloso, foliis sessilibus oblongis inciso-crenatis utrinque hirsutis, racemis longe pedunculatis, bracteis lanceolatis pedicellos superantibus. *Emodi montes.*

- Post n. 45. *deltioidea* * 92. V. erecta glaberrima, foliis deltoideo-ovalis acutis basi cuneatis inaequaliter dentatis, racemis laxis, bracteis foliaceis obtusiusculis. *Nov. Holl.* Sieber n. 483.

- Post n. 48. *punctata* Don. 93. V. caule repente glabro, foliis inferioribus petiolatis ovalibus, superioribus amplexicaulibus lanceolatis acutis crenulatis, racemis tenuifloris, bracteis laciniisque calycis acutis. *Ad scaturigines Nepal.*

pag. 77.

Ante Oligarrhenum:

AIDELUS *.

- micranthus* * *Nepal.* Herba procumbens ramosa glabra, foliis oppositis oblongis subspathulatis dentatis, floribus axillaribus solitariis minutis brevissime pedunculatis albidis. Hort. hal. 1825.

HEMIANTHUS Nutt.

- micranthemoides* Nutt. *Jamaica. Amer. bor.* Herba repens glabra, foliis subrotundo-ellipticis integerrimis striatis, floribus axillaribus breviter petiolatis albidis. (Herpestes micrantha Pursh. Syst. veg. 2. p. 301., Gratiola repens Sw ?)

ONCOMA *.

pulchellum * *Nov. Caled.* Frutex orgyalis, ramis verrucosis, foliis oblongis obtusis glabris, floribus lateralibus corymbosis. (*Oxera pulchella* Labill. nov. Caled. t. 28.)

pag. 78.

Ad Jusficiam.

Post n. 8. *gonystachya* Mart. 127. J. spica terminali quadrifariam imbricata, calyce 5fido subulato, labio cor. superiore 2fido, bracteis minutis subulatis, foliis oblongo-lanceolatis crenatis glaberrimis. *Brazil.*

humuliflora Mart. 128. J. spicis terminalibus geminis imbricatis villosis, bracteis subrotundis aristatis, foliis ovatis utrinque attenuatis ciliatis. *Brazil.*

Post n. 15. *calycotricha* Link. 129. J. panicula terminali compacta, calycis 5partiti laciniis lineari-setaceis flexuosis corollam subaequantibus, labio cor. infer. 3fido recurvato, foliis subcordato-oblongis acutis repandis undulatis glabris. *Brazil.*

pag. 79.

Post n. 23. *simplex* Don. 130. J. caule simplici foliisque ovatis obtusis venosis pilosis, spica terminali densa abbreviata, calyce 4partito. *Nepal.*

Post n. 33. *spathulata* Mart. 131. J. spicis axillaribus oppositis bifidis secundis, bracteis spathulatis, foliis oblongis utrinque attenuatis pubescentibus. *Brazil.*

oblongata Link. 132. J. caule fruticoso ramofo, foliis lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis, racemulis axillaribus folio brevioribus paucifloris, involucri 3phylo, calycibus 5partitis. *Brazil.*

pag. 80.

Post n. 41. *racemulosa* Wikstr. 133. J. racemulis axillaribus bracteatis, calycibus corollisque 4fidis, foliis subcordato-ovatis obtusis pubescentibus, caule fruticoso angulato. *Inf. Carib.*

pag. 81.

Post n. 61. *genuflexa* Mart. 134. J. spicis terminalibus pedunculatis, bracteis calycisque 5partiti laciniis linearibus ciliatis, labio cor. superiore integro, foliis ovatis cauleque repente hirsutis. *Brazil.*

pag. 82.

Post n. 79. *geniculata* Sims. 135. J. panicula terminali laxa nutante, bracteis subulatis, labio cor. super. integerrimo, foliis ovato-lanceolatis glabris. *Inf. Carib. Bot. mag. 2487.*

pag. 84.

- Post n. 108. *cuneifolia* Mart. 136. J. Spicis axillaribus compositis, bracteis orbiculatis mucronatis ciliatis, foliis ovatis crenatis glabris. *Brazil.*
- Post n. 115. *antirrhina* Mart. 137. J. Spicis axillaribus cymosis folio brevioribus, floribus subsecundis basi gibbis, foliis oblongis acuminatis integerrimis glabris. *Brazil.*

pag. 85.

Ad Dicteram Juss.

- Post n. 2. *recurvata* * 26. D. Spicis axillaribus terminalibusque dichotomis recurvatis, bracteis subulatis calycibusque villosis, corolla pubescente, foliis breviter petiolatis ovatis hirsutis. *Brazil.* (D. brasiliensis Mart.)

pag. 87.

- Post n. 25. *speciosa* Mart. 27. D. pedunculis axillaribus 1floris, bracteis exterioribus ovatis venosis, foliis ovato-oblongis subcrenatis subtus scabris, caule fruticoso. *Brazil.*

pag. 89.

Ad Eranthemum.

- crenulatum* Wallich. 17. E. suffruticosum erectum glaberrimum, foliis ovato-oblongis acuminatis obsolete crenatis, spicis verticillatis ebracteatis. *Ind. orient. Bot. reg.* 879.
- modestum* Mart. 18. E. racemis axillaribus terminalibusque, floribus verticillatis, bracteis fetaceis, foliis ovato-oblongis sessilibus supra hirsutis. *Brazil.*
- detruncatum* Mart. 19. E. spicis terminalibus trichotomis, bracteis subulatis ferrulato-ciliatis, foliis ovato-oblongis in petiolum attenuatis pubescentibus, pulvillis (verrucisve) infra folium truncatis. *Brazil.*
- verbenaceum* Mart. 20. E. spica terminali simplici, floribus oppositis, bracteis ovatis cuspidatis, foliis oblongis in petiolum decurrentibus glaberrimis. *Brazil.*

Ad *Campylanthum falsoloidem* Rott. (Teucrium filiforme Poir. enc. suppl. 2. p. 769.)

pag. 90.

Ad Acaenam.

- Post n. 4. *sarmentosa* Carmich. 16. A. foliolis oblongis argute inciso-ferratis supra glabris venosis subtus sericeis, stipulis indivisis, caule repente. *Inf. Acunae.* (Ancistrum Thuars.)
- Post n. 10. *agrimonioides* Kunth. 17. A. foliolis oblongis utrinque attenuatis grosse ferratis glabris, stipulis integerrimis, spicis axillaribus longissime pedunculatis, floribus inferioribus remotis bracteatis. *Mexico.*

pag. 104.

Ad Salicem.

- Post n. 79. *rostrata* Richardf. 116. S. foliis oblongis acutis integerrimis pubescentibus subtus glaucis, germinibus longe pedicellatis ovato-subulatis tomentosis, stigmate sessili 4fido. *Amer. arctic.*

pag. 105.

- Post n. 88. *arctica* R. Br. 117. S. ramis decumbentibus glabriusculis, foliis obovatis obtusis subtus villosiusculis, squamis amenti obovato-orbiculatis, germinibus subsessilibus tomentosis, stigmate 4fido stylo aequante. *Inf. Melville.*
- Post n. 91. *disperma* Roxb. 118. S. foliis ellipticis mucronatis integerrimis utrinque ramulisque sericeo-villosis, squamis amenti ♂ 8andris ovalibus obtusis, germinibus ventricosis sericeis stylo coronatis. *Ind. orient.*

pag. 106.

- Post n. 97. *desertorum* Richardf. 119. S. foliis ovalibus integerrimis venosis subtus glaucis, germinibus sessilibus tomentosis, stigmate sessili 2fido. *Amer. arctic.*

pag. 109.

Ad Piper.

- Post n. 38. *juliflorum* Nees. 250. P. foliis oblongis obtusis basi inaequalibus eglandulosis glabris, spicis oppositifoliis densis cernuis brevibus subechinatis. *Brafil.*

pag. 112.

- Post n. 78. 79. *Suipigua* Hamilt. 231. P. foliis ovatis 5nerviis glabris, spicis filiformibus solitariis folio brevioribus, caule volubili. *Nepal.*
- Mullefua* 232. P. foliis oblongis utrinque attenuatis 3nerviis
Hamilt. glabris, capitulis globosis solitariis pedunculatis petiolo longioribus. *Nepal.*
- Guigual* 233. P. foliis ovatis acuminatis 5nerviis glabris, capitulis globosis solitariis petiolos aequantibus.
Hamilt. *Nepal.*

pag. 118.

- Post n. 174. *Guildingianum* * 234. P. pubescens, caule repente ramosissimo, foliis petiolatis orbiculato-cordatis obtusis 3nerviis, spicis pedunculatis oppositifoliis erectis. *Inf. Carib.* (Peperomia reniformis Hook, exot. fl. t. 164.)

pag. 120.

- Post n. 205. *rubellum* Haw. 235. P. pubescens, caule ramosissimo, foliis subquaternis ellipticis subtus convexis ru-

bris 3nerviis venoso-reticulatis, spicis axillari-
bus terminalibusque subfoliariis. *Ind. occid.*

pag. 121.

Ad n. 221. *P. obversum* Vahl. (*Peperomia ovalifolia* Hook. exot.
fl. t. 165.)

pag. 122.

Ad Cladium.

Ad n. 3. *Cl. schoenoides* R. Br. (*Cl. teretifolium* Nees in Sieber
agrofl. n. 6.)

Post n. 4. *dubium* Nees. 15. *Cl. panicula racemosa*, squamis late
ovatis acuminatis, bracteis basi ciliatis, culmo
tereti 1nodi basi foliato, foliis compressis an-
gustissimis glabris culmum subaequantibus. *Nov.*
Holl. Sieber agrofl. n. 5.

pag. 123.

Ad *Cl. decompositum* R. Br. (*Cl. Filum* Nees in Sieber agrofl.
n. 11.)

pag. 124.

Ad Laciema.

myricoides Sw. 1. *L. foliis lanceolatis integerrimis subeveniis ressi-*
noso-punctatis, amentis solitariis, stigmatibus 2
sessilibus. Jamaica.

oblongum * 2. *L. foliis oblongis integerrimis venosis, amentis*
subfoliariis, stylo simplici, stigmatibus 2, 3.
Brazil.

pubescens Mart. 3. *L. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis subin-*
tegerrimis subtus villosis, amentis dense aggreg-
atis, stylo simplici, stigmatibus 2, 3. Brazil.
(Mart. nov. gen. t. 94.)

Berterianum 4. *L. foliis oblongis obtusiusculis basi attenuatis*
Mart. *resinoso-punctatis ferratis venosis, stylis 2 fili-*
*formibus. Cuba. Hispaniola. (L. alterum *.)*

ferrulatum 5. *L. foliis ovato-oblongis acuminatis ferrulatis*
Mart. *utrinque glaberrimis, amentis aggregatis, stylo*
simplici, stigmatibus 3. Brazil. (Mart. nov.
gen. t. 95.)

C L A S S I S III.

pag. 125.

- n. 143. *Sonerila* Roxb. Cor. 1petala rotata 3partita. *Ericeis affinis*.

pag. 127.

- Post n. 180. *Gilliesia* Lindl. Perianthium duplex: exter. e 5 bracteis sepaloides patentibus compositum, internum carnosum labelliforme. Stamina 3 perfecta basi in urccolum connata. Stam. 3 sterilia dentiformia postica. Stigma capitatum 3angulare (interdum abortiens 3fidum). Capf. 3locularis 3valvis, valvis medio septiferis. *Familia?*

pag. 128.

- Post n. 187. *Pseudanthus* Sieb. Flores monoeci: ♂ glomerati terminales. Cal. 6partitus, laciniis 2 concretis. Antherae subglobosae sessiles in fundo calycis. Flores ♀ axillares solitarii. Cal. foliaceus 6fidus persistens. Nux 6costata 1sperma. *Santalacae?*

pag. 131.

- Post n. 246. *Talafium* *. Flores spicati. Cal. bracteatus 2valvis lanatus. Cor. glaberrima subcartilaginea persistens mutica.

pag. 132.

- Centrophorum* Trin. n. 258. deleatur. Est enim *Andropogon acicularis* Retz.

- Caryochloa* *. Flores paniculati. Cal. 2valvis aristatus. Cor. 2valvis cum semine concretescens. Caryopsis grandis dura tuberculosa, arista laterali torta elongata.

pag. 133.

- Post n. 269. *Pleuropogon* R. Br. Flores racemosi. Cal. 1florus muticus, valvis inaequalibus. Cor. valva inf. obtusa mutica, super. nervo utroque lateraliter bifido. Caryopsis libera.

- Post n. 280. *Pleuraphis* Torr. Flores spicati. Flosculi terni basi involucre villosa, laterales ♂. Cal. centralis 1florus 2valvis 5fetus. Cor. valva inferior 1feta. Calyces laterales 2flori, valva inf. dorso setigera.

pag. 141.

- Ad *Valerianam saxatilem* L. n. 27. (V. trinervis Viv. flor. corfic.)

pag. 142.

- Post n. 50. *elata* Don. 69. V. caule ramofo tereti laevi, foliis lanceolatis integerrimis pubescentibus, floribus corymbofo-paniculatis, fructibus fulcatis villosis. *Nepal*.

pag. 143.

Ad Fediam Mönch.

- Post n. 3. *truncata* Reichenb. 23. F. fructu antice 2costato globofo, appendicula apicis oblique truncata elongata integerrima. *Creta*.
- microcarpa* Reichenb. 24. F. fructu antice 2costato ovato-globofo, appendicula apicis minima ovata integerrima. *Ager monspel.* (Valerianella Loif.)
- F. *carinata* R. et Sch. (non Loif.) habitat et in *Thuringia*. (Valerianella Loif.)

pag. 144.

- Post n. 12. *rotata* Reichenb. 25. F. fructu pubescente, dentibus fenis late ovatis patentibus uncinulatis. *Patria?*
- F. *discoidea* Vahl. dentes fructus etiam uncinulatos habet: habitat in *Lusitania*. (Valeriana discoidea Brot.)
- F. *uncinata* M. B. habet dentes subulatos.
- Ad F. *minutam* Vahl. dele syn. Loifeleurii.
- F. *eriocarpa* Desv. occurrit et in *Germania Italiaque*.
- F. *pumila* Vahl. habet dentes fructus ternos obtusos patentis.

pag. 145.

Ad Sonerilam Roxb.

- squarrosa* Roxb. 4. S. foliis obovatis integerrimis utrinque cauleque hispidualis, pedunculis terminalibus solitariis, floribus umbellatis 4fidis. *Nepal*.

Ad Burmanniam.

- Ante n. 1. *uniflora* Rottl. 10. B. caule filiformi 1floro, calyce 3carinato, capsula 3alata, alis oblongis, foliis lanceolato-linearibus acutis. *Ind. or.*
- Post n. 4. *coelestis* Don. 11. B. caule filiformi sub-3floro, alis capsulae oblongis apice rotundatis, foliis radicalibus lanceolatis cuspidatis brevissimis. *Nepal*.
- B. *disticha* L. habitat et in *Nepalia* et in *nova Hollandia*. (B. distachya R. Br.)

pag. 146.

- Croci lutei* Lam. varietas videtur Cr. *lagenaeiflorus* Salish.

pag. 151.

- Ad *Gladiolum gracilem* Jacqu. (Glad. debilis Bot. mag. 2585.)

pag. 153.

- lin. 3. dele syn. Gl. *campanulati* Andr.

pag. 158.

Ad Haemodorum Sm.

- brasiliense* * 6. H. racemis paniculatis, pedicellis aggregatis nuntantibus, staminibus versus apicem laciniarum infertis. *Brasil.* (Hagenbachia brasiliensis Nees.)

pag. 160.

Ad Iridem.

I. *ruthenica* Ker. similis quidem I. *humili* M. B., differt tamen stylis inciso-ferratis.

- Post n. 21. *longispatha* Fisch. 55. I. foliis lineari-lanceolatis sub-falcatis, scapo teretiusculo tortuoso sub-3floro, spatha longissime attenuata, germinibus angulatis. *Sibir.?*

pag. 161.

- Ad n. 29. *Iris heterophylla* hort. parif. proxima quidem I. *Güldenstädtianae* Lepech., differt tamen laciniis internis corollae erectis emarginatis styli laminae superantibus germinibusque gangularibus (non hexagonis).

pag. 162.

- Post n. 50. *nepalensis* Wallich. 56. I. foliis ensiformi-falcatis, scapo 2floro, tubo corollae elongato, germinibus 3gonis. *Nepal.* Commutari potest cum I. *biflora*, sed haec scapum habet foliis altiorem, germina teretiuscula.

pag. 164.

Ad Moraceam.

Herberti Lindl. 27. M. foliis linearibus plicatis scapo ramofo multifloro brevioribus, spathis inflatis flore multo brevioribus, laciniis cor. exterioribus tortis apice caudatis, interioribus exiguis abrupte incurvo-revolutis purpureo-penicillatis. *Brasil. Chili.* (Tigridia Herbertiana Herb. in Bot. mag. 2599.)

† *gladioloides* 28. M. foliis linearibus striatis caule tereti apice Kunth. ramofo brevioribus, ramis sub-3floris. *Peru.*

† *acrifolia* 29. M. foliis lineari-ensiformibus striatis scapo Kunth. compresso apice ramofo brevioribus, ramis geminis sub-3floris. *Caracas.*

pag. 170.

Post *Xiphidium* Löfl.:

GILLIESIA Lindl.

graminea
Lindl.

Chili. Herba viridis e bulbo, foliis radicalibus gramineis, scapo tereti umbellifero. Bot. reg. 992.

pag. 171.

Ad Udoram Nutt.

- granatensis* * 2. U. foliis verticillatis linearibus integerrimis ciliatis. *Nov. Granat.* (Elodea granatensis Humb.)
- orinocensis* * 3. U. foliis verticillatis subulatis recurvatis. *Ad Orinocum.* (Elodea orinocensis Rich.)

Quam Rostkovius (fl. sedin. p. 370.) in lacu prope Sedinum invenit, Serpicula verticillata ipsi dicta, longe aliena est planta, verticillis remotis, foliis linearibus acuminatis ferrulatis. Cum nec flores nec fructus viderim, conjecturae locus est, *Caulinae* speciem vel novam esse, vel adeo *C. flexilem* W.

pag. 173.

Ad Commelinam.

- Post n. 29. *deficiens* Herb. 66. C. foliis oblongo-lanceolatis acutis basi ciliatis, vaginis striatis, involucre cordato cucullato, corolla 2petala, anthera tertia maxima. *Brasil. Bot. mag.* 2644.
- Post n. 41. *longifolia* * 67. C. foliis lineari-lanceolatis glabris striatis basi ciliatis, panicula terminali nuda. *Ora Afric. orient.* (Aneilema Hook. exot. fl. t. 204.)
- luspida* Hamilt. 68. C. caule radicante ascendente, foliis lanceolatis acuminatis asperis, ora vaginarum ciliata, racemis paniculatis hirsutissimis. *Nepal.* (Aneilema Don.)
- radicans* * 69. C. caule radicante, foliis linearibus, vaginis villosis, pedunculis 5floris. *Nepal.* (Aneilema Don.)

pag. 175.

Ad Olacem.

O. obtusa Blum. videtur var. *O. imbricatae* Roxb.

Post Olacem:

PSEUDANTHUS Sieb.

- pimbleoides* Sieb. *Nov. Holl.* Fruticulus foliis imbricatis lanceolato-linearibus mucronatis glabris, floribus ♂ albis.

pag. 176.

Ad Comocladiam.

- propinqua* Kunth. 5. C. foliolis oblongo-lanceolatis acutis subintegerrimis subtus ferrugineo-tomentosis, paniculis simplicibus. *Cuba.*
- mollissima* Kunth. 6. C. foliolis parvis ovato-oblongis acutis dentatis supra subtomentosis subtus sericeis. *Mexico.* Humb. nov. gen. 7. t. 607.

pag. 181.

Ad Willichiam Mut.

calitrichoides * 2. W. erectiuscula glabra, foliis oppositis ellipticis obtusis integerrimis nervosis, pedunculis 1floris, corolla sub-3loba. *In cataractis Orinoc.* (Hydrantheium Kunth. in Humb, nov. gen. 7. t. 646.)

pag. 185.

Ad Restionem.

Ad R. *tropicum* R. Br. (R. lateriflorus Nees in Sieber agroft. n. 42.)

pag. 188.

Ad Lyginiam R. Br.

† *monteviden-
fis* * 3. L. floribus androgynis, vaginis bracteisque imberbibus, fasciculis multifloris, fructibus longe pedicellatis. *Monte Video.* Sello.

pag. 193.

Ad *Lepidosperma filiforme* Labill. (L. tetragonum Nees in Sieber agroft. n. 49.)

pag. 195.

Ad Rhynchosporam Vahl.

Post n. 5. *pilulifera* Bertol. 39. Rh. spicis axillaribus compositis pedunculatis folio brevioribus, spiculis globulosis, caryopse glabra, culmo angulato foliato, foliis linearibus. *Brasl.*

Post n. 12. *tenerrima* Nees. 40. Rh. spicis subaggregatis involucreatis, squamis mucronato - aristatis glabris, caryopse rugosa sub-3dentata, culmo foliato foliisque setaceis laevibus. *Nov. Holl.* Sieber agroft. n. 116.

pag. 197.

Ad Caustin R. Br.

recurvata * 4. C. spicis solitariis terminalibus sub-3floris, squamis glabris acutis, ramis hinc canaliculatis, ramulis fasciculatis falcato-recurvis. *Nov. Holl.* (Restio uncinatus Nees in Sieber agroft. n. 35.)

C. pentandra R. Br., ramis canaliculatis strictis, ramulis triquetris, vaginis longe aristatis.

pag. 200.

Ad Fimbristylum Vahl.

Ad F. *clatam* R. Br. (F. marginata Labill. nov. Caledon. t. 16.)

Post n. 38. *friata* Labill. 62. F. umbella composita involucrum superante, spiculis ovatis, squamis mucronatis 3andris, caryopse cancellata, culmo tereti basi

foliato, foliis obtusis ciliatis, vaginis pubescentibus. *Nov. Caledon. Nov. Holland.* (F. obtusifolia Nees in Sieber agroft. n. 117.)

pag. 203.

Ad Scirpum.

Post n. 9. *congestus* Hamilt. 159. Sc. spica elliptica, glumis obtusissimis scariosis, stigmatibus 3, culmis caespitosis teretibus fulcatis. *Nepal.* (Eleocharis Don.)

pag. 204.

Ad Sc. *Brownii* * (Eleocharis riparia Nees in Sieber agroft. n. 20.)

pag. 205.

Ad Sc. *retroflexum* Poir. var. Eleocharis recurvata Nees in Sieber agroft. n. 24. *Nov. Holl.*

pag. 206.

Post n. 55. *muticus* Don. 160. Sc. spiculis lateralibus sessilibus glomeratis, squamis concavis mucronulatis, stigmatibus 3, culmo triquetro aphylo apice obtuso. *Nepal.*

pag. 207.

Post n. 68. *Wallichianus* * 161. Sc. culmo basi 2phylo vaginato foliisque fetaceis striatis, vaginis apice barbatis, spicis ternis oblongis, squamis mucronatis carina scabris. *Nepal.* (Isolepis capillaris Don.)

pag. 208.

Post n. 82. *globosus* * 162. Sc. capitulo globofo dense multifloro, spiculis glabris sub-3floris, squamis obtusis basi lanatis, culmo tereti aphylo. *Nov. Holl.* Sieber agroft. n. 29.

Thuarsii * 163. Sc. capitulo globofo multifloro, spiculis ovatis, squamis late ovatis nervosis margine scariosis apice callosis, culmo hinc fulcato. *Inf. Acunae.* (Sc. fulcatus Thuars., Isolepis Carmich.)

Sequitur sectio:

** *Corymbis aut umbellis lateralibus.*

anceps Poir. 164. Sc. corymbis axillaribus paucifloris, spicis parvis sessilibus 3-4floris, squamis ovatis acutis nitidis patulis, culmo ancipiti foliato, foliis ensiformibus culmum superantibus. *Madagascar.*

iridifolius Poir. 165. Sc. corymbis axillaribus fastigiatis, spicis conicis obtusis, culmo compresso altissimo, foliis ensiformibus angustis. *Madagascar.*

latifolius Bertol. 166. Sc. corymbis compositis axillaribus, spicis solitariis ovatis acuminatis, squamis mucronatis, culmo angulato fulcato, foliis ensiformibus striatis. *Brazil.*

- bromeliæfolius* 167. Sc. corymbo-supradecomposito, spicis teretibus acuminatis, squamis obtusis coloratis, culmo elato squetro, foliis lanceolatis carinatis. *Guiana.*
Rudg.
- corymbosus* Roth. n. 83.

pag. 210.

- Post n. 103. *elongatus* Don. 168. Sc. umbella composita prolifera, spicis oblongis teretibus, squamis mucronatis glabris, involucre polyphylo umbellam ter superante, foliis carinatis scabris culmum superantibus. *Nepal.*
- Post n. 110. *Donianus* * 169. Sc. umbella composita prolifera, spicis ovatis paucifloris, squamis mucronulatis, involucre 5phylo umbellam superante, culmo 4gono inferne vaginato, foliis carinatis scabris. *Nepal.* (Sc. quadrangulus Don.)

pag. 212.

- Sc. *fulcatus* Elliott. nomen mutet in Sc. *Elliottii* *, cum Sc. *fulcatus* Roth. n. 50. jam adfit.

pag. 213.

- Post n. 141. *bicolor* * 170. Sc. spicis capitatis ovatis teretibus, squamis margine coloratis, involucre 2phylo hinc erecto illinc deflexo, culmo angulato filiformi, foliis canaliculatis angustissimis. *Inf. Acunnae.* (Isolepis Carmich.)
- squarrosus* * 171. Sc. capitulo globofo, spiculis ovatis, squamis margine concoloribus, involucre aphylo, folio altero deflexo, culmo angulato filiformi basi foliato, foliis canaliculatis angustissimis. *Inf. Acunnae.* (Isolepis Carmich.)
- n. 150. legatur *Humboldtii* *.

pag. 214.

- Ad Sc. *densum* Wall. (Isolepis tenuissima Don.)

pag. 216.

Ad Cyperum.

- Ad C. *articulatum* L. adde patriam: *nov. Holl.*

- Post n. 22. *setifolius* Don. 238. C. umbella 4-6radiata, involucre sub-5phylo umbellam multo superante, spiculis squarrosis, squamis obtusis infra apicem recurvo-mucronatis. *Nepal.*

pag. 221.

- Post n. 95. *Wallichianus* * 239. C. spicis subquinis linearibus, squamis ovalibus obtusis striatis, involucre sub-5phylo umbellam excedente foliisque linearibus carinatis asperis. *Nepal.* (C. pulcher Don.)

trifolcus Don. 240. C. spicis subquinis ovali-oblongis obtusis, squamis appressis repando-crispatis, foliis linearibus scabris culmo trifulco brevioribus. *Nepal.*

nervosus Bertol. 241. C. spicis linearibus remotiusculis erecto-patulis, squamis obovatis obtusis multinerviis, involucre pentaphyllo, radice tuberifera. *Brazil.* Opusc. scientif. 3. p. 407.

pag. 222.

Post n. 103. *caricinus* Don. 242. C. spicis racemosis tenuifloris linearibus remote alternis, bracteis lineari-setaceis scabris spicas superantibus, squamis mucronatis, foliis culmo 3quetro longioribus. *Nepal.*

pag. 225.

Ad *C. pilosum* Vahl. (*C. paniculatus* Don.)

pag. 227.

Post n. 171. *Siberianus* * 243. C. spicis ovato-oblongis compressis sub-20floris fulvis, squamis obtusiusculis appressis, involucre sub-3phyllo longissimo, culmo 3quetro scaberrimo folia linearia superante. *Nov. Holland.* (*C. microcephalus* Nees in Sieber agrost. n. 103.)

pag. 233.

Mariscus parviflorus Nees in Sieber agrost. n. 101. ad exemplar, quod vidi, nondum adultus, varietas esse *M. laevigati* R. et Sch. videtur, qui igitur et in *nova Holl.* provenit.

Ad patriam *M. panicei* Vahl. adde *Ind. or.*

pag. 234.

Post n. 8. *rigidus* * 28. M. spicis numerosis cylindricis subpedicellatis, spiculis oblongis 1floris erecto-patulis striatis bracteis setaceis superantibus, involucre polyphyllo longissimo, culmo 3quetro glabro. *Nov. Holl.* (*Carex Sieberi* Nees in Sieber. agrost. n. 104.) *M. paniceus* proximis differt culmo gracili, involucre 4phyllo, spiculis 3floris.

pag. 238.

Ad Olyram.

brasiliensis * 8. O. floribus femineis pluribus inferioribus, spicis paniculatis, foliis ovato-oblongis obtusis striatis scabris. *Brazil.* (*Raddia brasiliensis* Bertolon. opusc. scient. vol. 3. p. 410.)

pag. 239.

Post *Oropetium* Trin.:

THALASIUM *.

montevidense * *Monte Video*. Gramen pedale erectum basi radicans, culmo ramofo geniculato, vaginis retrorsum villosis, foliis convoluto-filiformibus. Sello.

pag. 241.

Ad *Alopecurum angustifolium* Sibth. (A. Pallavii Trin.)

pag. 243.

Ad *Polypogona*.*simplex* *

16. P. racemo stricto, calycibus rigidis scabris sub basi barbatis, corolla breviter aristata, foliis convolutis culmoque glabris, ligula nulla. *Nov. Holl.* (Podosaemon n. sp. Nees in Sieb. agrost. n. 94.)

pag. 245.

Ad *Paspalum*.

Post n. 20. *lanatum* * 31. P. spicis binatis alternis, rhachi angusta, flosculis 4-serialibus ovatis acutis inerviis lanatis, foliis latiusculis undulatis glabris. *Rio grande*. Sello.

pag. 250.

deleatur *Centrophorum chinense* Trin.

pag. 252.

Ante *Oryzopsis*:

CARYOCHLOA *.

montevidensis * *Monte Video*. Gramen cubitale glabrum, foliis filiformibus, panicula viridi. Sello.

pag. 254.

Ad *Deyeuxiam* Clarion.

Post n. 8. *megapotamica* * 12. D. paniculae effusae ramis racemosis, calycibus corolla brevioribus longissime lanatis, arista elongata geniculata, rudimento articulado calycem superante, foliis planis glabris. *Rio grande*. Sello.

pag. 256.

Ad *Stipam*.

Post n. 31. *verticillata* Nees. 37. St. paniculae effusae ramis inferioribus verticillato-fasciculatis, calycibus an-

gustissimis acuminatis, arista longissima flexuosa basi pubescente, foliis planiusculis, ligula nulla. *Nov. Holl.* Sieb. agroft. n. 64.

rudis *

38. *St. panicula contracta pauciflora*, calycibus elongatis linearibus acuminatis glabris nervosis, arista valida torta longissima, foliis convuluto-filiformibus. *Nov. Holl.* (*St. pubescens* Nees in Sieb. agroft. n. 66.)

pag. 258.

Ad Agrostin.

Ad *A. asperam* Mx. (*A. cryptandra* Torr.)

Post n. 18. *paradoxa* R. Br. 86. *A. panicula coarctata lanceolata fusco-purpurea*, corollae subpedicellatae valvis nervosis, foliis planis, ligula denticulata. *Inf. Melville.* (*Colpodium latifolium* R. Br.)

airoides Torr. 87. *A. panicula pyramidata glabra*, calycibus corolla brevioribus, valva altera acuta, obtusa altera, foliis linearibus glabris, vaginis ore barbatis. *Ad montes scopulosos Amer. bor.*

pag. 263.

Post n. 76. *caespitosa* Torr. 88. *A. paniculae contractae pedicellis superne incrassatis*, calycibus cuspidatis corollam superantibus glaberrimis coloratis, corollae scabrae arista elongata, culmo caespitoso, foliis distichis rigidis convolutis. *Ad fl. Missouri.*

pag. 265.

Post *Crysin*:

PLEUROPOGON R. Br.

Sabinii R. Br. *Inf. Melvill.* Gramen glabrum, floribus racemoso-spicatis.

Ad *Spartinam strictam* Roth. adde patriam et *Amer. bor.*

pag. 266.

Ad Aristidam.

Post n. 6. *megapotamica* * 35. *A. paniculae strictae elongatae ramis subsecundis*, calycibus longissimis aristatis glabris, arista corollae longissima patula scabra. *Rio grande.* Sello.

pag. 267.

Post n. 12. † *fasciculata* Torr. 36. *A. paniculae elongatae spiciformis ramulis fasciculatis*, calycibus corollam subaequantibus, aristis elongatis patulis, foliis lineari-filiformibus glabris, ligula barbata. *Canada.*

pag. 268.

Ad n. 24. *pilosa* Labill. 37. *A. paniculae racemosaе strictae ramis erectis*, valvis calyciinis inaequalibus aristatis corollam subaequantibus, aristis corollae in-

aequalibus, culmo inferne foliisque linearibus
laxis pilosis. *Nov. Caledon.*

pag. 269.

Ad Lycurum Humb.

muticus *

3. L. culmo erecto, foliis convolutis elongatis, superioribus ciliatis, flosculis lanatis muticis.
Monte Video. Sello.

pag. 270.

Post *Aegopogona*:

PLEURAPHIS Torr.

Jamefii Torr. *Canada.* Gramen gracile glabrum, radice repente, foliis angustissimis glaucis scabris, ligula fimbriata. *Ann. of the Lyc. of New-York, 1. p. 148. t. 10. (Hymenothecium 5setum Lag.?)*

pag. 275.

Ad Hierochloën Gmel.

pauciflora
R. Br.

8. H. racemo simplici, calycibus glaberrimis, flosculo ♂ superiore brevissime setigero, foliis culmi brevissimis, radicalibus involutis. *Inf. Melville.*

pag. 276.

Ad Airam.

Post n. 16. *Sabulonum* Labill. 50. A. paniculae strictae ramis multifloris apice pubescentibus, calycibus corollisque mucronatis glabris subaequalibus, foliis vaginantibus convolutis, culmo basi radicante.
Nov. Caledon.

pag. 277.

Post n. 24. *arctica* * 51. A. panicula coarctata lanceolata, ramis laevibus, arista stricta valvam subaequante, foliis involutis, culmis abbreviatis. *Inf. Melville. (Deschampsia brevifolia R. Br.)*

Ad *A. paludosam* Roth. (*A. uliginosa* Bönningh. Reichenb. ic. t. 150.)

A. capillaris Host. eadem cum *A. caryophyllea* L. . . Bernhadi in *Flora* 1825. p. 545.

pag. 279.

Ad Melicam.

Post n. 10. *Fischeri* * 22. M. panicula coarctata spicaeformi, calycibus laevibus sub-3floris flosculos subaequantibus, flosculis basi subsericeis, foliis linearibus, ligula truncata. *Inf. Melville. (Dupontia Fischeri R. Br.)*

pag.

pag. 282.

Ad Saccharum.

- Post n. 20. *floridulum* Labill. 29. S. paniculae ramis racemoso-spicatis fastigiatis, flosculis geminis aristatis inaequaliter pedunculatis, culmo elato, foliis latiusculis ferrulatis. *Nov. Caledon.*

pag. 283.

Ad Andropogona.

- Post n. 6. *megapotamicus* * 67. A. spica terminali imbricata longissima, flosculis sericeo-villosis, aristis longissimis hirsutis secundis, foliis convolutis glabris. *Rio grande. Sello.*

pag. 287.

- Ad *Andropogona nutantem* proximus, ni idem, A. *glaucus* Torr. in Ann. of the Lyc. of N.-York, 1. p. 153.

- Ad *Andropogona acicularem* Retz. patria *China. Inf. ocean. pacif. Nov. Holl.* (*Centrophorum chinense* Trin. p. 250.)

pag. 290.

Ad Anatherum P. B.

- Post n. 8. *megapotamicum* * 9. A. spicis solitariis, rhachi articulata pilosa, flosculis glabriusculis appressis, foliis longissimis glabris ferrulatis, culmi nodis longe pilosis. *Rio grande. Sello.*

pag. 302.

- Ad *Cenchrum australem* R. Br. C. anomoplexis Labill. in *nov. Caledon.* var. foliis latioribus.

pag. 305.

Ad Setariam P. B.

- Post n. 14. *vaginata* * 20. S. panicula spicata elongata vaginata, setis subsolitariis sursum asperis flexuosis, flosculis acutis glabris nervosis, culmo foliisque laevibus. *Rio grande. Sello.*

- pilifera* * 21. S. paniculae laxae ramis subspicatis, setis gracillimis piliformibus subbinis, flosculis alternis subsecundis ovatis acutis nervosis rhachique pubescentibus, foliis lato-lanceolatis ciliatis, vaginis longe pilosis, culmo flaccido. *Inf. Mascaren. Nov. Holl.* (*Urochloa panicoides* P. B.)

pag. 308.

Ad Panicum.

- P. gracile Nees in Sieber agrost n. 72. pertinet ad P. distachyon n. 13.

pag. 316.

Ad Panicum.

- Post n. 118. *loliaceum* Bertol. 203. P. paniculae racemosa ramis strictis, flosculis oblongis hirsutis nervosis, foliis lanceolato-linearibus supra pubescentibus, culmo vaginisque hirtis. *Brasil.*

pag. 317.

- Post n. 132. *megapotamicum* * 204. P. paniculae ramis patentibus, flosculis brevissime pedicellatis glabris acutis nervosis, corollis lucidis, culmo angulato foliisque convolutis glabris. *Rio grande. Sello.*

pag. 320.

- Post n. 174. *polygonatum* Schrad. 205. P. paniculae erectae ramis strictis, axillis pilosis, flosculis breviter pedicellatis lanceolatis acutis nervosis glabris, vaginis pilosis, nodis culmi barbatis. *Nov. Holl. Sieb. agroft. n. 121.*

- condensatum* Bertol. 206. P. panicula racemosa condensata strictissima, flosculis lanceolatis acuminatis nervosis, foliis cordato-lanceolatis culmoque decumbente glaberrimis. *Brasil.*

pag. 327.

- Elymus mollis* R. Br. in Franklin. itin. p. 732. videtur idem ac *E. villosus* Mühlenb. n. 7.

pag. 328.

Ad Pappophorum Schreb.

- elongatum* * 8. P. panicula cylindrica elongata lobata, calycibus glabris, aristis subvicinis, foliis convolutis longissimis. *Monte Video. Sello.*

pag. 329.

- Post n. 7. *megapotamicum* * 9. P. racemo spicato paucifloro, pedunculis abbreviatis villosis, calycibus subternis glabris nervosis, aristis subduodenis longissimis patentibus, culmo simplici, foliis ciliatis. *Rio grande. Sello.*

Ad Sefsteriam Scop.

- Post n. 10. *Pumilio* * 13. S. panicula coarctata abbreviata, calyce 3floro, flosculo infimo perfecto, reliquis neutris 1valvibus. *Afric. med. (Triraphis Pumilio R. Brown ad Denham et Clapperton. iter, p. 245.)*

pag. 332.

Ad Danthoniam Cand.

- paradoxa* R. Br. 13. D. panicula stricta, calycibus glabris 4floris, flosculis breviter villosis, ariata dorsali basi dilatata torta calycibus breviora, culmo foliisque

filiformibus glabris. *Nov. Holl.* (Stipa, spalmate Scribae forte, Nees in Sieber agrost. n. 34.)

Ad Köleram Perf.

macilenta
Cand.

9. K. panicula spicata cylindrica laxiuscula, flosculis glabris, calycibus 3floris cuspidatis, arista brevissima, culmo simplici foliisque angustissimis glabriusculis. *Gallia provinc.*

pag. 333.

Ad Avenam.

Post n. 10. *villosa* Bertol. 54. A. panicula stricta, corollis basi barbatis calycem aequantibus, valva corollae exter. 2feta, arista dorsali geniculata, culmo paniculaeque ramis villosis, foliis angustissimis vaginisque glabris. *Italia med.*

pag. 335.

A. *Forskolei* Vahl. et *arundinaceam* Delil. eandem habet speciem R. Brown ad Denham. it. p. 244.

pag. 338.

Ad Poam.

Post n. 21. *Sieberiana* * 135. P. paniculae nutantis ramis flexuosis scabris, spiculis coloratis, flosculis liberis remotiusculis 3nerviis acutiusculis carina scabris, foliis filiformibus angulatis, ligula nulla. *Nov. Holl.* (P. australis Nees in Sieber. agrost. n. 77.)

pag. 339.

Post n. 22. *arctica* R. Br. 136. P. panicula effusa, ramis paucifloris capillaribus laevibus spiculisque coloratis ovatis 3-4floris, corollae valva inferiore subsericea basi lanata, foliis linearibus, ligula subquadrata erosa. *Grönland. Amer. arctic.*

Post n. 31. *angustata* R. Br. 137. P. panicula simplici coarctata lineari-lanceolata, spiculis oblongis coloratis glabris sub-4floris, valvis corollae erosis denticulatis 5nerviis, foliis anguste linearibus, ligula subquadrata. *Amer. arctic.*

abbreviata
R. Br.

138. P. panicula simplicissima abbreviata coarctata, spiculis coloratis 4-5floris, valvis calycis acutissimis subaequalibus flosculos basi lanatos pubescentes aequantibus, foliis convoluto-fetaceis. *Inf. Meloille.*

pag. 342.

Post n. 63. *megapotamica* * 139. P. paniculae ramosissimae laxae ramulis capillaribus elongatis 1floris spiculisque linearibus glabris coloratis, flosculis acutis trinerviis, culmo elato, foliis convolutis. *Rio grande. Sello.*

pag. 349.

Ad *Ceratochloam unioloideam* Cand. forte *Uniola stricta* Torr. ann. of the Lyc. of N. York, 1. p. 155.

pag. 350.

Ad Eleusinen Gärtn.

Post n. 5. *rigida* * 16. E. spicis digitatis subquaternis stellato-patentibus, rhachi glabra spiculisque 8floris muticis, culmo ascendente, oris vaginarum pilosis. *Patria?* (Cynosurus rigidus Hort. berol.)

Ad n. 8. del. Iyn. *Poa digitata* R. Br.

digitata * 17. E. spicis digitatis, spiculis imbricatis sub-7floris glabris muticis, culmo tereti, foliis vaginisque glabris. *Nov. Holl.* (*Poa digitata* R. Br.)

pag. 353.

Ad Fesiuam.

Hemipoa Delil. 63. F. paniculae erectae ramis alternis rigidis coloratis, spiculis subsessilibus 4-6floris glabris muticis, culmo stricto, foliis angulissimis glabris. *Ager monspel.*

pag. 354.

Ante n. 35. *capitata* Balb. 64. F. spica solitaria ovata compressa sub-4flora glabra, calycibus acutissimis, flosculis subcoloratis muticis, culmo tenero simplici, foliis abbreviatis linearibus patulis glabra, ligula elongata vaginante. *Sardinia.*

pag. 358.

Ad Bromum.

Inter n. 18. et 19. *sardous* * 46. Br. paniculae racemosaee erectae ramulis articulatis subincrassatis, spiculis lanceolatis erectis sub-10floris glaberrimis, flosculis distantibus, aristis rectis valvas subaequantibus, valva inter. corollae subaristata, foliis angustis culmoque geniculato laevibus. *Ad litora Sardiniae.*

megapotamicus * 47. Br. panicula erecta racemosa contracta, spiculis ovatis sub-6floris hirsutis, calycibus flosculisque nervosis, valva cor. exter. obtusa scariosa, aristis subflexuosis valvas aequantibus, foliis pubescentibus, vaginis villosis. *Rio grande. Sello.*

pag. 362.

Ad Lepyrodiam R. Br.

elongata * 5. L. culmo subramoso gracili, vaginis reflexis sublanatis, spiculis ♂ sessilibus remotis, ♀ subpedunculatis, squamis mucronatis. *Nov. Holl.* (*Calorophus elongata* Labill., *Resio lateriflorus* R.)

Br., *Leptocarpus squarrosus* Nees in Sieb. agrost. n. 38.)

Ad *Holosteum diandrum* Sw. lege stipulis utrinque 4, loco utriusque.

H. succulentum L. deletur, rediturum vol. 2. p. 395. synonymon *Arenariae peploidis*.

pag. 363.

Ad Polycarpon.

apurense Kunth. 3. P. caule diffuso ramofo pubescente, foliis verticillatis (5-10) spathulatis ciliatis, stipulis ovatis acuminatis, floribus cymosis. *Ad Orinocum.*

Montia fontana L. et in alpihus quitenfibus occurrit. Humb. nov. gen. 6. p. 79.

pag. 364.

Ad Königiam.

nepalensis Don. 2. K. caule erecto retrorsum hispido, foliis ovatis acutis, floribus terminalibus glomeratis. *Emodi montes.*

C L A S S I S IV.

pag. 366.

Post n. 385. *Ptylocarpus* Mart. Cal. 8fidus, laciniis 2 longioribus. Cor. infundibuliformis 4fida, fauce barbata. Stam. inclusa. Stigma clavatum. Caps. 2locularis 2valvis. Sem. peltata compressa chartacea.

pag. 369.

Post n. 456. *Phelline* Labill. Cal. 4dentatus persistens. Cor. rotata 4partita. Stam. basi corollae inferta. Stigma 4dentatum. Caps. suberosa 4locularis, loculis 1spermis intus dehiscentibus. *Styraceae.*

Post n. 461. *Philagonia* Blum. Flores dioeci. Cal. 4dentatus. Petala 4. Stamina petalis alterna. Antherae 2loculares dorso affixae. Discus annularis obsoletus. Stigma peltatum grande. Caps. 4locularis, loculis 2spermis. *Terebinthaceae.*

pag. 377.

Ad Dipfucum.

mitis Don. 7. D. caule angulato inermi ramofo, foliis petiolatis 3lobis pinnatifidisque pilosis, paleis recepta-

culi rectis flosculos subaequantibus. *Emodi montes.* (D. inermis β . Wallich.)

Ad D. *pilosum* pertinet D. inermis α . Wallich. D. strictus Don.

Ad Scabiosam Vaill.

Post n. 6. *reversa* Ledeb. 13. Sc. foliis lanceolatis indivisis pinnatifidisque amplexicaulibus supra nitidis, laciniis lanceolatis subintegerrimis, caule hirsuto, involucrio ciliato, pappo setaceo. *Sibir.*

Hornemanni * 14. Sc. foliis pubescentibus, radicalibus lyratis, caulinis pinnatifidis amplexicaulibus, caule ramosissimo aspero, ramis patentibus, corollulis radiantibus. *Patria?* (Sc. pyrenaica Hornem. in lit.)

pag. 379.

Ad Succifam *leucanthum* * (Scabiosa mediterranea Viv. app. ad fl. corf.)

pag. 381.

Ad Asterocephalum Vaill.

Post n. 16. *diffusus* *. 48. A. foliis radicalibus lyratis acutiusculis ferratis glabriusculis, caulinis pinnatifidis, laciniis linearibus integerrimis, corollulis radiantibus involucrium duplo superantibus, fetis pappi testaceis. *Teneriffa.* (Scabiosa diffusa Reichenb. hort. t. 16.)

pag. 382.

In varietatibus A. *Columbariae* * dele Scabiosam fetiferam Lam., adde Scab. unifetam Sav., Savianam Reichenb.

pag. 383.

Ad A. *gramuntium* * (Scabiosa mollis W. suppl.)

Ad A. *agrestem* * add. fetis pappi brevissimis.

pag. 385.

Ad Patriniam Juss.

nudiuscula Fisch. 5. P. foliis omnibus 2pinnatifidis glabris, laciniis lanceolatis obtusiusculis, floribus corymbofo-paniculatis. *Imaus.*

coronata Fisch. 5. P. foliis radicalibus oblongis integerrimis pinnatifidisque carnosis glabris, scapo stricto, corymbis compactis. *Dacuria.*

pag. 386.

Post *Declieuxiam* Humb.:

PSYLLOCARPUS Mart.

ericoides Mart. 1. Pf. simpliciusculus superne divisus, foliis verticillatis subulatis internodio brevioribus, floribus terminalibus aggregatis. *Brazil.*

- asparagoides* Mart. 2. Pf. ramosus glaber, ramis gracilibus virgatis, foliis verticillatis filiformi-fetaceis, floribus capitatis. *Brazil.*
- laricius* * 3. Pf. ramosissimus glaber, foliis fasciculato-verticillatis fetaceis, floribus terminalibus subspicatis. *Brazil.* (Pf. laricoides Mart.)
- thymbroides* Mart. 4. Pf. ramosissimus pubescens, ramis squarrosis, foliis fasciculatis, floribus terminalibus subspicatis. *Brazil.*

pag. 387.

Ad Galium.

- Post n. 19. *atherodes* * 111. G. foliis lineari-filiformibus longe aristatis patentissimis glabris, pedunculis axillaribus 1floris 2phyllis folio brevioribus, petalis obtusis 1nerviis. *Rio grande.* Sello.

pag. 388.

- Ante n. 26. *corficum* * 112. G. foliis subsenis ovato-oblongis acutis pubescentibus, caule debili villoso, pedunculis divaricatis 3fidis paucifloris. *Corfica.*

Ad G. *asperifolium* Wall. videtur G. *parviflorum* Don. proxime accedere.

pag. 390.

- Post n. 66. *megapotamicum* * 113. G. foliis rigidis lanceolatis acutis spinuloso-ciliatis subtus pallidis glabris, fructibus grandibus sessilibus granulatis, caule simplici erecto. *Rio grande.* Sello.

pag. 391.

- Post n. 78. *Hamiltonii* * 114. G. foliis oblongis acutis utrinque pilosiusculis, pedunculis terminalibus trichotomis laxifloris, caule erecto ramofo piloso. *Nepal.* (G. latifolium Hamilt. Don.)

- vestitum* Don. 115. G. foliis ovali-oblongis obtusis utrinque canleque simplici hirsutissimis, pedunculis axillaribus trichotomis, floribus glomeratis, fructibus dense hispido-tomentosis. *Nepal.*

Ad G. *degans* Wall. (G. ciliatum Hamilt. Don.)

pag. 396.

In phras *Asperuloe galioidis* M. B. lege lacinulis corollae *uncinulatis* loco unguiculatis.

pag. 397.

Ad *Rubiam cordifoliam* L. pertinere et *alatum* Wall. n. 6. et *Munji-stam* Roxb. n. 20. Don.

- Post n. 9. *noxia* Hilar. 23. R. caule decumbente ramofo hirsutiusculo, foliis quaternis ellipticis mucronatis 3nerviis pellucido-punctatis hispidiusculis, pedunculis axillaribus 1floris, baccis albis. *Brazil.*

pag. 403.

Ad Spermacocen.

- megopotamica* * 62. Sp. caule suffruticoso ramoso hirtio, foliis lanceolatis cuspidatis utrinque strigosis, stipularum ciliis elongatis strictis, capitulis densifloris, calycibus aristatis corollam subaequantibus. *Rio grande*. Sello.

pag. 406.

Ad Ernodeam Sw.

- nepalensis* * 3. E. caule herbaceo tomentoso, foliis oppositis oblongo-lanceolatis nervosis pubescentibus, stipulis 3partitis fetaceis, cymis terminalibus trichotomis multifloris. *Nepal*. (Cuncea trifida Hamilt. Don)

pag. 411.

Ad Hedyotin.

- Ad H. *ulmifoliam* Roxb. pertinere H. *lineatam* Ej. n. 37. Hamilton. apud Don. fl. nepal. p. 134.

pag. 412.

- Ad H. *strictam* Wall. (H. fusca Hamilt. Don.)

pag. 413.

- Post n. 33. *ciliolata* Torr. 44. H. foliis spathulatis sessilibus ciliatis, pedunculis trichotomis, caule ramoso. *Ad cataractas Niagaræ*.

pag. 414.

- Post n. 39. *laxa* Don. 45. H. foliis ovatis acutis utrinque pilosiusculis, pedunculis axillaribus dichotomis, floribus subternis, caule ramoso debili laevi. *Nepal*.

pag. 415.

Ad Manettiam Mutis.

- Post n. 6. *cordifolia* Mart. 9. M. herbacea volubilis, foliis cordato-ovatis acutis glabriusculis, pedunculis axillaribus 1-3floris, calycibus 4fidis. *Brazil*.
M. *uniflora* Humb. habet calyces 8partitos.

pag. 415.

- Ad *Catesbaeam spinosam*. (C. latifolia Lindl. in bot. reg. 858.)

pag. 418.

Ad Gardneriam Wall.

- glabra* Wall. 2. G. foliis ovato-oblongis acuminatis pedunculis simplicibus 1floris. *Nepal*.

- G. *ovata* Wall. habet folia oblonga utrinque attenuata.

pag. 420.

Ad Callicarpum.

- Post n. 4. *rubella* Lindl. 22. C. foliis cordato-oblongis antrorsum dilatatis acuminatis crenato-dentatis utrinque ramisque villoso-tomentosis, cymis pedunculatis 2partitis multifloris. *China*. Bot. reg. 883.
- C. longifolia* Lam. melius habet folia lanceolata acuminata elongata, corymbos axillares abbreviatis. Cf. Hook. exot. fl. 133.

pag. 421.

- Ad Walleniam laurifoliam* Sw. var. *angustifolia* (W. *angustifolia* Mart. in nov. act. nat. cur. 11. p. 87.).

pag. 425.

Ad Exacum.

- Post n. 9. *erubescens* * 15. E. caule simplici tereti, foliis lanceolatis acutis 3nerviis amplexicaulibus, floribus paniculatis, laciniis corollae rotundatis. *Brazil*. (Dejanira *erubescens* Schlechtend.)
- pallefcens* * 16. E. caule simplici teretiusculo, foliis late ovatis acutis obscure 3nerviis coriaceis amplexicaulibus, floribus dense congestis, laciniis corollae rotundatis. *Brazil*. (Dejanira *pallefcens* Schlechtend.)
- nervosum* * 17. E. foliis sessilibus oblongis acuminatis 5nerviis pellucido-marginatis, floribus dense congestis, laciniis corollae oblongis. *Brazil*. (Dejanira *nervosa* Schlechtend.) *E. tetragonum* Roxb. proximum differt praeter patriam, calycibus 4alatis.

pag. 426.

Ad Sebaeam R. Br.

- Inter n. 2. et 3. *sulfurea* Schlechtend. 9. S. caule subtetragono ramofo, foliis sessilibus late ovatis acutis, calyce anguste alato, floribus 5fidis, staminibus exsertis. *C. B. S.*
- crassulaefolia* Schlechtend. 10. S. caule tetragono ramofo, foliis amplexicaulibus cordato-subrotundis acutis subcoriaceis nervosis, floribus corymbosis 5fidis, calycibus argute carinatis. *Afric. austr.*
- capitata* Schlechtend. 11. S. caule simplici folioso, foliis confertis ovatis 3nerviis, panicula coarctata terminali, floribus 4fidis, staminibus exsertis. *C. B. S.*

pag. 427.

Ad Houstoniam.

- Post n. 2. *minima* Beck. 9. H. caule erecto simplici scabriusculo, foliis spathulatis ciliatis, pedunculis terminalibus 1floris, laciniis calycis late ovatis acutis erectis. *Ad fl. Missuri*. *H. patens* Ell. proxima

differt caule ramofo, laciniis calycis linearibus.
Cf. Silliman's journ. vol. 10. p. 262. Elliott. Car-
olin. austr. p. 191.

pag. 428.

Ad Labatiam Sw.

macrocarpa 3. L. arborea, foliis oblongo-lanceolatis glabrius-
Mart. culis, floribus pedunculatis aggregatis. *Brazil.*
Mart. nov. gen. 2. t. 160. 161.

pag. 430.

Ad *Buddleam Neemda* Roxb. (B. subferrata Hamilt. Don.)

pag. 434.

Ad Plantaginem.

Post n. 12. *macrocarpa* Chamiff. 92. Pl. foliis lanceolatis integer-
rimis erectis glabriusculis, scapo subangulato,
spica cylindrica densiflora, capsula maxima 2lo-
culari 2sperma (non circumscissa). *Inf. Aleut.*

truncata 93. Pl. hirsutissimo-tomentosa, foliis lanceolatis
Chamiff. basi attenuatis, spicis clavatis elongatis basi laxis,
capsula 2loculari 2sperma. *Chili.*

Ad Pl. *lanceolatam* n. 15. pertinere Pl. *attenuatam* Wallich. n. 23.
Don.

Ad Pl. *xorullensem* Humb. (Pl. mexicana Link., graminca W.
herb.)

pag. 438.

Post n. 68. *tumida* Chamiff. 94. Pl. subcaulescens, foliis lineari-
bus obtusiusculis integerrimis cinereo-sericeis,
scapo laevi tereti, spica ovali, staminibus corolla
brevioribus, capsula 2loculari 2sperma. *Chili.*

brasiliensis 95. Pl. subcaulescens, foliis lineari-lanceolatis in-
Sims. tegerrimis ciliatis nervosis, spica cylindrica elon-
gata glabra, stylis longissimis. *Brazil.* Sello.
Bot. mag. 2616.

pag. 440.

Post n. 83. *princeps* Chamiff. 96. Pl. fruticosa elata ramofo, fo-
liis amplexicaulibus lineari-lanceolatis glaberrimis,
spica elongata sparsiflora laxa, capsula 2lo-
culari 2sperma. *Inf. Sandwich.*

coriacea 97. Pl. suffruticosa, foliis lineari-lanceolatis co-
Schlechtend. riaceis integerrimis glabriusculis, spicis crassis
cylindricis elongatis, antheris grandibus longe
exsertis, capsula 2sperma. *Rio grande.* Sello.

Post *Plantaginem* :

PHELLINE Labill.

comosa Labill. *Nov. Caled.* Frutex foliis fastigiatis subspathulato-
oblongis dentatis glabris, floribus paniculatis,
gemma lanuginosis.

pag. 441.

Ad Bruceam Herit.

- trifoliata* * 4. Br. foliis ternatis oblongis obtusis glabris, corymbis axillaribus dichotomis, floribus ♂. *Nov. Caledon.* (Evodia drupacea Labill. nov. Caled. t. 74.)

PHILAGONIA Blum.

- procera* Blum. *Java.* Arbor procera, foliis pinnatis lanceolatis integerrimis glabris, cymis terminalibus 3partitis.

pag. 443

Ad Ammanniam.† *Floribus axillaribus solitariis.*

- rubra* Hamilt. 19. A. foliis oblongis obtusis sessilibus, ramulis floriferis axillaribus oppositis folia subaequantibus, floribus sessilibus, caule simplici 4gono erecto. *Nepal.*

pag. 444.

- Post n. 13. *arenaria* Kunth. 20. A. foliis cordato-linearibus semiamplexicaulibus, pedunculis sub-3floris, floribus 4andris. *Caracas.*

pag. 447.

*Ad Cissum.*Ad *C. adnatam* Roxb. (*C. aristata* Blum.)Ad *C. rotundifoliam* Vahl. add., ramis scandentibus pruinosis, geniculis inflatis. *Patria: Java.*Ad *C. latifoliam* Lam. (*C. compressa* Blum.)

- Post n. 12. *discolor* Blum. 67. *C.* foliis cordato-oblongis acuminatis fetaceo-ferratis discoloribus ramulisque angulatis glabris, cymis oppositifoliis sub-5fidis folio brevioribus. *Java.*

- nodosa* Blum. 68. *C.* foliis subcordato-oblongis cuspidatis fetaceo-ferrulatis glabris, corymbis oppositifoliis dichotomis, pedicellis umbellatis, caule tereti herbaceo nodoso. *Java.*

pag. 448.

Ad *C. cineream* Lam. (*C. pubinervis* Blum.)

pag. 449.

- Post n. 36. *emarginella* Sw. 69. *C.* foliolis obovatis emarginatis remote crenatis glabris, ramis petiolisque 4gonis. *Inf. Carib.* Act. holm. 1825. p. 427.

- Post n. 43. *papilloso* Blum. 70. *C.* foliolis ovato-oblongis acuminatis grosse arguteque ferratis glabris coriaceis, corymbis axillaribus divaricatis, caule lignoso papilloso ramosissimo. *Java.*

- geniculata* Blum. 71. *C. foliolis oblongis acuminatis obtuse denticulatis membranaceis ad costam utrinque pubescentibus, lateralibus semicordatis, corymbis dichotomis geniculatis, caule suffruticoso teretiusculo. Java.*
- rhodocarpa* Blum. 72. *C. foliolis ovato-ellipticis acuminatis membranaceis glabris grosse inaequaliter dentatis, lateralibus semicordatis, corymbis dichotomis petiolo brevioribus, caule sub-4gono. Java.*
- hirtella* Blum. 73. *C. foliolis ovato-oblongis membranaceis inaequaliter ferratis subtus petiolisque tomentosis, corymbis dichotomis axillaribus. Java.*
- Ad *C. crenatam* Vahl. add. foliolis villosiusculis.
- Ad *C. carnosam* Lam. (*C. pergamacca* Blum.)

pag. 450.

- Post n. 54. *dichotoma* Blum. 74. *C. foliis coriaceis glabris, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis glanduloso-ferratis, corymbis dichotomis folio brevioribus. Java.*
- thyrsiflora* Blum. 75. *C. foliolis ovato-oblongis acutis ferrulatis subtus ramisque rubiginoso-tomentosis, thyrsis cirrifloris. Java.*
- quinquefolia* Soland. 76. *C. foliolis oblongis utrinque attenuatis ferratis glabris, ramis teretibus nodosis laevibus, paniculae oppositifoliae ramis divaricatis. Brasil. Bot. mag. 2443.*

Ad *C. heterophyllum* Poir. (*C. leucocarpa* Blum.)

Ad *C. ferrulatam* Roxb. (*C. glabrata* Blum.)

- tuberculata* Blum. 77. *C. foliolis oblongis acuminatis ferratis glabris coriaceis, corymbis petiolo brevioribus, caule compresso tuberculato. Java.*
- mutabilis* Blum. 78. *C. foliolis oblongis acuminatis, lateralibus obtusiusculis remote ferratis, ferraturis scariosis, cymis axillaribus, caule fruticoso, baccis 3-4-spermis. Java.*
- scariosa* Blum. 79. *C. foliolis ovalibus obtusiusculis coriaceis apice grosse ferratis, ferraturis apice scariosis, caule rimoso. Inf. Javae ab austro vicinu.*
- laevigata* Blum. 80. *C. foliolis ovatis acutis glanduloso-ferratis laevibus coriaceis, corymbis axillaribus, caule tereti verrucoso. Java.*
- involucrata* * 81. *C. foliolis oblongis acuminatis repando-dentatis, floribus polygamis fasciculatis involucratis, marginalibus ♂ pedicellatis, centralibus ♀ sessilibus. Java. (Pterisanthes ciffoides Blum.)*

pag. 451.

Ad *Cornum*.

- Post n. 13. *macrophylla* Wallich. 17. *C. foliis petiolatis subrotundo-ovatis acutis integerrimis subtus glaucis, cymis terminalibus pedunculatis patentibus. Nepala.*

pag. 453.

Ad Rivinam.

- affinis* Mart. 7. *R. glabra*, foliis ovatis acuminatis obsolete crenulatis margine nudis, racemis aequalibus, calyce 2labiato. *Brazil.*

pag. 454.

Ad Alchemillam.

- pectinata* Kunth. 11. *A. farmentosa* filiformis dichotoma, foliis subtus argenteo-sericeis pectinato-serratis, radicalibus longissime petiolatis reniformibus multilobis, caulinis sub-3lobis, stipulis 3-5fidis, floribus terminalibus diandris. *Nov. Granat.*
- sibbaldiaefolia* Kunth. 12. *A. caule* ascendente superne ramoso villosa, foliis ternato-3partitis sericeis, laciniis obovatis inciso-serratis, stipulis 2-4fidis, corymbis compactis, floribus diandris digynis. *Mexico.*
- hirsuta* Kunth. 13. *A. caule* erecto ramoso foliisque 3partitis hirsutis, laciniis flabellato-multifidis, stipulis 2-3fidis, floribus terminalibus fasciculatis diandris. *Amer. austr.?*
- nivalis* Kunth. 14. *A. caule* erecto subdiviso dense folioso radicante, foliis imbricatis amplexicauli-vaginantibus multifidis externe sericeo-hirsutis, floribus terminalibus subternis sessilibus diandris. *Alp. summ. Quito.*
- Ad *A. Aphanen* Leers. (*A. rupestris* Kunth. quae *A. tripartita* R. et P.)

pag. 472.

Ad Perfooniam Sm.

- Post n. 2. *gnidioides* Sieb. 23. *P. foliis* filiformibus canaliculatis pungentibus glabris divaricatis, pedunculis brevissimis subsolitariis axillaribus, calycibus subsericeis. *Nov. Holl.*
- Ad *P. juniperinam* Labill. (*P. acerosa* Sieb.)
- Post n. 6. *arida* Sieb. 24. *P. foliis* linearibus utrinque attenuatis hirsutis, pedunculis solitariis brevissimis, gemminibus villosis, stylis elongatis. *Nov. Holl.*

pag. 473.

- Post n. 14. *oxycoccoides* Sieb. 25. *P. foliis* oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis eveniis subcoriaceis glabris, ramis diffusis procumbentibus, pedunculis 1floris. *Nov. Holl.*
- revoluta* Sieb. 26. *P. foliis* oblongis obtusis coriaceis margine revolutis subtus pallide sericeis, fructibus stylo obliquo coronatis. *Nov. Holl.*
- glaucescens* Sieb. 27. *P. foliis* spathulato-lanceolatis mucronatis venulosis glabris glaucis, stylis longissimis. *Nov. Holl.*

pag. 474.

Ad Symphyonema R. Br.

- abrotanoides* Sieb. 3. S. foliis multipartitis, laciniis linearibus glabris 3dentatis, rachis bracteisque glaberrimis. *Nov. Holl.*

Ad Conospermum Sm.

- Post n. 2. *imbricatum* Sieb. 10. C. foliis imbricatis verticalibus ovatis mucronatis reticulatis basi contractis ramulisque pubescentibus, pedunculis terminalibus aggregatis. *Nov. Holl.*

pag. 475.

Ad Grevilleam R. Br.

- Post n. 1. *laurifolia* Sieb. 38. Gr. foliis oblongis acuminatis venosis subtus strigillosis, racemis multifloris spicatis, germinibus villosis. *Nov. Holl.*

pag. 476.

- Post n. 12. *acifolia* Sieb. 39. Gr. foliis lineari-filiformibus rigidis patentibus supra canaliculatis glabris, racemis abbreviatis, stylo longissimo glabro. *Nov. Holl.*

- Post n. 16. *diffusa* Sieb. 40. Gr. foliis lineari-lanceolatis mucronatis subtus sericeis, capitulis terminalibus pedunculatis. *Nov. Holl.*

- pubescens* Hook. 41. Gr. foliis spathulato-oblongis mucronatis utrinque pubescentibus, racemis corymbosis, pedicellis calycibusque glabris. *Nov. Holl.* Hook. exot. fl. t. 216.

- ferruginea* Sieb. 42. Gr. foliis oblongo-lanceolatis mucronatis venosis subtus ferrugineo-tomentosis, ramis hirsutis, fructibus villosis. *Nov. Holl.*

Ad Gr. *Baueri* R. Br. (Gr. *daphnoides* Sieb.)Ad Gr. *occidentalem* R. Br. (Gr. *oleoides* Sieb.)

pag. 477.

- Post n. 20. *myrtacea* Sieb. 43. Gr. foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis ramulisque hirsutiusculis, racemis paucifloris. *Nov. Holl.*

- Post n. 25. *acanthifolia* Sieb. 44. Gr. foliis pinnatifidis coriaceis glaberrimis, laciniis lanceolatis 3fidis spinosis, spicis strobiliformibus, calycibus villosis, stylo glaberrimo. *Nov. Holl.*

pag. 478.

Ad Hakeam Schrad.

- Post n. 1. *pachyphylla* Sieb. 35. H. foliis teretibus crassis velutinis mucronatis patentibus, calycibus aggregatis abbreviatis glabriusculis. *Nov. Holl.*

pag. 485.

Ad Banksiam.

- Post n. 12. *Cunninghamii* Sieb. 28. B. foliis linearibus integerrimis truncatis mucronatis subtus tomentosis eveniis, ramulis villosis. *Nov. Holl.*

pag. 487.

Ad Viscum.

- Post n. 1. *nepalense* * 26. V. ramulis compressis striatis dichotomis, articulis sub-3floris. *Nepal.* (V. dichotomum Don)

pag. 488.

Ad V. orientale W. (V. stellatum Don.)

- Post n. 23. *platyphyllum* * 27. V. ramulis alternis angulatis glabris, foliis alternis obovatis subtus nervosis petiolatis, umbellis sub-4floris pedunculatis sparsis, involucellis 6fidis persistentibus. *Nepal.* (V. latifolium Hamilt. Don.)

Ad Elaeagnum.

- Post n. 1. *argentea* Pursh. 10. E. foliis oblongis utrinque attenuatis supra lepidotis subtus argenteis, pedunculis nutantibus. *Ad fl. Missuri.* Colla hort. ripul. t. 28.

pag. 489.

El. trifloram Roxb. ad *El. latifolium* L. pertinere Don. et Rich.

- Post n. 4. *ferruginea* Rich. 11. E. foliis elliptico-oblongis acuminatis subcoriaceis subtus ferrugineo-lepidotis, pedunculis subternis axillaribus. *Java.*

El. conferta Roxb. — stylo stellatim piloso.*El. arborea* Roxb. — foliis acuminatis, stylo glabro.*El. umbellata* Thunb. — stylo glabro. *Nepal.*

pag. 491.

Ad Hamamelida.

- chinensis* R. Br. 2. H. foliis subovatis integerrimis subtus reticulatis stellato-pubescentibus, capitulis pedunculatis. *China.* (Arbuscula sinensis Plukn. t. 368. f. 2. Abel. it. chin. p. 375.)

Dicorypha Thuars.*stipulacea* Thuars.

pag. 493.

Ad Myricam.

- Post n. 5. *esculenta* Hamilt. 17. M. foliis spathulatis integerrimis coriaceis nitidis, amentis ♂ axillaribus racemosis, caule arboreo. *Nepal.*

- † *octandra* Hamilt. 18. M. foliis oblongis apice attenuatis subintegerrimis glabris, amentis ♂ solitariis petiolo longioribus, floribus 8andris. *Nepal.*

pag. 495.

Ad Illicem.

- Post n. 12. *elliptica* Kunth. 30. I. foliis ellipticis apice ferrulatis coriaceis glaberrimis supra nitidis, pedunculis 1floris ramulisque villosis, corollis 5-6petalis. *Peru.*
- Scopulorum* Kunth. 31. I. foliis obovatis rotundatis obsolete crenatis coriaceis glabris supra nitidis, pedunculis 5-7floris viscoso-pubescentibus, corollis 4-5petalis. *Peru.*
- rupicola* Kunth. 32. I. foliis subrotundo-ellipticis obtusis crenato-ferratis coriaceis glaberrimis nitidis, pedunculis sub-3floris glabris, corollis 4petalis. *Peru.*
- odorata* Don. 33. I. foliis oblongis crenulatis, umbellis sessilibus glomeratis petiolo aequantibus. *Nepal.*
- paraguaiensis* Hilar. 34. I. foliis spathulato-oblongis obtusiusculis remote ferratis glaberrimis, pedunculis axillaribus multipartitis, stigmate 4lobo. *Brafil. Paraguay.* (Caffine Gongonha Mart. Syst. 1. 939.)
- myricoides* Kunth. 35. I. foliis oblongis utrinque attenuatis ferrulatis laevibus, pedunculis 3floris glabris, corolla 4petala. *Nov. Granat.*

pag. 496.

- Post n. 25. *nepalensis* * 36. I. foliis subellipticis utrinque attenuatis integerrimis, umbellis globosis pedunculatis pubescentibus petiolo brevioribus. *Nepal.* (I. elliptica Don.)

I. *rotunda* Thunb. — floribus 5andris. *Nepal.*

- bumelioides* Kunth. 37. I. foliis obovatis mucronatis subintegerrimis glabris, pedunculis 1floris aggregatis. *Quito.*

pag. 497.

Ad Goniocarpum Thunb.

- falsoloides* Reichenb. 3. G. foliis linearibus glabris, floribus terminalibus aggregatis. *Nov. Holl.*

pag. 498.

Ad Bulliardam Cand.

- Sieberii* * 4. B. caule erecto ramofo, foliis linearibus ciliatis, pedunculis brevissimis axillaribus aggregatis. *Nov. Holl.* (Tillaea pedunculata Sieb.)

pag. 499.

Ad Potamogetona.

- Post n. 8. *indicus* Roxb. 24. P. gracilis, foliis longe petiolatis lanceolatis acutis coriaceis, superioribus oppositis,

tis, spicis pedunculatis remote verticillatis, pedunculis aequalibus. *Ind. or.*

Post n. 19. *crenulatus* Don. 25. P. foliis lineari-lingulatis obtusis crenulatis membranaceis 3nerviis sessilibus, summis oppositis. *Nepal.*

pag. 500.

Ad Ruppium.

R. maritima, — vaginis latioribus, pedunculis 4floris, antherarum loculis oblongis, nuculis erecto-obliquis.

rostellata Koch. 4. R. vaginis angustissimis, antherarum loculis subglobosis, nuculis transverse obliquis rostellatis. *Ad oras maris baltici.* Reichenb. ic. t. 174.

didyma Sw. 5. R. vaginis supremis ampliatis, pedunculis inaequalibus subbifloris, nuculis rostratis basi connatis. *Inf. Bartholom. e Carib.* Act. holm. 1825. p. 427.

CLASSIS V.

pag. 505.

Post n. 631. *Aspidosperma* Mart. Cal. 5partitus. Cor. 5fida. Stam. tubo adnata brevissima. Stylus clavatus. Folliculus compressus glaber.

Couma Aubl. Cal. 5fidus. Cor. infundibuliformis, laciniis angustis primum tortis. Stam. brevissima, antheris sagittatis. Discus hypogynus. Stigma 2fidum. Drupa 3-5pyrena. *Contortae.*

Post n. 634. *Mitreola* Rich. Cal. 5partitus persistens. Cor. urceolata. Stam. inclusa. Stigma indivisum. Caps. 2locularis, loculis polyspermis, placentis internis. *Gentianae.* *Ophiorrhiza* melius collocatur p. 514. post n. 778.

pag. 506.

Fabiana R. et P. Cal. 5fidus, dele tubum cor. longissimum.

Post n. 653. *Sibthorpia*. Cal. turbinatus 5fidus. Cor. subrotata. Antherae 2loculares. Stigma peltatum. Caps. compressa 2locularis, placenta centrali. *Scrofularinae.*

pag. 508.

Post n. 683. *Beaumontia* Wallich. Cal. 5sepalus. Cor. ventricosa campanulata, limbo 5lobo. Antherae sagittatae. Squamae hypogynae 0. Germen simplex.

pag. 510.

Post n. 718. *Embelia* Burm. Don. Cal. 5fidus. Cor. 5partita. Stam. laciniis corollae opposita, filamentis elongatis, antheris peltatis. Stigma truncatum. Drupa 1sperma. *Myrsineae*.

Post n. 720. *Hunteria* Roxb. Cal. 5partitus. Cor. infundibuliformis. Stigma 2lobum. Baccae duae 1-2spermae.

pag. 513.

Post n. 773. *Hymenopogon* Wallich. Cal. 5partitus. Cor. longe tubulosa hypocrateriformis, limbo 5fido. Stam. intra tubum. Capf. 4valvis 2ocularis. Sem. utrinque membranula appendiculata.

Lecananthus Jack. Cal. coloratus amplus carnosus, inaequaliter 2-4lobus. Cor. calyce minor, tubo abbreviato, limbo 5fido. Stylus 2fidus. Capf. 2ocularis polysperma.

Pflobium Jack. Cal. amplus 5partitus. Cor. tubus brevis, limbo 5fido. Stam. basi corollae inserta. Stigma clavatum 10alatum exsertum. Fructus siliquaeformis 2ocularis polyspermus.

pag. 514.

Ophiorrhiza transponatur e p. 505. huc post n. 778. inter Rubiaceas, egregie exposita ab Ach. Richardo in act. soc. nat. Paris. vol. 1. p. 61-68.

pag. 515.

n. 793. *Bartlingia* Reichenb. deleatur. Est enim *Plocama* p. 516. n. 815.

Post n. 801. *Zuccarinia* *. Cal. 1lateralis 3fidus. Cor. infundibuliformis, limbo 5fido. Antherae in tubo sessiles. Stigma 2lobum. Fructus baccatus 1spermus? germine 2oculari oligospermo. (*Jackia* Wallich. in flor. ind. 2. p. 323.)

Argostenma Wallich. Cal. 4-5dentatus. Cor. rotata, 4-5partita. Antherae conniventes exsertae. Fructus 2ocularis polyspermus?

pag. 516.

Post n. 809. *Geophila* Don. Cal. 5partitus. Cor. tubulosa 5fida. Stam. inclusa. Stigma 2fidum. Bacca 2sperma calyce coronata. *Rubiaceae*.

pag. 517.

n. 827. *Stylocoryna* Cav. — Capf. 2-4-polysperma.

Post n. 831. *Leycesteria* Wallich. Cal. inaequaliter 5partitus. Cor. infundibuliformis supra basin gibba, limbo 5lobo. Stam. exserta. Stigma capitatum. Bacca 5ocularis polysperma.

pag. 518.

Post n. 838. *Perrottetia* Kunth. Cal. 5lobus. Pet. 5 majora persistentia. Stam. cum petalis alternantia. Anthe-

rae cordatae 2loculares (?). Stigma sessile 2lobum. Discus orbicularis in fundo floris. Fructus baccatus dipyrenus. *Familia.*

- Post n. 851. *Icacina* Juss. Cal. inferus 5fidus. Pet. 5 e disco hypogyno orta, cum et stamina alterna insident. Antherae cordatae 2loculares. Stigma truncatum. Fructus 1spermus. *Familia?*
- n. 856. *Bonplandia* W. deleatur, contrahenda cum *Galipea* Aubl. p. 534.
- Post n. 857. *Euthemis* Jack. Cal. 5sepalus. Pet. 5. Stam. hypogyna. Antherae apice poris duobus dehiscentes. Stylus filiformis. Bacca 5sperma. Sem. arillata.
- † *Syndesmis* Wallich. Cal. spathaceus coloratus hinc fissus. Pet. 4, 5 basi cum filamentis juncta. Antherae sagittatae. Stylus lateralis, stigmatate simplici. Germen globulosum 1spermum.
- Harpullia* Roxb. Cal. 5sepalus. Pet. 5, cum staminibus alterna. Stigma 2lobum. Caps. 2locularis 2sperma. *Sapindeae.*

pag. 520.

- n. 879. *Brexia* Nor. Noronha enim condidit genus.
- Post n. 887. *Hortia* Vand. Cal. 5dentatus persistens. Pet. 5 uncinata basi barbata. Filamenta complanata. Antherae dorso affixae 2loculares. Caps. 5locularis, loculis 1-2spermis. *Rutaceae.*
- Metrodorea* Hilar. Cal. 5fidus. Pet. 5. Discus glanduloso-tuberculatus. Filamenta subulata. Antherae cordatae. Stylus brevissimus Stigma obtusum. Germen 5loculare, loculis 2spermis. *Rutaceae.*
- Dictyoloma* Adr. Juss. Cal. 5partitus. Pet. 5. Squamae lanatae staminiferae. Stigma capitatum. Caps. 5 2valves 3spermae. Sem. reniformia dorso reticulato-alata. *Rutaceae.*

pag. 521.

- n. 899. *Noisettia* Humb. Kunth. Sem. ovato-globosa, *haud alata.*
- Anchietea* Hilar. Cal. 5partitus. Cor. irregularis, petalo quinto maximo calcarato. Caps. maxima inflata 3valvis polysperma. Sem. grandia compressa alata. *Ionidia.*
- Post n. 901. *Amphirrhox* *. Cal. 5partitus. Pet. 5 unguiculata spathulata subinaequalia, unguibus longis in tubum conniventibus Antherae apice mucronatae. Caps. 1locularis 3valvis, valvis placentiferis. *Ionidia.*

pag. 522.

- Post n. 912. *Sphaerocarya* Wallich. Cal. 5partitus. Pet. 5 cum staminibus alterna. Squamae 5 fimbriatae inter stamina et oppositas calycis lacinias. Stylus indivisus. Drupa nuce 1sperma. *Rhamneae?*
- Post n. 915. *Crumenaria* Mart. Cal. campanulatus 5fidus superne coloratus. Pet. cucullata unguiculata stamina recipientia. Stigm. 3. Caps. 3cocca 3alata. *Rhamneae.*

pag. 523.

- Post n. 927. *Guilleminea* Kunth. Cal. campanulatus 5fidus 3bracteatus. Stam. 5 brevia tubo inserta. Antherae 1loculares. Stigma emarginatum. Capf. 1sperma, calyce tecta.
- Post n. 931. *Pfaffia* Mart. Char. Gomphrenae, praeter stigma simplex capitatum sessile.
- Mogiphanes* Mart. Cal. 5sepalus 2bracteatus, stipitatus basi 5glandulosus, stipitulo demum articulado. Tubus cylindricus antheras 1loculares, interjectis squamulis, gerens. Styl. 1. Stigma capitatum. Utriculus evalvis 1spermus.
- Hoplotheca* Nutt. Cal. 1phyllus 5fidus 2bracteatus demum durefens. Tubus cylindricus staminifer. Antherae 1loculares. Stigma penicillatum capitatum. Utriculus 1spermus calyce indurato clausus.
- Post n. 934. *Bouffingaultia* Humb. Cal. membranaceus persistens, limbo duplici, ext. 2-, inter. 5partito. Stam. basi calycis inserta. Antherae 2loculares posticae. Stylus 1. Stigma 3lobum. Utriculus 1spermus stylo coronatus.
- Post n. 939. *Licania* Aubl. Cal. turbinatus 5fidus basi 2bracteatus. Stam. annulo calycis interno infidentia ejusque laciniis opposita. Stylus incurvus, stigmatate simplici. Drupa 1sperma. *Rosaccae?*

pag. 525.

- n. 968. *Heurniam* scribo, non Huerniam, cum Justo Heurnii, collectoris Batavi in Africa australi, nomen gerat. Justus Heurnius, pastor ac medicus, pictor plantarum capensium, frater Othonis, prof. Leidensis, et filius Joannis, celeberrimi auctoris. Inclitum nomen, quod incititia sola deformare potest! Stapel. ad Theophr. p. 333. Hermann. hort. lugd. bat. p. 54.

pag. 526.

- Post n. 990. *Ditassa* R. Br. Cor. subrotata 5partita. Corona duplex, ext. 5partita, inter 5phylla exteriori opposita. Antherae membrana terminatae.

pag. 527.

- n. 996. *Oxypetalum* R. Br. add. Retinacula massarum pollinis sursum in appendiculam et dentes subulatos abeuntia.
- Post n. 999. *Physanthus* Mart. Cor. campanulata basi ventricosa. Corona 5phylla sublibera carnosa, foliolis extrorsum apice cucullatis. Stigmata apiculata exserta.
- n. 1001. *Gentiana*, leg. Cal. campanulatus.
- Post n. 1005. *Neuropeltis* Wallich. Cal. 5sepalus persistens. Cor. infundibuliformis 5fida. Stigmata reniformia. Capf. 1sperma bractea dilatata suffulta. *Convolvulae.*

pag. 528.

n. 1014. deleatur *Bauffya* Baumg. Est enim Gypophilae species, vol. 2. p. 373.

Post n. 1018. *Meniscofa* Blum. Flores polygami. Cal. 4-5fidus. Pet. 4, 5 biferialia. Stam. lata petalis opposita. Discus 5dentatus perigynus. Stigm. 2. Baccae didymae 1spermae. *Menispermis affinis*.

Post n. 1023. *Dulongia* Kunth. Cal. 5dentatus. Pet. 5. Discus orbicularis germen obtegens. Stam. cum petalis alterna, cum iisdem sub ambitu disci inserta. Antherae 2loculares. Stylus 0. Stigmata 2. Bacca semibilocularis, calyce petalis staminibusque coronata, loculis 2-3spermis. *Rhamnaceae*.

pag. 533.

Post n. 1117. *Merckia* Fisch. Cal. 5sepalus. Pet. integra. Stam. basi libera. Caps. inflata umbilicata fulcata basi 3locularis 3valvis. Semina pyriformia. *Caryophylleae*.

pag. 534.

Post n. 1140. *Eurycoma* Jack. Flores polygami. Cal. 5partitus. Pet. 5 glanduloso-pilosa. Glandulae 10 geminae inter stamina. Fructus 5 1spermi basi coaliti. *Terebinthaceae*.

Post n. 1141. *Galipea* Aubl. Cal. 5fidus. Pet. 5 linearia villosa conglutinata. Stam. 5, quorum 2-4 saepe abortiunt. Antherae basi 2lobae. Styli 5 subcoaliti. Cocci 5 2valves. *Rutaceae*.

pag. 536.

Ad Tricratum Herit.

arenarius * 3. Tr. foliis cordatis orbicularibus carnosis, involucro persistente, staminibus inclusis, lobis limbi repando-undulatis. *California*. (Abronion Hook. exot. fl. t. 193.)

pag. 538.

Ad Cerinthen.

alpina Kit. 6. C. caule ramofo, foliis cordato-ovatis integerinis glabris, corollis 5dentatis, dentibus revolutis, antheris filamenta longitudine superantibus. *Ad Danubium. Hungar.* (C. 5-maculata Wahlenb. carpath., suevica Martens.)

pag. 539.

Heliotropium viridiflorum Lehm. deleatur, rediturum sub Tournefortia.

Ad *H. linifolium* Lehm. (*H. compactum* Don., *brevifolium* Wall.)

pag. 540.

Post n. 26. *obovatum* Roxb. Don. 65. H. caule decumbente subramoso, foliis obovatis petiolatis eveniis utrinque fericeis, spicis conjugatis, calycibus tubo corollae brevioribus. *Nepal.*

pag. 543.

† *Roxburghii* * 66. H. caule erecto ramoso hirsuto, foliis ovato-oblongis, spicis terminalibus paniculatis secundis. *Ind. or.* (H. paniculatum Roxb.)

pag. 547.

Ad *Pulmonariam mollem* Wolf. (non Wulff.) Patria et *Bavaria et ager spadanus.* (P. saccharata Mill.)

pag. 548.

Onofma est neutrum. *Περὶ ὀνόματός* enim scribit Diosc. 3, 147. *Diosma* vero et *Citrosma*, ex ὄσμη compositae, feminae sunt.

pag. 549.

Ad *Onofma.*

Post n. 14. *macrocephalum* Don. 22. O. hispidissimum, racemis recurvatis aggregatis, caule ascendente simplici, foliis lanceolatis acutis subtus mollibus 3nerviis, laciniis calycis linearibus plumosis corollam superantibus, stylo incluso. *Nepal.* (O. bracteatum Wallich.)

Gmelini Ledeb. 23. O. foliis spatulato-lanceolatis tuberculato-hispidis, caule simplici, corymbo sessili, corolla tubulosa repando-dentata, genitalibus exsertis. *Imaus. Sibir. austr.* Gmel. fib. 4, t. 40.

Emodi Wallich. 24. O. procumbens hispidum, foliis lanceolatis tripplinerviis, racemis terminalibus solitariis, bracteis linearibus, corollae ventricosae 5sulcatae ore contracto, antheris filamenta superantibus, stylo exserto. *Nepal.* Roxb. fl. ind. 2. p. 11.

pag. 554.

Echium bonariense Poir. est idem ac *plantagineum* L., adventa ex Europa. Hilar. pl. ul. bras. ad t. 25.

pag. 557.

Ad *Myosotida.*

Post n. 9. *robusta* Don. 33. M. caule ascendente simplici, foliis oblongis acutis sessilibus utrinque pilosis, racemis conjugatis brevibus bracteatis, laciniis calycis obtusis tubum corollae superantibus. *Emodi montes.*

ovalifolia Wallich. 34. M. caule procumbente hirsutiusculo, foliis petiolatis subcordato-ovatis acutis hispidiusculis,

racemis terminalibus elongatis filiformibus, feminibus glaberrimis 3quetris. *Nepal*.

pag. 559.

Ad Borriginem.

spinulosa Roxb. 7. B. foliis sessilibus oblongis scabris, pedunculis oppositifoliis 1floris, caule debili dichotomo hispido. *Bengal*.

pag. 561.

Ad Anchusam.

Post n. 24. *arvalis* Reichenb. 35. A. foliis lanceolatis denticulatis hispidis, spicis laxis elongatis, bracteis ovato-lanceolatis, calycibus demum erectis (floribus coeruleis). *German*. (A. angustifolia Roth, arvensis Taufsch.)

pag. 563.

Ad Symphytum.

Post n. 5. *bulbosum* Schimper. 9. S. radice repente tuberifera, foliis oblongis decurrentibus, dentibus corollae erectis, fornicibus exsertis. *Palatinatus*. Reichenb. ic. t. 220.

pag. 564.

Ad Cynoglossum.

Post n. 3. *furcatum* Wallich. 49. C. foliis elliptico-oblongis acutis semiamplexicaulibus utrinque sericeis, racemis geminis erectis tenuifloris secundis, laciniis calycis obtusissimis setosis. *Ind. or.*

C. *canescens* W. (C. racemosum Roxb.)

pag. 565.

Post n. 27. *prostratum* Hamilt. 50. C. caule prostrato foliisque hispidis, foliis radicalibus longe petiolatis obovatis, caulinis sessilibus ellipticis, pedunculis abbreviatis subextraxillaribus. *Ind. or.* (C. marifolium Roxb.)

pag. 569.

Ad *Nemophilam phacelioidem* Bart. (N. Nuttallii Coll. app. ad hort. ripul.)

pag. 571.

Ad Lyfimachiam.

Post n. 6. *secunda* Don. 24. L. caule erecto glabro, foliis petiolatis ovatis acutis integerrimis, racemis terminalibus spicatis secundis, floribus cernuis, calycibus corolla brevioribus. *Nepal*. (L. lobelioides Wallich.)

pag. 572.

Ad Lyfimacium.

Post n. 17. *alternifolia* Wallich. 25. L. caule erecto 4gono foliisque alternis petiolatis oblongis utrinque attenuatis pubescentibus, pedunculis capillaribus elongatis, calycibus corollam superantibus. *Nepal.* (L. evalvis Wall., tetragona Don.)

pyramidalis Wallich. 26. L. caule erecto tereti, foliis oppositis, inferioribus ovato-lanceolatis superioribus linearibus, pedunculis axillaribus abbreviatis, calycibus corollam superantibus. *Nepal.* (L. heterophylla Don.)

Ad L. *japonicam* Thunb. (L. debilis Wallich.) *Nepal.*

pag. 573.

Ad Dodocatheon.

frigidum Chamiss. Ledeb. 3. D. foliis subspathulatis repando-dentatis, umbellis paucifloris, pedunculis divaricatis glandulosis, bracteis subulatis, antheris subsessilibus. *Ora occid. Amer. arctic.*

pag. 574.

Ad Primulam.

Pr. *denticulata* Sm. patriam habet *Nepalam* Don. fl. nepal. p. 79., non Africam.

pag. 575.

Post n. 24. *altissima* Don. 52. Pr. foliis cordato-oblongis obtusis inaequaliter dentatis rugosis, petiolis longissimis simplicibus, umbella multiflora, foliolis involucri dentatis, lobis corollae obcordatis. *Emodi montes.* (Pr. reticulata Wallich.)

speciosa Don. 53. Pr. foliis subcordato-oblongis obtusis erodentatis reticulato-venosis, petiolis praelongis dilatatis, umbella multiflora, foliolis involucri lanceolatis integerrimis, laciniis calycis ellipticis, corollae oblongis 2fidis. *Emodi montes.*

Post n. 27. *rotundifolia* Wallich. 54. Pr. foliis cordato-subrotundis grosse ferratis subtus farinosis, petiolis longissimis aequalibus, umbella pauciflora, lobis corollae rotundatis integerrimis. *Emodi montes.*

macrophylla Don. 55. Pr. foliis oblongis argute ferrulatis mucronatis supra glabris subtus farinosis, umbella pauciflora, lobis corollae obcordatis. *Emodi montes.*

Stuartii Wallich. 56. Pr. foliis lanceolatis acutis ferratis glabris subtus subtiliter farinosis, umbella pauciflora, lobis corollae 4dentatis. *Emodi montes.*

longifolia Curt. n. 32. Pr. foliis oblongis obtusis denticulatis glaberrimis, umbella erecta multiflora, involucri polyphyllis subulatis reflexis, laciniis calycis linearibus tubum corollae aequantibus. *Caucas.*

nivalis Pall. 57. Pr. foliis spathulato-lanceolatis repando-dentatis glabris, umbella multiflora crecta, foliolis

involucri lanceolatis basi subconnatis, laciniis calycis lanceolatis tubo corollae brevioribus. *Sibir.*

pag. 576.

Ad Pr. *sibiricam* Jacqu. (Pr. *intermedia* Ledeb.)

Post n. 45. *angustifolia* Torr. 58. Pr. foliis subspathulato-oblongis integerrimis membranaceis glabris eveniis, scapo 1floro, laciniis calycis subulatis, lobis corollae rotundatis integerrimis. *Montes scopulosi Amer. bor.* Ann. of the Lyc. of New-York, 1. t. 3. f. 3.

pag. 577.

Post n. 49. *tridentata* Don. 59. Pr. foliis radicalibus obovatis longe petiolatis eroso-dentatis glabris reticulato-rugosis, scapo 1floro foliis breviori, laciniis corollae acute 3dentatis. *Nepal.* (Pr. petiolaris et nana Wallich.)

Ad Androsacen.

Post n. 1. *primulina* * 27. A. foliis lanceolatis acutis pinnatifido-ferratis utrinque scapoque pubescentibus, umbella 3flora, laciniis calycis obtusis, fauce corollae barbata, lobis 2fidis. *Nepal.* (A. *primuloides* Don., *pufilla* Wallich.)

pag. 578.

Post n. 14. *carinata* Torr. 28. A. foliis congestis ovato-lanceolatis acutis carinatis ciliatis, scapo villoso, umbella pauciflora, calycibus obtusis corolla brevioribus. *Montes scopulosi Amer. bor.* Ann. of the Lyc. of New-York, 1. t. 3. f. 1.

Post n. 16. *farmentosa* Wallich. 29. A. farmentis elongatis radicanibus, foliis aggregatis spathulatis mucronatis integerrimis villosissimis, umbella multiflora, lobis corollae integerrimis. *Emodi montes.* (A. *lanuginosa* Wallich.)

Ad A. *rotundifoliam* Sm. (A. *incisa* Wallich.)

Post n. 20. *arctica* Chamiss. 30. A. foliis oblongis rigidis margine revolutis supra dense furcato-pubescentibus subtus glaberrimis, pedunculis folia aequantibus, calycibus glaberrimis. *Ora occid. Amer. arctic.*

pag. 579.

Ad Erythracam.

deleantur E. *compressa* Heyn., *litoralis* Fries n. 3. et 5. quae pertinent ad E. *linarifoliam* Perf. n. 10., cujus melior character hic est: E. caule apice ramoso, foliis radicalibus spathulatis, caulinis linearibus, floribus terminalibus aggregatis. *German. Anglia. Gallia. Succia.* (E. *conferta* Perf., *uliginosa* Kit., *aggregata* Thouin., *litoralis* Fries., *compressa* Hayn., *angustifolia* Wallr.)

pag. 580.

deleatur *Sabbatia verticillata*, reducenda ad *Hippion* * p. 589.

pag. 581.

Ad Sabbatiam.

- australis*
Schlechtend. 11. S. caule erecto 4angulo subalato, foliis radicalibus obovatis, caulinis lineari-lanceolatis, pedunculis elongatis 1floris, calyce 5partito tubum subaequante, laciniis corollae acuminatis. *Ad fl. Platan.* Sello.

pag. 584.

Post *Allamandam*:

ASPIDOSPERMA Mart.

- tomentosum*
Mart. 1. A. foliis terminalibus fasciculatis subsessilibus oblongis repandis venosis utrinque tomentosis, cymis compositis aggregatis. *Brasil.*
- macrocarpon*
Mart. 2. A. foliis subcordato-oblongis obtusis petiolatis coriaceis subtus tomentosis, cymis compositis aggregatis. *Brasil.*
- refractum*
Mart. 3. A. ramulis dichotomis refractis, foliis ovatis acutis pubescentibus, cymis simplicibus paucifloris. *Brasil.*
- bicolor* Mart. 4. A. ramulis divaricatis, foliis petiolatis obovatis obtusis supra glabris subtus incano-tomentosis. *Brasil.*
- pyrifolium*
Mart. 5. A. foliis petiolatis ovatis acutis utrinque glabris. *Brasil.*

COUMA Aubl.

- guianensis*
Aubl. *Guiana.* Arbor excelsa, foliis ternatis oblongis glabris, floribus paniculatis roseis. (*Cerbera triphylla* Rudg.) Rich. in ann. de scienc. natur. 1. p. 56.

pag. 585.

Ad Spigelim

- Ad Sp. *hamellioidem* Kunth. (Sp. *Humboldtiana* Schlechtend.) *Brasil.* Lacinae calycis capsulam laevem subaequant. Sp. *Anthelmia* L. habet lacinias calycis capsula muricata breviores.
- scabra*
Schlechtend. 6. Sp. herbacea perennis, foliis ovato-lanceolatis rigidiusculis subtus scabris, floralibus quaternis, staminibus inclusis, laciniis calycis capsulam scabriusculam superantibus. *Ad fl. Platan.* Sello.
- Flemmingiana*
Schlechtend. 7. Sp. herbacea annua, foliis oblongo-lanceolatis, floralibus quaternis, staminibus inclusis, dentibus calycis minimi basin capsulae laevis subaequantibus. *Brasil.* Sello.

- Beyrichiana* Schlechtend. 8. Sp. herbacea perennis, foliis petiolatis ovatis, floralibus quaternis, staminibus inclusis, laciniis calycis basi capsulae laevis paullo longioribus. *Brasil.* Beyrich.
- laurina* Schlechtend. 9. Sp. fruticulosa glaberrima, foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis, floralibus quaternis, staminibus inclusis, dentibus calycis minimis. *Brasil.* Sello.
- Selloi* * 10. Sp. fruticosa stellato-tomentosa, foliis ovatis acutis, genitalibus exsertis, laciniis corollae lanceolatis. *Brasil.* Sello. (Sp. *Sellowiana* Schlechtend.)
- Olfersiana* Schlechtend. 11. Sp. fruticosa stellato-tomentosa, foliis subcordato-ovatis acutis, staminibus inclusis, laciniis corollae obtusis. *Brasil.* Sello.

Loco *Ophiorrhizae* ponatur:

MITREOLA Rich.

- ophiorrhizoides* Rich. *Ind. occid. Carolina.* Herba simplex glabra, foliis ovato-oblongis, cyma terminali bifido-ramosa, floribus lateralibus sessilibus albis. (*Ophiorrhiza* *Mitreola* L.)

pag. 586.

Ad Lisianthum P. Br.

- Post n. 19. *speciosus* Schlechtend. 32. L. caule 4gono simplici, foliis sessilibus ovatis obtusis nervosis marginatis, panicula trichotoma coarctata, floribus cernuis. *Brasil.* Sello.

pag. 587.

- Post n. 28. *pedunculatus* Schlechtend. 33. L. caule simplici 4gono, foliis sessilibus ovato-oblongis acutis, pedunculo terminali 1floro, calycis campanulati corollaeque laciniis acutis. *Brasil.* Sello.

pag. 588.

Ad Loganiam R. Br.

- Post n. 9. *angustifolia* Sieb. 11. L. fruticulosa, foliis lineari-lanceolatis cuspidatis subtus tomentosis, stipulis obsoletis, floribus axillaribus corymbosis. *Nov. Holl.*

Ad Geniostoma Forst.

- acuminatum* Wallich. 6. G. ramis 4angulis subscandentibus, foliis oblongo-lanceolatis acuminato-cuspidatis coriaceis supra nitidis subtus strigillosis, umbellis axillari-bus petiolo brevioribus. *Inf. freti Malacc.*

pag. 589.

Ad Chironiam.

- centauroides* Roxb. 9. Ch. caule 4gono dichotomo, foliis oblongis 3nerviis, calycibus subfoliariis carinatis, stigmate 2lobo. *Bengal.*

*Ad Hippion *.*

- controversum* * 4. H. caule simplicissimo stricto tereti, foliis verticillatis sessilibus reflexis ovato-oblongis acutis 3nerviis, floribus corymbofo-paniculatis. *Brafil.* Sello. (*Sabbatia verticillata* Syst. veg. 1. p. 580. *Curtia gentianoides* Schlechtend. *Linnaea* p. 210.)

pag. 590.

*Ad Convolvulum.*Ad *C. pentaphyllum.* (*C. hirsutus* Roxb.)Ad *C. pendulum* * (*C. pedatus* Roxb.)

pag. 591.

Ad *C. tenuifolium* Vahl. (*C. digitatus* Roxb.)

pag. 594.

Ad *C. acuminatum* Vahl. varietas: *C. pudibundus* Lindl. in Bot. reg. 999.

- Post n. 60. *bignonioides* * 336. *C.* radice tuberosa, foliis 3lobis dentatis, lobis posticis sibi incumbentibus, pedunculis sub-3floris pendulis petiolo brevioribus, laciniis calycis subaequalibus obtusiusculis, limbo corollae infundibuliformis crispato. *Cayenna.* (*Ipomoea* Bot. mag. 2645.)

pag. 596.

- Post n. 92. *gangeticus* Roxb. 337. *C.* foliis cordato-subrotundis obtusis subtus villosis punctatis parallele venosis, pedunculis axillaribus petiolo brevioribus, laciniis calycis reniformibus demum auctis, gemminibus 4ocularibus. *Ind. or.*

pag. 597.

Ad *C. latiflorum* Desr. (*Ipomoea noctiluca* Herb. ad Bot. reg. 917.)

pag. 598.

- Post n. 117. *semidigynus* Roxb. 338. *C.* foliis cordato-ovatis acutis villosis, pedunculis petiolo brevioribus, corolla extus pubescente. *Ind. orient.*

- Post n. 119. *Hardwickii* * 339. *C.* foliis cordatis acutis subpubescentibus, pedunculis 2-3floris demum nutantibus, laciniis calycis exterioribus sagittatis ciliatis tubum gibbum corollae aequantibus. *Ind. or.* (*C. calycinus* Roxb.)

pag. 599.

Ad *C. coccineum* * (*Ipomoea phoenicea* Roxb.)

pag. 600.

Post n. 139. *Hamiltonii* * 340. *C. foliis cordatis cuspidatis pubescentibus, pedunculis multifloris folia superantibus, laciniis calycis acutis pilosis. Nepal. (Ipomoea cuspidata Don.)*

Post n. 145. *pilatus* * 341. *C. foliis profunde cordatis villosis, involucri 4angulari peltato 4-6floro. China. (Ipomoea pilata Roxb.)*

Ad *C. hispidum* Vahl. (*C. pilosus* Roxb.)

pag. 601.

Ad *C. repandum* Desr. (*C. blandus* Roxb.)

pag. 603.

Post n. 191. *davuricus* Sims. 342. *C. foliis sagittato-cordatis oblongis subtus pedunculisque 1floris tomentosis, bracteis late ovatis acutis (floribus roseis). Sibir. Bot. mag. 2609.*

pag. 604.

Post n. 206. *Malcolmii* Roxb. 343. *C. foliis sagittatis glabris, auriculis angulato-dentatis, pedunculis petiolos superantibus clavatis, laciniis calycis ovatis. Persia.*

pag. 605.

Post n. 221. *sphaerocephalus* Roxb. 344. *C. foliis sagittato-cordatis oblongis utrinque villosis, capitulis axillaribus sessilibus (floribus parvis purpureis). Ind. or. Nepal. (C. atropurpureus Wall., Ipomoea sphaerocephala Don.)*

pag. 606.

Ad *C. Kleinii* * (*C. laurifolius* Roxb. fl. ind. 2. p. 50.)

Post n. 233. *Rottleri* *, 345. *C. foliis ovatis acutis longe petiolatis parallele venosis subpubescentibus, pedunculis multifloris, bracteis lanceolatis calyces superantibus. Ind. or.*

pag. 608.

Post n. 255. *stipulaceus* Roxb. 346. *C. foliis cordato-sagittatis mucronatis glabris, auriculis repandis, pedunculis multifloris petiolos aequantibus, calycibus glabris, lobis corollae obcordatis. Ind. or.*

pentagonus Roxb. 347. *C. ramis 5genis, foliis cordato-sagittatis villosis, auriculis subangulatis, pedunculis umbelliferis rigidis, calycibus glabris. Inf. Molucc.*

Post n. 257. *Wallichianus* * 348. *C. caule prostrato, foliis hastato-trilobis obtusis utrinque glabris, auriculis*

emarginatis, pedunculis 1floris elongatis, bracteis cordatis calyces superantibus. *Nepal.* (Calyptegia hederacea Wallich.)

Clappertonii * 349. *C.* caule repente, foliis sagittatis glaberrimis, auriculis acutiusculis integerrimis, pedunculis 1floris. *Afric. med.* (Ipomoea R. Br. ad Denham. it. p. 240.)

Ad *C. Beladambu* * (*C.* flagelliformis Roxb. fl. ind. 2. p. 68.)

pag. 609.

Ad *C. ebracteatum* Desr. adde patriam: *Rio grande do Sul Amer. austr.* Sello.

Ad *C. rugosum* W. (*C.* reniformis Roxb.)

Ad *C. Pedem Caprae.* (*C.* bilobatus Roxb.)

pag. 610.

Post n. 285. *Rheedii* Wallich. 350. *C.* foliis oblongo-lanceolatis acutiusculis, pedunculis sub-3floris folia aequantibus, laciniis calycis exterioribus cordatis scariosis interiores occultantibus. *Nepal. Ind. or.* (Ben-tirn-tali Rheed. mal. 2. t. 54.)

caespitosus Roxb. 351. *C.* foliis lineari-lanceolatis glabris, pedunculis petiolos superantibus bracteatis 1-4floris, calycibus glabris margine callosis. *Ind. or.*

pag. 614.

Ad *Poranam racemosam* Jacqu. adde patriam: *Ind. or. Nepal.*

grandiflora Wall. 5. *P.* volubilis pilosa, foliis cordato-ovatis acuminatis 7nerviis, racemis axillaribus paucifloris, corolla calycem multo superante. *Nepal.*

pag. 615.

Ad *Nierembergiam pubescentem* * (*N.* viscidula Kunth., graveolens Hilar.)

Ad *Fabianam* R. et P.

thymifolia Hilar. 2. *F.* suffruticosa glanduloso-pubescentem, foliis sparsis linearibus obtusiusculis enerviis, floribus axillaribus solitariis pedunculatis nutantibus. *Rio grande Amer. austr.*

pag. 616.

Ad *Nicotianam.*

Post n. 7. *plumbaginifolia* W. 18. *N.* caule herbaceo diffuse ramoso tuberculato-aspero, foliis sessilibus, inferioribus obovatis, superioribus semiamplexicaulis lanceolatis undulatis, corollae tubo longissimo, limbo acutiusculo. *Rio grande.* (*N.* acutifolia Hilar.)

pag. 617.

Post n. 18. *nana* Lindl. 19. *N.* acaulis humillima, foliis lanceolatis integerrimis pilosis; pedunculis solitariis

axillaribus 1floris abbreviatis, calyce inflato viscidulo tubo corollae aequante, limbo corollae obsoleto 5lobo, lobis acutiusculis. *Montes scopulosi Amer. bor. Bot. reg. 833.*

Post *Lehmanniam* :

SIETHORPIA.

- retusa* Kunth. 1. *S. foliis cordato-reniformibus lobatis, lobis re-
tulis, floribus 5andris. Nov. Hispania. Syst. 2.
p. 815.*
- europaea* 2. *S. foliis peltatis cordato-reniformibus lobato-
crenatis, floribus 4andris. Anglia. Lusitania.
Syst. 2. p. 815.*
- pichinchenfis*
Kunth. 3. *S. foliis cordatis sub-7lobis, floribus 5andris.
Alp. Quito. Syst. 2. p. 815.*
- peregrina* 4. *S. foliis reniformibus orbiculatis crenatis, flori-
bus 7andris. Mauritania. Madera. (Disandra
prostrata L. Syst. 2. p. 166.)*

pag. 618.

Ad Verbascum.

V. thapsiforme et *cuspidatum* Schrad. specie congruunt. Sed *V. nemorosum* et *australe* Schrad. potius varr. *phlomidis* L.

Post n. 5. *candidissimum* Cand. 49. *V. foliis oblongis utrinque at-
tenuatis crenatis densissime candide floccoso-
tomentosis, inferioribus petiolatis, superioribus
decurrentibus, floribus remote verticillato-spi-
catis. Ager monspel.*

pag. 619.

Ad *V. Lychnitidem*, *V. Weldenii* Morett. var.

pag. 621.

De *V. cisalpino* Birol., var. *V. phoenicei*, cf. Colla in act. acad. tau-
rin. vol. 26. p. 507.

pag. 623.

Ad Cryptandram Sm.

- australis* Sm. 2. *Cr. foliis fasciculatis petiolatis lineari-filifor-
mibus ramisque scabris, floribus capitatis extus
setoso-plumosis. Nov. Holl. Sieb. n. 66.*
- amara* Sm. 3. *Cr. foliis confertis alternis minutis spathulato-
ellipticis subsessilibus, floribus fasciculatis extus
incanis. Nov. Holl. Sieb. n. 67.*
- obovata* Sieb. 4. *Cr. foliis sparsis obovato-spathulatis petiolatis
glabriusculis, ramis setoso-ramentosis, floribus
aggregatis glabris. Nov. Holl. Sieb. n. 129.*
- spinescens* Sieb. 5. *Cr. foliis confertis obovatis glabris, ramulis se-
tosis spinulentibus, floribus subsolitariis inca-
no-pubescentibus. Nov. Holl. Sieb. n. 68.*

pag. 625.

Ad Cantuam Juff.

- megapotamica**8. C. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glaberrimis integerrimis supra nitidis, paniculis axillaribus. - *Rio grande*. Sello.

pag. 626.

Ad Cobacam Cav.

- lutea* Don. 2. C. foliolis oblongis acutis, laciniis calycis linearilanceolatis mucronatis, staminibus longe exsertis. *Guayaquil*.

pag. 629.

Ad Epacrin Forst.

- rufifolia* R. Br. 22. E. foliis subcordato-ovatis acuminatis petiolatis, ramulis hirsutis, floribus sparsis pendulis, tubo corollae calycem his superante. *Nov. Holl.*
- sparsa* R. Br. 23. E. foliis oblongo-lanceolatis mucronatis petiolatis eveniis, floribus sparsis nutantibus, tubo corollae calycem acutum subaequante. *Nov. Holl.*
- rivularis* Sieb. 24. E. foliis subsessilibus ovatis acuminatis reflexopatientibus, calycibus acutis corollam subaequantibus. *Nov. Holl.*
- rigida* Sieb. 25. E. foliis ovato-oblongis obtusiusculis subsessilibus cartilagineis subtus carinatis patulis, calycibus obtusis tubum corollae aequantibus. *Nov. Holl.*

pag. 630.

Ad Lyfinema R. Br.

- L. pungens* R. Br. habet folia amplexicaulia. Proximum est:
- rufifolium* Sieb. 6. L. foliis semiamplexicaulibus ovato-oblongis cuspidatis ciliatis laevibus, calyce subulato tubum corollae aequante. *Nov. Holl.*
- L. pentapetalum* R. Br. habet folia 3gona obtusa glabra.

pag. 631.

Ad Eclitem.

- E. longiflora* Desf. habet caulem erectum, non sarmentosum. Proximae sunt *suffruticosae erectae, corollae longissimae tomentosae limbo crispato*:
- petraea* Hilar. 53. E. foliis cordato-linearibus acutis undulatis revolutis subtus incano-tomentosis, pedunculis axillaribus. *Ad fl. Platam.*
- Velame* Hilar. 54. E. foliis ovato-oblongis cuspidatis lanatis. *Brazil.* (*E. guaranitica* Hilar.)
- crescens* Hilar. 55. E. hirsuta, foliis ovato-oblongis acutis subtus tomentosis. *Brazil.*
- pinifolia* Hilar. 56. E. hispida, foliis quaternis linearibus revolutis subtus incano-tomentosis. *Brazil.*

pag.

pag. 633.

Post n. 39. *nutans* Anderf. 57. E. foliis oblongis utrinque attenuatis subtus rubro-venosis villosis, pedunculis nutantibus, corollae laciniis obtusis crispatis. *Inf. Carib. Bot. mag.* 2473.

pag. 634.

Deleatur *E. grandiflora* Roxb.

pag. 635.

Ad Vallarim R. Br.

† *controversa* * 8. V. caule volubili, foliis cordatis acuminatis 5nerviis, corymbis axillaribus subcapitatis. *Ind. or.* (Convulvulus binectariferus Wallich. in Roxb. fl. ind. 2. p. 47.)

Post *Ichnocarpum* R. Br. :

BEAUMONTIA Wallich.

grandiflora
Wall.

Ind. or. Frutex scandens, ramulis pubescentibus, foliis elliptico-oblongis mucronatis coriaceis glabris, floribus corymbosis amplis albis. (Echites *grandiflora* Roxb.) *Bot. reg.* 911.

pag. 636.

Ad Thenardiam Kunth.*scabra* *

3. Th. foliis ovato-ellipticis undulatis subtus glaucescentibus, cymis pedunculatis axillaribus 3fidis, corolla extus scabro-pubescente. *Nov. Caledon.* (Echites *scabra* Labill. nov. Caled. t. 31.)

Ad Alstoniam R. Br.Ad *A. scholarem* R. Br. (*A. plumosa* Labill. nov. Caled. t. 32.)*neriifolia*
Wallich.

5. A. foliis verticillatis lanceolatis acuminatis parallele venosis subtus villosis, cymis terminalibus sessilibus pubescentibus, fauce villosa, limbi laciniis acutis tubo brevioribus. *Nepal.*

lucida Don.

6. A. foliis oppositis oblongis acuminatis glabris lucidis reticulatis, cymis terminalibus pedunculatis trichotomis, fauce barbata, limbi laciniis obtusis tubum aequantibus. *Nepal.*

pag. 638.

Wrightia tinctoria R. Br. habet folia glaberrima. (*Nerium tinctorium* Roxb. non Rottl.)

Ad *Vincam majorem* L. V. media Delil., foliis laciniisque calycis haud ciliatis, ceterum non diversa.

Ad *Tabernaemontanam macrophyllam* Poir. T. cestrifolia Nees. Mart. var.

pag. 642.

Ad *Cerberam Odallam* Hamilt. (*Ochrofia elliptica* Labill. nov. Ca-
led. t. 30.)

pag. 645.

Ad Tournefortiam.

Post n. 27. *megapotamica* * 55. T. foliis oblongis obtusis glabris
medio dentatis subtus flavicantibus, spicis axilla-
ribus elongatis, calycibus verticillatis hirsutis.
Rio grande. Sello.

viridiflora Wall. 56. T. foliis petiolatis ovatis acutis integerrimis
subtus villosis, spicis compositis dichotomis re-
curvis. *Ind. orient.* (*Heliotropium viridiflorum*
Lehm., *Lithospermum* Roxb.)

pag. 647.

Ad Beureriam Jacqu.

cestroides * 4. B. foliis oppositis lineari-lanceolatis integerrimis
glabris, racemis paniculatis. *Amer. austr.*
(*Freylinia cestroides* Coll.)

Ad Ehretiam.

Post n. 4. *pyrifolia* Don. 23. E. foliis ovatis acutis ferratis gla-
bris, floralibus oblongis, panicula terminali, flo-
ribus confertis. *Nepal.* (*E. ferrata* Roxb.)

umbellulata Wallich. 24. E. arborea, foliis ovatis subretusis undulatis
glaberrimis, umbellis sparsis pubescentibus, co-
rolla subrotata, laciniis recurvis. *Silhet, prov.*
Ind. or.

pag. 648.

Post n. 18. *macrophylla* Wallich. 25. E. arborea, ramis verruco-
sis, foliis ovato-oblongis argute ferratis supra
hispidulis subtus pubescentibus, panicula termi-
nali. *Nepal.*

setosa Roxb. 26. E. foliis cordato-ovatis setoso-hispidis, spicis
secundis recurvis dichotomis paniculatis. *Inf. ad*
Ind. orient.

uniflora Roxb. 27. E. fruticosa, foliis subsessilibus oblongis inte-
gerrimis pilosis, floribus solitariis subsessilibus.
Inf. Molucc.

pag. 650.

Ad Cordiam.

Post n. 16. *Muñeco* Kunth. 73. G. foliis cordato-elliptico-oblon-
gis obtusiusculis remote dentatis supra strigillo-
sis subtus fusco-villoso-tomentosis, cymis sub-
axillaribus subdichotomis divaricatis, floribus
spicato-glomeratis, calycibus fusco-tomentosis.
Ad fl. Mogdalen.

Post n. 20. *acuminata* Wallich. 74. G. arborea glaberrima, foliis
ovato-oblongis acutis coriaceis integerrimis, co-

rymbis dichotomis subpubescentibus, laciniis calycis lanceolatis ciliatis tubo corollae brevioribus. *Ind. or.*

pag. 655.

Styphelia triandra Andr. habet folia striata cuspidata.

St. amplexicaulis Rudg. — folia longe ciliata.

pag. 657.

Ad *Stypheliam obovatam* Labill. (Cyathodes Tameiameiae Chamiss.) *Inf. Sandwich.*

Post n. 43. *Cymbula* * 72. St. foliis petiolatis congestis lanceolatis concavis rufis, spicis axillaribus confertis erectis, bracteis ciliatis. *Nov. Caledon.* (Leucopogon Cymbulae Labill. nov. Caled. t. 39.)

pag. 658.

Post n. 46. *glaucescens* Sieb. 73. St. foliis lanceolatis mucronatis integerrimis laevibus subtiliter striatis glaucis, pedunculis abbreviatis 1floris. *Nov. Holl.*

fastigiata * 74. St. foliis lanceolatis cuspidatis apice ferrulatis erectis striatis, calycibus axillaribus subfoliariis glaberrimis. *Nov. Holl.* (Leucopogon fastigiatus Sieb.)

malaica * 75. St. foliis lanceolatis acutis integerrimis subtus glaucis punctatis, stipulis axillaribus erectis. *Peninsula Malacc.* (Leucopogon malayanus. Malayana miscell. 1.)

Post n. 59. *denudata* * 76. St. foliis linearibus acutis erectis glabris integerrimis, floribus terminalibus aggregatis. *Nov. Holl.* (Leucopogon denudatus Sieb.)

pag. 660.

Ad Nolanam.

paradoxa Lindl. 6. N. caule prostrato foliisque ovatis obtusis petiolatis hirsutis, limbo corollae 10lobo, nuculis cumulatis 1spermis. *Chili. Bot. reg. 862.*

pag. 662.

Ad Ardifiam Sw.

A. revoluta Bonpl. (A. multiflora W. herb.)

Post n. 14. *propinqua* Kunth. 25. A. ramulis teretiusculis verrucosis, foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis integerrimis membranaceis glabris obsolete glanduloso-punctatis, racemis terminalibus solitariis simplicibus, fructibus pedicellatis. *Ad Orinocum.*

cestrifolia Kunth. 26. A. ramis subangulatis, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis membranaceis glabris epunctatis, paniculis axillaribus terminalibusque sessilibus, floribus racemosis 4-5andris. *Alp. nov. Granat.*

- durifolia* Kunth. 27. A. ramis teretibus, foliis obovato-oblongis obtusis integerrimis coriaceis glabris subtus corymbisque terminalibus lepidotis, floribus 5andris. *Alp. nov. Granat.*
- glandulosa* Roxb. 28. A. foliis lanceolatis margine coloratis glandulosis glabris, umbellis terminalibus globosis longe pedunculatis. *Silhet, prov. Ind. or.*
- pauciflora* Heyn. 29. A. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis glabris, pedunculis lateralibus filiformibus 2-3floris. *Ind. or.*
- anceps* Wallich. 30. A. ramis scandentibus ancipitibus, foliis lanceolatis acuminatis integerrimis coriaceis subtus reticulato-venosis, paniculis terminalibus, pedunculis complanatis glabris. *Silhet, provinc. Ind. or.*
- complanata* Wallich. 31. A. ramis subscandentibus teretibus, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis subtus reticulato-venosis, paniculae ramis flexuoso-divaricatis complanatis villosis. *Inf. freti Malacc.*
- tuberculata* Wallich. 32. A. ramis compressis, foliis obovato-oblongis integerrimis coriaceis nitidis glanduloso-punctatis, racemis paniculatis foliosis, ramis teretibus tuberculosis. *Ind. or.*
- Post n. 18. *punctata* Lindl. 33. A. foliis lanceolatis basi attenuatis coriaceis glanduloso-subcrenatis glabris, umbellis pedunculatis axillaribus pubescentibus, floribus cernuis punctatis. *China. Nepal. Bot. reg. 827. (A. macrocarpa Wallich.) A. pedunculosa Wall. var.*
- villosa* Roxb. 34. A. foliis lanceolatis crenulatis subtus ramisque villosis, umbellis terminalibus compositis villosissimis. *Inf. freti Malacc.*
- hymenandra* Wallich. 35. A. foliis obovatis acutis grosse crenatis glabris subtus reticulato-venosis, corymbis lateralibus foliatis, laciniis corollae acuminatis elongatis, antheris alatis apice caudatis in tubum coalitis. *Silhet, prov. Ind. or.*

pag. 663.

Ad Myrsinem.

- † *Potama* Don. 27. M. foliis ellipticis mucronulatis ferrulatis glabris nitidis, petiolis ramulisque pubescentibus, umbellis sessilibus, floribus 4fidis dioecis. *Nepal. (M. bifaria Wallich.)*
- † *sessilis* Don. 28. M. foliis oblongis acuminatis nitidis apice denticulatis, umbellis sessilibus, floribus ♂ 4fidis, stigmate 2lobo. *Nepal.*
- † *subspinosa* Don. 29. M. foliis lanceolatis acuminatis rigidis glabris spinuloso-ferrulatis, umbellis sessilibus pubescentibus, floribus dioecis. *Nepal.*
- semiferrata* Wallich. 30. M. arborea, foliis confertis lanceolatis attenuatis antice argute ferratis resinoso-punctatis, fasciculis pedunculatis, stigmate dimidiato laciniato-fimbriato. *Nepal.*

- capitellata* Wallich. 31. *M. arborea*, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis coriaceis, capitulis axillaribus sessilibus, stigmatibus subintegro. *Nepal.*
- pachysandra* Wallich. 32. *M. arborea*, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis laevibus, fasciculis axillaribus aggregatis glandulosis, antheris triangularibus crassis. *Inf. freti Malacc.*
- aurantiaca* Wallich. 33. *M. fruticosa scandens glabra*, foliis ovato-lanceolatis acutis integerrimis coriaceis supra nitidis, racemis axillaribus petiolos aequantibus, filamentis longissimis. *Ind. or.*

pag. 664.

Post *Myrsinem*:

EMBELIA BURM. DON.

- floribunda* Wallich. 1. *E. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis, racemis compositis, corollis revolutis glanduloso-pubescentibus. Nepal. (E. esculenta Don.)*
- Nagustia* Don. 2. *E. foliis ellipticis crenulatis, racemis simplicibus, corollis concavis glabris. Nepal. (Myrsine undulata Wallich.?)*
- Ribes* Burm. 3. *E. fruticosa scandens, foliis alternis petiolatis oblongis obtusis, racemis paniculatis terminalibus hirsutis, corollis concavis pilosis. Ind. or. N. L. Burm. fl. ind. t. 23.*
- robusta* Roxb. 4. *E. arborea, foliis ovali-oblongis integerrimis glabris, racemis axillaribus solitariis, corollis patulo-reflexis villosis. Ind. or.*
- vestita* Roxb. 5. *E. fruticosa scandens, foliis oblongo-lanceolatis subserrulatis, racemis axillaribus. Ind. orient.*
- villosa* Wallich. 6. *E. fruticosa scandens, ramis calloso-maculatis villosis, foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis subtus pilosiusculis, racemis axillaribus fasciculatis. Ind. or.*
- mutans* Wallich. 7. *E. fruticosa, ramis pendulis, foliis subbifariam approximatis lanceolatis acuminatis undulatis nitidis, racemis axillaribus abbreviatis fasciculatis. Silhet, prov. Ind. or.*
- canescens* Jack. 8. *E. fruticosa scandens villosa, foliis subcordato-oblongis acuminatis subtus pilosiusculis, petiolis sulcatis margine glanduloso-crispatis, racemis paniculatis hirsutis, corollis villosis. Inf. freti Malacc.*

pag. 665.

Post *Bumeliam*:

HUNTERIA ROXB.

- corymbosa* Roxb. *Inf. freti Malacc. Arbor, foliis oppositis oblongis integerrimis glabris, corymbis terminalibus, floribus albis.*

pag. 666.

Ad Sideroxylon.

- Post n. 9. *grandifolium* Wallich. 10. S. foliis obovato-ellipticis coriaceis glabris integerrimis, pedunculis axillaribus confertis pubescentibus basi squamatis, laciniis corollae obtusis. *Silhet, prov. Ind. or.*

pag. 667.

Ad Chrysophyllum.

- Post n. 14. *acuminatum* Roxb. 15. Chr. foliis lanceolatis acuminatis glaberrimis, pedunculis axillaribus 1floris recurvis. *Silhet, prov. Ind. or.*

pag. 669.

Ad Paederiam.

- recurva* Roxb. 6. P. erecta, foliis lanceolatis acuminatis integerrimis, corymbis terminalibus recurvis brachiatis villosis. *Ind. or.*
- Roxburghii* * 7. P. erecta, foliis subsessilibus oblongis integerrimis glabris parallele venosis, paniculis e dichotomia erectis. *Silhet, prov. Ind. or.* (P. erecta Roxb.)
- ternata* Wallich. 8. P. erecta, ramis trichotomis, foliis ternatis oblongo-lanceolatis integerrimis supra nitidis, pedunculis corymbiferis ramulisque triangularibus. *Ind. or.*

pag. 670.

Ad Leeam.

- robusta* Roxb. Blum. 6. L. caule tereti 1sulcato glabro, foliis bipinnatis acuminatis inaequaliter serratis subtus scabris, foliolis infimis ternatis. *Java. Ind. or.*
- rubra* Blum. 7. L. caule tereti sulcato, foliis 2pinnatis ad venas subtus asperis, foliolis infimis ternatis ovato-lanceolatis obtuse serratis. *Java.*
- javanica* Blum. 8. L. caule tereti punctato scabro, foliis 2pinnatis glabris argute serratis. *Java.*
- aculeata* Blum. 9. L. caule teretiusculo sulcato aculeato, foliis pinnatis glaberrimis grosse serratis. *Java.*
- Staphylea* Roxb. 10. L. ramis teretibus, foliis supradecompositis glabris, foliolis lineari-oblongis acuminatis serrulatis. *Ind. or.* (Aquilicia Otilis Gärtn.)
- integrifolia* Roxb. 11. L. foliis supradecompositis subtus pubescentibus, foliolis lanceolatis acuminatis integerrimis. *Ind. or.*
- Ad L. *aequatam*. (L. *hirsuta* Blum.)

pag. 671.

Ad Carissam.

- C. *ovata* R. Br. (C. *diffusa* Roxb.)
- C. *hirsuta* Roth. (C. *villosa* Roxb.)

axillaris Roxb. 10. *C. spinis oppositis recurvis, foliis oblongis, corymbis multifloris. Inf. Molucc.*

pag. 672.

Ad Willughbeiam Scop.

- Post n. 2. *volubilis* * 5. *W. caule scandente, foliis obovatis acutis petiolatis, racemis terminalibus laxis compositis. Sumatra. (Fagraea volubilis Wallich. in Roxb. fl. ind. 2. p. 36.)*
- racemosa* * 6. *W. caule (?) erecto, foliis breviter petiolatis ovalibus utrinque rotundatis, racemis terminalibus, floribus fasciculatis. Inf. freti Malacc. (Fagraea racemosa Jack. in Roxb. fl. ind. 2. p. 38.)*
- auriculata* * 7. *W. caule (?) arboreo, foliis confertis elliptico-oblongis utrinque attenuatis coriaceis glabris, stipulis 2lobis, floribus axillaribus pedunculatis. Sumatra. (Fagraea auriculata Jack. in Roxb. fl. ind. 2. p. 34.)*
- obovata* * 8. *W. caule arboreo, foliis petiolatis obovatis carnosis, pedunculis terminalibus 3floris. Silhet, prov. Ind. orient. (Fagraea obovata Wallich. in Roxb. fl. ind. 2. p. 33.)*
- † *elliptica* * 9. *W. foliis ellipticis glabris coriaceis, paniculis corymbosis terminalibus. Inf. Molucc. (Fagraea elliptica Roxb. fl. ind. 2. p. 32.)*
- fragrans* * 10. *W. caule arboreo, foliis lanceolatis obtusiusculis glaberrimis, corymbis axillaribus, staminibus ascendentibus. Inf. freti Malacc. (Fagraea fragrans Roxb. l. c.)*

Ad Strychnon.

- bicirrosa* Leschen. 12. *Str. caule scandente, cirris 2fidis oppositifoliis, foliis oblongis cuspidatis triplinerviis, fructibus 1lperinis. Ind. or. Roxb. fl. ind. 2. p. 267.*

pag. 675.

Ad Cestrum.

- Post n. 35. *pendulinum* Jacqu. 39. *C. ramis pendulis, foliis ovato-oblongis acuminatis membranaceis reticulato-venosis subtus pubescentibus, floribus terminalibus sessilibus aggregatis, laciniis corollae obtusis inflexis. Nov. Granat.*

pag. 679.

Ad Solanum.

- Post n. 35. *Gilo* Tin. 275. *S. foliis ovato-oblongis basi cuneatis angulato-dentatis utrinque floccoso-tomentosis, pedunculis geminis 1floris. Patria?*

pag. 681.

- Post n. 56. *Pseudochina* Hilar. 276. *S. arboreum, foliis lanceolatis acutis supra glabris, axillis venarum subtus*

barbatis, racemis extraxillaribus paucifloris divaricatis, calycibus glabris. *Brazil. Hilar. pl. uf. brasil. t. 21.*

Post n. 60. *spirale* Roxb. 277. S. foliis oppositis lanceolatis integerrimis glabris, racemis lateralibus, novellis spiralis, laciniis calycis glandulosis. *Silhet, prov. Ind. or.*

pag. 686.

Ad S. *biflorum* Lour. (S. 10dentatum Roxb., lysimachioides Wallich.) *Ind. or. Nepal.*

pachypetalon * 278. S. foliis oblongis repandis decurrentibus villosis, fasciculis axillaribus, corolla glabra carnosa. *Nepal.* (S. *crassipetalum* Wallich.)

Post n. 139. *erianthon* Don. 279. S. fruticosum, foliis ovato-oblongis acutis integerrimis utrinque ramisque stellato-tomentosis, corymbis terminalibus lanatis, corolla campanulata. *Nepal.*

pag. 688.

S. *agreste* Roth. (S. *diffusum* Roxb.)

pag. 689.

Post n. 179. *platanifolium* Sims. 280. S. foliis 5lobis utrinque subtomentosis, lobis acutis inciso-dentatis, umbellis extraxillaribus nutantibus, fructibus variegatis. *Amer. austr. Bot. mag. 2618.*

pag. 691.

quadrioculare * 281. S. foliis cordato-ovatis angulato-lobatis subtus stellato-tomentosis, aculeis caulinis confertis erectis, umbellis oppositifoliis paucifloris, calyce inermi, baccis hirsutis 4ocularibus. *Ind. or.* (S. *hirsutum* Roxb.)

pag. 693.

Ad S. *bonariense*. S. *guaraniticum* Hilar. var.

pag. 694.

S. *esculentum* Dun. (S. *longum* Roxb.)

pag. 696.

S. *giganteum* Jacqu. (S. *farinosum* Wall.) *Ind. orient.*

pag. 698.

Ad *Physalida*.

Post n. 19. *divaricata* Don. 22. Ph. ramis divaricatis angulatis pubescentibus, foliis petiolatis ovatis acutis subintegerrimis, floribus solitariis axillaribus folio brevioribus. *Nepal.*

Ph. *chenopodifolia* Lam. (Ph. *stramonifolia* Wallich.)

pag. 702.

Ad Spermadictyon Roxb.

- scabrum* * 2. Sp. foliis ovato-lanceolatis utrinque scabris, laciniis calycis linearibus. *Nepal.* (*Hamiltonia scabra* Don.) Sp. *suaveolens* Roxb. habet laciniis calycis setaceas glanduliferas.
- pilosum* * 3. Sp. foliis lanceolatis integerrimis petiolatis ramisque hirsutis, fasciculis axillaribus bracteatis hirsutissimis. *Inf. Molucc.* (*Hamiltonia pilosa* Roxb.)

pag. 703.

Ad Macrocnemum.

- Post n. 8. *stipulaceum* Roxb. 9. M. foliis subsessilibus lanceolatis glabris, stipulis ovalibus, paniculis terminalibus corymbosis. *Inf. Molucc.*
- parviflorum* Roxb. 10. M. foliis subpetiolatis lanceolatis glabris, stipulis annularibus truncatis, pedunculis axillaribus multifloris. *Inf. Molucc.*

pag. 704.

Ad Cinchonam.

- thyrsiflora* Roxb. 16. C. foliis petiolatis ovatis pubescentibus, stipulis oblongis glanduloso-fimbriatis, panicula thyrsoides nuda, calycibus villosis. *Bengal.*
- flaccida* * 17. C. foliis ovato-ellipticis acuminatis coriaceis nitidis, stipulis spatulatis, racemis axillaribus pendulis. *Ind. or.* (*Hymenodictyon flaccidum* Wallich.)
- obovata* * 18. C. foliis obovatis acutis glabris subtus reticulatis, stipulis ovatis glanduloso-ciliatis, racemis axillaribus erectis. *Ind. or.* (*Hymenodictyon obovatum* Wallich.)

pag. 706.

Ad Mussaendam.

- cubensis* * 8. M. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris supra nitidis, costa media subtus hirsutiuscula, paniculae foliatae ramis trichotomis apice incrassatis, bractea longe stipitata subrotunda. *Cuba.* (*Bractearia durissima* Pöppig.)
- corymbosa* Roxb. 9. M. foliis oblongis acutis integerrimis utrinque laevibus, corymbo terminali composito, bracteis longe petiolatis ovalibus acutis 5-7nerviis. *Ind. orient.*
- macrophylla* Wallich. 10. M. foliis ovatis acuminatis pubescentibus, corymbis terminalibus trichotomis hirsutis, bracteis petiolatis late ovatis 7nerviis villosis. *Nepal.*
- incana* Wall. 11. M. foliis ovato-oblongis acuminatis utrinque villosis subtus albidis, corymbo terminali fasciculato paucifloro, bracteis petiolatis subcordatis 5nerviis corollisque pubescentibus. *Nepal.*

Post *Danain*:

HYMENOPOGON Wall.

parasiticus Wallich. Frutex parasiticus in arboribus *Ind. or.*, foliis oppositis acuminatis villosis, corymbis trichotomis.

LECANANTHUS Jack.

crubescens Jack. *Sumatra. Penins. Malacc.* Frutex 4angulus ramifolius, foliis ovato-lanceolatis glabris, stipulis ligulatis, capitulis involucreatis.

PSILOBIUM Jack.

mutans Jack. *Sumatra.* Frutex erectus 4gonus, foliis lanceolatis acutis glabris, stipulis ovatis acuminatis, pedunculis nutantibus axillaribus 3-6floris. Altera species Pf. *tomentosum* Jack. nondum satis est definita. *Malayan miscell.* 2.

pag. 707.

Ad Rondeletiam.

R. stricta Roth. (Macrocneium strictum Roxb. in Rees cyclop., *Randia stricta* Roxb. fl. ind. 2. p. 145.)

byrsophylla * 22. R. foliis lanceolatis acuminatis nitidis ramulisque glaberrimis, panicula pyramidata, dentibus corollae abbreviatis. *Nepal.* (R. coriacea Wall.)

paniculata Roxb. 23. R. arborea, foliis subsessilibus oblongis utrinque attenuatis glabris subtus villosiusculis, stipulis subrotundis recurvatis, paniculae ramis brachiatis, pedicellis calycibusque villosis. *Inf. Molucc.*

tinctoria Roxb. 24. R. arborefcens, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis glabris, stipulis 3angularibus cuspidatis, paniculae ramis decussatis, floribus ternis. *Bengal.*

tetrandra Roxb. 25. R. fruticosa, foliis sessilibus lanceolatis glabris, stipulis pinnatifidis, floribus axillaribus glomeratis 4andris. *Inf. freti Malacc.*

scandens Roxb. 26. R. fruticosa scandens glabra, foliis petiolatis oblongis integerrimis, paniculis axillaribus brachiatis. *Inf. Mascaren.*

pendula Wallich. 27. R. fruticosa, ramis pendulis 4angulis, foliis ovato-lanceolatis acuminatis supra glabris subtus scabriusculis, corymbis terminalibus paniculatis. *Ind. or.*

pag. 708.

Post n. 12. *longifolia* Wallich. 28. R. foliis lanceolatis acuminatis supra pilosis subtus ramulisque tomentosis, panicula divaricata, dentibus calycis obtusis. *Ind. or.*

proxima Don. 29. R. foliis oblongis acuminatis subtus ramulisque tomentosis, panicula hirsutissima, dentibus calycis obtusis. *Ind. or.*

- cinerea* Wallich. 30. R. arborea, ramis 4angulis, foliis lanceolatis supra villosis subtus tomentosis, stipulis oblongis recurvis, paniculis supradecompositis, floribus fasciculatis. *Nepal.*
- spicata* Wallich. 31. R. foliis ellipticis acuminatis subtus villosis, stipulis acutis deciduis, panicula villosa, floribus spicatis 4andris. *Inf. freti Malacc.*

Post *Bertieram* Aubl.:

OPHIORRHIZA.

- subumbellata* Forst. 1. O. fruticosa, foliis lanceolatis acutis, umbellis axillaribus 3fidis. *Inf. Societ.*
- Mungos* 2. O. herbacea, foliis ovato-lanceolatis laevibus, spicis corymbosis, laciniis calycis ovatis. *Ind. or.*
- fascicularis* Don. 3. O. herbacea erecta ramosa, foliis oblongis acuminatis subtus pubescentibus, floribus terminalibus fasciculatis, laciniis calycis ovatis. *Nepal.*
- prostrata* Don. 4. O. herbacea prostrata radicans, foliis ovato-oblongis pubescentibus, spicis corymbosis, laciniis calycis oblongis. *Ind. or. Nepal.*
- rugosa* Wall. 5. O. herbacea villosa, foliis lanceolatis rugosis supra scabris, laciniis calycis minutis subulatis. *Nepal.*
- heterophylla* Jack. 6. O. herbacea tomentosa, foliis subrotundo-ovatis subtus albidis, altero minuto, floribus cymosis. *Sumatra. Malayan misc. 2. n. 7. 85.*
- tomentosa* Jack. 7. O. herbacea dense villosa, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis. *Sumatra.*

pag. 710.

Ad Lobeliam.

- Post n. 22. *arguta* Lindl. 151. L. foliis lineari-lanceolatis ferrulatis glaberrimis, pedunculis axillaribus 1floris folio brevioribus, calycibus glabris. *Chili. Bot. reg. 973.*

pag. 711.

- Post n. 36. *megapotamica* * 152. L. caule erecto ramoso foliisque linearibus angustissimis erecto-patulis glabris, floribus terminalibus corymbosis. *Rio-grande. Sello.*
- Post n. 40. *Sencensionis* * 153. L. foliis omnibus sessilibus pinnatifidis pilosiusculis, laciniis inaequalibus linearibus subdentatis, pedunculis axillaribus elongatis 1floris, corolla subregulari. *Nov. Holl. (Istoma axillaris Lindl. in bot. reg. 964.)*

pag. 713.

- Post n. 64. *excelsa* Leschen. 154. L. foliis petiolatis oblongo-lanceolatis denticulatis dense villosis, racemis terminalibus densifloris bracteatis, laciniis calycis linearibus tubum aequantibus. *Ind. orient. Roxb. fl. ind. 2. p. 114.*

pag. 714.

Ad Lobeliam.

Post n. 75. *trialata* Hamilt. 155. L. caule erecto exacte triquetro glabro, foliis subrotundis repando-dentatis subpetiolatis, pedunculis 1floris folio longioribus, capsula obovata. *Nepal.* (L. *micrantha* Hook.)

pag. 715.

Ad L. *stipularem* Roth. (L. *trigona* Roxb.)

pag. 716.

Ad *Lobeliam irriguam* R. Br. forte *Pratia repens* Gaudich. ex *Inf. Falkland.*

pag. 717.

Post n. 115. *rosea* Wallich. 156. L. caule erecto villoso glaucescente, foliis lanceolato-ensiformibus acuminatis denticulatis, racemis terminalibus paniculatis, pedicellis nutantibus secundis bracteatis. *Nepal.*

Deleatur L. *micrantha* Hook.

pag. 719.

Ad *Lyfipoma reniforme* Kunth. (*Viola algida* W. herb.)

pag. 720.

Ad Godeniam Sm.

Post n. 5. *armerifolia* Sieb. 34. G. caule stricto glabro paucifolio, foliis linearibus abbreviatis integerrimis, calycibus breviter pedunculatis villosis, corollis barbatis. *Nov. Holl.*

Post n. 11. † *pubescens* Sieb. 35. G. foliis obovatis inciso-dentatis glabriusculis, ramulis pubescentibus, floribus subsessilibus. *Nov. Holl.*

pag. 724.

*Ad Phyteunia.*Ad Ph. *Sieberii* * (Ph. *ferratum* Viv.) *Corfica.*

Post n. 17. *begonifolium* Roxb. 25. Ph. caule repente dichotomo villoso, foliis alternis petiolatis semicordatis spinuloso-ferratis subtus villosiusculis, racemis axillaribus secundis subspicatis. *Inf. freti Malacc.* Jack in Malayan miscell. 1, 5.

pag. 725.

Ad Campanulam.

Post n. 6. *aristata* Wallich. 172. C. caule filiformi simplicissimo, foliis sessilibus linearibus glanduloso-denticulatis, flore solitario erecto, laciniis calycis subulatis corollam superantibus. *Ind. or.*

pag. 726.

Campanulae Scheuchzeri Vill. var. *C. carnica* Schied., *linifolia* Scop.

Post n. 15. *lanceifolia* Roxb. 173. *C. caule simplici sub-3floro, foliis petiolatis lanceolatis ferratis, floribus nutantibus, laciniis calycis lanceolatis incis. Ind. or.*

pag. 729.

Post n. 53. *Morettiana* Reichenb. 174. *C. foliis cordato-ovatis crenatis, caule filiformi, flore erecto. Italia super. (C. filiformis Morett.)*

Post n. 58. *integerrima* Hamilt. 175. *C. caule erecto ramoso foliisque sessilibus linearibus acutis elongatis integerrimis hispida, laciniis calycis linearibus rectis corollam subaequantibus. Nepal. C. agrestis Wallich. var.*

pag. 730.

Ad *C. rapunculoidem*. (*C. infundibuliformis* Bot. mag. 2632.)

Post n. 68. *ramulosa* Wallich. 176. *C. caule ramoso, foliis lanceolatis sinuato-dentatis utrinque hirsutis, pedunculis nutantibus paniculatis bracteatis, laciniis calycis 3angularibus dentatis corolla brevioribus. Nepal.*

cana Wallich. 177. *C. caule ramoso foliisque confertis lanceolatis dentatis utrinque incano-villoso-tomentosis, floribus racemosis, laciniis calycis lanceolatis dentatis corolla brevioribus. Nepal.*

colorata Wallich. 178. *C. caule erecto foliisque lanceolatis acutis crenato-repandis incano-villofis, pedunculis elongatis, laciniis calycis 3angularibus integerrimis corolla brevioribus. Ind. or.*

pag. 732.

Post n. 86. *fulgens* Wallich. 179. *C. caule simplici foliisque breviter petiolatis lanceolatis acutis cuspidato-ferratis utrinque hirsutis, floribus fasciculato-racemosis bracteatis, laciniis calycis linearibus corollam aequantibus. Nepal.*

pag. 734.

Post n. 118. *isophylla* Morett. 180. *C. foliis cordato-reniformibus dentatis glabris, floribus corymbosis, corolla subrotata. Italia super.*

pag. 735.

Post n. 136. *Fischeriana* * 181. *C. foliis radicalibus cordatis ferratis, caulinis lanceolato-linearibus subintegerrimis, floribus paniculatis pendulis, laciniis calycis reflexis integerrimis. Sibir. (Adenophora coronopifolia Fisch.)*

thaliotrifolia * 182. *C. caule basi furculoso foliisque parvis orbiculatis integerrimis pilosis, pedunculis 1floris glau-*

duloso-pilosis cernuis, capsula 5loculari. *Emodi montes.* (Codonopsis? thalictrifolia Wallich., Glosocomia tenera Don.)

- Post n. 141. *ovata* * 183. C. caule erecto ramofo glabro, foliis petiolatis ovatis acutis repando-dentatis pubescentibus, pedunculis axillaribus erectis, laciniis calycis lanceolatis acutis. *Nepal.* (Wahlenbergia ovata Don.)

pag. 736.

- Post n. 145. *viridis* * 184. C. caule scandente ramofo, foliis cordato-oblongis acuminatis obsolete crenatis subtus glaucis villosis, pedunculis nutantibus, laciniis calycis linearibus denticulatis recurvis, corolla virescente intus purpureo-maculata. *Nepal.* (Codonopsis viridis Wallich. in Roxb. fl. ind. 2. p. 103.)

- purpurea* * 185. C. caule erecto ramofo foliisque oppositis ovato-oblongis subintegerrimis subtus glaucis glaberrimis, floribus erectis, laciniis calycis 3angularibus patulis. *Nepal.* (Codonopsis purpurea Wallich. l. c. p. 105.)

pag. 737.

- Post n. 160. *carnosa* Wallich. 185. C. caule procumbente, foliis ovatis argute serratis pellucido-punctatis carnosis glaberrimis, pedunculis axillaribus capillaribus, corolla subbilabiata, filamentis planiusculis basi aequalibus. *Nepal.*

pag. 738.

Ad *Schöpsiam* Schreb.

- fragrans* Wallich. 2. Sch. foliis alternis ellipticis integerrimis glabris, racemis axillaribus multifloris. *Nepal.*

pag. 741.

Ad *Pschotriam*.

- Post n. 12. *noxia* Hilar. 96. Pf. fruticosa, ramis bifariam pubescentibus, foliis brevissime petiolatis lanceolatis acuminatis glaberrimis, stipulis 2partitis, floribus fasciculatis terminalibus. *Basil.*

pag. 742.

- Post n. 33. *sphaerocarpa* Wallich. 97. Pf. foliis ovato-ellipticis acutis coriaceis glabris subtus parallele venosis, stipulis 2fidis, corymbis terminalibus compactis, fructibus sphaericis glabris ecostatis. *Silhet, prov. Ind. or.*

- truncata* Wallich. 98. Pf. foliis ovato-ellipticis utrinque attenuatis coriaceis glabris subtus parallele venosis, corymbi terminalis ramulis carnosis bracteatis, calycibus truncatis. *Ind. or.*

- connata* Wallich. 99. Pl. foliis subsessilibus lanceolatis acuminatis coriaceis glabris, stipulis ovatis acutis, corymbis terminalibus trichotomis, bracteis connatis infundibuliformibus sublobatis, floribus sessilibus ternatis, calycibus truncatis. *Ind. or.*
- adenophylla* Wallich. 100. Pl. foliis lanceolatis acuminatis supra nitidis subtus parallele venosis, axillis venarum glandulosis, stipulis ovatis obtusis, racemis terminalibus cylindricis. *Silhet, prov. Ind. or.*
- curviflora* Wallich. 101. Pl. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis membranaceis longe petiolatis, stipulis ovatis obtusis, racemis terminalibus compactis, limbo corollae incurvo. *Inf. freti Malacc.*
- ophioxylodes* Wallich. 102. Pl. caule fruticoso scandente dichotomo, foliis lanceolatis acuminatis glaberrimis, stipulis ovatis acuminatis, corymbo terminali, limbo corollae incurvo. *Silhet, prov. Ind. or.*

pag. 744.

- Pf. *hirsuta* Sw. Ad hanc ut varietas accedit: Pf. *Ioniceroides* Sieb. *Nov. Holl.*
- Pf. *asiatica*. (Pf. *collina* Labill. nov. Caledon. t. 47.)

pag. 745.

- Post n. 66. *Wallichiana* * 103. Pl. foliis ovatis acuminatis serrulatis nervosis glabris, paniculis terminalibus glomeratis, dentibus calycibus rotundatis. *Nepal.* (Pf. *nervosa* Don.)
- Post n. 70. *Marcgravii* * 104. Pl. foliis ovato-oblongis acuminatis venosis, stipulis 3fidis, cymis pedunculatis croceis, corolla basi gibba papilloso-tomentosa. *Brazil.* (Palicourea Hilar., Galvania 2. Veloz.)
- stipulacea* Wallich. 105. Pl. foliis subsessilibus oblongo-lanceolatis acuminatis nervosis coriaceis glabris, stipulis triangularibus apice foliaceis, panicula terminali trichotoma, bracteis 3fidis. *Inf. freti Malacc.*
- Reevesii* Wallich. 106. Pl. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis laevibus glaucis, stipulis obtusis appressis, panicula terminali subsessili, calycibus truncatis. *China.*
- aurantiaca* Wallich. 107. Pl. foliis lanceolatis acuminatis glabris supra lucidis subtus minute punctatis parallele venosis, stipulis ovatis cuspidatis, paniculae ramis verticillatis, floribus ternis, calycibus truncatis. *Inf. freti Malacc.*
- denticulata* Wallich. 108. Pl. caule suffruticoso basi repente ascendente, foliis ovatis acutis coriaceis subtus reticulatis, stipulis ovatis argute dentatis, panicula terminali cymosa, dentibus calycis subulatis. *Nepal.*

pag. 747.

- Bartlingia scoparia* Reichenb. delenda reducitor ad *Plocamam pendulum* Ait. p. 760.

pag. 749.

Ad *Morindam*.

- Post n. 2. *phillyreoides* Labill. 17. M. fruticosa, foliis lanceolatis supra badiis subtus sulfureis, stipulis ovatis acutis, capitulis globosis axillaribus subsessilibus, floribus 4andris. *Nov. Caledon.*
- tinctoria* Roxb. 18. M. foliis subsessilibus oblongis utrinque glabris opacis, fructibus unitis. *Ind. or.*
- exserta* Roxb. 19. M. foliis ovatis acutis nitidis, staminibus exsertis. *Bengal.*

pag. 750.

Ad *Naucleam*.

- Post n. 6. *undulata* Roxb. 12. N. arborea, ramis brachiatis, foliis petiolatis ovato-oblongis undulatis nitidis, stipulis ellipticis petiolos aequantibus, pedunculis terminalibus nutantibus. *Inf. Molucc.*
- macrophylla* Roxb. 13. N. arborea procera, ramis decussatis, foliis amplexicaulibus elliptico-oblongis obtusis basi attenuatis subtus villosiusculis, stipulis lanceolatis, pedunculis terminalibus solitariis, antheris sessilibus. *Ambonia. Ind. or. (N. sessilifolia Roxb.)*
- Cadamba* Roxb. 14. N. arborea, ramis horizontalibus, foliis petiolatis ovatis glabris, stipulis 3angularibus, pedunculis terminalibus, laciniis calycis linearibus. *Ind. or.*
- cordata* Roxb. 15. N. arborea, ramis horizontalibus, foliis petiolatis cordato-ovatis obtusis coriaceis glaberrimis, stipulis obovatis, pedunculis terminalibus solitariis, laciniis calycis clavatis carnosiss. *Ceylon. (N. coadunata Sm. in Rees cyclop.)*
- glabra* Roxb. 16. N. foliis ellipticis glabris, stipulis linearibus, pedunculis ternis, laciniis calycis 3angularibus. *Inf. Molucc.*
- rotundifolia* Roxb. 17. N. foliis petiolatis ovalibus obtusis, stipulis oblongis obtusis multinerviis, pedunculis paniculatis, capsulis distinctis. *Ind. or.*
- Post n. 7. *Adina* Sm. 18. N. suffruticosa, foliis lanceolatis acuminatis glaberrimis, stipulis patulis 2fidis, capitulis globosis folia subaequantibus, dentibus calycis obtusis, staminibus longe exsertis, fructu membranaceo. *China. (Adina globiflora Salish. parad. t. 115.) Bot. reg. 895.*
- adinoides* Lindl. 19. N. fruticosa, foliis spathulatis glabris, capitulis folia superantibus, fructibus membranaceis. *China.*

pag. 751.

- Post n. 8. *ovalifolia* * 20. N. foliis petiolatis obovatis glabris, pedunculis axillaribus terminalibusque compositis, receptaculo capsulisque villosis. *Inf. freti Malacc. (Uncaria Roxb.)*
- Ad *N. longifloram* Poir. (*Uncaria pedicellata* Roxb., *cirriflora* Jack.?)

Post

- Post n. 11. *sessilis* * 21. N. cirris spiralibus, foliis oblongis supra glabris molliusculis, pedunculis axillaribus pauciter-terminalibus multifloris. *Ind. or.* (Uncaria sessilifructus Roxb.)
- pilosa* * 22. N. cirris spiralibus, ramis 4gonis foliisque ovato-oblongis acuminatis pilosis, stipulis 2partitis, pedunculis axillaribus 1floris. *Ind. or. Inf. Molucc.* (Uncaria pilosa Roxb., scandens Sm.)
- Wallichiana* * 23. N. ramis 4angulis foliisque lanceolatis acuminatis subtus ferrugineo-villosis, stipulis diphyllis ovatis membranaceis recurvis, pedunculis abbreviatis demum uncinatis, capsulis longe pedicellatis. *Inf. freti Malacc.* (Uncaria lanosa Wallich.)
- grandifolia* * 24. N. ramis 4angulis, foliis late ovatis acuminatis coriaceis supra nitidis subtus villosis reticulato-venosis, capitulis grandibus tomentosis. *Ind. or.* (Uncaria macrophylla Wallich.)

Ad *Nonateliam* Aubl.

- Post n. 4. † *hispida* Wallich. 9. N. caule fruticoso, foliis inaequaliter oblongis acuminatis integerrimis coriaceis supra glabris subtus scabris, junioribus stipulisque lineari-lanceolatis hispidis, floribus axillaribus sessilibus subverticillatis, involucrio polyphyllo, bracteis lanceolatis 3nerviis hispidis. *Silhet, prov. Ind. or.*

pag. 753.

Ad *Scacvolam*.

- Post n. 22. *montana* Labill. 23. Sc. fruticosa, foliis obovato-oblongis coriaceis repandis glabris, cymis axillaribus pedunculatis pilosis, floribus sessilibus. *Nov. Caledon.*
- oppositifolia* Roxb. 24. Sc. foliis oppositis breviter petiolatis ellipticis integerrimis glabris, pedunculis axillaribus paucifloris. *Inf. Molucc.*

pag. 754.

Post *Rytideam* Cand.:

ZUCCARINIA *.

- ornata* * *Inf. freti Malacc.* Arbor procera, ramis 4angulis, foliis amplis obovato-oblongis cuspidatis supra nitidis subtus villosis, stipulis infundibuliformibus fimbriatis, paniculis axillaribus pendulis, floribus albis. (Jackia ornata Wallich.)

ARGOSTEMMA Wallich.

- sarmentosum* Wallich. 1. A. caule basi repente sarmentoso pubescente, foliis quaternis subsessilibus ovalibus obtusis, floribus umbellatis 4andris. *Nepal.*

- verticillatum* Wallich. 2. *A. caespitosum* erectum, foliis quaternis lineari-lanceolatis subfalcatis, pedunculis subgeminatis paucifloris, floribus 4-5andris. *Nepal.*
- rostratum* Wallich. 3. *A. erectum* glabrum, foliis oppositis petiolatis lanceolatis glaberrimis, stipulis ovalibus recurvis, umbella terminali multiflora. *Silhet, prov. Ind. or.*
- pictum* Wallich. 4. *A. humile* glabrum, foliis subcordato-ovatis acutis albo-reticulatis, umbella multiflora. *Inf. freti Malacc.*

pag. 756.

Ad *Canthium* Lam.

- angustifolium* Roxb. 4. *C. fruticosum*, spinis axillaribus, foliis subfasciculatis lanceolatis acuminatis lucidis, stipulis ensiformibus, floribus axillaribus aggregatis. *Ind. or.*
- parvifolium* Roxb. 5. *C. fruticosum* spinosum pilosum, foliis ovalibus integerrimis, floribus axillaribus fasciculatis, tubo corollae globofo. *Ind. or.*

pag. 757.

Post *Canthium* Lam.:

GEOPHILA DON.

- reniformis* Don. *Ind. or.* Herba reptans, foliis reniformibus pubescentibus, stipulis integris, pedunculis 2floris folio brevioribus. (*Psychotria herbacea* L. non Jacqu.)

Ad *Triosteum*.

- hirsutum* Roxb. 4. *Tr. fruticosum* hirsutum, foliis breviter petiolatis lanceolatis acuminatis, floribus axillaribus sessilibus, bracteis numerosis lanceolatis flores superantibus. *Ind. or.*
- Emodorum* * 5. *Tr. herbaceum* villoso-hirtum, foliis basi connatis obovatis acutis, racemis terminalibus verticillatis. *Emodi montes.* (*Tr. himaluyanum* Wallich.)

pag. 758.

Ad *Loniceram*.

- Post n. 14. *macrantha* * 31. *L. scandens*, ramulis teretibus petiolisque pilosis, foliis cordato-ovalibus cuspidatis subtus tomentosis, corollis pilosis. *Nepal.* (*Caprifolium macranthum* Don.)

pag. 759.

- Post n. 18. *ligustrina* Wallich. 32. *L. foliis* ellipticis integerrimis ciliatis, supremis lanceolatis, ramulis pilosis. *Nepal.*

Ad *L. Xylosteum*. *L. acuminata* et *diversifolia* Wallich. varr.

- Post n. 24. *glabrata* Wallich. 33. *L. scandens glabra*, foliis ovato-oblongis acuminatis subtus glaucis, floribus geminatis in fasciculis axillaribus terminalibusque, bracteis ovatis, tubo corollae breviusculo, (baccis nigris). *Ind. orient.* (*L. nigra* Thunb. japon)
- lanceolata* Wallich. 34. *L. foliis lanceolatis acuminatis supra nitidis pubescentibus subtus glaucis pilosis, pedunculis axillaribus elongatis villosis, (baccis nigris).* *Nepal.*
- Lefchenaultii* Wallich. 35. *L. foliis subcordato-ovatis acutis subtus villosis, pedunculis abbreviatis 2floris fasciculatis, involucre 6phyllo.* *Ind. or.*
- punicea* Sims. 36. *L. foliis subcordato-ovatis glabris nitidis, corollae tubo gracili basi subgibbo.* *Patria? Bot. mag. 2469.*

Ad *Weberam.*

- auriculata* Wallich. 4. *W. arborescens, foliis subsessilibus basi 2lobis oblongis emarginatis, axillis venarum subtus glandulosis, floribus paniculatis, stigmatibus 2lobo.* *Inf. freti Malacc.*
- densiflora* Wallich. 5. *W. subarborescens, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis glaberrimis, paniculis subsessilibus trichotomis, stigmatibus integro.* *Inf. freti Malacc.*
- oppositifolia* Roxb. 6. *W. fruticosa erecta, foliis oblongo-lanceolatis nitidis, spicis paniculatis oppositifoliis, stigmatibus clavato.* *Ind. or.*
- odorata* Roxb. 7. *W. fruticosa erecta, foliis lanceolatis acuminatis integerrimis nitidis, corymbis terminalibus.* *Ind. or.*
- macrophylla* Roxb. 8. *W. fruticosa erecta, foliis ovato-lanceolatis acuminatis, panicula terminali villosa.* *Inf. freti Malacc.*
- scandens* Roxb. 9. *W. scandens, foliis oblongis acuminatis ramulisque lucidis, cymis axillaribus, stigmatibus bilamellato.* *Silhet, prov. Ind. or.*
- truncata* Wall. 10. *W. volubilis, foliis ovatis acutis coriaceis supra nitidis, paniculae terminalis ramis complanatis, stigmatibus clavato bilobo.* *Inf. freti Malacc.*

pag. 760.

Ad *Vangueriam edulem* Vahl. V. *spinosa* Roxb. fl. ind. 2. p. 172. eadem videtur. Spinarum enim praesentia in specimenibus ficcis, quae Vahlus viderat, conspicui nequirit.

Ad *Bacobotryn* Forst.

- lanceolata* * 4. *B. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis utrinque ramulisque glabris, racemis subgeminis multifloris.* *Nepal.* (Maesa Don.)
- tomentosa* Hamilt. 5. *B. foliis oblongis acuminatis serratis utrinque ramulisque incano-tomentosis, racemis multiflo-*

ris paniculatis. *Nepal*. (B. macrophylla Wallich., Maesa tomentosa Don.)

Ad B. indicam Roxb. (Maesa Chifia Don.)

ramentacea Roxb. 6. B. foliis lanceolatis acutis integerrimis glabris, paniculis ramentosis. *Silhet, prov. Ind. or.*

argentea Wall. 7. B. foliis ovatis acuminatis argute fincato-dentatis pubescentibus subtus argenteis, racemis axillaribus abbreviatis, floribus fasciculatis. *Ind. orient.*

pag. 761.

Ad *Gardeniam*.

Post n. 2. *propinqua* Lindl. 35. G. spinis infraxillaribus rectis quaternis, foliis cordato-ovatis acuminatis undulatis pubescentibus. floribus terminalibus fasciculatis. *Patria? Bot. reg. 975.*

pag. 762.

Ad *Gardeniam esculentam* * (Randia triflora Don.) *Nepal*.

Ad G. spinosam Thunb. (Posoqueria rigida Wallich.)

Ad G. multifloram W. (Posoqueria longiflora Roxb.)

montana Roxb. 36. G. arborea, spinis axillaribus oppositis abbreviatis, foliis oblongis obtusis supra nitidis subtus subpubescentibus, floribus aggregatis terminalibus, dentibus calycis abbreviatis. *Ind. or.*

campanulata Roxb. 37. G. fruticosa, spinis solitariis subterminalibus, foliis lato-lanceolatis utrinque laevibus, floribus fasciculatis, dentibus calycis abbreviatis, corolla campanulata. *Ind. or.*

turgida Roxb. 38. G. arborefcens, cortice spongioso, spinis oppositis rectis, foliis obovatis glabris, floribus solitariis, dentibus calycis abbreviatis. *Butan.*

densa Wallich. 39. G. fruticosa, ramis decussatis 4gonis spinosis, foliis confertis obovatis mucronatis glabris, floribus solitariis, laciniis calycis subulatis. *Nepal.*

nutans * 40. G. fruticosa, ramis pendulis, spinis axillaribus oppositis horizontalibus, foliis fasciculatis obovatis glabris, floribus solitariis, laciniis calycis elongatis. *Ind. or.* (Posoqueria nutans Roxb.)

longispina * 41. G. arborea, ramis deflexis, spinis decussatis horizontalibus elongatis, foliis obovatis glabris, floribus solitariis, laciniis calycis cordato-ovatis persistentibus. *Ora Coromandel.* (Posoqueria longispina Roxb.)

fasciculata * 42. G. fruticosa, spinis axillaribus patentibus, foliis ovato-oblongis laevibus, floribus axillaribus fasciculatis, calycis hirsuti laciniis subulatis. *Silhet, prov. Ind. orient.* (Posoqueria fasciculata Roxb.)

floribunda * 43. G. arborefcens, spinis axillaribus, foliis confertis obovatis glabris, floribus fasciculatis, laciniis calycis lanceolatis elongatis. *Ora Coromandel.* (Posoqueria floribunda Roxb.)

pag. 763.

- Post n. 19. *rigida* Hamilt. 44. G. caule ramosissimo, foliis cuneatis retusis mucronulatis glabris, laciniis calycis subulatis, lobis corollae acutiusculis. *Nepal.*
- lucida* Roxb. 45. G. arborescens, gemmis resinosis, foliis oblongis lucidis parallele venosis, pedunculis solitariis clavatis, laciniis calycis subulatis. *Ind. or.*
- carinata* Wallich. 46. G. arborescens, gemmis resinosis, foliis obovatis subtus villosis, floribus solitariis, calyce truncato carinato. *Inf. freti Malacc.* (G. tubifera Wallich.)
- anisophylla* Jack. 47. G. arborescens, foliis oblongis villosis, altero minori, corymbis axillaribus, dentibus calycis abbreviatis. *Inf. freti Malacc.*
- G. grandiflora* Lour. (G. calyculata Roxb.)
- G. resinifera* Roth. (G. costata Roxb.)

pag. 764.

Ad *Stylocorynam* Cav.

- corymbosa* Labill. 2. St. foliis obovato-oblongis coriaceis glabris subtus discoloribus, floribus corymbosis, baccis 4locularibus. *Nov. Caledon.* St. racemosa Cav. habet baccas 2loculares.

Ad *Burchelliam* R. Br.

- parviflora* Lindl. 2. B. foliis subcordato-oblongis acutis glabriusculis subtus ad venas pubescentibus, floribus capitatis flavis. *Afric. austr.* Bot. reg. 891.

pag. 765.

Ad *Schwenkfeldiam* Sw.

- malaccensis* * 9. Schw. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis supra glabris subtus villosis, stipulis petiolos superantibus oblongis acutis, capitulis axillaribus pedunculatis. *Inf. freti Malacc.* (Urophyllum villosum Wallich.)
- glabra* * 10. Schw. foliis oblongo-lanceolatis acutis glabris, stipulis linearibus elongatis villosis, capitulis axillaribus breviter pedunculatis. *Inf. freti Malacc.* (Urophyllum Wallich.)

Post *Hameliam*:

LEYCESTERIA Wallich.

- formosa* Wall. *Emodi montes.* Frutex ramosus, foliis oppositis cordato-lanceolatis acuminatis glabris subtus glaucis, racemis terminalibus, bracteis grandibus purpureis ciliatis venosis, floribus albido-roseis.

pag. 766.

Ad *Hirtellam*.

- Ad H. *Cosmibuenam* Lam. (H. mollicoma Kunth.) *Nov. Granat.*
H. peruviana Perf. eadem. Sed H. pendula Lam.
diversa. -
- pendula* Lam. 6. H. racemis terminalibus compositis tomentosis,
floribus 3andris, foliis cordato-oblongis subtus
pubescentibus. *Amer. austr.?*
- hexandra* W. 7. H. racemis terminalibus ternis simplicibus pilo-
herb. fis, floribus 6andris, foliis oblongis obtusis basi
attenuatis coriaceis glabris supra nitidis, costa
media subtus pubescente. *Ad fl. Orinocum.*
- polyandra* 8. H. paniculis terminalibus ramosissimis tomento-
Kunth. sis, floribus polyandris, foliis oblongis utrinque
attenuatis coriaceis supra nitidis subtus albo-
tomentosis. *Mexico.*
- Opilia odorata* * delectur. *Aglaiia odorata* Lour. restituetur syst. 3.
p. 48.

pag. 767.

Ad *Rhamnum*.

- Post n. 1. *trigyna* Don. 48. Rh. foliis ovatis acuminatis ferrula-
tis lucidis, petiolis ramulisque pubescentibus,
spicis interruptis paniculatis. *Nepal.* (Zizyphus
hamosa et oppositifolia Wallich.)
- lucida* Roxb. 49. Rh. arborescens, spinis recurvis validis, foliis
oppositis subrotundo-oblongis emarginatis inte-
gerrimis nitidis, pedunculis axillaribus pauciflo-
ris abbreviatis. *Inf. Mascaren.*
- Rh. *tinctoria* Kit. habet folia *venosa* potius quam nervosa.
- Post n. 8. *virgata* Roxb. 50. Rh. foliis oblongis utrinque attenua-
tis membranaceis crenulatis glabris, pedunculis
1floris aggregatis. *Nepal.*
- Post n. 13. *incana* Roxb. 51. Rh. foliis ovato-oblongis integer-
rimis supra glabris subtus albido-pilosis, stipulis
filiformibus, corymbis axillaribus. *Inf. Molucc.*

pag. 769.

- Post n. 39. † *Nerija* * 52. Rh. foliis petiolatis ovali-oblongis ser-
rato-crenatis glabris, paniculis axillaribus com-
pactis. *Ora Coromandel.* (*Nerija dichotoma*
Roxb.)

pag. 770.

Ad *Zizyphum* Tourne.

- Post n. 6. *incurva* Roxb. 22. Z. aculeo altero incurvo, foliis ova-
tis acutis basi obliquis crenulatis 5nerviis, petio-
lis nervisque pubescentibus, cymis 2fidis pedun-
culatis, floribus semidigynis. *Ind. or.*
- rotundata* Cand. 23. Z. aculeo altero recurvo, foliis oblique ovatis
obtusis subcrenulatis subtus ramulisque villosis,
corymbis axillaribus, fructibus ovatis obtusis
glabris. *Inf. Mascaren.*

- oxycarpa* Cand. 24. *Z. aculeo altero recurvo, foliis oblique ovatis utrinque attenuatis argute ferrulatis subtus ramulisque villosis, corymbis axillaribus, fructibus oblongis acuminatis. Inf. Molucc.*
- latifolia* Roxb. 25. *Z. arborea, aculeis recurvis, foliis ovalibus ferratis subtus pubescentibus, panicula terminali, fructibus turbinatis. Ind. or.*
- Caracutta* Hamilt. 26. *Z. arborea, aculeo altero recurvo altero recto, foliis subrotundis ferrulatis glabriusculis, pedunculis axillaribus multifloris abbreviatis, fructibus ovalibus. Ind. or.*
- microphylla* Roxb. 27. *Z. fruticosa, ramis 2fariis flexuosis, aculeo altero recurvo altero recto, foliis ovatis ferrulatis subtus lanatis, floribus fasciculatis. Ora Coromandel. (Rhamnus nummularia Burm. ind. p. 61.)*
- flexuosa* Wall. 28. *Z. fruticosa, aculeo altero recurvo altero elongato recto, foliis lanceolatis obtusis crenatis nitidis, floribus axillaribus subsolitariis. Emodi montes.*
- Z. vulgaris* Lam. (*Z. nitida* Roxb.)
- Z. horrida* Roth. (*Z. elliptica* Roxb.)
- Z. Napeca* Lam. (*Z. glabra* Roxb.)

pag. 771.

- Z. Oenoplia* Mill. (*Z. albens* Roxb.)
- Z. Xylopyrus* W. (*Z. tomentosa* Roxb.)
- Post n. 19. *calophylla* Wallich. 29. *Z. fruticosa, aculeis recurvis, foliis ovato-oblongis crenulatis glaberrimis lucidis, corymbis paniculatis terminalibus. Inf. freti Malacc.*
- elegans* Wall. 30. *Z. fruticosa, aculeis minutis deciduis, ramis pubescentibus filiformibus, foliis 2fariis lanceolatis ferrulatis subtus pubescentibus. Peninsul. Malacc.*
- Post n. 21. *floribunda* Wall. 31. *Z. caule scandente, foliis ovatis acutis subintegerrimis coriaceis supra nitidis subtus glaucis nervosis, floribus racemoso-paniculatis, fructibus subcylindricis. Nepal.*
- flavescens* Wall. 32. *Z. caule scandente, foliis ovato-oblongis subintegerrimis supra opacis subtus glaucis nervosis, floribus fasciculato-racemosis. Emodi montes.*
- trinervia* Roxb. 33. *Z. arborefcens, foliis ovato-oblongis 3nerviis obtuse ferratis glabris nitidis, floribus axillaribus fasciculatis, fructibus globosis. Ind. or.*

Post *Zizyphum*:

PERROTTETIA Kunth.

- quinduenfis* Kunth. *Nov. Granat.* Frutex foliis alternis petiolatis oblongis acuminatis remote denticulatis membranaceis subtus tomentosis, stipulis petiolaribus geminis lanceolatis, racemis erectis axillaribus compositis foliis brevioribus, floribus rubris minutis.

pag. 772.

Ad *Ceanothum*.

C. paniculatus Roth. (*C. napalensis* Wallich.)
triqueter Wall. 21. *C. fruticosus*, foliis ovato-oblongis acuminatis ferrulatis subtus pubescentibus, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris, fructibus 3quetris. *Nepal*.

pag. 773.

Ad *Hoccniam dulcem* Thunb. adde patriam: *Nepal*.Ad *Celastrum*.

Post n. 7. *rufa* Wallich. 49. *C. arborea* glabra, aculeis axillaribus rectis, foliis lanceolatis acuminatis ferrulatis glaberrimis, pedunculis corymbiferis capillaribus, capsula 3sperma. *Nepal*.
rigida Wallich. 50. *C. fruticosa* erecta, ramis flexuosis spinosis, foliis obovatis coriaceis argute ferratis, spinis corymbiferis. *Ind. or.*

pag. 774.

Post n. 19. † *Hänkea* * 51. *C. fruticosa*, ramis flexuosis, foliis alternis petiolatis oblongo-lanceolatis undulatis integerrimis, racemis axillaribus folia superantibus, floribus bracteatis. *Peru.* (*Hänkea flexuosa* R. et P. fl. peruv. 3. t. 231. Etiam si ibi corolla 1petala urceolata et drupa indicentur, auctores dein ipsi ad *Celastrum* ablegarunt.)
verticillata 52. *C. arborea*, foliis subverticillatis oblongo-lanceolatis undulatis integerrimis glabris, pedunculis umbelliferis terminalibus, capsulis oligospermis. *Nepal*.
 Roxb.
robusta Roxb. 53. *C. arborea*, foliis alternis lanceolatis integerrimis nitidis, racemis axillaribus folia aequantibus, capsulis 2spermis. *Silhet, prov. Ind. or.*
opposita Wall. 54. *C. fruticosa*, ramulis 4gonis, foliis oppositis lanceolatis obtusis integerrimis, pedunculis axillaribus 3floris. *Ind. or.*
bivalvis Jacqu. 55. *C. fruticosa*, foliis oppositis lanceolatis acuminatis integerrimis glaberrimis, pedunculis lateralibus paucifloris, floribus apetalis, capsula 1sperma. *Inf. freti Malacc.*

pag. 775.

Post n. 27. *alnifolia* Don. 56. *C. foliis* ovatis acuminatis ferratis nervosis glabris opacis, pedunculis axillaribus subsolitariis 1floris. *Nepal*.
microcarpa 57. *C. foliis* ovatis crenatis utrinque ramulisque pubescentibus, pedunculis axillaribus solitariis 1floris. *Nepal*.
 Don.
 Post n. 40. *quadrangulata* Schrad. 58. *C. ramulis* quadrangulis, foliis alternis oblongis spinoso-dentatis nitidis, pedunculis axillaribus confertis. *Brasil.* (*Ilex acutangula* Nees.)

- ilicifolia* Schrad. 59. *C. foliis alternis oblongis truncatis subfinuato-spinosis supra lucidis subtus discoloribus, pedunculis axillaribus. Brasil. (Ilex truncata. Nees.)*
- ilicinus* Burch. 60. *C. foliis alternis ovato-subrhombeis grosse ferratis subtus pallidis, pedunculis axillaribus 1floris infra medium articulatis. Afric. austr.*
- dependens* Wallich. 61. *C. fruticosa scandens, foliis alternis pendulis oblongis acuminatis ferratis glabris, paniculis terminalibus, glandulis nectariferis reniformibus stamina interstinguentibus, capsula 3sperma. Nepal. (C. multiflora Roxb.)*
- nutans* Roxb. 62. *C. fruticosa scandens, foliis alternis obovato-oblongis obtuse ferratis glabris, paniculis racemosis terminalibus, capsulis oligospermis. Ind. orient.*
- monosperma* Roxb. 63. *C. fruticosa scandens, foliis obovato-oblongis ferrulatis nitidis, paniculis axillaribus terminalibusque elongatis, capsulis 1spermis. Ind. or.*
- † *pauciflora* Wallich. 64. *C. fruticosa erecta, foliis lanceolatis acuminatis subserratis glaberrimis, pedunculis 6-8floris, capsula 3valvi 6sperma. Inf. freti Malacc.*
- stylosa* Wall. 65. *C. fruticosa scandens, foliis ovato-lanceolatis acuminatis ferrulatis, pedunculis racemosis paucifloris, capsula globosa stylo elongato coronata. Nepal.*

pag. 776.

Ad *C. orbicularem* Humb. (Maytenus uliginosus Kunth. Humb. nov. gen. 7. p. 65.)

Ad *Pomaderrin* Labill.

Post n. 1. *phillyreoides* Sieb. 6. *P. foliis elliptico-oblongis integerrimis coriaceis subtus albido-tomentosis, cymis corymbosis confertis, calycibus villosis. Nov. Holl.*

Ad *P. lanigeram* Sims. (*P. obscura, ferruginea et viridirufa* Sieb.)
P. acuminata Link. potius dicenda *P. discolor* Vent. malmaif. t. 58. prior. Ad hanc *P. malifolia* et *discolor* Sieb.

intermedia Sieb. 7. *P. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis supra glabris subtus incano-villosis, cymis corymbofo-paniculatis, calycibus villosis. Nov. Holl.*

aspera Sieb. 8. *P. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis inaequaliter ferratis supra scabris subtus floccoso-tomentosis, paniculis axillaribus terminalibusque racemosis elongatis tomentosis, floribus apetalis. Nov. Holl.*

ligustrina Sieb. 9. *P. foliis lanceolatis integerrimis supra glabris subtus ferrugineo-villosis, paniculis terminalibus, calycibus fericeo-villosis. Nov. Holl.*

pag. 777.

Ad *Vitem*.

Ad *Vitem indicam*. *V. sylvestris* Blum. var.

Post n. 8. *Purani* Hamilt. Don. 27. *V. foliis cordatis dentato-ferratis acuminatis coriaceis subtus petiolisque*

villosis, thyrsis oppositifoliis spicatis brevibus.
Nepal.

truncata Blum. 28. V. foliis basi truncatis ovatis acuminatis obtuse glanduloso-ferratis, venis subtus pubescentibus, paniculis oppositifoliis. *Java.*

cymosa Blum. 29. V. foliis cordatis acuminatis setoso-ferrulatis subtus tomentosis, cymis pedunculatis 3fidis folio brevioribus. *Java.*

glaberrima Wallich. 30. V. caule carnosio 4gono, foliis subcordato-oblongis obtusiusculis mucronato-dentatis 3nerviis longibus, umbellis corymbosis. *Inf. freti Malacc.*

gracilis Wallich. 31. V. caule filiformi, foliis cordato-ovatis acuminatis argute dentatis supra pubescentibus subtus ramulisque ferrugineo-villosis, spicis filiformibus cirriferis. *Peninsul. Malacc.*

pag. 778.

Ad V. *glabratam* Roth. (V. *latifolia* Roxb. Don.)

V. *heterophylla* Thunb. crescit et in *Java.*

V. *triloba* Roth. (V. *lanata* Roxb.)

V. *capensis* Thunb. (V. *rugosa* Wallich.)

Post n. 14. *parvifolia* Roxb. 32. V. foliis cordatis sub-3lobis crenato-ferratis glabris, thyrsis oppositifoliis. *Bengal.*

barbata Wall. 33. V. ramis cylindricis glanduloso-setosis, foliis cordato-subrotundis 3lobis sinuato-dentatis 5nerviis glabriusculis, glomerulis cirriferis, floribus 4fidis. *Silhet, prov. Ind. or.*

glandulosa Wall. 34. V. ramis villosis, foliis cordato-ovatis 3lobis subtus villosis, axillis venarum foveolatis, corymbis dichotomis. *Nepal.*

Post n. 19. *javanica* * 35. V. foliis simplicibus ternatisque cordatis crenato-ferratis glabris, corymbis dichotomis. *Java.* (Ampelopsis *heterophylla* Blum.)

V. *ternata* Roth. (V. *cinnamomea* Wallich.)

semicordata Wallich. 36. V. foliis ternatis subtus villosis, foliolis acuminatis argute ferratis, lateralibus semicordatis, cymis oblongis. *Nepal.*

† *bracteolata* Wall. 37. V. foliis ternatis subtus subpubescentibus, foliolis acuminatis argute ferrulatis, lateralibus semiovatis, cymis diffusis, bracteis oblongis deciduis, floribus 4andris. *Ind. or.*

† *mollissima* Wall. 38. V. foliis ternatis villosissimis, foliolis acuminatis inaequaliter crenatis, cymis divaricatis, floribus 4andris. *Inf. freti Malacc.*

Post n. 22. *caprvolata* Don. 39. V. foliis quinatis oblongis acuminatis setaceo-dentatis coriaceis subtus pubescentibus, umbellis 4radiatis folio brevioribus. *Nepal.*

rubifolia Wall. 40. V. foliis pinnatis 5jugis subtus glaucis pubescentibus, foliolis subcordato-oblongis acuminatis argute ferratis, ramis corymbisque villosis. *Bengal.*

pag. 779.

Ad *Scopoliam* Sm.

Post n. 4. *megapotamica* * 6. Sc. foliolis lanceolatis abrupte acuminatis integerrimis opacis glabris, paniculis axillaribus divaricatis, floribus 5fidis. *Rio grande*. Sello.

venosa * 7. Sc. foliolis spathulato-lanceolatis mucronatis glaberrimis supra lucidis subtus parallele venosis, ramis verrucosis, ramulis glabris, racemis axillaribus. *Rio grande*. Sello.

Post *Huerteam* R. et P.:

ICACINA Adr. Juff.

senegalensis *Senegambia*. Arbor foliis alternis ovato-oblongis integerrimis glabris, floribus paniculatis terminalibus. Adr. Juff.

Ad *Sabiam* Colebr.

parviflora 2. S. foliis ovato-lanceolatis cuspidatis margine Wallich. membranaceis undulatis, ramulis pubescentibus, pedunculis axillaribus paucifloris, floribus digynis. *Nepal*.

campanulata 3. S. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis margi- Wallich. ne membranaceis ciliatis, pedunculis axillaribus 1floris, petalis concavis. *Nepal*.

pag. 780.

Bonplandia W. mutetur in *Galipeam* Aubl.

Post n. 1. *aromatica* * 10. G. foliolis lanceolatis acutis glabris integerrimis pellucido-punctatis, racemis spicatis axillaribus, staminibus 3 sterilibus. *Guiana*. (Raputia Aubl., Sciuris Vahl. Syst. veg. 1. p. 38.)

corymbosa * 11. G. foliolis lanceolatis acuminatis glabris, petiolo communi marginato, floribus corymbosis, staminibus 4, 2 sterilibus. *Guiana*. (Galipea trifoliata Aubl., Sciuris corymbosa Syst. veg. 1. 38.)

pag. 781.

Post n. 8. *macrophylla* Hilar. 12. G. foliis oblongis, racemis extraxillaribus, staminibus 3 sterilibus. *Brazil*. (Conchocarpus macrophyllus Mik., Sciuris simplicifolia Syst. veg. 1. 39.)

Gaudichaudiana Hilar. 13. G. foliis spathulatis mucronatis pellucido-punctatis, pedicellis pubescentibus, staminibus 3-4 sterilibus. *Brazil*.

Martiana Hilar. 14. G. foliis lanceolatis utrinque attenuatis glaberrimis, racemo simplici, staminibus 3 sterilibus. *Brazil*.

Ad *G. cuneifoliam* Hilar. dele *Hortiam* Vandell.

Post *Melicetum* Forst.:

EUTHEMIS Jack.

- leucocarpa* Jack. 1. E. foliis petiolatis lanceolatis spinuloso-ferratis glaberrimis nitidis, racemis erectis ramosis, (ramis apice gemmiferis corniculatis). *Peninsul. Malacc.*
- minor* Jack. 2. E. foliis anguste lanceolatis obsolete ferratis glaberrimis venoso-friatis, racemis simplicibus, fructibus acuminatis angulatis. *Peninsul. Malacc.*
- † *elegantissima* Wallich. 3. E. foliis elliptico-lanceolatis acuminatis subtilissime ferrulatis, venis reticulatis ad marginem confluentibus. *Penins. Malacc.*

SYNDESMIS Wallich.

- elegans* Wall. *Inf. freti Malacc.* Arbuscula, foliis sparsis lanceolatis coriaceis, corymbis terminalibus, calycibus coccineis, corolla candida.

HARPULLIA Roxb.

- cupanioides* Roxb. *Ind. or.* Arbuscula, foliis abrupte pinnatis glabris, foliolis 4-6jugis oblongis acutis integerrimis, paniculis axillaribus, floribus sulfureis.

pag. 788.

Ad *Evonymum*.

- micranthus* Don. 9. E. foliis oblongis acuminatis ferrulatis glabris lucidis, pedunculis 3fidis multifloris folio brevioribus. *Nepal.* (E. glaber Roxb.)
- lacer* Don. 10. E. foliis obovatis ferrulatis glabris, pedunculis axillaribus trichotomis folia superantibus. *Nepal.* (E. frigidus Wallich.)
- lucidus* Don. 11. E. foliis lanceolatis acuminatis argute ferratis glabris lucidis, umbellis lateralibus oppositis pedunculatis. *Nepal.* (E. grandiflora Wallich.)
- tingens* Wall. 12. E. arboreus, foliis subdecussatis ovato-lanceolatis ferrulatis supra rugosis coriaceis, pedunculis dichotomis, bracteis fimbriatis, capsula 5sperma. *Ind. or.*
- fimbriatus* Wall. 13. E. foliis oppositis ovato-lanceolatis acuminatis argute ferrulato-fimbriatis, pedunculis umbelliferis, capsula late alata. *Penins. Malacc.*
- † *grossus* Wall. 14. E. foliis suboppositis longe petiolatis ovatis acutis ferratis coriaceis nitidis, pedunculis filiformibus dichotomis. *Ind. or.*
- vagens* Wall. 15. E. fruticosus scandens, foliis ovato-lanceolatis ferratis, pedunculis filiformibus dichotomis, capsula globulari. *Nepal.*
- echinatus* Wall. 16. E. scandens radicans, foliis ovato-lanceolatis ferratis glaberrimis, pedunculis filiformibus dichotomis, capsula echinata. *Nepal.*
- † *dichotomus* Heyn. 17. E. ramis dichotomis, foliis lineari-lanceolatis acuminatis integerrimis glabris, pedunculis fasciculatis dichotomis, capsula clavata. *Ind. or.*

- † *indicus* Heyn. 18. E. ramulis sub-4angulis, foliis lanceolatis acuminatis integerrimis coriaceis supra nitidis, pedunculis sub-3floris, capsula clavata apice 5alata. *Ind. or.*
- † *garcinifolius* Roxb. 19. E. ramulis teretibus, foliis oppositis lanceolatis acuminatis integerrimis laevibus, pedunculis 3floris, capsula 2valvi 1sperma. *Silhet, provinc. Ind. or.*

pag. 789.

Ad *Büttneram*.

- Post n. 3. 4. *celtoides* Hilar. 19. B. foliis subcordato-oblongis acuminatis serratis supra asperis subtus pubescentibus, paniculis axillaribus. *Brazil.*
- sagittaeifolia* Hilar. 20. B. suffruticosa erecta, ramis angulatis brevissime aculeatis, petiolis 3quetris, foliis sagittatis apice dentatis, racemis spicatis, ligulis petalorum erectis elongatis subulatis. *Brazil.*

pag. 790.

Ad *B. tereticaulem* Lam. (*B. australis* Hilar.) *Brazil.*Ad *B. pannosam* Cand. (*B. australis* Sieb.)

- Post n. 13. *aspera* Colebr. 21. B. fruticosa, ramis teretibus pubescentibus, foliis late cordatis obtusiusculis integerrimis subtus pilosiusculis 5nerviis, umbellis axillaribus corymbosis, fructibus grandibus valide armatis. *Ind. or.*
- pilosa* Roxb. 22. B. fruticosa volubilis, ramis sulcatis, foliis 3-5angulis dentatis acutis subtus 7nerviis, glandula in medio nervo, umbellis axillaribus proliferis. *Ind. or.*
- Jackiana* Wall. 23. B. fruticosa scandens, ramis teretibus ferrugineis, foliis oblongis acutis integerrimis stellato-pilosis subtus 5nerviis, corymbis axillaribus longe pedunculatis. *Inf. freti Malacc.*
- melastomaeifolia* Hilar. 24. B. foliis ovato-ellipticis glabris integerrimis triplinerviis, panicula spicata elongata. *Brazil.*
- Gayana* Hilar. 25. B. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis glabriusculis, umbellis axillaribus pedunculatis. *Brazil.*
- sidaefolia* Hilar. 26. B. foliis cordatis acuminatis integerrimis subtus pubescentibus, corymbis sublateralibus. *Brazil.*

pag. 792.

Ad *Hydnocarpum* Vahl.

- moluccanus* * 2. H. foliis alternis lanceolatis acutis integerrimis glabris, pedunculis axillaribus multifloris. *Inf. Molucc.* (*Vareca moluccana* Roxb.)
- lanceolatus* * 3. H. foliis alternis lanceolatis glaberrimis parallele venosis, floribus axillaribus corymboso-fasciculatis. *Inf. freti Malacc.* (*Vareca lanceolata* Roxb.)

- heteroclitus* * 4. H. foliis alternis lanceolatis crenatis glabris, axillis venarum subtus glanduloso-foveolatis, stipulis ensiformibus, floribus axillaribus glomeratis sessilibus. *Ind. or.* (Vareca heteroclita Roxb.)

BREXIA Noronh.

- madagascaren-* 1. Br. foliis oblongis obtusis integerrimis, costa
sis Ker. subtus purpurea, pedunculis umbelliferis. *Madagascar.* (Venana Lam.)
- spinosa* Lindl. 2. Br. foliis lanceolatis elongatis rigidis marginatis spinosis, pedunculis subumbelliferis. *Madagascar.* (Theophrasta ferratifolia Hortul.)

pag. 793.

Ad *Escallonian* Mutis.

- Post n. 12. *megapotamica* * 15. E. foliis spathulatis longe mucronatis argute ferratis subtus punctatis venulosis glutinosis, ferraturis incurvis glandulosis, panicula corymbosa subfoliata. *Rio grande.* Sello.
- chlorophylla* 16. E. foliis obovatis mucronatis integerrimis subtus caesio-pulverulentis, racemis terminalibus. *Brazil.*
Schlechtend.

pag. 794.

Ad *Itcam.*

- umbellata* 2. I. foliis alternis oblongis integerrimis glabris,
Roxb. umbellis paniculatis. *Inf. Malaïc.*
- macrophylla* 3. I. foliis alternis elliptico-oblongis acuminatis
Wall. uncinato-ferrulatis coriaceis nitidis, racemis axillaribus fasciculatis. *Silhet, prov. Ind. or.*

Post *Calodendron* Thunb.:

HORTIA Vandell.

- brasiliana* Vand. *Brazil.* Suffrutex glaberrimus, foliis alternis spathulatis punctato-pellucidis, floribus cymosis roseis. Hilar. pl. uf. brasil. t. 17.

METRODOREA Hilar.

- nigra* Hilar. *Brazil.* Frutex ramis divaricatis, foliis oblongis utrinque attenuatis repandis, floribus paniculatis atropureis.

DICTYOLOMA Adr. Juff.

- Vandellianum* *Brazil.* Arbor foliis pinnatis margine glandulosis,
Adr. Juff. corymbis lateralibus dichotomis, floribus tomentosis. Mém. du mus. 12. t. 24.

pag. 795.

Ad *Cedrelam* P. Br.

febrifuga Blum. 3. *C. foliis pinnatis, foliolis ovato-oblongis acuminatis integerrimis, venis subtus concoloribus. Java.*

pag. 796.

SAUVAGESIA.

- racemosa* Hilar. 1. *S. suffruticosa, foliis ovato-oblongis crenatis parallele venosis, stipulis crispo-ciliatis, racemo simplici terminali, calycibus acutiusculis. Brasfil. (S. ovata Mart.)*
- Sprengelii* Hilar. 2. *S. suffruticosa ramosa, foliis lanceolatis subser-ratis, stipulis plumoso-ciliatis, racemo terminali, calycibus obtusis. Ind. or. Guiana. Brasfil. (S. serpyllifolia Mart., erecta *.)*
- rubiginosa* Hilar. 3. *S. suffruticosa ramosissima, foliis lineari-lanceolatis acutis ferrulatis, stipulis confertissimis plumoso-ciliatis, racemis spicatis terminalibus bracteatis, calycibus acutis. Brasfil. (S. laxa Mart.)*
- erecta* 4. *S. suffruticosa ascendens, foliis lanceolatis acutis ferratis, stipulis ciliatis, pedunculis subgeminis axillaribus, calycibus acutis. Ind. occid. Amer. austr. (S. erecta et Adima Aubl., nutans Pers.)*
- linearifolia* Hilar. 5. *S. suffruticosa ramosa, foliis linearibus acutis obsolete ferratis, stipulis 2fidis ciliatis, pedunculis axillaribus solitariis, calycibus acutis apice barbatis. Brasfil. (S. fruticosa Mart.)*
- tenella* Lam. 6. *S. herbacea erecta, foliis confertis linearibus subintegerrimis, stipulis abbreviatis ciliatis, pedunculis axillaribus 1floris, calycibus acutis. Guiana. Brasfil. (S. pusilla Mart.)*

Ad *Lauradium* Vandell.

- L. montana* Mart. (*L. glandulosa* Hilar.)
- L. alpestris* Mart. (*L. ericoides* Hilar.)
- elegantissima* Hilar. 3. *L. suffruticosa simpliciuscula, foliis minutis imbricatis sessilibus ovatis obtusis glabris, stipulis pilosis, racemis terminalibus laxis. Brasfil. (Sauvagesia elegantissima Hilar. mém. du mus. 9. syst. veg. 1. 796.)*
- Vellozii* Hilar. 4. *L. suffruticosa simpliciuscula, foliis alternis lanceolatis utrinque attenuatis mucronatis calloso-ferratis, stipulis plumosis, floribus racemosis, calycibus acutis 5nerviis. Brasfil.*
- capillaris* Hilar. 5. *L. suffruticosa ramosissima, foliis lanceolatis glanduloso-ferratis venoso-lineatis, pedunculis terminalibus paucifloris capillaribus divaricatis. Brasfil.*

pag. 797.

Ad *Violam*.

Post n. 16. *palmaris* Hamilt. 96. V. foliis longe petiolatis cordatis acuminatis crenatis pilosiusculis, calycibus acutis, petalis barbatis, calcari faccato. *Nepal*.

pag. 798.

Post n. 31. *Sieberiana* * 97. V. foliis longe petiolatis obovato-subrotundis dentatis glabris, scapo gracili 2bracteato, flore nutante, calcari brevissimo. *Nov. Holl.* (V. *spathulata* Sieb.)

acuta Bigel. 98. V. foliis ovato-lanceolatis obtusiusculis obsolete crenulatis basi subdecurrentibus, stipulis linearilanceolatis, petalis acutis imberbibus, calcari brevissimo. *Massachusetts Amer. bor.*

caespitosa Don. 99. V. foliis oblongis utrinque rotundatis glabris crenulatis, petioli marginatis, scapis folia superantibus, calycibus acutis, petalis obovatis integris, lateralibus barbatis. *Nepal.* (V. *Patrinii* γ. Cand.)

pag. 800.

Post n. 55. *Riviniiana* Reichenb. 100. V. caule erecto ramoso, foliis profunde cordato-ovatis crenatis supra pubescentibus, stipulis linearibus fimbriatis, pedunculis elongatis, appendicibus calycis superioribus angulatis persistentibus, fructibus acutis. *In nemoribus Europ.* (V. *canina* auctorum variorum.) V. *canina* L. vel maxime differt stipulis dentato-ferratis, foliis minus cordatis et fructibus obtusis. V. *fylvestris* Kit. minus ad V. *caninam* L. quam ad *Riviniianam* pertinet. Cf. Reichenb. ic. t. 75. 94. 95.

Post n. 56. *gracillima* Hilar. 101. V. caule filiformi erecto glaberrimo, foliis late cordatis obsolete dentatis subtus farinosis, stipulis parvis subulatis, calycibus acuminatis, petalis imberbibus. *Brazil.*

subdimidiata Hilar. 102. V. caulescens glaberrima, foliis cordato-ovatis dentatis, stipulis oblongo-lanceolatis incisis ciliatis, pedunculis folio brevioribus, calycibus acuminatis, petalis imberbibus. *Brazil.*

cerasifolia Hilar. 103. V. caulescens glaberrima, foliis lanceolatis acutis dentatis, stipulis oblongo-lanceolatis incisis ciliatis basi auriculatis, pedunculis folio brevioribus, calycibus acuminatis. *Brazil.* V. conferta Hilar. var.?

Hamiltoniana Don. 104. V. repens glaberrima, foliis reniformibus crenulatis, stipulis lanceolatis acutis dentatis, pedunculis folia subaequantibus, calycibus acutis, calcari abbreviato. *Nepal.* (V. *glandulifera* Wallich.)

arcuata Blum. 105. V. decumbens glabra, foliis reniformi-orbiculatis acutiusculis ferratis, venis pubescentibus, stipulis ovato-oblongis ciliatis 3nerviis basi subferratis. *Java.*

pilosa Blum. 106. V. caule stolonifero, foliis cordatis crenulatis pilosiusculis, stipulis fetaceo-incisus ciliatis.
Java.

Ad V. *persicifoliam* Roth. (V. *pratensis* Mert. et Koch.)

Ad V. *Wallichianam* Ging. (V. *reniformis* Wall.)

pag. 802.

Ad V. *rubellam* Cav. (V. *Chamissoniana* Ging. in *Linnaea* p. 403.)

† *trachelifolia* 107. V. suffruticosa glabra, foliis breviter petiolatis cordato-ovatis acuminatis argute ferratis, stipulis lanceolatis integerrimis. *Inf. Sandwich.*
Ging. Chamisso.

pag. 803.

Ad *Soleam* *.

Foliis alternis.

Post n. 6. 7. *sylvatica* * 24. S. suffruticosa pubescens, foliis alternis ovatis acuminatis dentatis, stipulis linearibus integerrimis, pedunculis solitariis, calycibus acuminatis, labello subrhombico mucronato. *Brazil.* (Ionidium Hilar.)

bicolor * 25. S. suffruticosa villosa, foliis alternis lanceolatis dentatis, stipulis linearibus integerrimis, floribus racemosis, labello rotundato mucronato. *Brazil.* (Ionidium Hilar.)

lanata * 26. S. suffruticosa lanata, foliis alternis ellipticis obtusis integerrimis mucronatis, stipulis scariosis, labello late obcordato. *Brazil.* (Ionidium Hilar.)

Poaya * 27. S. suffruticosa hirsutissima, foliis alternis subsessilibus subcordato-ovatis obsolete dentatis, stipulis scariosis, labello maximo obcordato. *Brazil.* (Ionidium Hilar. pl. uf. *Brazil.* t. 9.)

scariosa * 28. S. suffruticosa hirsuta, foliis alternis lanceolatis acuminatis ferratis, stipulis lanceolatis scariosis, laciniis calycis pinnatifidis, labello orbiculari. *Brazil.* (Ionidium Hilar.) I. villosissimum Hilar. var.

alba * 29. S. suffruticosa pubescens, foliis alternis lanceolatis ferrato-ciliatis, stipulis scariosis, calycibus ciliatis pilosis, labello rotundato. *Brazil.* (Ionidium Hilar.)

setigera * 30. S. suffruticosa, foliis alternis oblongo-lanceolatis acuminatis dentatis, stipulis multipartitis ciliato-fetosis, laciniis calycis pinnatifidis, labello oblongo concavo 3nervio. *Brazil.* (Ionidium Hilar.)

communis * 31. S. suffruticosa herbacea pubescens ramosa, foliis alternis lanceolatis dentatis glabris, stipulis linearibus integerrimis, pedunculis subracemosis, labello ovato 3nervio. *Brazil.* (Ionidium Hilar.)

- nana* * 32. *S. suffruticosa pubescens*, foliis alternis lanceolatis dentatis, stipulis linearibus, calycibus acuminatis, labello complicato obcordato. *Brazil.* (Ionidium Hilar.)
- guaranitica* * 33. *S. suffruticosa glabra*, foliis alternis lanceolatis dentatis, stipulis linearibus, floribus pendulis, calycibus acuminatis, labello orbiculari crenulato. *Brazil.* (Ionidium Hilar.)

Foliis oppositis.

- atropurpurea* * 34. *S. suffruticosa*, foliis oppositis ovato-lanceolatis acutis obsolete ferratis, stipulis caducis, floribus racemosis, labello obcordato. *Brazil.* (Ionidium Hilar.)
- bigibbosa* * 35. *S. fruticosa pubescens*, foliis oppositis oblongo-lanceolatis acuminatis obsolete dentatis, calycibus acuminatis ciliatis, labello spatulato basi bigibbo. *Brazil.* (Ionidium Hilar.)

Herbaceae.

- urticaefolia* * 36. *S. ramosa viscoso-pubescens*, foliis subsessilibus subcordato-ovatis acutis ferratis glabris, pedunculis paucifloris, calyce integerrimo, labello quadrato. *Brazil.* (Ionidium Mart.)
- brevicaulis* * 37. *S. simplex*, foliis petiolatis obovatis crenatis pilosiusculis, stipulis lanceolatis nervosis, pedunculis axillaribus erectis, labello orbiculari. *Brazil.* (Ionidium Mart.)

pag. 804.

Ad *Soleam anomalam* * (Ionidium racemosum Mart.)

Soleam Ipecacuanham *, laciniis calycis ferrato-pinnatifidis, eandem censet Hilarius ac *Violam Itoubou* Aubl. (*Soleam* n. 23.) Hilar. pl. uf. *Brazil.* t. 11.

pag. 805.

Ad *Noifettiam* Humb.

- galeopifolia* 5. *N. caule herbaceo glaberrimo subalato*, foliis lanceolatis acutis ferratis, floribus racemoso-fasciculatis, petalo infero cucullato cuspidato, calcaribus acutiusculo. *Brazil.* (*N. longifolia* Nees.)

Exsulet *N. pyriformis* Mart., quae

ANCHIETEA Hilar.,

- ad quam *salutaris* Hilar. 2. *A. fruticosa erecta*, foliis ovatis subdentatis glabris subtus resinoso-punctatis, stipulis scariosis ciliatis, pedunculis aggregatis axillaribus nutantibus 1floris. *Brazil.* Hilar. pl. uf. *Brazil.* t. 19.

- † *Roquesenillana* * 3. *A. fruticosa scandens*, foliis oblongo-lanceolatis acutis crenato-ferratis, pedunculis subracemosis, labello subrhombico obtuso. *Brazil.* (*Noifettia*? *Roquesenillana* Hilar.)

pag. 806.

Ad *Glossarrhenem floribundum* Mart. (*Schweiggeria fruticosa* * N. E. 2. 167., *floribunda* Hilar. mém. du mus. 11. t. 22. B.)

pag. 807.

Ad *Alfodeam* Thuars.

Post n. 12. 13. *castaneaeifolia* * 17. A. foliis alternis oblongo-lanceolatis argute ferratis mucronatis, racemis simplicibus, pedicellis pubescentibus. *Brazil.* (*Conohoria* Hilar.)

† *Cuspa* * 18. A. arborea excelsa, foliis elliptico-oblongis obtusis integerrimis glabris supra nitidis, summis oppositis, pedunculis simplicibus bracteatis. *Nov. Granat.* (*Cuspa* Humb., *Conoria Cuspa* Kunth.)

† *megapotamica* * 19. A. foliis elliptico-oblongis integerrimis venoso-reticulatis subtus subpubescentibus, pedunculis cymiferis axillaribus 2fidis, filamentis dorso barbatis. *Rio grande.* Sello.

Ad A. *physiphoram* Mart. (*Conohoria Lobolobo* Hilar.)

Ad A. *Rinoream* * (A. paniculata Mart., *Conohoria Rinorea* Hilar.)

Post *Alfodeam*:

AMPHIRRHOX *.

longifolia * *Brazil.* Frutex foliis oblongo-lanceolatis subdentatis glabris, floribus racemosis albidis. (*Spathularia longifolia* Hilar. mém. du mus. 11. t. 24.) *Spathulariac* genus jam adest vol. 4. p. 495.

Ad *Impatientem*.

Ad I. *fasciculatam* Lam. proxime accedit I. *setacea* Colebr. (*Balsamina* Hook. exot. fl. t. 137.) et I. *heterophylla* Wallich.

Ad I. *latifoliam* L. I. *mollis* Wallich. var.

pag. 808.

Post n. 18. *trilobata* Colebr. 24. I. pedunculis sub-4floris patulis folia subaequantibus, foliis oblongo-lanceolatis ferratis glabris, calcar conico acuminato incurvo. *Silhet, prov. Ind. or.*

Ad I. *scabridam* Wall. (I. *Hamiltoniana* Don.)

crisitata Wall. 25. I. pedunculis sub-3floris petiolos aequantibus, foliis lanceolatis acuminatis fetaceo-ferratis pubescentibus, calcar incurvo pedicellum aequante. *Ad terminos Mongoliae.*

urticaefolia Wall. 26. I. pedunculis sub-4floris filiformibus folia subaequantibus, foliis ovatis acuminatis glanduloso-crenatis sparse pilosis nitidis, calcar amplo conico pedicellum aequante. *Emodi montes.*

calycina Wall. 27. I. pedunculis sub-2floris, foliis alternis ovatis acuminatis argute ferratis utrinque pubescenti-

- bus, calycibus amplis villosis, calcarî ascendente conico pedicellos superante. *Nepal.*
- grandis* Heyn. 28. I. pedunculis 3floris, floribus maximis, calcarî longissimo, foliis longe petiolatis ovatis acuminatis serratis. *Ind. or.*
- Post n. 22. *fulcata* Wallich. 29. I. pedunculis oppositis multifloris folio brevioribus, foliis oppositis ovato-oblongis argute serratis, calcarî incurvo, caule glabro profunde sulcato. *Emodi montes.*
- bicornuta* Wall. 30. I. pedunculis elongatis corymbiferis, floribus fasciculatis bracteatis, nectarii ore appendicula cornuta, calcarî conico apice filiformi, foliis ovato-lanceolatis acuminatis serratis supra pubescentibus. *Nepal.*
- umbellata* Heyn. 31. I. pedunculis apice umbelliferis, calcarî longissimo, foliis ovatis obtuse acuminatis crenatis. *Ind. or.*
- odorata* Don. 32. I. racemis corymbosis folio brevioribus, calcarî pedicellos æquante, petalis lateralibus 2appendiculatis, foliis linearilanceolatis serratis glabris. *Nepal.*
- Ad I. *leptoceras* Wall. (I. micrantha Don., longicornu Wallich.)
- fimbriata* Hook. 33. I. racemo terminali capitato, bracteis purpureo-fimbriatis, calcarî subulato incurvo florem excedente, foliis oblongis acuminatis serrato-ciliatis. *Silhet, prov. Ind. or. Hook. exot. fl. t. 146. (I. bracteata Colebr. in Roxb. fl. ind. 2. 459.)*
- scapiflora* Heyn. 34. I. scapo corymbifero, calcarî longissimo, foliis radicalibus cordato-subrotundis obtusis multinerviis integerrimis. *Ind. or.*

pag. 810.

Ad *Argophyllum* Forst.

- ellipticum* Labill. 2. A. foliis ellipticis obtusis integerrimis margine revolutis subtus rufo-tomentosis, floribus cymosis. *Noo. Caledon.* A. *nitidum* Forst. habet folia subferrata.

pag. 811.

Ad *Ribes*.

- Post n. 22. *mexicanum* * 40. R. foliis subcordatis sub-5lobis subtus pubescentibus, lobis ovatis duplicato-serratis, petiolis basi glanduloso-ciliatis, racemis terminalibus bracteatis, calycibus campanulatis. *Mexico.* (R. multiflorum Kunth.)
- affine* Kunth. 41. R. foliis cordatis sub-5lobis subtus hirsutis, lobis obtusis duplicato-crenatis, racemis solitariis pendulis, calycibus campanulatis. *Mexico.* (R. campanulatum W. herb.)
- xorullense* Kunth. 42. R. foliis cordatis 5lobis subtus pubescentibus, lobis acutis duplicato-serratis, ramulis racemisque solitariis glandulosis, bracteis deciduis. *Mexico.* (R. ciliatum W. herb.)

frigidum Kunth. 43. R. foliis cordatis subrotundis 3lobis glanduloso-pilosis, lobis inciso-ferratis, racemis reflexis, bracteis dentato-ciliatis, calycibus campanulatis, fructibus hispidis. *Quito*. (R. hirtum W. herb.)

glaciale Wall. 44. R. foliis cordato-subrotundis 5lobis sparse pilosiusculis, lobis acuminatis inciso-ferratis, ramulis argenteo-nitidis, racemis erectis glanduloso-pubescentibus, bracteis ciliatis flores aequantibus, stylo elongato, fructibus glabris. *Emodi montes*.

villosum Wall. 45. R. foliis subcordato-subrotundis 3lobis obtusis resinosis pilosis, lobis ferratis glanduloso-ciliatis, racemis erectis, bracteis flores superantibus, ramis fructibusque villosis. *Emodi montes*.

pag. 812.

Post n. 32. *microphyllum* Kunth. 46. R. spinis subsolitariis rectis, foliis parvis subreniformibus 5fidis supra pubescentibus subtus glabriusculis, pedunculis brevissimis 2floris, calycibus campanulatis. *Mexico*.

pag. 813.

Post *Strumpfiam*:

SPHAEROCARYA Wallich.

edulis Wall. *Nepal*. Arbor foliis alternis oblongis acuminatis subcarnosis supra nitidis subtus reticulatis, floribus racemosis, fructibus edulibus.

Ad *Gouaniam*.

G. tiliacifolia Lam. (*G. nepalensis* Wallich.)

striata Rich. 7. *G.* foliis ovatis glabris nervosis crenatis emarginatis, ramis rachibusque striatis. *Guiana*. (*G. domingensis* Aubl.?)

sinilacina Sm. 8. *G.* foliis cordatis acutis ferrulatis glabriusculis, stipulis subulatis, pedunculis umbellatis folia subaequantibus. *Brazil*?

cordifolia Radd. 9. *G.* foliis cordato-ovatis ferrulatis pilosiusculis, stipulis minutis, capitulis axillaribus terminalibusque hirtis. *Brazil*.

corylifolia Radd. 10. *G.* foliis subcordato-ovatis acutis subdenticulato-glandulosis subtus pubescentibus, racemis axillaribus terminalibusque longissimis. *Brazil*.

† *canescens* Rich. 11. *G.* foliis oblongo-lanceolatis acutis subtus incanis, racemis axillaribus terminalibusque. *Guiana*.

stipularis Cand. 12. *G.* foliis subcordato-ovatis acuminatis ferratis glabriusculis, stipulis maximis semifagittatis acuminatis, fructibus 3alatis. *Mexico*.

cyclocarpa Sm. 13. *G.* foliis elliptico-oblongis acutis obsolete ferratis, junioribus ferrugineo-sericeis, fructus alis angustis orbiculatis. *Ind. occ.*?

aptera Cand. 14. *G.* foliis subcordato-ovatis acutiusculis grosse dentato-ferratis utrinque villosis, racemis axil-

laribus terminalibusque, fructibus subovatis apteris. *Amer. tropic.*

denticulata Sm. 15. G. foliis ovatis acuminatis apice denticulatis subtus hirsutis, racemis axillaribus, cirris terminalibus. *Ind. or.*

Retinaria Cand. 16. G. foliis ovatis acutiusculis subferratis subpubescentibus, racemis folia longe superantibus, fructibus triquetro-alatis. *Inf. Mascaren.* (*Retinaria scandens* Gärtn.) G. microcarpa Cand. var.

Post *Carpodetum* Forst.:

CRUMENARIA Mart.

decumbens Mart. *Brazil.* Planta annua, foliis subcordato-ovatis trinerviis, stipulis ciliatis, floribus axillaribus pedunculatis minutissimis.

Ad *Hederam*.

Hainla Don. 6. H. caule arboreo aculeato, foliis cordatis 5lobis dentatis coriaceis glabris, umbellis globosis racemoso-paniculatis. *Nepal.*

fragrans Don. 7. H. foliis ternatis glabris subtus glaucis, foliolis ovatis fetacco-ferratis, umbellis compositis multiradiatis glabris. *Nepal.*

tomentosa Don. 8. H. foliis septenatis coriaceis subtus dense tomentosis, foliolis lanceolatis acuminatis integerrimis, umbellis racemosis, caule arboreo inermi. *Nepal.*

aculeata Don. 9. H. foliis septenatis subtus pubescentibus, foliolis oblongis acuminatis ferratis, umbellis racemosis tomentosis, caule arboreo aculeato. *Nepal.*

parasitica Don. 10. H. foliis pinnatis 2jugis coriaceis glabris subtus glaucis, foliolis oblongis acutis integerrimis, umbellis racemosis glabris, caule radicante subparasitico. *Nepal.*

Ad *H. terebinthaceam* Vahl. (*H. elata* Don.)

pag. 814.

Ad *Celosiam*.

Post n. 9. *muricata* * 15. C. fruticosa ramosa glabra, foliis ovatis acutis, spicis paniculatis, calycibus glomeratis basi fetosis. *Ind. orient.* (*Achyranthes muricata* L., *Desmochaeta* Cand., *Cladostachys frutescens* Don.)

longifolia Mart. 16. C. suffruticosa erecta, foliis lanceolatis acuminatis glabris, floribus glomerato-capitatis, stigmatibus 4, 5. *Brazil.*

pag. 817.

Ad *Achyranthem*.

Post n. 12. *violacea* * 13. A. foliis lanceolato-linearibus pubescentibus, corymbo laxo. *Nov. Holland.* (*Aylmeria* Mart.)

- rosea* * 14. A. foliis verticillatis linearibus subulatis, corymbis terminalibus compactis bracteatis. *Noe. Holl.* (Aylmeria Mart.)
- linearifolia* Sw. 15. A. caule diffuso glabrato, foliis linearibus integerrimis; capitulis oblongis axillaribus terminalibusque, floribus extus villosis. *Inf. Bartholom. in Caribaeis.* Act. holm. 1825. p. 428.

pag. 818.

Ad *Desmochaetani achyranthoidem* Kunth. (Pupalia densiflora Mart. nov. gen. t. 156.) *Brasil.*

Ad *Illecebrum*.

I. irefinoides * deletur, rediturum ut *Pfaffia irefinoides* *.

- Post n. 3. *pulverulentum* * 22. I. suffruticosum albido-tomentosum, foliis ovato-oblongis obtusis supra pulverulentis, floribus paniculatis, calycibus lanatis. *Peru.* (Trommsdorffia Mart.)

pag. 819.

I. flavescens * delendum, cum ad *Mogiphanem* Mart. pertineat.

- Post n. 13. *maritimum* * 23. I. caule diffuso radicante, foliis spathulatis mucronatis glabris, floribus lateralibus aggregatis, calycibus acutis, squamulis stamina intercedentibus sub-3fidis. *Brasil.* (Bucholzia Mart.)

pag. 820.

- Post n. 18. *triandrum* Hamilt. 24. I. caule repente 4gono laevi, axillis barbatis, foliis lanceolatis obtusis denticulatis glabris. *Nepal.* (Alternanthera prostrata Don.)

Ad *I. polygonoides*. (Bucholzia polygonoides Mart.)

Post *Illecebrum*:

GUILLEMINEA Kunth.

- Illecebrum* * *Quito.* Herba diffusa ramosissima, foliis oppositis (altero minore) spathulatis acutis glabris, petioliis vaginantibus, stipulis nullis, capitulis axillaribus subsessilibus. (Gu. illecebroides Kunth. in Humb. nov. gen. 6. t. 518. *Illecebrum* densum W. herb.)

Ad *Irefinem*.

- I. elatior* Rich. (Rosea elatior Mart. nov. gen. t. 155.) *Brasil.*
- angustifolia* Euphras. 9. I. herbacea erecta glabra, foliis lineari-lanceolatis denticulatis utrinque attenuatis, panicula ramosissima, spicis oblongis. *Inf. Bartholom. in Caribaeis.*
- paniculata* * 10. I. herbacea glabra ramosissima, geniculis barbatis, foliis oblongis integerrimis utrinque attenuatis laevibus, spicis paniculatis, calycibus trinerviis longissime lanatis. *Brasil.* (Hebanthe Mart.)

- spicata* * 11. I. herbacea ramosa superne ferrugineo-pubes-
cens, foliis ovato-lanceolatis acuminatis subtus
dense hirsutis, spicis subternis pedunculatis, cal-
ycibus 5nerviis longissime lanatis. *Brasil.* (Heb-
anthe Mart.)
- virgata* * 12. I. suffruticosa erecta ramosa, foliis ovato-ob-
longis acuminatis subtus ferrugineo-strigillofis,
calycibus 3-5nerviis lanatis. *Brasil.* (Hebanthe
Mart.)
- dysdicta* * 13. I. herbacea erecta ramosa, foliis oblongis utrin-
que attenuatis subtus pubescentibus, floribus spi-
cato-paniculatis, calycibus 3nerviis fulvo-vil-
lofis. *Brasil.* (*Trommsdorffia aurata* Mart.)

pag. 823.

Ad *Gomphrenam*.

- G. gnaphaloides* Vahl. deleatur, redux *Pfussia* Mart.
G. brasiliensis est *Mogiphanes* Mart.
G. sericea *, *tuberosa* * et *stenophylla* * sunt *Pfussiae* Mart.
Post n. 9. *macrocephala* Hilar. 27. *G.* hirsutissima, caule ascen-
dente, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis rufo-
hirsutis, capitulo maximo terminali hemisphae-
rico polyphylo, foliolis longissimis, bracteis
dentato-cristatis. *Brasil.* Hilar. pl. uf. brasil.
t. 32.
- desertorum* Mart. 28. *G.* caule erecto 2fido foliisque lanceolatis sub-
tus pubescentibus, pedunculis elongatis, capitu-
lis 2phyllis, bractearum carina demum cristata.
Brasil.
- leucocephala* Mart. 29. *G.* caule erecto tenero dichotomo, foliis lan-
ceolatis subtus villosis, capitulo 4phylo, brac-
teis carina ferrulatis, calycibus dense lanatis.
Brasil.
- erriophylla* Mart. 30. *G.* caule erecto simplici foliisque ovatis acutis
densissime tomentosis, capitulis sessilibus globo-
sis diphyllis, bracteis calyce brevioribus. *Brasil.*
- Schlechtendalii* Mart. 31. *G.* caule erecto hirsutissimo, foliis ovalibus obtu-
sulis mucronulatis, capitulis sessilibus, bracteis
calycibusque ferratis. *Brasil.*
- Hänkeana* Mart. 32. *G.* caule ascendente ramoso foliisque lanceola-
tis acutis villosiusculis, pedunculis elongatis so-
litariis, capitulis diphyllis. *Peru.*
- celosioides* Mart. 33. *G.* caule ascendente brachiato foliisque ovato-
lanceolatis hirsutis, pedunculis terminalibus elon-
gatis, spicis cylindricis 2phyllis. *Ad fl. Platam.*
- pulchella* Mart. 34. *G.* caule ramoso ascendente foliisque lanceola-
tis acutis strigosis, pedunculis elongatis, capitu-
lis globosis 2phyllis, bracteis calyce triplo bre-
vioribus. *Monte Video.*
- villosa* Mart. 35. *G.* caule simplici, foliis ovato-lanceolatis mu-
cronulatis villosis, capitulis globosis 2phyllis,
bracteis calyce brevioribus. *Monte Video.*
- Selloi* * 36. *G.* caule erecto simplici foliato foliisque oblon-
gis hirsutis, pedunculis elongatis, capitulo ma-
ximo 2-4phylo, bracteis calycibusque ferratis.
Monte Video.

- agrestis* Mart. 37. G. caule erecto simpliciusculo foliisque lanceolatis strigoso-villosis, capitulis subdiphyllis lateralibus terminalibusque, bracteis calycem subaequantibus. *Brazil.*
- nigricans* Mart. 38. G. caule simpliciusculo foliisque lanceolatis subtus villoso-lanatis, pedunculis elongatis strigosis, capitulis 2phyllis, bracteis calycem aequantibus. *Brazil.*
- scapigera* Mart. 39. G. hirsutissima, caule simplici erecto, superne aphylo, foliis radicalibus lanceolatis, capitulis globosis 3-5phyllis, bracteis subcristatis calycem aequantibus. *Brazil.*
- Post n. 11. *macrorrhiza* Mart. 40. G. radice napiformi, caule dichotomo, foliis lanceolatis subtus villosis, capitulis pedunculatis globosis, bracteis calyce brevioribus. *Brazil.*
- debilis* Mart. 41. G. caule erecto basi diviso, foliis lineari-lanceolatis subtus villosis, pedunculis elongatis filiformibus, capitulis globosis, bracteis foliaceis, calyce tomentoso brevioribus. *Brazil.*
- sericantha* Mart. 42. G. radice lignosa, caule erecto subsimplici, foliis lanceolatis subtus densissime tomentosis, summis verticillatis, pedunculis elongatis, calycibus sericeis. *Brazil.*
- mollis* Mart. 43. G. caule erecto diviso, foliis lanceolatis acutis incano-villosis subsericeis, bracteis ovatis calyce brevioribus. *Brazil.*
- rupestris* Nees. 44. G. caule erecto diviso, foliis linearibus acutis albo-villosis, pedunculis elongatis, capitulis globosis, bracteis calyce brevioribus. *Brazil.* (G. Schultesia Mart.)
- virgata* Mart. 45. G. caule ramofo virgato pubescente, foliis linearibus acutis glabris, capitulis spicatis alternis, bracteis calyce brevioribus. *Brazil.*
- vaga* Mart. 46. G. caule erecto dichotomo, foliis petiolatis ovato-oblongis acutis subtus arachnoideo-villosis, capitulis pedunculatis subternis, bracteis calyce brevioribus. *Brazil.*
- elegans* Mart. 47. G. caule erecto dichotomo ferrugineo-pubescente, foliis petiolatis oblongis subtus venosis flavido-villosis, capitulis pedunculatis globosis, bracteis calyce brevioribus. *Brazil.*
- incana* Mart. 48. G. caule erecto simpliciusculo superne aphylo, foliis radicalibus oblongo-lanceolatis incano-villosis, capitulis axillaribus terminalibusque, bracteis calyce brevioribus. *Brazil.*
- † *angustiflora* Mart. 49. G. glabra, caule gracili erecto ramofo angulato, foliis linearibus angustissimis glaucis, spicis sub-4stichis aphyllis laxis, bracteis brevissimis, calyce corollino tubuloso elongato. *Brazil.* Mart. nov. gen. t. 121.

pag. 824.

- Post n. 21. *bicolor* Mart. 50. G. caule prostrato strigoso, ramulis fuscis, foliis lanceolatis utrinque attenuatis, capitulis hemisphaericis sessilibus, foliis floralibus

apice sphecclatis, bracteis denticulato - alatis.
Brazil.

prostrata Mart. 51. G. caule ramofo, foliis subcordato-ovatis acutis subtus villofis, capitulis globofis pedunculatis, bracteis foliaceis calyce brevioribus. *Brazil.*

deniffa Mart. 52. G. caule procumbente bifido foliisque lanceolatis acutis subtus pubefcentibus, capitulis 2phyllis, bracteis cristatis calyces aequantibus. *Brazil.*

G. *interrupta* habet stigma bilobum f. bifidum: ergo manet.

Post *Gomphrenam*:

PEAFFIA Mart.

* *Capitulis fubfolitariis.*

gnaphaloides Mart. 1. Pf. caule fruticofa foliisque ovato-oblongis mucronatis lanatis, capitulo glofo 2phyllo terminali. *Brazil. Monte Video.* (Cefofia gnaphaloides L., Gomphrena gnaphaloides Vahl., lanata Poir.)

puberula * 2. Pf. caule erecto ramofo foliisque oblongis acuminatis fubpubefcentibus, capitulis ovatis aphyllis longe pedunculatis, calycibus pubefcentibus. *Brazil. Nov. Granat.* (Brandefia puberula Mart., Achyranthes capituliflora Coll. hort. ripul. t. 18.)

oclutina Mart. 3. Pf. caule fimplici foliisque fubrotundo-ovatis obtufis fulvo-villofiffimis, capitulis ovatis pedunculatis fubfolitariis. *Brazil.*

tomentofa Mart. 4. Pf. caule foliisque ovatis acutis fubrepando-dentatis subtus albo-tomentofis, pedunculis fimplicibus terminalibus elongatis, capitulis fubglobofis. *Ad fl. Platan.* Sello.

jubata Mart. 5. Pf. villofiffima, foliis lineari-lanceolatis, pedunculis fimplicibus terminalibus, capitulis fubglobofis. *Brazil.*

glabrata Mart. 6. Pf. caule ramofo glabro, nodis villofis, foliis lanceolatis acuminatis elongatis, pedunculis fimplicibus axillaribus, capitulis ovato-globofis. *Brazil.*

** *Capitulis fpicive aggregatis.*

villofa * 7. Pf. caule erecto dichotomo foliisque fefilibus ovato-oblongis acutis subtus albo-villofis, capitulis fubternis diphyllis, calycibus glabriusculis. *Brazil.* (Brandefia villofa Mart.)

irefinoides * 8. Pf. caule fuffruticofa ramofo ferrugineo-hirfuto, foliis ovato-oblongis subtus fufco-fericeis, pedunculis ternis, capitulis ovatis minutis, calycibus longiffime lanatis. *Nov. Granat.* (Alternanthera Kunth., Illecebrum irefinoides Syst. veg. 1. 818., Sertürnera Mart.)

rufa * 9. Pf. caule ramofo rufo-hirfuto, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis acutis hirfutis, pedunculis bifidis, fpicis ternis aphyllis oblongis. *Brazil.* (Brandefia rufa Mart.)

fericea Mart. 10. Pf. radice tuberofo, caule fimpliciusculo fuperno nudo, foliis lanceolatis fericeis, pedunculis

3fidis subcorymbosis, capitulis globosis. *Brazil.*
(*Gomphrena sericea* et *tuberosa* Syst. veg. 1. 823.)

- hirtula* Mart. 11. Pf. pubescens, foliis linearibus, pedunculis terminalibus subternis, capitulis globosis. *Brazil.*
- glauca* * 12. Pf. caule ramosissimo foliisque lanceolatis glaucis glabriusculis, pedunculis trichotomis paniculatis, capitulis minutis ovatis, floribus polygamis. *Brazil.* (*Gomphrena stenophylla* Syst. veg. 1. 823., Iresine glomerata N. Entd. 2. p. 110., Sertürnera glauca Mart.)

MOGIPHANES Mart.

- diffusa* Mart. 1. M. caule erecto ramosissimo foliisque ovato-lanceolatis glabriusculis, pedunculis 3fidis, spicis cylindricis, bracteis calycibusque aristatis. *Brazil.*
- ramosissima* Mart. 2. M. caule erecto ramosissimo, ramis patulis foliisque lanceolatis acuminatis pubescentibus, capitulis oblongis pedunculatis solitariis aphyllis. *Brazil.*
- brasiliensis* Mart. 3. M. caule erecto ramofo rufo-villoso, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis pubescentibus, capitulis pedunculatis ovatis terminalibus. *Brazil.* (*Gomphrena brasiliensis* Jacqu., *Philoxerus* R. Br.) *M. villosa* Mart. var.
- straminea* Mart. 4. M. caule erecto ramofo foliisque oblongis acuminatis pubescentibus, capitulis pedunculatis ovatis, sepalis 3nerviis. *Brazil.* (*Gomphrena brasiliensis* L., *patula* Wendl.)
- multicaulis* Mart. 5. M. caule ascendente ramosissimo foliisque lanceolatis acutis subtus strigillosis, pedunculis subternis, capitulis oblongis basi foliatis. *Brazil.*
- hirtula* Mart. 6. M. caule ascendente diviso foliisque ovatis acutis strigillosis, pedunculis solitariis elongatis, capitulis oblongis aphyllis. *Brazil. Monte Video.*
- flavescens* Mart. 7. M. caule subscandente foliisque obovatis glabris, capitulis globosis pedunculatis subsolitariis, calycibus glabris. *Nov. Granat.* (*Alternanthera* Kunth., *Illecebrum* Syst. veg. 1. 819.)

HOPIOTHECA Nutt.

- lanata* Mart. 1. H. caule erecto subramoso, foliis oblongo-lanceolatis subtus ramisque sericeo-villosis, pedunculis elongatis, capitulis subrotundis sessilibus. *Amer. austr.* (*Gomphrena lanata* Kunth., *Humboldtiana* R. et Sch.)
- lactea* Mart. 2. H. caule suffruticoso erecto, foliis ovatis pubescentibus subtus albidis, spicis numerosis paniculatis. *Amer. tropic.* (*Gomphrena lactea* Cand.)
- floridana* Nutt. 3. H. caule erecto simplici glanduloso, foliis sessilibus lanceolatis acutis supra papilloso-scabris subtus dense sericeo-lanatis, panicula virgata,

spicis sessilibus. *Florida*. (Gomphrena Syst. veg. 1. 824.)

tomentosa
Mart.

4. H. caule erecto villoso, foliis subrotundis obtusis subtus tomentoso-lanatis, spicis pedunculatis oppositis. *Ad fl. Platam.* Sello.

sericea Mart.

5. H. caule erecto foliisque lineari-lanceolatis acutis sericeo-villosis, spicis oppositis pedunculatis. *Brazil.* (Gomphrena sericea Hofmanns-egg.)

Post *Anrederam*:

BOUSSINGAULTIA Humb.

bafelloides
Kunth.

Quito. Frutex volubilis, foliis alternis ovalibus carnofis integerrimis, floribus racemosis albidis. Humb. nov. gen. 7. t. 645. b.

pag. 825.

Ad *Condaliam* Cav.

spinosa *

3. C. spicis axillaribus oppositis, foliis confertis subspathulato-linearibus glabris, pedunculis aggregatis nutantibus. *Rio grande.* Sello.

Post *Flüggeam* W.:

LICANIA Aubl.

incana Aubl.

Guiana. Arbor foliis alternis ovato-oblongis acuminatis integerrimis subtus incanis, stipulis linearibus acuminatis, floribus spicatis albis. (Hedycrea Schreb. W.)

pag. 827.

Ad *Phylicam*.

Post n. 9. *squarrosa* Vent. 30. Ph. foliis lineari-lanceolatis patulis villosis subtus incanis, floralibus longioribus, capitulis florum subrotundis, laciniis calycis erectis acuminatis. *C. B. S.*

pag. 828.

Post n. 22. *elliptica* Roxb. 31. Ph. foliis oppositis ellipticis rigidis subtus incano-villosis concavis, stipulis ovatis, capitulis pedunculatis axillaribus villosis. *Inf. Helenae.*

ramosissima
Cand.

32. Ph. foliis alternis lanceolatis acutis superne lucidis subtus incano-villosis revolutis, stipulis subulatis, floribus axillaribus subsessilibus. *Inf. Helenae.* (Ph. rosmarinifolia Roxb.)

Ad Ph. *plumofam.* (Ph. horizontalis Vent.)

pag. 829.

Ad *Thefum*.

Post n. 4. † *divaricatum* Jan. 26. Th. caule ramosissimo, ramis fructiferis divaricatis, foliis linearibus, bracteis

ternis carnofo-triquetris subulatis, fructibus subrotundis. *Ora maris adriatici. Hispan. austr.*

rostratum
Mert. Koch.

27. Th. caule simplici, foliis linearibus Inerviis, racemis simplicibus demum comosis, bracteis solitariis, fructibus subglobosis calyce duplo brevioribus. *Bavaria austr.*

pag. 831.

Ad *Leptomeriam* R. Br.

Post n. 2. *xiphoclada* Sieb. 9. L. ramis angulatis compressis esquamatis, floribus glomeratis, bracteis caducis, laciniis calycis linearibus revolutis. *Nov. Holl.*

Ad *Hamiltoniam farmentosam* * (Comandra livida Richardf., non farmentosa.)

pag. 833.

Ad *Musam*.

M. rosacea Jacqu. (M. ornata Roxb.)

M. glauca Roxb. (M. nepalensis Wallich.)

pag. 834.

Ad *Heliconiam*.

brasiliensis
Hook.

5. H. foliis cordato-oblongis acutis glabris, scapo erecto, nectarii folio superiore convoluto. *Brafil.*

buccinata Roxb.

6. H. acaulis, foliis lanceolatis lucidis, spadice centrali flexuoso pubescente, spathe bifariis divergentibus, nectario acuto. *Inf. Molucc.*

Ad *Rauwolfiam*.

sumatrana
Jack.

12. R. foliis verticillatis petiolatis elliptico-oblongis integerrimis glaberrimis, pedunculis terminalibus umbelliferis, fauce corollae villis clausa. *Sumatra. Malayan misc. 1. n. 2. 22.*

pag. 835.

Ad *Alyxiam* Banks.

A. obtusifolia R. Br. (A. lucida Wallich.) *Ind. or.*

A. stellata R. et Sch. habitat et in *Inf. Molucc.*

A. scandens R. et Sch. (A. coriacea Wallich.) *Inf. freti Malacc.*

† *glaucescens*
Wallich.

8. A. foliis oppositis oblongis coriaceis supra nitidis subtus glaucis, corymbis axillaribus multifloris, fauce corollae coronata. *Inf. freti Malacc.*

Ad *Melodinum* Forst.

phillyreoides
Labill.

2. M. erectus, foliis oblongis obtusiusculis coriaceis, pedunculis trichotomis subcorymbosis folia superantibus. *Nov. Caledon.*

monogynus
Carey.

3. M. scandens, foliis oblongo-lanceolatis elongatis glaberrimis, paniculae ramis oppositis, floribus liginis. *Silhet, prov. Ind. or. Bot. reg. 834.*

pag. 843.

Ad *Hoyam* R. Br.

Post n. 1. † *pallida* Lindl. 7. H. foliis ovato-lanceolatis acuminatis carnofis venosis, umbella compacta, laciniis corollae obtufiusculis. *Patria?* Bot. reg. 951.

† *lanccolata* Wall. 8. H. foliis lanceolatis acuminatis, umbellis paucifloris, laminis gynostegii lineari-oblongis obtufis fubtus fulcatis. *Nepal.*

† *linearis* Wall. 9. H. foliis linearibus obtufis carnofis utrinque caule filiformi denfe pilofis. *Nepal.*

Ad *Pergulariam*.

Post n. 4. *sanguinolenta* Lindl. 14. P. foliis ovato-lanceolatis acuminatis glaberrimis, cymis multifloris folio brevioribus, calycibus tubum corollae intus glabrae aequantibus. *Senegambia.* Bot. mag. 2532.

pag. 846.

Ad *Gonolobum* Mx.

Post n. 22. *floccofus* Bertol. 26. G. foliis cordatis acuminatis fubtus tomentofis, floribus glomeratis, folliculis echinatis. *Guadalupa.*

pag. 848.

Ad *Afclepiadem*.

Post n. 24. *melliodora* Hilar. 39. A. caule fimplici erecto, foliis petiolatis linearibus elongatis acutis fubtus pubefcentibus, umbellis lateralibus multifloris. *Rio grande.*

pag. 851.

Ad *Macrofepim longifloram* * (*Schubertia longiflora* Mart.) *Brafil.*

Ad *Cynanchum*.

Post n. 2. *longifolium* Martens. 33. C. herbaceum volubile, foliis cordatis acuminatis nervofis, laciniis corollae acutis, coronae exterioribus denis alternatim lanceolatis acutis et fubcrenatis obtufis. *Ager venctus.*

pag. 852.

Post n. 22. *multiflorum* * 34. C. volubile hirsutum, foliis cordato-oblongis acutis utrinque pubefcentibus, umbellis multifloris, laciniis coronae cum antheris appendiculatis ope calli cohaerentibus. *Brafil.* (*Schubertia multiflora* Mart.)

pag. 853.

Post *Cynanchum*:

DITASSA R. Br.

* *Erectae*.

- decussata* Mart. 1. D. foliis adnatis confertis cordato-ovatis revolutis rmgofis hirtis, pedunculis multifloris subcymosis. *Brazil*. D. passerinoides Mart. var.
- accrofa* Mart. 2. D. foliis oppositis verticillatisque linearibus subulatis villosis, floribus umbellatis. *Brazil*.
- laevis* Mart. 3. D. suberecta, ramis laxis, foliis breviter petiolatis lineari-lanceolatis mucronatis utrinque glabris, umbellis multifloris, pedicellis flore brevioribus. *Brazil*.

** *Volubiles*.

- obcordata* Mart. 4. D. foliis petiolatis obcordato-subrotundis mucronatis reflexo-complicatis, floribus subfolitariis. *Brazil*.
- mucronata* Mart. 5. D. foliis breviter petiolatis oppositis ovato-lanceolatis mucronatis revolutis pubescentibus, floribus umbellatis. *Brazil*.
- retusa* Mart. 6. D. foliis petiolatis obovatis retusis mucronatis glabris margine planis, floribus umbellatis. *Brazil*.
- linearis* Mart. 7. D. foliis breviter petiolatis linearibus mucronatis planis glabris, umbellis paucifloris, pedicellis flores aequantibus. *Brazil*.

pag. 854.

Ad *Oxypetalum* R. Br.* *Volubilia*.

- riparium* Kunth. 1. }
Gothofreda R. et Sch. 2. } v. p. 854.
- Bankfii* R. et Sch. 3. O. foliis cordato-ovatis acutis pubescentibus, pedunculis multifloris, laciniis corollae reflexis, retinaculis antherarum apice nudis. *Brazil*. Mart. nov. gen. t. 29.
- appendiculatum* Mart. 4. O. foliis cordato-oblongis acutis pubescentibus, cymis sub-4floris, laciniis corollae erecto-patentibus, retinaculis antherarum apice membranaceo-appendiculatis. *Brazil*.
- megapotanicum* * 5. O. foliis cordato-lanceolatis acuminatis laevibus, pedunculis cymosis incano-pubescentibus. *Rio grande*.
- Berterianum* * 6. (n. 3. Iyft.)
- montanum* Mart. 7. O. foliis lanceolatis acutis, pedunculis multifloris, laciniis corollae sursum reflexis, foliolis coronae acutis, retinaculis apice sagittato-dilatatis. *Brazil*.

** *Erecta herbacea*.

- foliosum* Mart. 8. O. foliis cordato-ovatis subseffilibus confertis, pedunculis multifloris, laciniis corollae erectis, foliolis coronae bilobis. *Brazil*.

- erectum* Mart. 9. O. foliis cordato-ovatis acutis pubescentibus, pedunculis 1floris, laciniis corollae patentibus, foliolis coronae 2dentatis. *Brazil.*
- strictum* Mart. 10. O. foliis cordato-lanceolatis subsessilibus, pedunculis 1floris, foliolis coronae 3fidis, antherarum membrana elongata. *Brazil.*
- capitatum* Mart. 11. O. foliis lanceolatis acutis villosis, floribus in umbellam globosam congestis, foliolis coronae bifidis. *Brazil.*

pag. 855.

Post *Araujam* Brot.:

PHYSIANTHUS Mart.

- albens* Mart. 1. Ph. volubilis pubescens, foliis basi truncata oblongis subtus albo-pruinosis, cymis dichotomis, lobis coronae integerrimis. *Brazil.*
- megapotamicus* * 2. Ph. volubilis glaber, foliis sagittato-cordatis acuminatis, pedunculis 1floris, lobis coronae denticulatis. *Rio grande. Sello.*
- Ad *Astephanum cubensem* Kunth. (*Periploca parviflora* W. herb., *Humboldtiana* R. et Sch.)

pag. 856.

Ad *Gentianam*.

- Post n. 4. *volubilis* Don. 70. G. volubilis, foliis petiolatis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis 3nerviis, floribus axillaribus solitariis, laciniis calycis linearisubulatis, corollae campanulatae ovatis acutis, antheris ovalibus. *Nepal.*
- capitata* Hamilt. 71. G. erecta simplex, foliis ovali-oblongis mucronatis 3nerviis, floribus terminalibus sessilibus aggregatis bracteatis, laciniis calycis membranaceis ovatis acutis, corollae tubulosaе rotundatis. *Nepal.*
- G. unalasensis* Ledeb. hinc ad p. 859. post n. 56. est transferenda.

pag. 857.

- Post n. 23. *depressa* Don. 72. G. acaulis, foliis confertis elliptico-oblongis acutis cartilagineo-ferratis, flore solitario sessili, laciniis calycis corollaeque campanulatae ovatis mucronatis. *Nepal.*

pag. 858.

- Post n. 43. *Gebleri* Ledeb. 73. G. caule simplici erecto, foliis lineari-lanceolatis elongatis, floribus aggregatis terminalibus, corolla campanulata sulcata. *Imaus. Reichenb. ic. t. 271.*

pag. 859.

- Post n. 52. *decemfida* Don. 74. G. caule ramoso diffuso, foliis radicalibus elliptico-oblongis mucronatis, caulinis

linis minimis lineari-lanceolatis carinatis apice reflexis, floribus terminalibus subfoliariis, laciniis calycis lanceolatis recurvato-mucronatis, corollae alternis crassioribus aristatis. *Nepal.*

Post n. 56. *plebeja* Ledeb. 75. G. caule simplici tereti usculo, foliis ovatis acutiusculis sub-5nerviis, laciniis calycis latitudine inaequalibus, corollae erectis. *Sibir.*

aleutica
Chamiss.

76. G. caule 4gono subramoso, foliis lanceolatis amplexicaulibus, floralibus elongatis, laciniis corollae hypocrateriformis 4-(sub-5-)fidae lanceolatis apice denticulatis. *Inf. Aleut.* (G. unalascensis Ledeb. Syst. veg. 1. p. 856.)

Rurikiana
Chamiss.

77. G. caule 4gono ramoso, foliis lanceolatis sub-3nerviis, floribus longe pedunculatis, laciniis calycis inaequalibus, corollae fetaceo-acuminatis. *Ad oras freti Bering. Asiae et Amer. arctic.*

pag. 860.

Post n. 64. *floribunda* Don. 78. G. caule erecto tereti ramoso, foliis connatis lanceolatis acutis pubescentibus, floribus racemosis, corollae villosae laciniis ovatis acutis. *Nepal.*

Ad G. *Amarellam*. G. *lancifolia* Pers., *obtusifolia* Reichenb., *spathulata* Bartl., *montana* Nees. varr.

pag. 861.

Ad *Swertiam*.

Post n. 6. † *angustifolia* Don. 17. Sw. caule erecto 4gono ramosissimo, foliis lineari-lanceolatis acutis 3nerviis, floribus pedunculatis, laciniis calycis linearibus acutis corolla longioribus. *Nepal.*

multicaulis
Don.

18. Sw. caulibus caespitosis, foliis spathulato-lanceolatis, pedunculis 1floris, laciniis calycis ovalibus obtusis corolla brevioribus. *Emodi montes.*

pag. 862.

Ad *Evolvulum hirsutum*. E. *heterophyllus* Labill. t. 29. *Nov. Caledon.* var.

pag. 863.

Post *Reinwardtiam*:

NEUROPELTIS Wallich.

racemosa Wall. *Inf. freti Malacc.* Frutex diffusus, foliis petiolatis ternatis ovatis acutis carnosis, floribus racemosis, bracteis orbiculatis membranaceis reticulato-venosis.

pag. 864.

Ad *Cuscutam*.

Ante n. 1. *Epilinum* Weih. 22. C. caule simplici, glomerulis florum ebracteatis, corolla urceolata, dentibus abbreviatis, squamis appressis, staminibus inclusis.
Ad *Linum in Germania*.

Ad C. *monogynam* Vahl. dele patriam *Europ.* et syn. C. *Epilinum* Weih.

pag. 865.

Ad *Hydroleam*.

Post n. 3. *megapotamica* * 7. H. caule herbaceo glanduloso-villoso, foliis lanceolatis utrinque attenuatis hirsutis, corymbis terminalibus. *Rio grande*. Sello.

pag. 866.

Banffya Baumg. delenda, redit syst. 2. 373., *Gouffeia* vero Cand. cum *Brachystemmate* Don. syst. 2. 399.

pag. 867.

Ad *Panacem*.

Post n. 6. *glabratus* Kunth. 10. P. arboreus, foliis quinatis glabris, foliolis oblongis utrinque attenuatis integerrimis, umbellulis sub-3carpatis racemoso-paniculatis. *Nov. Granat.*

P. *splendens* Kunth. neutiquam ad P. *speciosum* pertinet, cum foliola habeat argute duplicato-dentata supra hispidula subtus argenteo-sericea, sed dubia species, cum nec flores nec fructus affuerint.

vinosus Schlechtend. 11. P. arboreus, foliis subseptenatis subtus racemisque ferrugineo-sericeis, foliolis obovato-oblongis mucronatis revolutis integerrimis, umbellis paniculatis. *Brazil*. Sello.

macrocarpus Schlechtend. 12. P. arboreus, foliis subseptenatis subtus ochraceo-tomentosis, foliolis obovato-ellipticis integerrimis revolutis, umbellis paniculatis. *Brazil*. Sello.

Post *Picramniam* Sw.:

MENISCOSTA Blum.

scandens Blum. *Java*. Frutex scandens glaber, foliis oblongis mucronatis, floribus paniculatis axillaribus.

pag. 868.

XANTHOSIA Rudg.

pilosa Rudg. 1. X. foliis lanceolatis sinuato-dentatis subtus dense stellato-tomentosis, ramis hirtis. *Nov. Holl.*

montana Sieb. 2. X. foliis 3fidis supra hispidiusculis subtus stellato-tomentosis, ramis hispidiusculis flexuosis. *Nov. Holl.*

DULONGIA Kunth.

acuminata Kunth. *Popayan in Columbia*. Arbuscula foliis membranaceis oblongis acutis apice serratis, e quorum nervo medio pagina superiore racemuli florum nascuntur. Humb. nov. gen. 7. t. 623. (*Phyllonoma ruscifolia* W. herb.)

pag. 869.

Ad *Eryngium*.

- Post n. 11. *pandanifolium* Schlechtend. 56. E. foliis linearibus obfolete denticulato-spinulosis, caule paniculato polycephalo, capitulis ovatis coloratis inermibus, paleis ovatis acuminatis calycibusque laevibus. *Ad fl. Platam*. Sello.
- Prifis*
Schlechtend. 57. E. foliis linearibus angustissimis strictissimis duplicato-spinoso-ciliatis, caule paniculato polycephalo, paleis subulato-spinulentibus calycibusque scabris. *Rio grande*. Sello.
- canaliculatum*
Schlechtend. 58. E. foliis linearibus canaliculatis nitidis horizontaliter spinoso-ciliatis, caule paniculato polycephalo, capitulis globosis subinermibus, involucris connatis, bracteis calycibusque laevibus. *Brazil*. Sello.
- Sanguisorba*
Schlechtend. 59. E. foliis ensiformi-linearibus obtusiusculis retrorsum ciliatis, capitulis paucis coloratis, paleis subulatis rigidis calycibusque laevibus. *Rio grande*. Sello.
- luzulaefolium*
Schlechtend. 60. E. foliis linearibus acutis denticulatis basi setoso-ciliatis, capitulis paucis inermibus globulosis, paleis calycibusque scabriusculis. *Brazil*. Sello.
- junceum*
Schlechtend. 61. E. foliis linearibus angustissimis acutis canaliculatis subdenticulatis, capitulis paucis globosis subinermibus, involucris connatis, paleis calycibusque laevibus. *Brazil*. Sello.
- eriphorum*
Schlechtend. 62. E. foliis linearibus inermibus integerrimis obtusis basi villoso-fimbriatis, capitulis paucis ovato-globosis inermibus coloratis, paleis elongatis calycibusque laevibus. *Ad fl. Platam et magnum Amer. austr.* Sello.

pag. 871.

- Post n. 26. *floribundum* Schlechtend. 63. E. foliis ensiformibus acuminatis spinuloso-ferratis ciliatis, caule polycephalo, paleis subulatis scabris. *Brazil*. Sello.
- Serra*
Schlechtend. 64. E. foliis ensiformibus spinoso-ferratis ciliatis, caule polycephalo, involucris spinoso-dentatis, paleis subulatis laevibus. *Monte Video*. Sello.
- uncinatum*
Schlechtend. 65. E. foliis spathulato-lanceolatis recurvo-spinoso-dentatis, capitulis paucis, involucris spinoso-pinnatifidis, paleis tricuspидatis scabris. *Brazil*. Sello.
- elegans*
Schlechtend. 66. E. radice globosa, foliis lineari-lanceolatis tricuspидatis spinoso-ciliatis, caule polycephalo, involucris paleisque tricuspидatis. *Monte Video*. *Rio grande*. Sello.
- ciliatum*
Schlechtend. 67. E. radice crassa, foliis obovato-lanceolatis pectinato-fimbriato-ciliatis, capitulis paucissimis ovalibus coloratis, paleis subulatis laevibus. *Rio grande*. Sello.

pag. 874.

Ad *Saniculam*.*S. marilandica*. (*S. liberta* Schlechtend.)† *hermaphrodita* Don. 4. *S. foliis ternatis glabris, foliolis ovatis utrinque attenuatis lobatis ferratisque, umbella 3fida sub-5flora, floribus omnibus seffilibus. Nepal.**elata* Don. 5. *S. foliis ternatis tripartitisve glabris, foliolis late ovatis acutis basi cuneatis lobatis ferratisque, umbellis 3fidis, floribus ♂ pedicellatis. Nepal.*Ad *Pozoam coriaceam* Lag. (*Asteriscium chilense* Chamiss. in *Linnaea* p. 354. l. 254.) *Chili.*

pag. 875.

Ad *Hydrocotylen*.*H. umbellata*. (*H. modesta* Schlechtend.)Post n. 10. *Barbarossa* Schlechtend. 61. *H. foliis orbiculatis 8lobis crenatis rufo-hirsutis, umbellis longe pedunculatis multifloris, caule radicante. Brasil.**Asterias* Schlechtend. 62. *H. foliis petiolatis 3-5lobis pilosiusculis, lobis lanceolatis duplicato-ferratis, umbellis longe pedunculatis multifloris, fructibus tuberculatis, caule decumbente. Brasil.*Ad *H. asiaticam*. (*H. Thunbergiana* * n. 22.)

pag. 876.

Post n. 19. *Icucocephala* Schlechtend. 63. *H. foliis reniformi-orbiculatis sub-9nerviis duplicato-dentatis utrinque pilosiusculis, umbellis globosis multifloris, fructibus laevibus, caule radicante. Brasil.*Ad *H. capitata* Thuars. (*H. hispida* Hamilt. Don.)

pag. 877.

Ad *H. macrodontem* * *H. calliodus* Schlechtend. var. *glabra*.Post n. 36. *Chamaemorus* Schlechtend. 64. *H. foliis reniformibus sub-7lobis nervosis duplicato-crenatis glabris, pedunculis brevibus petiolisque retrorsum hispidis, umbellis capitatis multifloris, fructibus reniformi-punctatis, caule repente. Chili. Chamisso.*Ad *H. fibthorpioidem* Lam. (*H. tenella* Don.) *Nepal.*

pag. 878.

Ad *H. plantagineam* * (*H. montana* Schlechtend.)

pag. 879.

Ad *Trachymenem* Rudg.*ericoides* Sieb. 6. *Tr. foliis linearibus acutis subcarnosis patentibus, ramulis flexuosis hirsutiusculis, umbellis paucifloris subcompositis. Nov. Holl.*

- laxifolia* Sieb. 7. Tr. foliis subcordato-ovatis 3nerviis subfessilibus, umbella decomposita, caule fruticoso. *Nov. Holl.*

pag. 880.

Ad *Bowlesiam* R. et P.

- geraniifolia* Schlechtend. 6. B. stellato-pubescent cinerea, foliis cordato-reniformibus 7lobis, lobis obtusis 3dentatis, pedunculis abbreviatis trifloris, caule erecto. *Chili.*

Ad *Bupleurum*.

- B. arborefcens* L. (Heteromorpha arborefcens Schlechtend.)

pag. 881.

- Post n. 7. *Mundtii* Schlechtend. 34. B. suffruticosum ramosissimum, foliis lineari-setaceis elongatis, umbellis 2-3radiatis, involucellis 5phyllis umbellulas aequantibus, fructibus laevibus. *Afric. austr.*

pag. 882.

- Odontites* 26. B. caule ramofo, ramis divaricatis, foliis linearibus 3nerviis, involucellis lanceolatis cuspidatis elongatis pellucidis nervoso-venosis. *Sicilia. Neapol. Gallia austr. (B. divaricatum a. Lam., veronense Turr., Gerardi Pollin.)*

- aristatum* Bartl. 35. B. caule erecto ramofo, ramis patulis, foliis lineari-lanceolatis 3nerviis, involucellis ovato-lanceolatis aristatis opacis 3nerviis subvenosis. *Europ. austr. (E. baldense Turr.)*

- glumaceum* Sibth. Sm. 36. B. caule gracili erecto ramofo, foliis linearibus angustissimis, involucellis ovatis pellucidis cuspidatis 3nerviis eveniis. *Gracia. Creta. (B. gracile Urv.)*

- juncum* 37. B. caule ramofo paniculato, foliis amplexicaulis lineari-lanceolatis acuminatis striatis, involucris umbellae pauciradiatae inaequalibus, involucellis lineari-subulatis pedicellisque fructu brevioribus, costis acutis. *Ad mare adriatic. Gallia. Italia.*

- Gerardi* Jacqu. 38. B. caule ramofo paniculato, foliis amplexicaulis linearibus 3-5nerviis, umbellae radiis quinque inaequalibus, involucellis linearibus cuspidatis subaequalibus umbellulas superantibus, pedicellis fructus aequantibus, costis acutiusculis. *Gallia. Italia. Austria.*

- baldense* Hoff. 39. B. caule ramofo, foliis lineari-lanceolatis acuminatis 5nerviis, involucellis linearibus cuspidatis pedicellisque fructus subaequantibus, costis subulatis, valleculis striatis. *Austria. Hungaria. Transylvan. Tauria.*

pag. 883.

Ad *B. tenuissimum*. (*B. junceum* Pollich., *Pollichii* Gmel.)
 † *tenuis* Hamilt. 40. *B.* caule gracili ramofo, foliis linearibus mucronatis 5nerviis, fupremis lanceolatis, umbellis sub-4fidis, involucellis ellipticis mucronatis fructus subaequantibus. *Nepal*.

Ad *Hernuda*.

rudiffima Reichenb. 6. *H.* foliis radicalibus obovato-oblongis lobata spinuloso-ciliatis venofis fubtus alperis, petiollis craffis vaginantibus, umbellis compofitis longe pedunculatis. *C. B. S.* (*Lichtenfteiniia lacera* Schlechtend. in *Linnaea*, 1. p. 394.)

pag. 884.

Ad *Sefeli varium* Trevir. patria *Aufiria*.

pag. 885.

Ad *Sefeli dubium* Schk. (*Selinum lineare* Schum., *Cnidium venosum* Koch.)

pag. 886.

Ad *Sifonem*.

Post n. 4. † *trinerviis* Hamilt. Don. 16. *S.* caule erecto tereti nudiusculo, foliis radicalibus pinnatis glabris, foliolis lanceolatis acutis integerrimis 3nerviis, involuero 5phylo, involucellis lanceolatis aristatis. *Nepal*.

pag. 887.

Post n. 9. † *Guffonii* * 17. *S.* caule simpliciusculo, foliis oppositis fessilibus 3partitiis glabris, laciniis oblongis acutis mucronato-dentatis, pedunculis 2fidis, involuero 2phylo exili, flosculis ♂ pluribus, umbella pauciflora. *Patria?*

pag. 888.

Ad *Cnidium Guffon*.Ad *Cn. Silaum* * (*Silaus pratensis* Bess. Koch.)

Post n. 10. *suffruticosum* Schlechtend. 11. *Cn.* caule suffruticoso ramofo, ramis rigidis teretibus, foliis petiolatis 2pinnatis succulentis glabris, foliolis oblongis obtufiusculis incisfis, involucris sub-3phyllis, fructibus ovalibus laevibus 5alatis. *C. B. S.* (*Conium suffruticosum* Berg.)

pag. 890.

Ad *Oenanthem interruptam* Thunb. (*Anneforrhiza capensis* Schlechtend.)

Ad *Oenanthem incbriantem* Thunb. (*Lichtensteinia pyrethrifolia* Schlechtend.)

Ad *Oenanthem obscuram* * (Lichtensteinia? Sfida Schlechtend.)

Ad *Meum heterophyllum* Mönch. (Critamus heterophyllus Koch.)

pag. 891.

Ad *Meum inundatum* * (Helosciadium inundatum Koch.)

pag. 892.

Ad *Cachryn alatum* M. B. Affinis est Prangos pabularia Lindl. ex India septentrionali, diversa foliis glabris. Quarterly journ. of scienc. vol. 18. n. 37.

pag. 895.

Ad *Thyffelum palustre* Hofm. (Pencedanum palustre Mönch. Koch.)

Ad *Caucalin grandifloram*. (Orlaya Hofm., Platyspermum Koch.)

pag. 898.

Ad *Daucum*.

montevidensis 17. D. caule erecto foliisque decompositis hirsutis, Link. foliolis linearibus abbreviatis, involucre foliaceo decomposito umbellam superante, partialibus Sfidis, floribus exiguis albidulis, setis fructuum glochidatis. *Monte Video*.

† *depressus* * 18. D. caulis, foliis radicalibus 2pinnatis pubescentibus, foliolis multipartitis tenuissimis, laciniis linearibus mucronatis, scapis caespitosis filiformibus villosis folia superantibus, involucre sub-5phylo pinnatifido. *Emodi montes*. (Athamanta depressa Don.)

Ad *Torilin* Gärtn.

† *elata* * 10. T. caule elato ramofo tereti retrorsum hispido, foliis longe petiolatis decompositis, foliolis lanceolatis pinnatifidis, extremis elongatis, involucre polyphylo, fructibus ovatis setosis. *Nepal* (Caucalis elata Don.)

pag. 899.

Ad *Athamantam*.

gigantea Don. 9. A. caule elato sulcato ramofo, foliis supradecompositis glabris, foliolis ovatis inciso-ferratis aristatis, involucre polyphylo, fructibus ovatis pubescentibus. *Nepal*.

Ad A. *Libanotida*. (Sefeli Libanotis Koch.) (Ligusticum Gmelini Chamiff. Gmel. sib. 1. t. 44. olim L. vaginatum mihi, est varietas polymorphae hujus speciei.)

Ad A. *Matthioli* Wulf. (Pimpinella anethifolia Don.) *Nepal*.

Post n. 5. † *teres* Don. 10. A. caule simplici stricto tereti laevi, foliis bipinnatis glabris, foliolis pinnatifidis, laciniis linearibus acutis canaliculatis, involucre 5phylo brevi, involucellis polyphyllis radiosaequantibus. *Nepal*.

pag. 900.

Ad *Athamantam tortuosam* * (Bubon aphyllus Schlechtend.) C. B. S.

pag. 901.

Ad *Scandicem*.

brachycarpa 7. Sc. caule humili ramoso, ramis divaricatis, foliis ternato-decompositis glabris, foliolis linearibus obtusiusculis ciliatis, fructibus subcylindricis, styliis convergentibus. *Sicil.*
Guffon.

pag. 902.

Ad *Myrrhida*.

Post n. 10. *longistylis* Torr. 23. M. caule erecto laevi, foliis 2ternatis, foliolis ovatis inciso-lobatis dentatis, umbella 3-4radiata, involucrio sub-3phylo, fructibus hispida basi attenuatis, styliis strictis elongatis. *Nov. Caesar.*

pag. 903.

Post n. 20. *gracilis* * 24. M. caule laevi ramoso, foliis triplicatopinnatifidis, foliolis lanceolato-linearibus acutis, involucellis 5phyllis, fructibus ovato-oblongis acutangulis. *Patria?* (Chaerophyllum Cyminum Fisch., gracile Bess. Trevir.)

pag. 905.

Ad *Stum*.

S. lancifolium M. B. habet ramos sulcatos.

Ad *S. angustifolium*. (Berula angustifolia Koch.)

Ad *S. nodiflorum* et *repens*. (Helosciadium Koch.)

crassipes * 26. S. caule basi radicante ascendente, foliis pinnatis, foliolis ovatis dentatis, umbellis 3fidis, pedicellis demum basi incrassatis connatis. *Corfica.* (Helosciadium Koch. Reichenb. ic. t. 218.)

Ad *S. Falcariam*. (Critamus agrestis Bess. Koch.)

pag. 906.

Ad *S. Bulbocastanum* * (Carum Bulbocastanum Koch.)

pag. 907.

Ad *Conium*.

Arracacha 3. C. caule tereti striato glabro, foliis imparipinnatis amplis laevibus, foliolis bijugis late ovato-oblongis pinnatifidis inciso-ferratis, involucrio nullo, involucellis oligophyllis, flosculis centralibus sessilibus abortientibus. *Ad Bogotam Nov. Granat.* Hook. exot. fl. t. 152.
Hook.

Ad *Ligusticum*.

Post n. 4. † *nepalense* Don. 22. L. caule erecto simplici, foliis pinnatis, foliolis ovatis utrinque attenuatis inciso-

ferratis nervosis, infimis 3partitis, involucellis polyphyllis. *Nepal.*

Ad L. *peloponnesiacum* Scop. (Molopospermum Koch.)

Ad L. *Cervariam* * (Peucedanum Lapeyr. Koch.)

pag. 909.

Ad *Selinum*.

Ad S. *austriacum* Jacqu. et *Oreoselinum* Scop. (Peucedanum Koch.)

S. *lineare* Schum. huc non pertinet sed ad *Seseli dubium* Schk. p. 885. Hujus loco ponendum S. *rablense* * (Peucedanum Koch.)

pag. 910.

Post n. 14. † *stellatum* Don. 17. S. caule erecto ramofo, foliis pinnatis glabris, foliolis ovatis mucronatis 3lobis inciso-dentatis, involucrio sub-2phylo, radiis umbellae pubescentibus, involucellis maximis coloratis. *Nepal.*

pag. 911.

Ad *Peucedanum*.

Post n. 12. † *virgatum* Schlechtend. 18. P. caule fruticoso ramofo, foliis pinnatis glabris subcoriaceis, foliolis lanceolatis integerrimis margine revolutis mucronatis, involucris abbreviatis polyphyllis. *C. B. S.*

pag. 912.

Ad *Heracleum*.

H. *asperum* M. B. in *alpibus bavaricis* inventum fertur.

Post n. 8. *nepalense* Don. 18. H. caule elato sulcato hirsuto, foliis 2jugis villosis, foliolis lobatis obtusis ferratis, floribus flavidis aequalibus. *Emodi montes.*

pag. 913.

Ad *Pastinacam*.

Post n. 5. *ambigua* Torr. 11. P. caule elato subangulato, foliis pinnatis glabris, foliolis linearibus subintegerrimis rigidis subtus glaucis, umbella terminali subsolitaria, involucellis subulatis. *Nov. Caesar.* (*Oenanthe ambigua* Nuttall.)

pag. 916.

Ad *Angelicam pratensem* M. B. (Ostetricum palustre Bess. Koch.)

Ad *Imperatoriam verticillarem* Cand. (Peucedanum verticillare Koch.)

Ad *Imper. Chabraei* * (Peucedanum Carvisolia Vill. Koch., Selinum podolicum Bess.)

pag. 917.

Ad *Thapsiam garganicam*. (Ferula neapolitana Tenor.)

pag. 920.

Ad *Chenopodium*.

Post n. 23. *giganteum* Don. 55. Ch. caule elato angulato ramoso, foliis inferioribus ovatis dentatis, superioribus oblongis obtusis mucronatis subintegerrimis, spicis racemosis foliosis axillaribus. *Nepal*.

pag. 928.

Ad *Amarantum curvifolium* * Patria: *Caucasus*.

pag. 930.

Ad *Microcam debilem* Sw. (Galenia celosioides *, Aphananthe celosioides Link.)

pag. 931.

Ad *Chaillietiam* Cand.

toxicaria Don. 5. Ch. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis undulatis integerrimis glabris coriaceis, racemis paniculatis, fructibus pubescentibus. *Afric. occ.*

erecta Don. 6. Ch. foliis oblongo-lanceolatis obtusis emarginatis glabris coriaceis integerrimis, floribus axillaribus, fructibus pubescentibus. *Afric. occ.*

pag. 933.

Ad *Viburnum*.

Post n. 6. *cotinifolium* Don. 33. V. foliis ovato-oblongis integerrimis utrinque stellato-tomentosis subtus ramulisque cinereis, cymis terminalibus lanatis. *Nepal*.

cylindricum Hamilt. 34. V. foliis ovato-oblongis acuminatis coriaceis integerrimis subtus ramulisque pubescentibus, cymis compositis tomentosis, corollae tubulosae limbo brevissimo 5dentato. *Nepal*.

punctatum Hamilt. 35. V. foliis ovato-oblongis mucronatis integerrimis utrinque glabris, cyma terminali sessili patente. *Nepal*.

pag. 934.

Post n. 16. *Mullaha* Hamilt. 36. V. foliis ovatis acuminatis remote ferratis subtus ramisque dense tomentosis, cymis compositis patentissimis, dentibus calycis abbreviatis. *Nepal*.

nervosum Don. 37. V. foliis cordatis acuminatis ferratis nervosis subtus ramulisque stellato-tomentosis, pedunculis terminalibus ternis cymosis paucifloris. *Nepal*.

pag. 936.

Ad *Rhoëm.*Ad Rh. *Vernicem* del. patria *Japonia*. (Rh. *venenata* Cand.)

Post n. 5. *juglandifolia* Humb. 50. Rh. foliolis sub-6jugis basi inaequaliter ovato-oblongis acuminatis subtus pubescentibus, petiolo teretiusculo subtomentoso, panicula ramosissima bracteata, calycibus glabris. *Nov. Granat.*

vernicipera Cand. 51. Rh. foliolis 5jugis sessilibus oblongis acutis utrinque tomentosis, petiolo teretiusculo, panicula terminali. *Japonia. Nepal.* (Rh. *Vernix* Thunb.; *juglandifolium* Wall. Don.)

† *perniciosa* Kunth. 52. Rh. foliolis 7-8jugis longissime petiolatis rhombeo-ovatis membranaceis glabris reticulato-venosis, petiolo teretiusculo. *Nov. Hispan.* Nec flores nec fructus visi.

acuminata Cand. 53. Rh. foliolis 3-4jugis oblongis acuminatis ramulisque glabris subtus parallele venosis, paniculis axillaribus folio brevioribus. *Nepal.*

pag. 937.

Ad Rh. *javanicam*. (Rh. *Amela* Don.) *Nepal.*

fraxinifolia Don. 54. Rh. foliolis 7jugis oblique lanceolatis acuminatis ferratis glabris lucidis, petiolo teretiusculo, panicula ramosissima villosa. *Nepal.*

Post n. 20. *pyroides* Burch. 55. Rh. foliolis obovato-oblongis integerrimis mucronatis, petiolis ramulisque pubescentibus, racemis axillaribus folio brevioribus, terminalibus paniculatis. *Afric. austr.*

Post n. 25. † *tridactyla* Burch. 56. Rh. foliolisspathulato-linearibus obtusissimis glabris, ramulis rigidis inermibus. *Afric. austr.*

pag. 938.

Post n. 40. *parviflora* Roxb. 57. Rh. foliolis obovatis crenatodentatis utrinque ramisque villosis, panicula terminali. *Nepal.*

ferraeifolia Burch. 58. Rh. foliolis linearibus acuminatis elongatis ferratis glabris, panicula terminali. *Afric. austr.*

Ad Rh. *cuneifoliam*. (Rh. *grandidentata* Burch.)

pag. 939.

Ad *Cassinem*.

excelsa Wall. 10. C. arborea, foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis subcarnosis glabris, umbellis axillaribus rotundatis, stigmatibus 5. *Nepal.*

discolor Wall. 11. C. arborea, foliis oppositis oblongis utrinque attenuatis integerrimis subtus subargenteis coriaceis, fasciulis axillaribus dichotomis, stigmatibus 4. *Silhet, prov. Ind. or.*

pag. 940.

Ad *Paliurum* Lam.

virgatus Don. 3. P. foliis oblique cordatis acutis 3nerviis lucidis, aculeis stipularibus geminis recto falcatoque, fructus alis integerrimis. *Nepal.* Bot. mag. 2535.

Ad *Turneram*.

Post n. 1. *mollis* Kunth. 23. T. foliis ovato-oblongis grosse crenato-serratis utrinque sericeo-pilosis subtus canescentibus, calycibus bracteatis. *Nov. Granat.*

Ad T. *acutam* W. (T. *carpinifolia* Kunth.)

Ad T. *peruvianam* W. (T. *sericea* Kunth.)

pag. 941.

Post n. 7. *hexandra* * 24. T. fruticosa, foliis oblongis inaequaliter crenato-serratis supra pubescentibus subtus incano-tomentosis, calycibus bracteatis, floribus 6andris. *Nov. Granat.* (T. *tomentosa* Kunth.)

Ad T. *tomentosam* W. (Piriqueta *tomentosa* Kunth.) Stylos habet 2partitos.

pag. 942.

Ad *Drymariam* W.

Post n. 1. *diandra* Blum. 6. Dr. caule decumbente diffuso pubescente, foliis subrotundo-ovatis mucronatis, pedunculis 2fidis, floribus diandris, calyce corollam superante, capsula sub-1sperma. *Java.*

Post *Drymariam*:

MERCKIA Fisch.

physodes Fisch. *Orae maritimae Asiae et Amer. arctic.* Planta Arenariam referens, foliis ovatis ciliatis, pedunculis 1floris, floribus albis. (Arenaria? *physodes* Fisch. Gand.)

Ad *Corrigiolam*.

telephifolia Pourr. 2. C. perennis, foliis spathulatis acutiusculis, floribus terminalibus glomeratis pedunculatis. *Corfica.* *Gallia austr.* Reichenb. ic. t. 161.

pag. 943.

Ad *Stackhoufiam* Labill.

spathulata Sieb. 2. St. caule herbaceo, foliis alternis spathulatis glabris, spicis terminalibus elongatis. *Nov. Holland.*

pag. 944.

Ad *Stapyleam occidentalem* Sw. dele syn. *Ventenatii*.

pag. 945.

Ad *Xanioxylon*.

- Post n. 13. *lyemale* Hilar. 39. X. foliolis 3-6jugis subfessilibus obovatis obtusis crenato-ferratis margine glandulosis, floribus paniculatis 4andris 1gynis. *Brazil*. Hilar. pl. ul. brasil. t. 37.
- forbifolium* Hilar. 40. X. foliolis 2-5jugis oblongis crenato-ferratis venosis glabris, petiolis aculeatis, floribus paniculatis 5andris dioecis 1gynis. *Brazil*. (Langsdorffia Leandr., Pohlana Langsdorffii Mart. nov. act. nat. cur. 11. p. 185. 12. p. 17.)

pag. 946.

Ad X. *Culantrilo* Kunth. (X. Tingo assuiba Hilar.)

- lucidum* Hilar. 41. X. arboreum, ramis 4angulis, foliolis 2-3jugis spathulatis retusis integerrimis pellucido-punctatis basi 2tuberculatis, floribus ♂ paniculatis 4andris. *Brazil*. (X. nitidum Hilar.)

pag. 947.

- Post n. 37. *præcox* Hilar. 42. X. arboreum inerme, foliis subabrupte pinnatis oblongis obtusis subintegerrimis subtus pubescentibus pellucido-punctatis, floribus ♀ paniculatis 4fidis. *Brazil*.

pag. 952.

Ad *Arahiam*.

- Post n. 12. *pubescens* Cand. 34. A. fruticosa glabra, foliis impari-pinnatis 2pinnatisque pubescentibus, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis ferratis basi inaequaliter attenuatis, umbellis compositis verticillatis. *Nov. Hispan.*

pag. 953.

- Post n. 30. *dubia* * 35. A. caule fruticoso muricato-echinato, foliis profunde cordatis palmato-7partitis subtus ferrugineo-pubescentibus, laciniis lanceolatis ferratis, umbellis compositis, floribus 1gynis. *Ind. or.* (Gastonia palmata Roxb. Lindl. bot. reg. 894.)

pag. 954.

Post *Glossopetalum*:

EURYCOMA Jack.

- longifolia* Jack. *Sumatra*. Arbuscula foliis amplis pinnatis, floribus paniculatis purpurcis.

Ad *Pilocarpum* Vahl.

- Humboldtii* * 4. P. foliis oblongo-lanceolatis acutis, petiolis marginatis, racemis compositis pubescentibus laxis, petalis rotundatis punctato-glandulosis, germinibus tuberculosis. *Nov. Andalus.* (Efenbeckia pilocarpoides Kunth. in Humb. nov. gen. 7. t. 655.)

pag. 955.

Ad *Droseram*.

- Post n. 11. 12. *sessilifolia* Hilar. 29. Dr. foliis sessilibus cuneiformibus fimbriato-laciniatis basi nudiusculis, stipulis multipartito-ciliatis, scapo glabro, calycibus glanduloso-pubescentibus, stigmatibus subsfidis. *Brazil.*
- montana* Hilar. 30. Dr. foliis breviter petiolatis oblongis obtusissimis glanduloso-pilosis, stipulis laciniatis, scapo pubescente, calycibus glandulosis. *Brazil.*
- hirtella* Hilar. 31. Dr. foliis spathulatis obtusis in petiolum decurrentibus glanduloso-pilosis, stipulis 3partitis, scapo hirsuto, calycibus glandulosis. *Brazil.*
- parvifolia* Hilar. 32. Dr. foliis obovatis obtusissimis glanduloso-pilosis, scapo glabriusculo 2-3floro, calycibus glandulosis. *Brazil.*
- maritima* Hilar. 33. Dr. foliis spathulato-cuneatis glanduloso-pilosis, stipulis subnullis, scapo calycibusque glanduloso-pubescentibus. *Brazil.*
- communis* Hilar. 34. Dr. foliis spathulatis obtusissimis petiolatis glanduloso-pilosis, stipulis multipartitis, calycibus glanduloso-pubescentibus. *Brazil.* Hilar. pl. uf. brasil. t. 15.
- villosa* Hilar. 35. Dr. foliis lineari-lanceolatis scapo calycibusque glanduloso-pilosis, petiolis villosis, stipulis 2partitis ciliatis. *Brazil.*
- ascendens* Hilar. 36. Dr. foliis linearibus scapoque ascendente glanduloso-pilosis, calycibus latiusculis. *Brazil.*
- graminifolia* Hilar. 37. Dr. foliis linearibus longissimis erectis, stipulis late ovatis laciniatis, scapo 3angulari paucifloro. *Brazil.*
- spiralis* Hilar. 38. Dr. foliis linearibus elongatis spiratim tortis, stipulis lanceolatis acutis, scapo complanato 2fido glanduloso-pubescente. *Brazil.*
- Post n. 19. *hilaris* Schlechtend. 39. Dr. foliis rosaceo-congestis spathulato-lanceolatis obtusis glanduloso-pilosis subtus petiolisque villosis, stipulis 0, racemo secundo bracteato. *C. B. S.*

pag. 958.

Ad *Staticem*.Ad *St. globularifoliam* Desf. Patria: *Sardinia.*

- echioides* 25. St. foliis spathulatis obtusis muricato-asperis, scapi ramis strictis elongatis simpliciusculis, calycibus remotis aristatis. *Europ. austr.* (St. aristata Sm.)
- articulata* Loif. 57. St. foliis spathulatis punctato-scabris, scapi ramiofilissimi ramis divaricatis punctato-asperis dichotomis articulatis, articulis medio crassioribus. *Gallia provinc. Corsica. Sardinia.* (St. echioides R. et Sch., rorida Sm.)
- acutifolia* Reichenb. 58. St. foliis lineari-lanceolatis acutis, scapo erecto, ramis dichotomis teretibus, floribus distantibus. *Liguria.* Reichenb. ic. t. 225.

pag. 961.

Ad *Armeriam* W.

- cardo* * 16. A. foliis filiformibus canaliculatis scapoque glabris, foliolis involucri obtusis. *Sardin. Corsica.*

pag. 962.

Ad *Linum*.

- Post n. 3. *ficulum* Presl. 49. L. simplex, foliis lineari-lanceolatis acutis 3nerviis, floribus corymbose-paniculatis, sepalis acuminatis 3nerviis margine glandulosis, petalis emarginatis. *Sicil.*
- Post n. 12. *piligerum* Presl. 50. L. simplex hirsutum, foliis oblongo-lanceolatis 3nerviis, sepalis linearibus pilosis, stylis stamina aequantibus. *Sicil. Creta.*

pag. 963.

- Post n. 23. *carneum* Hilar. 51. L. foliis lineari-lanceolatis acutissimis glaucescentibus, inferioribus oppositis, superioribus subimbricatis, panicula coarctata, calyce acuto ferrulato petalis breviori. *Brazil.*

pag. 964.

- Post n. 29. *erigeroides* Hilar. 52. L. simplex erectum, foliis alternis confertis linearibus acutissimis basi 2glandulosis, panicula subcorymbosa, sepalis acuminatis glanduloso-ferratis. *Ad fl. Platam.*
- litorale* Hilar. 53. L. multicaule erectum glaberrimum, foliis linearibus acutis, superioribus alternis, floribus paniculatis, sepalis acutis glandulosis. *Brazil.*
- junceum* Hilar. 54. L. caule erecto virgato glaberrimo, foliis remotis abbreviatis appressis linearibus acutis, floribus paniculatis, sepalis acutis glandulosis. *Brazil.*
- Ad L. *strictum*. (L. alterniflorum Delil.) *Gallia austr.*

pag. 965.

- Ad L. *aquilinum* Molin. (L. Chamissonis Schiede in Linnaea p. 69.)

Post n. 45. *Cicanoba* Hamilt. 55. L. fruticosum, foliis alternis petiolatis oblongis acuminatis serratis glabris, umbella terminali multiflora, sepalis acutis, floribus trigynis. *Nepal.*

repens Don. 56. L. fruticosum repens, foliis alternis ovatis mucronulatis crenulatis glabris, pedunculis foliariis, sepalis lanceolatis mucronatis denticulatis. *Nepal.*

A D
V O L U M E N I I .

C L A S S I S VI.

pag. 5.

- Post n. 1198. *Phycella* Lindl. Cor. tubulosa 6partita subringens subclausa. Stamina basi laciniarum inferta, sterilia 6 basi exteriorum adnata. Stigma simplex.

pag. 9:

- Post n. 1274. *Compfanthus** -(Compfoa Don.) Cor. campanulata 6petala, apice incrassata, petalis extus gibbosofaccatis. Filamenta basi dilatata. Antherae petatae. Stigmata 3 2fida apice revoluta. Caps. filiquaeformis 3locularis polysperma.

- Mierfa* Lindl. Bracteae patentēs, 6 exter. petaloideae, inter. bifidae coloratae depauperatae. Perianthium 1phyl- lum urceolatum carnosum, ore 6dentato. Stami- na minima fauci perianthii inferta. Stigma capi- tatum. Caps. 3locularis apice 3valvis polysper- ma. *Familia?*

pag. 11.

- Post n. 1299. *Steriphoma**. Cal. campanulatus 2lobus. Pet. 4. Fructus oblongus stipitatus. *Capparideae*.
 Post n. 1308. *Leptodermis* Wallich. Cal. 6dentatus, bractea mem- branacea tubulosa superne 2fida inclusus. Cor. 6fida. Antherae mediis filamentis adnatae linea- res. Stigma 6fidum. Caps. 6sperma. *Familia?*

pag. 12.

- Post n. 1327. *Squalamea* Lam. e syst. veg. 3. p. 150. huc transfe- renda. Cal. minimus 3fidus. Pet. 3. Stigmata sessilia. Samara 2locularis obcordata, loculis 1spermis. *Polygaleae*.

pag. 14.

n. 1357. *Cymation** deletur.

- Post n. 1368. *Kolbea* Schlechtend. Petala sine unguiculis glandu- lisque staminifera. Stylus 0. Stigmata in angu- lis germinis. Caps. 3locularis: femina duplici serie.

pag. 15.

- Post n. 1384. *Bocagea* Hilar. Cal. 3partitus vel subinteger. Pet. 6 duplici ordine. Stam. complanata. Antherae

2loculares. Baccae 1-3 distinctae 3spermac.
Anoncae.

Hornschuchia Nees. Cal. inferus coriaceus subtruncatus. Cor.
6partita duplici ordine. Antherae lineares sub-
sessiles. Fructus? *Familia?*

pag. 21.

Bromelia nudicaulis commutetur cum *Br. pyramidalis* Curt.: appo-
natur syn. *Br. nudicaulis* Ker.

nudicaulis 23. *Br. foliis lato-lanceolatis obtusis coriaceis*
enerviis lurido-viridis sursum nigro-spinuloso-
ferratis, scapo villoso supernè bracteis coloratis
vestito, spica simplici terminali, calycibus acu-
tis uncinulatis. Inf. Carib. Hook. exot. fl.
t. 143.

pag. 22.

Ad *Pitcarniam* Herit.

albiflora * 12. *P. foliis lineari-lanceolatis acuminatis integer-*
rimis glaberrimis, pedunculis laevibus bracteas
superantibus, petalis revolutis, stylo stamina ex-
ferta excedente. Brasil. (P. albiflos Bot. mag.
2642.)

pag. 24.

Ad *Tillandsiam*.

Post n. 11. *pulcra* Hook. 40. *T. foliis filiformi-setaceis canali-*
culatis laxiusculis tenuissime lepidotis, spica sim-
plici, bracteis (roseis) flore brevioribus, laciniis
corollae obtusis stamina superantibus. Inf. Carib.
Hook. exot. fl. t. 154.

Post n. 15. *bulbosa* Hook. 41. *T. foliis e basi latissima convoluto-*
subulatis flexuosis, spica simplici, bracteis viri-
dibus flores subaequantibus, genitalibus exsertis
corollam acutam superantibus. Inf. Carib. Hook.
exot. fl. t. 173.

Post n. 24. *nitida* Hook. 42. *T. foliis lingulatis nitidis integerri-*
mis scapoque paniculato glaberrimis, floribus
remotiusculis, calyce ovato bracteas excedente.
Jamaica. Hook. exot. fl. t. 218.

pag. 25.

Post n. 31. *aloacfolia* Hook. 43. *T. foliis lato-lanceolatis conca-*
vis longe acuminatis spiratim tortis rigidis obscu-
re fasciatis farinaceo-lepidotis, spica paniculata
flexuosa, floribus remotis, corolla apice revo-
luta calycem, genitalibus corollam superantibus.
Inf. Carib. Hook. exot. fl. t. 205. T. paniculata
proxima differt foliis brevioribus, corolla torta,
stigmatate bifulco. Plum. ic. 10. p. 233.

pag. 28.

Ad *Maffoniam longifoliam* Jacqu. M. *grandiflora* Lindl. bot. reg. 958. var.

pag. 31.

Ornithogalum corymbosum R. et P. melius sic definitur: O. foliis lineari-lingulatis canaliculatis prostratis, corymbo 6floro, bracteis cordatis pedicello brevioribus, petalis latissimis undulatis, filamentis subulatis. *Peru. Chili.* Bot. reg. 906.

pag. 33.

Ad *Ornithogalum hispidum* Hornem. (O. *Bergii* Schlechtend.)

pag. 34.

Ad *Allium*.

Post n. 16. *Sulvia* Hamilt. 97. A. foliis lineari-loriformibus planis glabris, scapo tereti laevi, umbella patula multiflora. *Nepal.*

pag. 40.

Ad *A. moschatum*. (A. *parciflorum* Viv.)

pag. 41.

Ad *Yuccam*.

Post n. 2. *glauca* Noif. 18. Y. foliis lanceolatis flaccidis glaucis, floribus subglobofis patentibus. *Carolina.* Bot. mag. 2662.

pag. 44.

Ad *Narcissum triandrūm*. N. *Macleai* Ker. var.

pag. 47. 48.

Ad *Pancreatium flavum* R. et P. (*Chrysiophiala flava* Bot. reg. 778.)

Post n. 33. *Herbertianum* * 37. P. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis, scapo tereti 2floro, corolla cernua staminibus rectis brevioribus, coronae brevis dentibus 2fidis. *Peru.* (*Stenomesson curvidentatum* Herbert in bot. mag. 2640., *Chrysiophiala pauciflora* Hook. exot. fl. t. 132.)

Leucoium trichophyllum Brot. spatha multi-non 1flora. Habitat et in Sardinia et Corfica.

pag. 49.

Ad *Amaryllida*.

A. *Atamasco*. *Zephyranthes striata* Bot. mag. 2593. var.

A. *candida* Ker. *Zephyranthes verecunda* Bot. mag. 2583. var.

carinata * 64. A. scapo 1floro foliis linearibus canaliculatis flaccidis breviori, spatha apice fisso-cancellata,

- tubo erecto subringente, staminibus declinatis.
Mexico. (Zephyranthes Bot. mag. 2594.)
rosea * 65. A. scapo 1floro folia linearia obtusa flaccida
 superante, spatha 2fida, corolla erecta regulari,
 laciniis ovalibus patentibus, stylo declinato. *Cuba.*
 (Zephyranthes rosea Lindl. bot. reg. 821.)
 Ad A. *minutam* Humb. (Zephyranthes grandiflora Bot. reg. 902.)

pag. 50.

- Post n. 12. *versicolor* * 66. A. foliis linearibus flaccidis, scapo
 tereti, spatha angusta, corolla nutante campu-
 nulata subirregulari. *Ad fl. Platam.* (Habran-
 thus Herb. in Bot. mag. 2485.)
 Ad A. *Reginae.* A. Carnarvonica Cand. hort. genev. t. 9. hybrida.
 Ad A. *miniatam* R. et P. (Hippeastrum subbarbatum Herb. in bot.
 mag. 2475.)
gracilis * 67. A. foliis gracilibus semicylindricis erectis, sca-
 po tereti, corolla campanulata erecta, stamini-
 bus declinatis inaequalibus. *Ad fl. Platam.*
 (Habranthus gracilifolius Herb. in bot. mag.
 2464.) Habr. angustus ib. 2639. var.

pag. 51.

- Ante n. 28. *bifida* * 68. A. scapo 4floro tereti, foliis linearibus
 flaccidis, spatha 2fida, floribus pedicellatis tu-
 bulosis cernuis, fauce squamata, staminibus de-
 clinatis inaequalibus. *Bouaria.* (Habranthus bi-
 fidus Herb. in bot. mag. 2597.)
 A. *cyrtanthoides* Sims. et *igneae* Lindl. ad Phycellam Lindl. redu-
 cuntor.

pag. 52.

- Post n. 44. *lineata* Coll. 69. A. spatha multiflora, floribus pedun-
 culatis, limbo aperto tubum superante, laciniis
 vittatis, genitalibus declinatis. *C. B. S.*

pag. 53.

- Post n. 58. *intermedia* * 70. A. foliis elliptico-oblongis costato-
 reticulatis in petiolum decurrentibus, scapo com-
 presso, floribus subcapitatis, laciniis oblongis
 obtusis. *Brazil.* (Griffinia Lindl. in bot. reg.
 990.)

pag. 54.

- Ad A. *striatam* Jacqu. (Brunsvigia minor Lindl. in bot. reg. 954.)

Post *Amaryllida*:

PHYCELLA Lindl.

igneae Lindl. (Amaryllis ignea p. 51.)*cyrtanthoides* Lindl. (Amaryllis cyrtanthoides Sims. p. 51.)Ad *Crinum*.

- Ad Cr. *crubescens* Ait. Cr. submersum Herb. in bot. mag. 2463. var.

Ad *Cr. deflexum* Ker. *Cr. elegans* Herb in bot. mag. 2592. var.

Ante n. 9. *strictum* Herb. 28. *Cr. bulbo ovato, foliis lanceolatis erectis abbreviatis, umbella pauciflora, tubo limbum superante, stylo stamina subaequante. Ceilon. Bot. mag. 2635.*

pag. 55.

Ad *Cr. flaccidum* Herb. *Cr. confertum* Herb. in bot. mag. 2522. var.

Post n. 23. *humile* Sims. 29. *Cr. bulbo sphaerico, foliis lineari-lanceolatis lacunosis marginè laevibus depresso, umbella multiflora, tubo limbum superante, laciniis angustis. Ind. or. Bot. mag. 2636.*

pag. 56.

Post n. 25. *undulatum* Hook. 30. *Cr. scapo compresso foliis lineari-lanceolatis canaliculatis breviori, tubo corollae longissimo, limbi laciniis erectis acutis undulatis. Amer. austr. Hook. exot. fl. t. 200.*

pag. 57.

Ad *Strumariam spiralem* Ker. (*Hessea spiralis* Berg. in *Linnaea* p. 252.)

pag. 58.

Ad *Cyrtanthum* Ait.

Post n. 3. *striatus* Herb. 8. *C. foliis linearibus subtus maculatis scapoque coloratis, floribus umbellatis cernuis, tubo costato striato, dentibus limbi obtusiusculis, genitalibus exsertis. C. B. S. Bot. mag. 2534.*

Ad *C. collinum* Burch. (*C. pallidus* Bot. mag. 2471.)

pag. 59.

Ad *Hypoxis*.

Post n. 3. *minor* Don. 25. *H. scapo capillari foliis linearibus acutis villosis triplo breviori, perianthio villoso, antheris filamenta superantibus. Nepal.*

pag. 60.

Ad *Curculiginem fascicularem* * (*Colchicum fasciculare* R. Br. ad Denham. it. p. 243.)

Ad *C. ensifoliam* R. Br. (*C. stans* Labill. nov. Caled. t. 24.)

pag. 61.

Ad *Lilium*.

Post n. 5. *cordifolium* Thunb. 23. *L. caule sub-4floro, foliis petiolatis cordatis acuminatis venosis, floribus sessilibus campanulatis, laciniis elongatis. Japon. Nepal. (Hemerocallis cordata Thunb. japon.)*

L. japonicum Thunb, habitat et in *Nepal*.

pag. 62.

L. glabrum * est *L. Martagon* var. *pallida*.

pag. 63.

Ad *Fritillariam verticillatam* W. (Fr. *cirrhosa* Don.) *Nepal*.

pag. 64.

Post n. 16. *macrophylla* Don. 20. Fr. floribus subternis cernuis, petalis spathulato-oblongis mucronulatis, bracteis pedicellos superantibus, foliis sparsis linearilanceolatis elongatis glabris. *Nepal*.

pag. 65.

Ad *Gloriosam*.

Gl. simplex Don. videtur varietas *Gl. superbae*, foliis angustioribus. *Nepal*.

virescens Lindl. 3. *Gl.* foliis cirriferis, pedunculis pendulis, petalis apice undulatis. *Senegamb.* Bot. mag. 2539.

Ad *Hemerocalem*.

disticha Don. 3. *H.* foliis linearibus carinatis margine cartilagineis scabris, floribus spicatis, nervis corollae reticulatim nexis. *Nepal*.

pag. 67.

Ad *Scillam vernam*. (*S. fastigiata* Viv.)

Sc. undulata Desf. et *obtusifolia* Poir. habitant et in *Sardinia*.

pag. 78.

Ad *Uropetalum* Ker.

hyacinthoides * 4. *U.* floribus racemosis nutantibus, bracteis pedicellos superantibus, foliis binis linearisubulatis canaliculatis scapo longioribus. *C. B. S.* (*Polemannia hyacinthiflora* Berg. in *Linnaea*, p. 250.)

longifolium Lindl. 5. *U.* floribus laxo racemosis pendulis, petalis obtusis, foliis loriformibus acuminatis longissimis. *Afric. orient.* Bot. reg. 974.

pag. 80.

Ad *Alströmeriam*.

rosea Hook. 39. *A.* foliis linearibus subtortis, pedunculis elongatis 1floris subcorymbosis, petalis subspathulatis ferrulatis. *Chili.* Hook. exot. fl. t. 181.

pag. 84.

Ad *Anthericum*.

Post n. 23. *nepalense* * 36. *A.* radice fasciculata, foliis linearilanceolatis scapum aequantibus, floribus race-

moſis cernuis, bracteis elongatis, petalis oblongis obtuſis. *Nepal.* (Phalangium Lindl. in bot. reg. 998.)

pag. 91.

Ad *Conantheram* R. et P.

- † *campanulata* 4. C. foliis lineari-lanceolatis acuminatis longiſſimis flaccidis, floribus racemoſis nutantibus, corolla 1petala campanulata, limbo aequaliter globo. *Chili.* Hook. exot. fl. t. 214. (C. bifolia Bot. mag. 2496.)

pag. 93.

Ad *Dracaenam*.

- Poſt n. 14. *ſtricta* Sims. 18. Dr. caule fruticoſo ſtricto, foliis confertis lineari-lanceolatis cuſpidatis margine ſcabra, racemo composito multifloro. *Nov. Zeeland.* Bot. mag. 2575.

pag. 96.

Ad *Aſparagum*.

- Poſt n. 21. *ſilicinus* Hamilt. 28. A. caule erecto ramoſiſſimo, foliis quinis inaequalibus lineari-falcatis mucronatis Inerviis, pedunculis axillaribus ſubſolitariis folio brevioribus. *Ind. or. Nepal.* (A. Curillus Roxb.)

Ad *Convallariam*.

- Poſt n. 2. *leptophylla* Don. 15. C. caule tereti glabro, foliis quaternis linearibus acuminatis longiſſimis, pedunculis elongatis ſubquaternis bifloris pendulis. *Nepal.*

pag. 97.

Ad *Ophiopogonem* Ker.

- intermedius* 3. O. foliis linearibus obtuſis ſtrictis ferrulatis, ſcapo 3quetro foliis duplo breviori, racemo paucifloro, bracteis flore brevioribus, ſtylo corollam aequante. *Nepal.*

pag. 98.

Ad *Uouliariam*.

- Ad U. *parviſloram* Wallich. (Diſporum parviſlorum Don.)
Pitſutu Hamilt. 9. U. foliis petiolatis ovato-lanceolatis acuminatis, umbellis multifloris, pedicellis flore brevioribus, filamentis elongatis. *Nepal.* (Diſporum Pitſutum Don.)

Ad *Streptopoda* Mx.

- † *ſimplex* Don. 4. Str. caule ſimpliciſſimo, foliis amplexicaulibus ovato-lanceolatis acuminatis, pedunculis filiformibus elongatis. *Nepal.*

pag. 99.

Ad *Xerophytam* Juff.

- abietina* * 2. *X. perennis* ramosa, foliis imbricatis e basi lata villosa filiformi-trigonis ciliatis, floribus terminalibus sessilibus subsolitariis. *Alp. Brasfl.* (Vellotia abietina Mart.)
- plicata* * 3. *X. perennis* subramosa, foliis imbricatis linearilanceolatis plicatis margine carinulaque plicarum hirsutiusculis, floribus subsolitariis pedunculatis, germinibus longissimis. *Brasfl.* (Vellotia plicata Mart.)

pag. 101.

Ad *Smilacem*.

- Post n. 34. *ovalifolia* Roxb. 69. Sm. aculeis falcatis, foliis ovali-oblongis 3plinerviis, umbellis paniculatis folia subaequantibus. *Nepal.*

pag. 102.

- Post n. 44. *orbiculata* Labill. 70. Sm. caule sub-4gono, foliis subcordato-orbiculatis fusco-mucronatis 5nerviis, petiolis apice incrassatis, floribus ♀ umbellatis. *Nov. Caledon.*
- Post n. 51. *maculata* Roxb. 71. Sm. ramis sulcatis inermibus, foliis subpeltatis triangulari-ovatis 7nerviis, umbellis sessilibus spicatis folia superantibus. *Nepal.*

pag. 103.

Post *Peliosanthen* Andr.:

COMPSANTHUS *. (Compsoa Don.)

- maculatus* * *Nepal.* Herba hirsuta ramosa foliosa, foliis amplexicaulibus cordatis acuminatis, floribus terminalibus pedunculatis albis purpureo-maculatis.

MIERSIA Lindl.

- chilensis* Lindl. *Chili.* Herba acaulis e bulbo, foliis radicalibus linearibus, scapo umbellifero, floribus rubentibus.

pag. 104.

Ad *Juncum*.

- Post n. 7. *scheuchzerioides* Laharp. 66. J. culmo brevissimo, foliis filiformibus, spicis subbinis 3-5floris, sepalis ovato-lanceolatis mucronatis capsulam subglobosam aequantibus. *Inf. Falkland.*

pag. 106.

- Post n. 24. *concinus* Don. 67. J. culmo tereti oligophyllo striato, foliis teretibus articulatis, fasciculo terminali multifloro, involucre polyphyllo scariofo abbre-

viato, sepalis obtusis, capsula triquetra stylo elongato coronata. *Emodi montes.*

- Ante n. 50. *conglomeratus* 68. J. culmo aphylo subtiliter sulcato laxe farcto, panicula laterali composita glomerata, floribus 3andris, sepalis acuminatis, capsula obovato-truncata apiculata. *Europ. Asia. America.* (J. communis a. Meyer., glomeratus Thb., bogotenfis Humb.)
- effusus* 69. J. culmo aphylo laevi laxe farcto, panicula laterali composita patente, floribus 3andris, sepalis acuminatis, capsula obovato-truncata depressa submucronata. *Europ.* (J. communis β. Meyer.)
- diffusus* Hopp. 70. J. culmo aphylo subtiliter sulcato farcto, vaginis radicalibus atropurpureis, panicula laterali patente, floribus 6andris, sepalis acuminatis, capsula obovata stylo coronata. *Ad Danubium.*

pag. 115.

Ad *Tradescantiam.*

- Post n. 2. *barbata* * 31. Tr. caule procumbente ramoso hinc villoso, geniculis barbatis, foliis linearibus acutis subtus vaginisque villosiusculis, pedunculis solitariis. *Nepal.* (Cyanotis barbata Don.)

pag. 116.

- Ad Tr. *villosam* * Patria: *Ind. or.*

pag. 119.

Ad *Berberin.*

- Post n. 1. *iberica* Stev. 34. B. spinis simplicibus 3partitisque, foliis obovato-oblongis mucronatis integerrimis, racemis pendulis multifloris. *Caucas.*
- Post n. 7. *glaucescens* Hilar. 35. B. racemis compositis pendulis, calycibus 8sepalis, foliis oblongis mucronatis integerrimis glaucescentibus. *Brazil.*
- Ad B. *latifoliam* R. et P. (B. coriacea Hilar.?)
- Ad B. *rufifoliam* Lam. (B. spinulosa Hilar.?)

pag. 120.

- Ad B. *nepalensem* * (B. Miccia Hamilt. Don.) Qui potnerit Donius Ilicem japonicam Thunb. huc trahere, haud intelligo. B. nepalensis * et in *Java* habitat.

pag. 121.

Ad *Cleomea.*

- Post n. 4. *affinis* * 60. Cl. glanduloso-pilosa, foliis ternatis quinatisque obovatis integerrimis glanduloso-ciliatis. *Java.* (Gynandropsis Blum.)

pag. 122.

- Ad Cl. *pentaphyllam.* Cl. Gandelabrum Bot. mag. 2656. var.

pag. 125.

Ad Cl. *viscosam*. (Polanisia Blum.)Post *Cleomen*:

STERIPHOMA *

- cleomoides* * 1. St. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis petiolo subaequantibus. *Caracas*. (Capparis paradoxo Jacq. Stephania W.)
- elliptica* * 2. St. foliis ellipticis petiolos duplo superantibus. *Inf. Trinit.* (Stéphania elliptica Cand.)

pag. 126.

Ad *Mabam* Forst.

- rufa* Labill. 10. M. fruticosa, foliis lanceolatis obtusiusculis coriaceis, junioribus ramulis baccisque solitariis breviter pedunculatis rufo-pilosis. *Nov. Caledon.*
- Ad *Amajouam corymbosam* Kunth. (? *Melanopfidium nigrum* Coll. hort. ripul. t. 35. Stigmata tria indicantur, quae filēt Kunthius.)

pag. 127.

Post *Cassupam* Humb.:

LEPTODERMIS Wallich.

- lanceolata* Wallich. *Nepal.* Frutex ramulis brevissimis fasciculatis, foliis ovatis acutis hispidis, floribus lateralibus sessilibus ternis. Quam Wallichius fl. ind. 2. p. 191. Sandram habet, Donius in fl. nepal. p. 138. Gandram pronunciat, *Hamiltoniae fruticosae* nomine.

Ad *Richardiam*.

- R. scabram* cum *pilosa* R. et P. eandem esse Mart. et Hilar., differre a sequentibus laciniis calycis 3angularibus.
- rosea* Hilar. 2. R. ramis diffusis foliisque oblongis utrinque attenuatis hirsutis, verticillis multifloris, laciniis calycis lanceolatis. *Brazil.*
- emetica* Mart. 3. R. ramis hispidis, foliis ovato-lanceolatis mucronatis pilosiusculis, verticillis paucifloris, laciniis calycis linearibus. *Brazil.*

pag. 128.

Ad *Loranthum*.

- Post n. 6. *obmunitus* * 75. L. ramis teretibus strictis, foliis spatulato-linearibus apice incrassatis, pedunculis nutantibus subsecundis, calyce duplici, exteriori 3dentato. *Rio grande*. Sello.
- Post n. 11. *pendulus* Sieb. 76. L. ramis teretibus glabris, foliis oppositis lineari-lanceolatis longissimis coriaceis laevibus, pedunculis umbelliferis, corollis longissimis. *Nov. Holl.*

pag. 129.

L. bicolor Roxb. ad pentandros ablegandus.Post n. 27. *ampullaceus* Roxb. 77. *L. foliis breviter petiolatis oblongis glabris, racemis axillaribus solitariis folio brevioribus, tubo corollae gibbo, fructibus ovalibus. Silhet, prov. Ind. or.**retusus* Jack. 78. *L. foliis oppositis obovato-oblongis retusis glabris, racemis subsolitariis abbreviatis, tubo corollae gibbo, fructibus 1spermis. Ind. or.*

pag. 130.

Post n. 45. *patulus* Jack. 79. *L. foliis oppositis ovato-ellipticis glabris, racemis paniculatis, calyce bracteato integro. Sumatra.*

pag. 131.

Post n. 47. *odoratus* Wallich. 80. *L. foliis ellipticis obtusis spicas axillares superantibus, floribus patulis, stylo petalis breviori. Nepal. (L. viridiflorus Wallich.)**globosus* Roxb. 81. *L. foliis oppositis oblongis eveniis glabris, spicis axillaribus subsolitariis, floribus oppositis. Bengal.**corynitis* * 82. *L. caule gracili, foliis ovali-oblongis, floribus axillaribus paucis, corolla irregulari, fructibus clavatis. Silhet, provinc. Ind. or. (L. clavatus Roxb.)**coccineus* Jack. 83. *L. foliis alternis petiolatis ovato-oblongis obtusis glabris, spicis axillaribus, calyce subintegro. Peninsul. Malacc. Malayan miscell. 1. 8.**polystachys* Wallich. 84. *L. ramis teretibus punctatis, foliis obovatis obtusis, racemis axillaribus oppositis subfasciculatis folio brevioribus, fructibus globulosis. Ind. or.**pulverulentus* Wallich. 85. *L. superne stellato-tomentosus farinosus, foliis oppositis obovatis glabris nervosis, racemis lateralibus fasciculatis tomentosis. Nepal.*Post n. 55. *vesitus* Wallich. 86. *L. foliis oblongis acutis subtus ferrugineo-tomentosis, floribus fasciculatis tubulosis. Nepal. Inf. freti Malacc. (L. ferrugineus Roxb.)**ligustrinus* Wallich. 87. *L. foliis lanceolatis acutis glabris, racemis subumbellatis. Nepal.**cordifolius* Wallich. 88. *L. foliis cordato-ovalibus obtusis, racemis fasciculatis. Nepal.**umbellatus* Wallich. 89. *L. foliis elliptico-oblongis acutis, floribus fasciculatis. Nepal.*Post n. 57. *involutus* Roxb. 90. *L. foliis oppositis cordato-ovatis breviter petiolatis glabriusculis, umbellis axillaribus subsessilibus, involucre 4phylo 4floro, calyce corollaeque tubo villosis. Bengal.**pentapetalus* Roxb. 91. *L. foliis oppositis subcordato-oblongis glabris, racemis axillaribus folia aequantibus, petalis 5 basi in corpus trigonum intumescens, antheris obovatis, fructibus oblongis. Silhet, Nepal.*

cylindricus Jack. 92. L. foliis alternis petiolatis lanceolatis utrinque attenuatis, racemis axillaribus divaricatis folia aequantibus, limbo corollae tubum superante. *Sumatra.*

incarnatus Jack. 93. L. foliis alternis petiolatis ovatis acutis, junioribus stellato-pubescentibus, racemis spicatis hirsutis, tubo corollae limbum superante. *Inf. freti Malacc.*

bracteatus Heyn. 94. L. stellato-tomentosus, foliis alternis longe petiolatis obovatis obtusis, umbellis axillaribus, bractea elongata lingulata. *Ind. or. Roxb. fl. ind. 2. p. 220.*

pag. 133.

Ad *Triplasiām* Lour.

farmentosa Blum. 3. Tr. arborea aculeata, ramis farmentosis, foliis simplicibus ternatisque oblongis acuminatis integerrimis, corymbis axillaribus, corolla tripetala. *Java.*

pag. 134.

Ad *Frankeniam*.

Ad Fr. *Nothriam* Thunb. (Fr. *Krebelli* Schlechtend.)

pag. 135.

grandifolia Chamiff. 17. Fr. caule suffruticoso prostrato, foliis oppositis obovatis mucronatis margine revolutis subcoriaceis pubescentibus, ramis calycibusque solitariis hirtis. *Nov. Californ.*

pag. 136.

Post *Atraphaxin*:

SOULAMEA Lam.

amara Lam. *Java. Inf. Molucc.* Frutex foliis oblongis integerrimis, floribus racemosis albidis. (Rex amaroris. Rumph.)

pag. 142.

Deleatur *Cymation* *.

pag. 143.

Ad *Colchicum*.

Post n. 7. *Ritchii* R. Br. 8. C. foliis linearibus, spatha submultiflora, appendicibus laciniarum corollae fimbriato-cristatis. *Numidia. Denham it. p. 241.*

Ad *Androcymbium* W.

leucanthum W. 3. A. foliis ovato-lanceolatis undulatis tenuissime fimbriatis, floribus subternis breviter pedicellatis bracteatis. *C. B. S. (Melantherium capense L., Anaguillaria capensis * p. 146.)*

Ad *Tofieldiam* Hudf.

Post n. 3. *coccinea* Richardf. 9. T. scapo subfoliato colorato, foliis lineari-lanceolatis, floribus capitatis subseffilibus, calyculo 3fido. *Ad oras maris glacialis Amer. arctic.*

pag. 145.

Ad *Triglochin*.

filifolium Sieb. 13. Tr. scapo folia lineari-filiformia superante, floribus racemosis, fructibus ovatis, stigmatibus persistentibus. *Nov. Holl.*

pag. 146.

Ad *Melanthium*.

M. uniflorum Jacqu. deleatur, reediturum sub *Kolbea* Schlechtend.

M. punctatum Cav. (*Erythrostictus punctata* Schlechtend.)

M. gramineum Cav. (*Erythrostictus graminea* Schlechtend.)

M. ciliatum Thunb. floribus punctatis, cornibus fructus retrorsum versis.

Post n. 7. *Bergii* Schlechtend. 12. M. foliis radicalibus lineari-lanceolatis papilloso-ciliatis, scapo superne sulcato, spica terminali pauciflora, floribus epunctatis, cornibus erectis. *C. B. S.*

marginatum Schlechtend. 13. M. foliis radicalibus lanceolatis vaginantibus cucullatis papilloso-ciliatis, scapo sulcato basi foliato, floribus laxo spicatis, germinibus acutangulis subulatis. *C. B. S.*

rubicundum W. 14. M. foliis oblongo-lanceolatis basi cucullatis ciliatis, scapo angulato papilloso, floribus spicatis secundis. *Afric. austr.*

Ad *Anguillarum biglandulosam* R. Br. (*Pleea Sieberi* Reichenb. in Sieb. fl. nov. holl. n. 156.)

Anguillaria capensis * deleatur. Est *Androcymbium leucanthum* W.

pag. 147.

Post *Anguillarum* R. Br.:

KOLBEA Schlechtend.

Breyniana Schlechtend. *Afric. austr.* Herba simplex e bulbo, caule folioso sub-1floro, foliis lineari-lanceolatis longissimis, flore puniceo-croceo. (Tulipa *Breyniana* L., *Melanthium uniflorum* Jacqu. Syst. 2. p. 146. excl. syn. Desrouff., *Melanthium aethiopicum* Thunb.)

Ad *Zigadenum* Mx.

chloranthus Richardf. 3. Z. caule subaphyllo folia radicalia linearia glauca superante, racemo subcomposito, bracteis lanceolatis. *Amer. arctic.*

Ad *Ornithoglossum* Salisb.

O. viride mutetur in *glaucum* Salisb. (*Lichtensteinia laevigata* W., *Cymation laevigatum* Syst. 2. p. 142.)

undulatum Schlechtend. 2. (*Lichtensteinia undulata* W., *Cymation undulatum* Syfl. 2. p. 142.)

Ad *Wurmbearum* Thunb.

truncata Schlechtend. 4. W. foliis lineari-lanceolatis, spica pauciflora flexuosa, floribus distantibus, laciniis limbi basi distantibus tubo longioribus. C. B. S.

pag. 153.

Ad *Dioscoream*.

Post n. 29. *Elephantopus* * 43. D. glaberrima, caudice maximo subrotundo, foliis reniformi-cordatis acutis 7nerviis utrinque nitidis, racemis ♂ axillaribus. *Afric. austr.* (Tamus Herit. Ait. Syfl. 3. p. 905., *Testudinaria* Burch. Lindl. bot. reg. 921.)

† *montana* * 44. D. foliis reniformi-cordatis obsolete nervosis subtus glaucis. *Afric. austr.* (*Testudinaria* Burch.)

pag. 155.

Ad *Menispermum*.

Post n. 5. *coriaceum* * 51. M. foliis cordato-ovatis mucronulatis coriaceis glabris, racemis elongatis solitariis pendulis. *Java.* (Cocculus Blum.)

Post n. 12. *lanuginosum* * 52. M. lanatum, foliis late ovatis rectis, corymbis axillaribus folio multo brevioribus. *Java.* (Cocculus Blum.)

ovalifolium * 53. M. foliis ovalibus integerrimis mucronatis 3nerviis glabris, ramulis villosis, pedunculis terminalibus paniculatis, pedicellis umbellatis. *Java.* (Cocculus Blum.)

pag. 156.

Post n. 26. *corymbosum* * 54. M. foliis subpeltatis cordato-subrotundis mucronulatis 5nerviis, corymbis axillaribus solitariis folio minoribus, pedicellis subumbellatis. *Java.* (Cocculus Blum.)

rimosum * 55. M. foliis subpeltatis ovali-oblongis acutis coriaceis glabris, racemis paniculatis axillaribus folio brevioribus, caule rimoso. *Java.* (Cocculus Blum.)

glaucescens * 56. M. foliis subpeltatis cordato-orbiculatis mucronatis glabris subtus glaucis, racemis paniculatis folia superantibus. *Java.* (Cocculus Blum.)

bantamense * 57. M. foliis subcordato-ovalibus acutis sub-5nerviis integerrimis glabris, paniculis elongatis axillaribus solitariis. *Java.* (Cocculus Blum.)

pag. 158.

Post *Lordizabalam* R. et P.:

BOCAGEA Hilar.

alba Hilar. 1. B. arborefcens, foliis ovato-lanceolatis acutis glabris, pedunculis subternis paucifloris, petalis interioribus angustioribus apice 3quetris. *Brazil.*

- viridis* Hilar. 2. *B. fruticosa*, foliis ovato-lanceolatis acutis subtus pilosis, pedunculis subfoliariis cernuis, petalis interioribus latioribus. *Brasil.*
- javenfis* * 3. *B. fruticosa*, foliis ovato-lanceolatis, pedunculis subracemosis, petalis interioribus majoribus unguiculatis apice cohaerentibus. *Java.* (*Orophea hexandra* Blum.)
- enneandra* * 4. *B. fruticosa*, foliis oblongis, pedunculis sub-3floris, pedicellis fasciculatis, floribus enneandris. *Java.* (*Orophea enneandra* Blum.)

HORNSCHUCHIA Nees.

- Bryotrophe* Nees. 1. *H.* foliis basi inaequalibus oblongis acuminatis triplinerviis subtus ad venas pubescentibus, pedunculis radicalibus racemosis. *Brasil.* *Denkw. der bot. Gef. in Regensb. 2. t. 11.*
- Myrtillus* Nees. 2. *H.* foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis reticulato-venosis subtus ramisque pubescentibus, pedunculis 1floris lateralibus. *Brasil.* *Denkw. der bot. Gef. in Regensb. 2. t. 12.*

Ad *Rumicem.*

- Post n. 4. *montevidenfis* * 60. *R.* valvis oblongis obtusis graniferis reticulatis, ramis angulatis asperis, pedunculis verticillatis, foliis oblongis undulatis subcrispis. *Monte Video.* Sello.

pag. 159.

- Ad *R. nepalensem* * (*R. hamatus* Trevir.)
R. aegyptiacus habitat et in *Sardinia.*
 Ad *R. scutatatum.* (*R. hastatus* Don.) *Nepal.*

pag. 163.

Ad *Alifna.*

- Post n. 4. *reniforme* Don. 10. *A.* foliis longe petiolatis reniformibus nervosis glabris, scapo elongato paniculato, pedunculis oppositis ternisque, fructibus trigonis obtusis. *Nepal.*

C L A S S I S VII.

pag. 164.

n. 1393. *Disandra* del.n. 1397. *Pancovia* W. melius ad *Afzeliam* Sm. p. 279. n. 1633. ablegatur.

pag. 165.

n. 1405. *Astranthus* Lour. satius *Decandris pentagynis* adnumeratur. Bot. mag. 2659.

pag. 166.

Disandra prostrata del. in cl. V. jam collocata.

pag. 168.

Ad *Pisoniam*.Ad *P. Pacurero* Humb. (*P. eucalyptifolia* Kunth.)Ad *P. aculeatam*. (*P. loranthoides* Kunth.)Ad *Petiveriam alliaccam*. (*P. tetrandra* Gomez. var. *levis*.)

C L A S S I S VIII.

pag. 170.

Post n. 1417. *Corallophyllum* Kunth. Cal. 8partitus coloratus. Cor. calyce minor tubulosa, limbo 8dentato. Stam. cor. inserta. Antherae biloculares. Stigma capitatum. Germen superum multiloculare, loculis 1permis.

pag. 171.

1420. *Cytinus* melius ad cl. XVI. *Monadelphiam* amandatur.1425. *Sodada* Delil. cum *Capparide* aptius conjungitur.1426. *Physofemon* Mart. Stam. declinata.1430. *Vitmannia* Vahl. *Rutaceis* adnumeratur.1431. *Elvasia* Cand. Antherae poris apice dehiscentes. *Ochneae* Hilar.

pag. 172.

Post n. 1446. † *Acrozus* * (*Acronodia* Blum.) Flores dioeci. ♂ Cal. 4sepalus. Pet. 4 linearia apice erosa. Antherae lineares pubescentes.

pag. 173.

- Post n. 1456. *Diplopetalon* * (Dimereza Labill.) Cal. 5sepalus persistens bracteatus. Pet. 10 duplici serie, exter. orbiculata, inter. 2partita apice 2callosa. Discus glandulosus 3-4fidus peristemon. Capf. coriacea 3valvis 3sperma. *Sapindae*.
- n. 1465. *Luxemburgia* Hilar. melius ad cl. XIII.

pag. 175.

- n. 1494. *Codia* Forst. Rec. commune villosum. Involucrum partiale 1phyllum. Cal. tubulosus 4-5partitus. Petala 4, 5 summo calycis tubo inserta. Stamina 8-10 gemina. Bacca sicca 4-5locularis, femine perfecto sublingulari. *Onagrae* Labillard.
- n. 1497. *Hermesia* Humb. jungenda cum *Alchornea* Sw. Syst. 3. n. 2381.
- Post n. 1498. *Astilbe* Don. Cal. 4partitus coloratus. Cor. 0. Antherae 2loculares. Capf. supera 2locularis 2rostris polysperma. *Saxifrageae*.
- n. 1499. *Marathrum* Humb. ad *Lacida* Schreb. n. 1980. ablegendum.

pag. 187.

Ad *Ericam*.

- E. *Coventria* Andr. (E. bucciniflora Bot. mag. 2465.)

pag. 192.

E. *incurva* Wendl. (non Andr.)

- Post n. 196. *sphaerantha* * 310. E. foliis linearibus obtusis erectis glabris, ramis villosis, floribus subcorymbosis terminalibus, calycibus ciliatis, corollis globosis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

pag. 196.

- Post n. 245. *appressa* * 311. E. foliis minutis subellipticis obtusis incano-pubescentibus arcte appressis, floribus terminalibus aggregatis, calycibus lanatis, corollae pubescentis limbo contracto, staminibus inclusis, stylo exserto. *C. B. S.*

pag. 203.

Ad *Diospyron*.

- Post n. 9. *ferrata* Hamilt. 28. D. foliis lanceolatis acuminatis ferratis glabris, petiolis brevibus ramulisque villosis, pedunculis aggregatis lateralibus cernuis calycibusque hirsutis, stylo 3fido. *Nepal*.
- serafifolia* Don. 29. D. foliis oblongis acuminatis integerrimis, petiolis brevibus ramulisque pubescentibus, pedunculis aggregatis lateralibus cernuis calycibusque pubescentibus, stylo 3fido. *Nepal*.

Post n. 20. *vaccinioides* Hook. 30. D. fruticosa, ramis flexuosis foliisque ovatis integerrimis nitidis subtus rufo-villofis, floribus sessilibus solitariis 4andris, fructibus 3locularibus. *China*. Hook. exot. fl. t. 139.

pag. 205.

Ad *Mimosam*.

Post n. 6. *adhaerens* Kunth. 45. M. aculeata fruticosa, foliis conjugato-pinnatis, foliolis bijugis dimidiato-obovatis mucronatis strigillofis, petiolis inermibus villosis, capitulis solitariis. *Ad Orinocum*.

M. *tetrandra* Humb. ad M. *pubicam* Kunth.

M. *polystachya* ad *Entadam* Syst. 2. p. 325.

pag. 206.

Ad M. *somniantem* Humb. (M. *somniculosa* Kunth.)

pag. 208.

Ad *Chloram perfoliatam*, Chl. acuminata, serotina et lanceolata Koch. varietates leves, quae foli diversitate cultuque nascuntur juxta ac evanescent.

CORALLOPHYLLUM Kunth.

coeruleum Kunth. *Mexico*. Caules caespitosi carnosif basi foliis laciniatis vestiti, flores sessiles coerulei. Forte moustrum. (Humb. nov. gen. 7. t. 660. b.)

pag. 210.

Ad *Vaccinium*.

Post n. 16. *canadense* Richardf. 49. V. foliis lanceolatis integerrimis utrinque pubescentibus, racemo terminali, floribus fasciculatis, stylo incluso. *Amer. arctic.*

pag. 212.

Post n. 36. *fulcinum* Chamiss. 50. V. foliis lanceolatis cuspidatis basi attenuatis coriaceis integerrimis glabris venoso-reticulatis, pedunculis axillaribus abbreviatis. *Ora occ. Amer. bor.*

V. *brasiliense* * deleatur, rediturum sub *Luffacia* p. 294.

pag. 213.

Sodada decidua Forsk. melius *Capparis Sodada* R. Br.

Physostemon lanceolatus Mart. — stylo persistente brevissimo.

Ph. *tenuifolius* Mart. — stylo filiquam aequantes.

Ph. *rotundifolius* Mart. — filiqua stylum superante.

Ad *Xylocarpum* Schreb.

Ante n. 1. *obovatus* * 3. X. foliis sub-2jugis obovatis coriaccis. *Java*. (Garapa obovata Blum.)

pag. 214.

Ad *Tetrathecam* Sm.

denticulata Sieb. 6. T. foliis oppositis linearibus revolutis subdenticulatis ramulisque pilosiusculis, calycibus lanceolatis acutis glandulosis. *Nov. Holl.*

Ad *Boroniam* Sm.

- Post n. 3. *floribunda* Sieb. 14. B. foliis sub-3jugis, petiolo marginato, foliolis lineari-lanceolatis mucronatis ferrulatis, pedunculis ternis. *Nov. Holl.*
- microphylla* Sieb. 15. B. foliis sub-6jugis, foliolis minutis obovatis mucronatis, pedunculis ternis. *Nov. Holl.*

pag. 215.

- Post n. 5. *triphylla* Sieb. 16. B. foliis ternatis linearibus subtus revolutis tomentosis, pedunculis axillaribus 1floris. *Nov. Holl.*

Ad *B. polygalacfoliam* Sm. *B. hyssopifolia* Sieb. var.

pag. 216.

Ad *Jamboliferam pedunculatam* L. (*Cyminofma* Gärtn. Cand.)

pag. 217.

Ad *Amyridem*.

A. polygama Cav. (*Schinus dependens* Ort. *Duvaua* Kunth.) Flores trigyni.

- Post n. 4. † *Caraña* Humb. 28. A. foliis ternatis, foliolis oblongis acuminatis glabris epunctatis supra nitidis subtus albo-pruinosis. *Ad Orinocum.* (*Icica?* *Caraña* Kunth.)

pag. 218.

Ad *A. ambrosiacam* L. (*Icica Tacamahaca* Kunth.)Ad *A. altissimam* W. (*Icica macrophylla* Kunth.)

- Post n. 20. *pinnata* Kunth. 29. A. foliis 3jugis pellucido-punctatis glabris, foliolis ovatis obsolete crenulatis acutiusculis, petiolis ramulisque pubescentibus, paniculis axillaribus. *Amer. tropic.*

fagaroides * 30. A. foliis 3jugis glabris, foliolis ovatis obtusis crenato-ferrulatis reticulato-venosis epunctatis, pedunculis axillaribus aggregatis brevissimis reflexis, fructu sub-3valvi. *Mexico.* (*Elaphrium fagaroides* Kunth.)

† *graveolens* * 31. A. foliis 3jugis glabris epunctatis, foliolis oblongis acuminatis grosse crenato-ferratis reticulato-venosis, petiolo superne alato. *Ad fl. Magdalen.* (*Elaphrium* Kunth.)

pag. 219.

Ad *A. Elaphrium* * (*Elaphrium glabrifolium* Kunth.)Ad *A. tomentosam* * (*Elaphrium Jacquinianum* Kunth.)Ad *A. copalliferam* * (*Elaphrium excelsum* Kunth.)

zorullensis * 32. A. foliis sub-8jugis villosis rugosis, foliolis oblongis obtusis duplicato-crenatis supra incanis subtus rufescentibus, petiolo interrupte alato, alis crenatis, pedunculis axillaribus paucifloris. *Mexico.* (*Elaphrium zorullense* Kunth. in Humb. nov. gen. 7. t. 612.)

- † *ariensis* * 33. A. foliis 5-7jugis villosis, foliolis oblongis acutis crenato-ferratis, petiolo subalato, alis integerrimis. *Mexico*. (Elaphrium Kunth.)
- † *lanuginosa* * 34. A. foliis sub-6jugis supra villoso-tomentosis subtus petioloque albido-lanatis, foliolis oblongis crenatis, panícula terminali glomerata. *Nov. Hispan.* (Elaphrium Kunth.)

Post *Amyridem*:

† ACROZUS *. (Acronodia Blum.)

- punctatus* * *Java*. Arbor foliis lanceolatis ferratis subtus punctatis, racemis axillaribus simplicibus. (Acronodia punctata Blum.)

pag. 220.

Ad *Bäckeam*.

- Post n. 2. *pinifolia* * 6. B. foliis oppositis lineari-filiformibus nigrescentibus, pedunculis axillaribus 3floris. *Nov. Caledon.* (Leptospermum Labill.)
- Ad B. *virgatam* Ker. Leptospermum parvulum Labill. nov. *Caledon.* t. 6l. var. 10andra.
- trichophylla* Sieb. 7. B. foliis oppositis alternisque lineari-fetaceis patulis glaberrimis, pedunculis axillaribus solitariis abbreviatis. *Nov. Holl.*
- spinosa* Sieb. 8. B. foliis fasciculatis (pathulatis coriaceis glabris, ramis angulatis (pinescentibus, racemis axillaribus terminalibusque compositis. *Nov. Holl.*
- fasciculata* Sieb. 9. B. foliis imbricato-fasciculatis fetaceis apice incurvo-mucronatis glabris, pedunculis axillaribus aggregatis. *Nov. Holl.*
- carnosula* Sieb. 10. B. foliis 4fariam imbricatis breviter petiolatis teretibus carnosis abbreviatis gibbis glanduloso-tuberculosis, floribus axillaribus subsessilibus. *Nov. Holl.*
- microphylla* Sieb. 11. B. foliis 4fariam imbricatis basi scariosa subdecurrentibus triquetris obtusiusculis glanduloso-punctatis ciliatis, pedunculis terminalibus aggregatis. *Nov. Holl.*

pag. 221.

Ad *Cupaniam*.

- Post n. 5. *Poiretii* Kunth. 12. C. foliis pinnatis sub-4jugis, foliolis oblongis acutis coriaceis supra nitidis subtus glabriusculis, ramis racemisque paniculatis ferrugineo-tomentosis. *Inf. Trinit. Guadalup.* (Robinia rubiginosa Poir. *Syst. veg.* 3. p. 247.) *Ann. des scienc. nat.* 1. p. 457.
- Post n. 11. *apetala* Labill. 13. C. foliis sub-6jugis ovato-lanceolatis glabris, racemis abbreviatis, floribus polygamis apctalis. *Nov. Caledon.*

DIPLOPETALON *. (Dimereza Labill.)

glaucum * *Nov. Caledon.* Frutex foliis subbinatis bijugisque lanceolatis subtus glaucis, floribus paniculatis. (Dimereza glauca Labill. nov. Caledon. t. 51.)

Ad *Thouiniam* Poit.

Post n. 2. *dioeca* Mart. 8. Th. foliis simplicibus oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glabris remote spinuloso-ferratis, petiolis apice articulatis, floribus racemosis dioecis. *Brazil.* Nov. act. nat. cur. 12. t. 4.

pag. 222.

Ad *Schmideliam* Cobbe Cand. petalis (haud glabris sed) intus villosis. (Ornitrophe panigera Labill. nov. Caledon. t. 52.) Folia vero haud sunt subtus fasciatim tomentosa, sed ad axillas venarum barbato-pubescentia.

Ad Schm. *Cominiam* Sw. (Schm. viticifolia Kunth.) Pöppigius e Cuba veram attulit.

pag. 223.

Ad *Phacocarpum* Mart.

campestris Mart. 1. Ph. foliis impari-pinnatis ramisque pubescentibus, paniculae ramis fulvo-villosis. *Brazil.* (Magonia pubescens Hilar.)

glabratus * 2. Ph. foliis abrupte pinnatis glabriusculis, paniculae ramis pubescentibus. *Brazil.* (Magonia glabrata Hilar.)

pag. 224.

Ad *Acer*.

Ad *A. oblongum* Wall. (*A. laurifolium* Don.)

Ante n. 11. *acuminatum* Don. 31. *A.* foliis cordatis 3-5fidis glabris, laciniis duplicato-ferratis longe acuminatis, corymbis paucifloris erectis folio brevioribus, pedicellis suboppositis elongatis glabris. *Nepal.*

pag. 226.

Luxemburgia Hilar. (Plectanthera Mart.) in cl. XIII. enigret.

pag. 228.

Ad *Oenotheram*.

Post n. 10. *erosa* Horn. 47. *Oen.* caule ramoso diffuso glabriusculo, foliis subpetiolatis lanceolatis basi sinuato-dentatis glabris, capsulis sessilibus subsulcatis apice truncatis. *Patria?*

pag. 229.

Post n. 23. *rosco-alba* Bernh. 48. *Oen.* caule simpliciusculo, foliis petiolatis ovato-oblongis denticulatis, petala-

lis amplis crenulatis, capsulis sub-4gonis curvatis pubescentibus. *Nepal.*

pag. 230.

Post n. 39. *triloba* Bart. 49. Oen. subacaulis, foliis runcinatis glabris, petalis sub-3lobis, capsulis sessilibus 4alatis, alis 1dentatis. *Amer. bor.*

pag. 231.

Ad *Jussiaevum*.

Post n. 1. *longifolia* Cand. 22. J. caule squetro stricto foliisque lineari-lanceolatis integerrimis glabris, capsulis pedunculatis oblongis 4quetris. *Brazil.* Reichenb. hort. t. 67. Cand. hort. genev. t. 4.

ovalifolia Sims. 23. J. caule erecto ramoso, ramis 4gonis, foliis oblongis utrinque attenuatis venosis villosis, sepalis 3nerviis hirtis. *Madagascar.* Bot. mag. 2530.

Post n. 7. *ramosa* Jacqu. f. 24. J. caule herbaceo ramoso glabro, foliis lanceolatis venosis undulato-crenulatis, floribus axillaribus solitariis subsessilibus. *Brazil.*

pag. 233.

Ad *Epilobium*.

Ad *E. strictum* Mühlenb. (*E. molle* Torr.)

reticulare Wahlenb. 21. *E.* caule tereti, foliis lanceolatis elongatis subdenticulatis, petalis emarginatis calycem superantibus. *Ager upsal.*

nutans Schmidt. 22. *E.* caule tereti foliisque oppositis ovato-lanceolatis obtusiusculis integerrimis glabris, petalis emarginatis calycem superantibus. *Paludes Bohemiae.* (*E. hypericifolium* Taufsch.)

Post n. 13. † *brevifolium* Don. 23. *E.* caule tereti foliisque ovatis acutis ferratis supra lineatis utrinque pubescentibus, floribus axillaribus breviter pedunculatis, petalis calycem superantibus. *Nepal.*

Ad *E. tetragonum*. (*E. virgatum* Fr.)

Ad *E. davuricum* Fisch. (*E. cylindricum* Dou.)

pag. 234.

Ad *Fuchsia*.

Post n. 2. *arborescens* Sess. 12. *F.* foliis verticillatis oblongis acuminatis obsolete serrulatis glabris, panicula ampla terminali, petalis patentibus apiculatis, stigmate 4fido. *Mexico.* Bot. reg. 943. Bot. mag. 2620.

decussata R. et P. foliis subtus albidis, ramis rufo-tomentosis, floribus folia staminibusque calycem subaequantibus.

gracilis Lindl. 13. *F.* foliis oppositis longe petiolatis lanceolatis remote denticulatis utrinque glaberrimis, pedunculis axillaribus aggregatis longissimis pendulis, staminibus longe exsertis, ramis coloratis pubes-

centibus. *Mexico*. (F. decussata Graham. Bot. mag. 2507.) Bot. reg. 847.

pag. 237.

Ad *Daphnen*.

D. cannabina Lour. a Donio perperam *D. odorae* Thunb. accensetur.

Bholua Hamilt. 32. *D.* floribus terminalibus umbellatis sericeo-villosis, laciniis corollae subrotundis retusis, stigmate sessili capitato, foliis lanceolatis utrinque attenuatis coriaceis glabris. *Nepal*.

D. sericea Vahl. et in *Nepal*. habitat.

pag. 239.

Ad *Gnidiam*.

Post n. 17. *denudata* Lindl. 19. Gn. foliis bifariam oppositis lanceolatis erectis 3nerviis ciliatis demum glabris, floribus terminalibus aggregatis, laciniis corollae lanceolatis obtusiusculis ciliatis. *C. B. S.?* Bot. reg. 757.

pag. 242.

Ad *Dodonaeam*.

laurina Sieb. 11. *D.* foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glabris, ramis teretibus, ramulis ancipitibus, pedunculis cymosis axillaribus. *Nov. Holl.*

pag. 243.

Ad *Aspidistram* Ker.

punctata Lindl. 2. *A.* foliis longe petiolatis oblongis nervosis, floribus radicalibus solitariis 8fidis *China*. Bot. reg. 977.

pag. 245.

Ad *Lagettam* Juss.

junifera Mart. 2. *L.* fruticosa, foliis alternis subpetiolatis lanceolatis acutis subtus sericeis, floribus dioecis subracemosis. *Brazil*. (*Daphne brasiliensis* Radd.)

Ad *Codium montanum* Forst. cf. *eximiam* analysin iconemque Labill. nov. Caled. t. 46.

Ad *Weinmanniom*.

Ad *W. glabram*. (*W. caripensis* Kunth.)

Post n. 4. *pubescens* Kunth. 9. *W.* foliis impari-pinnatis 4-6jugis utrinque pilosis, foliolis elliptico-oblongis acutis ferratis, petiolo communi alato articulato, racemis folia aequantibus. *Caracas*.

hirtella Kunth. 10. *W.* foliis impari-pinnatis 4-7jugis supra glabris subtus pubescentibus, foliolis oblongis acutiusculis ferrulatis, petiolo communi alato arti-

culato, floribus fasciculato - racemosis. *Nov. Granat.*

- forbifolia*
Kunth. 11. W. foliis impari-pinnatis 3-4jugis glabris, foliolis oblongis acutiusculis basi attenuatis ferratis, petiolo communi alato articulato, ramulis glabris, floribus fasciculato-racemosis. *Nov. Granat.?*
- sagaroides*
Kunth. 12. W. foliis impari-pinnatis 3-6jugis glabris, foliolis parvis coriaceis obovatis apice crenatis, petiolo communi alato articulato, floribus corymbosis. *Peru.*
- microphylla*
Kunth. 13. W. foliis binatis ternatis bijugisque glabris, foliolis parvis coriaceis obovatis apice crenatis, petiolo communi subalato, pedunculis subsolitariis. *Peru.*
- heterophylla*
Kunth. 14. W. foliis simplicibus ternatisque membranaceis glabris, foliolis ovato-oblongis ferratis, lateralibus multo minoribus, petiolo superne alato, racemis erectis elongatis. *Nov. Granat.*
- W. racemosa* Forst. habet racemos folia superantes. Huc et *W. macrophylla* Kunth. ex *Amer. austr.* et ipsa *laurina* Ej. Nec *W. ellipticam* Ej. diversam habeo: racemorum enim longitudo variat.
- Balbifana*
Kunth. 15. W. foliis simplicibus oblongo-lanceolatis acuminatis argute ferratis coriaceis glabris, racemis strictis elongatis. *Peru.*

pag. 246.

Hermesia Humb. deletur. Prima species, monente Adr. Jussieuo, sub *Alchornea*, altera sub *Callicoma* militat.

Post *Galeniam*:

ASTILBE DON.

rivularis Don. *Nepal.* Herba pilosa, foliis biternatis, foliolis ovatis duplicato-ferratis, floribus spicato-racemosis ochroleucis.

Marathrum Humb. sub *Lacide* redibit.

pag. 248.

Ad *Serianam*.

Post n. 14. *letalis* Hilar. 20. S. foliolis oblongo-lanceolatis acuminatis subdentatis glaberrimis, petiolis nudis, racemis pubescentibus. *Brazil.*

pag. 250.

Ad *Paulliniam*.

Post n. 32. *australis* Hilar. 21. P. foliis supradecompositis glabris, foliolis inciso-ferratis pellucido-venosis, paniculis simplicibus paucifloris. *Brazil.*

pag. 253.

Ad *Coccolobam*.

Totnea Hamilt. 18. *C. fruticosa*, ramis hirsutis, foliis lanceolatis acuminatis utrinque pubescentibus, racemis paniculatis, pedunculis hirtis, laciniis calycis oblongis obtusis. *Nepal*.

Ad *Polygonum*.

Post n. 1. *petiolatum* Don. 95. *P. foliis* petiolatis cordato-oblongis acuminatis crenulatis, stipulis integerrimis acutiusculis, spica brevi, bracteis cuspidatis. *Nepal*.

amplexicaule Don. 96. *P. foliis* amplexicaulibus cordato-oblongis acuminatis crenulatis utrinque pubescentibus, stipulis integerrimis obtusis, spica brevi, bracteis cuspidatis. *Nepal*.

macrophyllum Don. 97. *P. foliis* lanceolatis obtusiusculis coriaceis integerrimis glabris, radicalibus longe petiolatis, stipulis integerrimis obtusis, spica ovata, bracteis cuspidatis. *Nepal*.

viscosum Hamilt. 98. *P. foliis* oblongo-lanceolatis obtusiusculis hispidis, stipulis truncatis, spicis abbreviatis, caule ramoso glanduloso hispidissimo. *Nepal*.

Donianum * 99. *P. foliis* subsessilibus lanceolatis acutis integerrimis glabris, stipulis truncatis, spica oblonga, bracteis obtusis. *Nepal*. (*P. affine* Don.)

Post n. 7. *tortuosum* Don. 100. *P. foliis* ovalibus obtusis pubescentibus, stipulis truncatis pilosis, pedunculis hirsutis, spicis geminis tenuifloris. *Emodi montes*.

Post n. 10. *bracteatum* * 101. *P. foliis* linearibus obtusis margine revolutis subtus niveo-tomentosis, stipulis truncatis, floribus racemoso-spicatis cernuis, bracteis longe cuspidatis. *Emodi montes*. (*P. angustifolium* Don.)

gracillimum * 102. *P. foliis* radicalibus petiolatis ovato-oblongis obtusis crenulatis subtus pubescentibus, caulibus sessilibus linearibus revolutis, stipulis truncatis, racemo compacto, bracteis ovatis acutis. *Emodi montes*. (*P. tenue* Don.)

pag. 254.

Post n. 25. *alatum* Hamilt. 103. *P. foliis* amplexicaulibus ovatis acutis pilosis subtus glanduloso-punctatis, stipulis basi glandulosis, capitulis sphaericis terminalibus, bracteis ovatis acutis flore longioribus. *Nepal*. (*P. punctatum* Don.)

microcephalum Don. 104. *P. foliis* petiolatis ovato-lanceolatis acuminatis pubescentibus ciliatis, stipulis fimbriato-laceris, capitulis globosis pedunculatis. *Nepal*.

capitatum Hamilt. 105. *P. foliis* petiolatis ovatis acutis cauleque radicante lanatis, capitulis globosis. *Nepal*.

runcinatum Hamilt. 106. *P. foliis* runcinato-lyratis dense pilosis, laciniis extrema acuminata, stipulis obtusis hirsutis, capitulis subrotundis solitariis. *Nepal*.

- ciliatum* Hamilt. 107. P. foliis ovato-oblongis acuminatis ciliatis, caule decumbente, stipulis barbatis, capitulis sphaericis axillaribus pedunculatis. *Nepal.*
- patens* Don. 108. P. foliis cordato-oblongis cuspidatis margine crispo-repandis subtus pubescentibus, floribus glomeratis paniculatis. *Nepal.*

pag. 255.

- Post n. 86. *cymosum* Trevir. 109. P. foliis petiolatis hastato-ovatis acuminatis undulatis cauleque ramofo elato glabris, stipulis elongatis, cymis paniculatis patentibus. *Nepal.*
- dibotrys* Don. 110. P. foliis cordato-sagittatis acutis subtus pubescentibus, pedunculis axillaribus dichotomis, racemis conjugatis recurvatis, floribus secundis, pedicellis medio articulatis. *Nepal.*
- Hamiltonii* * 111. P. foliis lanceolatis acuminatis utrinque hispidis, stipulis bracteisque longissime setoso-ciliatis, spicis elongatis densifloris subpaniculatis. *Nepal.* (P. hispidum Hamilt.)
- molle* Don. 112. P. foliis petiolatis oblongis acuminatis subtus sericeis, stipulis divisis, caule erecto simplici villoso, floribus sessilibus paniculatis. *Nepal.*
- Ad P. *flagellare* Bertol. (P. romanum Guffon.)

pag. 258.

- Post n. 71. *Pofumbu* Hamilt. 113. P. foliis ovato-lanceolatis acutis glabris, stipulis setaceis petiolos superantibus, spicis filiformibus tenuifloris, bracteolis tubulosis 2floris setoso-ciliatis. *Nepal.*

C L A S S I S IX.

pag. 266.

Ad *Laurum*.

- Nacufua* Don. 24. L. foliis elliptico-oblongis acutis Inerviis supra nitidis subtus reticulatis tomentosis, umbellis axillaribus glomeratis sessilibus 6floris, pedicellis lanatis, involucris 8phyllis, floribus ♂. *Nepal.*
- Hamiltonii* * 25. L. foliis elliptico-oblongis acuminatis Inerviis subtus villosis, umbellis axillaribus, pedicellis lanatis, floribus ♂. *Nepal.* (L. umbellata Hamilt.)
- macrophylla* Don. 26. L. foliis lanceolatis acuminatis Inerviis reticulatis glabris subtus glaucescentibus, ramulis pedunculisque lateralibus solitariis cernuis incrassatis villosis. *Nepal.*

cuspidata Don. 27. L. foliis ovali-oblongis longe cuspidatis 3nerviis glabris, floribus axillaribus sessilibus aggregatis involucreatis. *Nepal.*

Ad *Tetrantheram* Jacqu.

Ad *T. trinerviam* * (Laurus aggregata Bot. mag. 2497.)
Post n. 10. *megapotamica* * 15. T. foliis lanceolatis acuminatis utrinque glaberrimis venosis, paniculis axillaribus diffusis ebracteatis, pedicellis paucifloris. *Rio grande*. Sello.

Dofhia Don. 16. T. foliis lanceolatis acutis 1nerviis glabris, pedunculis lateralibus corymbiferis, floribus 6partitis 12andris. *Nepal.*

Cuipala Don. 17. T. foliis elliptico-oblongis acutis 3plinerviis glabris subtus glaucis, umbellis lateralibus sessilibus glomeratis, involucreis 6phyllis imbricatis, floribus 4partitis 6andris. *Nepal.*

pallens Don. 18. T. foliis ellipticis acutis 3plinerviis glabris subtus glaucis, umbellis axillaribus sessilibus glomeratis, floribus ♀ 4partitis. *Nepal.*

pag. 268.

Ad *Perseam* Gärtn.

Post n. 8. *Cathia* * 45. P. foliis oblongis acutis multinerviis subtus ramulisque tomentosis, paniculis axillaribus longe pedunculatis. *Nepal.* (Cinnamomum *Cathia* Don.)

nitida * 46. P. foliis oppositis elliptico-oblongis obtusis 3nerviis glabris subtus glaucis, ramis glabris, paniculis supraxillaribus erectis, floribus ternis. *Ind. or.* (Cinnamomum nitidum Hook. exot. fl. t. 176., Laurus *Cassia* Nees.)

Post n. 12. † *pyrifolia* * 47. P. foliis oblongis acutis venosis glabris subtus pallidis, panicula terminali multiflora. *Nepal.* (Cinnamomum Don.)

tomentosa * 48. P. foliis lanceolatis acutis venosis subtus racemisque terminalibus paniculatis tomentosis. *Nepal.* (Cinnamomum Don.)

pag. 271.

Ad *Anacardium*.

Rhinocarpus 2. A. foliis amplis spathulato-lanceolatis obtusis
Cand. glabris reticulato-venosis, panicula corymbosa rufescente. *Ad fl. Magdalen.* (Rhinocarpus excelsus Berter. Kunth. in Humb. nov. gen. 7. t. 601.) A. occidentale habet folia magis elliptica retusa, paniculam diffusam glabriusculam, flamen unicum abortiens, cum in nostra 6-8 abortiant. Idem tamen genus esse, plurima suadent.

pag. 272.

Ad *Rheum*.

australe Don. 7. Rh. foliis cordato-subrotundis obtusis subtus margineque scabris, petioliis sulcatis teretius-

culis ramisque papillofo-asperis, sepalis oblongis apice crenulatis. *Nepal.*

pag. 273.

Ad *Butomum*.

latifolius Don. 2. *B.* foliis longe petiolatis elliptico-oblongis nervosis, umbella pauciflora, spatha diphylla. *Nepala.*

C L A S S I S X.

pag. 274.

Post n. 1541. *Pernetia* Gaudich. Cal. 5partitus. Cor. urceolata, limbo 5fido revoluto. Filamenta basi incrassata. Antherae apice 2lobae, lobis 2fidis. Glandulae 10 3lobae perigynae. Bacca polysperma.

n. 1543. *Encyanthus* Lour. capsulam fert, non baccam. Lindley. Enkianthum Lour. (ab ἔγχνος, quod male intellectos flores indicat) mutare decebat.

pag. 275.

Post n. 1561. *Mauria* Kunth. Cal. urceolatus 4-5lobus persistens. Pet. 4, 5 ovata. Filamenta subulata. Discus orbicularis. Stigma angulatum. Fructus 1spermus.

pag. 276.

Post n. 1564. *Cyrtocarpa* Kunth. Cal. 5partitus cum petalis patentibus nervoso-venosus. Discus orbicularis 10crenatus. Stigma sub-4fidum. Fructus drupaceus 5tuberculatus, calyce corolla staminibusque persistentibus suffultus.

Post n. 1569. *Micromelum* Blum. Cal. urceolatus integer persistens. Pet. 5 linearia. Stam. alterna breviora. Antherae didymae. Bacca exsucca, dissepimentis 5 1-2spermis.

pag. 277.

1582. *Eriostemon* Sm. Filamenta pilosa. Antherae apice appendiculatae.

Phebalium Vent. Cal. 5fidus. Pet. 5. Stam. glabra. Antherae apice emarginatae f. glanduloso-callosae. Fructus 5coccus.

Schotia Jacqu. et *Omphalobium* Gärtn. (non Jacqu. fil.) melius in cl. XVI. collocantur, ubi scientius secundum Candollei nuperas observationes digestae quaerantur.

pag. 278.

n. 1612. *Godoya* R. et P. melius ad cl. XIII.

pag. 279.

Post n. 1628. *Bovdichia* Kunth. Cal. campanulatus 5dentatus, dentibus 2 superioribus conniventibus. Cor. 5petala subpapilionacea. Legumen stipitatum membranaceum hinc alatum. Semina compressa.

pag. 281.

Post n. 1664. *Baphia* Afz. Cal. calyptraeformis florem includens subtus hians. Vexillum patens subrotundum alas lineares aequans. Carina acuta. Legumen fal-ciforme.

Post n. 1678. *Geissois* Labill. Cal. 4sepalus. Cor. 0. Stam. hypogyna exserta. Stylus 2partitus. Fructus filiquaeformis elongatus 2locularis, seminibus alatis imbricatis. *Familia?*

Detarium Juss. Cal. 4fidus. Cor. 0. Stamina alterna breviora. Stigma simplex. Drupa orbicularis, putamine farinaceo, 1sperma. *Familia?*

pag. 284.

Post n. 1737. *Poupartia* Commerf. Flores diclini. Cal. 5fidus. Pet. 5 patentissima. Styli 5 approximati. Drupa nucleo 2-5loculari. *Terebinthaceae.*

pag. 287.

Post *Arbutum*:

PERNETTIA Gaudich.

- | | |
|------------------------------|---|
| <i>empetrifolia</i>
Gaud. | 1. (<i>Arbutus pumila</i> Forst.) Hab. et in <i>Inf. Falkland.</i> |
| <i>mucronata</i>
Gaud. | 2. (<i>Arbutus mucronata</i> Forst.) |
| <i>microphylla</i>
Gaud. | 3. (<i>Arbutus microphylla</i> Forst.) |

Ad *Encyanthum* Lour.

- | | |
|----------------------------------|--|
| <i>E. quinqueflorus</i>
Lour. | 1. melius sic definitur: pedunculis aggregatis, sepalis patulis ovato-lanceolatis germen aequantibus, foveis nectariferis diaphanis, foliis oblongis utrinque attenuatis marginatis. <i>China.</i> Bot. reg. 884. (<i>Melidora pellucida</i> Salisb.) |
| <i>reticulatus</i>
Lindl. | 2. E. pedunculis aggregatis, sepalis ovatis appressis germine brevioribus, foveis nectariferis obscuris, foliis oblongis utrinque attenuatis reticulatis. <i>China.</i> Bot. reg. 835. |
| <i>biflorus</i> Lour. | 3. E. pedunculis geminis, sepalis lanceolatis patulis pilosis, foliis parvis ovato-lanceolatis villosis. <i>China.</i> |

pag. 288.

Ad *Gaultheriam*.

Post n. 4. *nummularioides* Don. 18. G. caule filiformi procumbente fetoso, foliis subfessilibus cordatis mucronatis supra nudis subtus margineque hispida, pedunculis axillaribus brevissimis solitariis bracteolatis. *Emodi montes*.

myrtilloides Schlechtend. 19. G. foliis oblongo-lanceolatis subtus ramisque fetoso-hirsutis, pedunculis brevissimis bracteatis. *Brazil. Sello*.

Ad *G. fragrantissimam* Wallich. (*G. fragrans* Don.)

G. hispida * deleatur, reitura sub *Luffacia* *.

Ad *G. tomentosam* Kunth. (*G. ferruginea* Schlechtend. *Brazil*.)

pag. 289.

Ad *Andromedam*.

Post n. 5. *Redowskii* Chamiff. 35. A. foliis 4fariam imbricatis squamiformibus laevibus nitidis fimbriatis, ramis exacte 4gonis, floribus 8andris. *Sibir. or.*

pag. 290.

Post n. 22. *ovalifolia* Wallich. 36. A. arborea, foliis ovato-oblongis acuminatis integerrimis subcoriaceis glabriusculis, racemis lateralibus foliatis multifloris, pedicellis secundis pubescentibus, laciniis calycis ovatis acutis, corollis oblongis pubescentibus. *Nepal*.

lanceolata Wallich. 37. A. fruticosa, foliis ellipticis acutiusculis membranaceis glabris, racemis terminalibus erectis, pedicellis cernuis directione variis squamulosis, laciniis calycis obtusis ciliatis, corollis ovatis pubescentibus. *Nepal*. (*A. squamulosa* Don.)

formosa Wallich. 38. A. arborefcens, foliis lanceolatis acuminatis crenulatis glabris, racemis compositis thyrsoides, pedicellis secundis cernuis calycibusque pruinosis, laciniis calycis ovato-oblongis marginatis, corollis ovalibus. *Nepal*.

pag. 291.

Post n. 26. *eucalyptoides* Schlechtend. 39. A. fruticosa, foliis petiolatis oblongis acuminatis integerrimis glabris, racemis lateralibus. *Rio grande. Sello*.

nummularia Schlechtend. 40. A. fruticosa, foliis breviter petiolatis cordatis ovatis subretusis coriaceis glabriusculis, racemis hispida. *Rio grande. Sello*.

pulcra Schlechtend. 41. A. fruticosa glabra, foliis petiolatis ovatis mucronatis coriaceis, racemis secundis axillaribus terminalibusque laevibus. *Brazil*.

neriifolia Schlechtend. 42. A. fruticosa glaberrima, foliis petiolatis ovato-lanceolatis acutis coriaceis, panícula racemosa terminali. *Brazil*.

pag. 292.

Rhododendron arboreum Sm. habet folia subtus argenteo-lepidota, racemos multifloros subcapitados.

pag. 294.

Ad *Luffaciam* *.

- Vaccinium* * 2. *L. glabriuscula*, foliis ovalibus mucronatis apice subserratis, racemis aggregatis bracteatis secundis, corolla cylindrico-urceolata. *Brasil.* (*Vaccinium brasiliense* * Syst. 2. p. 212. Gay-Lussacia Pseudo-Vaccinium Schlechtend.)
- salicifolia* * 3. *L. glaberrima pruinosa*, foliis oblongo-lanceolatis apice subserratis, racemis paucifloris ebracteatis. *Brasil.* (Gay-Lussacia Schlechtend.)
- Rhododendron* * 4. *L. ramis hispida*, foliis obovato-oblongis calloso-mucronatis apice obsolete serratis, floribus racemosis. *Brasil.* (Gay-Lussacia Schlechtend.)
- rugosa* * 5. *L. ramis hispida*, foliis oblongis retusis rugosis margine revolutis supra scabris subtus hirsutis, floribus racemosis. *Brasil.* (Gay-Lussacia Schlechtend.)
- hispida* * 6. *L. ramis hirtis*, foliis oblongis utrinque rotundatis apice callosis integerrimis margine revolutis hispidiusculis, racemis terminalibus foliatis strictis secundis viscoso-pilosis. *Brasil.* (*Gaultheria hispida* * Syst. 2. p. 288. Gay-Lussacia Pseudo-Gaultheria Schlechtend.)
- incana* * 7. *L. incano-tomentosa*, foliis oblongis calloso-mucronatis integerrimis revolutis, racemis bracteatis secundis. *Brasil.* (Gay-Lussacia Schlechtend.)
- pinifolia* * 8. *L. glaberrima pruinosa*, foliis confertis linearibus utrinque attenuatis crenatis, pedunculis paucifloris axillaribus bracteatis. *Brasil.* (Gay-Lussacia Schlechtend.)

pag. 299.

Ad *Melastoma*.

- Post n. 63. † *normale* Don. 167. *M. foliis ovato-ellipticis acutis 5nerviis supra hispida subtus lanatis, ramis setoso-pilosis, floribus ternis, calyce squamulis ciliatis canis appressis vestito. Nepal.*

pag. 302.

- Post n. 111. *denticulatum* Labill. 168. *M. foliis oblongis acuminatis 3-5nerviis subtus flavidis rufo-punctatis, corymbis paucifloris, floribus 6petalis, denticulis lacinias calycis intercedentibus. Nov. Caledon.*

pag. 309.

Ad *Rhexiam*.

- Post n. 49. *paniculata* Hamilt. 85. *Rh. foliis elliptico-oblongis acuminatis serrulatis coriaceis subtus ramisque lanatis.*

lanatis, panicula ampla pyramidata, floribus cernuis. *Nepal.* (Arthrostemma Don.)

pag. 311.

Post n. 84. *bidentata* Mart. 86. Rh. fruticosa, foliis fasciculatis lanceolatis acutis 2dentatis glabris, floribus corymbosis 5andris, calycibus muricatis. *Brazil.*

pag. 312.

Ad *Osbeckiam.*

Ad *O. nepalensem* Hook. (*O. speciosa* Don.)

Post n. 5. *Chulefis* Don. 20. O. foliis cordato-oblongis mucronulatis 5nerviis pilosis subtus canescentibus, ramis lepidotis, floribus corymbosis, squamis calycis ciliato-setosis. *Nepal.*

pag. 313.

Post n. 17. *ternifolia* Don. 21. O. ramis 3gonis, foliis ternis lanceolatis acutis 3nerviis margine hispidis, floribus racemoso-paniculatis, bracteis cordatis, laciniis calycis acutis hispidis. *Nepal.*

rostrata Don. 22. O. foliis ovato-lanceolatis acutis sub-5nerviis glabriusculis, floribus corymbosis, bracteis cordatis, calycibus setosis ciliatis. *Nepal.*

angustifolia Don. 23. O. foliis subsessilibus lineari-lanceolatis acutis obsolete 3nerviis ramisque 4gonis pilosis, floribus sessilibus glomeratis bracteatibus, laciniis calycis ovatis. *Nepal.*

Ad *Boswelliam.*

B. turifera Colebr. habet potius folia pubescentia.

B. balsamifera * est in *B. glabram* Roxb. mutanda.

B. hirsuta Sm. (non *.)

Post *Garugam* Roxb.:

MAURIA Kunth.

simplicifolia Kunth. 1. M. foliis simplicibus oblongis obtusis glabris, ramis verrucosis, floribus paniculatis. *Patria?* Humb. nov. gen. 7. t. 605. Eadem videtur cum *Mangifera axillari* Desrouff. in Encycl. bot. 3. p. 697. et *Cambessedea* Kunth. ad Humb. nov. gen. 7. p. 2. Hanc *Sonneratus* ex *Ind. or.* attulerat.

heterophylla Kunth. 2. M. foliis ternatis 2jugisque oblongis retusis glabris, ramis verrucosis, paniculis axillaribus terminalibusque. *Peru.* Humb. nov. gen. 7. t. 606.

Post *Baraultiam* Steud.:

CYRTOCARPA Kunth.

procera Kunth. Nov. *Hispan.* Arbor procerissima, foliis pinnatis, floribus paniculatis albis.

pag. 314.

Ad *Glycosimida.*

Gl. pentaphylla Colebr. (*Sclerostylis* Blum.)

cyanocarpa * 3. Gl. foliolis oblongis obtusiusculis, corymbis axillaribus terminalibusque. *Java.* (*Cookia* Blum.)

- chlorosperma* * 4. Gl. foliolis oblongo-lanceolatis, racemis compositis terminalibus. *Java*. (Cookia Blum.)
- trifoliata* * 5. Gl. foliis simplicibus ternatisque oblongo-lanceolatis obtusis, racemis axillaribus brevissimis. *Java*. (Sclerostylis Blum.)
- simplicifolia* * 6. Gl. foliis simplicibus oblongo-lanceolatis obtusiusculis, racemis axillaribus brevissimis. *Java*. (Sclerostylis lanceolata Blum.)

Ad *Linoniam*.

- Post n. 9. *retusa* Don. 10. L. foliis obovato-ellipticis retusis, petiolis femiteretibus, pedunculis subfolitariis 1floris. *Nepal*.
- spinosa* * 11. L. spinosa, foliis ovato-oblongis acutiusculis obsolete crenatis, pedunculis 1floris. *Inf. ad Javae oras*. (Sclerostylis Blum.)

pag. 315.

Murraya paniculata Cand. pedunculos habet subfolitarios axillares. Hook. exot. fl. t. 134.

Post *Murrayam*:

MICROMELUM Blum.

pubescens Blum. *Java*. Arbor foliis impari-pinnatis 4jugis, foliolis oblongis subtus ramulisque pubescentibus.

pag. 317.

Ad *Monotropam*.

M. Morisoniana Mx. et in *Nepal*. habitare, Don.

humilis Don. 6. M. caule 1floro, squamis approximatis oblongis obtusis integerrimis, petalis intus filamentisque pilosis, stigmatate umbilicato 7sulcato. *Nepal*.

pag. 318.

Ad *Gompliam*.

G. oleaeifolia Hilar. habet petala calycem superantia.

Post n. 9. *parvifolia* Hilar. 25. G. foliis sessilibus parvis ovatis subintegerrimis subtus ramulisque pubescentibus, floribus thyrsoideis bracteatis, petalis orbiculatis. *Brazil*.

floribunda Hilar. 26. G. foliis imbricatis oblongis acutiusculis subintegerrimis, paniculis terminalibus bracteatis, petalis obovato-orbiculatis. *Brazil*.

suaveolens Hilar. 27. G. foliis oblongis acuminatis subintegerrimis subveniens, floribus thyrsoideis numerosissimis parvis, calyce corollam aequante, antheris laevibus. *Brazil*.

cuspidata Hilar. 28. G. foliis oblongis obtusis mucronatis subintegerrimis glaberrimis, racemis terminalibus, antheris transverse rugosis. *Brazil*.

G. parviflora Cand. habet folia integerrima, petala calycem superantia. (Correia 2. Vand.)

- hexasperma* Hilar. 29. *G. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis obsolete ferratis subtus eveniis, paniculis terminalibus. Brasil.*
- olivaeformis* Hilar. 30. *G. glaberrima, foliis oblongis acuminatis obsolete ferratis, racemis terminalibus, antheris laeviusculis, receptaculo carnofo turbinato. Brasil.*
- curvata* Hilar. 31. *G. glaberrima, foliis ovato-oblongis acutis coriaceis venosis apice ferrulatis, racemis compactis incurvis, pedicellis tuberculatis, petalis calyce longioribus. Brasil.*
- glaucescens* Hilar. 32. *G. glaberrima, foliis subcordato-oblongis mucronatis apice ferrulatis glaucescentibus, racemis terminalibus, petalis obovatis calycem excedentibus, antheris transverse rugulosis. Brasil.*
- lucens* Kunth. 33. *G. foliis sparsis petiolatis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis remote ferrulatis obsolete venosis membranaceis nitidis, racemis terminalibus compositis. Nov. Granat.*
- semiferrata* Mart. 34. *G. foliis ellipticis antrorsum ferratis coriaceis, floribus paniculatis, petalis orbiculatis. Brasil.*
- persistens* Hilar. 35. *G. glaberrima, foliis oblongis acuminatis ferratis coriaceis, paniculis terminalibus, calycibus persistentibus, petalis calycem subaequantibus. Brasil.*
- venosa* * 36. *G. foliis lanceolatis acuminatis ferrulatis subtus venosis, racemis paniculatis, antheris transverse rugulosis. Brasil. (G. nervosa Hilar.)*
- humilis* Hilar. 37. *G. suffruticosa glaberrima, foliis oblongis coriaceis subserratis, racemis paniculatis, petalis obovatis calycem superantibus, antheris transverse rugulosis. Brasil.*
- nana* Hilar. 38. *G. suffruticosa, foliis ovato-oblongis acutis ferratis, stipulis persistentibus, floribus axillaribus racemosis, terminalibus paniculatis, petalis calycem subaequantibus, antheris transverse rugulosis. Brasil.*

pag. 319.

Ad *Quassiam*.

- versicolor* * 5. *Qu. floribus dioecis 10andris paniculatis, foliis pinnatis, foliolis elliptico-oblongis obtusissimis retusis costa media pubescentibus. Brasil. (Simaruba Hilar.)*

Ad *Zwingeram* Schreb.

- quassioides* * 8. *Zw. foliis pinnatis 4jugis, foliolis elliptico-oblongis acuminatis ferratis, corymbis trichotomis, floribus 5andris 5gynis. Nepal. (Simaba Don.)*

pag. 320.

Ad *Rutam*.

- Ante n. 13. *Rutae simplicifoliae Aplophyllae* genus Adr. Just.

- cordata* Don. 23. R. foliis amplexicaulibus cordatis integerrimis glaucis, floribus corymbosis, petalis integerrimis, filamentis glabris. *Nepal.*

pag. 321.

Ad *Eriostemonem* Sm.

- Post n. 4. *neriifolius* Sieb. 8. E. foliis lanceolatis marginatis mucronatis punctatis, pedunculis axillaribus 3floris, filamentis barbatis. *Nov. Holl.*
- hispidulus* Sieb. 9. E. foliis subspathulatis mucronatis calloso-crenatis supra hispidis subtus stellato-villofis, pedunculis 1floris. *Nov. Holl.*
- sorymbosus* Labill. 10. E. foliis oblongis subtus sericeis rufo-lepidotis, corymbis terminalibus, filamentis pilosis, antheris apice nudis. *Nov. Caledon.*

PHEBALIUM Vent.

- correaefolium* Adr. Juss. 1. Ph. foliis lanceolatis supra scabris subtus stellato-tomentosis, pedunculis axillaribus ternis. *Nov. Holl.* (Ph. ovatum Sieb.)
- hexapetalum* Adr. Juss. 2. Ph. foliis oblongis obtusis utrinque stellato-tomentosis, pedunculis terminalibus congestis, floribus 6petalis 12andris. *Nov. Holl.*
- squamulosum* Vent. 3. Ph. foliis lineari-oblongis acutis subtus floribusque lepidotis, staminibus exsertis. *Nov. Holl.* (*Eriostemon lepidotis* * Syst. 2. 322.)
- anceps* Cand. 4. Ph. foliis spathulato-lanceolatis glabriusculis, floribus corymbosis lepidotis, staminibus corolla brevioribus. *Nov. Holl.* (*Eriostemon anceps* Syst. veg. 2. p. 322.)
- Billardierii* Adr. Juss. 5. Ph. foliis lanceolatis integerrimis subtus rufo-lepidotis, ramulis angulatis, pedunculis axillaribus 3floris, staminibus exsertis. *Nov. Holl.* (*Eriostemon squameus* Labill., Ph. elaeagnoides Sieb.)
- elaeagnifolium* Adr. Juss. 6. Ph. foliis linearibus obtusis supra seriatim punctatis subtus argenteo rufoque lepidotis, pedunculis terminalibus umbellatis, staminibus exsertis. *Nov. Holl.* (Ph. *anceps* Sieb.)
- salicifolium* Adr. Juss. 7. Ph. foliis lineari-lanceolatis crenatis subtus stellato-pulverulentis, floribus axillaribus umbellatis, staminibus exsertis. *Nov. Holl.*
- phylicoides* Sieb. 8. Ph. foliis linearibus obtusis asperis subtus revolutis, ramis strictis hispidis, fasciculis terminalibus, staminibus exsertis. *Nov. Holl.* (Ph. *diomeum* Adr. Juss.)

pag. 323.

- Ad *Zygophyllum fruticosum* Cand., floribus 4fidis. (*Röperia* Adr. Juss.)

pag. 325.

Ad *Entadan* Adans.

- Plumerii* * 3. E. foliis 2pinnatis cirro terminatis, partialibus 4-propriis 6jugis, foliolis oblongis obtusis gla-

bris, spicis aggregatis dense imbricatis, caule scandente. *Ind. occid.* (Mimosa polystachya L. Syft. 2. p. 205.)

Ad *Desmanthum* W.

- leptophyllus* Kunth. 9. D. suffruticosus inermis, foliis 2pinnatis glabris, partialibus 6-7-propriis multijugis, foliolis inaequilateris linearibus acutis ciliatis, petiolo basi glandulifero, capitulis paucifloris. *Cumana.*

pag. 326.

Ad *Prosopis*.

- Post n. 4. *elegans* * 8. Pr. foliis 2pinnatis, partialibus 4-propriis multijugis, foliolis linearibus subfalcatis mucronatis, petiolis eglandulosis, spicis cylindricis. *Rio grande.* Sello.
- Bonplandiana* * 9. Pr. foliis 2pinnatis subtus pubescentibus, partialibus 4-propriis 8-9jugis, foliolis oblongis obtusis, petiolo eglanduloso, spicis geminis terminalibus. *Caracas.* (Adenantha Bonplandiana Kunth.)
- inermis* Kunth. 10. Pr. foliis 2pinnatis subtus subpubescentibus, partialibus 3-propriis 6-13jugis lineari-oblongis, petiolo 2-3glanduloso, spicis axillaribus solitariis. *Peru.*
- dubia* Kunth. 11. Pr. foliis 2pinnatis glabris, partialibus 12-propriis 15jugis, foliolis lineari-oblongis acutis, petiolo 2glanduloso. *Nov. Granat.*
- samariscina* * 12. Pr. foliis 2pinnatis glabriusculis, partialibus propriisque multijugis, foliolis imbricatis linearibus subciliatis, petiolo glandulifero, spicis terminalibus paniculatis. *Inf. Mascaren.* (Acacia W. Syft. 3. 138., Gagnebina Cand.)
- † *elephantorrhiza* * 13. Pr. glaberrima, foliis 2pinnatis, partialibus 10-12-propriis multijugis, foliolis linearibus, petiolis eglandulosis, spicis axillaribus solitariis. *Afric. austr.* (Acacia Burch. Cand.)
- Post n. 7. *juliflora* Cand. 14. Pr. spinis stipularibus geminis, foliis 2pinnatis, partialibus 2-propriis multijugis, foliolis oblongis obtusis glabris, petiolo basi glandulifero, spicis pendulis, germinibus villosis. *Ind. occid. Amer. austr.* (Mimosa piliflora Sw., Acacia juliflora W. Syft. 3. p. 142.)

pag. 327.

Ad *Guilandinam*.

- ciliata* Berg. 6. Gu. ramis angulatis aculeatis, ramulis ferrugineo-tomentosis, foliis abrupte pinnatis 3-6jugis glabriusculis, foliolis oblique orbiculatis emarginatis, racemis spicatis, tomentis ellipticis aculeatis. *Inf. Bartholom. in Caribaeis.* O. B. Bergius om Vestindien Stockh. 1819. Wikström. in Stockh. acad. handl. 1825. p. 431.

pag. 331.

Ad *Combretum*.

- Post n. 6. *parviflorum* Reichenb. 7. C. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis venosis subtus lepidotis, spicis axillaribus ferrugineis. *Senegambia*.
nanum Don. 8. C. foliis ovalibus obtusis glabris, spicis pubescentibus. *Nepal*.

pag. 333.

Ad *Bauhiniam*.

- B. variegata*. (*Schnellia microstachya* Radd., *Pauletia multinervia* Kunth.)
 † *B. unguolata*. (*Schnellia macrostachya* Radd., *Pauletia picta* Kunth.)
 † *B. parviflora* Vahl. (*Pauletia glaucescens* Kunth. *Cumana*.)
B. Pes caprae Cav. (*Gasparea* Kunth.)
suaveolens Kunth. 24. B. foliis cordatis subrotundo-ovatis, lobis rotundatis patulis multinerviis subtus pubescentibus, racemis terminalibus, calycibus sericeis. *Nov. Holl*.
B. porrecta Ait. (*B. cumanensis* Kunth.)

pag. 334.

- Ad *B. aculeatam*. (*Pauletia glandulosa* Kunth.)
 Ad *B. heterophyllum* Link. (*B. splendens* Kunth.)

Ad *Cassiam*.

- Ad *C. brasilianam* Lam. (*Baetyllobium ferrugineum* Schrad., *Cassia Trinitatis* Reichenb., *moschata* Kunth.)
 Ad *C. javanicam*. (*C. Sieberiana* Cand.) *Senegambia*.
Humboldtiana Cand. 119. C. foliis 4jugis oblongis acutiusculis supra glabris subtus villosiusculis, petiolo eglanduloso, racemis multifloris, leguminibus compressiusculis undulato-annulatis. *Ad fl. Magdalen*. (*C. speciosa* Kunth.)
 Ad *C. Fistulam*. (*C. excelsa* Kunth, *Bonplandiana* Cand.)

pag. 335.

- Post n. 5. *laeta* Kunth. 120. C. foliis 4jugis elliptico-oblongis acuminatis utrinque villosis, petiolo eglanduloso, pedunculis 4-8floris. *Nov. Granat*.
 Post n. 8. *puberula* Kunth. 121. C. foliis 2jugis inaequilateris acutis supra glabris subtus pubescentibus, superioribus elliptico-oblongis, inferioribus minoribus subrotundo-ovatis, petiolo basi glandulifero, racemis axillaribus. *Nov. Granat*.
 Post n. 11. *excelsa* Schrad. 122. C. foliis 10-15jugis elliptico-oblongis mucronatis basi inaequalibus supra glabriusculis nitidis subtus villosis, corymbis paniculatis. *Brasil*. (*C. fastigiata* Nees.)

pag. 336.

- Post n. 24. *strobilacea* Kunth. 123. C. foliolis oblongis emarginatis supra pilosiusculis subtus villosis, petiolo eglanduloso, racemis axillaribus, bracteis flores obvallantibus, leguminibus compressis torulosis. *Ad fl. Magdalen.* (C. Tarantan Kunth. var.?)
- Post n. 29. *fraxinifolia* Kunth. 124. C. foliolis oblongis obtusis glabris, petiolo eglanduloso, racemis axillaribus corymboso-congestis, leguminibus compressis laevibus. *Ad fl. Amazonum.*

pag. 337.

- Post n. 41. *purpurea* Carey. 125. C. foliolis lanceolatis pilosis, petiolo basi glandulifero, ramis purpureis, racemis congestis folio brevioribus, floribus 8andris. *Bengal. Bot. reg. 856.*

pag. 338.

- Post n. 48. *pistaciaefolia* Kunth. 126. C. foliolis oblongis retusis supra glabris subtus pubescentibus, petiolo eglanduloso, floribus racemosis, leguminibus compressis transverse venosis. *Popayan in Columbia.*
- Ad C. *tomentosam.* (C. cana Schrank.)
- Ad C. *bifloram.* (C. nemorosa Kunth., rostrata Mart., averisiflora Herb. in Bot. mag. 2638.)

pag. 339.

- Post n. 65. *venustula* Kunth. 127. C. foliolis obovato-ellipticis obtusis pubescentibus, petiolo basi glandulifero, racemi terminalis pedunculis 2floris. *Cumana.*
- acapulcensis* Kunth. 128. C. foliolis obovato-ellipticis supra glabris subtus pubescentibus punctato-maculatis, petiolo basi glandulifero, pedunculis axillaribus 2floris. *Mexico.*
- Post n. 70. *artemifoides* Cand. 129. C. incano - villosa, foliolis lineari-filiformibus, petiolo basi glandulifero, racemis axillaribus paucifloris folio brevioribus. *Nov. Holl.*
- glutinosa* Cand. 130. C. foliolis oblongis acuminatis ramisque glutinosis glabris, petiolo basi glandulifero, racemis axillaribus paucifloris. *Nov. Holl.*
- Alcaparillo* Kunth. 131. C. foliolis obovato-oblongis glabris, petiolis basi glanduliferis, racemis axillaribus terminalibusque laxis. *Peru.*
- elliptica* Kunth. 132. C. foliolis ellipticis retusis utrinque incano-villosis, petiolo eglanduloso, racemis axillaribus. *Cumana.*
- Peralteana* Kunth. 133. C. foliolis oblongis obtusis utrinque pubescentibus subtus incanis, petiolo eglanduloso, racemis axillaribus. *Mexico.*
- canescens* Kunth. 134. C. foliolis elliptico-subrotundis supra villosis subtus incano-tomentosis, petiolo eglanduloso, racemis axillaribus pendulis. *Quito.*

- argentea* Kunth. 135. C. foliolis subellipticis obtusis sericeis subtus argenteis, petiolo basi glanduloso, floribus axillaribus solitariis, terminalibus subracemosis, leguminibus gracilibus. *Mexico.*

pag. 340.

- Post n. 80. *barbata* Mart. 136. C. foliolis ovato-oblongis obtusis subtus pubescentibus, petiolo eglanduloso, floribus racemosis bracteatis, leguminibus hirsutis. *Brazil.*

- Post n. 84. *lotoides* Kunth. 137. C. foliolis obovatis obtusis glabris, petiolo eglanduloso, racemis terminalibus viscofo-pilosisculis. *Cumana et ad Orinocum.*

- Post n. 85. *cultrifolia* Kunth. 138. C. foliolis oblongo-lanceolatis falcato-ensiformibus apice denticulato-ciliatis glabris, petiolo glandulifero, ramis hinc pilosis, pedunculis axillaribus solitariis 1floris hirsutis bibracteatis. *Ad Orinocum.*

- sabaginifolia* Kunth. 139. C. foliolis dimidiato-cordatis obovatis subretusis glabris ciliatis, petiolo eglanduloso ramisque villosis, pedunculis axillaribus 1floris glabris bibracteatis. *Mexico.*

pag. 341.

- Post n. 91. *viscosa* Kunth. 140. C. foliolis obovatis emarginatis viscofo-pilosisculis, petiolo eglanduloso, ramis racemisque multifloris glutinoso-pilosis. *Nov. Granat.*

- pauciflora* Kunth. 141. C. foliolis ellipticis viscosis, petiolo eglanduloso, ramis racemisque terminalibus paucifloris viscofo-pilosis. *Mexico.*

- Post n. 94. *tenella* Kunth. 142. C. foliolis oblongis glabris, petiolo glandulifero, pedunculis 1floris 2bracteatis pilosisculis, caule procumbente. *Ad Orinocum.*

- obcordata* Sw. 143. C. foliolis obcordatis striato-venosis glabris, petiolo basi glandulifero, pedunculis subterminalibus 1floris, leguminibus pubescentibus. *Inf. Bartholom. in Caribaeis. Act. holm. 1825. p. 429.*

- Post n. 98. *Swartzii* Wikstr. 144. C. foliolis spathulato-linearibus mucronatis basi obliquis glabris, pedunculo basi glandulifero, pedunculis subterminalibus 1floris, leguminibus curvatis glabris. *Inf. Bartholom. in Caribaeis. Act. holm. 1825. p. 430.*

pag. 342.

- Ad C. *Patellariam* Cand. (C. biglandulosa Bertol. in opusc. scient. 3. p. 409.)

- flavicoma* Kunth. 145. C. foliolis lineari-oblongis pubescentibus, glandula stipitata petiolari, pedunculis 1floris 2bracteatis ramisque pilosis. *Mexico. Amer. austr. C. riparia, propinqua, felipensis, tristicula, ramosissima Kunth. varr.*

- Post n. 113. *dimidiata* Hamilt. 146. C. foliolis linearibus mucronatis ciliatis, petiolo glandulifero, stipulis lau-

ceolatis nervosis, pedunculis axillaribus geminis
1floris 2bracteatis, leguminibus hirsutis. *Nepal.*

arenaria
Kunth.

147. *C. foliolis linearibus glabris margine hispido-
scabris, inferioribus stipulisque ciliatis, petiolo
biglanduloso, pedunculis 1floris 2bracteatis ra-
misque pilosis. Amer. austr.*

pag. 343.

Ad *Caesalpiniam*.

Post n. 2. 3. *glabrata* Kunth. 20. *C. glaberrima, foliis abrupte
2pinnatis, partialibus 3-4-proprieis 4-5jugis, fo-
liolis oblongo-ellipticis utrinque rotundatis co-
riaceis, racemis terminalibus congestis, stamini-
bus corollam subaequantibus, leguminibus ob-
longis subtorulosis. Quito.*

† *melanosticta** 21. *C. foliis 2pinnatis, partialibus 2-proprieis 4ju-
gis, terminali elongato 8jugo, stipulis pinnatifid-
is, racemis elongatis, calycibus foliolisque
glanduloso-punctatis. Afric. austr. (Melano-
sticta Burchellii Cand.)*

*mollis** 22. *C. foliis 2pinnatis, partialibus 2-proprieis 4jugis,
foliolis ovato-oblongis obtusis, petiolis racemis-
que et leguminibus substipitatis tomentosis, ca-
lycis glandulosi lacinia inferiore fimbriata. Ad
fl. Magdalen. (Adenocalyx racemosus Berter.,
Coulteria mollis Kunth.)*

pectinata Cav. 23. *C. foliis 2pinnatis glabris, partialibus 2-4-pro-
prieis 6-8jugis, foliolis oblongis, nervo medio
subtus pubescente, calycis hirsuti lacinia infe-
riore fimbriata. Amer. austr. (Coulteria tinctor-
ia Kunth.)*

pag. 344.

Post n. 16. *ligulata* Rottl. 24. *C. foliis 2pinnatis, partialibus
4-proprieis 6jugis, foliolis ovalibus obtusis, pe-
tiolis retrorsum aculeatis, floribus paniculatis.
Ind. or.*

Cacalaco
Humb. 25. *C. foliis abrupte 2pinnatis, partialibus proprieis-
que 4jugis, foliolis obovato-subrotundis emargin-
atis membranaceis glabris nitidis, racemis ter-
minalibus villosis, staminibus corollam subae-
quantibus, leguminibus torulosis. Mexico. Humb.
pl. aequinoct. 2. t. 137.*

*horrida** 26. *C. foliis 2pinnatis aculeatis glabris, partialibus
2-proprieis 4-7jugis, foliolis oblongis, calycis
hirsuti lacinia infima fimbriata. Amer. austr.
(Coulteria horrida Kunth. Humb. nov. gen. 6.
t. 568.)*

Post *Caesalpiniam*:

BOWDICHIA Kunth.

virgilioides
Kunth.

*Amer. austr. Arbor inermis foliis pinnatis, foliolis
oblongis obtusis subtus ferrugineo-tomentosis,
racemis congestis, floribus violaceis.*

pag. 345.

Ad *Cubaeam* Scop.

- speciosa* * 4. *C. arborea*, foliis pinnatis, panicula ampla proli-
fifera. *Brazil.* (Moldenhawera floribunda Schrad.,
Dolichonemia speciosa Nees.)

Ad *Parkinsoniam*.

- orientalis* * 3. *P. inermis*, foliis pinnatis glabris, foliolis sub-
7jugis alternis oblongis, pedunculis axillaribus
geminis 1floris. *Inf. Molucc.* (Solulus arbor
Rumph. 4. t. 128. *Diphaca cochinchinensis* Lour.,
Dalbergia Diphaca Perf.)

Ad *Azeliam* Sm.

- bijuga* * 2. *A. foliis* 2jugis ellipticis coriaceis glabris, race-
mis lateralibus, floribus polygamis 7andris. *Gui-
nea.* (*Pancovia bijuga* W. Sylt. veg. 2. p. 167.)

Ad *Hymenaeam*.

- Candolleana* 4. *H. foliolis* basi inaequalibus coriaceis oblongis
Kunth. emarginatis; pedunculis terminalibus multifloris,
germinibus polyspermis. *Mexico.* Humb. nov.
gen. 6. t. 566.
- floribunda* 5. *H. foliolis* basi inaequalibus coriaceis oblongis
Kunth. obtuse acuminatis, paniculis axillaribus, legu-
minibus ovatis hirsutis 1-2spermis. *Guiana.*
Humb. nov. gen. 6. t. 567.

Ad *Myrospermum*.

- pubescens* Cand. 4. *M. foliis* impari-pinnatis subtus pubescentibus,
foliolis subcordato-oblongis acutiusculis emargi-
natis, petiolis ramulisque hirtis. *Amer. austr.*
(*Myroxylon pubescens* Kunth., periferum Lam.)

pag. 346.

Anagyris chinensis * (Macrotropis foetida Cand.)*A. inodora* Lour. (Macrotropis Cand.)Ad *Sophoram*.Ad *S. tomentosam*. (*S. havanensis* Jacqu.)

Post n. 3. *crassifolia* Jaim. 8. *S. arborea*, foliolis inaequilateris
oblongis obtusis coriaceis subtus pubescentibus,
racemo terminali elongato. *Senegambia.*

macrocarpa Sm. 9. *S. arborea*, foliolis elliptico-oblongis obtusis
rigidis subtus subsericeis, racemis axillaribus
abbreviatis. *Chili.* (Maju, Molin. chil. ed. nov.
p. 146. quam pro *Cassia stipulacea* W. habet.)

glauca Leschen. 10. *S. fruticosa*, foliolis ellipticis mucronatis supra
glaucis subtus villosis, racemis terminalibus con-
fertis. *Ind. or.*

litoralis Schrad. 11. *S. fruticosa*, foliolis subrotundo-ellipticis su-
pra glabris subtus tenuissime strigillofis canescen-
tibus, racemis terminalibus. *Brazil.* (*S. areni-
cola* Nees)

S. obliqua Perf. deleatur, reditura sub *Acaciis*.

pag. 347.

Ad *Podaliriam* Lam.

- P. hirsuta* W. (P. *Burchellii* Cand.)
coruscans Reichenb. 10. P. foliis subsessilibus confertis ovato-lanceolatis acutis utrinque sericeo-villosis, floribus axillaribus subsessilibus. *C. B. S.*

pag. 348.

Ad *Baptisiam* Vent.

- mollis* Nutt. 9. B. foliis petiolatis subrhombico-lanceolatis cauleque decumbente pubescentibus, stipulis linearilanceolatis, racemis spicatis terminalibus, leguminibus apice subulatis. *Carolina.* (Podaliria *mollis* Mx.)
 Post n. 8. † *nepalensis* Hook. 10. B. caule fruticoso glabro, foliis petiolatis ternatis, foliolis lanceolatis acuminatis subsericeis, stipulis deciduis, paniculis axillaribus. *Nepal.* Hook. exot. fl. t. 131.

Ad *Virgiliam* Lam.

- lylvatica* Cand. 5. V. foliis impari-pinnatis glabris, foliolis 6-7jugis ovalibus obtusis, paniculis terminalibus. *Afr. austr.* (Sophora *lylvatica* Burch.)
lutea Mx. 6. V. foliis impari-pinnatis glabris, foliolis 5jugis ovatis acuminatis, leguminibus stipitatis glabris. *Amer. bor.*

Ad *Cyclopiam* Vent.

- genistoides* Vent. 1. C. foliolis linearibus obtusis calycibusque muticis, ramis glabris. *C. B. S.* (Sophora *genistoides* L. Berg. cap. p. 140., Podaliria W., Galega Thunb.)
galioides Cand. 2. C. foliolis subulatis sulcatis mucronatis, calycibus acuminatis, ramis hirsutis. *C. B. S.* (Sophora *galioides* Berg. cap. p. 141., Aspalathus *callosa* Burm.)
latifolia Cand. 3. C. foliolis ovato-ellipticis submucronatis, calycibus acutis. *C. B. S.* (Genista *buxifolia* Burm.)

Ad *Thermiam* Nutt.

- laburnifolia* * 3. Th. foliis ternatis elliptico-oblongis acutis subsericeis, stipulis grandibus coalitis oppositifoliis caducis, racemis paucifloris, caule fruticoso. *Nepal.* (Thermopsis *laburnifolia* Don., *napaulensis* Cand.)
fabacea * 4. Th. foliis ternatis stipulisque distinctis late ovatis glabris, racemo terminali, caule herbaceo. *Camtschatca. Inf. Carib.* (Sophora *fabacea* Pall. astrag. t. 90. f. 2., Thermopsis Cand.)
alpina * 5. Th. foliis ternatis sessilibus stipulisque caulinis verticillatis ovatis villosis, spica terminali bracteata. *Imaus.* (Sophora *alpina* Pall. astrag. t. 90. f. 1., Thermopsis *corgonenfis* Cand.)

pag. 349.

Ad *Edwardfian* Salisb.

- nitida* Cand. 4. *E. fruticosa*, foliis pinnatis fericeis, foliolis ob-
ovatis obtusis emarginatis. *Inf. Mascaren.* (*Sophora nitida* Sm., fericea Jaum.)
- denudata* Cand. 5. *E. fruticosa*, foliis pinnatis supra glabris subtus
fericeis, foliolis ellipticis retusis. *Inf. Mascaren.*
(*Sophora denudata* Bory., retusa Pers.)

Ad *Chorizema* Labill.

- Henchmanni*
R. Br. 4. *Ch. foliis* solitariis ternatisque lineari-filiformibus mucronatis pilosiusculis, ramis calycibusque bracteatis viscosis, floribus racemosis. *Nov. Holl. Bot. reg.* 986. (*Podolobium aciculare* Cand.)
- † *platylobioides*
Cand. 5. *Ch. foliis* ovatis acuminatis reticulatis integerrimis supra glabris subtus villosis, floribus axillaribus subsessilibus, germinibus villosissimis. *Nov. Holl.* (*Platylobium reticulatum* Sieb.)

Ad *Podolobium* R. Br.

- stevrophyllum*
Sieb. 2. *P. foliis* oppositis 3fidis coriaceis glaberrimis, laciniis subaequalibus integerrimis apice spinosis, germine glabro. *Nov. Holl.*
- scandens* Cand. 3. *P. foliis* oppositis oblongis integerrimis apice setifero-mucronatis reticulatis subtus strigillofis, germine villoso, caule scandente. *Nov. Holl.* (*Chorizema scandens* Sm., *Daviesia umbellata* et *humifusa* Sieb.)
- fericeum* Cand. 4. *P. foliis* oppositis alternisque ellipticis calycibusque fericeis, racemis axillaribus folia aequantibus, germine setoso. *Nov. Holl.* (*Chorizema fericeum* Sm.)

Ad *Oxylobium* Andr.

- retusum* R. Br. 4. *O. foliis* oblongis retusis coriaceis reticulatis glabris, corymbis axillaribus pedunculatis congestis folio brevioribus. *Nov. Holl.* (*Chorizema coriaceum* Sm. *Podolobium*? Cand.) *Bot. reg.* 913.
- spinosum* Cand. 5. *O. foliis* ternis late ovatis glabris apice stipulisque spinosis. *Nov. Holl.*
- † *Pultenaeae*
Cand. 6. *O. foliis* verticillatis alternisque linearibus obtusiusculis margine revolutis subtus ramisque pubescentibus, umbellis pedicellatis. *Nov. Holl.* (*Pultenaea lylvatica* Sieb.)

pag. 350.

Ad *Gompholobium* Sm.

- G. minus* Sm. deleatur, rediturum sub *Burtonia*.
- Ad *G. grandiflorum* Sm. *G. setifolium* Sieb. var. foliis angustissimis elongatis setaceis.
- barbigerum*
Cand. 7. *G. foliolis* spathulato-linearibus mucronatis glabris, pedunculis solitariis, carina apice dense

barbata, vexillo amplo calycem superante. *Nov. Holl.* (G. fimbriatum Sieb.)

- virgatum* Sieb. 8. G. foliolis erectis linearibus obtufiusculis apice callofis, ramis teretibus, pedunculis subracemosis, carina imberbi. *Nov. Holl.*
- tetrathecoides* Sieb. 9. G. foliolis lineari-filiformibus submucronatis abbreviatis, ramis teretibus; brevissime villosis, floribus subterminalibus, carina imberbi. *Nov. Holl.*
- pedunculare* Cand. 10. G. foliolis inferioribus obovatis mucronatis, superioribus lineari-lanceolatis acuminatis, stipulis petiolum aequantibus, pedunculis elongatis basi apiceque 2bracteatis. *Nov. Holl.*

Ad *Callistachyn* Vent.

- ovata* Sims. 2. C. foliis ternis obovatis mucronatis. *Nov. Holl. Bot. mag. t. 1925.*

Ad *Pultenaeam* Sm.

- Post n. 3. *parviflora* Sieb. 18. P. foliis spathulatis recurvo-mucronatis subeveniis glabris, junioribus ramulisque subvillosis, stipulis rufis scariosis appressis, capitulis paucifloris. *Nov. Holl.*
- plumosa* Sieb. 19. P. foliis linearibus concavis eveniis, junioribus ramisque villosis, floralibus villosissimis, stipulis fuscis scariosis appressis, capitulis subrotundis. *Nov. Holl.*
- thymifolia* Sieb. 20. P. foliis obovatis concavis eveniis glabris, superioribus villosis, stipulis deciduis, capitulis compactis. *Nov. Holl.*
- hypolampra* Sieb. 21. P. foliis oblongis obtusis glabris subtus nitidis punctatis sub-3nerviis, stipulis scariosis aristatis, capitulis subspicatis foliatis, calycibus villosis. *Nov. Holl.*
- capitellata* Sieb. 22. P. foliis spathulatis supra nitidis subtus incanosericeis, ramis glabris exstipulatis, capitulis compactis villosis. *Nov. Holl.*
- aristata* Sieb. 23. P. foliis linearibus convolutis enerviis subtus asperis basi ciliatis, stipulis fuscis elongatis subulatis, calycibus villosissimis aristatis. *Nov. Holl.*
- echinata* Sieb. 24. P. foliis confertis tereti-subulatis mucronatis sulcatis asperis, stipulis subulatis, bracteis ramo-pilosis. *Nov. Holl.*
- phylicoides* Sieb. 25. P. foliis linearibus obtufiusculis margine revolutis supra asperis subtus ramulisque incanis, capitulis subrotundis, calycibus obtusis. *Nov. Holl.*
- paleacea* Sm. 26. P. foliis linearibus fetaceo-mucronatis margine revolutis sericeis apice incurvis, bracteis scariosis mucronatis calyces superantibus. *Nov. Holl.*
- biloba* R. Br. 27. P. foliis bilobo-retusis supra scabris subtus ramisque incano-pubescentibus, stipulis fetaceis recurvis, calycibus sericeo-villosis. *Nov. Holl.* (P. deltoidea Sieb.)

pag. 351.

Ad *P. dentatam* Labill. deleatur syn. *P. paleacea* Sm.

- Ad *P. stipularem* Sm. (*P. pforaleoides* Sieb., non *proteoides* ut Cand. scribit.)
- Ad *P. ferrugineam* Rudg. (*P. lanata* Sieb.)
- Post n. 17. *racemulosa* Sieb. 28. *P. foliis* obovato-ellipticis obtusis supra scabris subtus glabris, ramulis pubescentibus, racemulis axillaribus foliatis. *Nov. Holl.*
- villifera* Sieb. 29. *P. foliis* ovato-lanceolatis cuspidato-aristatis subtus nitidis 3nerviis longissime ciliatis, ramulis hirtis, floribus axillaribus, bracteis scariosis cuspidatis. *Nov. Holl.*
- euchila* Cand. 30. *P. foliis* spathulato-linearibus obtusis glabris subtus glaucis, ramulis extipulatis angulatis, pedunculis subracemosis, laciniis calycis inaequalibus, aliis latis obtusis, aliis linearibus acutis. *Nov. Holl.* (*Dillwynia cuneata* Sieb.)
- microphylla* Sieb. 31. *P. foliis* spathulato-linearibus calloso-mucronatis supra glabris subtus ramulisque incanis, floribus subcapitatis, calycibus pubescentibus. *Nov. Holl.*
- asperata* Sieb. 32. *P. foliis* linearibus revolutis glabriusculis supra tuberculoso-asperis, ramulis extipulatis calycibusque glabris, floribus lateralibus subspicatis foliatis. *Nov. Holl.*
- comosa* Sieb. 33. *P. foliis* linearibus revolutis supra muricato-asperis subtus ramulisque extipulatis strigillofis, floribus lateralibus subspicatis foliatis. *Nov. Holl.*
- squarrosa* Sieb. 34. *P. foliis* linearibus apice recurvo-mucronatis revolutis squarrosis scabris, ramulis extipulatis, floribus foliatis, calycibus spinulosis. *Nov. Holl.*

pag. 352.

Ad *Daviesiam* Sm.

- D. reticulatam* Sm. satius est cum Candolleo Jacksoniis accensere.
- racemulosa* Cand. 13. *D. foliis* lineari-lanceolatis acuminatis pungentibus, racemis solitariis bracteatis folio brevioribus. *Nov. Holl.*

Ad *Dillwyniam* Sm.

- D. parvifolia* R. Br. — foliis subcarnosis punctatis oblique mucronatis.
- Ad *D. ericaefoliam* Sm. *D. pinifolia* Sieb. var.
- acicularis* Sieb. 6. *D. foliis* filiformibus mucronatis rigidis erectis glabris, ramulis incanis, racemis terminalibus. *Nov. Holl.*
- rudis* Sieb. 7. *D. foliis* lineari-filiformibus mucronatis rigidis asperis, ramulis villosis, racemis spicatis foliatis. *Nov. Holl.* *D. hispidula* et *teretifolia* Sieb. varr.
- sinerascens* R. Br. 8. *D. foliis* lineari-filiformibus patentibus mucronato-pungentibus, junioribus ramulisque strigillofis, racemis paucifloris subterminalibus, calycibus sericeis. *Nov. Holland.* (*P. juniperina* Sieb.)

tenuifolia Sieb. 9. *D.* foliis linearibus gracillimis obtusiusculis rectis, ramulis subpubescentibus, pedunculis solitariis. *Nov. Holl.*

pag. 353.

Ad *Aotum* Sm.

- villosa* Sm. 1. *A.* foliis linearibus revolutis acutiusculis supra nitidis patentibus, ramulis pubescentibus, calycibus subfoliariis villosis. *Nov. Holl.* (*Pultenaea rosmarinacea* Sieb.)
- virgata* Cand. 2. *A.* foliis linearibus obtusis revolutis supra scabris erectis strictis, ramis tomentosis, floribus racemoso-spicatis lateralibus, calycibus sericeis. *Nov. Holl.* (*Pultenaea virgata* Sieb.)

Ad *Jacksoniam* R. Br.

- reticulata* Cand. 3. *J.* fruticosa, foliis lanceolatis pungentibus utrinque reticulato-venosis, stipulis geminis, floribus axillaribus solitariis. *Nov. Holl.* (*Daviesia* Sm.)
- furcellata* Cand. 4. *J.* fruticosa, ramis teretibus, ramulis furcellatis inermibus compressis striatis, racemis terminalibus, pedicellis apice bracteatis. *Nov. Holland.* (*Gompholobium furcellatum* Bonpl. plant. Navarr. t. 11.)
- horrida* Cand. 5. *J.* fruticosa, ramis angulatis, ramulis foliiformibus angulato-compressis spiniscentibus, racemis terminalibus, pedicellis medio bracteatis. *Nov. Holl.*

Ad *Burtoniam* R. Br.

- scabra* R. Br. 1. *B.* foliis petiolatis ternatis lineari-subulatis subaduncis scabris muticis, ramulis teretibus pubescentibus. *Nov. Holl.* (*Gompholobium scabrum* Sm.)
- minor* Cand. 2. *B.* foliis sessilibus ternatis linearibus aduncis mucronatis erectis laevibus, ramulis teretibus hirtis. *Nov. Holl.* (*Gompholobium minus* Sm.) *B. sessilifolia* Cand. var. foliis longioribus.
- conferta* Cand. 3. *B.* foliis simplicibus confertissimis lineari-subulatis margine revolutis ramisque glabris. *Nov. Holl.*

Ad *Mirbeliam* Sm.

- speciosa* Sieb. 3. *M.* foliis linearibus acutiusculis revolutis integerrimis, pedunculis axillaribus aggregatis, calycibus sericeis. *Nov. Holl.*

Post *Mirbeliam* :

BAPHIA Afzel.

- nitida* Loddig. *Afric. occid.* Arbor foliis pinnatis oblongis nitidis, floribus pedunculatis axillaribus albis.

Ad *Ormofiam* Jackf.

- dasycarpa* Jackf. 1. O. ramis ferrugineis leguminibusque tomentosis, foliolis oblongis acuminatis glabris. *Ind. occid.* (Sophora monosperma Sw., Podaliria Poir.)
- coccinea* Jackf. 2. O. foliolis subovatis coriaceis revolntis utrinque leguminibusque glabris. *Guiana.* (Robinia coccinea Aubl.)
- coarctata* Jackf. 3. O. foliolis inaequalibus supra glabris subtus ferrugineo-hirsutis. *Guiana.*

pag. 354.

Ad *Samydam*.

- Post n. 6. *macrocarpa* Gand. 15. S. foliis ovatis acutis serratis subtus subtomentosis, pedunculis axillaribus brevissimis subaggregatis. *Mexico.*

pag. 356.

Ad *Casariam*.

- Post n. 23. *glomerata* Roxb. 24. C. foliis ovali-oblongis acuminatis glabris subserratis, pedunculis fasciculatis abbreviatis 1floris. *Bengal.*

pag. 357.

Ad *Copaiferam*.

- * *Foliis abrupte pinnatis,*
† *pellucido-punctatis.*

- Jussievi* Hayn. 1. C. foliolis alternis ovato-lanceolatis acuminatis petiolisque glabris. *Peru?* Hayn. plant. off. 10. t. 17. b.
- laxa* Hayn. 2. C. foliolis suboppositis ovato-ellipticis obtusis subtus ad costam petiolisque pubescentibus, spicis pedunculatis compositis villosis. *Brazil.* Hayn. plant. off. 10. t. 18.
- Langsdorffii* Desf. 3. C. foliolis 3-5jugis alternis ellipticis obtusis ciliatis splendidis, petiolis pedunculisque pubescentibus, spicis compositis. *Brazil.* Mém. du mus. 7. t. 14. Hayn. plant. off. 10. t. 19.
- oblongifolia* Mart. 4. C. foliolis suboppositis 6-8jugis elliptico-oblongis submarginatis glabris, petiolis pubescentibus, stipulis lanceolatis, spicis compositis folio brevioribus. *Brazil.* Hayn. plant. off. 10. t. 23. a.
- † *trapezifolia* Hayn. 5. C. foliolis alternis 7jugis trapezio-ovatis obtusis glabris, petiolis pubescentibus. *Brazil.* Hayn. plant. off. 10. t. 23. b. c.
- multijuga* Mart. 6. C. foliolis alternis multijugis ovato-oblongis acuminatis nitidis glabris costato-venosis. *Brazil.*
- bijuga* W. herb. 7. C. foliolis oppositis 2jugis oblique ovato-oblongis acutiusculis coriaceis nitidis petiolisque glabris, spicis paniculatis. *Brazil.* Hayn. plant. off. 10. t. 16.

- Jacquini* Desf. 8. *C. foliolis alternis 2-5jugis ovato-oblongis acutiusculis nitidis parallele venosis petiolisque glabris, spicis paniculatis. Inf. Carib. Nov. Granat. (Copaiva officinalis Jacq., Copaifera officinalis W. Cand. Kunth. in Humb. nov. gen. 7. t. 659.)*
- guianensis* Desf. 9. *C. foliolis oppositis 4jugis subcordato-oblongis acuminatis parallele venosis glabris nitidis, spicis compositis. Guiana. Mém. du mus. 7. t. 13.*
- †† *Foliis epunctatis.*
- Martii* Hayn. 10. *C. foliolis oppositis sub-3jugis ovali-oblongis acutiusculis margine subrevolutis petiolisque glabris, spicis paniculatis. Brasil. Hayn. plant. off. 10. t. 15.*
- nitida* Mart. 11. *C. foliolis oppositis sub-4jugis ovato-oblongis acutis reticulato-venosis nitidis petiolisque glabris, ramulis verrucosis, racemis spicatis paniculatis elongatis, floribus remotiusculis. Brasil. Hayn. pl. off. 10. t. 17. a.*
- coriacea* Mart. 12. *C. foliolis oppositis sub-3jugis ovalibus emarginatis coriaceis glabris subtus glaucescentibus, spicis paniculatis. Brasil. Hayn. pl. off. 10. t. 20.*
- cordifolia* Hayn. 13. *C. foliolis oppositis sub-5jugis cordato-oblongis obtusis subtus ad costam petiolisque pubescentibus, pedunculis racemosis. Brasil. Hayn. pl. off. 10. t. 21.*
- Selloi* Hayn. 14. *C. foliolis subalternis 4jugis lanceolatis obtusiusculis, petiolis subtomentosis, spicis paniculatis. Brasil. Hayn. pl. off. 10. t. 22.*

** *Foliis impari-pinnatis vix pellucido-punctatis.*

- Beyrichii* Hayn. 15. *C. foliolis sub-3jugis oblongo-lanceolatis acuminatis petiolisque glabris, pedunculis racemosis. Brasil. Hayn. pl. off. 10. t. 12.*

Post *Crudiam* Schreb.:

GEISSOIS Labill.

- racemosa* Labill. *Nov. Caledon. Arbor foliis quinato-digitatis subtus discoloribus, stipulis oppositis magnis oblongis, floribus racemosis.*

DETARIUM Juss.

- senegalense* Juss. *Senegambia. Arbor foliis impari-pinnatis subtus villosis, floribus racemosis.*

pag. 359.

Ad *Bucidam*.

- megapotamica* *3. *B. racemis subcorymbosis, bracteis sericeis, calycibus lanatis, foliis oblongis lanceolatis obtusis submucronatis. Ad fl. magnum Amer. austr.*
- B. capitata* Vahl. *habet bracteas villosas calycesque glabros: B. Buceras bracteas caducas, calyces sericeos.*

pag. 360.

Ad *Hydrangeam*.

- Post n. 1. *anomala* Wallich. 6. H. cymis terminalibus hirsutis, floribus conformibus, foliis ovatis acuminatis sinuato-dentatis nudiusculis, petiolis nervisque pilosis. *Nepal*.
- heteromalla* Wallich. 7. H. cymis radiatis diffuse ramosissimis pilosis, radiis integerrimis, foliis oblongis acuminatis serrulatis subtus tomentosis. *Emodi montes*.
- aspera* Don. 8. H. corymbis paniculatis diffusis radiatis, radiis ovatis mucronatis ferratis, foliis lanceolatis acuminatis serrulatis subtus ramulisque dense incano-tomentosis. *Nepal*.

pag. 361.

Ad *Tiarellam*.

- polyphylla* Wallich. 5. T. foliis cordatis 3-5lobis argute ferratis utrinque pilosis, caule glanduloso-piloso, racemo laxo, laciniis calycis oblongis mucronatis. *Emodi montes*.

pag. 362.

Ad *Saxifragam*.

- Post n. 11. *foliolosa* R. Br. 118. S. foliis radicalibus cuneatis subdentatis, caule diviso folioloso, ramis 1floris, calycibus obovatis, petalorum laminis cordato-lanceolatis. *Inf. Melville*. (S. stellaris β . comosa W.)
- Post n. 13. *cuscutaeformis* Loddig. 119. S. stolonibus reptantibus, foliis cordato-orbiculatis repandis utrinque hirsutis albo-venosis, scapo subbifloro pubescente, petalis aequalibus lanceolatis. *China*. Bot. mag. 2631.

pag. 363.

- Post n. 22. †*hyperborea* R. Br. 120. S. foliis glaberrimis, radicalibus palmatis, petiolis elongatis, caule lanato subbifloro, bracteis oblongo-linearibus sessilibus, petalis 1nerviis. *Inf. Melville*.
- †*petiolaris* R. Br. 121. S. foliis radicalibus palmatis subsessilibus glandulosis, florali lobato, scapo foliis subbrevisiori, petalis 3nerviis. *Amer. arctic*.

pag. 369.

Ad *S. petraeam*. S. cervicornis Viv. var. *Corfica*.

pag. 371.

Ad *Gypsophilam*.

- Post n. 2. *dioeca* * 32. G. floribus paniculatis dioecis, foliis sessilibus lanceolatis, calycibus ovatis basi subaugulatis glabris, bracteis foliaceis acutis. *Ad fl. Platan*. Sello. (*Saponaria dioeca* Schlechtend.)

pag. 372.

- Post n. 15. *cerastioides* Wallich. 33. G. caule erecto 4gono piloso, foliis obovatis subsessilibus hirsutis, floribus corymbosis, laciniis calycis lanceolatis acutis membranaceo-fimbriatis, petalis emarginatis. *Nepal.*

pag. 373.

- Post n. 29. *transylvanica* * 34. G. caule herbaceo stricto, foliis linearibus carinatis obtusiusculis, floribus fasciculatis, bracteis minutis, calycibus coloratis, staminibus alternis abortientibus. *In alpibus dinariis.* (Banffy petraea Baumg. transylvan. 1. 385. Syt. veg. 1. 866.)

pag. 377.

Ad *Dianthum*.

- Ad *D. diffusum* Sm. *D. graminifolius* Presl. *Sicilia* var.

pag. 381.

- Post n. 73. *ficulus* Presl. 78. D. caule caespitoso 1floro, squamis calycis subfensis obovatis mucronatis tubo triplo brevioribus, petalis fimbriato-dentatis, foliis linearibus canaliculatis ciliato-scabris. *Sicil.*

- Arrostii* Presl. 79. D. caule caespitoso sub-1floro, squamis calycis quaternis emarginatis mucronatis tubo quater brevioribus, petalis fimbriato-dentatis imberbibus, foliis linearibus canaliculatis glaucescentibus rigidis ferrulatis. *Sicil.*

pag. 382.

- Ad *Chrysoplenium oppositifolium*. (Chr. nepalense Don.) - *Emodi montes.*

pag. 384.

Ad *Malpighiam*.

- Post n. 21. *macrophylla* W. suppl. 37. M. foliis amplis ovalibus integerrimis supra sericeo-strigillosis subtus setoso-aculeatis, umbellis lateralibus sessilibus. *Brasil.* Coll. hort. ripul. t. 11.

pag. 391.

Ad *Schinum*.

- † *terebinthifolius* Radd. 5. Sch. foliis impari-pinnatis sub-3jugis subaequalibus subferratis, floribus racemosis. *Brasil.*

pag. 392.

Ad *Stellariam*.

- Post n. 3. *monogyne* Wallich. 41. St. caule ramosissimo procumbente glabro, geniculis barbatis, foliis petiolatis

subrotundis nervosis glabris, umbellis dichotomis pedunculatis, floribus 5andris 1stylis. *Nepal.*

- Post n. 10. *saxatilis* Hamilt. 42. St. caule erecto simpliciusculo foliisque elliptico-oblongis mucronulatis utrinque tomentosis, pedunculis axillaribus trichotomis multifloris, calycibus acuminatis corolla longioribus. *Nepal.*
- Edwardfii* R. Br. 43. St. caule glabro, foliis ovato-lanceolatis integerrimis enerviis nitidis, pedunculis terminali-viis sub-1floris, petalis 2partitis lacinias calycis 3nervias superantibus, antheris purpureis. *Amer. arctic.*
- marginata* Chamiff. 44. St. caule caespitoso glaberrimo 4gono, foliis connatis ovato-lanceolatis cartilagineo-marginatis apice uncinatis, pedunculis axillaribus solitariis, petalis capsulisque calycem aequantibus. *Orae freti Bering.*
- rispa* Chamiff. 45. St. caule diffuso glaberrimo, foliis brevissime petiolatis ovatis acuminatis repando-undulatis 3nerviis, pedunculis axillaribus solitariis, calycibus 3nerviis petala superantibus. *Inf. Aleut.*

pag. 393.

St. tetragona Blum. in *Java* a *St. uliginosa* Sm. vix differt.

- Post n. 20. *patens* Wallich. 46. St. caule decumbente foliisque sessilibus lineari-lanceolatis acutis utrinque villosis, pedunculis axillaribus 3fidis paucifloris, calycibus acutis glabris corollam aequantibus. *Nepal.*
- monosperma*, Hamilt. 47. St. caule elato foliisque sessilibus late lanceolatis acuminatis glabris, panícula terminali trichotoma multiflora, calycibus obtusis corolla brevioribus, capsula 1sperma. *Nepal.*
- nitida* Hook. 48. St. caule erecto 4gono superne glaberrimo, foliis lanceolatis nitidis siccitate 3nerviis, pedunculis subpaniculatis, calyce obtuso petalis breviori. *Grönland.*
- laeta* Richardf. 49. St. caule decumbente foliisque lineari-lanceolatis carinatis laevibus glaucis, pedunculis subgeminis terminalibus, calyce villosiusculo petala aequante. *Amer. arctic.*
- gracilis* Richardf. 50. St. caule gracili 4quetto foliisque lanceolatis enerviis glaberrimis, ramis sterilibus gemma foliorum terminatis, flore solitario subterminali, calyce 3nervio petalis subbreviori. *Ad sinum Hudson.*

pag. 394.

- Post n. 35. *ligustrina* * 51. St. caule suffruticoso erecto ramoso, foliis lanceolatis acutis revolutis sub-3plinerviis glabris, floribus paniculatis, petalis calyce brevioribus, capsula 3valvi. *Inf. Sandwich.* (*Schiedea ligustrina* Chamiff.)

pag. 396.

Ad *Arenariam*.

- Post n. 17. *Redowskii* Chamiff. 117. A. caule procumbente caespitoso, foliis ovatis utrinque attenuatis mucronatis glabris basi ciliatis, pedunculis terminalibus calycibusque corolla brevioribus pubescentibus. *Sibir.?*
- nepalensis* * 118. A. caule diffuso angulato, foliis petiolatis oblongis mucronatis ciliato-ferrulatis, floribus corymbose-paniculatis, pedunculis glandulosis bracteatis, calycibus amplis coloratis obtusis, petalis minutis, capsula 1sperma. *Nepal.* (*Bra-chytemma calycinum Nepal.*)

pag. 397.

- Post n. 29. *Salzmanni* Presl. 119. A. caule ramosissimo flaccido villoso, foliis oblongo-lanceolatis acutis hispidis ciliatis, panicula dichotoma, calycibus 3nerviis margine scariosis corolla brevioribus capsula subglobosa longioribus. *Sicil.*

Ad *A. procumbentem* Vahl. *A. rosea* Presl.

pag. 398.

- Post n. 45. *abietina* Presl. 120. A. caule caespitoso ascendente paucifloro subvilloso, foliis lineari-lanceolatis aristatis rigidis glabris basi ciliatis, petalis obovatis emarginatis calycem acuminatum superantibus. *Sicil.*
- elegans*
Chamiff. 121. A. caule caespitoso ramoso foliisque linearibus obtusis crassiusculis glaberrimis, pedunculis solitariis, calycibus subulatis, capsula 3valvi. *Asia arctica ad fretum Bering.*

pag. 399.

Ad *A. polygonoidem* Wulf. varietas e solo sterili pertinet: *Gouffeia arenarioides*, quam Robillard et Castagne in agro massiliensi invenerunt, stylo tertio abortiente. Semina duo vel tria, quae quaterna in *A. polygonoide*. Cand. fl. gall. 6. 609. Semina subfolitaria in *Stellaria monosperma* Hamilt., *Arenaria bavarica* L. et *nepalense* *.

- Post n. 59. *quadri-valvis* R. Br. 122. A. caule caespitoso, foliis lineari-subulatis 3nerviis glabris, pedunculis unifloris elongatis pubescentibus, calycibus acutissimis 3nerviis petala superantibus, capsula 4valvi. *Inf. Melville.*

Ad *A. grandifloram* L. del. Iyn. *A. abietina* Presl.

pag. 400.

- Post n. 72. *Cerviana* Chamiff. 123. A. caule dichotomo foliisque lineari-filiformibus mucronatis succulentis glabris, floribus dichotome paniculatis glomeratis, capsulis 3valvibus calycem superantibus. *Chili.*

pag. 401.

Ad *A. cucubaloidem* Sm. *A. nardifolia* Ledeb. ex Imao var.

pag. 402.

Ad *A. bavaricam* L. (*A. Ponae* Reichenb. ic. t. 138.)

pag. 403.

Post n. 109. *subulifolia* Presl. 124. *A.* caule caespitoso simplici, foliis subulatis obtusiusculis glaberrimis, panicula dichotoma, calycibus acutissimis glanduloso-pubescentibus petala duplo superantibus, capsula 3valvi calycem aequante. *Sicilia*. (*A. arvatica* Presl.)

laricina Schlechtend. 125. *A.* caule decumbente, foliis fasciculatis subulatis rigidis ciliatis, floribus paucis terminalibus, petalis calycem superantibus, seminibus disciformibus ciliatis. *Sibir.* (*Spergula laricina* L. Syst. veg. 2. 422.)

Roffii R. Br. 126. *A.* caule ramosissimo, foliis 3quetto-subulatis obtusiusculis, pedunculis 1floris elongatis, petalis oblongis sepala sub-3nervia superantibus. *Amer. arctic.*

pag. 405.

Ad *Silenem*.

Post n. 13. *pauciflora* Cand. 146. *S.* caule erecto gracili basi foliato superne subviscoso, foliis subspathulato-lanceolatis acutis basi longe attenuatis glabriusculis, pedunculis elongatis, calycibus clavatis glaberrimis, petalis longe unguiculatis reticulatis, genitalibus exsertis. *Corfica. Sardinia.* Moris.

pag. 408.

Ad *S. nicaensem* All. *S. arenicola* Presl. var.Ad *S. cernuam* Thunb. *S. pilofellaefolia* Schlechtend.Ad *S. lusitanicam*. *S. fardoa* Moris.

pag. 409.

Ad *S. cerafoidem*. *S. matutina* Presl.

pag. 410.

Post n. 77. *undulatifolia* Moris. 147. *S.* caule erecto glabro, foliis spathulato-oblongis obtusis undulatis glabris, floribus subfasciculatis, calycibus glaberrimis coloratis, petalis 2lobis. *Sardinia.*

pag. 411.

Post n. 97. *calycina* Presl. 148. *S.* caule simplici erecto scabro apice viscoso, foliis lineari-lanceolatis acutis ferrulato-ciliatis, floribus paniculatis bracteatis,

calycibus longissime clavatis pedicellisque viscoso-pubescentibus, petalis 2fidis coloratis. *Sicil.*

pag. 412.

Ad *S. italicam* Gand. *S. ficula* Presl. var.

pag. 415.

Ad *S. inflatam* Sm. *S. crassifolia* Thor., *Thorei* Dufour.

pag. 416.

Ad *Cherleriam*.

Ch. octandra Sieb., imbricata Ser., potius *Arenaria aretioides* Portenschl. Gay.

dicranoides Chamiss. 4. *Ch. humilis* dense caespitosa, foliis arcte imbricatis spatulato-oblongis glaberrimis carinatis, pedunculis solitariis brevissimis. *Ora asiatica freti Bering.*

juniperina Don. 5. *Ch. dense* caespitosa, foliis imbricatis lanceolatis mucronatis subtus carinatis laevibus, pedunculis axillaribus solitariis brevissimis, petalis calyce duplo longioribus. *Nepal.*

grandiflora Don. 6. *Ch. dense* caespitosa, foliis confertis tetrastrichis lanceolatis mucronatis rigidis basi ciliatis, pedunculis terminalibus 1floris, petalis obovatis (roseis) calycem superantibus. *Nepal.*

pag. 417.

Ad *Cerastium*.

Post n. 13. *furcatum* Chamiss. 54. *C. caule* simpliciusculo ascendente superne glanduloso, foliis late lanceolatis acutis hirtis, floribus dichotome paniculatis, calyce obtuso petalis breviori capsulam excedente. *Sibir.?*

Ad *C. arvense*. *C. grandiflorum* Don., oblongifolium Torr. var.

pag. 418.

Post n. 23. *Beringianum* Chamiss. 55. *C. caule* caespitoso ascendente hirsuto superne viscoso, ramis elongatis paniculatis, foliis oblongis acutiusculis, floribus nutantibus, petalis capsulisque cylindricis calycem acutum superantibus. *Ora Amer. arctic. ad frctum Bering.*

pag. 421.

Ad *Lychnidem dioecam*. *L. divaricata* Reichenb. ic. t. 303. var. *glabra*.

pag. 422.

Spergula laricina L. deleatur, *Arenariis* supra, Willdenovio et Schlechtendalio suadentibus, adnumerata.

Ad *Bergiam*.

repens Blum. 4. B. caule ramofo repente, foliis lanceolatis ferulatis, floribus glomeratis axillaribus. *Java*.

pag. 423.

Ad *Oxalida*.

Agmen ducant

Subaphyllae.

fruticosa Radd. 140. O. caule suffruticofa ramofo, petiolis foliaceis lanceolatis nervofis glabris, pedunculis lateralibus abbreviatis fubracemofis, ftylis ftamina fuperantibus. *Brafil*. (O. rufciformis Mikan. Zuccarin. in act. acad. monach. 9. t. 2.)

bupleurifolia Hilar. 141. O. caule suffruticofa fimpliciusculo, petiolis foliaceis fubaphyllis nervofis, pedunculis complanatis elongatis 2fidis, ftaminibus ftylis fuperantibus. *Brafil*. (O. daphnaeformis Mik.)

† *faliciformis* Mik. 142. O. caule ramofiffimo, ramis virgatis, petiolis foliaceis fparfis, pedunculis elongatis 2fidis racemofis, ftylis breviffimis. *Brafil*.

Post n. 6. *ovata* Zuccar. 143. O. caule suffruticofa fimpliciusculo foliisque ovatis acutiufculis glabris, nervo medio fubtus bafi incralfato, pedunculis multifloris, ftaminibus ftylis fuperantibus. *Brafil*.

alata Mart. 144. O. caule suffruticofa, foliis ovatis acutis pubefcentibus, pedunculis elongatis alatis multifloris, ftylis ftamina fuperantibus. *Brafil*.

pag. 424.

Ad O. *punctatam* L. (O. *Piottae* Coll.)

Post n. 23. *megapotamica* * 145. O. foliolis obcordatis denfe pilofis, calycibus obtufiusculis, ftaminibus interioribus ftylis fuperantibus. *Rio grande*. Sello.

hispidula Zuccar. 146. O. foliolis obcordatis ciliatis fubtus glaucefcentibus, calycibus acutis 2glandulofis, ftylis ftamina longiora fuperantibus. *Monte Video*.

eriorrhiza Zuccar. 147. O. bulbo lanato, foliolis obcordato-bilobis glabris, petiolis hirtis, ftaminibus ftylis fuperantibus. *Monte Video*.

† *lobata* Sims. 148. O. radice tuberofa, foliolis obcordato-bilobis glabris fubtus glaucefcentibus, calycibus acutis. *Chili*. Bot. mag. 2386.

nana Hilar. 149. O. foliolis obovatis glabris, ftylis ftamina fuperantibus. *Rio grande*.

pag. 426.

Post n. 53. *lafiopetala* Zuccar. 150. O. radice tuberofa, foliolis obcordato-bilobis fupra glabriufculis fubtus pubefcentibus, fcapo fub-3floro, petalis extus margine pilofis, ftylis ftamina fuperantibus. *Monte Video*.

- rubra* Hilar. 151. O. foliolis obcordatis punctatis glabriusculis, scapo umbellifero, stylis stamina superantibus. *Brasil.*
- rupestris* Hilar. 152. O. foliolis obcordatis pilosis, scapo umbellifero, calycibus maculatis, staminibus stylis superantibus. *Brasil.*
- urbica* Hilar. 153. O. foliolis obcordatis pilosis, umbellis compositis, calycibus maculatis, stylis intermediis. *Brasil.* (O. violacea Savign., Martiana Zuccar.)
- triangularis* Hilar. 154. O. foliolis truncato-triangularibus sericeo-villosis, scapo umbellifero, staminibus stylis superantibus. *Brasil.*
- palustris* Hilar. 155. O. foliolis truncato-triangularibus glabriusculis, scapo umbellifero, stylis stamina aequantibus. *Brasil.* (O. papilionacea W. herb.)
- bipartita* Hilar. 156. O. foliolis linearibus bipartitis glabriusculis, scapo umbellifero, stylis intermediis. *Brasil.*

pag. 427.

- Post n. 80. *macromischos* * 157. O. caule basi nudo stipulato, foliis fastigiato-verticillatis cauleque incano-villosis, foliolis linearibus submarginatis, pedunculis longissimis demum refractis, stylis brevissimis. *C. B. S.*

pag. 428.

- Post n. 88. *confertissima* Hilar. 158. O. caule suffruticoso, foliis parvis confertissimis, foliolis obovatis pilosis, stylis stamina superantibus. *Brasil.*
- caespitosa* Hilar. 159. O. caule suffruticoso brevissimo, foliolis obcordatis ciliatis, pedunculis folia superantibus, stylis longissimis. *Brasil.*
- Sternbergii* Zuccar. 160. O. caule erectiusculo abbreviato foliolisque obcordato-bilobis hirtis, pedunculis petiolos superantibus. *Peru.* Hänke.
- Commerfonii* Pers. 161. O. caule brevissimo piloso, foliolis obovatis tomentosis, pedunculis folia subsuperantibus, calycibus obtusis. *Monte Video.* (O. sexenata Savign., hallucinatione folia sena indicantur.)
- paludosa* Hilar. 162. O. caule prostrato glaberrimo, foliolis obcordatis, petiolis basi stipulaceis dilatatis, pedunculis folia superantibus, stylis intermediis. *Brasil.*
- myriophylla* Hilar. 163. O. caule prostrato ramofo, foliis numerosis fasciculatis, foliolis profunde obcordatis villosis, stylis stamina superantibus. *Brasil.*
- amara* Hilar. 164. O. caule prostrato hirsuto, foliolis obcordatis villosis, pedunculis folia, staminibus stylis superantibus. *Brasil.*
- Post n. 90. *serpens* Hilar. 165. O. caule repente, foliolis obcordatis subvillosis, pedunculis folia, staminibus stylis superantibus. *Brasil.*

pag. 429.

- Post n. 106. *refracta* Hilar. 166. O. caule diffuso piloso, foliolis obcordatis ciliatis, pedunculis folia superantibus

2-3fidis umbelliferis, pedicellis fructiferis re-
fractis, stylis stamina superantibus. *Brazil.*

- Hänkeana* * 167. O. caule erecto foliolisque obovatis emargina-
tis glabris, pedunculis 2fidis multifloris folia su-
perantibus, floribus laxe racemosis, staminibus
stylis superantibus. *Peru.* (O. melilotoides Zuc-
car.)
- hispida* Mart. 168. O. caule brevissimo foliolisque obovatis emar-
ginatis hispidis, pedunculis folia aequantibus sub-
3floris, staminibus stylis superantibus. *Brazil.*
- squamata*
Zuccar. 169. O. caule humili squamato, foliolis obcordato-
bilobis glabris, pedunculis axillaribus dichoto-
mis multifloris. *Chili.* Hänke.
- crassicaulis*
Zuccar. 170. O. caule ascendente carnosio, foliolis obcorda-
tis subtus pubescentibus, stipulis lanceolatis acutis
ciliatis, pedunculis elongatis umbelliferis pauci-
floris, staminibus stylis subaequantibus. *Peru.*
Hänke.

pag. 430.

- Ad O. *albicans* Kunth. O. cinerea Zuccar. var.
- Ad O. *Barrelieri* L. (O. campestris Mart.)
- Ad O. *rhombofoliam* Jacqu. del. O. hedyfarifolia Radd.
- Ad O. *pentantham* Jacqu. del. Neaei Cand., apponatur O. divari-
cata Mart. var.
- Ad O. *Plumerii* Jacqu. O. umbraticola Hilar.
- O. *fruticosa* Radd. deletur, supra melius collocata.
- Post n. 122. *rhombéo-ovata* Hilar. 171. O. caule suffruticoso, fo-
liolis rhombéo-ovatis acuminatis ciliatis, medio
majori, petiolis nudis, pedunculis 2fidis multifloris,
staminibus stylis superantibus. *Brazil.* (O.
Neaei Cand., hedyfarifolia Radd.)
- cytisoides* Mart. 172. O. ramis tomentosis, foliolis ovatis utrinque
attenuatis incano-villosis, pedunculis folia supe-
rantibus multifloris, stylis stamina superantibus.
Brazil.
- densifolia* Mart. 173. O. caule virgato densissime folioso foliolisque
obcordato-bilobis hirtis, pedunculis elongatis
sub-8floris, stylis stamina superantibus. *Brazil.*
- rosellata* Hilar. 174. O. caule brevissimo suffruticoso, foliolis pu-
bescentibus, lateralibus subrotundis, intermedio
oblongo elongato, pedunculis 2fidis paucifloris,
stylis stamina superantibus. *Brazil.* (O. puberula
Mart.)
- insipida* Hilar. 175. O. caule simplici suffruticoso, foliolis oblongo-
lanceolatis acuminatis subtus pubescentibus, pe-
dunculis 2fidis. *Brazil.*
- linearis* Zuccar. 176. O. caule simplici suffruticoso, foliolis lineari-
bus acutiusculis hirsutis, pedunculis terminali-
bus solitariis elongatis multifloris, stylis stamina
superantibus. *Brazil.* Sello.
- cajanifolia*
Hilar. 177. O. caule suffruticoso pubescente, foliolis ova-
to-lanceolatis acuminatis, pedunculis 2fidis ra-
cemosis, staminibus stylis superantibus. *Brazil.*
(O. polymorpha Mart.)

- sepium* Hilar. 178. O. caule suffruticoso glabro, foliis verticillatis, foliolis ovatis obtusiusculis, pedunculis bifidis racemosis, staminibus stylos superantibus. *Brazil.*
- melilotoides* Hilar. 179. O. caule suffruticoso pilosiusculo, foliolis ovatis obtusis, pedunculis bifidis racemosis, staminibus stylos superantibus. *Brazil.*
- euphorbioides* Hilar. 180. O. caule suffruticoso pubescente viscoso, foliolis obtusis glabris, inferioribus ovatis, reliquis linearibus, pedunculis 2fidis 7floris, staminibus intermediis. *Brazil.*
- nigrescens* Hilar. 181. O. caule suffruticoso pilosiusculo, foliolis ovato-oblongis glaberrimis, pedunculis 2fidis racemosis, staminibus intermediis. *Brazil.*
- saxatilis* Hilar. 182. O. caule fruticoso ramosissimo, foliolis parvis subrotundis, pedunculis breviter 2fidis, staminibus stylos superantibus. *Brazil.* (O. leptophylla Zuccar.)
- distans* Hilar. 183. O. caule suffruticoso ferrugineo, foliolis obovatis retusis villosis, pedunculis umbelliferis. *Brazil.* (O. hirsutissima Mart.)
- fulva* Hilar. 184. O. caule suffruticoso hirsutissimo, foliolis subrotundis villosis, pedunculis 2fido-umbelliferis, staminibus stylos superantibus. *Brazil.*
- cordata* Hilar. 185. O. caule suffruticoso, foliis cordatis magis pubescentibus, pedunculis 2fido-umbelliferis. *Brazil.*
- campestris* Hilar. 186. O. caule suffruticoso, foliolis obcordatis hirsutis, pedunculis 2fido-umbelliferis, staminibus stylos superantibus. *Brazil.*

pag. 431.

O. *Commerfonii* del. supra jam melius collocata.

pag. 432.

- Post n. 138. 139. *mimosoides* Hilar. 187. O. caule fruticoso simplici, foliis abrupte pinnatis multijugis pubescentibus, foliolis lineari-oblongis obtusis, pedunculis villosis bracteatis 3-4floris, staminibus stylos superantibus. *Brazil.* Hilar. fl. brasil. t. 21.
- casta* Mart. 188. O. caule fruticoso umbellatim ramoso, foliis abrupte pinnatis multijugis glabriusculis, foliolis adnatis subrhombis, fasciculis florum subsessilibus bracteatis, staminibus stylos superantibus. *Brazil.* Zuccar. in act. acad. monach. 9. t. 6.
- dormiens* Mart. 189. O. caule suffruticoso simplici, foliis abrupte pinnatis multijugis pubescentibus, foliolis subsessilibus basi angulatis oblongis obtusis, pedunculis aggregatis 1floris e glomerulo bractearum prodeuntibus. *Brazil.* Zuccar. in act. acad. monach. 9. t. 5.
- somnians* Mart. 199. O. caule suffruticoso simplici, foliis abrupte pinnatis sub-6jugis pubescentibus, foliolis extremis majoribus obovato-oblongis obtusis, infimis

subcordatis acutis, capitulis florum longe pedunculatis bracteatis, stylis stamina superantibus. *Brasil.* Zuccar. in act. acad. monach. 9. t. 4.

pag. 433.

Ad *Sedum*.

Post n. 8. *himalense* Don. 67. S. caule herbaceo erecto, foliis ovato-lanceolatis dentatis laevibus glaucis, corymbo subsimplici, radice crassa. *Emodi montes.*

Post n. 15. *asiaticum* * 68. S. caulibus caespitosis filiformibus e caudice crassissimo ortis, foliis sparsis linearilanceolatis obtusis integerrimis glaucis, umbellis paucifloris, calycibus obtusis, floribus 8-andris 4-fidis. *Emodi montes.* (*Rhodiola asiatica* Don.)

pag. 434.

Post n. 19. *Anacamperos* 69. S. caule decumbente, foliis obovatis integerrimis glaucis subseffilibus, ramorum steriliu[m] rosaceo-congestis, corymbis pedunculatis terminalibus. *Gallia austr.*

pag. 437.

Ad *Cotyledonem*.

Post n. 2. *coruscans* Haw. 26. G. foliis cuneiformibus mucronatis subinvolutis micantibus, floribus paniculatis pendulis. *C. B. S.* Bot. mag. 2201.

Post n. 9. *decussata* Lindl. 27. G. caule fruticoso, foliis decussatis subteretibus fusco-mucronatis glaucis, panicula longe pedunculata, floribus pendulis. *C. B. S.* Bot. reg. 915. (*C. papillaris* Haw. non Thunb.)

pag. 439.

Ad *Robergiam* Schreb.

glabra * 2. R. foliis pinnatis glabris, foliolis subcordatis acuminatis coriaceis, paniculis axillaribus folio brevioribus. *Ad Orinocum.* (*Rourea glabra* Kunth.)

POUPARTIA Commerf.

borbonica *Inf. Mascaren.* Arbor foliis pinnatis, racemis compositis, floribus atropureis.
J. F. Gmel.

CLASSIS XI.

pag. 447.

Ad *Bassiam*.

butyracea Roxb. 3. B. foliis obovatis infra tomentosis coriaceis, pedunculis glomeratis lfloris calycibusque lanatis. *Nepal*.

pag. 448.

Ad *Garciniam* manifesto pertinet *Stalagmites cambogioides* Murr., quae eadem sit ac *Garcinia Cambogia* Desr. sive fecus, ambigo.

pag. 449.

Ad *Elaeocarpum*.

E. ferratus — axillis venarum subtus glandulosis.

E. reticulatus Sm. (*Eriostemum dentatum* Coll. hort. ripul. t. 30.)

Post n. 5. *lanceolatus* Blum. 11. *E.* foliis lanceolatis obtusiusculis remote ferratis, racemis axillaribus folio longioribus nutantibus, fructibus ovalibus, nucleo rugoso aculeato. *Java*.

obtusus Blum. 12. *E.* foliis obovato-oblongis obtusiusculis basi mucronato-ferratis, racemis axillaribus petalisque sericeis. *Java*.

macrophyllus Blum. 13. B. foliis ovato-oblongis obtusis repando-ferratis, stipulis semiorbiculatis foliaceis, racemis axillaribus folio brevioribus. *Java*.

glaber Blum. 14. *E.* foliis ovato-oblongis obtusis mucronato-ferratis, racemis axillaribus folia superantibus. *Java*.

resinosus Blum. 15. *E.* foliis ovali-oblongis acuminatis obsolete ferratis, axillis venarum glandulosis, racemis axillaribus folio brevioribus. *Java*.

angustifolius Blum. 16. *E.* foliis oblongo-lanceolatis acuminatis basi ferrulatis, racemis axillaribus folio brevioribus, fructibus globosis, nucleo rugoso subsulcato. *Java*.

floribundus Blum. 17. *E.* foliis oblongis acuminatis obtuse ferratis coriaceis glaberrimis, racemis axillaribus nutantibus folia aequantibus. *Java*.

longifolius Blum. 18. *E.* foliis oblongis acuminatis mucronulato-repandis, racemis folio brevioribus sericeo-tomentosis. *Java*.

stipularis Blum. 19. *E.* foliis oblongis acuminatis ferrulatis, venis subtus pubescentibus, stipulis ovatis inciso-ferrulatis, racemis axillaribus villoso-tomentosis, fructibus ovalibus. *Java*.

tomentosus Blum. 20. *E.* foliis ovato-oblongis acuminatis fetaceo-denticulatis subtus ramulisque villoso-tomentosis, racemis axillaribus elongatis. *Java*.

pag. 450.

Ad *Triumfettam*.

- Post n. 6. *spicata* Blum. 23. Tr. foliis cordato-subrotundis 3lobis inaequaliter ferrulatis supra pubescentibus subtus villosis, floribus interrupte spicatis. *Java*.
- suffruticosa* Blum. 24. Tr. foliis cordato-ovatis acuminatis inaequaliter ferratis subtus stellato-pilofiusculis, junioribus semi-3fidis, pedunculis extraxillaribus aggregatis 3-5floris. *Java*.

pag. 451.

- Ad Tr. *trilocularem* Roxb. Tr. pseudo-angulata Blum. var.
- Post n. 8. *villosiuscula* Blum. 25. Tr. foliis subrotundo-ovatis 5nerviis argute duplicato-ferratis, ferraturis infimis callosis, supra villosiusculis subtus stellato-tomentosis, pedunculis extraxillaribus aggregatis 3floris. *Java*.

Ad Tr. *annuam* L. (Tr. *graveolens* Blum.)

- † *oblonga* Wallich. 26. Tr. foliis ovato-lanceolatis inaequaliter ferratis subtus lanatis. *Nepal*.

Ad Tr. *obliquam* Roth. (Tr. *cana* Blum.) add. pedunculis extraxillaribus aggregatis 3floris. Patria: *Java*.

pag. 454.

Ad *Lythrum*.

- Post n. 6. *quintuplinervium* Mart. 16. L. fruticosum, foliis sessilibus oppositis ovatis 5plinerviis glabris, floribus oppositis sessilibus. *Brazil*.
- tribracteatum* Salzm. 17. L. foliis alternis spathulatis glaberrimis, floribus axillaribus subaggregatis 6andris, bracteis ternis subrotundis, caule ramoso, ramis decumbentibus. *Ager monspel*.

pag. 456.

Ad *Cupheam*.

- Post n. 16. *parviflora* Hook. 24. C. suffruticosa glanduloso-pubescentis, foliis lanceolatis basi attenuatis subrepandis ciliatis, floribus racemosis terminalibus. *Guiana*.
- Melvilla* Lindl. 25. C. foliis oppositis oblongis utrinque attenuatis scabris, floribus terminalibus racemosis cernuis, petalis 0. *Ins. Carib. Bot. reg. 852*.
- Post n. 20. *megapotamica* * 26. C. caule herbaceo simplici glabro, foliis oppositis lineari-lanceolatis integerrimis, corymbis terminalibus paucifloris, calycibus glabris. *Rio grande. Sello*.

pag. 461.

Ad *Agrimoniā*.A. *repentis* patria est *Armenia*. Tournef.

- nepalensis* Don. 5. A. foliis interrupte pinnatis villosissimis, foliolis ovatis ferratis, impari petiolato, racemis rectis

tenuifloris, bracteis 3fidis calyce brevioribus, laciniis calycis lanceolatis acutis carinatis. *Nepal.*

Ad *Callicomam ferratifoliam* R. Br. (*Hermesia banksiaefolia* Syst. 2. 246.)

pag. 462.

Ad *Pleurandram* Labill.

Post n. 6. *stricta* Sieb. 19. Pl. foliis linearibus apice callofis striatis scabris, calycibus sessilibus acutis pubescentibus. *Nov. Holl.*

cistiflora Sieb. 20. Pl. foliis lineari-filiformibus acutis fulcatis punctato-asperis, calycibus terminalibus sessilibus glaberrimis margine membranaceis. *Nov. Holl.*

pag. 463.

Post n. 18. *astrotricha* Sieb. 21. Pl. foliis spathulato-linearibus calloso-asperis hirsutiusculis, ramulis stellato-pulverulentis, pedunculis ebracteatis nutantibus, calycibus acutis. *Nov. Holl.*

camforosma Sieb. 22. Pl. foliis fasciculatis filiformibus pilosis, ramis albido-hirsutis, calycibus solitariis sessilibus glabris mucronatis. *Nov. Holl.*

microphylla Sieb. 23. Pl. foliis confertis teretiusculis obtusis 4fulcatis incano-pubescentibus, pedunculis solitariis abbreviatis, calycibus obtusiusculis. *Nov. Holl.*

pag. 466.

Ad *Blackwelliam*.

† *nepalensis* Cand. 8. Bl. foliis oblongis acuminatis serrato-dentatis utrinque glabris, racemis axillaribus paniculatis folio subbrevioribus, floribus 6-7andris. *Nepal.*

pag. 467.

Ad *Bruneliam* R. et P.

propinqua Kunth. 7. B. foliis impari pinnatis 3-4jugis subtus fusco-tomentosis, foliolis oblongis obtusiusculis crenulato-serratis, paniculis ferrugineis. *Amer. austr.*

pag. 468.

Ad *Sempervivum*.

Post n. 9. *calyciforme* Haw. 27. S. foliis dense imbricatis spathulatis obtusis glaucis apice recurvis margine albidis glabris, corymbo terminali glanduloso-pubescente. *Madera. Bot. reg. 892.*

C L A S S I S XII.

pag. 471.

- Post n. 1819. *Neillia* Don. Cal. campanulatus 5fidus. Petala subrotunda. Antherae 2loculares. Caps. 2locularis polysperma. *Spiraeis affinis.*
- Pygeum* Gärttn. Cal. 6dentatus. Pet. 6. Drupa sicca oblonga 1sperma.

pag. 473.

- Ante n. 1849. *Brayera* Kunth. Cal. persistens turbinatus, limbo duplici, utroque 5lobo. Pet. 5 squamaeformia. Stigmata subpeltata lobata. Fructus 2 1spermi.
- Post n. 1860. *Cowania* Don. Cal. 5fidus. Pet. 5. Styli 5-11 plumosi. Achenia totidem styliis coronata.

pag. 477.

Ad *Prunum*.

- Post n. 19. *cerasoides* Don. 43. Pr. foliis elliptico-oblongis acuminatis duplicato-ferratis subtus pilosis, stipulis pectinatis glanduliferis, petiolis 5glandulosis, umbellis subsessilibus paucifloris. *Nepal.*
- Post n. 23. *mollis* Torr. 44. Pr. foliis ovatis acuminatis duplicato-ferratis ramulisque pubescentibus; stipulis setaceis denticulatis, calycibus glabriusculis serratis, fructibus ovalibus grandibus. *Massachusetts Amer. bor.*
- Post n. 29. *undulata* Hamilt. 45. Pr. foliis elliptico-oblongis acuminatis coriaceis glabris integerrimis margine crispato-undulatis, petiolis eglandulosis, racemis solitariis multifloris glabris folio brevioribus. *Nepal.*

pag. 479.

Post *Banaram* Aubl.:

NEILLIA DON.

- thyrsiflora* Don. 1. N. foliis cordato-ovatis 3lobisque acuminatis duplicato-ferratis, stipulis foliaceis ovatis acuminatis ferratis, racemis spicatis thyrsoides terminalibus, bracteolis dentatis, calycibus sericeis. *Nepal.*
- rubiflora* Don. 2. N. foliis cordatis 3lobis acuminatis duplicato-ferratis, stipulis integerrimis membranaceis caducis, racemis terminalibus solitariis paucifloris, bracteolis obtusiusculis integerrimis, calycibus tomentosis. *Nepal.*

PR-

PYGEUM Gärtn.

acuminatum Silhet, prov. Ind. or. Arbor, foliis alternis oblongis acuminatis integerrimis glabris, racemis axillaribus, floribus flavicantibus. Linn. transact. 12. t. 18.

pag. 480.

Ad *Myrtum*.

Post n. 24. *vestita* * 142. M. foliis lanceolatis acutis venosis subtus ramulisque lanato-tomentosis, pedunculis brevissimis suboppositis, floribus 4fidis. Rio grande.

pag. 481.

Post n. 41. *megapotamica* * 143. M. foliis spathulato-lanceolatis obscure venosis subtus flavido-sericeis, pedunculis aggregatis folio brevioribus, floribus 4fidis. Rio grande. Sello.

Ad *M. cayennensem* * (*M. micrantha* Mart. Brasil.)

pag. 482.

Post n. 45. *Caledoniae* * 144. M. foliis ovatis glabris, pedunculis terminalibus ternis brevissimis, floribus 4fidis. Nov. Caledon. (Caryophyllus ellipticus Labill. t. 63.)

pag. 483.

Post n. 71. *spiciflora* * 145. M. foliis oblongo-lanceolatis cuspidatis venulosis ciliatis, ramis hirtis, pedunculis pubescentibus multifloris. Brasil. (*Eugenia spiciflora* Mart.)

pag. 485.

Post n. 101. *umbraticola* Kunth. 146. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis revolutis coriaceis nitidis pubescentibus, racemis axillaribus 2partitis. Ad Orinocum.

† *longifolia* Kunth. 147. M. foliis amplis subcordato-oblongis cuspidatis coriaceis glaberrimis lucidis, floribus 5fidis, fructibus pyriformibus. Ad Orinocum.

pag. 486.

Post n. 115. † *xylopioides* Kunth. 148. M. foliis lanceolatis acuminatis membranaceis reticulatis subtus strigillofis, paniculis axillaribus folio brevioribus, floribus 5fidis, fructibus ovalibus 1spermis. Nov. Granat. Humb. nov. gen. 7. t. 657.

pag. 487.

Ad *M. Berterianam* * (*Eugenia australis* Coll. in act. taurin. 31. t. 8.)

pag. 488.

Ad *Psidium*.

- Pf. pyriferum* habet ramulos 4angulares, pedunculos 1-3floros. Congruit *Pf. sapidissimum* Jacqu. Quo igitur deleto, accedunt nova:
- Araca* Radd. 16. *Pf.* ramulis teretibus, hirsutis, foliis oblongis obtusis utrinque pubescentibus, pedunculis axillaribus 1-3floris, fructibus subpyriformibus. *Brasil.* Opusc. scient. di Bologn. 4. t. 7. f. 1.
- litorale* Radd. 17. *Pf.* ramis teretibus, foliis oblongis obtusiusculis basi attenuatis coriaceis glabris, pedunculis 1floris, fructibus pyriformibus. *Brasil.* Opusc. scient. di Bologn. 4. t. 7. f. 2.

pag. 490.

Ad *Metrosideron* Gärtn.

- M. coriaceus* Labill. (*M. albidus* Sieb.)

pag. 491.

- Post n. 14. *juniperinus* Reichenb. 23. *M.* foliis filiformi-subulatis mucronatis rigidis glabris tuberculosis, pedunculis lanatis, spicis capitatis. *Nov. Holl.* Sieber.
- pungens* Reichenb. 24. *M.* foliis linearibus mucronatis patulis nervosis glabris, pedunculis lanatis, spicis capitatis. *Nov. Holl.* Sieber.
- Post n. 21. *operculatus* Labill. 25. *M.* foliis lineari-lanceolatis subtus discoloribus punctatis, floribus corymbosis, petalis operculi forma ante anthesin convolutis. *Nov. Caledon.*

pag. 492.

Ad *Leptospermum* Forst.

- Post n. 10. *squarrosus* Sieb. 20. *L.* foliis lanceolatis acutis squarrosis rigidis glabris, junioribus subtus sericeis, calycibus sessilibus glabris coloratis obtusis. *Nov. Holl.*
- L. flexuosum* Link. (*L. resiniferum* Bertol.)
- Post n. 19. *criocalyx* Sieb. 21. *L.* foliis parvis spathulatis glaberrimis punctatis, calycibus subsessilibus sericeo-lanatis. *Nov. Holl.*
- pendulum* Sieb. 22. *L.* foliis linearibus acutiusculis subsericeis, pedunculis brevissimis aggregatis calycibusque dense sericeo-lanatis. *Nov. Holl.*

pag. 499.

- Calyptranthes paniculata* R. et P. Ad hanc referenda *C. aromatica* Hilar. pl. uf. brasil. t. 14.

pag. 500.

Ad *Eucalyptum* Herit.

- Post n. 5. *curvula* Sieb. 25. E. operculo conico, pedunculis sub-3floris incrassatis compressis divaricatis, foliis inaequaliter oblongo-lanceolatis acutis. *Nov. Holl.*

pag. 501.

- Post n. 10. *pauciflora* Sieb. 26. E. operculo conico, pedunculis abbreviatis sub-6floris, foliis oblongo-lanceolatis falcatis nervoso-venosis elongatis. *Nov. Holl.*
- Post n. 11. *virgata* Sieb. 27. E. operculo conico, pedunculis 3floris incrassatis compressis rugosis erectiusculis, foliis lanceolatis acuminatis coriaceis subvenosis glabris. *Nov. Holl.*
- Post n. 14. *stricta* Sieb. 28. E. operculo submutico, pedunculis lateralibus 2floris, foliis linearibus acutis coriaceis glabris subpunctatis. *Nov. Holl.*
- longifolia* Lindl. 29. E. operculo submutico, pedunculis 3-6floris, foliis lineari-lanceolatis elongatis venosis acuminatis pendulis. *Nov. Holl. Bot. reg. 947.*
- Post n. 22. *eugenioides* Sieb. 30. E. operculo mucronulato, umbellis lateralibus racemosis, ramulis teretibus, foliis inaequaliter oblongo-lanceolatis. *Nov. Holl.*

pag. 502.

Post *Waldsteiniam* Kit.:

BRAYERA Kunth.

- anthelminthica* Kunth. *Abyssinia.* Arbor, cujus folia ignota, pedunculis ramosis pilosis bracteatis, floribus quaternis.

Ad *Spiracem*.

- Sp. acutifolia* W. (Sp. flexuosa Fisch.) e *Sibiria.*
- vaccinifolia* Don. 32. Sp. foliis elliptico-oblongis acutis glabris apice ferratis subtus glaucis, ramulis hirsutis, cymis terminalibus paucifloris tomentosis. *Nepal.*
- bella* Sims. 33. Sp. foliis ovatis acutis glabris ferratis subtus glaucis, cymis terminalibus patentibus ramulisque pubescentibus. *Nepal.*
- canescens* Don. 34. Sp. foliis ovalibus obtusis integerrimis villosis, corymbis confertis ramulisque tomentosis. *Nepal.*
- cana* Kit. 35. Sp. foliis ovatis acutis integerrimis subtus incano-villosis, corymbis terminalibus pedunculatis. *Croatia.*

pag. 505.

Ad *Aizoon*.

- Camforosma* Reichenb. 11. A. ramis virgatis foliisque alternis lineari-subulatis glabris, floribus axillaribus pedunculatis. *C. B. S.*

pag. 506.

Ad *Mespilum*.

- Post n. 21. *crenulata* Don. 41. M. foliis ovali-oblongis crenulatis apice retulis mucronulatis glabris nitidis, pedunculis lateralibus aggregatis elongatis 1-plurifloris. *Nepal*. (*Crataegus crenulata* Lindl.)

pag. 508.

Photinia dubia Lindl. (*Mespilus tinctoria* Don.)*Ph. integrifolia* Lindl. (*Pyrus integerrima* Don.)

pag. 509.

Ad *Pyrum japonicam* Thunb. De genere fictitio *Chaenomeles* lege *παλινοδία* auctoris ipsius in Bot. reg. ad n. 905.

Passia Hamilt. 39. P. foliis longe petiolatis ovatis acuminatis ferratis glabris, corymbis simplicibus umbellatis pilosis, laciniis calycis ovatis cuspidatis, fructibus sphaericis asperis. *Nepal*.

Nussia Hamilt. 40. P. foliis ellipticis mucronatis crenulatis coriaceis glabris, junioribus subtus ramulisque et corymbis terminalibus paniculatis niveo-lanatis, fructibus sphaericis. *Emodi montes*.

pag. 510.

Post n. 18. † *Sumboschia* * 41. P. foliis cordato-ovalibus mucronulatis subtus ramulisque lanatis, stipulis ellipticis acutis glanduloso-ferratis, pedunculis terminalibus solitariis tomentosis, laciniis calycis oblongis, fructibus basi attenuatis. *Nepal*. (*Cydonia Sumboschia* Hamilt. Don.)

Ad *P. arbutifoliam* Ehrh. *P. floribunda* Lindl. Bot. reg. 1006. hybrida.

Post n. 24. *crenata* Don. 42. P. foliis longe petiolatis ovalibus acutis crenatis supra glabris subtus ramulisque niveo-tomentosis, corymbis simplicibus lanatis, laciniis calycis ovatis acutis. *Nepal*.

lanata Don. 43. P. foliis ovato-oblongis acuminatis duplicato-ferratis subtus ramulisque niveo-lanatis, corymbis terminalibus compositis, laciniis calycis ovatis acuminatis. *Nepal*.

pag. 518.

Ad *Mesembrianthemum*.

Post n. 112. *crassulinum* * 248. M. ramis decumbentibus, foliis semiteretibus acutiusculis viridibus lucidis basi distinctis, calycibus inaequalibus, filamentis exterioribus abortientibus elongatis. *Afric. austr.?* (*M. crassuloides* Salm.)

pag. 526.

Tetragonia expansa Murr. (non Ait.)

Post *Dalibardam*:

COWANIA DON.

mexicana Don. *Mexico*. Frutex ramosissimus lanatus, foliis confertis spartito-pinnatifidis revolutis subtus niveo-lanatis, stipulis membranaceis dilatatis, floribus terminalibus sessilibus aureis. Linn. transact. 14. t. 22. f. 1.

pag. 527.

Ad *Rubum*.

R. *pinnatus* Don. fl. nepal. p. 234. ad R. *lasiocarpum* Sm. pertinere videtur.

R. *asper* Don. ad R. *biflorum* Buchan.

micranthus Don. 72. R. foliis sub-3jugis supra viridibus nitidis subtus albo-villosis, foliolis ovatis mucronatis duplicato-ferratis, petiolis sparse aculeatis, corymbo paniculato, petalis unguiculatis calyce brevioribus. *Nepal*. (R. *pauciflorus* Wallich. Bot. reg. 854.)

-pag. 528.

Post n. 13. *microphyllus* Don. 73. R. foliis ternatis quinatisque subtus niveo-tomentosis, foliolis obovatis serratis, pedunculis 3floris petiolisque aculeatis, calycibus dense tomentosis, caule decumbente, aculeis recurvis. *Nepal*.

R. *Wiegmanni* Weih. latius ad R. *plicatum* Ej. referendus.

pag. 530.

Ad R. *occidentalem* addatur patria: *Amer. bor.*

Post n. 41. *pedunculofus* Don. 74. R. foliis ternatis subtus niveo-tomentosis, foliolis ovatis basi attenuatis inaequaliter serratis, petiolis aculeatis, stipulis linearibus, pedunculis elongatis subgeminis, caule inermi laevi. *Nepal*.

flavus Hamilt. 75. R. foliis ternatis subtus tomentosis, foliolis ovalibus serratis, ramulis setoso-aculeatis, stipulis lineari-fetaceis, floribus glomeratis racemoso-corymbosis. *Nepal*.

pag. 531.

R. *paniculatus* Sm. (R. *cordifolius* Don.)

betulinus Don. 76. R. foliis ovatis cuspidatis glabriusculis inaequaliter serratis, stipulis minutis glandulaeformibus, floribus subracemosis, pedicellis geminis quaternisve calycibusque nudis, ramis teretibus glabris petiolisque parce aculeatis. *Nepal*.

pag. 532.

Post n. 68. *calycinus* Wallich. 77. R. caule reptante petiolisque villosis aculeatis, foliis cordato-orbiculatis cre-

natis utrinque villosis, stipulis late ovatis ferratis, pedunculis axillaribus 1floris, calycis aculeati laciniis foliaceis inciso-dentatis petala superantibus. *Nepal*.

pag. 533.

Ad *Potentillam*.

Post n. 1. *nepalensis* Don. 96. P. caule fruticoso erecto, foliis sub-2jugis ovalibus obtusis integerrimis supra villosis subtus nudis, stipulis obtusis membranaceis, calyce 15fido. *Nepal*.

pag. 534.

- P. lineata* Trevir. (*P. splendens* Don., Siemersiana Lehm.)
leuconota Don. 97. P. caule erecto simplici villoso, foliis pinnatis 7jugis subtus argenteo-sericeis, foliolis ovali-oblongis obtusis inciso-ferratis, pedunculis subumbellatis, laciniis calycis corolla brevioribus aequalibus. *Nepal*.
- peduncularis* Don. 98. P. foliis radicalibus pinnatis supra villosis subtus argenteo-sericeis, foliolis oblongis inciso-ferratis, scapo erecto paucifloro, petalis calyce longioribus. *Nepal*.
- micropetala* Don. 99. P. caule ascendente ramoso villoso-tomentoso, foliis subtus niveo-tomentosis, radicalibus pinnatis caulinis ternatis, foliolis obovatis ferratis, pedunculis axillaribus 1floris, petalis calyce duplo brevioribus. *Nepal*. (Comarum flavum Roxb.)
- confertiflora* Torr. 100. P. caule erecto viscoso-piloso, foliis subinterrupte pinnatis, foliolis oblique subrotundis inciso-dentatis, stipulis ovatis acutis integris, floribus fasciculatis, disco 5lobo staminifero. *Amer. bor.* (*Geum agrimonioides* Pursh. ? Syst. 2. p. 543.)
- nivalis* Torr. 101. P. caule erecto sub-1floro, foliis pinnatis glabris ciliatis, foliolis subimbricatis ovatis 2-3fidis, laciniis acutis, petalis subrotundis calyce longioribus. *Montes scopulosi Amer. bor.*
- pulchella* R.Br. 102. P. caule paucifloro, foliis pinnatis 2jugis supra villosis subtus sericeis, foliolis pinnatifidis, inferioribus minoribus, laciniis lineari-lanceolatis, stylis basi glanduloso-dilatatis. *Inf. Mcville*.

pag. 535.

- Post n. 18. *microphylla* Don. 103. P. caulibus caespitosis humilibus 1floris foliisque 2pinnatifidis subtus sericeo-villosis, laciniis linearibus obtusis, petalis obovatis calyce longioribus, receptaculo villoso. *Nepal*.
- coriandrifolia* Don. 104. P. caulibus caespitosis ascendentibus paucifloris, foliis 2pinnatis subtus pilosiusculis, laciniis linearibus submicronatis, petalis obcordatis calyce longioribus, receptaculo villoso. *Nepal*.

pag. 536.

- Post n. 29. *Loddigesii* * 105. P. caule erecto incano piloso, foliis 7-5natis supra hirsutis subtus incano-pilosis, foliolis pinnatifido-ferratis, floribus corymbosis, petalis retusis calycem superantibus. *Sibir.* (P. vinosa Loddig. Ledeb.)
- normalis* Bess. 106. P. caule erecto foliisque 5nato-digitatis utrinque dense lanatis, foliolis pinnatifidis subtus candidis, stipulis oblongis incisus, pedunculis corymbosis, petalis calycem subsuperantibus. *Ad Tyram.*
- P. virgata* Lehm. (P. elongata Bess.) *Podolia.*

pag. 537.

- Post n. 44. *pulchella* Richard. 107. P. caule diffuso abbreviato, foliis 7-5natis subtus niveo-tomentosis, foliolis obovatis apice inaequaliter ferratis, pedunculis subternis, petalis obcordatis, receptaculo hirsuto. *Amer. arctic.*

pag. 539.

- Post n. 68. *formosa* Don. 108. P. caule erecto foliisque 5-3natis fericeo-pilosis, foliolis spathulato-oblongis ferratis venosis, stipulis ovatis integris, petalis obcordatis calycem multo superantibus. *Nepal.* (P. nepalensis Hook. exot. fl. t. 88.)

pag. 542.

- Post n. 94. *atrosanguinea* Don. 109. P. caule ascendente paucifloro, foliis omnibus ternatis subtus niveo-tomentosis, foliolis obovatis inciso-ferratis, stipulis subintegris, petalis obcordatis calycem superantibus. *Nepal.*

pag. 543.

Ad *Sieveriam* W.

- paradoxa* Don. 7. S. fruticosa, foliis fasciculatis 3-5partitis subtus ferrugineo-lepidotis, floribus corymbosis, aristis plumosis. *Mexico.* Linn. transact. 14. t. 22. f. 2.
- Rossii* R. Br. 8. S. acaulis glabra, foliis radicalibus interrupte pinnatis, foliolis 3lobis, scapo 1floro sub-2phyllo, aristis nudis. *Inf. Melville.*

pag. 547.

Ad *Rosam.*

- Woodii* Lindl. — aculeis ramorum sparsis rectis, stipulis oblongis subintegerrimis.

pag. 548.

- Ad R. *cinnamomeam* reducenda R. *turbinella* Sw. n. 83.

R. laxa Retz. — ramis pruinosis, aculeis caulinis sparsis duplicibus subreflexis.

pag. 549.

R. livefcensis Bess. forte var.: *R. guttensteinensis* Jacqu. f. 110. *R. germinibus* oblongis utrinque constrictis pedunculisque geminis glabris, calycibus glandulosis petala longe superantibus, aculeis stipularibus patentifimis, foliis oblongis ferratis livido-glaucescens subtus verficoloribus petiolisque laevibus. *Vollhynia*.

pallens Retz. 111. *R. germinibus* hemisphaericis pedunculisque glabris, laciniis calycis subaequalibus, foliolis ovalibus glaberrimis, aculeis ramorum duplicibus horizontalibus. *Succia*.

hemisphaerica * 112. *R. germinibus* hemisphaericis brevissimis glabris, pedunculis aculeato-hispidis, aculeis ramorum duplicibus horizontalibus, foliolis minutis subrotundis petiolisque glaberrimis. *Patria?* In horto halensi colitur.

mosquensis * 113. *R. germinibus* globosis pedunculisque glabris, aculeis stipularibus rectiusculis, foliolis oblongis ferratis petiolisque inermibus pubescentibus. *Ager mosquensis*.

gorinkensis Fisch. 114. *R. germinibus* subglobosis pedunculisque glaberrimis, ramis nitidis subinermibus, petiolis foliisque subtus pubescentibus. *Ager mosquensis*.

R. ochroleuca Sw., quam *R. spinosissimae* varietatem habui, differt omnino aculeis ramorum rectis, petiolis subinermibus.

pag. 551.

dimorpha Bess. 115. *R. germinibus* ovatis utrinque contractis pedunculisque confertis abbreviatis sparsim glanduloso-hispidis, calycibus confertim glandulosis, aculeis ramorum sparsis subrecurvis, petiolis aculeatis foliisque utrinque pubescentibus. *Podolia*. Ergo minima est *R. tomentosae* var.

pag. 552.

R. Boreykiana Bess. germina habet oblonga (non ovata) foliola subtus pubescentia duplicato-ferrata margine (non subtus) glandulosa.

floribunda Bess. 116. *R. germinibus* elliptico-oblongis pedunculisque aggregatis glanduloso-pilosis, aculeis ramorum sparsis validis recurvis, petiolis aculeatis villosis, foliis lineato-rugulosis duplicato-ferratis subtus margineque glandulosis pubescentibus. *Ad Boryshenem*.

pag. 554.

R. turbinella Sw. ad *R. cinnamomeam* n. 21.

R. venosa Sw. ad *R. caninam* n. 77. releganda.

CLASSIS XIII.

pag. 557.

Post n. 1883. *Empedoclea* Hilar. Cal. polyphyllus imbricatus. Antherae 2loculares. Stigma capitatum. Germen 6spermum. Bacca? *Dillenicae*.

pag. 558.

Post n. 1893. *Entelea* R. Br. Cal. 4-5sepalus. Petala 4. Stam. omnia perfecta. Capf. echinata 5locularis, loculis polyspermis. *Tiliaceae*.

Echinocarpus Blum. Cal. 4partitus deciduus. Pet. 4, 5 incisa. Antherae cuspidatae. Stigma simplex. Capf. echinata lignosa 4valvis, intus pulpa farinacea farcta. *Bixaceae*.

Haffeltia Kunth. Cal. 4partitus. Pet. 4. Antherae 2loculares. Glandulae 8 perigynae. Fructus subglobosus 1-2locularis, loculis 1-2spermis. *Bixaceae*.

Post n. 1894. *Corynandra* Schrad. Cal. 4sepalus. Cor. 4petala. Filamenta clavata apice colorata. Antherae curvatae. Siliqua sessilis 2valvis polysperma. *Caparideae*.

Post n. 1900. *Porpa* Blum. Cal. 5partitus. Pet. 5, intus basi tomentosa. Stam. annulo membranaceo cincta. Stigma 3dentatum. Capf. 3locularis, loculis 1spermis.

1905. *Alegria* Sess. cum Lühea W. Mart. jungenda.

pag. 559.

Post n. 1911. inferendae:

Luxemburgia Hilar. n. 1465. p. 173.

et *Godoya* R. et P. n. 1612. p. 278.

Cochlospermum Kunth. *Bombacis* potius accensendum.

Post n. 1923. *Caraipa* Aubl. Cal. 5partitus. Pet. 5. Antherae 2loculares apice glanduliferae. Stylus simplex, stigmatate 3lobo. Capf. 3locularis, placenta centrali columnari 3alata. Semina solitaria compressa. *Ternströmiaceae*.

pag. 560.

Post n. 1936. *Micranthera* Choif. Flores dioeci. Cal. 4sepalus. Pet. 10. Antherae 2loculares. Stigma peltatum. Bacca 5locularis. *Guttiferae*.

pag. 561.

Post n. 1955. *Kuhtha* Kunth. Cal. campanulatus 6-8fidus clausus persistens, laciniis interioribus majoribus. Cor. 0. Antherae 2loculares. Stigma obtusum. Fructus 1locularis polyspermus. *Bixaceae*.

Ad *Davillam* Vand. adde Pet. 1-6 caduca.

pag. 562.

- Post n. 1977. *Trichospermum* Blum. Cal. 5sepalus. Pet. 5. Antherae didymae. Stylus 0. Stigm. 2. Capf. 2valvis hirsuta, placenta lineari. Sem. arillata ciliata.
- Ad *Sauraviam* W. adde: Stam. basi subcoalita. Styli 3, 5. Capf. baccata intus mucilaginosi. Placenta in quovis loculo 2fida.

pag. 564.

- Ad *Wormiam* Roth. adde: Sem. pulpa pellucida obvoluta.
- Post n. 2013. *Ceceria* Blum. Flores dioeci. Cal. 5sepalus 2bracteatus. Cor. 5partita. Stam. basi corollae adnata. Styli 3, 5 coaliti, stigmatibus acutis. Bacca 5locularis polysperma. *Ternströmiae*.

pag. 565.

- Post n. 2020. *Rollinia* Hilar. Cal. 3partitus. Cor. 1petala globa dorso 3alata. Bacca composita. *Anoneae*.
- Ad *Micheliam* add. Cal. bractea spathacea lateraliter dehiscente cinctus.
- Sarcocarpon* Blum. Flores monoeci. Cal. 3bracteatus 5sepalus. Petala 9-12, ordine ternario disposita. Filamenta brevissima. Antherae apice extrorsum adnatae. Fructus baccati 2spermi conglomerati.
- Ad *Dilleni*am. Petala persistentia. Stam. aequalia.
- Capellia* Blum. Cal. 5sepalus. Pet. 5 decidua. Stam. exteriora breviora, interiora multo longiora 1serialia. Capf. membranaceae intus dehiscentes polyspermae. *Dilleniaceae*.
- Aromadendron* Blum. Cal. 1phyllus spathaceus. Petala numerosissima. Stamina subulata. Antherae extrorsum dehiscentes. Capf. 2spermae in fructum ligneum coalescentes. *Magnolieae*.
- Post n. 2042. *Hydrastis*. Cal. corollinus 3sepalus. Nectaria 0. Caryopses baccatae 1spermae coalitae. *Ranunculaceae*.

pag. 567.

Ad *Swartziam* W:

- Post n. 3. *parviflora* Cand. 10. Sw. foliis simplicibus brevissime petiolatis ovatis acuminatis emarginatis, pedunculis sub-3floris, petalo subrotundo fimbriato calycem aequante. *Cayenn.*
- ochracea* Cand. 11. Sw. foliis simplicibus ovato-ellipticis acutiusculis, pedunculis 1floris. *Amer. austr.?*
- Post n. 4. *aptera* Cand. 12. Sw. foliis ternatis ovato-ellipticis acuminatis emarginatis, petiolis teretibus, pedunculis 2-5floris. *Guiana.*
- myrtifolia* Sm. 13. Sw. foliis ternatis pinnatisque bijugis, foliis oblongo-lanceolatis, petiolis marginatis, petalo

orbiculato calycem aequante, staminibus numerosissimis polyadelphis. *Caracas.*

Ad Sw. *pinnatam* W. adde: foliolis oblongis acuminatis, pedunculo subvillosa, racemis geminis, petalo orbiculato calycem excedente, staminibus plurimis. (S. brachystachya Cand.)

pag. 568.

Post n. 9. *tomentosa* Cand. 14. Sw. foliis pinnatis oblongis acutis subtus ramisque villosis, stipulis suborbiculatis, racemis multifloris, petalo orbiculato. *Guiana.* (Robinia Panacoco Aubl. Flores fructusque aliunde petitos esse, Cand. testatur. Ergo et Robinia tomentosa W. Syst. 3. 247. huc trahenda.)

polyphylla Cand. 15. Sw. foliis pinnatis multijugis glabris, petiolis teretibus, racemis subternis gracilibus spicaeformibus, petalo subrotundo. *Cayenn.*

Post *Doliocarpum* :

EMPEDOCLEA Hilar.

alnifolia Hilar. *Brafil.* Frutex ramis ferrugineis, foliis ellipticis ferratis venosis scaberrimis, floribus paniculatis albis.

pag. 569.

Ad *Papaver obtusifolium* Desf. adde patriam: *Sardiniam.*

pag. 570.

Ad *Stylophorum* Nutt.

simplicifolium * 4. St. capsulis oblongis setosis, foliis petiolatis oblongis obtusis integerrimis scapoque 1floro setoso-hirtis, flore cernuo. *Emodi montes.* (Papaver Don.)

nepalense * 5. St. capsula sphaerica setis plumosis dense tecta, foliis oblongis sessilibus indivisis hispida, caule ramofo, floribus paniculatis. *Nepal.* (Mecopopsis nepalensis Cand., Papaver paniculatum Don.)

pag. 571.

Ad *Glaucium* Tourn.

tricolor Bernh. 7. Gl. foliis lyrato-pinnatifidis pilosiusculis, filiqua hirsuta, petalis contiguis, basi macula halonata. *Thuringia.* *Podolia.*

Ad *Calophyllum.*

parvifolium Choif. 8. C. foliis cordato-ovatis obtusiusculis brevissime petiolatis laevibus striato-venosis, ramis tortuosis, paniculis laxis paucifloris. *Ins. Molucc.* Act. soc. nat. parif. 1. 229.

pag. 572.

Post *Sparrmanniam* Thunb.:

ENTELEA R. Br.

arborescens
R. Br.*Nov. Zeeland.* Arbuscula stellato-tomentosa, foliis cordatis inaequaliter dentatis 5nerviis, floribus umbellatis albis. Bot. mag. 2480.

ECHINOCARPUS Blum.

Sigun Blum.*Java.* Arbor procerissima, foliis alternis oblongis acutis, pedunculis 1floris lateralibus.

HASSELTIA Kunth.

floribunda
Kunth.*Ad fl. Magdalen.* Arbor foliis alternis oblongis dentatis 5nerviis basi 2glandulosis, cymis umbellatis terminalibus. Humb. nov. gen. 7. t. 651.

PORPA Blum.

repens Blum.*Inf. Javac vicina.* Suffrutex, foliis petiolatis subcordatis 3lobis dentatis scabris, stipulis oppositis lanceolatis, pedunculis oppositifoliis sub-3floris.

pag. 573.

Ad *Capparin*.

Post n. 20.

Sodada R. Br. 86. C. aphylla, ramis dichotomis, aculeis uncinatis, pedunculis axillaribus subfoliariis. *Arabia. Aegyptus.* (*Sodada* decidua Forsk. Delil. fl. aeg. t. 26. Sylt. 2. p. 213.)Ad *C. pubifloram*
micrantha
Blum.Cand. (*C. foetida* Blum.)
87. C. foliis subcordato-ovalibus glabris coriaceis apice scariofis, spinulis rectis, pedunculis aggregatis petiolo brevioribus. *Java.* C. callosa et flexuosa Blum. varr.

pag. 576.

Post n. 62.

tylophylla * 88. C. foliis ovalibus coriaceis glabris calloso-mucronatis, spinis uncinatis, racemis elongatis, pedicellis umbellatis. *Java.* (*C. callophylla* Blum.)Ad *C. lanceolarem*Cand. (*C. falaccensis* Blum.)

pag. 577.

Post *Capparin*:

CORYNOPHORA Schrad.

pulchella
Schrad.*Nepal. China.* Herba annua erecta, foliis inferioribus 5natis superioribus ternatis lanceolato-linearibus, floribus corymbosis albis, filamentis roseis.

pag. 578.

Ad *Diplophractum* Desf.

- falicifolium* * 2. *D.* foliis oblongis utrinque attenuatis subintegerrimis, stipulis nullis, pedunculis congestis terminalibus, petalis denis. *Nov. Caledon.* (*Microrhenna falicifolia* Labill. t. 57.)

pag. 579.

Ad *Grewiam*.Ad *Gr. laevigatam* Vahl. (*Gr. glabra* Blum.)

- odorata* Blum. 46. *Gr.* foliis oblongis subtus scabriusculis inaequaliter crenulatis, crenis infimis glandulosis, pedunculis axillaribus subgeminis 3-5floris, pedicellis umbellatis, sepalis 3nerviis. *Java.*

pag. 580.

Ad *Gr. guazumaefoliam* Juss. (*Gr. oblongifolia* Blum.)

- Post n. 24. *oppositifolia* Hamilt. 47. *Gr.* foliis ovatis acuminatis ferratis 3nerviis subtus ramulisque tomentosis, pedunculis solitariis 3floris oppositifoliis. *Nepal.*

pag. 581.

Ad *Gr. arboream* Roxb. (*Gr. inaequalis* Blum.)

- Post n. 42. *involutrata* Blum. 48. *Gr.* foliis inaequaliter cordatis oblongis acuminatis ferrulatis subtus stellato-tomentosis, paniculis axillaribus terminalibusque divaricatis, floribus involucreatis. *Java.*

- pumila* Hamilt. 49. *Gr.* fruticosa, foliis obovato-subrotundis 5nerviis ferratis ramulisque villosis, pedunculis axillaribus aggregatis 3floris. *Nepal.*

pag. 582.

Ad *Columbiam* Perf.

- javanica* Blum. 2. *C.* foliis dimidiato-cordatis acuminatis subferrulatis basi 5nerviis supra scabris subtus stellato-tomentosis, paniculis terminalibus divaricatis, capsulis villosis, alis apice extus dilatatis. *Java.*

- celebica* Blum. 3. *C.* foliis basi obliqua oblongis acuminatis ferratis 3nerviis supra scabris subtus stellato-pubescentibus, racemis paniculatis terminalibus, capsulae alis rotundatis. *Celebes.*

n. 1905. *Alegria candida* Sess. deleatur, sub *Litsea* reditura.

pag. 586.

Ad *Cistum*.

- Post n. 23. *Sideritis* Presl. 27. *C.* caule decumbente, foliis petiolatis obovatis subrugosis subtus canescenti-tomentosis, pedunculis solitariis elongatis 1-2floris superne articulatis calycibusque tomentosis, floribus ante anthesin nutantibus. *Sicil.*

Cupanius Presl. 28. *C.* caule erecto, foliis petiolatis subcordato-ovatis margine fimbriatis rugosis subtomentosis, petiolis dilatatis sulcatis, pedunculis sub-3floris superne bracteatis, calycibus villosis. *Sicil.*

pag. 592.

Ad *Helianthemum* Tourn.

Ad *H. bicolor* et *arcuatum* Presl., illud ab *H. croceo* Perf., hoc ab *H. vulgari* Gärtn. discernere nequeo.

pag. 594.

Post *Weiheam* *:

LUXEMBURGIA Hilar.

- speciosa* Hilar. 1. *L.* foliis spathulato-lanceolatis mucronatis ferrato-ciliatis venosis, stipulis laciniato-ciliatis, floribus racemosis. *Brazil.* (Plectanthera floribunda Mart.) *L. octandra* Hilar. var.
- corymbosa* Hilar. 2. *L.* foliis longe petiolatis lanceolatis mucronatis ferrato-ciliatis, stipulis pectinatis, corymbis paucifloris. *Brazil.* (Plectanthera ciliosa Mart., *Luxemburgia polyandra* Hilar.)

GODOYA R. et P.

- gemmiflora* Mart. *G.* foliis oblongis obtusis obsolete ferrulatis, racemis compositis elongatis, calycibus gemmaceis 10sepalis. *Brazil.* Mart. nov. gen. t. 74.
- G. obovata* et *spathulata* R. et P. quas p. 330. cum manca auctorum phrasi citavi, nec a se invicem nec a Martiana optime stabilita satis differre videntur.

pag. 596.

Ad *Cleyeram ochraceam* Cand. (Ternströmia Lufhia Don.)

Ad *Cochlospermum* Kunth.

- C. vitifolium* mutetur in *ferratifolium* Cand. (Bombax hibiscifolium W. herb., Wittelsbachia insignis Mart. nov. gen. t. 55.)
- vitifolium* * 8. *C.* foliis 5fidis crenato-ferratis utrinque glabris. *Nov. Hispan.* (Bombax vitifolium W. enum., Wittelsbachia Mart.)

pag. 597.

Ad *Delinam tripetalam* Blum. *D. intermedia* Blum. var.

pag. 598.

Ad *Bonnetiam* Schreb.

- B. meridionalis* Sw. 2. melius sic definitur: *B.* foliis alternis longe petiolatis stipulatis oblongis coriaceis remote costato-venosis, floribus racemosis, seminibus pendulis.

- venulosa* Mart. 3. *B. foliis alternis breviter petiolatis oblongis obtusiusculis subtus venulosis, floribus racemosis, feminibus erectis. Brasil.*
- anceps* Mart. 4. *B. foliis alternis subsessilibus spathulatis obtusis venosis, pedunculis axillaribus ancipitibus bracteatis 3floris. Brasil. (B. stricta Mart., Kieferia stricta Nees.)*
- corymbosa* * 5. *B. foliis obovatis obtusis coriaceis glaberrimis glaucescentibus parallele venosis, paniculae corymbosae ramis dichotomis, calycibus glabris. Brasil. (Kielmeyera corymbosa Mart. nov. gen. t. 72.)*
- coriacea* * 6. *B. foliis oblongis obtusis basi attenuatis coriaceis glaberrimis parallele venosis, corymbo paucifloro terminali, calycibus extus pubescentibus. Brasil. (Kielmeyera coriacea Mart. nov. gen. t. 70.)*
- variabilis* * 7. *B. foliis obovato-oblongis obtusis coriaceis, pedunculis elongatis subcorymbosis, calycibus obtusis glabris. Brasil. (Kielmeyera variabilis Mart. nov. gen. t. 71.)*
- petiolaris* * 8. *B. foliis longe petiolatis oblongis obtusis, racemis paucifloris, calycibus orbicularibus glabris, stigmatibus ternis. Brasil. (Kielmeyera petiolaris Mart. nov. gen. t. 69.)*
- rosea* * 9. *B. foliis subsessilibus oblongis obtusis, floribus terminalibus subternis, calycibus rotundatis extus pubescentibus. Brasil. (Kielmeyera rosea Mart. nov. gen. t. 68.)*

CARAIPA Aubl.

- parvifolia* Aubl. 1. *C. foliis alternis ovatis acutis subtus incano-tomentosis, floribus racemosis. Guiana.*
- grandifolia* Mart. 2. *C. foliis alternis oblongo-lanceolatis longissimis cuspidatis supra nitidis subtus glaucescentibus, floribus racemosis. Brasil.*
- densifolia* Mart. 3. *C. foliis alternis ovato-oblongis utrinque glabris subtus glaucescentibus, floribus racemosis. Brasil. (C. glabrata Mart. var.)*
- paniculata* Mart. 4. *C. foliis oppositis petiolatis oblongis subtus ramisque ferrugineo-tomentosis, panicula terminali, petalis extus dimidiato-tomentosis. Brasil. Mart. nov. gen. t. 64.*

pag. 599.

Ad *Afcium* Schreb.

- anomalum* * 4. *A. floribus subspicatis Sandris, cucullis pedicellatis hemisphaerico-galeatis, foliis oblongis obtusis mucronatis basi attenuatis subcoriaceis. Amer. tropic. (Norantea anomala Kunth. in Humb. nov. gen. 7, t. 647, b.)*

pag. 601.

Ad *Loasam palmatam* * (Treviran. in nov. act. nat. cur. 13. t. 12. Blumenbachia infignis Schrad.)

pag. 602.

Post *Heptacam* Lour.:

MICRANTHERA Choif.

clusioides
Choif.

Guiana. Arbor foliis oblongis acutis glaberrimis, floribus paniculatis bracteatis luteis. (*Clusia longifolia* Rich.)

Ad *Lecythin*.

Post n. 3. *Couratari* * 12. L. foliis petiolatis oblongis glabris coriaceis, floribus racemoso-spicatis, seminibus alatis. *Guiana*. (*Couratari guianensis* Aubl.)

pag. 606.

Ad *Maeruam* Forsk.

angolensis
Cand.

3. M. floribus racemosis, corona lacero-multipartita, foliis ovalibus. *Afric. occid.*

rigida R. Br.

4. M. corymbis terminalibus paniculatis, corona lacero-multipartita, foliis obovatis rigidis. *Afr. med.* Denham. et Clapperton. it. p. 226.

pag. 607.

Post *Ryaniam* Vahl.:

KUHLLIA Kunth.

glauca Kunth.

1. K. foliis basi dimidiata oblongis acutiusculis remote ferratis subtus glaucis, floribus fasciculato-paniculatis. *Nov. Granat.* Humb. nov. gen. 7. t. 652.

ulnifolia
Kunth.

2. K. foliis basi dimidiata oblongo-lanceolatis acuminatis grosse ferratis utrinque concoloribus, floribus paniculatis. *Alpes Popayan.* Humb. nov. gen. 7. t. 653.

Ad *Flacourtiam* Commerf.

Post n. 5.

flexuosa Kunth. 8. Fl. ramulis flexuosis spinosis, foliis ovato-oblongis remote ferratis membranaceis glabris nitidulis, floribus ♂ axillaribus aggregatis. *Mexico.*

celastrina
Kunth.

9. Fl. spinis ramorum longis rectis, foliis obovato-subrotundis membranaceis crenatis glabris nitidulis, pedunculis axillaribus subgeminis, fructibus subglobofo-ellipticis. *Mexico.*

prunifolia
Kunth.

10. Fl. truncis spinis horrido, ramis inermibus, foliis obovato-ellipticis obtusis coriaceis glabris nitidis glanduloso-crenatis, racemis axillaribus abbreviatis. *Nov. Granat.* Humb. nov. gener. 7. t. 654.

Post

Post n. 7. † *cordata* Kunth. 11. Fl. inermis, foliis cordatis acutis crenatis coriaceis glabris nitidis, floribus ♂ aggregatis, ♀ solitariis. *Peru.*

pag. 608.

DAVILLA Vand.

- rugosa* Poir. 1. *D. scandens*, foliis oblongis obtusis obsolete serratis hirsutis, floribus subpaniculatis digitatis. *Brazil.* (*D. brasiliensis* Cand.) Lessert. ic. t. 71.
- angustifolia* Hilar. 2. *D. scandens*, foliis glabris oblongo-linearibus acutis integerrimis, costa venisque subtus pilosiusculis, floribus racemosis 5-petalis digynis. *Brazil.*
- macrophylla* Hilar. 3. *D. scandens*, foliis oblongis acuminatis repandis subtus pubescentibus, floribus racemosis 5-petalis. *Brazil.*
- brasiliensis* Kunth. 4. *D. arborecens*, foliis oblongis obtusis parallele venosis coriaceis scabris, floribus fasciculato-paniculatis. *Nov. Granat. Brazil.*
- castaneaeifolia* Hilar. 5. *D. foliis oblongis acuminatis remote serratis parallele venosis aspero-pilosis*, floribus racemosis digynis. *Brazil.*
- elliptica* Hilar. 6. *D. foliis ellipticis obtusis integerrimis coriaceis subtus pubescentibus reticulatis*, racemis compositis villosis, floribus digynis. *Brazil.* Hilar. pl. uf. *Brasil.* t. 23.
- flexuosa* Hilar. 7. *D. foliis oblongis obtusis coriaceis glaberrimis integerrimis*, pedunculis subracemosis, capsulis subternis. *Brazil.*

pag. 610.

Ad *Curatellam*.

- Çambaiba* Hilar. 2. **C. foliis ovato-oblongis obtusissimis repandocentatis subtus tomentosis*, floribus paniculatis. *Brazil.* Hilar. pl. uf. *Brasil.* t. 24.

Ad *Baueram* Andr.

- galionides* Sieb. 2. *B. foliis ternis elliptico-linearibus integerrimis ciliatis*, pedunculis elongatis. *Nov. Holl.*

pag. 611.

Ad *Cliffortiam*.

- Post n. 8. *ferrata* Reichenb. 22. *Cl. foliis spathulato-lanceolatis cuspidato-ferratis glabris*, stipulis persistentibus imbricatis ovatis, ramis flexuosis virgatis. *C. B. S.*

pag. 612.

- Post n. 15. *spicata* Reichenb. 23. *Cl. caule simplici folisque subverticillatis lanceolatis erectis hirsutis*, spicis densis terminalibus foliosis. *C. B. S.* Olim *Anthospermum* habui, licet nusquam descriperim.

Post *Cliffortiam*:

TRICHOSPERMUM Blum.

- javanicum* Blum. *Java*. Arbor foliis alternis cordato-oblongis ferrulatis subtus 2glandulosis, stipulis ovatis, cymis axillaribus.
- Ad *Ablaniam* Auhl.
- digitata* * 2. A. foliis digitatis glabris supra nitidis, foliolis oblongis ferrulatis, floribus corymbosis. *Rio grande*. Sello.
- Ad *Lacida*.
- foeniculacea* * 2. L. foliis decompositis lineari-fetaceis ferrulatis, floribus solitariis spathaceis 8andris. *Nov. Granat.* (Marathrum foeniculaceum Humb. Syst. 2. p. 246.)
- Ad *Homalium*.
- incanum* Perf. 3. H. foliis spathulato-lanceolatis apice ferratis incano-tomentosis, floribus 1gynis. *Peru.* (Pineda incana R. et P.)
- angustifolium* Sm. 4. H. foliis lanceolatis subintegerrimis, racemis spicatis axillaribus, laciniis calycis interioribus obtusis. *Afric. occid.*
- † *Napimoga* * 5. H. foliis ovali-oblongis crenatis laevibus, spicis pedunculatis axillaribus interruptis filiformibus, corolla pubescente eglandulosa. *Guiana.* (Napimoga guianensis Auhl.)

pag. 613.

Ad *Sauraviam* W.

- S. excelsa* W. (Palava scabra Kunth.)
- S. gigantea* Cand. (Ternströmia racemosa Don.) *Nepal.*
- S. nepalensis* Cand. (S. micrantha Blum.) *Java.*
- S. bracteosa* Cand. (S. Reinwardtiana Blum.)
- S. bracteolata* Cand. (S. cuneata Blum.)
- S. ferrata* Cand. (Palava glabrata R. et P. Apatelia Cand. Syst. 3. 340.)
- S. lanceolata* Cand. (S. spadicea Blum.) Nonne et Palava lanceolata R. et P. (Apatelia Cand. Syst. 3. 340.) ? *Peru.*
- Blumeana* * 13. S. foliis cordato-oblongis acuminatis fetaceo-ferrulatis supra glabris subtus rufo-villosis, ramulis hirsuto-strigosis, pedunculis axillaribus trichotomis cymiferis petiolo brevioribus bracteatis, bracteis lato-lanceolatis. *Java.* (S. gigantea Blum.)
- Noronhiana* Blum. 14. S. foliis ovato-oblongis acuminatis calloso-ferratis utrinque strigoso-squamulosis, pedunculis axillaribus confertis 1floris nutantibus. *Java.*
- pendula* Blum. 15. S. foliis oblongis glanduloso-ferratis utrinque glabris, pedunculis axillaribus elongatis nutantibus 2-3floris, pedicellis sub-3floris umbellatis. *Java.*

- hirsuta* Blum. 16. S. foliis basi inaequali oblongis acuminatis supra scabris subtus ramulisque hirsutis, pedunculis axillaribus elongatis 3fido-umbellatis, bracteis spatulatis. *Java*.
- tomentosa* * 17. S. foliis obovato-lanceolatis argute denticulatis supra calloso-asperis subtus ramulisque albidotomentosis, paniculis axillaribus bracteatis. *Nov. Granat. Quito*. (Palava tomentosa Kunth.)
- biferrata* * 18. S. foliis obovato-oblongis biferratis, racemis brachiatis, pedicellis 3floris. *Peru*. (Palava biferrata R. et P., Apatelia Cand. Syst. 3. 340.)
- cauliflora* Blum. 19. S. foliis ovato-oblongis acuminatis aristatoferratis supra glabris subtus strigoso-tomentosis dilute spadiceis, pedunculis 1floris in trunco aggregatis. *Java*.

pag. 614.

Ad *Hibbertiam* Salisb.

- Post n. 14. *canescens* Sieb. 20. H. foliis spatulato-linearibus supra pilosis subtus glabris, ramis villosis, gemminibus pubescentibus. *Nov. Holl.*

pag. 615.

- Ad *Paeoniam peregrinam* Mill. *P. sessiliflora* Bot. mag. 2648. var.

pag. 618.

Ad *Delphinium*.

- Post n. 26. *pauciflorum* Don. 48. D. foliis multipartitis glabris, laciniis linearibus acutis, pedunculis remotis elongatis, calcare abbreviato, petalis superioribus 2fidis, inferioribus obovatis unguiculatis. *Nepal*.

- Post n. 31. *velutinum* Bertol. 49. D. petiolis basi dilatatis vaginantibus, foliis 5partito-multifidis utrinque cauleque villosis, laciniis linearibus, bracteis inferioribus flore longioribus. *Italia media*.

pag. 619.

- Ad *D. ciliatum* Stev. *D. scabrifolium* et *Carela* Don. *Nepal*.

pag. 621.

- Ad *Aconitum productum* Reichenb. (*A. grandiflorum* Pall. herb., *delphinifolium* β . *sibiricum* Cand.)

pag. 625.

Ad *Begoniam*.

- Post n. 12. *elliptica* Kunth. 39. B. herbacea glabra, foliis inaequilatero-ellipticis acuminatis subintegerrimis 5nerviis venosis, corymbis dichotomis longe pedunculatis, capsulae ala exteriori ovato-deltaeidea acuta ascendente. *Nov. Granat. Humb. nov. gen. 7. t. 641.*

- umbellata* Kunth. 40. *B. fruticosa* glabra, foliis inaequaliter ovatis acutis ciliato-ferratis, nervis subtus pubescentibus, floribus superioribus ♂ umbellatis, inferioribus ♀ solitariis, capsulae alis aequalibus cornutis. *Nov. Granat.*
- elegans* Kunth. 41. *B. suffruticosa* glabra, foliis subsessilibus inaequaliter oblongis acuminatis setaceo-ferratis reticulato-venosis, pedunculis paucifloris, capsulae alis inaequalibus coloratis. *Nov. Granat.*

pag. 626.

- Post n. 19. *palmata* Don. 42. *B. herbacea* fusco-hirsuta, foliis inaequaliter cordatis palmato-lobatis, scapo trifloro, capsulae villosae alis obtusangulis, altera productiore. *Nepal.*
- Post n. 26. *ciliata* Kunth. 43. *B. herbacea* pilosiuscula, foliis longe petiolatis semicordatis acutis grosse duplicato-ferratis ciliatis, pedunculis axillaribus 6floris, capsulae alis inaequalibus rotundatis. *Nov. Granat.*
- foliosa* Kunth. 44. *B. suffruticosa* scandens ramosissima glabra, ramis foliosis, foliis subsessilibus semicordatis argute ferratis obsolete venosis subtus papillofis, pedunculis paucifloris, capsulae alis inaequalibus, exteriori acuta. *Amer. tropic.? Humb. nov. gen. 7. t. 642.*
- gracilis* Kunth. 45. *B. radice* tuberosa, caule herbaceo simplici, foliis semicordatis duplicato-ferratis acuminatis sub-7nerviis, pedunculis 1floris. *Mexico.*
- populifolia* Kunth. 46. *B. caule* herbaceo pilosiusculo, foliis semicordato-reniformibus ferratis obsolete lobatis 9nerviis subtus ferrugineis, pedunculis 1floris. *Mexico.*
- acrifolia* Kunth. 47. *B. herbacea* dichotome ramosa glabra, foliis longe petiolatis semicordatis 6-7fidis acutis argute serrulatis hirsutiusculis, pedunculis terminalibus elongatis dichotomis. *Quito.*
- Post n. 30. *Hatacoa* Hamilt. 48. *B. herbacea*, foliis amplis semiovalo-oblongis acuminatis denticulatis subtus hirsutis, capsulae alis inaequalibus obtusis. *Nepal.*
- B. bidentata* Radd. (*B. guaduenfis* Kunth.)
- B. scandens* Sw. (*B. denticulata* Kunth.)
- ++++ *Foliis subaequaliter cordatis.*
- picta* Sm. 49. *B. radice* tuberosa, caule brevi herbaceo, foliis profunde cordatis ferratis acutis rugosis hirsutis subtus maculatis, pedunculis 3fidis, capsulae tomentosae alis inaequalibus abbreviatis. *Nepal.*
- diocca* Hamilt. 50. *B. caule* gracili, foliis aequaliter cordato-oblongis acuminatis inaequaliter dentatis glabris, capsulae alis subaequalibus acutis. *Nepal.*
- rubella* Hamilt. 51. *B. foliis* subaequaliter cordatis acuminatis erosodentatis glabris nitidis, petiolis filiformibus, pedunculis multifloris paniculatis, capsulae alis inaequalibus acutangulis. *Nepal.*

Post n. 87. *tenella* Don. 52. B. foliis subaequaliter cordatis acuminatis duplicato-ferratis glabris, scapo filiformi subbifloro, capsulae alis inaequalibus obtusangulis. *Nepal*.

pag. 628.

Ad *Drumyn granatensem* cf. Hilar. pl. uf. bras. t. 26-28.

pag. 629.

Ad *Tetraceram*.

** *Floribus* 3gynis.

- dichotoma* Blum. 20. T. foliis oblongis utrinque attenuatis apice denticulatis, venis subtus pedicellisque pubescentibus, pedunculis dichotomis, sepalis glabris ciliolatis. *Java*.
- gracilis* Blum. 21. T. foliis ovalibus utrinque attenuatis apice serrulatis subtus ramulisque subvillosis, pedunculis 1-2floris, sepalis 4 ciliatis. *Java*.
- rigida* Blum. 22. T. foliis ovalibus utrinque attenuatis apice repandis rigidis subtus scabris, panicula divaricata tomentosa, sepalis petalisque intus sericeis. *Java*.
- fugifolia* Blum. 23. T. foliis ovato-ellipticis acutis apice ferratis subtus scabriusculis, panicula pyramidata tomentosa, sepalis petalisque ciliatis. *Java*.
- T. *Affa* Gand. (T. sericea Blum.)

pag. 632.

Ad *Wormiam* Roth.

- obovata* * 5. W. foliis obovatis ferratis, pedunculis 1floris, floribus polygynis. *Java*. (*Colbertia* Blum.)
- scabrella* * 6. W. foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis fetaceo-ferratis pilosis, pedunculis aggregatis elongatis, sepalis petalisque rotundatis. *Nepal*. (*Dillenia scabrella* Roxb., *Colbertia* Don.)

Post *Gynocardiam* Roxb.:

GEERIA Blum.

- ferrata* Blum. 1. G. ramulis tomentosis, foliis lanceolatis acuminatis subtus pubescentibus, floribus confertis axillaribus 5gynis. *Java*.
- angustifolia* Blum. 2. G. foliis lanceolatis acuminatis ferratis subtus ramulisque sericeis, floribus ♀ 3gynis. *Java*.
- glabra* Blum. 3. G. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis subtus ramulisque glabris, floribus confertis axillaribus. *Java*.
- obovata* Blum. 4. G. foliis obovatis retufis apice obtuse ferratis subtus ramulisque glabris, floribus paucis axillaribus. *Java*.

pag. 633.

Ad *Sagittariam*.*S. guianensis* l. guayanensis.

Post n. 3. *palaeifolia* Mart. 17. *S. foliis obovatis obtusis multinerviis, angulis baseos obtusis, scapo sursum ancipiti angulato, floribus verticillatis hermaphroditis, fructibus obovatis striatis. Brasil.*

pag. 634.

Post *Carpodonta*:

ROLLINIA Hilar.

- longifolia* Hilar. 1. *R. foliis oblongo-lanceolatis subtus calycibusque rufo-tomentosis. Brasil. (Anona dolabripetala Radd., xestropetala Syst. 2. p. 641.)*
- sagifolia* Hilar. 2. *R. foliis ovatis cuspidatis subtus pubescentibus, costa venisque rufo-villosis. Brasil.*
- parviflora* Hilar. 3. *R. foliis oblongis acuminatis subtus pubescentibus. Brasil.*

pag. 635.

Ad *Guatteriam* R. et P.

- Post n. 13. *cuneiformis* Blum. 21. *Gu. foliis obovatis basi subcordatis glabris subtus glaucis, pedunculis 1floris petalisque subfalcatis elongatis, fructibus oblongis utrinque attenuatis. Java.*
- lateriflora* Blum. 22. *Gu. foliis oblongis acuminatis glabris, pedunculis solitariis 1floris, fructibus obovato-oblongis stipite brevioribus. Java.*
- pallida* Blum. 23. *Gu. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris subtus pallidis, pedunculis solitariis 1floris elongatis, fructibus stipitatis oblongis utrinque attenuatis pubescentibus. Java.*
- australis* Hilar. 24. *Gu. fruticosa, foliis oblongis acuminatis glabris, petalis subaequalibus obtusis. Brasil.*
- Post n. 19. *Gomeziana* Hilar. 25. *Gu. arborea, foliis oblongis acuminatis subtus pilosis, petalis interioribus lanceolatis acutis. Brasil.*
- macrophylla* Blum. 26. *Gu. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis subtus pubescentibus, pedunculis brevissimis paucifloris, petalis exterioribus brevioribus. Java.*
- Bragma* Blum. 27. *Gu. foliis oblongis acuminatis supra lucidis, venis subtus ramulisque tomentosis, pedunculis brevissimis 1floris, petalis interioribus brevioribus. Inf. Javae vicinae.*
- pifocarpa* Blum. 28. *Gu. foliis basi inaequali ovato-oblongis obtusiusculis, venis subtus ramulisque tomentosis, pedunculis 1floris, fructibus globosis subsessilibus. Java.*
- ferruginea* Hilar. 29. *Gu. foliis oblongis acutis subtus ferrugineo-pubescentibus, petalis interioribus latioribus bre-*

rioribus. *Brazil.* Gu. eriopoda Cand. petala habet subaequalia.

- villosissima*
Hilar. 30. Gu. foliis oblongis acuminatis, venis subtus villosissimis, pedunculis 2floris, petalis interioribus brevioribus. *Brazil.*
- lutea* Hilar. 31. Gu. fruticosa, foliis oblongis acuminatis subpubescentibus, petalis interioribus elongatis acutis. *Brazil.*

pag. 636.

Ad *Xylopiam*.

- grandiflora*
Hilar. 12. X. arborea, foliis lanceolatis subtus tomentosis, pedunculis brevissimis 2floris, petalis exterioribus linearibus, interioribus triquetris basi 2auriculatis. *Brazil.*
- sericea* Hilar. 13. X. arborea, foliis lanceolatis acuminatis subtus sericeis, pedunculis brevissimis 3floris, petalis exterioribus linearibus obtusis, interioribus triquetris. *Brazil.* Hilar. pl. uf. brasil. t. 33.

pag. 637.

Ad *Unonam*.

- Cananga* * 31. U. foliis inaequaliter ovato-oblongis acuminatis glabris, pedunculis axillaribus 1-multifloris demum foliosis, pedicellis subcorymbosis, petalis lanceolatis, fructibus ovalibus stipitatis. *Java.* (U. odorata Blum.)
- elliptica* Blum. 32. U. foliis subsessilibus subcordato-oblongis acutis glabris, pedunculis axillaribus 1floris bracteatis, petalis lineari-lanceolatis obtusiusculis. *Java.*
- litoralis* Blum. 33. U. ramis subscaudentibus, foliis ovato-oblongis coriaceis glabris, pedunculis 1floris petiolo longioribus, fructibus ovalibus medio coarctatis breviter stipitatis. *Java.*
- macrophylla*
Blum. 34. U. foliis ovato-oblongis acuminatis coriaceis glabris, pedunculis 1floris subaxillaribus, fructibus ovalibus 2spermis breviter stipitatis. *Java.*
- suaveolens*
Blum. 35. U. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glabris, pedunculis uncinatis multifloris, petalis linearibus sericeis, fructibus oblongis utriusque attenuatis breviter stipitatis. *Java.*
- U. odorata Dun. (U. virgata Blum.)
- U. nitidissima Dun. (U. fulgens Labill. nov. Caled. t. 56.)

pag. 638.

- Post n. 20. *biglandulosa* Blum. 36. U. fruticosa, foliis subcordatis ovato-lanceolatis margine 2glandulosis subtus glaucis, pedunculis 1floris folio brevioribus, fructibus moniliformibus stipitatis. *Java.*
- Post n. 25. *subcordata* Blum. 37. U. foliis subsessilibus subcordato-oblongis acuminatis subtus pubescentibus, pedunculis solitariis 1floris, baccis globosis stipitatis 2spermis. *Java.*

- Kentii* Blum. 38. *U. foliis oblongo-lanceolatis coriaceis nitidis, pedunculis 1floris nutantibus, baccis globosis breviter stipitatis 2spermis. Java.*
- humilis* Blum. 39. *U. foliis lato-lanceolatis, venis subtus fusco-fericeis, pedunculis oppositifoliis 3floris, baccis globosis stipitatis. Java.*

pag. 639.

Ad *Uariam*.

- U. dulcis (javana)* Dun. (*U. purpurea* Blum.)
- rugosa* Blum. 8. *U. arborea, foliis oblongis acuminatis glabris, pedunculis paucifloris axillaribus, fructibus globosis rugosis 4spermis. Java.*
- Burahol* Blum. 9. *U. arborea, foliis oblongis nitidis, pedunculis confertis 1floris, floribus monoecis. Java.*
- longifolia* Blum. 10. *U. foliis oblongis retusis subtus ramulisque ferrugineo-tomentosis, racemis elongatis paucifloris, pedicellis medio bracteolatis. Inf. Javae ab austro vicina.*
- obtusa* Blum. 11. *U. foliis ovalibus obtusis subtus ramulisque ferrugineo-villosis, pedunculis elongatis 1floris, fructibus ovalibus tomentosis. Java.*
- † *sphaerocarpa* Blum. 12. *U. farmentosa, foliis ovato-oblongis acutis subtus ramulisque ferrugineo-villosis, fructibus longe stipitatis globosis laevibus 4spermis. Java.*

pag. 640.

Ad *Anonam*.

- Post n. 8. *australis* Hilar. 31. *A. foliis ovatis cuspidatis glaberrimis punctatis, pedunculis solitariis. Brasil.*
- A. squamosa* sponte nusquam in America crescere sed introducta a Lusitanis in Brasiliam dicitur. Hilar. pl. uf. bras. ad t. 30.

pag. 641.

- A. xestropetala* * deleatur: militat enim supra sub *Rollinia* Hilar.
- sylvatica* Hilar. 32. *A. foliis elliptico-oblongis acutis pubescentibus pellucido-punctatis, pedunculis solitariis axillaribus. Brasil. Hilar. pl. uf. bras. t. 29.*
- cornifolia* Hilar. 33. *A. suffruticosa, foliis subrotundo-ovatis subtus pubescentibus, venis subtus rufis, pedunculis 1floris. Brasil.*
- dioeca* Hilar. 34. *A. suffruticosa, foliis obovatis pubescentibus subtus tomentosis, pedunculis 1floris. Brasil.*
- sursuracea* Hilar. 35. *A. fruticosa, foliis oblongis subtus ramulisque rufo-surfurosis, pedunculis oppositifoliis 2floris, Brasil.*

pag. 642.

Ad *Magnoliam*.

- Post n. 4. *Selloi* * 17. *M. foliis obovatis obtusissimis, petalis ovatis obtusis. Brasil, (Talauma Hilar.)*

- ovata* * 18. *M. foliis ovatis obtusiusculis, petalis subrotundis obtusissimis. Brasfl. (Talauma Hilar. fl. brasfl. t. 4.)*

pag. 643.

Ad *M. fuscata* Andr. (*M. parviflora* Blum.)

Ad *M. pumilam* Andr. add. (*Talauma Candollii* Blum.) del. syn. *Liriodendron Liliifera* L. Est enim species distinctissima:

- Rumphii* * 19. *M. arborea, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis, pedunculis terminalibus erectis. Inf. Molucc. (Sampacca montana Rumph. t. 2, t. 69., Liriodendron Liliifera L., Talauma Rumphii Blum.)*

Ad *Micheliam*.

M. Champaca L. pedunculos habet spathasque sericeas.

longifolia Blum. 8. *M. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris rigidis, pedunculis spathisque sericeis. Java.*

montana Blum. 9. *M. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis glabris, pedunculis spathisque nudis. Java.*

rufinervia Blum. 10. *M. foliis oblongis utrinque attenuatis, venis subtus spathisque rufo-villosis, petalis exterioribus spathulatis obtusis. Java.*

Ad *M. Doltsopam* Buchan. (*Manglietia glauca* Blum.) *Java.*

macrophylla Don. 11. *M. foliis lanceolatis utrinque attenuatis undulatis glabris, floribus terminalibus sessilibus solitariis. Nepal.*

SARCOCARPON Blum.

scandens Blum. *Java.* Frutex scandens, foliis ovato-oblongis, pedunculis confertis axillaribus 1floris.

pag. 644.

Post *Dilleni*am:

CAPELLIA Blum.

multiflora Blum. *Java.* Arbor excelsa, foliis oblongis repando-ferulatis glabris, pedunculis terminalibus multifloris.

AROMADENDRON Blum.

elegans Blum. *Java.* Arbor excelsa, foliis distichis oblongo-lanceolatis, floribus terminalibus solitariis.

pag. 645.

Ad *Adonida*.

Post n. 4. *davurica* Reichenb. 6. *A. petalis duodenis spathulatis apice crenulatis calycem glabrum multo superantibus, foliorum laciniis 3fidis linearibus. Sibir. Reichenb. ic. t. 321.*

sibirica Patrin. 7. *A. glaberrima*, petalis numerosis obovatis apice crenulatis calycem multo superantibus, foliorum laciniis abbreviatis incis. *Sibir.* (*A. ircutiana* Fisch.?)

pag. 646.

Ad *Ranunculum*.

Post n. 8. *Agerii* Bertolon. 148. R. foliis glabris, radicalibus cordatis sublobato-dentatis, sequentibus 3partitis, laciniis cuneatis obtuse dentatis incis, caule simplici sub-1floro, calyce reflexo. *Ager bononiensis Ital.* Opusc. scientif. di Bologn. 3. p. 182. t. 6.

pag. 647.

R. cortusaefolius W. (*R. heucheraefolius* Presl. *Sicil.*)

Ad *R. millefoliatum* del. syn. Bertolonii.

Post n. 22. *scaber* Presl. 149. R. foliis decompositis multifidis scabris, laciniis lineari-oblongis obtusis, calyce pubescente reflexo, caule erecto folioso multifloro appresse pubescente, radice grumosa. *Sicil.*

pag. 648.

Post n. 31. *cordifolius* * 150. R. foliis longe petiolatis cordatis crenatis, infimis orbiculatis, caule ascendente gracili glaberrimo, pedunculis 1floris, floribus oligandris, sepalis petalisque subternis. *Monte Video.* (*Casalea ascendens* Hilar.)

pag. 649.

R. bonariensis Poir. melius sic: R. foliis inferioribus petiolatis cordato-ovatis obtusis crenatis, superioribus subsessilibus ovatis, caule ramoso, sepalis petalisque minoribus ternis, floribus oligandris. *Buenos Ayres.* (*Casalea ficarifolia* Hilar.)

phyteumacfolius * 151. R. glaberrimus erectus, foliis inferioribus cordatis obtusis integerrimis, superioribus oblongis subdentatis, summis linearibus, petalis calycem subaequantibus. *Brazil.* (*R. bonariensis* Persf., heterophyllus Sm., *Casalea phyteumacfolia* Hilar.)

R. flagelliformis Sm. — floribus minutis oligandris. (*Casalea* Hilar.) *Brazil.*

javanicus Blum. 152. R. foliis omnibus petiolatis cordato-ovatis crenatis, summis lanceolatis trifidisve, pedunculis oppositifoliis 1floris, petalis calyce duplo longioribus. *Java.*

fontanus Presl. 153. R. caule ascendente fistuloso, foliis dentatis, inferioribus petiolatis cordato-ovatis obtusis, superioribus lineari-oblongis in petiolum attenuatis, pedunculis oppositifoliis, petalis calycem superantibus. *Montes Sicil.*

Post n. 46. *hydrophilus* Gandieh. 154. R. caule repente subnatan-
te, foliis radicalibus orbiculato-ovatis longissi-
me petiolatis, pedunculis 1floris. *Inf. Falkland.*

pag. 650.

R. *apiifolius* Perf. — calycibus coloratis, petalis minimis nectaria
referentibus. (*Aphanostemma* Hilar.)

pag. 651.

Post n. 65. *Sabinii* R. Br. 155. R. foliis 3partitis, radicalibus lon-
ge petiolatis, laciniis ellipticis, lateralibus semi-
bifidis, caulinis sessilibus linearibus, calycibus
hirsutis petala retusa subaequantibus. *Inf. Mel-
ville.*

arcticus 156. R. foliis glaberrimis, radicalibus longe petio-
latis hastatis 3partitis, laciniis 3-4fidis obtusis,
caulinis linearibus partitis, caule simplicissimo
Richardf. 1floro, calyce villoso reflexo petalis obtusissimis
breviori. *Amer. arctic.*

Purshii 157. R. caule repente foliisque petiolatis glaberri-
Richardf. mis, depressis ternatim decompositis, laciniis di-
varicatis linearibus acutis, elevatis subuniformi-
bus, laciniis cuneatis apice inciso-dentatis, ca-
lycibus glaberrimis reflexis corolla nervosa bre-
vioribus. *Amer. arctic.*

Post n. 72. *affinis* R. Br. 158. R. caule erecto 1-2floro pubescent-
te, foliis radicalibus petiolatis pedato-multifidis,
caulinis subsessilibus digitatis, laciniis linearibus,
fructibus recurvo-rostratis. *Inf. Melville.*

Post n. 73. 74. *angulatus* Presl. 159. R. caule ramoso appresse pi-
loso, foliis radicalibus longe petiolatis cordato-
subrotundis angulato-lobatis dentatis, caulinis
3partitis inciso-dentatis, fructibus rostratis gla-
berrimis. *Sicil.*

pag. 652.

R. *Villarfi* Cand. (R. *insularis* Viv.)

pag. 653.

R. *geranioides* Humb. habitat et in *Java*. Blum. flor. jav. p. 2.

pag. 654.

R. *acris*. (R. *ficulus* Presl.)

pag. 655.

R. *nepalensis* Cand. (R. *trilobatus* Don.)

pag. 656.

Post n. 127. *sessiliflorus* * 160. R. caule prostrato hirsuto, foliis
pilosis, radicalibus suborbiculatis, superioribus
3partitis incisifolius ciliatis, summis subtriangulari-

bus, floribus subsessilibus oppositifoliis oligandris, sepalis petalisque subternis. *In paludibus ad fl. Platam.* (Cafalea sessiliflora Hilar.)

pag. 657.

R. Philonctis Retz. (*R. pratensis* Presl.)

pag. 658.

Ad *Trollium*.

Ledebourii Reichenb. 6. Tr. sepalis 5 patentibus, nectariis 10-12 linearibus stamina superantibus. *Sibir.* Reichenb. ic. t. 272.

pumilus Don. 7. Tr. sepalis patentibus subrotundo-ovalibus, staminibus nectaria 12 lineari-lingulata duplo superantibus. *Emodi montes.*

pag. 659.

Ad *Caltham*.

Post n. 1. *Emodorum* * 14. C. caule ascendente dichotomo, ramis 2floris, foliis longe petiolatis sagittato-cordatis crenatis, angulis posticis subtruncatis dentatis, fructibus longe rostratis. *Emodi montes.* (C. himalensis Don.)

arctica R. Br. 15. C. caule repente, foliis reniformibus repandis crenatis, fructibus imbricatis recurvo-rostratis. *Inf. Melville.*

pag. 660.

Post *Caltham*:

HYDRASTIS.

canadensis Amer. bor. Herba e radice tuberosa lutea, foliis binis ternisve petiolatis palmatis inciso-ferratis, flore solitario pedunculato rubefcente, fructibus rubris Rubo similibus. (*Warneria canadensis* Mill.)

pag. 662.

Ad *Anemonem*.

A. pensylvanica. (*A. borealis* Richardf.)

Hudsoniana Richardf. 37. A. foliis villosis, involucri ternatim decompositis breviter petiolatis, radicalibus multipartitis, laciniis palmatis linearibus, pedunculis binis, sepalis 5-8 ovatis acutiusculis. *Amer. bor.*

elongata Don. 38. A. foliis glabris, involucri binis basi connatis 3lobis inciso-dentatis, inferioribus 3partitis, laciniis cuneatis inciso-lobatis, pedunculis ternis simplicibus 3fidisve pilosis, sepalis 5 ovalibus, germinibus glabris rostratis. *Nepal.*

obtusiloba Don. 39. A. foliis villosissimis, involucri ternis 3fidis, inferioribus cordatis 3lobis, lobis cuneatis inci-

fo-crenatis, sepalis obovatis, germinibus pilosis rostratis. *Nepal.*

pag. 663.

Post n. 36. *polyanthes* Don. 40. A. foliis villosissimis, radicalibus longe petiolatis cordatis 3partitis, lobis late cuneatis 3lobis inciso-dentatis, involucri 3phyllo 3partito, laciniis 3fidis pinnatifidisve, pedunculis umbellatis, sepalis obovatis, germinibus glabris. *Nepal.*

pag. 664.

Ad *Clematida*.

Cl. nepalensis Cand. (*Cl. montana* Don.)

pag. 665.

Post n. 7. *smilacina* Blum. 80. *Cl.* foliis ovatis coriaceis glabris integerrimis 5nerviis. *Java.*

glandulosa Blum. 81. *Cl.* foliis ovatis glanduloso-dentatis glabris 5nerviis, pedunculis paniculatis 3fidis, floribus monoecis. *Java.*

Cl. montana Buchan. (*Cl. anemonaeflora* Don.)

pag. 667.

Post n. 36. *campestris* Hilar. 82. *Cl.* caule scandente 5gono foliisque ternato-pinnatis pubescentibus, foliolis ovato-lanceolatis acutis, pedunculis axillaribus folitariis, terminalibus subternis, sepalis patulis villosis. *Brazil.*

pag. 669.

Post n. 64. *triloba* Hilar. 83. *Cl.* foliis ternatis glabris, foliolis 3fidis acuminatis, pedunculis 3fidis 2bracteatis. *Brazil.*

pag. 671.

Ad *Thalictrum*.

Post n. 15. † *javanicum* Blum. 53. *Th.* caule subtetragono striato, foliolis orbiculatis glabris subtus glaucis 3fidis, panicula dichotoma corymbosa erecta. *Java.*

C L A S S I S XIV.

pag. 675.

- Post n. 2061. *Stenarrhena* Don. Cal. $\frac{1}{2}$. Cor. $\frac{1}{3}$, lab. sup. galeato, labii infer. lobo medio maximo. Antherae longissimaeiloculares. Stigma 2fidum.

pag. 676.

- Post n. 2078. *Perilla*. Cal. 5fidus, lacinia suprema brevissima. Cor. $\frac{1}{3}$, lab. sup. emarginato, lobis labii inf. subaequalibus. Filamenta distantia corolla breviora. Styli 2 connexi.

pag. 677.

- Post n. 2089. *Pycnostachys* Hook. Cal. dentibus 5 spinulosis, squibus involutis. Cor. lab. sup. 4crenatum, infer. integrum cucullatum. Stam. declinata approximata.
- Glechion* *. Cal. tubulosus 5-dentatus, ore villosissimo. Cor. ringens, lab. sup. fornicato, dentibus ad latera faucis: lab. infer. indivisum.

pag. 678.

- Post n. 2113. *Casselia* Nees. Cal. campanulatus 5fidus persistens. Cor. infundibuliformis, limbo 5lobo. Antherae in fundo corollae, filamentis brevissimis. Caps. reticulata 2ocularis 2sperma, receptaculo seminum duplici septiformi, altero margine libero.

pag. 679.

- Post n. 2125. *Asaphes* *. Cal. duplex involucratus, exter. campanulatus truncatus ore spinulosus, interior tubulosus, dentibus 3 spinulosis. Cor. tubo curvato, limbo 4lobo. Stam. tubo inserta. Antherae 2oculares. Stigma peltatum.
- Ad n. 2140. *Hemiphragma* add. Wallich.

pag. 680.

- Post n. 2149. inferatur *Vrolikia* e syst. 3. p. 149.
- Post n. 2153. *Campyleia* Thuars. Cal. cylindricus angulatus 5dentatus. Cor. tubo incurvo, limbo sub-2labiato 4lobo. Caps. compressa ovalis stylo coronata 2valvis 2ocularis polysperma.

pag. 682.

- Post n. 2189. *Sopubia* Hamilt. Cal. campanulatus 5dentatus. Cor. campanulata aequaliter 5loba. Stam. exserta. Antherae 2partitae, loculis sterilibus tubulosis.

Stigma indivisum. Caps. 2locularis 2valvis polysperma. Dissepimentum parallelum continuum.

Ad n. 2196. *Chelone*. Caps. 2-(non 5-)locularis.

pag. 683.

n. 2204. *Sibthorpia*, hinc exul, in Cl. V. collocata est.

pag. 685.

n. 2235. *Didymocarpus* Jack., hinc exul, in Cl. II. collocatus est.

n. 2236. *Aeschynanthus* Jack. femina habet utrinque comosa, non aristata.

n. 2239. *Parentucellia* Viv. ad R. Brown. est Euphrasia.

Sinningia Nees. Cal. 5angularis, angulis alatis. Cor. 2labiata. Rudimentum filamenti quinti. Glandulae 5, cum filamentis alternae. Caps. subcarnosa 5angularis, placentis duabus 2fidis.

pag. 686.

Post n. 2251. *Abelia* R. Br. Involucrum 2-multiflorum. Cal. superus foliaceus. Cor. infundibuliformis 5loba. Germen 2loculare, loculis 2 abortientibus.

n. 2254. *Melianthus* melius *Rutaceis* Juss. accensendus.

pag. 687.

Ad *Lumnitzeram* Jacqu.

- caesia* * 10. L. ramis glabriusculis teretibus, foliis ovatis dentato-crenatis, pedunculis subverticillatis basi bracteatis. *Patria?*
- carnosa* * 11. L. ramis glabriusculis 4gonis, foliis ovatis subcoriaceis dentato-crenatis, verticillis racemosis nudis. *Monte Video.*
- rubicunda* * 12. L. caule fruticoso, foliis longe petiolatis ovalibus serratis ramulisque tomentosis, verticillis remotis paucifloris, bracteis minimis, tubo corollae calycem setaceo-dentatum ter superante. *Nepal.* (Plectranthus *rubicunda* Don.)
- virgata* * 13. L. caule suffruticoso, foliis elliptico-oblongis obtusis dentatis utrinque pilosis, verticillis remotis paucifloris, dentibus calycis infer. inaequalibus mucronatis. *Nepal.* (Plectranthus *virgata* Don.)

pag. 688.

Ad *Ocimum*.

Post n. 11. *flamineum* Sims. 28. O. foliis oblongis utrinque attenuatis serratis incanis, verticillis sub-6floris, staminibus longe exsertis. *China.* Bot. mag. 2452.

Coetosa * 29. O. foliis ovatis acutis serratis pilosis subtus canescentibus, pedicellis oppositis 3fidis paucifloris spicato-racemosis, calycibus pilosis. *Nepal.* (Plectranthus Don.)

ternifolium * 30. O. foliis ternis oblongo-lanceolatis acuminatis ferratis hirsutissimis subtus tomentosus, spicis ternis verticillatis multifloris, calycibus corollisque lanatis. *Nepal*. (*Plectranthus* Don.) Pl. ternatus Sims. e *Madagascar* huc?

pag. 689.

Ad *Plectranthum*.

Pl. *mollis* *. (Pl. *cordifolius* Don.)

coloratus Don. 29. Pl. caule fruticoso, ramis sulcatis, foliis ellipticis acutis ferratis hispida, verticillis multifloris contiguus spicatis, calycibus cylindricis fauce himaculatis, bracteis ovatis coloratis. *Nepal*.

pag. 692.

Ad *Melissam*.

Post n. 4. *coccinea* * 6. M. foliis obovatis integerrimis glabris subtus punctatis, pedunculis axillaribus subsolitariis, corollis clavatis pendulis. *Florida*. (*Cunila coccinea* Hook. exot. fl. t. 163.)

pag. 697.

Ad *Thymum*.

Post n. 35. *origanifolius* Don. 55. Th. caule erecto ramoso villoso, foliis subrotundo-ovatis acutis ferratis utrinque hirsutis, verticillis multifloris, floribus pedicellatis, dentibus calycis inaequalibus plumosis. *Nepal*.

pag. 698.

Post n. 43. *megapotamicus* * 56. Th. caule erecto herbaceo, foliis linearibus convolutis aspero-punctatis, pedunculis confertis folia subsuperantibus. *Rio grande*. Sello.

Post n. 44. *biflorus* Don. 57. Th. caule suffruticoso filiformi decumbente piloso, foliis elliptico-ovatis obtusis integerrimis marginatis nervosis subtus punctatis nudiusculis, pedunculis oppositis sub-3floris, calycis cylindrici sulcati dentibus setaceis. *Nepal*.

piperitus Don. 58. Th. caule fruticoso erecto ramoso, foliis ovatis obtusis subcrenulatis pilosiusculis, pedunculis oppositis 3floris, calycis dentibus subulatis. *Nepal*.

repens Don. 59. Th. caule repente 4gono, foliis cordatis crenatis nervosis hirsutis, corymbis subsessilibus 5floris, dentibus calycis superioribus ovatis obtusis. *Nepal*. (*Clinopodium repens* Roxb.)

parviflorus Requier. 60. Th. caule decumbente caespitoso, foliis subrotundis glabris, pedunculis 3floris, corolla regulari. *Corfica*.

pag. 699.

Ad Th. *Calamintham*. Th. *glandulosus* Requier. var.

nepetoides Don. 61. Th. caule erecto foliisque cordato-ovatis obtusis crenatis villosis, pedunculis multifloris, bracteis subulatis, calycibus basi ventricosis. *Nepal.* (*Glechoma erecta* Roxb.)

pag. 700.

Ad *Gardoquiam* R. et P.

capitata * 13. G. capitulis ovatis longe pedunculatis, bracteis calycibusque spinosis pilosis, foliis fasciculatis lineari-oblongis margine revolutis integerrimis cauleque ramoso hispidis. *Rio grande.* Sello.

origanoides Reichenb. 14. G. capitulis pedunculatis bracteatis, foliis ovatis apice subdentatis venoso-lineatis pubescentibus. *Inf. Trinit.*

spicata * 15. G. spicis terminalibus villosis, foliis subfasciculatis spatulatis subintegerrimis asperis. *Rio grande.* Sello.

Post *Lepechiniam* W.:

STENARRHENA DON.

lanata Don. *Nepal.* Herba simplex villosissima, foliis subseffilibus lanceolatis acutis crenulatis rugosis subtus niveo-lanatis, verticillis distantibus, bracteis integerrimis, floribus rubris.

pag. 701.

Ad *Scutellariam*.

Post n. 1. *scordifolia* Fisch. 39. Sc. caule erecto simplici sursum pubescente, foliis cordato-ellipticis subcrenatis pubescentibus punctatis, floribus axillaribus oppositis solitariis. *Sibir.*

barbata Don. 40. Sc. caule erecto simplici foliisque ovato-oblongis obtusis inferioribus serratis glabris, floribus solitariis, corollis villosis. *Nepal.*

repens Hamilt. 41. Sc. caule suffruticoso decumbente ramosissimo, foliis cordatis acutis inciso-serratis hirsutis, floribus axillaribus solitariis secundis, corollis tomentosis. *Nepal.*

pag. 702.

Post n. 17. *scandens* Hamilt. 42. Sc. caule erecto volubili foliisque ovatis acuminatis serrato-crenatis glabris, racemis axillaribus secundis multifloris, bracteis cordatis integerrimis pedicellos superantibus. *Nepal.*

Post n. 19. *indica* 43. Sc. racemis spicatis terminalibus, bracteis linearibus, tubo corollae filiformi, foliis cordatis obtusis crenatis pubescentibus subtus purpureis, caule simplici. *China. Ind. or. Nepal.* (*Scutellaria sinica* Plukn. t. 441. f. 1., sed nequaquam *Serratula amara* Rumph., quae *Gratiola amara* Roxb.)

pag. 703.

Post n. 35. *Felisberti* Mart. 44. Sc. foliis cordato-ovatis dentatis supra pilosis subtus cauleque pubescentibus, racemis terminalibus trichotomis foliosis, labio corollae inferiori emarginato. *Brazil.*

Ad *Prostantheram* Labill.

Post n. 1. *empetrifolia* Sieb. 13. Pr. foliis linearibus cuspidatis revolutis glabris, ramulis villosis, calycibus ciliatis. *Nov. Holl.*

pag. 705.

Ad *Aiugam*.

Post n. 7. *integrifolia* Don. 15. A. hirsutissima, caule erecto, foliis inferioribus spathulato-oblongis repando-crenatis in petiolum attenuatis, verticillis 10floris, laciniis calycis ovato-lanceolatis acutis. *Nepal.*

A. decumbens Thunb. provenit et in *Nepal.*

pag. 706.

Ante n. 18. *lobata* Don. 16. A. furculis reptantibus, foliis longe petiolatis cordatis obtusis inciso-lobatis, floribus verticillato-spicatis secundis, laciniis calycis lineari-lanceolatis acutis bractea brevioribus. *Nepal.*

Ad *Anisomelem* R. Br.

A. nepalensis * (Nepeta verticillata Trevir.)

† *australis* * 7. A. foliis 3fidis cauleque glabriusculis, cymis axillaribus paucifloris erectis, calycibus pubescentibus. *Nov. Holl.* (Teucrium australe Sieb.)

pag. 710.

Ad *Teucrium*.

quadrifarium 80. T. hirsutissimum, foliis petiolatis cordato-ovatis acutis inaequaliter crenatis, spicis elongatis oppositis multifloris, bracteis stipitatis cordatis acuminatis integerrimis coloratis decussatis, caule stricto tomentoso. *Nepal.*

laxum Don. 81. T. foliis petiolatis ovato-oblongis acuminatis ferratis utrinque pilosiusculis, racemis spicatis secundis multifloris, bracteis calyce hispido brevioribus. *Nepal.*

pag. 712.

Westringia rosmariniformis Sm. (Cunila fruticosa W.)

pag. 713.

Post *Leucosceptrum* Sm.:

PERILLA.

- elata* Don. 1. *P. fruticosa*, foliis ellipticis acutis crenatis supra scabris subtus ramulisque tomentosis, spicis terminalibus paniculatis, calycibus tomentosis. *Nepal.*
- fruticosa* Don. 2. *P. fruticosa*, foliis oblongis utrinque attenuatis ferratis pubescentibus, spicis linearibus paniculatis decussatis, bracteolis minutis subulatis, calycis hispidi dentibus subulatis. *Nepal.*
- leptostachya* Don. 3. *P. fruticosa*, foliis longe petiolatis ovatis utrinque attenuatis inciso-ferratis pubescentibus, spicis linearibus solitariis, bracteis subulatis calycem tomentosum aequantibus. *Nepal.*
- ocimoides* 4. *P. herbacea elata* hirsuta, foliis ovatis acuminatis ferratis, spicis secundis, bracteis ovatis acuminatis flore longioribus. *Ind. orient.* (*Melissa maxima* Arduin.)
- polystachya* Don. 5. *P. herbacea glabra*, foliis ovatis acuminatis ferratis, spicis numerosis, bracteis lanceolatis acuminatis flores subaequantibus, calycibus hispidis. *Nepal.*

pag. 716.

Ad *Origanum vulgare*. *O. normale* Don. var.

pag. 721.

Ad *Hyssopum*.

- Post n. 3. *lophanthoides* Don. 6. *H.* foliis ovatis acutis crenatis pubescentibus, pedunculis axillaribus capillaceis multifloris paniculatis folia superantibus, dentibus calycis ovatis obtusis. *Nepal.*

Post *Elsholtziam* W.:

PYCNOSTACHYS Hook.

- coerulea* Hook. *Madagascar*. Herba erecta glabra, caule 4gono, foliis lanceolatis subferratis, spicis densis, floribus coeruleis. Hook. exot. fl. t. 202.

GLECHON *.

- thymoides* * *Rio grande Amer. austr.* Suffrutex erectus, foliis obovatis obtuse dentatis venosis glabriusculis, floribus axillaribus subseffilibus subsolitariis.

pag. 722.

Ad *Mentham*.

- A *M. scellata* Lour. *M. verticillata* Roxb. Don. haud differre videtur.

Post n. 4. *Wanda* Wallich. 36. M. spicis cylindricis gracilibus, calycibus pubescentibus corollam aequantibus, staminibus inclusis nudis, foliis petiolatis rhombico-ovatis grosse dentatis subtus punctatis glabris. *Nepal*. Cand. ic. hort. genev. t. 8.

pag. 723.

- macrostachya* Tenor. 37. M. verticillis spicatis continuis elongatis, calycibus glabriusculis, staminibus corollam aequantibus, stylo exserto, foliis sessilibus subcordato-ovatis dentatis rugosis villosiusculis. *Neapol*. Ergo removeatur e syn. M. rotundifoliae.
- † *origanoides* Tenor. 38. M. floribus capitato-spicatis, bracteis confertis ovatis integerrimis, staminibus corolla longioribus, foliis subcordato-ovatis obtusis serratis, caule hirto. *Neapol*.
- urticaefolia* Tenor. 39. M. floribus verticillato-spicatis, infimis subcapitatis pedunculatis, bracteis cuspidatis incisedentatis, staminibus corolla brevioribus, foliis ovato-ellipticis conduplicatis divergenti-dentatis hirsutis, caule hirto. *Neapol*.

pag. 725.

Ad *Galeopsis Tetrabit* var. *G. bifida* Bönninghaus. fl. monaster. p. 178., lacinia media labii inf. bifida postice lineis duabus aureis notata.

pag. 726.

Ad *Lanium*.

- L. rugosum* Ait., lobo medio lab. inf. corollae obcordato variegato. *Europ. med. et austr.* Reichenb. ic. t. 217. (*L. maculatum* Sm. engl. bot. 2550. Hornem. fl. dan. 1649. fl. hal., *L. longiflorum* Tenor.?)
- maculatum*, foliis cordatis acutis inaequaliter dentatis medio albo-vittatis cauleque pilosiusculis, verticillis 6-10floris, lobo medio labii infer. obovato inciso-crenato. *Italia*. Reichenb. ic. t. 215.
- flexuosum* Tenor. 20. *L.* foliis cordato-ovatis acutis grosse inaequaliter dentatis pilosiusculis, caule flexuoso elato deorsum piloso, verticillis sub-10floris, calycibus aristatis tubum corollae aequantibus, lobo medio lab. inf. replicato. *In sepibus Italiae, Saxoniae et Palatinatus*. Tenore. Zeyher. Ergo removeatur e syn. *L. maculati*. *L. laevigatum* Reichenb. ic. t. 216. huc potius pertinet, cum verum *L. laevigatum* *L.* et glabros habeat caulem calycesque et hos multo breviores tubo corollae et dentes corollae latiores lanceolatos nec setaceos, lobum medium denique labii infer. patentem nec latere replicatum. A b. Aitonio accepta exemplaria magnopere differunt et statura minore.

pag. 727.

Ad *Lamium amplexicaule* L. L. intermedium et moluccellaefolium
Fries. varr.

pag. 731.

Ad *Hyptin atrorubentem* Poit. H. racemosa Zuccagn. Bertolon.
negli opusc. scient. di Bologn. 4. p. 333.

pag. 734.

Ad *Stachya*.

St. hirta. (St. divaricata Viv. append. ad fl. cors.)

Post n. 24. *marrubiiifolia* Viv. 54. *St. hirta*, caule brachiato, foliis cordatis subrotundis crenatis, floralibus ovato-ellipticis apice spinulosis, verticillis laxis 6floris, corollae galea loboque labii infer. medio emarginato. *Corsica*.

pag. 738.

Ad *Ballotam*.

cinerea Don. 9. B. foliis ovatis obtuse serratis subtus cauleque cinereo-tomentosis, pedunculis axillaribus oppositis 3-6floris, laciniis calycis foliaceis spatulatis corolla longioribus. *Nepal*.

pag. 739.

Ad *Betoniam*.

Post n. 7. *laevigata* Don. 10. B. spica oblonga, floribus confertis incurvis, dentibus calycis longissimis aristatis, foliis cordato-ovatis serratis cauleque glabris. *Nepal*.

Ad *Marrubium*.

M. leonuroides Desr. potius ad *M. asiracanicum* Jacqu., quam ad *M. catariaefolium* Desr.

M. peregrinum melius sic: *M.* caule ramosissimo, ramis patentibus, foliis oblongis basi attenuatis dentatis rugoso-venosis sericeo-tomentosis, bracteis dentibusque calycis subulatis divergentibus. *M. creticum* Mill., paniculatum Desr. et remotum Kit. e synonymis reiicienda.

creticum Mill. 17. *M.* caule ramosissimo, ramis divaricatis, foliis oblongo-lanceolatis rugoso-venosis albo-tomentosis, dentibus calycis rectis, duobus minoribus. *Creta*. *Austria*. *Ager halensis*. (*M. peregrinum* Jacqu.) Reichenb. ic. t. 288.

pag. 740.

Post n. 8. *paniculatum* Desr. 18. *M.* caule ramoso, foliis oblongis dentatis canescentibus, dentibus calycis subdenis erectis. *German*. *Hungar*. (*M. remotum* Kit.) Reichenb. ic. t. 500.

- † *mollissimum* 19. M. caule ramoso, foliis ovalibus obtusis crenatis utrinque sericeo-lanatis, dentibus dens brevissimis, alternis minoribus, galea corollae villosissima, genitalibus exsertis. *Nepal*.
Don.

pag. 741.

Ad *Phlomisida*.

- Post n. 9. *Bruguierei* Desf. 24. Phl. suffruticosa tomentosa, foliis ovato-oblongis subcrenatis, verticillis contiguis, bracteis laciniisque calycis elongatis dense tomentosis. *Persia*.

pag. 742.

Ad *Leucada* R. Br.

- Post n. 2. *helianthemifolia* Desf. 18. L. foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis integerrimis subtus revolutis tomentosis, verticillis approximatis terminalibus. *Ind. or.* Mém. du mus. 11. t. 1.

pag. 743.

Ad *L. cephaloten* * (*L. capitata* Desf.)

- Post n. 11. *lamiifolia* Desf. 19. L. caule rufo-villoso, foliis breviter petiolatis cordato-ovatis crenatis supra rufo-sericeis subtus stellato-villosis, verticillis terminalibus, dentibus calycis subulatis elongatis. *Ind. or.*

- † *marrubioides* 20. L. foliis ovato-oblongis crenatis cauleque pubescentibus, verticillis multifloris, bracteis linearibus. *Ceylon*.
Desf.

- lancaefolia* 21. L. foliis oppositis lanceolatis integerrimis venosis subtus canescentibus, verticillis densifloris, dentibus calycis abbreviatis. *Ind. or.*
Desf.

- ternifolia* Desf. 22. L. foliis ternis subsessilibus lanceolatis integerrimis subtus tomentosis, verticillis approximatis terminalibus. *Ind. or.*

pag. 744.

Ad *L. bifloram* R. Br. *L. procumbens* Desf. e *Bengal*.

pag. 748.

Ad *Verbenam*.

- Post n. 13. *Pseudo-Gerouō* Hilar. 46. V. caule suffruticoso, foliis ovato-oblongis acuminatis serratis glabris, spica solitaria laxa, bracteis calyce brevioribus. *Brasil*. Hilar. fl. brasil. t. 40.

- rigida* * 47. V. caule herbaceo simplici, foliis subsessilibus oblongo-lanceolatis grosse dentatis rigidis asperis, cymis terminalibus compositis, laciniis calycis fetaceis elongatis. *Rio grande*. Sello.

- megapotamica* * 48. V. caule herbaceo erecto pubescente, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis serratis basi cuneatis glabriusculis, capitulis terminalibus, brac-

teis minutis ciliatis, calyce elongato glabro. *Rio grande*. Sello.

pag. 751.

Ad *Lippiam*.

L. montevidensis * (Lantana Selloi Link. et Ott. ic. hort. berol. t. 50.)

pag. 752.

Post n. 17. *megapotamica* * 27. L. capitulis hemisphaericis terminalibus, bracteis late ovatis integerrimis, foliis ovatis ferratis subtus ad venas pilosiusculis, caule erecto herbaceo. *Rio grande*. Sello.

Echinus * 28. L. capitulis globosis longe pedunculatis, pedunculis hirsutis 2spinosis, bracteis setaceis, calycibus multifetis, foliis ovato-oblongis dentatis cauleque procumbente hirsutissimis. *Brazil*. (Zapania *Echinus* Mart. nov. act. nat. cur. 11. t. 5.)

pag. 754.

Post *Hebenstreitiam*:

CASSELIA Nees.

ferrata Nees. 1. C. caule fruticoso erecto ramoso, foliis oblongis grosse ferratis. *Brazil*. Mart. nov. act. nat. 11. t. 6.

integrifolia Nees. 2. C. caule herbaceo simpliciusculo, foliis oblongo-lanceolatis integerrimis. *Brazil*. Mart. nov. act. nat. 11. t. 6.

Ad *Tamoneam muticam* Perf. (T. spicata Aubl., *Leptocarpus chamaedryfolius* Link.)

pag. 758.

Ad *Clerodendron*.

Post n. 9. *macrophyllum* Sims. 35. Cl. foliis oppositis subsessilibus late ovatis acuminatis ferratis subtus tomentosis, floribus paniculatis. *Ins. Mascaren*. Bot. mag. 2536.

pag. 760.

Post n. 30. *lividum* Lindl. 36. Cl. foliis oblongis repando-crenatis utrinque lividis, costa subtus petiolisque hirsutis, cymis pedunculatis axillaribus, calycibus pentagonis inflatis coloratis. *China*. Bot. reg. 945.

pag. 761.

Ad *Petream oblongam* * (P. racemosa Mart. in nov. act. cur. 11. p. 72.)

Post *Petream*;

ASAPHES *.

nepalensis * *Nepal*. Herba erecta villosa, foliis oppositis oblongis obtusis integerrimis basi vaginantibus, floribus verticillatis rubris. (*Morina perfica* Don.)

pag. 769.

Ad *Linderniam*.

† *micrantha* Don. 3. L. caule erecto simplici glabro, foliis linearibus obtusis integerrimis, pedunculis capillaribus 1floris. *Nepal*.

pag. 771.

Ad *Conobeam* Auhl.

punctata Mart. 5. C. caule basi radicante ascendente, foliis ovatis acutis serratis punctatis supra scabris, floribus axillaribus geminis brevissime pedunculatis. *Brazil*.

Ad *Rhinanthum orientalem*. (*Rh. bifidus* Don.) *Nepal*.

pag. 772.

Alectorolophus hirsutus Allion. differt omnino calycibus hirsutis, maxime vero feminibus solidis haud marginatis.

pag. 773.

Post *Bartsiam*;

CAMPYLEIA Thuars.

coccinea Hook. *Inf. Mascaren*. Herba parasitica scabra simplex, foliis linearibus rigidis, floribus axillaribus sessilibus coccineis. Hook. exot. fl. t. 203.

pag. 774.

Castilleia pallida * dilabitur in duas species:

septentrionalis Lindl. C. glabra, foliis lineari-lanceolatis integerrimis 3nerviis, spica paniculata, calyce piloso. *Labrador*. (*Bartsia pallida* Mx.)

sibirica Lindl. C. tomentosa, foliis radicalibus linearibus acuminatis, superioribus ovato-lanceolatis 3nerviis, spica simplici, calyce villoso. *Sibir*. (*Bartsia pallida* L.) Cf. Bot. reg. 925.

pag. 776.

Ad *Euphrasiam*.

Post n. 20, *simplex* Don. 32. E. caule stricto simplici, foliis petiolatis scabris, calycibus acutis pilosis, labio infer. corollae maximo. *Nepal*,

pag. 777.

Ad *Pedicularem*.

- P. longiflora* Rudolph. (*P. tubiflora* Fisch. Stev., *Siphonantha* Don.) Habitat in *Imao* et *Emodis*.
teucrifolia 58. *P. galea* falcata acuminata corollam claudente, calyce inaequaliter bifido, floribus congestis longe bracteatis, foliis oblongis duplicato-ferratis utrinque tomentosis. *Inf. Curil.* Mém. de Mosc. 6. t. 10. f. 1.
 M. B. Stev.

pag. 778.

- Post n. 5. *brevifolia* Don. 59. *P. galea* porrecta rostrata emarginata labium inferius longe superante, calyce inaequaliter bifido serrato, floribus verticillato-spicatis, foliis oppositis vel quaternis pinnatifidis cauleque villosis. *Emodi montes*.
 Post n. 9. *proboscidea* Stev. 60. *P. galea* ovata acuminata margine villosa, calyce campanulato 2labiato 5dentato, spica elongata, foliis pinnatifidis argute ferratis. *Sibir*.
macrantha * 61. *P. galea* falcata acuta subhorizontali labium inferius aequante, calycibus obtusis bracteatis, floribus remotiusculis, foliis 3pinnatifidis glabris. *Dauria*. (*P. grandiflora* Fisch. Stev.)
P. compacta W. calycem potius habet 5dentatum subinflatum (haud obtusum).
P. Romanzovii Chamiss. galeam potius habet porrectam quam abbreviatam, folia quaterna. Habitat et in *insul. Aleut.* (*P. Chamissonis* Stev. mém. de Mosc. 6. t. 4.)
 Post n. 13. *nasuta* M. B. Stev. 62. *P. galea* arcuata brevissime rostrata emarginato-2dentata, calyce pubescente bifido, floribus congesto-spicatis, foliis 2pinnatifidis, caule subaphyllo. *Inf. Curil.*

pag. 779.

- Ad *P. euphrasoidem* Steph. pertinere *P. ramosam* Wormsk. Stev. mém. de Mosc. 6. p. 42.
adunca M. B. 63. *P. galea* falcata obtusiuscula basi 2dentata hiante, calyce foliaceo serrulato, floribus terminalibus congestis, foliis alternis 2pinnatifidis. *Sibir. Camtschatca*. Mém. de Mosc. 6. t. 5. f. 2.
 Stev.
macrodon 64. *P. galea* obtusissima ad faucem 2dentata, calyce 2lobo dentato, floribus axillaribus sessilibus, foliis pinnatifidis crenulatis. *Ad sinum Hudson.*
 Richardf.
 Post n. 26. *Wlassowiana* Stev. 65. *P. galea* obtusissima intra medium subbidentata, calyce subserrato, floribus solitariis axillaribus bracteatis, foliis alternis pinnatifidis. *Sibir.* Mém. de Mosc. 6. t. 9.

pag. 780.

- P. alopecuroides* Adam., haud Stev. (*P. Langsdorffii* Stev. mém. de Mosc. 6. t. 9. f. 2.) Male galea dicitur edentula, ipso pictore dentes delineante.

Ad *P. comosam* pertinere *P. rubentem* Steph., *achillaeifoliam* Ej. et *fasciculatam* Bellard. Steven.

In caractere *P. caucasicae* M. B. deleatur (*calycibus subulatis*).

pag. 781.

Post n. 45. *amoena* Adam. 66. *P. galea* recta obtusa lobis labii infer. brevior, calyce 5fido, verticillis paucifloris remotis, foliis quaternis pinnatifidis, laciniis distantibus linearibus ferratis. *Sibir. Camtschatca*. Mém. de Mosc. 6. t. 7.

pag. 788.

Digitalis micrantha Roth. ad *sinum neapolitanum* lecta, *D. australis* nomine a Tenorio missa.

pag. 797.

Linaria aphylla * del. quae *Utricularia capensis*, v. supra p. 16.

pag. 799.

Mimulus pilosusculus Kunth. (*M. parviflorus* Lindl. in bot. reg. 874.) *Chili*.

pag. 800.

Ad *Toreniam*.

diffusa Don. 6. *T.* caule diffuso pilosusculo, foliis ovatis acutis ferratis asperis, floribus terminalibus solitariis breviter pedunculatis, calyce spathaceo 3fido salato. *Nepal*.

Ad *Vandelliam*.

nummularifolia 3. *V.* caule simplicissimo 4gono, foliis sessilibus cordato-subrotundis ferratis, pedunculis folio brevioribus, laciniis calycis linearibus acutis. *Nepal*.

Don.

pag. 801.

Ad *Herpestim* Gärtm.

connata * 17. *H.* caule erecto ramoso foliisque connatis ovatis crenulatis nervosis glabris, floribus alternis sessilibus 3bracteatis. *Nepal*. (*Cybbauthera connata* Hamilt. Don.)

pag. 802.

Post n. 10. *glechomoides* * 18. *H.* caule herbaceo ascendente, foliis obovatis crenatis glabriusculis, pedunculis axillaribus oppositis, calycibus pilosissimis. *Itio grande*. Sello.

pag. 803.

Ad *Mazum* Lour.

furculosus Don. 3. *M.* acaulis hirsutus, furculis procumbentibus, foliis longe petiolatis cuneatis dentatis basi sinuatis pilosis, racemis radicalibus pilosis, laciniis calycis rotundatis. *Nepal*.

pag. 804.

Ad *Centrantheram* R. Br.*C. nepalensis* Don. eadem cum *C. hispida* R. Br.Ad *Büchneram*.

- Post n. 3. *hispida* Hamilt. 33. B. simplicissima hispida, foliis radicalibus spathulatis integerrimis 3nerviis, caulinis lanceolatis obtusis, floribus alternis, bracteis acuminatis calycem subaequantibus. *Nepal.*
- cruciata* Hamilt. 34. B. simplex scabra, foliis radicalibus obovatis dentatis 3nerviis, caulinis lineari-lanceolatis integerrimis, spica abbreviata 4fariam imbricata, bracteis lanceolatis calycem aequantibus. *Nepal.*
- angustifolia* Don. 35. B. simplex scabra, foliis linearibus integerrimis, inferioribus oppositis, floribus alternis remotis, bracteis flores superantibus. *Nepal.*

pag. 810.

Post *Seymeriam* Pursh.:

SOPUBIA Hamilt.

trifida Hamilt. *Nepal.* Herba aspera, foliis oppositis linearibus angustissimis sub-3fidis, floribus pedunculatis purpureis.

Ad *Angeloniam* Humb.

- A. salicariaefolia* Humb. (A. campestris Nees.) *Brazil.*
- procumbens* Mart. 2. A. foliis elliptico-lanceolatis argute ferratis basi ciliatis, pedunculis axillaribus folio brevioribus, caule procumbente. *Brazil.* (Phyfidium procumbens Schrad., Schelveria arguta Nees.)
- integerrima* * 3. A. foliis sparsis lanceolatis integerrimis, pedunculis racemosis, caule erecto. *Rio grande.* Sello.

Ad *Stemodiam*.

- Post n. 2. *muraria* Roxb. Don. 14. St. hirsutissima, foliis petiolatis ovatis acutis ferratis, pedunculis solitariis, laciniis calycis ovatis mucronatis, corolla villosa. *Nepal.*
- grandiflora* Hamilt. Don. 15. St. hirsutissima viscosa, foliis petiolatis ovatis acutis grosse ferratis, floribus oppositis breviter pedunculatis, bracteis maximis ovatis crenatis, laciniis calycis rotundatis. *Nepal.*

pag. 813.

Ad *Chelonem*.

- Post n. 10. *alpina* * 17. Ch. glaberrima, foliis oblongo-lanceolatis denticulatis, pedunculis multifloris, corolla subregulari, antheris hirsutis. *Montes scopulosi Amer. bor.* (Pentstemon Torr.)
- Post n. 13. *Digitalis* * 18. Ch. caule elato stricto, foliis amplexicaulibus lanceolatis acutis serratis glabris, panícula terminali trichotoma multiflora, corolla glanduloso-pubescente. *Ditio Arcanisa Amer. bor.* (Pentstemon Nuttall. Bot. mag. 2587.)

pag. 814.

Ad *Caprariam*.

- Post n. 5. *pufilla* Torr. 7. C. pubescens subramosa, foliis oppositis petiolatis cordatis repando-dentatis, pedunculis axillaribus elongatis 1floris. *Montes scopulosi Amer. bor.*

.pag. 815.

Sibthorpia hinc exul, jam supra p. 63. melius collocata.

pag. 821.

Ad *Ruelliam*.

- Post n. 18. *curviflora* Nees. 81. R. caule fruticoso glabro, foliis petiolatis lanceolatis acutis venoso-lineatis integerrimis, pedunculis terminalibus elongatis sub-1floris, laciniis calycis linearibus ciliatis, corolla ringente. *Brazil.*

pag. 823.

- Post n. 48. *anisophylla* Wallich. 82. R. caule erecto herbaceo, foliis alternis oblongo-lanceolatis acuminatis elongatis ferratis, stipulis oppositifoliis linearibus integerrimis stipitatis, pedunculis sub-3floris. *Nepal.* Hook. exot. fl. t. 191.

pag. 824.

- Post n. 52. *persicifolia* Lindl. 83. R. caule herbaceo glabro nodoso, foliis lanceolatis acuminatis elongatis ferratis venosis laevibus, pedunculis basilaribus corymbiferis erectis, corollae limbo 5lobo. *Bengal.* Bot. reg. 955.

- Post n. 60. *capitata* Don. 84. R. caule fruticoso ramoso, foliis lanceolatis acuminatis denticulatis utrinque pilosiusculis, spicis capitatis, bracteis calycibusque obtusis. *Nepal.*

pag. 825.

- Post n. 70. *rotundifolia* Don. 85. R. caule erecto ramoso pubescente, foliis subrotundo-ovatis acutiusculis crenatis, spica abbreviata, bracteis acuminatis, intermediis latissimis flore brevioribus. *Nepal.*

pag. 826.

Ad *Aphelandram* R. Br.

- A. *nitida* Nees. nov. act. nat. cur. 11. p. 51. varietas levis A. *crisitatae*.

- marginata* Nees. 2. A. fruticosa glabra, foliis oblongis retusis margine cartilagineo-ciliatis, spica terminali, bracteis ovato-lanceolatis calyce brevioribus corollaeque pubescentibus. *Brazil.*

Ad *Aetheilemu* R. Br.

- longifolium* * 4. Ae. caule erecto, foliis oblongis acuminatis integerrimis reflexis, spicis axillaribus abbreviatis. *Senegambia.* (Phaylophis longifolia Bot. mag. 2433.)

pag. 827.

Ad *Lepidagathin* W.

incurva Hamilt. 3. L. caule herbaceo erecto follisque integerrimis acutis asperis, inferioribus ovato-oblongis, superioribus lanceolatis elongatis, spicis terminalibus subquaternis densis secundis, bracteis ovato-lanceolatis mucronatis villosissimis, corollis incurvis. *Nepal*.

pag. 828.

Ad *Hygrophilam* R. Br.

brasiliensis * 4. H. fruticosa hirsuta, foliis oblongis integerrimis, altero minori, spicis terminalibus secundis villosis, bracteis dorsalibus ovatis cuspidatis trinerviis. *Brasil*. (Dicliptera tetrandra Nees.)

Ad *Thunbergiam*.

coccinea Wallich. 4. Th. volubilis glabra, foliis subhastato-cordatis acuminatis 5nerviis, inferioribus repandis, racemis pendulis, bracteis integerrimis caducis. *Bengal*. Hook. exot. fl. t. 195.

alata Hook. 5. Th. volubilis villosa-sericea, foliis sagittato-cordatis repandis, petiolis marginatis, pedunculis 1floris, bracteis calyce majoribus. *Afric. or.* 5-6° lat. austr. Hook. exot. fl. t. 177.

angulata Hook. 6. Th. scandens glabra, foliis subhastato-cordatis basi angulatis, petiolis teretibus, pedunculis 1floris, bracteis ciliatis. *Madagascar*. Hook. exot. fl. t. 166.

pag. 829.

Ad *Bignoniam*.

Post n. 3. *pallida* Lindl. 70. B. arborescens, foliis oppositis ovali-oblongis utrinque rotundatis glabris subtus reticulatis, pedunculis axillaribus solitariis erectis subbifloris lepidotis. *Inf. Carib.* Bot. reg. 965.

pag. 832.

Post n. 51. *megapotamica* * 71. B. foliis quinatis glabris, foliolis petiolatis obovato-oblongis integerrimis, pedunculis 2fidis axillaribus cymosis, calycibus 5dentatis, corolla pubescente. *Rio grande*. Sello.

pag. 835.

Ad *Spathodeam* P. B.

Post n. 5. *montana* * 14. Sp. arborescens, foliis quinato-digitatis lanceolatis subtus ramisque 4gonis lepidotis, panicula terminali fulvo-farinacea. *Brasil*. (*Zeyheria montana* Mart. nov. gen. t. 159.)

pag. 836.

Ad *Eccremocarpum scabrum* R. et P. Bot. reg. 939.*Incarvillea parasitica* Roxb. est *Aeschynanthus* Jack.

pag. 837.

Ad *Martyniam*.

- lutea* Lindl. 6. *M.* caule annuo tereti glanduloso-piloso, foliis cordato-orbiculatis dentatis, calyce 2bracteato, fructibus longe rostratis. *Brasil.* Bot. reg. 934.
- spathacca* * 7. *M.* caule perenni herbaceo viscoso-villoso, foliis cordato-deltoides acutiusculis angulato-dentatis, floribus racemosis, calyce 1bracteato infra fillo campanulato. *Brasil.* (Craniolaria 1bracteata Nees et Mart. in nov. act. nat. cur. 11. t. 4. *Holoregmia viscida* Nees.)

Didymocarpus Jack., exul, jam supra p. 13. 14. sub *Henckelia* * militat.

pag. 838.

Ad *Aeschynanthum* Jack.

- grandiflorus* * 3. *Ae.* caule fruticoso, foliis lanceolatis carnosissimis, umbella multiflora, stylo exserto. *Ad arbores, Bengal.* (*Incarvillea parasitica* Roxb., *Trichosporum grandiflorum* Don.)
- parviflorus* * 4. *Ae.* caule fruticoso, foliis ellipticis acuminatis nervosis, umbella pauciflora, stylo incluso. *Ad truncos arborum, Nepal.* (*Trichosporum parviflorum* Don.)

pag. 839.

Ad *Gesneram*.

- Post n. 18. *barbata* Mart. 27. *G.* herbacea, foliis oppositis oblongis acuminatis petiolatis subcrenatis subtus scabris, pedunculis subsolitariis, corolla extus villosa. *Brasil.*

pag. 840.

Ad *Besleriam*.

- Post n. 6. *flavo-virens* Mart. 20. *B.* fruticosa, foliis oppositis oblongis utrinque attenuatis denticulatis glabris, pedunculis axillaribus confertis bifido-cymosis. *Brasil.*

pag. 841.

- Parentucelliam floribundam* Viv. libyc. t. 21. f. 2. esse *Bartsiam latifoliam* Sm. p. 773. asseverant R. Brownius et Meratus. (Bulletin des scienc. nat. 1825. Febr. p. 225.)

SINNINGIA Nees.

- Helleri* Nees. *Brasil.* Planta suffruticosa, foliis petiolatis oppositis cordato-ovatis serratis pubescentibus, floribus racemosis viridi-flavicantibus. *Annal. des scienc. nat.* 6. p. 297., *Gloxinia Schottii* Mikan. del. *brasil. fasc.* 4.)

pag. 843.

Post *Linnaeam*:

ABELIA R. Br.

chinensis R. Br. *China*. Frutex decumbens, ramis virgatis, foliis oppositis petiolatis ovatis acutiusculis crenato-ferratis, floribus thyrsoides involucreatis. Abel's Journ. in China, p. 377.

pag. 844.

Ad *Gloxiniam* Herit.

macrophylla Mart. 3. Gl. subcaulis, foliis sessilibus cordato-oblongis obtusis crenatis utrinque hirsutis, calycibus acutis, limbi corollae lobis retusis. *Brasil.* (Gl. hirsuta Lindl. in bot. reg. 1004.)

C L A S S I S XV.

pag. 848.

Ad *Eutrema* R. Br. add. Septum apice fenestratum vel obsoletum. Post id: *Oreas* Chamiff. Silicula lanceolata compressa plana 1locularis. Semina plura funiculis elongatis pendula. Cotyledones incumbentes.

Ad *Brayam* Sternh. Cotyledones incumbentes R. Br. Hook. Post eam: *Platypetalum* R. Br. Silicula ovalis polysperma, valvis convexis. Cotyledones incumbentes. Stylus brevissimus. Calyx subpatens. Petalorum laminae dilatatae.

Post n. 2313. *Oudneya* R. Br. Cal. clausus basi faccatus. Stigmata connata, apicibus distinctis. Siliqua linearis rostrata, valvis 1nerviis. Semina 1seriata.

pag. 855.

Ad *Raphanum Raphanistrum*. R. fugax Presl. var. *albiflorus* Presl. 8. R. siliquis 1locularibus 1-3spermis stylo brevioribus, foliis simpliciter lyratis, radice bienni. *Sicil.*

pag. 858.

Ad *Biscutellam raphanifoliam* Poir. B. laxiflora Presl.

pag. 862.

Ad *Alyssum maritimum* Lam. (Lobularia Desv., Koniga R. Br. in Denham. et Clappert. it. p. 214.)

† *arenarium* Presl. 43. A. caule suffruticoso procumbente, foliis linearilanceolatis acutis subincanis, filiculis ellipticis subinflatis pilosiusculis 1-spermis stylo brevi mucronatis. *Sicil.*

pag. 863.

Ad *Hutchinsiam rotundifoliam* R. Br. (*H. pygmaea* Viv.)

pag. 864.

Ad *Iberim semperflorentem*. (*I. humilis* Presl.)

pag. 865.

Ad *Iberim linifoliam*. (*I. tenuifolia* Presl.)

pag. 866.

Ad *Lepidium suffruticosum*. (*L. lanceolatum* Presl.)

pag. 867.

Ad *Lepidium hirtum* Hook. (*Lepia Bonanniana* Presl.)

pag. 868.

Ad *Lepidium Pifcidium* Forst. (*L. owaihiense* Chamiss.)

pag. 869.

Post n. 48. *humifusum* Requier. 51. L. caule prostrato superne pubescente, foliis inferioribus lyratis, superioribus sagittatis integerrimis, petalis calycem triplo superantibus, filiculis glabris. *Corfica*.

pag. 871.

Ad *Farfetiam parvifloram* * (Cotyledones conduplicatae. R. Brown ad Denham. it. p. 213.) Cf. Linn. philof. bot. §. 170.

Ad *Farfetiam libycam* * (Koniga R. Brown ad Denham. it. p. 214.)

pag. 872.

Ad *Drabam*.

Post n. 5. *Sauteri* Hopp. 56. Dr. foliis spathulatis rigidis ciliatis, scapo glabro, staminibus corolla brevioribus, filiculis ovalibus glabris stylo brevi coronatis. *Alp. noric*.

pag. 874.

Ad Dr. *Wahlenbergii* Hartm. Dr. laevigata Hopp. Koch. var. Dr. *stellata* Jacqu. mutetur in Dr. *frigidam* Saut. Synonyma omnia deleantur: sola apposita Dr. *carinthiaca* Hopp. Koch. Siliculae sunt astylae. Omnis haec species varietas est Dr. *hirtae* L., quod optime jam monuit Wahlenb. fl. lappon. p. 175.

austriaca 57. Dr. foliis obovatis 2dentatis stellato-pubescentibus, scapo 1phyllo, filiculis patulis glabris stylo coronatis. *Austria*. (Dr. *stellata* et *hirta* Jacqu., *saxatilis* Koch.)

[Nec *Drabam laevigatam*, nec *Redowskiam sophiaefoliam* Chamiss. et Schlechtend. in Linnaea, 1. p. 25. 33., utpote magnopere dubias, recipere amsim.]

pag. 878.

Ad *Thlaspi montanum* L. Thl. scapiflorum Viv. var.Ad Thl. *alpefire* L. (Thl. *rivale* Presl.)

pag.

pag. 880.

Post *Eutrema* R. Br.:

OREAS Chamiss.

involutrata Chamiss. *Inf. Aleut.* Herba perennis, foliis longe petiolatis erectis spathulatis glabris, scapo folia subsuperante, floribus subracemosis bracteatis albis.

pag. 881.

Post *Brayam*:

PLATYPETALUM R. Br.

purpurascens R. Br. *Inf. Melvill.* Herba simplex, foliis spathulatis succulentis glabriusculis, floribus corymbosis purpurascensibus.

Ad *Nasturtium* R. Br.

heterophyllum Don. 28. N. caule erecto ramofo foliisque denticulatis glabris, inferioribus lyratis, superioribus ellipticis, corymbis multifloris, siliquis teretibus pedicellos superantibus. *Nepal.*

pag. 882.

Ad N. *diffusum* Cand. (N. *heterophyllum* Blum.)Ad N. *micranthum* Cand. (N. *sparsum* Don.)

pag. 884.

Ad *Pteroneuron* Cand.

Pt. carnosum Cand. cum *Cardamine glauca* * Syst. 2. p. 888. jungit Treviranus in nov. act. nat. cur. 18. p. 191.

decurrens Blum. 3. Pt. foliis pinnatis, foliolis ovatis repando-dentatis subciliatis basi decurrentibus. *Java.*

javanicum Blum. 4. Pt. foliis ternatis, foliolis ovato-oblongis inciso-dentatis, lateralibus basi inaequalibus. *Java.*

pag. 886.

Ad *Cardaminem*.

C. refedaeifolia L. (*C. debilis* Don.) *Nepal.*

Post n. 13. *Nasturtii* * 43. C. caule procumbente ramofo foliisque glabris, inferioribus ternatis, foliolo impari maximo subrotundo obsolete Sloba, superioribus simplicibus obovatis Slobis. *Nepal.* (*C. nasturtioides* Don.)

In *C. Bocconi* Viv. fuscipienda magnopere haereo. *Nasturtium* enim rotundo thalictri folio Bocc. mus. t. 116. (non 118.) satis bene *C. thalictroidem* Allion. refert, neque siliquas deflexas habet, quas Vivianus indicat.

pag. 887.

Post n. 27. *flaccida* Chamiss. 44. C. caule prostrato ramofo, samentis radicanibus, foliis pinnatis sparse hirsutiusculis, foliolis petiolatis angulato-dentatis, pedicellis subpatulis, inferioribus bracteatis, siliquis erectis. *Chili.*

maritima Portenschl. 45. C. caule diffuso foliisque pinnatis subcarnosis viridibus glabris, foliolis petiolatis obovatis Slobis, siliquis lanceolatis stylo tereti coronatis. *Dalmatia.* Treviranus in nov. act. nat. cur. 13. p. 190.

Linn. Syst. Veg. Vol. IV. P. II.

Q

Post n. 33. †*polyphylla* Don. 46. C. foliis pinnatis subtus cauleque erecto simplici pilosiusculis, foliolis oppositis lanceolatis obtuse serratis mucronulatis, racemo multifloro pubescente. *Nepal*.

†*purpurea* Chamiss. 47. C. foliis pinnatis cauleque erecto paucifolio parce hirsutiusculis, foliolis subrotundis, impari maximo sub-3lobo, floribus racemosis, filiquis stylo coronatis. *Asia arctica versus Caeciam*.

pag. 888.

C. glauca * v. supra ad *Pteroneuron*.

pag. 889.

Ad *Arabim*.

A. ciliata R. Br. (*A. madonia* Presl.)

pag. 891.

Post n. 26. *owaihenfis* Chamiss. 51. A. foliis repando-dentatis scabriusculis, radicalibus petiolatis lyrato-pinnatis sub-3jugis, caulinis subnullis, caule ascendente glabro a basi fere florifero, filiquis erecto-patentibus pedicellos triplo superantibus. *Inf. Sandwich*.

pag. 892.

A. Thaliana L. (*Sisymbrium Thalianum* Monnard. Gay.) Cotyledones incumbentes.

pag. 893.

Post n. 49. *longifiliqua* Presl. 52. A. caule simplicissimo foliisque pube furcata subcanescentibus, radicalibus oblongo-lanceolatis dentatis, caulinis ovato-lanceolatis integerrimis, pedicellis erecto-appressis filiqua multo brevioribus. *Sicilia*. Flores purpurascens. *A. purpurascens* Presl. var.

Post *Arabim*:

UDNEYA R. Br.

africana R. Br. *Numidia* et *Afric. med.* Planta suffruticosa ramosissima glaberrima, foliis sessilibus oblongo-lineari-bus obtusis integerrimis, floribus racemosis purpureis. (*Hesperis nitens* Viv. libyc. t. 5. f. 3. Syst. 2. p. 900.)

pag. 895.

Cheiranthus ochroleucus Hall. fil. melius *Erysimum ochroleucum* Cand. Monnard.

pag. 896.

Ad *Matthiolam* R. Br.

Post n. 3. *patens* Presl. 22. M. caule herbaceo diffuse ramoso foliisque lanceolatis integerrimis stellato-tomentosis, filiquis teretibus patentibus muricato-glandulosis tomentosis. *Sicil*.

pag. 898.

Malcolmia R. Br. Licet ipse stator hujus generis (hort. kew. 4. p. 121.) *Malcomiam* scribat, quod omnes repetunt, credo tamen sphaema fuisse, simile *Huerniae* et *Mathiolae*. Gul. *Malcolm* hortulanus fuit Londinensis 1771, cujus indices existant.

pag. 900.

Hesperis nitens Viv. exful supra jam *Oudneya* R. Br. dicta.

pag. 903.

Sisymbrium pannonicum Jacqu. in agro Francofurtensi ad Viadrum invenit Steinkopf.

pag. 905.

Ad *Erysimum helveticum* Cand. (E. Bonannianum Presl.)

Ad *E. canescens* Roth. (E. crassistylum Presl.)

pag. 906.

Ad *Erysimum hieracifolium*. E. *Marschallianum* Andr. varietas memorabilis.

robustum Don. 37. E. caule stricto angulato foliisque lanceolatis mucronatis dentatis utrinque subsericeis, filiquis ascendentibus pubescentibus pedicellos multo superantibus. *Enodi montes*.

violaceum Don. 38. E. caule stricto simplicissimo foliisque sagittato-lanceolatis acutis denticulatis pilosis, racemo congesto, filiquis patulis. *Enodi montes*. Flores purpurei.

pag. 907.

Erysimum asperum Cand. melius *Cheiranthus asper* Nuttall.

Ad *E. cuspidatum* Cand. E. glabrum Presl. sic. Sinapis tetraëdra Presl. del. pag.)

Maclovianum 39. E. foliis lanceolatis denticulatis glaucis apice barbatis, calycibus deciduis, filiquis glaberrimis stylo multo longioribus. *Inf. Falkland*. (*Brassica magellanica* Gaudich., *macloviana* Urv.)

Gay.

pag. 910.

Ad *Brassicam*.

Post n. 8. *villosa* Bivon. 34. Br. suffruticosa villosa, foliis omnibus petiolatis lyratis dentatis, floribus paniculatis, laciniis calycis erectis, filiquis sub-4gonis. *Sicil*.

pag. 911.

Post n. 23. *rectangularis* Viv. 35. Br. glabra, foliis rectangulopinnatis, foliolis sessilibus lineari-lanceolatis profunde serratis, extimis confluentibus, rostro filiquam glabram aequante. *Corfica*.

pag. 912.

Ad *Sinapim laevigatam*. (*Sinapis virgata* Presl. delic. prag., *Erucastrum virgatum* et *oleraceum* Presl. sic.)
panormitana * 27. S. filiquis glabris torosis appressis rostro longioribus, caule subramoso basi hispido, foliis petiolatis lanceolatis denticulatis scabris. *Ad Panormum Sicil.* (*Hirschfeldia integrifolia* Presl.)

pag. 913.

Ad *Sinapim albam* L. (*Bonannia officinalis* Presl.)
 Ad *S. dissectam* Lag. (*Bonannia dissecta* Presl.)
 Ad *S. heterophyllum* Lag. (*Hirschfeldia inflexa* Presl.)

pag. 918.

Ad *Heliophilam*.

Post n. 29. *stricta* Sims. 85. H. foliis hirsutis, inferioribus lanceolatis pinnatifidis, superioribus linearibus integerrimis, filiquis strictis mucronatis pubescentibus. *Afric. austr.* Bot. mag. 2526.

A D

V O L U M E N III.

CLASSIS XVI.

pag. 3.

DIANDRIA.

Crenias *. Cal. 0. Cor. 0. Spatha fissa. Stamina 3, basi connata, lateralia sterilia, medium bifidum, cruribus 2antheriferis. Stigmata 3. Capf. 2locularis 2valvis.

Ad *Momordicam* l. Antherae flexuosae didymae.

pag. 4.

Post n. 2346. *Salomonina* Lour. huc e syst. 1. p. 5. n. 26. Cal. 5fidus, laciniis aequalibus. Petalum 3lobum, lobis lateralibus falcatis, intermedio cucullato genitalia includente. Filamenta in vaginam styli coacta. Antherae 4 1loculares, circa stigma conglutinatae. Capf. 2locularis, oculis 1spermis. *Polygaleae*.

pag. 5.

Post n. 2369. *Aglaia* Lour. Flores polygami. Cal. 5dentatus. Petala 5 in globum conniventia. Stam. 5 in urceolum connata intus antherifera. Bacca exsucca 1-2sperma. *Aurantia*.

pag. 6.

Post n. 2373. *Cynostemma* Blum. Flores dioeci. Cal. 10sepalus, duplici serie. Cor. 0. Antherae 2loculares. Stigmata 3, 4. Drupa baccata globosa 3-4sperma. *Menispermaceae*.

Post n. 2376. *Euphronia* Mart. Cal. inferus 5partitus persistens. Filamenta basi complanata. Cor. 0? Capf. 3locularis 3valvis, feminibus solitariis.

HEXANDRIA.

Aphanamixis Blum. Cal. 5sepalus imbricatus. Pet. 3. Stamina in globum connata. Antherae 3gonae. Stigma simplex. Capf. 2-3locularis. Sem. solitaria axillata. *Meliaceae*.

Schizochiton * (*Chisocheton* Blum.) Cal. urceolatus subintegerimus. Pet. 4 linearia. Tubus conicus 6fidus intus antherifer. Capf. 2-3locularis. Sem. solitaria axillata. *Meliaceae*.

Post n. 2383. *Cytinus* huc e syst. 2. p. 171. Flores monoeci. Cal. corollinus tubulosus 4lobus 2squamatus. Columna

solida antherifera. Stigma capitatum fulcatum. Caps. 3locularis polysperma. Hook. exot. fl. t. 153.

pag. 7.

Trichiliae capsula est 3-4locularis.

Didymochiton Blum. Cal. 5sepalus imbricatus. Pet. 5 cum tubo staminifero arcte connata. Stigma capitatum. Bacca corticata, abortu 2-3locularis. Sem. folitaria exarillata. *Melieae*.

pag. 8.

Post n. 2401. *Parkia* R. Br. Cal. tubulosus $\frac{3}{4}$. Petala 5 inaequalia. Legumen in loculos transversos farina farctos divisum.

Amaria Seb. Mut. Cal. cylindricus 5fidus latere dehiscens. Pet. 5 obovata patentia carinata. Stamina 10 in tubum coalita. Stylus filiformis, stigmatate capitato. Legumen pedicellatum longissimum 2valve, polyspermum.

Schotia Jacqu. Cal. 5partitus coloratus. Pet. 5 unguiculata. Stam. basi in tubum coalita. Germen pedicellatum. Legumen 2-4spermum. Sem. basi arillata.

Post n. 2407. *Amphinomia* Caud. Cal. ventricosus persistens 5fidus. Pet. 5 spathulata unguiculata. Stylus 1 lateralis. Fructus leguminosus 2valvis polyspermus.

Omphalobium Gärtn. Cal. 5partitus persistens. Pet. 5 unguiculata. Stam. basi subcoalita. Caps. leguminosa sub-1sperma. Sem. ad futuram fixa basi arillata. (*Connarus proximus* habet stylos plures, folliculos vix dehiscences, sem. basi fixa arillata.)

pag. 12.

Post n. 2465. *Calpandria* Blum. Cal. 4sepalus inaequalis persistens. Pet. 4. Filamenta infer. distincta, summa in tubum cylindricum intus antheriferum coalita. Stigma semi-3fidum. Caps. lignosa 3locularis, valvis septiferis. Sem. folitaria. *Melieae*.

Sphaerostema Blum. Flores dioeci. Cal. 3sepalus bracteatus. Petala sub-9, triplici serie disposita. Stamina disco globofo imposita, filamentis connatis. Baccae spicatae distantes 2spermae. *Anonae*.

Post n. 2471. *Cordyla* Lour. Cal. inferus campanulatus 4fidus. Cor. 0. Filamenta basi in orbem coalita. Bacca pedicellata 1locularis 6sperma. *Leguminosif aff.*

pag. 14.

D I A N D R I A.

CRENIAS *.

Scopulorum * *Ad scopulos scaturiginum Brasil.* Plantula submersa caespitosa erecta ramosa foliosa, foliis imbrica-

tis amplexicaulibus subsemiorbicularibus bilobis denticulatis. (Mniopsis scaturiginum Mart.) Linnaeus *Mniopsis* nomen genericum reprehensus fuisset: phil. bot. §. 225. 227.

pag. 16.

n. 26. *ficifolia* l. *filifolia*.

pag. 19.

Ad *Bradleiam* Gärtn.

- Br. philippica* Cav. *Br. zeylanica* Labill. nov. Caled. t. 76.?
glauca Labill. 7. *Br. foliis elliptico-oblongis utrinque rotundatis undulato-repandis mucronatis subtus glaucis, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris. Nov. Caledon.*
macrophylla Labill. 8. *Br. foliis late obovato-ellipticis obtusis coriaceis, pedunculis ♀ aggregatis. Nov. Caledon.*

pag. 25.

Post *Matthissoniam* Radd.:

SALOMONIA LOUR.

- petiolata* Don. 1. *S. foliis petiolatis cordatis acutis integerrimis glabris 3nerviis, alis carinae aequalibus, capsulis truncatis denticulatis, caule diffuse ramoso. China austr. Nepal. (S. cantoniensis Lour., edentula Cand.)*
sessilifolia Don. 2. *S. foliis sessilibus ovalibus mucronulatis, alis carina brevioribus, capsulis lunatis duplici serie spinuloso-ciliatis, caule simplici recto. Nepal. (S. oblongifolia Cand.)*

pag. 30.

Ad *Viseniam* Houtt.

- Post n. 8. *Ulmariae* * 19. *V. caule virgato, foliis cordato-ovatis acutis dentato-ferratis supra glabriusculis subtus pubescentibus, panicula terminali cymosa. Rio grande. (Melochia ulmarioides Hilar.)*
sericea * 20. *V. foliis cordatis inaequaliter ferratis sericeis, panicula terminali. Brasil. (Melochia Hilar.)*
V. corchorifolia * (Melochia corchorifolia L., Riedlea corchorifolia Cand., radiata Blum.)

pag. 31.

- Post n. 18. *graminifolia* * 21. *V. foliis linearibus elongatis remote ferratis glabris, panicula terminali, caule simplici. Brasil. (Melochia graminifolia Hilar. fl. brasil. t. 31.)*

Ad *Waltheriam*.

- W. corchorifolia* Perf. est potius syn. *W. ellipticae* Cav., quam *criocladae* Cand.)

- W. glabriuscula* Hilar. pertinet ad *W. glabram* Poir. Patria et *Brasil*.
- ferruginea* Hilar. 10. *W. arborescens*, foliis oblongis acutis ferrugineo-tomentosis, capitulis axillaribus breviter pedunculatis, petalis calyce brevioribus. *Brasil*.
- cinerascens* Hilar. 11. *W. frutescens*, foliis subimbricatis cordato-subrotundis grosse ferratis utrinque cinereo-tomentosis, capitulis terminalibus. *Brasil*.
- viscosissima* Hilar. 12. *W. suffruticosa viscosissima*, foliis subcordato-oblongis acuminatis utrinque villosito-tomentosis, panicula foliosa, floribus glomeratis. *Brasil*.
- maritima* Hilar. 13. *W. suffrutescens*, foliis subimbricatis ovatis obtusis inciso-ferratis utrinque pilosis glanduloso-tuberculosis, capitulis terminalibus. *Brasil*.
- Douradinha* Hilar. 14. *W. suffrutescens*, foliis cordato-subrotundis obtusis glaucis utrinque tomentosis, capitulis terminalibus. *Brasil*. Hilar. pl. uf. bras. t. 34.
- lanata* Hilar. 15. *W. suffruticosa*, foliis ovatis acutiusculis plicatis inaequaliter ferratis villosis, superioribus lanatis incano-glaucis, capitulis terminalibus. *Brasil*.
- gracilis* Hilar. 16. *W. suffruticosa*, foliis ovatis obtusis plicatis, inferioribus pilosis, superioribus tomentosis, capitulis terminalibus. *Brasil*.
- communis* Hilar. 17. *W. suffruticosa hirsuta*, foliis subcordato-ovatis obtusis, capitulis terminalibus. *Brasil*.

pag. 32.

Ad *Erodium*.

E. Bocconi Viv. magnopere dubium. Bocconi enim *Geranium minimum* mus. t. 128. est *Erodium chamaedryoides* Herit. Descriptio tamen Viviani differt.

pag. 33.

Post n. 15. *geoides* Hilar. 43. *E.* caule herbaceo prostrato hirsuto, foliis ternatis, foliolis ovatis lobatis incisedentatis, stipulis ovatis cuspidatis, umbellis paucifloris. *Ad fl. Platam.*

E. cuneatum Viv. ad gruinum Ait. pertinere videtur.

pag. 34.

Post n. 27. *hispidum* Presl. 44. *E.* caule prostrato retrorsum hispido, foliis bipinnatifidis utrinque incano-pubescentibus, laciniis linearibus acutis, stipulis ovatis scariosis, pedunculis multifloris, petalis calycem subaequantibus. *Sicil.* (*Geranium laciniatum* Bivon.)

pag. 40.

Ad *Passifloram*.

P. glauca Ait. (*P. amethystina* Mikan.) *Brasil*.

pag. 41.—

Post n. 68. *aurantia* Forst. 85. P. foliis basi cuneatis lobis obtusis glabris, petiolis 2glandulosis, pedunculis solitariis, glandulis stipitatis, corona duplici, intertubuloso-conica apice 10dentata. *Nov. Caledon.* (Murucuja Perf. Syst. 3. p. 43. Difemina Labill. nov. Caled. t. 79.)

pag. 43.

Murucuja aurantia Perf. deletur.

pag. 45.

Ad *Feuillaeam*.

F. cordifolia L. foliis cordatis acutis basi angulatis coriaceis glabris, paniculis axillaribus, corollae lobis rotundis.

tannifolia Kunth. 5. *F. foliis* profunde cordatis acuminatis integerrimis membranaceis utrinque incano-tomentosis, paniculis axillaribus ramosissimis gracilibus, laciniis corollae acuminatis. *Ad fl. Magdalen.* Humb. nov. gen. 7, t. 640.

pag. 48.

Post *Leoniam* R. et P.:

AGLAIA LOUR.

odorata Lour. 1. *A. foliis* sub-2jugis obovato-oblongis obtusis racemisque compositis glabris, caule fruticoso. *China. Cochinchina.* (Camunium sinense Rumph. amboin. 5. t. 18. f. 1. Jack. in Mal. misc. 1. 33, *Opilia odorata* * Syst. 1. 766.)

odoratissima Blum. 2. *A. foliis* sub-2jugis oblongis obtusiusculis subtus paniculisque pyramidatis tenuissime lepidotis. *Java.*

† *polystachya* Wallich. 3. *A. foliis* paucijugis basi obliquis oblongo-lanceolatis glaberrimis, racemis paniculatis axillaribus. *Sihet, prov. Ind. or.*

Sulingi Blum. 4. *A. foliis* sub-3jugis elliptico-oblongis obtusiusculis paniculisque corymbosis glabris. *Java.*

elliptica Blum. 5. *A. foliis* sub-3jugis elliptico-oblongis subtus paniculisque laxis elongatis rufo-tomentosis. *Java.*

speciosa Blum. 6. *A. foliis* sub-4jugis oblongo-lanceolatis acutis subtus paniculisque rufo-lepidotis. *Java.*

decandra Wallich. 7. *A. foliis* sub-6jugis oblongis acuminatis utrinque paniculisque axillaribus pubescentibus, floribus 10andris, fructibus 5spermis. *Nepal.*

argentea Blum. 8. *A. foliis* multijugis cordato-oblongis acuminatis subtus argenteo-lepidosis, paniculis elongatis divaricatis. *Java.*

pag. 49.

Post *Clutiam*:

GYNOSTEMMA Blum.

- pedatum* Blum. 1. *G. foliis pedato-palmatis, laciniis ovato-oblongis grosse ferratis, panicula axillari. Java.*
- simplicifolium* Blum. 2. *G. foliis ovato-oblongis acuminatis serrulatis glabris, racemis paniculatis. Java.*

pag. 50.

Post *Jürgensiam*:

EUPHRONIA Mart.

- hirtelloides* Mart. *Brazil. Arbor foliis alternis petiolatis ovato-oblongis subtus tomentosis, floribus racemosis. Mart. nov. gen. t. 73.*

H E X A N D R I A.

APHANAMIXIS Blum.

- grandifolia* Blum. *Java. Arbor excelsa, foliis impari-pinnatis multijugis, foliolis oppositis oblongis, paniculis elongatis axillaribus.*

SCHIZOCHITON *.

- patens* * 1. *Sch. foliis pinnatis oblongis, paniculis patentibus ramosissimis. Java. (Chifocheton Blum.)*
- divergens* * 2. *Sch. foliis pinnatis oblongis, paniculis divaricatis virgatis. Java. (Chifocheton Blum.)*

pag. 64.

Ad *Guaream*.

- excelsa* Bonpl. 5. *Gu. foliis 2-3jugis ovalibus obtusis coriaceis supra glabris subtus ad axillas venarum villosis, paniculis axillaribus subsimplicibus abbreviatis. Nov. Hispan. Humb. nov. gen. 7. p. 227.*
- densiflora* * 6. *Gu. foliis 5-8jugis subtus pubescentibus, foliolis alternis basi obliqua oblongis acuminatis, racemis confertis axillaribus. Java. (Epicharis Blum.)*
- cauliflora* * 7. *Gu. foliis multijugis subtus villosis, foliolis oppositis oblongis acuminatis, racemis confertis lateralibus. Java. (Epicharis Blum.)*
- sericea* Blum. 8. *Gu. foliis multijugis subtus ad costam pubescentibus, foliolis oblongis acuminatis, racemis confertis lateralibus. Java. (Epicharis sericea Blum.)*
E. altissima Blum., arbor 140 pedes alta, floribus ignotis, varietas videtur.

Ad *Alchorneam* Sw.

- castaneae-folius* A. Dr. Juss. 2. *A. foliis lanceolatis acutis mucronato-ferratis utrinque glabris, floribus spicato-paniculatis.*

Ad Orinocum. (Hermesia W. Humb. acquinoct. 1. t. 46. Syst. 2. p. 246.)

Ad Myrsiticam moschatam Thunb. Hook. exot. fl. t. 155. 156.

pag. 66.

Ad Lansium domesticum Jack. (Cipadessa fruticosa Blum.)

Ad Heyneam Roxb.

quinquejuga * 2. H. foliis abrupte pinnatis 5-7jugis, foliolis ovato-oblongis subtus ad venas paniculisque virgatis rufo-tomentosis. *Java.* (Trichilia rufinervis Blum.)

† *multijuga* Blum. 3. H. foliis sub-6jugis, foliolis oblongis utrinque basi inaequaliter attenuatis, racemis axillaribus solitariis. *Java.*

pag. 67.

Ad Trichiliam.

Post n. 1. *excelsa* * 20. Tr. foliis impari-pinnatis 4jugis basi inaequalibus ovato-oblongis acuminatis, paniculis axillaribus coarctatis, floribus 3andris, capsulis globosis. *Java. Inf. freti Malacc.* (Melia excelsa Cand., Dysoxylon excelsum Blum.)

arborescens * 21. Tr. foliis impari-pinnatis oblongis utrinque attenuatis, racemis compositis axillaribus, floribus 10andris. *Java.* (Goniocheton Blum.)

bijuga Labill. 22. Tr. foliis abrupte pinnatis 2jugis, foliolis oblongis undulatis glabris, paniculis laxis folio brevioribus. *Nov. Caledon.*

montana Kunth. 23. Tr. foliis impari-pinnatis sub-2jugis oblongis acuminatis glabris subtus reticulatis, paniculis axillaribus simplicibus petiolo longioribus. *Alp. nov. Granat.* Humb. nov. gen. 7. p. 226.

pag. 68.

Ad Tr. moschatam Sw. dele syn. Andrewsii.

Tr. alliacea Forst. *Inf. Molucc. Java.* (Dysoxylon alliaceum et longifolium Blum.)

Post n. 8. *macrocarpa* * 24. Tr. foliis alternatim pinnatis oblongis, floribus paniculatis, capsulis globosis. *Java.* (Dysoxylon macrocarpon et laxiflorum Blum.)

similis * 25. Tr. foliis opposite pinnatis inaequaliter oblongis obtusiusculis, floribus paniculatis, capsulis globosis. *Java.* (Dysoxylon simile Blum.)

odorata Andr. 26. Tr. foliis opposite impari-pinnatis 4jugis glabris, foliolis ovato-oblongis undulatis, racemis axillaribus glomeratis, staminibus 2fidis distinctis. *Inf. Carib.* Hook. exot. fl. t. 123.

Tr. emetica Valil. gaudet floribus 10andris.

mollissima * 27. Tr. foliis subopposite pinnatis subtus paniculisque divaricatis villosis, foliolis ovato-oblongis obtusiusculis, floribus 3andris. *Java.* (Dysoxylon mollissimum Blum.)

pag. 69.

Post *Trichilium* :

DIDYMOCHITON Blum.

nutans Blum. *Java*. Frutex, foliis impari-pinnatis oblongo-lanceolatis subtus ad costam pubescentibus, spicis paniculatis axillaribus nutantibus, floribus glomeratis.

pag. 70.

Ad *Chorifiam insignem* Kunth. (Ch. ventricosa Nees et Mart. nov. act. nat. cur. 11. t. 20.)

Philotheca australis Rudg. foliis lineari-teretiusculis obtusis.

Reichenbachii 2. Ph. foliis confertis lineari-filiformibus acutis punctato-asperis, floribus terminalibus. *Nov. Holl.*

pag. 71.

Ad *Geranium*.

Post n. 12. *arachnoideum* Hilar. 63. G. caule decumbente ramoso dupliciter villoso, foliis 7partitis, laciniis anguste lanceolatis 3fidis, pedunculis filiformibus elongatis, fructibus villosis. *Brazil.*

pag. 72.

G. erioSTEMON Fisch. habitat in *alpibus Nepal.* Don. fl. nepal. p. 203.

pag. 74.

Post n. 44. *multifidum* Don. 64. G. acaule, foliis profunde 5partitis subtus pilosis, laciniis multifidis linearibus obtusis, scapo 4gono ascendente apice subtrichomo villoso. *Nepal.*

pag. 75.

Ad *G. rotundifolium* L. *G. albicans* Hilar. var.

Ad *Browneam* Jacqu.

racemosa Jacqu. 5. Br. foliis abrupte pinnatis 4jugis glabris, foliolis obovato-oblongis acuminatis integerrimis basi hinc glanduliferis, floribus racemosis, calyce exteriori tomentoso, staminibus corollam subsuperantibus. *Caracas.*

pag. 76.

Post *Browneam* :

PARKIA R. Br.

africana R. Br. *Afric. occid.* Arbor foliis 2pinnatis multijugis glabris, foliolis linearibus obtusis, petiolo communi basi glandulifero, floribus spicatis. (Mimosa

biglobosa Jacqu., taxifolia Perf., Inga biglobosa W., senegalensis Cand.)

AMARIA Seb. Mut.

- petiolata* Seb. 1. A. foliis petiolatis cordatis, floribus terminalibus. *Nov. Granat.*
Mut.
- sessilifolia* Seb. 2. A. foliis subamplexicaulibus oblongis, pedunculis axillaribus multifloris. *Nov. Granat.*
Mut.

Huc SCHOTIA Jacqu. e vol. 2. p. 326.

- latifolia* Jacqu. 1. Sch. foliis abrupte pinnatis 3-4jugis obovatis obtusis, stipulis minutis subulatis deciduis, corolla 4petala, leguminibus 2-4spermis. *Afric. austr.* Hook. exot. fl. t. 159. (Omphalobium Schotia Jacqu. fil. eel. 2. t. 126. ined.) Calyx non coloratus.
- speciosa* Jacqu. 2. Sch. foliis abrupte pinnatis lucidis, foliolis ovali-lanceolatis mucronatis, stipulis subulatis, corolla 5petala. *Afric. austr.* (Guajacum afrum L., Theodora speciosa Medic.)
- tamarindifolia* 3. Sch. foliis abrupte pinnatis sub-8jugis, foliolis ellipticis retusis altero margine excavatis. *Afric. austr.* Bot. mag. 1153. (Sch. alata Thunb.?)
Afzel.
- stipulata* R. Br. 4. Sch. foliis 5jugis foliolis oblongis acutis cuspidatis, stipulis dimidiato-ovatis falcatis mucronatis. *Afric. austr.*
- simplicifolia* 5. Sch. foliis simplicibus ovalibus emarginatis nitidis 3nerviis venoso-reticulatis, racemo terminali subvillosa. *Patria?*
Vahl. Cand.
[Huc *Metrocynia* Thuarsii e Madagascar pertinere videtur.]

pag. 78.

CONNARUS L. Cand.

- monocarpus* L. 1. C. foliis ternatis coriaceis glaberrimis, foliolis oblongis acuminatis venosis, ramis glandulosis, panicula terminali rufo-pubescente. *Ceylon.*
- pubescens* Cand. 2. C. foliis impari-pinnatis bijugis supra glabris subtus ferrugineo-pubescentibus, foliolis ovalibus acutis, extremo maximo, paniculis axillaribus terminalibusque. *Guiana.* Act. soc. hist. nat. parif. 2. t. 15. ? *Rourea frutescens* Aubl., *Robergia* Schreb. *Syst.* 2. 439.
- santaloides* 3. C. foliis pinnatis sub-3jugis glaberrimis, foliolis ovatis acuminatis reticulato-venosis, pedunculis axillaribus aggregatis. *Ind. or.* (Aegiceras minus Gärtn. de fruct. 1. p. 216. t. 46. excl. syn. Rumph.)
Vahl.
- † *mimosoides* 4. C. foliis pinnatis sub-10jugis glabris, foliolis oblongis emarginatis, racemis axillaribus. *Inf. Nicobar.*
Vahl.

OMPHALOBIMUM Gärtn.

* *Fructibus solitariis.*† *Foliis ternatis.*

- indicum* Gärtn. 1. O. foliolis subrotundo-ovatis acutiusculis glaberrimis venoso-reticulatis coriaceis, paniculis axillaribus terminalibusque. *Ceilon. Inf. Mollucc.* (Rhus zeylanicus Burm. zeyl. t. 89. Connarus asiaticus L., Omphalobium Gaudichandii Cand.)
- africanum* Cand. 2. O. foliolis oblongis acuminatis glaberrimis membranaceis venosis, paniculis axillaribus terminalibusque. *Afric. occid.* (Connarus africanus Lam., Cav. diff. t. 221.) O. Lamberti Cand. idem videtur.

†† *Foliis impari-pinnatis.*

- pinnatum* Cand. 3. O. foliolis 2jugis ovali-oblongis acutis utrinque glaberrimis, venis apice confluentibus, panicula terminali, petalis basi biappendiculatis, germinibus tomentosis. *Ind. or.* (Connarus pinnatus Lam. Cav. diff. t. 222.)
- Patriſii* Cand. 4. O. foliolis 3-4jugis ovali-oblongis acutis coriaceis glaberrimis venosis, ramis glandulosis, panicula terminali. *Cayenna. Act. soc. hist. nat. par. 2. t. 16. A.*
- Thonningii* Cand. 5. O. foliolis sub-2jugis ellipticis acutis submembranaceis glaberrimis, panicula terminali, germinibus hirsutis. *Guinea.*
- Smeathmanni* Cand. 6. O. foliolis sub-2jugis ovali-oblongis acutis coriaceis supra nitidis subtus ferrugineo-villosis, panicula terminali, germinibus subpubescentibus. *Afric. occid.*
- Perrottetii* Cand. 7. O. foliolis 2-3jugis oblongis utrinque attenuatis supra nitidis subtus ferrugineo pubescentibus, panicula terminali, fructibus glabratis. *Guiana.*

** *Fructibus aggregatis.*

- villosum* Cand. 8. O. foliis ternatis oblongis utrinque attenuatis supra glabris subtus paniculaque terminali fructibusque ferrugineo-villosis. *Afric. occid.* (Cnestis trifolia Lam.)
- pentagynum* Cand. 9. O. foliis ternatis glabris coriaceis subrotundo-ovatis 3nerviis, paniculis axillaribus terminalibusque, fructibus villosis. *Madagascar.* (Connarus pentagynus Lam. Cav. diff. t. 223.)

Post *Serracem* *:

AMPHINOMIA Cand.

- decumbens* Cand. C. B. S. Herba decumbens hirsuta, foliis ternatis obovatis, capitulis pedunculatis. (Hermannia triphylla L., Connarus decumbens Thunb. in Röm. arch. 1, t. 1.)

pag. 79.

Ad *Pentapetem phoeniceam*. *P. angustifolia* Blum. var.Ad *Dombeyam* Cav.

† *diversifolia* * 11. *D. foliis oblique cordatis finuato-lobatis integerrimis, junioribus peltatis 3-5lobis. Java. (Pterospermum diversifolium Blum.)*

pag. 80.

Ad *Pterospermum* Schreb.

lancaefolium Roxb. 8. *Pt. foliis inaequilateris oblongis acuminatis integerrimis subtus incano-tomentosis, pedunculis petiolos multo superantibus. Java.*

Ad *Helicterem*.*H. baruensis* L. (*H. brasiliensis* Mikan.) *Brasil.*

Post n. 4. *viscida* Blum. 15. *H. foliis cordato-subrotundis acuminatis sub-3lobis inaequaliter ferratis subtus stellato-villosis viscidis, pedunculis axillaribus multifloris reflexis, fructibus oblongis hirsutissimis. Java.*

javenfis Blum. 16. *H. foliis obsolete cordatis lanceolatis crenulatis supra glabris subtus glaucis ramulisque pubescentibus, pedunculis axillaribus geminis multifloris. Java.*

pag. 81.

H. hirsuta Lour. et *angustifolia* L. habitat et in *Java*.*Sterculia lanceolata* Cav. habitat et in *Java*.

pag. 82.

Post n. 15. *subpeltata* Blum. 28. *St. foliis subpeltatis ovato-oblongis acuminatis integerrimis subtus arachnoideo-tomentosis, racemis simplicibus, fructibus oblongis utrinque attenuatis. Java.*

St. macrophylla Vent. (*St. cordata* Blum.)

pag. 84.

Ad *Halesiam*.

parviflora Mx. 8. *H. foliis ovato-oblongis acutis utrinque petiolisque pubescentibus, racemis subcompositis pendulis, floribus 8andris. Amer. bor. Bot. reg. 952.*

Ad *Nepenthem*.

Gymnamphora Reinw. 4. *N. foliis petiolatis oblongis subtus ad costam asperis, cantharis radicalibus aphyllis nervoso-reticulatis ovatis superne cristatis. Java.*

pag. 88.

Ad *Malvaceam*.

- Post n. 11. *ruderalis* Blum. 68. M. foliis ovato-lanceolatis acutis grosse serratis subtus ramulisque strigosis, floribus axillaribus glomeratis, capsulis smucronatis. *Java*.
- timorensis* Blum. 69. M. foliis subcordato-ovatis grosse dentatis utrinque ramisque stellato-hispidis, floribus spicatis, capsulis apice barbatis mucicis. *Timor. Java*.

pag. 90.

- M. *circinata* Viv. ad M. *nicaensem* All. referenda.
- Post n. 41. *tomentella* Presl. 70. M. caule prostrato foliisque cordato-orbiculatis obtusis 5angularibus dentatis stellato-tomentosis canescentibus, pedunculis petiolo brevioribus. *Sicil*.
- hirsuta* Presl. 71. M. caule erecto ramoso hirsutissimo, foliis cordato-orbiculatis denticulatis utrinque tomentosis, inferioribus subangulatis, superioribus 5lobis obtusis, pedunculis quaternis hirsutis erecto-patulis petiolo triplo brevioribus, capsulis rugulosis tomentosis. *Sicil*.
- † *Bioniana* Presl. 72. M. caule erecto foliisque cordato-orbiculatis obtuse angulatis dentatis stellato-pubescentibus, pedunculis aggregatis brevissimis, fructiferis deflexis, capsulis tomentosis. *Sicil*.
- † *ribifolia* Viv. 73. M. stellato-pubescentibus, foliis inferioribus cordatis 5lobis, superioribus palmato-5fidis; laciniis obtusis crenatis, pedunculis solitariis folia superantibus, petalis calycem triplo superantibus. *Corfica*.

pag. 95.

Ad *Gossypium herbaceum*. (G. javanicum Blum.)

pag. 96.

Ad *Thespestium* Corr.

- Th *populnea* Corr. — foliis 7nerviis subtus lepidotis, pedunculis petiolos aequantibus.
- macrophylla* Blum. 3. Th. foliis cordatis acuminatis 5nerviis subcoriaceis, pedunculis petiolo brevioribus. *Java. Inf. Molucc.* (Novella litorea Rumph. amboin. 2. t. 74.)
- altissima* * 4. Th. foliis oblongis retusis integerrimis, pedunculis lateralibus multifloris, staminibus subliberis. *Java.* (Esenbeckia Blum.)

Ad *Urenam*.

- Post n. 4. 5. *repanda* Blum. 19. U. foliis subrotundis repando-dentatis subtus 1glandulosis glaucis pubescentibus; caule stellato-pubescente, involucri calycem superante. *Java*.

- † *tomentosa* Blum. 20. U. foliis late ovatis angulatis ferratis sub-5nerviis 1glandulosis tomentosis subtus canescentibus, summis ovato-lanceolatis 5nerviis, involucre calycem subaequante. *Java*.

pag. 101.

Ad *Hibiscum*.

- H. Lampas* Cav. et in *Java*. *H. callosus* Blum. var.

pag. 102.

- H. longifolius* W. (*H. Pseud-Abelmoschus* Blum.)

pag. 104.

- H. lasiocarpus* Cav. habitat ad *fl. Platan.*

- racemosus* Lindl. 86. *H. pube stellato-hispida pruriente, foliis longe petiolatis 5fidis acutis ferratis tomentosis, racemis terminalibus, involucre calycem aequante petalis multo breviori. Nepal. Bot. reg. 917.*

- mauritanus* * 87. *H. humilis suffruticosus pubescens, foliis longe petiolatis subcordato-subrotundis obtusis sub-3lobis repando-dentatis, pedunculis subsolitariis. Inf. Mascaren. Ind. or. (H. ficulneoides Lindl. in bot. reg. 938.)*

- venustus* Blum. 88. *H. foliis cordato-subrotundis semi-3lobis acutis grosse dentatis subtus stellato-tomentosis, pedunculis petiolo brevioribus, involucre sub-5phyllo, capsulis 5gonis hispidissimis. In hortis Javae.*

- virgatus* Blum. 89. *H. foliis lineari-lanceolatis acuminatis apice remote dentatis, infimis obovatis 3lobis, pedunculis folio brevioribus, involucre 8-10phyllo. In hortis Javae.*

pag. 105.

- Post n. 56. *unicaulis* Cand. 90. *H. caule simplici villosissimo, foliis profunde cordato-subrotundis angulatis sinuato-denticulatis supra hirsutis subtus candido-villosissimis, pedunculis solitariis petiolo brevioribus, involucri foliolis spathulatis calycem aequantibus, capsula hispidissima. Patria?*

- fugax* Mart. 91. *H. foliis subsessilibus oblongis acuminatis subtus ramisque tomentosis, pedunculis 1floris folio brevioribus. Brasfl.*

pag. 106.

- hispidus* Mill. Bot. reg. 806. var. *H. Trioni*.

- Post n. 78. *similis* Blum. 92. *H. foliis cordato-orbiculatis acuminatis crenulatis subtus albidis stellato-tomentosis 3-5glandulosis, involucre 10fido. Java.*

pag. 112.

Ad *Sidam*.

- Post n. 35. *vifcidula* Blum. 177. S. foliis cordato-subrotundis acuminatis dentatis subtus stellato-villofis, ramis viscidis, pedunculis petiolo brevioribus. *Java*.

pag. 116.

- Post n. 87. *centrota* * 178. S. caule procumbente ramoso hispido, foliis inferioribus 5lobis, superioribus hastato-3fidis glabris, laciniis acutis integerrimis, pedunculis folia superantibus, capitulis 2aristatis setoso-aculeatis. *Patria?* Hort. hal. 1826. (S. hastata ex hort. anglic.)

pag. 119.

- S. *Sonneratia* Cav. (S. cistiflora Blum.) *Java*.

pag. 121.

- Post n. 158. *elongata* Blum. 179. S. foliis cordatis grosse dentatis utrinque glabris, petiolis stipulisque pilosis, racemis axillaribus paucifloris foliatis, calycibus campanulatis. *Java*.

- atropurpurea* Blum. 180. S. foliis cordato-subrotundis acuminatis crenatis supra pubescentibus subtus tomentosis, stipulis foliaceis inaequaliter cordatis, panícula terminali, capsulis acuminatis calycem superantibus. *Java*.

- fundensis* * 181. S. foliis cordato-subrotundis acuminatis dentatis subtus incano-tomentosis, stipulis setaceis, floribus racemoso-paniculatis. *Java*. (S. fundaeica Blum.)

pag. 122.

- Post n. 171. *digitata* * 182. S. radice tuberosa, caule herbaceo foliisque palmato-digitatis glaucis, laciniis linearibus elongatis integerrimis, pedunculis axillaribus 1floris longissimis. *Ditio Arcansa Amer. bor.* (Callirrhoe digitata Nuttall. in Journ. of Philadelphia. 2. p. 181. Nuttallia Hook. exot. fl. t. 171.)

- pedata* * 183. S. herbacea glabra, foliis pedatis, laciniis lanceolatis incisif, pedunculis longissimis subcorymbosis. *Ditio Arcansa Amer. bor.* (Nuttallia pedata Hook. exot. fl. t. 172.)

pag. 124.

Ad *Bombax*.

- Ad B. *orientale* * *Eriodendron anfractuosum* Blum.

- Samäuma* * 10. B. foliis 7-5natis glabris, foliolis oblongis acuminatis integerrimis, floribus solitariis, petalis spathulatis elongatis extus fulvo-lanatis, antheris 5 anfractuosis. *Brazil*. (*Eriodendron* Mart.)

- Post n. 7. *parviflorum* Mart. 11. B. foliis 5-8natisque coriaceis, foliolis spathulatis emarginatis, pedunculis calycibusque glabris, petalis calyce longioribus tomentosis, fructibus glabris. *Brazil.*
- pubescens* Mart. 12. B. foliis 5-8natisque coriaceis pubescentibus, foliolis obovatis emarginatis, pedunculis calycibus petalisque tomentosis, germinibus glabris. *Brazil.*
- retusum* Mart. 13. B. foliis 5-8natisque glabris, foliolis obovatis retusis, pedunculis calycibusque glabris, petalis elongatis germinibusque tomentosis. *Brazil.*
- † *Mungaba* Mart. 14. B. foliis 8natis glabris, foliolis oblongis acuminatis integerrimis, calyce cupulari, petalis coriaceis reflexis, staminibus polyadelphis apice 2fidis. *Ad fl. Amazonum.*

pag. 125.

Ad *Carolineam*.

- tomentosa* Mart. 5. C. foliis 9natis tomentoso-hirtis coriaceis, foliolis obovatis obtusis, calyce basi multiglanduloso, petalis erectis stamina aequantibus. *Brazil.*

Ad *Gordoniam*.

- Post n. 1. *excelsa* Blum. 6. G. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ferrulatis, pedunculis axillaribus 1floris folio brevioribus. *Java.* (*Schima excelsa* Reinw.)
- Ad G. *Wallichii* Cand. G. *Chilamea* Don. — *Schima Noronhae* Reinw. var. *Java.*

pag. 126.

- Post n. 4. *semiferrata* * 7. G. foliis subtrapezoideis basi cuneatis latere latiori versus apicem ferratis coriaceis glabris, floribus terminalibus congestis polypetalis. *Brazil.* (*Wikströmia fruticosa* Schrad., *Lindleya* Nees., *Haemocharis semiferrata* Mart.)
- tomentosa* * 8. G. foliis subsessilibus obovato-oblongis subintegerrimis subtus tomentosis, ramis hirsutis, floribus solitariis terminalibus. *Brazil.* (*Haemocharis* Mart.)

Ad *Camelliam*.

- Ad C. *Kiffi* Wall. (C. *Keina* Don)
- oleifera* Abel. 4. C. foliis elliptico-oblongis acutis ferratis coriaceis nitidis, floribus solitariis, calycibus sericeis deciduis, petalis 2lobis. *China.*
- euryoides* Lindl. 5. C. foliis ovato-lanceolatis acuminatis ferratis subtus sericeis, ramis pilosis, pedunculis lateralibus 1floris squamosis. *China.* Bot. reg. 983.

pag. 127.

Post *Mesua*:

CALPANDRIA Blum.

- lanceolata* Blum. *Java.* Frutex foliis simplicibus lanceolatis ferratis, floribus solitariis geminisve lateralibus.

SPHAEROSTEMA Blum.

- axillare* Blum. 1. Sph. foliis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis, pedunculis axillaribus 1floris petiolum aequantibus, filamentis exterioribus liberis. *Java*.
- elongatum* Blum. 2. Sph. foliis ovatis acuminatis tenuissime denticulatis, pedunculis axillaribus 1floris petiolos longe superantibus, filamentis omnibus connatis. *Java*.

pag. 129.

Ad *Ingam*.

- Post n. 16. *candida* Kunth. 69. I. aculeata, foliis conjugato-pinnatis, foliolis 2jugis oblique-obovatis utrinque rotundatis submucronatis subcoriaceis glabris, capitulis axillaribus subglobosis longe pedunculatis, leguminibus circinatis. *Quito*.
- Post n. 18. *Catarrhactae* Kunth. 70. I. foliolis dimidiato-ovato-lanceolatis acuminatis membranaceis glabris, petiolo communi glandulifero, pedunculis axillaribus geminis, leguminibus circinatis, caule scandente. *Ad Orinocum*.

Ad I. *quassiaefoliam* W. (I. lucida Kunth.)

- Post n. 25. *Japida* Kunth. 71. I. foliolis 2jugis oblongis utrinque attenuatis membranaceis glaberrimis supra nitidis, petiolo communi alato glanduloso, leguminibus subarcuatis. *Ad fl. Magdalen*.

pag. 130.

- Post n. 32. *Bonplandiana* Kunth. 72. I. foliolis 5jugis subcordato-oblongis acutis glabris supra nitidis, petiolo communi alato glanduloso, spicis sessilibus, corollis sericeis, leguminibus glabris. *Nov. Granat*.

Ad I. *rhoifoliam* W. (I. ornifolia Kunth.)

pag. 131.

- Ad I. *nobilem* W. (I. Humboldtiana Kunth. *Nov. Granat*.)

pag. 132.

- Ad I. *Saman* W. (I. salutaris Kunth.)

pag. 136.

Ad *Acaciam* W.

- Post n. 51. *Spirorbis* Labill. 189. A. petiolis falcato-lanceolatis obtusis 3nerviis, spicis axillaribus binis, leguminibus cochleatis. *Nov. Caledon*.

pag. 137.

- Post n. 70. *Thibaudiana* Cand. 190. A. foliis partialibus 4-propriis 7-9jugis basi obliquis subrhombico-ovatis subtus petiolisque villosis, glandula petiolarum ses-

fili. *Amer. austr.* (*Sophora obliqua* Perf. Syst. 1. 346.)

Rohriana Cand. 191. *A. foliis partialibus 4-propriis 10jugis trapezoideis obtusis glabris, costa flavido-villosa, petiolo communi glandulifero, spicis axillaribus pedunculatis solitariis folia aequantibus. Amer. austr.* (*Mimosa nigricans* Vahl.)

Ad *A. muricatam* W. (*A. granulosa* Labill. nov. Caledon. t. 66.)
fulgens Labill. 192. *A. ramis teretibus cinereis, petioli glanduliferis, foliis partialibus 2-propriis 3jugis oblongis utrinque attenuatis subtus cinereis, spicis axillaribus solitariis. Nov. Caledon.*

pag. 138.

Aleurites laccifera W. deletur: redit enim ut varietas *Crotonis aromatici* p. 869.

pag. 139.

Post n. 89. *multiflora* Kunth. 193. *A. petioli pubescentibus eglandulosis, foliis partialibus 3-propriis 3jugis oblique oblongis nervoso-venosis glabris, capitulis fasciculatis in racemos digestis. Nov. Granat.*

pag. 141.

A. brachyloba et glandulosa W. (*Darlingtonia* Cand.)

pag. 143.

A. fasciculata Kunth. hinc ad p. 146. post n. 178. transferenda: ejus loco ponatur:

subtilifolia 194. *A. spinis stipularibus rectis, petioli glanduliferis, foliis partialibus 5-10-propriis multijugis linearibus obtusis subtus pubescentibus, spicis axillaribus solitariis. Nov. Granat.*
 Kunth.

pag. 146.

Post n. 178. *riparia* Kunth. 195. *A. aculeis sparsis uncinatis, petioli glanduliferis subaculeatis, foliis partialibus 12-propriis multijugis linearibus ciliatis, capitulis axillaribus solitariis, leguminibus apice uncinatis. Nov. Granat.*

pag. 147.

Post n. 186. *Arrufula* Don. 196. *A. aculeis sparsis recurvis, petioli aculeatis medio glanduliferis, foliis partialibus propriisque multijugis oblique linearibus obtusis ciliatis, capitulis pedunculatis subaggregatis. Nepal.*

Post *Acaciam*:

CORDYLA LOUR.

africana Lour. *Afric. or.* Arbor foliis pinnatis glabris, pedunculis multifloris, staminibus longis croceis, fructibus esculentis.

C L A S S I S XVII.

pag. 150.

Soulamea Lam. del. supra in Cl. VI. collocata.

pag. 151.

Post n. 2498. *Heylandia* Cand. Cal. 5fidus. Carina oblique truncata acuta. Stylus refractus. Legumen compressum 1spermum.

Hallia Thunb. n. 2518. huc transferatur, ab *Heylandia* carina obtusa styloque non refracto diversa.

pag. 152.

Post n. 2524. *Carmichaëlia* R. Br. Cal. cyathiformis 5dentatus. Vexillum latum striatum. Legumen sub-3spermum compressum, futuris (reple R. Br.) post valvarum lapsum superstitibus.

Post n. 2530. *Carpopogon* Roxb. Cal. $\frac{7}{8}$. Vexillum abbreviatum incumbens ovatum. Alae conniventes. Carina elongata.

Dicuilos Cand. Cal. $\frac{7}{8}$, laciniis profunde partitis. Vexillum carina brevius. Legumen lineare 8spermum.

pag. 153.

Post n. 2546. *Pueraria* Cand. Cal. campanulatus 2labiatus, lab. sup. subintegro, inf. 3fido. Carina obtusa. Vexillum obovatum. Legumen substipitatum compressum stylo coronatum.

Post n. 2557. *Parochetus* Hamilt. Cal. 4fidus nudus. Vexillum incumbens 2lobum. Carina obtusa alis tecta. Legumen gibbosum.

Odonia Bertol. Cal. 4partitus subaequalis. Alae superne 1dentatae. Carina 2partita. Legumen 4-8spermum.

Dumasia Cand. Cal. cylindricus truncatus 2bracteatus. Stylus medio dilatatus. Legumen oligospermum.

Sabinea Cand. Cal. campanulatus truncatus. Carina obtusissima. Stylus filiformis cum staminibus circinatus incurvus. Legumen stipitatum compressum.

Post n. 2558. *Caragana* Lam. Cal. tubulosus 5dentatus. Pet. subaequalia. Legumen sessile subcylindricum polyspermum.

Corynitis *. (*Corynella* Cand.) Cal. subbilabiatus 5dentatus, dentibus patulis subulatis. Carina obtusa. Stylus clavaeformis. Legumen compressum polyspermum.

Halinodendron Cand. Cal. campanulatus 5dentatus. Carina obtusa. Stylus filiformis. Legumen inflatum subcoriaceum oligospermum.

pag. 154.

- Post n. 2564. *Pachyrrhizos* Rich. Cal. 4lobus, lobo super. latiori emarginato. Vexillum basi biplicatum. Legumen compressum elongatum.
- Post n. 2569. *Hymenofpron* *. Cal. campanulatus semi-4fidus, lacinia suprema ascendente. Vexillum reflexum. Stigma subclavatum. Discus urceolatus. Legumen compressum utrinque ad futuram alato-marginatum.
- Post n. 2575. *Priestleya* Cand. Cal. 5dentatus. Vexillum subrotundum. Alae planae subfalcatae. Carina biceps, dorso incurvo. Legumen sessile compressum.
- Post n. 2581. *Neurocarpon* Desv. Cal. campanulatus 5fidus bracteatus. Vexillum 2lobum complicatum, alas carinamque amplectens. Legumen stipitatum 4gonum, valvis 1nerviis.
- Brongniartia* Kunth. Cal. $\frac{3}{2}$ 2bracteatus. Vexillum orbiculatum alas carinamque subaequans. Discus annularis. Legumen stipitatum subcultriforme angulatum.

pag. 155.

- Post n. 2600. *Amicia* Kunth. Cal. campanulatus 5fidus, laciniis 2 superioribus maximis rotundatis, 2 lateralibus minutis, inferiore oblonga concava. Vexillum alas carinamque superans. Legumen compressum 5articulatum.
- Pictetia* Cand. Cal. bracteatus 5fidus, dentibus super. brevioribus obtusis. Vexillum complicatum carina obtusa. Legumen stipitatum oligospermum subarticulatum.

pag. 159.

Ad *Fumariam*.

- Post n. 6. *Mundtii* * 8. F. caule erecto foliisque 2pinnatifidis ciroffis subtus glaucis, lobis obtusis, racemis oppositifoliis, fructibus compressis marginatis 1nerviis. *Afric. austr.* (Discocarpus Mundtii Schlechtend.)

pag. 160.

Ad *Corydalida*.

- C. Halleri* W. (*C. densiflora* Presl.)
persica Schlechtend. 38. C. foliis ternis ternatis, foliolis cuneiformibus argute incisif, bracteis integris ovatis, capsulis nutantibus. *Hyrkania*. S. G. Gmelin.

pag. 162.

- Post n. 26. *Cracca* Schlechtend. 39. C. caule scandente, foliis bipinnatifidis, laciniis obovatis integris incisive,

petiolis cirriferis, bracteis lanceolatis pedicellos aequantibus, filiquis pendulis polyspermis.
C. B. S.

- Post n. 36. *scandens* * 40. C. caule scandente, foliis 2pinnatis subtus glaucis, foliolis ovalibus mucronulatis, petiolis 2partitis divaricatis, ramulo altero cirrifero, corymbis simplicibus oppositifoliis. *Nepal.* (*Diclytra* Don.)

pag. 164.

Ad *Polygalam.*

- Post n. 21. *densiflora* Blum. 120. P. foliis lineari-lanceolatis mucronatis margine revolutis ciliatis, infimis obovatis, racemis supraxillaribus abbreviatis densifloris, alis falcatis capsula orbiculari longioribus. *Java.*

pag. 165.

- Post n. 35. *straminea* Presl. 121. P. caule erecto subramoso, foliis lanceolato-linearibus acutissimis, bracteis deciduis, alis ovato-ellipticis 3nerviis corolla capsulaque sessili duplo longioribus. *Sicil. Ad Brundisium.* Boccon. mus. t. 99.
- elongata* Presl. 122. P. caule ascendente, foliis ferrulatis, infimis obovatis, superioribus oblongis, alis ellipticis corolla brevioribus. *Sicil.*

pag. 167.

- Post n. 57. *arillata* Hamilt. 123. P. fruticosa ramosa, foliis oblongis acuminatis subtus ramulisque pubescentibus, racemis oppositifoliis, alis obovato-oblongis, stigmate 2dentato, capsulis subbaccatis margine alatis. *Nepal.*
- Ad *P. leptaleam* Cand. (*P. discolor* Hamilt. Don.)

pag. 171.

- Post n. 114. *triphylla* Hamilt. 124. P. caule herbaceo apice trichotomo, ramis triphyllis, foliis petiolatis ovatis acutis ferrulatis glabris, alis obovatis, petali lobis lateralibus falcatis apice truncatis 2dentatisque. *Nepal.*

pag. 174.

Ad *Monninam* R. et P.

- Ante n. 1. *vitellina* * 21. M. arborea ramosissima, foliis oblongis acutis, racemis compositis folia superantibus. *Java.* (*Jackia* Blum.)
- excelsa* * 22. M. arborea, foliis elliptico-oblongis undulatis, racemis compositis confertis. *Java.* (*Jackia* Blum.)
- longifolia* * 23. M. fruticosa, foliis oblongis acuminatis, racemis compositis folio brevioribus. *Java.* (*Jackia* Blum.)

pag. 176.

Ad *Spartium*.Sp. *nudum* W. habitat et in *Sardinia*.

pag. 177.

Post n. 11. *seffilifolium* * 27. Sp. ramis gracilibus striatis, foliis seffilibus subfiliformibus sericeis, spicis elongatis interruptis bracteatis, leguminibus ovalibus pubescentibus. *Asia minor*. (Genista seffilifolia Cand.)

Sp. *thebaicum* Delil. (Crotalaria Cand.)Sp. *Cupani* * (Genista Salzmanni Cand. Sp. gymnopterum Viv. *Corfica*.)

acanthoclados * 28. Sp. ramis oppositis spinoscentibus, foliolis seffilibus linearibus sericeis complicatis, floribus suboppositis interrupte spicatis, leguminibus pubescentibus. *Graccia. Asia minor*. (Genista acanthoclada Cand.)

ephedroides * 29. Sp. ramis rigidis spinoscentibus, foliis paucis seffilibus linearibus sericeis, racemis terminalibus subspicatis strictis. *Sardinia. Corfica*. (Genista ephedroides Cand. legumin. t. 36.)

cuspidosum Burch. 30. Sp. ramis teretibus divaricatis spinosis, foliolis oblongis, floribus alternis. *Afric. austr*, (Genista Cand.)

dalmaticum * 31. Sp. ramis angulatis spinosis foliisque linearibus pilosis, spinis ramosis patentibus, racemis terminalibus, leguminibus hirsutis. *Inf. Cressa in mari adriatico*. (Genista Bartling.)

pag. 183.

Ad *Ononida*.Ad O: *viscosam*. O. brachycarpa et breviflora Cand. varr.

pag. 185.

Ad *Anthyllida*.

chilensis Cand. 19. A. foliis pinnatis cauleque decumbente herbaceo hirsutis, foliolis oblongis subaequalibus, leguminibus rectis hirtis. *Chili*. (Lotus subpinnatus Lag. Syst. 3. p. 279.)

Post *Anthyllida*:

HEYLANDIA Cand.

hebecarpa Cand. 1. H. foliis semiamplexicaulibus cordato-ellipticis obtusis ramulisque virgatis hirsutis, floribus axillaribus solitariis subseffilibus, leguminibus hirtis. *Ceylon*. Cand. legum. t. 34.

leiocarpa Cand. 2. H. foliis breviter petiolatis cordato-subrotundis obtusis hirsutis, pedunculis axillaribus solitariis abbreviatis, leguminibus glabris. *Ind. or*. (Hallia hirta W.)

- latebrofa* Cand. 3. H. foliis petiolatis ovatis serrulatis glabris, floribus pedunculatis axillaribus geminis bractea cymbiformi occultis, leguminibus pubescentibus. *Ind. or.* (Hedysarum latebrosum L. mánt., Lespedezia Pers.)
- † *Perrottetii* * 4. H. foliis lineari-subulatis paucissimis, ramis virgatis calycibusque hirsutis, racemis confertis, leguminibus villosis. *Senegambia.* (Crotalaria Gand.)

Ad *Borboniam*.

- obcordata* * 9. B. foliis sessilibus obovatis mucronatis lineatis, stipulis subulatis calyces sessiles solitarios acquantibus, leguminibus villosis. *Senegambia.* (Podaliria obcordata Poir., Requiencia Cand. legum. t. 37.)
- sphaerosperma* * 10. B. foliis sessilibus obovatis mucronatis, stipulis subulatis calyce brevioribus, leguminibus pubescentibus. *Afric. austr.* (Requiencia Cand.)

pag. 186.

Borbonia ericaefolia L. *Priestleiae* Cand. potius adnumeratur.Ad *Hoveam*.

- elliptica* Cand. 5. H. foliis elliptico-oblongis emarginatis supra lucidis subtus subpubescentibus, pedunculis folio brevioribus geminis. *Nov. Holland. versus Africum.*
- chorizemaefolia* Cand. 6. H. foliis oblongo-lanceolatis sinuato-spinosis mucronatis coriaceis glabris, stipulis spinoscentibus, calycibus villosis. *Nov. Holland. versus Notum.*

Ad *Goodiam*.

- simplicifolia* * 3. G. foliis simplicibus lanceolatis, racemis axillaribus paniculatis. *Nov. Holl.* (Platychilum Gelfianum Delaun. herb. amat. t. 187. Cand.)

pag. 187.

Ad *Aspalathum*.

- A. *Hysrix* Thunb. A. microcarpus Burch. var.
- frankenioides* Burch. 67. A. foliis fasciculatis tercibus obtusiusculis pilosis, ramis villosis, floribus subsolitariis axillaribus terminalibusque sericeis. *Afric. austr.*

pag. 189.

- Post n. 45. *suffruticosus* Cand. 68. A. foliis subfasciculatis lineari-subulatis subpubescentibus erectis, pedunculis elongatis racemosis. *C. B. S.*

pag. 190.

- Post n. 57. *cymbaeformis* Cand. 69. A. foliis fasciculatis tercibus hirsutis, floribus subsolitariis axillaribus termi-

nalibusque, calycibus cymbaeformibus obtusis.
C. B. S. (A. uniflorus Lam.)

Ad *Nissoliam*.

N. *arborea*. (Machacrium acuminatum Kunth.)

pag. 191.

Ad *Amerimum*.

Post n. 3. *strigulosum* Kunth. 8. A. inerme, ramis ferrugineo-tomentosis, foliis subcordato-ovatis obtusis ut inque strigillofis, racemis axillaribus solitariis petiolos superantibus. Ad *Orinocum*.

Post n. 5. *polystachyon* * 9. A. fruticosum, foliis multijugis ovatis, racemis paniculatis. *Mexico*. (Viborquia Ort. dec. 5. t. 9. Varennea Cand.)

pag. 192.

Ad *Pterocarpum*.

Pt. *Ecastaphyllum* Berg. (Ecastaphyllum Brownei Rich. Perf. Hecastophyllum Kunth.)

dubius * 11. Pt. foliis simplicibus subcordato-oblongis acutiusculis reticulatis pellucido-lineolatis, fructibus reniformibus rugulosis. *Caracas*. (Hecastophyllum dubium Kunth.)

Post n. 6. *pubescens* * 12. Pt. foliis pinnatis 3jugis membranaceis subtus pubescentibus, foliolis ellipticis acutis, stipulis falcatis, ramis fructibusque orbiculatis tomentosis. *Mexico*. (Amphymenium pubescens Kunth.)

pag. 193.

Ad *Dalbergiam*.

Post n. 7. *amorphoides* * 15. D. arborea ramosissima, foliis petiolatis submultijugis membranaceis pubescentibus pellucido-punctatis, foliolis parvis ellipticis mucronatis, racemis terminalibus pedunculatis. *Mexico*. (Eysenhardtia amorphoides Kunth. in Humb. nov. gen. 6. t. 592.)

punctata * 16. D. arborea, foliis pinnatis sub-3jugis glabris supra nitidis pellucido-punctatis, foliolis oblongis obtusis membranaceis, racemis compositis. *Caracas*. (Lonchocarpus punctatus Kunth.)

guineensis * 17. D. arborea, foliis pinnatis sub-3jugis coriaceis glabris, foliolis ovalibus acutiusculis, racemis paniculatis, calycibus fructibusque sericeis, staminibus monadelphis. *Guinea*. (Robinia violacea P. B., Lonchocarpus formosianus Cand.)

macrophylla * 18. D. arborea, foliis pinnatis 4jugis epunctatis glabris, foliolis oblongis acuminatis supra nitidis, racemis subspicatis, calycibus fusco-tomentosis. Ad *fl. Magdalen*. (Lonchocarpus macrophyllum Kunth.)

pag. 194.

D. domingensis Perf. (Lonchocarpus violaceus Cand.)Ad *Degueliam* Aubl.

arborescens * 2. *D. arborescens*, foliis pinnatis 2jugis lanceolatis nitidis parallele venulosis, petiolo marginato, pedunculis paucifloris. *Nov. Granat.* (*Riveria nitens* Kunth. in Humb. nov. gen. 7. t. 659.)

Ad *Andiram* Lechen.

excelsa Kunth. 2. *A. foliis* 6jugis glabris, foliolis ovato-oblongis acutis membranaceis reticulatis, paniculis terminalibus, calycibus urceolatis subtomentosis. *Mexico.*

riparia Kunth. 3. *A. foliis* 6jugis glaberrimis supra nitidis, foliolis ovato-oblongis acuminatis, stipulis geminis subulatis, paniculis terminalibus ferrugineo-tomentosis. *Ad fl. Magdalen.*

Ad *Cylistam* Ait.

polystachya Cand. 5. *C. labio* calycis inf. 3dentato, pedunculis racemosis villosis. *Afric. occ.* Cand. legum. p. 382.

pag. 195.

Ad *Halliam* Thunb.

Post n. 2. *angustifolia* Cand. 8. *H. caule* filiformi, foliis linearibus acutis glabris, stipulis lanceolatis petiolo longioribus, pedunculis 1floris folio brevioribus. *Afric. austr.*

Ad *H. cordatam* Thunb. (*Rafnia cordata* Mart. Thunb.)*H. hirta* W. ad *Heylandiam* reducta.*H. sororia* W. (*Eleiotis* Cand.)Ad *Glycinem*.

Post n. 1. *simplicifolia* Kunth. 36. *Gl. suffruticosa* diffusa, foliis petiolatis cordato-lanceolatis mucronatis glabris, stipulis nervosis, pedunculis axillaribus sub-3floris, calycibus appresso pilosis bracteatis. *Ad Orinocum.*

Post n. 3. *diffusa* Kunth. 37. *Gl. procumbens* diffusa, foliis breviter petiolatis supra pubescentibus subtus glanduloso-punctatis, foliolis lanceolatis mucronatis venosis, corymbis axillaribus abbreviatis, leguminibus pilosis. *Nov. Granat.* Humb. nov. gen. 6. t. 572.

crinita Kunth. 38. *Gl. suffruticosa* erecta, foliis brevissime petiolatis ramisque longissime villosis, foliolis linearilanceolatis elongatis mucronatis, stipulis lanceolatis cuspidatis striatis, pedunculis paucifloris abbreviatis, leguminibus rufo-hirsutis. *Nov. Granat.* Humb. nov. gen. 6. t. 573.

rufa Kunth. 39. *Gl. suffruticosa* erecta, foliis coriaceis reticulato-rugosis ramisque rufo-hirsutis, foliolis elliptico-oblongis obtusis mucronatis, stipulis lan-

ceolatis, racemis axillaribus abbreviatis. *Nov. Granat.* Humb. nov. gen. 6. t. 574.

- pulchella* Kunth. 40. Gl. suffruticosa, foliis villosis, foliolis ovato-lanceolatis acutis, pedunculis brevibus axillaribus sub-6floris. *Nov. Granat.*

pag. 196.

- Post n. 13. *Lamarckii* Kunth. 41. Gl. volubilis, foliis pubescentibus punctatis, foliolis lateralibus subrotundo-ovatis inaequilateris, racemis laxifloris longissimis, leguminibus 2spermis. *Cuba. Jamaica.* (Dolichos minimus L. Syst. 3. p. 251.)

- macrophylla* Kunth. 42. Gl. volubilis, foliis glanduloso-punctatis ramisque triangularibus villosis, foliolis subcordatis 3nerviis, intermedio rhombico-ovato, lateralibus inaequilateris, racemis multifloris, calycibus sericeis. *Cuba.*

- malacophylla* * 43. Gl. volubilis, foliolis ovatis acutiusculis villosis resinoso-punctatis, racemis breviter pedunculatis folio brevioribus, vexillo obcordato. *Afr. or.* (Gl. mollis Hook. exot. fl. t. 201.)

- Post n. 17. *menispermoides* * 44. Gl. volubilis, foliolis reniformibus pubescentibus, stipulis ovatis, racemis subsessilibus paucifloris, laciniis calycis lanceolatis 3nerviis. *Nov. Hispan.* (Rhynchosia menispermoides Cand.)

pag. 197.

Gl. *sagittata* Humb. del., reditura sub *Rudolphia*.

pag. 198.

Ad *Pforaleam*.

- Post n. 3. *lathyrifolia* Balb. 54. Pf. foliis ovali-oblongis ciliatis, stipulis coalitis 2fidis, caule decumbente diffuso, floribus axillaribus subsessilibus subsolitariis. *Patria?*

- Post n. 7. *fascicularis* Cand. 55. Pf. foliis subternatis linearibus acuminatis, pedunculis axillaribus fasciculatis 1floris. *C. B. S.* (Lotus tenuifolius Burm.)

- Mutisi* Kunth. 56. Pf. foliolis oblongo-lanceolatis integerrimis glabris, nervo medio petiolis ramisque pilosis, spicis axillaribus densifloris folio brevioribus, calycibus appresso-pilosis. *Nov. Granat.* (Indigofera mexicana Mutis. L. suppl. Syst. 3. 274.)

pag. 199.

Ad Pf. *mehilotoidem* Mx. Pf. eglandulosa Ell.

pag. 200.

- Post n. 41. *macrostichys* Cand. 57. Pf. foliis ternato-pinnatis pubescentibus, foliolis ovatis mucronatis, petiolis glanduloso-scabris, pedunculis axillaribus fo-

lia superantibus, spicis ramosis hirsutissimis.
Ora occid. Amer. bor.

pag. 201.

Pf. *tetraphylla* Poir. est *Turpinia* Perf.

Post n. 51. *multijuga* Ell. 53. Pf. caule ramoso glabriusculo, foliis 9-10jugis pubescentibus, foliolis oblongo-lanceolatis obtusis, spicis oblongis, bracteis exilibus membranaceis eglandulosis. *Carolina austr.*

pag. 202.

Ad *Lepedeziam* Mx.

eriocarpa Cand. 14. L. foliolis obovatis retusis reticulatis supra glabris subtus strigillofis, racemis fasciculatis subsessilibus, leguminibus hirsutis calycem excedentibus. *Nepal.* (*Aspalathus cuneata* Don.)

pag. 205.

Post *Dorycnium*:

CARMICHAËLIA R. Br.

australis R. Br. *Nov. Zeeland.* Frutex ramosissimus, ramis ancipitibus, foliis ternato-pinnatis glabris, foliolis obcordatis, floribus racemosis violaceis. Bot. reg. 912. (*Lotus arboreus* Forst., *Achyronia arborea* Syst. 3. 285.)

pag. 206.

Ad *Melilotum*.

suaveolens Ledeb. 25. M. leguminibus sub-2spermis ovatis mucronatis rugulosis, vexillo alas carinamque superante, racemis laxis, stipulis subulatis, foliolis oblongo-lanceolatis apice dentatis, caule elato. *Sibir.*

pag. 207.

M. sibirica Poir. (*Medicago sibirica* Cand.)

pag. 208.

M. cretica Desr. (*Pocockia* Ser. Cand.)

pag. 209.

Ad *Trifolium*.

Post n. 16. *amabile* Kunth. 111. Tr. floribus fasciculatis ebracteatis, dentibus calycis acutis subaequalibus, leguminibus rugulosis, foliolis subrotundis denticulatis venosis glabris, caule caespitose erecto, ramis pubescentibus. *Mexico.* Humb. nov. gen. 6. t. 593.

Burchellianum Ser. Cand. 112. Tr. capitulis longe pedunculatis, laciniis calycis foliaceis inerviis tubo corollae longioribus, foliolis obcordatis argute dentatis glabris, stipulis lanceolatis elongatis obtufiusculis nervosis. *Afric. austr.*

africanum Ser. Cand. 113. Tr. capitulis longe pedunculatis, laciniis calycis 4gonis tubum corollae aequantibus, foliolis obovatis ferrulatis pilosis, stipulis lanceolatis elongatis acutis nervosis. *Afric. austr.* Burchell.

pag. 210.

Ad Tr. *campestre* Schreb. (Tr. agrarium C. C. Gmel. et pseudo-procumbens Ej. var.)

pag. 211.

Ad Tr. *carolinianum* Mx. (Tr. umbellatum Ser. Cand.)

pag. 213.

Post n. 53. *praetutianum* Guffon. 114. Tr. capitulis globosis foliariis bracteatis, dentibus calycis corolla brevioribus, foliis lanceolatis denticulatis glaucis hirsutis, stipulis membranaceis nervosis, caule suffruticoso. *Samnium Italiae.* (Sav. bot. etrusc. 4. p. 16. n. 7.)

pag. 218.

Ad Tr. *grandiflorum* Ledeb. (Tr. eximium Fisch.) Tr. nanum Torr. ad montes scopulofos Amer. bor. var.

Ad Tr. *uniflorum.* Tr. *Buxbaumii* Sav.

pag. 222.

Ad *Cytifum tomentosum* Andr. (*Goodia polysperma* Cand.)

pag. 225.

Cytifi dubii.

Post n. 39. *orientalis* Loif. 45. C. caule erecto hirsuto, foliis subsessilibus ternatis villosis, foliolis linearibus acutis, floribus subterminalibus paucis leguminibusque glabris, calycibus sub-5fidis. *Asia minor.*

africanus Loif. 46. C. ramis erectis hirsutis, foliis petiolatis ternatis, foliolis linearibus pilosis, umbellis terminalibus pedunculatis. *Afric. bor.*

Post *Cytifum*:

CARPOGON ROXB.

volubilis Roxb. *Ind. or.* Herba volubilis, foliis ternatis ovatis glabriusculis, pedunculis 3floris, floribus atropurpureis. Hort. hal. 1826.

DICHILLOS Cand.

- lebeckioides* Gand. 1. D. suffruticosum erectum glabriusculum, foliis ternatis linearibus, floribus terminalibus pedunculatis subfoliariis pendulis. *Afric. austr.* Cand. legum. t. 35.
- hypotrichum* * 2. D. scandens, foliis ternatis subtus strigilloso-villosis, foliolis oblongis, stipulis lanceolatis, pedunculis elongatis sub-2floris, leguminibus sericeo-villosis. *Afric. austr.*

pag. 226.

Ad *Adenocarpum volgensem* * (Calophaca wolgarica Fisch. Cand.)Ad *Lupinum*.

- Post n. 4. *rupestris* Kunth. 30. L. suffruticosus procumbens, foliis subseptenis lanceolatis acutis subtus sericeis, racemis pedunculatis, floribus subverticillatis 1bracteatis, calycibus sericeis. *Alp. Quito.*
- Smithianus* Kunth. 31. L. fruticulosus ramosissimus, foliolis exiguis spatulatis sericeo-hirsutis, racemis pedunculatis, floribus subverticillatis, calycis 2bracteati labio inf. integro, leguminibus hirsutis. *Alp. Quito.*

pag. 227.

- Post n. 15. *elegans* Kunth. 32. L. herbaceus erectus villosus, foliolis lanceolatis acutis subtus sericeis, stipulis setaceis, racemis elongatis, floribus subverticillatis, calycis bracteati labio inf. integro, leguminibus hirsutis. *Mexico.*
- montanus* Kunth. 33. L. herbaceus tomentosus, foliolis lanceolato-linearibus acutis subtus appresso pilosis, stipulis lanceolatis, racemis elongatis, floribus subverticillatis, calycis bracteati villosi labio inf. integro, leguminibus hirsutis. *Nov. Hispan.*
- microcarpus* Sims. 34. L. foliolis lineari-lanceolatis subtus pubescentibus, racemi pedicellis verticillatis, calycibus ebracteatis $\frac{5}{8}$, leguminibus rhombeis mucronatis 2spermis. *Chili. Bot. mag. 2413.*

pag. 228.

Ad *Piscidium puniceam* Cav. (Aeschynomene miniata Ort., Daubentonia punicea Cand.)

pag. 229.

Ad *Piscidium longifolium* W. (Daubentonia Cand.)Ad *Lebeckiam*.

- Post n. 7. *Burchellii* * 10. L. caule subscandente gracili, foliis ternatis remotis longe petiolatis, foliolis lineari-lanceolatis longe acuminatis, stipulis semisagittatis, pedunculis 2floris axillaribus elongatis. *Afric. austr.* (Ooptera Burchellii Cand. legum.)

t. 42. Nil vulgatus in papilionaceis quam alas
basi esse appendiculatas f. hinc dentatas.)

Ad *Rafniam amplexicaulem* Thunb. (*Vascoa* Cand.)

pag. 230.

Sarcophyllum carnosum Thunb. habet flores laterales sparsos flavos. Bot. mag. 2502.

pag. 231.

Platylobium reticulatum Sieb. ad *Chorizema* Cand.

Ad *Bossiaeam* Vent.

rotundifolia Cand. 10. B. ramis compressis foliosis, foliis obovato-subrotundis mucronatis glaberrimis. *Nov. Holl.*

Ad *B. microphyllum* R. Br. (*Platylobium microphyllum* Sims. bot. mag. 863., obcordatum Vent.)

pag. 233.

Ad *Tephrosiam* Pers.

hypargyra Cand. 41. T. caule suffruticoso erecto angulato villoso, foliis 2-4jugis supra glabris subtus argenteo-fericeis, foliolis infimis subrotundis, reliquis ovali-oblongis, terminali maximo, pedunculis axillaribus, staminibus monadelphis, leguminibus pubescentibus. *Ind. or.*

sophoroides Cand. 42. T. caule fruticoso, foliis 2-4jugis elliptico-oblongis acuminatis glaberrimis, racemis axillaribus. *Nepal.*

Senna Kunth. 43. T. caule fruticoso erecto, foliis 4jugis obovato-oblongis retusis glaucescentibus pubescentibus, racemis oppositifoliis, floribus fasciculatis, leguminibus pubescentibus. *Nov. Granat.*

venustula Kunth. 44. T. caule fruticoso elato, foliis 6jugis lanceolatis obtusis mucronatis pubescentibus subtus incanis, racemis oppositifoliis, floribus fasciculatis, leguminibus subcultriformibus pubescentibus. *Cumana.*

fruticosa Cand. 45. T. caule fruticoso scandente, foliis 5jugis ovato-oblongis acutis glabris, racemis paniculatis abbreviatis, leguminibus oblongis compressis villosis. *Ind. or.*

brachystachys Cand. 46. T. caule fruticoso, foliis 7jugis ellipticis obtusis subtus pubescentibus, racemis paniculatis. *Nepal.*

suberosa Cand. 47. T. caule fruticoso, foliis 8jugis elliptico-oblongis mucronulatis subtus pubescentibus, racemis axillaribus. *Bengal.* (*Robinia* Roxb.)

candida Cand. 48. T. caule fruticoso, foliis 10jugis elliptico-oblongis mucronulatis subtus sericeis, racemis axillaribus, leguminibus stylo elongato coronatis. *Bengal.* (*Robinia* Roxb.)

Mariana Cand. 49. T. caule suffruticoso villoso, foliis 4jugis oblongis subtus argenteo-sericeis, stipulis lanceolatis

- elongatis villosis, racemis abbreviatis subsessilibus, leguminibus villosis. *Inf. Marian.*
- leucantha* Kunth. 50. T. caule fruticoso erecto pubescente, foliis sub-8jugis oblongo-linearibus obtusis mucronatis subtus canescentibus, racemis terminalibus subgeminis, leguminibus tomentosis. *Nov. Hispan.* Humb. nov. gen. 6. t. 577.
- emarginata* Kunth. 51. T. arborescens, foliis multijugis oblongo-linearibus profunde emarginatis supra appresse pubescentibus subtus argenteo-sericeis, racemis terminalibus, floribus fasciculatis, leguminibus tomentosis. *Ad Orinocum.*
- Ad T. *mimosoidem* Perf. *Dalbergia Barclaii* Hook. exot. fl. t. 188. e *Madagascar.*
- Post n. 24. *oroboides* Kunth. 52. T. caule fruticoso ramoso, foliis multijugis linearibus incano-pubescentibus, pedunculis sub-1floris apice foliatis, leguminibus pubescentibus. *Mexico.* Humb. nov. gen. 6. t. 578. 579.
- astragalina* Kunth. 53. T. caule fruticoso tomentoso, foliis 8-9jugis oblongis obtusis subtus leguminibusque incano-tomentosis, floribus sparsis pedunculatis. *Quito.*

pag. 235.

Post *Teramnum*:

PUERARIA Cand.

- tuberosa* Cand. 1. P. radice tuberosa, caule fruticoso scandente, foliis ternatis ovatis acutis supra pubescentibus subtus sericeis, racemis terminalibus elongatis, leguminibus villosis. *Bengal.* (Hedysarum tuberosum Roxb. W.)
- Wallichii* Cand. 2. P. caule fruticoso, foliis ternatis ovatis acutis supra glabris subtus pubescentibus, racemis axillaribus compositis folia aequantibus. *Nepal.* Cand. legum. t. 43.

pag. 236.

Ad *Crotalariam*.

- Cr. genistoides* Lam. (*Cr. spartioides* Cand.)
- Post n. 9. *tenuifolia* Roxb. 84. *Cr.* ramis angulatis dense tomentosis, foliis lineari-oblongis obtusis sericeo-villosis, stipulis subulatis deciduis, racemis laxis elongatis, vexillo subtus discolore. *Coromandel.*
- alata* Hamilt. Roxb. 85. *Cr.* ramis alatis, foliis breviter petiolatis ovalibus retusis tomentosis, racemis paucifloris, bracteis ovatis acutis stipitatis. *Nepal.*
- tuberosa* Hamilt. Don. 86. *Cr.* caule suffruticoso decumbente, foliis lanceolatis acutis margine revolutis subtus ferrugineo-tomentosis, floribus axillaribus subsessilibus, leguminibus pilosissimis. *Nepal.*
- nitens* Kunth. 87. *Cr.* caule suffruticoso ramoso, ramis subangulatis sericeis, foliis obovato-oblongis obtusis sub-

- tus splendentibus, racemis terminalibus multifloris, leguminibus glabris. *Nov. Granat.*
- acuminata* Cand. 88. Cr. foliis linearibus acuminatis subtus ramisque sericeis, stipulis ovato-lanceolatis acuminatis petiolo brevioribus, pedunculis oppositifoliis 1-2-floris, germinibus glabris. *Afric. austr.* Burchell.
- virgulta* * 89. Cr. foliis petiolatis oblongo-linearibus mucronatis, junioribus ramulisque sericeis, stipulis nullis, racemis oppositifoliis elongatis, leguminibus pendulis. *Afric. austr.* (Cr. *virgultalis* Burch.)
- Ad Cr. *pellitam* Bert. (Cr. *Berteriana* Cand.)

pag. 237.

- Post n. 19. *novae Hollandiae* Cand. 90. Cr. foliis obovato-oblongis obtusis subtus ramisque sericeo-pubescentibus, petiolis apice nodoso-articulatis, stipulis nullis, racemis terminalibus. *Nov. Holl.*
- Ad Cr. *spectabilem* Roth. (Cr. *Lefchenaultii* Cand.)
- stipularis* Desv. 91. Cr. foliis ovalibus obtusis cauleque erecto villosis, stipulis ovatis acuminatis ad latera internodii excisis late decurrentibus, bracteis linearibus acuminatis. *Cayenn.*
- pterocaula* Desv. 92. Cr. foliis lineari-lanceolatis acutis sericeis, stipulis obtusis decurrentibus, leguminibus glabris. *Amer. tropic.*
- Genistella* Kunth. 93. Cr. foliis lanceolatis acutis subtus argenteis, stipulis abbreviatis acutis decurrentibus, racemis axillaribus terminalibusque multifloris. *Nov. Granat.*
- Espallilla* Kunth. 94. Cr. foliis lanceolatis obtusis utrinque flavo-sericeis, stipulis late triangularibus falcatis acuminatis decurrentibus, racemis oppositifoliis paucifloris. *Nov. Granat.*
- Post n. 21. *prostrata* Roxb. 95. Cr. caule prostrato ramoso foliisque subrotundis pilosis, stipulis linearibus, racemis paucifloris, bracteolis brevissimis. *Nepal.*

pag. 238.

- Post n. 29. *Burmanni* Cand. 96. Cr. caule erecto superne diviso, foliis oblongo-linearibus obtusis mucronatis sericeo-villosis, stipulis setaceis, floribus terminalibus subracemosis. *Ind. or.* (Cr. *sericca* N. L. Burm. fl. ind. t. 48. f. 1.)
- Ad Cr. *parvifloram* Roth. Cr. *breviflora* Cand. e *Brasilia* pertinere videtur.

pag. 239.

- Ad Cr. *puffillam* Roth. Cr. *pumila* Schrank.
- Ad Cr. *medicagineam* Lam. Cr. *virguta* Roxb. Schrank.
- Ad Cr. *bituminosam* * (Fagelia Neck. Cand., Cr. *glycinea* Lam.)
- Ad Cr. *uncinellam* Lam. Cr. *sphaerocarpa* et *senegalensis* Cand.
- cytisoides* Roxb. 97. Cr. foliolis ellipticis utrinque attenuatis subtus pubescentibus, stipulis exiguis subulatis, ra-

cemis oppositifoliis, carina rostrata, leguminibus acinaciformibus tomentosis. *Nepal.* (Cr. pforaleoides Don.)

- macrostyla* Don. 98. Cr. foliolis obovatis retusis coriaceis subtus ramulisque sericeo-villosis, racemis axillaribus, leguminibus ovatis compressis 1spermis villosissimis, stylo longissimo plumoso. *Nepal.*
- cylindrocarpa* Cand. 99. Cr. caule erecto paniculato, foliolis elliptico-oblongis subtus ramulisque subpubescentibus, racemis oppositifoliis, leguminibus cylindricis polyspermis stylo apiculatis. *Senegambia.*
- anagyroides* Kunth. 100. Cr. arborescens, foliolis oblongo-lanceolatis acutis subtus ramulisque sericeis, stipulis minutis subulatis, racemis oppositifoliis multifloris, leguminibus polyspermis. *Caracas.*
- mollicula* Kunth. 101. Cr. fruticosa, foliolis lanceolatis obtusis venosis villosis subtus canescentibus, stipulis subfalcatibus subulatis, racemis multifloris, calycibus sericeis, corollis glabris. *Mexico.*
- litoralis* Kunth. 102. Cr. suffruticosa procumbens, foliolis obovato-oblongis emarginatis appresso-pubescentibus, stipulis minimis subulatis, pedunculis sub-6floris, leguminibus pubescentibus. *Cuba.* (Cr. pumila Ort.)
- cajanifolia* Kunth. 103. Cr. fruticosa(?), foliolis oblongo-lanceolatis obtusis submucronatis supra glabris subtus ramulisque angulatis appresso-pubescentibus, stipulis capillaribus, racemis multifloris, leguminibus polyspermis pilosis. *Mexico. Ad Orinocum.* (Cr. maypurensis Kunth., setifera Cand.)
- bracteata* Roxb. 104. Cr. foliolis oblongis utrinque attenuatis superne glabris subtus pubescentibus, stipulis nullis, racemis oppositifoliis, bracteis reflexis, leguminibus dense hirsutis. *Ind. or.*

pag. 240.

Ad Cr. vitellinam Ker. Cr. holosericea Nees. Mart.

Ad Cr. incanam. Cr. hirta Lag., cubensis Cand. . Cr. Dombeyana Cand. leguminibus dumtaxat glabriusculis differt. Nec Cr. affinem Cand. diversam reor.

Post n. 69. *lupulina* Kunth. 105. Cr. erecta ramosa, foliolis oblongo-linearibus obtusis mucronatis supra scabris subtus pubescentibus, stipulis capillaribus, racemis oppositifoliis, leguminibus polyspermis. *Mexico.*

† *striata* Cand. 106. Cr. foliolis ellipticis obtusis mucronatis glabriusculis, stipulis nullis, racemo terminali, floribus pendulis. *Ind. or.*

podocarpa Cand. 107. Cr. erecta hirsuta, foliolis obovatis obtusis mucronatis, stipulis dimidiato-oblongis acutis, racemis oppositifoliis, leguminibus stipitatis glabris polyspermis. *Afric. media.*

pag. 241.

Cr. longifolia Lam. est *Neurocarpon* Desv.

pag. 242.

Ad *Coluteam*.

Post n. 3. *nepalensis* Sims. 6. *C. fruticosa*, foliolis subrotundo-ellipticis retusis, racemis paucifloris nutantibus, callis vexilli papillaeformibus, leguminibus subcoriaceis pubescentibus. *Nepal. Bot. mag.* 2622.

C. caspica M. B. (*Sphaerophyfa* Cand.)

C. davarica M. B. (*Sphaerophyfa* Cand.)

Ad *Sutherlandiam* R. Br.

microphylla 4. *S. frutescens*, foliolis oblongo-linearibus ramisque Burch. Cand. que pubescentibus, pedunculis 2-3floris. *Afric. austr.*

Ad *Lessertiam obtusatam* *. (*L. fruticosa* Lindl. in bot. reg. 970.)

pag. 243.

Ad *Lessertiam* Cand.

diffusa R. Br. 9. *L. herbacea diffusa*, foliolis 8-10jugis elliptico-linearibus subemarginatis utrinque hirsutiusculis, racemis pedunculatis folia superantibus, calycibus ebracteatis nigro-pilosis. *C. B. S.* (*Galega dubia* Jacqu.)

macrostachya 10. *L. basi suffruticosa erecta*, foliolis 4-6jugis elliptico-oblongis obtusis utrinque subpubescentibus, racemis paniculatis laxis folia longe superantibus. *Afric. austr.*

brachystachya 11. *L. basi suffruticosa erecta*, foliolis 6-8jugis oblongo-linearibus obtusis subtus subpubescentibus, racemis folio triplo brevioribus, leguminibus pendulis. *Afric. austr.*

falciformis 12. *L. herbacea erecta*, foliolis 8jugis linearibus acutiusculis, pedunculis axillaribus paucifloris patentibus, leguminibus falciformibus. *Afric. austr.?* Cand. legum. t. 46.

Ad *Erythrinam*.

Post n. 7. *rubrinervia* Kunth. 21. *E. foliolis subrotundo-ovatis acuminatis subtus glaucis rubro-venosis pilosiusculis*, calycibus spathaceis supra fissis. *Nov. Granat.*

umbrosa Kunth. 22. *E. foliolis triangulari-ovatis trinerviis glaberrimis*, calycibus campanulatis spathaceis. *Carracas.*

Ad *E. Humeanam* * lege *E. caffra* *Bot. reg.*

pag. 244.

Ad *Rudolphiam* W.

dubia Kunth. 3. *R. foliis subsagittato-cordatis acuminatis membranaceis glabris*, petiolis articulatis marginatis, pedunculis 1floris, leguminibus longissime rostratis. *Nov. Granat.* (*Glycine sagittata* W. Syst. 3. 197.)

pag. 245.

Ad *Bönninghausiam vincentinam* * (Chaetocalyx vincentinus Cand.)Post *Gronen* Lour.:

PAROCHETUS Hamilt..

- communis* Hamilt. 1. *P. reptans*, foliis ternatis, foliolis truncatis dentato-ferratis. *Nepal.*
major Hamilt. 2. *P. erectiusculus*, foliis ternatis, foliolis obovatis retusis crenatis. *Nepal.*

ODONIA Bertol.

- tomentosa* Bertol. 1. *O. scandens*, foliis ternatis ellipticis utrinque tomentosis, racemis axillaribus. *Hispaniol.*, *Opusc. Scientif.* 4. p. 334.
speciosa * 2. *O. erecta*, foliis ternatis oblongis subcoriaceis supra nitidis, floribus subracemosis terminalibus. *Peru.* (*Cytisus speciosus* Loif., *Collaea* Cand. legum. t. 40.)
 † *trinervia* * 3. *O. erecta*, foliis ternatis ellipticis obtusis supra pubescentibus subtus subtomentosis 3nerviis, pedunculis subfoliariis abbreviatis, laciniis calycis reflexis, leguminibus villosissimis. *Ind. or.* (*Collaea trinervia* Cand. legum. t. 41.)

DUMASIA Cand.

- villosa* Cand. 1. *D. ramis volubilibus petiolisque villosis*, foliis ternatis ovato-oblongis acutiusculis, racemis axillaribus multifloris. *Nepal.* Cand. legum. t. 44. (*Hedyfarum tiliaefolium* Don.?)
pubescens Cand. 2. *D. ramis volubilibus petiolisque subpubescentibus*, foliis ternatis ovato-ellipticis obtusis, racemis axillaribus paucifloris. *Nepal.* Cand. legum. t. 45.

SABINEA Cand.

- florida* Cand. 1. *S. floribus praecocibus*, foliolis 8jugis-elliptico-oblongis. *Inf. Carib.* (*Robinia florida* Vahl. Syst. 3. p. 246.)
dubia Cand. 2. *S. floribus serotinis*, foliolis 8jugis elliptico-oblongis, leguminibus stylo cirriformi coronatis. *Martinic.* (*Robinia dubia* Lam. Syst. 3. 246. *R. martinicensis* Perf.)

ROBINIA

juxta characterem genericum exacte sumtum non amplectitur nisi tres veras species:

R. Pseudacaciam, *viscosam* et *hispidam*.

Valde dubiae sunt: *R. aturensis* *, *macrophylla* *, *glycyphylla* Poir., *amara* et *flava* Lour.

Sub *Swartzia* militat *Robinia tomentosa* Poir., sub *Cupania*, *R. rubiginosa* Poir., sub *Dalbergia* *R. scandens* W., sub *Turpinia*, *R. glandulosa* *.

CARAGANA Lam.

complectitur *Robiniam frutescentem, pygmaeam, grandifloram et mollem* M. B., tum *tragacanthoidem* Pall., *Cham-lagu* Herit., *spinofam, Altaganam jubatam et Caraganam*, quae *Caragana arborefcens* Cand. audit.

microphylla Cand. 11. C. foliolis sub-6jugis incanis retufis, petiolo stipulisque apice fpinescentibus, radice repente. *Sibir.* (*Robinia microphylla* Pall.)

CORYNITIS *.

(*Corynella tolerari* nequit, cum graeca vox *κορύνη* cum appendicula latina *ella* haud jungenda fit: *κορυνίτις* vero auctoritatem clafficam habet.)

domingensis * (*Robinia domingensis* Syst. 3. 245. *Corynella paucifolia* Cand. Character fpecificus a Candolleo enunciatus a veritate aberrat.)

polyantha * (*Robinia polyantha* Sw. Syst. 3. 246.)

HALIMODENDRON Cand.

argenteum Cand. (*Robinia Halodendron* Pall. Syst. 3. 246.)

pag. 249.

Ad *Dolichon.*

D. tetragonolobus. (*Pfophocarpus* Neck. Cand.)

D. luteolus Jacqu. (*Vigna glabra* Sav. mem. phaseol. 3. p. 8. Cand.)

Post n. 18. *glycinoides* Kunth. 51. *D. racemis axillaribus paucifloris* longe pedunculatis, calycis lacinia superiore latiffima emarginata, foliolis ovato-oblongis obtufis mucronatis 3nerviis ramisque volubilibus frigillofis. *Peru.*

miniatus Kunth. 52. *D. racemis longiffime pedunculatis, calycis lacinia superiore maxima, leguminibus 3carinatis oligofpermis, foliolis subrotundis coriaceis reticulato-venofis ramisque volubilibus glabris.* *Cuba.* (*Canavalia* Cand.)

D. gladiatus Jacqu. (*Malocchia* Sav. *Canavalia* Cand.)

pag. 250.

D. enfiformis et *lineatus* Thunb. (*Canavalia* Cand.)

D. giganteus W. et *altiffimus* funt *Stizolobia* P. Br.

pag. 251.

D. ruber Jacqu. eft *Hymenospron* *.

D. rotundifolius Vahl. (*Canavalia obtufifolia* Cand.)

D. minimus eft *Glycine* Kunth.

D. fabaeformis Herit. (*Cyamopfis pforaloides* Cand.)

pag. 252.

Ad *Stizolobium* P. Br.

- altissimum* * 14. (*Dolichos altissimus* Syft. 3. 250. *Mucuna* Cand.)
giganteum * 15. (*Dolichos giganteus* W. Syft. 3. 250. *Mucuna* Cand.)
Mutisianum * 16. St. volubile, foliolis oblongis glabriusculis, lateralibus subdimidiatis, racemis subcapitatis, bracteis ovatis obtusis fuligineo-tomentosis. *Nov. Granat.* (Negretia Kunth)
molle * 17. St. volubile, foliolis ellipticis acutis villosotomentosis, lateralibus subdimidiatis, racemis capitato-globosis, bracteis acutis sericeis, leguminibus acinaciformibus tomentosis. *Nov. Granat.* (Negretia Kunth.)
macroceras * 18. St. volubile, foliolis ovatis acutiusculis supra laevibus subtus pubescentibus, spicis axillaribus longissimis, leguminibus latis oligospermis. *Brasil.* (Macroceratides Pseudo-*Stizolobium* Radd. mem. di Modena, 18. p. 392. t. 5. f. 5.)

pag. 253.

Post *Stizolobium*:

PACHYRRHIZOS Rich.

(Radices tuberofae.)

- tuberofus* * 1. (*Dolichos tuberofus* Lam. *Stizolobium* Syft. 3. 252.)
angulatus Rich. 2. (*Dolichos bulbosus* L. *Stizolobium* Syft. 3. 252.)
 Cand.
montanus Cand. 3. (*Dolichos montanus* Lour. *Stizolobium* Syft. 3. 252.)
trilobus Cand. 4. P. volubilis, foliolis trilobis acuminatis pubescentibus, spicis elongatis, leguminibus linearibus. *China. Cochinchina.* (*Dolichos trilobus* Lour.)

Ad *Phaseolum*.

- Post n. 6. *cirrosum* Kunth. 34. Ph. volubilis cirrosum, foliolis ovatis obtusis scabriusculis, racemis longissime pedunculatis, bracteis acutis calycem aequantibus, calycis lobis rotundatis. *Mexico.*
puberulus Kunth. 35. Ph. volubilis pubescens, foliolis ovatis cuspidatis, racemis pedunculatis axillaribus, leguminibus lanceolato-cultriformibus glabris. *Caracas.*
truxillensis Kunth. 36. Ph. volubilis retrorsum pilosus, foliolis subcordato-ovatis acuminatis appresso-pubescentibus, racemis longe pedunculatis, bracteis parvis deciduis, calycis lobo superiori latissimo emarginato. *Peru.*
speciosus Kunth. 37. Ph. volubilis pubescens, foliolis ovatis cuspidatis subtus tomentosis, pedunculis elongatis paucifloris, calycis lobo superiore maximo emarginato.

nato, reliquis acutis, floribus maximis. *Ad Orinocum.*

Ad Ph. *Pallar* Molin. (Ph. pilosus Kunth.)

Ad Ph. *inamoenum*. Ph. *derafus* Schrank. et *Xuarefii* Zuccagn. varr.

pag. 254.

Ad Ph. *vulgarem*. Ph. *compressus* Cand. (romanus Sav.), *oblongus*, *saponaceus*, *tumidus*, *haematocarpus*, *sphaericus*, *gonospermus* Sav. varr.

formosus Kunth. 38. Ph. volubilis retrorsum hispidulus, foliolis triangularibus mucronatis pilosiusculis, racemis longissime pedunculatis, bracteis subrotundis nervosis calycem aequantibus. *Nov. Hispan.* (Ph. sylvestris Kunth.)

pedunculatus Kunth. 39. Ph. volubilis retrorsum hispidulus, foliolis ovatis acuminatis glabriusculis ad marginem pilosis, racemis longissime pedunculatis, calycis lobo superiori abbreviato emarginato, leguminibus elongatis linearibus. *Nov. Granat.*

linearis Kunth. 40. Ph. subvolubilis retrorsum pilosiusculus, foliolis subcordato-linearibus obtusis mucronatis hispidiusculis, racemis longissime pedunculatis, calycis lobo superiori latissimo emarginato. *Amer. austr.*

Ph. *ocxillatus*. (Dolichos Kunth.)

pag. 256.

Ad *Clitoriam*.

Cl. *falcata* Lam. et *rubiginosa* Juss. pertinent ad Nevrocarpon Desv. *angustifolia* Kunth. 13. Cl. volubilis glabra, foliolis lineari-lanceolatis obtusis mucronatis, pedunculis axillaribus subsolitariis 1floris, dentibus calycis 2bracteati superioribus brevissimis. *Ad Orinocum.*

formosa Kunth. 14. Cl. volubilis glabra, foliolis oblongis obtusis mucronatis, pedunculis axillaribus 1floris, bracteis oblongis calycem multo superantibus, dentibus calycis 4 superioribus brevissimis. *Ad Orinocum.*

Cl. *multiflora* Sw. (Vilmorinia Cand.)

Cl. *polyphylla* Poir. 15. (Galactia pinnata Perf. Syst. 3. 257. Barbiera polyphylla Cand. legum. t. 39.)

pag. 257.

Ad *Galactiam* P. Br.

Ante n. 1. *simplicifolia* * 11. G. caule suffruticoso procumbente, foliis simplicibus oblongis obtusis subtus strigosis, pedunculis axillaribus geminis, calycibus nervosis. *Popayan Columbiac.* (Cologania procumbens Kunth.)

Post n. 5. 6. *pulchella* * 12. G. volubilis, foliis ternatis oblongis obtusis utrinque strigillosis subtus glaucescentibus, pedunculis axillaribus geminis, calycibus

- hirfutis. *Nov. Hispan. Ad fl. Amazonum.* (Cologania pulchella et ovalifolia Kunth.)
- mexicana* * 13. *G. volubilis*, foliis ternatis oblongo-linearibus subtus strigosis, pedunculis geminis axillaribus, calycibus pilosis. *Mexico.* (Cologania angustifolia et intermedia Kunth.)
- G. pilosa* Nutt. (*G. cubensis* Kunth. *Cuba.*)
- Jussievana* Kunth. 14. *G. suffruticosa* repens, foliis ternatis ellipticis subcoriaceis utrinque sericeis subtus subtomentosis, floribus axillaribus breviter pedunculatis subracemosis, calycibus argenteo-sericeis. *Ad Orinocum.*
- glaucescens* Kunth. 15. *G. suffruticosa* erecta, foliis ternatis elliptico-oblongis obtusis coriaceis glabris supra nitidis subtus glaucescentibus, racemis axillaribus congestis, calycibus leguminibusque sericeis. *Quito.*

Post *Galactiam*:

HYMENOSPRON *.

- sericeum* * 1. *H. volubile*, foliis ternatis subcordato-ellipticis mucronatis supra pubescentibus subtus calycibus leguminibusque sericeis. *Nov. Granat.* (*Dioclea sericea* Kunth.) *)
- † *apurense* * 2. *H. volubile*, foliis ternatis ovato-oblongis mucronatis glabris, nervo venisque subtus strigillosis, leguminibus pilosiusculis. *Ad Orinocum.* (*Dioclea apurenfis* Kunth.)
- rubrum* * 3. *H. volubile*, foliis ternatis ovatis acutis glabris, racemis laxis. *Martinic.* (*Dolichos ruber* Jacqu. Syft. 3. 251., *Dioclea Jacquini* Cand.)

pag. 260.

- Ad Orobum fruticosum* Pers. (*Coursetia tomentosa* Cand.)
- pastoënsis* * 37. *O. caule fruticoso*, foliis elliptico-subrotundis subtus incano-villosis, racemis longe pedunculatis folia acquantibus. *Alp. pastoënses* *Nov. Granat.* (*Sesbania dubia* Kunth. in *Humb. nov. gen.* 7. t. 660., *Coursetia* Cand.)

pag. 263.

Ad *Lathyrum*.

- Post n. 20. † *bruttius* Tenor. 44. *L. cirris* 2phyllis, foliolis oppositis elliptico-oblongis, stipulis semifagittatis se-

*) *Dioclea* * Syft. 1. 556. . . „*Diocles n'est presque connu, que pour avoir designé les haricots sous le nom de Dolichos.*” Cand. legum. p. 380. Contra *Diocles* celeberrimus fuit auctor *ἱστοριζοῦ* (Schol. Nicandr. ther. v. 647.). Scripsit *περὶ ὑγιεινῶν πρὸς Ἠλείστιαρχον*, in quo dedit *τῶν ὀσπρίων κατάλογον*. (Galen. fac. alim. 1. p. 303. 317. ed. Basil. graec.) Secundus aetate famaue post Hippocratem. Plin. 26, 6. Plura fragmenta servavit Oribanius, crebro sententias ejus citat Athenaeus.

taceis, caule angulato nudiusculo leguminibus-
que glabris. *Calabria citerior.*

Ad *L. sylvestrem.* (*L. longifolius* Tenor.)

pag. 267.

Ad *Viciam.*

Post n. 35. *humilis* Kunth. 67. V. foliolis sub-2jugis linearibus obtusiusculis mucronulatis venulosis, stipulis semifagittatis. *Mexico.* Humb. nov. gen. 6. t. 581.

Ad *V. gramineam* Sm. *V. andicola* Kunth. in Humb. nov. gen. 6. t. 582. et *setifolia* Ej.

pag. 268.

Post n. 50. *pulchella* Kunth. 68. V. foliolis linearibus angustissimis acutis, stipulis semifagittatis, pedunculis multifloris folia superantibus. *Mexico.* Humb. nov. gen. 6. t. 583.

pag. 271.

Lipariae

unica species est *sphaerica.* Reliquae *Priestleyae* Cand. quibus accedit *P. ericaefolia* Cand. (*Borbonia* Syst. 3. 186.)

pag. 272.

Ad *Poiteam* Vent.

Campanilla Cand. 3. (*Robinia latifolia* Poir. Syst. 3. 247.)

Ad *Sesbaniam* Poir.

S. grandiflora Poir. (*Agati* Rheed. Cand.)

S. aculeata Poir. (*S. exasperata* Kunth.)

Ad *S. pictam* Poir. *S. pachycarpa*, *leptocarpa*, *punctata*, *pubescens* Cand., *macrocarpa* Elliott. varr.

Ad *S. cannabinam* Poir. *S. paludosa* Jacqu. fil., *gracilis et affinis* Schrad. varr.

pag. 273.

Ad *Indigoferam.*

Post n. 9. *monophylla* Cand. 88. I. foliis obovatis mucronatis venosis incanis basi stipulatis, racemis folia superantibus, corollis leguminibusque rufo-villosis. *Nov. Holl.*

diphylla Vent. 89. I. foliis ovatis, altero terminali, laterali altero minori, racemis folia aequantibus, leguminibus oligospermis. *Afric. occid.*

Post n. 13. *peregrina* Cand. 90. I. foliolis oblongo-linearibus acutis supra pubescentibus subtus punctatis, floribus geminis axillaribus subsessilibus, leguminibus 4gonis. *Ind. or.* (*Lotus peregrinus* N. L. Burm.)

virgata Cand. 91. I. foliolis obovatis aristatis subcoriaceis supra glabris subtus pubescentibus, racemis subspicatis folia brevioribus, calycibus villosis. *Ind. or.*

pag. 274.

- Post n. 25. *Leschenaultii* Cand. 92. I. foliolis ovalibus obtusis, impari majori, racemis multifloris subsessilibus, leguminibus 4gonis. *Bengal.*
- † *timorensis* Cand. 93. I. foliolis obovato-oblongis canescentibus, racemis axillaribus petiolos aequantibus, leguminibus 4gonis. *Inf. Timor.*
- diversifolia* Cand. 94. I. foliolis oblongis canescentibus, terminali longiori, pedunculis paucifloris petiolos subexcedentibus, leguminibus deflexis pubescentibus. *Inf. Mascaren.*
- gracilis* * 95. I. caule diffuso ramosissimo glabriusculo; foliis ellipticis mucronatis supra glabris subtus strigillofis, stipulis subulatis, racemis paucifloris, leguminibus hirsutis reflexis oligospermis. *C. B. S.*
- complanata* Reichenb. 96. I. ramis ancipitibus, foliolis lanceolato-linearibus acutis subtus argenteis brevissime appressofrigillofis, racemis multifloris terminalibus, calycibus albis. *C. B. S.*

pag. 276.

- Post n. 48. *angulata* Lindl. 97. I. ramis angulatis purpureis foliolisque sub-4jugis ovalibus emarginatis glabris, racemis folia aequantibus. *Nov. Holl. Bot. reg.* 991.
- atropurpurea* Roxb. 98. I. foliolis ovalibus retusis pilosiusculis, racemis elongatis, leguminibus strictis mucronatis. *Ind. orient. Nepal.* (I. *Thibaudiana* et *leptostachya* Cand.)
- Dosua* Hamilt. 99. I. foliolis ovalibus retusis utrinque ramulisque dense rufo-pilosis, spicis axillaribus folio brevioribus, stipulis linearibus hispidis. *Nepal.*
- galeoides* Cand. 100. I. foliolis ellipticis mucronatis utrinque subpubescentibus, racemis folio brevioribus, leguminibus erectis strictis polyspermis. *Ceylon.*
- tephrosioides* Kunth. 101. I. foliolis alternis oblongo-linearibus obtusis aristatis subtus sericeo-strigosis, racemis longissime pedunculatis, leguminibus pendulis 4gonis oligospermis. *Quito.* Humb. nov. gen. 6. t. 580.
- truxillensis* Kunth. 102. I. foliolis oblongis obtusis mucronatis utrinque strigosis, ramulis ferrugineis, racemis subsessilibus multifloris folio brevioribus, leguminibus subfalcatis oligospermis. *Peru.*
- lespedezioides* Kunth. 103. I. foliolis spathulatis mucronatis strigillofis subtus glaucescentibus, racemis multifloris folia superantibus, leguminibus reflexis sub-8spermis. *Mexico.*
- humilis* Kunth. 104. I. procumbens sericea, foliolis oblongis acutiusculis rigidis, racemis paucifloris folia longe superantibus, leguminibus reflexis teretiusculis sub-2spermis. *Peru.*

pag. 277.

- Post n. 64. *heterotricha* Cand. 105. I. caule uncinato-setoso, foliolis obovatis mucronatis strigosis, racemis pe-

- dunculatis folia superantibus, leguminibus reflexis dupliciter pilosis. *C. B. S. Burchell.*
- astragalina* Cand. 106. I. caule erecto hispido, foliis 4jugis obovatis obtusissimis utrinque villosis subtus albidis, racemis folio brevioribus 4gonis hirsutissimis 2spermis. *Senegambia.*
- sessiliflora* Cand. 107. I. foliis sub-4jugis obovatis ramisque sericeis, spicis axillaribus sessilibus confertifloris folio brevioribus, leguminibus teretibus 4-6spermis. *Senegambia.*
- Perrottetii* Cand. 108. I. caule prostrato foliisque 4jugis obovato-oblongis subtus punctatis utrinque pubescentibus, racemis folio brevioribus confertifloris, leguminibus oblongo-teretibus oligospermis. *Senegambia.*
- Ad I. *senegalensem* Lam. I. *linearis* Cand. Neque I. *aspera* Cand. fatis distincta,
- Lagascae* Cand. 109. I. erecta, ramis teretibus foliisque 5jugis obovato-oblongis mucronatis subtus appresso-setosis, stipulis rufis scariosis, racemis pedunculatis folia superantibus, leguminibus reflexis. *Cheuchim* (mihi plane ignota).

pag. 279.

Ad *Galegam*.

- † *tricolor* Hook. 4. *G.* herbacea (?) pubescens, foliolis oblongis mucronatis oblique venosis, stipulis lanceolatis semisagittatis, racemis multifloris spicatis, floribus cernuis. *Nov. Holl.* Hook. exot. fl. t. 185.

Post *Güldenstädtiam* Fisch.:

NEVROCARPON DESV.

- simplicifolium* Kunth. 1. *N.* frutescens erectum, foliis simplicibus ellipticis emarginatis glabris subtus glaucescentibus, nervo venisque pubescentibus, pedunculis axillaribus bifloris. *Ad Orinocum.*
- macrophyllum* Kunth. 2. *N.* arborecens, foliis ternatis supra hirsutis subtus villosis, foliis subrotundo-ellipticis utrinque attenuatis, pedunculis axillaribus bifidis racemiferis. *Nov. Granat.*
- angustifolium* Kunth. 3. *N.* frutescens, foliis ternatis glabris ciliatis subtus glaucis, foliolis lineari-lanceolatis obtusis mucronatis, pedunculis axillaribus 1floris. *Nov. Granat.*
- guianense* Desv. 4. *N.* herbaceum glabriusculum, foliis ternatis subtus sericeis, foliolis lanceolatis mucronatis, pedunculis aggregatis 1floris abbreviatis. *Guiana.* (*Crotalaria guianensis* Aubl., *longifolia* Lam. Syst. 3. 241.)
- ellipticum* Desv. 5. *N.* herbaceum volubile, ramis ferrugineo-hirsutis, foliis ternatis subtus pubescentibus, foliolis oblongis, pedunculis 1floris. *Hispaniola.* (*Cli-toria rubiginosa* Juss. Pers.) Haec e *Guadalupa apetalam* misit Bertero. ? *Martia physalodes* Le-

andr. in *Brasil.* nec a Leandro nec a Schrankio
ficienter descripta.

falcatum Cand. 6. N. herbaceum volubile, foliis ternatis supra nitidis subtus ramisque hirsutis, pedunculis sub-3floris, leguminibus falcatis. *Hispaniola. Portorico.* (*Clitoria falcata* Lam. Syst. 3. 256.)

BRONGNIARTIA Kunth.

- mollis* Kunth. 1. Br. foliis 4jugis subtus ramisque villosis, foliolis ovato-ellipticis acutiusculis, pedunculis axillaribus geminis 1floris. *Nov. Hispan.* Legumen intus substantia spongiosa farctum. Humb. nov. gen. 6. t. 587.
- podalirioides* Kunth. 2. Br. foliis 2-5jugis utrinque appresso pilosis, ramis glabris, foliolis elliptico-oblongis mucronatis, pedunculis axillaribus geminis 1floris. *Nov. Hispan.* Corolla persistit. Humb. nov. gen. 6. t. 588.
- thermoides* * 3. Br. foliis multijugis ramisque sericeo-lanatis, foliolis oblongis obtusis mucronatis, pedunculis axillaribus subgeminis 1floris calycibusque hirsutis. *Nov. Hispan.* Corolla subpersistens: legumen abbreviatum. *Peraltea lupinoides* Kunth. in Humb. nov. gen. 6. t. 589.

Lotus subpinnatus Lag. del. Est enim *Anthyllis chilensis* Cand.

pag. 285.

Achyronia arborea * est *Carmichaëlia australis* R. Br.

pag. 291.

Ad *Phacam.*

Ph. floridana W. (*Glottidium* Desv. Cand.)

pag. 292.

Post n. 10. *densifolia* Sm. 19. Ph. decumbens ramosa laevis, foliis pinnatis multijugis obovatis emarginatis subtus villosis, stipulis ovatis concavis, racemis pedunculatis oblongis densis, leguminibus ovatis turgidis laeviusculis. *California.*

mollis Kunth. 20. Ph. diffusa tomentosa, foliis pinnatis multijugis oblongis obtusis utrinque sericeo-villosis, stipulis ovatis acutis, racemis longe pedunculatis compactis. *Mexico.*

Candolleana Kunth. 21. Ph. erecta pubescens, foliis pinnatis multijugis linearibus, stipulis vaginantibus, racemis paucifloris folio brevioribus, leguminibus elliptico-oblongis. *Mexico.* (*Ph. triflora* Cand.)

pag. 295.

Ad *Astragalum*.

- Post n. 85. *Aboriginum* Richardf. 222. A. suffruticosus erectus, foliis 6jugis lanceolato-linearibus incano-pubescentibus, racemis axillaribus laxis folia superantibus. *Amer. arctic.* Aborigines vefcuntur radicibus.

pag. 297.

- Post n. 56. *stipulatus* Don. 223. A. foliolis obovato-oblongis mucronatis glabris, stipulis maximis oblique cordatis, racemis spicatis tenuifloris folia subsuperantibus, leguminibus compressis cernuis. *Nepal.* Bot. mag. 2380.

pag. 299.

- Post n. 79. *macrorrhizus* Don. 224. A. foliolis ovalibus mucronatis subtus pubescentibus, stipulis connatis, pedunculis 3floris axillaribus folia excedentibus, leguminibus subulatis sericeis. *Nepal.*

pag. 301.

- Post n. 105. *succulentus* Richardf. 225. A. decumbens glabriusculus, foliolis ovalibus obtusis, stipulis triangularibus, spicis confertis pedunculatis folio brevioribus. *Amer. arctic.*

pag. 302.

- Post n. 113. *bidentatus* Kunth. 226. A. erectiusculus, foliolis lineari-oblongis emarginato-2dentatis glabris, stipulis vaginantibus, racemis compactis folia superantibus. *Amer.?* Humb. nov. gen. 6. t. 584.

pag. 304.

- A. *reptans* Humb. videtur varietas culta glabriuscula A. *strigulosi* Kunth.

pag. 305.

- Post n. 158. *nubigenus* Don. 227. A. foliolis ovalibus mucronatis dense pilosis, floribus solitariis subsessilibus, calycibus inflatis, leguminibus villosissimis. *Nepala.*

pag. 306.

- Post n. 171. *arcticus* * 228. A. subacaulis sericeus, foliolis ovali-oblongis, stipulis petiolaribus, fasciculis paucifloris, leguminibus erectis oblongis acuminatis. *Inf. Melwill.* (Oxytropis R. Br.)

pag.

pag. 310.

Ad *Kennediam* Vent.

Post n. 1. *cordata* Lindl. 7. K. foliis cordatis late ovatis acutiusculis, racemis multifloris. *Nov. Holl. Bot. reg.* 944.

K. *Comptoniana* Link., non *.

tabacina Labill. 8. K. foliolis ovato-oblongis mucronatis pilosiusculis, ramis retrorsum pilosis, racemis folia superantibus. *Nov. Caledon.*

Ad *Stylosanthen* Sw.

Post n. 1. *humilis* Kunth. 8. St. caule fruticoso ramofo hinc pubescente, foliolis oblongis ciliatis, stipulis hispидis, floribus aggregatis bracteatis, leguminibus reticulatis stylo uncinato terminatis. *Ad Orinoc.* Humb. nov. gen. 6. t. 594.

glutinosa Kunth. 9. St. caule herbaceo procumbente foliolisque oblongis glutinoso-pilosis, floribus axillaribus sessilibus solitariis. *Nov. Hispan.* Humb. nov. gen. 6. t. 595.

gracilis Kunth. 10. St. caule herbaceo erecto hinc pubescente, foliolis linearibus pubescentibus, stipulis hispидis, capitulis involucreatis, leguminibus glabris apice uncinato-aristatis. *Nov. Granat.* Humb. nov. gen. 6. t. 596.

pag. 311.

Ad *Zorniam* Mx.

thymifolia Kunth. 7. Z. fruticosa, foliis conjugatis oblongis subtus pubescentibus margine calycibus bracteisque glanduloso-punctatis, fructibus muricatis. *Mexico.*

pubescens Kunth. 8. Z. herbacea ramofo, foliis conjugatis oblongo-lanceolatis utrinque pubescentibus, bracteis ovatis punctatis ciliatis, fructibus 5-6-articulatis muricatis. *Ad fl. Magdalen.*

glochidata Reichenb. 9. Z. herbacea ramofo, foliis conjugatis linearibus, bracteis sagittato-ovatis 5nerviis ciliatis, fructibus glochidato-aculeatis. *Senegambia. Guiana.* (Z. *gracilis* Cand.)

dictyocarpa Cand. 10. Z. herbacea, foliis conjugatis lanceolatis, bracteis sagittato-ovatis acuminatis subglandulosis ciliatis, fructibus inermibus glabris reticulatis. *Nov. Holl.*

Z. *diphylla* Perf. in duas species a Smithio (Rees cyclop.) dirimitur, orientalem alteram, alteram occidentalem. Illa, Z. *angustifolia* Sm. distinguitur bracteis punctato-glandulosis et fructus aculeis retrorsum scabris. Haec Z. *reticulata* Sm. differt bracteis reticulatis eglandulosis et fructus aculeis glabris.

Z. *tetraphylla* Mx. (Myriadenus tetraphyllus Desv. Cand.)

Z. *pulchella* et *elegans* Perf. (Phyllodium Desv., Dicerma Cand.)

Ad *Hedyfarum*.

H. maculatum. Desmodium Perrottetii Cand. var.

Post n. 1. *Oliverii* * 129. *H. fruticosum* incano-pubescentibus, foliis orbiculatis mucronatis glaucis, racemis panicifloris laxis. Ad *Euphratem*. (*H. nummularifolium* Cand. in ann. sc. nat. 4. p. 102., *Taverniera nummularia* Cand. legum. t. 52.)

pag. 312.

H. spartium. (Taverniera Cand.)

H. biarticulatum. (Dicerma Cand.)

angustifolium Kunth. 130. *H. fruticosum*, ramis virgatis, foliis linearilanceolatis mucronatis subtus pubescentibus, racemis foliiteriis, bracteis ciliato-hispidis, lomentis 1-6-articulatis hispidulis. *Mexico*.

H. barbatum. (Nicolfonia cayennensis Cand. legum. t. 51.)

H. lappaceum Forsk. (Taverniera Cand.)

infractum * 131. *H. caule* angulato flexuoso-infracto, foliolis stipulisque ovatis acutis, racemis axillaribus simplicibus pubescentibus, lomentis glabris. *Mexico*. (Desmodium Cand.)

molliculum Kunth. 132. *H. suffruticosum* ramosum villosum, foliolis subrotundis mucronatis, terminali retuso, racemis laxifloris, lomentis uncinato-hispidulis. *Patria?*

venustum Kunth. 133. *H. suffruticosum* appresso pubescens, foliolis oblongo-ellipticis subtus sericeis glaucescentibus, racemis terminalibus sessilibus abbreviatis, calycibus barbatis, lomentis hispidiusculis. *Cumana*. (Nicolfonia Cand.)

rhombofolium Ell. 134. *H. herbaceum* pubescens, foliis rhomboideis obtusis subcoriaceis reticulato-rugosis, floribus paniculatis, lomenti articulis venosis pubescentibus. *Carolina*.

lineatum Mx. 135. *H. herbaceum* repens, ramis viridi-lineatis, foliis subsessilibus, foliolis subrotundis glabriusculis, racemis elongatis laxis parvifloris, lomenti articulis lenticularibus. *Carolina*.

Wade Vand. 136. *H. suffruticosum*, foliolis ovato-lanceolatis ciliatis, racemis oppositifoliis longissimis, pedicellis ternis, lomentis scabris 3-articulatis. *Brasil*.

Post n. 11. *tuberculosum* Labill. 137. *H. radice* tuberculosa, suffruticosum, foliis simplicibus ternatisque obovatis subtus pilosiusculis, stipulis 2-fidis cuspidatis, racemis erectis terminalibus aggregatis, lomentis pubescentibus. *Nov. Caledon*.

sambuense Don. 138. *H. fruticosum*, foliolis subrotundo-ovalibus mucronulatis villosis subtus canescentibus, stipulis lanceolatis mucronatis, racemis secundis, dente calycis superiori latiori emarginato. *Nepal*.

timorense * 139. *H. fruticosum*, foliolis rhombicis supra pubescentibus subtus incano-villosis, lateralibus multo minoribus, racemis plurimis paniculatis, leguminibus pubescentibus. *Inf. Timor*. (Desmodium Cand.)

gyroides Roxb. 140. H. fruticosum, foliolis ellipticis pilosiusculis, terminali maximo, racemis plurimis in paniculam dispositis, leguminibus hirsutis. *Ind. or.*

pag. 313.

H. *uncinatum* Jacq. (H. *caripense* Kunth.) H. *ancistrocarpon* Ledeb. var.

stipulaceum Sess. 141. H. caule erecto ramoso piloso, foliolis ovatis obtusiusculis, stipulis horizontalibus oblique ovato-lanceolatis acuminatis ciliatis, racemis terminalibus subpaniculatis. *Mexico.* (Desmodium Cand.)

Alamani * 142. H. caule erecto angulato ramoso foliolisque ovatis acutis glabriusculis, stipulis lanceolatis acuminatis patulo-reflexis, racemi terminalis pedicellis geminis, bracteis lanceolatis caducis, lacinia calycis inferiore elongata. *Mexico.* (Desmodium Cand.)

pag. 314.

H. *boreale* Nutt. per omnem *Amer. arcticam* crescit. H. *Mackenzii* Richardf. in Franklin's journ. p. 745.

pag. 315.

Post n. 46. *Razumovianum* Fisch. Cand. 143. H. caule erecto herbaceo, foliolis oblongo-linearibus utrinque subpubescentibus, spicis pedunculatis folia superantibus, alis calyce duplo longioribus carina dimidio brevioribus, lomenti articulis incanis reticulato-subrugosis. *Deserta Orenburg.*

altaicum Fisch. 144. H. caule erecto, foliolis elliptico-oblongis subtus appresse pubescentibus, spicis oblongis folia superantibus, alis calyce longioribus carinam subaequantibus, germinibus pubescentibus 2articulatis. *Imaus.*

venustum Fisch. 145. H. caule erecto, foliolis ellipticis utrinque appresse pubescentibus incanis, spicis oblongis folia subsuperantibus, alis calycem subaequantibus carina vexillum superante brevioribus, leguminibus villosis. *Ad Imaum.*

lasiocarpon Ledeb. 146. H. caule erecto, foliolis ovato-lanceolatis subpubescentibus, racemis elongatis axillaribus, bracteis pedicellos superantibus, carina vexillum alas aequans excedente, lomentis pilosis. *Imaus.*

rytidocarpon Cand. 147. H. caule ascendente, foliolis ellipticis obtusis subtus pubescentibus, racemis spicatis ovatis pedunculatis, alis calyce duplo longioribus, vexillo carinam superante, lomentis rugoso-reticulatis. *Sibir.*

splendens Fisch. 148. H. caule abbreviato, foliolis sub-3jugis ovatis argenteo-sericeis, pedunculis scapiformibus elongatis racemiferis, bracteis pedicellos excedentibus, alis calyce brevioribus, lomentis reticulatis sericeis. *Sibir.*

H. *Vespertilionis.* (Christia lunata Mönch., Lourea Vespertilionis Desv. Cand.)

pag. 316.

Post n. 57. *arboreum* Hamilt. 149. H. arborescens, foliolis ovalibus retusis ramulisque hirsutissimis, stipulis cordatis amplexicaulibus cuspidatis, racemis elongatis ebracteatis hirtis, laciniis calycis lanceolatis plumosis. *Nepal.* (*Erythrina arborescens* Roxb.)

H. *spirale* Sw. H. *tenellum* Kunth. var. ex *Amer. austr.*

Post n. 61. *Loureiü* * 150. H. herbaceum procumbens glabrum, foliis inferioribus simplicibus reniformibus, superioribus ternatis longe petiolatis, racemis terminalibus paucifloris. *China austr.* (H. reniforme Lour., *Lourea reniformis* Cand.)

pag. 317.

Ad H. *incanum* Sw. H. *cinereum* Kunth. var. e *Mexico.* Humb. nov. gen. t. 599.

Ad H. *supinum* Sw. H. *cajanifolium* Kunth. ex *Amer. austr.* Humb. nov. gen. t. 598.

Pryoni * 151. H. caule suffruticoso erecto glabriusculo, foliolis oblongis acutis supra glabris subtus ferriceis, lateralibus minoribus, racemis axillaribus folia excedentibus. *Ind. or.* (H. *viridiflorum* N. L. Burm.)

Roxburghii * 152. H. caule suffruticoso erecto tereti glabro, foliolis oblongis acuminatis supra glabris subtus appresse pubescentibus, stipulis lanceolatis, racemis terminalibus laxis, pedicellis elongatis subaggregatis. *Ind. or.* (*Desmodium diffusum* et *laxiflorum* Cand.)

floribundum Don. 153. H. fruticosum erectum, ramis 3gonis hirsutis, foliolis ovatis mucronatis subtus villoso-tomentosis, stipulis lanceolatis subulatis, racemis multifloris, pedicellis aggregatis. *Nepal.* (*Desmodium multiflorum* Cand.)

rufescens * 154. H. fruticosum, ramis teretibus rufo-villosis, foliolis ovato-ellipticis obtusis mucronatis supra glabris subtus pubescentibus, stipulis lanceolatis subulatis elongatis, racemis terminalibus paniculatis. *Ind. or.* (*Desmodium rufescens* Cand.)

concinnum * 155. H. fruticosum, ramis teretibus foliolisque obovatis mucronatis parallele venosis subtus pubescentibus, stipulis lanceolato-linearibus, racemis terminalibus, pedicellis geminis. *Ind. or. Nepal.* (*Desmodium concinnum* Cand.) D. paucinervium et *Leschenaaultii* Cand. varr.

H. *retroflexum.* (*Desmodium dubium* Lindl. in bot. reg. 967.)

H. *mauritanum* W. (*Desmodium trichocaulon* Cand. *Nepal.*)

laxum * 156. H. caule volubili 3gono glabriusculo, foliolis oblongis acuminatis subtus subpubescentibus, lateralibus semicordatis, medio basi attenuato, panicula terminali laxissima, pedicellis geminis. *Nepal.* (*Desmodium laxum* Cand.)

oxyphyllum * 157. H. caule fruticoso erecto tereti ramulisque subangulatis glabris, foliolis oblongis acuminatis

surtus pallidis laevibus, stipulis subulatis, paniculis terminalibus laxis, pedicellis aggregatis. *Nepal.* (Desmodium oxyphyllum Cand.)

- Adrians Labill.* 158. H. herbaceum ramosum glabrum, foliolis mucronatis venulosis, inferioribus ellipticis, superioribus oblongo-linearibus, racemis terminalibus laxis flexuosis, lomentis pilosiusculis. *Nov. Caledon.* (Desmodium spartioides Cand.?)

pag. 318.

- H. parvifolium* * non parviflorum. (*H. tenellum* Don.)

pag. 319.

- Post n. 97. *Ammoxylon* * 159. H. fruticosum erectum; foliis oblongis, utrinque attenuatis surtus ramulisque compressis incano-pubescentibus, stipulis minimis acutis, racemis lateralibus simplicibus. *Inf. Mascaren. Ceilon.* (Ornithopodium zeylanicum Burm. zeylan. t. 82., Bremontiera Ammoxylon Cand.)

- H. triquetrum.* Desmodium auriculatum Cand. var.

pag. 321.

Ad *Hedysara dubia.*

- dioecum* Don. 160. H. fruticosum, foliis ternatis, foliolis ovalibus obtusis coriaceis surtus glaucis pubescentibus, stipulis ovatis acutis, racemis axillaribus multifloris, floribus bracteatis dioecis. *Nepal.*

- rigidum* Ell. 161. H. caule erecto ramosissimo tomentoso, foliis ternatis, foliolis oblongis obtusis reticulatis pubescentibus, panicula ramosa, bracteis acuminatis. *Carolina.*

- Wallichianum* * 162. H. suffruticosum, ramis angulatis pubescentibus, foliis ternatis, foliolis ovatis acutiusculis utrinque sericeo-villosis, racemis subspicatis, bracteis villosis acuminatis flores superantibus. *Nepal.* (*H. retusum* Don., Desmodium angulatum Cand.)

- subspinosum* Filch. 163. H. suffruticosum erectum, foliis pinnatis incano-sericeis, foliolis ellipticis, ramis pedunculisque persistentibus spinosis, petiolis planiusculis, spicis pedunculatis folia superantibus. *Sibir.*

pag. 323.

Ad *Turpiniam* Pers.

- montevidensis* * 2. T. fruticosa, foliis abrupte pinnatis 2jugis glanduloso-punctatis, foliolis obovatis retusis, pedunculis aggregatis in racemum elongatum dispositis. *Monte Video.* (Pforalea tetraphylla Poir. Syst. 3. 201., Robinia glandulosa * Syst. 3. 248., Poiretia pforaleoides Cand.)

AMICIA Kunth.

- glandulosa* Kunth. 1. A. foliolis obovatis subemarginatis, vexillo obcordato, lomentis 5articulatis. *Quito*. Humb. nov. gen. 6. t. 600.
- Zygomeres* Cand. 2. A. foliolis obcordatis mucronatis, vexillo obovato, lomentis 2articulatis. *Mexico*.

PICTETIA Cand.

- squamata* Cand. 1. P. foliolis orbiculatis longe mucronatis, stipulis spinosis erectis, racemis laxis 3-7floris. *Inf. Carib.* (Robinia squamata Vahl. Syst. 3. 246.)
- aristata* Cand. 2. P. foliolis obovatis venulosis longe mucronatis, stipulis spinosis patulis, racemis laxis 3-7floris. *Hispaniola*. *Inf. Carib.* (Aeschynomene aristata Jacq. Syst. 2. 321.)
- obcordata* Cand. 3. P. foliolis obcordatis subtus recurvo-mucronatis, stipulis ovato-lanceolatis inermibus, racemis paucifloris. *Hispaniola*. Cand. legum. t. 47. f. 1.
- Desvouxii* Cand. 4. P. foliolis 1-2jugis approximatis oblongis utrinque attenuatis cuspidato-spinosis, stipulis spinosis rectis, pedunculis 1floris, leguminibus continuis. *Hispaniola*. (Robinia spiniifolia Desv.)
- ternata* Cand. 5. P. foliis ternatis spathulatis mucronatis, stipulis spinosis patulis, pedunculis 1floris. *Hispaniola*. Cand. legum. t. 47. f. 2.

pag. 325.

Ad Ornithopoda.

- Post n. 2. *roseus* Dufour. 6. O. procumbens villosus, foliis pinnatis, foliolis ovato-oblongis acutis, pedunculis folio longioribus apice foliatis, lomentis rectis compressis rostratis. *Sabuleta Aquitaniae*.
- O. *abracteatus* Brot., *repandus* Poir. et *scorpioides*. (*Astrolobium* Desv. Cand.)

pag. 327.

Ad Daleam.

- Post n. 11. *astragalina* Kunth. 25. D. fruticosa ramosissima, foliolis multijugis oblongo-lanceolatis acutis subtus pubescentibus glanduloso-punctatis, spicis oppositifoliis cylindricis, calycibus glandulosis hirsutis. *Quito*.
- ayavacensis* Kunth. 26. D. fruticosa, ramis villosis, foliolis 7-8jugis oblongis mucronatis subtus pubescentibus glanduloso-punctatis, spicis cylindricis oppositifoliis. *Quito*.

pag. 328.

- Post n. 20. *microphylla* Kunth. 27. D. fruticosa procumbens, foliolis 10jugis oblongis obtusis crassiusculis glabris

subtus glanduloso-punctatis, spicis oblongo-cylindricis, calycibus sericeis glandulosis. *Quito.*

pectinata
Kunth.

28. D. herbacea, foliolis multijugis linearibus acutiusculis complicatis glabris glanduloso-punctatis, spicis ovato-oblongis, calycibus sericeis glandulosis. *Mexico.*

C L A S S I S XVIII.

pag. 331.

Ad *Luhcae* W. characterem adde: Stamina exter. sterilia, vel in squamas 5 connata, vel basi tantum juncta crispata. (Haec sunt nectaria penicilliformia, quae igitur delenda.) Stigma 5lobum. Capf. 5locularis 5valvis medio septifera. Sem. 2seriata apice alata.

Apatelia Cand. delenda: est enim *Sauravia* W.

Archytea Mart. Cal. 5sepalus persistens. Pet. 5. Phalanges staminum 5. Antherae didymae 2loculares, loculis antice longitudinaliter dehiscentibus. Stylus simplex. Capf. 5locularis polysperma. Sem. linearia. *Tiliaceae.*

Schlechtendalia *. (Mollia Mart.) Cal. 5sepalus. Pet. 5. Phalanges staminum 5. Stigma simplex. Capf. 2locularis. Sem. 2seriata apice alata. *Tiliaceae.*

pag. 332.

Bubroma tomentosum * habitat et in *Java*. (Blum. flor. jav. p. 85.)

pag. 333.

Abroma fastuosum Salisb. (A. mollis Blum. *Java*.)

pag. 334.

Ad *Citrum*.

javanica Blum. 13. C. petiolis marginatis, foliis ovalibus obtusissimis crenulatis, fructibus oblongis: (pulpa amara.) *Java*.

pag. 336.

Ad *Melaleucam*.

Post n. 20. *uniflora* Hortul. 37. M. foliis oblongo-linearibus abbreviatis obtusis glaucis sub-inerviis punctatis patulo-recurvis glabris, floribus lateralibus sessilibus. *Nov. Holl.*

pag. 338.

Ad *Vellofiam*.

- V. candida* Mik. (*V. aloaeifolia* Mart., *tubiflora* Kunth. in Humb. nov. gen. 7. p. 155. *Radia tubiflora* Ach. Rich. Kunth. fyn. 1. p. 300.)
- asperula* Mart. 4. *V. scapo germinibusque scabris, foliis linearibus obtusiusculis ferrulatis. Brasil.*

pag. 340.

Ad *Lüheam* W.

- speciosa* W. 1. *L. foliis ovatis obtusis inaequaliter dentatis supra glabris subtus canescentibus, racemis terminalibus simplicibus paucifloris. Brasil.*
- candicans* Mart. 2. *L. foliis ovato-oblongis acuminatis argute serratis subtus incano-tomentosis, floribus solitariis. Mexico. (Alegria candida Sess. Syst. veg. 2. 582.?)*
- villosa* Mart. 3. *L. foliis late ovatis acutiusculis denticulatis utrinque villosis, floribus paniculatis. Brasil.*
- divaricata* Mart. 4. *L. foliis oblongis inaequilateris acutis inaequaliter serratis supra glabris subtus incanis, paniculae ramis divaricatis. Brasil.*
- paniculata* Mart. 5. *L. foliis subcordato-oblongis inaequaliter serratis supra pubescentibus subtus incano-tomentosis, floribus paniculatis. Brasil.*
- grandiflora* Mart. 6. *L. foliis ovato-oblongis acutis inaequaliter serratis supra pubescentibus subtus tomentosis, pedunculis racemosis bracteatis fusco-tomentosis, squamis stamineis discretis. Brasil.*

ARCHYTEA Mart.

- triflora* Mart. *Brasil. Arbuscula, foliis fasciculatis spathulatis acutiusculis glabris glaucescentibus, pedunculis 3floris.*

SCHLECHTENDALIA *.

- speciosa* * *Brasil. Arbor foliis alternis ovato-oblongis acutis repando-dentatis subtus lepidotis, floribus subcorymbosis albis. (Mollia speciosa Mart. nov. gen. t. 60.)*

pag. 341.

Ad *Hypericum*.

- H. bracteatum* Don. (*H. coriaceum* Blum. *Java.*)
- H. patulum* Thunb. (*H. javanicum* Blum. *Java.*)
- H. Lechenaultii* Cand. (*H. triflorum* Blum.)

pag. 346.

Post n. 67. *songaricum* Ledeb. 111. H. caule compresso, foliis cordato-ellipticis obtusis glaucis punctatis, calycibus acuminatis. *Ditio Kirgisorum.*

pag. 348.

H. elegans W. habitat et in *Bohemia ac Moravia.*

C L A S S I S XIX:

pag. 356.

Post n. 2699. *Grahamia* *. (*Graecmia* Hook.) Anthodium simplex polyphyllum reflexum. Rec. tuberculofum paleaceum. Pappus paleis 5 sinbriatis aristatis.

Lychnophora Mart. Anthodium imbricatum pauciflorum. Rec. nudum. Papp. duplex paleaceus, paleis interioribus lingulatis.

pag. 357.

Post n. 2725. *Monenteles* Labill. Anthodium duplici serie polyphyllum lanatum. Rec. nudum. Flosculi plerique ♀ graciles, unicus ♂ centralis. Pappus sessilis pilosus scaber.

pag. 358.

Post n. 2734. *Oligosporus* Cassin. Anthodium 5phyllum 3-5florum. Flores disci 4fidi, radii parvi 3fidi. Rec. nudum. Papp. 0.

pag. 359.

Dumcrilia Lag. idem genus ac *Jungia* L. fil.

pag. 362.

Post n. 2817. *Mataxa* *. Anthod. simplex polyphyllum. Rec. paleaceum. Sem. densissime lanata, coronula dentata.

pag. 370.

Ad *Cirsium pungens* * *Cnicus samniticus* Tenor. pertinere videtur.

pag. 372.

Cirsium anglicum Lobel. habitat et in *Palatinatu.*

Ad *C. ciliatum* M. B. pertinet et *C. ferrulatum* Ej. n. 47. ubi: ciliis deorsum decrefcentibus (non durefcentibus) legendum.

pag. 377.

C. rigens *. (Cnicus Lachenalii C. C. Gmel.)

pag. 385.

Ad *Carduum*.

† *fasciculiflorus* 45. *C. foliis* decurrentibus pinnatifidis nudiusculis, laciniis palmato-angulatis incisfis spinofis, floribus axillaribus feffilibus fafciculatis, calycis glabri fquamis spinofis appreffis. *Corfica*.
Viv.

Ad *C. carlinoidem* Gouan. *C. chrysacanthus* Tenor. Spinulae foliorum terminatae mucrone flavo valido. Gouan. illustr. p. 62.

pag. 398.

Ad *Centauream*.

Post n. 34. *Nuttallii* * 152. *C. caule* simpliciusculo glabro, foliis feffilibus oblongo-lanceolatis venofis, inferioribus denticulatis, superioribus integerrimis, floribus folitariis, fquamis calycis erectis pectinato-ciliatis. *Ditio Arcanfa Amer. bor.* (C. americana Nutt. in Journ. of Philad. 2. p. 117. Colla in act. taurin. vol. 31. t. 6.)

C. filiformis Viv. app. ad fl. corfic. magnopere dubia: forte varietas *C. maculofae* Lam.

pag. 425.

Ad *Chryfocomam*.

Ad *Chr. liburnicam* *. (Chr. Linofyris β . Sav. bot. etrusc. 3. p. 145.)

pag. 434.

Ad *Liatrim* Gärtn.

Post n. 20. *intermedia* Lindl. 21. *L. caule* humili paniculato pilofiusculo, foliis linearibus elongatis feabriusculis nervofis marginatis, pedunculis foliofis, fquamis anthodii rigidis fubfoliaceis appreffis. *Canada*. Bot. reg. 948.

pag. 437.

Ad *Vernoniam gracilem* Kunth. *V. flexuofa* Sims. in bot. mag. 2477. var.

V. trichocarpha * est *Lychnophora* Mart.

An et *V. dichocarpha* *? Character refpondet: habitus adverfatur.

pag. 449.

Post *Güntheriam*:

GRAHAMIA *.

- aromatica* * *Chili*. Herba annua ramosa glanduloso-glutinosa, foliis alternis lineari-lanceolatis dentatis, inferioribus pinnatifidis, pedunculis solitariis terminalibus, floribus flavis. (*Graemia aromatica* Hook. exot. fl. t. 189.)

LYCHNOPHORA Mart.

(Frutices alpêtres.)

- brunioides* Mart. 1. L. foliis lineari-lanceolatis acutis margine revolutis subtus tomentosis, floribus terminalibus sessilibus, anthodio villosa sub-3floro. *Brazil. Peru.* Mart. in Regensb. Denkw. 2. t. 4.
- ericoides* Mart. 2. L. foliis linearibus elongatis subflexuosis obtusiusculis margine revolutis subtus tomentosis, floribus terminalibus capitatis sessilibus, anthodio sub-3floro. *Brazil.* Mart. in Regensb. Denkw. 2. t. 5.
- Pinafter* Mart. 3. L. foliis linearibus obtusis viscidulis rugulosis margine revolutis subtus tomentosis, ramis tessellatis, capitulis globosis. *Brazil.* Mart. in Regensb. Denkw. 2. t. 6. (*Vernonia trichocarpha* Syft. 3. 437. prope ad hanc accedit.)
- villosissima* Mart. 4. L. foliis patentissimis linearibus elongatis obtusiusculis supra basi lanatis subtus ramisque tessellatis dense lanato-tomentosis, capitulis globosis lanatis. *Brazil.* Mart. in Regensb. Denkw. 2. t. 7.
- stavioides* Mart. 5. L. foliis subcordato-linearibus obtusiusculis patentissimis supra glabris margine revolutis subtus tomentosis, capitulis hemisphaericis lanatis. *Brazil.* Mart. in Regensb. Denkw. 2. t. 8.
- rosmarinifolia* Mart. 6. L. foliis subcordato-lineari-lanceolatis acuminatis patulis supra linea media villosis subtus revolutis ramisque tomentosis, capitulis multifloris, anthodio 1floro. *Brazil.* Mart. in Regensb. Denkw. 2. t. 9.
- hakeaefolia* Mart. 7. L. foliis spatulato-linearibus erectis mucronulatis subtus revolutis tomentosis, nervo dilatato, ramis pulvillato-tomentosis, capitulis globosis, anthodio 4floro. *Brazil.* L. *salicifolia* Mart. in Regensb. Denkw. 2. t. 10.

pag. 453.

Ad *Bidentem*.

- Post n. 26. *tenuifolia* Labill. 40. B. foliis pinnatifidis glabris, laciniis linearibus integerrimis, pedunculis 2fidis corymbosis, floribus radiatis, involucre anthodium acquante. *Nov. Caledon.*

pag. 457.

Ad *Ixodiam* R. Br.

Ammobium * 2. I. herbacea erecta ramosa, caule alato tomentoso, foliis lanceolatis decurrentibus, ramis 1floris. *Nov. Holl.* (*Ammobium alatum* R. Br. Bot. mag. 2459.)

Ad *Balsamitam* Desf.Post n. 5. *annua* Delil. 7. (*Tanacetum annuum* L. p. 486.)

pag. 474.

Gnaphalium candidans Kunth. (Gn. confanguineum Gaudich. *Inf. Falkland.*)

pag. 477.

Gnaphalium quintuplinerve Hamilt. (Gn. cynoglossoides Trevir. in nov. act. nat. cur. 15. p. 200.)

pag. 482.

Post *Gyneteriam* W.:

MONENTELES Labill.

spicatus Labill. 1. M. foliis decurrentibus oblongis ferratis subtus tomentosis, glomerulis spicatis. *Nov. Caledon.*

spicellatus Labill. 2. M. foliis decurrentibus lanceolatis obtusiusculis undulatis dentatis subtus incanis, floribus capitatis, squamis anthodii exterioribus nigris. *Nov. Caledon.*

pag. 492.

Artemisia saxatilis Kit. nuper et in *Alfatia* prope Colmariam inventa est. (C. G. Gmel. fl. bad. 4. p. 605.)

pag. 495.

Artemisia Sieversiana Ehrh. (A. Sacrorum Ledeb.?)

pag. 499.

Post *Cotulam*:

OLIGOSPORUS Cassin.

emarginatus Cassin. *Inf. Falkland.* Herba foliis imbricatis oblongis carnosis apice membranaceis bilobis, floribus solitariis sessilibus.

pag. 501.

Ad *Trixin* P. Br.

Post n. 7. *senecioides* Hook. 8. Tr. foliis amplexicaulibus pubescentibus, inferioribus oblongis sinuato-pinnatifidis, superioribus lanceolatis angulato-sinuatis,

pedunculis 2fidis erectis elongatis. *Chili*. Hook.
exot. flor. t. 101.

pag. 503.

Ad *Plaziam brasiliensem* *. (Augusta grandiflora Leandr. in act.
monach. 7. t. 14.) Tertia species dubia:

parviflora * 3. Pl. foliis oblongo-lanceolatis, floribus panicu-
latis. *Brasili*. (Augusta parviflora Leandr.)

pag. 504.

Ad *Nassaviam* Commerf.

Gaudichaudii 2. N. caule ramosissimo, foliis parvis imbricatis
Cassin. squarrosis lineari-lanceolatis spinoso-dentatis.
Inf. Falkland. (Mastigophorus Gaudichaudii Cas-
sin. in Dict. des scienc. nat. 34. p. 222.)

pag. 506.

Jungia ferruginea L. fil. (Dumerilia paniculata Cand.) Secunda
species est *J. axillaris* * (Dumerilia Cand.)

pag. 515.

Conyza pinnatifida Roxb. (Baccharis trifurcata Trevir. in nov. act.
nat. cur. 13. p. 201.)

pag. 524.

Ad *Inulam*.

Post n. 45. *caspica* Ledeb. 52. I. foliis amplexicaulibus cordato-
lanceolatis glabris margine denticulato-scabris,
pedunculis paniculatis villosis, squamis anthodii
linearibus squarrosis. *Ad Volgam*.

pag. 532.

Ad *Asterem*.

Post n. 96. *leptophyllus* Desf. 167. A. foliis linearibus glaberrimis,
superioribus filiformibus subsquamaceis, panicu-
lae corymbosae ramis squamulosis, squamis an-
thodii arcte appressis ovatis obtusiusculis. *Pa-
tria?*

pag. 537.

Post n. 155. *robustus* Nees. 168. A. caule glabro ramofo, foliis
omnibus amplexicaulibus oblongo-lanceolatis
ferratis nitidis, ramis 1floris foliosis, anthodio
laxo foliaceo, squamis lanceolato-linearibus
elongatis. *Putria?*

pag. 538.

Ad *A. laevigatum* W. del. syn. *A. glaucus* Nees.

pag. 546.

Ad *Cinerariam*.

- Post n. 8. *hypoleuca* Reichenb. 95. C. foliis ovatis fusco-denticulatis subtus petiolisque late marginatis dense niveo-lanatis, corymbo composito laxo terminali, anthodiis glabris. *C. B. S.*

pag. 549.

- Post n. 57. *venusta* Reichenb. 96. C. caule simplici foliisque glaucis glaberrimis, radicalibus longe petiolatis subcordatis angulatis, caulinis amplexicaulibus lanceolatis obtuse dentatis, pedunculis squamosis, squamis anthodii latiusculis. *C. B. S.*

pag. 551.

- C. Bergeriana* * mutetur in *Bergianam* *.

pag. 554.

Ad *Senecionem*.

- Post n. 26. *nervatus* Reichenb. 186. S. foliis subsessilibus lanceolatis utrinque attenuatis basi laciniato-subpinnatifidis ceterum integerrimis nervoso-venosis lineatis subtus tomentosis, corymbo composito terminali. *C. B. S.*

pag. 557.

- Post n. 69. *litoralis* Gaudich. 187. S. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis coriaceis, floribus subcorymbosis. *Ins. Falkland.*

pag. 559.

- S. montanus* W. cum *rupestri* Kit. jungatur.

pag. 560.

- Post n. 105. *fragrans* Fisch. 188. S. caule ramoso glaberrimo, foliis radicalibus petiolatis amplexicaulibus lyratis repando-dentatis, caulinis pinnatifidis linearibus revolutis, panicula corymbosa. *Sibir.?*

- Post n. 112. *difficilis* Dufour. 189. S. caule erecto lanato, foliis amplexicaulibus crassiusculis bipinnatifido-sinuatis, laciniis obtusis dentatis, pedunculis subcorymbosis lanatis, involucri anthodii glabri 0, squamis apice barbatis. *Hispan. Ann. des scienc. nat. 5. t. 11.*

pag. 561.

- S. lycopifolius* Poir. habitat in regno *Neapol.* (*Cineraria ceratophylla* Tenor.)

pag. 567.

- Arnica lanigera* Tenor. (*A. floccosa* Bertol.)

pag. 573.

Ad *Bellium*.

- crassifolium*
Moris. 3. *B. caespitosum*, foliis radicalibus petiolatis orbiculatis oleraceis integerrimis glaberrimis nerviis, scapo 1floro subpubescente. *Sardinia*.
- †*nivale*
Requien. 4. *B. foliis subspathulatis elongatis pilosiusculis*, scapo 1floro villoso, pappo 4aristato. *In cacuminibus montium Corsicae*.

pag. 577.

Ad *Verbesinam*.

- Post n. 17. *buphthalmoides* Link. 31. *V. caule suffruticoso decumbente*, foliis lanceolatis utrinque attenuatis dentatis triplinerviis scabris subtus ramisque hirsutiusculis, pedunculis elongatis 1floris. *Monte Video*. Link. et Ott. Abbild. t. 49.

pag. 585.

Ad *Pyrethrum*.

- Post n. 12. *diversifolium* Hook. 48. *P. caule subramoso pilis articulatis hirsuto*, foliis lanceolatis amplexicaulibus, inferioribus inciso-pinnatifidis in petiolum dilatatum decurrentibus, summis integerrimis, pedunculis 1floris, pappo paleaceo-aristato. *Nov. Holl.* Hook. exot. fl. t. 215.

pag. 590.

Post *Relhaniam*:

MATAXA *.

- capensis* * *C. B. S.* Suffrutex ramosus, foliis pinnatifidis carnosis glaberrimis, laciniis linearibus acutis, pedunculis 1floris. (Lanipila Burch. it. 1. p. 259. *Lafiospermum radiatum* Trevir. in nov. act. nat. cur. 13. p. 205.)

pag. 600.

Ad *Achilleam*.

- bifurcata*
Bivon. 65. *A. caule stricto simplici foliisque 2pinnatifidis amplexicaulibus viridibus sublanatis*, rhachi lata subdentata, laciniis approximatis lanceolatis, lacinulis incisus cuspidato-aristatis, corymbo compacto. *Sicil.?* Flores sulfurei.
- dentifera*
Reichenb.
(non Cand.) 66. *A. caule decumbente pubescente*, foliis subtripinnatifidis laxis teneris, rhachi subintegerrima, laciniis remotis patentibus, lacinulis linearibus abbreviatis acutis dentiformibus, corymbis laxo paniculatis, anthodio ovato. *Patriu?* Flores albi.

pag. 620.

- Millera biflora* L. ad *Delilium* * p. 674.

pag. 622.

Collaea procumbens *. (Sebastiania heterophylla Bertol. opusc. scientif. 4. p. 336.)

pag. 632.

Arctotis grandiflora Jacqu. mutetur in *A. Massonianam* * 26. A. foliis pinnatifidis denticulatis arachnoideis 3plinerviis, squamis anthodii exterioribus appressis, radio stramineo extus rubescente. *C. B. S.* Pristina phrasibus et synonyma deleantur.

pag. 634.

Crepis radicata Forsk. ad *Thurinciam* p. 666.

pag. 637.

Crepis tenuifolia W. (Cr. pulcherrima Fisch. Link.)

pag. 640.

Hieracium murorum. (H. Lachenalii C. C. Gmel.)

pag. 641.

Ad *H. glaucum* All. *H. bupleuroides* C. C. Gmel. var. *H. ramosum* Kit. (H. Mertini C. C. Gmel. fl. bad. 4. 591. *Franconia*.)

pag. 652.

Borkhausii Candollei * habitat in *Sicilia*. (*Crepis glandulosa* Guss.)

pag. 653.

Post n. 23. *Sardoa* * 26. B. caule ascendente foliisque runcinatis laevibus, caulinis paucissimis sagittatis, pedunculis solitariis elongatis, squamis anthodii glabris margine scariosis. *Sardinia*.

In distinguendis *Borkhausia* et *Leontodonte*, utpote eisdem characteres gerentibus, magnopere haereo, ni ad caulem foliatum *Borkhausiae*, scapum verò subflorum *Leontodontis* respiciatur. Ceterum *Leontodon salinus* Pollin. loco *Pollich.*, est *Sphalma*.

pag. 654.

Ad *Prenanthem*.

glomerata Reichenb. 45. Pr. caule suffruticoso, ramis virgatis fulcatis, foliis sessilibus oblongis coriaceis spinuloso-dentatis subtus reticulatis sublanatis, anthodiis sessilibus floccosis. *C. B. S.*

pag. 662.

Tragopon orientalis et in *Palatinatu* et ditone *badensi* habitat. (C. C. Gmel. fl. bad. 4. p. 579.)

pag.

pag. 664.

Picris lyrata Delil. ad Thrinciam p. 666.*Apargia hispida* W. (A. hirta C. C. Gmel. fl. bad. 3. p. 280.)

pag. 665.

Ad *Apargiam Villarzii* W. A. Rosani Cand.

pag. 666.

Ad *Thrinciam*.*caulescens*
Trevir.5. Thr. caule ramofo hispido, foliis radicalibus lyratis, caulinis cordato-lanceolatis. Ad *pyramidas Aegypti*. (Crepis radicata Forsk. Syst. 3. 634., *Picris lyrata* Delil. Syst. 3. 664.)

pag. 668.

Ad *Helminthiam*.*humifusa*
Trevir.2. H. caule prostrato glabro, foliis canlinis ovato-lanceolatis hispidis, involucri foliolis ovatis. *Patria?*

pag. 669.

Ad *Hypochoerin*.Post n. 7. *arenaria* Gaudich. 11. H. caule ramofo erecto, foliis pinnatifidis hispidulis, anthodio piloso. *Inf. Falkland.*

pag. 674.

Deliba Berteri *. (Millera biflora L. Syst. 3. 620.) Habitat et in *Cuba*.

C L A S S I S XX.

pag. 680.

Post n. 3000. *Gongora* R. et P. Sepala 3 exter. patentia aequalia, superius dorso columnae insertum, 2 interiora parva, margini columnae inserta, decurrentia. Labellum gibbosum vomeriforme acuminatum dentato-sinuatum. Columna subclavata.*Coelogyne* Lindl. Sepala patentia. Labellum cucullatum cum columna alata ultra antheram producta basi articulatum. Stigma 2labiatum infundibuliforme.Post n. 3009. *Notylia* Lindl. Sepala 4, inferius 2lobum labello suppositum. Labellum divaricatum unguiculatum integrum medio callosum. Columna libera teres acuminata. Anthera postica 1ocularis stigmati parallela.

Tribrachia Lindl. Sepala patentia, exteriora cum basi columnae connata, interiora nana. Labellum posticum integrum unguiculatum. Columna apice bicirrofa. Anthera terminalis opercularis.

pag. 681.

Post n. 3022. *Megachinium* Lindl. Sepala exteriora basi connata, superius maximum basi 2callosum, interiora nana. Columna plana lata abbreviata apice 2cuspidata. Labellum integerrimum cum pede columnae elastice articulatum.

pag. 682.

Post n. 3032. *Alamania* Laxarf. Sepala 6 nervosa subtus calcar mentientia. Labellum basi glandulosum. Columna 3cuspidata.

pag. 683.

Post n. 3049. *Gonyanthes* Blum. Cal. corollinus tubulosus 3dentatus. Antherae 3 ovaes fauci sub stigmatate insertae. Stigma 3lobum, antherarum auriculis adnatis. Caps. infera 3quetrailocularis. Sem. minuta aristata. *Cytineae*.

pag. 684.

Orchis laxiflora Lam. (O. Tabernaemontani C. G. Gmel. fl. bad. 3. p. 535.)

pag. 701.

Ad *Ophryn*.

Post n. 6. *canaliculata* Viv. 20. O. labello 3lobo canaliculato, lobo medio 2fido, lateralibus acuminatis hispidis, sepalis interioribus minimis hispidis, spica 3-4flora. *Corfica*.

pag. 704.

Ad *Limodorum*.

Post n. 6. † *sphaerochilos* * 11. L. calcare cylindrico germen aequante, labello rotundato undulato, sepalis erectis, scapo vaginato. *Corfica*. L. abortivo nimis affine. (L. sphaerolabium Viv.)

Pelexia adnata *. (P. spiranthoides Lindl. in Bot. reg. 985.)

pag. 719.

Ad *Vandam* R. Br.

Post n. 2. *recurva* Hook. 7. V. calcari obtuso germen subaequante, sepalis ovalibus concavis, labello 3dentato, racemis axillaribus pendulis, foliis alternis lanceolatis acutis. *China*. Hook. exot. fl. t. 137. (Sarcanthus rostratus Lindl. in bot. reg. 981.)

pag. 720.

Ad *Eulophium* R. Br.

- Post n. 6. *streptopetala* Lindl. 10. E. calcari conico abbreviato, lobo medio labelli rotundato emarginato, sepalis oblongis obtusis, interioribus basi tortis, scapo simplici racemifero, foliis lineari-lanceolatis nervosis. *Patria?* Bot. reg. 1002.

pag. 724.

Ad *Cymbidium*.

- Post n. 33. *stapelioides* Link. 59. C. labello 3lobo, lobo medio orbiculari, lateralibus erectis plica transversa antrorsum prominente tuberculoque longitudinali insignibus, sepalis acutis maculatis, scapo abbreviato decumbente sub-1floro, foliis oblongis nervosis. *Brasil.* Link. et Ott. Abbild. t. 52.

pag. 726.

Ad *Cataetum* Rich.

- criflatum* Lindl. 5. C. sepalis patentibus canaliculatis, interioribus tenuioribus, floribus laxe spicatis, labello multifido cristato, foliis oblongis utrinque attenuatis undulatis. *Brasil.* Bot. reg. 966.
- semiapertum* Hook. 6. C. sepalis late ovatis concavis patentibus subsecundis, labelli ore contracto integro, lateribus minute denticulatis, spica compacta foliis breviori. *Brasil.* Hook. exot. fl. t. 213.
- macracarpon* Kunth. 7. C. sepalis patulis oblongis acutis nervosis conformibus, labello emarginato rosellato, scapo paucifloro, capsulis grandibus pyriformibus 6costatis. *Ad Cayennam.* Humb. nov. gen. 7. t. 631.

pag. 727.

Ad *Colaccem* Lindl.

- aromaticus* * 4. C. labello 3lobo semicylindrico 2seriatim piloso, lobis lateralibus lanceolatis subserratis, medio duplici, super. brevi truncato, infer. spathulato apice recurvo ferrulato, scapo 1floro, bulbo pleiophyllo. *Mexico.* (Maxillaria aromatica Hook. exot. fl. t. 219.)
- parvulus* * 5. C. labello 3lobo obtuso venoso intus glandula longitudinali pilosa, sepalis lineari-lanceolatis, scapo 1floro, bulbo 2phylo. *Brasil.* (Maxillaria parvula Hook. exot. fl. t. 217.)

Post *Pleionem* Don.:

GONGORA R. et P.

- quinquenervis* R. et P. 1. G. labello 2dentato, sepalis exterioribus concavis, foliis lanceolatis 5nerviis. *Peru.*

atropurpurea 2. G. labello sub-7dentato, sepalis exterioribus planis, foliis oblongis nervoso-plicatis. *Inf. Trinit.* Hook. exot. fl. t. 178.

COELOGYNE Lindl.

fimbriata Lindl. *China.* Herba repens parasitica, bulbis ovalibus diphyllis, flore solitario diphylo, sepalis viridibus, labello fulvo fimbriato cristato. Bot. reg. 868.

pag. 728.

Ad *Oncidium* Sw,

Post n. 3. *Papilio* Lindl. 19. O. scapo ancipiti articulato paucifloro; sepalis superioribus linearibus longissimis, inferioribus distinctis ovato-lanceolatis undulatis, columna 2corni, alis fimbriatis, foliis solitariis ovalibus maculato-pictis. *Inf. Trinit.* Bot. reg. 910.

Post n. 12. *pumilum* Lindl. 20. O. panicula pyramidali erecta folia oblonga obliqua rigida subaequante, labello 3lobo cristato, alis columnae integerrimis, sepalis obtusis, superioribus maculatis. *Brazil.* Bot. reg. 920.

Post n. 16. *puber* Lindl. 21. O. labello panduriformi 2cristato, cristis dentatis, sepalis obovatis fasciatis, inferiori 2lobo, scapo ramoso, foliis lanceolatis nervosis. *Brazil.* Bot. reg. 1007.

pag. 729.

Cyrtopodium Woodfordii Sims. (C. glutiniferum Radd. Mem. di Modena, tom. 19. p. 221. t. 6.)

pag. 730.

Stelis micrantha Sw. melius sic: St. folio solitario oblongo obtuso coriaceo, floribus spicatis subsecundis 3quetris, sepalis interioribus apiculatis labello conformibus. Hook. exot. fl. t. 158.

Stelis ophioglossoides Sw. melius sic: St. foliis lanceolatis tenuibus obtusis apice recurvis in petiolum radicalem decurrentibus, floribus racemosis directione variis obsolete hexagonis, sepalis interioribus truncatis nanis. Bot. reg. 935.

pag. 731.

Post *Pleurothallis* R. Br.:

NOTYLIA Lindl.

punctata Lindl. (*Pleurothallis punctata* Lindl. in bot. reg. 759. Syst. 3. 731.)

multiflora Lindl. (*Pleurothallis sagittifera* Kunth. in Humb. nov. gen. 1. t. 91. Syst. ib.)

TRIBRACHIA Lindl.

pendula Lindl. *Senegambia*. Bulbi ovati 1phylli, folia subtus purpureo-maculata, scapus pendulus, flores spicati bracteati virescentes. Bot. reg. 963.

pag. 734.

Post *Ornithidium* Salisb.:

MEGACLINIUM Lindl.

falcatum Lindl. *Sierra Leone Afric. occid.* Bulbus oblongus diphyllus, foliis oblongis emarginatis 2plicatis, scapus spicifer, flores subsecundi rubro-variegati. Bot. reg. 989.

pag. 735.

Ad *Cattleyam* Lindl.

Loddigesii Lindl. 2. *C. diphylla*, floribus racemosis roseis. *Brazil*. Hook. exot. fl. t. 186.

Forbesii Lindl. 3. *C. diphylla*, pedunculis 2floris, bractea parva (non spathacea), floribus pendulis lurido-flavis. *Brazil*. Bot. reg. 953.

pag. 736.

Ad *Epidendrum*.

Post n. 14. *ellipticum* Graham. 31. *E.* caule ramoso, foliis distichis patentibus ellipticis obtusis, labello 3partito fimbriato, lobis lateralibus dilatatis, intermedio minori, sepalis patulis. *Brazil*. Hook. exot. fl. t. 206.

pag. 738.

Ad *Dendrobium* Sw.

Post n. 6. *Calceolaria* Hook. 24. *D.* caule erecto, foliis distichis linearibus carnosis, racemo laterali, sepalis ellipticis undulatis reticulatis, labello cucullato. *Ind. or.* Hook. exot. fl. t. 184.

pag. 739.

Dendr. pubescens Hook. pertinet ad *Octomeriam*.

pag. 742.

Post *Stenoglossum* Kunth.:

ALAMANIA Laxarf.

punicea Laxarf. *Mexico*. Herba parasitica e bulbillo diphylla, scapo spicifero, floribus puniceis. *Annal. des scienc. nat.* 3. p. 452.

pag. 743.

Ad *Calanthem firiatam* R. Br. pertinere videtur *Limodorum unguiculatum* Labill. nov. Caledon. t. 25.

pag. 744.

Ad *Octomeriam* R. Br.

- pubescens* * 3. (*O. Dendrobium pubescens* Hook. Syst. 3. 739.)
stellata * 4. *O. foliis lanceolatis acutis 5nerviis carnofis, sca-*
po spicifero sepalisque patentibus acuminatis ner-
vofis extus ferrugineo - pubescentibus, labello
3lobo, lobo medio elongato acuminato, laterali-
bus abbreviatis. Nepal. (Eria stellata Lindl. in
bot. reg. 904.)
- rosea* * 5. *O. bulbo elongato apice foliaceo, foliis petio-*
latis lanceolatis, spicis sub-3floris sessilibus. Chi-
na. (Eria rosea Lindl. in bot. reg. 978.)

pag. 746.

Cypripedium guttatum Sw. crescit et ad *Mosquam*. Fischer.

pag. 750.

Post *Rhopium* Schreb.:

GONYANTHES Blum.

candida Blum. *Java*. Herba parasitica tenera, scapo 4gono 3-4-
 flo. Annal. des scienc. nat. 3. p. 369.

pag. 754.

Aristolochia hastata Nutt. mutanda in *A. polyrrhizon* Plukn., cum
 prior *A. hastata* Kunth. p. 751. jam adfit.

C L A S S I S XXI.

pag. 761.

n. 3121. Ad *Ostryae* characterem adde: Flores ♀: sub squamis sin-
 gulis germina 2 hirsuta digyna.

pag. 762.

Post n. 3134. *Caperonia* Hilar. Flores monoeci s. dioeci. ♂ Cal.
 5fidus. Petala 5 cum staminibus 10 columnae in-
 ferta, quae deficit in floribus ♀. Stylus 3fidus,
 stigmatibus multipartito-stabellatis. Caps. 3cocca.

pag. 766.

Ad *Pothon*.

coriaceus 30. *P. foliis oblongis undulatis coriaceis venosis,*
Graham. nervo marginali, petiolis apice nodosis, scapo

teretiusculo foliis breviori, spadice cylindrico
spatham lanceolatam superante. *Brazil.* Hook.
exot. fl. t. 210.

- Harrisi*
Graham. 31. P. foliis lanceolatis acuminatis venosis, nervo
marginali, petiolis apice nodosis, scapo tereti-
usculo folia subaequante, spadice cylindrico spa-
tham lanceolatam reflexam subaequante. *Brazil.*
Hook. exot. fl. t. 211.

pag. 770.

Arun crinitum Ait. legit et in *Sardinia* Moris.

pag. 771.

Ad *Caladium* Vent.

- Post n. 19. *pedatum* Hook. 23. C. caulescens, foliis longe petio-
latis cordatis profunde 3partitis, lacinia superiore
maxima pinnatifida, inferioribus auriculatis inci-
sis, pedunculis petiolo brevioribus, spatha cucul-
lata involuta. *Brazil.* Hook. exot. fl. t. 206.

pag. 787.

Ad *Euphorbiam*.

- Post n. 23. *globosa* Sims. 210. E. erecta articulata, articulis ob-
ovatis tuberculatis, flore solitario terminali, ap-
pendiculis involucri palmatis. *Afric. austr.?* Bot.
mag. 2624.

pag. 795.

E. marginata Pursh. (E. variegata Coll. in act. taurin. vol. 31.
t. 7.)

pag. 798.

E. saxatilis Jacqu. (E. corfica Requien.)

pag. 800.

- Post n. 191. *papillosa* Hilar. 211. E. umbella papilloso-pubescen-
te, appendiculis involucri rotundatis, foliis ob-
longo-linearibus mucronulatis integerrimis lae-
vibus glaucis. *Brazil.*

pag. 808.

Ad *Caricem*.

- Post n. 24. *crisata* Schwein. 268. C. spica composita globosa ca-
pitata bracteata, spiculis inferne ♂, fructibus
ovato-lanceolatis rostratis alatis ciliato-ferratis
divergentibus squamas oblongo-lanceolatas ex-
cedentibus. *Pensylvan.*

pag. 811.

- Post n. 63. *muskingumensis* Schwein. 269. C. spiculis suboctonis
approximatis oblongis inferne ♂, bractea basi-
lari setacea, fructibus lanceolatis compressis bi-

dentatis alatis nervosis glabris squamas lanceolatas duplo superantibus, culmo 3quetro superne scabro. *Ad fl. Muskingum, receptum a fl. Ohio.* (C. arida Schweinitz et Torrey monogr. Caric. americ. in ann. of the Lyc. of N.York.)

pag. 812.

Post n. 80. *siccata* Dew. 270. C. spica composita, spicula terminali obtusa androgyna superne ♂, inferioribus subquaternis approximatis, bractea basilaris ovato-lanceolata, fructibus acuminatis 2fidis compressis nervosis margine scabris squamas lanceolatas subaequantibus. *Massachusetts, Amer. bor. Silliman's amer. journ. vol. 10. t. F. f. 18.*

pag. 815.

C. longifolia R. Br. melius infra post n. 237. collocatur.

pag. 816.

C. ariflata Dew. (C. Torreyana Dew. in Silliman's amer. journ. 10. p. 47.)

Post n. 125. *nigro-marginata* Schwein. 271. C. spicis ♀ binis ovatis sessilibus approximatis, culmis subternis, fructibus ovatis sub-3quetris rostratis 2dentatis pubescentibus squamam ovatam acutiusculam aequantibus, stigmatibus 3. *Pensylvania.*

pag. 817.

Post n. 126. *floridana* Schwein. 272. C. spicis ♀ subquaternis aggregatis ovatis sessilibus bracteatis, infima subremota, fructibus ovalibus basi attenuatis convexo-planis 2dentatis squamas cuspidatas aequantibus. *Florida.*

pag. 818.

Post n. 145. *Washingtoniana* Dew. 273. C. spicis ♀ distinctis oblongo-cylindricis erectis pedunculatis, fructibus ovalibus compressis utrinque attenuatis ore integro rostratis glabris squamas oblongas acutiusculas aequantibus, culmo 3quetro. *Nov. Hamptonia Amer. bor. Silliman's amer. journ. 10. t. D. f. 14.*

C. subulata Mx. (C. Michauxii Dewey.)

pag. 821.

Post n. 175. *Hitchcockiana* Dew. 274. C. spicis ♀ subternis pedunculatis erectis, floribus remotiusculis, fructibus inflatis striatis rostratis squamas mucronatas subaequantibus, culmo 3quetro foliisque scabro-pubescentibus. *Amer. bor. Silliman's amer. journ. 10. t. E. f. 15.*

Daviesii Dew. 275. C. spicis ♀ binis ternisve subapproximatis ovatis sessilibus paucifloris, infima saepe radicali

longe pedunculata, fructibus globoso-3quetris rostratis pubescentibus squamas ovatas subaequantibus, culmo decumbente. *Massachusetts Amer. bor.*

pag. 822.

Ad *C. conoides* W. Mühl. *C. blanda* Dew.

pag. 826.

Post n. 237. *longifolia* R. Br. ex n. 107. *C. spicis* ♂ binis, androgynis cylindricis nutantibus longe pedunculatis aggregatis, fructibus compressis nervosis 3gynis squamam ovatam aristatam aequantibus. *Nov. Holl.*

pag. 830.

Ad *Unciniam* Pers.

Macloviana Gaudich. 10. *U. spica* dense imbricata filiformi, squama infima longe aristata, fructibus oblongis planoconvexis villosis, culmo 3quetro laevi, foliis stric-
tis planis. *Inf. Falkland.*

pag. 831.

Ad *Scleriam* Berg.

Post n. 13. *capillaris* R. Br. 32. *Scl. culmo* 3quetro foliisque filiformibus canaliculatis retrorsum scabriusculis, panicula simplici rara nutante, floribus ♂ monandris, nucibus laevibus. *Nov. Holl.*

Scl. pygmaea Nees in Sieb. agrost. n. 108. eadem cum *Scl. tenui* Retz. videtur.

pag. 834.

Cnemidostachys salicifolia Mart. (*Microstachys ramosissima* Hilar.)

pag. 840.

Ad *Urticam*.

Post n. 58. *involuta* Sims. 112. *U. caule* ramoso hirsuto, foliis ovalibus 3nerviis crenatis lucidis ad apices ramorum congestis, paniculis sessilibus. *Inf. Carib. Bot. mag. 2481.*

pag. 841.

Post n. 79. *pellucida* Labill. 113. *U. suffruticosa*, foliis cordato-oblongis acuminatis crenato-dentatis sub-3plinerviis pellucido-punctatis subtus tomentosis, glomerulis paniculatis axillaribus folio brevioribus. *Nov. Caledon.*

pag. 844.

Ad *Böhmcriam* Jacqu.

Post n. 10. *repens* Nees. 30. *B. caule* repente ramoso foliisque oblongis obtusis serratis 3nerviis hirsutis, cymis 2fidis glomeratis axillaribus longe pedunculatis. *Brazil.*

pag. 846.

Post n. 29. *radicans* Mart. 31. B. caule basi radicante, foliis oblongis acutis apice ferratis 3nerviis subtus scabris, cymis brevissimis decompositis divaricatis axillaribus. *Brazil.*

pag. 847.

Ad *Bucum*.

† *coriacea** 8. B. spicis ♂ axillaribus breviter pedunculatis, antheris demum incurvis, floribus ♀ gemmaceis, stylo 2fido, foliis oblongis acuminatis basi obsolete 3nerviis. *Nepal.* (Pachysandra? coriacea Hook. exot. fl. t. 148.)

pag. 850.

Ad *Crozophoram* Neck.

Post n. 3. *peltata* Labill. 11. Cr. foliis spathulatis glabris integerrimis subglandulosis, floribus racemosis, bracteis ♂ peltatis. *Nov. Caledon.*

pag. 852.

Ad *Xanthium canadense* Mill. (X. occidentale Bertol. opusc. scientific. 4. p. 337.)

Ad X. *macrocarpon* Cand. (X. italicum Morett.)

pag. 853.

Ad *Myriophyllum*.

elatinoides Gaudich. 11. M. foliis quaternis pinnatifidis, superioribus lanceolatis subintegris, floribus dioecis, ♀ axillaribus. *Inf. Falkland.*

ternatum Gaudich. 12. M. foliis ternis, inferioribus capillaceo-pinnatifidis, superioribus oblongis integerrimis, floribus axillaribus, superioribus ♂ 8andris, inferioribus ♀. *Inf. Falkland.*

pag. 864.

Ad *Quercum*.

Qu. *bruttia* ac *Thomasi* Tenor. (in catal. sem. 1825.) rite collocari nequeunt, antequam penitus cognitae fuerint.

pag. 866.

Post *Codiaeum* Rumph.:

CAPERONIA Hilar.

castaneaefolia 1. (Croton castaneaefolius L. Syst. 3. 877.) Hilar.

palustris Hilar. 2. (Croton palustris L. Syst. 3. 877.)

cordata Hilar. 3. C. suffruticosa aculeata, foliis alternis cordato-ovatis spinuloso-ferratis hispidulis, floribus spicatis axillaribus dioecis. *Brazil.*

linearifolia
Hilar.

4. *C. suffruticosa* hispida, foliis linearibus acutis argutissime ferratis, floribus racemosis axillaribus. *Rio grande.*

pag. 879.

Ad *Acalypham.*

- Post n. 5. *australis* L. 59. A. spicis axillaribus solitariis basi ♀, involucri orbiculatis integerrimis, foliis oblongis obtusiusculis apice ferratis supra nitidis. *Brazil.* (A. *prunifolia* Nees. Mart.)

pag. 881.

- Post n. 27. *pruriens* Nees. 60. A. spica ♂ terminali solitaria, ♀ axillaribus pedunculatis, involucri 2floris orbicularibus dentatis, foliis rhombeo-ovatis obtuse ferratis ciliatis hirsutis. *Brazil.*

pag. 883.

- Post n. 52. *hirta* * 61. A. foliis ovato-oblongis aequaliter ferratis hirsutiusculis, petiolis cauleque simplici hirsutis, spicis ♂ filiformibus, ♀ terminali solitaria, involucrio 0. *Rio grande.* Sello.

- gracilis* * 62. A. foliis ovato-lanceolatis acuminatis arcuato-ferratis nervoso-venosis glabris, caule simpliciusculo, spicis ♂ filiformibus (subinde basi ♀) ♀ terminalibus aggregatis, involucrio 0. *Rio grande.* Sello.

pag. 887.

- Ad *Pinum canariensem* Sweet. adde: strobilis maximis ovato-oblongis. Cand. hort. genev. t. 1.

pag. 888.

Ad *Colymbeam* Salisb.

- C. angustifolia* Radd. opusc. scientif. 3. p. 411. e *Brazilia*, a *C. quadrifaria* Salisb. differre haud videtur. Sed altera species omissa est:

- excelsa* * 2. *C. foliis* confertis adnatis lineari-teretibus acutis incurvis. *Nov. Caledon. Nov. Holl. sub tropico Capricorni.* (*Dombeya excelsa* Lamb. pin. t. 39. 40. *Araucaria* R. Br. in Ait.)

- Ad *Thuia quadrangularem* del. Michel. et ponatur *Poit. et Turp.*

pag. 890.

- Typha minor* Sm. (T. elliptica C. C. Gmel. bad. 3. p. 603.)
T. angustifolia. (T. media C. C. Gmel. bad. 3. p. 602.)

C L A S S I S XXII.

♀ *Stephania* Lour. *Menispermis accensenda.* pag. 892.

pag. 895.

Post n. 3194. *Adriana* Gaudich. ♂ Cal. simplex 5partitus bracteatus. Cor. 0. Antherae apice appendiculatae.
♀ Cal. duplex 5partitus. Capf. 3cocca. Styli 3 2partiti.

pag. 899.

Ad *Stephaniam* Lour.

St. rotunda Lour. et in *Java*. (*Clypea corymbosa* Blum.)

discolor * 3. *St. foliis peltatis ovatis obtufiusculis mucronatis subtus incano-tomentosis, capitulis in umbellam axillarem dispositis. Java. (Clypea Blum.)*

venosa * 4. *St. foliis peltatis ovatis obtufiusculis mucronatis glabris subtus albicantibus, venis purpurascensibus, umbellis elongatis compositis axillaribus. Java. (Clypea Blum.)*

capitata * 5. *St. foliis peltatis ovatis acutis membranaceis, racemis axillaribus solitariis, receptaculis florum carnofis: Java. (Clypea Blum.)*

acuminata * 6. *St. foliis peltatis ovato-oblongis acuminatis subcoriaceis glabris, racemis axillaribus solitariis, receptaculis florum confertis. Java. (Clypea Blum.)*

tomentosa * 7. *St. tomentosa, foliis subrotundis obtufis mucronatis, corymbis dichotomis axillaribus folio brevioribus. Java. (Clypea Blum.)*

pag. 904.

Ad *Pistaciam*.

mexicana Kunth. 7. *P. foliis impari-pinnatis sub-8jugis subtus petiolisque pubescentibus, foliolis inaequilateris oblongis longe mucronatis, fructibus paniculatis subglobosis. Mexico. Humb. nov. gen. 7. t. 608.*

pag. 906.

Post *Styloceras* Adr. Juff.:

ADRIANA Gaudich.

tomentosa Gaudich. 1. *A. foliis 3-5lobis utrinque tomentosis, lobis dentato-crenatis. Nov. Holl.*

glabrata Gaudich. 3. A. foliis elliptico-oblongis integris Slobisque supra glabriusculis subtus tomentosis, lobis laciniato-crenulatis. *Nov. Holl.*

pag. 910.

Ad *Cissampelon*.

Post n. 5. *australis* Hilar. 23. C. foliis cordatis emarginatis mucronatis utrinque pubescentibus, floribus racemosis. *Brazil.*

monoeca Hilar. 24. C. foliis cordatis obtusis pilosis, floribus monoecis racemosis. *Brazil.*

gracilis Hilar. 25. C. foliis cordatis acutiusculis utrinque pubescentibus, floribus ♂ corymbosis. *Brazil.*

glaberrima Hilar. 26. C. foliis ovatis acutis nervosis glaberrimis, floribus ♂ corymbosis. *Brazil.*

litoralis Hilar. 27. C. foliis cordatis retusis subintegerrimis subtus villosis, racemis ♂ elongatis. *Brazil.*

communis Hilar. 28. C. foliis cordato-oblongis acutis integerrimis subtus tomentosis, floribus ♂ racemosis, ♀ glomeratis axillaribus. *Brazil.*

suborbicularis Hilar. 29. C. foliis suborbicularibus integerrimis subtus tomentosis, floribus ♂ corymbosis. *Brazil.*

subtriangularis Hilar. 30. C. foliis orbiculari-3angularibus integerrimis mucronatis pubescentibus. *Brazil.*

velutina Hilar. 31. C. foliis ovatis obtusis villosis, floribus ♂ corymbosis. *Brazil.*

pag. 911.

Post n. 21. *ebracteata* Hilar. 32. C. foliis subrotundo-rhombeis subintegerrimis subtus tomentosis, floribus ♀ axillaribus fasciculatis. *Brazil.*

C L A S S I S XXIII.

pag. 913.

Spixia Leandr.

♂ Bracteae duae. Perianthia 1phylla 4dentata terna inter pistilla. Stamina flosculi centralis 4, lateralis 2.

♀ Involucrum 1phyllum 2partitum deciduum. Bracteae duae oppositae 2partitae. Perianth. 0. Styli 4, stigmatibus peltatis. Caps. 4 pedicellatae 3loculares, loculis 2valvibus. Sem. arillata.

heteranthes Schrank. *Brazil.* Arbor ramosa, foliis alternis oblongis acutis repando-undulatis subtus ferrugineo-villosis, floribus axillaribus fasciculatis.

pag. 914. *Ad Parietariam.*

Post n. 6. *Soleirolii* * 11. P. caule repente radicante, foliis obliquis subrotundis pilosis, involucrio subnullo, floribus ♂ 4fidis, ♀ 8fidis. *Corfica.* (Helxine Requien.)

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

1833 2 1 3 4 5

[Faint, mostly illegible text at the bottom of the page.]

1857

A D

V O L U M E N I V .

CLASSIS XXIV.

AD SECT. I.

pag. 30.

Ad *Schizaeam trilateralem* Schk. pertinere videtur Sch. australis Gaudich. ex *Inf. Falkland.*

pag. 37.

Acrostichum mascarenense * loco mascarenensis.

pag. 59.

. 71 71 Ad *Polypodium*.

Post n. 185. *alpestre* Hopp. 216. P. fronde 2pinnata, foliolis lineari-lanceolatis pinnatifidis, laciniis obtusis acute ferratis, soris distinctis. *Alpestris German. austr.*

pag. 63.

Ad *Lomarian.*

robusta
Carmich.

44. L. frondis sterilis pinnis oblongo-lanceolatis acutiusculis integerrimis supra lanatis subtus rhachique paleaceis. *Inf. Acumae, Falkl.* (L. fetigera Gaudich. Pteris palmaeformis Thuars.)

antarctica
Carmich.

45. L. pinnis semioblongis obtusis integerrimis, terminali brevioris, indusiis inciso-erosis. *Inf. Acumae.* (*Acrostichum polytrichoides* Thuars.)

pag. 104.

Aspidium Wallichianum * mutetur in *A. Donianum* *, quod jam supra p. 96. adest *A. Wallichii* Hook.

pag. 126.

Ad *Cyatheam aculeatam* W. herb. *C. compta* Mart. Denkw. Rezensb. 2. 146.

Ad *C. hirsutam* Presl. *C. vestita* Mart. W.

phalerata
Mart.

18. *C. arborea* inermis, fronde 2pinnatifida glabra, foliolis lanceolatis acuminatis pinnatifidis, laciniis oblongis obtusis crenulatis. *Brazil.*

pag. 133.

Ad *Hymenophyllum.*

Post n. 36. *caespitosum* Gaudich. 47. H. fronde pinnata costa media rhachique pilosis, foliolis subimbricatis ovato-oblongis concavis integerrimis, stipite capillari hirsuto. *Inf. Falkland.*

A D S E C T. II.

pag. 137.

Dawsonia R. Br. Calyptra (non duplex) externe villosa, interne membranacea dimidiata.

pag. 145.

Gymnostomum involutum Hook. habitat et ad *C. B. S.*

Harrisonia Humboldtii * habitat et ad *C. B. S.*

pag. 147.

Hymenostomum cubense * est verus *Syrrhopodon*. Ergo servandum Schwägrichenii nomen.

pag. 154.

Ad *Grimmiam*.

Post n. 10. *Ecklonii* * 19. Gr. caule breviusculo subramoso, foliis oblongis acuminatis longissime piliferis, nervo apicem attingente, seta flexuosa, capsulae oblongae fulcatae operculo mucronato, dentibus peristomii subforatis. *Ad saxa in monte leonis, C. B. S.* Ecklon. Tela cellularis foliorum arcta subpunctata.

pag. 155.

Post n. 17. *albida* * 20. Gr. caule brevissimo simplici, foliis imbricatis concavis appresso-erectis ovatis acuminatis enerviis versus apicem diaphanis, capsula oblonga laevi. *C. B. S.* Ecklon.

crassa * 21. Gr. caule simplici abbreviato, foliis ovato-oblongis obtusis longe piliferis crassis subenerviis, seta elongata, capsulae oblongae operculo conico. *Ad montem leonis C. B. S.* Ecklon.

pag. 158.

Ad *Weisiam*.

Post n. 31. *tortilis* * 32. W. caule brevissimo simplici, foliis lineari-lanceolatis elongatis flaccidis nervosis integerrimis subpellucidis, capsulae oblongae erectae operculo conico subulato. *Ad montem diaboli C. B. S.* Ecklon.

Ad *Maschalocarpum*.

M. declinatus * habitat et ad *C. B. S.*

pag. 159.

Post n. 7. *Ecklonii* * 22. M. caule repente, ramis erectiusculis subincurvis, foliis lanceolatis acutis integerrimis,

nervo apicem attingente, seta elongata, capsula oblonga substriata, calyptra pilosissima. *Ad montem tabularum.* Ecklon.

M. intricatus * et *urceolatus* * habitat et ad *C. B. S.*

pag. 161.

Ad *Macromitrium.*

M. longirostre Schwägr. (*Orthotrichum amoenum* Hornsch. *Nov. Holl.* Sieber.)

M. clavellatum * et *acutifolium* Brid. habitant et ad *C. B. S.*

pag. 162.

Trematodon pallidifetus * Weisia Schwägr. restituenda.

Tr. pallidus * magnopere dubius. Ni genera multiplicentur, *Sclerodontium* Schwägr. restituendum.

pag. 163.

Ad *Dicranum.*

D. polypodioides Sw. habitat et ad *C. B. S.*

pag. 165.

Post n. 16. *dicarpon* Nees. 57. *D.* caule simpliciusculo dense radiculofo folioso, foliis ex ovata basi linearibus cuspidatis flexuosis argute ferrulatis, nervo apicem attingente, setis geminis longe vaginatis, capsulae curvatae operculo longe rostrato. *Nov. Holl.*

Post n. 19. *brachyphyllum* Hornsch. 58. *D.* caule erecto subramoso, foliis erecto-patulis ovato-lanceolatis pellucidis acutis albido-glaucis hinc opacioribus apice denticulatis enerviis, capsula subturbinata cernua. *Nov. Holl.* Cellulae foliorum parallelogrammae.

Sieberianum Hornsch. 59. *D.* caule erecto ramoso, foliis flexuosis lanceolatis cuspidatis integerrimis apice subtus scabris, nervo pellucidiori apicem subattingente, capsulae cylindricae basi productae cernuae operculo longe subulato. *Nov. Holl.*

pag. 166.

D. fasciatum Hedw. habitat et ad *C. B. S.*

pag. 170.

Trichostomum Barbula Schwägr. habitat et ad *C. B. S.* *Tr. convolutum* Brid. esse Weisiam Starkeanam Hedw. Schwägrichen.

Tr. indicum W. habitat et ad *C. B. S.*

pag. 171.

Tr. polyphyllum Schwägr. habitat et ad *C. B. S.*

pag. 172.

Tr. *Leucoloma* Schwägr. (Macrodon Auberti W. Arnott.)Ad *Didymodontem*.*D. pusillus* Brid. habitat et ad *C. B. S.*

pag. 173.

D. rigidulus Hedw. habitat in summo cacumine montis tabularis
*C. B. S.**capensis* * 18. *D.* caule brevissimo, foliis oblongo-lanceolatis
crassiusculis margine revolutis integerrimis mucronatis, nervo crasso apicem attingente, capsulae oblongae operculo subulato. *Ad montem tabularem C. B. S.* Ecklon.*D. squarrosus* Hook. habitat et ad *C. B. S.*

pag. 174.

Ad *Polytrichum*.*P. campanulatum* et *furcatum* Hornsch. esse *P. alpinum*, Schwägrichen.*P. appressum* Brid. Cilia bascos foliorum aliena videntur Schwägrichenio suppl. 2. p. 6.

pag. 178.

Ad *Barbulam*.*B. muralis* Timm. et *crinita* Schultz. habitant et ad *C. B. S.*

pag. 180.

conica * 29. *B.* caule brevissimo, foliis flexuoso-patentibus
lineari-lanceolatis integerrimis, nervo valido apicem attingente, capsulae cernuae cylindricae
fulcatae operculo conico. *In cacumine montis tabularis C. B. S.* Ecklon.

pag. 183.

Ad *Orthotrichum*.Post n. 22. *glaucum* * 34. *O.* caule simpliciusculo brevissimo, foliis oblongo-lanceolatis cuspidato-piliferis margine subincrassatis revolutis siccitate strictis, capsula subemersa fulcata, calyptra glabra. *Ad montem tabularem C. B. S.* Ecklon.

pag. 192.

Ad *Bartramiam*.Ad *B. pendulam* Hook. (*B. Sieberi* Hornsch., habitat et in *Nov. Holl.*)

pag. 193.

B. falcata Hook. nequaquam ad *B. uncinatam* Schw. pertinet. Est enim illa: *B.* caule erecto ramoso, ramis fasti-

giato - subverticillatis, foliis 4fariam dispositis ovato-lanceolatis tenuissime serrulatis secundis, nervo crasso apicem attingente, fetis caulem superantibus, capsulis glabris turgidis cernuis. *Tyrol. Funck.*

pag. 194.

Ad *Meesiam longisetam* Hedv. *Diplocomium hexastichon* Funck. crypt. n. 653.

M. dealbata Sw. habitat et ad *C. B. S.*

pag. 196.

Ad *Hookeriam* Sm.

Post n. 4. † *convoluta* * 33. H. caule vage ramoso, ramis curvato-involutis, foliis undique sparsis ellipticis obtusis integerrimis bistriatis, nervo obsoleto ad medium evanido. *In monte tabulari C. B. S. Ecklon.*

pag. 203.

Ad *Hypnum*.

Post n. 43. *clavatum* * 130. H. caule repente, ramis abbreviatis flexuoso-incurvis, foliis imbricatis ovato-lanceolatis falcato-secundis (luride flavis), seta subbasilari laevi, capsula subhorizontali clavata. *Ad montem diaboli C. B. S. Ecklon.*

pag. 211.

Bryum demissum Hook. esse *Meesiam*, Schwägrichen.

pag. 216.

Funaria hygrometrica Hedw. et *calvescens* Schwägr. copiosae ad *C. B. S.*

pag. 217.

Ad *Jungermanniam*.

Post n. 1. *Ecklonii* * 200. J. furculis repentibus ramosissimis, foliis distichis imbricatis amplexicaulibus orbiculatis integerrimis, auriculis clavatis appendiculatis, stipulis cordatis integerrimis emarginatis. *Ad radices arborum in monte diaboli C. B. S. Ecklon.*

nepalensis * 201. J. furculis erectiusculis ramosis, ramis patentibus, foliis distichis amplexicaulibus stipulisque orbiculatis integerrimis, auriculis alternis subclavatis. *Nepal. Kunze.*

J. nigricaulis Nees. habitat et ad *C. B. S.*

J. dilatata. (*Frullania minor* Radd.) *C. B. S.*

J. Tamarisci. (*Frullania major* Radd.)

globosa 202. J. ramis patentibus, foliis distichis semiverticilibus subrotundis, auriculis clavato-cylindri-

Meißner.

cis appressis, stipulis subrotundis 2lobis, furculis lateralibus globosis. *Ad corticem Chinae fuscae.*

pag. 218.

J. lobulata Hook. *Ad montem diaboli C. B. S.*

Post n. 14. *brunea* * 203. *J. furculis pinnatis bruneis, foliis confertis distichis patulis orbiculatis integerrimis, auriculis clavatis basi truncatis, stipulis 2fidis, laciniis cuneatis patentibus inciso-dentatis. In cacumine montis tabularis C. B. S.*

Post n. 18. *denticulata* Web. 204. *J. furculis repentibus ramosis, foliis remotiusculis alternis hyalinis oblique ovatis acutis denticulatis, auriculis cucullatis, stipulis subrotundis acute 2lobis. Ad Trichomanes rigidum.*

pag. 219.

Post n. 27. *conferta* Meisn. 205. *J. foliis imbricatis distichis subrotundis integerrimis, auriculis obtusis, stipulis reniformibus integerrimis remotiusculis. Ad corticem Chinae.*

pag. 221.

J. transversalis Sw. habitat et ad *C. B. S.*

pellucida Meisn. 206. *J. foliis subalternis subrotundis integerrimis tenerrimis pellucidis basi complicatis 1dentatis, stipulis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis. Ad filices Ind. occid.*

pag. 223.

Post n. 74. *tabularis* * 207. *J. furculis erectis simpliciusculis, foliis confertis subrotundo-ovatis integerrimis, stipulis ovatis 2fidis. Ad montem tabularem C. B. S. Ecklon.*

Ante n. 76. *retrospectans* Nees. 208. *J. furculis brevibus radiculosis, ramulis reflexis, foliis distichis adnatis subquadrato-ellipticis dentato-fimbriatis, stipulis 2fidis obfoletis. Nov. Holl.*

pag. 226.

Post n. 117. *formosa* Meisn. 209. *J. furculis ramosis, foliis distichis approximatis obovato-subrotundis hinc excisis integerrimis, auriculis spicato-conoidicis patulis. Martinica ad terram. Eximia et prope singularis species.*

pag. 229.

Ante n. 145. *ochroleuca* * 210. *J. furculis ramosissimis, ramis flexuosis incurvatis, foliis undique imbricatis adnatis hyalinis 2-3-4partitis, laciniis linearibus erectis repandis. Ad montem tabularem C. B. S. Ecklon.*

digitata Meisn. 211. J. foliis confertis amplexicaulibus cuneatis laciniatis, laciniis acutis divaricatis. *Ad corticem Chinae.*

pag. 230.

Post n. 160. *superba* Nees. 212. J. furculis erectis, foliis distichis subdecurrentibus semicordato-falcatis altero margine fimbriatis altero integerrimis. *Nov. Holl.*

longifolia Meisn. 213. J. foliis alternis adnatis lanceolatis elongatis apice laciniato-fimbriatis. *Amer. austr.*

pag. 231.

Post n. 170. *nervosa* * 214. J. furculis erectiusculis ramosissimis, ramulis convolutis, foliis undique imbricatis patulis oblongis obtusis integerrimis amplexicaulibus obsolete inerviis. *C. B. S. Ecklon. Linea magis pellucida longitudinalis pariter nervum simulat ac in J. albicante.*

pag. 233.

J. podophylla Thunb. habitat et in *Brazil.* (*Viviania Hymenophyllum* Radd.)

pag. 234.

Ad Marchantiam hemisphaericam. (*Duvalia rupestris* Nees in berl. mag. 8. p. 271.)

A D S E C T. III.

pag. 238.

Post n. 3371. *Leucogramme* Meyer. Lirellae simplices vel subramosae. Lamina prolifera canaliculata adnata longitudinaliter rumpens. Sporae e disco angustato propullulantes.

pag. 242.

Ad Mycoporum Meyer.

Mclino stigma Meyer. 2. M. crusta cinereo-nigricante, verrucis planis atris, ostiolis flavescens. *Brazil.*

Ad Ocellulariam Meyer.

sphaerica Meyer. 8. O. crusta cartilaginea glabriuscula lutescente, verrucis hemisphaericis fulvis, ostiolo marginato. *Ad cortices Brazil.*

pag. 248.

Ad Trypethelium.

deustum Meyer. 13. Tr. crusta albida pulverea effusa, verrucis subconfluentibus rugulosis atris sporangiisque cinereis. *Brazil.*

pag. 254.

Post *Asteriscam*:

LEUCOGRAMME Meyer.

- conferta* Meyer. 1. L. crusta albido-virescente glabra gyrosa, lirellis confertis. *Ad cortices Brasil.*
- turgida* Meyer. 2. L. crusta albido-pallente, lirellis sparsis elevatis elongatis simplicibus flexuosis. *Ad cortices Brasil.*
- carnea* Meyer. 3. L. crusta pallide virescente glaberrima contigua, lirellis sparsis ramosis curvatis extus albidis intus carneis. *Ad cortices Brasil.*
- serpentaria* Meyer. 4. L. crusta inaequabili colliculosa pallide olivacea, lirellis sparsis flexuosis extus albidis intus nigricantibus. *Ad cortices Brasil.*
- plicata* Meyer. 5. L. crusta glabra nivea, lirellis abbreviatis ovali-oblongis concoloribus turgidis margine plicatis. *Ad cortices Brasil.*
- radaccensis* Meyer. 6. L. crusta glabra limitata flavida, lirellis flexuosis turgidis albidis interruptis. *Ad cortices insul. Molucc.*

pag. 255.

Ad *Platygrammen* Meyer.

- fussulta* Meyer. 7. Pl. crusta pallide albida limitata glabra, lirellis irregularibus subramosis immeris interruptis atris. *Ad cortices Brasil.*

Ad *Glyphin* Ach.

- repens* Meyer. 3. Gl. crusta alba effusa pulverulenta, pulvillis difformibus confluentibus, lirellis subrotundis brunneis latentibus. *Ad cortices Brasil.*

pag. 262.

Ad *Lecideam palmicolam* * (L. parmelioides Kunth.)

pag. 263.

Ad *Lecideam crofam* * *Gyrophora rugosa* Kunth. pertinere videtur.

- porphyrea* Meyer. 103. L. thallo membranaceo glabriusculo margine suberoso ciliato supra ruberrimo papilloso subtus nigricante lacunoso, patellis margine tumidis rugulosis. *Ja monte tabulari ad C. B. S.*

pag. 271.

Ad *Cladoniam* Hoffm.

- Post n. 10. *terebrata* * 39. Gl. thallo subnullo, podetiis elongatis ramosissimis fragilibus virescenti-spadiceis per-tusis, ramulis brevibus nitidis furcatis, tuberculis truncatis fuscis aggregatis. *Ad terram Nov. Holl.* (Genomyce *terebrata* Laur.)

pag. 276.

Ad *Parmeliam* Ach.

- Post n. 3. *Celastris* * 246. P. thallo caespitoso erecto ramoso pallide flavicante, ramulis capillaribus abbreviatis, scutellis planiusculis luteis pallidius marginatis. *Ad ramos Celastris pyracanthae. C. B. S.*

pag. 277.

- Post n. 17. *Humboldtiana* * 247. P. thallo caespitoso erecto luteo-virescente, ramis teretinseulis obtusis complicatis lacunosis, scutellis subconcoloribus. *Ad Orinocum. (Dufourea tortuosa Nees in horis berol. t. 5. f. 2.)*

pag. 278.

- Post n. 23. *Ecklonii* * 248. P. thallo longissimo ramoso albido laevi, ramis linearibus, ultimis capillaribus, scutellis lateralibus carneis marginatis. *In sylvis ditionis Uitenhagen Afric. austr. Ecklon.*

pag. 280.

- Post n. 45. *Sieberiana* Laur. 249. P. thallo tenerissimo suberecto flavissimo subtus albo, ramis linearibus subpinatifidis intricatis ciliatis, scutellis sparsis aurantiis margine nudis. *Ad cortices Nov. Holl.*

- Ad *Parmeliam atlanticam* Ach. meth. Lichen atlanticus Engl. bot. 1715. a Borrero in Angliae rupibus inventus differt colore cinereo-virescente.

pag. 281.

- Post n. 54. *involutrata* Meyer. 250. P. thallo erectiusculo candido, laciniis applanatis longe fimbriatis subtus farinosus apice tumidiusculis, scutellis terminalibus concavis bruneis longe fimbriatis. *Brazil.*

pag. 283.

- Post n. 74. *concolor* * 251. P. thallo foliaceo lobato imbricato supra glabro virescente pallido subtus laevi livide lutescente, laciniis obtusis crenatis, scutellis concavis subvirescentibus demum fusco-nigricantibus, margine crasso crenulato. *C. B. S.*

- Post n. 76. *crinita* Meyer. 252. P. thallo foliaceo utrinque albido glabro, laciniis divaricatis apice dilatatis longe atro-fimbriatis, scutellis lateralibus planis basiis atro-fimbriatis. *Brazil.*

pag. 284.

- Post n. 81. *Deweyana* * 253. P. thallo orbiculari pallido glabro subtus livide bruneo glabriusculo, laciniis rotundatis sinuato-lobatis, scutellis concavis sulcis crasse marginatis. *Massachusetts Amer. bor.*

phyllocarpa Meyer. 254. P. thallo membranaceo glabro reticulato-lacunoso glauco-virente subtus ochraceo-pallido, scutellis planis fusco-rubris, margine foliaceo amplo lacero. *Brasil.*

pag. 285.

Post n. 95. *propinqua* Laur. 255. P. thallo orbiculari pallido rugosiusculo subtus albido, fibrillis raris fuscescentibus, laciniis lobatis eroso-dentatis, scutellis planiusculis membranaceis spadiceis, margine tenui granulato. *Ad saxa nov. Holl.*

pag. 286.

Post n. 105. *limbata* Laur. 256. P. thallo orbiculari sulfureo laevigato subtus fuscescente nitido, fibrillis longiusculis nigro-fuscis, laciniis linearibus convexiusculis dichotomis truncatis nigro-marginatis, scutellis centralibus spadiceis planiusculis, subtus ciliato-fibrillosis, margine tenui crenulato. *Ad saxa nov. Holl.*

pag. 287.

Ad *Parmeliam plicatilem* Ach. meth. *Collema olivaceum* Kunth.

pag. 289.

Post n. 123. *coniocarpa* Laur. 257. P. thallo membranaceo albidoglaucescente subtus nigro fibrilloso, lobis elevatis rotundatis incisif, margine crispo involuto albido pulverulento, scutellis concavis rufis, margine crasso pulverulento. *Ad arbores nov. Holl.*

Post n. 125. *fuscescens* Kunth. 258. P. thallo orbiculari cartilagineo-membranaceo tenuissime rugoso glaucofuscescente subtus nigro laevi, lobis incisif rotundatis flexuosis integerrimis, scutellis amplif concavis rufis, margine inflexo integro. *Ad alpes Amer. austr.*

pag. 290.

Ad *Parmeliam bullatam* Ach. meth. *Collema venustum* Radd.

cymbalifera Meyer. 259. P. thallo foliaceo membranaceo subdiaphano glauco-olivaceo, lobis erectiusculis reticulatis undulato-crispis, granulis marginalibus copiosis flavidis, scutellis solitariis concavis rufis, margine crasso crenulato. *Brasil.*

pag. 292.

Parmelia astroidea Hornem. deletur, jam supra p. 282. obvia.

pag. 293.

Post n. 165. *chryfocarpa* Meyer. 260. P. thallo appresso diffuso albo papillato-granuloso, scutellis concavis

disco olivaceo-fuscis, margine tumido integerrimo croceo. *Brasil.*

lugubris Meyer. 261. P. thallo radiofo lobato circinato fusco-aeneo supra glabro subtus protothalloque ambeunte aterrimis fibrillofo-tomentosis, lobulis crenatis margine albidis, periphericis dilutioribus, scutellis planis fuscis, margine tenui. *Brasil.*

pag. 294.

Post n. 172. *sanguinolenta* Meyer. 262. P. thallo effuso granuloso intus puniceo supra flavescente, scutellis planiusculis cruentis, margine puniceo integerrimo. *Ad arbores Brasil.* (P. erythrocarpa Meyer Entw. p. 16.)

pag. 298.

Post n. 209. *accruiata* * 263. P. crusta tenui laevigata sulfureo-virescente, scutellis convexiusculis rufo-fuscis, margine tumido flavo. *Ad arbores Brasil.* (Lecanora acervulata Radd.)

pag. 303.

Ad Stictam Schreb.

Hessiana Meyer. 25. St. thallo subcoriaceo lobato ochraceo-fuligineo supra glabro subtus celluloso, cyphellis albis, lobis undulato-crispis obtusis margine farinaceis. *Ad C. B. S.*

Ecklonii * 26. St. thallo membranaceo lobato supra glabro pallido subtus fusco aspero, laciniis rotundatis crenatis, scutellis fusco-nigricantibus rubromarginatis. *Ad montem diaboli C. B. S.*

rufa W. Kunth. 27. St. thallo latissimo glauco-rutilante subtus fusco-tomentoso, laciniis rotundatis sinuato-incisis margine nudis, forediis lateritiis, scutellis sparsis planis fusco-rubris, margine concolore tenuissime crenulato. *Cumano.*

Humboldtii Hook. Kunth. 28. St. thallo cinereo-fuscescente utrinque dense hirsuto subtus pallidiori, lobis rotundatis, forediis concoloribus, scutellis sparsis nigro-fuscis, margine thalode villoso. *Ad cortices nov. Granat.*

Floresiana Laur. 29. St. thallo helvolo-virente lacunoso rugoso subtus fusco-tomentoso, forediis minutissimis pallidis, laciniis pinnatifidis linearibus apice 2fidis, scutellis marginalibus nigro-fuscis. *Nov. Holl.*

aspera Laur. 30. St. thallo lurido-virescente, forediis albis et fibrillis exasperato subtus ferrugineo-atro tomentoso, cyphellis planiusculis niveis, laciniis dichotomis subpinnatifidis apice repandis, scutellis marginalibus planiusculis nigro-fuscis, margine crenato. *Inf. Mascaren.*

dissecta Laur. 31. St. thallo cervino-olivaceo scrobiculato sinuato-laciniato subbipinnato subtus fusco-tomentoso, laciniis linearibus retusis, forediis minimis

albis, scutellis marginalibus minutis rufis, margine integro. *Nov. Holl.*

- glaberrima* Laur. 32. St. thallo caespitoso ascendente cinnamomeo utrinque laevi laciniato sinuato, laciniis sublinearibus retusis, cyphellis pallidis. *Inf. Mascaren.*

pag. 306.

Ad *Peltigeram* Hoffm.

- Post n. 17. *Flörkeana* * 18. P. thallo lobato glauco subtus spongioso-tomentoso nigrescente, lobis rotundatis, scutellis rufis. *Inf. Mascaren.* (*Peltidca* Laur.)

pag. 310.

Ad *Sphaerophoron* Pers.

- australe* Laur. 5. Sph. thallo dichotome ramoso fibrilloso nitido livide fuscescente subtus pallido compresso, capitulis subglobosis. *Nov. Holl.*
- insigne* Laur. 6. Sph. thallo ramoso nudo plano ruguloso glabro pallide virescente subtus pallido, capitulis compressis. *Nov. Holl.*
- tenerum* Laur. 7. Sph. thallo erecto ramoso nudo albo, ramis teretibus divaricatis fibrillosis, capitulis minutis atris. *Nov. Holl.*

A D S E C T. IV.

pag. 313.

- Post n. 3435. *Rhodonema* Martens. Frons tubulosa continua ramula cartilaginea rosea. Capsulae laterales pedicellatae.

pag. 327.

- Zonaria Kunthii* Ag. habet potius lacinias lanceolatas obtusas undulato-repandas.

pag. 330.

- Ad *Lemaneam torulosam* Ag. (*Conferva pistrinaria* Pollin.)

pag. 345.

- Ad *Charam asperam* W. Ch. *hirta* Meyen.

- Ad Ch. *gracilem* Sm. Ch. *barbata* Meyen.

pag. 346.

- Ad *Charam flexilem*. Ch. *Brauniana* C. C. Gmel.

pag. 360.

- Ad *Zygnema stellatum* * (*Conferva quadrigranulata* Pollin.)

pag. 361.

Ad *Bangiam* Lyngb.

- † *aeruginosa* * 9. B. implexa tomentosa aeruginosa, filis duplicibus, aliis majusculis granulorum triplici serie, aliis minoribus dichotomis. *In terra Javae.* (Dichonemia aeruginosa Fr. Nees in nov. act. nat. cur. 13. t. 2.)

pag. 362.

Ad *Oscillatoriam* Vauch.

- † *Cortii* Pollin. 21. O. filamentis simplicibus viridibus flexuosis acutis. *In thermis Aponensibus.* (Pollin. sulle alghette nelle terme euganee: Bibliot. ital. 7. f. 4.)
- duplifecta* Poll. 22. O. filamentis simplicibus subfuscis, striis remotiusculis duplicatis. *In thermis Aponensibus.* (Ib. f. 3.)

pag. 364.

Ad *Vaucheriam dichotomam* Ag. (Conferva fontinalis Pollin.)Ad *V. terrestrem* Gand. (Conferva intexta Pollin.)

- † *aponina* * 14. V. ramosissima viridis, ramulis tenuissimis capillaribus hyalinis. *In thermis Aponensibus.* (Merizomyria Pollin. sulle alghette: Conferva aponina Pollin. flor. veron.)

pag. 368.

Post *Soleniam* Ag.:

RHODONEMA Martens.

elegans Martens. *Ad litus venetum.*

A D S E C T. V.

pag. 396.

Sphaeria punicea Schmidt. non Schw.

pag. 405.

Ad *Sphaeriam macularem* Fr. Xyloma concentricum Perf. Depazea frondicola Fr.

- Post n. 351. *hederaecola* * 361. Sph. peritheciis conglomeratis molliusculis nigrescentibus macula alba ambitu fuscescente cinctis. *Ad folia Hederac.* (Sph. Depazea hederaecola Fries.)

pag. 409.

Ad *Alphitomorpham pannosam* Wallr. Eurotium Rosae Grev. p. 525.

pag. 424.

Agaricus luridus Perf. mutetur in *A. fuscum* Schöff. addito *Perfoonii* synonymo.

pag. 426.

Agaricus cretaceus Perf. mutetur in *A. cimolium* * addito Perfoonii synonymo.

pag. 431.

Ad *A. emeticum* Schöff. ponatur *Ruffula lurida* Perf.

A. fragilis Perf. mutetur in *A. thraustum* * addito Perf. syn.

pag. 453.

A. pusillus Fr. mutetur in *A. nanodem* *, addito Friesii syn.

pag. 463.

A. semiglobatus mutetur in *A. subglobosum* Alb. et Schwein.

pag. 473.

Ad *Boletum*.

Post n. 39. *Katui* Ehrenb. 125. B. infundibuliformis membranaceus laevis nitidus supra zonatus fusco-ruber, poris minimis pallidis. *Nov. Hispan. Java. Inf. Molucc.*

Post n. 41. *rugosus* * 126. B. pileo subrotundo repando rugoso obsolete zonato nigricante coriaceo subtus velutino, poris minutissimis, stipite excentrico subramoso. *Java. (Polyporus Fr. Nees.)*

spathulatus Kunth. 127. B. pileo convexo late obovato fulvo, poris minutis subangulatis, stipite laterali crasso elongato. *Peru.*

gibbosus * 128. B. pileo lignoso tuberculato fusco-nigricante, poris minutis, stipite elongato crasso toruloso concolori. *Java. (Polyporus gibbosus et Cochlear Fr. Nees.)*

luteus * 129. B. pileo rigido tenui glabro lutescente, poris minutis stipiteque basi dilatato subconcoloribus. *Java. (Polyporus Fr. Nees.)*

affinis * 130. B. pileo tenui glabro coriaceo dilute castaneo subzonato margine albido, poris minutissimis alutaceis, stipite tenui glabro fusco. *Java. (Polyporus Fr. Nees.)*

pag. 474.

Post n. 50. *Pifachapani* * 131. B. pileo digitato elongato nigro-ferrugineo, poris minutis, stipite tereti. *Java. (Polyporus Blum. et Fr. Nees.)*

Lingua * 132. B. pileo linguaeformi suberoso supra rugoso fusco-nigricante subtus luteo, poris minutis. *Java. (Polyporus Nees.)*

pag. 475.

Ad *Boletum mollem* Perf. *Polyporus carneus* Fr. Nees, e *Java*, var.

pag. 476.

- Ad *Boletum hydnoïdem* Sw. *B. fibrosus* Kunth.
tenuis Kunth. 133. *B. dimidiatus* albo-fuscus zonatus laevis, poris majusculis hexagonis fuscis. *In alpibus Amer. austr.*
- telephoroides* 134. *B. dimidiatus* pallide fuscus rugosus subflexuosus, poris fuscis minutissimis. *Peru.*
 Kunth.
- Ad *B. fasciatum* Sw. *B. pavonius* Kunth. var.
striatus Kunth. 135. *B. dimidiatus* subimbricatus coriaceo-membranaceo nigro-fuscus radiatim striatus concentricè lineatus, poris angulatis fusco-cinereis. *Peru.*
- purpurascens* 136. *B. dimidiatus* reniformis flavo-fuscus laevis, poris minutissimis subangulatis purpurascens. *Nov. Granat.*
 Kunth.

pag. 478.

- Post n. 117. *dictyodes* * 137. *B. orbicularis* centro affixus pallide fuscus zonatus reticulato-venosus, poris majusculis hexagonis substantia spongiosa farctis. *In alpibus Amer. austr.* (*B. reticulatus* Kunth.)

pag. 480.

Hydnum fraceolens Brot. in *Lusitania*, non in *Lusatia*.

pag. 482.

- Post n. 47. *palmatum* Kunth. 79. *H. dimidiatum* palmato-incisum striatum flavo-fuscum subtus fulvo-villosum. *Nov. Granat.*

pag. 484.

Ad *Telephoram* Ehrh.

- Post n. 5. *Palmetto* Radd. 73. *Th. pileo* flabelliformi laciniato coriaceo fibroso flavo-fusco, stipite gracili compressiusculo. *Brazil.*
- infundibuliformis* 74. *Th. maxima*, pileo infundibuliformi lobato pallide fusco extus laevi intus squamoso-hirsuto, stipite brevi crasso. *Peru.*
 Kunth.

pag. 485.

Ad *Th. versicolore* Sw. *Th. badia* Kunth., *Ostrea* Fr. Nees.

pag. 486.

Th. Pavonia Sw. non Bertol. Per totam Indiam occidentalem provenit.

pag. 487.

Ad *Th. sulfuream* Perf. *Rhacodium sulfureum* Rehent.

pag. 488.

- Post n. 70. *cocrulea* Cand. 75. *Th. effusa* tomentosa azurca, margine demum sublibero, papillis parvis acutis.

Ad sepimenta. (Hypochnus coeruleus Fr. obs.
? Thelephora fimbriata Roth. catal. 2. 257.)

pag. 498.

Ad *Phallum.*

roseus Delil. 4. Ph. pileo depresso viridi-nigricante, stipite cylindrico reticulato fistuloso. *Aegypt.* Delil. t. 59.

pag. 513.

Ad *Pezizam controversam** Conferva lichenoides Radd. mem. di Modena, vol. 19. p. 48.

pag. 514.

Post n. 221. *limosa** 259. P. stromate granuloso subfloccoso aurantio-rufescente, cupulis hemisphaericis glabris candidis demum papyraceis. *In limo ad lacus Sebustianos.* (Bresse) Balbis.

pag. 561.

Ad *Erincum* Perf.

*Gei** 37. E. maculaeforme immersum rufescenti-albidum, floccis subliberis tenuissimis filiformibus apice attenuatis. *In foliis Gei urbani et rivalis.* (Phyllerium Fries.)

Ribium
Schlechtend. 38. E. immersum effusum bullosum luteo-virescens, floccis sparsis tubulosis basi dilatatis apice cernuis. *In foliis Ribis rubri.*

A D D E N D A.

T O M. I.

pag. 36.

Cynomorium coccineum legit et in *Sardinia* Moris Calaritanus.

pag. 38.

Ad *Sarmientam repentem*. (*Urceolaria* Feuill. l. Thuill.)

pag. 50.

Ad *Utriculariam*.

Post n. 24. *Ecklonii* * 66. U. scapo 1floro, calcari obtuso corollam superante, foliis linearibus acutis strictis persistens. Ad C. B. S.

pag. 90.

Ad *Acaenam*.

Post n. 14. *Eupatoria* Schlechtend. 18. A. foliolis basi obliqua oblongis inciso-ferratis subtus sericis, floribus sparsis glomeratisque in spicam interruptam dispositis. *Brazil*.

pag. 128.

Post n. 201. *Löflyingia*. Cal. 5partitus, laciniis basi 2dentatis. Petala 5 minima. Stigm. 3. Caps.ilocularis 3valvis polysperma.

hispanica 1. L. erecta viscoso-pubescens, foliis lineari-subulatis utrinque 1dentatis, floribus axillaribus confertis 3andris. *Hispan. Afric. bor.*

pentandra Cav. 2. L. procumbens villosa, foliis subulatis, floribus pentandris 3gynis. *Hispan. austr.*

L. renifolia Lag. videtur *Drymaria cordata* W.

pag. 254.

Deyeuxia avenacea * del. Est enim *Anisopogon avenaceus* R. Br. p. 273.

pag.

pag. 256.

Stipa melanocarpa Mühl. del. Est enim *Cymbopogon melanocarpus* * p. 289.

pag. 259.

Ad *Agrostin.*

Post n. 28. *aenea* * 89. *A. paniculae* strictae ramis verticillatis patulis, flosculis glaberrimis fuscis, corolla acuta nervosa calycem subaequante, culmo elato glabro, foliis ciliatis, vaginis ore pilosis. *Brasil.* (Vilfa Trin. gram. fasc. 2.)

domingensis * 90. *A. paniculae* ramis erectis, calycibus glabris inaequalibus acutis, corollae valva altera truncato-erosa, altera acuta, foliis lineari-cuspidatis glabriusculis, vaginarum ore piloso. *Hispaniola.* (Vilfa Trin.)

Post n. 35. *pallida* Cand. 91. *A. panicula* erecta subcontracta, calycibus acuminatis carina denticulatis, corolla obtusa 4nervia, arista subtorta calycem excedente, foliis angustis glabris, ligula 2fida. *Gallia provinc. Corsica. Inf. Aleut.* (*A. exarata* Trin.)

pag. 260.

Post n. 46. *Jureffi* Link. 92. *A. panicula* contracta interrupta glabra, calycibus obtusis asperis, corollae basi cyathidio suffultae valva altera obtusa nervosa, altera minuta, culmo foliisque glabris, ligula brevissima. *Lusitan.*

pag. 261.

Agrostis ramulosa Carmich. mutanda in *A. Carmichaëlii* *, appposito Carmich. synonymo.

pag. 286.

Andropogon condensatus Humb. del. Est enim *Cymbopogon condensatus* * p. 289.

pag. 289.

Andropogon purpurascens Mühl. del. ut synonymon *Pollinae scopariae* *.

pag. 291.

Andropogon nutans L. del. ut synonymon *Anthesteriae ciliatae* Retz.

pag. 294.

Chloris pallida W. del. Est jam supra *Andropogon provincialis* Lam. p. 286.

pag. 323.

Triticum dicoccum Schübl. potius ad *Tr. amyleum* Ser.,
Linn. Syst. Veg. Vol. IV. P. II. Y

pag. 388.

Ad *Galium*.

- Post n. 26. *Morifii* * 116. G. caule debili scabro, foliis senis lineari-lanceolatis aristatis antrorsum ciliatis, corollis cuspidatis. *Sardin.* Moris.
- maximum* Moris. 117. G. caule elato glaberrimo, foliis lingulato-linearibus obtusis laevibus, superioribus quaternis oppositisque, umbellis terminalibus. *Sardinia.*

pag. 399.

Ad *Anthospermum*.

- spermatocoeum* Reichenb. 7. A. foliis oppositis lineari-lanceolatis acutis cauleque herbaceo glaberrimis, floribus solitariis terminalibus. *C. B. S.*
- rubiceum* Reichenb. 8. A. caule herbaceo, foliis verticillato-fasciculatis lineari-lanceolatis, superioribus fructibusque hirtis, pedunculis oppositis solitariis. *C. B. S.*
- galioides* Reichenb. 9. A. foliis verticillatis abbreviatis linearibus acutis supra glabris subtus ferrugineis, fructibus scabris aggregatis. *C. B. S.*

pag. 425.

Ad *Exacum*.

- Ad *E. pallescens* * p. 41. *Callopisma perfoliatum* Mart. t. 183.
- Ad *E. nervosum* * p. 41. *Callopisma amplexifolium* Mart. t. 184.

pag. 426.

Ad *Sebaeam*.

- brasiliensis* * 12. S. caule ramofo 4gono, foliis sessilibus lanceolatis, pedunculis terminalibus subsolitariis, lobis corollae crenulatis. *Brasil.* (*Schultesia crenuliflora* Mart. t. 180.)
- gracilis* * 13. S. caule basi ramofo gracili paucifolio, foliis sessilibus lanceolatis nervosis, ramis 1floris, corollae lobis ovatis. *Brasil.* (*Schultesia gracilis* Mart. t. 181.)
- Ad *S. jorullensem* * *Schultesia stenophylla* Mart. t. 182.

Ad *Coutoubeam*.

- C. spicata* Aubl. (*C. densiflora* Mart.)

pag. 531.

Post *Heliotropium*:

PRESLEA Mart.

Cal. 5partitus. Cor. infundibuliformis, limbo 10-dentato, dentibus alternis minoribus introrsum conniventibus. Faux fasciculis pilorum 5. Antherae conniventes apice barbatae, latere membrana auctae. Drupa 4pyrena.

paradoxa Mart. *Brazil.* Herba ramosissima incano-hirsuta, foliis lanceolatis, floribus lateralibus terminalibusque flavis.

pag. 562.

Anchusa alpestris Stev. del. Est enim *Lycopsis alpestris* Lehm. p. 555.

Anchusa crispa Moris. Viv. 36. A. strigosissima diffusa, foliis oblongis basi attenuatis repando-dentatis, racemis laxis, calycibus subglobosis corolla brevioribus, seminibus triquetris glabris. *Sardin. Corsica.*

pag. 570.

Anagallis collina Schousb. habitat et in *Sardinia.*

pag. 585.

Ad *Spigeliam*. Cur. post p. 58. 59.

Sp. *Olferfiana* Schlechtend. est Sp. pulverulenta Mart. t. 192.

Sp. *laurina* Schlechtend. — — glabrata Mart. t. 193.

pulchella Mart. 12. Sp. caule herbaceo sulcato-angulato superne subaphyllo laevi, foliis minutis linearibus, spicis solitariis, antheris limbum corollae aequantibus, fructibus glabris. *Brazil.*

pufilla Mart. 13. Sp. caule herbaceo 4gono decumbente foliisque petiolatis ovatis acutiusculis pubescentibus, staminibus inclusis, fructibus glabris. *Brazil.*

pag. 586.

Ad *Lifianthum*.

alpestris Mart. 34. L. caule 4quetro, foliis sessilibus orbicularibus marginatis 3nerviis glabris, pedunculis terminalibus paucis. *Brazil.* (Flores violacei.)

pendulus Mart. 35. L. caule alato, foliis sessilibus ovato-oblongis 3-5nerviis, pedunculis subternis terminalibus elongatis flexuosis, calycis laciniis acuminatis. *Brazil.* Flores violacei.

Ad L. *chelonoidem* L. viridiflorus Mart.

Ad L. *speciosum* Schlechtend. v. supra 59. inflatus Mart.

Ad L. *campanulaceum* Lam. amplissimus Mart.

Ad L. *spathulatum* Bonpl. fere pertinet: *Helia oblongifolia* Mart. caule tereti simplici, foliis spathulatis obtusis, floribus cymosis, calycibus obtusis, tubo corollae gibbo. *Brazil.*

pulcherrimus Mart. 36. L. caule alato, foliis sessilibus ovatis acutis marginatis 3plinerviis, pedunculis corymbosis 3fidis elongatis, corollis amplis campanulatis e tubo gracili. *Brazil.* Flores coccinei.

Ad L. *pedunculatum* Schlechtend. supra p. 59. elegans Mart. sed pedunculi 2fidi.

tenuifolius * 37. L. caule simplici alato, foliis linearibus marginatis revolutis, pedunculo terminali solitario, floribus cernuis (coccineis). *Brazil.* (L. *angustifolius* Mart.)

paniculatus * 38. L. caule 4gono, foliis petiolatis lanceolatis triplinerviis, paniculae laxae ramis flexuosis, corolla glanduloso-pubescente. *Brazil.* (Irlbachia paniculata Mart.)

pag. 589.

Ad *Hippion* *.

diffusum * 5. H. caule gracili superne diviso, foliis quaternis ternisve ovatis acutis, floribus laxè paniculatis. *Brazil.* (Schübleria diffusa et conferta Mart.)

Ad *Hippion* controversum * Schübleria stricta Mart. t. 187. Eximia analysis.

patulum * 6. H. caule gracili paniculato, foliis linearibus, corollae laciniis acutiusculis. *Brazil.* (Schübleria patula Mart. t. 188.)

pag. 670.

Post *Rotulam* Lour.:

RHABDIA Mart.

Asperifoliae.

Cal. 5partitus. Cor. campanulata. Stam. inclusa. Stigma 2lobum. Bacca 4pyrena.

lycioides Mart. *Brazil.* Frutex ramis virgatis, foliis sparsis sessilibus oblongis undulatis hirsutis, floribus bracteatibus pedunculatis purpurascens.

pag. 671.

Theophrasta glycycarpa del.

LEONIA R. et P.

Cal. 5lobus. Cor. campanulata 5partita. Filamenta connata. Antherae 2loculares. Bacca 1locularis, placentatio parietalis.

racemosa Mart. 1. L. paniculis racemosis axillaribus pendulis. *Peru.* *Brazil.* (L. glycycarpa R. et P.)

cymosa Mart. 2. L. cymis axillaribus patulis. *Brazil.*

pag. 704.

Ad *Cinchonam*.

Post n. 13. *gratissima* Wall. 19. C. foliis elliptico-oblongis acuminatis subtus ad venas villosis, stipulis caducis lanceolatis glabris, paniculae ramis decussatis calycibusque villosis, seminum membrana crenulata. *Nepal.* Speciosissima familiae.

pag. 736.

Campanula lobelioides habitat in *Calabria*, Berger.; in *Sardinia*, Moris.

pag. 766.

Ad *Hirtellam*.

- canomenfis* * 9. *H. racemis axillaribus bracteatis pendulis villosis, floribus polyandris, foliis oblongis subtus ferrugineis. Brasfl. (Moquilea canomenfis Mart. 2. t. 166.)*
- tomentella*
Schott. 10. *H. racemis terminalibus ferrugineo-tomentosis, floribus 6-7andris, foliis oblongis utrinque attenuatis supra glabratis subtus hirsutis. Brasfl.*
- angustifolia*
Schott. 11. *H. racemis simplicibus nutantibus hirtis, floribus 7-9andris, foliis subcordato-lineari-lanceolatis acutis utrinque hirsutis. Brasfl.*

pag. 817.

Achyranthes aspera habitat et in *Sardinia*. Moris.

pag. 848.

Aclepias filiformis * mutetur in *Jacquinianam* *.

pag. 895.

Tordylium humile Desf. habitat et in *Sardinia*. Moris.

pag. 930.

Post *Microteam*:

ADENOGRAMMA Reichenb.

Cor. calycina infera oaduca 5petala, petalis striatis. Stam. simplicia cum petalis alternantia. Stigmata 2. Germen globum glandulosum 1spermum. Embryo inversus curvatus.

Mollugo
Reichenb.

C. B. S. Herba tenera ramosa, foliis linearibus verticillatis, floribus paniculatis.

pag. 956.

Ad *Sibbaldiam*.

Post n. 2. *californica* * 7. *S. crecta viscido-pilosa, foliis pinnatis pinnatifidisque, floribus paniculatis 10andris polygynis, petalis calyce brevioribus. California. (Horkelia californica Schlechtend.)*

T O M. II.

pag. 62.

Ad *Lilium*.*giganteum*
Wall.24. L. caule elato multifloro, foliis petiolatis cordato-ovatis acuminatis venosis, floribus racemoso-spicatis cernuis intus glabris. *Nepal*. (Wallich. flor. nepal. t. 12. 13.)

pag. 126.

Ad Amajouam guianensem Aubl., Martio monente, pertinere videtur *Ehrenbergia ciliata* * p. 133., quae igitur delenda.

pag. 133.

Post *Amooram* Roxb.:

PREPUSA Mart.

Cal. campanulatus 6fidus alatus. Cor. 6fida. Stigma 2lamellatum. Capf. 1locularis 2valvis, valvis introflexis placentiferis. *Gentianea*, a Sebaea et habitu et numero partium differt.*montana* Mart. *Brazil*. Frutex foliis obovato-oblongis emarginatis 3nerviis marginatis, floribus racemosis flavidis.

pag. 157.

Post *Menispermum*:

HOLLBÖLLIA Wall.

Flores monoeci. Perianth. 6phyllum duplici serie. Stam. distincta. Glandulae 6 staminum basi oppositae. Baccae oblongae folliculares 1loculares polyspermae.

latifolia Wall. 1. H. foliis quinatis ovato-oblongis 3nerviis, floribus racemosis. *Nepal*. (Wallich. flor. nepal. t. 16.)*angustifolia*
Wall. 2. H. foliis septenatis lineari-lanceolatis acuminatis, floribus umbellatis. *Nepal*. (Wallich. flor. nepal. t. 17.)

pag. 192.

Ad *Ericam scopariam* add. patriam: *Europ. austr.*

pag. 235.

Post *Fuchsiam*:

SARCOPYRAMIS Wall.

Cal. inverse pyramidatus 4dentatus, dentibus ciliatis. Antherae simplices rectae. Capf. basi calyce cincta apice 4alata 4locularis polysperma.

nepalensis
Wall.

Nepal. Herba simplex, caule 4gono, foliis oppositis petiolatis ovatis acuminatis ciliato-ferratis nervosis, floribus subumbellatis carnosis roseis. (Wallich. flor. nepal. t. 23.)

pag. 237.

Daphne oleoides Schreb. habitat et in *Sardinia*.

pag. 286.

Post *Styracem*:

DICLIDANTHERA Mart.

Cal. 5partitus. Cor. infundibuliformis. Antherae in fauce sessiles 2valves. Stigma simplex. Bacca oligosperma.

penduliflora
Mart.

1. *D. foliis alternis oblongis, petiolis 2glandulosis, racemis pendulis. Brasil.*

laurifolia
Mart.

2. *D. foliis oblongis, petiolis eglandulosis, racemis erectis pubescentibus. Brasil.*

Potaliam amaram Aubl. nomine *P. resiniferae* Martius nov. gen. t. 170. eximie illustravit. Resiniferam esse Aubletius ipse (l. p. 596.) testatur.

pag. 287.

Ad *Gaultheriam* procumbentem forte *Arbutus acadensis* Mill., quae nusquam a nuperis scriptoribus americanis indicatur.

pag. 325.

Ad *Tribulum*.

brasiliensis *

8. *Tr. foliis 5jugis oblique ovatis villosiusculis, pedunculis folio brevioribus, fructibus cristatis decaspermis. Brasil. (Ehrenbergia tribuloides Mart.)*

pag. 511.

Ad *Pyrum*.

Post n. 38. *sorbifolia* Chamiss. 44. *P. foliolis ovato-lanceolatis argute ferratis acuminatis nervo margineque pilosis apice barbatis, gemmis glutinosis, stipulis rufo-villosis. Camtschatca.*

pag. 527.

Ad *Rubum*.

tagallus
Chamiss.

78. *R. ramis teretibus tomentosis, aculeis sparsis uncinatis, foliolis ovatis duplicato-ferratis pubescentibus eglandulosis, floribus subsolitariis, laciniis calycis elongatis petala subaequantibus demum reflexis. Ins. Luzon.*

Mundtii
Schlechtend.

79. *R. ramis angulatis tomentosis eglandulosis, aculeis uncinatis crebris, foliis pinnatis ternatisque*

supra pilosis subtus incano-tomentosis, panicula coarctata, petalis obovatis calyce brevioribus.
Afric. austr.

- cluyfocarpus* Schlechtend. 80. R. ramis tomentosis glandulosis, aculeis sparsis uncinatis, foliis pinnatis ternatisque supra glabris subtus tomentosis glandulosis, panicula coarctata, petalis obovatis calycem aequantibus.
Afric. austr.

pag. 528.

- Post n. 21, *Sellai* Schlechtend. 81. R. ramis aculeatissimis, sterilibus pentagonis fertilibus teretibus, foliis quinatis ternatisque subtus villosissimis, panicula elongata, calycibus fructiferis erectis. *Monte Video.*

- imperialis* Schlechtend. 82. R. ramis sterilibus pentagonis glabris, aculeis uncinatis, foliis quinatis ternatisque utrinque viridibus, calycibus tomentosis petala excedentibus demum reflexis. *Brasil.*

pag. 530.

- urfinus* Chamiss. 83. R. ramis teretibus tomentosis, aculeis crebris subulatis rectis, foliis ternatis simplicibusque subtus incano-tomentosis, floribus paniculatis, calycibus aculeatis. *California.*

pag. 531.

- vitifolius* Chamiss. 84. R. ramis pubescentibus, aculeis rectiusculis subreversis, foliis cordatis lobis glabriusculis, floribus corymbosis, laciniis calycis elongatis acuminatis. *California.*

pag. 536.

Ad *Potentillam.*

- lignosa* W. herb. 110. P. fruticosa, ramis tortuosis compressis, foliis quinato-digitatis sericeis, foliolis cuneatis truncatis apice dentatis, pedunculis solitariis. *Hyrkania.*

pag. 541.

- Post n. 82. *elegans* Schlechtend. 111. P. caule erecto 1floro, foliis petiolatis glabriusculis ternatis, foliolis profunde inciso-lobatis, lobis linearibus obtusis integerrimis 3fidisque, stipulis membranaceis acutis, petalis obcordatis calycem superantibus. *Carnischatea.*

pag. 543.

Ad *Sieversiam.*

- rotundifolia* Chamiss. 9. S. foliis pinnatis, foliolis cordato-orbiculatis obsolete lobatis duplicato-dentatis radiatum nervosis, caule foliato paucifloro, laciniis calycis

subdentatis, petalis late obcordatis. *Inf. Aleut.*
(*Geum rotundifolium* Langsd. Cand.)

pag. 600.

Myrodendron Schreb. melius in *Monadelphia* collocatur. *Drupa* 8locularis, loculis 4 super. 4 inferioribus.

- crassifolium* * 2. *M.* foliis obovato-oblongis submarginatis integerrimis, petiolis alatis, panicula corymbosa. *Brasil.* (*Humirium* Mart.)
- floribundum* * 3. *M.* foliis obovatis in petiolum decurrentibus, ramis pedunculisque ancipitibus, floribus corymbosis. *Brasil.* (*Humirium* Mart.)

pag. 612.

Ad *Cliffortiam*.

- filicaulis* Schlechtend. 24. *Cl.* caule ramosissimo prostrato, ramis filiformibus, foliis fasciculatis cuneato-obovatis 3dentatis margine villoso ciliatis, stipulis membranaceis lanceolatis acutis. *Afric. ausif.*

Ad *Cl. obcordatam*. (*Cl. serpyllifolia* Schlechtend.)

pag. 628.

Ad *Mariaveam*.

- brasiliensis* Mart. 4. *M.* foliis lanceolatis glabris, pedunculis geminis 1floris. *Brasil.*

pag. 642.

Ad *Cadfuram* Juss.

- grandiflora* Wall. 2. *C.* fruticosa volubilis, foliis oblongis acuminatis serratis subtus reticulatis, pedunculis 1floris. *Nepal.*
- propinqua* Wall. 3. *C.* fruticosa volubilis, foliis ovato-lanceolatis subintegerrimis, floribus subfasciculatis, pedunculis bracteatis. *Nepal.*

Ad *Schizandram* Mx. accedere Wallich.

pag. 643.

Ad *Magnoliam*.

- insignis* Wall. 20. *M.* arborea, foliis oblongis acuminatis subtus glaucis venoso-reticulatis, geminis ferrugineo-tomentosis, floribus terminalibus solitariis 9petalis, petalis 3 exterioribus reflexis, capsulis 4spermis. *Nepal.*
- excelsa* Wall. 21. *M.* arborea, foliis oblongo-ellipticis acuminatis subtus glaucis reticulato-venosis, geminis ferrugineo-barbatis, floribus solitariis 12petalis, capsulis globosis remotis 1spermis. *Nepal.*

Ad *Micheliam*.

- lanuginosa* Wall. 12. M. arborea, foliis oblongis utrinque attenuatis subtus gemmisque dense tomentosis, floribus polypetalis. *Nepal*.

pag. 851.

Crambe reniformis Desf. habitat et in *Sardinia*.

pag. 911.

Brassica Sabularia Brot. habitat et in *Sardinia*.

T O M. III.

pag. 37.

Ad *Passifloram*.

- Polt n. 20. *nepalensis* Wall. 86. P. foliis cordato-oblongis integerrimis subtus petiolisque glandulosis, pedunculis squamatis aggregatis, calyce coronam triplicem superante. *Nepal*.
- † *cochinchinensis* * 87. P. foliis oppositis ovatis integerrimis glabris, petiolis 2glandulosis, floribus axillaribus geminis. *Cochinchina*. (P. pallida Lour.)

pag. 92.

Malva althaeoides Cav. habitat et in *Sardinia*.

pag. 182.

Ad *Ononida*.

- litoralis* Moris. 78. O. herbacea diffusa villosa, foliolis obovatis argute ferratis glandulosis, stipulis late amplexicaulibus ovatis ferrulatis, floribus racemosis, calycibus corollam subaequantibus, leguminibus 1spermis. *Sardiniae litora*.

pag. 270.

Ad *Ervum*.

- sardoum* Moris. 16. E. pedunculis racemosis, leguminibus dispersis pendulis foliolisque truncato-emarginatis mucronatis glaberrimis, petiolis cirriferis, stipulis lineari-lanceolatis ciliatis. *Sardinia*.

pag. 367.

- n. 2918. *Brunonia* Sm. del. Est enim jam vol. 1. p. 538. n. 577.

pag. 561.

- n. 112. *Senecio Cinerariae* * loco arenarii, appositis M. B. et Viv. synonymis.

pag. 666.

Ad *Scorzoneram*.

- Sardoa* Moris. 38. Sc. foliis linearibus obtufiusculis nervosis sparfe pilosis, fcapo fubfquamato, anthodio glabro. *Sardinia*.

pag. 769.

Ad *Arum*.

- Post n. 21. *speciofum* Wall. 32. A. acaule, folio folitario ternato, foliolis cordato-ovatis acuminatis repandis venosis, fpatha ftriata longe acuminata, fpadice apice longiffime filiformi. *Nepal*. (Wallich: flor. nepal. t. 20.)
- coftatum* Wall. 33. A. acaule, folio folitario ternato, foliolis elliptico-oblongis acuminatis venoso-coftatis, lateralibus femicordatis, fpatha nervoso-ftriata acuminata, fpadice apice longiffime filiformi. *Nepal*. (Wallich. flor. nepal. t. 19.)
- nepenthoides* Wall. 34. A. caule erecto variegato, foliis binis peltatim digitatis, foliolis fubfessilibus lanceolatis acuminatis fubtus glaucis, fpatha variegata apice triloba, lobis lateralibus obtufis reflexis, medio acuminato, fpadice clavato obtufo. *Nepal*. (Wallich. flor. nepal. t. 18.)
-

I N D E X

AUCTORUM IN HOC OPERE CITATORUM.

- Abel.* Clarke ABEL, medicus oratoris britannici in China, Amherstii: *A narrative of a journey in the interior of China*. Lond. 1818. 4. Plantas ab eo collectas R. Brownius illustravit.
- Ach. Achar.* Eric. ACHARIUS, medicus provincialis Vadstenaë in Suecia († 1819): *Lichenographiæ suecicæ prodromus*. Lincop. 1798. 8. *Methodus lichenum*. Stockh. 1805. 8. *Lichenographiæ universalis*. Gott. 1810. 4. *Synopsis methodica lichenum*. Lund. 1814. 8. Obs. in actis acad. Inec. holm., in actis soc. Linn. et hist. nat. Moscov.
- Adam.* Jo. Frider. ADAM, comitis Muffin-Puschkin in itinere per Caucasum (1800—1802) focus. *Decades 5 novarum plantarum: in Weber's et Mohr's Beyträgen zur Naturkunde*, Bd. 1. — M. F. ADAMS Sibiriam arcticam et orientalem percuratus est. Observ. in actis acad. Petropol. et soc. hist. nat. Moscov.
- Adanf.* Mich. ADANSON, acad. parisiensis, diu in Afric. occidentali vixit. (nat. 1725 † 1806.) *Familles des plantes*. vol. 1. 2. Paris 1763. 8.
- Afzel.* Ad. AFZELIUS, prof. Upsalienfis. *Genera plantarum guineensium*. Upsal. 1809. 4. *Remedia guineensia*. Upsal. 1816. 4. Obs. in act. holm. 1783. 1788 f.
- Ag.* Car. AGARDH, prof. Lundinensis. *Synopsis algarum Scandinaviæ*. Lund. 1817. 8. *Några Ord om Tobaks odlingens förbättring*. 1819. 8. *Species algarum rite cognitæ*. Lund. 1820. 8. *Icones algarum ineditæ*. Lund. 1820 f. *Systema algarum*. Lund. 1824. 8. Obs. in nov. act. nat. cur. 13.
- Ait.* Gul. AITON, horti Kewensis regii præfectus (nat. 1731 † 1798), auxilio Jonæ Dryandri edidit *Hortum kewensem*. vol. 1—3. Lond. 1789. 8. Filius, Gul. Townsend AITON, successor patris, adjuvante imprimis R. Brownio, secundam editionem curavit, vol. 1—5. Lond. 1810—1813. 8.
- Alb. et Schw.* J. B. AB ALBERTINI et Lud. Dav. A SCHWEINITZ, ecclesiæ Moravicæ addicti: *Conspectus fungorum in agra Niskienfi crescentium*. Lips. 1805. 8.
- Allam.* I. Allem. Frider. ALLAMAND: Obs. in nov. act. nat. cur. vol. 4.
- Allion.* Carol. ALLIONI, prof. Taurinensis (nat. 1725 † 1804): *Flora pedemontana*, vol. 1—3. Aug. Taur. 1785. fol. *Auctarium ad floram pedemontanam*. Taurin. 1789. 4.
- P. Alpin.* Prosper ALPINI, prof. Patavius, diu in Aegypto et Graecia degit (nat. 1553 † 1617.). *De plantis Aegypti*, ed. J. Vesling. Patav. 1640. 4. *De plantis exoticis*. Venet. 1627. 4.

- S. Amand.* . . S. AMANS: Obs. in Recueil des travaux de la soc. d'agriculture d'Agens, vol. 1.
- Anderf.* Georg. ANDERSON, horti Chelseani praefectus: Obs. in Transact. of Linn. soc. 11. 12.
- Gul. ANDERSON, medicus in insula S. Vincentii, multas in Britanniam plantas novas introduxit.
- Andr.* Henr. ANDREWS, pictor: *The botanists repository*, vol. 1—6. Lond. 1797 f. *Coloured engravings of heaths*, vol. 1—5. Lond. 1802 f.
- Andrz.* Anton. ANDRZEIOWSKI, adjutor Besseri, regiones Tyrae, Borytheni et Hypani finitimas orasque Ponti euxini sedulo peragravit, plantas inprimis cruciferas scienter illustravit. Obs. ejus et Besserus et Candolleus divulgavit.
- Anguill.* Ludov. ANQUILLARA, prof. Patavinus et Ferrariensis († 1570.) Italiam, Graeciam, Macedoniam et Dalmatiam peragravit. *Semplici. Vineg.* 1561. 8.
- Arbr.* Anton. DE L'ARBRE: *Flore d'Auvergne.* vol. 1. 2. Clermont. 1800. 8.
- Arduin.* Petr. ARDUINO, prof. Patavinus. *Animadversionum botanicarum specimen* 1 et 2. Patav. 1759. Venet. 1764. 4. Obs. in Saggi dell' accad. di Padova, 1. 2.
- Arnott.* G. A. Walker-ARNOTT: Obs. in Mem. of the Wernerian soc., in Edinb. philos. journ., in Mém. de la soc. d'hist. nat. à Paris, 2.
- Aspogr.* G. Casten ASPEGREN, pictor Carolicoronae in Suecia: *Förök til en Blekingfsk flora.* Carlsrona. 1823. 8.
- Aff.* Ignat. DE ASSO: *Synopsis stirpium indigenarum Arragoniae.* Massil. 1779. 4. Enumeratio stirpium in Arragonia detectarum, recuf. in Römer. script. de plantis hispanicis.
- Aub. v. Thuar.*
- Aubl.* Fusaeus AUBLET, peregrinator, qui diu in Guiana gallica vixit. *Histoire des plantes de la Guiane française.* vol. 1—4. Paris 1775. 4.
- Balb.* Jo. Bapt. BALEIS, prof. Taurinensis, jam Lugdunensis, cui innumeras debeo plantas. *Flora taurinensis*, Taurin. 1806. 8. *Horti academiici taurinensis icones et descriptiones*, fasc. 1. Taurin. 1810. 4. Eo potissimum et Domin. *Nocca* auctoribus: *Flora ticinensis*, vol. 1. 2. Ticin. 1816. 1821. 4. Obs. in act. acad. Taurinensis.
- Baldw.* Gul. BALDWIN, medicus Savannae in Georgia Amer. bor., Elliottio, Nuttallio aliisque multas largitus est plantas. Obs. in Silliman's americ. Journal.
- Gul. BALDWIN, Philadelphensis, cum Torreyo plura communicavit.
- Banks.* Jos. BANKS, praeses regiae societatis britannicae, Cookii comes illustris in primo itinere περιουσιω: plurimas plantas, ab ipso inventas et nuncupatas, aliis describendas commisit (nat. 1743 † 1820.). *Reliquiae Houstonianae.* Lond. 1781. 8. *Icones selectae plantarum, quas Kämpferus in Japonia collegit et delineavit.* Lond. 1791. fol. *On the blight in corn.* Lond. 1805. 4., recuf. in Annals of bot. 2.
- Barrel.* Jac. BARRELIER, ex ordine monachorum Dominici, magnus peregrinator (nat. 1606 † 1673.): *Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae*, ed. Ant. Jussieu. Paris 1714. fol.

- Bart.* Gul. P. C. BARTON, prof. Philadelphensis: *Compendium florac philadelphicac.* vol. 1. 2. Philadelph. 1818. 8.
- Bartl.* Frider. Theophil. BARTLING, M. D. Gottingensis: *Diosmeae descriptae et illustratae.* Gott. 1824. 8.
- Bartr.* Gulielm. BARTRAM, praedii et horti botanici prope Philadelphiam possessor: *Travels through South- and North-Carolina.* Philadelph. 1791. 8.
- Bât.* T. BATARD, Andegavienfis: *Flore du département de Maine et Loire.* Angers. 1809. 12. *Notices sur les végétaux du jardin des plantes d'Angers.* 1810. 12. *Supplément à la flore.* 1812. 12.
- Batsch.* Jo. Georg. Car. Aug. BATSCH, prof. Jenensis (nat. 1761 †1802): *Elenchus fungorum,* tab. 1—30. Hal. 1783. 1784. 4.
- Battarr.* Jo. Ant. BATTARRA (†1789): *Fungorum agri Ariminensis historia.* Favent. 1759. 4.
- Bauer.* Ferdin. BAUER, pictor egregius: *Illustrationes plantarum novae Hollandiae.* Lond. fol. 1813. tab. 1—10.
- C. Bauh.* Casp. BAUHINUS, prof. Basileensis (nat. 1550 †1624): *Prodromus theatri botanici.* Frcf. 1620. 4. *Pinax theatri botanici.* Basil. 1623. 4.
- J. Bauh.* Jo. BAUHINUS, prioris frater, archiater Montisbeligardi (nat. 1541 †1613): *Historia plantarum universalis.* vol. 1—3. Ebrodun. 1650. 1651. fol.
- Baumg.* Jo. Christ. Gottl. BAUMGARTEN, medicus Schäsburgi in Transsylvania: *Flora lipsiensis.* Lips. 1790. 8. *Enumeratio stirpium magno ducatu Transylvaniae indigenarum.* tom. 1—5. Vindobon. 1816. 8. Multas mihi plantas largitus est.
- Beck.* Ludov. C. BECK, scholae Rensselaerianae collega in Albania Amer. bor., regiones Missuri vicinas perscrutatus est. Obs. in Silliman's amer. Journ.
- Bellard.* Ludov. BELLARDI, praefectus horti bot. Taurinensis: *Appendix ad floram pedemontanam.* Aug. Taurin. 1792. 4. Innumeras plantas ab ipso accepit Willdenovius.
- Berg.* Petr. Jon. BERGIUS, prof. Holmienfis (†1790): *Descriptiones plantarum e capite bonae spei.* Stockh. 1767. 8. *Materia medica e regno vegetabili.* vol. 1. 2. Stockh. 1778. 8. Obs. in act. acad. holm. et petropolit.
- Car. Henr. BERGIUS, Custrinensis, pharmacopola, in regionibus C. B. S. vicinis multas collegit plantas, quas jam herbarium regium berolinense continet. (Nat. 1792 †1817.)
- O. E. BERGIUS: *Om Vcstindien.* Stockh. 1819. 8.
- Berger.* .. BERGER, egregius plantarum italicarum collector, tum miles, pro patria cecidit 1813.
- Jo. BERGERET, medicus Pali in Bearnia: *Flores des basses Pyrénées.* vol. 1. 2. Pau. 1803. 8.
- Bernh.* Jo. Jac. BERNHARDI, prof. Erfurtenfis. Obs. in Schraderi diario 1799 f. Multas tum in horto cultas tum spontaneas plantas cum aliis communicavit.
- Berter.* Car. Jos. BERTERO, eximius peregrinator, qui per Indiam occidentalem studiose et scienter plantas collegit et cum magistro Balbifio communicavit. Ab hoc plurimas accepi.
- Bertol.* Antonin. BERTOLONE, prof. Bononienfis: *Amoenitates italicac.* Bonon. 1819. 4. Is liber complectitur, quae prius seorsim ediderat. Obs. in Opusc. scientif. di Bologna.
- Bess.* W. J. J. BESSER, prof. Creminicenfis in Volhynia: *Primitiae florae Galiciae.* vol. 1. 2. Vienn. 1809. 12. *Enumeratio planta-*

- rum in Volhynia etc. collectarum.* Vilm. 1822. 8. Multas ipsi plantas debeo.
- Bichen.** J. E. BICHENO, Scotus: Obf. in *Transact. of Linn. soc.* 12.
- Bigel.** Jac. BIGELOW: *Florula bostoniensis.* Boston. 1814. 8.
- Billb.** Jo. Georg. BILLBERG cum Swartzio botanicon sueticum (*Svensk botanik*) edidit.
- Imman. BILLBERG: *diff. plantarum brasiliensium decas.* Upfal. 1817. 4.
- Bir.** J. A. J. BIRIA: *Histoire naturelle et médicale des Renoncules.* Montpell. 1811. 4.
- Bivon.** Anton. BIVONA-Bernardi, L. B. *de Alta turre: Sicularum plantarum cent.* 1. Panorm. 1806. 8. *Monografia delle Tolpidi.* Palerm. 1809. fol. *Stirpium rariorum in Sicilia provenientium manip.* 1—4. Panorm. 1813—1816. 4.
- Blan.** Gilb. BLANE, medic. Londinensis: Obf. in *Philos. transact.* vol. 80. et in *Transact. soc. Bengal.* 4.
- Bland.** Otto Christ. BLANDOW, pharmacopola Warenensis Megapol. *Musci frondosi exsiccati fasc.* 1—5. *Florulae Starminae fasc.* 9. elaboravit.
- Blom.** Car. Magnus BLOM, medicus Suecanus: Obf. in *act. acad. holm.*
- Blum.** C. L. BLUME, praefectus horti botanici ad Bataviam, Javam perscrutatus est. *Catalogus van de gewassen in't Plantentuin te Buitenzorg.* Batav. 1823. 8. *Bijdragen tot de Flora van nederlandsche Indië.* St. 1—5. Batav. 1825. 1826. Obf. in *Verhandel. van het bataav. Genootsch.* 9., in *nov. act. nat. cur.* (interprete Neefio) et in *Regensb. bot. Zeit.*
- Bocc.** Sylv. Paul. BOCCONE, monachus ficulus, botanicus magni Etruriae ducis, plantarum collector (nat. 1633 † 1704): *Museo di piante rare.* Venez. 1697. 4.
- Böb.** Jo. A. BÖBER, παιδαγωγικός equestris ruthenicae director (nat. 1746 † 1820). Obf. in *Pallas neuen nord. Beytr. Plantarum copiam ab eo Willdenovius habuit.*
- Böhm.** Georg. Rud. BÖHMER, prof. Wittebergenfis (nat. 1723 † 1803): *De plantis in cultorum memoriam nominatis.* Lips. 1799. 8.
- Bönnigh.** C. M. F. A. BÖNNINGHAUSEN, a consil. regiminis Monasterii: *Prodromus florum Monasteriensis.* Monast. 1824. 8.
- Boerh.** Hermann. BOERHAAVE, prof. Leidenfis (nat. 1668 † 1738): *Index primus et alter plantarum, quae in horto lugdunensi aluntur.* LB. 1710. 1720. 4.
- Bolt.** Jac. BOLTON: *Filices britannicae.* P. 1. 2. Leeds et Huddersfield. 1785. 1790. 4. *Geschichte der merkwürdigsten Pilze,* Th. 1—3., interprete Willdenow. Berl. 1795—1799. 8. Th. 4., curantibus Neefis. Berl. 1820. 8.
- Bonom.** Franc. BONAMY: *Florae nannetensis prodromus.* Nannet. 1782. 12. *Addenda ad prodromum.* 1785. 12.
- Bondt.** Nic. BONDT, prof. Amstelodamenfis (nat. 1765 † 1796): *Diff. de cortice Geoffraeae surinamensis.* LB. 1788. 8.
- Bonpl.** Amatus BONPLAND, Humboldtii comes, dein hortis regis Malmaison et Navarre praefuit, post Americam australem adiit, ubi jam obses a Francia, apud quem summa est rerum in Paraguay, detinetur. Humboldtii plantas aequinoctiales et Melastomata curavit. *Description des plantes rares, cultivees à Malmaison et à Navarre.* fasc. 1—10. Paris 1813—1816. fol.
- Borkhauf.** Maurit. Balthaf. BORKHAUSEN, Darmstadiensis: *Beschreibung der im Darmstädtchen wachsenden Holzarten.* Frkf.

1790. 8. *Tentamen dispositionis plantarum Germaniae seminiferarum*. Darmst. 1792. 8. *Handbuch der Forstbotanik*. Th. 1. 2. Giefs. 1800—1803. 8. Obf. in Römeri Archiv. 1. 2.
- Bory.** Jo. Bapt. BORY S. VINCENT, Agini in Aquitania natus, infulas Mascarenas 1802—1803 perscrutatus est, e quibus ingentem plantarum numerum cum Willdenovio communicavit, dein sub Napoleone stipendia meruit, post Bruxellis *Annales générales des sciences physiques* tom. 1—8. redegit, jam Parisiis privatam agit vitam. *Voyage dans les principales îles des mers d'Afrique*. Paris 1804. 4. Obf. in annalibus bruxellenfibus, musei parisiensis, soc. nat. scrutator. berol. (Berl. Magaz. 2. 3.)
- Bosc.** Ludov. BOSCH, peregrinator, jam praefectus horti regii parisiensis. Obf. in actis instit. gallici, in Dictionn. des scienc. natur. et in Berl. magaz. 5.
- Bouch.** J. A. G. BOUCHER: *Extrait de la flore d'Abbeville*. Paris 1808. 8.
- Bradl.** Rich. BRADLEY, prof. Cantabrigienfis (+ 1732): *Historia plantarum succulentarum*. dec. 1—5. Lond. 1716—1727. 4.
- Braun.** Franc. Ant. A BRAUNE: *Salzburgische Flora*. Th. 1—3. Salz. 1797. 8.
- Bray.** Gabriel Comes BRAY, orator regis Bavariae: Obf. in Denkschr. der Regensb. bot. Gesellsch. 1. 2.
- Breyn.** Jac. BREYN, mercator Gedanensis (nat. 1637 † 1697): *Exoticarum plantarum centuria*. Gedan. 1678. fol. *Prodromi plantarum*. Gedan. 1739. 4.
- Brid.** Sam. El. A BRIDEL, ducis Gothani legatus: *Muscologia recentiorum*: vol. 1—4. Goth. 1797—1817. 4. *Methodus nova muscorum*. Goth. 1819. 4. *Bryologia universa*. vol. 1. 2. Lips. 1826. 1827. 8.
- Brigant.** BRIGANTI apud Gusson. catal.
- Brignol.** Jo. BRIGNOLE, prof. Urbinas, dein Veronenfis: *Fasciculus rariorum plantarum Foro-Julienfium*. Urbin. 1810. 4. Obf. in Biblioteca italiana.
- Brongn.** Adolph. BRONGNIART, acad. parif. socius: Obf. in Mém. du mus., Dictionnaire des scienc. nat., Bullet. de la soc. philomath., Annales des scienc. nat.
- Brot.** Felix Avellar BROTERO, prof. Conimbricenfis, dein Olyfiponenfis: *Flora lusitanica*. vol. 1. 2. Olyfipon. 1804. 1805. 8. *Phytographia Lusitaniae*. Olyfip. 1816. fol. Obf. in Transact. of Linn. soc.
- Brousson.** Petr. Mar. Aug. BROUSSONET, diu in insulis Canariis et Mauritania vixit, denique prof. Monspeliensis (nat. 1761 † 1807): *Elenchus plantarum horti Monspeliensis*. Mouspel. 1805. 8. Ingentem plantarum novarum copiam Willdenovio liberaliter donavit.
- P. Br.** Patric. BROWNE, Hibernus: *Civil and natural history of Jamaica*. Lond. 1756. fol.
- R. Br.** Robertus BROWN, novam Hollandiam illustravit, jam custos musei Bankiani: *Prodromus florae novae Hollandiae*. Lond. 1810. 8. Appendices doctiffimas addidit ad Flinder's voyage to terra australis, ad Salt's voyage to Abyssinia, ad Abel's journey in China, ad Tuckey's expedition on the Congo, ad Ross voyage for the purpose of a northwest-passage, ad Parrey's voyage, ad Clapperton's and Denham's journey. Novam horti kewensis editionem novis multis ornavit: commentarios inseruit

- feruit *Transact. of Linn. soc. et Mem. of the Werner. society.* Pleraque haec interpretatus est aut recudi curavit C. G. Nees in R. Brown's vermischten botanischen Schriften. Th. 1. 2. Schmalkalden et Leipz. 1825. 1826. 8.
- Bruch.** .. BRUCH, pharmacopola Bipontinus: insignis muscorum scrutator, quorum plerosque mihi largitus est. *Obf. in Regensb. bot. Zeit.*
- Buch.** Leopold. A BUCH, illustris geognostes et physiologus: *Physikalische Beschreibung der canarischen Inseln.* Berl. 1825. 4.
- Buchan.** v. Hamilt.
- Bull.** .. BULLIARD (nat. 1751 †1793): *Herbier de la France.* 1780 f. fol.
- Burch.** Gul. J. BURCHELL: *Travels in the interior of southern Africa.* Lond. 1824. 1825. 4.
- Burgsd.** Frider. Aug. Ludov. A BURGSDORFF, sylvarum in marchia Brandenburgica summus curator (nat. 1747 †1801): *Versuch einer vollständigen Geschichte vorzüglicher Holzarten.* Th. 1. 2. Berl. 1783. 1787. 4. *Obf. in Beobacht. der naturf. Freunde in Berlin.*
- Burm.** Jo. BURMANN, prof. Amstelodamensis (nat. 1707 †1780): *Theaurus ceilanicus.* Amst. 1737. 4. *Rariorum africanarum plantarum* dec. 1—10. Amst. 1738. 1739. 4. Plumerii icones edidit.
- N. L. Burm.** Nic. Laur. BURMANN, prof. Amstelodamensis (nat. 1734 †1793): *Flora indica.* LB. 1768. 4.
- Buxb.** Jo. Christ. BUXBAUM, oratoris ruthenici in Constantinopoli medicus, Asiam minorem ipsamque Armeniam peragravit, post academ. petropolit. sodalis (nat. 1694 †1730): *Plantarum minus cognitarum* cent. 1—5. Petropol. 1728—1740. 4. *Enumeratio plantarum in agro halensi.* Hal. 1721. 8.
- Caes.** Andr. CAESALPINUS, prof. Pisanus (nat. 1519 †1603): *De plantis.* Florent. 1583. 4.
- Camer.** Joach. CAMERARIUS, medicus Norimbergenfis (nat. 1534 †1598): *Hortus medicus et philosophicus.* 1588. 4. *Epitome Matthioli de plantis.* Fref. 1586. 4.
- Camp.** Ant. CAMPANA: *Catalogus plantarum horti Ferrariensis.* 1812. 8.
- Campd.** F. CAMPERA, Hispanus: *Monographie des Rumex.* Paris 1819. 4.
- Cand.** Aug. Pyram. DE CANDOLLE, prof. primum Monspeliensis, jam Genevensis. *Plantarum succulentarum historia*, fasc. 1—28. Paris 1799—1803. fol. *Astragologia.* Paris 1802. fol. *Flore française*, ed. 3. vol. 1—5. Paris 1805—1815. 8. *Synopsis plantarum in flora gallica descriptarum.* Paris 1806. 8. *Catalogus plantarum horti botanici monspeliensis.* Monspel. 1813. 8. *Recueil de mémoires sur la botanique.* Paris 1813. 4. *Regni vegetabilis systema naturale.* vol. 1. 2. Paris 1818. 1821. 8. *Prodromus systematis naturalis.* vol. 1. 2. Paris 1824. 1825. 8. *Icones selectae plantarum, quas in systemate naturali descripsit:* delin. Turpin, curavit de Lessert. vol. 1. 2. Paris 1820. 1822. fol. *Plantae raras du jardin de Genève.* fasc. 1. 2. Genève 1825. fol. *Mémoires sur les Légumineuses.* Paris 1825. 4. *Obf. in Annales et Mém. du mus., in Mém. de la soc. nat. de Paris et de Genève.*
- Carey.** Gul. CAREY, medicus in Serampore Ind. or. *Hortus bengalensis.* 1821. 8. Roxburghii floram indicam vol. 1. curavit. *Plantarum novarum copiam in Britanniam misit.*

- Carmich.* Dugald. CARMICHAEL, navarchus, περίπλοῦς celebris, insulam Acunnae post Thuarfium illustravit. Obs. in Transact. of Linn. soc. 12.
- Cassin.* Henr. CASSINI, symbolas plures ad Dictionn. des scienc. nat. et Journ. de phys.
- Castigl.* Ludov. Comes CASTIGLIONE, Mediolanensis: *Viaggio negli stuti uniti dell' America settentrionale.* vol. 1. 2. Milano 1790. 8.
- Catesb.* Marc. CATESEY, peregrinator et collector avium plantarumque in australibus Americae borealis provinciis (nat. 1680 † 1749): *The natural history of Carolina, Florida and the Bahama islands.* vol. 1. 2. et app. Lond. 1731—1743. fol.
- Cav.* Ant. Jof. CAVANILLES, prof. Matritensis (nat. 1745 † 1804): *Monadelpiæ* diff. 10. Matrit. 1790 f. 4. *Icones plantarum et descriptiones.* vol. 1—6. Matrit. 1791—1800. fol. *Descripcion de los generos y species, demonstradas en las lecciones publicas.* Madrid. 1801. 1802. 8. *Anales de ciencias naturales.* n. 1—18. Madrid. 1800—1803. 8.
- Cavol.* Phil. CAVOLINI, Neapolitanus: *Zosteræ oceanicæ ἀνθήσις.* Neap. 1792. fol. Recuf. in Ulteri Ann. 9. et in Ann. of botany, vol. 2.
- Cervant.* Vincent. CERVANTES, prof. Mexicanus: Obs. in anal. de cienc. nat. Cum Lagasca et Humboldtio plura communicavit.
- Chaix.* . . CHAIX, ecclesiasticus Vapinci in Delphinatu, dein Baucii in Gallia provinciali, Villarfilii comes assiduus in itineribus per alpes. Obs. in Villarfilii flora Delphinatus.
- Chamiss.* Adalbert. a CHAMISSE, Kotzebuei comes in itinere περιβοιωῦ 1815—1818. Obs. in Kotzebuei itinerario, in Horis physicis berolinensibus et in Schlechtendalii Linnæa. Filices ex itinere reportatas Kanluffsio illustrandas tradidit.
- Choisf.* J. D. CHOISY: *Prodromus d'une monographie des Hypericinées.* Genève 1821. 4. Obs. in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. I. Adjuvit etiam Candolleum in prodromo elaborando.
- Choris.* Ludov. CHORIS, pictor in Kotzebuei περίπλοῦς. *Voyage pittoresque autour du monde.* Paris 1822. fol.
- Clarion.* . . CLARION: Obs. in Bullet. de la soc. philomath. Cum Palifoto et Candolleo plurima communicavit.
- Clark.* E. D. CLARKE, clericus: *Travels in various parts of Europe, Asia and Africa.* vol. 1—8. Lond. 1816. 8.
- Clement.* Simón de Rojas CLEMENTE, prof. Matritensis: *Ensayo sobre los lichenes de España.* Madr. 1811. 4. Obs. in Herrera agricultura general. vol. 1—4. Madr. 1818. 1819. 8.
- Clus.* Car. CLUSIUS, Atrebas, magnus peregrinator et instaurator rei herbariæ, tandem prof. Leidenfis (nat. 1525 † 1609): *Rariorum plantarum historia.* Antv. 1601. fol. *Curæ posteriores.* Antv. 1611. 4.
- Colebr.* H. Thom. COLEBROOKE, ad tempus præfes societ. bengal. Obs. in Asiatic researces, 9. 12. et in Transact. of Linn. soc. 12. 13.
- Coll.* Aloyf. COLLA: *Hortus ripulensis.* Taurin. 1824. 4. *Appendix* exstat in mem. di Torino, 31. Aliae obs. ib. vol. 25. 27.
- Collad.* Theod. Frider. COLLADON, Genevensis: *Histoire naturelle et médicale des Cafses.* Moutpell. 1816. 4.
- Colsm.* Jo. COLSMANN, prof. Havnensis: *Prodromus descriptionis Gratiatæ.* Havn. 1793. 8.
- Commel.* Jo. COMMELYN, senator et curator horti Amstelodam. († 1698): *Horti medici Amstelodanensis icones,* vol. 1. 2. Amst. 1697. 1702. fol.

- Commerf.* Philibert. COMMERSON, insignis peregrinator, Bugin-villaci navarchi comes, acutissimus scrutator, thesauros plantarum reliquit, que a Jussievo servantur. († 1773.)
- le Conte.* Jo. LE CONTE in Georgia Amer. bor. Plurimas legit plantas, quas cum Purshio et Elliottio communicavit. Obs. in Medical and philos. register, 2.
- Corr.* Joseph. CORREA de Serra, orator Lusitanicus († 1823): Obs. in Ann. du mus. et Transact. of Linn. soc.
- Coult.* Thom. COULTER: *Mém. sur les Dipsacées.* Genève. 1823. 4.
- Crantz.* Henr. Jo. Nepom. CRANTZ, prof. Vindobonenfis (nat. 1722 † 1799): *Classis Umbelliferarum emendata.* Vienn. 1767. 8. *Classis Cruciferarum emendata.* Vienn. 1769. 8. *Stirpes austriacae fasc. 1—6.* Vindob. 1769. 4.
- Cumin.* . . CUMINO: Obs. in act. taurin. 1805.
- Curt.* Gul. CURTIS, pharmac. Londinenfis († 1799): *Flora londinenfis,* vol. 1. 2. Lond. 1777 f. *Botanical magazine,* vol. 1—12. Lond. 1787—1798. 8.
- Cuss.* Petr. CUSSON, prof. Monspelienfis (nat. 1727 † 1783): Obs. in mém. de la soc. de médec. à Paris a. 1782. 1783.
- Cyrill.* Dominic. CIRILLO, prof. Neapolitanus, ad supplicium tractus 1799: *Plantarum rariorum regni neapolitani fasc. 1. 2.* Neapol. 1788. 1793. fol.
- Dalech.* Jac. DALECKAMP, medicus Lugdunenfis (nat. 1513 † 1588): *Historia generalis plantarum,* vol. 1. 2. Lugd. 1587. fol.
- Dalm.* . . DALMAN: Obs. in act. acad. holm. 1811.
- Danth.* . . DANTHOINE apud Lam. in encycl. bot. 2. p. 585.
- Deglund.* . . DEGLAND apud Loifeleur. flor. gall.
- Delil.* Alir. Rafen. DELILE, prof. Monspelienfis, Aegyptum a Napoleone occupatam perscrutatus est. *Florae aegyptiacae illustratio.* Paris 1813. fol. Pars operis splendidissimi: Description de l'Égypte. Multas mihi plantas largitus est.
- Delis.* D. DELISE: Obs. in Mém. de la soc. Linnéenne du Galva-dos, 1.
- Desf.* Renat. DESFONTAINES, prof. Parisienfis, Numidiam et Africam propriam 1783—1785 peragravit: *Flora atlantica.* vol. 1. 2. Paris 1800. 4. *Choix de plantes du corollaire des institut. de Tournefort.* Paris 1808. 4. *Tableau de l'école de botanique du jardin du Roi.* Paris 1815. 8. Obs. in Annal. et Mém. du muséum. Beneficam ejus voluntatem semper gloriabor.
- Desport.* . . DESPORTES: Obs. in plantas Genomanenses in Perfoonii enchiridio.
- Desrouff.* . . DESROUSSEAUX plura capita in Encycl. bot. vol. 4. elaboravit.
- Desv.* N. A. DESVAUX: *Journal de botanique.* vol. 1—5. Paris 1808—1814. 8.
- Dethard.* . . DETHARDING, medicus Rostochienfis. Plantas rariores megapolitanas et Willdenovio et mihi largitus est.
- Dew.* Chester DEWEY, collegii Gulielmi prof. in provincia Massachusetts. Obs. de caricibus in Silliman's amer. journ. 7—10. Insignem plantarum copiam ei debeo.
- Dicks.* Jac. DICKSON, Scotus, mercatu plantarum ficeatarum olarus (nat. 1733 † 1822): *Fasc. 1—4. plantarum cryptogamicarum Britanniae.* Lond. 1785—1801. 4. Obs. in Transact. Linn. soc.

- Dierb.** Jo. Henr. DIERBACH, prof. Heidelbergensis: *Flora Heidelbergensis*. 1819. 12. *Beyträge zu Deutschlands Flora*. Heidelb. 1825. 8.
- Diétr.** F. G. DIETRICH, hortulanus Ifenacensis: *Vollständiges Lexicon der Gärtnerey und Botanik*. Th. 1—10. Berl. 1802 f. 8.
- Dill.** Jo. Jac. DILLENIUS, prof. Gieffenfis, tum praefectus horti Elthamensis, demum prof. Oxonienfis (nat. 1687 †1747): *Catalogus plantarum circa Gieffam nascentium*. 1718. 8. *Hortus Elthamensis*. Lond. 1732. fol. *Historia muscorum*. Lond. 1741. 4.
- Dillw.** Lud. Weston. DILLWYN: *Synopsis of the british Conservae*, fasc. 1—20. Lond. 1802. fol. Interpretationem germanicam Weberus cum Mohrio inchoavit, non absolvit.
- Ditm.** L. P. F. DITMAR, senator Rostochienfis: *Die Pilze Deutschlands*, vol. 1., curante J. Sturm. Nürnberg. 1817. 12.
- Domb.** Jos. DOMBEY, per Peruviam peregrinatus est. (Nat. 1742 †1795.) Plurimas plantas Jussievo largitus est: plurimas ab ipso inventas Ruizius et Pavonius descripserunt.
- Don.** Dav. DON: *Prodromus florum nepalensis*. Lond. 1825. 8. Obs. in *Transact. of Linn. soc.*, in *Mem. of Werner. soc.* et in *Edinb. philof. journ.*
- Georg. DON, collector soc. horticulurae: fasciculos 9 plantarum Britanniae siccatarum 1804 et 1805 divulgavit.
- Donn.** Jac. DONN, praefectus horti Cantabrigienfis: *Hortus cantabrigienfis*, 1804. 8. ed. Pursh. 1815. 8.
- Dorthes.** .. DORTHEs: Obs. in *Journ. de physique*, 35.
- Draparn.** Jac. Phil. Raim. DRAPARNAUD, Mospeliensis, algarum scrutator.
- Dryand.** Jonas DRYANDER, custos musei Bankiani (nat. 1748 †1811). Obs. in *Philof. transact.*, in *act. acad. holm.*, in *Transact. soc. Linn.* Adjuvit etiam Aitonium seniore in edendo horto Kewensi.
- Dubois.** .. DUBOIS: *Méthode éprouvée, avec laquelle on peut parvenir facilement à connaître les plantes des environs d'Orléans*. Orléans 1803. 8.
- Duchesn.** Ant. Nicol. DUCHESNE: *Histoire naturelle des fraisiérs*. Paris 1766. 8.
- Ducluz.** J. A. P. DUCLUZEAU: *Essai sur l'hist. naturelle des Conserves des environs de Montpellier*. 1805. 8.
- Dufour.** Leo DUFOUR, medicus ad fanum S. Severi ad Aturum: Obs. in *annal. bruxell.* et in *ann. des scienc. nat.* 5. 8. Multas cum aliis plantas communicavit.
- Dufresn.** Petr. DUFRESNE: *Histoire de la famille des Valérianées*. Montpell. 1811. 4.
- Duham.** Henr. Ludov. DUHAMEL du Monceau, rerum maritimarum curator (nat. 1700 †1782): *Traité des arbres fruitiers*, vol. 1. 2. Paris 1768. 4. Editionem novam curarunt Poiteau et Turpin.
- Dum. Coursf.** .. DUMONT-COURSET: *Le botaniste cultivateur*, vol. 1—7. Paris 1811—1814. 8.
- Dun.** Mich. Felix DUNAL, ad tempus prof. Mospeliensis: *Histoire des Solanum*. Mospel. 1813. 4. *Solanorum generumque affinium synopsis*. Mospel. 1816. 8. *Monographie de la famille des Anonacées*. Paris 1817. 4. Adjuvit etiam Candolleum in elaborando prodromo.
- Dupuis.** DUPUIS, hortulanus parisiensis, cum Vahlío plantas communicavit.

- Durand.** Phil. DURAND: *De quibusdam Chloridis speciebus.* Mouspel. 1808. 4.
- Duroi.** Jo. Philipp. DUROI, medicus Brunsvicensis (nat. 1741 † 1785): *Die Harbke'sche wilde Baumzucht.* Th. 1. 2. Braunschw. 1771. 1772. 8.
- Duv.** Felix DUVAL: Obf. in *Mém. du mus. et in annal. bruxell.*
— Jeunet DUVAL, prof. Ratisbonensis: Obf. in Hoppe's Taschenbuch 1799.
- Eat.** ..EATON, Scholae Rensselaerianae in Albania collega: *Manual of botany.* New-York 1818. 8. Plantas, cum Torreyo et Deweyo communicavit.
- Edd.** ..EDDY: *Hortus Elginensis.* (1816.) 8.
- Ehrenb.** Christ. Gothofr. EHRENBERG, insignis per Aegyptum, Libyam et Arabiam peregrinator: *Sylvae mycologicae berolinenses.* Berol. 1818. 4. Obf. in *Horis phys. berol.*, in *Verhandel. der Ges. naturf. Freunde*, in *Jahrb. der Gewächsk.*, in *nov. act. nat. cur.*, in *Kunze's mykol. Heften.*
- Ehrh.** Frider. EHRHART, botanicus regius Hannover. († 1795): *Beiträge zur Naturkunde.* Th. 1—6. Hannov. 1787—1792. *Collectiones plantarum ab ipso siccatarum auctoritate valent.*
- Ell.** Stephan. ELLIOTT: *A sketch of the botany of South-Carolina and Georgia.* vol. 1. 2. Charlest. 1817 f. 8.
- Ellis.** Jo. ELLIS, mercator Londinensis († 1776): Obf. in *Philos. transact.* 57.
- Eschweil.** F. G. ESCHWEILER: *De fructificatione generis Rhizomorphae commentatio.* Elberf. 1822. 4. *Systema lichenum.* Norimb. 1824. 4.
- Esp.** Eugen. Jo. Christ. ESPER, prof. Erlangensis: *Icones fucorum.* Norimb. 1797—1799. 4.
- Etlng.** Andr. Ern. ETLINGER: *Diff. de Salvia.* Erl. 1777. 4.
- Euphras.** Beng. And. EUPHRASEN: *Reise nach der Insel Barthelemy, Eustache and Christoph.* Aus dem Schwed. Gott. 1798. 8.
- Falk.** Jo. Petr. FALK, Georgii comes per Sibiriac partem, Casani sibi mortem conscivit 1774. Obf. in *Georgi Bemerkungen einer Reise.* Petersb. 1775. 4.
- Fée.** A. L. A. FÉE, pharmacopola Parisiensis: *Essai sur les cryptogames des écorces exotiques officinales.* Paris 1824—1826. 4.
- Feuill.** Ludov. FEUILLEE, monachus doctissimus, botanicus regius, diu in Chili vixit. (Nat. 1660 † 1732.) *Journal des observations.* tom. 1—3. Paris 1714. 1725. 4.
- Ficin.** Henr. FICINUS, prof. Dresdensis: *Flora der Gegend um Dresden.* Th. 1. 2. 1821. 1823. 8.
- Fisch.** Ferdin. FISCHER, Halberstädiensis, primum horti Razumoviani prope Mosquam, jam horti academici Petropolitani praefectus. Obf. in *Mém. de la soc. d'hist. nat. de Moscou.* Ingentem orientalium plantarum messem Candolleo et mihi largitus est.
- Fl. wetter.** G. Gärtner, B. Meyer et J. Scherbius: *Oekonomisch-technische Flora der Wetterau.* Frkf. Th. 1—3. 1799—1802. 8.
- Flörk.** Henr. Gust. FLÖRKE, prof. Rostochiensis. Alpes noricas rhaeticasque sedulo scienterque peragravit, proventus et mecum et cum Willdenovio communicavit. *Deutsche Lichenen.* Lief. 1—10. Berl. 1815. *Collectio lichenum siccatorum cum idonea expositione.* Obf. in Hoppe's Taschenb., in *Schrader's Journ.*, in *Berl. Magaz.*

- Flot.* . . Δ **Flotow**, equitum levis armaturae centurio, eximius lichenum muscorumque indagator: Obf. in Jahrb. der Gewächsk.
- Flügg.* Jo. **FLÜGGE**, M. D.: *Graminum monographiae*. Hamb. 1810. 8.
- Forsh.* Petrus **FORSKÖL**, cum Niebuhrio Aegyptum et Arabiam peragravit (nat. 1732 † 1763): *Flora aegyptiaco-arabica*. Havn. 1775. 4. *Icones rerum naturalium*. Havn. 1776. 4.
- Forst.* Jo. Rein. **FORSTER**, Cookii comes in secundo περιπλω, demum prof. Halensis (nat. 1729 † 1798): *Characteres generum plantarum*. Lond. 1776. 4. Plantas plerasque a se inventas mihi donavit.
- — Filius Georgius, prof. Vilnensis, demum Moguntinus (nat. 1754 † 1794): *Prodromus florulae insularum australium*. Gott. 1798. 8. Idem in commentariis Gotting. 1787. floram Magellanicam illustravit.
- Furl. Forst.* Thom. **FURLEY FORSTER**, mercator Londinensis: *Flora Tunbrigensis*. Lond. 1816. 8. Obf. in Transact. soc. Linn. 5.
- Fouger.* Aug. Dionys. **FOUGEROUX** de Bondaroy, acad. Paris. sodalis: Obf. in act. acad. Paris. 1785. 1786.
- Fraser.* Jo. **FRASER**: *Thalia dealbata*, tabula singularis, del. Sowerby. 1794. fol. *Catalogus plantarum in America boreali incenturum*. 1813. 8.
- Fr. Fries.* El. **FRIES**, adjunctus in univers. Lundinensi: *Novitiae florae suecicae*. P. 1—8. 1814 f. *Observationes mycologicae*. Havn. vol. 1. 2, 1815. 1818. 8. *Flora hallandica*. Lund. 1818. 1819. 8. *Systema mycologicum*. vol. 1. 2. Lund. 1821. 1823. 8. *Plantae homonemaeae*. Lund. 1825. 8. Obf. in act. acad. holm. et in Kunze's mykol. Hefsten. Siccatorum lichenum et scleromycetum collectiones distribuit.
- Fröl.* Jo. Aloyf. **FRÖLICH**, medicus Ellwangenensis Würtenberg.: *De Gentiana libellus*. Erl. 1796. Obf. in Ulteri Ann. 1.
- Fuchs.* Leon. **FUCHS**, prof. Tubingensis (nat. 1501 † 1565): *Historia stirpium*. Basil. 1542. fol.
- Funch.* Henr. **FUNCK**, pharmacopola Gefrees in Franconia. Plantas cryptogamicas, praesertim muscos, sedulo collegit: siccatas divulgavit: *Kryptogamische Gewächse des Fichtelgebirges*, fasc. 1—31. 1801 f. 4. *Deutschlands Moose*, ein Taschenherbarium. Bayreuth 1820. 8.
- Gärtn.* Jos. **GÄRTNER**, medicus Calwenensis Würtenb. (nat. 1732 † 1791): *De fructibus et seminibus plantarum*. vol. 1. 2. Stuttg. 1788. 1791. 4. *Supplementum*, ed. fil. Car. Frid. Lipf. 1805. 4.
- Garcin.* Laurent. **GARCIN**, Indiam orientalem et Persiam peragravit. Obf. in Philos. transact. 36. 38. 45. 46. Herbario ejus usus est N. L. Burmann in edenda flora indica, apposita Garcini nomenclatura.
- Garid.* Jos. **GARIDEL**, prof. Aquis sextiis (nat. 1659 † 1737): *Histoire des plantes, qui naissent autour d'Aix*. 1715. fol.
- Gaudich.* . . **GAUDICHAUD**, comes navarchi Freycinet in itinere περιπρω (1817—1820). Insulas oceani pacifici, Moluccas ultiores, Mascarenas et Falklandii, ubi naufragium passi sunt, sedulo perquisivit. Floram insularum Falklandii Mirbelius edidit in Ann. des scienc. nat. 5. Messem largam plantarum cum Candolleo et Schwägrichenio communicavit.
- Gaudin.* Jo. **GAUDIN**, praeco sacer Neviduni: *Agrostologia helvetica*. vol. 1. 2. Paris 1811. 8.

- Gay.* Jo. GAY, marchioni Sémonville ab epistolis, Paris. Obf. in Mém. du mus. *Monographie des Lasopétalées*. Paris 1821. 4. *Fragment d'une monographie des Buttneriaccés*. Paris 1823. 4. Ex itinere per Pyrenaeos montes fegetem plantarum reportavit, cujus et me participem facit.
- Geisel.* Eduard. Ferdin. GEISELER, medicus Gedanensis: *Crotonis monographia*. Hal. 1807. 8.
- Gerard.* Ludov. GERARD, M. D.: *Flora gallo-provincialis*. Paris 1761. 8.
- Giesek.* Car. Ludov. (Metzler-) GIESEKE, prof. Dublinensis, in Grönlandia 1806—1813 degit: multas plantas et Hornemannuo et aliis impertiit.
- Paul. Dieter. GIESEKE, prof. Hamburgensis. Cum aliis iconum fasc. 1. absque titulo edidit, Hamb. 1777. fol.
- Gilib.* Jo. Eman. GILIBERT, ad tempus prof. Vilnensis: *Flora lithuanica inchoata*. P. 1. 2. Grodno. 1781. 1782. 8. *Chloris grodnensis*, in Usteri delect. opusc. 2.
- Ging.* . . DE GINGINS, in Candollei prodromo plura elaboravit genera. Obf. in Schlechtendalii Linnaea.
- Gled.* Jo. Theoph. GLEDITSCH, prof. Berolinensis (nat. 1714 † 1786): *Methodus fungorum*. Berl. 1753. 8. Obf. in act. acad. berol. 1766.
- Glox.* Benj. Petr. GLOXIN: *Observationes botanicae*. Argent. 1785. 4.
- Gmel.* Jo. Georg. GMELIN, acad. Petropolit. sodalis (nat. 1709 † 1755). Omnis Sibiriae, in qua decennium degerat, floram eximie aperuit. *Flora sibirica*. tom. 1—4. Petrop. 1747—1769. 4.
- C. C. Gmel.* Carol. Christ. GMELIN, prof. Carolsruh.: *Flora badensis alsatica*. vol. 1—4. Carolsruh. 1805—1826. 8.
- J. F. Gmel.* Jo. Frider. GMELIN, prof. Gottingensis (nat. 1748 † 1804): *Systema vegetabilium*. vol. 1. 2. Gott. 1791. 8.
- S. G. Gmel.* Sam. Gottl. GMELIN, acad. Petropolit. sodalis, oras maris caspici peragravit (nat. 1743 † 1774): *Historia fucorum*. Petrop. 1768. 4. *Tagebuch der Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reichs*. Th. 1—3. Altenb. 1774—1783. 4. Obf. in nov. comment. acad. petropol. 12. 14.
- Gochn.* Frider. Car. GOCHNAT: *Tentamen de plantis cichoraceis*. Argent. 1808. 4.
- Goldb.* Car. Lud. GOLDBACH, prof. Mosquensis (nat. 1793 † 1824): *Diff. Croci historiam sistens*. Mosqu. 1816. 8. Obf. in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Mosc.
- Gold.* . . GOLDIE, Canadam invisit. Obf. in Edinb. philos. journ.
- Gomez.* Bern. Ant. GOMEZ: Obf. in act. acad. Olysipon. 3.
- Gooden.* Sam. GOODENOUGH, episcopus Carleoli. Obf. in Transact. soc. Linn. 2. 3.
- Gouan.* Ant. GOUAN, prof. Mospeliensis: *Hortus mospeliensis*. Lugd. 1762. 8. *Flora mospeliensis*. Lugd. 1765. 8. *Illustrationes et observationes botanicae*. Turic. 1773. fol.
- GRAHAM.* Navarchus cum conjuge literata Chili adiit, mortui ibi vidua largam reportavit messem.
- Prof. Edinburgensis: Obf. in Edinb. philos. journ.
- Gratel.* J. P. A. G. GRATELOUP: *Observ. sur la constitution de 1806, avec un appendice sur les Conservees*. Montpell. 1806. 4. Obf. in Journ. de médec. 4.
- Greov.* Rob. Kaye GREVILLE: *Scottish cryptogamic flora*. vol. 1—4. Edinb. 1822 f. 8. *Flora Edinensis*. 1824. 8. Obf. in Transact.

- loc. Linn., in Mem. of Werner. loc. et in Edinb. philos. journ.
- Gronov.** Jo. Frid. GRONOVIVS, senator Leidensis (nat. 1690 † 1762): *Flora virginica* (e Claytoni collectionibus). vol. 1. 2. LB. 1743. 8.
- Güldenst.** J. Ant. GÜLDENSTÄDT, acad. Petropolit. sodalis (nat. 1745 † 1781): *Reisen durch Rußland und in caucasischen Gebirge*. Th. 1. 2. Petersb. 1787—1791. 4.
- Günth.** Christ. GÜNTHER, pharmacopola Wratislaviensis, acutus plantarum Silesiacarum scrutator. Cum Schummelio edidit: *Herbarium vivum plantas Silesiacas exhibens*, cent. 1—9. Wratisl. 1809. *Enumeratio stirpium phanerogamarum, quae in Silesia sponte proveniunt*. Wratisl. 1824. 8. Bergeri plantas italicas fortitus est. Multas ab eo rariores plantas accepi.
- Guerf.** L. B. GUERSENT: Obs. in Bullet. de la soc. philomath.
- Gunn.** J. Ern. GUNNER, episcopus Nidrosiae in Norvegia (nat. 1718 † 1773): *Flora norvegica*. P. 1. 2. Nidros. et Havn. 1776. 1772. fol. Obs. in Norfke Vidensk. Selsk. Skrift. 4.
- Gusson.** Jo. GUSSONE, praefectus horti botanici, quem Dux olim Calabriae, jam Rex Siciliae utriusque, prope Panormum stabiliverat. *Catalogus plantarum, quae in horto regio affereantur*. Neapol. 1821. 8. Ingentem plantarum numerum ipsius liberalitati debeo.
- Habliz.** Car. Lud. HABLIZL, agriculturae in Tauria curator: *Description physique de la Tauride*. Haye. 1788. 8.
- Hacqu.** Balth. HACQUET, prof. Leopoltanus (nat. 1740 † 1814): *Plantae alpinae carnolicae*. Vindob. 1782. 4.
- Hänk.** Thadd. HÄNKE, Bohemus, magnus peregrinator, Americam australem, Malaspinam duce, Californiam, Mexico, insulas Philippinas et Marianas perscrutatus est, novissime in terra Guaranitica degit (nat. 1760 † 1817). Ingentes thesauros plantarum incognitarum, et quas Neaeus legerat, congeffit, jam in museo bohemico servatas. *Reliquiae Hänkeanae*. vol. 1. Prag. 1825. fol. Obs. in Jacquini collect. 2. et in Abl. der böhmischen Gesellsch. 1786.
- Hagen.** Car. Gothfr. HAGEN, prof. Regiomontanus: *Tentamen historiae lichenum*. Regiom. 1782. 4. *Preussens Pflanzen*. Th. 1. 2. Königsb. 1818. 8.
- Hall.** Gul. HALL: Obs. in Transact. soc. Edinb. 3.
- Alb. AB HALLER, prof. Gottingensis, dein praefectus pagi Bern. (nat. 1708 † 1777): *Historia stirpium Helvetiae indigenarum*, tom. 1—3. Bern. 1768. fol. *Opuscula botanica*. Gott. 1749. 8. Obs. in comment. Gotting. et in commerc. liter. Noric.
- Hall. fl.** Alb. AB HALLER, prioris filius, senator Bern. (nat. 1753 † 1823): Obs. in Römeri Archiv. 1.
- Hamilt.** Franc. HAMILTON, olim Buchanan, med. Dr. et ad tempus praefectus horti Calcuttensis, omnem Indiam orientalem cum Nepala perscrutatus est. Obs. in Asiatic researches et Transact. of Linn. soc. Multas plantas largitus est Smithio, Donio, Hookero etc.
- Hartm.** C. J. HARTMANN: *Handbok uti Scandinaviens flora*. Stockh. 1820. 8.
- Haw.** Adrian. Hardy HAWORTH: *Observations on the genus Mesembrianthemum*. Lond. 1794. 8. *Miscellanea naturalia*. Lond. 1803. 8. *Synopsis plantarum succulentarum*. Lond. 1812. 8. *Supplementum*. Lond. 1819. 8.

- Hayn.** Frid. Gottl. HAYNE, prof. Berolinensis: *Getreue Abbildungen und Zergliederungen deutscher Gewächse*. Berl. 1798 f. 4. *Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneyk. gebräuchlichen Gewächse*. B. 1—10. Berl. 1805—1826. 4.
- Hedw.** Jo. HEDWIG, prof. Lipsienfis (nat. 1730 † 1799): *Fundamentum historiae naturalis muscorum frondosorum*. P. 1. 2. Lipf. 1782. 4. *Theoria generationis et fructificationis plantarum cryptogamicarum*. Lipf. 1798. 4. *Descriptio et adumbratio muscorum frondosorum*. vol. 1—4. Lipf. 1787—1797. fol. *Species muscorum frondosorum*, ed. Schwägrichen, Lipf. 1801. 4.
- H. Hedw.** Romanus HEDWIG, prioris filius (nat. 1772 † 1806): *Obf. in Weber's et Mohr's Archiv*. 1.
- Heist.** Laur. HEISTER, prof. Helmstädiensis (nat. 1683 † 1758): *Descriptio Brunsvigiae*. Brunfv. 1753. fol.
- Hellen.** Car. Nicol. HELLENIIUS, prof. Aboënfis: *Diff. de Hippuride*. Abo. 1786. 4. recens. in Ulteri Delect. opusc. *Obf. in act. acad. holm.* 1788.
- Henck.** Leo Gomes HENCKEL a Donnersmark, a consil. regim. Merseburgi: *Adumbrationes plantarum in horto halens.* Hal. 1805. 4. *Enumeratio plantarum circa Regiomontum crescentium*. Regiom. 1817. 8.
- Herb.** Gul. HERBERT, clericus in Spofforth Angliae († 1825): *Appendix to the botanical magazin*. 1821. 8. *Obf. in eodem promtuarario*.
- Herbich.** Fr. HERBICH, medicus militaris austriacus: *Obf. in Regensb. bot. Zeitung* 1823. 1824.
- Hergt.** Frider. HERGT, medicus Pöfsnek in Saxonia Coburg. in Hoppe's Taschenb. 1807.
- Herit.** Car. Lud. L'HÉRITIER de Brutelle (nat. 1746 † 1800): *Virgilia* f. l. et a. *Stirpes novae aut minus cognitae*, fasc. 1—6. Paris 1784. 1785. fol. *Geraniologia* 1787. 1788. fol. *Sertum anglicum* 1788. fol. *Cornus* 1788. fol.
- Herm.** Paul. HERMANN, diu in Ceilona vixit, dein prof. Leidenfis (nat. 1640 † 1695): *Catalogus horti lugduno-batavi*. LB. 1687. 8. *Paradisus batavus*. LB. 1705. 4. *Museum ceilanicum*. 1726. 8.
- Heyn.** Benj. HEYNE, diu in India orientali vixit († 1819): *Observationes ejus plerasque divulgavit Roxburghius, Gareyus et Rothius* (nov. spec.).
- Hilar.** Aug. S. HILAIRE, acad. Parif. focius, Brasiliam et terram Guaraniticam perferutatus est: *Plantes usuelles des Brasiliens*, fasc. 1—6. Paris 1824. 1825. 4. *Flora Brasiliae meridionalis*, fasc. 1—4. Paris 1824—1826. 4. *Obf. in Mém. du mus. et in Ann. des scienc. nat.*
- Hill.** Jo. HILL, medicus Londinensis († 1775): *The vegetable system*, vol. 1—26. Lond. 1759—1775. fol.
- Hilsenb.** Car. Theod. HILSENBERG, Erfurtenfis, pro Siebero plantas in Mascarenis legit, obiit in Madagascaria 1824.
- Hökert.** .. HÖKERT: *Diff. de Ammi*. Abo. 1810. 4.
- Hoffm.** Georg. Franc. HOFFMANN, prof. Gottingenfis, dein Mosquenfis (nat. 1760 † 1826): *Enumeratio lichenum*, fasc. 1. Erl. 1784. 4. *Historia salicium iconibus illustrata*. vol. 1. 2. Lipf. 1785. 1791. fol. *Vegetabilia cryptogama*, fas. 1. 2. 1787. 1790. 4. *Plantae lichenosae*, vol. 1—3. Lipf. 1789—1801. fol. *Deutschlands Flora* (Cryptogamie). Erl. 1795. 12. *Deutschlands Flora*, ed. 2. vol. 1. 2. Erl. 1800. 1804. 12. *Genera Umbelliferarum*.

- Mosqu. 1816. 8. Obs. in comment. Gotting., in mém. de la Soc. d'hist. nat. de Moscou etc.
- Hofman-Bang.** N. HOFMAN-BANG, dominus praediorum in Scandia: *De usu conservarum*. Havn. 1818. 8. Horneimauo et Lyngbyo plantas a se inventas largitus est.
- Hofmannsegg.** Jo. Centur. Comes AB HOFMANNSEGG, Dresdenfis, vitam et facultates rei herbariae augendae rara magnanimitate dicavit, diu (1797—1801) in Lusitania degit, Sieberum in Brasiliam misit, munificentia regia splendidissimum opus: *Flore portugaise*, tab. 1—85. 1809—1814. fol. instruxit atque ornavit. Ingentem copiam plantarum ab ipso Willdenovius habuit.
- Holl.** Frid. HOLL, pharmacopola, industrius plantarum collector.
- Holmsk.** Theod. eques HOLMSKIOLD, dominus praediorum in Scandia (nat. 1732 † 1794): *Beata ruris otia, fungis danicis impensa*. Havn. 1790. fol.
- Hook.** Gul. Jackson HOOKER, prof. Glasgoensis: *Jungermaniarum icones*, fasc. 1—20. Lond. 1813. fol. Floram londinensem Curtifii ab anno 1816 inde denuo edidit. *Muscologia britannica*. Lond. 1818. 8. *Musci exotici*, vol. 1. 2. Lond. 1818. 1820. 8. *Flora scotica*. Edinb. 1821. 8. *Exotic flora*, vol. 1—3. Edinb. 1823—1826. 8. Obs. in Edinb. philos. journ.
- Hopk.** Thom. HOPKIRK: *Flora Glottiana*. Glasg. 1813. 8.
- Hopp.** Dav. Henr. HOPPE, Ratisbonensis, egregius plantarum collector: *Botanisches Taschenbuch* 1790—1807. Regensb. 8. Obs. in Regensb. botan. Zeitung, in Denkw. der bot. Gesellsch. zu Regensburg, in Sturm's Flora.
- Hornem.** Janus Wilken HORNEMANN, prof. Havniensis. Florae danicae vol. 8—10. illustravit. *Hortus regius botanicus Haoniensis*. vol. 1. 2. Havn. 1813. 1815. 8. *Förfög til en oekonomisk Plantelaere*. Kiobenh. 1821. 8. Obs. in Tidkrift for Naturvidensk.
- Hornsch.** Frid. HORNSCHUCH, prof. Gryphiae: *Diff. de Voitia et Systylio*. Erl. 1818. 4. *Bryologia germanica* (socio Nees). vol. 1. Norimb. 1823. 8. Obs. in Horis phys. berol., in nov. act. nat. cur. et in Regensb. bot. Zeitung.
- Host.** Nic. Thom. HOST, archiater palatinus Austr.: *Synopsis plantarum in Austria sponte crescentium*. Vindob. 1797. 8. *Icones et descriptiones graminum austriacorum*. vol. 1—4. Vienn. 1801—1814. fol.
- Houssl.** Gul. HOUSTOUN, diu in nova Hispania vixit († 1733): *Reliquiae Houstounianae*, ed. Banks. Lond. 1781. 4.
- Houtt.** Mart. HOUTTUYN, medicus Amstelodamensis: *Linne's vollständiges Pflanzensystem*. Th. 1—14. Nürnberg. 1777—1788. 8. Obs. in Verhand. van het Maatsch. te Harlem, 21. en van het Genootsch. te Vlissingen, 10.
- Hudf.** Gul. HUDSON, pharmacopola Londinensis († 1793): *Flora anglica*, ed. 2. Lond. 1778. 8.
- Humb.** Alex. AB HUMBOLDT, perillustri doctissimusque peregrinator, acutissimus naturae interpres: *Florae sribergensis specimen*. Berol 1793. 4. Cum socio Amat Bonpland: *Plantes équinoxiales*, vol. 1. 2. Paris 1808—1816. fol. *Melastomées* 1809—1816. Adjutore Kunthio: *Nova genera plantarum*, vol. 1—7. Paris 1815—1825. fol. *Mimoses et autres plantes légumineuses*. Paris 1819. fol.

- Hunter.* Gul. HUNTER, medicus in Ind. orient.: Obs. in Asiatic research. 9. et in Transact. soc. Linn.
- Jack.* Gul. JACK, diu in India oriental. vixit: Obs. in Transact. soc. Linn., in Malayan miscell. et in Roxb. fl. ind. 2.
- Jacksf.* Georg. JACKSON: Obs. in Transact. soc. Linn. et in Andrews botan. reposit.
- Jacqu.* Nic. Jos. A JACQUIN, prof. Vindobonensis (nat. 1727 † 1820): *Enumeratio stirpium in agra Vindobonensi.* Vienn. 1762. 8. *Selectarum stirpium americanarum historia.* Vienn. 1763. fol. *Observationes botanicae.* P. 1—4. Vienn. 1764—1771. fol. *Hortus botanicus vindobonensis.* P. 1—3. Vienn. 1770—1776. fol. *Flora austriaca,* tom. 1—5. Vienn. 1773—1778. fol. *Miscellanea austriaca,* vol. 1. 2. Vienn. 1778. 1781. 4. *Icones plantarum rariorum,* vol. 1—3. Vienn. 1781—1793. fol. *Collectanea ad botanicam, chemiam et historiam naturalem spectantia,* vol. 1—5. Vienn. 1786—1796. 4. *Oxalis.* Vienn. 1792. 4. *Hortus schönbrunnensis,* vol. 1—4. Vienn. 1797—1804. fol. *Fragmenta botanica,* Vienn. 1800—1809. fol. *Stapeliae cultae.* Vienn. 1806—1815. fol.
- Jacqu. f.* Jos. Franc. A JACQUIN, prioris filius, prof. Vindobonensis: *Eclogae botanicae,* vol. 1. Vienn. 1816. fol.
- Jan.* Georg. JAN, prof. Parmensis. Flora Italiae superioris cent. 1—10. Sunt plantae siccatae. (1818.) Herbarium portatile. 1820. 8.
- Jaum.* in Duhamel ed. nov.
- Jon.* Gul. JONES, iudex summus in Bengalia († 1794): Obs. in Asiatic research. 2.
- Isert.* Paul. Erdm. ISERT: *Reise nach Guinea.* Kopenh. 1790. 8. Plantarum guineensium copiam et Vablio et Willdenovio largitus est.
- Jürg.* G. H. B. JÜRGENS, actor caussarum Jeveranus. Algarum siccatarum copiam fasciculis pluribus divulgavit, multas alias mihi donavit.
- Jussf.* Ant. Laurent. A JUSSIEU, prof. Parisiensis: *Genera plantarum, secundum ordines naturales disposita.* Paris 1789. 8. Obs. in Annal. et Mém. du mus.
- Adr. Jussf.* Adrianus A JUSSIEU, prioris filius: *De Euphorbiacearum generibus tentamen.* Paris 1824. 4. Obs. in Mém. de la soc. d'histoire nat. de Paris, 2. et in Ann. des scienc. nat. 2.
- J. Jussf.* Josephus A JUSSIEU, Antonii Laurentii patris, Condaminium comitatus est per Americam australem, dein solus remansit, aerumnis tandem et livore Hispanorum atrocique confectus succubuit. († 1747.) Heres nepos reliquiarum patris.
- Ives.* Eli IVES, prof. in collegio Yaleano novae Caesareae: Obs. in Silliman's amer. journ.
- Kämpf.* Engelb. KÄMPFER, medicus, diu in Persia, India orientali, Java et Japonia vixit, demum archiater comitis Lippii (nat. 1651 † 1716): *Amoenitates exoticae.* Lemgov. 1712. 4. Icones plantarum japonicarum edidit Jos. Banks. Lond. 1791. fol.
- Kaulf.* Georg. Frider. KAULFUSS, prof. Halensis: *Enumeratio filicum.* Lips. 1824. 8. *Erfahrungen über das Keimen der Choren.* Leipz. 1825. 8. In Sturmii flora muscorum frondosorum fasc. 15 et 16. claboravit et ornavit. Obs. in Regensb. bot. Zeitung.

- Ker.** Jo. *Bellenden-Gawler*, dein KER: Opera periodica, Botanical magazine et botanical register ad tempus instruxit et illustravit. Obs. in Annals of botany et Journ. of science and the arts.
- Kin.** ..KIN in Philadelphia, plantas a se collectas Elliottio donavit.
- Kit.** Paul. KITABEL, prof. Pestinensis (†1813): *Descriptions et icones plantarum rariorum Hungariae*, vol. 1—3. Vindob. 1803—1812. fol. Plurimas plantas ipsi debeo.
- Klein.** ..KLEIN, medicus missionis evangelicae in Tranquebar, Willdenovii amicus, cum quo ingentem plantarum numerum communicavit.
- Knight.** v. *Salisbury*.
- Koch.** Jos. KOCH, prof. Erlangensis: Obs. in nov. act. nat. cur. et in Regensb. bot. Zeit. Cum Mertensio floram germanicam edidit.
- Köl.** Georg. Lud. KÖLER, prof. Moguntinus: *Descriptio graminum in Germania et Gallia sponte nascentium*. Frcf. 1812. 8.
- Köll.** Jo. Lud. Christ. KÖLLE: *Spicilegium observationum de Aconito*. Erl. 1788. 8.
- König.** Jo. Gerard. KÖNIG, medicus missionis evangelicae in Tranquebar (nat. 1728 †1785). In Retzii observationibus, im Naturforscher (20, 23.) et in Phytogr. Sällsk. handl. 1. ipsius animadversiones et commentarii existant. Schrebero imprimis et Retzio plantas largitus erat.
- Car. König cum Jo. Sims edidit Annals of botany, vol. 1. 2. Lond. 1805. 1806. 8., in quibus plures ejus observationes.
- Krapf.** Car. A KRAFF: *Beschreibung der um Wien wachsenden essbaren Schwämme*. 1. 2. Wien 1782. 4.
- Kunth.** Car. Sigism. KUNTH, Humboldtii adjutor: *Synopsis plantarum aequinoctialium orbis novi*. vol. 1—4. Paris 1822—1825. 8. Obs. in Mém. du mus. et in Ann. des scienc. nat. Vid. et Humb.
- Kunz.** Gustav. KUNZE, prof. Lipsiensis: *Mykologische Hefte*, 1. 2. Leipz. 1817. 1823. 8. Obs. in Regensb. bot. Zeitung. Plantarum cryptogamicarum insignem copiam ipsi debeo.
- Labill.** Jac. Jul. LABILLARDIÈRE, acad. Parisiensis socius, Syriam primum 1787 invisit, dein cum navarcho Entrecasteaux, ad investiganda Lapeyroussii vestigia, in oceanum pacificum missus, novae Hollandiae, Terrae Diemen et novae Caledoniae floram egregie aperuit. *Icones plantarum Syriae rariorum*. dec. 1—5. Paris 1791—1812. 4. *Novae Hollandiae plantarum specimen*. vol. 1. 2. Paris 1804—1806. fol. *Sertum austro-caledonicum*. vol. 1. 2. Paris 1824. 1825. fol. Multas ipsi debeo plantas rarissimas.
- Laestad.** L. L. LAESTADIUS, jam praeco facer in Suecia, Lapponia 1821 peragravit: Obs. in act. acad. holm. 1822.
- Lag.** Marian. LAGASCA, prof. Matritensis, jam exul Londini: *Amenidades naturales de las Españas*. Orihucla. 1811. 4. *Elenchus plantarum, quae in horto bot. matritensi colebantur*. Matrit. 1816. 4. Obs. in Herrer. agricultur. ed. nova. Multas et mihi et aliis plantas largitus est.
- Lam.** Jo. Bapt. Monet DE LAMARCK, acad. Paris. sodalis: *Flore française*, vol. 1—3. Paris 1778. 8. *Encyclopédie méthodique. Botanique*. vol. 1—4. Paris 1783—1796. 4. *Journal d'hi-*

- histoire naturelle*, vol. 1. 2. Paris 1792. *Illustrations des genres*, vol. 1—4. Paris 1791 f. 4. Herbarium ejus ditissimum celsit Röpero, prof. Basiliensi.
- Lamb.** Aylmer Bourk. LAMBERT, possessor herbarii locupletissimi, in quo et Ruizii Pavoniique et Forsteri et Pallasii aliorumque reliquiae servantur: *Description of the genus Cinchona*. Lond. 1797. 4. *Description of the genus Pinus*. Lond. 1803. fol. nov. ed. 1823 f. Obf. in *Transact. soc. Linn.*
- Lam^x.** Jo. Vincent. Felix LAMOUREUX, Agiensis, Cadomi vixit (nat. 1779 †1825): *Diff. sur plusieurs espèces de Fucus*. Agen. 1805. 4. *Essai sur les Thalassiphytes*. Paris 1813. 4. *Ann. du mus.* 20. *Histoire générale des Polypiers*. Paris 1816. 8.
- Lang.** Ad. Fr. LANG, pharmacopola Pestinensis, plantas hungaricas siccatas distribuit.
- Langsd.** Georg. a LANGSDORFF, Heidelbergensis, jam orator ruthenicus in Brasilia, Krusensternii comes in itinere περιουσιμῶν, redux per Asiam borealem. Fischerus filicum rariorum a Langsdorffio inventarum fasciculum 1809 edidit. Ipse plantarum innumeram copiam et Fischeri et Martio aliisque largitus est.
- Lapeyr.** Philipp. Picot-LAPEYROUSE, metallorum sylvarumque curator, prof. Tolosanus: *Flore des Pyrénées*, dec. 1—4. Paris 1795—1801. fol., cujus partem facit monographia Saxifragarum. *Histoire abrégée des plantes des Pyrénées*. Toulouf. 1813. 8. *Supplément à l'histoire*, Toulouf. 1813. 8.
- Lapierre.** .. LAPIERRE: Obf. in *Journ. de phys.*
- Laroch.** Franc. LAROCHE: *Eryngiorum historia*. Paris 1808. fol. Idem textum vol. 5—7. Liliacearum Redoutei curavit.
- Latourr.** Max. Ant. LATOURRETTE, monetarius Lugduni (nat. 1729 †1793): Obf. in *Journ. de phys.* tom. 20.
- Laur.** Fr. LAURER, professor Gryphiae: Obf. in *Schlechtendalii Linnaea*.
- Lauth.** Thom. LAUTH: *Diff. de Acere*. Argent. 1781. 4.
- Lavr.** .. LAWRENCE, pictrix. *Collection of roses from nature*. Lond. 1799 f. fol.
- Laxarsf.** J. LAXARSA, Mexicanus: Obf. cum Candolleo communicata in *Ann. des scienc. nat.* 3.
- Laxm.** Eric. LAXMANN, praeco sacer in Kolywan Sibir. (†1796): Obf. in *nov. comment. acad. Petrop.* 15. 16. 18. et in *Pallas neuen nord. Beytr.* 3.
- Leandr.** P. LEANDRO do Sacramento, praefectus horti botanici in Rio Janeiro: Nova plantarum genera in *act. acad. monach.* 7.
- Lechen.** v. *Leshen*.
- Ledeb.** Car. Frid. LEDEBOUR, prof. Dorpatensis, Imaum peragravit. *Diff.: plantarum domingensium decadem sistens*. Gryph. 1805. 4. Obf. in *act. acad. petropol.* Plantas orientales multas mihi largitus est.
- Lee et Kenned.** .. LEE and KENNEDY, horticultores in Hammer-Smith prope Londinum, plantas novas plurimas introduxerunt.
- Leers.** Jo. Dan. LEERS, pharmacopola Herborn. (nat. 1727 †1774): *Flora Herbornensis*. 1775. 8.
- Lehm.** Jo. Christ. Georg. LEHMANN, prof. Hamburgensis: *Monographia generis Primularum*. Lips. 1817. 4. *Generis Nicotianarum historia*. 1818. 4. *Plantae e familia Asperifoliarum*. P. 1. 2. Berol. 1818. 4. *Monographia generis Potentillarum*. 1820. 4. *Icones plantarum rariorum*, fasc. 1—4. 1820 f. fol. Obf. in *Berl. mag.* 8. Multas ipsi plantas debeo.

- Lejeun.* A. L. S. LEJEUNE, medicus Spadanus: *Flore des environs de Spa*. vol. 1. 2. Liège 1812. 1813. 8.
- Lepsch.* Iwan LEPECHIN, acad. Petropolit. sodalis: *Tagebuch der Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reichs*. Th. 1-3. Altenb. 1774-1783. 4. Obs. in nov. comment. acad. Petrop. 19. in act. ejusdem acad. 1781. 1783.
- Lepellet.* .. LEPELLETIER: Obs. in Ann. du mus. 8.
- Leschen.* *Lechen.* .. LESCHENAUULT *de la Tour*, Baudini navarchii in $\pi\epsilon\sigma\tau\alpha\lambda\omega$ comes, insulas Moluccanas, Javam, Sumatram et Indiam orientalem perscrutatus est: dein praefuit horto botanico Pondicheriensis. Obs. in Mém. du mus.
- Lewis.* Meriwether LEWIS, proconsul Louisianae, cum duce bellico Dan. Clark 1804-1806 iter per Americam borealem ad flumen usque Columbiae suscepit. Plantas collectas Purshio donavit.
- Libert.* Maria Anna LIBERT, virgo rei herbariae gnara, Malmudariensis: Obs. in annal. bruxellens. 6.
- Libosch.* .. LIBOSCHÜTZ: Obs. in mém. de la soc. d'hist. nat. de Moscou, 5.
- Lichtenst.* Henr. LICHTENSTEIN, insignis zoologus, prof. Berolinensis, Africa australi peragrata, egregiam plantarum copiam reportavit, quae Willdenovio cesserunt.
- Lightf.* Jo. LIGHTFOOT, clericus in Nottinghamia (nat. 1735 † 1788): *Flora scotica*. vol. 1. 2. Lond. 1777. 8.
- Liljebl.* Sam. LILJEBLAD, prof. Upsaliensis (nat. 1761 † 1815): *Utkast til en svensk flora*. Upsal. 1798. 8. Obs. in act. acad. holm. 1793.
- Lindl.* Jo. LINDLEY: *Rosarum monographia*. Lond. 1820. 8. *Collectanea botanica*, fasc. 1-3. Lond. 1823. fol. *Digitalis monographia*. Lond. 1821. fol. Opus periodicum: Botanical register, copiosis ornavit illustrationibus. Obs. in Transact. soc. Linn. et Quarterly journ. of Sciences 18.
- Link.* Henr. Frider. LINK, prof. Berolinensis, cum Comite Hofmannsegg Lusitaniam perlustravit, textum operis splendidissimi: *Flore portugaise*, elaboravit. Cum Ottone praefecto edidit: *Abbildungen und Beschreibungen seltener Pflanzen im Berl. Garten*, fasc. 1-9. Berl. 1821 f. *Enumeratio plantarum horti berolinensis altera*. vol. 1. 2. Berol. 1821. 1822. 8. *Jahrbücher der Gewächskunde*, B. 1. Berl. 1820. 8. Obs. in *Horis phys. berol. et Berl. mag.* 3. 7. Multas mihi plantas largitus est.
- L.* Carol. LINNAEUS, auctor hujus operis, stator rei herbariae superioris, prof. Upsaliensis. (Nat. 1707 † 1778.) Hoc opus primum prodiit forma longe aliena, magnopere contracta, tanquam pars *Systematis naturae*. LB. 1735. fol. Sequentes editiones sensim uberioris fuerunt, ultima, quam Linnaeus curavit, est duodecima Holm. 1767. 8. Decimam tertiam diverso modo elaborarunt tum Jo. Fr. Gmelin, tanquam partem *Systematis naturae*, tum Jo. Andr. Murray. Gott. 1774. Decimam quartam idem 1784. Decimam quintam C. H. Perfoon. Gott. 1797. 8.
- — *Species plantarum*, ed. 1. vol. 1. 2. Holm. 1753. 8. Ed. 2. vol. 1. 2. Holm. 1762. 1763. 8. *Mantissa plantarum*. 1. Holm. 1767. 8. 2. 1771. 8.
- — *Genera plantarum*, ed. 1. LB. 1737. 8., ed. 6. Holm. 1767. 8.
- — *Hortus Cliffortianus*. Amstelod. 1737. fol.

- C. Linnaeus:** *Flora lapponica*. Amstelod. 1737. 8. ed. 2. cur. J. E. Smith. Lond. 1792. 8.
 — — *Flora suecica*, ed. 1. Holm. 1745. 8. ed. 2. 1755. 8.
 — — *Ocelandska och Gothländska resa*. Stockh. 1745. 8. *Wästgöta resa*. Stockh. 1747. 8. *Skånska resa*. Stockh. 1751. 8.
 — — *Flora zeylanica*. Amstel. 1748. 8.
 — — *Hortus upsaliensis*. Holm. 1748. 8.
 — — *Philosophia botanica*. Vienn. 1755. 8. ed. 4. me curante, Hal. 1809. 8.
 — — *Annoentates academicae*, vol. 1—7. Holm. 1749—1769. 8., vol. 8—10. curante Schrebero. Erl. 1785—1790. 8.
 — — Obf. in act. acad. holm., in nov. act. Upfal., in nov. comment. Petropol., in act. acad. Parif.
- L. fil. Car. LINNAEUS**, filius, prof. Upfal. (nat. 1741 † 1789): *Horti Upsaliensis plantarum rariorum* dec. 1. et 2. Holm. 1762. 1763. fol. fasc. 1. Lipf. 1767. fol. *Supplementum plantarum*. Brunfv. 1781. 8. Ehrhartus huic editioni curam adhibuit, appofitis fuis characteribus et nomenclatura. Sua facere filius ftuduit, quae pater reliquerat. *Nova graminum genera*. Upfal. 1779. 4.
- Lobel.** Matth. LOBELIUS, Belga, botanicus regius britannicus (nat. 1538 † 1616): *Stirpium nova aduerfaria*. vol. 1. 2. Lond. 1570. 1605. fol. *Plantarum f. stirpium hiftoria*. Antverp. 1576: fol. *Icones ftirpium*. Antverp. 1591. 4. *Stirpium illuftrationes*, ed. How. Lond. 1655. 4.
- Loddig.** Conr. LODDIGES, horticultor in Hackney prope Londinum: *Botanical cabinet*. vol. 1—7. Lond. 1817 f. 12.
- Löfl.** Petr. LÖFLING, Hispaniam et Americam australem inuifit (nat. 1729 † 1756): *Refa til spanska länderna*, ed. Linn. Stockh. 1758. 8. interpr. germ. Berl. 1766. 8.
- Loif.** J. L. A. LOISELEUR - Deslouchamps, Med. Doct.: *Flora gallica*. vol. 1. 2. Paris 1806. 1807. 8. Notices fur les plantes à ajouter à la flore franç. in Journ. de bot. vol. 2.
- Lottermof.** Theoph. LOTTERMOSER, collega gymnafii in Raftenburg, Boruff. orient. Obf. in Beyträgen zur Kunde Preuffens, 6.
- Lour.** Jo. DE LOUREIRO, acad. lusitanicae focius, miffioni catholicae in Cochinchina addictus: *Flora cochinchinensis*, vol. 1. 2. Olyfipon. 1790. 4. ed. Willdenow. Berol. 1793. 8.
- Lumnitz.** Steph. LUMNITZER: *Flora pofoniensis*. Lipf. 1791. 8.
- Lyngb.** Hans Chrif. LYNGBYE, praeco facer prope Ripas Jutiae: *Tentamen hydrophytologiae danicae*. Havn. 1819. 4. Algas picrasque mihi largitus eft.
- Macbrid.** Jac. MACBRIDE, medicus in Carolina, amicus Elliotti, cui magnam impertiit plantarum copiam.
- Maratt.** Jo. Franc. MARATTI: *Plantarum Romuleae et Saturniae specificae notae*. Rom. 1772. 8.
- Marcgr.** Georg. MARCGRAV, pictor, infervit Comiti Mauritio Naffavio, dum Brailiam occuparet (nat. 1610 † 1644): *Hiftoria naturalis Brailiae*, Pifonis et Marcgravii, ed. J. de Lact. Amft. 1648. fol.
- M. B. Frider. MARSCHALL A BIEBERSTEIN**, a confiliis ftatus ruthen. (nat. 1766 † 1826): *Befchreibung der Länder am kaspifchen Meer*. Frkf. 1800. 8. *Flora taurico-caucasica*, vol. 1-3. Char-

- cov. 1808—1819. 8. *Centuria plantarum rariorum Rossiae meridionalis*. Charcov. 1810. fol.
- Marsh.** Humph. MARSHALL: *Arbustum americanum, or the american grove*. Philadelph. 1785. 8.
- Mart.** Car. Phil Fr. MARTIUS, prof. Monachiensis, Brasiliae floram (1817—1820) recognovit et illustravit: *Flora cryptogamica Erlangensis*. Norimb. 1817. 8. *Reise in Brasilien* (Spixio comite adjuvante). Münch. 1823. 4. *Genera et species palmarum, quas in itinere per Brasiliam collegit*. Monach. 1823. fol. *Nova genera et species plantarum brasiliensium*, vol. 1. 2. Monach. 1824—1826. fol. *Specimen materiae medicae brasiliensis*. Monach. 1824. fol. Obs. in act. acad. Monach., in nov. act. nat. cur. 10—13., in commentar. soc. bot. Ratisbon. 2.
- Martens.** Georg, A MARTENS: *Reise nach Venedig*. B. 1. 2. Stuttg. 1824. 4.
- Martyn.** Jo. MARTYN, prof. Cantabrigienfis (nat. 1699 †1768): *Historia plantarum rariorum* cent. 1. Lond. 1728. fol.
- Mass.** Franc. MASSON, hortulanus doctus, diu in insulis Canariis, Azoribus, maxime autem in Africa australi degit (nat. 1741 obiit in Canada 1805): *Stapeliae novae*. Lond. 1796. fol.
- Maton.** Gul. Georg. MATON, M. D.: Obs. in Transact. soc. Linn.
- Maur.** Ernest. MAURI: *Romanarum plantarum* cent. 1—13. Rom. 1817—1820. 8.
- Mayer.** Jo. MAYER, medicus Pragenfis: Obs. in Abh. der böhmischen Gesellschaft 1785—1787, im Naturforscher, 17. et in Samml. physicalischer Aufsätze, 2.
- Medic.** Frider. Casim. MEDICUS, praefectus horti Schwezingensis (nat. 1736 †1809): *Botanische Beobachtungen*. Th. 1. 2. Mannh. 1783. 1784. 8. *Ueber einige künstliche Geschlechter aus der Malven-Familie*. Mannh. 1787. 8. Obs. in Üteri Annal.
- Meerb.** Nic. MEERBURG, custos horti botanici Leidensis: *Plantarum selectarum icones pictae*. LB. 1798. fol.
- Meisn.** Gul. MEISSNER, pharmacopola Halensis, sedulus plantarum cryptogamicarum scrutator, Jungermannias novas necum communicavit.
- Menz.** Archibald. MENZIES, Vancouverii comes in itinere ad Americae borealis oras occidentales. Egregiae messis, quam fecit, participes fuerunt Smithius, Lambertus et alii. Obs. in Transact. soc. Linn.
- Mérat.** X. V. MERAT: *Nouvelle flore des environs de Paris*. 1813. 8.
- Mertens.** Franc. Car. MERTENS, mercatorum scholae praefectus Bremae, algarum scientia clarus. Cum Kochio: J. C. Röhlings Deutschlands Flora, ed. nov. Frkf. Th. 1. 2. 1823. 1826. 8. Obs. in Mém. du mus. 5.
- Meyen.** Franc. Jul. Ferd. MEYEN, M. D.: Obs. in Schlechtendalii Linnaea.
- Meyer.** Ern. H. F. MEYER, prof. Regiomontanus: *Synopsis Junco-rum rite cognitorum*. Gott. 1822. 8.
- Georg. Frid. Gul. MEYER, physiographus Hannoveranus: *Primitiae florum Essequeboënsis*. Gott. 1818. 4. *Die Entwicklung u. Fortpflanzung der Flechten*. Gott. 1825. 8. Lichenum scientia excellens, plures novas species mihi largitus est.
- Mx.** Andr. MICHAUX, Persiani, American borealem, insulas Mascarenas et Madagascariam invisit (nat. 1746 †1803): *Flora boreali-americana*. (ed. Cl. Richard.) tom. 1. 2. Paris 1803. 8. *Histoire des chênes de l'Amérique*, Paris 1801. fol.

- Mx.* Filius Andr. Franc. MICHAUX: *Histoire des arbres forestiers de l'Amérique septentrionale*. vol. 1—3. Paris 1810—13. 4.
- Michel.* Petr. Ant. MICHELI, praefectus horti Florentini (nat. 1679 †1737): *Nova plantarum genera*. Flor. 1729. fol.
- Mik.* Jo. Christ. MIKAN, prof. Pragensis, Brasiliam invisit: *Delectus florum et faunae brasiliensis*. fasc. 1—4. Prag. 1822 f. fol. Gramina brasiliensia Trinio dedit.
- Mill.* Phil. MILLER, praefectus horti Chelseani (nat. 1691 †1771): *Gardeners dictionary*, ed. 1. Lond. 1731. fol. ed. 8. 1797. fol. *Figures of plants, described in the gardeners dictionary*. vol. 1. 2. Lond. 1760. fol.
- Mirb.* C. F. Brisseau-MIRBEL, acad. Paris. socius: Obf. in Mém. du mus., Ann. des scienc. nat. et in Bulletin de la soc. philomath.
- Mitch.* Jo. MITCHELL, medicus in Virginia: Genera recens condita in Act. nat. cur. 8.
- Mocino.* ..MOCINO, botanicus Mexicanus (†Barcinone 1819). Iconibus ab ipso, Sesseo et Cervantesio curatis, nondum editis, usus est Candolleus.
- Möhr.* Paul. Henr. MÖHRING, medicus Jeveranus (nat. 1710 †1792): Obf. in act. nat. cur. 6. 7. 8. et in commerc. lit. Noric.
- Mönch.* Conr. MÖNCH, prof. Marburgensis (nat. 1744 †1805): *Enumeratio plantarum indigenarum Hassiae*. Gott. 1777. 8. *Methodus plantas horti botanici describendi*. Marb. 1794. 8.
- Mohr.* Dan. Matth. Henr. MOHR, prof. Kiloniensis: *Observationes botanicae*. Kil. 1803. 8. Cum Fr. Webero: *Naturhistorische Reise durch Schweden, Beyträge zur Naturkunde*, Archiv für die systematische Naturgeschichte, Dillwyn's Conferven, Deutschlands kryptogamische Gewächse.
- Molin.* Jo. Ignat. MOLINA, missioni catholicae in Chili addictus: *Saggio sulla storia naturale del Chili*, ed. altera. Bologn. 1810. 4.
- Monnard.* J. P. MONNARD, rector scholae Neodunensis in Helvetia: Obf. in Ann. des scienc. nat. 7.
- Montin.* Lars MONTIN, medicus Suecus (nat. 1723 †1785): Obf. in act. acad. holm., in nov. act. soc. Upsal., in Physiogr. sällskap. et in Götheborgska vetensk. samhällets handl.
- Morett.* Jos. MORETTI, prof. Ticinensis: *Memorie ed osservazioni intorno a diversi oggetti riguardanti le scienze naturali*. Pavia 1820. 8. Obf. in Biblioteca italiana et in Brugnatelli giornale di fisica.
- Moricand.* Steph. MORICAND: *Flora veneta*. Genev. 1820. 8.
- Moris.* .MORIS, Calaritanus, Sardoae florum sedulus scrutator. Plantarum ab ipso collectarum participem me fecit Balbifius.
- Morif.* Robert. MORISON, primum horti Blesensis praefectus, dein prof. Oxoniensis (nat. 1620 †1683): *Historia plantarum universalis*, vol. 1—3. Oxon. 1715. fol.
- Mougeot.* v. Nestler.
- Mühlentb.* Henr. MÜHLENBERG, praeco sacer Lancastriae in Pennsylvania (†1815): *Catalogus plantarum Americae septentrionalis*. Lancastr. 1813. 8. *Descriptio uberior graminum*. Philadelph. 1817. 8. Obf. in neuen Schriften der Berl. Gesellsch. naturf. Freunde, 4. Et Willdenovio et mihi et Hedwigio ingentem plantarum numerum largitus est.
- Müll.* Ott. Frid. MÜLLER, prof. Havniensis (nat. 1730 †1784): *Flora danicae* vol. 4 et 5. ejus cura prodierunt. *Flora Friedrichs-*

- dalina*. Argent. 1767. 8. *Kleine Schriften aus der Naturhistorie*. Deffau 1782. 8. Obf. in nov. act. petropolit. 3., in act. acad. holm., in nov. act. nat. cur., in Naturforscher, et in Schriften der Berl. Gesellsch. naturf. Freunde, 4.
- Murr.* Jo. Andr. MURRAY, prof. Gotingensis (nat. 1740 † 1791): *Linnaei systema vegetabilium* ed. 13. Gott. 1774. ed. 14. 1784. 8. Obf. in nov. comment. Gott. 3—8. et in Commentat. soc. Gott. 1—9.
- Mussin.* Apoll. Comes MUSSIN-PUSCHKIN († 1805), Caucasi regionumque finitimarum peragratōr, cum Willdenovio multas communicavit stirpes.
- Mut.* Jos. Coelestin. MUTIS, in metropoli Columbiae, Bogota vitam degit (nat. 1734 † 1809). Plurimas plantas ad Linnaeum misit, multas Humboldtio dedit. Floram bogotensem, opus XLV annorum, ineditam reliquit, quam curaturi sunt filius Symphor. Mutis et Jos. de Caldas. Specimina inferuerunt in opus periodicum: *El semanario del nuevo reyno de Granada* 1813. 4.
- Neck.* Natal. Jos. A NECKER, botanicus electoris Palatinatus (nat. 1730 † 1793): *Elementa botanica*. Neowedi ad Rhen. 1790. 8.
- Nectoux.* H. NECTOUX, comes Napoleonis in expeditione aegyptiaca: *Voyage dans la haute Egypte*. Paris 1808. 8.
- N. E.* Neue Entdeckungen v. Spreng.
- Née.* Ludov. NÉE, Malaspinæ in itinere περιχοσμου comes, immensum plantarum numerum congeffit, quo usus est Cavanilles in iconibus et anal. de cienc. natur.
- Nees.* Car. Gothofr. NEES ab Esenbeck, prof. Bonnenfis: *Das System der Pilze und Schwämme*. Nürnberg. 1817. 4. *Synopsis Asterum herbaceorum*. Erl. 1818. 4. *Horæ physicae berolinenses*. Bonn. 1820. fol. *De Cinnamomo commentatio*. Bonn. 1823. 4. Cum Hornschuchio edidit Bryologiam germanicam, adjuvit Weiheum in Rubis germanicis edendis, Sieberi gramina e nova Hollandia nuncupavit. Obf. in nov. act. nat. cur., in comment. soc. bot. Ratisbon., et in Regensb. bot. Zeitung.
- Theoph. Frid. NEES, prioris frater, prof. Bonnenfis, cum fratre Boltonii tom. 4. interpretatus est ac auxit. Obf. in nov. act. nat. cur. et in Kunze's mykol. Heften.
- Nestl.* C. G. NESTLER, prof. Argentinenfis: *Monographia de Potentilla*. Paris 1816. 4. Cum Mougeoto stirpes cryptogamas Vogeso-rhenanas siccatas, vol. 1—6. 1810—1820. edidit.
- Neuwied.* Maxim. Princeps Wied-NEUWIED (nat. 1732), Brasiliam peragravit. Plerasque stirpes a se inventas et Schradero et Neesio dedit, quorum ille eas in annalibus literariis Gotingensibus divulgavit, hic, adjuvante Martio, in novis actis nat. cur. descripsit ac delineavit.
- Nitzsch.* Christ. Ludov. NITZSCH, prof. Halensis: *Beytrag zur Infsatorien-Kunde oder Naturbeschreibung der Cercarien und Bacillarien*. Hall. 1817. 8.
- Nocca.* Dominic. NOCCA, prof. Ticinenfis: *Ticinenfis horti plantae selectae*. Ticin. 1800. fol. Cum Balbifio edidit *floram ticinensem*, vol. 1. 2. Ticin. 1816. 1821. 4. Obf. in Usteri Ann. 5.
- Noij.* Ludov. NOISETTE, horticultor prope Parisios: plures novas stirpes introduxit.
- Nor.* Ferdin. DE NOROÑA, Hispanus, insulas Philippinas, Javam, Madagascariam et Mascarenas perscrutatus est: obiit in inf.

- Franciae 1787. Obs. in Verh. van het Batav. Genootsch. 5. Gazas ejus fortitus est Labillardière.
- Nutt.** Thom. NUTTALL, prof. Philadelph.: *The genera of North-American plants*. vol. 1. 2. Philadelph. 1818. 8. Obs. in Journ. of the acad. of Philadelph. et in Silliman's americ. journ.
- Oed.** Georg. Christ. AB OEDER, praetor et praefecturae Oldenburg. redemptor (nat. 1728 †1791): *Florae danicae volumina tria priora edidit.*
- Oliv.** Gul. Anton. OLIVIER, medicus, Persiam peragravit (nat. 1756 †1814): *Voyages dans l'empire Othoman, l'Égypte et la Perse*, vol. 1—3. Paris 1801. 8.
- Oliv.** Jof. OLIVI: *Zoologia adriatica*. Bassano 1792. 4.
- Ort.** Casim. Gomez DE ORTEGA, prof. Matritensis: *Continuacion de la flora española*, tom. 5. 6. Madr. 1784. 4. *Novarum aut rariorum plantarum horti Matritensis* dec. 1—8. Matrit. 1800 f. 4.
- Osb.** Petrus OSBEK, praepositus ecclesiarum in Suecia, Chinam invisit (nat. 1723 †1805): *Dagbok öfver en ostindisk resa*. Stockh. 1757. 8. Obs. in act. acad. holm. 1762. 1765. 1769 f.
- Ott.** Frid. OTTO, praefectus horti botanici Berolinensis, cum Linkio edidit icones et descriptiones plantarum. Obs. in Verhand. der Gartenbau-Gesellschaft. Ingentem plantarum copiam ipsi debeo.
- J. G. OTTO, praeco facer Kaufungae in Saxonia: *Versuch einer Anordnung der Agaricorum*. Leipz. 1816. 8.
- Oth.** .. OTTH, Candollei adjutor in elaborando prodromo.
- Paiv.** Imman. Joach. Henr. A PAIVA, medicus Olysiptonensis: *Memorias de historia natural* etc. Lisbon. 1790. 4.
- P. B.** A. M. F. J. PALISOT DE BEAUVOIS, acad. Paris. socius, Guineam invisit, diu in Hispaniola et America boreali degit (†1820): *Flore d'Oware et de Benin*, fasc. 1—6. Paris 1805—1810. fol. *Essai d'une nouvelle agrostographie*. Paris 1812. 8. *Muscologie ou traité sur les mousses* in Mém. de la soc. Linnéenne de Paris, 1.
- Pall.** Petr. Sim. PALLAS, acad. Petropolit. socius, magnus peregrinator (nat. 1740 †1810): *Reisen durch verschiedene Provinzen des russischen Reichs*. Th. 1—3. Petersb. 1771—1776. 4. *Flora rossica*, vol. 1. 2. Petrop. 1784. 1788. fol. *Neue nordische Beyträge*, Th. 1—7. Petersb. 1781—1796. 8. *Species Astragalorum descriptae et iconibus illustratae*. Lipf. 1800. fol. *Illustrationes plantarum minus cognitarum*. Lipf. 1803. fol.
- Panz.** Georg. Wolfg. PANZER, medicus Herspruck in Franconia: *Observationum botanicarum specimen*. Norimb. 1781. 8. *Idem zu einer künftigen Revision der Gräser*. München 1813. 4. In Sturmii flora plura capita elaboravit.
- Parkin.** Jo. PARKINSON, botanicus regius Britann.: *Paradisi in sole paradisi terrestriis*. Lond. 1629. fol. *Theatrum botanicum*. 1640. fol.
- Patrin.** Eugen. Ludov. Melch. PATRIN, Imaum 1781 perferutatus est. Obs. in Pallas nordischen Beytr. Plantae ab ipso collectae tum Pallasio tum musco Parisiensi cesserunt.
- Perpent.** Helena PERPENTI, femina Comensis: Obs. in Bibliotheca italiana 1817.
- Persf.** Christ. Henr. PERSOON: *Observationes mycologicae*, vol. 1. 2. Lipf. 1796. 1798. 8. *Commentatio de fungis claviformibus*.

- Lipf. 1797. 8. *Tentamen dispositionis fungorum*. Lipf. 1797. 8. Linnaeani systematis editionem 15. jam diximus. *Icones et descriptiones fungorum minus cognitorum*. fasc. 1. 2. Lipf. 1799. 1800. 4. *Synopsis methodica fungorum*. Gott. 1801. 8. *Icones pictae fungorum rariorum*, fasc. 1. 2. Paris 1803. 4. *Synopsis plantarum f. Enchiridion botanicum*, vol. 1. 2. Paris 1805. 1807. 12. *Abhandlung über die essbaren Schwämme*, übersetzt von Dierbach. Heidelb. 1822. 8. *Mycologia europaea*, vol. 1. 2. Erlang. 1822. 1824. 8. Obs. in Usteri Annal., in Journ. de botanique et in Wetterauer Annal.
- Petagn.** Vincent. PETAGNA: *Institutiones botanicae*, vol. 1-5. Neapol. 1785—1787. 8.
- Pill. et Mitterp.** Matth. PILLER et Ludov. MITTERPACHER de Mitterburg, prof. Pestinensis (nat. 1734 †1814): *Iter per Poseganam, Slavoniae provinciam*. Budae, 1783. 4.
- Pio.** Jo. Bapt. PIO: *De Viola specimen*. Taurin. 1813. 4.
- Pis.** Gul. PISO, medicus heroïs Mauritii Comitissae Nassavii, Brasiliam invadentis: *De Indiae utriusque re naturali et medica*. Amst. 1658. fol.
- Plukn.** Leon. PLUKNET, botanicus regius Britann.: *Almagestum botanicum*. Lond. 1696. 4. *Mantissa* 1700. *Amaltheum* 1705. 4.
- Plum.** Car. PLUMIER, e Minimorum ordine, botanicus regius gallicus, Indiam occidentalem sedulo et scienter perscrutatus est (nat. 1666 †1704): *Nova plantarum genera*. Paris 1703. 4. *Traité des fougères de l'Amérique*. Paris 1705. fol. *Plantarum americanarum* fasc. 1—10., ed. Jo. Burmann. Amst. 1755—1760. fol.
- Pöppig.** Eduard. PÖPPIG, Lipsiensis, Cubam adiit. Plantae siccaetae venales.
- Pohl.** Jo. Imman. POHL: *Versuch einer Flora Böhmens*. Th. 1. 2. Prag 1810. 1814. 8. *Des Freyherrn von Hochberg botanischer Garten zu Illubosch*. Prag. 1812. 8. Obs. in Hoppe's Tafchenb. 1807.
- Poir.** J. L. M. POIRET, Numidiam peragravit: *Voyage en Barbarie*. Paris 1789. Encyclopaediam botanicam a vol. 5. inde et supplementa digessit.
- Poit.** . . POITEAU, doctus plantarum cultor, diu in Hispaniola commoratus est. Plantas rarissimas cum aliis communicavit. Obs. in Annal. et Mém. du mus.
- Pollich.** Jo. Ad. POLLICH, medicus Caesareae Lutrae (†1780): *Historia plantarum in Palatinatu electorali sponte crescentium*. tom. 1—3. Mannh. 1776. 1777. 8.
- Pollin.** Cyrus POLLINI, prof. ad tempus Veronenfis: *Viaggio al lago di Garda*. Verona 1816. 8. *Sulle alghe viventi nelle terme Euganee*. Milano 1817. 8. *Flora veronenfis*, vol. 1—3. Veron. 1822—1824. 8. Multas mecum plantas communicavit.
- Portenschl.** Franc. A PORTENSCHLAG - *Ledermeyer*, Jctus Viennenfis (nat. 1772 †1821), sedulus plantarum collector: *Enumeratio plantarum in Dalmatia lectarum*. Vindob. 1824. 8. Amici posuerunt hoc monumentum: plantae a Rochelio delineatae.
- Pourr.** . . POURRET, abbas et canonicus S. Jacobi in Gallacia Hispaniae: *Chloris narbonensis* inserta actis academiae Tolosanae 3. Plantarum ingentem copiam Willdenovio largitus est.
- Presl.** Car. Boriwogo PRESL, custos musei bohemicus Prag., Siciliam invisit, cum fratre J. Swatoplucio edidit *Floram ceclicam*.

- Prag. 1819. 8. Seorsim: *Cyperaceae et gramineae siculae*. Prag. 1820. 8. *Deliciae pragenses*. Prag. 1822. 8. *Reliquiae Hænkeanae*, vol. 1. Prag. 1825. fol. *Flora sicula*. Prag. 1826. 8.
- Pursh.* Frider. PURSH, qui ipse se Sibiria natum dictitabat, regiones Americae borealis peruestigavit († 1820): *Flora Americae septentrionalis*. vol. 1. 2. Lond. 1814. 8.
- Pyl.* Bachclot DE LA PYLAIE: Obs. in Journ. de bot. 4. 5.
- Rad.* Justus RADIUS, medicus Lipsiensis: *De Pyrola et Chimophila specimen*. Lipf. 1821. 4.
- Radd.* Joseph. RADDI, Florentinus, Brasiliam obiit. Obs. in Atti di Siena, 9., memorie di Modena 18. 19. et opuscoli scientif. di Bologna. 3. 4. *Jungermannianografia etrusca*. Modena 1818. 4.
- Rafin.* Car. RAFINESQUE-Schmalz, diu in Sicilia commoratus est, jam prof. Lexington, Amer. bor.: *Caratteri di alcuni nuovi generi e nuove specie di animali e piante di Sicilia*. Palerm. 1810. 8. *Specchio delle scienze*. P. 1. Palerm. 1814. 8. *Florula Ludoviciana*. New-York. 1817. 8. (e C. C. Robin voyages 1807.) Obs. in Annual. bruxell. et in Silliman's americ. Journ.
- Ram.* Ludov. Franc. RAMOND, olim prof. ad Aquas Convenarum (Bagnères), dein praefectus Arverniae, Pyrenaeos montes obiit: *Voyages au Mont-perdu*. Paris 1801. 8. Obs. in Bullet. de la soc. philomath.
- Rau.* Ambros. RAU, prof. Wirceburgenfis: *Enumeratio Rosarum circa Wirceburgum crescentium*. Norimb. 1816. 8.
- Rebent.* Jo. Frider. REBENTISCH, praefectus seminarii chirurgici Berolin.: *Prodromus florum neomarchicae*. Berol. 1804. 8. *Index plantarum circum Berolinum sponte nascentium*. Berol. 1805. 8.
- Red.* P. J. REDOUTÉ, eximius plantarum pictor Paris.: *Les Liliacées*, vol. 1-8. Paris 1802-1816. fol. *Les Roses*. Paris 1817 f. fol. Splendidissimum utrumque opus.
- Reich.* Jo. Jac. REICHARD, medicus Francofurti ad Moenum (nat. 1748 † 1789): *Systema plantarum*, P. 1-4. Fref. 1779. 1780. 8. *Flora moeno-francofurtana*, tom. 1. 2. Fref. 1772. 1778. 8. Obs. in Schrift. naturf. Freunde zu Berlin, 1.
- Reichenb.* Ludov. REICHENBACH, prof. Dresdenfis: *Monographia generis Aconiti et Delphinii*. Lipf. 1820. fol. *Icones et descriptiones plantarum*, vol. 1. Lipf. 1822. 4. *Iconographia botanica*, vol. 1-4. Lipf. 1825-1826. 4. *Hortus botanicus*, cent. 1. Lipf. 1824. 4. Fasciculos 42. 43. 45. florum Sturmianae elaboravit. Obs. in Regensb. bot. Zeit. Multas plantas ipsi debeo.
- Reinw.* G. C. REINWARDT, prof. Leidenfis, diu in Java vixit: Obs. in Verhand. van het bataav. Genootsch. 9. et in Blum. catal. Buitenzorg.
- Relh.* Rich. RELHAN, clericus: *Flora cantabrigiensis*. 1785. 8. *Supplem.* 1-3. 1786-1793. 8.
- Requien.* . . REQUIEN, Avenionensis: *Enumeratio plantarum in Valle-clausa crescentium*, in Guérin description de Vaucluse. Avign. 1813. 12. Obs. in Ann. des scienc. natur. 5. Multas cum Candolleo plantas communicavit.
- Retz.* And. Jo. RETZIUS, prof. Lundinensis (nat. 1744 † 1821): *Fasciculus 1-6. observationum botanicarum*. Lipf. 1779-1791. fol. *Florae Scandinaviae prodromus*, ed. 2. Lipf. 1795. 8. Obs. in act. acad. holm. et in Phytogr. fälskap. handl.

- Rèyn.** L. REYNIER, medicus Laufannensis (†1824): Obs. in Journ. de phys., Mém. de la soc. de Lausanne, Mém. pour l'hist. nat. de la Suisse, in Höpfner's Mag. für die Naturk. Helvetiens.
- Rheed.** Henr. Adr. van RHEEDE tot Drakensteen, proconsul Malabar.: *Hortus malabaricus*, P. 1—12. Amstelod. 1678—1703. fol.
- Rich.** Ludov. Claud. RICHARD, acad. Paris. socius, diu in Guiana vixit, eximius plantarum scrutator. (nat. 1754 †1821.) Obs. in Perfoonii enchiridio, in Journ. de phys., in Ann. et Mém. du mus., in Melastomeis Humboldtianis. Innumeras plantas aliis largitus est.
- Achill. RICHARD, prioris filius, prof. Paris.: *Botanique médicale*. 1. 2. Paris 1823. 8. Obs. in Ann. bruxell. 4. et in Ann. des scienc. nat.
- Richardf.** Jo. RICHARDSON, Franklini comes in itinere ad polum arcticum. Floram earum regionum adumbravit in Franklin's voyage to the shores of the polar sea. Lond. 1823. 4.
- Riff.** A. RISSO: *Histoire naturelle des orangers*. (socio Poiteau) vol. 1. 2. Paris 1820. 4. Obs. in Ann. du mus. 20.
- Riv.** Aug. Quirin. RIVINUS, prof. Lipsienfis (nat. 1652 †1725): *Introductio generalis in rem herbariam*. 1690—1699. fol.
- Robf.** Ed. ROBSON: Obs. in Transact. soc. Linn. 3.
- Rochel.** Ant. ROCHEL, custos horti Pestinensis, dudum chirurgus in Rownye, Hungar: plantarum carpathicarum industrius scrutator, quarum multas mihi misit. *Pflanzen-Unrisse aus dem südlichen Karpath des Bannats*. 1820.
- Rodrigu.** Jos. RODRIGUEZ apud Lagasc. clench. hort. Matrit.
- Röhl.** Jo. Christ. RÖHLING, inspector Massenheim: *Deutschlands Flora*. Th. 1—3. Frkf. 1812—1814. 8.
- Röm.** Jo. Jac. RÖMER, prof. Turicenfis (†1819): *Archiv für die Botanik*. Th. 1—3. Lipf. 1796—1803. 4. *Linnaei systema vegetabilium*, vol. 1—6. (Cl. I—V., socio Schultesio.) Stuttg. 1817—1820. 8.
- Rohde.** Mich. ROLDE, Bremenfis, egregius collector et observator. Obs. in Schrader's Journ. Multas mihi plantas misit.
- Roland.** Dan. ROLANDER: Obs. in act. acad. holm. 1756.
- Rosc.** Gul. ROSCOE, civis Liverpooliensis, eruditissimus vir. Scitamineas primum in Transact. soc. Linn. 8. dein in opere splendido, quod etiamnum continuatur, egregie illustravit. Plantas ipsi debeo plures.
- Rostcov.** Frid. Gul. Theoph. ROSTCOVIUS, medicus Stettinensis: *Diff. de Junco*. Hal. 1801. 8. *Flora sedinensis*. Stettin. 1824. 8. Plerasque plantas ab ipso inventas mihi largitus est.
- Roth.** Alb. Gul. ROTH, archiater popularis principatus Bremenfis: *Beyträge zur Botanik*. Th. 1. 2. Bremen 1782. 1783. 8. *Tentamen florae germanicae*. P. 1—3. Lipf. 1788—1800. 8. *Catalecta botanica*, fasc. 1—3. Lipf. 1797—1806. 8. *Neue Beyträge zur Botanik*. Frankf. 1802. 8. *Botanische Bemerkungen*. Leipz. 1807. 8. *Novae plantarum species, praesertim Indiae orientalis*. Halberstadt. 1821. 8.
- Rottb.** Christ. Friis ROTTBÖLL, prof. Havniensis (nat. 1727 †1797): *Descriptionum et iconum liber*. Havn. 1773. fol. *Descriptiones plantarum rariorum*. Havn. 1776. 4. Obs. in Collect. soc. med. Havn. 2., in Kiobenh. Selsk. Skrift. 10., in Danske Vidensk. Selsk. nye Skrift. 2.

- Rottl.** . . ROTTLEK, missioni evangelicae in India orientali, Vepery, addictus. Obs. in neuen Schriften der Berl. Gesellsch. naturf. Freunde, 4. Vahlro, Willdenovio et mihi multas misit plantas.
- Roxb.** Gul. ROXBURGH, medicus Anglus in India orient.: *Plants of the coast of Coromandel.* vol. 1—3. Lond. 1795—1816. *Alphabetical list of the plants of S. Helena:* ad Beatson's tracts relative to the island of S. Helena. Lond. 1816. 4. *Flora indica,* ed. Wallich et Carey. Calcutta. vol. 1. 2. 1821, 1824. 8. Obs. in *Asiatic researches,* vol. 11. Plantarum copiam et Willdenovio et mihi donavit.
- Rudg.** Ed. RUDGE: *Plantarum Guianae rariorum icones et descriptiones.* Lond. 1806. fol. Obs. in Transact. soc. Linn. 8. 10.
- Rud.** Jo. Fr. RUDOLPH, acad. Petropolit. socius (nat. 1744 † 1809). Obs. in act. acad. Petropolit. Egregiam plantarum orientarium collectionem ab eo accepi.
- Rudolph.** Car. Asm. RUDOLPHI, prof. anatomiae Berolinensis, olim rei herbariae scientia insignis, multas mihi plantas rariores largitus est. Obs. in Schrader's Journ.
- R. et P.** Hippol. RUIZ et Jos. PAVON, Hispani, comite Dombeyo omnem regionum Americae australis dudum Hispaniae subditarum ambitum obierunt. *Florae peruvianae et chilensis prodromus.* Matr. 1794. fol. *Flora peruviana et chilensis,* vol. 1—3. Matr. 1798 f. fol.
- R. et Sch.** v. Röm. et Schult.
- Rumph.** Georg. Everard. RUMPHIUS, mercator, proconsul batavus in insula Amboina (nat. 1637 † 1706): *Herbarium amboinense,* ed. Burmann. vol. 1—7. Amst. 1741—1751. fol.
- Russel.** Alex. RUSSEL, medicus Halepensis († 1768): *Naturgeschichte von Aleppo,* überf. B. 1. 2. Göttingen 1793. 8.
- Sabin.** Jos. SABINE, societati horticult. britannicae ab epistolis: Obs. in Transact. soc. horticult. et in Botan. register.
- Sadler.** Jos. SADLER, Pestinensis: *Diss. sistens descriptionem plantarum epiphylliospermarum Hungariae.* Pestin. 1820. 8.
- Salisb.** Rich. Ant. SALISBURY: *Icones stirpium rariorum.* Lond. 1791. fol. *Prodromus stirpium in horto ad Chapel-Allerton.* Lond. 1796. 8. *Paradisus londinensis,* vol. 1. 2. Lond. 1805—1808. 4. *Ἐυδωρῶνος* dicitur, *Knighitii* nomine, commentarium de *Proteeis* edidisse, quem, nusquam venalem, mutuo ab Haworthio accepi. Obs. in Annals of botany, et in Transact. of horticult. society.
- Salm.** Josephus, Princeps SALM-Dyk (nat. 1773): *Verzeichniss des Geschlechts Aloë* f. l. et a. Multas praefertim succulentas, plantas mihi largitus est.
- Salzm.** Phil. SALZMANN, sedulus plantarum per Galliam australem, Corsicam et Hispaniam indagator. *Enumeratio plantarum rariorum, quas collegit.* Monspel. 1818. 8.
- Sant.** Georg. SANTI: *Viaggi per la Toscana,* vol. 1—3. Pisa 1795—1806. 8.
- Sav.** Cajetanus SAVI, prof. Pisanus: *Flora pisana.* tom. 1. 2. Pisa 1798. 8. *Botanicon etruscum.* tom. 1—4. Pisa 1808—1825. 8. *Observationes in variis Trifolii species.* Flor. 1810. 4.
- Savign.** . . SAVIGNY-nonnulla capita in Encycl. botan. vol. 4. elaboravit.

- Schäff.* Jac. Christ. SCHÄFFER, praeco sacer Ratisbonensis (nat. 1718 † 1790): *Fungorum, qui in Palatinatu et Bavaria circa Ratisbonam nascuntur, icones.* tom. 1—4. Ratisb. 1762—1770. 4.
- Schärer.* Lud. Imman. SCHÄRER, praeco sacer Bern.: *Lichenum helveticorum spicilegium.* Bern. 1823—1826. 4. Obs. in Musée helvet. 1.
- Schangin.* Petr. SCHANGIN, metallorum inspector in Barnaul Sibir. (nat. 1741 † 1816.) *Pallasio plantarum sibiricarum et mongolicarum copiam misit.* Observ. in Pallas neuen nord. Beytr. 6.
- Scherer.* Jo. Andr. SCHERER: Obs. in Jacquin coll. 1.
- Schimper.* Car. SCHIMPER, Heidelbergensis: Obs. in Regensb. botan. Zeit. 1825.
- Schk.* Christ. SCHKUHR, artifex mechanicus Wittebergenfis (nat. 1740 † 1811): *Botanisches Handbuch.* Th. 1—3. Wittenb. 1791—1803. 8. *Beschreibung und Abbildung der Riedgräser.* Wittenb. 1801. 1806. 8. *Vier und zwanzigste Klasse des Linné'schen Pflanzensystems.* B. 1. Wittenb. 1809. 4.
- Schlechtend.* Dieter. A SCHLECHTENDAL, dicasterii provincialis praefes Paderborn. Obs. in Berl. Mag. 7. 8. Supplementum ad Willdenovii enumerationem posthumum edidit.
- Dieter. A SCHLECHTENDAL, prioris filius, custos herbarii regii berolinensis: *Animadversiones in Ranunculeas Candollii,* fasc. 1. 2. Berol. 1819. 1820. 4. *Flora berolinensis,* vol. 1. 2. Berol. 1823. 1824. 8. *Adumbrationes plantarum,* fasc. 1—3. Berol. 1825. 1826. 8. *Linnaea,* vol. 1. Berol. 1826. 8. Officiosae ejus humanitati deo gratus plantarum in herbario regio. servatarum usum.
- Schleich.* J. C. SCHLEICHER, plantarum collector et venditor, Bex ad lacum Lemanum: *Catalogus plantarum in Helvetia sponte nascentium,* ed. 4. 1821. 8.
- Schmidel.* Casim. Christ. SCHMIDEL, prof. Erlangenfis (nat. 1718 † 1793): *Icones et analyses plantarum.* Norimb. 1782. fol. *Dissertationes botanici argumenti.* Erlang. 1783. 4.
- Schmidt.* Franc. SCHMIDT, hortulanus: *Oestreichs allgemeine Bauanzucht.* Th. 1. 2. Wien 1792. 1794. fol.
- Franc. Wilib. SCHMIDT, prof. Pragenfis († 1796): *Flora böemica,* cent. 1—4. Prag. 1793. 1794. fol. Obs. in Mayer's physik. Auffätzen 1., in neuen Abh. der böhmischen Gesellsch. 2., in Römer's Archiv, 1.
- Jo. Car. SCHMIDT, scholae Fellenbergianae in Hofwyl prope Bernam collega, cum Kunzio edidit: *Deutschlands Schwämme in getrockneten Exemplaren (1816—1818).* Obs. egregiae de Phacidio et de disponendis Sphaeriis, quas sequutus sum in hoc opere, in Kunze's mykolog. Heften, 1. 2.
- Schneevoogt.* G. Voorhelm SCHNEEVOOGT: *Icones plantarum rariorum,* fasc. 1. 2. Harlem. 1793. fol.
- Scholl.* Frid. Ad. SCHOLLER, paedagogus fratrum Moravieorum Barby (nat. 1718 † 1785): *Flora barbiensis.* Lipf. 1775. 8. *Supplementum floriae.* 1787. 8.
- Schott.* Henr. SCHOTT, inspector horti botanici Vindobonensis († 1819). Egregiam plantarum copiam congestit cumque aliis communicavit.
- Henr. SCHOTT, prioris filius, hortulanus, Brasiliam adiit. Obs. in Wiener medic. Jahrb. 6. et in appendice ad hoc opus.

- Schousb.* P. C. A. SCHOUSBOE, mercaturæ Danorum procurator in Mauritania: *Beobachtungen über das Gewächsreich in Marocos.* Aus dem Dänischen von J. A. Marcuffen. Leipz. 1800. 8.
- Schouw.* Joach. Frid. SCHOUW, prof. Havniensis: *Italiam et Siciliam 1817—1819 peragravit, mihi et algas et alias plantas largitus est.* Versuch einer allgemeinen Pflanzen-Geographie. Berl. 1823. 8.
- Schrad.* Henr. Adolph. SCHRADER, prof. Gottingensis: *Spicilegium floræ germanicæ.* Hannov. 1794. 8. *Systematische Sammlung kryptogamischer Gewächse.* 1. 2. Gött. 1796. 1797. 8. *Sertum Hannoveranum,* fasc. 1—3. Gott. 1795—1797. fol. *Journal für die Botanik,* B. 1—5. Gött. 1799—1801. 8. *Neues Journal für die Botanik,* B. 1—4. Gött. 1806—1810. 8. *Commentatio de Veronicis spicatis.* Gott. 1803. 8. *Flora germanica,* vol. 1. (Cl. I—III.) Gott. 1806. 8. *Hortus gottingensis,* fasc. 1. 2. 1809. 1813. fol. *Monographia generis Verbasci.* fasc. 1. 2. Gott. 1813. 1823. 4. Obf. in Gött. gel. Anzeigen.
- Schrank.* Franc. de Paula SCHRANK, acad. Monachienfis focus: *Bayerische Flora.* 1. 2. München 1789. 8. *Primitiæ floræ Salisburgensis.* Frcf. 1792. 8. *Reise nach den südlichen Gebirgen von Bayern.* Münch. 1793. 8. *Plantæ rariores horti Monacensis,* fasc. 1. 2. Monach. 1817. fol. Obf. in Usteri Annal., im Naturforscher, in act. acad. Monach., in Denkwürd. der bot. Gesellsch. in Regensb., in Regensb. bot. Zeit.
- Schreb.* Jo. Christ. Dan. SCHREBER, prof. Erlangenfis (nat. 1739 † 1810): *Icones plantarum minus cognitarum,* dec. 1. Hal. 1766. fol. *Beschreibung der Gräser.* Th. 1—3. Leipz. 1769—1810. fol. *Spicilegium floræ Lips.* 1771. 8. *De Phasco observationes.* Lips. 1772. 4. *Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et species.* Lips. 1774. 4. *Genera plantarum,* vol. 1. 2. Frcf. 1789. 1791. 8. Obf. in nov. act. nat. cur. 3. 4. in nov. act. Upfal. 1.
- Schubert.* C. SCHUBERT in Ficini flora Dresd. 2.
- Schübl.* Guft. SCHÜBLER, prof. Tubingenfis: *Diff. sistens descriptiones cerealiarum cultorum.* Tubing. 1818. 4.
- Schult.* Jo. Aug. SCHULTES, prof. Landshut. in Bavaria: *Oestreichs Flora.* B. 1. 2. Wien 1794. 8. *Observationes botanicæ.* Oenipont. 1809. 8. Cum Römero edidit Systema vegetabilium.
- Schultz.* Gar. Frid. SCHULTZ, medicus Neobrandenburgi: *Prodromus floræ Stargardensis.* Berol. 1806. 8. *Supplementum 1.* Neobrandenb. 1819. 8. Obf. in nov. act. nat. cur.
- Schum.* Christ. Frid. SCHUMACHER, prof. Havniensis: *Enumeratio plantarum in partibus Sæclundiae septentrionalis et orientalis.* P. 1. 2. Havn. 1801. 1803. 8. Obf. in Naturh. Selfk. Skrift. 1. 3.
- Schumm.* . SCHUMMEL, collector Silesius vid. Günther.
- Schwab.* Henr. SCHWABE, pharmacopola Dessaviensis, acutissimus plantarum, præfertim algarum, indagator.
- Schwägr.* Frid. SCHWÄGRICHEN, prof. Lipsiensis, eximius muscorum frondosorum scrutator. *Supplementum 1. et 2. ad J. Hedwig species muscorum frondosorum.* Lips. 1811—1826. 4. *Historiæ muscorum hepaticorum prodromus.* Lips. 1814. 8. Muscos rariores multos ipsi debeo.
- Schweigg.* Aug. Frid. SCHWEIGGER, prof. Regiomontanus (in Sicilia truncidatus 1821): *Flora erlangensis (cum Franc. Körte).*

- Erl. 1811. 8. Obf. in Königsb. Archiv für Naturwiff. 1. Plurimas eximio viro plantas debeo. Multis ille bonis flebilis occidit!
- Schwein.** Lud. Dav. A SCHWEINIZ, miffioni fratrum Moravicoꝝ in Bethlehem Penfylvaniae addictus, focio J. B. ab Albertini: *Confectus fungorum in agro Niskiensi crefcentium*. Lipf. 1805. 8. Caricum americanarum monographia. 1822. Obf. in Ann. of the Lyceum of New-York, 1., in Silliman's americ. Journ. et in act. nat. feruat. Lipf. 1.
- Sebaf.** Anton. SEBASTIANI, prof. Romanus: *Florae Romanae prodromus*. Rom. 1818. 8.
- Sécond.** . SECONDAT: *Observations de phyfique et d'hiftoire naturelle*. Paris 1750. 8.
- Segu.** Franc. SEGUIER, Nemaufenfis, Scipionis Maffei hospes: *Plantae veronenfes*, tom. 1—3. Veron. 1745—1754. 8.
- Ser.** Nic. Car. SERINGE, Bernae dudum, jam Genevae vivit: *Esfai d'une monographie des fuites de la Suisse*. Bern. 1815. 8. *Mélanges botaniques*. vol. 1. Bern. 1818. 8. *Mufée helvétique d'hiftoire naturelle*, vol. 1. Genev. 1823. 4. In Candollei prodromo plura capita elaboravit.
- Seff.** . SESSÉ, botanicus mexicanus, cujus icones et descriptiones plantarum mexicanarum *Mocino mexicanus*, Monspeli exul, cum Candolleo communicavit.
- Seft.** Dominic. SESTINI, abbas, celeberrimus numifmatum fcrutator. *Viaggio da Buchareft a Conftantinopoli*. 1794. 8. Quas in hoc itinere per Moefiam inferiorem et Thraciam invenerat plantas, cum Willdenovio communicavit, qui, quod Galacz (oppidum ad Danubium) afcriptum erat, Galatiam interpretatus eft, fallam patriam.
- Sibth.** Jo. SIBTHORP, prof. Oxoniensis († 1796), Graeciam omnem Afiamque minorem bis obiit. *Flora Oxoniensis*. Oxon. 1794. 8. *Flora graeca*, fplendiffimum opus, Smithio curante ab anno 1806 inde prodit.
- Sieb.** Franc. Gul. SIEBER, Pragenfis, insignis peregrinator, ingentes thefauros regionum variarum accelfuque difficillimarum aperuit. Brafiliam primum, Comitum Hofmannseggii juffu, adiit, dein Auftriam omnem, Italiamque peragravit, tum et Gretam et Aegyptum fcicenter obiit, tandem novam Hollandiam inivit. Ipfius fumtibus et Hilfenbergius Mafcarenas et Kohautus Martinicam et Senegambiam adierunt. *Reife nach der Infel Kreta*. Th. 1. 2. Leipz. 1823. 8.
- Siegesb.** Jo. Georg. SIEGESBEK, prof. Petropolitenum, Anandriam nuncupaffe constat e Linn. amoen. 1. p. 248.
- Sims.** Jac. SIMS, poft Curtiffi obitum opus: *Botanical magazine*, inftituit.
- Jo. SIMS, M. D. cum Konigio: *Annals of botany*, 1. 2. Lond. 1805. 1806. 8.
- Sm.** Jo. Ed. SMITH, M. D., digniffimus Linnaei heres: *Plantarum icones haftenus ineditae*. fasc. 1—3. Lond. 1789—1791. fol. *Icones pictae plantarum rariorum*. Lond. 1790—1793. fol. *Spicilegium botanicum*, 1. 2. Lond. 1791. 1792. fol. *English botany* (Sowerbio icones inftituente). vol. 1—36. Lond. 1790—1814. 8. *Sketch of a tour on the continent*, vol. 1—3. Lond. 1793. 8. *Tracts relating to natural hiftory*. Lond. 1798. 8. *Flora britannica*, vol. 1—3. Lond. 1800. 8. *Exotic botany*, fasc. 1—8. Lond. 1804—1806. 8. *Florae graecae prodromus*. vol. 1. 2.

- Lond. 1806. 1813. 8. *The english flora*, vol. 1—3. Lond. 1824. 1825. In *Transact. soc. Linn.*, in *Reesii Cyclopaedia* et in *actis taurinensibus* innumeras descripsit plantas novas aut raras. Plures etiam mihi largitus est.
- Chr. Sm.* Chr. SMITH (nat. 1731 † 1816), prof. Christianiae designatus, comes Buchii in insulis Canariis et Tuckeei ad Africam tropicam occidentalem. Et Buchius et R. Brownius divulgant, quas invenit plantas. (R. Brown's observ. on the herbarium collected by Chr. Smith in the vicinity of the Congo. Lond. 1818. 4.)
- Soland.* Dan. Car. SOLANDER, Banksii comes in celeberrimo itinere περιχομῆς, dein bibliothecarius musei britannici (nat. 1736 † 1786). *Ανεκδότοις* usi sunt Jon. Dryander et R. Brownius.
- Sonner.* Petr. SONNERAT, illustris navigator, rei herbariae scientia clarus († 1781): *Voyage à la nouvelle Guinée*. Paris 1776. 4. *Voyages aux Indes orientales et à la Chine*. Paris 1782. 4.
- Sowerb.* Jac. SOWERBY, pictor rei herbariae gnarus († 1822): *English fungi or mushrooms*. N. 1—29. Lond. 1799. fol. In opere Smithiano: *English botany*, icones fecit.
- Sparrm.* Andr. SPARRMAN, Ekebergii et Forsteri in itineribus comes, dein in Africa australi commoratus, tandem acad. holm. addictus (nat. 1747 † 1820). *Resa til Goda-hoppis-udden*. Stockh. 1783. 8. Obs. in *act. acad. holm.* et in *nov. act. soc. Upsal.*
- Spin.* Marchio SPIN, chiliarchus militum Sardin. *Le jardin de S. Sebastien*. Turin. 1818. 8.
- * *Auctor.* *Florae halensis tentamen novum*. Hal. 1806. 8. *Mantissa 1. florae halensis cum cent. novarum plantarum*. 1807. 8. *Observationes botanicae in floram halensem*. 1811. 8. *Plantarum minus cognitarum pug. 1. et 2.* Hal. 1813. 1815. 8. *Plantarum umbelliferarum prodromus*. Hal. 1813. 8. *Species Umbelliferarum minus cognitae*. Hal. 1818. 4. *Novi proventus hortorum huiusmodi et berolinensis*. Hal. 1818. 8. *Anleitung zur Kenntniss der Gewächse*. Th. 1—3. ed. 1. Hall. 1802—1804. 8. ed. 2. 1817. 1818. 8. *N. E. Neue Entdeckungen im ganzen Umfang der Pflanzenkunde*: Th. 1—3. Leipz. 1820—1822. 8. In Römeri et Schultesii systemate vegetabilium Umbelliferarum (vol. 6.) digestit. Obs. in *act. acad. Holm.* et Petropolit., *nov. act. nat. cur.*, *Transact. soc. Linn.*, *Bulletin de la soc. philomath.*, *Mém. de la soc. d'hist. nat. de Moscou*, *Schrader's Journ.*, *Berlin. Magaz.*, *Wetter. Annalen*, *Denkwürd. der bot. Gesellschaft in Regensb.*
- Stackh.* Jo. STACKHOUSE: *Nereis britannica*, ed. 2. Oxon. 1816. 4.
- Stark.* . STARKE, praeco facer Tfchirnae Silesiae: Obs. in *Schrader's Journ.* Plantas multas, praesertim cryptogamicas, cum aliis communicavit. Obs. in *Schrader's Journ.* 1799.
- Stechm.* Jo. Paul. STECHMANN: *Diff. de Artemisiis*. Gott. 1775. 4.
- Steph.* Frid. STEPHAN, prof. Mosquensis († 1817): *Enumeratio stirpium agri Mosquensis*. Mosqu. 1792. 8. *Icones plantarum Mosquensium*, dec. 1. 2. Mosqu. 1795. fol. Obs. in *Mém. de la soc. d'hist. nat. de Mosc.* 1.
- Sternb.* Casp. Comes a STERNBERG, e proceribus Bohemiae: *Botanische Wanderung in den Böhmer Wald*. Regensb. 1806. 8. *Reisen durch Tyrol in die östreichischen Provinzen Italiens*. Regensb. 1806. *Revisio Saxifragarum iconibus illustrata*. Ratisb.

1810. fol. Obf. in Sturmii flora, in Denkwürd. der bot. Gefellfch. zu Regensb. et in Regensb. bot. Zeit.
- Steud.* Ern. STEUDEL, medicus Efslingenfis Würtenb.: *Nomenclator botanicus*, vol. 1. 2. Stuttg. 1821. 1824. 8.
- Stev.* Chrif. STEVEN, a confil. Itatus ruthen. Obf. in Marfchall-Bieberfteinii flora taurico-caucasica, in Transact. Soc. Linn. et in Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Mosc. 3—6.
- Straufs.* Frid. A STRAUSS, Afciburgii: Obf. in Annal. der Wetter. Gefellfch. 2.
- Stremp.* Car. Frid. STREMPER: *Filicum berolinensium fynopsis*. Berol. 1822. 8.
- Sturm.* Jac. STURM, artifex Norimbergenfis: *Deutschlands Flora*, Abth. 1. Heft 1—47. Abth. 2. Heft 1—17. Abth. 3. H. 1—4. 1799 f. 12.
- Suffr.* . . DE SUFFREN: *Principes de botanique, fuivis d'un catalogue des plantes du Frioul et de la Carnia*. Venife. 1802. 8.
- Suter.* Jo. Rud. SUTER, prof. Bern. († 1827): *Flora helvetica*, vol. 1. 2. Turic. 1802. 12. ed. 2. cur. Hegetschweiler. Turic. 1822. 8.
- Sutt.* Car. SUTTON: Obf. in Transact. Soc. Linn. 4.
- Sw.* Ol. SWARTZ, prof. Holmienfis, Indiam occidentalem perfcru-tatus est (nat. 1760 † 1817): *Nova genera et species plantarum*. Holm. 1788. 8. *Observationes botanicae*. Erl. 1791. 8. *Icones plantarum incognitarum, quas in India occidentali detexit*. Erl. 1794. fol. *Flora Indiae occidentalis*, vol. 1—3. Erl. 1797—1806. 8. *Dispositio systematica muscorum frondosorum Sueciae*. Erl. 1798. 8. *Synopsis filicum*. Kil. 1806. 8. In opere: Svenfk botanik plurimas illustravit plantas; nemini mortalium liberalitate, et erga me, cessit. Obf. in act. acad. holm., in Schrader's Journ., in Berl. Magaz. et in Transact. Soc. Linn.
- Sweet.* Rob. SWEET: *Hortus suburbanus Londinensis*. Lond. 1818. 8. *Geraniaceae*, Lond. 1820 f.
- Sym.* Jelinger SYMONS: *Synopsis plantarum insulis britannicis indigenarum*. Lond. 1798. 8.
- Mich. SYMES, legatus britannicus in Ava: *Account of an embassy to the kingdom of Ava*. Lond. 1800. 4.
- Targion.* Octav. TARGIONI-TOZZETTI, prof. Florentinus: Obf. in Memorie di Modena.
- Tausch.* Ignat. Frid. TAUSCH, prof. Pragenfis: *Hortus Canalius f. plantarum, quae in horto Josephi Malabaila, Comitis de Canal coluntur, icones et descriptiones*, dec. 1. Prag. 1823. fol. Obf. in Regensb. bot. Zeit.
- Tenor.* Mich. TENORE, prof. Neapolitanus: *Flora neapolitana*, fasc. 1—6. Neapol. 1811. fol. *Prodromus florum neapolitanarum*. Neap. 1811—1813. 8. *Synopsis novarum plantarum, quae in prodromo describuntur*. Neap. 1815. 8. Plantarum collectionem novarum mihi largitus est.
- Thor.* Jo. THORE, medicus Tarbellis Aquitaniae (Dax en Gasco-gne) († 1823): *Essai d'une Chloris du département des Landes*. Dax. 1803. 8. Obf. in Journ. de botanique.
- Claud. Ant. THORY: *Prodrome de la monographie du genre Rosier*. Paris 1820. 8. Redoutaei Rosas adumbravit.
- Thouin.* Andr. THOUIN, praefectus horti botanici regii Parisiensis († 1824): Obf. in Ann. et Mém. du mus.
- Thuar.* Aub. AUBERT du PETIT-THOUARS, acad. Parisiensis fo-cius, a. 1792—1802 in insulis Acunnae, Mascarenis et Mada-

- gascaria {commoratus est: *Histoire des végétaux, recueillis dans les îles australes d'Afrique*. Paris 1806. 4. *Genera nova Madagascarensia*. Paris 1810. 8. *Mélanges de botanique et de voyages*. Paris 1811. 8. *Histoire des plantes Orchidées, recueillies sur les trois îles australes d'Afrique*. Paris 1822. 8.
- Thuill.** J. L. THUILLIER, prof. Parisiensis (†1822): *Flora des environs de Paris*. Paris 1799. 8.
- Thunb.** Car. Petr. THUNBERG, prof. Upsalienſis, a. 1772—1778 Africam australem, Javam, Ceylonam et Japoniam invisit: *Flora japonica*. Lips. 1784. 8. *Icones plantarum japonicarum*. Upsal. 1794. fol. *Prodromus plantarum capensium*. Upsal. 1794. 8. *Flora capensis*. (Cl. 1—4.) Upsal. 1813. 12. *Flora capensis*, ed. Schultes. Stuttg. 1823. 8. *Dissertationes botanicae*, (ed. Persoon.) 1. 2. Gott. 1799. 1800. 8. Obs. in act. acad. Holm., Petropol., nov. act. soc. Upsal., Transact. soc. Linn., comment. soc. physiogr. Lundin., soc. Havn., soc. Harlem.
- Till.** Mich. Angel. TILLI, praefectus horti botanici Pisani: *Catalogus plantarum horti Pisani*. Flor. 1723. fol.
- Timm.** Joach. Christ. TIMM, consul Malchini Megapol.: *Florae megapolitanae prodromus*. Lips. 1788. 8. Obs. in Siemssen's Magaz. für Naturk. Meklenb.
- Tin.** Vincent. TINEO, prof. Panormitanus: *Plantarum rariorum Siciliae pugillus*. Panorm. 1817. 8. *Egregiarum plantarum ficularum copiam mihi donavit*.
- Tode.** Henr. Jul. TODE, praeco sacer Pritzier Megapol. (nat. 1733 †1797): *Fungi meklenburgenses selecti*. P. 1. 2. Luneb. 1790. 1791. 4.
- Torr.** Jo. TORREY, medicus Noveboracensis: *Catalogue of plants in the vicinity of New-York*. Albany 1819. 8. *Flora of the middle and northern sections of the united states*, vol. 1. New-York 1824. 8. Obs. in Ann. of the Lyceum of New-York et Silliman's amer. journ. Insignem plantarum rariorum copiam mihi largitus est.
- Tourn.** Jos. Pitton DE TOURNEFORT, insignis peregrinator per Graeciam Aliamque minorem, eximius auctor systematicus, prof. Parisiensis (nat. 1656 †1708): *Institutiones rei herbariae*, vol. 1—3. Paris 1719. 4. *Relation d'un voyage du Levant*. tom. 1. 2. Amst. 1718. 4. Obs. in act. acad. Paris.
- Townson.** loco Townsend. Rob. TOWNSON: *Travels in Hungary*. Lond. 1797. 4.
- Trattin.** Leop. TRATTNIK, custos musei imperatorii Vindobon.: *Fungi austriaci, ad specimina viva cera expressi*. Vindobon. 1804. 1805. *Archiv der Gewächskunde*, fasc. 1—4. Wien 1811. 1812. 4.
- Trentep.** Jo. Frid. TRENTÉPOHL, praeco sacer Oldenbrock in ducatu Oldenburg. Obs. in Rothii catal. et bot. Bemerkungen.
- Trevir.** Lud. Christ. TREVIRANUS, prof. Wratislaviensis: *Allii species*. Wratisl. 1822. 4. Obs. in Berl. Magaz., Jahrb. der Gewächsk. et in nov. act. nat. cur. 13.
- Triguer.** . . DE TRIGUEROS, Hispaniam baeticam perscrutatus est. *Ανεξδότοις florae Carmonensis usus est Cavanilles*.
- Trin.** Car. Bern. TRINIUS, acad. Petropolit. sodalis: *Fundamenta agrostographiae*. Vienn. 1820. 8. *Clavis agrostographiae antiquioris*. Coburg. 1822. 8. *Species graminum iconibus et descriptionibus illustratae*, fasc. 1—4. Petrop. 1825. 1826. 8. Obs. in neuen Entdeck. 2.

- Turn.** Dawson TURNER: *A synopsis of the british Fuci*. Lond. 1802.
12. *Muscologine hibernicae spicitegium*. Yermouth. 1804. 8. *Fuci*,
or coloured figures and descriptions etc. vol. 1—4. 1807. fol.
- Turp.** P. J. F. TURPIN, ingeniosus et doctus plantarum pictor.
Cum Poiteo: *Flore des environs de Paris*. fasc. 1—7. 1808 f.
Cum eodem Duhamelii novam curavit editionem. Observ. in
Ann. et Mém. du mus.
- Turr.** Ant. TURRA: *Florae italicae prodromus*. Vicent. 1780. 8.
- Tuss.** F. R. DE TUSSAC: *Flore des Antilles*, vol. 1—3. Paris 1808
—1826. fol.
- Ucr.** E. Bernard. UCRIA, demonstrator plantarum Panorm.: *Hortus regius Panormitanus*. Panorm. 1819. 4. Obs. in Römer Archiv, 1.
- Uro.** Jo. Dumont d'URVILLE, primum comes navarchi Gauttier
1819 et 1820 infulas maris aegaei et oras ponti euxini invisit,
dein 1822—1825 itinere περιζουσιτω inclaruit. Enumeratio
plantarum in Mém. de la Soc. Linn. de Paris, 1.. Sur la flore
des Malouines in Ann. des scienc. nat. 6.
- Vahl.** Martin. VAHL, prof. Havniensis, Europam australem ipsamque
Numidiam obierat (nat. 1749 † 1804): *Symbolae botanicae*,
P. 1—3. Havn. 1790—1794. fol. *Eclogae americanae*, fol. 1. 2.
Havn. 1796. 1798. fol. *Icones illustrationi plantarum in eclogis
inservientis*, dec. 1—3. Havn. 1798. 1799. fol. *Florae danicae*
vol. 6. et 7. instruxit. *Enumeratio plantarum*, vol. 1. 2. Havn.
1804. 1805. 8. Obs. in Naturhist. Selsk. Skrivt. 1. 2.
- Vaill.** Sebast. VAILLANT, prof. Parisiensis (nat. 1669 † 1721): *Botanicon parisiense*. Leid. 1727. fol. Obs. in act. acad. Paris.
1718—1722.
- Vand.** Domin. VANDELLI, Italus, prof. Conimbricensis, diu in
Basiliana degit: *Diff. de Aponi thermis*. Patav. 1758. 4. *Fasciculus
plantarum*. Olysiip. 1771. 4. *Diccionario dos terminos technicos
de historia natural*. Coimbr. 1788. 4. Recus. in Römer
scriptor. de plantis lusitan., hispan. et brasil.
- Vauch.** Jo. Petr. VAUCHER, verbi divini minister Genevensis: *Histoire
des Conservees d'eau douce*. Genève. 1803. 4. Obs. in Mém.
du mus. et in mém. de la Soc. phys. de Genève.
- Vell.** Thom. VELLEI, chiliarchus britann. († 1806): *Coloured figures
of marine plants*. Bathon. 1795. fol. Obs. in Transact. Soc.
Linn.
- Vent.** Steph. Petr. VENTENAT, prof. Parisiensis (nat. 1757 † 1808):
: *Description des plantes nouvelles, cultivées dans le jardin de M.
Cels*. Paris 1800. fol. *Monographie du genre Tillcul*. Paris 1802.
4. *Jardin de la Malmaison*, vol. 1. 2. Paris 1803. 1805. fol.
Choix de plantes. fasc. 1—10. Paris 1803—1808. 4. *Decas generum
novorum*. Paris 1808. 4.
- Vest.** Laur. DE VEST, prof. Graiaci in Styria. Obs. in Regensb.
bot. Zeit. Cum Römero et Schultesio plantas communicavit.
- Vib.** Eric. VIBORG, prof. Havniensis (nat. 1759 † 1822): *Abh. von
der Gerste*. Kopenh. 1802. 4. Obs. in nov. act. havn. 1.
- Vigu.** loco Vign. L. G. A. VIGUIER: *Histoire naturelle des Pavots
et des Argémones*. Montpell. 1814. 4.
- Vill.** D. VILLARS, primum medicus Gratianopol., dein prof. Argentinen-
sifis († 1814): *Histoire des plantes du Dauphiné*, vol. 1—4.
Grenoble 1786—1789. 8. *Précis d'un voyage botanique*. Strasb.
1812. 8.

- Vitm.* Fulgent. VITMANN: *Summa plantarum, quae hactenus innotuerunt*, vol. 1—6. Mediol. 1789—1792. 8.
- Viv.* Domin. VIVIANI, prof. Genuensis: *Annali di botanica*, 1. 2. Genova 1802. 1804. 8. *Florae italicae fragmenta*. Gen. 1808. 4. *Florae libycae specimen*. Gen. 1824. fol. *Florae corsicae prodromus, cum appendice*. Genuae 1824. 1825. 4.
- Vog.* Bened. Christ. VOGEL, prof. Altorfinus: *Plantarum rariorum icones Trewianus illustravit*. Norimb. 1779. fol.
- Voit.* J. G. VOIT, medicus Svinfurtenfis: *Historia muscorum frondosorum in ducatu herbipolitano crescentium*. Norimb. 1812. 8. *Icones Sturmii in florae sect. 2. fasc. 11—14. illustravit*.
- Volckam.* Jo. Georg. VOLCKAMER, medicus Norimbergenfis (nat. 1616 † 1693): *Flora norimbergenfis*. Norimb. 1700. 4.
- Wahlb.* Petr. Frider. WAHLBERG: *Flora gothoburgensis*. Upsal. 1820. 8.
- Wahlenb.* Georg. WAHLENBERG, prof. Upsalienfis: *Flora lapponica*. Berol. 1812. 8. *De vegetatione helvetica*. Turic. 1813. 8. *Flora Carpathorum*. Gott. 1814. 8. *Flora upsaliensis*. Upsal. 1820. 8. *Flora suecica*. P. 1. 2. Stockh. 1824. 1826. 3. *Operis, Sænsk botanik tom. 9. rededit*. Obs. in act. acad. holm.
- Waiz.* Frid. WAIZ, tabularii praefectus Altenburg. Rosarum collector.
- Wall.* Nathan. WALLICH, horti botanici Calcutt. praefectus: *Tentamen florae nepalensis illustratae*. Calcutt. et Seramp. 1824. fol. Obs. in Roxburghii flor. ind., in Asiatic research., in Transact. Soc. Linn. et in Tidskrift for Naturvidenskab.
- Wallm.* . . WALLMODEN: Obs. in Liljeblad's svenk flora.
- Wallr.* Frid. WALLROTH, medicus Northufanus: *Annus botanicus*. Hal. 1815. 8. *Schedulae criticae*. Hal. 1822. 8. Obs. in Verhand. der berl. Gesellsch. naturf. Freunde, 1.
- Walt.* Thom. WALTER: *Flora Caroliniana*. Lond. 1788. 8.
- Wangenh.* Frid. Ad. Jul. A WANGENHEIM, sylvarum curator: *Beschreibung einiger nordamerikanischen Holzarten*. Gött. 1781. 8. Obs. in Beobacht. der berl. Gesellsch. naturf. Freunde.
- Web.* Fr. WEBER, prof. Kiloniensis (nat. 1781 † 1823). Cum Mohrio: *Naturhistorische Reise durch einen Theil Schwedens*. Gött. 1804. 8. *Deutschlands kryptogamische Gewächse*. Kiel 1807. 12. *Archiv für die systematische Naturgeschichte*. 1. Leipz. 1804. 8. *Beyträge zur Naturkunde*, B. 1. Kiel 1805. 8. *Großbritanniens Conserven*, nach Dillwyn bearbeitet, Heft 1—4. Gött. 1803—1805. 8. . . Scorpius: *Historiae muscorum hepaticorum prodromus*. Kil. 1815. 8.
- Georg. Henr. WEBER, prof. Kiloniensis, prioris pater: *Spicilegium florae gottingensis*. Goth. 1778. 8. Cf. Wiggers.
- Weig.* Christ. Ehrenfr. A WEIGEL, prof. Gryphiae: *Flora pomerano-rugica*. Berol. 1769. 8. *Observationes botanicae*. Gryph. 1772. 4.
- Weih.* Aug. WEIHE, medicus Herford.: *Beschreibung der deutschen Brombeerarten, mit Abbildungen*. Heft 1—4. Bonn 1820 f. fol. *Gramina germanica siccata fasciculis 12. edidit*.
- Weinm.* J. A. WEINMANN, hortulanus imperatricis viduae Ruthen. in Pawlowfk. Obs. in Regensb. bot. Zeit. 1821 f.
- Weis.* Fr. Gul. WEIS: *Plantae cryptogamicae florae Gottingensis*. Gott. 1770. 8.

- Wendl.* Henr. Ludov. WENDLAND, hortulanus Herrenhufanus: *Commentatio de Acaciis aphyllis*. Hannov. 1820. 4.
- Jo. Christ. WENDLAND, praefectus horti Herrenhufani, prioris pater: Cum Schradero: *Sertum hannoveranum*, fasc. 1—3. Gott. 1795—1797. fol. *Hortus herrenhufanus*, tom. 1—4. Hannov. 1798. 1799. fol. *Botanische Beobachtungen*. Hannov. 1798. 4. *Ericarum icones*, fasc. 1—17. Hannov. 1798—1806. 4. *Sammlung ausländischer und einheimischer Pflanzen*. B. 1. 2. Hannov. 1806—1810. 4.
- West.* Hans WEST: *Beskrivelse over S. Croix*. Kiobenh. 1793. 8.
- Wib.* Aug. Gul. Eberh. Christ. WIBEL: *Primitiae florum Werthemensis*. Jen. 1799. 8.
- Wigg.* Frid. Henr. WIGGERS: *Primitiae florum holsaticae*. Kil. 1780. 8. Verus auctor est G. H. Weber, prof. Kiloniensis, qui et *supplementum hujus florum* 1787. 8. edidit.
- Wikstr.* Jo. Imman. WIKSTRÖM, custos musei acad. Holm.: *Diff. de Daphne*. Upsal. 1817. 4. Obs. in act. acad. holm. Plantas succicas multas ipsi debeo.
- Wilk.* Sam. Gust. WILCKE: *Flora gryphica*. Gryph. 1765. 8.
- W.* Christ. Lud. WILLDENOW, prof. Berolinensis (nat. 1765 † 1812): *Florae berolinensis prodromus*. Berol. 1787. 8. *Tractatus de Achilleis*. Hal. 1789. 8. *Historia Amaranthorum*. Turic. 1790. fol. *Phytographia s. descriptio plantarum rariorum*. Erl. 1794. fol. *Linnaei species plantarum*, tom. 1—5. Berol. 1797—1818. 8. *Enumeratio plantarum horti berolinensis*, 1. 2. Berol. 1809. 8. *Supplementum* posthumum adidit Schlechtendal. *Berlinische Baumzucht*, ed. 2. Berl. 1811. 8. Obs. in Usteri's Magazin, in neuen Schriften berl. Gesellsch. naturf. Freunde, in Berl. Magazin, in act. acad. berolin., monach., erford.
- Willem.* Petr. Remig. WILLEMET, insulas Mascarenas peragravit, obiit in India orientali 1790 (nat. 1762): *Herbarium Mauritianum*, quod ad Millinum miserat, edidit Usteri in Ann. 18.
- Remig. WILLEMET, prioris pater, medicus Nancianus († 1807): *Flore de l'ancienne Lorraine*. vol. 1—3. Nancy 1805. 8.
- Willich.* Christ. Lud. WILLICH, medicus Clausthal. († 1776.) *Observationes botanicae, recusae in Reichard sylloge opusculorum botanicorum*. Frsf. 1782. 8.
- Wint.* Jo. Jos. WINTERL, prof. Pestinensis († 1789): *Index horti botanici*. Pestini. 1788. 8. (Cum tabulis 25, sed haud absolutus.)
- Wither.* Gul. WITHERING, medicus Birmingham. (nat. 1741 † 1799): *A systematical arrangement of british plants*, ed. 5. vol. 1—4. Birmingham. 1812. 8.
- Wohleb.* Jo. Frid. WOHLLEBEN, M. D.: *Supplementum ad Leysseri florum halensem*. Hal. 1796. 8.
- Woods.* Jos. WOODS Rosas britannicas illustravit in *Transact. soc. Linn.* 12.
- Woodw.* Thom. Jenkinson WOODWARD: Obs. in *Philos. transact.* 74. et in *Transact. soc. Linn.*
- Wormsk.* . Martin. WORMSKIOLD, centurionis legatus, Norvegiam 1807, tum Grönlandiam 1812—1815 invisit, dein Kotzebueum in περιπλω 1816 comitatus, in Camtschatca biennium commoratus, redux ingentem plantarum numerum reportavit, quas et Hornemannus et Lyngbyus illustrarunt.
- Wrang.* Frid. Ant. A WRANGEL: Obs. in act. acad. holm. 1823.

- Wred.* J. C. L. WREDOW, verbi divini minister Parum Megapol. (nat. 1773 † 1823): *Oekonomisch-technische Flora Meklenburgs*. Th. 1. 2. Lüneb. 1811. 1812. 8.
- Wright.* Gul. WRIGHT: Obf. in plantas jamaicenses, in Lond. medic. Journ. 8., in Uteri Mag. 4. 7. et in Philof. transact. 67.
- Wulf.* Fr. Xaver. WULFEN, abbas Clagenfurt in Carinthia († 1804). Obf. in Jacquini miscell. et collect., tum et in Römeri Archiv. 3.
- Young.* Thom. YOUNG, medicus: Obf. in Transact. soc. Linn. 3.
- Zanon.* Jac. ZANONI, prof. Bononiensis (nat. 1615 † 1682): *Istoria botanica*, ed. Monti, Bonon. 1742. fol.
- Zanted.* Aug. ZANTEDESCHI, medicus in Bovegno Brixian.: Obf. in comment. acad. Brixianae, 1813—1814. 1818. et in Brugnatelli diario physico.
- Zea.* . . ZEA, prof. Matrit.: Obf. in act. acad. Matrit. 1806.
- Zuccagn.* Attil. ZUCCAGNI, praefectus horti botan. Florent.: *Centuria 1. observationum botanicarum*. Flor. 1806. 4. Recuf. in Römeri collectan. Turic. 1809. 4.
- Zuccar.* J. G. ZUCCARINI, prof. Monachienfis: Obf. in act. acad. Monach.

INDEX GENERUM.

Nomina literis obliquis expressa synonyma sunt.

A.

- Ahelia* R. Br. 223. 239.
Ablania Aubl. 210.
Abroma Jacqu. 295.
Abronia Hook. 53.
Acacia W. 261-262.
Acacia W. et al. 165.
Acaena 19. 336.
Acalypha 315.
Acer 150.
Achillea 303.
Achyranthes 102-102. 341.
Achyranthes L. et Coll. 102. 106.
Achyronia * 271. 287.
Aconitum 211.
Acronodia Blum. 145. 149.
Acrostichum 320.
Acrostichum Thuar. 320.
Acrozus * 145. 149.
Adenantha Kunth. 165.
Adenocalyx Berter. 169.
Adenocarpus Cand. 273.
Adenogramma Reichenb. 341.
Adenophora Fisch. 77.
Adina Salisb. 80.
Adonis 217-218.
Adriana Gaudich. 316-317.
Aegiceras Gärtn. 254.
Aeschynanthus Jack. 223. 238.
Aeschynomene Ort. et Jack. 273.
 . 294.
Aetheilema R. Br. 236.
Azelia Sm. 170.
Agaricus 332-333.
Agati Rheed. 284.
Aglaia Lour. 85. 246. 250.
Agrimonia 190.
Agrostis 31. 557.
Aidclus * 11. 17.
Aira 32.
Aiuga 226.
Aizoon 195.
Alamania Laxarf. 306. 309.
Alchemilla 45.
Alchornea Sw. 251.
Alectorolophus M. B. 232.
Alegria Seff. 201. 205. 296.
Aleurites W. 262.
Alisma 144.
Allium 132.
Alopecurus 30.
Alphitomorpha Wallr. 332.
Alpinia 8.
Alfodea Thuar. 99.
Alstonia R. Br. 65.
Alströmeria 155.
Alternanthera Don. et Kunth.
 103. 106. 107.
Alyffum 239.
Alyxia Banks 109.
Amajoua Aubl. 139. 342.
Anarantus 122.
Amaria Seb. Mut. 247. 254.
Amaryllis 132-155.
Amaryllis Lindl. et Sims. 133.
Amerinum P. Br. 268.
Amicia Kunth. 264. 294.
Ammannia 43.
Annobium R. Br. 300.
Amomum Kön. 7.
Amplopsis Blum. 90.
Amphilochia Mart. 4. 10.
Amphinomia Cand. 247. 255.
Amphirrhox * 51. 99.
Amphymenium Kunth. 268.
Amyris 148-149.
Anacardium 156.
Anagallis 339.
Anagyris 170.
Anatherum P. B. 33.
Auchietea Hilar. 51. 98.

Anchusa 55. 559.
Anchusa Stev. 339.
Ancistrum Thuar. 19.
Andira Lefchen. 269.
Androcymbium W. 141. 142.
Andromeda 159.
Andropogon 22. 33. 337.
Andropogon Humb. et al. 337.
Androface 57.
Aneilema Hook. et Don. 25.
Anemone 220-221.
Angelica 121.
Angelonia Humb. 235.
Anguillaria R. Br. 142.
Anguillaria * 141. 142.
Anisomeles R. Br. 226.
Anisopogon R. Br. 336.
Annesforrhiza Schlecht. 118.
Anona 216.
Anona Radd. et Spr. 214.
Anthericum 135.
Anthezeria 337.
Anthospermum 338.
Anthyllis 266.
Aotus Sm. 175.
Apargia Scop. 305.
Apatelia Cand. 210. 211. 295.
Aphanamixis Blum. 246. 251.
Aphananthe Link. 122.
Aphanostemma Hilar. 219.
Aphelandra R. Br. 236.
Aplophylla Adr. Juff. 163.
Aquilia Gärtn. 70.
Arabis 242.
Aralia 125.
Araucaria R. Br. 315.
Arbutus Forst. et Mill. 158. 543.
Archytea Mart. 295. 296.
Arctotis 304.
Ardisia Sw. 67-68.
Arenaria 181-182.
Arenaria Fisch. 124.
Argophyllum Forst. 100.
Argostemma Wallich. 50. 81-82.
Aristida 31.
Aristolochia 310.
Armeria W. 127.
Arnica 302.
Aromadendron Blum. 202. 217.
Artemisia 300.
Arthrostemma Don. 161.
Arun 311. 347.
Asaphes * 222. 232.
Ascium Schreb. 207.
Asclepias 110. 341.
Aspalathus 267-268.

Aspalathus Burm. et Don. 171.
 271.
Asparagus 136.
Asperula 39.
Aspidistra Ker. 152.
Aspidium Sw. 320.
Aspidosperma Mart. 49. 58.
Astephanus R. Br. 112.
Aster 301.
Asteriscium Chamiff. 116.
Asterocephalus Vaill. 38.
Astilbe Don. 145. 153.
Astragalus 288.
Astranthus Lour. 145.
Asirolobium Desv. 294.
Athamanta 119-120.
Athamanta Don. 119.
Augustia Leandr. 301.
Avena 35.
Aylmeria Mart. 102. 103.

B.

Baccharis Trevir. 501.
Bactrylobium Schrad. 166.
Bäckea 149.
Baeobotrys Forst. 83-84.
Ballota 227.
Balsamina Hook. 99.
Balsamita Desf. 300.
Banffyia Baumg. 53. 114. 179.
Bangia Lyngb. 332.
Bankia L. fil. 47.
Baphia Afz. 158. 175.
Baptisia Vent. 171.
Barbiera Cand. 282.
Barbula Hedw. 323.
Barlingia Reichenb. 50. 79.
Bartramia Hedw. 323.
Bartia 238.
Bartia Mx. et L. 232.
Bassia Kön. 189.
Bauera Andr. 209.
Bauhinia 166.
Beaumontia Wallich. 49. 65.
Begonia 211-213.
Bellium 303.
Ben-tiru-tali Rheed. 62.
Berberis 138.
Bergia 184.
Berula Koch. 120.
Besleria 238.
Betonica 227.
Beureria Jacqu. 66.
Bidens 299.
Bignonia 237.
Biscutella 239.

- Blackwellia Commerf. 191.
 Blitum 10.
Blumenbachia Schrad. 208.
 Bocagea Hilar. 150. 143-144.
 Böhmeria Jacqu. 313-514.
 Bönninghaufia * 279.
 Boletus 333-334.
 Bolivaria Schlechtend. 11. 12.
 Bombax 259-260.
Bombax W. 206.
Bonannia Presl. 244.
 Bonnaya Link. 15.
 Bonnetia Schreb. 206-207.
Bonplandia W. 51. 91.
 Borbonia 267.
Borbonia * 284.
 Borkhaufia Böhm. 304.
 Boronia Sm. 148.
 Borrigo 55.
 Boffiaea Vent. 274.
 Boswellia Colebr. 161.
 Bouffingaultia Humb. 52. 108.
 Bowdichia Kunth. 158. 169.
 Bowlesia R. et P. 117.
Brachystemma Don. 114. 181.
Bractearia Pöpp. 73.
 Bradleia Gärtn. 248.
Brandesia Mart. 106.
 Brassica 243. 346.
Brassica Gaud. et Urv. 243.
 Braya Sternb. 239.
 Brayera Kunth. 192. 195.
Bremontiera Cand. 293.
 Brexia Noronh. 51. 94.
 Bromelia 131.
 Bromus 36.
 Brongniartia Kunth. 264. 287.
 Brownea Jacqu. 253.
 Brucea Herit. 43.
 Brunelia R. et P. 191.
 Brunonia Sm. 346.
Brunsoigia Lindl. 133.
 Bryonia 248.
Bryum 324.
Bubon Schlechtend. 120.
 Bubroma Schreb. 295.
Bucholzia Mart. 103.
 Bucida 177.
 Buddlea 42.
 Büchnera 255.
 Büttnera 93.
 Bulliarda Cand. 48.
 Bupleurum 117-118.
 Burchellia R. Br. 85.
 Burmannia 23.
 Burtonia R. Br. 175.
 Butomus 157.
 Buxus 314.
- C.
- Cachrys 119.
 Cadfura Juff. 345.
 Caesalpinia 169.
 Caladium Vent. 311.
 Calanthe R. Br. 309.
 Calathea Meyer. 5.
 Callicarpā 41.
 Callicoma R. Br. 191.
Callirrhoe Nutt. 259.
 Callistachys Vent. 173.
Callisthene Mart. 10.
Callitriche 4.
Callopisma Mart. 338.
Calophaca Fisch. 273.
 Calophyllum 203.
Calorophus Labill. 36.
 Calpandria Blum. 247. 260.
 Caltha 220.
 Calyptranthes Sw. 194.
Calystegia Wallich. 62.
 Camellia 260.
 Campanula 76-78. 340.
 Campylanthus Roth. 19.
 Campyleia Thuar. 222. 232.
Camunium Rumph. 250.
Canavalia Cand. 280.
 Canna 4-5.
 Canthium Lam. 82.
 Cantua Juff. 64.
 Capellia Blum. 202. 217.
 Caperonia Hilar. 310. 314-315.
 Capparis 204.
Capparis Jacqu. 139.
 Capraria 236.
Caprifolium Don. 82.
 Caragana Lam. 263. 280.
 Caraipa Aubl. 201. 207.
Carapa Blum. 147.
 Cardamine 241-242.
 Carduus 298.
 Carex 311-313.
Carex Nees. 39.
 Cariffa 70-71.
 Carmichaëlia R. Br. 263. 271.
 Carolinea 260.
 Carpopogon Roxb. 263. 272.
Carum Koch. 120.
 Caryochloa * 22. 30.
Caryophyllus Labill. 193.
 Casalea Hilar. 218. 220.
 Casearia 176.
Casparea Kunth. 166.

- Casselia* Nees. 222. 231.
Cassia 166-169.
Cassine 123.
Cassine Mart. 48.
Cattilleia Mut. 232.
Catafetum Rich. 307.
Gatesbaea 40.
Cattleya Lindl. 309.
Caucalis 119.
Caucalis Don. 119.
Caulinia 25.
Cauftis R. Br. 26.
Ceanothus 88.
Cedrela P. Br. 95.
Celastrus 88-89.
Celofia 102.
Celofia L. 106.
Cenchrus 33.
Cenomyce Laur. 327.
Centaurea 298.
Centranthera R. Br. 235.
Centrophorum Trin. 22. 30. 33.
Cerastium 183.
Ceratochloa Cand. 36.
Cerbera 66.
Cerbera Rudg. 58.
Cerithe 53.
Cestrum 71.
Chaenomeles Lindl. 196.
Chaerophyllum Fisch. et al. 120.
Chaetocalyx Cand. 279.
Chailletia Cand. 122.
Chara 331.
Cheiranthus 243.
Cheiranthus Hall. fil. 242.
Chelone 223. 235.
Chenopodium 122.
Cherleria 183.
Chionanthus L. 12.
Chirita Don. 15.
Chironia 60.
Chisocheton Blum. 246. 251.
Chlora 147.
Chloris W. 337.
Chorisia Kunth. 253.
Chorizema Lahill. 172.
Chorizema Sm. 172.
Christia Mönch. 291.
Chrysihiala Bot. reg. et Hook.
 132.
Chrylocoma 298.
Chrysohyllum 70.
Chrysopterygium 179.
Cinchona 73. 340.
Cineraria 302.
Cineraria Tenor. 302.
Cinnamomum Don. et Hook. 156.
Cipadessa Blum. 252.
Cirsium Vaill. 297-298.
Cissampelos 317.
Cissus 43-44.
Cistus 205-206.
Citrus 295.
Cladium P. B. 21.
Cladonia Hoffm. 327.
Cladostachys Don. 102.
Clematis 221.
Cleome 138-139.
Clerodendron 231.
Cleyera Thunb. 206.
Cliffortia 209. 345.
Clinopodium Roxb. 224.
Clitoria 282.
Clitoria Juss. et al. 286. 287.
Clusia Rich. 208.
Clypea Blum. 316.
Cnemidostachys Mart. 313.
Cneplis Lam. 255.
Cnicus Tenor. et C. C. Gmel.
 297. 298.
Cnicidium Cuss. 118.
Cnidium Koch. 118.
Cobaea Cav. 64.
Coccoloba 154.
Cocculus Blum. 143.
Cochlospermum Kunth. 201. 206.
Codia Forst. 146. 152.
Codonopsis Wallich. 78.
Cologyne Lindl. 305. 308.
Colax Lindl. 307.
Colbertia Blum. et Don. 213.
Colchicum 141.
Colchicum R. Br. 134.
Collaea * 304.
Collaea Cand. 279.
Collema Kunth. et Radd. 329.
Cologania Kunth. 282. 283.
Colpodium R. Br. 31.
Columbia Perf. 205.
Colutea 278.
Colymbea Salisb. 315.
Comandra Richardf. 109.
Comarum Roxb. 193.
Combretum 166.
Commelina 25.
Comocladia 25.
Complanthus * 130. 137.
Compsoa Don. 130. 137.
Conanthera R. et P. 136.
Conchocarpus Mik. 91.
Condalia Cav. 108.
Conserva Pollin. et Radd. 331.
 332. 335.
Conium 120.

- Conium* Berg. 118.
Connarus L. Cand. 254.
Connarus L. et al. 255.
Conobea Aubl. 232.
Conohoria Hilar. 99.
Conoria Kunth. 99.
Conospermum Sm. 46.
Convallaria 156.
Convolvulus 60-62.
Convolvulus Wallich. 65.
Conyza 301.
Cookia Blum. 161. 162.
Copaifera 176-177.
Copaiva Jacqu. 177.
Corallophyllum Kunth. 145. 147.
Gordia 66.
Cordyla Lour. 247. 262.
Cornus 44.
Correia Vand. 162.
Corrigiola 124.
Corydalis Dillen. 264.
Corynandra Schrad. 201. 204.
Corynella Cand. 263. 280.
Corynitis * 263. 280.
Costus 7-8.
Cotyledon 188.
Coulteria Kunth. 169.
Couma Aubl. 49. 58.
Couraturi Aubl. 208.
Coursetia Cand. 283.
Coutoubea Aubl. 338.
Cowania Don. 192. 197.
Crambe 346.
Craniolaria Nees. et Mart. 238.
Crataegus Link. 196.
Crénias * 246. 247.
Crepis 304.
Crepis Guffon. et Forsk. 304.
 305.
Crinum 133-134.
Critamus Koch. et Bess. 119. 120.
Crocus 23.
Crotalaria 275-277.
Crotalaria Cand. et al. 266. 267.
 286.
Croton 262.
Croton L. 314.
Crozophora Neck. 314.
Crumenaria Mart. 51. 102.
Cryptandra Sm. 63.
Cryptolobus * 272.
Gubaea Scop. 170.
Cucullaria Schreb. 4. 9.
Cuncea Hamilt. 40.
Cunila 16.
Cunila Hook. et W. 224. 226.
Cupania 149.
Cuphea P. Br. 190.
Curatella 209.
Curculigo Gärtn. 154.
Curcuma 7.
Curtia Schlechtend. 60.
Cuscuta 114.
Cuspa Humb. 99.
Cyamopsis Cand. 280.
Cyanotis Don. 138.
Cyathia Sw. 320.
Cyathodes Chamiff. 67.
Cybbanthera Hamilt. 234.
Cyclopia Vent. 171.
Cydonia Hamilt. 196.
Cylista Ait. 269.
Cymation * 130. 141. 142. 143.
Cymbidium Sw. 307.
Cymbopogon * 337.
Cyminosma Gärtn. et Cand. 148.
Cynanchum 110.
Cynoglossum 55.
Cynomorium 336.
Cynosurus Hort. berol. 36.
Cyperus 28-29.
Cypripedium 310.
Cyrtandra Forst. 14-15.
Cyrtanthus Ait. 134.
Cyrtocarpa Kunth. 157. 161.
Cyrtopodium R. Br. 308.
Cytinus 145. 246.
Cytifus 272.
Cytifus Loif. 279.

D.

- Dalbergia* L. fil. 268-269.
Dalbergia Persl. et Hook. 170.
 275.
Dalea 294-295.
Danthonia Cand. 54.
Daphne 152. 343.
Daphne Radd. 152.
Darlingtonia Cand. 262.
Daubentonia Cand. 273.
Daucus 119.
Davilla Vand. 201. 209.
Daviesia Sm. 174.
Daviesia Sieb. et Sm. 172. 175.
Dawsonia R. Br. 321.
Deguelia Aubl. 269.
Dejanira Schlechtend. 41.
Delilia * 305.
Delima 206.
Delphinium 211.
Dendrobium Sw. 309.
Dendrobium Hook. 310.
Depazca Fr. 332.

Deschampsia R. Br. 52.
Defmanthus W. 165.
Desmochaeta Cand. 103.
Desmochaeta Cand. 102.
Desmodium Cand. et Lindl. 290-295.
Detarium Juss. 158. 177.
Deyeuxia Clarion. 30.
Deyeuxia * 336.
Dianthus 179.
Dicerma Cand. 289. 290.
Dichilos Cand. 263. 273.
Dichonema Fr. Nees. 332.
Diclidanthera Mart. 343.
Dicliptera Juss. 19.
Dicliptera Nees. 237.
Diclytra Don. 265.
Dicorypha Thuar. 47.
Dicranum Hedw. 322.
Dictyoloma Adr. Juss. 51. 94.
Didymocarpus Jack. et al. 13-15. 223. 238.
Didymochiton Blum. 247. 253.
Didymodon Hedw. 323.
Digitalis 234.
Dillenia 202.
Dillenia Roxb. 215.
Dillwynia Sm. 174-175.
Dillwynia Sieb. 174.
Dimereza Labill. 146. 150.
Dioclea Kunth. et Cand. 283.
Dioscorea 143.
Diospyros 146-147.
Diphaca Lour. 170.
Diplocomium Funck. 324.
Diplopetalon * 146. 150.
Diplophractum Desf. 205.
Dipfacus 37-38.
Disandra L. 63. 145.
Discocarpus Schlechtend. 264.
Disemma Labill. 250.
Disporum Don. 136.
Ditassa R. Br. 52. 111.
Ditmaria * 4. 8.
Dodecatheon 56.
Dodonaea 152.
Dolichonemia Nees. 170.
Dolichos 230.
Dolichos L. et al. 270. 281. 282. 283.
Dombeya Cav. 256.
Dombeya Lamb. 315.
Donax Lour. 6.
Draba 240.
Dracacna 136.
Drimys 215.
Drosera 126.

Drymaria W. 124.
Dufourea Hilar. et Nees. 10. 328.
Dulongia Kunth. 53. 114.
Dumasia Cand. 263. 279.
Dumerilia Lag. et Cand. 297. 301.
Dupontia R. Br. 32.
Duvalia Nees. 326.
Duvaua Kunth. 148.
Dysoxylon Blum. 252.

E.

Ecastaphyllum Rich. 268.
Eccremocarpus R. et P. 237.
Echinocarpus Blum. 201. 204.
Echites 64.
Echites Roxb. et Labill. 65.
Echium 54.
Edwardia Salisb. 172.
Ehrenbergia Spr. et Mart. 342. 343.
Ehretia 66.
Elacagnus 47.
Elaeocarpus 189.
Elaphrium Kunth. 148-149.
Eleiotis Cand. 269.
Eleocharis Don. et Nees. 47.
Eleusine Gärtn. 36.
Elodea Humb. et Rich. 25.
Elvasia Cand. 145.
Elymus 34.
Embelia Burm. 50. 69.
Empedoclea Hilar. 201. 203.
Encyanthus Lour. 157. 158.
Enkianthus Lour. 157.
Entada Adanf. 164.
Entelea R. Br. 201. 204.
Epacris Forst. 64.
Epicharis Blum. 251.
Epidendrum 309.
Epilobium 151.
Eranthemum R. Br. 19.
Eria Lindl. 310.
Erica 146. 342.
Erineum Persf. 335.
Eriodendron Blum. et Mart. 259.
Eriostemon Sm. 157. 164.
Eriostemon Spr. et al. 164. 189.
Erijsina Mart. 9.
Ernodca Sw. 40.
Erodium Herit. 249.
Erucastrum Presl. 244.
Ervum 346.
Eryngium 115.
Erysimum 242. 243.

- Erythraea* Rich. 57.
Erythrina 278.
Erythrina Roxb. 291.
Erythroftictus Schlechtend. 142.
Escallonia Mut. 94.
Esenbeckia Kunth. et Blum. 126.
 257.
Eucalyptus Herit. 195.
Eugenia Mart. et Coll. 193.
Eulophia R. Br. 307.
Euphorbia 311.
Euphrasia 232.
Euphronia Mart. 246. 251.
Eurotium Grev. 332.
Eurycoma Jack. 53. 125.
Euthemis Jack. 51. 92.
Eutrema R. Br. 239.
Evodia Labill. 43.
Evolvulus 113.
Evonymus 92-93.
Exacum 41. 338.
Eysenhardtia Kunth. 268.
- F.
- Fabiana* R. et P. 49. 62.
Fageia Neck. 276.
Fagraea Wallich. et al. 71.
Farfetia Turr. 240.
Fedia Mönch. 23.
Ferula Tenor. 122.
Festuca 36.
Feuillaea 250.
Fimbristylis Vahl. 26.
Flacourtia Commersf. 208-209.
Frankenia 141.
Freylinia Coll. 66.
Fritillaria 135.
Frullania Radd. 324.
Fuchsia 151.
Fumaria 264.
Funaria Hedw. 324.
- G.
- Galactia* P. Br. 282-283.
Calactia Perf. 282.
Galega 286.
Galega Thunb. et Jacqu. 171.
 278.
Galenia * 122.
Galeopsis 223.
Galipea Aubl. 53. 91.
Galium 39. 338.
Galvania Velloz. 79.
Garcinia 189.
Gardenia 84-85.
- Gardneria* Wallich. 40.
Gardoquia R. et P. 225.
Gastonia Roxb. 125.
Gaultheria 159. 343.
Gaultheria * 160.
Gay-Lussacia Schlechtend. 160.
Geeria Blum. 202. 213.
Geissois Labill. 158. 177.
Geniostoma Forst. 59.
Genista Burm. et al. 171. 266.
Gentiana 32. 112-113.
Geophila Don. 50. 82.
Geranium 253.
Geranium Boccon. et Bivon. 249.
Gesnera 238.
Geum Pursh. et Langsd. 189.
 345.
Gilliesia Lindl. 22. 24.
Gladiolus 23.
Glaucium Tournef. 203.
Glechoma Roxb. 225.
Glechon * 222. 227.
Globba 8.
Gloriosa 135.
Gloscomia Don. 78.
Glossarrhen Mart. 99.
Glottidium Desv. 287.
Gloxinia Herit. 239.
Glycine 269-270.
Glycine W. 278.
Glycosmis Corr. 161-162.
Glyphis Ach. 327.
Gnaphalium 300.
Gnidia 152.
Godoya R. et P. 158. 201. 206.
Gomphia Schreb. 162-163.
Gompholobium Sm. 172-173.
Gompholobium Bonpl. et Sm.
 175.
Gomphrena 104-106.
Gomphrena Vahl. et al. 106-108.
Gongora R. et P. 305. 307-308.
Goniocarpus Thunb. 48.
Goniocheton Blum. 252.
Gonolobus Mx. 110.
Gonyanthes Blum. 306. 310.
Goodenia Sm. 76.
Goodia Salisb. 267.
Goodia Cand. 272.
Gordonia 260.
Gossypium 257.
Gourania 101-102.
Gouffesia Cand. 114. 181.
Graemia Hook. 297. 299.
Grahamia * 297. 299.
Gratiola 15.
Gratiola Rottl. et Sw. 14. 17.

- Grevillea* R. Br. 46.
Grewia 205.
Griffinia Lindl. 153.
Grimmia Hedw. 521.
Guajacum L. 254.
Guarea 251.
Guatteria R. et P. 214-215.
Guilandina 165.
Guilleminea Kunth. 52. 105.
Gymnostomum Hedw. 521.
Gynandropsis Blum. 158.
Gynostemina Blum. 240. 251.
Gypophila 178-179.
Gyrophora Kunth. 327.
- H.
- Habranthus* Herb. 133.
Haemocharis Mart. 260.
Haemodorum Sm. 24.
Hainkea R. et P. 88.
Hagenbachia Nees. 24.
Hakea Schrad. 46.
Halesia 256.
Halimodendron Cand. 263. 280.
Hallia Thunb. 263. 269.
Hallia W. 266.
Hamamelis 47.
Hamiltonia W. 109.
Hamiltonia Don. et Roxb. 73.
 139.
Harpullia Roxb. 51. 92.
Harrifonia Adanf. 321.
Hasseltia Kunth. 201. 204.
Hebanthe Mart. 103. 104.
Hecastophyllum Kunth. 268.
Hedera 102.
Hedychium Kön. 6-7.
Hedycrea Schreb. 108.
Hedyotis 40.
Hedysarum 290-295.
Hedysarum L. al. 267. 275. 279.
Helianthemum Tournef. 207.
Heliconia 109.
Helicteres 256.
Heliophila 244.
Heliotropium 53-54.
Heliotropium Lehm. 66.
Hellenia W. 8.
Helminthia Juss. 305.
Helosciadium Koch. 119. 120.
Helxine Requier. 318.
Hemerocallis 155.
Hemerocallis Thunb. 134.
Hemianthus Nutt. 11. 17.
Hemiphragma Wallich. 222.
Henckelia * 11. 13. 14.
- Heracleum* 121.
Hermannia L. 255.
Hermas 118.
Hernesia Humb. et Spr. 146.
 153. 191. 252.
Herpestes Gärtn. 254.
Herpestes Pursh. 17.
Hesperis Viv. 242. 243.
Hessea Berg. 134.
Heteromorpha Schlechtend. 117.
Heurnia R. Br. 52.
Heylandia Cand. 263. 266-267.
Heynea Roxb. 252.
Hibbertia Salisb. 211.
Hibiscus 258.
Hieracium 304.
Hierochloë Gmel. 52.
Hippeastrum Herb. 133.
Hippion * 58. 60. 340.
Hippuris 10.
Hirschfeldtia Presl. 244.
Hirtella 86. 541.
Hollböllia Wallich. 342.
Holoregmia Nees. 238.
Holosteum 37.
Homalium Jack. 210.
Hookeria Sm. 524.
Hoplotheca Nutt. 52. 107.
Horkelia Schlechtend. 341.
Hornschuchia Nees. 151. 144.
Hortia Vand. 51. 91. 94.
Houstonia 41.
Hovea R. Br. 267.
Hovenia Thunb. 88.
Hoya R. Br. 110.
Humirium Mart. 545.
Hunteria Roxb. 50. 69.
Hura Kön. 8.
Hutchinsia R. Br. 240.
Hydnocarpus Vahl. 93-94.
Hydnum 354.
Hydrangea 178.
Hydrantheium Kunth. 26.
Hydrastis 202. 220.
Hydrocotyle 116.
Hydrolea 114.
Hygrophila R. Br. 237.
Hymenaea 170.
Hymenodictyon Wallich. 73.
Hymenophyllum Sm. 320.
Hymenopogon Wallich. 50. 74.
Hymenospron * 264. 283.
Hymenostomum * 321.
Hymenothecium Lag. 52.
Hypericum 296-297.
Hypnum 324.
Hypochmus Fr. 335.

Hypochoeris 305.
 Hypoxis 134.
 Hyptis Jacqu. 229.
 Hyssopus 227.

I.

Jackia Wallich. et Blum. 50. 81.
 265.
Jacksonia R. Br. 175.
Jambolifera 148.
Jasminum 11-12.
Iberis 240.
Icacina Adr. Juff. 51. 91.
Icica Kunth. 148.
Ilex 48.
Ilex Nees. 88. 89.
Illecebrum 105.
Illecebrum W. et Spr. 103. 106.
 107.
Impatiens 99-100.
Imperatoria 121.
Incarvillea Roxb. 237. 238.
Indigofera 284-286.
Indigofera Mut. 270.
Inga 261.
Inga W. et Cand. 254.
Inula 301.
Ionidium Hilar. et Mart. 97.
 98.
Ipomoea Sims et al. 60-62.
Irefine 103-104.
Irefine * 107.
Iris 24.
Irlbachia 340.
Isolepis Don. et Carmich. 27.
 28.
Istoma Lindl. 75.
Itea 94.
Juncus 137-138.
Jungermannia 324-326.
Jungia 301.
Jussieva 151.
Justicia 18-19.
Ixodia R. Br. 300.

K.

Kämpfera 7.
Kennedia Vent. 289.
Kilmeyera Mart. 207.
Kicseria Nees. 207.
Kölera Persf. 35.
Königia 57.
Kolbea Schlechtend. 150. 142.
Koniga R. Br. 239. 240.
Kuhlia Kunth. 201. 208.

L.

Labatia Sw. 42.
Labichea Gaudich. 11. 12.
Lacis Schreb. 146. 210.
Lacistema Sw. 11. 21.
Lagetta Juff. 152.
Lamium 228-229.
Langsdorffia Leandr. 125.
Lanipila Burch. 303.
Lanium Rumpf. 252.
Lantana Link. et Ott. 231.
Lasiospermum Trevir. 303.
Lathyrus 283-284.
Laurus 155-156.
Laurus Bot. mag. et Nees. 156.
Lavradia Vand. 95.
Lebeckia Thunb. 273.
Lecananthus Jack. 50. 74.
Lecanora Radd. 330.
Lecidea Ach. 327.
Lecythis 208.
Lcea 70.
Lemanea Bory. 531.
Leonia R. et P. 340.
Leontodon 304.
Lepia Presl. 240.
Lepidagathis W. 237.
Lepidium 240.
Lepidosperma Labill. 26.
Leptocarpus Nees. et Link. 57.
 231.
Leptodermis Wallich. 130. 139.
Leptomeria R. Br. 109.
Leptospermum Forst. 194.
Leptospermum Labill. 149.
Lepyrodia R. Br. 36.
Lespedezia Mx. 271.
Lespedezia Persf. 267.
Lessertia Cand. 278.
Leucas R. Br. 230.
Leucogramme Meyer. 326. 327.
Leucodium 132.
Leucopogon Sieb. et Mal. misc.
 67.
Leycesteria Wallich. 30. 85.
Liatrix Gärttn. 298.
Licania Aubl. 52. 108.
Lichen Engl. bot. 328.
Lichtensteinia Schlechtend. et W.
 118. 119. 142. 145.
Ligusticum 120-121.
Ligusticum Chamiff. et Spr. 119.
Ligustrum 12.
Lilium 134-135. 342.
Limodorum 306.
Limodorum Labill. 309.

- Limonia* 162.
Linaria * 16. 234.
Lindernia 232.
Lindleya Nees. 260.
Linociera Sw. 12.
Linum 127-128.
Liparia 284.
Lippia 231.
Liriodendron L. 217.
Lifianthus P. Br. 59. 339-340.
Lithospermum Roxb. 66.
Loasa Adanf. 208.
Lobelia 75-76.
Lobularia Desv. 239.
Löflingia 336.
Logania R. Br. 59.
Lomaria W. 320.
Lonchocarpus Kunth. et Cand.
 268-269.
Lonicera 82-83.
Lopezia Cav. 8.
Loranthus 139-140.
Lotus Lag. et al. 266. 270. 271.
 284. 287.
Lourea Desv. et Cand. 291. 292.
Lühea W. 295. 296.
Lumnitzera Jacqu. 223.
Lupinus 275.
Luffacia * 160.
Luxemburgia Hilar. 146. 150.
 201. 206.
Lychnis 183.
Lychnophora Mart. 297. 299.
Lycopsis 539.
Lycurus Humb. 32.
Lyginia R. Br. 26.
Lyfimachia 55-56.
Lyfinema R. Br. 64.
Lyfionotus Don. 11. 14.
Lyfiopoma Humb. 76.
Lythrum 191.
- M.
- Maba* Forst. 139.
Machaerium Kunth. 268.
Macroceratides Radd. 281.
Macrocnemum 73.
Macrocnemum Roxb. 74.
Macrodon W. Arnott. 323.
Macromitrion Brid. 322.
Macroscepis Kunth. 110.
Macrotropis Cand. 170.
Maerua Forsk. 208.
Maesa Don. 83. 84.
Magnolia 216-217. 345.
Magonia Hilar. 150.
Maju Molin. 170.
Malcolmia R. Br. 243.
Malocchia Sav. 280.
Malpighia 179.
Malva 257. 346.
Manettia Mut. 40.
Mangifera Desrouff. et Kunth.
 161.
Manglietia Blum. 217.
Maranta 5-6.
Marathrum Humb. 146. 210.
Marchantia 326.
Marialvea Vand. 345.
Mariscus Vahl. 29.
Marrubium 239-240.
Martia Leandr. 286.
Martynia 238.
Maschalocarpus * 321-322.
Maffonia 132.
Mastigophorus Cassin. 301.
Mataxa * 297. 303.
Matthiola R. Br. 242.
Mauria Kunth. 157. 161.
Maxillaria Hook. 307.
Maytenus Kunth. 89.
Mazus Lour. 234.
Mecanopsis Cand. 203.
Medicago Cand. 271.
Meesia Hedw. 524.
Megaclinium Lindl. 306. 309.
Mela-leuca 295.
Melanopsidium Coll. 139.
Melanosticta Cand. 169.
Melanthium 142.
Melanthium L. et al. 141. 142.
Melastoma 160.
Melia Cand. 252.
Melianthus 223.
Melica 32.
Melidora Salisb. 158.
Melilotus Tournef. 271.
Melissa 224.
Melissa Arduin. 227.
Melochia Hilar. et L. 248.
Melodinus Forst. 109.
Meniscofsta Blum. 53. 114.
Menispermum 143.
Mentha 227-228.
Merckia Fisch. 53. 124.
Mesembrianthemum 196.
Mespilus 196.
Mespilus Don. 196.
Metrocynia Thuar. 254.
Metrodorea Hilar. 51. 94.

Metrofideros Gärtn. 194.
Meum Tournef. 119.
Michelia 202. 217. 346.
Micranthera Choif. 201. 208.
Micromelum Blum. 157. 162.
Microfemina Labill. 203.
Microstachys Hilar. 315.
Microtea Sw. 122.
Mierfia Lindl. 130. 137.
Millera L. 305. 305.
Mimosa 147.
Mimosa L. et al. 165. 253. 262.
Mimulus 234.
Mirbelia Sm. 175.
Mitreola Rich. 49. 59.
Mniopsis Mart. 248.
Mogiphanes Mart. 52. 107.
Mogorium Lam. 12.
Moldenhawera Schrad. 170.
Mollia Mart. 295. 296.
Molopospermum Koch. 121.
Momordica 246.
Monarda 16.
Monoteles Labill. 297. 300.
Monnina R. et P. 265.
Monotropa 162.
Montia 37.
Moquilea Mart. 341.
Moraca 24.
Morina Don. 232.
Morinda 80.
Mucuna Gand. 281.
Murraya 162.
Murucuja Perf. 250.
Musa 109.
Mussaenda 75.
Mycoporum Meyer. 326.
Myosotis 54.
Myriadenus Desv. 289.
Myrica 47-48.
Myriophyllum 314.
Myristica 252.
Myrodendron Schreb. 345.
Myroxylon Kunth. et Lamb. 170.
Myrrhis Morif. 120.
Myrsine 68-69.
Myrsine Wallich. 69.
Myrtus 193.

N.

Napinoga Aubl. 210.
Narcissus 132.
Nassavia Commerf. 301.
Nasturtium R. Br. 241.
Nasturtium Boccon. 241.

Nauclea 80-81.
Negretia Kunth. 281.
Neillia Don. 192.
Nemophila Bart. 55.
Nepenthes 256.
Nepeta Trevir. 226.
Nerija Roxb. 86.
Nerium Roxb. 65.
Neuropeltis Wallich. 52. 115.
Nevrocarpon Desv. 264. 286-287.
Nicolsonia Cand. 290.
Nicotiana 62.
Nierembergia R. et P. 62.
Niffolia Jacqu. 268.
Noisettia Humb. 51. 98.
Noisettia Hilar. 98.
Nolana 67.
Nonatelia Aubl. 81.
Norantea Kunth. 207.
Notelaea Vent. 12.
Notylia Lindl. 305. 308.
Novella Rumph. 257.
Nuttallia Hook. 259.
Nyctanthes Lour. 12.

O.

Ocellularia Meyer. 326.
Ochrosia Labill. 66.
Ocimum 225-224.
Octomeria R. Br. 310.
Odonia Bertol. 263. 279.
Oenanthe 113-119.
Oenanthe Nutt. 121.
Oenothera 150-151.
Olax 25.
Oligosporus Cassin. 297. 300.
Olyra 29.
Omphalobium Gärtn. 157. 247. 255.
Omphalobium Jacqu. fil. 254.
Oncidium Sw. 308.
Oncoma * 11. 18.
Ononis 266. 346.
Onosma 54.
Ophiopogon Ker. 136.
Ophiorrhiza 49. 50. 75.
Ophiorrhiza L. 59.
Ophrys 306.
Opilia * 86. 250.
Orchis 306.
Oreas Chamiff. 239. 241.
Origanum 227.
Orlaya Hoffm. 119.

Ormosia Jackf. 176.
 Ornithogalum 132.
 Ornithoglossum Salisb. 142-143.
 Ornithopodium Burm. 293.
 Ornithopus 294.
 Ornitrophe Labill. 150.
 Orobus 283.
 Oropheca Blum. 144.
 Orthotrichum Hedw. 323.
 Orthotrichum Hornsch. 322.
 Osbeckia 161.
 Oscillatoria Vauch. 332.
 Osericum Bess. 121.
 Oltrya Michel. 310.
 Otoptera Cand. 273.
 Oudneya R. Br. 239. 242.
 Oxalis 184-188.
 Oxera Labill. 11. 18.
 Oxylobium Andr. 172.
 Oxypetalum R. Br. 52. 111-112.

P.

Pachyrrhizos Rich. 264. 281.
 Pachysandra Hook. 314.
 Paederia 70.
 Paeonia 211.
 Palava Kunth. et al. 210. 211.
 Palicourea Hilar. 79.
 Paliurus Lam. 124.
 Panax 114.
 Pancovia W. 145. 170.
 Pancreatium 132.
 Panicum 33-44.
 Papaver 205.
 Papaver Don. 203.
 Pappophorum Schreb. 34.
 Parentucellia Viv. 223. 238.
 Parietaria 318.
 Parkia R. Br. 247. 253.
 Parkinsonia 170.
 Parmelia Ach. 328-330.
 Parochetus Hamilt. 263. 279.
 Paspalum 30.
 Passiflora 249-250. 346.
 Pastinaca 121.
 Patrinia Juss. 38.
 Pauletia Kunth. 166.
 Paullinia 153.
 Pedicularis 233-234.
 Pelexia Poit. 306.
 Peltidea Laur. 331.
 Peltigera Hoffm. 331.
 Pentapetes 256.
 Pentstemon Torr. et Nutt. 235.
 Peperomia Hook. 20. 21.
 Pergularia 110.
 Perilla 222. 227.
 Periploca W. et al. 112.
 Pernetia Gaudich. 157. 158.
 Perrottetia Kunth. 50. 87.
 Persea Gärtn. 156.
 Persoonia Sm. 45.
 Petrea 231.
 Peucedanum 121.
 Peucedanum Mönch. et al. 119.
 121.
 Peziza 335.
 Pfaffia Mart. 52. 103. 106-107.
 Phaca 287.
 Phaeocarpus Mart. 150.
 Phalangium Lindl. 136.
 Phallus 335.
 Phaseolus 281-282.
 Phayloopsis Bot. mag. 236.
 Phebalium Vent. 157. 164.
 Phelline Labill. 37. 42.
 Philagonia Blum. 37. 43.
 Philotheca Rudg. 255.
 Philoxerus R. Br. 107.
 Phlomis 230.
 Phrynium W. 4. 6.
 Phycella Lindl. 130. 133.
 Phylica 108.
 Phyllerium Fr. 335.
 Phyllodium Desv. 289.
 Physalis 72.
 Physianthus Mart. 52. 112.
 Physidium Schrad. 235.
 Physostemon Mart. 145. 147.
 Phyteuma 76.
 Picris Delil. 305.
 Pictetia Cand. 264. 294.
 Pilocarpus Vahl. 126.
 Pimpinella Don. 119.
 Pineda R. et P. 210.
 Pinus 315.
 Piper 20-21.
 Piriqueta Kunth. 124.
 Piscidia Jacqu. 273.
 Pisonia 145.
 Pisonia W. 12.
 Pistacia 316.
 Pitcarnia Herit. 131.
 Plantago 42.
 Platycheilum Delaun. 267.
 Platygramme Meyer. 327.
 Platylobium Sieb. et al. 172.
 274.
 Platypetalum R. Br. 239. 241.
 Platypermum Koch. 119.
 Plazia R. et P. 301.

- Plectanthera* Mart. 150. 206.
Plectranthus Herit. 224.
Plectranthus Don. 223-224.
Pilea Reichenb. 142.
Pleurandra Labill. 191.
Pleuraphis Torr. 22. 32.
Pleuropogon R. Br. 22. 31.
Pleurothallis Lindl. et Kunth. 308.
Plocama Ait. 50. 79.
Poa 35.
Poa R. Br. 36.
Pocockia Ser. 271.
Podaliria Lam. 171.
Podaliria Mx. et al. 171. 176. 267.
Podolobium R. Br. 172.
Podolobium Cand. 172.
Podosaemon Nees. 30.
Pohlana Mart. 125.
Poiretia Cand. 293.
Poitea Vent. 284.
Polanisia Blum. 139.
Polemanna Berg. 135.
Pollinia * 337.
Polycarpon 37.
Polygala 265.
Polygonum 154-155.
Polypodium 320.
Polyogon Desf. 30.
Polyporus Fr. Nees. et Blum. 333.
Polytrichum 323.
Pomaderris Labill. 89.
Porana Burm. 62.
Porpa Blum. 201. 204.
Pofoqueria Wallich. et Roxb. 84.
Potalia Aubl. 343.
Potamogeton 48-49.
Potentilla 198-199. 344.
Pothos 310-311.
Poupartia Commerf. 158. 188.
Pozoa Lag. 116.
Prangos Lindl. 119.
Pratia Gaudich. 76.
Prenanthes 304.
Prepufa Mart. 342.
Preslea Mart. 338-339.
Priestleya Cand. 264. 284.
Primula 56-57.
Prosopis 165.
Prostanthera Labill. 226.
Prunus 192.
Pseudanthus Sieb. 22. 25.
Psidium 194.
Ptilobium Jack. 50. 74.
Pfophocarpus Neck. 280.
Pforalea 270-271.
Pforalea Poir. 295.
Pfychotria 78-79.
Pfychotria L. 82.
Pfyllocarpus Mart. 37. 38-59.
Pteris Thuar. 320.
Pterisanthes Blum. 44.
Pterocarpus Löfl. 258.
Pteronevron Cand. 241.
Pterospermum Schreb. 256.
Pterospermum Blum. 256.
Pueraria Cand. 263. 275.
Pulmonaria 54.
Pultenaea Sm. 173-174.
Pultenaea Sieb. 172. 174. 175.
Pupalia Mart. 103.
Pycnostachys Hook. 222. 227.
Pygeum Gärtn. 192. 195.
Pyrethrum Sm. 305.
Pyrus 196. 343.
Pyrus Don. 196.

Q.

- Qualea* Aubl. 4. 9-10.
Qualea Link. et Spr. 9. 10.
Quassia 163.
Quercus 314.

R.

- Raddia* Bertol. 29.
Raddia Ach. Rich. 296.
Rafnia Thunb. 274.
Rafnia Mart. 269.
Randia Roxb. et Don. 74. 84.
Ranunculus 213-220.
Raphanus 239.
Raputia Aubl. 91.
Rauwolfia 109.
Redowskia Chamiss. et Schlechtend. 240.
Requienia Cand. 267.
Restio 26.
Restio Nees. et R. Br. 26. 36.
Retinaria Gärtn. 102.
Rex amaroris Rumph. 141.
Rhabdia Mart. 340.
Rhacodium Reber. 334.
Rhamnus 86.
Rhamnus Burm. 87.
Rheum 156.
Rhexia 160-161.
Rhinanthus M. B. 252.

Rhinocarpus Berter. 156.
Rhodiola Don. 188.
Rhododendron 160.
Rhodoneima Martens. 331. 332.
Rhus 125.
Rhus Burm. 255.
Rhynchosia Cand. 270.
Rhynchospora Vahl. 26.
Ribes 100 - 101.
Richardia 159.
Riedlea Cand. et Blum. 248.
Riveria Kunth. 269.
Rivina 45.
Robergia Schreb. 188.
Robergia W. 254.
Robinia 279.
Robinia Poir. et al. 149. 176. 203.
 268. 274. 279. 280. 293. 294.
Röperia Adr. Juss. 164.
Rollinia Hilar. 202. 214.
Rondeletia 74-75.
Rosa 199-200.
Rosea Mart. 105.
Rourea Kunth. et Aubl. 188.
 254.
Rubia 39.
Rubus 197. 345-344.
Rudolphia W. 278.
Ruellia 236.
Rumex 144.
Ruppia 49.
Russula Pers. 535.
Ruta 163-164.

S.

Sabbatia Adanf. 58.
Sabbatia * 58. 60.
Sabia Colebr. 91.
Sabinea Cand. 263. 279.
Saccharum 55.
Sagittaria 214.
Salix 20.
Salomonina Lour. 4. 246. 248.
Salvia 17.
Sampaca Rumph. 217.
Samyda 176.
Sanicula 116.
Saponaria Schlechtend. 178.
Sarcanthus Lindl. 306.
Sarcocarpon Blum. 202. 217.
Sarcophyllum Thunb. 274.
Sarcopyramis Wallich. 542-545.
Sarmienta R. et P. 536.
Sauravia W. 202. 210-211.
Sauvagesia 95.

Sauvagesia Hilar. 95.
Saxifraga 178.
Scabiosa Vaill. 38.
Scabiosa Viv. et al. 38.
Scaevola 81.
Scandix 120.
Schelveria Nees. 235.
Schiedea Chamiss. 180.
Schima Reinw. 260.
Schinus 179.
Schinus Orteg. 148.
Schizaea Sm. 320.
Schizanthus R. et P. 14.
Schizochiton * 246. 251.
Schlechtendalia * 295. 296.
Schmidelia Schreb. 150.
Schnellia Radd. 166.
Schöpfia Schreb. 78.
Schotia Jacqu. 157. 247. 254.
Schubertia Mart. 110.
Schübleria Mart. 540.
Schultesia Mart. 558.
Schweiggeria Spr. et Hilar. 99.
Schwenckia 13.
Schwenckfeldia Sw. 85.
Scilla 135.
Scirpus 27-28.
Sciuris Schreb. et al. 11. 14. 91.
Scleria Berg. 515.
Sclerodontium Schwägr. 322.
Sclerostylis Blum. 161. 162.
Scopolia Sm. 91.
Scorzonera 347.
Scutellaria 225-226.
Sebaea R. Br. 41. 338.
Sebastiania Bertol. 304.
Sedum 188.
Selinum 121.
Selinum Schum. et Bess. 118. 121.
Sempervivum 191.
Senecio 302. 346.
Seriana Blum. 153.
Sertiürnera Mart. 106. 107.
Sesbana Poir. 284.
Sesbania Kunth. 283.
Seseli 118.
Seseli Koch. 119.
Sesleria Scop. 34.
Setaria P. B. 33.
Sibbaldia 341.
Sibthorpia 49. 63. 223. 236.
Sida 259.
Sideroxylon 70.
Sieverfia W. 199. 344.
Silaus Bess. 118.
Silene 182-185.

- Simaba* Don. 163.
Simaruba Hilar. 163.
Sinapis 244.
Sinapis Presl. 243.
Sinningia Nees. 223. 238.
Sifon 118.
Sifymbrium 243.
Sifymbrium Monnard. 242.
Sium 120.
Smilax 137.
Sodada Delil. et Forsk. 145. 147.
 204.
Solanum 71-72.
Solea * 97-98.
Solulus Rumph. 170.
Sonerila Roxb. 22. 23-
Sophora 170.
Sophora Burch. et al. 171. 172.
 176. 262.
Sopubia Hamilt. 222. 235.
Souleamea Lam. 150. 141. 263.
Spartina Schreb. 31.
Spartium 266.
Spathodea P. B. 237.
Spathularia Hilar. 99.
Spergula L. 182. 183.
Spermaceo 40.
Spermedictyon Roxb. 73.
Sphaeria Hall. 332.
Sphaerocarya Wallich. 51. 101.
Sphaerophoron Perf. 531.
Sphaerophysa Cand. 278.
Sphaerostema Blum. 247. 261.
Spigelia 58-59. 339.
Spiraea 195.
Spixia Leandr. 317.
Stachys 229.
Stachytarpheta Vahl. 16.
Stackhoufia Labill. 124.
Stalagmites Murr. 189.
Staphylea 124.
Statice 126-127.
Stelis Sw. 308.
Stemodia 235.
Stenarrhena Don. 222. 225.
Stenomeffon Herb. 132.
Stenopania W. et Cand. 139.
Sterculia 256.
Steriphoma * 150. 159.
Sticta Schreb. 330-331.
Stipa 30-31.
Stipa Nees et Müll. 35. 337.
Stizolobium P. Br. 281.
Stizolobium * 281.
Streptopus Mx. 136.
Strumaria Jacqu. 134.
- Strychnos* 71.
Stylocoryna Cav. 50. 85.
Stylophorus Nutt. 203.
Stylosanthes Sw. 289.
Styphelia Labill. 67.
Succisa Vaill. 38.
Sutherlandia R. Br. 278.
Swartzia W. 202-205.
Swertia 113.
Symphyonema R. Br. 46.
Symphytum 55.
Synedemis Wallich. 51. 92.
Syrrophodon Schwägr. 321.

T.

- Tabernaemontana* 65.
Talafium *, 22. 30.
Talauma Hilar. et Blum. 216-
 217.
Tanonea Aubl. 251.
Tamus Herit. 143.
Tanacetum L. 500.
Taverniera Cand. 290.
Tephrosia Perf. 274-275.
Ternströmia Don. 206. 210.
Tesudinaria Burch. 143.
Tetracera 213.
Tetragonia 196.
Tetranthera Jacqu. 156.
Tetratheca Sm. 147.
Teucrium 226.
Teucrium Poir. et Sieb. 19. 226.
Thalictrum 221.
Thapsia 122.
Thelephora Ehrh. 334.
Thenardia Kunth. 65.
Theodora Medic. 254.
Theophrasta Hortul. et Spr. 94.
 540.
Thermia Nutt. 171.
Thermopsis Don. et Cand. 171.
Thesium 103-109.
Thespesia Corr. 257.
Thlaspi 240.
Thouinia Poit. 150.
Thrinicia Roth. 305.
Thuia 315.
Thunbergia 257.
Thymus 224-225.
Thyffelium Riv. 119.
Tiarella 178.
Tigridia Herb. 24.
Tillaea Sieb. 48.
Tillaudia 131.
Tosfieldia Hudf. 142.

- Tordylium* 341.
Torenia 254.
Torilis Gärtn. 119.
Tournefortia 66.
Trachymene Rudg. 116-117.
Tradescantia 158.
Tragopogon 304.
Trematodon * 322.
Tribrachia Lindl. 306. 309.
Tribulus 343.
Trichilia 247. 252.
Trichilia Blum. 252.
Trichospermum Blum. 202. 210.
Trichosporum Don. 258.
Trichostomum Hedw. 322-323.
Tricratus Herit. 53.
Trifolium 271-272.
Triglochin 142.
Trioicum 82.
Triphasia Lour. 141.
Triraphis R. Br. 34.
Tristicha Thuar. 4. 10.
Triticum 537.
Triumfetta 190.
Trixis P. Br. 300.
Trollius 220.
Trommsdorffia Mart. 103. 104.
Tulipa L. 142.
Turnera 124.
Turpinia Perf. 293.
Typha 515.
- U.
- Udora* Nutt. 25.
Uncaria Roxb. et al. 80. 81.
Uncinia Perf. 513.
Uniola Torr. 36.
Unona 215-216.
Urceolaria Fenill. 536.
Urena 257-258.
Urochloa P. B. 53.
Uropetalum Ker. 135.
Urophyllum Wallich. 85.
Urtica 313.
Utricularia (l. Urceol.) 16. 234.
 356.
Uvaria 216.
Uvularia 186.
- V.
- Vaccinium* 147.
Vaccinium * 160.
Valeriana 22-25.
Valeriana Brot. 25.
Valerianella Loif. 23.
- V.
- Vallisneria* R. Br. 65.
Vanda R. Br. 306.
Vandellia P. Br. 234.
Vangueria Juff. 85.
Vareca Roxb. 95-94.
Varennea Cand. 268.
Vascoa Cand. 274.
Vaucheria Cand. 532.
Vellofia Vand. 296.
Vellofia Mart. 137.
Venona Lam. 94.
Verbascum 63.
Verbena 250.
Verbefina 303.
Vernonia Schreb. 298.
Vernonia * 299.
Veronica 17.
Viborquia Ort. 268.
Viburnum 122.
Vicia 284.
Vigna Sav. 280.
Vilfa Trin. 357.
Vilmorinia Cand. 282.
Vinca 65.
Viola 95-97.
Viola W. 76.
Virgilia Lam. 171.
Viscum 47.
Visenia Houtt. 248.
Vitis 89-90.
Vitmannia Vahl. 145.
Viviania Radd. 326.
Vochysia Mart. 9.
Vrolikia * 222.
- W.
- Wahlenbergia* Don. 78.
Wallenia Sw. 41.
Waltheria 243-249.
Warneria Mill. 220.
Webera Schreb. 83.
Weinmannia 152-153.
Weisia Hedw. 321 322.
Westringia Sm. 226.
Wikströmia Schrad. 260.
Willuchia Mart. 26.
Willughbeia Scop. 71.
Wittelsbochia Mart. 206.
Wormia Rottb. 202. 215.
Wrightia R. Br. 65.
Wulfenia Sm. 16.
Wurmbea Thunb. 145.
- X.
- Xanthium* 314.
Xanthoxia Rudg. 114.

Xanthoxylon 125.
 Xerophyta Juss. 137.
 Xylocarpus Schreb. 147.
 Xyloma Pers. 332.
 Xylopiia 215.

Y.

Yucca 132.

Z.

Zapania Mart. 231.
 Zeyheria Mart. 237.

Zephyranthes Sims. et Lindl. 132.
 133.
 Zigadenus Mx. 142.
 Zingiber Gärtn. 7.
 Zizyphus Tournef. 86-87.
 Zizyphus Wallich. 86.
 Zonaria Ag. 331.
 Zornia Mx. 289.
 Zuccarinia * 50. 81.
 Zwingera Schreb. 163.
 Zygnema Ag. 331.
 Zygochloa 164.

A P P E N D I X.

HENRICI SCHOTT

FASCICULUS PLANTARUM BRASILIENSIIUM.

Henricus Schott, hortulanus Vindobonenſis, e Braſilia, quam 1817, et 1818 inviſit, ingentem plantarum copiam reportavit. Earum fasciculum, ut curis poſterioribus infererem, additis characteribus ad me miſſum cum ſero acceperim, nolui tamen deſſe juveni et doctrina et rei herbariae ſcientia inſtructo, quando praefertim cognovi ex ipſis exemplaribus, nova plura adefſe, quae alios fugiſſe ſcrutatores viderentur. Itaque ſumma omnia feci, ut et haec ſymbolae, ſueto ordine digeſtae, quamprimum in lucem prodirent.

CL. I.

1. *Broſimum microcarpon* Schott. nullo modo a Br. *Alicastro* Sw. diverſum reor. Namque differentia ipſa a Schottio indicata „ramulorum petiolorumque hirtorum,” ut exemplaria miſſa docuerunt, in cultis evaneſcit. Notandum tamen, hanc ſpeciem, Jamaicae alioquin peculiarem, et Braſiliae incolam eſſe.
2. *Broſimum diſcolor* Schott. Br. foliis ovato-ellipticis acutis ſupra nitidis ſubtus glaucis, ramulis pubeſcentibus, fructibus ſucculentis. Egregia et optime diſtincta ſpecies.

CL. IV.

3. *Rhopala multiflora* Schott. Rh. foliis lanceolatis utrinque attenuatis reticulato-venofis, racemis terminalibus compoſitis calycibusque flavido-tomentofis; ſtaminibus baſilaribus. Rh. polyſtachyae Humb. affinis (vol. 1. p. 482.) ſed omnino diverſa.

CL. V.

4. *Cordia frondofa* Schott. C. foliis ovatis acuminatis integerrimis ſupra punctato-ſtellatis ſubtus albedo-tomentofis, floribus paniculato-corymbofis, calycibus truncatis ſulcatis tomentofis. Finitima C. rotundifoliae R. et P. (vol. 1. p. 649.)
5. *Solanum violaeſolium* Schott. S. caule herbaceo radicante, foliis geminis inaequalibus utrinque hirtutis, altero cordato ſubrotundo, altero reniformi, pedunculis ſolitariis axillaribus, calycibus 10fidis. Pertinet ad ſeriem vol. 1. p. 686. pone S. ſylvaticum Dun.

6. ALSEÏS Schott.

(*Alseïdes*, nymphae lucorum, Apollon. Rhod.)

Cal. superus 5partitus. Cor. cyathiformis, limbo 5lobo, fauce barbata. Stamina ad basin usque corollae libera exserta. Stigma 2partitum. Germen 2loculare multi-ovulatum.

[Genus *Macrocnemo* proximum: id vero et calyce obsolete dentato et corolla infundibuliformi et staminum insertione ad faucem differt. *Machaoxia* Humb., quam sedulo comparavi, habitu similis, differt eadem staminum insertione, praecipue vero fructu 2spermo.]

- A. floribunda* Schott. Arbor mediocris, foliis oblongis acuminatis utrinque pilosiusculis, spicis ramosis terminalibus, floribus parvis ochroleucis.
7. *Psychotriam stenophyllum* Schott. a Pl. *noxia* Hilar. cur. post. p. 78. distinguere nequeo. Adest etiam jam Pl. *stenophylla* * vol. 1. p. 744.
8. 9. *Hirtellas* duas, *tomentellam* et *angustifoliam* Schott. jam supra p. 341. recensui.
10. *Hirtella indecora* Schott. est *H. paniculata* Lam. vol. 1. p. 766.
11. *Büttneria laevigata* Schott. est *B. Gayana* Hilar. cur. post. p. 93.

12. DIMORPHANDRA Schott.

Cal. urceolatus 5fidus. Petala 5 patentissima stamini-fera. Stamina abortientia totidem petaloidea spatulata, unguiculis linearibus. Lomentum lignosum polyspermum latice balsameo farctum.

[Genus ad *Profopin* quadammodo accedens, sed staminibus abortientibus satis diversum. Locum habet vol. 1. p. 794. post *Humboldtiam*.]

- D. exaltata* Schott. Arbor procera, foliis 2pinnatis, foliolis oblongis supra nitidis subtus hirsutis, spicis paniculatis terminalibus, floribus luteis.
13. *Hydrolea elatior* Schott. H. glabra, foliis lineari-lanceolatis, floribus lateralibus terminalibusque cymosis. Proxima *H. corymbosa* differt foliis lanceolatis, calycibus hispidis. vol. 1. p. 865.
14. *Astronium concinnum* Schott. A. foliis pinnatis glabris, foliolis 3jugis oblique ovato-oblongis acuminatis integerrimis, paniculis ♀ nutantibus. In corolla ♀ staminodia 5 erecta, antheris sterilibus basi 2partitis.
15. *Astronium fraxinifolium* Schott. A. foliis pinnatis hirsutiusculis, foliolis 6-8jugis lanceolatis acuminatis ferratis, paniculis ♀ erectis. In corolla ♂ nectarium 10lobum, in ♀ staminodia 5 erecta, antheris sterilibus minutis.

CL. VI.

16. MYRRHINIUM Schott.

Cal. superus 4fidus. Cor. 4petala. Filamenta subulata, in aestivatione versus petalum 2plicata. Antherae oblongae. Bacca calyce coronata 3-4locularis, loculis polyspermis.

[Myrteis accenset cl. auctor: mihi fatis finita et ab omnibus tom. 2. p. 11. enumeratis diversa videntur.]

M. *atropurpureum* Schott. Frutex orgyalis, foliis oppositis ellipticis coriaceis glabris punctatis subtus ferrugineis, floribus cymosis 2bracteatis atropurpureis. Stamina longissima. Semina subreniformia. Embryo infigniter curvatus.

CL. VII.

17. *Petrocaryam brasiliensem* Schott. a *P. montana* W. (Parinari Aubl.) distinguere nequeo. Stamina enim minus exserta haud tauti videntur, ut, cum alia omnia congruant, species nova iis stabiliatur.

CL. VIII.

18. *Seriana flans* Schott. S. erecta, foliis impari-pinnatis glabris supra nitidis, foliolis oblique lanceolatis inaequaliter ferratis, paniculae terminalis ramis flavido-tomentosis, alis samararum apice confluentibus.

19. *Coccoloba peltata* Schott. C. scandens, foliis coriaceis peltatis subrotundo-ovatis acutis laevibus, racemis florum erectis.

20. *Coccoloba parvifolia* Schott. C. foliis coriaceis obovato-ellipticis utrinque attenuatis glabris, racemis florum spicatis erectis.

21. *Haloragis tetrandra* Schott. H. herbacea simplex, foliis spatulato-linearibus subintegerrimis, floribus aggregatis subsessilibus minutissimis tetrandris.

CL. IX.

22. *Persea floribunda* Schott. est *P. Bofo* * vol. 2. p. 269.

23. *Persea angustifolia* Schott. videtur *P. psychotrioides* * ib.

24. *Persea incana* Schott. P. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis incano-tomentosis, venis prominentibus, paniculis folio brevioribus, calycibus tomentosis.

25. *Persea puberula* Schott. P. foliis lanceolatis acuminatis supra nitidis subtus pubescentibus, venis prominentibus, paniculis folia subaequantibus, calycibus tomentosis. *P. lineata* * vol. 2. p. 270. proxima.

26. *Persea lancifolia* Schott. P. foliis lanceolatis utrinque attenuatis glaberrimis nitidis subtus glaucis, venis immersis, racemis axillaribus folio brevioribus, calycibus pubescentibus.

27. *Persea indecora* Schott. P. foliis ovato-lanceolatis acuminatis glabris nitidis, venis prominentibus, racemis axillaribus terminalibusque folio brevioribus, calycibus glabris.

28. † *Cryptocarya hirsuta* Schott. Cr. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis subtus ramulisque hirsutis, paniculis axillaribus terminalibusque.

CL. X.

29. *Styrax macrophyllus* Schott. est *St. tomentosus* Humb.

30. *Styrax glabratus* Schott. St. foliis ovato-lanceolatis utrinque attenuatis glabris, venis coloratis, pedunculis subracemosis calycibusque albido-tomentosis.

31. ACOSMIUM Schott.

Cal. campanulatus 4-5fidus. Petala 5 patentissima. Stamina imo calyci inserta. Germen elongatum forte in legumen abit.

[Est *Sweetia* * vol. 2. p. 171., quam e manco exemplari rite enucleare nequivi. Nomen meum, ut prius, retinendum esse videtur.]

lentiscifolium Schott. (*Sweetia fruticosa* * melius *lentiscifolia* *.) Arbor alta foliis impari-pinnatis, foliolis elliptico-lanceolatis venulosis utrinque nitidis, ramis racemiferis aphyllis, floribus flavis.

32. EXOSTYLES Schott.

Cal. clavatus, laciniis 3 tandem revolutis. Petala 5 subaequalia imbricato-conniventia calyci medio inserta. Stamina subaequalia, filamentis basi dilatatis, antheris sagittatis cuspidatis. Stylus elongatus simplex. Legumen crassum polyspermum.

venusta Schott. Arbor ramis villosis, foliis impari-pinnatis, foliolis ovatis utrinque pilosiusculis, pedunculis subracemosis bracteatis, floribus roseis.

33. † CAULOTRETUS Rich. ? SCHNELLIA Radd.

Cal. subcampanulatus 5dentatus. Pet. 5 calycis fundo inserta unguiculata subaequalia. Stam. 10, alterna minora. Legumen membranaceum medio sub-1spermum, non dehiscens.

smilacinus Schott. Frutex scandens, ramis cirriferis, foliis indivisis ovatis acuminatis 5nerviis glabris, racemis spicatis elongatis.

34. MELANOXYLON Schott.

Calycis sepala 5 basi concreta. Pet. 5 subaequalia. Stamina hirsuta, antheris longitudinaliter dehiscens. Legumen compressum falcatum. Semina arillo in alam producto transverse leguminum cavitates implente.

Bräuna Schott. Arbor altissima ligno fusco-atro, foliis impari-pinnatis subtus hirsutis, foliolis oblongo-lanceolatis, racemis paniculatis ferrugineo-tomentosis.

35. *Combretum gracile* Schott. C. foliis oppositis oblongis utrinque attenuatis integerrimis glaberrimis nitidis, racemis laxis compositis pendulis, staminibus calycem urceolatum subaequantibus, petalis spathulato-linearibus.

CL. XII.

36. *Prunus brasiliensis* Schott. est *Pr. sphaerocarpa* Sw.

37. † *Chrysobalanus ovalifolius* Schott. Chr. foliis coriaceis subcordato-ellipticis obtuse apiculatis subtus argenteo-

tomentosis, floribus hermaphroditis, staminibus glabris.

38. † *Chrysotholus macrophyllus* Schott. Chr. foliis cordato-oblongis obtusis elongatis coriaceis supra nitidis subtus albo-tomentosis, venis parallelis prominentibus, floribus hermaphroditis.

In utraque specie praeter stamina fertilia septena adfunt sterilia minuta.

39. *Mollinedia brasiliensis* nomine misit Schottius *Citrosam*, quam *Schottianam* nuncupo, foliis ovato-oblongis versus apicem ferratis subtus hirsutis, pedunculis elongatis, fructibus tomentosis. Mollinediam R. et P. haud satis notam, ad *Citrosam* pertinere reor.

CL. XIII.

40. *Swartzia micropetala* Schott. est Sw. myrtifolia Sm. cur. post. p. 202.

41. *Swartzia elegans* Schott. Sw. foliis pinnatis 3jugis, petiolo marginato, foliolis ovato-lanceolatis acutis subtus nitidis, racemis axillaribus paucifloris, petalo cordato-subrotundo unguiculato infigni.

42. ASCRA Schott.

[Ἄσκρα, δῶς ἄκραπος Hefych.]

Cal. inferus 3sepalus. Cor. 3petala. Filamenta capillaria. Stylus brevis persistens. Germeniloculare, placentis tribus parietalibus, ovulis plurimis. *Guttiferis* accensenda.

- brasiliensis* Schott. Arbor mediocris, foliis alternis ovatis utrinque attenuatis obsolete dentatis 5plinerviis glabris, paniculis thyrsoides pubescentibus, floribus flavidis.

43. † OTHLIS Schott.

[Ὀθλῆς Geopon. 2, 4. forte corrupte.]

Cal. 5sepalus 2bracteatus persistens, sepalis bracteisque imbricatis concavis. Pet. 5 decidua. Antherae elongatae lineares continuae, loculis lateralibus tenuissimis. Caps. sub-1sperma. Sem. arillatum. *Dillenies* forte adnumeranda.

- O. castaneafolia* Schott. Frutex sarmentosus, foliis alternis sursum confertis oblongis ferratis glabriusculis, floribus lateralibus sessilibus.

{Delima guianensis Rich. vol. 2. p. 597. est proxima.]

44. *Begonia hispida* Schott. B. suffruticosa hispida, foliis semicordatis hinc acuminatis inaequaliter denticulatis, panicula multiflora, fructuum ala tertia maxima rotundata.

45. *Begonia vitifolia* Schott. B. suffruticosa hispida, foliis inaequaliter reniformibus angulato-lobatis ferratis, floribus hirsutis.

[Magnopere dubia, quando B. reniformis Dryandr. nimis est propinqua.]

46. *Begonia platanifolia* Schott. B. suffruticosa, foliis inaequaliter reniformibus multifidis ferrulatis hispidiusculis subtus purpurascensibus, laciniis acutis ferrulatis.

47. *Begonia lobata* Schott. B. suffruticosa incano-tomentosa, foliis inaequaliter reniformibus obtuse lobatis denticulatis, fructuum ala tertia maxima lineari-elliptica horizontali.
48. *Begonia tomentosa* Schott. B. suffruticosa, foliis inaequaliter reniformibus subtus ferrugineo-tomentosis denticulatis, fructuum alis binis obtusis, tertia maxima acuta.
49. *Begonia parvifolia* Schott. B. fruticosa glabra, foliis semicordatis ovato-lanceolatis acuminatis undulato-denticulatis glancescentibus, fructuum ala tertia elliptica maxima.
50. *Begonia undulata* Schott. B. fruticosa glaberrima, foliis subsemicordato-lanceolatis acuminatis repando-undulatis, fructuum alis subaequalibus rotundatis.
[*B. pulchella* Radd. proxima, sed folia dentato-ferrata.]
51. *Begonia besleriaefolia* Schott. B. fruticosa scandens ramosissima, foliis subsemicordato-oblongis acuminatis integerrimis supra glabris subtus hirsutis, fructuum alis binis obsoletis, tertia maxima rotundata.
52. *Begonia populifolia* Schott. est *B. scandens* Sw. Adest jam *B. populifolia* Kunth. cur. post. p. 212. aliena.
53. *Begonia depauperata* Schott. B. acaulis subbifolia, foliis subcordato-oblongis acuminatis inaequaliter ferratis glabris supra albo-maculatis subtus purpurascensibus, floribus ♂ subternis 2petalis, filamentis in columnulam elongatam concretis.
54. *Begonia concinna* Schott. B. acaulis, foliis peltatis oblique ellipticis acuminatis integerrimis utrinque pilosis, florum ♂ petalis exterioribus orbiculatis, fructuum alis binis subparallelis rotundatis, tertia maxima obtusa.
55. *Begonia peltifolia* Schott. B. acaulis, foliis peltatis oblique ovatis acutis integerrimis supra glabris subtus ferrugineo-tomentosis, fructuum alis binis rotundatis, tertia maxima obtusa.

56. *DASYNEMA* Schott.

Cal. 4-6-8sepalus. Cor. 0. Stamina hirsuta receptaculo hispido inserta. Antherae longitudinaliter dehiscentes. Styli 3, 4. Caps. setosa 4valvis 1sperma. Semen arillatum.

[*Dilleniis* omnino accensenda. Ab *Ablania* et *Tetracra* differt et antherarum fabrica et stylis et fructu.]

- D. hirsutum* Schott. *D.* foliis breviter petiolatis obovato-lanceolatis acuminatis subtus villosis, calycibus 4sepalis, antheris muticis.
57. *D. pubescens* Schott. *D.* foliis longe petiolatis oblongis acutiusculis subtus pubescentibus, calycibus 6-8sepalis, antheris apice appendiculatis.
58. *Laplacea inaequilatera* Schott. *L.* foliis inaequilaterisspathulato-lanceolatis hinc ferratis illinc integerrimis, floribus 5petalis. Est *Haemocharis semiferrata* Mart. *Gordonia* cur. post. p. 260.

CL. XIV.

59. *Ruellia pulchella* Schott. est *R. foetida* Humb.
 60. *Ruellia speciosa* Schott. *R. suffruticosa*, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis utrinque hispidiusculis, spicis axillaribus laxis, bracteis foliaceis maximis, sepalis linearibus longissimis.
 61. *Chasmodon ochroleuca* nomine inest *Bignoniaceae*, quam *candicans* Richardi habeo, etiamsi haec haud idoneo modo definita sit. Folia enim inferiora sunt ternata, superiora binata, foliola ovata seu subrotundo-elliptica obtusa subtus tomentosa, flores paniculati minuti.

CL. XVI.

62. *Myristica Bicuhyba* Schott. *M. foliis alternis distichis linearilanceolatis subtus glaucis, floribus glomerato-racemosis pedicellatis Sandris.*

CL. XVII.

63. *Trigonostemon parviflorus* Schott. *Tr. foliis ellipticis utrinque integerrimis subtus floccosis demum glabris, paniculis racemosis axillaribus.*

CL. XIX.

64. *Carphobolus sessiliflorus* Schott. dicit *Conyzam lucidam* * vol. 1. p. 509. Esse receptaculum paleosum, quod secus mihi in conspectum venit. Squamae enim anthodii aliquot interiores videntur quidem receptaculum obsidere, sed superest spatium centrale nudum. Si receptaculum vere esset paleaceum, *Cassipourea* R. Br. speciem dixeris, cui vero repugnaret habitus et patria. Accedit, quod altera species
 65. *Carphobolus umbellulatus* Schott. ne vestigium quidem palearum in receptaculo ostendat. Est nimirum *Eupatorium umbellulatum* *, collocandum vol. 3. p. 412. post *E. discolor* *, et sic definiendum: *E. foliis alternis oblongis acutis integerrimis supra nitidis subtus incano-tomentosis, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris, squamis anthodii appressis fuscis.*

CL. XXI.

66. *Ficus longifolia* Schott. *F. foliis utrinque glabris oblongo-linearibus acuminatis coriaceis nitidis brevissime petiolatis. Collocanda vol. 3. p. 781. post F. americanam Aubl.*
 67. *Ficus adhatodaefolia* Schott. *F. foliis utrinque glabris ovato-lanceolatis acuminatis sub-3nerviis, receptaculis pedunculatis solitariis. Quanquam F. nervosa Roth. vol. 3. p. 781. nimis sit propinqua, haud arbitror tamen eandem esse.*
 68. *Ficus clusiaefolia* Schott. *F. foliis utrinque glabris coriaceis obovatis obtusissimis, venis parallelis subimmerfis. F. grisea Vahl. l. c. nimis affinis.*
 69. *Ficus cestrifolia* Schott. *F. foliis utrinque glabris subcordato-lanceolatis acuminatis ovatis sub-3nerviis.*

70. *Ficus eximia* Schott. F. foliis utrinque glabris amplis cordato-oblongis acutis submembranaceis glaucescentibus. Collocanda vol. 3. p. 778. post pedunculatam Ait.
71. *Ficus pulchella* Schott. F. foliis subtus scabris lanceolatis acuminatis submembranaceis, venis parallelis approximatis, receptaculis pedunculatis majusculis. Affinis *F. Radula* W. p. 782., quae vero foliis coriaceis differt.
72. *Ficus hirsuta* Schott. F. foliis utrinque hirsutis oblongis obtusiusculis triplinerviis. Affinis *F. clethraefolia* W. p. 782.
73. *Ficus holosericea* Schott. F. foliis late cordatis oblongis acutiusculis subundulatis utrinque villosis, ramulis petiolisque fulvo-hirsutis.
74. *Ficus rufa* Schott. F. foliis subcordato-oblongis acutis supra nitidis subtus fulvo-pubescentibus, petiolis fulvo-hirsutis. Utraque affinis *F. fulvae** p. 779., sed haec folia habet obtusa, pubem subtus densam tomentoso-hirsutam.

CL. XXII.

75. † *PERIDIUM* Schott.

Flores dioeci. Cal. 2sepalus. Petalum 1 vesicaeforme hinc rimula hians. Nectaria 0. Stamina circiter 12 polyadelphe, antheris basi fixis 4gonis. ♀ ignot.

[Genus propter flores ♀ et fructus ignotos dubium, *Peræ*, quam Mutisius (Stockholm. acad. handl. 1784. p. 299.) descripsit, satis affine, nectariorum vero, seu membranularum multifidarum stamina stipantium defectu differens. Tricoccis accensendum omnino videtur.]

- P. obtusifolium* Schott. P. foliis obovato-oblongis obtusis integerrimis supra glabris subtus sparso, floribus aggregatis pedunculatis extus conferte aureo-lepidotis. Gemmae florum plurimae abortiunt, una aut altera perficitur.
76. *Peridium ferrugineum* Schott. P. foliis oblongis utrinque attenuatis supra laevibus nitidis subtus sparso, ramis laxis pedunculisque subfoliariis conferte ferrugineo-lepidotis.
77. *Peridium glabratum* Schott. P. foliis obovato-oblongis obtusiusculis utrinque glabris subtus subrufescentibus, pedunculis subfoliariis calycibusque dense lepidotis.







