


W. JUNK.  
VERLAG U. BUCHHANDL  
NATURWISS. U MATHEMAT.  
BERLIN W.15



DUPLICATA DE LA BIBLIOTHÈQUE  
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENEVE  
VENDU EN 1922

CONSERVATOIRE  
BOTANIQUE  
VILLE DE GENEVE

Suter

Flora

EX-LIBRIS



Released from library  
by [unclear]

Bequest of  
**Kenneth K. Mackenzie**  
October 1934

CONSERVATOIRE  
DE STANISLAW  
MONTEWSKI  
ET DU CHANT

# F L O R A H E L V E T I C A

E X H I B E N S

PLANTAS HÉLVETIAE INDIGENAS HALLE-  
RIANAS, ET OMNES QUAE NUPER DE-  
TECTAE SUNT ORDINE LINNAEANO.

C U R A V I T

JOHANN RUDOLF SUTER,  
Med. et Philos. Doct.

V O L. I.

---

T U R I C I,  
IMPENSIS ORELL, FUESLI ET SOCC.

1802.

# HELVETIENS FLORA

WORINN ALLE IM HALLERISCHEN WERKE  
ENTHALTENEN UND SEITHER NEUENTDECK-  
TEN SCHWEIZER PFLANZEN NACH LINNÉ'S  
METHODE AUFGESTELLT SIND.

VON

JOHANN RUDOLF SUTER,  
Med. et Philos. Doct.

ERSTES BÄNDCHEN.

---

ZÜRICH,

BEY ORELL, FUESSLI UND COMP.

1802.

*Sie, sie bleibt die Natur, und wenn auch hier  
alles verwelket,*

*Wenn auch hier alles der Zeit brausender  
Wirbel verschlingt;*

*Wenn er, wie Blätter ein Bach, das Leben der  
Völker dahinreist,*

*Leicht ihre Formen zerbricht, und über  
Leichen sich wälzt —*

*Bleibt sie doch die Natur, es grünt ihr am  
Busen die Flora,*

*Und in ätherischer Luft glüht sie am ewi-  
gen Eis;*

*Lächelnd sieht sie herab auf der Nationen  
Umwälzung,*

*Und die Brandung der Welt thürmt nicht  
die Wogen zu ihr.*

Staaten mögen verblühn , die Rose der Alpen  
blüht ruhig

In des Urgebirgs Schooss , ruhig das Veil-  
chen im Thal ,

Anemonen , Ranunkeln , Dryaden , und Primel  
und Steinbrech

Leben am Berge stets fort , Kinder der gros-  
sen Natur ,

Und im Thale da steh'n Hyacinthen , Narcis-  
sen und Sinngrün ,

Scherzend am silbernen Quell freut das  
Vergissmeinnicht sich.

Menschen , ehrt die Natur ! umarmt die Mut-  
ter der Blumen ,

Dann hört auch sie euch dereinst , wenn  
ihr *Vergissmeinnicht* ruft.

S U T E R.

---

## P R A E F A T I O.

Halleri immortale opus, quod nimis  
modeste inscribitur „Historia stirpium  
„indigenarum Helvetiæ inchoata”  
dives fons est, ex quo emanavit hæc  
patria Flora. Liber rarus, maximi  
momenti, jam diu dignus erat, qui  
ederetur forma leviori et portatili,  
sæpiusque cogitavi de vulgandis or-  
dine Linnæano Helvetiæ plantis, ani-  
mo gaudium reputans, quod inde  
perciperent domestici et peregrini  
botanophili.

---

## VORRED E.

Hallers unsterbliches Werk mit dem so bescheidenen Titel „*Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata*“ ist die reiche Quelle, aus welcher ich für gegenwärtige Flora meines Vaterlands schöpfte. Die Wichtigkeit und Seltenheit des Buchs sowohl als sein unbequemes Format in Folio veranlaßten schon lange den Gedanken bey mir, die Pflanzen *Helvetiens* in einer leichten tragbaren Form nach *Linnæischer* Ordnung bekannt zu machen, und ich fühlte oft im Geist die Freude, welche der einheimische und fremde Botaniker dabei empfinden müfste.

Göttingæ cum iterum morarer  
Ao. 1794, quo melior fierem et doc-  
tior, initium feci rei tractandæ, et  
comparavi Halleri *descriptiones cum*  
*typis egregiis* Jacquinii, Bulliardii, et  
Oederi. Ibi magna mihi familiaritas  
erat cum multis Clarissimis viris, et  
oblivio nunquam memoriam delebit  
amicitiæ et benevolentiae, quas mihi  
præstabant illa Germanicæ decora  
Heyne et Meiners.

Omne studium eo tempore ad rem  
herbariam contuli, in primis habito  
respectu ad Theophrastum, Dioscori-  
dem, Plinium, Græcorum Romano-  
rumque poetas etc., quorum plantæ  
ad hoc usque tempus adcurate de-  
finitæ non sunt.

Ao. 1794 machte ich den ersten Plan dazu in *Göttingen*, und verglich mit *Haller* die vortrefflichen Beschreibungen und Figuren eines *Jacquin* für die Alpenpflanzen, und für die der Ebene vorzüglich *Bulliard* und *Oeder*. Ich studierte damals zum zweytenmal in diesem berühmten Musensitz, wo die Freundschaft so vieler großen Männer, vorzüglich die eines *Meiners* und *Heyne*, mir den Aufenthalt eben so lehrreich als unvergesslich machte.

Botanik war da meine Hauptbeschäftigung, besonders in Rüksicht auf *Theophrast*, *Dioscorides*, *Plinius*, griechische und römische Dichter, die bis auf diese Stunde zu unserm Gebrauch noch nicht kritisch bearbeitet sind.

Grimsula usque ad Diablerets, a Furca usque ad montem St. Bernhardi. Hinc obstructi sunt fontes venæque caloris, et præter oras Lacus Neocomensis, præter Lemanum agrum, Valesiam, Tellinam vallem et Transalpinum tractum, ubique varia et potius frigida temperies est.

Inde multum quidem detrahitur de agri fertilitate; ipsa vero tempestatis varietas Floræ divitiis auget patriam, cum plantæ tam frigidissimi quam calidissimi cœli hac sede gaudent, et nullam aliam regionem invenies, quæ, habita ratione tam exiguae superficie 950 millaria quadrata vix excedentis, florum quantitate cum solo patrio certet.

deren einige 3-9 Stunden Breite haben, rauben dem Land die Wärme, die ihm sonst würde zu theil geworden seyn; und wenn man die Ufer des *Neuenburger-Sees*, den *Leman*, das *Unter-Wallis*, die *italiänischen Kantone*, und das *Veltlin* ausnimmt, so herrscht in den übrigen Gegenden wenig warme und meistens abwechselnde Witterung.

So ungünstig im Ganzen dieses der Fruchtbarkeit des Bodens ist, so liegt doch gerade in dieser Abwechslung des Clima die Ursache des grossen Reichthums der Flora, indem die Pflanzen des kältesten Norden, wie des glühenden Süden auf ihm gedeihen, und keine Gegend der Welt kann ihm in Verhältnis zu seinem Flächen-Innhalt, der ungefähr 950 Quadrat-Meilen beträgt, den Vorrang streitig machen.

*Facile concedimus, vivido caloris  
halitu augeri præcipue incrementum  
plantarum, quare frigoris causa illa  
Georgia meridionalis plantas sponta-  
neas nonnisi duas profert, contra  
servidissima Madagascar 5000 gignit.  
Sed æque pariterque verum est „pri-  
„marios montes, illa columna mundi  
„esse præ omnibus sacram sedem  
„Floræ divinæ, quam ornat propriis  
„et omnis generis herbis" et cum  
partim summa orbis veteris cacu-  
mina Helvetiam cingunt, partim  
plumbeus auster valles plurimas per-  
flet, ne mireis, quæso, si genera  
plantarum 496 et circiter 1800 spe-  
cies præter Cryptogamicas numere-  
mus, quæ ad 1000 accedunt.*

*Ut Lectores benevoli melius rem  
colligere*

Es ist freylich wahr, daß Wärme die Mutter einer üppigen Vegetation ist, daher findet man im kalten *Süd-Georgien* nur *Zwey* wildwachsende Pflanzen, und hingegen 5000 im heißen *Madagascar*. Allein es ist eben so wahr, daß in *Urgebirgen* die Flora vorzüglich reich und eigenthümlich gedeiht; und da theils die höchsten Gipfel der alten Welt sich bey uns finden, theils manche Thäler vom heißen Südwind durchstrichen werden, so zählen wir auch 496 bekannte *Gattungen*, und ohngefähr 1800 Arten ohne die Cryptogamisten, die nahe an 1000 seyn werden.

Um dem Leser Gelegenheit zu fei-

*colligere possint, proprietates calidæ et frigidæ regionis, ante omnia tamen elementa montium divitum plantis enumerare constitui qualia accepi ab Amico Eschero, fossilium regni peritissimo et indefesso scrutatore.*

*Gamor, Hohencasten, Hohenmesmer ceterique montes Abbatiscellano-rum omnes constant lapide calcareo squameo vel denso, cui aliquid argillosæ et siliceæ terræ, et aliquantulum saxy particulas ferri continentis admistum est. —*

*Albis et Uetliberg (montes Agri Tigurini) varie alternant Margam et Saxum arenarium, quod bituminoso vinculo gaudet. Hi montes continent Lithantraces, Lapidés suillos et in propinquuo Petræfacta.*

*Albulam (Rhætiæ), nunquam quidem perlustravi, sed cum vicina sit Juliis Alpibus, verisimiliter iisdem elementis,*

nern Resultaten zu geben, werde ich das Eigenthümliche der *kalten* und *warmen* Gegend, vor allein aus aber die Bestandtheile der pflanzenreichsten Gebirge anzeigen, wie mir mein Freund *Escher*, ein sehr gelehrter Mineralog, sie gütigst mittheilte. — „

Der *Gamor*, *Hohenkasten* und *Hohenmesmer* nebst dem ganzen Stock der *Appenzeller* Gebirge, bestehen insgesamt aus schuppigem und dichtem Kalchstein, der etwas Thon und Kieselerde enthält, nebst etwas Eisenstein-Niere.

*Albis* und *Uetliberg*, (in der Nähe von Zürich) sind eine Abwechslung von mannigfaltigen Mergellagern mit Sandstein, der bituminöses Bindemittel hat. Diese Gebirgsrevier enthält Steinkohlen, Stinkstein, und in ihrer Nähe Versteinerungen.

Den *Albulæ* (in Bündten) untersuchte ich nie, aber wahrscheinlich gleicht er dem benachbarten *Julier*, der aus Granit be-

## XXVIII

*Granite et meridiem versus Syenite constabit.*

*Bernhardinus (Rhæticæ) continet Gneissum et Quarzum.*

*Bernina (Rhæticæ) varia est Granite et Syenite: hic maxime invenitur in declivitate meridionali, ubi in Hornblendschiefer transit. In cacumine Calcem habet, et ad latus meridionale Micam schistam cum Granatis et Schörl.*

*Montium dorsa circa Oberalp (inter Schöllinen et fontes Rheni anterioris) continent Gneissum cum Quarzo, et Micam schistam præcipue ad latus meridionale. Granata et Prechnites versus Disentis inveniuntur. —*

*Alpes circa Rhenum posteriorem — habent Gneissum cum magna copia Quarzi. —*

*Galanda (Rhæticæ) constat Lapide calcario et Calce schista, quæ multum argillæ continent, et facile dilabitur. (Thermæ Friboriæ ejus corona includuntur.)*

*Speluga (Rhæticæ) constat Gneisso et Mica schista, in cacumine invenis Calcem*

steht, in der Höhe Hornblendschiefer, und auf der Südseite Sienit hat.

*Bernhardin* (in Bündten) hat Gneis mit Quarz-Lagern.

*Bernina* (in Bündten) besteht aus mannigfältigen Granit und Sienitarten; letztern besonders am Südabhang, wo er in Hornblendschiefer übergeht. Auf der Höhe kommt auch Kalkstein vor, und an der Südseite Glimmerschiefer mit Granaten und Schörl. —

*Die Gebirge von Oberalp*, zwischen den Schöllenen und den Quellen des Vorder-Rheins — enthalten Gneis mit Quarzlagern, auch Glimmerschiefer, besonders an der Südseite. Granaten und Prehnit kommen gegen Disentis hin vor. —

Am *Hinter-Rhein* ist Gneis mit vielem Quarz.

*Galanda* (in Bündten) hat Kalkstein und Kalkschiefer, welch letzterer viel Thon enthält, und leicht verwittert. (Das Pfeifersbad liegt in seiner Kette.)

Der *Splügen* (in Bündten) hat Gneis und Glimmerschiefer, auf der Höhe weißen Kalk-

*albam, et ad latus meridionale Hornblend-schiefer (Corneus) et Serpentini lapidis vestigia.*

*Titlis (Subsylvanæ) calcem habet Quarzo et Argilla mixtam; illa mixtura ad saxum arenarium accedit, hæc vero ad Margam et argillam schistam.*

*Hacken (Agri Suitensis) calce densa constat; prope viam Saxum arenarium viride invenis cum Petræfactorum copia. —*

*Rigi. Continet Brecciam cum Granite, Porphyrite, Quarzo, Calce, tractibusque Saxy arenarii et arenario vinculo, quod sœpe arenaria cubilia singulatim in Breccia format.*

*Surenenses Alpes (inter Altorsium et Engelbergenses) calce constant mixta Quarzo et Argilla; inde sœpe transit in Margam schistam et Argillam schistam. Latus orientale Gneiso gaudet. —*

*Engelbergenses Alpes. Calcem nigram continent et Calcem schistam; huic præcipue multum Argillæ admistum est.*

stein, an der Südseite Hornblendschiefer, und Spuren von Serpentinstein.

Auf dem *Titlis* (in Unterwalden) ist Kalkstein mit Quarz und Thon gemengt: im ersten Fall sich einem Sandstein, im letztern cinem Mergel und Thonschiefer nähernd.

Der *Hacken* (Kanton Schwyz) hat dichten Kalkstein, und in der Nähe des Passes grünen Sandstein mit häufigen Versteinerungen.

Der *Rigi* besteht aus Nagelfluh (Brecia) mit Granit, Porphyrr, Quarz, Kalk und Sandsteingeschieben, und Sandsteinbindemittel, welches oft einzelne Sandsteinlager in der Nagelfluh bildet.

Die *Surenen-Alpen* (zwischen Alt-dorf und Engelberg) bestehen aus Kalkstein mit Quarz und Thon gemengt, und daher oft in Mergelschiefer und Thonschiefer übergehend; die östliche Seite derselben hat Gneis.

Die *Engelberger-Alpen*. — aus schwarzem Kalkstein und Kalkschiefer, wo-von besonders letzterer viel Thon beygemengt

*Petrosilicem schistum per partes in calce invenis.*

**Pilatus.** *Calcem habet Quarzo et Argilla mixtam: illa mistione peculiaria oriuntur saxa arenaria, quæ non raro plane quartziformia sunt: hac vero, in primis ad latus meridionale, Marga schista et Argilla schisia figuruntur. —*

**Rofstock** (inter Muttensem et Schächenensem valles) calce constat nigra squamea, cui Argilla immista est, et Lapis schistus calcarius.

**Gotthardus.** *Gneissum continet ad latus boreale; in Ursaria valle micam schistam vides et Calcem. Meridionale latus Graniten habet et Gneissum, etiam Micam schistam et Hornblendschiefer, cum Granatis; circa radices Gypsum invenis. —*

**Furca.** *Mica schista cingitur et magna copia Quarzi; ad orientale latus illa mica ad Argillam schistam accedit et valde dilabitur.*

**Grimsula.** *Graniten et Gneissum habet, venasque Quarzi. —*

**Gasterenses Alpes** ipse Escherus

enthält; Kieselschiefer kommt Nierenweise im Kalkstein vor. —

Der *Pilatus* hat Kalkstein mit Quarz und Thon gemengt, im ersten Fall bildet er ganz eigne Sandsteine: die oft ganz quarzartig sind: im letztern, besonders an der Südseite, Mergelschiefer und Thonschiefer. —

Auf dem *Rosstock* (zwischen dem *Mutten* und dem *Schächtenthal*) findet sich Kalkstein, schwarzer schuppiger mit Thon gemengt, und Kalkschiefer.

Der *Gotthard* hat auf der Nordseite Gneis, im Urselerthal Glimmerschiefer und Kalkstein, an der Südseite von oben herunter, Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Hornblendschiefer, dito mit Granaten; am Fusse Gyps.

Die *Furka* hat Glimmerschiefer mit viel Quarzlager; an der Ostseite nähert sich der Glimmerschiefer dem Thonschiefer, und ist in starker Verwitterung.

Die *Grimsel* enthält Granit und Gneis mit Quarzgängen.

Die *Gasteren Alpen* untersuchte ich

*nunquam quidem perscrutatus est; cum vero boreali lateri Gemmii montis cohæreant, sine dubio Calce constant, qua sœpe multum Quarzi, sœpe tamen Argilla miscetur; tum speciem Calcis schistæ Margæque schistæ induit, et nonnunquam accedit ad Argillam schistam.* —

*Gemmius mons iisdem elementis gaudet quibus modo dictæ Alpes; ad latus tamen australe Quarzum rarius inventu est, frequentior vero Argilla.* —

*Scheideck mons (inter Hasli et Grindelwald) Argillam schistam et margam schistam continet, partesque Petrosilicis schisti, quibus Pyrites involvitur.*

*Semproninus. Gneisso constat, Mica schista et calcariis cubilibus.*

*Rosa. Gneissum habet quarzeaque cubilia, et ad australe latus multum Micæ schistæ.*

*Sassensis vallis Gneissum continet et Micam schistam; in intimo ejus recessu Lapidem Nephriticum invenis.* —

*Sylvio stat Gneisso.*

nie, da sie aber mit der Nordseite der *Gemmi* zusammenhängen, so bestehen sie wohl aus Kalkstein, der oft viel Quarz beymengt enthält, oft aber auch Thon, und dann ist er Kalkschiefer, Mergelschiefer, und nähert sich zuweilen dem Thonschiefer.

Die *Gemmi* ist wie die *Gasteren Alpen*; an der Südseite aber wird der beymengte Quarz seltener, der Thon aber häufiger.

Die *Scheideck* (zwischen Hasli und Grindelwald) hat Thonschiefer und Mergelschiefer mit Kieselschiefer-Nieren, die Schwefelkies enthalten.

Der *Simplon* hat Gneis, Glimmerschiefer, und einige Kalksteinlager.

Der *Rosa* besteht aus Gneis mit Quarzlagern; an der Südseite ist viel Glimmerschiefer.

Im *Sasseralthal* ist Gneis und Glimmerschiefer, im Hintergrund Jade mit Schmaragdit. (*Lapis Nephriticus*.)

Der *Sylvio* (Matterhorn) besteht aus Gneis, und

Mons St. Bernhardi. *Granite gaudet et Gneisso cum Mica schista et Quarzeis cubilibus:* —

(*Quinque postremo notati montes, inter quos ærius Rosa cum Montblanc altitudine certat, Valesiam a meridie cingunt, et plantis ditissimi sunt.*)

Aquilejensis regio (*quæ Haltero florum ubertatem paraverat*) Calcem continet Quarzo mistam, Argillam schistam, et Gypsum in quo aliquid Salis gemmæ et non raro Scaturigines Salis invenis.

Montes Ormond dessus, Diablerets et omnis catena, *quæ Enzeindaz, Panerossaz, Planevaz ad usque Dent de Morcle continet, calce constant plus minusve Argilla et Quarzo mista quæque sœpe ad Margam schistam accedit, et nonnunquam petrefacta et intervalla Bituminis lithantracis plena includit. Circa Taviglianaz arenarium Saxum invenis, viside durumque.*

der grosse *S. Bernhard* aus Granit und Gneis mit Glimmerschiefer und Quarzlagern.

(Die fünf leztgenannten Gebirge, unter denen der *Rosa* dem *Montblanc* an Höhe wenig nachgeben soll, bilden vorzüglich die südliche Alpenkette des Walliser Landes, und sind an den seltensten Pflanzen außerordentlich reich.)

*Die Gegend um Aigle* (wo die Flora dem grossen *Haller* so reiche Schätze gewährte) enthält Kalkstein mit Quarz gemengt, Thonschiefer und Gyps, in welchem sich etwas Steinsalz und nicht selten Salzquellen befinden.

Die nahen Gebirge *Ormond dessus* und *Diablerets*, nebst der ganzen Kette über *Enzeindaz*, *Panerossaz*, *Planevaz* bis an die *Dent de Morcle* bestehen aus Kalkstein der mehr und minder mit Thon und Quarz gemengt ist, oft in Mergelschiefer übergeht, nicht selten Versteinerungen und Zwischenlager von Steinkohlen enthält, und Stellenweise stark verwittert. Bey *Taviglianz* ist harter grüner Sandstein.

*Sanensis vallis Calce, Argilla schista et Marga schista constat. —*

*Stokhorn. Calcem habet saepe Argilla mistam; inde nonnunquam in Margam schistam transit. Cacumen ejus plane stat calce.*

*Jura densa constat calce, quæ interdum Gypso miscetur; non raro in Oolithum (Roggenstein?) et saepe accedente Argilla in Margam transit. —*

*Montes Wassersfalle, Chasserall et Tessenberg calce densa gaudet. —*

*Neocomenses iisdem constant elementis. Circa Löcle Lapidem suillum invenis, prope Chaux de fond Saxum arenarium, et altiorum montium plures Oolithum continent. —*

*Saleva (circa Genavam) densam calcem habet, e cinereo colore flavescentem.*

---

*Huc usque Escheri egregiae gravesque annotationes, Pluribus illas de-*

Im *Saanenland* herrschen Kalkstein, Thonschiefer und Mergelschiefer.

Der *Stockhorn* hat Kalkstein, oft mit Thon gemengt, daher zuweilen in Mergelschiefer übergehend. Die Höhe ist ganz Kalkstein.

Der *Jura* besteht aus dichtem Kalkstein, mit zuweiliger Gyps. Oft geht er in Roggenstein, oft durch beygemengten Thon in Mergel über.

Die *Wasserfälle* im Kanton Basel, der *Chasseralle* oder *Gestler* (im ehemaligen Bissthum Basel), und der *Tessenberg*, haben dichten Kalkstein.

Im *Neuenburgischen* findet sich das gleiche; bey *Locle* ist Stinkstein, bey *Chaux de fonds* Sandstein, und mehrere der höhern Gebirge haben Roggenstein.

Der *Salève* (bey Genf) besteht aus dichtem gelblich grauen Kalkstein.

So weit gehen *Eschers* treffliche und körnigste Bemerkungen; er hätte sie mir

*disset, si spatium mihi fuisse. Maneat interim ingenii ejus hoc pulchrum specimen, et materiem præbeat Botanogeographis.*

*Recensebo nunc:*

- 1) *Plantas, quæ omnibus Alpibus sunt communes;*
  - 2) *plantas rariores alpinas, quæ nobis communes sunt cum Sibiria, Lapponia etc.*
  - 3) *Plantas rariores calidarum regionum;*
  - 4) *tandem eas, quæ quibusdam regionibus aut montibus propriæ sunt.*
- 

<i>A. Plantæ alpinæ</i>	<i>A. Fast auf allen</i>
<i>communes et vul-</i>	<i>Alpen finden sich:</i>
<i>gares.</i>	

*Veronica alpina, et aphylla. Pingnacula alpina. Agrostis capillaris. Aira montana Poa alpina. Festuca rubra. Globularia cordifolia. Plantago alpina. Asperula taurina. Galium saxatile. Alchemilla alpina.*

*An-*

ausführlicher gegeben, wenn es der Raum meiner Arbeit erlaubt hätte. Unterdessen bleiben sie eine schöne Skizze von dem, was er uns einst liefern wird, und der botanische Geograph kann immerhin sein Gebäude an sie reihen.

Ich werde nun noch die den meisten *Alpen gemeinschaftlichen* Pflanzen, die beyden Extreme unsrer Flora, und das *Eigenthümliche* anführen, was hie und da eine Gegend oder ein Gebirge hat.

---

*Androsace villosa. Primula auricula. Soldanella alpina. Azalea procumbens. Campanula rhomboidea, thyrsoidea, barbata et alpina. Gentiana lutea, acaulis et bavaria. Astrantia major, minor. Athamanta cretensis. Phellandrium mutellina.*

*Al-*

*Allium victorialis*, *schœnoprassum*. *Anthericum* *Liliastrum*. *Rumex scutatus*, *alpinus*. *Epilobium alpinum*. *Rhododendron ferrugineum*. *Saxifraga androsacea*, *bryoides*, *stellaris*, *cuneifolia*, *autumnalis*, *rotundifolia*, *cæspitosa*. *Silene acaulis*. *Arenaria ciliata*, *saxatilis*. *Sedum atratum*. *Cerastium strictum*, *alpium*. *Rosa alpina*. *Rubus saxatilis*. *Geum montanum*. *Dryas octopetala*. *Cistus œlandicus*. *Aconitum Lycoctonum*, *Napellus*. *Aremone narcissiflora*, *alpina*. *Ranunculus aconitifolius*, *nivalis*, *alpestris*. *Trollius europaeus*. *Bartsia alpina*. *Myagrum saxatile*. *Draba aizoides*, *hirta*. *Lepidium alpinum*. *Thlaspi montanum*. *Iberis rotundifolia*. *Biscutella lœvigata*. *Arabis alpina*. *Ononis rotundifolia*. *Astragalus montanus*, *campestris*. *Trifolium alpinum*. *Hedysarum alpinum*. *Sonchus alpinus*. *Leontodon aureum*. *Cnicus spinosissimus*. *Carlina acaulis*. *Gnaphalium alpinum*. *Erigeron alpinum*. *Senecio Doronicum*. *Cineraria cordifolia*. *Arnica montana*, *scorpioides*. *Chrysanthemum alpinum*. *Achillea macrophylla*,

atrata. *Centaurea montana*. *Viola montana*. *Satyrium viride*, *nigrum*, *albidum*. *Carex saxatilis*, *atrata*. *Veratrum album*.

B. *Plantæ alpinæ rariores, quarum plurimæ cum Lapponia et Sibiria nobis sunt communes.*

-

B. Einige seltene Alpen-Pflanzen, und die wir mit dem kältesten Norden, *Lappland*, *Sibirien* etc. gemein haben:

*Veronica bellidioides*. *Valeriana celtica*. *Avena aurea*. *Androsace septentrionalis*. *Aretiæ*. *Campanula linifolia*, *cenisia*, *uniflora*. *Phyteuma pauciflora*, *Scheuchzeri*. *Rhamnus pumilus*. *Ribes alpinum*. *Thesium alpinum*. *Herniaria alpina*. *Gentiana nivalis*, *pumila*, *glacialis*. *Eryngium alpinum*. *Bupleurum petræum*, *graminifolium*, *caricifolium*. *Sibbaldia procumbens*. *Juncus trifidus*, *triglumis*, *spadiceus*, *luteus*. *Aira subspicata*. *Poa disticha*. *Festuca pumila*. *Avena distichophylla*. *Arbu-*

*tus alpina*, *Uva ursi*. *Saxifraga aspera*,  
*petræa*. *Silene Vallesia*. *Lychnis alpina*.  
*Sempervivum globiferum*. *Potentilla multi-*  
*fida*, *norvegica*, *nivea*. *Delphinium elat-*  
*tum*. *Aquilegia alpina*. *Anemone Halleri*.  
*Atragene alpina*. *Thalictrum alpinum*. *Ran-*  
*nunculus rutæfolius*, *pyrenæus*, *glacialis*.  
*Isopyrum aquilegioides*. *Horminum pyre-*  
*naicum*. *Scutellaria alpina*. *Dracocephal-*  
*lum Ruyschiana*. *Pedicularis incarnata*,  
*flammea*, *comosa*. *Draba stellata*. *Carda-*  
*mine bellidifolia*, *trifolia*. *Phaca alpina*,  
*frigida*, *australis*. *Astragalus alpinus et*  
*uralensis*. *Hieracium alpinum*, *taraxaci*.  
*Serratula alpina*. *Carduns helenioides*, *he-*  
*terophyllus*. *Artemisia glacialis*, *Boccone*.  
*Erigeron uniflorum*. *Tussilago frigida*. *Se-*  
*necio incanus*, *uniflorus*, *abrotanifolius*.  
*Achillea Clavennæ*, *alpina*, *moschata*,  
*nana*, *tanacetifolia*, *vallesiaca*. *Centaurea*  
*rhapontica*. *Filago Leontopodium*. *Viola*  
*pinnata*. *Ophrys alpina*. *Carex curvula*,  
*juncifolia*, *fœtida*, *alpina*, *strigosa*, *ferru-*  
*ginea*, *frigida*. *Salix myrsinifera*, *arbus-*  
*cula*, *herbacea*, *reticulata*, *Lapponum*.  
*Rhodiola rosea*. — .

C. Plantæ calidiorum regionum, quæ nobis sunt communes cum Italia, Hispania et Gallia meridionali.

C. Wie sehr contrastieren nun mit diesen Pflanzen folgende Blüthen Italiens, Spaniens, des südlichen Frankreichs etc.

*Jasminum officinale. Rosmarinus officinalis. Salvia officinalis; sclarea. Cyperus longus. Agrostis serotina. Polycarpon tetraphyllum. Scabiosa graminifolia. Galium rubioides. Plantago cynops. Bufo-nia tenuifolia. Atropa Mandragora. Campanula bononiensis. Telephium Imperati. Erythronium Dens canis. Asphodelus luteus. Agave americana. Hemerocallis flava. Erica arborea. Laurus nobilis. Ruta graveolens, montana. Silene gallica. Oxalis corniculata. Agrostemma coronaria, Flos Jovis. Cerastium tomentosum, manticum. Phytolacca decandra. Reseda Phyteuma. Euphorbia Lathyris. Cactus Opuntia. Phi-*

*ladelphus coronarius.* *Punica Granatum.*  
*Amygdalus communis.* *Capparis spinosa.*  
*Cistus salvifolius,* *salicifolius,* *appenninus.*  
*Paeonia officinalis.* *Clematis Flammula.*  
*Hyssopus officinalis.* *Lavandula Spica.*  
*Sideritis hyssopifolia,* *scordioides.* *Mentha cervina.* *Origanum creticum.* *Euphrasia viscosa.* *Antirrhinum bellidifolium.* *Myagrum perfoliatum.* *Clypeola Jonthlaspi.*  
*Bunias Erucago.* *Lepidium subulatum.*  
*Sisymbrium murale.* *Arabis serpillifolia.*  
*Geranium ciconium.* *Sida Abutilon.* *Spartium scoparium,* *radiatum.* *Lupinus angustifolius.* *Coronilla glauca.* *Vicia lutea.*  
*Astragalus Tragacantha.* *Colutea arborescens.* *Trigonella monspeliaca.* *Hypericum Coris.* *Lactuca augustana.* *Andryala lanata.* *Carthamus lanatus.* *Santolina chamaecyparissus.* *Tanacetum Balsamita.* *Artemisia Abrotanum.* *Chrysanthemum coronarium.* *Achillea tomentosa.* *Centaurea crupina,* *alba.* *Micropus erectus.* *Echinops spherocephalus.* *Serapias Lingua.*  
*Aristolochia rotunda.* *Andropogon Gryllus.*  
*Cenchrus racemosus.* *Parietaria judaica.*

*Celtis australis.* *Diospyros Lotos.* *Ficus*  
*Carica.* —

<i>D. Plantæ propriæ</i>	<i>D. GewissenGegen-</i>
<i>quarundam regi-</i>	<i>den eigene Pflan-</i>
<i>onum et mon-</i>	<i>zen:</i>
<i>tium.</i>	.

1) *Ager Basileensis.* *Kanton Basel.*

*Bupleurum tenuissimum*, *junceum.* *Si-*  
*lene noctiflora.* *Caucalis leptophyllos.* *La-*  
*serpitum silaifolium.* *Linum Radiola.* *Or-*  
*nithogalum minimum.* *Cratægus mono-*  
*gyna.* *Myosurus.* *Lactuca saligna.* *Hiera-*  
*cium cymosum.* *Senecio sylvaticus*, *nemio-*  
*rensis.* *Carex præcox Schreb.* *Isnardia pa-*  
*lustris.*

In Episcopatu olim | *Im ehmaligen Bissthum*  
*Basileensi.* | *Basel:*

*Thlaspi saxatile.*

2) *Rhætia.* *Bündten.*

*Cerastium manticum.* *Clematis Flammula.*  
*Horminum pyrenaicum.* *Arnica Doronicum.*  
*Gypsophyla fastigiata.*

3) *Alpes Abbatiscellanorum.* *Appenzell.*  
*Draba pyrenaica.* —

**XLVIII**

4) Thurgovia. *Thurgäu.*

*Ranunculus hederaceus.* *Scrophularia ver-  
ualis.* —

5) Ager Tigurinus. *Zürich.*

*Lysimachia thyrsiflora.* *Festuca hetero-  
phylla,* *amethystina* etc. —

6) Alpes Glaronenses. *Glarus.*

*Hypericum Coris.* *Ophrys monophyllos.* —

7) Suitensium mons | *Schwyz* auf dem  
*Aubrig.* | *Aubrig.*

*Sedum stellatum.* —

8) Pilatus mons. *Der Pilatus.*

*Ruta montana.* Den *Papaver alpinum*  
einzig unter den Gebirgen. *Cistus umbel-  
latus?* —

9) Gotthardus mons. *Der Gotthard.*

*Primula minima.* *Campanula patula.* —

10) Transalpina. *Die italienischen Kantone.*

*Silene gallica* et *saxifraga.* *Helleborus*  
*niger.* *Centaurea splendens.* *Andropogon*  
*Gryllus.* *Parietaria judaica.* *Viola Ruppii.*  
*Schoenus fuscus.* *Salvia officinalis.*

11) Generosus mons. *Der Berg Generosus.*

*Laserpitium trilobum.* *Crepis alpina.*  
*Achillea*

*Achillea Clavennæ, tanacetifolia.* *Selinum Seguieri.*

12) *Valesia. Wallis.*

*Campanula bononiensis.* *Caucalis latifolia.* *Rhus Cotinus.* *Telephium Imperati.* *Veronica præcox.* *Saponaria lutea.* *Silene Vallesia.* *Euphrasia viscosa.* *Antirrhinum genistifolium.* *Lepidium subulatum.* *Geranium eiconium.* *Vicia onobrychioides.* *Astragalus exscapus,* *Onobrychis.* *Coronilla glauca.* *Ervum Lens.* *Lactuca augustana.* *Andryala lanata.* *Santolina Chamæcyparissus.* *Artemisia Abrotanum,* *Vallesiaca.* *Xeranthemum annum.* *Tragopogon majus.* *Achillea tomentosa,* *Vallesiaca.* *Echinops sphærocephalus.* *Ephedra distachya.* *Cenchrus racemosus.* *Bulbocodium vernum.* *Amygdalus communis.* *Dianthus arenarius.* —

*Valesiæ montes.* *Auf den Walliser-Gebirgen.*

13) *M. Sylvio.* *Auf dem B. Sylvio.*

*Sempervivum globiferum.* *Thlaspi alpestre.* *Arabis Halleri.* *Trifolium saxa-*

tile All., *Potentilla multifida*. Letztere findet sich auch auf —

14) In M. Stock. *Dem Berg Stock.*

Der zum Nicolai-Thal gehört. Hier noch *Herniaria alpina* Vill. *Alyssum alpestre* All.

15) In ipsa Valle Nicolai. *Im Nicolai-Thal.*

Der *Astragalus Leontinus*. *Anemone Halleri*.

16) In Valle Saas. *Im Sasser-Thal.*

*Phyteuma Scheuchzeri.*

17) In M. Moro. *Auf M. Moro.*

*Geranium aconitifolium*, so wie *Senecio uniflorus*, welcher letzte auch auf *Fouly* und *Stock* wächst.

18) In monte St. Bernhardi. | *Auf dem St. Bernhard.*

*Pedicularis incarnata*. *Sisymbrium tanacetifolium*, *strictissimum*; und gegen Süden der *Tribulus terrestris*.

19) Ager Lemanus. *Kanton Leman.*

*Arundo Donax*. *Scirpus holoschoenus*, *supinus*. *Salvia sclarea*. *Laurus nobilis*. *Verbascum pulverulentum*. *Mentha cer-*

vina. *Tordylium maximum.* *Sisymbrium murale.* *Vicia lutea.* *Lupinus angustifolius.* *Ulex europaeus.* *Anagallis tenella.* *Laserpitium prutenicum* etc.

In ejus Alpibus. Auf den dahin gehörigen Alpen:

*Sur Champ* die *Brassia alpina*;

Auf *Taveyannaz* die *Festuca pumila*. —

20) Ager Solodorensis. Kanton Solothurn.

*Myagrum persfoliatum*. —

21) Ager Bernensis. Kanton Bern.

*Tulipa sylvestris.* *Hyacinthus botryoides*.

*Ornithogalum nutans.* *Sedum annum*.

*Alisma ranunculoides.* Auf dem *Tessenberg*:  
*Coriandrum sativum*. —

22) In Neocomensi- | Im Neuengurgi-  
bus. | schen.

Die *Fritillaria Meleagris*; und auf *Creux du Vent* die *Valeriana angustifolia*. —

23) Circa Genevæn. Bey Genf.

*Antirrhinum bellidifolium.* *Trifolium incarnatum.* *Lactuca virosa.* *Avena fragilis.* *Sium nodiflorum.* *Sison Amomum.* *Plantago Cynops,* *Psyllium*.

*In vicinis montibus.* Auf den nahen Bergen :  
*Thuiry* : *Aconitum Anthora*. *Doronicum Pardalianches*. Auf *Saléva* : auch das letztere ; dann noch : *Turritis Raji*. *Lepidium petræum*. *Sinapis pyrenaica*. *Anthyllis montana*. *Leontodon hirtum*.

---

*His notis facile proprietates cuius-cunque regionis agnosces , ut eligas utram velis.*

*Habent præterea „Campi“ *Carduos*, *Jasionen* , *Scabiosas etc.*, ut alibi; in „*agris frumentariis*“ *florent Cyanus*, *Githago et Raphanistrum*; in „*Sylvis*“ *Aspérule*, *Pyrolæ*, *Circææ*, *Daphne et Prenanthes*; in „*Lacubus et Flaviis*“ *Nymphææ*, *Potamogeton*, *Scirpi*, *Arun-dines et Typhæ*; in „*Paludibus*“ *Andro-„meda*, *Vaccinium*, *Sparganium*; in*

24) In Valle Tellina. *Im Veltlin.*  
*Angelica Archangelica.* *Asphodelus luteus.* *Serapias Lingua.* *Aristolochia Pisto-lochia.* —

---

Dieses mag genug seyn, um einzelne Gegenden zu unterscheiden, und der Botaniker kann sich daraus seine Lieblingsstelle wählen.

Uebrigens haben unsere „*Felder*“ ihre Disteln, *Jasionen*, *Scabiosen*, wie anderwärts; im „*Getreide*“ blüht die Kornblume, der Hederich, und die Rahde; im „*Schatten der Wälder*“ *Asperulæ*, *Pyrolæ*, *Circæen*, *Daphne* und *Prenanthes*; „*Seen und Flüsse*“ haben ihre *Nymphæen*, *Potamogeton*, *Scirpi*, *Arundo*, und *Typha*;

„Ruderibus” *Hyoscyamus et Chenopodia; et inter Rosas ubique*

»*Rubus et Sentes tantummodo lœdere  
« natæ.”*

*Caret æquis locis Helvetia, caret  
desertis arenosis et ericetis magnis;  
propterea desunt nobis plantæ his  
tractibus propriæ. Salsolas tamen ne-  
mini invidemus.*

*Cingit nos Alpium pulcherrima co-  
rona; Utinam has fines Naturæ vi-  
tæque nunquam transcendamus! Vi-  
vamus contenti! nil ultra requira-  
mus! Sit carum cuique gremium pa-  
triæ, ut flori gremium montis!*

„die Sümpfe“ *Andromeda*, *Vaccinium*, *Sparganium*; der „Schutt“, sein Bilsenkraut und Gänsefuß, und zwischen Rosen blühen Dornen, wie in der ganzen Welt. —

Große Flächen haben wir nicht, darum fehlen uns einige Pflanzen der Ebene, Sandpflanzen, und um das Salzkraut beneiden wir kein Land.

Die Natur schloß uns in den schönsten Kranz von Alpen ein, den sie auf dieser Welt geschaffen. Möchten wir nie über diesen schönen Umriss unsers Lebens hinausstreben, immer bedenken, daß wir lange ihre Lieblingskinder waren, und nur dann wieder glücklich werden können, wenn wir uns so innig an unser Land schließen, als die Blumen an ihren Berg.

*Hæc sufficiunt de plantarum loco natali; cétera quam paucissimis absolvam.*

*Me non fugit quam imperfectum sit opus meum, attamen pro viribus scripsi. Verum in longum adhuc tempus nobis desiderio erit absoluta et integra Flora Helvetica. Sunt Alpes multæ invisæ, sunt aliæ quas sine discrimine vitæ adire vix poteris; et certe in nubiferis quibusdam culminibus herbulæ florent æque solitariæ sicut Origanum illud Tournefortii in Archipelagi insula Amorgo patria sede Simonidis Jambi pugnacis repertoris. Præterea certo mihi persuasum est, multas cryptogamicas plantas inaccessarum habitatrices petrarum, in omne tempus latere*

Soviel zur Hauptsache in der Vorrede, und als ein kleines Resultat der Flora meines Vaterlands.

Ich weiss gar wohl, dass meine Arbeit nicht vollständig ist; ich that aber dabey was ich thun konnte. Wir werden auch noch nicht so bald eine ganz vollständige Blumenlese *Helvetiens* erhalten. Auf mancher unbesuchten, oder nur mit Lebensgefahr zu ersteigenden Alpe wird manches Pflänzchen noch lange so einsam blühen, als das *Origanum Tournefortii* auf des *Archipelagus* Insel *Amorgos*, dem Vaterland des Jambendichters *Simonides*. Auch bin ich überzeugt, dass viele *Cryptogamisten* auf unzugänglichen Felsen dem Forscher werden verborgen bleiben, ja dass selbst die Kälte

*indefessum quemque florum studiosum, imo vix evocantur in lucem e tenebris Alpium omnes Siliquosæ, Compositæ et Umbellatæ, quæ tanto-pere frigore gaudent. Audiant ergo botanophili Hallerum, cum non inventiant, qui melius dare consilium possit; inquirant in plantas planitiei proprias per omnem Valesiam et Transalpinam, fertiles illas regiones, unde singulis annis Schleicher novos flores decerpit; peragrent Thurgoviam, Argoviam, Solodorenses et Friburgenses agros; alpinos vero thesauros investigent per Rhætiæ Vallisque Tellinæ montes, ubi voluptate fructuque abundare sperat, quicunque circa Balneum St. Mauricii in Engadina superiore morari per æstatem velit.*

liebenden *Tetradynamisten*, *Syngenesisten* und *Doldengewächse* noch lange nicht alle werden gefunden werden. Der Botaniker beherzige also den Rath unsers grossen *Hallers*: suche noch fleissiger nach Pflanzen der *Fläche* in *Transalpinien* und *Wallis*, diesen reichen Gegenden, wo wenigstens *Schleicher* jährlich neue findet; er durchwandre das noch wenig besuchte, *Thurgau*, *Argau*, *Solothurn* und *Freyburg*, und spüre nach neuen Schätzen der Alpen im *Veltlin* und *Rhætiens* Gebirgen, wo reicher Genuss seiner warten soll, wenn er zu *St. Moriz* im hohen *Engadiner-Thal* seine Hütte aufschlägt.

*Tandem observasse necesse est ,  
me præter Hallerum , etiam Scheuch-  
zeri *Itinera Alpina* , fratriisque Agros-  
tographiam , Bauhinorum opera et  
Cappeleri Catalogum stirpium mon-  
tis Pilati consuluisse.*

*Recentiores plantas suppeditave-  
runt : 1) Nova Acta Helvet. Tom. I.  
pag. 270 ; 2) Tractatus quidam in  
Höpfneri Magaz. Tom. IV. p. 24.  
3) Et partim les Etrennes Helve-  
tiennes Anni 1797.*

*Stirpes , quæ errore quodam præ-  
teritæ sunt , et aliæ , quas D. Schlei-  
cher ex illo tempore invenit , quo  
Liber meus sub prelo sudabat , in  
fine notantur.*

*Sequitur Index Generum , et Spe-  
cierum*

Zum Schluss bemerke ich noch, daß ich nebst *Haller*, *Scheuchzer's* Alpenreisen und die Werke der *Bauhine* benutzte.

Die neuern Pflanzen zog ich aus einer Abhandlung die in *Höpfner's Magazin für die Naturkunde Helvetiens* Tom. IV. pag. 24. sq. steht, aus den *Nov. Act. Helvet.* Tom. I. pag. 270. sq. und einige aus den *Etrennes Helvétien* vom Jahr 1797.

Was ich theils vergessen, und was seit dem Druck des Werks Herr *Schleicher* neues gefunden, werde ich am Ende desselben nachliefern.

Ein Register über die *Gattungen*  
d

*cierum secundum numeros et ordinem Halleri dispositus.*

*In ordinandis generibus secutus sum Clariss. Schreberum. Proprias descriptiones littera S designavi; locum natalem cuiusvis plantæ plerumque Hallerus suppeditavit, et numerus adpositus ad numerum Historiæ Stirpium ejusdem auctoris spectat, quæ tibi in omnibus satis est factura.*

*Bernæ, D. 6. Decembris 1801.*

und eines über die *Arten*, der Reihe nach, wie sie bey *Haller* folgen, wird den Schluss machen.

In Anordnung der Gattungen bin ich *Schreber*'n gefolgt. Die mir eigenen Beschreibungen sind mit dem Buchstaben S bezeichnet. Die Angabe der Stellen, wo die Pflanzen wachsen, nahm ich meistens aus *Haller*, und die hinter derselben stehende Zahl deutet auf die Nummer in seinem Werk.

Bern, 6 December 1801.



*Classis I.*

MONANDRIA,

MONOGYNIA.

---

1. **HIPPURIS.** (*Tannenwedel.*) *G. pl. 15.*

Cal. o, nisi margo bilobus germen coronans; stigma acutum; semen 1, nudum.

*H. vulgaris*, fol. octonis subulatis L.  
*Oed. Dan. t. 87.*

In fossis et lacubus. 1572.

DIGYNIA.

2. **CALLITRICE.** (*Wasserstern.*) *G. pl. 17.*

Cal. o, petala 2 incurva, opposita; caps. 4- angularis, compressa, 2- locularis, 4-sperma.

1. *C. verna*, fol. superioribus ovalibus; flor. androgynis. L. *Oed. Dan. t. 129.*

In fossis et stagnis. 553.

2. *C. intermedia*. Fol. superioribus ovalibus, caulinis linearibus apice bifidis. *Schkuhr. Bot. Handb.* t. 1. f. e.

Ubique in stagnis, fossis et udis. 554. (florent May - Jul.)

3. *C. autumnalis*. Fol. omnibus linearibus apice bifidis; flor. hermaphroditis. L. *Loesel pruss.* t. 38.

In uliginosis, in quibus aqua sicca nudas lenticulas reliquit.

In via Worbensi, ultra Muri etc. 555.

4. *C. minima*. Fol. omnibus linearibus obtusis apice integris. Hoppe. Schleicher misit.

### 3. BLITUM. (*Schminkbeere.*) G. pl. 18.

Cal. 3-partitus; cor. 0; sem. 1, globosum compressum in calyce baccato.

B. *capitatum* capitellis spicatis terminalibus. L. *Schk.* t. 1.

In Rhætia ad viam versus M. *Albulam*. Circa Osagno vallis Lepontiæ. 1571.

(Inveni etiam supra *Varonne* Valesiæ, sed floribus per totum caulem sparsis, ut potius *B. Virgatum* sit. S.)

---

*Classis II.*

D I A N D R I A,  
M O N O G Y N I A.

---

*A. Flores inferi, monopetali, regulares.*

4. IASMINUM. (*Iasmin.*) *G. pl. 22.*

Cor. 5-fida; antheræ intra tubum; bacca ovalis 2-cocca! semina arillata.

*J. officinale.* Fol. oppositis: foliolis distinctis. L.

In rupibus circa *Chiavennam.* 529.

5. LIGUSTRUM. (*Rheinweide.*) *G. pl. 23.*

Cal. minimus 4-dentatus; cor. 4-fida; bacca globosa 4-sperma.

*L. vulgare.* Fol. lanceolatis acutis; paniculæ pedicellis oppositis. L. *Curt. lond.* V. n. 51.

In sepibus et silvis ubique. 530.

(Var. fol. ternis, auratis, et fructu albo.)

6. SYRINGA. (*Flieder, Lilak.*) *G. pl. 28.*

Cor. 4-fida; antheræ intra tubum; cap-

sula ovato - lanceolata compressa bilocularis bivalvis ; semina margine membranaceo.

*S. vulgaris.* Fol. ovato-cordatis integris L.

In sepibus ; etiam in aspera sylva montosa prope Moutrou ultra templum. En Chamblane secundum rivum. 531.

*B. Flores inferi, monopetali, irregulares. Fructus capsulares.*

7. VERONICA (*Ehrenpreis.*) G. pl. 32.

Cal. 4-5-fidus ; cor. 4-partita : lacinia infima angustiore, suprema maxima ; caps. obcordata, apice compressa, 2-locularis.

a. *Spicatæ.*

1. *V. spuria.* Spicis terminalibus ; fol. ternis æqualiter serratis. L.

In pascuis alpinis Rhæticis. Scheuchz. It. Alp. pag. 143.

( Hallerus quidem Scheuchzeri plantam *V. spicatae* conjunxit, cum vero nostra synonymon sit Bauhini a Linnae citatum, omittere nolo.)

2. *V. spicata.* Spica terminali ; fol. oppositis crenatis obtusis ; caule adscendente simplicissimo. L. Oed. Dan. t. 52.

a. *Spica unica* : passim in herhosis macilentis inter Valeire et Montcharand ; prope Roche supra scaturiginem le Furet, a la Marbrière etc.

In Valesia ad vias. In Rhætia etc. Basileæ in Syltula ad Neuhaus.

b. *Spicis pluribus Hallermus unice circa ar-*  
*cem St. Tryphon reperit, versus sacellum. 542.*

(Hanc posteriorem a V. *longifolia* vere di-  
 versam non credo. S:)

3. V. *officinalis*. Spicis lateralibus pedun-  
 culatis; fol. oppositis; caule procumbente.  
*L. Oed. Dan. t. 248.*

Frequens in sylvis et ad oras clivorum. 540.

b. *Corymboso - racemosæ.*

4. V. *aphylla*. Fol. ovatis subhirsutis sub-  
 crenatis, caule nudo procumbente pauciflo-  
 ro. S.

Frequens in Alpibus. Vbiue in Aquilejen-  
 sibus; etiam in *Fouly*, *Jeman*, *St. Bernhard*,  
*Speluga*, *Neunnenen*, *Stokhorn*. In altioribus  
 montanis: *Dolaz*, *Thuiry* etc. 541.

5. V. *bellidoides*, corymbo terminali;  
 caule adscendente diphylo; fol. obtusis  
 crenatis; calyc. hirsutis. *L. Hall. t. 15. f. 1.*

In alpibus editioribus: *Gotthardo*, *Fouly*, *Her-  
 bagere*, *Salanfe*, *Simplon*, *St. Bernhard*, *En-  
 zeindaz*, *Iavernaz*, *Pràpiaz*, *Dent de Midi*,  
*Furca*, *Speluga* etc. 543.

(Folia caulina opposita, hirsuta, 2-6.)

6: *V. alpina*. Fol. oppositis ovatis glabris subcrenatis margine hirsutis; corymbo terminali; calycibus hispidis. S. Hall. t. 15. f. 2. *Oed. Dan.* t. 16.

In Alpium lapidosis pascuis ubique.

B. flore albo: in Valesiae monte *de la Pierre*.

644.

(Foliorum paria 5-6. Sæpius integerrima sunt, tunc erit *V. integrifolia Willd.* quam non separo.)

7. *V. fruticulosa*. Fol. oppositis ovato-lanceolatis glabris subcrenatis, caulinis majoribus; caulis fruticulosus declinatis; corymbo terminali. S. Hall. t. 16. *Jacq. coll.* 4. t. 5.

In lapidosis subalpinis et montanis. In Aquilejensibus, in *Fouly* etc. In subalpinis circa balneum *Weissenburg*, indeque per vallem *Simmiam* et *Sanensem* ad rupes, ut inter *Combe* et *Chateau d'Oex*; in valle *Ursaria*; circa fontem superiorem balneariorum *Leucensium* etc. 545.

(Flores carnei, lineis purpureis; calyx sub-hirsutus lanceolatus.)

8. *V. saxatilis*. Fol. oppositis subovatis glabris obtusiusculis, pedunculo brevioribus; corymbo terminali; caule plerumque erecto. S. I. B. III. p. 284. *Oed. Dan.* t. 342.

Albina. In Aquilejensibus non rara; in *Gotthardo, Rosselina, Speluga.* Etiam in Jura. 545. B.

(Dissert a præcedente statura humiliore, flore cæruleo, calyce glabro.)

Var. in Monte d'Arbignon: Fol: profunde incisis, et crispis.

9. *V. serpillifolia*, racemo terminali subspicato, fol. ovatis glabris crenatis: radicibus oppositis, caulinis alternis. S. Oed. Dan. t. 492.

Ubique in pratis et ad vias. 549.

B. major, foliisque majoribus rotundis -- ad vias, et in alpibus Valesianis *Fouly.*

(Flos albo-coeruleus, imo segmento pure albo.)

10. *V. Beccabunga.* racemis lateralibus; fol. ovatis planis; caule repente. L. Oed. Dan. t. 511.

Abundat in rivis, potissimum purioribus. 534.

11. *V. Anagallis.* racemis lateralibus; fol: lanceolatis serratis; caule erecto. L. Oed. Dan. t. 903. vulgo in fossis. 533.

(Fl. tota æstate.)

12. *V. scutellata*, racemis lateralibus alternis; pedicellis pendulis; fol: linearibus integerrimis. L. Oed. Dan. t. 209.

Bernæ non rara im *Gyrenmoos*; in torfaceis  
im *Löhr*. Supra *Augustam* et *Friedlingen*. Biennæ  
in fossis aufm *Passgart* prope lacum. etc.  
§32.

13. V. *Teucrium*. racemis lateralibus longissimis; fol. ovatis rugosis dentatis obtusiusculis; caulis procumbentibus. L. Jacq. Aust. t. 60.

Non rara in pascuis montosis et ad vias. In agro Aquilejensi inter *Roche* et *Aigle*, sub *Chamoseire* etc. Circa thermas *Leucenses*. A *Pierabot*, supra St. *Aubin* etc. (circa *Tobinium* in M. *Engelberg*.) 537.

(Var. flore pleno, *a la Bastie*.)

14. V. *prostrata*, racemis lateralibus; fol. radicalibus oblongo-ovatis, caulinis linearibus serratis; caulis prostratis. S.

Frequens Basileæ in agris siccioribus et incultis; inter St. *Margret* et portam *lapideam*, in pratis supra *Ilfingen*, et eopiose circa *balneum Brüglingen*. 538.

(Caules palmates, rufescentes, rigidi, subtomentosi.)

15. V. *montana*, racemis lateralibus paucifloris; calyc. hirsutis; fol. ovatis rugosis crenatis petiolatis; caule debili. L. Jacq. Aust. t. 109.

Non vulgaris. In *Sylva Bremgarten* prope Bernam. Circa *Monbelliard*. 539.

(Caulis totus prostratus cubitalis; folia longe petiolata, subtus fere rubra; petala subcoerulea. Hall.)

16. V. *Chamaedrys*, racemis lateralibus; fol. ovatis sessilibus rugosis dentatis; caule bifarium piloso. L. *Oed. Dan.* t. 448.

Nihil vulgatius in sepibus et pratis. 536.

17. V. *urticaefolia*, racemis lateralibus; fol. ovato-lanceolatis hirtis argute serratis; caule erecto. L. *Jacq. Austr.* t. 59.

Frequens in Sylvis umbrosis. Bernæ impensis in sylva *Wylerholz*; circa Burgdorf, in monte *Pinzberg*; circa balneum *Weissenburg*; in valle *Emmen*. Circa *Wesen*, *Altdorf*, *thermas Fabarias*, *Curiam*. Inter *Aarau* et *Solothurn*. In M. *Muteto* versus *Schauenburg* etc. 535.

(Flos carneus venis coeruleis.)

### c. *Pedunculis unifloris*.

18. V. *agrestis*. Flor. solitariis; fol. cordatis incisis pedunculo brevioribus. L. *Oed. Dan.* t. 449.

Vulgo verno tempore, in hortis areis, ad vias. B. flore albo circa *Wabern* etc. 549,

19. *V. arvensis*. Flor. solitariis; fol. cordatis incisis pedunculo longioribus. L. *Curt. lond.* 2. n. 23.

Ubique in pratis et hortis. 548.

(Calycis duo segmenta reliquis majora. *Hall.*)

20. *V. hederaefolia*. Flor. solitariis; fol. cordatis planis quinquelobis. L. *Curt. lond.* 2. n. 19.

Vere frequens in hortis, areis, et ad vias. 550.

(Folia etiam triloba; petala calyce hispido breviora.)

21. *V. verna*. Flor. solitariis; fol. digitato-partitis; pedunculis calyce brevioribus. L. *Oed. Dan.* t. 252.

In Valesia inferiori; circa Genevam. 552.

22. *V. triphyllus*. Flor. solitariis; fol. digitato-partitis; pedunc: calyce longioribus. L. *Oed. Dan.* t. 627.

Basileæ circa novum domum; qui itur ad *Wies*-*sam* fl., et versus St. Jacob. Circa Genevam. In Valesia inferiore. In monte *Hermetis* circa *Scapheusiam*. 551.

23. *V. acinifolia*. Flor. solitariis pedunculatis; fol. ovatis glabris crenatis; caule erecto subpiloso. L. *Vaill. Paris.* t. 23. f. 3.

*Hallerus* loci oblitus. 547.

8. GRATIOLA. (*Purgierkraut*) G. pl. 37.

Cal. 7- phyllus , segmentis 2 exterioribus patulis ; cor. irregularis 4-partita , lacinia superiore latiore reflexa ; Stam. 4 , 2 breviora sterilia ; caps. ovata , 2-locularis.

G. *officinalis*. Fol. lanceolatis serratis ; flor. pedunculatis. L. Oed. Dan. t. 363.

Frequens in udis: ut *Ebroduni* inter arcem et lacum. *Aux Grangettes* versus lacum Lemianum. Circa *Boudry*, *Colombier*. *Anet*. Ad Lacum *Luganensem* et *Clavenensem*. 329..

B. *Alpina minima*. in M. *Braulio Rhætorum* Iulio floret. I. *Bauh.* III. p. 435.

9. PINGUICULA. (*Fettkraut*.) G. pl. 40.

Cal. bilabiatus 5 - fidus ; cor. ringens calcarata ; Stamina curva calyce breviora ; stigma 2-labiatum ; caps. ovata 1-locularis..

1. P. *vulgaris*. nectario cylindraceo longitudine petali. L. Oed. Dan. t. 93.

Frequens in udis circa Bernam, ultra *Seelhofen* et *Seedorf*; cirea *Yvorne*, *Nods*. Ad Rheum inter *Langwisen* et *Paradies*. Etiam in Alpibus, *Gotthardo* et in montibus *Thuirii*, *Uetliberg*. 292.

(Folia glutine rorida ; caulis aphyllus uniflorus; flos nutans violaceus. )

2. *P. alpina*, nectario conico petalo breviore. L. *Oed. Dan.* t. 453.

In alpinis ubique; in herbidis montium valjis *Emmiae*; in M. *Waach*, supra les *Plans*, en *Chapuisse* etc. 293.

(Flos albus, medio luteis villis pubescens.)

#### 10. UTRICULARIA. (*Wasserschlauch.*)

*G. pl. 41.*

Cal. 2-phylloë æqualis; cor. ringens calcarata; stamina incurva, antheræ cohærentes; caps. 1-locularis.

1. *U. vulgaris*, nectario conico; scapo paucifloro. L. *Oed. Dan.* t. 158.

*Gumlingæ* in torfetorum fossis, circa *Noville*, *Payerne*, *Champion* etc. Inter *Brüglingen* et versus *Hiltelingen*. Circa *Lacum Felinum* et *St. Gallen*. Versus *Paradies*. 20\*.

(Folia capillaria in aquis natantia; flores flavi.)

2. *U. minor*, nectario carinato. L. *Oed. Dan.* t. 128.

In paludosis circa la *Chetelaz*, 291. et Bernæ im *Gyrenmoos*. in *Addend.*

*C. Flores inferi monopetali irregulares. Fructus gymnospermi.*

11. VERBENA. (*Eisenkraut.*) *G. pl. 43.*

Cal. 5-dentatus, unico dente truncato;

cor. semiquinquefida incurva; stam. 2-4  
intra tubum; antheræ incurvæ.

*V. officinalis*, tetrandra; spicis filiformi-  
bus paniculatis; fol. multifido-laciniatis;  
caule solitario. L. *Oed. Dan.* t. 628.

Ubique ad vias orasque fossarum. 219.

12. LYCOPUS. (*Wolfsfuß.*) G. pl. 44.

Cor. 4-fida, lacinia unica emarginata;  
stam. distantia; sem : 4 retusa.

*L. europaeus*. Fol: sinuato serratis. L. *Fl. Dan.* t. 1081.

Abunde in aquosis. 220.

(Var. fol. glabris aut villosis, magis aut  
minus incisis, et pinnatis.)

13. ROSMARINUS. (*Rosmarin.*) G. pl. 49.

Cor. inæqualis, labio superiore bi-partito,  
inferiore trifido; stamina simplicia cum  
dente versus labium superius inclinata, eo-  
que longiora.

*R. officinalis*. L.

Aux *Ganges* loco deserto; in alveo torren-  
tis qui pagum *Montru* dividit, et ad pedem  
rupium gypscarum prope *Bex* 250.

14. SALVIA. (*Salley.*) G. pl. 50.

Cor. inæqualis; filamenta brevissima duo-  
bus filis transverse instructa, quorum extre-

mitati inferiori glandula, superiori anthera insidet.

1. *S. officinalis*. Fol. lanceolato - subovatis integris crenulatis; flor. interrupte - subverticillatis; calycum dentibus aristatis. *Wulf.*

(In Helvetia transalpina inventam misit Cl. Schleicher.)

2. *S. pratensis*. Fol. cordato - oblongis crenatis: summis amplexicaulibus; verticillis subnudis; corollis galea glutinosis. L.

Frequens ad vias et in pratis macilentis, Majo, Junio. 253.

(Var. flore albo, rubro, cæruleo et carneo.)

3. *S. verticillata*. Fol: cordatis crenato-dentatis; verticillis subnudis; stylo corollæ labio inferiori incumbente. L.

In agro Aquilejensi cis rivum *la grand Eau*, in ipso pago *Leisin*; ad pedem montium inter les *Gauges* et *le Furet*; in monte *Luan*, etiam circa *Echarpigny*. 251.

4. *S. glutinosa*. Fol. cordato - sagittatis serratis acutis. L.

Nihil frequentius in subalpinis: descendit ad usque *Glerolle*, et ad lacum, et *Bevieux*. In M. *Jura* etiam frequens; in M. *Muteto*, circa *Höllstein*; *Langenbruck*, *Wallenburg*, in ipsa denum urbe Basileensi. 252.

## D. Flores Superi.

15. CIRCAEA. (*Hexenkraut.*) G. pl. 31.

Cal. superus 2-partitus; cor. 2-petala patens; caps. hispida 2-valvis a basi versus apicem deliiscens.

1. *C. lutetiana*, caule erecto; racemis pluribus; fol. ovatis subdentatis, ore hirsutis. S. *Oed. Dan.* t. 256.

Frequens in sylvis umbrosis æstate. 813.

2. *C. intermedia*, caule erecto subramoso; fol. ovato-cordatis acuminatis subrepandis dentatis, glabris summis sessilibus. S.

Cl. Schleicher invenit.

3. *C. alpina*, caule adscendente; racemis pluribus; fol. cordatis dentatis glabris. S. *Oed. Dan.* t. 210.

Ad arbores putridas, inque rupibus subalpinis et montosis. In adscensu montis *Nessi*, in M. *Enzeindaz*, *Schweizerhaken*, *Chasseral-le*, *Wasserfall* etc. 814.

(*Hallerus* semper plures racemos vidit, et in omnibus meis speciminibus plures sunt quam in *Lutetiana*.)

## D I G Y N I A.

16. ANTHOXANTUM. (*Ruchgras.*) G. pl. 58.

Cal. gluma 2-valvis, 1-flora; cor. 2-val-

vis: valvula utraque aristam e dorso inferiore emittente; antheræ utrinque bifurcatæ; sem: 1, utrinque acuminatum.

A. *adoratum*, spica oblonga ovato; flosculis subpedunculatis arista longioribus. L. Oed. Dan. t. 666. Schreb. t. 5, Leers t. 2. f. 1.

Ubique in Pratis et ad vias. 1491.

B. Var. spica laxiori, ramosa — in collibus et alpibus.

---

# Classis III.

## TRIANDRIA, MONOGYNIA.

---

17. VALERIANA. (*Baldrian.*) *G. pl. 60.*

Cal. o; cor. 1-petala, 5-fida, tubo a latere inferiori nectarifero, gibbo; sem. 1.

1. *V. rubra.* Flor: monandris caudatis; fol: lanceolatis integerrimis. L.

Seduni ad arcem *Tourbillon*; Neocomi *au dongeon du Chateau* etc. 213.

B. Fol. linearibus. — In Aditu scopulo-so, qua ex *Creux du vent* adscenditur, ad dextra. 213. B. Hæc est. *V. angustifolia.* Wild. qui separavit.

2. *V. dioica.* Flor. triandris dioicis; fol. pinnatis integerrimis. L. *Oed. Dan.* t. 687.

Ubique in pratis udis.

B. Foemina cum rudimentis staminum, foliis latioribus subrotundis non laciniatis, floribusque minimis pallidis.

In palustribus *Michelfeldensibus*; inter *Wittighofen* et *Deisswyl.* *Tobinii* in pratis udis. 208.

3. *V. officinalis*. Flor. triandris; fol. omnibus pinnatis. L. *Oed. Dan.* t. 570.

a. Fol. latioribus. — » Frequens in humidis.

b. Fol. angustioribus. — » Frequentior in sepibus, sylvis, locisque siccoribus. 210.

4. *V. tripteris*. Flor. triandris; fol. dentatis: radicalibus cordatis, caulinis ternatis ovato-oblongis. L. *Jacq. austr.* t. 268.

Minime rara in montanis et alpinis humilioribus scopolis, in M. *Wasserfall*, in montibus vallis *Emmiae* etc. Etiam in planicie, circa *Roche a la Praisse*, et in fossis viæ ducentis versus *Kevay*. 211.

5. *V. montana*. Flor. triandris; fol. ovato-oblongis subdentatis, caule simplici. L. *Jacq. austr.* t. 269.

Frequens in *Jura*, *Wasserfall* etc. In Alpibus Aquilejensibus, in *Gemmio*, in *Obergurnigel*. Circa *Waldnacht* et lacum *Trüblisee* etc. 212.

(Folia radicalia subrotunda; dein ovato-oblonga, tandem lanceolata.)

6. *V. celtica*. Flor. triandris; fol. ovato-oblongis obtusis integerrimis. L. *Clus. pann.* pag. 515.

In Valesiae alpibus, *Dome*, *le Grandloe* ad dextra lacus; in montibus vallis *D. Nicolai*,

abunde magis in Vallis prætoriæ herbosis, nigra  
in terra. In M. Scheinberg. 209.

(Folia obtusiuscula; caulina 2 linearia.)

7. *V. olitoria*. Flor. triandris; caule di-  
chotomo; fol. oblongis integerrimis; fructu  
simplici. *Wild.*

Vulgo in agris primo vere. 214.

(Var: fol: superioribus dentatis.)

8. *V. dentata*. Flor. triandris; caule di-  
chotomo: fol. serratis oblongis; semine tri-  
dentato. *Wild.*

In agris vergente æstate. 215.

(Var. fol. integris.)

18. POLYCNEMUM. (*Knorpelkraut.*) *G.*  
*pl. 72.*

Cal. 5-phyllus; cor. o; caps. membra-  
nacea; sem. r, reniforme, splendens.

*P. arvense*. L. *Jacq. austr.* t. 365.

Circa Branson, Orbe, Grandson, Concise,  
Morges, Bâsileæ in segetibus ante portam D.  
Johannis. Circa Oetlingen, ad Wiesam. 1570.

(Folia triquetra, subulata.)

19. CROCUS. (*Safran.*) *G. pl. 75.*

Cor. 6-partita, æqualis; antheræ sagit-  
tatæ; stigmata convoluta.

i. *C. autumnalis*, stigmatibus oblique

truncatis integris ; fol. linearibus margine revolutis. Schrank. Kerner. t. 12.

In arduis Vallis Augustæ haud procul a M. D. Bernhardi; in Pilato. 1257.

2. *C. vernus*, stigmate lobato ; fol. ensiformibus margine revolutis. Schrank. Kerner. t. 11.

*Albo* flore frequens in montanis et subalpinis. Descendit etiam in planitem, et provenit in *Prépourg* prope *Roche*, in pratis sub *Moutruz*.

*Flavo* flore, et stigmate longiore, in der *Schwendi* Abbatiscellanorum et in Mont. Glaronesibus. 1257.

## 20. GLADIOLUS. (*Siegwurz.*) G. pl. 77.

Cor. 1-petala, 6-fida, ringens ; laciniis oblongis : suprema et infima extra vel intra laterales ; stamina adscendentia.

*G. communis*. Fol. ensiformibus ; flor. distantibus. L.

In monte *Zurichberg* per agros. In prato inter *Burdigny* et *Thuiry*.

*Minor*, circa *Chur* et in montibus Abbatiscellanorum. 1261.

## 21. IRIS. (*Schwerdtlilie.*)' G. pl. 79.

Cor. 6-petala, inæqualis ; petalis alternis geniculato-patentibus. Stigmata petaliformia, staminibus incumbentia, bilabiata.

1. I. *germanica*, barbata; fol. ensiformibus glabris falcatis brevioribus scapo multifloro. L. *Bull.* t. 141. — .

In Helvetia vitifera ubique. Basileæ *an der Baar* ad Rhenum, ad arcem *Münchenstein*. In Aquilejensibus abunde in ruderibus *St. Triphon*, ad viam a *Glerole* ad *Vevay*, *a la Tour*, in rupestribus *Passgartflüh* prope Biennam etc. 1258.

2. I. *Pseud-Acorus*, imberbis; fol. ensiformibus; petalis alternis stigmate minoribus. L. *Oed. Dan.* t. 494.

In omnibus fossis aquosis. 1260.

3. I. *sibirica*, imberbis; fol. linearibus; scapo subtrifloro tereti; germinibus trigonis. L. *Jacq. austr.* t. 3.

Rara: *Michelfeldæ*. 1259.

22. SCHOENUS. (*Knopfgras.*) G. pl. 92.

Glumæ paleaceæ univalves congestæ; Cor. o; sem: 1, subrotundum inter glumas.

1. S. *Mariscus*, culmo tereti; fol. margine dorsoque aculeatis. L. *Scheuchz.* p. 375. t. 8. f. 7. — ».

Circa Lacum Felinum. Abunde in humidis inter *Vervay* et *le Turet* haud longe *Roche*. In lacu Neocomensi prope *Grandson*. 1343.

2. S. *nigricans*, culmo tereti nudo; capi-

tulo ovato; involuci diphylli valvula altera subulata longa. L. *Scheuchz.* pag. 349. t. 7. f. 12. 13. 14.

Vulgo in udis: *in der Eymatte*, circa *Seedorf*, *Vervay* etc. Copiose ad Lacus *Felini* ripani orientalem. Junio floret. In *Pilato* etc. 1347.

3. *S. ferrugineus*, culmo tereti nudo; spicam æquante. L.

*Schleicher* invenit in torfaceis.

4. *S. fuscus*, culmo tereti folioso; spiculis subfasciculatis; fol: filiformibus canaliculatis. L.

*Schleicher* invenit prope *Locarno*.

5. *S. compressus*, culmo subtriquetro nudo; spica disticha, involucro monophyllo. L. *Leers.* t. 1. f. 1.

Bernæ in palude inter utrumque balneum *Anzihlianum*, in insula *Hunzikerau*. In pratis circa *Noville*. Ad Rhenum circa *Crenzach*, ad rivum *Birsig*. Circa *Tigurum*. Etiam in Alpibus, *Fouly*, *Gotthard*. 1342.

6. *S. albus*, culmo subtriquetro folioso; fol. canaliculatis carinatis subulatis; flor. fasciculatis. *Roth. Oed. Dan.* t. 320. *Scheuchz.* p. 503. t. XI. f. 11.

Passim in torfaceis: circa *Seedorf*, im *Löhr*,

prope *Vervay*. A la *Brevine*; frequens circa Lacum *Felinum* autumno. 1341.

(Flores juniores albi, per ætatem fulvi ant rubelli.)

### 23. CYPERUS. (*Cypergras.*) G. pl. 93.

Glumæ paleaceæ distichæ imbricatæ; se-men 1, triquetrum, acuminatum, nudum.  
 1. *C. longus*, culmo triquetro folioso; umbella foliosa supradecomposita; pedunc: nndis; spicis alternis. L. *Scheuchz.* pag. 378. t. 8. f. 12.

Circa *Chiavennam* inventum misit Cl. *Schleicher.*

2. *C. flavescens*, culmo triquetro nudo; umbella triphylla; pedunc: simplicibus; inæqualibus; spicis confertis lanceolatis. L. *Schk.* t. 7.

Vulgo in aquosis, ad vias et fossas. 1348.

B. Minor, *Scheuchz. Gram.* p. 386. t. 9. f. 13. florent Julio et Augusto.

3. *C. fuscus*, culmo triquetro nudo, umbella trifida, pedunc. simplicibus inæqualibus; spicis confertis linearibus. L. *Oed. Dan.* t. 179.

Etiam in udis, sed aliquanto rarior. Ad viam *Worbensem*, aux *Grangettes*; *Seewæ Solodurensium*. Aux *Convers*, a *Nodz*. Mi-

*chelfeldæ*, *Friedlingæ*, ad *Birsam* et *Birsig*.  
Ad' *Lacum Felinum* Julio floret. 1349.

(Differt a precedente : culmo vere triquetro et crassiore, panicula ramosiore, squamis minoribus et acutioribus.)

24. SCIRPUS. (*Binsengras.*) G. pl. 94.

Spica undique imbricata squamis ovatis plano-inflexis; sem. 1, triquetrum, acuminatum, subnudum.

*Spica unica.*

1. *S. palustris*, culmo tereti nudo; spica subovata terminali. L. *Oed. Dan.* t. 273. *Leers.* t. 1. f. 3.

Vulgo in palustribus. 1336. Fl. Junio.

(Setæ 3-4 e basi seminis.)

2. *S. ovatus*, culmo compresso nudo; spica ovata nuda terminali. S. *Roth.*

(Hunc in pratis udis circa *Bellinzonam* inventum misit *Schleicher*; sed a priori vere differre non credo. Squamas habet rufo-spadiceas ora alba, spicam rotundiorem, et erit varietas, cuius *Hallerus* meminit, quamque ad *S. capitatum* spectare credebat. Diversus tamen credi debet ob flores diandros.)

3. *S. caespitosus*, culmo striato nudo; spica bivalvi terminali longitudine calycis; radicibus

cibus squamula interstinctis. L. Scheuchz.  
p. 563. t. 7. f. 18.

In Alpium humidis floret Jul. et Aug. v. gr.  
in udis circa pedem Montis Forcletaz, aux Bar-  
mes, in Fouly etc. 1334.

4. *S. Boeothryon*, culmo tereti striato nudo  
basi vaginato: vagina truncata; spica ter-  
minali pauciflora bivalvi: valvulis ovatis  
spica brevioribus, margine scariosis: exte-  
riore breviore. Ehrh. Oed. Dan. t. 167.  
Scheuchz. p. 566. t. 7. f. 21.

In Alpibus et udis circa Lacum Felinum. In  
villa Bodenaker in sabulosis fossis ad sinistra; in  
viis humidis iusulæ Hunzikerau; in Gotthardø  
etc. 1335

5. *S. acicularis*, culmo tereti nudo seti-  
formi; spica ovata bivalvi; seminibus nudis.  
L. Oed. Dan. t. 287.

Magna copia ad stagnum supra pagum Herz-  
zogenbuchsee; tum ad Lacum Lemanum prope  
les Grangettes, et circa Basileam; in fundo  
piscinæ prope klein Riechen. Circa Lacum Fe-  
linum; circa Spietz ad lacum etc. 1346.

6. *S. campestris*, culmo striato nudo;  
spica terminali calycem bivalvem vix supe-  
rante; glumis calycinis oblongis apice mem-

branaceis obtusis æqualibus. *Roth. Catal. bot.* I. 5. *Scheuchz.* pag. 364. t. 7. f. 19.

In paludosis et Alpibus.

*Culmo tereti polystachyo.*

7. *S. lacustris*, culmo tereti nudo; spicis ovatis pluribus pedunculatis terminalibus. L.

Frequens in lacubus et aquis stagnantibus.  
1337.

(*Panicula lateralis*, setæ 5-6 ad basin semi-nis. Floret Jun. Jul.)

8. *S. setaceus*, culmo nudo setaceo; spicis lateralibus subsolitariis sessilibus pedunculatisque. *Roth. Leers.* t. 1. f. 6. *Oed. Dan.* t. 311.

In sylva Urhan. Basileæ prope Neuhaus,  
in sylva Wyleni, die Hard ad Wiesam. 1345.

*Schleicher* misit.

Spicæ 1-3 foliolo longiore instruetæ, semen nudum.

*S. Halleri* 1344 nonnisi varietas altior est,  
aux *Grangettes* in fossis.)

*Culmo triquetro; panicula nuda.*

9. *S. triquierter*, culmo triquetro nudo;  
spicis subsessilibus pedunculatisque mucronem æquantibus. L.

Prope Chessel inventum misit *Schleicher*.

10. *S. mucronatus*, culmo triangulo nudo

acuminato ; spicis conglomeratis sessilibus lateralibus. L. Scheuchz. Gram. pag. 404. t. 9. f. 14.

Circa *Moville* in *sylvis udis*, circa *Vervay*, versus *le Furet*, et in insulis ad cives *de la Tour* pertinentibus. Basileæ versus Rhenum inter *Neudorf* et *Huningen*, et versus *Binzen*. 1338.

( Miror *Hallerum Scheuchzeri* plantam repudiassse, qui eam habet locis paludosis et udis circa *Tigurum*, speciatim in udis promontorii *das Horn*, circa monasterium *Rüti*, et in pratis udis *Linthæ* fluvio adjacentibus, per quæ *Vesenum* oppidum aditur.

Mucro floribus multo longior.)

*Culmo triquetro, panicula foliacea.*

11. *S. maritimus*, culmo triquetro, panicula conglobata foliacea ; spicularum squamis trifidis : intermedia subulata. L. Scheuchz. pag. 398 et 400. t. 9. f. 7-10.

( *Michelfeldae*; circa *Roche*. 1339.)

12. *S. sylvaticus*, culmo triquetro folioso ; umbella foliacea ; pedunculi nudis supradecompositis ; spicis confertis. L. Leers. t. 2 f. 4. *Oed. Dan.* t. 307.

Frequens in pratorum et sylvarum udis, Mayo et Junio. 1340.

( Setæ 3 - 4.)

13. *S. annuus*, culmo triquetro nudo ; fol. linearibns ; umbella diphylla ; pedunc : nudis ; spicis solitariis : media subsessili, lateralibus pedunculatis. *S.*

*Allioni.* Ped. 2371. t. 88. f. 5.

In Helvetia transalpinia inventum misit. Cl. Schleicher. (Est *S. dichotomus*. Willd.)

25. ERIOPHORUM (*Dungras.*) G. pl. 95.

Spica undique imbricata : squamis ovato-oblongis, laxis, membranaceis; semen triquetrum acuminatum, villis spica longioribus instructum.

1. *E. vaginatum*, culmis vaginatis teretibus; spica scariosa. L. Oed. Dan. t. 236.

In torfaceis Löhr prope Bernam, et prope Herrenschwanden. In M. Wasserfalle; à la Chaux d'Abelle. Copiose circa Lacum Felinum Aprilis fine et Majo etc. 1332.

B. var : minor, spica latiori et rotundiori -- Scheuchz. Gram. pag. 304. Prodr. t. VII.

In summarum Alpium pascuis palustribus -- e. g. in Enzeindaz, Gotthardo, Scheidek, Fouilly, St. Bernhard etc. 1332.

(*E. capitatum* Hofm. Germ. III.)

2. *E. polystachion*, culmis teretibus; fol.

planis; spicis pedunculatis. L. Leers. t. 1.  
fig. 5.

In omnibus fere pratis humidis et uliginosis.  
April et Majo. 1331.

B. var. *angustifolia*, pappo rariore « -in uli-  
ginosis circa Lacum *Felinum* « Scheuchz. Gram.  
pag. 308 « erit.

3. *E. angustifolium* » culmis teretibus, sol.  
canaliculato-triquetris, spicis pedunculatis »  
Roth » —

Inventum aux. Mosses a Schleicher, cum  
*Scheuchzerus* jam *folia canaliculi in modum*  
*excavata* dixisset « l. c.

4. *E. alpinum*, culnis nudis triquetris;  
spica pappo breviore. L. Oed. Dan. t. 620.

In udis vallis *Grindelwald*. In Aquilejensi-  
bus Alpibus, in *Gemmio*, *Pilato*. In pratis  
paludosis montis *Hirzel*. Aux marais de l'*Eche-lette*, aux *Pontins*, à l'*Anvers de Renan*; in  
*M. Pouilleret*; prope *Spiez* in torfacea palude  
etc. 1333.

## 26. NARDUS. (*Borstengras.*) G. pl. 97.

Cal. o; cor. 2-valvis: valvula interiore  
minore; sem. 1, utrinque acuminatum,  
superne angustius.

N. *stricta*, spica setacea recta secunda. L.  
Schreb. tab. 7. Scheuchz. pag. 90. tab. 2. f. 10.

In Mont. Neunenen, Gemmio, Tombey, Fouly, Iavernaz, aliisque alpibus frequens; imo in aggeribus urbis Tiguri. 1410.

(Ab Alpicolis Suitensibus *Nätsch* vocatur.  
*Scheuchz.* l. c.)

## DIGYNIA

### A. Flores uniflori vagi.

27. PHALARIS. (*Glanzgras.*) G. pl. 106.

Cal. duplex uniflorus; exterior compres-  
sus carinatus, interior lanceolatus pubes-  
cens; sem. 1, acuminatum, glabrum, co-  
rollæ adnatum.

1. *P. phleoides*, panicula cylindrica spiciformi glabra, passim vivipara. L. *Oed. Dan.* t. 531.

Locis herbosis siccis et in agris Majo et Iu-  
nio frequens. 1531.

2. *P. utriculata*, panicula spicata; petalis  
arista articulata, vagina supremi folii spa-  
thiformi. L.

*Schleicher* invenit, in Valle Tellina.

3. *P. arundinacea*, panicula oblonga ven-  
tricosa ampla. L. *Leers.* t. 7. f. 3. *Oed. Dan.*  
t. 259.

In aquosis, ad fossas, circa *Tigurum*, *Seelhofen*, *Michelfelden*, etc. Majo, Junio. 1524.

4. *P. oryzoides*, panicula effusa; glumam  
rum carinis ciliatis. L. Schreb. t. 22.

In rivulo versus *Hiltelingen* et *Alschwyler*, ad  
fossam juxta pratum *Sclopetariorum*; *Friedlingæ*  
et circa *klein Riechen*. Inter *Spiez* et *Wyler* in  
palustribus; etiam monente *Schleicher* circa  
*Roche ad fossas*. 1411. (*Leersia oryzoides*. Willd.)

28. PANICUM. (*Fennich.*) G. pl. 108.

Cal. bivalvis, valvulis nervosis, exteriore  
minima; cor. altera hermaphrodita, altera  
mascula S. neutra.

1. *P. verticillatum*, spica verticillata; ra-  
cemeulis quaternis; involucellis unifloris bi-  
setis; culmis diffusis. L.

In agris et inter stipulas exeunte æstate. 1543.

2. *P. glaucum*, spica tereti; involucellis  
bifloris fasciculato-pilosis; semin. undulato-  
rugosis. L. Schreb. t. 25. *Leers.* t. 2. f. 2.

Inter *St. Blaise* et *Neufchatel* etc. 1542.

(*Hallerus* cum sequente conjugere videtur.)

3. *P. viride*, spica tereti; involucellis bi-  
floris fasciculato-pilosis; semin. nervosiss. L.  
*Leers.* tab. 2. f. 2.

Locis siccis et inter fruges Junio et Julio fre-  
quens. *Scheuchz.* Gram. pag. 46. t. 2. f. 2.

4. *P. Crus galli*, spicis alternis conjugatis-

que, spiculis subdivisis, glumis aristatis hispidis, rachi quinquangulari. L. Leers. t. 2. f. 3.

Locis præcipue pinguibus, circa simeta, per totam æstatem floret. Etiam ad fossas, ut aux Grangettes ad oram Lacus Lemani. 1544.

B. var. glumis longius aristatis.

5. P. *hirtellum*, spica composita: spiculis adpressis alternis, calyc. geminis; valvulis omnibus aristatis, extima longissima. L.

In umbrosis circa Locarno inventum misit Cl. Schleicher.

(Caulis repens pilosus; folia lanceolata, undulata subhirsuta.)

6. P. *sanguinale*, spicis digitatis, basi interiore nodosis; flosculis geminis muticis; vaginis foliorum punctatis. L. Schreb. tab. 16. Leers. t. 2. f. 6.

Frequens in hortorum domuumque areis per omnem æstatem. 1526.

B. var. *esculenta*, quæ non nisi culmis paulo firmioribus et crassioribus spicisque pluribus 9-12 differt invenitur circa Giornico vallis Leontiniæ.

c. Habeo et var. a Schleichero missam vaginis foliisque glabris.

7. P. *dactylon*, spicis digitatis patentibus, basi interiore villosis; flor. solitariis; sarmenitatis repentibus. L. Monti. ic. 99.

In arenosis ad Rhenum, et littoribus lacus Lemani, v. gr. aux *Grangettes*; etiam in declivitate exteriore fossæ aquosæ Tiguri minoris Aug. et Sept. frequens est etc. 1527.

29. PHLEUM. (*Lieschgras*) G. pl. 109.

Cal. 2-valvis linearis truncatus, apice bicorni dehiscens; cor. inclusa.

1. *P. pratense*, spica cylindrica longissima ciliata; culmo erecto. L. Schreb. t. 14. Leers. t. 3. f. 1.

Ubique in humidis pratis.

B. var. major calyc. longius cornutis circa Horgen, in agris. 1528.

2. *P. alpinum*, spica ovata cylindracea. L. Oed. Dan. t. 213. Scheuchz. Gram. p. 64. Prodr. t. 3.

In omnibus Alpibus frequens. 1529.

3. *P. nodosum*, spica cylindrica; culmo adscendente; fol. obliquis; radice bulbosa. L. Leers. t. 3. f. 2. Oed. Dan. t. 380. Leers. t. 3. f. 2.

Ubique in pratis, oris viarum et siccis. 1530.

4. *P. asperum*, spica cylindrica densissima; culmo recto; calyc. brevissime mucronatis. S. Villars Delph. t. 2. f. 4.

Frequens in agris et siccis Majo, Jun. 1531.

(*Spica lœvis, sed folia reliquis asperiora. Est Phalaris aspera Willd.*)

5, *P. hirsutum*, *spica cylindrica hirsuta laxiori; calyc. lanceolatis, cornubus hirsutis.*  
*S. Barrel. ic. 21. No. II.*

*In pratis montanis et alpinis. In M. Tschiera aliisque Rhæticis alpibus. In pratis supra Ilfingen; au Creux du Vent; in Valle Bagne. 1532.*  
*(Est P. Michelii. Allion. Ped. 2138.)*

30. ALOPECURUS. (*Fuchsschwanz.*) G.  
*pl. 102.*

*Cal. 2-valvis, valvulis concavis æqualibus;*  
*Cor. 1-valvis, marginibus basi coadunatis,*  
*calyce paulo brevior.*

1. *A. pratensis*, *culmo spicato erecto; glumis villosis; coroll. muticis.* L. Schreb. t. 19.  
*f. 1. Leers. t. 2. f. 4.*

Basileæ. *In pratis montis Juræ: a la Brevine,*  
*au Mont de Suze, aux Esplatures, près du Mou-*  
*lin de la Chaux de fonds.* 1539.

2. *A. agrestis*, *culmo spicato erecto; glu-*  
*mis lœvibus.* L. Schreb. t. 19. f. 2. Leers. t.  
*2. f. 5.*

*Passim in agris. v. g. circa Tigurum, Tobinium,*  
*inter pont de Thiele et Neufchâtel etc.* 1540.

3. *A. geniculatus*, *culmo spicato infracto;*

corollis muticis. L. *Leers.* t. 2. f. 7. *Oed.*  
*Dan.* t. 861.

Frequens in fossis aquosis. 1541.

31. MILIUM. (*Hirsegras.*) *G. pl.* 110.

Cal. 2-valvis, uniflorus : valvulis subæqualibus acuminatis ; cor. brevissima ; stigma penicilliformia.

1. *M. effusum*, flor. paniculatis dispersis muticis. L. *Leers.* t. 8. 7. *Fl. Dan.* t. 1142.

Abunde in sylvis Junio, Julio etc. 1525.

2. *M. confertum*, flor. paniculatis conser-tis. L.

Copiose in præcipitibus sylvis montis *Tschiera*, Rhætorum. 1525. B.

32. AGROSTIS. (*Straußgras.*) *G. pl.* 111.

Cal. 2-valvis uniflorus, corolla paullo mi-nor ; antheræ furcatæ ; stigmata longitudi-naliter hispida.

a. *Aristatae.*

1. *A. Spica venti*, petalo exteriore arista recta stricta longissima ; panicula patula. L. *Leers.* t. 4. f. 1. *Fl. Dan.* t. 853.

In agris Helvetiæ calidioris. etc. 1480.

b. Varietatem insignem habeo a *Schleicher* missam, culmo vix spithamali, panicula rara laterali incurva.

2. *A. interrupta*, petalo exteriore aristato; panicula attenuata coarctata interrupta. L.

*Hallero* est var. præcedentis.

3. *A. arundinacea*, panicula oblonga; petalo exteriore basi villoso, aristaque torta calyce longiore. L.

Sub arcibus *Farnsburg* et *Wallenburg*; in Mont *Dansex*. *Bernæ*. Frequens in clivo septentrionali Montis *Uetliberg*, speciatim circa arcem *Mannegg*, et in sylvosis ad *Silam* Jul. et Aug. 1522.

4. *A. Calamagrostis*, panicula incrassata; petalo exteriore toto lanato apice aristato; culmo ramoso. L. *Scheuchz*. p. 146. t. 3. f. 11.

Abunde in Agro Aquilejensi ad rupes, cis aditum cunicolorum *des fondemens*, supra torrentem *Gryonne*, ad viam inter *Olon* et *Aigle* quæ dicitur *le Tombay*, supra *Yvorne*, et au Mont *d'Arvel*. Ad Littus arduum Rheni posterioris, sere e regione castri *Räzuns*, ad viam, quæ dicit ad balnea *Fontis rubri*. 1521.

5. *A. serotina*, panicula flosculis oblongis mucronatis; culmo obtecto foliis brevissimis. L.

Ad rupes calidas Valesiæ repertam misit *Schleicher*.

(Folia brevia patentia alterna; paniculæ rami alterni.)

6. *A. rubra*, paniculæ parte florente pa-

tentissima ; petalo exteriore glabro , arista terminali tortili recurva. L.

A la Joux verte Aquilejensium ; in scopulis montis Nombrieux , supra les Plans. 1523. 3.

7. A. *canina* , calyc. elongatis ; petalorum arista dorsali recurva ; culmis prostratis subramosis. L. Leers t. 4. f. 2.

Abunde in pratis humidis inter Villeneuve et Perausaz , circa Lacum Felinum et alibi copiose.

1479.

8. A. *alpina* , fol. setaceis ; panicula coarcta- ta ; calyc. hispidiusculis coloratis ; petali exterioris arista dorsali articulata recurva corollæ æquali. S. Scheuchz. Gram. p. 140. Prodr. t. IV. Scop. Carn. 86.

In siccioribus Alpium pratis ; v. g. in Valle ursaria , Mont. Speluga , Gotthard , Taveyanaz , St. Bernhard , etc. 1477.

9. A. *rupestris* , fol. setaceis ; panicula laxa ; calyc. exasperatis ; arista dorsali articulata recurva flore duplo longiori. S. Allioni. Ped. 2161.

In siccis et apricis Alpium montiumque ; in Fouly , Prapioz , Gotthardo , Stok. 1478.

10. A. *vinealis* , calyc. coloratis ; petalo- rum arista dorsali longitudine fere calycis ; culmis adscedentibus. Schreb. Hofm. Germ. p. 25.

Frequens circa *Tigurum* in viis vinearum. 1481.

11. *A. gigantea*, paniculæ parte superiore prius florente, patentissima, calycib. hispidis; petalo exteriore glabro, dorso superne subaristato; culmo erecto. *Roth. Germ.*

In sylvis montanis *Schleicher* invenit.

(*Solani* varietatem præcedentis, e loco natali ortam, credit. Cl. *Willd.*)

### b. *Muticae.*

12. *A. stolonifera*, paniculæ ramulis patentibus muticis; culmo repente; calyc. æqualibus. L.

Abunde ad vias. 1473.

13. *A. hispida*, ramis paniculæ patentis verticillatis; calyc. æqualibus hispidiusculis; flosculis muticis. *Willd. Oed. Dan.* t. 163.

*Leers.* t. 4. f. 3.

In pratis, arvis, etiam in montosis circa. *Tigurum*, et in muris circa *templum aquaticum*. 1475.

14. *A. alba*, panicula coarctato-patula mutica; calyc. æqualibus dorso serratis corolla majoribus. *Hofm. Germ. III. Leers.* t. 4. f. 5.

In humidis et Alpium uidis.

(*Hallero* est præcedentis varietas.)

15. *A. pumila*, panicula mutica secunda; culmis fasciculatis erectis. L.

In paludosis circa Lacum *Felinum* Majo et Junio floret. 1474.

(Minima folia setacea glabra striata; panicula laxa pauciflora.)

16. *A. minima*, panicula mutica filiformi, flor. alternis, fol. setaceis. S. Scheuchz. Gram. p. 40. t. 1. f. 7.

Schleicher invenit.

### 33. DACTYLIS. (*Knaulgras.*) G. pl. 117.

Cal. 2-valvis multiflorus: valvulis concavis carinatis: altero latere convexis latioribus semiovatis, altero angustis; interiore majore.

*D. glomerata*, panicula secunda glomerata L. Schreb. t. 8. f. 1. Leers. t. 3. f. 3.

Ubique in pratis et ad vias. 1512.

### 34. STIPA. (*Pfriemengras.*) G. pl. 121.

Cal. 2-valvis uniflorus; cor. valvula exteriore arista terminali tortili longissima, basi articulata.

1. *S. pennata*, aristis lanatis. L. Barrel. ic. 45.

Abunde circa Roche: St. Maurice etc. In Rhætia monte Scaletta. 1514.

2. *S. juncea*, aristis nudis rectis; calycibus semine longioribus; soliis intus lœvibus. L.

(Hallerus cum sequenti conjungit.)

3. *S. capillata*, aristis nudis curvatis, calyc. semine longioribus; sol. intus pubescentibus. L.

Ad vias Valesiæ; circa Sedunum, et in muris sub Moutru. Copiose in petra, pago Fontis Rubri in Rhætia adjacente, Jul. et Aug. 1513.

B. *Flores biflori vagi.*

35. AIRA. (*Schimellen.*) G. pl. 112.

Cal. 2-florus, 2-valvis, valvulis æqualibus; flosculi absque interjecto rudimento.

a. *Muticae.*

1. A. *aquatica*, panicula patente; flor. multicis lævibus calyce longioribus; fol. planis. L.

Vulgo in fossis; e. g. Bernæ in vallecula Marsiliæ; infra Michelfelden. 1471.

(*Flores calyce vix longiores.*)

b. *Aristatae.*

2. A. *subspicata*, fol. planis; panicula spicata; flosculis medio aristatis: arista reflexa longiore. L. Oed. Dan. t. 228. Scheuchz. Prodr. t. 6.

In summis Alpibus. Au Chalet dessus, ad dextra montis St. Bernhard; in montibus du Val de Trient et supra Bagnes. Rara. 1490.

(Culmus trientalis, dodratalis, sub panicula denso brevique tomento villosus; folia mollia plerumque tria; panicula densa; calycis glumæ violaceæ apice aureo. Spica adulta, qualem habeo a Schleicher missam, tota auro resulget.)

3. A. *caespitosa*, fol. planis; panicula patente; petalis basi villosis aristatisque: arista

recta brevi. L. *Oed.* *Dan.* t. 240. *Leers.* t. 4. f. 8. *Scheuchz.* *Gram.* p. 244. t. 5. f. 2. 3.

In pratis, arvis, nemoribus, sylvis, et uidis per totam aëstatem floret. 1487.

5. *A. montana*, fol. setaceis; panicula angustata; flosculis basi pilosis aristatis: arista tortili longiore. L. *Leers.* t. 5. f. 2. *Scheuchz.* *Gram.* p. 216. *Prodr.* t. 4.

Ubique in alpinis et subalpinis, supra *Wazen*; in mont. *Bernhardino*, *Gemmio*, *Enzeindaz*, *Javernaz* etc. 1486.

(*A. alpinam* ab hac vere differre dubito, cuius arista etiam tortilis est, monente *Scheuchzero*, et mecum sentit *Gesnerus* in Not. Mscrptis.)

6. *A. flexuosa*, fol. setaceis; culmis subnudis; panicula divaricata; pedunc. flexuosis. L. *Leers.* t. 5. f. 1. *Oed.* *Dan.* t. 157. *Scheuchz.* *Gram.* p. 218. *Prodr.* t. 6.

In sylvosis Alpium radicibus, et copiose circa Basileam in querceto *Michelfeldensi*. 1486. B.

(*Hallerus* non nisi varietatem *adultam* praecedentis credit.)

7. *A. canescens*, fol. setaceis, summo spathaceo paniculam inferne involvente. L. *Fl.* *Dan.* t. 1023. *Scheuchz.* p. 242. t. 4. f. 29. 50.

C, B. in mœniis Basileensibus. 1483

(Arista in medio cineta denticulis, infra cras-

sior fusca, supra tenuior subclavata albida. L.)  
Schleicher etiam invenit.

8. *A. caryophyllea*, fol. setaceis; panicula  
divaricata; flor. aristatis distantibus. L. *Oed.*  
*Dan.* t. 382. *Barrel.* ic. 44. n. 1. *Scheuchz.*  
t. 4. f. 15.

In siccioribus Alpium pascuis. Inter *Bocca d'Adda*  
vallis *Tellinæ* et *Morbegno*. Basileæ ad *Birsam*  
et *Birsig* fl. auf dem *Birsfeld*, versus *Haltlingen*,  
ad *Wiesam*. 1482.

9. *A. Valesiaca*, fol. setaceis convolutis;  
culmo subnudo; panicula densa spicata viridi-argentea;  
calyc. glabris; flor. villosis. S.

Ad margines agrorum Valesiæ inferioris. 1445.

### 36. MELICA. (*Perlgras.*) G. pl. 113.

Cal. 2-valvis, 2-florus; corpusculum inter flosculos turbinatum, pedicellatum; antheræ utrinque bifurcatæ; sem. 1, ovatum, altero latere sulcatum.

1. *M. ciliata*, flosculi inferioris petalo exteriore ciliato. L. *Scheuchz. Gram.* p. 174. t. 3. f. 16. Et J. J. *Scheuchz. It. Alp.* p. 37. t. 4. f. 1.

In muris circa *Roche, Aigle*; in Valesia; *Biennae*; *Badae* ante portam novæ arcis; *Alt-dorf* etc. 1517.

(Etiam in montosis.)

2. *M. nutans*, petalis imberibus ; panicula nutante simplici. L. Schreb. t. 6. f. 2. Scheuchz. Gram. p. 171. 3. f. 16.

Vulgo in montibus et umbrosis Maj. Jul. floret. 1472.

3. *M. uniflora*, panicula rara ; calyc. 2-floris ; flosculo altero hermaphrodito , altero neutro. Retz. Obs. Fl. Dan. t. 1144.

Jisdem locis vulgaris.

(Hallerus a præcedenti non separare videtur,  
et Cl. Willd. Scheuchzeri plantam ad hanc citat.)

4. *M. cærulea*, panicula coarctata ; flor. cylindricis. L. Oed. Dan. t. 239. Leers. t. 4. f. 7.

Frequens in paludosis, torfaceis circa Seedorf,  
Vervay etc. Prope Neuhaus, in sylva Wyleni  
et Wasserfall ; in pratis sterilioribus udis et Al-  
pibus. 1518. B.

b. *major*, panicula ampliore. Scheuchz.  
p. 207. t. 4. f. 11. 12.

In sylvosis; circa Roche, ad Lacum Lemanum;  
in pratis circa Aigle, Tobinium etc. (Riedtgras  
nostratis.) etc. 1518.

c. panicula longissima, in montium Uet-  
liaci et Albii sylvosis culminibus.

Omnes autumno florent, similes omnes ex-  
cepta statura. Culmus fere enodis ; flos plerum-  
que unicus ; si duo, tunc alter pedunculatus,  
auterque viridis, aut violaceus, si adultior est.)

*C. Flores multiflori vagi.*

37. POA. (*Rispengras.*) G. pl. 114.

Cal. 2-valvis, multiflorus; spicula ovata: valvulis margine scariosis acutiusculis.

1. *P. aquatica*, panicula diffusa; spiculis 6-floris linearibus. L. Leers. t. 5. p. 5. *Fl. Dan.* t. 920.

In fossis circa Biennam et Ebrodunum; circa Crenzach et Michelfelden; infra Neüdorf. Copiose in Broja, inter Lacus Moratensem et Neocastrensem, fl. Maj. Jun. 1454.

(Culmus 6-pedalis; folia latissima; panicula pedalis ramosissima; spiculæ 6-8 floræ spadiceo-virides.)

2. *P. alpina*, culmo debili; panicula densa diffusa; spiculis 4-8 floris coloratis; calycis glumis æqualibus, floralium dorso sericeo. S. Scheuchz. Gram. p. 186. Prodr. t. 3.

Vulgo in Alpinis et montosis etc. 1456.

b. *Vivipara*, Scheuchz. Gram. p. 212. t. 4. f. 14..

Jisdem locis frequens. 1456. B.

c. *Minor*, culmo dodrantali purpurascente; fol. perangustis; panicula laxa patente; calycis valvula altera angustiore; flor. ex spadiceo-viridi-argenteo variegatis. Scheuchz. Gram. p. 190. Prodr. p. 20. t. 3.

In Alpium pratis altioribus, v. g. in *Rothenhorn*, *Sulz*, *Glütschegg*, *Hohrein*, supra vallem *Kienthal* etc. 1456. g.

3. *P. laxa*, panicula contracta subracemosæ; spiculis trifloris, basi dorsoque pubescentibus. *W. Scheuchz.* agrost. p. 163. *Prodr.* p. 19. t. 4. *Jt. Alpin.* p. 457. t. 6. f. 16.

In pratis altioribus alpium. v. g. in summo *Bernhardino* et ad fontes *Rheni* posterioris. Etiam ex summis Alpibus misit *Schleicher.* 1457.

(Culmus semipedalis 1-2. foliis instructus, ad radicem vero foliosus, in matura planta purpurascens. Panicula, ex ejus geniculo supremo orta, rara; glumæ corollæ fusco-violaceæ, apice et margine membranaceo albo diaphano; stamina flava; pedunculi in matura planta violacei. Elegantissimum gramen.)

4. *P. trivialis*, panicula ramosissima diffusa: pedunculis 3-4 coalitis verticillatis; spiculis subtrifloris basi pubescentibus; vaginis foliisque subtus scabris. *S. Leers.* t. 6. f. 5.

Ubique in pratis et siccis.

(Est *P. scabra* *Ehrh.* et *dubia* *Leers.* *Hallerus* ab *annua* non separat 1466. *S. variat* panicula viridi et subviolacea.)

5. *P. Halleri*, panicula diffusa; spiculis subquinquefloris; glumis calycinis acutis,

floralibus obtusiusculis basi et longitudine villosis; culmo debili adscendente. S.

In monte *Fouly*, circa les *Plans* etc. 1458.

Plantam hanc et sequentem non vidi; cum omnes nostras Poas tamen comparassem, ab omnibus diversissimam inveni. Hujus flos est ex viridi spadiceo et aureo varius.)

6. *P. juncea*, panicula stricta pauciflora; spiculis subquinquefloris basi hirsutis; culmo duro erecto. S.

In Alpibus Valesiæ superioris; circa *Praborgne*; in monte *Taveyannaz*. 1459.

(Culmi pedales, cubitales, pene lignescentes quando emarcuerunt. Panicula inelegans, disticha, ut non alia magis pauciflora sit. Calyx gluma alterna floralibus major. Flosculi virides, mucrone albo obtusiori, 4-6; gluma exterior basi hirsuta. Violaceus color calyci florique admistus, sed absque splendore, Hall.)

7. *P. angustifolia*, panicula densa diffusa; spiculis subquinquefloris viridi-spadiceis, nervo et basi hirsutis; culmo lœvi erecto; ligula truncata. S. Leers. t. 6. f. 3.

Ad vias; copiose vero in aggere extimo portus Armamentarii Tigurini navalis, quod *der Schiffsschopf* appellatur, Majo et Junio. Scheuchz Gram. p. 183. t. 3. f. 17. C. 1460.

(Culmi 2-3 pedales; folia valde angusta, in culmo latiora. *Hallerus Scheuchzeri* synonymon *P. pratensi* addit.)

8. *P. setacea*, panicula subdiffusa; spiculæ subtrifloris; culmo erecto lævi; ligula truncata; foliæ omnibus setaceis, radicalibus longissimis. *Dicks. H. sicc. 14. 4. Hofm. Germ. III. pag. 44. Scheuchz. Gram. p. 178. t. 3. f. 17. B.*

In omnibus pratis, in siccis et lapidosis. 1490.

Culmus 2-3 pedalis, folia angustissima, convoluta, ut setacea videantur. Panicula 3-4-uncialis; spiculæ frequenter 3, raris albisque pilis hirsutæ in basi et nervo.)

9. *P. strigosa*, panicula coarctata diffusa; spiculis ovatis subtrifloris; culmo erecto lævi; foliæ angustis cæspitosis. *Hofm. Germ. III. p. 44.*

In monte *Fouly*, aux *Plans* etc. 1464.

(Culmi pedales sesquipedales; folia radicalia angustissima convoluta; spiculæ virides aut viridi-spadiceæ apicibus albis vel fuscis; radices reptantes stoloniferæ, ut in præcedenti.

Hæ tres modo dictæ species ad *P. angustifoliam Linnaei* pertinent. Separavi, secutus Clarris. *Hofmannum*. Plures adhuc addere possem *angustifoliae* varietates, circa patriam *Tobinium* lectas, ubi totius Helvetiæ prata pinguissima sunt; sed hæc sufficient.)

10. *P. pratensis*, panicula diffusa; spiculis 2-3-floris alternis glabris minimis; culmo erecto tereti. S. Leers. t. 6. f. 4. Scheuchz. Gram. 177. t. 3. f. 17. A.

In omnibus pratis, Majo et Junio. 1465.

(Culmi 2-3-pedales, absque stolonibus.)

11. *P. gregalis*, panicula diffusissima; spiculis trifloris basi villosis; culmo ad terram infracto. S.

In pratis ubique; optimum pabulum, inde nomen imposui. 1462,

(Differt a praecedente, quacum autores confundunt, radice reptante stolonifera, culmo altiori infracto; spiculis plerumque viridibus villosis, et duriore habitu.)

12. *P. trinervata*, panicula diffusa; spiculis subquinquefloris basi nudis; glumis lanceolatis acutissimis scabris trinerviis. Ehrh. gr. 36. Fl. Dan. t. 1145.

Schleicher misit inventam in sylvis supra Bex.

13. *P. sylvatica*, fol. planis obtusis; culmo obliquo compresso; paniculæ diffusæ spiculis ovatis subquinquefloris lœvibus. Villars Delph. II. pag. 128. tab. 3.

Schleicher invenit in montanis.

14. *P. annua*, panicula diffusa angulis rectis; spiculis obtusis; culmo obliquo compresso. L. Leers. t. 6. f. 1.

Ad vias, locis siccis, in Domum areis toto anno floret. 1466.

(Culmus cespitosus, dodrantalis; folia brevia; spiculæ 3-5 virentes, apice et ad dimidiam marginem membranaccæ.)

15. *P. humilis*, panicula contracta angulis acutis; spiculis coloratis; culmo compresso; ligula brevi truncata. *Ehrh. gr.* 115.

Jisdem locis vulgaris.

(Differt a præcedenti, (cujus tamen varietas est,) breviori statura, spiculisque majoribus coloratis. *Hofm. Germ.* III. p. 45.)

16. *P. palustris*, panicula diffusa; spiculis subtrifloris pubescentibus; fol. subtus scabris. L.

Passim in aquosis: copiose ad margines fossæ Tiguri minoris; in monte Luan etc. fl. Jul. Aug. 1467.

(Culmi 2-3 pedales; folia radicalia plerumque arida; ligula obtusa, quandoque apice laciniata; panicula pyramidalis, semipedalis; spiculæ virides apice fusco, spadiceo, basi tenuissime villosæ. *Scheuchzerus* etiam 4 observavit, sed raro.)

17. *P. dubia*, panicula rara stricta; spiculis bifloris acuminatis basi villosis. S.

Circa Basileam, in muris, ut in pago Agi. 1468.

(Culmi recti duri, folia angusta; panicula violacea cum virore admisto, et aureo splendore in summo folliculo. *Hall.*)

18. *P. Schenckzери*, panicula angusta, densa, subdiffusa; spiculis subtrifloris; glumis calycinis dorso hispidis; ligula nulla. S.

In apricis Montis *Legerberg*. *Scheuchz.* Gram. pag. 180.

(Culmi pedales; folia 3-5 uncialia, glabra, angusta; pedunculi subasperi alterni; glumæ florales exteriores virides apice fuscæ glabræ. *Scheuchz.* Hanc tam diversam plantam *Hallerus* præcedenti conjunxit.)

19. *P. eragrostis*, panic. patente; pedicellis flexuosis; spiculis serratis 10-floris; glumis trinerviis. L. *Schreb.* Gram. t. 38. *Barrel.* ic. 44.n.2.

Minima, vix biuncialis, copiose ad ripam lacus Lemani, prope *Villeneuve*, qua via regia lacuna sequitur, etiam cis *Chillon*, et in Valesia.

Major circa *Basileam*, ad sepes viarum, aggeres, et in arenosis. 1450.

(Culmi debiles prostrati, in majore varietate cubitales erecti; spiculæ tenellæ subviolaceæ, primæ 5-floræ, inde 7-floræ, tandem 9floræ *Hall.*)

20. *P. rigida*, panicula lanceolata subramosa secunda; ramulis alternis secundis. L. *Barrel.* ic. 49.

Plantam humillimam, spiculis duris viridibus, circa *Genevam* inventam, misit *Schleicher*.

21. *P. compressa*, panicula coarctata subsecunda rigida; spiculis lanceolatis 6-9-flo-

ris compressis ; cor. valvulis margine spadiceis ; culmo declinato obliquo compresso. S. Leers. t. 5. f. 4. Fl. Dan. 742.

Ubique in muris vetustis , agris siccioribus , incultis ; etiam in arenosis ad Wiesam , et in Argilosodinibus versus Pümpliz. Jun - Aug. 1455.

22. *P. nemoralis* , panicula laxa , nutante ; spiculis subbifloris mucronatis viridibus margine albo ; culmo incurvo. S. Leers. t. 5. f. 3. Scheuchz. Gram. pag. 164. Prodr. t. 2. It. Alp. pag. 135. t. 18. f. 3.

In montium et Alpium nemorosis sylvosisque radicibus. Circa Bernam in dumetis , Tobinii in nemorosis etc. 1469.

B. Var. villosa et cirrhosa spongia ad singula genicula. Scheuchz. It. Alp. pag. 33.t. 5. f. 1.

In Alpium nemorosis ; in Val de Lie ; in Valle Angelimontana prope cavernam metalliferam Bruderloch in solo luto , terra pingui et nigra. Etiam Schleicher misit.

(Panicula priori rarior.)

23. *P. bulbosa* , panicula densa patentiuscula ; spiculis ovatis 4-floris dorso et margine subvillosis ; culmo tereti erecto basi bulboso. S. Vaill. t. 17. f. 8.

B. vivipara. Barrel. ic. 703.

In agris siccisque ad ripam Rheni , Wiesae , et circa Münchenstein ; Basileae circa telonium

ad margines agrorum. Bernæ auf dem Weilerfeld. Abunde in agro Lemano; in ipso pagulo Sales; Rupe in aggeribus à l'Eau froide. In pago Gonthey Valesiæ. 1461.

(*Spiculæ ex viridi et violaceo variæ.*)

24. *P. disticha*, spiculis compressis quadri-floris sessilibus, disticho-spicatis. W. Allioni. Ped. t. 91. f. 1.

In montibus Bernina et Speluga. 1447.

(Culmus nudus; folia radicalia glauca, dura linearia; spiculæ 5-floræ. Hall. *Sexfloras* dicit Allioni, paniculamque ovatam, aut spieam potius. 2208. *P. seslerioides*.)

25. *P. distans*, paniculæ ramis subdivisis; flor. quinquefloris: flosculis distantibus obtusis. L.

*Schleicher* misit inventam.

(a *P. salina* non videtur differre.)

26. *P. divaricata*, paniculæ ramis corymbosis; pedunc. clavatis; spiculis quadrifloris; fol. filiformibus. W. Gouan. Illustr. t. 2. f. 1.

In Helvetia transalpina inventam misit Schleicher.

(Diversissima est a præcedente: habitu multo delicatiore; patula panicula; pedunculis alternis, capillaribus, remotis; spiculis subviolaceis.)

27. *P. cristata*, panic. spicata; calyc. sub-pilosis subquadrifloris, pedunculo longioribus; petalis aristatis. L. Leers. t. 5. f. 6.

Vulgo in pratis siccis; in asperis et rupestribus Majo et Junio. 1444.

38. BRIZA. (*Zittergras.*) *G. pl. 115.*

Cal. 2-valvis multiflorus. Spicula disticha valvulis cordatis obtusis : interiore minuta ; stigmata plumosa.

1. *B. minor*, spiculis triangulis ; calyce flosculis longiore. L. *Scheuchz.* Gram. p. 205. t. 4. f. 9.

In montosis sterilioribus Majo frequens; Julio et Augusto in Alpibus. 1449.

(*Spiculæ 5-6-floræ.*)

2. *B. media*, spiculis ovatis ; calyce flosculis breviore. L. *Barrel.* ic. 16. *Oed. Dan.* t. 258. *Leers.* t. 7. f. 2.

In omnibus pratis siccis Majo floret, etiam in humidis. 1448.)

3. *B. eragrostis*, spiculis lanceolatis ; flosculis viginti. L. *Barrel.* ic. 43. *Schreb.* t. 39. *Scheuchz.* Gram. p. 194. t. 4. f. 4.

*Schleicher* inventam misit.

(Male Viri docti *Halleri* plantam 1450 huc citant: quæ non nisi ad *Poam cognominem* spectat, a qua differt: culmo adscendente piloso, pilis patulis ; foliis latioribus brevioribus lanceolatis margine suhirsutis, adscendentibus ; panícula breviore magis patentē ; spiculis majoribus, non violaceis ut in illa, sed *cinereo-viridibus.*)

39. FESTUCA. (*Schwingel.*) G. pl. 119.

Cal. 2-valvis multisporus; spicula tenuis oblonga teretiuscula: valvulis acuminatis, inferiore majore. semen utrinque acutissimum.

a. *Panicula secunda.*

1. F. *ovina*, panicula secunda coarctata aristata; culmo tetragono nudiusculo; fol. setaceis. L. Leers. t. 8. f. 3. Scheuchz. Gram. p. 279. t. 6. f. 8.

Frequens in pratis siccis, collibus, muris et torfaceis, Majo 1442. α.

B. Var. *vivipara*, Scheuchz. Gram. p. 213. Prodr. t. 1. It. Alp. pag. 457. t. 20..

In siccioribus Alpium pratis; etiam in pascuis uidis Alpium Rhæticarum, ad fontes Rheni posterioris.

2. F. *tenuisolia*, panicula subsecunda coarctata mutica; culmo tetragono nudiusculo; fol. capillaribus. Hofm. Germ. III. pag. 51. Leers. t. 8. f. 4. Scheuchz. Gram. pag. 275. t. 6. f. 6.

In torfaceis. v. gr. prope Pümpliz. 1442. B.

(a præcedente non differre dicit Hallerus, et promiscue habere et non habere aristas. Hofmannus antheras huic *violaceas* tribuit, quæ pri-

ori luteæ sunt. Spiculæ sunt tamen minores et glabriores.)

3. *F. alpina*, panicula secunda angustissima; spiculis 3-4-floris brevissime aristatis; fol. capillaribus glabris; culmo subnudo. S.

Frequens in altioribus alpibus: *Gemmio*, *Javernaz*, *Fouly*, *Enzeindaz*, *Richard*, sur *Champ*. 1442. ♂.

(Panicula viridis, subhirsuta; culmus vix 4 unciam. *Hall*. Invito *Hallero*, has duas plantas ab *ovina* separo.)

4. *F. amethystina*, panicula flexuosa; spiculis secundis inclinatis submuticis; fol. setaceis L.

In montosis et siccis, speciatim in montibus *Albio* et *Ulliaco*. *Scheuchz*. Gram. p. 276. t. 6. f.

7. *Hall*. 1442. ♀.

(Et hanc *Hallerus* separare nolebat, quamvis satis diversam, ut ex speciminibus video a *Schleicher* missis. Differt: culmo in recenti planta purpureo, altiori; ligula nulla, quæ in *Ovina* frequenter bifida est; panicula obscurius violacea flexuosa, quæ tamen non raro tota viridis est, monente *Scheuchzero*, et ex meorum speciminum fide etc.)

5. *F. rubra*, panicula secunda scabra; spiculis sexfloris aristatis: flosculo ultimo mutico; culmo semitereti L. *Leers*. t. 8. f. 1. *Scheuchz*. p. 287. t. 6. f. 9.

In Alpibus Aquilejensibus ubique; sic in Rhæticis, speciatim in pratis superioribus montis *Sursees* vallis *Sexammia*. In dorso montis *Suchet*. 1440.

(Culmi subundi, superne purpurei; folia setacea convoluta; panicula laxa subsecunda; spiculæ viridi-spadiceæ vel purpurascentes oris membranaceis.)

B. Major et multiflora: in pratis du *Val de Trient*.

6. F. *duriuscula*, panicula secunda oblonga; spiculis sexfloris oblongis lævibus; fol. setaceis. L. Leers. t. 8. f. 2.

Ubique in pratis siccis Majo, Junio. 1437.

(Folia juncea, spiculæ plerumque virides, aristata colorata.)

7. F. *multiflora*, fol. hirsutis latiusculis; spiculis panieulatis 5-10-floris aristatis glabris. Hofm. Germ. III. pag. 30.

Circa *Ferriere*; ubique in pratis siccioribus circa *Tigurum*, Majo. 1435.

(Culmi 2-3-pedales; folia inferne viridia, superne hirsuta incana; panicula matura secunda viridis vel viridi-spadicea; spiculis 5-7-floris. Scheuchz. pag. 287.

B. Var. spiculis villosis. Scheuchz. l. c.

8. F. *Rhaetica*, panicula laxa subsecunda; spiculis 3-5-floris muticis; fol. linearibus glabris. S.

( Culni semi - i - pedales; folia lète viridia; ligula obtusa e fusco subdiaphana; panicula viridi-violacea; coroll. valvula exterior per lentem quinquenervia dense hirsuta, dorso viridescens, ora spadicea.)

In humidis Alpium Rhæticarum Jul. Aug. florentem invenit Scheuchz. Gram. pag. 278. Hall. 1436.

( Varietatem non aristatam præcedentis credit Hallerus optime. Et mihi videtur, qui plantum, sine dubio, Scheuchzerianam habeo a Schleicherо in Alpibus Rhæticis inventam, et missam, nomine F. pilosæ Halleri, filii, qui magnum patrem in botanicis æmulatur.)

9. F. *pumila*, panicula subæquali stricta pauciflora; spiculis teretibus quadrifloris glabris subaristatis; fol. setaceis. W.

In monte Taveyannaz. 1439.

Culmus pedalis; folia glauca dura; spiculæ violaceæ cum aureo splendore admisto; pedunculi violacei, sic culni in parte superiore. Misit Schleicher plantam inventam.)

10. F. *heterophylla*, sol. laxis: radicalibus setaceis, caulinis planis latioribus; panicula rara secunda; spiculis subsexfloris lanceolatis glabris aristatis. Jacq. Coll. 2. p. 93.

Extra pagum Hirslanden. 1438.

Culni tripedales; folia culmea linearis-lanceolata; panicula cinereo-viridis: spiculis ad 7-floris. Misit Schleicher.

11. F. *Halleri*, panicula stricta secunda; spiculis sexfloris teretibus hirsutis longe aristatis; fol. glaucis setaceis. S. *Allioni*. Ped. 2245.

In Montibus *Ansex*, *Jeman*, *Fouly*, *Javernaz*, *Richard*. Ad glacialis Mont: *Stok*, *St. Bernhard*. 1441.

(Planta semipedalis; panicula minima cincereo-flava; spiculæ subpedunculatæ; aristæ longæ coloratae.

Misit *Schleicher* in Monte *Enzeindaz* inventam.)

12. F. *Myurus*, panicula spicata; calyc. minutissimis muticis; flor. scabris; aristis longis. L. *Barrel*. ic. 99. *Leers*. t. 3. f. 5. *Scheuchz*. Gram. p. 294. t. 6. f. 12.

In agris macilentis circa *Basileam* et ad *Wiesam*. *Bernæ* in muris sub porta *Marsiliana*. 1443.

13. F. *spadicea*, panicula erecta; spiculis ovatis 4-floris; glumis acuminatis muticis; fol. setaceis glabris pungentibus. *Smith*. *Act. Soc. Lin. Lond.* I. t. 10..

Ex Rhætia habuit *Hallerus*. 1463. Ego a *Schleicher* in Monte *Generoso* inventam.

(Culmus rectus cubitalis, teres, striatus; vaginæ albæ splendentes supra nigræ; spiculæ 3-4-floræ glabræ; corollæ calyce multo longiores.)

b. *Panicula aequali.*

14. F. *decumbens*, panicula erecta ; spiculis subovatis muticis ; calyce flosculis majore ; culmo decumbente. L. *Oed. Dan.* t. 162. *Leers.* t. 7. f. 5. *Scheuchz. Gram.* p. 170. t. 5. f. 16. A. B. C.

Non rara in sylvosis et sterilibus circa *Tigurum* et *Tobinium*. In udīs sylvæ *Wylensis*; etiam in Montibus, ut ad radicem montis *Tschiera*, au *Mont Pouillerel* etc. 1434.

( Culmus palmaris et pedalis ; folia firma sub-hirsuta ; panicula rara viridis.)

15. F. *elatior*, panicula decomposita, primo nutante, florente suberecta ; spiculis ovato-lanceolatis acutis muticis ; fol. planis. *Hofm. Germ.* III. pag. 31. *Curt. Lond.* 6. n. 66. *Leers.* t. 8. f. 6.

Frequens in aquosis, ad vias et margines agrorum etc. 1451.

( Culmi 2-4-pedales ; panicula magna laxa ; spiculæ 6-9-floræ ex violaceo et viridi variegatæ, glabræ, teretes, præcipue dum clausæ sunt.)

B. Var. culmo minore; panicula rariore, angustiore ; spiculis 5-7-floris viridibus, ora spadiceis, etiam, ut in sicca planta apparet, magis compressis. — Hæc est quam *Scheuchzerus* in aggere exteriore portus armamentarii *Tigurini*

*navalis* copiose Junio invenit. Misit Schleicher;  
et invito Hallero varietas est. 1451. β.

(Est *F. pratensis*, *Hofmanni* l. c.)

16. *F. arundinacea*, panicula erecta stricta; spiculis oblongis erectis 4-floris brevissime aristatis. *Ehrh. Hofm.* l. c. 52. *Scheuchz-Gram.* pag. 266. t. 5. f. 18.

Locis umbrosis, in aggeribus *Silæ* torrenti vicinis; *Basileæ* 1511.

(Culmi 3-5-pedales; folia arundinacea; panicula sparsa laxa pedalis; spiculæ 3-5-floræ non semper aristatæ, juniores violaceæ, inde pallentes. *Hall.* Est *Bromus littoreus* *Willd.*)

17. *F. loliacea*, spicula simplici disticha; spiculis subsessilibus multifloris remotis muticis. W.

Ad vias; in pratis humidis circa pontem *Birsæ* et circa *Mutetum*. 1452.

(Culmus cubitalis geniculis virentibus; spiculæ violaceæ.)

18. *F. fluitans*, panicula ramosa erecta; spiculis subsessilibus teretibus muticis. L. *Oed. Dan.* t. 237. *Schreb.* t. 3. *Lcers.* t. 8. f. 5.

Ubique in fossis, stagnantibus aquis, et ad ripas fluviorum, Majo, Junio. 1453.

(Culmus decumbens; panicula longa; spiculis alternis, sæpe solitariis.)

40. BROMUS. (*Trespe.*) *G. pl. 120.*

Cal. 2-valvis, patens, multiflorus; spicula oblonga, teres, disticha valvula florali inferiore majore obtusa bifida: arista infra apicem.

1. *B. secalinus*, panicula nutante; spiculis ovatis compressis; glumis nudis distinctis; aristis subulatis brevioribus flexuoso-rectis. *Roth. Scheuchz.* pag. 251. t. 5. f. 10.

In segetibus. 1502. B.

(Differt a sequente glumis glabris, aristis brevioribus, foliis utrinque asperis.)

2. *B. multiflorus*, panicula patente; spiculis lanceolatis compressis, 12-15floris: flosculis subimbricatis teretiusculis hirsutis; aristis capillaribus aequalibus rectis. *S. Weigel. Obs. t. 1. f. 1. Scheuchz.* pag. 250. t. 5. f. 9.

In segetibus etc. 1502.

In pratis prope *Servan* invenit *Schleicher.*

3. *B. pratensis*, panicula erecto-patente; pedunc. subsimplicibus; spiculis ovato-lanceolatis compressis suboctofloris; aristis rectiusculis glumæ longitudine. *Ehrh. Gram. 116.*

*Schleicher* inventum misit.

4. *B. mollis*, panicula erectiuscula; spiculis ovatis pubescentibus; aristis rectis; fol.

*mollissime villosis.* L. *Schreb.* t. 6. *Leers.* t. 11. f. 1.

Ubique. 1504.

5. *B. squarrosus*, panicula nutante; spiculis ovatis novemfloris glabris; aristis divaricatis: culmo inferne pubescente. S. *Barrel.* ic. 24. *Scheuchz.* Gram. p. 231. t. 5. f. 11.

In segetibus Valesiæ. Basileæ.

6. *B. villosus*, panicula subnutante; spiculis ovatis villosis; aristis flexuoso-ascendentibus; culmo foliisque pubescentibus. S.

In Valesia inventum misit *Schleicher.*

(*Hallerus* a præcedente non separat. 1501. B, a quo adhuc spicis crassioribus differt. Est var. *B. Alopecuri* apud *Willd.*)

7. *B. inermis*, panicula erecta; spiculis subteretibus subulatis nudis submuticis. L. *Barrel.* ic. 25. *Schreb.* t. 13.

Circa Bernam et Basileam 1433.

(Radices villosæ; culmus 2-3-pedalis; spiculae octofloræ. *Hall.*)

8. *B. asper*, panicula ramosa nutante scabriuscula; spiculis teretibus 6-9-floris aristatis; fol. hirsutis; culmo superne pubescente. S.

Frequens Majo, Junio, in pratis, dumetis, ad limites agrorum. 1503.

(Culmus 3-pedalis; folia molliter hirsuta, sed oris retroversa asperrima; arista nigra. *Hall.*)

9. *B. sterilis*, panicula nutante; spiculis oblongis distichis 6-9-floris; glumis subulato-aristatis sulcatis; fol. pubescentibus. S. *Scheuchz.* p. 258. t. 5. f. 14. *Leers.* t. 11. f. 3.

Ubique ad sepes, muros et vias. 1505.

10. *B. arvensis*, panicula nutante; spiculis ovato-oblongis teretibus 6-8-floris glabris. S. *Scheuchz.* p. 262. t. 5. f. 15. *Leers.* t. 11. f. 3. *Oed. Dan.* t. 293.

In agris, ad vias aestate. 1509.

11. *B. tectorum*, panicula nutante; spiculis linearibus pubescentibus 5-floris; arista tenuissima recta; fol. molibus hirsutis. S. *Leers.* t. 10. f. 2.

In tectis et muris *Majo*, *Junio*. 1508.

(*Scheuchzerus* hunc cum *B. molli* confudit.)

12. *B. agrestis*, panicula stricta erecta; spiculis lanceolatis 5-8-floris: junioribus teretiusculis, adultis distichis, arista longioribus; fol. radicalibus angustissimis, caulinis latioribus. S. *Vaillant.* t. 18. f. 2. *Allioni.* *Ped.* 2224.

Frequens in pratis siccioribus *Majo*, foliis hirsutis.

*B. fol. glabris*: in *Valle du Trient*. 1507.

(Est *B. erectus*. *Hofm. Germ.* III. pag. 55.  
spiculæ ex viridi et purpureo-spadiceo variæ.)

13. *B. giganteus*, panicula nutante maxima; spiculis 4-floris teretiusculis arista flexuosa brevioribus; fol. latissimis glabris. *S. Scheuchz.* p. 264. t. 5. f. 17. *Schreb.* t. 11. *Leers.* t. 10. f. 1.

In aquosis et circa fossas, Jun - Aug. 1510.  
(Viridis est.)

14. *B. montanus*, panicula subnutante; spiculis 4-5-floris teretibus subhirsutis, arista alba gracili paulo majoribus; fol. glabris. *S. Scopoli. Carn.* 117. *Scheuchz.* pag. 263. t. 5. f. 16.

Frequens in sylvis et aquosis; in nemorosis montis *Legerberg*, Majo et Junio. 1506.

(Culmus 2-4-pedalis; folia glabra et subhirsuta; vagina pilis rigida vel molliter villosa; ligula obtusa, spiculæ ex viridi albicantes. Hujus loci etiam *Hallero* monente ex fide horti sicci *Scheuchzeriana* planta pag. 511. t. 5. f. 19. quam viri docti minus recte ad *B. triflorum* spectare credunt, quem non habemus, qui tamen ultima planta in *Scheuchzeriano* opere designari videtur.)

15. *B. gracilis*, spica simplici nutante; spiculis alternis sessilibus remotis teretibus gracilibus 6-8-floris hirsutis, arista minori-

bus; culmo foliisque pilosis. S. *Oed.* *Dan.* t. 164.

In sylvosis montis *Rigi*, qua a pago *Arreas*-cenditur; in M. *Vogelberg*. *Au Chemin de la Cibour*, qua adscenditur a pago *Renan*. *Basileæ circa Birsam.* 1432.

**β.** Spiculis longioribus minus remotis et hirsutis, quæ est vera *Festuca dumetorum*.

Ubique in sylvosis nemorosis et dumetis, etiam in Alpinis et montanis 1431. **δ.** flor. Jun- Jul.

16. *B. pinnatus*, spica simplici erecta disticha; spiculis alternis subsessilibus teretibus 12-floris subaristatis pubescentibus; fol. seabis; culmo lœvi. S. *Weigel*. Obs. t. 1. f. 10. *Leers*. t. 10. f. 3.

Frequens in sylvosis, apricis et muris Jun. Jul. etc. 1431. **α.**

(Culmi 2-4-pedales, nonnisi geniculis villosi; vaginæ infra lanuginosæ; arista recta, gluma brevior.)

17. *B. Tigurinus*, spica simplici erecta; spiculis subsessilibus alternis subcompressis 9-15-floris villosis subaristatis; fol. hirsutis; culmo villoso. S.

In via cooperta (*chemin couvert*) Tiguri minoris, qua Proselytotrophium aditum. *Scheuchz.* Gram. pag. 37. n. 3. *Hall.* 1431. **β.** fl. Junio.

(*Hallerus* a præcedente separare nolebat, sed differt præterea, foliis non tantum *margine*, vero superne et inferne hirsutis, spiculisque minoribus.)

#### 41. AVENA. (*Hafer.*) G. pl. 122.

Cal. 2 - valvis multiflorus; arista e dorso corollæ spiraliter intorta, geniculo veluti reflexa.

1. A. *elatior*, paniculata; calyc. bifloris; flosculo hermaphrodito submutico, masculo aristato. L. Schreb. t. 1. Leers. t. 10. f. 4.

In segetibus nimis frequens. 1492.

*B.* radicibus repentibus, fibrosis, (non superimpositis et nodosis ut illa) culmis semper glabris, foliisque viridioribus —

In omnibus pratis.

(Huc spectat etiam *Halleri Avena* 1493, quæ etiam monente *Gesnero* in notis Mscptis ex fide herbarii *Scheuchzeriani*, quamvis in *udis* circa Basileam inventa, non differt.)

2. A. *mollis*, glumis bifloris nudiusculis; flosculo hermaphrodito mutico; mascula arista geniculata. L. (*Holcus mollis*) Schreb. t. 20. Leers. t. 7. f. 7. Basileae. 1485. (arista scabra. Hofmann.)

3. A. *lanata*, glumis bifloris villosis; flosculo hermaphrodito mutico; mascula arista

*recurva*. L. *Scheuchz.* Gram. pag. 234. t. 4. f. 24. *Leers.* t. 7. f. 6.

In omnibus pratis, potissimum locis subhumidis, et ad stagnorum oras. 1484. (*Holc. lanatus*.)

(Tota pubescit; arista brevis glabra subfuscata.)

4. *A. odorata*, glumis trifloris muticis acuminatis; flosculo hermaphrodito diandro. L. *Fl. Dan.* t. 965. (*Holc. odoratus*.)

*Mülhusiae versus* den *Pulverthurn.* 1496.

(Folia glabra; culmus cubitalis; panicula pauciflora; *Hall.*)

5. *A. sativa*, paniculata; calyc. dispersmis; semin. lævibus; altero aristato. L. 1494.

6. *A. fatua*, paniculata; calyc. trifloris; flosculis omnibus aristatis basique pilosis. L. *Schreb.* t. 15. *Leers.* t. 9. f. 4. *Scheuchz.* p: 239. t. 5. f. 1.

*Basileæ ad portam St. Johannis.* In Helvetia calidiori. 1495.

7. *A. aurata*, panicula sparsa erecta; glumis bifloris; flosculis auratis basi villosis; fol. setaceis. S. *Allioni Pedem.* 2254.

In alpibus Penninis, supra vallem *Bagnes*; in Alpe *Kienboden*. 1488.

(Pulchra planta. Culmi dodrantales; junior planta calyce viridiuscule est, flore subflavo nitente; adulta, tota cum caule calyce et flore auri metallico splendore resulget. *Hall.*)

8. *A. distichophylla*, panicula subspicata; calyc. trifloris; pedunculis villosis; fol. planis distiche patentibus. S. Villars. Delph. t. 4.

In Alpibus editioribus: Javernaz, Enzeindaz, Chaud, Commun; Fouly, Schönenbühl, Stok. 1489.

(Culmi juncei, ad terram foliosi, superne subnndi, 1/2 - 1 - pedales; folia glauca, linearia; flores ex aureo argenteo et violaceo splendore varii.)

9. *A. flavesrens*, panicula laxa; calyc. trifloris brevibus; flosculis omnibus aristatis. L. Schreb. t. 9. Leers. t. 10. f. 5. Scheuchz. Gram. p. 223. t. 4. f. 18.

In pratis et segetibus per totam aestatem. 1497.

β. fol. paulo latioribus et longioribus; spiculis majoribus gluma interiore minore Scheuchz. p. 225. t. 4. f. 19. iisdem locis.

10. *A. sesquitertia*, paniculata; calyc. subtrifloris; flosculis omnibus aristatis; receptaculis barbatis. L. Scheuchz. Grám. p. 220. t. 4. f. 17. A. B.

In pratis et locis siccoribus Junio floret. 1497. δ.

(Non est varietas *A. flavescentis*, ut Hallerus autumat. Willd.)

11. *A. dubia*; paniculata; calyc. subtrifloris; flosculo infimo terminali arista recta,

reliquis apice biaristatis, dorsali arista reflexa. *Leers.* t. 9. f. 3. *A. triaristata.* *Villars.* *Delph.* t. 4.

*Schleicher* misit inter novas; sed erat etiam in Horto sicco *Reipublicae*, inventa in collibus siccis, apricis et sterilibus.

12. *A. pubescens*, subspicata; calyc. subtrifloris basi pilosis; fol planis pubescentibus. L. *Leers.* t. 9. f. 2. *Scheuchz.* pag. 226. t. 4. f. 20.

Frequens in pratis Majo, Junio. 1498.

13. *A. pratensis*, subspicata; calyc. 5-flo-  
ris. L. *Leers.* t. 9. f. 1.

In Alpium pratis inferioribns, ut montis *Sur-  
sees* vallis *Sessamniae* supra sylvam; in monti-  
bus *Fouly*, *Luan* 1499.  $\alpha$ .

(Folia angusta, glabra, rigidiuscula; flosculi  
teretes, basi pubescentes. *Hall.*)

14. *A. bromoides*, subspicata; spiculis bi-  
natis: altera pedunculata, aristis divarica-  
tis; calyc. octofloris. L. *Scheuchz.* Gram.  
p. 228. t. 4. f. 21. 22.

In Alpibus Valesiacis: *Fouly*, *Jeman* etc. Fre-  
quens in pratis circa *Spelugam* Junio. 1499,  $\beta$ .

(Culmus pedalis; folia glauca linearia; caly-  
ces 3-5-flori; pedunculi villosi; tota planta ex  
viridi glauca.)

15. *A. versicolor*, subspicata; calyc. sub-

quinquefloris, rachi pilosa. *Willd. Scheuchz.*  
*Gram. p. 231. Prodr. pag. 23. t. 3. Villars*  
*Delph. t. 4. f. 5.*

Alpina: in jugis *Adulae*; in M. *Sursees* val-  
 lis *Sessamniensis*; in *Fouly, St. Bernhard*, supra  
*Bagnes*, abunde in adscensu *Gotthardi*. 1500.

(Culmi semiped - et pedales; folia radicalia  
 caryophyllea, glabra; spiculæ ex viridis padiceo  
 aureo et argenteo varia; arista tortilis, pedunculi  
 villosi.)

#### 42. ARUNDO. (*Rohr.*) G. pl. 124.

Cal. 2-valvis; flosculi congesti, lana cincti.

1. A. *donax*, panicula diffusa multiflora;  
 calyc. bifloris; fol. latissimis glaucis patulis. S.  
*Scheuchz. p. 159. t. 3. f. 14.*

(Culmus durus 6-pedalis; folia bipedalia in  
 quovis geniculo; sumimus caulis terminatur in  
 acumen, foliis se in coni speciem convolventi-  
 bus. *Hall.*)

In colle prope pagum *Olon*, sub via, quæ  
 dicit a *Verchier.* 1516.

2. A. *Phragmites* calyc. quinquefloris;  
 panicula laxa. L. *Leers. t. 7. f. 1.*

Ubique in fossis stagnis et oris lacuum. 1515.

3. foliis et culmo in summo fusiforme corpus  
 componentibus.

Copiose in fossis aquosis pratorum uliginosorum circa Wallenstadt.

(Panicula per ætatem nutans; calyces 3-5-flo. ri; pappus sere longitudine calycis; folia secantia.)

3. *A. epigejos*, panicula stricta erecta; calyc. unifloris corolla paulo longioribus; pappo longitudine calycis; fol. superne hirsutis, inferne glabris. S.

In sylvosis radicibus montis *Tschiera Rhætorum*, paulo supra *Anderam* vicum. In Aquilejensium Alpibus, v. gr. in *Bovannaz* 1520.

β. varietatem *Schleicherus* misit: vaginis totis molliter hirsutis; panicula tota viridi; culmo sub ea retroversu viscoso-aspero; glauca planta.

4. *A. calamagrostis*, panicula alterne contracta erecta; calyc. unifloris lævibus; corollis lanuginosis; culmo ramoso. S. *Oed. Dan.* t. 280.

Non rara in pratis humidis circa *Bernam*, v. gr. im *Inseli*, *Bodenacker*; circa *Roche*, *Tigurum*, *Basileam* etc. 1519.

(Folia latiora quam in præcedente; inde nescio quid sibi velint folia linearia aliorum autorum.)

5. *A. Pseudophragmites*, panicula ramo-sissima diffusa multiflora; calyc. unifloris; valvula exteriore apice fissa aristata: arista

longitudine calycis; culmo ramoso. *Hall.*  
fil. in *Röm. bot. Arch.* II. 11.

*Schleicher* quoque inventam misit.

D. *Flores spicati receptaculo su-*  
*bulato.*

43. LOLIUM. (*Lolch.*) G. pl. 126.

Cal. monophyllus multiflorus: spiculæ  
compressæ; rachis excavata alterius valvulæ  
calycinæ defectum supplet.

1. *L. perenne*, spica mutica: spiculis com-  
pressis multifloris. L. *Schreb.* t. 57. *Leers.* t.  
12. f. 1.

Vulgo ad vias et agrorum margines etc. 1416.  
α. β. aristatum.

γ. spica latiore: spiculis distichis confertiori-  
bus. — .

In semitis, viis agrorum et pratorum, locis-  
que siccis circa *Tigurum*. Inter *Lauffen* et *Basi-*  
*leam*; circa *Morbegno*. *Scheuchz.* Gram. p. 29.  
t. 1. f. 7. D. *Prodr.* t. 2.

δ. Foliis radicalibus angustioribus.

2. *L. tenue*, spica mutica tereti: spiculis  
trifloris. L.

Circa muros fossæ interioris *Tiguri* urbis vi-  
cinos. 1417. et. 1418. β.

3. *L. remotum*, spica subaristata mutica;  
spicu-

*spiculis compressis multifloris remotis. Hofn.  
Germ. III. pag. 63.*

*Basileæ, Badæ, et copiose in pratis circa Tigurum Majo et Junio. 1418. α. Scheuchz. Gram. pag. 26. 2.*

4. *L. temulentum*, spica aristata : spiculis compressis multifloris. L. *Oed. Dan.* t. 160. *Leers.* t. 12. f. 2.

In segetibus. 1420.

#### 44. ELYMUS. (*Haargras.*) G. pl. 128.

Cal. 4-phyllus distachyos : foliolis 2 singulis spiculis subjectis ; nectar. ciliatum.

1. *E. caninus*, spica nutante arcta ; spiculis rectis involucro destitutis : infimis geminis. L. *Leers.* t. 12. f. 4.

Circa Tigurum ad sepes et in umbrosis. Ad Rhenum prope suburbium D. Albani. A la Ferriere : in Monte Wasserfall. 1429.

2. *E. europaeus*, spica erecta ; spiculis bifloris involucro æqualibus. L. *Scheuchz. Gram.* p. 16. *Prodr.* t. 1.

Inter Corno et Claviller ; in vallecula Combe de Valanvron. In Monte Wasserfall. Frequens in sylvosis Montis Rigi. 1537.

(Culmi alti, firmi ; folia subhirsuta, longa ; spica rigida.)

45. SECALE. (*Roggen.*) *G. pl. 127.*

Cal. oppositus, 2-valvis, 2-florus, solitarius.

*S. cereale*, glumarum ciliis scabris L.

Seritur. 1421.

46. HORDEUM. (*Gerste.*) *G. pl. 129.*

Cal. lateralis 2-valvis, uniflorus, ternus.

1. *H. vulgare*, flosculis omnibus hermaphroditis aristatis: ordinibus duobus erectioribus. L. 1533.

2. *H. hexastichon*, flosculis omnibus hermaphroditis aristatis, seminibus sexfariam positis. L.

Vulgo seritur. 1534.

3. *H. murinum*, flosculis lateralibus masculis aristatis, involucris intermediis ciliatis. L. *Oed. Dan.* t. 629.

Ubique ad muros et vias. 1536.

4. *H. secalinum*, flosculis lateralibus masculis aristatis, involucris setaceis scabris. Schreb. *Vaill.* t. 17. f. 6.

Ad oras fluviorum; Basileæ in segetibus. 1538.

47. TRITICUM. (*Weitzen.*) *G. pl. 130.*

Cal. 2-valvis, subtriflorus; cor. valvula exterior ventricosa obtusa cum acumine, interior plana.

1. *T. hybernium*, calyc. quadrifloris ventricosis lœvibus imbricatis submuticis. L.

1422.  $\alpha$ .

2. *T. aestivum*, calyc. quadrifloris ventricosis glabris imbricatis aristatis. L. 1422.  $\beta$ .

3. *T. compositum*, spica composita: spiculis confertis aristatis. L. 1422.  $\gamma$ .

4. *T. turgidum*, calyc. quadrifloris ventricosis villosis imbricatis subaristatis L. 1423.

5. *T. spelta*, calyc. quadrifloris truncatis; flosculis aristatis hermaphroditis: intermedio neutro. L. 1424.

6. *T. monococcum*, calyc. subtrifloris, primo aristato, intermedio sterili. L. 1425.

(Hæc omnia coluntur, et apposuisse non piget.)

7. *T. repens*, calyc. quadrifloris subulatis acuminatis; fol. planis. L. Schreb. t. 26. Leers t. 12. f. 3.

Ad sepes, in cultis Jun. Jul. 1426.  $\alpha$ .

$\beta$ . *Aristatum*.

(Tiguri ad sepes; sic et *Interlaci*, aux *Gauges*; ad ripam torrentis *Vevaise*.

$\gamma$ . *procerius*, imo tricubitale; spicis prælongis: spiculis vulgari triplo majoribus 6-8-floris; calyc. muticis vel aristatis.

Ad sepes. 1427.  $\alpha$ .

$\delta$ . spiculis dissitis.

In aquosis prope *Hüningen*. 1427.  $\beta$ .

$\varepsilon$ . fol. glabris angustioribus.

*Tiguri*; prope *St. Imier*, circa *Ferrières*.  
1427. s.

8. *T. junceum*, calyc. 5-floris truncatis;  
fol. involutis. L.

Juxta Rhodanum ad limites agrorum in *Valesia*  
inferiore. Circa *Cliben* ad Rhenum. Abunde  
supra *Yvorne*, qua itur *Corbeirier*. 1428. (*Basi-*  
*leæ*.)

(Tota planta glauca.)

9. *T. tenellum*, calyc. subquadrifloris;  
flosculis muticis acutis; fol. setaceis. L.

In agris versus *Wyl*; aux *Ferrières d'Erguel*  
1430.

#### 48. CYNOSURUS. (*Kammgras.*) G. pl. 118.

Cal. 2-valvis multiflorus; receptac. pro-  
prium unilaterale sæpe foliaceum.

1. *C. cristatus*, bracteis pinnatifidis. L.  
*Schreb.* t. 8. f. 1. *Oed. Dan.* t. 238. *Leers.*  
t. 7. f. 4.

Vulgo in pratis Majo, Junio. 1545.

2. *C. echinatus*, bracteis pinnato-palea-  
ceis aristatis. L. *Barrel.* t. 123. f. 2.

In segetibus circa *Curmayeul*, ad pedem mon-  
tis *Col de Ferry*. 1546.

3. *C. durus*, spiculis secundis alternis ses-  
silibus rigidis obtusis appressis. L. *Pollich.*  
t. 1. f. 1.

In Valesia inferiori; prope Branson inventum misit Schleicher. 1419.

(Culmi plures humiles rigidi; folia glabra, radicalia culmis minora; spiculae confertae.)

4. *C. caeruleus*, bracteis integris subdennatis; corollis mucronatis; spica oblonga. W.

In rupestribus; circa Roche etc. In montibus Albio et Uetliaco copiose Majo. Frequens etiam in Alpibus. 1446.

49. LAPPAGO. (*Stachelgras.*) G. pl. 131.

Cal. subtrivalvis: valvulis alternis cartilagineis; cor. bivalvis: valvula majore ventricosa, minore lanceolata.

*L. racemosa*, panicula spicata; glumis muricatis, setis ciliaribus. L. Schreb. t. 4. Barrel. ic. 718.

Non nisi circa arcem Sedunensem ponit Hal. lerus 1413, sed frequentem in Valesia invenit Schleicher.

(Culmi humiles, foliosi, frequenter geniculati; folia glauca firma glabra saepe undulata.)

### T R I G Y N I A.

50. MONTIA. (*Montie.*) G. pl. 133.

Cal. 2-phyllus; cor. 1-petala, 5-partita: laciinis tribus alternis minoribus; styli villosi; caps. 1-locularis, 3-valvis.

*M. fontana*, fol. oblongo-ovatis subcarnosis; pedunc. ternis unifloris. *Curt. Lond.*  
*Micheli t. 13. f. 1. 2.*

Rara. *Michelfeldae*, circa *Rimbach*. 301.  
(Flores penduli exigui albi.)

**51. HOLOSTEUM.** (*Spurre.*) *G. pl. 136.*

Cal. 5-phillus; petala 5; caps. 1-loocalaris, cylindracea, apice dehiscens.

*H. umbellatum*, flor. umbellatis. L.

*Basileæ versus pontem Wiesae*, extra portam *Blasianam*. *Tiguri locis aridis, sic et Tobinii.*  
879.

(Petala 2-3-dentata, immatura carnea, dein alba.)

**52. POLYCARPON.** (*Nagelkraut.*) *G. pl. 138.*

Cal. 5-phillus; petala 5, minima, ovata; caps. ovata, 1-loacularis, 3-valvis.

*P. tetraphyllum*, caule ramoso prostrato; fol. quaternis. L. *Barrel. ic. 534.*

In valle *Tellina* inventum misit *Schleicher.*

(Caules humillimi dichotomi; folia obovata integerrima; stipulæ albæ oppositæ lanceolatæ diaphanæ.)

---

## Classis IV.

### TETRANDRIA, MONOGYNIA.

---

a. *Flores monopetalii, monospermi, inferi.*

53. GLOBULARIA. (*Kugelblume*) G. pl. 146.

Cal. communis imbricatus; proprius tubulatus inferus; corollulæ labio superiore 2-partito inferiore 3-partito; Recept. paleaceum.

1. *G. vulgaris*, caule herbaceo, foliis radicalibus tridentatis, caulinis lanceolatis. L. Schk. t. 21.

In calidiori *Helvetia*, in locis gramineis, inter rupes: in *Passgantfluh*, prope *Rupem*, a la *Marbriere*, supra *Fontanay*, aux *Gauges* etc. supra *Morges*, *Thuiri*. Etiam *Basileæ*: in sylva *Huningensi*, circa *Dornacnm*, et ad patibulum. In glaciis fluviorum, grande *Eau*, *Baye de Clarenç* etc. Floret Majo, Junio. 218.

2. *G. cordifolia*, caule subnudo ; foliis cuneiformibus tricuspidatis, intermedio minimo. L. Jacq. aust. t. 245.

In scopulis Juræ et Alpium ubique, et utrinque etiam in planitiem descendit : *Rupe ad mont de la Praisse et la Marbriere*; sic ad *Beauchamp ex Jura*. Fl. Majo. 216.

3. *G. nudicaulis*, caule nudo unifloro, foliis oblonge ovatis, integerrimis. H. Jacq. aust. t. 230.

Minus modo dicta frequens, neque in planitiem descendit, copiose in *Monte Richard* et à *la Joux verte*; etiam aux *Martinets*. In *Wängenalp* et *Breitlauwenen*; supra *Interlachen*. In *Fronalp*, *Mürtschen*, *Schilt Glaronensium*. 217.

b. *Flores monopetali, monospermi, superi. Aggregatæ.*

54. DIPSACUS. (*Karten.*) G. pl. 148.

Cal. communis polyphyllus : proprius superus vix manifestus, recept. paleaceum.

1. *D. sylvestris*, fol. sessilibus serratis, paleis rectis. W. Jacq. aust. t. 402.

Abunde ad vias, orasque fossarum fl. Jul. Aug. 198.

2. *D. laciniatus*, fol. connatis, sinuatis. L. Jacq. aust. t. 405.

Circa *Mülhusiam Hallerus* nasci suspicabatur,  
ut indigena sit. 198.  $\beta$ .

$\beta$ . *D. pilosus*, fol. petiolatis appendicula-  
tis. L. Jacq. austr. t. 248.

In dumetis, humidis. Ad sepes et muros  
*Bernæ* versus *Sandrein*; au grand *Clos* prope  
*Roche* etc. 199.

55. SCABIOSA. (*Scabiosen.*) G. pl. 149.

Cal. communis polyphyllus, proprius du-  
plex superus; Recept. paleaceum s. nudum.

a. *Coroll. 4-fidis.*

1. *S. alpina*, corollulis quadrifidis æqua-  
libus; calycibus imbricatis; floribus cernuis;  
foliis pinnatis, foliolis lanceolatis serratis. L.

In monte *Saleva*; in montis *Thuiri* vallecula,  
qua primum a rupibus aditur. Sed abunde in  
*Aquilejensi* ditione, circa *Leisin*, *Corbeiri* et  
*Arveja* ad vias, in Monte *Luan* etc. Ego circa  
*Grion* ad oras agrorum. fl. Jul. Aug. 200.

2. *S. succisa*, (Teufelsabbis) corollulis  
quadrifidis æqualibus; caule simplici, ramis  
approximatis; foliis lanceolato-ovatis. L. Oed.  
Dan. 279.

In pratis udis, et sylvis umbrosis. fl. Aug. Sept.  
201.

(Var.  $\alpha$ . flore albo prope *Vervay* etc. H.

$\beta$ . hirsuta; in pratis udis Michelfeldensibus.

γ. foliis laciniatis in *Muteto* monte. C. B. Basil. pag. 80.)

3. *S. integrifolia*, corollulis quadrifidis radiantibus; foliis indivisis: radicalibus ovatis serratis, rameis lanceolatis; caule herbaceo. L.

In pratis circa *Ferrieres d'Erguel* et super *Portvaley*. In montibus Glaronensibus. fl. æstate. 205.

4. *S. arvensis*, coroll. quadrifidis radiantibus; foliis pinnatifidis incisis; caule hispido L. *Oed. Dan.* t. 447.

In pratis et ad vias ubique. fl. May - Aug. 206.

(Var. α. fol. superioribus semipinnatis, et albo flore; glabra.

β. foliis omnibus integris.)

5. *S. sylvatica*, coroll. quadrifidis radiantibus; foliis omnibus indivisis, inferioribus ovatis serratis, summis lanceolatis integerimis; caule hispido. *Jacq. austr.* 562.

In dumetis passim.. *Bernæ* versus *Muri* et cis *Bodenaker*; super *Rüggisberg*. In monte *Muteto*, *Aix* etc. 204. fl. Jul. Aug.

### b. Corollulis 5-fidis.

6. *S. graminifolia*, coroll. quinquefidis radiantibus; foliis linearis-lanceolatis integerimis (basi connatis, tomentosis) caule herbaceo. L.

Rara planta in alpibus *Helveticis* ad lacum *Locarnensem*, lecta, secundum *Scheuchzeri Catalogum*; a nemine præterea in *Helvetia* visa. 203.

7. *S. columbaria*, coroll. quinquefidis radiantibus; foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis pinnatis setaceis. L.

Vulgo ad vias siccas et in agris, flore dilute cæruleo, æstate.

(Var.  $\alpha$ . flore albo, in *Valesia* abundans, et ab ochroleuca diversa.

$\beta$ . prolifera; circa *Valkenried*, et *Basileæ* versus *Cliben*.

$\gamma$ . foliis omnibus ovatis, et firmioribus. In Monte *Fouly*, *Audon*, ad radicem montis *Titlisberg*. ) 202.

8. *S. pyrenaica*, coroll. quadrifidis radiantibus; foliis tomentosis integris, dentatis et pinnatifidis, caule unifloro. W.

(Inter plantas Cl. *Constant* fuit, lecta circa *Moutru*: sed unicum exemplum neque bonum fuit, neque ab eo tempore reperiri potuit, neque adeo pro certa civi haberi potest. 207.)

c. *Flores monopetali, monocarpi, inferi.*

56. PLANTAGO. (*Wegerich.*) G. pl. 186.

Cal. 4-fidus; cor. 4-fida, limbo reflexo.

Stamina longissima. Caps. 2-locularis, circumseissa, dissepimento libero.

*Scapo nudo.*

1. *P. major*, foliis ovatis glabris; scapo tereti; spica flosculis imbricatis. L. *Oed. Dan.* t. 461.

Ad margines agrorum, ad vias, in hortis ubique fl. Jun - Aug.

(Var. magnitudine, foliis varie dentatis et sinuatis 66o.

Reperitur etiam aliquando caule foliato extra portam *S. Blasii*, in via, qua itur ad molendinas cuprarias. C. B. *Basil.* pag. 56.)

2. *P. media*, fol. ovato-lanceolatis pubescens, spica cylindrica; scapo tereti. L. *Oed. Dan.* t. 581.

In pratis. fl. Maj. Junio 659.

3. *P. lanceolata*, fol. lanceolatis; spica subovata nuda, scapo angulato. L. *Oed. Dan.* t. 437.

Variat magnitudine, spicarum et nervorum in foliis numero; imo habemus varietatem alpinam capitulo nigro, scapoque longe lanuginoso.) Vulgaris ad vias ubique. fl. Maj-Aug. 656.

4. *P. alpina*, fol. linearibus planis; scapo tereti hirsuto; spica oblonga erecta. L. *Jacq. hort.* t. 125.

In omnibus alpibus, inque Juræ summis iugis vulgaris, *Nadelgras* dicta alpicolis, qui plurimi ea pascua faciunt, in quibus abundat. 657.

5. *P. coronopifolia*, fol. linearibus dentatis (subhirsutis) scapo tereti. L. *Oed. Dan.* t. 272.

*De Saussure prope St. Julien, versus Fragi.* 658.

*Caule ramoso.*

6. *P. psyllium*, caule ramoso herbaceo, foliis (linearibus) subdentatis recurvatis, capitulis aphyllis. L. *Bull.* t. 363.

*Genevæ ad vias.* 661.

7. *P. cynops*, caule ramoso suffruticoso (procumbente) foliis integerrimis filiformibus strictis, capitulis subsoliatis. L.

*Genevæ.* 662.

57. CENTUNCULUS. (*Wiesenkleinling.*)

*G. pl.* 189.

Cal. 4-fidus; cor. 4-fida, patens; stam. longitudine ferme corollæ; caps. 1-locularis, circumscissa.

*C. minimus*, caule minimo procumbente; foliis lanceolatis alternis sessilibus; floribus sessilibus, solitariis. *Oed. Dan.* t. 177.

Abunde inter Lacum Lemanum et les *Grangettes*, ultra *Noville*. Cl. la *Chenal*; circa *Domum rubram Basil.* 627.

d. *Flores monopetali, monocarpi, superi.*

58. SANGUISORBA. (*Wiesenknopf.*) G.  
pl. 190.

Cal. 2-phyllus; cor. 4-partita; german inter calycem et corollam.

S. *officinalis*, spicis ovatis. L. Oed. Dan.  
t. 97.

In pratis udis abunde. fl. Jul. Aug. 705.

e. *Flores monopetali, dioici, superi.*  
*Stellatae.*

59. SHERARDIA. (*Sherardie.*) G. pl. 156.

Cor. 1-petala, infundibuliformis; semina bina, dentibus 3 coronata.

S. *arvensis*, fol. omnibus verticillatis; floribus terminalibus. L. Oed. Dan. t. 459.

In omnibus agris abunde fl. Jul-Autumnum. 734.

60. ASPERULA. (*Waldmeister, Meyer-kraut.*) G. pl. 157.

Cor. 1-petala, infundibuliformis; semina 2, integumento globoso tecta.

i. A. *odorata*, fol. octonis lanceolatis; florum fasciculis pedunculatis. L. Oed. Dan. t. 562.

In sylvis non rara. 728. In monte Muteto et aliis C. B. Basil. 95. fl. Maj-Jul.

2. *A. arvensis*, fol. senis; floribus sessili-  
bus terminalibus aggregatis. L. Hoppe *Ectypa*.  
78.

In agris circa *Mathod*, *Montcharand*. In Va-  
lesia inferiori; circa *Chur*. *Basileæ* in agris, per  
quos ascenditur ad montem *Mutetum*. Circa  
*Genevam*, *Grandson*, *Ondervilliers* etc. 733. fl.  
Maj-Jul.

3. *A. taurina*, fol. quaternis ovato-lan-  
ceolatis, floribus fasciculatis terminalibus.  
L. J. Bauh. H. P. III. 718. fig.

In subalpinis. Abunde circa *Interlaken* in syl-  
va der grosse Rucken. Inter Stein et Schweiz, et  
versus Art in sepibus. Circa Kertzen. In ad-  
scensu montis Blattenberg. In monte Furkmatt  
Glaronensium. Circa Lucernam, a Butikon ad  
*Chur* ubique. 732.

4. *A. tinctoria*, fol. linearibus, inferiori-  
bus senis, intermediis quaternis; caule flacci-  
do; floribus plerisque 3 - fidis. L. Tabern.  
t. 733. fig. 1.

In sylvis, circa Montcharand versus la Dou-  
viere. 729. fl. Jun. Julio.

5. *A. pyrenaica*, fol. quaternis lanceolato-  
linearibus; caule erecto; floribus sæpius tri-  
fidis.. L.

Cel. D. *Achilles Mieg* plantam circa *Basilicum* legit. 731.

6. *A. cynanchica*, fol. quaternis linearibus, superioribus oppositis; caule erecto; floribus 4-fidis. L.

Abunde ad oras viarum, et sepes. fl. aestate.  
730.

(Var. flore trifido circa arcem *Martinach.*)

61. **GALIUM.** (*Labkraut.*) *G. pl.* 162.

Cor. 1-petala, rotata; semina 2, integumento globoso tecta.

*Fructu glabro.*

1. *G. rubioides*, fol. quaternis lanceolato-ovatis æqualibus, subtus scabris; caule erecto; fructibus glabris. L.

*Chiavennae, Mendrisii, Lugani*, in sepibus.  
720.

2. *G. palustre*, fol. quaternis obovatis inæqualibus; caulibus diffusis. L. *Oed. Dan.* t. 423..

In aquosis circa *Mathod, Paterniacum.* In palustribus *Michelfeldensibus* etc. 719. Jun. Aug.

(Var. caule vix pedali, foliis tamen quaternis; et caule altiori, fol. senis angustioribus.)

3. *G. Halleri*, fol. octonis linear-lanceolatis mucronatis subtus canaliculatis; pe-

dunc. trichotomis verticillatis ; caule glabro.  
tereti erecto. S.

Ad summas rupes castelli *Istein*. Circa *Gen-*  
*vam*. Au *Creux de Genthoud*, près de la mai-  
son *Lullin*. 714.

(Legi etiam hoc **G.** in monte *Engelberg* prope  
*Tobinium*. Omnino a *montano* differt, et cui  
comparari posset, non invenio. Folia octona,  
etiam sena in summis ramis, sursum rigentia,  
retroversu aspera. Caulis in geniculis tumescit,  
semina glabra.)

4. **G. Boccone**, fol. senis linearibus sub-  
asperis ciliatis mucronatis ; pedunc. sub-  
trichotomis ; caulis tetragonis prostratis ob-  
liquis subalatis basi pubescentibus. S.

Vulgatissimum ad vias, sepes, in arvis et la-  
pidosis 715.  $\alpha$ .

5. **G. hirsutum**, fol. suboctonis lanceo-  
lato-linearibus hirtis acuminatis ; pedunc.  
subtrichotomis ; caule subtetragono basi pu-  
bescente. S.

Hoc montana amat et sicca, et erit *Halleri*  
var. *hirsuta* præcedentis.

(Differt adhuc fol. longioribus et caule tenuiori.)

6. **G. scabrum**, fol. suboctonis linearibus  
mucronatis : inferioribus pubescenti-hispidis,  
superioribus scabris ciliatis ; pedunc. subtri-

chotomis ; caule adscendente flexuoso-sub-tetragono inferne hispido. S.

Iisdem locis. (*Caulis superne glaber.*)

7. *G. glabrum*, fol. suboctonis glabris linearis-lanceolatis spinula terminatis ; pedunc. trichotomis ; caule adscendente subramoso glaberrimo. S.

*Schleicher* misit inventum.

(Non inveni, nec *Hallerus* invenerat. An *G. austriacum* ? Planta tota viridis.)

8. *G. Jussieui*, fol. subsenis linearis-subulatis laevibus ; flor. umbellatis ; caule adscendente. W.

In Alpibus.

(Hoc crit. *G. Halleri*. 715. y. et ejus varietas β. rubro flore circa *Gestinen*.)

9. *G. aristatum*, fol. octonis lanceolatis laevibus ; panicula capillari ; petalis aristatis ; semin. glabris. L.

Hoc *Scheuchzerus* in Alpibus Rhæticis invenit, sexis innatum, non ultra spithamam altum, flor. niveis onustum. It. Alp. pag. 140.

(*Hallerus* ejus synonymon *G. boreali* addit, non bene, cum hoc habeat folia quaterna. Ego *Linnaeum* secutus, ob *Bocconis* synonymon.)

10. *G. saxatile*, fol. senis obovatis obtusis glabris ; caule ramosissimo procumbente ;

pedunc. axillaribus brevissimis paucifloris. S.

Ubique in saxis alpinis. 718.

11. *G. verum*, fol. octonis linearibus sultatis; ramis floriferis brevibus. L. *Flor. Dan.* t. 1146.

Abunde ad vias et in arvis siccis. 710.

12. *G. Mollugo*, sol. octonis ovato-linearibus subserratis patentissimis mucronatis; caule flaccido; ramis patentibus. L. *Fl. Dan.* t. 455.

Ad sepes et in pratis. 711.

(Var. caule humillimo in Alpibus.)

13. *G. sylvaticum*, fol. octonis lato-lanceolatis glaucis lævibus subtus margineque scabris, floralibus binis; pedunc. capillaribus; caule lævi tereti. S.

Vulgo in nemoribus. 712.

14. *G. glaucum*, sol. verticillatis linearibus; pedunc. dichotomis summo caule floriferis; caule lævi. L. *Jacq. austr.* t. 81. *Oed. Dan.* t. 609.

Circa Genevam. Basileæ in asperis collibus. 716.

15. *G. purpureum*, fol. verticillatis linearisetaceis; pedunc. capillaribus folio longioribus. L.

In arenosis ad *Lacum Luganensem* prope Ca-

*po di Lago*; in rupibus prope *Ripa*; et inter *Ripa* et *Chiavennam*. 721.

(Caulis ramosissimus; folia plerumque octona; flores et caules atropurpurei. Hall.)

### *Fructu scabro.*

16. *G. spurium*, fol. senis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis; geniculis simplicibus; fructib. recurvatis scabris. Roth.

Circa *Chexbres*, et in agris circa les *Saugettes* prope *Noville*, *Basileæ*. Au *Locle*, et circa *Ferrière*. 724.

17. *G. harcynicum*, fol. subsenis obovatis mucronatis: summis angustioribus; caule procumbente; ramis confertis elongatis; pedunc. multifloris. Ehrh. Hofm. Germ. III. pag. 72.

In agris circa *Basileam*. In monte *Mürtschen* 717.

(Caulis ramosissimus humilis subtetragonus. Schleicher etiam invenit.)

18. *G. uliginosum*, fol. senis lanceolatis retrorsum serrato-aculeatis mucronatis rigidis; coroll. fructu majoribus. L. Barellier, ic. 82.

In oris stagnorum et pratis uidis. *Basileæ*, eir-

**ca Augst**, *Michelfelden et Tobinii*. Etiam in  
Alpibus : *Audon, Ormont dessus*. 713.

(Caulis asper sulcatus; folia sena et septena.)

19. *G. lucidum*, fol. senis linearis-subula-  
tis mucronatis rigidis incurvis atro-vire-  
tibus; panicula terminali; caule glabro sul-  
cato quadrangulo. S. *Allioni Ped.* 21. t. 77.  
f. 2.

Ad rupes calidas inventum misit *Schleicher*.

(Planta revera virore splendet, nomine digna.)

20. *G. boreale*, fol. quaternis lanceolatis  
trinerviis glabris; caule erecto; semin. his-  
pidis. L. *Fl. Dan.* t. 1024.

Abunde in pratis circa *Vervay* prope *Roche*.  
In pratis *Bemont* prope *la Brevine, à la Chaux* etc.  
**Circa Thermae Leucenses** etc. 722.

21. *G. rotundifolium*, fol. quaternis sub-  
rotundo - ovatis trinerviis hispido - ciliatis;  
caule decumbente; fruct. hispidis. W. *Jacq.*  
*austr.* t. 94. *Barrel.* ic. 323. 324.

In sylvis abiegnis: prope *Bernam* in sylvula,  
qua descenditur ad villam *Bodenaker*, in sylvis  
montis *Gurten*; circa *Balnea Gurnigel et Weis-*  
*senburg, Tobinii im Boowald*. 727.

22. *G. Aparine*, fol. octonis lanceolatis ca-  
rinis scabris retrorsum aculeatis; geniculis  
villosis; fruct. hispidis. L. *Oed. Dan.* t. 495.

Abunde in segetibus et pratis. 723.

*B.* flore purpureo, in Rhætia, et au haut de la Combe grède.

23. *G. parisiense*, sol. verticillatis linearibus; pedunc. bifloris; fructib. hispidis. L.

Circa St. Roc, ad pedem montis *Grisei* in rupibus. Etiam Rupe in udis. 726.

(Caulis scaber tetragonus; folia 6-7, in ora hirta; flores albi peregrini. Hall.)

## 62. RUBIA. (*Färberröthe.*) G. pl. 164.

Cor. 1-petala campanulata; baccæ 2-, monospermæ.

*R. tinctorum*, sol. subsenis lanceolatis margine carinaque aculeatis; caule angulo aculeatis. S.

In Valesia circa *Leucam*, versus pontem Rhodani; circa *Sedunum Gonthey*, a la Porte du Sex. In pago *Yvorne* propo pontem, paulo superius in lapidosis. Circa Spiez. 708.

F. *Flores tetrapetali superi.*

## 63. CORNUS. (*Hartriegel.*) G. pl. 194.

Involuer. saepius 4-phyllo; petala supera 4; drupa 2-locularis.

1. *C. mascula*, arborea; umbellis involucrum æquantibus. L.

Frequens in rupibus agri *Veragrici*, etiam proxime Roche trans torrentem. 815. fl. Apr. Majo.

2. *C. sanguinea*, ramis rectis; fol. ovatis concoloribus; cymis depressis. *l'Herit. Oed. Dan.* t. 481.

Vulgo ad sepes. Jun. Jnl. 816.

64. TRAPA. (*Wassernuss, Stachelnuss.*)  
*G. pl. 208.*

Cal. 4 partitus; cor. 4-petala; nux 1-lo-  
cularis spinis 4oppositis armata, quæ folia  
calycis fuere.

*T. natans*, nucibus quadricornibus; spi-  
nis patentibus. L.

In stagnis *Hiltelingæ*. Inter montem *beligardum* et *Basileam*. In lacu *Tigurino*, circa *Tun-gen* et *Andelfingen*. In lacu *Chiavennensi* et *Ebroudunensi* etc. 527.

*G. Flores incompleti, inferi.*

65. ALCHEMILLA. (*Sinau.*) *G. pl. 222.*

Cal. 8-fidus; cor. 0; stylus ad basin ger-  
minis insertus; sem. 1.

1. *A. vulgaris*, fol. reniformibus novem-  
lobis acute dentatis; corymbis terminalibus.  
*W. Oed. Dan.* t. 693.

In pratis et sylvis; etiam in Alpibus, 1566.  
Maj. Jun.

2. *A. maxima*, in Glaronensium Alpe *Bärenbo-den*. *Scheuchz. It. Alp.* p. 329.

*γ. pubescens*, in *St. Bernhardo* et vicinis Alpibus.

2. *A. alpina*, fol. digitatis serratis subtus sericeis. *S. Oed. Dan.* t. 49.

In Alpinis, subalpinis, et Juræ cacuminibus ubique. 1567.

3. *A. pentaphyllea*, fol. quinatis multifidis glabris. L.

Rarior, et altiorum alpium: in *Gemmio, Furca, Gotthardo, Pilato, Alpibus Abbatiscellani, Speluga. Supra Bagnes. In St. Bernhardo.* 1568-

4. *A. Aphanes*, fol. tripartitis: laciniis trifidis pubescentibus; flor. axillaribus glomeratis monandris. *W. Fl. Dan.* t. 973-

H. Flores incompleti superi.

66. ISNARDIA. (*Isnardie.*) *G. pl. 207.*

Cal. 4-fidus; cor. o; caps. 4-locularis, calyce cincta.

I. *palustris*. L.

*Schleicher* misit inventam.

67. CAMPHORATV *glabra*, an nobiscum habitat, ut *Linnaeus* affirmat, alii inquirant. *Bauhini* planta spectat ad *Polygonem arvense, Hallero* monente ex fide Horti sicci, 1570. Nomen apposuisse non piget; studiosi animadvertant.

DIGY-

## D I G Y N I A

68. CUSCUTA. (*Flachsseide.*) *G. pl. 227.*

Cal. 4-5-fidus ; cor. 1-petala ; caps. 2-lo-cularis , circumscissa.

1. *C. europaea*, flor. sessilibus. L. *Oed. Dan. t. 199.*

In urtica vulgo nascitur 654.  $\alpha.$

2. *C. Epithymum*, flor. sessilibus 5-fidis ; bracteis obvallatis. L. *Oed. Dan. t. 427.*

In Thymo, Sideritide, Origano, Serpillo, Erica aliisque humilibus plantis provenit ; vulgaris in calidis rupibus. 654  $\beta.$

## T E T R A G Y N I A.

69. ILEX. (*Stechpalme.*) *G. pl. 232.*

Cal. 4-dentatus ; Cor. 1-petala, rotata. Styl. o ; bacca subrotunda 4-sperma.

I. *Aquifolium*, sol. ovatis acutis spinosis nitidis undulatis ; flor. axillaribus subumbellatis. W. *Oed. Dan. t. 508.*

Vulgo in sepibus etsylvis. 667 fl. Majo.

$\beta.$  Absque spinis. in colle Soquenil prope Roche.

70. POTAMOGETON. (*Saamenkraut.*) *G. pl. 234.*

Cal. o ; cor. 4-petala, Styl. o. Sem. 4 , acuminata , gibba.

1. *P. natans*, fol. natantibus petiolatis ellipticis acutis basi rotundatis subeordatis. W. Oed. Dan. t. 1025. 3

In stagnis et fluv. tranquillioribus ubique. 845. Jun. Jul.

2. *P. perfoliatum*, sol. cordatis amplexicaulibus. L. Oed. Dan. t. 196.

Vulgo in lacubus et stagnis. 845.

3. *P. fluitans*, fol. natantibus longe petiolatis lanceolato-ovatis utrinque attenuatis. W.

Hoc Halleri credo, qui nunquam reperit, sed habuit ex horto sicco Hagenbachii, Bernæ lectum. 844.

(Cl. Wildenow solam forsitan veritetatem *P. natantis* credit.)

4. *P. densum*, sol. ovatis acuminatis oppositis confertis; caulis dichotomis; spica quadriflora. L.

Vulgo in rivis. 849. fl. Jun. Jul.

5. *P. lucens*, fol. lanceolatis planis in petiolum desinentibus. L. Oed. Dan. t. 195.

In lacubus, fluviis, fossisqne paludosis. 847. fl. Jun. Jul.

6. *P. crispum*, fol. lanceolatis alternis oppositisve undulatis serratis. L. Fl. Dan. t. 927.

In rivulis, quorum fluentum inclinatis caulis sequitur. 848. fl. Maj. Jun.

7. *P. serratum*, fol. lanceolatis oppositis subundulatis. L.

8. In lacubus, longissima, decem et viginti Orygarum planta integras mediis iu aquis sylvulas efficit. Sed etiam in fossas subit, circa *Gampelen* etc. 846. fl. Jun. Jul.

8. *P. compressum*, fol. linearibus obtusis; caule compresso. L. *Oed. Dan.* t. 205.

In paludosis circa *Gümlingen* et *Muri*. *Basileæ* in fonte palatii *Durlachensis*. *Friedelingæ*. 851 Fl. Jul.

9. *P. gramineum*, fol. lineari lanceolatis alternis sessilibus, stipula latioribus. L. *Oed. Dan.* t. 222.

Locum non addidit *Hallerus*. 850

10. *P. marinum*, fol. linearibus alternis distinctis, inferne vaginantibus. L. *Vaillant Paris.* t. 32. f. 5. *Oed. Dan.* t. 186.

Passim *Tiguri*, *Basileæ*, circa *Seelhofen*. 853. fl. æstate.

11. *P. pusillum*, fol. linearibus oppositis alternisque distinctis basi patentibus; caule tereti. L. *Vaillant Paris.* t. 32. f. 4.

In paludosis *Gürbenmoos*; in *Reusa* flumine etc. 852. fl. Jun. Jul.

71. SAGINA. (*Mastkraut.*) *G. pl.* 236.

Cal. 4-phyllo; petala 4, calyce breviora. Caps. 1-locularis, 4-valvis, polysperma.

1. *S. procumbens*, ramis procumbentibus.  
L. Schk. t. 27.

Nihil vulgatius in areis glareosis hortorum, in testis plantas alentibus, in torfaceis, v. gr. Löhr. 861. fl. Jun. — Sept.

2. *S. apetala*, caule erectiusculo pubescente; floribus alternis apetalis. L. Fl. Dan. t. 845.

*Tobinii* in agris siccis, et in hordeo inveni.  
Etiam misit *Sahleicher*.

(Cal. margine purpurascens; petala minutissima, vix nudo oculo conspicua, alba, obcordata; antheræ albæ) Hofman. Germ. 59. Adde petiolos pubescentes. Fl. Maj-Aug.

---

*Classis V.*

PENTANDRIA,  
MONOGYNIA.

---

A. Flores monopetali, inferi, <sup>5</sup>te-  
traspermi.

72. HELIOTROPIUM. (*Sonnenwende.*  
*Skorpionschwanz.*) G. pl. 239.

Cor. hypocrateriformis, 5-fida, interjec-  
tis dentibus: fauce nuda.

1. H. *europaeum*, sol. ovatis integerrimis  
tomentosis rugosis, spicis conjugatis. L. Jacq.  
*Austr.* t. 207.

*Genevæ*, in Aquilejensi dominio; circa *Che-  
bres* et alibi in agro Vaudeusi. C. B. *Easileæ* in  
agris ad *Cliben* et ad *St. Jacobum*. *Basil.* p. 75;  
ego in Valesia ad vias.

(Var. Jasmini odore, circa *Mathod*, *Valeyre*,  
*Yvorne.*) 593. Fl. Jul. Aug.

73. *MYOSOTIS*. (*Mausohr.*) *G. pl. 240.*

*Cor. hypocrateriformis, 3-fida, emarginata, squamulis fornicatis 5, fauce clausa.*

1. *M. palustris*, seminibus lœvibus; calycibus patulis obtusis corollam æquantibus; foliis subglabris ligulatis. *Hofm. Germ.* p. 61.

Frequens in paludosis. 591 α. Fl. æstate tota.

(*Varietas flore albo Bernæ et in Alpibus.*)

2. *M. sylvatica*, calycibus patulis acutis hirsutis; foliis ovato-lanceolatis. *Hofm. l. c.*

Hanc *Halleri* 591. β. credo; in sepibus, circa *Bernam* vulgatissimam.

3. *M. arvensis*, seminibus lœvibus; calycibus tubo corollæ longioribus clausis; foliis hirsutis, obovato lanceolatis, imis petiolatis, superioribus sessilibus; caule ramoso. *S. Bull. t. 355.*

Vulgo ad vias, in pratis et arvis. 590. Fl. Maj-Aug.

(*Variet flore albo, rubello; et β. flore minimo, cuius pars interior lutea sit. Hæc in arvis macilentioribus.*)

4. *M. nana*, seminibus lœviusculis margine serrulatis; caule simplici paucifloro, foliisque oblongis villosis. W.

In Alpibus circa fontes *Gurben* fl. In monte *Simplon*; in Alpibus Vallis *D. Nicolai*, en *Chaud commun.* In *Pilato*.

(*Galyces tomentosi*, *flos maximus in tota gente, pulcherrime cæruleus.*) 592. Inveni in *Panerossaz*. Aug. fl.

5. M. *Lappula*, seminibus aculeis glochidibus; fol. lanceolatis pilosis. L. *Oed. Dan.* t. 692.

Frequens in omni Helvetia ad vias aridas, in que muris 589.

74. LITHOSPERMUM. (*Steinsaame.*) G.  
pl. 241.

Cal. quinquepartitus; cor. infundibiliformis, fauce perforata nuda.

1. L. *officinale*, sem. lœvibus; corollis calycem vix superantibus; foliis lanceolatis. L. *Schk. t. 29. Fl. Dan.* t. 1084.

Ad vias, et potissimum in glareosis ripis et insulis fluviorum. 595. Fl. April-Jun.

2. L. *arvense*, sem. rugosis; cor. vix calycem superantibus. L. *Oed. Dan.* t. 456.

In segetibus pene totius Hélvetiæ abunde, potissimum planioris. 594 Fl. Maj. Jun.

3. L. *purpureo-coeruleum*, sem. lœvibus; cor. calycem multoties superantibus. L. *Jacq. Austr. t. 14.*

Abunde in sepibus Gubernii Aquilejensis, in colle *Saquenil*, in ipso prato *Pré pourri*, circa scaturiginem *le Furet*, supra *Bevieux*, circa

*le Bullet. Circa Genevam, versus Champé. Basileæ versus Dornach: in sylva, qua itur a Münchenstein ad Muttenz, ad dextera. Circa Scaphusiam. 596. Fl. Maj. Jun.*

75. ANCHUSA. (*Ochsenzunge.*) *G. pl. 242.*

Cor. infundibiformis, fauce clausa squamulis quinque; semina basi insculpta.

1. A. *Italica*, fol. lucidis strigosis; racemis bipartitis diphyllis; floribus subæquilibus fauce barbatis. *Retz. Obs.*

2. A. *angustifolia*, fol. oblongo-lanceolatis integris, floribus spicatis, calycibus quinquefidis. *W.*

(Cum descriptio *Halleri* ad has duas plantas spectet, conjungere satius duxi, quam unam alteramve separare. 599.

Invenitur flore violaceo inter *Vettis* et *Mellipsch* Rhætiæ. Cæruleo, multis locis: circa *Versoi*; supra *Gorgier*; circa *Gonthey*, Chur et in tota Rhætia. In valle *Lepontia*: circa *Chiavennam*. Et ego in Valesia inveni ad oras vinearum post *Aven*; hæc certe *Italica* est. Fl. Augusto. utcunque sit, utramque habemus; nec vere differt *officinalis*.)

76. CYNOGLOSSUM. (*Hundszungen.*) *G. pl. 243.*

Cor. infundibiformis, fauce clausa squa-

mis 5; semina 4 depressa, interiore tantum latere stylo affixa.

1. *C. officinale*, staminibus corolla brevioribus; sol. lato-lanceolatis, basi attenuatis tomentosis sessilibus; laciniis calycinis oblongis. W. Schk. t. 30. *Fl. Dan.* t. 1147.

Ad vias, et fossarum aggeres frequens. 587.  
*Fl. Maj.-Jul.* (var. albo flore.)

2. *C. sylvaticum*, staminibus cor. brevioribus; sol. lanceolatis asperis planis, subsessilibus remotis. *Hofm. Germ.* 63.

In montanis sylvis, au *Creux du Vent*, in aditu boreali; a la *Chenau* supra Aquilejam. A la *Combe de la Ranceniére*; prope molendinum *Cul de Roche*; a la *Combe gréde*. 588.

(Affinis Apennino, vel ejus varietas. *Hofmann. l. c.*)

77. PULMONARIA. (*Lungenkraut.*) G.  
pl. 244.

Cal. 5-dentatus, prismatico-5-gonus; cor. infundibuliformis, fauce pervia.

1. *P. angustifolia*, sol. radicalibus lanceolatis. L. *Oed. Dan.* t. 483.

Nobis montana est; et copiose nascitur in montibus Gubernii Aquilejensis, in sylvis versus *Luan*, au *Richard*, circa *les Plans*. Ad rium prope *Dœnum novam Basileæ*. In Comitatu Neocastrensi. 598. *Fl. vere.*

2. *P. officinalis*, fol. radicalibus ovato-cordatis scabris. L. *Oed. Dan.* t. 482.

Nobis aliquanto rarius maculata, ceterum in sylvis, sepibus, locis subhumidis et umbrosis provenit. Maculosa, circa *Genevam*, *Basileam*, *Roche*. 597. Fl. Apr. Maj.

78. SYMPHITUM. (*Beinwell*, *Schwarzwurz.*) *G. pl.* 245.

Corollæ limbus tubulato-ventricosus, fauce clausa radiis 5 subulatis.

1. *S. officinale*, fol. ovato-lanceolatis, decurrentibus. L. *Oed. Dan.* t. 664.

Vulgatior flore ochroleuco ad rivos, in prati, paludosis et sylvis. Flore rubro breviori. *Tiguri* frequentior, *Basileæ* in arenosis cis *Birsam*, 600, et *Tobinii* ad rivos. Fl. Jun. Jul.

2. *S. tuberosum*, fol. semidecurrentibus, summis oppositis. L. *Jacq. Austr.* t. 225.

*Schleicher* invenit.

79. CERINTHE. (*Wachsblume.*) *G. pl.* 246.

Corollæ limbus tubulato-ventricosus, fauce pervia. Sem. 2, bilocularia.

*C. major*, fol. amplexicaulibus; cor. obtusiusculis patulis. L. *Schk.* t. 30.

In montosis et alpinis sylvis. In montibus circa *Thun*; inter *Gurnigel* et *Neunenen*; in M.

*Stokhorn, Rothenhorn, Ioch, sur la Dent de Jaman.* Abunde vero in omnibus Aquileiensium subalpinis, et in *Jura, aux Bulles,* prope *Chaud de Fonds,* haud longe a *Valanvron.* 602.

80. ONOSMA. (*Lotwurz.*) G. pl. 247.

Cor. campanulata; limbus tubuloso-ventricosus; faux pervia; sem. 4.

*O. echiooides*, cor. cylindricis obtusis; foliis lanceolatis hispidis; fructibus erectis. W. Jacq. Austr. t. 295.

In Valesia abunde: circa *Branson, Fouly, Gonthey, Sideram.* Magna copia in via *le Tombey* inter *Verchier et Olon.* 601.

81. BORAGO. (*Boretsche.*) G. pl. 248.

Cor. rotata, fauce radiis clausa.

*B. officinalis*, fol. omnibus alternis, calyc. patentibus. L. Schk. t. 31.

In ruderosis; sed *vera* indigena non est. 607.

(Var. flore albo, carneo.)

82. ASPERUGO. (*Scharfkraut.*) G. pl. 249.

Cal. fructus compressus: lamellis plano-parallelis sinuatis.

*A. procumbens*, cal. fructus compressis. L. Oed. Dan. 552.

Passim circa *Roche, Aquilejam, a Fontanay, a Notre Dame du Sex.* In Rhætia et Valesia. 606.

83. LYCOESIS. (*Krummhals.*) *G. pl. 250.*

Cor. infundibiliformis, tubo incurvato.  
*L. arvensis*, fol. lanceolatis, hispidis, calycibus florescentibus erectis. L. *Curt. Lond.*  
 5. n. 57.

In agrorum limitibus et ad vias, inque ruderosis Aquilejæ, Aventici. *Bernæ im Lindenthal.*  
 605. Fl. Jun - Aug.

(Var. flore albo.)

84. ECHIUM. (*Natterkopf.*) *G. pl. 251.*

Cor. campanulata, limbo irregulari, fauce nuda.

1. *E. vulgare*, caule tuberculato-hispido; fol. caulinis lanceolatis hispidis; flor. spicatis lateralibus. L. *Oed. Dan.* t. 445.

Vulgo ad vias et in ruderatis flore rubro. Flore albo passim *a la grande* Eau. 603. Fl. Jun. Aug.

2. *E. italicum*, caule erecto piloso; spicis hirsutis; cor. subæqualibus, staminibus longissimis. L.

Albo flore in Valesia. 604.

b. *Flores monopetali, inferi, angiospermi.*

85. ARETIA. (*Aretie.*) *G. pl. 256.*

Cor. hypocraterif. 5-fida, tubo ovato; stigma depresso-capitatum. Caps. 1-locularis, globosa, subpentasperma.

1. *A. helvetica*, fol. imbricatis, flor. subsessilibus. L. Hall. tab. XI.

In Alpibus occidentalibus non rara: in Gemmio um die Taube: ubique in Aquilejensibus. Supra Portvaley, Bagnes in M. Salanfe, Herbagere, Dent de Midi. In Bündnerberg. 617. Fl. Jul. Aug.

(Caules, foliis pubescentibus, imis emarcidis, tecti, densissimos cespites faciunt. Flor. terminales, solitarii, albi.)

2. *A. alpina*, fol. linearibus patentibus, flor. pedunculatis. L. Hall. tab. XI.

Tripliçem varietatem habemus.

$\alpha.$  fol. linearibus, repandis, ciliatis; flore albo. —

In montibus vallis Ormond dessus, Prapiez, Audon, Taveyannaz, Richard, la Varaz (unde habeo) et Kienthal.

$\beta.$  fol. magis villosis, minus repandis, brevioribus; flore roseo. —

In M. St. Bernhard, Simplon; in glacialibus supra Bagnes et les Martinets,

$\gamma.$  calyc. et fol. tomentosis; flore purpureo. —

In M. Trone Rhætorum, et in Alpibus Vallis St. Nicolai. 618.

3. *A. Vitaliana*, fol. linearibus, recurvatis; flor. subsessilibus. L.

In altissimis Alpibus inter Valesiam et Italiam

positis : ut in *Sempronio* monte , super vallem  
*S. Nicolai* et *Praporgne* , et in valle d'*Angrogne*.  
 ( *Flos luteus.* ) 616.

86. ANDROSACE. (*Mannsschild.*) *G. pl.*

257.

Involucrum umbellulæ. Cor. tubus ovatus,  
 faux glandulis obsessa ; caps. 1-locularis,  
 globosa.

1. *A. maxima* , perianthiis fructuum maxi-  
 mis. L. Jacq. *Austr.* t. 331.

In segetibus circa *Aven* Valesiæ. 624.

2. *A. obtusifolia* , fol. lanceolatis basi an-  
 gustatis glabris , perianthiis angulatis pubes-  
 centibus. W. Allioni. Sp. pag. 22. t. 4.

In M. Jeman , col de *Ferry* , St. Bernhard ;  
 supra les Martinets ; supra le Val de *Bagnes* ;  
 in *Speluga*. 621 , ego in Panerossa reperi. Aug.  
 flor.

3. *A. villosa* , fol. linear-i-lanceolatis mar-  
 gine villosis , perianthiis villosis. W. Jacq.  
*Coll.* 1. t. 12. f. 3. et *Austr.* t. 332.

Vulgo in omnibus Alpibus , etiam in Iuræ jugis.  
*Dolaz* , *Falconario*. 620. ( *A. Chamæjasme* nimis  
 argute separatur. )

4. *A. lactea* , fol. lanceolatis glabris ; um-  
 bella involucris multoties longiore. L. Jacq.  
*Austr.* t. 333.

Frequens in Iura, in *Creux du Vent*, *Wasserfall*, *Thuiri* etc. 622. in M. *Fracto*, et ad *Thermas Fabarias* æstate floret. C. B. Prodr. 118. ex *Halleri* synon.

5. *A. carnea*, fol. linearibus ciliatis rugosis; floribus umbellatis. H. *Allioni*. Ped. Tab. V. f. 2. *Linnaei* Var. β.

In Alpibus Abbatiscellanis; in *Fouly*, *St. Bernhard*, *Salanfe*. In summo *Canigou* et *Ballon*. 619.

87. PRIMULA. (*Primel*, *Schlüsselblume*) G. pl. 258.

Involucrum umbellulæ; Cor. tubus cylindricus, ore patulo; Caps. 1-locularis apice 10-dentato dehiscens.

1. *P. officinalis*, fol. rugoso-dentatis; limbo corollarum concavo, tubi collo oblongo. *Hofm. Germ.* p. 67. *Oed. Dan.* t. 433.

In pratis, imprimis apricis 610. Fl. April. Maj.

2. *P. inodora*, fol. rugoso-dentatis; limbo coroll. plano, tubi collo hemisphærico. *Hofm. l. c. Oed. Dan.* t. 434.

Vulgatissima in sylvis, sepibus, locis umbrosis. 609.

(Flores exteriores nutantes.) Flor. April. Maj.

3. *P. acaulis*, fol. subtus villosis, pedun-

culis radicalibus unifloris. *Hofm.* l. c. *Oed.*  
*Dan.* t. 194.

In magna parte australis Helvetia. Incipit *Lausannæ*, inde per Vaudensia vineta in Aquilejenses continuatur, et ubique etiam hiemem ornat. Circa *Neocomum Curiæ*. 608. .

(Var. Flore viridi, pleno.)

4. *P. farinosa*, sol. rugosis crenatis glabris, subtus farinosis; flor. umbellatis, limbo plano. *S. Oed. Dan.* t. 125.

Vulgo in pratis humidis subalpinis; etiam *Bernæ* inter utrumque balneum. et inter *Seelhofen* et *Arolam* fl. Ita circa *Roche*, versus le *Furet*, circa *Tigurum*, *Scaphusiam*. Inde in Alpes adscendit: in *Enzeindaz*, *Fouly*. 623. In *Pilato*.

(Var. flore albo in Alpibus supra lez *Plans* et *Valesiacis*.)

5. *P. villosa*, sol. serrulatis planis hirsutis; scapo 1-2 floro. *S. Jacq. Austr. app.* t. 27.

In montibus *Scheideck*, *Gotthardo*, *Fouly*, *Jeman*, *St. Bernhard*, *Gamor*, *Nesso*. Etiam in planitiem cum rupibus descendit, et abundat circa fissuram rupium, per quam torrens le *Trient* in vallem prope *Martigny* erumpit. 618. 5

6. *P. longiflora*, sol. serratis glabris; umbella nutante; corollæ tubo longissimo. *L. Jacq. Austr. app.* t. 46. *Allion. Ped.* t. 39. f. 3.

In M, *Montemor Valesiae* superioris. 611.

(*Tubus floris* purpureus, *flos* violaceus.)

7. *P. marginata*, fol. obovatis, serrato-dentatis, albo-marginatis; scapo multifloro; involucri foliolis pedunculis brevioribus. W. ex *Curt. Mag.* 191.

In Alpibus Helveticis; nec *Hallero* nec aliis nota.

8. *P. Auricula*, fol. serratis glabris obovatis; scapo multifloro circiter longitudine foliorum. *Jacq. Austr.* t. 415.

In omnibus Alpibus. Vulgo luteo flore, albo passim, e. g. circa *Wesen*, in Iuræ montanis, *au Rocher des Voutières près d'Ondervilliers*. 612.

9. *P. minima*, fol. dentatis cuneiformibus nitidis hirsutis; scapis subunifloris. L. *Jacq. Austr.* t. 273.

Supra Gotthardum. *Hallerus* vero non reperit. 614.

(Corolla carnæa, intus hirsuta.)

10. *P. integrifolia*, fol. integerrimis ellipticis, ad oras subcrenato-cartilagineis; umbella erecta; calyc. longe tubulosis obtusissimis. *Jacq. misc.* 1. p. 160. *Fl. Austr.* t. 527.

In Alpibus passim, non tam en ubique. In M. *Joch*, *Sureneck*, *Septimo*; *Lunæ*; *Hohen-*

*kasten*, *Krajalp*, *Furkmatt*; *Mürtschen*, *Galand*. In *Spelugæ saxosis et paludosis siccis*. In *Gotthardo*. 615. (In *Pilato*.)

88. SOLDANELLA. (*Alpenglökgen.*) G. pl. 260.

Cor. campanulata, ore lacero-multifido; caps. 1-locularis, apice multidentato dehis- cens.

*S. alpina*, flor. nutantibus, laciniis den- tatis, stylo corollam excedente; sol. reni- formibus sublobatis. *Schmidt* bohem. *Jacq.* Austr. t. 13.

Ubique in *Alpibus*, qua nix nuper deliquescit. In *M. Dolaz*. Etiam in montanis. e. g. in *Ramlis- berg*. Var. flore albo. 634.

89. CYCLAMEN. (*Schweinbrod*, *Erd- scheibe.*) G. pl. 262.

Cor. rotata reflexa tubo brevissimo: fauce prominente; bacca tecta capsula.

1. *C. europæum*, sol. orbiculatis cordatis crenatis. *W. Jacq.* Austr. t. 401.

In subalpinis. Rupe; *au Rocher de la Praisse*, et e regione ad scopulos sub *Porta Saxi*. Circa *Wesen*, *Wallenstadt*, *Chur*, in *Rhætia*, ad lacum *Thunensem*. In *M. Saleva*, *Generoso*. In submontanis: passim in *Neocastrensi* comi- tatu. 635.

(Var. albo flore, parva, oblonga radice, etc.)

2. *C. hederæfolium*, fol. cordatis angustatis denticulatis. W.

In montibus Rhæticis habet *Lobelius*. Adv. ic. 605; sed præter eum nemo in *Helvetia* vidit. Hall. 635. var. s.

90. MENYANTHES. (*Zottenblume.*) G.  
pl. 263.

Cor. infundibiformis hirsuta; stigma 2-fidum; caps. 1-locularis.

M. *trifoliata*, fol. ternatis, cor. laciniis margine integris, superne barbatis. Roth Germ. Ocd. Dan. t. 541.

Frequens in fossis paludosis totius *Helvetiae*; etiam in subalpinis et montanis. 633. Fl. April-Jun.

91. HOTTONIA. (*Wasserfeder.*) G. pl. 265.

Cor. hypocrateriformis; stam. tubo corollæ imposita; stigma globosum; caps. 1-locularis.

H. *palustris*, fl. verticillatis pedunculatis. W.

Abunde in paludosis inter tres lacus; tum in fossis sub pago Bühl, Walperswyl et Michelfeldæ. 632.

(Folia quina, pinnata, supra aquam expansa.)

92. LYSIMACHIA. (*Weiderich.*) *G. pl. 269.*

*Cor. rotata*; caps. *globosa*, *mucronata*,  
*10-valvis*.

*Pedunculis multifloris.*

1. *L. vulgaris*, *paniculata*, *racemis terminalibus*. *L. Oed. Dan. t. 689.*

In udis, pratis et fossis frequenter. 630.

(Var. *fol. binis*, *ternis*, *quaternis*.) *Fl. Jun. Jul.*

2. *L. thrysiflora*, *racemis lateralibus pedunculatis*. *L. Oed. Dan. t. 517.*

Circa *Hegnau agri Tigurini*. 631.

*Pedunculis unifloris.*

3. *L. punctata*, *fol. subquaternis subsesilibus*; *pedunc. verticillatis unifloris*. *L. Jacq. Austr. t. 366.*

*Wildenow et Reichard in Helvetia nasci affirmat*, quo jure et cujus autoritate nescio. Saltem apposuisse non pigebit.

4. *L. nemorum*, *fol. ovatis acutis*; *flor-solitariis*; *caule procumbente*. *L. Oed. Dan. t. 174.*

*Vulgaris circa Bernam in sylvis*. (Et *Basileæ in sylva Wyleni* et ad *Wiesam in alneto*.) *Etiam in Alpes adscendit*. (e. g. in *Pilatum*.) 628. *Fl. Jun. Jul.*

5. L. *Nummularia*, fol. subcordatis; flor. solitariis; caule repente. L. *Oed. Dan.* t. 495.

Vulgo in humidis, præcipue sylvaticis. 629.

93. ANAGALLIS. (*Ganchheil.*) *G. pl.* 270.

Cor. rotata; caps. globosa, 1-locularis, circumseissa.

1. A. *phœnicea*, caule procumbente; fol. ovato-lanceolatis; calycis segmentis lanceolatis. Hall. *Hofm. Germ.* p. 70.

Ubique in arvis et hortis. 625. Fl. Jun.. Jul.

(Var. flore albo.)

2. A. *cærulea*, caule procumbente; fol. ovato-lanceolatis; petalis serratis; calycis foliis subulatis. Hall.

In agro Aventico, *Bernæ* nulla. 626.

Utramque in agris et hortorum areolis habet.

C. B. *Basil.* p. 74. sic ego circa *Tobinium*.

(Var. fol. ternis, quaternis.)

94. AZALEA. (*Azalee.*) *G. pl.* 277.

Cor. campanulata, laciniarum lateribus inflexis; stam. receptaculo inserta; caps. 5-locularis, 5-valvis.

A. *procumbens*, ramis diffuso - procumbentibus. L. *Oed. Dan.* t. 9.

In Alpibus imprimis agri Aquilejensis omnibus abunde.

In *Val de Lie, Gemmio, Gothardo; Grim-sula, Speluga, Albula, Adula* etc. 666.

**95. CONVOLVULUS. (*Winde.*) G. pl. 287.**

Cor. campanulata, plicata; stigmata 2; caps. 2-locularis, loculis dispermis.

1. *C. arvensis*, fol. sagittatis, utrinque acutis; pedunculis subunifloris. L. *Oed.Dan.* t. 459.

In agris et hortis nimis frequens 664. Fl. Maj-Jul.

2. *C. sepium*, fol. sagittatis postice truncatis; pedunculis tetragonis unifloris. L. *Oed. Dan.* t. 458.

Ubique ad sepes. 663. Fl. Jun-Aug.

**96. POLEMONIUM. (*Speerkraut.*) G. pl. 289.**

Cor. rotata, 5-partita, fundo clauso valvis staminiferis; stigma 3-fidum; capsul. 3-locularis.

*P. cœruleum*, fol. pinnatis; flor. erectis; calyc. tubo corollæ longioribus. L. *Oed. Dan.* t. 255.

In insula Rheni supra Märk. In Rhætiæ sylvis. In *Albulæ* descensu versus Bergün. In Descensu *Spelugæ*. In comitatu Neocastrensi.

In sylva Bremgarten cis die Neubruk prope Bernam. 665. Fl. æstate.

97. VERBASCUM. (*Königskerze.*) *G. pl.*

331.

*Cor. rotata, subinæqualis; filamenta inclinata villosa; caps. 2-locularis, 2-valvis.*

1. *V. thapsus*, *fol. decurrentibus, utrinque tomentosis; caule simplici.* L. *Oed. Dan. t. 631.*

*Ubique in glareosis, in fossis et ad vias 581.*  
*Fl. Jul. Aug.*

(*Var. fol. angustioribus decurrentibus, circa Fouly, Agaunum et Octodurum Valesiæ, 582. quod est V. bicolle Murray. prodr. monente Reichardo,*)

2. *V. Lychnitis*, *fol. ovato-lanceolatis, subtus incanis, radicalibus petiolatis, caulinis sessilibus; spica laxa ramosa.* *Oed. Dan. t. 586.*

*In ruderatis, ad vias. 583. Fl. Jul-Sept.*

(*Variat flore albo et luteo.*)

3. *V. nigrum*, *fol. crenatis, radicalibus petiolatis cordato-lanceolatis, caulinis sessilibus angustioribus.* S. *Fl. Dan. 1088.*

$\alpha$ . *Flore luteo ad vias vulgare.*

$\beta$ . *Flore albo. Badæ. Aquilejæ, et ad muros cœmeterii Künizensis. 584. Fl. Jun-Aug. (Filamenta purpureo-villosa.)*

4. V. *blattaria*, fol. glabris serratis, radicalibus petiolatis sinuatis, caulinis amplexicaulibus; spica rariori; pedunculis solitariis. S.

In pago Aventico passim, ut circa Urbam, ad pavimentum Mosaicum, in *Boseja*; circa *Montagny*, *Sussevaz*, *Freycovagnes*. Circa *Ebrodunum*, *Genevam*, ad sepes et agrorum limites. *Scaphusiae*.

(*Stamina purpura barbata*, *stylus violaceus*). 585.

98. DATURA. (*Stechapfel*.) G. pl. 332.

Cal. tubulosus deciduus; Cor. infundibuliformis, plicata. Caps. 4-valvis.

D. *Stramonium*, pericarp. spinosis erectis ovatis; fol. ovatis glabris. L. *Oed. Dan.* t. 456.

Americana planta, in hortis, simetis, et circa urbes. 586. Fl. Jun-Sept.

99. HYOSCYAMUS. (*Bilsenkraut*.) G. pl. 333.

Cal. tubulosus, inferne ventricosus; Cor. infundibuliformis obtusa semi-5-fida, lacinia unica reliquis latiore. Stam. inclinata; Caps. bilocularis circumscissa, operculo horizontaliter dehiscente.

H. *niger*, fol. amplexicaulibus sinuatis; flor. sessilibus. L. *Bull.* t. 93.

In simetis, ad vias et fossas. etc. 580. Fl. Jul-Aug.

100. ATROPA. (*Wolfskirsche*, *Tollkraut.*) *G. pl. 335.*

Cor. campanulata; stam. basi conniventia, superne extrorsum divergentia, arcuata; Bacc. globosa 2-locularis.

1. A. *Mandragora*, (*Alraun Tollkraut*) acaulis, scapis nulloris. L.

In præcipitis Montis *Generosi* Helvetiæ transalpinæ.

(*Flos subviolaceus*; fructus luteus, fœtidus.) 578.

2. A. *Belladonna*, caule herbaceo; sol. ovatis integris. L. *Jacq. Austr. t. 309.*

Ubique in sylvis cœduis. 579. Fl. Jul. Aug.

101. PHYSALIS. (*Schlutte.*) *G. pl. 336.*

Cor. rotata; Stam. conniventia; Bacc. intra calycem inflatum coloratum bilocularis.

P. *Alkekengi*, sol. geminis integris acutis; caule herbaceo, inferne subramoso. L. *Schk. t. 45.*

Minime rara circa *Mathod*, *Baume*, *Rex*, *au Furet*, *a la Praisse*, locis umbrosis. Sic *Tiguri*, *Basileæ* ad ædem *D. Albani*, et in dumetis circa *Brüglingen*. 577. Fl. Jul. Aug.

102. SOLANUM. (*Nachtschatten.*) *G. pl. 337.*

Cor. rotata; Antheræ subcoalitæ apice poro gemino dehiscentes. Bacc. 2-locularis.

1. *S. Dulcamara*, caule inermi frutescente flexuoso; fol. superioribus hastatis; racemis cymosis. L. *Oed. Dan.* 607.

In paludosis fossis frequens. 575. Fl. Jun-Aug.  
(Var. albo flore circa *Walkenried.*)

2. *S. nigrum*, caule inermi herbaceo; fol. ovatis dentato-angulatis; racemis distichis nutantibus. L. *Oed. Dan.* t. 460.

In hortis et ruderiosis. 576.  $\alpha.$   $\beta.$

(Var. baccis luteis, croceis; fol. angulatis, integris et magnitudine, cum in arenosis *Michelfeldæ* vix palmum excedat. C. B. *Basil.* p. 51.)

3. *S. villosum*, caule inermi herbaceo; ramis teretibus villosis; fol. ovatis angulosis villosis; baccis nigris acinis luteis. *Hofm.* *Germ.* p. 79.

In hortis subinde; circa Ferrieres. 576.  $\gamma.$

103. VINCA. (*Sinngrün.*) G. pl. 419.

Contorta. Cor. hypocrateriformis; Stigma capitatum orbiculo plano insidens; Folliculi 2, L-valves.

1. *V. minor*, caul. procumbentibus; fol. lanceolato-ovatis; flor. pedunculatis. L. *Blakewell.* t. 59.

Ubique in umbrosis primo vere ad Jun. 572.

Var. flore albo et purpureo: sic in sylvula super *Muri*, super scaturiginem *le Furet* prope *Roche Lausannæ*, (et *Tobinii.*)

2. *V. major*, caul. erectis; fol. ovatis; flor. pedunculatis. L.

In ruderosis et vetustis muris pagi *Yvorne*: similibus locis circa molendinum *Grand Champ* prope *Chillon*. 573.

c. *Flores monopetali, superi.*

104. CAMPANULA. (*Glokenblume.*) G.  
pl. 290.

Cor. campanulata, fundo clausa valvis staminiferis; stigma 5-fidum; Caps. infera 3-5-locularis, totidem foraminibus laterali- bus dehiscens.

*Foliis lævioribus.*

1. *C. cenisia*, catl. unifloris; fol. ovatis glabris integerrimis subciliatis. L. *Allioni*. Ped. T. VI. f. 2.

Circa rupes glaciales *les Martinets, à la Vara*z, *Serin, Fouly*. 696. (folia sessilia.)

2. *C. rotundifolia*, glabra; fol. radicalibus oblongis reniformibus dentatis, caulinis linearibus integerrimis. W. *Oed. Dan.* t. 189.

Vulgo in muris et ad vias. 701. Fl. Jul. Aug.

3. *C. pusilla*, fol. omnibus serratis, radicalibus cordato-ovatis, firmis, nitidis, caulinis linearibus alternis remotis. *Jacq. Collect.*

2. p. 79.

Frequens in Alpibus: Flore albo passim

*Scheuchzer*, flore cœruleo in planitem descendit, ut in insulas Arolæ supra Bernam. 702. (*in Enzeindaz* Augusto florentem inveni.)

4. *C. linifolia*, fol. pubescentibus, radicalibus obovato-lanceolatis subserratis; caulinis linear-i-lanceolatis; caule subunifloro pubescente. S. *Barrel.* ic. 487. *Allioni Ped.* t. 6. f. 1.

In valle Ursaria. In montibus Aquilejensibus.  
700.

(Sic ego inveni; etiam in *Gemmio* Augusto florentem, et inter *Enzeindaz* et *Diableret*.)

5. *C. Schleicheri*, fol. omnibus linearibus integerrimis glabris subciliatis; flor. axillariis secundis cernuis; caule glaberrimo S.

Hanc misit in Alpibus inventam Cl. *Schleicher*, nomine *C. Scheuchzeri*. Hæc vero uniflora est, et habet folia radicalia rotundiora (*C. Linifolia*). Nostra habet 6-7-flores secundos, glaberrima est etc. Ab omnibus diversa, inventoris nomine digna. An *C. Linifolia rara*. I. *Bauh. H.P.* II. 797? Videtur.

6. *C. patula*, fol. strictis; radicalibus lanceolato-ovalibus; panicula patula. L. *Oed. Dan.* t. 373.

In descensu montis *Gotthard* versus pontem *Diaboli*. 698. (Flor. exigui parvi; cal. ad laciniarum basin denticulo 2-fido. *Hofm. Germ.* p. 71.

7. *C. Rapunculus*, fol. radicalibus lanceolato-ovalibus undulatis, caulinis serratis; caule angulato scabro; floribus paniculatis.  
*Oed. Dan.* t. 855.

Vulgo ad vias, scipes, sylvarum oras, nec raro albo flore. 699. *Fl. Maj.-Jul.*

8. *C. persicifolia*, fol. radicalibus obovatis, caulinis lanceolato-linearibus subserratis sessilibus remotis. L. *Bull. t. 367. Fl. Dan.* t. 1087.

Circa Basileam, Aquilejam, Echarpigny, et in agro Aventico ubique; tum circa Genevam, Neocomum, Gorgier, inter Sonceboz et Biennam ad oras nemorum. 697. *Fl. Jul. Aug.*

9. *C. rhomboidea*, fol. rhomboidibus serratis; spica secunda; calyc. dentatis. L. *Barrel. ic. 567.*

In Alpinis et submontanis pratis et sylvis per frequens: Flore albo circa Geschinen. 693.

(Sunt quidem flores aliquot per caulem sparsi, sed summi glomerati, tanien secundi.)

### *Foliis scabris.*

10. *C. latifolia*, caule tereti striato glabro; fol. ovato-lanceolatis duplicato serratis; pedunc. axillaribus unifloris erectis; calycibus glabris. Schmidt, apud W. *Oed Dan.* t. 85..

*A la Combe de Valanvron, et au Cul des Près,  
alibique in sylvis obscuris. Etiam ad Lacum  
Rivarium. 691.*

11. *C. rapunculoides*, fol. cordato-lanceo-  
latis; caule ramoso; flor. secundis, sparsis,  
calyc. reflexis. L.

In sepibus inter *Arlesheim* et *Mönchenstein*.  
In segetibus circa *Genevam*. Circa *Roche* abun-  
de, et imprimis *Agauni*, ad oppidi introitum.  
*Circa St. Imier. 692.*

12. *C. bononiensis*, fol. amplexicaulibus  
ovato-lanceolatis serratis, subtus tomentosis,  
sessilibus, caule paniculato. S.

Unico loco reperta, inter *Branson* et *Fouly*.  
689.

(*Thomas* reperit etiam à *Gontey* Valesiae infe-  
rioris, ad oras vinearum.)

13. *C. Trachelium*, fol. petiolatis, corda-  
to-lanceolatis, acute serratis, hirsutis; flor.  
nutantibus, pedunculis trifidis triflorisque;  
calycibus hispidis. S. *Bull. t. 319. Fl: Dan.*  
*t. 1026.*

Nihil vulgatus ad sylvarum margines et in se-  
pibus. Flore albo in subalpinis, ut in Valle *Uri-  
ensi*, *Haselia*, Valesia superiore. 690. Fl. Jul.  
Aug.

14. *C. glomerata*, caule angulato simplici  
glabriuscule; fol. scabris oblongo-lanceola-

tis cordatis sessilibus; capitulo glomerato. W.  
Barrel. ic. 523. No. III. Allion. Ped. t. 39. f. 1.

Vulgo ad vias, et in collibus aridis. 685. Fl.  
Jun. Jul.

(Folia radicalia petiolata.)

15. *C. cervicaria*, hispida; flor. sessilibus,  
capitulo terminali; fol. lanceolato-linearibus  
undulatis. L. Oed. Dan. t. 787.

Rarior in Helvetia. Scheuchzerus ex quarto iti-  
nere retulit, loco non expresso. Hallerus nun-  
quam reperit, 686.

16. *C. thyrsoidea*, hispida, racemo ovato-  
oblongo terminali; caule simplicissimo; fol.  
lanceolato-linearibus. L. Jacq. Austr. t. 413.

In Alpinis pratis lapidosis ubique: in montanis  
rarior, tamen in monte Botrodz, qua ad sum-  
mum montem Dolaz adscenditur. 688.

(Caulis totus foliis floribusque tectus. Fl. Jul.  
Aug.)

*Capsulis obtectis, calycis sinubus  
reflexis.*

17. *C. Allionii*, caps. obtectis; caule unillo-  
ro hispido; fol. linear-lanceolatis undula-  
tis hispidis. W. Allioni Spec. ped. pag. 36.  
t. 6. f. 3.

In M. Lioson, *Col de Ferry, Prapioz.* 694. β.

18. *C. barbata*, caps. 5-locularibus ob-

tectis; caule simplicissimo subunifolio; foliis lanceolatis; cor. barbatis. L. Allioni ped. p. 56. t. 6. f. 2.

Flore coeruleo abunde in omnibus alpinis, etiam humilioribus.

Flore albo in Valle Medels circa Tavetsch; in Valle Ursaria, in M. Darbon. 694 Fl. Aug. (Flores secundi.)

19. C. *spicata*, hispida, spica laxa; flor. alternis; fol. linearibus integerrimis. L. J. Bauh. H. P. II. p. 801. Allion. Ped. t. 46. f. 2. t. 47. f. 1. —.

Passim in Valesia: circa Tavernetta, Arcem. Octodureensem., Lida, St. Pierre et Fouly. In Helvetia transalpina, a Chiavenna ad Ripa. Ad lacum magnum, et lacum Comensem, ad vineas. 687.

19. C. *alpina*, caule simplici; pedunc. 1-floris axillaribus diphyllis. L. Jacq. Austr. t. 118.

In M. Scheideck, aliisque alpinis. 695.

20. C. *speculum*, caule ramosissimo diffuso; fol. oblongis subcrenatis; flor. solitariis; caps. prismaticis. L.

Passim in segetibus. 703. Fl. Jun. Aug.

(Fol. sessilia; flos purpureus.)

21. C. *hybrida*, caule basi subramoso stricto; fol. oblongis subcrenatis; calyc. ag-

gregatis corolla longioribus; caps. prismaticeis L.

In sepibus et inter segetes, locis macilentis nobis vulgatior. 704.

(Dissert præsertim a Speculo; flor. sessilibus, ternis quaternis. Fl. Iul. Aug.)

105. PHYTEUMA. (*Rapwurzel.*) G. pl.  
292.

Cor. ab initio corniculata, ad basin deinde 5-partita, rotata, laciinis linearibus; Caps. 2-3-locularis, utrinque foramine laterali dehiscens.

1. *P. pauciflora*, capitulo subfolioso; bract. ovatis ciliatis; fol. omnibus linearilanceolatis subcrenatis. W.

In Monte Bündtnerberg. 680.

2. *P. Scheuchzeri*, fol. radicalibus petiolatis linearilanceolatis subserratis, caulinis linearibus integris; bracteis linearibus, duabus imis longissimis. S. *Allioni* ped. t. 39. f. 2. optime.

In rupibus ad viam malam. In Speluga. In M, Cenero inter Bellinzonam et Luganum, et in rupibus circa eam civitatem et Chiavennam. 682. In Val Saas invenit Schleicher.

(*P. Scorzonetifolia Villarsii Delph.* ab hac non diversa erit; nec *Hallerus* separabat *P. Michelii.*)

3. *P. hemisphærica*, capitulo subrotundo; bracteis ovato-lanceolatis subhirsutis; fol. linearibus subintegerrimis longissimis; caule unifloro subnudo. S.

In Alpibus paulo altioribus non rara; in adscensu a *Ponte Diaboli*; in *M. Furca*, *Grimsula*, *Ioch*, *Iavernaz*, *Martinets*, *Prapioz*, *Ieman*, *Fouly* etc. Flore albo in summo *Speluga*. 679. ego in *Panerossa* Aug. florentem inveni.

4. *P. orbicularis*, capitulo subrotundo; fol. radicalibus petiolatis; bracteis ovato-lanceolatis. S.

In subalpinis et montanis frequens. 681.

(Var. multis spicis caulem ambientibus. *Hall. alia*: fol. omnibus oblongo ellipticis obtusis, quæ est *P. ellyptica Villarsii Delph*: quam ex *M. Treftier* misit *Schleicher*.)

5. *P. betonicaefolia*, spica oblonga; fol. simpliciter crenatis, radicalibus lanceolato-cordatis, caulinis lanceolatis. W. *Villars Delph.* II. p. 518. t. 12. f. 3.

*Schleicher* in Catalogo habet. pag. 57. Ego ex *La Varaz*.

6. *P. spicata*, fol. radicalibus cordatis, petiolatis, caulinis sessilibus linear-lanceolatis rarius serratis; spica oblonga, bracteis linearibus. S. *Oed. Dan.* 362.

Flore ochroleuco vulgaris in pratis et nemoribus.

Flore cæruleo in Valle *de Freniéres* abunde, in Valle *Ormond* et circa *Lausannam* et *Genavam*. 684.

(Var. flore quadrifido, spica gemina, et foliis macula fusca notatis.)

7. *P. ovata*, spica ovata; stylis hirsutis flore longioribus emarginato-bifidis; fol. radicalibus cordatis, duplicato-dentatis. W.

Passim in pratis subalpinis, in Valle *Grindelia*, *Ursaria*, *Haselia*, circa den *Boden*; circa thermas *Leucenses*, *Piperinas*, et inter *Lenz* et *Brienz Rhætiæ*. In iisdem montibus super *Falz*. In M. *Fouly* circa *Anderam* et fontes *Rhodani*. 683.

(Omnium maxima. Folia radicalia longe petiolata, caulina summa lanceolata, dentata.)

106. SAMOLUS. (*Salzpungen.*) G. pl. 294.

Cor. hypocrateriformis 5-fida, laciinis quinque accessoriis ad basin sinus limbi coniventibus; caps. infera, 1-locularis, 5-valvis.

*S. Valerandi*, L. Oed. Dan. t. 198.

In fossis circa *Vervay Aquilejensium*. 707.

107. LONICERA. (*Lonicere.*) G. pl. 319.

Cor. 1-petala, irregularis, laciinis revolutis, una profundius separata; stigma obtuso-capitatum; baccæ infera.

*Caule volubili.*

1. L. *periclymenum*, capitulis ovatis imbricatis terminalibus; fol. omnibus distinctis  
L. *Fl. Dan.* t. 908.

In sepibus et sylvis Valesiae circa *Gonthey*,  
*Fouly*. En *Chamblande* et in sylva *Sauvebelin*  
prope *Lausannam*. Bernae rario in sylva *Bremgarten*. In montanis circa *Zweylütschinen* etc.  
( *Tobinii am Weissenberg.* ) 673.

*Pedunculis bifloris.*

2. L. *nigra*, baccis distinctis, fol. ellipticis integerrimis. L. *Jacq. Austr.* t. 314.

Passim in subalpinis et montosis. In M. *Dolaz*;  
in via *l'Echelette* inter lacum *Iuranum* et *Valorbe*.  
Circa *Ferrarias* officinas *Vallis Erguel* etc. In  
subalpinis, en *Collatel* sub monte *Javernaz*.

( Folia juniora hirsuta, subplicata, unde quasi  
serrata. Stipulae ovato-lanceolatae. Bracteae squa-  
nis 2 aridis, et foliolis 3-5-transversis latis, basi  
connatis. Cor. purpurascens; Sem. 5-6. Hall. )  
676.

3. L. *Xylosteum*, bacc. distinctis; fol. in-  
tegerrimis pubescentibus. L. *Oed. Dan.* t. 808.

Vulgo in sepibus et dumetis. 677. Fl. Maj.  
Jun.

4. L. *alpigena*, bacc. coadunatis digy-

nis ; fol. ovali-lanceolatis. L. Jacq. Austr. t. 274.

In montanis circa Wallenburg. In M. Wasserfall, Dent de Vaulion, Montendre, Falconario, Hengst, Salera, Thuiry. In Alpinis Aquilejensium. In adscensu Gemmii a Pago Kandersteg etc. in Pilato. 675.

(Folia subhirsuta, integerrima; flos sublaeteus, extus subruber, hirsutus. Hall.

5. L. coerulea, bacc. coadunatis globosis; stylis indivisis. L. Jacq. Austr. app. t. 17.

Rariter in Alpinis et submontanis. Abunde in M. Richard; in M. la Pierre Valesiae et circa Praborgne. A la Chaux du milieu versus la Brevine. Dans les Marais de Monible du petit Val. 674.

(Cortex flavissimus, fol. ovata, integerrima. flores parvi ochroleuci.)

d. Flores pentapetali, inferi.

108. RHAMNUS. (Wegdorn.) G. pl. 358.

Cor. squamulis 5 introrsum conniventibus staminaque munientibus; Bacca subrotunda,

*Spinosi.*

r. R. catharticus, spinis terminalibus; flor. 4-fidis dioicis; fol. ovatis; caule erecto. L. Oed. Dan. t. 850.

Satis frequens ad scpes. Majusculæ arborescentes inter utrumque lacum *Seedarfensem*. 824. Fl. Maj. Jun.

2. *R. saxatilis*, spinis terminalibus; flor. 4-fidis hermaphroditis. L. Jacq. Austr. t. 53.

Inter *Chur* et *Embs.* 822.

(Folia ovato-lanceolata serrata glabra. *Hall.*)

### *Inermes.*

3. *R. alpinus*, inermis; flor. dioicis; fol. ovato-lanceolatis, crenatis, glaberrimis. *Hall.* t. 40.

In subalpinis et montanis. 823.

4. *R. pumilus*, inermis repens; flor. hermaphroditis; fol. petiolatis ovatis crenatis. *Jacq. Collect. 2. t. 11.*

Inveni ad *Chemin Neuf*, quæ itur a *Diableret* *Aven* *Valesiæ*. Habet etiam *Schleicher* in Catalogo pag. 58.

(Folia sunt potius oblonga et serrata.)

5. *R. frangula*, inermis; flor. monogynia hermaphroditis; fol. integerrimis. L. *Oed. Dan.* t. 278.

In sepibus et paludosis 821. Fl. Maj. Jun.

109. *EVONYMUS*. (*Spindelbaum.*) *G. pl.*  
373.

Cor. 4-5 petala; filamenta germini impon-

sita ; Caps. 5-gona, 5-locularis, 5-valvis, colorata ; semina calyprata.

1. *E. europaeus*, flor. plerisque 4-fidis ; fol. sessilius. L. Bull. t. 135.

Ad sepes et in dumetis. 829. Fl. Maj. Jun.

2. *E. latifolius*, panicula trichotoma ; fol. lato-ovatis æqualiter serratis ; ramis lævibus. Hellen. Dissert. in Usteri Delect. 1. p. 96. Jacq. Austr. t. 289.

Circa Thermas fabarias et Chiavennam. 830.

110. VITIS. (*Filziger Wein.*) G. pl. 396.

Petala apice cohærentia emarcida. Bacca 5-sperma, supera.

V. *Labrusca*, fol. cordatis subtrilobis dentatis subtus tomentosis. L.

Ad sepes et in sylvis. 825.

e. *Flores pentapetalii, superi.*

111. RIBES. (*Krausbeere, Iohannisbeere.*) G. pl. 390.

Petala 5, et stamina calyci inserta, styl. 2-fidus ; Bacca polysperma infera.

*Inermia.*

1. *R. rubrum*, racemis glabris nutantibus ; flor. planis ; fol. obtuse 5-lobis, caule erecto. W.

In subalpinis et submontanis. In Aquilejensi-

bus, circa *Arveia* ad molendinum, in sepibus; et abunde in M. *Fouilloux*. Prope *Bernam* in sylva *Bremgarten*. In Iuræ vallibus *Combe de Valanvran*, au haut des *Converts*, au roc *Mildeux*, à la *Metairie du Creux*. 818.

(Petal: parva rubra, bacca rubra.)

2. *R. alpinum*, inerme; racemis erectis; bracteis flore longioribus. L. Jacq. Austr. t. 47.

In subalpinis et submontanis. Supra Thermas Leucenses; in agro Aquilejensi pene ad ædes pagi *Roche*; aux rochers de la *Praisse*. In montanis l'*Echelette* supra *Valorbe*. Supra *Riegolswyl*, in itinere ad montem *Wasserfall*. A la *Combe de Valanvron* et circa *Ferrière*. In M. *Saleva* et *Thuiry*. 817.

3. *R. nigrum*, inerme; racemis pilosis; flor. oblongis. L. Oed. Dan. t. 556.

Ad ripas rivorum et stagnorum, circa *Tigurum*, *Bernam*; versus *Büren*. Circa *Wengi* in paludosis etc. 819.

(Folia subtus punctata. In tota planta odor urinæ felinæ.)

### *Aculeata.*

4. *R. reclinatum*, ramis subaculeatis reclinatis, pedunculi bractea triphylla. L.

5. *R. Uva crispa*, ramis aculeatis; bac-

cis glabris; pedicellis bractea monophylla. L.  
*Oed. Dan.* t. 546.

In sepibus. 820.

(*Hallerus* non separat; nec *Grossularia* separari debet cum baccis subhirsutis.)

112. HEDERA. (*Epheu.*) *G. pl.* 395.

Petala 5, oblonga, apic. incurvis. Bacca 5-sperma, calyce cincta.

H. *Helix*, fol. 5-angularibus, 5-lobisque, floralibus ovatis; umbella erecta. W. *Fl. Dan.* t. 1027.

Sterilis ubique in sylvis.

Fœcunda in tota Helvetia calidiori. Circa *Interlaken* etc. 826.

f. *Flores incompleti; superi.*

113. THESIUM. (*Leinblatt.*) *G. pl.* 410.

Cal. 1-phyllus, cui stamna iuserta; cor. 0; sem. 1, subrotundum tectum.

1. *T. linophyllum*, panicula foliacea; fol. linearibus. L.

In Helvetia rarum. Inter *Mendris* et *Cassina*, in via ad montem *Generosum*. 1573.

(Caulis firmus rectus; folia radicalia longe petiolata, elliptica, circumserata. *Hall.*)

2. *T. alpinum*, racemo foliato; fol. linearibus. L. *Jacq. Ausir.* t. 416.

In M. *Fouly*; supra *Port Valey*; in glacialibus supra *Bagnes*. 1574.

**B.** Caule altiori, erectiori, foliis tamen linearibus, mollibus et flaccidis, flor. 4-5-fidis.

In monte *Gurten* prope *Bernam*; in montibus *Biennensibus*; in valle *Adelboden*, in montanis et subalpinis pascuis ubique.

### A. *Flores monopetalii.*

114. ASCLEPIAS. (*Schwalbenwurz.*) G.  
pl. 429.

Contorta, cor. 5-partita; nectaria 5 carnosa s. cucullata, tubo filamentorum infra-antheras adnata, e fundo corniculum acutum introrsum flexum exserentia. Sem. pappo coronata.

**A.** *Vincetoxicum*, fol. ovatis acuminatis margine tenuissime ciliatis; caule erecto; umbellis proliferis. W. Oed. Dan. t. 8. 49.

Frequens in asperis saxosis incultis, Maj. Jun. 571.

115. SWERTIA. (*Swertie.*) G. pl. 449.

Cor. rotata: nectaria 10 ad basin laciniarum corollæ setis parvis erectis cincta. Caps. 1-locularis, 2-valvis.

*S. perennis*, coroll. quinquefida; pedunc. tetragonis subulatis; caule indiviso; fol. radicalibus ovalibus. W. Jacq. Austr. t. 243.

In udis montanis et alpinis. In M. Rigi; abunde in pratis udis *Harzersboden* inter *Tschangnau* et *Habcheren*. In *Neocomensibus* et *Aquilejensibus* etc. 636. Jul. Aug.

### 116. GENTIANA. (*Enzian.*) G. pl. 450.

Cor. 1-petala inferne tubulosa; caps. apice læviter bifida, 2-locularis, 2-valvis. Receptac. 2, singula valvulae longitudinaliter adnata.

#### a. Corollis 5-9-fidis subcampanulatis.

1. *G. lutea*, coroll. subquinquefidis rotatis verticillatis; calyc. spathaceis. L. — .

Ubique in pratis montanis et subalpinis. 637.

2. *G. purpurea*, coroll. subquinquefidis campanulatis striato-punctatis verticillatis; calyc. membranaceis spathaceis. Frölich. W. Oed. Dan. t. 50.

In montibus; *Perche*, *Lioson*, *Iavernaz*, *Ovan-naz*, *Richard*, sur *Champ*, *Enzeindaz*, *Fouly*, *Gotthardo*, *Pilato*, *Rigi*, *Bärenboden*, *Waach*, *Stokhorn*, *Speluga*, *Nesso*. In paludosis die Möser supra *Habcheren*, circa fontes *Rhodani*; in pratis vallis *Ursarie*. 639.

#### b. flere roseo, (in monte *Lioson.*)

3. *G. pannonica*, coroll. subsexfidis campanulatis punctatissimis verticillatis; calycemembranaceis truncatis. *Frölich.* *W. Jacq. Austr.* t. 136.

*Schleicher* misit inventam.

(A sequenti distincta laciniis corollæ subrotundo-ovatis obtusis, nec ovatis acutiusculis. *W.*)

4. *G. punctata*, coroll. subsexfidis campanulatis punctatissimis verticillatis; calycemembranaceis truncatis *Frölich.* *W. Jacq. Austr.* app. t. 28.

*Alpina*, non *montana*. In M. *Iavernaz*, sur *Champ*, *Taveyannaz*, *les Martinets*, aliisque *Aquilejensibus*. In M. *Fouly*, *Jeman*, *St. Bernhard*, *Gamor*. Ad rupem glacialem, ex qua *Rhodanus* scaturit. 638.

In alpib. Rhæt. frequens. *Scheuchz. It. Alp.* p. 334.

5. *G. campanulata*, coroll. septemfidis campanulatis impunctatis verticillatis; calycem brevibus subtruncatis. *Frölich.* *W. Jacq. Austr.* app. t. 29.

(Hanc, quæ *C. Bauhino* non nisi *luteæ* varietas est, *Willdenow* alpibus *Aquilejensibus* donat; quo jure, ignoro.)

6. *G. asclepiadea*, coroll. 5-fidis campanulatis oppositis axillaribus subsessilibus; foliis amplexicaulibus ovato-lanceolatis. *Frölich.* *W. Jacq. Austr.* t. 328. *Barrel.* ic. 70.

Flore *cæruleo* abunde in monte *Iavernaz* et *Mayen* etc. in descensu a *Scheideck* versus *Hasli*. In M. *Chaudé* supra *Villeneuve*, in *Altmatt* prope *Einsiedlen*; ad *Heilig Creuz* vallis *Entlibuch*, in *Lauterbrunn*, *Grindelwald*. In M. *Generoso*; Etiam in montanis: *Arni* supra *Summiswald*, *Engelberg* prope *Tobinium* etc.

Flore *albo*-in pascuis alpinis *Nideren* et *Bühl Glaronensium* supra *Bilten*. 640.

7. G. *cruciata*, coroll. quadrifidis hypocrateriformibus nudis verticillatis sessilibus, caul. ancipitibus basi attenuatis. *Frölich. W. Jacq. Austr. t. 372.*

*Bernæ* satis vulgaris in prato carnificis suburbano, in sylvula *Weissenstein*.

Frequens in Aquilejensibus; in herbidis montis *Crenzach* etc. 643.

8. G. *Pneumonanthe*, coroll. quinquefidis campanulatis acuminatis axillaribus pedunculatis; fol. sublinearibus obtusis. *Frölich. W. Oed. Dan. t. 269. Barrel. ic. 52.*

Non rara in pratis udis, ut circa *Bernam* sub *Seelhofen*, versus *Belp*.

In paludosis prope *Mathod*; abunde circa *Roche*. etc. 641.

b. Corollis infundibiliformibus nudis 5-10 fidis.

9. G. *acaulis*, corolla quinquefida cam-

*panulata* caulem excedente. L. Jacq. Austr. t. 135. Barrel. ic. 47. 105. 106. 110.

In omnibus subalpinis et montanis Iuræ pratis frequentissima; sic in Aquilejensium alpinis. 642.

(Var. fol. latioribus, brevioribus et angustioribus, qualem ex M. Fouly etiam Schleicher misit, sed caulis constanter uniflorus, et plerumque flore minor.)

10. *G. verna*, corolla quinquefida infundibuliformi crenata; petalis basi auriculatis; fol. ovato-lanceolatis, radicalibus consertis; caule unifloro. S. Barrel. ic. 109.

Frequens in pratis utdis circa Bernam, Eymatten, Seelhofen, Drakau; inter Muri et Allmadingen ad viam. Etiam in Alpibus: Dansex, Chapuise, la Varaz, Fouly, Simplon, Braulio Rhætiæ etc. 644.

(Var. flore albo.)

11. *G. pumila*, corolla quinquefida infundibuliformi subserrata, petalis basi auriculatis; fol. lanceolato-linearibus, caule unifloro. S. Jacq. Austr. t. 502.

In summis alpibus: Fouly, St. Bernhard, Taveyannaz, Panerossa, Gemmio. 644. (Magnus Hallerus a precedente non separat, aqua non nisi foliis angustioribus et statura minori differt.)

12. *G. utriculosa*, coroll. quinquefidis hy-

pocrateriformibus ; calyc. carinato - alatis ;  
fol. caulinis spathulatis. *Frölich. W. Barrel.*  
*ic. 122. f. 2.*

Alpina et montana. In valle *Ursaria*; in mon-  
tibus *Speluga*, *Joch*, *Ochsenstock*, *Intrame*.  
In montanis : *Feuerstein*, *Valanvron*, *Chas-  
seralle*. Etiam abunde in planicie prope *Ver-  
vay* ad fossas, eundo versus *le Furet*. 646.

*β.* flore albo, supra *les Plans*.

13. *G. bavarica*, corolla quinquefida infun-  
dibuliformi serrata ; fol. ovatis obtusis. *L.  
Barrel.* *ic. 98.*

Ubique in alpinis, frequentissima in Aquile-  
jensibus. 645.

*β.* flore albo supra *les Plans*.

(Folia radicalia conferta non semper caulinis  
majora; petala subserrata. Ejus varietas minor.  
foliis paulo acutioribus etiam confertis et imbri-  
catis — non rara in summis Alpibus. Sed se-  
parari non debet. Erit *G. imbricata*. *W. Barrel.*  
*ic. 101. f. 2*, a *Hallero* præcedenti juncta.)

14. *G. nivalis*, coroll. quinquefidis infun-  
dibuliformibus ; ramis alternis unifloris ; fol.  
caulinis lanceolatis. *Frölich. W. Hall.* t. 17.  
*Oed. Dan.* t. 17.

Alpina. In *Gemmio*, *Joch*, *Boulaire*, *Pane-  
rossa*, *Enzeindaz*, *Taveyannaz*, *Serin*, *Fouly*,  
*Simplon*, *Gotthardo*, *Pilato*. Ad lacum *Silien*.

*sem et Sylvæ planæ, in summo monte Flimsensium.*  
Abunde in montibus *Ai* ad *Leysin* pertinentibus  
etc. 647.

**β.** flore albo.

(*Variabilis* planta habet caulem filiformem,  
uniflorum et ramosum, et folia caulina plerumque  
majora.)

15. G. *Centaurium*, coroll. quinquefidis  
infundibnliformibus; caule dichotomo; pis-  
tillo simplici. L. *Oed. Dan.* t. 617.

In sterilibus, sylvaticis, montosis et paludosis.  
648.

**β.** flore albo. *Am Worberweg, im Muri-*  
*holz.*

(*Nunc Chironia Centaurium.*)

**γ.** caule dichotomo ramosissimo diffuso. *Vail-*  
*lant.* t. 6. f. 1. in paludosis circa *Anet* et in monte  
*Zürichberg.*

(*Chironia ramosissima.*)

c. *Corollis fauce squamis capillaceo-*  
*multifidis acutis 4-5-fidis.*

16. G. *germanica*, coroll. quinquefidis hy-  
pocrateriformibus barbatis; laciniis limbi  
ovatis acutis: fol. ovato-lanceolatis; ramis  
internodiis longioribus. W.

In montibus Neocomensibus. *Basileæ.* Circa  
*Panex*, *Kandersteg* et in monte *Feuerstein*.  
651.

17. *G. Amarella*, coroll. quinquefidis hypocrateriformibus barbatis; laciniis limbi lanceolatis acutis; sol. lanceolatis; ramis internodiis brevioribus. W.

(*Hallerus* non separare videtur. *Schleicher* utramque misit.)

18. *G. campestris*, coroll. quadrifidis hypocrateriformibus obtusis sauce barbatis; calycis laciniis duabus maximis. *Frölich*. W. *Oed. Dan.* t. 567.

Vulgo in subalpinis et submontanis pratis. In Monte *Muteto*; frequens ineunte autumno in collibus editioribus circa *Tigurum*. In Alpibus. 650.

*g.* flore albo, a *Comba Aquilejæ*, et prope *Pertuis*.

19. *G. glacialis*, coroll. quadrifidis hypocrateriformibus sauce barbatis; caule basi folioso; pedunc. longissimis unifloris. S.

In monte *Auffés* super *Saas Valesiæ* superioris habet *Hallerus*. 652. Ego frequentem in *Gemmio*, etiam in *Pannerossaz* inveni.

(Caulis subviolaceus; folia radicalia in orbem sparsa, caulina 2 opposita; flores in pedunculo longe nudo cœrulei. Cur separatur *G. tenella*? cur *dichotoma*? cur *nana*? Etiam nostræ caulis non rar. dichotomus, non raro corolla 5-fida.)

20. *G. ciliata*, coroll. quadrifidis: laciniis

serratis medio inciso-ciliatis; fol. lanceolatis linearibusque; caule flexuoso angulato. Frölich. W. Jacq. Austr. t. 113.

Frequens. Bernæ in der Eymatte versus Pümpliz, circa Roche les Plans in M. Muteto etc. 653.

## PENTANDRIA, DIGYNIA.

### B. Flores incompleti.

117. HERNIARIA. (*Bruchkraut.*) G. pl. 434.

Cal. 5-partitus, patens; Cor. o. Stamina 5 intra calycis lacinias, et alia 5, calyci alterna sterilia. Caps. 1-sperma.

1. *H. glabra*, glomerulis multifloris. Oed. Dan. t. 529.

Passim in arenosis: *Basileæ ad Wiesam*, in arce *St. Tryphon*, in Valesia à *St. Sulpy*, *Morgiæ*, *Tiguri* etc. 1552.

2. *H. hirsuta*, glomerulis paucifloris. Hall.

In Valesia passim. Ad rupes glaciales Montis Oberstafel. Circa *Branson*, *Zurmatte*. In agris *Basileensibus*, cis et trans *Wiesæ* pontem, circa *Wyl* et *Riehen*. 1553.

(A priori adhuc distinguitur flore multo majori, pro folii portione. Hall.

3. *H. alpina*, sol. obovatis acutis glabris margine ciliatis; flor. glomeratis 5-fidis hirsutis. W.

Hanc Villarsii plantam habet Schleicher in Catalogo p. 57 , inventam misit in M. Stock.

(Dissert ab *hirsuta* sol. obovatis nec lanceolatis. W. )

IIS. CHENOPODIUM. ( *Gänsefuss.* ) G.  
pl. 435.

Cal. 5-phyllus, 5-gonus, persistens. Cor. o.  
Sem. 1 , lenticulare , superum.

*Foliis angulosis.*

1. C. *bonus Henricus* , fol. triangularis-  
sagittatis integerrimis , spicis compositis aphyllis  
axillaribus. L. *Oed. Dan.* t. 579.

Vulgo ad vias , et ad simeta. 1578. Fl. Maj-  
Aug. imo Octobri.

2. C. *rubrum* , fol. cordato-triangularibus  
obtusiusculis dentatis ; racemis erectis com-  
positis subfoliosis caule brevioribus. L. *Fl.*  
*Dan.* 1149.

In ruderosis , hortis et ad vias. 1583.

3. C. *murale* , fol. ovatis inæqualiter den-  
tatis acutis nitidis ; racemis corymbosis nudis ;  
caule ramoso patulo. W.

Sinilibus locis provenit , ex Synonimi. citato. C.  
B. *Basil.* p. 34.

( Hallerus separare nolebat , et vereor ne hæc  
omnia , præsertim *Bauhini* planta , ad C. *hybridum*  
pertineant.)

4. *C. album*, fol. rhomboideo-triangularibus erosionis; postice integris: summis oblongis; racemis erectis. L.

Nihil vulgatus in iisdem locis. 1579.

5. *C. serotinum*, fol. deltoideis sinuato-dentatis rugosis glabris uniformibus; racemis terminalibus. L.

Locus similibus. 1582.

(Folia non farinosa.)

6. *C. viride*, fol. rhomboideis dentato-sinuatis; racemis ramosis subfoliatis. L.

Similibus locis abunde. 1580.

(Caulis erectus viridis, angulis purpurescentibus; folia subtus incana.)

7. *C. hybridum*, fol. cordatis angulato-acuminatis; racemis ramosis nudis. L. Barrel. ic. 540.

Similibus locis. 1581. (Folia non farinosa.)

8. *C. botrys*, fol. oblongis sinuatis, racemis nudis multifidis. L.

Bernæ quidem in ruderosis, tamen suspecta. Sed in Valesia inferiori abundat, circa Branson etc. Abunde inter pagum *Lucens* et *Brojæ* pontem ad viam regiam. 1585.

9. *C. glaucum*, fol. ovato-oblongis repandis; racem. nudis simplicibus glomeratis. L. Fl. Dan. t. 1151.

Non certa civis; ex *Bauhinianis* synonymis tamen videtur 1584.

10. *C. urbicu[m]*, fol. triangularibus sub-dentatis; racemis confertis strictissimis cauli approximatis longissimis. L. *Fl. Dan.* t. 1148.  
*Schleicher* misit inventum.

*Foliis integris.*

11. *C. vulvaria*, fol. integerrimis rhomboideo-ovatis; flor. conglomeratis axillaribus. L. *Fl. Dan.* t. 1152.

In hortis et ad vias circa *Roche*; *Biennæ*, *Basileæ*. 1577.

12. *C. polyspermum*, fol. integerrimis ovatis; caule decumbente; cymis dichotomis aphyllis axillaribus. L. *Oed. Dan.* t. 1153.

Passim in hortis et incultis; *Bernæ*; *Basileæ* in arenosis circa *Cliben*, *Michelfelden* et *Riehen*. 1576. Caulis erectus. *Hall.*

Var. folio latiore *Basileæ* in pratis quibusdam minoris urbis. C. B. *Basil.* p. 34.

119. SALSOLO. (*Salzkraut.*) *G. pl.* 437.

Cal. 5-phyllos; Cor. o. Caps. 1 - sperma. Sem. cochleatum.

*S. prostrata*, frutescens; fol. linearibus pilosis inermibus. *Jacq. Austr.* t. 294. *All. Ped.* t. 38. f. 4.

In *Valle Augusta* ad pedem Alpium Valesiacarum. 1575.

120. ULMUS. (*Rüster.*) G. pl. 443.

Cal. 5-sidus, turbinatus, interne coloratus. Cor. o. Bacca ovalis compressa, membranaceo-alata, 1-locularis.

1. *U. campestris*, fol. duplicato-serratis basi inæqualibus; flor. subsessilibus conglomeratis pentandris; fruct. glabris. W. *Oed. Dan.* t. 632.

Non vulgatissima. In Cub. Aquilejensi passim, ut ad sinistra torrentis *la Gryonne*, versus les *prés novés*. In Valesia, Rhætia. Circa *Basilicam*. 1586.

(Sunt multæ varietates, fol. glabris, angustioribus etc.)

2. *U. effusa*, fol. duplicato-serratis basi inæqualibus; flor. octandris pedunculatis effusis; fructibus margine ciliatis. W.

In monte *Wasserfall*. C. B. *Basil.* pag. 106.

## C. Umbellatæ.

a. *Involucro universali partialique.*

121. ERYNGIUM. (*Mannstreu.*) G. pl. 456.

Flores capitati. Receptaculum paleaceum.

1. *E. campestre*, fol. radicalibus amplexicaulibus pinnato-lanceolatis. L. *Oed. Dan.* t. 554.

Passim ad Lacum Lemanum in arenosis, sub Lausanna, cis Vevay etc. Circa Basileam ad vias versus St. Louis etc. 735.

2. *E. alpinum*, fol. digitatis laciniatis suborbiculatis; capitulo oblongo polyphyllo, paleis setaceis trifidis. L. Jacq. ic rar, t. 55.

In M. Thuiry, Ioch, Pilato, Tannieres. Abunde in Aquilejensibus. La Varaz, Richard, Nombrieux, Chaude, Naye. 736. Etiam in Boulaire.

(Folia radicalia longe petiolata, cordata, serrata.)

### 122. HYDROCOTYLE. (*Wassernabel.*) G. pl. 457.

Umbella simplex. Involucrum 4-phylum. Petala ovata, integra. Fruct. compressus transverse bipartibilis.

*H. vulgaris*, fol. peltatis; umbellis 5-floris. L. Oed. Dan. t. 90.

In aggeribus fossarum circa Noville et les Granettes, et secundum fl. Brojam circa Sugy inter duos lacus. Sic ad rivum Urtinen inter utrumque lacum Seedorfensem abunde. Circa Cressier et Thielae pontem; aux Allées de Colombier. Ad Lacum felinum. 812.

### 123. SANICULA (*Sanikel.*) G. pl. 458.

Umbellæ consertæ, subcapitatae. Fructus scaber. Flores disci abortientes.

*S. europaea*, fol. radicalibus simplicibus; flosculis omnibus sessilibus. L. *Oed. Dan.* t. 283.

In sylvis vulgaris. 737. Fl. Maj. Jun.

(Folia radicalia longe petiolata 5-loba.)

124. ASTRANTIA. (*Astrantie*) G. pl. 459.

Involucra partialia lanceolata, patentia, æqualia, colorata. Sem. 2, ovato-oblonga, pericarpii crusta tecta, rugosa.

1. *A. major*, fol. 5-lobis, lobis trifidis. L.

In alpinis et montanis vulgaris. Etiam in planitatem descendit, et abundat circa *Ripas*, super *Glerolle*. 790.

2. *A. minor*, foliis septenis digitatis serratis. *Hall. Scop. Carn.* t. 7.

- Alpina. In omnibus Alpibus Valesiacis et Aquilejensibus. In M. *Fracto* et *Speluga*, et *Generoso*; descendit etiam in alpinas Valles *Hasli*, *Chapuisse*, *Ursariam*. 791.

125. BUPLEURUM. (*Durchwachs*, *Hassenöhrlein.*) G. pl. 460.

Involucr. partiale 5-phylum: foliolis patentibus ovatis acutis; petala involuta, integra; fructus subrotundus compressus striatus.

1. *B. rotundifolium*, involucris universalibus nullis; fol. perfoliatis. L.

*Basileæ in agris; Genevæ; circa Bevieux et Bex; in Valesia etc. 767. Fl. æstate.*

2. *B. stellatum*, involucellis coadunatis, universalis triphylo. L. *Hall.* t. 18.

In Alpibus non rarum. *In der Schöllinen, supra pontem Diaboli. In M. Gothardo, Fouilloux, Darbon, Salanfe, Dent de Midi. Circa Airolo. 771.*

(Folia radicalia longissima linearia, caulina rara, sessilia.)

3. *B. petræum*, involucellis subpentaphyllicis coadunatis, universalis pentaphyllo; fol. caulinis cordato-lanceolatis amplexicaulibus, radicalibus linearibus. W.

C. B. in Alpibus *Valesianorum. Prodr.* pag. 129. IV. Est *Halleri. 773. var. β.*

4. *B. graminifolium*, involucellis heptaphyllis, universalis pentaphyllo; fol. radicalibus gramineis. S. *Jacq. ic. rar. t. 56.*

In *Abbatiscellanorum Alpibus*; Alii in Alpibus. 773. var.  $\alpha$ .

5. *B. angulosum*, involucellis 5-phylis orbiculatis, universalis 3-phyllo ovato; fol. amplexicaulibus cordato-lanceolatis. L.

In *Iuræ vallibus, au roc de Corbeaux, in M. Chasseralle. 770.  $\alpha$ .*

(Folia radicalia longe petiolato graminea. *Hall.*)

6. B. *pyrenaicum*, involucellis 5-phyllois subrotundis emarginatis connatis, universali triphylo basi inciso; fol. lanceolatis cordatis amplexicaulibus. W.

Hæc notæ spectant ad *Halleri* plantam 769, quam in Alpibus habet non sine dolore loci natalis omissi.

7. B. *longifolium*, involucellis 5-phyllois ovatis, universali subpentaphyllo; fol. amplexicaulibus. L.

In *Iura*, *Creux du Vent*, in *Legerberg*, et prope *Badam am Legerberg*. Circa *Genevam*. 768.

(Folia radicalia petiolata.)

8. B. *falcatum*, involucellis 5-phyllois acutis, universali subpentaphyllo; fol. lanceolatis; caule flexuoso. L. Jacq. *Austr.* t. 158.

Vulgo *Basileæ*, et in toto pago Aventico ad sepes et in aridis. 776.

(Ego copiose in *Aquilejensium montanis* inveni.)

9. B. *Odontites*, involucellis 5-phyllois acutis, universali triphylo; flosculo centrali altiori; ramis divaricatis. L.

Nòn certa civis: in collibus *Campoclaresibus* cum proveniat, vix poterit in alpibus *Valesiacis* provenisse. Hall. 772.

(Hæc *Halleri* nota non recte se habet, cum plantæ frigidissimarum et calidissimarum regionum in *Valesia* proveniant.)

10. *B. ranunculoides*, involucellis pentaphyllis lanceolatis longioribus, universali triphylo; fol. caulinis lanceolatis. L.

In M. Rohtenhorn, Lioson, Prapioz, Naye; etiam in monte *de la Pierre* sub monte *St. Bernhardi*. In M. Oberstafelberg, Generoso. In Alpibus *Surenensis* et *Abbatiscellanis*. In Rhætia et in M. *Fräla* Vallis Tellinæ. In montibus Vallis *Ternanza* sub monte *Sylvio*. 770.  $\beta$ .

(Caulis vix dodrantalis, folia graminea.)

11. *B. tenuissimum*, umbellis simplicibus alternis pentaphyllis subtrifloris. L. *Barrel.* ic. 1248. *Fl. Dan.* t. 1090.

*Basileæ* inter *Birsam* et *Sylvam* quæ *Augustam* dicit. 774.

12. *B. junceum*, caule erecto paniculato; fol. linearibus; involucris triphyllis, involucellis pentaphyllis. L.

In Valesia prope *Sedunum*. *Basileæ*, locis herbidis ad sepes ad *St. Iacobum*; in monte *Muteto* et in aliis. 775. C. B. *Basil.* p. 81.

13. *B. caricifolium*, involucellis pentaphyllis cuspidatis, universali monophyllo lanceolato; fol. linearibus basi attenuatis. W.

*Schleicher* inventum misit. (Folia radicalia longissima linearia, suprema lanceolata.)

126. TORDYLIUM (*Zirmet.*) G. pl. 463.

Involucrum universale foliolis tenuibus,

individis, longitudine saepius umbellæ; partiale extrorsum umbellula longius; fructus suborbiculatus compressus margine crenulatus bipartibilis.

*T. maximum*, umbellis consertis radiatis; foliolis lanceolatis inciso-serratis L. Jacq.  
*Austr.* t. 142.

Plantam hanc Majo florentem, et in Sabaudia prope Cormou non longe a S. Mauritio itinere Genevæ Lugdunum, a I. Bauhino inventam, H. P. III. p. 2. pag. 85. Hallerus habet, 811. Sed circa Orbe inventam misit Schleicher.

127. CAUCALIS. (*Haffdolde.*) G. pl. 464.

Cor. radiatæ, disci masculæ. Petala inflexo-emarginata. Fruct. setulis rigidis hispidus. Involucra integra, margine membranacea.

1. *C. grandiflora*, involuer. singulis 5-phyllis, foliolo unico duplo majore. L. Jacq.  
*Austr.* t. 54.

Circa Mathod, Yvonans, Goumoens, Yvorne, Basileam, Genevam, Tigurum; in V. lesia. 740.

2. *C. daucoides*, umbellis 3-fidis aphyllis, umbellulis 3-spermis, 3-phyllis. L. Jacq.  
*Austr.* t. 157.

Passim in segetibus circa Basileam, Mathod, Montcharan, Gontey, inter Douanne et Dess. etc. 739.

3. *C. latifolia*, umbella universali 3-fida, partialibus 5-spermis; fol. pinnatis serratis. L. Jacq. t. 128.

In Helvetia rarer. In Valesia circa *Gontey*.  
738.

(Semiua aculeis purpureis hirta. Hall.)

4. *C. leptophylla*, involuero universali subnullo, umbella bifida, involucellis 5-phyllo. L.

Rarius inter segetes, communiter in vineis montis *Muteti*, C. B. *Basil.* pag. 46. et nobiscum stat *Hallerus*. 739, in fine.

(Fructus ovatus aculeis verticillato-hispidis, apice triglochibus.)

5. *C. helvetica*, involucro universali subnullo, umbella a 3-10-fida, involucellis a 3-5, ramis strictis divaricatis. M. Jacq. *Hort. 3. t. 16.*

Inter stipulas circa *Mathod*, circa *Basileam*.  
742.

Foliis duplicato-pinnatis, pinnulis longe confluentibus; semina nigris villis asperis hirta. Hall. Inventa etiam circa *Bolligen* in arvis.

6. *C. Anthriscus*, umbellis confertis, foliolis ovato-lanceolatis pinnatifidis. L. in *Tordylio* Jacq. *Austr. t. 261.*

Nihil frequentius ad. sepes et in sylvis cœduis.  
741. Fl. Jun. Jul.

128. DAUCUS. (*Möhre, Mohrrübe.*) G.  
pl. 466.

Involucr. universale pinnatifidum ; umbella fructifera concavo-connivens ; fructus pilis rigidis hispidus.

*D. carota*, seminibus hispidis ; petiolis subtus nervosis. L. *Oed. Dan.* t. 723.

Ubique ad vias et in pratis paludosis. 746.

129. BUNIUM. (*Erdnuss, Erdknoten.*)  
G. pl. 468.

Involucr. universale polyphyllum, partiale setaceum. cor. uniformis ; fruct. ovatus.

*B. Bulbocastanum*, L. *Oed. Dan.* t. 220.

Multis locis inter segetes : circa *Montcharan* et *Olon* abunde ; in valle *St. Imier.* 783.

130. CONIUM. (*Schierling.*) G. pl. 469.

Involucr. universale polyphyllum brevisimum, inaequale ; partiale dimidiatum, 3-phyllum ; fructus subglobosus quinquestriatus, striis crenatis.

*C. maculatum*, seminibus striatis. L. *Jacq. Austr.* t. 156.

Ad macerias, in cœmeteriis, ad vias. Copiosissimum in cœmeterio pagi *Olon.* 766.

131. SELINUM. (*Silge.*) G. pl. 470.

Involucra polyphylla, partiale patens,

universale reflexum. Petala cordata, æqualia; fruct. compresso-planus, ovali-oblongus, utrinque in medio striatus; semina lateribus membranacea.

1. *S. sylvestre*, radice fusiformi multiplici; stylis erectis, corollulis explicatis. L.

Vulgo in udis. Inter *Roche* et *Chessel* abunde; *Bernæ* circa *Gümlingen*, *Seedorf* etc. Ascendit etiam in *Alpes*, et supra *Morcle*, inque *M. Fouly* provenit, et ex rupibus quoque marmoreis erumpit cis *la Marbrière*. 799.

(Variabilis planta videtur, a sequenti tamen distinguenda caule lœvi.)

2. *S. palustre*, sublactens, radice unica.

L. Jacq. Austr. t. 152. No. *Caula hispida* Kappi;

Circa *Vervay* ad *Lacum*. 800.

(Caulis hispidus.)

3. *S. carvifolia*, caule sulcato acutangulo; involucro universalis evanido; stylis erectis, petalis conniventibus. L. Jacq. Austr. t. 16. Hall. t. 20.

Prope *Ebrodunum* in pratis ad viam versus *Grandson*. Circa *Bernam* super prædium das *Inselin*, inter arundines, et in prædio *Bodenaker*, *Michelfeldæ*. Circa montem *Beligardum*. 802.

(Foliola omnia apice s. mucrone albo.)

4. *S. Chabréi*, caule tereti striato, invo-

luero universalis nullo , vaginis foliorum laxis , foliolis filiforme-linearibus. W. Jacq. Austr. t. 72.

Prope Nodz in prato humido. Circa Goudeba. 801. prope Lacum les Brenets. Addend. p. 186.

( Mihi saltem Halleri planta ad hanc referenda videtur, et persuasum habeo, cum plantam vidi sem a Schleicher missam, circa Basileam lectam. )

5. S. Seguieri , caule subteretis striato ; involucro universalis nullo ; foliolis trifidis linearibus mucronatis. W. Jacq. Hort. t. 61.

Schleicher habet in Catalogo pag. 59, et misit inventum in monte Generoso.

( Caulis laevis ; folia tripinnata, radicalia sesquipedalia. Umbellæ radii 30 - 40. involucella setacea. )

### 132. ATHAMANTA. (*Hirschwurz.*) G. pl.

471.

Petala inflexo-emarginata ; fructus ovato-oblongus , striatus.

1. A. Libanotis , fol. bipinnatis planis ; umbella hæmisphærica ; seminibus hirsutis. L. Jacq. Austr. 392. Allionii Ped. t. 62.

Duae nobis varietates : humilis , vix pedalis , in Creux du Vent , in monte Scheibenflüh. Major, in scopolis sub pago Rinkenbærg , sub arce Fal-

*kenstein*, versus *Mummeliswyl*. In M. *Crenzach*, *Wasserfall*. Ad supercilia lacus *Thunensis*, *Badæ*. 744. (An major diversa a *sibirica*?)

2. *A. cervaria*, fol. pinnatis decussatis, inciso-angulatis, sem. nudis. L. *Jacq. Austr.* t. 69.

Nobis frequens: prope *Mathod* supra vineas, inter *Mathod* et *Champrent*, in adscensu M. *Muttetii*, *Falconarii*; prope *Roche*, aux *Gouges* etc. In montibus *Legerberg*, *Albio*, *Crenzach*, *Saleva*, *Leiterberg* etc. Trans Alpes ab *Airolo* ad *Comum* ubique. 804. Fl. Jul. Aug.

(Folia glauca, subtus venis nigris picta, petala alba extus purpurea. *Hall.*)

3. *A. oreoselinum*, foliolis divaricatis. L. *Jacq. Austr.* t. 63.

Non rara: ex rupibus prope *Roche à la Marbrière* et aux *Gouges*, en *Iorogne*, circa *Bex* etc. In *Valesia Agauni*, et inter *St. Leonhard* et *Siders*. *Biennæ auf der Passgärtfluh*. In M. *Chasseralle*, *Legerberg*, *Muteto*, *Crenzach*, *Thuiry*, *Maloja* etc. et *Michelfeldæ*. 803.

4. *A. Matthioli*, fol. supradecompositis 3-4 pinnatisve diffusis, foliolis elongato-subsetaceis; seminibus ovato-acutis striatis hirsutis suaveolentibus. *Wulfen*, apud. W.

· *Schleicher* in Catalogo sub nomine *A. rupestris. Scop.*

5. *A. cretensis*, foliolis linearibus planis hirsutis; petal. bipartitis, semin. oblongis & hirsutis. L. Jacq. Austr. t. 62.

Nihil vulgatius in gramineis subalpinis et montanis, etiam in *Wasserfall*, *Saleva*, *Suchez*, *Creux du Vent*, *Dent de Vaulion* etc. 745.

(Etiam in *saxosis* montis *Enzeindaz*. Fl. Jul. Aug.)

133. PEUCEDANUM. (*Haarstrang*) G.  
pl. 472.

Umbella universalis longissima; involucra brevissima; petala æqualia, oblonga, incurva, integra, semina 2 compressa, striis tribus elevatis notata, margine membrana lata integra cincta.

1. *P. Silans*, foliolis pinnatifidis, laciniis oppositis; involucro universalē diphyllo. L. Jacq. Austr. t. 15.

In humidis vulgo: circa 3 lacus vicinos. *Bernæ* inter *Seelhofen* et *Belp*, in der *Fymatte* etc. In pratis montis *Muteti*. 797.

(Flores lutei, extus albidi. Fl. Jun. Sept.)

2. *P. alsaticum*, fol. pinnatifidis, laciniis 5-fidis obtusiusculis. L. Jacq. Austr. t. 70.

Circa *Mülhusiam*. 798.

(Saltem meminisse juvabit.)

154. LASERPITIUM. (*Laserkraut.*) *G. pl.*  
476.

Petala ~~is~~ flexa, emarginata; patentia; fructus oblongus, membranis 8 longitudinalibus angulatus.

1. *L. latifolium*, fol. oblique cordatis dentatis, dentibus mucronatis; seminum alis crispis. *W. Jacq. Austr.* t. 146.

Alpinum et montanum: in M. *Muteto* supra *Dornach*. In M. *Suchet* et *Neirivaux* maxima copia. In pratis montanis *Iorogne* etc. supra *Aquilejam*. *À la combe de Valanvron.* 792. Etiam in *Pilato*. *Hallerus L. Lilanotis*, quod seminum alis *lævibus* differt, non separat.)

2. *L. trilobum*, foliolis trilobis incisis. L. In monte *Generoso* *Insubriæ Helvetiæ*. 793.

3. *L. Siler*, foliolis ovali-lanceolatis integrerrimis petiolatis. *L. Jacq. Austr.* t. 145.

Frequens in rupibus apricis: in adscensu ad montes *Dolaz*, *Thuiry*, *Falconarium*. In supercilio scopoloso lacus *Brienzensis*, supra *Interlaken*. In rupibus *d'Orvin*, de *Moton* et a *Pertuis*. In *Chasseralle*, *Creuz du Vent* etc. Abunde in *Aquilejensium* rupibus. In Alpes etiam adscendit. 794.

(*Involucr. universale latifolium reflexum; par-tiale polyphyllum angustum. Semina odoratissi-ma omnino 4 alas breves et crispas habent. Hall.*)

4. *L. hirsutum*, s. *Halleri*, fol. supra-decompositis hirsutis, foliolis multifidis; involucri polyphylli foliis margine membranaceis apice ciliatis. W. Hall. t. 19.

Alpina planta, neque infrequens. In pratis uidis vallis Ursariæ, supra die Teufelsbrücke. In M. Scheideck, Iavernaz, Fouly, St. Bernhard, Alesse, Ieman, Salanfe, supra Sas etc. In montes non descendit. 795.

5. *L. simplex*, scapo nudo aphyllum simplici, fol. pinnatis multifidis acutis linearibus, umbella semiglobosa. L. Allioni Ped. t. 71. f. 2 Villars Delph. t. 14.

Hanc plantam Hallerus primum in M. Iavernaz detexit, dein in multis aliis montibus repperit, ut in Enzeindaz, Grandvire, Mayen, Liesson, Audon, Fouly, Dent de Midi, Herbagere, Salanfe, St. Bernhard etc. 796.

(Cl. Willdenow ad *L. lucidum* eam spectare credit; non bene, ut nobis videtur.)

6. *L. Chironium*, foliolis oblique cordatis, petiolis hirsutis. L.

Circa Disentis legit Burserus Hall. 808 fine.

135. HERACLEUM. (*Bärenklau.*) G. pl. 477.

Involuer. caducum. Cor. disformis, inflexo-unciuata, emarginata. Fructus ellipti-

cus, compressus, emarginatus, in medio utrinque striatus, marginatus.

1. *H. sphondylium*, fol. pinnatis, foliolis quinis oblongis pinnatifidis acutis dentatis; corollis subuniformibus. W.

In pratis vulgatissima; angustifolia circa les Plans et in Creux du Vent. 809. Fl. Jul. Aug.

2. *H. angustifolium*, fol. cruciato-pinnatis, foliolis linearibus; corollis flosculosis. Barrel. ic. 56.

In Rhæticis Alpibus habet C. B. in *Prodr.* p. 83.

(Ab illo angustifolio *Halleri* diversum videtur.)

3. *H. Alpinum*, fol. simplicibus cordatis obsolete lobatis serratis. W. Barrel. ic. 55.

Legit primum B. in M. *Wassersfall*, *Hallerus* ad rupes sylvæ der Geiten, quæ præcipitio iniminet; au Bec de l'Oiseaux, aux Combes Gréde et Bioss, au Creux du Vent, sur la Motte de Bonod. 810.

### 136. LIGUSTICUM. (*Liebstöckel.*) G. pl.

478.

Cor. æquales; petala involuta integra introrsum carinata; fructus oblongus 5-sulcatus utrinque.

1. *L. peloponnense*, fol. multiplicato-pinnatis; foliolis pinnatim incisis. L. Jacq. Austr. app. t. 13.

In montibus Rhæticis circa *Pusclav.* In rupibus circa *Formaz* trans Alpes griseas. In valle *Tellina* ultra *Morbegno*, eundo versus montem *Trona*. 758.

2. *L. nodiflorum*, fol. biernatis: fol. ovato-lanceolatis inciso-dentatis; pedunc. verticillatis; involuero universali monophyllo setaceo. S. *Allioni Ped.* t. 72.

(*Schleicher* misit inventum super *Port Valais*.

Umbellæ universales 3-4 ve ticillatæ. Folia subtus pallida. Dentes mucrone albo.)

### 137. ANGELICA. (*Angelick.*) G. pl. 479.

Cor. æquales, petalis incurvis lanceolatis; fructus subrotundus angulatus stylis reflexis.

1. *A. Archangelica*, foliorum impari lobato. L. *Oed. Dan.* t. 206.

In Valle Tellina. Cl. *Dick* detexit inter *Bocca d'Adda* et *Morbegno*. 807.

(Petala viridia.)

2. *A. sylvestris*, foliolis æqualibus ovato-lanceolatis serratis. L. *Hofm. Germ.* p. 99.

In aquosis frequentissima et in sylvis. 806. Fl. Jul. Aug.

(Petala plerumque rubella.)

3. *A. verticillaris*, fol. divaricatissimis, foliolis ovatis serratis; caule pedunculis verticillato. L. *Jacq. Hort.* t. 130.

(Schleicher habet in Catalogo pag. 55, et misit inventam prope *Tusis*. Foliola subtus venosissima, pallida, dura. Ad hanc solam, et non ad *Ligust. nodiflorum* spectat synonymon *Tournefortii*; et ob folia dura erit *Ligust. foliis Angelicæ*. Ioh. Bauh. H. P. III. 2. pag. 147.)

### 138. SIUM. (Merk.) G. pl. 480.

Involucrum polyphyllum. Cor. uniformis; petala inflexo-cordata æqualia. Fruct. subovatus, striatus, parvus.

1. *S. latifolium*; fol. pinnatis; umbella terminali. L. Oed. Dan. t. 246. Jacq. Austr. t. 66.

In fossis aquosis circa *Roche*, *Mathod*, *Payerne* etc. 777.

2. *S. angustifolium*, fol. pinnatis, umbellis axillaribus pedunculatis; involucro universalis pinnatifido. L. Oed. Dan. t. 247.

In rivulis et fossis. 778. Fl. Jun-Aug. (*Hallerus* conjungit cum *S. nodifloro*, quod umbellis subsessilibus differt. Nec ego separo.)

3. *S. falcaria*, fol. linearibus decurrentibus connatis. L. Jacq. Austr. t. 257.

Non facile reperitur nisi circa *Basileam* ad domum *Sclopetariorum*, et extra portam *D. Iohannis* ad sepes. 782.

139. SISON. (*Sison.*) *G. pl.* 481.

Umbella inæqualis; involucra sub-4-phylala; fructus ovatus, striatus.

1. *S. segetum*, fol. pinnatis, umbellis cernuis. L. *Jacq. Hort.* t. 134.

In pratis *Vallis Erguel*. Sed nondum satis certa avis, cum *Hallerus* solum folium, neque id optime conservatum viderit. 779.

2. *S. inundatum*, repens, umbellis 2-fidis.

L. *Oed. Dan.* t. 89.

Unicam nonnisi plantulam reperit *Hallerus*, in fossis paulo ultra *Noville*, quando versus Rhodanum, qua troctarum captura est. 780.

(Umbellæ ex alis foliorum in longiusculis bacillis. *Hall.*)

140. OENANTHE. (*Rebendolde.*) *G. pl.* 484.

Umbella partialis pluribus brevissimis radiis congesta. Flosculi difformes in disco sessiles. Fructus subovatus, perianthio et pistillo coronatus.

1. *O. fistulosa*, stolonifera; fol. caulinis pinnatis filiformibus fistulosis. L. *Fl. Dan.* t. 846.

In fossis aquosis non rara, *Bernæ*, *Paternæ* etc. 755

In pratis paludosis *Michelfeldæ*. C. B.

(Involucr. univers. 1-folium aut nullum. *Hall.*)

2. *O.*

2. *O. peucedanifolia*, fol. omnibus linearibus: radicalibus bipinnatis, caulinis pinnatis; involucro universali nullo; radicum napulis ovatis sessilibus. *Pollich. pal. t. 3.*

*Circa les Esserts*, abunde in pratis, prope *Roche aux marais de Choulez et de Suinet.* 756.

(*Involucr. universale 1-5 phylum. Hall.*)

b. *Involucris partialibus, universali nullo.*

141. PHELLANDRIUM. (*Peersaat, Wasserfenchel.*) *G. pl. 435.*

*Involucr. partiale 7-phylum, longitudine umbellulæ: flosculi disci minores; fructus ovatus, lævis, coronatus perianthio et pistillo.*

1. *P. aquaticum*, foliorum ramificationibus divaricatis. *L. Bulliard. t. 147. Fl. Dan. t. 1154.*

*Passim in aquosis: im See bey Moosseedorf. Au Locle, près le moulin du Cul de Roches. Michelfeldæ. 757.*

(Var.  $\beta$ . fol. capillaribus: *Michelfeldæ.*)

2. *P. Mutellina*, caule subnudo, fol. pinnatis. *L. Jacq. Austr. t. 56. Allioni Ped. t. 60. f. 2.*

*In omnibus alpibus abundat, et ex ejus frequentia fere pascuorum bonitas æstimatur. Etiam in montanis, in Mittlerberg Biennensium.* 763.

142. CICUTA. (*Wüterich, Wasserschierling.*) *G. pl. 486.*

Umbellæ subrotundæ, involucr. partiale polyphyllum brevibus setis; flores æquales; fructus subovatus sulcatus.

*C. virosa*, umbellis oppositifoliis; petiolis marginatis obtusis. *L. Oed. Dan.* t. 208. *Bull.* t. 151.

Abunde circa *Roche*, ultra *Noville*. Basileæ in stagnis versus *Friedlingen*, et inter *Hüninge*n et *Otmarsheim*. Circa lacum *Felinum*, *Zurzach*. etc. 781.

143. AETHUSA. (*Gleisse.*) *G. pl. 487.*

Involucella dimidiata, foliolis 3-5 linearipendulis; petala inflexocordata; inæqualia, fructus striatus.

1. *A. cynapium*. (*Gundspetersilie.*) foliis conformibus. *L.*

Ubique in hortis et ad muros. 765. flor. Jul. Aug.

2. *A. meum*, fol. omnibus multipartito-setaceis. *L. Jacq. austr.* t. 303.

In *Pilato*; in *Toggicis* montibus. *A la grande vi* circa *pastorias casas*. *A la grande Sagne*, près de la *Tourne*, proche *Ferrière*, prope la *ronde fontaine*, à *Roulier*, près de la *Brévine*, in *M. Ballon*, circa *Dess* etc. 761.

144. CORIANDRUM. (*Coriander.*) G.  
pl. 488.

Involuer. universale subunifolium, partiale 3-phylum; cor. radiata; fructus sphæricus.

*C. sativum*, fructibus globosis. L.

Circa Tramlingen Dessiæ regionis. 764.

145. SCANDIX. (*Kerbel.*) G. pl. 489.

Involuer. partiale 5-phylum longitudine umbellulæ; cor. disformis, radiata; petala inflexo-emarginata; fructus subulatus.

1. *S. odorata*, seminibus sulcatis angulatis. L. Jacq. austr. app. t. 37.

Passim in alpinis: in M. Nombrieux, Richard. In Valesia versus Valorsine. Prope Ivorne supra la maison blanche, ad semitani, quæ ducit ad Corbeirier. Au bec de l'Oiseau, à la Joux du Plane, sur l'Anvers de Renans; in pomariis circa Ferrieres, et prope la Brevine 753.

(Involuer. universale 1-phylum; folia mollia albida. Hall.)

2. *S. pecten*, semin. rostro longissimo. L. Jacq. Austr. t. 263.

In agris: Valesiæ, Aquilejensium aux gauges prope Roche. Basileæ versus S. Margret, versus Muri Argoviæ etc. 754.

3. *S. cerefolium*, semin. nitidis ovato-subulatis, umbellis sessilibus lateralibus. L. Jacq. Austr. t. 390.

Exoticam putat *Hallerus*; sponte tamen nas-  
citur in Valesia, v. c. à *Gonthey*. 747.

4. *S. anthriscus*, semin. ovatis hispidis;  
coroll. uniformibus: caule lævi. L. Oed.  
Dan. t. 863.

Circa *Genevam*. *Basileæ*. In pago *S. Blaise*  
ad muros; sic in pago *Treicovagnes*. Prope  
*Neuweg* in ruderosis. 743.

146. CHAEROPHYLLUM. (*Kälberkropf.*)  
G. pl. 490.

Involucr. sub -5-phylum reflexum, con-  
cavum; petala inflexo-cordata, mucrone in-  
flexo, exterioribus paulo majoribus. Fruc-  
tus oblongus, acuminatus; lævis.

1. *C. sylvestre*, caule lævi striato, geni-  
culis tumidiusculis. L. Jacq. Austr. t. 149.

Nihil frequentius primo vere in pratis. 748.

2. *C. bulbosum*, caule lævi, geniculis  
tumido, basi hirto, L. Jacq. Austr. t. 63.

Circa *Bernam* passim ad sepes, *Mülhusii*  
et *Basileæ*. 752.

(Involucr. univers. 1-phylum; partiale 3-phyl-  
lum mucronatum. Hall.)

3. *C. temulum*, caule scabro, geniculis tumidis. L. Jacq. Austr. t. 65.

In sepibus non rarum. *Biennæ; Delemontii.*  
Inter *Neufchatel* et *S. Blaise*. 750.

4. *C. hirsutum*, caule æquali; foliolis incisis acutis, fructibus biaristatis. L. Jacq.  
Austr. t. 148.

Vulgo ad rivos et in pratis; adscendit etiam  
in Alpium et Juræ Valles.

Var.  $\beta$ . foliis hirsutis; minor. In M. *Wasserfall, Luan, Taveyannaz*, etiam in altioribus  
rupibus, *Prapioz, Neunnen*. 751.

5. *C. aureum*, caule æquali; foliolis incisis, semiir. coloratis sulcatis, muticis. L.  
Jacq. Austr. t. 64.

Non solum in Juræ pratis et subalpinis, ut  
in pratis circa *Jorogne*, sed et in planicie, circa  
*Mathod, Roche, Bernam*. Circa *Pümpliz* in  
pratis et ad sepes vulgatissima. 749.

(Caulis longe maculatus, et purpura tinctus.  
In planicie nervi foliorum hirsuti sunt, in monta-  
nis folia tota; flores albi extus subrubri. Hall.)  
147. IMPERATORIA. (*Meisterwurz.*) G.  
pl. 491.

Involucr. universale subnullum, partiale  
exiguis et paucis foliolis. Petala inflexo-  
emarginata: semina ovata, compressa, mar-  
gine lato cincta.

I. *Ostruthium*. L.

In alpinis non rara, sed unicee alpina: In Vallibus *Chapuise*, *Lauterbrunn*, *Schöllinen*, *Urseren*. In M. *Maloja*, *Speluga*, *Wängialp*, *Aix*, *Isenau*, *Jeman*, *Sulanfe*, *Combe de Martigny*, *Valesianorum*. In *Glaronensium* alpibus. 805.

(Etiam in quibusdam *Aquilejensium* alpibus provenit, ubi radicem acrem a pastoribus non modo manducatam, sed etiam loco *Nicotianæ* in auras fugere vidi.)

148. SESELI. (*Rosshüimmel.*) G. pl 492.

Involuer. partiale foliolo uno altero linearie; fructus ovatus striatus.

1. *S. montanum*, petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris; fol. caulinis angustissimis. L.

In M. *Wasserfall* invenit la *Chenal* et circa *Prundrut* et *Mumpelgard*. Höpfner Magazin. IV. p. 31. Circa *Orbe* inventum misit *Schleicher*.

2. *S. annum*, petiolis rameis membranaceis ventricosis emarginatis. L. Jacq. Austr. t. 55.

Abunde circa *Aquilejam*, in herbidis prope *Verchier*, qua ab arce *Aquilejensi* ascenditur. In insula *Mondenii*. Agauni, versus sedem *Eremitæ*. 762.

(Folia firma, glauca, vaginæ duræ, virescentes, ora alba. *Hall.*)

5. *S. saxifragum*, caule filiformi divaricato; fol. duplicatoternatis linearibus, umbellis sub-6-fidis. L.

Copiose ad Lacum Genevensem. C. B. Prodr. p. 84.

(Apud Hallerum non invenio, nisi *Rivini* synonymon sub præcedente. Videtur magnus vir, *S. glaucum*, *montanum*, et *annuum* plantæ præcedenti conjunxisse; *glaucum* saltem a monte non nisi fol. *glaucis* differt, et ab eo citatum synonymon I. Bauhini certe ad *glaucum* spectat. Etiam *saxifragum* nimis argute separatur.)

c. *Involucro nullo*, nec universalis,  
nec partialibus.

149. PASTINACA. (*Pastinak.*) G. pl. 494.

Petala involuta, integra; fructus ellipticus, compresso-planus.

*P. sativa*, fol. simpliciter pinnatis. L.

In ruderosis, ad vias vineasque. 808. fl. Jul. Aug.

150. ANETHUM. (*Dill.*) G. pl. 496.

Petala involuta, integra; fructus ovato-striatus.

*A. Foeniculum*, (*Fencheldill*) fructibus ovatis. L.

Vulgo in vineis et ad viarum margines, circa  
*Mathod*, *Ripaz*. Sed non pro vera cive habet  
*Hallerus*. 760.

151. CARUM. (*Gemeiner Kümmel.*)  
G. pl. 497.

Involucr. saepe 1-phylum; petala inæqualia, carinata, inflexo-emarginata; fructus ovato-oblongus striatus.

C. *Carvi*, caule ramoso; vaginis foliorum ventricosis; involucre partiali nullo. W. Jacq. *Austr.* t. 395. *Fl. Dan.* t. 1091.

In pratis ubique, imprimis subudis; etiam in alpibus. 789.

152. PIMPINELLA. (*Bibernell.*) G. pl. 498.

Umbellæ ante florescentiam cernuæ, petala inflexo cordata; stigmata subglobosa; semina oblonga, striata, versus apicem angustiora.

1. P. *saxifraga*, caule striato glabro, fol. pinnatis glabris, radicalibus foliolis subrotundis argute dentatis, caulinis bipinnatis linearibus. W. Jacq. *Austr.* t. 595.

In pratis, locisque aridis. 786.

2. P. *magna*, fol. uniformibus pinnatis, foliolis omnibus lobatis, impari trilobis. W. Jacq. *Austr.* t. 596.

In pratis et sylvis; etiam in montibus. v. c.  
in M. Crenzach.

Var.  $\beta$ . umbella rubente, in subalpinis et  
submontanis. 785.

(Folia hirsutie ludunt. *Hall.*)

3. *P. dissecta*, fol. omnibus pinnatis,  
pinnis multipartitis, segmentis subfoliatis  
acutis. *Retz. Obs. 3. t. 2.*

In aridioribus collibus. 787. (*P. Geneven-*  
*sis. Villars.*)

4. *P. dioica*, pumila, umbellis numero-  
sissimis compositis simplicibusque. *L. Jacq.*  
*Austr. t. 28.*

In Helvetia non rara: in M. *Wasserfall,*  
*Dolaz*; etiam in planicie circa *Roche, Aquile-*  
*jam et Biennam* frequens. 788.

(Dubitavi saepius, *Halleri* plantam hoc spec-  
tare; presertim ob quædam Synonyma ab eo  
citata, potius *Seseli tortuosum* vel *Hippomara-*  
*thrum* notabatur. Umbellæ vero densissimæ et  
 numerosissimæ, quibus *Seselea* carent, aliæ-  
que notæ faciunt, ut *P. dioicam* præferam.  
Ergo non nova est, ut *Cl. la Chenal* putat, qui  
eam in prato sicco *Michelfeldæ*, et in collibus  
circa semitam *a la Sarraz* ad halneum *St. Loup*  
invenit. *Höpfner Magazin IV. p. 31.*

Nisi etiant C. B. *Seseli Massiliense foeniculi*  
*folio ad Seseli tortuosum*, ut scalent, spectare

satius ducas, jam illam magnum virum nostram  
*Dioicam* in saxosis herbidis montis *Crenzach*,  
 et in sylvis *Hüningensibus* circa *Michelfelden*  
 invenisse videbis. *Basil.* pag 49.)

153. APIUM. (*Eppich.*) *G. pl.* 499.

Involucr. o., seu 1-phllum, petala æqua-  
 lia; fructus ovatus, striatus.

*A. graveolens*, fol. caulinis cuneiformi-  
 bus. *L. Fl. Dan.* t. 730.

Non satis certa civis, etsi in ruderosis et  
 fossis proveniat, ut ad *Balneum suburbanum*  
*Bernense* exterius; a St. *Blaise.* 784.

154. AEGOPODIUM. (*Giersch.*) *G.*  
*pl.* 500.

Involucr. o. Petala apice inflexa æqua-  
 lia. Fructus ovato-oblongus, striatus.

*A. podagraria*, sol. caulinis summis ter-  
 natis. *L. Fl. Dan.* t. 670.

Ad sepes, in hortis. 759. fl. Maj. Jun.

T R I G Y N I A.

*A. Flores superi.*

155. VIBURNUM. (*Schwelke, Schneeball.*)  
*G. pl.* 503.

Cal. 5-paritus, superus. Cor. 5-fida.  
 Bacca 1-sperma.

1. V. *Lantana*, fol. cordatis serratis venosis, subtus tomentosis. L. Jacq. Austr. t. 541.

Nihil vulgatius ad sepes. 669. fl. Maj. Jun.

2. V. *Opulus*, fol. lobatis, petiolis glandulosis. L. Oed. Dan. t. 661.

Abunde ad sepes, fossas et rivos. 668.

(Var. flor. omnibus sterilibus.)

156. SAMBUCUS. (*Hollunder.*) G. pl. 505.

Cal. 5-partitus; Cor. 5-fida. Bacca 3-sperma.

1. S. *ebulus*, cymis tripartitis, stipulis foliaceis; caule herbaceo. L. Fl. Dan. t. 1156.

In locis humidis umbrosis, in sylvis fossisque frequens: 671. fl. Jul. Aug. (Etiam in Jurae montibus.)

2. S. *nigra*, cymis quinquepartitis; caule arboreo. L. Oed. Dan. tab. 545.

Nigro fructu ubique in seribus; fructu viridi Basileæ extra portam Eschmei thor, et ad viam versus Gundeldingen. 670. fl. Maj. Jun.

(Var. fol. laciniatis.)

3. S. *racemosa*, racemis compositis ovatis, caule arborco. L. Jacq. ic. t. 59.

In sylvis non rara: Bernæ im Premgarten, inter Langgasse et viam ducentem in villam

*Stasli.* Am *Belpberg*, circa *Burgdorf*. In M.  
*Albio*, *Saleva* etc. 672.

(*Flores minimi ochroleuci, fructus ruber*)

B. *Flores inferi.*

157. RHUS. (*Sumach.*) G. pl. 502.

Cal. 5-partitus; petala 5; bacca subrotunda, 1-sperma.

R. *Cotinus*. (*Perrücken Sumach*) racemis plumosis, foliis ovatis. Hall. Jacq. austr. t. 210.

Circa *Leucam* in rupibus ad *Rhodanum*. 827.

158. STAPHYLEA. (*Pimpernuss.*) G.  
pl. 507.

Cal. 5-partitus; petala 5. *Nectarium* e receptaculo fructificationis urceolatum, capsulae 3 inflatae, flaccidae, connatae; semina 2 ossea, globosa, acumine obliquo et fovea orbiculata ad latus apicis.

S. *pinnata*, foliis pinnatis. L. Hofm.  
Germ. p. 110.

Passim ad sepes. Bernæ im *Altenberg*. Inter *Solothurn* et *Wallenburg*. Prope urbem Basileam extra portas *Rhenanam* et *Albanam*. In M. *Muteto* et dumetis trans *Birsam*. Vitoduri im *Bruderholz*. Scaphusiæ im *Mühlenthal*. In

*agro Aventico*, ubi vocant nés coupés. Aquilejæ. 831.

(Exoticam putat *Hallerus.*)

159. TAMARIX. (*Tamarisken.*) G.  
pl. 510.

Cal. 5-partitus; petala 5; stigmata plumosa; caps. 1-locularis, acuminata, triquetra; sem. papposa.

*T. germanica*, flor. decandris. L. Oed. Dan. t. 234.

In alveis glareosis fluviorum; ad Arolam cis *Sæelhofen* et usque ad *Thun*; circa *Aroviam*; in *Rheno*, *Rhodano* etc. etiam in arenosis ad *Birsam.* 948.

(Stamina omnia basi connata, alterna exteriora breviora. Spicæ terminales. Folia conferta, sessilia, linear-lanceolata, glauca. Flores rosei.

160. TELEPHIUM. G. pl. 515.

Cal. 5-phylloides; petala 5 receptaculo inserita; caps: triquetra, trivalvis, unilocularis.

*T. Imperati*, sol. alternis. L.

In Valesia circa *Sedunum*, *Gonthey*. Aux *Platieres de Sierre.* 841.

(Caules procumbentes foliosi; folia ovato-lanceolata; umbella terminalis, flores albi.)

161. CORRIGIOLA. (*Knotenkraut.*) *G.*  
*pl. 516.*

Cal. 5-phillus margine membranaceo; petala 5. Sem. 1, ovatum, triquetrum.

*C. litoralis*, *Oed. Dan.* t. 554.

*Vivisci*; in arenosis ad *Wiesam.* 842. fl.  
 Autumno. C. B.

(Caules prostrati; folia linearis-oblonga glauca;  
 flores pedunculati albissimi; fasciculus terminalis.)

162. ALSINE. (*Vogelmiere.*) *G. pl. 518.*

Cal. 5-phillus; petala 5 æqualia; caps.  
 1-locularis, trivalvis, calyce tecta.

1. *A. media*, petalis bipartitis; fol. ovato-cordatis. *L. Oed. Dan.* t. 525.

Nihil vulgatus in hortis et ad vias. 880.

2. *A. mucronata*, petalis integris brevibus, fol. setaceis; calyc. aristatis. *L. Hall.* t. 17.

In arenosis à la grande Eau prope Aquilegiām; in area arcis St. Tryphon, etc. passimque in Aquilejensibus. In Valesia circa Sedunum, Branson. A la tuillerie de Grandson, prope Concise; et in Castello Istein. 870.

## T E T R A G Y N I A.

163. PARNASSIA. (*Pinblatt.*) *G. pl. 523.*

Cal. 5-partitus; petala 5 striata; nectaria 5 cordata, ciliata apicibus globosis; caps. 1-locularis, 4-valvis; receptac. valvulis adnatum.

*P. palustris.* L. *Oed. Dan.* t. 584.

Frequens in aquosis. 832. fl. Jul. Aug.

(Etiam in summas alpes adscendit. e. g. interveni in *Panerossaz, Boulaire.*)

## P E N T A G Y N I A.

164. STATICE. (*Grasnelke.*) *G. pl. 527.*

Cal. 1-phylus, integer, plicatus, scariosus; Cor. infundibuliformis 5-petala; caps. 1-locularis, evalvis; sem. 1, oblongum, elongo funiculo pendulum.

*S. Armeria*, scapo simplici capitato, fol. linearibus. L.

In summis Alpibus *Griseis.* 835.

165. LINUM. (*Lein, Flachs.*) *G. pl. 528.*

Cal. 5-phylus; petala 5; caps. 5-valvis, 10-locularis; sem. solitaria.

*Fol. alternis.*

1. *L. usitatissimum*, calyculis capsulisque mucronatis, petalis crenatis, fol. lanceolatis altervis; caule solitario. L.

In agris et vervactis circa Basileam, Bernam et in universa Helvetia. 836.

2. L. *narbonense*, calyc. acuminatis; fol. lanceolatis sparsis strictis scabris acuminatis; caule tereti basi ramoso. L.

Frequens in Juræ montosis et alpibus. Maxima copia in monte Montendre vallis du Lac de Joux; in M. Dolaz, Thuiry, et ubique in Alpibus Aquilejensibus. In Valesiae monte Fouly, Val de Lie, supra Thermae Leucenses etc. 837.

(Primo intuitu plantam hanc ad L. *alpinum* spectare putavi; sed rite examinatis meis specimenibus, quæ in Aquilejensium Alpibus legi, constanter calycem *acuminatum* inveni, qua nota, et ea quasi sola, ab *Alpino* distinguitur. Forsan eadem planta solo calyce ludit. S.)

3. L. *tenuifolium*, calyc. acuminatis; fol. sparsis linearis-setaceis, retrorsum scabris. L. Jacq Austr. t. 215.

Nunquam alpina, et raro montana, ad vias vero in toto pago Aventico circa Roche, Fontaine, au Tombey, Mathod etc. et supra Cheire, in Valesia, ubique frequens est. In M. Crenzach. 838.

### *Fol. oppositis.*

4. L. *catharticum*, fol. oppositis ovato-lanceolatis; caule dichotomo, coroll. acutis. L.

Frequens in pratis, etiam uidis, et locis gramineis. 839.

(Caulis raro dichotomus.)

5. L. *radiola*, fol. oppositis; caule dichotomo; flor. tetrandris tetragynis. L. *Oed.* *Dan.* t. 178. *Vaill.* t. 4. f. 6.

*Mülhusiae* detexit Cl. Hofer. *Basileæ* etiam in arenosis ad *Wiesam.* 840.

(Calyx 4-folius; petala 4. Hall.)

166. DROSERA. (*Sonnenthau.*) G. pl. 531.

Cal. 5-fidus, petala 5, caps. 1-locularis, apice 5-5-valvis.

1. D. *rotundifolia*, scapis radicatis, fol. orbiculatis. L. *Fl. Dan.* t. 1028.

In paludosis um den Neuhausweyer. In torfeto Löhr. Circa Kilchlindach. Aux marais des pruats et de l'Echelette. 834.

2. D. *longifolia*, scapis radicatis; fol. ovali-oblongis. L.

Hæc in paludosis vulgatior, circa Moosendorf, Vervay etc. 833.

167. SIBBALDIA. G. pl. 536.

Cal. semi-10-fidus; petala 5 calyci inserta; styli e latere germinis; sem. 5.

S. *procumbens*, foliolis tridentatis. L. *Oed.* *Dan.* t. 32.

In Alpibus editioribus, in *Taveyannaz* Aquilejensium; in Valesiacis *Bovinaz*, *Col de ferry*, et supra montem D. *Bernhaïdi*. In Valle D. *Nicolai*. In M. *Simplon*, *Speluga*, *Furcula*. In *Abbatiscellanis*. 1116.

(Folia terna, tridentata, radicalia juniora sericea; petala flava, calyce non majora.)

**168. CRASSULA.** (*Dickblatt.*) *G. pl. 533.*

Cal. 5-phyllo; petala 5 unguibus longis conniventibus; squamæ 5 nectariferæ ad basin germinis; caps. 5.

*C. rubens*, fol. fusiformibus subdepressis; cyma 4-fida foliosa; flor. sessilibus, stamin. reflexis. L.

In arvis circa *Basileam* et *Hüningen*, et alibi, 960.

**P O L Y G Y N I A.**

**169. MYOSURUS.** (*Mäuseschwanz.*) *G. pl. 533.*

Cal. 5-phyllo, coloratus, deciduus; petala 5-unguiculata oblique introrsum aperta; receptac. seminibus tectum imbricatim dispositis; semina numerosa.

*M. minimus*. L. *Oed. Dan.* t. 406.

Rarus in Helvetia. *Mülhusii*; an der *Wiese* circa *Basileam*. 1159.

(Gaudet pinguibus agris et pratis. Aprilifloret. J. B. III. pag. 512.)

*Classis VI.*

## HEXANDRIA.

## MONOGYNIA.

A. *Calculati*, *calyce corollaque instructi*.

170. BERBERIS. (*Sauerdorn.*) *G. pl. 595.*

Cal. 6-phyllus; petala 6, ad ungues glandulis 2; Styl. 0; bacca 1-locularis, 2-sperma, puncto umbilicata.

B. *vulgaris*, pedunc. racemosis; spinis triplicibus. L. *Oed. Dan.* t. 90. 4.

B. *Fl. Spathacei* S. *Glumacei*.

171. GALANTHUS. (*Schneeglöckchen*, *Schneetropfen.*) *G. pl. 547.*

Petala 3 exteriora concava, interiora nectarifera 3, breviora emarginata; antheræ in setam desinentes, conniventes; Stylus filiformis.

*G. nivalis.* L. *Jacq. Austr.* t. 313.

In pratis *der Schooshalde* prope Bernam,  
*Aquilejæ, Moutru*; in pratis *sur les Cretets de la Chaud de fonds*. 1254.

172. LEUCOJUM. (*Knotenblume.*) G.  
*pl. 549.*

*Cor. campaniformis, 6-partita, apicibus incrassata; Styl. clavatus, obtusus.*

*L. vernum, spatha 1-flora; stylo clavato.*  
*L. Jacq. Austr. t. 312.*

*Secundum rivulos, quibus prata irrorantur, Bernæ, Tobinii etc. Etiam in monte Muteto.*  
1253.

173. NARCISSUS. (*Narcisse.*) G. *pl. 550.*

*Petala 6 æqualia nectario monophyllo infundibiliformi inserta. Stam. intra nectarium.*

1. *N. poeticus*, spatha uniflora; nectario rotato brevissimo scarioso crenulato. L.

Lacteo flore vulgatissimus in subalpinis pratis vallis inferioris *Gessenay*, unde ad *Ville-neuve* usque ad *Blonni* descendit, vernaqæ prata tota dealbet. *Rupe* inter arundines. Etiam in valle *Motier-Travers*, circa *la Brevine*, in *Combe de Valanvron* etc. 1250.

(Var. *β.* flore medio luteo, circa *Genevam.*  
*γ.* flore candido odoratissimo, in montibus circa *Curiam.*) 

2. N. *Pseudo Narcissus*, spatha uniflora, nectario campanulato erecto crispo, aequante petala ovata. L.

*Bernæ* in pomariis primo vere vulgo, sic in *Neocomensi* comitatu et alibi. 1252. (*Lucernæ* frequens in pratis et pomariis. S.)

3. N. *odorus*, spatha subbiflora, nectario campanulato sexfido lævi dimidio petalis breviore; fol. semicylindricis. L.

In prato a *la Gardelle*, haud longe Geneva 1251.

(Flos nutans flavus; nectarii segmenta emarginata, pene ovata. Hall.)

174. BULBOCODIUM. (*Friihlings Uchttblume.*) G. pl. 555.

Cor. infundibiliformis 6-petala: unguibus longissimis linearibus staminiferis. Caps. supera.

B. *vernus*, fol. lanceolatis. L. *Villars Delph.* t. 2.

In Valesia circa *Branson* invenit *Schleicher.*

175. ALLIUM. (*Lauch.*) G. pl. 557.

Spatha multiflora marcescens; cor. 6-petala; umbella congesta; caps. supera 3-lo-  
cularis.

*a. Fol. caulinæ plana. Umbella capsulifera.*

1. A. *Ampeloprasum*, caule planifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus tricuspidatis, petalis carina scabris.. L. *Micheli. gen. t. 24. f. 5.*

In agris circa *Wiesam*, inque vinetis circa *Crenzach*. 1218.

(Non vera civis ab *Hallero* creditur.)

2. A. *porrum*, caule planifolio umbellifero; staminibus tricuspidatis, radice tunicata. L.

In vineis *Wylensibus* et ad Rhenum sitis. C. B. Basil. Circa *Moutru* in vineis, sed, ut puto, casu aliquo, provenit. 1217. Hall.

3. A. *rotundum*, caule planifolio umbellifero; umbella subglobosa; staminibus tricuspidatis; flor. lateralibus nutantibus. L.

In vineis et segetibus *Genevæ* et *Basileæ* uterque *Bauhinus* legit, *Hallerus* nunquam. 1219.

4. A. *Victorialis*, caule planifolio umbellifero, umbella rotundata, stamin. lanceolatis corolla longioribus; foliis ellipticis. L. *Jacq. Austr. t. 216.*

In alpibus, locis saxosis, frequens. In M. *Nesso*, *Fracto*, supra *Schennis*, circa glaciales rupes vallis *Grindelwald*. In M. *Oehrli*,

*Hohenmesmer.* In M. Rothenhorn supra Brienz.  
In *Serin*, la *Varaz*, *Prapioz*. In summis  
montibus rarius: in *Chasseralle*, *Creux du Vent*  
etc. 1229.

b. *Fol. caulina plana. Umbella bul-*  
*bifera.*

5. *A. arenarium*, caule planifolio bulbi-  
fero; vaginis teretibus; spatha mutica; sta-  
minibus tricuspidatis. L. *Oed. Dan.* t. 290.

*Basileæ ad sepes inter campos, patibulo ad-*  
*sitos et St. Jacob.* In montis *Muteti* latere sep-  
tentrioñali, locis gramineis. Prope *Riehen* 1222.

(*Scopoli* et *Pollich* hanc plantam *A. scorodoprasum* credunt; non bene, cum illud habeat  
vaginas *ancipites*, nostrum vero *teretes*. Dif-  
fert adhuc nostrum floribus multo perfectiori-  
bus, habituque multo humiliori. Num vero  
septentrionale *scorodoprasum* a nostro *vere* di-  
versum sit, nec dixerit *summus Hallerus*, nec  
ego dixerim. Vaginæ saitem discriminem cum  
eo non intelligo.)

6. *A. carinatum*, caule planifolio umbel-  
lifero; staminibus subulatis. L. *Hall. All.*  
t. 2. f. 2.

Non rarum. Bernæ um den *Bodenaker*; circa  
*Uetendorf*, *Rinkenberg*, *Spiez*; circa *Roche*,  
*St. Tryphon*, in muris; ad viam regiam versus

*Moutru* etc. In Valesiæ sylva *Leitern*. Inter *Chur* et *Tusis*, et inter *Chur* et *Ems*. Basileæ prope villam *die Klîbe*, *Neuhaus* etc. In dumosis vinearum *M. Muteti*. 1224.

c. *Fol. caulina teretia. Umbella capsulifera.*

7. A. *sphaerocephalon*, caule teretifolio umbellifero; fol. semiteretibus, stamin. tricuspidatis corolla longioribus. L. Hall.  
*All. t. 2. f. 1.*

Abunde in rupibus Helvetiæ calidioris: prope *Interlachen* in der *Goldey*, circa *Neocomum*, *Roche*; *Seduni*, *Agauni* ubique. Basileæ in agris auf dem *Birsfeld*, ad pontem *Wiesæ*, et retro *St. Jacob* etc. 1220.

Cur *Linnæus* hanc plantam excludebat, non capio.

8. A. *paniculatum*, caule subteretifolio umbellifero; pedunculis capillaribus effusis; staminibus subulatis, spatha longissima. L. Hall. *All. t. 1. f. 1.*

Circa *Bonneville*, *Pseffers*, et in sylva *Saufelaz* *Aquilejensium*. 1225.

9. A. *vineale*, caule teretifolio bulbifero; stamin. tricuspidatis. L.

Circa *Brugg*, *Königsfelden*, *Tigurum*. Basileæ in agris lapidosis versus *Muttenz*, *Kleinrieghen*,

riehen, Kleinhuning, auf dem Birsfeld. *Interlaci* in segetibus. 1221.

10. *A. oleraceum*, caule teretifolio bulbifero; fol. scabris semiteretibus subtus sulcatis; stamin. simplicibus. L. Hall. All. t. 1. f. 2.

*Michelfeldæ* in dumetis collis qui longe prata terminat. In dumetis et inter vineas *Muteti*. Circa *Sonvilliers* secundum agros. *Badæ* in arcis dirutæ ruderibus etc. 1223.

(*Folia fistulosa*, scabra non vides. *Hall.*)

#### d. *Folia radicalia. Scapus nudus.*

11. *A. senescens*, scapo nudo ancipiti; fol. linearibus subtus convexis lœvibus, umbella subrotunda; staminibus subulatis. L.

*Genevæ* in pratis, et abundantissime in pratis udis inter *Roche* et *Chessel*. Etiam circa *Seelhofen*. 1227. ♀.

(Petala erecta a se invicem distantia, canaliculata, inflexa. Stamina corolla paulo longiora. *Linnæus.*)

12. *A. angulosum*, scapo nudo ancipiti; fol. linearibus canaliculatis subtus subangulatis, umbella fastigiata. L. Jacq. Austr. t. 423.

Hoc rupestre est et minus: in M. *Dansex*; *Badæ*, *Burnii*, in alta Rhætia.

Var. flore minori *Seduni*, circa St. *Tryphon*, et circa *Telonium* Vallis Lepontiæ. 1227.  $\alpha.$   $\beta.$

(Folia interdum subtus vix angulata, at scapus superne parum angulato-striatus. Petala interiora apice patentia, omnia lateribus conniventia. *Hallerus* dubitat, an sit diversum ab *A. senescente?* certissime distincta species, utramque ultra 20 annos alui. *Linnæus*.

Hæc optima; sed dubitat *Hallerus*, quia ob angulos quosdam minutissimos, (qui et in *senescente* conspiciuntur,) plantas, radice, vagina, totoque habitu similes separare solebat. Quidquid sit, litem in *Elysia unda* componant. S.)

13. *A. ursinum*. scapo nudo triquetro; fol. lanceolatis petiolatis; umbella fastigiata. L. *Oed. Dan.* 757.

Frequens: *Basileæ*, circa *Roche* etc. 1228.

14. *A. schoenoprasum*, scapo nudo adæquante folia teretia subulato-filiformia. L.

Alpina planta vulgaris: in M. *Waach*, in vallecula der *Kessel* inter montem *Neunnen* et balneum *Wyssenburg*. In alpibus Aquilejensibus. In *Mürtschen*, *Hohenmesmer*, St. *Bernhard*, *Dolaz*. Etiam in planicie, in petrosis circa *Lauffenburg*, et ad ripam *Rheni*. 1226.

C. *Flores nudi.*

176. LILIUM. (*Lilie.*) G. pl. 558.

Cor. 6-petala, linea longitudinali nectarifera; stigma triangulare, caps. valvulis pilo cancellato connexis.

1. *L. candidum*, fol. sparsis; cor. campanulatis, intus glabris. L.

In Monte *Schlossberg* Novae Villæ *Chatelain* invenit. 1231.

2. *L. bulbiferum*, fol. sparsis; coroll. campanulatis erectis, intus scabris. L. Jacq. Austr. t. 226.

In Bodmen Abbatiscellanorum. Inter *Art et Schweiz*, ad Lacum *Rivarium*; auf *Ammon* et *Quinten*, et trans *Gotthardum*.

Var. minor in Rhætiæ rupibus, inter M. *Enzeindaz* et pagum *Aven*. 1232.

3. *L. martagon*, fol. verticillatis; flor. reflexis, corollis revolutis. L. Jacq. Austr. t. 351.

In omnibus sylvis vulgare, etiam potissimum in Biennensium montanis pratis.

Var.  $\beta.$  major: in *Saleva*, a *Pertuis*, le long des *Convers*, au bec de l'oiseau.

$\gamma.$  flore albo in Jura. 1233. fl. Jun. Jul.

177. FRITILLARIA. (*Schachblume.*) G.  
pl. 559.

Cor. 6-petala campanulata, supra unguis  
cavitate nectarifera. Stam. longitudine co-  
rollæ.

F. *Meleagris*, fol. omnibus alternis, caule  
unifloro. L. Jacq. Austr. app. t. 32.

Cl. *Gagnebin* in paludosis circa *Goudeba* in-  
yenit, ubi ita inclaruit, ut vicini «' *Tulipes de*  
«' *Goudeba* » vocant. Nascitur etiam ad lacum  
*des Brenets*, à *Moron*, et aux *Essertilles*. 1235.

β. flore albo.

178. UVULARIA. (*Zapfenkraut.*) G.  
pl. 560.

Cor. 6-petala erecta longissima; nectarii  
fovea baseos petali; filamenta brevissima;  
antheræ longæ corolla dimidio breviores.

U. *amplexifolia*, fol. amplexicaulibus  
glabris alternis. S. Barrel. ic. 720.

Primus reperit *Gagnebin* au fond de la *Combe Biosse*, versus montem *Chasseralle*, à la *Chaux d'Abel*, aux *Combes de Valanvron*, au mont *Pouilleret* dans les *Abimes*. Dein abunde inventa in Alpibus Aquilejensibus, ut in Valle *Chapuise*, in Valesiacis de *Lie*, et supra *Vauvry*; etiam in *Griseis*. 1237.

(Flos pendulus convergens; petala albida per-

ætatem apicibus reflexa, exteriora basi gibba  
rubro notata, interiora angustiora pene subu-  
lata. Hall.)

179. ERYTHRIONUM. (*Hunds-Zahn.*) *G.*  
*pl. 562.*

Cor. 6-petala campanulata; petala acu-  
minata versus basin alternatim incumbe-  
ntia; nectario tuberculis 2 callosis petalorum  
alternorum basi adnatis.

*E. Dens Canis.* L. Jacq. *Austr. app. t. 9.*  
Lobelius in Jura prope Genevam dudum le-  
git. Inde le Clerc reperit à la Batie, et ad  
Lacum Lemanum, qua ex regia via Helvetica  
semita ducit ad sylvam Vaugeron in sepibus. 1234.

(Caulis uniflorus; folia supina, petiolata, ova-  
to-lanceolata; flos nutans purpureus, cum viridi  
in ungue macula. Hall.)

180. TULIPA. (*Tulpe.*) *G. pl. 563.*

Cor. 6-petala, campanulata; styl. o., stig-  
ma trilobum.

*T. sylvestris*, flore subnutante; fol. lan-  
ceolatis. L. Oed. Dan. t. 375.

Civem veram non credit Hallerus, etsi pas-  
sim circa Bernam in pratis reperitur, ut in prato  
plano e regione urbis im alten Berge. 1236.

181. ORNITHOGALUM. (*Milchstern, Vogelmilch.*) G. pl. 566.

Cor. 6-petala, erecta, supra medium patens; filamenta alterna basi dilatata.

a. *Staminibus omnibus subulatis.*

1. *O. luteum*, scapo anguloso, 2-phyllo; pedunc. umbellatis simplicibus. L. Oed. Dan. t. 578.

Basileæ versus St. Jacob, circa Gundeldingen. Kiburgi. Circa Thierrachern. In Aquilejen-sibus abunde. Etiam in Alpibus: Chapuise, Fouly, Trone etc. in pratis. 1213.

(Cum nostrum in scapo 1-3 folia habeat, ex quorum numero speciei multiplicandæ rationem quærit Cl. Persoon, vides, et *pratense* et *syl-vaticum* nolis non deesse.)

2. *O. minimum*; scapo angulato 2-phyllo; pedunculis umbellatis ramosis. L. Oed. Dan. t. 612.

In sylvula ad dextra novæ domus Basileæ Cl. Mieg invenit. 1214. et ibi vulgo in segetibus. id. in Add.

(Scapus polyphyllus; pedunculi pubescentes; petala exteriora subhirsuta. Hall.)

3. *O. pyrenaicum*, racemo longissimo; filamentis lanceolatis; pedunc. floriferis pa-

tentibus æqualibus, fructiferis scapo approximatis. L. Jacq. Austr. t. 103.

Genevæ à la Batie, et in colle ad fl. Arve e regione Champé. In segetibus versus montem Saleva. Circa Bussigny et Cressig, supra Lausannam. Basileæ ad Birsam in dumetis, in via ducente ad Münchenstein etc. Abunde in dumetis ad viam, inter Chambon et Chessel Aquilejensium. 1210.

(Est O. stachyoides Cl. Willenow.)

b. *Staminibus alternis emarginatis.*

4. O. umbellatum, flor. corymbosis; pedunc. scapo altioribus; filamentis basi dilatatis. L. Jacq. Austr. t. 343.

In viis gramineis, agris, et inter vineas, Tigruri, Aquilejæ, Basileæ etc. 1215. Etiam Tobinii frequens in agris. Maj. Jun.

5. O. nutans, flor. secundis pendulis; nectario stamineo campaniformi. L. Jacq. Austr. t. 301.

In pratis circa Bernam passim via im alten Eerg. Prope Genevam in pomariis pagorum Frontenay, Conche. 1216.

182. SCILLA. (*Meer-Zwiebel.*) G. pl. 567.

Cor. 6-petala, patens, decidua; filamenta filiformia, corolla dimidio breviora.

1. *S. amoena*, flor. lateralibus alternis subnutantibus; scapo angulato. L. Jacq. Austr. t. 21 S.

In pratis circa *Morges*, *Jain*, et circa *Fenal* et supra *Bex* reperiisse *Davall* dicunt in *Höpfners Magazin* T. IV. pag. 34; sed valde dubito cum viris doctis.

2. *S. bifolia*, radice solida; flor. erectiusculis paucioribus. L. Jacq. Austr. t. 117.

*Basileæ* paulo ultra *Crenzach*, circa *Hiltelingen* et in sylva *Wylensi*; im *Homburger Amt.* *Tiguri* im *Käferhölzlein*. *Aquilejæ* abunde in pratis etc. in sepibus à *Noiraigues* etc. 1211.

(Var. flore coeruleo, *Basileæ* in sylvis circa *Novam Domum*. C. B. Basil. p. 19.)

3. *S. verna*, bulbo tunicato, racemo paucifloro bracteato, corollis campanulatis; fol. linearibus canaliculatis, radicalibus pluribus. Ait. Kew. apud W.

Hanc plantam, credo, *Hallerum* invenisse *Bernæ* in pratis suburbanis *im alten Berg*, qua nunc via munita et omnia Medica consita sunt. 1212.

(*S. italicam* præ omnibus tulisse, nisi ipse *Hallerus* eam obnegasset. In tantis tenebris *Bauhini* figuram descriptionemque H. P. II. pag. 581, ab *Hallero* laudatam, cum *Clusii Ornithogalo*, *Hispan. min. Hist.* p. 188. comparavi.

(quod nuperorum *S. verna* dicitur), et, fere omnia convenient. Habet etiam bracteas longitudine pedunculi. Si hæc non placeant, *S. italicam* propono, et invito *Hallero*, quæ folia obtusa, petiolos, flores et stipulas cærulescentes habet, hasque longitudine pedunculi.)

183. ASPHODELUS. (*Asphodill.*) G.  
pl. 569.

Cor. 6-partita. Nectar. ex valvulis 6  
germen tegentibus.

A. *luteus*, caule folioso; fol. triquetris  
striatis. L.

In monte *Fräla* vallis *Tellinæ*. 1206.

184. ANTERICUM.. (*Zaunblume.*) G.  
pl. 570.

Cor. 6-petala patens; antheræ 4-sulcæ;  
stigma trigonum; caps. ovata 3-locularis.

1. A. *serotinum*, fol. planiusculis; scapo  
unifloro. L. Jacq. *Austr.* app. t. 38.

Pure alpina. In *Hohenmesmer*, *Sattel*, *Spe-  
luga*, *Lunæ* monte. Abunde in *Gemmio*; etiam  
in *St. Bernhard*, *Kahlenberg*, *Schönbühl*. Ad-  
*Thermas fabarias*. 1209. Jul. fl.

(Folia teretia aut triquetra; petala alba intus  
et extus rufis lineis picta. *Hall.*)

2. -A. *ramosum*, fol. planis; scapo ramoso;

cor. planis, pistillo recto. L. Jacq. Austr.  
t. 161. Fl. Dan. t. 1157.

Frequens: Bernæ in prato aprico Brunnadern,  
in pratis circa Seelhofen, in M. Bolligerberg.  
In Aquilejensibus ubique etc. 1208.

3. A. liliago, fol. planis; scapo simpli-  
cissimo; coroll. planis, pistillo declinato.  
L. Oed. Dan. t. 616.

In rupestribus: in Passgardtflüh prope Bien-  
nam, circa Roche; Agauni. Circa Basileam,  
bey Oris; Michelfeldæ, et in M. Crenzach.  
Etiam in M. Salera, Wässerfall; in Valle  
Weisland sub Gutendammen etc. 1207:

4. A. liliastrum, fol. planis; scapo sim-  
plicissimo; coroll. campanulatis, stamin.  
declinatis. L.

Abunde in pratis alpinis: Burmii. In Valle  
Ursaria. Inter Waldnacht et Surenen. In Hö-  
henkasten. Ubique in Aquilejensibus. Supra  
thermas Leucenses. Etiam in summis monti-  
bus, ut in Thuiry, 1230. Jun. floret.

5. A. calculatum, fol. ensiformibus;  
perianthiis trilobis, filamentis glabris, flor.  
trigynis. L. Oed. Dan. t. 36.

Vulgare, sed nusquam uberiorius, quam Bernæ  
in prato die Eymatte, qua primum rivos de  
sylva effluit, et in palustribus circa Seelhofen.

Etiam in M. Crenzach, et in gramineis omnium Alpium collibus. 1205. fl. Aestate.

185 ASPARAGUS. (*Spargel.*) *G. pl. 573.*

Cor. 6-partita, erecta: petalis 3-bus interioribus apice reflexis. Bacca 3-locularis, 2-sperma.

*A. officinalis*, caule herbaceo tereti erecto; fol. setaceis, stipulis paribus. *L. Oed. Dan.* t. 805.

In pratis Valesiæ passim, circa *Octodurum*, *Martigny*. In *Rhætia*. Inter *Cliben* et *Wiesani* fl. 1239.

186. CONVALLARIA. (*Mayblümchen.*)  
*G. pl. 575.*

Cor. 1-petala, 6-fida; bacca globosa 3-locularis, ante maturitatem maculata.

1. *C. majalis*, scapo nudo. *L. Oed. Dan.* t. S54.

Vulgo in sylvis et sepibus; etiam in montibus et altioribus alpibus. 1241.

*Cor. infundibuliformibus.*

2. *C. verticillata*, fol. verticillatis. *L. Oed. Dan.* t. 86.

In sylvis montosis et subalpinis: In la *Chenau* Aquilejæ, au *Furet*, sur *Champ* etc. In montibus Biennensibus. In M. *Wasserfall*, *Gemmio*. etc. 1244. fl. Maj. Jun.

3. *C. polygonatum*, sol. alternis amplexicaulibus; caule ancipiti; pedunc. axillaribus subunifloris. L. *Oed. Dan.* t. 377. —

Frequens in saxosis asperis circa *Moncharans*, *Creux du Vent*; *Roche*. In *Valesia* etc. In *M. Muteto*, *Crenzach*. 1242.

4. *C. multiflora*, sol. alternis amplexicaulibus; caule tereti; pedunc. axillaribus multifloris. L. *Oed. Dan.* t. 152.

Vulgo in sepibus et dumetis. 1243.  $\alpha$ . fl. Maj. Jun.

5. *C. latifolia*, sol. alternis amplexicaulibus acuminatis; caule angulato; pedunc. axillaribus multifloris. L. *Jacq. Austr.* t. 252.

In iisdem locis. 1243.  $\gamma$ .

(A *C. multiflora* nonnisi magnitudine diversa videtur, et nunquam separari debuisse.)

### *Cor. rotatis.*

6. *C. bifolia*, sol. cordatis; flor. tetrandris. L. *Oed. Dan.* t. 291.

Abunde in sylvis abiegnis. 1240.

(Flos 4-fidus; bæcca 2-locularis.)

187. HYACINTHUS. (*Hyazinthe.*) G.  
pl. 577.

Cor. campanulata, limbo 6-fido reflexo;  
pori 3 melliferi ad apicem germinis.

1. *H. non scriptus*, coroll. campanulatis 6-partitis apice revolutis. L. Bull. t. 555.

Rarus, tamen circa *Moutru*, supra templum in dumetis asperis; versus *Chillon*, et in solitudine *Plan savoy* haud longe a *Roche* lectus est. 1248.

2. *H. comosus*, coroll. angulato-cylindricis, summis sterilibus, longius pedicellatis. L. Jacq. Austr. t. 126.

In calidiori Helvetia: circa *Roche* abunde, ut in aditu du *Prépoury*; in rupibus *Agaunensis*-bus. *Lausonnæ* in agris circa *Chamblande*. *Genevæ*. *Basileæ auf dem Birsfeld*. 1247. fl. Maj. Jún.

3. *H. botryoides*, coroll. globosis uniformibus; fol. canaliculato-cylindricis strictis. L.

Rarior. *Genevæ* in segetibus ultra pontem *Arve*. J. B. *Bernæ* in via per villam *Rappenthal* supra domum, inque vicina villa *Lorraine*. 1246. fl. April. Maj.

4. *H. racemosus*, coroll. ovatis, summis sessilibus, fol. laxis. L. Jacq. Austr. t. 187.

*Vulgaris*. In petrosis circa *Roche* ubique. *Bernæ* in via per villam *Rappenthal* ad sinistra. *Basileæ* in agris ad pontem *Wiesæ*; in agris *Hornburg* dictis prope portam St. *Blasii*, et in vineis *Wylenibus*. 1245.

189. AGAVE. *G. pl. 582.*

**C**or. infundibuliformis, 6-partita, erecta, supera; filamenta erecta, corolla longiora.

**A. americana**, fol. dentato-spinosis; scapo ramoso. L.

*Americana stirps: prope Lugano, ad pagum Gandri in rupibus. Etiam ad Lacum Verbanum haud longe remotum.* 1249.

189. HEMEROCALLIS. (*Tagblume.*) *G. pl. 585.*

**C**or. 6-partita, infundibuliformi-campanulata; tubo cylindrico. Stam. declinata.

**H. flava**, fol. linearis-subulatis carinatis; coroll. flavis. L.

In pratis inter *les Posses* et *Fenalet* invenit *Ricou.* 1230. in Addendis pag. 188.

*D. Flores incompleti.*190. ACORUS. (*Gemeiner Calmus.*) *G. pl. 586.*

**S**padix cylindricus flosculis tectus; cor. 6-petala, antheræ adnatæ; Stylus 0; caps. 3-locularis.

**A. calamus.** L. *Leers.* t. 13. f. 12. *Fl. Dan.* t. 1158.

(*Bernæ, in stagnis prædii Holligen. Circa Schadau. Ad Tramlingen in stagno. Basileæ,*

circa Brüglingen et St. Jacob; prope Gundel-dingen, et in piscina prope Brattelen. 1307. fl. æstate.

191. JUNCUS. (*Binsen.*) *G. pl. 590.*

Gluma 2-valvis; Cal. 6-phyllus; Cor. o. Caps. 1-loocularis 3-sperma, seu 3-loocularis polysperma.

a. *Culmis nudis.*

1. *J. conglomeratus*, culmo nudo stricto, capitulo laterali. L. *Leers.* t. 13. f. 1.

In paludosis et uliginosis, speciatim circa Lacum Felinum opiosus. 1312. fl. Jul.

2. *I. effusus*, culmo nudo stricto, panicula laterali. L. *Leers.* t. 13. f. 2. *Fl. Dan.* t. 1096.

In aquosis et umbrosis. e. g. *Michelfeldæ*, ad Birsam etc. 1311. *β.* fl. Junio.

3. *I. inflexus*, culmo nudo, apice membranaceo incurvo; panicula laterali. L. *Barrel.* ic. 204. *Leers* t. 13. f. 3.

Frequens in terra humida et lutosa. 1311. *α.* fl. Jun Jul. (Incurvum et inflexum habemus.)

4. *I. filiformis*, culmo nudo filiformi nutante, panicula laterali. I. *Scheuchz. gram.* p. 347. t. 7. f. 11. *Leers* t. 13. f. 4.

In Alpium udis, haud tamen frequens: in *Gotthardi* paludosis; inter *Lauterbrunn*, et *Grin-*

*delwald*, in Alpibus *Surenensibus*. In M. *Fouly*,  
*Sanetsch*; supra *les Plans*. 1313.

(Folia mollia teretia, panicula pauciflora.  
*Hall.*)

5. I. *trifidus*, culmo nudo; foliis flori-  
busque tribus terminalibus. L. *Oed. Dan.*  
t. 107.

In montibus altioribus e petrarum fissuris  
communiter prodit: in summo monte *Joch*, in  
*Fracto*. Abunde in *Schöllinen*, circa pontem  
*Diaboli*; in M. *Fouly*, St. *Bernhard*, *Simplon*,  
etc. 1315. fl. Jul. Aug.

6. I. *squarrosus*, culmo nudo; fol. seta-  
ceis; capitulis glomeratis aphyllis. L. *Oed.*  
*Dan.* t. 430. *Willd. prodr.* t. 4. f. 8.

In *Gotthardi* paludibus. 1317.

(Totus riget caule et foliis. *Hall.*)

### b. Culmis foliosis.

7. I. *alpinus* (*Villarsii*), foliis fistu-  
losis articulatis, panicula simplici, glumis  
aristatis. *Hall.*

In Alpium uidis; ex *Gotthardo* et *Oberstafel*  
habuit *Hall.* 1321.

(A vulgari *aquatico* s. nostro *acutifloro* dif-  
fert radice mere fibrosa, capillata et albicante,  
foliis crassioribus, statura humiliori, et pani-  
cula minore. *Scheuchzer* gram. p. 333. No. 3.)

8. I. *acutiflorus* (*Ehrhardi*), fol. nedo-

soarticulatis, floribus acutis. *Hofm. germ.*

p. 125. *Fl. Dan.* t. 1097.

In aquosis vulgaris. 1322. fl. initio Junii.

(Folia fistulosa compressa; panicula laxa; flores spadicei, lineis distincti virentibus, argute mucronati. *Hall.*)

9. I. *obtusiflorus* (*Ehrhardi*), fol. nodoso-articulatis, flor. obtusis. *Hofm. germ.* l.c.

Tiguri inter arundines lacus, um das Horn. Circa Roche abunde in fossis et inter arundines, versus Vervay et alibi. Ad stagnum, ex quo rivus in prata Eymatten defluit, haud longe Berna. Aux Combes de Valanvron. Basileæ ad Birsam et Rhenum. 1323.

(Differt a priori: magnitudine, panicula ampliori, foliis magis teretibus, « internodiis & obscurioribus, floribus minoribus, viridibus & obtusioribus. *Hall.* *Linnæus* hos juncos conjunxit *I. articulati* nomine.)

10. I. *subverticillatus*, culmo decumbente; fol. setaceis; floribus glomeratis verticillatis, glomerulis foliosis. W. *Schenckz.* *gram.* p. 530. t. 7. f. 10. *Fl. Dan.* t. 1099.

Cl. la *Chenal* reperit circa M. *Belligardum*. *Stæhelinus* Basileæ. 1320. Etiam *Schleicher* inventum misit.

(*I. supinus Mönchii* non diversus W.)

11. I. *Tenageja*, annuus: culmo ramoso

paniculato; flor. solitariis sessilibus, petalis ovato-oblongis; caps. subglobosa. *Ehrh. Hofm. germ. Vaill. t. 20. f. 1. Fl. Dan. t. 1160.*

*Schleicher* in *Catal.* habet p. 57, et misit.

12. I. *bulbosus*, culmo compresso indiso; fol. linearibus canaliculatis; corymbo terminali; calycinis foliolis obtusis capsula subrotunda obtusa brevioribus. *W. Oed. Dan. t. 431. Leers t. 13. f. 7.*

Locis humidis et ad fontes hinc inde circa *Tigurum*. Ad Rhodanum prope *Porte du Sex*. Infra *Michelfelden* et *St. Jacob*; in der *Hart*; ad ripas *Wiesæ* et *Rheni* etc. Aux marais de *Cressier* 1318. fl. Jun. Jul.

13. I. *biflorus*, culmo dichotomo; fol. angulatis; flor. solitariis sessilibus. *L. Barrel. ic. 263. 264. Leers. t. 13. f. 8 Fl. Dan. t. 1098.*

In sylvis udis, ad fossas, viasque humidas frequens. 1319. fl. æstate.

(Var. minor frequens circa Lacum *Felinum*, et in *St. Bernhardo*.)

14. I. *Jacquini*, sol. subulato; capitulo subquadrisfloro terminali. *L. Scheuchz. gram. p. 323. t. 7. f. 9. Jacq. Austr. t. 221.*

Pure alpinus. *Scheuchzerus* primus detexit in summo monte *Ochsenstock* territorii Angeli-

montani. Etiam in M. Salanfe, St. Bernhard, Rosboden, Oberstafel, Ferpeto, vallis Praborgne. 1316. Ego in Gemmio. fl. Jul. Aug.

(Folium unicum; flores 6-10 atrofusci splendentes.)

15. I. *triglumis*, sol. planis; gluma tri-flora terminali. L. Oed. Dan. t. 132.

Et hic pure alpinus: in M. Javernaz, inque-prima scaturigine Ivoettaz. In alpinis Ober-stafel, Simplon, St. Bernhard, Fouly, Sanetsch; in M. Bernardino Rhætiæ, Pilato. 1314.

(Folia, ex latis vaginis, duo teretia fistulosa, dimidio suo caule breviora, var. 4-flora et humiliis biflora. Hall.)

16. I. *pilosus*, sol. planis pilosis; co-rymbo subsimplici, pedunculis unifloris nutantibus; calycinis foliolis capsula brevioribus ovatis acutis. W. Leers. t. 13. f. 10.

Verno tempore vulgo in locis umbrosis et sylvosis. 1325.

(Folia supra glabra, inferne ora longis pilis hirsuta; flores solitarii, calyce triplo maiores, spadicei, margine albido.)

Est I. *vernalis*. Hofm. germ. p. 126.

17. I. *maximus*, sol. planis pilosis; co-rymbo decomposito; pedunc. elongatis divaricatis subtrifloris; calycinis foliolis aristatis longitudine capsulæ. W. Oed. Dan. t. 441.

In nemorosis et sylvosis circa *Tigurum*. In sylvis montanis aux *Creux du Vent*. Sur les *Eloges*, au moulin de la *Suze*. 1324. fl. Maj. (Folia eadem cum piloso, sed latiora.)

18. I. *spadiceus*, fol. planis glabris, vaginis pilosis; corymbo decomposito divaricato; pedunculis subquadrifloris; calycinis foliolis mucronatis capsula acuta brevioribus. W. *Scheuchz.* gram. pag. 312. fig. 6. *Villars Delph.* t. 6.

In summis Alpium Rhæticarum pascuis speciatim autem locis umbrosis et nivosis versus Rheni posterioris origines, Alpibusve circumvicinis vallis *Schams*. In M. *Bernhardino*, *Gottardo*, *Furca*, *Javernaz*, *Prapiez*, *Pouly*, *Bernhard*, valle *Orsiere*, *Sempronio*, in Alpibus vallis D. *Nicolai*. Etiam in *Creux du Vent*. 1326.

19. I. *luteus*, fol. planis, vaginisque glabris; corymbo composito conferto; pedunc. multifloris, calycinis foliolis acutiusculis splendentibus. W. *Villars Delph.* t. 6.

In M. Rhæticis, speciatim in *Aviculæ* montis summis fere locis aridis, statim post nivis secessum satis copiose invenit *Scheuchz.*

*Hallerus* in descensu *Furcæ*, secundum glacialem molem, ex qua præcipua Rhodani scaturigo prodit. In M. *Javernaz*, *Chaud com-*

*mun, Fouly, Valorsine, Trona, St. Bernhard*  
etc. 1329.

20. *I. campestris*, fol. planis subpilosis;  
spicis sessilibus pedunculatisque. L. Leers.  
t. 15. f. 5.

Ubique in nemoribus, in pratis et ad vias,  
primo vere. 1330.

Var. magis conglomerata in alpibus. e. g.  
*Scheidek, Neunnen, Gotthard, (I. multiflorus.)*

21. *I. albidus*, fol. planis pilosis; corymbo  
decomposito; pedunc. subquadrifloris; caly-  
cinis foliolis mucronatis, interioribus paulo  
longioribus; radice fibrosa. W. Leers. t.  
15. f. 9.

Vulgo in sylvis. 1327.

22. *I. niveus*, fol. planis pilosis; corymbo  
composito, pedunc. subquinquefloris; caly-  
cinis foliolis acutis, interioribus duplo lon-  
gioribns; radice repente. W. Scheuchz.  
gram. t. 7. f. 7. pag. 320.

In sylvosis et montosis Rhætiæ, speciatim in  
opacis et sylvosis *Viæ malæ* frequens. Circa ther-  
mas *Fabarias*. Maxima copia in pratis *Jorogne*,  
circa *Bouveret* et *Echarpigny*. In *Gotthardo*,  
*Speluga*, et ad viam. qua adscenditur ad *Wä-  
sen*. 1328.

23. *I. spicatus*, fol. planis; spica racemosa  
nutante. L. Oed. Dan. 1. 270.

In Gotthardo. 1330. ♂. In pratis alpinis inventum misit Schleicher.

(Folia glabra plana; vaginæ valde pilosæ; spica nigra, compacta, cernua, bracteata: bracteis villosis; flores subpedunculati; calyx lanceolatus mucronatus. Nec *I. sudeticus* Willd. nec *I. pediformis* Villars. Delph. t. 6. diversus erit.)

### 192. PEPLIS. G. pl. 605.

Cal. campanulatus, 12-fidus, denticulis alternis reflexis; petala 6 minutissima calyci inserta; caps. 2-locularis.

P. portula, flor. apetalis. L. Micheli p. 21. t. 18. Oed. Dan. t. 64.

Rara planta. In palustribus alneti circa telonium Wiesæ. C. B. Basil. p. 74. Mulhusia in udis. 856.

## TRIGYNI A.

### 193. RUMEX. (*Ampfer.*) G. pl. 613.

Cal. 3-phyllus; petala 3 conniventia; persistentia; sem. 1 triquetrum.

a. Fl. *Hermaphroditii*: *valvulis granulo notatis.*

1. R. *sanguineus*, fl. hermaphroditis; *valvulis integerrimis*: unica granifera; fol. cordato-lanceolatis. L.

Inventum misit Schleicher.

2. *R. crispus*, fl. hermaphroditis, valvulis integris graniferis; fol. lanceolatis undulatis acutis. L. *Munting* t. 104. p. 210.

Ad vias, fossas, domuum areas. 1589. fl. Jun. Jul.

3. *R. acutus*, fl. hermaphroditis; valvulis dentatis graniferis; fol. cordato-oblongis acuminate. L. *Munting*. t. 88. p. 209.

In fossis, ad vias, ad sepes, in ruderosis. 1591. fl. Jul. Aug.

4. *R. nemolapathum*, flor. hermaphroditis: valvulis linearibus obtusis integerim graniferis; verticillis remotis, ramis patentibus; fol. inferioribus cordato-lanceolatis, superioribus lanceolatis. *Ehrh. Hofm. Germ.* p. 128.

*Munting*. tab. 132 et 142; p. 215 et 216.

Ad ripas fluviorum, stagnorum, et fossas.  
Ad Birsam, Wiesam. 1590.

5. *R. obtusifolius*, flor. hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, fol. cordato-oblongis obtusiusculis crenulatis. L. *Munting*. t. 68. p. 205.

Vulgo in ruderosis, et ad vias. 1592. fl. aestate.

6. *R. pulcher*, flor. hermaphroditis: val-

vulis dentatis, subunica granifera; fol. tridentalibus panduriformibus. L.

Ad vias inter *Viviscum* et *Puilly*, et abunde qua versus *Glerolle* adscenditur ad *Chebres*. 1593.

(*Hallerus* R. divaricatum conjungit, sed inventum nescio.)

b. *Hermaphroditii*: sine granulo.

7. R. *aquaticus*, flor. hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis; fol. cordatis glabris acutis. L.

In fossis suburbanis; et in fossis aqua plenis circa *St. Blaise*. 1588. fl. Jun. Jul.

(Cl. *Willdenow* hanc plantam, errore quodam, sub suo R. *hydrolapatho* notavit.)

8. R. *scutatus*, flor. hermaphroditis; fol. cordato-hastatis; caule tereti. L.

Abunde ad lapides deciduos in Alpibus, *Steinenberg*, *Prapioz*, *Gemmi* etc. in montanis *Javernaz*, *Ovannaz*, *Gotthardo* etc. Etiam in ruderiosis et in muris: *Agauni*, *Meloduni*, circa *Luganum* et *Chiavennam*. 1594.

(Var. *B.* fol. maculatis, in valle *Prægallieni*. *Scheuchz.* It. alp. pag. 129.)

9. R. *digynus*, flor. hermaphroditis digynis. L. *Oed. Dan.* t. 14.

Passim in Alpibus editioribus: *Javernaz*, *Ormond*,

*mond, Prapioz, Furcæ parte ad Rhodanum respiciente, Taveyannaz, St. Bernhard, Pilato etc.*

Var.  $\beta.$  junior, fol. non emarginatis, in M. St. Bernhard prope diversorum, in descensu Spelugæ, in Alpibus Uriorum et Engelbergen-sium etc. 1595.

(Flos 4-fidus: calyce 2-phyllo, cor. 2-petala, stamin. 6, stylis 2. Linnæus.)

### c. Flores diclini.

10. *R. alpinus*, flor. hermaphroditis sterilibus fœmineisque: valvulis integerrimis nudis, fol. cordatis obtusis rugosis. L. Munting. t. 15. p. 194.

Vulgo ad stabula alpina, qua simus abundant. 1587.

11. *R. acetosa*, flor. dioicis; fol. oblongis sagittatis. L. Munting. t. 174. p. 221.

Vulgaris in pratis. 1597. fl. Maj-Aug.

Var.  $\beta.$  maxima, fol. longioribus angustioribus: in montibus. Joh. Bauh. H. P. p. 990; et ad Spelugæ radices in pratis nemoribusque umbrosis, versus Campum Altinum habet Scheuchz. It. Alp. pag. 129.

Var.  $\gamma.$  latiori, rotundo et non undulato folio, provenit in monte Chapuise-aut vera species, aut varietas notatu digna. Hall. 1598. Scheuchz. It. Alp. p. 322. (R. arifolius. Al-

*Lioni Ped.* 2040. Nec separat *Hallerus R.* luxuriantem.)

12. *R. acetosella*, flor. dioicis; fol. lan-  
ceolato-hastatis. L. *Fl. Dan.* tab. 1161.

Frequens in agris requietis, areis carbona-  
riorum etc. 1596.

Var.  $\beta$ . minima in Alpibus.

194. SCHEUCHZERIA. G. pl. 615.

Cal. 6-partitus; Cor. o; Styl. o. Caps. 3-6,  
compressæ, inflatæ, 2-valves.

*S. palustris.* L. *Oed. Dan.* t. 76. *Loes.*  
pruss. t. 28.

Rara in Helvetia, ab *Hallero* nunquam lecta.  
Invenit eam *Burserus* in palustribus circa *Einsiedlen*, et in M. *Pilato* ad lacum. *Scheuch-  
zerus* circa lacum *Felinum* Majo florentem,  
(quo loco extirpata est.) *Mulhusie.* 1310.

Nuper inventa tamen aux *Mosses.* Etrennes  
*Helvet.* 1797, unde habeo etiam a *Schleicher*  
lectam.

(Radix vaginis albis vestita; folia juncea ca-  
rinata; flores axillares, solitarii longe peduncu-  
lati, ex viridi lutescentes.)

195. TRIGLOCHIN. (*Drey-Zak.*) G. pl.  
616.

Cal. 3-phylloides, deciduus; petala 3 caly-  
ciformia: styl. o; Stigmata plumosa; caps.  
basi dehiscens.

*T. palustre*, caps. 3-locularibus sublinearibus. L. Leers. t. 12. f. 5. Fl. Dan. t. 490.

Abunde in pratis uidis, circa Seedorf, Michelsteden. etc. 1308.

196. COLCHICUM. (*Zeitlose.*) G. pl. 621.

Spatha. Cor. 6-partita, tubo radicato; Caps. 3, connexæ inflatæ.

1. *C. autumnale*, fol. planis lanceolatis erectis. L.

In omnibus pratis, potissimum subudis.

Var. β. *C. vernum*, fol. et petalis angustioribus.

Abunde prope Roche in pratis circa Rennaz, etiam Tiguri etc. 1255.

2. *C. montanum*, fol. linearibus patentissimis. L. Allion. Ped. t. 74. f. 2.

In pratis alpinis supra Campum Dulcinum prope pagum Madesen, et in pratis Altstættensibus, qua itur ad montem Gamor. 1256.

(Flos paulo ante folia erumpit, petalis linearibus.)

P O L Y G Y N I A.

197. ALISMA. (*Froschlöffel, Frosch-kraut.*) G. pl. 625.

Cal. 3-phyllus; petala 3; caps. compressæ; sem. plura.

1. A. *plantago*, fol. ovatis acutis; fructibus obtuse trigonis. L. Oed. Dan. t. 561.

In omnibus fossis aqua plenis. 1184. fl. Jul.  
Aug.

β. fol. lanceolatis.

2. A. *ranunculoides*, fol. linear-lanceo-  
latis; fruct. globoso-squarrosis. L. Oed.  
Dan. t. 122.

Amicus Wagnerus Gymnasiarcha invenit ad  
Lacum Neocomensem.

---

*Classis VII.*

## HEPTANDRIA,

## MONOGYNIA.

198. Aesculus. (*Rosskastanie.*) G.  
pl. 628.

Cal. 1-phillus, 5-dentatus, ventricosus.  
Cor. 5-petala, inæqualiter colorata, calyci-  
inserta. Caps. 3-locularis.

A. *hippocastanum*, flor. heptandris. L.  
Arbor ex oriente adlata satis frequens. 1029.

---

## C l a s s i s. VIII.

## O C T A N D R I A.

## M O N O G Y N I A.

---

A. *Flores completi.*

199. OENOTHERA. (*Nachtkerze.*) G.  
pl. 637.

Cal. superus, 4-fidus, reflexus; petala 4;  
Caps. cylindrica infera 4-locularis; Sem.  
nuda, angulata.

O. *biennis*, sol. ovato-lanceolatis, planis;  
caule muricato-villoso. L. *Oed. Dan.* t. 446.

Planta inde ab 1614 ex Virginia advena vul-  
garis in sylvis Bernensibus. ut inter viam du-  
centem ad Ostermannigen, et inter suburbium  
die Schooshalde. In sylva Bremgarten, qua  
itur ad villam Drakau. Ad viam regiam prope  
Marnan. 994.

200. EPILOBIUM. (*Weidenröslein.*) G.  
pl. 639.

Cal. 4-fidus, coloratus, petala 4; caps.  
longissima, cylindracea, striata, 4-locula-

ris, 4-valvis; Semina papposa; receptac.  
liberum, coloratum.

*Staminibus declinatis.*

1. *E. angustifolium*, fol. sparsis, linearilanceolatis; flor. inæqualibus. L. *Oed.*  
*Dan.* t. 289.

Abunde in sylvis cœduis, ut in sylva *Bremgarten*, circa *Seeberg* ad viam regiam, *Tobinii*. etc. 1000.

2. *E. angustissimum*, caule subrepente ramoso; foliis sparsis linearibus subdentatis; floribus inæqualibus. S.

Alpina proprie planta: in *Prapiez*, *Ovannaz*; ad glaciales rupes vallis *Grindeliæ*, sub *M. Wetterhorn* et in *M. Audon*. Descendit vero cum torrentibus in glareas planitiei, et copiose reperitur in alveo torrentis *la Tiniere*, prope *Villeneuve*; in *Baye de Clarens*; ad torrentem grande *Eau Aquilejæ*, in *la Fœvaise* etc. Basileæ circa *Cliben* et *Klein-Hünigen*, ad *Rheenum*, ad *Wiesam*. juxta vineas *Crenzachenses* etc. Etiam in valle *Arsaria*, *Chiavennæ*. 1001.

.(Ego frequenter inveni in ruinis Montis *Diableret*, et in *Geminio*. Caulis est vere lignosus.) fl. Jul. Aug.

*Staminibus erectis; petalis bifidis.*

3. *E. hirsutum*, fol. oppositis alternisque subamplexicaulibus ovato-lanceolatis serratis glabriusculis, venis hirsutis; caule ramosissimo hirsuto. *W. Oed. Dan.* t. 326.

Ad aquas, inter cyperos et arundines abunde, inque fossis. 995. Var.  $\alpha$ .

4. *E. pubescens*, fol. oppositis alternisque subsessilibus lanceolatis denticulatis utrinque pubescentibus; caule simplici villoso. *W. Oed. Dan.* t. 347.

Similibus locis. 995.  $\beta$ :

(Bene ab *hirsuto* separatur hæc planta illo minor, mollior, et floribus multo minoribus.).

5. *E. montanum*, fol. oppositis ovatis dentatis. L.

Vulgo ad sepes et in aquosis. 996.

Var.  $\beta$ . fol. nitidis glabris tenerioribus, nervis tamen subhirsutis passim in muris opacis et saxonum fissuris. *Scheuchz. It. Alp.* pag. 132.

Var.  $\gamma$ . foliis ternis, in descensu montis *Scheidek.*

Var.  $\delta$ . foliis quaternis; circa *Chasseron. Hall.*

6. *E. tetragonum*, fol. lanceolatis denticulatis, imis oppositis; caule tetragono. L. *Fl. Dan.* t. 1029.

Passim in aquosis, 997. fl. Jul. Aug.

7. *E. palustre*, fol. oppositis lanceolatis integerrimis ; petalis emarginatis ; caule erecto. L.

In fossis et paludibus. 998.

8. *E. alpinum*, fol. oppositis, ovato-lanceolatis integerrimis ; siliquis sessilibus ; caule repente. L. *Oed. Dan.* tab. 322.

In montibus et alpibus, locis riguis. Etiam in montanis. à la Chaux d'Abelle. 999.

(Caulis semipedalis ; folia remote dentata ; siliquæ glabræ.)

### 201. CHLORA. G. pl. 653.

Cal. 8-phyllo ; cor. monopetala, hypocrateriformis, 8-fida ; Caps. ovato-oblonga, 1-locularis, 2-valvis, polysperma.

*C. perfoliata*, fol. perfoliatis. L. *Barrel.* ic. 515. 516.

In calidiori Helvetia. Circa *Genevam*, versus *Versoi*, *Thuiry*, in ipso torrente *Baye de Clarens*; ad rupes versus *Viviscum*, prope le *Basset*. In pratis humidis *Michelfeldensium*. 649.

(Folia radicalia ovata, caulina perfoliata.)

### 202. VACCINIUM. (*Heidelbeern.*) G. pl. 658.

Cal. superus ; cor. monopetala 4-5fida ; Filamenta receptaculo inserta, antheræ bicornes ; bacca globosa, 4-locularis.

a. *Foliis deciduis.*

1. *V. myrtillus*, pedunc. unifloris; fol. serratis ovatis deciduis; caule angulato. L. *Fl. Dan.* t. 974.

Ubique in sylvis abiegnis. 1020.

2. *V. uliginosum*, pedunc. unifloris; fol. integerrimis obovatis, obtusis lœvibus. L. *Oed. Dan.* t. 231.

In torfaceis circa *Gümlingen*, *Löhr*, *Chaud d'Abelle*, et *des Pontins* etc. Etiam in Alpium rupes ascendit, ibique focum alit. e. g. in *Gotthardum*, *Gemmium*; ad radices *Titliaci*. etc. 1021.

b. *Foliis sempervirentibus.*

3. *V. vitis idæa*, racemis terminalibus nutantibus; fol. obovatis revolutis integerimis, subtus punctatis. L. *Oed. Dan.* t. 40.

Vulgo in sylvis abiegnis paulo altioribus. 1022.

(Calyx 4-fidus.)

4. *V. oxycoccus*, fol. integerrimis revolutis ovatis; caulibus repentibus filiformibus nudis. L. *Oed. Dan.* t. 80.

In torfaceis circa *Löhr*, et *Gümlingen*. *A la Chaux d'Abelle*. Circa *Solodurum*. 1023. Etiam ad *Lacum Felinum*. Majo floret. I. B. (Calyx 4-fidus; cor. 4 fida; folia firma, alterna, subtus incana.)

203. ERICA. (*Heide.*) G. pl. 659.

Cal. 4-phyllo; cor. monopetala, 4-fida; filamenta receptaculo inserta; antheræ apice bifidæ; caps. 4-locularis, 4-valvis; dissepi-  
mentis cum suturis coeuntibus.

1. E. *vulgaris*, antheris aristatis; cor. campanulatis subæqualibus; calyc. duplicatis; fol. oppositis sagittatis. L.

Frequens in sylvis abiegnis et campestribus  
sterilibus. 1012.

2. E. *herbacea*, antheris muticis exser-  
tis, stylo exerto; cor. tubuloso-campanu-  
latis, flor. axillaribus secundis; fol. qua-  
ternis linearibus glabris. W.

Vulgaris in omnibus subalpinis; descendit  
Interlacum usque, in collem *Rugen*, et ad la-  
cum *Thunensem*. Ad Lacum *Lauerzersee*, in  
*Pilato*. 1013.

(Junior planta herbaceo colore; adulta car-  
neo; tunc *Erica carneae*.)

3. E. *arborea*, antheris aristatis, stylo  
exerto, corollis campanulato-globosis, flor.  
terminalibus umbellatis; fol. ternis quater-  
disque linearibus scabriusculis; ramulis  
villoso. W.

Inter *Ripam* et *Chiavennam* ad rupes, et in-  
ter *Poco d'Adda* et *Morbegno*. 1014.

(*Ericæ restat species, quam Ericam tertiam*

*Cortusi* ex I.-B. H. P. T. I. P. 2. pag. 358.  
*Hallerus* vocat No. 1012., quæ ob *cauliculos albicantes*, *ternaque folia glabra*, ut *Bauhinus* habet, *Erica cinerea* commodissime vocari possit; sed has tenebras resolvere non queo, aliique doctiores hanc plantam alpinam ab inferis reducant, quæ crescit in sylva montis præalti d'Arbignon.)

204. DAPHNE. (*Seidelbast*, *Kellerhals.*) G. pl. 664.

Cal. o; cor. 1-petala, 4-fida, infundibuliformis, marcescens, stamina includens. Drupa 1-sperma.

1. D. *Mezereum*, flor. sessilibus ternis caulinis; foliis lanceolatis deciduis. L. Oed. Dan. t. 268.

In omnibus sylvis primo vere; etiam in alpibus. v. c. in *Gemmio*. 1024.

2. D. *alpina*, flor. sessilibus aggregatis lateralibus, fol. lanceolatis obtusiusculis, subtus tomentosis. L. *Barrel.* ic. 234.

Ad latus occidentale Montis *Saleva*, inter lapides deciduos. *An der Eruhl Rhætiæ. Aux rochers de Moron paroisse des Planchettes.* 1026.

(Folia juniora hirsuta, adulta calva; flores in foliorum rosula terminali. *Hall.*)

3. D. *laureola*, racemis axillaribus 5-

floris; fol. lanceolatis glabris. L. Jacq.  
Austr. t. 183.

Non rara. Circa Roche ubique, ut versus le Grand Clos. In Jura monte frequenter in sylvis, ad viam regiam inter Wallenburg et Langenbruck etc. In montibus Münchenstein, Wasserfall. etc. 1025. fl. Jan-Mart.

4. D. cneorum, flor. fasciculatis terminalibus sessilibus; fol. lanceolatis nudis mucronatis. L. Pollich. pal. t. 1. f. 4.

In montibus Swisenzium; copiose in Uriorum alpe Fismat. In Spelugæ via prope diuersorium; in M. Lunæ, Fræla, Galanda, Hohemesmer, Tiefenkasten, Regio. In rupibus prope Moron, à la Chaux prope Erevine. 1027.

#### 205. STELLERA. G. pl. 667.

Cal. o; Cor. monopetala infundibiliformis 4-5lida; Stamina brevissima; sem. 1, nitidum restratum.

S. passerina, fol. linearibus; flor. 4-fidis. L.

Basileæ inter stipulas; sed copiosissime circa Orbe, Montcharan; Valeire et Mathod. Inter segetes près d'Areuse, et in agris vallis St. Imier. 1028.

(Folia alterna; flores axillares sessiles.)

## D I G Y N I A.

206. MOEHRINGIA. *G. pl. 676.*

Cal. 4-phyllo; petala 4; caps. subglobosa, 1-locularis, 4-valvis.

*M. muscosa*, fol. linearibus oppositis; pedunculis axillaribus longissimis unifloris.

*S. Jacq. Austr. t. 449.*

Frequens ad rupes humidas, ad saxa torrentium adspergine rorida, et in summarum alpium umbrosis et udis. 860.

## T R I G Y N I A.

207. POLYGONUM. (*Knöterich.*) *G. pl. 677.*

Cal. 0; Cor. calycina 5-partita; filamenta saepius 8; Sem. 1, plerumque triquetrum.

a. *Spica unica.*

1. *P. bistorta*, caule simplicissimo monostachyo, fol. ovatis in petiolum decurrentibus. *L. Oed. Dan. t. 421.*

Vulgo in pratis udis. Prope balneum exteriorum in suburbis Bernensibus, qua itur ad fabricas im Sulgenbach. 1559.

(Var. *β.* radice magis intorta, foliisque minoribus et lœvibus in Jura. *I. B. III. p. 539.*)

2. *P. viviparum*, caule simplicissimo

monostachyo ; sol. lanceolatis. L. Oed.  
Dan. t. 13.

In Alpium pratis altioribus ubique. In Juræ etiam culminibus. *Falconario, Montendre, Dolaz.* 1553.

b. *Pistillo bifido, aut stamina minus 8.*

3. *P. amphibium*, flor. pentandris semi-digynis; spica ovata. L. Oed. Dan. t. 282.

Var.  $\alpha$ . *natalilis*, fol. coriaceis; staminibus 5, in juniori flore brevioribus, in adulta planta corolla longioribus.

Ubique, v. c. Bernæ in piscinis im *Sulgenbach*.

Var.  $\beta$ . *terrestris*, caule longe reptante, dein erecto, foliis minus duris, hirsutis erectis.

Frequens in vineis, circa *Biel, Ligerz*. Etiam aux *Grangettes*, ad Lacum Lemanum. 1565. fl. Jun. Jul.

4. *P. hydropiper*, flor. hexandris semi-digynis; fol. lanceolatis, stipulis submuticis. L.

In fossis et aquosis viarum. 1554. fl. Jul. Aug.

5. *P. minus*, s. *angustifolium*, flor. pentandris semidigynis; spicis filiformibus, fol. lanceolato-linearibus. *Hofm. Germ.* 158. W.

In humidis circa *Michelfelden*. C. B. Prodr. p. 43.

Vár. **P.** pumila repens in agris *Haltingensisibus* et *Hüningensisibus*; in torfaceis das *Löhr*, et in sylvosis humidis. 1555.

(Folia glabra, absque maculis. *Hall.*)

**6.** *P. persicaria*, fl. hexandris digynis; spicis ovato-oblongis; fol. lanceolatis; stipulis ciliatis. L. *Oed. Dan.* t. 702.

In agris, hortis, fossis et ad vias. 1557.

(Var. flore rubro et albo, fol. maculatis et non maculatis. *Hall.*)

**7.** *P. incanum*, flor. hexandris digynis; spicis oblongis; fol. oblongo-lanceolatis subtus pubescentibus. W.

Passim v. c. in insulis Rheni. 1556.

(Vaginæ ciliatæ; flos albus aut ruber. *Hall.*)

### c. *Floribus octandris.*

**8.** *P. aviculare*, flor. octandris trigynis axillaribus; fol. lanceolatis; caule procumbente herbaceo. L. *Oed. Dan.* t. 803.

Vulgo ad vias, et inter stipulas. 1560.

(Var. fol. brevioribus, angustioribus, longioribus; varietas vero foliis latioribus, superne virentibus, inferne albicanibus; inter saxorum fissuras, ad arciū editissimarum radices, ut

in petris arcis *Wallenburgensis* Basileensium,  
et in vicinis lecta est a C. B. Prodr. pag. 131.)

9. *P. alpinum*, flor. octandris trigynis  
racemoso-paniculatis; fol. ovato-lanceolatis  
glabris margine ciliatis; caule ramoso, ge-  
niculis barbatis. W. Allion. Ped. t. 68. f. 1.

In pratis circa pagum *Formazz*, ad pedem  
*Alpium grisearum*. 1564.

(*Stamina etiam pauciora*, ad 5. *Hall.*)

#### d. *Foliis subcordatis.*

10. *P. fagopyrum*, fol. cordato-sagitta-  
tis; caule erectiusculo inermi; seminum-  
angulis æqualibus. L.

Basileæ in agris ad *Otlingen* et *Riehen*; ad  
littora arenosa lacus *Lemani*, et passim ad  
fimeta. 1563.

11. *P. convolvulus*, fol. cordatis; caule  
volubili angulato; floribus obtusatis. L.  
*Oed. Dan.* t. 744.

Ubique in arvis. 1561. fl. Jul. Aug. (An-  
theræ violaceæ.)

12. *P. dumetorum*, fol. cordatis; caule  
volubili lævi; flor. carinato-alatis. L. *Oed.*  
*Dan.* t. 756.

Aquilejæ in dumetis abunde. 1562.  
(Antheræ albæ.)

## T E T R A G Y N I A.

208. PARIS. (*Einbeere.*) *G. pl.* 683.

Cal. 4-phyllo; petala 4 angustiora; antheræ medio filamentorum utrinque adnatae; bacca globosa, 4-sulca, 4-locularis.

*P. quadrifolia.* L. *Oed. Dan.* t. 139.  
*Bull.* t. 119.

In umbrosis nemoribus et sepibus abunde.  
1006. fl. Jun. Jul.

209. ADOXA. (*Bisamkraut.*) *G. pl.* 684.

Cal. 2-3-fidus, inferus; Cor. monopetala 4-5fida; bacca 4-5-locularis, calyce coalita.

*A. moschatellina.* L. *Oed. Dan.* t. 94.  
Frequens in scipibus, Bernæ inter *Hollingen* et viam versus *Küniz*, im breiten Rein. Circa *Aquilejam*, Roche. Basileæ in dumetis ad *Novam Domum* copiose, et versus *Riehen*. Au Mont *Milledeux*. (Circa *Tobinium* in dumetis,) 1005.

(Folia glauca, triloba; lobi lateralibus semilibobis, medio subtrifido; pedunculo intrafoliaceo, nudo, subquinquefloro.)

210. ELATINE. (*Tännel, Wasserpfeffer.*) *G. pl.* 685.

Cal. 4-phyllo: petala 4; Caps. 4-locularis, 4-valvis, globoso-depressa.

1. E. *hydropiper*, fol. oppositis. L. *Oed.*  
*Dan.* t. 156.

Circa Mülhusiam. 858.

2. E. *alsinastrum* fol. verticillatis. L.  
*Vaillant.* t. 1. f. 6.

Circa Mülhusiam. 857. Etiam Basileæ in  
paludibus Michelfeldensibus, et in rivulo juxta  
patibulum. C. B. *Prodr.* p. 24.

---

## Classis IX.

## ENNEANDRIA.

## MONOGYNIA.

211. LAURUS. (*Lorbeer.*) *G. pl.* 688.

Cal. o; cor. calycina 6-partita. Nectarium glandulis 3 bisetis, coloratis, germen cingentibus. Filamenta interiora glandulifera; Drupa 1-sperma.

*L. nobilis*, fol. lanceolatis venosis perennantibus; flor. 4-fidis. L.

Circa Moutru in omnibus pomariis abundat.  
1602.

## HEXAGYNIA.

212. BUTOMUS. (*Wasserviole.*) *G. pl.* 693.

Cal. simplex, 3-phillus; petala 6, alternis exterioribus minoribus; Caps. 6, univalves, introrsum dehiscentes, polyspermae.

*B. umbellatus.* L. *Oed. Dan.* t. 604.

Non frequens. In fossis Michelfeldæ et Ebraduni. Mülhusiæ. 1186.

## C l a s s i s . X.

## D E C A N D R I A.

## M O N O G Y N I A.

## A. Flores polypetali irregulares.

213. DICTAMNUS, (*Diptam.*) *G. pl. 726.*

Cal. 5-phyllus; petala 5; filamenta punctis glandulosis adspersa; caps. 5, margine introrsum coalitæ.

*D. albus*, foliis pinnatis; caule simplici.

*L. Jacq. Austr. t. 428.*

Circa Basileam; circa Scaphusiam in monte Randen. In Valesia inter Loueche et Viege ad viam regiam. 1029. \* \*

(Folia dentata, viscida, nitida; flores spicati, viscidii, rubiginosi, subpurpurei, odorati. *Hall.*)

## B. Flores polypetali inæquales.

214. RUTA. (*Raute.*) *G. pl. 725.*

Cal. 5-partitus; petala concava; receptac. punctis 10 melliferis cinctum; caps. lobata; semina plurima, scabra, reniformi-angulata.

1. *R. graveolens*, sol. supradecompositis, foliolis oblongis terminali obovato; petalis integerrimis. W.

Maxima copia in rupibus sub *Agaunensis* Eremitæ sacello. 1003.

2. *R. montana*, sol. supradecompositis, foliolis omnibus linearibus; petalis integerimis. W. Jacq. ic. rar. t. 76.

Unice in *Pilato* monte provenit. 1004.

215. TRIBULUS. (*Bürzeldorn.*) G. pl. 732.

Cal. 5-partitus; petala 5 patentia; caps. 5, gibbæ, spinosæ, polyspermæ.

T. *terrestris*, sol. subsexjugis subæqualibus, seminibus quadricornibus. L. *Barrel.* ic. 558.

Abunde in Valle *Prætoria*, sub monte Bernhardo. 947.

216. MONOTROPA. (*Ohnblatt.*) G. pl. 737.

Cal. 0; petala 10, apicibus serrata, 5 exteriora basi gibba, introrsum concava melifera; caps. 5-valvis.

M. *hypopithys*, flor. lateralibus octandris, terminali decandro. L. *Oed. Dan.* t. 232.

Frequens in sylvis abiegnis inque fagetis putrescentibus foliis stratis. *Bernæ* im *Sädelbach* inter *Sandrein* et *Spiegel*, inter *Almedingen* et *Liche*. In M. *Wasserfall*, *Crenzach*. In valle *Frenières* abunde. 1002.

217. PYROLA. (*Wintergrün*.) G. pl. 752.

Cal. 5-partitus; petala 5; antheræ nutantes magnæ, sursum bicornes; caps. 5-gona, 5-locularis, 5-valvis angulis dehiscens, dissepimentis contrariis.

1. *P. rotundifolia*, staminibus adscendentibus pistillo declinato. L. Oed. Dan. t. 110.

In montosis, dumetis et pratis. Inter *Ilfingen* et montem *Feuerstein*. In pratis circa *Roche aux Saugettes* et *Baunes*. In mont. *Mutteto* et *Münchenstein* etc. 1010. fl. Maj.-Jul.

2. *P. minor*, flor. racemosis dispersis; stamin. pistillisque rectis. L. Oed. Dan. t. 55.

Frequens: in sylvis montis *Gurten*, in sylva *Bremgarten* etc. 1009.

3. *P. secunda*, racemo unilaterali. L. Oed. Dan. t. 402.

Frequens in sylvis abiegnis. In sylvula supra villam *Bodenacker*. In sylvis M. *Gurten*. In M. *Crenzach*, *Münchenstein*, *Wasserfälle*. 1008. fl. Jun.-Aug.

(Eam jam *Clusius* in jugis Lausannæ ad Lemanum lacum proximis legerat. *Pannon.* pag. 505.)

4. *P. uniflora*, scapo unifloro. L: *Oed. Dan.* t. 8.

In *Pilato*. In *via mala*. In Mont. *Schilt, Galandu, Scheidek*. Abunde circa fl. *Avancon*, in aspera sylva, qua a pagulo *les Plans* ascenditur in montem *Pondenan*. *Bey Fählen* inter *Roslen* et *Alpsigleton*. etc. 1011.

### C. Flores monopetali æquales.

218. RHODODENDRON. (*Alprose.*) G.  
pl. 746.

Cal. 5-partitus; cor. rotato-infundibiformis; Stam. declinata; caps. 5-locularis polysperma.

1. *R. ferrugineum*, fol. glabris, subtus leprosis; coroll. infundibiformibus. L. *Jacq. Austr.* t. 255.

Vulgo in alpinis lapidosis. etc. Etiam in Juræ montosis altioribus. 1015.

Var. flore albo in M. *Javernaz*; sed rarum.

(*Alpicolis* vocatur *Rafauslen*, et *Valesiis Hünerstauden*, quoniam *Phasiani* montani iis delectant. *Scheuchz. It. Alp.* pag. 337.)

2. *R. hirsutum*, fol. ellipticis acutiusculis

lis ciliatis, subtus punctatis; coroll. infundibuliformibus. W. Jacq. Austr. t. 98.

Satis frequens in alpinis, etsi aliquanto rarius quam prius. In montibus d'Ansez, Enzeindaz, Gemmio (principue circa Schwarzenbach), Gotthardo, Pilato, in Rhæticis etc. Inter Juræ Juga solus mons Thuiry hanc stirpem alit. 1016. Imo ad ripam lacus Brienzensis prope catarractam rivi Diesbach. Saussure voyag: VI. pag. 231.

**219. ANDROMEDA.** G. pl. 747.

Cal. 5-partitus. Cor. ovata, ore 5-fido; antheræ bicornes, nutantes; caps. pentagona, 5-locularis, dissepimentis valvis contrariis.

A. *polifolia*, pedunc. aggregatis, coroll. ovatis; fol. alternis lanceolatis revolutis. L. Oed. Dan. t. 54.

In torfaceis vulgo, circa Gümlingen, im Löhr. In paludosis la Chaux d'Abelle etc. In Pilato. 1017.

**220. ARBUTUS. (*Sandbeere.*) G. pl. 750.**

Cal. 5-partitus minimus; cor. ovata, ore basi pellucida, 5-fida, laciniis parvis revolutis. Bacca 5-locularis.

1. A. *Alpina*, caul. procumbentibus; fol. rugosis serratis. L. Oed. Dan. t. 73.

Ad radicem M. *Titlisberg*; a la *Chenau* de *Corteber*, et à *St. Imier*; sed abunde in montibus *Gubernii Aquilejensis* etc. et in *Gemmio*. 1019.

2. A. *Uva ursi*. (Bärentraube) caulinibus procumbentibus; fol. integerrimis. L. *Oed. Dan.* t. 35.

Frequens in sabulosis sterilibus: abunde supra vineas *Sugy* et *Nan* in monte *Vuilly*; in M. *Luan*, *d'Ansez*, *Prapioz*, *Gemmio*, *Gotthardo*, in glareis *Pilati*. *Basileæ*, via qua tenditur ad St. *Christianæ* fanum juxta vineas. etc. 1018.

### D I G Y N I A.

221. CHRYSOSPLENIUM. (*Milzkraut.*)  
G. pl. 763.

Cal. 4-5fidus coloratus; cor. 0; filamenta 8-10; caps. 2-cornis, semi-bivalvis.

1. *C. alternifolium*, fol. alternis. L. *Oed. Dan.* t. 366.

Frequens in sepibus, ad rivos, in fossis, et in humidis umbrosis alpium. 1543. fl. Apr.-Jun.

2. *C. oppositifolium*, fol. oppositis. L. *Oed. Dan.* t. 365.

In adscensu montis *Ballon*. *Basileæ* in dumetis humidis non longe a *nova Domo*. A la *Vachette* près de *Goumoy*, in dominio *Franquemont*. 1549.

222. SAXIFRAGA. (*Steinbrech.*) *G. pl.*  
764.

Cal. brevis, partitus, petala 5. Caps. 2-rostris, 1-locularis, inter apices dehiscens, polysperma.

1. *S. cotyledon*, fol. radicalibus aggregatis lingulatis cartilagineo-serratis; caule subnudo paniculato; petalis ovatis. S.

In saxosis Alpium et Juræ ubique; et cum rupibus in planitiam descendit, circa *Roche* etc. 978.

α. Fol. longioribus. *Barrel.* ic. 1309. 1311.  
1312.

β. Fol. brevioribus et latioribus. *Barrel.*  
ic. 1310.

2. *S. aizoon*, fol. radicalibus aggregatis lingulatis cartilagineo-dentatis; caule simplici racemoso folioso; calycibus glabris. *W. Jacq. Austr.* t. 438.

In adscensu vallis *Schöllinen*, et *Gotthardi* ex valle Ursaria et Lepontina, inque ea ad *Bellitionem* usque; sic a *Speluga* adusque *Chiavennam* et passim in Rhätia. Circa *Suaz* vallis Misauinæ, circa *Formaz* vallis *Oscellanæ*. In Valle St. Nicolai, *Gemmio* etc. 977.

(Cl. *Willdenow* hanc prioris varietatem cre-

dit, quamvis synonyma *Bocconis* et *Seguieri* ab *Hallero* laudata, suo *aizoo* apposuisse.)

3. *S. mutata*, sol. radicalibus aggregatis lingulatis margine cartilagineo-subdentatis ciliatis; caule subfolioso, villoso, viscido, racemoso: racemis alternis; calyc. viscidis subhirsutis. S. Hall. t. 16. Jacq. ic. rar. t. 466.

In montibus *Uetliberg*, *Cronberg*. Ad *Utierfluh*, in m. *Grüsiberg* sub *Thunio*; in *Gemmio*. 979.

(Folia caulina alterna; petala linear-lanceolata, crocea.)

4. *S. androsacea*, sol. radicalibus confertis, lanceolatis, obtusis, pilosis; caule simplici subnudo paucifloro. S. Jacq. Austr. t. 389.

Frequens in Alpibus Aquilejensibus, Valaisiacis, Rhæticis, *Gemmio*, *Gotthardo* etc. 984.

*β.* Folio tridentato, sed raro.

(Planta humilis; folia caulina 12; petala albida.)

5. *S. cæsia*, fol. linearibus perforato-punctatis aggregatis recurvatis; caule multifloro. L. Jacq. Austr. t. 374.

In alpibus editioribus et saxosis, *Gotthardo*, *Scheidek*, *Joch*, *Wetterhorn* etc. Frequens in

omnibus Aquilejensibus, in Valesiacis. In *Gamor*, *Oberstafel*, *Pilato* etc. 982.

(Folia radicalia confertissima glauca caulinata 5-6, adscendentia; flores raro ultra 6, saepe 2; petala lactea, rotunda, subviridi-striata.)

6. *S. burseriana*, fol. aggregatis imbricatis triquetris subulatis laevibus; caule subnudo unifloro. L. Jacq. misc. t. 17. f. 3.

Versus Münchenstein, circa Langenbruck, et in rupe Maurharterfluh? 983.

(Folia dura; caulis viscidus 3-6-florus; petala alba, ovata, speciosae magnitudinis, pallidis lineis distincta. Hall. Haec planta, ob multiflorum caulem, est varietas *Linnæanae*. Verioram habeo a Schleicheru in Alpibus inventam.)

7. *S. tenera*, fol. molibus integerrimis oblongis obtusiusculis subhirsutis: radicalibus aggregatis, caulinis alternis; caule simplici paucifloro. S. Allioni t. 61. f. 2. (*S. muscoides*.)

Frequens au Dard, inter *Sex de Champ*, et *Sex de Culand* vallis Ormond dessus. In Valesiae monte Schönebühl, supra Bagnes ad rupes glaciales, et in glacialibus du Mont Rouge. Ego in Gemmio inveni, et habeo a Schleicheru inventam. 985.

(Planta cespitosa. Folia viridia delicata; caulis 1-3-florus; calyx hirsutus; petala albida.

An *S. sedoides*, ut Cl. Willdenow credit? sed hæc habet caulem ramosissimum. An *trichodes Scopoli Carn.* t. 15? figura conveniret, nisi filia *lanceolata picta* essent. Etiam *moschata* non recedit, si integra folia semper haberet.)

8. *S. bryoides*, sol. lanceolatis mucronatis margine cartilagineis ciliatis; caule nudiusculo paucifloro; calycibus obtusis. W. Scopoli Carn. t. 15. Jacq. misc. 2, t. 5. f. 1.

Non rara in alpinis: Scheidek, Gotthardo, Furca, Gastern, Fouly, Rosa, Sylvio, Salanfe; Bernhard, Simplon, Speluga, Septimo, Gemmio, in Aquilejensibus etc. 969.

(Cauliculus simplex, pubescens, atro-rubens; folia radicalia imbricata erecta, calyx viridis; petala calyce fere duplo majora, pallide luteola, maculis fulvis notata.)

9. *S. stellaris*, caule nudo ramoso glaberrimo; sol. cuneiformibus apice dentatis; petalis lanceolatis acuminatis. S. Scopoli Carn. t. 13. Jacq. coll. 1. t. 13.

Ubique ad rivulos alpinos. 973.

(Folia crassula, in eodem cespite oblonga et cuneiformia, petala alba maculis croceis in ungue.)

10. *S. cuneifolia*, sol. cuneiformibus obtusissimis repandis; caule nudo paniculato. L. Scopoli Carn. t. 13.

Abunde in omnibus alpibus; descendit a Gott-

*hardo ad Wesen*, et a rupibus Aquilejensibus ad rupem *la Praise* proxime *Roche*. Non tamen montana. 974.

(Folia dura, subtus rubra, petala albaluteo-punctata; calyx reflexus.)

11. *S. oppositifolia*, fol. caulinis ovatis oppositis imbricatis: summis ciliatis. L. *Oed. Dan.* t. 34. *Allioni Ped.* t. 21. f. 3.

Pulcherrima planta in alpium altiorum lapi-dosis ubique: in *Grimsula*, *Gemmio*, *Gott-hardo*, *Neunenen*; in Rhæticis, Valesiacis et Aquilejensibus; ad moles glaciales vallis *Grin-delwald* etc. 980.

(Caules procumbentes uniflori; folia quadri-fariam imbricata; petala ovata purpurea et coerulea.)

12. *S. liflora*, caulis. repentibus; fol. caulinis ovatis oppositis ciliatis; pedunc. bifloris; petalis lanceolatis. *S. Allioni Ped.* t. 21. f. 1.

Summarum alpium incola: in præcipite via *Grandvire*; sub culmine *Dent de Morcle*; in *M. Meuveran*, *Martinets*, *Prapioz*, *Oberstafel*, *Sempronio*, *St. Bernhard*, *Fouly*. 981.

(Differt a præcedente, fol. omnibus cilia-tis: caulinis multo rarioribus, nec imbricatis, et petalis lanceolatis. Flores plerumque sunt albi, quamvis etiam coerulei.)

15. *S. aspera*, fol. caulinis lanceolatis alternis ciliatis; caulib. procumbentibus. L. Jacq. *Austr.* app. t. 31.

In summis alpibus: *Gotthardo*, *Furca*, *Grimula*, *Scheideck*; descendit a *Gotthardo*, ad *Wesen* et ad *Zollbrük* vallis *Lepontiæ*. In *Fouly*, *Simplon*, *St. Bernhard*, *Valorsine*, *Servant*, *Salanfe*, *Septimo* etc. 970.

(Folia linear-lanceolata, dure ciliata, pedunculi longi uniflori; flores albi.)

14. *S. hirculus*, fol. caulinis lanceolatis alternis nudis inermibus; caule erecto. L. Hall. t. 11.

*A la Chaux d'Abelle*, *Mairie des Brenets* Neocastrenium.. *Hallerus* filius reperit à *la Chetelaz* prope *Bellelai*, in paludosis semper-montanis et torfaceis; etiam in paludosis *de la Brcvine* et à *la Chatagne*.

Ego in sylvoso monte *Bovonnaz*. 972.

(Caulis ruber, præcipue sub flore hirsutus, inferne rare, folia non semper nuda, sed etiam raris pilis ciliata, flores 1-2; petala magna, flava, saepe punctis croceis notata.)

15. *S. autumnalis*, fol. caulinis linearibus alternis ciliatis: radicalibus aggregatis. L. Scopoli *Carn.* t. 14.

α. Flore luteo, crocco-punctato.

Frequens in montanis et subalpinis riguis;

etiam in planitiem descendit et in M. *Belpberg*, ad cataractas rivulorum, et demum in insulis *Arolæ*, v. gr. *Hunzikerau* reperitur. (Ad hanc refert *Hallerus* iconem *Oed. Dan.* t. 72, quod suæ *Aizoidi* tribuit *Linnæus*, quamque foliis lineari-subulatis sparsis nudis inermibus ab *autumnali* separat. Minus recte, ut nobis videatur, cum nostra specimina plerumque folia lineari-subulata *ciliata* habeant, obtusiora et mucronata.)

3. Flore toto *aurantio*, maculis saturatiорibus, pene purpureis. —

Unice alpina: in *Gemmio*, *Gotthardo*, in *Aquilejensibus*, ad arenosa circa glaciales moles vallis *Grindelwald* etc. 971.

16. *S. rotundifolia*, fol. caulinis reniformibus dentatis petiolatis; caule paniculato. L. *Bull. herb.* t. 327.

Frequens in scrobibus rupium, et humectis umbrosis *Juræ* et *Alpium*. 975.

(Folia radicalia longe petiolata, caulina profundius incisa: petiolis hirsutis; petala alba, rubro et flavo punctata.)

17. *S. granulata*, fol. caulinis reniformibus lobatis, caule ramoso; radice granulata. L. *Oed. Dan.* t. 514.

Nebis non vulgatissima. Copiosissima circa *Gäbistorf*, circa *Arnex* supra *Urbam*, et Basi-

leæ inter St. Margret et Gundeldingen; etiam ultra novam Domum et hintern Birsfeld. 976.

(Flores magni, longe pedunculati: pedunculis viscidis; petala alba viridi-striata.)

18. *S. bulbifera*, fol. radicalibus petiolatis reniformibus crenatis, caulinis inferioribus incisis, sessilibus, summis sparsis linearibus; caule ramoso bulbifero. *S. Oed. Dan. t. 390.*

*Schleicher* misit inventam prope Branson Valesiæ.

(A præcedente potissimum differt; foliis minus incisis, et floribus minoribus.)

19. *S. tridaetylites*, fol. caulinis cuneiformibus trifidis alternis; caule erecto ramoso. L.

Frequens in tectis, muris vetustis, et arvis macilentis. 986.

*S.* valde ramosa, caule pene dodrantali; fol. trilobatis: lobis integris aut bilobatis. — *Auf dem Ried inter Sarnen et Stanz.*

(Hæc videtur *S. rupestris* Willd.; plantam non vidi.)

20. *S. petræa*, fol. cuneiformibus, radicalibus integris tridentatisque; caulinis quinquedentatis, superioribus trifidis; pedunc. subtrifloris. *Vahl. W. Oed. Dan. t. 68. Scopoli carn. t. 16.* (S. *hypnoides*.) Al-

*Ioni Ped.* t. 22. f. 3. (pro planta valde foliosa,)

In asperrimis Alpium: ut in præcipiti semita la *Grandvire*, in *Fouly*, *Sempronio*, *Paneros-saz*, unde habeo. 987.

(Planta hirsuta; petala alba; folia caulina sumnia etiam integra.)

21. *S. grönlandica*, fol. caulinis palmato-multifidis sparsis: laciiniis acutis; caule erecto. *L. Gun. Norv.* t. 7. f. 1.

Hanc *Hallerus* a *Gesnero* accepit, veditque in Horto sicco *Scheuchzeri*. 990.

(Differt a præcedente habitu foliorum et caulis toto glabro, cum qua cæterum caule folioso, ramoso, et ad singulas alas pedunculum uniflorum educeente satis convenit. *Hall.* Ob habitum glabrum non esse potest *S. adscendens*. *Willd.* et *Hallerum* sequi satius duxi.)

22. *S. moschata*, fol. radicalibus aggregatis integris trifidisque acutis linearibus; caule viscoso subracemoso; petalis calyci æqualibus. *W. Jacq.* misc. t. 21. f. 21.

Frequens in Alpibus. *Hallerus* cum sequente jungit.

23. *S. museoides*, fol. radicalibus aggregatis integris trifidisque oblongis obtusis;

caule filiformi subbifloro; petalis vix calyce longioribus. W. Scop. t. 14. (S. cespitosa.)

Jisdem locis frequens: floribus ochroleucis, ut prior.

24. S. *cæspitosa*, fol. radicalibus aggregatis linearibus integris trifidisque, caulinis linearibus; caule erecto subbifloro; petalis calyce multo longioribus. S.

(Has tres plantas, in Alpibus perfreqentes *Hallerus* conjunxit. 988. Ultima minima est. *Muscoides* habet folium trifidum caulinum, et viriditate distinguitur. *Moschata* caule viscoso gaudet.)

25. S. *hypnoides*, fol. caulinis linearibus integris trifidisque: stolon. procumbentibus; caule erecto nudiusculo. L. Oed. Dan. t. 548. *Allioni* Ped. t. 21. f. 4. 5. 6.

Altiorum alpium: in *Gotthardo*, *Fouly*, *St. Bernhardo*, supra *Bagnes*. *Speluga*, *Pilato*, in mont. vallis *St. Nicolai*. etc.

Var.  $\beta$ . cum gemmulis in aliis foliorum. 989.

(Cl. Willdenow præcedenti nupsit, errore quodam. Nam ipse *Hallerus Oederi* iconem laudat in *Addendis* pag. 186, et planta differt præcipue fol. longe petiolatis, et caule viscido; ejus folia caulinata prima trifida sunt, summa linearia, et habet pedunculos multifloros.)

223. SCLERANTHUS. (*Knauel.*) *G. pl.*  
*767.*

Cal. 1-phyllo, 5-fidus, collo coaretatus persistens; cor. 0; sem. 2, calyce inclusa.

1. *S. annuus*, calycibus fructus patulis.

L. *Oed. Dan.* t. 504.

In agris et inter stipulas vulgo. 1551.

2. *S. perennis*, calycibus fructus clausis. L. *Oed. Dan.* t. 563.

*Basileæ ad Wiesam sursum eunti occurret, postquam pontem Huningam ducentem superaveris. In collè, qui agros Wy lenses separat a sylva cognomine. In Valesia, circa Föuly, Gonthey etc. In summo monte Salanfe.* 1550.

224. GYPSOPHILA. (*Gypskraut.*) *G.*  
*pl. 768.*

Cal. campanulatus angulatus 5-partitus; petala 5 ovata subsessilia; caps. globosa 1-locularis.

1. *G. repens*, fol. lanceolatis; staminibus corolla emarginata brevioribus. L. *Jacq. Austr.* t. 407.

In alpibus nihil vulgatus; etiam in planitatem descendit a torrentibus eluta, ut circa Belp etc. 905. fl. æstate. (*Hallerus* cum *G. prostrata* conjungere videtur, dum *Pluknetii* synonymon citat.)

2. *G. fastigiata*, sol. lanceolato-linearibus obsolete-triquetris laevibus obtusis secundis.

L. Rupp. p. 117. t. 2. f. 1.

*Scheuchzerus* in *Maloja* et *Septimo* mont. ait se legisse; præter eum nemo. 906.

(Folia glauca pulposa; petala ovata, roseola. Hall.)

3. *G. muralis*, sol. linearibus planis; calyc. aphyllis; caule dichotomo; petalis crenatis. L.

Inter stipulas; autumnalis planta. 903.

4. *G. saxifraga*, sol. linearibus; calycibus angulatis squamis 4; cor. emarginatis.

L. Barrel. t. 998.

Frequens secundum lacum Iemanum, Lau-  
sannæ au Montbenon. In Aquilejensi regione  
et Valesia, a St. Tryphon, aux Glaciers de la  
Grande Eau; in arenosis vallis Lepontiæ. Ba-  
sileæ in agris. 902.

(Petala alba, lineis roseis picti.)

225. SAPONARIA. (*Seifenkraut.*) G.  
pl. 769.

Cal. 1-phyllus tubulosus basi nudus,  
5-dentatus; petala 5 unguiculata, filamenta  
alterna unguibus petalorum inserta; Caps.  
oblonga, 1-locularis.

1. *S. officinalis*, calyc. cylindricis; fol.  
ovato-lanceolatis. L. Oed. Dan. t. 543.

Ad vias et in siccis ruderosis abunde. 908.  
fl. Jul. Aug.

Var.  $\alpha$ . flore pleno.

Var.  $\beta$ . staminibus violaceis nigris et amplis  
a Pertuis.

2. *S. vaccaria*, calyc. pyramidatis 5-an-  
gularibus; sol. ovatis acuminatis sessilibus. L.

In segetibus passim; in Valesia. Basileæ po-  
tissimum versus *Michelfelden*, circa *Moncharan*,  
a *Bosseja*, prope *Urbam*, a *Cressy* etc. 907.

3. *S. ocyoides*, calyc. cylindricis villo-  
sis; caul. dichotomis procumbentibus. L.  
*Jacq. Austr.* app. t. 23.

Nihil frequentius ad vias agri Aquilejensis;  
etiam ad rupes pagi *Gümmenen*; in vineto  
*Kuilly* supra vineas; in alpinis etiam et mon-  
tanis; in scopolis ad ripam *Rivarii* lacus. 909.

4. *S. lutea*, calyc. teretibus; coroll. co-  
ronatis; flor. subumbellatis; sol. sublinea-  
ribus canaliculatis. L. *Allioni Pedem.* t.  
23. f. 1.

In M. *Ternanche*. 904. (*Schleicher* invenit,  
qua descenditur du Col du Mont-Cervin au  
*Breuil*. *Saussure* voyages. T. VIII. pag. 208.)  
226. DIANTHUS. (*Nelke.*) G. pl. 770.

Cal. cylindricus 1-phyllo, basi squamu-  
lis 4 cinctus; petala 5 unguiculata; caps.  
cylindrica 1-locularis.

a. *Flores aggregati.*

1. D. *Carthusianorum*, fl. subaggregatis; squamis calycinis ovatis aristatis tubum subæquantibus; fol. trinerviis. L.

In Ericetis, Juniperetis, et ad vias, in Agro Aquilejensi, circa Basileam. etc. 899. In Valesia frequens. fl. Jul. Aug.

β. Var. alpinam vix digitalem misit Schleicher.

γ. Misit etiam varietatem flor. confertissimis.  
(D. *vaginatus*. Villars Delph. III. pag. 594.)

2. D. *armeria*, flor. aggregatis fasciculatis; squamis calycinis lanceolatis villosis, tubum æquantibus. L. Oed. Dan. t. 230.

In nemoribus et ad vias. Inter Belmont et Nidau; circa Bex; Bernæ ad sylvulam Muriensem. Circa St. Aubin; in M. Crenzach, et in sylvis viisque siccis circa Basileam. 900.

3. D. *prolifer*, flor. aggregatis capitatis; squamis calycinis ovatis obtusis, muticis, tubum superantibus. L. Oed. Dan. t. 221.

Locis siccis, tenui gramine vestitis. In glærea ad Grande Eau; in Valesiæ viis ubique. Circa Moncharan, Gorgier etc. Basileæ passim. locis asperis, non raro in muris. etc. 901.

Var. β. D. *diminutus*, qui nonnisi floribus solitariis differt, Hallero monente nullo modo separari potest, et nunquam separo.

b. *Flores solitarii, plures in eodem caule.*

4. *D. sylvestris*, flor. solitariis, squamis calycinis brevissimis ovatis, exterioribus acutis, interioribus obtusissimis, petalis crenatis imherbibus. W. Jacq. ic. rar. t. 82.

Latiōri folio in rupibus circa lacus nostros, et in rupibus etiam circa Aubonne, Moncharan, Roche, in Valesia, agro Vaudensi. Perangustis foliis, in Alpibus Scheibenflüh, Revereuse, Fouly; et erit *Dianthus*, quem Scheuchzerus in pratis alpinis siccoribus vallis Domleschg invenit. Itin. Alp. p. 132. (ut Hallerus jam habet No. 901. γ)

Var. β. flore unico passim occurrit, vulgatissima inter Valeire et Moncharans locis gramineis. 896. in scopolis ad lacum Rivarium. Scheuchz. It. alp. p. 511.

5. *D. deltoides*, fl. solitariis; squamis calycinis lanceolatis binis; coroll. crenatis. L. Oed. Dan. t. 577.

Schleicher eum habet in Catalogo pag. 56; quasi novum, misitque; sed credo esse *Dianthum*, quem Cherlerus Basileæ extra portam St. Johannis reperit, apud Haller. No. 896. fine.

6. *D. plumarius*, flor. solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis; coroll. multitudinis faucepulentescentibus. L.

Magna cōpia circa *Burgdorf* in rupibus *Gisenau*, etiam sub ipsa civitate in coteis scopulis. Ad pedem montis *Falkenstein*. Circa *Neufchatel* et *Valangin*. Circa *Augst*, in amphiteatro etc. 897.

7. *D. superbus*, flor. paniculatis; squamis calycinis brevibus acuminatis; coroll. multifido-capillaribus; caule erecto. L. *Oed. Dan.* t. 578.

In nemorum oris circa Bernam (versus Muri) *Mathod*, *Yverdun*, *Gampelen*, *Roche* etc. Basileæ. In Jurae montosis ubique. 898.

In ascensu montis St. *Bernhardini* supra *Rheinwald* ad viæ latera. *Scheuchz.* flore carneo invenit. It. alp. p. 453.

### c. *Caule unifloro.*

8. *D. arenarius*, caul. subunifloris, squamis calycinis ovatis obtusis; petal. multifidis; sol. linearibus. L.

Cl. *Morell* invenit circa *Leuck*, et *Dick* in arenosis.

9. *D. Alpinus*, caule unifloro; coroll. crenatis; squamis calycinis exterioribus tubum æquantibus, sol. linearibus obtusis. L. *Jacq. Austr.* t. 52.

*Dick.* invenit, sed locus ignoratur. (Minime tamen dubito, quin planta, quæ in Austricæ-

pratis subalpinis, summisque Alpium jugis provenit, Helvetiorum alpes amet.)

10. *D. cæsius*, caul. subunifloris, squamis calycinis subrotundis brevibus; petalis crenatis pubescentibus; fol. margine scabris. Smith. W.

*Davall* invenit in M. Rocheblanche ad monte Suchet:

(Hi tres *dianthi* nuper inventi exstant in Höpfner Magazin. T. IV. p. 32.)

11. *D. scaber*, caule unifloro; squamis calycinis lanceolatis tubum æquantibus; petalis multifidis; fol. linear-lanceolatis, scabris. S.

Hunc *Schleicherus* misit, inventum in valle alpina Terranche. (*Caulis scaber*, *pedalis*.)

### T R I G Y N I A.

227. CUCUBALUS. (*Taubenkropf.*) G.  
pl. 771.

Cal. inflatus 5-dentatus; petala 5 unguiculata absque corona ad faucem; caps. 3-locularis, apice quinquefariam dehiscens.

1. *C. behen*, calyc. subglobosis glabris reticulato-venosis; caps. 3-locularibus; coll. subnudis. L. Oed. Dan. t. 857.

Flore albo ubique reperitur; flore rubro circa Kandersteg, balnea Leucensia etc.

Var.  $\beta$ . caule repente, foliis lanceolatis hirsutis; — in Alpibus supra Vallem St. Nicolai. 913.

2. *C. otites*, petalis linearibus indivisis undulatis glabris; flor. dioicis; pedunc. glabris; caule paniculato. W. Oed. Dan. t. 518.

Minime rarus in agro Aquilejensi, a Fontenai, etc. a St. Tryphon; in Vallesia, in Helvetia Transalpina, Chiavennæ, ad Lacum Luganensem etc. 920.

228. SILENE. (*Leimkraut.*) G. pl. 772.

Cal. ventricosus 5-dentatus; petala 5, unguiculata, denticulis 2 ad faucem coronata; caps. 1-3-locularis.

a. *Floribus solitariis lateralibus.*

1. *S. gallica*, flor. subspicatis alternis secundis, petal. indivisis; fruct. erectis. L. Vaillant paris. t. 16. f. 12.

*Mendrisii* inter stipulas. 914. Schleicher etiam misit inventam.

b. *Flor. lateralibus confertis.*

2. *S. nutans*, petalis bifidis; flor. lateribus secundis cernuis; panicula nutante. L. Oed. Dan. t. 242.

Nihil frequentius ad vias, sepes, inque rupibus. 915.

c. *Flor. ex dichotomia caulis.*

5. *S. baccifera*, calyc. fructiferis cernuis inflatis laevibus; caps. coloratis, ramis divaricatis. W. (*Cucubalus bacciferus.*)

Circa Genevam a *Frontenex* ad sepes, et ad vias. 912. Etiam *sous la colline de Champel.*

4. *S. noctiflora*, calyc. 10-angularibus: dentibus tubum æquantibus; caule dichotomo; petalis bifidis. L.

Basileæ ante portam St. Johannis. 911.

(*Folia ovato-lanceolata sessilia hirsuta; petala rubella. extus sublutea.* Hall.)

d. *Flor. terminalibus.*

5. *S. armeria*, flor. fasciculatis fastigiatis; fol. superioribus cordatis glabris; petalis integris. L. *Oed. Dan.* t. 559.

Potissimum circa *Brieg*, *Branson*, *Fouly*; tamen etiam circa *Roche* in rupibus trans l'Eau froide, sed rarius. In *Helvetia transalpina*, ut *Chiavennæ*, in rupibus. 916.

6. *S. rupestris*, flor. erectis, petal. emarginatis; calyc. teretibus; fol. lanceolatis. L. *Oed. Dan.* t. 4.

In alpibus minime rara; etiam in Valles descendit, *Haseliam*, *Uraniensem*, adusque pagum *Steg.* Haud longe a Basilea in collculo; in monte *Vogelberg*. 917.

7. *S. saxifraga*, caul. subunifloris; pedunc. longitudine caulis; flor. hermaphroditis foemineisque; petal. bifidis. L. Segu. veron. t. 6. f. 1.

*Schleicher* in Catalogo pag. 59. misit inventam in rupibus calidis Helvetiae transalpinæ.

8. *S. vallesia*, caul. subunifloris decumbentibus; fol. lanceolatis tomentosis longitudine calycis. L. Allioni Ped. t. 23. f. 2.

In summis alpibus infrequens. In descensu montis *Sylvii*, in St. Bernhardo. 910.

(Caulis plerumque uniflorus; petala breviter bifida. Hall.)

9. *S. acaulis*, acaulis depressa; petal. emarginatis. L. Oed. Dan. t. 21. Allion. Ped. t. 79. f. 1.

Non infrequens, in *Gemmio*, *Joch*, *Prapioz*, in Auquilejensibus. 919.

Var.  $\beta$ . flore albo, in summo monte *Joch*. *Scheuchz*. It. Alp. p. 425. fl. Jul. Aug.

229. STELLARIA. (*Sternmiere*, *Meierich*) G. pl. 773.

Cal. 5-phylloides, patens; petala 5, bipartita; caps. 1-locularis, 6-valvis, polysperma.

1. *S. nemorum*, fol. cordatis petiolatis; panicula pedunculis ramosis. L. Oed. Dan. t. 271.

Passim in nemoribus uidis montosis; in monte  
supra Kerzen. etc. 886.  $\alpha$ .

2. *S. dichotoma*, fol. ovatis sessilibus;  
caule dichotomo; flor. solitariis; pedunc.  
fructiferis reflexis. L.

In sylvis umbrosis; in *Combanivaz*, *Lioson*,  
*Gotthard*. 886.  $\beta$ .

(Conjungit has plantas *Hallerus*; illa junior,  
hæc adultior ei videtur)

3. *S. holosteæ*, fol. lanceolatis, serrula-  
tis; petalis bifidis. L. *Oed. Dan.* t. 698.

Circa Basileam in via versus St. *Louis*; in  
via *Riehana* et ultra novam domum. *Genevæ*. 884.

(Petala calyce triplo longiora. W.)

4. *S. arvensis*, fol. linearibus integerri-  
mis; flor. paniculatis minoribus, petalis  
ultra medium 2-partitis. *Hofm. Germ.*  
p. 152.

In stipulis. 882.  $\alpha$ .

5. *S. palustris*, fol. linearibus integerri-  
mis; flor. duplo majoribus, semibifidis.  
*Hofm. Germ.* p. 152.

Inter carices. 882.  $\beta$ .

6. *S. alsine*, caule diffuso ramoso; fol.  
sessilibus; pedunc. lateralibus; petalis calyce  
brevioribus angustissimis bipartitis. *Hofm.*  
*Germ.* p. 153.

*Vulgaris* in aquosis, ut ad rivi *Sulgenbach*

in Arolam influxum; inque carbonariorum areis.  
381. Circa *Tobinium*.

7. *S. cerastoides*, fol. oblongis pubescen-  
tibus; caule decumbente; pedunc. unifloris  
geminatis erectis; petalis calyce majoribus.  
W. (*Cerastium trigynum Villars fl.*  
*Delph.* t. 46.)

Altissimarum Alpium rarer hospes; in *Pen-  
ninis alpibus et monte St. Bernhardo*; in *la  
Paraz M. Ormond* dessus. 890.

(Caules infracti, ut ductum ab omni folio-  
rum pare mutent. *Hall.*)

Ego inveni in *Panerossaz*, fl. Aug. *S. mul-  
ticaulis*: fol. lanceolatis glabris, ramis erectis  
simplicissimis, pedunculo subsolitario terminali  
*Willd.* erit prioris varietas, cuius *Halterus* eo-  
dem loco meminit. Non separarem.)

230. ARENARIA. (*Sandkraut.*) G. pl. 774.

Cal. 5-phýllus; petala 5 integra; caps.  
1-locularis, 3-6-valvis polysperma.

1. *A. biflora*, fol. obovatis obtusis; caul.  
procumbentibus; pedunc. bifloris lateralibus.  
L. *Allioni Ped.* t. 44. f. 1. t. 64. f. 3.

In altioribus Alpibus: St. *Bernhard*, *Gott-  
hardo*, *Ovannaz*, *Fouly*, *Septimo*; circa origi-  
nem Rhodani. 877.

(Petala alba, ovata, calyce longiora.)

2. A.

2. *A. trinervia* , fol. ovatis acutis petio-  
latis nervosis. L. *Oed. Dan.* t. 429.

Frequens in sylvis potissimum abiegnis, et  
in umbrosis humidis. Jun. Jul. 878.

(Flores longe pedunculati, petala alba calyce  
breviora.)

3. *A. ciliata* , fol. ovatis nervosis ciliatis  
acutis. L. *Oed. Dan.* t. 346. *Jacq. coll.*  
1. t. 16. f. 2.

4. *A. multicaulis* , fol. ovatis enerviis ses-  
silibus acutis, corollis calyce majoribus. L.  
*Jacq. coll.* 1. t. 17. f. 1. *Hall. t. 17.*

(Has plantas *Hallerus* conjungit, quæ in al-  
pinis saxosis ubique reperiuntur, et certe non  
sine ratione. Utraque habet folia ciliata, utra-  
que corollas calyce multo majores, et si hujus  
radicem longius proserpentem excipies, discri-  
men verum nullum invenies.)

5. *A. serpyllifolia* , fol. subovatis acutis  
sessilibus ; coroll. calyce brevioribus. L.  
*Fl. Dan.* t. 977.

Frequentissima in muris et locis macilentis,  
imo Alpes amat supra *Praborgne* , et *Gemmi*  
horridas et madidas rupes. 875.

6. *A. polygonoides* , fol. linearibus ; cau-  
lib. procumbentibus ; pedunc. bifloris ter-  
minalibus erectis ; calycum subviscidorum

soliolis enerviis. *Wulf.* in *Jacq. coll.* 1. t. 15. *Allioni Ped.* t. 64. f. 4. (*A. obtusa.*)

In Alpibus, *Enzeindaz*; *Taveyannaz*, *Pripioz*, *Audon*, *Martinets*, *Dent de Midi*, *Fouly*, *Furcula*, supra *Kienthal* et *Coenobium St. Bernhardi* etc. 863.

(Caules debiles procumbentes; folia imbricata, mollia, viridia, glabra; calycis foliola oris albis, petala alba calyce majora.)

7. *A. rubra*, caulis prostratis, sol. oppositis filiformibus internodiis duplo brevioribus; stipulis membranaceis vaginantibus. S.

Minus frequens in Helvetia, quam in Germania. Circa Basileam inter novam Domum et arcem *Oetlingen*; ad *Wiesam* in agris versus *Wytl.* In glareesis ad Arolam im *Rätisboden* vallis Haseliæ; prope *Nidau*. Super *Viége* Valesiæ. 872.

(Calyx viscidus; flores coeruleo-purpurascentes.)

8. *A. cespitosa*, sol. subulatis glabris; caulis paniculatis; calycis foliolis lœvibus striatis ovato-lanceolatis; petalis ovatis calyce majoribus; caule pedunculisque pubescentibus. S.

Ubique in rupibus Alpium et Juræ; etiam in planicie à la Rape prope Roche. 867.

(*A. saxatilis* differt calyce nonnisi obtuso; sed non separo.)

9. *A. dubia*, fol. subulatis subhirsutis;

caulibus paniculatis patent-pilosis; calycis foliolis linearibus acuminatis striatis hirsutis; petalis calyci subæqualibus. S. Villars Delph. t. 47. (A. *hybrida*.)

(Hæc est Halleri planta 865, quæ nobis in segetibus, muris, imo in Alpibus (v. gr. *Gemmio*) provenit. Majori hirsutie, statura minori, ab omnibus similibus distinguitur. Præ omnibus A. *vernæ* Linnæi credo, quamvis dubiam vocassem.)

10. A. *tenuifolia*, glabra; fol. subulatis; caule paniculato; calycis foliolis lanceolatis aristatis; petalis calyce minoribus. S. Vaill. paris. t. 5. f. 1. Oed. Dan. t. 389.

Ubique in muris et inter stipulas. 866.

(Differt potissimum a præcedente: petalis minoribus, glabro et altiore habitu. *Hallerus* et *Allioni* eam optime descripserunt.)

11. A. *laricifolia*, fol. setaceis: inferioribus fasciculatis; caule pubescente superne nudiusculo; calycib. oblongis lineatis sub-hirsutis; petalis calyce majoribus. S. Jacq. Austr. t. 272. Villars Delph. t. 47.

In alpinis: *Prapioz*, *Salanfe*, *Arbignon*, *Pra-borgne*, *Gemmio*, *Pilato*; supra *Wasen*; inter *Airolo* et *Faido*. Ad lacum *Siliensem*. In lapidosis montis *Thuiry*, qua primum in *Vallem* subitur, quæ Authoram alit. 869.

(Folia dura, pallide viridia. Non separo *A. striatam*, quæ vere minime differt, ut satis appareat ex I. *Bauhini* synonymo H. P. III. pag. 360. « Auricula muris pulchro flore, folie te-“nuissimo” quod ad utramque citatur. *Villars Delph.* t. 47.)

12. *A. recurva*, fol. inferioribus fascicu-latis linear-subulatis sulcatis recurvis se-cundis, summis linear-lanceolatis oppositi basi connatis; pedunc. terminalibus sub-bifloris pubescentibus; calyce lanceolato striato petalis paulo minore. S. Jacq. coll. 1. t. 6. f. 1. *Allioni Ped.* t. 89. f. 3.

Altiorum Alpium: vallis *Ursariæ*, *Gotthardi*, *Enzeindaz*, St. *Bernhard*, *Fräla*. 868.

(*Schleicher* etiam misit.)

13. *A. austriaca*, caule flaccido dichoto-mo; fol. radicalibus linearibus, caulinis lanceolatis oppositis; pedunculis longissimis subbifloris; petalis calyce paulo majoribus. S. Jacq. *Austr.* t. 270. *Allioni Ped.* t. 64. f. 2.

In loco die *Clus*, qua ex *Candersteg* aditur vallis *Gasternthal* habet *Hallerus*. 864. Etiam *Schleicher* invenit, misitque.

(Caulis et pedunculi pubescentes; folia cau-lina pauca; sub dichotomia f. lia 2 ovato-lan-ceolata; calyx lanceolatus mucronatus. *A. tri-flora* *Villars Delph.* tab. 47, non differre videtur.)

14. A. *grandiflora*, fol. subulatis planis strictis, radicalibus confertis; caulib. unifloris. L. *Allioni Ped.* t. 10. f. 1. *Scopoli Carn.* t. 17. *Stellaria aculeata*.

Rara. In M. *Chasseron*; circa Genevam. 874.

(Folia rigida sulcata aristata, margine et nervo subhirsuto; petala maxima ovata; calycis foliola ovato-lanceolata. *Hall.*)

### 231. CHERLERIA. G. pl. 775.

Cal. 5-phylloides, foliolis lanceolatis, concavis, striatis; nectaria 5, cordata, petaloidea; antheræ alternæ steriles; caps. 1-loicularis, 3-valvis, 3-sperma.

C. *sedoides*, fol. oppositis, linearibus, acutis, basi connatis; caul. repentibus. *Jacq. Austr.* t. 284. *Hall.* t. 21.

In alpibus altioribus ubique: in *Gemmio*, *Leitern*, *Gotthardo*, *Sempronio*, in *Griseis* etc. 859.

### P E N T A G Y N I A.

#### 232. SEDUM. G. pl. 789.

Cal. 5-fidus; petala 5; nectaria 5 ad basin germinis; caps. 5, acuminatæ compressæ, longitudinaliter sutura introrsum dehiscentes.

##### a. *Planifolia*.

1. S. *telephium*, fol. planiusculis serratis; corymbo folioso; caule erecto. L. *Oed. Dan.* t. 686.

Vulgare: circa Bernam in sepibus über dem Bodenacker. Ad muros *Nidoviæ* et circa *Neocomum*. B sileæ in agris M. *Muteti* etc. Etiam in alpibus.

Var.  $\beta$ . non serratum: Basileæ extra portam D. *Albani*. 954.

2. *S. maximum*, fol. planiusculis oppositis subdentatis; corymbis axillaribus. *Krock. Hofm. Germ.* p. 156.

Frequentissime in rupibus circa *Roche*, *Aquilejam*, *Biennam*; supra *Baume*; in valle Lepon-tia tota; circa *Chiavennam*. 955.

(Differt a præcedente foliorum figura, direc-tione, ramis, aliasque sedes tenet. *Hall.*)

3. *S. anacampseros*, fol. cuneiformibus integerrimis; caul. decumbentibus; flor. corymbosis. L.

In rupibus Alpium Aquilejensium, sur *Champ Richard*. In Valesiæ montibus St. *Bernhard*, *Jeman*, *Fouly*; supra *Bagnes*. 956.

4. *S. stellatum*, fol. planiusculis angula-tis; flor. lateralibus sessilibus solitariis. L.

Ad aggeres viarum muscosos haud longe a *Gex*, autore *Rajo*; sed ibi non inventum. Re-perit tamen *Gesner* in monte *Aubrig* (*Suiten-sium*.) 957.

5. *S. cepœa*, fol. planis lanceolatis; caule

ramoso ; flor. paniculatis, petalis acutis aristatis. L.

Passim in calidiori Helvetia : circa Genavam ; Mendrisii ad sepes ; a Poco d'Adda a Morbegno. Tiguri. 958.

(*Au Creux de Genthod. Saussure Voyag. dans les Alpes. I. pag. 58.*)

b. *Teretifolia.*

6. *S. dasypHYLLUM*, sol. oppositis ovatis obtusis carnosis ; caule infirmo ; flor. sparsis. L. *Bull. 3. Jacq. hort. t. 153.*

Nihil vulgatius in muris agri Aventici ; circa Roche, Aquilejam, Viviscum ; Lausannæ etc. Sed etiam in summis Alpibus, non solum in muris et rupibus circa Lauterbrunn, et versus glaciales moles prope Sichellauwenen, et versus Kandelsteg, sed omnino in Rosselina monte. 961.

(Folia reti venarum rubrarum adspersa. Hall.)

7. *S. reflexum*, sol. subulatis sparsis basi solutis : inferioribus recurvatis. L.

In mentosis, scopolis et aridis agri Aquilejensis, Valesiæ etc. in agris et mœnibus circa Basileam etc. 967. fl. Jun. Jul.

8. *S. saxatile*, fol. sparsis semiteretibus obtusis basi solutis ; caule ramoso decumbente. Wigg. *Oed. Dan. t. 59.*

Altiorum Alpium : *Gotthardi*; in via a Morcle ad Jeman; Foully. 964.

(Folia alterna sessilia, versus caulem plana, virēntia, nunquam rubra, ad solem micantia; petala lutea. *Hall.*)

9. *S. album*, fol. oblongis obtusis terebratibus sessilibus patentibus; cyma ramosa. L. *Oed. Dan.* t. 66. *Bull.* t. 79.

Nihil frequentius in muris et ad rupes. 959. fl. Jul. Aug.

10. *S. acre*, fol. subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis; cyma trifida. L.

Ubique ad vias, aggeres, prata macilenta, muros. 966. fl. Jun. Jul.

11. *S. sexangulare*, fol. subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis sexfariam imbricatis. L.

Vulgatissimum circa *Bex* et *Bevieux* in muris et ad vias. 965.

12. *S. villosum*, caule erecto, fol. planiusculis pedunculisque subpilosus. L. *Oed. Dan.* t. 24. *Allioni Ped.* t. 65. f. 5.

Plurimum in pratis palustribus inter *Rüggisberg* et *Rüti*, et circa St. *Catherine* prope *Lau-sannam*; in iudis petris montis *Pinzberg* prope *Burgdorf*, supra officinam lateritiam, prope *Einsiedlen*. 962.

(Viscida et hirsuta planta; petala lāte purpurea, extus hirsuta. *Hall.*)

13. *S. atratum*, caule erecto; flor. corymbosis fastigiatis. L. Jacq. Austr. t. 8. Allioni Ped. t. 65. f. 4.

Abunde in toto dorso Alpium septentrionali, Gemmio, Aquilejensibus et Valesiacis omnibus; etiam in Gotthardo, Speluga etc. 963.

(Folia alterna; tota planta glabra, cum rubore in foliis et fructibus. Hall.)

233. OXALIS. (*Sauerklee.*) G. pl. 794.

Cal. 5-partitus; petala 5, unguibus connecta; caps. 5-gona, 5-locularis, angulis longitudinaliter dehiscens.

1. *O. acetosella*, scapis unifloris; fol. ternatis; foliolis obcordatis pilosis. L.

Vulgo ad sepes, et in arborum umbra. 928. fl. Apr-Jul.

2. *O. corniculata*, caule ramoso decumbente radicante; pedunc. subumbellato petiolis breviore; fol. ternatis obcordatis; stylis longitudine staminum interiorum. W. Oed. Dan. t. 873.

Passim in valle Tellina; circa Mendris et Chiavennam in sepibus; etiam in pago Frontenex prope Genavam. 929.

234. AGROSTEMMA. (*Rhade.*) G. pl. 795.

Cal. 1-phyllo, coriaceus, tubulosus, 5-dentatus; petala 5, unguiculata, limbo patente obtuso; Caps. 1-locularis 5-valvis.

1. *A. githago*, hirsuta; calyc. corollam æquantibus; petalis integris nudis. L. *Oed. Dan.* t. 576.

Nimis inter segetes frequens. 926. fl. Jun. Jul.

2. *A. coronaria*, tomentosa; fol. ovato-lanceolatis; petal. emarginatis coronatis serratis. L.

In planiori Valesia abunde etc. 925.

3. *A. flos jovis*, tomentosa, petalis emarginatis. L.

In Rhætia, Locarnensium agro; in Valesia, circa *Praborgne* et alibi. 924.

### 235. LYCHNIS. (*Lichtnelke.*) G. pl. 796.

Cal. 1-phillus oblongus membranaceus 5-dentatus; petala 5, unguiculata, limbo subbifido; caps. subovata, 1-5-locularis.

1. *L. flos cuculi*, petal. 4-fidis; fructu subrotundo. L. *Oed. Dan.* t. 590.

In pratis udis perfreqvans.

Var.  $\beta$ . flore albo passim; etiam circa *Rennaz.* 921. fl. Jun. Jul.

2. *L. quadridentata*, petal. 4-dentatis; caule dichotomo; fol. glabris recurvis. L. *Jacq. Austr.* t. 120.

In Abbatiscellanis alpibus; abunde in valle *Alpina Chapuise*, ad lapides humidos; etiam in

M. *Taveyannaz*, *Prapioz*; in valle Gaster. 918.  
Ego a la *Varaz* inveni. fl. Aug.

3. *L. viscaria*, petalis subintegris. L.  
*Fl. Dan.* t. 1032.

Rara. Circa *Octodurum* passim ad vias sa-  
bulosas. A *Tourtemagne*, *Gontheys*, *Formaz*;  
ad *Soazz* vallis *Misaucinæ*. 927.

4. *L. alpina*, petal. bisidis; flor. tetra-  
gynis. L. *Oed. Dan.* t. 65. *Hall.* t. 17.

Summarum alpium: In M. *Albula* Valesiæ;  
ad rupes glaciales *Chermontana*; in M. *Griseis*,  
*Stokberg*, *Arola*; in montibus vallis St. Nico-  
lai; etiam in monte supra *Kienthal*. 922.

(Folia radicalia conferta, flores umbellati.  
*Hall.*)

5. *L. dioica*, flor. dioicis. L.

α. Flore albo.

Ubique ad vias siccas in agris.

β. Flore rubro.

Frequens in aquosis, inque montanis silvis.  
923.

(Cl. *Willdenow* et *Villars* hanc pro specie  
distincta habent, et lubenter illis assentior.  
Planta s' item, quam in Alpibus à la *Varaz*  
inveni, non solum majori hirsutie a vulgari  
alba differt, sed etiam caule teretiori, flor. mi-  
noribus, et calyce villosiore.

236. CERASTIUM. (*Hornkraut.*) G.  
pl. 797.

Cal 5-phyllo; petala 5 bifida, longitudine calycis; caps. 1-locularis, apice dehiscentia, 10-dentata.

a. *Capsulis oblongis.*

1. *C. vulgatum*, fol. ovatis; petalis calyci aequalibus; caul. diffusis. L. *Vaillant paris.* t. 30. f. 1.

Vulgo in pratis et ad vias. 893, fl. Maj. Jun.  
(Petala calyce paullo longiora.)

2. *C. viscosum*, erectum, piloso-viscosum; fol. oblongis obtusis; petalis calyce brevioribus. W. *Vaillant* t. 30. f. 3.

Non rarum ad macilenta viarum. 895. fl. æstate.  
(Stamina subinde 5.. *Hall.*)

3. *C. semidecandrum*, decumbens, pilosum; fol. oblongis obtusis; petal. calyce brevioribus. W. *Vaillant* t. 30. f. 2.

Ad vias verna planta. e. g. Bernæ um das Siechenhaus. 894.

4. *C. arvense*, fol. linear-lanceolatis obtusis glabris; coroll. calyce majoribus. L. *Vaillant* t. 30. f. 4. *Oed. Dan.* t. 626.

Circa Mathod, Moncharan, in Valesia. In valle Ursaria. In montibus du Lac de Joux. Basileæ versus St. Louis etc. 889.

(*Folia semper subhirsuta, certe ciliata. Hall.*)

5. *C. alpinum*, fol. ovato-lanceolatis ; caule diviso ; caps. oblongis. L. *Oed. Dant.* 6.

Satis frequens in Alpibus. 888.

(*Flores calyce multo maiores.*)

b. *Capsulis subrotundis.*

6. *C. strictum*, fol. linearibus acuminateis glabris ; pedunc. unifloris subtomentosis ; caps. globosis. L. *Allion. Ped. t. 88. f. 4.*

In Alpibus ubique frequens. 892.

(*Caulis subhirsutus, viscidus; calyx glaber, nitens. Hall.*)

7. *C. aquaticum*, fol. cordatis sessilibus ; flor. solitariis ; fruct. pendulis. L.

In aquaticis fossisque. 885. fl. æstate.

8. *C. latifolium*, fol. ovatis subtomentosis ; ram. unifloris ; caps. globosis. L. *Jacq. Coll. 1. t. 20.*

In alpibus altioribus Valesiæ, (et in Aquilejensibus) in *Gemmio, Gotthardo, Fouly* etc. 887.

(*Caules prostrati; calyx, pedunculi hirsuti; flores maximi.*)

9. *C. tomentosum*, fol. oblongis tomentosis ; pedunc. ramosis ; caps. globosis. L.

Circa *Moutru nova civis et procul dubio exhortis nata. Au Foulet, près de la Chaud de Fonds.* 891.

(Tota planta tomentosa; flores calyce maiores.)

10. *C. manticum*, glabrum; caule striato; fol. lanceolatis pedunc. longissimis; caps. globosis. L. Seguier Ver. III. t. 4. f. 2.

In Rhætia. 883.

(Folia basi connata; petala profundissime bifida; calycis folia ovato-lanceolata, alis albis aucta, ex qua nota facile agnoscitur. Hall.)

237. SPERGULA. (*Spark.*) G. pl. 798.

Cal. 5-phillus; petala 5 integra; caps. ovata, 1-locularis, 5-valvis; semi. plurima, margine emarginato cincta.

1. *S. arvensis*, fol. verticillatis; flor. decandris. L.

Basileæ in arenosis ad *Wiesam*; infra *Burgfelden*, et inter pratum *Sclopetarium* et *Alschwyl*. Bernæ non rara, in adscensu ad M. *Gurten* supra villam der *Spiegel*, in segetibus *Vallesiæ* etc. 873.

2. *S. pentandra*, fol. verticillatis; flor. pentandris. L.

*Schleicher* habet in Catal. pag. 59.

3. *S. nodosa*, fol. oppositis subulatis lævibus; caul. simplicibus. L. Oed. Dan. t. 96.

In torfaceis prope *Pümpliz*, *Löhr*; circa *Seedorf*, *Anet*, *Morat* etc. 871.

4. *S. saginoides*, fol. oppositis linearibus  
lævibus; pedunc. solitariis longissimis; caule  
repente. L. *Allioni Ped.* t. 64. f. 1.

In udis rupibus, inter muscos, in M. *Javernaz*, *Chaud commun*, *Prapioz*, *Jeman*, *Spe-luga*, St. *Bernhard* etc. Etiam in planicie ver-  
sus *Luganum*. 862.

(Flores per ætatem nuantes. *Hall.*)

### D E C A G Y N I A.

258. PHYTOLACCA. (*Kermesbeere.*) G.

pl. 800.

Cal. 0; petala 5 calycina; bacca supera  
10-locularis, 10-sperma.

P. *decandra*, fl. decandris decagynis. L.  
Passim in Helvetia transalpina, inter *Poco*  
*d'Adda* et *Morbegno*; inter *Ripam* et *Chi-  
avennam*. Circa *Osogne* et au *Cong* vallis Le-  
pontiæ. 1007.

---

## C l a s s i s   X I .

## D O D E C A N D R I A .

## M O N O G Y N I A .

239. ASARUM. (*Haselwurz.*) *G. pl. 801.*

Cal. 3-4-fidus, superus: laciniis apice inflexis; cor. o; caps. infera, coriacea, subsexlocularis.

*A. europaeum*, fol. reniformibus, obtusis, binis. *L. Oed. Dan. t. 633.*

In sylvis montosis: abunde in adscensu montis *Dolaz*; inter *Munchenstein* et *Muttenz*, qua via per sylvam dicit; *in der Hardt* etc. Abunde prope *St. Imier*; prope *Loeles*; circa *Delsperg* etc. Non procul *Tiguro* ad *Limagum* fl. (In sylvis montis *Engelberg* prope *Tobinium*. 1547.

*B.* Fol. majoribus: circa fanum *D. Virginis Eremitarum*.

(*Floret vere.*)

**240. PORTULACA.** (*Portulak, Purzel-kraut.*) *G. pl. 824.*

Cal. 2-fidus, superus; petala 5; caps. tecta, ovata, 1-locularis, circumscissa.

*P. oleracea*, fol. cuneiformibus; flor. sessilibus. L.

Basileæ in agris. Ad *Olon secundum* viam publicam. In *Kalesia* etc. 968.

**241. LYTHRUM.** (*Weidrich.*) *G. pl. 825.*

Cal. 6-12 dentatus, dentibus alternis minoribus; petala 6, patentia, calyci inserta; caps. oblonga, 2-locularis, polysperma.

1. *L. salicaria*, fol. oppositis, cordato-lanceolatis; flor. spicatis dodecandris. L. *Oed. Dan.* t. 671.

Vulgo ad fossas et ripas. 854. fl. Jun.-Aug.

2. *L. hyssopifolia*, fol. alternis linearibus; flor. hexandris. L. *Jacq. Austr.* t. 133.

Rarum in Helvetia. Mülhusiæ in sylvis uidis. *Basileæ.* 855. *Schleicher* etiam inventum misit.

### D I G Y N I A.

**242. AGRIMONIA.** (*Odermennig.*) *G. pl. 830.*

Cal. 5-fidus, superus, altero obvallatus; petala 5; semina 2, in fundo calycis.

*A. eupatoria*, fol. caulinis pinnatis: impari petiolato; fructibus hispidis. L. Oed. Dan. t. 588.

Abunde in sepibus, ad vias, et in nemorosis. 991. fl. æstate ad autumnum.

### T R I G Y N I A.

243. RESEDA. (*Wau.*) G. pl. 831.

Cal. 1-phyllus, partitus; petala inæqualia, laciniata; caps. gibba, 1-loocularis, apice dehiscens.

1. *R. luteola*, fol. lanceolatis integris, basi utrinque unidentatis; calyc. quadrifidis. L. Oed. Dan. t. 864.

Abunde ad vias. 1058.

2. *R. lutea*, fol. omnibus trifidis: inferioribus pinnatis. L. Jacq. Austr. t. 353.

In glareosis fluviorum, lacuumque oris, et ad vias: ad *Birsam*, ad *Lacus Thunensis* suprema littora; in viis publicis ab *Aventico*, in *Valesiam* usque. 1056. fl. Maj. Jun.

3. *R. phyteuma*, fol. integris trilobisque, calyc. maximis 6-partitis. L. Jacq. Austr. t. 152.

Sub molendino papyraceo pagi *Dardagny* in agris, et in *Rhodani* arenosis. 1057.

**244. EUPHORBIA.** (*Wolfsmilch.*) **G.**  
*pl. 832.*

Cal. 1-phyllus, ventricosus, 4-5-dentatus, subcoloratus; petala 4-5, crassa, margini calycis imposita; filamenta diverso tempore erumpentia; caps. 5-cocca.

a. *Umbella trifida.*

1. *E. peplus*, umbella trifida: dichotoma, involucellis ovatis, fol. integerrimis obovatis petiolatis. L. *Bull. t. 79. Fl. Dan.*  
*t. 1100.*

Ad margines hortorum, in vinctis, et agris.  
*t. 1049.*

2. *E. exigua*, umbella trifida: dichotoma, involucellis lanceolatis; fol. linearibus. L. *Oed. Dan. t. 592.*

In agris ethortis, exeunte æstate abunde. *t. 1048.*

(Var. fol. acutis et obtusis; petala lunata; caps. glabra.)

3. *E. falcata*, umbella trifida; dichotoma, involucellis subcordatis mucronatis; fol. lanceolatis obtusiusculis. L. *Jacq. Austr. t. 121.*

Circa Noviodunum. Lausannæ versus montem supra Pully. In campis circa Chexbres. In Valesia.

*Höpfn. Magaz. IV. p. 32.* Prope Sedunum inventam misit Schleicher.

b. *Umbella quadrifida.*

4. E. *lathyris*, umbella quadrifida : dichotoma ; fol. oppositis integerrimis. L. Bull. t. 103.

In Helvetia transalpina. Inter Bellitionem et Ossogne ad viam ; circa Crivola. Etiam Rupe. 1044.

(Tota glauca; petala bicornia, corniculis obtusis, fructus levis. Hall.)

c. *Umbella quinquefida.*

5. E. *segetalis*, umbella quinquefida : dichotoma ; involucellis cordatis acutis ; fol. linear-lanceolatis : superioribus latioribus. L. Jacq. Austr. t. 450.

Circa Siders in Valesia superiori inventam misit Schleicher.

6. E. *dulcis*, umbella quinquefida : bifida, involucellis subovatis ; fol. lanceolatis obtusis integerrimis. L. Jacq. Austr. t. 213.

Abunde circa Roche au Prépourry, aux Gages, a Echarpygny, en Jorogne. Bernæ in Engewald. Basileæ in M. Muteto etc. In valle Jurana abunde. 1051..

Amat montium umbrosa ; fl. Maj. Jun.

(*Folia subtiliter serrata; petala rotunda flava; fructus purpureus, asper.* *Hall.* *Et folia utrinque villosa vidi, caulemque villosum.* *S.*)

7. *E. paralias*, umbella subquinquefida: bifida; involucellis cordato-reniformibus; fol. sursum imbricatis. *L. Jacq. hort. t. 188.*

Ad vias totius Valesiæ (imo in subalpinis ad viam, qua a *Chemin neuf* descenditur ad *Aven.*) Aux isles de *Lavey*. Basileæ in sylva inter *Hüninguen* et *Michelfelden* etc. 1055.

(*Folia glauca, glabra, mucronata, inferiora minora linear-lanceolata; petala subrotunda, obtusa, integra; capsula glabra.*)

8. *E. helioscopia*, umbella quinquefida: trifida: dichotoma; involucellis obovatis; fol. cuneiformibus serratis. *L. Oed. Dan.* t. 725.

Ubique in hortis et ad vias. 1050.

(Fl. æstate.)

9. *E. verrucosa*, umbella quinquefida: subtrifida: bifida, involucell. ovatis; fol. lanceolatis, serratis, villosis; caps. verrucosis. *L.*

In agro Lemano, abunde circa *Grandchamp* supra molentinum; etiam circa Basileam, in montosis *Mutetæ*, et *S. Christianæ*; circa *Genvam*; reliquis tamen rario. 1052. Ad vias circa *Noville* invenit *Scleicher.*

10. *E. platyphyllos*, umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucell. carina pilosis; fol. serratis lanceolatis; caps. verrucosis. L. Jacq. Austr. t. 376.

Vulgo ad vias totius pene Helvetiae. 1053.

(Fl. Jul. Aug.)

11. *E. sylvatica*, umbella quinquefida: bifida, involucellis perfoliatis subcordatis; fol. lanceolatis integerrimis. L. Jacq. Austr. t. 375.

Ubique in sylvis et sepibus, locisque lapidosis. 1045.

(Floret vere, toto anno folia retinens; imo jam initio Februarii, circa montem Salevam et pontem Arve florentem vidi I. B. III. pag. 672.

Plures alii *Tithymali* huc pertinent, sed nolo hic me litibus immergere. Hall. Certe de *Amygdaloide* et *Characia* quæstio subit. q. vid. S.)

#### d. *Umbella multifida*.

12. *E. esula*, umbella multifida, bifida, involucellis subcordatis: petalis subbicoribus; ramis sterilibus; fol. uniformibus. L.

Basileæ ad Rhenum versus Haltingen. 1046.

13. *E. cyparissias*, umbella multifida: dichotoma, involucellis subcordatis, ramis sterilibus; fol. setaceis: caulinis lanceolatis. L. Jacq. Austr. t. 435.

Ad vias ubique, inque pascuis macilentis. 1047.

3. E. *degener*, fol. punctis croceis notatis in iisdem locis frequens, nonnisi varietas erit.  
14. E. *palustris*, umbella multifida: subtrifida: bifida, involucellis ovatis; fol. lanceolatis; ramis sterilibus. *Oed. Dan.* t. 866.

Frequens in paludosis littoribus fluviorum lente manantium: ad *Brojam* præalte; tum in pratis udis circa *Michelfelden*, *Roche* etc. 1054.

15. E. *characias*, umbella multifida: bifida, involucellis perfoliatis emarginatis; fol. integerrimis; caule frutescente. L.

In sylvis, sepibus locisque lapidosis. 1045.

(*Hallerus* cum E. *sylvatica* conjunxit; *Gesnerus* E. *Characiam* indigenam statuit, et ego E. *amgydaloidem* vix separassem. S.)

### D O D E C A G Y N I A.

245. SEMPERVIVUM. (*Hauswurz.*) G.  
pl. 837.

Cal. 12-fidus; petala 12; Caps. 12. extrorsum acuminatæ, introrsum dehiscentes, polyspermæ.

1. S. *tectorum*, fol. ciliatis, propaginibus patentibus. *Oed. Dan.* t. 601.

In Alpibus: in *Gotthardo*, *Steinenberg*; in rupibus vallis *Ursariæ*; in montibus, *Salanfe*, vallis *Kienthal*, *Lepontiæ* et *Tellinae*. Abunde circa *Branson* *Valesiæ*; etiam inter *Siders* et

*St. Leonhard*; supra *Biennam*; a *Fontanai* supra *Aquilejam*, semper in *rupibus*. Quod enim in tectis provenit, non debet pro spontaneo haberri. 949.

2. *S. globiferum*, fol. ciliatis, propaginibus globosis. L. Jacq. Austr. t. 40.

In alpibus, supra pagum *Ternanche*, trans montem *Sylvium* abunde. 950. et in *Pilato*.

(*Caulis calyxque hirsuti*, petala 12, flava, hirsuta, per oras ciliata. *Hall.* Invenit *Schleicher en descendant du Col du Mont-Cervin au Breuil. Saussure Voyages. T. VIII. pag. 208.*)

3. *S. arachnoideum*, fol. pilis intertextis, propaginibus globosis. L. Jacq. Austr. app. t. 42. *Barrel. ic. 591. 593. 594.*

Maxima copia ad rupes *Valesiae* circa *Branson*, ad exitum torrentis *le Trient*, versus *Sideram*, in arce *Tourbillon*, et ad omnes muros vallis *Ursariæ* usque ad *Wasen*. In Alpes etiam lapidosas ubique adscendit: *Fouly*, *Pra-pioz*, *Ovannaz*, *Wängenalp*, *Scheidek*, *Lau-terbrunn.*

3. Flore albo, et statura minori, foliisque brevioribus et latioribus. in M. *Sylvio*. 952.

(Telæ cum matura planta evanescunt. *Caulis viscidus*, flores magni purpurei. *Hall.*)

4. *S. hirtum*, foliis, caule, petalorumque apicibus hirtis. L. Jacq. Austr. t. 12.

In M. Steinberg, circa Sichellauwenen etc. et  
in Abbatiscellanis montibus. 949.

(*Hallero* est varietas *S. tectorum*; differt ta-  
men: statura humiliore, foliis dentatis, petalis  
6, albidis, quæ duodena et purpurascens in  
illo sunt. Male *Viri docti* Halleri plantam  
No. 951, ad hoc referunt, cum synonymon I.  
*Bauhini* " *Sedum latifolium floribus albicantis-*  
*bis*" III. pag. 689, ab *Hallero* citatum certis-  
sime ad *S. hirtum* spectet.)

5. *S. montanum*, sol. integerrimis; pro-  
paginibus patulis. L. Jacq. Austr. app. t. 41.

Abunde in Alpium saxis: in *Gotthardo*,  
*Gemmio*, *Speluga*; in valle Lepontina ad *Bel-*  
*litionem* usque, etc. 951.

(Caulis summus purpurascens; folia crassa,  
hirsuta, mucronata, mucrone purpureo; petala  
9, purpurea. S.

6. Floribus late incarnatis: prope *Lacunz*  
*Engstlanum*. Scheuchz. It. Alp. pag. 49.

*Classis. XII.*

## ICOSANDRIA.

## MONOGYNIA.

245. CACTUS. (*Stachelfeige.*) G. pl.  
838.

Cal. 1-phyllus, imbricatus, superus; petala numerosa: interiora majora conniventia, exteriora breviora patula; stylus longitudine staminum; bacca oblonga, 1-locularis, umbilicata, polysperma.

C. *opuntia*, articulato-prolifer laxus: articulis ovatis; spinis setaceis. L.

Pro Americana planta vulgo habetur; provenit autem in rupibus Valesiae supra Boveret et Vauvry, et in monte Veche, quinque leuis a Lugano. 1099.

247. PHILADELPHUS. (*Pfeifenstrauch.*)  
*G. pl. 840.*

Cal. 4-5-partitus, superus; petala 4-5, subrotunda patentia; caps. ovata, utrinque acuminata, 4-5-locularis; semina numerosa, margini dissepimentorum incrassato affixa.

*P. coronarius*, fol. subdentatis. L.

Passim in sepibus. 1100.

248. PUNICA. (*Granatenbaum.*) *G.*  
*pl. 847.*

Cal. 5-fidus, superus; petala 5-6, calyci inserta; pomum multiloculare, polyspermum.

*P. granatum*, fol. lanceolatis; caule arboreo. L.

*Seduni* in rupibus arcis *Valeriæ*, olim forte casu eo delata. 1098.

249. AMYGDALUS. (*Mandelbaum.*) *G.*  
*pl. 848.*

Cal. 5-fidus, inferus; petala 5, ovata, obtusa, calyci inserta; drupa nuce poris perforata.

*A. communis*, fol. serraturis infimis glandulosis; flor. sessilibus geminis. L.

In sepibus circa *Gonthey* et *Saillon* *Valesiæ*, inque pratis. 1078.

Etiam in *Valle d'Aoste*, sub *M. St. Bernhard.* *Addend.* pag. 187.

250. PRUNUS. (*Pflaumen, Kirschenbaum.*) G. pl. 849.

Cal. 5-fidus, inferus; petala 5, subrotunda, patentia; filamenta 20-30; drupæ nux suturis prominulis.

1. *P. padus*, flor. racemosis; fol. deciduis, basi subtus biglandulosis. L. *Oed. Dan.* t. 205.

In sepibus non rara: Bernæ-im *Sulgenbach*, circa *Wabern*. In valle des *Ormonts* et aliis subalpinis. In montanis aux *Brenets* a *Goudeba*. Basileæ versus *Riehen*; circa *Münchenstein*, *Muttenz* etc. (*Tobinii*) 1086. fl. Maj. Jun.

2. *P. mahaleb*, flor. corymbosis terminalibus; fol. ovatis. L. *Jacq. Austr.* t. 227.

Nihil frequentius in subalpinis et submontanis; in agro Aquilejensi ubique ad rupes; sic *Biennæ*; prope balneum *Flühen* etc. 1084. fl. vere.

3. *P. cerasus*, umbellis subpedunculatis; fol. ovato-lanceolatis glabris conduplicatis. L.

In colle super *Portvaley*, maxima copia. A *Champel* et St. *Jean* prope *Genevam*. 1083.

4. *P. avium*, umbellis sessilibus; fol. ovato-lanceolatis, subtus pubescentibus, conduplicatis. L.

In sylvis, sepibus et triviis ubique. 1082. fl. Majo.

5. *P. domestica*, pedunc. subsolitariis; fol. lanceolato-ovatis, convolutis; ramis muticis. L.

In sepibus minime rara. 1079. fl. Apr. Maj.

6. *P. insititia*, pedunc. geminis; fol. ovatis subvillosis convolutis; ramis spinescentibus. L.

Au Torrent, et a Cormoret prope Courte-lury (in episcopatu olim Basileensi.) 1081.

7. *P. spinosa*, pedunc. solitariis; fol. lanceolatis glabris; ramis spinosis. L. Fl. Dan. t. 926.

Frequens ad sterilia viarum, et in sepibus. 1080. fl. Apr. Majo.

### D I G Y N I A.

251. CRATAEGUS. (*Hagedorn.*) G. pl. 854.

Cal. 5-fidus, concavo-patens; petala 5; bacca infera, subrotunda, carnosa, umbilicata, 2-sperma.

1. *C. aria* (Mehlbaum), fol. ovatis, incisis, serratis, subtus tomentosis. L. Oed. Dan. t. 502.

In dumetis subalpinis et submontanis perfruens; etiam in monte Muteto.

$\beta$ . foliis semipinnatis. Au Creux du Vent, a la Ferriere, et apud Neocomenses. 1089.

2. *C. terminalis*, fol. cordatis septangulis: lobis infimis divaricatis. L. Jacq. Austr. t. 443.

Passim in sepibus: frequens circa Roche, aux Gauges; in monte Falconario. Basileæ versus Gundeldingen, in M. Muteto et Münchenstein. Circa Tigurum. Inter Linieres et Neufchatel, et circa eam urbem. 1088.

3. C. oxyacantha, fol. obtusis subtrifidis serratis. L. Oed. Dan. t. 654.

Ubique ad sepes.

β. non spinosa: Agauni, a la Porte du Sex. 1087.

γ. maxima, ad 10 pedes et ultra: ad ripam Rheni posterioris, haud procul a balneo Rothen-Brunn. Scheuchz. It. Alp. pag. 90.

4. C. azarolus, fol. obtusis subtrifidis subdentatis. L.

Hic est forsitan Chamæcerasus, quem in Monte Generoso Gesnerus invenit. Folia sunt quidem aceris campestris, fructus Ceraso saltem similis; sed ignorabat magnus Hallerus. No. 1085, ut nihil restet nobis, nisi iter in M. Generosum, ad investigandam veritatem.

5. C. monogyna, fol. acutis subtrifidis serratis glabris; flor. monogynis; pedunc. calyeibusque subpubescentibus; calycinis segmentis lanceolatis acuminatis. W. Jacq. Austr. t. 292. f. 1.

Schleicher misit inventam.

## TRIGYNYA.

252. SORBUS. (*Speierling.*) *G. pl.* 855.

Cal. 5-fidus; petala 5; bacca infera, mol-  
lis, globosa, umbilicata, 3-5sperma.

1. *S. aucuparia*, fol. pinnatis, utrinque  
glabris. L. *Fl. Dan.* t. 1034.

In sylvis abunde. 1091. fl. Maj. Jun.

2. *S. domestica*, fol. pinnatis, subtus  
villoso. L. *Jacq. Austr.* t. 447.

Non vulgaris. Circa arcem *Münchenstein*,  
*Ouchy*; in sylvis inter *Muttenz* et *Gemper*, et  
circa *Ramstein*. 1092.

## PENTAGYNYA.

253. MESPILUS. (*Mispeln.*) *G. pl.* 857.

Cal. 5-fidus; petala 5; bacca globosa,  
umbilicata; calyce connivente subclausa;  
semina 3-5, ossca, gibba.

1. *M. germanica*, inermis; fol. lanceola-  
tis, subtus tomentosis; flor. sessilibus, soli-  
tariis. L.

In dumetis circa Bernam; in dumetis insulæ  
*St. Petri*, lacus Biennensis. Neocomi, entre  
les maisons du *Plan*. 1094.

Fl. Apr. Majo.

2. *M. amelanchier*, fol. ovalibus, apice  
serratis, basi integris, junioribus subtus to-

mentosis, adultis utrinque glabris; racemis terminalibus. S. Jacq. Austr. t. 300.

Frequens, montanorum hospita et subalpinorum: trans sylvam la Chenau versus Chamoiseire, circa torrentem Tantin. In colle Soquenil prope Rupem. In M. Falconario; in ascensu M. Hauenstein supra Balstall, et circa Falkenstein; circa Reichenstein et Landskron etc. Neocomi à la Rochelle. Inter Tusis et Chur. 1095.

(Arboris non obliviscor, cuius fructus coeruleo-nigricantes dulcesque, sitienti et esuriensi, ad alpinam viam Chemin Neuf, maximæ deliciæ erant.)

3. M. *chamæ-mespilus*, inermis; fol. ovalibus acute serratis glabris; flor. corymboso-capitatis. L. Jacq. Austr. t. 231.

In alpinis ubique; frequens in Aquilejensibus. Etiam in montanis, ut in M. Botrod, qua ad cacumen Dolæ adscenditur, in M. Thuiry, Falconario, Chasseralle. 1090.

(Folia dura, constanter subtus pallida; flos rubellus; fructus niger, edulis. Hall.)

4. M. *cotoneaster*, inermis; fol. ovatis integerrimis, subtus tomentosis. L. Oed. Dan. t. 112.

Vulgo in lapidosis, ad pedes Juræ et alpium; In M. Albiæ et Badae. Supra Biennam, ad

pèdem arcis *Falkenstein*; in M. *Wasserfalle*,  
*Grandvi*, *Saleva*, circa *Roche* etc. 1093.

(Flores laterales, cernui. Baccæ rubræ, insipidæ. Semina 3. *Hall.*)

**254. PYRUS. (*Birnbaum.*) G. pl. 858.**

Cal. 5-fidus; petala 5; pomum inferum,  
5-loculare, polyspermum.

1. *P. communis*, fol. ovato-lanceolatis  
serratis lævibus; flor. corymbosis. S.

In arvis et sylvarum oris. 1096.

2. *P. malus*, fol. ovatis serratis acuminateis,  
subtus hirsutis; umbellis sessilibus. S.

In sylvarum oris, et per arva. 1097.

**255. SPIRAEA. (*Spierstaude.*) G. pl.  
862.**

Cal. 5-fidus; petala 5; caps. acuminatae,  
bivalves; semina pauca, parva, acuminata,  
suturae internae affixa.

1. *S. aruncus*, fol. supradecompositis;  
spicis paniculatis; flor. dioicis. L.

In sylvis umbrosis non rara. Bernæ in sylvulis ad Arolam, sub *Wabern*. In adscensu montis *Pinzberg* prope *Burgdorf*. Ad sepes inter *Belmont* et *Herblingen*. Circa *Wasen Uriorum*. etc. etc.

(Tobinii am *Weissenberg*) 1134.

2. *S. filipendula*, fol. interrupte pinna-

tis : foliolis linear-lanceolatis, interrupte serratis glaberrimis, flor. cymosis. L. Oed. Dan. t. 635.

Paulo infrequentior. Basileæ supra Münchenstein; qua itur ad Gempenweyd. In der Rænkismatt. ib. Circa Aigle et Roche in pratibus udis, sic in Valesia circa Gonthey. Prope Neocomum au Mail, in Valle Motier Travers etc. 1136.

3. S. ulmaria, fol. interrupte pinnatis: foliolis ovatis biserratis subtus canis, flor. cymosis. L. Oed. Dan. t. 547.

Ubique ad aquas, fossas, et in humidis pratibus. 1135. fl. Jun. Jul. sic priores.

### P O L Y G Y N I A.

256. ROSA. (*Rose.*) G. pl. 863.

Cal. 5-fidus, urceolatus; carnosus, collo coarctatus; petala 5, calycis collo inserta; semina numerosa, hispida, calycis interiori lateri affixa.

1. R. eglanteria, germinibus globosis, pedunculisque glabris; caule aculeis sparsis rectis; petiolis scabris; foliolis acutis. L.

In sepibus circa Lassaraz. 1103.

(Flores flavi; folia odoratissima. Conjungit Hallerus cum sequente.)

2. R. rubiginosa, germin. globosis petio-

lisque aculeatis; aculeis recurvis; fol. subtus rubiginosis. L. Jacq. Austr. t. 50.

Non rara in Helvetia planiori: circa *Roche*, au *Tombey*, circa *St. Tryphon*, *Lassaraz*, supra *Biel* et *Crassy*, circa *Ferriere*. Basileæ versus *St. Louis*. Etiam in alpes ascendit circa *Geschinen*. 1103.

(Flores exigui, incarnati, odore quasi pomorum. Hall.)

3. R. *cinnamomea*, germin. globosis, pedunculisque glabris; caule aculeis stipularibus; petiolis subinermibus. L.

Omisit *Hallerus* plantam a *Gesnero* jam in monte *Albio* inventam, I. *Bauh. H. P.* II. pag. 39. Nascitur etiam circa *Lausannam* supra *Pully*, in loco, *Rosiaz* dicto; et flore pleno multis in locis agri *Leniani*; sed male pro nova habetur in *Höpfn. Magaz.* IV. p. 33.

(Caules rubri; folia sexjuga, sature viridia, subtus glabra; petala rubra, unguibus albis. *Scopoli Carn.* 605.)

4. R. *arvensis*, germin. oblongis pedunculisque scabris: calycis foliolis subpinnatis; caule petiolisque aculeatis; fol. septen- nis glabris. S.

Ad sepes, Bernæ, Basileæ, *Tobinii* etc. 1102.

(Planta I. *Bauhini*, a *Hallero* citata. utique.

arvensis est, cur novam faciunt in Höpfn. Mag. IV. p. 33?)

5. *R. montana*, germin. oblongis pedunculisque hispidis; fol. septenis subrotundis, glabris; caule petiolisque aculeatis. S. Vill. Delph. T. III. p. 547.

Circa Servan inventam misit Schleicher, et hæc erit Rosa, quam in montibus Aquilejensibus invenerant, inque valle Praborgne, inter pontem Diaboli et Steg etc. in Höpfn. Mag. l. c. (aculei recurvi.)

6. *R. pimpinellifolia*, germin. globosis pedunculisque glabris; caule aculeis sparsis rectis; petiol. scabris; foliol. obtusis. L.

7. *R. spinosissima*, germin. globosis glabris; pedunc. hispidis; caule petiolisque aculeatissimis. L. Oed. Dan. t. 398.

Hallerus has duas conjungit, et jure. Proveniunt abunde circa Roche, supra les Gauges, en Planfavey. Neocomi supra Pierabot. Auf der Sissacher Flüh. In monte Chasseralle. Au petit Saleve. 1106.

8. *R. villosa*, germin. globosis, pedunculisque hispidis; caule aculeis sparsis; petiol. aculeatis; fol. tomentosis. L.

Montana: in agro Aquilejensi, in Valesia, um das Heilbad, circa Ferrière; et locis humidis in alnetis circa Basileam. 1105.

9 *R. gallica*, germin. ovatis pedunculisque hispidis; caule petiolisque hispido-aculeatis. L.

Genevæ circa castellum l'Abbatie, et inter Genevam et Trenei. I. Bauh. II. 35. « *Rosa sylvestris rubella*. »

(Frutex humilis; folia subrotunda, quina, raro septena, *glabra*, superne obscurius virentia; flores incarnati, jucundissimi odoris. I. B. *Hallerus* cum sequente conjungit. 1104.

Invenit etiam Schleicher in pratis prope Servan.)

10. *R. pumila*, germin. ovatis petiolis pedunculisque hispidis; caule superne aculeatissimo. L. Jacq. Austr. t. 198.

Genevæ invenit Saussure. 1104. in Addend. pag. 188.

(Frutex humilis; caulis infimus raro spinosus; aut nunquam; superne spinis horridus; flores intense carnei; calyx pilis fuscis. Hall. et I. B. *Rosa pumila* II. pag. 35. ex Clusio et *R. austriaca* eadem est.)

11. *R. pyrenaica*, germin. ovatis pedunculisque hispidis coloratis; petiolis hispido-aculeatis, calyc. foliosis. Gouan. ill. t. 19.

Schleicher invenit.

12. *R. alpina*, germin. ovatis glabris; pedunculis petiolisque hispidis; caule inermi. L. Jacq. Austr. t. 279.

In rupibus subalpinis et montanis abunde. In M. *Grandvi Dolaz*; inter M. *Wasserfall* et *Vogelberg*. A la *Dent versus le Pont*, et in M. *Thuiry*. In M. *Luan*; in montis *d'Ansex* gypsariis rupibus. A la *Combe Biosse*, et *Combe de Valanvron*. 1107. Et ego inveni ad viam alpinam, qua itur ex sur *Champ a la Varaz*, Augusto florentem.

(Folia septena et novena, ovalia, (subinde lanceolata) glabra, argute serrata; petioli spinis rarissimis innoxiiis; flores solitarii, magni, purpurei, odori. S.

R. *lagenaria Villarsii*, quam Schleicher in Catal. p. 58. inter *novas* ponit, ab hac non diversa videtur, ut ex specimine video in Vallesia superiore invento; habet folia paullo minora et rotundiora.)

13. R. *canina*, germin. ovatis pedunculisque glabris; caule petiolisque aculeatis. L. Fl. Dan. t. 555.

In sepibus et dumetis vulgatissima. 1101.

B. foliis glaucis rubedine tinctis, floreque rubro, a Scheuchzero. It. Alp. p. 518, et Hallerio in ipso pago *Grindelwald*, et a La Chenal in alpinis pascuis lecta, est R. *rubrifolia Villarsii Delphe*, et nonnisi species caninæ.

(Schleicher etiam in montanis invenit.)

14. R. *collina*, germin. ovatis sere gla-

bris; pedunc. petiolisque glanduloso hirsutis; caule aculeato. *Jacq. Austr.* t. 197.

*Schleicher* invenit aux Plans.

257. RUBUS. (*Brombeere.*) *G. pl.* 864.

Cal. 5-fidus: laciniis oblongis patentibus; petala 5, erecto-patentia; bacca composita ex plurimis acinis in capitulo convexo inter se cohærentibus, monospermis.

a. *Frutescentes.*

1. *R. idæus*, fol. quinato-pinnatis ternatisque; caule aculeato; petiol. canaliculatis. *L. Oed. Dan.* t. 788.

Abunde in sylvis cæduis et collibus, (dumentisque.) 1108.

*β.* non spinosus: circa rivum *Glasbach.*

2. *R. cæsius*, fol. ternatis subnudis, lateralibus bilobis; caule aculeato tereti. *L. Bull.* t. 381.

In agris declivibus et fossarum aggeribus. In agro Aquilejensi etiam ad vias, murosque vinearum. 1110.

3. *R. fruticosus*, fol. quinato-digitatis ternatisque; caule petiolisque aculeatis. *L. Fl. Dan.* t. 1163.

Nihil frequentius in sylvis. 1109.

4. *R. tomentosus*, fol. ternatis acutis inæ-

qualiter dentatis utrinque tomentosis, lateralibus subincisis. *Willd.*

In Valesia *Schleicher* invenit.

5. *R. glandulosus*, fol. ternatis mollibus hirsutis : foliolis ovatis serratis; caule petiolis pedunculisque aculeatis hirsutis. S. *Schleicher* invenit aux *Plans*, misitque nomine *R. glandulosi Bellardi*.

(*Folia etiam habent aculeos subtus in nervis.*)

### b. *Herbaceus.*

6. *R. saxatilis*, fol. ternatis nudis; flagellis reptantibus herbaceis. L. *Oed. Dan.* t. 134.

In alpium sylvosis et ad vias asperas dumosas. A la *Chenau* supra *Aquilejam*, ultra *Panex*; supra les *Plans*, ad viam in *Lauterbrunnen*. In montibus Vallis *Enniæ* ultra *Tschangnau*; in M. *Fracto*; ad radicem M. *Titlisberg*, et circa *Thermas Fabarias*. Etiam in montanis: *Thuiry*, *Motier Travers*, *Chasseralle* etc. 1111.

## 258. FRAGARIA. (*Erdbeere.*) G. pl. 865.

Cal. 10-fidus; petala 5; receptaculum seminum ovatum, baccatum, deciduum.

1. F. *vesca*, flagellis reptantibus. L.

In omnibus sylvis, inque collibus apricis.

β: quæ crepitum edit, dum fructus decer.

pitur (Knallbeere): au bois de la *Ferriere*;  
*Combe de Valanvron.* 1112.

γ. absque flagellis: *Biennæ*, in calidis petrosis Juræ. *Addend.*

2. *F. sterilis*, caule decumbente; ramis floriferis laxis. L.

Ad oras viarum steriles, circa *Bernam*, *Roché* etc. 1113.

259. POTENTILLA. (*Fingerkraut.*) G.  
*pl.* 866.

Cal. 10-fidus: laciniis alternis minoribus reflexis; petala 5; stamina raro a numero 20 recendentia; semina subrotunda nuda, receptaculo parvo exsucce affixa.

a. *Foliis pinnatis.*

1. *P. anserina*, fol. piunatis serratis: caule repente; pedunc. unifloris. L. *Oed. Dan.* t. 544. *Bulliard* t. 157.

Vulgo ad vias paulum humectas, et ad fossas. 1126.

2. *P. multifida*, fol. bipinnatis: segmentis integerrimis distantibus subtus tomentosis; caule decumbente. L.

Circa rupes glaciales montis *Stock*, qui ad vallem St. *Nicolai* pertinet. 1125. *Schleicher* in M. *Sylvio* inventam misit.

(Folia radicalia longe petiolata, septena, novena; flores terminales, calycis exteriora segmenta ovato-lanceolata, interiora gracilia; petala lutea, profunde cordata. *Hall.*)

3. *P. rupestris*, fol. pinnatis ternatisque; caule erecto; flagellis nullis. L. Jacq. Austr. t. 114.

Non vulgatissima. Secundum semitam ab arce *Hermitage* ducentem ad montem le *Petit Saleve*, prope arcem. A *Gentou*. In valle *Servant Valesiae*, versus montem *Salanfe*; in valle *Praborgne*. In sylva *Schæren*. 1127.

(Folia radicalia septena, caulina quina, tereta; calycis segmenta alterna perparva, majora tridentata; petala alba. *Hall.*)

4. *P. supina*, fol. pinnatis: foliolis oblongis profundè dentatis; caule decumbente dichotomo; pedunc. axillaribus solitariis. W. Jacq. Austr. t. 406.

*Schleicher* invenit.

### b. Foliis digitatis.

5. *P. recta*, fol. septenatis lanceolatis serratis utrinque subpilosis; caule erecto. L. Jacq. Austr. t. 583.

In monte *Follatel* inter *Branson* et *Ellé*: in summo districtu *Decuriæ Gomsch*, et circa *Chiavennam*. 1121.

(*Folia septena et quina ; flores corymbosi ; petala sulphurea cordata. Hall.*)

6. *P. argentea*, fol. quinatis cuneiformibus incisis subtus tomentosis ; caule erecto.  
L. *Oed. Dan.* t. 865.

Ad vias siccas, et in muris frequens. 1124.

7. *P. verna*, fol. radicalibus quinatis acute serratis retusis ; caulinis ternatis ; caule declinato. L. *Allioni Ped.* t. 24. f. 2.

Vulgo ad vias. 1119.

$\beta$ . fol. omnibus terratis.

$\gamma$ . petalis maculatis.

(Huc pertinet etiam *P. filiformis*, *Villars* quam *Schleicher* etiam invenit.)

8. *P. rubens*, fol. radicalibus cuneiformibus quinatis subtus et margine pilosis, caulinis ternatis ; caule adscendente rubente. S. *Allioni Ped.* 1486.

In monte *Servin* vallis D. *Nicolai* inventam misit *Schleicher*.

(*Folia viridia ; caulis satis crassus a medio ad summum totus rubet. Priori valde affinis est.*)

9. *P. opaca*, fol. radicalibus septenatis et novenis pilosis subtus incanis : foliolis cuneiformibus inciso-serratis ; caulis filiformibus pilosis decumbentibus. S. *Jacq. ic. rar.* 1. t. 91.

In collibus, montosis et Alpinis.

(*Hallerus a verna* non separat. Hujus loci sunt *Quinquefolia*. 3. 4. 6. C. B. in *Pin.* et 3. in *Prodr.* p. 139. et *Pentaphyllum* parvum hirsutum. I. B. Hist. pag. 398.

Dissert adhuc a *verna* « petiolis rubentibus longiusculis et molliter pilosis; a "rubente" caule minus crasso et magis piloso.)

10. *P. dubia*, sol. hirsutis: radicalibus quinatis et septenatis longissime petiolatis, caulinis ternatis lanceolato-stipulatis: foliolis cuneiformibus inciso-serratis; petiolis pilosis incrassatis; caule adscendente compresso hirsuto multifloro. S.

Bernæ in glareæ fodinis; circa *Fouly*; in Mont. *Joux*, *Verte*, *Gemmio*. 1120.

(Hanc dubiam voco, quamvis non ignotam; ad *P. intermediate*, *hirtam*, valde, imo proxime accedit, diversa tamen est. Inter plures comparatas plantas, *P. salisburgensis* *Haenke* *Jacq.* ic. rar. 3. t. 490. ei sola convenit. Eam pluries in *Jura* inveni; et misit nuper *Schleicher* nomine: *Pot. intermediate*. Aegre eam *Hallerus a verna* separat.)

11. *P. aurea*, sol. radicalibus quinatis apice serratis pilosis margine sericeis, caulinis ternatis; caule declinato. S. *Oed. Dan.* t. 114. *Hall.* t. 21.

In alpinis ubique; etiam in montanis *Chasseralle*, *Tête de rang*, *Dolaz* etc. 1122.

12. *P. alba*, fol. quinatis, apice conniventis-serratis, subtus sericeis: foliolis oblongis; caulis filiformibus procumbentibus; receptac. hirsutis. S. Jacq. Austr. t. 115.

In australi parte sylvæ des *Prangins* circa *Nyon*. Höpf. Magaz. IV. p. 33.

*Schleicher* invenit in pratis siccis prope *Locarno*.

(Radix crassiuscula nigricans; folia superne viridia glabra, subtus denso sericeo villo splendentia; petioli caule plerumque longiores. *Hallerus* cum sequente conjungere videtur, et C. B. jam invenerat in saxosis circa *Curiam Rhætorum*. Prodr. pag. 139. No. 2.)

13. *P. caulescens*, fol. quinatis, apice serratis, utrinque incanis, foliolis subcuneiformibus; caulis multifloris decumbentibus; receptaculis hirsutis; petalis oblongis. S. Jacq. Austr. t. 220.

Frequens in agro Aquilejensi et Valesiæ; prope *Roche*, in muris *Agäuni*; au *Chemin neuf* inter *Diableret* et *Aven*, inter *Salges* et *Innen* Valesiæ. Ad lacum *Rivarium*, versus *Sargans* etc. In *Abbatiscellanis* Alpibus *beym wilden Kirchlein* etc. 1123.

(Differt adhuc a præcedente: radice multo crassiore; foliolis apice profundius incisis: den-

tibus 3-8, non oblongis sed s<sup>æ</sup>pe cuneiformibus; caulis altioribus, et magis multifloris. *P. clusiana*, quae non nisi petalis subrotundis differt, non separari debet.)

14. *P. reptans*, fol. quinatis hirsutis serratis; caule repente; pedunc. unifloris. S. *Fl. Dan.* t. 1164.

Ubique ad vias. 1118.

### *c. Foliis ternatis.*

15. *P. norvegica*, fol. ternatis; caule dichotomo; pedunc. axillaribus. L. *Oed. Dan.* t. 171.

In summis alpibus, circa templum *Jovis Pennini*. 1115. In alpibus montis *Sylvii*. *Alioni Ped.* 1488.

(Omnium humillima: folia serrata, hirsuta; flores pauci lutei, calyce paulo maiores. *Hall.* Inventa etiam circa Lacum *Lioson*. *Etrennes Helvetiennes*. Anni 1797.)

16. *P. nivea*, fol. ternatis incisis subtus tomentosis; caule adscendente. L.

*Thomas* invenit in M. *Sylvio*; *Schleicher* in monte *Lötscherberg*.

(Folia subtus dense tomentosa, superne viridia, circumserata; caules subnudi purpurascentes subtomentosi; flores lutei; pedunculi uniflori tomentosi.)

17. *P. grandiflora*, fol. ternatis dentatis utrinque subpilosis; caule decumbente foliis longiore. L. Hall. t. 21.

Alpina: aux *Essuyeres*, *Martinets*, *Fouly*; ultra *Enzeindaz*, in *M. Simplon*, *Braulio*, *Gotthardo*; inter *Urseren* et *Realp*; ad lacum *Sylvæ* planæ. 1114.

(Caulis erectus; folia subrotunda crenata; flores flavi calyce villoso multo maiores.)

260. TORMENTILLA. (*Blutwurz.*) G.  
pl. 866.

Cal. 8-fidus; petala 4, obcordata; semina 8-20 subrotunda, nuda, receptaculo parvo affixa.

*T. erecta*, caule erectiusculo; fol. sessilibus. L. Oed. Dan. t. 598.

In pascuis udis, sylvis et alpibus. 1117.

261. GEUM. (*Benediktenkraut.*) G.  
pl. 867.

Cal. 10-fidus, laciniis alternis minimis; petala 5; semina hispida stylo longe aristata.

i. *G. rivale*, flor. nutantibus; fructu oblongo; aristis plumosis tortis. L. Oed. Dan. t. 722.

Abunde ad rivos, v. gr. Bernæ inter duo balnea, ad rivum qui urbem adluit cis Holligen etc. Etiam in montanis et alpinis. 1129.

2. *G. urbanum*, flor. erectis, fruct. globosis villosis; aristis uncinatis nudis; fol. lyratis. L. *Oed. Dan.* t. 672.

Frequens ad sepes: inque sylvis. 1130.

3. *G. montanum*, flore inclinato solitario; fructu oblongo; aristis villosis erectis. L. *Jacq. Austr.* t. 373.

In omnibus pascuis alpinis, non tamen in Jura. 1131.

4. *G. reptans*, fol. uniformibus incisis: alternis minoribus; flagellis reptantibus. L. *Jacq. Austr.* app. t. 22.

Passim in Aquilejensibus alpibus, in *Audon*, *Prapioz*, *Enzeindaz*, *Javernaz*, *Chaux commun*. In M. *Fouly*, *Serin*, *Simplon*, *Schönbühl*. In montibus vallis *Kienthal*. In *Galanda*. 1132.

(Caules foliis paulo longiores; flos maximus flavus.)

5. *G. hybridum*, flore nutante; calyce folioso, corollam polypetalam excedente. L.

Circa Thermas Leucenses; in montibus Aquilejensibus, et im *Oberland*. *Höpfn. Magazin.* IV. pag. 33.

## 262. DRYAS. *G. pl.* 868.

Cal. 6-10-fidus, æqualis; petala 5-8 patentia: semina stylis longissimis lanigeris instructa.

D. octo-

*D. octopetala*, octopetala; fol. oblongis, crenatis, basi cordatis, subtus tomentosis; pedunc. nudis unifloris. S. *Oed. Dan.* t. 31.

In omnibus alpibus, etiam in Montibus; *Falconario, Mole, Hengst, Dent de Vaulion* etc. 1133.

263. COMARUM. G. pl. 869.

Cal. 10-fidus maximus patens coloratus, lacinis alternis minoribus; petala 5, calyce triplo minora; receptac. ovatum carnosum maximum persistens.

*C. palustre*, caule adscendente; fol. inferioribus septenis quinisve, superioribus ternatis; pedunculis axillaribus 1-2 floris pubescentibus. S. *Oed. Dan.* t. 686. *Hofm.* *Germ.* fig.

Frequens in palustribus: Bernæ ultra *Pümpfli* in torfaceis, in paludibus sylvæ *Bremgarten*, inter vias ad *Neubrük* et ad *Hasli*. In torfaceis *Gümlingensibus*, circa *Löhr* etc. 1128.

---

*Classis. XIII.*

## POLYANDRIA.

## MONOGYNIA.

A. *Tetrapetali.*

264. CAPPARIS. (*Kapern.*) *G. pl. 876.*

Cal. 4-phillus, coriaceus : petala 4, obtusa ; patentia ; stamina filiformia ; bacca corticosa, 1-locularis, pedunculata.

*C. spinosa*, fol. ovatis alternis integerrimis ; pedunc. lateralibus solitariis nudis unifloris ; stipulis spinosis ; caps. ovalibus. S.

In petris insularum *Borromearum.* 1077.

265. ACTAEA. (*Christophskraut.*) *G. pl. 877.*

Cal. 4-phillus caducus, petala 4, utrinque acuminata, caduca ; bacca 1-locularis ; semina semiorbiculata gemino ordine incumbentia.

*A. spicata*, racemo ovato; fructibus bac-  
catis. L. *Oed. Dan.* t. 498.

Passim in sylvis umbrosis; in fossa arcis  
*Burgdorf*, supra *Doffen*, in sylva sub *Wabern*;  
in Montis *Muteti* adscensu etc. 1076.

**266. CHELIDONIUM. (*Schöllkraut.*) G.**  
*pl. 880.*

Cal. 2-phillus; petala 4, patentia; sili-  
qua cylindracea; receptaculum lineare, in-  
ter valvulas suturæ instar circumambiens.

1. *C. majus*, pedunc. umbellatis. L. *Oed.*  
*Dan.* t. 542.

In ruderatis et ad sepes ubique. 1059.

2. *C. glaucium*, pedunc. unifloris; fol.  
amplexicaulibus sinuatis; caule glabro. L.  
*Oed. Dan.* t. 585.

Ad Lacum Neocomensem, tum ad officinas  
lateritias versus *Grandson*, tum ad extremas  
*Allées de Colombier*. 1060.

**267. PAPAVER. (*Mohn.*) G. *pl. 881.***

Cal. 2-phillus, caducus; petala 4; stigma  
peltatum planum radiatum; caps. 1-locula-  
ris, sub stigmatis corona foraminibus plu-  
rimis dehiscens.

1. *P. argemone*, caps. clavatis hispidis;  
caule folioso multifloro. L. *Oed. Dan.* t. 867.

In agris versus *Liebek*, *Kulm*, *Gundischwyl*;  
circa *Sion*; *Regensberg*, *Altschweyler*. 1061.

2. *P. alpinum*, caps. hispida; scapo unifloro nudo hispido; fol. bipinnatis. L. Jacq. *Austr.* t. 83.

In *Pilato*; abunde inter lapides deciduos en *Pierre plate* supra *Portvaley* e regione *Roche*. 1062.

(A *P. nudicauli*: fol. simplicibus pinnatosinuatis, floreque flavo odorato — *Hallerus* non videt, qui differat.)

3. *P. rhoeas*, caps. glabris globosis; caule piloso multifloro; fol. pinnatifidis incisis. L.

In agris ubique. 1064.

(Caulis pili patuli.)

4. *P. dubium*, caps. oblongis glabris; caule multifloro setis adpressis; fol. pinnatifidis incisis. L. Jacq. *Austr.* t. 25.

Passim inter segetes, minus tamen frequens.  
Inter *Biennam* et *Bonneville* ad viam; inter *Hindelbank* et *Kirchberg*, circa *Bipp*, *Tobinium*. Basileæ in ipso vallo Petrino. 1063.

(Caulis inferne setis patulis, superne adpressis; petala minora quam *rhaeadi*.)

5. *P. somniferum*, calyc. capsulisque glabris; fol. amplexicaulibus incisis. L.

Passim ad vias et in ruderatis. 1065.

B. *Pentapetalii.*

268. TILIA. (*Linde.*) *G. pl.* 894.

Cal. 5-partitus coloratus deciduus; petala 5; caps. globosa coriacea 5-locularis, 5-valvis, basi dehiscens.

1. *T. grandifolia*, fol. cordatis acuminatis serratis subhirsutis; fructu 4-loculari.  
*Ehrh. arb.* 8.

Circa *Köniz*, in *M. Muteto*. 1030.  $\alpha$ .

(Var. fructu pentacocco cirea *Aigle.*)

2. *T. parvifolia*, fol. cordatis acuminatis inæqualiter serratis; fructu 5-loculari.  
*Ehrh. arb.* 36.

In sylvis. 1030.  $\beta$ .

(Folia glabra.)

269. CISTUS. (*Cistrose.*) *G. pl.* 915.

Cal. 5-phyllus, foliolis 2 minoribus; petala 5 subrotunda; caps. 1-10-locularis, calyce tecta.

a. *Exstipulati.*

1. *C. salvifolius*, arborescens exstipulatus; fol. ovatis petiolatis utrinque hirsutis.

*L. Clus. Hisp.* pag. 141. fig.

*Chiavennæ* in rupibus, circa *Ripam*. 1031.

(Folia rugosa opposita, pedunculi longi uni-

flori ; flos flavus in nostris. *Hall.* Sic et in meis a *Schleicher* missis.)

2. *C. fumana*, suffruticosus exstipulatus procumbens ; fol. alternis linearibus margine scabris ; pedunc. unifloris. *L. Jacq. Austr.* t. 252.

Locis calidis et lapidosis: circa *Montcharan*, *Fontaney*, *Tombey*, *Bex*, *Yvorne* etc. Frequens in Valesia circa *Varonne*. 1032.

3. *Erectum* seu *C. calycinum Linnæi*, inventum *Scheuchzerus* in *Gotthardi jugis*. *It. Alp.* pag. 337.

5. *C. canus*, suffruticosus exstipulatus procumbens, fol. oppositis obovatis villosis subtus tomentosis ; flor. subumbellatis. *Jacq. Austr.* t. 277.

Erat in Catalogo *Scheuchzeri*. *Hall.* ad. 1035.

(An vere differt a. *C. marifolio*?)

4. *C. marifolius*, suffruticosus exstipulatus ; fol. oppositis lineari-oblongis, superne pilosis, subtus incanis subpetiolatis ; caule pedunculisque tomentosis. *S.*

In montosis Juræ: la *Dent de Vaulion*, *Dolaz*, *Falconario*, *Thuiry*, in montium siccis circa *Genevam* ut *Saleve*. Au bout de la *Chariere neuve*, du côté du droit de *Renan*; a *Pertuis*. etc. 1035.

(Flores flavi. Male *Linnæus* ad *C. anglicum*,

qui folia utrinque viridia floresque albos habet;  
*I. Bauhini synonymon: Helianthemum alpinum*  
*folio Pilosellæ minoris. " II. pag. 18." citat,*  
*quod noster Cistus est.*

5. *C. oelandicus*, suffruticosus procumbens exstipulatus; fol. oppositis linearি-oblongis pilosis utrinque viridibus; flor. sub-umbellatis; calyce lineato pubescente. S. Jacq. Austr. t. 399. Scopoli Carn. t. 25.

In omnibus Alpibus et montanis altioribus.  
 1034.

(Flos luteus; pedunculi rubent.)

### b. *Stipulati.*

6. *C. salicifolius*, herbaceus patulus villosus stipulatus; flor. racemosis erectis, pedicellis horizontalibus. L.

Circa Branson inventum Schleicher misit.

(Hujus loci, *Cisti* species annua angustifolia. I. Bauh. H. P. II. pag. 15.)

7. *C. pilosus*, suffruticosus stipulatus erectiusculus; fol. linearibus subtus bisulcatis incanis; calyc. laevibus. L.

Erat in Catalogo Scheuchzeri. Hall. 1035.

8. *C. helianthemum*, suffruticosus procumbens; stipul. lanceolatis; fol. oblongis revolutis subpilosis. L. Oed. Dan. t. 101.

Vulgo ad oras viarum, in siccis. 1033. a.

8. fol. latioribus. *Seguier* veron. Suppl.  
T. 6. f. 1.

Est *C. grandiflorus*. *Scopoli Carn.* t. 25.

In *Gemmio Hallerus* legit.

(Folia lanceolata utrinque villosa ei tribuit  
*Scop.*)

9. *C. apenninus*, suffruticosus stipulatus  
patulus; fol. lanceolatis hirtis. L.

In monte *Salvatore* prope *Lugano* invenit  
*Schleicher.*

(Flores albi; caulis teres incanus; folia su-  
perne linea profunda exarata, viridia, subtus  
incana; in summo caule foliola 3-4linearia al-  
terna; stipulae lineares.)

10. *C. polifolius*, suffruticosus stipulatus  
procumbens; fol. oblongo-ovatis incanis;  
calyc. levibus; petalis serratis. L.

Circa *Leucam* et in *Pilato*. 1036.

(A priori diversus vix est, imo *C. pilosum*  
non separarem. *Haller* monente habet cau-  
les prostratos, folia tomentosa linea exarata  
crassula, flores magnos albos — haec omnia in  
illo. Etiam *Linnæus* dubitabat, dum *Menzelii*  
synonymon, quod *Hallerus* huic addit, illi tri-  
buisset; et petala serrata in *apennino* conspi-  
cua sunt.)

C. *Polypetali.*

270. NYMPHALA. (*Seerose.*) *G. pl. 886.*

Cal. 4-5-phyllus; Cor. polypetala; bacca dura ovata carnosa multilocularis.

1. *N. lutea*, fol. cordatis integerrimis; calyce pentaphyllo petalis majore. L. *Oed. Dan.* t. 603.

Frequens in fossis majoribus et lacubus; etiam alpinis *au Lac rond* etc. 1066.

2. *N. alba*, fol. cordatis integerrimis; calyce quadrifido. L. *Oed. Dan.* t. 602.

Iisdem locis priori frequentior. 1067.

## D I G Y N I A.

271. PAEONIA. (*Pfingstrose, Gichtwurz.*)

*G. pl. 920.*

Cal. 5-phillus inæqualis; petala 5 subrotunda patentia; Styli o; Caps. polyspermæ.

*P. officinalis*, foliolis oblongis. L.

In montibus Glaronensium, qua fluv. *Sernf* scaturit; circa *Luganum*; in pratis montis *Generosi*. 1187.

## T R I G Y N I A.

272. DELPHINIUM. (*Rittersporn.*) *G.*

*pl. 927.*

Cal. o; petala 5 inæqualia; nectar. 2-fidum, postice cornutum; caps. 3 vel 1, introrsum dehiscentes.

1. *D. consolida*, nectar. monophyllis; caule subdiviso. L. *Oed. Dan.* t. 683.

Passim in agris circa *Ebrodunum*, *Neocomum*, *Bellelai*, *Basileam*, *Roche*, in Valesia inferiori.  
1203.

(Caps. unica.)

2. *D. ajacis*, nectar. monophyllis; caule simplici. L.

Passim in ruderosis. 1202.

(Caps. 1; calcar brevius, non nisi petalorum longitudine.)

3. *D. elatum*, nectar. diphyllis; labellis bifidis apice barbatis: fol. incisis; caule erecto. L.

In M. *Nesso*, *Sureneck*. Maxima copia in adscensu petroso *la Boulaire*; etiam in montibus *Lioson*, *Taveyannaz*, *Prapioz*, *Audon*, aliisque Aquilejensibus. 1201.

(Pulchræ plantæ folia tripartita, laciniæ tripartitæ incisæ, extima minore. Spica longa florum pulchre cœruleorum.)

273. ACONITUM. (*Eisenhut.*) G. pl. 928.

Cal. o; petala 5 inæqualia: supremo fornicate; Nectar. 2, pedunculata, recurva; caps. 3-5.

1. *A. lycoctonum*, cuculli calcare spirali; labio ovato emarginato, corollæ ga-

lea conica elongata; fol. palmatis pubescentibus: laciniis trifidis dentatis. Willd.  
Jacq. Austr. t. 380.

In montanis et subalpinis ubique. 1200.

(Flores flavi.)

2. *A. napellus*, cuculli calcare adunco obtuso; labio lanceolato revoluto bifido; galea convexa; fol. nitidis digitato-quinquepartitis: laciniis lato-lanceolatis brevisime dentatis: pedunc. glabris. Willd.  
Jacq. Austr. t. 381.

Flore cœruleo frequens in lapidosis, subalpinis, etiam alpinis, ut in *Gemmio*.

3. flore albo in *Aquilejensium* montibus, *Taveyannaz*, supra *les Plans*, montibus circa *Servant*.

γ. flore fusco, in *Taveyannaz*. 1197.

3. *A. anthora*, flor. pentagynis; foliorum laciniis linearibus. L. Jacq. Austr. t. 382.

*Lobelius* habet in Alpibus Rhæticis sed nuper ibi nemo vidit. Repertum in montis *Thuiry* adscensu australi, inferius, quam stabula. 1199.

(Flos hirsutus, pulposus, colore luteo-subviriidi. Hall.)

4. *A. cammarum*, cuculli calcare adunco obtuso; labio lanceolato recto acute emarginato; galea conica elongata; fol. opacis

quinquepartitis : laciinis oblongo-cuneiformibus trifidis dentatis. *Willd. Jacq. Austr.* t. 424.

Flore dilute cœruleo vulgare in Aquilejensibus : in valle *Goufin* inter *Arveja* et la *Croix d'Arpille* ; in montibus *Richard*, la *Varaz*, *Ovannaz*, *Taveyannaz*.

$\beta.$  flore albo.

$\gamma.$  floribus aquose cœruleis albo mistis : apud *Urienses*, et in monte *Mittelberg* *Biennen-sium*. 1198.

(*Spica* laxior quam in *Napello*, *galea* multo longior.)

### P E N T A G Y N I A.

274. AQUILEGIA. (*Akeley.*) *G. pl. 934.*

Cal. o ; petala 5 ; nectaria 5 corniculata inter petala ; caps. 5 distincta.

1. *A. vulgaris*, nectariis incurvis. *L. Oed. Dan.* t. 695.

In dumetis, ad sepes, in sylvis. 1195.

$\beta.$  flore albo — circa *Bernam*.

$\gamma.$  flore pleno in agro *Lemano*.

$\delta.$  flore rubro — etiam *Bernæ* et circa *To-binum*.

2. *A. alpina*, fol. trilobatis : lobis tri-partitis ; medio trifido ; caule paucifloro. *S. Allioni Ped.* t. 66.

Circa thermas fabarias; supra vallem alpinam *Waldnacht*. Abunde in montibus Aquilejensibus! *Richard*, *la Varaz*, *Boulaire*, *Chapuisse*, *Essuieres*, *Pillon*, *Orgevaux*, *Prapioz*. In montibus *Vallis de Lie*, *Beverin* etc. 1196.

(Nectaria in meis curva et recta; flores cœrulei speciosissimi, penduli.)

275. NIGELLA. (*Schwarzer Kümmel*.)

*G. pl. 935.*

Cal. o; petala 5, patentia; nectaria 5; trifida, intra corollam; caps. 5, sutura introrsum connexæ, superne introrsum dehiscentes.

*N. arvensis*, pistillis quinis; petalis integris; caps. turbinatis. L.

In segetibus borealis Helvetiæ circa *Bellelai*, *Liechtstall*, Basileam ad *Birsam*. 1194.

P O L Y G Y N I A.

276. ANEMONE. (*Anemone*.) *G. pl. 948.*

Cal. o: petala 6-9; sem. plura, acuminate, stylum retinentia.

1. *A. hepatica*, sol. trilobis integerrimis. L. *Oed. Dan.* t. 610.

Verna planta ubique in sylvis abiegnis. Basileæ tamen rara, unice in *Burghaldenberg*. 1156.

a. *Pedunculo involucrato, seminibus caudatis.*

2. A. *pulsatilla*, pedunc. involucrato; petalis rectis; fol. bipinnatis. L. Oed. Dan. t. 153.

In Helvetia non frequentissima. Basileæ in monte *Crenzach*. Badæ. Tobinii in sylvis. Scaphusiaæ auf der *Clus*, in der *Enge*, et in monte *Randen*. Neoconi supra *Vausseyon*; circa *Martigny*, *Fouly*. 1146.

β. folio tenuius inciso et flore minore. *Michelfeldæ* in pratis udis et paludosis. C. Bauh. Prodr. pag. 94.

3. A. *vernalis*, pedunc. involucrato; fol. pinnatis: foliolis tripartitis obtusis glabriusculis; flore erecto. Willd. Oed. Dan. t. 29. Hall. t. 21.

Alpina: in Alpibus Prægalliensibus; in M. *Rigi*, *Albula*. Abunde in monte *Lassiaz* supra pierre de *Moëlez* ad pedem scopuli *Tour de Famelon*. In montibus *Enzeindaz*, *la Varaz*, *Javernaz*, *les Martinets*, *Jeman*, *Fouly*, St. *Bernhardo*. 1147.

(Caulis semipedalis involucro flavo nitente tomentosissimo multifido. Flos junior albus, adultus flavis pilis nitet.)

4. A. *halleri*, pedunc. involucrato, fol.

sericeis pinnatis profunde incisis : foliolis linearibus ; flore erecto connivente. S. *Allioni* *Ped.* t. 80. f. 2.

In monte *Flüelen* vallis St. *Nicolai* Valesiæ superioris , unde etiam habeo a *Schleicher* missam. 1148.

(Pulchra planta tota sericeo villo splendet, a præcedente plane diversa. Caulis semipedalis, involucrum linearis multifidum; flos minor quam in illa , obscure purpureus, magis connivens, albis pilis nitens.)

5. *A. alpina* , sol. caulinis ternis connatis supradecompositis glabriusculis : foliolis pinnatifidis obtusis acutis ; seminibus hirsutis caudatis. *Willd. Jacq. Austr.* t. 85.

In omnibus Alpinis ; et in Juræ jugis : *Dolaz, Falconario, Thuiri.* 1149.  $\alpha$ .

(Flos magnus albus, extus violaceus, hirsutus; petala 6-10; caulis et petioli hirsuti.)

6. *A. apiifolia* , sol. caulinis ternis connatis supradecompositis villosis : foliolis pinnatifido-dentatis acutis ; semin. hirsutis caudatis. *Willd. Jacq. misc.* 2. t. 4.

In montibus *Braulio, Gotthardo*. Abunde ad pedem M. St. *Bernhardi*, et à la *Croix de Javernaz, La Varaz, Luan, Prapioz, Meuvran, Sanetsch*. Etiam in *Bovinaz, Fouly, Sempronio et Pilato.* 1149.  $\beta$ .

(Differt a præcedente: caule foliisque hirsutioribus, vaginis foliorum involucri latioribus rubro-striatis; dominatur rubor in caule, et petiolis, viror in illa; huic floris color luteus, flos ipse minor, et (monente Scopoli) caudarum apices incurvi et villosuli, qui in illa recti et imberbes sunt. *Hallerus* tamen non separat, qui eodem in jugo, supra scaturiginem rivi *Ivoettaz*, et albo flore, et semiflavo, et flavo plantas reperit.)

7. *A. baldensis*, fol. bitemnatis: foliolis tripartitis, laciniis trifidis et bifidis, lanceolatis; involucro folioso: caule petiolisque hirsutis; semin. lanatis. S. Allioni *Ped.* t. 44. f. 3. t. 67. f. 2. Scopoli t. 26. Supra *les Plans*; in montibus *Prapioz*, *les Chaux*, *Fouly*, *Simplon*, Alpibus griseis, Valle St. *Nicolai*. 1151.

(Planta vix semipedalis, folia virentia glabra; vagina involueri triphylli denuoque trifidi hirsuta; petala 7-10 alba, extus hirsuta et subrubra. *A. fragifera* eadē erit.)

8. *A. hortensis*, fol. digitatis; semin. lanatis. L.

Flore miniato in rupibus supra molendinum prope Roche.

Flore purpureo circa templum pagi Moutrou. 1152.

b. *Flore nudo; seminibus ecaudatis.*

9. A. *sylvestris*, pedunc. nudo; semin. subrotundis hirsutis muticis. L. Bull. t. 59.  
Haud longe Mülhusia. 1150.

10. A. *nemorosa*, semin. acutis; foliolis incisis; caule unifloro. L. Oed. Dan. t. 549.

Verno tempore ubique ad sepes et in dumetis. 1154.

*β.* var. minor floreque minore.

In editissimo monte supra Curiam Rhætorum.  
C. Bauh. Prodr. p. 95. *Ranunculus* 1.

11. A. *ranunculoides*, fol. radicalibus nullis, caulinis bibernatis; foliolis incisis; petalis subrotundis; caule subbifloro; flor. axillaribus; semin. acutis. S. Oed. Dan. t. 140.

Basileæ abunde in pomario ad novam Domum, et alneto prope Wiesam. Rupe in prato Prépoury. In Münchenstein etc. 1153.

(Flos flavus.)

12. A. *narcissiflora*, seminibus nudis rotundis planis; fol. septemfidis imbricatis hirsutis; flor. umbellatis. Hall. Jacq. Austr. t. 159.

Nihil in Alpibus vulgatius locis herbosis. Abunde etiam in montanis Grandvi et Montendre, Mole, etc. 1155.

*Taveyannaz* etc. In monte *Salanfe* Valesiæ etc. 1140.

(Differt a sequente, cuius habitum tamen refert: foliis subhirsutis, subtus incanis, foliolis minoribus, et odore.)

5. *T. minus*, foliolis subrotundis trifidis incisis; flor. cernuis. *Willd. Oed. Dan.* t. 732. *Jacq. Austr.* t. 419.

Frequens in rupibus subalpinis et submontanis: *Agauni*, in agro Aquilejensi. In Neocomensibus circa *Locle*, a la *Ranceniere* etc. Badæ iu monte *Legerberg*. In sylva, per quam a *Münchenstein* descenditur versus *Muttentz*. *Tiguri*, *Chiavennæ*, *Lugani* etc. Circa *Engelberg* et in Alpibus Aquilejensibus. 1139.

(Folia glabra; panicula laxa; flores viridi-lutei.)

4. *T. angustifolium*, foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. L. *Jacq. hort.* t.

3. t. 43.

Rarum: *Lausannæ*. Basileæ in pratorum marginibus haud longe *Michelfelda*. In angulis pratorum ultra St. *Louis*. 1137.

(Caulis sulcatus, subniger; petala alba minima.)

5. *T. nigricans*, caule folioso sulcato; flor. corymbosis; foliolis radicalibus cuneiformibus trifidis, caulinis linearibus. *Willd. Jacq. Austr.* t. 421.

(*Halleri* — 1138.  $\alpha$ . qui cum sequente jun-

git, ei nonnisi foliis *lattioribus* diversum. Nigrius tamen est et caule magis sulcato, quamquam iisdem locis habitare amet.)

6. *T. flavum*, caule folioso sulcato; panicula multiplici erecta. L. *Fl. Dan.* t. 939.

Abunde in paludosis circa *Anet*, et ad *Brojam* fl. circa *Mathod*, *Rupe*. Basileæ prope novam Domum etc. 1138. **β.**

(Huic caulis potius striatus, folia angustiora, magis rugosa nervosa et viridiora. Separavi tamen, quod separare non debuisse, recentiorum nimio amore.)

7. *T. aquilegifolium*, fruct. pendulis triangularibus rectis, caule tereti. L. *Jacq. Austr.* t. 318.

*Michelfeldæ*. Tiguri ad *Silam* et in M. *Uetliberg*. Bernæ infra villam *Hasli* ad *Arolam*. Circa *Seelhofen*. In Argovia, ad viam inter *Grenchen* et *Kulm*, *Tobinii* ad rivos et sepes frequens, sic inter *Tobinium* et *Rothrist* ad semitam. Inter *Chur* et *Tusis*. Etiam in sylvis alpinis et montanis etc. 1141.

280. ADONIS. G. *pl. 952.*

Cal. 5-phyllus deciduus; petala quinis plura absque nectario; sem. nuda, angulata.

1. *A. miniata*, flor. octopetalis; petalis

*obtusis integris ; fruct. cylindricis.* *Jacq.*  
*Austr. t. 354.*

*Circa St. Jacob Mülhusiæ. 1158. α.*

*2. A. flammea, flor. octopetalis : petalis lanceolatis acutis ; fruct. cylindricis ; caule hirto.* *Willd. Jacq. Austr. t. 355.*

*Circa Basileam, eundo versus Münchenstein et versus Dornach.* *Circa St. Pierre et Vetrod Valesiæ. 1158. β.*

*3. A. vernalis, flore dodecapetalo ; fructu ovato.* *L. Jacq. Austr. t. 44.*

*In segetibus inter Agaunum et Sedunum ; circa Vetrod, St. Pierre, Branson, Fouly, et inter Charat et Saxon. --- 1157.*

*(Petala flava, cum macula violacea in ungue.*  
*Hall.)*

**281. RANUNCULUS. (*Ranunkel.*) G.**  
*pl. 953.*

*Cal. 5-phillus, concavus, subdeciduus ; petala 5, obtusa nitida, intra unguis poro mellifero ; sem. nuda.*

*a. Foliis simplicibus.*

*1. R. flamacula, fol. radicalibus petiolatis ovato-lanceolatis subintegerrimis ; caule declinato.* *S. Oed. Dan. t. 575.*

*Abunde in omnibus udis æstate. 1182.*

2. *R. reptans*. fol. linearibus; caule repente. L. *Oed. Dan.* t. 108.

Ad ripas lapidosas lacuum Helveticorum. 1183.

(Varietatem præcedentis credit *Hallerus*, qui per continuos gradus, ut a lapidosis recedit, altior fit, et denique in onines *Flammulæ* conditiones reddit.)

3. *R. lingua*. fol. lanceolatis; caule erecto.  
L. *Oed. Dan.* t. 755.

Passim in aquosis: circa *Seelhofen*, *Seedorf*, ad fossas viæ *Worbensis*, circa *Murten*, *Röche*, *Michelfelden*; *Tobinium* etc. 1181.

(Var. fol. glabris et hirsutis, integris et serratis.)

4. *R. pyrenæus*, fol. linearibus indivisis; caule erecto, striato subbifloro. L.

In altioribus Alpibus: *Fouly*, *Jeman*, *Enzeindaz*, *Prapioz*, *la Varaz*, *Panerossa*, *Bovinaz*, *Salanfe*, *St. Bernhard*, supra vallem D. *Nicolai*; *Bernina*, *Braulio*, et ad glaciales fontes Rhodani. 1180. α.

(Radix fasciculata; caulis digitalis subnudus; flos parvus albus, rarus visu ob nivales moles, inter quas habitare amat.)

β. Var. caule altiori ramoso multifloro.  
*Allioni Ped.* t. 76. f. 1.

5. *R. valesiacus*, fol. petiolatis ovatis

serratis; caule ramoso folioso paucifloro;  
radice fasciculata. S.

Hunc invenit Cl. Ricou in monte *Mille* su-  
pra Vallem de *Bagnes*. 1180. β.

(Dignus est, qui a priori separetur; utique  
differt. Caulis cubitalis superne hirsutus; flores  
pauci magni albi; calyx fusco tinctus.)

6. *R. parnassifolius*, fol. subovatis ner-  
vosis lineatis integerrimis petiolatis; flor.  
umbellatis. L.

Frequentissimus in Alpium saxosis Aquile-  
jensium; etiam in Valesiæ mont. *Fouly*, *Je-  
man*, *Dent de midi*, *St. Bernhard*, supra Pra-  
borgne etc. 1179.

(Radix fasciculata; folia potius subcordata,  
caulina 2-3 sessilia; flores magni albi; calyx  
purpurascens. *Hallerus* citavit synonymon *Lin-  
næi*, *R. amplexic.* minus bene; figura enim  
*Menzelii* pag. t. 8, cui folia amplexicaulia  
alterna adpicta sunt, alienissima est a *Halleri*  
descriptione, nec repertus, quantum scio; in  
Helvetia *R. amplexicaulis*, nisi eum credas,  
cujus inter *Scheuchzeri* plantas *Hallerus* in *ad-  
dendis* meminit.)

7. *R. ficaria*, fol. cordatis angulatis petio-  
latis; caule unifloro. L. *Oed. Dan.* t. 499.

Ad sepes et in umbrosis vere ubique. 1160.

8. *R. thora*, fol. radicalibus nullis, cau-  
linis

linis 1-2 reniformibus subtrilobis crenatis nervosis sessilibus, summo lanceolato inciso; caule subbifloro. S. Jacq. Austr. t. 442.

Abunde in Aquilejensium montibus occidentalibus, supra le Pertuis d'Avenaire, en petit Ayerne, in monte Chaude et in ea tota regione. Dans le Val de Lie et in Alpibus supra hanc Vallem. Etiam in pascuis summi montis Thuiry. 1178. Et in M. Saleva.

(Flos parvus luteus; variare dicunt folio unico radicali petiolato.)

### b. *Foliis dissectis et divisis.*

6. *R. auricomus*, fol. radicalibus longe petiolatis reniformibus trilobis crenato-incisis, caulinis digitatis linearibus; caule multifloro. S. Oed. Dan. t. 665.

Verno tempore frequens in umbrosis, ad sepes, et in sylvis. 1177.

10. *R. sceleratus*, fol. petiolatis: radicalibus trilobis, lobis 2-3-partitis crenatis, caulinis digitatis; fructibus oblongis, calyce glabro reflexo; caule ramoso. S. Oed. Dan. t. 571.

Abunde in aquosis circa Roche, Yverdun, Chateau Thiele, Mathod etc. 1175.

11. *R. aconitifolius*, fol. quinquelobis dentatis, lobis acuminatis, intermediis tri-

fidis, floralibus summis digitatis sessilibus lanceolatis. *Willd. Clus.* pann. fig. p. 370.

(*Hallerus* cum sequente conjungit, a quo differt: caule humiliori, foliis ad petiolum usque partitis, floribusque rarioribus et minoribus. Var. flore pleno in monte *Salanfe*.)

12. *R. platanifolius*, fol. quinquelobis dentatis, lobis obtusis intermediis trifidis, floralibus summis digitatis sessilibus linearisubulatis. *Willd. Oed. Dan.* t. III.

Uterque floribus albis frequens in omnibus montanis et alpinis. 1164.

13. *R. rutæfolius*, fol. supradecompositis, radicalibus petiolatis; caule simplicissimo plerumque unifolio et unifloro; radice tuberosa. *S. Allioni Ped.* t. 67. f. 1.

Altissimarum alpium: in *Septimo Rhætiæ* monte, inque *Montemor* et *Oberstafel* Valesiæ superioris, et in M. *Triftier*. 1165. *R. Berardi Villars. Delph.* t. 49.

(Folia glauca: foliola tripartita incisa obtusa et dentata; caulis 2-florus etiam et bifolius, ut appareat ex specimine a *Schleicher* in Valesiæ monte *Triftier* lecto et misso; petala alba ungue phoeniceo.)

14. *R. glacialis*, fol. ternatis: foliolis tripartito-multifidis, caulinis sessilibus; caule

subtrifloro; calyc. hirsutis. *Willd. Oed. Dan. t. 19. Villars Delph. t. 49.*

Frequens in Alpibus Aquilejensibus: *Prapioz, Enzeindaz, Panerossaz, sur Champ, Ovan-naz.* In Valesiacis: *Simplon, S. Bernhard, Je-man, Fouly, Chermontana,* in valecula *Furcæ* prope jugum. In *Septimo*, et in alpe *Piora* Lepontiorum. In montibus Vallis St. Nicolai et Kienthal. 1166.

(Caulis palmaris et sesquipalmaris non raro ramosus et multiflorus; flos satis magnus albus, incarnatus aut fere purpureus; calyx flavo-aut purpureo-villosus. Var. fol. lanuginosis sur le Col du Mont-Cervin. *Saussure voyages. I. p. 203.*

15. *R. nivalis*, sol. radicalibus petiolatis quinquelobis dentatis glabris, caulin sessili digitato: laciniis linearibus integerimis; caule unifloro. *S. Jacq. Austr. t. 325. 326.*

Abunde in omnibus alpibus Aquilejensibus, Rhæticis etc. In montanis *Creux du Vent, Chasseron.* 1168.  $\alpha$ .

$\beta$ . var. folii caulin laciniis dentatis. s. *R. Gouani* Illuстр. t. 17. f. 1-2 separari non debet. Nec separarem *R. lapponicum* qui ipso *Linnæo* monente habet « folia ambitu fere reniformia, « sed tripartita ad basin usque, lobo intermedio « obsolete trilobo, lateralibus pluribus lobulis « notatis.»

γ. Insignior ejus varietas caule altiori ramoso multifloro, foliis profundius divisus.

In M. Luan et Thuiry. Hall. 1168. β.

(Omnibus flos luteus est.)

16. R. monspeliacus, sol. tripartitis crenatis; caule simplici villoso subnudo unifloro. L.

In montium *Surenensium*, *Jugi*, et *Laubersgradt* summis fastigiis. Scheuchz. It. Alp. I. p. 46.

(*Hallerus* a præcedente non separat, sed differt: foliis crassiusculis subtus hirsutis, petiolis cauleque villosis. Flos etiam aureus est, sed major, et folia caulina angustiora. Schleicher misit in glareosis alpinis inventum.)

17. R. alpestris, sol. radicalibus subcordatis obtusis tripartitis, lobis trilobatis, caulino lanceolato integerrimo; caule subunifloro. L. Jacq. Austr. t. 110.

In omnibus Alpibus frequentissimus, quando nives defluerunt. 1167.

β. flore majore. --- Copiose in Alpibus *Surenensibus* et *Tittliaco* monte.

γ. flore pleno majori --- en Chaud commun; minori, petalis numerosis *Bellidem* plenam referentibus, in monte *Rosselinaz*.

(Caulis, non semper uniflorus, plerumque duabus ligulis gaudet; calyx glaber; petala magna, alba, obcordata.)

18. *R. bulbosus*, calyc. retroflexis; pedunc. sulcatis; caule erecto multifloro; fol. compositis. L. *Oed. Dan.* t. 551. *Bull.* t. 22.

Verno tempore in hortis, pratis et ad vias. 1174.

(Folia hirsuta: lobo medio longius petiolato.)

19. *R. repens*, calyc. patulis; pedunc. sulcatis; stolon. repentibus; fol. compositis. L. *Oed. Dan.* t. 795.

In pratis et agris. 1173.

(Folia hirsuta: lobo medio petiolato aut sessili; calyx subhirsutus flavescens; petala obtusa, quæ præcedenti ovata sunt.)

20. *R. polyanthemos*, calyc. patulis; pedunc. sulcatis; caule erecto; fol. multipartitis. L.

In sylvis. 1171.

21. *R. Breyninus*, fol. radicalibus hirsutis digitatis serratis, caulino palmato tridentato: laciniis linearibus; calyce hirsutissimo; caulibus hirsutis humillimis unifloris. S. *Allioni Ped.* 1456.

In montibus Enzeindaz et Gotthardo. 1170.

(Flos flavus: receptaculum lanuginosum. Hall.)

22. *R. acris*, calyc. patulis; pedunc. teretibus; fol. tripartito-multifidis: summis, linearibus. L.

In pratis, ad vias et oras rivulorum. 1169.

**γ.** Insignior ejus varietas caule altiori ramoso multifloro, foliis profundius divisis.

In M. Luan et Thuiry. Hall. 1168. **β.**

(Omnibus flos luteus est.)

16. *R. monspeliacus*, fol. tripartitis crenatis; caule simplici villoso subnudo unifloro. L.

In montium *Surenensium*, *Jugi*, et *Laubersgradt* summis fastigiis. Scheuchz. It. Alp. I. p. 46.

(*Hallerus* a præcedente non separat, sed differt: foliis crassiusculis subtus hirsutis, petiolis cauleque villosis. Flos etiam aureus est, sed major, et folia caulina angustiora. Schleicher misit in *glareosis alpinis inventum.*)

17. *R. alpestris*, fol. radicalibus subcordatis obtusis tripartitis, lobis trilobatis, caulino lanceolato integerrimo; caule subunifloro. L. Jacq. Austr. t. 110.

In omnibus Alpibus frequentissimus, quando nives defluxerunt. 1167.

**β.** flore majore. --- Copiose in Alpibus *Surenensibus* et *Tittliaco* monte.

**γ.** flore pleno majori --- en Chaud commun; minori, petalis numerosis Bellidem plenam referentibus, in monte *Rosselinaz*.

(Caulis, non semper uniflorus, plerumque duabus ligulis gaudet; calyx glaber; petala magna, alba, obcordata.)

18. *R. bulbosus*, calyc. retroflexis; pedunc. sulcatis; caule erecto multifloro; fol. compositis. L. *Oed. Dan.* t. 551. *Bull.* t. 22.  
Verno tempore in hortis, pratis et ad vias. 1174.  
(*Folia hirsuta*: lobo medio longius petiolato.)

19. *R. repens*, calyc. patulis; pedunc. sulcatis; stolon. repentibus; fol. compositis. L. *Oed. Dan.* t. 795.

In pratis et agris. 1173.

(*Folia hirsuta*: lobo medio petiolato aut sessili; calyx subhirsutus flavescens; petala obtusa, quæ præcedenti ovata sunt.)

20. *R. polyanthemos*, calyc. patulis; pedunc. sulcatis; caule erecto; fol. multipartitis. L.

In sylvis. 1171.

21. *R. Breyminus*, fol. radicalibus hirsutis digitatis serratis, caulino palmato tridentato: laciniis linearibus; calyce hirsutissimo; caulibus hirsutis humillimis unifloris. S. *Allioni Ped.* 1456.

In montibus *Enzeindaz* et *Gotthardo*. 1170.  
(*Flos flavus*: receptaculum lanuginosum. Hall.)

22. *R. acris*, calyc. patulis; pedunc. teretibus; fol. tripartito-multifidis: summis, linearibus. L.

In pratis, ad vias et oras rivulorum. 1169.

(Caulis teres; folia hirsuta; calyx glaber linea obscuriori notatus.)

22. *R. lanuginosus*, calyc. patulis; pedunc. teretibus; caule petiolisque hirsutis; fol. trifidis lobatis crenatis holosericeis. L. *Oed. Dan.* t. 397. *Casp. Bauh. Prodr.* p. 96. fig.

In M. *Saleva*; in humidis montis *Muteti*; ad radices montis *Titliaei*; inter *Hub* et *Thorberg Alp.* otc. 1172.

23. *R. arvensis*, semin. aculeatis; fol. superioribus decompositis linearibus. L. *Oed. Dan.* t. 219.

In agris. 1176.

24. *R. fluviatilis*, fol. omnibus dichotomo-capillaceis, caule natante. *Willd. Oed. Dan.* t. 376.

Basileæ ad *Wiesam*, et passim in fluentiis paulo rapidioribus. 1161.

(Foliorum laciniæ parallelæ, non divergentes ut in sequentibus. *Hall.*)

25. *R. aquatilis*, fol. omnibus capillaceis: laciniis divergentibus. *Leys. Barrel. ic.* 566.

Ubique in rivulis quietis, fossisque aqua plenis. 1162.  $\alpha$ .

$\beta$ . fol. circumseriptione rotunda terminatis.

Circa Nidau, Erlach, Mathod, in fossis quietis; in stagnis prope Hiltelingen.

26. *R. heterophyllus*, fol. submersis capillaceis, emersis reniformi-palmatis. *Leys. Barrel. ic. 565.*

Non rarus. v. gr. Bernæ inter Neubrük et Ortschwaben in rivo inter duas sylvas elabente. Basileæ ad Wiesam. etc. 1163.

(Omnis 3 posteriores habent petala alba, ungue flavo.)

27. *R. hederaceus*, fol. subrotundis trilobis integerrimis; caule repente. *L. Oed. Dan. t. 321.*

*Lachenal* invenit circa Pfirt. *Höpfn. Mag. IV. pag. 34.*

282. *TROLLIUS*. (*Trollblume.*) *G. pl. 954.*

Cal. o; cor. 12-15-petala; nectaria linearia sæpe petalorum numero; caps. plurimæ ovatæ siliquosæ.

*T. europæus*, coroll. conniventibus; nectar. longitudine staminum; fol. quinquelobis serratis; caule unifloro et multifloro. *S. Oed. Dan. t. 133.*

Abunde in pratis montosis et subalpinis. 1189.

283. *ISOPYRUM*. *G. pl. 955.*

Cal. o; petala 5; nectaria trifida tubulata; caps. plures recurvæ polyspermæ.

*I. aquilegioides*, stipulis obsoletis. L.  
Hall. 1190.

(In Helvetiorum alpibus habet C. Bauh. loco  
non addito:

“ Radix parva; folia thalictri forma, sed exi-  
“ gua, pallide virentia, inter quæ caulinus te-  
“ nus, palma minor, 2-3 foliolis brevibus ob-  
“ longis minime divisis exurgit, florem unicum  
“ cæruleum sustinens, forma quidem vulgari  
“ Aquilegiæ similem, sed quintuplo minorem.  
“ Prodr. pag. 75. et I. Bauh. H. P. III. p. 484.”  
*Lachenal* vero, et forsitan rectius, hanc plan-  
tæ ad *Aquilegiæ* viscosam delegat *Act.*  
*Helv.* VIII. p. 146, quæ non tantum *Monspelii*,  
sed etiam (*Allioni* monente 1506.) Alpium  
Pedemontanarum incola est.)

284. HELLEBORUS. (Nieswurz.) G. pl. 956.

Cal. o; petala 5, seu plura, subrotunda,  
magna; nectaria brevissima bilabiata tubu-  
lata; caps. polyspermæ erectiuseculæ; sem.  
suturae affixa.

1. *H. hyemalis*, flore folio insidente; fol.  
radicalibus peltatis multifidis: laciniis inte-  
gerrimis. Willd. Jacq. Austr. t. 202.

Passim in pratis, imprimis in ipso pago *Bex*.  
In montosis Biennensibus, ut in rupibus mon-  
tis *Chasseralle*. 1191.

(Flos flavus nobis hexapetalus esse solet. Hall.)

2. *H. niger*, scapo subbifloro subnudo; fol. pedatis. L. Jacq. Austr. t. 201.

Hunc, a *Hallero* frustra quæsitum, circa *Lugano* inventum misit Cl. *Schleicher*.

(Folia crassa levia subserrata, petala alba extus rosea.)

3. *H. viridis*, caule bifido; ramis foliosis bifloris; fol. digitatis. L. Jacq. Austr. t. 106.

Non frequens. Prope *Tigurum* et circa *Kyburg*; *Mendrisii* in dumetis. In rupibus versus la *Chetelaz* haud longe *Bellelai*. 1192.

(Folia circumserata; flores virides sæpe nutantes.)

4. *H. fætidus*, caule multifloro folioso; fol. pedatis. L. Bull. t. 71.

Frequentissimus hic, ad Alpium radices et Juræ. Etiam Bernæ in sylva *Bremgarten* in via a *Langgasse* ad rivum *Glasbach*. 1193.

(Flores virides per oram rubro colore tincti.)

285. CALTHA. (*Dotterblume.*) G. pl. 957.

Cal. o; petala 5; nectaria o. Caps. plurimes polyspermæ.


*C. palustris*. L. Oed. Dan. t. 668.

Ubique ad rivulos et in humidis, a vere ad autumnum. 1188.

---







New York Botanical Garden Library

QK 315 .S9 v.1

gen

Suter, Johann Rudol/Flora Helvetica : ex



3 5185 00108 6048

