


# SYNOPSIS STIRPIUM INDIENARUM *ARAGONIAE.*

AUCTORE C. A. R.

CÆSARAUGUSTANO.

EST IGITUR COGNITIO NATURALIS  
patriæ præferenda exterarum regionum  
contemplationibus Linnæus Amœn.

*Acad. Vol. I. pag. I.*



*Men' moveat cimex Pantilius? aut crucier , quòd  
Vellicet absentem Demetrius?*

*Horat. Sat. X. Lib. I.*

# P R Æ F A T I O.

**A**RAGONIÆ Regnum positum est inter gradus XL. 10. & XLII. 30. latitudinis borealis (1). Fines in universum habet ad septentrionem Pyrenæos montes, quibus à Galliâ discriminatur: Navarram, & utramque Castiliam ad occidentem; ad meridiem Regnum Valentiniū: porrò ad ortum solis Cataloniæ Provinciam. Flumen *Iberus* ex alpibus Cantabricis defluens inter boream, & occidentem quasi transversim permeat, & Aragoniam nostram bifariam dividit. Septentrionalis tractus, quò ad Pyrenæos vergit, eò magis montibus exasperatur; pars verò exposita fluminī, vel campestris est regio, aut humilioribus collibus inæqualis. Quæ ex adverso fluminī adjacet ejusdem ferè naturæ est; sed locis irriguis, & fertilitate celebrior, ille ager in primis, qui ad orientem spectat Cataloniæ finitus, & à nostratis *tierra baxa* nuncupatur. Australior Aragoniæ plaga montosa est, & subalpina, in quâ *Lobeti* (2), & *Turolii* (3) ditiones continentur. Hinc istinere ad septentriōne flexo propè Castiliæ fines, occurrit primum *Darocensis* regio; huic proxima est *Bilbilitana*, cui jungitur ad boream *Turiasonensis*; utraque aspera, & confragoza perpetuis jugis ad montem *Caunum* usquè pertingentibus.

Mons *Caunus* (4) in confiniis Castiliæ assurgit altissimus.

Ad

(1) Mapa del Reyno de Aragón, por Juan Bautista Labaña Cosmógrapho mayor del Rey Don Felipe II. corregido, y aumentado por Don Thomás de Lezaun, en Zaragoza 1778.

(2) *Lobetum*, hodiè *Albarracín*, in orientali Celtiberiæ orā, cuius meminit Ptolomæus l. 2. c. 5.

(3) *Turolium* Latium ignorat, cum sit recentis originis. Occurrit passim hoc nomine in patriarcharum legum collectione. Nostratis *Teruel*.

(4) Sterilemque *Caunum* nivibus...

Ad septentrionem humiliores, & sylvos montes emittit, qui per depresso clivos in amoenissimam, & latè protensam planitiem terminantur. Ab occidente sensim subsidit. Alia verò secundaria juga, & variè connexa à supereminente dorso ad ortum solis versus Iberi ripas excurrunt. Multiplex est in montem ascensus: supernè tamen non facilè pervius ob abruptam, & scopulosam ipsius naturam. Inferiorem partem latè occupant dumeta, & lætissima prata; uberrimis fontibus, & rivulis irrigata, in quibus tanta est plantarum varietas, & copia, ut indè potissimum hujus montis celebritas orta sit (i).

Cæ-

(i) Bernardus Cienfuegos (de quo mox) in *Historiâ Plantarum tom. I. p. 144.* de infinitâ stirpium varietate in M. Cauno nascentium disserens, occasione *Antherici Liliastri* à se ibi detecti, hæc habet lectu non injucunda: „Dice bien Miconio que es de España, y que se crio en „montes, que lo es muy alto, y frio Moncayo, en tierras humedas „que lo son mucho aquellos prados, y junto à arroyos; porque estos pra- „dos los inunda un arroyo por su buena agua llamado de los antiguos, „*Irves*, ó *Iros*, que significa resplandeciente, por los visos azules, y ver- „des, que hacen sus aguas sobre unas peñas de fortísimos jaspes culebrinos „por donde corre; ó por el resplandor, y claridad de sus aguas, ó „por causa del mucho azogue, que lleva quando sale de madre, y de- „xa resplandecientes los prados donde pára, y dentro sus aguas se co- „ge, que vienen corriendo por diversos mineros de plata, oro, y „cobre, plomo, y hierro, en cuyas laderas hay antiguas Oficinas de „haberse trabajado, y en nuestros tiempos se han labrado de cobre, y „plata, y continuamente hoy dia se están labrando de antimonio, al- „cóhol, y plata, y muchas de hierro. Al otro lado inunda estos pra- „dos un arroyo, que llaman *Val de Milanos*. Todos ellos son „fertiles de hermosas, y peregrinas plantas, muchos, y diversos ge- „neros de Violas, Narcisos, Junquillos, Marthagones, Tulipas sil- „vestres, Fritillarias, Anemomes diversas, Ranunculos de todas suer- „tes hasta blancos, quatro especies de Filipendulas, Trifolio, Allelu- „ya, Angelica, Archangelica, y Imperatoria. En lo que riega Irves „muchas Contrayerya, y Morsus Diaboli tres diferencias, los ponzo- „ñosos Aconitos, Flamula, Tora, y Antora; embueltos para quitar- „les su malicia con las raíces del Morsus Diaboli: à un lado algo mas

Cæsaraugusta antiqua Regum sedes, & Regni caput, meditullium tenet, amne Ibero affusa. Posita est in pingui, & fertilissimâ planicie, quæ ad radices collum borealium procumbit. Ad austrum statim ab urbis egressu alii colles assurgere incipiunt, vitibus consiti, qui ad occasum sese flectentes versus meridiem continuantur, & cum montosâ regione, vulgò *la Serranía*, coalescunt. Illos *monte del Castellar*, posteriores *Monte torrero* incolæ appellare solent. Sunt autem aromaticis, & minimè vulgaribus stirpibus insignes, illis præcipue, quæ arido, & petroso solo delectantur.

Jam verò præter salubrem cœli temperiem, & beatam camporum amœnitatem, tanta est in Aragoniâ nostrâ frugum, vitium, olearumque fertilitas, tantus pomiferarum arborum proventus, tam nobilia in montanis australibus pecori vellera (quorum omnium magna vis ad exterros exportatur), ut nullis sit posthabenda regionibus, illis nimirùm, quæ soli ubertate maximè commendantur. Videbor forsitan nonnullis in patriæ gloriam effusissimus, quod hic talia commémorem; sed id eo consilio factum est, ut cognitâ soli naturâ, quid circa numerum, & elegantiam plantarum ab illo expectari possit, in comperto sit apud omnes (1).

Plan-

„de Agramonte. Los Satyriones son tantos, y principalmente las especies de Manuscristi, que me causaban confusión: en suma estos padres son riquísimos de plantas. Quisiera para solo escribir de las plantas de Moncayo tener un Libro manuscrito mas de quinientos años, que tiene Don Francisco Quevedo, Caballero del Habito de Santiago, conocido por sus buenas, y curiosas letras, ingenio agudo, y modo nuevo de decir con que ilustra su nobleza. Aunque padece un defecto, que no cabe en hombres doctos (como lo es conocido en todo Europa por sus escritos, y las sales, y águdezas juntas con buena doctrina), y es no querer comunicar, ni prestar libros. Puedese escusar esto con decir que como es raro en lo que escribe, quiere valerse de libros raros, y manejados de pocos.“

(1) Scriptoribus Gallis, qui compendia, ut ajunt, geographica,

Plantarum Aragoniæ vix aliqua mentio fit à Scriptoribus Botanicis. Ut ab exteris ordinar, primus omnium Carolus Clusijs Provinciam nostram adiisse puto, quod *Chamelææ tricoccæ* natales indicans, in Aragonum regno oriri tradit (1). Clusium excipit Jacobus Albinus Medicus Hamburgensis, qui plantarum gratiâ Aragoniam peragrasse constat, & nonnullas stirpes ab ipso in nostro solo detectas Casparo Bauhino communicasse, *Hieracium*, videlicet, *tomentosum hispanicum* (2), *Linariæ aureæ affinem* (3), sive *Senecionem linifolium Linnæi*, & *Onobrychidem incanam* (4). Ultimus ordi-

pis ineptiarum cùm in Hispaniæ rebus versantur, ut vix aliquid proferant veritati consentaneum. His igitur Aragoniæ solum audit sterile, aridum, & infructuosum. Attamen ubertatem rei frumentariæ in hacce regione scriptor Hibernus Bernardus Ward nuper agnovit *Proyecto economico*, p. 46. Tambien se sabe, inquit, que las dos Castillas, y el Reyno de Aragon son capaces, si se adelanta en ellas la agricultura, de dar trigo à Reynos enteros. Et proximè el apòsco sèculo in maximâ annonæ caritate, limitaneas provincias Aragonia sublevavit, teste memorato Cienfuegos, qui celebriores nostros frumentarios agros sequentibus verbis indicavit t. 5. p. 80. Para conclusion de este capitulo pondré la division de las tierras, que en España llevan mas pan. Comenzando de la punta de Cataluña es tierra de poco pan, y malo, tanto que no se come pan candeal, ni tierno, ni à penas se saca el sal, vado; ponen aquella miserable nacion el pan al sereno, y aire, y sol à secar para que coman poco los criados. En Aragon es mucha la abundancia, hâcense diversos generos de panes. La hoya de Huesca, de tierra seca es fertilissima, y es remedio de las Montañas, y Pirineos. En los regadíos la canal de Ebro es sumamente fertil, y mucho mas sus secanos. Las cinco Villas, Bardena del Rey, y Montes remedian con su abundancia la falta grande de Navarra, y Vizcaya. Lo graso del Rio Xalon, y tierra de Siguenza suplen la falta del Alcarria. La mucha abundancia del campo de Alcalá, Hita, Guadalaxara, y contornos de Madrid remedian el excesivo gasto de la Corte.

(1) *Hist.* I. p. 87.

(2) C. Bauhin. *Prodrom.* p. 64.

(3) P. 107.

ne Jacobus Barrelier, qui plurimas, & rarissimas stirpes per Hispanias observavit, videtur etiam aliquam Aragoniae partem attigisse; nam de novâ *Ononidis* specie visâ non procul ab oppido *Bujaraloz* expressè meminit (1).

Venio nunc ad hispanos Scriptores. Horum antiquissimus Joannes Ximenez Gil ex Turiasone municipio oriundus, anno 1508. scripsit patrio sermone de plantis in Monte *Cauno*, Pyrenæis, & montosis Aragoniae provenientibus, earumque ad medicos usus præstantiâ (2). Autographum MSS. possedit Josephus Ozcariz Velez è supremo Aragonum Senatu, quod litteris anno 1662. Matrii datis ad Ludovicum Exea Talayero nobis testatum reliquit; subjungens magnam ex illius operis lectione voluptatem perceperisse (3). Dolendum est omnibus, quibus aliquis inest amor patriæ, utilissimum opus in quo fato nobis ereptum: quod si lucem publicam vidisset, Aragoniae Flora non solùm reliquas totius Europæ temporis antiquitate superasset, sed etiam Neotericorum in re herbariâ cognitos labores prævertisset, si Joannis Cubæ insipidum, & ineptum opus exceperis. Quanta igitur gloria ex hac lucubratione publici juris factâ Provinciae nostræ accessura fuisset, exteris ipsis æstimandum relinquimus. Undè factum est ut omni adhbitâ diligentia ad detegendum manuscriptum animum appulerim, sed irritis hucusquè conatibus.

Post

(1) *Barrel. Obs.* 844.

(2) En operis inscriptionem: „Salubridad de Moncayo, y terminos contiguos, de los Montes Pirineos, Sierras de Albarracín, Teruel, y Daroca, y otros puestos altos del Reyno de Aragón en sus yerbas, y plantas, „por el Bachiller Juan Ximenez Gil.“

(3) Autographas litteras vidit Felix de Latasa Cæsaraugustanus vir longè doctissimus, & acerrimi judicii, qui in adornandâ Scriptorum nostrorum Bibliothecâ multis abhinc annis feliciter occupatur. Ultrâ 2800. autores incredibili studio, & diligentia congessit, de quorum vita, & scriptis magnâ eruditione disserit, & Aragoniae decus gnaviter tuetur. Opus est eximium, cui publicam lucem optare debemus, ne

Post longum temporis intervallum , quo nostratum labores in re herbariâ intermissos fuisse deprehendimus , popularis noster Bernardus Cienfuegos ad magnum opus herbarium sese comparavit . Fuit illi interior Botanices peritia , cum magnâ Scriptorum cognitione conjuncta ; cuius rei luculentum extat testimonium in Historiâ Plantarum , quam multijugæ eruditio nis apparatu hispano sermone conscripsit (1) . Quod attinet ad vitam , & conditionem auctoris , non alia sunt nobis monumenta , quâ ex illius scriptis eruimus . Natus est in urbe Turiasona , ex quâ admodum adolescens ad Academiam Complutensem se contulit , ubi cùm linguarum , & eloquentiæ Collegio fuisset adscriptus (2) , humaniores litteras professus est . Eo igitur tempore ad scribendum se accinxit , quod in annum 1599. incidit , ut ex operis præfatione datâ Matri ti Kalendas Novembris anni 1627. docemur (3) . Hæc autem præfatio scripta videtur antequam nominatæ Historiæ

ex-

(1) Nicolaus Antonius Bibl. Hisp. t. I. p. 175. auctoris nostri mentionem fecit , & aliud ipsius opusculum indicavit . *Bernardus de Cienfuegos* , ait , *Turiasonensis scripsit* : *Vida del Padre Gonzalo de Silveira de la Compañía de Jesus Martyr. Matri apud Ludovicum Sanchez 1614.* 4.

(2) Tom. 5. pag. 192... „Hallandome à la sazon en Alcalá Co-  
„legial , à donde la providencia de aquel Santo Arzobispo , y Carde-  
„nal Fray Francisco Ximenez de Cisneros previno con sus rentas de  
„pan à la necesidad que podia tener aquella Universidad , tocóme  
„aquel año ser Panadero , y aunque à costa de hacienda , y dinero  
„tube abundancia , y acudí à muchos que perecian . El verano me fui  
„à mi tierra à Aragon , à donde se habia dado licencia para sa-  
„car trigo para el remedio de Castilla , y principalmente de la  
„Corte : tocóle à mi Lugar que es Tarazona , y puerto de Castilla el  
„dar su tierra diez mil fanegas .“ Vide pag. 57. n. 395.

(3) ... „Al tiempo que comencé este trabajo en Alcalá leía Ca-  
„thedra de letras humanas , y despues acá que son 28. años , no he  
„hecho profesion de la lengua vulgar , trabajando siempre en los Auto-  
„res latinos , y estrangeros , que escurecen el lustre del lenguage Caste-“

extrémam manum admoverit , cum nonnullo loco stirpes alleget anno 1631. à se ipso lectas , & observatas . Medicinæ operam navavit ; nunquam tamen lucrificiendi causâ Clinicem exercuit (1) . Atque ità aptiorem studio Botanices indulgendi opportunitatem habuit ; quo nomine Pseudo-litterati , & semidocti illum magnoperè deridebant (2) . Ex variis ejus observationibus hinc indè interjectis patet , ipsum varias Hispaniæ Provincias cum fructu peragrasse ; Matriti verò perpetuum fixit domicilium , ubi amicitiam coluit cum Didaco de Cortavilla , Botanico peritissimo , qui hortum alebat rarioribus stirpibus instructum (3) ; tum etiam cum Hieronymo Huerta Interpretè Pliniano , & acerrimo Historiæ naturalis indagatore (4) .

b

Nunc

(1) ... , Estos tales son los que me morderán con nombre de emperico , ó ignorante , porque habiendo estudiado su profesion , no he abierto puerta à la ganancia como ellos sentados en la silla de una mula . “ Ibid.

(2) T. 3. p. 101. b. , Esté el conocimiento de las yervas tan desestimado , y abatido , que cierto que me corro muchas veces de decir que conozco alguna ; porque me ha sucedido saber que en conversacion como por burla , mofa , y escarnio algunos cultos , politicos , mirlados , filosofos de clausulas decoradas , bedijudos , pedantes , gramaticones meros , poetizantes ; todos gudejas , y petos , censores de libros , que no entienden , aunque los tienen en los estantes , como el librero compuestos por ostentacion , y adorno , ó para venderlos , y cambiarlos ; quando se ofrece tratar de mí , ó nombrarme , aunque saben el nombre propio , por fisga , burla , y escarnio como tengo dicho dicen , el herbolario .“

(3) Tom. 2. p. 924... , El nombre con que se conoce en España es Galega , à donde no es muy ordinaria , ni la he visto , sino en las zanjas de unas hazas , y dehesa de Agreda en los arroyos , que baxan de una falda del Monte Moncayo , que llaman la Sierra del Maderro , y antes de baxar al Paular de Segovia en unas zanjas de unas hazas , y tierras novales recien rozadas , y sembradas entre Robledo en una hoyuela donde habia dos diferencias de Vincetoxicum . De allí la trajo Diego de Cortavila , insigne Boticario , y gran simplicista , y herbario à su jardin , que es un museo de plantas raras .“

(4) Tom. 4. p. 265

El año de

Nunc igitur CL. Viri laudabile institutum , & operis rationem exponam. Historia plantarum superius designata , quæ in Regiâ Matritensi Bibliothecâ inedita asservatur ; septem volumina complectitur nitidissimè compacta , in quibus præter manifestas autographi notas , omnia cernas concinno , & pulcherrimo ordine digesta (1). Primùm enim præmissis ico-nibus affabré delineatis , synonyma , & nomina vernacula sub-nequit clarissimus auctor ; mox addit plantæ descriptione , & collatitiam ex variis Scriptoribus historiam ; postremo loco usus medicos , & œconomicos stirpium fusè , & enucleatè persequitur ; superstitiones opiniones , quæ de mirificis illarum virtutibus vulgò circumferuntur solidè refutat , & non-nunquam datâ occasione Alchymistarum somnia , & commenta ridet , propriâ edoctus experientiâ quâm parùm sit credendum illorum insaniae , & vanitati (2). Loca natalia plantarum in Aragoniâ nostrâ , & in aliis Hispaniæ Provinciis sæpiùs indicat. Quinimò multa erudita ex anecdotis profert ad viros litteratos , & Historiam naturalem illius ævi pertinentia.

Atqui opus hocce perfectum , & omnibus numeris abso-lutum non habemus , nam præter integrum de arboribus trac-tationem , quæ omnino desideratur , ex Sygenesistis , Um-bel-

„ la Botica de Santiago Rojo , que vive en Madrid à la Calle de Tole-  
„ do , algunos tallos de esta planta (*de Solano sermo est*) con flores , ho-  
„ jas , y fruta aunque no sazonada , que hice mirar à muchos doctos  
„ Medicos , y Boticarios , y entre ellos al Doctor Hieronimo de Huer-  
„ ta , gran escudriñador de la verdad de la historia natural , como lo  
„ muestra su traducion , y notas sobre Plinio. Dios le tenga en su Rey-  
„ no , que estando escribiendo esto à 23. de Julio me dixerón que era  
„ muerto. “

(1) Postulat grati animi officium , ut viri doctissimi Joannis de Santander Regiæ Bibliothecæ Præfecti eximiam in me juvando humanitatè commorem , quod usuram Codicis liberalissimè concesserit.

(2) Tom. 5. p. 685... „un tiempo que viví desvanecido en la Chimica , no con muy poco gasto , del qual no tengo mas que el arre-

belliferis, & Teträdynamistis, paucissimas plantas descripsit  
Clar. vir, cuius egregios conatus ignota nobis obstacula op-  
presserunt. Interim cum non sit plenior in hoc argumento  
Scriptor, & qui rem accuratius tractaverit, princeps omnino  
nobis auctor esse debet indigenarum stirpium.

Circà dimidium hujus, quod nunc vergit, sæculi Antonius Campillo Pharmacopæus oppidi *Albalate del Arzobispo*, & non indoctus Botanicus, opusculum edidit Cæsaraugustæ anno 1736. inscriptum *Faro Medico*, in quo promisit generaalem stirpium historiam, quam equidem *Orbis vegetabilis* titulo integro opere complexus est, cuius alterum volumen *anecdoton* penè filium Jacobum mihi videre contigit. Træduntur in illo plantarum descriptiones, additis compendiosis characteribus ex præstantissimis Botanicis deproprietatis. Sed singulare est quòd loca natalia omittat, cùm tamen in Pharmacopæorum usum quidquid ad formulas medicinales, & pharmaceuticas operationes spectat magno cumulo congerat. Fuit cæterum vir solers, & indefessus in exqairendis plantis, quarum quinque millia contulit in hortum siccum, adjunctis notis, & observationibus (1). Est igitur inter Scriptores recensendus, qui patrias stirpes illustrarunt.

Tandem nonnullas Aragoniæ plantas enumerat *Flora Hispanica Josephi Quer*. (2) conscripta alphabeticâ methodo, quæ cum nihil habeat dignitatis, ad doctrinam parùm idoneam semper visa fuit. Opus alioquin imperfectum est, nec ultrà

(1) Vedit penè Auctorem Thomas Perea in Ecclesiâ S. Andreæ Cæsaræ Augustæ Pastor, ut ipse testatur in litteris supramemorato libello præfixis:

(2) *Hypericum Androsænum* t. 3. p. 30. *Atriplex Halimus* 3. p. 168. *Acanthus mollis* 3. p. 162. *Carpinus Ostrya* 4. p. 51. *Catariæ*, que *Nepeta minor* folio *Melissa Turcica* 4. p. 94. *Azalea procumbens* 4. p. 197. *Cistus villosus* 4. p. 319. *Cistus albidus* 4. p. 322. *Cochlearia officinalis* 4. p. 372. *Cochlearia Armoracia* 4. p. 379. *Conyza squarrosa* 4. p. 411. *Carpesium cernuum* 4. p. 414. *Cornus sanguinea* 4. p. 439. *Coriaria myrtifolia* 4. p. 440.

tertium elementum procedit. In tradendis viribus medicis plantarum nimirum operosus est auctor, omnia sine delectu, & judicio undique corradens. Tournefortii dogmata primo volumine magno conatu asserere contendit, & ut deprimat Linnæum, magnificis illum suspendit elogiis. Tam vagis, & longè quæsitis excursibus lectorem fatigat, ut futilebus sanè argumentis adversus CL. Linnæi principia numerosas paginas impletat: fuerat enim stimulatus à quibusdam viris, quos hic nominare non attinet, ut suppeditatis armis sistema sexuale in Hispaniâ prosterneret; quod quideam ipse præstare non poterat, nec Linnæana scripta, & Sigesbeckii Epicricin, quâ maximè utitur intelligere, cùm adeò esset latini sermonis ignarus, ut Isagoge Tournefortiana, quam suo operi inseruit, à Francisco Sarmiento fuerit in ejus gratiam hispanè conversa.

Cum ergò popularium meorum opera nondum typis descripta, nihil in communem utilitatem attulerint, & novas quotidiè variarum regionum Floras prodire viderem, aliquem laborem impendendum existimavi, ut quás ferat stirpes Aragoniæ solum, investigarem. Cujus rei exequendæ idoneam nactus sum opportunitatem; nam cum integrâ hyeme febre laborassem, adulto jam vere urbanioribus negotiis mie subducere constitui, ut liberiore aere uti liceret ad confirmandas vires, & occurrendum recidivæ. Incertus ergò quam potissimum regni partem eligerem, ubi amplior esset laboris materia, Aragoniam australē tandem mihi proposui, quoniam aptior visa est, & minùs his temporibus perlustrata.

Igitur initio Aprilis Cæsaraugustâ profectus ad calidiorē orientalem plagam Ibero flumini vicinam iter suscepi. Peragatis itaque amœnissimis collibus circà *Quinto*, *Hijar*, *Caspé*, & *Alcañiz*, non paucas stirpes reportavi floribus onustas. Indè montem de *Tolocha* ab oppido *Calanda* non valde remotum, & quem accolæ communi nomine *el Desierto* vocant, ascendi. Hinc me ad occidentem converti, & superatâ

neam , & minimè arboream regionem celerrimo itinere percurri, ut montem de *Herrera* citius salutarem. Elapsis quatuor diebus in observandis plurimis rarissimis , & elegantibus stirpibus impensis , monti valedixi, & via , quæ per *Belitanos* (1) Cæsaraugustam ducit ; me in patriam incolumen reduxit.

Post aliquas excusiones factas in agrum Cæsaraugustanum , secundam peregrinationem versus occidentem institui. Colles antiquæ *Segontiæ* (2) (*Epila*) vicinos , in primis quem dicunt *Montolar* , non sterilem plantarum , & adjacentem valleculam , vulgo *Val de Urrea* maritimis stirpibus insignem , magno cum fructu perreptavi. Montes de *Rodanas* ad occasum solis positos adii ; montanam regionem , quæ vicos *Brea* , & *Illueca* complectitur , superavi , & altissimum jugum *la Sierra de Villaroya* conscendi : hinc per scopulosos montes minimè vulgaribus stirpibus divites , qui oppido *Calcena* imminent , in agrum descendi urbem *Borja* circumiacentem. Turiasonem non perveni , ut erat constitutum , sed reversione factâ in australi plagam *M. Caunum* invisi , radices ejus pascuosas , & devias sylvas peragravi. Porrò multiplicia juga ; quæ versus meridiem excurrunt , transcendit *Vadaveronem* montem (3) percurri , & postquam agrum *Nertobrigæ* (4) fertilissimum lustrasse , *Segontiam* repetii. Indè per campestrem , & beatam regionem optimi vini feracissimam,

(1) Ab oppido *Belia* hodiè *Belchite* Harduin. ad Plin. l. 3. c. 4. n. 2.

(2) Hieronymus Surita in notis ad *Itiner.* Antonini edit Colon. Agrip. 1600. p. 591. veterem Segontiam in oppido *Rueda* duo millia circiter passum ab *Epila* remoto collocavit. Ut mihi videantur , inquit , *Rueda* oppido ad *Salonis* ripas hujus *Segontiæ* vestigia contineri.

(3) ... & fractis *Vadaveronem* montibus Martial. l. 1. Ep. 50.

*Vadaveronem* intelligo non solum illam montium catenam , quam vocant *Sierra de Bicor* , sed etiam aliam dictam *Sierra de Toved* , quæ interjectis humilioribus collibus à primâ disjungitur. Utramque fractorum montium appellatione aptissimè Poeta designavit.

(4) *Nertobriga* hodiè *Rula*. Surita in opere citato p. 589. quod *Nertobrigam* Ricalm hodiè appellatam esse existimemus.

main, vulgò *el Campo de Cariñena*, in montem de *Herrera* plantarum ditissimum, iteratò demùm iter relegi. Mox meridionalem jugorum tractum, qui oppida *Badenas*, *Segura*, *Montalvan*, & *Aliaga* pertingit, non infœcundis excursionibus adii. Tum demùm itinere versùs orientem inflexo prata montana salutavi. In his facile principatum tenet, ob stirpium feracitatem, quod vulgò dicunt *la Palomita* vicis *Tronchón*, & *Villarluengo* utrinquè limitaneum. Ejusdem omnino naturæ sunt, quæ versùs austrum circà pagos *Cantavieja*, *Linares*, *Alcalá de la Selva*, &c. numerosis pecorum gregibus optimum pabulum suppeditant. Ab his non longè distat *Turolium* urbs aridis, & parùm herbosis collibus cincta, ubi cùm severa febris me invasisset, & intensos calores, quibus jam adsuetus non eram, tolerare non possem, de maturando in patriam reditu cogitare cœpi.

Verumtamen non priùs hanc regionem dimittere placuit, quām aliquas stirpes decerperem in alpibus australibus, quæ ab oppido *Camarena* versùs occidentem producuntur. Res itaque ex voto successit, nam superato summo jugo *Xablambre*, in quo *Veronicam austriacam*, & *Primulam Vitalianam* obvias habui, excelsos montes circà *Albarracin*, *Griegos*, & *Oribuela* quatriduò rimatus sum; ex quibus non ignobiles plantas in herbarium, & adversaria contuli. Hinc ad septentrionem conversus, montana propè *Rodenas*, & *Villar del Saz* non sine fructu perlustravi. Tum demùm subalpinos tractus dimissi, & per humiliores agros propè *Xiloca* fluminis ripas cursum properans, *Darocam* petii. Indè in lacum de *Gallocanta* feliciter excurri, & *Salicorniam herbaceam* in mediterraneâ regione detexi. Tandem Darocâ relicta *Calatayud* urbem perveniens, itineri coronidem imposui. Nihil tamen discedere, quin *Brotodi* (1) montes, & abruptos

sco-

(1) *Et delicati dulce Brotodi nemus,*

*Pomona quod felix amat.* Martial. l. i. Ep. 50.

scopulos inviserem. Hos intercipit irrigua vallis, sed angusta, nomine *Campiel*, ubi præterlabentis Salonis beneficio, poma duracina coluntur sapidissima, & tantæ magnitudinis, ut omnia quotquot in Hispaniâ sunt cognita, facile superent.

Itaque cum non spernendum plantarum, & observationum thesaurum comparasse, rem non indignam facturum existimavi, si quod nemo anteà aggressus fuerat, hoc libello patefacerem, ut qualiscumque sit peregrinationis meæ fructus, aliquando in patriam redundaret. Continet igitur hic Prodomus ultrà mille plantas, quas in trimestri itinere, aut in agro Cæsaraugustano mense Martio, & sub fine autumni anni 1778. observare licuit. Ut autem Aragonensis Flora auctior, & ornatior in scenam prodiret, aliquas stirpes adjunxi ab amicis communicatas. In his primum locum sibi vendicant rarissimæ nonnullæ, quas propè Cæsaraugustam felici solertiâ detexit Franciscus Otano, Botanicus peritissimus; tum etiam quas ex Oscensi agro transmissit Petrus Lapiedra, de re herbariâ optimè meritus. Quæ circà uibem *Barbastro* nascentes suis locis indicantur, studio & diligentia Josephi Blanco, mihi amicitiâ devincti, omnino acceptas refero. Hanc autem integrum plantarum supellecilem Bibliothecæ Societatis Cæsarangustanæ donare decrevi, ut cuique Botanico in posterum constare possit, quâ fide, & sinceritate in recensendo hoc opere versatus sim.

Hisce igitur adjumentis, & CL. virorum humanitate factum est, ut nostra Synopsis post brevem peregrinationem, & non magnos conatus Floram Suecicam Linnæi, & Belgicam Davidis de Gorter numero plantarum flore conspicuo longè superet. Et tamen non omnia præstiti, quæ poteram; nam Botanicorum laborum mediâ jam æstate maximè pertæsus, in

bo-

---

dem hodiè sibi vendicat locus ille, quem nostrates vocant *Campiel* tria millia ferè passuum à novâ Bilbili remotus. Interpretes, quibus ignorantia feuit Topographia Bilbilitana, conjecturis minimè probabilibus Poëtam illustrare allaborarunt.

boreali Aragoniæ plagâ , ut alia taceam , Pyrenæas alpes , agrum Oscensem , juga urbi *Barbastro* vicina , & illam montium catenam , quæ *Sierra de Guara* nominatur , intacta reliqui . In australi regione plurima adhuc supersunt juga , valles , sylvæ , præcipitia , quæ nondum invisi ; imò ea ipsa quæ peragravi loca , vix rapidissimo itinere deflorari potuerunt ; nam montes *Caunum , de Herrera* , & subalpinos tractus ad orientem spectantes , non nisi cursim , & obiter salutavi , cùm sint adeò plantarum feraces , ut integras æstates requirant . Quòd si ego unus quadrimestri spatio ultra mille plantas congesse , quid spectare non debemus , si Botanici nostri unanimi , & constanti labore ad perquirendas indigenas stirpes , & omnes Aragoniæ partes rimandas animum intenderint ?

Sunt equidem aliquæ exterarum regionum Floræ hac nostrâ ditiores , sed habitâ ratione temporis , nullæ . Hallerus enim post 26. annorum labores locupletiorem stirpium Helveticarum historiam publici juris fecit . Joannes Antonius Scopoli in adornandâ Florâ Carniolicâ septem annos impedit ; tandem in Gallo-provinciali tres integras æstates Ludovicus Gerard. Is autem tam magnificis elogiis Gallo-provinciam suam extollit , ut reliquas regiones plantarum thesauro superare temerè pronunciaverit (1) . At Hispani non temerè consentient cum illo , nec facilè dabunt , quod illa regio , quam ob cœlum mite , solique fertilitatem tantoperè laudant Galli , cum Hispaniâ nostrâ numero , & elegantiâ plantarum certate possit . Hanc laudem Italiae tantum libenter concedimus . Hispania enim præter Monspelienses stirpes , omnes ferræ alpinas (2) educit in boreali plagâ ; habet autem peculiares ,

(1) ...hæ verò eâ suppellectile gaudent , quæ regiones suis stirpibus maxime celebratas facilè vincat Præfat. p. 4.

(2) Vide litteram Petro Collinsonio ab anonymo scriptam Iour.

res, quas nondum Galli suis accensere potuerunt (1). Imò ex hac nostrâ enumeratione dilucide constabit, eam esse Aragoniae soli naturam, ut Monspelienses, & Gallo-provinciales stirpes facile omnes enutriat, quod ad plenam evidētiam perduceretur, si quis per otium omnes illas exploraret: ultrā quas non paucas sibi vendicat cum aliis Hispaniae provinciis equidem communes, sed quæ Gallicarum cohortem non intrant. Harum itaque catalogum confidere, & ad cālēm Libri collocare operæ prætium esse duxi, ut Hispaniae divitias efferre, & celebrare assuescant Botanici Galli.

Nunc igitur paucis docebo rationem laboris mei. In recensendis plantis Linnæanani methodum cæteris præstantiorē anteposui; nec me unquam momordit familiaris ille novaturiendi pruritus, quo tot Scriptores, qui nova quotidiè condunt systemata breviter peritura, vexatos esse deprehendo. Inter hos nescio quid magnum ostentant, qui methodum naturale invenisse facile sibi persuadent. Atqui omnes methodi naturales mihi vehementer erunt suspectæ, donec inter Botanicos convenerit de notis, & characteribus, quibus ordines naturales internoscantur. Video enim in hoc maximè dissentientes Botanicos, cùm quam alius assumit classem naturalem, alius explodat. Hoc autem ut necessario evincam argumento, Adansonium allegare sufficiat, qui methodum Tournefortianam eò cæteris præstantiore judicavit, quia in illâ tertia classum pars sit naturalis (2). In Rajanâ vero non nisi quintam partem agnovit (3). E contrario Hallerus, quem magnum fuisse Botanicum non ibit inficias Adansonius, Raji methodum penè optimam dixit, Tournefortia-

(1) *Stipa tenacissima*, *Loeflingia*, *Queria*, *Minuartia*, *Ortegia*, *Chamarops humilis*, *Glinus lotoides*, *Teucrium fruticans*, *Nerium Oleander*, *Rhododendron Ponticum* &c.

(2) *Familles des Plantes* Pref: p. 31. De ces 22. classes, il y en a six à des près de  $\frac{1}{3}$  de naturelles.

(3) *Ibid.* p. 20. De ces 22. classes il y en a six à des près de  $\frac{1}{3}$  de naturelles.

nam totam arbitriam, adeoque minimè naturalem pronunciavit (1). Porro cùm CL. Linnæus fragmenta methodi naturalis dare vellet § 8. ordines constituit, ex quibus 20. ferè expunxit Adansonius (2). Deinde cùm præcipius cujusque methodi scopus esse debeat, ut genera, & species plantarum inter se ritè dignoscantur, non video quòd naturalis methodus plus valeat quam artificialis. Hoc autem facile demonstratur assumpto naturali ordine Umbelliferarum, in quo quām difficilè sit genera distinguere, nullus non novit Botanicus. Rursus non sola methodus, sed naturalis generum character, in quo notæ omnes in fructificatione obviæ exhibentur, juvat ad stirpium cognitionem. Hunc autem numeris omnibus absolutum, antè Linnæum quis dedit Botanicorum (3)?

Quibus intellectis, nihil mihi antiquius fuit, quām ut CL. virum in enumerandis stirpibus religiosè sectarer. Sed optimum idemque tutissimum consilium esse putavi, plantas proponere nomine generico, triviali tantum associato, quo dilucide, & compendiosè species distinguuntur. Linnæanas definitiones specificas brevitati consulens omisi, quòd veris

(1) De methodico studio Botanices inter Opuscula edita Gottingæ 1749. 8. p. 40. Sensu ergo paulum alio, quām quo optima dicitur Rajana, quòd naturæ methodo simillima sit.

Ibid. p. 42. Non Tournefortiana, quæ tota arbitraria est, ut ex similibus floris convenientius quotidie novas, neque peiores methodos excogitare sic facillimum.

(2) Præf. p. 47.

(3) La façon dont M. Linnæus établit les caractères naturels des plantes dans son Livre intitulé Genera plantarum fournit cet avantage; elle est plus exacte, elle me paroit mériter par là quelque préférence. M. de Jussieu Mem. de l' Acad. des Sciences de Paris 1739. p. 251. Adansonius tamen in censurâ opusculo Josephi Quer de viribus Vvæ ursi gallicè converso, præfixâ, Tournefortianum characterem Linnæano præferendum esse judicavit; quām rectè, videant illi, qui manca Tournefortii genera cum Lin-

Botanicis, quibus specierum immortale opus præ manibus est, omnino sint inutiles; cæteros, qui scientiæ principiis destituuntur, nihil juvent. Plantas autem novas à Linnæo prætermisas, quas omni studio illustrare sum conatus, adhibitâ differentiâ specificâ, ut par erat, exhibui. Eadem est ratio synonymorum, quæ in Linnæano opere adhibentur. Quid enim præstat auctorum loca à Linnæo allegata repetere? Quod si ritè considerassent tot Florarum Scriptores, multum chartæ, & operæ typographicæ compendium fecissent. At qui manifestus hic nævus apparet in Florâ Belgicâ Davidis Gorter, cui si Linnæi definitiones, & synonyma demas, vix unum, alterumve Morisoni synonymon supererit; cum nullas plantas novas, aut utiles observationes contineat. Potuissem etiam denominationes specificas à Linnæanis diversas fingere, quod minimè difficile puto, at meliores dare difficultum, ne dicam impossibile. Nolui tamen Hallerum imitari, qui in opere alioquin eximio, non solum differentiis à Linnæo traditis alias substituit, sed etiam præ occulto quodam in Botanicorum principem livore, non pauca nomina generica rejicit, & quæ à CL. Viro feliciter fuerant constituta adeò perturbavit, ut novos in synonymiâ labores suscipiendos futuris Botanicis reliquerit.

Stirpes illas tantum proposui, quæ in solo natali à me observatæ, aut siccæ ab amicis transmissæ, consideratæ sunt. Spontaneas solum admissi; hortensibus, & quæ culturâ proveniunt exclusis, quas tamen nonnulli Scriptores suis inserunt catalogis. Hallerus ipse, quidquid in præfatione promiserit, non paucas hujus ordinis indigenis admiscet, plantas nempè Cereales, Cactum Opuntiam, Hippocastanum, &c. Studui etiam diligenter, ne loco specierum varietates assumerem; insigniores tantum sub unaquâque specie indicasse contentus.

Plantas dubias, & novas species cum optimo præceptorc. Antonio Palau, Matritensi Professore, & Botanico longè doc-

speciminibus à me lectis retinere utilius visum est, ne perireat earum memoria, & ab aliis diligentius examinentur.

Neque nostro operi ornando, & locupletando defuerit stirpes aliquæ rarissimæ, quæ vel omnino indictæ sunt, aut ita obscurè ab antiquis traditæ, ut pro novis haberi debent; omnes autem in Linnæano opere desiderantur. In his igitur describendis, atque illustrandis onne studium, & operam collocavi; quid verò præstiterim, Botanicorum iudicio commissus, ipsis definiendum relinquo.

Synonyma à Linnæo in speciebus plantarum usurpata, observationes superiùs expositas, omissi; alia tamen è variis Scriptoribus mutuatus sum, illis præcipue, qui Hispanicas stirpes illustrarunt, Clusio, Grislei, Barrelierio, &c. Imò Linnæana adhibui nonnulla ex CL. Viti Mantissâ 2. quòd nostris Botanicis sit minus cognita, & Cæsaraugustæ in officinis librariis nunquam reperiatur. Hispanica Flora paucissima mihi synonyma suppeditavit, cùm proprias definitiones non habeat, sed Bauhinianis, aut Tournefortianis plerumque utatur.

Denominationes plantarum, quibus utitur Bernardus Cienfuegos, sivè proprias, sivè alienas, nefas fuisse præterire; nam, etiam si opus sit ineditum, princeps est auctor patriarchum stirpium. Verùm cùm septem hujus operis volumina nullam habeant adscriptam numeri notam, in gratiam eorum, quibus illa evolvere datum fuerit, ità distinguere placuit.

*Tomus 1.* nobis erit, qui præfationem in fronte gerit.

*Tomus 2.* cui de Linariis tractatio præfigitur.

*Tomus 3.* cuius Caput I. de Alyso Galeni inscribitur.

*Tomus 4.* qui de plantis leguminosis præcipue agit.

*Tomus 5.* in quo de Cerealibus tractatur.

*Tomus 6.* in duas partes dividitur. I. 465. paginas numerat, & de Graminibus agit. II. 748. paginis constat, & à Trifoliis orditur.

*Tomus 7.* varias Icones cum synonymis extra sedes proprias locatas, nonnullas etiam sine ullâ descrip-

In synonymorum ordine Hispanica nomina dedi ; & in auxilium vocavi Dioscoridis interpretationem ab Andreâ Laguna evulgatam , ut Pharmacopæis nostris , quibus est maximè familiaris , innotesceret , quas plantas officinales Aragoniæ solum educat. Ubi desunt Hispanæ denominationes , operæ prætium esse duxi Dioscoridis nomen , quod sæpè in generico , vel triviali Linnæi retinetur , ex versione Lagunæ allegare , ut cum scientiâ rei herbariæ veteris auctoris notitiam conjungerem. Adjunxi etiam vernacula Provinciæ nostræ nomina , quotquot congerere valui. Utilissimum sanè foret , omnia si fieri posset , adferre ; at ego in itinere properans , tantas & tam diversas nomenclaturas à rusticis impositas , indagare non potui (1).

Venerat etiam in mentem Arabica synónyma proferre ex Ebn Beitaris Codice Escurialensi , qui ad temporarios usus in Regiam Bibliothecam Matritensem delatus fuit ; quod quidem ad rem herbariam & Hispani sermonis origines illustrandas , magni momenti esse intelligebam : sed temporis angustiæ & typographicorum characterum defectus , quominus id facerem , prohibuere.

(1) Cienfuegos t. 3. p. 395... „Tengo libros manuscritos en mis poder de 400 años há , que tratan de yerbas , y diversas medicinas , cuyos nombres hoy no están en uso , y totalmente se han olvidados , aunque de la forma , descripción , partes , y lugar se conoce ser las mismas plantas. Pondré algunos similes , como llamar antigüamente en Castilla à las Coloquintidas *Tuero* ; de donde vino el refran común , *amarga como tueras*. La Valeriana antigüamente se llamó *Elera*. Están hoy los papeles antiguos llenos de este nombre *Canduerca* , y à penas tenemos noticia que planta sea , aunque algunos dicen que es especie de Vid silvestre , que llaman *Vya taminia*. A mas de lo dicho en distancia de 8. ó 10. leguas en Castilla tienen las yerbas mas comunes nombres causados de diferentes naciones , que la habitaron , como en tierra de Toledo , lo que en Madrid es *Espliego* , en Toledo es *Albucema*. Escorzonera es nombre nuevo por su invencion , y uso ; y en algunos lugares de tierra de Toledo es conocida siglos há con nombre de *Churrimues* por el humor como leche que da ella destila .”

Loca hatalia studiosè indicavi ; in primis illa , ubi plantas majori copiâ nascentes observare licuit ; at vulgatissimis nullum sæpius peculiarem locum designavi.

Cùm hocce opusculum meis sumptibus in lucem proferatur , & eos ponere magnos non possim , plantas tantum novas , & unam alteramve ex illis , quarum nullæ extant Icones , æri incidendas curavi. Id autem maximè studui , ut notæ discriminis perspicuè exhiberentur , cum in eo positam esse arbitrer veram Iconismi perfectionem.

Tandem ut Aragonensis Floræ Prodromus nostratisbus esset usus uberioris , nonnullas hinc indè observationes adjeci , brevitate suâ saltem commendabiles , & ad specierum illustrationem forsitan non inutiles. Usus œconomicos stirpium intrà notarum cancellos coirctatos ex probatissimis Scriptoribus produxi ; & quamvis à colligendi officio maximè abhorream , valuit apud me publica civium nostrorum utilitas , præsertim cùm omnes libri , & præcipuè exoticis linguis scripti , ex quibus mea desumpsi , ob commerciorum difficultatem in his terris penitus ignorentur.

Hisce ergo præfandi munere defunctus , reliquum est , ut malevolorum malitiæ occurram , & lectorem moneam esse nonnullos , qui me in cognoscendis plantis dicant inexercitatum , & hoc scribendi consilium vehementer improbent. At qui nondūm ipsis innotuit , quibus adjumentis in re herbariâ proficere potuerim , neque illos adeò injurios esse puto , ut me omnino ineptum existiment ad comparandam stirpium cognitionem. Quidquid demùm sit , non est causa cur metuam hos importunos criticos , qui cum Botanicis scriptis nullam sint laudem consequuti , non habent quo præ aliis sese efferant , aut inflentur opinione sui.

*Ingeniis non ille favet , plauditque sepultis;*

*Nostræ sed impugnat , nos , nostraque lividus odit.*

Horat. Ep. I. lib. 2.

# SYLLABUS AUCTORUM , QUI IN HOC Opere frequentius allegantur.

- A**cta Anglica. *Philosophical Transactions* London 4.  
 Acta Berolinensia. *Memoires de l' Academie Royale des Sciences de Berlin*. 4.  
 Acta Parisiensia. *Memoires de l' Academie Royale des Sciences* Paris 4.  
 Acta Stocki sive *Acta Academiæ Suecicæ Holmiæ*. 4.  
 Arduini Petri Memoriæ , Dissertazioni , e Descrizioni *Padova* 1766. 4.  
 Barrelieri Jacobi Icones Plantarum *Paris*. 1714. fol.  
 Bauhini Caspari Pinax , & Prodromus *Basileæ* 1671. 4.  
 —— Joh. Historia Plantarum *Ebrouduni* 1650. fol. 3.  
 Bergii Petri Jonæ Materia medica è regno vegetabili *Holmiæ* 1778. 8. 2.  
 Celsii Olai Hierobatanicon *Upsaliæ* 1745. 8. 2.  
 Columnæ Fabii minus cognitarum stirpium Ecphrasis I. & II. *Romæ* 1616. 4.  
 Clusii Caroli Historia Plantarum *Antuerpiæ* 1583. fol.  
 Dioscorides Pedacio acerca de la materia medicinal traducido por Andrés de Laguna *Salamanca* 1566. fol.  
 Du-Hamel du Monceau Traité des Arbres *Paris* 1755. 4. 2.  
 Forskal Petri Flora Arabica *Hafniæ* 1775. 4.  
 Gerard Ludovici Flora Gallo-Provincialis *Paris* 1761. 8.  
 Gleditsch Joh. Gottlieb Physicalische Abhandlungen *Berlin* 1765. 1766. 1767. 8.  
 Govan Antonii Illustrationes , & Observationes Botanicae *Tiguri* 1773. fol.  
 Grislei Gabrielis Viridarium Lusitanicum *Veronæ* 1748. 8.  
 Gunneri J. Ernest. Flora Norwegica Nidrosiæ 1766. fol.  
 Halleri Alberti Historia stirpium indigenarum Helvetiæ inchoata *Bernæ* 1768. fol. 3.  
 Hellot Art de la teinture des laines *Paris* 1772. 12.

- Jacquin Nicolai Josephi *Observationes Botanicæ Vindobonæ*  
næ 1764. 1767. fol. P. I. II. & III.
- Journal œconomique Paris 1751. 8. seq.
- Linnæi Caroli *Systema naturæ Vindobonæ* 1770. 8.
- *Mantissa secunda Holmiæ* 1771. 8.
- *Amoenitates Academicæ Holmiæ* 8. 7.
- Loefling Petri *Reise nach den Spanischen Landern*, aus  
dem Schwedischen übersetzt durch D. Alexander Bernhard  
Kolpin Berlin, und Stralsund 1766. 8.
- Morison Roberti *Historia Plantarum Oxonii* 1680. 1701.  
fol. 2.
- Muntingii Abrahami *Phytographia Amstælodami* 1711. fol.
- Necker N. J. Methodus Muscorum *Mannhemii* 1771. 8.
- Plinii Caii *Historia naturalis curante Harduino Paris* 1723.  
fol. 3.
- Quer Joseph Flora Espaniola Madrid 1762. 1764. 4. 4.
- Scheuchzeri Joan. *Agrostographia Tiguri* 1719. 4.
- Schrebers Daniel Gottfried *Sammlung von Schriften zur Ca-  
meral-Wissenschaft T. XII. Hall ab anno 1751.* 8.
- Schrebers Job. Christ. Dan. *Descriptio Graminum Systema-  
tica Germanicæ Lipsiæ* 1769. fol.
- Scopoli Joan. Antonii Flora Carniolica *Vindobonæ* 1772.  
8. 2.
- *Annus II. Historico-naturalis Lipsiæ* 1769. 8.
- Shaw Thomas *Voyage d' Afrique Paris* 4. 2.
- Tournefortii Josephi *Voyage au Levant Paris* 1717. 4. 2.
- Theophrasti Historia Plantarum *Basileæ* 1535. fol.
- Vaillant Sebastiani *Botanicon Parisiense Leidæ* 1727. fol.

## MONANDRIA.

## MONOGYNIA.

## SALICORNIA.

*Salicornia herbacea.* Kali geniculatum Barrel. Ic. 192.

Provenit copiosè en la laguna de Gallocanta.

Planta procumbens, aphylla, carnosa.

Pars hujus plantæ residua, quæ in crystallos coire recusat destillationi submissa sal volatile concretum suppeditat: hoc autem cum acidis consociato, pulvis cœruleus præcipitatur, qui cum azureo Berolinensi elegantiâ certat Henckel Flora Saturans Append. c. 2.

## DIGYNIA.

## CALLITRICHÉ.

2. *Callitriché verna* (L.).

Oritur in aquis Cæsaraugstæ, en Añon &c.

## DIANDRIA.

## MONOGYNIA.

## LIGISTRUM.

3. *Ligustrum vulgare.*

Arbol del Paraíso, y de Alheña Laguna l. 1. c. 104 (1).

In sepibus non rarum.

Baccæ chartas lusorias rubro colore tingunt Linn. Amæn. Acad. t.

5. *Plantæ tintoriae.*

## PHILLYREA.

4. *Phillyrea angustifolia*, Diosc. l. 1. c. 105.

Vernaculè Olivillo.

Habitat in montosis circà Caspe, Alcañiz, en la Sierra de Arcos.

## VERONICA.

5. *Veronica spicata.*

Provenit en Moncayo, circà Tronchon.

6. *Veronica Officinalis.*

A Ve-

*Veronica.*

Oritur in sylvis circà Albarracín, Orihuela, & alibi.

Planta, quæ ad pedes statuæ I. C. Cæsareæ Philippi nascebat-  
tur, teste Eusebio *Hist. l. 7. c. 14.* hanc nostram fuisse exis-  
timabat Melderus medicus Ulmensis: Francus *Veronica Thézans.*

*Veronica alpina.*

*Veronica minor alpina serpilli folio Clus. Hist. 2. p. 337.*

Oritur in montosis propè *Val de-Linares.*

Planta in nostro solo glabra: quarè nullus dubito, quòd Clusi  
Synonymon ad hanc speciem pertineat, ut ipse Linnæus suspi-  
catur in *Florâ Lapponicâ.*

*Veronica Beccabunga.*

In aquis non rara *Cæsaraugusta &c.*

*Veronica Anagallis aquatica.*

Habitat cum priori *Cæsaraugusta en el termino de las Fuentes.*

*Veronica austriaca.*

Occurrit mihi en el monte de Xabalambre circà *Camarena.*

Folia inferiora pinnatifida; superiora sinuata.

*Veronica Chamædrys.*

*Veronica minor foliis imis rotundioribus Moris. 2. p. 320.  
sect. 3. t. 23. f. 2.*

Habitat en Moncayo, en el Monte de Herrera, en la Palomita,  
*Val de-Linares.*

*Veronica (tenuifolia) racemosa, foliis setaceo multifidis Tab. I.  
f. 1.*

*Chamædrys hispanica, foliis tenuissimè divisis C. Bauhin.  
Prod. p. 117.*

Nascitur circà *Hijar, Alcañiz.*

Planta pedalis. Radix fibrosa. Caules teretes, pubescentes.

Folia opposita, multifida, laciniis setaceis, sèpiùs pinnatis.  
Racemi plerumque terminales, etiam laterales. Flores cœrulei,  
pedunculati, subjectis bracteis linearibus.

*Veronica agrestis.*

In agris non rara *Cæsaraugusta.*

*Veronica arvensis.*


Provenit en el monte de Herrera, & in pratis australibus.

*Veronica hederifolia.*

Habitat *Cæsaraugusta, en Calamocha.*

*Veronica triphyllus.*

Legi en la sierra de Villaroya ad margines satorum.



F. 1. *Veronica tenuifolia*



F. 2. *Massersmidia cancellata*.



## VERBENA.

17. *Verbena officinalis.*  
*Verbena Laguna l. 4. c. 61.*  
*Juxta fossas vulgatissima Cæsaraugustæ, en Epila, Calatayud.*

## LYCOPUS.

18. *Lycopus europæus.*  
*Habitat in udis Cæsaraugustæ.*  
*Ad pannos nigro colore imbuendos Gallis inservire tradunt nonnulli Iour. æcon. 1762. Avril.*

## ROSMARINUS.

19. *Rosmarinus officinalis (1).*  
*Romero Laguna l. 3. c. 81.*  
*In Aragoniâ calidiore vulgatissimus.*  
*In fasciculos collectus ad usum foci dividitur.*  
*Ex floribus cum spiritu vini destillatis aqua Regina Ungarie obtinetur. Ex Rosmarino optima mella fiunt Jayme Gil de las Colmenas trat. I. c. 5.*

## SALVIA.

20. *Salvia Officinalis.*  
*Salvia Laguna l. 3. c. 36.*  
*Provenit copiosè en el Castellar, circà Borja, Segura, Montalván, Teruel &c.*
21. *Salvia pratensis.*  
*Oritur circà Badenas, in pratis montanis en la Palomita, Cantavieja, Linares &c.*
22. *Salvia verbenaca.*  
*Vernaculè Balsamina.*  
*Habitat Cæsaraugustæ, en Epila, Hijar, Caspe, Alcañiz &c.*
23. *Salvia Æthiopis.*  
*Hispanis Oropesa.*  
*Provenit circà el Frasno, Fortanete, Camarena & alibi in Aragoniâ australi.*

## DIGYNIA.

### ANTHOXANTHUM.

24. *Anthoxanthum odoratum*, Schreber Gram. p. 49. t. 5.

(1) Tratado de la quinta esencia del balsamo del romero por Cosme Novella Zaragoza 1616. 8. Liber rarissimus.

Gramen anthoxanthon Cienfuegos t. 6. part. 1. p. 86. Ic. 88.  
Gramen alopecurum, spicâ plumosâ, luteâ, villis crîspis Bar-  
rel. Ic. 124. n. 1.

Provenit en Moncayo, en el monte de Herrera, in pratis montanis  
en la Palomita &c.

Eximum pabulum Schreber l. Ic.

## TRIANDRIA.

tribus silvæni illæ ad MONOGYNIA.

## VALERIANA.

25. Valeriana rubra.

Provenit circâ Villarluengo, Camarena, Badenas.

Varietas foliis angustioribus in montosis propè Montalván.

26. Valeriana calcitrapa.

Oritur en Moncayo, en el monte de Herrera, en la Sierra de Villa-  
roya.

27. Valeriana dioica.

Provenit en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya.

Flores foliolo colorato distinguuntur.

28. Valeriana officinalis.

Valeriana Laguna l. 1. c. 10. Cienfuegos t. 1. p. 776. t. 7.  
Ic. 3.

Habitat en la Palomita, en Linares, Camarena.

Adversùs Epilepsiam commendatur Marchant Act. Par. 1706.

29. Valeriana locusta.

Ad agrorum aggeres Cæsaraugstæ, en Hijar &c.

Apud Belgas acetaria ingreditur.

## CNEORUM.

30. Cneorum tricoccum.

Chamælea Diosc. l. 4. c. 173.

Habitat in agro Oscensi, undè ad me trasmissum.

## GLADIOCUS.

31. Gladiolus communis.

Estoque yerva Laguna l. 4. c. 22.

Gladiolo Cienfuegos t. 1. p. 633, 644.

Oritur in agris Cæsaraugstæ, en Segura.

Ad scrophulas commendabat N. Espino in opere inscripto

Miravillas secretos de Medicina, y Cirugia, cuius autographum

possidebat noster Cienfuegos l. 6.

### IRIS.

32. Iris *Pseudo-acorus*.  
*Espadaña fina* Cienfuegos t. 1. p. 625.  
 In humidis vulgaris *Cæsaraugustæ*, en *Calamocha*, *Epila* &c.  
 Flores flavo colore tingunt Denso monatl. *Beitrag.* p. 356.  
 Rustici Scotti ex hac plantâ cum vitriolo martis atramentum parant *Act. Angl.* n. 117.

### CYPERUS.

33. Cyperus *longus*.  
*Hispanis Juncia olorosa* *Laguna* l. 1. c. 4.  
 An *Malinathalla* *Theophr.* l. 4. c. 10?  
 Habitat in aquosis *Cæsaraugustæ*, & alibi.  
 Regum cadavera apud *Scytha*s cypero odorato farciebantur  
*Herod.* l. 4.  
 34. Cyperus *flavescens*.  
 Provenit *Cæsaraugustæ*, en *Epila*, *Calatayud* &c.  
 35. Cyperus *fusca*.  
 Habitat *Cæsaraugustæ* ad ripas fluminis *Gállego*.

### SCIRPUS.

36. Scirpus *palustris*.  
 Vulgatissimus in aquosis.  
 37. Scirpus *lacustris*.  
*Holoschoenus* *Diosc.* *Laguna* l. 4. c. 53.  
 In humidis non rarus ubique ferè.  
 38. Scirpus *Holoschoenus*.  
 Provenit *Cæsaraugustæ* in paludibus.  
 39. Scirpus *sylvaticus*.  
 Habitat *Cæsaraugustæ*, en *Epila*.

### ERIOPHORUM.

40. Eriophorum *polystachion*.  
*Gramen eriophoron* Cienfuegos t. 6. part. I. p. 355. Ic. 357.  
 Gramen pratense, juncea, nutante, amplâ, sparsâ, & bombycinâ paniculâ *Barrel.* Ic. 12.  
 Habitat in pratis humidis en *la Palomita*, en *Cantavieja*.  
 Norvegi ex pappo cum lanâ mixto chirothecas conficiunt. Ad implendas culcitas, ad turundas vulnerarias, & varia lanificia

adhibetur Gunner. Fl. Norveg. part. I. p. 66. Gleditsch Abhand.  
p. 252.

### NARDUS.

41. *Nardus stricta* Schreber Gram. t. 7.  
Provenit circà Orihuela, en la modorra de Badenas.  
Vermes nascentes ex ovis, quæ ad radices Typulæ deponunt, à cornicibus expetuntur Scheber l. c.

### LYGEUM.

42. *Lygeum Spartum* Loefling. Iter p. 365. t. 2.  
*Albardin* Cienfuegos. t. 6. part. I. p. 436. Ic. 446.  
Nostratis audit *Esparto*, quo nomine in aliis Hispaniæ Provinciis *Stipa tenacissima* indigitatur.  
Provenit copiosè *Cæsaraugusta* en el Castellar, circà Fuentes, Híjar, Caspe, Epila &c.  
Utilissima planta, ex quâ apud nos corbes, & funes conficiuntur.

### DIGYNIA.

### PHALARIS.

43. *Phalaris canariensis*.  
*Alpiste* Cienfuegos t. 5. p. 428.  
Oritur *Cæsaraugusta*, en Valde Urrea.  
Avicularum pabulum.  
44. *Phalaris phleoides*.  
Gramen, typhinum spicâ conoide, striatâ, culmo violaceo  
Barrel. Ic. 21. n. 1.  
Provenit en el pinar de Losilla circà Albarracin, en el monte de Herrera.  
Calycis glumæ aristatæ, oris albis. Folia mucronata.

### PANICUM.

45. *Panicum verticillatum*.  
In hortorum ambulacris frequenter obvium est.  
Involucrum ex 16, aut 20 pilis constat.  
46. *Panicum viride*.  
Habitat cum priori.  
Involucrum persistens è pilis circiter decem.  
47. *Panicum crus galli*.  
Gramen palustre, arundinaceum milii paniculâ, semine phalari-

dis Barrel. Ic. 8.

Oritur Cæsaraugustæ, en Ricla.

48. Panicum Dactylon.

Dactylon Plin. t. 24. n. 119. alia planta.

Gramen crucis, seu cruciatum tetradactylon Barrel. Ic. 753.

num. 1.

Nascitur Cæsaraugustæ, en Epila.

Unicuique spiculæ denticulum subjectum est.

### P H L E U M.

49. Phleum pratense Scheber Gram. t. 14.

Provenit en la modorra de Badenas, & in pratis montanis.

50. Phleum nodosum.

Gramen typhinum Dodonæi Cienfuegos t. 6. part. 1. p. 254.

Ic. 256.

Gramen typhoides arvense, radice tuberosâ Petiver Gram. It. t. 3. f. 1.

Oritur in pratis circa Cantavieja, sed rariùs.

Culmi declinati, geniculati.

### A L O P E C U R U S.

51. Alopecurus agrestis, Schreber Gram. t. 19. f. 2.

Gramen cum caudâ muris, purpurascens I. Bauh. Hist. 2.

p. 473.

In agris non rarus Cæsaraugustæ, en Hijar.

52. Alopecurus geniculatus.

In aquis frequenter occurrit.

53. Alopecurus monspeliensis Schreber Gram. 151. t. 20. f. 3.

Oritur Cæsaraugustæ, propè la laguna de Gallocanta.

### M I L I U M.

54. Milium effusum.

Provenit circa Purujosa.

Panicula rara, pauciflora. Folia plana, 4. aut 5. lineas lata.

55. Milium paradoxum Scopoli Fl. Carn. t. 1.

Habitat en los montes de Rodanas, en la Sierra de Toved.

### A G R O S T I S:

56. Agrostis spica venti.

Provenit en el monte de Herrera.

Ad pabulum commendat Kalm 47. Stock 1747. 66.

57. *Agrostis rubra.*  
Gramen serotinum arvense. Rajus Angl. 394. Hist. p. 1288.  
Oritur Cœsaraugstæ, en Epila.  
Panicula in nostro solo vix purpurascens dici potest.
58. *Agrostis capillaris*, Stillingfleet Misc. t. 3.  
Habitat en la modorra de Badenas, circà Rodenas, en el monte de Herrera.  
Panicula lanceolata, stricta. Rami capillares.

## AIRA.

59. *Aira aquatica.*  
Provenit in humidis Cœsaraugstæ.
60. *Aira montana.*  
Oritur in montosis propè Oribuela.
61. *Aira caryophyllea.*  
Habitat en la Sierra de Villaroya.  
Panicula ætate divergit. Spiculæ ovatæ, mucronatæ.

## MELICA.

62. *Melica ciliata.*  
Habitat en el monte de Herrera, en Rodanas.
63. *Melica nutans* Schreber Gram. t. 6. f. 2.  
Oritur in montosis australibus; ut enumerare non adtineat.
64. *Melica cœrulea* Lin. Mant. 2. p. 325. *Aira cœrulea* Idem Spec. Pl. p. 95.  
In pratis montanis frequens en la Palomita, Cantavieja, Linares &c.  
Panicula densa, purpurascens infernè à folio obvolvitur: cautè distinguenda ab *Agrosti capillari*, quòd calyces gerat constantem unifloros, ut in Belgio etiam observavi.  
Ad confirmandos aggeres utilis Bradlei Farmer. direct. p. 54.

## POA.

65. *Poa trivialis.*  
Ad agrorum margines, & justà vias.
66. *Poa angustifolia.*  
Legi copiosè circà Quinto, Alcañiz.
67. *Poa annua*, Stillingfleet Misc. t. 7.  
Passim ubique.  
Cum P. triviali conjungit Ill. Hallerus Helv. n. 1466. à qui

68. *Poa rigida.* Gramen paniculâ multiplici, majus Scheuch. Agrost. p. 271.  
Legi Cæsaugustæ ad muros.  
Spiculæ cylindricæ, in plantâ adultâ divergunt.
69. *Poa compressa.* Habitat Cæsaugustæ en el monte torrero, circâ Calcentia.  
Panicula rigida. Spiculæ lanceolatæ, compressæ, subsexfloræ.  
Rami angulati.
70. *Poa culmis prostratis, foliis convolutis, spiculis subseptemfloris.*  
An Poa paniculâ coarctatâ, secundâ, muticâ, foliis convolutis rigidis, culmo humifuso Govan Fl. Monsp. p. 470?  
Habitat propè la Laguna de Gallocanta.  
Planta spithamea. Culmi prostrati; folia convoluta, rigidiuscula. Spiculæ ovatæ, sex, vel septemfloræ. Nonnulla habet communia cum *P. littoralis* Cl. Govani; an verò hæc nostra species ad illam referri debeat, determinare non ausim, cum Icon Graminis canini maritimi C. Bauh. Prod. 4. quod in synonymiâ adhibuit Ill. vir, nostræ stirpi non benè respondeat.
71. *Poa bulbosa, vivipara.* Gramma, ò heno minimo Cienfuegos t. 6. part. 1. p. 76. Ic. 78.  
Oritur in collibus circâ Alcañiz, en el monte de Herrera, en la Sierra de Villoroya.  
Spiculæ cordato-lanceolatæ, apice foliola emittunt.
72. *Poa cristata* Lin. Syst. nat. p. 94.  
Oritur copiosè en el monte torrero, in pratis montanis en la Palomita &c.

## BRIZA.

73. *Briza media.* Cedacillo Cienfuegos t. 5. p. 305. Ic. 310.  
Gramen tremulum, seu phalaroides, minus, latâ, sparsâ paniculâ Barrel. Ic. 16.  
Frequens in pratis montanis en la Palomita, Cantavieja, Linares, circâ Badenas.

## DACTYLIS.

74. *Dactylis glomerata* Schreber Gram. t. 8. f. 2.  
Passim juxtâ vias Cæsaugustæ &c.  
Gramen pro pabulo nimis durum. Canibus vomitum ciet.

## CYNOSURUS.

75. Cynosurus *cristatus*, Schreber Gram. t. 8. f. 1.  
Gramen plantaginis spicâ glumosâ, digitatâ, heteromallum,  
majus, & minus. Barrel. Ic. 27.  
Provenit en el monte de Herrera.  
Verveces hoc gramine saginati sapidissimi fiunt Scheber l. c.  
76. Cynosurus *echinatus*.  
Oritur in montosis circâ Calcena.  
77. Cynosurus *aureus*.  
Gramma aurea, ò dorada Cienfuegos t. 6. part. 1. p. 157. Ic. 159.  
Habitat in rupibus en la sierra de Toyed.

## FESTUCA.

78. Festuca *ovina* Stillingfleet Misc. t. 11.  
Oritur en Moncayo, en Rodanas, en la Sierra de Villaroya, &  
in pratis montanis australibus.  
Pabulum ovibus gratissimum Linn. Amoen. Acad. t. 4. Ovis.  
79. Festuca *fluitans* Schreber Gram. t. 3.  
Gramen aquis innatans Cienfuegos t. 6. part. 1. p. 347.  
Ic. 349.  
Gramen miliaceum aquaticum, brizæ locustis, semine rufo.  
Barrel. Ic. 7.  
Occurrit mihi en Borja ad rivulum Sorban, en Calamocha, &  
alibi.  
Bonum pabulum equis præbet Schreber p. 39.  
Hæc planta semina manna suppeditat, ex quibus in Septentrio-  
ne placentæ fiunt Linn. Amoen. Acad. t. 3. Plantæ esculenteæ.  
80. Festuca *elatior* Schreber Gram. t. 2.  
Gramen arundinaceum Cienfuegos t. 6. part. 1. p. 335.  
Ic. 337.  
Gramen arundinaceum, locustis viridi-spadiceis, loliaceis,  
breviùs aristatis Scheuch. Agrost. p. 266. t. 5. f. 18.  
Habitat en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya.  
Bonum pabulum pro pecore Kalm Act. Stock. t. 7. p. 212.

## BROMUS.

81. Bromus *mollis* Schreber Gram. t. 8. f. 2.  
Passim ad agrorum margines.  
Ad firmandam arenam mobilem laudat Schreber p. 61.  
82. Bromus *arvensis*, Diosc. l. 4. c. 141.  
Passim in agris.

A B. tectorum vix specie distinguitur.

83. *Bromus madritensis*. I. latus & ciliatus  
Frequens Cæsaraugusta en el monte torrero. *oscul. 137*
84. *Bromus pinnatus*.  
Provenit in siccis, Cæsaraugusta en el monte torrero, circa Caspe,  
en el monte de Herrera &c. *oscul. 137*
- Bromus distachyos* Linnæi, & *Festuca ciliata* Govani non differunt à nostro nisi spicularum numero: præterea flosculorum valvulas interiores saepius ciliatas observavi in hac plantâ.

S T I P A.

85. *Stipa pennata*.  
*Gramen pennatum* Cienfuegos t. 6. part. 1. p. 130. Ic. 137.  
*Gramen sparteum*, *pennatum*, *majus* Barrel. Ic. 146. *idem* a  
Provenit circa Teruel, Alcalà de la Selva &c. *oscul. 137*
86. *Stipa capillata*.  
In siccis frequens, en el monte torrero, en el de Herrera &c.  
Panicula rara, pauciflora.

A V E N A.

87. *Avena elatior*, Schreber Gram. t. 1. p. 130. *idem* a  
Legi en la Sierra de Villaroya.  
Bonum pabulum Schreber l. c.
88. *Avena fatua*, Schreber Gram. t. 15. *idem* a  
Vernaculæ Ballueca, & Ballico. *idem* a  
*Avena silvestre* Cienfuegos t. 5. p. 272. Ic. 282.  
*Festuca dumetorum*, *utriculis* lanagine flavescentibus Barrel.  
Ic. 75. n. 4.  
Pestis agrorum.
89. *Avena flavescens* Schreber Gram. t. 9.  
Oritur en la modorra de Biddenas,  
Spiculæ ex viridi flavæ.
90. *Avena fragilis*, Schreber Gram. t. 24. f. 3.  
Provenit in siccis Cæsaraugusta.
91. *Avena pratensis*.  
Provenit en la Sierra de Villaroya, in pratis montanis.  
Spiculæ quadrifloræ culmo adpressæ.

A R U N D O.

92. *Arundo Donax*.  
Caña Laguna l. 1. c. 94.

*Cæsaraugustæ ad aquas vulgatissima.*

In Aragoniâ nostrâ culmi alii juxtâ alios positi , & religati asserum loco culcitris substernuntur.

93. *Arundo Phragmites.*

Vernaculè *Carrizo* : attamen hoc nomen omnibus calamariis, & arundinaceis plantis commune est.

Juxtâ fossas ubique frequens.

Radix Chinæ succedanea Cláudinus *Ingres. ad infirm.* p. 178.

Panicula viridi colore tingit Linn. *Amœn. Acad. t. 5. Pl. tint.*

94. *Arundo calicibus unifloris*, extùs lanuginosis Gerard Prov. p. 105.

Habitat juxtâ fossas *Cæsaraugustæ*, en Epila.

Culmus ferè bicubitalis. Panicula sericea, speciosa. Calyces membranacei, mutici, lanâ exteriore cincti. Corollæ minutæ.

Cum flores omnes hermaphroditos observem, non video cur Cl. Linnæus in Mant. 2. synonimum Gerardi ad *Andropogonem Ravennæ amandaverit.*

## LOLIUM.

95. *Lolium perenne.*

Nihil vulgatiūs in agris.

## ELYMUS.

96. *Elymus Caput medusæ*, Schreber *Gram. 17. t. 24. f. 2.*

Habitat en el pinar de Losilla circà Albarracín, en Calamocha.

## HORDEUM.

97. *Hordeum murinum* Plin. l. 22. n. 65.

Vulgatissimum juxtâ vias.

## TRITICUM.

98. *Triticum tenellum.*

Provenit en Rodanas, en la Sierra de Villaroya.

Variat plerumque calicibus septemfloris.

99. *Triticum repens.*

Gramà vulgar de Espana Cienfuegos t. 6. part. 1. p. 33. Ic. 35

Laguna l. 4. c. 32.

In agris, & hortis vulgare.

Proximè elapso sæculo, difficultate urgente frumentariâ, e radice panis parabatur in tractu Numantino (tierra de Soria teste Cienfuegos l. c. Ex eam succus dulcis exprimitur Gle

ditsch Act. Berol. 1768.

100. Triticum calycibus subnovemfloris, flosculis hirsutis, aristatis.  
 Gramen loliaceum, corniculatum, spicâ partiali subhirsutâ, fragili Scheuch. Agrost. p. 138.  
 Provenit copiosè en el Castellar, nec alibi mihi visum.  
 Culmus ferè tripedalis. Spica disticha. Spiculæ 9, aut 10 flores continent. Flosculi hirsuti aristati. Calycis glumæ etiam aristatæ, post flosculorum defluvium persistentes. Ob hanc notam singularem Scheuchzeri synonymum huc retuli. Triticum à Cl. Hallero n. 1432. propositum huic nostro proximè accedit.

## TRIGYNIA.

### MONTIA.

101. Montia *Fontana*.  
 Ad fontes non rara.

## HOLOSTEUM.

102. Holosteum *umbellatum* Loefling. Iter. p. 171.  
 In agris Cæsar Augustæ non rarum.  
 Caulis supernè pubescens.

## POLYCARPON.

103. Polycarpon *tetraphyllum*.  
 Provenit locis gramineis Cæsar Augustæ, en Caspe.

## TETRANDIA.

### MONOGYNIA.

### GLOBULARIA.

104. Globularia *Alypum*.  
 Vernaculè Cebollada, Bocha.  
 Non est Alypum Diosc. l. 4. c. 180.  
 Globularia fruticosa, myrti folio, rigido, nunc tridentato, nunc plano Shaw Afric. n. 267. Africanis Tessellgah.  
 Provenit en Tolocha, en el Castellar, in collibus circà Hijar, Caspe. Purgat ad flagitium usque.  
 105. Globularia *vulgaris*. Oritur en Tolocha, circà Badenas, en el monte de Herrera.

106. *Globularia cordifolia.*

Habitat in rupibus circà *Calcena*, *Montalván*.

Folia in meis speciminiis vix dentata. Scapus pollicaris.

## DIPSACUS.

107. *Dipsacus fullonum.*

*Cardencha Laguna l. 3. c. 11.*

Passim juxta fossas.

Ad carminandos pannos lanariis nostris inservit: & ad hoc in Galliâ colitur *Journ. œcon. 1760. Novembre.*

## SCABIOSA.

108. *Scabiosa succisa.*

Succisa morsus diaboli. *Cienfuegos t. 3. p. 291. t. 7. Ic. 442.*

Habitat in udis en *Linares*, *Alcalà de la Selva*.

Viridi colore tingit *Journ. œcon 1762. Avril.*

Fabri decoctum adhibent ad sananda vulnera equum pedibus à clavis inficta *Schaarschmidt Therap. p. 270.*

109. *Scabiosa arvensis.*

*Escabiosa mayor de los sembrados Cienfuegos t. 7. Ic. 426. t. 3. p. 28.*

Legi copiosè circà *Montalván*.

110. *Scabiosa columbaria.*

Scabiosa peregrina, integris, seu bellidis foliis altera *Barrel. Ic. 223.*

*Cæsaraugusta vulgaris* ad agrorum margines; en *Epila* &c.

Folia radicalia spatulata, crenata, integra; sæpius etiam infernè pinnatifida.

111. *Scabiosa stellata.*

Habitat circà *Cæsaraugstam*.

Folia pinnatifida, hirsuta.

112. *Scabiosa corollulis quinquefidis*, foliis radicalibus pinnatifidis, caulinis linearibus, bipinnatis.

Habitat circà *Badenas*, *Aliaga*.

Caulis cubitales, subhirsuti. Folia radicalia laciniata, caulinæ duplicatò pinnata; pinnis ultimis linearibus, acutis. Flores cœrulei, radiantes. *Icon.* quâ *Ill. Iaquinius Obs. t. 73, 74. S. ochroleucam* repræsentavit, adeò exactè præsentem sirpem refert, ut cum illâ conjungere non dubitarem, nisi prima flores luteos haberet, nostra verò cœruleos; quæ quidem variatio in eâdem specie difficillimè obtinet. An ergo sit sufficenter

distincta, determinent alii.

## SHERARDIA.

113. *Sherardia arvensis.*  
Asperula flore carneo, acuto folio Barrel. Ic. 541. n. 1.  
In agris frequens. *Cesaraugustæ*, & alibi.
114. *Sherardia muralis.*  
Legi in rupibus *en el monte de S. Ginès* propè *Rodenas*.  
Flores 4, vel 5 verticillati, pedunculis unifloris.

## ASPERULA.

115. *Asperula arvensis.*  
In agris frequenter obvia est, ut nominare non adtineat.
116. *Asperula rotundifolia.*  
Provenit *en el pinar de Losilla* circà *Albarracín*.
117. *Asperula cynanchica.*  
*Oritur en el monte torrero.*

## GALIUM.

118. *Galium palustre.*  
Galium aquaticum flore albo Barrel. Ic. 82.  
Provenit copiosè in pratis humidis *en Calamocha*. Synonymum  
Barrelieri ad aliam speciem retulit Hallerus Hely. n. 713.
119. *Galium verum*, Diosc. l. 4. c. 97.  
*Quaxa leche.*  
Ubique vulgare.  
Radices rubrum colorem largiuntur; flores verò cum alumine,  
luteum Linn. Amoen. acad. t. 5. Pl. tint. Ad morbos hystericos  
cum successu adhibuit Cl. Iussieu Lin. Amoen. t. 4. Censura  
simpl.
120. *Galium sylvaticum.*  
Rubia sylvestris lævis I. Bauh. Hist. 3. p. 716.  
Frequens juxta vias, & ad margines agrorum.  
Radix rubro tingit Arduini Mem. I. p. 55.
121. *Galium Aparine.*  
*Amorde hortelano* Laguna l. 3. c. 98.  
Locis ruderatis vulgatissimum.
122. *Galium parisiense.*  
Habitat circà *Borja*.
123. *Galium caule anguloso*, foliis senis, subasperis, aristatis Haller.  
Hely. n. 715.

*Galium album*, minimum, spatiiospermon Barr. & Ic. 157.

Nascitur in rupibus en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya.

Folia setacea, aristata, quasi imbricata. Pedunculi bifidi, etiam trifidi. Uariat foliis octo, vel novem.

## RUBIA.

124. *Rubia tinctorum*.

*Rubia Laguna l. 3. c. 154.*

Vernaculè Roya, seu Royuela.

Oritur in vineis Cæsaraugusta, en Calatayud, Epila &c.

Vis tinctoria hujus plantæ 200 abhinc annis Hispanis cognita erat, teste Laguna l. c. Ossa animalium rubro colore tingit Att.

Par. 1739. p. 1. Circà ejus culturam vide Iour. econ. 1764.

125. *Rubia peregrina*.

Habitat in sepibus Cæsaraugusta, en el monte de Herrera.

Folia ex elliptico lanceolata, lucida, avenia, serraturis subspinosis. Pedunculi sæpiùs dichotomi, rariùs trichotomi.

## PLANTAGO.

126. *Plantago major*.

*Llanten Laguna l. 2. c. 115.* vox Arabica occurrit apud Ebri Aluam rei rusticæ scriptorem. Vide Casiri Bibl. Escar. t. 1. p. 336. Ubiquè vulgatissima.

127. *Plantago lanceolata*, *Laguna l. 2. c. 115.*

Oritur copiosè juxtâ fossas.

2. Varietas: foliis tomentosis.

*Plantago* foliis linear-lanceolatis, pubescentibus, spicâ subrotundâ, nudâ, scapo subangulato foliis longiore Gerard Prov. p. 333.

*Plantago angustifolia*, tota tomentosa Grislei Virid. Lusit. p. 69. Habitat en el monte de Herrera.

128. *Plantago lagopus*.

Provenit en el monte torrero, en Monegrè de Rodanas.

Foliorum dentes vix conspicui.

129. *Plantago albicans*.

Holosteum Salmaticense Cienfuegos t. 6. part. 1. p. 415. I. 417 (1).

Holosteum Salmanticum pusillum , annum Grislei Virid. Lusit.  
p. 50.

Cesaraugstæ frequens , en Epila , Calatayud &c.  
Varietas duplex.

130. Plantago alpina.

Oritur copiosè en Moncayo , en el monte de Herrera , en la Sierra de Villaroya , circà Tronchon , Cantavieja &c.

Optimum pabulum Haller Helv. n. 657.

131. Plantago Coronopus.

Terva estrella Laguna l. 2. c. 119. aliis audit Estrellamar.  
Passim locis glareosis.

Ad morsum rabidi canis laudabat Dampier Act. Angl. n. 451.  
In Hispaniâ nostrâ edulis Ciensuegos t. 6. part. 1. p. 174. y  
aun en España se come el Coronopo con nombre de Estrellamar.

132. Plantago Psyllium.

Zaragatona Laguna l. 4. c. 71. Nomen ex duabus vocibus arabicis compositum , nempè à bazar , & katona suppresso b , quasi dixeris semen Psyllii. Utitur voce katona Rhases de Variolis , & morvillis ed. Ioan. Channing Lond. 1766. 8. p. 164.

Habitat en el monte Torrero , circà Hijar , Calanda. Semen ad serica nigro colore imbuenda requiritur Macquer tint. en soye p. 62.

133. Plantago Cynops.

Oritur in sterilibus Cesaraugstæ.

Folia hirsuta , rigidiuscula , canaliculata.

## CORNUS.

134. Cornus sanguinea.

Provenit in sepibus.

Baccæ oleum ad lampades præbent Arduini Mem. p. 101.

## CAMPHOROSMA.

135. Camphorosma monspeliensis.

Oritur juxtâ vias Cesaraugstæ , en Epila , Calatayud &c.

Folia fasciculata , hirsuta. Stamina 4 semper numeravi. Foliorum infusum ad hydropem , & asthma laudatur Act. Par. 1703.

P. 54, 55.

## ALCHEMILLA.

136. Alchemilla vulgaris.

Pie de leon Laguna obs. ad l. 4. c. 121. Cienfuegos t. 6. part.

Provenit copiosè en Valde Linares, circà Calcena.

Vaccarum lac optimum reddit; ideoque Cl. Linnæus hujus culturam in Sueciâ commendavit. *Jour. œcon.* 1762. Mai.

Cienfuegos *Ib.* p. 635. Mucho me admiro de los censores de libros de nuestros tiempos, que no han censurado, y tildado á Lagunz como quien escribe contra bonos mores, aunque su intento es remediar los daños, que ellos causan, y encubrir los defectos de naturaleza, con lo que en vulgar escribe de la Alchimilla, tomandolo á la letra de Matthiolo.

### 137. *Alchemilla argentea.*

*Pentaphyllum alpinum minimum* Cienfuegos *t.* 6. *part.* 2. *p.* 596. *Ic.* 602.

*Alchimilla pentaphyllea* Munting. *Phyt.* 19. *f.* 20.  
Oritur en Moncayo.

## DIGYNIA.

### 138. *Cuscuta europæa.*

Epitimo Laguna *l.* 4. *c.* 179. Cienfuegos *t.* 3. *p.* 355.

Nascitur aliorum stirpium parasitica.

### 139. *Hypecoum procumbens.*

Hispanis Pamplina.

In agris frequens Cæsaraugustæ &c.

### 140. *Hypecoum pendulum.*

*Hypecoum Clusii*, *tenuifolium*, flore pallido Barrel. *Ic.* 352.

Habitat cum priori: copiosè en Calcena.

## TETRAGYNIA.

### ILEX.

### 141. *Ilex Aquifolium.* Plin. *l.* 16. *c.* 24.

Acebo: sed non est Paliurus Dioscor. ut putat Laguna *l.* 1. *c.* 101.

Provenit copiosè en Moncayo, Calcena.

Ex cortice interiore fermentationi submissâ viscum paratur Dur Hamel *Arb.* I. *p.* 64.

## POTAMOGETON.

### 142. *Potamogeton natans*, Diosc. *l.* 4. *c.* 102

In aquis copiosè en Epila.

### 143. *Potamogeton densum.*

144. *Potamogeton gramineum.*

Provenit in flumine Xiloca en Monreal del Campo, Calamocha, Daroca.

### SAGINA.

145. *Sagina erecta.*

*Chamælinum gramineo*, seu acuto folio Barrel. Ic. 1165. n. 2.

Legi en la Sierra de Villaroya.

Caulis rigidus, filiformis. Folia radicalia congesta, acuta. Flores vix aperiuntur: petala calyce breviora.

### PENTANDRIA.

#### MONOGYNIA.

##### HELIOTROPIUM.

146. *Heliotropium europæum.*

Tornasol Laguna l. 4. c. 192.

Provenit Cæsaraugstæ, en Epila. &c.

### MYOSOTIS.

147. *Myosotis scorpioides.*

Non est *Myosotis* Diosc. l. 2. c. 174.

Oritur in montosis, apricis, en el monte de Herrera, en Tolocha &c.

148. *Myosotis Lappula.*

Echioides minus, globoso, echinato, & singulari semine Barrel. Ic. 1246.

Guettarda Manetti Virid. Flôr. n. 478.

Provenit en Calanda, en la Palomita.

149. *Myosotis apula.*

Symphytum Echii folio angustiore, radice rubrâ, flore luteo Tournef. Inst. p. 131.

Echium luteum, minimum, hispanicum Barrel. Ic. 1254.

Habitat in collibus circâ Quinto, Caspe.

### LITHOSPERMUM.

150. *Lithospermum officinale*, Diosc. l. 3. c. 152.

*Lithospermo menor* Cienfuegos t. 5. p. 596.

In agris vulgatissimum.

151. *Lithospermum arvense.*

Habitat cum priori.

152. *Lithospermum purpureo-cæruleum.*  
Oritur in sylvis circà Tronchon.  
Caulis ferè sesquipedalis, floriger erigitur, at fructifer decumbit. Folia lanceolata in petiolum decurrentia, scabra. Flores axillares, solitarii, racematin dispositi.
153. *Lithospermum fruticosum.*  
Anchusa frutescens tenuifolia, flore cœruleo vivacissimo Grisei Virid. Lusit. p. 18.  
Habitat in siccis circà Hijar, Caspe, Alcañiz, Calanda, Ariño &c.  
Flores speciosi purpurei, etiam cœrulei. Folia strigosa, linearia.

### ANCHUSA.

154. *Anchusa officinalis.*  
Buglossum Diosc. l. 4. c. 129. non Anchusa ejusdem l. 4. c. 25.  
Buglosa vulgar Cienfuegos t. 3. p. 364. b.  
Bulglossum sylvestre Barrel. Ic. 326.  
In agris frequens Cæsaraugusta, en Belchite &c.  
Corollam apes subeunt, Scopoli Fl. Carn. I. p. 122.  
Flores cum alumine viridi colore tingunt Linn. Amæn. Acad. t. 5. Pl. tinct.

### CYNOGLOSSUM.

155. *Cynoglossum officinale.*  
Lengua de perro Laguna l. 4. c. 130.  
Cinoglosa Cienfuegos t. 3. p. 373. t. 7. Ic. 498.  
Ad agrorum margines Cæsaraugusta, & alibi.
156. *Cynoglossum cheirifolium.*  
Cinoglosa 2 diferencia Cienfuegos t. 3. p. 374. t. 7. Ic. 496.  
Provenit Cæsaraugusta, en Epila, Hijar &c.  
Variat foliis spatulatis.

### SYMPHYTUM.

157. *Symphytum officinale.*  
Consuelda Laguna l. 4. c. 11.  
Oritur circà Barbastro.  
Radicis decocto super laccam effuso, color kermesinus obtinetur Hellot art de la teint. c. 15. Glutine symphyti lana caprarum Ancyranarum facilius in fila ducitur, Leisten Chem Tillamp. p. 25.

## ASPERUGO.

158. Asperugo procumbens.

Passim locis ruderatis.

## LYCOPSIS.

159. Lycopsis arvensis, Diosc. l. 4. c. 28.

In agris frequenter occurrit.

Caulis tuberculatus, hispidus.

## ECHIUM.

160. Echium italicum.

Echium flore albo, & carneo Grisei Virid. Lusit. p. 34.

Provenit circà Cariñena, Piedrahita.

161. Echium vulgare Diosc. l. 4. c. 29.

In agris vulgatissimum.

## MESSERSMIDIA.

162. Messersmidia (*cancellata*) foliis lanceolatis, hispidis, capsulis cancellatis Tab. I. f. 2.

Cerinthe foliis lanceolatis, caulis ramosis, floribus vix calyxem superantibus, fructibus cancellatis Quer Fl. Esp. 4. p. 145. tab. 25.

Provenit circà Tronchon.

Planta pedalis. Radix fibrosa, rufescens. Caules pilosi, ramosi. Folia radicalia lanceolata, obtusiuscula, duas circiter lineas lata, hispida: caulina similia, sensim angustiora. Inflorescencia racemosa. Flores coerulei, pedunculati. Calyx quinquepartitus, laciniis linearibus. Corolla infundibuliformis: tubus subcylindricus; limbus quinquefidus. Stamina quinque tubo inserta, brevissima: antheræ simplices. Germen ova-tum, acutum. Stylus brevis, filiformis: stigma obtusum. Capsula coriacea, umbilico retuso, quatuor prominentiis notata, bilocularis. Semen unicum in singulo loculo hinc convexum, inde angulatum.

Semina duo numeravit Quer; nos autem, & optimus præceptor unicum tantum observavimus. Ad *Messersmidia* genus revocare maluimus hanc rarissimam stirpem, cum nec habitu, neque fructificatione ad *Cerinthem* accedat.

## ANDROSACE.

163. Androsace maxima.

Non est *Androsace* Diosc. l. 3. c. 144.  
Provenit in agris Cæsaugustæ.

## PRIMULA.

164. *Primula veris.*

*Primula veris* 1. Matth. Cienfuegos t. 2. p. 258. Ic. 262.  
Oritur en Moncayo, circà Calcena, in pratis montanis la Palomita, Cantavieja, Linares &c.

165. *Primula farinosa.*

*Primula veris de flor bermeja* Cienfuegos t. 2. p. 276. Ic. 280.  
Provenit in pratis montanis en la Palomita, Cantavieja.

166. *Primula Vitaliana.*

Legi in summo monte Xabalambre circà Camarena.  
Folia congesta, linearia, mollia. Semina tria constanter numeravi.

## LYSIMACHIA.

167. *Lysimachia vulgaris* Diosc l. 4. c. 3.

Ad aquas non rara Cæsaugustæ &c.

Flores ad induranda coria utiles Gleditsch Act. Berol. 1754.  
p. 124. seq.

168. *Lysimachia (Otani) racemosa*, capsulis quinquevalvibus, foliis oppositis lanceolatis, subtus in punctatis Tab. II. f. 1.  
Ephemerum Matthioli C. B. Pin. 244. Bauh. Hist. 2. p. 905.  
Dodon. Pempt. p. 203.

Ephemerum Matthioli, vel potius Ephemerum spurium Lobel. Obs. p. 191.

Provenit ad ripas rivuli la Guerba propè Cæsaugustam loco appellato la Almotilla; en Alcalá de la selva.

Obscura est admodum hujus stirpis historia. Matthiolus in Diosc. p. 780. Ephemerum antiquorum illustrare satagens, plantam pinxit, quam ex apposita figurâ, & descriptione nullo modo possis agnoscere.

Ab hac omnino recedit quæ sub *Ephemeru Matthioli* nomine à Dodonæo, & Lobelio proposita est: quam quidem eandem esse cum nostrâ ex sequenti descriptione facile patebit.

Planta tricubitalis. Radix multiceps, fibrosa, horizontaliter sese diffundens. Caulis teres fistulosus, glaber. Folia opposita, lanceolata, integerrima, glauca, nullis punctis notata. Inflorescentia terminalis, racemosa. Pedunculi communes angustati. Flores albi propriis pedicellis sustentantur, subiectis




F. 3. *Arenaria montana*.



F. 2. *Salsola vermiculata*.

F. 1. *Lysimachia*  
*Otani*.





bracteis linearibus, alterni, s<sup>e</sup>piùs in summitate oppositi. Calycis laciniæ 5, ovatæ, rotis membranaceis. Corolla rotata, quinquepartita, laciniis obtusis. Stamina quinque, antheris incumbentibus. Germen subrotundum; stylus longus; stigma obtusiusculum. Capsula globosa, unilocularis, quinquevalvis. Semina plura angulata, receptaculo punctato affixa.

A *Lysimachia Ephemero*, quam in horto Amstælodamensi s<sup>e</sup>piùs observare licuit, abundè distinguitur magnitudine, capsulis quinquevalvibus, floribus albis, foliis in punctatis.

*Lysimachiam Otani* appellare placuit, quòd *Franciscus Otano* hanc rarissimam stirpem primus in agro Cæsaraugustano detexerit.

### A N A G A L L I S.

169. *Anagallis arvensis*, Diosc. l. 2, c. 169.

Hispanis Murages.

In agris vulgatissima.

Ad morsum rabidi canis cum successu adhibebat Cl. Barbe Pharmacopæus Parisiensis *Tour. æcon.* 1763. Novembre. Amant oves Schreber *Sammel.* III. p. 315.

170. *Anagallis latifolia*.

*Anagallis femina*, *latifolia*, *minor Grisei Virid. Lusit.* p. 17. Provenit Cæsaraugusta, en Calamocha.

### P L U M B A G O.

171. *Plumbago europæa*.

Vernaculè Belesa.

Dentelaria Cienfuegos t. 6. part. 2. p. 687.

Oritur juxtà vias Casaraugusta, en Calatayud, Calanda &c.

Planta acerrima, urens.

Cienfuegos *Ibid.* p. 688.... y aun en los montes de Aragon algunos quieren, que sea diverso genero de ella, y usan de ella para causticos, y quitar lamparones, vexigatorios, y retorios, ó fuentes la gente de las montañas de Balbastro, haciendose vexigas con ella detrás de las orejas para dolores de cabeza.

### C O N V O L V U L U S.

172. *Convolvulus arvensis*.

Enredadera; vernaculè Correguela, quo nomine Corrigolam aliis locis appellant.

In agris frequens.

173. *Convolvulus sepium.*  
Yedra campana Laguna l. 4. c. 146.  
In sepibus vulgaris.
174. *Convolvulus lineatus.*  
*Convolvulus minor spicæfolius, hispanicus* Barrel. Obs. 30.  
Ic. 311. Varietas.  
Oritur copiosè en el monte torrero, en Epila, Calatayud, Trou-  
chon &c.  
Planta sæpius vix pollicaris, decumbens.
175. *Convolvulus Cantabrica.*  
*Convolvulus non Convolvulus, angustifolius* Munting. Phyt.  
29. f. 140.  
Provenit circà Calatayud, Brea.  
Caules pedales. Folia angustiora quàm in C. linearis.  
In eâdem Hispaniâ inventa sic Cantabrica, per Divi Augusti tempo-  
ra à Cantabris reperta Plin. l. 25. c. 47.

### CAMPANULA.

176. *Campanula caule uniflora, foliis crenatis, calycibus cernuis.*  
An varietas C. pullæ Linnæi? Confer Iacquin Obs. p. 30.  
tab. 18.  
Oritur in collibus circà Hinojès, in montosis propè Villar del  
Saz, Orihuela &c.  
Planta spithamea. Caules filiformes. Folia inferiora petiolata,  
ovata, crenata: Suprema linearia, sessilia. Flores magni, nu-  
tantes, caules terminant. Icon C. pullæ apud Iacquinum satis  
benè hnic stirpi respondet; sed folia superiora subrotunda  
pinguntur, quod in nostris speciminibus non obtinet.
177. *Campanula Rapunculus.*  
Oritur in pratis montanis en la Palomita, Cantavieja, Alcalá de  
la Selva &c.  
Radix edulis Linn. Amœn. t. 3. Pl. esculente.
178. *Campanula persicifolia.*  
Habitat propè Rodenas.
179. *Campanula Trachelium.*  
Provenit circà Badenas, in pratis montanis.
180. *Campanula glomerata.*  
Rapunculus caliculatus Barrel. Ic. 523. n. 3.  
Nascitur circà Camarena, Badenas, en el pinar de Losilla circ  
Albarracin.

## PHYTEUMA.

811. *Phyteuma orbicularis*. *Margaritaria* L. *Bot. un. 1. 1. 1.*  
*Phyteuma* *Diosc.* *l. 4. c. 131.* *obscura*.  
*Rapunculus corniculatus*, *cæruleus*, *minor* *Barrel.* *l. c. 525.*  
*Provenit* *circà Aliaga* *en el barranco de la hoz.*

## SAMOLUS.

182. *Samolus Valerandi*.  
*Provenit Cæsaraugusta*, *en el termino de las fuentes*.

## LONICERA.

183. *Lonicera Caprifolium*. *Madreselva* *Laguna l. 4. c. 15.* *Periclymenum* *Diosc.* *non differt à nostrâ.*  
*Periclymenum perfoliatum* *Grislei Virid.* *Lusit.* p. 68.  
*In sepibus vulgaris*; *etiam in sylvis*; *en la Sierra de Arcos*, *propè Rodanas*, *en el desierto de Calanda*.  
*Ad exanthemata valet*, *Y sed negligitur* *Linn.* *Amæn. t. 5. Obst. medic.*
184. *Lonicera Periclymenum*.  
*Oritur en Moncayo.*
185. *Lonicera Xylosteum*. *Caprifolium erectum*, *minus*, *Xylostei Dodonei species* *Barrel.* *l. c. 511.*  
*Provenit en la Palomita*, *en el avellanar del Collado circà Bedinas*, *in sepibus &c.*  
*Folia ovata*, *acuta*, *mollia*. *Flores albi.*

## CORIS.

186. *Coris monspeliensis*.  
*Oritur Cæsaraugusta*, *en Montolar*, *circà Hijar*, *Alcañiz*, *Montalván &c.*  
*Africani ad luem venereum hac plantâ utuntur* *Shaw Afric.*

## VERBASCUM.

187. *Verbascum Thapsus*.  
*Gordolobo Laguna l. 4. c. 105.*  
*Habitat in aridis Cæsaraugusta*, *en Rodanas*, *& alibi.*  
*Morbis pulmonum bovillæ gentis medetur* *Scopoli Fl. Carn. I.* p. 155. *Semina ad pisces capiendo inserviunt* *Boccone Mus. di Fis.* p. 212.

188. *Verbascum nigrum.* MURTYUM  
Provenit in ruderatis Cæsaraugstæ &c. L. 4. c. 70.
189. *Verbascum Blattaria.* Nascitur copiosè Cæsaraugstæ, en Cariñena. Blattaria flore albo Corvini Barrel. Ic. 1249. hujus varietas.
190. *Verbascum sinuatum.*  
Provenit en Epila, Brea &c.

## DATURA.

191. *Datura stramonium.*  
An Solanum furiosum Diosc. l. 4. c. 75? Lepidam historiam de Francisco Duce Lotharingiæ fabulatur Laguna obs. ad l.c. Locis ruderatis non rara.  
Planta venenata, & Antonii copiis olim exitialis. De hac intelligi debere putat Trillerus in pec. dissert. locum Appiani de bellis Parthicis. Turcæ semina edunt Linn. Amæn. t. 6. Inebriania.

## HYOSCYAMUS.

192. *Hyoscyamus niger.*  
Veleno Laguna l. 4. c. 70.  
In ruderatis frequens.  
Aqua ex hac plantâ destillata, quam Ferdinandus I. Aragoniæ Rex ad dolores nephriticos levandos potavit, periculosum ei soporem induxit Chronica de Don Juan II. cap. 225.  
Ova, quæ ad folia *Cimex hyoscyami* deponit chartam tingunt pulchro colore kermesino Act. Angl. 1671. Seminibus gallinæ saginantur Iour. æcon. 1765. Mai.
193. *Hyoscyamus albus.*  
Frequens Cæsaraugstæ in fimetiis.

## ATROPA.

194. *Atropa Belladonna.*  
Habitat circà Cantavieja, Camarena.  
Planta venenata. Folia ad cancrum laudat Linn. Amæn. t. 4. Censura simpl.

## PHYSALIS.

195. *Physalis Alkekengi.* Vexiga de perro Laguna l. 4. c. 73.  
Provenit en Seno circà Castellote, in montosis propè Beceite.  
Non huius plantæ fructus in Hispaniâ edules sunt, ut asserit

Hallerus Helv. n. 577. sed Physalidis minima baccæ.

### SOLANUM.

196. Solanum Dulcamara. Vellio fr. ex. collas sibi  
Oritur juxta fossas Cæsar Augusta, en Epila &c.  
Ad icterum valet Hill Knovyl. of plants.
197. Solanum nigrum. Terva mora Laguna l. 4. c. 72.  
Passim in sepibus, & ruderatis.  
Succus mures arcet, & paronychiæ medetur Linn. Gotl. resa  
p. 209.

### LYCIUM.

198. Lycium europæum Linn. Syst. nat. p. 177.  
Hispanis Cambronera: vernaculè Artos.  
Provenit in sepibus Cæsar Augusta, en Epila, Hljar, Alcañiz,  
Calatayud &c.  
Flores de colore sordido. Folia spatulata, obliqua carnosa,  
congesta.

### RHAMNUS.

199. Rhamnus infectorius, Linn. Syst. nat. p. 178.  
Rhamnus Lycium Scopoli An. 2. p. 44.  
Provenit en el monte de Herrera.  
Folia ovata, crenata.  
Baccæ appellantur Graine d'Avignon: pictoribus, & infectoribus  
ad flavum colorem inserviunt Duhamel Arb. II. p. 215. Ea-  
rum ope etiam coriantinguntur i Cl. la Lande Art du Maroquin  
p. 23.
200. Rhamnus (Aragonensis) spinosus, floribus quadrifidis, her-  
maphroditis, foliis fasciculatis, linearibus, supernè lates-  
centibus.  
Lycium angustifolium, hispanicum Barrel. Ic. 996, sed folia  
pingit mimis angusta.  
Provenit in montosis circà Cæsar Augustam, Caspe, Epila, Po-  
zuelo &c.  
Frutex bipedalis, cortice glabro. Rami spinosi spinis termina-  
libus. Folia glabra, fasciculata, linearia, supernè latiora.  
Flores herbacei, hermaphroditi, congesti, pedunculati. Ca-  
lyx quadrifidus, stamina 4: & totidem squamulæ. Styli 2. vel  
tres. Bacca bi, aut trilocularis, nigra.  
Baccæ flavo colore tingunt, & quidem constanti. Cum hic  
frutex in Aragoniâ copiosè proveniat operæ premium

plorare an Rhamno orientali Cassiari Gebira dicto substitui posset ad tingenda coria, vulgo Tasiletes.

201. *Rhamnus Frangula*. **UMAJOE**

Oritur en Moncayo, circà Orihuela, Tronchon. Hujus carbones ad pulverem pyrum omnium optimi Du-Hamel Arb. I. p. 246. Cortex flavum colorem largitur Jour. œcon. 1762. Mai. Rob ad ovium scabiem Sagar morb. epid. p. 56.

202. *Rhamnus Alaternus*

Vernaculè Palo mesto, & Palo de Bañon.

Provenit in montosis circà Calatayud, Calzenay, Bañon, & alibi. Lignum sanguinem contemperare credunt nostrates.

203. *Rhamnus pumilus*, Linn. *Syst. nat.* p. 179.

Alaternus saxatilis, folio subrotundo, subtus incano Quer Fl. Esp. II. p. 202. tab. 27.

*Rhamnus rupestris* Scopoli Fl. Carn. tab. 50.

Habitat in rupibus circà Badenas, Aliaga.

Frutex in rupium fissuris radicatus, & eas obvestiens.

Folia elliptica, crenata, vix subtus villosa. Baccæ trispermæ.

**ZUMMAH**

**EUONYMUS**.

204. *Evonymus europaeus*, Theophr. l. 3. c. 18. Bonetero.

Habitat en la peña cerrada de Fortanete, circà Linares.

Folia conjugata, glabra, ovato-lanceolata, vix serrata. Pedunculi axillares : capsulæ quadrangulæ.

Lignum fabris torneariis vomitum diciet Act. Stock. 1764. trim.

III. Arilli seminum tinctoriam vim habent I. Bauh. Hist. 1.

part. 2. p. 190.

Fructus cum putamine siliquæ sesamor proximus... hic specus encarnatus Theophr. Ibid.

**RIBES**.

205. *Ribes alpinum*. Provenit en Val de Linares.

Folia tripartito-lacinata. Petala subrotunda, fulva.

206. *Ribes Grossularia*. Oritur en Val de Linares, Alcalá de la Selva, Orihueta.

Baccæ lomphaciæ succedaneæ in re culinariâ Du Hamel Arb. I. p. 280.

**HEDEERA**.

*Hedera Helix*.

*Tedra Laguna l. 2. c. 170.*

Antiqui vocabant *Cazuz*, nomen prorsus arabicum Gol. 1903.  
Casiri Bib. Escr. I. p. 336. (1).

Provenit in sepibus, en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya.

Resina de hoc fructice defluit Du Hamel Arb. I. p. 291.

### ILLECEBRUM.

208. *Illecebrum verticillatum.* K. J. H.

Oritur juxtâ vias, & agros *Cæsaraugustæ* &c. Imperiti Pharmacopæi hujus radicem pro *Hypecacuanâ* habent.

209. *Illecebrum Paronychia.*

*Sanguinaria.*

*Polygonum argenteum*; *latifolium* Munting. Phyt. 44. f. 231.

Provenit in aridis *Cæsaraugustæ* &c. Ad depurandum sanguinem apud nos adhibetur.

210. *Illecebrum capitatum.*

Nascitur in rupibus en el avellanar del Collado circâ Badenas.

### THESIUM.

211. *Thesium linophyllum.* C. D. G. T.

Provenit circâ Brea, in montosis propè Albarracín, Calatayud. Thesei radix gustu amara est, alvum purgat Theophr. l. 7. c. 11.

212. *Thesium alpinum*, Gerard Prov. t. 17. f. 1.

Oritur en Alcalá de la Selva loco apelato Valdonacara.

Flores constanter quadrifidos vidi.

### VINCA.

213. *Vinca minor.* L. 4. c. 150. An Clematis daphnoides ejusdem l. 4. c. 17?

Non videtur *Chamædaphne* Diosc. l. 4. c. 150. An *Clematis daphnoides* ejusdem l. 4. c. 17? Provenit copiosè en el desierto de Calanda.

### DIGYNIA.

### CYNANCHUM.

214. *Cynanchum acutum.*

Scammonia, *Monspeliensium longifolia* Munting. Phyt. 29. fig. 141.

Ha-

(1) E esta yerba no ha mas de una raíz sola, que se va derecha ayuso, e es así como sogra, e apegase á las paredes, e sube contra arriba. Monter. de D. Alonso / 2. c. 2.

Habitat juxtà vias Cæsaraugusta, en Epila, Galatayudo.

### ASCLEPIAS.

215. *Asclepias Vincetoxicum*, Diosc. l. 3. c. 100.  
Provenit copiosè en Pitarque.
216. *Asclepias nigra*.  
Oritur en Rodanas, en el barranco de la atalaya circà Villar de Saz.

### SEGUNDO LIBRO

#### HERNIARIA.

217. *Herniaria glabra*.  
*Mil en grana*. In agris non rara.
218. *Herniaria hirsuta*.
219. *Herniaria fruticosa*, Loefling. Iter. p. 180.  
Polygonum fruticosum, erectum, hispanicum Barrel. Ic. 713.  
Habitat en el monte torrero, in montosis propè Epila, Pozuelo, Hijar, Caspe &c.

### TERCER LIBRO

#### CHENOPODIUM.

220. *Chenopodium Bonus Henricus Cienfuegos t. 3. p. 49.*  
*Vernaculè Serrones*. Oritur copiosè en Moncayo. Editur apud nos, sed rariùs.
221. *Chenopodium album*. Nihil vulgatiùs juxtà vias Cæsaraugusta, en Epila.
222. *Chenopodium viride*. Vernaculè Bletos, sive Bledos; non confundendum cum *Amarantho Blito*. In simetis, & ruderatis frequens. Planta salsuginosa, cùjus cineres ad mundanda linteal nostratibus inserviunt.
223. *Chenopodium Botrys*. *Bien granada*, Laguna l. 3. c. 124. Provenit Cæsaraugusta, & alibi. Pro Théa venditur Hamb. Mag. t. 17. p. 505. Tineas arcet Laguna l. c.
224. *Chenopodium Vulvaria*. *Mea perros* Cienfuegos t. 3. p. 50. b. In ruderatis copiosè.

## SALSOLA.

225. *Salsola Kali.*  
Provenit *Cæsaraugstæ en Miraflores.*
226. *Salsola vermiculata* Loefling. Iter p. 182. vide Tab. II. f. 2.  
Vernaculè *Sisallo.*  
*Kali vermiculatum*, fruticans, minori folio, hispanicum Barrel. Ic. 216.  
Oritur copiosè *Cæsaraugstæ* juxtà vias, en *Epila*, *Calatayud*, *Hijar*, *Caspe*, *Atcañiz* &c.  
Folia acuta, carnosa, cum fasciculo foliorum ex alis. Calyces dilutè purpurei.  
Variat folijs hirsutis.  
*Kali geniculatum*, *aphyllantes* Barrel. Ic. 215. quod pro synonymo assumpsit Loeflingius l. c. & ab illo mutuatus est Cl. Linnaeus ad nostram stirpem nullo modo pertinet, cum aphylla non sit; neque Icon Barrelieri habitum plantæ repræsentat.  
Saponis confectores hujus fruticis cineribus utuntur *Cæsar-*  
*augustæ.*
227. *Salsola fruticosa.*  
Habitat en *Val de Urrea.*  
Folia carnosa. Calyces herbacei.

## ULMUS.

228. *Ulmus campestris.*  
*Olmo Laguna* l. c. 92.  
Provenit in sepibus, en *Moncayo*, en el deserto de *Calanda*.  
Gallæ, quas in dorso foliorum Aphides faciunt magnam ha-  
bent affinitatem cum *Chinensium Oupeitze*: undè suspicabatur  
Cl. Geoffroy quòd ad usus tinctorios trahi possent, & ori-  
entalibus substitui Act. Par. 1724. p. 320. Ad torcula, temones,  
& doliorum circulos utiliter adhibetur Du Hamel Arb. II. p. 370.

## GENTIANA.

229. *Gentiana asclepiadea.*  
*Cruciata Cienfuegos* t. 3. p. 107. t. 7. Ic. 111.  
*Gentiana aselepiadis* folio Barrel. Ic. 70.  
Provenit en la *Palomita*, *Cantavieja*, *Linares*, *Orihuela* &c.
230. *Gentiana Centaurium* (1).

Cen-

*Centaurea menor* Laguna l. 3. c. 7.

*Centaurium minus*, purpureum, angustifolium Barrel. Ic. 423.

Varietas. Vide Ic. 435. 436.

Oritur circà Càsaraugastam, en la modorra de Badenas, in pratis montanis.

Ad febres intermittentes Marchant Act. Par. 1701. p. 218.

231. *Gentiana spicata.*

Nascitur propè Càsaraugastam.

232. *Gentiana perfoliata* Loefling. Iter p. 187.

*Centaurea* de Mesué Cienfuegos t. 7. Ic. 107.

*Centaurium minus*, perfoliatum, luteum, crassioribus capitelli Barrel. Ic. 516. n. 2.

Habitat Càsaraugastæ, circà Tronchon, Alcalà de la Selya.

Variat corollis 8, vel 9-fidis : staminibus 8, aut 9.

### ERYNGIUM.

233. *Eryngium campestre.*

*Cardo corredor* Laguna l. 3. c. 22.

In campestribus, & sterilibus vulgare.

Radix dulcis, edulis.

### SANICULA.

234. *Sanicula europaea.*

*Sanicula verdadera* Cienfuegos t. 6. part. 2. p. 610. Ic. 616.

Habitat en Linares en la cerrada de la balsa, en el pinar de Losillae circà Albarracin.

### ASTRANTIA.

235. *Astrantia major.*

Provenit circà Linares en la cerrada de la balsa.

### BUPLEURUM.

236. *Bupleurum rotundifolium.*

Perfoliata Cienfuegos t. 3. p. 454. Ic. 457.

Perfoliata minor folio acuto Barrel. Ic. 1128.

In agris frequenter occurrit.

237. *Bupleurum odontites.*

Occurrit mihi en la Sierra de Toved, en el avellanar del Collado circà Badenas, ubi parcius pronascitur.

Planta bipinnicaris. Folia lanceolata, angusta, glabra. Involucra umbellas occultantia.

238. *Bupleurum rigidum.*

Oritur en la Sierra de Arcos, circà Montalvan, Villarluengo, Cantavieja.

239. *Bupleurum tenuissimum.*

*Bupleurum tenuifolium*, tannum Grislei Virid. Lusit. p. 24.

*Bupleurum tertium minimum* Fab. Columnæ Barrel. Ic. 1248.

Provenit in rupibus propè Rodenas.

240. *Bupleurum fruticosens*, Loefling. Iter p. 188.

Habitat en el monte torreco, in collibus circà Epila, Pozuelo, Hijar &c.

Folia acuta, subcarnosa.

## TORDYLIUM.

241. *Tordylium Anthriscus.*

Provenit in vineis Cæsaraugusta, en Calamocha.

Flores rubelli. Folia pinnata, aspera, pennis lanceolatis, incisis.

## CAUCALIS.

242. *Caucalis Daucoides.*

*Caucalis* Diosc. l. 2. c. 128. obscura.

Oritur en el monte torrero, circà Epila.

Folia tripinnato-multifida.

243. *Caucalis latifolia* Linn. Syst. nat. p. 205.

Vernaculè Cadillo: quod nomen nonnullis Castiliæ locis *Lappa* tribuitur.

Provenit in agris en Borja, Daroca, Calamocha &c.

Umbella ex 3. aut 4. radiis. Flores purpurei. Semina majuscula, aculeis rectis.

## DAUCUS.

244. *Daucus Carota.*

*Zanahoria*, nomen corruptum à voce arabicâ *Asfanoria* apud Ebn Aluan Casiri Bibl. Escr. I. p. 333. Vide Laguna l. 3. c. 55.

Ad agrorum margines Cæsaraugusta, en Epila, Calatayud, Daroca &c.

E radice saccharum obtinuit Margraff Act. Berol. d. 1747. p. 89.

Eandem pistam ad mammarum cancros adhibebat Cl. Sulzerus Iour. Oecon. 1765. Octobre.

## AMMI.

245. *Ammi majus.*

Provenit Cæsaraugusta.

## BUNIUM.

246. *Bunium Bulbocastanum* Diosc. l. 4. c. 125.

*Bulbocastaña* Cienfuegos t. 1. p. 589.

Oritur en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya.

Radix esculenta; mihi non displicet. Ex eâ panem parari posse docuit David Lamble in litteris ad Cl. Templemannum datis Iour. Oecon. 1768 Mai.

## CONIUM.

247. *Conium maculatum*.

*Cicuta*, Cañabeja Laguna l. 4. c. 80.

Rosch Deuter. 29. v. 18. Psalm. 79. v. 22. Jerem. 8. v. 14. Celsius Hierobot. II. p. 46.

Ad agrorum margines, & locis ruderatis non rara.

*Cicuta optima circa Susam*, & in totum locis prægelidis Theophr. l. 9. c. 15.

Vires ejus resolventes Cl. Storkii operâ inclaruerunt. Adversus scirrhos, & cancros cum successu datur.

## SELINEUM.

248. *Selinum palustre*.

Oritur en la Palomita, in pratis humidis circâ Cantavieja, Linares.

Rusi Zingiberi substituunt Act. Stok. 1747. n. 3.

249. *Selinum Carvifolia* Jacq. Austr. tab. 16.

*Selinum* foliis triplicato-pinnatis, pinnulis latiusculis, simplicibus, & trifidis Haller. Helv. n. 802. tab. 20.

Provenit circâ Calçena.

Folia supradecomposita, pinnis ultimis bi-trifidis.

Involucrum nullum. Flosculti albi.

## ATHAMANTA.

250. *Athamanta cervaria*.

Provenit copiosè en el Castillo de Perasens.

Folia bipinnata: pinnæ ultimæ cuneiformes, plerumque trifidae.

## FERULA.

251. *Ferula glauca*.

Cañabeja nomen omnibus ferulaceis plantis commune.

Provenit en Rodanas, in montosis circâ Ricla, Añon.

Cienfuegos t. 2. p. 311. b. El mismo estilo guardan hoy los viejos

Españoles, al menos guardaron nuestros abuelos, que trahian por baculos tallos de Cañahierlas (que entonces no había trahido la prodigalidad cañas, ni juncos de Indias, muletillas de ebano, ni cayados, ó muletillas blancas del Conde, haciendnos monos de lo que el otro quiso usar, olvidando lo que nuestros mayores tuvieron por honra), con los cuales mas de quatro veces me han dado como dicen coscorrones. Estos baculos se hacen hoy dia en Italia, Francia, y España de tres generos de plantas de los hinojos, de las cicutas, y de las Tapsias.

### LASERPITIUM.

252. *Laserpitium latifolium.*

Oritur en la cerrada de la balsa circà Linares.

Foliola sæpiùs biloba, subhirsuta.

253. *Laserpitium gallicum.*

Habitat en la dehesa de Aliaga.

254. *Laserpitium Siler.*

Nascitur in rupibus circà Aliaga, Tronchon.

Radix aromatica, crassa. Semen odoratum. Est Seseli Cretense officinarum.

### HERACLEUM.

255. *Heracleum Sphondylium* Diosc. l. 3. c. 84?

*Spondilium vulgare* foliis acutè incisis Barrel. Ic. 56.

Provenit circà Xarque, en la Polomita, & in pratis montanis.

A pecore non tangitur Schreber Samm. l. III. p. 17.

Poloni petiolos radicales in sole exponunt, ut farinosam, & dulcem substantiam obtineant Linn. Amæn. Acad. t. 3. Pl. esculentæ.

*Sphondili fricti ex ænogaro simplici* Apic. Cæl. lib. 3. an nostrum?

### SIUM.

256. *Sium latifolium* Diosc. l. 2. c. 116.

In fossis aquâ plenis minimè rarum.

Planta armentis exitialis Act. Stock. 1750. n. 3.

*Curculio Phellandri* Sio adhærens equis perplexiam inducit Linn.

Amæn. Noxa Insect. t. 3.

257. *Sium nodiflorum.*

Habitat cum priori.

### SISON.

258. *Sison verticillatum.*

*Oenanthe folio Millefolii Grisei Virid* Linn.

Oenanthe millefolii palustris folio Moris. Umbel. p. 63. tab. 6  
Oritur in pratis humidis en la Palomita, Cantavieja, Linares,  
Alcalà de la Selva &c.

### OE NAN THE.

259. *Oenanthe fistulosa.*

Non est Oenanthe Diosc. l. 3. c. 129.

Provenit locis paludosis Cæsaraugusta, en Calamocha &c.  
Planta vènenata.

### SCANDIX.

260. *Scandix Antbriscus.*

Caucalis vaginis lanuginosis, foliis triplicato-pinnatis, seminibus rostratis Haller. Hely. n. 743.

In ruderatis frequens, etiam en el monte de Herrera.

261. *Scandix australis.*

Oritur inter segetes Cæsaraugstæ, en Epila &c.

Involucra apice bicornia, aristata. Styli persistentes. Folia supra-decomposita, lacinias ultimis setaceis.

### CHÆROPHYLLUM.

262. *Chærophylleum sylvestre.*

Myrrhis Diosc. l. 4. c. 117. obscura.

Ad agrorum margines: copiosè en Calcena.

Unbellæ luteum colorem suppeditant meliorem quam Serratula.

Linn. Amoen. t. 5. Pl. tint.

263. *Chærophylleum temulum.*

Provenit en la modorra de Badenas.

Folia triangularia, bipinnata. Pinnulæ subrotundæ, inciso-dentatae. Semina lanceolata.

### SESELI.

264. *Seseli glaucum.*

Oritur locis glareosis circa Cæsaraugstam.

Caulis striatus, subnudus. Folia triplicato-pinnata, ultimis laciis plerumquæ trifidis, linearibus.

265. *Seseli pumilum.*

Provenit en la dehesa de Aliaga.

A Pimpinellâ glaucâ non differt Govan Illustr. p. 15.

## THAPSIA.

266. *Thapsia villosa* Diosc. *l. 4. c. 158.* Thapsia major latifolia Munting. *Phyt. 46. f. 243.*  
Habitat in montosis australibus, & circà Brea, Añon, Calce-na &c.

Luteo colore tingit Linn. *Amæn. t. 5. Pl. tint.* Cienfuegos *t. 6. part. 2. p. 249.* loquens de Mercatoribus herbarum, & aro-matum subjungit: del mismo ardid usan en el Turbith cogiendo mucha copia de él en España de ciertas raíces de Tapsia, que este nombre le dán en España, siendo el primero año, que es tierna, y nueva la planta su raiz Turbith; el segundo año, que es mas tiesa, Tapsia; quando vieja, y cocosa, Cañaheja, como diremos en su lugar: y porteandolo à Venecia, siendo nacido en España le venden por Turbith de Alexandria.

## PASTINACA.

267. *Pastinaca sativa*. Chirivìa. Proyenit Cæsaraugstæ spontanea. Ex Pastinacæ radicibus saccharum obtinuit Cl. Marggraf *Act. Berol. 1747. p. 89.* A pecore respuitur Schreber *Samml. III. p. 63.*

## ANETHUM.

268. *Anethum Fæniculum*. Hinojo Laguna *l. 3. c. 77.* In vineis vulgatissimum Cæsaraugstæ, en Epila &c. In Italiâ turiones eduntur. Apud nos ad condieandas olivas, & carnes porcinas inservit.

## CARUM.

269. *Carum Carvi*. Altaravea Laguna *l. 3. c. 62.* Casiri Bibl. Esc. I. p. 334. Habitat in pratis montanis en la Palomita, Cantavieja, Linares, Mosqueruela, Bonum pabulum Schreber *Samml. III. p. 19.* Radix in Angliâ editur Linn. *Amæn. t. 6. Macellum Olitorium.*

## PIMPINELLA.

270. *Pimpinella Saxifraga*. Major circà Linares, en la modorra de Badenas.

2. Minor circā Tronchom.

Coccus radicibus adhæret, & kermesinum colorem præstat  
Cardan. Sub. l. 9.

### APIUM.

271. *Apium graveolens*. Vernaculè Apio borde. Vide Laguna l. 3. c. 70.  
Juxtà fossas Cæsaraugustæ, en Epila,

### TRIGYNTIA.

### RHUS.

272. *Rhus coriaria*. Zumaque Laguna l. 1. c. 124. vox arabica apud Golium, & Ebn Aluam Casiri Bib. Esc. I. p. 336.  
Habitat in rupibus circā Barbastro spontanea.  
In agro Bilbilitano colitur ad condensandā coria.  
Radix rufo colore tingit, cortex verò, luteo Linn. Amæn. t. 5. Pl. tint. Arabes Hispaniam incolentes è seminib⁹ Rhois panem parabant Casiri l. c. *Rhus obsoniorum* veterum, ciborum erat condimentum Linn. Amæn t. 5. Culina mutata. Plin. l. 24. n. 55. *Rhus*, qui erythros appellatur, semen est hujus fruticis. Vim habet adstringendi, refrigerandi. Aspergiur pro sale obsoniis.  
Cortex cum vitriolo martis atramentum facit Lewis Hist. des Coul. Sect. 6. §. 1.

### VIBURNUM.

273. *Viburnum Tinus*. Hispanis Durillo, quo nomine nonnullis locis *Crataegus forminalis* intelligitur.  
Provenit copiose en el desierto de Calanda.
274. *Viburnum Lantana*. Hábitat en Moncayo, en el avellanar del Collado circā Badenas, & alibi. Folia conjugata, ovata, rugosa, utrinquè villosa. Flores corymbosi, albi. Stamina, & petala sæpius quatuor. Baccæ ellipticæ, compressæ. Cortex internus vesicatorii loco inservit. Pare Op. p. 538.

### SAMBUCUS.

*Tezgos Laguna l. 4. c. 175 (1).*

Nihil vulgatiū Cæsar Augustæ, en Daroca, Calatayud &c.

Baccæ cum acetō filum, & coria cœruleo colore imbuunt Linder. Fargekonst p. 62, 65.

276. *Sambucus nigra.*

*Sabuco, Laguna l. 4. c. 175.*

Oritur in sepibus, etiam in montosis propè Rodenas.

Capsulæ, & pectina ex ligno sunt Du Hamel. Arb. II. p. 255.

Baccæ cum alumine, & ærugine filum fusco colore tingunt Linder. Far-gekonst. p. 63, 65. Vires resolventes vulgaris notitiae.

## TAMARIX.

277. *Tamarix gallica*

*Taray, Tamariz Laguna l. 4. c. 96.* nomen corruptum ab arabico *Tarsa* Casiri Bib. Esc. I. p. 329.

Frequens juxta flumina Cæsar Augustæ, en Epila &c.

Existentiam salis Glauberiani in cineribus probare conatus est Cl. Montet; sed non omnibus satisfecit Jour. Oecon. 1763. Decembre. Cæsaraugustæ ad lixivia cineribus utuntur. Ad firmāndā coria adhiberi potest la Lande Art du Tanneur p. 22.

278. *Tamarix germanica.*

Provenit ad ripas fluminis Gallego.

Folia quadrifariam imbricata. Petala purpurea. Flores decandri.

## TELEPHIUM.

279. *Telephium Imperati.*

Provenit en Montolar, citcà Ricla, Calatayud, & alibi &c.

Folia ovato-lanceolata. Flores umbellati.

## CORRIGIOLA.

280. *Corrigiola littoralis.*

Occurrit mihi semel in montosis de Hinojés

Flores terminales, & axillares congesti. Folia angusta, glauca.

## ALSINE.

281. *Alsine media* Diosc. l. 4. c. 88.

In umbrosis freqnens, ut enumerare non adtineat.

Ad

(1) Tratado de las cosas no naturales, y virtud purgativa de los

Ad phthisin valeat Burgraf Lexic.

## -ulli invenimus sialos opili TETRAGYNIA.

### PARNASSIA.

282. *Parnassia palustris.*

*Gramma del Parnaso Laguna l. 4. c. 34.*

Oritur in uidis en la Palomita.

Caulis uniflorus. Folia radicalia cordata : caulinum unicum.

### PENTAGYNIA.

### XII. STATICE.

283. *Statice Armeria.*

*Gramen polyanthemum majus Cienfuegos t. 6. part. 1. p. 224  
Ic. 226.*

Provenit en Moncayo , en la Sierra de Villaroya.

Variat floribus albis circà Badenas , in pratis montanis en la Palomita , Cantavieja , Linares &c.

284. *Statice cordata.*

Oritur Casaraugusta , en Calatayud , Val de Urrea.

Folia spatulata , vix retusa. Flores numerosi , cœrulei , imbricati , secundi.

### LINUM.

285. *Linum usitatissimum.*

*Lino Laguna l. 2. c. 94.*

*Lino hortense Cienfuegos t. 5. p. 626. Ic. 634.*

Provenit circà Villaluengo spontaneum , cum in illo tractu non colatur.

Cienfuegos Ib. p. 631. En España hilan poco las mugeres , solo conocemos un mercado de lienzo , que llaman de Daroca , que no alcanza à la quarta parte de Castilla , y lo demás se consume en las casas , que se hilan , y no alcanza à camisa. Tienese por lino en pelo el mas excelente , el mas blanco , delgado de hebra , y largo. de las montañas de Castilla es algo corto , y negro , à causa de que no lo cuecen , y curan con limpieza. El de la Rioja , y Aragón es de blado largo de pelo , y mas blanco ; aunque la delicadeza de las mugeres de Castilla dicen que es aspero como cañamo , que les abre dedos. El dia que hoy escribo esto no se hallará en Madrid una

descuido de la labranza, y falta de gente. En Aragon valia una arroba antes de la expulsion de los Moriscos año 1600. à 22. reales la arroba del mas escogido, y hoy año de 1628. vale à tres ducados, y en plata, de suerte que con la subida de precios, prohibicion, ó Pragmaticas de mercadurias no entra en Castilla una onza. Del Cairo, ó Alexandria por via de Venecia venia à Espana lino, que estimaban mucho los Moriscos para telas delicadas, y pasaban à Holanda: ahora no viene.

Ex seminis oleo cum lithargyrio, & fuligine vernicem parant  
incolæ pagi Niewjansk in Siberiâ Pallas Reise t. 2. p. 187.

286. *Linum narbonense.*

*Linum sylvestre*, latis, acutis foliis, flore ampio Barrel. Ic. 1007.  
*Linaria angustifolia*, flore cœruleo ampio Munting. Phyt. 40.  
f. 206.

Oritur in siccis Cæsaraugustæ, en la dehesa de Talamantes, circà  
Añon, & in Aragoniâ australi ubique ferè.

287. *Linum tenuifolium.*

Lino silvestre 4. de hoja estrecha Cienfuegos t. 5. p. 654

*Linum sylvestre*, fruticosum, angustifolium Barrel. Ic. 1004.  
Habitat in siccis en el monte torrero, circà Epila, Pozuelo, Hijar, Alcañiz &c.

Frutex pedalis. Folia inferiora congesta, linearia, recurva, scabra. Caules subnudi. Flores paniculato-corymbosi, albi, ungue violaceo. Hujus plantæ innumeræ varietatas existunt.

288. *Linum strictum.*

Provenit circà Cæsaraugustam.

289. *Linum maritimum.*

Lino silvestre de flor amarilla Cienfuegos t. 5. p. 672.

Habitat cum priori.

290. *Linum catharticum.*

Vernaculè Cantilagua, & Canchilagua.

Chamælinum subrotundo folio Barrel. Ic. 1165. n, 1.

Nascitur copiosè circà Villarluengo, in pratis propè Camarena, Linares, Griegos &c.

Ad dolores nephriticos, hydropem, & febres intermitentes commendat Linn. Amæn. t. 4. Cens. simp.

Nostrates, cum successu adhibent ad dolores colicos levandos.

## HEXANDRIA.

## MONOGYNIA.

## NARCISSUS,

291. *Narcissus Pseudo-Narcissus.*  
Provenit en Moncayo.
292. *Narcissus triandrus.*  
Provenit en el Monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya.  
Stamina 6. constanter observavi. Flores cernui, petala alba, reflexa.
293. *Narcissus Jonquilla.*  
*Junquillo menor* Cienfuegos t. 1° p. 339.  
Habitat en el monte torrero. Floret Martio.  
Variat spathâ uniflorâ.

## APHYLLANTES.

294. *Aphyllantes monspeliensis.*  
Oritur in siccis Cæsaraugstæ, en Tolochæ, Rodanas, & in montosis australibus.

## ALLIUM.

295. *Allium Porrum.*  
Puerros montesinos Cienfuegos t. p. 521. Laguna l. 2. c. 138.  
Cæsaraugstæ in agris, & olivetis non rarum.
296. *Allium Victorialis.*  
*Victorial larga* Cienfuegos t. 3° p. 399. b.  
Habitat en Moncayo.  
Folia ex elliptico lanceolata. Petala alba, linearia, acuta,
297. *Allium subhirsutum.*  
Provenit circà Barbastro.
298. *Allium sphærocephalum.*  
Allium montanum, flore purpureo, globato Grislei Virid. Lusit. p. 85.  
Oritur in vineis Cæsaraugstæ, en Calamocha, en el monte de Herrera, en la modorra de Badenas.  
Petala rubere amant.
299. *Allium vincale.*  
Habitat en Cantavieja, in montosis circà Rodenæs, Badenas, en el monte de Herrera.  
Bulbi florales foliolis instruuntur.  
Alandæ Linsienses hoc Allio saginatæ sapidissimæ sunt Buchn.

*Misc. an. 1727. p. 486.*

300. *Allium roseum.*

Vernaculè *Ajo de culebra.*

*Ajo silvestre de hoja angosta Cienfuegos t. I. p. 514.*

*Ad agrorum margines Cæsar Augustæ, en Epila, Cariñena.*

*Petala dilutè purpurea.*

## LILIUM.

301. *Lilium Martagon.*

Provenit en Moncayo.

*Folia verticillata, oblonga, nervosa, glabra. Flores ex rufo flavescent, & punctis nigris notantur.*

*Radix in Sibiriâ edulis Gmel. I. p. 45.*

## TULIPA.

302. *Tulipa sylvestris.*

Provenit in collibus circà Hijar, Caspe.

## ORNITHOGALUM.

303. *Ornithogalum luteum.*

Oritur en Moncayo.

*Folia graminea; flores flavi.*

304. *Ornithogalum narbonense.*

*Ornithogalo, que llaman de Narbona Cienfuegos t. I. p. 247.*

Provenit copiosè circà Borja.

305. *Ornithogalum umbellatum.*

*Leche de gallina Laguna l. 2. c. 133.*

Habitat circà Calcena, Oseja.

## ASPHODELUS.

306. *Asphodelus fistulosus.*

Nonnulli *Cebollada* vocant; cavendum itaque ne cum *Globularia Alypo* confundatur.

Provenit copiosè Cæsar Augustæ, en Epila, Calatayud &c. Floret Martio.

*Folia fistulosa, compressiuscula. Dubitat Cl. Linnæus Mant. 2. an sit species Antherici?*

307. *Asphodelus ramosus.*

*Gamones Laguna l. 2. c. 159. Cienfuegos t. I. p. 161.*

*In montosis australibus frequentissimus.*

*In Aragoniâ australi folia siccata*

pecoris hyberno tempore.

Ex radice contusâ, & fermentationi submissâ amyllum præcipitatur Cl. Du Hamel Fabr. de l' amidon p. 1. & panis fit Iour. de Trevoux. 1709. Dec. Apud veteres Manium cibus, ideoque Infernalis herba dicebatur, Lucianus de luctu: Iam eos, qui transmissâ palude sunt ingressi, pratum excipit asphoselo consitum.

### ANTHERICUM.

308. Anthericum Liliago.

Provenit en el monte de Herrera, propè Pitargue.

### ASPARAGUS.

309. Asparagus officinalis.

Esparragos Laguna l. 2. c. 114.

In agris frequens Cæsaraugustæ, en Calatayud, Daroca &c.

Et Ravenna ternos libris rependet Plin. l. 19. n. 19.

310. Asparagus acutifolius.

Corruda prior Clus. Hist. 2. p. 177.

Oritur circà Cæsaraugustam. Baccæ rubræ.

311. Asparagus aphyllo.

Provenit Cæsaraugustæ in sepibus, en Rodanas, en Hijar &c.

Spinæ 4, aut 5 ex eodem punto prodeunt.

Corruda propter aculeos pusillum quendam producit petiolum, ex quo flosculus tandem ipse erumpit Theophr. l. 6. c. 3.

### CONVALLARIA.

312. Convallaria Polygonatum, Diosc. l. 4. c. 6.

Polygonatum latifolium, flore albo majori, odorato Barrel.

Ic. 711. n. 1.

Provenit en la Sierra de Arcos, in sylvis circà Albarracín, Badenas, Montalván, en el Monte de Herrera, circà Cal cena &c.

A C. multiflorâ vix specie differt. Radix edulis.

### HYACINTHUS.

313. Hyacinthus serotinus.

Oritur in collibus circà Hijar, en la Sierra de Arcos, circà Cal cena.

Flores colore sordido.

314. Hyacinthus comosus.

Jacinto mayor comoso Cienfuegos t. 1. p. 277.

In agro suauiter occurrit Cæsaraugusta en Estella Camarenas 816

Flores inferiores magis remoti, superiores congesti neque staminæ, neque stylos exerunt.

315. *Hyacinthus racemosus.*

Provenit copiosè in agris *Cesaraugusta*: etiam in montes ascen-  
dit *en Tolocha*, *en el monte de Herrera*, & alibi.

Odor suavis. In Belgio in hortis colitur.

### JUNCUS.

316. *Juncus acutus.*

*Juncus Laguna l. 4. c. 53.*

Ad flumina, &c in paludibus vulgatissimus.

Varietas culmis gracilioribus ad corbellos adhibetur.

317. *Juncus effusus.*

Habitat cum priori. Culmi striati.

318. *Juncus articulatus.*

Provenit in humidis *Cesaraugusta*.

Folia vix articulata dici possunt.

319. *Juncus bufonius.*

Oritur juxta aquas.

Petala mucronata. Capsusa obtusiuscula.

320. *Juncus foliis fistulosis, compresis, petalis acutis.*

*Juncus foliis compressis, articulatis, paniculâ semel ramosâ*  
Haller. *Helv. n. 1322.*

Grámen junceum paniculatum, humilius, utriculis frequenter  
donatum Moris. *Hist. 3. p. 227. t. 9. f. 2.*

Habitat in udis in pratis montanis *en la Palomita, Cantavieja, Linares* &c.

Planta palmaris. Folia compressa, fistulosa, minimè articula-  
ta. Panicula simplex; petala acuta; fructus triangularis, spa-  
diceus.

A *J. articulato* omnino differt petalis acutis, paniculâ minùs  
ramosâ, & minori altitudine.

321. *Juncus pilosus.*

Nascitur *en el monte de Herrera*.

### BERBERIS.

322. *Berberis vulgaris.*

*Berberos, Agracillos.*

Provenit copiosè *en Val de Linares, Alcalá de la Selva, Orihuela, Aliaga*.

*Amoen. t. 5. Pl. tint. Baccæ acidissimæ potum suppeditant i morbis acutis utilem.*

## FRANKENIA.

323. *Frankenia pulverulenta.*

*Albohol de Castilla. Cienfuegos t. 2. p. 864. Ic. 868. Nomen arabicum corruptum à voce Bahor. Vide Golium col. 229. qu ex Ebn Beithar brevem hujus plantæ descriptionem adumbravit.*

*Provenit Cæsaraugusta propè la puerta quemada, en la laguna d Gallocanta.*

*Planta salsuginosa.*

## PEPLIS.

324. *Peplis Portula.*

*Legi loco inundato circà Villar del Saz.*

## TRIGYNTIA

### RUMEX.

325. *Rumex crispus.*

*Romaza Laguna l. 2. c. 106. Eodem nomine aliæ Lopathi species indigitantur.*

*Hydrolapato menor Cienfuegos t. 3. p. 41. t. 7. Ic. 28.*

*Juxtà fossas vulgaris Cæsaraugusta, & ubique.*

326. *Rumex pulcher.*

*Lopathum arvense, subhirsutum, folio retuso Tilli H. Pis. 93 t. 37. f. 2.*

*Ad vias Cæsaraugusta.*

327. *Rumex acutus.*

*Oxylaphathum Diosc. l. c. Romaza Cienfuegos t. 3. p. 31.*

*Oritur in fossis Cæsaraugusta, en Daroca &c.*

*Antiquis edulis fuit.*

*Aut herba lopathi, prata amantis... Horat. Epod. 2.*

328. *Rumex scutatus.*

*Acedera de hoja redonda Cienfuegos t. 3. p. 546. t. 7. Ic. 40.*

*Acetosa rotundifolia, Romana Grislei Virid. Lusit. p. 14.*

*Provenit en Rodanas, circà Hinojés, Calatayud, en Moncayo, & alibi.*

*Cienfuegos Ibid. p. 55. b. Pero donde mas lozanas, tiernas, y me*

orillas del río Jalón, tan celebrado de Marcial, arrimadas à las cercas de las viñas, y heredades, que son todas de una pizarra de color de plomo, tan fragil que con unas piquetas, y barrenos hacen unos hoyos, donde dentro de pocos años, poniendo un sarmiento se crian las mayores vides de Europa: entre estas viñas, y sus pizarras, se crio esta planta, y desde allí por regalo se coge con sus raíces, y en unos cestos de mimbre con alguna humedad se conserva, y reparte por muchas Ciudades del Reyno, y publicamente se vende en Zaragoza las primaveras.

329. *Rumex acetosa.*

Acederas, Laguna l. 2. c. 106. Cienfuegos. t. 3. p. 51. t. 7. Ic. 36.  
Habitat en Moncayo.

330. *Rumex acetosella.*

Provenit ex Rodanas, en el monte de Herrera. &c.  
Edulis ut præcedens.

### TRIGLOCHIN.

331. *Triglochin palustre.*

Gramen triglochin Cienfuegos t. 6. part. 1. p. 161. Ic. 163.  
Oritur in udis Cesaraugusta, en Calamocha.

### COLCHICUM.

332. *Colchicum autumnale.*

Colchico que mata Cienfuegos t. 1. p. 470. Laguna l. 4. c. 85.  
Legi autumno anni 1778 propè Mallen.

Indocti Pharmacopæi pro Hermodactylo utuntur. Radix aliis  
venenata, aliis innocua. Confer Haller. Hely. n. 1256.

### POLYGYNIA.

#### ALISMA.

333. *Alisma Plantago aquatica*, Diosc. l. 3. c. 163.

In aquosis vulgaris.

Pecori nocet Gleditsch Act. Berol. 1768.

334. *Alisma ranunculoides.*

Habitat cum priori Cesaraugusta.

## OCTANDRIA.

## MONOGYNIA.

## EPILOBIUM.

335. *Epilobium hirsutum.*

Juxtâ fossas frequens Casaraugustæ, en Daroca, Calatayud, &c.  
Pappum Epilob. angustifolii ad lanificia adhibuit Gl. Vvestbeck  
Gunner. Fl. Norveg. p. 33.

336. *Epilobium montanum.*

Habitat in montosis circâ Orihuela.

Pedunculi in summo caule axillares, solitarii. Flores purpurei.

337. *Epilobium palustre.*

In aquosis non rarum, en Moncayo, &c.

## VACCINUM.

338. *Vaccinium myrtillus.*

Provenit in sylvis circâ Orihuela.

Frutex spithameus, decumbens. Flores axillares, solitarii.  
Baccæ cum lacte violaceo colore tingunt Francheville Act. Berol. 1767. at cum alumine, & gallis cœruleus color paratur pictoribus utilis Gunner. Fl. Norv. p. 93. Cum vires tinctoriae hujus fruticis nuperis innotuerint, nullas dubito quod antiquorum *Vaccinium* (1) nostrum sit, non verò *Hyacinthi* species, ut hariolatur Harduinus ad Plin. l. 21. c. 97.

## ERICA.

339. *Erica vulgaris.*

Brezo Laguna l. 1. e. 97.

Provenit en Moncayo, en el monte de Herrera, en la sierra de Villarroya.

Ex radicibus carbones fiunt ad usum ferrariorum. *Erica* decoctæ coria optimè condensari, experimentis in Hiberniâ comprobant Thomàs Rankin, & Holle Vvaring. Iour. Oecon. 1766. Avril.

Lagoporum pabulum Gunner El. Norveg. p. 14.

Luteo colore tingit Iour. Oecon. 1764 Juin.

Eri

(1) *Mollia luteola pingit vaccinia caltha* Virg. Ecl. 2.

*Item Vaccinia Italæ mansuissata: Galliæ verò etiam purpurea tingendæ causâ servitiorum vestes.* Plin l. 16. n. 31.

*Eadem ratione Vaccinium temperantes, & lac miscentes purpuram faciunt elegantem*

340. *Erica cinerea.*

Oritur en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya, en Moncayo.

341. *Erica umbellata* Loefling. Iter. p. 191.

Habitat en Moncayo.

Antheras muticas dixit Linnæus Mant. 2. ego aristatas video.

Corollæ campanulatæ, rubræ.

## DAPHNE.

342. *Daphne Laureola.*

Provenit in montosis circà S. Juan de la Peña, undè habui.

## PASSE RINA.

343. *Passerina hirsuta.*

Vernaculè *Marapollo.*

Sanamunda 3. Clus. *Erica Alexandrina* Lobel Barrel. Ic. 233.

Provenit copiosè en el Castellar, circà Hijar, Caspe. Folia carno-  
sa. Flores axillares, sessiles, lutei. Floret totâ hyeme.

Infectores Cæsaraugustani lanas hoc frutice luteo colore im-  
buunt. Africani ad scopas utuntur Shaw. Afr. n. 587,

## TRIGYNTIA.

## POLYGONUM.

344. *Polygonum Bistorta.*

*Bistorta* Cienfuegos t. 3. p. 275. t. 7 Ic. 412.

Provenit circà Barbastro.

Ex radicibus panis paratur Kalm Kalajoki. Skon. p. 34.

345. *Polygonum Persicaria.*

Juxtâ fossas Cæsaraugstæ, en Calatayud, Daroca &c.

Radix luteo colore tingit Act. Stok 1745. p. 251.

346. *Polygonum aviculare.*

Passim ad vias.

347. *Polygonum floribus octandris*, trigynis, foliis lanceolatis, sti-  
pulis laceris.

*Polygonum* floribus octandris, trigynis, foliis subulato-linea-  
ribus, stipulis setaceo-laceris, caulis subrufescens Jac-  
quin. Obs. III. p. 8. t. 57. Varietas.

In agro Cæsaraugustano detexit Franciscus Otano.

Planta sesquipedalis. Radix lignosa. Caules infernè perennan-  
tes, angulati, ramosi, erecti. Folia petiolata, lanceolata, in-

tegerima, sensim angustiora. Stipulæ membraceæ, laceræ. Flores bini, oppositi, sessiles, dilutè purpurei. Stamina octo, styli tres.

Qui *Polygoni setasi* descriptionem à Cl. Jacquinio traditam cum præcedenti contulerit, magnam inter utrumque *Polygonum convenientiam* animadvertis. In nostro folia paulò latiora videntur, stipulæ minus laceræ, & setosæ, caules nullo modo rufescentes: sed Icon Jacquiniana habitum Aragonensis plantæ optimè refert: non adsunt ergò sufficienes distinctionis notæ, qnæ has duas stirpes conjungere prohibeant tamquam ejusdem speciei varietates.

### 348. *Polygonum Convolvulus.*

Legi in rupibus circà Santed.

## TETRAGYNA.

### PARIS.

#### 349. *Paris quadrifolia.*

Habitat in sylvis en Montayo.

Gallinas enecat Gunner. Fl. Norveg. p. 55.

## DECANDRIA.

## MONOGYNA.

### DICTAMNUS.

#### 350. *Dictamnus albus.*

Vernaculè Chitan.

*Fraxinella* Cienfuegos t. 3. p. 151. t. 7. It. 183.

*Dictamnus albus officinarum, minor, hispanicus* Barrel. It. 1318.

Habitat circà Calanda.

Vapor exhalans in loco obscuroflammam concipit Nollet Phys. t. 4. p. 300.

## RUTA.

#### 351. *Ruta graveolens.*

*Ruda Laguna* l. 3. c. 48.

Provenit en el monte toreero, in collibus cireà Calatayud, Híjar, Caspe, Calanda, Alcañiz &c.

## TRIBULUS.

352. *Tribulus terrestris.*

*Abrojos Laguna l. 4. e. 16.*

*Tribulo terrestre Cienfuegos t. 4. p. 571. Ic. 589.*

*Habitat Casaraugusta.*

## ARBUTUS.

353. *Arbutus Unedo.*

*Madroño Laguna l. 1. c. 138.*

*Vernaculè nonnullis locis Alborocera.*

*Arbutus folio serrato Barrel. Ie. 674, 673.*

*Provenit copiosè en el desierto de Calanda, en Tolocha, en la Sierra de Arcos.*

*Fructus edulis, inebrians.*

354. *Arbutus Uva ursi.*

*Gayubas Quer Disertacion sobre la pasion nefritica &c. Matriti 1763. 4.*

*Oritur copiosè en Moncayo, en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya. &c.*

*Ad calculum frangendum vires habet eximias Quer op. cit. Ad condensanda coria la Lande Art. du Tanneur. p. 22. Cum alumine, & cristallo tartari lanas nigro colore inficit Iour. Oecon. 1767. Aout.*

## PYROLA.

355. *Pyrola rotundifolia.*

*Habitat in sylvis circá Linares, sed rariùs.*

## DIGYNIA.

356. *Saxifraga Cotyledon.*

*Sedum montanum, roseum, serratum, flore guttato. Barrel. Ic. 1311.*

*Provenit in montosis circà Beceite.*

357. *Saxifraga granulata.*

*Oritur en Moncayo, en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya.*

*A pecore non tangitur Schreber Samml. III. p. 75.*

358. *Saxifraga tridactylites.*

*Habitat in rupibus en Moncayo.*

del Collado propè Badenas , en la Palomita.  
Planta vulneraria.

359. *Saxifraga cespitosa* Scopoli Fl. Carn. t. 14.

Nascitur en el monte de Herrera , en la Sierra de Villaroya , en Tolocha .

### SCLERANTHUS.

360. *Scleranthus annuus*.

Provenit en la Sierra de Villaroya , in montosis circà Orihuela.

Coccus Polonicus hujus radicibus adhæret , olim celebris & in arte tinctoriâ adhibitus Linn. Amœn. t. 5. Plantæ tinct.

### GYPSOPHILA.

361. *Gypsophila Struthium*.

Hispanis Xabonera. Vernaculè Albada , & Herbada.

Non est *Struthium* antiquorum , ut patet ex descriptione Dioscor. l. 2. c. 152. & observatione Lagunæ.

Provenit copiosè Cæsaraugusta , en el Castellar , circà Epila , Pozuelo , Hijar , Belchite , & ubi gypsum adest.

Folia carnosa , acuta. Flores corymbosi , albi : petala ovata.

Cineres ad mundanda lintea expetuntur. Radix etiam dum mollescit saponis vices explet. Ad depurandum sanguinem arthriticis , calculosis , & siphiliticis proponit Linnæus Mant. 2. p. 384.

### SAPONARIA.

362. *Saponaria officinalis*.

Gentiana concava , anglica Gerardi Barrel. Ic. 92. Varietas.

Habitat in agris Cæsaraugusta , en Borja.

Trita in aquâ spumam agit , & saponis loco inservit ad detergendas maculas ex pinguedine tortas , non alias Bergius Mat. Med.

363. *Saponaria Vaccaria*.

Habitat in agris Cæsaraugusta , en Epila , Daroca , Calamocha &c.

364. *Saponaria Ocyoides*.

Provenit en el monte de Herrera , en la Sierra de Villaroya , circà Calçena , Val de Linares , Biber.

Folia ex elliptico lanceolata. Flores rubri , speciosi , fauce coronatâ.



Tab. III.  
pag. 53.



*Dianthus hispanicus.*

## DIANTHUS.

365. *Dianthus Carthusianorum.*  
Provenit en la modorra de Badenas.
366. *Dianthus Armeria.*  
Oritur circà Orihuela, en la modorra de Badenas.
367. *Dianthus prolifer.*  
Habitat in montosis circà Villar del Saz, el Frasno, Segura, Bior, Rodenas.  
Petala præmorsa. Capitulum bracteis longitudine florum cingitur.
368. *Dianthus Caryophyllus.*  
*Clavel, Betonica coronaria* Laguna l. 4. c. 1. & Cienfuegos t. 3. p. 269. t. 7. Ic. 334.  
Provenit en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya, en Moncayo, circà Orihuela.  
Pater *Caryophylli horrensis*.  
Cienfuegos Ibid. p. 270. b. conocí un Fraile Francisco, que se llamaba Matute grande artifice de ingerir, que en el lugar donde naci los ingertò (los Claveles) en Lirios, y salieron de color azul, y terciopelados como el mismo lirio cardeno.
369. *Dianthus belloides.*  
Nascitur circà Orihuela.  
Petala obversè ovata, serrata, purpurea, punctis albis notata.
370. *Dianthus superbus.*  
Oritur circà Tronchon.  
Dianthus (*Hispanicus*) caule subunifloro, squamis calycinis ova-  
tis, petalis linearibus, integerrimis Tab. III.  
Habitat en el monte torrero, circà Epila, Tronchon.  
Planta spithamæa. Radix lignosa. Folia radicalia in cæspitem congesta, linearis-subulata. Caules uniflori, rariùs biflori, glabri. Tubus calycinus cylindricus: squamæ quatuor ad basin ovatæ, acutæ. Petala linearia, integerrima, pallidè purpurea. Cætera ut in congeneribus.  
2. Variat petalis subrotundis, albis, & rubris. Hæc varietas vulgatior est circà Segura, Orihuela, Rodenas, en la muela de S. Juan, propè Griegos.  
A D. pungente Linnæi distinguitur squamis calycinis, & caulinibus non suffruticosis; à reliquis verò Dianthis, petalis linearibus.  
Ad febres intermitentes laudant nostrates.

*TRIGYNIA.*  
*CUCUBALUS.*

372. *Cucubalus Behen.*

Hispanis *Collejas*.

In agris frequenter occurrit *Cesaraugusta*, en *Epila*, *Calatajud* &c.

Flores siccati, & in pulverem redacti ad erisipelas prosunt  
Gunner. *Fl. Norv.* p. 9. Planta dum junior edulis; sed pecus  
respuit Schreber *Samml.* III. p. 53.

Cienfuegos t. 6. part. 2. p. 249. Yo he hallado en las montañas  
de Aragon, y en sus laderas Griegos, y Armenios cogiendo immen-  
sidad de estas raíces de *Collejas* las cuales llevan à Venecia, y me  
confiesan que las buelven à embarcar à España con nombre de *Behen*,  
y las reparten à toda Europa como mercaduría de Levante.

373. *Cucubalus Otites.*

Oritur en el monte torrero, in aridis circà *Epila*, *Pozuelo*.

Radix fusiformis, fibrosa. Folia radicalia congesta, cunei-  
formia, obtusa, caulina connata. Flores verticillati, dioici. Ca-  
lyx striatus. Petala angusta, albido-viridia.

SILENE.

374. *Silene nocturna.*

Provenit *Cesaraugusta* in olivetis, & agris.

375. *Silene viridiiflora.*

Oritur en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya, circà Ba-  
denas, in pratis montanis La Palomita, Cantavieja.

Caulis pubescens. Rami floribus 3, aut 4 terminati. Petala  
albido-viridia.

376. *Silene conoidea.*

Synonymum Morisoni in *Silene conica* ad hanc speciem per-  
tinet.

Habitat in agris *Cesaraugusta*, en *Epila*, *Borja* &c.

377. *Silene Armeria.*

Occurrit frequenter in agris *Cesaraugusta*, en *Epila*, *Calata-  
jud* &c.

378. *Silene rupestris.*

Legi in rupibus calcareis circà *Calcena*.

STELLARIA.

379. *Stellaria graminea.*

Provenit in sylvis en *Moncayo*, circà *Orihuela*, *Linares* &c.

80. *Stellaria petalis calycem exquantibus foliis lanceolatis cauli-*

bus procumbentibus.

*Anagallis aquatica* quarta. Lobel. p. 467.

Alsine foliis lanceolatis, petalis bipartitis, petiolis unifloris  
Haller *Helv.* n. 881.

Legi in rivulis montes sylvosos circà *Orihuela* irrigantibus.

Caules procumbentes, tetragonoi, glabri. Folia opposita, lan-  
ceolata, integerrima. Pedunculi umbellati, uniflori, rariùs bi-  
flori. Calyx in quinque segmenta acuminata divisus. Petala  
totidem alba, bipartita, expansa, calycem longitudine æqua-  
tia. Stamina decem, styli tres. Capsula ovata, sexvalvis.

### ARENARIA.

381. *Arenaria tetraquetra*.

*Caryophyllus saxatilis*, ericæ foliis C. Bauh. *Prod.* p. 105.

Provenit en la muela de S. Juan propè Griegos, in montosis  
circà Tronchon.

Planta, quam vidi, vix pollicaris erat. Folia opposita, ovata,  
acuta, imbricata. Flores terminales, aggregati, albi.

Ad febres intermittentes valere mihi narratum.

382. *Arenaria* foliis linearibus, inferne ciliatis, caulis ramosis.

An Alsine foliis ovato lanceolatis, ciliatis, petalis calyce ma-  
joribus Haller. *Helv.* n. 876. t. 17?

Provenit en la Palomita, circà Fortanete, Cantavieja.

Planta spithamea. Caules subhirsuti, ramosi. Folia linearia  
ejusdem latitudinis, infernè ciliata. Flores albi in petiolis uni-  
floris. Petala calyce majora. Planta media inter *A. multicaulem*,  
& *ciliatam* Linnæi, ut utrasque conjugat tamquam meras  
varietates.

Foliorum figurâ ab *Alsine Hallerianâ* superiùs allegatâ nonnihil  
recedit; sed Icon apposita habitum nostræ stirpis optimè re-  
præsentat.

383. *Arenaria montana* Tab. II. f. 3.

Habitat en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya, circà  
Albaracin.

Caules reptantes. Folia lanceolata, opposita. Rami fructiferi  
erecti. Pedunculi umbellati, duo, aut tres. Calycis segmenta,  
acuta. Petala alba, obversè ovata, calycibus duplò longiora.  
Flores in toto genere maximi.

384. *Arenaria rubra*.

Oritur locis gramineis Cæsaraugusta.

Variat floribus pentandris.

385. *Arenaria saxatilis.*  
Habitat in duris Cæsaraugusta, circà Badenas.
386. *Arenaria tenuifolia.*  
Legi in rupibus circà Calcena.  
Pedunculi uniflori. Calycis laciniæ subulatæ.
387. *Arenaria laricifolia.*  
Stellaria laricifolia Scopoli Fl. Carn. tab. 18.  
Provenit en el avellanar del Collado circà Badenas, en Segura.  
Folia congesta, setacea.

## PENTAGYNIA.

### COTYLEDON.

388. *Cotyledon umbilicus Veneris.*  
Umbilico de Venus, Orejas de monge, Vasillos Cienfuegos l. 1. p. 1175. Laguna l. 4. c. 93.  
In umbrosis frequens en Moncayo, en el monte de Herrera, e la Sierra de Villaroya, circà Rodanas.
389. *Cotyledon Hispanica.*  
Pistorinæ. Cotyledon caule simplici, foliis oblongis, subteretibus, corollis tubulosis, fasciculatis Ortega Cotyledonis Muzizoniae, & Pistorinæ descriptio Matriti 1772 (1).  
Habitat in montosis circà Villar del Saz, secùs el barranco de la Atalaya; propè Santed, sed parciùs.

## SEDUM.

390. *Sedum dasypyllosum.*  
Provenit en el monte de Herrera, en Rodanas, Moncayo, en la Sierra de Villaroya, circà Segura.
391. *Sedum reflexum.*  
In rupestribus, & sterilibus frequens.
392. *Sedum album.*  
Uvas de gato.  
Siempreviva menor Laguna l. 4. c. 91.  
In muris vulgatissimum.
393. *Sedum acre.*  
Vide Laguna l. 4. c. 92.

(1) Sed cur Pistoriniam dixit plantam à Cl. Linæo propositam, & descriptam cum nova genera propediem evigare promitteret? Hæc autem ad inaneim ostendit illa genera hic sequè prodierunt.

In montosis magnâ copiâ, en Moncayo, en el monte de Herrera &c.

Planta exurens ad tineam utilis Marquet Obs. p. 271. cum aquâ, & melle ad carbunculos Ibid. Obs. 98.

394. *Sedum foliis subglobosis*, caule humili, umbellato.

An *Sedum* caule folioso, erecto, umbellato, humillimo, foliis teretibus Haller *Helv.* n. 963?

Provenit en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya, en la de Arcos &c.

Planta pollicaris tota rubore perfusa. Folia opposita, etiam alterna, subglobosa. Flores umbellati, albi, linea rubrâ percorsi. *Sedum saxatile atrorubentibus floribus* Scheuch. *It. I.* p. 48. t. 6. f. 3, 4. quod inter synonyma adposuit Hallerus ad nostrum valdè accedit, si non idem, ut ex Iconibus patet.

### OXALIS.

395. *Oxalis acetosella*.

*Oxitriphyllum*, ò *Alelluya* Cienfuegos t. 3. p. 305. t. 7. Ic. 46.

*Oxys folia terna* habet Plin. l. 27. n. 89.

Oritur en Moncayo. Cienfuegos l. c. Nace en tierras humedas, y sombrias, en los bosques en mi lugar, que es Tarazona, riberas del monte Moncayo.

Vires habet tremoris tartari Floyer Pharm. p. 90.

### AGROSTEMMA.

396. *Agrostemma Githago*.

Provenit inter segetes *Cesaraugusta*, en Daroca, Calcena, Epila, Montalván &c.

### LYCHNIS.

397. *Lychnis dioica*.

In agris vulgatissima.

### CERASTIUM.

398. *Cerastium vulgatum* Loefling. Iter p. 197.

In agris, & pratis etiam montanis frequens, en la Palomita, en el monte de Herrera &c.

399. *Cerastium viscosum*.

Ad agrorum margines *Cesaraugusta*, en Hijar, Epila &c.

400. *Cerastium alpinum*.

Habitat en Moncayo, en la Sierra de Villaroya.

## DODECANDRIA.

## MONOGYNIA.

## PEGANUM.

401. Peganum *Harmala* Diosc. l. 3. c. 49.

Hispanis *Alharma*, nomen arabicum Casiri Bibl. Esc. I. p. 336. etiam *Gamarza*.

Provenit copiosè *Cesaraugusta*, en *Hijar*, *Calatayud*, *Belchite*, *Epila*, & ubi gypsum adest. Cineres ad lixivia utiles, quod ad mundanda linteal valde conferant. Semina tosta in foris veneunt apud *Turcas*, quibus ebrietatem cum hilaritate quadam conjunctam inducit Linn. *Amoen. t. 6. Inebriancia*.

## PORTULACA.

402. Portulaca *oleracea*.

*Verdolugas* Laguna l. 2. c. 113.

*Andrachne*.... colligitur cibi causâ Plin. l. 25. n. 103.

In urnis plantarum sponte crescit.

In acetaria recipitur.

## LYTHRUM.

403. Lythrum *Salicaria*.

Juxta fossas *Cesaraugusta*, en *Epila*, *Daroca*, *Calatayud* &c.

Ad dysenteriam cum successu adhibetur Iour. econ. 1764. Juillet.

Haen. Rat. med. III. p. 214. Bonum pabulum Schreber Samml.

III. non ita secundum Gleditsch Act. Berol. 1768. Flores confirmata coria Idem Act. Berol. 1754. p. 124. seq.

## DIGYNIA.

## AGRIMONIA.

404. Agrimonia *Eupatoria*.

*Agrimonia* Laguna l. 4. c. 42. sed non est *Eupatorium* Dioscoridis.

Provenit circà *Linares*, en la modorra de *Badenas*, *Cesaraugusta*. Ad icterum cum melle datur Iour. econ. 1769. Octobre. Flor ad induranda coria inserviunt Gleditsch. Act. Berol. 1754. 1

124. seq.

TRIGYNIA  
RESEDA.

405. Reseda Luteola.  
Gualda.  
Habitat in agris circà Calanda, Xarque, & alibi.  
Flavo colore tingit Hellot de la teint. c. 6.
406. Reseda canescens.  
Oritur en Biber de la Sierra, en el monte de Herrera.  
Variat floribus pentagynis.
407. Reseda alba.  
Provenit copiose circà Alcañiz, Teruel, Calamocha.
408. Reseda lutea.  
Nascitur en el monte torrero, circà Fortanete, & alibi.
409. Reseda Phyteuma.  
Habitat Cæsaraugstæ, en Epila, Hijar.  
Flores odorati. Fructus magnus.

EUPHORBIA.

410. Euphorbia Peplis.  
Provenit in agris Cæsaraugstæ.
411. Euphorbia Peplus.  
Peplis Plin. l. 27. n. 93.  
Habitat cum priori.
412. Euphorbia exigua.  
Passim Cæsaraugstæ in olivetis.
413. Euphorbia dulcis.  
Tithymalus dulcis, tuberosâ radice Barrel. Ic. 909.  
Oritur circà Caspe, nec alibi mihi visa.
414. Euphorbia segetalis.  
Nascitur inter segetes en Alcañiz, Calatayud, Brea.
415. Euphorbia helioscopia Diosc. l. 4. c. 166.  
Lecherezna; quod nomen omnibus Euphorbiis commune est.  
Esula rotundifolia serrata, carnosior Barrel. Ic. 212.  
Vulgatissima in agris Cæsaraugstæ, en Epila, Hijar, Daroca &c.  
Carnes boum ingrato sapore inficit Linn. Fl. Suec. n. 425.
416. Euphorbia serrata.  
Provenit in satis Cæsaraugstæ, en Epila, Hijar.  
Variat sponius umbellâ universali.

417. *Euphorbia verrucosa.*

Provenit en la dehesa de Cantavieja, en Alcalá de la Selva.  
Caules in nostro solo eriguntur.

418. *Euphorbia pilosa* Scopoli Fl. Carn. tab. 21.

In agris, & ruderatis Cæsaraugustæ.

419. *Euphorbia Characias* Diosc. l. 4. c. 166.

Oritur circà Brea, Añon. Folia mollia, hirsuta. Capsulæ pubescentes. Cienfuegos t. 6. part. 2. p. 249. Lo mismo hacen (loquitur de mercatoribus) con una semilla que llaman Coca de Levante, que lo es de una especie de Titimalo, Caracias, ó amygdaloides, que en Aragon, Valencia, y Cataluña son matas casi tan grandes como arbolillos; la simiente grande negra de tres esquinas. Esta cogén, y bolviéndola à traer à España, y dividir por Europa, la venden con nombre de Coca de Levante.

420. *Euphorbia sylvatica.*

Habitat in montanis circà Villarluengo, Linares, Alcalá de la Selva, Camarena, Albarracín &c. Euphorbiarum lac cum vaccino mixtum cosmetici loco fœminis inservit Linn. Amæn. t. 3. Euphorbia.

**DODECAGYNTIA****SEMPERVIVUM**421. *Sempervivum tectorum.*

Passim in tectis, & muris.

Negat Cl. Hallerus Hely. n. 949. quod in muris provenit spontaneum esse; sed apud nos certè in hortis non colitur.

Portulacæ succedaneum, edule Linn. Amæn. t. 3. Pl. 1escul. Cum terram uniat, ad firmanda tecta utile est Linn. Skonska Resa p. 183

**ICOSANDRIA****MONOGYNTIA****PUNICA POLYPUNICA**422. *Punica Granatum.*

Granado Laguna l. 1. c. 137.

Arbor exoticæ originis, sed indignatum in Aragoniâ obtinuit. Nunc provenit in sepibus Cæsaraugustæ, in rupibus circà Hijar Añon; in hoc oppido certè non colitur.

## PRUNUS.

423. *Prunus Mahaleb.*

Oritur circà Purujosa, en el avellanar del collado circà Badenas, en Pitjarque.

Ad cultrorum manubria adhibetur ob elegantem ruborem.

424. *Prunus Cerasus.*

*Cerezo borde.*

*Ciruelo silvestre* Laguna l. 1. c. 137.

Provenit magnâ copiâ en Moncayo, circà Purujosa.

Integras sylvas circà Cesaruntem occupat Tournef. Voyag. II.

p. 221. Fructus arboris sylvestris ad edendum idoneus.

425. *Prunus foliis ovato-acutis, serratis, subtùs tomentosis.*

Provenit in rupibus circà Calatayud, versùs Campiel è regione Guermeda.

Humilis fruticulus vix ad pedalem altitudinem assurgit. Rami virgati, cortice rubello. Folia petiolata, ovata, acuta, serrata, subtùs tomentosa. Fructus sessiles, sed omnes ferè emarginati erant. Quos adhuc integros mihi observare licuit, drupas esse cognovi. Alii diligenter examinent.

426. *Prunus spinosa.*

Vernaculè Aranones.

*Endrino, ò ciruelo sylvestre* Cienfuegos t. 2. p. 617. Ic. 621.

..... et spinos jam pruna ferentes Virg. Georg. 4.

In sepibus vulgatissima Cæsaraugustæ, en Epila, Calatayud, Daroca.

Folia Theæ succedanea Linn. Amoen. t. 7. Potus Theæ. Cortex rubro colore tingit Linder. Fangekonst. p. 43. Succus baccharum nigro Lewis Hist. des Coul. Sect. 2. §. 5. In agro Bilbilitano Persica in hunc fruticem inseruntur.

## DIGYNIA.

427 *Cratægus Aria.*

Vernaculè Mostajo. Vox arabicæ originis, nam Moschtahi occurrit apud Ebn Aluam. Doctissimus Casiri Mespilum interpretatur Bib. Esc. I. p. 328. Sed Cratægum, & Mespilum magna affinitas intercedit.

Oritur en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya, en Moncayo, circà Badenas, Oribuela.

*Linum durum* ad molendinorum axin utile Du-Hamel Arb. I. p. 195.

428. *Cratægus terminalis.*

*Sorbus quadruplex differentia . . . . quartum genus terminalis appellant Plin. l. 15. n. 23.*

Provenit en Moncayo.

Folia infernè hirsuta. Flores corymbosi, albi. Fructus edulis.

429. *Crataegus Oxyacantha.*

*Espino de majuelas Laguna l. 1. c. 102.*

Provenit in sepibus, en la Sierra de Villaroya, en el monte de Herrera, & in montosis ubique ferè.

Flores constanter monogynos observavi.

## TRIGYNYA.

### SORBUS.

430. *Sorbus domestica.*

*Serval Laguna l. 1. c. 136.*

Fructus vernaculè Azarollas.

Habitat en Moncayo, en la libreta de Piedrahita.

Lignum omnium durissimum Du Hamel Arb. II. p. 273. Fructus insigni austeritate præditus.

## PENTAGYNYA.

### MESPILUS.

431. *Mespilus Amelanchier.*

*Amelanchier Galloprovinciæ Barrel. Ic. 527.*

Oritur copiosè en el monte de Herrera, en Moncayo, en la Sierra de Villaroya, en la dehesa de Aliaga, en Cal cena.

432. *Mespilus Cotoneaster.*

*Chamæ-Mespilus alpina Munting. Phyt. 12. f. 54.*

Nascitur circè Linares, Alcalá de la Selva.

Flores in nostro solo trigyni. Fructus farinosus ad edendum inidoneus.

### PYRUS.

433. *Pyrus Malus.*

*Manzano Laguna l. 1. c. 131.*

Provenit en Moncayo, propè Purujosa.

Ex fructibus sylvestribus vinum pomaceum paratur vulgo Cidera Adt. Angl. v. 43. n. 477. Apes Malorum flores subeunt Gloditsch. Abhand. II. p. 155. Lignum torneatoribus inservit Du Hamel Arb. II. p. 9. Cortex citreum colorum præstat Linn.

## SPIRÆA.

434. *Spiræa Filipendula.*

Oritur en el monte de Herrera, circà Aliaga, Alcalá de la Selva. Ex radicibus panis fit Linn. Amæn. t. 3. Pl. esculentæ. Sues eas amant Linn. Amæn. t. 1. Fl. Oecon.

435. *Spiræa Ulmaria.*

Habitat en la Palomita, circà Cantavieja, Linares &c. in pratis. Norvegis inservit ut cerevisiæ bonum odorem, & saporem concilient Gunner. Fl. Norv. p. 77. Bonum pabulum Schreber. Samml. III. p. 87.

## POLYGYNIA.

## ROSA.

436. *Rosa canina.*

Escaramujos Laguna l. 1. c. 103.

Barkanim Judic. c. 3. v. 7. 16. Celsius Hierob. II. p. 192.

In sepibus frequentissima.

Calycis laciniæ duæ utrinquè pinnatæ, duæ simplices, & quinta ab altero latere dentata. Fructus edules etiam in Iedzo Relat. des Voyag. au Nord. t. 3. Aqua stillatitia vulgaris notitiæ.

437. *Rosa alba.*

Provenit in montosis en el monte de Herrera, en Moncayo, en la Sierra de Villaroya.

Calycis segmenta integra.

## RUBUS.

438. *Rubus idæus* Diosc. l. 4. c. 39.

Fructus vernaculè Chordones appellatur.

Oritur copiosè en Moncayo.

In montosis Aragoniæ borealis gelatinam parare solent ex fructibus. Dudaim Rubenis Gen. c. 30. v. 14. ad hanc stirpem revocat Rudbeck. in pec. dissert. Ups. 1733. 8.

439. *Rubus casius.*

In sepibus, & sylvis, en Moncayo, en el monte de Herrera.

440. *Rubus fruticosus.*

Zarzamora Laguna l. 4. c. 38.

In sepibus vulgatissimus.

Fructus edulis, mihi gratissimus. Flores ad condensanda coria utiles Gleditsch Act. Berol 1754. p. 124. seq.

441. *Fragaria vesca.*

*Fresas de Castilla* Cienfuegos t. 6. part. 2. p. 639. Ie. 647.

Provenit copiosè en Moncayo , circà Piturque.

*Coccus radicibus adhæret* Act. angl. v. 54. p. 92.

Circà vocis originem hæc habet Cienfuegos t. 6. part. 2. p. 646. Despues de haber inquirido con cuidado el nombre que antiguamente tenian en España las Fresas, hallo que el de fresas es moderno , y como tomado de los Franceses del nombre fraises , porque preguntando à gente platica de las montañas de Burgos me han asegurado que à la mata llaman Mayueta yerva , y al fruto Mayueta. En tierra de Buitrago ansi mesmo les llaman Mayuetas : los Asturianos le dicen à la fruta Belletanos , y el Vocabulario Morisco de Talabera en la letra M. dice ansi : Mayueta fruta de cierta yerba en Morisco , ò Aljama , Zirota mita polot , y tambien zaror mita polot. De que se infiere que este nombre Mayueta , que traen Vikman , y Xarava fue comun en España para las fresas ; pues aun se conserva en las montañas , y en algunas provincias , aunque los mas politicos , ò cultos de nuestros tiempos les llaman fresas.

## POTENTILLA.

442. *Potentilla rupestris.*

Provenit in montosis circà Val de Linares , Orihuela.

Flores albi. Stipulæ ovatæ , ciliatæ.

443. *Potentilla argentea.*

*Quinquefolium erectum, incanum* Cienfuegos t. 6. part. 2. p. 520.

Ie. 522.

Oritur en el monte de Herrera , en el pinar de Losilla circà Albaracin.

Planta apud nos suffruticosa. Flores lutei.

444. *Potentilla hirta.*

Habitat en la modorra de Badenas.

445. *Potentilla verna.*

Provenit in siccis circà Andorra , Ariño , Montalvan , Badenas , en el desierto de Calanda.

446. *Potentilla alba.*

Oritur in rupibus circà Montalvan , Camarena , en la mueta de San Juan propè Griegos , & in montosis australibus.

Folia cuneiformia , hirsuta , apice plerumque tridentata.

447. *Potentilla reptans.*

Cinco en rama comun, y vulgar Cienfuegos t. 6. part. 2. p. 484.  
Ic. 502. Laguna l. 4. c. 43.  
Oritur Cæsaraugustæ, en Epila.

448. *Potentilla subacaulis.*

*Fragaria sterilis*, molli lanugine pubescens Amman. Ruthén. 84.  
110.  
Habitat in montosis circà Aliaga, Fortanete, Mosqueruela, Cantavieja.

### TORMENTILLA.

449. *Tomentilla erecta.*

*Tomentilla*, ó siete en rama. Cienfuegos t. 6. part. 2. p. 665.  
Ic. 669.

Habitat en la Palomita, circà Cantavieja, Val de Linares, Orihuela &c.

Radix ad condensanda coria præstat: & quidem experimentis nuper in Germania institutis compertum est ad ejusmodi artificium reliquis substantiis astringentibus anteponendam esse  
*Mus. rust. III. n. 1.*

### GEUM.

450. *Geum urbanum.*

In sepibus, & sylvis, circà Borja, en el monte de Herrera &c.

451. *Geum rivale.*

Provenit copiose in pratis montanis en la Palomita, Cantavieja, Linares, Alcalà de la Selva.

Petala rubella, conniventia. Folia pinnata.

Ad febres intermittentes, & diarrhœam cum successu adhibetur Bergius *Act. Stock.* 1757.

452. *Geum montanum.*

Habitat en Moncayo, en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya.

Folia hirsuta, mollia, pinnata; extremo foliolo maximo, subrotundo. Flores lutei.

### POLYANDRIA,

### MONOGYNIA.

### CHELIDONIUM.

453. *Chelidonium majus.*

*Celidonia* Laguna l. 2. c. 171.

Provenit in ruderatis Cæsaraugusta, en Híjar &c.

Radix gossypium tingit pulchro colore luteo Iour. æcon. 1764.  
Juin.

454. Chelidonium Glaucium.

Dormideras marinas Laguna l. 4. c. 67.

Legi en el desierto de Calanda.

455. Chelidonium corniculatum.

Provenit in agris Cæsaraugstæ &c.

456. Chelidonium hybridum.

Inter segetes passim.

P A P A V E R.

457. Papaver Argemone, non Diosc. l. 2. c. 168.

Provenit in agris Cæsaraugstæ.

458. Papaver Rhœas.

Amapolas Laguna l. 4. c. 65.

Vernaculè Ababol.

In satis vulgatissimum.

Warsoviæ in Poloniâ è capsulis combustis lixivium parant,  
quod sericis guausapinis nitorem, & elegantiam conciliat Iour.  
æcon. 1769. Fevrier. Ad expediendos catarrhos florum infuso  
utuntur nostrates.

N Y M P H Æ A.

459. Nymphæa lutea.

Est & alia Nymphæa in Thessaliâ, amne Peneo, radice albâ, capite  
luteo rosâ magnitudine Plin. l. 25. n. 37.

Oritur circâ Teruel en la acequia del molino.

Radix ad induranda coria adhiberi potest Gleditsch Act. Berol. 1754. p. 124. seq. Suibus in deliciis est. Pellit fumo gryllos domesticos Linn. Amæn. t. 1. Flor. æcon.

T I L I A.

460. Tilia europæa Plin. l. 16.

Tilo.

Provenit circâ Aliaga en el barranco de la hoz.

Tilia foris navium longarum, & arcarum, mensurarumque fabricæ  
expetenda est. Habet etiam corticem funibus cujusque percommodeum  
Theophr. l. 5. c. 8. His addit Du-Hamel lignum ad scrinia,  
& opera torneatorum adhiberi Arb. III. p. 335. Flores apes

Carbones pictoribus inserviunt ad delineanda præludia figurarum Linn. Amæn. t: I. Fl. æcon. Lignum porosum est, adeòque ad liquores adservandos ineptum.

### CISTUS.

461. Cistus *villosus*; an Diosc. l. I. c. 106?  
Provenit en Moncayo.
462. Cistus *laurifolius* Munting. Phyt. 9. f. 42.  
Vernaculè Estepa, & Estrepa.  
Oritur copiosè en la Sierra de Villaroya, circà Rodanas, Trenchon, Santed, Badenas &c.  
Ex hoc frutice carbones fiunt à ferrariis expetiti.
463. Cistus *albibus*.  
Vernaculè Estrepilla, sive Estepilla.  
Habitat en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya, en el desierto de Calanda &c.  
Flores purpurei, speciosi, è quibus optima mella fiunt Jayme Gil de las colmenas trat. I. c. 5.
464. Cistus *salvifolius*.  
Provenit copiosè en Biber de la Sierra.
465. Cistus *libanotis*.  
Cistus Ledon Rosmarini folio, flore albo Grislei Virid. Lusit. p. 30.  
Habitat in collibus circà Hijar, Caspe, Alcañiz, Belchite, en Tolocha, en el Castellar.
466. Cistus *umbellatus*.  
Oritur en Moncayo, en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya.
467. Cistus *lævipes*.  
Chamæcistus luteus vermiculato folio, major Barrel. Ic. 445, & 446.  
Habitat en el monte torrero, en Montolar, in collibus circà Hijar, Belchite &c.
468. Cistus *marifolius*.  
Oritur en el monte torrero, en Montolar, & in collibus aridis etiam in Aragoniâ australi.  
Variat foliis subtùs incanis, aut glabris.
469. Cistus *guttatus*.  
Cistus annuus angustifolius, flore luteo punctato Munting. Phytog. 9. f. 40.  
Provenit en el monte de Herrera, circà Rodanas.

470. *Cistus salicifolius.*  
Habitat in pratis montanis *en la Palomita, Cantavieja, Linares, Alcalá de la selva.*  
Variat floribus luteis, & albis. Folia ovata, obtusa, hirsuta.
471. *Cistus squamatus.*  
Nascitur copiosè *en el monte torrero* versùs gypsi lapidicinas, in collibus circà *Epila, Calatayud, Pozuelo, Hijar, Belchite.*  
Flores lutei, vix calycem superantes. Folia elliptica, congesta incana, colore ferè *Elæagni angustifoliae.*
472. *Cistus serpillifolius.*  
Habitat *en el monte torrero, en Montolar.*
473. *Cistus pilosus.*  
Legi *en Montolar, circà Pozuelo.*
474. *Cistus Helianthemum.*  
An *Panaces Chironium* Diosc. l. 3. c. 53?  
Habitat *en el Castellar, en Montolar, in collibus circà Hijar, Alcañiz, Calatayud.*

## DIGYNIA.

### PÆONIA.

475. *Pæonia officinalis.*  
*Peonia Laguna l. 3. c. 151. Cienfuegos t. 2. p. 186. Ic. 208.*  
Provenit copiosè circà *Tronchón, Fortanete, Camarena.*  
Planta *Baar* in Machæruntis valle proveniens, quam vim dæmones fugandi habuisse fabulatur Zonaras Annal. l. 6. Pæonia fuit, si fides tribuenda memorato Cienfuegos *Ibid.*

## TRIGYNIA.

476. *Delphinium Consolida.*  
Inter segetes non rarum *en Montalván, Calamocha, Piedrahita &c.*  
Corolla cum alumine cœruleum colorem largitur ad pingendas litteras Linn. *Amœn. t. 5. Pl. tint.*

### ACONITUM.

477. *Aconitum Napellus.*  
An *Lycocotonum tertium* Diosc. l. 4. c. 79?  
Oritur *en Moncayo, en la Palomita.*  
Planta exurens, acerrima, exitialis; in Septentrione mitior, ut à Laponibus edatur Linn. *Fl. Lappon. p. 179.*

*Cf. Storck extractum Napelli in doloribus arthriticis cum*

successu dedit.

Radix lupos, decoctum verò pediculos pecorum enecat Linn.  
Anæn. t. I. Fl. æcon.

## PENTAGYNIA.

### AQUILEGIA.

478. *Aquilegia vulgaris.*

Hispanis *Pajarilla.*

*Aquilegia simplex corniculata*, flore cœruleo Barrel Ic. 628.

Provenit en Moncayo, Calcena.

### NIGELLA.

479. *Nigella damascena.*

*Neguilla damascena* Cienfuegos t. 5. p. 532.

Inter segetes vulgaris Cæsaraugustæ &c.

480. *Nigella arvensis.*

*Axenuz* Laguna l. 3. c. 87. nomen arabicum Casiri Bibl. Esc. I.

p. 334.

*Neguilla silvestre primera* Cienfuegos t. 5. p. 542. Ic. 546.

Kezach, Isai. c. 28. v. 25, 27. Celsius Hierob. II. p. 70.

Oritur in agris Cæsaraugustæ, en Calamocha, Daroca &c.

Variat pistillis septem.

Cienfuegos t. 5. p. 553. Los Andaluces en tierra de Ecija como imitadores de los Africanos, que señorearon aquella tierra, hacen de masa cierto guisado morisco, que llaman Zainas, en el qual gastan Neguilla, que ellos dicen Axenuz, y para este efecto, y echar en tortas la siembran, y cultivan, y Ajonjoli, ó Alegria.

## POLYGYNIA.

### ANEMONE.

481. *Anemone Hepatica.*

*Trifolio aureo* Cienfuegos t. 6. part. 2. p. 331. Ic. 337.

Provenit en Moncayo, Calcena, en la Palomita, Linares, circa Badenas, & alibi.

### CLEMATIS.

482. *Clematis Vitalba.*

*Clematitis* Diosc. l. 4. c. 8.

Terva de bordioseros.

In sepibus vulgatissima.

Planta urens, acris, vesicas trahit. Ex pappo chartam conficit Schæfferus.

### THALICTRUM.

483. *Thalictrum tuberosum.*

Provenit copiosè en Rodanas, en la dehesa de Talamantes.  
Flores magni, albi.

484. *Thalictrum flavum*, an Diosc. l. 4. c. 99?

Oritur en la dehesa de Cantavieja, circà Orihuela.

Radix cum alumine lanas flavo colore inficit Linn. Amæn. t. 5. Pl. tinct. Pecori non displicet Schreber Samml. III. p. 82.

### ADONIS.

485. *Adonis aestivalis.*

Oritur Cæsaugustæ in agris, & vineis.  
Flores aurantii, octopetali.

486. *Adonis vernalis.*

Inter segetes magnâ copiâ Cæsaugustæ, en Alcamiz.

Pro Helleboro Hippocratis habetur Schulze de elleborism. vet. n. 5.

### RANUNCULUS.

487. *Ranunculus Flammula.*

In aquosis circà Orihuela.

Planta acris, vesicas excitat.

488. *Ranunculus Lingua.*

Legi in rivulo, circà Villar del Saz.

489. *Ranunculus gramineus.*

Ranunculus graminifolius, radice grumosâ, villosâ Grislei Virid. Lusit. p. 91.

Habitat en la Sierra de Villaroya, en la peña cerrada de Fortanete, en la modorra de Badenas.

Radix grumosa, fibris capillata. Folia graminea, nervosa.

490. *Ranunculus Ficaria.*

Celidonia menor Laguna l. 2. c. 172.

Oritur in umbrosis en la Palomita.

Ad edendum idoneus Linn. Amæn. t. 6. *Macellum olitorium.*

491. *Ranunculus sceleratus.*

Provenit in aquis en Daroca, & alibi.

Planta urens, venenata pro Herbâ sardoâ à nonnullis habita.

Cæterū Ranunculi Diosc. l. 2. c. 166. maximè obscuri.

492. *Ranunculus monspeliensis.*

Habitat ad radices montis de Herrera.

Caules sericei. Folia palmato-tripartita, laciniis divisis.

493. *Ranunculus bulbosus.*

Provenit copiosè en *Calcena*, & in Aragoniâ australi.

Radix accerrima, vesicas trahit.

494. *Ranunculus repens.*

Juxtà fossas vulgaris Cæsaraugustæ, en *Epila*, *Calatayud* &c.

Ranunculi anguillis grati Linn. Amœn. t. 1. Fl. æcon.

495. *Ranunculus acris.*

Oritur in pratis en *la Palomita*, *Cantavieja*.

496. *Ranunculus arvensis.*

Legi in agris circà *Tronchon*, *Villarluengo*, *Cantavieja* &c.

497. *Ranunculus bederaceus.*

Habitat en la Sierra de Villaroya, en la fuente del Espino, en Añon.

498. *Ranunculus aquatilis.*

Ranunculus aquaticus albus lato, & fœniculi folio Barrel.

Ic. 565.

In aquosis frequens.

## HELLEBORUS.

499. *Helleborus foetidus.*

De Helleboro Diosc. l. 4. c. 152. & antiquorum nondum liquet.

*Eleboro fetido* Cienfuegos t. 3. p. 314. b. t. 7. Ic. 517.

Provenit en *Moncayo*, en la Sierra de Villaroya, en *Calcena*, circà *Villarluengo*, *Cantavieja*, *Camarena* &c.

Alvum vehementer dicit. Contrà vermes infantum nuper in Angliâ innotuit Andrew Inoc. p. II.

Ad *Helleborum nigrum* probabili conjecturâ retulit Homeri Moly Cl. Trillerus Diss. de Moly Homericō §. 16.

Negra era la raíz, y como leche  
la flor, y entre los Dioses es llamada  
Moly, que es mui difícil arrancarla.

Gonzalo Pérez Odys. lib. 10.

## DIDYNAMIA.

## GYMNOSPERMIA.

## TEUCRIUM.

500. *Teucrium Botrys.*

Provenit en la Palomita.

Planta tota hirsuta. Folia bipinnata, pinnulis linearibus. Calyx deorsum ventricosus. Flores purpurei.

501. *Teucrium Chamæpitys* Diosc. l. 3. c. 169.

Hispanis Pinillo Laguna l. 3. c. 170.

Oritur en el monte torrero, circà Hijar, Caspe, Calanda &c.

Cum Aristolochiæ, & Gentianæ radicibus, Chamædry, & Centaurio minori pulverem ingreditur vulgo de Portland ac podagram in Angliâ celeberrimum, quo Cl. Clephane utebatur Bergius Mat. Med.

502. *Teucrium Iva.*

*Anthyllide seconda* de Dioscorides Cienfuegos t. 2. p. 889. Ic. 892.

Legi in rupibus propè Ricla.

Cienfuegos t. 2. p. 891. En Aragon los Boticarios, que hacen poca distincion del olor, que ha de tener la verdadera Chamæpitys que en Castilla llaman Pinillo, Iva Arthetica, la gastan con buena fee, y malas obras, porque aseguro que casi en toda España no he hallado Chamæpitys verdadera con las partes, que pide Dioscorides sino es en el campo de Cartagena, y Murcia, y Lorca.

503. *Teucrium scorodonia.*

Oritur en Moncayo.

Calyx bilabiatus. Labium superius denticulo unico constat, inferius quatuor dentibus instruitur. Flores ochroleuci, secundi. Caules hirsuti.

504. *Teucrium Scordium.*

Ecordio Laguna l. 3. c. 119. Cienfuegos t. 1. p. 526.

Provenit Cæsaraugustæ en el termino de las Fuentes.

505. *Teucrium Chamædrys.*

Germindrina, Camedreos Laguna l. 3. c. 106.

Oritur in montosis en Moncayo, Tolocha, en la Palomita, en el monte de Herrera, circà Cal cena &c.

Carolus V. decocto uti solebat Vesal. Rad. Chin. p. 111.

506. *Teucrium pyrenaicum.*

Habitat en la Palomita.

Tota planta villosa.

507. *Teucrium Polium*.  
*Polium montanum*, *supinum*, *odoratissimum* *Grislei Virid.*  
*Lusit.* p. 70.  
*Polium montanum*, *gnaphalodes*, *incanum*, *flore rubro*, *su-*  
*pinum* *Barrel.* Ic. 1083.  
*Provenit en el monte torrero*, *in collibus aridis circà Hijar*,  
*Caspe*, *Alcañiz*, *Calanda*, *en Montolar*.  
*Folia lanata*. *Caules procumbentes*. *Flores in nostrâ varietate*  
*rubri*, *odorati*.

508. *Teucrium capitatum*.

*Oritur en el monte torrero*, *en Montolar &c.*

*A præcedenti etiam distinguitur quòd seriùs floreat.*

### SATUREJA.

509. *Satureja montana*.

*Axedrea Laguna l. 3. c. 41. Cienfuegos t. 3. p. 215. t. 7. Ic.*  
*293.*

*Provenit copiosè en la dehesa de Aliaga.*

### HYSSOPUS.

510. *Hyssopus officinalis*.

*Hysopo Laguna l. 3. c. 28. Sed Hyssopus antiquorum videtur*  
*diversa planta.*

*Habitat circà Villarluengo.*

### NEPETA.

511. *Nepeta Cataria (minor)*.

*Calamintha II. Diosc. l. 3. c. 39.*

*Hispanis Gatera.*

*Gataria Cienfuegos t. 3. p. 185. t. 7. Ic. 273.*

*Oritur circà Barbastro.*

512. *Nepeta violacea*.

*Provenit copiosè circà Camarena, Rodenas.*

*Folia suprema sessilia. Verticilli longè pedunculati.*

513. *Nepeta Nepetella*.

*Habitat in aridis Cesaraugusta, circà Hijar, Caspe, Alcañiz,*  
*Calanda &c.*

*Planta ferè sesquipedalis in nostro solo, incana. Folia petiolata,*  
*cordata, angustissima, acuta, crenata.*

*Pedunculi oppositi, inferiores dichotomi, superiores bis di-*  
*chotomi cum intermedio flore subsessili.*

## LAVANDULA.

514. Lavandula *Spica*. s. l. oblonga, panicula, cymosa, & magno capitulo  
Alhucema, nomen arabicum Gol. col. 707.  
Etiam, & vulgatius Espliego Cienfuegos t. I. p. 741.  
Habitat en el monte torrero, & in collibus aridis Aragoniae  
magno copia: sedulice nisi oratione annua non advenit  
515. Lavandula *Stachas*. subrotunda, ex foliis ciliatis composta  
Cantueso Laguna L. 3. t. 29.  
Provenit copiosè en la Sierra de Villaroya, en el monte de Herrera.

## SIDERITI S.

516. Sideritis *hyssopifolia*. ap. r. minima, s. l. male inodorans A  
Sideritis mentana, hyssopifolia, major Barrel. Ic. 329.  
Sideritis spicata, fœtida Munting. Phyt. 46. f. 241.  
Habitat circà Añon, Fortanete, Tronchon.  
Planta fœtida. s. l. obovata ap. 3. e. à enuguæ saudæ  
517. Sideritis *hirsuta*.  
Tetrahita caulis procumbentibus, foliis sessilibus Gerard. Prov.  
p. 272.  
Nascitur in aridis Cæsaraugustæ, en Epila, Segura, Montalvan.  
518. Sideritis spicis interruptis, foliis lanceolatis, utrinque dentato-  
spinosis. An varietas *Scordiodis* Linnæi?  
An varietas *S. scordiodis* Linnæi?  
Provenit copiosè in aridâ planicie inter Epila & Pozuelo.  
Planta pedalis. Radix lignosa. Caules teretes, incani. Folia  
lanceolata, utrinque 2. aut 3. dentibus, validis, & spinosis  
instructa, tomentosa. Bractæ cordatæ, dentato-spinosæ. Verti-  
cilli remoti. Flores 6. in singulo verticillo. Calyces æquales  
spinis 5. Corollæ luteæ ut in congeneribus.

2. Altera varietas datur foliis minus rigidis, & pluribus den-  
tibus notatis, quæ quidem frequentius occurrit Cæsaraugustæ en  
el monte torrero.

A *S. scordioide* mihi differre videtur spicis non ovatis, sed  
interruptis, & foliis rigidioribus. Si quis verò meram illius  
varietatem statuat, non repugnabo.

## MENTHA.

519. Mentha *sylvestris*.  
Menthastrum Plin. l. 20. n. 52.  
Mastranzo nevado Cienfuegos t. 3. p. 190. b. t. 7. Ic. 233.

520. *Mentha viridis.*  
In laquosis vulgariſ; en Altaniz magnâ copiâ.
521. *Mentha rotundifolia.*  
Vernaculè Padrastros.  
*Mastranzos*. Laguna l. 3. c. 38. Cienfuegos t. 3. p. 189. t. 7.  
Ic. 232.  
Passim juxtâ fossas.
522. *Mentha aquatica.* ALQUACIA  
Nascitur copiosé in pratis humidis en Calamocha.
523. *Mentha Pulegium.*  
Poleo Laguna l. 3. c. 32. Cienfuegos t. 3. p. 159. t. 7. Ic. 187.  
Oritur ad fossas en Epila, Cæsaragustæ &c.  
Ad arcendos pulices utilis Linn. Amœn. t. 7. *Mentha usus.*

## MULIGLECHOMA.

524. *Glechoma hederacea.*  
Hispanis *Tedra terrestre*.  
In sepibus non rara Cæsaragustæ &c.
- LAMIUM.
525. *Lamium purpureum.*  
Oritur en Hijar magnâ copiâ.
526. *Lamium amplexicaule.*  
Ad margines agrorum frequens Cæsaragustæ, en Epila &c.
- GALEOPSIS.
527. *Galeopsis Ladanum.*  
Oritur in montosis circâ Camarena, Orihuela.

## BETONICA.

528. *Betonica officinalis.*  
Betonica Laguna l. 34. c. 1. est ergo *Cestrum* Diosc.  
Vettonica Plin. l. 25. n. 46. distincta planta.  
Betonica. Cienfuegos t. 3. p. 255.  
Habitat en la Palomita, in pratis circâ Cantavieja, Linares, en la modorra de Badenas, en Moncayo.  
In cineribus multum est salis marini Du. Hamel Exploit. I.  
p. 38.

## STACHYS.

529. *Stachys palustris.*  
Provenit circâ Trenchos.

530. *Stachys alpina.*

Oritur en la Palomita, in pratis circà Cantavieja, Linares &c.

531. *Stachys annua.*

*Stachys* Cienfuegos t. 3. p. 249. & seqq.

Habitat en Montalvan, Rodenas, Villarluengo, & alibi in Aragoniâ australi.

## BALLOTA.

532. *Ballota nigra.*

*Marrubio bastardo* Laguna l. 3. c. III.

*Ballota* Cienfuegos t. 3. p. 243. t. 7. Ic. 313.

Passim in ruderatis.

Bobus medicina est Linn. Amoen. t. 1. Fl. Oecon.

## AMMARRUBIUM.

533. *Marrubium Alysson.*

*Aliso de Galeno* Cienfuegos t. 3. p. 1, 94.

Provenit Cæsaraugustæ, en Epila.

Flores rubelli. Dentes calycini uncinati.

Cienfuegos t. 3. p. 95. Una buena vieja de las que llaman en Castilla curanderas me enseñó esta planta, y preguntandole el nombre, me dixo que se llamaba yerva de Santa Quiteria, que es abogada del mal de rabia. Comprobò el efecto el nombre, porque teniendo unos perrillos en mi posada enfermos, que un salvador, o embustero (que en mi opinion lo son los que se dicen salvadores) decia que rabiaban, fue a traer esta planta, y luego que la olieron, aunque aspera, y espinosa, que punza mejor que una zarza, y mas si está seca, la mordieron, y mascaron, cobrando entera salud.

534. *Marrubium peregrinum.*

Oritur copiosè Cæsaraugustæ, en Epila, Cármena &c.

Calycis dentes villosi. Flores purpurei.

535. *Marrubium vulgare.*

*Marrubio* Laguna t. 3. c. 113. Cienfuegos t. 3. p. 235. t. 7. Ic.

225. Passim ubique ferè.

Ad phthisin aliquandò utiliter datur Haller Helv. n. 258.

## EPHLOMIS.

536. *Phlomis lychnitis.*

*Stachys prælongo*, angustoque folio, flore luteo Barrel. *Ic.*  
1521.

Provenit in collibus siccis Cæsaraugustæ, en Epila, Pozuelo, Belchite &c.

Bracteæ cordatæ, acuminatæ. Flores lutei, speciosi.  
Ex foliis siccis ellychnia fiunt.

*Phlomis herba venti.*

Oritur en Segura, Montalvan, Teruel, Calamocha &c.

### CLINOPODIUM.

538. *Clinopodium vulgare.*

Habitat en Moncayo, en Bicor, en el monte de Herrera, en la modorra de Badenas, in sylvis circà Albarracin.

### ORGANUM.

539. *Origanum vulgare.*

Oregano Laguna l. 3. c. 30. Cienfuegos t. 3. p. 127. t. 7. *Ic.* 153.

Habitat circà Linares, en la modorra de Badenas, ad radices M. Cauni &c.

Ad condientes carnes porcinas utuntur nostrates. Tingit lanas colore violaceo Iour. Oecon. 1762. Juin.

### THYMUS.

540. *Thymus Serpyllum.*

Serpel Laguna l. 3. c. 42. Cienfuegos t. 3. p. 223. t. 7. *Ic.* 306.

Oritur en la Palomita, & in montosis Aragoniæ australis abundè.

541. *Thymus vulgaris.*

Tomillo Laguna l. 3. c. 40. Cienfuegos t. 3. p. 207. t. 7. *Ic.* 284.

In collibus aridis vulgatissimus.

2. Varietas: foliis linearibus.

Legi magnâ copiâ en el Castellar.

Nonnulli hauc varietatem Axedrea vocant.

Ad condientes olivas adhibent nostrates.

542. *Thymus Acinos.*

Albahaca sylvestre Cienfuegos t. 3. p. 17. t. 7. *Ic.* 61.

Vernaculè Albahaca de monte.

Provenit en Moncayo, en la Sierra de Villaroya, en el monte de Herrera, & in pratis montanis La Palomita &c.

Gratissimi odoris planta.

543. *Thymus Mastichina.*

Habitat en la Sierra de Villaroya, circà Rodenas, en los montes de Rodanas.

Frutex pedalis, aut paulò altior. Folia in caule congesta, linearia, etiam ovata, inferiora subtùs incana, superiora glabra. Verticilli hirsuti. Calix quinquedentatus, dentibus pilosis, & quasi pennatis. Flores albi.

### MELISSA.

544. *Melissa officinalis.*

Torongil Laguna l. 3. t. 112.

Melisa llamada Torongil Cienfuegos t. 3. p. 91. t. 7. Ic. 349.

Provenit copiosè en la modorra de Badenas.

545. *Melissa Calamintha.*

Calamento Laguna l. 3. c. 39.

Calaminta Cienfuegos t. 3. p. 193. t. 7. Ic. 254.

Legi in dumetis en el desierto de Calanda, in agro Cæsaragustano.

546. *Melisa fruticosa.*

Oritur in rupibus calcareis circà Ricla, & Montalvan ponè templum oppidi, en Segura.

Caules incani, pedales. Folia ex ovato rhomboidea, tomentosa. Flores parvi, dilutè purpurei.

### SCUTELLARIA.

547. *Scutellaria alpina.*

Habitat en la Palomita, en Alcalà de la Selva, Val de Linares.

### PRUNELLA.

548. *Prunella vulgaris.*

In sylvis non rara, en la modorra de Badenas.

549. *Prunella laciniata.*

Brunella montana multifido folio, flore albo Grislei Virid. Lusit. p. 23.

Brunella foliis imis integris, superioribus laciniatis, flore albo Manetti Virid. Flor. n. 155.

Provenit circà Badenas, Orihuela, Alcalá de la Selva.

## ANGIOSPERMIA.

## RHINANTUS.

550. *Rhinantus crista galli.*

Habitat in sylvis cīcā Badēnas, in pratis montanis, en la Palomita, Cantavieja, Linares, en Calamocha, Montalban.

Pestis sātōrum. Pecus non respuit Schreber Samml. III. p. 26.

Pānem cōeruleum reddit Bresl. Samml. 1718. m. Julio.

551. *Rhinantus Trixago.*

Trixago Chamaedryos foliis Barrel. Ic. 774. n. 1.

Oritur in pratis humidis en Calamocha.

*Trixaginis folia ad rūpta, & vulnera in oleo trita valent Theophr.*

I. 9. c. 10.

## EUPHRASIA.

552. *Euphrasia officinalis.*

Provenit copiosè en Moncayo, en la sierra de Vllaroya, en el monte de Herrera, en la Palomita, Alcalà de la selva &c.

Planta veteribus ignota. Arabes sub nomine Adhil hujus mentionem fecere; posteà vero Matthæus Sylvaticus medicus Mantuanus, qui cīcā annum 1320. floruit in Pandectis eandem stirpem proposuit, & ad oculorum morbos laudavit; sed potius nocet, quam prodest. Sal alkalinæ naturæ est Gmelin. Act. Petrop. V. p. 285.

553. *Euphrasia Odontites.*

Euphrasia sylvestris, major, purpurea Barrel. Ic. 276. n. 2.

Legi in agris en Calamocha, cīcā Tronchon.

554. *Euphrasia lutea.*

Provenit cīcā Tronchon.

## MELAMPYRUM.

555. *Melampyrum pratense.*

Oritur in sylvis cīcā Orihuela.

A bobus amatūr. Loc, & butyrum flavescent, & pinguissimum reddit Linn. Amoen. t. 1. H. econ.

556. *Melampyrum sylvaticum.*

Habitat in sylvis en Moncayo.

## ANTIRRHINUM.

557. *Antirrhinum spurium.*

Provenit in agris Cæsaraugustæ.

Planta tota hirsuta. Folia ex elliptico-subrotunda.

558. *Antirrhinum origanifolium.*

Provenit in rupibus circà *Calcena*, en el desierto de *Calanda*.

559. *Antirrhinum triphyllum.*

*Linaria Valentina* Cienfuegos t. 5 p. 719.

Oritur in agris *Cæsaraugustæ*, en *Epila*:

2. Altera varietas triplò minor, floribus cœruleis.

*Linaria cœrulea apula*, *triphyllea* Colum. Ecphr. I. p. 80. t. 78.

Legi in agris *Cæsaraugustæ* propè el puente de la Guerba.

560. *Antirrhinum repens.*

Oritur circà *Tronchon*.

Caules procumbentes, floriferi eriguntur. Flores cœrulei, palato flavo.

561. *Antirrhinum arvense.*

Legi in arvis propè *Tronchon*.

Caules scabri. Flores parvi, cœrulei, subsessiles bracteis recurvis distinguuntur.

562. *Antirrhinum viscosum.*

Habitat en el monte de *Herrera*, en el de S. Ginès propè *Rodenas*.

563. *Antirrhinum (ærugineum) foliis inferioribus quaternis linearibus floribus racemosis*, supremo calycis foliolo cæteris duplò longiore Govan Illustr. p. 38.

*Linaria tenuifolia æruginei coloris* C.B. Pin. 212.

*Linaria hispanica secunda* Clus. Hist. I. p. 320.

Provenit in rupibus circà *Calcena*, en el desierto de *Calanda*.

Folia subcarnosa, in ramulis imbricata. Flores respectu plantæ magni, atropurpurei, palato flavo, viloso. Calcar strii violaceis.

564. *Antirrhinum junceum.*

Nascitur en el monte de *Herrera*, en el pinar de *Losilla* circ. *Albaracin*.

Planta sesquipedalis. Caules teretes, juncei, glabri. Folia linearia, inferiora subopposita, superiora alterna. Flores racemosi. Calycis laciniæ subæquales. Corollæ breviter calcaratæ. Labium superius album striis cœruleis, inferius pallide flavidum.

565. *Antirrhinum majus.*

*Antirrhinum* Diosc. l. 4. c. 134. obscurum.

Provenit copiosè *Cæsaraugustæ*, en *Hijar*, *Montalvan*, en el monte de *Herrera* &c.

Variat foliis latioribus, & angustioribus.

566. *Antirrhinum bellidifolium.*

*Linaria olorosa* Cienfuegos t. 5. p. 722.

Habitat en la Sierra de Toved, en la de Villaroya, circà Santed. Folia radicalia spatulata, crenata, glabra: caulinæ digitata lacinis linearibus, intermediâ longiore.

## SCROPHULARIA.

567. *Scrophularia nodosa.*

Provenit circà Cæsaraugustam.

568. *Scrophularia aquatica.*

Juxtà fossas vulgaris Cæsaraugusta, en Calatayud, Teruel, Daroca &c.

Infuso Sennæ addita, ejus ingratum saporem, & odorem corrigit. Varietas *Iquetaya* Brasiliensis Act. Par. 1701. p. 214.

569. *Scrophularia auriculata.*

Habitat cum antecedenti.

570. *Scrophularia sambucifolia.*

Scrophularia sambucifolio, flore rubro, luteo, vario pulchro Grislei Virid. Lusit. p. 75.

Scrophularia sambucifolio Munting. Phyt. 45. f. 238.

In agro Cæsaraugustano legit Franciscus Otano, sed minimè vulgaris.

571. *Scrophularia canina.*

Ruta canina, sive Scrophularia multifida Grislei Virid. Lusit.

p. 73.

Provenit Cæsaraugusta, circà Calatayud, Toved, Ricla.

## DIGITALIS.

572. *Digitalis purpurea.*

Habitat en Moncayo, en el monte de Herrera, circà Orihuela, Rodenas, Purujosa.

573. *Digitalis lutea.*

Legi en la Sierra de Villaroya.

574. *Digitalis obscura.*

Povenit en la Sierra de Arcos, circà Rodenas, Villarluengo, Morelos.

## ERINUS.

575. *Erinus alpinus.*

Oritur in rupibus en la muela de San Juan propè Griegos.

Folia angusta, dentata, hirsuta, alterna.

## OROBANCHE.

576. Orobanche *major* Loefling. Iter, p. 207.  
*Terva tora* Laguna l. 2. c. 131. Cienfuegos t. 3. p. 414.  
 Provenit in siccis *en el monte torrero*, & alibi.  
 Pecori displicet Schreber Samml. III. p. 62.

## VITEX.

577. Vitex *Agnus castus*.  
*Sauzgatillo* Laguna l. 1. c. 114.  
 Loci non memini, sed plantam coram habeo, & in herbario Josephi Lucan nuper vidi.  
 Folia integerrima in meis speciminibus.  
 In Oriente semina cum Cepâ contusa, & in cataplasmati forman redactâ stomacho admovent in doloribus cōlicis Forskal.  
*Fl. Arab.* p. 213.

## TETRADYNA MIA.

## SILICULOSA.

## MYAGRUM.

578. Myagrum *rugosum*.  
 Passim in agris *Casaraugustæ*, *en Epila*, *Daroca*, *Calatayud*.  
 Folia sæpiùs lanceolata, & obversè ovata. Caules procumbentes.  
 579. Myagrum *perfoliatum*.  
 Myagrum Diosc. l. 4. c. 118. posset esse *Sativum*.  
 In agris non rarum, *en Moyuela*.  
 580. Myagrum *paniculatum*.  
 Occurrit mihi in montosis propè *la Val tuerta de Mosqueruela*.  
 581. Myagrum (*irregularē*) petalis duobus proximis reliquis majoribus, foliis lyrato-sinuatis.  
 Myagro similis flore albo J. Bauh. *Hist.* II. p. 895.  
 Oritur locis gramineis, humidiusculis *en Hijar*.  
 Radix fibrosa. Caules palmates, teretes, glabri. Folia radicilia lyrato-sinuata, etiam integra, & oblonga, glabra: caulina amplexicaulia, basi sagittata. Flores albi. Calyx tetraphyllus. foliolis oblongis, concavis. Petala quatuor linearia, quorum duo proxima cæteris majora. Filamenta 6. de more familiæ, nullis denticulis instructa. Germen ovatum; stylus filiformis, brevis; stigma obtusum. Capsula subglobosa unilocularis, bivalvis. Semen unicūm, subrotundum.

in fructificatione colligat; nam ob petala irregularia ad *Iberides*, ob capsulam manospermam forsitan ad *Crambes* genus revocari posset. Ego verò deficientibus staminum denticulis, & habitâ ratione styli, atque faciei *Myagris* annumeravi.

## D R A B A.

### 582. *Draba alpina*.

Provenit in rupibus *en el monte de Herrera*, *en el avellanar del Collado* circâ *Badenas*.

### 583. *Draba verna*.

In montosis frequens *en Tolocha*, *Moncayo*, *en el monte de Herrera* &c.

*Paronychiis imposita medetur Gunner. Fl. Norv. p. 3. Racemus nutans instantes imbres indicat Linn. Amæn. t. I. Fl. æcon.*

## L E P I D I U M.

### 584. *Lepidium sativum*.

*Mastuerzo Laguna l. 2. c. 144.*

Provenit locis glareosis *Cæsaraugusta*, *en Moyuela*.

In acetaria recipitur.

### 585. *Lepidium latifolium*.

*Mastuerzo salvage Laguna l. 2. c. 165.*

Juxtâ fossas magnâ copiâ *Cæsaraugusta*, *en Epila*, *Daroca*, *Calatayud*, *Barbastro*.

Judæi agnum paschalem cum Lepidio edere solebant. Huic successit *Cochlearia armoracia*. Linn. *Amæn. t. 5. Culina mutata*.

### 586. *Lepidium subulatum* Tab. VI. f. 3.

Habitat in siccis propè *Epila*, *Teruel*.

Folia inferné imbricata. Flores numerosi albi, Siliculæ ovatæ.

Non est, *Nasturtium fruticosum*, foliis linearibus, glaucis, subirsutis Haller. *Helv. n. 506.* quod cum nostro conjunxit.

### 587. *Lepidium Iberis*.

*Iberis Diosc. l. 1. c. 147.*

Passim juxtâ vias *Cæsaraugusta*, *en Daroca*, *Calatayud*, *Epila*, *Barbastro*.

Stamina sex in nostro solo: totidem in *Helvetiâ* numeravit Hallerus *n. 507*.

## T H L A S P I.

### 588. *Thlaspi alliaceum* *Diosc. l. 2. c. 145.*

Legi in agris circà *Linares*.

Vaccarum lac ingrato sapore inficit *Act. Stock.* 1750. trim. 2.  
sed ad curculiones arcendos valet *Oecon. Nachricht.* V. p. 425.

589. *Thlaspi saxatile*.

Provenit in rupibus circà *Calcena*.

590. *Thlaspi campestre*.

Habitat in agris en *Ricla*, & alibi: etiam in montes ascendit,  
ut in *M. de Herrera* viderim. Tunc igitur mirè variat cauli-  
bus triplò brevioribus, procumbentibus, foliis radicalibus hir-  
sutis, lyratis.

591. *Thlaspi perfoliatum*.

Ad agrorum margines *Cæsaraugusta*.

592. *Thlaspi Bursa pastoris*.

In agris vulgatissimum.

Bonum pabulum pro pecore Linn. *Amœn.* t. 4. *Ovis*.

### COCHLEARIA.

593. *Cochlearia Coronopus*.

In agris frequens *Cæsaraugusta*, en *Epila*.

Siliculæ rugosæ, scabræ.

Medicamentum Joan. Stephens adversùs calculum ingreditur  
Haller. *Helv.* n. 502.

594. *Cochlearia glastifolia*.

Provenit juxtà fossas en *Epila*, *Monreal del Campo*, *Calamocha*.

Planta tricubitalis, tota glabra. Caulis teres, glaber. Folia cras-  
sa, amplexicaulia, basi cordata. Flores numerosi, albi.

Siliculæ turgidæ.

595. *Cochlearia Draba*.

*Draba* *Diosc.* l. 2. c. 146.

Frequens ad agrum margines *Cæsaraugusta*, en *Epila*.

Folia molliter villosa.

### IBERIS.

596. *Iberis saxatilis*.

Oritur copiosè in collibus circà *Alcañiz*.

Folia in nostro solo glabra, neque ciliata. De specie non  
dubito cum *Icon Columnæ* omnino respondeat, & planta sit  
suffruticosa.

597. *Iberis amara*.

Oritur in agris en *Trasmoz*, *Segura*.

## ALYSSUM.

598. *Alyssum spinosum.*

Provenit in rupibus circà Talamantes, Calatayud, en Xabalambre, Purujosa, Badenas, Montalván. Caules ramosissimi. Folia spatulata, incana. Flores albi.

599. *Alyssum halimifolium.*

Nascitur in siccis circà Andorra, Calcena.

Folia punctata. Caules in nostro solo parùm declinati.

600. *Alyssum campestre.*

*Thlaspi Alysson* incanum, luteum, lunato utriculo Barrel. Ic. 908. n. 2.

Provenit in aridis Cæsaraugustæ, etiam in montosis.

Ab *A. calycino* specie non differt. Folia incana, punctata.

## CLYPEOLA.

601. *Clypeola Ionthlaspi.*

*Thlaspi*, que tiene forma de *Lunaria Griega* Cienfuegos t. 2. p. 132. Ic. 136, 137.

Habitat en Tolocha, en el monte de Herrera.

## BISCUTELLA.

602. *Biscutella lavigata* Linn. Mant. 2.

*Alyssum* Diosc. l. 3. c. 99.

*Lunaria* de flor amarilla de los de Monpeller Cienfuegos t. 2. p. 122. Ic. 126.

Provenit copiosè en Moncayo, Tolocha, en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya, in collibus, circà Hijar, Alcañiz.

Caules laves, ferè aphylli. Folia radicalia lanceolata, hispida, rarís dentibus instructa.

603. *Biscutella apula* Linn. Mant. 2.

Iondraba alyssoides, apula, spicata Colum. Ecphr. I. p. 283.

t. 285. f. 1.

Habitat inter segetes en Epila, el Frasno, Montreal del Campo.

Folia amplexicaulia, lanceolata, pilosa. Caules villosi.

## SILIQUOSA.

## CARDAMINE.

604. *Cardamine pratensis.*

Legi magnâ copiâ circà Alcañiz.

Ad morbos convulsivos cum successu adhibuit Georgius Baker

Iour. œcon. 1772. Février.

## SISYMBRIUM.

605. *Sisymbrium Nasturtium aquanticum.*  
Berros Laguna l. 2. c. 117.  
In fossis aquâ plenis ubique ferè vulgatissimum.  
Editur inter acetaria.  
Semina cum pulvere pyro mixta ejus vim augent, ut globus sclopetarius longiorem metam attingere possit Linn. Amæn. t. 1.
606. *Sisymbrium pyrenaicum.*  
Oritur en Bicor, circâ Purujosa.  
Folia caulinata bipinnata pinnulis linearibus, acutis, integerimis. Flores lutei.
607. *Sisymbrium polyceratum.*  
Provenit in muris Cæsaraugstæ.
608. *Sisymbrium Barrelieri.*  
Habitat in agris circâ Villar de los Navarros, Rodanas, Calcena, Brea &c.
609. *Sisymbrium (erucastrum) sub-acaule, foliis lyrato-runcinatis, lœvibus, caule hispidot.* Govan Illustr. p. 42. tab. 20.  
In agris passim Cæsaraugstæ, en Epila, Hijar, &c.  
Folia in nostro solo subvillosa. Calyx patens. Stylus brevis, teres.
610. *Sisymbrium asperum.*  
Sisymbrium foliis pinnatifidis, foliolis inæqualiter laciniatis, siliquis scabris Gerard Prov. p. 360.  
Oritur circâ Fortanete.
611. *Sisymbrium Sophia.*  
In ruderatis frequens.
612. *Sisymbrium altissimum.*  
Provenit Cæsaraugstæ propè el molino de la abeja, nec alibi mihi visum.  
Planta tripedalis, glabra. Folia hastato-lanceolata, basi utrinque duabus sèpiùs laciniis acutis, & parallelis instructa. Flores lutei. Sapor acerrimus. urens.
613. *Sisymbrium Irio.*  
Passim juxtâ muros Cæsaraugstæ.
614. *Sisymbrium Loeselii.*  
Habitat cum antecedenti, &c en Alcañiz.  
Planta molliter villosa.

## ERYSUMUM.

615. *Erysimum officinale* Diosc. l. 2. c. 147. Irio, sive *Erysimum* Diosc. Cienfuegos t. 4. p. 663. In ruderatis magnâ copiâ Cæsar Augusta, en Epila, Belchite.
616. *Erysimum Barbarea*. Ad agrorum margines in Aragoniâ australi, etiam in satis en la Sierra de Villaroya. Ab Anglis inter acetaria recipitur Kalm. Resa I. p. 417.
617. *Erysimum Alliaria*. *Alliaria* Cienfuegos t. 1. p. 534. Oritur en Moncayo, Cal cena, Añon, Borja. Ad condendos cibos inservit Linn. Amœn. t. 3. Pl. escul.
618. *Erysimum hieracifolium*. Legi in muris circà la Virgen de Arcos. Radix fusiformis. Caules angulosi, pedales. Folia radicalia lanceolata, sinuata; caulina linearia, rariter dentata. Flores parvi, lutei. Siliquæ tetragonæ, scabré.

## CHEIRANTUS.

619. *Cheiranthus erysimoides*. Hesperis foliis linearibus, lanceolatis, rariter dentatis, siliquis erectis, tetragonis Haller. Hely. n. 450. Provenit circà Cal cena, Añon.
620. *Cheiranthus tristis*. Oritur copiosè en el monte torrero, in collibus circà Hijar. Folia linearia, raris dentibus instructa, mollia.

## HESPERIS.

621. *Hesperis inodora*. Provenit circà Hijar, Calanda. Folia ovata, acuta, dentata. Flores purpurei, parvi.

## ARABIS.

622. *Arabis alpina*. Habitat en Pitarque, en la Palomita, Val de Linares, Camarena &c.
623. *Arabis Turrita*. Legi en la dehesa de Cantavieja, sed rara.

## TURRITIS.

624. *Turritis glabra*. Habitat ad pratorum margines circà Linare.

Folia cordato-amplexicaulia ut in *Brassicâ orientali*. Siliquæ compressæ caulis adprimuntur.

**625. Turritis hirsuta.**

Provenit en *Tolocha*, en el monte de *Herrera*, in collibus circa *Alcañiz*.

Siliquæ graciles, à caule divergunt.

## BRASSICA.

**626. Brassica orientalis.**

In agris, & vineis vulgaris *Cæsaraugustæ*, en *Calamocha* &c.

**627. Brassica vesicaria Tab. IV.**

Provenit copiosè *Cæsaraugustæ*, en *Epila*, *Hijar*, *Millen*.

Planta pedalis, aut paulò major, juvenis hirsuta, adulta verò hirsutiem deponit. Folia lanceolata, dentata, sæpiùs pinnatifida, laciinis linearibus, dentatis. Flores albi, venis fuscis.

Siliqua ex elliptico ovata, lateribus carinatis, villosa: rostrum ensiforme, compressum, ejusdem ferè longitudinis. Calyx maturo fructu persistit, sæpiùs etiam decidit.

## SINAPIS.

**628. Sinapis nigra.**

*Mostaza Laguna l. 2. c. 143.*

*Sinapi Matth. c. 13. v. 31. Marc. c. 4. v. 31. Celsius Hierob.*

*II. p. 312.*

Frequens in agris *Cæsaraugustæ*, en *Monreal del Campo* &c.

Putat Wedelius *Exerc. VI. dec. 7.* esse Fœculam Coam antiquorum . . . . . qualia *lissum*

*pervellunt stomachum Siser, Alec, Fœcula Coa. Horat. l. 2. Sat. 83*

Nostro ævo semen in electarium paratur ad condendos cibos

Ex eodem phosphorus obtinetur Albin. *Phosphor.*

**629. Sinapis erucoides.**

Provenit copiosè *Cæsaraugustæ* in olivetis, en *Epila*, *Hijar* &c.

Folia pilis raris aspersa. Flores majusculi. Petala alba, unguibus violaceis. Siliquæ maturæ purpurascentes: rostrum sulcatum, angulis duobus obsoletis.

## ISATIS.

**630. Isatis tinctoria.**

*Pastel Laguna l. 2. c. 175. Antiqui appellabant *Anil*, quo nomine posteà *Indigofera tinctoria* significari cœpit. Vide Cas-*



*Brassica vesicaria.*



Habitat en Pitarque, Cantavieja, circà Calatayud.

Planta tinctoria vulgaris notitiæ ab infectoribus in Aragoniâ coli solet, nam spontanea inutilis est Astruc Hist. nat. du Languedoc. p. 323.

## MONADELPHIA. DECANDRIA.

### GERANIUM.

631. *Geranium cicutarium.*

Passim ad agrorum margines Cæsaraugstæ &c.

632. *Geranium malacoides.*

Provenit Cæsaraugstæ florens totâ hyeme.

Folia petiolata terræ adpressa. Scapus pollicaris, etiam spithameus.

633. *Geranium ciconium.*

Oritur circà Alcañiz, Belchite, Calanda.

634. *Geranium pratense.*

Provenit circà Linares, Orihuela.

Folia subrotunda in quinque, aut septem lobulos trilobatos divisæ. Flores cœrulei.

635. *Geranium robertianum.*

Habitat en Moncayo, en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya.

636. *Geranium lucidum.*

Nascitur en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya, en Moncayo.

637. *Geranium molle.*

Cæsaraugstæ non rarum ad agrorum margines.

638. *Geranium dissectum.*

Oritur in agris Cæsaraugstæ.

639. *Geranium rotundifolium.*

Habitat Cæsaraugstæ in aggeribus agrorum.

640. *Geranium sanguineum.*

Pico de Cigüeña Laguna l. 3. c. 125.

Provenit circà Montalván.

## POLYANDRIA. ALTHÆA.

641. *Althæa officinalis.*

Malvavisco Laguna l. 3. c. 157.

Oritur copiosè in humidis Cæsaraugusta, en Calamocha, Daroca,  
Monreal del Campo.

642. *Althæa cannabina.*

Malva hirsuta, cannabina, hispanica Grislei Virid. Lusit. p. 60,  
Provenit in sepibus Cæsaraugsta, en Fuentes de Xiloca.

Folia scabra, serrata.

Cienfuegos r. 5. p. 834. Los Frailes, y cordoneros hacen muy curiosos cordones de las malvas, y alceas cocidas como el cañamo, y lino, y despues aderezado como el lino, y cañamo, y en Alemania, y otras partes añiden à los lienzos malvas cocidas para que salgan mas blancos, y delgados los lienzos, y telas, aunque no tan durables.

643. *Althæa hirsuta.*

In montosis circà Calcena mihi semel obvia fuit.

Planta, quam vidi caules habebat spithameos, scabros, folia hispidiuscula, trilobata, lobis crenulatis; flores parvos, purpurascentes; calycem exteriorem 9-fidum.

## M A L V A.

644. *Malva rotundifolia.*

Oritur circà Belchite.

Folia ferè orbicularia, crenata. Flores parvi, dilutè purpurei.

An varietas sequentis?

645. *Malva sylvestris.*

*Malva Laguna l. 2. c. 109.*

Ubique vulgatissima.

Veteres Malvi svescebantur.

..... Me pascunt olivæ,

Me cichoreæ, levesque malvæ Horat. l. 1. Od. 31.

Malvas minores de grano ex liquamine, oleo Apic. Cæl. l. 3.

646. *Malva mauritiana.*

Legi circà Epila.

Folia ex cordato quinqueloba. Flores cœrulei.

647. *Malva (hispanica)* foliis inferioribus lobatis, superioribus palmato-incisis, calyce exteriore diphyllo, setaceo Tab. v. f. 1.

Malva foliis palmato-incisis, caule procumbente, calyce exteriore diphyllo Loefling. Iter. p. 214.

Provenit en Moncayo, circà Morés, Calamocha.

Caules in nostro solo ferè sesquipedales, declinati, scabri.

Folia omnia pedunculata, inferiora triloba, lobis saepius retusis; media palmato-quinque partita, laciniis tri-bifidis. Su-

stipulae bipinnate lanceolatae, magnæ. Flores pur-

Tab. V.  
pag. 90.



F. 2. *Ononis juncea*.



F. 1. *Malva Hispanica*.



purei. Calyx interior pentagono-pyramidalis, laciniis cordato-acuminatis, nervosis. Exterior diphyllo, foliolis setaceis, hispidis. Petala latè præmorsa : cætera ut in congeneribus.

Alteram varietatem observavi, caule pollicari, erecto *en Montolar*, & *Val de Urrea*.

Ex præcedenti descriptione patet, quòd *Malva nostra*, & *Loeflingiana* non possit eadem esse cum *Malva hispanica* Linnæi, cui folia tribuuntur subrotunda, ut in Icone Plukenetii ibi allegata pinguntur.

An igitur Cl. vir de aliâ plantâ dixerit, vel synonymum *Loeflingii* incautè posuerit, determinare non ausim.

648. *Malva Alcea* Diosc. l. 3. c. 158.

Provenit *Casar Augusta*.

Folia trilobata, scabra.

649. *Malva moschata*.

Provenit circà *Orihuela* sed parciùs.

Caules cubitales. Folia radicalia reniformia, sèpiùs lobata, crenata : caulina in quinque, aut septem lacinias partita, segmentis pinnatifidis. Flores magni, purpurei. Calyx exterior foliis tribus lanceolato-acuminatis. Tota planta pilis scabra.

### LAVATERA.

650. *Lavatera triloba*.

*Althæa fruticans*, incana, minore folio, hispanica *Barrel.* It.

428.

Oritur circà *Calatayud* in collibus è regione *Guermeda*.

Folia incana, mollia. Flores dilutè purpurei.

### DIADELPHIA.

### HEXANDRIA.

### FUMARIA.

951. *Fumaria enneaphylla*.

Oritur in rupibus madidis *en Tolocha*, *en la Sierra de Arcos*, circà *Calcena*, *Aliaga*.

652. *Fumaria officinalis*.

*Palomilla Laguna* l. 4. c. 111.

In agris passim.

In cineribus sal marinus admistus est *Gmelin Act. Petrop. V. p.*

289.

653. *Fumaria spicata.*

Habitat cum priori *Casaraugusta*, & alibi.

## OCTANDRIA.

### POLYGALA.

654. *Polygala vulgaris.*

*Polygalol*, ò *Polygalon* Cienfuegos t. 2. p. 787. Ic. 792.

Provenit en el monte de Herrera, circà Alcañiz, Calanda, in pratis montonis.

Ad pleuritidem cum successu adhitetur Act. Par. 1739. p. 131.

655. *Polygala amara* Diosc. l. 4. c. 143.

Oritur copiosè in pratis en la Palomita, circà Cantavieja, Linares, Alcalá de la selva, en la dehesa de Aliaga.

Flores coerulei, caules decumbentes.

656. *Polygala monspeliaca.*

Habitat in collibus circà Hijar, Caspe, Alcañiz: en el monte torrero, sed parciùs.

Planta suffruticosa, quâ notâ à præcedentibus maximè differt.

## DECANDRIA.

### SPARTIUM.

657. *Spartium junceum.*

*Retama*, ò *Hiniesta Laguna* l. 4. c. 159.

*Ginesta*, ò *retama hortense* Cienfuegos t. 2. p. 576. Ic. 380.

Memini vidisse multis abhinc annis inter Villafranca, & Bujaraloz magnâ copiâ florentem juxta viam publicam.

Vox *retama* ab arabicâ *retam* derivata est. Sed orientalium *retam* ad Genistæ genus pertinere videtur; quam quidem *Genistam* foliis simplicibus ramis alternis striatis, fructu ovali uniloculari dixit Forskal Fl. Aráb. p. 214. attamen in eo hallucinatus est quòd orientalem *Genistam* eandem cum nostrâ ex nominis similitudine putavit. Celsius Hierob. I. p. 246. Hebræorum *retam* ad *Spartium scoparium* revocavit. Flores ab apibus amantur Iour. œcon. 1762. Mars.

658. *Spartium monospermum.*

Vernaculè *Ginesta*.

*Gayomba* Cienfuegos t. 2. p. 396. Ic. 402.

Non pyra quæ lentâ pendent religata genistâ. Martial. l. 1. Ep. 44.

Provenit copiosè in aridis *Casaraugusta*, en Epila, Hijar, Caspe,

Cienfuegos Ibid. 400. Es tan comun en España, que los peregrinos extranjeros de Francia, y Alemania, que só color de visitar el cuerpo del glorioso Apostol Santiago visitan todas sus fuerzas, y bordoneando, y corriendo la droga llevan muchos doblones, como se vé en los que à veces la industria de los guardas de puertos secos les quitan, para enseñar el camino à los que quedan atrás van dando nudos en las matas de las retamas desde los Pirineos hasta Santiago de Galicia, y desde Santiago hasta nuestra Señora de Guadalupe.

Et paulò post : Esta mata es la Gayomba, que algunos embusteros confiando mas en las medicinas caducas que en la celestial de Dios, buscan casi en ella la inmortalidad, diciendo vanidad grande) que en lo profundo de su raiz como asida de una raiz delgada, que baxa profundisima se halla cierta bolilla redonda, ó nabillo que ellos llaman panacea, la qual comida hace volver à nacer dientes, y muelas, desofusca la vista, tiñe el pelo, renueva la sangre, y virtud vital, y buelve los viejos de treinta años. Qué verdad tenga esto no lo sé, mas de haber visto diversas relaciones de ello, y en mi tiempo cierto Principe Eclesiastico, y Cardenal de Roma se dexó creer de ello, y embió la descripción, nombre, y pintura à España, donde algun engañador le había dicho se hallaba. Yo tuve noticia del aviso por medio del Licenciado Rios, Procurador de Filipinas, buena persona, y docta; pero facil, y ciego en buscar estas invenciones, y chimieas, y hice gran risa, y burla de semejante fabuia, aunque he visto libros manuscriptos antiguos Españoles, que tratan de ella.

### 659. Spartium purgans.

Ginesta, ó retama angulosa, y vainillas vellosas del monte Moncayo  
Cienfuegos t. 2. p. 413. Ic. 416. optima.

Genista tertia hirsuta Dodon. Pempt. p. 750.

Hispanis Retamón.

Occurrit mihi inter M. Caunum, & oppidum Añon.

Allegatus Cienfuegos primus fuit recentiorum, qui optimam hujus plantæ descriptionem concinnavit.

### 660. Spartium scopiarum.

Genista angulosa Cienfuegos t. 2. p. 382. Ic. 392.

Provenit en Moncayo, in sterilibus circà Caspe.

Flores conditi capparidum succedanei Osbeck Act. Stock. 1765.

Tota planta ad firmando coria inservit la Lande Art. du Tanneur p. 14. In Italiâ incolæ oppidi Bagno ad aqua propè Pisas ex eâdem in thermis maceratâ tolerabiles telas faciunt, quæ tincturam fa-

661. *Spartium spinosum,*

*Aliaga, & Aulaga Cienfuegos t. 2. p. 445. Ic. 449.*

Provenit copiosè in sterilibus, en el monte torrero, circà Epila, Pozuelo, Hijar, Caspe, Alcañiz, Calanda &c.

Floribus utuntur nostrates ad lanas luteo colore imbuendas.

Cienfuegos Ib. p. 518. En Aragon, y en la Alcarria las mugeres cogén sus flores, y secas en polvos las dán para mal de amarillo, y oplaciones: y las cuidiosas, que bilan lana se sirven de ellas, y flor de guilda para teñir amarillo, y hacer unos poyales, ó paños de lana gruesa para los bancos, y mesas, y avantales, y otras cosillas de la misma manera que en las tierras septentrionales usan para tinta de las flores de la diferencia de retami, que llaman flos tintorius.

He visto en Moncayo á estrangeros coger en la primavera sacos enteros de la flor de Aulaga, y llevárla á sus tierras sin querer confesar para qué: sospecho es para tinta de lanas, ó paños, y tapicerías, porque dicen las mugeres de mi tierra que la lana teñida con ella no admite polilla, y raras veces la vemos en paños, ni tapicerías estrangeras.

## GENISTA.

662. *Genista sagittalis.*

*Carchesia Cienfuegos t. 2. p. 486. Ic. 494.*

Provenit in agro Oscensi.

Cienfuegos Ibid. p. 489. En Aragon no la he visto sino en unas quebradas de los montes de Sora.

Folia decurrentia. Flores flavi in summis caulis. Calyx pubescens, bilabiatus. Vexillum alarum longitudine. Leguminosa scabra, nigra. Semina 5, aut 6.

663. *Genista florida.*

*Ginesta pequeña, ó flor de tintoreros Cienfuegos t. 2. p. 478. Ic. 472.*

Oritur en Moncayo, in montosis circà Orihuela, en el monte de San Ginés.

Folia simplicia, lanceolata, sericea. Calyces etiam sericei, splendentes.

664. *Genista pilosa.*

Provenit en la Sierra de Villaroyna.

Caules procumbentes. Folia terna, & solitaria, obversè lanceolata, subtùs villosa. Flores spicati. Calyx bilabiatus, pubescens. Siliquæ, scabræ, nigræ.

665. *Genista germanica.*  
In sylvis circà Oribuela mihi obvia fuit.  
In nostro solo humilis fruticulus. Siliquæ breves, pilosæ,  
tetraspermæ. Folia ovata, hirsuta. Rami vetusti spinis al-  
ternis.
666. *Genista hispaniæ.*  
Genistella spinosa flore spicato Munting. Phyt. 10. f. 45.  
Habitat ad radices montis Cauni, en la dehesa de Aliaga.  
Rami spinosi, bipinnati, aphylli. Folia linearia, acuta, villo-  
sa, simplicia.

### ONONIS.

667. *Ononis spinosa.*  
Detiene buei Laguna l. 3. c. 19.  
In agris frequens.  
Ad calculum laudatur Haen Rat. med. VI. p. 290.
668. *Ononis minutissima.*  
Legi in rupibus en los montes de Rodanas, en Tolocha, circà  
Tronchon.  
Planta tota glabra. Stipulæ longè aristatæ.
669. *Ononis Cherleri.*  
Provenit in duris Cæsaraugustæ.
670. *Ononis Natrix.*  
Nascitur locis glareosis Cæsaraugustæ, en Alcañiz, Moyuela &c.  
Natrix vocatur herba, cuius radix erulsa virus hirti redolet Plin.  
l. 27. n. 83.
671. *Ononis tridentata.*  
Vernaculè Asnallò, & Arnacho.  
1. Varietas: foliis linearibus, tridentatis, pedunculis bi-  
floris.  
Habitat circà Teruel.  
2. Varietas: foliis cuneiformibus, quinquedentatis, pedun-  
culis unifloris. Hujus synonymum est  
Cicer montanum, fruticans, incantum, angustifolium, serra-  
tum minùs Barrel. Ic. 419.  
Provenit in collibus Cæsaraugustæ, circà Epila, Calatayud, Po-  
zuelo, Hijar, Belchite, ubi gypsum adest.  
Frutex ferè sesquipedalis, aut minor. Caules lignosi; rami ju-  
niores tomentosi. Folia carnosa, ternata, cuneiformia, quin-  
quedentata, cum fasciculo foliorum minorum ex aliis. Flores  
sparsi, purpurei. Pedunculi uniflori, articulati. Legumen

ovato rhomboidea, villosa, cernua. Semina 5, aut 6 reniformia.

Etsi nonnullæ discriminis notæ in hac varietate obseruentur, non ausim separare in tantâ habitûs similitudine. Si verò quis novam speciem statuat, fortè non errat.

Salsuginosa planta à pecore depascitur.

672. *Ononis (junccea)* fruticosa, stipulis imbricatis, ventricosis, floribus spicatis, sessilibus, calycibus vexilla æquantibus *Tab. V. f. 2.*

Oritur in aridis *Cæsaraugustæ.*

Frutex sesquipedalis, erectus. Caules juncei, glabri, ramosi. Folia inferiora ternata, superiora simplicia cuneiformia, serrata, longè petiolata. Stipulæ bicornes, serratæ, ventricosæ, imbricatim positæ, petiolum ex sinu proferunt. Inflorescentia spicata. Flores pallidè flavi, sessiles intrà singulas superiores bracteas. Calycis laciniæ lineares, omnino glabræ vexillum æquantes. Legumen ovatum, villosum, trispernum.

Ab *O. mitissimâ* Linnæi omnino distinguitur quod nostra sit fruticosa, illa annua; hujus calyces glabri, illius verò viscosi. *Anonis non spinosa, trifolia, glabra*, Barbel. *Ic. 762.* florum figurâ accedere videtur.

673. *Ononis (Aragonensis) fruticosa*, floribus geminatis, bracteatis conjugationibus infernè remotioribus *Tab. VI. f. 2.*

*Anonis hispanica frutescens*, folio rosæ sylvestris Tournef. *Inst. p. 409.*

Provenit in rupibus calcareis en *Segura* versùs aquas medicatas, en *la dehesa de Aliaga*, en *la peña cerrada de Fortanete*.

Frutex sesquipedalis. Caules tortuosi, procumbentes, ramosissimi, cortice nitido. Folia ternata, rotunda, glabra, dentata. Stipulæ ovato-lanceolatæ, leviter serratæ. Summi ramiflorigeri nudi, pubescentes. Flores ad singulas bracteas gemelli, pedunculati, conjugationibus distichis, infernè remotioribus. Bracteæ cordatæ, acuminatæ, pubescentes.

*Calyx campaniformis*, hirsutus, laciniis linearibus. Flores flavi, speciosi. Vexillum replicatum, venis sanguineis: alæ ovatae, vexillo dimidio breviores: carina acuta. Filamenta decurrentia connata. Legumen ovato-oblongum, villosum, uniloculare, bivalve. Semina 4, aut 5. reniformia.

Synonymum *Tournefortii*, quod ad hanc speciem revocavi, ad varietatem *O. crispæ* retulit Cl. Linnæus. At ex praecedenti descriptione facile datebit quantum intersit utramq;





Et primo quidem intuitu Aragonensis planta ab *O. crispâ* distinguitur partium glabritie, & floribus geminatis, neque solitariis, aut axillaribus.

674. *Ononis (cenisia)* pedunculis muticis, unifloris, foliis ternatis, cu-neatis, stipulis serratis, caulis prostratis Linn. Mant. 2.  
*Anonis inermis* glabra Allioni Pedem. 47. t. 10. f. 3.  
 Provenit copiosè en la Palomita, circà Cantavieja, Val de Linares, Alcalá de la selva, Pitarchue.  
 Caules erectos dixit Allionius, ego verò constanter prostratos observavi.
675. *Ononis (aggregata)* herbacea, prostrata, floribus terminalibus, aggregatis Tab. VI. f. 1.  
 Oritur en la muela de San Juan propè Griegos.  
 Planta pollicaris. Radix fibrosa, latè repens. Caules herbacei, ramosi, prostrati. Folia cuneata, ternata, serrata, subhirsuta. Stipulæ ovatæ, denticulatæ. Flores lutei, in summis caulis pedunculati, 4. aut 5; etiam tres, vel duo, ità congesti ut umbellam mentiantur. Calyx hirsutus, laciniis linearibus. Corolla calycem superans. Legumen ovatum, villosum, erectum. Semina duo, aut tria.
676. *Ononis* herbacea, pedunculis axillaribus aristatis, subtrifloris, foliis ternatis, pubescentibus.  
*Anonis annua*, erectior, latifolia, glutinosa, Lusitanica Tournef. Inst. p. 409.  
 Provenit en el avellanar del Collado circà Badenas, propè Tronchon. Planta pedalis. Radix fibrosa. Caulis pubescens, subviscosus. Folia ternata, rotunda, dentata, pubescentia. Stipulæ lanceo-latæ, serratæ. Pedunculi axillares, elongati, aristati, triflori, aut biflori. Flores purpurei, magni. Legumen oblongum, villosum. Semina 5, & 6. reniformia. Ab *O. rotundifolia* differt caule herbaceo, & floribus ebracteatis.

### ANTHYLLIS.

677. *Anthyllis Vulneraria.*

1. Varietas: floribus rubris.

Loto affinis hirsuta flore subrubente C. Bauh. P. 333.

Provenit in montosis circà Brea.

2. Floribus luteis.

Oritur propè Purujosa.

3. Floribus ex albo, & rubro variegatis.

Habitat circà Badenas, Montalvan, in pratis en la Palomita,

*Cantavieja, Linares, Alcalà de'la selva.*

A pecore non valdè amatur Schreber *Sammil. III. p. 12.*

Hujus corollæ, ut & *Loti corniculati cœruleæ* evadunt; ideóque putat Cl. Linnæus quòd fecula tinctoria ex his plantis parari posset, eodem artificio, quo ex *Indigoferâ* obtinetur. *Amæn. t. 5. Pl. tint.*

678. *Anthyllis Erinacea.*

*Erizo Cienfuegos t. 2. p. 468. Ic. 470.*

*Vernaculè Tollaça, sive Toyaga.*

*Erinacea altera Lusitana Grislei Virid. Lusit. p. 35.*

Provenit copiosè en *Moncayo, circà Calcena, in montibus inter Montalvan, & Aliaga.*

## OROBUS.

679. *Orobus niger.*

*Orobo, ò jervo de Panonia Cienfuegos t. 4. p. 472.*

*Oritur en la modorra de Badenas.*

Hujus plantæ radicibus Britanni famen tolerarunt cum à Romanis premerentur Dion. in *Severo. Linn. Amæn. t. 1. Fl. æcon.*

## LATHYRUS.

680. *Lathyrus Aphaca.*

*Arbeja, ò disante menor Cienfuegos t. 3. p. 420. Ic. 421.*

In agris frequens *Cæsaraugusta, en Epila, Borja.*

681. *Lathyrus Cicera.*

*Lathyro, ò Cicercula Cienfuegos t. 4. p. 324 Ic. 326.*

Habitat in agris *Cæsaraugusta.*

682. *Lathyrus sativus.*

Hispanis *Alcarceña, vox Arabica apud Ebn Aluam Casiri Bibl. Escr. I. p. 332.*

Habitat cum priori spontaneus.

683. *Lathyrus angulatus.*

Legi en las montes de Rodanas in colle dicto *Monegrè.*

Folia angustissima, acuta.

684. *Lathyrus hirsutus.*

Oritur inter segetes *Cæsaraugusta.*

Folia lanceolata, scabra, uti legumina.

685. *Lathyrus pratensis.*

In agris vulgatissimus *Cæsaraugusta, en Borja.*

Bonum pabulum Schreber *Sammil. III. p. 49.*

686. *Lathyrus sativus.*

*Lathyrus silvestre* Cienfuegos t. 4. p. 332. Ic. 334.

Habitat cum priori, etiam en Moncayo.

687. *Lathyrus latifolius.*

Provenit copiosè en la modorra de Badenas.

Folia rigidiuscula, nervosa. Flores speciosi, purpurei.

688. *Lathyrus heterophyllus.*

Provenit en el avellanar del Collado circà Badenas, en la Palomita, circà Cantavieja, Linares.

### VICIA.

689. *Vicia Cracca.*

*Cracca* Cienfuegos t. 4. p. 305.

*Cesaraugusta vulgatissima*; etiam in montosis en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya &c.

690. *Vicia onobrychoides.*

Habitat en el monte de Herrera, en el avellanar del Collado circà Badenas.

691. *Vicia sativa.*

*Algarrobas* Cienfuegos t. 4. p. 318.

Inter segetes non rara *Cesaraugusta*.

Ex seminibus panis fit Kalm Resa p. 55. Cæterum columbarum cibus, & optimum pabulum pro pecore Oeon. nachricht. V. p. 769.

692. *Vicia lathyroides.*

Habitat in pratis en el monte de Herrera.

Planta pollicaris in illo solo, procumbens. Folia cordata, retusa. Flores solitarii, purpurei, parvi.

693. *Vicia lutea.*

In agris frequens *Cesaraugusta*.

Folia linearia, pilosa, retusa cum acumine. Legumina turgida, hirsuta, stylo reflexo. Caules angulati.

694. *Vicia peregrina.*

Occurrit in agris *Cesaraugusta*, en Epila.

### ERVUM.

695. *Ervum tetraspermum.*

In agris *Cesaraugusta* frequenter occurrit.

Folia linearia, acuta 2. aut 3. parium. Pedunculi capillares foliis longiores, aristati, uniflori, rariùs biflori. Legumina villosa, matura pilos depinunt.

696. *Ervum hirsutum.*

Legi in satis en la sierra de Villaroya.

### CYTISUS.

697. *Cytisus hirsutus.*

Provenit en el monte torrero, in collibus aridis circà Hijar, Caspe, Alcañiz, Calanda, Quinto.

### COLUTEA.

698. *Colutea arborescens*, Theophr. l. 3. c. 17.

Espanta lobos Laguna obs. ad l. 3. c. 79. Diosc.

*Colutea de Theophrasto* Cienfuegos t. 2. p. 1002 Ic. 1017.

Oritur in sylvis circà Calcena, Tronchon, Pitarque.

Folia Sennæ substitui possunt Du Hamel Arb. I. p. 178.

### GLYCYRRHIZA.

699. *Glycyrrhiza glabra.*

Vernaculè Regaliz.

Regaliza, Orozuz, Palo dulce Laguna l. 3, c. 5. & Cienfuegos t. 2. p. 940. Ic. 968.

Provenit copiosè Cæsarangustæ, en Quinto, Fuentes, Caspe &c.

Magna vis radicum ad exteris exportatur. Succus in pastillos recipitur ad pectoris morbos laudatissimos.

Cienfuegos Ibid. p. 960. Esta es la Regalicia, que ofende las tieras gruesas de la canal de Ebro, de que se hace cargazon para Leon de Francia, Londres, y Amberes.

Decoctum Glycyrrhizæ cum melle, & lacte ad vermes pellendos laudat Aurelianus Linn. Amæn. t. 5. *Spigelia anthelmintica*.

### CORONILLA.

700. *Coronilla Emerus.*

Colutea scorpioides Cienfuegos t. 2. p. 1018. Ic. 1012.

Legi in rupibus en la dehesa de Aliaga.

701. *Coronilla glauca* Du Hamel Arb. I. p. 185. Ic. 186.

Provenit circà Alcañiz, in rupibus propè Calcena, Calanda &c.

### ORNITHOPUS.

702. *Ornithopus scorpioides*, Dios. l. 4. c. 194.

*Scorpioides de Mathiolo* Cienfuegos t. 2. p. 978.

Oritur inter segetes Cæsarangustæ, en Barbastro.

## HIPPOCREPIS.

703. *Hippocrepis unisiliquosa.*

*Lunaria*, que tiene su vainilla forma de herradura Cienfuegos t. 2. p. 39.

Vernaculè *yerva del pico.*

Habitat in agris *Cæsaraugusta*, en *Epila*.

Anilis fabula est quòd ferrum secet. Cienfuegos Ib. p. 39. Los Italianos desvanecidos, y chimerosos le nombran sferra cavallo, y de aqui tuvo el origen de persuadirse que hollando esta planta las bestias, y brutos, que van herrados, se les caen las herraduras: experiencia que muchos en valde han hecho sin conseguir tal intento. Et p. 40. Del mismo jaez destos son los supersticiosos Espanoles, que llaman à esta la yerva del pico, diciendo (error grande) que si à esta ave, que anida en huecos de arboles socavando con aquel pico de hueso tan duro como hierro qualquier tronco, le ponen una lamina de hierro clavada para impedirle la entrada, busca esta yerba, y en tocando con ella, ó saltan los clavos, ó se rompe la plancha de hierro.

704. *Hippocrepis multisiliquosa.*

Provenit en el monte torrero, en *Montolar*, & alibi in aridis.

*Foliola linearia*, angustissima; sequentis vero ovata, obtusa.

705. *Hippocrepis comosa.*

Nascitur *Cæsaraugusta*, en *Caspe*, *Alcañiz* &c.

## SCORPIURUS.

706. *Scorpiurus sulcata.*

*Scorpioide I. de Dodoneo* Cienfuegos t. 2. p. 988.

Oritur in agris, & olivetis *Cæsaraugusta*, en *Epila*.

## HEDYSARUM.

707. *Hedysarum obscurum?*

Provenit in collibus circà *Alcañiz*.

Planta suffruticosa, radice perennante. Folia impari pinnata, foliolis ovatis. Stipulæ vaginantes. Pedunculi foliis longiores. Flores racemosi, purpurei, carinâ compressâ, extrorsum latiore. Cum fructum non viderim speciem certò determinare non possum: sed carinæ figura Hedysaris hanc stirpem annumerare cogit. Nonnulla videtur habere communia cum *Hedysaro alpino*, & Icon Cl. Halleri *Helv. n. 395. tab. 12.* non omnino repugnat.

708. *Hedysarum Onobrychis*: an *Diosc. l. 2. c. 164?*

## Hispanis Pipirigallo.

*Onobrychis primera de Dodoneo Cienfuegos t. 2. p. 751. Ic. 755*  
*Habitat circà Segura, Montalván, Tronchon, Aliaga, Camarenas,*  
*Badenas &c.*

*Caules in spontanèâ plantâ declinati.*

*Cum in macro solo etiam provenire possit, ejus culturam com-*  
*mendat Du Hamel Agric. l. 9. c. 2. art. 2.*

## ASTRAGALUS.

709. *Astragalus pilosus.*

*Legi in satis en los montes de Rodanas.*

*Spica hirsutissima: flores lutei. Foliola subrotunda, pilosa.*

710. *Astragalus Cicer.*

*Garbanzo silvestre de los herbarios Cienfuegos t. 4. p. 157.*

*Habitat in siccis propè Belchite.*

*Foliola oblonga, hirsuta.*

711. *Astragalus glycyphyllos.*

*Provenit en la Palomita, circà Alcalá de la Selva.*

*Stipulæ magnæ; flores axillares, pedunculati, in spicam con-*  
*gesti. Legumina triangula, glabra.*

712. *Astragalus hamosus.*

*Hedysaro, ò Securidaca menor Cienfuegos t. 2. p. 702. Ic. 708.*

*Legi Cæsaraugustæ loco sterili, petroso juxtà viam Matri-*  
*tensem.*

713. *Astragalus sesameus.*

*Vicia sesamea Cienfuegos t. 4. p. 314. Ic. 316.*

*In muris propè la Virgen de Arcos mihi obvius fuit.*

714. *Astragalus austriacus.*

*Onobriche segunda de Clusio Cienfuegos t. 2. p. 768. Ic. 770.*

*Oritur en Segura in rupibus, quibus arx inædificata est.*

*Alæ emarginatæ.*

715. *Astragalus incanus.*

*Onobrychis incana C. Bauh. Prod. p. 149.*

*Habitat en el monte torrero, in collibus aridis circà Quinto, Hi-*  
*jar, Caspe, Alcañiz.*

Bauh. l. c. Alteram non minus incanam, sed minorem, semipalma-  
rem, foliis brevioribus, & rotundis ex Aragonia, & Castiliae saxo-  
sis D. Albinus attulit.

716. *Astragalus Tragacantha.*

*Hispanis Granèvano.*

*Cummi eius alavitira Laguna l. 2. c. 21.*

Oritur en la Palomita, en Alcalà de la selya, circà Orihuella &c.  
Spicæ hirsutæ. Flores albo-purpurei.  
Gummi Tragacantæ infectoribus inservit ad serica præparanda.  
Ex eâdem cum farinâ, & aquâ optimum gluten fit Du Hamel *Arb. II.* p. 345.

### PSORALEA.

717. *Psoralea bituminosa.*

*Trifolium* *Dioscoridis l. 3. c. 117.*

*Trifolio asphaltites* *Cienfuegos t. 6. part. 2. p. 34, 37. Ic. 44, 48.*

Provenit in collibus circà Hijar, Caspe, Alcañiz, Calanda.

Meliloti vires possidet Jussieu *Act. Par. 1744. p. 381.*

### TRIFOLIUM.

718. *Trifolium Melilotus officinalis.*

*Corona de Rei Laguna l. 3. c. 44.*

*Trebol real oloroso* *Cienfuegos t. 6. part. 2. p. 166. Ic. 194.*

Oritur in agris Cæsaraugustæ.

Pharmacopæi imperiti *Lotum siliquosum* huic substituunt, & pro vero Meliloto habent.

Cienfuegos *Ib. p. 244.* Parece que en la Corte, à donde asiste el Protomedicato, y à quien incumbe el examen de los Boticarios, y con mas cuidado se debian quitar errores, debieran haber examinando, què simple era este, contentandose con la doctrina comun de la Pharmacopea de Luis Velez Boticario, que escribió en esta Corte. Tratando en su Pharmacopea (que es la mas recibida en Castilla, y conforme la qual se examinan los Boticarios, y dispensan las medicinas) del emplastro de Meliloto dice, que usan de diversas yervas por Meliloto como en Toledo del *Scorpioides*, en Madrid una especie de trifolio pratense.

*Et t. 2. p. 811....cada oficina gasta el suyo; Aragon, Valencia, y parte de Andalucia el trebol real oloroso, Toledo la Colutea s orpioides, Madrid una especie de trebol de prados, y vainillas largas esquinadas.*

Cum aliorum errores circà Meliloti delectum refutasset Cl. vir, incidit ipse in Scyllam cupiens vitare Charybdim, nam pro vero Meliloto habuit, & pinxit *Trigonellam corniculatam* Linnæi. *Ibid. p. 266.*

Inter vestimenta positum ea à tineis tuetur Linn. *Amaen. t. 1.*

*Fl. acon.*

719. *Trifolium strictum.*  
Provenit en la Sierra de Bicor.
720. *Trifolium repens.*  
*Trifolium pratense*, & *vulgatius* flore albo Cienfuegos t. 6.  
part. 2. p. 119. Ic. 123.  
Oritur copiosè in fossis Cæsaraugustæ, en Epila, Calatayud, Da-  
roca; in pratis en la Palomita, Cantavieja &c.
721. *Trifolium subterraneum.*  
*Trifolium hirsuto*, stellato capite, sub terram se condente,  
perenne, *Lusitanicum* Grisei Virid. Lusit. p. 82.  
Provenit en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya.  
Flores reflexi, albi, vexilli tubo stricto, longo.
722. *Trifolium rubens.*  
Pie de liebre mayor Cienfuegos t. 6. part. 2. p. 357.  
Occurrit mihi en el pinar de Losilla circà Albarracín.  
Stipulæ maximæ, ventricosæ. Spica subcylindrica, speciosa.  
Flores purpurei, foliolo interstincti. Legumen sub-rotundum,  
planum, monospermum.
723. *Trifolium pratense.*  
Trebol de prados de flores purpureas Cienfuegos t. 6. part. 2. p.  
84. Ic. 86.  
In pratis vulgatissimum.  
Bonum pabulum: sed ob nimiam alimenti vim flatus in equis,  
& vaccis producit Oecon. Nachricht. VI. p. 45.  
Cienfuegos Ib. p. 480. Ha llegado à tanto la vanidad supersticio-  
sa, y error de los hombres, que persuadidos han planta, que incli-  
ne à amar han buscado trebol no de cuatro hojas, como poco ha de-  
ciamos, sino de dos: y debe tener algun fundamento este cuidado,  
apetito de buscarle, pues aun entre los refranes comunes, que junt  
el Comendador Griego, en la letra D se halla uno, que dice: Dam  
trebol con dos hojas, darte he mozas en que escojas. Sino e  
que teniendo por dificultoso el hallarlo, los embusteros que les ofre-  
cen el conseguir su depravado intento, les piden esta yerva.
724. *Trifolium lappaceum.*  
Habitat circà Cæsaraugustam.  
Folia cordata, nervosa, margine ciliata. Spicæ caules termi-  
nant, ovatæ, hispidæ.
725. *Trifolium angustifolium.*  
Pie de liebre mayor de hojas estrechas Cienfuegos t. 6. part.  
p. 367.  
Provenit in agro Cæsaraugustano, en la modorra de Badenas.

726. *Trifolium arvense.*

*Lagopode*, ò pie de liebre menor Cienfuegos t. 6. part. 2. p. 347.  
Ic. 353.

*Lagopus angustifolia*, minor, erectior Barrel. Ic. 901.

In agris, & sylvis non rarum.

727. *Trifolium stellatum.*

Legi en el pinar de Losilla circà Albarracin, en el monte de San Ginès propè Rodenas.

728. *Trifolium fragiferum.*

Habitat in agro Cesaraugustano.

Folia cordata, glabra, vix serrata. Petioli hirsuti. Calyx sericeus, quinquedentatus, dentibus duobus superioribus longioribus. Legumen subrotundum, monospermum.

729. *Trifolium montanum.*

Nascitur copiosè in pratis en la Palomita, Cantavieja, Linares, Alcalà de la selva.

Flores albi. Legumen monospermum. Folia lanceolata, serrulata.

730. *Trifolium agrarium.*

Trebol de prados de flor amarilla, diferencia tercera Cienfuegos t. 6. part. 2. p. 129. Ic. 134.

Provenit en Bicor, en el monte de Herrera.

Vexillum striatum, alas involvens. Caules procumbentes. Folia cuneata, striata, glabra.

Eximum pabulum Haller. *Helv.* n. 363.

## LOTUS.

731. *Lotus siliquosus.*

Provenit in humidis en Caspe, Alcañiz, Calanda, Calamocha.

Folia terna ferè rhomboidea, acuta. Caules uniflori. Flos magnus pallidè flavus. Vide n. 718.

732. *Lotus rectus.*

Trifolium rectum monspeliense I. Bauh. *Hist.* 2. p. 359.

Provenit in agro Cesaraugustano.

733. *Lotus corniculatus.*

*Lotus* Diosc. l. 4. c. 112, 113. alia planta.

In pratis montanis frequens en la Palomita, Cantavieja, Linares; etiam en el monte de Herrera.

Egregium pabulum Schreber *Samml.* III. p. 51.

734. *Lotus Dorycnium* Diosc. l. 4. c. 76.

Oritur circà Cesaraugustam, en Caspe, en el desierto de Calanda.

## TRIGONELLA.

735. Trigonella Fœnum græcum.

*Alholvas Laguna l. 2. c. 93.* Cienfuegos t. 4. p. 391. Ic. 393.

Oritur in agris Cæsaraugustæ, en Calcena.

Luteo colore tingit Hellot de la teint. c. 18. sed nostris negligitur. Apud veteres edulis erat teste Apicio Cœlio l. 3. Fœnum græcum ex liquamine, oleo, & vino.

## MEDICAGO.

736. Medicago sativa.

*Mielga, Alfalfa Laguna l. 2. c. 136.* Cienfuegos t. 6. part. 2. p. 282. Ic. 291. *Alfalfa* nomen corruptum ab arabico *Alfasasa* Gol.

Ad agrorum, & viarum margines Cæsaraugustæ, & alibi, ut enumerare non adtineat.

Caules in spontaneâ plantâ procumbentes. Folia angusta, obverse lanceolata.

In Aragoniâ pro pabulo seritur. Flatus, & emphysemata in animalibus gignit Bourgelat *Mat. med.* p. 110. Radices ad dentiscalpia utiles *Art du dentiste II.* p. 307.

Cienfuegos *Ib.* p. 286. Padece muchos años de una enfermedad de un gusanillo, que llaman cucillo, el qual roe, y consume como la oruga los tallos tiernos, y hojas. Contra esta enfermedad usan de dos remedios uno natural, que es tomar unos cedazos de seda, y trayendolos encima de sus tallos, que aunque altos salen mui iguales, y conformes, à la tela se apega aquel gusanillo, y sacandolo à lo raso, lo quemam que es mejor: otros lo pisan, y embuelven en tierra. Algunos haciendo cenizas fortíssimas, à la mañana quando la yerva està con rocío la ciernen con cedazos por encima, y ahoga, y quema el gusano, que la roe.

737. Medicago lupulina.

Provenit in agris Cæsaraugustæ, en Borja.

Folia terna, subrotunda, vix serrata.

738. Medicago polymorpha.

Hujus infinitæ sunt varietates.

1. Scutellata.

Medica clypeata Grislei Virid. Lusit. p. 62.

2. Intertexta.

Medica echinata maxima. Lusitana Grislei *Ibid.*

3. *Muricata.*

*Medica doliata*, *echinata*, *minor Grislei Ibid.*

4. *Hirsuta.*

*Medica echinata*, *pluribus lappulis in uno pediculo Grislei Ibid.*  
Has varietates fructibus spinosis recenset noster Cienfuegos sub nomine *Carretillas* t. 6. part. 2. p. 298.

**POLYADELPHIA.****POLYANDRIA.****HYPERICUM.**

739. *Hypericum quadrangulum.*

Provènit en la Palomita.

Folia ovata, integerrima, nervosa.

740. *Hypericum perforatum.*

Corazonillo Laguna l. 3. c. 165.

Hipericon Cienfuegos t. 3. p. 3. t. 7. Ic. 384.

Oritur in montosis circà Epila, Rodanas, en la modorra de Badenas, en el monte de Herrera, en Moncayo.

Flores ad præparanda coria adhiberi possunt Gleditsch Act. Berol. 1754. p. 124. seq.

Flavo colore tingit. Act. Stock. 1745. p. 250.

741. *Hypericum montanum.*

Nascitur en el pinar de Losilla circà Albarratin.

742. *Hypericum hirsutum.*

Androsænum alterum hirsutum Colum. Ecphr. I. p. 75. t.

74. Hiperico annu. Habet folia glabra et rufa.

Oritur en la Palomita, in pratis circà Linares, en la modorra de Badenas.

**STNGENESIA.****POLYGAMIA ÆQUALIS.****TRAGOPOGON.**

743. *Tragopogon pratense.*

Barba cabruna Laguna l. 2. c. 132.

Provenit Cæsar Augustæ.

Turiones edules Bradley Lady direct. p. 109.

744. *Tragopogon crocifolium.*

Tragopogon flore luteo, & purpureo Grislei Virid. Lusit. p. 80.

Oritur en la Palomita, circà Oseja.

Flores ex flavo obsoletè purpurascunt.

745. *Tragopogon picroides.*

Habitat in agris Cæsaraugustæ, en Belchite.

### SCORZONERA.

746. *Scorzonera hispanica.*

Oritur in montosis circà Epila, Tronchon, Rodenas.

Radix officinalis; etiam in acetaria recipitur.

747. *Scorzonera (Clusii) caule multifloro, foliis radicalibus petiolatis, lanceolatis, nervosis.*

*Scorzonera latifolia*, altera C. B. Pin. 275.

*Scorzonera major Pannonica* I. Clus. Hist. 2. p. 138. fig. bona.

Vaillant. Act. Par. 1721. p. 207.

*Scorzonera plantagineo folio, caule folioso Grislei Virid. Lusit. p. 75.*

Habitat in agris Cæsaraugustæ.

Planta pedalis. Radix carnosa. Caules ramosi, foliosi. Folia radicalia petiolata, lanceolata, quinquenervia, ut in *Plantagine lanceolata*; caulina ad ramorum extortum linearia. Flores lutei, ut in congeneribus.

748. *Scorzonera angustifolia.*

Provenit in agris Cæsaraugustæ, en Borja.

749. *Scorzonera resedifolia.*

*Chondrilla Sicula* Boccon. Sic. p. 13. t. 7. f. 4.

Ad agrorum margines Cæsaraugustæ.

A sequenti vix specie distinguitur, nisi calycis tomentum sufficiat, nam eadem facies, & foliorum in lacinias divisio.

- 750.

*Scorzonera laciniata.*

Nonnullis locis vocatur Farfallas.

*Tragopogon laciniatus* foliis Colum. Phyt. p. 116. t. 32.

*Tragopogon Resedæ minoris folio*, erectum Barrel. Ic. 799.

*Scorzonera multifido folio Grislei Virid. Lusit. p. 75.*

Habitat in agris Cæsaraugustæ, en Epila, Hijar &c.

Folia ad edendum idonea.

### PICRIS.

751. *Picris echooides.*

In agris vulgatissima Cæsaraugustæ, en Epila, Calatayud, Daroca &c.

Folia radicalia ligulata, hispida, tuberculata.

## SONCHUS.

752. *Sonchus levis.*

Vernaculè *Lechecino.*

*Cerrajas Laguna l. 2. c. 120.*

Ad vias, & in agris vulgatissimus.

Adversùs morsum tarantulæ Boccon. *Mus. di piante p. 119.*

753. *Sonchus foliis lanceolatis, dentatis, caulis paucifloris.*

*Sonchus Hieracites minor Grislei Virid. Lusit. p. 77.*

An varietas *Sonchi maritimi* Linnæi?

Provenit *Cæsaraugustæ en el termino de las fuentes*, in pratis humidis *en Calamocha, Monreal del Campo.*

Radix carnosa, altè descendens. Caules pedales, teretes, glabri. Folia radicalia lanceolata, dentata; caulina amplexicaulia. Flores magni, lutei, duo, aut tres, nonnumquam solitarii in singulo caule. Calyx imbricatus, infernè ventricosus. Pappus pilosus. Reliqua ut in congeneribus.

## LACTUCA.

754. *Lactuca Scariola.*

*Endivia minor, lactucina, spinosa Barrel. Ic. 135.*

Habitat *Cæsaraugustæ, en Camarena &c.*

A *L. virosâ* non videtur specie differre.

755. *Lactuca perennis.*

Provenit circà *Calatayud, Hinojès.*

756. *Lactuca (fragilis) foliis linearibus, remotè dentatis, fragilibus.*

Habitat *en el monte Torrero, circà Epila.*

Radix perennans. Caules pedales juncei, ramosi, glabri, striati. Folia linearia, dentata, facilè fraguntur. Flores lutei. Calyx cylindricus, squamis imbricatis. Pappus pilosus. Tota planta laetum succum fundit. Media inter *Lactucas & Sonchos.* Sed habitâ calycis ratione, inter *Lactucas* recensere malui.

## CHONDRILLA.

757. *Chondrilla juncea.*

*Achicorias dulces.*

*Chondrilla prima Dioscoridis Colum. Phyt. p. 9. t. 3.*

Provenit in agris, & vineis *Cæsaraugustæ, en Calamocha.*

In Hispaniâ inter acetaria recipitur.

Flores sessiles, sèpiùs congesti, lutei,

## PRENANTHES.


758. *Prenanthes viminea* Jacq. *Fl. Austr.* t. 9.  
Condrilla saxatilis viscosa, caule cnemidophoro, Colum. Ec-  
phr. 1. p. 238. t. 240.  
Oritur Cæsaraugustæ, en Epila, Calatayud, Hijar.
759. *Prenanthes muralis.*  
Habitat circà Pitarque, Rodenas, & alibi.

## LEONTODON.

760. *Leontodon Taraxacum.*  
Hispanis Amargon.  
Passim juxtâ vias.  
Folia juniora in Septentrione eduntur Linn. Amæn. t. 4. Ace-  
taria.
761. *Leontodon autumnale.*  
Provenit Cæsaraugustæ, en Calcena.  
Calyx turbinatus, squamis arctè imbricatis.
762. *Leontodon hirtum.*  
Hieracium pumilum, saxatile C. B. Prod. p. 66.  
Oritur in siccis, & montosis en el monte de Herrera, & alibi,
763. *Leontodon hispidum.*  
Hieracium foliis lanceolato-linearibus, integris, villosis, sca-  
po unifloro Gerard. Prov. p. 166.  
Habitat en el monte tòrrero.  
Caulis aphyllus in nostro solo, rariùs uno, alterove foliolè  
instructus. Flores magni, pallidè flavi.

## HIERACIUM.

764. *Hieracium Pilosella.*  
Provenit en Moncayo, en el monte de Herrera, & locis editis,  
en Segura.  
Coccus tinctorius radicibus adhæret Linn. Amæn. t. 5. Pl. tinct.
765. *Hieracium murorum.*  
Pulmonaria maculata, hispida Munting. Phyt. p. 44. f. 233.  
Oritur en Moncayo, en el monte de Herrera, en la Sierra de Vi-  
llaroya, en Rodanas &c.  
Planta polymorpha. In nostro solo ad sesquipedalem altitu-  
dinem assurgit. Caules subnudi, pilis nigris aspersi, parum ra-  
mosi. Folia radicalia ovata, hispida, infernè dentata, sæ-  
piùs integerrima; nonnumquam violaceo maculata. Calyx pi-



Tab. VII.  
pag. 111.



*Hieracium balsamicum*

Aragoniam observavi.

766. *Hieracium blattarioides.*

Provenit copiosè en el avellanar del Collado circà Badenas , en Montalvan , Aliaga.

Folia radicalia lanceolata , sinuata ; sæpiùs integra. Caules sulcati , supernè crassiores. Flores magni , dilutè flavi. Calycis laciniæ laxæ , oris sericeo-tomentosis.

767. *Hieracium (balsameum)* foliis radicalibus lanceolatis , rariter dentatis , caulinis cordatis , amplexicaulibus , superioribus integerrimis Tab. VII.

*Hieracium* foliis ovato-lanceolatis, rariter dentatis, caulinis amplexicaulibus Haller. *Helv.* n. 36.

Provenit in rupium fissuris en Moncayo , en el monte de Herrera , en la Sierra de Villaroya , en Rodanas , Alcalá de la Selva &c.

Radix perennans. Caules unâ cum foliis glutinosi , aspersi pilis apice granduliferis. Folia radicalia lanceolata , rariter dentata ; caulina cordata , amplexicaulia , inferiora serrata , superiora integerrima. Flores paniculato-corymbosi , lutei. Calyces squamis imbricatis , viscosis. Reliqua ut in congeneribus.

Tota planta digitis trita odorem spirat suavissimum , & balsameum , qui in speciminibus siccis omnino cum glutine evanescit.

## CREPIS.

768. *Crepis barbata.*

*Hieracium barbatum* Grislei *Virid. Lusit.* p. 49.

Habitat circà Toyed.

769. *Crepis foetida.*

*Hieracium graveolens* Grislei *Virid. Lusit.* p. 49.

Legi in vineis circà Calamocha.

Folia trita odorem amygdali amari referunt.

770. *Crepis Diocoridis.*

Provenit ad agrorum margines Cæsaraugstæ , en Hijar , Segura ; in pratis montanis en la Palomita , Cantavieja , Linares &c.

Caules pedales , sulcati. Calyces subincani , ad basin foliolis lineam latis , & patentiusculis cinguntur.

771. *Crepis virens.*

Oritur Cæsaraugstæ.

Calyces in nostro solo glabri , angulati.

772. *Crepis pulchra.*

Habitat Cæsaraugstæ , circà Segura , Villaruengo.

## ANDRYALA.

773. *Andryala integrifolia.*

Oritur *Cæsaraugustæ*, en *Epila*, *Villarluengo*, *Rodenas*, & alibi.  
Planta tota incana. Folia ovata dentata; sæpius oblonga. Flores in oppido *Rodenas* dormientes observavi matutino tempore;  
vigilantes verò horis pomeridianis.

## HYOSERIS.

774. *Hyoseris minima.*

Lapsana foliis ovatis, dentatis, caulis nudis, sub flore tumentibus Haller. *Helv. n. 4.*

Oritur en *Bicor*.

Planta in nostro solo dodrantalis. Caulis simplex, uniflorus,  
superne incrassatus. Calyx ventricosus. Semina nuda.

775. *Hyoseris Rhagadioloides.*

Rhagadioloides Calthæ folio, calyce hispido Vaillant *Ast. Par.*  
1721. p. 202.

Habitat locis glareosis *Cæsaraugustæ*, en *Epila*.

Folia hispida lanceolata, sinuato-dentata. Caules, & calyces  
pilis rigidis scabri. Semina aristata, incurva.

## HYPOTHÆRIS.

776. *Hypochæris radicata.*

Provenit en *Moncayo*, en *Bicor*, en el monte de *Herrera*.

Radix crassa, teres. Folia radicalia obtusa, pinnatifida. Caulis subaphyllus.

## LAPSANA.

777. *Lapsana communis.*

Oritur en *Pitarque*, circà *Linares*, & alibi in sepibus.

Constantinopoli acetaria ingreditur Linn. *Amæn. t. 4. Acetaria.*

778. *Lapsana stellata.*

Nascitur in agris *Cæsaraugustæ*.

Post flosculorum defluvium squamæ calycinæ expanduntur, asteris formam mentientes.

## CANTANANCHE.

779. *Cantananche cœrulea.*

Chondrilla cyanoides, cœrulea, coronopifolia Barrel. Ic. 1134

Provenit copiosè en el avellanar del Collado circà *Badenas*, en la *Palomita*, circà *Cantavieja*, *Linares*.

Folia radicalia nervosa, plantaginea, integra, aut remotè dentata.

### CICHLORIUM.

780. Cichorium Intybus.

Achicorias amargas.

In agris magnâ copiâ Cæsar Augustæ &c.

Ad vernas equorum curationes laudat Bonsi Ippiatr. p. 26.

Inter acetaria cocta recipitur.

781. Cichorium Endivia.

Escarola silvestre.

Habitat cum priori.

Pater Endiviae hortensis.

Confer Cichorium pumilum Jacquin Obs. IV. t. 80.

### SCOLYMIUS.

782. Scolymus hispanicus.

Cardillos.

Ubique in agris vulgatissimus.

In Hispaniâ Scolymo cum carnis cocto vescimur.

### ARCTIUM.

783. Arctium Lappa.

Lampazo Laguna l. 4. c. 108.

Ad agrorum margines, & vias frequens.

Notabile & in Lappâ, quæ suæ asperitatis causâ vestibus adhærescit Theophr. l. 7. c. 14.

Radices, & caules edules Muffet healt. impr. p. 217. Poloni ejus decoctum ad luem venereum adhibent, quo etiam Henricus III. sanatus fuit River. Obs. 41. Pecus non tangit Schreber Samml. III. p. 15. Ad saginandas gallinas utile Iour. acon. 1757. Aout.

### SERRATULA.

784. Serratula arvensis.

In agris vulgaris Cæsar Augustæ, en Epila &c.

Pappus ad culcitrâs implendas inservit Linn. Westgota resa p. 266.

### CARDUUS.

785. Carduus lanceolatus.

Provenit in agro Cæsar Augustano.

786. Carduus nutans.

*Onopyxus* ampio capite, purpureus, angustifolius Barrel Ic.

116.

Oritur en Montreal del Campo, circà Almonacir de la Cuba.

787. *Carduus acanthoides.*

Provenit circà Biber, Calcena, en la Sierra da Villaroya, en Roldanas.

Folia lanceolata, pinnatifida, laciniis plicatis.

788. *Carduus crispus.*

Cardo de burro.

Passim in agris, & juxtà vias.

789. *Cardus monspessulanus.*

Juxtà fossas, & locis humidis magnâ copiâ Cæsarangusta, en Epila, Calatayud, Daroca &c.

Folia lanceolata, margine spinosa. Caules supernè nudi. Pedunculi tomentosi.

790. *Carduus foliis decurrentibus, sinuatis, subtus tomentosis, pedunculis elongatis, subnudis, unifloris.*

An *Carduus* foliis decurrentibus, pinnatifidis, margine spinosis, caule unifloro, pedunculo longissimo, calycum squamis inermibus patentibus, setaceis Govan Illust. p. 62. tab. 24?

Provenit circà Camarena, Albarracin, Orihuela, Alcalà de la selva &c.

Folia lanceolata, sinuata, subtus tomentosa, suprà villosa, spinosa. Pedunculi longi, incani, uniflori, uno altero vè folii ramento instructi. Calycis squamæ patentæ, rigidæ, latiusculæ, pungentes.

A *Carduo medio* Govani vix differt, nisi calycis squamis spinosis; cætera in utroque adeò convenientiunt, ut in Icone Cl. vivi plantam nostram ad vivum expressam facile deprehendas. An igitur illa nota distinctionem urgeat speciei, aliis definiendum relinquo.

791. *Carduus marianus.*

Passim in ruderatis, juxtà vias Cæsarangusta &c.

792. *Carduus eriophorus.*

Provenit Cæsarangusta, circà Albarracin, Calamocha.

Folia hispida, pinnatifida, laciniis bilobatis, divaricatis, sursùm, & deorsùm tendentibus. Flores magni, purpurei. Calycis squamæ acutæ, villosæ.

793. *Carduus mollis.*

Legi copiosè in summo jugo Xabalambre.

# SOMMENICUS.

- [ 794. *Cnicus Acarna* Theophr. l. 6. c. 4. ] Habitat in arvis Cæsaraugustæ , en Epila . Flores congesti , dilutè purpurei , parvi .

ONOPORDUM.

795. *Onopordum Acanthium*. Hispanis Tobas . Espina blanca Laguna . l. 3. c. 12. Acanthium tomentosum , capite , & semine majoribus , cris- pantibus caulum talis Barrel . Ic . 502 . Passim juxtà vias , & in incultis . Receptaculum edule saپore Cynaræ Linn . Amæn . t . 3 . Pl . es- culenta . Veteres ad cancrum adhibebant hujus plantæ succum ; nunc verò negligitur , non rectè Linn . Amæn . t . 5 . Obst . me- dicina .

796. *Onopordum acaule* . Oritur en Moncayo , en la Sierra de Villaroya , en el monte de Her- rera . Folia in orbem disposita , sinuata , spinosa , incana . Flores cen- trales congesti , sessiles , dilutè purpurei , sex , aut octo , quo- rum unus , aut alter reliquis duplò major . Calycis squamæ pungentes . Receptaculum alveolatum .

## CARLINA.

797. *Carlina vulgaris.*  
In agris frequens Casaraugustæ, en Epila &c.  
Folia amplexicaulia, sinuato-dentata, spinosa, supra glabra,  
inferne tomentosa.  
Ad Sodam valet Eph. nat. cur. II. Obs. 45.

## TRACTYLIS.

798. *Atractylis humilis* Loefling Iter p. 218.  
Legi in collibus aridis propè Pozuelo, Epila, en el monte torre-  
ro, sed parciùs.

799. *Atractylis cancellata* Loefling Iter p. 219.  
Oritur in agro Cæsaraugustano.  
Flores lutei.

## CARTHAMUS.

800. *Carthamus lanatus.*

*Atractylis* Diosc. l. 3. c. 101. L. A. M. Provenit ad vias circà Teruel, Rodenas, Calamocha. Pappus coloratus. Sanguineum succum fundit. Floribus Crocus fucari solet apud nos.

801. *Carthamus Carduncellus.* CHICKO

Oritur juxà vias en Segura, Montalván, Camarena, & in Aragoniâ australi ubique ferè. Radix in Africâ editur Shaw Afr. n. 162.

## EUPATORIUM.

802. *Eupatorium cannabinum.*

Hoc est *Eupatorium legitimum* Diosc. l. 4. c. 42. quod Laguna pessimè *Agrimonia* interpretatus est. *Canabina de agua* Cienfuegos t. 5. p. 847. Ic. 851. Provenit ad aquas Cæsaraugustæ.

## CHYSOCOMA.

803. *Chrysocoma Lynosyris.*

*Linaria aurea de Trago* Cienfuegos t. 5. p. 770. Ic. 774. Vernaculè *Manzanilla de pastor.* Oritur in duris circà Tronchon. Folia linearia, acuta, rigidiuscula.


## SANTOLINA.


804. *Santolina Chamæcyprissus.*

*Abrotanum fœmina* Dioscor. l. 3. c. 27. *Abrotanum fœmina*, *incanum*, *hispanicum* Barrel. Ic. 463. In aridis vulgatissima Cæsaraugustæ, en Epila, Calatayudi, Hijar, Caspe &c.

805. *Santolina rosmarinifolia.*

*Abrotanum fœmina*, *virens*, *vermiculato*, *serrato folio* Barrel. Ic. 464. Provenit propè Rodenas. Planta suffruticosa, pedalis. Caules virgati, uniflori, supernè nudi. Folia linearia, acuta, carnosa, dupli denticulorum serie utrinquè instructa. Flores duplò majores quam in prædenti. Paleæ concavæ.





F. 1. *Artemisia herba alba.*

# POLYGAMIA SUPERFLUA.

## TANACETUM.

806. *Tanacetum Balsamita.*

*Menta Sarracenica*, ò *yerva de Santa Maria* Cienfuegos t. 3. p. 177. t. 7. Ic. 239.

Provenit ad margines pratorum circà Linares, Alcalà de la selva.

## ARTEMISIA.

807. *Artemisia Abrotanum.*

*Abrotano*, *Yerva lombriguera* Laguna l. 3. c. 27.

Provenit circà Tronchon, en la muela de San Juan propè Griegos, en Villarluengo.

808. *Artemisia campestris.*

In sterilibus non rara, *Cæsaraugusta*, en el monte torrero.

809. *Artemisia rupestris.*

Oritur locis saxosis circà Utrillas, Aliaga, Mosqueruela, Albarracín.

Folia radicalia congesta, multifida, sericea. Caules spithamæi, subnudi. Flores globosi, magni respectu plantæ, penduli.

In Helvetiâ vocant *Genipi blanc*. Semina ad pellendos vermes utilia.

810. *Artemisia (herba alba) fruticosa*, floribus solitariis, subsessilibus, bracteatis, flosculis omnibus hermaphroditis Tab. VIII. f. 1. Vernaculè *Ontina*.

*Herba alba* Gesn. *Hort.* p. 244.

*Absinthium incanum*, lanuginosum, crispo, cristato folio Barrel. Ic. 433.

*Abrotanum mas*, *tenuifolium*, *latifolium*, *hispanicum* Idem Ic. 447. quoàd partem florentem.

*Absinthium seriphium*, *montanum*, *candidum* Scheuch. It. IV. p. 328. I. p. 29. tab. 3. f. 1.

*Artemisia* foliis tomentosis, multifidis, floribus erectis, longè spicatis, penè sessilibus Haller. *Helv.* n. 128.

Habitat in collibus aridis *Cæsaraugusta*, en Epila, Calatayud, Híjar, Pozuelo &c.

Frutex pedalis, erectus. Folia congesta, incana, bipinnata: pinnis iterùm pinnatis, etiam trilobis. Rami floriferi tomentosi, alterni. Flores solitarii, spicati, subsessiles, subjectis bracteis linearibus. Calycis squamæ concavæ, exteriores tomentosæ, interiores membranaceæ. Flosculi 4. aut 5. hermaphrodi-

ti, apice rubelli. Scheuchzeri Icon pessima, cum flores pedunculatos repræsentet; adeoque novam dedimus accuratiorem.

Odor aromaticus cum gravitate quâdam.

Variat foliis viridibus, glabris. A pecore depascitur.

811. *Artemisia fruticosa*, foliis linearibus, bipinnatis, incanis, floribus racemosis.

Legi en la dehesa de Albarracín.

Frutex vix pedalis, erectus. Folia inferiora linearia, ad extremum bipinnata, pinnis linearibus acutis, incanis; superiora linearia, simplicia. Ex horum axillis racemuli prodeunt. Flores vix explicati erant; idèque eorum descriptionem omitto. Mihi distincta omnino species visa est; examinent populares accuratiūs.

812. *Artemisia Absinthium*.

Axenxos Lagunā l. 3. c. 24., 26. Cienfuegos t. 7. p. 144.

Oritur copiosè en Teruel, Albarracín, Tronchon, Villarluengo, Purujosa.

Adversus vermes, & febres intermittentes cum fructu datur Haller. Helv. n. 124. Ovium carnes amaro sapore inficit Linn. Amoen. t. 1. Fl. æcon.

813. *Artemisia vulgaris*.

In ruderatis frequens.

Ex Artemisiæ lanâ *Moxa Chinensium* paratur ad podagram valdè laudata Ephem. Nat. cur. Dec. II. an. 4. obs. 1. non verâ ex Santolinâ, ut asserit Cl. Bowles Introd. à la Hist. nat. p.

## GNAPHALIUM.

814. *Gnaphalium Stæchas*.

Provenit in siccis en el monte torrero, circâ Epila, Calatayud, Teruel, Montalván &c.

Folia sparsa, linearia, incana. Flores corymboso-capitati.

815. *Gnaphalium luteo-album*.

Nascitur in agris Cæsaraugustæ, en Epila.

Folia amplexicaulia, lingulata, obtusa, lanata.

## XERANTHEMUM.

816. *Xeranthemum annuum*.

Iacea pusilla, oleæ folio, purpureis, congestisque floribus Barrel. Ic. 1126.

Habitat Cæsaraugustæ loco arido secùs viam Matritensem, ex

Folia subtus incana. Squamæ calycinæ membranaceæ, aristatæ.

### CARPESIUM.

817. *Carpesium cernuum.*

Aster cernuum Columnæ, flore citrino Barbel. Ic. 1142.

Conyzoides flore flavescente, cernuo Tournéf. Act. Par. 1706.  
p. 108.

Habitat in agro Casaraugustano.

Folia lanceolata, versùs petiolum attenuata, villosa, ser-  
rulata. Calyx ad basin foliolis longioribus instructus. Flo-  
res flavi, nutantes. Semina nitida, glutinosa.

### CONYZA.

818. *Conyzasaxatilis.*

Provenit in rupibus en Montolar, in montosis de Campiel circà  
Calatayud.

Folia tomentosa, infernè congesta. Pedunculi nudi. Calyx cy-  
lindricus, squamis margine nigris.

### ERIGERON.

819. *Erigeron viscosum.*

Hispanis Olibarda.

*Conyzamayor* Clus. Hist. 2. p. 20.

Oritur copiosè Cæsaraugstæ, en Epila, Hijar, Caspe, Alcañiz.

Pedunculi pilosi, sèpiùs biflori, foliolis linearibus aspersi.

Ad hanc plantam, quæ capris exitialis esse constat, retulit Cl.  
Gleditsch *Ægoleibron* Plinii l. 21. c. 44. Herba est, inquit, ab  
exitio, & jumentorum quidem, sed præcipue caprarum appellata  
*Ægolethron*. Tournefortius verò Act. Par. 1704. p. 351. Cha-  
mærhodendron interpretatus est, non rectè meo judicio. Vide  
Act. Berol. 1759.

Ad confirmandum vinum debile inservire mihi narratum.

820. *Erigeron graveolens.*

Nascitur in rupibus circà Rida, Montalvan, Albarracin, Calata-  
yud, & alibi.

Caules hirsuti, ætate fiunt glabri.

821. *Erigeron acre.*

Habitat en el pinar de Losilla circà Albarracin, en la modorra  
de Badenas.

Folia lanceolata, integerrima, villosa. Pedunculi solitarii. Flo-

822. *Erigeron foliis linear-i-lanceolatis*, remotè dentatis, rigidiusculis.

Oritur en la dehesa de Albarracin, en la modorra de Badenas.  
Radix simplex, fibrosa. Caules palmares, scabriusculi, villosi.  
Folia linear-i-lanceolata, rigida, remotè dentata. Flores non dum explicaverat; calyx verò foliolis squarrosis, linearibus, reflexis constabat; undè ad *Erigerontis* genus hanc stirpem revocavi, quòusque ab aliis diligentius observetur. Nolui tamen prætermittere, ne pereat illius memoria.

## TUSSILAGO.

823. *Tussilago Farfara.*

*Farfara Laguna l. 3. c. 120.*

Provenit in succulentis; copiosè en *Calcena*, *Villarluengo*.  
Succus ad calculum laudatur *Commer. Norimb. 1736. p. 394.*  
Ex lanâ radicis fomes parari potest *Scaliger Subt. p. 180.*

## SENECIO.

824. *Senecio vulgaris,*

*Terva cana Laguna l. 4. c. 98.*

Passim juxta vias.

Cl. Stedman medicus Edimburgensis cataplasma ex Senecione in febribus intermittentibus stomacho admovere jubebat non sine successu *Iour. Oecon. 1753. Janvier.*

825. *Senecio viscosus.*

Provenit circà *Fortanete*, *Mosqueruela*, & alibi in Aragoniaustrali.

826. *Senecio sylvaticus.*

Propé vias frequenter occurrit.

Radii revoluti, flavi.

827. *Senecio Jacobaea.*

Habitat en *Mosqueruela*, *Teruel*, *Camarena*, *Albarracin*, & alibi. Viridi colore tingit non valdè duraturo Linn. *Amœn. t. 5. Pl. tintæ.*

828. *Senecio paludosus.*

Oritur in udis en la *Palomita*.

Caulis sulcatus, villosus, rubens. Folia sessilia, lanceolata, crassa, subtùs pubescentia, serrata.

829. *Senecio Doria.*

Juxta fossas frequens *Cæsaraugustæ*, en *Epila*, *Calatayud*, Da-

Folia crassa, serrata, ovato-lanceolata.

830. *Senecio Doronicum.*

Senecio corollis radiantibus, caule simplici, subunifloro, foliis indivisis, radicalibus petiolatis, subtus incanis Gerard.

*Prov. p. 196. tab. 7.*

Oritur en Segura versùs aquas medicatas.

In nostro solo folia vix villosa apparent. Flos unicus, magnus.

### A S T E R.

831. *Aster alpinus.*

Habitat en la Palomita, in pratis circà Cantavieja.

Caules uniflori, dodrantales, foliosi.

832. *Aster (Aragonensis) foliis radicalibus spatulatis, integerrimis, caulinis linearibus; Tab. VIII. f. 2.*

Oritur en el monte de Herrera versùs Castelfrio.

Radix multiplex, fibrosa. Caules pedales, leviter striati, lanati; in adultâ plantâ lanam exuunt. Folia radicalia spatulata, integerrima, citò pereuntia; caulina sparsa, linearia, acuta, subtus bisulcata. Inflorescentia corymbosa. Flores radio cœruleo. Calyx villosus, imbricatus, squamis inferioribus acutis, patentiusculis, superioribus latioribus, erectis. Flosculi hermaphroditi, tubulosi, quinquefidi in disco; fœminei ligulati, lineares in radio. Pappus pilosus. Semina oblonga. Receptaculum planum, nudum.

Ad *Asteris* genus hanc elegantem stirpem amandavi, non refragante præceptore, ob calycis naturam, quæ in hoc ordine magni momenti esse debet: habet tamen quandam cum *Erigeronte* convenientiam.

### S O L I D A G O.

833. *Solidago Virga aurea.*

Virga aurea montana, minor Barrel. Ic. 783.

Provenit en Moncayo, en la Sierra de Villaroya, en los montes de Rodanas, en el de Herrera, circà Rodenas, en la modorra de Badenas.

Hæc est vera officinalis planta ad renum, & vesicæ vitia commendata. Indocti Pharmacopæi in Aragoniâ nostrâ hujus loco substituunt *Veronicam tenuifoliam* n. 12, descriptam.

## INULA.

834. Inula *Helenium*.

*Ala Laguna l. 1. c. 27.*

Habitat in montosis circà *Barbastro*.

Folia magna, ovata, subtùs tomentosa, serrata. Flores magni. Calycis squamæ latæ, foliaceæ, reflexæ.

Radix aromatica, multum gummi habet Cartheuser *Mat. med. II*, p. 54. Ex eâdem in urinâ maceratâ, cum vacciniis, & cinere clavellato color cœruleus obtinetur Linder *Fargakonst.* p. 62.

835. Inula *dysenterica*.

Juxtà fossas non rara *Cæsaraugustæ*, en *Epila*.

Planta ad dysenterias utilissima, sed à nuperis neglecta. Russorum copiis adversùs Turcas bellum gerentibus valde profuit Linn. *Amœn. t. 4. Censura simpl.*

836. Inula *salicina*.

Habitat in pratis en *la Palomita*, circà *Cantavieja*, *Linares*, en *la modorra de Badenas*.

Folia rigida, recurva.

837. Inula *montana*.

Oritur circà *Badenas*, en *Camarena*, *Pitarque*.

Caulis pedalis. Folia incana, lanceolata, integerrimæ. Flores magni, lutei. Calycis squamæ villosæ, lineares, reflexæ.

## CINERARIA.

838. Cineraria *palustris*.

Provenit copiosè in pratis humidis circà *Calamocha*.

## DORONICUM.

839. Doronicum *pardalianches*.

Habitat en *Moncayo*.

## BELLIS.

840. Bellis *perennis*.

Vernaculè *Margarita*.

*Bellis in pratis nascitur, flore albo, aliquatenus rubente.* Plin. *l. 26. n. 13.*

Passim ad vias, & agrorum margines. Floret totâ hyeme.



Tab. IX.  
pag. 123.



F.1. *Chrysanthemum Aragonense.*



F.2. *Carex Halleriana.*

## CHRYSANTHEMUM.

841. Chrysanthemum *corymbiferum*.  
Tanacetum inodorum, latifolium, alpinum, magno Bellidis flore Barrel. Ic. 786.  
Habitat en Moncayo, en la Sierra de Villaroya, en el monte de Herrera.
842. Chrysanthemum *Leucanthemum*.  
Inter segetes non rarum Cæsar Augustæ, en Epila.  
Infusum ad orthopnæam commendat Floyer Pharmac. p. 100.
843. Chrysanthemum *montanum* Jacq. Obs. t. 91.  
Provenit circà Badenas, Pitarque, Camarena.  
Folia crassa, spatulata, imma serrata, superiora linearia, integra.
844. Chrysanthemum *alpinum*.  
Leucanthemum alpinum, tenuifolium Barrel. Ic. 458. n. 3.  
Oritur in montosis circà Orihuela, en la Muela de San Juan prope Griegos.  
Planta pollicaris. Folia cuneiformia, dentata. Calyx squamis oris sphacelatis.
845. Chrysanthemum (*Aragonense*) caule unifloro, foliis radicalibus congestis, sericeis, linearibus, apice subtridentatis, caulinis superioribus integrerrimis, acutis. Tab. IX. f. 1.  
Chrysanthemum pallidum, minimis, imisque foliis incisis. superioribus integris, & capillaribus Barrel. Ic. 421.  
Provenit en la Sierra de Villaroya, circà Purujosa.  
Radix lignosa. Caules pedales, inferne perennantes, incani, superne nudi, uniflori. Folia radicalia congesta, sericea, linearia, apice plerumque tridentata, dentibus acutis; nonnumquam 4, & 5. dentata: caulina inferiora similia radicalibus, superiora etiam linearia acuta, integrerrima. Flores lutei, radio pallide flavo. Calyx imbricatus squamis sericeis, oris membranaceis. Flosculi hermaprhoditi in disco, tubulati, quinquefidi; fœminei in radio ligulati, tridentati. Semina oblonga. Pappus nullus. Receptaculum nudum.

## MATRICARIA.

846. Matricaria *Parthenium*.  
Matricaria Laguna l. 3. c. 149.  
Habitat in agro Cæsar Augustano.  
Infusum ad hydrozem valet Spindler Obs. 51.

## COTULA.

847. *Cotula aurea* Loefling. Iter p. 221.  
Provenit Cæsaraugstæ propè la puerta quemada.  
Odor aromaticus, suavissimus. Nonnulli Chamomillæ substi-  
tuunt felici errore.

## ANTHEMIS.

848. *Anthemis altissima*.  
Passim in agris Cæsaraugustæ , en Epila.  
Planta procumbens , rariūs erecta in nostro solo. Folia villosa  
Caulis supernè incrassatus. Calyx hirsutus. Paleæ latæ , obso-  
letè triangulares.

849. *Anthemis nobilis*.  
*Manzanilla* Laguna l. 3. c. 148.  
Vernaculè *Camomila*.  
Oritur en la Sierra de Villaroya , en el monte de Herrera , circ  
Badenas.  
Hæc species apud nos est officinalis , & *Matricariae Chamomill*  
vices explet. Ejus infuso ad ventriculi mala plurimùm utuntu  
nostrates.

850. *Anthemis arvensis*.  
In agris Aragoniæ australis magnâ copiâ.

851. *Anthemis Cotula*.  
*Manzanilla bastarda* Laguna Obs. ad C. 149. l. 3.  
In agris magnâ copiâ Cæsaraugustæ , en Epila.  
Multa cum antecedenti habet communia : distinguitur præci-  
puè calycis squamis oris membranaceis , neque fuscis , palei  
rigidioribus , & foetore peculiari.  
Floribus in hystericâ passione feliciter utebatur Cl. Jussieu Linn.  
Amœn. t. 4. Censura simp. Ad gallinas saginandas commendatur  
Iour. œcon. 1757. Aout. Bufones adlicit Linn. Amœn. t. 1  
Fl. œcon. 1757. B.

852. *Anthemis montana*.  
Oritur en Segura versus aquas medicatas.  
Folia pinnata : pinnæ dentatæ. Caules supernè nudi , striati.

## ALII ACHILLEA.

853. Achillea Ageratum Diosc. l. 4. c. 60.  
Provenit Cæsaraugustæ , en Camarenæ .  
854. Achillea tomentosa .  
An Achillea Diosc. l. 4. c. 37?

Oritur en Añon , Purujosa , circà Albarracín.

855. Achillea Millefolium.

Mil en rama Laguna l. 4. c. 104. sed Stratiotes Diosc. videtur alia planta.

Ad agrorum margines non rara ; etiam en el monte de Herrera.

Ad phthisin laudatur , Langius de Millefol. p. 14. Ad scabiem pecoris Kalm. Resa p. 299.

856. Achillea nobilis.

Legi circà Montalván , Segura.

Calycis squamæ oris minùs fuscis quàm in Achilleâ Millefolio.

### BUPHTHALMUM.

857. Buphthalmum spinosum.

Vernaculé Cevadilla.

Juxtà fossas frequens Cæsaraugustæ , en Epila , Calatayud , Hijar.

Folia calycina trinervia.

Cevadilla vocant nostrates quòd sternutationem excitet.

### POLYGAMIA FRUSTRANEA.

#### CENTAUREA.

858. Centaurea crupina.

Chondrilla purpurea , tenuifolia , capite Jaceæ , semine Cardui Barrel. Ic. 1136.

Oritur in pratis circà Cantavieja en la Serna , en la modorra de Badenas .

859. Centaurea pectinata.

Stœbe tenuifolia , erectior , hispanica Barrel. Ic. 359. proximè accedit.

Provenit en el monte de Herrera , en el de San Ginès , circà Calatayud .

Planta spithamæa , procumbens. Folia pinnata , pinnis linearibus. Calyx squamis ciliatis , ciliis albis , capillaribus , plumosis. Corollulæ pallidè purpureæ , etiam albæ.

860. Centaurea nigra.

Iacea foliis radicalibus semipinnatis , caulinis ovato-lanceolatis , caulis angulatis Haller. Helv. n. 184.

Provenit in agris circà Borja , in pratis montanis en la Palomita , Cantavieja , Linares ; circà Badenas .

861. Centaurea montana.

Oritur en Moncayo , en la Sierra de Villaroya , en el monte de

*Herrera*, & alibi.

Planta spithamæa. Flores speciosi, cœrulei.

862. *Centaurea Cyanus*.

Inter segetes non rara circà *Biber de la Sierra*, & in Aragon australi.

Corolla cum alumine pulchrum colorem cœruleum præbet a pingendas litteras Linn. *Amœn. t. 5. Pl. tinct.* Flosculi cum aqua gummatâ subacti, in placentam rediguntur pictoribus utile Gentl. *Magaz. 1748. March.*

863. *Centaurea paniculata*.

*Arsolla*, mata Gallegos.

Provenit copiosè circà *Cetina*.

Flores parvi, dilutè purpurei. Folia superiora simpliciter pinnata, etiam linearia.

864. *Centaurea Scabiosa*.

Provenit en Montolar.

865. *Centaurea Iacea*.

Habitat in pratis en la Palomita, Cantavieja, Linares, en la Valtuerta de Mosqueruela, en la modorra de Badenas.

Luteo colore tingit Linn. *Amœn. t. 5. Pl. tinct.*

866. *Centaurea alba*.

Provenit circa Purujosa.

Squamæ calycinæ acutæ, argenteæ.

867. *Centaurea conifera*.

Vernaculè Cuchara de pastor.

Stœbe pinea, ampio capite Barrel. *Ic. 138.*

Oritur in aridis circà Cæsaraugustam, Hijar, Caspe, Alcañiz, Cilanda, Tronchon, Orihuuela.

Planta vix palmaris. Folia radicalia lanceolata, infernè hastato-dentata: superiora pinnatifida, pinnis linearibus, acutis, omnia subtùs tomentosa. Flores in toto genere maximi, purpurei. Calycis squamæ scariosæ, oblongæ, apice palmatæ.

868. *Centaurea aspera*.

Iuxta vias vulgatissima Cæsaraugusta, en Epila, Hijar, Calatayud.

Calycis spinæ triplices.

869. *Centaurea benedicta*.

Provenit Cæsaraugusta en la Almozara.

Ad variolas ovium commendatur, Linn. *Amœn. t. 4. Ovis.*

870. *Centaurea calcitrapa*.

Vernaculè Abrojos.

Passim juxtà vias.

Ad febres intermittentes adhibere solent nostrates.

871. *Centaurea solstitialis.*

*Carduus solstitialis*, flore luteo, minor *Grislei Virid. Lusit.*

p. 25.

Ad agrorum margines frequens *Cesaraugustæ en Epila, Hijar &c.*

872. *Centaurea collina.*

Provenit circà *Teruel, Rodenas, Orihuela, Calatayud, Cetina.*

Flores neutri in ambitu quadrifidi. Foliorum laciniæ spinâ innocuâ terminantur.

873. *Centaurea Salmantica.*

Passim ad agrorum margines *Cesaraugustæ, en Epila, Calatayud, Daroca, Hijar.*

Folia inferiora lyrata; superiora linearia, dentata.

Ad scopas nostratis inservit.

874. *Centaurea nudicaulis.*

*Centaurea calycibus squamosis*, foliis radicalibus indivisis, petiolatis, caule unifloro, subnudo *Gerard Prov. p. 187. tab. 5.* bona.

Oritur en el avellanar del Collado circà *Badenas, en la dehesa de Aliaga.*

Folia inferiora ovata, dentata: superiora linearia. Caules uno, alterove foliolo instructi.

## POLYGAMIA NECESSARIA.

### CALENDULA.

875. *Calendula officinalis.*

Passim in agris *Cesaraugustæ &c.*

Flores luteo colore tingunt. Linn. *Amœn. t. 5. Pl. tint.*

### FILAGO.

876. *Filago germanica.*

Oritur propè *Cesaraugstam.*

Caules tomentosi. Folia sparsa, linearia. Calycis squamæ strictæ, acutæ.

*Herba impia* vocatur *incana, rorismarini aspectu, ihyrsi modo vestita, atque capitata* Plin. *l. 24. n. 113.*

877. *Filago pyramidalis.*

*Gnaphalium roseum, supinum, serpyllifolium* Barrel. *Ic. 128.*

*n. 5.*

*Legi conspicuæ primæ pars. Secunda pars.*

Planta vix pollicaris, parum ramosa. Folia linearí-lanceolata, tomentosa. Florum glomeruli in dichotomiâ caulis, & in ramorum summitate, foliis cincti.

### MICROPOS.

878. *Micropus erectus* Loefling. Iter. p. 225. t. 1. f. 3.  
*Gnaphalium minus latioribus foliis* C. B. Pin. p. 263.  
 Provenit en el monte torrero, & locis aridis.

### ECHINOPS.

879. *Echinops Ritro.*  
*Carduus sphærocephalus*, latifolius, cœruleus, major Barrel.  
 Ic. 412.  
 Habitat en el monte torrero, in siccis circâ Epila, Pozuelo, Híjar, Calatayud.  
 Ex Echinope strigoso fomes paratur.

### MONOGAMIA.

### JASIONE.

880. *Jasione montana.*  
 Provenit en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya, en los montes de Rodanas.  
 Caulis erectus, aut procumbens, angulatus. Folia linearia, undulata, hirsuta. Capitulum terminale, cœruleum.

### VIOLA.

881. *Viola odorata.*  
*Violetas Laguna l. 4. c. 122.*  
 Habitat Cæsar Augustæ en el soto de Cogullada, & in montosis.  
 In catarrhis utiliter datur Schulze Mat. med. p. 192.
882. *Viola canina.*  
 Provenit in umbrosis en Moncayo, en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya, en el desierto de Calanda.
883. *Viola montana.*  
*Viola martia arborescens, purpurea Garidel Aix. tab. 99.*  
 Habitat en Moncayo.  
 Stipulæ magnæ, pinnatifidæ. Flores cœrulei, calcaribus brivibus.
884. *Viola tricolor.*

Flores albi cum mixturâ purpurei, & flavi coloris.

## GYNANDRIA.

## DIANDRIA.

## ORCHIS.

885. *Orchis bifolia.*

*Orchis radicibus oblongis, labello linearis Haller. Helv. n.*

*n. 1285. tab. 35.*

*Provenit in sylvis circâ Añon.*

886. *Orchis Morio.*

*Orchis radicibus subrotundis, galeæ petalis lineatis, labello trifido, crenato, medio segmento emarginato, Haller. Helv.*

*n. 1282. tab. 33.*

*Oritur en Moncayo, en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya.  
Vide num. seq.*

887. *Orchis mascula.*

*Cynosorchis Diosc. l. 3. c. 135, 136.*

*Orchis radicibus subrotundis, petalis lateralibus reflexis, labello trifido, segmento medio longiore bifido, Haller. Helv. numer. 1283. tab. 33.*

*Provenit en Moncayo, en la Sierra de Villaroya, en la Palomita &c.*

*Bulbi cocti, & siccati fiunt pellucidi : tunc ex illis paratur pulvis farinaceus ad roborandas vires eximius, quem in Oriente appellant Salep. Geoffroy Act. Par. 1740. p. 97, 98. Ex Orchide n. 886. etiam parari scribit Cl. Bergius Mat. Med.*

888. *Orchis radicibus rotundis, spicâ brevissimâ, labello breviter quadrifido, circumserato, punctato Haller. Helv. n. 1275. tab. 30.*

*Oritur en la Palomita, in pratis circâ Cantavieja.*

*Calcar germine brevius.*

889. *Orchis militaris.*

*Orchis radicibus subrotundis, spicâ conicâ, labello quadrifido, brachiolis & pectore perangustis Haller. Helv. n. 1277. tab. 28.*

*Habitat in pratis en la Palomita, circâ Cantavieja, Linares, Villaruengo.*

890. *Orchis latifolia.*

*Orchis radicibus palmatis, caule fistulosò, bracteis maximis, labello trifido, serrato, medio segmèto obtuso Haller. Helv.*

*n. 1279. tab. 32.*

*Habitat en Pitargue, in pratis en la Palomita, circâ Cantavieja.*

*Linares, Montreal del Campo.*

Variat foliis maculatis; flore rubro, aut albido.

891. *Orchis incarnata.*

Orchis radicibus palmatis, bracteis coloratis, labello circum-serrato, trilobato, lobo medio emarginato Haller. *Helv. n. 1280.*

Oritur en *Moncayo.*

892. *Orchis maculata.*

Orchis radicibus palmatis, caule folioso, labello trifido, ser-rato, medio segmento acuminato Haller. *Helv. n. 1278. tab. 32.*

Provenit circà *Orihuella*, in pratis humidis en *Montreal del Campo.*

893. *Orchis conopsea.*

Orchis radicibus palmatis, flore concolore, labello obtusè tri-fido, calcare germe breviore Haller. *Helv. n. 1274. tab. 29.*

Nascitur in pratis circà *Villarluengo.*

Odor suavissimus.

894. *Orchis abortiva.*

Epipactis aphylla, calcare longo, labello ovato, lanceolato Haller. *Helv. n. 1288. tab. 36.*

Oritur in sylvis circà *Añon.*

### SATYRIUM.

895. *Satyrium viride.*

Orchis radicibus palmatis, galeâ connivente, labello trisulco, calcare brevissimo Haller. *Helv. n. 1269. tab. 26.*

Habitat en el quarto pelado de *Cantavieja*, circà *Linares.*

### OPHRY'S.

896. *Ophrys ovata.*

Bifolio Cienfuegos t. 1. p. 1056.

Epipactis foliis binis, ovatis, labello bifido Haller. *Helv. nu-  
mer. 1291. tab. 37.*

Provenit in pratis montanis en *la Palomita, Cantavieja, Alcalá  
de la Selva, Linares.*

897. *Ophrys insectifera (myodes).*

Orchis radicibus subrotundis, labello sericeo, bisulco, bra-chiolis brevibus, subulatis Haller. *Helv. n. 1265. tab. 24.*

Provenit en el desierto de *Calanda.*

Nectarii labium quadrilobum.

898. *Ophrys adrachnites.*

Orchis radicibus subrotundis, labello sericeo, emarginato, ap-pendiculato Haller. *Helv. n. 1266. tab. 24.*

Habitat en la Palomita, in pratis circà Cantavieja, Linares.

A præcedenti, cuius varietatem statuit Cl. Linnæus, mihi omnino differre videtur, spicâ densiore, petalis duobus interioribus ovatis, nectarii labio non quadrilobo, sed ex pentagono rotundato, duabus protuberantiis ad latera germinis notato.

### SERAPIAS.

899. *Serapias longiflora.*

*Epipactis* foliis ensiformibus, caulinis, floribus pendulis, labello obtuso, per oras plicato Haller. *Helv. n. 1296. t. 39.*

Oritur in udis en la Palomita.

900. *Serapias grandiflora* Linn. *Syst. nat. p. 594.*

*Epipactis* caule paucifloro, lineis in obtuso labello levibus Haller *Helv. n. 1298. tab. 41.*

Provenit en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya, in sylvis circà Albarracín.

901. *Serapias rubra* Linn. *Syst. nat. p. 594.*

*Epipactis* caule paucifloro, labello lanceolato, lineato, lineis undulatis Haller. *Helv. n. 1299. tab. 42.*

Habitat in sylvis circà Tronchon, en el avellanar del Collado circà Badenas.

### HEXANDRIA.

### ARISTOLOCHIA.

902. *Aristolochia Pistolochia.*

*Pistolochia* de Clusio Cienfuegos *t. 7. p. 137.*

Habitat en el monte torrero, in collibus circà Alcañiz.

903. *Aristolochia longa* Diosc. *l. 3. c. 4.*

*Aristolochia longa* Cienfuegos *t. 3. p. 118. b. t. 7. Ig. 127.*

Provenit in sepibus Cæsaraugusta, en Hijar &c.

### POLYANDRIA.

### ARUM.

904. *Arum maculatum.*

*Aro Laguna l. 2. c. 157. Cienfuegos t. 1. p. 1116.*

Oritur in umbrosis en Epila, Hijar,

Planta acris, exurens. Radix sapone vicos explet Pechev Her.

bal. p. 65. Ex eâ amyllum paratur Du Hamel *Fabrique de l' amidon* p. 9. & panis fit Porta Mag. nat. l. 4. c. 17. Undè non improbabil conjecturâ existimat Wedelius *in pec. Dissert.* quod Chàra Cæsaris, quâ ejus milites famem Dyrrhachii sublevarunt, ad Ari radicem pertineat. Cæsar *de Bello civili* l. 3. Est etiam genus radicis inventum ab iis, qui fuerant cum Valerio, quod appellatur Chàra, quod admistum lacte multùm inopiam levabat ; id ad similitudinem panis efficiebant.

## MONOECIA.

## MONANDRIA.

## ZANNICHELLIA.

905. *Zanichellia palustris.*

Habitat in flumine Xiloca en Monreal del Campo, Calamocha, Daroca.

## DIANDRIA.

## LEMNA,

906. *Lemna trisulca.*

In aquis vulgatissima Cæsaraugusta &c.

907. *Lemna minor.*

Habitat cum priori.

Anatum cibus Linn. *Amœn. t. I. Fl. æcon.*

908. *Lemna gibba.*

In aquis non rara.

## TRIANDRIA.

## TYPHA.

909. *Typha latifolia.*

Espadaña Laguna l. 3. 127.

Provenit juxtâ flumen Xiloca, en Daroca.

Radix inter acetaria recipitur Gleditsch *Meth. p. 21.* Pappus ad culcitrás replendas utilis.

910. *Typha angustifolia.*

Oritur juxta fossas Cæsaraugstæ , en Epila , Calatayud.  
Usus œconomicus ad sedilia confienda.

### SPARGANIUM.

911. *Sparganium erectum* Diosc. l. 4. c. 23.

*Sparganio* Cienfuegos t. 3. p. 465.

Habitat in aquosis Cæsaraugstæ , propè Villar del Saz.

### CAREX.

912. *Carex dioica*.

Provenit in humidis Cæsaraugstæ , en la Palomita.

913. *Carex arenaria*.

Oritur en el monte de Herrera , en la Sierra de Villaroya.

Radices dulces balsamicam vim possident , & Sarsaparrillam occidentalem adeò superare dicuntur , ut Berolini in illius locum facilè substituatur Gleditsch Act. Berol. 1768.

914. *Carex remota*.

Provenit en la modorra de Badenas , en el barranco del lobo.

Folia canaliculata . Squamæ spiculas distinguentes sensim minores.

915. *Carex flava*.

Nascitur in pratis humidis en la Palomita , circà Cantavieja.

916. *Carex montana*.

Habitat en la Sierra de Villaroya , circà Calcena.

917. *Carex limosa*.

Oritur in pratis en la Palomita , circà Cantavieja.

918. *Carex distans*.

Provenit Cæsaraugstæ , in collibus circà Alcañiz.

919. *Carex cæspitosa*.

Oritur en la Palomita , circà Cantavieja.

920. *Carex acuta*.

Gramen triangulum Cienfuegos t. 6. part. 1. p. 343. Id. 345.

Habitat en la Palomita , circà Cantavieja , & alibi.

Hæc cum sequenti ob radices duras , & latè repentes ad firmanda loca paludosa præstat Gleditsch. Act. Berol. 1768.

921. *Carex vesicaria*.

Habitat in paludibus Cæsaraugstæ , en la Palomita.

922. *Carex (Halleriana) spicâ fœmininâ sessili , mari approximatâ , alterâ solitariâ radicali , Tab. IX. f. 2.*

*Carex spicâ fœmininâ infimâ radicali , capsulis triquetris , elongatis Haller. Hely. n. 1385.*

Oritur en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya, circa  
Calcena.

Radix multiplex. Folia graminea, angusta, carinata. Culmi  
pedales, spicâ masculâ, longâ terminantur. Huic proxima est  
fœminina sessilis. Ex radice scapus dodrantalis assurgit spicu-  
lam aliam fœmininam, solitariam gerens. Interdum duæ spicæ  
radicales observantur. Capsulæ trigonæ, mucronatæ.

## BETULA.

923. *Betula Alnus.*

*Alyso.*

Provenit ad aquas en Epila, Pitarque.

Lignum torneatoribus inservit; & ad calefacientes fornaces re-  
liquis præfertur. Sub aquâ durat. Cortex pileos nigro colore  
inficit Du Hamel *Arb.* I. p. 44. & lanas etiam cum limaturâ  
chalybis Linder *Fargekonst.* p. 73. Folia ad condensanda coria  
præstant Gleditsch *Act. Berol.* 1754. p. 124. seq. Chermes Alni in  
hac arbore lanam texit, quæ equos obcœcat. Sanantur sale in  
aures immisso Gunner. *Fl. Norveg.* p. 60.

## TETRANDRIA.

### BUXUS.

924. *Buxus sempervirens.*

*Box.*

Oritur copiosè en Calcena, Villarluengo, Cantavieja.

Lignum ad icones ligneas, ad opera torneatorum, & pectines  
utilissimum Du Hamel *Arb.* I. p. 117.

Fundum aquæ petit.

## URTICA.

925. *Urtica vrens.*

*Ortiga Laguna l. 4. c. 95.*

*Ortiga tercera, ò moëna Cienfuegos t. 3. p. 336. b. t. 7. l. 465.*  
Passim in ruderatis.

926. *Urtica dioica.*

*Ortiga mayor Cienfuegos t. 3. p. 335. t. 7. l. 463.*

*Kimischon Prov. c. 24. v. 31. Celsius Hierob. II. p. 206.*

Habitat cum priori; etiam in montes ascendit en Moncayo, en  
el de Herrera &c.

Planta tenera edulis, & ad pabulum optima *Act. Stock.* 1747.

p. 79. Radices cum alumine flavo colore tingunt Linn. Amæn.  
 t. 5. Pl. tint. Chalybs in Urticæ succo extinctus mollior eva-  
 dit Weesch Hecast. I. Obs. 24. Ex tusâ cortice chartam para-  
 vit Cl. Schæfferus. Tandem cum in fila duci possit ut Canna-  
 bis , ad linteamina adhiberi cœpit. Vide Jour. æcon. 1751.  
 Avril , & 1766. Septembre. Habet ergò vulgatissima planta  
 egregias utilitates.

## PENTANDRIA.

### XANTHIUM.

927. *Xanthium strumarium.*

Oritur Cæsaraugstæ , en Epila , & alibi.

Luteo colore tingit Linn. Amæn. t. 5. Pl. tint.

In Arabiâ Camelorum pabulum Forskal Fl. Arab. 98.

928. *Xanthium spinosum.*

Habitat Cæsaraugstæ , Oscæ , en Epila.

Folia trifida , segmento medio productiore , lanceolato , sub-  
 tus incana.

### AMARANTHUS.

929. *Amaranthus Blitum.*

Bledos Laguna l. 2. c. 108.

Legi copiosè en Epila.

Antiquorum Blitum non liquet an ad hanc speciem pertineat,  
 vel potius ad *Amaranthum album* Linn. Amæn. t. 5. Culina mu-  
 tata.

## POLYANDRIA.

### CERATOPHYLLUM.

930. *Ceratophyllum demersum.*

Provenit copiosè en los ojos de Montreal del campo.

### MYRIOPHYLLUM.

931. *Myriophyllum spicatum.*

In aquis frequens Cæsaraugstæ , en Borja &c.

## POTERIUM.

932. *Poterium Sanguisorba.*

Hispanis Pimpinela

Locis glarcosis frequens *Cesaraugusta*, & alibi ut enumerare non adtineat.

In acetaria recipitur, vulgo *ensalada italiana*. Ad condensanda coria inservit Gleditsch *Act. Berol.* 1754. p. 124. seq.

## QUERCUS.

933. *Quercus Ilex.*

Hispanis *Encina*, *Carrasca* Laguna l. 1. c. 121.

In sylvis Aragoniæ frequens, ut enumerare non adtineat.

*Ilici honos* ad axes plastrorum vertuvis simpliis, & juga lyrarum, psalteriorumque. *Theophr.* l. 5. c. 8.

Lignum durum, difficile putrescit, ideoque ad opera nava-  
lia adhibetur Du Hamel *Arb.* I. p. 316.

934. *Quercus Suber.*

*Alcornoque* Laguna *Ibid.*

Provenit en la Sierra de Villaroya, circà Sestrica.

Cortex detrahitur Julio, & Augusto, atque ope ignis expla-  
natur. Combustus verò fuliginem præbet ad varia artifia uti-  
lem Du Hamel *Arb.* II. p. 293.

935. *Quercus coccifera.*

*Coscoja*, sive *Coscojo* Laguna l. 4. c. 49.

Provenit copiosè en el Castellar, in collibus circà Hijar, Caspe,  
Alcañiz, en los montes de Rodanas &c.

Cortex ad firmando coria utilis la Lande *Art. du Tanneur* p. 23.  
*Coccus* ramis, & foliis adhærens colorem kermesinum largitur  
constantem. Colligitur sub finem veris, & aceto intinctus, pos-  
teà siccatus ad usus reponitur Nissolle *Act. Par.* 1714. p. 434.  
Nostratis negilitur; at Lagunæ ævo notissimus erat in ar-  
te tinctoriâ. Vide l. c. *Granum* hoc, primoque ceu scabies frutici  
parvæ aquifoliæ ilicis, cusculum vocant; pensionem alteram tributi pau-  
peribus Hispaniæ donat Plin. l. 16. n. 12.

936. *Quercus Robur.*

*Roble* Laguna l. 1. c. 121.

Habitat en Moncayo, circà Cal cena.

Materies dura, pretiosa ad ædificia, naves, & opera carpenti-  
tariorum Du Hamel *Arb.* II. p. 209. Ob densitatem ad dolii  
facienda cæteris præstat, *Iour. Oecon.* 1771. Decembre. Succu  
adeò adstringens, ut cum alkali tartarum vitriolicum præbea  
Neuman *Chem.* p. 189. & pro aceto haberi possit *La nature con-  
siderée* &c. *Lett.* 162. Cortex ad induranda coria præstantissi-

— Ch. la Lande *Art. du Tanneur* p. 18. 24. Gallæ hujus ar-

boris Orientalibus cedunt. Ex glandibus anno 1709. in Galliâ panis parabatur.

937. *Quercus Egilops.*

Vernaculè Marojo.

Provenit en la Sierra de Villaroya, circà Calcena.

Cortex ad præparanda coria utilis Linn. Amæn. t. 5 Pl. tint.

938. *Quercus Cerris.*

Vernacule Rebollo.

Habitat en Moncayo, circà Calcena, en la Sierra de Villaroya.

Folia utrinquè pubescentia, laciniis obtusis.

Gallæ orientales ex hac arbore colliguntur Bergius Mat. med.

## FAGUS.

939. *Fagus sylvatica.*

Haya Laguna l. r. c. 131.

Provenit copiosè en Moncayo.

Lignum ad alendum focum præstantissimum; etiam ad axes, temones, & torneatorum opera Du Hamel Arb. I. p. 233. Si in igne torreatur, aut in stagno per mensem maceretur, adversus vermes munitur Mus. med. II. p. 136. Semina oleum præbent ad lampades utilissimum Francheville Act. Berol. 1766.

Cortex ad condensanda coria utilis Gleditsch Act. Berol. 1754.

p. 124. seq. Cineres clavellati vulgo Potasse in Septentrione parantur.

## CORYLUS.

940. *Corylus Avellana.*

Avellano Laguna l. r. c. 142.

Provenit copiosè en Moncayo, en el avellanar del Collado circà Badenas.

Ex nucleis oleum exprimitur ad picturam, & ad recipiendos odores Du Hamel Arb. I. p. 189. etiam panis paratur, & potus chocolatæ æmulus Hamburg. Magaz. t. 16. Cortex carbones suppeditat ad delineandum utiles. Virga divinatoria vulgaris notitiæ. Rami virides frumentum à corruptione præservant Linn. Amæn. t. 1. Fl. øcon.

## MONADELPHIA.

## PINUS.

941. *Pinus sylvestris.*

*Pino balsam.* In Aragoniâ nonnulli vocant *Pino negral*, quo nomine alia species in Castiliâ indicatur. Vide Laguna l. 1. c. 70. Oritur copiosè in sylvis Aragonie.

Magnam resinæ copiam fundit. Ex truncis, & ramis concisis, & in furio incensis pix liquida obtinetur, ad opera navalia expetita. Vide Du Hamel Arb. II. p. 147. seq. Lappones resinam mandunt, & dentes ab odontalgia immunes servant. Harmes Med. Lap. p. 20. Ligni usus ad ædificia, naves, carbones, & alia opera vulgaris notitiæ. Infusum picis adversùs variolas laudat Cl. Berkley in opere inscripto *Siris*. Confer *Jour. Acad.* 1763. Iun.

942. *Pinus Pinea.*

*Pino albar.*

Habitat cum priori.

Nuclei edules.

## CROTON.

943. *Croton tinctorium.*

Provenit circa *Almudebar*, & in agro *Oscensi*, unde ad me transmissum à Petro Lapiedra.

Caules pulvere glauco aspersi. Folia rhomboidea, dentata, subtomentosa. Flores masculi in facemos dispositi. Calyx quinquepartitus. Petala 5 lanceolata. Stamina 8, aut 9 monadelphæ. Flores fœminei infrà masculos, axillares, pedunculati. Capsulae tricoccæ, scabré, nutantes.

Fœminæ in oppido *Almudebar* tibialia cœruleo colore hac plantâ inficiunt.

Propè Monspelium succum pressione prodūctum in sole exponunt. Deinde calcem in vasibus ligneis urinâ extinguunt. Mox pannos linteos hoc succo intinctos, posteà sicutos ita componunt, ut particulis alkalinis imbui possint. Belgæ peculiari artificio elementa tinctoria in pastillos recipiunt ad usus cœconomicos.

Cl. Nissole hujus plantæ floribus cum alumine. & crystallo tartari sericum, & lanam eleganti cœruleo colore tinxit. Act. Par. 1712. p. 339. Nonnulli etiam in Galliâ tentarunt fecundum suam operam obtinere, sed incassum Beau-

vais de Raseau Art de l' Indigotier p. 72.

## SYNGENESIA.

### MOMORDICA.

944. *Momordica Elaterium.*

*Cogombrillo amargo Laguna l. 4. c. 156.*

*Pakkyoth , Vitis agrestis Reg. IV. c. 4. v. 39. Celsius Hierob. I. p. 393.*

Oritur copiosè *Cesaraugustæ*, en *Epila*, *Calatayud*.

E seminibus oleum ad lampades paratur *Celsius l. c.*

### BRYONIA.

945. *Bryonia alba.*

*Nuez blanca Laguna l. 4. c. 173.*

Vernaculè *Tuca*.

In sepibus frequens.

Turiones cum ovis eduntur, antiquis non ignoti Plin. l. 23. n. 16.

Ex radicibus amyllum paratur *Du Hamel Fabr. de l' ámidon p. 9.* Cienfuegos t. 5. p. 358. *El Rei Don Felipe II. prohibió el uso del almidon, y las mugeres le hacian mucho mejor, mas tieso, mas blando, y transparente de raices de Tragontia, ó Serpentaria mayor sacando su leche por expresion, y dejandola secar. El burujo, que quedaba apetecian muchissimo los animales, y se cebavan con él los lechones, y engordaban.*

*Et in notá marginali p. 357. El año de 1630. por Julio valia en Madrid una libra de almidon dos reales.*

### DIOECIA.

#### DIANDRIA.

#### SALIX.

946. *Salix amygdalina.*

Provenit circà *Borja*.

947. *Salix fragilis.*

Habitat cùm priori.

948. *Salix Helix.*

Oritur ad aquas *Cesaraugusta*, en *Epila*, *Alcalá de la selva*.

949. *Salix caprea.*

Habitat en *Epila*, *Pitarque*, *Daroca*, & alibi.

- Folia supernè latiora.
950. *Salix viminalis.*  
Hispanis Mimbre.  
Nascitur juxta flumina Cæsaugustæ, en Epila.  
Ad ligamina, & corbes faciendo inservit.
951. *Salix cinerea.*  
Habitat en Moncayo.
952. *Salix alba.*  
Sauce Laguna l. 3. c. 115.  
Ad ripas fluminum vulgatissima.  
Ex hujus ligno doliola fiunt, in quibus oleum, farina, butyrum &c. optimè servari possunt; sed ad vinum tuendum inutilia sunt Iour. æcon. 1759. Ianvier. Cortex cinnamomeum colorē largitur Arduini Mem. p. 64. In febribus intermittentibus cum successu adhibebatur ab Edmundo Stone Iour. æcon. 1765. Avril. Cum ad Salicis radices pisces sua ova deponere soleant, earum ope ad piscinas transferri possunt Iour. æcon. 1758. Octobre. Ad firmanda coria Gleditsch Act. Berol. 1754. p. 124. seq. Cynips Salicis gallas excitat, quæ luteo colore tingunt, sed apud infectores nondum invaluerunt Linn. Amœn. t. 5. Pl. tinct.

## TRIANDRIA.

### O S Y R I S.

953. *Osiris alba* Loefling Iter p. 228.  
Provenit in sepibus Cæsaugustæ, en Hijar, Caspe.  
Caules angulati; folia linearia: flores in nostro solo flavascunt.

## TETRANDRIA.

### V I S C U M.

954. *Viscum album.*  
Liga Laguna l. 3. c. 97.  
Habitat in arboribus.  
Ad capiendas aves inservit. Turdus baccis vescitur Du Hamel Arb. II. p. 355. Adversus Epilepsiam laudat Boyle Phil. exper. Ex. V. p. 251.

## PENTANDRIA.

### PISTACIA.

#### 955. Pistacia Terebinthus.

*Cornicabra Laguna l. 1. c. 72, 73.*

*Elah Gen. c. 12. v. 6. Celsius Hierob. I. p. 34.*

Provenit en Tolocha, en el desierto de Calanda, in montosis circà Calatayud, Ricla, Brea &c.

*Fert & folliculos emittentes quædam animalia, seu culices Plin. l. 13. n. 12. Hi folliculi in Oriente luteo colore tingunt, cum acidiis verò, rubro Linn. Amæn. t. 5. Pl. tint.*

Terebinthina ex hac arbore diffuit Tournef. Voy. I. p. 379.

#### 956. Pistacia Lentiscus.

*Lentisco, Mata Laguna l. 1. c. 71.*

*Tzeri Gen. c. 37. v. 25. Celsius Hierob. II. p. 180.*

Habitat en Tolocha, en el desierto de Calanda, en los montes de Rodanas, circà Brea &c.

Lignum apud nos ad alendum focium inservit. Ad dentiscalpia  
accidens utile Du Hamel Arb. I. p. 355.

*Lentiscum melius. .... Martial. l. 14. Ep. 22.*

Ad induranda coria Cl. la Lande Art. du Maroq. p. 8. In Oriente Mastichen fundit, & ex baccis oleum ad lampades exprimitur Tournef. Voyag. I. p. 214, 378.

### HUMULUS.

#### 957. Humulus Lupulus.

*Hombrecillos, in Aragoniâ Vidarria Laguna l. 4. c. 146.*

Oritur in sepibus en Borja, Xarque, Ricla.

In Septentrione ad cerevisiam condiendam inservit. Veteres Lupulo vescebantur Plin. l. 21. n. 50. In lue venereâ plurimum valet Floyer Pharm. p. 149.

## HEXANDRIA.

### TAMUS.

#### 958. Tamus communis.

*Nuezâ negra Laguna l. 4. c. 184.*

Oritur in sepibus; copiosè en Biber de la Sierra.

Folia cordata, acuminata.

Apud veteres edulis Plin. l. 21. n. 50.

## SMILAX.

959. *Smilax aspera.**Zarzaparrilla Laguna l. 4. c. 145.**Habitat en el desierto de Calanda.**Radix Sarsaparrilla occidentalis succedanea.*

## OCTANDRIA.

## POPULUS.

960. *Populus alba.**Alamo blanco Laguna l. 1. c. 89.**Iuxta flumina, & in ambulacris frequens.*961. *Populus nigra.**Chopo, Alamo negro Laguna l. 1. c. 90.**Habitat cum priori.**Ex gemmis cum aquâ coctis resina odorata exprimitur, quæ nonnullis Italizæ locis ceræ vices explet *La nature considerée* Ec. Lett. 162.**Lignum torneatoribus inservit. Ex cortice panis fit in regione Kamtschatka. Ex Populi lanâ chartam paravit Schæfferus Haller *Helv. n. 1632.**

## ENNEANDRIA.

## MERCURIALIS.

962. *Mercurialis annua.**Mercurial Laguna l. 4. c. 190.**Passim in ruderatis.**Sicca cœrulea evadit Lussieu *Act. Par. 1724. p. 354.* An ergo ad usus tinctorios trahi posset?*963. *Mercurialis tomentosa.**Mercurialis tenuifolia, fruticosa, perennis Grislei *Virid. Lusit. p. 63.***Oritur Cæsaraugustæ, en Daroca, Calamocha.**Folia elliptica, acutiuscula, involuta, incana.*

## DECANDRIA.

## CORIARIA.

964. *Coriaria myrtifolia.**Myrtoetalon Munting. *Phyt. p. 14. f. 62.**

Provenit in agro Casar augustano circà flumen Gáliego.

Ad condensanda coria adhibetur la Lande *Art du Tannenr* p. 23. Folia nigro colore tingunt Francheville *Act. Berol.* 1767. Cum hæc planta semina habeat nigra, coriariis inserviat, & vires venenatas exerat, facile adducor ut credam esse Nauteam Plauti *Asinaria* *Act. V. Scen. II.*

..... Nauteam

*Bibere malim, si necessum est, quam illam oscularier.*

Moveor auctoritate Festi. Nautea, inquit, herba granis nigris, quam Coriarii utuntur.

## MONADELPHIA.

### JUNIPERUS.

965. *Juniperus communis.*

Enebro Laguna l. 1. c. 83.

Oritur copiosè in sylvis, & montosis Aragoniæ.

*Juniperus ad rem ædificatoriam tum subdivalem, tum obruendam sub terram* Theophr. l. 5. c. 8.

Lignum rubens, fragrans ad opera scriniaria utile. In Africâ Gummi Sandarac obtinetur, quod ad vernices inservit Du Hamel. Arb. I. p. 324. Resina Olivan, nostratisbus inienso, cuius magna vis in Ecclesiis Catholicorum consumitur, ex Junipero Lyciâ defluit Bergius Mat. med. Ego verò in Sacello B. Virginis in monte de Herrera dicato resinam ex Junipero collectam ad eundem usum adhiberi, & gratissimum aroma spirare observavi.

966. *Juniperus thurifera.*

Hispanis Sabina Laguna l. 1. c. 84.

Habitat cum priori.

Cum nostra folia gerat Cupresso similia, facile darem quod esse possit lignum Thyinum Apoc. c. 18. v. 12. Wedelius quidem in pec. *dissert.* Sabinam interpretatur.

### TAXUS.

967. *Taxus baccata.*

Tejo Laguna l. 4. c. 81.

Provenit circà Aliaga en el barranco de la boz.

Lignum durum ad opera toneatorum aptum. Ajunt nonnulli baccas, & umbram hujus arboris venenatas esse; alii negant.

## EPHEDRA.

968. *Ephedra distachya.*

*Polygonum fruticans, botryoides, hispanicum, majus* Barrel. *Ic.*

*732. n. 3. & medium* *Ic. 731. n. 1.*

*Provenit in collibus circà Hijar, Caspe, Alcañiz, Rodenas, en  
en el Castellar, propè Pozuelo.*

*Variat magnitudine: datur enim quæ vix palmum excedit.*

*Altera varietas ad tripedalem altitudinem assurgit.*

## SYNGENESIA.

## RUSCUS.

969. *Ruscus aculeatus,*

*Brusco Laguna l. 4. c. 147.*

*Provenit en el desierto de Calanda, circà Barbastro.*

## POLYGAMIA.

## MONOECIA.

## CELTIS.

970. *Celtis australis* Theophr. *l. 4. c. 4.*

*Almez Laguna l. 1. c. 134. sed non est *Lotus* Diosc.*

*Almez, Lodoño Cienfuegos t. 4. p. 96. Ic. 108.*

*Vernaculè Alatonero.*

*Provenit in sepibus, en la Sierra de Ricla, in montosis circà  
Calatayud.*

*Baccæ à pueris eduntur. Lignum ad doliorum circulos adhibe-  
tur en Barbastro. Ex eo etiam virgæ fiunt piscatoriæ jour. æcon.*

*1770. Avril.*

*Cienfuegos Ib. p. 101. Los Africanos, ù Moros, que fueron Reyes  
de Zaragoza en un Jardin de su Castillo, que llaman el Aljaferia  
por haver edificado aquél palacio un Rei Moro llamado Aljifar, para  
verdura, ora fuese de Africa, ù de otra parte de Aragon planta-  
ron allí arboles, que hoy se conservan altos mas de veinte codos, y  
cuyos troncos no los abrazará un hombre.*

## VERATRUM.

971. *Veratrum album.*

*Verde o ambre blanco. Laguna l. 4. c. 151.*

*Heleboro blanco*, yerva del Ballesteros Cienfuegos t. 3. p. 379. t. 7.  
Ic. 512.

Provenit en Moncayo.

Planta venenata. Unguentum scabiem sanat, & decoctum tineam vaccarum Bianchi Obs. p. 192. Americani semina Maiz cum Veratro coquunt, & serunt. Ità insecta enecant Kalm Act. Stock. 1751. trim. 4. Cienfuegos Ibid. p. 382. Tambien los Cazadores Espanoles usan de esta yerva para untar las flechas, y estan tan platicos en ello que si hieren un ciervo en la pesuña, ò le clavan un cuerno, ò pasan sola una oreja con la flecha que vulgarmente llaman enherbolada, le siguen de rastro como presa cierta, y segura. Su Magestad tiene un hombre, que le sirve en la caza, el qual hoy dia vive en Fuencarral aldea de Madrid, el qual hace la confeccion del eleboro para las flechas en grande eminencia.

Et p. 387..... quando trataba de concluir con este discurso, me acordé de los ganaderos de tierra de Segovia que para curar de la sarna à los ganados en lugar de la miera, que es aceyte de enebro, usan del eleboro blanco en esta manera. Cortan las cebollas, y raíces dél, y despues de haberlas cocido en una caldera, toman unas matas como escobas, y estando caliente laban con aquella agua caliente los ganados de qualquier genero que sean, y aun los mismos perros, y borricos si tienen sarna, y dentro de pocos dias curan todos. Dicen que es mucho mejor que la miera porque no pierde ni corta la lana.

### ANDROPOGON.

972. *Andropogon birtum* Loefling. Iter p. 231.

Provenit in montosis de Campiel circà Calatayud.

973. *Andropogon Ischænum.*

Gramen Ischæmon Plinii Cienfuegos t. 6. part. 1. p. 169. Ic. 177.

Legi en Rodanas en el barranco de la Calderuela.

*Ischæmonem Thracia invenit, quâ ferunt sanguinem sisti.* Plin. l. 25. n. 45.

### HOLCUS.

974. *Holcus lanatus*, Schreber Gram. p. 145. t. 20. f. 1.

Gramen lanatum Cienfuegos t. 6. part. 1. p. 139. Ic. 141.

Provenit en el Pinar de Losilla circà Albarracín, en la modorra de Badenas, en el monte de Herrera.

*Bonum pabulum* Schreber l. c.

Hol-

975. *Holcus mollis* Schreber Gram. p. 149. t. 20. f. 2.  
 Nascitur in agro Cæsaraugustano.  
 Folia glabra, nervosa, quatuor circiter lineas lata. Flosculi  
 acuti, pubescentes, amant purpurascere.  
 Optimum pabulum pro pecore Schreber l. c.

### CENCHRUS.

976. *Cenchrus capitatus*.  
 Gramen montanum, echinatum, tribuloides, capitatum Cien-  
 fuegos t. 6. part. 1. p. 318. Ic. 320.  
 Habitat in siccis Cæsaraugusta.

### ÆGILOPS.

977. *Ægilops ovata*.  
 Festuca, sive Ægilops narbonensis Cienfuegos t. 5. p. 298. Ic. 296.  
 Oritur juxta vias Cæsaraugusta, en Calamocha.

### VALANTIA.

978. *Valantia Cruciatæ*.  
 Galium foliis quaternis, hirsutis, petiolis octifloris Haller. Hely.  
 n. 709.  
 Provenit in sylvis en Moncayo.  
 Rubro colore tingit Steinmeyer de Rubiâ p. 20.  
 979. *Valantia glabra*.  
 Cruciatæ minor, glabra, flore Molluginis albo Barrel Ic. 323.  
 Habitat en la dehesa de Aliaga, circè Tronchon.  
 Radix colorem rubrum suppeditat, qui experimentis Cl. Dam-  
 bournai elegantiam illius, quem vulgò vocant *Andrinopolis*,  
 æmulatur Journ. æcon. 1768. Avril.

### PARIETARIA.

980. *Parietaria officinalis*.  
*Parietaria Laguna* l. 4. c. 87.  
 Ad muros vulgatissima.  
 Ad curculionem è frumento arcendum laudat Bradley Farmer  
 direct. p. 122.

### ATRIPLEX.

981. *Atriplex Halimus*.  
*Salgada Laguna* l. 1. c. 100.  
*Malluach* Job. c. 30. v. 4. Celsius Hierob. II. sp. 96.  
*Vermiculæ Socæ & Silvæ quo nomine omnes salsuginosæ*

plantæ indigitantur.

Provenit copiosè Cæsaraugstæ , en Calatayud , Val de Urrea .  
Cineres saponis confectoribus inserviunt.

982. *Atriplex glauca.*

*Atriplex marina , repens Grisei Virid. Lusit. p. 21.*

Oritur Cæsaraugstæ , en Epila .

983. *Atriplex patula.*

Occurrit juxtà vias Cæsaraugstæ .

### A C E R.

984. *Acer Pseudo-Platanus.*

Provenit circà Aliaga en el barranco de la hoz .

Succum dulcem præbet ad parandum saccharum idoneum Act.  
Stock. 1754. trim. 3.

985. *Acer campestre,*

Vernaculè Acere .

Habitat en Moncayo , en la Sierra de Villaroya , en el moute de Herrera , & in sepibus .

Lignum ad recipiendos tubos sclopetarios expetitur Du Hamel  
Arb. I. p. 36.

### D I O E C I A.

#### F R A X I N U S.

986. *Fraxinus excelsior.*

Fresno Laguna l. 1. c. 88.

Oritur en Moncayo , en la Sierra de Villaroya , en la modorra de Bardenas .

Lignum durum , & celerrimi incrementi ad temones , & torneatorum opera adhibetur Du Hamel Arb. I. p. 251. Cortex exterior filum in aquâ maceratum cum farinâ , & Sabinâ sylvestri cœruleo colore imbuit Linder Fargekonst p. 63.

### P O L Y O E C I A.

#### F I C U S.

987. *Ficus Carica.*

Higuera Laguna l. 1. c. 145.

Habitat en los montes de Rodanas , en las Valdorias de Albacate , circâ Albaracin .

Arbor vere spontanea quæ locis desertis

ea Cl. Linnæus Amœn t. I. *Ficus*, Europæ australis indigenam statuit. Lignum ad poliendum utile, quia oleum, & smiris pollinem facile recipit Du Hamel *Arb.* I. p. 240.

## CRYPTOGAMIA.

### FILICES.

### EQUISETUM.

988. *Equisetum arvense.*  
Provenit Cæsaraugustæ, circà Tronchon
989. *Equisetum palustre*  
*Hippuris altera* Diosc. l. 4. c. 48.  
In aquosis vulgatissimum.  
Pecori nocet Gleditsch *Act. Berol.* 1768.

### OPHIOGLOSSUM.

990. *Ophioglossum vulgatum.*  
*Lengua de serpiente* Cienfuegos t. 2. p. 114. Ic. 110.  
Habitat in sylvis en Moncayo.

### OSMUNDA.

991. *Osmunda Lunaria.*  
*Lunaria menor ramosa* Cienfuegos t. 2. p. 86, 87.  
Provenit circà Tronchon, Beceite.

### ACROSTICHUM.

992. *Acrostichum septentrionale.*  
Oritur in rupibus en Moncayo, en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya, en los montes de Rodanás.

### PTERIS.

993. *Pteris aquilina.*  
*Helecho Laguna* l. 4. c. 186. nomen commune cunctis Filicis speciebus; sed peculiariter Pteridi tribuitur.  
Habitat en el pinar de Losilla circà Albarracín.  
Radix ad præparanda coria vulgo Cordovanes utilis est Gleditsch *Abhand.* I. p. 33. Sal cinerum ad saponem, & vitrum conficiendum adhibetur *Act. Stock.* 1742. trim. 3. Dalechamp. *Hist. gen.* p. 1224. porci radicibus saginantur *Recueil d' Agric.* de Tour.

## ASPLENIUM.

994. *Asplenium Scolopendrium.*  
*Lengua cervina* Laguna l. 3. c. 115.  
 Provenit in saxosis propè el Monasterio de Piedra.
995. *Asplenium Ceterach.*  
*Doradilla* Laguna l. 3. c. 145.  
 Oritur in umbrosis eu Moncayo, Tolocha, en el Monte de Herrera, en Rodanas.
996. *Asplenium Trichomanes* Diosc. l. 4. c. 138.  
 Provenit cum antecedenti iisdem locis.
997. *Asplenium ruta muraria.*  
 Ad muros minimè rarum Cæsaraugustæ, en Calcenia.  
 Planta iners, & insipida.
998. *Asplenium Adiantum nigrum.*  
 Nascitur in rupibus en Moncayo, en el monte de Herrera, en la Sierra de Villaroya, & alibi.

## POLYPODIUM.

999. *Polypodium vulgare.*  
*Polipodio* Laguna l. 4. c. 187.  
 Provenit en Rodanas, en el monte de Herrera, en Moncayo, en la Sierra de Villaroya.
1000. *Polypodium Filix mas* Diosc. l. 4. c. 185.  
 Habitat en Moncayo, in montosis circà Orihuela.  
 Eximia vis hujus Filicis ad Tæniam enecandam non ignota fuit Dioscoridi, & Theophrasto l. 9. c. 20. & ult. Cl. Andry initio præsentis sæculi hanc medicinam quasi è postliminio restituit, & radicem cum melle propinavit. Hodiè in pulverem redacta ad tres drachmas præscribi solet Bergius Mat. Med. Asparagi edules. Radix bonum pabulum pecori suppeditat Gunner. Fl. Norveg. p. 4, 5.
1001. *Polypodium fragile.*  
 Legi in collibus circà Hinojés.
1002. *Polypodium regium.*  
 Oritur circà Badenas, en la peña cerrada de Fortanete.  
 Pinnæ dentibus acutis instruuntur, in quo præcipuè ab antece. denti distinguitur.

## ADIANTUM.

1003. *Adiantum capillus Veneris*  
*Culantrillo* Laguna l. 4. c. 137.  
 In muris madidis non rarum cæsarauguste en Hiar &c.

## MUSCI.

## POLYTRICHUM.

1004. *Polytrichum commune.*

*Polytricum aureum*, majus Barrel. *Ic.* 251. *n.* 3.

*Polytrichum surculo capitulifero*, *simpliciusculo*, *stelifero an-*  
*notino-articulato*, *capitulis adultis tetrahedris*, *obliquis Nec-*  
*ker* *Meth. Musc.* *p.* 124. *n.* 7.

Oritur in sylvis; copiose en el pinar de Losilla circa Albarracin.

## MNIUM.

1005. *Mnium serpyllifolium.*

*Bryum surculo simpliciusculo*, *capitulis subaggregatis*, *cer-*  
*nuis*, *foliis obovatis*, *obtusis*, *nitidis*, *integerrimis Necker*  
*Musc.* *p.* 216. *n.* 27.

Provenit in humidis.

## BRYUM.

1006. *Bryum striatum.*

Oritur in sylvis circa Tronchon.

Folia crispa. Pedunculi laterales caules vix longitudine supe-  
rantes. Calyptre integra.

1007. *Bryum pomiforme.*

*Bryum surculo erecto*, *foliis setaceis*, *capitulis globosis Nec-*  
*ker* *Musc.* *p.* 208. *n.* 19.

Provenit in sylvis.

Surculi vix unciam longi: folia subulato-setacea.

1008. *Bryum subulatum.*

*Bryum capitulis subulatis*, *foliis superioribus acutis*, *patentibus*,  
*primordialibus subradicalibus Necker* *Musc.* *p.* 192. *n.* 2.

Habitat in sylvis circa Orihuela, Tronchon.

1009. *Bryum murale.*

*Musgo*, nomen commune cunctis Muscorum speciebus.

*Bryum capitulis oblongis*, *erectis*, *cuspidatis*, *foliis oblongis*,  
*concavis*, *piliferis Necker* *Musc.* *p.* 196. *n.* 5.

In tectis, & muris vulgare.

A *B. rurali* vix specie differre puto.

1010. *Bryum heteromallum.*

*Bryum surculo adolescente apice annotino*, *dorso capitulifero*,  
*foliis secundis capillaceis Necker* *Musc.* *p.* 229. *n.* 41.

Oritur in sylvis circa Orihuela.

## HYPNUM.

1011. *Hypnum filicinum.*

*Hypnum* surculo juniore erecto, simpliciter pinnato, adulto subrepente, capitulifero, capitulis oblongis, obliquis Necker *Musc.* p. 164. n. 17.

Provenit in udis *en la Palomita.*

Folia distichè imbricata, setâ terminantur.

1012. *Hypnum crista castrensis.*

*Hypnum* surculo pinnato, ramis supremis contiguis, apice deflexis, capsulis subrotundis obliquis Necker *Musc.* p. 165. n. 8.

Habitat in sylvis circà Tronchon.

1013. *Hypnum abietinum.*

*Hypnum* primordialibus obtusis, ramis teretibus subulatis, foliis ovatis acutis, rachi siccatae appressis Necker *Musc.* p. 163.

n. 15.

Habitat cum antecedenti.

Rami teretes, acuti, neque compressi.

1014. *Hypnum sericeum.*

*Hypnum* repens, ramis annotinis ramosis erectis, capitulo erecto, acuminato, primordialibus acuminatis Necker *Musc.* p. 173.

In arboribus frequens.

1015. *Hypnum Sciuroides.*

*Hypnum* surculo germinante crassiore, capitulifero tenuiore, ore capitulo coarctato, primordialibus pilosis Necker *Musc.* p. 175. n. 9.

Ad arborum cortices minimè rarum.

## JUNGERMANNIA.

1016. *Jungermannia dilatata.*

*Jungermannia* surculo reptante imbricato, foliis serie duplice orbiculatis, ramorum apice latiusculo Necker *Musc.* p. 140.

n. 19.

Oritur in sylvis circà Tronchon.

## RICCIA.

1017. *Riccia fluitans.*

In aquis non rara.

## LICHEN.

1018. *Lichen geographicus.*

- Lichen flavicundus, mappiformis, lineolis ramosis, punctis atris intermixtis Necker Musc. p. 46. n. 2.
- Provenit copiosè in rupibus en el monte de Herrera, en Moncayo.
1019. Lichen sanguinarius.
- In rupibus frequens en el Monte de Herrera &c.
1020. Lichen fusco-ater.
- Habitat cum prioribus.
1021. Lichen calcareus.
- In rupibus non rarus.
1022. Lichen candelarius.
- Lichen fulvus fronde subrotundâ, germinante asperiusculâ, primordialibus nudis, crustaceo-pulverulentis Necker Musc. p. 51. n. 12.
- In petris, muris, & arborum corticibus vulgaris.
- Luteo colore tingit, sed negligitur Linn. Amæn. t. 5. Pl. tint.
1023. Lichen subfuscus.
- Lichen rugosus, subcinereus, scutellis subfuscis, margine crenulatis Necker Musc. p. 53. n. 14.
- Passim ad arborum truncos.
1024. Lichen saxatilis.
- In arborum corticibus mihi frequenter occurrit.
- Violaceo colore tingit Linn. Amæn. t. 5. Pl. tint.
1025. Lichen ciliaris.
- Lichen fronde erectiusculâ, laciliis linearibus ciliatis; scutellis concaviusculis, stipitatis, subcrenatis Necker Musc. p. 101. n. 71.
- Ad arborum truncos passim circâ Tronchon.
- Ciliæ in meis speciminibus concolores, stutelli non crenati.
1026. Lichen furfuraceus.
- Lichen fronde ramosissimâ, supernè cinereâ, subvillosâ, infernè nigrâ, ramulis acutis Necker Musc. p. 107. n. 77.
- Ad pinorum cortices passim.
1027. Lichen farinaceus.
- Lichen fronde linearis, ramosâ, laterali verrucosâ, verrucis planis, farinosis Necker Musc. p. 104. n. 74.
- Habitat cum antecedenti.
1028. Lichen caperatus.
- Lichen fronde juniori suprà rugosiusculâ, germinante pulverulentâ, frondulis extimis lœvibus, latioribus obtusis Necker Musc. p. 95. n. 64.
- In rupibus frequens circâ Epila, & alibi.
1029. Lichen glaucus.

1029. *Lichen glaucus.*

Lichen fronde laciniatâ, nitidâ, margine criso-farinosa, subtus atrâ, punctis scutelliformibus bruneis Necker Musc. p. 100. n. 69.

Ad arbores passim circâ Tronchon.

1030. *Lichen caninus.*

Lichen fronde simplici, obtusa, sinuato-lobatâ, subtus venoso-villosa, peltis ovatis ascendentibus Necker Musc. p. 79. n. 44.

Legi copiosè in sylvis circâ Tronchon.

Ad morsum rabidi canis commendabant Cl. Mead, & Sloane Act. Angl. Vol. 20. p. 237. Ex hoc igitur Lichene pulvis fit antilyssus Pharm. Lond.

Lichen can. 3 ij

Pip. nigr. 3 j

M. F. pulvis D.XIV.

1031. *Lichen pyxidatus, prolifer.*

Lichen scypho crenulato, tuberculis sessilibus, stipitatisve Necker Musc. p. 55. n. 16.

Habitat en la Sierra de Arcos.

1032. *Lichen fimbriatus.*

Lichen pyxidatus minor Vaillant Paris. tab. 21. f. 6.

Legi in sylvis propè Tronchon.

1033. *Lichen cornutus.*

Lichen stipite subnudo, difformi, subventricoso, scyphis proliferis Necker Musc. p. 59. n. 19.

Oritur circâ Tronchon.

Caulis simplex foraminulo terminatur.

1034. *Lichen stipite squamato, calycibus congestis.*

Lichen squamosus, acetabulis dense aggestis Vaillant Paris. tab. 21. f. 10.

Lichen infundibulis proliferis, fungulis atrofuscis Haller Hely. n. 1928.

Habitat cum antecedenti in sylvis circâ Tronchon.

1035. *Lichen barbatus.*

Bryum Dioscor. l. 1. c. 20. Plin. l. 12. c. 23.

In arboribus copiosè.

1036. *Lichen chalybei-formis.*

Lichen fronde vagâ, ramosâ, filiformi, decumbente, flexuosa.

Necker Musc. p. 73. n. 34,

Legi magnâ copiâ in pinis circâ Orihuela, Tronchon.

## CHARA.

1037. *Chara vulgaris.*Oritur in aquis requietis; *Cesaraugusta* in rivulo *la Guerba*.

## CONFerva.

1038. *Conferva rivularis.*

In rivulis, &amp; fossis frequens.

1039. *Conferva capillaris.*Conferva filamentis simplicibus, invicem contortis *Necker Musc.*  
p. 8. n. 13.

Habitat cum priori.

Ex Confervis tolerabilem chartam paravit Cl. Guettard *Jour*  
*æcon.* 1751. *Juillet*, *Aout*.

## BYSSUS.

1040. *Byssus velutina.*Byssus repens, simplicissima, ramosaque, primordialibus con-  
volutis *Necker Musc.* p. 2. n. 3.Legi in rupibus circà *Tronchon*.1041. *Byssus candelaris.*Lichen farinaceus, flavus *Necker Musc.* p. 112. n. 31.

Provenit in muris, &amp; arborum corticibus.

1042. *Byssus lactea.*Lichen crustaceo-farinosus, candidus *Necker Musc.* p. 113.  
n. 84.

Habitat cum priori.

## Fungi.

## AGARICUS.

1043. *Agaricus campestris.**Hongo Cienfuegos* t. 3. p. 430.

In pratis, &amp; sylvis vulgatissimus.

Corpuscula globosa, quæ pro seminibus à Michelio, & aliis  
Botanicis habita sunt, ova animalia esse contendit Otto Mu-  
chhausen in *der Hausvatter*. Asserit enim quod primùm in tela  
membranaceam dilatantur, deinde in fungos excrescant. Quo-  
si vera sint, & experimentis comprobata, tota hæc Fungorum  
classis ad regnum animale referri debet. Confer Linn. *Amœ-*  
*t. 7. Mundus invisibilis.*

A nonnullis *Cagarrias* appellatur.

Provenit circà *Val de Linares*.

Edulis, deliciosus.

**1045. Agaricus fimetarius.**

Fungus comatus Steerbeck *Fung.* p. 218. tab. 23. f. I.K.L.

In fimetis vulgatissimus.

Perniciosus, in atramentum facilè difluit.

**BOLETUS.**

**1046. Boletus versicolor.**

Agaricus squamis iridiformibus Batarra *Fung.* t. 35.

Legi in arboribus circà *Epila*.

**1047. Boletus bobinus.**

Provenit in pratis circà *Linares*.

Edulem faciunt nonnulli. Nostrates negligunt, rectè quidem meo judicio.

**PHALLUS.**

**1048. Phallus esculentus.**

Crespillas Cienfuegos t. 3. p. 433. b.

Legi in pratis circà *Linares*, sed parciùs. Cienfuegos *Ibid.* Tienen figura oval, ò piramidal por de fuera arrugados, y llenos de diversas hebras, ò como nervios; en medio de ellas unos huequecillos, ò concavidades, que parecen un panal de miel.

**LYCOPERDON.**

**1049. Lycoperdon Tuber.**

Criadillas de tierra. Turmas de tierra Cienfuegos t. 3. p. 408.

In campestribus, apricis.

Cienfuegos *Ibid.* p. 409. b. Las mayores, que hay en Espana son en el Reyno de Murcia, despues las de Estremadura; aunque menores las de tierra de Madrid son mui gustosas. Et p. 410. En Castilla se dice un refran comun: yerva turmera dame la compañera; porque dicen que se hallan donde se crio cierta yerva, que es señal manifiesta de que alli hai turmas. Algunos dicen que es la yerva que Plinio en el l. c. llamò Tuberaria, que quieren sea la yerva llamada en latin Cistus annuus, que en Castilla llaman yerva del quadrillo, ò yerva turmera.

**1050. Lycoperdon bovista.**

Pedo de lobo.

In campestribus, & montosis non rarum. Specimen à me lectum

156

circà pagum *Perasens* caput infantis magnitudine exæquabat.

2. Varietas : superficie tuberculatâ.

*Lycoperdon album*, totum aculeatum, altiori basi donatum  
Micheli Nov. Gen. p. 217. t. 97. f. 1.

Legi circà *Tronchon*.

Pollen ad compescendas hæmorrhagias utiliter adhibetur expe-  
rimento Cl. la Fosse *Act. Par* 1762. Occulis nocet *Iour. æcon.*  
1755. *Octobre*.

1051. *Lycoperdon stellatum*.

Geaster major, umbilico fimbriato Micheli Nov. Gen. p. 220.  
t. 100. f. 1. 2. 3.

In sylvis circà *Orihuella* mihi obvium fuit.

## MUCOR.

1052. *Mucor Mucedo*.

Habitat in putridis.

1053. *Mucor glaucus*.

Provenit in pomis corruptis.

# APPENDIX.

## DIANDRIA.

### MONOGYNIA.

### JASMINUM.

1054. *Jasminum fruticans.*

*Jasminum Polemonium Monspeliensium Grislei Virid. Lusit.*

*p. 52.*

Oritur in sepibus *Cæsaraugustæ*, *en Hijar*, *Caspe*, *Alcañiz*, *en el deserto de Calanda*, ubi ad octo pedum altitudinem arborescit. Flores lutei, speciosi.

## TRIANDRIA.

### DIGYNIA.

### BROMUS.

1055. *Bromus squarrosus.*

Habitat in rupibus circà *Rodenas*.

Aristæ ætate divergunt.

## PENTANDRIA.

### MONOGYNIA.

### LYSIMACHIA.

1056. *Lysimachia linum stellatum.*

Oritur in aridis *Cæsaraugustæ* secùs viam publicam Matritensem, in collibus propè *Hijar*.

Planta in nostro solo vix pollicaris. Radix simplex, fibrosa.

Caules ramosi. Folia linearia, acuta, integerima, imbricata.

Pedunculi axilares, sparsi. Calycis laciniæ acutæ. Corolla albi-

da, calyce dimidiò brevior. Capsula globosa, quinque valvis.

Semina minuta.

## GYNANDRIA.

## DODECANDRIA.

## CYTINUS.

1057. Cytinus Hypocistis Linn. Syst. nat. p. 602.  
*Hypocistide Laguna l. t. c. 107.*  
 Legi copiosè en Tolocha.
- 
- 

## ERRATA.

- Præf. p. XIII. lin. 27. passum. . . . lege. . . . passuum.  
 Præf. p. XVI. lin. 19. impedit. . . . impedit.  
 Ibid. lin. ult. 1785. . . . . 1758.  
 Pag. 3. lin. ult. 1616. . . . . 1605.  
 Pag. 14. lin. 15. equum. . . . . equorum.  
 Pag. 39. lin. 8. peſtina. . . . . pectines.  
 Pag. 56. lin. 36. promitreret. . . . . promitteret.  
 Pag. 80. lin. 38. Antirrhinnm. . . . . Antirrhinum.  
 Pag. 93. lin. 35. sepiarum. . . . . scoparium.  
 Pag. 131. lin. ult. sapone. . . . . saponis.  
 Pag. 133. lin. 14. substituatur. . . . . substituantur

CATALOGUS STIRPIUM A SCRIP-  
toribus Botanicis memoratarum, quæ in Arago-  
niâ proveniunt; in Galliâ verò nondùm re-  
pertæ sunt.

**A** Anagallis *latifolia*.

**A** Anthyllis *Erinacea*.

Antirrhinum *viscosum*.

— *junceum*.

Artemisia *Herba alba* Gesner. Hort. p. 244.

Asparagus *aphyllus*.

Astragalus *austriacus*.

Atriplex *Halimus*.

— *glaуca*.

Brassica *vesicaria*.

Bupleurum *fruticescens*.

Carex *Halleriana* Haller Helv. n. 1385.

Chrysanthemum *Aragonense*, sivè *Chrysanthemum pallidum*,  
*minimis imisque foliis incisis, superioribus integris,*  
*& capillaribus* Barrel. Ic. 421.

Cistus *Libanotis*.

— *squamatus*.

Cochlearia *glastifolia*.

Cotula *aurea*.

Cotyledon *bispanica*.

Digitalis *obscura*.

Elymus *Caput Medusæ*.

Erica *umbellata*.

Filago *pyramidalis*.

Fumaria *enneaphylla*.

Genista *florida*.

Gypsophyla *Struthium*.

- Hieracium balsameum* Haller *Helv.* n. 36.  
*Hyacinthus serotinus.*  
*Lepidium subulatum.*  
*Lygeum Spartum.*  
*Lysimachia Otani*, sive *Ephemerum* Matthioli C. Bauh. *Pin*  
*p. 244.*  
*Malva Hispanica.*  
*Marrubium peregrinum.*  
— *Alysson.*  
*Nepeta violacea.*  
— *Nepetella.*  
*Ononis Aragonensis*, sive *Anonis Hispanica frutescens*,  
*folio rosæ sylvestris* Tournef. *Inst. p. 409.*  
*Ononis n. 676.* sivè *Anonis annua*, *erectior*, *latifolia*, *glu-*  
*tinosa*, *Lusitanica* Tournef. *Inst. p. 409.*  
*Quercus Ægilops.*  
— *Cerris.*  
*Reseda canescens.*  
*Rhamnus pumilus.*  
*Salsola vermiculata.*  
*Scorzonera Clusii n. 747.*  
*Scrophularia sambucifolia.*  
*Sherardia muralis.*  
*Silene viridiflora.*  
*Sinapis erucoides.*  
*Teucrium pyrenaicum.*  
*Thymus mastichina.*  
*Veronica tenuifolia*, sivè *Chamædrys Hispanica*, *foliis te-*  
*nuissimè divisis* C. Bauh. *Prod. p. 117.*

# INDEX GENERUM.

## A.

**A** Cer.  
Achillea.  
Aconitum.  
Acrostichum.  
Adiantum.  
Adonis.  
Ægilops.  
Agaricus.  
Agrimonia.  
Agrostemma.  
Agrostis.  
Aira.  
Alchemilla.  
Alisma.  
Allium.  
Alopecurus.  
Alsine.  
Alyssum.  
Amaranthus.  
Amimi.  
Anagallis.  
Anchusa.  
Andropogon.  
Androsace.  
Andryala.  
Anemone.  
Anethum.  
Anthemis.  
Anthericum.  
Antirrhinum.

*pag. 147.*

124.

68.

148.

149.

70.

146.

154.

58.

57.

7.

8.

17.

47.

42.

7.

39.

85.

135.

33.

23.

20.

145.

21.

112.

69.

37.

124.

44.

7.

Anthoxanthum.

Anthyllis.

Aphyllantes.

Apium.

Aquilegia.

Arabis.

Arbutus.

Arctium.

Arenaria.

Aristolochia.

Artemisia.

Arum.

Arundo.

Asclepias.

Asparagus.

Asperugo.

Asperula.

Asphodelus.

Asplenium.

Aster.

Astragalus.

Astrantia.

Athamanta.

Atractylis.

Atriplex.

Atropa.

Avena.

## B.

**B** Allotta.

Beilis.

Barbarea.

3.

97.

42.

38.

69.

87.

51.

113.

55.

131.

117.

131.

11.

30.

44.

21.

15.

43.

149.

121.

102.

32.

34.

115.

46.

26.

11.

76.

122.

Betonica	M	75.	Chærophyllo.	36.
Betula.		134.	Chara.	154.
Biscutella.		85.	Cheiranthus.	87.
Boletus.		155.	Chelidonium.	65.
Brassica.		188.	Chenopodinm.	30.
Briza.		19.	Chondrilla.	109.
Bromus.		10, 157.	Chrysanthemum.	23.
Bryonia.		139.	Chrysocoma.	106.
Bryum,		150.	Cichorium.	113.
Bunium.		134.	Cineraria.	122.
Buphtalmum.		125.	Cistus.	67.
Bupleurum.		132.	Clematis.	69.
Buxus.		134.	Clinopodium.	77.
Byssus.		154.	Clypeola.	85.
	C.		Cneorum.	4.
<b>C</b> Alendula.		127.	Cnicus.	115.
Callitriche.		1.	Cochlearia.	84.
Campanula.		24.	Colchicum.	47.
Camphorosma.		17.	Colutea.	100.
Cardamine.		85.	Conferva.	154.
Carduus.		113.	Conium.	34.
Carex.		133.	Convallaria.	44.
Carlina.		115.	Convolvulus.	23.
Carpesium.		119.	Conyza.	119.
Carthamus.		116.	Coriaria.	142.
Carum.		37.	Coris.	25.
Catananche.		112.	Cornus.	17.
Caucalis.		33.	Coronilla.	100.
Celtis.		144.	Corrigiola.	39.
Cenchrus.		146.	Corylus.	137.
Centaurea.		125.	Cotula.	124.
Cerastium.		57.	Cotyledon.	56.
			Cratægus.	61.
			Crepis.	111.

Cucubalus.	54.	Eriophorum.	5.
Cuscuta.	18.	Ervum.	99.
Cynanchum.	29.	Eryngium.	32.
Cynoglossum.	20.	Erysimum.	87.
Cynosurus.	10.	Evonymus.	28.
Cyperus.	5.	Eupatorium.	116.
Cytinus.	158.	Euphorbia.	59.
Cytisus.	100.	Euphrasia.	79.

## D.

Actylis.	9.
Daphne.	49.
Datura.	26.
Daucus.	33.
Delphinium.	68.
Dianthus.	53.
Dictamnus.	50.
Digitalis.	81.
Dipsacus.	14.
Doronicum.	122.
Draba.	183.

## E.

Chinops.	128.
Echium.	21.
Elymus.	12.
Ephedra.	144.
Epilobium.	48.
Equisetum,	148.
Erica.	48.
Erigeron.	119.
Erinus.	81.

## F.

Agus.	137.
Ferula.	34.
Festuca.	10.
Ficus	147.
Filago.	127.
Fragaria.	64.
Frankenia.	46.
Fraxinus.	147.
Fumaria.	91.

## G.

Aleopsis.	75.
Galium.	15.
Genista.	94.
Gentiana.	31.
Geranium.	89.
Geum.	65.
Gladiolus.	4.
Glechoma.	75.
Globularia.	13.
Glycyrrhiza.	100.
Gnaphalium.	118.
Gypsophyla.	162.

# H.

<b>H</b> edera.	
Hedysarum.	
Heliotropium.	
Helleborus.	
Heracleum.	
Herniaria.	
Hesperis.	
Hieracium.	
Hippocrepis.	
Holcus.	
Holosteum.	
Hordeum.	
Humulus.	
Hyacinthus.	
Hyoscyamus.	
Hyoseris.	
Hypecoum.	
Hypericum.	
Hypnum.	
Hypochoeris.	
Hyssopus.	

# J.

<b>J</b> asione.	
Jasminum.	
Iberis.	
Iex.	
Illecebrum.	
Inula.	
Iris.	
Isatis.	

	28.
	101.
	19.
	71.
	35.
	30.
	87.
	110.
	101.
	145.
	13.
	12.
	141.
	44.
	26.
	112.
	18.
	107.
	151.
	112.
	73.

Juncus.	
Jungermannia.	
Juniperus.	

# L.

<b>L</b> actuca.	
Lamium.	
Lapsana.	
Laserpitium.	
Lathyrus.	
Lavandula.	
Lavatera.	
Lemna.	
Leontodon.	
Lepidium.	
Lichen.	
Ligustrum.	
Lilium.	
Linum.	
Lithospermum.	
Lolium.	
Lonicera.	
Lotus.	
Lychnis.	
Lycium.	
Lycoperdon.	
Lycopus.	
Lycopsis.	
Lygeum.	
Lysimachia.	
Lythrum.	

# M.

<b>M</b> Alva.	
Marrubium.	
Matricaria.	
Medicago.	
Melampyrum.	
Melica.	
Melissa.	
Mentha.	
Mercurialis.	
Mespilus.	
Messersmidia.	
Micropus.	
Milium.	
Mnium.	
Momordica.	
Montia.	
Mucor.	
Myagrum.	
Myosotis.	
Myriophyllum.	

# N.

<b>N</b> Arcissus.	
Nardus.	
Nepeta.	
Nigella.	
Nymphæa.	

# O.

<b>O</b> Enanthe	

90.	Ononis.	95.
76.	Onopordum.	115.
123.	Ophioglossum.	148.
106.	Ophrys.	130.
79.	Orchis.	129.
8.	Origanum.	77.
142.	Ornithogalum.	43.
	Ornithopus.	100.
	Orobanche.	82.
78.	Orobus.	98.
74.	Osmunda.	148.
62.	Osyris.	140.
21.	Oxalis.	57.

# P

7.	<b>P</b> æonia.	68.
150.	Panicum.	6.
139.	Papaver.	66.
13.	Parietaria.	146.
156.	Paris.	50.
82.	Parnassia.	40.
19.	Passerina.	49.
335.	Pastinaca.	37.
	Peganum.	58.
	Peplis.	46.
42.	Phalaris.	6.
6.	Phallus.	155.
73.	Phillyrea.	1.
69.	Phyteuma.	25.
66.	Phleum.	7.
	Phlomis.	76.
	Physalis.	26.
	Phyteuma.	25.
	Pictis.	

Pimpinella.	37.	Rhamnus.	27.
Pinus.	138.	Rhinanthus.	79.
Pistacia.	141.	Rhus.	38.
Plantago.	16.	Ribes.	28.
Plumbago.	23.	Riccia.	151.
Poa.	8.	Rosa.	63.
Polycarpon.	13.	Rosmarinus.	3.
Polygala.	92.	Rubia.	16.
Polygonum.	49.	Rubus.	63.
Polypodium.	149.	Rumex.	46.
Polytrichum.	150.	Ruscus.	144.
Populus.	142.	Ruta.	50.
Portulaca.	58.		
Potamogeton.	18.		
Potentilla.	64.	S	
Poterium.	135.	Aagina.	19.
Prenanthes.	110.	Salicornia.	1.
Primula.	22.	Salix.	139.
Prunella.	78.	Salsola.	31.
Prunus.	61.	Salvia.	33.
Psoralea.	103.	Sambucus.	38.
Pteris.	148.	Samolus.	25.
Punica.	60.	Sanicula.	32.
Pyrola.	51.	Santolina.	116.
Pyrus.	62.	Saponaria.	52.

## Q.

**Q**Uercus.

## R.

**R**Anunculus.

37.	Rhamnus.	27.
138.	Rhinanthus.	79.
141.	Rhus.	38.
16.	Ribes.	28.
23.	Riccia.	151.
8.	Rosa.	63.
13.	Rosmarinus.	3.
92.	Rubia.	16.
49.	Rubus.	63.
149.	Rumex.	46.
150.	Ruscus.	144.
142.	Ruta.	50.
		S
64.	Aagina.	
135.	Salicornia.	
22.	Salix.	19.
78.	Salsola.	
61.	Salvia.	
103.	Sambucus.	
148.	Samolus.	
60.	Sanicula.	
51.	Santolina.	
62.	Saponaria.	
	Satureja.	
	Satyrium.	
	Saxifraga.	
	Scabiosa.	
	Scandix.	
	Scirpus.	
	Scleranthus.	
	Scolymus.	
	Scorpiurus.	
	Scorzonera.	

Scrophularia.	81.	Tanacetum.	117.
Scutellaria.	78.	Taxus.	143.
Sedum.	56.	Telephium.	39.
Selinum.	34.	Teucrium.	72.
Sempervivum.	60.	Thalictrum.	70.
Senecio.	120.	Thapsia.	37.
Serapias.	131.	Thesium.	29.
Serratula.	113.	Thlaspi.	83.
Seseli.	36.	Thymus.	77.
Sherardia.	15.	Tilia.	66.
Sideritis.	74.	Tordylium.	33.
Silene.	54.	Tomentilla.	65.
Sinapis.	88.	Tragopogon.	107.
Sison.	35.	Tribulus.	51.
Sisymbrium.	86.	Trifolium.	103.
Sium.	35.	Triglochin.	47.
Smilax.	142.	Trigonella.	106.
Solanum.	27.	Triticum.	12.
Solidago.	121.	Tulipa.	43.
Sonchus.	109.	Turritis.	87.
Sorbus.	62.	Tussilago.	120.
Sparganium.	133.	Typha.	132.
Spartium.	92.		V.
Spiræa.	63.		
Stachys.	75.	V	
Statice.	70.	Accinium.	48.
Stellaria.	54.	Valantia.	146.
Stipa.	11.	Valeriana.	4.
Symphytum.	20.	Veratrum.	144.
		Verbascum.	25.
		Verbena.	3.
		Veronica.	1.
		Viburnum.	38.
	39.	Vicia.	99.

## T.

**T** Amarix.

Taraxacum.

Viola.  
Viscum.  
Vitex.  
Vlmus.  
Vrtica.

X.

X Anthium.

128.  
140.  
82.  
31.  
134.

135.

Xeranthemum.

Z.

Z Annichellia.

113.

132.

# NOMINA HISPANICA , ET VERNACULA

## Aragonie.

Numeri non paginarum, sed stirpium seriem indicant.

### A.

<i>Ababol.</i>	num. 458.	<i>Alpiste.</i>	43.
<i>Abrojos.</i>	352, 870.	<i>Alquitira</i>	716.
<i>Acebo.</i>	141.	<i>Alyso.</i>	923.
<i>Acedera.</i>	328, 329.	<i>Amapolas.</i>	458.
<i>Acere.</i>	985.	<i>Amargon.</i>	760.
<i>Achicorias amargas.</i>	780.	<i>Amor de hortelano.</i>	121.
<i>— dulces.</i>	757.	<i>Aneas.</i>	910.
<i>Agracillos.</i>	322.	<i>Añil.</i>	630.
<i>Agrimonia.</i>	404.	<i>Apio borde.</i>	271.
<i>Ajo de culebra.</i>	300.	<i>Arañones.</i>	426.
<i>Ala.</i>	834.	<i>Arbeja.</i>	680.
<i>Alamo blanco.</i>	690.	<i>Arbol del paraiso.</i>	3.
<i>— negro.</i>	961.	<i>Arnacho.</i>	611.
<i>Albabaca de monte.</i>	542.	<i>Aro.</i>	904.
<i>Albardin.</i>	42.	<i>Arsolla.</i>	863.
<i>Albobil.</i>	323.	<i>Artos.</i>	198.
<i>Alborocera.</i>	353.	<i>Asnallo.</i>	611.
<i>Alcaravea.</i>	269.	<i>Avellano.</i>	940.
<i>Alcarceña.</i>	682.	<i>Aulaga.</i>	661.
<i>Alcornoque.</i>	934.	<i>Axedrea.</i>	509, 541.
<i>Alfalfa.</i>	736.	<i>Axenuz.</i>	480.
<i>Algårroba.</i>	691.	<i>Axenjos.</i>	812.
<i>Alharma.</i>	401.		
<i>Alheña.</i>	3.	<h3>B.</h3>	
<i>Alholvas.</i>	735.	<i>Ballico.</i>	88.
<i>Alhucema.</i>	514.	<i>Ballueca.</i>	88.
<i>Almez.</i>	670.	<i>Balsamina.</i>	22.

<i>Belesa.</i>	171.	<i>Carrizo.</i>	93.
<i>Berberos.</i>	322.	<i>Cebollada.</i>	104. 306.
<i>Berrcos.</i>	605.	<i>Cedacillo.</i>	73.
<i>Betonica.</i>	528.	<i>Celidonia mayor.</i>	453.
<i>Bien granada.</i>	223.	<i>—menor.</i>	490.
<i>Bistorta.</i>	344.	<i>Centaurea.</i>	230, 232.
<i>Bledos.</i>	929.	<i>Cerezo.</i>	424, 426.
<i>Bocha.</i>	104.	<i>Cerrajas.</i>	752.
<i>Bonetero.</i>	204.	<i>Cevadilla.</i>	857.
<i>Box.</i>	924.	<i>Chirivia.</i>	267.
<i>Brezo.</i>	339.	<i>Chitan.</i>	350.
<i>Brusco.</i>	969.	<i>Chopo.</i>	961.
<i>Buglosa.</i>	154.	<i>Chordones.</i>	438.
<i>Bulbocastaña.</i>	246.	<i>Cicuta.</i>	247.

## C.

<i>Cadillo.</i>	243.	<i>Cogombrillo.</i>	944.
<i>Cagarrrias.</i>	1044.	<i>Colchico.</i>	332.
<i>Cambronera.</i>	198.	<i>Collejas.</i>	372.
<i>Camedreos.</i>	505.	<i>Consuelda.</i>	157.
<i>Camomila.</i>	849.	<i>Corazoncillo.</i>	740.
<i>Caña.</i>	92.	<i>Cornicabra.</i>	955.
<i>Cañabeja.</i>	247, 251.	<i>Corona de Rey.</i>	718.
<i>Canchilagua.</i>	290.	<i>Correguela.</i>	172.
<i>Candilera.</i>	536.	<i>Coscojo.</i>	935.
<i>Cantilagua.</i>	290.	<i>Crespillas.</i>	1048.
<i>Cantueso.</i>	515.	<i>Criadillas de tierra.</i>	1049.
<i>Carchesia.</i>	662.	<i>Cruciata.</i>	229.
<i>Cardencha.</i>	107.	<i>Cuchara de pastor.</i>	867.
<i>Cardillos.</i>	782.	<i>Culantrillo.</i>	1003.
<i>Cardo corredor.</i>	233.		
<i>—de burro.</i>	788.		
<i>Carrasca.</i>	933.		
<i>Carratillas.</i>	728.	<i>Detiene huei.</i>	667.

## D.

<i>Doradilla.</i>	995.	<i>Fresno.</i>	986.
<i>Dormideras.</i>	454.		
<i>Durillo.</i>	273.		

## G.

		<i>Gamarza.</i>	401.
		<i>Gámones.</i>	307.
		<i>Gatera.</i>	511.
		<i>Gayomba.</i>	658.
		<i>Gayubas.</i>	354.
		<i>Germandrina.</i>	505.
		<i>Ginesta.</i> 657, 658, 659, 660, 663.	657, 658, 659, 660,
		<i>Gordolobo.</i>	187.
		<i>Gramia.</i>	99.
		<i>— del Parnaso.</i>	282.
		<i>Granado.</i>	422.
		<i>Granèvano.</i>	716.
		<i>Gualda.</i>	405.

## H.

		<i>Haya.</i>	939.
		<i>Helecho.</i>	993.
		<i>Herbada.</i>	361.
		<i>Higuera.</i>	987.
		<i>Hiniesta.</i>	657.
		<i>Hinojo.</i>	268.
		<i>Hipocistide.</i>	1057.
		<i>Hombrecillos.</i>	957.
		<i>Hongos.</i>	1043.
		<i>Hysopo.</i>	510.

## F.

<i>Farfallas.</i>	750.
<i>Fresas.</i>	141.

## J.

*Facinto*

<i>Funcio.</i>	33.	<i>Mielga.</i>	736.
<i>Junco.</i>	316.	<i>Mil en grana.</i>	217.
<i>Funquillo.</i>	293.	<i>—en rama.</i>	855.
<b>L.</b>		<i>Mimbre.</i>	990.
<i>Lampazo.</i>	783.	<i>Mostajo.</i>	427.
<i>Lechecino.</i>	752.	<i>Mostaza.</i>	628.
<i>Leche de gallina,</i>	305.	<i>Murages.</i>	169.
<i>Lechetrezna.</i>	415.	<i>Musgo.</i>	1009.
<i>Lengua cervtna.</i>	994.	<b>N.</b>	
<i>—de perro.</i>	155.	<i>Neguilla.</i>	479, 480.
<i>—de serpiente.</i>	990.	<i>Nuezza.</i>	945, 958.
<i>Lentisco.</i>	956.	<b>O.</b>	
<i>Liga.</i>	954.	<i>Olibarda.</i>	819.
<i>Lino.</i>	285, 287, 289.	<i>Olivillo.</i>	4.
<i>Lithospermo.</i>	150.	<i>Olmo.</i>	228.
<i>Llanten.</i>	126.	<i>Ontina.</i>	810.
<i>Lodoño.</i>	970.	<i>Oregano.</i>	539.
<b>M.</b>		<i>Orejas de monge.</i>	388.
<i>Madreselva.</i>	183.	<i>Oropesa.</i>	23.
<i>Madroño.</i>	353.	<i>Orozuz.</i>	699.
<i>Malva.</i>	645.	<i>Ortiga.</i>	925, 926.
<i>Malvavisco.</i>	641.	<b>P.</b>	
<i>Manzanilla.</i>	849, 851.	<i>Padrastros.</i>	521.
<i>Manzano.</i>	433.	<i>Pajarilla,</i>	478.
<i>Margarita.</i>	840.	<i>Palo dulce.</i>	699.
<i>Marojo.</i>	937.	<i>Palo mesto, ò de Bañon.</i>	202.
<i>Marrubio.</i>	532, 535.	<i>Palomilla.</i>	652.
<i>Mastranzo.</i>	519, 521.	<i>Pamplina.</i>	139.
<i>Mastuerzo.</i>	584, 585.	<i>Pedo de lobo.</i>	1050.
<i>Mata.</i>	956.	<i>Peonia.</i>	475.
<i>Matapollo.</i>	343.	<i>Rie de leon.</i>	136.
<i>Mea perros.</i>	224.	<i>Pimpinela.</i>	922.
<i>Mennigia.</i>	962.		

<i>Pinillo.</i>	500.	<i>Siete en rama.</i>	449.
<i>Pino.</i>	941, 942.	<i>Sisallo.</i>	226.
<i>Poleo.</i>	523.	<i>Sosa.</i>	981.
<i>Polipodio.</i>	999.		
<i>Puerros.</i>	295.		

## Q.

<i>Quaxa leche.</i>	119.
---------------------	------

## R.

<i>Rebollo.</i>	938.
<i>Regaliz, ó Regalicia.</i>	699.
<i>Retama.</i>	657.
<i>Roble.</i>	936.
<i>Romaza.</i>	325.
<i>Romero.</i>	19.
<i>Roya.</i>	124.
<i>Rubia.</i>	124.
<i>Ruda.</i>	351.

## S.

<i>Sabina.</i>	966.	<i>Valeriana.</i>	28.
<i>Sabuco.</i>	276.	<i>Vasillos.</i>	388.
<i>Salgada.</i>	981.	<i>Veleño.</i>	192.
<i>Salobre.</i>	981.	<i>Verbena.</i>	17.
<i>Salvia.</i>	20.	<i>Verdegambre.</i>	971.
<i>Sanguinaria.</i>	209.	<i>Verdoiagas.</i>	402.
<i>Sanicula.</i>	234.	<i>Veronica.</i>	6.
<i>Sauce.</i>	952.	<i>Vexiga de perro.</i>	195.
<i>Sauzgatillo.</i>	577.	<i>Vidarría.</i>	957.
<i>Serpol.</i>	540.	<i>Violetas.</i>	881.
<i>Serrones.</i>	220.	<i>Umbilico de Venus.</i>	388.
<i>Serval..</i>	430.	<i>Uvas de gato.</i>	392.
<i>Siempreviva.</i>	302.	<i>Xabonera.</i>	361.

## T.

<i>Tamariz.</i>	277.
<i>Taray.</i>	277.
<i>Tejo.</i>	967.
<i>Tilo.</i>	460.
<i>Tobas.</i>	795.
<i>Tomillo.</i>	541.
<i>Tornasol.</i>	146.
<i>Torongil.</i>	544.
<i>Trebol real oloroso.</i>	718.
— <i>de prados.</i>	723, 730.
<i>Tuca.</i>	945.

## V.

<i>Valeriana.</i>	28.
<i>Vasillos.</i>	388.
<i>Veleño.</i>	192.
<i>Verbena.</i>	17.
<i>Verdegambre.</i>	971.
<i>Verdoiagas.</i>	402.
<i>Veronica.</i>	6.
<i>Vexiga de perro.</i>	195.
<i>Vidarría.</i>	957.
<i>Violetas.</i>	881.
<i>Umbilico de Venus.</i>	388.
<i>Uvas de gato.</i>	392.

## X.

<i>Xabonera.</i>	361.
------------------	------

**Y.**

<i>Yedra.</i>	207.
<i>Yedra campana.</i>	173.
<i>Yedra terrestre.</i>	524.
<i>Yerva cana.</i>	824.
<i>Yerva del ballestero.</i>	971.
— del pico.	703.
— de pardioseros.	482.
— de Santa Maria.	806.
— estrella.	131.

**lombriguera.****mora.****tora.****Yezgos.****Z.**

<i>Zanahoria.</i>	244.
<i>Zaragatona.</i>	132.
<i>Zarzamora.</i>	440.
<i>Zarzaparrilla.</i>	959.
<i>Zumaque.</i>	272.



