

» 14. *HYPNUM* (CUPRESSINA) *COMPRESSULUM* Nob. — Caule erecto, biunciali, compresso pallide rufescente nitido, ramis clavato-acuminatis; foliis longe ovato-elongatis longe cuspidatis parce falcatis concaviusculis, ecostatis, vix denticulatis, cellulis linearibus nodulo obscuro papillam simulante clausis, basilaribus ad angulos quadratis majoribus fuscis. — *H. Cupressiformi* affine, sed cellulis subpapillosis differt.

» Stérile. G. de l'Isle.

» 15. *SPHAGNUM* *LACTEOLUM* Nob. — Cespites compacti profundi rigidi solidiusculi albicantes, ramulis fasciculatis 1-2 erecto-patentibus obtusis, ramulis deflexis 2-3 cauli adpressis. Cortex caulinus e duplici, rarius triplici strato cellularum inanum formatus, cellulis corticalibus ramorum lageniformibus. Folia caulina patenti-recurva ovata subrotunda basi late marginata, cellulis superioribus fibrosis porosisque; folia ramorum erectorum cucullata obtusa subdentato-erosa, cellulis fibrosis valde porosis, folia perichætalia solida longius ovato-lanceolata, medio latius marginata, cellulis superioribus fibrosis, inferioribus porosis subtiliter fibrosis. Capsula immersa magna. — *S. compacto* var. *rigido* Nees (*S. rigido* Sch.), simile, sed cortice, foliis cauliniis ovatis longioribus obtusis apice erosus et cellulis fibrosis et porosis præditis differt; habitu *S. cymbifolio* affine. G. de l'Isle. »

BOTANIQUE. — *Liste des Lichens recueillis par M. G. de l'Isle, aux îles Saint-Paul et d'Amsterdam, et description des espèces nouvelles; par M. NYLANDER.*

(Renvoi à la Commission nommée pour les documents scientifiques rapportés par les missions pour l'observation du passage de Vénus.)

Lichens de l'île Saint-Paul.

« 1. *PARMELIA PRÆPERLATA*, *n. sp.* — Similis fere *P. perlatae* (sorediatæ), sed jam differens spermatiis longioribus. — Sur les rochers.

» 2. *PARMELIA CONFLUENS*, *n. sp.* — Thallus albus adnatus, confluenti laciniatus, laciniis subimbricatis parum sinuato-incisis, centro sorediosus, subtus niger; apothecia fere mediocria, margine receptaculari soredioso; sporæ submediocres. Species e stirpe *Parmeliæ lævigatae*. Thallus *K* addito *Ca Cl* leviter intus erythrinose tinctus. — Sur les rochers, avec précédent.

» 3. *PHYSICIA PARIETINA* f. *AUREOLA* (Ach.). — Sur dolérite, abondant près de la mer.

» 4. *PHYSICIA PICTA* (Sw.), saxicola. — Sur les rochers; stérile.

» 5. *LECANORA FULGESCENS*, *n. sp.* — Similis *Lecanoræ aurantiacæ erythrellæ* Ach., sed thallo vix areolato-rimuloso et sporis minoribus. — Abonde sur les rochers.

» 6. *LECANORA MILVINA* (Whlbn.). — Sur dolérite.

» 7. *LECANORA SUBSULPHURATA*, *n. sp.* — Subsimilis *Lecanoræ sulphuratae* (Ach.), a qua differt præcipue thallo rugoso-subleproso tenuiore, *Ca Cl* non reagente; etiam epithecium *Ca Cl* non mutatum. — Sur dolérite.

» 8. *URCEOLARIA DEUTERIA*, *n. sp.* — Satis similis *Urceolarie actinostomæ* (Pers.) et vix aliter differens quam reactione *Ca Cl* nulla. — Sur dolérite.

» 9. *LECIDEA PARASEMOPS*, *n. sp.* — Thallus albus tenuis rimosus; apothecia nigra plana marginata; sporæ fusco-nigræ biloculares, epithecium et hypothecium nigra. Thallus *K* non reagens. Spermatia arcuata. — Sur dolérite avec le suivant.



Nylander, William. 1875. "Liste des lichens recueillis par M. G. de l'Isle aux Saint-Paul et d'Amsterdam et description des espèces nouvelles." *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences* 81, 725–726.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/24528>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/246748>

Holding Institution

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Sponsored by

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.