

# *Alstroemeria crispata*

Phil.

» R.A. Philippi, Linnaea 29: 70. 1858. TIPO: [Chile] In editissimis Andibus ad Huanta legit Cl. Gay 431, 1836 (Holotipo: SGO 47003).

**Nombre común:** *Alstroemeria* de hojas crespas; lirio del campo, lirio, *alstroemeria* (Hoffmann *et al.* 2015).

**Descripción:** Hierbas perennes, con rizomas, de 3,5 a 25 cm de alto. Hojas sésiles, carnosas, lanceoladas, no resupinadas, papilosas, glaucas, glabras, con márgenes notoriamente ondulados, de 3,5-4,5 cm de largo por 0,5-0,8 cm de ancho. Inflorescencia en umbela densa, apretada, con 5-15 rayos bifloros. Flores con los tépalos revolutos, los externos de color rosado intenso o pálido, obovado-redondeados, con un mucrón ancho, de 1,5-2,5 cm de largo; tépalos internos superiores más angostos que los externos, lanceolados, provistos de una franja amarilla en el tercio medio y manchas purpúreas; tépalo interno inferior más corto y sin patrón de manchas. Cápsula globosa de 6-8 mm de diámetro. Semillas de color café claro.

**Fenología:** Florece entre octubre y diciembre y el fruto madura entre diciembre y enero (Hoffmann *et al.* 2015).

**Origen:** Endémica de Chile.

**Distribución geográfica:** Se distribuye en las regiones de Atacama y Coquimbo, desde Alto del Carmen (28°58'S) y Los Andes, camino a Portillo (32°51'S), entre 1.000 y 3.000 m s.n.m.

**Estado de conservación:** Vulnerable (Hoffmann *et al.* 2015; Squeo *et al.* 2008).

