



Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret

TAXONOMIA

Família Botânica: Arecaceae
Gênero: *Astrocaryum*
Nome popular: Iri, Brejaúva



ECOLOGIA

- *Estágio Sucessional*: Pioneira
- *Síndrome de dispersão*: Zoocórica
- *Perenidade das folhas*: Perenifólia
- *Crescimento*: Moderado a lento
- *Densidade de copa*: Baixa
- *Floração*: Março a junho (ES)
- *Solo e ambientação*: Ocorre em terrenos muito declivosos e planos, solos secos e úmidos, de textura variando de arenoso a franco-argilo-arenoso. Prefere áreas de meia-sombra e úmidos.

UTILIDADES

- *Uso Madeireiro*: Moirão de cerca, Construção civil.
- *Alimentação humana*: Palmito comestível.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

- *Nordeste*: BA
- *Sudeste*: RJ, MG, SP, ES
- *Sul*: PR, SC
- *Bioma*: Mata atlântica (Floresta Ombrófila)

Adaptado da Lista de Espécies da Flora do Brasil



REFERÊNCIAS

- CARVALHO, F. A.; NASCIMENTO, M. T.; BRAGA, J. M. A.; Composição e riqueza florística do componente arbóreo da Floresta Atlântica submontana na região de Imbaú, Município de Silva Jardim, RJ. **Acta Botânica Brasilica**. n.20, v.3, p.727-740. 2006.
- PINTO SOBRINHO, F.A. **Conhecimento etnobotânico de mateiros residentes no entorno de Unidades de Conservação no estado do Rio de Janeiro**. 2007. 73f. Dissertação (Mestrado em Botânica) - Escola Nacional de Botânica Tropical, Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
- LIMA, A. L.; SOARES, J.J.; Aspectos florísticos e ecológicos de palmeira (Arecaceae) da Reserva biológica de Duas Bocas, Cariacica, Espírito Santo. **Boletim Museu Biológico Mello Leitão** (N. série) 16. 2003