



Skupina			
Deblo:	Basidiomycotina	Red:	Agaricales
Razred:	Agaricomycetes	Družina:	Agaricaceae
Podrazred:	Agaricomycetideae	Rod:	Agaricus
		Pod-rod:	Flavescens
		Sekcija:	Arvenses
		Pod-sekcija:	Arvensis

Latinsko ime:

Agaricus arvensis Schaeff. 1774

syn.: Agaricus leucotrichus (F.H. Møller) F.H. Møller 1952, Psalliota arvensis (Schaeff.) Gillet 1878, Agaricus exquisitus Vittad. 1835, Agaricus fissuratus (F.H. Møller) F.H. Møller 1952

Slovensko ime:

Poljski kukmak

Saprofit | Način rasti
NE | Zaščitena

Klobuk: 8-15 (18) cm v premeru, zvonaste oblike, kasneje kegljaste, gladke površine brez lusk, bele barve, kasneje rumene barve.

Trosovnica: ozki gosti lističi, najprej beli nato rožnati, kasneje temno rjavi.

Trosni prah: vijoličasto rjavi

Trosi: elipsasti, 6,3-7,7 × 4,4-5,3 μm.

Bet: 8-15 (18) cm bel ali rumen, valjast, votel, lomljiv, v spodnjem delu kijasto odebeljen. Dvojno zastiralo bele ali rumenkaste barve, spodnje na robu natrgano in debelejše, zgornje tanjše.

Meso: belo, pod kožo rumenkasto. Diši po janežu, okus po orehah.



Rastišče: v manjših skupinah, raste na svetlih jasad, travnikih, pašnikih, pognojenih poljih. Pogosto ob robu iglastih gozdov. Raste od junija do oktobra.

Užitnost: zelo dobra užitna goba.

Opombe: možnost zamenjave z Agaricus silvicola ki ima manjše trose, Agaricus xanthoderma, ki diši po karbolu in je strupen.

Čas rasti			
JAN	FEB	MAR	APR
MAJ	JUN	JUL	AVG
SEP	OKT	NOV	DEC

Značilnosti




Velikost od 5 - 15 cm



Trosovnica - lističi

Trosni prah - vijoličasto rjava



Skupina			
Deblo:	Basidiomycotina	Red:	Agaricales
Razred:	Agaricomycetes	Družina:	Agaricaceae
Podrazred:	Agaricomycetideae	Rod:	Agaricus
Pod-rod:	Rubescentes	Sekcija:	Sanguinolenti
		Pod-sekcija:	Fusco-fibrillosus

Latinsko ime:

Agaricus bohusii Bon 1983

syn.: Agaricus caespitipes Hlaváček 1982, Agaricus elvensis Berk. & Br. ss. Cooke, Psalliota elvensis

Slovensko ime:

Šopasti kukmak

Saprofit | Način rasti
NE | Zaščitena

Klobuk: 5-15 cm v premeru, pol zaokrožen, nato sploščen, svetlo rjav, prekrit z rjavimi luskami.

Trosovnica: rožnata, kasneje porjavi, vidno rjavo zakrneli obročki, zastiralo rožnate barve.

Trosni prah: vijoličasto rjavi

Trosi: ovalni s kapljico, 4,5-6 × 3,5-5 µm

Bet: 10-25 × 0,6-3 cm, belkasto rožnat, svilnat, porjavi na pritisk, raste v šopih.


Meso: belo, prijetnega vonja in okusa.

Rastišče: raste v listnatih gozdovih v šopih, v zemlji z veliko vlage. Pogost. Od poletja do jeseni.

Užitnost: užitna


Čas rasti			
JAN	FEB	MAR	APR
MAJ	JUN	JUL	AVG
SEP	OKT	NOV	DEC

Značilnosti



Oblika - s klobukom in betom

Bet - z obročkom




Velikost od 5 - 15 cm



Trosovnica - lističi



Trosni prah - vijoličasto rjava





Skupina			
Deblo:	Basidiomycotina	Red:	Agaricales
Razred:	Agaricomycetes	Družina:	Agaricaceae
Podrazred:	Agaricomycetideae	Rod:	Agaricus
Pod-rod:	Flavescens	Sekcija:	Arvenses
		Pod-sekcija:	Sylvicola

Latinsko ime:

Agaricus essettei Bon 1983

syn.: Psalliota abruptibulba Peck. ss.auct europ., Agaricus abruptibulbus Peck ss.auct europ.

Slovensko ime:

Odsekani kukmak

Saprofit | Način rasti
NE | Zaščitena

Klobuk: 6-12 cm v premeru, izbočen in prekrit s svilnato kožico bele barve, ki porumeni na dotik, gladek, proti robu včasih luskinast.

Trosovnica: ozki gosti lističi, različno dolgi, sprva beli, kasneje postanejo rožnati, naposled temno rjavi, pri mladi gobi prekriti s tankim zastiralom.

Trosni prah: temno rjav.

Trosi: elipsasti, $6,4-7,9 \times 4,5-5,2 \mu\text{m}$

Bet: 8-12 \times 1-2 cm, tanek, bel valjast, v spodnjem delu kroglasto odebeljen, z ravno spodnjo ploskvijo, v notranjosti kmalu votel, v gornjem delu gladek s tankim belim zastiralom, spodnji del je nakosmičen.

Meso: nežno, belo v tanki plasti, prijetnega blagega okusa, diši po janežu.

Rastišče: največ v smrekovih in mešanih gozdovih, raste v skupinah, pri nas precej pogosta goba. Od poletja do jeseni.

Užitnost: užitna goba

Opombe: možnost zamenjave z Agaricus xanthoderma, ki je strupena in prav tako bele barve.


Čas rasti			
JAN	FEB	MAR	APR
MAJ	JUN	JUL	AVG
SEP	OKT	NOV	DEC

Značilnosti



Oblika - s klobukom in betom

Bet - z obročkoma



Velikost od 5 - 15 cm



Trosovnica - lističi



Trosni prah - vijoličasto rjava

