

**SCHEDA N° 0310**

**ORDINE Agaricales**

<b>GENERE</b> <i>Hebeloma</i>	<b>SPECIE</b> <i>H. crustuliniforme</i>	<b>AUTORE</b> (Bull.) Quéf.	
<b>DATA DI RACCOLTA</b> 08/11/2021	<b>LUOGO DI RACC.</b> Cà Marcello Levada	<b>COMUNE</b> Piombino Dese	<b>PROV.</b> PD
<b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 25	<b>I.G.M.</b> IV 127	<b>RACCOGLITORE</b> Dino G. Cerantola - Flavio F. Pinton	

**HABITAT:**

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<b>BOSCO DI:</b> PLANIZIALE DI LATIFGLIE VARIE		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:** boschetto con latifoglie varie prevalenza *Carpinus*

**NOTE:** 2 stazioni di crescita gregaria tra i fogliame sotto *Carpinus* di notevoli dimensioni

**MICROSCOPIA:** Spore amigdaliformi, un po' panciute, nettamente verrucose, 11,0-13,2 X 5,8-6,um

**BIBLIOGRAFIA:** Funghi d'Italia Zanichelli pag. 354 al n°977 - Funghi d'Italia AMB vol.1 pag. 158

**DETERMINATORE** Dino Cerantola - Flavio Pinton

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**  FRESCHI  SECCHI



**H. CRUSTULINIFORME GAMBO E IMENIO**



**HEBELOMA CRUSTULINIFORME**



**H. CRUSTULINIFORME CAPPELLO**



**HEBELOMA CRUSTULINIFORME**

## DESCRIZIONE

### **Hebeloma crustuliniforme**

**Ordine:** Agaricales  
**Famiglia:** Hymenogastraceae  
**Genere:** Hebeloma  
**Specie:** H. crustuliniforme

**Sezione:** >> Hebeloma [= sez. Indusiata (Fr.) Sacc.] (incl. Sez. Scabrispora Romagn.) - Basidiomi con velo generale o parziale cortiniforme, ± consistenti o fugaci nei giovani; spore ellissoidali, ovoidi, amigdaliformi ± verrucose.

**Sinonimi:** Agaricus crustuliniformis Bull., Herb. Fr. (Paris) 7: tab. 308 (1787)  
Agaricus crustuliniformis f. inodora Britzelm., Botan. Centralbl. 68(5): 111 (1896)  
Agaricus crustuliniformis var. minor Cooke, Ill. Brit. Fung. (London) 3: pl. 414 (457) (1886)  
Agaricus diffractus Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 182 (1838) [1836-1838]  
Agaricus elatus var. longicaudus (Pers.) Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 3: 171 (1828)  
Agaricus longicaudus Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 332 (1801)  
Agaricus longicaudus Wasser, Nov. sist. Niz. Rast. 13: 218 (197)

**Cappello:** 3-10 cm; dapprima emisferico-campanulato, poi convesso, ± umbonato, margine talvolta ondulato; superficie glabra, vischiosa a tempo umido, ocrea-argilla pallido, non uniforme, talvolta con chiazze più scure brune e biancastro verso il margine.

**Lamelle:** fitte, smarginate, essudanti goccioline acquose in gioventù (anche all'apice dello stipite), pallide, poi brunastre ± maculate di scuro.

**Carne:** biancastra, con odore rafanoide molto intenso, sapore amaro.

**Gambo:** 4-8 x 0,5-1,5 cm; cilindrico, ingrossato alla base, biancastro, fioccoso soprattutto all'apice, imbrunite con l'età e alla manipolazione.

**Spore:** amigdaliformi, un po' panciute, nettamente verrucose, 11,0- 13,2 X 5,8-6,6 um, brune al microscopio. Cheilocistidi clavati-capitati o pedicellati. Caulocistidi identici o subcilindrici.

**Habitat:** estate-autunno; isolato o gregario, ubiquitario, in boschi di latifoglie e di conifere, piuttosto comune.

Autore della scheda: Flavio Franco Pinton Cds. gmc.

Autore delle foto: Dino G. Cerantola Cds. gmc.