



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.


Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.



* 31. K. H.

MENTEM ALIT ET EXCOLIT



K. K. HOFBIBLIOTHEK
ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

* 31. K. 11



FLORA
CRYPTOGAMICA
GERMANIAE.

AUCTORE
FRED. GUIL. WALLROTHIO,

*Medicinae et Chirurgiae Doctore, circuli Northusani
Physico regio, Academiae Leopold. Carol. Natur.
Curios., Societ. Natur. Curios. Berolinensis, Tur-
icensis, Wetteravicae, Lipsiensis, Halensis, Societat.
bot. reg. Bavar. Ratisbon., oeconomiae Potsdamens.
et pharmaceuticæ Germaniae borealis sodali.*

PARS POSTERIOR,

CONTINENS

ALGAS ET FUNGOS.

NORIMBERGAE,

SONTIBUS J. L. SCHRAGII.

1833.

COMPENDIUM
FLORAE GERMANICAЕ.

SECTIO II.

PLANTAE CRYPTOGAMICAE S. CELLULOSAE.

SCRIPSEBUNT

MATH. JOS. BLUFF
ET
CAROL. ANT. FINGERHUTH.

TOMUS IV.

NORIMBERGAE,
SUMTIBUS J. L. SCRAG.
1833.

* 31 K M



PRAEFATIO.

Alteram, quam nunc D. O. M. auctore,
botanophilis offero Florae cryptogamicae meae
partem, *Algarum* et *Fungorum* patruorum
enumerationem succinctam amplexuram, si-
mili, quam priorem eaque plane absolvere
studui mente, ut praeter paucas mihi igno-
tas, sub auctorum s. inventorum, sigillatim
praenotatorum fide indicatas, solum fere ex-
ploratas mihi satisque perspectas describerem,
reliquas autem minus certas, neandum ad tru-
tinam vocatas interim reticerem aliisque re-
linquerem. Divitem prorsus specierum ex-
utraque classe dubiarum, tum ab aliis, tum
a me ipso dudum lectarum messem sicco
transiens pede, continuatae potius commen-
datam volui indagini, quam praecocem sine
haesitatione promulgare, ne systema inqui-
linis his, ut ita dicam, ephemeric obrnatur

vel obscuratur. Morphoseos enim et metamorphoseos rationes, tum ad ordinem systematicum construendum, tum ad stirpium valorem et dignitatem muniendam et reconciliandam, gravissimae, quas quidem in classium praecedentium quadriga interpretanda eruimus ducesque habuimus et auctrices, in his sive parum modo, sive plane non elucescere videntur classibus ratamque in minimis saltem iisque tum ortu, tum vegetatione abstrusis organismis cognitionem dirimunt omnino vel redargunt.

Ex hac potissimum ratione *Algarum* distributio systematica, mancis illis generum characteribus innixa, vilis ac rimosus haud aliter ac per studium, sive ad ripas denuo expertum, sive in recessu litorali institutum, e contemptibus tandem exibit, et qualiacunque sint de systemate suffragia irridebit.

Neque aliter est cum illis Phytozoorum generibus, a plurimis auctoribus *Algarum* classi adscriptis, quae quamvis absone, ne a tironibus desiderentur, *Hygrophytozoorum* titulo nostris post *Algas* inserui et seorsim corollarii loco enumeravi.

Litigarunt mecum inscii scriptores et linguae graecae ἀναλογοθέτοι de terminis graecis, partim a me primum ad prisorum auctoritatem in memoriam vocatis, partim fictis et ad partium, a me primum interpretatarum significationem promulgandam in hoc et aliis operibus adhibitis; litem novam alii de generum antiquitus jam inclarescentium, *Erysibes* dico, *Ceraunii* et *Aschiī* notione, ipsis auctoribus redditā nunc contestentur, ut per errorem me lapsū vcl adsiduum sciam Naturae interpretem. Veterum auctoritas ubique et in his rerum herbariarum titulis, cynosura!

Indicem partis posterioris cum priore parentem scripsi quidem, speciebus synonymis vero omissis generibusque solum receptis, typis commisi, ne voluminis moles nimis augeatur.

Specierum denique numero, aliorum in diversis patriae tractibus divitias colligentium et observantium adminiculis mutuoque in hac literarum Thule exemplorum commercio destitutus, vix volui superbire, persuasissimum habens, ex continuato horum vegetabilium studio, tum aliis, tum mihi ipsi, sive

novas plane quotidie elucescere, sive jam
notas civitatem inter patruas exposcere. Quod
ut prospere succedat vegetabiliumque aga-
morum enumerationem, qualem nunc, pro-
aliis, ut assolet, symbolam impertio, novis
optimisque perficiatur augmentis; vota facio,
cumque die ditiorem numerum et perfectius
auguror patruarum stirpium examen, ad
quod illustrandum et amplificandum, si vires
supersunt et officiorum, quibus sepelior, tur-
bae permittunt, industriae nervos masculos
intentumque spondeo laborem.

Ex museo meo Northusano, Decbr. 12. 1832.

Fr. Wallroth.

CLAVIS SYSTEMATICA.

VEGETABILIUM AGAMORUM.

Classis V. ALGAE s. PHYKEA.

Ordo I. Myxophycea W. Physenmata lubrica inctilenta physinges inconditas praestantia, s. distincta filamentosa, spermatidiis varie digestis, nonnisi emeras penicillata, clonariis destituta.

- A. myxophysalides*, physing. amorphis saepius, s. magis figuratis, sine tegmine coactis muculentis.
81. *Coccochloris* Spr. Physinx globosa impalpabilis ex spermatidiis globosis coacta.
88. *Sphaerozyga* Ag. Physinx stratosa ex spermatidiis globosis concatenatis coacta.
89. *Tetraspora* Ag. Physinx bullosa ex spermatidiis quaternatim dispositis coacta.
90. *Corynephora* Ag. Physinx bullato - subglobosa ex spermatidiis clavatis coacta.
91. *Nodularia* Mert. Physinx subglobosa ex physeumatis, nodis geniculiformibus interceptis coacta.
92. *Rivularia* Roth. Physinx subglobosa ex physematis, continuis, globulo insidentibus, a centro radiantibus coacta.

*

93. *Chaetophora Ag.* Physinx globosa ex physeumatis bacillaribus articulatis, e basi communis radiantibus coacta.
94. *Hydrurus Ag.* Physinx frondosa ex physetumatis hyalinis, spermatidia elliptica seriata continentibus coacta.
95. *Hydrocoryne Schwb.* Physinx clavata subspongiosa, ex physeumatis tenerimis coacta.
B. myxonemata, physeum. continua transversim striatis, sive in strata placentaria confluentibus, sive distinctis, ex spermatidiis emersis vestitis.
96. *Oscillaria Bosc.* Physeumata continua transversim striata, oscillantia, in stratum placentare digesta.
97. *Hygrocrocis Ag.* Physeumata hyalina moniliformis in membranulam amorpham coeuntia.
98. *Leptomitus Ag.* Physeumata tenerima obsolete striata libera, e basi adnata fluitantia.
99. *Draparnaldia Bory.* Physeumata subramosum obsolete geniculatum, ex verticillis proliferum.
100. *Batrachospermum Roth.* Physeum filare insiticio-geniculatum, primum filis moniliformibus, deinde spermatidiis pyriformibus emersis instructum.
101. *Chordaria Ag.* Physeum funiculare, spermatidiis ionatis disseptum, s. filis emersis mucosis penicillatum.
- Ordo II. Dermatophycea W.** Physeumata filaria, nunc colluviem membranula exceptam infarcientia, nunc distincta eaque continua, articulis intercepta, conjugatave, varia, praeter condylia gemmacea, spermatidiis interaneis diffusis, s. ad intervalla annularia s. fasciata comparsia foeta, clonariis destituta.
A. dermatophysinges, spermatidiis globosis s. moniformibus, tunica hyalina exceptis.
102. *Nostoc Ag.* Physiox subglobosa tunicata, spermatidiis moniliformibus farcta.
B. dermatonemata, physeumatis fistulosis distinctis, articulatis, conjugatis continuis, intus spermatidiis variis foetis.

a. *arthronemata*, phys. per intervalla articulata constrictis ibique fertilibus.

103. *Bolbochaete Ag.* Physeuma ramosum articulatum, articulis extremis prolifero-setosis.

104. *Conserva L.* Physeuma simplex s. prolifero-ramosum, spermatidiis effusis foetum.

b. *gryphonemata*, phys. articulis geniculatis interceptis, trabecularum transversalium ope conjugatis.

105. *Zygnum Ag.* Physeuma tenuiter conjugatum, spermatidiis stellatis, macularibus spiralibusve foetum.

106. *Hydrodictyon Roth.* Physeuma tubulosum reticulato-conexum.

c. *trichonemata*, phys. continuis capillaribus, intus spermatidiorum agmine annulatis.

107. *Calothrix Ag.* Physeuma arachnoideum rigidulum, intus spermatidiis minutissimis annulatum.

108. *Bangia Lyngb.* Physeuma tubulosum capillare, spermatidiis fasciatis densis foetum.

109. *Lyngbya Ag.* Physeuma tubulosum, spermatidiis erraticis (jam annularibus, jam effusis) foetum.

110. *Sphaeroplea Ag.* Physeuma capillare, spermatidiis globosis, demum succrescentibus foetum.

111. *Scytonema Ag.* Physeuma coriacenum tenax, intus striis annulatis s. moniliformibus notatum.

112. *Vaucheria DC.* Physeuma membranaceum, intus spermatidiis coloratis foetum, extus condylóphorum.

113. *Lemanea Bory.* Physeuma membranaceum, spermatidiis moniliformibus, per intervalla digestis foetum, dein torulosum.

114. *Bryopsis Lmx.* Physeuma pinnatum, latice viridi coacto scatena.

115. *Scytophion Lyngb.* Physeuma tubulosum membranaceum, spermatidiis striato-areolatis foetum.

C. *dermatoplynthia*, physematisbus in membranam ecostatam, intus spermatidiis foetam expansis.

116. *Ulva L.* Physeuma plynthodes planum ecostatum, spermatidiis minutissimis jugiter contextis foetum.

117. *Phyllona Wigg.* Physeuma plynthodes planum hyalinum, spermatidiis sphaericis quaternatim depositis, dein in soros coactis foetum.
118. *Laminaria Lmx.* Physeuma e basi pythmenode stipitata, in membranam compaginatam, spermatidius lunatis foetam expansum.
- Ordo III. Coccophycea IV.* Physeumata varia frondosa, clonariis subglobosis aucta.
119. *myclothamnia, physeumatibus filaribus s. funicularibus, per interstitia distincta septatis, clonariis globosis appensis auctis.*
119. *Ectocarpus Lyng.* Physeuma capillare maculato-geniculatum ramosum, clonariis globosis s. siliquiformibus lateralibus auctum.
120. *Sphaelaria Lyngb.* Physeuma articulatum pinnatum, in extremitatibus incrassatis denigratis clonaria recondens.
121. *Ceramium Adans.* Physeuma tubulosum coloratum ramosissimum annulato-geniculatum, clonaria globosa, sporis angulatis foeta proferens.
122. *Polysiphonia Grev.* Physeuma solidum articulatum, ex tubulis longitudinalibus compositum, clonaria ovata acuminate, sporis pyriformibus foeta proferens.
123. *Cladostephus Ag.* Physeuma farctum ex geniculatis ramentaceum, clonaria siliquiformia, (in ramentis) terminalia proferens.
124. *Rhodomela Ag.* Physeuma filare, (?) granulis sphaericis sparsis, s. in extremitate lomentacea reconditis foetum, clonaria globosa proferens.
125. *Chondria Ag.* Physeuma tubulosum subgelatinosum, in ramos ramentaceos divulsum.
126. *Polyides Ag.* Physeuma funiculare ex fibris radiantibus constipatum, clonariis verruciformibus spongiosis foetum.
127. *Sporocknus Ag.* Physeuma planum ramosum, margine spinulosum. Clonaria?
128. *Sphaerococcus Stackh.* Physeuma subcoriaceum

varium, clonaria sphaerica, aporis rotundis foeta exserens.

129. *Wormskjoldia* Spr. Physeuma membranaceum expanso-laminosum, spermatidiis punctiformibus, in areolas maculares congestis inscriptum clonariis que tuberculosis auctum.
130. *Furcellaria* Ag. Physeuma cylindricum funiculare, ad ramos extremos in clonaria siliquiformia intumescens.
131. *Fucus* L. Physeuma compressum s. alatum membranaceo-cartilagineum, phyciis instructum, clonaria turgida intus mucosa exserens.
132. *Cystosira* Ag. Physeuma ramosum subcylindricum, praeter phycias, clonaria tuberculiformia loculosa terminalia exserens.
133. *Sargassum* Ag. Physeuma compressum nervosum ramosum, phyciis axillaribus petiolatis distinctis instructum, clonaria tuberculiformia racemosa exserens.

Ordo IV. Gyrophycea W. Physeuma mono-s. polysiphonium, ramis conformibus verticillatum, praeter conylylia colorata, clonariis nucamentacea spiraliter striatis bracteatis auctum.

134. *Chara* Vaill. Physeuma verticillatum, ex axillis ramorum clonaria nucamentacea spiraliter striata, conylyliis superaddita exserens.

Corollarium. Hygrophytozoorum genera: 135. *Rhabdium* W. — 136. *Temachium* W. — 137. *Melosira* Ag. — 138. *Desmidium* Ag. — 139. *Diatoma* DC. — 140. *Achnanthes* Bor. — 141. *Echinella* Ach. — 142. *Meridion* Ag. — 143. *Encoelium* Agardh.

Classis VI. FUNGI s. MYCETES.

Ordo I. Asporomycetes W. Vegetabilis mycetoidea simplicissima, reliquorum veluti umbram s. prototypum praestantia, habitu prorsus varia, gongro-trichohypno- et rhizomorpha, sive massam mere cellulosam

pseudostromaticam adnotam libereve succrescentem, sive rhabdos continuos, seriatos articulatosve mentientia, aspora plane, s. partes cum sporidiis analogas sub appendicularum sporomorpharum specio proferentia.

A. gongromorphae, rhabdis piliformibus s. pseudo-stromatibus placentaribus, granuliformibus clavatisve, ex cellulis cubilium vegetorum transfiguratis veluti subeuntibus.

† *trichomata, rhabdis intus massa grumosa farctis.*

144. *Erineum Pers.* Rhabdi e figura clavata turbinate in flarem tendentes, utriculares, membranacei, ex foliorum vegetorum parenchymate seu pilorum abortus subeuentes.

†† *sarcomata, pseudostromatibus adnatis, tuberculiformibus s. bacillaribus.*

145. *Leptostroma Fr.* Pseudostroma innatum maculare s. placentare, mere cellulosum asporum.

146. *Sclerotium Tod.* Pseudostroma carnosum, e figura incondita ad subrotundam tornatamve tendens, s. bacillare emersum, mere cellulosum.

147. *Acrospermum Tod.* Pseudostroma carnosum elongato-subclavatum in apicem pruinosum tumidulum desinens.

B. helicomorphae, rhabdis filaribus geniculato-septatis moniliformibus, asporis, colorem fulvum saepius cum cano mutuantiibus.

148. *Helicomyces Lk.* Rhabdi erecti flocciformes, apice septato spiraliter involuti.

149. *Amphitrichum Nees.* Rhabdi e basi articulata in globulam obtecta assurgentibus.

150. *Alternaria Nees.* Rhabdi erecti opaci, interstitiis filiformi-teonatis, articulos ovales remotos interstinguentibus intercepti.

151. *Plegmatium Fr.* Rhabdi fistulosi membranacei, septis transversis opacis farctis intercepti.

152. *Trentepohlia Mart.* Rhabdi ramosi rigiduli, intus massa grumulosa varie digesta repleti illaque demam adspersi.

153. *Syncoelium W.* Rhabdi erecti, ex articalis inflatis, intus massa grumosa saturatiore scatentibus ovato-subrotundis annulatis catenulati.
154. *Acrothamnium Nees.* Rhabdi decumbentes delicati, e basi ramosa in splices septatos assurgentem.
- C. rhizomorphi, rhabdis continuis s. septatis, mole varia.*
- † *byssoides, rhabdis arachnoideo-hypoideis.*
155. *Byssus Humb.* Rhabdi hyalini continuo hypoidei simplices s. ramosi fugaces, q. deliquescendo contabescentes. (Aliorum initia cryptophila.)
156. *Ozonium Pers.* Rhabdi continuo ramosi, dein in fibrillulas hypoideas penicillatas secedentes.
157. *Dermatium Lk.* Rhabdi simplicissimi opaci colorati persistens, in stratum patinatum intertexti.
- †† *torulosi, rh. septatis appendiculas sporomorphas appensa exserentibus, s. in illas secedentibus.*
158. *Balanium W.* Rhabdi vago ramosi, ad extremitates dichotomas appendices sporomorphas obovatas exserentes demumque excutientes.
159. *Gongylocladum W.* Rhabdi simplices in tubercula subrotunda inflato-articulata, dein in particulas conformes fractas soluti.
160. *Spondylocladum Mart.* Rhabdi erecti annulato-moniliformes, in ramos conformes verticillatos divisi.
161. *Helicotrichum Nees.* Rhabdi simplices septati rigidi, appendices sporomorphas cylindricas circinatas fugaces ad basin congerentes.
162. *Polytrincium Kz.* Rhabdi simplices erecti moniliformes, appendices sporomorphas didymas laxe appensa sustinentes.
163. *Arthrinium Kz.* Rhabdi simplices depresso-septati, veluti torulosi, appendices sporomorphas opacas ovatas fusiforme que varie septatas exserentes.
164. *Helmisporium Lk.* Rhabdi erecti rigiduli simpliciusculi continui s. septati, appendices sporomor-

phas clavato-subcylindricas septatas laterales laxe appensa sustinentes deince abjacentes.

165. *Cladosporium Lk.* Rhabdi erecti continui in extremitates septato-torulosus desinentes inque articulos subtortuosos secundentes.

166. *Rhacodium P.* Rhabdi capillares ramosissimi dense intertexti continui, versus extremitates annulatomoniliformes corpuscula granulata sporangimorpha, appendicibus sporomorphis torulosis conglobatis facta proferentes iisque effusis dein obruti.

+++ *corticati*, rh. continua *corticatis*.

167. *Ceratonema P.* Rhabdi teretinsculi continui rhizomorphi, intus inaequaliter aspori.

168. *Rhizomorpha Roth.* Rhabdi teretiusculi continui extus corticati, intus stuppei, hinc inde in corpuscula papillaeformia succrescentes.

Ordo II. Sporomyctes W. Sporidia mera vesiculosa libera, figura, colore et dispositione varia, diversimode excepta, nunc nuda plane forasque profusa, nunc epidermide vegetabilium vegetorum mutata, nunc conceptaculis propriis pyrenimorphis recondita, nunc stratum callosum obstruentia.

A. epipori, sporidiis liberis profusis, cubilia integra obvallantibus inquinantibus.

a. coacti, spor. simplic. geminative congregatis.

169. *Nemaspora Ehr.* Sporidia globosa simplicia microscopica coacta cirrhorumque instar propullantia.

170. *Coccospora W.* Sporidia sphaerica magna simplicia in massam difformem coacta.

171. *Phloeospora W.* Sporidia cylindrica septata, ex epidermide foliorum vegetorum cirrhorum instar subcaantia.

172. *Fusidium Lk.* Sporidia fusiformia continua epidermidem foliorum languidorum obducentia.

173. *Stilbospora* P. Sporidia ovalia septata in grumulos colliculosos coacta.
174. *Asterospora* Kz. Sporidia stellata farcta.
 b. inquinantes, spor. simplicibus, septatis concatenative, facile inter se secedentibus, inquinantibus.
 † seriati, spor. simplicibus seriatis.
175. *Melanconium* Nees. Sporidia simplicia ovato-subrotunda, grumulos convexos inquinantes praestantia.
 †† moniliformes, spor. concatenatis moniliformibus.
176. *Oospora* W. Sporidia ovata s. subglobosa, rhabdorum articulatorum instar concatenata, inter se facile dilabentia.
177. *Monilia* Lk. Sporidia ovato-oblonga, extremitatibus utrinque attenuatis cohaerentia, dein secedentia.
 ††† continuo, spor. continua septatis.
178. *Didymosporium* Nees. Sporidia oblonga didyma, in grumulos epidermide acissa ciuctos digesta.
179. *Tetracladium* Lk. Sporidia quaterna catenulata sparsa.
180. *Hormiscium* Kz. Sporidia globosa plurima catenulato-torulosa, in grumulos depresso coacta.
181. *Siridium* Nees. Sporidia oblonga isthmis tenuostifiliformibus interceptis concatenata, basi implexa grumulos concinnantia.
182. *Phragmidium* Lk. Sporidia cylindrica plures septata, veluti annulata, in basin pellucidam continuum pedicelliformem desinentia eaque adhaerente (in fol. vegetis) grumulos fasciculatos praestantia.
 ††† striati, spor. continua longitudinaliter striatis.
183. *Entomycium* W. Sporidia fusiformia continua, stria longitudinali notata.
 B. hysopori, sporidiis simplicibus septatis, epidermidis dein scissas cingentesque fundo exceptis.
 a. phlosgensi, spor. ex cubilibus vegetis emerg.
184. *Schizoderma* Fr. Sporidia minuta globosa sim-

- plicia cum sporidochio conglutinata discoideo-erumpentia.
185. *Cryptosporium* Kz. Sporidia fusiformia obscure septata, sub epidermide pl. languida delitescentia.
 186. *Bullaria* DC. Sporidia oblonga didyma, in grumulos hypophloeodeos congesta.
 187. *Physoderma* W. Sporidia simplicia sphaerica, grumulos convexos velatos informantia.
 188. *Erysibe* Theophr. Sporidia simplicia in grumulos, epidermidi partium vegetarum insculptos congesta.
 189. *Puccinia* P. Sporidia ovalia geminata s. bilocularia, in basin hyalinam tenuata, in grumulos, epidermidi partium vegetarum insculptos congesta.
b. *myogeni*, *sporidiis in stratum carnosum s. gelatinosum*, *sporidochium mentiens infixis*.
 190. *Bleanoria* Fr. Sporidia cylindrica elongata utrinque truncata simplicia, veluti cum sporidochio hypophloeode in tuberculum conglutinata.
 191. *Coryneum* Nees. Sporidia fusiformia septata, basi tenuata, veluti sporidochio verruciformi innata, strata scutellaria dein epiphloeodea mentientia.
 192. *Sporidermium* Lk. Sporidia fusiformia opaca, basi tenuata assurgentia, veluti sporidochio effuso innata.
 193. *Prosthemium* Kz. Sporidia fusiformia septata in basin tenuata, veluti sporidochio plano innata.
 194. *Sarcopodium* Ehrb. Sporidia flocciformia elongata septata, sporidochio pseudostromatico effuso superaddita.
 195. *Gymnosporangium* Lk. Sporidia uniseptata, basi producta suffulta, sporidochio vesiculoso gelatinoso erumpenti velut innata.
 196. *Podisma* Lk. Sporidia uniseptata, basi stipitiformi longissima implicita, sporidochium pseudostromaticum gelatinosum clavatum mentientia.
 197. *Phragmotrichum* Kz. Sporidia rhombea septata, isthmus cylindrica intercepta, basi stipitiformi sporidochio pseudostromatico fibroso-gelatinoso innata, dein solata.

198. *Exosporium Lk.* Sporidia oblongo-linearia septata assurgentia, sporidochium pseudostromaticum verruciforme obvallantia.
C. perisporii, *sporidiis variis*, *sporidochio pseudo-stromatico figurato emerso superadditis*.
199. *Epicoccum Lk.* Sporidia globosa, sporidochio pseudostromatico membranaceo hemisphaericо laxe incubentia.
200. *Aegerita P.* Sporidia globosa sporidochii paenostromatici liberi rotundati superficiem tenacem obliterantia.
201. *Dermosporium Lk.* Sporidia globosa sporidochii globosi superficiem, tegminis corticati instar investientia.
202. *Illesporium Mart.* Sporidia globosa colorata, sporidochium liberum subgalatinosum infarcientia, dein ex illo fatiscentia.
203. *Tubercularia Tod.* Sporidia globosa simplicia minima, sporidochium pseudostromaticam clavato-verrucosum subcarnosum, dein epiphloeodes obtectentia.
204. *Fusarium Lk.* Sporidia fusiformia tenuissima continua, sporidochio tenui carnosō sessili stipitatoe fota, dein diffluentia.
205. *Conoplea P.* Sporidia globosa simplicia congregata, sporidochium ex pilis rigidulis laxe impletis conflatum repletia, dein effusa.
206. *Hyphebia Fr.* Sporidia libera globosa, sporidochio effuso, e villo in pelliculam contexto, dein fatiscente recondita.
207. *Trichoderma P.* Sporidia globosa minuta congregata discolora, sporidochio subrotundo ex floccis hyphoideis contexto obvelata, dein transfusa.
- D. entospori*, *sporidiis variis*, *non nisi angulato-stelatis*, *sporidochio vario*, *sive ex epidermide cubilium vegetorum succrescente*, *sive ex substantia propria eoque mucilaginea*, *sive membranaceo exceptis*.

- a. phloeoecii, sporidochio cupulari, tubuloso et cornuto phloicode.
208. *Aecidium* P. Sporidia globosa simplicia pseudosporidochium carnosum, ex cubilium vegetorum epidermide varie figuratum infarcientia.
- b. myxoeccii, sporidochio tenerrimo membranaceo, sporidiis conglobatis foeto, mucilagine circumstuo exceptis. (Genus desciscens, potius ad Pyrenomycetes pycnopyrenes p. 869 revergens.
209. *Myxarium* W. Sporidochium ovatum nucleatum, massa mucilaginosa amorpha circumstua reconditum.
- c. dermatoecii, sporidochiis ex substantia propria compositis, corticatis, globosis, clausis s. vertice reclusis, intus sporidiorum agmine foetis.
† claudi, sporidochiis clausis.
210. *Sclerococcum* Fr. Sporidochium firmum, sporidiis globosis coactis farctum.
211. *Ostracococcum* W. Sporidochium sessile testaceum durissimum, sporidiorum globosorum discolorum farcimine coacto foetum illudque demum transmittens.
212. *Spermatodermia* Tod. Sporidochium hemisphaericum tuberoso-spongiosum, tegmine durissimo tectum, sporidiis globosis minimis farctum.
213. *Peridermium* W. Sporidochium tenuissime membranaceum utriculiforme, inflatum, sporidiis globosis liberis plurimis foetum, demum basi circumscissa faticens.
214. *Onygena* P. Sporidochium capitatum stipitatum corticatum, sporidiis globosis liberis conglobatis farctum.
215. *Cenococcum* Fr. Sporidochium suberoso-carneum fragile crassum, sporidiis minimis pulvulentis liberis farctum.
- †† pertusi, sporidoch. in porum oculumque reclusis.
216. *Chaetomium* Kz. Sporidochium subglobosum fragile pilosum, dein e vertice pertuso sporidia globosa profundens.

217. *Cylindnum W.* Sporidochium vasculare sessile tenuiter membranaceum fragile, operculo planculo obturatum eoque dein circumscisso apertum, ollare.
 †† *discoidei*, sporidoch. in discum dein dilatatis.
218. *Myrothecium Tod.* Sporidochium patellare tenerimum sessile, sporidiis minutis discoloribus, dein in discum coactis oblitteratum.
219. *Stephanoma JV.* Sporidochium membranaceum sessile, extus pilis propexis munitum, primum connivens, dein in discum sporidiis angulato-stellatis obrutum dilatatum.
220. *Asterophora Ditm.* Sporidochium stipitato-capitatum contexto-floccosum, vertice irregulariter dehiscente stratum sporidiorum angulatorum compactum sustinens.

Ordo III. Hyphomycetes Mart. Hyphae filamentae, arachnii instar intertextae, sporidia simplicia septatae sustinentes.

- A.* *epispori*, sporidiis hyphae sine ordine adspersis liberis, facile aufugis.
- † *hyphis arsyntheticis instratum expansum contextis*.
 * *sporidiis simplicibus*.
221. *Mycobanche Pers. emend.* Sporidia sphaerica simplicia, utrinque aequalia s. hinc macroonata, veluti caudata, hypham ramosam effusam oblitterantia.
222. *Gonytrichum Nees.* Sporidia globosa, hypha nodosa ramisque conformibus subverticillata excepta.
223. *Byssocladium Lk.* Hyphae delicatae ramosissimae radiatim expansae, sporidiis globosis exiguis adspersae.
224. *Sporotrichum Lk.* Hyphae delicatae hyphae maxima arachnoideo-lanceum praestantes, sporidiis simplicibus liberis adspersae.
225. *Fusisporium Lk.* Hyphae ramosae septatae, non nisi circinato-tortuosae, sporidiis simplicibus, figura fusiformi subcylindricis continua rectis curvatisque adspersae.

- ** *sporidiis septatis.*
- 226.** *Trichothecium Lk.* Sporidia oblonga septata s.
obsolete didyma, hyphae ramosae septatae adspersa.
- 227.** *Scolecotrichum Kz.* Sporidia didyma, hyphae sim-
plici vermiculatae pellucidae adspersa.
- †† *hyphis asynthetis assurgentibus, hyphasma
erectum fasciculatum praestantibus.*
- * *sporidiis simplicibus.*
- 228.** *Actinodadium Ehrb.* Sporidia simplicia globosa,
hyphae e basi simplici in apicem umbellato-ramo-
sum assurgentí adspersa.
- 229.** *Acladum Lk.* Sporidia simplicia, saepissima sub-
terminalia, facile caduca, hyphis simplicibus fasci-
culatis erectis septatis, siccando contractis adspersa.
- 230.** *Chloridium Lk.* Sporidia globosa simplicia cre-
berrima, hyphae subsimplici erectae continuac-
vage inspersa.
- 231.** *Oncocladum W.* Hypha rigida, ramis quaternis
deflexis verticillatis brevissimis intercepta, spori-
dia globosa minutissima interjecta fovea.
- B. synpori, sporidiis appensis, fastigiatis laterali-
busque, hyphas asynthetas s. figuratas ornantibus.*
- † *hyphis socialibus asynthetis simplicibus.*
- * *sporidiis terminalibus,*
° *simplicibus.*
- 232.** *Botrytis Mich.* Hyphae simplices sociales, fer-
tile assurgentes, in fastigio plerumque sporidia
globosa s. oblonga simplicia colligentes.
- 233.** *Aspergillus Mick.* Hyphae erectae subsimplices
septatae, apice clavato sporidia simplicia globosa
subseriata sustinentes.
- 234.** *Penicillium Lk.* Hyphae septatae liberas erectae,
apico penicillatim fissae ibique sporidia globosa
simplicia exserentes.
- 235.** *Campylotrichum Ehrb.* Hyphae delicatae conti-
nuae ramosae, ramos divaricatos hamatos emit-
tentis, circaquæ apices sporidia globosa congesta
sustinentes.

*** sporidiis 1 - pluresve transversim longitudinaliterque septatis s. moniliformibus.*

235. *Dactylium* Nees. Hyphae erectae, extremae sporidia oblonga septata exserentes.
237. *Stemphylium* W. Hyphae simplices nodosae, vertice incrassato sporidium ovatum subangulatum longitudinaliter transversimque septatum, veluti multiloculare exserentes.
238. *Dendryphion* W. Hyphae erectae solidae opacas rigidulae simplicissimae, apice sporidiorum sphacricorum catenulas in capitulum penicillatum congestas exserentes.
- *** sporidiis simplicibus ramulos laterales terminantibus.*
239. *Acremonium* Lk. Hyphae subramosae septatae, ramos varie digestos patentes, sporidiis simplicibus ornatos emittentes.
240. *Verticillium* Necs. Hyphae erectae septatae ramosae, sporidia simplicia apicibus ramulorum innata, veluti pedicellata portigentes.
241. *Stachylidium* Lk. Hyphae assurgententes septatae ramosae, ramos laterales oppositos verticillatosque; sporidiis globosis minimis adspersos emittentes.
242. *Diplosporium* Lk. Hyphae erectae ramosae septatae sporidia didyma sustinentes.
- †† synthetici, hyphis in synthesis contextis, hypopharma subfiguratum concinnantibus.*
** hypkasmine assurgente figurato.*
243. *Coremium* Lk. Hyphae erectae hyalinae septatae, in fasciculos congestae, sporidia simplicia terminalia penicillata sustinentes.
244. *Ceratium* A. et Schw. Hyphae arachnoideae in hyphasma primum molle, dein coacto-membranaceum ramosum constipatae, ad extremitates sporidiis leviter adnatis adspersae.
245. *Icaria* Pers. Hyphae arachnoideae in hyphasma continuum simplex s. ramosum contextae, dein extus solntae, sporidia globosa undique sovantes.

- ** *hyphamate membranaceo thelephoroideo.*
246. *Hypochnus Fr.* Hyphae tenerimas tenacellae radiantes, praeter ambitum fibrilloso-radiantem asporum, in hyphasma submembranaceum appланatum, sporidiis microscopicis foras interspersis foetum iotertextae.
247. *Coniophora DC.* Hyphae arachnoideae in hyphasma membranaceum molle contextum stratoque sporophoro conformi s. pulvinulis interrupto obductum.
248. *Epichysium Tod.* Hyphasma infundibuliforme carnososucculentum, iatus hyphis funicularibus ramosis constipatis adnatis, latere atroque sporephoris exaratum.
- E. entospori, sporidiis conglobatis s. voluti sporodochio vesiculari capitato subterminati reconditis, demum liquecendo s. fatiscendo prorumpentibus.
† cecospori, sporidiis conglobatis.*
249. *Myrotrichum Lk.* Hyphae continuae ramosissimae implexae caespitosae, sporidia subglobosa copiosissima, in globulos hyphasmati incidentes coacta sustinentes.
250. *Coccotrichum Lk.* Hyphae ramosae septatae coloratae, sporidia simplicia opaca, in globulum primum coacta, dein fatiscentia sustinentes.
251. *Bactridium Kz.* Hyphae ramosae articulatae, apice truncato sporidia solitaria elongata aggregata adnata colligentes.
- †† *cystispori, sporidiis peridiolo veluti inclusis, s. illud mox absidentibus.*
252. *Phycomyces Kz.* Hyphae decumbentes continuae flaccidae, apice in sporidia oblonga, circa vesiculam incidentem collecta desinentes.
253. *Colletosporium Lk.* Hyphae ramosae continuae, vesiculas sporidiis globosis minutissimis simplicibus farctas gerentes.
254. *Sporodinia Lk.* Hyphae septatae robustae, apice tumido sporidia aggregata colligentes.
255. *Melidium Eschw.* Hyphae ramosae solidae. ra-

mulos fertiles in vesiculam globosam, sporidiis hyalinis quaternis foetam intumescentes spargeutes.

256. *Pilobolus* Tod. Hyphae continuas erectas robustae, a basi tenuata bullato-ventricosae, vesiculam sporophoram globosam coloratam ex apice elastice projicientes.
257. *Syzygitus* Krb. Hyphae ramosae tubulis transversis coenentes eoque connubio favente sporidia magna globosa farcta praestantes.
258. *Mucor* Pers. Hyphae debiles caducas erectas septatae ramosae, apice vesiculam sporophoram globosum, sporidia vario projicientem sustinentes.
259. *Thamnidium* Lk. Hyphae sparsae, a basi inde ramulis vagis, globulos sporomorphos exiguos exserentibus auctas, ex apice vesiculam globosam, dein in sporidia diffluentem sustinentes.
260. *Stilbum* Tod. Hyphae farctae stipitiformes ex apice capitulum sporophorum rotundum, primum molle, dein coactum sporidiisque profusis foetum sustinentes.
261. *Cephalotrichum* Lk. Hyphae stipitiformes, rigidulae, apice in floccos contortos sporidiis interpersis foetos solutae.
262. *Didymocrater* Mart. Hyphae erectas septatae laxe caespitosae, capitulum sporophorum geminatum cylindricum, vertice in os orbiculatum reclusum exserentes.
263. *Eurotium* Lk. Hyphae decumbentes implexae, capitula sporophora nuciformia tenera, sporidiis simplicibus globosis hyalinis farcta, dein irregulariter fatiscentia sustinentes.
264. *Pilophora* W. Hyphae erectae simplices obsolete septatae, capitulum sporophorum sphaericum inflatum, dein vertice umbonato sporidia globosa transmittens basique circumscissa patula hians & campanulatum exserentes.

Ordo IV. Myxomycetes W. Peridium vasculosum, primam fluxum conforme clausum, dein exarescens

corticem subscariosum s. membranaceum, nonnisi duplicum varie fissilem, sarcimine sporophoro immaturo pulposo, maturo pulverulento jugiter conglobato s. cellularis dissepto farctum inducens.

A. placognates, peridiis primum fuso-mucilaginosis inconditis, veluti placentaribus, dein exarascendo figuram subhemisphaericam dimidiatam, basi adnatam pulvinatam saepius informantibus.

265. *Dichosporium* Nees. Peridium hemisphaericum tenuiter membranaceum floccoso-pulverulentum, sporidia globosa majuscula nuda continens.

266. *Amphisporium* Lk. Peridium persistens, sporidiis biformibus, globulosis fusiformibusque foetum.

267. *Spumaria* Pers. Peridium dein difforme crustaceum flocculosum cellularare fragilissimum, in alia peridiola plicata bursaeformia veluti proliferum, sporidia globosa majuscula nuda laxe fovens.

268. *Enteridium* Ehrb. Peridium membranaceum plicatum, sporidiis in glebulas congestis fibrisque in membranulas confluentibus interstinctis farctum.

269. *Reticularia* Bull. Peridium indeterminatum placentare, nunc tenerium, nunc testaceum, intus sporidiis globosis fuliginosis, floccis parcis ramosis compressis interstinctis foetum.

270. *Aethalium* Lk. Peridium difforme fragilissimum, extus strato flocculoso-celluloso deciduo cinctum, intus daedaleo-cellulosum, sporidiis compactis foetum.

B. angiogasteres, peridiis vasculosis figuratis, sporidiiorum sarcimine nudo s. floccis dissepto foetis, sessilibus s. stipitatis.

271. *Licea* Lk. Peridium varium, nonnisi dimidiatum s. semicylindricum, tenuiter membranaceum irregulariter s. circumscisse dehiscens, sporidiis liberis (floccis plane destitutis) foetum.

272. *Leocarpus* Lk. Peridium difforme testaceum deplanatum, sporidiis globosis opacis majusculis, trabeculis assurgentibus teneris interstinctis foetum.

273. *Physarum* Pers. Peridium membranaceum tenerimum, sporidiis laxis, floccis parieti adnatis intertextis foetum.
274. *Craterium* Trent. Peridium simplex rigidum substipitatum, operculo clausum eoque abjecto cystiforme persistens.
275. *Dictyodium* Schrad. Peridium e capillitio innato reticulatum venosove nervosum irregulariter dehisces.
276. *Cribaria* Schrad. Peridium dein vertice excusso dimidiatum, intus floccis, trabecularum instar a latusculis porrectis reticulumque liberum prominens mentientibus auctum.
277. *Didymium* Schrad. Peridium figuratum irregulariter dehisces, tegmine adnato in squamulas furfuraceas fatiscentes obductum, columellam variam s. nullam floccisque parieti adnatam fovens.
278. *Diderma* Pers. Peridium duplex; externum crustaceum fragile, internum hyalinum, columellam variam, nonnisi placentarem floccosque vagos, e basi ad latera verticemque tendentes fovens.
279. *Trickia* Hall. Peridium simplex, vertice irregulariter rumpens, floccos dense implexos versus basin adnatos, elastice semet expandentes tortos fovens.
280. *Arcyria* Hill. Peridium tenuiter membranaceum, vertice umbonato ociis cadaco, partem inferam poculiformem circumcissam relinquens, intus floccorum implexorum, a basi ad condensatum apparet, parastadis instar auctum.
281. *Diackea* Fr. Peridium tenerissimum ociissime caducum, stipite floccoso palverulento laxe, e basi crassa sensim tenuato, floccorum parastadem reticulatam penetrante suffolatum.
282. *Stemonitis* Gled. Peridium caducum, stipite setaceo firmo discoloro penetrante floccorumque reticulato - connexorum parastadem excipiente instructum.

- C. sphaerogasteres, peridiis globosis membranaceis
s. carnosis constipatis, vertice diversimode re-
clusis floccorumque apparatu vario instructis.*
283. *Lycogala Mich.* Peridium sessile globosum, ex membrana dupli compositum, vertice sensim dehiscens, sporidia globosa cum floccis vagis lateralibus profuga spargens.
284. *Bovista Dill.* Peridium glosum, tegmine externo dein secedente caduco tectum, interius membranaceum tenerum, sporidia hinc caudata floccis tortuosis undique adnata spargens.
285. *Lycoperdon Tourn.* Peridium e basi magis minusve producta subglobosum, tegmine contiguo, varie dein desquamante tectum, internum membranaceum, sporidia globosa simplicia laxa, floccis parastadem compactam conicam adhaerentem praestantibus incumbentia fovens.
286. *Tylostoma Pers.* Peridium globosum papyraceum, stipite proprio suffultum, vertice in osculum circinatum pertusum, sporidia globosa, floccis adnatis arachnoideis excepta fovens.
287. *Geaster Mich.* Peridium globosum, ex strato dupli distincto compositum, externum carnosum, dein stellatim fissum, internum globosum reclinando suffulcium.
- D. naucogasteres, peridiis corticatis clausis, dein sporidiorum pulverulentorum agmine farctis.*
288. *Scleroderma Pers.* Peridium globosum clausum, floccis porrectis, dissepimenta cellulosa mentientibus, sporidia excipientibus farctum.
289. *Argylium W. (Bullardia Jungh.)* Peridium naucosum arrhizum testaceum, intus sporidiorum farcimine liquido dein coacto, membranulis teneris intercepto farctum.
290. *Ceraunium Theophr.* Peridium suberosum naucosum arrhizum bicorticatum, intus trabeculis fibrilosis ramosis, a latere utroque porrectis, sporidia

majuscula rotunda conglobata, dein pulverulenta interatinguentibus instructum.

Ordo V. Hymenomycetes Fr. Ascoma fibroso-carbosum s. gelatinosum, varie figuratum, ascis in membraculam velati constipatis foetum.

A. angiospori, ascomatibus e figura placentari in patellarem tubulosamque tendentibus, dein discum ascophorum marginatum recludentibus.

a. thyreodochii, ascomatibus radialim s. laciniatim scisis s. hiantibus.

291. *Xyloma Pers.* Ascoma placentare innatum, hymenium ascis subclavatis foetum, primum summa cubilium epidermide velatum, dein varie recludens.

292. *Phacidium Fr.* Ascoma circinatum ionatum umbonatum, hymenium placentare, ascis erectis foetum summaque epidermide, dein laciniatim fissa tectum coacipiens.

293. *Phlyctidium W.* Ascoma orbiculatum, primum subcallosum clausum, dein tenuatum epidermideque in rugas complicatas revelata discumque marginatum, ex ascis oblongis, mox saturationibus decoloratum recludens.

294. *Tryblidium Reb.* Ascoma vasculare orbiculatum, primum clausum, demum vertice in lacinias angulatas irregulariter fissum discumque ascophorum, massae grumosae instratum recludens.

295. *Colpoma IV.* Ascoma oblongum s. subcylindricum friabile adnatum hypophloeodes, dein discum cavernosum, ascis clavatis, strato grumoso incumbentiibus foetum, per hiatum longitudinalem monstrans.

296. *Tympinis Tod.* Ascoma e basi tenuata orbiculatum, saepius hypostromati impositum, tegmine subcoriaceo discum ascophorum concavum, ascis tenuibus pavitum primum abscondens, sphaeriaciforme, dein apertum pezizaeforme.

297. *Sphaerothyrium W.* Ascoma membranaceum orbiculatum, basi dilatata insculptum, primum vertice umbonato clausum eoque opercaliformi abjecto in discum plantum marginatum, ascis cylindricis erectis foetum reclusum, cupulare.
298. *Lophium Fr.* Ascoma verticale, a basi sarcina infixa tereti compressum, dein rima longitudinali dehiscens, semibivalve.
- b. lomatodochii, ascomatibus sessilibus stipitatisive, colore, figura et superficie perquam variis, primum clavis, dein margine proprio sensim sedente latusculisque reclinantibus discum pavillarem, ascis saepius tetrasporis foetum reducis. + ascis fixis.*
299. *Actidium Fr.* Ascoma sessile rotundatum, a centro versus ambitum in rimulas canaliculatas, hymenio ascis erectis cylindricis tenuissimis foeto pavitas dehiscens.
300. *Hysterium Tod.* Ascoma sessile ovato-oblongum carbonaceo-duriusculum, dein vertice in discum rimaeformem angustum, ascis erectis fixis foetum reclusum, naviculare.
301. *Stictis Pers.* Ascoma insculptum farinoso-miculaceum orbiculare, primum sarcinum ascophoro ceraceo (stilante s. demum obturante), mox fundum replente factum, denique limbum callosum circumducens.
302. *Phibalis W.* Ascoma obverse pyriforme subcoriaceum, dein discum infundibuliformem, ascis linearibus oligosporis foetum, ex hiatu circinato monstrans.
303. *Solenia Hoffm.* Ascoma membranaceum erectum, dein elongato-tubulosum, vertice reclusum, intus hymenio pertenui, ascis subglobosis foeto vestitum.
304. *Peziza Dill.* Ascoma carnosum-membranaceum s. ceraceum sessile s. stipitatum, primum marginibus conniventibus clausum, dein in discum rotundatum

ex ascis insignibus saepius octosporis paraphysibusque foetum discolorem dilatatum; cupuliforme.

A. dasysephae, ascomatibus tenacellis sessilibus stipitatisve, extus pube tenera s. rigidula vestitis.

† sessiles, ascomatibus sessilibus,

** epiphytae, in partibus pl. annuis vigentibus.*

— P. punctiformis, Arundinis, micacea, villosa, Nidulus, sulfurea, adpressa, relicina, Platani, strigosa.

*** epiphyiae, ascom. in lignis nascentibus. — P. hyalina, Pineti, episphaeria, variecolor, flavo-fuliginea, rufo-olivacea, barbata, spadicea, hispidula, flammea, cruenta, corticalis, tumida, farinosa, albo-violascens, syringea, bicolor.*

†† stipitatae, ascom. in stipitem desinentibus. — P. acuum, torva, fuscescens, sphaerocephala, caulincola, clandestina, rorida, striatula, sericea, cernua, viridula, calycina, pithya, patula, nivea, virginea, ciliaris, proboscidea.

B. trichosephae, ascomatibus sessilibus, ad marginem et latiuscula pilis setosis hirtis coloratis obsecisis.
— P. tentaculata, Berberidis, diversicolor, theleboloides, stercorea, setosa, livida, scutellata, umbrosa, carneo-rufa, melenoloma, phaeoloma, hirta, brunnea, fusco-atra, leucotricha, hemisphaerica.

*C. leioscyphae, ascomatibus teneris sessilibus brevi-
terque stipitatis, extus glaberrimis s. politis.*

† sessiles, ascomatibus sessilibus.

** firmae, ascom. tenacellis depresso-margine conformi parce prominulo cinctis. — P. epiblastematica, Cerastiorum, juncina, compressa, melanophaea, melaxantha, Coccostigma, decipiens, Resinae, Hypnorum.*

*** tremellinae, ascom. sessil. tremellosis s. aquosis.*

— P. arenula, atrata, lacustris, dilutella, vulgaris, axillaris, viridans, Jongermanniae, tuda, olivacea, atro-virens, rubella, vinosa, dispersa, infixa, chrysocoma, limbata.

†† stipitatae, ascom. longius breviusque stipitatis,

* **margine instero cinctis.** — P. Volutella, chrysostigma, epiphylla, faginea, haematites, amenti, imberbis, conigena, chionea, salicella, herbarum, pallescens, lutescens, citrina, scutula, serpentina, ferruginea, Insudibulum, strobilina, lenticularis, nigripes, versiformis, discolor, janthina, Cacaliae, aeruginosa, Caucus, Buccina.

** **ascom. margine dectero cinctis.** — P. simetaria, clavicularis, acicularis, aurea.

D. stromatoscyphae, ascomatibus sessilibus stipitatisve, e basi fila byssina sive in stratum intertexta, sive in comam rhizoideam implexa exscentibus, s. stromati byssino insidentibus.

† dasyscyphoideae, ascom. sessilibus extus surfuraceis s. tomentosis, stromati hyphoideo insidentibus. — P. Lignicerne, fibrillosa, caesia.

†† leioscyphoideae, ascom. sessilibus calvis, stromati hyphoideo insidentibus. — P. adhaerens, Inteola, porioides, sauvinea.

††† aleuroscyphoideae, ascom. furfuraceis s. tenuiter farinosis, hypostromati hyphoideo insidentibus.

* **ascom. sessilibus.** — P. poriaeformis, omphalodes, aurelia, cinerea, Kneiffii, fusca, scutelliformis, lateritia, Nigrella.

** **ascom. stipitatis, plexum rhizodem exscentibus.** — P. sthenostoma, zhizopus, fusco-cana.

E. aleuroscyphoideae, ascomatibus sessilibus stipitatisve extus incisis, siisque nunc fibrosis, nunc granulosis nunc pruinosa-farinosis.

† inophilae, ascomatibus extus pilis fibrosis, rigidulis adpressis adpersis.

* **sessiles, ascom. sessilibus.** — P. dentata, coracella, Cyathus, sanguinolenta, pruinosa, velutina, Ledi, farinacea, cyathiformis, aleuritica.

** **stipitatae, ascom. stipitatis.** — P. litorea, Persoonii, crassipes, pyriformis, albipes, bolaris, elatina, etioloma; decolorans, Campanula; au-

mala, scyphiformis, striata, tubaeformis, cyathoidea, coronata, inflexa, virgultorum, coccinea.

†† *coccophloeac, ascom. extus granulis papulosis eaducis ob sessis.*

* *sessiles, ascom. sessilibus.* — *P. microstoma, Pteridis, papillaris, umbrosa, papillosa, gemmata, granulata.*

** *stipitatae, ascom. stipitatis.* — *P. gemmifera, fulgens.*

††† *trachyphloeae, ascom. extus scobe primum rudi, dein in fibras tenellas producta hirsutis.*

* *ascom. sessilibus.* — *P. rubiginosa, sepulchralis.*

** *ascom. stipitatis.* — *P. micropus, verrucosa, fibrosa, hypocateriformis, Macropus.*

†††† *alpithphloeae, ascom. furfure tenui farinosis.*

* *lenticulares, geophilae, ascom. sessilibus, latusculis adpressis.* — *P. miliaris, Haemato stigma, convexula, Schenckii, xanthomela, rubricosa, humosa, hepatica, macrospora, leucoloma, rutilans.*

** *cochleatae, ascom. primum cochleatis, dein eupularibus, a. sessilibus.* — *P. dimorpha, Lancicula, saniosa, violacea, purpurascens, appanata, pustulata, cupularis, thelephora, badia, mespili-formis, carbonaria, venosa, cochleata, onotica, leporina, aurantia, abietina, repanda, cerea, Marsupium, lycoperdoides.*

b. *stipitatae, ascom. stipitatis.* — *P. purpurea, varia, Catina, sulcata, Acetabulum, Rapulum, tuberosa.*

†† *areis foras profusis.*

205. *Xylogramma W.* Ascoma dein erumpens ellipticum a. elongatum, hymenium tenuissimum, ascis mox emersis pulverulentum, veluti excipulo marginante excipiens, naviculare.

206. *Cycledum W.* Ascoma orbiculatum carnosum, ex latusculorum reclinazione in discum, ascis mox profusis incusum, veluti excipulo proprio exceptum, reclusum, patellare.

**

307. *Ascobolus Pers.* Ascoma subcarnosum globosum, dein in discum, hymenio ascis clavatis amplis fugacibus superfusum reclusum.
308. *Bulgaria Fr.* Ascoma obconicum, intus glutinoso-pulposum, mox vertice rupto in discum planum, ascis stipatis elastice emergentibus foetum reclusum.
309. *Cyphella Fr.* Ascoma tenuiter membranaceum concavum, e basi brevi subcernuum, intus hymenio ascis globosis majusculis liberis suffuso vestitum, dein hinc lacerum hians hymeniumque inferum veluti mentiens.
310. *Volutella Tod.* Ascoma hypocrateriforme coriaceum stipitatum, margine revoluto apertum, intus massa nuguinosa, mox coeante suffusum.
- B. *gymnospori, ascomatibus sessilibus stipitatisve, mole, figura et substantia perquam variis, hymenium effusum immarginatum, ascis variis in natis s. emersis vestitum, gliscendo sensim faciemque alteramutram expandendo informantibus.*
- a. *peridochii, ascomatibus polymorphis tremellino-gelatinosis, carnosis membranaceis, sessilibus stipitatisve, partes extremas hymenio superficiali undique investientibus.*
- a. amorphi, ascom. gelatinosis inconditis.*
311. *Myxomphalos W.* Ascoma sessile, puntiforme plato-convexusculum, ascis globosis minutissimis cum pulpa circumflua coactis foetum.
312. *Periola Fr.* Ascoma sessile, intus carnosо-gelatinosum solidum, extus villo sporidiis obsoletis intersperso vestitum eoque veluti corticatum.
313. *Agyrium Fr.* Ascoma gelatinosum, siccando ceraceo-coactum innato-sessile glabrum, undique ascophorum, extus dein in sporidia solutum.
314. *Dacrymyces Nees.* Ascoma sessile guttatum erumpens, ex floccis sporophoris assurgentibus, in massam carnosо-gelatinosam conformem coactis, dein deliquescens.

315. *Naematelia* Fr. Ascoma gelatinosum amorphum pulvinatum gyroso-plicatum, extus undique sporidiis minutissimis, dein emersis foetum, intus corpusculo nucleiformi carnosum coacto duriusculo dissimili auctum.
316. *Hymenula* Fr. Ascoma appланatum molle, siccaudo subcoriacum, extus ascis imperfectis foetum.
317. *Tremella* Dill. Ascoma pulposo-fluxile lobato-plicatum inconditum, extus sporidiis minutissimis globosis, dein emersis foetum usque superfusum, siccando contabescens (ex aqua denuo reviviscens.)
β. clavati, ascomatibus e stipite sterili in clavulam subcylindricam simplicem s. in ramos divulsam desinentibus.
 † *corynoidei*, ascom. pistillaribus.
318. *Pistillaria* Fr. Ascoma simplicissimum ovato-cylindricum cum stipite sensim confluens, apicem versus hymenio stipato obsolete ascophoro foetum.
319. *Typhula* Fr. Ascoma subcylindricum, stipite filiformi tenacello sustinutum, superne in clavulam undique ascophoram desinens.
320. *Geoglossum* Pers. Ascoma clavaeforme, praeter stipitem sterilem confluentem, hymenio undique ascophoro, ascis elongatis catenulatis foeto obductum.
 †† *pterygoidei*, ascomatibus e stipite in expansiones alares dilatatis.
321. *Spathularia* Pers. Ascoma carnosum-membranaceum compressum stipitatum, supra hymenio ascophoro vestitum.
322. *Sparassis* Fr. Ascoma e basi crassa napiformi, ramicos foliaceos utrinque ascophoros, in capitulum congestos exserens.
 †† *merismoidei*, ascomatibus ramosis, nisu ramos redintegrandi insignibus.
323. *Calseeras* Fr. Ascoma cylindricum carnosum-gelatinosum simplex s. ramoso-partitum, superne hymenio unguiculoso obductum.
324. *Clavaria* Vaill. Ascoma cylindricum carnosum

- ramosum s. simplex clavatum, com basi stipitiformi confluens, superne hymenio vestitum.*
- y. mitrati, ascomatibus capitatis s. mitratis, hymenio supero vestitis, subtus cavis.*
- 325. *Ditiola Fr.*** Ascoma primum tegmine floccoso involutum, deinde stipitem producendo capitalumque orbiculato-discoideum, hymenio corrugato-plicato vestitum immarginatum informando erumpens.
- 326. *Mitrula Fr.*** Ascoma carnosum ovatum laeve undique ascophorum, basi stipitem discretum arcte ambiens.
- 327. *Vibrissa Fr.*** Ascoma capitatum stipitatum, supra hymenio primum laevi, deinde ascis transfusis velutino vestitum, subtus nudum.
- 328. *Verpa Sw.*** Ascoma clavato-pileatum stipitatum, supra hymenio laevi s. corrugato, ascis fixis foeto colorato vestitum, subtus concavum laeve liberum.
- 329. *Leotia Hill.*** Ascoma subtremellosam pileatum stipitatum rotundum, Timbo revoluto connatum s. liberum, hymenio ascis fixis clavato-cylindricis foeto unguinoso obductum.
- 330. *Marchella Dill.*** Ascoma ceraceo-carnosum pileato-clavatum rotundatum, com stipite centrali cavo-confluens, supra reticulato-lacunosum, hymenio undique vestitum.
- 331. *Helvella L.*** Ascoma ceraceo-membranaceum pileatum stipitatum, subtus concavum, supra sinuato-plicatum, hymenio undique vestitum.
- 332. *Phallus L.*** Ascoma celluloso-cibosum, latice unguinoso illinitum, capitatum, stipite cylindrico ex volva uteriformi ovata, primum clausa, gelatina distenta, deinde scissa subeunte suffulta.
- b. epichitii, ascomatibus thalloideis, supra hymenio polito obductis.*
- 333. *Exidia Fr.*** Ascoma gelatinosum, supra hymenio stipato polito s. papilloso-aspero, ascis fistulosis, sporidia elastice projicieatis foeto vestitum, subtus saepius tegmine s. vellera difformi manitum.

334. *Rhizina Fr.* Ascoma carnosum crustaceo-laminare, subtus ramices tentaculatos radiciformes exserens, supra hymenio, ascis insignibus fixis foeto obductum.
c. hypodochii, ascomatibus sessilibus breviterque stipitatis, subtus ascophoros.
 + *laminares, ascom. basi laterale adnatis crustaceis, dimidiatis basive stipitiformi suffultis.*
335. *Thelephora Ehrh.* Ascoma varium, crustaceo-deplanatum s. thalloideum dimidiatum, hymenio infero (s. in resupinatis supero) carnosum obductum.
336. ? *Merisma P.* Ascoma subcoriaceum irregulariter ramosum s. incondito-laminosum, hymenio undique obductum, subtus magis ascophorum.
337. *Hyphoderma W.* Ascoma ex hyphis ramosis, ad extremitates in ascos subclavatos desinentibus contextum, adnatum, dimidiatum pileatove-flabelliforme, ex ascis subclavatis emeris epiculosum s. pulvрerulentum.
p. fistulosi, ascomatibus sessilibus stipitatisve, ex alteraque parte tubulos, intus hymenio vestitos exserentibus.
338. *Polyporus Mich.* Ascoma fibroso-floccosum, ex aversa parte tubulos cylindricos jugiter connexos exserens stratoque foraminuloso veluti exponctum.
339. *Holctus Dill.* Ascoma varium, subtus tubulis cylindricis discretis (s. inter se divellendo secedentibus) obsitum.
340. *Buglossus Wahlb.* Ascoma succoso-carnosum, subtus pavimento floccoso-verrucoso, singulis verrucis in tubulos distinctos dein hiantibus obducto ornatum.
g. radulares, ascomatibus varie, ex alteraque (inferiore) parte tubercula verrucosa s. radulas subuliformes informantibus.
341. *Hydnus L.* Ascoma varium (adnatum, dimidiatum pileatum s. merismoideum) ex alteraque parte stratum conforme ex radulis propriis subulatis s. incisis muricatum exserens.

342. *Irpea Fr.* Ascoma dimidiato-s. resupinato-pileatum, subtus ex scamnis seriatim s. reticulatim exaratis radulas compressas s. teretiusculas informans.
343. *Sistotrema Fr.* Ascoma dimidiatum, subtus radulis brevibus irregulariter dispositis planis gyroso-flexuosis lamellosis interruptis exaratum.
344. *Phlebia Fr.* Ascoma effuso-resupinatum, supra plicato-rugosum ascophorum.
345. *Merulius Hall.* Ascoma resupinatum s. inconditopileatum, ex aversa pagina hymenium gyroso-flexuosum exaratum informans.
346. *Cantarellus Adans.* Ascoma e basi stipitiformi in pileum dimidiatum s. infundibuliformem desinens, subtus plicis subparallelis s. trabeculis conexo-reticulatis subdecurrentibus exaratum.
347. *Daedalea P.* Ascoma suberosum tenax, dimidiato-s. integro-pileatum, subtus plicas conformes obtusas scalari-lamellares simplices dichotomasve, isthmis porosis s. lacunosis interceptos sublamellares exsereus.
348. *Agaricus L.* Ascoma carnosum s. membranaceum stipitatum, subtus lamellas parallelas distinctas conferruminatas utrinque ascophoras, velo fugaci s. persistente primum manitas expandens.
349. *Rhipidium W.* Ascoma carnosum stipite subexcentrico suffultum, subtns e lamina distiucta lamellas propexas, dein acie longitudinaliter fissas revolutas exserens.
350. *Scaphophorum Ehrenb.* Ascoma coriaceum dimidiatum, subtns hymenio liris geminato-parallelis, dein ad latuscula replicata ascophoris exarato vestitum.

Ordo VI. Pyrenomycetes W. Pyrenia figura, mole, colore et superficie varia, plerumque tornata nucamentacea s. tuberiformia, clausa s. poro hiatuque re-

clusa, intus apparatu ascode veluti nucleato s. pulpoſo foeta, basi ipsis cubilibus s. aſtromate vario excepta.

A. cryptostomi, pyreniis globosis dimidiatisco, aſtomis s. cryptostomis, ſponte ſaltem non dehifentibus.

351. *Phoma Fr.* Pseudopyrenium hypophloeodes, ſupra ſumma epidermidis pellicula tectum, puiſtulosum, intus grumosum.
352. *Ceuthospora Fr.* Pseudopyrenium hypophloeodes, cum epidermide cubilium obvelaute innatum umbonatum, intus grumosum, vertice irregulariter dehifens mentiens.
353. *Perispodium Fr.* Pyrenium subcarnosum subglobosum, intus pulpa ascophora gelatinosa farctum.
354. *Leptothyrium Kz.* Pyrenium dimidiatum ſcutiforme longitudinaliter ſulcatum, ascos solutos fusiformes obducens.
355. *Actinothyrium Kz.* Pyrenium dimidiatum ſcutiformer radiato-fibroſum, ſporidia fusiformia obtegens.
356. *Lasiobotrys Spr.* Pyrenium subcoriaceum, apice depreſſum, intus massu granuloſo-gelatinosa coacta, ascis globosis foeta farctum.
- B. sphinctrostomi, pyreniis globosis, primum clausis, dein ex vertice tenuato pulpa sporophoram eructantibus s. constrictam monstrantibus.*
357. *Cytispora Fr.* Paſendopyrenium membranaceum celluloſo-difforme, tuberculo grumoso hypophloeodi inſculptum, pulpa sporophoram cirrhosam eructans.
358. *Helicobolus W.* Pyrenium membranaceum sphacelicum synphloeodes uniloculare, pulpa ascophora gelatinosa farctum illamque dein ex ascidiis follicularibus hyalinis conflatam ex vertice tenuato eructans.
359. *Coecobolus W.* Pyrenium membranaceum inſculptum, pulpa gelatinosa, dein ex vertice dimoto denuoqne contracto, veficulae opacae instar propulsa coronatum.

360. *Alphitomorpha* W. Pyrenium carnosum versicolor (primum album, mox flavescent, deinde melanophaenum), basi capillito peripherico-radiante cum stromate hyphideo connexum, dein ex vertice dimoto utriculum hyalinum transmetteas.
361. *Sphaeronaema* Fr. Pyrenium verticale subcylindricum, dein pulpa coacta ex vertice hiant transmissa coronatum.
362. *Thelebolus* Tod. Pyrenium subrotundum urceolato-ventricosum gelatinoso-tenacellum, ex vertice hiant vesiculam globosam excutiens.
363. *Sphaerobolus* Tod. Pyrenium rotundum, deinstellatum sissum vesiculamque globosam, tunica stipato-membranacea, mox elastice inversa inclusam projiciens.
- C. customi, pyrenis membranaceis, primum vertice papillato clavis, dein osculo tornato reclusis.
364. *Sphaeria* Hall. Pyrenium membranaceum papillatum papillaque decidua osculo tornato, labiato rostellato pertusum, simplex ipsis cubilibus s. stromati varie figurato exceptum, veluti compositum, nucleo ascidiis elongatis foeto pulposo-gelatinoso farctum.
- A. astromaticae, pyrenis simplicibus distinctis, stromate destitutis, ab ipsis cubilibus satis.
- a. leptostomae, pyrenis subglobosis, vertice obsolete papillato pertusoque cubilia parce permeantibus.
- + leioptyriæ, pyrenis calvis.
- * synphloeodeæ, pyr. cum cubilibus connatis.
- * limbatae, pyr. epiphyllinis, aream limbo discolore cinctam, veluti aridam obsidentibus.
— Sph. vagans, Spinaciae, Gentianaecola, Brassicaecola, Vincetoxicæ, Dianthi, Fragariaecola, Cornicola, Juglandicola, Castaneaecola, frondicola, Hederaecola, Quercicola, Buxicola, Pyrolæ, Tremulaecola, stemmatea, Linnaeac, crispans, cruenta, Ostruthii, Aegopodii.

**** effusae pyr. effusis.** — Sph. culmorum, caulincola, stipata, acerina, marginata, Helicis, corylaria, leptidea, Empetri, Epilobii, Geranii, leguminum, Hederae, punctiformis, radiata, sparsa, atomaria, analepta, elliptica, chartarum, epimyces, Cucurbitacearum, mucosa, Agaricola.

**** hypophloecodeae, pyr. simpl. vertice summam epidermidis pelliculam scindendo s. simul prehendendo penetrantibus.** — Sph. Eryngii, sentina, epicymatia, hians, stercoraria, sthenograpta, eustoma, duplex, Pinastris, Vincae, Ruscii, Erynymi, Taxi, delitescens, Corni, foveolaris, sarmientorum, Visci, apiculata, sepincola, culmifraga, fissa, Micula, inquilia, herbarum, Lonicerae, rugosa, protracta, proruptipens, Spartii, spurca, Amorphae, eructans, Xylostei, inquinans, maculata, conspurcata, succincta, pertusa, Eremita, urceolata, papillata, patellaria, limitata, clypeata, seminuda, albicans, Mamma, Tiliæ. — Sph. vivax, ditopa, Corticia, decodens, pruinosa, anserina, ocellata, eunomia, rhodostoma.

***** epiphloecodeae, pyr. praeter basin adnatam vertice liberis.** — Sph. stigmatella, congregata, myriocarpa, vilis, surculorum, complicata, mycofila, polveracea, mobilis, microthelia, Citrum, sanguinea, episphaeria, Resinæ, Granatum, Auranantium, Peziza, mitrosa, Pulvis pyrius, coidea, obducens, stercoraria, spermoides, operculata, livida, Nucula, Rhamnii, moriformis, pomiformis, medullaris, Bombarda.

†† eriopyreniae, pyrenis vestitis.

*** hypophloecodeae, pyr. latitantibus.** — Sph. xantholeuca, larvata, rufa, hirta, lanata.

*** epiphloecodeae, pyr. liberis.** — Sph. exilis, depilata, Vermicularia, comata, herpotricha, polytricha, erythrella, canescens, calva, basitrichia, crinita, araneosa, strigosa, horridula, hispida, pilosa, auricoma, ovina, mutabilis, acinosa.

- a. *platystomae, pyreniis vertice rimoso-scissis osculoque labiato cristatoe reclusis.*
 † *leiopyreniae, pyreniis calvis.*
 * *rimo-ae, pyr. vertice rimoso.* — Sph. hysterina, conigena, glaucina, oppilata, Berberidis, barbara, Cistula.
 ** *labiatae, pyr. vertice cristato s. labellato.* — Sph. caulum, Arundinis, angustata, compressa, cristata, libera, ventricosa, cirrhosa, excipuliformis, macrostoma, pileata.
 †† *eriopyreniae, pyreniis vestitis.* — Sph. Hericiam, sanguinolenta, biformis.
- c. *ceratostomae, pyreniis in collum brevius conoideum s. longius corniculatum, apice pertusum productis.*
 † *epiphyllae, pyreniis epiphloeoideis.*
 * *leiopyreniae, pyr. calvis.* — Sph. erythrostoma, Grossulariae, amoena, setacea, aciculatis, pungens, melanostyla, curva, Gnomon, tubaeformis.
 ** *eriopyreniae, pyreniis vestitis.* — Sph. Avellanae, barbata.
- †† *epiphytæ, pyr. ex caulibus lignisque putridis subeuntibus.* — Sph. microscopica, atro-rubens, Solani, sulfulta, redimita, Doliolum, Lingam, Carduorum, Bardanae, iofaciens, brachystoma, orthoceras, putaminum, rubella, abstrusa, trichostoma, acuta, crassicollis, Penicillus, pleurostoma, rostellata, stricta, cuspidata, rostrata.
- B. *stromaticæ, pyreniis distinctis s. vertice umbonato confluentibus, stroma varium, nonnisi figuratum obstruentibus.*
- a. *phlebostromaticæ, pyreniis ex stromate serpentino-s. dendriticō -figurato, fibrilloso subeuntibus.* — Sph. venulosa, dendritica, veronicosa, geographicā, reticulata, abjecta, nervisequia, stellaris, Asteroma, Himantiae.
- b. *triptostromaticæ, pyreniis ex stromate grumoso syn- s. hypophloegode incondito et incuso subeuntibus.*

a. cubiculares, pyreniis stromate grumoso effuso, sub epidermide decolore delitescente exceptis.

† *brachystomae, pyr. subastomis.* — Sph. thora-racella, metaena, picea, denigrata, centhocarpa, bifrons, coenosa, Lirella, polita, Graminis, filicina, rimosa, Junci, striaeformis, macularis, insularis, conglomerata, Oedema, cellulosa, Anethi, subscripta, arundinacea, longissima, signans, Podagrariae, Trifolii, atronitens, Ulmi, Dothidea.

†† *ceratostomae, pyr. in colla exserta productis.* — Sph. Coryli, fimbriata.

g. circinatae, pyr. hypophloeodeo-lectis circumantibus collisque conniventibus epidermidem parcus longiusque permeantibus.

† *brachystomae, pyreniorum collis vix prominulis.* — Sph. Aethiops, pusilla, syncephala, convergens, acclinis, socialis, conjuncta, umbilicata, decumbens, quaternata, vasculosa.

†† *ceratostomae, pyreniorum collis exsertis.* — Sph. hypodermia, operta, Strumella, Persoonii, coronata, pentagona, Friesii, ciliatula, pulchella.

y. obvallatae, pyr. hypophloeodeo-latitantibus in orbe aggregatis, collisque convergentibus stroma grumosum penetrantibus s. corculum centrale circumvallantibus. — Sph. dolosa, tessera, stilbostoma, capsularis, ambiens, salicina, deplanata, leucopis, turgida, leiphaemia, Abietis, Pini, decorticans, lixivia, dimorpha, tortuosa, ciliata.

d. incusae, pyr. aggregatis, stroma cinctum verticeque incuso-pulverulento prominulum perforantibus. — Sph. clandestina, cubicularis, tessellata, dissepta, circumscripta, Radula, angulata, scutellata, tumida, Kunzei, microstoma, melanostoma, diatrypa, cincta, leucostoma, nivea.

e. vasculosae, pyr. distinctis, conceptaculo vasculoso hypophloeode exceptis.

† *leplostomae, pyr. umbilicato-papillatis.* — Sph.

- *Carpini*, fibrosa, corniculata, syngenesia, anomia, enterolensa, gastrina.
- †† *ceratostomae*, pyr. collis assertis. — Sph. ceratina, detrusa, fascicularia, *Hystrix*, ceratosperma, ferruginea, Sorbi, Prunastri.
- c. *hyphostromaticas*, stromate fibroso hyphoideo in subiculum lanosum contecto.
- † *leptostomae*, pyr. papillatis. — Sph. contexts, inferialis, elongata, flavescens, aurantia, viridis, tristia, cinerea, violacea, byssiseda, *Aquila*, *Rachodium*, *Trichoderma*.
- †† *ceratostomae*, pyr. rostellatis. — Sph. dryina, Stilbum, lucifuga, lagenaria.
- d. *pachystromaticae*, pyreniis stroma coactum figuratum ob-sidentibus s. insculptis.
- a. *ectopyreniae*, stromate subrotundo carnosu, pyreniis liberis obpresso.
- † *leiopyreniae*, pyr. calvis. — Sph. chnaumatica, flacca, palicaris, baccata, acervalis, populina, varia, nancosa, pithyophila, conglobata, panicea, *Cucurbitula*, *Ribis*, sinopica, *Laburni*, Aurora, coccinea, chrysitis, decolorans.
- †† *eritopyreniae*, pyr. vestitis. — Sph. Vaccinii, decora.
- β. *entopyreniae*, pyreniis stromate figurato insculptis.
- † *effusae*, pyr. confluentibus stroma inconditum effusum mentientibus. — Sph. simeti, lineata, parallela, insitiva, *Melogramma*, *sphaerococca*, lata, flavo-vires, velutina, *Stigma*, undulata, scabrosa, spinosa, apiculosa, spinifera.
- †† *pulvinatae*, stromate subcarnoso hemisphaericō, epidermide scissa succincto.
- * *calvae*, stromate primitus calvo. — Sph. rubra, ochracea, *Ribesia*, friabilis, quercina, bullata, sordida, lanciformis, lenta, succenturiata, lutea, verruciformis, favacea, pilulifera.
- ** *vestitae*, str. primum velutino, deinceps coacta s. calvescente.
- * *hyphoideae*, stromatis initio hyphoideis, dein

coccinis. — Sph. typhina, gelatinosa, rufa, citrina, lateritia, rosea, deusta.

**** velutinae, stromate primum velutino-pulverulento dein calvescente.** — Sph. confluens, coprophila, botryosa, nummularia, rubiginosa, uda, serpens, fusca, rubricosa, rubiformis, fragiformis, Tubulina, concentrica.

7. discoideae, stromate in discum dilatato. — Sph. copularis, Poronia.

8. claratae, stromate figurato stipitato. — Sph. filiformis, carpophila, Hypoxylon, stuppea, digitata, balbosa, polymorpha, alutacea, militaris, capitata, ophioglossoides.

D. astomi, pyreniis subrotundis s. obovatis, stromate destitutis, foeturam ascoden variam, sive intra tegminis laminas, sive nuclei carnosi instar comprehendentibus.

a. coclopyrenii, pyreniis intus vacuis, intra tegminis laminas foetis.

265. Hydnocaryon IV. Pyrenium nuciforme globosum classum, intra tegminis laminas conformes, ascis folliculatis, sporidia 10 - 12 seriato-connata gerentibus foetum.

266. Clathrus Mich. Pyrenium volva, deinde in lacinias dehiscente suffultum sessile, in ramices reticulato-connexos, massæ uida distentos cancellatum.

b. angelopyrenii, pyreniis clavis, nucleo gelatinoso, carnoso s. calculoso faretis.

† *hyalepyrenes.*

267. Ariosporium Kz. Pyrenium globosum minantissimum, basi adfixum, aporidiis pulpa gelatinosa exceptis foetum.

268. Pyrenium Tod. Pyrenium subrotundum sessile arrhizum nuciforme corticatum, intus primum pulposum, deinde in massam conformem indurescens.

†† *sarcopyrenes, pyreniis carnis, ascis subclavatis s. sphaericis, nunc conglobatis, nunc ad venas congestis, nunc disperse foetis.*

369. *Bothidea* Fr. Pyrenium subrotundum hypo-s. epiphloeoedes clausum, nucleo cereo, ascis erectis suclavatis, sporidia simplicia foventibus, congregatis foetum.
370. *Endogone* Lk. Pyrenium globosum pisiforme, extus tegmine tenui floccoso corticatum, intus grumosum coactum, ascis sphaericis membranaceis, sporidiorum congeriem foventibus interspersis foetum.
371. *Aschion* Theophr. Pyrenium subglobosum arhizum tuberiforme hypogaeum corticatum, intus demum ascis vesiculosus appendiculosis, sporidia 3-5 aspera s. muricata globosa foventibus, carnem coactam venoso-ramosam dilutiorem sterilem infarcientibus.
372. *Rhizopogon* Fr. Pyrenium globosum tuberiforme hypogaeum, e basi radicante reticulo filamentoso obtextum, intus carnosum, venis distinctis caeculatis, ad latuscula ascis globosis ecaudatis foetum.
- †† pycnopyrenes, pyreniis subrotundis pyxidatiave, intus ascoperas distinctas foventibus.
373. *Polyangium* Lk. Pyrenium subrotundum vesiculosofloccosum, ascoperas oblongas majusculas, massa grumosa scatentes circumcludens.
374. *Cyathus* Hall. Pyrenium coriaceum vasculosopyxidatum, primum obturatum, intus pulposum, dein apertum, ascoperas lenticulares, margine s. centro incumbentes monstrans.
375. *Polysaccum* DC. Pyrenium subclavatum, vertice subgloboso irregulariter dehiscens, ascoperis discretis inaequalibus, cellulas infarcientibus foetum.

INDEX AUCTORUM IN HOC OPERE CITATORUM.

- Ach. Erik Acharius: *Lichenographiae suecicae prodromus*. Lin cop. 1798. — *Methodus lichenum*. Holm. 1805. — *Lichenographia universalis*. Gottingae 1810. — *Synopsis methodica lichenum* Lund. 1814. — *Observationes in Actis acad. suec. holmiens. et societ. Linnaeanae*.
- Adans. Mich. Adanson: *Familles des plantes*. Paris. 1763.
- Agardh. Carol. Agardh; *Synopsis algarum Scandinaviae*. Lund. 1817. — *Species Algarum rite cognitae*. Lund. 1820. — *Systema Algarum*. Lund. 1824. — *Aphorismi botanici*. Lund. 1827. — *Observationes in phylax. bot. ratisbon.*
- A. et Schw. J. B. ab Albertini et L. Dav. a Schweinitz: *Conspectus fungorum in agro niskiensi crescentium*. Lipsiae 1805.
- Arnott. Walker Arnott: *Nouvelle methode des especes des Mousses* in *Annal. societ. Linn. Parisiensis*. 1826.
- B. J. Georg. C. Batsch: *Elenchus fungorum*. Hal. 1783. — *Continuatio I. II.* Hal. 1786-1799.
- Batt. J. A. Battarra: *Fungorum agri ariminensis Historia*. Favent. 1759.
- Bauh. Caspar Bauhinus: *Phytopinar*. Basil. 1813.
- Bauh. Joann. Bauhinus: *Historia pl. universalis*. Tom. III. Ebroduni 1650.

XLVIII Index auctorum citatorum.

- Bernh. J. Fr. Bernhardi: *Observationes in Schraderi diario*. 1799.
- Bisch. Gottl. Wilh. Bischoff: *Die kryptogamischen Gewächse*. I. II. Liefer. Norimb. 1828.
- Biven. Anton Bivona-Bereardi: *Stirpium rariorum in Sicilia provenientiam*. Palerm. 1809.
- Blackw. Elizabeth Blackwell: *a curious herbal, containing 500 cuts of the useful plants*. Vol. II. Lond. 1737.
- Bland. Otto Christ. Blandow: *Musci frondosi exsiccati*. Fascic. 4.
- Bolt. Jac. Bolton: *Filices britanicae*. Huddersf. 1785. — *Geschichte der merkwürdigsten Pilze*, interprete Willdenow. Berl. 1795.
- Bor. J. B. M. Bory de St. Vincent: *Mémoire sur les genres Conserva et Bysus*. Bord. 1797. (cf. Usteri Annal. XXIV. p. 95.)
- Braun. Fr. Ant. a Braunne: *Salzburgische Flora*. Salisb. 1797.
- Brid. Sam. El. à Bridel-Brideri: *Muscologia recentiorum*. Goth. 1797. — *Methodus nova muscorum*, Ibid. 1819; — *Bryologia universa*. Vol. II. Lips. 1826.
- Bruch. Bruchii observationes in phylgr. bot. ratisb. de muscis fl. german.
- Bull. Bulliard: *Herbier de la France*; avec 600 planches. Paris 1780.
- Buxb. J. C. Buxbaum: *Enumeratio plantarum in agro halensi crescentium*. Hal. 1721.
- Chev. F. F. Chevallier: *Histoire des Hypargyrons*. Paris 1824.
- Clus. Carolus Clusius: *rariorum plantarum historia*. Antw. 1601.
- Crom. Crome: *Sammlung deutscher Laubmose*. Schwerin. 1803.
- Curt. Gul. Curtis: *Flora londinensis*. Lond. 1777.
- DC. Aug. Pyramus De Candolle: *Flore française* Tom. VI. Paris 1805.

- Bükk. Jacob Bickerton: *Fasciculi plantarum cryptogamicarum Britanniae*. Lond. 1785.
- Dill. J. Jac. Dillenius: *Historia muscorum*. Oxon. 1741.
- Hillw. Ludw. Weston Dillwyn: *Synopsis of the British Confervae*. Fasc. 1—20. Lond. 1802.
- Ditm. L. P. Fr. Ditmar: *Die Pilze Deutschlands*. Vol. I. J. curante Sturm. Norimb. 1817.
- Rub. J. E. Duby: *Botanicon gallicum*. T. II. Paris 1828.
- Encl. J. A. P. Ducluzeau: *Essai sur l'histoire naturelle des Conferves des environs de Montpellier*. Montpellier 1805.

220

- Ehrenb. Christ. Gothofr. Ehrenberg: *Sylvae mycologicae berolinenses*. Berol. 1818.
- Ehrh. Friedrich Ehrhart: *Beyträge zur Naturkunde*. Th. VI. Hannov. 1787. — *Plantae cryptogamiae L. exsiccatae. Decad. 32*. Hannov. 1785—93.
- Engl. bot. *English Botany, or coloured figures of British plants, by Edward Smith and James Sowerby*. Vol. 20. Lond. 1790—1814.
- Etch. Fr. G. Eschweiler: *de fructificatione generis Rhizomorphae commentatio*. Elberf. 1822. — *Litteraturblätter*. Norimb. 1828—31.

221

- Fée. A. L. Fée: *Essai sur les cryptogames des écorces exotiques officinales*. Paris 1824.
- Ficin. Heinri Ficinus: *Flora der Gegend um Dresden*. Dresden. 1822.
- Floerk. H. Gust. Floerke: *Deutsche Lichenen*. Liefer. 10. Berol. 1815 et observat. de lichenibus germ. in *Actis soc. berol. et wetterav.* — *De Cladonia, difficillimo lich. genere commentatio nova*. Rostoch 1828.
- Flor. dan. *Icones plantarum in regnis Daniae et Norvegiae nascentium, ad illustrandam Floram danicam*. Volum. I. III. edita a G. Christ. Oeder. Volum. IV. VI. ed. Otto Fr. Müller. Volum. VI. VII. ed. Martin

Vahl. Volum. VIII — X ed. J. Wilken Hornemann.
Hafniae 1766 — 1831.

Fr. Elias Fries: *Observationes mycologicae.* Havn. 1815.
— *Systema mycologicum.* Vol. III. Lund. 1821. —
Observationes in: *Kunze mykologisch. Heft.* Tom. II. et
in: *Schlechtd. Linnaea.* 1831. — *Schedulae criticae de
lichenibus exsiccatis Sueciae.* Lund. 1824. — *Stir-
pes agri fennionensis.* Ibid. 1825. — *Elenchus Fun-
gorum, sistens comment. in Systema mycolog.* Gry-
phisw. 1828.

Funk. H. Christ. Funk: die kryptogamische Gewächse
des Fichtelgebirges. Fasc. 31.

Fürnr. Fururohr: *observ. in philyr. bot. ratisb.* 1830.

Gled. J. Theoph. Gleditsch: *Methodus fungorum.*
Berol. 1753.

Grev. Rob. Kaye Greville: *Scotish cryptogamic Flora.*
Vol. IV. Edinb. 1822.

Guett. J. Etienne Guettard: *Mémoires sur les diffe-
rentes parties d'histoire naturelle.* Vol. V. Paris.
1768 — 1783.

Hag. C. Gothofr. Hagen: *Tentamen historiae lichenum.*
Regiom. 1782.

Hall. Albertus ab Haller: *Historia stirpium Helvetiae
indigenarum.* Tom. III. Bern. 1768.

Hedw. J. Hedwig: *Descriptio et adumbratio muscorum
frondosorum.* Vol. IV. Lips. 1797. — *Theoria ge-
nerationis et fructificationis pl. cryptogamic.* Lips.
1798. — *Species muscorum frondosorum* ed. Schwaeg-
richen. Lips. 1801.

Hepp. Philipp Hepp: *Lichenen-Flora von Würz-
burg.* Maiuz 1824.

Hill. Joannes Hill: *the vegetable System.* Vol. 26.
Lond. 1759 — 1775.

Hoffm. Georg. Franc. Hoffmann: *Enumeratio liche-
num.* Erlang. 1784. — *Vegetabilia cryptogama.* Fasc. 2.

- Ibid. 1787. — *Plantae lichenosae*. Vol. III. Lips.
 1789. — *Phytographische Blätter*. Gott. 1793.
Deutschlands Flora, oder bot. Taschenbuch. Tom. II.
Cryptogamie. 1795.
- Holmsk.* Theod. eques Holmskiold: *beata ruris otia,*
fungis danicis impensa. Havn. 1790.
- Hook.* Gul. Jackson Hooker: *Jungermanniarum icones*.
 Fasc. 20. Lond. 1813. — Idem socio Taylorio (*Hook.*
 et *Tayl.*): *Muscologia britanica*. Lond. 1818.
- Hirsch.* Friedr. Hornschuch: *Dissertatio de Voitia*
et Systylio. Erlang. 1818. — *Bryologia germanica*,
oder Beschreibung der in Deutschland und in der
Schweiz wachsenden Moose; sociis Nekesio et Sturmio.
 Th. II. Nürnb. 1823.
- Huds.* Gul. Hudson: *Flora anglica*. ed. II. Lond. 1778.
- Humb.* Alexander ab Humboldt: *Florae friburgensis*
specimen. Berol. 1793.
- Jacq.* Nic. Jos. a Jacquin: *Collectanea ad botanicam*
et hist. natural. spectantia. Vol. V. Vienn. 1786-1796.
- Jungh.* Junghuhu; *observationes in: Schlechtendalii*
Linnaea. 1831.
- Jurg.* G. H. B. Jürgens: *Algae aquatice, quas ad*
titora maris dyn. Jeveranam et Friesiam orient. al-
luentis rejectas colligit et illustravit. Fasc. 19. Jever
 1819.
- Kaulf.* Georg Fr. Kaulfuss: *Enumeratio Filicum*.
 Lips. 1824. — *Erfahrungen über das Keimen der*
Charen. Leipzig. 1825.
- Kz.* Gustav Kunze: *mykologische Hefte*. I. II. Leip-
 zig. 1817. 1823.
- Lmr.* J. Vineent Felix Lamouroux: *Dissertation sur*
plusieurs espèces de Fucus. Agen. 1805. — *Essai*
sur les Thalassophytes. Paris 1813.
- Leers.* J. Dan. Leers: *Flora herbornensis*. Herb. 1775.

- Leyss.** Fr. Guili. a Leysser: *Flora halensis.* Es. II.
Hal. 1783.
- Lightf.** J. Lightfoot: *Flora scotica.* Lond. 1777.
- Liljeblt.** Sam. Liljeblad: *Utkast til en svensk Flora.*
Ups. 1798.
- Lindenb.** J. B. G. Lindenbergs: *Synopsis Hepaticarum europaearum in novis Act. acad. caes. Leopold.*
Vol. XIV, et seorsim prædict. Bonn. 1829.
- Lk.** H. Friedr. Link: *Observationes in ordines pl.*
naturales. Dissert. I. H. in Berl. Magaz. 1809. —
Species pl. ed. Willdenow, continuata a Link. Tom.
VI. pars I. Berol. 1824.
- L.** Carolus Linnaeus: *Species plantarum.* Holm. 1762.
- Lois.** J. L. A. Loiseleur — Deslongchamps:
Flora gallica. Paris. 1806. — *Notice sur les pt. à*
ajouter à la fl. franc. in *Journ. bot.* Vol. II. et
seorsim.
- Lyngb.** Hans Xian Lyngbye: *Tentamen hydrophy-*
tologiae danicae. Hava. 1819.
- Mapp.** Marc. Mappus: *Historia pl. alsaticarum.* Argent.
1742.
- Mart.** C. Ph. Fr. Martius: *Flora cryptogamica et*
langensis. Norimb. 1817.
- Mentz.** Christ. Mentzel: *Pugillus plantarum rarerum.*
Berol. 1682.
- Mert.** Franc. Carl Mertens: *obseruat. in Transact.*
Linn. Societ. et in Jürgens. Alg. aquatice.
- Meyen.** Jul. Ferd. Meyen: *obseruat. in Schlechten-*
dal's Linnaea 1830.
- Mich.** Petr. Aut. Michelii: *Nova plantarum genera.*
Florent. 1729.
- Moris.** Robert Morison: *Historia plantarum universa-*
salis. Oxon. 1715.
- Moug. et Nestl.** Mougeot et Nestler: *Stipula*
cryptogamicas Fogosorum. Fasc. III. Argent.
- Neck.** Natal. Jos. a Neckar: *obst. in Ueltpalat.*

Nees. C. G. Göthe: Nees ab Eeckbeck: das System der Pilze und Schwämme. Nürnberg. 1817; et socio Hornschuchio (N. et Hornsch.): *Dryologia germanica*. Nitsch. Chr. Ludw. Nitsch: *Beytrag sur Infusorien-Kunde*. Hal. 1817.

Otto. J. G. Otto: *Versuch einer Anordnung der Agaricorum*. Leipzig. 1816.

Pal. Beauv. A. M. Fr. Palisot de Beauvois: *Mycologie, ou traité sur les mousses* in *Mém. de la societ. Linn. de Paris* I. — *Prodrome de cinq. et six. famille de l'Aethogamie*. Paris 1805.

Pers. Christ. Henr. Persoon: *Observationes mycologicae*. Lips. 1796. — *Commentatio de fungis clavaceiformibus*. Lips. 1797. — *Tentamen dispositionis fungorum*. Lips. 1797. — *Icones et descriptiones fungorum minus cognitorum*. Lips. 1799. — *Synopsis methodica fungorum*. Gott. 1801. — *Mycologia europaea*. Vol. II. Erlang. 1821. — *Observat. in Usteri Annal.* Pohl. J. Ad. Pollich: *Historia pl. in Palatinatu electorali sponte crescentium*. Tom. III. Mainz. 1776.

Robert. J. Friedr. Rebentisch: *Prodromus florae neomarchitae*. Berol. 1804. — *Index plant. circa Betulinum sponte crescentiam*. Berol. 1805.

Regensb. bot. Z.: Regensb. bot. Zeitung, von D. Heinr. v. Hoppe, fortgesetzt von Eschweiler.

Reich. Rich. Reichen: *Flora cantabrigensis*. Cant. 1785.

Rosk. J. Christ. Roskilius: *Deutschlands Flora*. Frankf. 1812. — *Observat. in annal. wetterav.*

Roth. Alb. Gail. Roth: *Tentamen florae germanicae*. Tom. III. Lips. 1788. — *Catalecta botanica*. Lips. 1797.

Rupp. Henr. Bernh. Ruppius: *Flora jenensis*, ed. Balzer. Jenae. 1745.

- Schaeff.* J. Christ. Schaeffer: *Fungorum, qui in Palatinatu et Bavaria circa Ratisbonam nascuntur, icones.* Tom. IV. Ratisb. 1792 — 70.
- Schaer.* Ludw. Imman. Schaeerer: *Lichenum helveticorum spicilegium Bern.* 1823. — *Umbilioariae helveticae; in Musée helveticq.* 1.
- Schk.* Christ. Schkuhr: *Die vier und zwanzigste Classe des Linnéischen Pflanzensystems.* Wittenb. 1809.
- Schlctd.* Diter. a Schlechten d: *Flora berolinensis.* Tom. II. Berol. 1825. — *Linnaea.* Berol. 1826.
- Schl.* J. C. Schleicher: *plantae cryptogam. Helveticæ sessiles.* Cent. VI.
- Schmid.* Casim. Christ. Schmidel: *Icones et analyses plantarum.* Norimb. 1782.
- Schrad.* Henr. Ad. Schrader: *Spicilegium floræ germanicae.* Hannov. 1794. — *Systematische Sammlung kryptogamischer Gewächse.* Gott. 1795. — *Journal der Botanik.* Gott. 1799 — 1810.
- Schrk.* Franc. de Paula Schrank: *Bayersche Flora.* München 1799.
- Schrbc.* J. Xtian Dan. Schreber: *Spicilegium floræ lipsiensis.* Lips. 1771. — *De Phasco observationes.* Lips. 1772.
- Schultz.* C. Fr. Schultz: *Supplementum ad floram stargardiensem.* Neobrand. 1819. — *Recensio gener. Barbulae et Syntrichiae, in nov. Act. nat. curios. caes. soc. XI.*
- Schum.* Christ. Fr. Schumacher: *Enumeratio planarum in partibus Selandiae septentr. et orient.* Havn. 1801.
- Schwaegr.* Friedr. Schwaegrichen: *Supplementum I. II. ad J. Hedwigii species muscorum.* Lips. 1811. *Historiae muscorum hepatic. prodromus.* Lips. 1814.
- Scop.* J. Aut. Scopoli: *Flora carniolica.* Ed. II. Viennæ. 1772.
- Sm.* Edward Smith: *Flora britanica, curante Reimer.* T. III. Turic. 1804. — *Engl. botany.*

- Sow. James Sowerby: *Coloured figures of English Fungi*. Lond. 1796. — *Supplementum*. 1815.
- Spr. Curtius Sprengel: *Florae halensis tentamen novum*. Hal. 1806. — *Mantissa I. II.* 1807. — *Anleitung zur Kenntniß der Gewächse*. Halle 1802. Ed. II. 1817. — *Neue Entdeckungen im ganzen Gebiete der Pflanzenkunde*. B. III. Leipz. 1820.
- Stackh. J. Stackhouse: *Nereis britannica*. ed. II. Oxon. 1816.
- Stark. J. Starke: *Observat. in Schrad. Journ.* 1799.
- Strauss. Fr. a Strauss: *observ. in den Annalen der witterauisch. Gesellschaft*. II.
- Strempl. G. Fr. Strempl: *Filicum berolinense synopsis*. Berol. 1822.
- Sturm. Jac. Sturm: *Deutschland's Flora*. Nürnb. 1799.
- Sw. Olaus Swartz: *Flora Indiae occident.* Vol. III. Erlang. 1806. — *Dispositio systematica muscor. frondosorum Sueciae*. Erlang. 1798. — *Synopsis Filicum*. Kilon. 1806. — *Observ. in act. holm.*
- Thor. J. Thore: *Essai d'une Chloris du département des Landes*. Dax. 1803.
- Thuill. J. L. Thuillier: *Flore des environs de Paris*. Paris 1799.
- Tod. H. Jul. Tode: *Fungi mecklenburg. selecti*. P. II. Lüneb. 1790.
- Tournef. Jos. Pitton Tournefort: *Institutiones sc̄ herbariae*. Tom. III. Paris 1719.
- Trattin. L. Trattinick: *Fungi austriaci*. Vindeb. 1800. — *Die essbaren Schwaemme des oesterr. Kaiserstaates*. Wien 1809.
- Trentep. J. Fr. Trentepohl: *Observat. in Rothi catalepsis*.
- Turn. Dawson Turner: *a Synopsis of the British Fuci*. Lond. 1802. — *Muscologias hiberniae spicilegium*. Yarm. 1804.

- Vaill. Sebast. Vaillant: *Botanicon parisienne*. Leid. 1727. — *Observat. in Act. acad. Paris* 1719.
- Vauch. J. Petr. Vaucher: *Histoire des Conserves d'eau douce*. Genève 1803.
- Vill. D. Villars: *Histoire des plantes du Dauphiné*. Vol. IV. Grenobl. 1786.
- Voit. J. G. Voit: *Historia muscorum frondosorum in ducatu heripopolitano crescentium*. Norimb. 1812.
- Wahlenb. Georg Wahlenberg: *Flora lapponica*. Berol. 1812. — *Flora suecica*. Tom. II. Holm. 1824.
- W. Fr. Guilielm Wallroth: *Annus botanicus*. Hal. 1815. — *Schedulae criticae de plantis floriae halensis selectis*. Hal. 1822. — *Naturgeschichte der Flechten*. Th. II. Frankfurt a. M. 1825. — *Naturgeschichte der Säulchen-Flechten*. Nordh. 1829. — *Observationes in N. Verhandlungen der Berliner Naturf. Gesellsch. et in Annal. weiteraviciis*.
- Web. G. Henric. Weber: *Spicilegium florae gottigenensis*. Goth. 1778.
- W. et M. Fr. Weber et Dan. Henr. Mohr: *Naturhistor. Reise durch Schweden*. Gott. 1804. — *Deutschl. kryptogamische Gewächse*. Leipzig 1804. *Beyträge zur Naturkunde*. Kiel. 1805. — *Grossbritaniens Conserven, nach Dillwyn bearbeitet*. Hst. 4. Gotting. 1803.
- Weig. Christ. Ehrenfr. a Weigel: *Flora pomeranorugica*. Berol. 1796.
- Weis. Fr. Guil. Weis: *Plantae cryptogamicae florae Gottingensis*. Gott. 1770.
- Wigg. Fr. Henric. Wiggers: *Primitiae florae holsticae*. Kil. 1780.
- Willd. Christ. Ludwig Willdenow: *Florae berolinensis prodromus*. Berol. 1787. — *Observation. in Usteri's Annalen*.
- With. W. Withering: *Botanical arrangements of the vegetables naturally growing in Great-Britain*. Birmingh. 1796.

F L O R A E
C R Y P T O G A M I C A E

SECTIO II.

ALGARUM ET FUNGORUM CLASSIS V. VI.

Classis V.

ALGAE ROTH. Tangē.

(*Phycea Wallr.*)

Vegetabilia daedalea, ut plurimum aquatica, aquis quibuscunque, dulcibus (*algae hydrophilae*), aequo ac salsis marinisque (*a. halophilae*) submersa, rarius terrestria (*a. geophilae*) s. amphibia, ex primordiis muculentis elementorum concursui amico sive particulis propagationis gratia excretis globosis semetque producecentibus, varie reconditis et adpensis ortum debentibus subenstia, ex parenchymate simplicissimo minusque evidenter celluloso, vivo gelatinam coactam, membranam carnemve lubricam, exsiccatu (eoque vix s. saltem minus bibulo) corium s. cartilaginem tenacellam plane referente, *physeuma* (*cormi pars analogæ; frons, filum, caulis, folium, Agrdh. et auct.*) ad consistentiae, durationis, coloris, fabricæ internæ totiusque figurationis rationem per quam variam habituque versatili at proprio, versus aliorum quorumcunque vegetabilium siogulas partes umbrae instar reclinante præclarum, nunc molem globosam amorpham plane s. in lobos divulsam, ejuscemodi radimentis et propsgulis jugiter intermixta prægauantem præstans (*physinges*), nunc in fila (— *nemata*) plerumque fistulosa (*ph. capillare, flare, funiculare*), continua (*trichonema*) s. articulata (*arthronemata*) s. geniculis mactularibus (*myclonemata*) intercepta, solitaria s. aggregata, rarius inter se conjugata (*gryphonemata*), simplicissima s. prolifero-ramosa, arbusculæ divisuram haud male mentiente (— *thamnia*) protensum, nunc cum quodam nisi latescendi compaginatum (*ph. thallobes* s. plyn-

thodes), colore vivaci herbaceo-viridi in rosam purpuramque tendente illosque ex causis externis promiscue elicientibus insigne, vario fructificationis apparatu, *spermatidiis* nimis embryomorphis (*semina* auct.) diversimode digestis, circumfluis, erraticis innatisve in formas coactis, sive foras protrusis varie succrescentibus denique caducis (*myrophyken*), sive in membranam jugiter intertextis ejusque latusculis interaneis reconditis (*dermophycea*), sive denique praeter haec aliaque organa propagationis secundaria (*condylia*); clonariis propriis s. sporangiis capsularibus foras appensis varieque figuratis, sporulas muculentas *spermatidiis* similes contiuentibus (*coccophycea*) s. nucamentaceis cortice gyroso obductis (*gyrophycenae*) foetum, concianantia.

(*Algae L. ex emend. Roth. Lyngb. Agardh. A. aquatica Wahlenb. Hydrophyta Lyngb. Bory. Thalassiohyta Lamour. Phyceae et Oceanides auct.*)

Ordo I.

MYXOPHYCEA W. Schleimtange.

Vegetabilia aquatilia raro amphibia s. marina ex muci vegetabilis coenantis simulac semet propagantis colluvie subeontia, unac globulos distinctos s. moniliformes s. in filia productos, in massam amorpham conglobatos, inconditos plane s. figuratos formantia (*myxophysinges*), nunc ex physeumatibus distinctis simplicibus s. ramulosis, continois, fistulosis, spermatidia primum innata dein emersa mucosa, saepius in filamenta difformia arachnoideo-conservina succrescentia, superficiem gelatinosam velatinam s. penicillatam mentientia habitumque prorsus biformem vel aetates duplices praestantia profundentibus, filariibus s. funicularibus (*myronemata*) composita, viva lubrica omnino, sicca contabescientia papyroque jugiter adhaerentia, vix nisi ex aqua fervida reviscentia, viridia s. ex viola veraicolora, sporangiis veris destituta.

(*Algae Nostochinae, Confervoideae batrachospermeae, Fucoideae chordarieae Agrdh. A. tremelloideas*

*Spr. syst. A. infusoriae Mart. A. chaetophoraceae Leibl.
Algæ chaeophoroideæ Grev. Dub. A. tremellarieæ
Bory. Oscillatoreæ auct. Hydrophyta gelatinosa tremelloidæ Lyngb.)*

A. Myxophysalides, spermatidiis e figura rotunda magis minusve productis, distinctis conjugatisve muco circumfluvis, sive massas amorphas impalpabiles globosæ sive frondis s. clavæ instar divulsas, velamine destitutas redintegrantibus, sub aqua libere circumfluas.

N.B. Prima complectuntur totius classis germina veluti asyntheta, a reliquis quadantenus aliena, quæ primitus saepe ex aqua sive retenta sive diutius stagnante solis influxu subeunt, nec cum lichenum primordiis gomimicis asynthetis (*Palmella botryoides* et *Protococcus viridis* Agardh. syst. 14) ab auctoribus varie traditis et a me primum ad trutinam vocatis (cf. *Naturgesch. der Flechten*, 1. 315.) vix nisi distinctionem generalem admittunt. Talis scilicet est materia viridis a Priestleyo sic dicta (*Priestleya botryoides* Meyer pr. pr. *Lepra infusionum* Schrk. bav. II. 556. *Vaucheria infusionum* DC. gall. II. 65. pr. pr.) quam animalculis infusoriis suffusam *Ingenhousius* animalem, *Sennebierius* vegetalem agnovit, filamentis continua microscopicis muco exceptis compositam.)

a. spermatidiis globulosis in massam mucosam amorpham coactis.

87. COCCOCHLORIS SPR. Wasserball.

Spermatidia globulosa mucosa massam globosam inbri-
cam impalpabilem membranula non exceptam infarcentia.

(*Coccochloris* Spr. *Palmella* Lyngb. Agardh. excl. tam
en specieb. plurimis, aliis subscribendis).

1085. *C. minuta* W., lithophila, spermatidiis sphæ-
ticis sparsis physinges sessiles hemisphaericas herbaceo-
virentes mucosas infarcentibus. — *Palmella minuta* Agardh
in bot. Zeit. 1827. p. 630.

Ad saxa fluminis Tepl pr. Carlsbad (Agardh.)

1086. *C. stagnina* Spr., hydrophila, spermatidiis globosis saturationibus physinges globosas pruiniformes hyalino-virentes lubricas liberae circumfluas infarcentibus. — *Coccochloris stagnina* Spr. hal. mant. I. 14., syst. IV. 372. *Palmella hyalina* Lyngb. hydroph. t. 69. *Agrdh* syst. 13. *P. globosa* Agrdh l. l.

Aquis stagnantibus innatet v. c. in lacubus agri hal. pr. Wansleben (Sprengel) et alibi.

1087. *C. aurantia* W., lithophila, spermatidiis globosis saturationibus physinges globulosas exiguae adnatas aurantiacas infarcentibus. *Palmella aurantia* Leiblein in bot. Z. 1837. p. 260.

Ad parietum limina umbrosa agri wirceburg. (Leiblein.)

1088. *C. sanguinea* W., geophila, spermatidiis subglobosis in physinges primum subglobosas dein confluentes difformiter expansas tremellosas sanguineas coifiatis mucoque circumfuso coactis. — *Coccochloris cruenta* Spr. syst. IV. 373. *Palmella cruenta* Agrdh syst. 15. excl. syn. *Tremella cruenta* Engl. bot. t. 1800 ? *Thelephora sanguinea* Pers. syn. 575.

Ad terram platearum sparcam juxta parietes occultos. (Habitu et strato subiecto aliquantulum recedit et cum Oncobryacee generis notis Agardh bot. Zeit. I. I. 629.) forsitan congruit, quas cum praecedente mihi quidem dubia restat).

b. spermatidiis globulosis concatenatis.

88. SPHAEROZYGA AG. Schnurstocke.

Spermatidia globosa concatenata fila articulata mentientia, stratum gelatinosum constituentia. (*Sphaerozyga* Agrdh in bot. Z. 1827. p. 634. *Syncollesia* et *Synaphia* Necs. *Cyclobion* Agrdh. olim. *Conservae* spec. auct.)

1089. *Sph. mucoriformis* Ag., spermatidiis globosis in fila radiautia concatenatis maculam orbiculatam

mucosam viridem constituentibus. — *Syncollecia mucoroides* Agrdh syst. 32. *Conferva mucoroides* Ag. act. holm. 1814. t. 8. *Spr. Antit. II.* t. 1. f. 1. *Sgnaphia et Syncollecia mucoroides* Nees.

Ad fenestrarum commissuras patriae.

1090. *Sph. Jacobi* Ag., spermatidiis globosis in fila torulosa conjunctis ex muco circumfluo subradiantibus. *Agrdh. in bot. Z. I. I.*

In fontibus ad Carlsbad (Agardh.)

1091. *Sph. flexuosa* Ag., spermatidiis in fila torulosa tenerima conjunctis, stratum gelatinosum coeruleo-virens constitutibus. *Sphaerozyga flexuosa* Agrdh I. l. p. 634. *Oscillatoria flexuosa* Agrdh syst. 66. ?Leibl. in bot. Zeit. 1817. p. 278. *Anabaina oscillatorioides* Bory. Dub. gall. II. 992.

In rivulis Hercyniae (Wallr.)

c. spermatidiis globosis quaternatis.

89. TETRASPORA AG. Schleimblase.

Physeuma bullosum s. physiogoidenm gelatinosum veluti inflatum speiremata in ordinem quaternarium disposita concipiens.

(*Tetraspora* Agrdh. *Ulvae et Tremellae* sp. auct.)

1092. *T. lubrica* Ag., hydrophila, physeumate phsingode undulato-rugoso incondito veluti formam iestam s. tubulosam mentiente lubrico pallide viridi impalpibili libere circumfluo. — *Tetraspora lubrica* Agrdh sp. 188. *Solenia lubrica* Spr. syst. IV. 367. *Rivularia lubrica* DC. gall. VI. 1. *Ulva lubrica* Roth germ. III 540. *Tremella palustris* Web. spic. 279. — Dill. hist. t. 8. f. 2.

In fossis stagnantibus v. c. agri gotting. (Weber), halensis (Wallr.) et alibi. Acetate. (*Physeuma amorphum*, lubricum omnino et praeter substantiam membranaceam, indolem fistulosam etiam mentiens. Siccata ita

collabitar ut pictoram pertenuem vel quoque Ulvae Lactucae primordia aemulari videatur.)

1093. *T. gelatinosa Desv.*, physeumate physingode ovato-subclavato vesicaeformi tremulo. *Agrdh syst.* 188. *Ulva gelatinosa Vauch. conf.* 244. *Agrdh spec. I.* 426. *Tetraspora gelatinosa Desv. ang.* 18.

In similibus cum priore locis, a qua vix nisi mole imminuta et figura ovato-subclavata differre videtur.

1094. *T. explanata Ag.*, physeumate physingode plano expanso bulloso. *Agrdh in bot. Z. l. l. p.* 642.

In fluvio Tepl pr. Carlsbad. (*Agardh.*)

d. spermatidiis clavatis.

90. CORYNEPHORA AG. Keulentraeger.

Physeuma gelatinosum bullatum subglobosum ex spermatidiis utrinque clavatis subarticulatis farctum.

1095. *C. marina Agrdh syst.* 24. *Tremella difformis L.* et auct. *Chaetophora marina Lyngb. hydropk. t.* 66. *Rivularia tuberiformis Engl. bot. t.* 1956.

In mari septentrionali. (*Physeoma subglobosum intus cavum fulvo-fuscum, ex filis clavatis contextum.*)

e. physinge filis continuis articulatisque farcta.

91. NODULARIA MERT. Schleimflocke.

Physeuma mucosum membranaceum nodis genicula mentientibus interceptum et spermatidia transmittens.

1096. *N. spumigena Mert.* in *Jürg. alg. aquat. IV.* 4. *Nodularia spumigena Agrdh syst.* 76. *Spr. syst. IV.* 361.

In fossis insulae Norderney. (*Jürgens.*)

92. RIVULARIA ROTH. EMD. Backflocke.

Physeumata continua globulo incidentia e centro communi radiantia intus annulata physinges subglobosas gelatinosas integumento externo destitutas infarcientia.

(*Rivularia* Roth. Mart. Ag. *Linckia* Lyngb. Spr. *Tremella* L. Spr. Hedw. Roth germ.)

1097. *R. atra* Roth, physeumatibus simplicibus apice capillaribus fissis obscure annulatis radiantibus in physinges globosæ atro-virides demum durissimas densissime compactis. — *Rivularia atra* Roth cat. II. 340. Web. et M. Beytr. II. 365. Jürg. alg. IV. 4. Agrdh syst. 24. Engl. bot. t. 1798. *Linckia atra* Lyngb. t. 67. Spr. syst. IV. 371. *Batrachospermum hemisphaericum* DC. gall. II. 591. *Tremella hemisphaerica* L. syst. 1626. Weig. obs. 39. t. 2. f. 3. Roth germ. III. 550.

Ad lapides, palos vetustos aqua salsa s. marina vexatos, maris baltici (Weigel), agri halens. (Roth. Wallr.), insulae Norderney (Jürgens). (Physinges vesiculas mentiuntur globosas viridi-flaventes gelatinosas sparsas, Sinapcos s. Cannabeos molem aequantes, quae siccando corrugantur et collabuntur).

1098. *R. Schwabeana* W., physeumatibus simplicissimis capillaribus obtusis strictis annulatis radiantibus in physingem globosam atro-virentem duram compactis. — *Linckia Amblyonema* Spr. syst. IV. 371. *Stylobasis stylocarpa* Schwabe in lit.

In lacubus et stagnis agri dessaviens (Schwabe).

1099. *R. angulosa* Roth, physeumatibus strictis simplicissimis e basi sphaerica pellucida prodecentibus continuis annularibus apice arachoides curvatis in physiogem globosam cavam sordide-viridem gibbere angulosam intertextis. — *Rivularia angulosa* Roth cat. II. 50. Agrdh syst. 25. Mart. ert. 301. Web. et M. Beytr. II. 361. *Gaillardotella natans* Bory in Moug. et Nestl. n. 796. *Ulva pruniformis* Engl. bot. t. 968. *Linckia natans* Lyngb. hydroph. t. 67. Spr. syst. IV. 371. *Tremella natans* Hedw. theor. III. 551. *Tr. utriculata* Huds.

In aquis stagneantibus vel lente fluentibus, libere natat seu ab his plantis aquaticis (Myriophyllo) adhaeret, v. c. in agro lipsiens. (Hedw.), erlang. (Martius), halensi

(*Wallr.*) *hadensi* (*Kneiff*). (*Physinges solitariae* s. *gregariae*, *subrotundae*, *sordide-virides*, *molem semini* *Cannabaeos* s. *nucis avellanae* *aequantes*, *extus pruinula* *veluti* *irroratae*, *rarius etiam sinuosae*. Ex observatione *Weberi*, *Mohrii* et *Neesii* a reliquis indole oscillatoria recedere dicitur.)

93. CHAETOPHORA AG. Stachelträger.

Physeumata gelatinosa *bacillaria* e basi communi radiantia articulata ramosa *physingem globosam* s. *lobatam* conficientia.

† *globosae*, *physingidibus globosis*.

1100. *Ch. elegans* *Lyngb.*, physeumatibus inferne dichotomis patentibus, superne in ramos subsecundos fasciculatos divisis, physingem globosam dilute-viridem infarcientibus. — *Chaetophora elegans* *Agrdh* syst. 27. *Rivularia elegans* *Roth* cat. III. 337. Jürg. alg. XVI. 8. *Riv. rugosa* *Roth*.

In fossis ad plantas aquáticas. Aestate.

1101. *Ch. tuberculosa* *Hook.*, physeumatibus ramosissimis, ramulis divaricatis obtusis articulis turgidis interceptis physinges subglobosas tuberculosas virides confidentibus. — *Chaetophora tuberculosa* *Hook.* *Agrdh* syst. 27. *Spr. syst. IV.* 371. *Rivularia tuberculosa* *Roth.* Engl. bot. t. 2366.

In fossis Thuringiae (*Wallr.*).

1102. *Ch. pisiformis* *Ag.*, physeumatibus in ramos adpresso dichotomos divulsis physinges globosas dilute-virides infarcientibus. *Agrdh* syst. 27. *Tremella nivea* *Hedw.* jun. *obser.* I. 8. t. 2. *Rivularia pisiformis* *Roth.* *Batrachospermum utriculatum* *Vaucl.* conf. t. 12. f. 2. 3. *DC. gall.* II. 58.

In stagnis Thuring. ad plantas aquáticas.

1103. *Ch. anisococca* *W.*, physeumatibus recticulatis globulis inaequales continentibus, physinges spu-

meas subpellacidas viridissimas constituentibus. *Nostoc anisococcum* Spr. syst. IV. 372.

In lacubus agri dessaviensis (Schwabe).

1104. Ch. dura Ag., physeumatibus rectis subtulosis concentricis e basi simplici dichotomo-ramosis, ramulis parallelis adpressis fastigiatis longitudine aequalibus contracto-geniculatis physinges globosas virides uitidulas conficiuntibus. — *Rivularia dura* Roth. Mart. erl. 300. *Tremella globosa* Hedw. theor. t. 36. f. 1—6. *Flor. dan.* t. 1488. *Chaetophora globosa* Schrank.

In piscinis et fossis ad alias plantas vivas et mortuas variis Germaniae locis (Roth. Martius). (*Agardhius* syst. 29 inter dubias recenset, quae Webero auctore à Ch. pisiformi plane non differre dicitur et rectius forsitan hoc et Ch. pisiformi Ch. eleganti subscribitur.)

†† *lobatae, physingidibus lobatis s. figuratis* (*Myriodactylon Desv.*)

1105. Ch. endiviaefolia Ag., physeumatibus ramosissimis patulis fastigiatis physinges plumules lineares e basi dichotoma pluries lobatas truncatas conficiuntibus. — Agrdh syst. 28. Lyngb. hydroph. t. 65. Mart. erl. 300. *Myriodactylon spinulosum et incrassatum* Desv. *Tremella palmata* Hedw. comm. f. 4—7. *Rivularia endiviaefolia* Roth germ. III. 546. Flot. dan. t. 1488. f. 21. *Batrachospermum fasciculatum* Vauch. conf. t. 13. f. 1. DC. gall. II. 58. *Conferva incrassata* Bosc. *Tremella viridissima* Hall. hist. n. 2115. — Dill. hist. t. 10. f. 10.

β. *elongata*, physingidibus in lobos tenuiores productis. — *Chaetophora elongata* Lyngb. Spr. syst. IV. 371. *Rivularia elongata* Roth. *Riccia fluitans* Oeder. flor. dan. t. 275. *Chaetophora clavata* Hornem. fl. dan. t. 1728. *Ch. ricciooides* Bory.

γ. *diformis*, physingidibus obsolete lobatis — *Ch. endiviaefolia* β. *crassa* Agrdh l. l. *Ulva incrassata* Huds. Engl. bot. t. 967.

In stagnis et lacubus limpidioribus agri halens. (*Fischer*), ducat. oldenburg (*Roth*), erlang. (*Martius*), badeensis (*Kneiff*). (Capitulum sub aqua fugit subrotundum densum elevatum sesquunciale s. majus, laete-viride fluctuans impalpabile, in lobos plures varios divulsam et siccando contabescit.)

1106. *Ch. cornu Damae* Ag., physingidibus teretiusculis linearibus papillosis in lobos divaricatos breves explanatis. Ag. syst. 29. *Rivularia Cornu Damae* Roth germ. III. 544. excl. syn. pl. — Dill. hist. t. 10. f. 10. Vaill. bot. t. 10. f. 3.

Ad lapides stagnorum ducat. bremens. pr. Vegesack (*Roth*). (Physinges figuratas fluctuantes laete-virides valde lubricas in lobos teretiusculos divaricatos divulsas praestat, quae more praeced. siccando deplanantur papyroque arte adhaerent. *Mohrius* et *Sprengelius* hanc ab illa non distingunt.)

94. HYDRURUS AG. *Wasserschweif.*

Physeumata condunata hyalina spermatidia elliptica seriatim conjuncta continentia, physingem frondosam gelatinosam constituentia.

1107. *H. Vaucheri* Ag., physingidibus compactis e vertice demum lobulos ramiformes graciles exsertibus. — Agardh syst. 24. *Cluzella foetida* Bory. Dub. gall. II. 963. *Rivularia foetida* DC. gall. II. 5. *Ulva foetida* Vauch. conf. 244. t. 17. f. 3. *Conserva foetida* Vill. delph. t. 56.

Ad saxa stagnorum minorum German. austr. (*Agardh*), ad Lemaneam fluviatilem pr. Lohr agri wirceburg (*Born*).

1108. *H. Rothii* W., physeumatibus brevibus geniculatis subramosis crystallinis basi dilatata in physinges compressas pluries divisas s. ramosas obtuse-lobatas contextis. — *Batrachospermum fasciculatum* DC. gall. II. 58. *Rivularia conservoides* Roth germ. III. 545. excl. syn.

In rivulo confragoso pr. Vegesack, caespitalis deusis

fluctuantibus subrotundis saturate-viridibus lapillis adhaerentem Rothius semel legit.

1109. *H. penicillatus* Ag., physinge elongata cylindrica solida fusca demum virente a basi inde in lobos ramiformes verticillatos penicillatos divisa. Agrdh syst. 24. *Coccochloris Myosurus* Spr. syst. IV. 373. *Cluzella Myosurus* Bory. Dub. gall. II. 963. *Rivularia myosurus* Moug. *Palmella myosurus* Lyngb. hydroph. t. 68. *Ulva intestinalis* Chantr. t. I. f. 2. *Tremella myosurus* Flor. dan. t. 1604. *Butrachospermum myosurus* Duderuz. *Conserva myosurus* Brouss.

In rivulis German. austral. suis locis vulgaris (Agrdh.)

1110. *H. crystallophorus* Schäbl. in Regensb. bot. Z. 1828, p. 65. et 143.

In rivulis German. mediae (Schäbler). (Species singularis l. l. descripta).

95. HYDROCORYNE SCHWB. Wasserkeule.

Physeumata tenerima in physingem clavatam subspongiosam gelatinosam coëuntia.

1111. *H. spongiosa* Schw. in Spr. syst. IV. 373.

In lacu agri dessaviens. (Schwabe). (Alga satis peculiaris ad Badiagam fluviatilem Schw. (*Spongia fluvialis et lacustris* L.) quadantenus accedens, sordide-virens, clavata, lubrica, ex physeumatibus arachnoideo-capillaribus densissime junctis composita).

B. Myxone mata, physeumatibus capillaribus s. filariibus continuis striisve transversis articulos mentientibus inscriptis s. geniculis interceptis, plerumque tubulosis, lubricis, nunc in massas amorphas placentares coactis, nunc distinctis vagiter ramosis usque spermatidia innata superficiem lubricam s. emersa in fila arachnoidea succrescentia superficiemque penicillato-villosum s. lanosam mentientia profundentibus.

(Algæ conservoideæ leptomitæ, batrachospermeæ et oscillatorinæ Agrdh syst.)

a. placentaria, physeumatibus tenerrimis simplissimis muco circumfluo s. subjecto exceptis massam placentarem uniformem mentientibus, exsiccando contabescentibus semetque explicantibus. (Oscillarieae Bory. Dub.)

96. OSCILLARIA BOSC. Schwingfaden.

Physeumata continua simplicissima capillaria tubulosa striis transversis densis notata, hyalina lubrica superius colorata et decolora, ex moco veluti matricali subvenientia eove excepta (sub solis influxu) elastica s. oscillantia, in strata membranacea s. placentaria digesta.

(*Oscillaria Host. Bory. Dub. (inter animalia lundat).* *Oscillatoria Vauch. Agrdh. Mart. Spr. Trichophorus Pal. Beauv. Conservae spec. auct.*) (Vegetabilia quadantes amorphibola, a quibusdam ob motum peculiarem, sub sole conspicuum, ex striarum transversalium fabrica pendentem, regno animali adscripta).

† *physeumatibus virentibus facile decoloribus.*

1112. *O. labyrinthiformis Ag.*, physeumatibus tenuissimis in membranam latissimam primum viridem deinde aeruginosam sinuosam obtexitis, bullas physingoides anfractuosas mentientibus. *Agrdh syst. 60. Spr. syst. IV. 362. Anabaina thermalis Bory. Dub. gall. II. 992. Tremella thermalis Thore. Ulva labyrinthiformis L. U. thermalis Vand. Fucus thermalis Secondat.*

Aquis thermarum innuat v. c. carolinarum (*Agardh.*) (*Materia viridis thermarum Schaer. in Jacq. coll. I. 171.*)

1113. *O. papyracea Ag.*, physeumatibus tenuissimis in stratum gelatinosum breviter radians tenuiter papyraceum aeneo-virens densissime intertextis. *Agrdh syst. 61.*

Ad ligna molarum aquis semper suffusa. (Cum *Oscill. Retzii* forsitan conjugenda).

1114. *O. flos aquae Ag.*, physeumatibus capillaribus tenerrimis hyalinis rectis primum pallide-viridibus

dein coeruleis, exsiccando aeruginosis membranam spumeam lubricam facile secedentem mentientibus. — *Agrdh* syst. 59. *Spr. syst.* 362. *Wahlenb. suec.* II. 911. *Nestoc flos aquae Roth cat.* III. 192. *C. dubia Roth.* *Byssus flos aquae L.*

In fossis aquarum superficiem obducit membranae instar, v. c. in tractu jeveran. (*Jürgens*). (Exsiccata et vitro matricali superaddita colore belle aeruginoso oculos allicit.)

1115. *O. viridis* Vauch., physeumatibus dilatet viridibus rigidulis rectis in stratum gelatinosum breviter radians intertextis. — *O. tenuis* *Agrdh* syst. 66. *O. limosa* Hook. *O. Adansonii Gratel.* *Vaucheria infusionum DC. gall.* II. 65. pr. pr. *Conferva intricata et fontinalis Roth* *C. limosa Dillw.* t. 20. *Oscill. viridis* *Vauch.* conf. t. 15. f. 7. *Mart.* erl. 305.

In aquis quietis minime rara nec non in terra juxta pateos et aedes humecta, praesertim vere post pluvias.

1116. *O. subsalsa* Ag., physeumatibus tenerrimis viridibus e basi saturate-viridi gelatinosa coacta comam breviter radiantem penicilliformem concolorum. dein suscescentem exserentibus. — *Agrdh* syst. 66.

Ad plantas lacus salsi pr. Halam. (Physeumata tenerima e bulbo mucoso saturate-viridi prodeunt comamque breviter radiantem penicilliformem mentiuntur.)

1117. *O. limosa* Ag., physeumatibus tenerimis rigidis obscure-aeruginosis rectis in stratum gelatinosum longe radians atrovirens expansis. — *Agrdh* syst. 66. *Lyngb. Spr. syst.* IV. 363. *Oscill. Adansonii Vauch.* conf. t. 15. f. 6. *Conferva fontinalis Dillw.* t. 64. pr. pr. *C. limosa Roth.* *Flor. dan.* t. 1549. f. 2. *Chaetophora lobata Schrank im Naturf.* XIX. 125.

In fundo limoso aquarum quietarum minime rara. (*Sprengelius* cum hac *O. tenuem* Ag. et *O. antiarium* *Jürg.* jungit. Alia homonyma *Martii*.)

1118. *O. aeruginea* Mart., physeumatibus filibrus chalybeo-viridibus praelongis in stratum radians implicitis, annulis diametro 4—5 brevioribus. Mart. erl. 306. *Conferva aeruginea* Mert. Oscill. major Vauch. conf. t. 15. f. 3. Agrdh syst. 67. *O. princeps* Vauch. l. L. *Trichophorus princeps* Desv.

In aqua fossarum limpido. Vere. (Pulcherrima physeumatibusque satis conspicua, fasciis transversalibus latescentibus notata. Color aerugineo-viridis cum nitore eximio. Totius plantae incrementum, Martio auctore, celeberrimum.)

1119. *O. amphibia* Ag., physeumatibus tenuissimis rectis in membranam dilate-viridem breviter radiantem intricatis, radiis extremis dilatius virentibus. Agrdh bot. Zeit. 1827. p. 632.

Ad ligna thermarum carolin. (Agrardh.)

1120. *O. laminosa* Ag., physeumatibus tenuissimis curvatis in membranam duplikatam dilute-viridem contiguum intertextis. Agrdh bot. Zeit. l. l. 633.

Ad muros thermarum carolin. vaporibus calefactos. (Agrardh.)

1121. *O. elegans* Ag., physeumatibus tenuissimis rectis in membrana plures lacte-virides radiantes contextis, radiis aeruginosis. Agrdh l. l.

In similibus cum priore locis.

†† physeumatibus chalybeo-aeruginosis strata atro-virentia s. nigricantia mentientibus.

1122. *O. nocturnalis* Ag., physeumatibus obscure-virentibus rigidis rectis in stratum gelatinosum breviter radians nigro-vires demum cum nitore quodam nigricans intertextis. — Agrdh syst. 62. *O. vaginata* Vauch. conf. t. 15. f. 13. Mart. erl. 307. *Microcoleus terrestris* Desmaz. Dub. gall. II. 992. *Vaginaria terrestris* Bory. *Rhizomorpha muralis* DC. gall. VI. 116. *Conferva vaginata* Diliw. t. 99. *C. amphibia* y. *atra* Roth germ. 491. *Phytoconis nigricans* Bory de St. Vinc.

Ad aedium limites umbrosos et spurcos vere abundat et saxa terramque interjectam saepe longo lateque occupat. (Siccata nigrescit magis membranamque contiguam duram mentiri solet. *Sprengelius* pro *O. nigrae Vauck.* lucu geophilo habet.)

1123. *O. rupestris Ag.*, physeumatibus tenuissimis brevissime radiantibus rigidis flexuosis atro-viridibus hyalinis in stratum nigrum gelatinosum compactum densissime implicitis. *Agrdh* syst. 63. *O. subfuscus v. atra Lyngb.*

Ad rupes humectas Hercyn., muscos (Neckeram penatam) saepius destruens.

1124. *O. nigra Ag.*, physeumatibus rectis rigidis gryseo-lutescentibus in stratum gelatinosum longissime coeruleoque radians nigrum coactis. *Agrdh* syst. 63. *O. nigra Vauch.* conf. t. 15. f. 14. *Lyngb.* *hydrop.* t. 26. *Spr.* syst. IV. 363. *Mart.* erl. 307. *Conferva fontinalis Dillw.* conf. t. 64. pr. pr.

Rivulis quietis passim innatat.

1125. *O. Okeni Ag.*, physeumatibus tenuissimis rectis in stratum nigrum illico radians intricatis oscillantibus. *Agrdh.* bot. Zeit. I. I. 633.

In aquis thermarum carolin. (*Agrdh.*)

1126. *O. subfuscus Ag.*, physeumatibus hyalinis rigidis rectis in stratum compactum violaceo-fuscum breviter radians intertextis. *Agrdh* syst. 64. *Vauch.* conf. t. 15. f. 5. *Lyngb.* *Hydrop.* t. 26. *O. Corium Lyngb.* L. L. nec *Ag.* *O. purpureo-coerulea Mart.* erl. 306. *Conferva violacea Huds.*

Ad saxa fluviorum coenosorum. Vera et aestate.

1127. *O. chalybea Mart.*, physeumatibus tenuissimis rigidis chalybeis e strato nigrescente compacto quaquavorsum longissimeque radiantibus, striis inaequalibus, alternis angustioribus latioribusque. *Mert.* in *Jürg. alg.* XIII. 4. *Agrdh* syst. 67.

In fossis sere semper propter ripas agri reverens. (*Mertens et Jürgens*). (Strata tempore pluviali dense contracta, alias tempestate serena fila evidentius oscillantia exserunt.)

1128. *O. decorticans* W., physeumatibus tenuissimis curvis dense contextis coeruleo-mentibus e strato virido longe radiantibus. — *Conferva decorticans* Jürg. alg. IX. T. ? Dillw. conf. t. 26.

Ad lapides humi jacentes nec non ad dolia aquis longius exceptis repleta.

1129. *O. antliaria* Mert., physeumatibus tenuissimis breviter radiantibus aeneo-virentibus e strato atrofuscō-vidente breviter radiantibus. Mert. in Jürg. alg. XIV. 4. excl. syn. Agardh syst. 63.

In putorum alveis, strata densa formans.

1130. *O. violacea* W., physeumatibus tenuissimis violaceo-coeruleo-mentibus e strato obscure-virente nitido longe radiantibus.

Ad fenestrarum commissuras in vitro stillicidiis irritato expansa. Hyenie. (Exsiccata membranam nitidam contiguam praestat, ex qua physeumata belle violacea s. coerulea prominent. Ab *O. auctumnali* tenuitate differt.).

+++ physeumatibus ochraceis.

1131. *O. ochracea* Lyngb., physeumatibus tenuissimis flavo-virentibus strato crasso ochraceo incumbentibus. Lyngb. hydroph. t. 26. *Conferva ochracea* Dillw. conf. t. 62. Roth germ. III. 493. Jürg. alg. VI. T.

In fossis arenosis. (*Agardhius* recte inter dubias recenset.)

+++ physeumatibus hyalinis fere achrois.

1132. *O. alba* Vauch., physeumatibus tenuissimis hyalinis apice revolutis e strato albido achroo conformati subeuntibus. Agardh syst. 69. Vauch. conf. t. 15. f. 11.

In thermis aquisgrauens. (Wallr.) (*O. arachnoidea* Agardh bot. Z. t. t. forsan eadem.)

97. HYGROCROCIS AG. *Gährungsflocke.*

Physeumata hyalina arachnoidea tenuissima ramosa moniliformia aut obsolete articulata in gelatinam informem s. membranam coloratam intertexta fluitantia.

(*Hygrocrocis Ag.* *Mycoderma Pers. myc. Bory. Dub.*)
— Genus dubium, a *Boryo* ad *Zoophyta*, a *Dubyo* ad *Diatomeas*, a *Persoonio* ad *Hypomycetes* relatum. Prima fermentationis acetosae sequela.)

1133. *H. Cerevisiae Desmaz.*, ?physeumatibus simplicibus ramosisque subflexuosis moniliformibus s. articulis inaequalibus interceptis, in pelliculam leviter corrugatam helvolam intertextis. — *Mycoderma Cerevisiae Desmaz.* obs. bot. t. 8. f. 1. *Dub. gall. II.* 988.

Ad superficiem cerevisiae aëre expositae.

1134. *H. Vini Ag.* ?physeumatibus ramosis flexuosis moniliformibus s. articulis inaequalibus interceptis, in pelliculam s. colluviem pulposam albida intertextis. — *Mycoderma Vini Fallot. Dub. I. l. M. mesentericum et Lagenae Pers. myc. I.* 96. *Hygrocrocis Vini Agrdh syst. 49.*

Ad superficiem vini et ad rimas doliorum.

1135. *H. atramenti Ag.*, ?physeumatibus dichotomo-ramosis intricatissimis decumbentibus in stratum albidum deossissime intertextis, articulis diametro sesqui-longioribus. *Hygrocrocis atramenti Agrdh I. l. Mycoderma atramenti Dub. gall. II.* 988. *Conserva atramenti Lyngb. hydr. t. 57. Spr. syst. IV.* 355.

Ex gummi arabico ad atramentum præparandum adhibito subit inque superficie atramenti primum floccos albidos præstat dein membranis compactis fundum occupat.

b. *filaria*, physeumatibus distinctis ramosis muco vegetabili amorpho s. eumorpho (ramelli, frondes diorganae Agrdh) circumfusis.

98. LEPTOMITUS AG. *Haarschopf.*

Physeumata tenuissima hyalina achroa obsolete striata libera e basi adnata fluitantia (nec intertexta). (Sunt

vegetabilia amphibola, primordialia quasi, e corporibus organicis patrescentibus primitus subeuntia ideoque dubia.)

1136. *L. candidus* Ag., physeumatibus subsimplicibus tenuissimis erectis distinctis hyalinis longissime striatis. *Agrdh* syst. 49.

Ad caules Hydrocharidis (*Roth*), ad Conservas patrescentes. (*Leiblein*).

1137. *L. lacteus* Ag., physeumatibus ramosissimis hyalinis in massam informem lubricam coactis, exsiccando distinctius replicatis. *Agrdh* syst. 47. *Conservae lactea* Dillw. t. 79. *Roth* cat. *C. pusilla* Roth germ. III. 524.

In rivulis turfosis gramintum culmis adhaerens, variis German. locis (*Trentepohl*. *Roth*. *Jürg. Wallr.*) ((Mucilaginem albida limpidam viva refert, exsicca telam arachnoideo-bombycinam tenuissimam, physeumatibus primum coactis dein exsiccando explicatis satis conspicua.)

1138. *L. niveus* Ag., physeumatibus ramosis erectis rigidulis niveis, ramulis subimbricato-fasciculatis fuscostriatis. -- *Leptomitus niveus* *Agrdh* bot. Z. I. I. 631. *Oscillatoria nivea* Spr. syst. IV. 361. *Conservae nivea* Dillw. Engl. bot. t. 2529.

In aqua thermarum carolin. (*Agardh*.)

1139. *L. nana* Ag., physeumatibus exilissimis ramosis, ramis ramulisque acuminatis, interstitiis geniculiformibus pellucidis. *Agrdh* syst. 49. *Conservae nana* Dillw. conf. t. 30.

Ad Algas destructas maris septentr.

1140. *L. inconspicuus* Ag., physeumatibus fasciculatis subsimplicibus continuis divergentibus hyalinis. *Agrdh* bot. Z. I. I. 631.

Ad Conservas maiores thermar. carolin. (*Agardh*.)

99. DRAPARNALDIA BORY. *Draparnaldie.*

Physeuma gelatinosum subramosum transversim striatum veluti obsolete-geniculatum undique s. ex punctis

distinctis verticillatis alia physeumata difformia macum penicillatum informans illisque vestitum,

(*Confervae spec. auct. Batrachospermum Vauch.*)

1141. *Dr. uniformis Ag.*, physeumatibus tenuissimis uniformibus contortis rumulos laxe dispositos subsecundos conformes spargentibus, articulis inferioribus diametro duplo longioribus. *Agrdh* bot. Z. I. I. 635.

In aquis thermar. carolin. (*Agardh.*)

1142. *Dr. tenuis Ag.*, physeumatibus tenuissimis subuniformibus simpliciusculis macum glomeratum conformem emitteatibus. — *Agrdh* syst. 57. *Dr. mutabilis et laxa Bory.* *Conferva lubrica Lyngb.* hydroph. t. 52. *Jürg. alg. I.* 10. *C. pusilla Lyngb.* t. 51. *C. protensa Dillw.* t. 67. *C. crigua Dillw.*

β. elongata, physeumate productiore et distinctiore. — *Agrdh.* l. l. *Draparnaldia hypnosa Moug.* et *Nestl.* n. 499. *Conferva lubrica Dillw.* conf. t. 57. *C. contorta Roth* cat. II. 218.

In stagnis aliis vegetabilibus adhaerens, suo loco vulgaris. (*Boryus* pro *Draparnaldiae* mutabilis habet infantem, nec forsitan incongruenter.)

1143. *Dr. plumosa Ag.*, physeumatibus capillari- bus hyaliniis tenuibus ramosis, geniculis obsoletis saturate-fasciatis interstinctis ibique alia physeumata difformia laete-viridia transversum striata primum brevia deinceps productiora gelatinosa emitteatibus habitumque fasciculato-penicillatum mentientibus. — *Draparn. plumosa Agrdh* syst. 58. *Spr. syst. IV.* 369. *Batrachospermum plumosum Vauch.* conf. t. II. f. 2. *DC. gall. II.* 59. *B. glomeratum β. plumosum Wahlenb.* suec. 915. *Conferva mutabilis Roth* germ. III. 518., cat. III. 282. t. 4. f. 6. *Dillw.* t. 12. *Flor. dan.* t. 1481. *Jürg. alg. VII.* 9. *C. lubrica Engt.* bot. t. 2087. *C. gelatinosa Chantr.* excl. syn. — *Dill. hist. t. 6. f. 34.*

In rivulis celeriter fluentibus ad lupillo sub aqua fluctuans, passim, v. c. prope Leesum duc. bremens. (*Mertens*), pr. Heringam Thuring. et in fontibus calidis

Paderae pr. Paderborn (Wallr.) Aestate. (*Schrankius* bot. Z. 1823. p. 35.) hanc pro statu vernali s. juvenili *Confervae zonatae* declarat.)

1144. *Dr. glomerata* Ag., physeumatibus filari-
bus tenuibus hyalinis ramosis geniculis obsoletis inter-
ceptis ibique alia physeumata difformia laete-viridia stria-
ta obtusa brevia emitentibus habitumque glomeratum
mentientibus. — *Agrdh* syst. 58. *Spr. syst. IV.* 369.
Lyngb. hydroph. t. 64. *Conferva mutabilis* Engl. bot. t.
1746. *Batrachospermum glomeratum* Vauch. conf. t. 12.
f. 1; var. *a.* *Wahlenb.* suec. l. l. *C. fasciculata* Thor.
C. Chara Roth.

In similibus cum priore locis. (*Wahlenbergius* cum
praecedente jungit et *Boryus* dudum pro ejus forma
adulta agnoscit.)

100. BATRACHOSPERMUM ROTH. Tausendast.

Physeuma filare cylindricum hyalinum tenerrimum,
nodis genicula insiticia mentientibus primum saepius fila
difformia moniliformia verticillata gelatinosa informanti-
bus interceptum iisque detersis ibi spermatidia pyriformia
emersa colligens.

(*Confervae* sp. auct. *C. nodosa* Wallr. *Charae* spec.
Weis. *Batrachospermum* Roth. *Agrdh.* *Mart.* *Lemanea*
Bory. *Chantransia* DC. *Trichogonium* Pal. Beauv. *Go-*
niciados Fries. — *Apona* Adans.)

1145. *B. inflatum* W., physeumate simplici tenero
hyalino-olivaceo lubrico primum insiticio-geniculato ibi-
que filis hyalinis brevissimis gelatinosis penicillato iisque
detersis nodis globosis intercepto. — *Conferva ve-*
sicata *Agrdh* syst. 93. *Lyngb. hydroph.* t. 47. *Spr.*
syst. IV. 356. *Chantransia vesicata* DC. gall. II. 52.
Conferva alternata Dillw. Engl. bot. t. 2304. *Prolifera*
vesicata Vauch. conf. t. 14. f. 14. *Hornem.* fl. dan. t.
1483. f. 2. *Conferva nodosa* Vauch.

Ad alias plantas aquáticas Germ. mediae et Thuring.
(Habitu capillari veluti articulato. *Confervari* quodam-

modo refert, inde gelatinosa tamen et nodis primum penicillatis ad hoc genus, ut in Anno bot. 183. jam prae-monui, spectat, et cum Leclercio contra Borgum, aetatem praestat spermatororam.)

1146. *B. moniliforme* Roth, physeumate primum coacto physingode dein a basi inde ramosissimo iusiticio-geniculato ibique primum filis moniliformibus verticillata gelatinosis penicillato usque detersis in nodos spermatidiis emersis foetos geniculaque oblitterantes incrassato. — *Batrachospermum moniliforme* Mart. erl. 290. Agrdh syst. 53. Spr. syst. IV. 369. *B. gelatinosum* Wahlenb. suec. II. 914. excl. var. β . *Conserua nodosa* Wallr. ann. bot. 125.

α . *penicillata*, physeumate viridi s. violaceo lubrico, ex nodis geniculiformibus approximatis fila moniliformia densa gelatinosa verticillos penicillatos mentientia non-nisi condylia globosa comprehensa transmittente. — *Batrach. Veprecula* Mert. in Jürg. alg. XIX. 7. *B. moniliforme* Roth germ. III. 480. Vauch. conf. 113. t. 11. f. 3. DC. gall. II. 59. Jürg. alg. VI. 3.; var. α . Mart. erl. I. l. *Conserua nodosa* junior tota gelatinosa Wallr. l. l. *Batrachosperma ludibunda confusa* Bory. *B. nigricans* DC. bullet. philom. *Chara batrachosperma* Weis spic. 33. c. icon. *Charospermum glomeratum* Link. pr. pr. *Conserva gelatinosa* L. sp. 1635. Roth cat. I. 125. Engl. bot. t. 689. Dillw. conf. t. 32. — Dill. hist. t. 7. f. 42 — 44.

β . *detonsa*, physeumate a basi inde per internodia distincta diaphana sensim tenuata protracto-cuneiformia, nodis sphaericis ex spermatidiis emersis velutinis saturationibus interstincto articulationem geniculatam s. iusitiam mentiente ibique ramos coniformes sensim tenuiores magisque approximato-nodulosos veluti proliferos vagos irregularesque emitente. — *Batrach. moniliforme* k. *detersum* Agrdh syst. 55.; γ . aetate media atro-violacea Mart. l. l. *B. gelatinosum* γ . atrum Wahlenb. suec. l. l. *Conserua nodosa* *B. aetate media* Wallr. ann. 280. t. 6. f. 6. excl. syn. Mert. *Lemanea batracho-*

spermosa Bory in Berl. Mag. *Batrachospermum tenuissimum* Bory. Dub. gall. II. 978. *Chantransia atra et dichotoma* DC. *Conserva atra* Huds. angl. Dillw. conf. t. 11. Spr. pug. I. 65. *C. putealis* Spr. in lit. — Dill. hist. t. 7. f. 46.

γ . *spermatophora*, physeumate ramosissimo a basi inde ad apicem nodis sphaericis intercepto, his interno diisque cylindricis approximatis demum spermatidiis innatis ob sessis. — *Conserva nodosa* C. perfecta fructifera Wallr. ann. l. l. t. 6. f. 8. *C. verrucosa* Draparn. *Lemanea Dillenii et sertularina* Bory. *B. tenuissimum* β . *sertularinum* Dub. l. l.

In aquis duris limpidis fontibusque frigidis ex solo calcareo stillantibus v. c. agri hal. et thuring. (Ruppius. Sprengel. Wallr.), gotting. (Weis. Weber. Wallr.) et aliis suisqne locis passim. Formas s. aetates β . et γ . rarissime intercurrentes, Angliae antea indigenas, equidem primum floriae thuring. (ad Lodersleben) et gotting. (auf der Rasczmühle) restitui. (Formae hae, quas post Dilleum dudum in memoriam revocavi, habitu plane dissimili praecellunt, morphoseos legibus tamen facile patent. Color in omnibus varius, nunc pallide-s. sordide viret, nunc violacens, isque ad nodos et ad internodia eo magis nigrescere videtur, quo magis spermatidia diffunduntur et ad interstitia sine illis hyalina magisque tenuata transciunt vel dissipantur.)

101. CHORDARIA AG. EMEND. Schleimschitz.

Physeuma filare s. funiculare cylindricum continuum farctum s. fistulosum obsolets disseptum gelatinosum extus spermatidiis pyriformibus saepius in fila arachnoidea difformis mucosa nounisi persistentia undique succrescentibus foetum illaque circa extremitates potissimum recol ligens.

(*Batrachospermum* spec. auct. *Polycoma* Palis. Beauv. *Thorea* Bory in Berl. Mag. 1808. Agrdh. *Chaetospora* Agrdh. nec Rob. Br. *Mesogloea* Agrdh. *Chordariae et Scytophionis* sp. Agrdh. *Chorda* Lyngb. — Genus habitu

vario decipiens nec tamen secundum illum in plura dividendum, quod spermatidiorum indole congrua satis differt.)

† *spermatidiis profusis superficiem mucosam penicillatam praestantibus.*

1147. *Ch. vaga* W., physeumate filari continuo gelatinoso prasino in ramos conformes vase-dichotomos divulso, a basi inde filis arachnoideis intricatissimis mucosis dilutius aeruginosis virentibusque brevibus stipato iisque demum praeter extremitates pedicillatas destituto. — *Batrachospermum vagum* Agrdh syst. 52. Spr. syst. IV. 369. Lyngb. hydroph. t. 64. *B. turfosum* Bory. Dub. gall. II. 978. *Conferva gelatinosa* β. coerulescens Wahlgren. lapp. 510., suec. II. 914. pr. pr. *Batrachosperma turfosa* Bory. *B. coerulescens* Pers. in lit. *B. moniliforme* d. *vagum* Roth cat. I. 125., germ. III. 482.

In aquis stagnautibus limpidis paludum turfosarum v. c. pr. Leesum agr. bremens. (Mertens. Roth), Vogesorum (Kneiff.).

1148. *Ch. Thoreana* W., physeumate filari continuo farcto gelatinoso protenso, a basi inde in ramos conformes alternos confertos patentes divulso, primum atro-virente dein atro-violaceo, his illisque aliis filis arachnoideis patentibus penicillatis dilutius violaceis obpresso iisque veluti torvo. — *Thorea ramosissima* Bory ann. mus. XII. t. 18. f. 2. Berl. Mag. l. l. t. 6. f. 1. Spr. syst. IV. 370. excl. syn. Lyngb. Agrdh spec. II. 324., syst. 56. *Th. hispida* Desv. ang. *Th. Lehmanni* Flor. dan. t. 1594. *Batrachospermum hispidum* DC. gall. II. 60. *Conferva hispida* Draparn. Thor. mag. encycl. V. 398. t. 5. C. *hirsuta* Thore.

Ad palos ligneos Rheni bavar. pr. Argentoratum (Kneiff.). (Variat magnitudine et filorum ambeuntium longitudine eorumque defectu. *Th. Lehmanni* Hornem., quam Agardhius luc dicit, forsitan diversa.)

† *spermatidiis demum caducis.*

1149. *Ch. multifida* Lyngb., physeumate filari con-

tinuo farcto gelatinoso rubente a basi iude inaequaliter dichotomoque ramoso hinc inde in mucum diffluente illumque primum nudique dein in extremitatibus divaricatis ambeuntem s. circumfluum penicillatum recolligente. — *Mesogloea multifida* Agrdh syst. 50. *Rivularia rubra* IVaklenb. succ. II. 916. *Chaetophera multifida* Hook. Ch. rubra Agrdh syn. 127. *Rivularia multifida* Web. et M. Reise 193. t. 3. f. 1., Beiträg. II. 368. Jürg. alg. XVIII. 8. *Chordaria multifida* Lyngb. Flor. dan. t. 1669. *Batrachosperma spongiodioides* Bory.

Ad litora insulae Norderney et Wangerooge (Jürgens). (Junior tota muco gelatinoso fibrilluloso stipata, dein praeter extremitates axillasque similiter diffuentes facile terfa.)

1150. *Ch. Wigghii* W., physeumate filari continuo farcto gelatinoso demum duriusculo roseo, a basi iude in ramos conformes patentissimos demum nudos divulso, his illisque alia physeumata brevia lateralia patentia penicillata subclavata exserentibus. — *Chaetospora Wigghii* Agrdh syst. 146., spec. II. 112. *Hypnea Wigghii* Lamour. ess. 131. Dub. gall. II. 951. *Cladostephus Wigghii* Spr. syst. IV. 347. *Fucus Wigghii* Turn. in Linn. Trans. VI. 135. t. 10., hist. t. 102. Engl. bot. t. 1165.

Ex oris Angliae ad litora germanica projectam conservo aliquin rarissimam et dubiam. (*Smithius* enim ad Rivularias, *Sprengelius* ad *Cladostephum* retulerunt et *Agardhius* genus proprium construxit, cuius notae cum *Chordaria* exacte congruunt. Fila enim mucosa penicillata physeuma ambeuntia praecedentem referunt, nec receptacula ei adscripta elonaria sistunt sed potius condylia sunt, in *Batrachospermo* moniliformi similiter obvia.)

+++ *spermatidiis minus profusis* potius *constipatis* superficiem gelatinosam fere nudam mentientibus. (*Chordaria* et *Sporochnus* Ag.)

1151. *Ch. rhizodes* W., physeumate filari continuo viridi facile versicolore gelatinoso demum duriuscu-

lo e basi inde in alios ramos conformes subaequales vagos eorumque rudimenta brevia tentaculata s. ramenta exserente, extus undique spermatidiis moniliformibus constipatis, superficiem lubricam (siccando) velutinam s. extremitates rugoso-torulosas praestantibus conflato. — *Sporochnus rhizodes* Agrdh spec. I. 156., syst. 260. *Chordaria rhizodes* Agrdh syn. 15. Lyngb. hydroph. 52. t. 13. *Fucus rhizodes* Turn. hist. t. 235. (*lusus robustior*). *Ceramium tuberculatum* Roth cat. III. 112. *Conferva verrucosa* Engl. bot. t. 1688. *C. gracilis* Wulff.

B. paradoxæ, ramulis extremis attenuatis. Agrdh I. L. *Fucus rhizodes* B. tenuior Wahlenb. suec. II. 892. *Chordaria paradoxæ* Lyngb. hydroph. 53. t. 14. *Scyto-siphon paradoxus* Flor. dan. t. 1595. f. 2. *Conferva paradoxæ* Roth cat. III. 172. *C. rhizodes* Khrh. in herb. Web. et M. in Dillw. conferv. IV. 13.

Ad litora maris septentrionalis, rarissime. (Mertens.)

1152. *Ch. flagelliformis* Ag., physeumate filari continuo gelatinoso, secco fuscescente duriusculo, a basi inde virgato-ramosissimo extus undique spermatidiis innatis superficiem lubricam praestantibus foeto iisque nonnisi hinc inde in fila tenuissima articulata succrescentibus penicillato. *Chordaria flagelliformis* Agrdh spec.

. 166. Lyngb. hydroph. 51. *Scytosiphon tomentosus* Hornem. flor. dan. t. 1594. f. 2. Lyngb. hydroph. 62. excl. syn. *Gigartina flagelliformis* Lamour. *Fucus longissimus* Stackh. *Fucus flagelliformis* Flor. dan. t. 650. (*m. proliferum*). Turn. hist. t. 85. Engl. bot. t. 1222. Jürg. alg. II. 2. *Conferva dichotoma* Flor. dan. t. 358.

E mari septentrionali ad litora rarius ejicitur, copiosa ad insulam Helgoland, nonnisi *Fuco serrato* adnata (Jürgens), ad insulam Rupiae (Laurer). (Longitudo 1 - pedalis digitalis; crassities fili s. pennae tenuissimae. Substantia mollis omnino ac flexilis ob spermatidia lubrica eorumque nonnisi in fila succrescentium ope papryum conglutinat.)

1153. *Ch. filiformis* W., physeumate funiculari

continuo tubuloso gelatinoso sordide purpurascente, siccardo virescente, a basi adnata tenuata inde undique alia physeumata lateralia disticha s. ramosa turgida duplo crassiora obtusa in basin similiter tenuata saepius prae-longa adscendentia exserente, spermatidiis pyriformibus innatis undique vestito iisque lubrico. — *Solenia filiformis* Spr. syst. IV. 368. *Halymenia filiformis* Agrdh spec. 214., syst. 245. *Ulva contorta* DC. gall. II. 10. *Ulva filiformis* Wahlenb. lapp. 508. *Gastridium filiforme* Lyngb. hydroph. 68. t. 17. excl. syn. pl. Jürg. alg. XII. 1. *Halymenia purpurascens* Grev. cr. t. 240. ?*Ulva purpurascens* Engl. bot. t. 641. *U. incrassata* Flor. dan. t. 653. et t. 1664. *Dumontia incrassata* Lamour. Dub. gall. II. 941. *Conferra filiformis* Flor. dan. t. 1480. f. 2. *Fucus contortus* Gmel. fuc. t. 22.

E mari septentr. ad littora insulae Norderney rarius ejicitur (Jürgens). (Miram de genere apud varios autores dissensionem summanique, quao inter hanc et Ch. Fili var. fistulosam intercedit communionem, habitus quadratus alienus solum potuit machinari. Spermatidia primum penitus innata deiu emersa punctula subtilissima et superficiem glutinosam, in exsiccatis etiam humectando eliciendam praestant. Variat a mole fere capillari ad digitii minoris crassitatem et talis plerunque contorta redditur.)

1154. *Ch. Filum W.*, physeumate funiculari continuo simplicissimo praelongo subfistuloso extus undique spermatidiis pyriformibus innatis s. emersis superficiem lubricam praestantibus foeto iisque faventibus nonnisi in alia articulata arachnoidea mucosa penicillata prolifer.

a. lubrica, physeumate ex spermatidiis innatis lubrico praelongo minus inflato, hinc inde dissepto. — *Scytosiphon Filum* Agrdh spec. I. 161., syst. 257. *Chorda Filum* Lamour. Lyngb. hydroph. t. 18. *Flagellaria filum* Stackh. *Fucus tendo* Esper fuc. t. 22. *Ceramium Filum* Roth germ. 479. *Fucus Filum* L. sp. 1631. *Flor. dan. t. 821. Turn. hist. t. 86. Wahlenb. suec. II. 891. Jürg. alg. III. 1.*

β. penicillata, physeumate ex spermatidiliis magis emer-
sis gelatinoso s. veluti tomentoso. — *Scy whole siphon Filum*
δ. tomentosus Agrdh l. l. Chorda tomentosa Lyngb.
hydrop. t. 19.

γ. inflata, physeumate inflato fistuloso abbreviato te-
nuiter membranaceo lubrico. *Scy whole siphon Filum ε. fistu-*
losus Agrdh l. l. Encoelium Lyngbyanum Grev. cr. t.
290. Scy whole siphon fistulosum Agrdh disp. 24. Lyngb. hy-
drop. 66. Conserva fistula Roth cat. III. 169. Ulva
fistulosa Huds. angl. 569. Engl. bot. t. 642. Dub. gall.
II. 957. Jürg. alg. XVII. 2. U. Filum Gouan. U. lum-
bryalis Lamour. U. simplicissima Clement.

Inter Helgoland et Wangerooge in maris facie flu-
tantem, plurimum ulnarum longitudine insignem legit cl.
Jürgens, ad oras Frisiae orient. a mare frequentius
ejectam Rothius. (Stirps singularis, praeter coloris va-
rietas, aliis innumeris mutationibus ad longitudinem,
crassitatem, superficiem et dissepimentorum interaneorum
fabricam obnoxia, ex quibus praeter var. lusus α. capil-
laris, phys. teuato capillari abbreviato (Scy whole siphon
β. thrix Agrdh l. l. Ch. Filum var. trichodes Lyngb.
*Fucus thrix Stackh.); β. (disseptus, phys. abbreviato
hinc inde s. prope extremitates constricto, fines articula-
to-tornulosos mentiente (Scy whole siphon γ. lomentarius
Agrardh. *Ch. lomentaria Lyngb. hydrop. t. 18. Fucus*
Filum DC., var. cum fructu glandiformi Roth germ. l. l.)
distingui possunt. Spermatidia in physeumate vivo s.
ex aqua calida madefacto, digitos inquinant et mucosos
reddunt.)*

Ordo II.

DERMATOPHYKEA W. Haattange.

Vegetabilia aquatica, rarissime terrestria, nunc collu-
tivem globosam tunica hyalino-membranacea exceptam
(dermatophysinges) praestantia, nunc filaria e basi ple-
rumque aduata libere natantia, physeumatibus fistulosis

distinctis iisque articulatis (*arthronemata*), sive inter se conjugatis (*gryphonemata*), sive continuis omnino et capillaribus (*trichonemata*) praecellentia, nunc ob membranam utramque compaginatam latescentia magis et informam thallodeu s. plynihoden expansa (*dermatoplynthia*), habitu prorsus vario plerumque tamen ex spermatidiis translucentibus viorem laetam herbaceum subeuntia, praeter condylia gemmacea (*coniocystae Ag.*) spermatidiis propagationi inservientibus per substantiam interaneam undique diffusis s. in strias transversas s. annulares, fascias, puncta, crucem saturatus tiuctam cum ordine quodam congestis foeta, clonariis veris destituta.

(*Algae Nostochinae, Conservoideae, Ulvaceae Agrdh.*
Algae Conservinae, Solenotae et Ulvaceae Spr. syst.
Conservaceae Leibl.)

A. Dermatophysinges, spermatidiis globosis s. moniliformibus physinges vesiculosas tunica hyalina exceptas infarcientibus cum myxophysingibus praeter integumentum externum conformibus, minus tamen lubricis nec tam facile inter digitos diffluentibus. (*Algae Nostochinae Ag.*) — Prima lichenum homoeomericorum aemulantur primordia nec quoque a gonidiorum heteromerorum asynthetorum habitu externo plane discrepant. Hinc *Agardhii* commenta, *Nostoc* generis species terrestres dein in Collemata invalescere et Palmellas aequae ac *Protococcus geophilos* *Algis* adnumerandos esse, fictitia facile dispelluntur nec hypothesis restringunt, *Nostoc* commune, de quo auctores disceptant, lichenem s. *Thrombium Nostoc meum* praestare.)

a. physingidibus filis moniliformibus farctis.

102. NOSTOC AG.

Physinges gelatinosae subglobosae filis moniliformibus curvatis farctae, velamine hyalino tunicato exceptae. (*Nostoc Vauch. Ag. nec Paracels. et excl. spec. terrestribus.*)

† *physingibus globosis.*

1155. *N. sphaericum* *Vauch.*, physinge globosa solida subaggregata laevi atro-viridi. — *Nostoc sphae-*

ricum Vauch. *Agrdh* syst. 20. *Spr. syst. IV.* 372. *N. pusillum* Moug. et Nestl. vog. n. 799. *Linckia granulata* Roth. *Ulva pruniformis* Huds. *Conserva Pisum Flor.* dan. t. 660. f. 2. pr. pr. *Die Wassererbse* Müll. im *Naturf. XVII.* t. 64. — *Dill. hist. t. 10. f. 17.*

In fossis aqua dulci repletis passim, variis Germaniae locis.

1156. *N. pruniforme* Ag., physinge globosa solitaria dein atro-virente subcoriacea polita. *Nostoc pruniforme* *Agrdh* syst 20. *Lyngb. hydroph.* 200. t. 68. *Spr. syst. IV.* 372. *Tremella pruniformis* Roth germ. III. 548. *Web. spic.* 279. *Ulva pruniformis* L. *syst. IV.* 586. *Weig. obs. 40. t. 2. f. 4.* nec *Gunn.*

In lacubus profundioribus aqua dulci repletis eorumque fossis, nunc libere natans, nunc aliis plantis s. ligno appensum, passim. (*Physinges a pisi majoris ad pruni molem variae, primum glauco-virescunt et aliquam duri-tem veluti ednot, deinde adultae laetius virent, politae nitent, siccando autem corrugantur et membranae nigro-virescentis instar collabuntur.*)

1157. *N. Rothii* Ag., physinge vesicaeformi globosa intus cava s. utriculosa, tegmine subcoriaceo angulo s. rotundato-lobato conflata fusco-viridi. *Agrdh* syst. 20. *Linckia verrucosa* Roth cat.

In stagnis ducat. oldenborg. (Roth). (Ambigit inter praecedentem et sequentem et forsitan plane non differt.)

†† *physingibus difformibus.*

1158. *N. verrucosum* Vauch., physinge vesiculosa subglobosa cava tegmine plicato laevi conflata. *Agrdh* syst. 21. *Vauch. conf. t. 16. f. 3.* *Lyngb. hydroph.* 199. *Nostoc coriaceum* *Agrdh* l. l. nec *Vauch. Tremella verrucosa* L. Roth germ. III. 554. *Leyss. hal. Tr. utriculata* Hoffm. *Linckia verrucosa* Wigg. hols. 94. — *Dill. hist. t. 10. f. 16.*

Ad saxa et sarmenta quaecunque rivulorum. (*Physinges a pisi ad avellanae molem variae, subrotundae,*

obtuse-lobatae, sinuosae, ex vesiculis pluribus inter se jungiter appensis compositae, fusco-virides, siccando collapsae, membranam piceam referentes.)

1159. *N. confusum* Ag., physinge incondita utriculosa elata sursum dilatata gyroso-plicata. *Agrdh syst. 22. Spr. syst. IV. 372. Rirularia Linckia Roth N. Beytr. I. 265. Jürg. alg. XIX. 8. Web. et M. Beytr. II. 351. R. gigantea* Trentep.

In lacubus fossisque stagnantibus, agri hal., jeveran. et alibi, suisque locis frequens.

B. Dermatonemata, physeumatibus tubulosis distinctis nec inter se coactis, mole variis, nunc articulatis (arthronemata), nunc conjugatis (gryphonemata), nunc denique continuis membranaceis nisi latescendi, inflandi s. compaginandi insignibus, praeter condylia foras propulsâ intus spermatidiis tum numero tum dispositione variis, foetis.

a. arthronemata, physeumatibus tubulosis, mole variis, arachnoideis, capillaribus s. filaribus per intervalla articulata constrictis s. geniculis articulos interstingentibus interceptis ibique spermatidiorum viridium granulis transversis longitudinaliterve congestis s. varie diffusis foetis. (Conseruae filamentosae (Roth).

108. BOLBOCHAETE AG. Kugelstachel.

Physeuma tubulosum ramosum articulatum, ad summitates articulorum in setas bulbiferas continuas proliferum s. ramulos accessoriros emittens.

1160. *B. setigera* Agrdh syst. 123. Lyngb. hydroph. t. 45. Spr. syst. IV. 353. *Conserva setigera* Roth cat. III. t. 8. f. 1. Jürg. alg. XIII. 5. *C. vivipara* Dillw. conf. t. 59.

Ad plantas aquáticas agri jeverens. (Jürgens).

104. CONFerva L. *Wasserfaden.*

Physeuma tubulosum membranaceum dissepimentis articuliformibus interceptum liberum s. adnatum simplex s. proliferō-ramosum conforme distinctum, spermatidiis interaneis effusis raro coactis foetum.

(*Conferva L. et auct. Prolifera Vauch. Oedogonium Lk. Hempelia Meyen. Polyspermae, Ceramii, Chantransiae, Oscillatoriae spec. qd. auct. gall.*)

② *simplices, physeumatibus simplicissimis.*

a. *bombycinae, physeumatibus filorum arachnoidorum molem subacquantibus, liberis, viridulis.*

† *hydrophilae s. aquarum dulcium.*

1161. *C. sordida* Dillw., phycemate simplicissimo longissimo arachnoideo dense contexto virescente, articulis primum centro pellucidis deinceps hyalinis diametrum quater superantibus. — *Conferva bombycina* Agrdh syst. 88. *C. punctalis* Lyngb. hydroph. t. 46. Jürg. alg. XIX. 3. *C. fugacissima* Lyngb. t. 46. f. 1. *C. sordida* Dillw. conf. t. 60. Spr. syst. IV. 355. *C. breviarticulata* Mohr. *C. serpentina* Müll. *Prolifera composita* Vauch. conf. t. 14.

In fossis et stagnis German. borealis passim.

1162. *C. floccosa* Ag., phycemate simplicissimo tenerrimo sublubrico stratum ballosum mētiente hyalino-virescente, articulis diametrum subaequantibus s. longitudine variis. *Conferva floccosa* Agrdh syst. 89. nec Jürg. *C. fugacissima* Lyngb. hydroph. t. 46. f. 1. 2. Dillw. conf. t. 60. *Hempelia floccosa* Meyen b. Zeit. 1827. *Prolifera floccosa* Vauch. conf. t. 14. f. 3. *Conferva sordida* Engl. bot. t. 2303.

In similibus cum priore locis. (Articuli minus perspicui eorumque longitudine varia. Jürgensii alga (XVI. 7.) homonyma satis singularis, Agardhio teste proprii generis speciem forsitan sistit.)

1163. *C. mucosa* Mert., phycemate simplicilubrico

tenuissimo viridi-flavente, exsiccando fasciam longitudinalem exhibente, articulis diametrum subaequantibus. — *Conserva mucosa* Mert. *Agrdh syst. 90. Dillw. conf. t. B.*

In fossis turfosis Angliae primum detecta, nec tamen a nostris etiam aliena esse videtur.

1164. *C. fragilis* Roth, physeumate simplici viridi pellucido curvo fragili, articulis diametro octies longioribus. — *Conserva fragilis* Roth cat. II. 104. *Agrdh syst. 86.*

In turfosis German. borealis. (Roth.)

1165. *C. hyemalis* Roth, physeumate simplici mucoso ferrugineo subdiaphano fragili, articulis rectangularibus diametrum subaequantibus. — *Roth t. l. Agrdh t. l. Jürg. XVII. 6.*

In aquis lente fluentibus (Roth.)

1166. *C. zonata* W. et M., physeumate simplici tenui lubrico hyalino-viridi, articulis subquadratis fascia transversali demum in globulum collabente notatis diametrum subaequantibus. — *Conserva zonata* Web. et M. Reise 97. t. 1. f. 7. *Lyngb. hydroph.* t. 45. *Flor. dan.* t. 1838. f. 1. *Agrdh syst. 90. Oedogonium zonatum* Link. *Conserva lucens* Dillw. conf. t. 42. *Engl. bot.* t. 1655. *Draparnaldia conservoides* Bory.

Ad lapides rivulorum limpidorum suis locis minime rara v. c. in agro wirceburgensi. (Leiblein.)

1167. *C. dissiliens* Dillw., physeumate simplici tenuissimo lubrico aequali, articulis diametro brevioribus fascia spermatidiorum lata notatis. — *Conf. dissiliens* Dillw. conf. t. 63. *Agrdh syst. 90.* nec *Jürg. C. bicolor Engl. bot.* t. 2288. *Cadmus dissiliens* Bory.

In aquis stagnantibus German. mediae.

1168. ?*C. compacta* Roth, physeumate simplicissimo arachnoideo lubrico densissime compacto, geniculis annularibus, articulis obsoletis medioteus prominulis. *Roth cat. I. 170. t. 1. f. 4., flor. germ. III. 497. Dillw. conf. t. 59. Agrdh syst. 91. Jürg. alg. IV. 8.*

In aquis lente fluentibus agri jeverens. (Jürgens), ad ripas Visurgis (Roth.) (Differt a Conserva rivulari: colore saturatiore, physeumate ipso crispato, siccando tortuoso nec alternatim compresso; geniculis latioribus, articulos mediotenus magis turgescentes intercipientibus.)

† *halophilae, aquarum salsarum s. marinorum.*

1169. *C. implexa* Dillw., physeumate simplici tenai molli crispato-impresso, articularis diametro duplo longioribus. Agrdh syst. 81. Dillw. conf. t. B. Lyngb. hydroph. t. 49. Spr. syst. IV. 356. Engl. bot. t. 2309. *Bangia viridis* Hornem. fl. dan. t. 1601. *Ceramium glomeratum* DC. gall. II. 48. (teste Dub.)

In mari septentrionali. (Sprengelius *C. flavicantem* et *C. orichalceam* Mert. hujus potat formam senilem.)

1170. *C. flavicans* Mert., physeumate simplici capillari implicato-tortuoso flavescente, articularis diametrum nequantibus fere quadrangularibus. Mert. in Jurg. alg. V. 9.

In oris maritimis agri jeverens. et insulae Spiekeroge. (Mertens et Jürgens.)

b. trichinae, physcumatis capillaris s. setaceis, articularis grumulo spermatidiorum globuloso foetis, excicando alternatim contabescentibus. (Conservae capillares Agrdh. Oedogonium Lk. Leibl.)

† *geophilae, humum udam obducentes.*

1171. *C. erectorum* Roth, physeumate tenuissimo praelongo deuse implexo pallide viridi s. e viola fuscescente, articularis diametrum subaequantibus, spermatidiorum grumulos subquadratos laxem comprehendentibus.

— *Conserva erectorum* Roth cat. III. 213. II. 206. t. 5., germ. 507. Dillw. conf. t. 1. Flor. dan. t. 1548. Lyngb. hydroph. t. 47. Engl. bot. t. 1553. Grev. cr. t. 261.

In ericetis turfosis, sphagnosis tersis ipsisque promontoriis udis Thuring. et Hercyn. minime rara. (Variat coloris ratione et tenacitate pro loci apri umbrosique varietate et ad aetatem variam spermatidiorum

grumulos diversimode, a *Dillwynio et Rothio* (in *Web.* et *M. Conf.* t. I. a. b.) propositos digestos consarcinat.)

†† *hydrophilae, aquarum dulcium.*

1172. *C. fugacissima* Roth, physeumate tenuissimo recto hyalino arachnoideo (inter exsiccationem veluti evanido), geniculis obscuris, articulis centro diaphanis. *Roth* cat. I. 176. t. 2. f. 3., germ. III. 503. *Agrdh* syst. 93. ?*Jürg.* alg. XIV. 6. nec *Lyngb.* *C. punctalis* *Jürg.* alg. XIX. 3. pr. pr.

In fossis agri bremens. (*Roth. Mertens.*) (Siccata flavo-virescit, splendet et bombycem tenuissimam tenacellam refert, ex physeumatibus intricatissimis contextam.)

1173. *C. tumidula* Sm., physeumate simplicissimo tenuerrimo hyalino, articulis cylindricis elongatis demum inflatis ellipticis, spermatidiis granulo viridi foetis. *Conferva tumidula* Sm. engl. bot. t. 2376. *Agrdh* syst. 93. *C. inflata* Engl. bot. t. 1670. *Oedogonium tumidulum* Link.

In aquis stagnantibus, v. c. agri wirceburg. (*Leiblein.*)

1174. *C. Candollei* Ag., physeumate simplici tenui, articulis diametro triplo longioribus utrinque inflato-globosis. *Agrdh* syst. 94. *Oedogonium Candolii* Link. *Prolifera Candolii* Lecl.

In aquis stagnantibus agri wirceburg. (*Leiblein.*)

1175. *C. capillaris* Ag., physeumate simplici varie flexo laxiusque intricato, articulis diametrum subaequantibus, siccando alternatim contabescentibus, spermatidiis demum effusis. *Agrdh* syst. 96. nec *Lyngb.* et *Jürg.* — *Dill. hist.* t. 5. f. 25. B.

In fossis et stagnis passim.

1176. *C. rivularis* L., physeumate simplicissimo capillari longissime producto fluctuante recto aequali nitidulo saturate-virente, articulis farctis diametro triplo-s. quadruplo longioribus, exsiccando alternatim contabescentibus, spermatidiis in grumulum infarcentem lineasque latescentes demum coactis. — *Conferva rivularis* L. syst.

120. *Wcis* cr. 20. *Roth* germ. III. 496. *Engl. bot.* t. 1654. *Agrdh* syst. 95. *Lyngb.* *hydroph.* t. 46. *Flor. dan.* t. 881. *Jürg.* XIV. 7. *C. capillaris* auct. *ipsiusq.* *Jürg.* alg. XII. 5. *Chantransia rivularis* DC. *gall.* II. 51. *Prolifera rivularis* Vauch. *conf.* t. 14. f. I. *Pr. Cuvieri Leclerc.* *Conferva funicularis* Roth cat. I. 161. — *Dill. hist.* t. 2. f. 1.

In fossis et flaviis lente flaentibus vulgaris, caute tamen a praecedente et a *C. crispata* distinguenda.

†† *halophilae*, *aquarum salsarum s. marinorum.*

1177. *C. Jürgensii* Mert., physeumate simplici longissimo flexili contracto-geniculato, spermatidiis in quincuncem dispositis dein in punctum confluentibus articulumque diametro paullo longiore hyalinum relinquentibus. — *Conferva Jürgensii* Mert. in *Jürg. alg.* II. 6. *Agrdh* syst. 100. *Spr. syst.* IV. 357.

Ad litora maris septentrion. (Jürgens). (*C. aerea* proxima dicitur, quae potius ad *C. ripariam* vergit vel *C. rivularem* multo tenuiorem praestat. Spermatidia varie disposita.)

1178. *C. aerea* Dillw., physeumate simplici adnato stricto rigido seta crassiore, articulis diametrum vix aequantibus genicula constricta interstingueantibus. *C. aerea* Dillw. t. 80. *Agrdh* syst. 100. *Spr. syst.* IV. 357. *C. vermicularis* Roth. *C. antennina* Bory.

In aestuariis German. borealis. (Physeumate adnato rigidulo ad ordinem sequentem vergit.)

1179. *C. Melagonium* W. et M., physeumate simplici adnato rigido stricto, articulis diametro duplo longioribus, exsiccando ellipticis. *Agrdh* syst. 99. *Web. et M. Reise* t. 3. f. 2. *Dillw.* t. B. *Lyngb.* *hydroph.* t. 51.

Ad maris septentrion. litora.

1180. *C. tortuosa* Dillw., physeumate simplici rigidulo crispato implexo tenui, articulis opacis cylindricis diametro triplo longioribus. *Agrdh* syst. 98. *Dillw.* *conf.* t. 46. *Engl. bot.* t. 2220. *Jürg. alg.* XVII. 8.

In stagnis marinis et ad rupes maris septentr. (Jürg.)

1181. *C. margosa* Mert., physeumate simplici elongato flexuoso, articulis diametrum subaequantibus, geniculis subtumidis hyalinis. *Spr. syst. IV.* 357.

In aestuariis German. borealis. (Mertens.)

1182. *C. Linum* Roth, physeumate simplici longissimo subfuniculari rigidulo laxe implexo, articulis diametrum subaequantibus turgidis veluti punctatis s. exsiccando variegatis, geniculis annularibus pellucidis interstictis. *Confervae Linum* Roth cat. I. 178., germ. III. 501. Jürg. alg. III. 10. Lyngb. hydroph. t. 50. Agrdh syst. 97. Flor. dan. t. 771. f. 2. *Ceramium Linum* DC. gall. *C. melagonium* Flor. dan. t. 1483. f. 1. *C. capillaris* Web. et M. Reise t. 9. Huds. With. ipsiusque L. sp. 1636. teste Wahlenb. suec. Dillw. conf. t. 9. (quae *C. crassa* Ag.) — Dill. hist. t. 5. f. 25. A.

Ad litora maris septentrion., ducat. oldenburg. (Roth), agri jeverens. et Frisiae orient. (Jürgens). (Physeumatum longissimorum, rigidolorum, laete viridium, saepius tamen sordibus spurcorum complexus strata densa, diffusa perficiunt, Ruppiae s. Potamogetonis marini habitum fugentia.)

c. fasciculatae, physeumatibus adnatis in comam penicillatam fasciculatam collectis, rigidulis, viridibus s. e fusco decoloribus.

1183. *C. Youngana* Dillw., halophila, physeumate simplici tenui adnato rigidulo curvato viridi, articulis diametro subaequalibus submoniliformibus. Agrdh syst. 101. nec syn. Dillw. conf. t. 102. Spr. syst. IV. 357. ?*C. isogona* Engl. bot. t. 1030. Agrdh syst. 102.

Ad litora maris septentrionalis

1184. *C. flaccia* Dillw., physeumate simplici tenuissimo curto flaccido, articulis diametro subbrevioribus viridibus, geniculis pellucidis. Agrdh syst. 102. Dillw. conf. t. 29. Lyngb. hydroph. t. 49. Jürg. alg. XVIII. 4.

Ad Algas majores (Fucum vesiculosum) versus insulam Norderney rejectas. (Jürgens.)

1185. *C. flaccida* Lyngb., physeumate simplici pertenui adnato rigidulo fascescente attenuato, articulis iaequalibus, inferioribus diametro brevioribus, superioribus illum aequantibus. *Lyngb. hydroph.* t. 50. *Agrdh syst.* 102. *Engl. bot.* t. 2310. nec *Dillw.* et *Jürg.* *C. Youngana* *Agrdh* syn.

In similibus cum priore algis iisdem locis.

1186. *C. Fucorum* Roth, physeumate simplici recto curto, articulis ovalibus diametro sesquilongioribus. *Roth cat. Agrdh syst.* 102. *C. flaccida* *Jürg. alg.* VI. 9.

In priorum consortio ad litora insulae Norderney. (*Jürgens.*)

1187. *C. collabens* Ag., physeumate simplici adnato tenui sublubrico, articulis variis diametrum plerumque aequantibus, geniculis pellucidis, spermatidiorum grumulum subquadratum, siccando tubo inflato regonditum interstinguentibus. — *Conferva collabens* *Agrdh syst.* 102. *C. aerea* v. *lubrica* *Dillw.* *C. aerea* E. *Bot.* t. 1929.

In mari germanico. (*Agardh.*)

1188. *C. hormoides* Lyngb., physeumate simplici adnato rectinsculo filari caespitoso, articulis diametrum superantibus spermatidiorum grumulum subquadratum coactum laxe concipientibus, siccando inflato - constrictis subquadrangulis. — *Conferva hormoides* *Lyngb. hydroph.* t. 49. *Agrdh syst.* 101. *Spr. syst.* IV. 357. *C. flacca* *Engl. bot.* t. 1043. nec *Dillw.* *C. penicilliformis* *Roth.*

Ad litora maris insulae Norderney. (*Jürgens.*) (Sicca ex pulcherrimis, a praecedente tamen caute distinguenda).

1189. *C. fucicola* Ag., physeumate simplici flaccido fastigiato lutescente, articulis pellucidis diametro sesquilongioribus. *Agrdh syst.* 103. et auct. *grd.*

Ad Fucos majores in mari baltico.

1190. *C. ferruginea* Roth, physeumate simplicissimo capillari rigidulo stricto fastigiato caespitoso pallide-ferrugineo, articulis siccando tenuiter inflatis ovatis

hyalinis inaequalibus, intermediis diametro duplo longioribus, summis confertioribus, illam subaequantibus, spermatidiorum grumulo annulari veluti disseptis. — *Conferva fucicola* Dillw. conf. t. 66. *Flor. dan.* t. 1484. f. 2. *Lyngb. hydroph.* t. 50. *Spreng. in Berl. Mag.* 1809. t. 7. f. 11. (*optima*) Jürg. *alg.* I. 8. *Wahlenb. lapp.* 514., suec. II. 907.

In *Fuco vesiculoso et nodoso maris septentr.* (Roth. Jürgens), insulae Rugiae (Laurer.)

1191. *C. dubia* Leibl., physeumate adnato simplissimo capillari rigidulo criso 1-2 unciali caespitoso viridi, articulis hyalinis diametrum subaequantibus, spermatidiorum grumulis rotundis interstinctis. *Conferva dubia* Leibl. *bot. Zeit.* 1827. p. 279. nec Roth.

Ad caules *Polygoni amphibii* aliarq. pl. sub aqua putrescentes agri wirceburg. (Leiblein). (Spermatidiorum dispositione ad *C. rivularem*, habitu tamen hanc divisionem appellare videtur.)

◎◎ ramoso-proliferae, physeumatibus ex geniculis alia conformia irregulariter emittentibus usque veluti proliferis, habitum diffracto-ramosum mentientibus.

d. proliiferae, phycumate articulis longioribus intercepto ibique (praesertim extremis) alia conformia irregulatia emittente, spermatidiis innatis colorato usque evanidis hyalino, extus sordibus inquinato. *Hydrophilae et halophilae.*

(*Confervae glomeratae* Agrdh. *C. ramosae* Spr. *Annulina* Link.)

1192. *C. stellaris* Roth, hydrophila, physeumatibus aequalibus tenuissimis subparallelis apice demum ramosis porrectis in basin confluentibus pulvinulumque mucosum mentientibus. *Conferva stellaris* Roth germ. III. 494. *Flor. dan.* t. 660. f. 1. *Agrdh syst.* 106.

Ad internum vitri aqua repleti parietem (Trentepohl), intra globos vitreos sutorum (Wallr.). (Species suspecta, intricatissima, Agardhio teste Draparnaldiae tenuis primordium.)

1193. *C. Aegagropila L.*, halophila, physeumatibus rigidis ramosissimis obtusiusculis e centro communis egressis globum constituentibus, articulis diametro quinque longioribus, geniculis annularibus interceptis. *C. Aegagropila L.* syst. 973. Roth germ. III. 517. Web. et M. Reise I. t. 1. f. 7. Dillw. conf. t. 87. Engl. bot. t. 1377. Agrdh syst. 118. Wahlenb. succ. II. 908. Chloronitum aegagropilum Gaill. Ceramium aegagropilum DC. gall. II. 41. Cf. Rudolphi in bot. Zeit. 1827. p. 183. *Confervae brevissima* Ehrh.

Lacubus frigidioribus innatet v. c. pr. Warnemünde. (Timm.) (Physiages mentitor globosas, tri-lineares s. unciales, amoene-virides, ex physeumatibus densissime compactis, ramosissimis, tenuissimis, geniculis annularibus interceptis, conflatas.)

1194. *C. olivacea JV.*, hydrophila, physeumate capillari parce-ramoso curto in strata fasciculata conjuncto olivaceo-fusco, geniculis tenuissimis annularibus interstincto, articulis diametrum duplo longioribus, spermatis diis globosis majusculis deum articulos hyalinos relinquentibus.

Ad palos quercinos aqua suffusos, Thuring. (Asporomyceten ferme aemulatur et a Confervis colore olivaceo quidem recedit, fabrica interna tamen congruit et cum Ceramio fusco Vauch. denuo comparanda est.)

1195. *C. congregata Ag.*, halophila, physeumate intricato ramoso, ramis adscendentibus in caespites fasciculos subglobosos junctis, articulis diametro subaequalibus. Agrdh syst. 111. *Confervae uncialis* Lyngb. hydroph. 56. Jürg. alg. XII. 6.

Ad scopulos insulae Heligoland rarius. (Jürgens.)

1196. *C. crystallina Roth*, physeumate arachnoideo ramosissimo, ramis ramulisque subverticillatis alternis subdichotomis, articulis cylindricis diametro octies longioribus. Agrdh syst. 112. Roth cat. III. 75.

In mari baltico. (Roth.) (Dubia, forsitan C. sericea subscrivenda.)

1197. *C. lanosa* Mert., physeumate arachnoideo recto inaequali subcaespitoso flavente, ramulis elongatis conformibus remotis, articulis ovato-oblongis diametro triplo longioribus. *C. lanosa* Mert. in Jürg. alg. IX. 10. Agrdh syst. 112. Roth cat. III. t. 2. Lyngb. hydroph. t. 56.

Fuco vesiculoso prope Wangerogen rejecto adnascitur. (Mertens. Jürgens.)

1198. *C. flavescentia* Roth, hydrophila, physeumate capillari ramosissimo fasciculato, ramis patentibus subalternis, articulis oblongis diametro sexies longioribus. *C. flavescentia* Roth germ. III. 511. nec Wallr. ann. bot. Dillw. conf. t. E. Engl. bot. t. 2088. ? *C. pennatula* Flor. dan. t. 945.

In lacu ducat. oldenburg. (Roth.) (Siccando flavescit, aliquantulum nitet vitroque arcte adhaeret.)

1199. *C. sericea* Huds., physeumate capillaceo viridi demum rufo-lutescente nitente ramosissimo e basi dichotoma trichotomo superne in ramulos rigidulos subsecundos desinente, articulis diametro quinques longioribus. *C. sericea* Huds. Flor. dan. t. 651. Agrdh syst. 113. Spr. syst. IV. 358. *Chloronitum sericeum* Gaill. *Ceramium sericeum* DC. gall. II. 42. — Dill. hist. t. 5. f. 33.

Ad litora maris septentrion. (Huic forsitan non immrito *Sprengelius* l. l. Conservam puram, crystallinam, flavescentem Roth, laete-virentem Dillw., Pennatulam Vahl., C. fascicularem et C. Ruchingeri subscribit.)

1200. *C. laete-virens* Dillw., physeumate capillaceo ramosissimo rigido, ramis arcuatis alios ranunculos secundos approximatos breviores et tenuiores exserentibus, illorum articulis diametro latioribus, horum angustioribus. *Conserva laete-virens* Dillw. conf. t. 48. Jürg. alg. XVI 3.

Ad litora maris septentr. (Jürgens). (Cl. Agardh hanc *C. glomeratae*, *Sprengelius* *C. sericeae* subscribere jubet, quae ad Jürgensi specimina satis distincta arti-

culorumque natura a reliquis aliena vel potius ad Ceramium accedere videtur.)

1201. *C. riparia* Roth, physeumate capillari longissimo remotissime ramoso, ramis brevibus divaricatis hexuosis, articulis diametro duplo longioribus. *Agrdh* syst. 106. *Engl. bot.* t. 2100. nec *Jürg.* *C. obtusangula* Lyngb. *hydroph.* t. 55. ? *Zygnema litoreum* Lyngb. teste *Agardhio*.

Ad ripas fluviorum nec non ad litora maris septentrionalis.

1202. *C. cripata* Roth, physeumate capillari ramoso, ramis alternis remotis, articulis cylindricis diametro sexies-deciesve longioribus siccando alteruantim contabescentibus. — *C. crispata* *Agrdh* syst. 109. *Roth* cat. II. 225. *C. canalicularis* *Roth* cat. II. 218. *C. capillaris* *Engl. bot.* t. 2364. *ipsiusq. forsitan* *Linn. et al. auct.* *C. crispa* *Dillw.*

In lacubus profundioribus agri hal. et alibi.

1203. *C. glomerata* L., physeumate capillari ramosissimo laete-viridi, ramis alternis, ultimis brevibus fastigiatis subsecundis, articulis cylindricis diametro quarter longioribus, spermatidiis annularibus interstinctis. — *Annulina glomerata* Link. *Confervae glomerata* L. sp. 1637. *Weis* cr. 25. *Roth* cat. *Agrdh* syst. 107. *Flor. dan.* t. 651. f. 2. *Dillw.* conf. t. 13. *Engl. bot.* t. 2192. *Lyngb. hydroph.* t. 53. *Jürg. alg.* XI. 2. *C. cristata* *Roth* germ. III. 512. *Chantransia glomerata* *Vauch.* t. 10. f. 4. *C. sericea* *Leyss.* hal. ? *C. laete-virens* *Engl. bot.* t. 1854. — *Dill. hist.* t. 4. f. 16. 18. t. 5. f. 28.

In rivulis et torrentibus durioribus potissimum et limpidioribus Thuring. et Hercyn. inferior. vulgaris, saxis lignisque adnata, nec quoque aquis salsis et marinis deest (*var. marina* *Roth* L. L.). (*Stirps vulgaris* quidem at secundam locum et aetatem perquam versipellis. Ejus primordia lubrica omnino, laete-viridia, Batrachospermum s. Draparnaldiam penitus aemulantur, dein in physeumata protenduntur tenuia, debilia satis ac flaccida, siccando

rigidula nec papyro jugiter adhaerentia, e basi subsimplici extremitatem versus sensim magis dichotomo-irregulariterque ramosa et in penicillos veluti finientia.)

1204. *C. rupestris* L., halophila, physeumate stricto virgato ramosissimo rigidulo, ramis erectis, articulis cylindricis, quibusdam inflatis diametro triplo longioribus, exsiccando alternatim constrictis pellucidoque geniculatis. ***Conferva rupestris* L. sp.** 1637. ***Flor. dan.*** t. 948. **Roth germ.** III. 516. ***Dillw. conf.*** t. 23. ***Wahlenb. succ.*** II. 908. ***Engl. bot.*** t. 1699. ***Lyngb. hydroph.*** t. 54. **Jürg. alg.** IX. 5. ***C. Hutchinsiae* Jürg. alg.** I. 4. ***Chloronitum rupestre* Gaill.** ***Ceramium rupestre* DC.** gall. 42. ***Conferva virgata et glauca* Roth.** — ***Dill. hist.*** t. 5.f.29.

Ad litora maris septentr. (Jürgens.) (Viorem saturum nonnisi glaucescentem siccata quoque retinet nec papyro adhaeret. Articulorum genicula saturate virentia inter se stria pellucida pertenui distincta et contracta cum articulis hyalinis inflatis habitum torulosum impertinent.)

1205. *C. expansa* Mert., halophila, physeumate capillari flaccido viridulo, ramis remotis alternis oppositive, articulis diametro sexies longioribus medio angustioribus, siccando alternatim contractis. **Mert. in Jürg. alg.** V. 8. ***Agrdh syst.*** 114. ***Spr. syst.*** IV. 358.

In stagnis marinis agri jeverens. (Mertens et Jürgens.)

1206. *C. refracta* Roth, halophila, physeumate capillari ramosissimo, ramis tenuibus divaricato-refractis creberrimis, articulis diametro duplo longioribus. **Roth cat.** II. ***Agrdh syst.*** 114. ***Spr. syst.*** IV. 358. ***C. fracta marina* Lyngb.** nec alior. ***C. albida* Engl. bot.** t. 2327. fig. dextr.

In mari septentrionali (Roth.) (Habitu denso ramisque maxime tenuatis a sequentibus forsitan differt.)

1207. *C. arcta* Dillw., halophila, physeumate stricto virgato capillari ramosissimo hyalino-virente, ramis erectis incrassatis, articulis inaequalibus, inferioribus diametrum subaequantibus, superioribus multo longiori-

bus. *Agrdh syst. II* 118. *Spr. syst. IV.* 359. *Engl. bot.* t. 2098.

Ad litora maris septentrion alii passim.

1208. *C. fracta Vahl*, physeumate capillari ramo-sissimo viridi flexuoso, ramis teneris alternis divaricatis iatricatis, articulis cylindricis diametrum ter quaterve superantibus. — *Vahl fl. dan.* t. 946 *Agrdh syst. II* 110. *Dillw. conf. t. 14.* *Engl. bot. t. 2338.* *Jürg. alg. IV.* 3. *Lyngb. hydroph. t. 52.* *Wahlenb. succ. II.* 908. *C. diraricata Roth cat. I.* 179. t. 3. f. 1., *germ. III.* 510. *C. vagabunda Angl.* *C. patens Agrdh syst. II* 110. *C. flexuosa Agrdh syn. DC.* *Dillw. conf. t. 10.* *Flor. dan. t. 882.* — *Dill. hist. t. 3. f. 11.*

In stagnis praesertim marinis. (Physeumate superne in ramos divaricatos divulso, in caespites iusignes juncto praeprimis a praecedente differt, quae alioquin perquam variabilis est materque aliarum complurium specierum. Color enim tum ex spermatidiis interaneis tum ex cotypsculis membranae externae adfixis, nigredinem sordidam mentientibus pendens, varius, hyalinus nunc virens, nunc nigricans. Nec quoque ramulorum copia et articulorum longitudo notas praestant stabiles et var. *mari-*
narum titulo coram sunt spec. ex geniculis undique proliferis, ramentis verticillatis fere onusto, specierum plurimum valorem iufringentia. Ex eorum numero sunt: *Conferva pulverulenta Mert.* in *Jürg. alg. XIX.* 4., physeumate primario nigricanti-punctato, reliquis hyalinis; *C. heterochlora Agrdh syst. II* 115. (*C. albida Jürg. alg. III.* 5. *Dillw. t. E.* nec *Roth.* *Ceramium densum Roth germ. III.* 473.) similibus plane notis nec aliis recognoscenda, et *C. aspera Ag. syst. II* 115. (*C. nigricans Roth germ. I.* 471. *Ceramium asperum cat. II.* 180. *Spr. syst. IV.* 359.) vix nisi punctis elevatis papulosis (sicut in *Chara papulosa mea*) colorem nigricantem impertientibus habituque robustiore diversa.)

1209. *C. usneoides Wallr.*, hydrophila, physen-membranaceo funiculari ex geniculis annularibus

contractis parco remoteque prolitero demum extus papilloso, articulis cylindricis inflatis siccando alternatim compressis ligamentosis diametro ter quaterve longioribus. — *Conferva usneoides* Wallr. ann. bot. 13. t. 6. f. *C. dilatata* f. *clavata* Jürg. alg. XIV. 5. *C. clavata* Retz. *C. flexuosa* auct. qrd.

In rivulis et fluviiis agri hal. et Thuring. v. c. pr. Heringam, saxis et graminum culmis adhaereos. (A reliquis omnibus physeumatis mole, fabrica stipata tenacius membranacea, spermatidiis primum interaneis effusis dein forsan profusis, superficiem papillosam mentientibus, s. denique *C. nigricantis* iustar colorem s. *C. flexuosa* Jürg. alg. VIII. 10. sordide-nigricantem mentientibus differt, quamvis, *C. fractae* aemula hinc inde ex geniculis quibusdam alias proles s. ramos conformes at duplo graciiores emittat. Hinc dubia restat nec tamen cum *Lemaea torulosa*, ad quam *Agardhius* retribuit, conjugenda.)

1210. ? *C. enterochlora* W., halophila, physeumate capillari, articulis diametrum triplo longioribus geniculis annularibus pellucidis interceptis, spermatidia in cylindram coacta tubulum laxe infarcientia includentibus. ?*Conferva subdivisa* Roth. Agrdh syst. 107.

Inter alias *Confervas* ex insula Norderney ab amiciss. Jürgens missas equidem legi, quae fabrica interna ad *C. hormoiden*, geniculis ramosis ad hanc tribum spectat, spermatidiorum grumulo cylindrico tubulum hyalinum laxe infarciente coacto a reliquis recedit et potius ad Zyg nemata reflectit.)

1211. *C. prolifera* Roth, halophila, physeumate tubuloso membranaceo cylindrico inflato ex articulis geniculato-constrictis alia lateralia conformia dichotoma fastigiata emitente habitumque catenatum meantente, articulis primum spermatidiis viridibus dein profusis foetis inaequalibus, plurimis diametro triplo longioribus, ultimo productiore, his illisque siccando alternatim compressis. — *Conferva prolifera* Roth cat. I. t. 3. f. 2. Jürg. alg. IX. 9. excl. syn. Dillw. Agrdh syst. 119. *C. pellucida*

Huds. C. catenata Desf. Bryopsis confervoides Lenorm. Chloronitum proliferum Link. Ceramium catenatum DC. gall. II. 42. C. acragropila Wulff. C. fasciculata Roth l. l. — Dill. hist. t. 5. f. 27.

Cum aliis Algis mixta illisque adnata e mari germanico ad insulam Norderney ejicitur. (Spermatidia primum inclusa dein forsitan foras projiciuntur et articulos hyalinos reddunt.)

b. gryphonemata, physeumatibus tubulosis mole variis, geniculiformibus interstinctis, inter se trabecularum transversalium ope conjugatis, spermatidiis varie dispositis foetis. (Confervae genuinae Ag.) (Tendunt vel praenotant physeumatum connubium plynthodes.)

105. ZYGNEMA AG. Jochsaden.

Physeuma tubulosum tenuiter membranaceum articulis geniculiformibus interceptum, dein per tubulos breves transversaliter exsertos connatum s. alterum cum altero copulatum, spermatidiis in stellas, maculas, spirasve dispositis foetum.

(*Zygnema Ag., Spr., Wahlenb. Mougeotia Ag. Confervae conjugatae auct. Diadenus Pal. Beauv. Conjugatae Vauch. Mart. Jugalis Schrank. Spirogyra et Globulina Link. Leda, Salmacis Bory.*)

† *asterococca, spermatidiis stellatis, physeuma maculato-punctatum praestantibus (Tendaridea et Ledae sp. Bory.)*

1212. *Z. cruciatum Ag.*, physeumate simplici lubeo viridi, articulis diametro duplo longioribus, spermatidiorum grumulis macularibus binis subrotundis stellas mentientibus, demum in maculas subrotundas s. quadratas confluentibus. — *Zygnema cruciatum*, gracile, recurvum et stellinum Agrdh syst. 77. *Z. stellatum* Spr. syst. IV. 360. *Globulina cruciata et gracilis* Link. *Conjugata bipunctata* Mart. erl. 293. *Confervae bipunctata* Engl. bot. t. 2463. *Dillw. conf. t. 1. Jürg. alg. VIII. 1. Roth cat. II. 204. *C. cruciata* DC. *Tendaridea bi-**

punctata Desmaz. *T. Castor Bory.* *Zygnum bipunctatum Lyngb.* *hydroph.* t. 60. *Wahlb.* *suec.* II. 910. *Conjugata cruciata Vauch.* *conf.* t. 6. f. 4. t. 7. f. 2. *Conferva stellina Müll.* *act.* *petrop.* III. t. 2.

In aquis segnibus vulgaris. (Variat praeter colorem dilutius saturatiusve virentem s. subolivaceam demum fere nigrescentem articulorum dimensione, articulis nunc diametro triplo longioribus (var. β . *longius-articulata Ag.* l. l. *C. bipunctata Dillw.* t. 2. *A. Conjugata lutescens Vauch.* *conf.* t. 6. f. 3.), nunc articulis diametrum subaequantibus (var. γ . *brevi-articulata Agrdh* l. l. *Conferva bipunctata Dillw.* B.), et spermatidiorum primum in stellas binas dein vero in maculas quasi confluentium (*Z. bipunctata* var. *unipunctata Lyngb.*) dispositione.)

1213. *Z. pectinatum Ag.*, physeumatis adnati articulis diametro sesquilocogioribus, spermatidiis stellatis transversis oblongatis veluti pectinatis. *Agrdh* syst. 78. *Lyngb.* *hydroph.* t. 60. *Jürg.* *alg.* XI. 3. *Conferva semistrangulata Roth.* *C. bipartita Dillw.* *conf.* t. 105. *Engl.* *bot.* t. 2302. ?*Jürg.* *alg.* II. 9. *Globulina pectinata Link.* *C. pectinalis Engl.* *bot.* t. 1609. *Conjugata pectinata Vauch.* *conf.* t. 7. f. 4.

In flaviis minime raro. (Prioris varietatem habet *Sprengelius*.)

†† *spirococca*, spermatidiis in spiram dispositis.) *Salmacis Bory.*)

1214. *Z. quininum Ag.*, physeumate aequali, articulis diametro triplo longioribus, spermatidiis in spiras simplices primum acutiusculas demum arcuatas dispositis. *Agrdh* syst. 80. *Lyngb.* *hydroph.* t. 25. *Spirogyna quinina Link.* *Conferva punctata Dillw.* *C. multistriata Roth.* *C. spiralis Dillw.* t. 3. pr. pr. *C. quinina Müll.* *Conjugata perticalis Vauch.* *conf.* t. 5. f. 1. *Conferva perticalis Müll.* *in act.* *petrop.* III. t. 1. f. 2. *DC.* *Salmacis quinina Gaill.*

In aquis lente fluentibus et stagnantibus.

1215. *Z. deciminum* Ag., physeumate simplici lubrico, articulis diametro quadruplo longioribus, spermatidiorum spiris duplicebus a. cruciatis, crucibus laxis veluti subquaternatis. Agrdh syst. 81. *Spirogyra decimina* Link. *Conjugata setiformis* a. *lubrica* Mart. erl. 293. *Conferva inflata* Engl. bot. t. 2376. *C. spiralis* Engl. bot. t. 1656. *C. nitida* Dillw. conf. t. 4. f. A. B. *Conferva decimina* Müll. I. I.

In iudeum cum priore locis.

1216. *Z. nitidum* Ag., physeumate simplici labri-
co nitido-virente, articulis diametrum subaequantibus,
spermatidiorum spiris cruciatis tenuibus arctis. Agrdh
syst. 82. *Salmacis nitida* Bory. *Conferva spiralis* auct.
Conjugata setiformis a. *Rothiana* Mart. erl. I. I. pr. pr.
Spirogyra adnata Link. *Conjugata princeps* Vauch.
Conferva setiformis et *conjugata* Roth cat. III. 266.
Jürg. alg. X. 6. *C. bulligera* DC. *bull. philom.* *C. nitida* Flor. dan. t. 819. *C. jugalis* Flor. dan. t. 883. DC.
Dillw. conf. t. 5. *C. multistriata* Roth. *C. bullosa* Hedw.
— *Dill. hist.* t. 2. f. 2. Mich. gen. t. 86. f. 6.

In fossis stagnantibus frequens.

1217. *Z. condensatum* Ag., physeumate aequali,
articulis diametro subaequalibus, spermatidiorum spiris
binatis arctissimis. Agrdh syst. 80. Jürg. alg. XIV. 8.
Conferva condensata DC. *Spirogyra condensata* Link.
Conjugata condensata Vauch. conf. t. 5. f. 2.

In fossis profundioribus passim.

+++ *sphaerococca*, *spermatidiis in grumulos*, *tubum*
per intervalla infarcientes coactis. (*Mougeotia*
Agrdh. *Zygnematis et Ledae* sp. Bory.)

1218. *Z. genuflexum* Ag., physeumate genuflexo
flexuoso geniculisque in reticulum laxum copulato viridi,
articulis diametrum quater superantibus, spermatidiorum
linea longitudinali rotatis. — *Zygnema genuflexum* Agrdh
syn. 96. *Lyngb. hydroph.* t. 58. *Wahlenb. succ.* II. 911.
Mougeotia genuflexa Agrdh syst. 83. *Conferva genu-*
flexa Roth cat. II. 199. Jürg. alg. III. 7. *C. globifera*

Jürg. alg. III. 8. *C. coactilis* Jürg. alg. XII. 7. *Conjugata angulata* Vauch. conf. t. 8. *C. bullosa* Ehrh.

In aquis stagnantibus aestate passim.

1219. *Z. serpentinum* Dub., physeumate conovo-
luto, articulis diametro duplo longioribus, spermatidiis
viridibus longitudinaliter rectangulis articulos infarcien-
tibus, demum in strias coactis. — *Zygnea serpentinum*
Dub. gall. II. 977. *Z. compressum* Lyngb. *hydrop. t.*
58. *Conferva serpentina* Müll. DC. *gall. II.* 57. *Conju-
gata serpentina* Vauch. conf. t. 8. f. 10.

In aquis paludum German. australis.

1220. *Z. capucinum* Dub., physeumate nitente
atro-violaceo demum hinc inde inflexo et conjugato, ar-
ticulis diametro ter-sexiesve longioribus, spermatidiis
violaceis per intervalla articulos infarcientibus, demum in
grumulos elongatos s. punctiformes coactis. — *Zygnea
capucinum* Dub. l. l. *Mougeotia capucina* Agrdh
syst. 84. *Leda capucina* Moug. et Nestl. n. 793.

In aquis stagnantibus Vogesorum. (Mougeot et Nest-
ler.) (Congruit etiam diagnosis *Confervae atro-violaceae*
Agrdh syst. 87. cum speciminibus a Kneiffio eodem ti-
tulo benevole communicatis, algam eximiam praestantibus.)

106. HYDRODICTYON ROTH. Wassernetz.

Physeumata tubulosa tenuiter membranacea reticula-
tum connexa, opus reticulatum mentientia. Spermatidia
demum coacta embryomorpha in quovis articulo evolunta.

(*Hydrodictyon Roth. Agrdh. Vauch. Confervae sp. L.*)

1221. *H. utriculatum* Roth, physeumatis arti-
culis reticulatum connexis demum rete veluti ex areolis
pentagonis contextum mentientibus illudque exsiccando
informantibus. — *Hydrodictyon utriculatum* Roth cat.
III. 322., germ. III. 531. Agrdh syst. 85. Wahlenb.
suec. II. 909. Flor. dan. t. 1597. Mart. erl. 291. Jürg.
alg. XIV. 1. Lyngb. hydrop. t. 58. *H. tenellum* et ma-
jus Roth. *H. pentagonum* Vauch. conf. t. 9. DC. gall.

H. 16. Spr. syst. IV. 360. Conferva reticulata Dill. hist. t. 4. f. 14. L. sp. 1635. Weis cr. 24. Dillw. conf. t. 97. Flor. dan. t. 1597. Engl. bot. t. 1687. Muscus aquaticus bombycinus retiformis Loes. pruss. 173. c. icon. 54.

In stagnis profundioribus libere natans, v. c. agri gotting. (Weis), erlang., halens., oldenburg. et jeverens. (Martius. Wallr. Roth. Jürgens). (Alga perquam singularis auctum tempore in atriculum s. physingem oblongam, Ulvae intestinali plane non dissimilem, digitum crassam, ex physeumatibus in opus pentagono-reticulatum connexis conflata, ex initis vernalibus exiguis s. ex embryo primi articuli veluti matricalis adolescere solet. Physeumata alioquin longitudine et amplitudine, a crassitate capillari ad setas equinae crassioris molem variant novasque olim species imposuerunt.)

c. trichonemata, physeumate tubuloso continuo ut plurimum capillari s. funiculari cum nisu quodam latescendi latitudinemque plynthoden adficiendi, spermatidiis vario modo nec in formas distinctas digestis. (Oscillatoriae, Ulvaceae genera Agrdh. Solenotae Spr.)

107. CALOTHRIX AG. Haarschopf.

Physeuma arachnoideum continuum rigidulum intus spermatidiis intricatissimis annulatum.

(Desmaretella Bory. Oscillatoriae et Conservae spec. exact. — Genus dubium inter illa et Bangiam ambigens.)

+ physeumatibus simplicibus.

1222. *C. nivea* Ag., physeumatibus tenuissimis rigidulis niveis in caespitem sordide lutescentem fasciculatis. Agrdh syst. 70. *Oscillatoria nivea* Spr. syst. IV. 362. *Conservae nivea* Dillw. Engl. bot. t. 2529.

In fontibus sulfureis v. e. thermarum aquisgran. (Wallr.)

1223. *C. confervicola* Ag., physeumatibus erectis minutis tenuissimis in basin fasciculatis primum laeteviridibus dein glaucescentibus. Agrdh syst. 70. Desmaretella confervicola Bory. Dub. gall. II. 973. Oscillato-

ria confervicola Ag. syn. *Spr. syst. IV.* 362. *Linckia ceramicola* Lyngb. *Conserva confervicola* Flor. dan. t. 1484. f. 1. Engl. bot. t. 2576. Jürg. alg. XVIII. 6.

Ad Algas teouiores marinas, Ceramia v. c. et Chordariam Filum, in mari septentrionali.

1224. *C. scopulorum* Ag., physeumatibus erectis curvato-flexuosis minutis in stratum velutinum condensatis laete-viridibus. Agrdh syst. 70. *Oscillatoria zostericola* Lyngb. hydroph. t. 27. Flor. dan. t. 1599. f. 1. *O. scopulorum* Ag. syn. Spreng. l. l. *Conserva scopulorum* Web. et M. Reise t. 3. f. 3. Roth. Engl. bot. t. 2171.

Ad Algas marinas majores, Zosteram, nec non ad scopolos marinos. (Ad hanc *Sprengelius Calotrichem Mucoarem* et *Lyngbyam confervoides* Ag. transfert).

1225. *C. pulvinata* Ag., physeumatibus curtis rigidulis erectis dichotomis linea virescente longitudinali notatis, in caespitem densum obscure-viridem spongiosum fasciculatis. Agrdh syst. 71. *Ceramium pulvinatum* Jürg. alg. IV. 5.

Ad palos et ligna semipatrida propter maris septentrion. litora, rarissima. (Mertens.)

†[†] physeumatibus ramosis distinctis.

1226. *C. lanata* Ag., physeumatibus rigidulis virescentibus erectis ramosis in caespitem atro-viridem congestis. Agrdh syst. 72. *Trichophorus lanatus* Desv. journ. bot.

Ad saxa fontium.

1227. *C. tinctoria* Ag., physeumate mucoso abbreviato erecto ramoso in caespitem densum intense viridem exsiccando violaceum fasciculatis. Agrdh syst. 72. Dub. gall. II. 987. *Conserva tinctoria* Pers. *Leptomitrus investiens* Bory in Moug. et Nestl. vog. n. 899.

In aquis Vogesorum herbas ambiens. (Mougeot et Nestler.)

1228. *C. distorta* Ag., physeumatibus rigidulis erectis mucosis ramosis coeruleo-virentibus tortis. *Agrdh* syst. 72. *Oscillatoria distorta* Lyngb. hydroph. 90. *Conferva distorta* Dillw. conf. t. 22. Roth cat. III. 201. Flor. dan. t. 820. Engl. bot. t. 2577. Jürg. alg. XI. 5.
In lacubus marinis agri jeverens. libere nataus. (Jürg.)

108. BANGIA LYNGB. Bangie.

Physeuma tubulosum tenuiter-membranaceum continuum capillare, spermatidiis fasciatis densis foetum.

(*Bangia* Lyngb. *Agrdh. Schizonema* Ag.)

1229. *B. rutilans* Lyngb., physeumate simplici capillari recto fusco-virente siccando rutilante, grumulis cylindrico-oblongis parallelis confertia. — *Bangia rutilans* Lyngb. hydroph. t. 26. Spr. syst. IV. 361. *Schizonema rutilans* Agrdh syst. 9. *Conferva rutilans* Trentepohl. Roth cat III. 179. Jürg. alg. I. 3.

Culmis stramineis adhaeret in insula Norderney (Jürg.)

1230. *B. foetida* Spr., physeumate subramoso erecto continuo subolivaceo caespitoso-virgato, spermatidiorum grumulis moniliformi-catenulatis. *Bangia foetida* Spr. syst. IV. 361. *Schizonema Dillwynii* Agrdh syst. 10. *Ulva foetida* Vauch. *Conferva foetida* Dillw. conf. t. 104. Engl. bot. t. 2101. Jürg. alg. VII. 8.

Confervis tabidis adnata in insula Norderney. (Jürgens.) (Habitu alieno gaudet et ad Hydrophytozoa reflectere videtur.)

1231. *B. torta* Ag., physeumate viridi intricato plano, spermatidiorum grumulis fasciatis bi-tripunctatis notato subtoruloso — *Bangia torta* Agrdh syst. 75. *Conferva torta* Mert. in Jürg. alg. XIII. 6. *C. contorta* Jürg. alg. VI. 4.

In fossis marinis agri jeveran. (Mertens et Jürgens.)

1232. *B. atro-purpurea* Ag., physeumate simplicissimo capillari recto aequali fasciis quinque-puncta-

tis s. maculis radiatis notato. *Agrdh syst.* 76. *B. fusco-purpurea* et *atro-purpurea* *Lyngb.* *hydroph.* 83. *Oscillatoria atro-purpurea* *Agrdh* syn. 109. *Bangia fusco-purpurea* *Spr.* *syst. IV.* 361. *Conserva atro-purpurea* *Dillw.* *conf. t.* 103. *Roth cat. III.* 208. *t.* 6. *Wahlcnb.* *Inpp.* 515. *Jürg. alg. XI.* 4. *Engl. bot. t.* 2085. *Cadmus violacea* *Bory* in *Moug.* et *Nestl.* *vag. n.* 895. *Conserva jubata* *Draparn.*

Ad rotas aquarias molarum ducat. oldenburg. (Jürg.)

109. LYNGBYA AG. *Lyngbye.*

Physeuma tenuiter-membranaceum simplex tubulosum continuum flexile intus spermatidiis mobilibus primum in annulum approximatum dispositis dein evanidis foetum.

(*Oscillatoriae* et *Conservae* sp. auct.)

1233. *L. aeruginosa* Ag., physeumate rigido crassiusculo aeruginoso, spermatidiorum grumulis annularis densis. — *Lyngbya aeruginosa* *Agrdh* *syst.* 74. *Oscillatoria aestuarii* Jürg. *alg. XV.* 3. cum var. *atrovirente*.

Ad limum litoris maris septentr. (Jürgens.)

1234. *L. crispa* Ag., physeumate rigidulo criso aeruginoso in caespites obscure-s. sordide virides congesto. *Agrdh* *syst.* 74. *Oscillatoria majuscula* *Dillw.* *conf. 40. t. A.* Jürg. *alg. IV.* 7.

In stagois maritimis inter alias congeneres. (Jürgens.)

1235. *L. muralis* Ag., physeumate capillari crassiusculo tenaci curvato-flexuoso viridi in stratum viridi-nitens implicito, spermatidiorum grumulis laxis approximatis annularibus angustis dein evanidis, isthmos remotos vacuos reliquientibus. — *Agrdh* *syst.* 74. *Oscillatoria muralis* *Agrdh* syn. *Conserva muralis* *Dillw.* *conf. t. 7.* *Engl. bot. t.* 1551. Jürg. *alg. V.* 6. *Roth cat. III.* 189., germ. I. 491. C. *Flüggii* *Roth.* *Oscillatoria patietina* *Vauch.* *conf. t. 15. f. 8.* *Byssus velutina* *Weis.*

Ad terram, muros et ligna patria, in locis stillicidio

expositis vulgaris. (Colore praecellit praeino s. laete-viridi et a speirematibus asynthetis lichenum faciliter dignoscitur.)

1236. *L. lutescens* W., physeumate praelongo tenissime-capillari rigidulo tortili pallide-lutescente in stratum contiguum longe expansum fulvum intertexto, spermatidiorum grumulis duplicibus approximatis annulos latescentes mentientibus. — *Lyngbya muralis* var. *fulva* Wallr. in lit.

Ad radices arborum, v. c. Aesculorum et Pyrorum imas Thuring. rares. (Praecedenti similis quidem, diversa tamen, physeumatibus duplo tenuioribus, rigidioribus, longioribus, pallide-flaveutibus, in stratum contiguum nec in cirrhos floccosos tortum intertextis et spermatidiorum grumulis geminatis isthos hyalinis subaequantibus approximatis, tubulum diutius infarcentibus. — *Lyngbya ochracea* Leibl. (bot. Z. 1827. p. 260.) in aquis martialibus pr. Wipfeld lecta, mihi ignota.)

110. SPHAEOPLEA AG. Kugelschlund.

Physeuma continuum capillare, spermatidiis globosis sparsis demum incrementibus foetum.

(*Conferua* sp. auct. *Bangia* Spr.)

1237. *Sph. annulina* Ag., physeumate capillari simplicissimo aequali vago, spermatidiis globosis lateritiis seriatis s. dispersis, isthos subquadratos hyalinos interstingentibus. — *Sphaeropla annulina* Agrdh syst. 76. *Bangia annulina* Spr. syst. IV. 361. *Conferua annulina* Roth cat. III. 211. t. 7. Jürg. alg. XVII. 7.

In fossis stagnantibus agri bremens. et jeveran. (Roth et Jürgens.)

111. SCYTONEMA AG. Hautfaden.

Physeuma tubulosum continuum capillare coriaceum curtum, intus striis annulatis s. moniliformibus notatum.

1238. *Sc. myochrus* Ag., physeumatibus tenuiter-capillaribus vase-ramosis intus striis annulatis liberis sa-

turbationibus approximatis notatis inter-olivaceis, ramulis geminis secundis in stratum fasciculatum densum implexis. — *Scytonema myochrous Agrdh syst. 40. Wahlenb. suec. II. 913. Scytonema ocellatum Lyngb. hydroph. t. 28. Conserva myockrous Dillw. conf. t. 19. Engl. bot. t. 1555. Flor. dan. t. 1002. f. 2. Lyngb. t. 27. Conserva seriata Wahlenb. lapp. 514. t. 30. f. 2.*

Ad rapes madore continuo irroratas praeruptas Hercyn. v. c. inter Zorgam et Hohgeiss ad viam (Waller.), Saxoniae (Reichenbach), nec non ad vectes aqua suffusas. (Alga plaga saxorum praeruptorum longe lateque tanquam pelle humectata obducit coloreque olivaceo tristi oculos e longinquo jam allicit.) *Scytonema byssoidem et Stigonema atro-virens Agrdhii*, lichenes sunt, de quibus *Parmelia velutina* mea I. 552. conferatur.)

1239. Sc. velutinum W., physeumate tenuiter capillaceo curto viridi erecto e basi simplici hyalina estriata in apicem vase-ramosum obsolete striatum desineute, in stratum primum contiguum dein crustaceum rimoso-areolatum olivaceum dehiscens deosissime constituto, odoro. — *Bysus antiquitatis Weis gott. 14.*

Ad saxa arenaria agri thuring. (Habitus praecedentis; at physeumata tenuiora, breviora, compacta, dein crustaceo-areolata, fere tessellata, odore picet insignia, obsolete taustum striata, in extremitatibus, ni fallor, spermatidiis majoribus foeta.)

1240. Sc. comoides Ag., physeumate in caespitem nigro-ferrugineum complicatis flexuosis, annulis distantibus aureo-fuscis moniliformibus, ramis sparsis remotis adscendentibus apice attenuatis. *Scytonema comoides Agrdh syst. 41. Gaiitonella comoides Bory. Conserva araneosa Mohr. C. comoides Dillw. conf. t. 27. Engl. bot. t. 1700.*

Ad littora maris septentrionalis.

1241. Sc. Kneiffii W., physeumatibus tenuiter capillaceis productis fulvis nitidis simplicissimis hyalinis intus striis subquadragulis transversis liberis inscriptis dein effoetis numerosissimis, in globum sphaericum ma-

juscum distictum aquae innatantem extus horridum laxe intertextis. — *Scytonema globosum* Kneiff.

In aquis prope Sundheim badens. (Kneiff.)

112. VAUCHERIA DC.. *Vaucheric.*

Physeum tubulosum continuum subramosum irreguliter aggregatum membranaceum pulvere granuloso virente (spermatidiis) intus foetum, extus condylis (coniocystae homogenae Ag., propagula Mart.) globosis instructum.

(*Ectospermae* Vauch. *Confervae* spec. L. — *Ulvacae* Ag., *Algae infusoriae* Nees. Mart. *Solenotae* Spr. *Vaucherieae* Grev. Dub.)

† condylis solitariis.

1242. *V. granulata* Lyngb., physeumate aggregato brevissimo filari hyalino hypogaev, condylia solitaria emersa globosa latice limpido viridi foreta dein collapsa concava insignia, semina Napi subaequantia, viridia sustinente. — *Vaucheria radicata* Agrdh syst. 465. *V. granulata* Lyngb. hydroph. 78. *Coccochloris radicata* Spr. syst. IV. 372. *Botrydium argillaceum* Wallr. ann. 153. Mart. erl. 303. *Hydrogastrum granulatum* Desv. ang. 19. Dub. gall. II. 975. *Linckia granulata* Wigg. hols. 94. *Tremella granulata* Huds. Roth germ. III. 552. Engl. bot. t. 324. Spr. II. 96. *Ulva radicata* Retz. *U. granulata* L. sp. 1633. *Flor. dan.* t. 705. Schreb. spic. 141. — Dill. hist. 10. f. 17.

In solo argillaceo pingui tenaci aquis stagnantibus super relicto, ad vias patruas vulgaris, nocturno. (Habitu peculiari ob physeumata hypogaea praecellit, synonymis fastidiens, ulterius tamen indaganda.)

1243. *V. dichotoma* Lyngb., physeumate subfuniculari s. setaceo caespitoso erecto dichotomo fastigiato, condylis sessilibus solitariis maximis globosis demum acutiusculis. — *Vaucheria dichotoma* Agrdh syst. 171. Lyngb. hydroph. 75. t. 19. Mart. erl. 304. *Ceramium*

caespitosum $\beta.$ *maximum* Roth cat. I. 155. *Ceramium dichotomum* Roth germ. III. 474. *Conferva dichotoma* Dill. hist. t. 3. f. 9. L. sp. 1635. *Flor. dan.* t. 358. *Dillw.* conf. t. 15. *Engl. bot.* t. 932.

In aquis stagnantibus fossarum et piscinarum fundum limosum exsiccatum occupana, v. c. Thoring., agri hal. v. c. ad Bennstaedt et alibi, cum propagulis *Mertensius* primum in fossa pr. Ritzebüttel. (Comparatur haud inique a mediae aetatis scriptoribus et *Dillenio* cum setis porcinis, e fundo libere emergentibus et haud mediocrem nonnisi altitudinem attingentibus. Variat caeteroquin physeumate simplicissimo et duplo tenuiore, condylis simul magis tenuatis. (*Conferva nitens* Roth cat. I. 163. *C. furcata* Huds. *Vaucheria dichotoma* *Flor. dan.* t. 1724. f. 2. 4., $\beta.$ *submarina* Agrdh syst. 171. Lyngb. t. 20. *A. Ectosperma litoralis* Bory.)

1244. *V. ovata* DC., physeumate laxe ramoso capillari subdichotomo, condylis solitariis globosis pedunculatis, pedunculis simplicibus horizontalibus nudis. — *V. ovata* DC. gall. II. 63., syn. 12. Lyngb. hydroph. 76. t. 20. *Flor. dan.* t. 1721. f. 2. *V. bursata* Agrdh spec. I. 461., syst. 172. *Conferva dilatata* v. *bursata* Roth cat. III. 184. *C. bursata* Müll. N. Act. petrop. III. 96. t. 2. f. 10.

In fossis Germaniae boreal. et septentrion., in agro halens. (Wallr.) (Caespites laxiores et physeumata praecedentibus tenuiora.)

1245. *V. hamata* DC., physeumate capillari subsimplici, condylis solitariis ovatis pedunculatis, pedunculo hamo reflexo instructo. — *Vaucheria hamata* DC. gall. II. 63. Lyngb. hydroph. 77. t. 20. *Flor. dan.* t. 1726. f. 1. Agrdh spec. I. 462., syst. 172. *Ectosperma hamata* Vauch. conf. 26. t. 2. f. 2.

In fossis aquarum dulcium cum prioribus primo vere. (Caespitibus e luteo virescentibus, pedunculis basi hamatis facile dignoscenda.)

1246. *V. clavata* DC., physeumate capillari vase ramoso, ramis apice subdilatatis incurvis, condylis solitariis ovalibus opacis terminalibus. — *Vaucheria clavata* DC. gall. II. 64. *Agrdh* spec. I. 462., syst. 172. *Conferva dilatata* Roth cat. II. 194., var. β . *clavata* I. I. III. 183. *Ectosperma clavata* Vauch. conf. 34. t. 3. f. 10. *C. bulbosa* Trentep. in Roth bot. Beamerk. 185. *vesicata* Müll. I. I. 95. t. 2.

Ad ligua rivulorum Germaniae passim. (Confervae usneoidi meae hand dissimilis, quae quidem geniculata, productior omnibusque partibus amplior nec condylophora.)

1247. *V. Dillwynii* Lyngb., physeumate capillari ramoso viridi flexuoso obtuso, condylis lateralibus terminalibusque globosis sessilibus, physeumatis diametrum subacquantibus. — *Vaucheria Dillwynii* Lyngb. *hydrop.* 77. t. 21. *Hornem* fl. dan. t. 1596. f. 1. *Agrdh* spec. I. 464., syst. 173. *Ceramium Dillwynii* Roth cat. III. 111. *Conferva Dillwynii* Web. et M. conf. t. 16. excl. syn. Vauch. *C. frigida* Dillw. conf. t. 16. excl. syn. Roth. *Riccia amphibia* L. suec. 435. *R. arachnoidea* Müll. fl. dan. t. 898. f. 2. — *Dill. hist.* IV. t. 4. f. 17. Mich. gen. t. 89. f. 5.

In terra nuda frigida lucorum sub umbra continua, veris et auctumni tempore per totam German. (Stratum depresso expanse saturate-virens spissum offert. Physeumata satis tenuia condylis dilatiora et tenuiora. *V. glaucescens* Mart., caespitibus minutissimis glaucescentibus insiguis, *Agardhio* teste hujus est var. colore glaucescente diversa.)

1248. *V. terrestris* DC., physeumate stricto dense implexo viridi, condylis hemisphaericis lateralibus subcompressis, pedunculi cornuti dorso insidentibus. — *Vaucheria terrestris* DC. gall. II. 62. *Agrdh* sp. I. 465., syst. 173. *Ectosperma frigida* Nees musc. propag. p. 11. f. 1. excl. syn. Dillw. *Ectosperma terrestris* Vauch. conf. 27. t. 2. f. 3. excl. syn.

In terra humida, ollasque etiam hortorum non nisi occupat.

† condylis binis pluribusve aggregatis.

1249. *V. sessilis DC.*, physeumate capillari ramoso, condylis ovalibus 2-3 sessilibus, cornu interjectum reduncum soventibus. — *Vaucheria sessilis DC. gall. II. 63. Lyngb. hydroph. 80. t. 22. Flor. dan. t. 1725. Agrdh syst. 174., spec. I. 467. Engl. bot. t. 1765. Ectosperma sessilis Vauch. conf. t. 2. f. 7. Jürg. alg. VI. 10.*

In fossis aquarum dulcium, auctumno passim. (Physeumata intricata nonnisi fluitant. *Vaucheria cruciata DC.* haud longe recedit nec aliena videtur.)

1250. *V. geminata DC.*, physeumate capillari dichotomo, condylis globosis geminis oppositis pedunculo communi bifurco subtultis. — *Vaucheria geminata DC. gall. II. 62. Lyngb. hydroph. t. 23. Agrdh syst. 174., spec. I. 467. Engl. bot. t. 1766. Flor. dan. t. 1725. Ectosperma geminata Vauch. conf. 29. t. 2. f. 5.*

In fossis stagnantibus Thuring. (Physeumata tenuissima at tenacia rectiuscula.)

1251. *V. caespitosa DC.*, physeumate capillari dichotomo caespitoso, ramis ultimis horizontalibus secundis, condylis binis sessilibus terminalibus mucronem interjectum obsidentibus. — *Vaucheria caespitosa DC. gall. II. 63. Lyngb. hydroph. 81. t. 23. Flor. dan. t. 1726. f. 3. Agrdh spec. I. 468., syst. 174. Jürg. alg. XV. 2. Ceramium caespitosum Roth germ. III. 475. Ectosperma caespitosa Vauch. conf. 28. t. 2. f. 4. Conserva fontinalis Blumenb. Gött. Magaz. II. 80. c. ic. C. abbreviata Schreb. spic. 143. C. canalicularis L. suec. — Dill. hist. t. 4. f 15.*

Ad fontium margines nudos, caespitibus spongiosis densis laete viridibus passim obvia. (Var. β . *maximam* Rothius habet.)

1252. *V. racemosa DC.*, physeumate capillari dichotomo, condylis lateralibus ovalibus racemosis. — *DC. gall. II. 61. Lyngb. hydroph. 82. t. 23. Flor. dan. t.*

1727. f. 1. *Agrdh syst.* 175., *spec. I.* 469. *Ceramium caespitosum* Roth *cat. I.* 154. *Ectospermaraecemosa* Vauch. *conf. t. 3. f. 8.* *Conferva amphibia* Weis *spic. 24.* — *Dill. hist. t. 3. f. 10.*

In fossis nostris haud adeo rara per totam aestatem. (*Condylia* 4–6 aggregata, pedunculis divaricatis brevibus insidentia. Hujus quoque *I. Vaucheria multicornis* DC. *I. I. esse videtur.*)

††† condylis nullis.

1253. *V. fusca* Ag., physeumate setaceo fusco dichotomo contracto-geniculato. *Agrdh spec. I.* 472. *Ceramium fuscum* Roth *germ. III.* 477., *cat. II.* 186. *excl. syn.*

Ad litora maris septentrion. pr. Eckwarden. (Roth.) (Dubia plane ac minus nota, forsitan cum *Conferva olivacea* mea comparanda.)

113. LEMANEA BORY. Léman'stang.

Physeuma contineum membranaceum tubulosum spermatidiis mouiliformibus parieti interno per intervalla adfixis dein diffusis foetam ibique torulosum.

(*Goniocladum* Link. *Trichogoni spec.* Pal. Beauv. *Nodularia* Lyngb. nec *Flocrk.* *Chantransia* DC. *Apona* Adans. *Confervae spec. auct.*)

1254. *L. pulchella* W., physeumate subarachnoido stricto rigidulo in fasciculum virgatum congesto, superne in ramos conformes diviso purpurascente, spermatidiis per intervalla diametro sexies longiora congestis, genicula punctato-fasciata mentientibus. — *Trentepohlia pulchella* Chauv., var. *β. chalybea* Agrdh *syst. 37.* *Anduinella chalybea* Dub. *gall. II.* 872. *Ceramium pulchellum* Agrdh. *Chantransia pulchella* Fries. Leibl. *bot. Zeit.* I. I. 264. *Ch. nana* Moug. et Nestl. *voges. n.* 594. *Ch. Hermanni* Desv. (And. *Hermannii* Dub. I. I.) *Conferva chalybea* Mert. in *Jürg. alg.* XII. 3. Roth *III.* 286. t. 8. f. 1. *Engl. bot.* t. 1996. *Dillw. conf. t.*

91. *Conserva corymbifera* Engl. bot. t. 196. *Ectocarpus chalybeus* Lyngb. hydroph. t. 44.

Ad rotas molarum aqua suffusas in ducat. oldenburg. (Jürgens), ad Lemaneam torulosam Alsatiæ (Wallr.) (Hanc habitu magis quam partium tam intricatarum examine hic retuli, nec hujus in Lemaneæ torulosæ nodis consortium explicare studeo. Forsan haec illius proles tuncque genus ad *Myxophycea* relegandum, cum quorum habitu congruit.)

1255. *L. torulosa* Ag., physeumate tubuloso subsimplicissimo dein membranaceo unicolor (viridi s. purpurascens) funiculari subincurvo, grumulis spermatidiorum moniliformium interaneis intervalla contracta infarcientibus intercepto ibique noduloso s. toruloso. — *Lemanea torulosa* Agrdh spec. II. 6., syst. 255. *Lemanea incurvata* Bory. *Goniocladon torulosum* Link. *Chantransia torulosa* DC. gall. II. 50. *Conserva verrucosa* Draparn. *C. torulosa* Roth cat. I. 202., germ. III. 529. *C. fluviatilis* a. Lam. encycl. *Chara sertularioides* Web. spic. 30. excl. syn. — Dill. hist. t. 7. f. 48.

Ad saxa cataractarum Salae pr. Halam au der hohen Brücke (Sprengel. Wallr.) nec non in torrentibus Hercyn.

1256. *L. fluviatilis* Ag., physeumate tubuloso subsimplicissimo funiculari protuso stricto olivaceo demum (exsiccando) atro-virente membranaceo cartilagineo per intervalla extus verticillatim papilloso. — *Lemanea fluviatilis* Agrdh spec. II. 4., in act. holm. 1814. t. 2. f. 2. *Nodularia fluviatilis* Lyngb. hydroph. 99, t. 29. Flor. dan. t. 1904. *Lemanea corallina* Bory in Berl. Mag. *Polysperma fluviatilis* Vauch. conf. 99. t. 1. f. 3. *Goniocladon fluviatile* Link. *Chantransia fluviatilis* DC. gall. II. 50. *Conserva fluviatilis* L. sp. 1635. Roth cat. I. 203., germ. III. 522. — Dill. hist. t. 7. f. 47. Vaill. bot. t. 4. f. 5.

In similibus cum priore locis, Alsatiæ v. c., nec quoque in Hercyniae torrentibus deest. (Hujus generis notio et locus in systemate apud auctores varius. Plu-

rimi inter Confervoideas enumerarunt; adhucitatem cum Nostochio Bonnemaisonius et Linkius, cum Scytonemate Lyngbyeus, cum Oscillatoria et Bangia Friesius, cum Batrachospermo et Thorea Boryus praemonuerunt; Agardhius propriam Lemaniearum familiam condidit et Sprengelius ad Phykoideas iterum retulit, quod spermatidiorum dispositione interanea ad Myxophyces pertinet et ab his vix nisi indole minus gelatinosa aberrat.)

114. BRYOPSIS LAMX. Baumfaden.

Physeuma tubulosum pinnatum, continuum latice viridi incluso coacto colorato foetum.

1257. Br. *Arbuscula* Lamour., physeumate tenuissimo subcompresso decomposito, ramis pectinato-pinnatis, ramulis oppositis. Spr. syst. IV. 365. *Bryopsis Arbuscula* Agrdh spec. I. 451. *Br. composita* Ag. I. I. *Br. hypnoides*, *Balbisiana* et *cupressina* Lamour. *Fucus Arbuscula* DC. gall. II, 35. *Confervae tenax* Roth. *Ulva plumosa* Huds. Engl. bot. t. 2375.

Ad oras German. borealis teste Sprengelio.

115. SCYOTOSIPHON LYNGB. Darmling.

Physeuma tubulosum capillare s. funiculare membranaceum continuum striato-areolatum, spermatidiis microscopicis in areolas digestis foetum.

(*Scytoniphon* Lyngb. pr. pr. *Solenia* Ag. syst. Spr. nec Hoffm. et Pers. *Ilea* Fries. Leibl. *Enteromorpha* Link. *Ulvae intestinales* s. *tubulosae* L. Roth germ. III. 533. observ. 2. *Confervae continuac et geniculatae* Roth.) Habitus filaria confervoideus, nisi latescendi inflationisque casum subeundi insignis.

1258. *Sc. intestinalis* Lyngb., physeumate tenuiter membranaceo tubuloso conciane-areolato dilatius saturatus virente polymorpho, nunc filiformi, nunc funiculari, nunc difformi plane, figuris sinuoso-anfractuosis physingodeas s. plynthodes mentiente.

a. trichodes, physeumate tenuissimo capillari subsimplici, habitum conservinum adficiente. — *Ulva crinita* auct. qrd.

b. nematodes, physeumate funiculari aequaliter protenso. — *Tetraspora intestinalis* Desv. *Scytosiphon intestinalis* Lyngb. *hydroph.* 67. *Solenia intestinalis* Agrdh *syst.* 185. *Spr. syst. IV.* 367. *Conferva flexuosa* auct. qrd. *Conferva intestinalis* Roth *germ. III.* 484., *cat. I.* 159. *Ulva intestinalis* L. *sp.* 1632. *DC. gall. II.* 65. *Wahlenb. succ. II.* 901. *Agrdh spec. I.* 418, *Jürg. alg. XIII. I.* *Tremella intestinalis* Nonne erf.

y. plynthodes, physeumate nisu latescendi insigni, e figura oblonga magis minusve protenso deplanato denum complanato tenui elongato lanceolato-ensiformi utrinque longe attenuato, margine saepius undulato-crispo. — *Ulva Linza* L. *sp.* 1633. *Agrdh spec. I.* 413. *Roth germ. III.* 538., *cat. III.* 330. *Lyngb. hydroph.* 32. *Jürg. alg. VIII.* 5. *Flor. dan. t.* 889. *U. lanceolata* Roth *l. l.* *Phylloma lanceolata* Wigg. *hols.* 99. *U. intestinalis v. collapsa* Wahlenb. *l. l.* — *Dill. hist. t. 9. f. 6.*

δ. physingodes, physeumate inflato physingode e figura subelavata dein in sinuosam anfractuosamque difformem dilatata. — *Ulva ventricosa* Bonnem. *DC. rapp. I.* 7. *Dub. gall. II.* 958. *U. intestinalis campanulata* Wahlenb. *l. l.*; *y. maxima* Agrdh *l. l.* — *Dill. hist. t. 9. f. 7.*

In fossis et rivulis salsis agri hal. v. c., quos suis locis dense obducere solet, nec non in mari septentrion. abundat et variet. ad longitudinem, latitudinem et colorem et alia moustra jactat insignia, habitu plane alieno inter se quidem recendentia, simulac tamen transeuntia. Monstrum *δ.* physingodes inter omnes Algas maximam subit difformitatem. Varietas *y.* ob laminas physeumatis compaginatas nisu latescendi semetque producendi insignis, in mari septentr. copiosa.)

1259. *Sc. compressus* Lyngb., physeumate tubuloso tenuiter-membranaceo dilutius saturatusve virens-

te, areolis seriatis, exsiccando strias longitudinales mentionibus exarato, e figura filari et funiculari vario, saepius prolifero, habitum ramosum mentiente. — *Solenia compressa* Agrdh syst. 186. Spr. syst. IV. 367. *Scytesiphon compressus* Lyngb. hydroph. 64. *Ulva compressa* L. suec. 433. Engl. bot. t. 1739. Wahlenb. lapp. 508. Agrdh spec. I. 420. Flor. dan. t. 1480. f. 1. Dub. gall. II. 958. *U. intestinalis* β. compressa Wahlenb. suec. II. 901. *Conserva compressa* Roth cat. I. 161., germ. III. 485. *C. fistulosa* Wulff.

a. trichodes, physeumate subcapillari simplici tenuissimo implexo saturate-viridi. — *Ulva byssoides* Mert. in Jürg. alg. VII. I. Agrdh spec. I. 425. *Scytesiphon vellutinus* Lyngb. hydroph. t. 16. *Ulva compressa* γ. *crinita* Agrdh I. I.; var. *crispata* Lyngb. I. I. t. 15. f. 1. Dub. I. I. *Conserva crinita* Roth cat. I. 162. t. 1. f. 3., germ. III. 486. nec Agrdh (*Stilophora* ej. in bot. Zeit. I. I.). *Ulva capillaris* Lamour. (lusus phys. productioribus.) *U. conservoides* Thunill. Lam. *Ulva prolifera* Flor. dan. t. 763. f. 1. *U. compressa* β. *prolifera* Agrdh I. I. *Conserva crinita* Jürg. alg. VII. 5. (monstrum proliferamentaceum.)

β. nematodes, physeumate e basi capillari tenuata funiculari aequaliter protenso. — *Scytesiphonis compressi* synon. supra I.

In mari septentrionali aquisque salsis passim. (Quamvis *Wahlenbergius* hanc praecedentis habeat var., spermatidiis aliter dispositis tamen distinguenda est. Synonyma var. *a. subscripta*, sive tenuitate et longitudine, siue indole prolifera solum inter se differunt, nec alias spec. praecedentis excludunt.)

1260. *Sc. clathratus* Lyngb., physeumate tubuloso erectinsculo vase ramoso irregulariter clathrato capillari s. filiformi flavescente, ramis ramulisque divaricatis iisque nonnisi moniliformibus. — *Scytesiphon clathratus* Lyngb. hydroph. 66. t. 16. Flor. dan. t. 1667. *Sc. paradoxus* Flor. dan. t. 1595. f. 2. *Solenia clatha-*

ta Agrdh syst. 186. Spr. syst. IV. 368. Ulva clathrata Agrdh sys. 46. Conferva clathrata Roth cat. III. 175. Jürg. alg. II. 5. Conferva paradoxa Dillw. conf. n. 115. t. F.

Ad litora maris aliasque oris Frisiae orient. maritimas, v. c. pr. Bensersiel (Jürgens.)

1261. *Sc. percursor* *IV.*, physeumate capillari simplici, spermatidiis in striam longitudinalem congestis astrisque transversalibus notato. — *Solenia percura* *Agrdh syst. 187. Ulva percura* *Agrdh spec. I. 424. Jürg. alg. XVII. 12. eoque teste *Conferva bipartita* Jürg. alg. II. 9. *Scytosiphon compressus confervoides* Lyngb. t. 15. *Conferva dissiliens* Jürg. alg. XVI. 6.*

In fossis et aquae duotibus agri jeverens. et Frisiae orient. (Jürgens.)

1262. *Sc. Juergenstii* *Ag.*, psyseumate tubuloso capillari, raro funiculari simplici, intus spermatidiis effusis foeto sordide-fuscoque virente. *Scytosiphon Juergensii* *Agrdh spec. II. 49. Conferva fuscobrunnea Mert.* in Jürg. alg. I. 5.

Ad oras septentrion. agri jeverens. et in Frisiae oriental. oris maritimis. (Mertens et Jürgens.)

1263. *Sc. uncinatus* *IV.*, physeumate tubuloso ramoso laete-viridi ramenta brevia uncinata exserente, exsiccando subcartilagineo spermatidiis areolatis foeto. — *Ulva clathrata* *γ. uncinata* *Agrdh spec. I. 423. U. confervoides* Lamour. *U. ramulosa* Engl. bot. t. 2037. Jürg. alg. X. 5. *U. muscoides* et *longissima* Clement. *U. uncinata* Mohr in lit.

Ad litora maris pr. Wangerogen. (Jürgens.) (Consistentia siccando subcartilaginea a reliquis omnino recedere videtur, nec tamen alium locum eodem jure appellat.)

1264. ?*Sc. foeniculaceus* Lyngb., physeumate setaceo protenso tubuloso tereti ramoso, ramis basi patulis apicem versus attenuatis. *Scytosiphon foeniculaceus* Lyngb. *hydropk.* 63. *Agrdh sp. I. 163. Flor. dan.*

t. 1595. f. 1. *Fucus subtilis* Turn. hist. t. 234. *Ceramium fibrosum* Roth cat. II. 171. *Conferva foeniculacea* Huds. — Dill. hist. t. 2. f. 8. *Barrel*. t. 1121. f. 1.

Ad litora maris baltici et septentrion. rarissime.
(Fractificatio latet; hinc generis dubii planta.)

C. Dermatoplyntia, physeumate tenuiter-membranaceo explanato s. plynthode ecostato intus spermatidiis foeto. (*Ulvaceae Agrdh.*)

116. ULVA L. Watt.

Physeuma plynthodes complanatum tenuiter membranaceum ecostatum sessile, spermatidiis minutissimis membranae intertextis foetum.

(*Ulva Agrdh syst. Spr. nec priscor. Ulvae prasinæ et latissimæ Agrdh sp. — Lactuca marina Veter.*)

† *geophilæ.*

1265. ?*U. furfuracea* Mert., physeumate cuneato-obovato minutissimo piano erectiusculo, in pulvriolum caespitosum aggregato. — *Ulva furfuracea* Agrdh syst. 190., spec. I. 417. *Flor. dan.* t. 1489. *U. terrestris* f. *furfuracea* Wahlenb. suec. II. 900.

Ad parietes ligneos et lapides juxta domicilia agri bremens. (Mertens.) (Sequentis procul dubio var. junior.)

1266. *U. crispa* Lightf., physeumate bulloso pliato-crispo rugoso demum membranaceo dilute-viridi, in stratum expansum aggregato. — *Tetraspora terrestris* DC. gall. *Ulva terrestris* Roth cat. I. 211., germ. III. 542. *Wahlenb.* suec. 900. Jürg. alg. IV. 3. *Tremella crispa* Schreb. spic. II. 972. *Ulva crispa* Lightf. scot. II. 972. *Agrdh* spec. I. 416., syst. 190. — Dill. hist. t. 10. f. 12.

In umbrosis ad sepes et tecta maxime straminea agri lipsiens. (Schreber), berolin. (Willdenow), halens. et hercyn. (Wallr.) (Physeuma tennissimum membranaceum dilutius saturatus viride, sinuatum, rugoso - plicatum

et crispum caespites densos conficiunt et siccando rigidiora evadunt.)

†† *halophilae.*

1267. ?*U. bulbosa* Roth, physeumate primam obovato dein expanso undulato-laciniato bulloso lubrico, spermatidiis exacte quaternatis foeto. — *Ulva bulbosa* Roth cat. III. 329. Agrdh syst. 190., spec. I. 414. Engl. bot. t. 2320. *Tetraspora minima* Desv. *U. minima* Vauch. conf. 243. t. 17. f. 1. *Tremella palustris* Web. spie. 279. *Ulva Lactuca* β. Huds. angl. 567. Jürg. alg. V. 3. — Dill. hist. t. 8. f. 2.

In fossis salsis Germaniae boreal. passim. (Duba species, melius forsitan ad Tetrasporam releganda. Siccando omnino collabitur et picturam in papyro aemularatur pertenuem, halitu veluti explosam.)

1268. *U. Lactuca* L., physeumate polymorpho plerumque tenerissimo et latissimo dilute-virente, margine saepius laciniato-crispo, spermatidiis densis microscopicis foeto. — *Ulva Lactuca* L. sp. 1635. Wahlenb. suec. II. 900. Roth cat. III. 206., germ. III. 538. Agrdh spec. I. 409., syst. 189. — Dill. hist. t. 8. f. 1.

a. umbilicata, physeumate umbilicato. — *Ulva latissima* γ. *umbilicalis* Agrdh l. l. *U. umbilicalis* Roth pr. pr.

β. mesenteriformis, physeumate oblongo latescente undulato-plicato bulloso. — *Ulva latissima* β. *mesenteriformis* Agrdh l. l. *U. mesenteriformis* Roth.

γ. latissima, physeumate solitario oblongo s. subrotundo latissimo plano, nonnisi magis stipato terebrato-pertuso. — *Ulva latissima* L. suec. 433. Agdh spec. I. 407., syst. 188. Jürg. alg. VI. 2. Roth cat. II. 245., germ. III. 533. *U. Lactuca* β. *latissima* Lightf. Wahlenb. l. l.

Ad maris septentrion. litora, praesertim in fossis profundioribus, aquam a vicissitudine relictam ducentibus. (Stirps versipellis, varietatum mater, ex quibus var. γ. priscis jam nota (τὸ βρύον Theophr.), et in usu domestico fuit.)

117. PHYLLONA WIGG. EMEND. *Purpurea*.

Physeuma plynthodes planum hyalinum basi scutata adnatum, spermatidiis sphaericis coloratis primam quaternatim dispositis dein in soros egerentes coactis foeto. (*Ulvae purpureae* s. *Porphyrae* Ag. spec. *Porphyra* Ag. syst. *Ulvae allochroae* Spr. *Ulvae et Fuci* sp. auct. *U. Ulvastra* Dub.)

1269. *Ph. purpurea* W., physeumate e basi scutata adnato plynthode plano tenui polymorpho hyalino, spermatidiis primam quaternatis dein aggregatis foeto iisque ex viola purpuraque dilutius saturatusve tincto, nunc umbilicato rotundato-rosaceo, nunc dilatato ovato-lanceolato undulato-crispo s. lacinato. — *Porphyra purpurea* Agrdh syst. 191. *P. vulgaris* Agrdh in bot. Zcit. *Ulva umbiliculis* L. sp. 1633. Wahlend. lapp. 506. Spr. syst. IV. 369. *U. purpurea* Roth cat. I. 209. t. 6. f. 1. germ. III. 535. Agrdh spec. I. 405. Lyngb. hydroph. 29. Jürg. alg. I. 2. *U. vinosa* Gouan. *U. sericea* Wulff. *U. purpureo-violacea* Roth germ. I. 254.

a. umbilicata, physeumate e basi umbilicata ovato-subrotundo. — *Ulva umbilicalis* a. Wahlend. I. L. *U. purpurea* β. *umbilicata* Agrdh sp. I. I.

β. protensa, physeumate e basi adnata ovata oblongo-lanceolato marginie undulato-crispo s. exsiccando plicato. — *U. umbilicalis* β. *purpurea* Wahlend. I. I. *U. lacinata* Roth germ. 535.

In portu Ritzebütteliano et pr. Eckwarden (Voigt. Roth et Mertens); ad ruinamenta lignea Jadae fluctibus opposita, nec non ad litora insularum maris septentr. (Jürgens.) (Physeumatis figura e natura umbilicata a prima inde aetate insigniter variat et semet sensim producendo sesquipedalem s. pedalem nonnisi adipiscitur longitudinem. Parenchyma foetum purpurascens, effodem demum virens s. hyalinum omnino.)

118. LAMINARIA LAMOUR. *Plattentang*.

Physeuma compaginatum e basi pythmenode divisa stipitem teretem farctum in membranam planam s. plyn-

thodes expansum exserens. Spermatidia parenchymati physeumatis innata pyriformia nounisi in soros congesta.

(*Laminaria Lamour.* Ag. Spr. *Ulva L.* et auct.) — Genus vagum, ex habito potius quam notis, mihi saltem perspicuis, ab *Ulva* distinguendum.)

+ stipite evanescente s. physeumate ecostato.

1270. *L. Phyllitis* Lamour., stipite compresso physeuma tenerrimum hyalinum lineari-lanceolatum integerrimum informante. — *Laminaria Phyllitis* Lamour. ess. 22. Agrdh spec. I. 121., syst. 273. Jürg. alg. XIX. I. *L. papyrina* Bory. *Ulva Phyllitis* DC. gall. II. 15. *Fucus Phyllitis* Stackh. t. 9. Turn. hist. t. 164. Engl. bot. t. 1331.

Ad Fucos majores in litore insularum Baltrum et Norderney rejectos (Jürgens.) (Melius forsitan pro *L. saccharinae* declarant primordiis.)

1271. *L. Fascia* Ag., stipite brevissimo in physeuma angusto-lineare simplex aequale membranaceum undulatum planum utrinque attenuatum sensim protenso. — *Laminaria Fascia* Agrdh spec. I. 122., syst. 273. *Fucus Fascia* Oed. fl. dan. t. 768. Roth germ. III. 499.

Ad saxa marina nec non in stagnis viciniis, aqua a vicissitudine relicta repletis, v. c. in ducat oldenburg. (Mertens. Roth.) (Physeumata plerumque aggregata, praeter basin tenuatam longe productam fere sessilia, angusta, margine undulata s. spiraliter convoluta, subcoriacea, primum viridia dein magis fuscescentia.)

1272. *L. saccharina* Lamour., stipite tereti elongato sublignoso, basi in pythmenes callosos radiatos diviso, in physeuma lanceolatum ensiforme enervium simplicissimum integrum praelongum (siccando) subcartilagineum protenso. — *L. saccharina* Lamour. ess. 22. Agrdh sp. 117., syst. 272. Lyngb. hydroph. 21. t. 5. *L. longipes* et *viridissima* Bory. (varietates.) *Ulva saccharina* DC. gall. II. 15. *U. longissima* Gunn. norw. II. 128. t. 7. f. 2. *Fucus saccharinus* L. sp. 1630. Turn.

hist. t. 163. Engl. bot. t. 1376. Roth germ. III. 446. Flor. dan. t. 416. Wahlenb. lapp. 493. Jürg. alg. VIII. 2.

In fundo maris septentr. pr. Helgoland (Jürgens), et alibi ad ejus litora frequenter ejicitur. (Ehrhart. Mertens. Roth.) (Alga ad longitudinem insolitam, non nisi 1-2 cubitalem speciosissima.)

1273. ?*L. lapathifolia* W., stipite teretiusculo brevi firmo pythmenibus callosis radiatis suffulto, in phyeuma simplicissimum e basi subcordata ovato-oblongum enerve subcarnosum (siccando) pellucidum teuaciter-membranaceum dilute-viride dilatato. — *Fucus saccharinus* Timm megap. et auct.

Ad litora maris baltici. (Detharding.) (Nolui omitttere dubiam Algam latitudine pedali, consistentia tenaciore et colore viridi-oleoso insignem, a *L. saccharina* maris septentrion. saltem toto habitu et nisu latescendi valde alienam.)

1274. *L. digitata* Lamour., stipite teretiusculo praelongo pythmenibus callosis radiatis suffulto phyeuma ovato-subrotundum latissimum enerve in lacinias plurimas flabelliformes profunde fissum exserente. — *Laminaria digitata* Lamour. I. I. Agrdh sp. 113., syst. 270. *Ulva digitata* DC. gall. II. 16. *Fucus digitatus* L. mant. 134. Flor. dan. t. 392. Turn. hist. t. 162. Engl. bot. t. 2274. Roth germ. III. 447.

Ad litora maris septentr. solum ab Ehrharto inventa.

1275. *L. palmata* W., stipite brevi compresso ramoso dilatato, ramis compresso-filiformibus palmatum expansa, in laminas coriaceas membranaceo-pellucidas dilatatas planas simplices palmatae integerrimas, segmentis lanceolatis oblongo-lanceolatis simpliciusculis obtusis. — *Halymenia palmata* Agrdh sp. I. 104. Dub. gall. II. 944. *Delesseria palmata* Lamour. *Ulva palmata* DC. gall. II. 12. Lyngb. hydr. 24. *Fucus dulcis* Gmel. fuc. 189. *F. ovinus* Gunn. *F. palmatus* L. sp. 1636. Turn. hist. t. 115. Engl. bot. t. 1306. Roth germ. III. 449. Ehrh. Beytr. III. 84.

Ad litora maris septentr. (Ehrhart, teste Rothio.)
(Generis dubii planta, a me nōdum ex litoribus patruis visa.)

† stipite physeuma permeante, costam mentiente.

1276. *L. esculenta* Lamour., stipite incrassato pinnis elongatis enervibus onusto physeumaque ensiforme membranaceum permeante. — *Laminaria esculenta* Lamour. L. l. Agrdh sp. I. 110., syst. 269. *Fucus teres et tetragonous* Linn. *Transact. Fucus esculentus* L. mant. 135. *Flor. dan.* t. 417. *Turn. hist.* t. 117. *Fucus pinnatus* Gunn. *F. fimbriatus* Gmel.

Ex oceano septeutr. ad litorararissime rejectam conservo.

Ordo III.

COCCOPHYKEA W. Knopfffruchtange.

Vegetabilia halophila, molis, figurae, coloris, expansionis et consistentiae ratione perquam varia, nunc fistulosa s. filaria, habitum ordinum praecedentium plane fingenita, per interstitia distincta massa granulosa (? *spermatioidis*) colorata, genicula septata articulos interstinguentia mentiente (*myclothamnia*), nunc farcta jugiterve compaginata, siccando saepius compagem subcartilagineam formasque classis typum proprium designantes perbelle descissas (*callithamnia*) coloraque variabilium amoenitate insignes concinnantia, praeter granulorum ioteranorum cum spermatioidis praecedentium ordinum forsan analogorum et *physciorum* (*vesiculae auct.*) apparatum, *clonaria* vera subglobosa, sporidiis coloratis, limbo hyalino saepius circumfusis filisqne articulatis mixtis foeta proferentia, habitu prorsos vario at proprio insignia.

(*Confervoidae* k. *ectocarpeae*; *Floridae et Fuscoideae* Ag. *Algae confervinae, phykoideae et floridae* Spr.) — Omnia fere marina, ex oceano ad litora patrua rejecta, habitu satis vario at proprio insignia, ad classum perfectiorum cives revergentia; quaedam dubia omnino ob partium propagationi inservientium defectum.

A. Myclothamnia, physeumatibus filaribus s. funicularibus simpliciter fistulosis, per interstitia distincta septis transversis strias maculares (οἱ μίκλαι) genicula articulis intercepta mentientibus inscriptis vel interstinctis et ex illis nonnisi in alia physeumata multo tenuiora aliquoquin praeter consistentiam conformia dichotoma s. verticillata proliferis (ramenta), ex membranulis tenuissimis conflatis indeque teneritate singulari et quadam coloris et formae formositate et concinnitatem, arbusculac habitum ramosum haud male reddente insignibus, clonariis globosis externis s. foras appensis, nudis s. involucro veluti cinctis. (Algae conservoideae i. ceramicae, k. ectocarpeae.) Ceramiaeae Bory. Thalassiophytac diaphysetae Gaill. A. filamentosae Dub.)

119. ECTOCARPUS LYNGR. Fadentang.

Physeuma capillare tenuissime membranaceum fistulosum, geniculis macularibus interceptum ramosissimum, habitum implexo-penicillatum saepius mentiens. Clonaria lateralia globosa s. apice tenuata, veluti siliquaeformia.

(*Ceramii et Conservae sp. auct. Lyngbyae sp. Gailt. Capsicarpellae, Pilayellae et Anduinellae sp. Bory.*)

1277. *E. siliculosus* Lyngb., physeumate capillari tenuerrimo ramosissimo densissimo, ramis erectis subulatis oppositis alternisque, geniculis diametro sublongioribus interceptis, clonario linear-lanceolato siliquaeformi transversim striato. — *Ectocarpus siliculosus* Lyngb. hydroph. t. 43. *Agardh* sp. 37., syst. 161. excl. syn. sequent. sp. Jürg. alg. XIII. 2. *E. subulatus* Agardh in kit. *Cerium siliculosum* Agardh syn. *Conservae siliculosa* Dillw. conf. t. *E. Engl.* bot. t. 2319. *Capsicarpella elongata* Bory. *Ceram. conservoides* Roth cat. I. t. 8. f. 3.

Ad litora maris, v. c. insulae Wangerogen satis vulgaris. (Jürgens.) (Polymorpha, ad fallacias velati facta, habitu densissime implexo elongato rigidulo, colore oliveo-viridi et clonariis siliquaeformibus recognoscenda, aliquoquin varietatum complurium aegre distinguendarum ma-

ter, ex quarum numero *Agardhius* a. atro-virentem, mucosam magis et majorem, atro-viridem, exsiccando nitentem; β . firmam, firmiorem, conglomeratam et Conservae glomeratae instar implicitam; γ . nebulosam, tenuerrimam in physingem veluti mucosam coactam; δ . penicillatam, ramis apice penicillatis; ϵ . protensam, phys. tenuissimo protenso longius geniculato, insignes notavit.

1278. *E. litoralis* Ag., physeumate capillari terrimo ramosissimo pallide-virente, ramis patulis subuliformibus virgato-ramosissimis, geniculis diametro sublongioribus, clonario subsphaerico. *Agrdh* sp. II. 40. *Ceramium litorale* Wahlenb. succ. II. 994. *C. Mertensii* DC. gall. VI. 9. nec Roth. *C. tomentosum* Roth cat. III. 146., germ. III. 468. Jürg. alg. II. 3. *Ectocarpus siliculosus* var. *major* Lyngb. t. 42. *Conserva litoralis* Huds. — Dill. hist. t. 6. f. 19.

Algis maris baltici et septentrionalis majoribus frequens adnascitur. (Praecedenti forsau nimis adfinitis et ab ipso *Agardhio*, *Lyngbyo*, *Sprngelio* aliisque huic subscripta, ramulis magis irregularibus tamen et prope apicem virgato-fasciculatis, implexis elongatis, curvatis et colore fuscescente forsau distinguenda.)

1279. *E. compactus* Ag., physeumate pertenui densissime implexo vase ramoso, geniculis diametro duplo longioribus, clonario sphaerico. *Agrdh* sp. II. 41. *Ectocarpus ferrugineus* Agrdh syst. I. 63. nec sp. *Ceramium tomentosum* Hornem. fl. dan. t. 1487. f. 2. *Ectoc. litoralis* var. *ferruginea* Lyngb. in lit. *Conserva litoralis* Engl. bot. t. 2290. *Ceramium compactum* Roth cat. III. 149. Jürg. alg. XVII. 4. — Dill. hist. t. 3. f. 13.

In mari septentrionali. (Jürgens.) (A reliquis exsiccatus habitu lanoso s. stupido, colore ferruginino et physeumatibus firmioribus differt.)

1280. *E. tomentosus* Lyngb., physeumate tenuissimo patent-ramosissimo mediotes in caespitem uniformem alia lateralia libera exserentia implexo fusco-lutescente, geniculis hyaliois diametro quadruplo longio-

ribus, clonario siliquaeformi. — *Ectocarpus tomentosus* Lyngb. *hydrop. t. 44. Agrdh sp. II. 44., syst. 163. excl. syn. nonn. Ceramium tomentosum Agrdh syn. nee Roth. Anduinella funiformis Bory. Conserva tomentosa Lightf. Dillw. conf. t. 56. Jürg. alg. XVII. 5.*

Ad Fucum nodosum in litora insularum Norderney et Spikeroge rejectum.

1281. *E. flavescentes* IV., physeumate filiformi bunciali basi in caespitem juncto hyalino flavescente, geniculis remotis diametro duodecies longioribus intercepto ibique conformiter ramoso, clonario sphaerico insigni. *Conserva flavescens* Wallr. ann. bot. 135. excl. syn.

Ad scopulos lacus salsi Seeburg. agri hal. (Alia praeter clonaria lateralia insunt corpora majora gelatinosa, e rubro flaventia, quibus olim Tremellae litophilae nomen dedi. Habitum Vaucheriam refert.)

120. SPHACELARIA LYNGB. *Brandspitzentang.*

Physeuma articulatum rigidum fasciatum distiche ramosum pinnatum filare, ex aliis quasi coadunatis compositum longitudinaliter striatum, geniculis fasciatis interceptum. Clonarium terminale in apicibus ramorum incrassatis sphacelatis truncatis nigrum (*sphacella* Ag.), sporidiis microscopicis foetum.

1282. *Sph. cirrhosa* Ag., physeumate cartilagineo ramoso caespitoso parvolo pinnato viridi-olivaceo, pinnae tenuibus elongatis alternis oppositively filiformibus, superioribus pyramidatis, articulis diametro subaequalibus. — *Sphacelaria cirrhosa* Ag. syst. 163. *Sph. pennata* Lyngb. *hydrop. I. 31. Dub. gall. II. 964. Conserva olivacea et pennata* Dillw. *Delisella pennata* Bory. *Conf. cirrhosa* Roth.

Ad litora maris septentrionalis Algis majoribus adnata passim adfluit.

121. CERAMIUM ADANS. *Gliedertang.*

Physeuma tubulosum tenuissime membranaceum hyalinum ramosum, geniculis annularibus coloratis promi-

nulis interceptum (roseum s. purpurascens). Clonaria globosa sporidiis plurimis angulatis conglomeratis foeta, nonnisi involucrata.

(*Ceramium Adans. et Roth emend. Ag. syst. Callithamnion Lyngb. Ag. sp. Griffitsia, Gaillona, Boryna Gaill. Fuci globiferi Gmel.*)

† *nana*, physeumate depresso nano saepius fastigiatum. (*Ceramia Roth.*)

1283. *C. repens* Ag., physeumate capillari adnato pythmenes bulboso - scutatos nonnisi exserente minuto roseo, ramis ramulisque divaricatis subsecundis, geniculis contractis articulos diametro plerumque quadruplo longiores interstingentibus, clonariis minutissimis terminilibus globosis subsessilibus. — *Callithamnion repens* Lyngb. hydroph. t. 40. *Agrdh* sp. II. 184. *Ceramium repens* Agrdh syst. 131. *Conservia repens* Dillw. conf. t. 17. *Roth cat. III. 221. Engl. bot. t. 1608. Flor. dan. t. 1665.*

β. *tenellum*, phys. subsimpli s. parcius ramoso. — *Callithamnium et Ceramium repens* β. *tenellum* *Agrdh* I. I. Lyngb. *Conservia tenella* Dillw. conf. t. F. Jürg. alg. VIII. 8.

Ad Algas majores praecipue ad Furcellariam fastigiatam, Fucum alatum prorepens, v. c. propter litora insulae Wangeroge. (Jürgens.)

1284. *C. Daviesii* Ag., physeumate subtilissimo capillo tenuiore erecto caro libero ramoso dilute roseo hyalino, ramis acutis erectis alteruis acutis, articulis diametro triplo longioribus, clonariis globosis circa ramulorum latera interua conglomeratis minimis. — *Callithamnium Daviesii* Lyngb. hydroph. t. 41. *Agrdh* syst. II. 186. *Ceramium Daviesii* Ag. syst. 132. *Dub. gall.* II. 971. *Conservia Daviesii* Dillw. conf. t. F. Engl. bot. t. 2329. Jürg. alg. XV. 7.

Ad Ulvam ? plantaginifoliam propter litora insulae Norderney rejectam. (Jürgens.) (Ex intricatissimis, pubem veluti mentiens, 2-3 lineas longum, irregulariter ramosum.)

1285. *C. Rothii Ag.*, physeumate subtilissimo erecto fastigiato parce-remoteque ramoso abbreviato erecto rubente in caespitem pulvinatum (sphaericum) congesto, geniculis diametro duplo longioribus, clonariis sphaericis lateralibus. — *Callithamnium Rothii et floridulum Lyngb. hydroph.* 129. t. 41. *Ag. sp. II.* 185. *Ceramium Rothii Ag. syst.* 133. *Conserua Rothii Dillw. conf. t. 73. Engl. bot.* 1702. *Jürg. alg. II.* 10. *C. violacea Roth cat. I. t. 4, germ. III.* 525.

Ad trabes exsesa pro maniendo litore maris septentr. (Jürgens), nec non in similibus locis ducat. oldenburg. pr. Eckwarden (Roth). (Alga perpusilla quidem at elegans, colore peculiari intense roseo oculos alliciens, physeumatibus dichotomo-ramosis in caespites pulvinatos congestis insignis, adultior *C. allochroo* similis.)

†[†] *involucrata, clonariis (ex prolibus) involucratis, physeumate dichotomo saepius apice forcipato, geniculis elevatis nonnisi proliferis intercepto.*
(*Ceramium Ag. sp.*)

1286. *C. setaceum W.*, physeumate dichotomo stricto setiformi roseo viridi hyalinoque variegato caespitoso, ramis erectis elongatis simplicibus attenuatis, articulis cylindricis diametro 4-6plo longioribus, clonario pellucido pedicellato involucrato. — *Griffitsia penicillata Agrdh syst.* 144. *Ceramium penicillatum Duci. Conserva setacea Huds. Turn. Engl. bot. t. 1689. Dillw. conf. t. 82. Jürg. alg. XII. 4.* — *Dill. hist. t. 6. f. 37.*

Ad litora maris septentrional. iusul. Norderney et Baltrum, rarissime. (Jürgens.)

1287. *C. diaphanum Roth*, physeumate repetito-dichotomo flacco tenuissime membranaceo caespitoso roseo-purpureo hyalino geniculis coloratis anularibus turgidulis distinctis sub apice forcipato approximatis diametrum sequantibus nudis s. ex aliis physeumatibus brevissimis capillo tenoribus verticillato-ciliatis intercepto iisque variegato, clonario sphaericо sessili nonnisi geni-

colorum prolibus excepto iisque veluti involucrato. — *Ceramium diaphanum* Agrdh syst. 133. Dub. gall. II. 967.

a. glabellum, physeumatis geniculis subtilissime turgidis nudis. — *Ceramium forcipatum* *a. glabellum* DC. gall. II. 46. *C. diaphanum* Roth cat. III. 154. Ag. sp. II. 150. Lyngb. t. 37. Jürg. alg. XVIII. 2. *C. plumosum* Hopp. *C. elegans* Ducl. *Boryna diaphana* Gratel. Guill. *B. axillaris* et *elegans* Gratel. *Conferva elegans*, *globulosa* et *fastigiata* Roth. *C. moniliformis* Roth. *C. seposita* Gunn. *C. corallinoides* Scop. nec L. *Batrachospermum moniliforme* Hopp. *Conf. diaphana* Lightf. *Flor. dan.* t. 951. Roth cat. II. 226., germ. III. 525. Dillw. conf. t. 38. Engl. bot. t. 1742. *Wahlenb.* lapp. 511. *C. nodulosa* Huds. — *Dill. hist.* t. 7. f. 41.

β. ciliatum, physeumatis geniculis aliis prolibus multo tenuioribus brevissimis stipatis iisque verticillato-ciliatis s. pilosis. — *Ceramium forcipatum* *β. ciliatum* DC. t. l. *C. diaphanum* *γ. pilosum* Ag. syst. *C. ciliatum* Ducluz. Lyngb. t. 37. Ag. sp. *Boryna ciliata* Gratel. *B. forcipatum* Bory. *Conferva pilosa* Roth cat. II. 225. t. 5. f. 2. *C. fastigiata* Wulf. *C. ciliata* Huds. Lightf. Roth cat. III. 295. Dillw. conf. t. 53. Engl. bot. t. 2428.

Utraque forma ad litora maris baltici pr. Travemünde (Mertens), m. septentrional. (Jürgens), insulae Rugiae (Laurer), nunc seorsim nunc promiscue intercurrit, Algis majoribus, Cladostepho spongioso ipsique Zosterae adnata.

1288. *C. virgatum* Roth, physeumate subfilari roseo (siccando) stipato membranacco s. subcartilagineo geniculis annularibus saturioribus contractis intercepto ibique alia capillaria sensim magis tenuata confertim-geniculata dichotoma emittente, in extremitates furcata desinente habitumque ramosissimum virgatum concinnante, clonario solitario sessili lateral subgloboso, basi involucrato. — *Ceramium nodulosum* et *axillare* DC. *C. rubrum* Agrdh sp. II. 147., syst. 135. Lyngb. hydr. t. 62. *C. elongatum* Roth cat. II. 178. *C. virgatum* Roth cat. I. t. 8. f. 1., germ. III. 461. Jürg. alg. II. 4. *C. vio-*

laceum Jürg. alg. III. 4. a. (specim. dati saltem fide). *Boryna rubra* Gaill. *Conserva rubra* Huds. Dillw. conf. t. 34. *Flor. dan.* t. 1482. Engl. bot. t. 1166. *C. elongata* et *corallina* Spr. *Berl. Mag.* t. 6. f. 3. 4. *C. tubulosa* Huds. *C. ramosissima* L. gottl. — *Dill. hist.* t. 6. f. 38. *A. t.* 35. *A. D.*

Ad litora maris septentr. ubique, praesertim ad ins. Waageroge et Norderney (Jürgens), pr. Eckwarden (Roth), Rngiae (Laurer). (Siccando riget et atro-purpurascere solet nec ob tenacitatem papyro adhaeret, ex aqua vero reviviscit. Variet. ciliatae s. proliferae indica coram sunt ideoque clonaria involucrata.)

††† *arbusculiformia, physeum. in ramos alternos magis minusve densos divulso, habitum pinnatum s. arbusculae mentiente.* (*Callithamnium Ag. sp.*)

1289. *C. tetragonum* Ag., physeumate caespitoso ramosissimo, ramulis quadrigonis abbreviatis patentibus basi apiceque attenuatis subfastigiatis, articulis primariis diametro duplo longioribus, clonario laterali sessili globoso. — *Callithamnion tetragonum* Ag. sp. II. 176. *Ceramium tetragonum* Ag. syst. 137. Jürg. in lit. *Conserva tetragona* Dillw. conf. t. 65. Engl. bot. t. 1690.

Ad litora maris septentrion. pr. Norderney. (Jürgens.)

1290. *C. Hookeri* Ag., physeumate ramosissimo, primario crassiore continuo pallide rufo-fuscescente, ramulis confertis abbreviatis piunatis, pinnulis alternis articulatis, articulis diametro sesquilongioribus. Agrdh syst. 138. *Callithamnion Hookeri* Ag. sp. II. 178. *Conserva Hookeri* Dillw. conf. t. 106.

In iisdem cum praeced. locis (Jürgens), cuius varietatem putat Sprengelius.

1291. *C. tetricum* Ag., physenmate ramosissimo basi tomentoso-ramentaceo, ramis strictis repetito-pinnatis, pinnis pinnulisque alternis pectinatis, articulis diametro subtriplo longioribus, clonariis (in pinnis) terminalibus indeque subpedicellatis. Agrdh syst. 141. *Calli-*

thamnion tetricum Ag. sp. II. 179. *Conferva tetrica* Dillw. conf. t. 141. Engl. bot. t. 1915. Jürg. alg. X. 7.

Inter rejectamenta maris septentr. cum Ceramio virgato saepius copulatum. (Jürgens.)

1292. *C. purpurascens* W., physeumate ramoso geniculis pellucidis articulos diametrum subaequantibus intercepto, ramis acutis duplo tenuioribus patentibus alios ramulos alternos distichos emitentibus, supremis fastigiatis, clonario obovato apiculato. — *Conferva purpurascens* Jürg. alg. X. 8. eoque teste Engl. bot. t. 2695.

Inter rejectamenta maris septentr. Polysiphoniae violaceae adnatum. (*Conferva purpurascens* Huds. a Jürgensio huc, ab Agardhio ad *Ceramium thujodes*, a Mohrii ad *C. versicolor* laudatur, hinc nostrum dubium.)

1293. *C. corymbosum* Ag., physeumate capillari ramosissimo in ramulos corymbosos desinente flacco diffuso amoene roseo, articulis diametro triplo s. quadruplo longioribus intercepto, clonario laterali ovato-globoso subsessili atro-purparascente. — *Callithamnion corymbosum* Ag. spec. II. 165. *Ceramium corymbosum* Ag. syst. 138. *C. pedicellatum* Hornem. fl. dan. t. 1596. f. 2. *Conferva corymbosa* Engl. bot. t. 2352.

Ad litora maris septentr. (Jürgens et Agardh.)

1294. *C. roseum* Roth, physeumate tenuiter membranaceo roseo a basi iude in ramos tenuiores patentissimos conformes alios ramulos capillares alternos acutos patentes exsertentes divulso elegantissime ramoso, geniculis coloratis articulos diametro triplo longiores interstinguentibus intercepto, clonariis subsessilibus obovatis ad latus pinularum interaum appensis. — *Ceramium roseum* Roth cat. III. 145. Jürg. alg. I. 9. Agardh syst. 139. *Callithamnion roseum* Ag. sp. II. 164. Lyngb. t. 39. *Conferva rosea* Dillw. conf. t. 17.

Ad munimenta liguea aestu maris verberata dynast. Jever., insulae Norderney ad Jadae ripas. (Jürgens. Roth.)

122. POLYSIPHONIA GREV. *Rochrentang.*

Physeuma tubulos longitudinales (? *sporidiis (stictidia Ag.)*) *in alia physeumata arachnoidea saepe succrescentibus farctos*) *geniculis approximatis pellucidis interceptos redintegrans, vasculosum, (exsiccando) habitum striatum geniculisque valde approximatis intervenientibus farctum et continuum meutiens, ramos diiformes saepius tubulosos et evidenter geniculatos essentia. Clonaria ovato-acuminata apice dehiscentia, sporidiis pyriformibus farcta. (Polysiphonia Grev. Spr. Dub. Hutchinsia Ag. syst. et sp. Lyngb. nec Brown et DC. Grammita Bonnem. Corredoria Mart. Dicarpella, Brongniartella et Gratelupella Bory, Ceramii et Conservae sp. auct. Conf. vasculosae Wahlenb. lapp.)*

† *homoeothamniae, physeumate primario demum saepius cum secundariis s. ramis ramulisque conformibus.*

* *phaeochroae, physeumate e roseo-purpurascente, s. e purpura dilutius saturatusque fuscescente, exsiccando fere nigrescente.*

1295. *P. stricta* Grev., physeumate brevi capillari subaequali in ramos virgatos patentes divulso dilute roseo, geniculis articulos diametro duplo longiores bivenos interstinguentibus, clonario sphaericо subsessili oligosporo. — *Polysiphonia stricta* Grev. edinb. 309. Dub. gall. II. 966. *Hutchinsia stricta* Agrdh syn. 56. Lyngb. hydr. 115. t. 36. Flor. dan. t. 1666. Jürg. alg. XIII. 3. exc. syn. *Ceramium serpularioides* Gratel.

Ad litora insulae Wangerogen rarius. (Jürgens.)

1296. *P. fibrillosa* Spr., physeumate capillari tenerrimo stricto solitario s. aggregato a basi inde multivenosa obsolete hyalino-geniculato alia lateralia irregularia incondito-ramosa ad extremitates in comam penicillatam soluto, primum viridulo dein purpurascente, clonariis lateralibus sphaericis exignis crebris breviter pedicellatis. — *Polysiphonia fibrillosa* Spr. syst. IV. 319. *Hutchinsia fibrillosa* Agrdh spec. II. 78. *Ceramium*

fibrillosum Mert. in Jürg. alg. VIII. 6. *Conferva fibrillosa* Dillw. conf. n. 163. t. G. Hornem. fl. dan. t. 1545.

Ad Ulvam plantagineam in insula Wangeroge projectam, rarissime. (Jürgens.)

1297. *P. allochroa* JV., physeumate capillari ramosissimo diffuso flacco roseo demum a basi inde fuscescente in articulos quinque-venosos diametro quadruplici longiores obsolete-geniculato hyalino, ramis superioribus sensim tenuatis trivenosis angustius geniculatis plerumque in fibrillulas hyalinas fatiscentibus, clonariis ovatis breviter pedicellatis hyalinis demum rumpentibus sporulasque majusculas profundentibus. — *Hutchinsia allochroa* Agrdh sp. II. 79., syst. 153. *Ceramium allochromum* Mert. in Jürg. alg. XVII. 3. *Hutch. violacea v. allochroa* Ag. syn. Lyngb. t. 34. f. B. *Ceram. allochromum* Roth cat. III. 464.

Ad litora insulae Wangeroge. (Mertens. Jürgens.)

1298. *P. urceolata* Grev., physeumate setaceo subaequali ramosissimo a basi inde atro-purpureo dein fuscescente rigidulo in alia abbreviata patentia conformatia trivenosa disulso, geniculis pellucidis articulos diametro sesquilongiores interstinguentibus intercepto, clonariis subsessilibus urceolatis apice denticulatis. — *Polysiphonia urceolata* Grev. Spr. syst. IV. 348. *Hutchinsia urceolata* Hook. scot. 88. Agrdh syst. 151., spec. II. 70. *Ceramium urceolatum* Jürg. alg. IV. 6. *Conferva urceolata* Dillw. conf. 1. G.

Ad litora insulae Wangeroge et Norderney veris tempore ejicitur. (Jürgens.)

1299. *P. byssoides* Grev., physeumate setaceo elongato primum purpurascente deinde fusco-nigrante a basi inde vagiter ramoso geniculis obsoletis articulos diametro bis terve longiores oblique venosos interstinguentibus intercepto, ramis alternis patentibus subconformatibus alios ramulos horizontales apice in physeumata arachnoideo-capillaria geniculata effusos spargentibus, clonario elliptico hyalino breviter pedicellato. — *Polysiph.*

byssoidea Grev. edinb. 309. *Spr. syst. IV.* 349. *Hutchinsia byssoides* Ag. *syst. 158.*, sp. II. 99. *Ceramium molle* Roth *cat. II.* 138. *Brongnartella elegans* Bory. *Conferva byssoides* Engl. *bot. t.* 547. *Dillw. conf. t.* 58. Jürg. *in lit.* *Fucus byssoides* Woodw.

Ad litora insulae Wangerooge. (Jürgens.)

1300. *P. atro-rubescens* Grev., physeumate scatoco a basi inde geniculis pellucidis remotis diametrum tenuissime venosum hyalinum sexies deciesve superantibus intercepto, dein pallide-fuscescente, ramos conformes patentes alios ramulos approximato-geniculatos tenuiores infra apicem acutum saepius ex spermatidiis nodulosis siliquaeformes inque fila arachnoidea solutos exserente habitumque ramosissimum patulum concinnante, clonario obovato sessili. — *Polysiph. atro-rubescens* Grev. edinb. 308. *Dub. gall. II.* 965. *Hutchinsia atro-rubescens* Lyngb. Ag. sp. II. 64. *H. violacea* Ag. sp. II. 64. *H. violacea* Ag. *syst. 150.* pr. pr. et excl. syn. plur. *Grammita atro-rubescens* Desmaz. *Conferva fucoides* Jürg. *in lit.* *Ceramium violaceum* b. Jürg. *alg. III.* 4. *Conferva atro-rubescens* Dillw. *conf. t.* 70. Jürg. *XVI.* 5.

Ad litora insulae Wangerooge et Norderney. (Jürgens.)
(Extremitates Iomentaceae Rhodomelam fere acmulantur.)

1301. *P. elongata* Spr., physeumate funiculari atro-purpureo a basi geniculis diametro brevioribus obsoletis articulos venoso-reticulatos opacos interstinguentibus intercepto remote-ramoso, ramis superioribus dichotomis alios ramulos difformes capillares subsimplices pellucidos dilutiores exserentibus illisque raro destitutis, clonario obovato laterali. — *Polysiph. elongata* Spr. *syst. IV.* 349. excl. syn. pl. *Corradoria elongata* Mart. *Bryna elongata* Gratel. *Hutchinsia elongata* Ag. sp. II. 82., *syst. 152.* *Ceramium elongatum* Roth *cat. III.* 128. *Conferva elongata* Huds. *Dillw. t.* 33.

β. simplex, phys. parce conformiterque ramoso. — *Grateloupella brachygonium* Hutch. *elongata* β. *denuata* Ag. l. l. *Ceramium brachygonium* Lyngb. t. 36.

Conferva elongata Engl. bot. t. 2429. Jürg. alg. V. 5.
Fucus diffusus Huds. Esp. fuc. t. 133.

Ad litora insulae Norderney. (Jürgens.) (Forma β . vernalis habitum alienum fere Polyidis lumbricalis tenuioris omnino mentitur, ob ramulorum capillarium a phys. primario difformium defectum.)

1302. *P. nigrescens* W., physeumate funiculari erectiusculo atro-purpureo (exsiccando) nigro-fuscescente elongato subcaespitoso a basi (soepius denudata inde) undique ramos conformes duploque tenuiores dichotomos adpresso virgatos emitente habitumque scoparium praestante, geniculis medio hyalinis approximatis turgidis nodos annulares mentientibus articulos multivenosos opacos diametrum subaequantes intercepto, clonariis lateribus subsessilibus magnis. — *Polysiph. fucoides* edinb. 308. *Dub. gall.* II. 965. *Hutchinsia nigrescens* Lyngb. hydr. 109. t. 33. *Agrdh* sp. II. 69. *H. violacea* Ag. syn. *Ceramium nodulosum* DC. gall. 45. excl. syn. *Dicarpella violacea* Bory. *Conferva fibrata* Engl. bot. t. 2139. *Ceram. violaceum* Roth cat. I. 150. t. 8. f. 2., germ. III. 462. *Conf. nigrescens* Engl. bot. t. 1717.

Ad litora maris septentrionalis. (Jürgens.)

1303. *P. fastigiata* Grev., physeumate funiculari a basi subaequali inde dichotomo, superne fastigiato-ramoso in extremitates breviter bifurcatas desinente, geniculis pellucidis articulos ex siphonulis brevissimis rectis opacis farctis venas s. strias mentientibus aliamque quadratam saturatiorem iocudentibus compositos diametrum subaequantibus intercepto, exsiccando nigrescens duriusculo fragili, clonariis solitariis sessilibus subterminilibus ovatis acuminatis. — *Polysiph. fastigiata* Grev. Spr. *P. polymorpha* Dub. gall. II. 965. *Hutch. fastigiata* Agrdh sp. II. 67., syst. 154. Lyngb. t. 33. *Ceramium polymorphum* DC. gall. II. 45. *Wahlord. suec.* *C. fastigiatum* Roth cat. III. 157., germ. III. 463. Jürg. alg. VII. 3. *Dicarpella fastigiata* Bory. *Granmita fast.* Desmaz. *Fucus lanosus* L. Huds. *Conferva polymorpha*

Oed. fl. dan. t. 395. Dillw. conf. t. 42. Engl. bot. t. 1764. nec L. — Dill. hist. t. 6. f. 35.

Ad Fucos maiores, praeprimis ad *F. nodosum* maris septentrion. (Jürgens.)

† heterothamniac, phys. primario undique ramentis hirsuto ejusque ramis alias ramulos difformes exserentibus. (*Dasya et Bonnemaisonia Ag. Asperocaulon Grev.*)

1304. *P. hirsuta* W., physeumate composito - pin-nato cum ramorum basi approximato - geniculato, spermatidiis farcto iisque in ramenta brevia articulata succrescentibus undique hirsuto, ramis polysiphoniis angulis genicalis obsoletis corculo nigro inscriptis articulos diametro longiores interstinguentibus interceptis ibique alias ramulos tenuiores dichotomos in articulos inflato-quadrangulos diametrum aequantes geniculis saturationibus constrictos divulsos exserentibus, clonariis ovatis sporidiis clavatis foetis. — *Dasya coccinea* Agrdh sp. II. 119. *Bonnemaisonia coccinea* Ag. bot. Zeit. 1827. p. 637. *Asperocaulon coccineum* Grev. edinb. 309. *Polysiph. coccinea* Spa. syst. IV. 348. *Hutchinsia coccinea* Ag. syn. Hook. *Callithamnum coccineum* Lyngb. *Gaillona coccinea* Bonnem. *Ceramium coccineum* DC. *C. hirsutum* Roth cat. II. 169. Jürg. alg. V. 4. *Conservae plumosa* Ellis. *C. coccinea* Huds. Dillw. conf. t 36. Engl. bot. t. 1055.

Ad litora insulae Helgoland copiose, rarius ad Wangerooge ejicitur. (Jürgens.)

123. CLADOSTEPHUS AG. Schweftang.

Physeuma massa grumosa farctum obsoleto geniculatum ibique ramenta capillaria difformia verticillata geniculato-articulata emittens. Clouaria siliquaeformia in ramentis terminalia.

(*Ceramii* sp. DC. *Conservae verticillatae* Roth. *Dasytrichia* Lamour.)

1305. *Cl. spongeus* Ag., physeumate funiculari farcto parce dichotomo geniculis approximatis annulari-

bus inscripto ibique ramenta capillaria simplicissima incurva verticillata internodia superantia adpressa obtusa confertissima exserente habitumque caudatum mentiente. — *Cladostephus spongiosus* Agardh syst. 168., sp. II. 12. *Ceramium spongiosum* DC. gall. 38. *Conferva spongiosa* Lightf. Roth cat. III. 309. Dillw. conf. t. 42. Engl. bot. t. 2427. f. 1. *Fucus hirsutus* L. mant. 164. — Moris. hist. XV. t. 9. f. 6.

Ad litora insulae Norderney. (Jürgens.) (De clonariis veris adhuc sub judice lis est. Capsulas ellipticas ex physeumatis primarii extremitatibus turgidis subclavatis prodeentes *Dillwynia* pinxit; *Agardhius* vero alios fructus elongatos siliquaeformes massa sporacea foetos setis insidentes describit. Alia dubia de synonymis.)

124. RHODOMELA AG. Faserläng.

Physeuma flare submembranaceum extus tenuissime areolatum, granulis sphaericis microscopicis (spermatidiis) sive mediotenus sparsis sive in extremitate lomentacea reconditis inscriptum. Clonarium sporidiis paucis pyriformibus foetum.

(*Fuci, Gigartinae et Sphaerococci* sp. auct.) — Genus dubium forsitan cum nomine omissendum et eum sp. Germaniae propriis ad *Polysiphonias* amandum.)

1306. *Rh. volubilis* Ag., physeumate linearis subcostato spiraliter torto sparsim ramoso-dentato, dentibus clonaria sphaerica exigua exserentibus. — *Rhodomela volubilis* Agardh sp. I. 374. *Volubilaria mediterranea* Lamour. Dub. gall. II. 946. *Fucus volubilis* L. Gmel. Turn. hist. t. 2. Roth germ. III. 446.

Ad litora Holsatiae rejectam Rothius observavit, a me nondum visam.

1307. *Rh. subfuscata* Ag., physeumate filiformi ramosissimo, ramulis setaceis-subulatis alternis duplo gracilioribus, clonariis globosis pedicellatis. — *Rh. subfuscata* Ag. sp. I. 378. *Gigartina subfuscata* Lamour. ess. 48. Lyngb. 47. t. 10. *Sphaerococcus subfuscus* Ag. syn. 32.

Fucus variabilis Angl. *F. subfuscus* Turn. hist. I. t. 10. Jürg. alg. V. 2. Engl. bot. t. 1164. Flor. dan. t. 1543. *F. confervoides* Huds. angl. 591.

$\beta.$ *penicillata*, ramis extremis saepius spermatidiorum glomeratis foetis in fila arachnoidea diffusa solutis. — *Rh. subfusca* $\delta.$ *penicillata* Ag. I. I.

Ad litora insulae Wangeroge rarius. (Jürgens); var. $\beta.$ ramiculis penicillatis omnino ad Polysiphonias accedit.

125. CHONDRIA AG. Schnentang.

Physeuma tabulosum teres s. compressum subgelatinosum exsiccando membranaceum regulariter contractum et attenuatum ibique veluti in ramulos breves ramentis subclavatis saepe obsitos proliferum. Clonarium globosum sessile gigantinum ramis ramulisque adnatum.

(*Chondria* Ag. *Lomentaria* Gaill. Dub. *Laurencia* Lam.)

† fronde inermi, filiformi, ramentis subclavatis.

1308. *Ch. pinnatifida* Ag., physeumate compresso 2-3 pinnato, pinnae obtusis callosis. Agrdh syst. 201., sp. I. 338. *Laurencia pinnatifida* Lamour. *Fucus corymbifer* Wulff. cr. Esper fuc. 93. *F. multifidus* et *pinnatifidus* Huds. Turn. hist. t. 20. Engl. bot. t. 1202. DC. gall. II. 30. — Moris. hist. XV. t. 8. f. 2.

$\beta.$ *angusta*, jugamento ramentisque cylindricis gracilioribus. Agrdh I. I. *Fucus ramosissimus* Flor. dan. t. 276. *F. pinnatifidus* Gm. *Gelidium pinnatifidum* Lyngb.

Ex mari septentrionali ad litus raro adluit.

1309. *Ch. ovalis* Ag., physeumate teretiusculo funiculari dichotomo, ramentis ellipticis undique sparsis basi maxime attenuatis, siccando complanatis aucto. *Chondria ovalis* Agrdh. sp. I. 348., syst. 204. *Lomentaria vermicularis* Gaill. Dub. gall. II. 951. *Gigartina vermicularis* Lamour. *Fucus sedoides* Linn. transact. III. 17. *F. polypodioides* Gmel. hist. 189. *F. vermicularis* Gm. hist. t. 18. f. 4. DC. gall. II. 27. *F. ovalis* Huds. Engl. bot. t. 711. Turn. hist. t. 81.

Ad insulam Wangeroge. (Jürgens.)

1310. *Ch. clavellosa* Ag., physeumate filiformi plures pinnato, ramentis lineari-lanceolatis obtusis distichis basi attenuatis erectis, clonariis aliis punctiformibus, aliis tuberculiformibus ovatis sessilibus. — *Chordaria clavellosa* Agrdh sp. I. 353. *Lomentaria clavellosa* Gaill. Dub. I. I. *Gastridium clavellosum* Lyngb. 70. t. 17. *Gigartina clavellosa* Lamour. *Fucus clavellosus* Turn. hist. t. 30. Engl. bot. t. 1203.

Ad insulam Norderney. (Jürgens.)

† physeumate articulato-constricto.

1311. *Ch. articulata* Ag., physeumate tereti angusto tubuloso subgelatinoso ramosissimo dichotomo articulato-concatenato, articulis ovato-ellipticis elongato-lanceolatis trinque attenuatis, ramis nonnisi fastigiatis verticillatisque, clonariis sessilibus urceolatis. — *Chondria articulata* Agrdh syst. 207., sp. I. 357. *Lomentaria articulata* Lyngb. t. 30. A. Dub. gall. II. 950. *Gigartina* Lamour. *Ceramium torulosum* Roth cat. III. 125. *Fucus articulatus* Lightf. Turn. hist. t. 106. Engl. bot. t. 1574. Jürg. alg. XV. 1. *Ulva articulata* Huds. DC. gall. II. 7. — *Moris*. hist. XV. t. 8. f. 14.

Inter rejectamenta maris septentr. ad iusulam Norderney, rarissima. (Jürgens.) (Neque generis notae neque locus in systemate certus constant.)

B. *Chondrothamnia*, physcumate compaginato continuo basi pythmenode stipitem fibrosum saepius emitente adnato, membranacea s. coriaceo, exsiccando subcartilagineo, a figura tenuata cylindrica funiculari in alias quascunque concinnas multipliciterque descissas partitasque divulso vel in plynthis foliacea nervis venisque instructa expanso, colore viridi, raseo et purpureo insigni illosque colores inter se tum ex varia loci et aeris conditione tum ex mutuae consortium vindicta miscente et subeunte, allochroo, clonaria homogena sporidiis limbo hyalino cinctis foeta subsphaerica saepius ad extremitates emittente, spermatidiis destituta.

(Florideae et Fucoideae Ag. Phykoideas et Floridae Spr. Fucaceae Lamour. Dub.)

126. POLYIDES Ag. Wechseltang.

Physeuma cylindricum farctum funiculare cartilagineum e fibris radiantibus compositum. ?*Clonaria verruciformia* spongiosa fibris sporidia sustentantibus foeta uuda (epidermide non tecta.)

(*Fuci*, *Gigartinae* et *Chordariae* spec. auct. *Spongicarpus* Grev.) — Genus dubium *Agardhii* auctoritate receptum, singulari fructificationis apparatu a *Coccophykeis* desciscens et ad *Myxophycea* reclinans.

1312. *P. lumbicalis* Ag., physeumate tereti contorto obtuse-dichotomo fastigiato, ramulis teretibus crassis furcatis acutis, clonariis oblongis dissimilibus lateribus. — *Polyides lumbicalis* Agardh sp. I. 192., syst. 194. *P. rotunda* Gail. Dub. gall. II. 953. *Furcellaria rotunda* Lyngb. *Spongicarpus rotundus* Grev. *Gigartina rotunda* Lamour. *Fucus caprinus* Gunn. *Sphaerococcus fastigiatus* Wahlenb. suec. II. 895. *Fucus radiatus* Angl. *F. rotundus* Gmel. Turn. hist. t. 5. Engl. bot. t. 1738. *Flor. dan.* t. 1544. Jürg. alg. V. 1.

Ad litora insulae Wangerooge rarius ejicitur. (Jürgens.) (*Physeuma cartilagineum* primum pellucido-fuscens, dein olivaceo-fuscum, molis variae, inter pennam corvinam et passerinam ambigens. Cauter a *Furcellaria lumbicali* dignoscendus.)

127. SPOROCHNUS AG. Spitzentang.

Physeuma angustum planum membranaceum, ramis ramulisque in basin petioliformem quasi angustatum margine spinulas remotas exserens. ?*Clonaria*. —

(*Sporochnus* Ag. *Desmia* Lyngb. *Desmaretia* Lamour. Dub.) — Genus dubius oppressum, partibus fructificationi inservientibus conspicuis saltem destitutum, interim hoc ex habitu et fabricae indole relatum.)

1313. *Sp. aculeatus* Ag., physeumate e basi lignosa brevi tereti in ramos cartilagineos planos lineares enerves repetito-pinnatimque ramosos sparsos diviso, pri-

mariis integerrimis, ultimis margine primum penicilliferis mox spinulosis, spinulis subremotis subulatis erectis dein incurvis. — *Sporochnus aculeatus* Agrdh syst. 259., sp. I. 151. *Desmia aculeata* Lyngb. hydroph. 133. t. 44. *Desmarestia aculeata* Lamour. Dub. gall. II. 939. *Fucus contortus* Esp. fuc. t. 43. *F. usneoides* Oed. *F. virgatus* Gunn. norv. I. 45. *F. muscoides* Gmel. Gunn. *F. aculeatus* L. sp. 1632. *Flor. dan.* t. 355. Roth germ. III. 453. *Turn. hist.* t. 187. Jürg. alg. IX. 3. — *Moris. hist.* XV. t. 9. f. 4.

Ad litora maris septentr. prope Wangerooge. (Roth. Jürgens.)

1314. Sp. *ligulatus* Ag., physeumate plano membranaceo subenervi subtriplicato-pinnato, ramis ramicisque oppositis linear-lanceolatis basi attenuatis. — *Sporochnus ligulatus* Ag. I. I. *Desmarestia ligulata* Dub. I. I. *Desmia lingulata* Lyngb. t. 7. *Fucus herbaceus* Huds. *F. ligulatus* Lightf. scot. t. 29. *Turn. hist.* t. 48. Engl. bot. t. 1636. *Flor. dan.* t. 1592. Jürg. alg. III. 2.

Inter rejectamenta maris ad insulam Norderney minime frequens. (Jürgens.)

128. SPHAEROCOCCUS STACKH. Knopftang.

Physeuma subcoriaceam polymorphum a figura filari dichotoma ad pliathoden varium. Clonarium sphaericum sporidiis rotundis glomeratis foetum.

(*Fuci et Gigartinae* sp. Lam. *Ceramia continua* Roth germ.)

+ *filares*, physeumate teretiusculo filari s. funiculari dichotomo-ramoso.

1315. *Sph. confervoides* Ag., physeumate tereti filari s. funiculari cartilagineo sesquipedali a basi inde ramos ramicisque coniformes patentim vagiterque dichotomos sensim magis gracilescentes exserente, clonariis hemisphaericis lateraliter adnatis sparsis physeumate crassioribus, dein sporidia violacea oblonga spargentibus. — *Sphaeroc. confervoides* Agrdh syst. 232., sp. I. 303. Jürg. alg. VI. I. *Gigartina conferv.* Lamour.

Lyngb. *Dub.* *Ceramium longissimum* *ß.* *Roth cat.* et *germ.* *III.* 460. *Fucus confervoides* *L.* sp. 1629. *Turn.* *hist.* t. 82. *Engl. bot.* t. 1668.

a. procerrimus, phys. filari nonnisi 1-2 pedali simpliciter vagiterque ramoso. — *Fucus procerrimus* *Esp.* *F. longissimus* *Wulff.* *Ceramium longissimum* *Roth cat.* *II.* 172., *germ.* *III.* 460. *Jürg. alg.* *XVII.* 1.

b. divaricatus, phys. funiculari breviora divaricato-ramoso. — *F. confervoides* *Wulff.*

y. setaceus, phys. setaceo 1-3 unciali divaricato-ramoso. — *Fucus setaceus* *Poir.* *Gelidium setaceum* *Lamour.*

Ad litora insulae Norderney et Wangeroge. (*Jürgens.*) (Variet. habitu vario decipiunt. Clonaria phycumati adnata hemisphaerica Brassicae semina aequantia mammillata sporidia violaceo-rubra spargunt illisque exsiccando papyrum inquinant.)

1316. *Sph. plicatus* *Ag.*, physeumate filari corneo aequali rigido a basi inde ramoso, ramis inferioribus ramulos vagos alteroos superne oppositos verticillum nodosum mentientes emitentibus obtusis. — *Sphaeroc. plicatus* *Agrdh* sp. I. 313. *Gigartina plicata* *Lamour.* *Dub.* *G. Griffitsiae* *Lyngb.* *hydr.* t. 11. *Ceramium plicatum* *Roth cat.* II. 162., *germ.* *III.* 458. *Fucus albus* *Flor.* *dan.* t. 408. *F. plicatus* *Huds.* *Turn. hist.* t. 180. *Engl. bot.* t. 1089. *Jürg. alg.* *XVI.* 1.

Ad litora insulae Helgoland et Baltrum. (*Jürgens.*) (Variet phys. tenuitate nonnisi setacea et ramorum dispositione vaga s. Furcellariae lumbricalis more fastigiata.)

1317. *Sph. purpurascens* *Ag.*, physeumate filari tereti tenero (exsiccando) rigido cartilagineo a basi inde ramosissimo, ramulis setaceis conformibus utrinque attenuatis, sterilibus s. fertilibus hinc inde inflatis s. clonariis sphaericis aduatis sporidiis angulatis sarcis nodosis iisque veluti interceptis. — *Sphaeroc. purpurascens* *Agrdh* sp. I. 318., syst. 236. *Gigartina purpurascens* *Lyngb.* t. 46. ?*Fucus corallinus* *Flor.* *dan.* t. 709. (forma peculiaris, clonariis lomenta mentientibus.) *Fucus*

purpureus Gmel. *F. scorpioides* Flor. dan. t. 887. *F. tuberculatus* Lightf. *F. capillaceus* et *acicularis* Esper (formae gracilescentes.) *F. purpurascens* Huds. Turn. hist. t. 9. Engl. bot. t. 1243. Jürg. alg. X. 1.

Ad litora maris septentr. prope Helgoland copiosissime, rarius ad Wangerooge. (Jürgens.)

†^t *plani*, physeumate *plano dichotomo*.

1318. *Sph. Brodiaei* Ag., physeumate filiformi subdichotomo, ramis in laminas oblongas bifurcas subproliferas abeuntibus, clonariis sphaericis pedicillatis terminalibus. — *Sphaeroc. Brodiaei* Agrdh syst. 213., spec. I. 239. *Lyngb. hydr.* t. 3. *Delesseria Brodiaei* Lamour. *Fucus Brodiaei* Turn. hist. t. 72. *Flor. dan.* t. 1476. *F. membranifolius* Lamour.

a. concatenatus, phys. elongato plures proliferis, laminis lanceolatis. *Agrdh* L. L. *Lyngb.*

b. ligulatus, phys. tenuiore angustissimo laminas lanceolatas s. linguaeformes membranaceas vage exserente.

c. angustissimus, phys. filiformi laminisque linearibus duplo angustioribus.

In mari baltico (Flocerke. Detharding.)

1319. *Sph. membranifolius* Ag., physeumatis basi elongata tereti cornea ramosa dichotoma in laminas membranaceo-cartilagineas cuneiformes multifidas enervis expansa, segmentis extremis obtusis angustis denticulatis, clonariis ovatis pedicellatis subbasilaribus. — *Sphaeroc. membranifolius* Agrdh syst. 214., spec. I. 240. *Lyngb. hydr.* t. 3. *Halymenia membranifolia* Lamour. *Fucus membranifolius* Turn. hist. t. 74. *F. rubens* Flor. dan. t. 827. *F. ceranoides* Huds. — *Moris. hist.* XV. t. 9. f. 2.

a. latifolius, physeumatibus in plynthia membranacea dilatatis. — *Sph. palmetta* Lyngb.

b. fimbriatus, laminis apice ciliatis. — *F. fimbriata* Huds.

c. pinnatus, physeumate compresso filiformi pinnato.

S. fibrillosus, physeumate setaceo vase ramoso. *Agrdh*
t. I. F. Fibrilla *Esper* t. 250.

Ad litora meris septentr. pr. Norderney (*Jürgens*);
 var. β . — γ . in mari baltico. (*Detharding*.)

1320. *Sph. crispus* Ag., physeumate plano dichotomo cartilagineo integerimo criso-undulato, segmentis caneiformibus, clonariis hemisphaericis in disco physeumatis sessilibus hinc concavis deciduis. — *Sphaerococcus crispus* *Agrdh* syst. 219., spec. I. 256. *Chondrus crispus* *Lyngb.* *Dub. gall.* II. 947. *Ch. polymorphus* *Lamour.* *Ulva crispata* *DC. gall.* II. 13. excl. syn. et var. *Fucus lacerus* *Stackh.* *F. polymorphus* *Lamour.* *F. ceranoides* *Gmel. fuc.* t. 7. *Roth germ.* III. 450. *F. crispus* *L. mant.* *Turn. hist.* t. 216.

α . *aequalis*, physeum. linearis membranaceo subpedali.
 — *Fucus crispatus* *Flor. dan.* t. 826.

β . *patens*, physeum. dichotomo canaliculato paten-
 tim divisus, segmentis caneiformibus angustis. — *Jürg.*
alg. X. 3.

γ . *corymbosus*, physeum. elongato apice in laciniis co-
 rymboseo-dichotomis explanato. — *F. foliifer* *Esper.*

In mari septentr. abudat et inter rejectamenta li-
 toralia ad Wangeroge, Norderney assatum reddit. (*Jürgens*.)

+++ *subcostati*, *physcumate obsoleto-costato*.

1321. *Sph. rubens* Ag., physeumatis basi tereti subnulla in laminas membranaceas elongato-cuneatas pal-
 mato-bifurcas inferne obsolete costatas expanso, segmen-
 tis superioribus basi angustatis et cum inferioribus quasi
 concatenatis, extremis obtusis subrotundis, clonariis ru-
 gosis sessilibus nodique per faciem sparsis. — *Sphaeroc-*
rubens *Agrdh* syst. 213., spec. I. 237. *Halymenia rubens*
Dub. gall. II. 943. *Chondrus rubens* *Lyngb.* *hydr.* t. 18.
Dawsonia et *Delesseria rubens* *Lamour.* *Fucus rubens*
Turn. hist. t. 42. *Roth germ.* III. 452. excl. syn. *Gmel.*
Timm prodr. 1062. *Engl. bot.* t. 1053. *F. crispus* *Huds.*

F. epiphyllus Flor. dan. t. 708. *F. prolifer* Lightf. DC. gall. II. 29.

Ad littora maris baltici (Timm.)

129. WORMSKIOLDIA SPR. *Wormskield-Tang.*

Physeuma membranaceum stipitatum s. acaule folia-
ceum in laminam plynthoden s. filiformem expansum,
spermatidiis punctiformibus in maculas parvas aggrega-
tis inscriptum. Clonaria rotundata tuberculiformia.

(*Delesseria Lamour.* Agrdh et auct.) — Genus a *Lesser-
tio* male formatum et *Lessertiae* genere *Candolleano*
jam sacratum huicque *Wormskioldia* dictum *Sprengelio*.

† *venosae*, *acaules*, *physeumate venoso*.

1322. *W. lacerata* Spr., physeumate membranaceo
tenerrimo plano praeter basin rarius nervosam aenio
ramosissimo vagiter fisso, lacinias obtusis sublinearibus
marginie criso-laceris undulatis, clonariis in processibus
marginalibus immersis depresso-hemisphaericis. — *Wormsk.
lacerata* Spr. syst. IV. 332. *Delesseria lacerata* Agrdh
syst. 251. sp. I. 184. *Halymenia lacerata* Dub. gall. II.
944. *Chondrus laceratus* Lyngb. *Dawsonia lacerata* La-
mour. *Fucus ciliatus* Esp. *F. laceratus* Gmel. fuc. t. 21.
f. 4. *Turn. hist.* t. 68. *Engl. bot.* t. 1067. DC. *F. crispa-
tus* Huds. *F. endiviacfolius* Lightf.

Ex mari septentrion. ad littora advehitur. (Mertens.)

†† *costatac*, *physeumate costato*.

1323. *W. alata* Spr., physeumate costato obsolete
nervoso linearis dichotomo versus apicem alternatim pin-
natido spermatidiis punctiformibus in lineolas angustas
parallelas ad utramque nervi latus dispositas digestis in-
scripto, piunis sublingulatis, clonariis sessilibus tubercu-
liformibus. — *Wormsk. alata* Spr. I. I. *Delesseria alata*
Lamour. Agrdh spec. I. 184. Lyngb. hydr. t. 2. Dub
gall. II. 946. *Sphaerococcus alatus* Wahlnb. succ. II
898. *Fucus alatus* Huds. Gmel. fuc. t. 25. f. 1. Flor

dan. t. 352. Turn. hist. t. 160. Engl. bot. t. 1387. Jürg. alg. IX. 4.

In mari baltico et sinu Codano (*Detharding*), ad litora insularum Frisiae raro, frequentius ad insulam Helgoland. (*Jürgens*). (Varietates intercurrunt platy- et leptoplynthiae.)

1324. *W. Plocamium* Spr., physeumate erecto cartilagineo pinnato dichotomo ramosissimo, ramulis ultimis pectinatis secundis filiformibus, clonariis globosis sessilibus aggregatis lateralibus. — Wormsk. *Plocamium* Spr. l. l. *Delesseria Plocamium* Agrdh sp. I. 180. *Plocamium coccineum* Lyngb. *hydrop*. t. 9. *Pl. vulgare* Lamour. *Dub. gall.* 949. *Ceramium Plocamium* Roth cat. II. 161., germ. III. 458. *Fucus Plocamium* Gmel. *fuc.* t. 16. *Flor. dan.* t. 1593. Jürg. alg. IV. 2. *F. coccineus* Huds. *Turn. hist.* t. 59. *Engl. bot.* t. 1242.

Ad litora maris septentr. insulae Wangerooge rarius (*Jürgens*), pr. Ritzebüttel (*Buck*).

1325. *W. Hypoglossum* Spr., physeumatis basi stipitiformi teretiuscula sensim alata in frondem linearis lanceolatam aveniam reticulatam e costa saepius proferam ad margines spermatidiis lineutam dilatata, clonariis sparsis tuberculiformibus costae insidentibus. — Wormsk. *Hypoglossum* Spr. syst. l. l. *Delesseria Hypoglossum* Agrdh syst. 249., spec. I. 176. *D. Hypoglossum* Lamour. *Dub. Fucus hypoglossoides* Stackh. *Ulva lingulata* DC. *gall.* II. 14. (quae *Deless. lingulata* Dub. l. l.) *Fucus hypoglossum* Woodw. *Engl. bot.* t. 1396. *Turn. hist.* t. 14.

Ad litora insulae Norderney. (*Jürgens*.)

1326. *W. sanguinea* Spr., physeumatis basi cornea sublignosa tereti ramosa in plynthia ovata s. elongata lanceolata simplicia integerrima undulata obtusa pinnatim nervosa dilatata, clonariis sphaericis petiolatis e costa denudata emergentibus. — Wormsk. *sanguinea* Spr. syst. l. l. *Delesseria sanguinea* Lamour. Lyngb. *hydrop*. t. 2. *Agrdh syst.* 248., spec. I. 172. *Sphaero-*

coccus sanguineus *Wahlenb.* suec. II. 898. *Fucus sanguineus* *Linn.* mant. 136. *Flor. dan.* t. 349. *Turn. hist.* t. 36. *Engl. bot.* t. 1041. *Roth germ.* III. 439. *Timm meg.* no. 1061. *DC. Jürg. alg.* X. 2. — *Moris. hist.* XV. t. 8. f. 6.

$\beta.$ *lanceolata*, physeumate angustissimo lanceolato.

Ad litora maris septentr. prope Helgoland copiose, rarius ad insulam Wangerooge, vix vero illaesa ejicitur (*Jürgens*), ad mare balticum (*Timm.*)

130. FURCELLARIA AG. *Gabeltang.*

Physeuma pythmenibus fibrosis innixum cylindricum funiculare dichotomum; rami spicæ in clonaria siliquaeformia subulata simplicia intumescentes.

1327. *F. fastigiata* *Lamour.*, physeumate funiculari cartilagineo dichotomo fastigiato, augulis dichotomiae acutis, apicibus bifurcis obtusis, clonariis conceptacula siliquaeformia terminalia praestantibus. — *Furcellaria lumbicalis et fastigiata* *Lamour.* *Dub. Lyngb.* 103. *Agrdh* sp. I. 103. *Fucus lumbicalis* *Gmel.* *fuc.* t. 6. f. 2. *Turn. hist.* t. 6. *Engl. bot.* t. 824. *Roth germ.* III. 455. *Jürg. alg.* IV. I. *F. furcellatus* *L.* sp. 1631. *Flor. dan.* t. 419. et t. 1544. *Wahlenb.* suec. II. 890. *Roth* t. I. *F. fastigiatus* *Huds.* *Linn.* — *Moris. hist.* XV. t. 9. f. 4.

Ad litora insulae Helgoland, rarius ad Norderney et Wangerooge (*Jürgens*); in mari baltico ubertim. (Variat physeumatis teneritate fere filari.)

131. FUCUS L. EMD. *Seetang.*

Physeuma compressum nunc dilatatum, nunc alatum ramosum subdichotomum membranaceo – cartilagineum physciis (*vesiculis auct.*) plerumque instructum. Clonaria turgida intus mucosa tuberculis sphaericis spermato-phoris fibrisque mixtis foeta.

(*Fucus L.* ex emend. *Grev.* *aliorumq.* *Halidrys* *Lyngb.* *Siliquaria et Nodularia* *Lamour.*)

† ecostati, physeumate enervi dilatato compresso, physciis siliquosis s. ovatis instructo; clonariis porrectis. (*Halidrys Lyngb. Dub.*)

1328. *F. nodosus L.*, physeumate compresso subdichotomo physciis innatis hoc illucve inflatis ovato-oblongis instructo, ramulis planis alato-dilatatis serratis, clonariis lateralibus distichis pedunculatis pyriformibus. *Fucus nodosus L. sp. 1628. Turn. hist. t. 91. Roth germ. III. 454. Engl. bot. t. 570. Flor. dan. t. 146. DC. Lam. Dub. Jürg. alg. VIII. 1. Halidrys nodosa Lyngb. hydroph. t. 8. — Moris. hist. XV. t. 8. f. 2.*

Ad litora marium germanicor. copiose. (Var. minorem, ramis ramulisque distichis suboppositis, *Rothius* indicat.)

1329. *F. canaliculatus L.*, physeumate cartilagineo dichotomo compresso ecostato linearis canaliculatus phycio, clonariis terminalibus oblongis obtusis subterstichis. — *Fucus canaliculatus L. syst. II. 716. Turn. hist. t. 3. Roth germ. III. 451. Lyngb. hydroph. t. 1. F. excisus L. sp. 1637. Flor. dan. t. 214.*

Ad litora maris septentrion. (Jürgens), maris baltici (Timm.)

† costati, phys. alato-dilatato nervoso. (*Fucastra Dub.*)

1330. *F. vesiculosus L.*, physeumate cartilagineo piano alato-dilatato linearis costato integerrimo dichotomo, physciis sphaericis illi lateraliter iunatis geminis, clonariis ovalibus tumidis tuberculatis obtusis plerumque confluentibus. — *Fucus vesiculosus L. sp. 1626. Turn. hist. t. 88. Roth germ. III. 442. Timm prodr. I. I. Wahlenb. tapp. 490. Engl. bot. t. 1056. Lyngb. hydroph. t. 1. F. inflatus L. sp. 1627. Flor. dan. t. 1127. Esper t. 10. 12. 83. — Moris. I. I. f. 5. Quercus marina Lobel 255. Clus. hist. I. 21.*

a. volubilis, phys. spiraliter torto phycio, clonariis elongatis. — *F. vesiculosus a. volubilis Turn.*; var. *spiralis* Roth. *F. volubilis Huds. nec L.* (qui *Volubilaria mediterranea Lamour. Dub.*)

β. acutus, phys. angusto physiophoro int apices lanceolatos producto. — *Turn. et auct. l. l. Jürg. XI. 1.*

γ. obtusus, phys. dilatato in apices obovatos obtusos desinente. — *Fucus divaricatus Esp. Roth germ. III. 443.*

δ. linearis, phys. angusto aphyscio, clonariis elongatis lineari-lanceolatis acutis. — *F. linearis Huds.*

ε. undulatus, phys. margine sinuato, subundulato. — *Roth l. l.*

ζ. subecostatus, phys. unciali subecostato. — *F. balticus Ag. DC.*

In mariibus germanicis copiosissime, pro munieris litoribus iuserviens. (Perquam versipellis et praeter var. l., alias innumeras ad physeumatis et ad clonariorum rationem: var. *macroclonarium*, clonariis maximis et var. *sphaeroclonarium*, clonariis rotundatis proferens.)

1331. *F. ceranoides L.*, physeumate cartilagineo plano alato-dilatato lineari costato dichotomo integro aphyscio, segmentis lateralibus angustioribus multifidis, clonariis ovalibus tumidis tuberculatis apice acutis basi confluentibus. — *Fucus ceranoides L. sp. 1626. Turn. hist. t. 89. Agrdh syst. 277., sp. I. 93. DC. Engl. bot. t. 2115. ?Roth germ. III. 430. Jürg. alg. X. 4.*

Ad oras insulae Wangeroge rarissime. (Jürgens.)

1332. *F. serratus L.*, physeumate cartilagineo plano alato-dilatato lineari costato dichotomo serrato-dentato aphyscio, clonario solitario tuberculato depresso tuberculato obtuso. — *Fucus serratus L. sp. 1626. Turn. hist. t. 90. Roth germ. III. 441. Engl. bot. t. 1221. Lyngb. hydroph. t. 1. Jürg. alg. VIII. 3. — Moris. hist. XV. t. 9. f. 1.*

α. integer, physeumate obtuso subintegro.

β. angustus, physeumate duplo angustiore lineari.

Ad rupes insulae Helgoland ubertim, ad litora vicina (Jürgens. Roth) et maris baltici (Timm. Detharding.)

+++ *physeum. e basi cyathiformi emergente integerimo, dein clonariis immersis foeto. (Himanthalia Lyngb. Dub.*

1333. *F. l o r e u s L.*, physeumate compresso dichotomo e basi cyathiformi subeunte in ramos erectos lineares obtusos aphyscios elongatos succrescente, dein per omnem superficiem clonariis parvis tuberculiformibus numerosissimis foeto. — *Himanthalia lorea Lyngb.* tent. t. 8. *Dub. gall. II.* 939. *Fucus lorea L. syst. II.* 716. *Roth germ. III.* 453. *Engl. bot. t.* 569. *Turn. hist. t.* 196. *Wahlenb. lapp. 499.*, suec. *II.* 889. *Flor. dan. t.* 710. *Agrdh sp. I.* 92. *Jürg. alg. IX. 1.* *F. elongatus L. sp.* 162T. *Ulva pruniformis Gunn.*

Ad litora maris septentr. (Jürgens.) (Annus esse videtur; vere solum calycem basilarem relinquens.)

132. CYSTOSIRA AG. Schotentang.

Physeuma ramosum subcylindricum in ramos conformati tenuiores physciis interceptos divulsum. Clonaria tuberculosa terminalia loculosa, tubercula pertusa spermatidia filis mixta continentia.

1334. *C. fibrosa Ag.*, physeumate lignoso tereti ramoso, ramis in ramulos filiformes ramosissimos inermes obtusos divisus, physciis innatis insignibus ovato-ellipticis subconcretatis, clonariis filiformibus terminalibus. *Cystoseira fibrosa Agrdh sp. I.* 65. *Fucus baccatus et abrotanoides Gmel. fuc. t. 3.* *F. setaceus Huds.* *F. fibrosus Huds.* *Turn. hist. 299.* *Engl. bot. t. 1969.* *Jürg. alg. VIII. 4.*

β. plana, phys. unimervio plano simplici aphyscio.

Inter maris septentrion. rejectamenta insulae Wangerooge, rarissima. (Jürgens.)

1335. *C. siliquosa Ag.*, physeumate compresso, ramis distichis alternis, ramulis planis linearibus integris, physciis pedunculatis oblongis articalato-nodosis, clonario pedunculato lanceolato terminali. — *Cystos. siliquosa*

Agrdh sp. I. 71. *Fucus siliquosus* L. sp. 1829. *Flor. dan.* t. 106. *Roth* gcrm. III. 440. *Turn. hist.* t. 159. *Engl. bot.* t. 474. *Halidrys siliquosa* Lyngb. *hydroph.* t. 8.

Ad litora maris septentr. et baltici cum tempestatibus advehitur. (*Jürgens. Detharding.*) (Variat: clonariis apice bifidis.)

133. SARGASSUM AG. *Beerentang.*

Physeuma ramosum cylindricum s. *compressum* in ramos compressos foliiformes distinctos sessiles nervo medio instructos divisum, phyciis distinctis axillaribus petiolatis auctum. *Clonaria tuberculiformia* in racemem axillarem disposita, tuberculis pertusis, spermatidiis fibris nullis mixtis foeta.

1336. *S. baciferum* Ag., physeumate compresso in ramulos foliiformes lineari-lanceolatos serratos divulso phyciisque sphaericis muticis pisiformibus aucto, clonariis cylindricis racemosis. — *Sargassum baciferum* *Agrdh* sp. I. 6. *Jürg. alg.* IX. 2. *Fucus baciferus* *Turn. hist.* t. 47. *F. natans* L. sp. 1628.

È mari septentrion. ad litora Wangerogensia rarissime ejicitur. (*Jürgens.*)

Ordo IV.

GYROPHYKEA W. *Spiraltange.*

Vegetabilia limnophila i. e. lacustris s. scaturiginosa, e fundo aquarum dulcium et salsarum gliscendo nec tamen emergendo socialiter assurgentia turgida emersa citato contabescientia, mansu arenosa s. heliophoba, annua, ex physeumate membranaceo tubuloso coque nunc simplici (*monosiphonio*), exsiccando collabente et ligamenti instar compresso, nunc ex aliis pluribus convatis unum veluti redintegrantibus tubulumque interanum corrugando obducentibus (*polysiphonio*), nunc denique ex utroque mixto (*heterosiphonio*) composito, per intervalla articu-

lato-constricta geniculato-fracto ibique alia phyeumata lateralia praeter molem et longitudinem conformia s. difformia (*monstra inflata*), in verticilos magis minusve regulares digesta, e latere interno fertilia exserente, basi in caudicem conformem nodis coactis interceptum desinente, aphylo prorsus et arrhizo insignia, ex phyeumatum lateralium stricturis clonaria nucamentacea spiraliter striata libera sessilia, ramentis plerumque bracteiformibus succincta et gemmas (*condylias*) varias proferentia. — Propagatio primaria veluti ex embryis clouariorum, secundaria ex condyliis.

(*Chareae* Bisch. cr. fasc. 1. t. 1, 2. *Characeae* Rich. *Brongn.* Kunth (inter *Rhizocarpeas* et *Piperaceas*); *Agrah* et *Spr.* (inter *Confervas* *genuinas* et *Ceramieas*). *Pl. filicoideae* *verticillatae* *Wahlenb.* *suec.* *Dub.* *Algæ vegetantes* *Mart. erl.* *Algarum genus L.* (inter *Lichenem* et *Tremellam*). *Scop.* *Poll.* *Mart.* *Wallr.* *Schröd.* *Inundatae* *Linn.* *natur.* *Genus sexuale* (*monoicum*: *Schreb.* *Willd.* sp. *Pers.* *Reichenb.*) ; (*monandrum*: *Willd.* *berol.* *Sm.* *Bess.*), (*polygamum*: *Pursh*). (*Eleo-deae* (*Onagriis* et *Salicariis* *adfinis*) *Lem.* *Najades* *Juss.* *DC.* *Spr.* *Catabophyta* *Neck.* *Pl. apetalac* *caulifoliae* *Hall.* *hist.* *Pseudocryptogamæ* *Vaill.* *Gled.*) — (De ordine inserendo adhuc sub judice lis est; equidem post *Linnaeum* primos *Algæ* reddidi ceu ordinem perfectiorum, phyeumatis ratione ad *Liagoram*, fabrica monosiphonia ad *Ceranium setaceum*, polysiphonia ad *Polysiphonias* *Grev.*, superficie papulosa quarundam ad *Confervas* aliquas, indole prolifera ad *Draparnaldiam* *spectans*, nec propagandi modo a quibusdam *Coccophykeis* alienum. Hinc notiones qualesunque, phauerogamis propriæ, quas auctores cauli, foliis, ramis, nuculis, involucro, ipsisque floribus substituere, deserendae idoneisque exarandæ.

134. CHARA VAILL. *Armenleuchter.*

Clonarium turbinatum *nucamentaceum* evalve extus spiratim-striatum, phyeumatis processu hyalino in coronam 5-lobam (*calyx* auct.) abeunte tunicatum, em-

bryis globosis mucosis foetum prolemque e vertice transmittens, alare (i. e. physeumatis lateri interno adfixum (*fl. foeminae*)). *Condylia* duplicita: alia sphaerica colorata filis articulatis farcta demum in lamellas triangulas dehiscentia, clouario subjecta (*fl. masculi* auct.), alia globulis farcta hemisphaerica s. conglobata tuberi-s. stellaeformia. *Physeuma* tubulosum membranaceum hyalinum latice vegetabili viridi globuloso circumfluo (veluti spermaticis) tinctum, simplex omnino ac laeve (*monosiphonium*), s. ex aliis pluribus superadditis (*polysiphonium*) compositum, s. ex utraque mixtum (*heterosiphonium*), per intervalla distincta (*arthronematum* iustar) articulatum ibique alia physeumata lateralia verticillata cum primario (ex abortu) conformia, e latere interno fertilia exserens, aphyllum prorsus at undique in processus conformes, ramos, ramulos bracteasque mentientes proliferum.

(*Nitella Agardh. Chara Vaill. L. et auct. Conservae sp. Müll. Equisetum Moris. C. Baum. (cui scilicet nunc quoque ad finem habent Hallerus, Wahlenb. Bischoff et Duby.) Hippuris Pluken. Ponted. Dill.* — (Speciatim genus dubiis jam nobilitatum tractant: *Vaillantius* act. paris. 1719. *Willd. Berl. Magaz.* 1803. *Wallroth* ann. bot. in tractatu de *Chara algarum* genere. *Kaulfuss Erfahrungen über das Keimen der Charen. Martius* in act. monach. *Bischoff* crypt. *Gew. I. t. 1. 2.*)

A. monosiphoniae, physeumate solitario membranaceo, vivo hyalino sequaci, nunc laevi omnino nec striato ac praeter sordes lacustres mundo, nunc papulis microscopicis undique obsito, alia physeumata lateralia conformia saepius minus regulariter verticillata exsertente; clonarius ovato-subglobosis, numero pariis, condyllo globoso superadditis.

(*Nitella Ag. Charae sine striis evidentibus Wahlenb. Ch. tubulis solitariis Mart. Chara flexilis Vaill. L. Wallr.* — Modo prolificandi, sordes suscipiendo totoque habitu ad Conservas proliferas revergunt.)

1337. *Ch. gracilis* Sm., physeumate monosiph-

nio pertenui capillari saepius (ex laticis interanei recessu) hyalino, vix nisi a basi ramosa inde constricto ibique alia physeumata lateralia verticillata numero et longitudine varia simplicia s. ultra medianam partem constricta inque alia conformia extremitates 2-3 furcata s. proli-
fero-flabellatas mentientia desinente, clonariis subglobosis
1-3 condylum conforme subjectum s. interjectum mu-
nientibus proliumve extremarum latera occupantibus.

a. epicarpa, phys. subsimplicissimo continuo magis minusve protenso, ex apice (constricto fructificationem subterminalem sustinente. — *Charae flexilis* var. *Mert.*

β. dichocarpa, phys. saepius tenerrimo, a basi ramosa inde constricto ibique alia lateralia verticillata conformia simplicia s. bi-trifurcata ad axillas fertilia exserente, clonario axillari solitario cum condylio subjecto confor-
mi. — *Ch. flexilis* *α. flabellata* *Reichenb.* in *Moessl.*
D. Fl. III. 1594. *Ch. tenuissima* *Desv. journ. II.* 313.
Lois. not. 136. *Ch. gracilis* *Sm. engl. bot. t. 2140.* *Ch. intricata* *Wolff* in *lit. Ch. hyalina* *auct.*

γ. syncarpa, phys. pertenui, a basi inde constricto ibique alia lateralia in verticillos obsoletos regularesve digestos emittente, lateralibus sive apice sive infra illum constrictis ibique ad extremitatis bi-trifurcae s. proli-
ferae alas, clonaria gemina ternave cum condylio inter-
jecto conformia traosmittentibus. — *Chara capitata*
Nees ab Esenb. in *Regensb. Denksch.* 1818. *II. t. 6.*
Meyen in *Schtdl. Linn.* 1827. *pt. 3.* *Agrdh syst.* 125.
Ch. syncarpa *Reichenb.* *l. l.*

δ. prolifera, phys. fasciculato subsimplici pertenui, a basi inde constricto ibique alia lateralia approximata brevia, ex stricturis coufertis iterum verticillata exserente habitumque torulosum mentiente, clonario exiguo cum condylio subjecto conformi. — *Ch. hyalina* *DC. gall.*
VI. 247. *Ch. congesta* *Maerkl.* in *lit. ?R. Brown.* *Ch.*
Iupulina *auct.* *Batis maritima* *Poit.* et *Turp.* in *herb.*
Mert. nec *L.* *Ch. glomerata* *Desv. pr. pr.* *Lois. not.*
136. *Reichenb.* *l. l.* *Ch. flexilis* *β. stellata* *Wallr.* *ann.*
178. *t. 6. f. 1.*

In fossis limosis et stagnis minoribus German. australis et mediae; var. α . ducat. bremens.; β . Franconiae (Wolff), agri hal. et thuring.; γ . tractus rhenan. (Nees), agri gotting., halens. (W.), berolin. (Beyrich); δ . Franconiae (Wolff), agri halens. et caroliruh. pr. Knielingen (Maerklin.)

1338. *Ch. flexilis* L., physeumate monosiphonio filari atro-virente (e latice vegetabili), a basi ramosa inde constricto ibique alia physeumata lateralia conformia verticillata numero et longitudine varia, sive continua sive medioteanus sive infra apicem constrictum in alia fructificationem munientia prolifera exserente, clavario subgloboso axillari s. subterminali.

α . *epicarpa*, phys. elongato simplicinsculo continuo s. hinc inde constricto ibique alia physeumata obsolete s. perfecte verticillata internodia subaequantia simplicissima s. simpliciter furcata sterilia s. ex apice fertilia spargente, rarius condylis stellatis hinc inde dispersis obpresso. — *Ch. opaca* Agrdh syst. 125. excl. syn. DC. *Ch. flexilis* Thuißl. par. et al. auct. *Ch. Vaillantii* Spr. in lit. — *Ch. stelligera* Bauer. Reichenb. t. l. 1595., pt. crit. icon. cent. VII. (*forma condylophora*.)

β . *dichocarpa*, physeumatibus verticillorum longius infra apicem costrictis, e latere interno alia conformia sinemque extremum subaequantia fructificationem alarem soventia exserentibus habitumque bi- trifidum mentientibus. — *Nitella flexilis* Agrdh syst. 124. *Chara flexilis* L. sp. 1624., ed. Willd. IV. 187. Poll. pal. Hoffm. germ. 122. Roth germ. I. 390. Sm. brit. I. 96. Pers. syn. II. 530. Willd. in act. berol. L. l. 89. Wallr. ann. 176. excl. syn. pl. Mart. erl. 289. — Engl. bot. t. 1703. Schmid. icon. t. 14. Schhk. Handb. III. t. 280. Bisch. cr. t. I. f. 1. — *Ch. translucens minor flexilis* Raj. Hippuris setis bifurciq Dill. Buxb. hal. 160.

γ . *acarpa*, verticillorum phys. continuis, infra apicem constrictum condylophoris. — *Ch. dioica* Wolff.

δ . *ramentacea*, verticillorum phys. continuis ex apice

ramenta in comam congesta sustinentibus. — *Hippuris setis per extremitatem stellatis* Dill.

α . *prolifera*, verticillorum physeumatibus cum primo conformibus, alia ex axillis illis breviora s. longiora, apice ramentis continuis s. plures constrictis ibique non nisi fertilibus in comam congestis coronata exserentibus, & incondito-repetitoque proliferis. — *Nitella nidifica* Agrdh syst. 125. *Ch. flexilis* β . *marina* Wahlenb. suec. II. 694.; var. *nidifica* Hart. *Ch. glomerata* Thuill. *Ch. Stenkameriana* Wallm. *Ch. intertexta* Trentep.

In stagnis, lacubus flaviisque lente fluentibus, variis German. locis haud rara, α . potissimum in aquis marinis. (*Chara stelligeram* Bauer., vix nisi condylis sparsis in ordinem quemdam et formam veluti stellatam digestis insignem, denuo non distinguo, quippe omnibus speciebus ejusmodi corpora, a *Hebentischio* ceu flores infecundati praemonita et a me primum descripta, communia.)

1339. *Ch. translucens* Pers., physeumate monosiphonio funiculari longissime protenso robusto (siccanando) tenaciore atro-virente, a basi subsimplici inde constricto ibique alia physeumata magis minusve regulariter constricta ibique (s. mediotenus s. infra s. ad ipsum spicem) ramenta brevia acuminata reliquis multo graciliora cum clonariis condylisque in comam congesta exserente. — *Nitella translucens* Agrdh syst. 124.

α . *epicephala*, phys. praeter verticillorum rudimenta incondita continuo, ex apice constricto comam ramentaceam cum fructificatione interjecta exserente eoque veluti capitato. — *Chara Chorda* Lois. *Ch. conservoides* Thuill. *Ch. translucens* Pers. enc. II. 531.

β . *syncephala*, phys. a basi inde remotissime constricto ibique alia physeumata conformia praelonga, internodia saepius excedentia continua omnino s. semel bisve constricta huc illucve comam ramentaceam capituliformem sessilem, s. physeumatis appendice juxta verticillos exserta veluti pedunculatum porrigente. — *Ch. flexilis* Thuill. par. II. 472. (qui genus proprium divinavit.)

*DC. gall. II. 586.; var. *e. translucens* Reichb. l. l. 1594.
Ch. pedunculata Agrdh syst. praef. 27. (*lusus pedunc.*
inter verticillos). *Ch. obtusa* Desv. Lois. not. 136. *Ch.*
translucens auct. Engl. bot. t. 1855. *Ch. vulgaris* f.
elongata Wallr. l. l. *Ch. corallina* Willd. act. berol. t.
 2. f. 2. *Agrdh* syst. 123. (*sp. extorris*). — *Vaill.* l. l.
 t. 3. f. 8.*

γ. prolifera, verticillorum physeumatibus cum primo
 rastro robusto conformibus praelongis subcontinuis, ex axil-
 lis alia physeumata ramentacea 2-3 constricta, in fasci-
 culos insignes aequales sessiles s. exsertos, raro fertiles
 transmittentibus. — *Ch. nidifica* auct.

In aquis stagnantibus salsis praesertim German. au-
 stralis et mediae, rarius etiam in agro halens. et bre-
 mensi intercurrens. — (NB. Specierum cum synonymis
 selectis et certis triadem modo expositam, unam ean-
 demque stirpem totidemque formas ad physeumatis mo-
 lem capillarem (*Ch. gracilis*), filarem (*Ch. flexilis*) et
 funicularem (*Ch. translucens*) praestare, testis sum, et
Ch. translucentem meam, physeumate monosiphonio lae-
 vi rarissime continuo, mole vario, plerumque a basi inde
 articulato-constricto ibique alia conformia continua in
 verticillos obsoletos perfectosque digesta emitte, clo-
 nariis ovato-subglobosis 6-8 gyrosis alaribus solitariis
 ternisve nudis, condylis globosis lateritiis illa subae-
 quantibus — insignem cum formis subscriptis, varietati-
 bus et monstris commendo.)

1340. *Ch. barbata* Meyen, physeumate monosi-
 phonio, plerumque filari, a basi inde constricto ibique alia
 physeumata regulariter verticillata, basi ramentis paten-
 tibus succincta, a media parte continua ex articulis 2-4
 superioribus intra physeumata semi-verticillata brevia clo-
 naria g. oviforme 6-8gyrosum coronula tenui tectum
 manuentia exserente. — *Chara barbata* Meyen in Schleid.
 Linn. 1827. t. 3. f. 7. 8. *Reichenb.* l. l. 1595. *Ch. in-*
tricata Maerkl. in herb. Mert.

In stagnis et fossis v. c. des Bischoffweilers pr. Er-

langam (*Macrklia*), agri hal. (*Waller*), am Plötzensee pr. Berolinum (*Meyen*). (Stirps, ni fallor, distincta, a precedentibus, physeumatibus verticillorum ad basin fasciculo minorum sustentatorum articulatis, intra alia physeumata bracteiformia, clonarium oviforme majuscum, tunica gyris 6-8 remotis inscripta et in coronulam sensim excurrente obductum, illis duplo plerumque brevius, transmittentibus.)

1341. *Ch. papulosa W.*, physeumate monosiphonio subtili ramoso undique papuloso, a basi inde articulis, inferioribus remotis, reliquis sensim magis approximatis intercepto ibique alia physeumata regalariter verticillata sena internodiis longiora, ad basin et juxta articulos iterum alia teretia spinuliformia patentia verticillata clonario sublongiora emitte, clonario ovato-subrotando extus papuloso obtuse-plicato, condylis sphaericis. — *Chara nidifica Bang.* pr. pr.

Inter Charam nidificam e mari septentrion. ejectam equidem stirpem eximiam rimatus sum, primo intuitu papulis microscopicis, omnes praeter condylia partes obtegentibus, demum, virore excusso, illas dealbantibus et physeumatibus verticillorum articulatis ibique similibus spinuliformibus obsessis, habitu prorsus horrido recognoscendam.

B. heterosiphoniae, physeumate primario polysiphonio tenuiter striato, ex articulis alia verticillata monosiphonia emitente, heterosiphonio prorsus.

1342. *Ch. coronata Ziz.*, physeumate primario polysiphonio tenuiter striato funiculari, a basi ramosa iude articulato ibique alia verticillata monosiphonia inflata ex articulis constringentibus iterum alia eaque obsoleta linearia acuminata verticillata cum internodiorum ramentis conformia emitente, clonariis oviformibus exiguis solitariis ternisve, physeumatis rudimenta bracteiformia subaequantibus. — *Chara coronata Ziz.* Bischoff er. I. t. l. f. l. (ramulus)

In fluminibus lente fluentibus agri berolin. (Beyrich),

et Germaniae mediae (Ziz). (Stirps insignis, ad formas singulas, quibus procul dubio Ch. translucentis meae more obnoxia, sedulo observanda. Internodiorum ramenta cum reliquis, tam ad verticillorum articulos, tam ad eorum basin apicemque emergentibus conformia, lusus nudos et ramentaceos saltem suadent.)

C. polysiphoniac, physeumate polysiphonio, non nisi circa tubulum interaneum s. matricalem alia gracilissima conferruminata redintegrante unumque quasi, modo subtilissime striatum, modo costatum redintegrante, plerumque dextrosum torto et ad internodiorum basin ramentaceo, alioquin mundo s. frequentius massa grumosa calcarea spurco, lateralibus verticillatis regulariter conformaterque articulatis vel ex monstri casu continuis s. inflatis (monstra inflata cum blastematis metamorphosi ad inflationem comparanda; cf. Wallr. Naturgesch. d. Flechten. II. 148.) ; clonariis ovatis oblongisque 12-15 gyrosis; condylis globosis lateritiis subjectis.

(*Charae verae* Agrdh. *Ch. tubulis compositis* auct. *Ch. composito-tubulosae* Reichenb.)

1343. *Ch. pulchella* W. mend., physeumate polysiphonio subtilissime striato plerumque gracilecente capillari s. filiformi mundo pellucido fragilissimo, a basi inde alia regulariter remoteque verticillata conformatia internodiis nudis s. ramentaceis breviora plures geniculata ibique ramenta semiverticillata acuminata brevissima emittentia exserente, clonariis ovato-subrotundis ramenta bracteiformia superantibus, corona convata tectis.

a. delicatula Desv., phys. gracillimo capillo saepius tenuiore nudo, alia conformatia rariter verticillata exserente, saepius sterilecente. — *Ch. délicatula* *β. setacea* Agrdh syst. 130. *Ch. delicatula* Desv. Lois. l. l. *Ch. aspera* Jürg. alg. XVIII. 1. pr. pr.

β. globularis Thuill., phys. capillari nudo laete-virente subsimplici protenso, ex articulis approximatis alia regulariter verticillata, e latere interno fertilia exserente. — *Ch. globularia* Thuill. par. II. 472. Pers. syn. II.

530. *Ch. gracilis* Spr. syst. IV. 345. pr. pr. et excl. syn. ad *Ch. monosiph. pertin.* *Ch. vulgaris* β. DC. gall. II. 584.; var. γ. *pulchella* Wahl. suec. II. 692. *Bruz. char.* 8. *Ch. intricata* Steudel. *Ch. pulchella* Waltr. ann. 184. t. 2. excl. syn. plur. *Ch. zeylanica* Hornem. (sp. extorris).

γ. *capillacea* Thuill., phys. protenso capillari s. filari, ex articulis remotis alia lateralia in verticillos regulares digesta internodiis longiora saepius praelonga, ex articulis fertilius exserente. — *Ch. capillacea* Thuill. l. l. Pers. syn. II. 530. DC. syn. 119. *Ch. fragilis* Desv. Lois. l. l. Reichenb. l. l. 1597. *Ch. vulgaris* Hedw. theor. t. 32. 33. Schleid. berol. II. 46. *aliorumque auct.* *Ch. Hedwigii* Agrdh l. l. pr. pr.

δ. *inflata*, phys. capillari, verticillorum ramulis sterilibus, a media inde parte parce inflatis. — *Chara capillacea* auct.

ε. *aspera* Willd., phys. capillari s. filari, saepe gracillimo, praeter ramenta internodiorum tenerrima acuta spinuliformia cum praecedentibus var. conformi, mole et proceritate vario. — *Ch. galloides* DC. cat. 93., gall. VI. 246. (1-2 dodrantalis). *Ch. canescens* Desv. Lois. not. 136. DC. VI. 246. pr. pr. (dodratalis, filaris). *Ch. aculeata* Gay in herb. *Ch. pusilla* Floerk. Dethard. in lit. (uncialis, erecta, omnium subtilissima). *Ch. aspera* Willd. l. l. 298. Wallr. ann. 186. t. 6. f. 3. Agrdh syst. 130. Reichenb. l. l. 1598. Jürg. alg. l. l. *Ch. hirta* Meyen. *Ch. hispida* a. Wahl. suec. II. 692. coque teste ipsius Linn. suec. *Ch. intertexta* Desv. Lois. (lusus tener, parcius ramentaceus). *Ch. jubata* Thuill. in herb. gall.

In aquis purioribus, nec non in stagnis salsis passim. (Linnæo forsitanum nota, a me primum nec non cum aliis formis ramentaceis, a Willdenowio et Dethardingio lectis, distincta.)

1344. *Ch. erinoides* W., physeumate polysiphonio filari membranaceo subsimplici hyalino sulcato pleram-

que mundo sequaci valde protenso, a basi inde alia physeumata lateralia 10-12 in verticillos regulares, internodio ramentis fasciculatis tenuissimis longissimis acicularibus propexis undique horrido duplo breviores digesta 6-8 articulata exserente, clonariis oblongis perpendicularibus tenuissime tunicatis, demum gyris sulcatis parce notatis, nigris, coronula 5-dentata pertenui tectis, ramentis bracteiformibus verticillatis patentibus duplo brevioribus. — *Ch. crinita* Wallr. ann. 190. t. 3. Agric. syst. 126. *Bruz. ch.* 10. 19. *Fries nov.* I. 57. II. 589. *Kaulf.* I. I. t. 1. f. 20-24. *Ch. hispida* y. *crinita* Wahlenb. succ. II. 692. *Ch. galloides* Petit in herb. Gay. *Ch. canescens* Lois. not. 139. pr. pr. Reichenb. I. l. 1599. excl. syn. *Floerk. DC. gall.* VI. 246. pr. pr. *Ch. horridula* Dethard. pr. pr.

In stagnis salsis agri hal. v. c. Koelmensi ubertim. (Wallr.) (Habitu ex ramentorum ubertate, formis ramentaceis stirpium aliarum similis omnino, at physeumate sulcato nudo, nec vix nisi sordibus adhaerentibus nec transfuscis spurco, hyalino s. stramineo sequaci plerumque subsimplici et valde protenso, ramentis fasciculatis porrectis acicularibus internodia et phys. lateralium basin obvallantibus, verticillis denis sensive remotis; clonario oblongo fere subcylindrico, tunica tenerrima obducto, sulcis s. striis duplicatis subtilissimis notato, coronula acuta pertenui tecto, ramentis bracteiformibus duplo breviore, a reliquis affatim dignoscenda. Variat physeumatis proceritate digitali s. bicubitali et verticillis multo brevioribus, fere obsletis. Ex synonymis meum vindico, reliquis certius rataque stirpis innixum diagnosis.)

1345. *Ch. vulgaris* L., physeumate polysiphonio filari ramoso tenuiter contortoque costato, raro mundo, frequentius massa calcarea obducto vel quoque inter internodia suprema ramentaceo, a basi inde alia physeumata regulariter verticillata conformia plures constricta ibique inter physeumata semiverticillata fertilia, clonario oviformi longiora articulata s. rarius continua inflata exsertente.

α. munda, phys. rite comparato mundo inter verticillos supremos saepius ramentis papillosois s. cylindricis reversis instructo. — *Ch. batrachosperma* Thuill. par. I. 473. DC. gall. II. 586. Pers. syn. II. 530. nec Weis. *Nitella batrachosperma* Agrdh syst. 126. *Ch. vulgaris* v. *viridior* Wahlenb. succ. II. 692.; β. *nuda* Sm. brit. I. 5. *Ch. flexilis* Spr. hal. 290. excl. syn. Mart. 17. *Ch. Hedwigii* Agrdh syst. 129. pr. pr. *Ch. diffusa* Wallm. apud Liljeb. *Ch. vulgaris* L. et auct. pr. pr. *Hedw. theor.* t. 34. 35. *Ch. baltica* β. *glabrata* Agrdh l. l.

β. foetida, phys. rite comparato uudique massa calcarea grumosa obducto, inter verticillos supremos nudo s. ramentaceo. — *Ch. vulgaris* L. sp. 1624., ed. Willd. IV. 183. Wallr. ann. 179. t. l. f. 1. Wahlenb. succ. II. 692. Pers. syn. II. 530. Willd. act. I. Sm. brit. I. 4. Engl. bot. t. 336. Flor. dan. t. 150. Hoffm. germ. II. 322.

γ. funicularis, phys. rite comparato, nunc nudo, nunc ramentis obsito eoque plerumque incrustato difformi fragilissimo, verticillorum physeumata internodio triplo brevioribus incurvis, nonnisi obsoletis, saepius sterilescentibus. — *Ch. funicularis* Thuill. par. l. l. Pers. l. l. *Ch. vulgaris* γ. *papillata* Wallr. ann. 183. excl. syn. *Ch. hispida montana* et *canescens* auct. (spec. *ramentacea*.)

δ. m. inflatum, phys. primario polysiphonio capillari s. filari, ex stricturis alia physeumata verticillata, praeter articulum inferiorem nonnisi fertilem, diformia inflata monosiphonia, dein complanata exserente. — *Ch. vulgaris* auct. qrd. *Ch. gracilis* et *scoparia* Maerkl. in lit. *Ch. decipiens* Desv. *Ch. batrachosperma* et *globularis* auct. qrd. *gallic*. *Ch. foliosa* Nolt. in herb. Mert. *Ch. montana* Schleich. cat. 1807. p. 10. Pers. l. l. (*lusus verticillis magis approximatis, habitum caudatum mentiens.*)

In German. aquis, var. α. purioribus, β. in stagnantibus abundat; γ. in leute fluentibus, δ. in scaturiginibus editioribus passim intercurrunt. (Physeumata praeter molem variam, aliis quoque rationibus fortuitis quidem et ad locum fideliter redeuntibus et ad formas modo l. adhibitis, habitum varium adficiunt, prout superficies man-

da (var. α) persistenter, s. tegmen calcareum induerit (var. β), vel verticillorum physeumata obsoleta tantum et veluti extremis deficientibus mutila conglomerata fuerint (var. γ), s. inter se difformia ex inflatione accedente semet informaverint.)

1346. *Ch. hispida* L., physeumate polysiphonio subramoso, plerumque funiculari corticato crasso eoque contorto magis innocuo fragili, a basi inde alia physeumata regulariter verticillata producta, internodio ramentis sparsis confertisque reversis horrido breviora, pluries constricta ibique fertilia exserente, clonariis oviformibus, coronula in limbum ovatum obtusum patentem divisa tectis, ramenta semiverticillata subaequantiibus. — *Chara hispida* L. sp. 1624., ed. Willd. IV. 185., act. berol. l. l. 87. Pers. l. l. Sm. brit. l. 5. Hoffm. germ. II. 185. Wallr. ann. 187. t. 4. Wahlenb. suec. II. 692. excl. syn. omn. et var. praeter β . Agrdh syst. 128. Reichb. l. l. 1598. Briz. ch. 9. 20. Engl. bot. t. 463. Flor. dan. t. 154. — Moris. hist. XV. t. 4. f. 9. Plukn. amalh. t. 29. f. 4.

α . *leptodermatina*, phys. molis variae, plerumque tamen funiculari glebisque calcareis usque obsito ramentisque acicularibus obsesso, ob tubulos exteriores tenuiores sulcato, internodiis superioribus horrido-ramentaceis. — *Ch. hispida* auct.; var. *major* Wallm. *Ch. horridula* auct. ipsiusq. Dethard. secundum spec. olim cum clonariis oviformibus data.

β . *pachydermatina*, phys. crasso culmi secalini molem aequante corticato contorto, praeter internodia suprema plerumque innocuo. — *C. hispida* Pers. Bisch. cr. t. l. f. 9.

γ . *m. inflatum*, phys. mole, longitudine et superficie vario, alia physeumata verticillorum, praeter articulos inferiores cum illo conformes difformia, s. monosiphonia inflata exserente.

α . *balticum*, verticillorum physeumatibus brevibus, praeter articulos inferiores 2-4, intra ramenta verticillata fertiles, in extremitates inflatas breves continuas rhoso-

siphonias steriles desinentibus. — *Ch. baltica* Fr. novit.
 289. Agrdh syst. 127. *Bruz. char. II. Ch. hispida* J.
baltica Wahlenb. suec. II. 693.

b. halense, verticillorum physeumatibus praelongis,
 praeter articulum infimum in extremitates continuas monosiphonius steriles illo decies longiorem protensis. —
Ch. vulgaris y. *elongata* Wallr. ann. 182. pr. pr. *Ch.*
tomentosa auct. qrd.

In lacubus et piscinis profundioribus totius German.
 passim. (Mole et proceritate physeumatis primarii in-
 signiter variat et lusum *majorem* et *minorem* jactat, for-
 mis l. aeque communes habitumque plane alienum inter
 se mentientes. Formas minores leptodermatinas ad *Ch.*
vulgaris var. reflectere, verum quidem, nihilosecius *Ch.*
hispida am, intermodiorum ramentis copiosis sparsis rever-
 sis longioribus, proceritate constante, clonariis oviformi-
 bus majoribus, coronula obtusa patula tectis, distingue-
 re mallem.)

1347. *Ch. ceratophylla* W., physeumate polysip-
 phonio ramosissimo funiculari sulcate contorto saepius
 suberoso rigidissimo, ramentis conicis cuspidatis papillae-
 formibus aspero, articulis nodosis intercepto ibique alia
 verticillata superne confertia conformia, ex articulis
 confertis inter ramenta brevia verticillata fertilia, facile
 inflata continua exserente, clonariis oviformibus, coronula
 5-deutata obtusa tectis, condylis subjectis insignibus
 coccineis. — *Ch. ceratophylla* Wallr. ann. 192. t. 5.
Agrdh syst. 127. *Ch. tomentosa* J. magis *conglomerata*
Wahlenb. suec. II. 693.

β. m. inflatum, phys. plerumque leptodermatino te-
 nuiter sulcato spithameo, alia verticillata praeter articu-
 lum infimum in extremitates continuas steriles monosi-
 phonias taeniatas praelongas protenso. — *Ch. tomento-*
sa L. sp. 1624. excl. syn. Fries in lit. (spec. *verticillo-*
rum articulis I-3 polysiphoniis, extremis monosiph. in-
flatis). *Agrdh* syst. 127.; var. *a.* Wahlenb. suec. L. I.
Spr. syst. IV. 345. excl. syn. Thuill. *Ch. tomentosa* β.

latifolia Reichb. I. I. 1601. Schleid. ber. I. 46. Ch. *latifolia* Willd. I. I. 299. Ch. *ceratophylla* Hornem fl. dan. t. 1656. (opt.)

In lacubus majoribus; var. α . agri hal. in den Wansleber Doemeken abundat; m. β . im Tegler See agri borol. (Willd., Schleid.); ducat. megapol. am Tollensee (Detharding, Roopert); im Schaalsee (Mertens) et aliis German. mediac locis passim. (Ramenta ramulos obsidentia et fines ramorum extremi (m. β) monosiphones habitum plurimum in exsiccatis singunt, ex quo suco Ch. latifoliae seusus incongruus ortus. Clonaria etiam in hoc plane non s. rarissime (*nuda*, *bracteis destituta*, Schleid.) occurunt et monstri casum indicant. Rami plures constricti ramentis aucti, habitum (α) alienum, foliosum, horridum et pingue fingunt.)

N.B. Charas modo traditas omnes, tum nostrates, tum quoque gallicas et sueicas in gazophylaciis Gayianis et Mertensianis ditissimis ad specimina auctorum rata digersti, nec tamen desunt aliae omissae, ex quarum numero ab Agardhio (præf. ad syst. p. 28.): *Chara firma*, *collabens*, *pilifera*, *fallax laudatae*. Ch. *ulvoiden* Beriol., Ch. *Braunianam* Gmel.; Ch. *capillarem* et *botryooiden* Krock. aliis dijudicandas et explodendas relinquo.

Algae physeumatis natura Fungis perfectiores, propagationis apparatu omnino inferiores, centrum totius regni agamici occupant ideoque tum habitu externo tum partium singularium seorsim illustratarum examine ad alteram quamque spectant et revergent quasi classem earumque similitudines affinitatis consanguineae vinculis nexus adpellant. Variae hinc apud varios auctores in contentionem venerunt species, in systemate, ut ita dicam, veluti errabundae, ab Agardhio tamen huic classi subscriptae. Muscorum primordia pseudocotyledonaria prorsus sistunt: *Protonema* Agardh syst. 43. (*Herpotrichum Fr.*) *repens*, *umbrosum* (*Confervula umbrosa* Dillw. Roth), *velutinum* (*Conf. varia* Roth. *C. velutina* Dillw.).

Byssus velutina L.., *cryptarum* (*C. cryptarum Dillw.*), *Acharit* (*C. Acharii W. et M. Roth. Dillw.*), *Orthotrichi* (*C. Orthotrichi Dillw.*), *Equiseti*, nec alia *C. frigida* auct. qrd. — *Lichenibus* a me tribnuntur: *Palmella botryoides* cen hologonidia asyntheta (cf. *Naturg. I.* 398., fl. *crypt.* *I.* 516.) ; *Nostoc commune Ag.* (*Thrombium Nostoc p. 295.*) *Lichina confinis Ag.* (*Thr. glaciale p. 297.*) *Mycinema Pulveraria Pers.* (*Epinyctis latebrarum W.*) *Scytonema byssoidicum* et *Stigonema atrovirens* (*Paramelia velutina W.*) *Fungorum regnum* dives intrant: *Byssocladium fenestrale*; *Mycinema fulvum*, *Pteridis*, et *Protonema muscicola*, (*Plegnatia*); *Chroolepus* et *Trentepohlia Ag. syst. 36.* *Syncollesia foliorum* et aliæ ejusmodi. *Amphibola* habeo vegetabilia, *Algis* tamen interim subscripta: *Leptomitum*, *Hygrocytin* et *Oscillariam*.

Praeter has vero alia restat cohors inter regnum vegetabile et animale quasi ambigens, quae a nuperis *Algis* forsau audacius reddita s. adnexa, ordinis recepti gratia, corollarii loco, brevibus tractanda est.

Corollarium.

HYGROPHYTOZOA W. Saft-Pflanzenthiere.

Corpuscula organica (*frustula Ag.*, *granula Lyngb.*, *Jürg.*, *corpuscula Dub.*, *fila Spr.*) hyalina virore vegetabili debili subacta et latice vegeto forsau foeta, habitu externo cum physenmate algarum conformiter consignata eique analoga, contextu obsolete-celluloso alieno tamen instructa, striis articuliformibus minusque jugiter cohaerentibus inscripta, inter se facillime secudentia, liberas, muco excepta, varias nonnisi satis pulchras figuræ coucinnantia (*telamones.*)

(*Algae diatomae Agrdh.* *Algarum appendix* inter *plantas* et *animalia* *ambigentia continens Dub.* *Algae amphibolae Spr. syst.* (*Ordo Sclerophytozois meis analogous.*)

A. temachina, *telamonibus asynthetis compresso-teretiusculis s. planis*, *striis articuliformibus saepe interceptis* ibique facile secendentibus, figura perquam variis.

135. RHABDIUM W.

Telamones aciculares lineares s. cuneati mucō obvoluti, in massam linearem complexi. (Frustulia Agrdh. Echinellae sp. Lyngb.)

1348. *Rh. obtusum* W., telamonibus linearibus elongatis utriusque obtusis rectangulis massam subgelatinosam fusco-viridem difformem mentientibus. — *Frustulia obtusa* Agrdh syst. I. *Echinella obtusa* Lyngb. hydr. t. 69. Jürg. alg. XIV. 10. *Diatoma scalaris* Gratel.

Ad Vaucheriam dichotomam fossarum agri jeverens. (Jürgens.)

1349. *Rh. cuneatum* W., telamonibus cuneatis minutissimis, medioteanus fascia flavente notatis, postice bidentatis, aggregatis. — *Frustulia cuneata* Agrdh syst. 2. *Echinella cuneata* Lyngb. hydr. 70. Jürg. alg. XIX. 10

Ad litora maris septentrion. Wormskoldiae Plocamie insidens. (Jürgens.)

136. TEMACHIUM W.

Telamones filares fragillimi bacillares striis transversis densis iuscripti ibique sponte inaequaliterque secedentes. (Fragilaria Ag. Lyngb.)

1350. *T. pectinale* JV., telamonibus simplicibus planis rigidis strictis fragillimis, striis transversis parallelis diametro triplo brevioribus medio pellucidis iuscriptis ibique scissilibus, caespitem lutescentem constituentibus. — *Fragilaria pectinalis* Agrdh syst. 7. Lyngb. hydr. t. 63. Jürg. alg. XVI. 4. *Nematoplaia argentea* Bory. *Diatoma pectinalis* Agrdh. Flor. dan. t. 1598. *Conferva attenuata* Mart. erl. 297. pr. pr. C. lucens Thore. C. bronchialis Roth cat. I. 186., germ. III. 520. C. clandestina Bory. C. pectinalis Müll. act. petr. Dillw. conf. t. 24. Engl. bot. t. 1611.

Ad plantas aquáticas, v. c. prope Vegesack. (Roth), insular. mar. septentr. (Jürgens.)

1351. *T. striatum* W., telamonibus filaribus attenuatis compressis flaventibus, striis parallelis densis inscriptis, septis alternatim solutis. — *Fragilaria striatula* Agrdh. syst. 7. *Conferva striatula* Jürg. alg. XI. 17.

Ad Polysiphoniam mar. septentr. (Jürgens.)

1352. *T. hyemale* W., telamonibus attenuatis antarciacis, articulis diametro divido brevioribus irregulatiter solutis fragillimis. — *Fragilaria hyemalis* Agrdh syst. 7. *Lyngb. hydr.* t. 63.

In fontibus gelidis agri halensis. (Wallr.)

137. MELOSIRA AG.

Telamones filares articulati ad genicula constricti fragillimi interque se facile secedentes.

1353. *M. numulina* Ag., telamonibus filaribus inaequalibus globulos subcirculares moniliformi-seriatos continentibus, caespites ochraceos constituentibus. — *Melosira nummuloides* Agrdh syst. 8. *Gaillonella nummuloides* Bory. Dub. gall. II. 989. *Fragilaria nummuloides* Lyngb. hydr. t. 63. *Conferva moniliformis* Jürg. alg. I. 7. excl. syn. *C. nummuloides* Engl. bot. t. 2287. nec Dillw.

Ad culmos Poae maritimae in fossis insulae Norderney. (Jürgens.)

1354. *M. moniliformis* Ag., telamonibus filaribus articulis ellipticis diametro sesquilonioribus linea transversali notatis interceptis, caespitem fuscescentem constituentibus. — *Melosira moniliformis* Agrdh l. l. *Conferva inflexa* Roth germ. III. 527. *Conf. moniliformis* Müll. Web. et *M. Flor.* dan. t. 1548. f. 1. nec Jürg.

In similibus cum praeced. locis.

1355. *M. Jürgensii* Ag., telamonibus fuscescentibus, geniculis contractis articulis, estriatis diametro sesquilonioribus. — *Agrdh* syst. 9. *Conferva lineata* Jürg. alg. V. 10.

In fossis submarinis insulae Norderney. (Jürgens.)

138. DESMIDIUM AG.

Telamones filares transversim densissime striati mucosoi flexiles virentes in articulos semisoluti, figuram pinnatifidam (tunc) veluti mentientes.

1356. *D. Swartzii* Ag., telamonibus stria longitudinali viridi notatis, articulis bidentatis, post copulationem figuram pinnatifidam mentientibus. — *Desmidium Sw. Agrdh syst. 9. Conferva dissiliens Engl. bot. t. 2464. ?Jürg. alg. XVI. 6. Diatoma Swartzii Ag. Sw. bot. t. 491. Lyngb. hydroph. t. 61.*

In aquis quietis agri jever. (Jürgens.)

139. DIATOMA DC.

Telamones articulati hyalinii rigidi compressi deinceps in frustula angulata s. polymorpha, angulis alternis hinc cohaerentia secundentes.

† *hydrophila, aquarum dulcium.*

1357. *D. tenue* Ag., telamonibus compressis intricatis laevibus non striatis utrinque dilatatis hyalinis, articulorum angulis alternatim cohaerentibus diametro triplo brevioribus. — *Diatoma tenue Agrdh syst. 4. Sw. bot. t. 491. ?Lyngb. hydr. t. 61. D. vulgare Bory. Conferva flocculosa Fl. dan. t. 1487.*

In aquis quietis agri hal. passim.

1358. *D. flocculosum* Ag., telamonibus compressis intricatis flexuosis, articulis diametro subaequibus striatis, striis plurimis (5-10) parallelis longitudine aequalibus centrum non attingentibus dupliceque lineam verticalem veluti mentientibus. — *Diatoma flocculosum Agrdh syst. 4. Lyngb. hydroph. t. 61. Conferva flocculosa Roth cat. I. t. 4. f. 4. Dillw. conf. t. 28. Engl. bot. t. 1761. C. rhomboidalis Bory.*

In aquis stagnantibus Thuring. passim.

†† *halophilae, aquarum marinorum.*

1359. *D. marinum* Lyngb., telamonibus compres-

sis intricatissimis flexuosis, articulis diametro sesquilegioribus, striis 2 s. 1 parallelis centrum non attingentibus notatis. — *Diatoma marinum* Lyngb. hydroph. t. 62. Agrdh syst. 5. Jürg. alg. XIX. 9. *D. flocculosum* DC. gall. II. 49. excl. syn. *D. daunicum* Bory. *Conferva taeniaeformis* Engl. bot. t. 1883. Jürg. alg. VI. 8.

Ad litora insularum Norderney et Wangeroog. (Jürgens.)

1360. *D. Biddulphi anum* Ag., telamonibus simplicibus compressis longitudinaliter striatis viridulis, articulis solutis quadratis transversim fasciatis subalternatione refractis. — *Diatoma Bidd.* Agrdh syst. 5. *Conferva Biddulphiana* Engl. bot. t. 1762. Jürg. alg. X. 9.
In iisdem cum praeced. locis. (Jürgens.)

1361. *D. arcuatum* Lyngb., telamonibus compressis teneris rigidis arcuatim diametro aequalibus, striis parallelis numerosissimis undique inscriptis. — *Diatoma arcuatum* Lyngb. hydroph. t. 62. Flor. dan. t. 1593. f. 2. *D. striatum* Agrdh syst. 6. *D. rigidum* DC. I. 1. *Conferva striatula* Jürg. alg. XIX. 6. vix differt.

Ad litora maris septentrionalis.

1362. *D. fenestratum* Lyngb., telamonibus planis strictis flaventibus, articulis diametro quadruplo longioribus, centro fascia transversali notatis, demum solutis. — *Diatoma fenestratum* Lyngb. hydroph. t. 61. Jürg. alg. XII. 8. Agrdh syst. 5.

Ad Ulvam compressam maris septentr. (Jürgens.)

1363. *D. unipunctatum* Ag., telamonibus transversim striatis compressis ferrugineis, articulis diametrum subaequantibus centro puncto rosaceo pellucido notatis. — *Diatoma unipunct.* Agrdh I. 1. 6. *Achnanthes unipunctata* Grev. cr. t. 287. *Fragilaria unipunct.* Lyngb. t. 62.
Ad litora maris septentr.

1364. *D. obliquatum* Lyngb., telamonibus sub-simplicibus planis caespitosis fuscescentibus, articulis planis caespitosis fuscescentibus, articulis diametro sesquilongioribus obliquis fascia transversali punctoque no-

tatis. — *Diatoma obliquatum* Agrdh syst. 6. Lyngb. hydraph. t. 62. Jürg. alg. XIII. 7. *Conserva obliquata* Engl. bot. t. 1889.

Ad litora insulae Norderney. (Jürgens.)

1365. *D. Lyngbyei* Ag., telamonibus simplicibus intricatissimis latescentibus, articulis diametro triplo longioribus. Agrdh syst. 4. *Diatoma tenue* β. *marinum* Lyngb. t. 61. Jürg. alg. XIV. 9.

In praecedentis consortio. (Jürgens.)

1366. *fasciculatum* Ag., telamonibus simplicibus linearibus aggregatis strictis rigidis fastigiatis, e basi communi radiatum excurrentibus. — *Diatoma fasciculatum* Agrdh. Sw. bot. t. 491., syst. 3. *Echinella fasciculata* Jürg. alg. XI. 8. excl. syn.

Ad litora maris septentr. (Jürgens.)

140. ACHNANTHES BORY.

Telamones plani simplices articulati subquadrati, articulis linearibus incurvis 1-6 cohaerentibus obtusis, hinc in basin productis stipitiformem, vexilliformes.

1367. *A. brevipes* Ag., articulis bipunctatis, basi stipitiformi brevissima. Ach. syst. I. *Achn. adnata*, dubia et *bacillarioides* Bory. *Echinella stipitata* Lyngb. hyd. t. 70. Jürg. alg. XIII. 8.

Ad litora insul. Frisiae. (Jürgens.)

1368. *A. longipes* Ag., articulis unipunctatis, basi stipitiformi productiore. Agrdh syst. I. *Diatoma Vexillum* Jürg. alg. VI. 6. *Conserva stipitata* Engl. bot. t. 2488. *C. armillaris* Müll. act. holm. 1783. t. 3.

Ad litora insul. Wangeroge. (Jürgens.)

B. placentaria, telamonibus compositis, synthesin varie figurata constituantibus.

141. ECHINELLA ACH.

Gelatina subglobosa hyalina, telamonibus ellipticis radiantibus farcta. Agrdh nec alior.

1369. *E. Acharii Ag.*, telamonibus cylindricis.
Agrdh syst. I5. Echinella radiosa Ach.
In lacubus Thuringiae.

142. MERIDION AG.

Telamones cuneati s. ovati in laminas planas aggregati, mucro obvoluti.

1370. *M. vernale Ag.*, telamonibus cuneatis, in semicirculum conjunctis massamque flaventem ovato-clavatam duriusculam fluitantem constituentibus. — *Meridion vernale Agrdh syst. 2. Echinella olivacea Lyngb. hydr. t. 70. Jürg. alg. XVI. 9. Ulva olivacea Flor. dan. t. 1429.*

In fossis ad culmos putres.

143. ENCOELIUM AG.

Telamones compositi tubulosi punctati penicillisque obsessi, tenuiter membranacei, reticulati.

1371. *E. echinatum Ag.*, telamonibus funicularibus subincrassatis s. inflatis continuis teretibus fuscis, undique verrucis atris papilloso, dein in penicilos diaphanos solutis obsitis. — *Encoelium echinatum Agrdh syst. 261. Asperococcus rugosus et bullatus Lamour. Dub. gall. II. 956. Ulva Turneri Mort. Jürg. alg. XIX. 2. Engl. bot. t. 2570. U. rugosa DC. gall. II. 8. nec Linu. Gastridium Opuntia Lyngb. hydr. t. 18.*

Ad litora ins. Norderney ad Fucum nodosum. (Jürgens.) (Naturam vegetabilem fabrica renuit, quod cum *Anadyomene* genere, melius hue militare videtur.) (Cetera, *Gloionema* v. c. *Agardhio* auctore, gelatina filiformi tenaci corpusculis ellipticis longitudinaliter seriatis farcta insigne, et *Alcyonidium*, *Agardhio* monente, fronde spongiosa succosa lobata granulis repleta, distinctum, (*Ulva diaphana* Flor. dan. t. 1245. Jürg. alg. III. 3.), *Badiagam* Schwab. Spr. ipsumque *Codium*, ab auctoribus receptum relinquo, dum haec jam nimis amphibola videantur.)

*Classis VI.***F U N G I L. S c h w ä m m e.**

(Mycetes Spr.)

Vegetabilia simplicissima, multiformia, tum a classium praecedentium natalitiis, fabrica et morphosi alienigena, tum inter se iisdem plane rationibus ipsoque habitu ordinum singulorum perquam vario haud mediocreter descentia, ex Naturae, rudem inconditamque materiem ad umbram qualemcumque vegetabilem informandam addiscens, machinatione audaciore, contextus simplicissimi synthesinve laxam constipantis ope ad typum mycetoideum, vix nisi clanculo ultimas classes appellantem, rite exarata concinneque saepius figurata, neque vitae et locorum natalium conditione vel morphoseos ratione, figuræ et colorum amoenitate, neque etiam virore vegeto, herbaceis illis ocalorum laetitiis, neque ectypo vegetabili et odore sueto sed proprio illo mucido et mycetoideo inclarescens, plurima vilia omnino habitu ac abjecta, quaedam sat speciosa, eaque neque ab usu domestico (*μυκήτης βρώσιμοι* Diosc.) neque a noxarum suspicione (*μ. φθάρτικος* Diosc.) aliena, omnia vero ordine partium concentuque magnifica, scotophila, a sole et aqua refugientia nec ex hac denuo reviviscentia, fermentationis acetosae et vinae vel putredinis ineuntis pedisequa, iisque faventibus sive ex mutua cubilium cum Natura genetrice relatione jam sponte quasi propullulantia, jam ex mycelio, pseudocotyloeo aum analogo, Iove pluvio s. udore tepido auctum-nali intrantibus nascentia, partes elementares globulosas et filamentoso-arachnoideas ad stroma asyntheticum a. syntheticum, particularum propagationi inservientium apparatus varium (*sporidia* et *asci* auct., *farina fungorum*

*L.) nudum s. diversimode reconditum illico paratus concinnantia. Stroma, cormi para analoga, (*stroma et thallus Lk.*) mere-simpliciter-laxeque cellulosum partiumque elementarium et propagationi inservientium, illico succrescentium connubium ad morphosin typicam informandam adhibens, vel ex ipsis cubilibus inde mutatis mutuans totidemque cum singulis desflexibus ordines perpetrans, nunc videlicet ex cellulis meris compositum (*pseudostroma*) et partibus quibuscumque propagationem spondentibus, saltem non perspicuis destitutum (*Asporomycetes*), nunc ex cubilibus penitus inversis (*pseudosporidochium*), vel ex substantia propria in conceptaculi distincti figuram concinnatum (*sporidochium*) sporidiisque liberis nec adminiculis alienis sustentatis foetum (*Sporomycetes*), nunc ex cellulis fistulosis arachnoideis simplicibus constipatisve plerumque hyalinis (*hypha*), varie dispositis conflatum (*hyphasma*) similibusque particulis, alter tamen figuratis, magis minusve jugiter appensis instructum (*Hymenomycetes*), nunc ex massa fluxa amorphha ocius exarescens vasculorumque adnatorum s. tornatorum saepius stipitatorum instar emergens (*peridium*) sporidiisque illico in sarcimen pulveraceum, floccis stuposis appensis foetum (*Myxomycetes*), nunc vero in tuberculorum verruciformiam membranaceorum s. carnosorum diversimode et cum ordine quodam reclusorum, sive cubilibus ipsis sive strato proprio innatorum figuram exaratum (*peritheciun*), nucleo sporuligero vario, primum pulposo dein saepius ex poro promanante s. ex ore recluso projecto foetum coque emissu vacuum omnino (*Pyrenomycetes*), nunc denique veluti strata satis varie, at cum typo mycetoideo congruenter figurata (*stroma proprie sic dictum*), sive pulposa nonnisi amorphha (*coleostromatici*), sive cyathiformia (*cyathostromatici*), sive elongata, in clavae, arbusculae, phalli mitrulaeve figuram concinnata (*corynestromatici*), sive magis dilatata inque pileum rotundatum dimidiataque, lamellis subtus, poris dentibusque instructum (*pilostromatici*) ibique membranula distincta ascophora (*hymenium*) s. ascis linearibus*

foeta vestitum (*Hymenomycetes*) praestans partiumque plurium multiplicatione praecelleens.

(*Muxijtης* *Diosc.* *Mycetes* *Spr.* *Wallr.* *Fungi* *Plin.* *Linn.* et *auct.* — *Mucedineae* *Brong.* *Dub.* *Hyphomycetes* *Lk.* *Coniomycetes* et *Byssaceac* *Fr.* — *Uredineac* *Dub.* *Gymnomyctes* *Lk.* *Coniomycetes* *Fr.* pr. pr. — *Lycoperdaceae* *Dub.* *Angiocarpi* *Pers.* *Gastromycet* *Lk.* *Gasteromycetes* *Fr.* — *Hypoxyla* *DC.* *Dub.* *Xylomycet* *Willd.* *Pyrenomycetes* *Fr.* — *Hymenomycetes* *Fr.* *Fungi* *Brong.* *Dub.*) — Prisci *Aristotele*, *Theophrasto*, *Diocoride*, *Plinio* aliisque auctoribus praecentibus, *Mycetes* vegetabilibus, quorum radios praestant, succensuere; *C. Bauhinus* pro pituita corporum putrescentium mala ac superflua habuit; *Huellius* originem sementivam eorum defendit; naturam animaliem prohibere praeter mediae aetatis scriptores, *Linnaeus* olim (*dissert. mundum invisibilem delincatura. Holm. 1767.*), *Büttner*, *Otto de Münchhausen et Weis*, ipseque *O. Fr. Müller* in *Pyrenomyctum* palpaco ecphora, animalcula s. *Zoophytorum* naturam enucleavit. — *Linnacus* *Mycetes* flocci habuit, nec cum *Algis* regni quisquiliis vegetabilis appellare erubuit; *Persoonius* primas ad ordinem systematicum duxit lineas; *Linkius*, *Neesius*, *Kunzeus* cum additamentis eximiis expoliverunt et *Friesius* denique ó náv in opere palmario emendavit.)

Ordo I.

ASPOROMYCETES W. Zellenpilze.

Vegetabilia quoad fabricam et genesis simplicissima, prima vegetationis mycetoidese initia ejusque syntheseos primordia, mycelio destituta, sponte quasi sive ex fabrica foliorum inversa sive ex putredinis ineuntis temperie mala succrescentia, jam amorpha plae, jam figuram tornatam adhucientia cumque aliis perfectionibus configurata, saepius cryptophila, perirrhiza vel entocaula, ordinum sequentium prototypi eorumque rudimenta cellulosa ste-

rilia spondentia, nunc globulorum morphosi praevalente fere solum ex cellularum, parenchyma cubilium, quadantes referentium et immutatarum congerie homogene constipata, vel sub corpusculorum figuratorum magis forma subeuntia (*pseudostroma*), colore vario saepius stygio insignia, nunc morphosi fibrarum s. fistularum praevale ante ex filis arachnoideis fistulosis simplicibus omnino, sive corticem circumducentibus continuis s. disseptis (*rhabdii*) composita, praepter sporangiorum rudimenta, sporidiis veris saltem discretis et propagationi iuservientibus egena s. aspora plane vel partes solum analogas (*appendices sporomorphas*) proferentia.

(*Hyphomycetes trichoidei et membranacei Lk. syst. Mucedines asporae Lk. ord. Hyphomycetes phyllophoraceae et hymenotrichi Fr. Inomycetes terrestres Nees. Trichomyces et Byssi fibrillaeformes Pers. myc. Fungi gymnocarpi filamentosi DC. F. nematothecii byssoides Pers. syn. Hymenomycetes sclerotiae Fr. Lycoperdaceae sclerotiae Dub.* — (Ordo dubius ob partium sporomorpharum defectum, aliorum vegetabilium forsas primordia s. monstra, ex nisu vegetationis inverso succrescentia habitumque proprium fideliter concinnautia.)

A. gongromorphi, rhabdis fistulosis epiphyllinis s. pseudostromatibus compactis epiphloeoideis, cellularum et parenchymatis vegetabilium perfectiorum veluti excrementis (οἱ γόγγοι), sub forma typica varie succrescentibus habitumque pro varia configurationis globulosa s. fistulosac ratione diversissimum concinnantibus.
— Vegetationis mycetoideae symbola elementaria.

⊖ *trichomorphi*, (*trichomata*), *rhabdis epiphyllinis fistulosis continuis, figura et colore variis, intus massa grumosa farctis eaque absorpta hyalinis, ex foliorum vivorum epidermide male succrescentibus.* (*Hyphomycetes phyllophoraceae Fr. Mucedineae phyllophoraceae Dub.* — Status morbosi vestitus plantarum, *Fr. myc.* Foliorum veluti excrements, nec tamen a typo proprio aliena.

144. ERINEUM PERS. Blattfaser.

Rhabdi (*flocci Lk., Hz., fibrae Mart., filamenta Dub.*) simplicissimi continui cylindrici diaphani tenuiter membranacei obscure cellulosi, inter figuram clavatam, turbinatam et filarem varii, massa grumosa (cum sporiis forsitan analoga sive ad latera (pilorum instar) coacta sive diffusa) farcti eaque excussa hyalini utriculares, in areas caespitosas congesti.

(*Phyllerium. Taphria et Erincum Fr. obs. Erineum Pers. Kunze in mykol. Heft. II. 133 - 176. Schlechten-dal: die Gattung Erineum, in Denkschrift der Regensb. bot. Gesellsch. Tom. III. et seorsim impress. Ratisb. 1821.) Grevill. in edinburg. Journ. XI. 71.*

† *taphria, rhabdis granuliformibus, minutie et figura ovoidea desciscentibus, aream mellitam serico veluti obductam perficientibus. — Partium mellitarum et resinacearum transfigurationes mycetoideae.*

1372. *E. aureum Pers.*, hypo-, rarius epigenum, rhabdis simplicissimis minutissimis ovato-clavatis pallide-flaventibus areclam circumscripatam impressam, hinc bullatum prominulam occupantibus faciemque tenuiter velutinam aureo-flaventem mentientibus. — *Taphria populi* Fr. obs. I. 217. t. 8. f. 3. *Erineum populinum* Schum. *E. aureum* Pers. syn. 700., mycol. I. 8. Kunz. l. l. 133. Dub. gall. II. 913. DC. gall. VI. 14. Grev. l. l. crypt. t. 13. Alb. et Schw. nisk. 371. — *Malpigh. de extrem. et tumor.* t. 22. f. 78.

Ad utramque Populi tremulae foliorum faciem, frequenter tamen inferiorem, vulgare. Aestate.

1373. *E. gryseum Pers.*, hypogaeum, rhabdis microscopis e figura subglobosa clavatis numerosissimis pallide rubentibus dein expallentibus, aream impressam latescenti-rotundatam constipantibus faciemque sericeam mentientibus. — *Erineum griseum* Pers. mycol. I. 8. excl. syn. Kunz. l. l. 115. Dub. gall. II. 912. *E. minutissimum* Grev. l. l. 81. *Taphria quercina* Schmidt in lit.

Ad foliorum Quercus faciem inferiorem rarius, praesertim in German. australis tractibus.

1374. *E. badium* Kunz., hypogenum, rhabdis minutissimis oviformi-clavatis, aream subaequalem pustulaeformem subgrumosam badiam occupantibus. *Erineum badium* Kunz. I. l. 135. *Taphria alnea* Schmidt in lit.

Ad foliorum Alni glutinosae paginam inferiorem, v. c. Lusatiae super. (Schmidt.)

† grumaria, rhabdis abbreviatis difformibus magisque depressis et a figura filari alienis, capitato-clavatis, aream grumosam mentientibus. (Rubigo Lk. Mart. Fr. nec priscor. — Cellularum deformatio-nes.

1375. *E. Oxyacanthae* Pers., amphigenum, rhabdis brevissimis ovato-capitatis subclavatis, primum sparsia pallidis, dein confertis integrangue folii faciem obliterantibus, fuscescentibus. — *Erineum clandestinum* Grev. I. l. 76. t. 2., crypt. 141. f. 2. Kunz. I. l. 144. Dub. gall. 912. *E. oxyacanthae* Pers. mycol. I. 7.

Ad utramque foliorum Crataegi Oxyacanthae et monogynae faciem passim.

1376. *E. nervisequum* Kunz., epigenum, rhabdis tenuibus clavaeformibus pallide-roseis, vittas lineares superficiales cum nervis facie superioris utrinque parallelas a. nervisequas farinaceo-grumosas tennes demum pallidas constituentibus. — *Erineum nervisequum* Kunz. I. l. 143. Link sp. II. 159. Pers. mycol. I. 7. Dub. gall. II. 912.

Ad foliorum Fagi sylvaticae juniorum paginam superiorem, v. c. Lusatiae super. (Schmidt), Thuring. et Hercyn. infer. et aliis locis passim, primo vere.

1377. *E. Padi* Duv., hypophyllum, rhabdis effusis superficialibus dense grumosis, primum ex albido rubellis, dein aurantiacis, demum spadiceo-umbrais, irregulatiter cyathiformibus. *Erineum Padi* Duv. Rebent. ind.

berol. 39. *Kunz.* l. l. 144. *Schltd.* erl. 93. *E. padinum* Fr. obs. I. 322. *Rubigo Padi* Mart. erl. 348.

Ad Pruni Padi foliorum paginam inferior. passim. Aestate.

1378. *E. purpurascens* Gaertn., hypogenum, rhabdis infundibuliformibus, primum pallidis, areas subimmersas circumscriptas occupantibus, dein confluentibus rufescenti-tabacinis omnemque paginam obliterantibus. — *Erineum purpurascens* Gaertn. in Roehl. germ. II. 357. *Kunz.* l. l. 137. *Link* sp. II. 161. *Dub. gall.* II. 912. *E. agariciforme* Grev. l. l. 80. t. 3. f. 14. *E. acerinum* Schum. Rebent. DC. Schltd. nec Pers. *Rubigo acerina* Link obs. I. 22. f. 36. Mart. erl. 348.

Ad Aceris campestris et platanoidis foliorum faciem aversam satis frequens.

1379. *E. fagineum* Pers., hypogenum, rhabdis difformibus turbinato - clavatis, primum albidis in areas ovato-subrotundas parce immersas digestis, dein confluentibus ferrugineo-spadiceis spatiumque internervium contractum obliterantibus. — *Erincum fagineum* Pers. obs. II. 102., syn. 700., mycol. I. 8. *Kunz.* l. l. 141. *Link* sp. II. 158. *Grev.* l. l. t. 3. f. 10., crypt. t. 250. f. 1. DC. gall. II. 592. cum var. *pallida* et *purpurea*, *Fago sylv. purpureae propria*. *Rubigo faginea* Nees syst. 64. t. 5. f. 10. Mart. l. l. *Erineum lacteum* Fr. obs. II. 371.

Ad foliorum Fagorum nostratum paginam inferiorem, primo vere minime rarum.

1380. *E. alneum* Pers., hypogenum, rhabdis primum simplicibus albidis dein subdivis, apicem versus tubercula capituliformia sustinentibus, in basin brevem crassiusculam tenuatis, areas irregulares confluentes internervias parce immersas praestantibus. — *Erineum alneum* Pers. syn. 701., mycol. I. 7. *Kunz.* l. l. 146. *Link* sp. II. 157. Fr. obs. I. 223. *Grev.* l. l. 77. t. 2. f. 7.; crypt. t. 157. f. 2. *Dub. gall.* 911. *Rubigo alnea* Link obs. I. 22. Nees syst. 64. f. 63. B. Mart. erl. 348. *Mucor ferrugineus* Bull. herb. t. 514. excl. syn.

Ad foliorum Alni glutinosae faciem aversam auctumno vulgare, pro varia aetate tamen habitum et colorem varium induens.

1381. *E. platanoidis* Fr., hypogenum, rhabdis globoso-cyathiformibus cupulatisve in basi stipitiformem brevem tenuatis, primum pallidis dein rufescentibus demum nitido-spadiceis, in areas axillares internerviasque tenues aquales demum effusas digestis. — *Erineum platanoidis* Spr. syst. IV. 560. *E. platanoides* Fr. obs. I. 224. Kunz. l. l. 139. Dub. gall. II. 911. Link sp. II. 156. *E. curtum* Grev. l. l. 80. t. 3. f. 3.

Ad foliorum Aceris platanoidis faciem inferiorem passim.

1382. *E. betulinum* Schum., hypogenum, rhabdis difformibus clavatis turbinateis infundibuliformibusque, nonnisi subbicornibus, primum albidis dein ferrugineis, in basi stipitiformem productis, areas maculaeformes dispersas informantibus. — *Erineum betulinum* Schum. saell. II. 445. Kunz. l. l. 149. Dub. gall. II. 911. Fr. obs. I. 221. Link sp. II. 155. Grev. l. l. 79. t. 3. f. 16. acc DC. et alior. *Rubigo betulina* Link obs. I. 22.

Ad Betulae albae paginam inferiorem haud adeo rarum. Aestate.

1383. *E. roseum* Schultz, epigenum, rhabdis difformibus, e basi stipitiformi brevi clavatis apice depresso discum truncato-scutellarem s. subinfundibuliformem recludentibus, primum roseis dein fusco-purpureis, pulvinos gramosos elevatos sparsos effusos praestantibus. — *Erineum roseum* Schultz starg. 506. Schilt. erin. 21. Kunz. l. l. 150. Link sp. II. 155. Dub. gall. II. 911. *E. purpureum* Fr. obs. I. 221. *E. betulinum* Alb. et Schw. nissk. 370. et alior. *E. Betulae* DC. gall. VI. 14. Grev. l. l. 77. t. 3. f. 9., crypt. t. 21. *Robigo rosea* Link obs. I. 20.

Ad folia Betulae fruticosae epigenum minime rarum.

1384. *E. populinum* Pers., amphigenum, rhabdis obesis difformibus opacis, e basi stipitiformi crassa capitulum irregulare erosio-crenulatum sustinentibus, primum pallidis sparsis superficialibus effusis dein rufescenti-spadiceis congestis, aream maculaeformem saccatam hinc bullatam iuinformantibus. — *Erineum populinum* Pers. obs. I. 100., syn. 700., mycol. I. 7. Kunz. I. l. 147. Link sp. II. 157. Grev. I. l. t. 3. f. 11., crypt. t. 250. f. 2. Dub. gall. II. 911. *E. aureum* Schum. *Rubigo populina* Mart. erl. 348.

Ad Populi tremulae folia amphigenum, nonnisi tamen etiam epigenum, minime rara.

+++ *phylleria*, *rhabdis filiformibus fistulosis simplicibus productionibus magisque tortis, pulvinulos piliformes mentientibus.* (*Phyllerium* Fr. I. l.) Pilorum configurationes mycetoideae.

1385. *E. salicinum* W., hypogenum, rhabdis sub-solitariis rectis cylindricis capillaribus fistulosis, e sensim in apicem acuminatum tenuatis simplicissimis utrinque stria saturatiore lineatis ferrugineis demum hyaluis, dispersis, faciem parce pilosam mentientibus. — *Erineum salicinum* Wallr. in lit.

Ad folia Salicis babylonicae hort. berolin. hypogenum. (Satis singulare ob rhabdos undique dispersos nec ad aream congestos. Comparandum cum *Dématio salicino* Pers. syn. 699.)

1386. *E. tiliaceum* Pers., amphigenum, rhabdis fistulosis cylindricis conformibus apice recurvatis obtusis pallidis demum roseis fuscescentibusque, in pulvinos undique dispersos depresso s. nervisequos jugiter condensatis.

a. *sparsum*, pulvinulis sparsis. — *Erineum tiliaceum* Pers. obs. I. 25., syn. 700., mycol. I. 3. Kunz. I. l. 153. Link sp. II. 146. Nees syst. 63. f. 62. Mart. erl. 346. Grev. I. l. t. 3. f. 11. Dub. gall. II. 909. *Phyllerium tiliaceum* Fr. obs. I. 219.

S. nervisequum, pulvinulis nervisequis. — *Erineum nervale* Kunz. l. l. 154.

Ad Tiliarum nostratum amphigenum, tum sparsum, tum nervisequum vulgare.

1387. *E. ilicinum DC.*, hypogenum, rhabdis filiformibus tortis apice tenuatis, primum albido dein fusco-spadiceis, in pulvinos convexiusculos rotundo, aversam folii partem bullatum elevantes congestis. — *Erineum ilicinum DC. gall. VI. 14. Grev. l. l. t. 2. f. 5. Pers. mycol. I. 4. Kunz. l. l. 160. Link sp. II. 148. Phyllerium dryinum Schldt. erin. 13.*

Ad folia Quercas Ilicis hypogenum, maxime in German. austral., nec non vero in hort. berolin. cultarum.

1388. *E. purpureum DC.*, amphigenum, rhabdis cylindricis tortuosis intricatis apice obtusiusculis attenuatis, primum ex albido-roseis dein purpurascenscentibus diaphanis, areas maculares superficiales circumscriptas praestantibus. — *Erineum purpureum DC. gall. VI. 15. Kunz. l. l. 159. Dub. gall. II. 910. E. semidophilum Schldt. erin. 18.*

Ad Betulae albae et ovatae epigenum vel amphigenum, rarius.

1389. *E. Pseudo-Platani Kunz.*, hypogenum, rhabdis cylindrico-clavatis flexuosis intricatis, primum albis dein spadiceo-umbrinis, areas circumscriptas immersas intertextas perficientibus. — *Erineum Pseudo-Platani Kunz. l. l. 165. Pers. mycol. I. 5. Link sp. II. 150. Dub. gall. II. 910. E. acerinum DC. gall. Grev. l. l. 78. t. 2. f. 8. Phyllerium Pseudo-Platani auct. Ph. sphendamnum Schldt. erin. 28.*

Ad folia Aceris Pseudo-Platani hypogenum, ubertim.

1390. *E. acerinum Pers.*, amphigenum, rhabdis cylindricis intricatis apice subaduncis, primum albo-cinerascentibus demum rubiginosis, pulvinos effusos crassos subimmersos dense contextos constituentibus. — *Erineum acerinum Pers. syn. 700., mycol. I. 6. Link sp. II. 150.*

Kunz. L. l. 163. Dub. gall. II. 910. E. platanoides Pers. mycol. I. 5. Phyllerium acerinum Fr. obs. I. 218. Schld. erin. 17. nec DC.

Ad folia Aceris platanoidis et Pseudo-Platani amphigenum, minime raram.

1391. *E. pyrinum Pers.*, amphigenum, rhabdis flexuoso-tortuosis utrinque aequalibus obtusis diaphanis superficialibus internerviis, primum pallide-rubetibus cylindricis, demum ligamentosis spadicco-ferrugineis, non-nisi integrum paginam obliterantibus. — *Erineum pyrinum Pers. syn. 700., mycol. I. 4. Link sp. II. 149. Mart. erl. 341. Kunz. l. l. 156. Grev. crypt. t. 5. f. 2. E. malinum DC. encycl. Phyllerium pyrinum Fr. obs. I. 219. Schld. erin. 15.*

Ad folia Pyri Mali sylvestris s. Mali acerbae Mer. hypogenum, rarius epigenum.

1392. *E. Sorbi Kunz.*, amphigenum, rhabdis cylindricis, e basi tenuata sensim in apicem falcatum obtusum desinentibus, primum dilute-roseis dein fulvo-ferrugineis nitidis, in areas effusas superficiales digestis. — *Erineum Sorbi Kunz. L. l. 159. Link sp. II. 154. Grev. cr. t. 263. f. 1. E. sorbeum Pers. mycol. I. 4. excl. syn. Fr. Dub. gall. II. 911.*

Ad utramque foliorum Sorbi Aucupariae paginam passim.

1393. *E. Vitis Duv.*, hypogenum, rhabdis cylindricis protensis subsimplicibus flaccidis, apice obtusis, pulvinos circumscriptos, aversam folii partem bullatim elevantes, dein confluentes praestantibus, primum dilute roseis dein fuscis denique spadiceo-ferrugineis iisque non-nisi alternatim compressis, veluti articulato-septatis. — *Erineum Vitis Duv. in DC. gall. II. 74. Mart. erl. 346. Grev. l. l. 71. t. 2. f. 3. Kunz. l. l. 161. Link sp. II. 151. Pers. mycol. I. 4. Phyllerium Vitis Fr. obs. I. 219. Schld. l. l. 19.*

Ad Vitis viniferae sylvestris folia hypogenum, rarissime epigenum. (Color pro aetate varius; rhabdorum stricturae transitum ad Plegmatium edunt.)

1394. *E. Juglandis DC.*, hypogenum, rhabdis tenuibus erectiusculis cylindricis in apicem sensim tenuatis albidis, in pulvinos internervios subquadratos obesos hincque bullas rugosas elevantes constipatis. — *Erineum Juglandis Schleich.* in *DC. gall. VI.* 15. *Pers. mycol. I.* 2. *Kunz. l. l.* 170. *Link sp. II.* 147. *Grev. crypt. t.* 263. *f. 2.* *E. subulatum Grev. l. l.* 75. *t. 2. f. 4.* *E. juglandinum Fr. obs. I.* 218. *Schltd. erin.* 12.

Ad folia *Juglandis regiae* hypogenum, variis German. et Thuring. locis, minime rarum. (Rhabdi, pilis axillas nervorum e natura obsidentibus satis similes, nec habitu externo et fabrica interna ab illis plane diversi, mire tamen contexti itaque constipati, ut parenchyma folii oblitterautes spatiumque internervium transversim occupare pulvinulosque subquadratos elevatos formare videantur. Qnod cum ita sit quumque pilorum transfiguratio in his Erineis formandis plane non denegari possit, aliae ejusdem generis species: *Erineum v. c. coryleum Pers. mycol. I.* 3.; *E. Rubi Fr. obs. II.* 371.; *E. Khamni Pers. l. l.*; *Phyllerium Gei Fr. l. l.* *E. mespilinum DC.*, *E. Hyperici Pers.* et *E. atriplicinum Nestl.*, rhabdis septatis aequalibus obtusis albidis, in caespites limitatos (in *Atriplice hortensi*) hypogenos insigne, in contentionem veniant nec sigillatim enumerantur. Forsan radicularum succedanearum informatio ad muscorum surculos, eundem exsequitur typum ac *Erinea hypophylla* et *Erinei bryophilii* notionem defendunt (*Dematium muscorum Schleich.* in *Link sp. II.* 133. *Byssus muscorum Bory* in *Uster. N. Annal. XVIII.* 111.) Analogia est quoque blastematis Patelliarum staphylocarpum metamorphosis in pilos fasciculatos. Similem denique pilorum transfigurationem elidunt etiam praeter alia, quaedam insectorum s. cynipis hybernacula, ex quorum numero: 1) *fasciculatum*, embryodochio depresso lenticulari circinnato, praeter basin adnatam libero, subtus nudo adpresso, supra umbonato pilisque rectis fasciculatis ferrugineis quaquavorsum spectantibus vestito, (*Sclerotium fasciculatum Schum. etell. II.* 187. *Hornem. fl. dan.* t. 1492. *Hopkirk fl.*

anom. 10. t. 11. f. 1.); 2) *mammillatum*, *embryodochio* depresso supra mammillato, pilis brevibus sparsis pallidis hirsutiusculo; et 3) *nitidissimum* illud *comitum*, *embryodochio* tornato hemisphaerico praeter verticem umbilicato-depressum, pilis deflexis arcte adpressis aureonitentibus s. ferrugineis undique vestito, entomologis, ut suis reddant, mycologis vero, ut ex nostris eventilent, commendatum velim.)

@@ *gomphomorpha*, (*sarcinata*), *cellulis herbarum vegetarum s. languescentium*, *epidermidis pelliculam s. ipsum parenchyma partium quarumcunque constitutentibus*, *huc ilucve, locis tamen distinctis, male succrescentibus* iisque penitus inversis et multipli-catis, *nunc maculas adnatas amorphas, nunc tuberculula placentaria sessilia primum saepius hypophloidea, nunc denique corpuscula graniformia a figura sphaerica ad bacillarem varia, parenchymate carnosō obscure-celluloso, demum conformi, extus de colore, veluti stromate figurato (pseudo-stroma) insignia informantibus, a sporidiorum secretione omnino deficientibus.*

(*Gasteromyci solidi Lk. obs. Tuberacearum genera Pers. fung. Gasteromycetum genera infima s. Xylomacei aspori Fr. syst. Sclerotiacae Fr. et Dub. pr. pr. Vegetabilium fungorum prototypi Nees syst. 146.)* Vegetabilia satis paradoxa, epi- et entophyta, sponte ex aliis plantis languentibus, cum figuraione quadam typica succrescentia, cellularum globosarum veluti transfigurationes mycetoideae et hymenomycetum prototypi.

145. LEPTOSTROMA FR. Stengelschild.

Pseudostroma innatum dimidiatum maculare s. placentare clausum laeve, summam cubilium vegetorum pelliculam constipans cellulisque discoloribus ex vegetatione inversa succrescentibus farctum, demum saepius integrum, ab epidermide laesa secedens, sporidiis veris destitutum.

(*Leptostroma Fr. obs. Dub. Spr. nec Ehrenb. Schi-*

zoderma Ehrenb. *Sclerotia xylomata* Fr. pr. pr. (Parenchymatis vitia ejusque veluti calli, vegetabilium epiphytorum exiguorum, cum *Ectostromate* genere (Fr. syst. II. 602.) nimis vago ac paradoxo, typum elementarem aliorum forsitan praestantium, titulo inclarescentia.)

1395. *L. punctiforme* W., pseudostromate exiguo pubescentiiforme nigro opaco innato sparso arcte adhaerente, cum cubilibus adaequato.

Ad foliorum vegetorum, Salicis v. c. Capraeae, Euphorbiae Cyparisseos, Rosae majalis, Buxi sempervirentis aliorumque faciem aversum.

1396. *L. sphaerooides* Fr., pseudostromate exiguo tenui orbiculari laevi convexusculo atro, demum a cubilibus secedente. *Leptostroma sphaerooides* Fr. syst. II. 600. *Xyloma sphaerooides* Schwein.

Ad caules herbarum elatiorum.

1397. *L. hysteriooides* Fr., pseudostromate oblongo nigro vario, vertice tumidulo substriato. *Leptostroma hysteriooides* Fr. l. l.

Ad caules herbarum, Paeoniae v. c., passim.

1398. *L. maculare* W., pseudostromate innato subrotundo s. oblongo, demum confluente convexusculo fusco-nigro subnitido. — *Sclerotium herbarum* Fr. syst. II. 263. *Scl. Euphorbiae* Kunz. in lit. *Xyloma Potentillae* Fr. X. *Lini* Ehrenb. sylv. 27.

Ad caules herbarum vivos et languidos, v. c. Potentillae vernae, Lini, Gerastiorum, Euphorbiae exiguae aliorumque.

1399. *L. areolatum* W., pseudostromate planiusculo opaco nigro-fusco, foliorum parenchymatis areolas obreptando infarcente, demum bullato. *Sclerotium areolatum* Fr. syst. II. 263., obs. II. 553. t. 7. f. 5.

Ad folia languida Pruni Padi et virginianae.

1400. *L. vulgare* Fr., pseudostromate subrotundate

simplici vario nitido nigro ruguloso, demum integro sessente. *Fr. syst. II.* 599. *Sclerotium nitidum* Pers. X. *Actaeae* Schwein.

Ad caules Lunariae, Actaeae aliarumque.

1401. *L. nitidum* IV., pseudostromate oblongo latescente sparsa, demum confluenta aterrimo nitido longitudinaliter striato.

a. Iridis. — *Leptostroma Iridis* Ehrenb. *sylv.* 27. *Dub. gall.* II. 726. *Ectostroma Iridis* Fr. *syst. II.* 602.

β. Typhae. — *L. Iridis* β. *Typhae* Dub. I. l.

Ad folia viva Iridis et Typhae, passim.

1402. *L. Spiraeae* Fr., pseudostromate conglomerato connato rugoso difformi nitido, intus gryseo, demum integro secedente. *Fr. syst. II.* 599. *Xyloma Spiracae* Kunz. *myk. Hft. I.* 75.

Ad Spiraee Aranci caules languidos.

1403. *L. filicinum* Fr., pseudostromate elongato laevi nigro difformi dein adulto magis, costa elevata inscripto integro que secedente. *Fr. syst. II.* 599. *Schizodermia filicinum* Ehrenb. *sylv.* 15. *Leptostroma Pteridis* Ehrenb. I. l. 27. *Sclerotium Pteridis* Pers. *Hypoderma striiforme* DC. *gall.* VI. 166.

Ad stipites Filicum nostratum, Pteridis v. c., Osmundae et Aspidiorum.

1404. *L. juncinum* Fr., pseudostromate piano oblongo difformi nitido nigro-fusco, demum integro secedente. *Fr. syst. II.* 598. *L. caricinum* Fr. I. l.

Ad culmos Junci communis et Caricum.

1405. *L. scirpinum* Fr., pseudostromate orbiculari opaco vertice umbonato, demum integro secedente. *Fr. syst. II.* 598. *Dub. gall.* II. 726. *L. xylomoides* Fr. *obs. I.* 197. t. 1. f. 6. *Schizodermia scirpinum* Ehrenb. *sylv.* 27.

Ad culmos Scirpi lacustris languentes, auctumno.

146. SCLEROTIUM TODE. *Fleischknopf.*

Pseudostroma obscure-cellulosum carnosum album s. pallide - roseum subsimilare, superficiem saturatiorem a. decolorem induens, polymorphum, saepius e figura irregulare ad subrotundam tornatamque tendens, siccando duritiem subcartilagineam adficiens, sporidiis destitutum.

(*Sclerotium Tod. Pers. Nees. Fr. syst. excl. tribu Xylomatum et sp. nonnullis ad Perisporium referendis. DC. in mem. mus. hist. nat. 1816. 411. et alior. auct. Coccopleum Ehrenb. Astoma Gray. Sphaeriae et Xylo-matis sp. Angl. Lycoperdon auct. med. aet. Thanatophyton Nees. Rhizoctonia DC. Spermoedia Fr. Sphacelia Leveill. (Vegetabilia tum ad figuram fabricanque interna tum ad genesin paradoxa, cum verrucis et calculis regni animalis comparanda.)*

† *placentaria, pseudostromate e basi latescente adnata superficiali, primum saepius epidermide obvelato, difformi, nisu semet producendi insigni.*

(*Sclerotia subadnata Fr.*)

1406. *Scl. nervale Fr.*, pseudostromate elongato depresso crassiusculo, nervos folii veluti obesos ambeunte, aterrimo, intus albo. — *Sclerotium nervale Fr. syst. II. 260. Dub. gall. II. 874. Scl. Trientalis Fr. l. l. Xylo-ma nervale Alb. et Schwein. nisk. 64. t. 7. f. 7.*

Ad foliorum semipatridorum nervos, v. c. Ulmorum, Fraxinorum et Prunorum.

1407. *Scl. Pustula DC.*, pseudostromate hemisphaericо hypophyllo, e figura subrotunda vario umbonato ruguloso nigrescente, intus corneo albo. — *Sclerotium Pustula DC. memoir. l. l. 417. t. 14. f. 7. Fr. syst. II. 260. Dub. gall. II. 875. Scl. quercinum Pers. syn. 124. Alb. et Schw. nisk. 76.*

Ad folia Quercus, Pyri, Fagi, Castaneae et Acerum nostratum (*Sclerot. acerinum Schwein. Fr. syst. II. 264.*)

1408. *Scl. Brassicæ Pers.*, pseudostromate ob-

longo depresso tenui sparsa, primum extus iatusque albo, demum nigro-punctato. — *Sclerotium Brassicæ Pers.* syn. 122. *Alb. et Schw. nisk.* 75. *Dub. gall. II.* 874. *Fr. syst. II.* 259.

Ad petiolas et folia putrescentia *Brassicae oleraceae*, *Hemerocallis* et *Liliorum*, nonnisi etiam interaneum.

1409. *Scl. durum Pers.*, pseudostromate oblongo magis minusve producto attenuatoque dimidiato sparsa carnosum nigro tenuiter striato, intus albido demum basi, soluto. — *Sclerotium durum Pers.* syn. 121. *Rebent. neom.* 361. *Alb. et Schw. nisk.* 74. *Fr. syst. II.* 259. *Dub. gall. II.* 874. *Grev. crypt. t. 1. Astoma solidum Gray.* *Sphaeria tuberosa Sowerb. fung. t. 393. f. 2.*

Ad caules exsiccatos herbarum elatiorum, Umbelliferarum praeprimis, nec quoque a receptaculis *Daturæ* et *Dipsaci alienum* (var. $\beta.$ $\gamma.$ *Fries.*); var. *linearem* perangustam in *Hemerocalle* legi.

1410. *Scl. bullatum DC.*, pseudostromate e figura orbiculata ovato convexo granulato atro demum confluentem, intus albido. — *Sclerotium bullatum DC. gall. II.* 113. *Dub. gall. II.* 874. *Fr. syst. II.* 259.

Ad corticem Cucurbitarum putrescentium.

1411. *Scl. compactum DC.*, pseudostromate ovato aut vario reticulato-convexo demum crasso subrugoso incondito nigrescente intus albo-variegato. — *Sclerotium compactum DC. gall. VI.* 113. *Dub. l. l.* *Fr. syst. II.* 258.

Ad receptacula matura *Helianthi* et intra Cucurbitas maturas.

1412. *Scl. pyrinum Nees*, pseudostromate ovato-oblongo convexo, primum floccoso molli fusco dein nigro-fusco coacto, intus subconcolore. — *Sclerotium pyrinum Nees.* *Fr. syst. II.* 258. *Dub. gall. II.* 874. *Scl. fructuum Grev.* *Tremella ustulata Bull. champ.* 221. t. 420. f. 2. *Pers. syn.* 627. *Scl. varium b.* *Alb. et Schw. nisk.* 627.

Ad poma putrescentia hyemis tempore. (Tum genesi tum fabrica interua haud mediocriter desciscit novumque forsitan & aliud genus adpellat.)

1413. *Scl. variegatum* W., pseudostromate ova-to-subgloboso adnato dein elongato ruguloso ex albo nigroque variegato, intus corneo albo. — *Sclerotium Maydis* Dub. gall. II. 872.

Ad rhachidem Zeae Maydis, Thuring. (Wallr.)

† *figurata*, pseudostromate e figura hemisphaerica globosam, depresso-scutellarem & cylindricam adficiente, praeter basin leviter adnexam libero.

* *subglobosa*, pseudostromate e figura hemisphaericā ad globosam tendente, basin nudo & fibrilloso, emergente.
o *sessilia*, pseudostr. basi nudo.

1414. *Scl. Conii* Dub., pseudostromate punctiformi dein epidermidem roseam transeunte hemisphaericō exiguo subdepresso ruguloso lutescente, intus concolore. — *Sclerotium Conii* Dub. gall. II. 873.

Ad caules exsiccatos Conii maculati.

1415. *Scl. palliolatum* Fr., pseudostromate globoso primam inclusō albo dein nigro-fusco hemisphaericō utrisque prominulis tecto, intus concolore. — *Sclerotium palliolatum* Fr. syst. II. 256. Schld. berol. II. 216. *Coccopleum palliolatum* Ehrenb. sylv. 27.

Ad lamellas Agaricorum putres agri berol. (Ehrenb.) (Dubium, mihi igoootum.)

1416. *Scl. inclusum* Kunz., pseudostromate spadiceo primam immerso dein emerso libero lenticulari rugoso, demum nigro, intus variegato. — *Sclerotium inclusum* Schm. et Kunz. Deutschl. Schw. n. 131. Fr. syst. II. 255.

Ad foliorum populinorum semiputridum paginam utramque rarius.

1417. *Scl. sanguineum* Fr., pseudostromate pri-

mum obtecto dein emerso libero subgloboso laevi exiguo obscure sanguineo. — *Sclerotium sanguineum* Fr. syst. II. 255.

Ad folia Convallariae majalis putris, ex quibus perforando emergit.

1418. *Scl. fuscum* W., pseudostromate e basi depressa subgloboso conoideo laevi fusco-castaneo nitido sparsa, demum corneo, intus albente.

Ad ligna cariosa laxe appensum, in nemoribus thuring.

1419. *Scl. fulvum* Fr., pseudostromate erumpente, dein libero globoso s. magis oblongato rugoso fulvo intus albido. Fr. syst. II. 255.

Ex foliis graminum hemi jacentium primo vere emergit.

1420. *Scl. lactum* Ehrenb., pseudostromate subrotundo rubente in basin albida tenuato. *Sclerotium lactum* Ehrenb. in Spr. syst. IV. 521.

Ad caules herbarum elatiorum agri berolin. (Ehrenb.)

1421. *Scl. immersum* Tod., pseudostromate erumpente, e figura subrotunda ovali laevi flavescente, dein stramineo, intus albo. — *Sclerotium immersum* Tod. mecl. 2. t. 1. f. 3. DC. gall. VI. 111. Fr. syst. II. 255.

Ad Pini sylvestris ramulos moribundos ducat. meclenb. (Tode.)

1422. *Scl. vulgaratum* Fr., pseudostromate libero globoso s. difformi laevissimo flavo disperso, intus albo. — *Sclerotium vulgaratum* Fr. obs. I. 204., syst. II. 249.

Ad quisquilias putres firmo mixtas, suis locis passim; simile inter folia putrida, magis tamen testaceum.

1423. *Scl. udum* Fr., pseudostromate ovato-globoso libero glabro e flavo purpurascente, intus pallidiore. Fr. syst. II. 250.

Inter gramina lacustria ad ripas rejecta.

1424. *Scl. stereorarium* DC., pseudostromate libero subrotundo nigro majusculo, primum carnoso, dein

corneo ruguloso, intus albo. — *Sclerotium stercorarium* DC. gall. II. 250. Dub. gall. II. 873. Fr. syst. II. 250.

Sub fimo vaccino passim delitescit.

1425. *Scl. Semen Tod.*, epi- et entocaulon, pseudostromate sphaericо veluti tornato sparso, nonnisi magis conferto, primum laxe appenso ex albo - lutescente, dein spadiceo, demum nigro opaco mobili, siccando corrugato corneo, intus albo. — *Sclerotium Semen Tod.* mecl. I. 4. t. 1. f. 6. Pers. syn. 123. Albert. et Schw. nisk. 75. Rebent. neom. 361. DC. gall. VI. 113. Nees syst. f. 138. Fr. syst. 249. Grev. crypt. t. 144. f. 2. *Sphacria Brassicæ* Bolt. fung. t. 119. f. 2. Sowerb. fung. t. 393. f. 3. *Lycoperdon Brassicas* Berg. *L. oleaceum* auct. *Lyc. subterraneum* Hall. hist. n. 2178. *Tremella sphaerica* Gleditsch.

Ad caules et folia putrescentia humi congesta, Solani tuberosi maxime et Brassicarum aliarumque ejusmodi domesticarum, nec ab interaneis alienum, auctumno, ubivis locorum abundanter. (De hoc, ceu Brassicae semine degeneri, huic ut ovum ovo simili, multum confabulati sunt mediae etatis scriptores et ad varietates nobiliores gignendas sationi, Hallero primum refutante, diguum habuerunt.)

1426. *Scl. scutellatum* A. et Schw., pseudostromate orbiculato patellaeformi, in basin brevissimam tenuato subsessili majuscule convexiusculo fusco, intus albo. — *Sclerotium scutellatum* Alb. et Schw. nisk. 74. t. 3. f. 6. Nees syst. f. 139. DC. mem. 418. Fr. syst. II. 249.

Ad folia putrescentia, Frazini potissimum et Acerum, petiolis nervisque intermediis, raro ipsis novellis adfixum.

1427. *Scl. pezizaeforme* Schum., pseudostromate subsessili orbiculato plano-depresso albo-virescente intus concolore. — *Sclerotium pezizaeforme* Schum. saell. II. 186. Fr. syst. II. 248.

Ad folia dejecta Fagi, auctumno, in saltibus Hercyn. inferior. passim.

.. suffulta, pseudostromate basi suffulto.

1428. *Scl. byssisedum* W., pseudostromate globoso exiguo, primum pallido byssum tenerrimam parcam nigrescentem caducam circumspargente, dein fusco nudo laevi, basi tenuiter appenso. — ? *Sclerotium pubescens* Pers. syn. 123. *Fr. syst. II.* 253. *Alb. et Schw. nisk.* 76.

Ad lamellas et hymenium Agaricorum, auctummo. (Alphitomorpham habitu et minutie ferme aemulatur.)

1429. *Scl. stipatum* Fr., pseudostromate ovato-globoso exiguo aggregato fuscō-testaceo, primum fibrillis byssinis suffulto, dein nudo rugoso, intus concolore. — *Sclerotium stipatum* Fr. *syst. II.* 254.

Ad ligna putrida duriora, hyemo.

1430. *Scl. strobilinum* Schm., pseudostromate sphaericō rugoso nigro, fibrillis radiatim expansis insidente, intus albo. — *Sclerotium strobilinum* Schm. in Kunz. myk. Hft. I. 85. *Fr. syst. II.* 254. *Rhizoctonia strobili-na* Link sp. I. 120.

Ad strobilos Piui putrescentes Saxoniac. (Schmidt.)

1431. *Scl. radicum* Tod., pseudostromate ova-to sparso assurgente nigro basi producta fibrilloso-radiato. — Tode medl. 5. t. 1. f. 8. Pers. syn. 122. *Fr. syst. II.* 254.

Stipulas humi jacentes obsidere dicitor. (Tode.)

*⁺ *lobata, pseudostromate difformi lobato praeter basin primum cubilibus incumbentem demum libero, saepius subterraneo s. obiecto, nonnisi entocaulo.*

1432. *Scl. varium* Pers., pseudostromate gregario carnoso laxe appenso, primum e basi byssoidea alba succrescente subrotundo, dein oblongo lobato plane difformi fuscescente, demum nigro rugoso secedente, intus albo. — *Sclerotium varium* Pers. syn. 122. Rebent. neom. 361. t. 4. f. 16. *Alb. et Schw. nisk.* 75. *DC. mém. L.* L 315. *Nees syst. f.* 138. *Fr. syst. II* 258. *Dub. gall.* 874. *Scl. ovatum* Schum. *Elvella Brassicac Hoffm. veget.* cr.

18. t. 5. f. 2. *Lycoperdon oleraceum* Poll. pal. III. 312.
Tuber oleraceum Web. hol. 14.

Ad caules, tubera et rhizomata, brumae tempore in
 caveis defossa, haud rarum, v. c. ad Brassicam, Daucum,
 nec non intra caules herbarum elatiorum v. c. Malva-
 rum, Georginae. (Primordia byssoides satis peculiaria;
 moles varia, saepius insignis, 1-2 uncialis; figura rufa,
 polymorpha.)

1433. *Scl. tectum* Fr., pseudostromate primum
 hypophloecode latescente applanato insigni difformi dein
 emergente nigro, intus albido. — *Sclerotium tectum* Fr.
 obs. I. 204., syst. II. 251.

Ad caules herbarum elatiorum passim.

1434. *Scl. atro-virens* Schm., pseudostromate
 convexo sublobato durissimo laevi atrovirente, intus al-
 bido. Schmidt l. l. 86. Fr. syst. II. 251.

In Polyporo fermentario putri circa Lipsiam. (Schmidt.)

1435. *Scl. Fungorum* Pers., pseudostromate e
 figura ovata oblongaque vario; difformi lobato polymor-
 pho glaberrimo pallido dein fulvo, intus albo, hymeno-
 mycetum parenchymati insperso. — *Sclerotium fungorum*
 Pers. syn. 120. Alb. et Schw. nisk. 73. Fr. syst. 252.

$\beta.$ lacunosum, pseudost. duro lacunoso nigro. Fr. l.
 L *Sclerotium lacunosum* Pers. syn. 121. Nees syst. f. 137.

Intra lamellas Agaricorum patrescentium, praeprimis
 Agarici tuberosi rarius; $\beta.$ subterraneum, a var. $\alpha.$, prae-
 ter colorem plane non diversum.

1436. *Scl. truncorum* Fr., pseudostromate vario
 subcompresso tuberculoso s. lacunoso glabro flavo, intus
 albo. — *Sclerotium truncorum* Fr. syst. II. 252. *Scl. flavum* Schum. *Scl. subterraneum* $\beta.$ *truncorum* Tod.
 mecl. 4. t. 1. f. 5. Alb. et Schw. nisk. 73.

Ad ligna uida Fagorum putrium rarius.

1437. *Scl. muscorum* Pers., pseudostromate dif-
 formi lobato glabro tuberculoso, extus intusque aureo

spongioso. — *Sclerotium muscorum* Pers. syn. 120. Fr. syst. II. 152. *Scl. subterraneum* a. Tod. l. l. Alb. et Schw. l. l.

Ad muscos putrescentes, passim etiam ad ligna. (Aliud forma congruens at laevissimum cornicum, inter Jungermanniam albicanem montis Bructeri legi, forsitan novum.)

1438. *Scl. complanatum* Tod., pseudostromate primum molli lacteo obovato, dein assurgente compresso obcordato ruguloso ex albido-fuscescente, intus albo. — *Sclerotium complanatum* Tod. mecl. 5. t. 1. f. 9. Pers. syn. 121. Rebent. Alb. et Schw. nisk. 73. Fr. syst. II. 248. Nees syst. f. 140.

Ad folia putria aliasque quisquiliis humi jacentes, minime rarus.

1439. *Scl. Vaporariorum* A. et Schw., pseudostromate primum tecto magno durissimo fuscescente, e figura subglobosa oblongaque perquam vario, unciali, demum corrugato nigro. — *Sclerotium vaporarium* Alb. et Schw. nisk. 73. t. 10. f. 1. DC. mem. 414. Nees syst. f. 136. Fr. syst. II. 251. ?*Scl. atratum* Desv.

Ad corticem coriarium vaporariorum rarius.

1440. *Scl. bryophilum* W., pseudostromate gregario e figura subrotundo-angulata elongato-tortuoso polymorpho luteo-salvo, extremitates fibrillosas exserente iisque copulato, sicco fragili scrobiculato. *Rhizoctonia muscorum* Fr. syst. II. 265.

Ad radices Hedwigiae ciliatae aliquamque muscorum basi compacta putrescentium Hercyn. rarius. (*Rhizoctonia Crocorum* DC. Fr. syst. II. 265. *Thaumatophyton Crocorum* Nees syst. f. 135. et *Rhizact. Medicaginis* DC. Fr. l. l., bulbos Croci et radices Medicaginum in Gallia australi infestantes, mihi latent, nec tamen a Sclerotii separandae. Simili jure *Periola* genus (Fr. syst. II. 266.) in contentiouem venit, praeter faciem externam villosam, a quibusdam Sclerotii (Scl. vario v. c.) minime alienam et substantiam gelatinoso-carnosam, vix a Scleratio rite distingendum.)

*** *cornuta, pseudostromate cylindrico cornuto, sive entocaulo, sive epigynio interglumaceo, intus roseo.*
(Spermoedia Fr. Sphacelia Leveill.)

1441. *Scl. rossum Kneiff*, pseudostromate oblongato cylindrico utriusque truncato crasso tenuiter pruinoso longitudinaliter striato nigro, primum entocaulo dein culmum disrumpente, intus pallide-roseo. *Sclerotium roseum Kneiff in lit. — Dub. gall. II. 874.*

Intra culmos marcescentes Scirpi lacustris circa Argentoratum, unico loco. (*Kneiff.*)

1442. *Scl. Clavus DC.*, pseudostromate subcylindrico elongato corniformi acuminato, extus fusco-purpurecente nonnisi leviter pruinoso, intus carnosus pallide roseo, e basi glumarum Graminearum adusta libere prominente illasque subaequante, grana transfigurata veluti mentiente. — *Spermoedia Clavus Fr. syst. II. 268. Sphacelia segetum Leveillé in act. societ. Linn. Paris. V. 126. Regensb. bot. Literat. Bl. I. 80. Sclerotium Clavus DC. mem. 416. t. 14. f. 8, gall. II. 115.*

a. *Secales*, pseudostr. cylindrico elongato sulcato, apice nonnisi fiso, glumis duplo majore. — *Secale cornutum Balding. diss. Mutterkorn Schrif. Berl. Ges. I. 244. Grana Secalis degenerati Brunn. in ephem. N. C. Decas III. 348. Secale luxurians Bauh. pin. 23. Secalis mater Thal. herc. 47. Clavi Siliginis Lonic.*

β. *Triticī*, pseudostr. ovato turgido utrinque obtuso glumas subaequante.

γ. *Lolii*, pseudostr. cylindrico acuto tenuato glumis occluso.

δ. *Arundinis*, pseudostr. cylindrico acuto tenuato glumas aequante.

ε. *Dactylidis*, pseudostr. cylindrico acuto tenuato glumas excedente.

ζ. *Festucae*, pseudostr. cylindrico obtuso glumas vix superante.

η. Sessleriae, pseudostr. cylindrico tenuato utrinque acuminato glumas longe excedente.

Intra glumas graminum praedictorum in agro thuringiaco abundat, aliorum alibi, aestate. (Vegatabile noxiūm, nauseosum (*Tessier malad.* 21.), vera causa *Raphaniae Linn.*, Ergotismi Gallorum aliorumque morborum, super iterum inter medicamina satis ancipititia receptum.)

N.B. Ad hoc genus insuper, praeter alia, quaedam blastematis lichenosi excrementa pertinent ejusque transfigurationes callosae s. *phymata* sic dicta (*Naturg. I.* 74.) in censum veniunt, utpote generi tum geneseos, tum habitus ratione analogi, quae quidem *Peltigerae* aphthosae var. *β. phymatoden Flor. germ. I.* 560. statuunt, et in *Parmelia gelida* (*I.* 486.), *P. pulmonaria* (*I.* 508.), *P. gomulifera* (*I.* 546.), *P. fraxinea* (*I.* 537.), *P. jubata* (*I.* 541.), *P. officiarum* (*I.* 544.) aliisque affinitate redeunt.

147. ACROSPERMUM TOD. Spitzkorn.

Pseudostroma elongatum subclavatum substipitatum, e cortice membranaceo tenui inseparabili persistente compositum, intus carnosum conforme demum rigidum, praeter apicem, nonnisi tumidalum et dilatiorem pruinosum, asporophorum.

(*Acrospermum Tode. Fries. Xyloglossi spec. Pers. fung. escul. Phacorrhiza Pers. myc. Clavariae spec. Pers. et auct.*) Genus dubium, sive praecedenti sive *Clavariae*, si quidem apex ascophorus, subscribendum.

1443. *A. compressum* Tod., pseudostromate lanceolato subcompresso, demum praeter apicem pruinosum albido olivaceo-nigrescente parce salcato. — *Acrospermum compressum* Tod. *mcl. I.* 8. *t. 2. f. 13. Fr. syst. II.* 245. *Clavaria herbarum* Pers. *clav. 68. t. 3. f. 4.*

Ad caules herbar. majorum passim.

1444. *A. Phacorrhiza* W., pseudostromate simplici albo clavato subcarnoso, e tuberculo badio s. ni-

greciente emergente. — *Phacorrhiza sclerotiooides* Pers. myc. I. 192. *Acrospermum sclerotiooides* Fr. syst. II. 245.

Ad caules exsiccatos Sonchi alpini Vogesorum (Moug. et Nestler), nec non Hercyn.

1445. *A. conicum* Fr., pseudostromate conico laevi nigrescente apice dilutiore. Fr. syst. II. 246. Pers. myc. t. 11. f. 5. 6.

Ad caules herbarum elatiorum siccios, paasim.

1446. *A. cornutum* Fr., pseudostromate laevi cornuto dein siccando sulcato rufo, apice dilutiore. Fr. t. l. Sclerotium cornutum Fr. obs. I. 205.

Ad Agaricos putres passim. (Noli commutare cum Sphaeronemate.)

1447. ?*A. pyramidale* Tod., pseudostromate ova-to-acuminato laevi roseo apice albo-pruinoso, basi flocculoso. — *Acrospermum pyramidale* Tod. l. l. t. 2. f. 14. Fr. syst. II. 246.

Ad Agaricum deliciosum aridum. (Tode.)

1448. ?*A. laetum* W., pseudostromate subrotundo saepe geminato laete-rubro basi albida stipitato. Sclerotium laetum Ehrenb. sylv. 26. f. 2.

Ad caules herb. elatiorum agri berol. (Ehrenberg.)

B. helicomorphi, rhabdis filiformibus fistulosis, septis genicula mentientibus interceptis, intus massa grumosa (?sporidiis particulive analogis) sarcis, colore variis, saepius colorem fulvum cum cano mutuantibus.

(Byssacearum genera Agrdh class. Inomycetes Nees. Mart. Algarum genera Agrdh syst.)

148. HELICOMYCES LINK. Ringelfascr.

Rhabdi floccosi pertennes caespitosi simplices erecti, apice septato spiraliter involuti.

1449. *H. roseus* Lk., rhabdis arachnoideo-capillaris carnis aequaliter septatis roseis, dein gryseo-inca-

nescentibus pulvinulosque pertenues maculares dein effusos praestantibus. — *Helicomyces roseus* Link obs. I. 19. t. I. f. 35., spec. I. 131. Nees syst. 40. f. 37. ?*Hypoplasma roseum* Rebent. neom. 397. t. 4. f. 20. *Erysiphe spiralis* Fr. fems. 43.

Ad trunco putrescentes German., v. c. prope Rostochium. (Ditmar.)

149. AMPHITRICHUM NEES. Krausfaser.

Rhabdi erecti continui, e basi articulata stromatis iastar obtexta globosa assurgententes.

1450. *A. effusum* Nees, rhabdis effusis aterrime rigidis, e basi obtexta hyalina articulata prominentibus. — *Amphitrichum effusum* Nees in act. nat. cur. IX. t. 6. f. 17. Spreng. syst. IV. 556.

Ad ligna pinea. (Nees.) (Mihi latet.)

150. ALTERNARIA NEES. Wechselseifaser.

Rhabdi erecti simplices opaci interstitiis filiformi-tenuatis, articulos ovales remotos interstinguentibus intercepti.

1451. *A. tenuis* Nees, rhabdis strictis nigro-olivaceis dense aggregatis, articulis oblongis interceptis. — *Alternaria tenuis* Nees syst. 12. f. 68. Pers. myc. I. 20. Dub. gall. II. 931.

Ad caules herbarum siccios. (An *hyphasma* aliud ejusdam?)

1452. *A. rufa* Ehrenb., rhabdis rigidis curtis nigris complexis, articulis nodos rudes mentientibus. Ehrenb. sylv. 10. 22. Schleid. berol. 149. Spr. syst. IV. 558.

Ad ramos pineos agri berolin. (Ehrenberg.) (Genus *amphibolum*, milii dubium plane.)

151. PLEGMATIUM FR. Aftfaser.

Rhabdi subramosi fistulosi tenuiter constipatoque membranacei, septis transversis opacis veluti sporophoris interstincti.

(*Plegmatium Fr. fems. Protonema et Mycinema Agrdk.*
Confervae spec. auct.) Genus Confervae tum habitu tam
 fabrica interna compar, vix nisi loco et textura stipata
 vitaque aëra diversum, illi saltem analogon.)

1453. *Pl. muscicola Fr.*, rhabdis simplicibus ab-
 breviatis subfasciculatis aureis, septis sporophoris, articulos
 diametrum aequantes interstinctis. — *Protonema*
muscicola et Acharii Agrdk syst. 45. Plegmatium musci-
ccola Fr. fems. 42.

Ad ligna carie exesa saltuum udorum. (Pseudocotyle-
 dones muscorum, nec non Erinea Phylleria refert plane
 et denuo observanda, saltem dubia species.)

1454. *Pl. fulvum Fr.*, rhabdis decumbentibus pro-
 ductis submembranaceis dein compresso-ligamentosis va-
 ge-ramosis ferrugineo-spadiceis, his remulisque septis
 sporophoria, articulos diametro triplo longiores siccando
 alternatim compressos aequantibus interstinctis, in stra-
 tum expansum laxum intertextis. — *Plegmatium fulvum*
Fr. fems. 42. Mycinema fulvum et rubiginosum Agrdk
syst. 33. Conferva muscicola auct.

Ad ligna putrida, terram arenosam subactam, ipsaque
 caules herbarum elatiorum (Bardanae) siccis agri-
 tharing., halens et gotting. haud quidem rarum. (Insig-
 ni colore jam et rhabdorum plexu longe protenae oca-
 los alliciens.)

1455. *Pl. olivaceum W.*, rhabdis decumbentibus
 vase ramosis, septis saturationibus latescentibus, articulos
 diametro quater longiores interstinctibus sordide vi-
 ridibus, in stratum expansum olivaceum implexis.

Ad ligna sulcina putrida Thuring.

1456. *Pl. Sasicola W.*, rhabdis implexis vase ra-
 mosis membranaceo-coriaceis flaccis fusco-nigrescentibus,
 septis sporophoris articulos diametro quadruplo longioribus,
 siccando alternatim compressos interstinctibus.
 — *Conferva sasicola Wallr. ann. bot. 135. t. 6. f. 4.*

Ad schistum irroratum in cryptis Thuring. et Hercyn. superioris.

1457. Pl. ebenum W., rhabdis erectis abbreviatis ramosis caespitosis atris, ramulis remotis divergentibus septis articulos diametrum subaequantibus interstinctis, — *Chroolepus ebenus* Agrdh syst. 36. *Conserva ebenea* Dillw. conf. t. 101. Spr. syst. IV. 354. *C. nigra* Roth.

Ad saxorum latibula.

1458. Pl. Pteridis Fr., rhabdis simplicissimis fuscoculentescentibus declinatis, articulis longitudinaliter plicatis diametro triplo longioribus. — *Plegmatium Pteridis* Fr. l. l. *Mycinema Pteridis* Agrdh syst. 33. *Conserva Pteridis* Agrdh. Spr. syst. IV. 354.

Ad rhizomata Pteridis aquilinae emortua.

152. TRENTEPOHLIA MART. Trentepohlia.

Rhabdi erecti ramosi rigiduli septati persistentes versicolores, intus massa grumulosa varie digesta (sporidiis) repleta illaque foras adspersi.

(*Trentepohlia* Mart. Agrdh nec Hoffm. *Amphiconium* Nees. Spr. *Chroolepus* Agrdh. *Conservae* et *Byssi* spec. nact.) (De generis loco systematico ejusque notis adhuc sub judice lis est: Algam refert quidem, nec tamen cum reliquis Asporom. helicomorphis communione reticet.)

1459. Tr. aurea Mart., rhabdis erectis tenuiter capillaribus vase patentimque ramosis flexuosis in articulos diametro duplo longiores obsolete distinctis grumulisque sporomorphis varie digestis foetis, primum aurantio-flaventibus dein gryseo-incanescentibus, in pulvinos convexos molles congestis, — *Trentepohlia aurea* Mart. erl. 351. Agrdh syst. 36. *Amphiconium petracum* Nees syst. 69. in adnot. Spr. syst. IV. 344. *Oxonium aureum* Dub. gall. II. 934. *Sporotrichum Jolitkis* Ficin. *Ketocarpus aureus* Lyngb: hydroph. t. 44. *Dematium aureum* Rebent. neom. 395. *Conserva aurea* Dillw. conf. t. 35. Roth. Weis. *Dematium petraeum* Pers. syn. 697.

Lichen aureus Ach. *Byssus aurea* Linn. spec. II. 1683.
Leyse. Roth. Wahlenb. succ. — *Flor. dan.* t. 718. f. 1.
Engl. bot. 212. *B. petraea* Dill. hist. t. 1. f. 16. Rupp.
jex. 300.

Ad ligna putrescentia et gypsum vicinum irroratum
 rupium thuringiacar. ubertim, in Peltigerae saccatae con-
 sortio.

1460. *Tr. Jolithus IV*, rhabdis erectis brevibus
 ramosis, septis pellucidis, articulos granulatis sporomor-
 phis ovatis plenos diametro sesquiloniores intercepientibus
 inque extremitates turgidas desineatibus, pulvinos de-
 pressos s. caespitosos elevatos arte condensatos prae-
 stantibus, primum aureis (violam spirantibus) dein aeru-
 ginosis. — *Amphiconium rupstre* Nees l. l. *Spr. syst.*
IV. 344. *Chroolepus Jolithus* Agrdh *syst. 34. Domatium*
Jolithus Wahlenb. *lapp.* 535. *Conferva Jolithus* Agrdh
syn. Lyngb. Phytoconis Jolithus Bory de St. Vinc. *Con-*
ferva aurea *β.* *Jolithus* Roth *germ. Lepraria Jolithus*
Ach. Byssus Jolithus L. *sp. 1638. Flor. dan.* t. 899. f.
 1. *Lichen iridis colore* Hall. *hist. n.* 2090. *Byssus ger-*
manica Mich. *gener. t.* 89. f. 3. *Jolithus s. lapis viola-*
cens Swenk. *fossil. Siles.* 382.

Ad saxa duriora porphyrea et granitica irrorata hu-
 moque tenui tecta montium editissimorum Silesiae et
 Hercyn. super. (Schwenkf. — Wallr.) (A praecedente,
 cui Rothius subscribit, distinctissima, duplices tamen ad
 loci natalis conditiones spondet varietates: *a. alpestrem*,
 rhabdis curtis anguste-disseptis, in stratum aequale tenuē
 stipato-pulverulentum digestis, ad cautes Hercyn.; et
β. alpinam, rhabdis productioribus crassioribus rigidiori-
 bus, in pulvinos elatos condensatis, ad petras Silesiae.)

153. SYNCOELIUM W. Kettenfaser.

Rhabdi subramosi ex articulis hyalinis inflatis, intus
 massa grumosa saturatiore scatentibus ovato-subrotundis
 annulatis seriatim connexis compositi, catenulati.

(*Torulac*, *Moniliac* et *Leprariae* sp. auct.)

1461. *S. catenulatum* W., rhabdis ex articulis hyalinis inflatis ovato-subrotundis annulatis seriatim connexis compositis moniliformibus, primum cinnabarinis dein expallescentibus massamque effusam pulverulento-stupposam mentientibus. — *Terula cinnabrina* Mart. erl. 357.

Ad corticem arborum, Alnorum v. c. et Quercum nostratum annosum in umbrosis passim. (Cantius profecto a chrysogonidiis lichenum (Naturg. I. 303.), cui habitu externo simillimum dignoscendum, Plegmatium cum Trentepohlia eximie jangens.)

154. ACROTHAMNIUM NEES. Schlingfaser.

Rhabdi decumbentes intricati, e basi ramosa opaca, in splices septatas adscendentibus.

1462. *A. violaceum* Nees, rhabdis violaceis, e basi ramosa opaca declinata in extremitates magis pelliculas septatas veluti sporophoras assurgentibus pulvinulosque effusos crassiusculos praestantibus. — *Acroth. violaceum* Nees syst. 74. f. 11. Pers. myc. I. 25. Link sp. I. 27. Ehrenb. sylv. 10. *Himantia Rosae* Spr. syst. IV. 559. *Sporotrichum muscorum* Link obs. II. 35. *Bysus globulifera* Schum. scell. II. 441.

Ad radices arborum putrescentium, v. c. Francon. (Nees.) (Pro fungi cujuscunque perfectioris primordio declarat Friesius. Ad Asporomycetes rhizomorphos torulosos deflectere videtur.)

C. rhizomorphi, rhabdis molis variae, saepius arachnoideis, vase ramosis valde protensis fistulosis, praeter extremitates et appendices nonnisi septatas lateri appensa s. corpuscula sporangiomorpha infarcientes, continis omnia, nunc simplicissimis in paucum magis minusve densum contextis, nunc in fasciculos laxe aggregatis, nunc virgatis plane tegmineque homogene magis tamen stipato veluti corticatis membranamque nonnisi ramulos tentaculatos exserentem expansis, praeter appendices sporomorphas et corpuscula subglobosa dispersas.

s. extremos rhabdos terminantia rhabdorum imperfectiorum stupa farcta cum sporangii prossus analogi, sporidiis veris destitutis.

(*Hyphomycetes trichoides* Link sp. *Mucedineae byssinae et Lycoperdacearum Sclerotiacarum genera* Dub. *Mucedineae asporae* Lk. Mart.)

• *byssoides*, rhabdis continua arachnoideo-hypoideis s. filariibus hyalinis stygiisque opacis.

155. BYSSUS HUMB. Grufschimmel.

Rhabdi arachnoidei hyalini simplices s. ramosi decumbentes fistulosi continui laxè intertexti fugaces (aëris contactu saltem) contabescentes s. confluentes, sporidiis destituti.

(*Hypha* Link sp. Pers. myc. *Hyphasma* Rebent. *Dematum* Pers. *Byssus* L. pr. pr. ex emend. Humb. Dub. (*Mycetes subterranei in cryptis locisque suffocatis vegeti, albi, aliorum procul dubio initia, ex loco lucisque defectu pessumdati, hinc dubii.*)

1463. *B. floccosa* Schreb., rhabdis hypoideis simplicissimis subparallelis niveis, primum laxe intertextis, hypham veluti gossypinam elatam subrotundam manubriam, dein collapis, membranam compactam s. corium tenacellum mentientibus. — *Byssus floccosa* Schreb. spic. 144. Mart. erl. 345. *B. bombycinus* Nces syst. f. 73. *Hypha bombycinus* Pers. myc. I. 63. Link sp. I. 141. *Hyphasma floccosum* Rebent. ncom. 396. *Dematum bombycinum* Pers. syn. 696. — Dill. hist. t. I. f. 9.

Ad ligna et lapides in caveis uidis et fodiniis minime rara, spithama nonnisi altior et latior, occissime glisceus.

1464. *B. elongata* DC., rhabdis simplicibus tenuissimis, filamenta tenuia subcylindrica ramosa mentientibus, nonnisi longissime protensa. — *Hypha elongata* DC. gall. II. 67. Dub. gall. II. 934.

Ad ligna cryptarum udarum.

1465. *B. argentea* Dub., rhabdis e centro radiantis, in ramulos tenuissimos arachnoideos argenteos divulsis. *Dub. gall. II.* 934. *B. cellaris* Humb. *frib.* 66. *Hypha argentea* Pers. *Lk. l. l.* *Mesenterica argentea* Pers. *syn. 706.* — *Vaill. bot. t. 8. f. 1.*

Ad parietes udos et sullocatos.

1466. *B. speciosa* Humb., rhabdis niveis ramosissimis repentibus, in ramos flexuosos compressos apice expansos orbiculatim dispositos confluentibus. — *Hysus speciosa* Humb. *frib.* 69. *t. 4. f. 18.* *Hypha speciosa* Pers. et *Link l. l.*

In omnibus cubiculis fibergensibus, lignum et saxa obducens. (*Humboldt.*)

1467. *B. digitata* Humb., rhabdis longissimis arachnoideis, in fasciculos funiculares propexos apice divisos confluentibus. — *B. digitata* Humb. *l. l. t. 2. f. 1.* *Hypha digitata* Pers. *myc. I.* 65. *Lk. l. l.*

In fodinis metallicis Saxoniae ad columnas (*Humboldt.*)

1468. *B. clavata* Humb., erecta nivea versus basin attenuata clavaeformis. *Humb. l. l. t. 4. f. 17.* *Hypha clavata* Pers. et *Link.*

In fodinis fibergens. (*Humboldt.*)

1469. *B. Penicillum* Scop., erecta nivea, rhabdis fasciculatim congestis simplicissimis. — *Humb. l. l. 68.* *Scop. dissert. I.* 91. *t. 2. f. 3.* *Hypha Penicillum* Pers. et *Link. l. l.*

In fodinis metallicis Saxoniae (*Humboldt.*)

1470. *B. radiciformis* Lesk., nivea tenerima, rhabdis ramosis pendulis, globis floccosis hinc inde adhaerentibus. *Humb. frib. l. l.* *Hypha radiciformis* Pers. et *Link. l. l.*

Ad columnas ligneas fodinarum (*Humboldt.*)

1471. *B. globosa* Humb., expansa, radians deinde globum pendulum glomerata. *Humb. frib. 70.* *Leske. Scopol. diss. I.* 93. *t. 16.*

Ad trabes in fodinis metallicis Saxon. (*Humboldt.*)

1472. *B. membranacea* Humb., explanata nivea, membrana ex filamentis constans dense intertexta. Humb. de pl. subterr. n. 6., frib. 69. *B. floccosa* Scop. l. l. t. 4. *Hypha membranacea* Pers. et Link l. l.

In fodinis metallicis Saxon. (Humboldt.)

1473. *B. sulfurea* Dub., mollissima dilatata indeterminata citrino-sulfurea, exsiccata membranacea sordide carneae. Dub. gall. II. 934. *Hypha sulphurea* Necs in N. act. acad. Leop. II. 568.

Ad ligna in locis humidis et suffocatis passim.

156. OZONIUM PERS. EMEND. Strahlenfaser.

Rhabdi decumbentes protensi continuo ramosi primum aggregato-fasciculati dein facile secedentes, habitum penicillatum mentientes, (*thallus* Lk.), sporidiis destituti.

(*Ozonium* Pers. ex emdt. Lk. *Ozonii* et *Byssi* spec. Pers. et DC. *Himantia* Pers. Spr. et aliorum auct. (quae quidem pro bona parte aliorum perfectiorum mycelia corynoidaria praestant, vel ad *Thelephoras*, *Hypochnum* ipsasque *Clavarias* deflectunt.) Mycetes cryptophili, aliorum procul dubio juvenes degeneres, loco in quo nati.

1474. *O. candidum* Mart., rhabdis primum fasciculato-aggregatis funicularibus ramosissimi nonnisi longissime protensis laxis niveis dein stramineis radiatim expansis hinc iude et ad extremitates secedentibus habitumque plumosum s. penicillatum mentientibus. — *Ozonium candidum* Mart. erl. 358. Link sp. L. 139. Dub. gall. II. 935. *Sporotrichum plumosum* Spr. syst. IV. 547. *Himantia candida* Pers. syn. 703. *Byssus candida* Huds. Ehrh. Beytr. III. 85. — Dill. hist. t. I. f. 15. A.

Ad folia humecta lignumque putridum.

1475. *O. castaneum* W., rhabdis primam fasciculato-aggregatis filaris ramosis adpressis productis fusco-castaneis, dein in alias rhabdos arachnoideos con-

colores rigidulos parce ramosos secedentibus, stratum implexum mentientibus.

Ad ligna putredine exesa Thuring. (Wallr.)

1476. *O. stuposum Pers.*, rhabdis ramosis umbrinis fulvisque glabris intertextis sensim tenuatis, lignum fissum plerumque penetrantibus. — *Oz. stuposum Pers. myc. I. 87. Link. sp. I. 138. Dub. gall. II. 934. Dematium stuporum Pers. syn. 696. Byssus intertexta DC. gall. II. 68.*

Ad trabes putrescentes defossas subterraneum.

1477. *O. auricomum Lk.*, rhabdis primariis simplicibus rigidulis subfasciculato-comosis porrectis aurantio-rufis setosis, dein in alios arachnoideo-capillares secedentibus incumbentibus, hypham mollem ramosam tenuiter tortuosoque intertextam fulvam mentientibus. — *Oz. auricomum Link obs. I. 19., spec. I. 138. Dub. gall. II. 934. Grev. crypt. t. 260. O. fulvum Pers. myc. I. 87. Himantia fulva Spr. syst. IV. 559. Rhizomorpha capillaris Roth in Uster. Ann. Ceratonema capillare Pers. syn. 695. Byssus fulva Huds. Humb. frib. 62. B. barbata Engl. bot. t. 701. B. aurantiaca DC. gall. II. 68.*

Ad areas ligni faginei caesi, sub tecto arescentes rarius. (Habitu torvo et colore insigne.)

1478. ?*O. flammeum W.*, rhabdis clavaeformibus miniatoflammeis in apicem byssoidem dilutiorem deplanatis. *Himantia flammnea Junghuhn in Schldt. Linn. 1830. p. 408. t. 7. f. 4. ?H. lateritia Bull.*

Inter folia putredine conglutinata Hercyn. infer. (Junghuhn.)

157. DEMATIUM LK. Starrfaser.

Rhabdi ramosi decumbentes continui simplicissimi integrimi (nec secedentes) opaci persistentes, in stratum tomentosum inconditum laxe intertexti, sporangiis sporidiisque (saltem conspicuis) destituti.

(*Dematium Lk.* nec *Pers. Racodii et Xylestromatis spec. Pers.*)

1479. *D. nigrum Lk.*, rhabdis intricatis e gryseo-fuscove nigris mollibus, in stratum effusum crassum contextis. *Link obs. I. 19.*, sp. *I. 131.* *Sporotrichum nigrum Lk. obs. II. 35.* *Racodium vulgare et resinae Fr. obs. I. 215.* *R. nigrum Schum.*

Ad arbores putrescentes minime rarum.

1480. *D. mollissimum Lk.*, rhabdis intricatis e gryseo et fusco nigris mollissimis, in stratum effusum crassum contextis. *Link sp. I. 132.*

Ad corticem arborum agri rostoch. (*Link.*) (Praecedente crassius quidem nec tamen dissimile.)

1481. *D. rupestre Lk.*, rhabdis intricatis crassitie inaequalibus, in stratum pannosum ellusum crassum laxe contextis, aterrimis. — *D. rupestre Link obs. I. 19.*, sp. *I. 133.* *Nees fung. 76. f. 73.* *Mart. erl. 358.* *Racodium rupestre Pers. syn. 701.*, myc. *I. 68.* *Byssus rupestris DC. gall. II. 592.* *B. nigra auct.*

Ad rupes a sole retractas cryptarum montium editiorum, Hercyn. v. c. abundat.

1482. *D. rupincola Lk.*, rhabdis intricatis crassitie subaequalibus, in stratum crassum effusum contextis, atris. — *D. rupincola Link sp. I. 133.* *Racodium rupestre β. petraeum Pers. syn. 701.* *Byssus petraea Wulff.*

Ad rupes umbrosas German. austr. (*Wulffen.*)

1483. *D. geotrichum W.*, rhabdis elongatis arachnoideis ramosissimis, in stratum tenuatum pannosum longe effusum cubilibusque adhaerens laxe intertextis, stygiis.

Ad terram limosam Hercyn. infer. minime rarum.

1484. *D. badium Lk.*, rhabdis teneris ramosis, in stratum effusum crassiusculum contextis, badiis. — *Dematium badium Link sp. I. 132.* nec *Dub. et Pers.*

Ad ramos arborum dejectos German. (*Link.*)

1485. *D. jubatum* Lk., rhabdis intricatis e fusco-gryseis in stratum effusum laxum lanosum elasticum intertextis. — *Dematium jubatum* Link t. l.

Ad ramos udos humi jacentes agri rostoch. (Link.)

1486. *D. castaneum* Lk., rhabdis densis parallelis, in stratum longitudinaliter effusum constipatis, ferrugineo-badiis. — *Dematium castaneum* Link t. l. *D. badium* Dub. gall. II. 933. *Racodium castaneum* Pers. myc. I. 70.

Ad ramos exsiccatos Hercyn.

1487. *D. Aluta* Lk., rhabdis cinnamomeis tenuibus, in stratum pannosum late expansum dense constipatis. — *Dematium Aluta* Link sp. I. 134. *Dub. gall.* II. 933. *Racodium Aluta* Pers. syn. 702., myc. I. 69. *Byssus Aluta* DC. gall. II. 10.

Intra arbores cavas et ad trahes cryptarum.

1488. ?*D. giganteum* Chev., rhabdis intricatis pallide alutaceis, in stratum coriaceo-suberosum latissimum obesum constipatis. *Dematium giganteum* Chev. par. I. 79. *Dub. gall.* II. 933. *Byssus gigantea* DC. gall. II. 67. *Xylostroma Corium* Pers. myc. X. *giganteum* Tod. mecl. I. t. 6. f. 51.

Intra arborum fissuras passim. (Dubii generis vegetabile, aliis cojuscunque monstrum.)

1489. ?*D. violaceum* Pers., rhabdis simplicibus brevibus violaceis, caespitulos parvos concolores dein caesios constituentibus. *Dematium violaccum* Pers. syn. 697. *Byssus phosphorea* L. spec. 1638. Roth germ. III. 564. Dill. hist. t. 1. f. 6. Mich. gen. t. 90. f. 3.

Ad ligna putrida. (Persoon.) (Dubium quidem at synonymis celeberrimum.)

1490. *D. cinnabarinum* Pers., rhabdis brevissimis parce ramosis, pulvinulos penicillatos subrotundos confluentes praestantibus, primum cinnabarinis dein gryeo-expallescientibus. — *Dematium cinnabarinum* Pers. syn. 697. (in fungo), myc. I. 14. (in Abiete). *Dub. gall.*

IL 934. D. abietinum Ditm. Spr. syst. IV. 553. Sporotrichum abietinum Link obs. I. 11. Byssus abietina Fr. fems. 43.

Ad trunco Abietum udos Hercyn. et ad alia quaeunque ligna putrida. (Treutepohiac aureae tam simile ut oculis nudis distingui nequeat.) *Linkius* pro alga habet (*sp. I. 41.*)

1491. *D. Nidulus W.*, rhabdis simplicissimis tenerimis brevibus, e basi dense implexa constipata undique aequaliterque assurgentibus apicibusque liberis, nidulum figuratum veluti conosum rotundum exiguum centro impressum pallide-fuscum mentientibus.

Ad Thelephoras emergit Himantias Thuring. (*Waller.*) (Habitu omnino Chaetomium s. Pezizolam aemulatur, nec tamen sporidia vidi inter rhabdorum complexum asporum.)

N.B. Praeter meas, alias complures, a Persoonio aliisque ad amussim traditas consulto omisi hujus generis species, utpote amphibolas ac valde paradoxas.

@@ torulosi, rhabdis basi continuis s. septatis simplicibus farctis saepius rigidulis, nunc ad apicem sive infra illum difformibus, in articulos cokaerentes s. moniliformes vel facile secedentes divisis, nunc corpora similia figurata septisque transversais s. longitudinalibus intercepta, ad latera laxe appensa et ex aqua facile dilabentia, libera, veluti sporomorpha promentibus, sive conglobata terminalia exserentibus, ex olivaceo nigris, strata s. fasciculos stygios mentientibus. (*Ryssi disjuncti Nees. Mucedineac byssaceae Dub.*) Familia charactere ancipiti insignis; fabrica rhabdorum difformium stipatorum olivaceo-coloratorum ad Rhabdomycetes, corpusculis sporomorphis, vix nisi rhabdos secundarios s. appendices spondentibus, a rhabdis difformibus, ad Hyphomycetes reflectens.

158. BALANIUM W. Eichelknopf.

Rhabdi continuoi vase-ramosi opaci, ad extremitates dichotomas, corpuscula sporomorpha obovata in basin

sensim tenuata et veluti pedicellata sustinentes, demumque excutientes. (Cum *Hyphomycetum Melidio* analogon.)

1492. *B. stygium* W., rhabdis continuis opacis vag-
e-ramosis, extremitatibus dichotomis corpuscula sporo-
morphia subpyriformia demum secedentia sustinentibus,
in stratum nigrum effusum laxe intertextis. *Balanium*
stygium Wallr. in lit.

Ad ligna putredine exesa sub sepimentis occultata Thuring. (Wallr.) (Rhabdi e basi simplici continui vase-
ramosi, in extremitates patentes dichotomas, primum cor-
pusculo sporomorpho obovato solitario coronatas desi-
nunt illisque basi pedicelliformi facile fracta, undique
dispersis insperguntur, et cubilia strati fibrosi stygi
parce inquinantis instar, longe lateque obducunt.)

159. GONGYLOCLADIUM W. Dorfasser.

Rhabdi erecti simplices septati e basi tenuata inde
sensim tomentes et veluti in tubercula subrotunda in-
flata articulati, primum continui dein sensim magis con-
stricti inque articulos subrotundos dilabentes. (?*Oede-*
mium Lk.)

1493. *G. atrum* W., rhabdis simplicibus implexis
decumbentibus, in strata effusa crassiuscula dense aggre-
gatis, atris. — *Oudemium atrum* Link spec. I. 43.

Ad corticem Tiliae putrem agri northus. (Wallr.) (Rhabdi a media inde parte in articulos subrotundos in-
tumescunt, primum habitum strumosum s. tornosum
mentiuntur, deinde vero in illos secedunt jugiter nunc in-
termixtos fucumque cum sporidiis liberis *Hyphomycetum*
facientes.)

160. SPONDYLOCLADIUM MART. Quirlfasser.

Rhabdi erecti stricti parce ramosi opaci rigidi annu-
lato-moniliformes in ramos conformes verticillatos divisi.
— (Cum *Stachylidio* *Hyphomycetum* analogon. Martius.)

1494. *Sp. fumosum* Mart., rhabdis brevissimis erectis, e basi simplici in ramulos quateros subverticillatos divisus articulisque subglobosis moniliformibus interceptis, in stratum fumoso-nigrum aggregatis. — *Spondylocladium fumosum* Mart. eti. 355. Link spec. I. 78. *Dentatium verticillatum* Hoffm. germ. III. t. 13. f. 1. (rudis.)

Ad ligna putrida herbasque mucidas auctumno.

161. HELICOTRICHUM NEES. Wickelfaser.

Rhabdi simplices s. ramosi septati rigiduli. Appendices sporomorphae cylindricae circinatae fugaces.

(*Helicosporium* et *Helicotrichum* Nees. Lk.)

1495. *H. vegetum* Nees., rhabdis rigidulis acutis dense aggregatis nigris, appendicibus sporomorphis spiraliter involutis septatis, ad basin inspersis viridi-gryseis. — *Helicosporium vegetum* Nees syst. 68. f. 69. Pers. myc. I. 18. Link spec. I. 51.

Ad ligna putrida Franconiae. (Nees.)

1496. *H. pulvinatum* Pers., rhabdis tenerrimis arachnoideis ramosis praeter apices septatos continua sordide olivaceis opacis, in stratum lanosum laxe-intertexis, appendicibus spiraliter involutis obsolete-septatis creberrimis deciduis, circa basin flaventem interspersis. — *Helicosporium pulvinatum* Pers. myc. I. 19. Spr. syst. IV. 553. *Helicotrichum pulvinatum* Nees act. Leopold. IX. 246. t. 5. f. 15. Link spec. I. 33.

Ad truncos putridos Franconiae. (Nees.)

162. POLYTHRINCIUM KZ. Paternosterfaser.

Rhabdi erectiusculi simplices moniliformes olivacei fasciculos caespitosos densos atro-virides constituentes. Appendices sporomorphae 1-septatae s. didymae, dein interspersae.

1497. *P. Trifolii* Kunz., rhabdis rigidulis curtis subdiaphanis, ex articulis inaequalibus contiguis monili-

formibus concatenatis, in grumulos primum pulvinatos circumscriptos dein confluentes olivaceo-fuscos, maculae flavae incidentes dense congestis, appendicibus sporomorphis ovalibus concoloribus hyalinis dein juxta basin interspersis. — *Polythrinoidum Trifolii* Kunz. et Schm. myk. Hft. I. 13. t. I. f. 8. Link spec. I. 43. Grev. cr. t. 216. *Trichothecium Trifolii* Spr. syst. IV. 552.

Ad Trifoliorum nostratum vegetorum folia plerumque hypophyllum, passim. (Habitu erysibode facile decipit.)

163. ARTHRINIUM KZ. Gliederfaser.

Rhabdi simplices depressi septis crassiusculis opacis interstincti, veluti torulosi caespitulos, parvos constituentes. Appendices sporomorphae opacae farctae, e figura ovata fusiformique variae diversimode septatae.

(*Arthrinium* Kz. *Campoum*, *Goniosporium* et *Sporopklem* Lk.)

1498. *A. Caricicola* Kz., rhabdis tenerimis moniliformibus decoloribus, in pulvinulos subrotundos exiguo sparsos fuscos dense congestis, appendicibus sporomorphis concoloribus opacis fusiformibus transversim longitudinaliterque septatis interspersis, rhabdorum mollem superantibus. — *Arthrinium caricicola* Kunz. et Schm. L. I. t. I. f. 4. II. 102. Link spec. I. 42. excl. syn. Fries.

1499. *A. curvatum* Kz., rhabdis tenerimis erectiusculis remote-septatis curtis fuscescentibus, in caespites dein confluentes velutinos dense congestis, appendicibus sporomorphis creberrimis minutissimis ovatis curvatis concoloribus subsimplicibus opacis interspersis. — *Arthrinium curvatum* Kunz. et Schm. L. I. II. 103. *Campoum curvatum* Link spec. I. 44.

Ad folia Scirpi lacustris arida agri lips. (Lehmann.)

1500. *A. puccinioides* Kz., rhabdis elongatis tenuibus fuscis, in caespites exiguo velutinos laxe con-

gestis, appendicibus sporomorphis creberrimis minutis concoloribus spaciis 3-4 gonis. — *Arthriniucl. puccinoides* Kunze et Schm. l. t. II. 103. *Goniosporiucl. puccinoides* DC. gall. II. 75. *Xyloma caricinum* Fr. obs. II. 361. t. 1. f. 4. (teste Kunze.)

Ad folia Caricum collinaram arida agri v. c. lipaiens. (Kunze.)

1501. *A. Sporophleum* Ks., rhabdis tenuibus curtis fuscis remote-septatis, appendicibus sporomorphis minutis copiosissimis oblongis utrinque acutis concoloribus. — *Arthriniucl. Sporophleum* Kunz. et Schm. l. L. *Sporophleum gramineum* Nees in lit. Spreng. Grundz. t. 5. f. 5. Link spec. I. 45.

Ad folia graminum arida passim.

1502. *?A. pyrinum* W., rhabdis curtis e basi condita inde simplicibus bacillaribus subpellucidis torulosis, appendicibus sporomorphis lateralibus s. subterminalibus oblongis utrinque acuminatis basi tenuata leviter adnatis pellucidis simplicibus rhabdorum molem subaequantibus illisque duplo brevioribus, maculam olivaceo-fuscam tenuissimam rotundam aequalem efficiuntibus. — *Bryotrichum pyrinum* Wallr. in lit.

Ad utramque Pyri communis foliorum faciem v. c. circa Heringam Thuring. (Wallr.) (Appendices sporomorphae simplices nec transversim vel potius longitudinaliter septatae itaque a genere desciscere videntur. Nolum tamen dubius novum genus servare.)

164. HELMISPORIUM Lk. Ringelkenle.

Rhabdi erecti rigiduli simplices s. parce ramosi opaci continui s. septati sparsi confertique distincti. Appendices sporomorphae e figura clavata cylindricae laterales, basi tenuata appensa septatae pelluerdae, dein facile sedentes,

(*Helmisporiucl. Lk. obs. Helminthosporiucl. Pers. myc. et Lk. sp. Coelosporiucl. Lk.*)

1503. *H. gracile* W., rhabdis simplicibus nodosis graciliscentibus erectis pellucidis fasciculatis, appendicibus sporomorphis circa apicem congestis ovatis minimis 3-4 septatis utrinque obtusiusculis, rhabdorum molem subaequantibus. — *Helmisporium gramineum* W. oīd.

Ad folia vaginasque graminum cerealium sicoa et Iridum folia passim.

1504. *H. cylindricum* W., rhabdis simplicibus nodosis flexuosis curvatisque opacis dense caespitosia, appendicibus sporomorphis cylindricis utrinque attenuatis acuminatis, rhabdo duplo crassioribus illoque quater brevioribus. — *Helmisporium cylindricum* W. in lit.

Ad lignum coryleum putridum Thuring.

1505. *H. nanum* Nees, rhabdis simplicibus sparsis subnodosis distinctis opacis rigidulis curtis erectis, appendicibus subcylindricis utrinque obtusis 3-5 septatis, rhabdum subaequantibus illoque duplo crassioribus. — *Helmisporium nanum* Nees syst. 67. f. 65. Link spec. I. 49. Dub. gall. II. 929. *Cladosporium nanum* Spr. syst. IV. 553.

Ad ligna putrida minime rarum.

1506. *H. fugax* W., rhabdis simplicibus aequalibus opacis erectis distinctis sparsis, appendicibus sporomorphis majusculis oblongo-cylindricis pellucidis septatis caducis. — *Acrosporium conservoides* Wallr. in lit.

Ad Agrostis Spicae venti culmos, praeprimis ad nodos, Thuring.

1507. *H. simplex* Nees, rhabdis simplicibus s. parce ramosis dense aggregatis, appendicibus sporomorphis pellucidis fusiformibus obsolete septatis. — *Helmisporium simplex* Nees nov. act. Leopold. IX. 241. t. 5. f. 11. Pers. myc. I. 18. Link spec. I. 50.

Ad ligna salicina agri Lipsiens. (Kunze.)

1508. *H. tenuissimum* Nees, rhabdis simplicibus erectis olivaceo-nigris laxe caespitosia, appendicibus spo-

romorphis ad basin congestis olivaceis clavatis. — *Helmisporium tenuissimum* Nees l. l. 242. t. 5. f. 1. Link spec. I. 50. Dub. gall. II. 929.

Ad caules herbarum siccis nec non ad petala florum compositorum marcida (v. c. Anthemidum), passim.

1509. *H. subulatum* Nees, rhabdis subsimplicibus subulatis laxe aggregatis, appendicibus sporomorphis clavatis pellucidis. — *Helmisporium subulatum* Nees l. l. t. 5. f. 13. Pers. et Link l. l.

Ad ramulos quercinos Franconiae. (Nees.)

1510. *H. minus* Lk., rhabdis subramosis atris laxe aggregatis, appendicibus oviformibus obsolete septatis. *Helmisporium minus* Link spec. I. 48.

Ad ramulos putridos passim.

1511. *H. pellucidum* Kz., rhabdis ramosis aggregatis pellucidis fusco-nigris brevibus, appendicibus sporomorphis pyriformibus, in basin veluti stipitiformem productis. — *Helmisporium pellucidum* Kunze apud Link spec. I. 49.

Ad ramulos dejectos agri Lipsiens. (Kunze.) (Quid sit *Helmisporium subramosum* Kunz. in lit. s. *Conoplea fusca* Pers. myc. I. 12. mihi latet.)

1512. *H. nodosum* W., rhabdis curtis nodosis tortuosis atro-viridibus, in stratum effusum velutinum stygium congestis, appendicibus ovalibus utrinque acuminatis concoloribus obsolete septatis.

Ad traeum fagineum Hercyn. (Waller.)

1513. ?*H. coelospermum* Lk., rhabdis ramosis aggregatis in caespitulos globosos congestis, appendicibus sporomorphis globosis orificio subrotundo dehiscentibus, demum cavis. — *Helmisporium cavispermum* Link obs. II. 38. *Coelosporium fruticulosum* Link spec. I. 46. excl. syn. Pers. *Erineum articulatum* DC. gall. II. 74.

Ad graminea siccata. (Link.)

1514. *H. vesicarium* W., rhabdis subsimplicibus pellucidis articulis ovatis geniculato-interstinctis teruloso-moniliformibus, appendicibus sporomorphis ovato-subglobosis utriusque obtusis maximis inflatis pellucidis transversim longitudinaliterque disseptis veluti quadrilocularibus, grumulos fasciculatos sparsos nigro-virentes mententibus. — *Dematium articulatum* Pers. syn. 694. pr. pr.

Ad Allii sativi scapos siccios, auctumno minime rarum. (Appendices Pucciniae sporidia majuscula fere simulantur.)

1515. *H. Cheiranthi* Libert, rhabdis erectis simplicibus pellucidis subnodosis septatis, appendicibus sporomorphis copiosissimis maximis pyriformibus, basi producta appensis septis transversis pluribus longitudinalibusque interstinctis veluti celluloso-reticulatis, extus torulosis, rhabdo duplo crassioribus, areas effusas nigro-olivaceas praestantibus. — *Helmisporium Cheiranthi* Libert in Desmaz. crypt. n. 213. Dub. gall. II. 929. *Puccinia Cheiri* Lestib. bot. belg.

Ad folia Cheiranthi annui cheirifolii languescentia, auctumoi tempore minime rarum.

1516. *H. praelongum* W., rhabdis depresso apice subramosis nigro-olivaceis pellucidis laxe caespitosis articulatis curtis, appendicibus sporomorphis cylindricis praelongis aequalibus rectis opacis obscure-(10-15) septatis concoloribus rhabdos dein caducos obliterantibus.

Ad Georginae canes patres hortor. thuring. (Singularis sp., quae rhabdis facile evanescentibus, ex appendicium caterva superstite, Hormiscium plane refert.)

1517. *H. velutinum* Lk., rhabdis parce ramosis opacis obsolete septatis obtusis nigrescentibus praelongis strictis obtusis dense aggregatis, cubilia (ramulos) uniuersique veluti strigorum propexarum agmine stygio ambeuntibus, appendicibus sporomorphis subcylindricis basi attenuatis 3-8 septatis pellucidioribus. — *Helmisporium velutinum* Link obs. I. 8., spec. I. 47. Nces syst. f. 65.

*Mart. crl. 350. Grev. cr. t. 148. f. 2. Dematium ciliare
Pers. syn. 694. Sphaeria ciliaris DC. gall. VI. 131.
Hypoxylon ciliare Bull. fung. t. 468. f. 1.*

Novellas maxime coryleas a trunco reciso inde nascentes languidas passim ambit, habitu torvo ac colore stygio oculos alliciens fucumque cum Sphaeriis ceratoatomis faciens.

165. CLADOSPORIUM LK. Kettenfaser.

Rhabdi erecti simplices continui aggregati in extremitates septatas torulosas excurrentibus inque articulos subrotundos (*sporidia auct.*) secedentibus.

(*Cladosporium Link. Mart. Nees et auct. Dematii sp. Pers.*)

1518. *Cl. tenerimum Lk.*, rhabdis dense aggregatis albis, extremitatibus in articulos globosos demum secedentibus. — *Cladosporium tenerimum Link sp. I. 41.*

Ad corticem arborum putrescentium pasim.

1519. *Cl. fuscum Lk.*, rhabdis dense aggregatis fuscis, extremitates parce ramosas in articulos globosos secedentes spargentibus, tomentum duriusculum fuscum epicaulon mentientibus. — *Cladosporium fuscum Link sp. I. 40.*

Ad caules herbarum elatiorum et fruticum tenellorum, Rosae v. c., variis German. locis.

1520. *Cl. polysporum Lk.*, rhabdis atris curtis in strata effusa aggregatis, ex spice in articulos globosos plurimos secedentibus. — *Cladosporium polysporum Link sp. I. 40.*

Ad ligna putrescentia agri berolin. (Link.)

1521. *Cl. atrum Lk.*, rhabdis atris strictis in stratum crassiusculum effusum dense aggregatis, ex apice inflexo in articulos globosos raros secedentibus. — *Cladosporium atrum Link obs. II. 38., sp. I. 40.*

Ad caules herbarum elatiorum siccios v. c. circa Lipiam (Schmidt), Vratislaviam (Link) et alibi passim.

1522. *Cl. graminum Lk.*, rhabdis sparsis fasciculatisque curtis microscopicis gryseo-nigrescentibus ex apice articulos globosos parcos demittentibus. — *Cladosporium graminum Link* sp. I. 42. *Dematium graminum Pers. myc.* I. 16.

Ad folia culmosque graminum arescentiam.

1523. *Cl. herbarum Lk.*, rhabdis atro-viridibus simplicibus fragilibus depressis in stratum demum effusum constipatis, plurimis extremitutes tornosas fragiles exserecentibus. — *Cl. herbarum Link* obs. II. 37., sp. I. 39. *Nees syst.* 67. f. 64. *B. Mart. erl.* 351. *Acladium herbarum Link* obs. I. 10. *Dematium herbarum Pers. syn.* 699., *mycol.* I. 15. *D. graminum Pers. l. l.*

Ad vegetabilia quaecunque humi rejecta, ad ore continuo irrorata, copiose.

1524. *Cl. epiphyllum Nees*, rhabdis parce ramosis fasciculato-ramosis atro-viridibus, ex apice in articulos plurimos ovato-subglobosos facile secedentibus. — *Cladosporium epiphyllum Nees.* *Mart. erl.* 351. *Dematium epiphyllum Pers. syn.* 695. *myc.* I. 16. (a *Linkio praecedenti subscriptum.*)

Ad folia humecta, quercina potissimum.

1525. *Cl. Fumago Lk.*, rhabdis curtis subbacillaribus obsolete-torulosis vase ramosis erectis aggregatis, ex apice in articulos minutissimos globosos conglomeratos hyalinos secedentibus usque demum delapsis, stratum ellusum tenuiter membranaceum sordide-stygium constituentibus. — *Cladosporium Fumago Link* spec. I. 41. *Fumago vagans Pers. myc.* I. 9. *Syncollesia foliorum Agrdh syst.* 52. *Torula Fumago Chevall. par.* I. t. 3. f. 4.

Ad foliorum vivorum paginam superiorem, *Tiliae*, *Humuli*, *Ulmi*, *Populi*, *Betulae* et *Salicum* patruarum aliarumque pl. sub dio et in caldariis vigentium passim, aestate praeprimis calida post pluvias. (Hoc scilicet, *Humuli* pestem, quam *Goetheus* noster sciscitatur, constituit naturamque vegetabilem penitus exxit.)

1526. *Cl. dendriticum* W., rhabdis brevissimis simplicissimis continua subnodosis, apice uniseptatis ibique articulum ovalem oblongumque hyalinum exserentibus, in fasciculos punctiformes seriatim dispositos minutissimos, muculam subrotundam belle dendriticam perficientes demumque confluentes congestis. — ? *Fumago Mali Pers. myc. I. 9.*

Ad Pyri Mali folia epigenum, auctummo, Thuring. passim. (*Wallr.*) (Dothidea hirsutas similiter saepius dispositas, habitu externo penitus refert, et auctummo sero maculas contiguas circumscriptas stygias aemulatur.)

166. RHACODIUM PERS. EMD. Knopffaser.

Rhabdi capillares ramosissimi decumbentes in strata mollia incondita intertexti, contingi, versus extremitates annulato-moniliformes, corpuscula granulata sporangiomorpha tanica tenui velata, appendicibus sporomorphia torulosis conglobatis farcta profereentes demumque fasciendo spargentes.

(*Racodium Pers. ex emend. Lk. Antennaria Link et Nees ex emend. Fries. nec Gaertn. et R. Brown.*)

1527. *Rh. cellare* Pers., rhabdis arachnoideis continua, primum flaventibus, deinceps olivaceo-nigris, demum atro-fuligineis vase ramosis, in paucum crassum laxe intertextis, ad extremitates obsolete-moniliformes corpuscula sporangoidea rotunda, stupa torulosa simili farcta, pulveris pyri specie inhaerentia proferentibus. — *Racodium cellare* Pers. syn. 701. *Link sp. I. 26. Nees syst. f. 70. Grev. crypt. t. 259. Antennaria cellaris Fr. syst. III. 229. Fibrillaria vinaria Sowerb. Byssus cryptarum DC. gall. II. 67. B. septica Roth. B. mollissima Ehrh. B. dolaris Vittm. — Dill. hist. t. 1. f. 12.*

Ad dolia paeprimis vinaria et acetaria, in cellis diutius recondita, pro varia acetate stratorum crassitie, corporeorum sporangioideorum mole ipsoque colore intensa stygio varians.)

1528. *Rh. pityophilum* W., rhabdis ramosis decumbentibus praeter apicem moniliformibus, in stratum inconditum ramos ambiens grumulosum compactum coactis, corpuscula graniformia, stupa simili torulosa farcta proferentibus illisque jogiter mixtis. — *Torula fuliginosa* Pers. mycol. I. 21. *Antennaria pinophila* Nees syst. 279. f. 298. Mart. erl. 353. Link sp. I. 118. Fr. syst. III. 231. *A. Elates* Spr. syst. IV. 558. *Monilia Piceae* Funk. *Dematium fuliginosum et pinastrum* Schleich.

Ad ramulos languescentes Pinus Piceae, in altis pinetorum alpestrium penetralibus.

1529. *Rh. aterrimum* Ehrenb., rhabdis brevibus rigidis atro-nitentibus, in stratum effusum expansis, ad apices in articulos subovales pellucidos solutis. — *Racodium aterrimum* Ehrenb. sylo. 10. 12. Schtdl. berol. 153. Link sp. I. 26.

Ad trunco putridos Pinorum agr. berol. (Ehrenberg.)

1530. *Rh. rubiginosum* Fr., rhabdis mollibus rubiginosis dense contextis, corpuscula rotunda concolora elevantibus. — *Rh. rubiginosum* Fr. obs. II. 370. Link sp. I. 27. *Byssus intertexta* DC. gall. II. 68.

Ad ligna vetusta odorum.

N.B. Generis notio minus bene liquet, nec in corporis calis sporangioideis nil nisi rhabdorum congregatorum video rudimenta, quae fatiscendo inter se miscentur.

◎◎◎ *corticati, rhabdis continuis demum tegmen corticatum circumducentibus, intus inanibus s. laxe farctis.*

167. CERATONEMA PERS. Hornfaser.

Rhabdi teretinsculi subsimplices liberi tenuiter membranacei continui rhizomorphi intus iuvanes, sporidiis et corpusculis sporangioideis destituti.

(*Ceratonema et Capillaria* Pers. myc. *Rhizomorphae et Isariac* sp. auct.)

1531. *C. capillare* Pers., rhabdis tenuissimis ramosis capillaribus primum croceis sequacibus dein exsiccando compressis fuscescentibus. — *Rhizomorpha capillaris* Roth in Uster. Ann. I. 8. t. 1. f. 3. *Ceratонema capillare* Pers. myc. I. 49.

Inter folia dejecta putrescentia.

1532. *C. Arundinis* W., rhabdis ramosissimis fusco-nigricantibus, in strata tenuia macularia laxe congestis. — *Capillaria Arundinis* Pers. myc. I. 51. *Rhizomorpha conservoides* Chaill.

Intra calmos Arundinis Phragmitis.

1533. *C. fucinum* W., rhabdis vage patentimque ramosis teretibus dein ligamentosis alternatim compressis, in strata mollia laxe congestis fusco-purpurascentibus.

Inter tomentum spongiosum Parmeliae coerulescentis Hercyn. et Thuring. passim.

1534. *C. Crabronis* Pers., rhabdis simplicibus elongatis fasciculatis erectis nodo centrali interceptis dilute ambrinatis, apice tenerrimo dilutioribus. — *Ceratонema Crabronis* Pers. myc. I. 48. *Isaria sphæcophila* Ditm. in Sturm germ. III. 115. t. 57.

Supra Vespa Crabronem emortuam agri rostoch. (Ditm.)

1535. *C. hippotrichodes* Pers., rhabdis filiformibus teretiusculis nitidis nigro-fuscis parce-vagiterque ramosis flexuosis, setam equinam mentientibus. — *Ceratонema hippotrichodes* Pers. myc. I. 49. *Rhizomorpha setiformis* Roth cat. I. 235. Mart. erl. 360. *Lichen hippotrichodes* Web. spic. 231. *Hysus filamentosa* Guett. — Dill. hist. t. 13. f. 11. B.

Ad folia acerosa delapsa patredine conglobata Hercyn. v. c. miuime rerum. (Cum corpusculis sporangoides Rhizomorphum tuberculosam designantibus nunquam vidi, quae pro radicibus Agarici androsacei a Friesio (syst. I. 137.), Persoonio negante, habetur mihiique satis dubium, synonymis modo dignum laudatur.)

168. RHIZOMORPHA ROTH. Rindenfaser.

Rhabdi primum hyphideo-arachnoidei nivei heliophobi sparsi mucidi, deinde sive in membranam sive in funiculos teretiusculos ramosos coacti fuscescentes tegmenque crustaceum rigidum stipatum circumducentes, hinc inde in corpuscula sporangoidea papillaeformia, stupam conformem tortam e vertice profundentia (*tubercula sphaeruliformia* Pers. myc., *apothecia* Ach.) succrescentes.

(*Rhizomorpha* Roth cat. I. 231. et alior. Cf. DC. bullet. de scie. nat. V. no. 74. p. 102. t. 12. f. 2. Eschweiler de fructif. *Rhizomorphae* comment.) (Genus vexatum, a plurimis auctoribus Fungis (Pers. Roth. Mart. Spr. Fr.), ab aliis (Humb. Web. Achar.) Lichenibus adscriptum, ab aliis denique (Fries. Eschweiler. Mart.) seu Fucus aereus cum Algis comparatum.)

† notae cum corpusculis sporangoideis.

1536. *Rh. tuberculosa* Ach., rhabdis corticatis filiformibus subsimplicibus fuco-nigris, hinc inde corpuscula globosa sporangoidea concolora proferentibus. — *Rhizom. tuberculosa* Ach. syn. 290. *Rh. setiformis* β. *tuberculosa* Ach. lich. 589. Roth cat. I. I. *Chaenocarpus setosus* Rebent. neom. 530. t. 3. f. 12. pr. pr. *Hypoxylon loculiferum* Bull. t. 135. *Lichen setosus* Leyss. hal. Roth.

Ad ligna diutius in cellis recondita, nec non in pineorum penetralibus uscis ad ligna. (Comparanda tum natura tum synonymis cum Ceratonemate hippotrichode, vix forsitan distineto.)

1537. *Rh. subterranea* Pers., rhabdis demum corticatis teretiusculis protensis pennae corvinæ molem aequantibus nigro-fuscis undique ramos patentes teretes tenuiores confertos liberos s. tentaculatos emittentibus, corpuscula sporangoidea papillaria, stupam tortam dilutius fuscescentem demum prouentia proferentibus. — *Rhizomorpha subterranea* Pers. syn. 705., myc. I. 56. Eschw. I. I. t. 1—9. *Rh. putealis* Pers. myc. I. I. Mart. erl. 360. *Fibrillaria subterranea* Pers. I. I. *Rh. dicho-*

toma Sowerb. Ach. *Rh. spinosa* Ach. *Usnea radiciformis* Scop. *Lichen radiciformis* Humb. frib. 34. Web. spic. 232.

Ad trabes fodinarum plurimarum, nec non ad puteorum canales defossos, quas circumcirca saepe amplectitur. (Mole, expansione et ramorum dispositione eximie varians, praeter varietates l., alias procul dubio excipiens.)

1538. *Rh. divergens* Grcv., rhabdis demum corticatis ramosissimis teretibus spadiceo-fuscis, ramis divaricatis in ramulos subpalmatos derinentibus corpore scutulaque sporangioidea clavata exserentibus. — *Rhizom. divergens* Grcv. cr. t. 154. Spr. syst. IV. 542. *Rh. filicina* Rebent. neom. ind. berol. *Rh. palmata* et *flabelliformis* Pers. myc. *Rh. variegata* Sowerb.

Sub cortice pinuum Hercyn.

1539. *Rh. subcorticalis* Pers., rhabdis demum corticatis compressis fuscis, nonnisi in membranam taeniatum, e latere fibrillas transversales tentaculatas exserentem expansis, inter corticem et laburnum invalescentibus, hinc corpuscula sporangioidea conica exserentibus. — *Rhizom. subcorticalis* Pers. syn. 704., myc. I. 54. Spreng. syst. IV. 542. *Rh. fragilis* Roth l. l. Dub. gall. II. 867. *Rh. scandens* Rebent. neom. 391. Pers. myc. *Rh. Harrimanni* Pers. Ach. *Rh. corticata*, *Friesii* et *corrugata* Ach. teste Spr. *Lichen aidaelus* Humb. frib. 33. *Clavaria phosphorea* Sowerb. — Mich. gen. t. 66. f. 3. Flor. dan. t. 713.

Sub cortice arborum variarum, *Salicu*m praeprinii et *Quercu*m exesarum. (Duplicates, more praecedentium, agnosacere solet variet., alteram taeniatum, rhabdis hinc inde membranaceo-taeniatis latescentibus; alteram *vir-gatam*, rhabdis cylindricis omnibus conformibus (*Rh. fragilis* f. *teres* Dub. l. l. *Rh. scandens* Pers.). *Rh. ve-stita* Rebent. est ejusdem monstrum byssō obductum. Librum arboreum in organismum distinctum inversum, ex cambii secretione mala et intempestiva haec vegetabilia praestare, Martius statuit.

† dubiae nec cum corpusculis sporangioideis visae.

1540. *Rh. fusca* Nestl., fusco flaccida compressa ramoso-intertexta, ramis extremis dilatatis membranaceis pallidis. *Spr. syst. IV.* 542. *Dub. gall. II.* 868..

In vasis magnis et puteis.

1541. *Rh. chordalis* Ach., fusca simplex filiformis longissima flexuosa intus alba. *Ach. in act. holm.*

1814. *Spr. syst. I. L. Rh. imperialis* Sowerb. *Rh. ob-*

struens Pers. *Rh. lara et simplex* Rebent. teste *Spr.*

Ad cortices siphonum putres.

1542. *Rh. Humboldtii* W., filiformis laevis opaca fascio-nigrescens intus rufa simpliciter pinnata, ramis horizontalibus distichis apice penicillatis. — *Rh. Achariana* Fr. *Spr. I. I. Rh. pinnata et crinalis* Pers. myc. *Lichen pinnatus et verticillatus* Humb.

Sub arborum cortice nec non in fodiosis. (Alias completes novas *Acharius* in *act. succ.* et in *synops. lich.*, *Friesius* (obs. I. 211. —) et *Persoonius* in *mycol. ean-*merat, quas quidem dubias consulto omisi.)

Ordo II.

SPOROMYCETES W. Sporen pilze.

Vegetabilia simplicia satis quandoque simplicissima omnino, vegetationis mycetoideae initia continuata partimque carpomorpharum, huic classi propriarum umbram veluti praestantia, saepius asyntheta, nonnisi solummodo ex parenchymate foliorum (postea sub tabis erysibodis casu oculis languescentium) penitus suisque locis inverso, integro s. disrupto, sive inter putredinem vegetabilem incutem primitus subeuntia eaque stasi favente ortum clandestinum, demum tum colore atieno, tum fabrica callosostipata praenotatura maturantia, ex sporidiis meris, neque thecis inclusis, neque ad mioiculis ellis fibrosis intertextis, sed inter se libere congregatis, massa sporacea

forsu foetis, nunc simplicissimis siveque e figura globosa magis minusve oblongatis, nunc 1-pluriesve septatis, figuram prorsus ovato-geminatam cylindricam basinque utrinque aequalem vel inaequalem tenuando inque stipitem suffulcentem producendo (*sporidia pedicellata* auct., sp. in *basin tenuata* potius) concinnantibus, nunc concatenatis, hyphasma moniliforme mentientibus, varie tamen reconditis, et sive foras profusis, cubilia integra veluti transigendo inquinandoque obvallantibus (*Sporomyces epispori*), sive ex parenshymate inverso inque conceptaculi calyculati, tubulosi cancellative figuram concinato s. strato carnosu, primum hypophloecode (*sporodochium*) exceptis (*Sp. hypospori*), sive illud, pseudostromatis vices agens ambeundo obsidentibus (*Sp. perispori*), sive denique conceptacula propria figurata vascularia infarcentibus composita, habitu prorsus perquam vario pulverulento, indole inquinante et colore e flavo, fusco nigrove insignia.

(*Dermatocarpi gymnospori* Pers. syn. *Coniomycetes* Mart. Schldl. Spr. *Mycetes crysiboidei* Wallr. *Gymnomyces* Lk. sp. *Uredines epiphytae et epixylae nigrae* Strauss. *Uredinaceae* Dub.)

A. epispori, sporidiis liberis ac profusis, aliis simplicibus, septatis basinque aequalem constringentibus s. inaequalem producentibus, aliis seriatim concatenatis, inter se facile secedentibus, massam tersam s. pulverulentam mentientibus, epidermidem immutatam plane transigentibus, tum adminiculis, tum stromate proprio destitutis, cubilia obvallando inquinandoque foras obliterantibus. (*Epiphytae genuinac et suffultae* Lk. *Uredines stilbosporae et nemasporeae* Dub.) Partium propagationi mycetoideae inservientium symbola.

a. coacti, sporidiis simplicissimis geminatisve jugiter conglobatis, massam coactam depresso depressam tersam, ex aqua adfusa tamen solvendam praestantibus, ex latibilis hypophloecodeis, saepe cirrhorum, stillarum s. scobis instar propullulantibus.

169. NEMASPORA EHRENB. Schleimranke.

Sporidia globosa microscopica simplicissima, in pallam convexam epidermidem transeuntem coacta, dein in cirrhos varie tortos conglutinata profluentia.

(*Naemasporae* recept. obsoleto s. nullo Pers. DC. Nees. *Nemaspora* Ehrenb. Fr. Dub. *Myxosporium* Lk.)

1543. *N. crocea* Pers., sporidiis globosis microscopis, cirrhos ex massa hypophloode convexa profluentes varie tortos croceos succinicos emitentibus. — *Nemaspora crocea* Pers. syn. 109. Ehrenb. *sylv.* 12. Nees syst. t. 366. Dub. *gall.* II. 885. *Myxosporium croceum* Link sp. II. 99.

Ad liguorum fagineorum cortices, primum putredinis initium simulac vulgare.

170. COCCOSPORA W. Kornsporling.

Sporidia sphaerica pellucida simplicissima majuscula, in massam difformem liberam tunica destitutam conglobata, veluti muce conglutinata, ex aqua facile solveuda.

1544. *C. aurantiaca* W., sporidiis sphaericis simplicissimis majusculis pellucidis croceis, in massam amorpham graniformem cylindricam aurantiacam coactis.

Ad ligna putredine exesa, sub quisquiliis similibus defossa usque laxe appensa Thuring. (Waller.) (Corpuscula liguis radiculisque laxe appensa, amorpha, saepius tamen & figura oblonga cylindrica laevigata, belle aurantiaca, sub vitris sporidiorum majusculorum croceorum, inter se ex aqua facile solvendorum, ovalis piscium haud dissimilium complexum nudum praestant ideoque a Pollyangio facile discernuntur.)

171. PHLOEOSPORA W. Blattsporling.

Sporidia cylindrica angustissima pellucida, septis tenuerrimis interstincta, conglutinata cirrhoramque coactorum instar ex summa epidermidis pellicula scissa pro-

pullulantia, dein in grumulos depresso maculares stipatos considerantia, ex aqua adfusa facile solvenda.

(*Septaria* Kunz. *Fr. Stilbospora* DC. *Fusidii et Fusarii* sp. auct.)

1545. *Phl. Ulmi* W., sporidiis cylindricis curvis hyalinis utrinque acuminatis curtis 4-5 septatis hypophloeoideis, dein stillae vermicelliferae albae instar propullulantibus inque grumulos depresso compactos subsidentibus. — *Phloecospora Ulmi* Wallr. in lit. 1815. *Septaria Ulmi* Fr. novit. Kunz. myk. Hft. II. 107. Link sp. II. 87. Dub. gall. II. 885. ?*Fusidium septatum* Spr. syst. IV. 569. pr. pr. *Stilbospora Uredo* DC. gall. VI. 152., memoir. du Mus. II. t. 14. f. 9. *Sphaeria ulmocola* Bernard. sic. III. 14. *Fusarium septatum* Schmidt et Kz. D. Schw. n. 182.

Ad folia *Ulmi campestris* vegeta, auctummo, variis Thuring. locis minime rara, a me ab anno 1810 inde observata itaque dicta.

1546. *Phl. Oxyacanthae* W., sporidiis longissimis 8-12 septatis albo-flaventibus, stellarum vermicelliferarum sparsarum exiguarum instar promanantibus. — *Septaria Oxyacanthae* Kunze l. l. 109. *Dub. gall.* II. 885. *Link* l. l.

Ad folia *Crataegi Oxyacanthae* vegeta Thuring. rario. (Schmidt et Kunze.)

172. FUSIDIUM LK. Spindelsporling.

Sporidia fusiformia libera saepe septata, scobis instar foliorum aridorum epidermidi incumbentia, effusa.

(*Fusidium* Lk. Nees. Spr. *Fusisporii* spec. Dub.)

1547. *F. gryseum* Lk., sporidiis fusiformibus tenuissimis utrinque attenuatis pellucidis, in strata tenera grysea late diffusis. — *Fusidium griseum* Link obs. I. 6. *Ditmar in Sturm germ.* III. 35. t. 17. *Fusisporium griseum* Dub. gall. II. 926.

Ad folia *Quercum nostratum* arida passim.

1548. *F. flavo-virens* Ditm., sporidiis flavo-virentibus fusiformibus, in strata tenuissima aeruginosa

diffusis. — *Fusidium flavo-virens* Ditm. I. l. 37. t. 18.
F. aeruginosum Link obs. I. 6., sp. II. 97.

Ad folia Quercus Roboris arida. (Ditm.)

1549. *F. Buxi* Schmidt, sporidiis fusiformibus minutissimis albicantibus, ad strata sparsa digestis. — *Fusidium Buxi* Schm. in lit. Link sp. II. 97.

Ad folia Buxi sempervirentis arida, v. c. hort. lip-siens. (Schmidt.)

1550. *F. aureum* Lk., sporidiis fusiformibus aurantiacis, ad strata angusta digestis. — *Fusidium aureum* Link obs. I. 6., sp. II. 97.

Ad fungos putrescentes agri v. c. rostoch. (Link.)

1551. *F. candidum* Lk., sporidiis compactis fusiformibus albis, in strata demum confluentia digestis. — *Fusidium* Link l. l. *Fusisporium candidum* Dub. gall. II. 925.

Ad ramulos emortuos Fagi sylvaticae, v. c. agri rostoch. (Link), berolin. (Ehrenberg.)

1552. *F. expansum* Lk., sporidiis cylindricis incurvis aurantiacis majusculis effusis. Link sp. II. 98. *Fusarium expansum* Schld. berol. II. 139.

Ad Stilbosporas ramos obsidentes agri berol. frequens. (Schlechtendal.)

1553. *F. sulphureum* Lk., sporidiis parvis fusiformibus curvatis crassiusculis, ad strata demum effusa congestis. — *Fusidium sulphureum* Link sp. II. 98. *Fusarium sulphureum* Schld. berol. l. l.

Ad tubera putrescentia Solani effossa.

173. STILBOSPORA PERS. EMD. Schorfsporling.

Sporidia ovalia s. oblonga opaca septata, ex epidermide mortua profluentia grumulosque colliculosos contractos mentientia.

1554. *St. macrospora* Lk., sporidiis cylindricis

biseptatis pellucidis atris, grumulos elevatos in ambitu effusos epidermidem subeentes informantibus. — *Stilbospora macrospora* Link sp. II. 95. *St. macrosporina* Pers. sys. 96. Nees syst. 21. f. 17. *Dub. gall.* II. 883. *Puccinia macrospora* Spr. syst. IV. 569.

Ad ramos corticemque arborum emortuarum frequens.

1555. *St. angustata* Pers., sporidiis cylindricis obscure septatis pellucidis atris, grumulos subrotundos papillatos, epidermide tectos informantibus. — *Stilbospora angustata* Pers. syn. 96. Link l. l. *Dub. l. l.*

Ad ramos dejectos, fagineos paeprimis, passim.

174. ASTEROSPORA KUNZ. Sternsporling.

Sporidia stellata farcta, in fundo floccoso-granuloso coacervata, ex epidermide erumpentia.

1556. *Ast. Hoffmanni* Kz., sporidiis stellatis, fundo tenui flavescenti varie incumbentibus, nigris. — *Asterosporium Hoffmanni* Kunz. in bot. Z. 1819. p. 225. Schldl. berol. II. 135. *Dub. gall.* II. 883. *Stilbospora asterosperma* Hoffm. germ. III. t. 13. f. 3. Pers. syn. 96. Ehrenb. sylv. 9. 21.

Ad ramulos fagineos et betulinos passim.

b. inquinantes, sporidiis simplicibus, transversim longitudinaliterque septatis, nunc continuis, nunc concatenatis, inter se facile secedentibus, simulac inquinantibus.

† sporidiis simplicibus s. seriatis, demum in alia simplicia secedentibus.

175. MELANCONIUM NEES. Russporling.

Sporidia simplicia rotundata, basi utraque aequalia libera, in grumulos primum hypophloeodeos dein emersos convexiusculos inquinantes congesta.

* sporidiis minoribus.

1557. *M. disseminatum* Lk., sporidiis inspersis

conglomeratis subglobosis minutis atris pellucidis. — *Melanconium disseminatum* Link spec. II. 91.

Ad asseres semiputres passim.

1558. *M. sphaerosporum* W., sporidiis minutis globosis atris pellucidis, ad grumulos ellipticos, primum hypophloeodeos dein profusos redactis. — *M. sphaerospermum* Link sp. II. 91. *Stilbospora sphaerosperma* Pers. syn. 97., obs. myc. I. t. 1. f. 6. Alb. et Schie. nisk. 53.

Ad graminum culmos, nec non ad fruticum (Frangulae) ramulos siccos, passim.

1559. *M. sphaeroideum* Lk., sporidiis globosis minutis atris pellucidis, in grumulos semiglobosos unidine effusos hemisphaericos, primum hypophloeodeos dein emersos compactis. — *M. sphaeroideum* Link sp. I. 92. *Stilbospora microsperma* auct. et forsitan ipsius Pers. obs. I. t. 2. f. 3.

Ad ramulos arborum siccos passim.

1560. *M. microsporum* Nees, sporidiis minutis ovalibus pellucidis, ad grumulos epidermidem transigendo subconicos coactis. — *M. microsporum* Nees. Spr. syst. IV. 565.

In similibus cum praeced. locis, a quo vix differt.

1561. *M. bicolor* Nees, sporidiis subglobosis oblongisque minutis atris, in grumulos subrotundos colliculoso-elevatos, deinde cubilia prominula (pseudostromatica) pallide-flavescentia denudantes congestis. — *M. bicolor* Nees syst. 32. f. 27. Link sp. II. 92. *M. discolor* Schm. et Kz. D. Schw. n. 151.

Ad ramos arborum, Betulae praeprimis et Aloj defectos, minime raram. (Sphaeriam hypophloeoden haud inique refert.)

1562. *M. conglomeratum* Lk., sporidiis subglobosis minutis atris opacis laxis, in grumulos primum subrotundos deinde effusos digestis epidermideque scissa cinctis. — *M. conglomeratum* Link sp. II. 92. Dub. gall. II. 884.

M. atrum Link obs. I. 3. t. 1. f. 7. *Stilbospora conglobata* Link obs. II. 30. (aetates.) *Stilbospora microsperma* Link l. l. (*sporidiis magis angulatis*).

Ad ramos emortuos sepimentorum vulgare.

** *sporidiis majoribus*.

1563. *M. ovoidum* Lk., sporidiis ovalibus opacis atris, in grumulos a vertice elevato inde sensim deplanatos congestis. — *M. ovoidum* Link sp. II. 90.

In similibus cum praecedente locis passim.

1564. *M. effusum* Lk., sporidiis ovatis opacis atris, in stratum tenuatum laxe digestis. — *M. effusum* Link sp. II. 91.

In iisdem cum priore locis, a quo praeter crescendi modum plane non diffieret videtur.

1565. *M. apiocarpon* Lk., sporidiis majusculis atris pellucidis obovatis, grumulos discoideos convexiusculos rotundos, epidermide scissa cinctos infarcientibus. *M. apiocarpum* Link sp. II. 90.

Ad arborum (Alnorum) trunco languentes, variis Germania locis, nec tamen ubertim.

1566. *M. putredinis* W., sporidiis subglobosis atris opacis majusculis, primam grumulos ovatos convexos nigrescentes constituentibus, dein effusis, cubilia longe lateque inquinantibus.

Ad ligna abietina fabrefacta, in humo uida congesta passim reddit.

1567. *M. ovatum* Lk., sporidiis magnis, e figura ovali magis minusve basi tenuatis pyriformibus atris pellucidis, ad grumulos primum convexos dein effuso-deplanatos congestis epidermidemque transfusam obliterantibus. — *M. ovatum* Link sp. II. 90. *Stilbospora ovata* Pers. syn. 96., obs. myc. I. 31. t. 2. f. 6. Alb. et Schw. nisk. 53. *St. pyriformis* Hoffm. germ. t. 13. f. 4. Link obs. II. 30.

Ad arborum languidarum corticem siccum, haud quidem rarum.

†† *moniliformes, sporidiis ovatis ovalibusque concatenatis, hyphasma moniliforme mentientibus, facile inter se secedentibus.*

176. OOSPORA W. Eysporling.

Sporidia subglobosa s. oviformia intricata pellucida, primum concatenata, hypham articulatam simplicem teneram decumbentem mentientia, articulisque inter se facile secedentibus fragilia.

(*Oidium Lk. Oideum Schltd. (quorum loco Oosporam nuncupo.) Acrosporium Nees. Spr. Pers. Alysdium Kz.*)

1568. *O. candida* W., sporidiis laxe concatenatis simplicibus intricatis, grumulos primum hemisphaericos dein confluentes caudidos sericeo-splendentes constitutibus, fragilibus in singulos articulos oblongis utrinque sensim tenuatos hyalinos sponte secedentibus. — *Torula fructigena* Alb. et Schw. nisk. 365. *Monilia fructigena* Rebent. neom. 394.

Ad poma sub dio putrescentia Thuring. (A sequente, colore candido catenulisque sporidioram oblongis, utrinque tenuatis differre videtur.)

1569. *O. fructigena* W., sporidiis concatenatis erectiusculis simplicibus intricatis, grumulos ochraceos tomentosos mentientibus, fragilibus in singulos articulos ovales secedentibus. — *Oidium fructigenum* Link sp. I. 122. Kunz. et Schm. myk. Hft. I. 80. t. 2. f. 22. Dub. gall. II. 932. *Acrosporium fructigenum* Pers. myc. I. 24. *Torula fructigena* Pers. obs. I. t. 1. f. 7. *Monilia fructigena* Pers. syn. 693.

Ad poma quoecunque, Pyra, Persica et Armeniaca, sub dio tectore putrescentia, haud rara.

1570. *O. moniliformis* W., sporidiis concatenatis erectis simplicibus laxe aggregatis ex albo-flaventibus, in articulos singulos facile secedentibus. — *Oidium monilioides* Link sp. I. 122. Dub. gall. II. 922. *Acrosporium*

monilioides Nees syst. f. 49. B. Pers. myc. I. 23. *Monilia hyalina* Fr. obs. I. 210. t. 3. f. 4.

Ad folia culmosque graminum, exente aestate, passim. (*Linkius* cl. var. *albam* et *flavicantem* habet.)

1571. ?*O. Uredinis* W., sporidiis concatenatis erectis simplicibus dense aggregatis luteo-albis, in articulos singulos breves crassiusculos secedentibus. — *Oidium Uredinis* Link sp. I. 123.

Ad foliorum Kubi fruticosi paginam inferiorem, in consortio *Erysibes*, v. c. circa Berolinum. (Ehrenberg.) (Nondum vidi.)

1572. *O. aurea* W., sporidiis concatenatis erectiusculis simplicibus parce ramosis flavis, caespites parvos flavescentes mentientibus, dein in articulos singulos ovales secedentibus. — *Oidium aureum* Link obs. I. 16. f. 29. Nees syst. f. 44. Link sp. I. 121. Dub. gall. II. 931. *Acrosporium aureum* Pers. myc. I. 25. Spr. syst. IV. 556.

Ad trunco arborum putres passim.

1573. *O. fulva* W., sporidiis concatenatis erectis simplicibus dense aggregatis fulvis, in articulos singulos ovales secedentibus. — *Oidium fulvum* Link sp. I. 121. *Acrosporium fulvum* Pers. I. I. *Alysidium fulvum* Kunz. et Schm. myk. Hft. I. 18.

In similibus cum priore locis, a qua forsitan vix differt.

1574. *O. larva* W., sporidiis concatenatis erectiusculis divergenti-ramosis dense aggregatis gryseis, in articulos singulos ovales demum secedentibus. — *Oidium larum* Ehrenb. sylv. 10. 22. Link sp. I. 123. *Acrosporium larum* Pers. myc. I. 25.

Ad fructus Pruni Armeniacae putres. (Ehrenberg.)

1575. *O. subramosa* W., sporidiis concatenatis erectiusculis parce ramosis dense aggregatis fusco-nigris, in articulos ovales demum secedentibus. — *Oidium subramosum* Link sp. I. 125. *Conoplea fusca* Pers. myc. I. 12.

Ad ramos dejectos fruticum (Rosarum praerimis) circa Lipsiam. (Kunze.)

1576. *O. fuliginosa* W., sporidiis concateuatis tenuimis, in stratum crassum pulverulentum effusum aggregatis fuliginoso-olivaceis, dein in articulos globosos exiguo secedentibus.

Ad corticem Fraxini putridum Thuring. (Wallr.)

1577. *O. virescens* W., sporidiis concatenatis subramosis dense aggregatis virescentibus, dein in articulos ovales secedentibus. — *Oidium virescens* Link sp. I. 124.

Ad folia dejecta alnea agri lips. (Ehrenberg.)

1578. *O. chartarum* W., sporidiorum catenulis decumbentibus longe-late-tenuiterque effusis parce ramosis, cubilia subtiliter superinductibus atris, dein in articulos singulos ovatos secedentibus. — *Oidium chartarum* Link sp. I. 124. *Stilbospora chartarum* Ehrenb. sylv. 10. 21. *Sporotrichum chartaceum* Pers. myc. I. 83.

Ad chartas qualescumque, locis humidis vel v. c. sub ollis uidis reconditis ubique succrescit.

177. MONILIA Lk. Kettensporling.

Sporidia ovato - oblonga utrinque tenuata compressa, massa sporacea striam longitudinalem opacam constitutente foeta, hyphasma concatenatum elongatum mentientia, fragillima, demum secedentia.

(*Monilia* Lk. nec Pers. *Torula* auct.)

1579. *M. antennata* Pers., sporidiorum catenulis elongatis compressis hyphasma catenulatum mentientibus, in pulvinos effusos pannosos atro-violaceos congestis, demum in articulos ovato-oblongos utrinque sensim tenuatos pellucidos, centro stria opaca inscriptos secedentibus. — *Torula antennata* Pers. myc. I. 21. *Dub. gall.* II. 931. *Monilia antennata* Pers. syn. 691. *Alb. et Schw.* msk. 365. *Nees syst.* II. f. 67. (minus fida). *Mart. erl.* 356. nec *Spr. Anelit.* *Dematium antennaeforme* Hoffm. *germ.* t. 13. f. 4.

Ad trunco caesos fagineos minime rara. (Juvenis ac imperfecta abjecta quasi et decipiens, perfecta insignis,

tum habitu pannoso s. sericeo atro-violaceo, tum sporidiis singulis ovato - oblongis medioteanus opaco - striatis oculos afficiens, et ab Oospora eadem indole diversa.)

†† sporidiis continuis I - plurisepte septatis.

178. DIDYMOспорIUM NEES. Brillensporling.

Sporidia septo transverso interstincta, didyma, oblonga, basi utraque aequalis, ad grumulos primum hyphophloeodeos dein emersos rotundos congesta.

1580. *D. complanatum* Nees, sporidiis didymis minutis subglobosis atris, in grumulos subrotundos s. ellipticos deplanatos compactis dein inquinantibus. — *Didymosporium complanatum* Nees syst. 33. f. 29. Link sp. II. 93. Dub. gall. II. 884. *Stilbospora didyma* Link obs. II. 30. *St. conglutinata* Link l. l. *St. fugax* Schm. et Kunz. *D. Schw.* n. 79.

Ad ramulos, salicinos paeprimis virgultorum, agros et hortos seipientium Thuring. vulgare.

1581. *D. elevatum* Lk., sporidiis oblongia didymis atris, in grumulos cubilia papillata oblitterantes, dein effusos congestis. — *Didymosporium elevatum* Link sp. II. 94. *D. betulinum* Grev. er. t. 273. Dub. gall. II. 884. *Melanconium betulinum* Schm. et Kz. *D. Schw.* n. 208. *Stilbospora spermatodes* Link obs. II. 30. *Stilbospor. microsperma* Pers. syn. 96. pr. pr.

Ad corticem Betulae et Fagi siccum passim.

179. ?TETRACOLIJM LK. Gliedersporling.

Sporidia quaterna in catenulam juncta, hyphasma torulosum depresso mentientia.

1582. *T. Tuberculariae* Lk., sporidiorum catenulis nigris subcylindricis, Tuberculariae discum denigratis. — *Tetraecolium Tuberculariae* Link sp. I. 125. *Torula Tuberculariae* Nees in act. acad. Leop. IX. 247. t. 6. f. 16.

Ad Tuberculariae vulgaris discum, prope Lipsiam lectum (Kunze.) (Mihi latet, quamvis ubique eandem Tuberculariam ascis Sphaeroboli inquinantis viderim obtextam, huic me hercule non dissimilem.)

180. HORMISCIMUM KZ. Schnursporling.

Sporidia globosa pellucida in series continuas s. concretas concatenata, hyphasma torulosum mentientia, in grumulos exiguo epixylos condensata.

(*Torula Pers. Lk. Dub.*)

1583. *H. condensatum* W., sporidiorum catenulis strictis tenerrimis pellucidis oblongatis, articulos globos 14-20 jugiter conjunctos s. hyphasma bacillare mentientibus, grumulos ovato-oblongos tenuatos depresso maculares compactos fusco-castaneos informantibus. — *Hormiscium condensatum* Kunz, in lit.

Ad Coryli radices cortice denudatas aridas Thuring. (W.)

1584. *H. expansum* Kz., sporidiorum catenulis simplicibus strictis nigris, articulos globosos 5-10 subpellucidos conjunctos mentientibus stratumque expansum constituentibus. — *Hormiscium expansum* Kunz. myk. Hft. I. 12. *Torula expansa* Pers. myc. I. 22. *Monilia expansa* Spr. syst. IV. 557.

Ad caules herbarum elatiorum humi jacentium, auctumno passim.

1585. *H. compactum* W., sporidiorum catenulis seriatis brevissimis oblongis utrinque parce attenuatis aggregatis, ex articulis 4 globosis pellucidis jugiter conjunctis compositis, grumulos convexiusculos parvos brunneos compactos constituentibus.

Ad ramorum salicinorum fines extremos, falce recisos Thuring. (Wallr.) (Grumuli minus pulverulentii, compacti Stilbosporae iustar.)

1586. *H. laxum* W., sporidiorum catenulis seriatis elongatis implexis tenerrimis subpellucidis, ex articulis 18-24 conjunctis compositis, hyphaema filiforme moni-

liforme fragile mentientibus, grumulos primum rotundos dein confluentes latissimos pulverulento-inquinantes aëneo-virides s. nigrescentes constituentibus. — *Sporidesmium Hormiscium* Kunz. in lit.

Ad Brassicae, Georginae caules putres agri Northusani (Wallr.) (Canto quidem ab Hormiscio genere distinguendum et Sporidesmium dicendum admonuit cl. Kunze. Aliam var. sporidiis duplo crassioribus, in strata velutina digestis diversam habeo.)

1587. *H. altum* Ehrenb., sporidiornum catenulis variis rigidis obscuris atris, ex articulis ovalibus maguis compositis undique effusis. — *Hormiscium altum* Ehrenb. sylv. I. 10. 22. Schlecht. berol. 149. *Torula alta* Pers. myc. I. 24. *Monilia alta* Spr. syst. IV. 557.

Ad ramos putredine exesos, Alni paeprimis, passim.

181. SIRIDIUM NEES. Kettenporling.

Sporidia oblonga opaca, isthmis tenuato-filiformibus interceptis concatenata, grumulos rotundatos basi implexos constituentia. Nees.

1588. *S. marginatum* Nees, sporidiis oblongis, isthmis filiformi-constrictis interceptis basique similiter producta, in grumulos planos nigros epidermide cinctos implexis. — *Seiridium marginatum* Nees syst. 22. f. 19.

Ad Rosarum sylvestrium ramos German. austral. (Höchstetter), apud nos quoque passim reddit.

182. PHAGMIDIUM LK. Keulensträger.

Sporidia cylindrica clausa septis 3-6 opacis, totidem articulos interstinguentibus anuulata, basin pellucidam continuam fistulosam exerentia ejusque ope ex epidermide (foliorum) vegeta subeuntia, fasciculata, grumulos liberos propexos mentientia.

(*Phragmidium* Lk. Kz. Schlecht. *Aregma* Fr. *Puccinia* Pers. Mart. *Ascophora* pr. pr. Tode.)

1589. *Phr. mucronatum* W., sporidiis ovato-ob-

longis, apice obtusis apiculatis 3-5 annulatis, basi continua utrinque aequali capitulum sequante pellucida suffultis, grumulos fasciculatos nigrescentes constituentibus.

a. *obtusum*, sporidiis apice obtusis. — *Phragmidium obtusum* Schm. et Kunz. D. Schw. n. 120. Link sp. II. 886. *Aregma obtusata* Fr. obs. I. 225.

a. *Potentillae*. — *Puccinia Potentillae* Pers. syn. 229. Alb. et Schw. nisk. 381. Grev. crypt. t. 57.

b. *Fragariastris*. — *Puccin. Fragariastris DC. gall. VI. 55.*

c. *Ulmi*. — *Phragmidium Ulmi Dub. gall. II. 886. Puccinia Ulmi DC. gall. II. 219.*

β. apiculatum, sporidiis spicè apiculatis. — *Phr. intermedium* Link sp. II. 85. *Dub. gall. L. L.*

a. *Potentillae vernaæ*.

b. *Sanguisorbae*. — *Puccinia Sanguisorbae DC. gall. VI. 54.*

c. *Poterii*. — *Phragmidium Poterii Wallr. in lit.*

Ad paginam pl. laud. inferiorem passim.

1590. *Phr. asperum* JV., sporidiis ovato-oblongis asperis, apice papillatis 3-4 annulatis majusculis opacis, in basin hyalinam subaequalem abrupte tenuatis eaque suffultis, grumulos insignes subrotundos pulvinatos nigro-violaceos inquinantes stipatos constituentibus.

Ad Rubi fruticosi folia hypogaeum, v. c. in dumetis des Kyffhäuser's Thuring. (Wallr.)

1591. *Phr. incrassatum* Lk., sporidiis oblongis 3-5 annulatis opacis, apice longius breviusque mucronatis, basi hyalina inaequali sensim incrassata bulbosa s. inflata suffultis, ad grumulos parvos liberos sparsos dein effusos digestis. — *Phragmidium incrassatum* Link sp. II. 85. *Dub. gall. II. 886. Puccinia mucronata* Pers. syn. 230.

a. *Rosarum*, sporidiorum basi inferiore abrupte inflata, appendicem fusiformem mentiente. — *Phragmidium mucronatum* Schld. berol. 156. *Phr. incrassati var. 1. mucronata* Lk. l. l. *Aregma mucronata et acumi-*

nata Fr. l. l. *Puccinia mucronata* Nees syst. f. 14.,
var. α . Pers. Alb. et Schw. P. Rosae Schumach. *Uredo mucronata* Strauss. *Ascophora disciflora* β . *byssina* Tod. mecl. I. 16. t. 3. f. 27.

β . *Ruborum*, sporidiorum basi inferiore sensim incrassata, appondicem cylindricam bulbosam mentiente. — *Phragmidium bulbosum* Schitd. ber. l. l. *Phr. incrassatum* var. 2. *bulbosa* Link sp. II. 85. *Aregma bulbosa* Fr. obs. I. 226. *Puccinia mucronata* β . Pers. syn. 230. Alb. et Schw. nisk. 302. *Puccinia Rubi* Schumach. *Uredo bulbosa* Strauss. wett. annal. II. 108.

Var. α . ad Rosas hortenses quascunque; β . ad Rubos nostrates hypophyllum, auctumno abundat, nec fere unquam Erysiben sociam immunem relinquit. In Rubo Idaeo sporidia saepius effunduntur et foliorum paginam gryseam reddunt.)

+++ striati, sporidiis folliculatis longitudinaliter striatis continuis.

188. ENTOMYCLIUM WALLR. Schwarzstrich.

Sporidia fusiformia cylindrica continua subaequalia recta non septata libera epigena, intus massa sporacea coacta, stria longitudinalem saturatiorem, folliculo utrinque pellucido inclusam mentiente repleta eaque veluti striata.

1592. *E. folliculatum* W., sporidiis majusculis fusiformibus, intus stria longitudinali opaca notatis, in strata epicaula effusa congestis.

Ad Georginae caules putreantes hortor. northusar. rariss. legi.

B. hypopori, sporidiis (besimina Neck. Hoffm.) figura et colore variis, primum hypophloeodeis s. epidemidis pellicula velatis, dein scissam revelantibus grumulosque emergentes s. emersos terros discoideos, pro varia parenchymatis fabrica rotundos elongatosve informantibus, nunc simplicibus omnino siisque inter se con-

formibus (homoeospora) s. difformibus (heterospora), nunc septatis geminalisve, nonnisi basi productiore veluti pedicellata suffulti, epidermidis fundo calvo superimpositis iisque demum inquinantibus, aufugis (phloeogeni) s. pulvace gelatinosae innatis tercis.

(Uredinaceae aecidineae et melanconieae Dub. pr. pr. Gymnomycetum series 1. pr. pr. et 2. Link. Coniomyctes suffulti et liberi Spr. syst. Epiphytarum gener. Lk. obs.

a. phloeogeni, sporidius ex ipso plantarum vegetarum parenchymate inde mutato succrescentibus et stromatis loco sporidochium magis minusve rotundatum, inter epidermidem scissam et mutatam informantibus. (Vegetabilia cum exanthematibus animalium comparanda, foliorum labem erysiboden partionque sexualium et fructificantium metamorphosin irreparabilem parantia.)

184. SCHIZODERMA FR. Schlitzsporling.

Sporidia minuta globosa simplicia utrinque aequalia, cum pseudostromate granuloso conglutinata discoideoerumpentia.

(*Schizoderma* Fr. orb. I. 194. Dub, nec Ehrenb. *Hypodermium* Lk.) (Locus generis in systemate dubius, forsan melius inter Sporom. myxogenos. Habitus Phacidiorum.

1593. *Sch. sparsum* Dub., grumulis primum hypophloedeis oblongis parvis amphigenis sparsis, dein emersis, epidermide scissa cinctis atris. — *Schizoderma sparsum* Dub. gall. II. 885. *Hypodermium spareum* Link spec. II. 88.

Ad folia Abietis et Pini passim.

1594. *Sch. sulcigenum* Dub., grumulis linearibus oblongisque, primum epidermide elevata tectis, dein epidermide rupta sulcos repletibus fuscis. — *Schizoderma sulcigenum* Dub. l. l. *Hypodermium sulcigenum* Link l. l.

Ad folia sicca Pini sylvestris. (Nestler.)

1595. *Sch. nervisequum* Dub., gramalis binis linearibus nervisequis hypogenis. Dub. l. l. *Hypodermium nervisequum* Link l. l.

Ad folia Abietum Alsatiae. (Nestler.)

185. CRYPTOSPORIUM KZ. *Gruftsporling.*

Sporidia fusiformia obscure-septata coacta hypophloeodea s. sub epidermide plantatum languidarum delitescientia.

(*Cryptosporium Kunz. Fusarium Lk. Fusidium Spr.*)

1596. *Cr. atrum* Kz., sporidiis minutis curvis atris pellucidis compactis hypophloeodeis, ad grumulos ellipticos minutos congestis. — *Cryptosporium atrum* Kunz. myk. Hft. I. I. t. I. f. I. Link sp. II. 96. Schld. berol. II. 135. *Fusidium atrum* Spr. syst. IV. 569.

Ad culmos graminum, Caricum praeprimis, languidos, v. c. circa Lipsiam (Kunze), Berolinum (Eisenhart. Link.)

1597. *Cr. aurantiacum* Lk., sporidiis aurantiacis hypophloeodeis curvis compactis aurantiacis, sub epidermide grumulos protuberantes dein irregulariter confluentes perficientibus. — *Cryptosporium aurantiacum* Link l. l. *Fusarium hypodermium* Link obs. II. 31.

Ad caules exsiccatarum herb. elatiorum, Umbelliferarum praeprimis agri wratislav. (Link.)

186. BULLARIA DC. *Bullensporling.*

Sporidia oblonga, medio constricta s. dilyma, basi aequalia, ad grumulos hypophloeodeos congesta.

1598. *B. Umbelliferarum* DC., sporidiis oblongis, medio constrictis fuscis, grumulos hypophloeodeos subrotundos oblongosque praestantibus. — *Bullaria Umbelliferarum* DC. gall. II. 226. *Dub. gall.* II. 886. *Puccinia Bullaria* Link sp. II. 78. *Stilbospora bullata* Link obs. II. 30. *Uredo bullata* Pers. syn. 222. *Alb. et Schw.* nisk. 129.

Ad caules Umbelliferarum siccios. (Mihi latet, ab auctoribus aestumatissimis tamen receptum genus, a *Bromniartio* Didymosporio subscriptum, tutius vero non solum ob locum natalem sed quoque ob sporidiorum et grumulorum hypophloeodeorum indolem separandum.)

187. PHYSODERMA W. Blasenbrand.

Sporidia simplicia sphaericu insignia ex massa spora-
cea opaca, parenchyma herbarum vegetarum penetrantia
grumulosque convexos s. gibbosos epidermide velatos in-
formantia.

1599. *Ph. maculare* W., sporidiis sphaericis magnis
pellucidis fusco-luteis, grumulos ovales depresso immersos
epidermide tenuissima velatos brunneos informantibus.

Ad Alisuntis graminei folia vegeta amphigenum, suis
locis redit, v. c. in agro halens. et berolin. (Wallr.) (Ma-
cularum ovalium brunnearum epidermide hyalina jugiter
obductarum illamque translucentium specie oculos allicit,
et ex sporidiorum maximorum parenchyma subeuntiem
congerie mera constat.)

1600. *Ph. gibbosum* W., sporidiis sphaericis ma-
ximis, foetis praeter limbum hyalinum opacis, demum ef-
foetis pellucidis aureo-flaventibus, grumulos oblongos
gibbosos, epidermide bullata obductos infarcentibus.

Ad caules et petiolas vegetas Aegopodii Podagrariae
rarius, v. c. prope Heringam Thuring. (Wallr.) (Ve-
getable paradoxon, cum Peridermio quasi analogon, cica-
trices oblongas sparsas gibbosus, caulem colliculosum
mentientes, epidermide jugiter obductas praestans, sub
quibus sporidia innumera majora sphaerica, piscium ovu-
lorum instar nidulantur, herbam iugressam mox langui-
dam interficiens.)

1601. *Ph. pulposum* W., sporidiis sphaericis ma-
ximis folliculo sporuligero foetis subopacis, dein effoetis
hyalinis pallide-virentibus, parenchyma pulposum infar-
centibus grumulosque ovatos dein confluendo varicosos
convexos epidermide velatos informantibus. — *Erysibe*
megalospora Wallr. in lit.

Ad caules Atriplicis angustifolii et Chenopodiorum
pr. Heringam Thuring. rarius. (Habitu pulposo, dum
viget, sporidiisque pulpae reconditis desciscere videtur,
nec tamen meliorem scio locum.)

188. ERYSIBE THEOPHR. Schmutzbrand.

Sporidia simplicia (neque septata neque didyma), inter figuram sphaericam oblongoque-cylindricam varia libera utrinque aequalia s. in basin filiformem inaequalem tenuata, in grumulos (*aceruli auct.*) primum sub summa epidermidis pellicula integra delitescentes, deinde illam irregulariter ruptam transeuntes concinne congesta inque parenchymate vegeto at mutato nidulantia.

(*Hypodermium Lk. obs. II. Caeoma Lk. obs. I., spec. Schleid. Uredo Pers. Strauss in annal. wetterav. II. 70. sqq. Spr. Dub. Lycoperdon L. Schrk. Ustilago et Rorigo Plin. Erysibe (Ἐρυσίβη) Theophr. hist. pl. VIII. 10. Tabernacm. Mentz. pugill. et Murray, qui in stirp. agri gotting. p. 25. anno 1770 primus hunc titulum, priscorum a nuperis male interpretatum et a me aptius restitutum (Verhandl. der Naturf. Fr. zu Berlin Tom. I. l. p. 11.) ad haec vegetabilia insignienda transtulit.)*

+ leucosporae, sporidiis albis. (*Albugo Ehrh. Pers. Caeoma candidum Nees.*)

1602. *E. sphaerica* W., sporidiis sphaericis non nisi utrinque compressis obsoleteque truncatis hyalinis albis, grumulos ovales convexos sparsos deinde confluentes epidermide stipata diutius integra s. vertice perforata tectos infarcentibus, Compositas Cruciferasque potissimum infestantibus. — *Uredo candida* Pers. syn. 223. excl. var. β . *Caeoma candidum* Nees syst. 16. f. 8. Link sp. II. 31. *Uredo inaperta* DC. gall. II 231. *Aecidium candidum* Gmel. S. N. 1437.

α . Cruciferarum, spor. sphaericis. — *Uredo Cruciferarum* DC. l. l. *U. candida* α . *Thlaspeos* et γ . *Alyssi* Pers. *U. Cheiranthi* Pers. *Caeoma candidum* α . *Cruciferarum* Schleid. berol. 117. *U. Thlaspi* Sowerb.

β . Caryophyllacearum, spor. retusodatis. — *Erysibe Arenariae marinae* W. in litt.

γ . Compositarum, spor. utrinque truncatis. — *Uredo cubica* Strauss l. l. 86. t. 2. f. 3. *Uredo Tragopogii* DC.

gall. l. l. U. obtusata Lk. U. candida f. Pers. Caeoma candidum b. Compositarum Schldl.

Var. *a.* ad Cruciferas quascunque, Capsellam v. c. Bursam, Cheiranthum incanum, Arabides, Teesdalias, Iberides, Erysima, Brassicas, nulli, praeter petala, parti parcens; *f.* ad Arenariam marinam et medium; *g.* ad Scorzoneram octangularis, Inulam eusifoliam et Tragopogona minime rara.

1603. *E. quadrata* W., sporidiis quadratis hyalinis albis, grumulos subrotundos gibbosos epigenos, epidermide stipata bullata integra velatos infarcentibus, Portulaceas infestantibus. — *Caeoma candidum* Link. pr. pr., var. *c.* *Portulacearum* Schldl. l. l. *Uredo Portulacae* DC. gall. VI. 86. Dub. gall. II. 892.

Ad superiorem Portulacae oleraceae hortens. et Bliti (*Uredo Bliti* Bernard. sicut. III. II.) foliorum paginam rario. (Figura sporidiorum, aliquantum praecedente majorum rata constat.)

† *chrysosporae*, sporidiis flavis aureisve dein facile expallentibus, epidermidem obvelantem diu redintegrantibus. (*Rubigo* Pers. Rebent. nec Mart.)
* *homoeosporae*, sporidiis omnibus conformibus.

1604. *E. Cerealium* W., sporidiis subglobosis exiguis flavis, grumulos amphigenos primum ovales deinceps oblongos, epidermide integra bullata demum longitudinaliter scissa tectos sparsos informantibus, Cerealia maxime infestantibus. — *Uredo Rubigo-vera* DC. gall. VI. 83. Dub. gall. II. 898. *Caeoma Rubigo* Link sp. II. 4.

Ad folia culmosque Cerealium cum *E. linearis* et *Puccinia graminis* abundat.

1605. *E. linearis* W., sporidiis oblongis utrinque obtusis pellucidis flaventibus, in grumulos lineares longitudinales striaeformes tenues, primum hypophloeodeos dein epidermidis rima scissa cinctos lateos congestis. — *Caeoma lineare* Link sp. II. 4. Schldl. berol. 118. *Uredo linearis* f. Pers. syn. 216. excl. syn. Sowerb. Dub.

gall. II. 893. U. frumenti Mart. mosq. Aecidium lineare Pers. olim. Lycoperdon lineare Schrank bav.

Ad folia vaginasque Graminearum maxime cerealium.

1606. *E. chrysoides* W., sporidiis oviformi-subglobosis pellucidis, grumulos subregulares rotundatos dein epidermide scissa cinctos intense aureos praestantibus.

— *Caeoma chrysoides* Schitdl. ber. 118. *U. circinnata* Strauss l. l. 88. *U. confluens* ? Alb. et Schw. nisk.

121. *Ur. Orchidis Mart. mosq.* 229. *Caeoma Orchidum* Link sp. II. 9.

Ad *Orchidis latifoliae* et *conopseae* folia amphigena rarius.

1607. *E. limbata* W., sporidiis subrotundo-oviformibus majusculis pallide-flaventibus, limbo opaco corculum pellucidum circumscribente cinctis grumulosque ovalis oblongosque primum epidermide mox longitudinaliter scissa velatos infarcientibus.

a. Alliorum. — *Caeoma Scorodizon* Schitdl. ber. 118. *C. Alliorum* Link sp. II. 7. *Uredo Alliorum* DC. gall. VI. 82. Dub. gall. II. 892.

b. Iridie. — ?*Uredo Iridis* Dub. gall. II. 898.

Ad *Allia varia* tum *hortentia* tum *sylvestria* Thuring. passim; *b. ad Iridis gramineae* et *pumilae* folia rarius.

1608. *E. variolosa* W., sporidiis oviformibus majusculis aureo-flaventibus subopacis, grumulos distinctos subrotundos sparsos, elevato-gibbosos, epidermide stipata dein vertice perforata velatos illaque dein residua redimitos, aream pallidam obsidentes infarcientibus, *Liliacea* infestantibus. — *Caeoma Lili* Link sp. II. 8. *Uredo aecidiiformis* Strauss l. l. 94. f. 8. ?*U. Prostii* Dub. gall. II. 892.

Ad *Lilii candidi* folia hortor. thuring. minime rara, quae hac tabe quotanois redeunte mox languent, nec unquam flores spondent.

1609. *E. Senecionis* W., sporidiis subglobosis

opacis, grumulos subrotundos ovalesve, epidermide adhaerentes pallide-ochraceos informantibus — *Caeoma Senecionis* Schleidtl. ber. II. 119. *Uredo Senecionis* Schüm. saec. U. *farinosa* β. Pers. syn. 217.

Ad *Senecionem viscosum* et *sylvaticum hypophylla*.

1610. *E. betulinia* W., sporidiis ovatis pallucidis lateis, grumulos minutos convexos mammillares diu clavatos infarcientibus. — *Caeoma betulinum* Schleidtl. ber. II. 119. *Uredo betulina* Wahl. lapp. U. *betulac* Schüm. U. *populina* β. Pers. syn. U. *longicapsula* β. *betulina* DC. gall. VI. 85. Dub. gall. II. 895. pr. pr. U. *ovata* β. Strauss l. l.

Ad *Betularum nostratium* folia hypogena, passim.

1611. *E. oblongata* W., sporidiis oblongis opacis flavis, grumulis ellipticis convexis, epidermide demum scissa velatis, maculae fusco-rufescens inincidentibus. — *Caeoma oblongatum* Link obs. II. 27. Schleidtl. berol. II. 118. *Link sp.* II. 7.

Ad utramque foliorum *Luzulae pilosae* paginam passim.

1612. *E. cylindrica* W., sporidiis oblongis utrinque obtasis pellucidis flavis majusculis punctato-muriculatis, grumulos subrotundos ovalesve saepius confluentes hypophyllos bullatos informantibus. — *Caeoma cylindricum* Schleidtl. 119. *Ur. populina* α. Pers. syn. 219. *Lycoperdon populinum* Ehrh.

Ad *Populi balsamiferae* et *candidantis* folia hypogena, sero auctumno, in hortis haud rara.

1613. *E. volvata* W., sporidiis majusculis sphaericis opacis flaventibus, grumulos depresso subrotundos ovalesque, epidermide primum integra stipata bullata dein mediotenus fissa persistente volvata exceptos informantibus. — *Uredo Thesii* Dab. gall. II. 899. *Erysibe Thesii* Wallr. in lit.

Ad folia *Thesii Linophylli* Thuring. passim.

1614. *E. mammillaris* W., sporidiis sphaericis

pellucidis pallido-flaventibus, granulos hypophloeo-deos circumscriptos parvos hemisphaericos prominulos, hinc maculam tenuem fuscam inscribentes, epidermide primum integra dein poro pertusa velatos infarcentibus. —

α . Aristolochiae. — *E. Aristolochiae* Wallr.

β . Vincetoxiti. — *U. Vincetoxicæ* Dub. gall. 894.

γ . Soldanellæ. — *Uredo Soldanelæ* DC. gall. VI.

85. Dub. gall. II. 893.

Var. α . ad Aristolochiae Clematitidis folia juniora hypogena; β . in Cynancho Vincetoxicico agri thuring.; γ . in Soldauella alpina ratios.

1615. *E. nitida* W., sporidii globosis mediocriter magnis pellucidis rari aureo-flaventibus, granulos subrotundos adpresso tenuatos deplanatos pallide-lutescentes, cum epidermide subaequales, maculae luteas insidentes informantibus.

α . Chaerophylli. — *E. Umbelliferarum* W.

β . Galii. — *E. Galii* W.

Ad Chaerophylli sylvestris et Galii Molleginis folia passim in agro thuring.

1616. *E. polymorpha* W., sporidii e figura subglobosa subovalibus basi inaequalibus rubro-flaventibus, granulos primum sparsos distinctos subrotundos, epidermide tectos dein illa cinctos confluentes informantibus. — *Uredo polymorpha* Strauss I. I. 88.

α . Potentillarum. — *Caeoma Potentillæ* Schleid. ber. II. 121. *Uredo Potentillæ* DC. gall. II. 621. *U. Potentillarum* DC. I. I. VI. 80. Dub. gall. II. 894. *U. polymorpha* Ø. Strauss I. I.

β . Pyrolæ. — *Caeoma Pyrolæ* Link sp. II. 15. Schleid. ber. II. 122. *Uredo Pyrolæ* Mart. mosq. Accidium Pyrolæ Schultz starg. *U. polymorpha* Ø. Strauss I. I.

γ . Agrimonie, grumulis dein confluentibus.

δ . Saxifragarum. — *Caeoma Saxifragarum* Schleid. I. I. 121. *U. Saxifragarum* Strauss I. I. 87.

Ad folia plantarum dictarum minime rara.

1617. *E. Labiatarum* W., sporidiis subglobosis minutis flavis, grumulos depresso-pallido-flaventes subrotundos, epidermide erupta cinctos informantibus. — *Uredo Labiatarum* Dub. gall. II. 900. (*pro phaeospora.*)

a. Mentharum. — *Uredo Menthae* Pers. syn. 220. *U. Menthastris* Link obs. II. 27. *Accidium Menthae* Sowerb.

β. Clinopodii. — *U. Clinopodii* auct.

γ. Thymi. — *U. Labiatarum γ. Thymi Acinos* DC. gall. VI. 72.

Ad folia pl. 1. paginam inferiorem passim.

1618. *E. pustulata* W., sporidiis e figura subglobosa ovalibus exiguis pellucidis dilute-flaventibus, grumulos rotundos distinctos sparsos dein subaggregato-confluentes, parvalos, epidermide stipata diu velatos centroque primum mamillata dein pertusa exceptos pallidos cum rosa debili flaventes informantibus. — *Caeoma Onopordorum* Link sp. II. 29. *Uredo pustulata* Pers. syn. 219. DC. gall. VI. 85. Dub. gall. II. 894. *U. ovata* Strauss.

α. Epilobiorum. — *U. pustulata α. Epilobii* Pers. Dub.

β. Caryophyllacearum. — *U. pustulata Cerastii* Pers. *Caeoma Caryophyllacearum* Link l. l. 26. *C. Cerastii* Schidl. l. l. 121.

γ. Circaeae. — *U. Circaeae* Alb. et Schw. n. s. 124.

δ. Vacciniorum. — *U. pustulata δ. Vacciniorum* Alb. et Schw. l. l. Dub. l. l. *Caeoma Vacciniorum* Link l. l. 15.

ε. Vincae. — *Caeoma Vincae* Link l. l. 14. *Uredo Vincae* DC. gall. VI. 70.

ζ. Padi. — *Caeoma Padi* Necs in lit. *Uredo Padi* Schm. et Kz. D. Schw. n. 187. (*quam Linkius ad C. Porphyrogeneta transfert.*)

Var. *α.* in Epilobio roseo, palustri et parvifloro; *β.* in Cerastio vulgato et Stellaris; *γ.* in Circaea lutetiana

passim; s. in *Vinca minore* rarius; t. in *Pruno Pado* rarius ad foliorum paginam aversam varia German. l.

1619. *E. Alchemillae W.*, sporidiis e figura subglobosa ovalibus opacis, primum pallido-flaventibus dein saturatioribus fere fuscescentibus, grumulos ovales, epidermide pallida primum velatos dein rimosa revoluta cinctos informantibus. — *Caeoma Potentillarum v. Alchemillae Schltl. Dub. Link. Uredo Alchemillae Pers. syn. 215.*

Ad *Alchemillae vulgaris* folia inde imminuta et complicata hypogena Hercyn. passim.

1620. *E. Ledi W.*, sporidiis subglobosis opacis copiosissimis, primum flavis dein aurantiacis, grumulos maiores sparsos confertosque subellipticos crassiusculos, epidermide rupta cinctos informantibus. — *Caeoma Ledi Link sp. II. 15. Schltl. l. l. 122. Alb. et Schw. nisk. 125.*

Ad folia *Ledi palustris* hypogena (*Albertini et Schweinitz.*) (Nondum vidi.)

1621. *E. Empetri W.*, sporidiis ovoidibus flavis, grumulos sparsos majusculos ovales hypogenos, epidermide dein rupta cinctos informantibus. — *Caeoma Empetri Link l. l. 16. Uredo Empetri DC. gall. VI. 87. Dub. l. l. 892.*

Ad *Empetri nigrum* folia rarius.

1622. *E. Rhododendri W.*, sporidiis subglobosis effusis flavis, grumulos minimos planos confertos subrotundos hypogenos epidermide rupta cinctos, maculas hinc fuscas reliquentes coicinnantibus. — *Caeoma Rhododendri Link sp. II. 16. Uredo Rhododendri DC. gall. VI. 86. Dub. l. l. 893.*

Ad *Rhododendri ferruginei* folia alpium German. austral. (*Ehrengberg.*)

1623. *E. Hypericorum W.*, sporidiis subglobosis pellucidis pallido-aurantiis, grumulos parvos sparsos orbicularis primum convexos, dein concavos epidermide

repta cinctos informantibus. — Caeoma Hypericorum Schleid. L. I. 122. U. hypericorum DC. gall. VI. 81. Dub. L. I. 895. U. Androsacmi DC. encycl.

Ad folia Hypericorum variorum, praeprimis H. humifusi.

1624. *E. Symphyti W.*, sporidiis subglobosis pellicidis pallido-aurantiis, grumulos exiguos largiter dispersos rotundos dein confluentes, epidermide reclinata cinctos informantibus. — *Caeoma Symphyti* Schleid. L. I. 122. *Uredo symphyti* DC. Dub. L. I.

Ad *Symphytum officinale* hypophyllum paasim.

1625. *E. Rosae W.*, sporidiis subglobosis ovalibus vel magis minusve pellucidis, grumulos exiguos sparsos, epidermide cinctos viridi-flaventes, maculae angustae luteae insidentes informantibus. — *Caeoma Rosae* Schleid. L. I. 120. *Uredo Rosae* Pers. syn. 215.

Ad *Rosarum sylvestrium* et *hortensium*. folia hypogena cum aliis ejusmodi epiphytis.

1626. *E. Ruborum W.*, sporidiis subglobosis pellucidis, grumulos sparsos, primum subglobosos exiguos dein majores confluentes, maculae aurantiae & atro-purpureae insidentes luteo-aurantios informantibus. — *Caeoma Ruborum* Schleid. L. I. 120. *U. Ruborum* DC. gall. *U. Rubi fruticosi* Pers. syn. 218. *U. effusa* d. Strauss L. I. 88.

Ad *Ruborum nostratianum* folia hypogena.

1627. *E. miniata W.*, sporidiis subglobosis subovalibusque pellucidis miniatto-aurantiacis, grumulos mole varios saepe demum confluendo insignes (in alabastris) tumidulos. dein epidermide cupta ciuctos largiter infarcientibus.

a. *Rosarum*. — *Caeoma minutum* Schleid. L. I. 120. *C. Rosae* var. 2. *miniata* Link sp. II. 30. *Uredo miniata* Pers. syn. 216. *U. effusa* a. *β.* Strauss L. I. *U. elevata* Schum. *U. Eglanteriae* Mart. mosq. *U. pinguis* DC. gall. II. 235. Dub. gall. II. 894. *Aecidium Rosae* Roehl. germ. III. 517. *Lycoperdon subcorticinum* Schenk.

β . *Ulmiae*. — *Uredo Ulmariae* Mart. mosq. *U. Spiraeae* Sowerb. fung. t. 398.

Ad Rosas quascunque patruas iisque valde inimica, nulli propemodum, praeter petala parti parcens; β . ad folia Spiraeae Arunci passim, pleramque nervisequa, nervos obesos contrahens demumque rumpens.

1628. *E. fulva* W., sporidiis subglobosis ovalibusque opacis, primum laete aurantiacis dein pallentibus, grumulos subrotundos parvos sparsos saepius in orbem aggregatos dein confluentes epidermidemque cingentem oblitterantes informantibus. — *Caeoma compransor* Schldl. l. l. 119. *Uredo circinalis* var. *Strauss* l. l. *U. tuberculosa* Schum. *U. fulva* Schum.

α . *Sonchorum*. — *U. Sonchi* Schum. *U. Sonchi arvensis* Pers. syn. 217.

β . *Tussilaginum*. — *U. Petasitis* DC. *U. Tussilaginis* Pers. syn. 218.

Ad Sonchorum et Tussilaginum nostratum folia hyponema satis frequens.

1629. *E. confluens* W., sporidiis subrotundis ovatisque pellucidis flavis, grumulos circumscriptos dein confluendo irregulares depresso, epidermidem reclinantes, inquinantes laete-aurantias praestantibus. — *Caeoma confluens* Schldl. l. l. 123. *Uredo confluens* DC. Pers. *U. Mercurialis* Mart. mosq.

Ad Mercurialis perennis folia passim.

1630. *E. Rhinanthacearum* IV., sporidiis subrotundis ovalibusve magis minusve pellucidis flavescientibus, grumulos varios demum confluentes planos obesos laete croceos, epidermide scissa cinctos informantibus. — *Caeoma Rhinanthacearum* Link obs. II. 28. Schldl. l. l. 122. *Uredo ringentium* Mart. mosq. *U. confluens* Alb. et Schw. nisk. 122.

α . *Euphrasiae*. — *Uredo Euphrasiae* Schumach. Rebt.

β . *Melampyri*. — *U. Melampyri* Rebt. neom.

γ . *Rhinanthorum*. — *U. confluens* d. Alb. et Schw. l. l.

Ad Euphrasiarum et Melampyrorum nostratum folia, caules ac calyces frequenter.

1631. *E. tremellosa* W., sporidiis subrotundis pellucidis, grumulos primum sparsos demum confluentes irregulares, epidermide primum in massam tremellosam coactam aurantio-flavam stipata tectos, veluti tremellosos infarcentibus illamque demum scariosam ambeuntem raptam revelantibus. — *Caeoma Campanulae* Schleid. l. l. 121. *C. Campanularum* Link sp. II. 16. *Uredo Campanulae* Pers. syn. 212. *Alb. et Schw.* nisk. 124. *Dub. gall.* II. 894. *Uredo tremellosa* β. Strauss l. l. 90. *Mart. erl.* 317.

Ad Campanulas plures, C. Trachelium paeprimis tam en et rapunculoides aestate infestans.

1632. *E. insculpta* W., sporidiis globosis conformibus magnis aurantio-flavis, primum insculptis dein epidermidem circinatim elevantibus grumulosque distinctos hemisphaericos mammaeformes stipatos clausos, demum vertice perforatos informantibus.

α. *Sedorum*, grumulis minoribus magisque depressis. — *Uredo Sedi DC. gall.* II. 227., VI. 69.

β. *Sempervirorum*, grumulis ambonatis hemisphaericis mammaeformibus diu clausis. — *Caeoma Sempervivi* Link sp. II. 21. *Uredo ovata* Strauss l. l. 94. *U. sempervivi* Alb. et Sch. nisk. 126.

Var. α. in Sedo Telephio; β. in Sempervivo tectorum Thuring. suis locis haud quidem rara, aliis rarissima. Vere. (Folia ingressa majora pallescunt, primum belle rubent, dein vero ex grumulorum ubertate tabescunt ac corrugantur. Prima initia subtilissima, sphaerica, instar punctiformia fusca, dein dilatantur, halone aureofusco circumscribuntur et umbones hemisphaericos epidermide stipata obductos, sporidiis farctos dein apice pertusos singunt et Aecidium plane aemulantur.)

* heterosporeae, sporidiis inter se difformibus.

1633. *E. grossa* W., sporidiis flavis, aliis subglo-

bosis, aliis pyriformibus, grumulos minutos flaventes sparsos in orbem angustum centro depresso cofluentes, epidermide rupta cinetos praestantibus. — *Caeoma gyrosum* Schleid. l. l. 121. *Uredo gyrosa* Rebent. neom. 355. t. 3. f. 13. *U. Rubi Idaei* Pers. syn. 218. *U. Idaezi* Mart. mosq.

Ad Rubum Idaeum epiphylla, rarius.

1634. *E. Populi* W., sporidiis flavidantibus, aliis subrotundis in basin longam productis, aliis oblongis utrinque obtusis, grumulos sparsos raro confertos, epidermide demum vertice perforata obductos informantibus. — *Caeoma Populi* Schleid. l. l. 123. *Uredo longicapsula* a. DC. gall. II. 233., VI. 85. Dub. gall. II. 895. excl. var. β. et syn. Pers. *U. populina* Schum. *U. ovata* a. Strauss l. l. 92.

Ad folia Populorum patruarum hypogena rarius etiam amphigena,

1635. *E. Pulsatillæ* W., sporidiis opacis flaventibus, aliis subglobosis ooidesive, aliis elongatis utrinque obtusis, grumulos sparsos orbiculares convexos stipatos flavos, epidermide bullata integra velatos praestantibus. — *Uredo tremellosa* v. *Pulsatillæ* Strauss l. l. 89. *U. Pulsatillæ* Steud. Dub. gall. II. 895. *U. Delphinii* W.

Ad Anemonen Pulsatillam hypophylla.

1636. *E. aecidiiformis* W., sporidiis aliis subglobosis, aliis clavatis obtusis, grumulos pallide-aurantios subrotundos oblongos sparsos nonnisi confertissimos, epidermide scissa cinetos praestantibus. — *Caeoma eegirinum* Schleid. l. l. 123. Link sp. *U. Acheronis* Spr. syst. *U. aecidioides* DC. gall. II. 236. Dub. gall. II. 895. *U. effusa* γ. Strauss l. l. 91.

Ad utramque Populi albae foliorum paginam.

1637. *E. areolata* W., sporidiis pallide-flaventibus, aliis e figura globosa ovalibus, aliis oblongis utrinque obtusis, grumulos latescentes rotundos pertenues, epider-

mide lacera hyalina cinctos pertennes depresso obsiden-
tibus.

Ad Allii Porri folia amphigena Thuring.

1638. *E. mixta* W., sporidiis lutescentibus, aliis
subrotundis in basin brevem tenuatis, aliis ovato-oblon-
gis utrinque obtusis, grumulis subrotundis demum con-
fluentibus effusis laete-aurantiis, epidermide rupta cinctis.
— *Caeoma mixtam* Link obs. II: 28., sp. II: 40. excl.
syn. DC. Schltl. l. l. 124. *Uredo mixta* Steud. Dub.
gall. II: 895.

Ad Salicum patruarum folia hypogena indeque ad va-
rias partes herbaceas aberrans, suis locis haud rara, aliis
plane deficiens.

1639. *E. Vitellinæ* W., sporidiis aurantiis, aliis
subrotundis in basin tenuatis subpyriformibus, aliis sub-
ovalibus, grumulis distinctis subrotundis epidermide scissa
cinctis, hinc maculam lutescentem relinquenteribus. —
Caeoma saliceti Schltl. l. l. 124. Link sp. II: 41. *Ure-
do Vitellinæ* DC. gall. II: 231.

Ad Salicem album et fragilem hypophylla.

1640. *E. epitea* W., sporidiis flavis, aliis subro-
tundis in basin longam abrupte tenuatis, aliis elongato-
pyriformibus, grumulis exiguis dispereis hemisphaericis,
epidermide rupta annulatim cinctis — *Caeoma epiteon*
Schltl. l. l. 124. Link sp. II: 41. *Uredo epitea* Kunz.
myk. Hft. I. 68. Dub. gall. II: 896. ?*U. orbicularis*
Mart. erl. 318.

Ad Salicem triandram et viminalem hypophylla.

1641. *E. Caprae arum*, W., sporidiis flaventibus,
aliis subglobosis, aliis pyriformibus in basin brevem te-
nuatis cum aliis, ovato-subglobosis rariter interspersis,
grumulis subrotundis sparsis planiusculis aurantio-flavis
demum vacuis, epidermide rupta cinctis. — *Caeoma Ca-
praearum* Schltl. l. l. 124. Link l. l. 41. *Uredo Ca-
praearum* DC. gall. II: 80. *U. farinosa a. Pers.* syn. 217.

Ad Salicem Capraeam et auritam hypophylla, varius ipsos ramulos novallos, pilis occultata infestans.

1642. *E. Helioscopiae* W., sporidiis his pyriformibus, aliis subglobosis pedicellatis, aliis subglobosis utrinque aequalibus interspersis aurantiis, grumulis rotundis dispersis convexis demum confluentibus, epidermide ciuctis. — *Caecoma Helioscopiae* Schleidt. l. l. 125. *C. Euphorbiarum* Link sp. II. 39. pr. pr. *Uredo Helioscopiae* DC. gall. II. Pers. syn. 215. *U. Euphorbiae* Rebent. *U. polymorpha* η. Strauss.

Ad Euphorbiae Cyparissiae, Helioscopiae et palustris folia hypogena, nec ab aliis partibus aliena.

1643. *E. Poterii* W., sporidiis aurantiis, aliis majoribus cylindricis curviusculis utrinque obtusis, aliis subglobosis, grumulis exiguis sparsis subrotundis convexis, epidermide stipata ciuctis. — *Caecoma Poterii* Schleidt. l. l. 125. *Uredo potentillarum* e. DC. gall.

Ad Poterii Sanguisorbae folia hypogena.

1644. *E. Lini* W., sporidiis aurantiis, aliis subrotundis, aliis pyriformibus in basin brevem tenuatis cum subrotundis intermixtis, acervis subrotundis sparsis convexis, epidermide ciuctis. — *Caecoma Lini* Link obs. II. 28. Schleidt. l. l. 125. *Uredo Lini* DC. *U. miniata* β. Pers. syn. 216. *U. polymorpha* η. Strauss.

Ad Linum catharticum vulgaris. (Trias ultima alii potius subscribenda.)

1645. *E. Filicum* W., sporidiis his globosis, aliis ovoidibus angulatis, aliis iterum cuneiformibus, mole figuraque polymorphis prorsus pellucidis aureo-flavacantibus, grumulis primum ovatis oblongisque sparsis convexis clausis deinde saepe confluentibus, maculae fulvae insidentibus.

a. microspora, sporidiis mediocriter magnis minus polymorphis, inter figuram globosam ovoidemque variis cum cuneiformibus paucissimis intermixtis, grumulis oblongis dispersis. — *Caecoma Filicum* Link sp. II. 36.

*Uredo Polypodii DC. gall. VI. 81. Dub. gall. II. 893.
U. linearis β. Polypodii Pers. syn. 217. t. 4. f. 9. 10.*

β. *macrospora*, sporidiis maximis, valde polymorphis, globosis, ovoidibus angulatis, subpyriformibus cuneatisque copioissimis, demum integrum paginam oblitterantibus. — *Erysibe P. calcarei W. in lit.*

Ad frondium Polypodii fragilis et calcarei paginam inferiorem, Hercyn. infer. et Thuring. passim. (Eximia sp., tum sporidiorum in eodem grumulo varietate, tum eorum mole.)

+++ *phaeosporae*, sporidiis demum fuscobrunneis. (Nigredo Pers. Rebent.)

* sporidiis omnibus conformibus s. acqualibus.

1646. *E. formosa W.*, sporidiis subglobosis cinnamomeis, grumulis semiglobosis minutis cum ordine quodam dispersis, maculam pallidam occupantibus. — *Caeoma formosum Schltl. l. l. 127. Uredo maculosa Strauss l. l. 101.*

Ad *Prenanthes murorum hypophylla*, rarius.

1647. *E. Silenes W.*, sporidiis ovoideo-globosis opacis cinnamomeis, grumulis subrotundo-ovatis convexis irregularibus. — *Caeoma Silenes Schltl. l. l. 128.*

Ad *Silene chlorantha hypophylla agerberolin*. Schltl.

1648. *E. Flosculosorum W.*, sporidiis subglobosis opacis rubro-fuscis, grumulis minutis adpressis parce prominulis subrotundis sparsis. — *Caeoma ephialtes Schltl. l. l. 126. Uredo eichoreacearum DC. U. flosculosorum Alb. et Schw. U. apiculata et Uromyces apiculatus Link obs. pr. pr.*

Ad *Hieracia nostratia*, *Taraxaca*, *Centaureas*, *Lapsanas*, *Cnicos* aliosque flosculosos cum reliquis epiphytis passim intercurrentes.

1649. *E. suaveolens W.*, sporidiis exacte globosis majusculis subpellucidis fuscobrunneis, grumulis primum subrotundis adpressis epidermide lacera ciactis dein

confertissimis confluentibus, integrum saepius paginam obliterantibus et inquinantibus. — *Caeoma suaveolens* Schleid. I. l. 127. *Link* sp. II. 19. *Uredo suaveolens* Pers. syn. 221. *U. Serratulae* Schum. *U. obtegens* Lk. obs. I. 27. *Mart.* erl. 320.

Ad *Serratulae arvensis* folia hypogena abundat.

1650. *E. cinnamomea* W., sporidiis subglobosis parcissimeve in basin attractis pellucidis, primum pallidis dein rufis, grumulis ovatis oblongisque tenuibus deplanatis exiguis copiosissimis, epidermide hyalina lacera cinctis, inferiorem folii partem inquinantibus.

a. Polygonorum. — *Caeoma Polygonorum Link* sp. II. 10. *Uredo Polygonorum DC. Dub.* *U. Centumrodii Schumach.* saec. II. 231.

b. Convolvuli. — *Uredo Convolvuli Strauss* I. l. 96. *U. Betae* *b. Convolvuli* Pers. syn. 221. *Alb. et Schw.* 127.

c. Ruminum. — *U. Ruminum* auct. *U. Acetosae Schum.* I. l. *C. apiculatum Link* pr. pr.

d. Violarum. — *U. Violarum DC. gall.* VI. 13. *Dub.* I. l. 899. *Caeoma Violarum Link* I. l. 25. pr. pr.

e. Betarum. — *Caeoma Betarum Link* sp. II. 11. *Uredo Betae Pers. syn.* 220. *U. cincta* *Strauss. Mart.*

f. Fabarum. — *Caeoma Leguminosarum Link* I. l. 34. *Schleid.* I. l. 127. pr. pr. *Uredo Viciae Fabae DC.* *U. cincta* var. *Fabae* *Strauss* I. l. 95. *Mart. erl.* 319.

g. Viciarum. — *E. Leguminosarum W.* in lit.

h. Trifoliorum. — *U. Trifoliorum DC. gall.* VI. 66.

i. Phaseolorum. — *U. Phaseolorum* auct. pr. pr.

j. Valerianae. — *E. Valer. officinalis W.*

k. Cichoracearum — ?*U. Cichoracearum DC.* I. l.

Ad plantas laud. satis vulgaris, cautius tamen ab *E. rostellata* dignoscenda et alias plures excipiens.

1651. *E. Genistarum* W., sporidiis ovoideis fuscis pellucidis, grumulis orbiculatis oblongisve minutis spar-

sis epidermide cinctis. — *Uredo Genistarum* Dub. gall. II. 898.

Ad Genistas nostrates passim. (Praecedenti subscript.)

1652. *E. Armeriae* W., sporidiis ovoideis subopacis pallide-cinnamomeis, grumulis oblongis dein confluentibus, subdepressis. — *Caeoma Armeriae* Schltdl. I. L. 126. *Uredo Armeriae* Dub. I. l. 899.

Ad Armeriam vulgarem passim.

1653. *E. circinalis* W., sporidiis ovoideis subcohaerentibus, grumulis subrotundos epidermide scissa cinctos fuscos deinceps confluentes constituentibus. — *Caeoma Ribesii* Link sp. II. 28. *Uredo circinalis* Strauss I. l. 86.

a. *Ribis*. — *Uredo Ribis* Chevall. paris. I. 400. Dub. gall. II. 898. *U. confluens* d. *Ribesii* Alb. et Schw. nisk. 122. DC. VI. 86.

β . *Euonymi*. — *Uredo Euonymi* Mart. mosq. 230.

Ad Ribes alpini et Euonymi europaei folia apud nos rarius.

** sporidiis difformibus, aliis sphaericis, aliis basi magis minusce productis. (*Uromyces* Link obs.)

1654. *E. muricella* W., sporidiis majusculis pallide-cinnamomeis subdiformibus plerisque exacte ovoidiformibus utrinque obtusis, paucioribus basin sensim produdentibus vesiculoso-picturatis extus tenuissime muriculatis, grumulis subrotundis ovalibusque sparsis fusco-cinnamomeis cum epidermide tenui cingente emersis. — *Caeoma Umbellatarum* Link sp. II. II. 23.

a. *Apii*. — *E. Apii* Wallr. in lit.

β . *Conii*. — ?*Uredo Conii* Strauss I. l. 96. Mart. erl. 319.

γ . *Cynapii*. — *U. Cynapii* DC. gall. VI. 72.

Ad plantarum l. folia, quae ingressa languent et ocios contabescunt. Autumno. (Synonyma auct. dubia; laudant enim sporidia elliptica, noonisi septulo obsoleto distincta. Nostra inter se congruant.)

1635. *E. rostellata* W., sporidiis disiformibus, aliis e figura subglobosa ovalibus utrinque obtusiusculis, alias hinc in basin brevem illi duplo breviorum abrupte protractis s. apiculato - rostellatis, grumulis primum subrotundis, epidermide teami obduotis scutellaribus, mole variis dein facile confluentibus illamque circumducentibus s. reclinantibus variolosis fusco-brunneis, inquinantibus. — *Caeoma apiculatum* Link sp. II. 32. pr. pr. *C. apiculatum* Schleid. l. l. 128.

a. *Phyteumatis*, grumulis subrotundis sparsis elevatis, epidermidem cingentem reclinantibus. — *Uredo Phyteumatis* DC. gall. VI. 65. Dub. l. l. 897.

b. *Ficariae*, grumulis subrotundis aggregatis epidermide obductis, maculae pallidae insidentibus dein confluentibus. — *Caeoma Ranunculacearum* Link sp. II. 23. excl. syn. pl. Schleid. l. l. 127. *Uredo Ficariae* Alb. et Schw. nissk. 123. DC. gall. VI. 65. *Puccinia Ficariae* DC. gall. VI. 65. *Puccinia Ficariae* DC. gall. II. 225.

γ. *Leguminosarum*, grumulis ovato - subrotundis, primum sparsis maculae luteae incidentibus clausis, dein confluentibus insignibus illam obliterantibus. — *Uredo Fabae* Dub. gall. II. 897. pr. pr. *Puccinia Phaseoli* Rebent. nom. 356. U. *Phaseoli* Strauss l. l. 98. Nees syst. f. 10. U. *Trifolii*, *Orobi*, *Hedysari* et *Laburni* DC. gall. VI. 63. pr. pr. U. *Pisi* auct. qrd. (quae omnia ab E. cinnamomea et ab E. appendiculata caute dignoscantur.)

δ. *Euphorbiarum*, grumulis primum distinctis scutellaribus dein confluentibus foliumque lineare angustum contrahentibus. — *Caeoma scutellatum* Schleid. l. l. 128. *C. acutellosum* Link sp. II. 35. *Uredo scutellata* Pers. syn. 220. Alb. et Schw. 127. U. *Euphorbiac Cypriessiae* Pers. pr. pr. *Aecidium scutellatum* Gmel. *Lycoperdon scutellatum* Schrk. bav. II. 631.

ε. *Geraniorum*, grumulis sparsis, hinc maculam rubram relinquentibus. — *Caeoma Geranii* Schleid. l. l. 128. Lk. l. l. 25. *Uredo Geraniorum* DC. gall. VI. 73.

ζ. *Ornithogali*, grumulis ovato - oblongis epidermide

diu clausis turgidis. — *Caeoma Ornithogali* Schleid. l. l. 125. *Link* l. l. 7. *Uredo Ornithogali* Schm. et Kunz. ?*U. Asphodeli* DC.

η. *Lilii*, grumulis ovato-oblongis, epidermide diu velatis turgidis dein in sporidia majuscula fatiscentibus. — *Erysibe Lilii* Wallr. in lit.

Ad folia pl. l. plerumque hypogena, passim quoque amphigena, minime rara. (Optime cum *E. cinnamomea* pallidiore tameu comparatur. Bascs rostratae nonnisi bipartintur, bicornes.)

1656. *E. appendiculata* W., sporidiis ovatis oblongatisque subpellucidis, plurimis in basin illo duplo longiorem pellucidam sensim productis, habitum pyrifor- mem s. longe pedicellatum mentientibus, grumulis pri- mum subrotundis compactis, epidermide tenuata grysea obductis dein plerumque confluentibus illamque oblite- rantibus rufo-fuscis. — *Caeoma appendiculatum* Link sp. II. 33. excl. syn. Nees. *C. appendiculatum* Schleid. l. l. 129. *Uredo appendiculata* Pers. syn. 222. *Dub. gall.* II. 897.

a. *Arenariae*, grum. rariter dispersis convexis. — *Uredo sparsa* Schm. et Kunz. *D. Schw.* n. 170. *Caeoma sparsum* Link sp. II. 25.

β. *Alliorum*, grum. oblongis epidermide tenui grysea velatis dein effusis. — *Caeoma ambiguum* Link l. l. 8. *Uredo ambigua* DC. gall. VI. 64. *Dub. l. l.* 897.

γ. *Limonii*, grumulis bullatis. — *Uredo Limonii* Dub. gall. II. 897. *Puccinia Limonii* DC. gall. II. 596.

δ. *Fabae*, grum. amphigenis s. epicaulis, epidermidem demum obliterantibus. — *Uredo et Caeoma appendicu- latum* auct. qrd.

Var. α. ad *Arenarium* medium circa Artern Thuring.; β. ad *Allium Scorodoprasum*; γ. ad *Staticen Limonium*; δ. ad *Viciae Fabae* folia et caules, in quibus grumuli epidermide diu velantur. (Synonyma aegre laudantur, nec a praecedente aliena.)

+++ elaeosporae, sporidiis subglobosis conformibus, mole et colore variis, nunc mediocriter magnis, nunc minutissimis usque nunc olivaceo-nigris grumulos nigros mentientibus, nunc dilutiis saturatiusve violaceis s. purpurascensibus, varias pl. ipsius fructificationis et floris partes infestantibus, habitumque placentarem baccatum-ve induentibus. (Uredines spor. violaceo-nigris, violaceis s. olivaceis Schleid. C. Ustilago Pers. Rebent. Mart.)

* macrosporae, sporidiis majusculis, corculo opacis, limbo pellucido arillatis, nonnisi minus exacte globosis.

1657. *E. arillata* W., sporidiis subrotundis angulatis, corculo opacis, limbo tenui pellucido corrugato circumductis olivaceo-nigris, grumulis primum immersis, epidermide vesicata obductis, pro plantae fabrica figura et mole variis, demum in pulverem vigrum fatiscentibus, inquinantibus.

a. Ranunculacearum, grumulis subrotundis dein conuentibus, epidermidem hyalinam bullatim sublevantibus demumque sporidiis copiosissimis profusis oblitterantibus. *Uredo Ranunculacearum* DC. gall. VI. 75. Dub. gall. II. 901. *U. Anemones* Pers. syn. 223.

b. Violarum, grumulis sparsis elongatis, ex petiolis foliorumque pagina utraque emergentibus. — *Uredo vesicaria* Kaulf. in Ks. et Schm. myk. Hft. I. 67. Dub. l. l. 901.

c. Gladioli, grumulis subrotundis, dein longius excurrentibus. — *Uredo Gladioli* Requien. Dub. l. l.

d. Colchici, grumulis immersis elongato-striatis, epidermide scissa demum marginatis. — *Uredo Colchici* Ficin. dresd.

Var. *a.* ad utramque foliorum faciem Ranunculi Ficariae, Anemones nemorosae et Hepaticae trilobae, *b.* Violae odoratae; *c.* Gladioli communis; *d.* Colchici auctumnalis, rarius. (Grumuli pro plantae fabrica variam concinnant figuram; in Hepatica magis tenuantur et ambitum circumscripsum servant, in Ranunculis magis producuntur et praesertim nervos extremos, sicut in Vio-

la petiolas simeūl occupant; in Colchico vero striarunt immessarum nervis interjectarum specie redent.)

1658. *E. floccosa* W., sporidiis subrotundidis angulatis, centro opacis e limbo angustissimo pellacido arilatis, floccos hyalinos cylindraceos arachnoideos rectos illa subaequantes facile secedentes emitentibus usque floccoso-conglobatis, grumalis amphigenis epidermide primum obductis bullosis, maculae rubrae insidentibus deincepsque in pulvere floccosum nigro-violaceum satisecentibus.

Ad utramque foliorum paginam Hellebori viridis semel legi circa Heringam Thuring. (Singularis sp.; sporidia praecedentis fere, floccos pertennes breves hyalinos rectos acutos exserant s. forsan in illos evolvuntur, Leprariae incanae sic dictae fastar usque inter se conglobantur. Floccis dentis praecedentem refert.)

1659. *E. occulta* W., sporidiis effusis subrotundidis, e centro opaco limbum pellucidum verrucosum, veluti ex aliis multo minoribus concatenatis ambeuntibus compositum circumducentibus olivaceis copiosissimis, vaginalium et glumerarum faciem iateraneam investientibus illasque demum longitudinaliter ruptas, tomenti velutini continui rimosi iuster obducentibus.

a. *Secales*, sporidiis effusis, striae vaginalium iaternarum infarcientibus culmumque longitudinaliter scissum taeniatum hinc denigrantibus, hioc translucendo cinnereum mentientibus. — *Erysibe troglodytes* Wallr. in lit.

Var. a. *Secales cerealis* vitium noxiā, hucdum praetervisum, in agris thuring. pinguioribus annisque faetis increbescens; milique dadum jam innotescens. Habitū externo et crescendi modo *E. typhoiden* et *hypodyten* quidem aemulatur, sporidiorum indole tamen affatim recedit insignemque spoadet speciem. (Vaginae interternodia superiora culmi secalini spicam informantis amplexorae, Junio exente et antequam floret, quamvis externo habitu cum reliquis congruat, ex tate erysibode intercasa tamen longitudinaliter dehiscunt internamque.

faciem ex sporidiorum, interstitia internervia infarcientiam et tomentum nigrum velutinum mentientium ube-
tate, ligamenti instar replicant et hinc colorem nigrum
hinc caesium inferunt. Eadem tabes rhachin quoque et
glumas ingreditur, donec culmus contabescat sterilisque
vaginis fassis ante messem denudatos pereat.)

1660. *E. sphaerococca* W., sporidiis tornato-
sphaericis, magnis, coreulo opacis, limbo pellucido tenuis-
sime muriculato cinctis, glumas corollinas Graminearum
clausas laze infarcientibus, dilutius saturatisve rufe-
scentibus.

a. Agrostidis. — Uredo segetum a. decipiens Pers.
syn. 225.

Intra glumas corollinas graminum, v. e. Agrostidis vul-
garis, ob tabem erysiboden imminutae et mutatae ideo-
que var. *pumila* dictae, rarius in agro hal. et gotting.
(Species antiquitos inclarescens ipsamque graminis stir-
pem propriam olim (*Agrostis pumila* L. Koel. Roth.
Poll.) s. *varietatem Agr.*-*var. γ. floribus ustilagine cor-
ruptis muticis* Schrad. germ. I. 296.) designans, a Per-
soonio male interpretata, a nuperis omnino omissa, di-
stinctissima colore inter has et phaeosporas ambigens,
natalitiis interaevis tamen ab his descisceus.)

1661. *E. foetida* W., sporidiis tornato-sphaericis ma-
jusculis, coreulo pellucidis, limbo saturo laevi cinctis oli-
vaceo-nigris foetidis, germinua triticea rite figurata, farinae
loco infarcientibus usque tunicatis. — *Erysibe fol-
liculata* Wallr. in Berl. Verhandl. I. 19. *Catoma sito-
philum* Link sp. II. 2.C. *segetum* Nees syst. f. 7. *Uredo*
sitophila Ditmar in Sturm. fung. germ. t. 34. *U. Caries*
DC. gall. VI. 78. *Dub. gall.* II. 901. *La Carie Tess.*
malad. des grains 217. *Ustilago tritici* C. Bauk. pin.
Buzb. hal. 342.

Intra Triticorum grana, farinae loco, minime raro
apud Thuringos, ab agricultis exercitatis faciliter tam
negotio a segete propulsanda. (Cf. Wallr. in Berl. Ver-
handl. I. 19.)

1662. *E. baccata* W., sporidiis subglobosis medio-criter magnis violaceo-nigris, corculo opacis, limbo tenui pellucidis, Caricum germinia infestantibus illaque in massam carbonaceam intus vacuam compactam impalpabilem rotundam, primum (non nisi semper) urceolo hyalino reclasam mutantibus habitumque bacatum mentientibus. — *Caeoma urceolorum* Schleid. ber. II. 130. *C. decipiens* Mart. erl. 315. *Link sp.* II. 5. *Uredo urceolorum* DC. gall. VI. 78. *Dub. gall.* II. 902. *Aecidium urceolorum* Schum. *U. Caricis* Pers. syn. 225. *U. decipiens* β. Strauss l. l. III. *U. carpophila* Schumach. saell. II. 234.

In spicis Caricium complurium sexu distincto insignium, v. c. in urceolis *C. praecocis*, *ericetorum*, *montanae piluliferae*, *glaucæ aliarumque*. (Sporidia in baccam veluti figuratam coacta pro caryopsis mole variant, et nunc urceolo albido obducta delitescunt, nunc prominent illo destituta et baccae ovalis carbonaceae instar oculos alliciunt.)

1663. *E. receptaculorum* W., sporidiis globosis, corculo obscuris, limbo pellucidis brunneo-violaceis, Cichoreacearum receptacula anthodio primum reclasa obvallantibus genitaliaque effoeta simul ingressa inquinantibus, demum aufugis. — *Cacoma receptaculorum* Link sp. II. 17. Schleid. l. l. 130. *Uredo receptaculorum* DC. gall. VI. 79. Strauss l. l. III. *Dub. gall.* II. 902.

α. *Tragopogonis*. — *Uredo Tragop. pratensis* Pers. syn. 225. Alb. et Schw. nisk. 130. *Tragopogon capitulis quidpiam fuliginis simile continentibus* Rupp. jen. 208. Matth. Kreutrb. 167.

β. *Scorzonerae*. — *Rupp. l. l.*

Intra capitula *Tragopogonis pratensis* in pratis Hercyn. et Thuring. aridis haud quidem rara, rarer tamen in *Scorzonera*s. (Capitula nondum nubilia hac tabe aggressa immixuntur, connivent, demum patent sporidiaque profundunt, praeter paucula genitalibus effoetis adhaerentia.)

microsporae, sporidiis centro opaco notatis, limbo pellucido cinctis, duplo quam macrosporarum minoribus.

1664. *E. longissima* W., sporidiis omnium minutissimis tornato-globosis, centro pellucidia, limbo opaco ciuctis, primum olivaceis interstitia internervia, epidermide tenui aequaliter obducta infarcentibus, dein saturatioribus effusis valleculas concavas epidermide longitudinaliter scissa marginatas nudas relinquentibus. — *Caeoma longissimum* Schleid. berol. II. 129. *Link sp.* II. 4. *Uredo longissima* Sowerb. fung. t. 139. *Dub. gall.* II. 901.

Ad utramque foliorum et vaginarum Festucae aquatice faciem suis locis ubertum, aliis rarescens.

1665. *E. olivacea* W., sporidiis globosis minimis olivaceis, Caricum germina primum obsidentibus dein fragentibus semetque profundentibus. — *Caeoma olivaceum* Link sp. II. 6; ? Schleid. I. l. 130 (qui sporidia majora laudat). *Uredo olivacea* DC. gall. VI 78. *Dub. l. l.*

Caricis ripariae germina infestat, a me nondum visa, hinc dubia, quamvis auctorum sententia satis diversa.

1666. *E. typhoides* W., sporidiis globosis minimis pellucidis olivaceis hypophloeodeis copiosissimis, culmi (Arundinis Phragmitis) internodia ambeuntibus compactis, epidermide stipata jugiter tectis et sub illa inflata delitescentibus.

Culmos Arundinis Phragmitis ad Rhenum fl. circa Argentoratum infestat, uno loco. (Kneiff.) (Sp. singularis. Internodia culmi hoc vegetabili adpressa vaginis recondita, molem augent vel duplicant, fuscescere incipiunt, molem obesam Typhae instar clavatam a basi inde sensim tenuatam induant, duritiem lignosam adipiscuntur et sub epidermide stipata sporidiorum, Cichorei ad usum domesticum praeparati instar compactorum agmina abundantissima culnum amice ambeuntia recondunt. Sequenti forsitan adfinis.)

1667. *E. Maydis* W., sporidiis exacte globosis minutissimis opacis olivaceo-nigrescentibus, culnum (Zea)

s. semina infarcentibus, epidermide tectis, demum in pulvere satiscientibus. — *Caeoma Zeae Link sp. II. 2. Uredo Maydis DC. gall. II. 77. Dub. gall. II. 901. U. segetum η. DC. encycl. Bonnet über d. Nutzen d. Bl. 187.*

Ad receptacula Zeae Maydis cultae rarissime.

1668. *E. hypodytes W.*, sporidiis omnium minutissimis exacte globosis centro opacis olivaceo-nigrescentibus copioissimis effusis, culnum ambeuntibus illumque inquinantibus — *Caeoma hypodytes Schlecht. berol. II. 129.*

Ad Elymi areuarii culmos vaginis primum obducta agri berolin. (Schlechtendal.) (Cauta ab *E. typhoide* duplo et ab *E. occulta* sporidiis quadruplo minoribus et colore diversa, ad *E. veram* potius accedens.)

1669. *E. utriculosa W.*, sporidiis exacte globosis minutissimis purpureo-violaceis opacis (Polygonearum) perigonum infarcentibus caryopsidemque destruentibus, demum effusis inquinantibus. — *Caeoma utriculosum Link sp. II. 9. Schlecht. I. l. 130. Nees syst. f. 6. Uredo utriculosa Dub. gall. II. 901. U. Histortarum γ. ustilaginea DC. gall. VI. 76. U. Caricis in Polygoni spicis Wallr. ann. 139. U. Hydropiperis Schum. Ustilago Persicariae Mentz. pug. et alior.*

Intra Polygonorum, *P. minoris* maxime et *Hydropiperis* perigonia passim.

1670. *E. Panicorum IV.*, sporidiis subglobosis minutis, nonnisi in figuram ovatae tendentibus pallucidis olivaceo-umbinis, primum perigonio inclusis, dein profasis, ovarium destruentibus, glumas aristasque inquinando occupantibus. —

a. Panici glauci, sporidiis perigonium inflatum vesicatum infarcentibus. — *Erysibe inflata W. in lit.*

β. Panici miliacei, sporidiis dein effusis, paniculam vaginis obductam inflatam inquinantibus. — *Caeoma destruens Schlecht. I. l. 130. Link sp. II. 3. Uredo destruens Dub. gall. II. 901. U. segetum δ. Panici miliacei Pers. syl. 224. U. Carbo δ. DC. gall. VI. 76.*

Intra Panicorum variorum germina, var. α . *P. glauci agri haleus*, passim; β . *P. miliacei agri gotting.* rariss. (Utraque var., inflorescentia jubente, habitu inter se reredit, sporidiorum indole tamen congruit.)

1671. *E. antherarum* W., sporidiis globosis minutissimis pellucidis purpureo-violaceis, anthers (*Caryophyllacearum*) nondum nubiles inclusas, dein exsertas occupantibus, destruentibus et inquinantibus. — *Caeoma antherarum* Schlecht. I. l. 130. *Nees syst. f. 5.* Link sp. II. 25. *C. violaceum* Mart. erl. 315. *Uredo antherarum* DC. gall. VI. 79. Dub. gall. II. 902. *U. violacea* Pers. syn. 225.

Anthers complurium *Caryophyllacearum*, v. c. *Silene chlorantha*, nutantis, *Seponariae officinalis*, *Lychoidis dioicae*, *Floris cuculi*, *Cucubali Otitis*, *Dianthi Carthusianorum* et deltoidis infestat, nec quoque ab iisdem *Scillae bifoliae* et *Tulipae* partibus in agro thuring. aliena. (Wallr.)

1672. *E. vera* W., sporidiis exakte globosis minutissimis pellucidis nigro-violaceis inodoris, partes *Cerealium hordeacearum* fructificationi inservientes infarcientibus, destruentibus demumque profusis inquinantibus. — *Caeoma segetum* Link obs. I. 4., sp. II. 1. Schlecht. I. l. 129. *Uredo Carbo* DC. gall. VI. 76. pr. pr. Dub. gall. II. 901. *U. segetum* Pers. syn. 225. excl. var. δ . ϵ . *Reticularia segetum* Bull. herb. t. 472. f. 1. Ερβοίβη Theophr. I. l. *Ustilago et Robigo* Plin. Cf. Wallr. in Berlin. Verhandl. I. p. 9.

α . *Hordei*. — *Uredo segetum* α . *Hordei* Pers. I. l. Tessier malad. des grains 306.

β . *Tritici*. — *U. segetum* β . *Tritici* Pers. I. l. *Lycoperdon Tritici* Bjerkand.

γ . *Avenae*. — *U. segetum* γ . *Avenae* Pers. I. l. *Tavernacm. hist.* 556. *Ditm. in Sturm. germ.* t. 33.

δ . *Holci avenacei*.

Graminum cerealium aliorumque trita ac noxia pestis, qua a gravis proferendis culmus integer desciscit.

N.B. Has scilicet *Erysibes*, exercitiorum botanicorum documenta, ipse in agro thuring. paucissimis cum autorum titulis l. exceptis, legi; alias praeter has, a gallicis potissimum indicatas, ab indigenis forsan haud alienas denuoque indagandas amicis reliquo: *Uredinaria Quercus* Brond.; *U. Erigeronis* Rq.; *U. proeminentia DC.* (in *Euphorbia Chamaesyce*; *U. Cacaliae DC.*; *U. Benenae DC.*; *U. Erythronii DC.*; *U. Muscari Dub.*; *U. Festucae DC.*; *U. Ribis Chev.*; *U. Plantaginis Dub.*; *U. Chenopodii maritimi Dub.*; *U. Terebinthi DC.*, *U. Ari italicæ Req.*; *U. Calthæ Req.*; *U. melanogramma DC.*, (ad folia *Caricum*); *U. seminis Convolvuli Desmaz.*; *U. Floscultorum (Knautiae) DC.*, et alias ejusdemodi, sive dubias, sive novarum proventu augendas.

190. PUCCINIA PERS. Zwillingbrand.

Sporidia ovalia septo transversim interstincta s. geminata, veluti bilocularia opaca colorata, basi aequalia hincve in basin pellucidam (*pedicellus auct.*) tenuata, primum hypophloeodea dein emersa, ad grumulos subrotundos elongatosque tersos, epidermide scissa cinctos, cum ordine quoddam nequaliterque congesta.

(*Puccinia Pers.* Lk. *Dub.* *Spr.* nec *Adans.* *Dicacoma Nees.* *Caeoma E.* *Dicacoma Mart.* *Uromyces Lk. obs. II.*) (*Erysibes* ferme habitu aemulantur illasque nonnisi septo obsoleto mentiuntur.)

† oosporae, sporidiis utrinque aequalibus s. in basin illis breviorem brevissimamve tenuatis.

1613. *P. inquinans* JV., amphigena s. quoque epicaula, sporidiis e figura subrotunda ovalibus, septo obsoleto interceptis, opere veluti marmoreo opacis, utrinque aequalibus hincve brevissime apiculatis, grumulis ovato-subrotundis convexiusculis, sin epidermide velatis, deum ex rima sporidia trausmittentibus illamque omnino oblitterantibus.

a. *Compositarum.* — *Puccinia Compositarum* Schldl.

ber. II. 133. Link sp. II. 73. Dub. gall. II. 890. Uredo Flosculorum Strauss pr. pr. Puccinia Flosculorum Roehl.

a. *Lapsanae*. — *Aecidium Lapsanae* Schultz.

β. *Arnicac*. — *Uredo Arnicac DC. gall. VI. 65.*

γ. *Cyani*. — *U. Cyani β. DC. I. l. 74.*

δ. *Tragopogonis*. — *U. Hysterium Strauss.*

ε. *Serratulac*. — *U. maculosa Strauss.*

ζ. *Centaurearum*. — *Puccinia Centaureae et Echinopis DC. gall. VI. 59. P. Calcitrapae DC. I. l. II. 221. P. Podospermi DC. I. l. II. 595. Dicaeoma caulincola Nees syst. f. 13.*

η. *Cicerbitac*. — *Erysibe Cicerbitae W. in lit.*

θ. *Prenanthis*. — *P. Prenanthis Kunze.*

ι. *Bardanae*. — *Erysibe Bardanae W. in lit.*

κ. *Hieraciorum* — *P. Hieracii Mart. mosq.*

λ. *Cnicorum*. — *Uredo Cnici Strauss.*

μ. *Apargiac*. — *Uredo Apargiae Schleich.*

b. *Umbelliferarum*. — *Puccinia Umbelliferarum DC. gall. VI. 58. Schltl. I. l. 133. Link sp. II. 77. Dub. gall. II. 890.*

α. *Aegopodii*. — *P. Aegopodii Strauss.*

β. *Pimpinellae*. — *P. Pimpinellae Strauss.*

γ. *Aethusac*. — *P. Aethusae Lk. I. l. 77.*

δ. *Heraclei*. — *P. Heraclei Grev. cr. t. 42.*

ε. *Athamanthae*. — *P. Athamanthae. DC. II. 228.*

c. *Labiatarum*. — *P. Labiaturum Schltl. I. l. 133.*

α. *Betonicac*. — *P. Betonicac DC. gall. VI. 57.*

Link sp. II. 72. P. Anemones β. Betonicac Alb. et Schw. nisk. 131. Dicaeoma Betonicac Nees syst. f. 11. Uredo Betonicac Strauss I. l. 99.

β. *Clinopodii*. — *P. Clinopodii Lk. I. l. DC.*

γ. *Menthac*. — *P. Menthac Pers. Lk. DC.*

δ. *Stachydise*. — *P. Stachydise DC. gall. II. 595.*

δ. *Polygonearum*. — *P. Histortae W. in lit.*

ε. *Narixfragac*. — *P. Narixfragac Schltl. I. l. 134.*

γ. *Gentianarum*. — *Puccinia Gentianae Link. Roehl.*

?*Ureds Gentianae Strauss.*

Varietates ad familias naturales digestae ad pl. lau-

datas minime rarescunt; var. d. ad *Polygonum Bistortam Hercyn. superior.* plane non differt. (Grumuli tum ex foliorum fabrica varia, tum ex eorum vestitu varium habitum nanciscuntur, et sporidia exsiccando, generis indolem reticere solent.)

1674. *P. Adoxae DC.*, sporidiis oblongis utrinque acutiusculis, septo transverso interstitiis fusco-castaneis, grumulis primum subrotundis epidernide lacera ciuctis dein confluentibus, maculas fusco-castaneas constituentibus. — *Puccinia Adoxae DC. gall. II.* 220.

Ad *Adoxae Moschellinae* folia et caules, vere, passim. (A praecedente vix diversa videtur.)

1675. *P. fuscata H.*, sporidiis sphaericis cohaerentibus s. geminatis, mediotenus septam constrictum meutieutibus, hiuc nonnisi parce apiculatis, extus tenuissime muriculatis, intus opacis s. nubeculosis, grumulis subrotundis distinctis fusco-ferrugineis dein confluentis nudis, epidernidem oblitterantibus.

a. Ranuncularum, grumulis plurimis confluentibus. — *Puccinia Anemones Pers. syn. 226. Schlecht. l. l. 134. Dub. gall. II. 891. Uredo Ranuncularum DC. gall. II. 229. pr. pr. U. quincunx Strauss l. l. 99. Puccin. vesiculosus auct. Accidium fuscum Sowerb. fung. t. 53.*

b. Prunastri, grumulis parvis sparsis. — *Puccinia Pruni spinosae Pers. syn. 226. Kz. et Schmidt D. Schw. n. 91. Uredo Prunastri DC. gall. VI. 85. Dub. gall. II. 898.*

c. Pruni, grumulis majoribus confertioribus. — *P. Prunorum Link sp. II. 82.*

d. Ruborum, grumulis deia confluentibus.

e. Dentariae. — *Uredo Dentariae Alb. et Schw. 129.*

Ad folia *Pruniferarum* (*Pruni spinosae*, *Pr. domesticae*), *Ranuncularum* (*Anemones nemorosae*) et *Rosacearum* quarundam (*Rubi corylifolii*) amphigena, passim. (*Erysibe* *geminatam* potius refert: sporidia conjugata; saepius enim secedunt et simplicia praestant.)

1676. *P. Asari Kz.*, sporidiis ovato-oblongis, mediotenus disseptis, hiuc in basin pellucidam acicularem

brevem tenerrimis, hinc obtusis s. tenuissime apiculatis hyalinis, grumulis convexis subrotundis parvis, epidermidem hyalinam demum reclinantibus fusco-brunneis, saepe confluentibus. — *Puccinia asarina* Kunz. myk. Hst. I. 70., D. Schw. n. 148. Dub. gall. II. 890. P. Asari Link sp. II. 68.

Ad *Asarum europaeum* amphigena. Aestate.

1677. *P. Acerum* Lk., sporidiis ovatis, mediotenus dissepitis fuscis, grumulis subrotundis, epidermide bullata nitente, centro rumpente tectis. *P. Acerum* Link sp. II. 80. *P. bullata* Lk. obs. II. 29.

Ad folia *Aceris Pseudo-Platani*. (Link.)

† *urospora e*, sporidiis basi inaequalibus, hinc in basin diaphanam, sporidio altero duplo s. triplo longiori productis (sp. *pedicellata* auct.). — *Uromyces* L.

1678. *P. Calthae* Lk., sporidiis ovatis fuscis, hinc in basin brevem hyalinam productis, grumulis subrotundis convexis, epidermide erupta cinctis sparsis circinatimque dispositis, maculae fuscae insidentibus. *Puccinia Calthae* Link sp. II. 79.

Ad folia *Calthae palustris* passim.

1679. *P. Polygonorum* Schlecht., sporidiis bilocularibus, loculo supremo obtuso ovato opaco facile secedente, inferiore sensim tenuato recto illo triplo longiore, grumulis primum verrucosis parvis sparsis aggregatis stipatis fusco-nigricantibus, epidermide lacera succinctis. — *Puccinia Polygonorum* Schlecht. I. I. 132. Link sp. II. 69. Dub. gall. II. 889. *P. Polygoni amphibii* Pers. syn. 227. Alb. et Schw. nissk. 132. Strauss t. I. 103. *P. Bistortae* et *P. Convolvuli* DC. gall. VI. 61. pr. pr.

Ad *Polygona nootkatia* ubertim, caute tamen a *P. inquinantis* var. d. dignoscenda.

1680. *P. Thezii* Chaillet., sporidiis ovatis bilocularibus, loculis conformibus, inferiore in basin illo longiori crassiusculam abrupte tenuatis, grumulis convexis

nigro-fuscis nitidis stipatis, epidermide elevata lacera cinctis. — *Puccinia Thesii* Chaill. Dub. gall. II. 889. ?*P. deformis* Kunze in Spr. syst. IV. 558.

In Thesio Linophyllo amphigena. (Sporidia P. fuscum quadanteus referunt, laevore tamen et loculo inferiore in basin producto differant.)

1681. *P. Buxi* DC., sporidiis oblongo-cylindricis pellucidiis medio disseptis, loculo superiore ovato, inferiore oblongo in basin duplo longiore filiformem rigidulam rectam producto, grumulis foetis scatellaribus subrotundis emersis sparsis liberis compactis fuscis, epidermidem ruptam reclinantibus illamque demum concavam pallidam relinquentibus. — *Puccinia Buxi* DC. gall. VI. 60. Dub. gall. II. 888. Sowerb. fung. t. 439. Grev. cr. t. 17. Link sp. II. 83.

Ad Buxi sempervirentis elationis folia hypogena, rarius in hort. thuring.

1682. *P. Discoidearum* Lk., sporidii ovalibus bilocularibus pellucidis, loculis subaequalibus subrotundis, inferiore in basin praelongam illo duplo longiore producto, grumulis subrotundis convexiusculis parris stipatis fusco-nigris, epidermide scissa redimitis. — *Puccinia Discoidearum* Link sp. II. 73.

a. Tanaceti. — *Puccinia Tanaceti* DC. gall. II. 222. Dub. I. l. *Urodo Tanaceti* Strauss L. L. 106.

b. Balsmitae. — *U. Balsmitae* Str. I. l.

y. Artemisiarum. — *P. Artemisiarum* Kz. et Schm. D. Schw. n. 93. Dub. I. l. *P. Absinthii* DC. gall. VI. 56.

d. Pyrethri. — *P. Pyrethri* Schub.

e. Asparagi. — *P. Asparagi* DC. gall. II. 595.

Var. ad Tanaceti, *b. Balsmitae*, *y. Artemisiae vulgaris*, *Absinthii* et *Seriphii*, *d. Pyrethri inodori* et *e. Asparagi officinalis* hortensis folia rarius.

1683, *P. conglomerata* Kz., sporidiis bilocularibus, loculis subconformibus, inferiore in basin brevent

tenuatis, grumulis primum epidermide tectis parvis dein speciosis subrotundis. — *P. conglomerata* Schm. et Kz. D. Schw. n. 191. *P. Syngenesiarum* Link sp. II. 74. *Uredo conglomerata* Strauss l. l.

Ad folia Tussilaginis alpinae (Kunze), Centaurearum (Ehrenberg.)

1684. *P. clavuligera* W., sporidiis bilocularibus pellucidis, loculis difformibus, superiore obtuso subrotundo s. ovali, inferiore sensim tenuato subcuneato in basin illum subaequantem sensim gracilescente, grumulis subrotundis stipatis convexisculis nitidis fuscis, epidermide succinctis.

a. *Galiorum*. — *P. Galii Cruciatae* Dub. gall. II. 890. *P. Valantiae Pers.* syn. 107. Link sp. II. 75. Alb. et Schw. nisk. 132. *P. Stellatarum* Dub. l. l. *P. punctata* Link obs. II. 30. ?*P. difformis* Kz. myk. Hft. I. 71. pr. pr.

β. Luzulae. — *P. Luzulae* W. in lit.

γ. Scirpi. — *P. Scirpi* DC. gall. II. 223. Dub. l. l.

δ. Caricis, grumulis internervis ideoque magis elongatis. — *P. Punctum* Link sp. II. 68. *P. Caricis* Rebent. neom. 356. Schleidt. l. l. 131. DC. gall. VI. 60.

ε. Iridis. — *P. Iridis* Wallr. in lit.

Var. *α.* ad *Galii* veri, *Molluginis*, *Cruciatae* et *Aparines*; *β.* *Luzulae* pilosae; *γ.* *Scirpi lacustris*; *δ.* *Caricis ericetorum*; *ε.* *Iridis pumilae* folia amphigena.

1685. *P. annularis* Str., sporidiis bilocularibus, loculo superiore subrotundo, inferiore obovato in basin duplo longiore protenso, grumulis convexis constipatis ex fuso-ochraceis dein tabacino-fuscescentibus, maculae ferrugineae iusidentibus. — *Puccinia annularis* Strauss l. l. 106. Schleidt. l. l. 132.

Ad *Tenacium Scorodoniam hypophylla*, rarias suisque locis.

1686. *P. Tripolii* W., sporidiis bilocularibus pellucidis oblongis, loculis coformibus ovalibus, inferiore in basin illum subaequantem producto, grumulis convexis compactis intus subcarnosis, primum epidermide tenui

tectis cinnamomeis parvis plerumque aggregatis, accervulos nodosos colliculosos mentientibus, dein fusco-ferrugineis. — *Puccinia Tripolii* Wallr. in lit.

Ad Asterem *Tripolium amphigena* et epicaula v. c. ad salinas arterens. Thuring. abundat. (Ad foliis grumuli subrotundi, ad caules elongati, crassiores, latores veluti obesi, iisque a sequente differt.)

1687. *P. Circæae* Pers., sporidiis exiguis atrinque acutis pellucidis compactis mediotenus parce constrictis in basin duplo longiore productis, grumulis subrotundis convexiusculis minutis saepius aggregato-confluentibus pulvinatis, primum epidermide hyalina tectis cinnamomeis dein fusco-rufescentibus, hinc maculam concolorē relinquentibus. — *Puccinia Circæae* Pera. syn. 228. *Dub. gall.* II. 887. *DC. gall.* II. 220. *Link sp.* II. 82.

Ad Circaciam alpinam et Intetianam Hercyn. et Thuring. hypophylla passim.

1688. *P. Caryophyllearum* W., sporidiis oblongis pellucidis bilocularibus, loculo superiore ovato obtuso, inferiore longiore pyriformi in basin praelongam productis, grumulis compactis ovatis oblongisque sparsis s. confertis, epidermidem hyalinam demum obliterantibus. — *Puccinia verrucosa* Schleid. I. I. 123. *P. Lychnidearum* Link sp. II. 80. pr. pr. *Uredo verrucosa* Strauss I. I. 107.

a. Saginae. — *P. Saginae* Kz. et Schm. D. Schw. n. I. 21.

b. Cerastiorum. — *P. Cerastii* W. in lit.

c. Arenariae. — *P. Arenariae trinerviae* W.

d. Stellariae. — *P. erassa* Lk. obs. II. 30. *P. Stellariae* Dub. gall. II. 887.

e. Frankeniae. — *P. Frankeniae* Lk. I. I.

Ad plantas laud. Thuring. et hortor. Aestate, passim.

1689. *P. Dianthi* DC., sporidiis oblongo-cylindricis angustato-elongatis pellucidis 1-2 obsolete septatis, loculo superiore oblongo obtusiusculo, inferiore sensim in basia duplo longiore praelongatum attenuato, grumulis compactis subrotundis rufo-fuscis sparsis s. concen-

trico-aggregatis, demum confluentibus placentaribus, epidermide lacera cinctis. — *Puccinia Lychnidearum* Dub. et Link l. l. pr. pr. *P. Dianthi DC. gall. II.* 220.

Ad Dianthi Carthusianorum folia in hort. thuring. maxime rara. (Hujus et praecedentium sporidia in eodem grumulo variant quidem et inter se communionem, vel *P. verrucosae* titulum generalem cum var. subscendam suadent; in hac tamen reliquis magis tennantur, producantur et sp. distinctam omnino promittunt.)

1690. *P. graminis* Pers., sporidiis oblongo-cylindricis angustis pellucidis 1-2 septatis, loculo superiore ovali acutiusculo, inferiore sensim in basin rostratum duplo longiorem tenuatis, grumulis compactis nigris, pro varia epidermidis fabrica variis eaque demum scissa cinctis. — *Puccinia graminis* Pers. syn. 228. Schltl. l. l. 131. Link sp. II. 67. *P. linearis* Roehl. *P. cerealis* Mart. mosq. *Uredo frumenti* Sowerb. fung. t. 140. *U. linearis* Strauss l. l. 104. *Aecidium lineare* Gmel. syst. *Lycoperdon lineare* Schrank. *Uredo frumenti* Sowerb.

$\alpha.$ *culturorum*, grumulis angustis spatia internervia infarcentibus longissimis, demum culmum ambeuntibus demigrantibusque. — *Puccinia caulinum* Roehl. *P. graminis* $\gamma.$ *caulinum* Alb. et Schw. l. l.

$\beta.$ *vaginarum*, grumulis e figura subrotunda ovalibus subquadratisque, minus longe excurrentibus.

Ad grama quaecunque, maxime corealia. Auctumoo.

1691. *P. arundinacea* Hedw. fil. l., sporidiis ovatis bilocularibus, loculo utroque subrotundo subconformati, inferiore in basin gracilem illo duplo longiorem abrupte tenuato, grumulis compactis subspongiosis fascis, pro varia epidermidis fabrica variis.

$\alpha.$ *epiphylla*, grumulis convexis pulvinatis emersis, intra spatia internervia latescentia exceptis ideoque ovatis oblongisque, nonnisi insigibus. — *Puccinia striola* Schltl. l. l. 131. nec Link.

$\beta.$ *epicaula*, grumulis convexis angustissimis, spatia

culti internervia angustissima infarcentibus linearibus, non nisi longissime excurrentibus culinumque striatum inscribentibus. — *P. arundinacea* Hedw. fil. in DC. gall. Dub. gall. II. 889. *Uredo graminis* f. DC. gall. VI. *U. striola*. Strauss l. l. 105. *U. Phragmitis* Schum. pr. pr. *Puccinia Phragmitis* Kunz.

Ad folia culmosque Arundinis *Phragmitis* passim copiose, quoad locum habitu vario decipiens et scite a *Sphaeria rimosa* sterili dehiscente dignoscenda.

N.B. Alias complures, sive novas, sive praecedentibus subscribendas *Pucciniae* species, auctores gallici praepri-
mis laudant, quarum indagandarum nomina transcribo.
Puccinia Iberidis Dub. (in *Iberide sempervirente*); *P. Thlaspeos* Dub., *P. Corrigiolae* Chev.; *P. Globulariae* DC.; *P. Jasmini* DC.; *P. Asteris* Dub. (ad *A. salignum*); *P. Aviculariae* Pers.; *P. Veronicarum* DC.; *P. Veratri* Dub.; *P. Eryngii* DC., (hanc quoque juvenem in *agris patruis* legi); *P. Hibis* DC.; *P. Thalictri* Chev.; *P. Asphodeli* Dub.; *P. Prostii* Moug. (ad folia *Tulipae*); *P. Epilobii* DC.; *P. Primulae* Dub.; *P. expansa* Ehrenb. (ad *Cacalias alpinas*); *P. Salicum* Ehrenb.; *P. longicauda* Opiz.; *P. maculosa* et *grieca* Roehl. — Mirum profecto consortium generis cum *Erysibe* in iisdem herbis et vix nisi indole erysibode explicandum, nusquam tamen praeter loci communionem aliquam adfinitatem spondens.

b. mycogēni, sporidiis in basin communem, stratum carnosum gelatinosumve s. stroma veluti mentientem diffluentibus innatis, ad grumulos discoideos s. patellares compactos, primum saepius (in ramslis languidis) hypophloeodeos, dein emersos congestis.

(*Gymnomycetes* Lk. *Uredineae melanconiae* Dub. *Coniomycetes* Spr. syst.)

190. BLENNORIA FR. Schleimsporling.

Sporidia elongata cylindrica utrinque truncata dia-
phana simplicia minutissima, cum pseudostromate hypo-
phloeode gelatinoso in tuberculum erumpens conglutinata.

1692. *B. Buxi Fr.*, sporidiis numerosissimis minutissimis, grumulos convexos fusco-nigricantes, demum epidermide opta cinctos constituentibus. *Blennoria Buxi Fr.* syst. orb. I. 366. Dub. gall. II. 885.

Ad folia Buxi sempervirentis arida amphigena. (Simum ad folia Eryngiorum nostratium quoque legi, nunc tamen dubium.)

191. CORYNEUM NEES. Dockensporling.

Sporidia fusiformia septata opaca erecta, basi tenuata dilutiore, pseudostromati verruciformi planiusculo innata, grumulos primam hypophloeodeos dein emersos scutellares occupantia, demum ex illis prominentia. (*Exosporium Spr.*)

1693. *C. umbonatum Nees*, sporidiis subcylindricis, apice attenuato pellucidis, basi dilatata producta lanatis, grumulos subrotundos scutellares s. convexiusculo-discoideos, epidermide acissa succinctos nigrescentes constituentibus. — *Coryneum umbonatum Nees* syst. 34. f. 31. Link sp. II. 124. Dub. gall. II. 882. *Erosorium umbonatum Spr.* syst. IV. 563.

Ad ramos dejectos Carpini, Lusatiae v. c. (Kunze) et Thuring. (Wallr.)

1694. *C. disciforme Kz.*, sporidiis clavatis, basi attenuata suffulta, grumulos scutellares planos informantibus. — *Coryneum disciforme Kunz.* myk. Hft. I. 76. t. 2. f. 18. Ehrenb. syb. 12. Schleid. berol. II. 140. *Erosorium disciforme Spr.* syst. I. t.

Ad ramos juniores quercinos languidos passim. Hyeme.

1695. *C. pulvinatum Kz.*, sporidiis ovalibus obtusis in basin elongatam productis, grumulos rotundos patellares convexos liberos atros informantibus. — *Coryneum pulvinatum Kunze* l. l. Link sp. II. 124. *Erosorium pulvinatum Spr.* syst. IV. 563.

Ad ramulos dejectos Ulmi, Tiliae, v. c. agri Lipsiens. (Kunze), thuring. Wallr.) passim.

1696. *C. brachyurum* Lk., sporidiis ovali-subglobosis in basin brevissimam crassiusculam desinentibus, grumulos convexos atros obducentibus. — *Coryneum brachyurum* Link sp. l. l.

Ad ramos dejectos agri berol. (Link.)

1697. *C. depressum* Kz., sporidiis ovalibus in basin tenerrimam productis grumulosque depresso atros occupantibus. — *C. depressum* Kunz. l. l. f. 17.

In similibus cum priore locis, a quo vix differt.

1698. *C. confluentis* Nees, sporidiis oblongis obtusis basin tenerrimam exserentibus, grumulos subrotundos gregarios medioteanus elevatos nigros informantibus. — *Coryneum confluentis* Nees jun. in Kunz. l. l. II. 66. Link sp. II. 125.

Ad ramulos dejectos rarius.

192. SPORIDESMIUM LK. Bündelsporling.

Sporidia fusiformia opaca septata basi tenuata assurgentia pulvinata, pseudostromati effuso innata.

(*Puccinia Spr. Sporidermium Nees (ex sphalmate)*).

1699. *Sp. atrum* Lk., sporidiis clavato-fusiformibus dense aggregatis erectis, dein basi implexa decumbentibus sporidochiumque atrum effusum obstruentibus. — *Sporidesmium atrum* Lk. obs. I. 39. f. 64. Nees syst. f. 18. Lk. sp. II. 120. Dub. gall. II. 882. *Puccinia atra* Spr. syst. IV. 569. *Sporid. fusiforme* Nees in nov. act. acad. Leop. IX. 240. t. 5. f. 1. (adultum). *Sp. vagum* Nees l. l. f. 2.

Ad asperes putridos passim.

1700. *Sp. olivaceum* W., sporidiis oblongis obtusis in basin productis sublavatis obsolete septatis, in stratum tenue velutinum olivaceum nitidum congestis sporidochiumque atro-fuscum verrucosum deplanatum obstruentibus. — *Sporidesmium olivaceum* W. in lit.

Ad Tiliae ramulos putres, nonnisi Sphaeriam Tiliae occupans stratoque velutino olivaceo belle investiens, Thuring. haud infrequenter.

193. PROSTHEMIUM KZ. *Birkenschorf.*

Sporidia fusiformia septata binata ternatave in basin tenuata, stromati plano iunata, sub epidermide erumpentia. *Kunze.*

1701. *Pr. betulinum* Kz., sporidiis opacis sessilibus in basin appendiculatam tenerrimam pellucidam desinentibus, primum hypophloecodeis dein emersis, grumulos atros planos constituentibus. — *Prosthemium betulinum* *Kunz.* myk. *Hft. I.* 17. t. 1. f. 10. *Schltdl. berol. II.* 139. *Ehrenb. sylv.* 12. 24. *Exosporium betulinum* *Spr. syst. IV.* 563.

Ad ramos betulinos dejectos vulgare.

194. SARCOPODIUM EHRENB. *Lockensporling.*

Sporidia flocciformia elongata septata pellucida, sporidochio pseudostromatico effuso iunata.

1702. *S. circinatum* *Ehrenb.*, sporidiis flocciformibus annulato-septatis, apice obtuso incurvis circinatis, sporidochio pseudostromatico carnoso carneo-flaventib impositis. — *Sarcopodium circinatum* *Ehrenberg sylv.* 12. 23. f. 4. *Schltdl. berol. II.* 140.

Ad caules plantae annuae arescentes agri berolin. (*Ehrenberg.*)

195. GYMNOSPORANGIUM LK. *Nacktsporling.*

Sporidia uniseptata basi producta suffulta, stromati erumpenti vesiculoso gelatinoso effuso adnata. *Lk. obs.*

1703. *G. Juniperi* *Lk.*, sporidiis conicis uniseptatis basi quadruplo longiore suffultis, sporidochio pseudostromatico prium hypophloecode conico, dein effuso aurantiaco superadditis. — *Gymnosporangium Juniperi* *Link sp.* *II.* 127. *Nees syst.* 37. f. 23. *Regensb. bot. Z.* 1826. p. 373. *G. conicum* *DC. gall.* *II.* 216. *Tremella juniperina* *L. sp.* 1625. *Pers. syn.* 625. *Hoffm. veg. cr. I.* 31. t. 6. f. 4.

Ad truncos Juniperi communis passim.

196. PODISOMA LK. Schweisporling.

Sporidia uniseptata in basin longissimam stipitiformem producta usque inter se simplicata, sporidochium pseudostromaticum clavatum gelatinosum mentientia.

(*Podisoma Lk. et auct. Gymnosporangii sp. DC.*)

1704. *P. fuscum* Dub., sporidiis utrinque obtusis, sporidochium pseudostromaticum globosum dein conicum rufo-spadiceum demum fulvum constituentibus. — *Podisoma fuscum* Dub. gall. II. 851. *P. Juniperi* Link obs. I., sp. II. 121. Nees syst. 18. f. 15. *Gymnosporangium fuscum* DC. gall. II. 217. *Puccinia Juniperi* Pers. syn. 228. *Tremella Sabinæ* Dicks. *Puccinia cristata* Schmid. icon. III. t. 66. Mich. gen. t. 92. f. 1.

Ad corticem Juniperi Sabinæ, suis locis passim, aliis rarissimum.

1705. *P. clavariaeforme* Dub., sporidiis utriusque acutis, sporidochium pseudostromaticum cylindricum s. compressum aurantiacum constituentibus. — *Podisoma clavariaeforme* Dub. gall. II. 881. *Tremella clavariaeformis* Jacq. coll. II. 274. *Tr. digitata* Vill. delph. t. 56. *Tr. ligularis* Bull. champ. t. 427. f. 1. *Tremella juniperina* L. suec. n. 1135. Web. spic. 271. Hoffm. veg. cr. I. 33. t. 7. f. 2. *Wahlenb. suec.* II. 994.

Ad corticem Juniperi communis German. austral., nec non Thuring. inferior. parcis obvium.

197. PHRAGMOTRICHUM KZ. Kolbensporling.

Sporidia rhombæa septata, isthmis cylindricis pellucidis intercepta, basi stipitiformi sporidochio pseudostromatico fibroso-gelatinoso depresso innata, dein epidermide rupta, soluta libera, facile secedentia.

1706. *Phr. Chailletii* Kz., sporidiis rhombis, intus septato-cellulosis, sporidochium oblongum atrum constituentibus concoloribus. — *Phragmotrichum Chailletii* Kunz. et Schm. myk. Hft. II. 54. t. 2. f. 4. Link

sp. II. 126. *Dub. gall. II.* 881. *Gymnosporangium Chaillietii* *Spr. syst. IV.* 562.

Ad strobilos abietinos v. c. prope NenschateL (Chaill.)

198. EXOSPORIUM LK. Borstenkugel.

Sporidia oblonga s. linearia opaca septata sessilia, ex sporidochio pseudostromatico verruciformi s. elluso succrescentia, propixa.

(*Erosporium Lk. obs. Vermicularia et Erosporium Fr. Conoplae et Sphaeriac sp. auct.*, — a quibus sci-licet vix habitu externo, solum fere aegriusque natura interna, sporidiorum sic dictorum indole septata dignoscuntur et Linkii auctoritate hic laudantur.)

1707. *E. maculans* Lk., sporidiis elongatis densis filiformibus nigris, ex sporidochio pseudostromatico depresso, maculae nigrae s. concolori oblongae dein confluenti insidente, succrescentibus. — *Erosporium maculans* Link sp. II. 123.

Ad caules herbarum elatiorum passim, Franconiae v. c. (Nees.)

1708. *E. ditrichum* Lk., sporidiis elongatis filiformibus paucis atris, ex sporidochio pseudostromatico globoso minuto concolore prominentibus. — *Erosporium ditrichum* Link sp. II. 123. *Sphaeria ditricha* Fr. syst. II. 515.

Ad folia delapsa, Pyri v. c. et Betulae passim.

1709. *E. Rubi* Nees, sporidiis brevissimis filiformibus nigris, ex sporidochio pseudostromatico subgloboso supra depresso, maculae nigrae circumscriptae iusidente concolore succrescentibus — *Erosporium Rubi* Nees nov. act. Leop. IX. 236. t. 5. f. 6. Link sp. II. 123.

Ad folia Rubi caesii aliorumque frequens, maculis nigris saepe solum superstitibus.

1710. *E. trichellum* Lk., sporidiis elongatis filiformibus densis nigris, ex sporidochio pseudostromatico globoso iunato minuto concolore succrescentibus. —

Exosporium trichellum Link l. l. *Sphaeria trichella* Fr. syst. II. 515.

Ad folia sicca arborum variarum ipsiusque Hederae vulgare.

1711. *E. minutum* Lk., sporidiis elongatis filiformibus nigris densis, ex sporidochio pseudostromatico minutissimo oblongo aggregato concolore succrescentibus. — *Exosporium minutum* Link sp. l. l. *Sphaeriac Dematii* var. *minor* Fr. syst. II. 505.

Ad caules herbarum siccis passim.

1712. *E. Dematum* Lk., sporidiis brevibus filiformibus sparsis nigris e sporidochio pseudostromatico oblongo sparso nonnisi latescente concolore prominulis. — *Exosporium Dematum* Link sp. l. l. *Fermicularia Dematum* Fr. syst. III. 253. *Sphaeria Dematum* Pers. syn. 88. Fr. syst. II. 505.

Ad caules herbarum elatiorum siccis auctumno abundantanter. (Habitu Sphaeriam quidem resert, interanea tamen thecis destituantur nec locum respirent videntur.)

1713. *E. Eryngii* Chev., sporidiis elongatis claviformibus acutis distinctis concoloribus, ex sporidochio pseudostromatico minutissimo punctiformi atro gregario emergentibus. — *Exosporium Eryngii* Chev. pars. I. 39. t. 3. *Dub. gall.* II. 882.

Ad caules siccis Eryngii campestris.

1714. *E. hispidulum* Lk., sporidiis longissimis filiformibus atris, sporidochium pseudostromaticum oblongum, epidermide erupta cinctum obsidentibus. — *Exosporium hispidulum* Link sp. II. 122. *Conoplea hispidula* Link obs. II. 34. excl. syn. Pers.

Ad folia glumasque graminium siccorum auctummo et hyeme passim.

1715. *E. hypodermium* Lk., sporidiis elongatis filiformibus nigris, ex sporidochio pseudostromatico oblongo nonnisi longitudinaliter producto epidermideque

scissa cincto parce prominulis. — *Exosporium hypodermium* Link sp. II. 121. *Conoplea hypodermia* Link obs. II. 32. Pers. myc. II. 12.

Ad caules herbarum (Umbelliferorum) siccis.

1716. *E. clavuligerum* Lk., sporidiis elongatis, filiformibus atris cum aliis clavatis pellucidioribus intermixtis, ex sporidochio pseudostromatico subgloboso colore propullulantibus. — *Exosporium clavuligerum* Link sp. II. 121. *Conoplea clavuligera* Link obs. II. 33.

Ad truncos emortuos Salicam potissimum.

1717. *E. Tiliae* Lk., sporidiis obtusatis opacis atrovirentibus obsolete septatis, ex sporidochio pseudostromatico subgloboso hypophloeode, dein depresso nigro assurgentibus. — *Exosporium Tiliae* Link obs. I. 8. t. I. f. 8., sp. II. 121. Nees syst. 8. f. 30. Grev. er. t. 208. *Conoplea Tiliae* Pers. myc. I. 11.

Ad truncos ramulosque Tiliarum gelu tactos, auctumno et hyeme vulgare.

1718. *E. circinatum* W., sporidiis cylindricis obtusis majusculis nigris opacis obsolete septatis, sporidochium pseudostromaticum rotundum convexiusculum obtegentibus cumque illo circinatum radiantibus adpressis, grumulos tergos convexos sparsos majusculos atros constituentibus.

Ad lignum decorticatum vetustum Salicis capraeae Hercyn. superior. (Wallr.) (Sporidiorum fabrica certo quidem non liquet, habitus tamen Exosporii s. Apiosporii insignem testatur speciem.)

C. perispori, sporidiis figura et mole variis, globosis cylindricisve, continuis septatisve, microscopicas ac majusculis, omnium tamen sporidochio pseudostromatico neque minus vario, at emerso ac figurato obsolete celuloso, sive in membranulam sive in villum intertexto superinfusis, liberis, ex aqua saltem facile solvendis.

(Uredineae tuberculariae Fr. Dub. Sarcopodia Schleid.)

199. EPICOCCUM LK. Koernerkugel.

Sporidia globosa parca, sporidochio pseudostromatico membranaceo globoso libero irregulariter laxaque incumbentia.

1719. *E. atro-sanguineum* W., sporidiis globosis simplicibus majusculis atro-sanguineis parcis, sporidochio membranaceo bracteato tenuato punctiformi laxe incumbentibus, convexiusculis.

Ad folia sicca Calami aromatici agri northus., auctum-no passim.

1720. *E. nigrum* Lk., sporidiis sporidochioque sub-globosis nigris, maculam nigram obidentibus. Link obs. II. 32., sp. II. 107. Mart. erl. 328.

Ad caules aridos plant., v. c. agri rostoch. et vratislavien. (Link.)

1721. *E. purpurascens* Ehreg., sporidiis sub-globosis sporidochioque convexis nigris, maculae purpureae insidentibus. — Ehrenb. sylv. 12. Schltdl. berol. II. 136. Link sp. II. 108.

Ad caules herbarum siccis, Asparagi praeprimis hortensis vel intra Zeae culmos siccis (? *Peziza Conoplea* Alb. et Schw. nissk. 345. t. II. f. 3.) auctum-no passim..

200. AEGERITA PERS. Kugelstaub.

Sporidia globosa sparsa sporidochii pseudostromatici liberi rotundati superficiem praestantia s. penetrantia.

(*Aegerita Pers.* Nces. Link. Fr. *Sclerotium Hoffm.* DC. *Tuberulariae albidae* Spr. syst. *Heticularia* Bull.)

1722. *A. candida* Pers., sporidiis inaequalibus, sporidochium hemisphaericum liberum dispersum (seminis Nicotianae molem aequans) candidum superfundentibus. *Aegerita candida* Pers. syn. 684. Nees syst. f. 24. Mart. erl. 326. Grev. cr. t. 268. f. 1. Fr. syst. III. 219. Link sp. II. 108. Dub. gall. II. 879. *Tuberularia candida* Spr. syst. IV. 565. *Sclerotium album* DC. gall. VI. 112. Sol. *Aegerita Hoffm.* germ. t. 9. f. 1.

Ad ligna corticesque arborum (Alorum potissimum), ad asseres vetustos pineos passim.

1723. *A. aeruginosa* JV., sporidiis globosis minimis aeruginosis, sporidochium hemisphaericum liberum punctiforme dispersum obidentibus, dein anfugis illudque deplanatum relinquenter.

Ad ligna corylea nemorum thuring.

1724. *A. epizyta* DC., sporidiis oblongis, stromate convexiusculo in basin deplanato, primum gryseo, dein nigrescente. — DC. gall. II. 72. Dub. gall. II. 879. *Dichosporium aggregatum* Nees syst. f. 99. Fr. syst. III. 218. ?*Aegerita pallida* Pers. syn. 685. *Reticularia epizyton* Bull. champ. t. 472. f. 1.

Ad ligna putrida, quercina paeprimitis legi myceten descriptioni congruum, an quoque eundem.

1725. *A. caesia* Pers., pruinata caesia albida sparsa punctiformis. — Pers. syn. 685. Ehrenb. sylv. 12. Schleid. berol. 137. ?*Agyrium caesium* Fr. syst. II. 231. *Tuberularia caesia* Spr. syst. IV. 565.

Ad ramos putridos, sub umbra jacentes, auctores dubiam, nec a me visam indicant.

201. DERMOSPORIUM LK. Rindenporling.

Sporidia globosa, sporidochii globosi superficiem, tegminis corticati instar investientia.

1726. *D. flavicans* Lk., sporidiis globosis minuti flavicantibus, sporidochii globosi minuti concoloris superficiem obstruantibus. — *Dermosporium flavicans* Link obs. II. 32. Ehrenb. sylv. 12. Link sp. II. 107. Nees syst. f. 25. *Epicoccum flavicans* Spr. syst. IV. 563.

Ad ramos putridos humi jacentes agri berolin. (Ehrenberg). (Genus dubium, nec Friesio nec mihi satis notum.)

202. ILLOSPORIUM MART. Staubball.

Sporidia globosa minima pellucida colorata, membranula granulosa excepta, sporidochium veluti liberum subgelatinosum infarcientia inque illa fatiscentia.

1727. *I. roseum* Mart., sporidochio orbiculari sparso roseo, demum depresso difformi, in sporidia minima fatiscendo disfluente. — *Illosporium roseum* Mart. erl. 325. Fr. syst. III. 258. Dub. gall. II. 816. *Coccochloris rosea* Spr. syst. IV. 375. *Palmella rosea* Lyngb. hydroph. 207. Grev. cr. t. 51. *Sclerotium granulatum et persicolor* Schum. saecil. II. 180. *Tubercularia rosca* Pers. syn. 114. Schleid. berol. II. 137. *Lepraria rosea* Ach. prodr. 9. *Lepra rosea* Willd. berol. ? *L. carneae* Ehrh. *Byssus rosca* Retz. *Tremella rosca* Nonne erf. *Lichen roseus* Schreb. spic. 140. *Flor. dan.* t. 1243. f. 1. *Tubercula parva elegantissima in lichene saratili* Leyss. hal. 279.

Ad blastemata Parmeliarum platyphyllinorum, P. ciliaris, saxatilis et homochroae praeprimis, brumae tempore emergit.

1728. *I. carneum* Fr., sporidochio sphaerico gregario libero carneo-rubro, demum in sporidia concolora minima disfluente. — *Illosporium carneum* Fr. syst. III. 259.

Ad Lichenes platyphyllinos, Peltigeras praesertim suis locis occurrit, brumae tempore, nec tamen satis liquet.

1729. *I. coccineum* Fr., sporidochio minimo conferto globoso undique disperso coccineo, demum in sporidia concolora inquinantia disfluente. — *Illosporium coccineum* Fr. syst. III. 259.

Ad Lichenum blastemata crustacea, praeprimis quae metamorphosis chamaumaticam subiere, Eudocarpi verrucosi et Parmeliae subfuscæ praesertim brumae tempore, ab eorum decolorationibus erythrotropis (Wallr. Naturg. II. 451.) scite dignoscendum.

203. TUBERCULARIA TOD. Staubknöpfchen.

Sporidia globosa simplicia minima copiosissima, sporidochium pseudostromaticum clavato-verruciforme subcarnosum, ex epidermide scissa prorumpens circumfluenta superficiemque coloratam foetam (siccando) pulvrentam, humectando pulposam, tegmiois coacti iustar obstruentia effoetumque demum tersum relinquentia.

(*Tubercularia* Tode et auct. nec tamen Hoffm. Wigg. et Stackh. *Sphaeriae* et *Tremellae* sp. auct. (Genus vexatum, tum cum praecedente, tum cum Agyrio, Ditio-
la et Dacryomycete, habitu omnino conformibus, analogon et ad aetatem foetam et effoetam caute interpretandum.)

1730. *T. vulgaris* Pers., sporidochii iunctis hyphoeodcis albido-fuscis floccosis depresso in basin stipitiformem curtam, epidermidem scissam infarcentem transseuntemque succrescentibus capitulumque emersum, marginem reclinando occultans, foetum, sporidiorum lateritiorum dein diffluentium tegmine laxe coacto obductum hemisphaericum pallide roseum opacum, effoetum carnosum miniatum, raro demum decolor elevantibus. — *Tubercularia vulgaris* Tod. mecl. I. 18. Pers. syn. 112. Link sp. II. 99. *Helotium coccineum* Pers. myc. I. 346. *Sphaeria miniata* Bolt. fung. t. 127. *Sph. tremelloides* Weig. obs. t. 3. f. 1. *Tremella purpurea* L. sp. 1004. Hoffm. cr. 29. t. 6.

a. *Populi*, sporidochiis hemisphaericis sparsis plerumque majusculis, foetis pallidius-saturatusve roseis suberosis, effoetis tersis magis ac miniatis, rarius confluendo depresso. — *T. vulgaris* auct. pl. *T. confluens* auct. qrd. (*Iusus magis depresso*.)

β. *Fraxini*, sporidochiis minoribus sparsis tersis plerumque laetiusque miniatis.

γ. *floccosa*, sporidochiis sparsis minoribus, primum roseis basi margineque floccos primordiales pertenues albidos circumducentibus. — *T. floccosa* Link obs. II. 35., sp. II. 102. *T. velutipes* Nees syst. f. 37.

s. Betulae, sporidochii majusculis sparsis tercis coccineis, epidermide transversim scissa coarctatis denum plerumque decoloribus fuscis.

s. sarmmentorum, sporidochii parvis ex epidermide longitudinaliter scissa seriatim emergentibus. — *T. vulgaris* var. *Pteleae*; var. *Vitis* Wallr. in lit. *T. sarmmentorum* et *Menispermi* Fr. obs. I. 208.

ζ. Corchori, sporidochii minimis punctiformibus.

η. Georginac, sporidochii minutis conglomeratis coccineis.

Ad arborum fruticumque quorumcunque vere recisorum laevigantium corticem, laburno innatum epidermidemque scissam auctumui tempore transigens; var. α . ad Ribes nigrum, Populos, Tilias, Carpinum, Salices, Rosas, Aesculnum, Robinum, Prunos aliasque, Iusus minores maioresque, pisi minoria molem nonnisi aequantes (ad Populum), vel depresso (ad Tilias) proferens; β . ad Fraxinos; γ . ad Rhoëm typhinae, in qua quidem pili facile cum sporidochii basi confluent, et Fagum; δ . ad Betulam albam; ε . ad Vitem, Pteleam pinnatam, Hederaem, Clematidem, Menispernum, Lonicera; ζ . ad Corchorum novellasque Rhoës typhinae; η . ad Georginac rhizomata effossa, auctumno abundant. (Variat habitumque alium pro varia laburni et epidermidis fabrica, putredinis gradu, humorum affluxu sporidiorumque informatione melius pejusve succedente s. plane deficiente finitaque jam, induit eximiisque in ramulis quibuscumque vulgivoga locum dat vicissitudinibus. Humepta mollis omouino ac pulposa, sive alia excipit, et v. c. Sporobolorum ascis iunctis s. Tetracolio obsessa undique denigratur; vel quoque byssum tenerrimum parcum, mihi nondum perspectum exserit, et amicum cum Sphaeria decorante, ex sporidochio simul saepius succrescente exercere solet consortium (*Tubercularia Pruni Schum. suec. II. 183.*)

1731. *T. granulata* Pers., sporidochii initis hypophloeodeis tercis albis depresso, in basin stipitiformem brevissimam (raro productiorem) succrescentibus capitu-

lumque primum convexum carnosum dein discoideo-scutellare deplanatum, epidermidī scissae incumbens, margine saepius dilutiore cinctum helvolum ex lateritio magis minusve fuscescens saepius decolor informantibus, sporidiorum loco stillas fluxiles sphaericas, succini instar indarescentes concolores projicientibus. — *Tuberularia minor* et *lutescens* Link sp. II. 100. *T. granulata* et *discoidea* Pers. syn. 113.

a. Philadelphi, sporidochiis exiguis helvolis, primum epidermidem scissam infarcentibus, dein transeuantibus magis deplanatis facileque decoloribus.

b. Acerum, sporidochiis majusculis incarnatis dein continuendo deplanatis, saepius difformibus. — *Tub. discoidea, granulata et confluens* Pers. l. l.

c. Sambuci, sporidochiis discoideis e rosa debili pallide-fuscis sparsis. — *Tub. granulata* auct. Alb. et Schw. *T. mutabilis* Nees Link l. l. *Tub. heterochroa* Kz.

d. Salicis, sporidochiis patellaribus dilute fuscis, dein decoloribus. — *T. saligna* Alb. et Schw. nisk. 69. *T. Pseudo-Acaciae* Rebent. neom. 363.

e. Acaciae, sporidochiis cum rosa debili flaventibus. — *T. Acaciae* Fr. obs. l. 207. *T. minor* Lk. pr. pr.

f. Populi, sporidochiis scutellaribus depressis carnis miniatis, margine dilutiore cinctis. — *T. laevis* Nees in lit. *T. Castaneae* Pers. syn. 114.

g. Abrotani, sporidochiis primum helvolis dein fusco-nigris subaggregatis seriatis. — *T. Artemisiae* Schum. scell. 183. *T. herbarum* Fr. l. l. pr. pr.

h. Alni, sporidochiis exiguis fasciculatis, primum helvolis dein incarnatis marginatis, basi stipitiformi emersa fragili suffultis. — *T. Cerasi* Schum. l. l.

Ad arborum fruticumque modo laudatorum cortices languescentes, aucturno passim. (Coloris rationes praecedentem tangere quidem videntur, quae peculiari sporidiorum haud diffuentium in massam circumfusam, sed globulis propullulandis sive inhaerentibus sive circum-

fusis, primum nitore succinico oculos allicitibus, dein vero cum ipso sporidochio facile decoloribus, eximium spoodet differentiam species, alioquin tam loco, tam habitu externo adhiois.)

1732. *T. liceoides Fr.*, sporidochii initis hypophloeodeis tercis albido-fuscescentibus depresso, illico capitulum hemisphaericum sessile insigne sustinentibus carnosis, primum pallidis dein fuscis veluti corticatis. — *Tubercularia liceoides Fr. obs. I. Link sp. II. 103.*

Ad Aceris campestris et Crataegi Oxyacanthae languidos cortices agri herringens. legi, quam corpusculorum succinorum fide cum praecedente cen var. majorem subscribere mallem, colore primo intuitu quidem alienam, nec tamen a Tuberc. Pseudo-Acaciae Rebent. multum diversam.

1733. *T. ciliata Ditm.*, sporidochio pezizoideo, basi fusca emersa suffulto, farcto, discum sporophorum convexum rubescens, margine ciliato succinctum recludente. — *Tubercularia ciliata Ditmar in Sturm. fung. germ. III. t. 14. Link obs. II. 31., sp. II, 103. nec Alb. et Schwein. T. Ditmari Spr. syst. IV. 565.*

Ad ramulos Alni glutinosae languescentes agri rostock. (Ditmars.)

1734. *T. persicina Ditm.*, sporidochio pezizoideo adnato albido, primum hemisphaerico dein discum patellarem convexiusculam laevem, sporidiis majusculis globosis lilaciniis foetum recludentibus. — *Tubercularia persicina Ditmar t. I. 99. t. 49. Link sp. II. 101. ?Selerotium Circeae Schum. saell. II. 187.*

Ad Circaeum lutetianum hypogyna, ex Aecidio Epilobii var. Circaeae saepius succrescentem legit cl. *Ditmarus* in agro rostock., quae mo quidem judice a genere aliena.

204. FUSARIUM Lk. Spindelknöpfchen.

Sporidia fusiformia tenuissima simplicia, plerumque continua, sporidochio tenero carnoso sessili s. effuso capitatoque fota et ex illo diffuentia.

(*Fusarium* Lk. et auct. *Dacryomyces* et *Erosorii* sp. *Spr. Fusidii* et *Tuberculariae* sp. *Link. Atractium* Lk.)

1735. *F. roseum* Lk., sporidochio minuto sessili subgloboso gregario roseo, sporidiis fusiformibus pallidioribus copiosissimis foeto. — *Fusarium roseum* Link sp. II. 105. *Fusidium roseum* Link obs. II. 31.

Ad caules herbaceos elatiornm siccios (Malvarum v. c.) eorumque folia passim, auctummo.

1736. *F. pallens* Nees, sporidochio subcapitato, primum hypophloeode dein emerso ex cinereo-subfuscante, sporidiis concoloribus subfusiformibus rectiusculis acutis obtusiusculis foeto. — *Fusarium pallens* Nees in act. Acad. Leop. IX. 237. t. 5. f. 7. Link sp. II. 104. *F. candidum* Ehrenb. sylv. 12. 24. Schldtl. berol. 139. *Fusidium obtusatum* et *pulvinatum* Link obs. II. 31.

Ad ramos dejectos fruticos passim.

1737. *F. oxysporum* Schldtl., sporidochio convexo subverrucoso rosco dein erumpente ruguloso et conflante, sporidiis parvis curvatis utrinque acutissimis foeto. — *Fusarium oxysporum* Schldtl. berol. II. 139. Link sp. l. l.

Ad tubera semipatris Solani. (Schlechtendal.)

1738. *F. lateritium* Nees, sporidochio vario obso erumpente intense lateritio, sporidiis multmis arcuatis utrinque acutissimatis foeto. — *Fusarium microsporum* Schldtl. berol. II. 139. *F. lateritium* Nees syst. f. 26. Link l. l.

Ad ramos patrascentes Robiniae Pseudacacie agri berol. (Schlechtendal.)

1739. *F. Stilbaster* Lk., sporidochio emerso ca-

pitato lutescente veluti stipitato, in sporidia fusiformia concolora deliquescente, fugaci. — *Fusarium Stilbaster* Link sp. II. 106. *Atractium Stilbaster* Link obs. I. 8. Nees syst. f. 34.

Ad trunco Fagi caeos passim at occissime diffluens.

1740. *F. ciliatum* Lk., sporidochio minuto emerso subgloboso, in basin attenuato rubente, pilis longis portatis munito, sporidiis concoloribus fusiformibus septatis foeto. — *Fusarium ciliatum* Link sp. II. 105. *Atractium ciliatum* Lk. obs. II. 32. *Tubercularia ciliata* Alb. et Schw. nisk. 68. t. 5. f. 6.

Ad ramos putres et samenta inter hortorum rejectamenta, auctummo, rarius.

1741. *F. Chaetomium* W., sporidochiis subglobosis sessilibus, a basi inde pilis rigidulis atris adpressis obvallatis, greges concentricas mentientibus, sporidiis cylindricis utrinque acuminatis rectiusculis pellucidis obsolete septatis foetis. — *Chaetomium oxytropis* Wallr. in lit.

Ad Cucurbitas patres agri thuring. semel. (Wallr.) (Habitu externo *Chaetomium depresso* omnino refert, sporidiis tamen recedit.)

1742. *F. heterosporum* Nees, sporidochio subtremelloso expanso ruberrimo, sporidiis globosis fusiformibusque superfuso. — *Fusarium heterosporum* Nees I. L. Link sp. II. 107. *Erosopodium Lolii* Spr. syst. IV. 563.

Intra germina Lolii perennis, quae colorem ruberimum inde nanciscuatur.

1743. *F. tremelloides* Grev., sporidochio subhemisphaericō glabro aurantiaco, dein gregario disiformi subtremelloso magis deplanato, sporidiis hyalinis longissimis parallelis foeto. — *Fusarium tremelloides* Grev. cr. t. 10. Spr. syst. IV. 564. *Dacrymyces Urticae* Fr. syst. II. 251. *Tremella miniata* Rebent. neom. 284. *Tr. Urticae* Pers. syn. 928. Alb. et Schw. nisk. 304. *Tr. saepincola* f. Willd. in Uster. bot. Mag. IV. 182.

Ad caules plantarum siccios, Urticae praeprimis et Daturae passim, brumae tempore. (Hoc cum praecedente indole tremellosa a reliquis desciscit quidem, sporidiis tamen congruere videtur.)

205. CONOPLEA PERS. SYN. *Kegelschopf.*

Sporidochium ex pilis rigidulis obsolete septatis assurgentibus in basin laxe implicitum ibique sporidiis globosis simplicibus conglobatis liberis, dein pilos porrectos occupantibus foetum.

1744. *C. hispidula* Pers., sporidochii pilis simplissimis rigidulis fasciculato-comosis assurgentibus aëneonigrescentibus, basi implicita sporidia globosa pellucida conglobata comprehendentibus demumque suscipientibus.
— *Conoplea hispidula* Pers. syn. 235. Ehrenb. sylo. 12. Schleidl. berol. II. 155. Dub. gall. II. 928.

Ad folia graminorum sibi nec falci commissorum tenuiora emortua, in promontoriis umbrosis Thuring., auctumno sero, minime raro. (Stirps insignis, habitu externo Chaetomium mentiens, singulari sporidiorum, modo basin obtegentium, modo pilis appensorum dispositione, ab illo aequa ab aliis, ab auctoribus huic generi subscriptis diversa, melius forsitan ad Asporomycetes amandanda, vel inter utrumque ordinem ambigens. *C. sphaerica*, *cineracea* et *gilia* Pers. Dub. dubiae.)

206. HYPHELIA FR. *Filzschorf.*

Sporidochium effusum indeterminatum, e villo in pelliculam cohaerentem contextum, fragillimum, dein vertice rumpens, sporidia libera laxius coacervata transmittens.

1745. *H. rosea* Fr., sporidochio primum rotundo dein effuso applanato, e villo subtilissimo in membranam coacto tecto, ambitum hyphoideum circumspargente fragillimo, dein sporidia vesicalosa rosea transfundente.
— *Hypelia rosea* Fr. syst. III. 211. *Trichoderma ro-*

seum Pers. syn. 231. *Hoffm.* germ. t. 10. f. 1. Alb. et Schw. nisk. 135.

Ad ligna vetusta, lumentina sub Alnorum et Populorum cortice, laxe inhaerente. Vere.

1746. *H. viridula* W., sporidochio primum maeulari pallide-viridi depresso, ambitum hyphoideum pallidiorum emitte deinde coacto ambonato, sporidia alba compacta obvallante.

Ad Lichenum gonidia asyntheta in Salicis cortice rarius, v. c. circa Heringam Thuring.

1747. *H. fusca* Fr., sporidochio subpulvinato hemisphaericō confluentē cinereo-fusco, ambitū tenuiter radiantem spargente, sporidiis flavis foeto. — *Hyphelia fusca* Fr. syst. III. 212. *Trichoderma fuscum* Schum. swell. II. 236.

Ad ramos dejectos Ulmi similem quamdam legi.

1748. *H. castanea* W., sporidochio pulvinato hemisphaericō deinde confluentē cinereo-albo grumoso, sporidiis fusco-castaneis majusculis subangulatis opacis.

Ad ligna putrida in caveis uidis Thuring.

1749. *H. nigrescens* Fr., sporidochio tenuissimo applanato cæsio admodum caduco, sporidiis minimis fuligineo-nigrescentibus. — Fr. syst. III. 212. *Trichoderma caesium et nigrescens* Pers. syn. 232. Alb. et Schw. nisk. 136.

Ad troncos vetustos praesertim Populorum.

1750. *H. terrestris* Fr., sporidochio effuso candido strigoso-tomentoso deinde a vertice elevate inde evanescente, sporidiis subargillaceis. — *Hyphelia terrestris* Fr. syst. III. 213. *Trichoderma laeve* Schum. l. l. Alb. et Schw. nisk. 136. *Tr. nemorosum* Pers. champ. T. tuberculatum Pers. syn. 234. Alb. et Schw. nisk. 136.

$\beta.$ *varia*, sporidochii filii candidis, roseis, violaceis, flavisque variantibus. — *Trichoderma varium* Ehrenb. sylvo. II. Schldtl. berol. II. 145. (teste Frieso.)

Ad terram nodam nemorum et pinetorum, praesertim aestate calida, minime rara.

207. TRICHODERMA PERS. HARNETZ.

Sporidochium subrotundum saepius indeterminatum, ex floccis tenerimis ramosis septatis implexis laxe contextum, demum irregulariter a vertice inde fatiscentis, sporidia minuta conglobata inter se libera globosa discolora obvelans.

1751. *Tr. viride* Pers., sporidochio adnato epiphloeode, primum laxe floccoso candidissimo circumscripto, dein convexo floccisque stipatis obtecto, demum in sporidia globosa minutissima obscurer-virentia tegmenque floecosum undique oblitterantia fatiscente grumulunque pulverulentum nudum mentiente. — *Trichoderma viride* Pers. syn. 230. *Alb. et Schw.* nisk. 135. *Nees syst. f.* 74. *Fries syst. III.* 215. *Flor. dan.* t. 1495. *Grev. cr.* t. 271. *Tr. argenteum et aeruginosum* Pers. et Link. *Sphaeria olivacea* Willd. berol. 416. *Pyrenium lignorum a. vulgare* Ted. mekl. 33. t. 3. f. 29. *Mucor lignifragus* Bull. champ. t. 504. et ex eo *Botrytis lignifraga* Link sp. I. 56.

Ad corticem lignorum caesorum sub umbra congestorum, ad fungos duriores putres, folia aliasque quisquiliae, auctummo minime rarum. (*Sporidiorum* colorem in iisdem locis vidi deflectere in aeruginosum, flavicantem et plane nigrescentem.)

1752. *Tr. cinnabarinum* W., sporidochio subrotundo, ex floccis laete cinnabarinopuniceis stipatis dense obtecto, deinde a vertice inde in sporidia primum conglobata stelliformia deinde globosa distincta minima minuta fatiscente grumulosque pulverulentos nudos inconditos ellusos mentiente.

Ad pannos detritos in caveis uidis projectos Thering. insiginem hanc legi speciem, a Sporotricho paonorum Ehrenb. caute dignoscendam. (*Sporidochia* primum punctiformia, dein majora, semina Papaveris fere aequantia, ex floccis undique constipatis sporidiorumque cumulum arte involventibus composita, amoena punicea, raro integra deprehenduntur, frequentias fatiscant et pilos pan-

ni demum undique colore cinnabarino - miniatos tingunt. Sporidia sporidochio fata, inter se Stephanomatis instar conglobantur, dein sponte secedunt.)

1753. *Tr. flavum Sommerf.*, sporidochio rotundato sublibero, villo albo arachnoideo obducto, sporidiis globosis minimis flavis. — *Tr. flavum Sommerf. lapp.*
312. *Fr. syst. III. 215. Tr. aureum auct. nec Pers.*

Ad quisquilias herbarum putres ipsosque pannos detritos, rarius, colore citrino laeto oculos alliciens.

1754. *Tr. dubium A. et Schw.*, sporidochio adnato ovali seriatim demum confluente albido - llavente, sporidiis globosis concoloribus compactis. — *Fries syst. III. 216. Alb. et Schw. nisk. 136. Tr. Pyrenium Pers. syn. 233. Pyrenium lignorum f. aureum Tod. l. l.*

Ad trunacos fagineos caesos, aestate.

1755. *Tr. pezizoides IV.*, sporidochio globoso, nonnisi in basin brevem producto subturbinato s. subcylindrico, extus villo candido brevissimo obducto, sporidia dense conglobata aëreo-virentia demum vertice prominula concipiente.

Ad ligna decorticata quercina passim.

1756 *Tr. penicillatum IV.*, sporidochio globoso, basi depresso, fibris propexis brevibus fragillimis caedidis tecto, intus sporidiis gramosis flavo-sarantiis foeto.

Ad ligna patrescentia Corylorum passim. (De hac et praecedente specie dubia supersunt.

D. entospori, sporidiis mole, figura et colore variis, rarius angulato-stellatis simplicibus, sporidochia neque minus varia, nunc phloeodea omnino (pseudosporidochia) eaque mire diversimodeque a figura cupulari, tubulosa cornutaque, ex ipsa epidermide herbarum succrescentia (phloeoecii), nunc ex substantia propria composita, mucilaginosa (myxoeccii), nunc membranacea (dermatoecii) eaque itidem clausa irregulariterve transfusa, sive in porum osculumque circumscissum, sive in discum

patellarem reclusa occupantibus, liberis, neque pulpa neque floccis inter se conglobatis.)

(*Uredineae accidineae et apiosporeae Dub. Lycoperdacearum trichiacearum sp. Dub.*)

a. phlococcii, sporidochiis varie figuratis, cupularibus, tubulosis et cornutis, ex ipsa cubilium vegetorum epidermide succrescentibus.

208. AECIDIUM PERS. Warsensporling.

Sporidia globosa simplicia hyalina libera (alba s. flaventia dein saturatior) pseudo-sporidochium hypophloeodes, ex foliorum parenchymate calloso inverso, primum verrucæ instar prominulo, dein urcei, tuboli cancellorumque figuram mentiente succrescens eique conforme, deum in os crenulatum s. varie fissum reclusum infarcientia eorumque basin saccatam denique effoetam persistentem relinquentia.

(*Cacomatis subg. 2. Lk. Schltdl. Mart. Uredinis sp., epidermide sporangium spurium persistens praebente insignes Spr. syst. Accidium Gmel. Pers. DC. Dub. nec Hill. Sphaerotheca Desv. Roestelia Rebent. Cronartium Fr. Lycoperdon Schk. Jacq.) — (Genus naturale, pseudosporidochio figurato s. corticale ab Erysibe affatim distinctum, aegrius vero ob mutuam partium cum parenchymatis fabrica relationem, ad species reducendum, cum Stictide analogon.)*

+ *urceolaria, pseudosporidochiis urceolatis, dein limbo oris aperti crenulato reflexo reclusis, sparsis s. foliorum parenchymate calloso, veluti pseudostromatico aggregatis. (Accidia sensu strict. auct. plurim. Accidia Caeomata Dub.)*

* *pseudosporidochiis distinctis, per omnem folii paginam, hinc via mutantam, dispersis.*

1757. *A. Ervi W.*, pseudosporidochiis hypogenis sparsis exiguis impressis subrotundis, ore subintegro prominulis, his sporidiisque albidis.

Ad *Erythronium* *hispidum* hypophyllum, nec quoque a petiolis ipsiusque leguminibus alienum, Thuring. (Wallr.)

1758. *A. leucosporum* W., pseudosporidochiis hypogenis copiosis sparsis prominulis, primum mamillariibus, deinde limbo areolato involuto cupulatis crassis verrucosis mediocriter magnis, sporidiis ovalibus albis. — *Uredo leucosperma* Spr. syst. IV. 573. *Caeoma leucospermum* Schleidt. ber. II. 116. *Link* sp. II. 55. *Aecidium leucospermum* et *quadrifidum* DC. gall. II. 239. Dub. gall. II. 907. *Aec. Anemones* Pers. syn. 212. Mart. erl. 313. *Lycoperdon Anemones* Pultn. Hoffm. germ. t. 11. f. 1.

Ad *Anemone nemorosa* hypophyllum vere ineunte minima rarum. (Folia hoc vitio adgressa, latiora plerumque ac erassiora, alienum induere solent habitum, ad quem scientiae statoribus speciei proprius titulo jam intulerunt. *Bauunculus* III. in dorso stigmatis picturatum Thal. herc. 98. *Anemone nemorosa* dorso punctulis frequentibus protuberantibus erasperata J. Bauk. hist. II. 231. *Ran. nemorosus* stigmatodes Mentz. pag. 258. *Anemone sylv. degener.* Raj. hist. *Anem. nemor. sterilis*, fol. punctatis C. Bauk. pin. 177. — Ejus initia rubentia Pollichias male pro insectorum ietu habuit.)

1759. *A. punctatum* Pers., pseudosporidochiis hypophyllis laxis ureolatis albido-virentibus coafertissimis, limbum oris constricti crassum subintegrum recludentibus, sporidiis compactis violaceo-fuscis. — *Aecidium punctatum* Pers. syn. 212. Dub. gall. II. 908. Alb. et Schw. nisk. 119. DC. gall. II. 239.

Ad *Anemones* ranunculoidem hypophyllum.

1760. *A. Thesisii* Desv., pseudosporidochiis hypogenis sparsis cupularibus nonnisi subcylindricis, basi circumcisisis, ore dilatato lacero reclusis. — *Aecidium Thesisii* Desv. journ. II. 311. Dub. gall. II. 908. *Sphaerotheca alberscens* Desv. *Caeoma Thesisii* Schleidt. berol. II. 116.

Ad *Thesium ebracteatum* hypophyllum in agro herophilin. (Schlechtendal).

1761. *A. Epilobii DC.*, pseudosporidochiis sparsis flavescens copulaeformibus, ore reflexo fisso demum ceduco fundum lividum aperientibus, maculae lutescenti insidentibus, sporidiis aurantiacis dein saturatioribus. — *Aecidium Epilobii DC. gall. II. 238. Dub. gall. II. 909. Wahlenb. succ. 1036. A. pulchellum Schrad. Caeoma Epilobiatum Link sp. II. 59.*

Ad *Epilobia*, v. c. *E. roseum hypophyllum*, nec non in *Circaea lutetiana* passim.

1762. *A. Cyanii DC.*, pseudosporidochiis sparsis numerosis albidis, ore in dentes latescentes fissio reclusis, maculae flavae insidentibus, sporidiis albidis demum flavescens copulaeformibus. — *Aecidium Cyanii DC. gall. VI. 90. Caeoma Cyanatum Link sp. II. 51.*

Ad *Centauream Cyanum hypophyllum*.

1763. *A. Cichoreacearum DC.*, pseudosporidochiis sparsis, hinc inde confertioribus cupularibus, ore reflexo parce denticulato s. pauciradiato reclusis, sporidiis aurantiacis dein saturatioribus. — *Caeoma Cichoreacearum Schldl. I. I. 116. Aecidium Cichoreacearum DC. gall. II. 239. Dub. gall. II. 907. A. Tragopogi Pers. syn. 211. Caeoma Tragopogonatum Link sp. I. I.*

Ad *Tragopogonem pratensem*, *Crepidem tectorum* (*Aec. Crepidis Opiz.*) et *Scorzoneras* (*Aec. Scorzonerae DC.*) *hypophyllum*, raro *epiphyllum* vel *epicaulon*.

1764. *A. Falcariae Pers.*, pseudosporidochiis per integrum folii paginam sparsim increbrescentibus flaventibus cupularibus, ore patulo grandidentato reclusis, sporidiis albicantibus dein auratio-flaventibus. — *Caeoma Falcariae Schldl. I. I. 116. C. Falciarium Lk. I. I. 53. Aecidium Falcariae Rebent. neom. 353. A. Sii Falcariae Pers. syn. 202.*

Ad *Sium Falciarium hypophyllum* ubertim, rarius etiam ad *Bupleurum falcatum* (*Aec. Bupleuri Opiz.*) et forsitan ad *Aegopodium Podagrarium* (*Aec. Aegopodii Rebent. neom. 353.*).

1765. *A. Euphorbiae Pers.*, pseudosporidochiis pallide-flavis cupularibus insignibus, limbo crenulato reflexis, integrum folii angustati faciem occupantibus contrahentibusque, sporidiis aurantiacis demum fuscis. — *Cacoma Euphorbiae Schlecht.* l. l. C. *Euphorbiatum Link* l. l. 53. *Aecidium Euph. Gmel. Humb. Pers.* A. *Euphorbiarum DC. gall. VI. 91. Dub. l. l. Nees syst. f. 3. Lycoperdon Euphorbiae Schrank.*

Ad Euphorbiam Cyperissias, Esulam et sylvaticam hypophyllum minime rarum. (Folia ejusmodi a latitudine naturali deflectere solent caulemque strictiorem et elatiorem sterilem modo ambeunt, hisc: *Euphorbia degener Riv. Jacq. Hoffm. s. Tithymalus Cypar. fol. punctis croceis notatis C. Bauh. Rupp. ipsaque Esula scabiosa Gesneri.*)

1766. *A. Soldanellae Hornsch.*, pseudosporidochiis cum ordine quodam sparais, paginam integrum occupantibus, in aversa tubercula relinquentibus, sporidiis aurantiis. — *Cacoma Soldanellatum Link l. l. 46.*

Ad Soldanellam alpinam alpium salisb. (Hornschuch.)

1767. *A. elatinum A. et Schw.*, pseudosporidochiis ovalibus primum convexis integris, dein rima aperiis fere conchatis, sporidiis pallido-aurantiacis. — *Caeoma elatinum Link sp. II. 66. Aecidium elatinum Alb. et Schw. niss. 121. t. 5. f. 3. DC. gall. VI. 88. Peridermium elatinum Kunze et Schm. D. Schw. n. 141.*

Ad Pinum Piceam hypophyllum, Lusatiae. (Albertini et Schweinitz. Schmidt.)

*** pseudosporidochiis congestis magis, maculae nunc tenuatae, nunc parenchymati foliorum cicatrizado insidentibus.*

1768. *A. Convallariae Schum.*, pseudosporidochiis brevibus subcylindricis in es laciniatum reflexum reclusis, (cum ordine quodam s. circinatum) maculae flavae limbo ferrugineo limitatae insidentibus, sporidiis sorride fluorescentibus. — *Cacoma elegans Schlecht. l. l. 115.*

C. Convallariatum Link sp. II. 52. *Aecidium Convallariac et Majanthae* Schum. saell. II. 224. *Flor. dan.* t. 1435. *Uredo Convallariae* Spr. syst. IV. 573.

Ad Convallarias nostrates ipsamque Paridem quadrifoliam hypophyllum rarius.

1769. *A. bifrons* DC., pseudosporidochiis numerosis congestis semiimmersis urceolatis helvolis, ore patulo parce crenulato prominulis, maculae planae pallidae insidentibus, sporidiis aurantiacis. — *Aecidium bifrons* DC. gall. II. 246. *Caeoma Ranunculaceatum* Link sp. II. 54.

a. *Ranunculacearum*. — *Caeoma Ranunculacearum* Schlecht. I. l. 113. *Aecidium Ranunculacearum* DC. gall. VI. 97. *Dub. gall.* II. 903. *Sowerb.* t. 397. *A. Ranunc.* acris Pers. syn. 210. *A. Ficariae* Pers. obs. II. 23. *A. confertum* a. *Ficariae* DC. II. 245. *A. Aquilegiae* Pers. ic. 58. t. 23. f. 4.

β. *Lycoctoni*. — *Aecidium bifrons* a. *Lycoctoni* DC. I. l.

γ. *Erythronii*. — *Aecidium Erythronii* DC. I. l. *Aec.* *Erythroniatum* Link I. l. 42.

δ. *Parnassiae*. — *Caeoma Parnassiae* Schlecht. I. l. 113. *Dub. gall.* II. 904. *C. Parnassiatum* Link sp. I. l. 56.

ε. *Allii*. — *Aecidium Allii ursini* Pers. syn. 210. *Caeoma Alliatum* Link I. l. 43.

ζ. *Violarum*. — *Caeoma Violae* Schlecht. I. l. 114. *Aecidium Violarum* DC. gall. II. 240. *A. Violae Alb.* et Schw. nisk. 118. t. 10. f. 2. *Uredo Albertiniana* Spr. syst. IV. 572.

η. *Galiorum*. — ? *Caeoma Galiatum* Link I. l. 52. ? *Aecid. Galii* Pers. syn. 207. *Alb.* et *Schw.* nisk. 116.

θ. *Leguminosarum*. — *Aecidium Orobii* Pers. syn. 210. *Aec. Viciae Opis.*

Var. α. ad *Ranunculum* repente, bulbosum, polyanthemum; acrem, lanuginosum et *Ficariam*, *Caltham palustrem*, *Aquilegiam vulgarem*; β. ad *Aconitum Lycocotonum*; γ. ad *Erythronium* D. *Canjs* (*hortense*); δ. ad

Parnassiam palustrem; ζ. ad Violam caninam, hirtam, tricolorem et odoratam; η. ad Galium Molluginem latifolium; θ. ad Trifolium repens, Orobam vernum Viciae amque sepiuntur squide legi hypophyllum, nonnisi ad petiolos quoque aberrans, in agro thuring.

1770. *A. Lysimachiae Schldt.*, pseudosporidochiis laxe aggregatis cupularibus, maculae luteae effusae insidentibus, sporidiis pallide aurantiacis. — *Caecoma Lysimachiae Schldt.* I. l. 113. *C. Lysimachiatum Link* sp. I. l. 45.

Ad Lysimachiam thyrsifloram hypophyllum agri bero-lin. (Schlechtendal.)

1771. *A. Actaeae W.*, pseudosporidochiis emersis exiguis aggregatis, os lacernum hyalinum crenulatum re-cludentibus, maculae tenui pallidae insidentibus, sporidiis pallidis. — *Aecidium Actaeae Opiz*, teste Steudel.

Ad Actaeam spicatam hypophyllum Thuring. (Wallr.)

1772. *A. Salicorniae DC*, pseudosporidochiis distinctis sparsis, nonnisi subcircinatis albidis cupularibus, fimbriatum erectum subdenticulatum informantibus, sporidiis flaventibus. — *Caecoma Salicorniatum Link* I. l. *Aecid. Salicorniae DC gall.* VI. 92. *Dub. gall.* II. 906.

Ad Salicornias nostrates indicia saltem vidi punctiformia.

1773. *A. Compositarum Mart.*, pseudosporidochiis dense congestis turceolatis semiimmersis, ore reflexo tenero denticulato prominulis, maculam rubeolam s. pallidam tenuataam s. marcidam subrotundam circinatim ob-sidentibus, nonnisi confluentibus, sporidiis pallido-aurantiacis. — *Aecidium Compositarum Mart.* erl. 314. *Caecoma Compositarum Schldt.* I. l. 114. *Link* sp. II. 50.

α. *Prenanthis*. — *A. Prenanthis Pers.* syn. 208.

β. *Crepidis*. — *A. Crepidis W.* in lit. *A. Hieracii Schum.*

γ. *Serratulae*. — *Aecid. rubellum Gmel.* *Acc. Rumicis γ. Serratulae Alb.* et *Schw.* *Caecoma rubellatum Link* I. l. 50.

- d. Leucanthemi.* — *Aecid. Leucanthemi DC. gall. VI. 94. Dub. l. l. 905. Caeoma Leucanthematum Link.*
- e. Cirsii.* — *Aecid. Cirsii DC. l. l. Cacoma Cirsiatum Link l. l.*
- f. Inulae.* — *Aecid. zonale Dub. l. l. 906.*
- g. Taraxaci.* — *Aecid. Taraxaci Schm. et Ks.*
- h. Rumicis.* — *Aecid. Rumicis Hoffm. germ. t. 2. f. 2. Caeoma Rumicis Schleidl. l. l. 114. C. rubellatum Link l. l. 44. Aec. Rumicis Alb. et Schw. l. l.*
- i. Polygonorum.* — *Aecid. Polygonorum Kunz. Caeoma Polygonatum Link l. l. 44.*

j. Valerianae dioicae. — *A. Valerianae IV.*

k. Aviculariae. — *Aec. Aviculariae Kr. Ficin. dred.*

l. Rhei. — *A. rubellum γ. Rhei DC.*

Ad Compositas praedictas aliasque minime rarum; var. *o.* — *μ.* ad Rumices, Rhea, Polygona et Valerianam.

1774. *A. Populi Hornem.*, pseudosporidochiis depresso congestis patinaeformibus, macula rubro-lutea cinctis, sporidiis caesiis. — *Aecidium Populi Hornem. fl. dan. t. 1319. Uredo Hornemanniana Spr. syst. IV. 572.*

Ad Populem tremulam hypophylla, rarius saltē ex initiis innotuit.

1775. *A. Barbareae DC.*, pseudosporidochiis in acervulos rotundos oblongosque sparsos irregulariter circinatim digestis orbiculatis, maculae fuscae insidentibus, sporidiis aurantiacis. — *Aecidium Barbareae DC. gall. II. 244. Dub. l. l. 905. Cacoma Cruciferatum Link l. l. 56.*

Ad Barbareae vulgaris folia et petiolos passim.

1776. *A. Tussilaginis Pers.*, pseudosporidochiis magis semiimmersis urceolatis, ore revoluto grandidentato campanulato prominentibus, primum pallidis dein rufescentibus, in acervos rotundos circinatim congestis, aversam folii partem e purpura tingentibus, sporidus aurantiacis. — *Aecidium Tussilaginis Pers. syn. 209. Dub.*

I. I. 906. Lycoperdon epiphyllum L. sp. 1665. L. hypophyllum Ehrk.

Ad Tussilaginem Farfaram abundat hyphillum. (Nolum cum Aecidio Compositarum conjugere; obstant pseudosporidochia duplo majora, ampliora eorumque limbi indentes longiores multoque latiores fissi, revoluti.)

1777. A. Grossulariae Schum., pseudosporidochiis primum verrucosis nitidis fusco-rubentibus dein urceolatis, ore brevi reflexo parce dentato reclusis, confertis, folii parenchyma obesum callosum rubrum subrotundum obsidentibus, sporidiis flaventibus. — *Aecidium Grossulariae Schum.* saell. II. 223. *DC. Dub. Grev. cr. t. 62. Aec. Rumicis et rubelli var. Grossulariae Pers. Caeoma Ribis Schltldl. I. l. 114. C. Grossulariatum Link I. l. 59.*

Ad Ribes Grossulariam passim, rarius etiam ad *R. nigrum* et rubrum hypophyllum, nec petiolis parcens.

1778. A. Asperifoliorum Pers., pseudosporidochiis aggregatis cupularibus, limbo breviter denticulato reflexo cinctis, acervos crassiusculos subrotundos irregulares occupantibus, sporidiis rubro-aurantiis. — *Aecidium Asperifolii Pers. syn. 208. Caeoma Asperifolii Schltldl. 112. C. Borragineatum Link I. l. 48. A. Lycopsis Desv.*

Ad Asperifolias, Borraginem potissimum, Echinum, Cynglossum, Symphytum et Lycopsin, in agro thuring. parcus obviam.

1779. A. Pedicularis Libosch., pseudoepidochiis dense congestis subimmersis cupuliformibus, margine lacero denticulato reflexis, acervos tumidos obesos irregulares effusos occupantibus, sporidiis sordide aurantiacis. — *Aecidium Pedicularis Liboschütz mémoir. de Mosc. V. 76. Caeoma Pedicularis Schltldl. I. l. 113. Aecidium crassum var. Pedicularis Funk.*

Ad Pedicularem palustrem rarius.

1780. A. Urticae DC., pseudosporidochiis emersis

capularibus helvolis, ore campanulato primum erecto dein in denticulos brevissimos tenuissimos sciso reclusis, in acervulos rotundos parvos s. elongato-nervisequos congestis, praeter basin aduatam liberis, in aversa folii parte maculam nigro-fuscum punctatam infirmantibus, sporidiis albis dein flaventibus. — *Aecidium Urticae Schum.* *sacell. II.* 222. *Rebent.* neom. 353. *DC. gall. II.* 243. *Dub. I. l. 905. A. Asperifol. sp. Urticae Alb. et Schw. nissk. 117.*

Ad *Urticam dioicam* et *piluliferam hypophyllum* et *lubentius nervisequum*. (Forsan *Aecidio Asperifoliorum* subscribebendum.)

1781. *A. Nymphaeae H.*, pseudosporidochiis immersis in maculam subrotundam placentarem constituentibus, ore subintegro parce prominulis, sporidiis aurantiacis. — *Aecidium Nymphoidis DC. gall. II.* 597., *VI.* 93. *Dub. I. l. 905. Uredo hemisphaerica Spr. syst. 571. Caeoma Nymphoidatum Lk. l. l. 48.*

Ad *Nymphaeam luteam epiphyllum Thuring.*, nec non alibi ad *Villarsiam nymphoiden*.

1782. *A. Melampyri Kz.*, pseudosporidochiis aggregatis, maculae purpureae insidentibus brevibus niveis, margine lacinulatis, sporidii albii. — *Kunze et Schm. D. Schw. n. 165. Caeoma Melampyratum Link. sp. II.* 46.

Ad *Melampyrum nemorosum hypophyllum (Kunze.)*

1783. *A. Menthae DC.*, pseudosporidochiis sparsis emersis subrotundis ovalibus, parenchyma folii callosum obesum occupantibus, sporidiis aurantiis. — *Aecidium Menthae DC. gall. VI.* 95. *Caeoma Menthatum Link.*

Ad *Menthae sylvestris* folia et caules *Austriac.* (*Ehrbg.*)

1784. *A. Geranii DC.*, pseudosporidochiis in acervos subrotundos subcircinatim digestis, maculae flavopurpurascenti insidentibus hincque fuscum nigro-punctatam relinquentibus, sporidiis flavis dein fuscis. — *Aecidium Geranii DC. gall. VI.* 93. *Caeoma Geraniatum Lk.*

Ad *Geranium pratense hypophyllum*.

† tubularia, pseudosporidochiis primum cupulae-formibus dein in tubulos cylindricos longius breviusque productos succrescentibus, basi epidermide volvata munitis, apice demum fissilibus polysporis (Aecid. ceratites Lk. Dub.)

1785. *A. Phaseolorum W.*, pseudosporidochiis emersis liberis candidis subtubulosis cito fissilibus basinque cupulaeformem relloquentibus, in acervos parvos rotundos dein confluentes ex aversa folii parte maculam luteam prominulam relquentibus, sporidiis albis.

Ad *Phaseoli-vulgaris* folia hort. heringens. passim. (W.)

1786. *A. Xylostei W.*, pseudosporidochiis primum mammillaribus dein confertis hyalinis albis subcylindricis, ore contracto tenuiter fimbriato apertis urceolos mentientibus, in acervulos subrotundos maculae utrinque pallidae insidentes congestis, sporidiis pallide-flaventibus. — *Caeoma Xylosteatum* Link l. l. 53. *Aecidium Lonicerae* Dub. gall. II. 906. *A. Periclymeni* Schum. nec DC.

Ad *Lonicera Xylosteum hypophyllum*, passim in Thuring. sepiibus.

1787. *A. Periclymeni DC.*, pseudosporidochiis plurimis in acervulos subrotundos congestis raro effusis cylindricis, ore denticulato erecto reclusis, maculas fuscas crassiusculas obsidentibus, sporidiis aurantiacis. — *Caeoma Lonicerae* Schitl. l. l. 115. *C. Periclymenatum* Link l. l. 52. *Aecid. Periclymeni DC.* gall. II. 597. Dub. II. 907.

Ad *Lonicera Periclymenum hypophyllum*, passim.

1788. *A. Clematidis DC.*, pseudosporidochiis subcylindricis albis hyalinis, ore patulo tenuiter denticulato reclusis, in acervulos parvos obesos congregatis, hinc maculam fusco-nigram informantibus, sporidiis pallide flavicantibus. — *Caeoma Vitalbatum* Link l. l. 54. *Aecidium Clematidis DC.* gall. II. 243. Dub. l. l.

Ad *Clematidis Vitaliae* folia, pedunculos, petiolos et fructus, in quibus pseudosporidochia ordinem concentri-

cum deserunt, v. c. in agro thuring., (W.) nec non magdeburg. (John.)

1789. *A. p o c u l i f o r m e* W., pseudosporidochiis primum conicis, apice depresso, dein cylindricis, ore patulo tenuissime crenulato basin farctam recludente spertis, in acervulos subrotundos saepius nervisequos oblongos dense congestis, ex parenchymate incrassato convexinsculo fusco, hinc maculam flavo-rubentem relinquente subeuntibus, sporidiis saturate-aurantiacis — *Caeoma elongatum* Link sp. II. 63.

a. *Rhamnorum*. — *Caeoma crassum* Schldl. I. I. 112. *C. crassatum* et *Rhamnatum* Link I. I. 60. *Aecidium crassum* et *Rhamni* Pers. syn. 206. DC. gall. II. 244. Rebent. Dub. *A. irregulare* DC. *A. Frangulae* et *A. cathartici* Schum. saec. II. 225. Gaertn. wettner.

β. Evonymi. — *Aecidium Evonymi* Gmel.

γ. *Berberidis*, pseudosp. cylindricis, maculam minus obesam tenuitam obsidentibus. — *Caeoma Berberidatum* Link I. I. *Aecidium Berberidis* Pers. syn. 209. Sowerb. t. 397. Rebent. neom. 352. t. 3. f. 11. cum var. *cyathiformi* et *cylindrica*. Grev. cr. t. 97. *Lycoperdon p o c u l i f o r m e* Jacq. coll. I. t. 4.

δ. *Phillyreæ*. — *Aec. Phillyreæ* DC. gall. VI. 96.

Ad Rhamni Frangulae, cathartici et alpini folia et petiolas passim; β. ad *Evonymum europaeum* rarius; γ. ad *Berberidem vulgarem* salis frequenter.

1790. *A. columnare* Alb. et Schw., pseudosporidochiis subcylindricis sparsis hyalinis tenerrimis subscariosis facile laceris, dein urceolos ore tenuiter dentatos mentientibus foliorumque faciem contrahentibus, sporidiis aurantiacis. — *Caeoma columnatum* Link sp. II. 66. *Aecidium columnare* Alb. et Schw. nisk. 121. t. 5. f. 4. *Peridermium columnare* Kunz. et Schm. D. Schw. n. 10.

Ad *Pinus Picea* folia hypogennia, Lusatiae (Kunze et Schmidt.)

1791. *A. cornutum* Pers., pseudosporidochii prae-longis e basi plerumque incrassata rubra ochreato-aperta subeuntibus fasciculatis laxe cellulosis, foetis farctis tubuloso-cylindricis erectis, effoetis scariosis contabescen-tibus deflexis, ab apice inde scissili demum caducis, in-aversa folii parte maculam purpuream nigro-punctatam relinquentibus, sporidiis subglobosis fusco-tulis. — *Cae-coma cylindrites* Link sp. II. 64.

a. Oxyacanthae, pseudosporidochii tenuissime fissili-hus, maculae convexiusculae insidentibus. — *Accidium laceratum* Sowerb. t. 318. Dub. gall. II. 902. DC. II. 247. Grev. er. t. 269. *Aecid. Oxyacanthae* Pers. syn. 206. t. 4. f. 7. 8. DC. VI. 98. *Caeoma penicillatum* Schltld. I. t. 111. *Aec. penicillatum* Alb. et Schw. nisk. 115. *Cancellaria Pyri* Hertg in Hopp. Taschenb. 1807. p. 238. *Uredo penicillata* Spr. syst. IV. 570. *Lycoper-don penicillatum* Müll. fl. dan. t. 839.

b. Malii. — *Accidium Malii* Schum. saell. II. 222. *Aec. lacertum* a. *Malii syloestris* DC. I. L.

c. Amelanchieris, pseudosporidochii paucissimis, ex macula colliculosa targida subeuntibus. — *Aecid. Ame-lanchieris* DC. gall. VI. 97. Dub. gall. II. 903.

d. Sorbi, pseudosporidochii pluribus ex callo con-vexo, hinc areolam purpureum reliquente subeuntibus. — *Aecid. cornutum* Pers. Dub. DC. I. I. Grev. er. t. 180. *Uredo cornuta* Spr. I. I. *Caeoma cornutum* Schltld. I. I. *Lycoperdon corniferum* Müll. fl. dan. t. 838.

e. Mespili, pseudosporidochii plurimis fasciculatis, ex macula pallida hinc purpurea porrectis. — *Accidium Mespili* DC. gall. I. I. Pers. myc. I. t. 4. f. 2.

Var. a. ad Crataegum Oxyacantham, monogynam, Pru-num sylvestrem rarius; b. ad Pyrum Malum; c. ad P. Amelanchier, fruticem spontaneum in collibus calcareis ad Bleicherode circul. northusani vulgatissimum, passim; d. ad Sorbum Aucupariam vulgare; e. ad Mespilum, ly-pophyllum et ad variam foliorum fabricum habitu vario decipieus.

+++ cornuta, pseudosporidochiis sparsis obsolete cellulosis sequacibus, dein membranaceis rigidis cylindricis, ex epidermidis tuberculo calloso emergentibus, angustius foratis, oligosporis, sporidiis microscopicis dein profusis forasque adhaerentibus. (Cronartium Fr. Kunz. Cacoma Lk. Erinei et Sphaerias sp. Willd. et auct.)

1792. *A. asclepiadeum* W., pseudosporidochiis corniformibus tenuissimis, primum sequacibus, dein rigidulis subcartilagineis tenuissime foratis dilute-fuscescens in tuberculis erectiusculis, ex epidermidis tuberculo calloso hemisphaerico emergentibus sparsis, demum in maculam pallidam aggregatis. — *Cronartium Vincetoxicii* Kunz. myk. Hest. II. 98. t. 2. f. 7. *Cr. asclepiadeum* Fr. obs. I. 220. *Erineum asclepiadeum* Funk. *Cacoma cronartites* Link sp. II. 65.

Ad folia *Cynanchi Vincetoxicii*, in promontoriis Thuring., aestatis exeuntis tempore minime rarum.

1793. *A. Paeoniae* W., pseudosporidochiis ex epidermidis tuberculo hemisphaerico transversis tenerrimis erectiusculis, demum rigidulis puberulis pallide-cinnamomeis, hinc s. utrinque maculam subrotundam fuscam obidentibus. — *Sphaeria flaccida* Alb. et Schw. nissk. 31. t. 7. f. 4. Fr. syst. II. 516.

Ad foliorum *Paeoniae officinalis* paginam inferiorem rarius. (Hoc neque a genere, neque genus nuper statutum et vix nisi fabrica tenaciore poroque angustiore pseudosporidochiorum sparsorum a precedentibus diversum distinguere valeo.)

+++ cancellaria, pseudosporidochiis ovalibus, a basi inde tenuiter fissilibus, apice mammillato cohaerentibus, polysporis. — (*Aecidium Roestelia* Dub. *Roestelia* Rebent.)

1794. *A. cancellatum* Pers., pseudosporidochiis conicis tenuiter membranaceis, foetis a basi inde in lacinulas tenerrimas setaceas fissis, apice mammillari convexo comprehensis albicantibus, tuberculo calloso obeso difformi insidentibus hincque maculam rubram nitidam

nigro-punctata relinquentibus, sporidiis ferrugineo-fuscis majusculis. — *Cacoma Roestelites* Link sp. II. 64. *C. cancellatum* Schleid. t. I. I. III. *Uredo cancellata* Spr. syst. IV. 570. *Roestelia cancellata* Rebent. neom. 350. t. 2. f. 9. *Aecidium cancellatum* Pers. syn. 202. Dub. DC. Nees syst. f. 1. Humb. frib. 127. *Lycoperdon cancellatum* L. sp. 1634. Jacq. austr. t. 17. Flor. dan. t. 764.

Ad Pyri communis folia hypo-rarius etiam epigenum, auctumno sporidiis foetis, quibus profusis sporidochia saepius inquinantur. (Punctula maculae aversam signantia *Sphaeriam hypophyllam* Rebent. neom. 336. vel quoque ipsam Spk. *Aecidii* Fr. in Kunz. et Schm. myk. Hft. II. 41. praestant.) (Alias complures, a me quidem ad indigenas nondum lectas, denuo indagandas species nunc auctorum titulis modo laudo: *Aecidium Bunii* DC., *A. circinatum* Gaertn., *A. Hippocrepidis* DC., *A. Lychnidis* Schulz., *A. Peltigerae* DC. (dubium omnino ac suspectum), *A. Sonehi* Opiz, *A. Thalictri* Grev., *A. unilaterale* DC., *A. Limonii* Dub., *A. Ari* Desm., *A. Orchidearum* Desm.

b. myxococcii, sporidochio tenerissimo membranaceo, sporidiis conglobatis veluti nucleatis foeto, mucilagine difformi circumflua excepto.

209. MYXARIUM W. Schleimnus.

Sporidochium ovatum tenerissimum membranaceum, sporidiis globosis albis jugiter conglobatis (siccaudo) grumosae farctum, massa mucilaginosa amorpha circumflua exceptum.

1795. *M. nucleatum* JV., sporidochio ovato vari nonnisi reniformi depresso helvolo, sporidiis globosis albitibus dense conglobatis farcto, in massa mucilaginosa difformi limpida pallide lutescente circumfluo. — *Tremella micolacea* Wallr. olim.

Ad ramulos patredine exesos (Crataegi) praeprimis, locorum adorum v. c. propc Heringam Thuring. (Wallr.)

(Vegetabile paradoxon, fonsan cum *Nematelia nucleata* Fr. syst. II. 228 comparandum. Ramulis exesis, humi jacentibus massa mucilaginosa sequax limpida amorpha pallide-lutescens, siccando coacta membranae instar expansa incubit, in qua 1-4 corpuscula compacta ovata saepius reniformia libere circumflua indutantur, sporidiis globosis inter se liberis at jugiter conglobatis, nucleus gomosus mentientibus foeta.)

c. *dermatocici*, sporidochiis ex substantia propria, tum a cubilibus, tum a contentis aliena compositis, veluti corticatis, varie quidem figuratis, saepius tamen globosis, clausis omnino s. vertice reclusis, sporidiorum agmine inter se liberorum foctis.

† *clausi*, sporidochiis vir nisi fortuito reclusis.

210. ? SCLEROCCUM FR. Hartkorn.

Sporidochium firmum nudum sporidiis globosis opacis, inter se comque latusculis interuis in tuberculatum arcte conglutiatum.

1796. *Scl. sphaerale* Fr., sporidochiis subglobosis sphaceliaeformibus sparsis subcorneis laevibus nigris, sporidiis globosis minutis opacis coactis foctis, lichenum blastema occupantibus. — *Sclerococeum sphaerale* Fr. sched. cr. n. 365., syst. III. 257. *Spiloma sphaerale* Ach. syn. 2. *Mars. erl.* 285. *Lecidea populosa* Ash. lich. 171. (apothecia.)

Ad lichenum blastemata crustacea praepritis Parmeliae sordidie W. (germ. I. 464.) s. ad Isidium corallinum. (Paradoxon vel solum Friesit auctoritate receptum.)

211. OSTRACOCOCCEUM W. Schalensporting.

Sporidochium sessile subglobosum testaceum durissimum nitidum, sporidiorum globosorum nigrorum arctissime coactorum faccimine foetum illudque deinde mediocrenus s. utriusque tenuando transmittens.

1797. *O. graniforme* JV., sporidochio sessili testaceo s. gypsaceo durissimo nitido candido graniformi, primum globoso sporidiorum nigrorum globosorum arte coactorum farcimine foeto illudque denique tenuando monstrante s. mediotenus utrinque transmittente.

Ad tonicem linteum in locis uidis projectam Thuring. (Wallr.) (Vegetable paradoxon, cuius morphosis quidem latet habitusque potius Myxomycetum naturam adpellare videtur, sporidochiis corticatis, duritiem gypsaceam attingentibus cumque sporidiornm nigrorum farcimine coacto, primum obducto dein hinc inde transmissso foetis, seminis papaverini molem aequantibus et fibris linteis appensis habitum suffultum mentientibus insigne.)

212. SPERMATODERMIA TOD. *Hautsporling.*

Sporidochium hemisphaericum sessile tuberoso-spongiosum, tegmine durissimo fibroso-celluloso conflatum, sporidiis globosis minimis farctum.

1798. *Sp. clandestina* Tode, sporidochio hemisphaerico sessili, basi deplanato opaco nigro durissimo, sporidiis globosis minimis farcto iisque demum suffuso.

— *Spermadermia clandestina* Tod. mekl. l. l. DC. gall. VI. 17. Kunze in myk. Hest. II. 95. (qui generis charact. emendavit). *Sphaeriae leiphaenae* status junior teste Fries syst. orb. I. 159.

Inter corticem et labrum arborum. (Tode. Kunze.) (Genus suspectum.)

213. PERIDERMUM W. *Blasensporling.*

Sporidochium tenuissime membranaceum utriculiforme inflatum, sporidiis globosis liberis plurimi foetum, demum a basi inde solutum, veluti circumscissum.

(*Caeoma Peridermium* Lk. *Aecidium* DC. *Lycoperdon* Willd.) — A reliquis Aecidiis sporidochii indole aberrat.

1799. *P. Pinii* JV., sporidochiis hemisphaericis s. oblongo-compressis sparsis utricularibus (siccando) fragilis-

simis, dein basin versus irregulariter rumpentibus, sporidiis sphaericis aurantiacis dein pallidioribus. — *Aecidium Pini Pers.* in *Gmel. syst.* 1473. *DC. gall.* II. 237. *Grev. cr. t. 7. Dub. gall.* II. 903. *Nees syst. f. 4. Caeoma pini-neum Link sp.* II. 66. *Lycoperdon pini Willd.* in *Usteri Magaz.* II. 16. t. 4. f. 12.

a. acicola, sporidochiis exignis bullatis.

b. truncicola, sporidochiis speciosis vesicatis.

Ad ramos et folia *Pini sylvestris*, suis locis frequens, aliis plane non obvium.

214. ONYGENA PERS. *Hufsporling.*

Sporidochium capitatum sphaericum stipitatum, e floccis coactis corticatum irregulariter rumpens, sporidiis globosis liberis conglobatis factum.

1800. *O. equina Pers.*, sporidochio capitato rotundo cervino s. c. rosa debili pallente, basi saepius umbilicata, stipite concolore brevi (inter se non nisi coalitis), primum laevi dein subtiliter verrucosa, demum varie irregulariterque diffracto, sporidiis coucoloribus conglobatis. — *Oxygona equina Pers.* obs. II. 71. t. 6. f. 3., syn. 203. Alb. et Schw. nisk. 112. Schum. saell. II. 220. (quo loco etiam *Piligena* genus, forsitan idem laudatur.) *Nees syst. f. 121. Flor. dan. t. 1309. f. 1. Fr. syst. III. 207. O. caespitosa Pers. in *Desv. Journ.* II. 30. *Lycoperdon equinum Willd.* ber. 412. t. 7. f. 20. — *Dill. hist. t. 5. Mich. gen. t. 97. f. 8.**

Ad ungulas putres equorum suis locis passim, aliis rarissimum, nec non ad cornua bovinæ et caprea, utробique tamen rarius modo obvium.

1801. *O. corvina Alb. et Schw.*, sporidochio capitato globoso granuloso albido, stipite elongato sursum sensim attenuato subtulito, demum in frustula dehiscente, sporidiis globosis minutis hyalinis conglobatis. — *Oxygona corvina Alb. et Schw. nisk.* 113. t. 9. f. 2. *Fr. syst. III. 208. O. hyssipus Dillmar in Sturm germ.* III. t. 12.

Ad pennas putres Lusatiae (Alb. et Schw.), nec non ad ossicula pellemeque ab strigibus emuncta excrementa agri rostoch. (Ditmar.)

1802. *O. faginea* Fr., sporidochio depresso-globoso ruguloso, e basi umbilicata in stipitem brevem aequaliter producto, demum fatiscente caduco globumque sporophorum dilute fuscescentem decorticatum relinquente. — *Onygena faginea* Fr. syst. III. 209. *O. decorticata* Schwein. (extorris); an quoque Pers. obs. II. 72. t. 6. f. 9. vel potius haec *Cibraria Onygena* Schum.?

Ad ligna Fagi exesa Hercyn. inferior. auctamno legi.

215. CENOCOCCUM FR. Nussporling.

Sporidochium crassum suberoso-corneum intus farctum nubicosum s. sponte non dehiscens, sporidiis globosis minimis pulverulentis liberis congregatis farctum, fragile.

1803. *C. geophilum* Fr., sporidochio tornato-globoso libero hypogaeo arrhizo atro-piceo fragili viciniformi, sporidiis compactis foetis, demum inani. — *Cenococcum geophilum* Fr. syst. III. 65. *Lycoperdon graniforme* Sowerb. fung. t. 270.

Sub terra laxa fagetorum thuringiac. saepius vidi, quod ignobile plene ac singulare juveni tunc apparuit.

†† sporidechiis sive in porum, sive in osculum (circumscissum) reclusis.

216. CHAETOMIUM KZ. Borstensporling.

Sporidochium subglobosum tenuiter membranaceum fragile, pilis opacis rigidulis undique vestitum, deinde vertice mamillato poro regulari perlatus, demum irregulatiter fatiscens, sporidia globosa profundens. (*Chactomium* Kz. *Conopleae* sp. auct. *Vanhallia* Marchand crypt. plant. van Luxemb. p. 261.) (Cauter tum a Conoplea et Exosporio, tum a Sphaerius Pezizisque pilis proprie-

vis dignoscendum, quod sporidochio et sporidiorum inde Sporobolum ferme adspicitur.)

1804. *Ch. epiphyllum* Kz., sporidochio conoideo sessili punctiformi sparsa atro, vertice pilos concolores comosos porrectos emittente. — *Chaetomium epiphyllum* Kunze in lit. ad specim.

Ad folia sicca praeprimis radicalia pl. herbacearum, v. c. Dianthi seperbi.

1805. *Ch. globosum* Kz., sporidochio minuto adnato semigloboso undique pilis simplicibus divergentibus obpresso, sporidiis globosis. *Chaetomium globosum* Kunz. myk. Hft. I. 16. Fr. syst. III. 255.

Ad caules herbarum elatiorum (Dianthi CARTHUSIANUM v. c.) passim. (Ab hoc vix nisi loco in foliis deciduis acernosis rarius obvium differre videtur *Chaetomium pusillum* Fr. t. l. Haud longe forsitan etiam distat *Sphaeria exilis* Alb. et Schw. nissk. 44. t. 9. f. 4. in lignis populnea putridis.)

1806. *Ch. strigosum* W., sporidochio minuto hemisphaericо tenerrimo, a basi inde pilis porrectis assurgentibus stipatis nigris obpresso, dein vertice in discum albido sporidiis paucis globosis foetum recluso. — *Sphaeria phaeocomes* Rebent. neom. 338. t. I. f. 4. Fr. syst. II. 515.

Ad folia graminum mollium, Holci praeprimis lanati Thuring., auctummo passim.

1807. *Ch. coccodes* W., sporidochio globoso sessili sparsa verrucaeformi atro tenerrimo undique pilis brevibus rigidis, porrectis horrido dein caduco, sporidia congregata nuda relinquent.

Ad Solani tuberosi tubera mucida hyemis tempore passim.

1808. *Ch. chartarum* Ehrenb., sporidochio subgloboso nigro, halone laete flavicante cincto, sporidiis subglobosis. — *Chaetomium chartarum* Ehrenb. sylv. 15. 21. Fr. syst. III. 254.

Ad chartam emporeticam putrem. (Ehrenberg.)

1809. Ch. circinans W., sporidochiis globosis minutissimis nigris, pilis brevibus rigidis concoloribus perfectis hispidis nitidulis, vertice albo reclusa, in orbem maculae fuscenti incidentem dispositis s. a centro iude circinantibus, sporidiis microscopicis subrotundis. — *Exosporium Rubi* auct. *Dothidea Chaetomium* Kunz. Fr. syst. II. 563. *Sphaeria Ruborum* Wallr. in lit. 1812.

Ad folia Ruborum nostratum vegetorum passim at fugax satis solisque maculis dilute fuscescentibus superstes.

1810. Ch. Potentillae W., sporidochio globoso minutissimo nigro, pilis brevibus rigidis concoloribus assurgentibus obtecto opaco, vertice albo reclusis, secundum nervos folii aggregato-seriatis linea continua hirtas mentientibus. — *Dothidea Potentillae* Fr. syst. II. 563. *Sphaeria Potentillae* Wallr. in lit.

Ad Potentillae anserinae foliorum faciem superiorem, agri halens. (Wallr.) (Pulchrum satis, at ob minutum aegre desinoendum, rectius tamen hoc trahendum.)

1811. Ch. depresso-globosum W., sporidochio depresso-globoso nonnisi ovali, a basi iude pilis brevibus rigidis nigris assurgentibus torvo, dein a vertice iude apertis discum sporophorium recludentibus.

Ad ramulos siccos lignaque abietina uda, minime rarus accutus.

1812. Ch. atrum Lk., sporidochiis confertis molibus subrotundis majusculis nonnisi ellusis atris, pilis proprie horridis, demum fragilibus, sporidia copiosissima profundentibus. — *Chaetomium atrum* Link sp. I. 46. in adnot. Dub. gall. II. 876. *Fankallia atra* March. I. *Conoplea atra* Pers. syn. 253.

Ad ligna semiputria locorum odorum.

1813. Ch. gelatinosum Ehrenb., sporidochio subgloboso gelatinoso pellucido, basi pilis fibrosis insidente. — *Chaetomium gelatinosum* Ehrenb. sylv. 15. 27. Fr. syst. III. 254.

In similibus cum sequente locis (Ehrenberg), pro cuius statu immaturo etiamnum magis gelatinoso Friesius declarat.

1814. *Ch. pannosum* IV., sporidochii globosis masculis fragilissimis sordide-nigris, sporidia ovalia minutiissima centro punctata numerosissima continentibus illaque demum undique profudentibus, pilis stipatis opacis rigidulis implexo-crispis undique obtextis, glebas pannosas deinde cofluentes stygias sporidobis concoloribus obtutus arcte contextas mentientibus.

Ad Helianthi anni caules siccios hort. northusan. (Rhacomium s. Sphaeriam byssisedam ejusque incanabala Hyphomatis griseo-fusci nomine nota fere refert habitu extero et sporidiis uberrime superfusis et ex sporidochio rarius integro profusis sub vitro pannum pulverulentum aemulatur.)

1815. *Ch. elatum* Kz., sporidochio sessili globoso, dein elevate turbinato tenuiter membranaceo punctulato atro, basi pilis simplicibus brevioribus, superne productioribus vage ramosis implexis divergentibus incomto s. absesso, vertice poro regulari pertuso sporidiisqne ellipticis copiosissimis foeto, demum diffluente. — *Chaetomium elatum* Kunz. et Schm. D. Schw. n. 184. Dub. gall. II. 876. Grev. crypt. t. 230. Fr. syst. III. 254. *Conoplea elata* Spr. syst. IV. 554.

Ad folia culmosque graminum aquaticorum, maxime ad Arundines siccatas stabulorum tectis superinjectas, vel quoque ad Juncam communem in caveis uidis ad terram rejectam, agri halens, et heringens, minime rarum gregibusqne undique excurrentibus, fere nullenis profunsum. (Cautius profecto a Conoplea distinguendum, cuius sporidochium fragile saepius pilis fastigiatis in penicilllos s. fasciculos deusos collectis penitus obruitur et aegro patet.)

217. CYLICHNIUM W. Bücksensporling.

Sporidochium vasculare sessile epiphloeoedes tenuiter membranaceum fragile, primum sporidobis congregatis globosis liberis masculis pellucidis foetum, operculo pla-

niusculo conformi obturatum idque demum circumscisum abjecens, demum effoetum ollare persistens.

1816. *C. operculatum* JV., sporidochio tenuiter membranaceo sessili subgloboso fuscescente, operculo conformi depresso primum obturato, sporidiis globosis coulobatis fuscis foeto, demum ore circumscisso recluso olari diutius persistente.

Ad arborum (*Salicis* praeprimis, *Pronorum* et *Matorum*) cortices lichenum goniitris asyathetis supersusos, in hort. heringens. Thuring. (Waller.) (Mycetes satis singularis, sporidochii operculati figura ad Craterium, Myxomycetum genus revergens, morphoseos ratione tamen, huic modo ac *Galycio* analogus, vel cum *Sphaerocarpa Schum.* (sacell. H. 220.), a *Friccio* (syst. III. 148.) Craterio nutanti subscripta comparandos, nec cum *Eustegia Fr.* commutandus.)

†[†] sporidochiis figuratis in discum patellarem sporo-phorum reclusis.

218. MYROTHECIUM TODE. Tausendsporling.

Sporidochium indeterminatum e floccis delicatis Iaxis contextum, vertice decum fuscens, sporidiis minutis globosis simplicibus, primum pulposis, deinde in discum contractis liberis foetum.

1817. *M. roridum* Tode, sporidochio subtectando dein confluendo difformi caudido, sporidiis cylindricis viridibus, dein nigrescentibus. — *Myrothecium roridum* Tod. mecl. t. 3. f. 38. Fr. syst. III. 217. *M. Charmichaelii* Grev. cr. t. 140. *Dacrydium roridum* Link obs. I. 39. (sporidius roseis.)

Ad ligna quisquiliusque patres rarissime.

1818. *M. Verrucaria* Ditm., sporidochio circumscripto adnato subtectando candido planiusculo, discum sporidiis ovatis olivaceo-nigris obductum revelante. — *Myrothecium Ferrucaria* Ditmar in Sturm germ. III. t. 4. *Pesiza Verrucaria* Alb. et Schw. consp. 340. t. 8. f. 6.

Ad folia exesa Lapsanae et Cucumerum in agro rostoch. (Ditmar.)

1819. *M. inundatum* Tod., sporidochio candido polymorpho, discum planum sporidiis globosis viridi-nigrescentibus supersum recludente. — *Myrothecium inundatum* Tod. L. L. f. 39. Nees syst. f. 98. Ditmar L. L. t. 3. *M. viride* Pers.

Ad fungos putrescentes, v. c. Hercyn. rariissime.

219. STEPHANOMA W. Kronensporling.

Sporidochium sessile tenuissimo membranaceum, extus pilis septatis adpresso ad marginem prominentibus munitum s. strigosum, primum sphaericum coagivens, dein in discum strato sporidiorum globoosorum alborum, ambitu vesiculiferorum angulato-stellatorum liberorum furfuraceo obductum, deplanatum, pezizaeforme.

1820. *St. strigosum* W., sporidochio sessili, primum pisiformi, dein scutellato-deplanato tenerimo fragili, extus margineque pilis tenuibus propexis septatis fusco-castaneis hirto, disco aperto sporidiis albis angulato-stellatis liberis farinoso-furfuraceis superfuso. — *Asterothecium strigosum* Wallr. in lit.

Ad terram nudam glareosam quercetorum collinorum agri beringens. Thuring., auctumno, rarius. (Wallr. 1816.) (Vegetabile perquam singulare, habitu pezizoideo quodammodo alienum, attentius vero inspectum longe diversum. Sporidochium laxe-obsoleteque cellulosum, primum subglobosum pisiforme, dein deplanatum, extus pilis longis tenuissimis regulariter septatis fuscis, ad marginem propexis horridum iisque derasis fusco-virescens; discus apertus sporidiis majusculis hyalinis subrotundis, circum circa alia minora, in coronulam veluti disposita jungentibus, angulato-stellatis, liberis, densis farinoso-pulverulentis superbus.)

220. ASTEROPHORA DITM. Sternsporling.

Sporidochium capitatum, a stipite discretum, e floccis jungiter contextum, vertice irregulariter dehiscens stratumque sporidiorum angulatorum liberorum compactum supernum recludens.

(*Asterophora Ditm. Elvellae et Agarici sp. auct.*)
(Habitu capitato-pileato cum Hymenomyc. analoga.)

1821. *A. agaricoides* Fr., sporidochio primum capitato hemisphaerico clauso stipiteque solido, villo tenui velato albo-cinerascente, demum subtus lamellato verticeque inde in stratum sporophorum compactum convexum cervinum fatiscente. — *Asterophora agaricoides* Fr. syst. III. 205. *A. lycoperdoides* Ditmar in Sturm germ. III. 53. t. 26. *Agaricus lycoperdoides* Bull. herb. I. 519. Pers. syn. 325. Nees syst. f. 194.

Ad Agaricos putres (*A. piperatum* praeprimis et adustum) auctumnio, rarissima. (Gregaria plerumque. Stipes solidus uncialis crassiusculus aequalis villosus cinerasceus, intus fibrosus. Sporidochium hemisphaericum dein magis depresso, nunc tomento tenui albo tectum et clavum eoque tenuando evanescente stratum sporophorum cervinum convexum patescens. Lamellae adnatae crassiusculae distantes. Agaricum parasiticum Bull. fere refert Friesio teste.)

1822. *A. lycoperdoides* Fr., sporidochio primum capitato globoso clauso breviter stipitato, villo tenui obtegto, subtus laevi, vertice stratum sporophorum furfuraceum recludente. — *Asterophora lycoperdoides* Fr. syst. III. 206. *Elvella Clavus* Schaeff. fung. t. 279. *Agaricus lycoperdoides* Sowerb. t. 219.

Ad Agaricum adustum putrescentem neque minus rara. (*A. physaroides* Fr., sporidochio globoso subtus laevi stipite elongato sulluto, fonsan diversam neque legi neque vidi.)

*Ordo III.***HYPHOMYCETES M. Schimmelpilze.**

Vegetabilia simplicia satis ac subtilia; socialia, vegetatibus myceliis ac continuatae symbola perfectiora, Asporomycetum cellulas solutas et Sporomycetum sporidia libera veluti ad synthesis propriam redintegrantia, putredinis corporum organicorum quorumcunque tum inventis tam penitus subeuntis pedis equa, fervescendi periodo potissimum ex mycelio abscondito subeuntia, morphosin accelerantia et subito finientia, saepius ephemera, colore plerumque hyalino, raro laetius tincto, ipso stygio rarissime insignia, astromatis loco ex *hyphis* (*floccis*, *fila*, *filamenta* auct.) filamentosis tubulosis continuis s. septatis homogenis iisque nunc distinctis *hyphasma* (*thallassus* Link) simplex, arachnii instar intertextum s. in strata s. caespites floccosos pulvinatos laxe comprehensum, nunc inter se coactis, *hyphasma compositum* s. figuratum praestantibus, varie digestis, cum cubilibus succubis s. ex illis integris omnino assurgentibus, illico plerumque *sporidia* simplicia septatave homogena, sporulis forsan foeta, nuoc libere inspersa (*Hypomycetes epipori*), nunc hyphae simplici s. compositae figuratae magis minusve jugiter appensa (*H. synspori*), nunc veluti peridio-
lo vesiculoso satis tenero nec carnoso nonnisi in sporidia diffluente, *hyphis* stipitiformibus firmis sustentato eamque terminante recondita s. excepta (*H. entospori*) produceantibus insignia, oculis nudis abjecta quidem, astra-
matis tamen formarum conciuarum figuraione praeclara.

(*Hypomycetes* Mart. Nees. Fr. Lk. sp. excl. tamen plurimis gener. *Asporo-* et *Pyrenomycetum*). *Mucedines* Lk. obs. excl. gener. *asporis*. *Mucedineae* Brong. Dub. excl. *phylleriaeis* et *byssinis*. — (Ambigunt quasi inter *Asporo-* et *Sporomycetum* ordines elementares il-

losque stromatis parte analoga ut plurimum asyntheta, hos sporidiorum similitudine aemulanter et hypha demta s. addita totidem fere genera analoga praestant.

A. epipori, sporidiis simplicibus septatisve, sine ordine hyphae simplici adpersis, liberis omnino, foetis demum aufugis.

a. hyphis asynthetis hyphaema laxe contextum in stratum decumbens implexum construenlibus.

* *sporidiis simplicibus.*

221. MYCOBANCHE PERS. EMD. Rotschimmel.

Sporidia sphaerica majuscula utrinque aequalia s. hinc mucronata simplicia demum confertiora, cubilia penetrantia hyphamque ramosam parcam septatam demum abstergendo obliterantia.

(*Sporendonema Desm. Dub. Sepedonium Lk. Mycobanche Pers. comest. Uredinis sp. Pers. syn. Mucoris sp. Bull. Trichodermatis sp. Alb. et Schw. Mycogone Pers. myc.*) — Erysibae analoga.

* *sporidiis globosis. (Sepedonium Lk.)*

1823. *M. chrysosperma* Pers., hyphis effusis dein obtextis crassiusculis cubilia perreptantibus demum caducis, sporidiis globosis magnis copiosissimis flavis obliteratis — *Sepedonium mycophilum* Lk. obs. I. 16., spec. I. 29. Dub. gall. II. 925. Mart. erl. 334. Nees syst. f. 38. Grev. er. t. 198. *Sporotrichum mycophilum* Spr. syst. IV. 549. *Uredo mycophila* Pers. syn. 274. DC. gall. II. 230. *Mycobanche chrysosperma* Pers. fung. comm. 133. *Trichoderma mycophilum* Alb. et Schw. niss. 122. *Reticularia chrysosperma* Bull. t. 467. *Mucor chrysospermus* Bull. t. 504. f. 1. Sowerb. fung. t. 378.

Hymenomycetes (Hercyn. infer. et superior.) primum foras tegminis teuuioris lanei instar infestat, demum sporidiis sine numero increbrescentibus penitusque subeuntibus parenchyma totum fungi, Erysibes instar infarcit et colore alieno aureo undique profuso oculos allicit.

1824. *M. miniat a* IV., hyphis tenuissimis effusis albis cubilia obducentibus illaque demum sporidiis subglobosis pulverulentis miniat o-rubris increbrescentibus penitus infarcentibus. — *Sporendonema casei* Desmaz. mém. t. 3. f. 1. *Dub. gall.* II. 925. *Sepedonium caseorum* Lk. sp. I. 29. *Oidium rubens* Lk. obs. II. 37. *Aegerita crustacea* DC. *gall.* II. 72. *Mucor crustaceus* Bult. *champ.* t. 100., *herb.* t. 504. f. 2.

Ad caseos vetustos, tum noctates, tum helveticos et belgicos, quos demum sporidiis coloratis infarcit et non solum extus sed quoque intus pulvere veluti miniat sanguis inquinat.

•• sporidiis hinc appendiculatis s. basin filiformem exserentibus. (*Mycogone* Lk. et auct.)

1825. *M. rosea* IV., hyphis tenibus albis dense contextis, sporidiis rubris hinc productis. — *Mycogone rosea* Lk. obs. I. 16. *M. incarnata* Pers. myc. I. 26. *M. alba* Pers. I. 1. (status *juvenilis*.)

Hymenomycetes (*Agaricos praeprimis*) primum foras hyphasma spargendo dein sporidia profundendo et penetrando infestat et *Persoonio* auctore foetet.

1826. *M. cervina* IV., hyphis tenerrimis albis in hyphasma effusum lanosum contextis, sporidiis flavo-fuscis globosis majusculis, hinc appendiculo globoso auctis. — *Mycogone cervina* Döitmar in *Sturm germ.* t. 53. Pers. myc. I. 26. *Link* sp. I. 30. *Dub. gall.* II. 917.

Ad Pezizam macropodem agri rostoch. (Döitmar), quam pellis murini iastar obducendo et deinceps penetrando enecat.

1827. *M. flava* IV., hyphis tenerrimis effusis albis septatis dein sporidiorum ovato-oblongorum utrinque acuminatorum congerie oblitteratis grumulosque confluentes flavos nitidos mentientibus. — *Sepedonium flavum* Wallr. in lit. *Epochnium flavum* Kz. in liter. ad specim.

Ad lignum Tiliae putredine exesum Thuring. (Hyphae dein sporidiis in grumulos crassiusculos congestis hinc s. utrinque appendiculatis hyalinis majusculis oblitterantur.)

222. GONYTRICHUM NEES. Knieschimmel.

Hypha intricata nodosa ibique ramos conformes subverticillatos exserens. Sporidia globosa simplicia iuspersa.

1828. *G. caesium* Nees, hyphis rigidulis deuse contextis intricatis fusco-caesiis hyphasma pulvinatum constituentibus, sporidiis minutissimis pellucidis. — *Gonytrichum caesium* Nees in act. Leopold. IX. 244. t. 15. f. 14. *Pers. myc. I.* 19. *Lk. sp. I.* 32. *Sporotrichum verticillatum* Spr. syst. IV. 548.

Ad ramos quercinos dejectos Franconiae. (Nees.)

223. BYSSOCLADIUM LK. Strahlenschimmel.

Hypha intricata ramosa septata radiatim expansa. Sporidia globosa exigua libera adaspersa.

1829. *B. fenestrarum* Lk., hyphis intricatis ramosis arachnoideis decumbentibus, periphericis expansis radiantibus, centralibus congestis caesio-virentibus, sporidia umbrino-foliginosa iuspersa soventibus. — *Byssocladium fenestrale* Mart. erl. 337. Agrdh syst. 31. Link obs. II. 36. Nees syst. f. 47. *Sporotrichum fenestrale* Ditmar in Sturm germ. III. t. 1. Link sp. I. 19. Dub. gall. II. 924. *Conferva fenestrata* Roth germ. III. 495. Dillw. conf. t. 94. *Flor. dan.* t. 1668. f. 1.

Ad fenestrarum commissuras putres, ex quibus ad vitra solet transmigrare. (Plures Algis genus adnumerant; alii cum priore, habitu tantum nec sporidiorum iudicem diversum, sequenti subscriptunt.)

224. SPOROTRICHUM LK. Sporenschimmel.

Hyphae ramosae subdecumbentes intricatae septatae liberae hyphasma arachnoideo-lanosum variorum colorum praestantes. Sporidia simplicia utrinque obtusa aequalia libere iuspersa facile aufuga.

(*Sporotrichum* Kk. et auct. *Asperotrichum*, *Aleurisma* et *Alytosprium* Lk. (Genus amplum, aliis sigillatum

expositis procul dubio amplificandum, vagum tamen aliam
rum forsau initia ipsosque lichenes apud Linckium com-
prehendens vel atroma hyphoideum Alphitomorphae
quarundam mentiens. Oosporeae analogon genus.

+ leucospora, sporidiis hyalinis albis.

1830. *Sp. candidum* Lk., hyphis vagis adpressis
laxe contextis hyphasma tenerimum demum effusum praes-
tantibus, sporidiis globosis concoloribus albis. — *Sporotrichum candidum* Link obs. I. 9., spec. I. 2. Nees
syst. f. 45. R. Mart. erl. 336.

Ad trucos putres nemorum umbrosorum passim.

1831. *Sp. Boletorum* Ehrenb., hyphis hyalinis
albis in hyphasma crassiusculum dein effusum dense im-
plexum contextis, sporidiis variis maximis, aliis oblongis,
aliis subcylindricis subannulatis. — *Sporotrichum Boletorum*
Ehrenb. sylv. 10. 22. Schleid. berol. 141. *Trichothecium Boletorum* Spr. syst. IV. 552.

Ad Boletos aridos agri berol. (Ehrenberg.)

1832. *Sp. larum* Nees, hyphis vagiter ramosis
adpressis hyphasma tenuissimum demum effusum consti-
tuenteribus, sporidiis concoloribus oblongis parcus adspersis. — *Sporotrichum larum* Nees syst. f. 45. Link spec.
I. 1. nec. Mart.

Ad ligna putria passim.

1833. *Sp. obducens* Lk., hyphis adpressis albis
in hyphasma tenui primum circumscripsum dein effusum
dense jugiterque constipatis, cubilia obducentibus, spo-
ridiis globosis concoloribus. — *Sporotrichum obducens*
Link spec. I. 2. Pers. myc. I. 74.

Ad ligna truncorum exesorum decorticata.

1834. *Sp. polysporum* Lk., hyphis albidis hya-
linis in hyphasma pulvinatum crassiusculum molle laxe
intertextis, sporidiis globosis minutis concoloribus plu-
rimis interspersis. — *Sporotrichum polysporum* Link sp.
I. 2. Mart. erl. 336. Pers. myc. I. 74.

Ad cortices arborum putredine exesos.

1835. *Sp. lanatum* W., hyphis ramosissimis implexis albo-pallescensibus pellucidis parce septatis polysporis in hyphasma pulvinatum mollissimum elasticum laxe contextis, sporidiis globosis minimis plurimis concoloribus demum aufugis.

Ad penas anserinas in cryptis putredine exesas agri northusan. (Hyphae demum magis pallescunt et aliquam cum praeced. quidem similitudinem, loco tamen natali et sporidiis aliquantulum majoribus differentiam suadent.)

1836. ?*Sp. byssinum* Lk., hyphis centrifugis apicem versans expansis albis in hyphasma tenuissimum effusum laxe contextis, sporidiis globosis minutis concoloribus. — *Sporotrichum byssinum* Link sp. I. 20. *Byssocladum candidum* Lk. obs. II. 36. *Himantia plumosa* Pers. myc. I. 90.

Ad folia arborum dejecta. (Link.) (Cantius profectum ab Alphitomorphis tum ab Ozonio candido Mart., si quidem differt, dignoscendum, Linkii auctoritate tamen laudatum.)

1837. *Sp. Pellicula* Lk., hyphis tenerimis hyalinis primam erectiusculis dein subsidentibus in hyphasma tenerimum candidum jngiter intertextum constipatis, sporidiis globosis minutis parcus interspersis. — *Sporotrichum Pellicula* Link spec. I. 3.

Ad caules herberum siccos, Georgiuarum praeparatis hortensium passim.

1838. *Sp. fructigenum* Lk., hyphis abbreviatis hyslois obsolete septatis in hyphasma caespitosum parvum crassiusculum albido congestis, sporidiis globosis inflatis majusculis superfusis. — *Sporotrichum fructigena* Link spec. I. 4. Pers. myc. I. 74. *Sp. macrosporum* Spr. syst. IV. 548. *Aleurisma macrosporum* Link obs. II. 38. *Acrosporium fructigenum* Pers. myc. I. 24. *Torula fructigena* Pers. obs. I. 26. t. 1. f. 7. *Monilia fructigena* Pers. syn. 693.

Ad arborum pruniferarum fructus immaturos tabidos,

Cerasa, Persica et Armeniuca paeprimis minime raro, auctumnō. (Tum habitu, tam sporidiorum iudeole ac mole quadantenus desciscit.)

1839. *Sp. Fungorum* Lk., hyphis protensis laxe in hyphasma tenerimum effusum laevosum contextis, sporidiis globosis minutis. — *Sporotrichum fungorum* Link sp. I. 4.

Ad fungos putres passim.

1840. *Sp. agaricinum* Lk., hyphis parcis hyalinis in caespites pertenues sporidiis globosis oblitteratos junctis. — *Sporotrichum agaricinum* Link Jahrb. I. 170. ?Ehrenb. sylv. 10. *Sp. saccharinum* Link obs. I. I.

In similibus cūm priore locis at parcius.

1841. *Sp. densum* Lk., hyphis parce ramosis hyalinis candidis in hyphae crassiusculum densum coctipatis, sporidiis globosis minutis. — *Sporotrichum densum* Link obs. I. 11., spec. I. 4. Nees syst. f. 45. C. Mart. Ehrenb. Pers. myc. I. I.

Ad insecta emortua in ambrosis passim, nec non ad folia carnesque mucidas.

1842. *Sp. inquinatum* Lk., hyphis hyalinis candidis laxe - circumscripteque contextis, sporidiis globosis primum concoloribus dein pallide - Intescentibus plurimis oblitteratis — *Sporotrichum inquinatum* Link sp. I. 5. *Sp. merdarium album* Link obs.

Ad merdam humavam siccām. (Ehrenberg.)

† ochrospora, sporidiis flavicantibus.

1843. *Sp. merdarium* Ehrenb., hyphis laxe implicitis albido in hyphae crassiusculum circumscriptum, conjunctis, sporidiis globosis flavis. — *Sporotrichum merdarium* Ehrenb. sylv. 10. Schleidt. berol. II. 143.; var. *Rava* Link sp. I. 10.

In iisdem cum priore locis. (Ehrenberg.)

1844. *Sp. luteo-album* Lk., hyphis tenuerrimis

parcis laxe intertextis albis, sporidiis globosis minutis flavescensibus. — *Sporotrichum luteo-album* Link spec. I. 9.

Ad caules herbarum elatiorum siccoe.

1845. *Sp. laetum* Lk., hyphis subtilissimis parcis rariter dispersis, sporidiorum globosorum minutorum flavissimorum stipe obliteratis.

Ad ligna putrida sub umbra dejecta.

1846. *Sp. vitellinum* Lk.; hyphis teneris protensis in hyphasma crassiusculum stuposam longe excurrens implicitis albidis hyalinis, sporidiis globosis vitellinis demum pallidioribus uberrimis obtectis. — *Sporotrichum vitellinum* Link obs. I. II., spec. I. 10. Mart. erl. 337.

Ad asperes putrescentes agri rostoch. (Siemssen.)

1847. *Sp. flavissimum* Lk., hyphis protensis ramosis hyalinis in hypham crassam longe effusam stuposam laxe congestis, sporidiis globosis minutissimis flavissimis. — *Sporotrichum flavissimum* Link obs. II. 34., spec. I. 9. ?*Sp. sulfuratum* Griseb. cr. t. 108. f. 2. an quoque Ehrenb. et Schmidz.?

Ad ligna putrida passim.

††† *erythrospora*, sporidiis e rosa minioque magis minusve rubescensibus.

1848. *Sp. stercorarium* Lk., hyphis raris effusis hyalinis sporidiorum uberrimorum globosorum roseorum stipe obtectis. — *Sporotrichum stercorarium* Ehrenberg sylv. II. Schleid. berol. II. 143.

Ad sterco humanum siccum.

1849. *Sp. scotophilum* Lk., hyphis implicitis in hyphasma crassiusculum contextis, sporidiis globosis rubris. — *Sp. scotophilum* Ehrenb. et Schleid. I. I.

In iisdem cum priore locis, inter se vix diversa.

1850. *Sp. ollare* Pers., hyphis assurgentibus dein decumbentibus effusis albis protensis, sporidiis globosis

roseis subconcentricis. — *Sporotrichum ellare Pers. myc.* I. 81. *Sp. roseum Link obs. I. 33.*

Ad muros ollasque signulinas terra uda repletas passim.

1851. *Sp. mycophilum Lk.*, hyphis crispulis tenuibus parce dispersis, sporidiis globosis rubris uberrimis obtusis. — *Sporotrichum mycophilum Link spec. I.* 15. *Pers. myc. I. 80.*

Ad fungos exsiccatos passim.

1852. *Sp. lateritium Ehrenb.*, hyphis laxe tenuiterque intertextis demum confluentibus, sporidiis ovalibus (oblongis) minimis copiosissimis superfusis. — *Sporotrichum lateritium Ehrenb. sylv. II.*

Ad rejectamenta hortorum. (Sequentis potius iasus?)

1853. *Sp. aureum Lk.*, hyphis crispulis in hyphasma crassiusculum pulvinatum laxe congestis, sporidiis globosis croceis creberrimis superfusis. — *Sporotrichum aureum Link obs. I. 11., sp. I. 15. Aegerita aurantia DC. gall. II. 72. Mucor aurantius Bull. t. 504. f. 5.*

Ad ligna potius, alnea praeprimis.

1854. *Sp. orocicum Ks.*, hyphis parce ramosis croceis in hyphasma crassiusculum contextis, sporidiis ovalibus minutis concoloribus creberrimis superfusis. — *Sporotrichum croceum Kunz. et Schm. myk. Hst. I. 81. Dub. gall. II. 923. Ozonium croceum Pers. myc. I. 86. Alytosprium croceum Link spec. I. 24. Himantia sulfurea Pers. syn. 703.*

Ad quisquilias putres a luce retractas. (Pro Thelephorae sulfureae statu degenere habet Friesius.)

1855. *Sp. pannorum Lk.*, hyphis abbreviatis parce ramosis tenuibus, sporidiis copiosis subglobosis uberrimis rubro-miniatis obliteratis. — *Sporotrichum pannorum Link spec. I. 13.*

Ad pannos putrescentes. (Ehrenberg.) (Quod eodem legi colore minato differre videtur et sporidia saepe seriata edit, cautius hyphis intertextis tenuioribus

et sporidiis minoribus a Trichodermate cinnabarino dignoscendum.)

1856. *Sp. coccineum W.*, hyphis tenerimis brevibus dense intertextis coccineis cum sporidiis concoloribus globosis microscopicis hyphaema tenuiter membranaceum belle coccineum constreuentibus. — *?Ckroolepus cobaltigiacus Agrdh syst. 35. Lepraria cobaltiginea Schrank salisb. Ach. meth. 7. Hyssus cobaltiginea Wulf. in Jacq. coll. II. t. 12. f. 1. B. cobaltii flos Scop. Lichen cobaltigineus Ach. prodr.*

Ad terram gypsaceam udam German. austral. (Wulfen. Schrank. Scopoli), equidem prope Steigerthal Hercyn. infer. (Vegetabile dubium, a nuperis, ni fallor, neglectum, colore belle coccineo oculos ulciciens et forsitan hoc referendum.)

1857. *Sp. helvolum W.*, hyphis tenerimis pellucidis parce ramosis contionis pallido-fuscescentibus, sporidiis simplicibus ovatis pellucidis maguis facile aufugis, hyphaema tenue sericeum obliterantibus helvolis.

Ad Alni lignum putridum Thuringiae (Wallr.)

++++ *pkaeospora, sporidiis fuscescentibus.*

1858. *Sp. cinnamomeum W.*, hyphis intricatis ramosis fuscocinnamomeis cum sporidiis inspersis concoloribus globosis microscopicis, hyphaema paonosum effusum tenerimum laxe intertextum constituentibus.

Ad corticem internum putrem Aceria campestris. (W.)

1859. *Sp. fuscoc-album Lk.*, hyphis implexis ramosis validis hyalinis in hyphaema lanosum crassiusculum effusum laxe intertextis, sporidiis subglobosis magnis creberrimis fuscis intus grumulosis. — *Sporotrichum fuscoc-album Link spec. I. II. Pers. myc. I. 71. Sp. oosporum Ehrenb. sylv. 10. Schltdl. berol. II. 143.*

Ad cortices arborum putres Silesiae (Link), agri berolin. (Ehrenberg), Thuring. (Wallr.)

1860. *Sp. tortuosum W.*, hyphis intricatis pello-

cidis obscure-septatis flexuoso-tortniosis hyphasma tenerum e basi stipata floccosum dilute-cinnamomeum constituentibus, sporidiis subglobosis lateralibus.

Ad ligna faginea caesa Thuring. (Wallr.)

1861. *Sp. fuscum* Lk., hyphis fuscescentibus in hyphasma crassiusculum jugiter intertextis, sporidiis subglobosis minutis creberrime interspersis coicoloribus. — *Alytosprium fuscum* Link sp. I. 23. *Macrotrichum ferrugineum* Grev. edirb. III. 64. *Sporotrichum fuscum*, stuposum et badum Link obs. I. 10. *Corticium fuscum* Pers. myc. I. 38. *Thelephora vinoso* Pers. syn. 578.

Ad cortices arborum udos paasim.

+++++ *chlorospora*, sporidiis ex olivaceo virentibus.

1862. *Sp. flavo-virens* Lk., hyphis tenerimis paccios dispersis sporidia glomerata gloiosa copiosissima flavo-viridiu sustinentibus. — *Sporotrichum flavo-virens* Link spec. I. 17.

Ad trancos putres Lusatiae. (Albertini.)

1863. ?*Sp. bombacinum* Lk., hyphis tenerimis arachnoideis in telam intricatam constipatis effusis, sporidiis globosis minutis e livido viridulis. — *Sporotrichum bombacinum* Link sp. I. I. *Athelia bombacina* Pers. myc. I. 85.

Ad folia dejecta, quas dense obtagit.

1864. *Sp. chlorinum* Lk., hyphis tenerimis densis in hyphasma mollissimum crassiusculum effusum laxe intertextis, sporidiis globosis glomeratis uberrimis flavo-viridibus. — *Sporotrichum chlorinum* Link obs. II. 35., spec. I. 17. Pers. myc. I. 79.

Ad folia dejecta Silesiae (Link.)

1865. ?*Sp. virescens* Lk., hyphis parcis cum sporidiis globosis obscure-viridibus in hyphasma subcrustaceum constipatis. — *Sporotrichum virescens* Link obs. II. 11. excl. syn. spec. I. 16. Mart. erl. 336. *Cladosporium virescens* Pers. myc. I. 14. *Dematiom virescens* Pers. syn. 698. Alb. et Schw. nisk. 368.

Ad ligna exsiccati quaecumque caulesque herbarum elatiorum siccios ubertim. (Habitus a rei quis desciscit; hinc dubia sp., quamvis per vulgata satis.)

+++++ *s podiospora, sporidiis gryscis.*

1866. *Sp. gryseum Lk.*, hyphis tenerimis implexis ellis's cum sporidiis globosis creberrime interspersis hyphasma tenuatum gryseum constituentibus. — *Sporotrichum griseum Link obs. I. 11., sp. I. 8. Mart. ert. 336. Pers. myc. I. 76.*

Ad caules herb. elatiorum siccios pose terram.

1867. *Sp. murinum Lk.*, epigaeum, hyphis tenerimis protensis divaricato-ramosis implexis, sporidiis globosis minatis creberrimis demum superstitibus. — *Sporotrichum murinum Link spec. I. 8. Pers. myc. I. 76.*

Ad terram humidam umbrosam. (A Dematio geotricho meo caute distinguendum.)

+++++ *melanospora, spor. nigrescentibus.*

1868. *Sp. parietinum Lk.*, hyphis laxis vagis sporidia globosa nigrescentia centro recolligentibus. — *Sporotrichum parietinum Link obs. II. 181., spec. I. 18.*

Ad parietes calce nuper illinitos.

1869. *Sp. calcigenum Lk.* hyphis arcte adpressis parcissime dispersis, sporidiis globosis minimis nigrescentibus cubilia inquinantibus supersatis. — *Sporotrichum calcigenum Link sp. I. 18, obs. II. 35.*

Ad parietes calce illinitos udos.

1870. *Sp. lyococcus Ehrenb.*, hyphis intertextis crassiusculis stuposis albentibus, sporidiis globosis subtruncatis conglobatis dispersis. — *Sporotrichum lyococcus Ehrenb. sylv. II. Pers. myc. I. 82. Link spec. I. 18.*

Ad fructus pruniflorarum putres (Ehrenberg). (Quod equidem pro hoc habui, a generis habitu haud mediocriter desciscit.)

1871. *Sp. Collae Lk.*, hyphis implicitis stuposis

longe lateque vagantibus sporidiisque globosa minima nigra conglobata hinc inde dispeesa sustinentibus. — *Sporotrichum collae* Link spec. I. 19. *Collarium nigrispermum* Nees syst. f. 42. Mart. erl. 339.

Collam siccata superinducere solet.

225. FUSISPORIUM LK. Spindelschimmel.

Hyphae ramosae intricatae septatae varie digestae, non nisi circinato-tortuosae (*Circinotrichum Nees*) s. fugates. Sporidia simplicia, e figura fusiformi subcylindrica, non septata libere inspersa, recta s. curvata. (*Menispora Pers.* *Chamatosporium Ehrenb.* *Macrosporium Fr.* *Circinotrichum Nees.* *Leptothelium Lk.* obs. I. 39. — Cum Fusidio Asporomycetum analogou genus.

\dagger *orthospora*, *sporidiis rectis.* (*Fusisporium Lk.*)

1872. *F. roseum* Lk., hyphia tenerrimis implexis late expansis a centro inde sporidia subcylindrica tenerima utrinque acuta rosea cereberrima sublevantibus. — *Fusisporium roseum* Link sp. I. 30.

Ad culmos graminum herb. elatiorum siccios.

1873. *F. aurantiacum* Lk., hyphia tenerrimis laxe vagiterque intertextis, sporidiis tenuibus subcylindricis utriusque acutis aurantiacis inter se conglobatis. — *Fusisporium aurantiacum* Link obs. I. 17. Nees syst. f. 40. B. Mart. erl. 338. *Camtosporium aureum* Spr. syst. IV. 553.

Ad caules herbarum corticesque peponum passim.

1874. *F. longum* IV., hyphis intricatis adpressis dense contextis, sporidiis cylindricis longissimis roseis. — *Sporotrichum cylindrosporum* Link sp. I. 14. *Alytosprium roseum* Ehrenb. syst. II. 24.

Ad ramulos emortuos agri berol. (Ehrenb.)

1875. *F. candidum* Lk., hyphia albia lanosis dense congestis, sporidiis concoloribus sparsis utrinque obtusatis. — *Fusisporium candidum* Link spec. I. 31.

Ad amenta aliasque quisquiliis passim.

1876. *F. circinatum* W., hyphis tenerrimis e nigro-olivaceis circumto-tortuosis implexis, sporidiis fusiformibus hyalinis interspersis. — *Circinotrichum maculiforme* Nees syst. 18. f. 66. Mart. erl. 349. Pers. myc. I. 19. Link sp. I. 35. *Gyrotrichum maculiforme* Spr. syst. IV. 554.

Ad folia dejecta querciuu passim.

†† *menispora*, *sporidiis curvatis*. (*Menispora* Pers.)

1877. *F. glaucum* W., hyphis laxe intertextis effusis primum glaucis dein nigrescentibus, sporidiis tenuissimis arcuatis utrinque acuminatis. — *Menispora glauca* Pers. myc. I. 32. Link sp. I. 31. *Camtsporium glaucum* Ehrenb. sylo. II.

Ad corticem putrem internum agri berolin. (Ehrenberg), heringens. (Wallr.)

** *sporidiis septatis*.

226. TRICHOTHECIUM LK. Zwillingsschimmel.

Sporidia oblonga septata s. obsolete didyma utrinque aequalia s. siue tenuiter attenuata, in basin veluti producta (*Epochnium* Lk.), libere inspersa. Hyphae ramosae intricatae septatae.

(*Trichothecium* et *Epochnium* Lk. *Fusisporii* sp. Dub.) — Genus cum *Aporomyctum* *Puccinia* cumque *Mycogone* analogon.

* *sporidiis utrinque aequalibus*.

1878. *Tr. roseum* Lk., hyphis intricatis in hymenio circumscriptum pulvinatum album congestis, deum sporidiis oblongis disseptatis roseis pluribus obsessis. — *Trichothecium roseum* Link sp. I. 28., excl. syn. Persoon obs. I. 16. f. 17. Nees syst. f. 41. Mart. erl. 338. — Hoffm. germ. III. t. 10. f. 1. pr. pr. (ob septula in duas partes divisa).

Ad caules herbarum siccos, ligna quaecunque, praesertim *Fagorum* corticem adum, in quo articuli rotundi

sporidia oblonga majuscula praestant, nec non ad terram uadem ipsaque animalium excrements.

1879. *Tr. candidum* W., hyphis tenerrimis remote septatis primum in acervulos subrotundos exiguo lanosos congestis dein confluentibus, hyphasma effusum contiguum laxum candidum mentientibus, sporidiis ova-to-oblongis utriusque aequaliter obtusatis concoloribus medioteatus septatis hyalinis creberrime interspersis.

Ad pampinos putres inter hortorum rejectamenta, auctummo, rarius. (Color immutabilis candidus, nec rosam immiscens.)

^o sporidiis hinc appendiculatis. (*Epochnium Lk.*)

1880. *Tr. moniliforme* W., hyphis tenerrimis laxis albis effusis, sporidiorum oblongorum nigrescentium obsolete septatoym hinc parce appendiculatoym congerie superfluis. — *Epochnium monilioides* Link sp. I. 32., obs. I. f. 28. *Nees syst. f. 40.* *Mart. erl. 338.* *Fusisporium monilioides* Dub. gall. II. 925. *Monilia fructigena* Schum. saec. II. 339.

At poma matura succosa putria passim. (Septa in vivis conspicua, exsiccando obliterantur magis.)

1881. *Tr. virescens* W., hyphis albis laxius intertextis effusis, sporidium oblonga septa viridia inspersa soventibus. — *Epochnium virescens* Mart. erl. 338. Link sp. I. 33.

Ad Pruni Armeniacae fructes putres. (Martius.)

227. SCOЛЕCOTRICHUM KZ. Schneckenschimmel.

Sporidia didyma libere inspersa. Hyphae simplices vermiculatae peltocidae.

1882. *Sc. virescens* Kz., hyphis simplicibus prostratis brevibus veluti vermiformibus cum sporidiis didymis inspersis cinereo-virentibus. — *Scolicotrichum virescens* Kunz. et Schm. myk. Illst. I. 10. t. 1. f. 5. Schitdl. berol. II. 154. Spr. syst. IV. 554.

Ad ramos Pruni Cerasi putres, (Kunze.) (Quam auctoris fide sigillatim laudavi, a me nondum visam, praecedenti mallem tamea subscribere.)

†† hyphis arystketis simplicibus s. ramosis assurgentibus hyphasma erectum fasciculatum praestantibus.

* *sporidiis simplicibus.*

228. ACTINOCLADIUM EHRENB. Sternschimmel.

Hyphae e basi simplici in apicem umbellato-ramosum assurgentibus dissitae s. segregatae. Sporidia simplicia globosa vage inspersa.

1883. *A. rhodosporum* Ehrenb., hyphis segregatis parce dispersis nigrescentibus in apicem triduum desinentibus, sporidiis globosis dilute violaceo-roseis. *Actinocladium rhodosporum* Ehrenb. in Links Jahrb. II. 51. t. 5. f. 3. Pers. myc. I. 32. Link spec. I. 51.

Ad tristes aridos Carpiuorum agri berolin. (Ehrenb.)

229. ACLADIUM LK. Stammschimmel.

Hyphae simplicissimae erectae a basi inde septis articulatos quasi interstinguentibus interceptae rigidulae dein compressae erectae distinctae plerumque tamen in fasciculos parvos congestae. Sporidia simplicia hyalina mole varia, a basi inde ad verticem libere inspersa, nonnisi primum subterminalia corymbum discolorem album constituentia.

(*Actadium*, *Haplotrichum*, *Haplaria* Lk.) Com Plegmatio Asporomycelini analogon, hyphae articulis non nisi alternatim compressae indole distinctum.

* *sporidiis undique dispersis.*

1881. *A. conspersum* Lk., hyphis erectis brevibus luteo-albentibus in caespitulos exiguis dein confluentes congestis, sporidiis ovalibus hyalinis hinc inde inspersis dein aenigis. — *Actadium conspersum* Link

obs. I. 9. f. 13., spec. I. 37. Nees syst. f. 50. Mart. crt. 341.

Ad truncos putridos Thuring. passim.

1885. *A. microsporum Lk.*, hyphis erectis albis tenerrimis oculis jam caducis in caespitulos effusos congestis, sporidiis globosis minutis ubique dispersis. — *Acladium microspermum Link. l. l.*

In iisdem cum praeced. locis.

1886. *A. polysporum JV.*, hyphis primum assurgentibus fuscis remote-septatis tenacellis protensis, a media iude parte ad verticem sporidiis ovalibus obtusis simplicibus creberrimis conglobatis obssessis, dein subsidentibus implexis hyphasma intertextum fusco-hepaticum opacum longe effusum constituentibus.

Ad Cucurbitam putridam Thuring. (Wailr.)

1887. *A. heterosporum JV.*, hyphis assurgentibus remote-septatis tortuoso-nodosis, a media iude parte ad verticem sporidiis variis, aliis ovalibus, aliis oblongis cylindricisque obtusis hyalinis creberrimis, nonnisi obsolete septatis obssessis, hyphasma circumscriptum rotundatum maculiforme sparsum glauco-virescens constitutentibus.

Ad folia Juglandis putrescentia, autumno in agro northusan. (Habitus externus Fusarii circinati s. Circinotrichi, at hyphae breviores, nec in apicem tenerrimum circinatum tortum protensae et sporidia haud fusiformia. Aliud habita et colore plane non distinguendum interspersum video sub vitris, *Helmisporium penicillatum* interim dictum, rhabdis erectis nodosis flexuosis, in caespites penicilliformes conjunctis olivaceis pellucidis, appendicibus sporomorphis majusculis 1-4 locularibus obtusis insigne suque loco inscreandum.)

“^o sporidiis subfastigiatis. (*Haplotrichum Lk.*)

1888. *A. capitatum Lk.*, hyphis albis tenerrimis erectis parce rariterque fasciculatis dein fugacibus, spo-

ridiis simplicibus circa apicem collectis subfastigiatis dein erraticis. — *Haplodichum capitatum* Link spec. I. 52. *Botrytis capitata* Dub. II. 919. *Acladium capitatum* Link obs. I. 10. f. 13. Nees syst. f. 51. Mart. erl. 341.

Ad trunco ramulosque arborum vulgare.

1889. *A. epiphyllum* W., hyphis erectis productis tenerrimis fusco-ferrugineis effusis parce fasciculatis deinde effusis persistentibus, e vertice sporidia primum umbellata ovalia exigua pellucida spargentibus.

Ad folia (Vitis v. c., Liliorum) contubescens et ad strues congesta, auctemano.

1890. *A. penicillatum* W., hyphis curtis distinctis pallide-fuscis, e basi congesta penicillatim assurgentibus dein decumbentibus, sporidiis exiguis pellucidis globosis primum fastigato-radiantibus dein erraticis.

Ad caules herb. elatiorum siccios (Hemerocallis v. c.).

1891. *A. conservinum* W., hyphis simplicissimis erectis stipatis (lamen cadutis) capillaribus parce-remotisque septatis ibique exsiccando alternatim contractis compressis olivaceis, sporidiis ovalibus minutissimis, primum in capitulum ovatum congestis dein undique erraticis.

Ad Populi tremulae ligna decorticata Thuring. (Hyphae sporidiis destitutae Plegmatium omnino referunt, articulis alternatim contractis idem s. Conservas penitus aemulantur.)

1892. *A. gryseum* W., hyphis tenerrimis rigidulis parce ramosis erectis segregatis gryseis remote septatis, sporidiis subglobosis minutissimis, primum circa s. infra apicem conglobatis, deinde dispersis undique diffusis. — *Haplaria grisea* Link obs. I. 9. f. 12., spec. I. 52. Nees syst. f. 49. Mart. erl. 340. Pers. myc. I. 28.

Ad folia secca graminum, potissimum palustrium, v. c. Arundinis, Calami et Sparganii vulgaris.

230. CHLORIDIUM Lk. Grünflocke.

Hyphae subsimplices erectae continuæ (non septatae) opacæ aggregatae. Sporidia globosa simplicia ciberrima ruge inspersa.

1893. *Chl. viride* Lk., hyphis tenerrimis erectis laxe aggregatis primum lacte viridibus dein flaventibus, sporidiis copiosissimis globosis concoloribus conglobatis, hinc ioda inspersis deinde aulugis. — *Chloridium viride* Link obs. I. II. *Chl. dispersum* Nees syst. 66. f. 64. Mart. erl. 350. *Dematium asserculorum* Pers. myc. I. 15.

Ad ligna putrescentia agri rostoch. (Ditmar), Franco-miae (Nees), erlangens. (Martius.)

1894. *Chl. griseum* Ehrenb., hyphis tenerrimis stabulatis rigidulis nigro-fuscis effusis, sporidiis cylindricis copiosissimis albo-griseis. — *Chloridium griseum* Ehrenb. sylv. 17. 23. Link sp. I. 38. *Dematium griseum* Pers. myc. I. 15. *Chaetopsis Wauchii* Grev. edinb. III. 63. t. 1.

Ad truncos Alni glutinosae agri berolin. (Ehrenberg). (Invitus genus, (quod Sporomycetum Conopleam fere tangit) a praecedente distinguo, vix nisi hyphae indole continua diversum.)

231. ONCOCLADIUM W. Quirlschimmel.

Hyphae rigidulae septatae fuscantes, ramis quaternis oppositis deflexis verticillatis brevissimis interceptae, iisque sporidia globosa minutissima simplicia interjecta soventes, in massam amorpham laxe conglomeratae.

1895. *O. flavidum* W., hyphis simplicibus erectis rigidulis hyaliniis ramos quateruos in verticillum congestos dellexos brevissimos septum interjectum aequantes truncatos exserentibus iisque regulariter interceptis, sporidiis globosis minutissimis simplicibus flavis ramulos occultantibus dein aulugis, hypham persistentem nudam relinquentibus.

Ad penas auerinas patredine excessas in caveis patruis in Sporetrichi lanati consortio. (Ex elegantissimis;

hyphia exacte verticillatis, ramis quaternis, in modum Abietum emortuarum, recurvis interceptis perquam singularis, sub microscopio abietem ad ramos truncatam, — si parva licet componere magnis —, plane referens.)

B. synspori, sporidüs appensis, sive eaducis sive diutius persistentibus, simplicibus septatisve usque nunc fastigiatis nunc lateralibus ramulos terminantibus, hyphis variis sive simplicibus s. asynthetis, sive compositis s. syntheticis figuratis.

ⓐ hyphis socialibus simplicibus s. asynthetis.

† sporidiis terminalibus,

* simplicibus.

232. BOTRYTIS MICH. EM. Traubenschimmel.

Hyphae simplices s. ramosae septatae sociatim aggregatae, steriles decumbentes, fertiles assurgentibus, circa apices plerumque sporidia globosa s. oblonga simplicia colligentes.

(*Botrytis Mich.* ex emend. *Lk.* *Spicularia Pers.* *Geotrichum* et *Polyactis Lk.* obs. et spec.)

† leucosporae, sporidüs albia.

1896. *B. ramulosa Lk.*, hyphis implexis arachnoideis stuposis albis, fertilibus erectis ramulos brevissimos subfastigiatos mentientibus, sporidiis globosis manusculis cirea apicem conglomeratis. — *Botrytis ramulosa Link* obs. I. 12. *Pers. myc.* I. 35. *Link* spec. I. 53. *B. nivea Mart.* erl. 242. pr. pr. et excl. syn. *Pers.* *B. parasitica Pers.* obs. I. 96. t. 5. f. 6. *Macer botrytis Sowerb.* fung. t. 359.

Ad caules siccos vivosque, *Thlaspi praepriani* *Borsae* *pastoris*, *Thuring. vulgaris*, cante tamen ab *Erysibe candida* distinguenda.

1897. *B. geotricha Lk.*, hyphis arachnoideis implexis longe lateque expansis albis, fertilibus assurgentibus brevibus subramosis, sporidia oblonga utrinque tran-

cata concolora hyalina circa apicem colligentibus, demum profusis. — *Botrytis geotricha* Link sp. I. 53. *Geotrichum candidum* Link obs. I. 53. *Geotrichum candidum* Link obs. I. 15. f. 26. Pers. myc. I. 26. *Sporotrichum larum* Mart. erl. 335. *Acrosporium candidum* Spr. syst. IV. 556.

Ad terram sterilem locorum thuringiac.

1898. *B. epigaea* Lk., hyphis arachnoideis tenuiter intertextis effusis, fertilibus subramosis brevibus, ad apicem sporidia globosa minuta sustinentibus. — *Botrytis epigaea* Link sp. I. 53.

In similibus cum priore locis.

1899. *B. elegans* Lk., hyphis effusis tenuissimis segregatis, fertilibus longioribus erectioribus ramoso-corymbiosis demum flavescens, sporidiis globosis. — *Botrytis elegans* Link obs. I. 13., spec. I. 54.

Ad sterco vaccinum agri rostoch. (Link.)

1900. *B. dendroides* DC., hyphis effusis caespitosis tenerrimis divaricato-ramosis, fertilibus erectis ramosissimis, sporidüs subovalibus maximis. — *Botrytis dendroides* DC. gall. II. 70. Pers. myc. I. 34. Dub. gall. II. 919. *B. agaricina* Link obs. I. 13. spec. I. 53. Ditmar in Sturm germ. IV. t. 51. *Sporotrichum Agaricorum* Ehrenb. sylv. 10. 22. (teste Linkio.) *Mucor dendroides* Bull. herb. f. 504. f. 9.

Ad Hymenomycetes putres passim.

1901. *B. densa* Ditmar., hyphis tenerrimis in caespites subrotundos albissimos dense contextis, fertilibus erectis ramosissimis subvirgatis, sporidiis ovoidibus concoloribus majusculis. — *Botrytis densa* Ditmar in Sturm germ. t. 52. Link spec. I. 54.

Ad muscos putres agri rostoch. (Ditmar.)

1902. *B. leucospora* Lk., hyphis arachnoideis erectiusculis apice multifidis gryseis, sporidiis discoloribus albis globosis. — *Botrytis leucospora* Link spec. I. 61.

Ad pyra putris passim.

1903. *B. epiphylla* Pers., hyphis varia intertextis albis arachnoideis, fertilibus abbreviatis, sporidiis subglobosis concoloribus parcis. — Pers. myc. I. 36. Link l. l.

Ad folia vegeta herbarum praeprimis Chenopodiorum et Atriplicum.

†† *ochrosporae*, *sporidiis flavicentibus*.

1904. *B. flavicans* Lk., hyphis tenerrimis arachnoideis effusis albis, fertilibus abbreviatis vage ramosis facile caducis, cum sporidiis globosis minutis caespitulos parvos exiguos dein confluentes praestantibus. — *Botrytis flavicans* Link obs. II. 36., spec. I. 58. *B. flavidula* Mart. erl. 343.

Ad ramos dejectos passim.

1905. *B. fulva* Lk., hyphis dense contextis in stratum crassiusculum effusam subfulvum constipatis dictius persistentibus, fertilibus ramosissimis, sporidiis globosis. *Botrytis fulva* Link spec. I. 58. *Dematioides ollare* Pers. syn. 697.

Ad terram uadam ollarum in vaporariis frequens.

1906. *B. allochroa* Lk., hyphis laxe intertextis tenerrimis primum albis dein flaveotibus, fertilibus apice ramosis corymbiferis, sporidiis globosis majusculis. — *Botrytis allochroa* Link obs. I. 12. Nees syst. 55. f. 53.

Ad caules herbarrum siccis passim.

††† *erythrosporae*, *sporidiis e rosea minioque magis minusve rubentibus*.

1907. *B. rosea* Lk., hyphis arachnoideis in caespites parvos roseos laxe contextis, fertilibus ramosis apice multipartitis, sporidiis globosis minutis concoloribus. — *Botrytis rosea* Link obs. II. 36., spec. I. 57. *B. Linkii* Dub. gall. II. 919.

Ad ramos dejectos agri rostoch. (Link.)

1908. *B. macrospora* Lk., hyphis arachnoideis laxe intertextis primum albis dein rosata debilem sub-

euntibus, fertilibus apice ramosis subverticillatis, sporidiis subcylindricis oblongis magnis. — *Botrytis macrospora* Link obs. I. 13., spec. I. 57. Dürmer in Sturm germ. t. 50.

Ad folia dejecta Quercus Roboris agri rostoch. (Dürm.)

1909. *B. varia* Dub., hyphis arachnoideis laxe contextis, primum albis, dein pallide roseis, fertilibus vase ramosis, sporidiis oblongis mole varijs. — *Botrytis variosperma* Link obs. II. 36., spec. I. 57. *B. varia* Dub. gall. II. 919. *Cladobotryum varium* Nees syst. 55. f. 54.

Ad ligni caesi frustula rarius. (Vix nisi sporidiorum majorum et minorum mole diversa.)

1910. *B. aurantiaca* Lk, hyphis arachnoideis primum albis dein belle aurantiacis late expansis, fertilibus ramosissimis, sporidiis globosis concoloribus. — *Botrytis aurantiaca* Link obs. I. 12. f. 18., spec. I. 59. *Trichoderma aureum* Pers. syn. 232.

Ad caules herbarum elatiorum, Umbelliferarum prae-primis, quorum interanea saepius penetrat; ad pampinos, potrescentes aliasque quisquiliis udas passim.

††† phaeosporae, sporidiis fuscescentibus.

1911. *B. velutina* W., hyphis arachnoideis pellucidis erectis approximato-septatis alternatimque contractis fasciculato-ramosis, hyphasma tenerimum velutinum pallide-fuscum constituentibus, sporidiis subterminalibus microscopicis ovato-subglobosis plurimis concoloribus.

Ad corticem Aceris campestris putrem Thuring. (Sub lente composita hyphae praeter molem Plegmatium plane referunt.)

1912. *B. hepatica* W., hyphis intricatis pellucidis vase-ramosis depressis, fertilibus erectis ramos conformati oppositos spargentes illosque spicem versus in verticillum congestos sporidiis globosis tectos spargentibus, hyphasma effusum laxum constituentibus.

Ad lignum coryleum putridum Thuring.

+++++ chlorosporae, sporidiis viridulis.

1913. *B. olivacea* W., hyphis intricatis effusis, fertilibus brevibus parce ramosis sporidiisque globosis concoloribus olivaceis. — *Botrytis olivacea* Link sp. I. 55.

Ad truncos putres agri rostoch. (Link.)

1914. *B. pulvinata* Lk., hyphis erectiusculis in hypobasme effusum crassiusculum nigro-olivaceum dense constipatis, sporidiis globosis ramos breves occupantibus. — *Botrytis pulvinata* Lk. spec. l. l.

Ad fungos putres vesparumque cellas.

1915. *B. polyspora* Lk., hyphis lanosis late expansis, fertilibus ramosissimis productioribus, sporidiis globosis creberrimis concoloribus hypobasme sordide olivaceum constituentibus. — *Botrytis polyspora* Link obs. I. 12., spec. I. 56. Ditmar l. l. f. 35. Mart. erl. 342.

Ad ramos putres Thuring. et Hercyn. passim.

1916. *B. cinereo-virens* Kz., hyphis arachnoideis in stratum effusum tenerum mediotenuis cinereum ambitu viridulum digestis, sporidiis globosis maguis creberrimis. — *Botrytis cinereo-virens* Kunze et Schm. myk. Hft. I. 82. Link spec. I. 82. Link spec. I. 56.

Ad ligua putrida Thuring. minime rara.

+++++ spodosporae, sporidiis e cinereo-gryceis.

1917. *B. cana* Kz., hyphis arachnoideis in caespites caenos subrotundos junctis, sporidiis ovalibus magnis parcius superfusis. — *Botrytis cana* Kunze et Schm. l. l. I. 83. Link spec. I. 59.

Ad folia marcida oda agri Lips. (Kunze.)

1918. *B. Polyactis* Lk., hyphis teneris gryceis, fertilibus vage ramosis apice divisis, hyphasma crassiusculum late expansum constituentibus, sporidiis globosis glaucis. — *Botrytis Polyactis* Link spec. I. 59. excl. syn. DC. *Polyactis vulgaris* Link obs. I. f. 22. Noes syst. 58. f. 57. Mart. erl. 344. *Penicillium racemosum* Pers. myc. I. 41. *Monilia vulgaris* Pers. l. l.

Ad caules herbarum putres vulgaris.

1919. *B. racemosa* DC., hyphis teneris effusis cinereis fertilibus ramosissimis assurgentibus, sporidiis ova-to-oblongis albis dein cinerascentibus secus ramulos spicatos racemosos dispositis. — *Botrytis racemosa* DC. gall. II. 30. excl. syn. Pers. Dub. gall. II. 920. *Spiculularia racemosa* Pers. myc. I. 40. *Mucor racemosus* Bull. herb. t. 304. f. 7.

Ad olera putrescentia abundat.

1920. *B. turbinata* Lk., hyphis teneris erectis in basin congestis caesiis, sporidiis globosis concoloribus. — *Botrytis turbinata* Link spec. I. 60. *Polyactis turbinata* Kunze et Schm. L. L. I. 83. *Monilia turbinata* Pers. myc. I. 31.

Ad lignum Pini putridum agri lipo. (Kunze.)

1921. *B. cinerea* Pers., hyphia crassiusculis articulato-constrictis ramosis aequalibus erectis fuligineo-cinereis, sporidiis globosis concoloribus. — *Retrytis cinerea* Pers. syn. 690., myc. I. 32. *Alb. et Sichia* nisk. 363. Link spec. I. 60.

Ad quisquilias putres ipsosque fungos passim.

1922. *B. murina* Ditm., hyphis rigidis remote-acuteteque ramosis opacis demum fusco-nigricantibus, sporidiis hyalinis microscopicis circa ramulorum axillas conglomeratis, hyphasma crassiusculum effusum molle primum gryseo-murinum, deinde illis caducis fuscum constituentibus. — *Botrytis murina* Ditmar in Sturm germ. 73. t. 36. Link spec. I. 61.

Ad ramos dejectos locis obacuris pdis passim.

1923. *B. bicolor* Lk., hyphis tenerrimis effusis e gryseo rubentibus, fertilibus vase ramosis apice divisis, sporidiis subglobosis albis. — *Botrytis bicolor* Lk. spec. I. 61.

Ad caules herbarum elatiorum agri berol. (Link.)

1924. *B. ramosa* Pers., hyphis erectis effusis apice quadrididis gryseis, sporidiis globosis glaucia. — Bo-

trytis ramosa Pers. syn. 960. Alb. et Schw. nisk. 363.
Spicularia ramosa Pers. myc. I. 39. *Polyactis quadrifida* Link sp. I. 62. *Aspergillus quadrifidus* Link obs. II. 36.
 — Mich. gen. t. 91. f. 2.
 Ad caules herbarum putrescentium.

1925. *B. umbellata* DC., hyphis gracilibus erectis caespitosis, fertilibus apice umbellato-multifidis primum albis dein gryseo-nigrescentibus, sporidiis globosis secus ramulos adfixis. — *Botrytis umbellata* DC. gall. II. 71. *Polyactis umbellata* Link spec. I. 63. *Spicularia umbellata* Pers. myc. I. I. *Mucor umbellatus* Bull. I L.

Ad fructus edales saccharo conditos.

††††† *melanoasperae*, sporidiis nigris.

1926. *B. nigra* Lk., hyphis effusis erectis nigris, fertilibus in ramulos paucos virgatos productis, sporidiis minutis globosis concoloribus hiuc inde conglomeratis. — *Botrytis nigra* Link obs. I. 12., spec. I. 62. *Virgaria nigra* Nees syst. 54. f. 51. Mart. erl. 342.

Ad troncos ramosque dejectos, agri rostoch. (Ditmar), Franconias (Nees. Martius.)

233. ASPERGILLUS MICH. Kolbenschimmel.

Hyphae erectae subsimplices septatae, apice clavato sporidia simplicia globosa saepius seriatu sustinentes.

(*Aspergillus* Mich. ex emend. Link. *Monilia* Pers. myc.)

† *leucospori*, sporidiis albis.

1927. *A. candidus* Lk., hyphis sparsis brevibus erectis simplicissimis persistentibus albis, sporidiis globosis concoloribus. — *Aspergillus candidus* Link sp. I. 65., obs. I. 14. *Monilia candida* Pers. syn. 692., myc. I. 30. — Mich. gen. t. 91. f. 2.

Ad plantas siccas fungosque locis udis conservatos minime rarus.

1928. *A. oosporus* W., hyphis robustis densis erectiusculis, sporidiis ovalibus incumbentibus albis. —

Aspergillus ovalispermus Link obs. II. 37., spec. I. 66.
Mart. erl. 345.

Ad poma putrida passim.

†† *ochrospori*, sporidiis demum flaventibus.

1929. *A. flavus* Lk., hyphis arachnoideis albis erectis laxe caespitosis, circa apicem dein lutescentem sporidia globosa concolora colligentibus. — *Aspergillus flavus* Link obs. I. 14. Nees syst. f. 66. Mart. erl. 345. *Monilia flava* Pers. myc. I. 30.

Ad plantas siccatas herbariorum praeprimis locis uidis repositorum.

1930. *A. conoideus* Spr., hyphis erectis lutescentibus in apicem conicum elongatum hyalipum desinentibus. — Spreng. syst. IV. 541. *Byssus conoidea* Müll. Flor. dan. t. 897. f. 2.

Ad semina Cannabeos ex aqua infusa.

1931. *A. laneus* Lk., hyphis ramosis implexis expansis sublanatis dein versus apicem globosum luteolis, ibique sporidiis lutescentibus effusis. — *Aspergillus laneus* Link spec. I. 66.

Ad fungos putridos rarius.

†† *glaucospori*, sporidiis glaucis.

1932. *A. glaucus* Lk., hyphis arachnoideis tenuissimis late expansis depressis, fertilibus erectis apice glauco tumido sporidiis globosis concoloribus obtuso. — *Aspergillus glaucus* Link obs. I. 14., spec. I. 67. *Monilia glauca* Pers. syn. myc. I. 19. *Spicularia simplex* Pers. myc. teste Spreng. *Mucor Aspergillus* Bull. *M. glaucus* Müll. fl. dan. t. 777. f. 2. *Aspergillus capitatus* Mich. gener. t. 91. f. 1. *M. crustaceus* L. sp. 1656. Ad corpora putrida panemque mucidum vulgaris.

1933. *A. gryseus* Lk., hyphis lanosis gryseis effusis, fertilibus exarsis parce incrassatis ibique sporidia globosa minuta concolora colligentibus. — *Aspergillus gryceus* Link spec. I. 69.

Ad corpora putrida German. (Link.)

+++ rhodo- et chlorospori, sporidiis roseis et viridibus.

1934. *A. roseus* Lk., hyphis tenerimis implexis, fertilibus simplicibus roseis aggregatis, sporidiis globosis concoloribus. — *Aspergillus roseus* Link sp. I. 68. *Monilia rosea* Pers. syn. 697. Alb. et Schw. nisk. 364. Batsch elench. t. 12. f. 58. *Acladium roseum* Ehrenb. sylv. II. *Mucor glomerulosus* Bull.

Ad chartas, tapetes et linteas quaecunque locis uidis recondita passim.

1935. *A. virens* Lk., hyphis teneris densis lanosis, fertilibus assurgentibus ramosis apice inflatis ibique sporidia globosa seriata viridia sustinentibus. — *Aspergillus virens* Link obs. I. 14. *Monilia virens* Pers. myc. I. 31.

Ad corpora putrescentia rarius.

234. PENICILLIUM LK. Pinselschimmel.

Hyphae septatae liberae simplices s. ramosae, steriles decumbentes, fertiles erectae, apice penicillatim fissae ibique aporidia globosa simplicia exerentes.

1936. *P. candidum* Lk., hyphis albis tenuiter caespitosis, fertilibus assurgentibus ramosis, sporidia concolora sustinentibus. — *Penicillium candidum* Link obs. I. 15., spec. I. 69.

Ad fungos aliasque quisquiliias patres.

1937. *P. roseum* Lk., hyphis teneris albis parce congestis, fertilibus erectis subramosia dein caducis, sporidiis globosis roseis persistentibus. — *Penicillium roseum* Link obs. II. 37., spec. I. 69.

Ad caules siccios v. c. Solani (Nees.)

1938. *P. glaucum* Lk., hyphis in stratum densum album deo glaucum implexis depressis effusis, alias fertiles subramosas interspersas transmittentibus, sporidiis globosis albis deo glaucescentibus. — *Penicillium glau-*

cum Link *obs. I.* 15., *spec. I.* 30. *P. expansum* Link
obs. I. 15. Nees *syst. f.* 59. Mart. *erl.* 344. *Monilia digitata* Pers. *syn.* 602. *Mucor penicillatus* Bull. *M. glaucus* L. *sp.* 1656.

Ad corpora putrescentia, maxime quae ex saccharo condita sunt, miram saepius luxuriam adficieunt.

235. CAMPSOTRICHUM EHRENB. Hakenschimmel.

Hyphae intricatae continuae ramosae, ramis divaricatis hamatis. Sporidia globosa, circa apices ramulorum congesta. (Ehrenb.)

1939. *C. bicolor* Ehrenb., hyphis opacis rigidulis brevibus flexuosis olivaceo-nigris dense aggregatis in ramulos pellucidos desinentibus, sporidiis magnis subovatis rufo-fuscis. — Ehrenb. in Link *Jahrb.* II. 53. t. 1. f. 4. Link *spec. I.* 72. Schltdl. *ber.* II. 154.

Ad Usneam officinarum destructam, primum ab Ehrenbergio acutissimo observata, nec Hercyn. deficit.

** sporidiis uni-s. pluries transversim longitudinaliterque septatis s. toruloso-moniliformibus.

236. DACTYLIUM NEES. Fingerschimmel.

Hyphae steriles obsoletae, fertiles erectae, e fastigie sporidia oblonga septata exserentes.

1940. *D. candidum* Nees, hyphis fertilibus aggregatis simplicibus parce septatis albis, sporidiis masculis circa apicem congestis paucis oblongis hyalinis septatis. — *Dactylium candidum* Nees *syst. f.* 58. Link *sp. I.* 77. *Helmisporium candidum* Spr. *syst. IV.* 554.

Ad truncum quercinum putrem. (Nees.)

1941. *D. nigrum* Lk., hyphis fertilibus sparsis simplicibus nigris continua, sporidiis binis pluribusve oblongis septatis nigrescentibus.

Ad ligna putrida agri restoch. (Link.)

237. STEMPHYLIUM W. Knopf & Klemm.

Hyphae simplicissimae breves articulatae nodulosae, vertice incrassato sporidium ovatum subangulatum longitudinaliter transversimque septatum, veluti multiloculare sustinentes. (Cum *Helmisporio* analogon genus.)

1942. *S. botryosum* W., hyphis articulato-nodulosis abbreviatis erectis in fasciculos distinctos gregatimque excurretes juncis fragilibus, sporidio ovato subangulato longitudinaliter transversimque septato, veluti concamerato laxe appenso opacè nigro majusculo terminatis.

Ad caules exsiccatos, in hortis, auctumni tempore in strues congestos v. c. Asparagorum, in consortio Sphaeriae complanatae Tod., suis locis ubertim. (Hyphae brevisimae 20-30 s. plures, fasciculos pulvinatos, in greges subrotundas a. oblongas compulsas constituant oculosque maculis nigrescentibus aliciunt, et cum setate s. exsiccando facile evanescunt s. deteruntur.)

238. DENDRYPHION W. Paternosterträger.

Hyphae erectae solidae continuæ opacæ rigidulæ simplicissimæ, apice sporidiorum sphaericorum catenulas lineares continuas (facile tameu secedentes), in capitulum laxum penicillatam congestas exserens.

1943. *D. comosum* W., hyphis strictis stipatis simplicissimis rigidulis brevibus nigris confertim sparsis, apice sporidiorum catenulas lineares breves hyalicas in comam stellatam laxe congestas gryreas sustinentibus. — *Aspergillus catenulatus* Wallr. in lit.

Ad Urticae dioicae caules putrescentes inferiores in agri nothusani variis locis, nusquam samea frequenter. (Hyphomycetes perquam singularis, sporidiorum concatenatione Oosporam, eorum dispositione in comam hemisphaericam Dactylium, habitu externo Stilbum referens, notis laudatis tamen distinctum.)

N.B. Aliud genus elegantissimum ad virgulas salicinas putres circa Heriogam Thuring. lectum, exsiccando

periit, *Corynodermium* dictum, a *Kunzeo* amicissimo, cum quo illud olim communicavi, forsan describendum.

†*sporidiis simplicibus ramulos laterales terminantibus.*

239. ACREMONIUM LK. *Hafschimmel.*

Hyphae parce ramosae septatae. Sporidia simplicia ramos varie digestos et patentim porrectos occupantia.

1944. *A. fuscum* Kz., hyphis arachnoideis expansis fuscis ramulos alternos oppositosque approximatost exserentibus sporidiisque globosa coacolora sustinentibus. — *Acremonium fuscum* Kunz. et Schm. myk. Hist. I. 79. t. 2. f. 23. *Link spec.* I. 75.

Ad lignum abietinum putridum agri lips. (Kunze.)

1945. *A. nitidum* Mart., hyphis limitatis coccineis. — Mart. erl. 339. *Link spec.* I. 75. *Mycogone nitida* Spr. syst. IV. 555.

Ad Sphaeriam deuestam agri erlang. (Martius.)

1946. *A. alternatum* Lk., hyphis arachnoideis effusis laxe intertextis albis ramulos fertiles breves alternos emittebantibus, sporidiis globosis. — *Acremonium alternatum* Link obs. I. 13. *Link spec.* I. 74. *Ditm. in Sturm germ.* I. t. 3. *Mart. erl.* 339. *Mycogone alternata* Spr. syst. I. I.

Ad folia dejecta faginea agri rostoch. (Ditm.)

1947. *A. verticillatum* Lk., hyphis tenerrimis dense intertextis effusis albis in ramulos fertiles verticillatos divisis, sporidiis minimis ovalibus. — *Acremonium verticillatum* Link obs. I. 13. f. 20., spec. I. 74. *Nees syst.* 45. f. 39. *Mart. erl.* 339. *Mycogone verticillata* Spr. syst. I. I.

Ad trunco Pinuum putridos passim.

240. VERTICILLIUM NEES. *Wirtelschimmel.*

Hyphae decumbentes, fertiles erectae septatae ramosae. Sporidia simplicia, apicibus ramulorum innata iisque veluti pedicellata.

1948. *V. tenerum* Nees., hyphis testaceis aggregatis rubro-gryseis, ramulos teruos patentes sporidia globosa alba sustinentes emittentibus. — *Verticillium tenerum* Nees syst. 57. f. 55. Link spec. I. 75. *Botrytis tenera* Pers. myc. I. 38.

Ad caules herb. elatiorum, Alceae roseae v. c.

1949. *V. capitatum* Ehrenb., hyphis laxe in fasciculos minutissimos congestis albis, versus apicem parceramosis ibique sporidia globosa pellucida sustinentibus. *Verticillium capitatum* Ehrenb. sylv. 13. 25. Link spec. I. 76. *Botrytis capitata* Pers. I. t.

Ad excrements larvarum minima in truncis putridis agri berol. Vere. (Ehrenberg.)

241. STACHYLIUM LK. Achterschimmel.

Hyphae steriles decumbentes, fertiles assurgententes septatae ramosae, ramis lateralibus (sporidias Lk.) oppositis verticillatisque oblongis, sporidiis globulosis minimis (granulis Lk.) demum adspersis.

1950. *St. terrestrae* Lk., hyphis arachnoideis tenpter intertextis albis, alias erectas leviter emersus transmittentibus breviter ramosas, ramulis oblongis verticillatis, sporidiis concoloribus globosis. — *Stachylidium terrestre* Link obs. I. 73. f. 21. spec. I. 78. Mart. ert. 343. *Botrytis terrestris* Pers. myc. I. 38.

Ad terram umbrosam ericetorum passim.

1951. *St. bicolor* Lk., hyphis robustis longe latèque expansis gryseis, fertilibus ad apicem ramosis, ramis oppositis verticillatisque, sporidiis albis. — *Stachylidium bicolor* Link spec. et obs. I. t. *Botrytis bicolor* Pers. myc. I. l.

Ad caules exsiccatos, Rhei v. c. undulati (Link.)

242. DIPLOSPORIUM LK. Zwillingsschimmel.

Hyphae fertiles erectae ramosae septatae. Sporidia didyma s. septo transverso distincta.

1952. *D. nigrescens* Lk., hyphis parce ramosis fuligineo-atris in hyphasma ellipsum crassiusculum congesiis, sporidiis ovalibus didymis concoloribus. — *Diplorporium nigrescens* Link sp. I. 64. *Botrytis didyma* Kunze et Schm. myk. Hft. I. 81. Pers. myc. I. 37.

Ad lignum durum agri lips. (Schmidt.) (Cum Trichothecio analogou quidem idque pro Sporotricho, quod hoc pro Botrytide.)

@@*synthetici*, hyphis arachnoideis ad synthesis contextis, nonnisi in figuram variam constipatis, hyphasma (trichophorum Nees.) figuratum, nunc assurgens, nunc depresso concinnantibus, sporidiis fastigiatis s. undique superfusis foetis.

(*Hypomyctes gymnomycetes* Lk. *Trichomycetes* Mart. *Uredineae tuberculariae et scoriadeae* Dub. *Cephalotrichaceae* Fr.)

+ hyphaemate assurgente figurato..

243. COREMIUM LK. Pinselschopf.

Hyphae steriles obsoletae, fertiles erectae hyalinae septatae plurimae fasciculatim congestae, hyphasma veluti laxe constipatum constituentes. Sporidia simplicia terminalia penicillata. (Est *Penicillium syntheticum*.)

1953. *C. glaucum* Lk., hyphis fertilibus arachnoideis erectis in fasciculos lexos congestis sordide lutescentibus, sporidiis terminalibus comoso-penicillatis dein glauca. — *Coremium glaucum* Link obs. I. 19. f. 13. Mart. erl. 365.

Ad fructus conditos corruptos vulgare.

1954. *C. candidum* Nees, hyphis fertilibus arachnoideis erectis in fasciculum laxe congestis candidis, sporidiis terminalibus concoloribus. — *Coremium candidum* Nees syst. 87. f. 86. Mart. erl. 365. *Link spec. I. II. Monilia candida* Pers. syn. 692.

In similibus cum praeced. locis, a quo vix nisi colore differt.

1955. *C. citrinum* Pers., hyphis fertilibus erectis fasciculatis citrinis, sporidiis terminalibus concoloribus. — *Coremium citrinum et leucopus* Pers. myc. I. 43. Link spec. I. 72. *Monilia Pericillus* Pers. syn. 692.

In muscerdis rarius. (Persoon.)

244. CERATIUM ALB. et SCHW. Faltenkopf.

Hyphae simplices arachnoideae in hyphasma primum fluxum elongatum subramosum membranaceum varie figuratum constipatae, ex aqua facile semet evolventes, in apice sporidia solitaria adnata dein fugacia gerentes. (Cum Hydnæ Hymenomycetum eximie analogoo.)

(*Ceratium Alb. et Schw. Isaria Spr. Puccinia Adams.*)

1956. *C. floccosum* JV., hyphis urachnoideis tenerimis ex spacie sporidia microscopica concolora exserentibus, in hyphasmata distincta simplicissima sparsim aggregata, e basi crassiore sensim tenuata conica s. pyramidalia, raro denuo producta filiformia candidissima laxe constipatis sporidiisque prominulis tenuissime villosulis.

Intra Salices cavas pr. Heringam Thuring. (Wallr.)

1957. *C. pyridatum* Alb. et Schw., hyphis sterilibus effusis tenuissimis velutino-pulverulentis cubilia obliterantibus albidis, fertilibus constipatis in hyphasma brevia confertim sparsa, e basi simplici sive in apicem conformem sive bi- tri- pluriesve partitum abeuotia erecta pallida succrescentibus.

a. cornutum, hyphasmate cornuto simplicissimo non nisi productiore acuminato. — *Ceratium pyridatum* Alb. et Schw. nisk. 359. t. 12. f. 9. Link spec. II. 119. *Isaria pyridata* Spr. syst. IV. 545.

b. flabellatum, hyphasmate bi-tripartito s. flabellato. — *Ceratium poroides* Alb. et Schw. nisk. 359. t. 2. f. 6. Link spec. II. 119. *C. aureum* Link obs. II. 39. Pers myc. I. 44.

Ad ligas putrida paucim. (Hyphasmata ex acetate magis pallescunt.)

1958. *C. virens* W., hyphasmatibus cornutis simplicissimis in apicem sensim acuminatis erectis distinctis aggregatis greges longe effusas densas constitutentibus, sporidii olivaceo-flavescens illud dense ambcentibus.

Ad ramulos (Pruni, Salicis) putredine exesos in septentrorum limosis terrestribus coacervatos pr. Heringam. Thuring. (Wallr.) (Ab *Hydnus virens* Alb. et Schw. caute dignoscendum)

1959. *C. ferrugineum* W., hyphis arachnoideis ferrugineis in stratum circumscripum dein effusum tenuis dense intertextis, hyphasmatata brevia simplicissima erecta cornuta concolora exserentibus.

Ad trunca putrescentes Pyri communis Thuring. (Wallr.) (*Hydnus ferruginosum* Pers. caute dignoscendum, nisi id quoque melius sub Ceratio militat.)

1960. *C. rubicundum* Ehrenb., hyphasmatibus in stratum carnosum rubicundum confluentibus ramosis albis.

— *C. rubicundum* Ehrenb. Link spec. II. 119.

Ad muscos putres agri berol. (Ehrenberg.)

1961. *C. hydnoides* Alb. et Schw., hyphis tenerime arachnoideis candidis, hyphasmatata distincta dein fasciculato-congregata, a basi iude in ramos coniformes obtusos patentes simplices divulsa constipata ex sporidiis concoloribus supersusis villosula redintegrantibus. — *Ceratium hydnoides* Alb. et Schw. nisk. 358. t. 2. f. 7. Nees syst. f. 82. Link spec. II. 118. *Isaria mucida* Pers. syn. 688. *Clavaria Puccinia* Batsch elench. f. 49. *C. byssoides* Bull. *Byssus fruticulosus* Oed. fl. dan. t. 718. f. 2. *Tremella hydnoides* Jacq. *Puccinia* Mich. Hall.

Ad trunca putridos fugineos et salicinos passim. (Aliud habitu quidem simile, fabrica interna multo subtiliore, hyalina, candore niveo, hyphasmatibus compressis taeniatis flexuosis ramosis parce sporophoribus alienum conservo, forsitan novum s. senile.)

245. ISARIA PERS. Keulenschopf.

Hyphae arachnoideae in hyphasma continuam elongatum simplex s. ramosum contextae inque clavulam (magis minusve protensam) plerumque figuratae, extus solitae filamentosae, sporidia globosa numerosissima interpersa foventes deinde transmittentes.

(*Isaria* Pers. et auct. *Ramariae* et *Claveriae* sp. auct.) — Fungilli plerumque farinacei fugaces, ex lignis putredine exesis ipsisque insectorum larvis corruptis sponte emergentes.

† epizooae, hyphasmate ex insectis emergente.

1962. *I. crassa* Pers., hyphasmate crassissculo subconico simplicissimo albo praeter basin glabram undique farinoso-sporophoro. — *Isaria crassa* Pers. syn. 637., myc. I. 45. Alb. et Schw. nisk. 360.

Ad chrysalides terrae infossas passim. (*Linkius Isariae truncatae* subscribere jubet.)

1963. *I. velutipes* Lk., hyphasmate gregario albo capituligero farinoso-sporophoro, basi stipitiformi concolore villoso. — *Isaria velutipes* Link obs. I. 18. f. 32. Nees syst. f. 85. Ditmar in Sturm germ. III. t. 54.

Ad chrysalides emortuas passim.

1964. *I. arachnophila* Ditm., hyphasmate gregario simplicissimo candido e basi in apicem sensim aequaliterque intumescente, undique sporidiis concoloribus compactis, tegmen tartareum rimosum mentientibus superflusis. — *Isaria arachnophila* Ditmar in Sturm germ. III. t. 55. *Link sp.* II. 113. Pers. myc. I. 45.

In araneis putrescentibus passim. (Apice hyphasmata nonnisi bipartituntur, totum corpus, sub herbis delitescens illaque adpressum abscondunt ideoque ortum vegetabilem saepius fingunt.)

1965. *I. Eleutherorum* Nees, hyphasmate subcompresso filiformi ramulosso undique albo floccoso-sporophoro, rasselis lateribus curtis. — *Isaria Eleu-*

teratorum Nees syst. f. 84. Pers. myc. I. 45. Link sp. II. 113.

In cadavero Calathi fasci. (Nees.)

1966. *I. truncata* Pers., hyphasmate albo subcaespitoso demum ramosissimo, ramis truncatis crenulatis in alias ramulos excurrentibus, undique floccoso-sporophoris. — *Isaria truncata* Pers. syn. 687., myc. I. 45. Link sp. II. 112. (quo loco haec et *I. velutipes* I. crassae titulo exponuntur.) *Ramaria farinosa* Dicks. Holmsk. Lamar. 94. cum icon.

Ad chrysalidea passim.

†† *epiphytæ*, hyphasmate ex vegetab. emergente.

1967. *I. epiphylla* Pers., hyphasmate caeapitoso clavato simplici albo filamentoso-sporophoro in basin elongatam concolorem producto. — *Isaria epiphylla* Pers. syn. 688., myc. I. 46. Alb. et Schw. nisk. 361. Link sp. II. 115.

Ad folia exsiccata faginea s. populea.

1968. *I. filiformis* W., hyphasmate tenerissimo simplicissimo filiformi erecto praeter apicem acutum utrinque aequali albo, undique filamentoso-sporophoro dein rigidulo.

Ad Agaricos minores patres Thuring.

1969. *I. agaricina* Pers., hyphasmate subgregario erecto rigido flocculoso-sporophoro, dein in ramos subhorizontales divulso. — *Isaria agaricina* Pers. syn. 688., myc. I. 47. Link sp. II. 115. *Clavaria brachiate* Batsch etencl. cont. I. f. 163.

Ad fungos putrescentes passim.

††† *epizylæ*, hyphasmate ex lignis emergente.

1970. *I. citrina* Pers., hyphasmate gregario lutescente ramosissimo undique villoso, sporidiisque albis discoloribus plumae instar supersuso, in basin citrinam desinente. — *Isaria citrina* Pers. syn. 689., icon. t. 3. f. 1., myc. I. 46. *Ditmar* I. L. t. 37. Link sp. II. 117.

Ad trunco putridos Hercyn. infer. passim.

1971. *I. glauca* Ditm., hyphasmate subsimplici e basi convata emerente undique floccoso-sporophoro canescente. — *Isaria glauca* Ditmar l. l. t. 19. Link sp. II. 116.

Ad ramos fagineos agri rostoch. (Ditm.)

1972. *I. clavata* Ditm., hyphasmate simplici e basi sensim in apicem clavatum obtusum incrassato, undique floccoso umbrino-stramineo. — *Isaria clavata* Ditmar l. l. t. 56. Link sp. II. 115.

Ad trunco fagineos passim.

1973. *I. bulbosa* Nees, hyphasmate e basi dilatata sensim tenuato parceque ramulosq; undique floccoso-sporophoro albo. — *Isaria bulbosa* Nees syst. f. 83. Link sp. II. 116.

Ad trunco putridos. (Nees.) (*Linkius rectius* forsitan pro *I. glauca* declarat juvene.)

1974. *I. hydnoides* Lk. hyphasmate temerrimo eretto conferto brevissimo e basi aequali in apicem acutum tenuato undique floccoso-sporophoro candido. — *Isaria hydnoides* Link sp. II. 116. *Hydnum calvum* Alb. et Schw. nisk. 271. t. 10. f. 8.

Ad trunco putridos passim.

1975. *I. glaucocephala* Lk.; hyphasmate basi convata fuscescente floccoso in apices canescentes desidente. — *Isaria glaucocephala* Link sp. II. 116.

Ad ramulos emortuos agri berol. (Link.)

1976. *I. furcellata* Mart., hyphasmate gregario albo molli in ramos erectos subfastigios subclavatos divulso, hyphis sporophoris erectis densis versus apicem collectis. — *Isaria furcellata* Mart. erL 364. Link sp. II. 117.

Ad asseres semiputres agri erlang. (Martius.)

1977. *I. umbrina* Pers., hyphasmata e basi con-

nata latescente in apicem partitum decinente, undique floccoso-sporophoro umbrino. — *Isaria umbrina* Pers. syn. 689., myc. I. 46. Alb. et Schw. nisk. 361. Link sp. II. 117.

Ad truncos putridos passim.

1978. *I. tartarea* W., hyphasmate tenero rigido depresso adnato albo, a basi inde in ramulos coniformes patentes radiantes diviso, extus tegmine floccoso sporidiisque subglobosis minutissimis conglobatis vestito, sensim secedente stratumque medullare rigidum pallescens capillare nudum relinquente.

Ad lignum putredine Thuring. passim. (Habitu externo et hyphasmatis crescendi cubilibusque arete adprimendi modo Ozonium ferme aemulatur, tegmine tartareo tamen dein floccoso pulverulento facile dignoscitur. Forsan *I. saccharina* Pers. (*Aleurisma* Lk.) hoc spectat, ad Boletos rarissime proveniens.)

1979. *I. spiculosa* W., hyphasmate e basi hypophidea oriundo cacapitoso, in ramos teretes coniformes aciculares albos apice dilute cinnamomeos plurimos erectos tortuosos diviso, extus demum in floccos sporophoros albos soluto.

Ad truncos Carpini patres Thuring.

1980. *I. funicularis* W., hyphasmate praelongo parce dichotomoque ramoso funiculari, ligni fibras exesas penetrante, hyphis albis dein solatis sporidiisque globosis candidis stratum medullare tenacellum rigidulum ambeantibus illudque dein nudum relinquentibus.

Intra lignum putredine exesum. (Rhizomorpham crescendi modo, habitu Alectoriam jubatam Ach. refert.)

†† *hyphis in hyphasma membranaceum thelephoroidem expansum, ambitu serico-fibrillosum contextis, s. magis constitutis excipulique instar figuratis.*

246. HYPOCHNUS FR. Faserlager.

Hyphae tenerrimae tenacellae radiantes, praeter ambitum fibrilloso-s. sericeo radiatum asporum distinctum,

in hyphasma submembranaceum subcontiguum applatum cum sporidiis microscopicis foras interspersis contextae.

(*Hypochnus* Fr. obs. *Athelia* Pers. myc. Dub. *Tomentella* Pers.) — Genus dubium; habitu cum Asporomyces rhizomorphis byssinis, fabrica cum Thelephorais resupinatis comparandum, sporidiorum cum hyphasmate relatione Hyphomycetes veluti explanatos vel ad figuram vel ad indolem hymenoden tendentes praestans.

1981. *H. screus* Fr., hyphasmate effuso vivo inaequali arte adpresso pruinoso-tomentoso. — *Hypochnus screus* Fr. obs. II. 278. *Thelephora screva* Pers. syn. 580. Alb. et Schw. nisk. 278.

Ad ligna salicina et alne patredine exesa. (Aliquantum desciscit et fabrica Hymenellam referre videtur.)

1982. *H. epiphyllus* W., hyphasmate tenuissimo glabro irregulariter effuso cincerascente. — *Athelia epiphylla* Pers. myc. I. 84. Dub. gall. II. 933.

Ad folia quercina siccata.

1983. *H. dendriticus* W., hyphis tenerrimis ramentibus albo-pallescensibus, supra sporidiis concoloribus parcis conglobatis adspersis, hyphasma tenuissimum centro angusto-reticulatum, ambitu dendriticō-expansum constitutis, dein confluentibus.

Ad corticem Pruni acidae hort. thuring. (Corticem longe lateque ambit, Ozonii candidi instar semet explicat, sporidiis coactis vero superfluous.)

1984. *H. velutinus* W., hyphasmate longitudinaliter effuso pulverulento-velutino, a centro carneo-rubo inde ambitum dilutiorem albido fibrillosum spargente. — *Athelia velutina* Pers. et Dub. L. L. *Thelephora velutina* DC. gall. VI. 33.

Ad ligna exsiccata locis adis.

1985. *H. sericeus* W., hyphasmate suborbiculari a centro reticulatum contexto pallide-fuscescente inde

ambitum sericeum fibrillosum sulphureum spargente. — *Athelia sericea* Pers. myc. 84. Dub. l. l. *Thelephora sulphurea* Pers. syn. 579. DC. gall. II. 34.

Ad trunco abietino juxta terram. (Hunc cum Sporasticho croceo jungere jubet Friesius.)

1986. *H. reticulatus* W., hyphis arachnoideis rigidulis dilute cinnamomeis ramosis foras sporidiis conglobatis punctiformibus concoloribus adspersis hisque cripto-torulosis, inter se multipliciter reticulato-intertextis, dein hyphasma fibrosum membranaceum ferrugineum, primum rotundatum dein effusum demum sordide cinereum constituentibus.

Ad ligna putredine exesa sepimentorum uodrum Thuring. (Oculo armato fabrica hyphasmatis arguta et subtilis facile patet, et sporidiis hyphis per intervalla incumbentibus illasque crispantibus optime dignosuitar.)

1987. *H. ferrugineus* Fr., hyphasmate effuso tomentoso ferrugineo, sporidiis pulverulentis superfusio. — *Hypochnus ferruginosus* Fr. obs. II. 280. *Thelephora Persoonii* DC. gall. Th. ferruginosa Alb. et Schw. misk. 280. *Tomentella ferruginea* Pers. obs. II. 18. *Theleph. ferruginea* Pers. syn. 378.

Ad ligna sagiea et betulina rarius.

1988. *H. coeruleus* Fr., hyphis arachnoideis albis, ex sporidiis intertextis coerulescentibus, in hyphasma primum circumscriptum a centro umbonato belle coeruleo contiguo tenuiter velutino inde marginem album byssinum spargente, dein rimoso-areolatum sordide violaceum effusum dense contextis. — *Hypochnus coeruleus* Fr. obs. II. 279. *Thelephora coerulea* Schrad. DC. gall. II. 107. Dub. gall. II. 772. Th. fimbriata Roth. *Auricularia phosphorea* Sowerb. t. 353. *Byssus coerulea* Lam. B. phosphorea auct. nec L. et Mich. *Conserva phosphorea* auct. — Mich. gen. t. 66. f. 6.

Ad ramos salicinos sepimentorum uodrum Thuring. circa Heringam passim. (Colore amoene violaceo s. coe-

rulescentes oculos allicit et ab omnisibus recedit, dein vero palescit magis, caesius redditur inque areolas rimosas male dehiscit.)

1989. ?*H. umbrinus* W., hyphis arachnoideis albis cum strato sporophoro superficieli membranaceo-constituto umbrino in hyphasma adnatum, primum rotundum dein longe expansum, margine lacerum contextis, membranam longitudinaliter scissam mentientibus. — ?*Himantia umbrina* Alb. et Schw. nissk. 373.

Ad canales abietinos s. aqueductus sub terra defosso ibique putrescentes northusanos. (Quem interim ita voco organismum, clandestinam observare videtur cum Rhizomorpha subterranea Pers. consortium ejusque forsitan monstrum expansum s. plynthodes sistit.)

1990. *H. strigosus* W., hyphasma obigure-lucentem opaco crassiusculo irregulari dense strigoso-villoso, praeter ambitum dilutiorem byssinum strato sporophoro pallido obducto. — *Athelia strigosa* Pers. myc. I. 83. Dub. gall. II. 932.

$\beta.$ *filamentosus*, hyphasma filamentoso s. subfuniculare sordide latescente, extus pulverulento. — *Thelephora byssoides* DC. gall. VI. 33. Fr. syst. I. 452. Pers. syn. 577.

Ad ligna salicina potria; $\beta.$ inter muscos pinetorumque quisquilias, quas jugiter penetrat ac obducit.

247. CONIOPHORA DC. Staubträger.

Hyphasma tenui membranaceum adnatum molle, strato conformi sporophoro in acervulos numerosos concentricos pulverulentos fatiscente obductum.

(*Coniophora* DC. Pers. *Thelephorae* sp. auct.) — Genus nondum satis notum, cum precedente tamen confine, forsitan idem.

1991. *C. membranacea* DC., hyphasma tenuiter membranaceo albido, zonis fuscis variegato, latescente,

margine byssino pallido. — *Coniophora membranacea* DC. gall. IF. 34. Pers. myc. I. 53. Dub. gall. II. 773.

β . *leioplaca*, hyphasmate suborbiculari laevissimo paleo-fuscescente, zonis concentricis pulveraceis exarato. Pers. I. I. *Auricularia pulverulenta* Sowerb. t. 214.

Ad ligna trabesque putres vaporiorum; β . ad partes udos, rarissime. (Superficies tuberculis majusculis difformibus, sporidia globosa spadicea spargentibus tecta; hyphasma saepius longe lateque expansum, a cubilibus facile divellendum.)

1992. *C. foetida* Pers., hyphasmate carnososo-tremellosu ruguloso fusco albo-pruinoso, zonis dilutioribus, verracia inaequalibus majusculis, sporidiis oblongis minimis. — *Coniophora foetida* Pers. myc. I. 154. *Thelephora foetida* Ehrenb. sylv. 18. 30. Schldl. berol. 200.

Ad asceres putres cloacis obtectos, agri berolin. (Ehrenberg.)

1993. *C. Cerebella* Pers., hyphasmate molli subtus tomentoso subolivaceo, supra undulato-gyroso rubiginoso-pulverulento. — *Coniophora cerebella* Pers. myc. I. 155. *Thelephora cerebella* Pers. syn. 580.

Ad ligna uda cellarum agri misiolaci. (Ludwig.)

248. EPICHYSIUM TODE. Rankenbecher.

Hyphasma insundibuliforme figuratum carnososo-succulentum, intus hyphis funicularibus ramosis constipatis adnatis, latere utroque sporophoribus exaratum.

1994. *E. argenteum* Tode, hyphasmate insundibuliformi carnosulo argenteo tenacello, basi fibrillosa infixa, facie interna hypharum funiculo reticulato s. dendriticamente ramoso adpresso sporophoro exarato, deinde dilute fuscescente. — *Epichysium argenteum* Tod. mecl. Nees syst. f. 9. Alb. et Schw. nisck. 356.

In stercore (suillo) corrupto rarissime, agri meclenb. (Tode), Lusatiae (Albertini et Schweinitz). (Genus dubium mihi satisque vexatum; Todei auctoritate tamen

servandum, huc potissimum inserendum, quamvis ab aliis, *Neesio v. c.* et *Sprengelio* in consortio *Dacryomyceti*, a *Friesio* ad *Hyphomycetes gasterotrichos* pone *Antennariam* expositum sit, ab *Albertinio* inter *pezizoideos* et *bysaceos* intermedium laudetur; ulterius indagandum.)

C. entospori, sporidiis conglobatis s. sporidochio peridimorpho, vesciculari capitato reconditis, primum saepius pulposis, demum foetis liquefando s. fatiscentendo prorumpentibus, plerumque terminalibus.

+ *coccospori*, sporidiis conglobatis.

249. MYXOTRICHUM LK. Schleimschimmel.

Hyphae continuae ramossissimae implexae caespitosae. Sporidia copiosa subglobosa semipellucida, in globulos hyphasmati incidentes primum gelatinosos coacta.

(*Oncidium* Nees. ? *Dacrydium* Lk. obs. I. nec Forst.)
Cum Rhacodio vel Chaetomio analogon.

1995. *M. chartarum* Kz., hyphis tenerimis subsimplicibus apice emerso uncinatis, in caespites olivaceo-nigrescentes implexis, globulis inspersis in sporidia subglobosa microscopica semipellucida fatiscentibus. — *Myxotrichum chartarum* Kunze in myk. Hft. II. 110. *Oncidium chartarum* Nees in Ks. myk. Hft. I. I. 64.

Ad chartam locis uidis asservatam (Nees. Kunze.)

1996. *M. murorum* Kz., hyphis depressis tenerimis stipatis dichotomo-ramosis apice rectis, in stratum stygium implexis, globulis inspersis slaveutibus pulposis, demum in sporidia creberrima microscopica hyalina globosa fatiscentibus. — *Myxotrichum murorum* Kunze l. l.

Ad parietes cavearum passim.

250. COCCOTRICHUM LK. Kornschimmel.

Hyphae ramosae totae septatae coloratae. Sporidia simplicia opaca, in globulum primum coacta dein fatiscentia. (*Aleurisma* Mart. *Sporotrichi* sp. auct.)

1997. *C. Martii* Lk., hyphis tenerrimis implexis expansis nigro-cinerascentibus, sporidiis conglobatis deo secedentibus minimis. — *Coccotrichum Martii* Link spec. I. 26. *Aleurisma granulosum* Mart. etl. 335. *Sporotrichum granulosum* Link Jahrb. I. 183.

Ad corpora putrescentia agri erlang. (Martius.)

1998. *C. carneum* W., hyphis arachnoideis ramosissimis effusis albis laxe molliterque intertextis, sporidiis primum in globulos pallide-carneos conglobatis villosis undique dispersis deo fatiscentibus, hyphasma undique obliterantibus illudque membranaceum pallide cinnamomeum mentientibus.

Intra ligni faginei fragmenta scissa Thuring. (Wallr.)

1999. *C. rhodochroum* W., hyphis arachnoideis parce intertextis effusis albis dein rubentibus, sporidiis primum in globos albos mox miniatos rubrosque conglobatis dein micimis concoloribus secedentibus hyphamque superfludentibus. — *Sporotrichum sporulosum* Link spec. I. 6. Sp. *monotrichum* Spr. syst. IV. 547. Sp. *rhodochroum* Link Jahrb. I. 177. *Aleurisma sporulosum*, inspersum, bulbosorum et roseum Link obs. A. erubescens Nees syst. 52. f. 48.

Ad quisquilias patres ipsamque terram uadam.

251. BACTRIDIUM KUNZ. Knollenchimmel.

Sporidia solitaria elongata extremitatibus hyalinis medio materia grumosa (?sporulis) referta aggregata, hyphis ramosis articulatis apice truncatis adnata dein incumbentia.

2000. *B. flavum* Kz., hyphis tenerrimis parce contextis albis, sporidiis oblongis utrinque obtusis ilavis in caespites parvos conglobatis. — *Bactridium flavum* Kz. et Schm. myc. Hst. I. 5. f. 2. Nees in act. acad. Leop. IX. 234. t. 1. f. 3. Link spec. I. 34. *Trichothecium flavum* Spr. syst. IV. 552. *Tremella mucoroides* Bull. herb. t. 490. f. 4.

Ad corticem arborum agri lips. (Kunze),

2001. *B. candidum* Kz., hyphis strictis in caespites condensatis, sporidiis oblongis utrinque obtusis concoloribus. — *Bactridium candidum* Kz. et Schm. l. l. Link l. l. *Trichothecium candidum* Spr. l. l.

In similibus cum priore locis (Schmidt.)

2002. *B. carneum* Kz., hyphis strictis albis in caespitem parcis junctis, sporidiis oblongis subcylindricis acutis carneis. — *Bactridium carneum* Kz. et Schm. l. l. Nees l. l. t. 2. f. 21.

Ad trunco putres Helvetiac primum a Neesio repertum, euidem in similibus l. Thuring. legi.

† *cystispori*, sporidiis peridiolo (sporangium s. peridium auct., *cystis* Nees.) veluti inclusis s. illud ob-sidentibus. (*Nematomyces vesiculiferi* Mart.)

252. PHYCOMYCES KZ. Oelschimmel.

Hyphae decumbentes continuae simplices flaccidae, apice in sporidia oblonga circa vesiculam insidentem collecta desinente.

2003. *Ph. nitens* Kz., hyphis simplicibus decumbentibus continnis olivaceo-nigris in stratum effusum digestis, vesicula pyriformi nitida concolore dein sporidiis ovalibus erumpentibus superfusa. — *Phycomyces nitens* Kunze in myk. Hft. I. 113. *Mucor nitens* Spr. syst. IV. 539. *Ulva nitens* Agrdh spec. I. 425.

Ad molas cellasque olearias patruas passim, tum ad ligna, tum ad saxa.

253. COLLETOSPORIUM LK. Blasenschimmel.

Hyphae ramosae intricatae evades continuae, massa vesiculosa hinc inde inspersae. Sporidia globosa minutissima simplicia, vesiculos infarcientia.

2004. *C. umbrinum* Lk., hyphis ramosis badiis in stratum densum longe lateque effusum intertextis, vesi-

calis irregularibus, sporidiis ratis globosis. — *Colletosporium umbrinum* Link sp. I. 25.

Ad paginam internam corticis arborum putrescent. in comit. glacensi. (Link.)

2005. *C. atrum* Lk., hyphis teneris effusis atris in stratum tenue contextis, vesiculis dispersis ratis, sporidiis globosis. — *Colletosporium atrum* Link l. l.

Ad ramos dejectos agri berol. (Link.)

254. SPORODINIA LK. Flockenschimmel.

Hyphae robustae septatae ramosae, fertiles erectae, apice tumido sporidia aggregata colligentes.

2006. *Sp. grandis* Lk., hyphis robustis vage ramosis flavo-fuscis in hyphasma laxum congestis, ramis divaricatis apice clavato sporidia ovalia plurima magna eructantibus illisque aggregatis coronatis. — *Sporodinia grandis* Link spec. I. 94. *Aspergillus globosus* Link obs. I. 14. f. 15. Ehrenb. sylv. 34. *Monilia spongiosa* Pers. myc. I. 30.

Ad fungos putrescentes Hercyn. passim.

2007. *Sp. carne a* Ehrenb., hyphis obsoletis, fertilibus erectinsculis brevibus, in apicem globosum illico in sporidia primum alba dein carne a fatiscentem intumescentibus. — *Mucor carneus* Link spec. I. 88. *Polyactis carne a* Ehrenb. sylv. 12. 25.

Ad Pinus sylvestris folia putrida agri berol. (Ehrenberg.)

2008. *Sp. candida* W., hyphis vage ramosis erectis remote-septatis tenuerrimis hyalinis distinctis fasciculato-aggregatis, hyphasma plumosum meutientibus candidissimis, ramulis sporophoris suboppositis lateralibus approximatis patentibus a basi tenuata tubaeformibus sporidia microscopica ovato-subrotunda concolora eructantibus usque in globum congestis coronatis.

Ad folia Sambuci nigrae tabida Thuringiae. (Elegansissima; oculos nudos habito tenuero plumoso, armatos

ramulorum diepositione opposita ex apice tubaeformi sporophora afficiens.)

255. MELIDIUM ESCHW. Traubenschimmel.

Hyphae ramosae ? solidae, ramulis sporophoris in vesiculos globosas solitarias sporidiis hyalinis quaternis foetas intumescentibus.

2009. *M. subterraneum* Eschw., hyphis semi-pellucidis stipatis implexis, fertilibus assurgentibus ramosis, ramis primariis plerumque ternatim fasciculatis, deinde ramosissimis bifidis in vesiculos sphaericas conformatibus. — *Melidium subterraneum* Eschw. rhizom. 33. f. 10.

Ad Rhizomorpham subterraneam detexit Eschweiler.

256. PILOBOLUS TODE. Pillenträger.

Hyphae erectae sparsae simplices continuae roridae e basi tenuata sensim bullato-ventricosae, vesiculam sporophoram globosam ex apice elastice projicientes. Sporidia globosa hyalina. (Com Sphaeronemate analogon genns.)

2010. *P. crystallinus* Tod., hyphis e basi tenuata obovatis flavescens inbus, vesicula hemisphaerica nigra. — *Pilobolus crystallinus* Tod. meclenb. I. 41. Pers. obs. I. 76. t. 4. f. 9., syn. 117. Alb. et Schw. nissk. 72. Flor. dan. t. 1080. Fr. syst. II. 308. Link sp. I. 95. Nees syst. f. 81. *Hydrogera crystallina* Virg. hols. 110. *Mucor obliquus* Scop. *M. urceolatus* Dicks. crypt. I. 25.t.3.f.1.

Ad finum quadrupedum patruorum rarius.

257. SYZYGITES EHREND. Jochschimmel.

Hyphae ramosae decumbentes transversis tubulis coextantes. Sporidia magna globosa farcta, ex coitu floccorum nascentia.

2011. *S. megalocarpus* Ehrenb., hyphis dichotomis primum albis lutescentibus cinereis, cystibus li-

beris conicis pyriformibus connatis lateo-virentibus demum bis contractis maximis, globulo sporophoro mediotenuis nigro, sporidiis globosis minimis subpeliucidis. — Ehrenb. Berl. Verhdt. I. 98. t. 2., sylv. 13. 25. Schleidt. berol. II. 147.

Ad **Agaricos** putres, auctumno. (Ehrenberg.)

258. MUCOR PERS. Knopfschimmel.

Hyphae steriles decumbentes laxe irregulariterque implexae **hyalinæ** fluxiles quasi ac caducae, fertiles erectæ saepius **septatae** et ramosæ, apice vesiculam sporophorum globosam sporidiis simplicibus globosis foetam, dein sive diffluentem, sive iudurescentem, sive rumpentem sustinentes.

† *hyphas* maste manifesto.

2012. *M. fimetarius* Lk., hyphis arachnoideo-lanosis implexis effusis albis, fertilibus ramosissimis, vesiculis globosis indurescentibus deplanatis subtus umbilicatis nigris. — *Mucor fimetarius* Link obs. I. 29., spec. I. 80.

Ad **stercus** vaccinum frequens.

2013. *M. acicularis* W., hyphis teneria tenacellis acicularibus simplicibus praelongis assurgentibus hyalinis, fertilibus vesiculam globosam primum albo-viridulam dein basi depresso dilute cinereum minutissimam evinentibus.

Ad fumum equinum stabulorum uolorum, qui hyphis acicularam porrectarum instar inhorrescere videtur.

2014. *M. truncorum* Lk., hyphis arachnoideo-fanosis albis, fertilibus ramosis vesiculos globosas dein deplanatas indurescentes subtus umbilicatas fuscas elevantibus. — *Mucor truncorum* Link I. I.

Ad **truncos** putrescentes passim.

2015. *M. rufus* Pers., hyphis lanosis albis expansis, fertilibus ramosis ex apice vesiculos globosas primum albidas dein rufo-fuscescentes nigrasve exserentibus

— *Mucor rufus* Pers. syn. 200. *Link l. l. M. ramosus* Bull. champ. t. 480. *D.C. gall. II. 248. Dub. gall. II. 914.*
Ad fungos pomaque putrescentia.

2016. *M. ferrugineus* Lk., hyphis arachnoideis dense contextis fugacibus, fertilibus ramosis ad apices vesiculam ferrugineam exiguum exserentibus. — *Mucor ferrugineus* Link spec. I. 82.

Ad pastam ex sulfure et tartaro mixtam, (Ehrenberg.)

2017. *M. carnis* Lk., hyphis arachnoideis dense intertextis albis facile fugacibus, fertilibus ramosis ex apice vesiculam olivaceo-fuscascentem minutam exserentibus. — *Mucor carnis* Link spec. I. l. ? *M. gracilis* Link l. l.

Ad carnes assatas passim, nec non ad panem mucidum.

2018. *M. Juglandis* Lk., hyphis arachnoideis tenibus parce dispersis, fertilibus brevibus, vesiculam globosam flavam demum verrucosam exserentibus. — *Mucor Juglandis* Link obs. I. 18., spec. I. l.

Intra duces juglandes minime raro.

2019. *M. corymbosus* W., hyphis albis sparsis arachnoideo-lanosis (exsiccando) tenacillis persistentibus hyalinis candidis in ramulos fertiles divulsis, ramulis corymbosis brevibus coniformibus, vesiculas globosas majusculas candidas, sporidiis globosis pellucidis farctas sustinentibus.

Ad corticem lichenosum Rhamni Frangulae humi. jacentem, in sepimentis Thuring. (Wallr.) (Vesicularum sporophorarum per omnem aetatem candore peculiariter differt haec species bella a sequente habituque Melidium reddit.)

2020. *M. flavidus* Pers., hyphis albis arachnoideis lanosis, fertilibus ramosis vesiculam globosam lutescentem dein gryseam elevantibus. — *Mucor flavidus* Pers. syn. 199. Nees syst. f. 76. Mart. erl. 361. Link spec. I. 83. *Byssus* Schmid. icon. t. 52. f. 2.

Ad fungos putrescentes passim.

2021. *M. microcephalus* W., hyphis praelongia debilibus flaccis simplibus distinctis sparsis argenteis assurgentibus omnibus fertilibus vesiculamque sphaericam exiguum flavo-fuscum asperulam dein (sub aqua) in sporidia ovalia hyalina fatiscentem longe exserentibus.

Ad setas porcinas sapoue illinitas. (*Waller.*)

2022. *M. pygmaeus* Lk., hyphis dense intertextis albis dein fuscouscentibus, fertilibus ramosis assurgentibus vesiculamque fuscouscentem exiguum exserentibus. — *Mucor pygmaeus* Link sp. I. 83.

In pasta e sulure et semin. Avisi composita. (*Ehrbg.*)

2023. *M. terrestris* Lk., hyphis arachnoideis dense implexis albis, fertilibus parce ramosis vesiculam globosam albam elevantibus. — *Mucor terrestris* Link spec. I. 83.

Ad Confervarum putrid. strues propter lacum salsum agri hal. exstructas.

2024. *M. lateritius* Lk., hyphis arachnoideis dense intertextis aurantiacis, vesiculam globosam minutissimam sustinentibus. — *Mucor lateritius* Link I. I.

Ad panem mellitum. (*Ehrenberg.*)

2025. *M. oosporus* Lk., hyphis arachnoideis laxe intertextis albis, fertilibus subsimplicibus depresso vesiculam globosam concolorem (ex aqua) in sporidia oblonga fatiscentem sustinentibus — *Mucor oosporus* Link I. I.

Ad sterco caninum passim.

2026. *M. Mucedo* Mart., hyphis arachnoideis juciter contextis omnibus subsimplicibus albis, vesiculis globosis primum albis dein nigrescentibus. — *Mucor Mucedo* Mart. exl. 361. Link spec. I. 83.

Ad corpora putrescentia quaecunque, carnes potissimum, panem coctum aliaque ejusmodi.

†† *hyphasmate* obsoleto.

2027. *M. tenuis* Lk., hyphis tenuissimis albis, fer-

tilibus erectis crassiusculis vesiculam globosam nigram (ex aqua) in sporidia copiosissima fatigantibus exserentibus. — *Mucor tenuis* Link spec. I. 86.

Ad poma exsiccata putrida. (Ehrenberg.)

2028. *M. aquosus* Mart., hyphis obsoletis, fertilibus simplicibus aggregatis albis vesiculam globosam aquosam pallide-ochraceam sustentibus. — *Mucor aquosus* Mart. erl. 362. Link spec. I. 88.

Ad corpora sub aqua putrescentia agri erlang. (Mart.)

2029. *M. minimus* Lk., hyphis obsoletis, fertilibus simplicibus aggregatis rigidulis lutescentibus vesiculam crystallinam elevantibus. — *Mucor minimus* Link spec. I. 89. *M. ?Hydrophora* Pers. syn. 202. Nees syst. f. 77. *Hydrophora minima* Tode mecl. II. 5. t. 8. f. 65.

Ad ramos fagineos, quibus putredo Hyadibus regnabitus imminet., v. c. ducat megap. (Tode), Francon. (Nees.)

2030. *M. tenellus* Schum., hyphis obsoletis, fertilibus erectis gryceis tenellis vesiculas crystallinas subpendulas sustentantibus. — *Mucor tenellus* Schum. saell. II. 237. Link spec. I. 89. *M. Aspergillus* Scop. carn. *Hydrophora tenella* Tod. mecl. II. 6.

Ad ramulos caulesque putridos auctumno. (Species dubia ac suspecta.)

2031. *M. caninus* Pers., hyphis obsoletis albis, fertilibus erectis simplicibus, vesiculas lutescentes minutissimas exserentibus. — *Mucor caninus* Pers. syn. 201. Nees syst. f. 79. Mart. erl. 362. Link spec. I. 90. *Hydrophora stercoreus* Tod. mecl. II. 7.

Ad sterco caninum vulgaris.

2032. *M. stercoreus* Lk., hyphis obsoletis, fertilibus erectis simplicibus lutescentibus, vesiculas concolores majusculas elevantibus. — *Mucor stercoreus* Link spec. I. 90. *Hydrophora stercorea* Tod. I. 1.

Ad sterco humanum. (Tode.)

2033. *M. murinus* Pers., hyphis obsoletis, fertilibus simplicibus sparsis brevibus albis, vesiculum globosam luteam sustentantibus. — *Mucor murinus* Pers. syn. 201. *Stilbum murinum* Pers. myc. I. 353.

Ad sterco murinum, auctumno. (Persoon.)

2034. *M. Fimbria* Nees, hyphis obsoletis, fertilibus sparsis simplicibus brevibus, vesiculam globosam opacam elevantibus. — *Mucor Fimbria* Nees syst. f. 78.

Ad Sphaeriarum stromata. (Nees.)

2035. *M. stolonifer* Ehrenb., hyphis tenerrimis laxe intertextis albis, fertilibus erectis basi implexis longis stolones mentientibus, apice vesiculos olivaceo-nigras elevantibus. — *Mucor stolonifer* Ehrenb. sylv. 13. 25. Link spcc. I. 92. Schldt. berol. II. 148. *Rhizopus nigricans* Ehrenb. nov. act. Leop. X. 198. t. 11.

Ad pampinos putres ramosque betulignos agri berolin. (Ehrenberg.)

2036. *M. clavatus* Lk., hyphis tenerrimis decumbentibus albis, fertilibus simplicibus erectis clavatis, vesicula fusco-nigrescente (ex aqua) in sporidia globosa satisciente. — *Mucor clavatus* Link spec. I. 92.

Ad pyra putrida agri berol. (Link.)

2037. *M. globifer* Lk., hyphis tenerrimis decumbentibus albis, fertilibus simplicibus erectis clavatis, sporidiis globosis majoribus minoribusque jugiter mixtis. — *Mucor globifer* Link spec. I. 92.

Ad pyra putrescentia agri berol. (Link.)

2038. *M. lutescens* Lk., hyphia teneris decumbentibus albis, fertilibus simplicibus erectis intra vesiculum luteam subclavatis, eaque in sporidia subglobosa sedente. — *Mucor lutescens* Link spec. I. 93.

Ad Brassicae oleraceae caules putres.

2039. *M. fusiger* Lk., hyphis ramosis effusis albis fertilibus simplicibus erectis, vesiculos nigrescentes deit

in sporidia fusiformia fatiscentes elevantibus. — *Mucor fusiger* Link spec. I. 93. *M. rhombospermus* Ehrenb. sylv. 13. 25.

Ad Hymenomycetes putres agri berol. (Ehrenberg.)

259. THAMNIDIUM LK. *Astschimmel.*

Hyphae sparsae erectae, a basi inde ad medium partem ramulis vagis globulos sporomorphos exiguos exserentibus auctae, ex apice vesiculam sporophoram globosam, dein in sporidia globosa simplicia diffluentem sustinentes.

2040. *Th. elegans* Lk., hyphis candidis inferne vage ramosis, superne simplicibus, vesiculam globosam concolorem exserentibus. — *Thamnidium elegans* Link obs. f. 45., spec. I. 97. Nees syst. f. 75.

Ad collam exsiccandam passim. (Praeter ramos hymen inferne augentes, a Mucore plane non differre videtur.).

260. STILBUM TODE. *Kolbenschimmel.*

Hyphae erectae farctae aequales sociales stipitiformes persistentes, ex apice capitulum sporophorum rotundum elongatumve primum molle dein coactum sporidiisque microscopicis profusis foetum sustinentes.

(*Stilbum Tode et auct. Chordostylum Periconia Tode.*) — Sporidiorum cum reliquis conformium potissimum sive genus vexatum et tum cum *Trichia Myxomycetum*, tum cum *Sporomycet. dermatoeciis* analogou hoc retuli, quod hyphae inde stipata farcta alioquin a reliquis desciscit.

† *capitulo globoso.* (*Stilbum propriæ s. dict.*)

2041. *St. byssisedum* Pers., hyphis stipitiformibus e basi byssoidea assurgentibus majusculis congestis albis, capitulo subrotundo concolore s. dein pallidior. — *Stilbum byssisedum* Pers. myc. I. 347.

Ad ligna pinæ mucida Vogesorum. (Persoon.)

2042. *St. puberulum* Tod., hyphis stipitiformibus e basi incrassata puberula sensim tenuatis albis, capitulo ovato concolore. — *Tode med. 32. t. 3. f. 21.* Pers. myc. I. 355.

Ad folia Pinorum putrida ducat. med. (*Tode.*)

2043. *St. hirsutum* Hoffm., hyphis stipitiformibus e basi byssoidae alba emergentibus erectis ochraceis capillaribus, setis adpressis hirtis, capitulo globoso albo solido coronatis. — *Stilbum hirsutum Hoffm. germ. t. 10. f. 2.* *St. strigosum* Pers. syn. 680., myc. I. 348.

Ad truncos putridos Hercyn. rarissime.

2044. *St. tomentosum* Schr., hyphis stipitiformibus gracilibus albidis tomentosis e basi byssoidae emergentibus, capitulo subrotundo demum opaco albido. — *St. tomentosum* Schrad. *Journ. II. 65. t. 3. f. 2.* *Grev. er. t. 281.* *St. parasiticum* Ditmar l. l. t. 46. Pers. myc. I. 351.

Ad Trichias, Arcyrias aliosque Myxomycetes putres passim.

2045. *St. erythrocephalum* Ditm., hyphis stipitiformibus crassisculis pilosis albidis, capitulum roseum globosum sustinentibus. *Stilbum erythrocephalum* Ditmar in *Sturm germ. t. 45.*

Ad excrements avium agri rostoch. (*Ditmar.*)

2046. *St. xanthocephalum* Ditm., hyphis stipitiformibus tenuibus nigrescentibus rigidis gregariis, capitulo globoso fulvo. *Stilbum xanthocephalum* Ditmar l. l. t. 60. *St. minimum a. nigripes* Tod.

Ad truncos putridos passim.

2047. *St. vulgare* Tod., hyphis glabris elongatis sorsum sensim tenuatis, primum albidis dein flavescientibus gregariis, capitulo globoso albido demum lutescente. *Stilbum vulgare* Tod. mekl. I. t. 2. f. 16. *Ditmar l. l. t. 58.* *St. gelatinosum* Pers. syn. 601. *St. pellucidum* Schrad. *Journ. II. 65.* Pers. myc. I. 354.

Ad trunco putres, Fagorum praeprimis.

2048. *St. bulbosum* Tod., hyphis stipitiformibus elongatis e tuberculo hemisphaerico gryseo emergentibus flexuosis, capitulo sphaericu albo. — *Stilbum bulbosum* Tod. mecl. I. 10. t. II. f. 7. Pers. myc. I. 355.

Ad quisquilias putres. (Tode.)

2049. *St. hyalinum* Alb. et Schw., hyphis stipitiformibus majusculis fascicularibus cum vitrea pelluciditate caudidis s. eburneis subulatis, capitulo concolore sphaericu lacteo dein magis turbido. — *Stilbum hyalinum* Alb. et Schw. nisk. 353. t. 12. f. 6.

Ad quisquilias putrescentes agri niskiens. (Albertini et Schweiniz.)

2050. *St. brevipes* W., hyphis stipitiformibus robustis brevibus sparsis s. confertissimis opacis nigris, capitulo majusculo sphaericu violaceo-fusco ex sporidiis conglobatis diu persistentibus pulverulentio inquinante.

Ad Campanulam Medium putrescentem hortorum norths., auctumno sero. (Habitus Dendryphii comosi. Hypae stipitiformes greges longe excurrentes densas stipatas fuscas mentiuntur et longitudine et dispositione variant.)

2051. *St. pusillum* W., hyphis stipitiformibus brevibus sparsis e basi incrassata sensim attenuatis nigricantibus, capitulo majusculo hemisphaericu primum argenteo dein fusco-cinerascente, ex sporidiis conglobatis persistentibus composito.

Ad Sambuci nigrae ramos decorticatos passim. (Gallyci pusilli habitum exacte reddit.)

2052. *St. tenax* Spr., hyphis stipitiformibus elongatis flexuosis tenuissimis capillaribus albidis dii spadiceis, capitulo globoso exiguo ochroleuco. — *Stilbum tenax* Spr. syst. IV. 546. *Chordostylum capillare* Tod. l. l.

Ad ramos emortuos ducat. meclenb. (Tode.)

2053. *St. byssoides* Spr., hyphis stipitiformibus rigidis abbreviatis glaberrimis cinereo-nigricantibus, e basi compacta conformi subeuntibus, capitulis minutis nigris. — *Stilbum byssoides* Spr. syst. IV. 546. *Periconia byssoides* Pers. syn. 686. *Nees nov. act. Leopold.* IX. t. 5. f. 9.

Ad caules plantarum elatiorum. (Persoon.)

2054. ? *St. aquigenum* Rebent., hyphis stipitiformibus purpurascenscentibus, capitulo globoso atro-purpureo. — *Stilbum aquigenum* Rebent. neom 382.

Ad Charam vulgarem dispersam, rarissime. (Rebentisch.)

2055. *St. olivaceum* Spr., hyphis stipitiformibus gracilibus nigris, capitulo globoso olivaceo. — *Stilbum olivaceum* Spr. syst. IV. 546. *Atractium olivaceum* Schmidt.

Ad ramos putridos agri lipsiens. (Schmidt.)

2056. *St. piliforme* Pers., hyphis stipitiformibus fasciculatis strictis nigris glabris, capitulo sphaericо hyalino fugacissimo. — *Stilbum piliforme* Pers. syn. 581., sicc. I. 353.

Ad herbas ramosque putres, auctumno.

2057. *St. rigidum* Pers., hyphis stipitiformibus gregariis robustis rigidis olivaceo-nigrescentibus fragiliibus a basi crassiore inde subuliformibus, capitulo primum aquoso lacteo dein compacto gryseo facile deciduo. — *Stilbum rigidum* Pers. in Uster. Annal. I. 32. t. 2. f. 2., syn. 680. *Ditmar* in Sturm germ. t. 59. cœu var. β . *atra* Pers. myc. I. 349.

Ad trancos putres miuime rarum. (Habitu valde recedit et potius, capitulo elapso Sphaeriam qualemcumque rostratam adpellat, quod alioquin hyphae indole satis variat et saepius in ramos divellitur.)

2058. *St. citrinum* Pers., hyphis stipitiformibus elongatis mollibus glabris subfascicularibus pallido-citri-

nis, capitulo globoso. *Pers. syn. 681., icon. pict. IV. t. 22.*

Ad truncos patridos Hercyn. (*Persoon.*)

2059. ? St. pallens Spr., hyphis stipitiformibus cavis, curtis sub epidermide lateatibus fuscis, capitulo minuto globoso pallide cinereo. — *Spr. syst. IV. 546.*
Atractium pallens Nees. (*teste Spr.*)

Ad ramos alneos. (*Nees.*)

2060. St. mycophilum Pers., hyphis stipitiformibus rigidulis sparsis hyalinis albis, capitulo ex rotundo subturbinato concolore. *Pers. myc. I. 351.*

Ad Agaricos putres, auctummo. (*Persoon.*)

2061. St. equinum Pers., hyphis stipitiformibus -pellucidis capillaribus, capitulo subovato ex albido sublateritio demum turbido. *Pers. myc. I. 353.* ? *Ascophora Stilbum* Tod. mecl. 14. t. 3. f. 24.

Ad finum equium humidum (Tode.)

2062. St. micropus Pers., hyphis stipitiformibus gregariis brevibus crassiusculis albis, capitulo subturbinato. *Pers. myc. I. 354.. syn. 683.*

Ad truncos abietinos Hercyn. (*Persoon.*)

2063. St. rubicundum Tod., hyphis stipitiformibus attenuatis subpellucidis demum lutescentibus, capitulo ovato albo. — *St. rubicundum* Tod. mecl. I. t. 2. f. 18. *Pers. myc. I. 354.*

Ad caudices Fagorum nuper caesarum. (Tode.)

2064. St. luteum Alb. et Schw., hyphis stipitiformibus gregariis minimis pellucidis lutescentibus, capitulo ovali aureo. — *Stilbum luteum* Albert. et Schwinsk. 354. *Pers. syn. 684., myc. I. 354.*

Ad Agaricum putrem agri nisk., semel. (*Alb. et Schw.*)

2065. St. leiotopus Ehrenb., hyphis stipitiformibus crassis laevibus albis in capitulum subglobosum depresso roseum sensim tenuatis, figuram clavatam me-

tientibus. — *Stilbum leiopus* Ehrenb. sylv. 24. Pers. myc. I. 355.

In stercore murino truncisque putridis agri berolin. (Ehrenberg.)

2066. *St. smaragdinum* Alb. et Schw., hyphis stipitiformibus gregariis subcaespitosis viridibus rigidis persistentibus deorsum nigriscentibus, capitulo obovato pellucido smaragdino demum deciduo. — *Stilbum smaragdinum* Alb. et Schw. nisk. Flä. t. 1. f. 3.

Ad ligna abietina putrida auctemno passim.

† capitulo oblongo s. cylindrico, hyphae setiformi decolori inniro. (Periconia Tod.)

2067. *St. flavo-virens* Spr., hyphis stipitiformibus rigidis persistentibus a basi saturatiore inde virentibus, capitulo oblongo viridissimo. — *Stilbum flavo-virens* Link spec. I. 111. Nees syst. f. 87. Periconia flavo-virens Alb. et Schw. nisk. 357. t. 4. f. 7.

Ad folia dejecta putrescentia rarius.

2068. *St. nanum* Spr., hyphis stipitiformibus nigris, cinereo-pruinosis, capitulo cylindrico argenteo. — Spr. syst. IV. 547. Periconia nana Ehrenb. sylv. 13. Link spec. I. 110.

Ad strobilos Pini Strobi. (Ehrenberg.)

2069. *St. setosum* W., hyphis stipitiformibus setosis erectis nigris rigidis dein fasciculatis tortuosis, capitulo cylindrico elongato tenui, sporidiis nigris congregatis obasso.

Ad Georginae caules putres. (Wallr.)

2070. *St. subulatum* Spr., hyphia stipitiformibus subulatis nigris, capitulo elongato cylindrico cinereo. — Spr. syst. IV. 547. Periconia subulata Nees in act. nov. Leop. IX. t. 5. f. 8. Link spec. I. 109. P. Stemonitis Pers. syn. 687. t. 3. f. 15. P. Avellanae Rebent. neom. 358. *Isaria Stemonitis* Spr. I. I. 345.

Ad glandes quercinas truncosque putres passim.

2071. *St. typhinum* W., hyphis stipitiformibus setosis rigidulis distinctis simplicissimis erectis sparsis sensim tenuatis nigro-fuscis, capitulo elongato cylindrico cinerascente, ex sporidiis ovatis pellucidis dense conglobato.

Ad dolia acetaria vacua Thuring. (Waller.) (Cum Stemnitide analoga.)

N.B. Quamplurimas quidem Stilbi species tum descriptas tum novas legi, paucas tamen integras potui conservare et ad examen denuo instituendum adhibere.

261. CEPHALOTRICHUM Lk., Haarschopf.

Hyphae stipitiformes stipatae continue, apice in floccos contortos sporidiis interspersis foetos solutae.

2072. *C. leucocephalum* W., hyphis stipitiformibus gracillimis brevibus in fasciculos penicilliformes junctis, primum candidis, dein aeneis, demum nigris nitidis stipatis e basi congesta diffusis, apice in floccos brevissimos hyalinos candidos, sporidiis concoloribus in capitulum minutissimum album dein gryseum congestis testos persistentes finientibus.

Ad Campanulam Medium putrescentem, in Stilbi brevipedis consortio. (Pro varia aetate habitum et colore varium obtinet et nonnisi hyphis apice penicillatum fissis sterilibus occurrit.)

2073. *C. rigescens* Lk., hyphis stipitiformibus parce fibrilosis fuscis apice in floccos contortos, sporidiis globosis hyalinos foetos solutis. — *Cephalotrichum rigescens* Link spec. II. 111. Nees syst. f. 87. *Coremium rigescens* Spr. syst. IV. 544.

Ad trunco caeso agri rostoch. (Link.)

2074. ? *C. monilioides* Lk., hyphis stipitiformibus brevissimis albis s. e luteo rufescens, capitulo concolor. — *Cephalotrichum monilioides* Link spec. II. 112. *Isaria monilioides* Alb. et Schw. nisk. 362. t. 12. f. 8. (rudis.)

Ad ligna putrida Lusatiae. (Albertini et Schweinitz.)

262. DIDYMOCRATER MART. Krugschimmel.

Hyphae erectae subsimplices molles s. fluxae septatae laxe caespitosae. Capitulum sporophorum geminatum cylindraceum, vertice in os orbiculatum reclusum.

2075. *D. elegans* Mart., hyphis erectis subsimplicibus septatis subfibrillosis curtis laxe gregariis, capitulis terminalibus geminatis cylindricis tenuissime membranaceis fragilibus, sporidiis numerosissimis globosis microscopicis foetis viridi-cinerascentibus. — *Didymocrater elegans* Mart. erl. 393. Link spec. I. 99.

Ad culmos graminum male exsiccatorum herbariorum. (Martius.)

263. EUROTIUM LK. Nusschimmel.

Hyphae decumbentes parce ramosae septatae in stratum parcum implexae oculis decolorantes. Capitula sporophora tenuiter membranacea nuciformia, sporidiis simplicibus globosis hyalinis farcta, dein irregulariter fatiscentia.

(*Mucoris*, *Moniliae* spec. auct.) — Genus cum Alphitomorpha analogon Myxomycetumque, Martio teste, prototypus s. potius symbolum.

2076. *E. Coriorum* W., hyphis parce intertextis brevibus tortuosis dein cionamomeis, capitulis sporophoris mollibus sphaericis minutissimis nudis, primum sparsis laete citriuis dein luteis conglomeratis, hyphae non nisi obvolventibus.

Ad calceamentorum coria huncinctis reposita passim (Capitulorum moles Alphitomorphae clandestinae pyrenium vix aequat.)

2077. *E. fructigenum* Mart., hyphis tenuissimis testaceo-fuscescentibus, capitulis sporophoris minimis ellipticis luteis. — Mart. erl. 369. Link spec. I. 80.

Ad fructus patridos Fuchsiae hort. erlang. (Martius.)

2078. *E. epizylon* Kz., hyphis congestis dense contextis pulvinato-macularibus, primum flaventibus dein

fusco-rufescens, capitulis sporophoribus citrinis parvis couvertis, hyphasma demum oblitterantibus. — *Eurotium epixylon* Kunze et Schmidt D. Schw. n. 83.

Ad ligna caesa in locis suffocatis reposta frequens.

2079. *E. herbariorum* Lk., hyphis effusis parcis dense intertextis flavis dein ferrugineis, capitulis sporophoris citrinis sparsis majusculis sphaericis duris dein depressis facile fragilibus. — *Eurotium herbariorum* Link obs. I. 44., spec. I. 79. Nees syst. f. 97. Mart. erl. 369. *Monilia nidulans* Roth germ. I. 559. *Mucor herbariorum* Wigg. hols. 111. Pers. syn. 202. *M. globosus* Hall. hist. n. 1257.

Ad plantas male siccatas herbariorum locis uidis repostorum frequens, ad ligna putrida rariss.

264. PILOPHORA WALLR. Huthschimmel.

Hyphae fertiles erectae obsolete septatae simplices, primum fluxiles dein persistentes rigidulae. Capitulum sporophorum tenerrimum, primum sphaericum inflatum, dein vertice umbonato sporidia globosa transmittens basique circumscissa patula hians s. campanulatum.

(*Mucoris* et *Ascophorae* spec. Tode et auct.) — (Ascophoram cum Todeo nolui naucupare, ascos enim non profert nec alienas species excludit, quae distinctissima et cum *Hymenomycetis* pilicatis analoga est.

2080. *P. rorida* JV., hyphis simplicibus continuis crassiusculis praelongis pallide fuscis in hyphasma non-nisi amplissimum laxe contextis, fertilibus erectis porrectis, capitulo sporophoro primum hemisphaerico fluxo, dein vertice umbonato sporidiis globosis ovatisque aeneo-viridibus transfusis tecto basique circumscissa. campanulato persistente hyalino. — *Mucor ascophorus* Link spec. I. 85. *M. Mucedo* Pers. syn. 201. pr. pr. *M. roridus* Willd. in Uster. Magaz. IV. 1. *M. sphaerocephalus* Bull. herb. t. 480. f. 2. *Ascophora Mucedo* Tod. med. I. 13. t. 3. f. 22. Alb. et Schw. nisk. 356. Nees syst. f. 89. Mart. erl. 362. Grev. cr. t. 369.

Ad corpora patrescentia passim, nonnisi valde extensa, hyphis numerosissimis composita, fructusque inanes (*Cucurbitas v. c.*) omnino infareiens.

2081. *P. agaricina* W., hyphia simplicibus continuis tenerimis crystallinis albis, sterilibus laxe implexis crispulis, fertilibus erectiusculis brevioribus, praeter apices crassiusculos conformibus, capitulo sporophoro primum hemisphaerico albo dein in basin attracto obconico plicato-lamelloso, sporidia globosa in discum tersum digesta aeneo-virentia concipiente demumque spargente.

Ad panem ex oleo coctum mucidum (Wallr.)

Ordo IV.

MYXOMYCETES W. Schleimpilze.

Vegetabilia mycetoidea simplicia, praeter basin conformem, nonnisi circumfusam sterilem suffulcentem, myceliorum loco substratum, (*Hypothallus Fr.*) stromate destituta, ex massa primitus fluxa, veluti mucilaginosa s. pulposa eaque rudi indigestaque, tempore aestivo idoneo et morphoseos ratae, lactescens, mucilaginosae et mesenteriae informatione faventibus, perisporangia ex substantia propria composita ordinique propria s. peridia ex indumentis simplicibus omnino s. compositis, laxe fibrosoque cellulosis sensim magis in membranam scariosam s. in carnem constipatam coenuntibus itidemque caducis s. persistentibus, varios colores et figuras informantibus, conceptacula ventricosa s. vasculosa mentientibus conflata, primum puluae glebosae furcimine impalpabili decolore et cum membranulis externis conformi (*aetas fluxa*), ocius jam in sporidia innumera globosa plerumque microscopica, raro in basin caudatam producta, floccis plerumque stuposis sive concinnes simpliciterque tortis, sive in parastudem propexum implicitis laxe excepta, exarescendo immutato foeta (*aetas arida*), clausa concinnantia, demum varie dehiscentia et sporidia

contenta fuliginosa pulveris s. fumaginis instar aufuga profundentia, et praeter basin sessilem s. stipitatum, phialae instar residuam oculis jam vel saltem eodem anno pereuntia.

(*Lycoperdaceae Brong. Dub. Gasteromycetes Mart. G. trichosperni trichogasteres et myxogasteres Fr. Gasteromyces aerogastri, trichocysti et geogastri Nees. Gasteromycetum series 1. et 2. (excl. tamen Culycio, Onygena, Mucore et al. ejusm.) Link obs. 1. G. mycetoides Lk. obs. II. Angiocarpi dermatocarpi Pers. syn. Lycoperdon L. sp. pr. pr.) — Duplicem exsequuntur haec vegetabilia satis singularia aetatem, fluxam et aridam s. fuliginosam et ad illam cautius profecto dignoscantur, quibus scilicet hinc et ob Gasteromycetum titulum anticipitem et ab auctoribus varie traditum, novum dedi. Praeter landatas, alias, quarum morphosin compertam non habui, aut novas aut ex loco insereendas, interim consulto emisi.*

A. Placogasteres s. placentares, peridiis ex massa mucilaginea informi sensim coeunte occissime succrescentibus, ob basin cubilibus instratam veluti dimidiatis hemisphaericisve, sporidiorum catervam inditam undam s. cellulis interstinctam superinduentibus, amorphis s. indeterminatis, e basi deplanata gibbosis.

(*Myxogasteres aethalini Fr. Lycoperdaceae fuliginosus Dub. Gastromycetes sporomesti diffuentes Nees. Mart. Mucores Schaeff.*)

265. DICHOSPORIUM NEES. *Doppelstaubling.*

Peridium hemisphaericum tenuiter membranaceum floccoso-pulverulentum. Sporidia globosa majuscula conglobata, floccis destituta.

2082. *D. aggregatum Nees*, peridiis convexis fuscis tegmine floccoso-pulverulento obductis, demum confluentibus inconditis, sporidiis nigris. — *Dichosporium aggregatum Nees* syst. 105. f. 99. Spr. syst. IV.

525. Fr. syst. III. 209. *Spumaria physaroides* Pers. syn.
 163. ? *Reticularia epixylon* Bull. fung. t. 472. f. 1.
 ? *Aegerita epixylon* DC. gall. II. 72.

Ad corticem Quercus vetustum, auctumno. (Nees.)
 (Vegetabile, tum generis natura et notione, tum loco in
 systemate, dubium, denuo indagandum comprobandum-
 que, num huc s. potius ad Sporomycetes epispores referatur.)

266. AMPHISPORIUM LK. Brandstäubling.

Peridium persistens. Sporidia dimorpha, alia globu-
 losa, alia fusiformia, nuda.

2083. *A. versicolor* Lk., peridio convexo pallido
 submucoso, sporidiis concoloribus biformibus farcto. —
Amphisporium versicolor Link obs. II. 40. t. 1. f. 6.
 Nees syst. 106. f. 100.

Ad Hyacinthi bulbos, sub aqua, hyemis tempore de-
 mersos. (Link.) (Peridii colore mutabili, primum albo,
 deinde lutescente, denique pallido-cinerascente et aetate
 fluxa huc omnino spectare videtur, quod quidem mihi
 cum praecedente dubium.)

267. SPUMARIA PERS. Schaumstäubling.

Peridium ineffiguratum simplex adnatum crustaceum
 flocculoso-cellulare fragilissimum, in alia peridiola plicata
 s. libera adscendentia bursaeformia proliferum. Sporidia
 majuscula globosa, centro satura, libera congregata, floc-
 quis destituta.

(*Spumaria* Pers. et auct. *Reticulariae* spec. Bull.
Mucilaginis et *Fuliginis* sp. Hall.

2084. *Sp. alba* DC., primordiis fluxis effasis quis-
 q; pilias qualescumque siccas vegetasque undique ambeau-
 tibus, oculis jam peridiorum depressorum s. adscendenti-
 um conoubium informantibus, sporidiis majusculis nigro-
 fuscis. — *Spumaria alba* DC. gall. II. 261. Dub. gall.
 II. 863. Fr. syst. III. 95. *Reticularia alba* Bull. fung.
 t. 326. *Mucilago alba* Nat. fung. t. 40.

a. crustacea, primordiis fluxis effusis adnatis demum in laminam crustaceam laceram sporidia oblitterantem contahescentibus. — *Spumaria alba a. laminosa* Fr. t. I. Sp. *Mucilago Nees* syst. f. 94. *Grev. cr. t. 267. Fuligo Hall. hist. n. 2134.*

b. bursaeformis, primordiis fluxis effusis in perioliola libera disformia stipitata cylindrica obtusa grysea tortuosa s. cornuto-ramosa abenutibus, peridia distincta fasciculata mentientibus. — *Spumaria alba b. cornuta* Fr. t. I. ?*Didymium spumarioides* Fr. syst. III. 121. *Spumaria Mucilago* Pers. disp. t. I. f. I., syn. 163. *Wahlenb. succ. II.* Sp. *cornuta* Schum. saell. II. 195. — *Flor. dan. t. 1978. f. 1.*

Terram graminosam, stipites, culmos ramosque vegetos suis locis longe lateque obducit, aestate serena et alibi tempestate minus idonea, eadem cubilia vestitu hypoideo obtegere semetque praenotare videtur. (Polymorpha, fere daedalea, me auctore, discrimina suis numeris absoluta et ad *Didymium spumarioides* distinguendum rata, fere retinet.)

268. ENTERIDIUM EHRENB. Zellenstäubling.

Peridium membranaceum plicatum. Sporidia in glebulas congesta, fibris in membranulas confluentibus interstincta floccisque destituta.

2085. *E. olivaceum Ehrenb.*, peridio pulvinato hemisphaericō basin hyalinam dein nitidissimam obsidente, sporidiis globosis olivaceis, fibris dilutioribus exceptis foeto iisque translucentibus dilute-fuscescente. — *Enteridium olivaceum Ehrenb.* in *Link Jahrb. II. 54. t. I. f. 5. Schltl. berol. II. 158.*

Ad corticis alnei faciem internam putrescentem agri berol., hyeme. (*Ehrenberg.*) (Cl. *Friesius* (syst. III. 90.) hanc pl. pro *Reticulariae olivaceae* sua statu imperfectiore et minus feliciter informato habet, quam tamen, etiam si non rite perspectam, citra *Ehrenbergii lyncei* auctoritatem negligere nolui.)

269. RETICULARIA BULL. Netzstäubling.

Peridium indeterminatum simplex nudum placentare irregulariter dehiscens, compagis variae, nunc tenerrimum, nunc testaceum, intus floccos parcos ramosos compressos exserens. Sporidia globosa fuliginosa.

(*Fuligo et Lycogala Pers. pr. pr. Strongylium, Lignidium, Dermodium, Diphtherium auct. nuper. infra l. Reticularia Bull. excl. tamen aliis spec. et ex emendat. Friesii. Arongylium Steud. Trichodendron Alb. et Schw.*)

† *hyalodermatinae*, peridio tenero satis ac friabili.

2086. *R. maxima Fr.*, peridio tenuissimo tuberoso ex albo purpureo-nigricante basin sterilem effusam obidente, floccis basi adnatis fasciculatis, sporidiis atropurpurascens. — *Reticularia maxima Fr. syst. orb. veg. I. 147., syst. fung. III. 85. Dermodium inquinans Link obs. I. 25. (neglectis forsan floccis in fundo delitescentibus.)*

Ad trunco arborum caesarum, Fagorum potissimum radices muscosas, quas latitudine spithamea nonnisi amplectitur. (Color lacteus oculis jam in fusco-rubentem et fusco-purpurascem s. utro-purpurascem invertitur, a basi substrata effusa argentea pertenui alienus. Moles ut plurimum insignis. Figura varia placentaris. Sporidia innumera demum floccos tenellos ramosissimos e fundo emergentes nec verticem attingentes, relinquentia.)

2087. *R. atra Fr.*, peridio tenerrimo fragillimo tenuissime reticulato, floccis e basi assurgentibus divaricato-fruticulosus sporidiisque nubilibus atris. — *Reticularia atra Fr. syst. III. 86. Lycoperdon fuliginosum Sorw. fung. t. 257. Lycogala atrum Alb. et Schr. nisk. 83. t. 3. f. 3.*

Ad ligna et cortices arborum coniferarum, ex quibus nonnisi ad terram transmigrat, Hercyn., Lusatiae et alibi passim. Aestatis tempestate serena pluvia. (Fluxa primum, horizontaliter adpressa s. pendula, polymorpha, albicans, dein sordide flavescentia, deinde sanguineo-fuscens, et tandem, tegmine tenuiter reticulato s. tu-

berculoſo fragilissimo fatiscente nigrescens, pulverem inquinantem spargens et floccos atros, e basi latescente tenuatos, verticem attinentes nudos relinquens.)

2088. *R. umbrina* Fr., peridio pulvinato tenerissimo laevigato ex argenteo umbrino, floccis cum basi adnatis erectis ramosis sporidiisque umbrinis. — *Reticularia umbrina* Fr. syst. III. 87. *R. fuliginoides* Fr. syst. orb. I. 147. Dub. gall. II. 862. *Strongylium fuliginoides* Ditm. in Sturm germ. III. t. 38. excl. syn. Alb. et Schw. *Fuligo laevis* Sommerf. F. *Lycoperdon* Schumach. *Trichoderma fuliginoides* Pers. syn. 231. *Lycogala argentea*, *turbinata* et *punctata* Pers. syn. 157. DC. gall. II. 261. Grev. cr. t. 106. *Reticularia Lycoperdon* Bull. fung. 95. t. 446. f. 4. Sowerb. fung. t. 272. *Lycoperdon fuscum* Huds. *Mucor Lycogalus* Bolt. fung. t. 133. f. 2. — Schaeff. ratisb. t. 192. Mich. gen. t. 95.

Ad truncoſ vetusſ ſiccоſ Abietum v. c. Alnorom, Quercuum et Betulae, aestate calida, haud quidem rara. (Species communis at versipellis, primum colore argenteo et nitore sericeo insignis, dein e gryseo in umbrinum s. fuſco-rutilum vergens. Flocci e fundo ad verticem tendunt, membranaceo-fibroſi albi, peridium integrum infarcientes diaque persistentes.)

2089. *R. plumbea* Schum., peridio tenuiſſimо laevi cinereo-plumbeo ſuper basin sterilem effusam expanſo, floccis fundo adnatis sporidiisque dilute-umbriois. — *Reticularia plumbea* Schum. saell. II. 193. Fr. syst. III. 88. — Fl. dan. t. 1976. f. 1.

Ad truncoſ Fagi nuper caeos, Hercyn. inferior. (Wallr.) Peridia extus laevia, sporidiis umbrinis foeta, basin effusam hyalinam tenerimam spargentia eaque indole a praeced. dignoscenda.)

2090. *R. versicolor* Fr., peridio depresso tenui laevi e minio fuligineo dein effuso confluente, floccis adnatis submembranaceis reticulatis, sporidiis fuliginosis. — *Reticularia versicolor* Fr. syst. III. 90.

Ad ligna pinæ vetusta Hercyn. aliquoties vidi rudimenta, aetatis fluxæ tempore, colore minato saltem insignia cauteque à Lycogalacte epidendro dignoscenda.

2091. *R. muscorum* Fr., peridiis tenuissimis membranaceis venulosis fragilissimis ex ochraceo exalbescibus, basin tenuem pallentem diaphanam obstipantibus, floccis submembranaceis flavis, sporidiis fusco-nigrantibus. — *Reticularia muscorum* Fr. syst. III. 91. *Lignidium gryseo-flavum* Link obs. I. 24. f. 37. Nees syst. f. 93. *Fuligo muscorum* Alb. et Schw. nisk. 86. t. 7. f. 1.

Ad quisquilias humi pinetorum projectas et ad brycta sphagnosa uda Hercyn., passim.

2092. *R. olivacea* Fr., peridio membranaceo subplicato hyalino, floccis adnatis dendroideis reticulatis, sporidiis viridi-olivaceis. — *Reticularia olivacea* Fr. syst. III. 89.

Ad ligna abietina vallium udarum Hercyn. superior. (Wallr.) (Basi substrata egere solent peridia tenera quidem at persistentia et ex sporidiorum colore olivaceo in hoc ordine satis raro, ex hyalino similiter translucentia.)

†[†] *ostracodermatinae*, peridiis cortice testaceo obductis floccosque à pariete inde emittentibus. (*Diphtherium* Ehrenb.)

2093. *R. flavo-fusca* Fr., peridio stipato-membranaceo firmo laevi hemisphaerico-pulvinato, primum albo, dein umbrino-flavescente basin sordide-flaventem obidente, floccis reticulatis clavato-appendiculatis laterilibus sporidiisque dilute gryseo-fuscis — *Reticularia flavo-fusca* Fr. syst. III. 88. *Diphtherium flavo-fuscum* Ehrenb. sylv. 27. f. 3. (cum var. α . *flavo-fusca* et var. β . *cinerca*) Schltl. ber. II. 158.

Ad canticos arborum, Hippocastani agri berol. v. v. (Khrenberg), Fraxini Thuring. (Wallr.) (Nolui cum *Friesio* novum genus ex peridii compago magis firmiterque stipata vel ex floccorum indole reticulato-torulosa distinguere, quam quaecunque hujus generis species totidem deflexus subministrare videatur.)

2094. *R. testacea* W., peridio hemisphaericō amplio, primē (pulposo) albido deinde testaceo cartilagineo crasso pallide-umbrino, floccis lateralibus ramoso-tortuosis rigidulis dilute-carneis, sporidiis exiguis terreo-fuscis.

Intra Salices cavas Thuring. prope Heringau aliquoties legi.

270. AETHALIUM LK. Breystäubling.

Peridium ineffiguratum insigne, extus strato floccoso-celluloso mox evanescere corticatum, intus cellulosum, cellulis superioribus saepe sterilescentibus, massam granulosam mentientibus, interaneis hyalinis lamellas transversas breves, sporidiis compactis, foetas constituentibus, demum fragilissimum.

(*Aethalium* Lk. Nees et auct. *Reticulariae* sp. *Bull. Lycoperdi*, *Mucoris* sp. auct. *Fuligo* Hall. Pers. *Mucilago* Mich. pr. pr.)

2095. *Aeth. septicum* Fr., primordiis fluxis effusis inconditis unctuosus ex albo flaventibus, oculis peridium fragile floccosum pallide-cinnamomeum informantibus, cellulis superioribus desciscentibus plerumque sterilecentibus s. effoetis, interaneis hyalinis gryscis laxis lamellosis, sporidiorum subglobosorum inaequalium (majusculorum duplove minorum) sarcinime compacto violaceo-umbrino farctis. — *Aethalium septicum* Fr. syst. III. 93. *Aeth. flavum* Grev. cr. t. 272. *Fuligo varians* Sommierf. *Reticularia hortensis*, *lutea*, *carnosa*, *cerea* Sowerb. fung. t. 339. *R. septica* Wither. *Lycoperdon luteum* Batsch. *Mucor ovatus* Schaeff. bavar. t. 192. et 194. *M. Mucilago* Scop. *M. septicus* L. spec. 1656.

a. *cinnamomeum*, epigaeum, massa unctuosa in peridia amplissima intas cellulis effoetis cinnamomeis foetisque hyalinis gryscis farcta oculis inversa. — *Aethalium septicum* b. *cinnamomeum* Fr. t. 1. *Fuligo vaporaria* Pers. syn. 161. *F. hortensis* Dub. gall. II. 863. *Reticularia hortensis* Chevall. Bull. fung. t. 424. f. 2. DC. gall. II. 260.

β . *violaceum*, massa unctuosa basin violaceam spar gente. — *Fuligo violacea* Pers. syn. 160.

Ad cortices vaporarios hortorum aliaque rejectamenta putrescentia, aestate uida et tepida, (Sole tacta facile coit massa unctuosa pallens et corpuscula mesenterico-plicata s. turundas tortuosas firmas, plane alienas ac informes jactat.)

2096. *Aeth. flavum* Nees, primordiis flexis pulvinatis ocius peridium braoeum, basi hyalina suffultum informantibus, cellulis superioribus desciscentibus effiectis laete citrinis s. sulfureis gru nosis, interaneis alboflaventibus parcis, sporidiis aequalibus duplo minoribus umbrino-fuscia farctis. — *Aethalium septicum* a. *flavum* Fr. syst. III. 93. *Aeth. flavum* Nees syst. f. 92. *Fuligo pallida* Pers. obs. II. 36. *F. flava* Pers. syn. 161. cum var. β . *pallida* *F. laevis* Pers. l. l. (peridio magis deplanato.) *F. candida* Pers. l. l. (forma expallens.) *F. flavescens* Schum. saell. II. 194. *Mucor ovatus* Schaeff. bavar. t. 192. pr. pr. *Reticularia lutea* Bull. fung. t. 380.

Ad arborum cortices, Popolorum, Tiliaram et Fungorum praecipuis, in agro thuriag. et Hercyn. inferior. minime rara. (Quamvis auctores nuperi hoc meram prioris varietatem censeant, differre tamen videtur, primordiis limpidioribus basin opumeam exsiccando arachnoideam hyalinam circumfudentibus, peridio exteriore tenuiore et nudiore, cellulis exterioribus sterilescentibus belle citrinis s. sulfureis, sporidiis aequalibus inter se et duplo, quam in praecedente, minoribus ipsoque denique loco natuli, in truncis et cortice semicorropto.)

2097. *Aeth. rufum* W., primordiis flexis couicis ocius peridium hemisphaericum fragile membranaceum rufum, tegmine floccoso albo demum reticulato obductum informantibus, sporidiis fusco-nigris exiguis compactis conformibus, cellulas concolores oblitterantibus. — *Aethalium septicum* c. *rufum* Fr. l. l. *Fuligo rufa* Pers. syn. 159.

Ad cortices arborum, nec non inter muscos et folia patredine concreta, paucim. (Nec hoc cum Aethalio

septico conjugere mallem, quod peridio distincto hemisphaerico, nucem avellanam s. juglandinam aequante, corice stipato duriore rufa s. castaneo et sporidiorum minorum sarcimine compacto, cellulas obliterante differt.)

B. Angiogasteres s. vasculares, xylophili plerumque, putredinis ineuntis s. jamjam penitus subeantis comites, ex primordiis fluxis mucilaginem unctuosam inconditam s. undique effusam, nonnisi figuratam mentientibus (status primordialis s. primitivus auct., Messenterica Tod. pr. pr., mihi aetatem fluxam spondens), sub teporis commodi cubiliumque ydorum efficacia, entomophoseos instar, in peridia figurata vascularia, ex integumentis coloro, consistentia et duratione variis, simplicibus s. duplicibus, demum sporidiorum sarcimine ex pulpa inpalpabili coacta, simili modo subeunte floccorumque apparatu vario inhaerente foeta, stipitata s. sessilia succrescentes, vel rarius tantum et morphoseos legibus consentientibus a figura rata desciscentes velutique morphosin placentarem s. deflexum dimidiato-adnatum mentientes et subsidentes.

(*Myxogasteres physarei, stemonitei et trichiacei Fr. syst. Lycoperdaceae trichiaceae Dub. Gasteromycetes dermato- et trichogasteres Sp. syst. Trichocisti Mart.*)

271. LICEA LK. Nacktstäubling.

Peridium varium (subcylindricum assurgens s. dimidiatum depresso) tenue membranaceum laeve irregulatiter dehiscens s. circumscissum. Sporidia laxe congesta libera nullisque planè s. parcis floccis excepta.

(*Licca Schrad. emend. Tubulinæ, Liceæ et Dermodiæ spec. auct. Perichaena Fr. Phelonitis Chevall.*)

† *hemisphaericæ*, peridio subhemisphaerico sessili, demum saepius obsolete circumcisso, intus parce floceoso. (*Perichaena Fr.*, quæ vix nisi dehiscendi modo, in aliis quoque generibus ludicro et floccorum aberratione fallaci differre videtur.)

2098. *L. minima* Fr., peridiis hemisphaericis apice dehiscentibus atris punctiformibus gregariis, sporidiis rubiginosis. — *Licea minima* Fr. syst. III. 199.

Ad ligna putrida asseram pineorum passim. (Sphaeriam minorem mutantem solet.)

2099. *L. suberea* Fr., peridiis punctiformibus sparsis atris superne depresso-margine prominentem dehiciente circumscissis, sporidiis sulfureis. — *Licea suberea* Fr. syst. III. 198. *Phelonitis suberea* Chevaill. par. t. 9. f. 21.

Ad suber fabricatum locis humidis passim reddit in agro northus. (Cylichno meo similis, morphosi fluxu tamen diversa satisque singulatis margine, Patellariae instar prominente, circumscisso.)

2100. *L. strobilina* Alb. et Schw., peridiis hemisphaericis s. oblongo-subrotundis aggregatis rufo-fuscis demum circumscisis, sporidiis sordide-flavanticibus ex-pallentibus majusculis liberis farctis. — *Perichaena strobilina* Fr. syst. III. 190. *Grev. cr. t. 275.* *Licea strobilina* Alb. et Schw. nissk. 109. t. 6. f. 5. *DC. gall. VI.* 100. *Dub. gall. II.* 861. *Ditmar in Sturm germ.* III. t. 20. *Nees syst. f. 101.*

Ad faciem interiorem squamarum Pini Abietis et Pinaceae, Lusatiae v. c. (*Albertini et Schwentzitz*), Hercyn. (*Wallr.*) et alibi passim, strobilos nidulando divaricatos mire mutans.

2101. *L. abietina* W., peridiis obovato-globosis badio-nigris subcircumscisis, floccis sporidiisque flavis. — *Perichaena abietina* Fr. symb. II., syst. III. 191. *Licea circumscissa* β. *abietina* Alb. et Schw. l. l. *Trichia fusco-atra* Sibth.

Ad cortices Abietum putrum, auctummo passim in similibus cum priore locis. (Praecedente major, saturatior, minus adpressa, laevis omnino et fusco-nigricans)

2102. *L. circumscissa* Pers., peridiis aggregatis globoso-depressis luteo-fuscis nitidis demum regulariter circumscisis, floccis sporidiisque luteis. — *Licea circum-*

scissa Pers. syn. 196. *Dub. gall.* II. 861.; var. *a. populina* Alb. et Schw. nisk. 108. *Perichaena populina* Fr. syst. III. 191. *Grev. cr.* t. 252. *Trichia circumscissa* Schrad. *T. gymnosperma* Pers. obs. I. 63. t. 6. f. I. 2. *Sphaerocarpus sessilis* Bull. t. 417. f. 5. Sowerb. t. 258. nec Ehrh. et Mich. *Lycoperdon corticale* Batsch. elench. I. 155.

Ad corticem emortuam Populorum, Thuring. v. c. *vulgaris*. Auctummo.

2103. *L. quercina* W., peridiis globosis luteis sublaceris, floccis sporidiisque flavis. — *Perichaena quercina* Fr. syst. III. 102. ? *Physarum luteo-album* Schum. saec. II. 199.

Ad trunco quercinos (Hercyn. infer.) passim.

2104. *L. sulfurea* W., peridiis sphaericis exiguis sparsis nitidulis nigro-fuscis teneris fragilissimis, demum lacero-dehiscentibus, sporidiis ovatis exiguis pellucidis floccisque partis pallide-sulfureis.

Ad caules Georginae putres in sterquilinia hortorum projectos, pr. Northusam passim. (Waller.) (A reliquis differt peridiis sparsis nigro-fuscis et a *L. strobilina*, sporidiis duplo minoribus pellucidis, quae in illa opaca, sphaerica maxima sunt.)

2105. *L. pannorum* W., peridiis hemisphaericis sparsis convexiusculis opacis rugulosis fusco-castaneis fragilibus, deinde irregulariter a vertice inde dehiscentibus, sporidiis globosis majusculis pellucidis pallide sulfureis s. dilute citrinis libere-conglobatis.

Ad pannorum fragmenta in locis uidis inter vegetabilia putrescentia recondita, circa Northusam. (Waller.) (Vitis omnino ac oculis retracta, vitis nisi sporidiorum colore citrino semet prodere solet.)

2106. *L. alutacea* W., peridiis ovato-subrotundis sparsis e basi aduata deplanata convexis nitidis tenerimis subtilissime-alutaceis fusco-olivaceis lacero-dehiscentibus, sporidiis liberis cinereo-olivaceis. — *Aethalium minimum* Wallr. in lit.

Ad asperes abietinos semiputres in consortio Dacryomycis et Patellariae sabuletorum xylophilac, Thuring. passim. (Oculis retracta at distincta, peridio subtilissime alutaceo et sporidiorum colore.)

2107. *L. rugulosa* W., peridiis adnato-hemisphaericis lenticularibus umbonatis sparsis tenerimis opacis ruguloso-colliculosis dilute brunneis irregulariter dehiscentibus, sporidiis conglobatis umbrinis floccis brevibus tortuosis tenerimis intermixtis.

Ad corticem Tiliarum in locis uidis humi jacentem agri northusan, hyeme, semel. (Peridia rare integra omnino deprehenduntur et veluti ex areolis subrotundis vertice umbonatis, ambitu depresso-vallecaloais composita, faciem colliculoso-rugulosam praestant.)

2108. *L. congesta* W., peridiis subglobosis aggregatis subangulatis olivaceo-slaventibus irregulariter lacerris, sporidiis carneis. — *Perichaena congesta* Fr. syst. III. 192. *Physarum congestum* Sommerf. lapp. 241. *Lycoperdon pineum* Batsch elench. 155.

Ad ligna pinea putria Hercyn. passim.

2109. *L. incarnata* A. et Schw., peridiis variis ovalibus nonnisi productionibus subconfluentibus nitentibus carneo-chalybeis, sporidiis ex albo-incarnatis. — *Perichaena incarnata* Fr. syst. III. 193. *Licea incarnata* Alb. et Schw. nisk. 109. t. 10. f. 6.

Ad lignum abietinum putre, Lusatiae v. c. (Albertini et Schw.), Hercyn., passim. Auctumno.

† *serpentes*, peridiis basi depressis serpendo elongatis, figuram linearem mentientibus. (*Licea serpulariae* Fr.)

2110. *L. contorta* W., peridiis elongatis flexuosis hemicylindricis sparsis dilutius saturatiusve umbrinis tenerimis lacero-dehiscentibus, sporidiis aureo-lateis. — *Perichaena contorta* Fr. syst. III. 192. *Lycogala contortum* Ditmar in Sturm germ. III. t. 5. Grev. cr. t. 206.

Ad ligna putrida pinea, nec non intra rimas Pyri Mali domesticae abstrusa, passim. (A Liceae circumscissae lusibus serpeatis caute dignoscenda.)

2111. *L. serpula* Fr., peridiis sparsis depresso-hemicylindricis, e figura subrotunda elongatave variis spadiceo-nigricantibus, sporidiis olivaceo-fuscis. — *Licea serpula* Fr. syst. 197. *L. serpula v. spadicea* Fr. symb. 12.

Ad asseres truncosque semiputres passim. (A Licea alutacea peridio saturatiore laevi nisique semet producendi diversa.)

2112. *L. flexuosa* Pers., peridiis sparsis subflexuosis hemicylindricis linearibus, nonnisi hinc crevatis nitidis spadiceis, sporidiis concoloribus. — *Licea flexuosa* Pers. syn. 197. Fr. syst. III. 197.

Ad truncos pineos Hercyn. rarissima, (Persoon), quamvis vix nisi nitore a praecedente diversa esse videatur.

2113. *L. variabilis* Schrad., peridiis sparsis depresso-hemicylindricis linearibus, nonnisi hinc crevatis nitidis spadiceis, sporidiis sordide-flavanticibus. — *Licea variabilis* Schrad. gener. I. 18. t. 6. f. 5. Pers. syn. et Fries t. L.

Ad truncos Abietum cortice orbatarum Hercyn. passim. (Schraderus peridium duplex laudat, quod mihi latet.)

+++ *cylindrica*, peridiis elongato-cylindricis asurgentibus stipato-connatis basi substratae innixis, confertissimis, stroma veluti tubuliferum s. multicapsulare mentientibus. (*Liceae tubulinæ* Fr. *L. tubulosæ* Dub. *Tubulina* Pers. disp. *Tubulifera* Müll. et alior. *Dermidii*, *Stemonitidis* et *Reticulariae* sp. auct.)

2114. *L. cylindrica* Fr., primordiis flaxis distinctis albis dein incarnato-rubentibus denique umbrinis, in peridia linearia tenuia recta subconico-cylindrica basi substratae albidae coactae fibrosae innixa succrescentibus, sporidiis terreo-ferrugineis. — *Licea cylindrica* Fr. syst. III. 195. Dub. gall. II. 862. *L. Tubulina* Schrad. *Dermidium fallax* Nees syst. f. 103. *Tubulina fallax* et

fragiformis Pers. syst. 198. pr. pr. *T. cylindrica* DC. gall. II. 2019. *Reticularia multicapsula* Sowerb. t. 199. *Sphaerocarpus cylindricus* Bull. champ. t. 470. f. 3. *Stemonitis ferruginea* Batsch elench. f. 175.

Ad trunco abietinos et populinos putridos passim.

2115. *L. fragiformis* Nees, primordiis confluentibus effusis spumosis lacteis ocios jam incarnatis demum umbrinis, in peridia linearia cylindrica curvata connata basi attenuata strato albo tenui innixa succrescentibus, sporidiis umbrinis. — *Licea fragiformis* Nees syst. f. 102. Fr. syst. III. 196. Grev. cr. t. 308. *Tubulina fragiformis* β. clavata Pers. obs. II. 30. *Licea clavata* Schrad. nov. gen. 18. *Tubulina fragiformis* DC. gall. II. 250. *Tubulifera fragiformis* Gmel. *Sphaerocarpus fragiformis* Bull. champ. t. 384.

Ad ligna et ramulos, ipsos muscos longe lateque saepé occupans, Hercyn. v. c. rariss. (Prima incunabula ñoxa utriusque spec. differentias jam praemonent; illius ad caespites distinctos, primum plano-convexos stratoque rigescendo contracto hemisphaericos congregantur, hujus spumam longe profusam, ocissime gliscentem edunt et in peridia similia succrescent. Hinc quoque synonyma segre distribuantur nec certo liquet, cui *Tubulifera coccinea* Roth cat. I. 243. *T. arachnoidea* Jacq. misc. ipsaque *T. Ceratum* fl. dan. t. 659. f. 2. subscribantur numqu sequens ab illis reapse differat.)

2116. *L. effusa* Ehrenb., primordiis fluxis incarnatis dein arescendo basinque pallidam dein sordidam fibrosam substernendo in peridia cylindrica angusta tenuissima arcte conglutinata pulvinata apice obtuso prominula olivaceo-umbrina succrescentibus, sporidiis globosis concoloribus. — *Licea umbrina* Ehrenb. sylv. 14. et 26. f. 1. Schltldl. berol. II. 157.

Ad trunco putres agri berol. (Ehrenberg.) (Friesius ad *L. cylindricam* refert, quae inter utramque forsitan ambigit et coloris ratione ad praecedentem magis accedit.)

272. LEOCARPUS LK. Schalenhäutling.

Peridium difforme deplanatum simplex testaceum fragile irregulariter rumpens basinque circumscissam impressam demum relinquens. Flocci parci breves, trabecularum instar assurgentibus. Columella nulla. Sporidia globosa majuscula opaca.

(*Didermatia* sp. Fr. *Licea* Willd.)

2117. *L. calcareus* Lk., peridiis sessilibus inter figuram ovatam oblongumque curvatam variis, e basi depressa convexiusculis, humectis hyalinis glaucescentibus, siccis opacis testaceis candidis fragilissimis, demum irregulariter rumpentibus basinque impressam fuscata reliquenibus, sporidius compactis atris floccos parcos obstruentibus. — *Leocarpus calcareus* Link obs. I. 23. *Diderma liceoides* Fr. syst. III. 107.

Ad quisquilias hortenses quascunque in rejectamentis putrescentes, inter asparagorum, fabarum et pisorum strues herbaceas, aestate pluvia in agro thuring. minime rarus. (Evidem neque apud *Friesium* speciem Linkianam, neque in hac peridiis duplicis vestigia video ideoque denuo distinguo.)

273. PHYSARUM PERS. Blasenstacubling.

Peridium simplex membranaceum tenerrimum nudum glaberrimum irregulariter dehisceus. Columella nulla. Sporidia laxa, floccis peridio adnatis intertexta.

(*Physarum* Pers. et auct. ex emend. Fr. *Trichiae*, *Lycogalactis*, *Liceae*, *Sphaerocarpi* et *Reticulariae* sp. auct. (Cum *Friesio* praeeonte *Physara* salato, peridio simplici, tenerrimo, neque tegmine externo crustaceo (ut in *Didermate*), neque furfure scobiformi (ut in *Didymio*) instructa.)

† *adnata*, peridius subeffusis variisve, basi appلانata adnatis, facilime confluentibus.

2118. *Ph. atrum* Fr., peridius tenerrimus rotundatus stipato-aggregatis confluentibus atris, floccis nullis,

sporidiis atris. — *Physarum atrum* Fr. syst. III. 147. *Lycogala atra* Pers. in lit. nec. Alb. et Schw.

Ad truncos vetustos Vogesorum (Mougeot), nec tamen etiam aliis regionibus v. c. Hercyniae debet videtur. (Peridia conferta, demum polymorpha, in crustam contiguam fere confluentia, angustissima, nec floccis conspicuis saltem instructa.)

2119. *Ph. album* Fr., peridiis tenerimis subrotundo-depressis laevibus albidis, floccis raris tenellis sporidiisque nigris laxis. — *Physarum album* Fr. syst. III. 147. *Lycogala minuta* Grev. cr. t. 40. *Licea alba* Nees in Kunze myc. Hft. II. 66.

Ad quisquilias vegetabilis humi jacentes passim.

2120. *Ph. nigrum* Fr., peridiis tenerimis subrotundis nigris, facile difformibus inaequalibus, floccis tenellis copiosis implexis sporidiisque atris. — Fr. syst. III. 146. *Strongylium minus* Fr. symb. 7.

Ad ligna pinea Hercyn. superior. (Cante a Physaro atro floccis satis bene perspicuis distinguendum.)

2121. *Ph. confluens* Pers., peridiis rigidulis depresso convexis difformibus confluentibus laevibus cinereo-albis, floccis fasciculatis, parastadem dendroideam mentientibus sporidiisque compactis, fusciscentibus. — *Physarum confluens* Pers. syn. 169. Fr. syst. III. 146. Alb. et Schw. nisk. 91.

Ad ligna et cortices putrescentes (Persoon), ad muscos (Albertini et Schweinitz) passim at oculis detractum. (Figura perquam varia, a punctiformi ad linearem, saepius satis diversimode exarata, hincque Reticulariis adfine, et floccorum apparatu peculiariter quadanteuns desiccans.)

2122. *Ph. sinuosum* Fr., peridiis compressis elongato-flexuosis venulosis albido-cinereis in rimam ad latera s. mediotenuis dehiscentibus bivalvibus, floccis capillaribus albis reticulatis, sporidiis atro-fuscis. — An-

gioridium sinuosum Grev. cr. t. 310. *Physarum sinuosum* Fr. syst. III. 145. *Ph. bivalve* Pers. obs. I. 6. t. I. f. 2., syn. 169. *Dub. gall.* II. 861. *Reticularia sinuosa* Bull. champ. t. 416. f. 2. *Sowerb. fung.* t. 6. *DC. gall.* II. 259.

Ad folia, stipulas muscosaque putredine coactos passim, rarius ipsos vegetos infestat. (Moles varia, 4-5 lineas longa, 1-2 alta, saepius vero minor. Flocci parietibus aduati, pertenues. Rima centralis s. lateralis; margines variit.)

† *sessilia*, peridiis sessilibus e figura rotundata globosis, magis saepius concinne figuratis, tornatis, aggregatis, e primordiis fluxis mesentericis emergentibus.

2123. *Ph. Licea* Fr., peridiis sessilibus rotunda-to-hemisphaericis gregariis nitidis castaneis, floccis nullis, sporidiis majusculis fusco-atris. — *Physarum Licea* Fr. syst. III. 143. *Licea pusilla* Schrad nov. gen. 19. t. 6. f. 4. Pers. syn. 196. *Alb. et Schw.* nisk. 108.

Ad ligna putrida, pinea et alnea, auctumno ad veris finem passim. (Invitus cum *Friesio* a *Licea* distinguo, cum quo genere praeter primordia mesenterica et habitum physaroideum exacte congruit.)

2124. *Ph. conglobatum* Ditm., peridiis sessilibus globosis gregariis gryseis, floccis sporidiisque fuliginosis. — *Physarum conglobatum* Ditmar in Sturm germ. III. t. 140. Fr. syst. III. 142. *Lycoperdon Alni* Bjer-kander.

Ad frustula ligni faginei serra recisi agri rostoch. (Ditm.), nec non ad cortices Populorum et Alnorum humi jacentes Thuring. (Wallr.) (Caute a Didymio cinereo peridii fabrica et floccis dignoscendum.)

2125. *Ph. virescens* Ditm., peridiis sessilibus globosis verruculosis gregariis flavo-virescentibus, sporidiis fuliginosis. — *Physarum virescens* Ditmar L. I. t. 61. Fr. syst. III. 142.

Ad lignum fagineum putre agri rostoch. (Ditm.).

2126. *Ph. thejotenum* Fr., peridiis minimis confertissimis ovato-globosis squamulosis flavis, floccis concoloribus, sporidiis purpureo-fuscis. — *Physarum thejotenum* Fr. symb. 21., syst. III. 142.

Ad folia Fagi putredine incaute conglobata Hercyn. (W.)

+++ *botryosa*, peridiis subsessilibus s. stipite e basi substrata fluxa assurgentem floccido suffultis, tenerimis, intus floccis undique adnatis instructis.

2127. *Ph. utriculare* Fr., peridiis ovato-oblongis inflatis tenerrimis majusculis subsessilibus s. stipite flacco flavente brevissimo euflultis foveolatis, foetis chalybeis, effoetis utriculosis albis, floccis concoloribus, sporidiis nigris. — *Physarum utriculare* Fr. syst. III. 139. *Ph. hyalinum* §. *chalybaeum* Alb. et Schw. nisk. 92. *Ph. botrytes* Sommerf. lapp. 242. *Ph. ovoides* Schum. *Physarum hyalinum* Dub. gall. II. 860. *Trichia utricularis* DC. gall. II. 251. *Spaerocarpus utricularis* Bull. champ. 120. f. 417. f. I. (teste Friesio.)

Ad cortices arborum, Fagorum praesertim. putres Lichenesque ianatos platyphyllinos, *Parmeliam parietinam* v. c., Thuring. (Wallr.) Singularis species, peridio sessili distincte stipitato, majusculo, semina Cannabaeos minora aequante, superficie alutacea demum effoeto diutius persistente, utriculo insignis.)

2128. *Ph. cancellatum* W., peridiis globosis in majusculis membranaceis albis dein cancellato-corrugatis fragilibus, stipitibus (spuriis) primum fluxis mucilaginosis flaventibus brevibus basi implexis, floccis teneris eburueis albis parcis, sporidiis nigro-fuscis.

In similibus cum priore locis, a quo haud dissimili, peridiis majoribus, firmiss membranaceis, tenacellis quasi, rugis cancellatis exaratis dignoscitur.

2129. *Ph. hyalinum* Pers., peridiis globosis inflatis tenerrimis albidis parvis, stipitibus fascicularibus flaccidis flexuosis adscendentibus rufescensibus, floccis albis, sporidiis atris. — *Physarum hyalinum* Pers. disp.

8. t. 2. f. 4., syn. 170. Schum. saell. II. 204. Fr. syst. III. 130. Ph. *globuliferum* auct.

Ad trucos vetustos rarius. (Præcedenti simillimum et vix nisi stipitibus fasciculatis, e basi substrata od-
scendentibus peridiisque globosis minoribus diversum.)

+++ stipitata, peridiis stipite discreto suffultis,
basi plano-umbilicatis, globosis s. turbinatis, floccos
fundo adnatos soventibus.

* peridiis obovatis turbinatis.

2130. *Ph. fimetarium* Schum., peridiis obova-
tis purpurasceni-umbriuis, stipite brevi subflexuoso,
floccis e basi assurgentibus sporidiisque fuscis. — *Physarum fimetarium* Schum. saell. II. 205. Fr. syst. III. 138.

Ad finum vaccinum Thuring. aliquoties legi.

2131. *Ph. connatum* Schum., peridiis pyriformibus rubro-badiis, stipitibus ferrugineo-fuscis e basi substrata soepius fasciculatim assurgentibus, floccis compactis sporidiisque badiis. — *Physarum connatum* Schum. saell. II. 202. Fr. syst. III. 138. Flor. dan. t. 1310.

Ad trucos putridos Fagi, Hercyn. inferior. (Wallr.) (Peridia primum subsessilia, dein stipite sensim succrescente in basin producuntur.)

2132. *Ph. rubiginosum* Chev., peridiis globoso-
turbiatis stipitibusque tenuibus laevibus rubiginosis,
floccis reticulatis albis, sporidiis atris. — *Physarum rubiginosum* Chevall. par. II. 338. Fr. syst. III. 137.

Ad Fraxinorum caudices muscosos Thuring. rarius.
(Wallr.) (Peridia mediotentas dehiscunt faciemque Cra-
terii fingunt.)

2133. *Ph. muscicola* Pers., peridiis turbinatis
cinereis, stipitibus brevibus laevibus lutescentibus, flo-
ccis albis, sporidiis atris. — *Physarum muscicola* Pers.
syn. 171. Alb. et Schw. nissk. 93. Fr. syst. III. 137.

Ad muscos pinetorum hercynic. passim. Auctumno.

(A Physaro nntante distinguendum praecipit Persoonius, peridio obovato in formam cylindricam proclivi et sporidiis compactis alienum.)

** peridiis sphaericis subtus non umbilicatis.

2134. *Ph. columbinum* Pers., peridiis globosis, primum flaventibus, dein violaceo-chalybeis nitidis rugulosis majusculis, stipite aequali nigro, sporidiis atropurpureis. — *Physarum columbinum* Pers. obs. I. 5., syn. 173. Fr. syst. III. 136. *Mucor violaceus* Leers herb. 287.

Ad trunco putridos agri herborn. (Leers), Hercyn. inferior. (Persoon, Wallr.), Saxonie (Ludwig), Lusatiae (Albertini et Schweinitz), vere utrobique rarius. (Variat peridiis e figura globosa obovatis, ad straminas tectorum uda.)

2135. *Ph. flavidum* Fr., peridiis sphaericis rugoso-verrucosis luteis, stipitibus brevibus subaequalibus rugosis pallidioribus, floccis erectis ebarneis, sporidiis nigro-fuliginosis. — *Physarum flavidum* Fr. symb. 22., syst. III. 135.

Ad sarmenta et stipites, Ruborum v. c., Filicum aliisque herbaceas quisquiliae Hercyn.

2136. *Ph. sulfuratum* Alb. et Schw., peridiis sphaericis rugoso-squamulosis sulfureis, stipitibus laevibus brevibus conicis albis, floccis flavis, sporidiis fusco-nigris. — *Physarum sulphureum* Alb. et Schw. nissk. 93. t. 6. f. 1. Fr. syst. III. 134.

Ad folia sicca humi jacentia, Lusatiae (Albertini et Schweinitz.) (Peridii superficies squamuosa Didymium quidem praenotat, quod columella deficiente melius sub Physaro militat.)

2137. *Ph. bullatum* Ditm., peridiis sphaericis verruculosis albido-virescentibus, stipite conico-subulato curto ? inflato pallidiore, sporidiis fusco-atris. — *Physarum bullatum* Ditmar in Sturm. germ. III. t. 22. Link obs. L. 25. Fr. syst. III. 134.

Ad ligna faginea putrida agri rostoch. (Ditmar.)

2138. *Ph. psittacinum* Ditm., peridiis sphaericis verruculosis virescentibus, stipite subulato gracili aurantiaco, floccis sporidiisque fusco-atris. — *Physarum psittacinum* Ditmar l. l. t. 52. Fr. syst. l. l.

In foliis putridis Fagorum agri rostoch. (Ditmar.) (Praecedenti simillimum, vix nisi stipitum magis, non nisi longius productorum et floccorum rite expicatorum ratione distinguendum.)

2139. *Ph. subulatum* Schum., peridiis sphaericis atro-fuscis caesiis subcernuis, stipite subulato fuscescenti-flavo, floccis sporidiisque fusco-atris. — *Physarum subulatum* Schum. saec. II. 201. Fr. syst. III. 133. ?*Ph. purpurascens* Link obs. II. 42. *Ph. globosum* Sommerf. lapp. 243. nec Fr.

Ad trunços putredine exesos Hercyn. inferioris. (Vix nisi peridio exacte sphaerico, demum primum cernuo a *Ph. nutante* diversum.)

2140. *Ph. gracilentum* Fr., peridiis sphaericis nutantibus nigro-fuscis expallentibus, stipite capillari flaccido fuscescente, floccis albis, sporidiis nigricantibus. — *Physarum gracilentum* Fr. syst. III. 133. *Trichia mutans* Trentep. *Mucor Flor. dan.* t. 465. f. 3.

Ad *Hypna semiputrida* passim. (Stipitibus gracile-scentibus Stemonitem prope aemulatur.)

2141. *Ph. leucophaeum* Fr., peridiis globosis sub-depressis erectis cinereo-caesiis, stipite brevi rugoso sub-sulcato albo, sporidiis nigro-fuliginosis. — *Physarum leucophacum* Fr. syst. III. 132. *Trichia filamentosa* Trentep. ?*Physarum confluens et connexum* Link obs. II. 42.

Ad trunços muscosos Fagorum paeprimis Hercyn. inferior. passim. (A reliquis stipite obsoleto, e basi substrata quasi assurgente, rudi, sporidiis conglobatis semetque facile a peridio solvendis et ex illo proepisis, columnella destitutis, quadantenus aberrat. *Physarum solutum* Schum., peridio sphaerico subbivalvi stipiteque elongato caesio, ad quod Fries l. l. *Ph. elongatum* Lk., dubie landat, mihi dubium.)

*** peridiis lenticiformibus, basi plana umbilicatis.

2142. *Ph. alatum* Fr., peridiis lenticularibus gregariis albicantibus subtus excavatis, stipite solcato-alato viridi-flavo, sporidiis fusco-xubentibus. — *Physarum alatum* Fr. syst. III. 132. *Trichia alata* Trentep.

Ad truncos agri mecleburg. (Trentepohl.)

2143. *Ph. sulcatum* Lk., peridiis hemisphaericis subtus umbilicatis erectis gryseis, stipite attenuato sulcato albido, floccis sporidiisque fusco-atris similiterque translucentibus. — *Physarum sulcatum* Link obs. I. 27. ?*Ph. bulbiforme* Schum saell. II. 200. *Flor. dan. t.* 1974. f. 3. Fr. syst. III. 131.

Ad ligna faginea putrida. (Link.)

2144. *Ph. striatum* Fr., peridiis globosis depressionibus punctulatis subtus umbilicatis cinereo-albicantibus, stipite brevi striato fusco dorsum incrassato, floccis sporidiisque fusco-nigris. — Fr. syst. III. 131. *Ph. aurantiacum* Pers. syn. 173. t. 3. f. 7-11. *Trichia aurantia* DC. gall. II. 253. *Sphaerocarpus aurantius* Bull. champ. 173. t. 484. f. 2.

Ad corticem Betularum rarius. (*Physaro* nutanti simile satis, statura robustiore, firmiore, stipite striato breviore ventricoso fusco nec ceruno, peridio punctulato ejusque colore diversum.)

2145. *Ph. Pini* Schum., peridiis hemisphaericis subtus umbilicatis erectiusculis majusculis gregariis squamoso-diffractis cinereo-caesis, stipite elongato attenuato laevi nigro-fusco, floccis sporidiisque compactis nigris cantibus. — *Physarum Pini* Schum. saell. II. 203. Fr. syst. III. 131. *Phys. nutans* auct.

Ad truncos abietinos putrescentes Hercyn. superior. passim, auctummo. (*Physaro* nutanti simile quidem, illo tamen majus et robustius magisque sociale. Primordia flexa lutescentia, fere Mesentericae luteae Todei, dein effusa, in peridiorum sylvulam gregarie succrescentia diuque persistentia.)

2146. *Ph. compressum* Alb. et Schw., peridiis lentiformibus subtus umbilicatis, dein obverse parabolicis bivalvibus subcernuis cinereis s.(ex sporidiis translucentibus) fuscoc-atriis, stipite gracili laevi incurvo pallido dein fuscō, floccis sporidiisque fuligineis. — *Physarum compressum* Alb. et Schw. nisk. 97. Link obs. II. 42. *Ph. cernuum* Schum. saell. II. 211. Fr. syst. III. 130. Fl̄r. dan. t. 1974. f. 2.

Inter quisquilias herbaceas putreantes Lusatiae (*Albertini et Schweinitz*), Thuring. infer. (Waller.) passim. (Synonyma ex descriptionum tide junxi.)

2147. *Ph. albipes* Lk., peridiis subglobosis subtus planiusculis verruculosis gryseis subcernuis, stipite attenuato laevi albido, nonnisi obsoleto, floccis fuscis, sporidiis nigro-fuliginosis. — *Physarum albipes* Link obs. I. 27. Fr. syst. III. 130. *Physarum connatum* Ditmar in Sturm germ. III. 41. nec Schum.

Ad rhizomata herbarum elatiorum ipsorumque Filicam agri rostoch. (Ditmar) et alibi.

2148. *Ph. aureum* Pers., peridiis globosis cernuis basi parce depresso, primum laevibus flavis, dein squamuoso-furfuraceis belle deauratis, stipite concolore sursum tenuato striato, floccis tenerrimis penicillatis chalybeis, sporidiis atro-fuscis. — *Physarum nutans* y. *aureum* Fr. syst. III. 129. *Ph. aureum* Pers. disp. t. I. f. 6., syn. 173. Alb. et Schw. nisk. 94. Ditmar l. t. t. 23. (peridia nimis aurantia.) Grev. cr. t. 124.

Ad trunco putrediae exesos Hercyn. inferior. et Thuring. rarius. (Friesius cum sequente jungit; vix vero talem coloris mutationem ex cibereo in aureum persequi potui, quod praeter hunc stipite striato et floccis chalybeis differt.)

2149. *Ph. nutans* Pers., peridiis lenticularibus subtus unabilicatis laevibus, demum subsquamulosis cernuis, stipite subulato albido-fuscescente, floccis e basi assurgentibus tenerrimis albidis, sporidiis fuligineo-nigris. — *Physarum nutans* Fr. syst. III. 128. excl. var. y.

a. cinereum, peridiis albido-cinerascentibus. — *Physarum nutans* Pers. syn. 203., var. *a.* Fr. l. l. *Trichia alba* DC. gall. II. 252. *Sphaerocarpus albus* Bull. champ. t. 407. f. 3. pr. pr.

b. viride, peridiis virescentibus. — *Physarum viride* Pers. syn. 172. Ab. et Schw. nissk. 94. Ditmar l. l. t. 24. Nees syst. f. 108. *Trichia viridis* DC. gall. II. 253. *Sphaerocarpus viridis* Bull. champ. t. 481. f. 1.

Ad ligna putredine exesa, var. *a.* haud quidem rara, *b.* rarior. (*Friesio* observante color peridiis cinereus transit in pallide-luteum, coccineum (var. *d. coccinea* Fr. l. l.), flavo-viridem et viridem ipsuque aureum, totidemque var. subministrat. Stipites sursum seosim tenuantur peridiique pondere demum nutare incipiunt. Flocci diu persistentes stupam implexam referunt.)

274. CRATERIUM TRENTEP. Becherstäubling.

Peridium simplex papyraceum rigidum figuratum, operculo magis minusve distincto primum clausum illoque abjecto cyathiforme persistens. Columella nulla. Flocci varii congesti (albi) sporidia elevantes.

(*Craterium Trentep.* in Roth cat. II. 224. Lk. Nees Fr. et auct. *Arcyriae* sp. Pers. *Stemonitis* sp. Schrank.)

† *sciassilia*, peridiorum vertice tenuissimo sensim evanescente basinque reclusam relinquente.

2150. *Cr. mutabile* Fr., peridiis subrotundo-turbatis erectis vertice laceris aureis, basi stipiteque brevi striatis concoloribus, floccis lutescentibus, sporidiis atris. — *Craterium mutabile* Fr. syst. III. 154. *Trichia aurea* Schum. saec. II. 208. nec Fl. dan.

Ad caudices quercinos exesos Hercyn. inferior. rarius. (Pulchra haec simulacrum rara species dehiscendi modo et operculi figurati defectu quadau tenus desciscit, rectius tamen huc spectat.)

2151. *Cr. leucocephalum* Ditm., peridiis turbatis erectis spadiceis facile expallescens, vertice te-

nuissimo caduco basinque cyathodem recludente, stipite striato badio, floccis albis, sporidiis atris. — *Craterium leucocephalum* *Ditm* in *Sturm* *germ.* III. t. 11. *Grev.* cr. t. 65. *Fr.* *syst.* III. 153. *Cr. vulgare* *Chev.* *paris.* 340. nec *Ditm.* et *excl.* *icone.* *Physarum pedunculatum* *Schum.* *saell.* II. 206. *Arcyria leucocephala* *Hoffm.* *germ.* III. t. 6. f. 1. *Pers.* *syn.* 183. *Stemonitis leucocephala* *Gmel.* *Trichia cinerea* *Trentep.* L. I. 227. *Flor.* *dan.* t. 1314. f. 2. *Stemonitis cyathiformis* *Schrink.* *Peziza convivalis* *Batsch* *clench.* 121. *Pers. myc.* I. 286. — *Mich.* *gen.* t. 86. f. 14.

Ad folia dejecta Filicumque frondes putres Hercyn. et Thuriag. passim.

2152. *Cr. xanthopus* *W.*; peridio turbato candido farinoso, vertice convexo in glebulas concolores cretaceas concolores frustulatim inspersas dein resoluto, stipitibus sparsis erectis striatis flavo-fuscis, floccis albis, sporidiis castaneo-fuscis. — *Physarum xanthopus* *Wallr.* in *lit.*

Ad ligna putrida sepimentorum relictorum Thuring. semel. (Praecedentem sp. habitu aemulatur, peridii colore tamen et arenulis veluti vertici inspersis diversa.)

† *circumscissa*, peridiorum vertice dein circumsciso recluso.

2153. *Cr. minutum* *Fr.*, peridiis pyriformibus erectis lutescentibus, operculo convexo coacolore, stipite brevi laevi rufescente, sporidiis atris. — *Craterium minutum* *Fr.* *syst.* III. 151. *Arcyria leucocephala* *Alb.* et *Schw.* *nisk.* 100. et *alior.* *Trichia turbinata* *DC.* *gall.* II. 252. *Dub. gall.* II. 859. *Tr. minuta* *Rehm.* *Nidularia minuta* *Wether.* *Cyathus minutus* *Hoffm.* *Sowerb. fung.* t. 239. fig. superior. *Peziza minuta* *Leers* *herb.* 281.

Ad muscos et lichenastras aliasque herbarum quisquiliis ad strues rejectas rarius, v. c. agri herborn. (*Leers*), Thuriag. (*Wallr.*)

2154. *Cr. nutans* *Fr.*, peridiis pyriformibus incli-

natis stipiteque elongato laevi subferrugineis, operculo convexo flavo, floccis nullis, sporidiis atris. — *Craterium nutans* Fr. syst. III. 151. *Sphacrocarpa operculata* Schum. saell. II. 220. *Peziza cernua* Pers. mycol. I. 282. *P. coccinella* Fr. syst. II. 125. nec Sommerf. *P. nutans* Batsch. — Mich. gen. t. 86. f. 12.

Ad Lichenes putrescentes humi jacentes, v. c. Parmeliam ciliarem et furfuraceam Hercyn. infer. semel similem plantolam legi illarumque dubius reticere nolui. (Ambigit inter praecedentem sp. et sequentem habitu, singularis partibus tamen diversa operculoque convexo colorato satis peculiaris.)

2155. *Cr. pedunculatum* Trentep., peridiis cyathiformibus subcernuis laevissimis nitidis castaneis, operculo orbiculari piano firmo subcretaceo, stipite elongato capillari laevissimo croceo, floccis niveis rudibus effusis, sporidiis atris. — *Craterium pedunculatum* Trentep. l. l.

* 224. Fr. syst. III. 150. *Cr. vulgare* Ditmar l. l. t. 9. Nees syst. f. 120. Dub. gall. II. 858. coque teste *C. leucocephalum* Desmaz. *Cyathus minutus* Hoffm. veget. cr. II. 6. t. 2. f. 2. *Peziza cernua* β. Batsch. — ?Mich. gen. t. 86. f. 13.

Ad folia, stipites ramulosque putridos rarius, v. c. in agro rostoch. (*Ditmar*), Hercyn. et alibi, nusquam tamen vulgare.

2156. *Cr. pyriforme* Ditmar., peridiis pyriformibus erectiusculis, infra apicem saepius contractis stipiteque brevi laevi ochraceis, operculo firmo cretaceo, sporidiis atris. — *Craterium pyriforme* Ditmar l. l. t. 10. Fr. syst. III. 150.

Ad folia corticemque Betularum putrem in locis udia roridis agri rostoch. (*Ditmar*.)

275. DICTYDIUM SCHRAD. Netztäubling.

Peridium simplex membranaceum disphanum tenerimum, e capillitio innato reticulatum venosove nervosum, irregulariter dehiscentia.

(*Dictydiuum Schrad. nov. gen. I. II. Lk. Nees. Fr. Cibrariae sp. Pers. Stemonitis sp. auct.*)

2157. *D. venosum Schrad.*, peridiis subcernuis, nervis divergenti-ramosis apicibus liberis venosis, stipite gracili, sporidiis lutosis s. fulvo-fuscescentibus. — *Dictydiuum venosum Schrad. I. I. 14. t. 3. f. 6. Fr. syst. III. 167. Cibraria venosa Pers. syn. 191. Alb. et Schw. nisk. 105.*

Ad trunco abietinos putres Hercyn. (Schrader) (Stipites graciles, rectiasculi. Peridium irregulariter dehiscens; uervis obscurioribus, primariis 7-10 et pluribus divergenti-ramosis, apice non reticulato-concrexis sed venoso-tentaculatis.)

2158. *D. microcarpon Schrad.*, peridiis subcernuis sphaericis punctulatis transversim reticulatis, stipite tenerissimo longissimo, sporidius lutosus. — *Dictydiuum microcarpon Schrad. I. I. 13. t. 4. f. 3. Fr. syst. III. 17. Cibraria microcarpa Pers. syn. 190. Alb. et Schw. nisk. 104.*

Ad trunco abietinos putridos Hercyn. (Schrader), Lusatiae (Albertini et Schweinitz). (Peridium sphaericum minutissimum, primum albidum, dein fuscum, denum fuscescenti-flavum, vertice irregulariter rumpens sporidiusque profusis pallescentia. Reticuli nodi subrotundangulati, peridium nigro-punctatum mentientes. Schrader.)

2159. *D. splendens Schrad.*, peridiis erectis laevibus subrotundis aequaliter transversimque reticulatis apice dehiscentibus fusco-lutescentibus splendentibus, sporidiis lutosis. — *Dictydiuum splendens Schrad. I. I. 14. t. 4. f. 5. 6. Fr. syst. III. 166. Cibraria splendens Pers. syn. 191.*

Ad trunco putridos pineos et fagineos Hercyn. superior. et inferior. passim.

2160. *D. trichoides Chev.*, peridiis globosis rubellis erectis, dein cancellatim venosis rufescens, stipite simplici caro crassiusculo, sporidiis fusco-purpureis. — *Dictydiuum trichoides Cheraill. par. I. 327. Dub. gall. II. 856. Fr. syst. III. 166. Cibraria coccinea Pers. syn.*

190. Trichia reticulata DC. gall. II. 256. Sphaerocarpus trichoides Bull. champ. t. 387. f. 2.

Ad ligna putrida Populorum Thuring. (Wallr.)

2161. D. ambiguum Schrad., peridiis cernuis, fibris transversalibus transversimque reticulatis, sporidiis fusco-purpureis. — Schrad. l. l. 13. t. 4. f. 2. Fr. syst. III. 165.

Ad truncos abietinos Hercyn. (Schrader.)

2162. D. umbilicatum Schrad., peridiis sphaericis parvis cernuis vertice umbilicatis, nervis parallelis transversalibus juncitis, sporidiis fusco-purpureis. — Dictydiom. umbilicatum Schrad. l. l. 11. t. 4. f. 1. Fr. syst. III. 165. **D. cernuum Nees syst** f. 47. Grev. cr. t. 153. **Mucor cancellatus Batsch** cont. II. t. 42 f. 232.

Ad truncos exesos Pinorum, Salicium, Populorum et Fagorum Hercyn. infer. et Thuring. passim. (Peridium foetum fusco-purpureum, dein longitudinaliter fissum, effoetum diaphano-hyalinum.)

276 CIBRARIA SCHRAD. Siebstaeubling.

Peridium figuratum, simplex teguiter membranaceum, dein vertice excusso dimidiatum. Flocci trabecularum nervearum iustar peridio adnati eoque evanescente superne reticulum liberum constituentes. Sporidia coacervata nullis floccis intertexta, e vertice reticulato-cibroso profusa.

(*Cibraria* Schrad. nov. gen. *Necs.* Pers. Lk. Fr. *Stemonitis* sp. auct. *Sphaerocarpi* sp. Bull.)

† *globosa* e, peridiis globosis ut plurimum socialibus.

2163. Cr. tenella Schrad., peridiis sphaericis subcernuis fuscescentibus, reticulo aequali nodoso, stipite gracillimo, sporidiis lutois. — *Cibraria tenella* Schrad. l. l. 6. t. 3. f. 2. Alb. et Schw. nisk. 106 Fr. syst. III. 175.

Ad ligna pinea Hercyniae superioris et alibi rarius.

(Basis peridiū excipuliformis reticulum purpureo-fuscum, sub lente luculenter nigro-punctatum exserit.)

2164. *Cr. aurantiaca Schrad.*, peridiis sphaericis subcernuis fulvis, e basi inaequaliter dentata reticulum subnodosum flavescens exserentibus, sporidiis laete lutescentibus. — *Cibraria aurantiaca Fr. syst. III.* 174.

a. ochracea, sporidiis ochraceis. — *Cibraria variabilis Ficin. dresd.* 296.

b. aurantiaca, sporidiis aurantiacis. — *Cibraria aurantiaca Schrad. l. l. 5. t. I. f. 3. 4. Schum. saelt. II.* 218. *Cr. vulgaris b. Pers. syn. 194. Trichia semicancellata b. Poir.*

γ. sulfurea, sporidiis sulfureis s. flavis. — *Cibraria aurantiaca γ. Alb. et Schw. nisk. 106.*

Ad ligna putredine exesa Hercyn., Thuring., Saxonie et Lusatiae passim.

2165. *Cr. vulgaris Schrad.*, peridiis sphaericis minutis subcernuis lutosis, e basi patellaformi parallelovenosa denticulata reticulum aequale exserentibus, stipite elongato flexuoso rufescente striato, sporidiis lutosis. — *Cibraria vulgaris Schrad. l. l. 6. t. I. f. 5. Alb. et Schw. nisk. 106. Nees syst. f. 116. Fr. syst. III. 174. Dub. gall. II. 856. Trichia semicancellata DC. gall. II. 255. Sphaerocarpus semitrichoides Bull. champ. t. 387. f. 1.*

Ad ligna putredine exesa, Populorum praeprimis et Fagorum, parcius tantum obvia.

2166. *Cr. intricata Schrad.*, peridiis subrotundis erectiusculis fuscescenti-lutosis, e basi cupulari denticulata reticulum rigidulum inaequale exserentibus, stipite gracili stipato nigrescente, sporidiis lutosis. — *Cibraria intricata Schrad. l. l. 7. t. 3. f. 1. Pers. syn. 195. Fr. syst. III. 173.*

Ad truncos abietinos putres Hercyn., rarius, aestate et auctumno. (Schrader.)

2167. *Cr. pupurea Schrad.*, peridiis subrotundis erectis majusculis vivide purpurascentibus, e basi cupu-

lari reticulum tenacellum cribroso-pertusum exserentibus, stipite flexuoso dein curvo, sporidiis coacoloribus. — *Cibaria purpurea* Schrad. l. l. 8. Alb. et Schw. nisk. 105. Fr. syst. III. 173. *Clathrus pedatus*, reticulo fixo Schmid. icon. t. 33. f. 2.

Ad truncos abietinos putredine excessa Lusatiae, brumae tempore. (*Albertini et Schweiniz.*) (Totius generis longe speciosissima, colore purpureo insignis.)

† obovata e, peridiis obovatis.

2168. *Cr. rubiginosa* Fr., peridiis obovato-oblongis utrinque obtusis majusculis fragilibus badio-rubiginosis, e basi excipuliformi nitida reticulum delicatum aequale exserentibus, stipitibus brevibus nigrescentibus confertissimis, sporidiis rubiginosis. — *Cibaria rubiginosa* Fr. syst. III. 172.

Ad truncos abietinos Hercyn. superior. dubius Franc sp. legi. (Cautius a Licea Tubulina simillima dignoscenda, strato fluxo circumscripto, exarescendo membranaceo, sporidiis confertis quidem nec tamen confluentibus tecto insignis.)

2169. *Cr. argillacea* Pers., peridiis subrotundis erectis stipatis tenuissimis obscure-venosis, e basi cyathode reticulum aequale fragile emittentibus, sporidiis argillaceis. — *Cibaria argillacea* Pers. syn. 193. Chev. paris. 328. t. 9. f. 13. Alb. et Schw. nisk. 106. Fr. syst. III. 172. *C. micropus* Schrad. l. l. 3. t. 2. f. 1 ? *Stemonitis sphacrocarpa* Schrank. St. *argillacea* Pers. olim.

Ad ligna abietina Hercyn. super. frequens.

2170. *Cr. pyriformis* Schrad., peridiis erectis pyriformibus purpurascientibus gregariis, e basi excipuliformi reticulum aequale obsolete-striatum emittentibus, stipitibus curvis firmis striatis fusco-purpurascientibus, sporidiis lutosis. — *Cibaria pyriformis* Schrad. l. l. p. 4. t. 3. f. 4. 5. Fr. syst. III. 171. *Cr. rufescens* β. Pers. syn. 193.

Ad ligna abietina Hercyn. (Schrader.)

2171. *Cr. fulva Schrad.*, peridiis erectis turbinateis fulvis e baseos infundibuliformis venulosae longe stipitatae margine denticulato reticulum continuum exserentibus, sporidiis fulvis. — *Cibraria fulva Schrad.* I. l. 5. t. 1. f. 1. Fr. syst. III. 171. *Cr. intermedia Schrad.* Pers. Alb. et Schw. I. l. *Cr. rufescens Pers.* disp. t. 1. f. 5., var. a. Pers. syn. I. l.

In iisdem cum priore locis.

2172. *Cr. macrocarpa Schrad.*, peridiis erectis majusculis obovatis gregariis, stipitibus crassiusculis fusco-nigrescentibus e strato tenuissimo purporascente assorgentibus basinque infundibuliformem nervosam repando-margiuatam in reticulum rigidulum nitidum fuscescens desinentem elevantibus, sporidiis lutosis. — *Cibraria macrocarpa Schrad.* I. l. 8. t. 2. f. 3. Alb. et Schw. nisk. 105. Fr. syst. III. 170.

Ad caudices abietinos patres Hercyn. superior. (Schrad.)

277. DIDYMIUM SCHRAD. Schuppenstaedling.

Peridium figuratum tenuiter membranaceum irregulatiter dehiscens, tegmine adnato, in squamulas furfuraceas fatiscente obductum. Columella varia saepe nulla. Flocci vagi peridio adnati, inter sporidia serpentes. (*Didymium Schrad.* ex emend. Fr. *Physari* sp. Pers. *Cioni* sp. Nees.) — Morphosis praecedentis at tegmine simplici, in furfures fatiscente differt.

+ *adnata*, peridiis adnatis, basi appланatis, columella destitutis.

2173. *D. Serpula Fr.*, peridiis appланatis elongatis venose-serpentibus flexuosis reticulatisque plumbeis albedo-furfuraceis, sporidiis compactis atris. — *Didymium Serpula Fr.* syst. III. 126.

Ad corticem Populi tremulue et Tiliae putrem.

2174. *D. cinereum Fr.*, peridiis subglobosis adnatis gregariis furfure cinereo-caesio obductis, floccis

reticulatis albis, sporidiis atris. — *Didymium cinereum* Fr. syst. 126. *Physarum cinereum* Pers. syn. 170. *Alb. et Schw. nisk.* 72. excl. var. 7. Nees syst. f. 107. *Trichia coerulea* Treit. *Lycoperdon cinereum* Batsch elench. cont. I. 249. f. 169. *L. complanatum* Batsch I. L. f. 170. (*Iusus peridiis diffuso-applanatis.*)

Ad ligna corticesque putres paasim. (Ab hoc *Linkius Physarum griseum*, peridiis gryseis, saepius confluentibus, sporidiis non conglomeratis, (obs. I. 27.) distinguere praecipit Physaroque cinereo sporidia in acervulos globosos conglomerata adscribit.)

2175. *D. physaroides* Fr., peridiis consertis irregulariter subrotundis nigris albido-polveraceis, columella nulla, sporidiis conglobatis nigrescentibus. — *Didymium physaroides* Fr. syst. III. 125. *Spumaria physaroides* Pers. syn. 163. *Alb. et Schw. nisk.* 87.

Ad trunco putridos, abietinos praesertim. (Statum mucidam s. obsoletum aliis cuiuscunque mentitur, tegmine farinoso et a praecedente crescendi modo conferiore, minutie et floccis albis deficientibus dignoscitur.)

† sessilia, peridiis subepkaericis magis regularibus subsessilibus columellaque instructis.

2176. *D. complanatum* Schrad., peridiis membranaceis coerulecente-cinereis variis applanato-sessilibus gregariis, columella depressa rufescente-ochracea, sporidiis fuliginoso-atris. — *Didymium complanatum* Schrad. nov. gen. 24. t. 5. f. Fr. syst. III. 125. *Cionium complanatum* Link. *Diderma complanatum* Pers. syn. 168.

Ad folia dejecta in udis patrescentia, Hercyn. inferior. (Schrader.)

2177. *D. effusum* Fr., peridiis membranaceis applanato-sessilibus sparsis confluendoque difformibus cinereo-glaucoscentibus flocculoso-pruinosis, columella floccisque albis, sporidiis fuligineo-atris. — *Didymium*

effusum Fr. syst. III. 124. *Diderma effusum* Link obs. II. 42.

Ad folia delapsa, Betulae praesertim, Hercyn. inferior. passim. (Varium quidem at peridii (sub lente) flocculosi teneritate facile diguoscendum.)

2178. *D. lobatum* Nees, peridiis subrotundis subsessilibus sublobatis variis nigris albido-furfuraceis, columella depressa, floccis sporidiisque nigro-fuscis. — *Didymium lobatum* Nees syst. II. 112. f. 104. Fr. syst. III. 123. *Physarum cinereum* auct. plurim.; var. *p. obovata* Alb. et Schw. nisk. 92. *Ph. cinerascens* Schum. saell. II. 199. *Reticularia nigra* Bull. champ. t. 446. f. 2. DC. gall. II. 259. *Trichia sphaerica* e. *β.* Trentep.

Ad muscos et lichenastram in nemorum udorum peu-trelibus Hercyn. et Thuring. minime rarum. (Variat mole et basi noanisi productiore, stipitem veluti mentiente.)

+++ *stipitata*, peridiis hemisphaericis subtus excavatis subrotundisive, stipite erecto firmulo suffultia.

2179. *D. muscicola* Lk., peridiis globosis subconnatis botryosis cinereis furfuraceis, stipite e basi diffluente latescente fusco suffukis. — Link obs. II. 42. Fr. syst. III. 122.

Ad muscos Silesiae. (Link.)

2180. *D. leucopus* Fr., peridiis globosis minutis albis, stipite subintrante floccisque albis. — Fr. syst. III. 121. *Physarum leucopus* Link obs. I. 27.

Ad trunca arborum agri rostoch. (Link.)

2181. *D. herbarum* Fr. peridiis subglobosis gry-geo-albidis pruinosis, stipitibus inaequalibus basi dilatata nonnisi confluentibus, albis rigidulis, floccis latentibus, sporidiis nigricantibus. — *Didymium herbarum* Fr. syst. III. 120. *Licea stipitata* DC. gall. VI. 101.

Ad caules et folia vegeta, v. c. Thuring.

2182. *D. Iridis* Fr., peridiis globosis pruinosis argillaceis, stipite brevi subconico laevi sordide-flavente,

columella stipiteque albidis, floccis sporidiisque fuligino-
sis. — *Didymum Iridis* *Ditmar* in *Sturm germ.* III. t.
7. *Nees syst.* f. 106.

Ad folia caulesque herbarum vegetarum et longue-
scendentium, *Iridis Pseudacori* v. c. (*Ditmar*), *Rubi caesii*
(*Nestler*) aliarumque, auctumno, rarius.

2183. *D. xanthopus* Fr., peridiis globosis fuscis
albido-pruinosis, stipite elongato laevi luteo, columella
clata albida, floccis sporidiisque fuliginosis. — *Didymum*
xanthopus Fr. *syst.* III. 120. *Cionium xanthopus* *Ditmar*
L. l. t. 43. *Lycoperdon stipitatum* Retz.

Ad caules exsiccatos et folia dejecta, Thuring. v.
c., rarius.

2184. *D. melanopus* W., peridio globoso subter
depresso albido tenerrimo globuloso - farinoso, stipite e
basi effusa deplanata nigro-virescente assurgente inferno
concolore, superne sensim attenuato flavescente in colu-
mellam duplo crassiorem vertice umbilicatam desinente,
floccis transversis peridii frustula concipientibus, spori-
diis nigro-fuscis.

Ad librum mercatoriorum aquis submersum deinque
emersum Thuring., passim. (Wallr.) (Didymio flamme-
to simile et inter *D. nigripes* et *xanthopus* ob stipi-
tem discoloram fere medium, basi stipitis coacta tamen
et columella umbilicata ab his, ab illo vero floccis ca-
ducis nec productis in peridio effoeto diversum.)

2185. *D. nigripes* Fr., peridiis globosis subgre-
gariis e pruina tenui gryseis, stipite elongato rigido
laevi nigro, columella obsoleta, floccis sporidiisque fuli-
ginosis. — *Didymum nigripes* Fr. *syst.* III. 119. *Phy-
sarum nigripes* *Ditmar* in *Sturm germ.* III. t. 42. Link
obs. I. 27.

Ad folia, muscos aliasque quisquilias humi jacentes,
auctumno, passim.

2186. *D. farinaceum* Fr., peridiis subrotundis
tenuissimis nigrescentibus, farina flocculosa cinerea ob-

ductis, columella minuta fere obsoleta, stipite brevi sporidiisque fusco-nigris. — *Didymium farinaceum* Fr. syst. III. 119. ?Schrad. nov. gen. 22. t. 5. f. 6. (columella insolita, fere *D. versipellis*.) *Physarum farinaceum* Pers. syn. 274. Alb. et Schw. nisk. 96. *Ph. globosum* Schum. *Ph. melanospermum* Pers. in Roem. Annal. *Trichia sphaerocephala* Sowerb. t. 240. *Trichia Hall. hist.* n. 2160. t. 48. f. 2.

In similibus cum praeced. locis Hercyn. inferior. et Thuring. minime raro. (Perquam varium mole, figura et stipitis ratione, nonnisi plane sessile s. deplanatum (*Trichia depressa* Trentep.) Alia specimina conservo, stipite brevi albo, e basi (*hypothallus* Fr.) deplanata circumscripta areolata emergente insigua, novam forsitan speciem in straminum strue uda agri northus. praestantia.)

2187. *D. filamentosum* JV., peridio globoso, ex glebulis minutissimis albis in corticem furfuraceum laxe contextis tegmen ciuereo-caesum mentientibus obducto, dein in illas floccis appensa fatiscentibus, stipite e basi deplanata erecto brevi tenuiter sulcato pallido in columellam insiguum unguiculato-lenticularem desinente, floccis albis a columella ad latera transversim tendentibus, demum tegminis particulas elevantibus effusis spori diaque nigro-fusca profundentibus. — ?*Trichia filamentosa* Trentep. *Physarum leucophaeum* auct.

Ad stipites caulesque herbarum elatiorum patrescen tes hortorum northusan. passim. (Friesius nostram ad specimina data pro *Physaro leucophaeo* declaravit, quae quidem columella insigni claviculari praecellit simulque admonet, ut *Didermati* subscribatur. Peridii particulae cretaceas dein floccis effusis appensa, habitum satis singularem impertinent.)

2188. *D. squamulosum* Fr., peridiis globoso-de pressis subtus umbilicatis cinereis, squamulis concoloribus tectis, stipite brevissimo laevi albo, columella candida, sporidiis fusco-nigris. — *Didymium squamulosum*

Fr. syst. III. 118. Diderma squamulosum Alb. et Schw.
nisk. 88. t. 4. f. 5.

Ad folia dejecta, faginea praeprimis, passim.

2189. *D. tigrinum Schrad.*, peridiis lenticularibus erectis subtus umbilicatis nigris, squamulis furfuraceis flavo-virentibus ornatis, stipite crassissimo elongato lutescente, columella fusca, sporidiis nigro-fuliginosis. — *Didymium tigrinum Schrad. nov. gen. 22. t. 6. f. 2. Physarum tigrinum Pers. syn. 174. Alb. et Schw. nisk. 96. Flor. dan. t. 1454. f. 1. (stipite breviore, fuscescente.) ?Ph. albo-punctatum Schum.*

Ad ligna patrida abietina, Hercyn. (*Schrad., Wallr.*), Lusatiae (*Albertini et Schweinitz.*)

2190. *D. rufipes Fr.*, peridiis hemisphaericis subtus umbilicatis cinereis majusculis, squamulis furfuraceis obsoletis, stipite firmo rufescente, sporidiis nigro-fuliginosis. — *Didymium rufipes Fr. syst. III. 116. Physarum squamulosum Pers. syn. 174.*

Ad trunco Pini sylvestris putres rarius.

2191. *D. furfuraceum Fr.*, peridiis lenticularibus ceruinis albido-cinereis flocculoso-farinaceis, columella nulla, stipite albido laevi, sporidiis nigricantibus. — *Didymium furfuraceum Fr. syst. III. 116. Physarum furfuraceum Schum. saec. II. 204.*

Ad ligna Fagi putrida Hercyn. infer. (*Wallr.*)

2192. *D. hemisphaericum Fr.*, peridiis hemisphaericis depressis erectis albido-velatis, subtus plano-umbilicatis, stipite brevi crasso albido, columella obsoleta, sporidiis nigro-fuligineis. — *Didymium hemisphaericum Fr. syst. III. 115. Physarum hemisphaericum Chevall. par. 258. Ph. depresso Schum. saec. 202. Flor. dan. t. 1972. f. 2. Reticularia hemisphaerica Bull. champ. t. 446. f. 1. DC. gall. II. 258.*

In similibus cum priore locis, auctumno, at multo rarius.

2193. *D. melanopus Fr.*, peridiis hemisphaericis

gregariis depressis erectis farinosis, subtus plane-umbilicatis gryseis, stipite subulato columellaque nigris, sporidiis fusco-fuligineis. — *Didymium melanopus* Fr. syst. III. 114.

g. Clavus, stipite substriato, peridiis farinoso-villosis, subtus coucavis nigris. — *Physarum Clavus* Alb. et Schw. nisk. 96. t. f. 2.

Ad quisquilias in nemoribus udis humi jacentes minime raro, Hercyn. infer. et Thuriug. (Ita saltem cum *Friesio* stirpem interpretor ex speciminiibus innumeris, inter se haud mediocriter aberrantibus et forsitan novas species praestantibus, quarum quidem nonnullas *Linkius*, (obs. I. 27.) sub titulis *Physari sinuosi*, peridio globoso subdiformi gryseo deplanato, stipite brevissimo fusco, floccis albis, et *Ph. capitati* peridio globoso gryseo subtus umbilicato, stipite fusco, floccis albis insignes prae-mouisse videtur.)

278. DIDERMA PERS. *Doppelhaeuffling*.

Peridium duplex; externum crustaceum nonnisi testaceum discretam glabrum fragile dehiscens, internum hyalinum tenerrimum s. arachnoideum evanescens. Columella varia, nonnisi placentaris, saepius nulla. Flocci parci vagi, a basi ad latera verticemque tendentes, inter sporidia compacta serpentes.

(*Diderma* Pers. ex emend. Fries. *Leangium* Lk. *Didymii*, *Trichiae*, *Leocarpi*, *Spumariae* et *Physarii* sp. auct.)

† *adnata, peridiis adnatis columella destitutis.*

2194. *D. muscicola* Lk., peridiis sessilibus flexuosis, tegmine externo gryseo, interno fuscidente, floccis fuscis, sporidiis atris. — *Link obs. I. 26. Fr. syst. III. 113.*
Muscos udos obtexere dicitur. (Link.)

2195. *D. reticulatum* Fr., peridiis sessilibus serpentibus elongatis flexuosis reticulatim, tegmine externo aurantiaco, interno tenerrimo floccisque flavidis, columella nulla, sporidiis atro-fuscis. — *Diderma reticu-*

latum Fr. syst. III. 112. Alb. et Schw. nisk. 90. t. 7. f. 2.

Inter felia coacervata rariissime. (Forsan *Didermatis vernicosi* monstrum reticulatum sessile.)

2196. *D. contextum* Pers., peridiis sessilibus congestis elongatis flexuosis, tegmine externo citrino, interno dilutius flavente, columella nulla, sporidiis fuliginosis. — *Diderma contextum* Pers. obs. I. 89. *Ditmar in Sturm germ.* III. 79. Fr. syst. III 112. *Physarum contextum* Pers. syn. 168. Alb. et Schw. nisk. 91.

Ad caules herbarum siccios rarius.

2197. *D. ochraceum* Hoffm., peridiis subrotundidis sessilibus congestis, tegmine externo luteo, interno tenui pallidiore, columella floccisque albis, sporidiis nigricantibus. — ?*Diderma conglomeratum* Fr. syst. III. 111. *D. ochraceum* Hoffm. germ. III. t. 9. f. 2. *Lycoperdon luteum* Jacq. misc. 138. t. 8.

Ad folia putrescentia et muscos Hercyn. passim. (*Hoffmanni* plantulam & Friesiana distinguere nolui, nec constat, num *D. granulatum* Schum., peridiis flavis columella destitutis et *D. minutum* Schum., peridiis subreniformibus fragilibus flavis, quibus *Friesius* l. l. civitatem impertuit, reapse differant.)

2198. *D. contortum* Hoffm., peridiis rotundatis sessilibus, tegmine externo crasso candido, interno tenuissimo hyalino, columella nulla, floccis obsoletis, sporidiis atro-fuscis — *Diderma deplanatum* Fr. syst. III. 110. *D. contortum* Hoffm. germ. III. t. 9. f. 2. Pers. syn. 166.

Ad muscos ramis fagineis incumbentes Hercyn. (Hoffm.) (*Majusculum*, *polymorphum* e figura subrotunda, saepius inaequale contortumque, semper applanatum. Tegmen externum crassiusculum, candidum, persistens, laeve omnino s. solcis exaratum, internum hyalinum, aegre conspicendum.)

2199. *D. cyanescens* Fr., peridiis sessili-adnatis subrotundo-ditiformibus, tegmine externo crasso albo, in-

terno caesio, columella nulla, floccis sporidiisque nigro-fuscis concoloribus. — *Diderma cyanescens* Fr. syst. III. 109. *Diderma difforme* Alb. et Schw. nisk. 90. ? Nees syst. f. 105. nec Fr. et Pers.

Ad plantas vegetas in locis irriguis, praeprimis Oxa-lidem infestans, auctumno.

2200. *D. valvatum* Fr., peridiis sessili-adnatis e figura subrotunda varia, nonnisi subelongatis albentibus, tegmine externo tenui in rimas valvasve dehiscente, columella nulla, floccis e basi adnata assurgentibus erectis ebarneis, sporidiis atris. — *Diderma valvatum* Fr. syst. III. 109.

Ad ligna putrida, pinea praeprimis et alnea Hercyn. inferior. (Dehiscendi modus et floccorum ratio satis peculiari et esseotialis.)

† *sessilia, peridiis sessilibus, columella instructis, gregariis quidem, basi substrata tamen destitutis.*

2201. ?*D. trichodes* Fr., peridiis globosis sessilibus fuscis, nonnisi difformibus, floccis densis persistentibus concoloribus, columella parva aggregata. — Fr. syst. III. 108. *Didymium trichodes* Link obs. II. 42.

Ad arborum corticem Silesiae. (Link.) (Physaro reticulato ad fine nec a Trichiis alienum auctores declarant, quod floccis copiosis ad praeced. accedit et mihi dubium, neandum a me visum est.)

2202. *D. complanatum* Pers., peridio sessili complanato vario coerulecente-cinereo, columella rufescente-ochracea. — Pers. syn. 168. *Didymium complanatum* Schrad. nov. gen. 24. t. 5. f. 5.

Ad folia dejecta putrescentia, auctumno. (Schrader.) (Quod Friesius dubium reliquit, in auctoris fidem tamen nolui omittere.)

2203. *D. depresso* Fr., peridio orbiculari depresso, tegmine externo candido fugaci, interno cinereo,

colomella plana testaceo-pallida, floccis sporidiisque fuscis.
— *Diderma depressum* Fr. syst. III. 108.

Ad ramulos dejectos et sarmenta putrescentia, Rubi Idaei praeprimis, tale quale in Hercyn. infer. legi.

2204. *D. testaceum* Pers., peridio applanato-sessili subrotundo hemisphaerico, tegmine externo columellaque conformi rufescenti-carneis, interno violaceo, floccis sporidiisque fuliginoso-nigris. — *Didymium testaceum* Schrad. nov. gen. 25. t. 5. f. 1. *Diderma testaceum* Pers. syn. 167. Alb. et Schw. nisk. 89. *Reticularia sphaeroidalis* f. Bull. l. l.

Ad folia dejecta uda Thuriog. passim.

2205. *D. difforme*? Pers., peridio oblongo difformi sessili deplanato, tegmine externo candido, interno coerulecente subreticulato, columella subglobosa, sporidiis fuligineo-fuscis (obscure-fuscis Pers.) — *Diderma difforme* Sommerf. lapp. 241. Fr. syst. III. 106. ? Pers. syn. 167. *Didymium difforme* Dub. gall. II. 858.

Ad caules herb. elatiornm, Solani v. c. tuberosi Thuring. Auctumno. (Hoc titulo variae innoverunt procul dubio species et anceps omnino haereo, utrum mea specimina synonymis l. satisfaciant?)

2206. *D. globosum* Pers., peridio globoso-hemisphaerico sessili, tegmine externo candido, interno cinereo, columella globosa, sporidiis fuliginoso-nigris. — *Diderma globosum* Pers. disp. 9. t. 4. f. 4., syn. 167. Alb. et Schw. nisk. 89. *Ditmar in Sturm germ.* III. t. 6. Grev. or. t. 122. *Didymium globosum* Chevall. par. 334. t. 9. f. 28. *D. candidum* Schrad. nov. gen. 25. *Reticularia sphaeroidalis* a. Bull. champ. t. 446. *Mucilago minima* Mich. gen. t. 96. f. 6.

Ad folia delapsa, locis udis aresentia passim.

†† *syncephala*, peridiis e basi substrata flava, gelatinam mollem, cum ordine quodam, arbuseulae instar prorepentem mentiente, sensim in stipites veluti

*spurios assurgentibus inferneque sociatim coalescentibus,
obovatis plerumque columellaque destitutis. (D. botry-
cea Fr.)*

2207. *D. vernicosum Pers.*, peridiis obovatis, tegmine externo testaceo fulvo dein spadiceo vernicoso nitido fragilissimo, interiore hyalino, stipitibus capillaribus brevibus laxis, e basi membranacea dilatata assurgentibus, sporidiis nigricantibus. — *Diderma vernicosum Pers.* obs. 89. t. 3. f. 7., syn. 165. Alb. et Schw. nisk. 89. *Flor. dan. t. 1312. f. 2. Fr. syst. III. 102.* *Leangium vernicosum Dub. gall. II. 858.* *Leocarpus vernicosus Link obs. I. 25.* *Nces syst. f. 110.* *Grev. cr. f. 111.* *Physarum nitidum et vernicosum Schum. saell. 206.* *Reticularia fragilis Poir.* *Trichia lutea Trentep.* *Lycoperdon fragile Dioks.* cr. I. t. 3. f. 6. *L. parasiticum Wither.*

Ad graminas, muscos, folia ramulosque patrescentes, Jove pluvio, per totum annum suisque locis ubertim, aliis itidem plane deficiens. (Morphosis ut in reliquis, satis singularis, a macilagine flava, arescendo demum persistente et peridia rigida, vernicoso-nitentia, testacea, rufescens, lutescentia, badia in pedicellis discoloribus luteis tenacellis implexis difformibus fasciculatim congregata exserente. *D. atrovirens*, peridiis ovalibus, tegmine crasso atro nitido sporidiisque atrovirentibus, *Friesio* teste I. l. affine quidem at diversum esse dicitur.)

2208. *D. spumariaeforme W.*, peridiis subrotundo-difformibus caesiis, tegmine albo tectis, e basi effusa contigua dein membranaceo-cellulosa confluendo subeuntibus, columella cylindrica floccisque albis, sporidiis atris. — *Diderma spumarioides Fr. syst. III. 104.* *Flor. dan. t. 1918. f. 1.* *Reticularia alba Sowerb. fung. t. 280.* *R. hortensis Bull. champ. t. 424.* *Spumaria alba Schum. saell. II. 195.* *?Mucilago crustacea alba Mich. gen. t. 96. f. 2.*

Ad quisquilias herbaceas vigentes quasconque humi jacentes, aestate pluvia et serena, tale quid in nemoribus

thuring. saepe legi, nec tamen a Spumariae albae monstris difformibus distinguere volui. (*Diderma oblongum*, peridiis obovatis caesiis firmis, tegmine tenui albo laevi deciduo obductis, stipitibus laxis submembranaceis, sporidiis atris, Fr. syst. III. 103. s. *Spumaria didermoides* Ach. in Pers. syn. XXIX, simile mihi que dubium, in-dagaandum reliqua.)

2209. *B. ramosum* Pers., peridiis rotundatis turbinateis, primam albis, dein flavis demumque gryseo-nigrescentibus, intus ? loculo?is, stipitibus ramosis albis, sporidiis nigris. — *Diderma ramosum* Pers. syn. 166. nec Fries. *D. stipitatum* Fr. syst. III. 104. *Didymium ramosum* Dub. gall. II. 859. *Reticularia stipitata* Bull. champ. t. 380. DC. gall. II. 258.

Ad ligna putria Hercyniae myxomyceten perfectum legi cum descriptione data satis congruum, ad praecedentem vero amicius accedentem.

2210. *D. papaverinum* W., peridiis ovalibus, tegmine interno gryseo-argenteo fragili, externi rudimentis obsoletis punctato-cellulosis obducto, stipitibus e basi implexa peridia fasciculato-aggregata sustinentibus productis luteis, floccis teneris eburneis rigidis ramoso-reticulatis undique appensis sporidiaque nigro-fusca interstinguentibus. — *Physarum papaverinum* Wallr. in lit.

Ad trabes quercinas dolii uidis suggestas agri nort-husan., brumae tempore, semel et abuudanter. (Wallr.) (Primordia fluxa gelatinosa opere phrygio reticulato quasi cubilia longe lateque obducunt, Mesenteriae s. Phlebomorphae citrinae instar, ex quibus ocius jam stipes longi exsurgunt inter se basi cohaerentes, superne peridium ovale, basi subaequale, majusculum, seminis papaverini grysei molem et colorem aequans sustinentes et demum ob stipites basi implexos plura in fasciculos juncta spargunt. Peridium fragile gryseo-argenteum tenerrimum obsolete punctulatum, extus maculis minutissimis candioribus (tegminis externi rudimentis contractis) inscriptum, sporidiorum globosorum minutissimorum sarcimine

nigro-fusco, floccis ebarneis rigidis ramosis utrinque appensis intercepto foetum. Sporidia profusa cubilia inquinare solent.)

2211. *D. compactum* W., peridiis subglobosis rectis flavo-viridibus, e basi substrata in stipes rectos crassiusculos inter se confluendo et divergendo nexos succrescente aurantio suffultis socialibus, sporidiis compactis atris, floccis albidis interspersis. — *Physarum compactum* Ehrenb. sylv. 14. 26 Schiltl. berol. II. 161.

Ad trancos putridos agri berol. (Ehrenberg.) (Ad *D. rufipes* Friesius, a me nondum visum, refert.)

2212. *D. rufipes* Fr., peridio globoso obovatoque intesceate, stipite brevi aurantio-rubo striato, sporidiis fusco-nigris, floccis vagis stipatis a columella centrali deppressa oriundis exceptis. — *Diderma rufipes* Fr. syst. III. 101. *Physarum aurantium* β. *rufipes* Alb. et Schw. nisk. 94.

Ad folia, ramenta quaecunque et ramulos suffocatos imbribus auctumnalibus humectos, in agro niskensi. (Albertini et Schwainz.)

+++ *stipitata*, peridio lenticulari s. subgloboso, stipite distincto suffulto.

2213. *D. globuliferum* Fr., peridio globoso albo-flavente dein nigricante, stipite brevi crasso luteo-rufescente, sporidiis nigricantibus, globulis luteolis intermixtis. — *Diderma globuliferum* Fr. syst. III. 100. *Trichia globulifera* DC. gall. II. 253. *Physarum globuliferum* Pers. syn. 175. t. 3. f. 11. *Dub. gall.* II. 861. *Sphaerocarpus globuliferus* Bull. champ. t. 484. f. 3.

Ad ligna herbasque majores putres, Thuring. at parcius modo obvium. (Primordia fluxa tenuia Mesentericas instar serpentia; peridia inde nata caduca, floccis saepius solum superstitibus. Globulos intermixtos Friesius pro columellae spuriae rudimento habet.)

2214. *D. lepidotum* Fr., peridiis globosis basi parce umbilicatis tessellatum dehiscentibus fer-

rugineo-latescentibus, stipite elongato gracilescente, columella ovoidi obsoleta, sporidiis atris. — *Diderma lepidotum* Fr. syst. III. 100. *Cionium lepidotum* Nees syst. 114. *Leangium lepidotum* Ditmar in Sturm germ. III. t. 21.

Ad ligna putrida Fagorum agri rostoch. (Ditmar.) (Differt a praecedente haud dissimili, stipite longiore et peridio tessellatum dehiscente.)

2215. *D. umbilicatum* Pers., peridiis subgregariis subtrotundis subtes umbilicatis albidis in lacinias demum patentes fissis, stipite obeso brevi subconico, columella rugosa grumosa insigni rufescente, sporidiis atropurpurascenscentibus. — *Diderma umbilicatum* Pers. syn. 165. Alb. et Schw. nisk. 88. Fr. syst. III. 99. 99. Flor. dan. t. 1972. f. 1. *D. crassipes* Schum. saec. II. 196.

Ad cortices arborum putres, Populorum praeprimis, Sorborum et Abietis, rarius, auctummo. (Stipes satis brevis; peridium internum obsoletum.)

2216. *D. floriforme* Pers., peridiis gregariis sphaericis subcuriaceis stellatim-fassis reflexis albido-lutescentibus s. stramineis, stipite gracili elongato, columella insigni obconica, sporidiis nigro-fuscis. — *Diderma floriforme* Pers. syn. 164. DC. gall. II. 257. Fr. syst. III. 99. *Leangium floriforme* Link obs. I. 24. *Didymium floriforme* Schrad. I. I. 21. *Sphaerocarpus floriformis* Bull. champ. t. 311.

Ad trunco putredine exesos, Hercyniae v. c., at rarissime.

2217. *D. stellare* Pers., peridio lenticulari subtoz umbilicato, exteriore fusco-pallente crustaceo dein in lacinias 5-8 sensim revolutas fisso, interno tenerrimo hyalino caduco, stipite brevissimo robusto, columella subtrotunda insigni, sporidiis nigris. — *Diderma stellare* Pers. syn. 164. Alb. et Schw. nisk. 88. Fr. syst. III. 99. *Leangium stellare* Link obs. I. 24. Nees syst. f. 109. *Didymium stellare* Schrad. nov. gen. 21. t. 5. f. 3. *Lycoperdon radiatum* L. sp. 1654. (saltem ex descriptione.)

Ad cortices abietinos semipatres Lusatiae (*Albertini et Schweiñz*), Hercyniae (*Persoon. Schrader. Wallr.*) Auctummo.

279. TRICHLA HALL. Haarstäubling.

Peridium simplex membranaceum persistens figuratum, vertice irregulariter rumpens. Flocci dense implexi, versus basin adnati torti, elastice semet expandentes sporidiaque simplicia laete colorata spargentes.

(*Trichia Hall. ex emend. Pers. et Fr. Lk. Nees Goniospora Lk. in Schrad. Journ. 1809. Stemonitis sp. Gmel. Lycoperdi sp. auct. Mucoris, Clathri et Sphaerocarpi sp. Bull. Trentep. aliorumque.*) Primordia fluxa fere mesenterica.

+ sessiles, peridiis subsessilibus, nonnisi irregulatiter figuratis fissisque, floccis laxioribus instructis.

2218. *Tr. Serpula* Fr., peridiis variis venoso-serpentibus flexuosis reticulatisque flavis, floccis sporidiisque concoloribus pulchre luteis. — *Trichia Serpula* Fr. syst. III. 188. *Tr. venosa* Sekum. saell. II. 207. *Lycoperdon lumbicale* Batsch cont. I. 259. f. 174. Willd. berol. 414. *Tr. spongoides* Vill. *Mucor Serpula* Scop. carn. II. 443.

a. simplex, peridiis subsimplicibus. — *Trichia Serpula* Pers. syn. 181. Abb. et Schw. nisk. 100.

b. reticulata, peridiis longioribus varie flexis. — *Trichia reticulata* Pers. syn. 182. Nees syst. f. III. Grev. cr. t. 266.

Ad truncos arborum putres, Betularum praeprimis et Alnorum, auctummo sero, rarius.

2219. *Tr. circumscissa* JV., peridiis sessilibus sparsis subrotundis depresso - convexiusculis fusco-castaenis areolatis, oculus jam a media inde parte transversim fissis basinque patellarem deplanatam, centro umbo rotato adibam membranaceam laevigatam nudam

relinquentibus, sporidiis aureis, floccis tortuoso-implexis effusis flaventibus. — *Trichia circumscissa* Wallr. in lit.

Ad ramulos salicinos humi jacentes in locis suffocatis Thuring. (Wallr.) (*Peridia integra* rarissime comprehenduntur; adont plerisque flocci effusi cum sporidiis profusis speciem prodentibus et scutula basilaria, cubilibus adpressa iisque concolora, centro umbonata s. papillata, peridii circumscissi rudimenta residua, vix nisi sub vitro perspicua.)

2220. *Tr. varia* Pers., peridiis sessilibus e figura subrotunda reniformique variis, nonnisi longius excurrentibus flavescensibus, floccis sporidiisque ochraceis. — *Trichia varia* Pers. obs. II. 32., syn. 181. Alb. et Schw. nisk. 100. Fr. syst. III. 188. *Stemonitis varia* Pers. *Lycoperdon vesiculosum* Batsch. *Mucor granulatus* Schaeff. bavar. t. 296. — Mich. gen. t. 95. f. 2.

Ad truncos excesos, Betulae, Populorum, Salicarum Thuring. passim.

2221. *Tr. chrysosperma* DC., peridiis subsessilibus rotundatis congestis nitidis luteo-cinnamomeis, floccis sporidiisque ochraceo-aureis. — *Trichia chrysosperma* DC. gall. II. 250. Fr. syst. III. 187. *Tr. nitens*. Pers. syn. 180. Dub. gall. II. 860. *Tr. olivacea* Pers. I. I. Alb. et Schw. nisk. 99. pr. pr. *Tr. favaginea* Schum. taell. II. 207. *Stemonitis favaginea* Gmel. *Lycoperdon favagineum* Batsch cont. I. f. 173. *Lycop. gregarium* Retz. *Sphaerocarpus chrysospermus* Bull. champ. 417.

Ad ligna potredine exesa in locis abditis, passim. (Rarius tantum peridia integra leguntur, colore quidem vario, semper tamen sporidiorum aureo s. fulvo insignis.)

2222. *Tr. turbinata* With., peridiis obovatis sessilibus congestis ochraceo-alutaceis, floccis sporidiisque ochraceis. — *Trichia turbinata* Wither. Fr. syst. III. 187. *Tr. ovata* Pers. obs. et syn. 180. Flor. dan. t. 1313. f. I. *Tr. olivacea* Pers. pr. pr. *Stemonitis pyriformis* Willd. berol. *Tr. pyriformis* Vill. delph. 492. t.

3. Lycoperdon aggregatum Retz. L. luteum Reh. Mucor pyriformis Scop. Lycop. epiphyllum Lightf. Clathrus turbinatus Huds. — Hall. hist. t. 48. f. 7. Sowerb. fung. t. 85.

Ad ligna macida caudicum, in nemoribus roridis, Thuring. aestate serena satis frequens. (Figura turbinata, obesa. Primordia fluxa alba, dein flava, ochracea, opaca, nunquam aurea et nitida, saepius sole tacta, praematura exarescent facileque decipiunt (*Sclerotium Fagi Schum.*))

2223. *Tr. nigripes Pers.*, peridiis subsessilibus e figura obovata pyriformi variis, nonnisi productioribus laevibus gregariis lutescentibus, stipite brevissimo nigrescente saepius obsoleto, floccis sporidiisque luteo-ochraceis. — *Trichia nigripes* Pers. syn. 178. *Fr. syst. III.* 186. *Tr. vulgaris*, *cordata*, *pyriformis* et *cylindrica* Pers. obs. II. 32. (*formae variae.*) *Tr. elongata* et *cylindrica* Schum. saell. II. 207. *Fl. dan.* t. 1313. f. 2. *Tr. pyriformis* DC. gall. II. 251. *Sphaerocarpus pyriformis* Bull. champ. t. 417. f. 2.

In similibus cum priore locis nec a foliis congestis, praesertim fagineis aliena. (Valde polymorpham et decipientem synonyma jam praenotant et ad singulas aberrationes totidem varietates distingui possunt. Primordia fluxa alba, ut in reliquis, *Mucorem lacteum* Leers s. *Embolum lacteum* Hoffm. forsitan signant.)

† *stipitatae*, peridiis obsolete circumscisis, e basi stipitata persistente floccos congestos elevantibus e monstrantibus. (*T. hemiarcyriae* Fr.)

2224. *Tr. clavata Pers.*, peridiis obovatis, primum albo-rubentibus, oculis jam flaventibus intentibus majusculis laevibus, stipite rugoso subconcoiore, floccis sporidiisque ochraceis. — *Trichia clavata* Pers. obs. II. 34., syn. 178. DC. gall. II. 101. *Fr. syst. III.* 186. *Tr. citrina* Schum. saell. II. 209. *Tr. pyriformis* Sibth. Sowerb. fung. t. 400. f. 6.

β. cerina, peridiis longe stipitatis saturate-cerinis s.

olivaceis. — *Trichia cerina* *Ditmar* in *Sturm* germ. III. 51. t. 25.

Ad trunco putridos, fagineos praeprimis, Hercyn. inferior. et Thuring. passim; var. β . ad caudices alneos et abietinos agri rostoch. (*Ditmar*), vix nisi colore satratiore, sere olivaceo diversa.

2225. *Tr. fallax* *Pers.*, peridiis primis albo-rubescens in globosis, dein turbinatis gregariis e miniatore-argillaceis circumscisis opacis, in basi stipitatum plicatam desinentibus, floccis sporidiisque ovatis obscure-ochraceis. — *Trichia fallax* *Pers.* obs. I. 59. t. 3. f. 4. *DC. gall.* II. 251. *Nees* syst. f. 113. *Fr. syst.* III. 185. *Arcyria decipiens* *Pers.* olim. *Sphaerocarpus sicooides* *Bull. champ.* t. 417. f. 2. *Clathrus stipitatus* *Schmid.* icon t. 33. f. 1-18.

Ad trunco putridos nemorum Hercyn. inferior. et Thuring. passim. (Primordia fluxa ex colore albo ocios jam e minio quid vel ex rosa debili trahentia fucum facile faciunt et *Mucorem miniatum* *Jacq. austr.* t. 299. *M. Trichiam* *Oed. fl. dan.* t. 467. f. 2. et *Trichiam graniformem* *Hoffm. veg. crypt* II. t. 1. f. 2. significant.)

2226. *Tr. serotina* *Schrad.*, peridiis obovatis sparsis opacis badiis, stipite furco laevi, floccis sporidiisque latosis. — *Trichia serotina* *Schrad.* bot. Journ. 1799. II. 61. t. 3. f. 2. *Fr. syst.* III. 184. *Tr. Botrytis* β . *simplex* *Pers.* syn. 176. ? *Tr. notata* *Flor. dan.* t. 1680. f. 2.

Ad trunco abietinos Hercyn. superior. (*Schrader.*) (*Friesio* observante nuper potissimum illuxit, habitu com praecedentibus similis, stipitis laevore et nitore tamen diversa.)

2227. *Tr. pyriformis* *Hoffm.* peridiis turbinato-pyriformibus subfusciculatis atro-rubentibus, stipitis exsertis fulvis, floccis sporidiisque ericato-fulvis. — *Trichia pyriformis* *Hoffm. veg. cr. l. l. t. l. f. l.* *Fr. syst.* III. 184. *Tr. Botrytis a.* *Pers.* syn. 176. *Stemonitis pyriformis* *Roth.* *Mucor pyriformis* *Leers herb.* 288.

In similibus cum reliquis locis. Aestate.

2228. *Tr. rubiformis* Pers., peridiis turbioato-cylindricis chalybeis fasciculatis, stipitibus brevibus confluentibus rubiginosis, floccis sporidiisque puniceis. — *Trichia subiformis* Pers. dispos. 54. t. 4. f. 3., syn. 176. Alb. et Schw. nisk. 98. Nees syst. f. 112. Flor. dan. t. 1365. f. 2. Fr. syst. III. 183. *Tr. chalybea* Chevall. par. 323. t. 9. f. 24. *Stemonitis fasciculata* Gmel. *Tr. cinnabarinum* Bull. champ. t. 502. f. 1. *Lycoperdon vesparium* Batsch cont. I. f. 172. *L. favaceum* Schrank. Hall. hist. t. 48. f. 5.

Ad trunco arborum, Fagorum praeprimis, Populerum et Salicu vulgaris. (Cautius ab Arcyria similibus distingueda.)

280. ARCYRIA HILL. Kelchstaeubling.

Peridium simplex tenuiter membranaceum, vertice ambonato illico caduco, partem subjectam poculiformem circumscissam reliquens. Flocci dense implexi, e basi adscendentibus contorti, parastade elasticum emersam demum deciduam mentientes.

(*Arcyria* Hill. hist. 47. ex emend. Pers., Fries. Lk. et Nees. *Stemonitis* sp. Trentep. *Trichia* sp. Hall. *Bull. Clathri* et *Clathroidis* sp. L. et Mich.)

2229. *A. ochroleuca* Fr., peridiis stipitatis sparsis globosis luteis, floccorum parastade ovata erecta sporidiisque ochraceo-pallidis. — *Arcyria ochroleuca* Fr. syst. III. 181. *A. flavescens* Sch. *A. silacea* Ditmar in Sturm germ. III. t. 8. *Stemonitis ochroleuca* Trentep.

Ad ligua putrida queretina et faginea passim.

2230. *A. umbrina* Schum., peridiis gregariis ova-tis stipitatis umbrinis, stipite distincto concolore, floccorum parastade ovata erecta sporidiisque ochraceis. — *Arcyria umbrina* Schum. saecil. II. 213. Flor. dan. t. 1975. f. 1. Fr. syst. III. 181. *Stemonitis lutea* Trentep. *St. flavescens* Schrank. *St. pomiformis* Roth germ. I. 448. *Mutor pomiformis* Leers herb. 218.

Ad truncos abietinos Hercyn., auctumno sero.

2231. *A. nutans* Fr., peridiis subsessilibus cylindricis pallidis congestis, dein vertice excusso calyculum minimum enervem pellucidum reliquoentibus, floccorum parastade elongata nutante sporidiisque sordide lutescentibus. — *Arcyria nutans* DC. gall. II. 254. Fr. syst. III. 180. *A. flava* Pers. syn. 184. *A. alutacea* Schum. saec. II. 212. *Stemonitis amoena* Trentep. St. *nutans* Gmel. *Trichia nutans* Bull. champ. t. 502. f. 3. Sowerb. fung. t. 260.

Ad caudices abietinos Hercyna. superioris passim.

2232. *A. straminea* W., peridiis sparsis s. aggregatis ovato-oblongis stramineis, stipite illis triplo breviore saturatiore suffultis, floccorum parastade conformati daedaleo-reticulata sporidiisque concoloribus. — *Arcyria pallens* Wallr. in lit.

Ad ligna salicina putrida Thuring., unico loco. (Specimina legi tantum effusa, satis insignia tamen floccorum parastade pallida, sine nitore straminea.)

2233. *A. cinerea* Schum., peridiis stipitatis gregariis ovato-globosis cinereis deinde nigrescentibus, floccorum parastade ovato-cylindrica sporidiisque glauco-cinerascentibus. — *Arcyria cinerea* Schum. saec. II. 213. Alb. et Schw. nisk. 101. Fr. syst. III. 180. Flor. dan. t. 1975. *A. albida* Pers. dispos. 10. t. I. f. 2. (rudis.) *Trichia cinerea* Bull. champ. t. 477. f. 3. DC. gall. II. 254. *Stemonitis glauca* Trentep. *Clathrus recutitus* L. sp.

In similibus cum priore locis, at rarius.

2234. *A. carne a* W., peridiis sparsis ovatis cinnereo-carneis, stipite breve flavente, parastade coaetoreticulata sporidiisque pallide-carneis. — *Trichia carne a* Wallr. in lit.

Ad funum equinum nemorum Thuring. (Wallr.) (Praecedenti simile quidem, at stipite breviore, peridiis colore et natalitiis alienum.)

2235. *A. fusca* Fr., peridiis gregariis stipitatis ovata-globosis fuscis, vertice excusso basin cupulaeformem subintegram relinquentibus, floccorum parastade ovata compacta sporidiisque carneo-cinereis. — *Arcyria fusca* Fr. symb. 27., syst. III. 179. *A. carnica et dentata* Schum. saec. II. 213. *A. cinerea* Pers. syn. 184. pr. pr.

Ad ligna putredine exesa Hercyn. rarius. (Sporidiorum colore carneo-cinereo facile recognoscenda, alioquin polymorpha.)

2236. *A. incarnata* Pers., peridiis congestis breviter stipitatis ovatis enervibus incurvatis, vertice excusso basin cupulaeformem pezizoideam relinquentibus floccorum parastade elongata sporidiisque carneis. — *Arcyria incarnata* Pers. observ. I. 58. t. 5. f. 4., syn. 185. *Ditmar* l. l. t. 44. Fr. syst. III. 178. *A. lilacina* Schum. l. l. *Stemonitis globosa et carnea* Trentep. St. *Trichia Roth* germ. I. 594.

Ad ligna putrida passim. (Ab hac vix nisi peridiis cylindricis elongatis tortis caespitosis sporidiisque ferme sanguineis distat *Trichia flexuosa* Schum. l. l.)

2237. *A. punicea* Pers., peridiis congestis stipitatis, e figura ovata elongatis puniceis, vertice excusso basin calycularem venosam relinquentibus, floccorum parastade assurgente producta sporidiisque puniceis. — *Arcyria punicea* Pers. syn. 185. *Alb. et Schw. nisk.* 101. *Flor. dan.* t. 1364. f. 2. *Nees syst.* f. 114. *Grev. cr.* t. 130. Fr. syst. III. 177. *Trichia coccinea* Bull. champ. t. 368. *DC. gall.* II. 255. *Empolis eriocatus* Batsch. *Stemonitis coccinea* Roth l. l. *Mucor coccineus* Leers. *M. clathroides* Scop. *Trichia denudata* Wither. Sowerb. *Clathrus denudatus* L. sp. 1649. — *Hall. hist.* t. 48. f. 6. *Mich. gen.* t. 94. f. 1.

Ad truncoꝝ putridos quoscunque Hercyn. inferior. et Thuring. frequens. (Eximie variat et aliquem ad longitudinem prodere videtur nisum, ex quo continuato *Arcyria vermicularis*, peridiis cylindricis elongatis flexuosis rubris, sporidiis floccorumque parastade paelonga in-

signis, exortā esse videtur. *A. melanocephala* Schum. L. I. eadem et apice prae mature exar escente nigricante solam differt.

2238. *A. conjugata* Schum., peridiis membranaceis majusculis ovatis turgidis, verticis tegmine tenerimo hyalino, ex sporidiorum sarcinino punico translucente rubro ocius caduco, basi residua vernicosa ollari fusco-rubra venosa dein magis tenuata deplanata, parastade laxa elevata ovata, stipite brevi striato rufofusco. — *Arcyria conjugata* Schum. sacll. II. 215.

Ad caudices Populi tremulae putridos Thuring. passim. (Quam Friesius praecedenti subscribere jubet, equidem cum Schumachero peridiorum indole, figura et mole distinguere mallem.)

281. DIACHEA FR. *Flockenstacubling.*

Peridium simplex tenerimum hyalinum in frustula dehiscendo ocissime caducum, stipite floccoso - grumoso pulverulento laxe celluloso, e basi crassa sensim tenuato floccorum parastadem reticulatam penetrante suffultum. Sporidia globosa inspersa.

(*Diachea Fr. Stemonitis* Trentep. Pers. *Trichiae sp.* Bull.)

2239. *D. elegans* Fr., peridiis ovatis oblongisque obtusis tenerimis cum nitore chalybeo-violaceo micantibus, stipitibus gregariis floccoso - grumosis e basi in-crassata subconica brevi sensim tenuatis parastademque caesiis penetrantibus candidis, sporidiis atro-rubentibus. — *Diachea elegans* Fr. syst. orb. I. 143., syst. myc. III. 156. *Stemonitis leucostyla* Pers. syn. 186. *St. leucopoda* DC. gall. II. 257. *Trichia leucopodia* Bull. champ. t. 601. f. 2. *Stemonitis elegans* Trentep. in Roth cat. I. 220.

Ad plantas, ramulos stipitesque vegetos et siccios agri thuring. passim, ob vitam ephemeralam autem rarius tantum integra superest. Aestate serena. (Initia fluxa ve-

nosa Phlebomorphae Pers. instar, lactea, undique serpento vagantis et occissime propullantia, cito jam coeunt stipitemque peridiphorum diutius persistentem exseruant floccoso-grumosum fragilem et inanem.)

282. STEMONITIS GLED. Fadenstaeubling.

Peridium simplex tenuissime-membranaceum hyalinum oculis jam evanescens, stipitatum stipiteque setaceo firmo nigro penetrante floccorumque reticulato-connexorum parastadem excipiente instructum. Sporidia inspersa.

(*Stemonitis Gleditsch* meth. 140. *Pers. Nees. Fr. Trichiae et Arcyriae* sp. auct. *Clathroidastrum Mich.*)

† *stylophorae*, peridiis globosis sparsis, e basi dimidiata stipitem semipenetrantem exserentibus.

2240. *St. cribarioides Fr.*, peridiis atris sessilibus fugacibus basin excipuliformem exiguum relinquenter floccorumque parastadem nigricantem stylidio brevi centrali instructam sustinentibus. — *Stemonitis cribarioides Fr. syst. III. 163. Cibraria Lycoperdi Fr. Nees in lit.*

Ad apices foliorum Lycopodiis annotini putrescentes Thuring. prope Arnstadt (*Lucas.*)

2241. *St. arcyrioides Sommerf.*, peridiis globosis violaceo-chalybeis irregulariter fisis, stipite brevi basin excipuliformem floccorumque parastadem globosam semipenetrante, sporidiis fuscescentibus ovatis. — *Stemonitis arcyrioides Sommers. Fr. syst. III. 162. St. chalybea Pers. in lit.*

Ad caules herbarum in Vogesis (*Mougeot*) vicinisque regionibus.

2242. *St. violacea Fr.*, peridiis lenticularibus chalybeis fugacibus subtus umbilicatis majusculis fugacissimis, stipite brevi basin obsoletam floccosque laxos albos semipenetrante, sporidiis nigricantibus. — *Fr. syst. III. 162.*

Ad Jungermanniam laevigatam Vogesorum. (*Mougeot.*)

(Habitu et floccorum et sporidiorum colore Didymium fere refert.)

2243. *St. physaroides* Alb. et Schw., peridiis globosis obtusis persistentibus argenteo-micantibus laevissimis demum laceris, stipite semipenetrante fusco-atro, floccis globosis liberis e sporidiis fusco-atris. — *Stemonitis physaroides* Alb. et Schw. nisk. 103. t. 2. f. 8. Fr. syst. III. 162. *Trichia physaroides* Schum. saec. II. 210.

Ad caudices abietinos putres Lusatiae. (Albertini et Schweiniz.)

2244. *St. ovata* Pers., peridiis sparsis ovatis fugacissimis chalybeis, stipite subulato elongato stricto nitido semipenetrante, floccis purpurascensibus, sporidiis fuscis. — *Stemonitis ovata* Pers. syn. 189. Alb. et Schw. nisk. 104. Fr. syst. II. 160. *St. atro-fusca* et *nigra* Pers. disp. *Mucor Embolus* L. sp. II. 1655.

Ad ligna putrida passim.

2245. *St. obtusata* Fr., peridiis globosis sparsis fugacibus nigrescentibus, stipite tenui nigro subpenetrante, floccis atro-fuscia compactis cum sporidiis concoloribus. — *Stemonitis obtusata* Fr. syst. III. 160. *St. globosa* Schum. t. I. *St. reticulata* Trentep.

In similibus cum praeced. locis, at rarius.

† *axiferae*, peridiis stipite penetrante instructis, sparsis s. saepius subfasciculatis.

2246. *St. papillata* Pers., peridiis globosis fugacissimis cinerascentibus, vertice e stipite excurrente papillatis, floccis exacte globosis compactis atro-fuscis cum sporidiis concoloribus. — *Stemonitis papillata* Pers. syn. 188., disp. 10. t. 1. f. 4. Alb. et Schw. nisk. 103. Fr. syst. III. 160.

Ad ligna abietina sylvatica s. fabrefacta passim. (Stipes firmulus, peridium nequaquam s. illo brevior, ater opacus illud penetrans et verticem papillatum mentiens.)

2247. *St. oblonga* Fr., peridiis ovato-cylindricis

sparsis fugacissimis sporidiisque fascis, stipite e basi bulbillosa subulato tenello stricto penetrante. — *Stemonitis oblonga* Fr. syst. III. 159.

Ad ligna pinea putrida Hercyn. super.

2248. *St. typhoides* DC., peridiis cylindricis utrinque obtusis gregariis hyalinis fugacissimis, stipitibus e basi substrata socialiter assurgentibus floccorumque parastadem gracilem compactam cum sporidiis concoloribus fuscescens penetrantibus. — *Stemonitis typhoides* DC. gall. II. 257. Ehrenb. sylv. f. 7. Fr. syst. III. 158. *St. typhina* Pers. obs. I. 57., syn. 187. nec Willd. *Trichia typhoides* Bull. champ. t. 477. f. 2. *Embolus pertusus* Batsch cont. I. t. 30. f. 176. *Mucor Stemonitis* Schaeff. bavar. t. 297. *Clathrus nudus* Flor. dan. t. 216.

Ad ligna putrida quaecunque, Salicum praeprimis, passim.

2249. *St. ferruginea* Ehrenb., peridiis cylindricis fugacissimis, stipitibus e basi substrata primum fluxa flavicante dein fuscescente persistente emergentibus fasciculatis flocceramque parastadem cylindricam penetrantibus s. sub apice evanescentibus, sporidiis primum albis dein puniceo-ferrugineis. — *Stemonitis ferruginea* Ehrenb. sylv. 26. f. 6. Schltl. berol. II. 164. Fr. syst. III. 158. *St. violacea* Schum. *St. fasciculata* DC. gall. II. 256. aliorumque. *St. typhina* Willd. berol. cum *Tremella typhina* L. l. ceu aetate flora. *Trichia axifera* Bull. champ. t. 477. f. 1.

Ad truncos putres, pineos praeprimis. (Simillima sequenti, at mucilago flavicat, stipitis processus interaneus plerumque infra apicem evanescit et sporidia minora e puniceo ferruginea.)

2250. *St. fusca* Roth., peridiis cylindricis fuscis fugacissimis, stipitibus e basi substrata valida submembranacea fusca assurgentibus capillaribus nitidis rigidis atris fasciculatis, floccorum parastadem conformem rectam penetrantibus, sporidiis magnis primum albis dein dilutius saturatiusve fuscis s. nigrescentibus. — *Stemonitis*

fusca Roth germ. I. 448. Trentep. Fr. syst. III. 157.
St. fasciculata Pers. syn. 187. pr. pr. Nees syst. f. 118.
Rhrenb. sylv. 25. f. 5. Schltl. berol. II. 164. Grev. cr.
 t. 170. *Trichia nuda* Sowerb. fung. t. 59. *Clathrus nudus* Linn. Bolt. — Mich. gen. t. 94. f. 1.

Ad trancos putres vñgaris.

2251. *St. Tubulina* Alb. et Schw., peridiis cylindricis praeter apicem tuberculatum glaberrimis nitidis, stipitibus fasciculatis circunnatim undique convergentibus, e basi substrata argentea assurgentibus, floccis coalitis, sporidiis primum albis dein fuscis. — *St. Tubulina* Alb. et Schw. nisk. 102. Schltl. berol. 164. *St. fusca* var. β . Fr. syst. I. L.

Ad Pinus emortuas decorticatas, Lusatiae (Albertini et Schweinitz.) (Friesio teste *Mucor araneosus* Jacq. misc. II. 144. t. 15. et *Tubulina Cremor* Flor. dan. I. 659. f. 1. aetates fluxas praestant.)

C. *Sphaerogaster's* s. *globulares*, *geophili* plurimque, primordiis carnosis globosis pulpa primum unctuosa farcis, sub tempore idoneo ex mycelio ut plurimum hypogaeo subcuntibus arescendoque sensim peridia globosa, basin magis minusve attrahentia s. producentia, libera, ex indumentis simplicibus s. duplicitibus iisque sacculis inter se difformibus membranaceis s. carnosis, jugiter connatis, sive sine ordine desquamantibus sive cum ordine quadam reclinatis composita verticemque varium, nunc sensim dehiscentem, nunc ore figurato s. hiatu reclusum monstrantia sporidiisque floccorum apparatus varius exceptis fuliginosis foeta informantibus.

(*Gasteromycetes trichogasteres* Fr. *Lycoperdaceae lycoperdeae* Dub. *Gasteromycetes geogasteres* et *dermatogasteres* Spr. syst.)

283. LYCOGALA MICH. Milchstaeubliug.

Peridium figuratum subglobosum sessile, ex membra-
na duplii compositum, papyraceum, vertice sensim de-

fuscens. Speridia colore debili tincta cum floccis vagis lateralibus capillaribus facile profuga.

(*Lycogala* Mich. Pers. ex emend. *Galeperdon* Wigg. hols. Fr. *Liceac*, *Lycoperdi*, *Mucoris* spec. auct.)

2252. *L. miniatum* Pers., peridiis subgregariis, primum pulposis miniato-sanguineis subglobosis pisiformibus, dein arescendo decoloribus alutaceis s. punctulis resinosis inscriptis, vertice lacero dein dehiscentibus, sporidiis nubilibus e rosa debili pallide-cinnamomeis. — *Lycogala epidendrum* Fr. syst. III. 80. *L. miniata* et *ferruginea* Schum. saec. II. 192. *L. miniata* Pers. obs. II. 26., syn. 158. Nees syst. f. 97. (junius.) Grev. cr. t. 38. Dub. gall. II. 862. *L. punctata* Nees syst. f. 96. (foetum) nec Pers. *L. verrucosum* Batsch. *Mucor fragiformis* Schaeff. bayar. t. 193. *Lycoperdon pisiforme* Linn. *L. Epidendrum* L. spec. 1654. Hall. Poll. Burb. hal. *L. sanguineum* Rupp. *Bovista miniata* Dill. *Lycogala globosum* Mich. gen. t. 95. — *Flor. dan.* t. 720. *Bull. fung.* t. 503. *Sowerb. fung.* t. 52.

Ad truncos arborum, Alnorum potissimum, lignaque quaenamque irrigua, a veris iuitio inde ad hyemis finem volgare. (*Moles pisi*, nucem majorem non nisi attingens. Primordia miniata, pulposa, cum Lyceis cylindricis quadantenua fuscum facientia, arescendo versicolora, magis minusve fuscescens superficiemque alutaceam s. ex punctis resinosis superstitionibus scabram induentia, ocius vero jam sporidia variorum colorum et debilium, pallide-rosea, cinerea s. ex albido-flaventia profudentia.)

2253. *L. conicum* Pers., peridiis gregariis, primum pulposis miniato-rubris conicis, dein arescendo violaceo-pupurascentibus nitidis, demum verrucis in fibrillulas brevissimas solutis variegatis pallide-fuscis, vertice truncato fatiscentibus, sporidiis foetis pallide-roseis fere argillaceis. — *Lycogala conica* Pers. syn. 159. Fr. syst. III. 82.

Ad ligna carie exesa Hercyn., auctemno, rarissime. (Praecedentem ferme aemulatur quidem, ligula exacte

conoidea tamen et superficie verrucoso-fibrillosa variegata differentiam spondere videtur.)

2254. *L. plumbeum* Fr., peridiis sparsis, primum pulposis pallidis ovato-subglobosis, dein arescendo e cinereo plumbeis, vertice forato reclusis, sporidiis demum albo-flaventibus. — *Lycogala plumbeum* Fr. syst. III. 82. *L. cinerea* Schum. saec. II. 193.

Ad ligna abietina putria Hercyn. superior., passim. Auctumno. (Differt potissimum colore peridiorum cinereo et sporidiorum magis albente, nunquam saltem roseam immiscente aequo ac dehiscendi modo magis regulari Tylostomatis instar.)

2255. *L. punctatum* Pers., peridiis sparsis, primum pulposis globosis stramineis resinoso-punctatis, dein arescendo cinerascentibus fusco-papillatis, sporidiis pallidis. — *Lycogala punctatum* Pers. syn. 158. *Mart. erl.* 371. nec alior. — *Bull. fung.* t. 416. f. 3.

Ad trunca Thuring., rarius. (Qualem ipse hoc titulo tuli speciem Persooniano nec Friesiano, qui dubiam relinquit, accedere videtur quidem ad *L. plumbeum*, peridiis tamen et sporidiorum colore aequo ac superficie papillosa distinguatur.)

2256. *L. parietinum* Fr., peridiis sparsis exiguis, primum pulposis hemisphaericis olivaceis, dein arescendo nigro-coerulescentibus rigidis fragilibus punctatis lacero-dehiscentibus, sporidiis fluventibus. — *Lycogala parietinum* Fr. syst. III. 83. *Licea bicolor* Pers. syn. 195., icon. t. 3. f. 4. *Alb. et Schw.* nisk. 107. *Didymium parietinum* Schrad. nov. gen. 24. t. 6. f. 1.

Ad parietes lutosos calce tenuiter obductos in locis abditis, Thuring. v. c., rarius. (Desciasit a reliquis peridiis tegmine rigidiore ideoque fragiliore, nec non colore atramentario (*Alb. et Schw.*) vel potius e nigro coerulecente aberrat et ex minoribus generis est.)

284. BOVISTA DILL. EMEND. *Lappenstaeubling.*

Peridium globosum papyraceum, tegmen externum primum aduatum cellulosum dein in squamas satiscendo

caducum, interius membranaceum tenerum vertice inaequaliter rumpens. Sporidia microscopica in basio producta s. pedicellata, floccis undique consertimque adnatis ramosis tortuosis inspersa.

2257. *B. nigrescens* Pers., peridio papyraceo tenuaci albo-cinereo subgloboso, demum nigrescente-umbro, a basi rotundata plicata residua iude corticem laevem exente, sporidiis purpureo-fuscis floccos conferitos ambeuntibus — *Bovista nigrescens* Pers. disp. 6., syn. 136. Fr. syst. III. 23. *Lycoperdon nigrescens* Wahlenb., succ. II. L. *Bovista Sowerb.* fung. t. 331. aliorumq. auct. *L. globosum* Bolt. fung. t. 118. *L. arrhizone* Batsch elench. t. 29.

2258. *B. cepaeformis* W., peridio obovato in basin brevissimam deplanatum consistente, dein helvolo furfuraceo-floccoso tenaci, vertice perforato collapso, floccis parcis subtilissimis, sporidiis globosis longe canbatis e viola debili pallentibus. — ?*Bovista cepaeformis* auct. qrdam.

Ad terram arearum nemorensium Thuring., v. c. prope Heringam. (Wallr.) (A reliquis peridii figura obovata, in basin deplanatam latescente, superficie furfuraceo-floccosa pallida et sporidiorum colore e viola quid subeunte satis distincta.)

2259. *B. nuciformis* W., peridio sphaerico utrinque obtuso nuciformi, cortice exteriore membranaceo scarioso floccoso-pulverulento subpersistente internumque argenteo-gryseum diutius obvelante, vertice demum recluso, floccis parcis subtilissimis, sporidiis microscopicas breviter caudatis ochraceo-sulfureis.

Ad terram semitarum collium s. promontoriorum graminosorum Hercyn. infer., v. c. circa Breitenstein, locum meum natalem. (Nucis avellanae majusculae molem et figuram exacte refert, corticem externum diu servat et demum primum ex verticis ore patulo sporidia ochraceo-sulfurea profundit et erratica evolat.)

2260. *B. plumbea* P., peridio globoso nuciformi papyraceo flexili plumbeo-caesio, demum praeter basin residuum corticem exuente verticemque angustum recludente, sporidiis primum pulposis rubeatibus, foetis successentibus. — *Bovista plumbea* Pers. obs. I. 5., syn. 137. pr. pr. Fr. syst. III. 24. Dub. gall. II. 854. *B. pusilla* Pers. syn. 138. (*forma minor.*) *B. furfuracea* Pers. l. l. (junior.) *Lycoperdon furfuraceum* Batsch elench. t. 145. *L. sphæricum* Mich. gen. t. 97. f. 6.

In montium promontoriis sterilibus Thuring., haud rara. (Praecedente minor, nucem avellanam aequans, exacte globosam; pulpa primum rubescens.)

2261. *B. tunicata* Fr., peridio globoso papyraceo flexili plumbeo-gryseo lacero-dehiscente, extus membrana tenuissima discreta tunicato, sporidiis olivaceo-fuligineis, floccis tortuosis acutissimis inspersis. — *Bovista tunica* Fr. syst. III. *B. plumbea* Pers. l. l. pr. pr.

In clivis graminosis ad terram sterilem, Thuring. v. c. passim. (Praecedentem fere refert, peridio tenuiore, magis laevigato, plumbeo, membrana hyalina obducto eoque quasi tunicato tamen differre videtur.)

285. LYCOPERDON TOURN. Flockenstäubling.

Peridium e basi aequali producta subglobosum, tegmen externum contiguum furfuraceum s. verrucosum fugax varie dehiscens, internum membranaceum persistens, vertice tenuato regulariter rumpens. Sporidia globosa simplicia laxa coacervata, floccorum a lateribus saepius secedentium parastadem compactam e basi inde assurgentem conicam obstruentia.

(*Lycoperdon Tournef. pr. pr. Pers. et auct. Lycoperdi et Bovistae sp. Linn. et auct.* (A Bovista genere, cui Neesius nuper subscriptis, peridio tenero, mollissimo, a vertice inde caduco, cyathum, ut ita dicam, fomentarium ipsis sporidiis globosis caudatis demum denudatum relinquentे diversum.)

+ pachypodes, peridii acauli globosi vertice molli, dein caduco cupulari, floccis parcis fugacibus.

2262. *L. Bovista L.*, peridio globoso acauli insigni saepe giganteo verticemque areolatum dehiscendo sensim exente basinque obconicam plicatam cyathoden dimidiatam relinquente, cortice floccoso subdiscreto, sporidiis olivaceo-fuligineis cum floccis parcis ocius jam fugacibus. — *Bovista gigantea* Nees syst. f. 124. Dub. gall. II. 854. *Lycoperdon Proteus* Sowerb. fung. t. 332. *L. giganteum* Batsch fung. t. 165. Pers. syn. 140. DC. gall. II. 264. *Flor. dan.* t. 1920. *L. Bovista L.* spec. 1653. pr. pr. (saltem ex synon.) Bull. fung. t. 447. Fr. syst. III. 29. *L. maximum* Schaeff. bavar. t. 191. *Bovista maxima* Dill. *Bovista J. Bauh. hist.* III. 111. Clus. hist. 286.

In promontoriis pinguioribus pratisque editioribus, v. c. Thuring., passim suisque, aestate exeunte locis. (Insigniter variat a bulbi ad crani humani (*Fungus rotundus orbicularis, capitis pueri magnitudine* C. Bauh. pin. 375.) vel modii molem giganteamque formam s. macrocephalam, *Friesio* teste, ulnas duas pondusque librum suecic. 18. facientem, suis locis, v. c. auf dem Straussberge, an der Rothenburg) profert. Saucios fungos daedaleas profecto adsectat formas, ex quarum numero *Lycoperdon quadricorne* Sw. act. holm. 1815. p. 123. innotuit.)

2263. *L. caelatum* Bull., peridio obconico-turbinate ample pallescente, verticem flaccum in squamas latusculas tessellatim rimosas dehiscentem demum exente basinque obconicam plicato-scrobicolatam cupularem dimidiatam relinquente, sporidiis fuligineo-lutescentibus cum floccis parcis interspersis liberis aufugis. — *Lycoperdon Bovista* Pers. syn. 141. Nees syst. f. 125. *L. caelatum* Bull. fung. t. 430. DC. gall. II. 264. Dub. gall. II. 855. *L. gemmatum, areolatum et papillatum* Schaeff. bavar. t. 186. 189. 190. *Bovista officinarum* Dill. Raj. *Lycoperdon Vaill. paris.* t. 16. f. 4. *Fungus semiorbicularis* Dodon. Mentz. pug. t. 6. Clus. hist. 287.

In promontoriis collinis Thuring. minime raro. (Praecedente plerumque minus, vertice flacco facile caducum cupulamque obconicam satis crassam, auctum ei tempore relinquent. Sporidiorum farcimen pro varia aetate varium proferre solet colorem: hinc var. vitellina, peridio sporidiisque vitellinis (*Lycoperdon vitellinum* Fr. symb. 7.) et var. fusca, sporidiis floccisque fuscis, passim intercurrent ex metamorphosi subeante.)

2264. *L. pusillum* Batsch, peridio globoso obtuso toto flaccido persistente, vertice ore angustato dehiscente, tegmine externo laevigato dein rimoso adpresso-squamoso, basi sterilescente obsoleta cum floccis collapsis contigua, sporidiis olivaceis. — *Lycoperdon pusillum* Batsch fung. cont. II. f. 228. Fr. syst. III. 33. *Bovista pusilla* Pers. syn. 138. *L. ericetorum* Desv. *L. pratense* Schum. *L. Bovista* Bolt. fung. t. 117. *L. laccerum* Batsch. *L. cepaeforme* Bull. fung. t. 436. f. 2. pr. pr. *L. furfuraceum* Schaeff. bavar. t. 294. — Mich. gen. t. 97. f. 3.

In agris sterilibus arenosis post messem minus frequenter, v. c. Hercyn. infer. (Sessile, pro parte sub terra defossum, nisi nucisque molem aquans, globosum primum osculoque exiguo prominulo nec tamen umbo-nato reclusum, & reliquis cupularibus prorsus alienum, hinc Bovistis recentiorum affine et cautius a *L. verrucoso* satis polymorpho dignoscendum.)

† brachypodes, peridiis globosis in basin turbinatam abrupte excutientibus, sere tubaeformibus, prius pulposis dein membranaceis, e vertice sciso floccos densos persistentes elasticos monstrantibus sporidiisque profundentibus.

2265. *L. granulatum* W., peridio subgloboso in basin plicatam attracto membranaceo fusco duriusculo fragili, tegmine continuo in verrucas exiguae tessellatas usperas contracto, floccorum parastade basilari compacta obovata, sporidiis cinereo-olivaceis.

In ericetis nemorosis Thuring. (Wallr.) (Bovistam

nuciformem mole ac figura, colore et superficie Ceratium granulatum refert.)

2266. *L. saccatum* Fr., peridio infra verticem rotundatum depresso in collum abrupte constricto a pileato turbinatoe scarioso, tegmine tenui obtecto, vertice in areolas dehiscente, demum dilute-fuscescente, floccorum parastade persistente constipata, a basi inde collum penetrante elastica, sporidiis umbrino-fuligineis. — *Lycoperdon saccatum* Fr. syst. III. 35. Flor. dan. t. 1139. *L. boletiforme* Pers. *L. gemmatum* et *ericiplum* auct. *L. medium* Vaill. Bocc. mus. t. 306. f. 1.

In domitis collinis promontiorum patruorum nemoribusque caeduis. (Cautius dignoscendam praecipit Friesius, cum sequente facile commutandam speciem: peridio ad collum constrictio veluti pileato, praeter corticem tenuiter granulatum externum ex membranula scariosa diutis persistente conflato et floccis compactis elasticis illud totum infarcientibus.)

2267. *L. pyriforme* Rupp., peridiis subfasciculatis umberatis in basia brevem abrupte tenuatis pyriformibus membranaceis helvolis, verrucis exiguis fuscis distinctis dein caducis inscriptis, floccis demum a latusculis secedentibus paraatademque centralem conicam compactam relinquentibus, sporidiis olivaceo-fuscis. — *Lycoperdon pyriforme* Rupp. jen. 304. Bull. fung. t. 32. Dub. gall. II. 854. Pers. syn. 148. Fr. syst. III. 38. *L. Bovista* d. *pyriforme* Wahlenb. succ. II. 1023. *L. ovoidicum* Bull. t. 435.

Ad latera montium declivium nec non ad trunca putridos Tharing. et Hercyn. inferior. passim. (Peridia plerumque aggregata ex mycelio rhizode protenso subcunctia (*Lycoperdon ramosum* Jacq. austr. t. 224. Flor. dan. t. 1680.), demum helvola ex verrucis uberrimis minutulis inscripta potius fuscescentia nec in areolas dilata, nonnisi vero spinulis brevibus inde successantibus obsita.)

2268. *L. verrucosum* Rupp., peridio subgloboso vario, saepius tamen abrupte in basin longiore pro-ducto, demum membranaceo, tegmine farinaceo in ver-rucas stellatas dispanso inque spinulas caducas abeunte su-perfuso iisque evanidis scarioso cinerascente, floccorum parastade basiliari subrotunda compacta, sporidiis viridi-fuscis. — *Lycoperdon gemmatum* Batsch. Fr. syst. III. 36. *L. Bovista* Bolt. t. 117. *Wahlenb. suec.* II. 1023. *L. Proteus* Hull. t. 143. *DC. gall.* II. *L. verrucosum* Rupp. jen. 356.

a. excipuliforme, peridio subrotundo, basi elongata sub-cylindrica duplo longiore tenuiter plicata sussulto, vertice verrucoso-gemmato spinulosove. — *Lycoperdon gemmatum* *a. excipuliforme* Fr. l. l. *L. excipuliforme* Scop. Schaeff. bavar. t. 187. Pers. syn. 143. Nees syst. f. 126. — *Vgill. bot.* t. 12. f. 15.

β. perlatum, peridio rotundato depresso basi tereti scabriuscula sussulto, vertice verrucis compactis demum caducis areolas pentagonas dilutioreas relinquentibus ob-sito. — *Lycoperdon gemmatum* *β. perlatum* Fr. l. l. *L. nigrescens* Pers. (vetus.) *L. perlatum* Pers. obs. I. 4., syn. 148. *L. hirtum* Bull. t. 475. *L. gemmatum* Batsch. Flor. dan. t. 1120. — *Vaill. bot.* t. 12. f. 16.

γ. furfuraceum, peridio turbinato, vertice in verru-cas maiores depresso dispanso. — *Lycoperdon gemma-tum* *γ. furfuraceum* Fr. l. l. *L. molle* Pers. obs. II. 79., syn. 150. *Dub. gall.* II. 854.

δ. papillatum, peridio subsessili subrotundo, vertice furfuraceo-papilloso. — *Lycoperdon gemmatum* *δ. papil-latum* Fr. l. l. *L. papillatum* Schaeff. bavar. t. 184. *L. pratense* Pers. pr. pr. *Dub. gall.* II. 855. *L. cepae-forme* Chevall.

η. hirtum, peridio subsessili turbinato, vertice ver-rucis mollibus tenuibus (plerumque nigrescentibus) hirto. — *Lycoperdon gemmatum* *δ. hirtum* Fr. l. l. *L. hirtum* Mari. erl. 386. *L. umbrinum* *β. hirtum* Pers. syn. 148.

L. echinatum, peridio turbinato verrucis spinosis valdioribus sparsis horrido. — *Lycoperdon gemmatum* *y. echinatum* Pers. syn. 147. Schum. Dub. *L. pyriforme* auct.

In nemoribus caeduis, fagetis potissimum (Thuring. et Hercyn.) ubertim, (Species distincta at peridii figura et superficie valde varians, ab auctoribus autem praeter Friesium perperam interpretata, a reliquis tegmine furfuraceo dispanso ibique in verrucas spinulasve abeunte, membranam scariosam areolatam relinquente, facile dignoscenda.)

2269. *L. constellatum* Fr., peridio obovato membranaceo persistente, tegmine aculeato fusco-reticulato dein caduco, floccis laxis sporidiisque fusco-purpureis. — *Lycoperdon constellatum* Fr. symb. T., syst. III. 39. *L. umbrinum* Flor. dan. t. 1800.

In altis fagitorum penetralibus Hercynia inferior. (Wallr.) (Cant. a L. gemmati formis echinatis dignoscendum: peridii tegmine aculeos confertos acutos, habitum horridiorem spondentes producto usque evanidis, Colubri instar, fusco-reticulato.)

2270. *L. utriforme* Bull., peridio elato obtuso sensim in basin praelongam obesam cylindricam subaequalem abeunte, primum albo, dein helvolo s. lutescente, tegmine floccoso concolore diu persistente in spinulas tenues s. e basi latiore floccosas abeunte undique superiusfuso, floccorum parastade tenerima compacta illud infarciente, sporidiis terreo-fuscis. — *Lycoperdon utriforme* Bull. champ. t. 450. f. II. DC. gall. II. 263. Dub. gall. II. 855. ?*Bovista uteriformis* Fr. syst. III. 25.

Ad terram nudam nemorum caeduorum apricorum v. c. prope Breitenstein Hercyn. infer. (Quamvis minus nota, distinctissima tamen tum differentiis l. tum proceritate insigni spithamea fere et amplitudine baculi.)

286. TYLOSTOMA PERS. Spundstaedling.

Peridium globosum papyraceum, tegmine farinaceo caduco obductum, stipite proprio suffultum, verticis cen-

tro osculo circinato - figurato pertusum. Sporidia microscopica globosa in globos majores collecta, floccis peridio adnatis arachnoideis excepta.

(*Tylostoma* Pers. et auct., *rectius* *Tylostoma* cum *Sprengelio*. *Lycoperdon* Tourn. Mich. L.)

2271. *T. mammosum* Fr., peridii globosi osculo mammoso prominulo integro, stipite aequali subsquamose fistuloso recto unciali. — *Tylostoma mammosum* Fr. syst. III. 42. *T. brumale* DC. gall. II. 269. Nees syst. 130. *Flor. dan.* t. 1740. f. 1. *Dub. gall.* II. 855. *Lycoperdon pedunculatum* L. sp. 1654. *Bull.* t. 294. 471. f. 2. *Mart. erl.* 389. *L. parisiense* Tournef. *nat.* t. 331.

β. squamosum, stipite imbricato-aquamoso. — *Lycoperdon palmatum* Batsch. *L. squamosum* Gmel. *Tylostoma squamosum* Pers. syn. 139. — Mich. gen. t. 97. f. 3.

In campis arenosis rarius, v. c. agri hannover., gotting., erlang. (*Martius*), lipsiens. (*Schreber*, qui sporidia caudata laudat) et alibi.

2272. *T. fimbriatum* Fr., peridii globosi osculo piano saturatus tincto helvolo-fusco ciliato - fimbriato, stipite aequali farcto nadiuscule. — *Tylostoma fimbriatum* Fr. syst. III. 43. *Lycoperdon brumale* Pers. syn. 139. *Wahlenb. suec.* 1024. *L. pedunculatum* auct. pl. Batsch elench. f. 167.

In promontoriis et aggeribus limosis, tectorum graminis Thuring. rarissime, v. c. circa Heringam, brumae tempore. (*Friesii* fide utramque simillimam distinxii, meaque stipite farcto, longiore, robustiore, osculo obtusissimo, fimbriis ciliatis facile demum deciduis deplano sporidiisque pallidioribus pro suo agnovi.)

287. GEASTER MICH. Sternstuebling.

Peridium globosum primum clausum stratisque duplicitibus distinctis compositum, exteriore carnosò volvato dein stellatimque fisso, stromatis vices veluti agente, ab interiore globoso centrali papyraceo vertice deliscente,

reclinato basique substrato. Flocci laxi peridio undique adnati. Sporidia majuscula sphaerica.

(*Geaster Mich. Fr. Geastrum Pers. Lycoperda geastrum Woodw. Myriostoma et Plecostoma Desv. Actinodermium Nees.*)

† *plecostomata*, ore conico elongato pectinato striato. (*Geastrum ore coronatum Mich.*)

2273. *G. fornicatus Fr.*, peridii tegmine externo subquadrifido testaceo revoluto-fornicato, interno globoso stipitato rufescente, ore conico striato. — *Geaster fornicatus Fr. syst. III. 12. Geastrum quadrifidum DC. gall. II. 267. Nees fung. f. 128. Dub. gall. II. 853. Mart. erl. 387. Lycoperdon volva reflexa Schmid. icon. t. 37. (var. minor et major.) L. fenestratum Batsch clench. f. 168. L. coronatum Schaeff. bavar. t. 183. L. fornicatum Huds. Woodw. Sowerb. fung. t. 198.*

Ad terram pinetorum, super folia coniferarum compacta, v. c. agri erlang. (Martius), berolin. (Schltdt.) halensis. (Wallr.) et aliis procul dubio Germaniae locis. Autumno. (Peridii exterioris radii plerumque quaternatim, saepius etiam pluries (var. *multifida* Schmid. l. l. f. 11-14. *G. multifidum Pers. disp. G. pectinatum Pers. syn. 133.) fissi.)*

2274. *G. striatus DC.*, peridii tegmine externo tenui membranaceo multifido explanato, interno punctulato umbrino sphaericо substipitato, ore conico elongato acuminato striato. — *Geaster striatus Fr. syst. 13. G. striatum DC. gall. II. 853. G. coronatum β. Pers. syn. 132. G. multifidum Schreb. spic. 113. Pers. l. l. G. pectinatum Schltdt. berol. II. 167. Lycoperdon pedicellatum Batsch clench. f. 151. Willd. berol. 413. — Mich. gen. t. 100. f. 3.*

β. *minimus*, tegmine peridii externo pauci-radiato, interno subconoideo globoso pallido. — *Geastrum minimum Chevall. par. 360. t. 10. f. 3. nec Schwein. G. badium Pers. in Desv. Journ. bot. 1809. t. 9. p. 27.*

In ericetis arenosis rarissime, v. c. agri berol. (Willdenow. Schlechtendal.)

*† schizostomata, ore fimbriato-ciliato depresso
plano s. late conico canescente. (G. ore fimbriato Mich.)*

2275. *G. limbatus Fr.*, peridii tegmine externo coriaceo testaceo multipartito, interno stipitato globoso umbrino-nigricante, ore depresso acutiusculo fimbriato-piloso. — *Geaster limbatus Fr. syst. III. 15.* *Geastrum multifidum DC. gall. 267. Dub. gall. II. 853.* *Grev. cr. t. 306.; var. β. Pers. syn. G. coronatum Pers. syn. 132.* *Lycoperdon volvam explanans* Schnid. *Icon. t. 46.* *L. stellatum Huds.* Sowerb. *fung. t. 312.*

In pinetis editioribus, Hercyn. v. c.

2276. *G. fimbriatus Fr.*, peridii tegmine externo multipartito explanato-flacco, interno sessili, ore indeterminato fimbriato-piloso. — *Geaster fimbriatus Fr. syst. III. 16.* *Lycoperdon Geaster Batsch* *clench. f. 151. Willd. berol. 472.* — *Mich. gen. t. 100. f. 2.*

Ad terram nodam nemorum editiorum Hercyn. inferior. (Wallr.), agri herolin. (Willdenow) et alibi rarius. (Tegmen externum dein in lacinias ovatas s. obovatas fissum, flaccum explanatum; interioris vertex in osculum piloso-fimbriatum reclusus.)

2277. *G. mammosus Chev.*, peridii tegmine externo aequaliter multipartito, supra castaneo, subtus argenteo rigido hygrometrico, interno sessili depresso, ore in disco circulari conico-acuto ciliari. — *Geaster mammosus Fr. syst. III. 17.* *G. mammosum Chevall. par. 359.* *G. hygrometricum β. Pers. syn. 135.* *Lycoperdon corallinum Batsch* *clench. f. 151.* — *Mich. gen. t. 100. f. 3.*

Ad terram sterilem schistosam quercetorum collinorum Hercyn. v. c. inferior., prope Breitungen comit. Roslaens. Auctummo sero. (Majusculus; radii inflexi, viccando reflexi, eximia hygrometrici.)

+++ *odontostomata*, ore dentato determinato,
ciliis non distinctis.

2278. *G. rufescens* Pers., peridii tegmine externo
multifido demum revoluto, interno sessili nudo, ore den-
tato. — *Geaster rufescens* Fr. syst. III. 18. *Geastrum*
rufescens Pers. syn. 134. Alb. Schw. nisk. 79. *Flor.*
dan. t. 1433. *Lycoperdon recolligens* Sowerb. L. volvam
reflectens Schmid. icon. t. 43. 53. *L. stellatum* L. spec.
1653. *Poll.* Schaeff. bavar. t. 182.

In pinetis ad terram undam variis German. locis
passim, auctummo. (Varietates majores et minores in-
tercurrunt.)

2279. ? *G. stellatus* W., peridii tegmine externo
tenui explanato s. involuto 7-10 radiato pallido demum
caduco, interno subsessili globoso viridulo. — *Lyco-*
perdon multifidum Schreb. spic. 113. *L. stellatum* Oed.
fl. dan. t. 360.

In muris argillaceis Schoenfeldicis agri lipsiens. inter
muscos, auctummo et hyeme. (Schrebero auctore certis-
imo laudavi, qui simul sporidia caudata indicat. Dcano
indagandus.)

++++ *actinostomata*, ore substellatum fuso glabro
nec prominente, peridio sessili firmo magis fere lignoso.
(*Sterebeckia* Lk. *Actinoderma* Nees. *Geastrum* ore stel-
lato Mich.)

2280. *G. hygrometricus* Pers., peridii tegmine
externo crasso rigido multipartito inflexo carnoso, su-
pra cinereo-fuscescente demum rimoso s. areolato, sub-
tus laevi albo, interno sessili vellere albo obducto ra-
rius calvo depresso globoso aunciformi irregulariter de-
hiscente. — *Geastrum hygrometricum* Pers. syn. 135.
excl. var. DC. gall. II. 268. excl. syn. quibsd. Mart.
erL 388. Nees-syst. f. 127. Dub. gall. II. 853. Fr. syst.
III. 19. *Lycoperdon volvam recolligente* Schmid. icon.
101. t. 27. *L. stellatum* Scop. carn. II. 489. excl. syn.
Bull. t. 138. pr. pr. Willd. berol. 412. *Gleditsch* meth.
t. 6. — *Mick.* gen. t. 100. f. 4. 6.

Ad terram sterilem schistosam quercetorum collinorum, auctumno, v. c. circa Breitungen (Wallr.), agri erlang. (Persoon, Martius), agri berolin. (lusus calvus), (Beyrich), et alibi rarius. (Polymorphus et forsitan ad peridiis superficiem nunc villosam nuac glaberrimam ad species duplices revocandus.)

C. *Naucogasteres*, peridiis corticatis duris clavis, sponte saltē non dehiscentibus, veluti naucosis, intus primum farcimine pulposo, dein in sporidia floccis transversis, nec in parastadem centralem collectis intercepta, inquinantia mutata foetis.

(Gasteromycetes trichogasteres sclerodermei Fr. Lycoperdeacearum genera Brongn. Dub.)

283. SCLERODERMA PERS. Fellataeubling.

Peridium globosum firmum adnato-corticatum clavatum omnino s. irregulariter fatisens. Flocci e latere interno porrecti, dissepimenta angusta cellulosa mentientes, cum sporidiis interjectis primum compacti, demum soluti, fuliginosi.

(*Scleroderma Pers. Lk. et auct. Lycoperdastra Mich.*)

2281. *S. vulgare* Fr., peridio globoso insigni saepius difformi sessili, in basia deplanato citrino durissimo, vertice areolato-verrucoso diutius clauso sordide-albo s. lutescente, primum pulpa atro-coerulecente, dein sporidiis fuligineis, septis floccosis albo-gryseis interceptis foeto. — *Scleroderma vulgare* Fr. syst. III. 51. Flor. dan. t. 1969. f. 2. *Scl. squamatum* Chevaill. *Scl. citrinum*, *Cepa et spadiceum* Pers. syn. 153 (varicatae.) *Scl. aurantium* Pers. l. l. excl. syn. *L. Lycoperdon tessellatum* Schum. saell. II. 191. *L. aurantiacum* Bull. champ. t. 270. nec *L. Sowerb.* t. 268. *L. cervinum* Bolt. t. 116. *L. majus* Vail. par. t. 16. f. 8.

In pietatis nostratibus minime raro. Auctumno.

2282. *S. Boe Vista* Fr., peridio subrotundo s. obovato subsessili difformi molli inaequabili floccoso sordide

lateo s. pallide fuscescente, vertice areolato - tessellato s. rimoso, floccis flavescentibus, sporidiis olivaceis fuliginoisis. — *Scleroderma Bo Vista* Fr. syst. III. 48. *Lycoperdon defossum* Batsch cont. II. f. 229. *L. polyrrhimum* Batsch elench. 141. — Mich. gen. t. 99. f. 2.

In campis arenosis German. borealis ipsiusque agri halens. passim. Auctemno. (Differt a praecedente, cui simile, peridio molliore, dein vero magis rigente et fragiliore, pulpa magis butyracea flavente, dein in sporidia olivacea septis lutescentibus intercepta conversa.)

2283. *S. macrorrhizan* W., peridio rotundo magno coriaceo helvolo, in basin myceliis latescentibus implexis longis ramosis albis fibrilosis sustentatam abrupte filamentibus, verticis epidermide scissa tenuiter areolata, floccis pallide-flavescentibus, sporidiis olivaceo-viridibus. — ? *Scleroderma vulgare* β. *macrorrhizum* Fr. t. 1.

Ad terram glaceosam tersam arearum hortensium northusan., auctumno. (Mycelia e basi latescente sensim tenuata, in fasciculum comosum implexa peridium, Mytremycetis instar elevant, nec ex terrae sed ex naturae conditione profiscuntur.)

2284. *S. verrucosum* Pers., peridio rotundato duro subverrucoso in basin brevem stipitiformem producto, verticem versus magis tenuato fragili subspadiceo, pulpa atro-purpurascente, floccis sporidiisque fuscis. — *Scleroderma verrucosum* Pers. syn. 154. Grev. er. t. 48. Fr. syst. III. 49. *Lycoperdon spadiceum* Nees syst. f. 123. nec Pers. Schneff. bav. t. 188. *L. defossum* Sowerb. t. 311. *L. verrucosum* Bull. t. 24. DC. gall. II. 265. Schaeff. bav. t. 184. — Mich. gen. t. 99. f. 3. Vaill. paris. t. 16. f. 7.

β. minus, peridio reniformi sessili. — *Scleroderma spadiceum* auct. *Lycoperdon dispar* Batsch.

In campis pinetisque arenosis vulgare.

2285. *S. areolatum* Ehrenb., peridio depresso-globoso sequenciali flavo-fusco in mycelia brevia rhizoi-

dea complexa finiente, areolis saturationibus minimis eleganter tessellato, sporidiis dilute fusco-purpurascen-
tibus globosis minutis. — *Scleroderma areolatum* Ehrenb.
aglo. 15. n. 27. Schitdl. Berol. 167.

In campis umbrosis agri berolin. ipsiusque hort. bot.
areis (Ehrenberg), agri halens. (Wallr.) (Friesius pre-
cedenti subscriptis habitu satis alienam.)

289. BULLARDIA JUNGH. *Bulliard's - Staubbning.*

Peridium naucosum nuciforme arrhizum, cortice te-
staceo fragili obductum, intus sporidiorum sarcimine,
primum pulposo dein fuligineo inquinante, membranulis
semet invicem excipientibus, cavernulasque fibris teneris
ramosis exstructas informantibus intercepto foetum.

2286. *B. inquinans* Jungk., peridio subterraneo
naucoso nuciformi majusculo rotundo laevi fusco-atro,
fibrillis radicalibus parcis arcte adpressis vestito, intus
sporidiis globosis atris inquinantibus foeto. — *Bullardia*
inquinans Junghuhn in Schitdl. Linn. 1830. p. 408.
? *Tuber moschatum* Bull. t. 479. Dub. gall. II.

In coryletis odis Hercyn. superioris et inferioris, au-
ctumno, maxime Hyadibus faventibus. (Junghuhn.)
(Odorem subdilem, haud ingratum spirat, sere aroma-
ticum nec tamen moschum redolet. Sapor dulcissimus.)

290. CERAUNIUM THEOPHR. *Staubträffel.*

Peridium sphaericum subterraneum arrhizum naucosum
süberosum (exsiccando) lignescens bicorticatum, in-
tus trabeculis fibrillosis ramosis a latere utroque por-
rectis, sporidia majuscula rotunda, primum coagulata
dein laxius disposita inquinantia interstinctibus in-
structum.

(*Phymatium* Chevall. *Klaphomyces* Nees. Fr. *Sclero-dermatis* sp. Mich. Pers. *Lycoperdastrum* auct. nec.
mediae. *Tuberis* sp. Plin. Tournef. Nees syst. *Ceraunium*
Wallr. in lit. 1815. *Kequivox* Theophr.) (Antiquitus in-

notuit. Fungum ex semine cervorum nasci cervosque eundem inter aphrodisiaca eligere, patres fabulantur quidem ridiculi, nec tamen rationem ad titulum, a Neesio factum confirmant, quem dudum cum Eresio meo restitui sacro-sanctum. Sues potius vescuntur.)

2287. C. granulatum W., peridio subrotando s. depresso, mole vario, strati externi intus citrini superficie pallide-fuscescente papulis adpressis minutis tessellato-granulata, interno carneo-pallente, sporidiis majusculis globosis opacis purpureo-nigricantibus, trabeculis ramosis fibrillosis carneo-fuscescentibus flocculorum brevium ope appensis. — *Elaphomyces granulatus* Nees. *Fr. syst. III.* 53. *Phymatium fulvum* Chevall. *par.* 361. *Scleroderma cervinum* Pers. *syn.* 156., *var. granulata* Alb. et Schw. *nisk.* 81. *Lycoperdon cervinum* L. *sp. II.* 1053. — *Weinm. phyt.* t. 524. *Mich. gen t.* 99. *f. 4.* *4. Tubera cervina* Lob. *ic. t.* 276.

Sub humo laxa coryletorum et pinetorum in promontoriis nemorensibus Hercyn. infer. v. c. suis locis satis abundantem. (Variat figura, mole, colore tegminis externi, nonnisi ab interno neque minus vario et in membraculem villosam carneo-fuscum saepius deliquescente, corticis instar sponte secedentis papillarum conicarum minutissimarum aspritiem alutaceam praestantium ratione et sporidiorum majusculorum distinctorum colore nigro-violaceo.)

2288. C. scabrum W., peridio subrotando nuciformi, tegminis externi intus flavi superficie papulis verrucosis conicis angulatis truncatis scabra stramineo-helvola, sporidiis exiguis violaceo-fuscis cum floccis albis interjectis congregatis. — *Elaphomyces scaber* Wallr. *in lit. E. cervinus.* f. Schleidl. *berol.* II. 166. *Lycoperdon scabrum* Willd. *berol.* 409. *t. 7. 19.*

Sub terra pingui in promontoriis collinis Thuring., auctummo. (A praecedente certo diversa sp., superficie scabra, colore helvolo magis, sporidiis duplo minoribus

floccisque byssoides productioribus plurimis interjectis facile recognoscenda.)

2289. *C. muricatum* W., peridio globoso tornato fulvo dein fusco aculeis subtetragonis acutis stipatis undique muricato, sporidiis nigrescentibus. — *Elatophomyces muricatus* Fr. syst. III. 59. excl. syn. Willd. *Scleroderma cervinum* auct. *Lyc. solidum* et *Tuber* Linn.

In similibus cum priore locis, fagetis, at apud nos multo rarioris. (De pyreniis dothideaceis, quibus peridia foras inscribuntur, et ex quorum notione *Hallerus* genus Sphaeriae subscribere voluit, adhuc sub-judice his est; melius forsitan ejusdem generis species, cum aliis Hymenomycetum inquiline (Sphaeria rosea, lateritia et Agaricola), vel cum ipso Hypolysso ventricoso Pers. interam comparanda.)

Ordo V.

HYMENOMYCETES FR. Sporenlagerschwämme.

Vegetabilia mycetoidea composita, habitu proprio ectypum Fungorum certius designantia, contextus floccosi s. celluloso-fibrosi, in ordinibus praecedentibus jam asyntheticis praenotati, in hoc tamen synthesin mycetoideam redintegrantis ope figurata, stromate ascophoro, i. e. a *comitate* fibroso-caruoso s. gelatinoso-luhrico sessili s. stipitato, admodum varie exstructo, *ascis* (*thecae* Lk. obs., *sporangiola* Lk. sp.) foetis vel effoetis s. primitus descendendo vacuis (*paraphyses* auct.) membranulam distinctam (*hymenium* auct., *receptaculum commune* auct., *sporoma* Lk.) usque constipatis pavitam emersive molliter farinosam inquinantem, nunc cubicularem conceputaculo excipuliformi (*Hymenomycetes angiospori*), vertice in velamen primum integrum dein vero varie fissum producto (*H. angiospori thyreodochii*), sive primitus statim recluso vel colum ex latusculorum reclinatorum hiatu, discum marginatum informante (*H. angiospori tomato-*

dochii) reconditam et exceptum, nunc nadam plane nec margine proprio septum (*H. gymnospori*), ascomatis amorphi s. in clavac, mitrae, volvae modum figurati faciem superiorem (*H. gymnospori peridochii*) inferioremvne (*H. hypodochii*) crustae contiguae iuster expansam, vel in tubulos pervios, subulas furcas, lamellas, ex natura dorsum propebas pileisque subitus appensas succrescentem, investientibus foeto insignia, mole quidem et habitus exteriori concinnitate totius classis culmen ipsamque cum vegetabilibus perfectioribus analogiam appellantia, nec tamen partium propagationi inservienti illasque concipientium apparatu attingentia.

(*Hymenomycetes pileati, clavati, mitrati, cupulati, tremellini et Gastromycetum angioasterum ordo tuberacearum Fr. Hymenomyc. tribus phaciacearum Fr. Dub. Fungorum ordines; clavati, explanati, pileati, uterini Nees, Martius. F. tremellini Dub. F. gastromyces heterocliti, sporomesti et rhantispori Lk. Sarcomyces Lk. sp. F. hymenothecii, agaricoidei, botetoidei, hydnoidei, gymnocalpi, lithothecii Pers. syn.*).

A. angiospori, ascomatibus sessilibus stipitatisve, colore, substantia et mole variis, vertice primum sive ex velamine obturatorio dein varie fisco, sive ex limbo connivente hiatumque cum disco ascophoro interjecto monstrante clavis, denique in discum ascophorum limbo s. margine succinctum ascis stipatis pavitum s. emersis incuso-pulverulentum coloratum reclusis, navicularibus, cylindrico-tubulosis, urceolaribus, patellaribus scutellaribus bivalvibusque.

(*Fungi tribus funginearum Brongn. Dub. Hypoxylon sphaeriaceorum sp., phaciaceorum genera Dub. Gasteromycetes phaciacei et depasearum genera Fr. Hymenomycetes cupulati, perizei, Dermei, Stictes et heterocliti Fr. Mycelomyctum sphaeroideorum et Fungorum utrinorum genera Spr. syst.*)

a. thyreodochii, ascomatibus vertice primum obturatis ibique deinceps sive radiatum, sive circumcircata,

sive laciniatim scissis, sive transversim laniatis discumque ascophorum magis minusve dilatum recludentibus, adnatis s. basi brevi suffultis, punctiformibus, verrucosis, lenticularibus, vascularibus s. scutellaribus.

(*Pyrenomyces phacidiacei* Fr. *Hypoxyla phacidiacea* Brong. *Dub. Fungi sphaeriacei a. xylomacei* Reichb.)

291. XYLOMA PERS. Blattschorf.

Hymenium entophloeodes placentare, ascis erectis axis subclavatis, sporodiole uniseriata continentibus fuscum, parenchymati decolori ipsi s. in stratum pseudo-astromaticum carnosum obesum luxurianti superimpositam, vertice primum summa epidemidis pellicula integra velatum deo undulata scissa redorsum, ascoma maculare s. placentare annatum mentiens.

(*Rhytisma* Fr. *Dub. Placuntium* Ehrenb. et *Ectstromatis* et *Asteromatis* sp. auct. ceterorum aliorumque incognitula. *Xylomata composita* s. *majora* Pers.)

† *leptostromatica*, ascomatibus entophloeodeis cum parenchymate foliorum hyalino concolore concretis aequalibus, macularibus.

2290. *X. hypophyllum* W., ascomatibus phloeoidea effusis insatio confluentibus, maculas hypophyllas oblongas rugoso-sulcatas opacas nigricantes intus albidas dehiscentes constitutentibus.

α. *Onobryckis*. — *Rhytisma Onobrychis* Fr. syst. II. 559. *Xylema Onobrychis* DC. gall. VI. 159.

β. *Lathyri*. — *Rhytisma Orobii* Schleid. berol. II. 218.

Ad *Onobrychis sativae* et *Lathyrri tuberosi* foliorum faciem inferiorem frequens, rarius tamen perfectum. Aestate.

2291. *X. Urticæ* W., ascomatibus subrotundis laevibus prominulis, halos insato atro caulem ambeante et undique denigrante succinetis, dein flexuoso-dehiscentibus discumque cinerastentem recludentibus. — *Rhytisma Urticæ* Fr. syst. II. 570.

Ad caules *Urticæ dioicae*, hyeme.

2292. *X. Liriodendri* W., ascomatibus immatis epiphyllis subrotundis umbonatis gregariis atris nitidis, intus concoloribus, in aversa folii parte maculas nigro-fuscas relinquenteribus. — *Ectostroma Liriodendri* Fr. syst. II. 602.

Ad folia Liriodendri Tulipiferae languida hortorum nostratum passim. Aestate.

2293. *X. lacrymans* W., ascomatibus epiphyllis insculptis circinatis nonnisi confluentibus tenerimis cum foliorum parenchymate aequalibus nigris opacis dein resinoso-micantibus, a centro papillato inde hyalinis inaequaliter plicato-radientibus ibique discum tenerrimum revelantibus, demum in maculam nigram tenuatam haluc dilutiore cinctam rotundatam confluentibus. — *Rhytisma acerinum* b. *Pseudo-Platani* Fr. syst. II. 569. *Xyloma Pseudo-Platani* auct.

Ad foliorum Aceris Pseudo-Platani et A. plataneoidis paginam superiorem Thoring. passim.

2294. *X. gyrae* W., ascomatibus epiphyllis insculptis, primum punctiformibus dein circinatis confluentibus foliorum parenchyma sensim permutcentibus maculamque nigram opacam supra gyroso-plicata effusam tenuem obsidentibus, demum discum pallescentem revealantibus. — *Rhytisma acerinum* a. Fr. syst. II. 569. *Xyloma acerinum* Pers. syn. 104. Nees syst. f. 21., β. *confusens* Mart. erl. 309. *Sphaeria maculaformis* Kehr. *Mucor granulosus* Bull. t. 504.

Ad folia Acerum, Pseudo-Platani praeprimis.

2295. *X. punctatum* Pers., ascomatibus immatis epiphyllis subrotundis ponctiformibus distinctis gregariis rugosis fusco-nigris opacis, venarum areolas obsidentibus picturamque subrotundam mentientibus, demum frustulatim rempentibus, iutus concoloribus. — *Rhytisma punctatum* Fr. l. l. *Xyloma acerinum* a. *sparsum* Mart. l. l. *X. punctatum* Pers. l. l.

Ad folia Aceris Pseudo-Platani vulgare. (*X. gyrae* forsitan incunabula imperfecta s. *Phomatis* sp.)

2296. *X. umbilicatum Pers.*, ascomatibus innatis amphigenis orbiculatis punctiformibus depresso-umbonatis nigris sparsis, dein subsidentibus centro papillatis umbilicatis ibique discum albidum tenuerrimum monstrantibus. — *Dothidea umbilicata Fr. orb. I. 363. Dub. gall. II. 717. Xyloma umbilicatum Pers. in Moug. et Nestl. vog. n. 761.*

Ad folia arida Crataegi Oxyacanthae suis locis passim.

2297. *X. Andromedae Pers.*, ascomatibus innatis oblongato-dissimilibus atris nitidis, primum tenuatis dein crassiusculis paginam superiorem saepius oblitterantibus, supra plicato-rugosis lucidis ibique raro discum cinereo-fulgineum monstrantibus. — *Rhytisma Andromedae Fr. syst. II. 567. Xyloma Andromedae Pers. syn. 104. Alb. et Schw. nisk. 62.*

Ad folia Andromedae polifoliae frequens.

† *pachystromatica*, ascomatibus strato pseudostromatico cernoso, ex cubilium parenchymate male, saepius enorriter succrescenti, epidermide decolore nigra obducto superadditis.

2298. *X. umbonatum Hoppe*, ascomatibus epiphyllis innatis lenticularibus umbonatis atris nitidis distinctis rotundis majusculis, in vertice centro papillato demum discum fuscum recludentibus, intus obesis, in aversa folii parte maculam convexam relinquenteribus. — *Rhytisma salicinum b. minus Fr. syst. II. 568. Wahlenb. lapp. 524.; var. umbonata Alb. et Schw. nisk. 62. Xyloma umbonatum Hoppe.*

Ad foliorum Salicis capreae paginam superiorem passim. (Ascomatis figurazione regulari papillaque centrali satia distincta sp.)

2299. *X. amphigenum W.*, pseudostromate innato amphigeno convexo tenuissime punctulato nigro subrotundo, ascomatibus primum impressione insulari plicato-marginata dein squamoso-rupta discumque pallidum, revelante inscripto, epigeno nitido, hypogeno opaco glau-

cescente, halone maculari cincto. — *Rhytisma salicinum* Fr. syst. II. 563. pr. pr. *Xyloma salicinum* auct.; var. β . *Lébert* in lit.

Ad utramque foliorum Salicis purpureas et Helicis paginam. Aestate.

2300. *X. leucocreas* DC., strato pseudostromatico epigeno demum subrotundo maximo calloso nigro tenuiter striato, intus carnosus albus, supra ascomatibus ovato-subrotundis primum concaviusculis dein squamoso-rumpentibus discumque stramineum recludentibus inscripto, hinc maculam aequalem opacam cinereo-nigrescentem asperulam relinquentem. — *Rhytisma salicinum* a. Fr. I. L. *Xyloma leucocreas* DC. gall. IL 303. *X. salicinum* Pers. syn. 103., dispos. 5. t. 2. f. 4.

Ad folia Salicis capreae, anritae et fuscae minime rarum.

2301. *X. Cicatrix* W., strato pseudostromatico epiphloeodeo innato plano cicatriciformi maximo atro nitido, intus albo carnosus, supra ascomatibus sparsis soveolatis dein discum pallidum revelantibus inscripto. — ?*Rhytisma maximum* Fr. syst. II. 566.

Ad ramos Salicis Busseliana meae (S. viridis Fr.) Thuring. rarius. (Prima initia ramosorum epidermidem, verrucarum sparsarum s. Phloeoscoriae meae instar elevant, deinde confluent et stratum pseudostromaticum 1-2 uncias longum, $\frac{1}{2}$ latum nitidum praestant.)

2302. *X. giganteum* Rebent., strato pseudostromatico orbiculari plano crasso subrugoso fuscoescente, deinde deplanato laxe adnato, supra ascomatibus labiato-s. reticulato-dehiscentibus discumque albido monstrantibus inscripto. — *Rhytisma giganteum* Fr. syst. II. 566. *Xylonia giganteum* Rebent. neom. 342. t. 2. f. 8.

Ad folia Brassicaceae oleraceae capitatae agri neomarch. (Rebentisch). Auctummo.

292. PHACIDIUM FR. Linsenschorf.

Hymenium entophloeodes placeatare subrotundum nondem, ascis erectis fixis, sporidiis ovalibus uniserialibus praegoantibus cum aliis rudimentis sterilibus (paraphysibus) intermixtis fontum, primum summa epidermidis pellicula decolore (nigra) integra, dein in lacinias plures radiantes demum caducas fissa leviter tectum, ascoma circinatum umbonatum iunatum mentiens.

(*Phacidium Fr.* syst. nec *clenchi*. *Nees*. *Ehrenb*. *Pezizae*, *Sphaeriæ et Xylomatis sp. auct.*) Genus difficile interpretabundum, praecedenti adhuc, vix nisi Iove pluvio regnante naturam internam monstrans.

+ *synphloeodes*, ascomatibus innatis, orbilium pellicula obtecta. (*Phacidii tribus 3. Xyloma Fr. Phacidia libera Schmidt.*)

2303. *Ph. punctiforme* W., ascomatibus innatis orbiculatis punctiformibus minutissimis gregariis rugulis nigris, dein verticem scissum abjicientibus discumque hyalino-viridulum planum, limbo nigro crenulato cinctum recludentibus.

Ad inferiorem Pruni Padi foliorum languidorum paginam, auctummo, rarius.

2304. *Ph. arundinaceum* Kz., ascomatibus innatis orbiculatis rufo-fuscis sparsis confertisque, disco plano papilla centrali obsoleta instructis, ambitum versus dilutius fuscescentibus integris prominulis. — *Phacidium arundinaceum* Kz. et Schmidt myk. Hst. I. 44. *Xyloma arundinaceum* DC. gall. VI. 162. pr. pr.

Ad calmos Arundinis Phragmitis aridos Saxonise. (Kunze et Schmidt.)

2305. *Ph. dentatum* Schm., ascomatibus innatis, primum planis rotundatis punctiformibus exiguis, dein dilatatis subquadratis atro-nitentibus, maculae pallidae linea nigra saepius limitatae insidentibus, demum vertice plauo in lacinias 4-5 acutas dehiscentibus discumque li-

vidum s. cordide lutescentem recludentibus. — *Phacidium dentatum* Schmidt l. l. Fr. syst. II. 577. *Xyloma lichenoides* DC. pr. pr. *Peziza Insula* Rebent. *Sphaeria punctiformis* y. Pers. syn. 91.

Ad folia quercina dejecta ubertim. Hyeme.

2306. *Ph. repandum* Fr., ascomatibus subrotundis innatis pallido-virentibus demum nigricantibus, in laciniis inaequales obtusas fatiscentibus discumque fuligineum recludentibus. — *Phacidium repandum* Fr. syst. II. 578. *Ph. herbarum* Dub. gall. II. 722. *Xyloma herbarum* Alb. et Schw. nissk. 65. t. 4: f. 6.

Ad caules, petiolos ipsaque nonnisi folia viva herbárum, v. c. *Potentillarum*, *Galiorum*, *Cerastiorum* aliarumque ejusmodi, passim.

2307. *Ph. Rubi* Fr., ascomatibus epiphyllis innatis hemisphaerico-applanatis rugulosis atris, primum papilla centrali inscriptis diuque clausis, demum in laciniis inaequales obtusas fatiscentibus discumque albidum recludentibus. — *Phacidium Rubi* Fr. syst. II. 578.

Ad *Rubum Idaenum* et *corylifolium* epiphyllum.

2308. *Ph. fimbriatum* Schm., ascomatibus innatis erbiculatis hemisphaerico-applanatis atris striato-radiatis, dein in laciniis plures teneras rampentibus discumque albidum recludentibus. — *Phacidium fimbriatum* Schmidt l. l. 39.

Ad folia *Populi nigrae*. (Schmidt.)

2309. *Ph. coronatum* Fr., ascomatibus innatis orbicularibus hemisphaerico-depressis convexiusculis nigricantibus nitidulis, dein collapsis rugosis in laciniis plures acutas caducas secedentibus discumque flavescentem s. liventem, ascis subclavatis foetam recludentibus. — *Phacidium coronatum* Fr. syst. II. 577. Schmidt l. l. 36. *Ascobolus coronatus* Schum. *Xyloma petzoides* Pers. syn. 105., icon. t. 10. f. 1. *Peziza connivens* Mart. erl. 463. *P. comitialis* Batsch l. f. 152. *P. artocreas* Rebent. *P.*

viridis Bolt. t. 119. f. 1. *Sclerotium quercinum* Flor. dan. t. 1380.

Ad folia dejecta *Quercus*, *Fagi*, *Betulae*, *Alni*, *Carpini* aliarumque arborum, udore brumali conglobata *vulgare*.

† *hypophloeodea*, *ascomatibus primum hypophloeodeis*, *dein erumpentibus umbonemque epiphloeodeum exserentibus*. (*Phacidii tribus 2. erumpentia*.)

2310. *Ph. quadratum* Schm., *ascomatibus subinnatis depresso-convexusculis subrotundis nigris in lacinias plures acutas dehiscentibus discumque stramineum recludentibus*. — *Phacidium leptideum* Fr. syst. II. 576. *Ph. quadratum* Schmidt l. l. 32.

Ad caules exsiccatos *Vaccinii Myrtilli* et *Vitis Idaeae* paasim.

2311. *Ph. abietinum* Schm., *ascomatibus erumpentibus subrotundis depresso-convexusculis nigris opacis, in lacioias 3-4 obtusas dehiscentibus discumque cinereum recludentibus*. — *Phacidium abietinum* Schmidt & l. Fr. syst. II. 576.

Ad folia pinea dejecta passim.

2312. *Ph. lacerum* Fr., *ascomatibus erumpentibus subrotundis nigris dein in lacioias obtusas inaequales dehiscentibus, discum atro-fuscum recludentibus*. — *Phacidium lacerum* Fr. l. l.

Ad folia pinea passim. Auctummo.

2313. *Ph. Taxi* Fr., *ascomatibus erumpentibus minutis applanatis cinereo-nigricantibus, dein in lacioias acutas discum nigrum recludentes secedentibus*. — *Phacidium Taxi* Fr. syst. II. 575. *Xyloma Taxi* Fr. obs.

Ad folia *Taxi* delapsa Thuring. saltem initia vidi.

2314. *Ph. Ledi* Schm., *ascomatibus erumpentibus subhemisphaericis exiguis fusco-nigricantibus rugulosis, vertice in lacioias plures obtusas, discum violaceum recludentes dehiscentibus*. — *Phacidium Ledi* Schmidt l. l.

31. *Fr. syst. II. 574. Xyloma Ledi Alb. et Schw. nisk.*
60. t. 9. f. 1.

Ad ramos siccos Ledi palustris Lusatiae et aliis German. borealis locis. Vere.

2315. *Ph. carbonaceum Fr.*, ascomatibus erumpentibus subrotundis inaequalibus nigris, in lacinias obtusas dehiscentibus discumque siccum nigrescentem recludentibus. — *Phacidium carbonaceum Fr. syst. II. 574. Xyloma carbonaceum Fr. obs.*

Ad ramos salicinos siccos passim.

2316. *Ph. valvatum Schm.*, ascomatibus erumpentibus subrotundis truncato-disciformibus atris sparsis, dein in lacinias obtusas dehiscentibus discumque fuligineum recludentibus. — *Phacidium Pini Fr. syst. II. 573. Ph. valvatum Schmidt l. l. Hysterium valvatum Nees-syst. f. 299. Xyloma Pini Alb. et Schw. nisk. 60. t. 5. f. 8.*

Ad corticem Pini sylvestris et Juniperi passim. Vere.

†† epiphloeodea, ascomatibus emersis.

2317. *Ph. pulverulentum Schm.*, ascomatibus immersis orbiculatis subhemisphaericis minutis pulverulentis fuligineis, in lacinias acutas dehiscentibus discumque caesium recludentibus. — *Phacidium pulverulentum Schmidt l. l. 33. Fr. syst. II. 573.*

Ad ligna Pini sylvestris agrilipsiensis semel. (Schmidt.)
 Vere.

293. PHLYCTIDIUM W. Tüpfelchorf.

Ascoma ex parenchymate cubilium decolore, amplius non nisi inque strati pseudostromatici subiculosi dendritici speciem effuso semet informans, primum callosum dein tenuiter membranaceum orbiculatum oblongatumve clavum innatum, demum summam verticis umbonati pelliculam in rugas complicatas fatiscentem abjiciens discumque mollem veluti excipulo integro marginatum, ex ascis oblongis bi-trilocularibus persistentibus denique saturioribus foetum recludens.

(*Cenangii tribus 4. Excipula Fr. syst. II. 189. Excipula l. l. p. 596., elench. II. 146. Dothideae et Sphaeritiae sp. auct. Actinonematis, Asteromatis sp. DC. Grev. Fr.*)

+ *filamentosa*, *ascomatis initis radio filamentoso-byssideo tenerimo dendriticō-ramoso radianti adnatis.* (*Actinotrichum Wallr. in lit.*)

2318. *Phl. Rosae IV.*, ascomatibus subrotundis ovalibusque exiguis, primum concreiusculis albis dein nigrescenti-lividis depresso, ex radiis filamentosis tenerimis arachnoideo-byssodeis epiphyllis adnatis distinctis ramosissimis a centro inde radiantibus, hypostroma dendriticam circinatum praestantibus successentibus, hinc maculas sordide cinerascentes concentrico-punctatas mentientibus. — *Asteroma stellatum* Wallr. ros. 47. *A. Rosae* Libert in annal. L. soc. 1826. *Dothidea Alphitomorpha* Wallr. in lit. D. *Rosae* Dub. gall. II. 716. *Dendria Rosae* Fr. femo. 42. *Himantia pulchella* Pers. myc. I. 91. (*hypostroma sterile.*) *Erysiphe radiosum* Fr. obs. I. 207., syst. III. 241, elench. II. 151. *Sporotrichum maculare* Link sp. I. 20. *Sp. pulchellum* Dub. gall. II. 924. *Sclerotium radiosum* Ach. in lit.

Ad feliorum vegetorum Rosae Chamaerrhodi var. gallica et muscosae faciem superiorem in hort. thuring. passim. Aestate inde ad auctumnū. (Wallr.)

2319. *Phl. Padi IV.*, ascomatibus subrotundis sparsis minutissimis patellaribus albis, margine tenui concolare cinctis, saepius confluentibus, hypostromati-epiphyollo. ex radiis filamentosis compressis deplanatis tenerimis arce adpressis distinctis arachnoideo-byssodeis dichotomo-ramosis, a centro obsoleto inde dendriticō-radiantibus albis composito adfixis, maculas centro fusco-cinerascentes mentientibus. — *Dothidea Padi* Spr. syst. IV. 411. Dub. gall. II. 716. *Asteroma Padi* DC. gall. VI. 164. Fr. elench. II. 151:

Ad Pruni Padi foliorum vegetorum faciem superiorem, in hortis halens. et thuring. satis raro. (Prae-denti simile, at filis longioribus, magis deplanatis mi-

ntusque contiouis crispulis, maculas in fines longe ampliores patentes praestantibus et ascomatibus minoribus distinctum.)

2320. *Phl. Crataegi W.*, ascomatibus subrotundis minutissimis dein nigrescentibus, hypostromati epiphylio, ex fibrillulis hypoideis a centro radiantibus ramosis distinctis canescenscentibus crispulo-nodalosis composito adfixis, maculas fuscas mentientibus. — *Actinonema Crataegi Pers. myc. I. 52. Fr. elench. II. 151. Capillaria Crataegi Link sp. II. 22.*

Ad folia vegeta Crataegi terminalis rarissime.

† *macularia*, ascomatis initii cubilium parenchyma extus penitusve adficientibus, sive decolorantibus, sive magis constipantibus inque stratum hypostromatum saepius mutantibus.

2321. *Phl. nitidum W.*, ascomatibus innatis minutis sparsis orbiculatis nigro-piceis nitidissimis laevissimis, primum vertice convexiusculo prominulo dein subsidente corrugato deplanato clausis illoque secedente discum planum albidum margine tenui succinctum recludentibus.

a. *alneum*. — *Dothidea alnea Fr. syst. II. 564. Xyloma alneum Pers. syn. 108.*

β. fagineum. — *Sphaeria Artocreas auct. Xyloma fagineum Pers. l. l.*

Ad folia alnea et faginea languida vulgare.

2322. ? *Phl. sphacroides W.*, ascomatibus innato-superficialibus hypophyllis punctiformibus atris depresso-urceolaribus, margine infexo, disco pallido. — *Cenangium sphacroides Fr. syst. II. 191. Xyloma sphacroides Pers. syn. 106. Excipula sphacroides Fr. exsicc.*

Ad folia decidua Salicis capreae. (Vilis ac dubia sp.; ascomata vertice collapse potius formam urceolare induunt quam recludentur.)

2323. *Phl. Empetri W.*, ascomatibus erumpenti-

superficialibus epiphyllis punctiformibus opacis atris, demum in discum atrum reclusis. — *Excipula Empetri Fr. syst. II. 190. Pesiza Empetri Kunze in lit.*

Ad folia Empetri passim.

2324. *Phl. melanophaeum W.*, ascomatibus inato-erumpentibus atris, primum clavis convexis, dein in discum concavum dilatum reclusis. — *Excipula melanophaea Fr. syst. II. 190. Peziza melanophaea Kunze.*

Ad squamas conorum abietinorum vulgare.

2325. *Phl. Rubi W.*, ascomatibus primum hypophloeodeis dein erumpendo epiphloeodeis subcornueis laevibus atris convexis exiguis, demum in discum pallidum reclusis. — *Excipula Rubi Fr. l. l.*

Ad Ruborum nostratum caules siccos passim.

2326. *Phl. Heraclei W.*, ascomatibus hypophyllis innatis gregariis, primum livido-flaventibus callosis parce prominulis, dein emergeotibus exiguis subrotundis atris opacis, vertice depresso corrugato-plicato clavis illoque secedente discum pallidum recludentibus. — *Dothidea Heraclei Fr. syst. II. 556.*

Ad folia Heraclei Ostruthii passim.

2327. *Phl. Solidaginis W.*, ascomatibus hypophyllis primum lutescentibus callosis innatis verruciformibus, dein atro-fuscis plicato-corrugatis exiguis, denique nigris nitidis aggregato-confluentibus maculam fuscarn rotundam halone luteolo cinctam obliterantibus, vertice diu clavis, sero discum album recludentibus. — *Dothidea Solidaginis Fr. syst. II. 562. Xyloma Solidaginis Fr. obs. X. Virgaureae DC.*

Ad folia Solidaginis Virgaureae passim.

2328. *Phl. Saniculae W.*, ascomatibus hypophyllis, primum insculptis fuscescentibus, dein adnatis orbiculatis convexiusculis nigris opacis confertissimis minutis, maculau nigro-fuscarn mentientibus, demum deplanatis verticem irregulatiter reclinantibus discumque planum

flaventem margine sciso nigro cinctum recludentibus. — *Dothidea Saniculae* W'all. in lit.

Ad Saniculae europaeae foliorum vegetorum faciem inferior. in agro thuring. rarius.

2329. *Phl. Ranunculi* W., ascomatibus hypophyllicis, primum innatis dein emergentibus orbiculatis nigris opacis convexis, deinde subsidentibus verticem reclinando in discum nigrum cum margine concolorum reclusis, confluenter foliumque obfuscantibus. — *Dothidea Ranunculi* Fr. syst. II. 562. *Sphaeria Ranunculi* Wallr. in lit.

Ad folia vegeta Rannuc. nemorosi et polyanthemi in agro thuring. passim. Aestate exente.

2330. *Phl. Gentianae* W., ascomatibus aliis inter initia hypophloeodea jam descendentibus hypostromaque effusum maculare nigrescens mentientibus, aliis erumpentibus atris primum vertice clausis dein discum gryseo-albidum recludentibus. — *Excipula Gentianae* Fr. elench. II. 144. *Peziza Gentianae* Pers. myc. I. 310. Fr. syst. II. 153.

Ad caules siocos Gentianae luteae in m. vogeso. (Mougeot.)

2331. *Phl. nervosum* W., ascomatibus aliis inter initia hypophloeodea jam parenchyma infarciendo descendentibus hypostromaque longitudinaliter effusum informantibus, aliis ex illo erumpentibus sphaericis atris cupuliformibus, saepius seriatis. — *Excipula nervosum* Fr. elench. II. 147. *Peziza nervosum* Pers. myc. I. 308. Fr. syst. II. 153. *Sphaeria nervosa* Chaill.

Ad folia languida Plantaginis lanceolatae in German. austral. passim.

294. TRYBLIDIUM REBENT. Kesselschorf.

Ascoma carnosum-membranaceum vasculare, e basi tenuata orbiculatum, primum clausum inflatum, demum

vertice in lacinias angulatas irregulariter fissum discumque massae granosae iustratum pulposum uscis majusculis foetum recludens.

(*Triblidium* Rebent. Kunz. Ehrenb. Pers. myc. Cenangii tribus 2. *Triblidium* Fr. *Phacidii* tribus 1. Fr. cleanch.)

2332. *Tr. seriatum* Fr., ascomatibus e basi attracta depresso-globosis gregarie rugosis atris, dein in lacinias obtusas laceris discumque fuligineo-atrum recludentibus. — *Triblidium seriatum* Fr. exsicc. *Cenangium seriatum* Fr. syst. II. 185. *Phacidium seriatum* Fr. cleanch. II. 131. *Peziza truncatula* Rebent. n. nom. 388. nec Pers.

Ad corticem betulinum Neomarch. (Rebentisch.)

2333. *Tr. Pinastri* Fr., ascomatibus erumpentibus e basi tenuata subglobosis diffiformibus rugosis atro-nitentibus saepius deliquescentibus, vertice depresso in lacinias plures obtusas dehiscentibus discumque albidum recludentibus. — *Triblidium Pinastri* Fr. exs. *Cenangium Pinastri* Fr. syst. II. 184. *Peziza Pinastri* Pers. syn. 672. Alb. et Schw. n. sp. 344.

Ad corticem abietinum emortuum, hyeme. (Stirpe versipellis figura, mole et dispositione, nonnisi in monstra tuberculosa difformia desciscens (*Sphacronaema bulbosum* Fr. *P. Pinastri* y. *ramosa* Alb. et Schw. L. l.))

2334. *Tr. abietinum* W., ascomatibus nigris opacis, primum hypophloeodeis dein emergentibus verrucosis convexis inconditis sphaeriseformibus, demum in basin abrupte attractis sessilibus liberis, vertice convexiusculo irregulariter corrugato clausis patellaribus, demum lacero-fissis discum atro-sanguineum nudum veluti marginatum recludentibus. — *Phacidium pithyrum* Kz. nec Fr.

Ad corticem abietinum emortuum Hercyn. infer. frequens.

2335. *Tr. calyciforme* Rebent., ascomatibus sparsis nigris, primum hypophloeodeis verrucosis inconditis saepius desciscentibus, dein emersis praeter basin

adnastam liberis planis lentiformibus obtuse marginatis, vertice tenuiter rimoso-areolato clausis, demum laciniato-dehiscentibus discumque pallidum recludentibus. — *Phacidium calyciforme* Spr. syst. IV. 410. Fr. elench. *Cenangium calicif.* Fr. syst. II. 183. *Cyphelium scabrosum* Ach. *Triblidium calicif.* Rebent. Pers. myc. I. 333. t. 2. f. 3. 4. *Chevaill. par.* t. 8. f. 9. *Limboria corrugata* auct. *Peziza Hysterium* Pers. syn. 671.

Ad trunco quercino minime rara.

295. COLPOMA W. Schlitzachorf.

Ascoma oblongum semicylindricum, basi deplanata adnatum, primum hypophloecodes clausum, extus friabile, intus strato grumoso discolor pavitum hymenioque carnosoceraceo uscis clavatis dein secedentibus foeto aequaliter obductum, demum summam cubilium pelliculam fissam vertice longitudinaliter scisso penetrans discumque cavernosum reclusum monstrans, annuum.

(*Cenangii* tribus *Clithris* Fr. syst. Dub. *Variolariae*, *Hysterii*, *Hypodermatis* spec. Tod. Bull. Pers. et DC.)

2336. *C. trigonum* W., ascomatibus amphigenis sparsis, primum hypophloeodeis dein emergendo semi-liberis tumidis ovato-oblongis triangularibusve similiterque (trifariati saepius) dehiscentibus utrinque obtusis fuscis, discum ceryuum monstrantibus. — *Phacidium trigonum* Schmidt in Kunz. myk. Hft. I. 40. f. 12. *Hysterium tumidum* β. *trigonum* Fr. syst. II. 592.

Ad folia sicca quercina praeprimis et tiliacea passim.

2337. *C. verrucosum* W., ascomatibus primum hypophloeodeis ovalibus convexis turgidis nigris opacis verruciformibus, dein vertice mediotebris striato epidermidem scissam perforantibus, diu clausis ibique demum tenuiter longitudinaliterque hiantibus discumque dilatum monstrantibus s. integris omnino secedentibus maculamque conformem nigrescentem relinquenter. — *Hysterium verrucosum* W. in lit.

Ad Galii veri caules aridos agri northasani. Hyeme,

at vix nisi Jove pluvio favente discum recludere solet, et humectando caules undique verrucosos reddit, siccando vero plane delitescit.

2338. *C. elatinum* W., ascomatibus primum hypophloeodeis dein erumpendo epiphloeodeis atris opacis rugosis majusculis oblongis curvatis in discum rufescenti-nigrum sulcatum labiis inflexis occultatum reclusis, demum contractis inconditis volvam crispata mentientibus. — *Hysterium elatinum* Pers. syn. addend. 28. Fr. syst. II. 584. *Lichen elatinus* Achär. prodr.

β. crispum, ascomatibus elongatis flexuosis angustis in labia distincta tenuia crispata reclusis. — *Hysterium elatinum* β. Tr. L. L. *Triblidium crispum* Pers. myc. I. 332. *Hypoderma crispum* DC. gall. VI. 167. *Hysterium crispum* Pers. syn. 101., icon. t. 9. f. 1.

Ad corticem abietinum Hercyn. superior.

2339. *C. quercinum* W., ascomatibus ovato-oblongis transversis, e basi deplanata convexis semicylindricis nigro-fuscis opacis, mole variis, primum hypophloeodeis clausis, dein vertice epidernidis pelliculam scissam revelantibus ibique longitudinaliter hiantibus discumque pallidum navicularem mox ascis secedentibus effiectum monstrantibus, demum friabilibus caducis maculam fuscam conformem relinquenter. — *Cenangium quercinum* Fr. syst. II. 189. *Triblidium quercinum* Pers. myc. I. 333. *Hysterium quercinum* Pers. syn. 100. Nees. syst. f. 300. a. *Sphaeria collapse* Sowerb. t. 373. *Hysterium nigrum* Tod. mecb. II. 5.f.64. *Variolaria corrugata* Bull. t. 432.

Ad ramulos quercinos novellos, quos enecat, frequens. (Variat ascomatum mole et nonnisi ascomatibus quadruplo minoribus reddit. *Pruina albicans*, qua labia saepius adspersa, ex cortice proficiuntur.)

296. TYMPANIS TODE. Paukenzschorf.

Ascoma orbiculato-tornatum, basi magis minusve tenuta nonnisi hypostomati vario impositum, ex strato

duplici, externo subcoriaceo verticem convexiusculam s. umbilikato-depressum primum obturante dein tenuando varie revelante discumque ascophorum concavum cum strato interno grumoso dilutiore adaeatum monstrante, compositum, dimorphum prorsus, nunc sphaeriaciforme, nunc peziziforme. Hymenium gelatinosum turgidum, primum verticis velamine tectum, dein cum ascis tenuibus transfasis s. profusis fatiscens.

(*Cenangia erumpentia* Fr. elench. C. tribus I. *Scleroderris* Fr. syst. *Pezizae descendentia*, *ascidiis fixis*, *substantia dupli* Spr. syst. IV. 514. *Hylostoma et Scleroderris* Pers. *Pezizae et Sphaeriac* sp. auct., quas quidem pro varia aetate et informationis gradu omnino referunt et vix nisi verticis velamine tenuando secedente nec in oculum marginemque figuratum recluso differunt.)

† *astromaticae*, ascomatibus ex cubilibus hypo-
e. epiphloeoideis succrescentibus, sparsis s. aggregato-
caespitosis.

* *sparsae*, ascomatibus sparsis.

2340. *T. Rubi* W., ascomatibus deinceps erumpendo epiphloeoideis subcorneis laevibus spursis atris exiguis, primum convexis clavis, denum hiantibus discumque pallescentem recludentibus. — *Excipula Rubi* Fr. syst. 190.

Ad Rubi Idaci sarmenta sicca praesim.

2341. *T. turgida* W., ascomatibus sparsis dein erumpentibus subcoriaceis rugulosis nigris minutis, primum subglobosis vertice clavis, dein in discum albidum humectando mollem turgescotentem reclasia. — *Excipula turgida* Fr. syst. II. 190. *Cenangium turgidum* Dub. gall. II. 736. *Peziza leucomela* Pers. syn. 670.

Ad ramulos essiccatos Coryli. Auctumoo.

2342. *T. Aparines* W., ascomatibus sparsis, primum hypophloeoideis dein epidermidem scissam infarcientibus sessilibus subrotundis, extus fuligine tenui adpersis asperulis nigricantibus diu clavis subglobosis, denique in discum dilute cinereum carnosulum limbo inflexo eu-

ctum reclusis. — *Cenangium in caulinibus Aparines Kneiff*
in lit. n. 85. ?*Sphaeria Galii Guépin*. Fr. elench. II. 105.

Ad caules siccos Galii Aparines agri badena. (Kneiff),
nec non thuringiaci. Aestate.

2343. *T. Patella* W., ascomatibus sparsis primum
hypophloeodeis dein emersis praeter basin adnatam ob-
tusam liberis atris nitidulis stipato-sericeis, primum he-
misphaerico-tornatis s. siccando urceolato-patellatis um-
bilicate-papillatis clavis, demum (udore favente) vertice
accedentibus discumque urceolatum cinereo-album reclu-
dentibus, basi tenuatis phialiformibus. — *Phacidium Pa-
tella* Fr. elench. II. 133.

a. *sphaeroidesformis*, campestris, ascomatibus hemisphae-
rico-tornatis clavis, vertice umbonato s. urceolato - pa-
tellato, monisi, ascos albos coactos transfundentibus. —
Phacidium Patella β. *campestre* Fr. l. l. *Heterosphaeria*
Patella Grev. scot. t. 103. *Peziza Chauvini* Pers. P. *Li-
guetici* DC. *Sphaeria Patella* Pers. syn. 16. Fr. syst. II.
511. *Sph. penetrans* α. *Patella* Tod. mecl. II. 45. f. 121.

β. *pezizoidesformis*, alpestris, ascomatibus dein vertice
depresso tenuato accedentibus discumque albidum limbo
erecto inslexo (?dentato Fr.) munitum recludentibus, phia-
liformibus. — *Ph. Patella* α. *alpestre* Fr. l. l. *Peziza*
Chailletii Pers. myc. I. 288. Fr. syst. II. 144. *P. Sele-
topyxis* Pers. l. l. *P. leucomela* β. *Umbelliferarum* DC.
P. fimbriata Chaill. teste Fr.

Ad caules herbarum elatiorum siccios, praesertim Um-
belliferarum, Galii Molluginis, uliarumque; var. α. in
campis depresso siccis, β. in vallibus edioribus et al-
pestribus uidis passim. Auctummo.

2344. *T. Urceolus* JV., ascomatibus sparsis, pri-
mum hypophloeodeis dein emersis praeter basin adnatam
epidermide scissa cinctam liberis atris opacis vellere se-
riceo adpresso fusco tenerimo vestitis, vertice primum
convexusculo s. umbilicato-impresso clavis, dein subsi-
dendo magis deplanatis osculoque rotundo hiantibus, de-

mum in discum cinereum carnosum reclusis, saepius basia producentibus. — *Cenangium Urceolus* Fr. clench. II. 32.

a. sphaeriaeformis, ascomatibus majusculis vertice umbilicato-depressis clausis. — *Cenangium Urceolus* Fr. syst. II. 182. *Sphaeria Urceolus* Schmidt in lit.

b. pezizaeformis, ascomatibus e basi tenuata subpyriformibus, vellere brunneo strias mentiente vestitis, vertice dein patinio reclusis, urceolaribus. — ?*Peziza Urceolus* Alb. et Schw. nisk. 332. t. 3.f. 4. Fr. syst. II. 113.

Ad ramos betulignos Lusatiae. (Alb. et Schw.)

2345. *T. Ariae* Fr., ascomatibus sessilibus sparsis doris nigris, primum subrotundis clausis, dein vertice subsidente dilatatis orbiculato-deplanatis ambitum marginantem subelevatum veluti circumducentibus, majusculis subgregariis. — *Tympania Ariae* Fr. clench. II. 18. *Peziza inconstans* Kz. in lit.

a. sphaeriaeformis, ascomatibus erumpentibus subovatis, dein collabescendo depressis clausis. — *Sphaeria Cotoneastri* Fr. syst. II. 494. *Sph. conica* Alb. et Schw. nisk. 51. (*lusus magis conicus*.)

b. pezizaeformis, ascomatibus vertice dein rotundato-deplanatis. — *Tympania Ariae* Fr. syst. II. 175. *Peziza Ariae* Pers. myc. I. 325.

Ad corticem Sorborum et Mespili Thuring. passim.

2346. *T. Frangulae* Fr., ascomatibus subgregariis erumpentibus sessilibus orbicularibus turbinato-truncatis nigricantibus opacis, dein in discum umbrinam, limbum subobliterantem reclusis. — *Tympania Frangulae* Fr. clench. II. 18. syst. II. 174. *Peziza Frangulae* Pers. myc. I. 324. *Sphaeria versiformis* in Rhamno Alb. et Schw. nisk. 52.

Ad ramos exsiccatos Rhamni Frangulae passim.

** *aggregatae*, ascomatibus aggregato-caespitosis sive desciscendo sive copulando basin implexam s.

hypostromaticam raeptius informantibus, vel in monstra corniculata succrescentibus.

2347. *T. saligna* Tod., ascomatibus gregariis subcaespitosis atris nitidulis, primum globularibus dein elongatis, verticem obtusum truncatum clausum demum in discum concavum apertum informantibus. — *Peziza Todeana* Spr. l. l. *Tympanis saligna* Tod. mecl. I. 24. t. 4. f. 37. Fr. syst. II. 176. *?Sphaeria palina* Fr. syst. II. 494.

Ad ramos salicinos siccios rarius.

2348. *T. Aucupariae* W., ascomatibus caespitosis nigris albido-pulverulentis, e basi implexa elongata subcylindrica in verticem angustum primum clausum dein apertum desinentibus. — *Cenangium Aucupariae* Fr. syst. II. 181. *Peziza Aucupariae* Spr. l. l. *Dothidea caespitosa* Fr. obs. *Sphaeria Aucupariae* Pers. syn. 51. *Sph. caespitosa* Tod. mecl. I. 41. t. 14. f. 113.

Ad ramos Sorbi Aucupariae passim.

2349. *T. Prunastri* W., ascomatibus subcaespitosis transversim erumpentibus subcorneis nudis nigricantibus, e basi stipitiformi cylindrica in verticem profunde excavatum s. in apicem subaequalem desinentibus. — *Cenangium Prunastri* Fr. syst. II. 180. *Peziza Prunastri* Pers. syn. 673.

β. m. ceratostomum, ascomatibus subuliformibus teretibus rigidis in apicem subaequalem s. parce dilatatum desinentibus. — *Fr. l. l. Ceratostoma spurium* Fr. obs. II. 338. *Sphaeria Prunastri* Pers. *Sph. rigida* DC. gall. VI. 132.

Ad ramos siccios Pruni domesticae et spinosae passim.

2350. *T. conspersa* Fr., ascomatibus subrotundocaecitosis stipatis mox epidermidem transversim scissam infarcentibus erectis atris nudis pulvereoque albo adspersis, biformibus, aliis (desciscentibus) cylindricis obtusis corniculatis; aliis e basi cylindrica obovatis in verticem umbilicato-depressum disciformem dilatatis tenuissime

rugulosis, dein discum nigricantem recludentibus. — *Typanis conspersa* Fr. syst. II. 175. *Peziza Pyri* Pers. syn. 671. *P. Aucupariae et sphacroides* Pers. myc. I. 327. *P. conglomerata* Wahlenb. lapp. *P. populnea* Alb. et Schw. nisk. 243. *P. sphaerinaformis* Rebent. *P. sphacroides* Roth. Nees syst. f. 281.

Ad ramos languidos Sorbi Aucupariae, Pyri, Alni, Populi, Betulae aliarumque arborum passim.

2351. *T. cupularis* JV., ascomatibus aggregatis cubilia hypo-s. epiphloeodea obliterantibus hypostroma que crustaceum stygium montantibus, raro sparsis, mole varijs atris punctato-corrugatis, primum subglobosis clausis, dein vertice obsolete papillato subsidente ambilicato-depressis cupulaeformibus, demum lacero-apertis discum ceraceum album ascis moniliformibus foetum monstrantibus. — *Sphaeria capularis* Pers. syn. 53. t. 1. f. 9. Fr. syst. II. 416. Sph. Pruni Schumach. Sph. Cucurbitula b. nigrescens Tode met. II. 39.

Ad ramos exsiccatos, v. c. Ulmi, Salicis, Tiliae, Crataegi, Carpini aliarumque arborum, hyeme frequens; (Ambigit notis genericis inter Typanin et Sphaeriam; nunquam valtem porum circinatum sperit, sed verticis velamine sciso ascorum moniliformium nonnisi in clausis foras transfusorum s. in fondo delitescentium micam recludit et rarissime etiam in moustra corniculata deasciscit. Alia ascomata hyphae ramosae rigidulae stygiae, hypostroma pilosum mentienti insident, quam quidem peregrinam habeo.)

† stromaticae, ascomatibus hypostromati vario, nunc hyphideo, nunc carnosu saepius male s. in corpula verrucosa figurata succrescenti impositio.

2352. *T. obtecta* JV., ascomatibus erumpentibus sessilibus subcoriaceis, gregaris, vellere adpresso dense fusco-fuligineo vestitis, a basi inde telam radiantem hyphideam circumscriptam albidaq. mox effusam dense intertextam sordidam emitentibus, primum hemisphaericis, vertice dia clauso ambilicato-depressis, dein oscalo

circinato hiantibus, demum discum concavum albo-pallentem limbo albo laxe piloso cinctum recludentibus deplanatis siccandoque semet varie contrahendo assurgentibus. — *Tympanis obtecta* Wallr. in lit.

a. sphacriaeformis, campestris, ascomatibus hemisphaericis, vertice clauso umbilicato-depressis vellere adpresso vestitis, ipsis cubilibus hypophloeodeis a. telae hypostromaticae nonnisi laxioriante incidentibus. — *Sphaeria aligata* Fr. syst. II. 445. *Sph. aquila* var. *Sph. syst.* *Sph. umbilicata* JV. in lit. nec Pers.

b. pezizaeformis, ulpestris, ascomatibus vellere laxiore vestitis, dein in discum concavum albo-pallescens reclusis, vivis deplanatis, siccis semet varie contrahentibus limbisque candidum fimbriato-pilosum exserentibus. — *Peziza Rosae* Pers. syn. 656. Fr. syst. II. 109. Alb. et Schw. nissk. 327. *P. Pruni avium* Pers. myc. I. 213. pr. pr. *Myrothecium hispidum* Tod. medl. I. 27. f. 41.

Ad ramulos siccos duros humi jacentes, Rosarum praeriparia nec non Prunorum, Ribes rubri, et Corylorum, in agro thuring. abundantem. (Morphosis eadem ac sequentia; habitus exteriorus pro varia loci conditione et lucis affluxu magis minusve denegate satis mutabilis.)

2353. *T. fuliginosa* JV., ascomatibus gregariis, saepius inter initia hypophloeodea desciscentibus stratumque hypostromaticum effusam membranaceum fuscescens mentientibus, dein emergentibus fuscobrunneis hemisphaericis, vertice ambonato depresso-umbilicato clausis, demum emersis liberis (adore favente) discum carnosum albido-cibereum limbo lacero cinctum recludentibus, superficie variis.

a. sphacriaeformis, campestris, ascomatibus incauto-hemisphaericis minoribus nudis nitidulis, vertice umbo-nato depresso-umbilicato clausis, dein irregulariter hiantibus a. inter initia in basin pseudostromaticam rugosam ceruleo-fuscum desciscentibus. — *Phleoscoria salicina* Wallr. in lit. *Sphaeria fuliginosa* Pers. syn. 52. Fr. syst. II. 423.

$\beta.$ *pezisaeformis*, alpestris, ascomatibus subaesilibus majusculis oculis jam vellus rufo-fuscum inducentibus emersis, e basi tenuata urceolato-patellaribus, humectando discum albido-cinereum recludentibus. — *Cenangium fuliginosum* Fr. elench. II. 23. *C. difforme* Fr. in Moug. et Nestl. vog. n. 889. Dub. gall. II. 736.

Ad ramos salicinos; $\alpha.$ *Salicis fragilis* et *albae agri thuring.* *vulgaris* (Persoon, Wallr. 1812); $\beta.$ *Salicis caprae montis vogesi* (Kneiff, Nestler), nec non Hercyn. inferior. rarius. (Ramulorum mycete ex natalitiis versipelli ingressorum epidermis continua quidem fuscescere et a lumbro dehiscere incipit, dein desquamando plerumque secedit s. ascomata transmittit, strato hypostromatico ex aliis ascomatibus inter initia descendentibus succrescenti Phloeoscoriae instar adnata.)

2354. *T. Ribes* W., ascomatibus e basihypophloeoede in stratum caelosum pseudo-stromaticum tuberosum connata fasciculato-caespitosis, epidermidem scissam obliterantibus subturbinatis obconicisve liberis fusco-causticis, superficie varia, primum vertice clausis leviter impressis, sero apertis discumque albidum recludentibus. — *Cenangium Ribis* Fr. syst. II. 179.

$\alpha.$ *detonsa*, ascomatibus e basi tenuata turbinatis nudis. — *Peziza Ribesia* Pers. syn. 672. *Cenangium Ribis* Fr. syst. II. 179.

$\beta.$ *torva*, ascomatibus majoribus obconicis tomentoso-hirtis. — *Cenangium Ribis* $\beta.$ Fr. l. l. *Peziza Ribis* $\beta.$ Alb. et Schw. l. l.

Ad trunhos *Ribes nigrum*, rubri et petraci freqnens. (Stratum carnosum, siccando corneum saepius ab ascomatibus informandis, sicut in aliis Sphaeriis basi hypostomatica simili instructis, deficit et inter nisum semet figurandi, in corpus e basi tenuata hemisphaericum unidique clausum et citoctum, nudum, tornatum fuscum excrescit, Tubiculariae primordiis simillimum cauteque ab his dignoscendum (monstrum phymatodes.)

297. SPHAEROTHYRIUM W. Deckelschorf.

Ascoma ex substantia propria formatum membranaceum, basi orbiculari insculptum, vertice umbonato tenerrimo heterogeneo integro primum clausum eoque dein circumcirca soloto et operculiformi abjecto in discum planum, marginibus excipuli innati residui circumscissis erectis succinctum apertum, cupuliforme. Asci cylindrici erecti cum paraphysibus intermixtis in nucleum ceraceum congesti, dein caduci.

(*Stegilla* Reichenb. *Eustegia* Fr. syst. Dub. Nees nec R. Brown. *Stegia* Fr. obs. nec DC.)

2355. *Sph. Ilicis* W., ascomatibus innatis rotundatis sparsis nigris nitidis, primum umbone parce prominulo tenuiore caesio tectis eoque dein circumscisso abjecto in discum ceraceo-mollem cinereum reclusis, effoetis patellaribus cerascentibus, margine nitido subcalloso nigro tornato prominulo succinctis. — *Xyloma conavum* Grev. edinb. 368. *Eustegia Ilicis* Chevall. par. I. 443. Dub. gall. II. 717. Fr. syst. II. 533. *Sph. ilicina* Nees apud Fr. syst. II. 522. *Sph. complanata* Ilicis Mougeot. et Nestl. vog. n. 82.

Ad soliorum Ilicis Aquifolii faciem superiorem German. austral. (Mougeot), agri hannover. (Wallr.) rarius.

2356. *Sph. discolor* W., ascomatibus submembranaceis nigris sessilibus, primum operculo convexo umbonato parce papillato fusco-rufescente tectis illoque circumscissim abjecto in discum albidum reclusis, effoetis pezizaformibus, dein urceolatis, margine concolore prominulo cinctis. — *Eustegia discolor* Fr. syst. II. 533. *Stegia discolor* Fr. obs. II. 351. t. 8. f. 2.

Ad asperos pineos et corticem arborum lichenosum rarissime. (Noli commutare cum Cylichnus meo I. 267.)

2357. *Sph. arundinaceum* W., ascomatibus confertis dein erumpentibus membranaceis nigris, primum operculo concolore planiusculo dein concavo tenui tectis eoque deciduo in discum gelatinosum reclusis, cupulifor-

mibus. — *Eustegia arundinacea* Fr. *elench.* II. 112. *Sphaeria Calami* Nees in Kunz. myk. *Hft.* II. 65. *Xyloma arundinaceum* DC. *gall.* VI. 162. pr. pr. teste Fr.

Ad Arundinis Phragmitis culmos siccos rarius v. c. agri halens., si quidem a Phacidio arundinaceo differt.

298. LOPHIUM FR. Muschelschorf.

Ascoma compressum verticale submembranaceum nigrum, basi ionata farcta veluti cardine suffultum, primum clausum, dein rima longitudinali dehiscens, semibivalve, ascorum erectorum, sporidia simplicia exigua includentium cum paraphysisibus intermixtorum sarcimine pulposo, dein pulverulentio grumoso repletum.

(*Sphaeriacae*, *Hysterii* et *Hypozyli* sp. auct. *Lophium* Fr., quod quidem ab illis *situ verticali* et *sarcimine carbonaceo* differt.)

2358. *L. mytilinum* Fr., ascomatibus erectiusculis nigris nitidis membranaceis, e basi infixa tenuata sursum in valvas conchatas, extus transversim corrugato-striatas dilatatis, primum limbo tenuato conniventibus, dein hiantibus ascorumque sarcimen grumosum dilute fuscescens eructantibus. — *Lophium mytilinum* Fr. *syst.* II. 534. *Grev. scot.* t. 177. f. 1. *L. mytilinellum* Fr. I. L. (*lusus minor.*) *Hysterium mytilinum* Pers. *syn.* 97. *Nees. syst.* f. 301. *Sphaeria ostracina* Sowerb. t. 375. *Hypoxylon ostracinum* Bull. t. 144. f. 4.

Ad cortices antiquos Abietum, Pinatum, Betolarum et Inglandom pone radices, in Hercyn. infer. et super. nec non in Thuring. ditioque passim, per totum annum.

2359. *L. Utriculus* Spr., ascomatibus e basi subsessili infixa tenuata in valvas conchatas fusco-nigras opacas extus laeves dilatatis, flabelliformibus. — *Lophium Utriculus* Spr. *syst.* IV. 406. *Sphaeria Utriculus* Rebent. *neom.* 331. t. 2. f. 18.

Ad Salices annosus Neomarch. (Rebentisch.)

2360. *L. unguiculatum* W., ascomatibus e basi

infixa farcta in apicem truncatum subaequalem rime longitudinali inscriptum desinentibus erectis obtusangulo-teretiusculis, striis transversis annulatis exaratis, obesis fragilibus nigro-piceis, intus fuscescens. — *Hysterium pedicellatum* Schum. saec. II. 153.

Ad corticem Quercuum vetustarum passim. (Ab hoc *L. elatum* Grev. scot. t. 177; f. 1. Fr. elench. II. 113. haud multum differre videtur.)

2361. *L. dolabrisiforme* W., ascomatibus erectis utrinque compressis obsolete tenuiterque striatis nigropiceis nitidulis, e basi subaequali infixa (nonnisi parce strigulosa) in apicem truncatum ancipitem desinentibus, siccando fragilissimis, intus cinereo-farctis. — *Lophium dolabrisiforme* Wallr. in lit.

Ad corticem Pyri communis et Alni in agro heringena. Thuring. rarius. (Wallr.)

b. *Lomatodochii*, ascomatibus figura, mole, superficie et substantia perquam variis, sessilibus stipitatis, superne conniventibus, primum verticem clausum mentientibus ibique dein margine proprio sensim secedente latusculisque reclinantibus discum ascis fixis s. solutis foetum recludentibus.

(*Fungi helvellacei* Dub. F. uterinorum ord. 4. cupulati Fr.)

© ascis fixis.

299. ACTIDIUM FR. Sternschorf.

Ascomia sessile rotundatum, a centro versus marginem in rimas canaliculatas subtiliter dehiscens, intus farctum. Ascii erecti fixi tenuissimi cylindrici persistentes, sporidiis simplicibus rotundatis foeti.

2362. *A. hysteroides* Fr., ascomatibus punctiformibus atris laevibus, primum rotundatis clavis dein 4-6 gonis radiato-stellatis. — *Actidiuum hysteroides* Fr. syst. II. 595. *Wahlenb.* saec. II. 1022. *Hysterium globosum* Pers. syn. 98.

Ad ligna decorticata abietina rarius. (Neque generis notio neque loca in systemate certe patet.)

300. HYSTERIUM TODE. Ritzenschorf.

Ascoma ex substantia propria carbonaceo - duriuscula compositum, simplex, sessile, ovato - oblongum cum nisa finem atrumque producendi, nunc hypophloeodes innatum, summa cubilium pellicula velatum, nunc ectophloeodes, basi latescente saepe dimidiata adnatum, vertice labiis accumbentibus longitudinaliter connivento erumpens iisque dein reclinantibus in discum rimaesformem angustum, ascia erectis fixis, sporidia subglobosa 1 - 3 seriata continentibus s. vacuis intermixtis foetum reclusum, naviculare.

(*Hysterium* Tode et auct. *Hypoderma* DC. *Lophodermium* Chev. *Lichenis*, *Sphaeriae* et *Xylomatis* sp. auct.) Genus nobile cum *Graphide Lichenum* analogon cauteque ab hoc dignoscendum.

synphloecdea, ascomatibus innatis simplicissimis cum cubilium epidermide conformibus, dimidiatis, vegetabilia annua occupantibus. (*Hysterii* tribus 3. subtecta et 4. *Xyloma* Fr.)

2363. *H. punctiforme* Fr., ascomatibus innatis subrotundo-ellipticis minimis punctiformibus nigris, dein vertice depresso rima longitudinali inaequaliter dehiscentibus. — *Hysterium punctiforme* Fr. syst. II. 593.

Juxta nervos foliorum Quercus languidorum.

2364. *H. herbarum* Fr., ascomatibus innatis ellipticis in macula exarida pallida sparsis depressis nigris, demum concavisculis, rima longitudinali discum fuligineum monstrante scisis. — *Hysterium herbarum* Fr. L. L.

Ad folia sicca Convallariarum aliarumque ejusmodi herbarum passim.

2365. *H. foliicolum* Fr., ascomatibus amphigenis innatis synphloecdeis cum epidermide subcontiguis ovatis sparsis utrinque obtusis piceis nitidulis laevissimis, mediotenuis rimula longitudinali depressa tenerima connivente fissis. — *Hysterium foliicolum* Fr. syst. II. 592. Grev. scot. t. 129. f. 1. *H. Aucupariae et Cotini* Schleich.

Hypoderma sylomoides DC. gall. VI. 164. Xyloma hysteroides Pers. syn. 106., icon. 38. t. 10. f. 3.

Ad folia sicca arborum, praeprimis Crataegorum aliarumque Rosacearum passim.

2366. *H. Lauri Fr.*, ascomatibus epigenis insculptis synphloeodeis cum epidermide contignis oblongis utriusque obtasis sparsis nigris opacis, rimula longitudinali tenuerrima, striam dilatiorem mentiente connivente scissis. — *Hysterium Lauri Fr.* in Schleid. Linn. 1830. p. 552.

Ad folia Lauri nobilis cuiusdam aetate provectionis in horto thuringiaco semel.

2367. *H. maculare Fr.*, ascomatibus insculptis, maculam exaridam pallidam nonnisi nigro-limitatam obsidentibus subrotundo-ellipticis minutis nigris opacis, dein depresso-que rimulam longitudinalem discum stramineum monstrantem dehiscentibus. — *H. maculare Fr.* syst. II. 592. Grev. scot. t. 129. f. 2.

Ad folia sicca arborum suffraticumque praeprimis Vacciniis uliginosi. Vere.

2368. *H. tumidulum Fr.*, ascomatibus epiphyllis ovalibus prominulis fusco-nigricantibus turgidis, dein iu- rimam longitudinalem labiis albentibus integris tenuatis occultatam dehiscentibus discumque sublividum monstrantibus. — *Hysterium tumidulum Fr.* L. L. ercl. var. β.

Ad folia dejecta Fagi, Betulae aliarumque.

2369. *H. culmigenum Fr.*, ascomatibus innatis elliptico-oblongis prominulis laevibus nigris, maculam subdeterminatam gregatim obsidentibus, siccando diu clausis, humectando discum pallidum tenuem monstrantibus. — *Hysterium culmigenum Fr.* L. L. *H. gramineum* Grev. scot. t. 87.

Ad culmos graminum siccios vulgare.

2370. *H. arundinaceum Schrad.*, ascomatibus innatis synphloeodeis parce prominulis orato-oblongis sparsis fusco-nigris rugulosis, occlusi jam rima longitudinali tenuiterhiantibus. — *Hysterium arundinaceum Schrad.*

Journ. II. 68. t. 3. f. 3. Fr. syst. II. 591. Hypoderma arundinaceum Rebent. neom. 342. pr. pr.

Ad culmos Arundinis Phragmitis siccus passim.

2371. *H. scirpinum* Fr., ascomatibus innatis rectis elongatis aterrimis, maculam pallidam nonnisi circumscriptam obsidentibus, primum depresso, dein turgida in labia medioteanus cristato-prominula parallela longitudinaliter scissis discumque albido monstrantibus. — *Hysterium scirpinum* Fr. syst. l. l. *Sphaeria Leptostroma* Ehrenb. sylv. 29. *Hypoderma scirpinum* DC.

Ad culmos Scirpi lacustris languidos passim.

2372. *H. commune* Fr., ascomatibus innatis oblongis obtusis prominulis atris opacis, dein vertice labiis subrugosis fragilibus hiantibus discumque subfuligineum monstrantibus. — *Hysterium commune* Fr. syst. II. 589. *H. Artemisiae* Schum. saec. II. 155.

Ad caules herbarum firmiores, Epilobii v. c., Aconitorum, Artemisiarum aliarumque ejusmodi, si quidem ab *H. Rubi* revera differt.

2373. *H. melaleucum* Fr., ascomatibus innatis hypophyllis ellipticis nigris laevibus, primum depresso, deo linea prominula carinata demum in rimam longitudinalem dilutiorem scissa exaratis. — *Hysterium melaleucum* Fr. obs. I. 192. t. 2. f. 1., syst. II. 589. *H. pulchellum* Fr. l. l. (*lusus labii viridi-luteis.*)

Ad folia exsiccata Vaccinii Vitis idaeae passim.

2374. *H. sphaerioides* A. et Schw., ascomatibus epiphyllis subinnotatis summa pellicula decolore arcte obvolatis illamque permeantibus prominulis hemisphaericis nigris nitidis, demum utrobique hiantibus discumque molle albidum monstrantibus. — *Hysterium sphaerioides* Alb. et Schw. nissk. 57. t. 10. f. 3. Fr. syst. II. 588.

Ad folia Ledi palustris Lusatiae. (Alb. et Schweinitz.)

2375. *H. nervosum* Fr., ascomatibus hypophyllis nervisequis in striam longissimam rectam nigrum

convexus calamus confluentibus, dein in rimam longitudinalem, discum pallidum monstrantem dehiscentibus. — *Hysterium nervisequum* Fr. syst. II. 587. Dub. gall. II. 720. *Hypoderma nervisequum* DC. gall. VI. 167.

Ad folia Pini Piceae m. vogesi. (Mougeot.)

2376. *H. Rubi* Pers., ascomatibus innatis, primum punctiformibus saepius desciscentibus (maculas xylomaticas s. phaciaceas mentionibus), dein elongatis lanceolato-linearibus atrinque acutiusculis rectis piecis nitidis, demum in vertice elevato prouolo rimula longitudinali connivente fiasia. — *Hysterium Rubi* Pers. syn. 100. Fr. syst. II. 587. Grev. scot. t. 24. *Hypoderma virgultorum* a. DC. gall. VI. 165.

Ad sarmenta emortua Raborum passim.

†† *hypophloeodea*, ascomatibus primum hypophloeodeis, dein erumpendo epiphloeodeis. (*Hysteria erumpentia* Fr. *Lophodermium Chev.* *Dichaenae* sp. Fr. *Polydoratum* Chev. nec Stackh.)

2377. *H. Striola* Fr., ascomatibus primum hypophloeodeis linearibus elongatis longitudinalibus nigris, striae parallelas interruptas mententibus, dein epidermidem scissam infarcentibus emergentibus, intus gryseis. — *Hysterium Striola* Fr. Dub. gall. II. 720.

Ad caules Umbelliferarum German. austral.

2378. *H. Pinastri* Schrad., ascomatibus epiphyllis innato-immersis ovali-oblongis. laevibus nigris, epidermide scissa succinctis, dein in labia distincta, discum lividum monstrantia dehiscentibus. — *Lophodermium Pinastri* Chevaill. *Hypoderma Pinastri* DC. gall. II. 303. *Hysterium Pinastri* Schrad. Journ. II. 69. t. 3. f. 4. Alb. et Schw. nisk. 58. cum var. *sparsa* et *limitata*. Fr. syst. II. 587. Grev. scot. t. 60.

Ad folia Pinorum nostrarum et Juniperorum suis locis vulgare.

2379. *H. conigenum* Moug., ascomatibus primum

hypophloecodeis dein emergentibus punctiformibus atris nitidis, demum elongatis rima longitudinali dehiscentibus discumque carbonaceum atro-fuscum refulgentibus. — *Hysterium conigenum* Moug. et Nestl. vog. n. 75. Dub. gall. II. 719. Fr. syst. II. 386.

Ad squamas strobilorum Pini sylvestris passim.

2380. *H. degenerans* Fr., ascomatibus primum hypophloeodeis, dein erumpentibus gregariis rotundatis elongatisve variis nigris, demum in labia subcrenata discum molle lividum munitia reclusis. — *Hysterium degenerans* Fr. syst. II. 385.

Ad ramos sicclos Vaccinii uliginosi passim.

2381. *H. Ledi* Fr., ascomatibus erumpentibus elongatis sublinearibus atris subparallelis, dein in labia tenuia distantia discum rufesceni-nigrum seorsim dilatatum munitia reclusis, cymbiformibus. — *Hysterium Ledi* Fr. syst. II. 585. *H. abietinum* B. Ledi Alb. et Schar. nisk. 56.

Ad ramos exsiccatos Ledi palustris Lusatiae. (Albertini et Schweinitz.)

2382. *H. rugosum* Fr., ascomatibus primum hypophloeodeis, mox transversim erumpentibus subrotundis ovalibusque simplicibus utriusque obtusis confertis nigrofusca opacis duris, discum dilute fuscescens sub rimula tenui labiis tumidis inflexis succincta occultantibus, deinde coagulatibus amorphis, pseudostroma crustaceum rimoso-rugosum transversim effusum fusco-atrum munitientibus epidermidemque derasam decolorem obliterantibus. — *Hysterium rugosum* Fr. clerch. II. 141. *Opegrapha rugosa* Schaeer. spicil. 52. *Opegrapha macularia* Ach. lich. 247. *Verrucaria rugosa* Web. *Lichen rugosus* L. sp. II. 1607. pr. pr. Hoffm. enum. t. 2. f. 5. — *Dill. hist.* t. 18. f. 2.

a. fagineum, ascom. majoribus ovalibus. — *H. rugosum* a. *fagineum* Fr. L. l. *Dichaena faginea* Fr. olim.

Polymorphum fagineum Chev. *Schizoderma fagineum* Chev. paris. *Phleoscoria faginea* Wallr. *Naturg. I.* 222. *Opegrapha epiphega* Ach. meth. *O. faginea* et *conglomerata* Pers. *Lichen conglomeratus* et *epiphegus* Ach. prodr.

$\beta.$ *quercinum*, ascom. minoribus ovato-subrotundis. *Fr. l.* *L. Heterographa macularis* Fée. *Polymorphum quercinum* Chcv. *Opegrapha quercina* Pers. *l. l.*

$\gamma.$ *coryleum*, ascom. subrotundis minutis. *Fr. l. l.*

Ad corticem arborum l. vegetum, in truncis junioribus et ramulis ubertim. Per totum ascom. (Hoc dudum ex Lichenibus expuoxi Fungumque l. l. declaravi.)

2383. *H. Fraxini* Pers., ascomatibus nigris opacis duris sparsis, primum hyphoeodeis subrotundis, dein ellipticis emergentibus simplicibus utrinque obtusis trigouisve acutiusculis, demum medioteanus discum linearem labiis tamidis volvato-inflexis laevibus occultatum monstrantibus majusculis, iotas cinerascentibus obsolete celulosis. — *Hysterium Fraxini* Pers. syn. 98. *Fr. syst. II.* 585. *Grev. scot. t.* 72. *Sphaeria sulkata* Bolt. *t.* 124.

Ad ramos siccos Fraxini, in agro thuring. frequens.

+++ *epiphloeoidea*, ascomatibus superficialibus epixylis corneis, praeter basin adnatam prominulis. (*Hysteria denudata* Fr. *Hysteria proprie s. dicta DC.*) Graphides referunt et neque minus difficile ob habitum polymorphum ad species reducuntur.

2384. *H. ellipticum* Fr., ascomatibus sparsis minutis subellipticis immersis nigris, dein ex labiis discum atrum revelantibus secedentibus concaviusculis. — *Hysterium ellipticum* Fr. *syst. II.* 583. *H. minutum* DC.

Ad corticem ramulorum salicinorum passim.

2385. *H. aggregatum* DC., ascomatibus oblongis s. elongatis exiguis convexis parallelo-aggregatis nigris

laevibus, vertice rima tenui exaratis. — *Hysterium aggregatum* DC. gall. VI. 168. Fr. syst. II. 583.

Ad ligna quercina passim.

2386. *H. confluens* W., ascomatibus immersis linearibus longissimis parallelis s. flexuosis atris nitidulis, primum compressis tenuiter sulcatis, dein discum angusterrimosum labiis obtusis occultatum recludentibus, demum confluentibus, stratum contiguum explanatum mentientibus, raro sparsis. — *Hysterium longum* auct. nec Pers.

Ad lignum Crataegi exsiccatum durum Thuring. rarius (Wallr.) (Tabulam explanatam plicis rimulisque hieroglyphicis exaratam fero refert et praecedentis forsitan praestat perfectiorem.)

2387. *H. angustatum* Pers., ascomatibus subimmersis linearibus utrinque contractis acutiusculis sparsis s. confertis raro parallelis atris nitidulis, primum sultato-rimosis, dein a centro inde in discum nigrum opacum rugulosum, labiis tumidis inflexis nitidis munitum reclusis. — *Hysterium lineare* Fr. syst. II. 583. Grev. scot. t. 167. f. 2. *H. Prostii* Dub. gall. II. 719. *H. angustatum* Pers. syn. 99. Nces syst. f. 303. (ascom. parallelis.)

Ad cortices arborum siccios desquamatos, Malii prae-primis, Pyri, Acerum aliarumque, ad ipsa ligna fabrefacta, in quibus plerumque ascomata parallela exadunt.

2388. *H. acuminatum* Fr., ascomatibus subimmersis sparsis rectis atris linear-lanceolatis acuminatis, dein in discum cornuum conformem labiis prominulis cinctum reclusis. — *Hysterium acuminatum* Fr. syst. II. 582.

Ad ligna vetusta faginea passim.

2389. *H. varium* Fr., ascomatibus ionato-superficialibus gregariis ellipticis s. elongatis variis uigris opacis, intus fuscescentibus, dein in rimam labiis obtusis obsoletisve conniventem parce hiacitibus. — *Hysterium varium* Fr. l. l.

Ad lignum quercinum et fagineum passim, v. c. insulae Ruginie. (Laurer.)

2390. *H. biforme Fr.*, ascomatibus emergendo superficialibus, primum verrucosis subrotundis, dein oblongis rectis flexuosisque in discum rimosum album, labiis tumidis convexis latis obvalatum reclusis. — *Hysterium biforme Fr. syst. II. 582.*

Ad ligna dura et troncos decorticatos Betulae, Crataegi, Pyri, passim. (Cum Graphide varia analogum.)

2391. *H. episphaerium Fr.*, ascomatibus innatosuperficialibus ellipticis depresso nigris, dein in discum linearem labiis planiusculis laevibus cinctum reclusis. — *Hysterium episphaerium Fr. syst. II. 581.*

Ad Sphaeriam Stigma lignaque putria rarius.

2392. *H. navicularc W.*, ascomatibus emeris atris nitidis, praeter basin adnatam liberis ovalibus oblongisque rectis curvisque semicylindricis, sulco rimaeformi, labiis rectis excepto inscriptis.

Ad corticem ramorum Cerasi Thuring.

2393. *H. contortum Ditm.*, ascomatibus emeris elongatis opacis nigris, primum compresso-subcylindricis, vertice lineatis, dein in rimam tenuem labiis erectis prominulis munitum reclusis, rectis curvisque, non nisi confluētibus, intus albentibus. — *Hysterium graphicum Fr. syst. II. 581. H. contortum Ditmar in Sturm germ. III. t. 32.*

Ad corticem Pini sylvestris Lusatiae (Ditm., Kunze), nec non ad humum circa caudices vetustos collectam, quo loco saepius tomento stygio alieno, subiculum proprium mentienti, solet insidere.

2394 *H. elongatum Wahlenb.*, ascomatibus ovato-oblongis utrinque obtusis rectis atris, praeter basin adnatam emergentibus sessilibus majusculis, primum vertice depresso, dein sulcum labiis tumidis inlexis obvalatum recludentibus. — *Hysterium elongatum Wahlenb. lapp. 522. excl. syn. Fr. syst. II. 581.*

Ad ligna decorticata duriora, Rhamni v. c. Salicis, Populi Hercyn. superior. rarius.

2395. *H. pulicare* Pers., ascomatibus superficia-
libus subrotundis-ellipticis oblongisque turgidis sparsis
atris nitidulis longitudinaliter striatis, dein in rimam la-
biis obtusis cinctam hiantibus. — *Hysterium pulicare* Pers.
syn. 98. *Fr. syst. II.* 579. *Nees. syst. f.* 302. *Lichen
alneus* Ach. prodr. *Lichenis spec. auct. med. actat.*

$\beta.$ *elongatum*, ascomatibus elongatis linearibus subpa-
rallelis. *Fr. I. I.*

Ad cortices et ligas quercinae praeprimis, vulgare.
(Figura et mole ludit et saepius decipit.)

NB. Inter dubias et a genere alienas nomino: *Hy-
sterium candidum* Tod., in Brassica; *H. coeruleum* Tod.,
in ramis quercinis; *H. viride* Alb. et Schw. et *H. ro-
tundum* Bernhardi.

301. STICTIS PERS. Gruftschaf.

Ascoma primum iuscalptum farinoso-miculaceum ob-
solete cellulosum clausum hemisphaericum glebosum rude,
farcimine asophoro ceraceo nonnisi stillante s. verticem
signatae, dein subsidente fundumque replete factum,
demum erumpendo coactum inque limbum callosum ve-
luti figuratum reclusum. Asci tenues fixi, sporidiis glo-
bosis minutissimis foeti.

(*Stictis* Pers. obs. et myc. Lk. Fr. excl. *Xylogra-
phis*, *Pezizae* sp. Pers. syn. *Pezizae ascidiis imperfectis*,
margine hymenii accessorio Spr. syst. IV. 515. *Lichenis*,
Hysterii et *Sphaeriae* sp. auct.) Habitu lichenoso praec-
cellunt, nec inique cum *Gyalecta* Ach. s. *Aecidio*, au-
alogis generibus comparantur.

† *hypophloeoidea*, ascomatibus insculptis hypo-
phloeoidea.

2396. *St. insculpta* W., ascomatibus hypophloeo-
dea insculptis corneo-coactis hemisphaericis albidis, sum-

ma epidermidis pellicula dia obtectis illamque dein a centro inde scissam umbonatam elevantibus, humectis in discum album tenuem poroso-satiscentem immersum immarginatum reclusis, siccando iterum contractis.

Ad ramulos salicinos Thuring. (Wallr.)

2397. *St. Lecanora Fr.*, ascomatibus hypophloeodeis insculptis corneo-coactis albidis, dein figuratis, epidermidis pelliculam lacero-3. stellatim scissam, limbo surfuraceo candido subintegro parce prominulo infarcentibus, demum urceolaribus discum ascophorum planum fulvum monstrantibus. — *Stictis Lecanora et ocellata Fr.* syst. II. 193. *Peziza ocellata Pers. myc.* *P. Lecanora Schmidt et Kunze D. Schw. n.* 174.

Ad ramos salicinos sicclos passim.

2398. *St. Betuli Fr.*, ascomatibus hypophloeodeis carnosico-ceraceis mollibus gregariis subrotundis oblongisque difformibus albis subimmarginatis, dein planiusculis pallentibus. — *Cryptomyces Betuli Grev. scot. t.* 206. *Fr. elench. II. 27. Stictis Betuli Fr. syst. II. 193. Peziza Betuli Alb. et Schw. nisk.* 309.

Ad ramos sicclos Carpini et Tiliae, v. c. Lusatiae infer. (Alb. et Schweinitz.) (Abnormia quidem et novi generis cives, mihi vero ignotus.)

2399. *St. Pelvula Fr.*, ascomatibus orbicularibus majusculis laevibus rufescenti-pallidis profunde excavatis cupuliformibus. — *Fr. syst. II. 196. Peziza pelvula Pers. myc. I.* 337.

Ad ramulos sicclos salicinos rarius.

†† entophloeodeae, ascomatibus primum immersis, dein erumpentibus.

2400. *St. pallida Pers.*, ascomatibus immersis gregariis punctiformibus pallidis, halone oblongo albidore cinctis, primum clausis, dein ore elliptico hiantibus discumque urceolatum gilvo-pallidum monstrantibus, siccando conniventibus. — *Stictis pallida Pers. obs. II.* 74.

*t. 6. f. 7. Fr. syst. II. 196. Peziza punctiformis Pers.
syn. 674.*

Ad ligna sicca passim. (Generis dubia civis.)

2401. *St. arundinacea Pers.*, ascomatibus immersis orbicularibus, primum clavis aequalibus, dein limbo prominuo integerrimo parce pilosulo demum calvo obtuso emergentibus osculoque aperto regulari discum coeruleum monstrantibus. — *Stictis arundinacea Pers.* myc. I. 336. *Fr. syst. II. 195.*

Ad straminea arida tectorum, vere rarius.

2402. *St. stellata W.*, ascomatibus immersis clavis, dein emeritis orbiculatis exiguis liberis sessilibus subglobosis, vertice in osculum rotundum, fundum concavum concolorum monstrans reclusis corneis albis, extus tegmine furfuraceo grumoso albo-cinereo 4-6 radiato obductis s. stellatis.

Ad caules sicclos Arctii Bardanae agri thuring. rarissime.

2403. *St. radiata Pers.*, ascomatibus immersis orbicularibus clavis corneis, dein vertice in osculum rotundum patulum, limbo extus pulverulento niveo parce prominulo calloso revoluto lacero redimitum reclusis fundumque urceolatum abstrusum, farcimine ascophoro primum liquido dein ceraceo flavente s. aurantio scatentem monstrantibus. — *Stictis radiata Pers. obs. et syn. 674. Fr. syst. II. 194. Grev. scot. t. 227. Peziza aecidiooides Nees syst. f. 263. P. marginata Reh. Sowerb. t. 16. Lichen excavatus Hoffm. enum. 47. t. 7. f. 4. Sphaerobolus rosaceus Tod. mecl. I. 44. t. 7. f. 58. Lycoperdon radiatum L.*

Ad corticem arborum, Salicis copreae paeprimis, nec non Rhamni, Pyri aliarumque et ad ipsos calmos exsiccatos, passim.

2404. *St. Pupula Fr.*, ascomatibus erumpentibus hemisphaericis albo-farinosis, dein vertice farcimen ascophorum atrum primum subglobosum mox deplanatum sustinentibus illudque sensim dilatando basinque micu-

laceo-farinosa candidam limbi instar cingentem reclinatis, patellaribus. — *Stictis Pupula* Fr. syst. II. 193., elench. II. 25. *St. radiata* auct. ipsiusque Alb. et Schw. *Stictis mollis* Pers. *Urceolaria monocarpa* Dufour. *Peziza Pupula* Spr. syst. I. l. *Sphaeria venusta* Sommersf. in lit.

Ad ramos sicclos Rosarum nec non Tiliae, Populi, Pruni domesticae, Pyri Mali ipsaque stramina sicca, et ligna quercina arida tectorum in agro thuring. passim, alibi rarissime. (Quam primus anno 1812 *Verrucariae cæculæ* titulo l. l. sustuli, variat insigniter mole; inter initia Sphaeriam cubicularem, adulta vero Pezizam haud male refert et locis uidis ab ascomate informando facile deficit inque cubilibus stillam ascophoram erumpentem viridem nudam relinqnit (*Agyrium atrovirens* Fr. syst. II. 232. *Tubercularia atrovirens* Spr. syst.)

2405. *St. chrysophaea* Pers., ascomatibus inscalptis dein erumpentibus orbicularibus in osculum rotundum patulum, limbo crassiusculo erecto subrepando aureo succinctum reclusum fundumque excavatum rubrum monstrantibus, urceolaribus. — *Stictis chrysophaea* Pers. myc. I. 335. Fr. syst. II. 194. *Peziza* Pers. syn. 674., icon. t. 8. f. I.

Ad ramos sicclos decorticatos abietinos Hercyn. super. (Persoon.)

2406. *St. ollaris* W., ascomatibus erumpentibus majusculis atris membranaceis globosis clausis, extus tegmine tenaci farinoso-grumoso obductis, dein omersis vertice umbonato osculo circinato patulo hiantibus hemisphaericis, ollaribus. — *Peziza sphaeroidea* W. in lit.

Ad ramos Rhamni Frangulae Thuring., quoad generis notionem dubiam banc sp. passim legi.

302. PHIBALIS W. Feigenträger.

Ascoma erumpens sessile, dein liberum obverse pyriforme carnosso-subcoriaceum, primum marginibus in flexis conniventibus clausum, dein circinatum reclusum discum-

que infundibuliformem profunde immersum tenorem, ascis linearibus oligosporis foetum monstrans.

(*Pezizae tribus Encoelia Fr. syst. P. erumpentes corticolae sicciores Wahlenb. suec.*)

2407. *Ph. farinacea* W., ascomatibus erumpentibus sessilibus depressis solitariis nigro-subrufescutibus, disco farinaceo, margine promonulo dilatato ciucto. — *Tymanitis farinacea* Pers. myc. I. 326. excl. syn. teste Fr. syst. II. 176.

Ad ramos exsiccatos pineos Hercyn. (Persoon.)

2408 *Ph. pulveracea* W., ascomatibus gregariis nigricantibus, extus scobe furfuracea cinerea obtectis, primum subglobosis, deinde in basin stipitiformem productis turbinatis, vertice semipatulis. — *Cenangium pulveraceum* Fr. syst. II. 181. *Peziza pulveracea* Alb. et Schw. nisk. 342. t. 8. f. 2. *P. ramosa* Ehrenb. (cum monstrum stipite subramoso.)

Ad corticem betulinum Lusatiae rarissime. (Alb. et Schweinitz.)

2409. *Ph. bicolor* W., ascomatibus hypophloeodeis mox epidermidem scissam penetrantibus, e strato pseudostromatico carnoso convexulo caespitose erumpentibus; extus tegmine furfuraceo stipato albo-cinereo vestitis, primum subrotundis basi subaequalibus clavisphaeriformibus, deinde in basin productis subturbinatis vertice in osculum circinatum, demum in discum planum fuscostrum margine tenui ciuctum reclusis, scutellaribus.

Ad Rhamni Frangulae ramulos siccios Thuring. pluribus quidem locis, omnibus tamen rarissime. Vere. (Ascomata 2-6 in caespitem juncta stratoque coccineo epidermidis juncta, primum Sphaeriam ovinam, adulta magis deplanata Patellariam abietinam W. haud male referunt.)

2410. *Ph. fascicularis* W., ascomatibus hypophloeodeis, mox epidermidem lacero-scissam infarcentibus subeuntibusque coriaceis fusco-nigricantibus rugulosis sac-

pius scobe arenulosa adspersia stipato-caespitosis, pri-
mum subturbinatis margine volvato crasso inflexo clavis,
dein magis deplanatis discum nigro-fuscum tenuiter mar-
ginatum monstrantibus, difformibus. — *Peziza fascicu-
laris* Alb. et Schw. nissk. 315. t. 12. f. 2. Fr. syst. II.
75. *P. populnea* Pers. syn. 671.

Ad ramos moribundos Populi tremulæ nec non Fra-
xini et Salicis fragilis passim.

2411. *Ph. fissa* W., ascomatibus hypophloeodeis,
mox epidermidem lacero-scissam infarcentibus subeun-
tibusque subcaespitosis sessilibus membranaceis fragilibus,
primum clavis, extus scobe farinosa dilute-cinnamomea
a. cervina adspersis, dein hiantibus discumque album re-
cludentibus. — *Peziza fissa* Fr. syst. II. 75. *P. fascicu-
laris* β. *corylina* Wahlenb. suec. II. 993. *P. lacera* Pers.
myc. I. 227. nec homonym. p. 280 et Willd.

Ad ramos coryleos (Ehrenberg), alneos equidem.

2412. *Ph. glabra* W., ascomatibus hypophloeodeis
subsolitariis, mox epidermidem scissam superantibus ses-
silibus membranaceis teuacellis, extus glabris nitidis di-
lute-fuscescentibus, dein discum albo-pallescentem mar-
ginibus inflexis cinctum recludentibus.

Ad ramulos quercinos juniores languidos Thuring. (W.)

2413. *Ph. furfuracea* W., ascomatibus sessilibus
caespitosis carnosò-coriaceis majusculis saepius difformi-
bus, extus furfure ferrugineo-pallido obtectis, dein di-
scum cinnamomeo-nigrum margine involuto cinctum re-
cludentibus. — *Peziza furfuracea* Pers. syn. 672. Roth
cat. II. 357. t. 9. f. 3. Alb. et Schw. nissk. 343. cum
var. β. *caespitosa*.

Ad ramos coryleos et alneos passim.

2414. *Ph. ampliata* W., ascomatibus sessilibus te-
neris carnosulis fragilibus, e basi abrupte dilatata cam-
panulatis, extus nudiusculis fuligineo-fuscia. — *Peziza*
ampliata Pers. icon. 31. t. 8. f. 4. Fr. syst. II. 76.

Ad arborum truncos Hercyn. (Persoon.)

803. SOLENIA HOFFM. Röhrenträger.

Ascoma simplex basi farcta sessile membranaceum erectum, dein elongatum tubulosum, vertice obtuso in os integrum constrictum relusum, intus hymenio pertenui, ascis imperfectis subglobosis foeto vestitum.

2415. *S. ochracea Hoffm.*, ascomatibus sparsis s. gregariis clavato-cylindricis tenerrimis fragilibus declinatis, extus pilis brevibus fibrosis rigidulis adpressis ochraceis hirsutis, intus albidis. — *Solenia ochracea Hoffm.* germ. III. t. 8. f. 2. Pers. myc. I. 334. Fr. syst. II. 201. *Peziza Hoffmanni* Spr. syst. IV. 516. *P. ochracea* Pers. syn. 675.

Ad caudices arborum, Tiliarum v. c. patres passim. (Pezizam anomalam colore fere refert et nonnisi cubilia strato concolore obducit.)

2416. *S. candida Hoffm.*, ascomatibus sparsis cylindricis candidis tenerimis fragilibus glaberrimis, demum in os truncatum revoluto-marginatum reclusis. — *Solenia candida Hoffm.* l. l. f. 1. Pers. et Fr. l. l.

Ad lignum fagineum putridum. (Hoffmann.)

2417. *S. fasciculata Pers.*, ascomatibus conformati-gregariis subfasciculatis clavato-cylindricis, extus pilis adpressis tenerimis subsericeis albis vestitis, dein calvis. *Solenia fasciculata Pers.* myc. 335. t. 12. f. 8. 9. Fr. syst. II. 200. *S. candida* Moug. *S. incana* Pers. syn. 675. (*Iulus albido-ferrugineus*.) *Peziza Solenia DC.* gall. II. 80.

Ad ligna pinea et betalina in terra uda putrescentia rarius.

804. PEZIZA DILL. Becherträger.

Ascoma carnoso - membranaceum s. ceraceum sessile centrove stipitatum, primum marginibus conniventibus clausum, dein in discum rotundatum ascophorum disco-locorem dilatatum, cupuliforme, extus s. ad latuscula (ve-

lum Fr.) varium. Hymenium distinctum persistens laeve s. politum marginibus exceptum, disciforme. Ascii insignes fixi distincti, alii perfecti sporidiis numero variis, saepius octonis (*Octospora Hedw.*), elastice demum prorsilientibus foeti, alii inanes intermixti (*paraphyses auct.*)

(*Peziza Dill. Pers.*, emend. generis charactere. Nees. *Fr. Encoelia Hill. Octospora Hedw. Patella Weber. Peziza* (Plinii), *Honsola, Pissidia, Ugola, Terana, Trombeta* Adans. *Elvellae* sp. Gled. Schaeff. *Fungoides Tournef. Mich.*) Vegetabilia vulgivaga plerumque, veris et auctumui tempore udo vigentia.

A. dasycyphae, ascomatibus ceraceis tenacellis, primum et plurimque diutius iterumque siccando conniventibus; extus pube tenera patula s. rigidula magis adpressa, sive in villum laxum sive in tomentum stipatum contexta, habitum mollem veluti innocuum s. torvum magis impertinente, undique aequaliter vestitis, intra verticis margines hymenium tenue, ascis exiguis sporidia simplicia continentibus foetum informantibus, figura variis, sessilibus s. stipitatis, ipsis cubilibus nec strato superadditis. (*Pezizae series II. Lachnea Fr. excl. tribu S. Fibrina et T. Tapesia. P. villosae Nees et Mart.*)

† *sessiles, ascomatibus epiphloeodeis sessilibus.*

* *epiphytae, in partibus pl. annuis vigentes.*

2418 *P. punctiformis* Fr., ascomatibus sessilibus minutissimis saepius fugacibus, diu clausis hemisphaericis discumque concolorē occultantibus, extus villo nivēo, pallido s. dilute fuscescente vestitis globulumque punctiformem floccosum mentientibus. — *Peziza punctiformis* Fr. syst. IL 105. nec Pers. *P. dryophila* Pers. myc. I. 265.

Ad folia putrescentia, alnea praeprimis et quercina, ad ramulos abietiacos et Clematis vites.

2419. *P. Arundinis* Fr., ascomatibus sessilibus perexiguis punctiformibus gregariis, extus villo tenui sub-

ferrugineo dein caduco vesitis fuscescensibus, disco-pallide-fuligineo. — *Peziza Arundinis* Fr. syst. II. 105.

Ad culmos Arundinis Phragmitis siccus. (Kunze.)

2420. *P. micacea* Pers., ascomatibus sessilibus gregatim congestis tenerimis, extus villo delicatissimo pallide-helvolo vestitis. Pers. myc. I. 268. Fr. L. l.

Ad caulem Cardui nutantis talem qualem legi, sevo jam confectam.

2421. *P. villosa* Pers., ascomatibus sessilibus minutis persistentibus globosis dia conniventibus, extus vellere albo vestitis, disco pallido s. carneo. — *Peziza villosa* Pers. syn. 655. Alb. et Schw. nisk. 325. Fr. syst. II. 104. *P. granuliformis* Pers. syn. 651. *P. Sclerotium* Pers. obs. II. 84. *P. sessilis* Sowerb.

P. carneae, ascomatibus intus incarnatis. *P. granuliformis* Nees syst. f. 273. *P. incarnata* Pers. 165.

Ad caules herbarum siccus et semiputres, folia decidua ipsosque Agaricos, Isariae comes.

2422. *P. Nidulus* Schm., ascomatibus sessilibus punctiformibus depresso-globosis fusco-badiis, pilis fusco-castaneis, exterioribus nounisi ferrugineo-pulverulentis torvis demum caducis, superioribus inflexis diutius seriatimque persistentibus discunque impresso-mammillarens obturantibus. — *Peziza Nidulus* Schmidt et Kz. D. Schw. n. 72. Fr. syst. II. 104. Pers. myc. I. 250.

Ad caules siccus, praeprimis Convallariae multiflorae, v. c. Lusatiae (Schmidt), agri badeus. (Hartmann et Kniff), Thuring. (Wallr.) rarius. (Ad Pezizas trichoscyphas reflectit; ascomata enim primum vndeque pilis strigosis porrectis inhorrescentia, dein recalva et saepius vertice impresso mammillato solum setulis residuis inflexis obturantur.)

2423. *P. sulfurea* Pers., ascomatibus sessilibus tenacellis, primum subglobosis strigoso-tomentosis, pilis marginalibus discum carneum (humectando) recludentibus, (siccando) occultantibus sulfureo-virentibus, reliquis

sordide-fuscescentibus, demum omnibus concoloribus. — *Peziza sulphurea* Pers. myc. I. 250. pr. pr. Fr. syst. II. 104. *P. citrinella* DC. gall. VI. 24. *P. virescens* Schum. Fr. l. l.

Ad caules herbaceos elatiorum, Urticae praesertim, passim. (Ascomata primum subglobosa, ob pilos superiores sulfureo-virentes et inferiores fuscescentes, bicolora demum magis subsidunt, deplanari incipiunt et concolora sordide fuscescant.)

2424. *P. adpressa* W., ascomatibus primum subsessilibus rotundis oculis jam in discum planum vitellino-lutescentem pallescentem reclusis usque adpressis planis lenticularibus majusculis, subtus parce tomentosis, margine pilis brevissimis rectis parcis prominulis pallidoculfureis fimbriatis.

Ad caules Helianthi annui siccios agri northus. (Wallr.)

2425. *P. relicina* Fr., ascomatibus sessilibus minutis obconicis badiis, pilis erectis confertis strigosis vestitis. — Fr. syst. II. 103. *P. Atropae Alb. et Schw.* risk. 320.

Ad caules herbarum siccios, Atropae v. c., Chenopodiacearum, Sonchorum uliginosique passim.

2426. *P. Platani* Pers., ascomatibus sessilibus paullis extus parce setosis nigris torvis, primum conniventibus subglobosis, dein discum planum albido reductibus subsidentibus. — *Peziza Platani* Pers. myc. I. 253. Fr. syst. II. 103.

Ad folia decidua Aceris Pseudo-Platani German. boreal. rarissime. (Persoon.)

2427. *P. strigosa* Fr., ascomatibus innato-sessilibus applanatis concavis strigosis nigris, disco pallido. — Fr. syst. II. 103.

Ad culmos et folia graminea arida passim.

** epiphyiae, in lignis nascentes.

2428. *P. hyalina* Pers., ascomatibus sessilibus punctiformibus subglobosis molibus diu clausis, demum ap-

planatis pilos parcos exuentibus, humectis vitro-pellucidis. — *Peziza hyalina* Pers. syn. 655. Fr. syst. II. 102. Alb. et Schw. nisk. 326.

Ad ligna putredine exesa uida vulgaris.

2429. *P. Pineti* Batsch, ascomatibus sessilibus gregariis ceraceis crassiusculis stipatis, extus parce villosis cano-fuscescentibus, primum urceolatis dein explanatis calvescentibus discumque planum pallidum recludentibus. — *Peziza Pincti* Batsch elench. 201. f. 140. Fr. syst. II. 101. *P. lurida* Pers. syn. 666. Alb. et Schw. nisk. 337.

Ad folia Pinorum delapsa uodore conglobata.

2430. *P. episphaeria* Mart., ascomatibus sessilibus minutis gregariis, extus pilis propexis ciliatis albis ob sessis, dein planis discum dilate lutescentem recludentibus. — *Peziza episphaeria* Mart. erl. 465. Fr. syst. II. 100.

Ad Sphaeriam deustam agri erlang. (Martius.)

2431. *P. variecolor* Fr., ascomatibus sessilibus gregariis stipatis, extus floccis villosis vestitis ex flavo fuscoque pallescentibus, primum globosis clavis granuliformibus, dein subsidentibus discumque (humectando) urceolatum albo-pallescentem recludentibus. — *P. variecolor* Fr. l. l. *P. sulphureo-caesia* Schum. saell. II. 432. *P. sulphureae* var. Pers. syn. l. l. *P. albo-lutea* Pers. icon. 31. t. 8. f. 4. *P. hydnoidea* Sowerb. t. 178.

Ad ligna putrida quaecunque frequens. (Colore ad modum vario redit, frequentius flavescit s. cum pallore admisto lividum s. fusco-umbrinum ostendit.)

2432. *P. flavo-fuliginea* A. et Schw., ascomatibus sessilibus gregariis teneris mollibus strigoso-hirtis laete sulfureis, primum cupularibus, dein subsidentibus subrotundis discum olivaceo-fuligineum recludentibus, demum saepius flexuosis. — *P. flavo-fuliginca* Alb. et Schw. nisk. 319. t. 11. f. 7. Fr. syst. II. 100.

Ad lignorum frusta et foliu madore putrida in sylvarum penetralibus humectis passim. Auctumno.

2433. *P. rufo-olivacea* A. et Schw., ascomatibus sessilibus sparsis carnosō-ceraceis molliusculis, extus villosō-palverulentis sordide rufo-ferrugineis, dein orbiculato-applanatis, discum e viridi olivaceum demum nigrescentem recludentibus. — *Peziza rufo-olivacea* Alb. et Schw. nisk. 320. t. II. f. 4.

Ad ramos emortuos Ruborum, v. c. Lusatiae. (Albert. et Schw.), Viburni, Thuring., Ribis. (Martius.)

2434. *P. barbata* Kz., ascomatibus sessilibus gregariis adnatis ferrugineis tomento ferrugineo adpresso obtextis, primū conniventibus globosis, dein subsidentibus discumque pallidum recludentibus. — *Peziza barbata* Kunze in Fr. syst. II. 99. *P. Xylostei* auct. *P. rufo-olivacea* DC. *P. pellita* Pers. myc. I. 264.

Ad ramos Lonicerae Xylostei et Caprifolii languidos, moutis vogesi v. c. et agri thuring. passim.

2435. *P. spadicea* Pers., ascomatibus sessilibus sparsis majusculis duriusculis, extus tomento stipato spadiceo vestitis, primū orbicularibus, dein ore conniente discum pallidum moustrantibus. — *Peziza spadicea* Pers. myc. I. 252. Fr. syst. II. 98. nec Batsch.

Ad ramos Tiliae et Populi tremulae languidos.

2436. *P. hispidula* Schrad., ascomatibus sessilibus subcarnosis atris nitidis setisque concoloribus putentibus hispidis, primū nreolatis, dein discum caesio-album recludentibus. — *Peziza hispidula* Schrad. Journ. 1799. II. 64. Fr. syst. II. 98. Pers. myc. I. 247. *P. discolor* Mart. erl. 464. *P. strigosa* β. Pers. syn. 648.

Ad ligna ramosque dejectos passim.

2437. *P. flammnea* A. et Schw., ascomatibus sessilibus firmis extus pilis adpressis strigoso-villosis flammneo-rubiginosis, intus nigris, primū clausis, dein discum concolorē ferrugineum recludentibus. — *Peziza flammnea* Alb. et Schw. nisk. 319. t. I. f. 6. Fr. syst. II. 96.

Ad ligna dura, Mali v. c., Carpini aliarumque ejusmodi arborum passim.

2438. *P. cruenta* W., ascomatibus sessilibus molli-
bus, extus pilis villosis tortuosis laxe adpressis vestitis
ferrugineo-cruentis, primum clavis dein discum albo-
pallidum cum compage interea concolorum refulgentibus.

Ad ramulos siccios Corni masculae agri badensis (Kneiff),
thuring. (Wallr.) (Habitu praecedentem aemulatur, villi
colore ferrugineo-cruento et disci compagisque internae
pallore assatim differt.)

2439. *P. corticalis* Pers., ascomatibus sessilibus
duriusculis gregariis, extus piloso-tomentosis pallide-fu-
scoscentibus, demum ex flocculis adspersis magis cine-
rascentibus, intus fusco-rufis, siccis conniventibus sub-
globosis basi tenuatis, humectis discum pallide-fuscum
refulgentibus. — *Peziza corticalis* Pers. syn. 651. Alb.
et Schw. nisk. 322. Fr. syst. II. 96. *P. granulaformis*
Schum. *P. urceolata* Rutstr. nec Fahl.

Ad corticem duriorem arborum vetustarum Populi
praeprimis, Alni, Quercus pone radicem.

2440. ?*P. tumida* Pers., ascomatibus sessilibus spar-
sis mollibus, extus pilis patentibus, inferioribus pallide-cin-
namomeis, supremis albentibus vestitis, primum (et sic-
cando) clavis subglobosis dein subsidentibus discum quo
nigro-fuscum refulgentibus. — *Peziza tumida* Pers. myc.
I. 269. Fr. syst. II. 97.

Ad sarmenta Vitis Thuring. rarius.

2441. *P. farinosa* W., ascomatibus sessilibus mol-
liter carnosulis, siccis clavis globosis, extus pilis pro-
poxis tenerrimis dilute ciunamomeis sparsis confertisve
iisque apice farinula albida adspersis undique vestitis si-
militerque in stratum tenue intertextis, humectis discum
concarum dilute-carneum margine inflexo cinctum re-
fulgentibus. — *Peziza carneola* W. in lit.

Ad lignorum ciborum frustula humi jacentia, Fraxini
v. c., Tiliae, Fagi Thuring. passim. (Praecedenti similis,
at superficie tenuiori tomentosula, pilis similibus in stra-
tum tenue saepius intertextis diversa, cum *P. rufiberbi*
Alb. et Schw. et Fr. syst. II. 107. forsitan comparanda.)

2442. *P. albo-violascens* A. et Schw., ascomatibus sessilibus sparsis carnosis, extus villo propexo rigidulo candido (veluti asbestos) vestitis, intus nigrofuscis, primum (siccandoque) conniventibus globosis punctiformibus, dein discum glauco-coerulecentem concaviusculum, ascis emersis spiculosum, recludentibus magisque deplanatis majusculis. — *Peziza albo-violascens* Alb. et Schw. nisk. 322. t. 8. f. 4. Fr. syst. II. 96. *P. fallax* Pers. myc. I. 266. *Ascobolus Vitis* Wallr. in lit. Fri. elench. II. 16.

Ad sarmenta *Vitis*, *Clematis* et *Ruborum* Thuring. passim. (Ascis emergentibus haud mediocriter a genere aberrat, habitu tamen convenit. Monstra e disco proli- fera intercurrunt.)

2443. *P. syringae* W., ascomatibus sessilibus spar- sis carnosis, extus villo propexo rigidulo candido (as- bestino) vestitis, intus fuscescentibus, primum (et siccando) conniventibus globosis punctiformibus, dein discum pallidum recludentibus deplanatis ascosque pulverulentos pallide-stramineos eructantibus.

Ad ramos *Syriogae vulgaris*, *Lonicerae Caprifolii*, Thuring. vulgaris. (Habitu et superficie cum praecedente congrua, disco pallido, demum ascis emersis et pulveris pallide-straminei iustar profusis neque minus congenere.)

2444. *P. bicolor* Fr., ascomatibus subsessilibus sparsis confertisque e basi obtusa leviterque producta subglobosis majusculis mollibus, extus villo propexo rigidulo (veluti asbestos) candido denso undique vestitis, primum (et siccando) conniventibus depresso, dein discum e rubro-luteoque pallescentem s. discolorem reclu- dentibus. — *Peziza bicolor* Bull. champ. t. 410. f. 3. Sowerb. t. 17. Fr. syst. II. 92. *P. Oxyacanthae* Pers. obs. et *P. pulchella* Pers. myc. Rebent. (ceu latus disco aurantio-coccineo.) — *P. transparens* Pers. obs. *P. quer- cina* Pers. myc. I. 260. (ceu l. disco luteo.) *P. pulchella* Nees syst. f. 284. (ceu l. disco pallide sordido.)

Ad ramos exsiccatos *Quercus* praeprimis, *Coryli* et

Oxyacanthea, vulgaris. (Auctores inter *P. stipitatas* referunt ob basin saepius productam; equidem hoc loco laudo ob habitum congruum.)

†[†] *stipitatae, ascomatibus in stipitem desinentibus.*

2445. *P. acuum A. et Schw.*, ascomatibus tenerimis minimis cam stipite debili longo cupulaque plano-concavuscula albidis hirsutinsculis. — *Peziza acuum Alb. et Schw.* nisk. 330. *Fr. syst. II.* II. 95. *P. perpusilla Pers. myc. I.* 317.

Ad arborum coniferarum folia in pinetorum altis penetalibus passim. (Viva albescit hirsutiemque teneram induit, trita robescit.)

2446. *P. torva W.*, ascomatibus minutissimis albis, primum e basi tenuato stipitiformi adpresso-pilosa penicilliformibus, dein subglobosis stipitem occultantibus, in discum urceolatum lutescentem reclusis, extus pilis portrectis rigidulis patulis torvis.

Ad ligna Pyri communis arida passim.

2447. *P. fuscescens Pers.*, ascomatibus pusillis gregariis stipitatis fuscescentibus, pilis badiis parce pubescentibus, primum globoso-turbinatis conuiventibus dein patulis. — *P. fuscescens Pers. syn. 654. Alb. et Schw.* nisk. 325. *Fr. syst. II.* 95.

Ad folia Fagi dejuncta, in sylvis, Lusatiae v. o. raries.

2448. *P. sphærocephala W.*, ascomatibus tenerimis minimis pallide-stramineis, extus pube delicata vestitis, primum globosis dein abrupte in stipitem brevem concolorum desinentibus discumque urceolatum recludentibus.

Ad stramina sicca Thuring. (Waller.)

2449. *P. caulincola Fr.*, ascomatibus stipitatis minutis gregariis firmulis fusco-lutescentibus, primum turbinato-globosis, praeter stipitem brevem glabrum farinoso-pubescentibus. — *Peziza caulincola Fr. syst. II.* 94. *conque teste: P. Serratulae Pers. myc. I.* 263. (ascom. gry-

seis). P. albo-marginata Schum. saell. II. 436. P. cya-
thula Pers. (subferruginea.)

Ad caules herbarum siccios minime rara quidem at dubiis vexata.

2450. *P. clandestina* Bull., ascomatibus stipitatis gregariis turbinatis cerviniis, extus furfuraceo-villosis, demum in discum albidum concavam reclusis. — *Peziza clandestina* Bull. champ. 251. ercl. icon. Pers. myc. II. 262. Fr. syst. II. 94.

Ad ramulos dejectos (Ruborum), caules Solani tuberosi siccios aliasque quisquilias.

2451. *P. rorida* W., ascomatibus semiglobosis parvis albo-pallescensibus in discum coucolorum s. lutescentem concavum reclusis, extus cum stipite brevi in basin tenuato pilis teneris apice crystallino-granulosis adspersis. — *P. glandulosa* W. in lit.

Ad ligna siccata faginea Thuring. passim.

2452. *P. striatula* W., ascomatibus stipitatis obconico-turbinatis parvis albis dein stramineis, vertice depresso in osculum angustum marginibus inflexis cinctum reclusis, extus cum stipite filiformi striato firme producendo pilis rigidulis patulis brevibus fragilibus caducis torvis.

Ad ligna Crataegi Oxyacanthae Thuring. rarius. (Habitus *P. anomala*, at stipite striato et pilis mollioribus, laxioribus et fragilioribus diversa.)

2453. *P. sericea* A. et Schw., ascomatibus breviter stipitatis, extus villo viridulo dein fuscescente circa marginem albicante sericeo-nitente adpresso tectis carnosis, obconicis, dein cupularibus in discum concavum ochraceo-ferrugineum reclusis. — *Peziza sericea* Alb. et Schw. nisk. 325. t. 3. f. 7. Fr. syst. II. 93.

Ad ligna putrida in locis undis Lusatiae. (Alb. et Schw.)

2454. *P. cerina* Pers., ascomatibus subsessilibus gregariis vellere furfuraceo denso lutescenti-olivaceo rigidulo (versicolore) vestitis, primum (exsiccandoque) he-

misphaerico-tornatis undique clausis, dein vertice in osculum rotundum angustum reclasis, denum discum vitellino-ochraceum aperientibus, intus stipiteque curto crassiusculo (nonnisi plana nullo) atro-fuscis. — *Peziza cerina* Pers. syn. 651. Alb. et Schw. nisk. 321. Nees syst. f. 283. (*discus nimis virens.*) Fr. syst. II. 92. *P. lutescens* Pers. olim. *P. biformis* Flor. dan. t. 1260. *P. bicolor* Schum. *P. marginata* Holmsk.

Ad ligna sicca, fraxinea praeprimis et quercina minime rara. (Cum Sphaeria mutabili comparanda. Color eximie variabilis, primum vivide lutescens, dein olivaceus, saepius fuscus s. grysens, qualis *P. grisea* Pers. myc.)

2455. *P. viridula* Schrad., ascomatibus stipitatis cyathiformibus viridulis, extus albido-villosis. — Schrad. Journ. I. t. 63. Fr. syst. II. 91.

Ad truncos putres nemoris sollingens. (Schrader.)

2456. *P. calycina* Pers., ascomatibus erumpentibus breviter stipitatis infundibuliformibus albido-villosis, dein in discum planinsculum aurantiacum reclasis. — *Peziza calycina* Pers. syn. 653. Fr. syst. II. 91. *P. calycina* β. *flavo-coccinea* Alb. et Schw. *Octospora calycina* Hedw. musc. II. 64. t. 22. B. *P. calyciformis* Wild. berol. Batsch. cont. I. f. 135.

β. *chrysophthalma*, ascom. primam vitellino-aureis, stipitis basi nigrescente. *P. calycina* β. *Abietis* Fr. I. t. I. *P. chrysophthalma* Pers. myc.

Ad ramos putrescentes Pini Abietis et sylvestris vulgaris. (*P. calycinae* titulus apud auctores sati ambigens est.)

2457. *P. pithya* Pers., ascomatibus gregariis cereo-carnosis firmis, extus stipiteque brevi villo delicato dein fugaci vestitis rubellis, denum in capulam planinsculam aurantio-rubram dilatatis. — *Helotium pithyum* Fr. syst. II. 155. *Peziza pithya* Pers. syn. 652. icon. t. II. f. 2. Nees syst. f. 287. Alb. et Schw. nisk. 323.

Ad ramulos et folia languida Pinus Piceae rarius.

2458. *P. patula* Pers., ascomatibus exiguis stipitatis extus dense villosis albis, primum hemisphaericis dein in discum planum lutescentem reclusis. — *Peziza patula* Pers. syn. 654. Alb. et Schw. nisk. 324. Nees syst. f. 285. Fr. syst. II. 91.

Ad folia quercina, popolina et betulina dejecta passim.

2459. *P. nivea* Fr., ascomatibus breviter stipitatis candidis villoso-tomentosis turbinatis. — *Peziza nivea* Fr. syst. II. 90. *P. virginea* Flor. dan. t. 1440. f. 1. *Octospora nivea* Hedw. fil. *P. clandestina* Bull. t. 416. f. 1. excl. descript.

Ad ramos locis uidis dejectos passim.

2460. *P. virginea* Batsch, ascomatibus stipitatis gregariis exiguis candidis, extus pilis confertis patulis longis ob sessis, primum hemisphaericis, dein in discum luteo-flaventem planum dilatatis. — *Peziza virginea* Batsch. Pers. syn. 653. Fr. syst. II. 90. *P. nivea* Sowerb. t. 65. *P. parvula* Flor. dan. t. 1016. f. 4. *Lacnum agaricinum* Retz. *P. calycina* auct. *P. carpophila* Pers. obs.

Ad ligna, cortices, folia ipsaque pericarpia praeprimis faginea ubertim.

2461. *P. ciliaris* Schrad., ascomatibus stipitatis gracilibus niveis, extus pilis sparsis longis ob sessis, cyathiformibus, discum pallidum recludentibus. — *Peziza ciliaris* Schrad. Journ. t. l. 63. Alb. et Schw. nisk. 324. Fr. syst. II. 89.

Ad folia dejecta quercina et faginea Hercyn. inferior. passim.

2462. *P. proboscidea* W., ascomatibus stipatis insignibus, extus undique pilis sericeis implexis candidis nitentibus adpressis vestitis, e basi producta cylindrica abrupte in cupulam cyathiformem desinentibus discumque roseo-coccineum, margine inflexo cinctum concavum recludentibus. — *P. calycina* auct.

Ad terram nudam nemoris Roslebiens. Thuring. 1809.

(Insignis: stipite centimetrum dimidium longo, unguem crasso, disco roseo-coccineo et tomento sericeo fibroso candido nitido adpresso.)

B. trichoscyphae, ascomatibus sessilibus carnosis, mole et colore variis, sive solum ad marginem, sive simul ad latuscula pilis setosis hirtis coloratis fistulosis continuis septatis rectis, habitum torvum impertinentibus obssessis, vertice hymenium discoideum ex asis di-
ctosporis conflatum recludentibus.

(Pezizae tribus 5. *sarcoscyphae* sessiles pr. pr. et ciliares Fr. syst.)

2463. *P. tentaculata* W., ascomatibus sessilibus parvis subrotundis atris carnosomembranaceis, primum conniventibus, deinceps marginem obtusum nitidulum inflexum reclinantibus discumque planum opacum concolorēm recludentibus, patellaribus, ad latuscula marginemque setis brevibus stipatis tentaculato-perrectis nigris sparsis parce instructis. — *Peziza amphitricha* W. in lit.

Ad virgas salicinas decorticatos Thuring. rarius. Per totum annum. (Cycledi atrati habitum exakte reddit, extus tamen setis brevibus stipatis, tentaculorum instar perrectis munita certo dignoscitur.)

2464. *P. Berberidis* Pers., ascomatibus sessilibus sparsis minutis rufo-fuscescentibus hirtis basique setis strigosis subradiantibus cinctis. — *Peziza Berberidis* Pers. myc. I. 649. Fr. syst. II. 99.

Ad ramos sicclos Berberidis rarius.

2465. *P. diversicolor* Fr., ascomatibus sessilibus gregariis exiguis obconicis carnosis ex albido luteoque viridulis ferrugineoque versicoloribus, extus setulis erectis strigosis longis concoloribus torvis, demum discum convexiusculum pallidiorem marginatum recludentibus. — *P. diversicolor* Fr. syst. II. 88. *P. domestica* Sowerb. Fr. syst. II. 107.

a. albida, ascomatibus expallidis. — *P. papillata* vaccinea Pers. myc. I. 254.

P. chlorina, ascomatibus viridulis umbrino-setosis. — *Fr. l. l. P. chlorina Pers. l. l. P. strigosa Schum. sæc. II. 434.*

P. cervina, ascomatibus luteo-subferrugineis. — *Fr. l. l. P. cervina Pers. l. l. P. papillata Schum. nec Pers.*

Ad simum quadrupedum, Thuring. v. c. rarius (Cautius ab Ascobolo papillato, disci laevore nec papillato, dignoscenda.)

2466. *P. thelebolooides* Alb. et Schw., ascomatibus carnosia sessilibus subgregariis sordide lutescentibus, extus setis rigidis longiusculis assurgentibus concoloribus torvis, primum sphaericis dein urceolaribus pallentibus, discum subconcolorem concavum monstrantibus. — *Peziza thelebolooides* Alb. et Schw. nisk. 321. t. 12. f. 4. *Fr. syst. II. 88.*

Ad terram pinguem simo conditam ipsumque simum, Lusatiae v. c. (Alb. et Schweiniz.)

2467. *P. stercorea* Pers., ascomatibus sessilibus gregariis fulvis, extus setulis badiis erectiusculis ad marginem increbrescentibus ciliatis dein caducis horridulis, primum globosis clausis, dein concavis magisque subscendentibus discum concolorem recludentibus, siccando fuscescientibus. — *Peziza stercorea* Pers. obs. II. 89., synt. 650. *Fr. syst. II. 87. P. cupularis* Wahlenb. ups. 466. *P. ciliata* Bull. t. 438. f. 2. *P. scutellata* Bolt. t. 108. *Octospora scutellata* Hedw. l. l. 10. t. 3. f. A. O. *septigera* Schrank. *P. equina* Flor. dan. t. 779. f. 3. *P. lutea* Reich. *Elvella lutea* Scop. carn. 481.

Ad simum vaccinum et equinum nec non in terra pingui stercorata passim.

2468. *P. setosa* Nees, ascomatibus sessilibus gregariis aurantiacis, extus setis erectis longis subconcoloribus s. fuscis horridis discumque concolorem planum obvallantibus. — *Peziza setosa* Nees syst. 260. f. 275. *Fr. syst. II. 87. P. stercoraria epixyla* Alb. et Schw.

Ad truncos vetustos putredine exesos Lusatiae, Thuring. et Hercyn. passim.

2469. *P. livida* Schum., ascomatibus sessilibus, primum hemisphaericis dein magis subsidentibus deplanatis, extus fuligineis, versus marginem setis continuis longis rigidis fusco-ferrugineis horridis, dein discum concavum rubro-fuscum s. glanco-lividum reincidentibus. — *Peziza livida* Schum. sacc. II. 422. Fr. syst. II. 86. *P. scutellata* Batsch cont. I. f. 154. *P. fasciculatae* var. Pers. myc. I. 244.

Ad trunco putredine exesos passim.

2470. *P. scutellata* L., ascomatibus applanatis carnosis majusculis, extus pallidis, in discum miniato-s. aurantio-rubrum planum reclusis, marginem versus setis strictis divergentibus nigris hispidis. — *Peziza scutellata* L. Sowerb. t. 24. Bull. t. 10. Pers. syn. 650. Fr. syst. II. 85. *Octospora hirta* Hedw. L. L. 10. t. 3. B. *P. ciliata* Hoffm. veg. crypt. II. 25. t. 7. f. 3. *Elvella ciliata* Schaeff. bav. t. 284. — Vaill. bot. t. 13. f. 13. 14.

Ad ligna putredine consumta vulgaris.

2471. *P. umbrosa* Fr., ascomatibus depresso-appланatis carneo-miniatis, extus pilis badiis brevibus obsessis. — *P. umbrosa* Fr. syst. II. 85. Mich. gen. t. 86. f. 19.

Ad terram umbrosam Hercyn. infer. passim.

2472. *P. carneo-rufa* Mart., ascomatibus sessilibus gregariis carneo-rufis subpellucidis, extus et margine setis rigidulis albidioribus erectis obsitis, demum urceolatis. — *Peziza carneo-rufa* Mart. est. 464. Fr. syst. II. 85.

Ad terram arenosam humidam Francon. (Martius.)

2473. *P. melanoloma* A. et Schw., ascomatibus sessilibus gregariis sordide aurantiis, extus pilis subtilissimis atris ad marginem increbrescentibus obsessis, primum hemisphaericis dein concavo-planiusculis, saepius difformiter subsidentibus. — *Peziza melanoloma* Alb. et Schw. nisk. 336. t. 2. f. 5. Fr. syst. II. 68.

Ad terram carbonariorum minime rara.

2474. *P. phaeoloma* W., ascomatibus adnato-applanatis carnosis majusculis, discum rotundatum latum vitellinum, margine crasso involuto, setulis brevissimis densis continuis assurgentibus obpresso cinctum recludentibus, scutellaribus. — ?*Peziza acetabulo primum* cavo luteo Rupp. Jen. 359.

Ad terram glareosam udam sterilem Thuring. passim. Aestate uda. (Ascomata adulta, praeter marginem involutum undique adusta, monetae instar applanata, Peltigerae arcticae cymatiorum ambitum aequantia, disco carnosu vitellino s. cerino insigoa.)

2475. *P. hirta* Schum., ascomatibus sessilibus, extus fusco-hirtis, primum hemisphaericis, dein subsidentibus discumque miniatum, margine iofexo succinctam recludentibus. — *Peziza hirta* Schum. saell. II. 422. Fr. syst. II. 84. *P. hybrida* Sowerb. t. 369.

Ad terram muscosam Thuring. et Hercyn. inferior. talem quallem legi, nunc detritam.

2476. *P. brunnea* A. et Schw., ascomatibus sessilibus brunneis, extus pilis brevibus fasciculatis hirtis, primum subglobosis dein hemisphaerico-depressis in discum dilutiorem reclusis. — *Peziza brunnea* Alb. et Schw. nisk. 317. t. 9. f. 8. Fr. syst. II. 83.

Ad terram deustam Lusatiae et Hercyn. passim.

2477. *P. fusco-atra* Rebent., ascomatibus sessilibus sparsis fusco-atris tomentoso-hirtis, primum oblongis dein subsidentibus subglobosis discum concavum sordido pallidum, siccando nigrescentem recludentibus. — *Peziza fusco-atra* Rebent. neom. 385. Fr. syst. II. 82.

Ad terram humidam Neomarch. (Rebentisch.)

2478. *P. leucotricha* A. et Schw., ascomatibus majusculis sessilibus carnosulis, extus setulis longiusculis caudidis strigulosis, primum globosis, dein hemisphaerico-concavis discum albo-glaucoscentem recludentibus. — *Peziza leucotricha* Alb. et Schw. nisk. 322. t. 7. f. 5. Fr. syst. II. 82.

Ad terram udam umbrosam, v. c, Lusatiae (Albert. et Schweinitz), at rarissime. Auctumno.

2479. *P. hemisphaerica* Wigg., ascomatibus carnosis magnis, extus pilis setosis septatis fusco-ferrugineis fasciculatis densis undique obsessis torvis, primum conniventibus subglobosis, dein hemisphaericō-concavis urceolatis discum albo-glaucoscentem s. dilute fuscum concavum, margine involuto volvato cinctum recludentibus. — *P. hemisphaerica* Wigg. Hoffm. crypt. II. 28. t. 7. f. 6. Pers. syn. 316. Flor. dan. t. 1558. Fr. syst. II. 82. *P. fasciculata* Schrad. Pers. myc. I. 244. *P. kir-suta* Holmsk. *P. Labellum* et *lanuginosa* Bull. t. 204. et 396. *Octospora fasciculata* Hedw. l. l. t. 4. *P. repli-cata* Tod. *P. campanulata* Vittm. *P. Scutella* Batsch. *P. subhirsuta* Baumg. *P. hispida* Huds. *Elvella albida* Schaeff. bav. t. 151. Flor. dan. t. 656. *E. campanulata* Scop. — Mich. gen. t. 86. f. 4.

Ad terram muscosam in nemoribus pinguis, nec non ad truncos arborum putredine exesos passim. Aestate. (Mole, disci et setarum, in hac, me observante, Phlegmatii instar septiarum colore satis varians. Setae basin ascomatum versus tenuantur magis et flaccescunt ideoque lubentius terram penetrant.)

C. leioscyphae, ascomatibus teneris plerumque membranaceis ceraceis, sessilibus breviterque stipitatis, e figura patellari et urceolari varüs, extus glaberrimis s. politis (velo nullo Fr.), ipsis cubilibus nec strato superadditis, hymenium discoideum continuum s. concretum vertice mox recludentibus. (Pezizac series 3. *Phialea* Pers. Fr.)

† *sessiles*, ascomatibus sessilibus.

* *firmae*, ascom. sessilibus fibroso-stipatis tenacellis orbiculatim depresso, margine homogene parce prominulo nec discum, ascis tenuibus foetum, involvendo occultante cinctis. (*P. phialeae* tribus 12. *Patsillea* Fr.)

2480. *P. epiblastematica* W., ascomatibus sesilibus glaberrimis subcoriaceis rotundatis confertis mi-

nutissimis, primum punctiformibus hemisphaericis, dein patellaribus planis tenuiter marginatis in acervulos parvos dense congestis, bicoloribus, aliis helvolo-stramineis, aliis livido-nigrescentibus opacis. — *P. epiblastematica* W. in lit.

Ad Peltigerae caninae putrescentia superficiem hyalodermatiam Hercyn. superior. ratissime. (Wulff.) (Stirps tum natalitiis tum morphosi perquam singularis. Prima initia verrucas subtilissimas gregarias stramineas s. liventes sistunt, quae mox in tubercula neque minus parva hemisphaerica concolora succrescunt; ocius jam vertice in discum angustum rotundum, margine conformi teuui cinctum recluduntur eamque formam, aucta aliquantis per magnitudine ad aciculae capituli molem, patellarem servant et acervulos nudis oculis vix satis conspicuos, tamen ex ascomatibus 40-70 compositos stipato-congestos construunt. Coloris mutabilitas mira, nec tamen inique cum *Patellaria tricoloribus flor. crypt.* L 367. et nominatim cum *Patellaria anomala* nec habitu dispare comparatur.)

2481. *P. Cerastiorum* W., ascomatibus primum innatis verrucosis, dein emersis subsessilibus subceraceis rotundatis in discum helvolum planiusculum saturatius marginatum reclusis, scutellaribus, demum fusco-liventibus marginem reclinantibus. — *Peziza Cerastiorum* W. in lit. 1812. Fr. syst. II. 153.

Ad utramque foliorum Cerastii vulgati aliorumque strigosorum faciem caulesque humi prostratos etiamnum vivos Thuring. rarius. Aestate.

2482. *P. juncina* Pers., ascomatibus sessilibus subceraceis applasatis obscure rufis mollibus glaberrimis, margine prominulo. — Fr. syst. II. 152. Pers. myc. I. 314.

Ad culmos sicclos Junci laevia in uliginibus Thuring. saltem vidi initia. Aestate pluvia.

2483. *P. compressa* Pers., ascomatibus innato-sessilibus tenuatis glaberrimis nigrescentibus minimis subrotundis, discum coucolorem atrum recludentibus, demum

exsiccando compressis conchiformibus s. multangulo-concentribus. — *Peziza compressa* Pers. syn. 670. Alb. et Schw. nisk. 340. Fr. syst. II. 152.

Ad ligna dura sicca rarius.

2484. *P. melanophaca* Fr., ascomatibus sessilibus glaberrimis coriacels minutissimis sparsis, extus margineque rufo-cinnamomeis, discum planum saturatiorem melanophaenum recludentibus, scutellaribus. — *Peziza melanophaea* Fr. syst. II. 150. *P. bicolor* Nees syst. 257. f. 265. nec Bull.

Ad ligna salicina et quercina passim. (Habitu lichenoso, sere Patellariae abstrusaee meae, colore Xylogrammati parallelo non dissimilis.)

2485. *P. melaxantha* Fr., ascomatibus sessilibus ceraceo-siccis sparsis glabris, primum hemisphaericis, extus nigro-olivaceis, dein vertice hiante discum planum lutescentem margine nigro-olivaceo cinctum recludentibus, adpresso-scudellaribus. — *Peziza melaxantha* Fr. syst. II. 150. *P. xanthomela* f. *epixyla* Alb. et Schw. nisk. 335.

Ad ligna emortua exsiccata Hercyn. inferior. passim.

2486. *P. Coccostigma* W., ascomatibus dein emergens sessilibus sparsis planis tenuiter conformiterque marginatis patellaribus, punctiformibus rubro-coccineis.

Ad ligna abietina cortice destituta humi jacentia, Hercyn. superior. rarius. Aestate.

2487. *P. decipiens* W., ascomatibus sessilibus glaberrimis sparsis minutissimis rufo-fuscis, primum subglobosis dein planiusculis margine concolore obtuso cinctis.

Ad cendices Pruni domesticae, Helmisorii rhabdis in crustam furfuraceo-stygiam congestis insidens simulque stratum hypostromaticum filamentosum tenerrimum mentiens.

2488. *P. Resinæ* Fr., ascomatibus sessilibus sparsis glaberrimis tenaciter carnosis, primum subglobosis belvolis dein basi obtusis verticeque sensim in discum planiusculum aurantio-rubellum, margine obtuso cinctum

reclusis, denique adpressis patellaribus subimmarginatis, intus flaventibus. — *Peziza Resinæ Fr.* syst. II. 149. *Lecidea Resinæ Fr.* obs. I. 180.

Ad resinam Pini Abietis Hercyn. superior. passim. (*Species suspecta* ob habitum lichenosum similitudinemque externam cum *Patellaria rubella DC.*, a qua quidem praeter alias notas microscopicas, ascomatibus basi obtusis, tenaciter carnosis, nunquam convexia, intus flavolutescentibus certo differt.)

2489. *P. Hypnorum Fr.*, ascomatibus sessilibus parvis sparsis glaberrimis luteis cupulatis, margine subflexuoso ciuctis. — *Peziza Hypnorum Fr.* syst. II. 149.

Ad muscos udore putrescentes talem qualēm legi.

** *tremellinae*, ascomatibus sessilibus subtremellosis s. aquoso mollibus, margine adscendente cum hymenio confluentem, ascis tenuibus s. plane obsoletis foeto instructis. (*P. Phialeæ tribus II. Mollisia Fr.*)

2490. *P. arenula A. et Schw.*, ascomatibus sessilibus glaberrimis minimis subglobosis fuligineis, intus albidis. — *Peziza arenula Alb. et Schw. nisk.* 341. *Fr.* syst. II. 148.

Ad frondes Pteridis aquilinae putres rarius.

2491. *P. atrata Pers.*, ascomatibus sessilibus subglobosis glaberrimis nigrescentibus gregariis minutis, dein margine albicante conniventibus. — *Peziza atrata Pers.* syn. 669. *Alb. et Schw. nisk.* 340. *Nees syst. f.* 266.

Ad ramulos caulesque pl. putres vulgaris.

2492. *P. lacustris Fr.*, ascomatibus sessilibus cereo-mollibus sparsis glabris nigrescentibus, primum convexiusculis, dein marginem nigricantem reclinantibus discumque dilutiorem s. albo-pallescensem planum recludentibus, patellaribus. — *Peziza lacustris Fr.* syst. II. 143.

Ad culmos siccos Scirpi lacustris Thuring. v. c. et aliis locis rarius. (Quam ita saluto, disci colore a Friesiano, disco fuligineo-nigricante, insigni, recedere quidem, nec tamen alia ratione differre videtur.)

2493. *P. dilutella* Fr., ascomatibus sessilibus cereo-mollibus glabris confertis, primum subglobosis gleuco-aeruginosis, dein concavis cinereo-fuscis, siccando nigricantibus membranaceis, marginem integerrimum patulum flexuosum albo-vittatum exserentibus. — *Peziza dilutella* Fr. syst. II. 147., elench. II. 13.

Ad caules herbarum elatiorum, Georginarum putrescentium v. c., nec non ad ligna uda passim.

2494. *P. vulgaris* Fr., ascomatibus erumpentibus sessilibus molliter membranaceis glaberrimis subcaespitosis utrinque concoloribus albido-pallescens. — *Peziza vulgaris* Fr. syst. II. 146. ?*P. crumpens* Grev. scot. t. 99.

Ad ramulos languidos, Coryli praeprimis.

2495. *P. axillaris* Nees, ascomatibus sessilibus carnosulis aurantiacis glabris, basi pallidioribus, disco urceolato margine obtuso cincto. — *Peziza axillaris* Nees syst. 258. f. 267. Fr. syst. II. 145.

Intra foliorum axillas ad muscos minores in locis undis rarius. Aestate uda.

2496. *P. viridans* Fr., ascomatibus sessilibus cereo-gelatinosis glaberrimis dilute fuscescentibus cupulaeformibus, margine integerrimo viridulo cinctis basique fibrillas tenerrimas gelatinosas exserentibus. — *Peziza viridans* Fr. syst. II. 145. *Octospora viridans* Hcđw. I. 4. II. 20. t. 6. f. B.

Inter muscos in muro argillaceo agri lipsiens. (Hedwig.) Auctumno. (Ad *P. stromatoscyphas* stipitatas reflectere videtur, quae mihi quidem ignota.)

2497. *P. Jungermanniae* Nees, ascomatibus sessilibus sparsis carnosso-mollibus glabris saturate viridibus minutis subfragilibus patellaribus marginatis, siccando corrugatis nigrescentibus. — *P. Jungermanniae* Nees in Fr. syst. II. 144. *P. bryophila* Pers. myc. I. 305.

Ad muscos et lichenastras in locis umbrosis rarius, v. c. ad surculos Jungermanniae byssaceae et Bryi argentei Thuring. Vere ineunte.

2498. *P. uda Pers.*, ascomatibus sessilibus ceraceo-aquosis applanatis immarginatis laevibus lido-fuscescens-tibus orbiculatis crassiusculis. — *Peziza uda Pers.* syn. 634. Alb. et Schw. nisk. 307. Fr. syst. II. 142.

Ad ligna prostrata humida passim.

2499. *P. olivacea Batsch*, ascomatibus sessilibus ceraceo-carnosis glaberrimis majusculis, extus rugulosis olivaceis, dein in discum nigrescentem margine tumido prominulo cinctum reclusis, patellaribus. — *P. olivacea Batsch* elench. f. 51. Fr. syst. II. 142., elench. II. 12. pr. pr.

Ad trucos quercinos putres agri jenens. (Batsch.)
(Variat colore ex olivaceo magis lutescente s. flavovirente.)

2500. *P. atro-virens Pers.*, ascomatibus sessilibus subtremellosis, primum globosis viridulis, dein hemisphaerico-concavis in discum planiusculum subcarneum reclusis scutellaribus, humectis tumentibus pellucidis, siccis nigrescentibus. — *P. atro-virens Pers.* syn. 635. Alb. et Schw. nisk. 308. Fr. syst. II. 141.

Ad ligna putredine uda penitus exesa passim. Vere primo.

2501. *P. rubella Pers.*, ascomatibus sessilibus ceraceo-mollibus glabris gregariis minutis semipellucidis incarnato-rubris planiusculis, margine flexuoso nonni minute lacinulato. — *Peziza rubella Pers.* syn. 635. Alb. et Schw. nisk. 308. Fr. syst. II. 141.

Ad ligna putrida passim.

2502. *P. vinosa A. et Schw.*, ascomatibus sessilibus subtremellosis minutis glaberrimis incarnato-rubellis, denum planiusculis. — *Peziza vinosa Alb. et Schw.* nisk. 308. Fr. L L

Ad ramos putres, quercinos praeprimis, rarius.

2503. *P. dispersa W.*, ascomatibus sessilibus membranaceo-ceraceis fragilibus tenerrimis glaberrimis sparsis minutis, primum urceolatis, dein in discum planiusculum

lutescentem dilatatis marginemque concolorum repandum reclinantibus, vivis flavo-rubellis, siccis membranaceis pellucidis coccineis. — *P. coccinella* Sommerf. lapp. 276. *Fr. elench. II. II.* nec *syst. P. dispersa* JV. in lit. 1815. *P. diluta* γ. *fungorum* Alb. et Schw. nisk. 338.

Ad corticis salicini et populini soluti faciem utramque, Sphaeriam Stigma non nisi simul occupans, v. c. Thuring., at rarius.

2504. *P. infixa* JV., ascomatibus sessilibus glaberrimis exiguis sparsis, basi punctiformi insculptis, primum ureolatis deinde discum concavum centro saturatiore notatum, margine elevato conformi patulo cinctum recludentibus, vivis pallide cerinis subtremellosis, siccis aurantio-flavis. — *Peziza tenacella* JV. in lit.

Ad ligna salicina putredine exesa Thuring. (Sequente fere aemulatur at adfigendi modo peculiari et mucula centrali saturatiore diversa.)

2505. *P. chrysocoma* Bull., ascomatibus sessilibus subgelatiuosis glaberrimis exiguis sparsis luteo-fulvis, primum subglobosis demum latuscula reclinando subsidentibus explanatis margine tenui conformi cinctis, non nisi confluentibus s. in corpuscula amorpha desciscentibus. — *P. chrysocoma* Bull. t. 376. *Fr. syst. II.* 140. *Bulgaria chrysoc.* Sommerf. *P. aurea* Pers. obs. I. 41. nec *Fr. P. subplana* Schum.

Ad ligna faginea, pinea et salicina putrida ubertim. Auctumno.

2506. *P. limbata* JV., ascomatibus sessilibus carnosulis glabris confertis flavis, primum globosis, deinde subturbanatis extns rugulosis in discum planiusculum concolorum, marginis limbo integro dilutiore hyalino cinctum dilatatis. — *P. limbata* JV. in lit. 1820. ?*P. undella* γ. *ollaris* Fr. syst. II. 66. *P. ollaris* Pers. myc. I. 299.

Ad terram nudam ollarem frequenter humectarum sub tectis repositarum Thuring. Vere. (Wallr.) (Sicando faciem pristinam fere exuit. Prima initia exacte

globosa, flava, semivis papaverini minoris molem sequantia, oculis jam vertice hiantia sensimque e basi subturbinata discum planiusculum, siccando rimulosum concolorum, marginis limbo hyalino pertenui pellucido erecto integerissimo cinctum recludentia, extus rugulosa.)

†[†] *stipitatae*, ascomatibus mole et substantia ceraceo-molli et carnosò-tenacella variis, stipite vario nonnisi obsoeto papillæformi suffultis. (P. *Phialæ molissiae, calycinae et lenticulares* sp. Fr.)

* *ascomatis marginis inflexo.*

2507. ?*P. microscopica* JV., ascomatibus omnium minutissimis confertim sparsis glabris in basin stipitiformem attractis s. obconicis turbinatissimo fuscis, dein vertice impressis, veluti in discum punctiformem concolorum obtuse marginatum impressis.

Ad frustula ligai faginei caesi Thuring. semel.

2508. *P. Volutella* Fr., ascomatibus tenerrimis cito caducis (ephemeris) albis glabris, primum revolutis, dein depressis in discum angustissimum umbilicatum reclusis, stipite setaceo nigro suffultis. — *Peziza Volutella* Fr. syst. II. 127. *Volutella nuda* Tod. meclb. I. 29. t. 6. f. 44. nec Fr.

Ad culnum triticeam patrem semel in agro meclenb. a Todeo lecta. Autumno.

2509. *P. chrysostigma* Fr., ascomatibus minimis punctiformibus aureis, e basi stipitiformi brevissima obconicis in discum plaum immarginatum reclusis. — *Peziza chrysostigma* Fr. syst. II. 128. *P. mellina* Pers. myc. (lucus major.)

Ad stipites locis humectis putrescentes Filicum, Aspidii v. c. F. maris Hercyn. rarius.

2510. *P. epiphylla* Pers., ascomatibus grabis carnosò-ceracis, e basi papillæformi brevi saturatiore sensim incrassatis convexo-planiusculis marginatis ochra-

ceo-pallidis, demum fuscescentibus. — *Peziza epiphylla* Pers. syn. 669. Alb. et Schw. nisk. 339. Fr. syst. II. 137.

Ad folia dejecta putrescentia, vere ubique.

2511. *P. faginea* Pers., ascomatibus gregariis minutis glabris, e basi stipitiformi brevi crassa in cupulam planiusculam albam desinentibus. — *Peziza faginea* Pers. syn. 664. Alb. et Schw. nisk. 334. Fr. syst. II. 136.

Ad pericarpia sicca faginea in locis umbrosis, auctumno tatis vulgaris.

2512. *P. haematites* W., ascomatibus glabris sparsis minutis corneis coccineo-sanguineis, primum e basi attracta obconicis turbinatiave, dein vertice in discum planiusculum saturatiorem, margine tenui dilutiore cinctum reclusis, obovatis. — *Peziza miniata* W. nec aliorum.

Ad Rubi Idaei caules sicclos Thuring. semel. (Wallr.) (Sphaeriam episphaeriam primo intuitu fere refert.)

2513. *P. amenti* Batsch, ascomatibus sparsis minutis glaberrimis aquose-pellucidis, dein fuscescentibus, e basi stipitiformi brevi incrassata in cupulam convexiusculam cicatricula centrali notatam marginaque demum reflexo cinctam desinentibus. — *Peziza amenti* Batsch cont. I. 211. f. 148. Pers. myc. I. 314. Fr. syst. II. 127.

Ad capsulas salicinas putrescentes agri jenensis (Batsch) et alibi, vero exēunte rarius.

2514. *P. imberbis* Bull., ascomatibus carnosoceraceis glabris albis, e basi stipitiformi brevi papillaeformi in cupulam plano-concaviusculam desinentibus, demum magis subsidentibus planioribus, saepius flexuosis. — *Peziza imberbis* Bull. t. 467. f. 2. Fr. syst. II. 136. *P. nivea* Batsch elench. f. 57. Pers. myc. I. 295.

Ad ligna vetusta in locis uidis rarius.

2515. *P. conigena* Pers., ascomatibus ceraceo-aquosis minutis gregariis glaberrimis pallentibus, e basi stipitiformi brevi obesa demum oblitterata in cupulam planiusculam plano-convexiusculam immarginatam desi-

uentibus. — *Peziza conigena* Pers. syn. 634. (colore subcinereo s. livido.) Alb. et Schw. nisk. 307. Fr. syst. II. 139. cum var. b. *incarnata*.

Ad conos abietinos in pinetorum uidis penetralibus, v. c. Hercyniae, auctumno scero.

2516. *P. chionea* Fr., ascomatibus exiguis ceraceo-cinnamomeis hyalinis exiguis albidis, primum obovatis, e basi stipite brevissimo suffulta in cupulam tenuem concaviusculam tenuiter inflexoque marginatam concolorum dilatatis. — *Peziza chionea* Fr. syst. II. 132.

Ad folia pinea aliasque quisquiliis humi jacentes passim. Vero.

2517. *P. salicella* Fr., ascomatibus primum hypophlocoideis ociis emergentibus hemisphaericis in discum utrinque planum aequaliter marginatum dilatatis, stipite brevissimo firme fragili epidermidem scissam insarciente suffultis sordide-stramineis, dein adpresso-sessilibus immarginatis stipitem obliterantibus. — *P. salicella* Fr. syst. II. 133.

Ad ramos salicinos languidos passim.

2518. *P. herbarum* Pers., ascomatibus primum e basi cylindrica alba glabriuscula subturbinatis, vertice piano sensim in discum ceraceo-carnosum convexiusculum farinulosum subimmarginatum albo-pallescentem dilatatis, stipite conformi brevissimo suffultis. — *Peziza herbarum* Pers. syn. 664. Alb. et Schw. nisk. 334. Fr. syst. II. 136. nec Nees.

Ad caules herbarum siccos, Urticæ præprimis. Auctumno.

2519. *P. pallescens* Pers., ascomatibus primum e basi cylindrica alba pyriformibus dein vertice impresso-umbilicato sensim in discum albido-pallentem nodiuseculum concaviusculum, margine tumidulo concolor tornato cinctum refulcentibus stipitemque brevem crassiusculum e basi sensim informantibus. — *Peziza pallescens* Pers. syn. 664. Alb. et Schw. nisk. 334. Fr. syst. II. 132. P.

citrina Sowerb. t. 151. *P. lenticularis* Hoffm. germ. II.
t. 13. f. 5.

Ad ligna faginea caesa eorumque fragmenta vulgaris.

2520. *P. lutescens* A. et Schw., ascomatibus glaberrimis lutescentibus minutis, primum e basi stipitiformi tenui cylindrica dein in verticem hypocrateriformem orbicularem dilatatis. — *Peziza lutescens* Alb. et Schm. nisk. 120. *Flor. dan.* t. 1440. f. 1. *Fr. syst.* II. 120. *Octospora lutescens* Hedw. l. l. 30. t. 9. f. 3.

Ad ramos abietinos dejectos paasim.

2521. *P. citrina* Batsch, ascomatibus primum obconicis vertice urceolato hiantibus sensimque in discum plano-concaviusculum dilatatis, stipitem crassum brevissimum e cupulae basi obovata informantibus s. obconico-cupulaeformibus stipato-carnosis obesis, extus pallidis, intus marginisque limbo citrinis, siccando callosis aurantiacis. — *Peziza citrina* Batsch cont. II. f. 218. *Pers. syn.* 663. *Fr. syst.* II. 131. *Octospora citrina* Hedw. l. l. *P. cyathoides* L.

Ad caudices Fagi, Quercus, Alni aliarumque arborum petres, vulgaris, at coloris ratione satis mutabilis.

2522. *P. scutula* Pers., ascomatibus firmulis hypocrateriformibus laevibus luteo-testaceis margine integerim, stipite tenui aequali. — *Peziza scutula* Pers. myc. I. 284. *Fr. syst.* II. 123. *P. hypocrateriformis* Kunze. *P. herbarum* Nees syst. f. 282.

Ad caules herbarum siccios passim.

2523. *P. serotina* Pers., ascomatibus gregaris laete flavis, e basi stipitiformi firma crassiuscula in cupulam plano-convexam tenuatam dilatatis. — *Peziza serotina* Pers. syn. 661. Alb. et Schw. nisk. 331. (var. *verna*) *Fr. syst.* II. 119. *Helvella aurea* Bolt.

Ad ramulos et folia in locis uliginosis putrescentia, auctummo sero rarius.

2524. *P. ferruginea* Schum., ascomatibus pri-

mam turbinatis, e basi curta in verticem concavum luteo-ferrugineum dilatatis, extus glabris margineque tumido pallide-luteis. — *Peziza ferruginea* Schum. sacc. II. 429. Fr. syst. II. 134.

$\beta.$ *nana*, ascomatibus e basi stipitiformi in cupulam dilatatis cinnamomeis. — Fr. l. l. *Octospora nana* Hedw. l. l. t. 9. f. A.

Ad truncos vetustos quercinos; at var. $\beta.$ ex terra pullulare dicitur. (Speciem interpretatione Friesii hic laudo, mihi satis dubiam ac suspectam.)

2525. *P. Infundibulum* Batsch, ascomatibus glabris rufo-ferrugineis, e basi stipitiformi farcta in cupulam planiusculam dilatatis. — *Peziza Infundibulum* Batsch elench. f. 147. Pers. myc. I. 239. *P. Calyculus* Sowerb. fung. t. 116. Pers. syn. 660., var. $\beta.$ Fr. syst. II. 130. *P. calycula* Schum.

Ad arborum corticem agri jenens. (Batsch.)

2526. *P. strobilina* Fr., ascomatibus tenacibus stipatis gregariis minutis pallide-rufescentibus, e basi stipitiformi brevi nigricante pyriformibus demumque in cupulam concavam margine tumido cinctam dilatatis. — *Peziza strobilina* Fr. syst. II. 125.

Ad strobilos abietinos in locis udis jacentes Hercyn. superior. passim.

2527. *P. lenticularis* Bull., ascomatibus gregariis glabris laete flavis nitidulis, e basi stipitiformi papillata nigrescente in cupulam primum concavam dein convexiusculam dilatatis stipitemque obliterantibus. — *Peziza lenticularis* Bull. t. 300. Pers. syn. 664. Fr. syst. II. 133. *P. citrina* auct. qrd. *Helotium nigripes* Schum. Pers. myc. *Octospora citrina* Flor. dan. t. 1294. f. 1. *P. aurea* Sowerb.

Ad arborum truncos, fagineos paeprimis, earumque ramulos dejectos vulgaris.

2528. *P. nigripes* Pers., ascomatibus exiguis gregariis glabris dilute-gallenibus, e basi stipitiformi longiuscula

nigrescente in cupulam plano-concaviusculam marginatam dilatatis. — *Peziza nigripes* Pers. syn. 661. Alb. et Schw. 332. Fr. syst. II. 132. cum var.

Ad trunco et folia putrida passim.

2529. *P. versiformis* Pers., ascomatibus gregariis substipitatis, extus primum puberulis purpura debili tinctis, dein in cupulam subcontortam difformem dilatatis calvis flavo-olivaceis. — *Peziza versiformis* Pers. icon. t. 7. f. 7., syn. 647. Alb. et Schw. nisk. 314. cum var. β . livida. Fr. syst. II. 131.

Ad trunco abietinos ipsosque strobilos putrescentes Hercyn. superior. passim. (Superficie pubernia aberrat et forsitan inter *P. aleuroscyphas* melius laudatur.)

2530. *P. discolor* Fr., ascomatibus e basi brevissima fusco-nigrante in cupulam orbicularem, humectando gryseo-pallidam, siccando ochraceam dilatatis demumque subsidentibus adpressis. — *P. discolor* Fr. syst. II. 134. *Octospora discolor* Hedw. l. l. t. 22. f. C.

Ad arbotum cortices agri hannover. (Ehrhart.)

2531. *P. janthina* Fr., ascomatibus glabris laevibus violaceis carnosulis, primum cylindricis dein e basi stipitiformi brevi in cupulam urceolatam s. infundibuliformem marginatam incrassatis. — *Peziza janthina* Fr. syst. II. 130. *Octospora violacea* Hedw. l. l. t. 8. f. A.

Ad trunco vetustos Salicis rarius.

2532. *P. Cacaliae* Pers., ascomatibus glaberrimis firmulis nitidis, primum albidis dein fuscescentibus, e basi stipitiformi elongata crassiuscula in cupulam subinfundibuliformem dilatatis. — *Peziza Cacaliae* Pers. myc. l. 285. Fr. syst. II. 122.

Ad caules herbarum siccios, praeprimis Compositarum, Carliuae v. c., Cardui et Cacaliarum.

2533. *P. aeruginosa* Pers., ascomatibus glabris aeruginosis, e basi stipitiformi brevi dein in cupulam turbinatam flexuosa concolorem s. disco dilatiorem ex-

pannis subsessilibus. — *Peziza aeruginosa* Pers. syn. 662. Alb. et Schw. nisk. 334. Fr. syst. II. 130. *Helvella aeruginosa* Flor. dan. t. 532. f. 2.

Ad ligna putrida quercina, ex hac Peziza voluti aerugine tincta rarius.

2534. *P. Caucus* Rebent., ascomatibus pallide-fuscescentibus glaberrimis ceraceis, e basi brevi crassiuscula subflexuosa filiformi stipitata abrupte in cupulam vascuiformem margine erecto cinctam ampliatis. — *Peziza Caucus* Rebent. ncom. 386. t. 4. f. 17. Fr. syst. II. 126. *P. amentalis* Schum. saell. II. 418.

Ad amenta dejecta Populi albae, v. c. Neomarch. (Rebentisch), rarius. Vere.

2535. *P. Buccina* Pers., ascomatibus majusculis glabris infundibuliformibus saturate-flaventibus, stipite incrassato subincurva plicato-striato sullutis. — *Peziza Buccina* Pers. syn. 659. Alb. et Schw. nisk. 331. Fr. syst. II. 129.

Ad ramulos pineos dejectos rarius. Vere.

** ascomatis margine deflexo discumque hemisphaericum s. convexum elevante. (*Pezizae VII. Helotium* Fr. syst. *Helotium* Pers. syn. *Leotiac* et *Helvella* sp. auct.) Habitu quidem nec natura a Pezizis pluribus re-cedunt.

2536. *P. fimetaria* Fr., ascomatibus gregariis exiguis glabris rubentibus, stipite aequali discum conicum subangulatum demum deplanatum elevantibus. — *P. fimetaria* Fr. syst. II. 157. *Helotium fimetarium* Pers. syn. 678. *Leotia fimetaria* Pers. obs. II. 21. t. 5. f. 4.

Ad simum vaccinum pluvias irroratum rarius. Auctummo.

2537. *P. clavicularis* W., ascomatibus gregariis teneris fragilibus erectis glabris, stipite e basi tenuata sensim incrassato pallido discum convexum pallide roseum, margine dilutiore acuto reclinato cinctum elevantibus. — *Helotium claviculare* W. in lit.

Ad simum leporinum pluviis madefactum Thuring.
Auctumno. (Wallr.)

2538. *P. acicularis* Fr., ascomatibus gregariis
glabris caudidis dein pallentibus s. rufescens, stipite
elongato aequali tenui discum primum utrinque planum
dein convexum, subtus marginibus reflexis concaviusculum
sustinentibus. — *P. acicularis* Fr. l. l. *Helotium agariciforme* DC. gall. II. 75. *H. aciculare* Pers. syn. 617.,
var. *a. quercina* Alb. et Schw. nissk. 349. *Leotia aciculare* Pers. obs. II. 20. t. 5. f. 1. *Helvella agariciformis* Bolt. Sowerb. *H. acicularis* Ball. t. 473. f. 1.

β. abietinum, ascom. minoribus pallidioribus. Fr. l. l.
Alb. et Schw. l. l. *Helotium elongatum* Schum.

Intra caudices quercinos putres, rarius.

2539. *P. aurea* Fr., ascomatibus gregariis obscure
flavis, stipite tenui subsimplici basi parce tomentosa ca-
pitulum lenticulare laeve sustinentibus. — *P. aurea* Fr.
syst. l. l. *Helotium aureum* Pers. syn. 618. Alb. et Schw.
nissk. 350.

Ad ligna pinea putrida rarius. Vere.

D. stromatoscyphae, ascomatibus figura, mole,
colore et superficie variis, sessilibus stipitatiue, e basi
inde fila byssina stratum laxe intertextum effusum, cu-
bilis telae hyphoideae instar obtexens, s. comam col-
lectam, plexus rhizoidei s. caudicis descendenter instar
terram penetrantem mentientia exserentibus, i. e. stro-
mati byssino insidentibus hymeniumque varium reclu-
dentibus.

(Pezizae Lachneae trib. 7. *Tapesia*. *P. Tapesiae*
Pers. myc.) — Series specierum sequent. artificialis, cum
Sphaeriis hypostromaticis eximie analoga, inter reliquas,
quae antecedunt vel subsequuntur veluti media, ad al-
teram quamque revergens suasque species praeter indo-
lem hypostromaticam simillimas excipiens, habitu prorsus
peculiariter distincta.

+ dasycyphoidaceae, ascomatibus sessilibus tomentosis s. vellere furfuraceo vestitis, stromati hyphoideo insidentibus. — Analogas cum Pezizis dasycyphis p. 449.

2540. *P. Lonicerae A. et Schw.*, ascomatibus sessilibus minutis sparsis ceraceis, extus fusco-nigris, pilis albis mox fuscobrunneis vestitis similemque telam e basi emitentibus, primum globosis dein discum, ore connivente crenato cinctum pallidum reincidentibus. — *Peziza Lonicerae Alb. et Schw.* nissk. 328. t. 11. f. 8. (*byssiseda*). Fr. syst. II. 115 (nuda inter Fibriadas.)

Ad ramos sicclos Lonicerae Periclymeni, v. c. Lusatiae (Albert. et Schweinitz). (Strati hyphoidei initia in hac vix umquam desunt, dein vero facile obliterantur.)

2541. *P. fibrillosa JV.*, ascomatibus sessilibus hemisphaericis, vellere furfuraceo tenui ferrugineo vestitis, e basi telam hypostromaticam stygiam teneram texserentibus, demum vertice in discum concavum dilutiorem, marginibus indexis cinctum reclusis. — *Peziza ferruginea Pers. myc. I.* 274. t. 1. f. 7. 8. nec Schumach.

Ad ramulos quercinos-vallium Hercyn. infer. udarum similem saltem legi.

2542. *P. caesia Pers.*, ascomatibus sessilibus minutis, primum sparsis, floccum punctiformem mentientibus, dein globosis, extus villo delicatiore mollissimo candido propexo undique horridulo ejusque filis arachnoideis tortuosis, e basi inde in stratum effusum laxe intertextum succrescentibus gregatimque cohaerentibus, demum latusculis reclinatis discum tremellosum dilute viridescens (siccando) caesio-nigrescentem nude marginatum reincidentibus. — *Peziza caesia Pers. syn. 657. Ditmar in Sturm germ. III. t. 31.* (contra morem minus fida.) Fr. syst. II. 108. Nees syst. f. 272. *P. lichenoides Pers. icon. 29. t. 7. f. 1. P. byssiseda JV.* in lit. *P. erraticata* Fr. t. 1.

Ad ligni saginei frustula homi jacentia v. c. Thuring. rarius. (Stirps. bella, a teneris initii ad senectutem

observanda. Villus basi subjectus saepius ferrugineo-rufescit et hypostroma variegatum mentitur, quod quidem sterile cubilia arachnii instar longe lateque obducit. Disci color in vivis dilute-virescens, in siccis nigricans ex ascis emersis, sporidiis globosis farctis.)

† leioscyphoidae, ascomatibus sessilibus, primus jam calvis, nihilominus tamen stratum hyphoideum exserentibus.

2543. *P. microscopica* W., ascomatibus glabris microscopicis punctiformibus exilissimis carnosulis pallide flaventibus, dein discem planiusculum cerinum dilatius marginatum recludentibus, basi pilis arachnoideis suffoltis.

Ad finem vaccinum Thuring., in consortio Ascoboli pilosi, cuius forsitan initia incondita.

2544. *P. adhaerens* W., ascomatibus sessilibus sparsis carnosulis glaberrimis luteo-fulvis, e basi iude fila parca arachnoidea emitentibus, primum conniventibus, dein urceolatis, margine inflexo concolore cinctis, demum deplanatis immarginatis. — *?P. santhosia* Pers.

Ad ligna carie exesa salicina Thuring. rarius.

2545. *P. luteola* Fr., ascomatibus sessilibus sparsis ceraceis glabris luteolis, e basi stratum hyphoideum breve parcum album exserentibus, dein concavis cum disco concoloribus. — *Peziza luteola* Fr. syst. II. 110.

Ad ligna abietina Hercyn. parcus obvia.

2546. *P. porioides* A. et Schw., ascomatibus sessilibus confertia glabris niveis tenerimis minutis, stromati hyphideo stipato-intertexto, ambitum determinatum byssinum spargenti submembranaceo insidentibus. — *Peziza porioides* Alb. et Schw. nisk. 327. t. 6. f. 5. Fr. syst. II. 111. *Porothelium lacerum* Fr. obs. II. 273.

Ad corticem et ligna abietina homi jacentia, v. c. Lusatiae super. (Albertini et Schweinitz.)

2547. *P. sanguinea* Pers., ascomatibus sessilibus

minutissimis carnosulis glaberrimis marginatis atro-sanguineis melanophaeenis, primum sparsis punctiformibus globosis, dein urceolatis, e basi villum arachnoideum radiantem album mox confluentem exserentibus, denique adpresso-deplanatis patellaribus, cubilia stratumque dense intertextum fibrosum cruentantibus, raro nudis. — *Peziza sanguinea* Pers. syn. 657. Alb. et Schw. nisk. 328. Nees syst. f. 211. Fr. syst. II. 110.

Ad lignorum fagineorum, quercinorum aliquorumque frustula cassa, nec non ad ramulos decorticatos, cum lusu astronomico, ascomatibus ipsis cubilibus nec strato insidentibus insigni, passim intercurrente. Auctummo. (Ascomatum color interous atro-sanguineus, siccando melanophaeenus evadit, ideoque villum hypostromaticum aequo ac cubilia cruentando tingere solet saepiusque penitus penetrat. Cauta a Cycledo Lecideola, vix nisi colore interno diverso, dignoscenda.)

††† *aleuroscyphoidae*, ascomatibus sessilibus basique productis, tegmine furfuraceo s. tenuiter farinoso superfusis s. velutinis, hypostromati hyphoideo insidentibus. — Superficie cum *P. aleuroscyphis* analogae, figura ad trichoscyphas tendentea.

* *sessiles, ascomatibus sessilibus.*

2548. *P. poriaeformis* DC., ascomatibus sessilibus minutissimis molliter carnosis dilute fuscescentibus, e basi villum candidum radiantem tenuissime farinosum distinctum fimbriatum exserentibus, primum sparsis punctiformibus globosis, extus nudiusculis clausis, dein aggregatis fusco-furfuraceis, in discum urceolarem concolorum marginatum reclusis, denique hemisphaericis vertice hiantibus, furfure gryseo adspersis confertissimis, stratum hypostromaticum effusum dense intertextum obliterantibus crustamque rimoso-colliculosam cinereum mentientibus. — *Peziza poriaeformis* DC. gall. VI. 26. Fr. syst. II. 106. *P. tephrosia* Pers. myc. I. 211. *P. anomala* γ. *poriaeformis* Pers. syn. 656.

Intra Salices cavas agri gottingens. rarissime, (Persoon), heringensis passim (Wallr.) Per totum annum.

2549. *P. omphalodes* Bull., ascomatibus sessilibus confertis minutis carnosulis tenuiter farinosis aurantio-lutescentibus, nonnisi rosam miniumve immiscentibus, e basi villum parcum dein evanidum exserentibus, primum convexis, demum planis subumbilicatis. — *Peziza omphalodes* Bull. t. 485. f. I. Fr. syst. II. 73. *P. confluens* Pers. myc. I. 274.

a. miniata, ascomatibus aurantio-rubris.

β. lutea, ascom. aurantio-luteis. — *P. confluens* Pers. consp. 337., obs. II. 81. t. 5. f. 6., var. *a.* Pers. myc. I. 274.

γ. rosella, ascom. incarnato-roseis. — Fr. I. L. *P. rosella* Ehrenb. sylv. 29. n. 48.

δ. lilacina, ascom. vinoso-lilacinis. Fr. I. L.

Ad terram carbonariorum derelictam Hercyn. v. c. inferior. passim, nec non in vaporariis rarius. Aestate.

2550. *P. aurelia* Pers., ascomatibus sessilibus sparsis submembranaceis subventricosis majusculis, primum tomentosis aureis, deinde rubiginosis, subiculo delicato fibrilloso-radianti albo insidentibus. — *Peziza aurelia* Pers. myc. I. 270. Fr. syst. II. 107.

Ad folia, ramos ipsaque pericarpia saginea aliasque quisquiliis humi jacentes putres, v. c. montis vogesi (Mougeot) et alibi passim.

2551. *P. cinerea* Batsch, ascomatibus sessilibus gelatinoso-carnosulis molibus, siccando tenacellis ex albocinerascentibus caesiisve, extus velutino-sulfuraceis saturatioribus, e basi inde fila parca arachuoidea sensim in stratum hypostromaticum laxe intertextum effusum stygiom expansa succrescentibus, primum subglobosis clausis, dein osculo rotundo hiantibus, demum discum glaucum concavum margine dilutiore integerrimo cinctum recludentibus, subsidente deplanatis, patellaribus. — *Peziza cinerea* Batsch cont. I. f. 131. Pers. syn. 634. Nees syst. f. 269. *P. nivea et grisea* Batsch. (tusus coloris dilutioris.) *P. plana, alnea et obconica* Schum. saell. *P. callosa* Bull. t. 416. Batsch cont. II. f. 219. *Tremella cinerea* With.

Ad ligna putredine uida exesa s. in humum penitus redacta quaecunque, aestate pluvia ubertim. (Stratum hypostromuticum stirpi procul dubio proprium, quamvis aliurum more saepius obsoletum.)

2552. *P. Kneiffii* W., ascomatibus sessilibus sparsis carnosis, extus tegmine furfuraceo terso dilotius saturatisve fusco velutinis, a basi inde telam brevem rigidulam distinctam sensim confluentem effusam albam emitteutibus, primum subgloboso-verruciformibus, dein vertice in discum planum pallescentem margine fusco ciuctum reclusis, lenticulari-scutellaribus majusculis, demum nigro-fuscis decoloribus cumque strato hypostromatico cinereo concoloribus. — *Eustegia Arundinis Kneiffi* in lit.

Ad culmos Arundinis Phragmitis propter Rhenum. (Kneiff.) (Stratum effusum culmos denique integros ambit, et ascomata majuscula habitu lichenoso, sere Parmeliae cerinae praecellunt.)

2553. *P. fusca* Pers., ascomatibus sessilibus submembranaceis tenacellis sparsis, extus tegmine furfuraceo terso fusco vestitis, a basi inde telam teneram fibrillosam, dein saepius in stratum crassum fibroso-crustaceum s. grumosum effusum dense intertextam exserentibus, primum depresso-hemisphaericis, mox circinatim ocellatis, denique discum pallide-slavicantem, margine volvato ciuctum recludentibus, applanatis, scutellaribus, exiguis. — *Peziza fusca* Pers. syn. 657. Fr. syst. II. 109. Alb. et Schw. nisk. 328. *P. Pruni avium* Pers. obs., myc. I. 273. (ceu forma juvenilis.)

P. astromatica, ascomatibus demum scutellaribus, extus glabrescentibus, subiculo destitutis. — *Peziza livido-fusca* Fr. syst. II. 147.

Ad ramos Pruni Cerasi, Aloii, Populi, Coryli, Betulae aliarumque, inter quisquilias sepimentorum uどrum sepultos passim. (Extero habitu Sphaeriam byssisedam sere refert ejusque strata hypostromatica sterilia s. ascomatibus destituta inter se vix discerni possunt. Auctores

discum relusum cinereum indicant, qui in nostris e flavo pallescit.)

2554. *P. scutelliformis* W., ascomatibus sessilibus submembranaceis tenacellis sparsis, extus tegmine furfuraceo tergo fusco-nigrecente nitidulo vestitis, e basi inde telam arachnoideam exerentibus sensimque in stratum stipato-intertextum membranaceum spadiceum nitidum succrescentibus, primum globosis vertice hiantibus, dein reclinando discum planum stramineo-pallentem, margine inflexo flexuoso cinctum recludentibus, majusculis, adpressis, scutellaribus. — *Peziza cryptophila* W. nec Humb.

Ad ligna abietina mausolei cuiusdam in agro northusano. (Wallr.) (Stratum hypostrom. dein membranulae continuae instar cubilia undique obducit et siccando integrum secedit. Ascomata P. melaxantham s. xanthomelam. haud male referunt.)

2555. *P. lateritia* Pers., ascomatibus sessilibus carnosis majusculis sparsis, extus fusco-furfuraceis rugulosis, primum hemisphaericis dein deplanatis patellaribus, discum rigrum rugosum planum margine reclinato conformi cinctum recludentibus stratoque hypostromatico fibroso-membranaceo flavo-lateritio insidentibus. — *Peziza lateritia* Pers. myc. I. 273. Fr. syst. II. 110. *P. olivacea* Spr. mant. ad flor. hal. II. 30. nec I. 25. ad mea specimina.

Ad truncos fagineos putredine exesos nemoris roslebiens. (Wallr.) 1809. (Nisi eadem cum Persooniana, in agro parisiensi semel lecta, ei saltem proxima et neque minus praeclarata.)

2556. *P. Nigrella* Pers., ascomatibus sessilibus magnis (sesquuncialibus) gregariis subcespitosisve, extus tegmine stipato crassiusculo velutino-furfuraceo deteribili nigro-fusco inque basin cubilia penetrantem producto obductis, primum hemisphaerico-globosis, dein expansis concavis, nonnisi difformibus (oblongatis), discum atrum laevem recludentibus. — *Peziza Nigrella* Pers.

tyn. 648. Alb. et Schw. nisk. 318. Fr. syst. II. 81. P. nigra Schum. nec alior. Elvella hemisphaerica Wulff.

Ad terram muscoso-humosam truncosque putres German. austral. et Lusatiae superior. (Alb. et Schweiniz.)

† *stipitatae, ascomatibus in basin fibrillis stromaticis conjunctis, cubilia penetrantibus plerumque rhizoden et stipitem superadditum mentientibus suffultam desinentibus. (P. sarcoscypharum stipitat. sp. Fr.)*

2557. *P. sthenostoma Mart.*, ascomatibus primum clavato-subcylindricis, dein turbinatis stipato-carnosis miniatо-saurantiis, extus pilis tenuibus adpressis hirsutis, vertice discum depresso-concavum magine inflexo constricto occultatum aperientibus, basi subaequali sensim in stipitem crassum nigrum, plexum hypostromaticum penetrantem fibrosum emittem subtiliter desinentibus. — *Peziza sthenostoma Mart. erl. 469. Fr. syst. II. 80.*

Ad ligas putrida agri erlang. rarissime. (Martius.)
Sero auctumno.

2558. *P. rhizophorus A. et Schw.*, ascomatibus cæspitosis obesis carnosis majasculis, extus tegmine obtecto cum pilis furfuraceis rubiginosis exsertis velutino-hirto obductis, primum globosis clavis, dein osculo circinato hiantibus, denique hemisphaericis discum nigrum concavum, margine inflexo occultatum monstrantibus basinque sensim breviterque in plexum rhizoden propexam stygiam penetrantem desinentem producentibus. — *Peziza rhizophorus Alb. et Schw. nisk. 347. t. 1. f. 4.* P. melanostoma b. Fr. syst. II. 80.*

Ad truncos exesos (Quercus et Fagi) eorumque radices, quisquiliis herbaccis quibuscumque putrescentibus onustatas, Lusatiae v.c. superioris. (Albert. et Schweiniz.)

2559. *P. fusco-cana A. et Schw.*, ascomatibus maguis, demum in discum obverse patenterque campanulatum, margine reflexo patulum sordide olivaceum s. incantescentem reclusis, in stipitem rugoso-lacunosum obsum, fibras tenacellas rhizomorphas cubilia obrepentes

exserentes abrupte desinentibus, extus fusco-nigricantibus saturationibus tenuiter velutinis. — *Peziza melana* Fr. syst. II. 60. *P. melania* Pers. myc. I. 239.

a. byssoides, plexu rhizoideo byssino-fibrilloso. — *P. melania* a. *vogesiaca* Pers. l. l.

b. rhizomorpha, plexu rhizoideo tenacello fibroso. — *P. melania* b. *fusco-cana* et *g. sphagnophila* Pers. l. l. Ehrenb. *P. fusco-cana* Alb. et Schw. nisk. 312. t. 5. f. 2.

Var. *a.* ad ligna putrescentia defossa pinetorum montis vogesi (Mougcot); *b.* in similibus locis Lasatiae superioris (Albert. et Schwein.) saepius etiam plexu rhizomorphoideo infixo s. sphagneta nostrata intrans (Ehrenberg). (Elegans, forsitan tamen Ascobolo subscribenda.)

E. aleuroscyphae, ascomatibus molè, figura, consistentia, colore et ascorum conditione perquam variis, extus incisis, i. e. scobe peculiari, nunc magis protensa fibras capillares, nunc tornata granula laxe superaddita, nunc comminuta furfures contritos s. pruinam adflatam plane referente vestitis.

(*Pezizae Aleuriac et Fibrinae* sp. Fr. syst.)

a. inophloea, ascomatibus carnosulis, raro obesis s. ceracellis, siccando tenacellis osculumque connivendo contrahentibus, extus pilis parcis, saepius longitudinaliter convergenterque adpressis veluti fibrosis solutis rigidulis adspersis, verticem reclinum versus pliato-striatis. — (*P. Lachnearum* tribus 8. *Fibrina*.) Cum *P. dasyscyphis* analogae suasque simul inter stromatoscyphas (no. 2418-63.) excipiens.

† *sessiles*, ascomatibus sessilibus.

2560. *P. dentata* Pers., ascomatibus sessilibus minutissimis albido-pallentibus, scobe parca farinosa adspersis, primum subglobosis, dein hemisphaericis, vertice dentato-inciso reclusis. — *Peziza dentata* Pers. icon. 5. t. I. f. 6., Fr. syst. II. 147.

Ad ligna cariosa rarius. Auctumno.

2561. *P. ceracella* Fr., ascomatibus exiguis sparsis sessilibus ceraceo-membranaceis fragilibus pallide-flaventibus, extus tenuissime fibrilloso-farinosis, primum planis, dein margine subtilissime striato in osculum circinatum conniventibus obovato-globosis helvolis. — *Peziza ceracella* Fr. syst. II. 114.

Ad ligna quaecunque mucida, Betularum preprimis. Aestate.

2562. *P. Cyathus* Nees, ascomatibus sessilibus membranaceis subcylindricis fuscis, ore denticulato connivente, disco albido. — *P. Cyathus* Nees in Mart. erl. 463. Fr. syst. II. 114.

Ad ramulos siccos Betulae, v. c. agri erlang. (Nees, Martius.)

2563. *P. sanguinolenta* A. et Schw., ascomatibus sessilibus sparsis stramineis s. pallide-ochraceis, ad tactum cruentatis exiguis, primum parce fibrillosis, dein glabrescentibus hemisphaerico-concavis. — *Peziza sanguinolenta* Alb. et Schw. nisk. 336. t. 8. f. 7. Fr. syst. II. 145.

Ad ligna putredine uda confecta passim.

2564. *P. pruinosa* W., ascomatibus sessilibus gregariis stramineis carnosso-membranaceis, extus tenuiter farinosis, primum subglobosis vertice hiantibus deinde discum pallido lutescentem recludentibus scutellaribus, deinceps dilatatis planiusculis, marginem flexuosum reclinantibus glabrescentibus, facile decoloribus.

Ad Solani tuberosi caules putres agri northusan. Vere. (Wallr.)

2565. *P. velutina* W., ascomatibus sessilibus exiguis, extus fibris tercis rigidulis furfuraceis spadiceo-castaneis adspersis, primum subrotundudo-globosis in osculum circinatum marginibus inflexis cinctum, dein in discum subconcolorē concavum reclusis patellaribus, siccais connivendo varieque contrahendo 2-3 angularibus.

Ad ramulos coryleo Thuring. (Wallr.)

2566. *P. Ledi A. et Schw.*, ascomatibus sessilibus sparsis obovatis, extus fusco-nigris, scobe furfuracea concolore compacta tectis, marginem crenatum fibrosum versus viridulis, demum in discum fuligineum concavum reclusis. — *Peziza Ledi Alb. et Schw.* nisk. 343. t. 10. f. 7. *Nees syst. f.* 264. *Fr. syst. II.* 114.

Ad ramos languidos Ledi palustris, v. c. Lusatiae superior. (Albertini et Schweinitz.)

2567. *P. farinacea Pers.*, ascomatibus sessilibus ceraceo-coriacaeis, extus striato-fibrosis rugosis fusco-nigricantibus, dein obovatis vertice in discum urceolatum fuligineum ocius expallentem, margine inflexo convergenter fimbriatum occultatum reclusis. — *P. Pinicola Rebent.* neom. 385. *Fr. syst. II.* 113. *Phacidium fibrum Fr. exsicc. n.* 162. *Peziza farinacea Pers.* syn. 692.

Ad corticem Pini sylvestris, Lusatiae et alibi passim. Vere.

2568. *P. cyathiformis W.*, ascomatibus tenerime membranaceis concoloribus subsessilibus sparsis obconico-campanulatis, extus fibris furfuraceis stipatis vestitis, in discum subconcolorem patulum laevem, marginibus inflexis cinctum reclusis. — *Peziza cyathiformis W.* in lit. nec Scop.

Ad gramina putria in tectorum grumis, nec non inter Populi ligni fibras in agro thuring. Auctummo. (Wallr.)

2569. *P. aleuritica W.*, ascomatibus membranaceis sessilibus gregariis, extus fibrillulis intricatissimis furfuraceo-floccosis cineris undique aequaliterque vestitis, primum globosis, vertice osculo circinato hiantibus, dein discum urceolatum concolorem laevem, marginis ore inflexo cinctum recludentibus, demum considentibus sacciformibus, hinc fissis. — *Solenia urceolata Fr. elench.* II. 28. *Peziza urceolata W.* in lit.

Ad sarmenta Clematis Vitaliae in agro heringens. Thuring. (Wallr.) (Haec cum antecedente melius forsitan sub Phibalide genere militant.)

†† *stipitatae, ascomatibus stipitatis.*

2570. *P. litoraea* Fr., ascomatibus exiguis tenuissime fibrilosis dein calvis pallentibus, e stipite brevi in cupulam depresso-hemisphaericam dilatatis obconicis, disco rubescente, margine lacero cincto. — *Peziza litoraea* Fr. syst. II. 121.

Ad culmos Arundinis Phragmitis siccis rarius.

2571. *P. Persoonii* Moug., ascomatibus exiguis, primum hypophloeodeis subglobosis, dein subcaespitosis emergentibus urceolatis hyalinis aurantiacis, stipite brevissimo roseo suffultis calvis, vertice primum clausis, mox osculo, marginis limbo albido scarioso-lacero cincto hiantibus illudque siccando occludentibus. — *Peziza Persoonii* Moug. Pers. myc. I. 288. t. 12. f. 1. Grev. scot. t. 262. *Lycoperdon Equiseti* Hoffm. veget. II. 17. t. 5. f. 1. *L. minimum* Leers herb. 285.

Ad frondes Equiseti limosi propter ripas Rheni (Mougeot, Kneiff.) Aestate. (Desciscit quidem fibrarum defectu, marginisque limbo scarioso, saepius lacero forsitan partem analogam praestat. Stipes tam brevis, ut ascomata sessilia apparent. In nostris sp. semper conferta in caespitulos juncta, et sicca nitorem resinosum induant.)

2572. *P. crassipes* W., ascomatibus obconico-pyriformibus fusco-rufescens, vertice primum in osculum subrotundum, dein in discum concavum rufum reclusis, extus fibrillis parcis brevibus pallide-gryseis obtitis, intus stipiteque curto crasso rufescens.

Ad caadices Carpini caesos Thuring. (Wallr.)

2573. *P. pyriformis* Fr., ascomatibus tenuissimis aquoso-pellucidis globose-turbinatis sordide flaventibus, stipite filiformi albido suffultis, margine subprominulo dilatiore. — *Peziza pyriformis* Fr. syst. II. 121. *Octospora pyriformis* Hedw. I. l. t. 10.

Ad muscos locis uidis putrescentes, plerumque intra foliorum alas emergens. Vere.

2574. *P. albipes W.*, ascomatibus minutissimis, e basi stipitiformi crassa brevissima glabra alba hemisphaericis, osculo angusto circinato hiantibus, pallide gryseis, extus scobe furcosa cum fibrillulis intermixtis verstitis.

Ad ramulos decorticatos Ligustri vulgaris in agro northusano. rarius. (Wallr.)

2575. *P. bolaris Batsch*, ascomatibus ceraceis firmatis, e stipite brevi nigrescente hemisphaerico-infundibuliformibus subochraceis, primum fibrilloso-venosis, dein glabrescentibus. — *Peziza bolaris Batsch* cont. I. f. 155. Pers. syn. 658. Fr. syst. II. 112.

Ad ramos siccos, coryleo praeprimis v. c. Thuring. et alibi.

2576. *P. elatina A. et Schw.*, ascomatibus ceraceis constipatis crassiusculis, e basi stipitiformi firma sensim obconicis viridibus, fibrillis nigris adpressis striato-venosis, demum in discum planum sordide intescentem reclusis. — *Peziza elatina Albert. et Schw.* nisk. 330. t. 2. f. 3. Fr. syst. II. 112.

Ad ramos Pini Piceae emortuos humique jacentes Lusatiae superior. (Albertini et Schweiniz.)

2577. *P. erioloma Fr.*, ascomatibus tenerrimis hyalinis pallidis acetabuliformibus, stipite tenui aequali glabriusculo suffultis, marginem versus fibrillis porrectis ciliatis succinctis. — *Peziza erioloma Fr.* syst. II. 121.

Ad stramina putrida Thuring. semel.

2578. *P. decolorans W.*, ascomatibus gregaris stipato-carnosis, intus croceo-rubentibus, extus fibrillis teneris rigidulis adpressis, marginem versus seriatis albis vestitis, primum turbinatis, dein in discum pallide-vitelinum, mox flavo-croceum incusum, margine inflexo disco colore cinctum reclusis, hypocrateriformibus abrupte stipitatis.

Ad ligna putrida Salicis capraeae Thuring. rarius. Vere. (Wallr.) Prima initia caute a Peziza crassipede et albipede dignoscantur.)

2579. *P. Campanula* Nees, ascomatibus gregariis pellucidis tenellis flaventibus membranaceis tenuissime fibrillosis, e basi stipitiformi brevi abrupte campanulatis. — *Peziza Campanula* Nees syst. 268. f. 295. Fr. syst. II. 123. *P. sulphurea* Batsch cont. I. f. 146.

Ad strumina putrescentia Franconiae. (Nees.)

2580. *P. anomala* Pers., ascomatibus ex initio tortuoso-floccosis saepius luxuriantibus stratumque hypostromaticum mentientibus emergentibus, gregariis, primum sessilibus subglobosis, dein basin conformem rigidum sensim producentibus verticeque impresso-umbilicato hiantibus, deinde stipitatis turbinatis, extus fibrillis rigidulis tortuosis adpressis dilate-cervinis s. pallide fuscescens-tibus undique stipatoque obductis, humectis fuscis, discum albida recludentibus. — *Peziza anomala* Pers. syn. 656. excl. var. γ . Alb. et Schw. nisk. 320. Fr. syst. II. 106. *P. stipitata* Pers. myc. I. 270. *P. rugosa* Sowerb. t. 369.

α . *pseudostromaticæ*, initiis floccosis subrotundis, partim ascomata conformia informantibus, partim deliquescentibus stratumque pseudostromaticum effusum floccoso-pilosum, ascomata elevans mentientibus. — *P. anomala* auct., var. β . *conglomerata* Pers. syn.

β . *subsessilis*; ascom. *hemisphaericis* *subsessilibus*.

γ . *m. crustaceum*, ascom. subcylindricis utrinque subaequalibus s. in verticem subclavatum incano-fibrillosum desuentibus confertissimis constipatis s. connatis, crustam contiguam effusam demum rimoso-areolatam mentientibus. — *P. anomala* δ . *socialis* Pers.

Ad ramos cortice orbatis tectosve fere omnes lignaque arida (Thuring. et Hercyn.) ubertim. (Omnes autores stratum pseudostromaticum pro genuina stirpis parte habent et inter byssidas enumerant, quamvis incunabulorum aberrationem sistat. Exempla scia numeris absoluta, nec loci iuqua conditione ab ascomatibus informandis prohibita, nunquam ejus vestigia edunt.)

2581. *P. scyphiformis* W., ascomatibus exiguis sparsis tenuiter membranaceis albo-pallescens-tibus, extus

fibris tenerrimis adpressis parcis aequaliter adspersis; primum e basi stipitiformi firma crassa subclavato-turbinate sensim osculo rotundo hiantibus, deinde in discum concavum concolorum reclusis abrupte scyphiformibus, siccando margine inflexo subtili tenuissime striato inflexo conniventibus compressis triquetris.

Ad caules aridos Chaerophyllorum uostratum passim. (Sequenti similis, differre tamen videtur tegmine fibroso aequaliter diffuso, nec in striae distinctas stipato, cupulis concaviuscolis abrupte acyphiformibus, siccando plane difformibus triquetris et stipite breviore, crassiore magisque aequali.)

2582. *P. striata* Nees, ascomatibus exiguis sparsis tenuiter-membranaceis albo-pallescens, primum e basi brevi stipitata firma eatufatiore crassa sensim tenuata turbinatis, in osculum rotundum hiantibus deinde in discum concolorum marginie inflexo cinctum reclusis abrupte urceolatis, extus fibris brevissimis in striae parallelas constipatis exaratis, siccando subglobosis. — *Peziza striata* Nees Fr. syst. II. 122. nec Pers. syn. *P. Urticae* Pers. myc. I. 286. Dub. gall. II. 750.

Ad caules Urticae dioicae siccios passim.

2583. *P. tubaeformis* W., ascomatibus majusculis sparsis tenuissime membranaceis pallidis, extus fibrillis tenerrimis delicatis floccoso-surfuraceis gryseo-cinerascens, undique aequaliterque superfusis, e basi stipitiformi firma fragili sensim in discum profunde acuteque excavatum reclusis tubaeformibus, siccando marginie inflexo fissis angulatis. — ? *Helotium gibbum* Alb. et Schw. nisk. 350. t. 4. f. 1.

Ad ramos Rosae Cynorrhodi humi jacentes agri herringens. Thuring. (Wallr.) (Superficie, fabrica ipsoque habitu cum *P. cyathiformi*, aleuritica ipsaque Digitali A. et Schw. convenit et forsitan cum his aliud genus intrat.)

2584. *P. cyathoides* Bull., ascomatibus gregariis

carnosalis stipatis, primum subcylindrica, dein e basi stipitiformi clata compressa cerino-flaveute sensim in apicem hemisphaericum albo-pallescentem, osculo reclusum intumescentibus subclavatis siccis, demum in discum profunde urceolatum concolorum, margine inflexo contracto, limbum incisum mentiente tectum dilatatio cornicis, extus fibrillulis tenerrimis parce adspersis, humectis aquoso-fuscescentibus, cyathiformibus. — *Peziza cyathoidea* Bull. t. 416. f. 3. Pers. syn. 124. Fr. syst. II. 124. P. Solani Pers. obs. P. tenella Batsch cont. I. f. 151. Nees syst. f. 294. P. Hirudo et convivalis Batsch. Octospora albidula Hedw. l. l. t. 9. f. B. Elvella infundibuliformis Scop.

Ad caules herbarum elatiorum putres abundanter, auctummo. (Talem ad caules patruarum semper legi, nunquam glabram, sed fibrillulis adspersam basique inferiore magis minusve lutescentem. *P. clavata* Pers. myc. I. 283. juvenis esse videtur.)

2585. *P. coronata* Bull., ascomatibus sparsis, primum cylindrica, dein e basi stipitiformi subcompressa concolor sensim turbinatis vertice clausis, siccis demum in discum urceolatum concolorum, extus cum marginis limbo in cilia setacea longa (20-25) diducto inflexo tenuiter fibrilloso-furfuraceis albo-pallescentibus cyathiformibus, humectis dilute fuscescentibus, discum ciliis portrectis minitum recludentibus. — *Peziza coronata* Bull. t. 416. f. 4. Fr. syst. II. 120. *P. radiata* Pers. syn. 662. Nees syst. f. 293. *P. armata* Roth. *P. subulata* Schum. Flor. dan. t. 1380. (at nimis valida.) *P. dentulata* Flor. dan. t. 1016. f. 3. (*lignotilis*.)

Ad caules herbarum elatiorum (*Urticae praesprimis*), nec non ad sarmenta (*Ruborum*), stramina sicca ipsaque ligna, parcius. (Praecedenti affinis.)

2586. *B. inflexa* Bolt., ascomatibus majusculis stipitatis albidis, cupulae subhemisphaericae margine dentibus triangularibus brevibus cincto. — *Peziza inflexa* Bolt. t. 106. Fr. syst. II. 120. *P. coronilla* Pers. myc. 207.

In similibus cum praeced. locis, at epud nos saltem multo rarius.

2587. *P. virgultorum* Wigg., ascomatibus co-stipatis, primum obconicis robustis, extus cum stipite crasso magis minusve producto tenuiter fibrilloso-furfuraceis pallescentibus, dein vertice in discum planiusculum satoratiorem surantiacum inflexo-marginatum reclusis scutellaribus, demum planis, margine aequali cinctis abrupte stipitatis subpeltatis. — *Peziza virgultorum* Wigg. prim. n. 1125. Wahlenb. suec. II. 986. nec Schum. et Pers. myc. *P. fructigena* Fr. syst. II. 118.

$\alpha.$ *herbicola*, ascom. breviter abrupteque stipitatis ex Inteo testaceis, disco hypocrateriformi rubentibus. — *P. scutula* Fr. syst. 123. Pers. myc. I. 284. *P. herbarium* Nees syst. f. 282.

$\beta.$ *ramicola*, ascom. breviter robustiusque stipitatis, disco amplio carnosu. — *P. fructigena* b. *virgultorum* et $\beta.$ *salicina* Fr. l. l. *Octospora fungoides* Hedw. l. l. t. 19. *P. salicina* Pers. syn. 663. *P. flavescens* Pers. myc. I. 277.

$\gamma.$ *fructicola*, ascom. longius graciliusque stipitatis. — *P. fructigena* Bull. t. 228. Nees syst. f. 292. Pers. syn. *P. calyculus* et *Carpini* Batsch. *Helotium flavescens* Pers. myc. I. 346.

Var. $\alpha.$ ad cales herbarum elatiorum; $\beta.$ ad ramulos putres salicios et fagineos; $\gamma.$ ad pericarpia faginea et quercina humi jacentia frequens. Auctumno. (Locus natalis stipitis proceritatem totamque molem insigniter mutat; hinc in saltibus editioribus uidis ascomata robustiora magisque hirsuta (praesertim basi, sicut *Hedwigii* icon reddit) quam in depressis obvia.)

2588. *P. coccinea* Jacq., ascomatibus magnis sub-coriacis, extus pallidis scobe fibrillosa tenerrima furfuracea adspersis, primum obconicis, dein in discum concavum laete coccineum, margine inflexo subcrenulato cinctum dilatatis infundibuliformibus, stipite valido longiusculo sursum incrassato fissu suffultis. — *Peziza coc-*

cinea Jacq. austr. t. 169. Bolt. t. 104. Nees syst. f. 288.
Fr. syst. II. 79. *P. poculiformis* Hoffm. veget. cr. t. 7.
f. 5. *P. epidendra* Bull. Sowerb. *Eliella coccinea* Scop.

Ad ramos putridos humi jacentes, carpineos v. c. in
 nemoribus Thuring. et Hercyn. utriusque rarius. Vere.
 (Stipitis basis in locis uidis hypham rhizoideam exserit.)

b. *coccophlocae*, *ascomatibus substantia*, *figura*
 et *mole variis*, *extus praeter surfures tenues*, *granulis*
papulosis solutis, *dein facile caducis obsecisis.*

† *sessiles*, *ascomatibus sessilibus.*

2589. *P. microstoma* JV., *ascomatibus sessilibus*
 exilissimis albidis, *extus concoloribus tenuiter papulosis*,
dein hemisphaericis in osculum circinatum immarginatum
angustum dilutum reclusis, urceolaribus. — ? *Peziza hyalina*
β. granulata Pers. myc. II. 316. *P. hyalina* Nees
 syst. f. 270. nec Pers.

Ad Coryli truncoꝝ vetustos Thuring. Vere.

2590. *P. Pteridis* A. et Schw., *ascomatibus mi-*
nimiis sessilibus ceraceo-mollibus, *extus olivaceis rugu-*
losis granulosis, *dein cupularibus discum sordide lute-*
scentem, *margine lacero cinctum monstrantibus*, *siccando*
contractis. — *Peziza Pteridis* Alb. et Schw. nisk. 338.
 t. 12. f. 7. *Fr. syst. II.* 144.

Ad stipites Pteridis aquilinae patres, rarius. Vere.

2591. *P. papillaris* Bull., *ascomatibus gregariis*
ceraccis firmulis sessilibus lacteis, *extus praeter fibrilla-*
las delicatas marginem versus granulosis, *dein concavis*,
siccando clausis granuliformibus. — *Peziza papillaris*
Bull. t. 468. f. 1. Fr. syst. II. 102. *P. granuliformis*
Alb. et Schw. nisk. 322.

Ad lingua putrida passim.

2592. *P. umbrosa* Schrad., *ascomatibus minuti-*
sessilibus carnois flaventibus, *extus ferrugineo-pustulatis*,
primum conviventibus demum convexiusculis revolutis. —
Peziza umbrosa Schrad. *Fr. syst. II.* 66.

Ad terrum pinetorum hercynic. (Schrader.)

2593. *P. papillosa* Reich., ascomatibus sessilibus subglobosis dilute-fuscis, externe papillis atro-fuscis obsitis, margine crenato. — Reich. fl. wett. III. 374. Pers. myc. I. 225. Fr. syst. II. 151. (inter dubius.)

Ad terram nudam agri wetterav. (Reichard.)

2594. *P. gemmata* Schum., ascomatibus minoribus gregariis sessilibus sphaericis sordide pallentibus, extus granulis umbriosis obsitis. — Fr. syst. II. 55. Schum. saecil. II. 421. excl. syn.

Ad truncos fagineos putres, v. c. Thuring. rarius.

2595. *P. granulata* Bull., ascomatibus sessilibus subgregariis aurantio-rubris s. pallidioribus, extus corpusculis exiguis papillaeformibus concoloribus dein caducis obcessis, primum subglobosis, mox in discum levigatum planum dilatatis, scutellaribus. — *Peziza granulata* Bull. t. 438. f. 3. Pers. syn. 667. (*P. granulosa*.) Fr. syst. II. 67. *P. seabra* Flor. dan. t. 655. f. 2. *P. fulva* Huds. — Vaill. bot. t. 13. f. 14.

Ad sterca vaccinum in nemoribus undis passim.

†[†] *stipitatae*, ascomatibus stipitatis.

2596. *P. gemmifera* W., ascomatibus gregariis parvis subcarnosis flavicantibus, extus gemmulis pellucidis plurimi splendentibus obcessis, primum obconicis clausis, deinde in discum marginibus inflexis ciuctum saturatiorem reclusis sensimque in basin stipitiformem de-sinentibus.

Ad caudices quercinos Hercyn. inferior. passim. (Habitus externus *P. citrinae*; nec quoque *P. pallida* Schum. saecil. II. 428., dubia Friesio, dissimilis esse videtur.)

2597. *P. fulgens* Pers., ascomatibus carnosis fragilibus vitellinis s. subaurantiis, extus concoloribus granulosis, primum globosis subsessilibus, deinde campanulatis undulato-contortis magnis, saepius inconditis lobatis basi stipitiformem producentibus. — *Peziza fulgens* Pers. myc. I. 241. Fr. syst. II. 67., elench. II. 6.

In pinetis German. australis et ni fallor ipsius Hercyn. superior.

c. *trachyphlocae*, ascomatibus more reliquarum variis, extus scobe primum rudi, dein in fibras tenacellas producta, hirsutiem mentiente asperis.

† sessiles, ascomatibus subsessilibus.

2598. *P. rubiginosa* Pers., ascomatibus gregariis majusculis e basi producta campanulatis carnosis fragilibus rubiginosis, extus dense farinoso-verrucosus. — *Peziza abietina* y. *rubiginosa* Pers. myc. I. 233. Fr. syst. II. 47.

Ad margines viarum montis vogesi. (Mougeot.)

2599. *P. sepulchralis* Rebent., ascomatibus gregariis carnosis fragilibus fuscis concoloribus, extus verrucis minutis acutis muricatis, primum obovatis integris in basin productis, dein hemisphaerico-campanulata demumque subsidentibus dilatatis facile lacero-inconditis. — *Peziza sepulcralis* Rebent. n. nom. 384. t. 4. f. 18. Pers. myc. I. 224. ?*P. arenaria* Osbeck. Pers. syn. 641. Fr. syst. II. 63. cum var. β .

In tectorum grumis tumulisque coemeteriorum v. c. Neomarchiae, (Rebentisch.) Vere.

†† stipitatae, ascomatibus distinctius stipitatis.

2600. *P. micropus* Pers., ascomatibus sparsis carnosis fragilibus fuligineo-pallescensibus, extus squamulosofurfuraceis, e basi brevi stipitiformi abrupte in cupulam conico-hemisphaericam obliquam, dein incondito-flexuosa dilatatis. — *Peziza micropus* Pers. syn. 642., icon. t. 8. f. 3. Fr. syst. II. 54.

Ad truncos putredine exesos Hercyn. (Persoon.)

2601. *P. verrucosa* Pers., ascomatibus sparsis carnosis fragilibus livido-pallescensibus, extus dilatioribus, tuberculis inaequalibus asperis, maguis, e basi stipitiformi brevi difformi infundibuliformibus. — *Peziza verrucosa* Pers. syn. 646., myc. I. 234. Fr. syst. II. 54.

Ad truncos putres agri gotting. (Persoon.) (Ulterius indaganda, ipsi *Friesia ignota* ac suspecta!)

2602. *P. fibrosa* W., ascomatibus coriaceis breviter stipitatis, extus praeter furinam furfuraceam fibris tenacibus porrectis hirtis fusco-cinereis, demum in discum utrinque planum tenuiter marginatum nigro-fuscum nitidam dilatatis, peltatis. — ?*Peziza Macropus* β . *hirta* Pers. myc. I. 237. *Fr. syst.* 57. *Octospora villosa* Hedw. L. L. t. 19.

Ad truncos fagineos mucidos Thuring. rarior.

2603. *P. hypocrateriformis* Pers., ascomatibus coriaceis stipitatis, extus praeter farinam tenuem fibris validis sparsis tortuosis vestitis albo-cinerascentibus, deinde in discum amplum concaviusculum fuscum reclusis. — *Peziza Macropus* γ . *erosa* Pers. myc. I. 237. *Elvella hypocrateriformis* Schaeff. bav. t. 152.

Ad terram nudam Bavariae et Hercyn. rarior.

2604. *P. Macropus* Pers., ascomatibus elatis, stipite longo e basi subbulbosa sensim tenuato firmo erecto, tegmine furfuraceo obtexto vestito cinereo suffultis, abrupte peltatis, in discum utrinque planum membranaceum dilute fuscum immarginatum, subtus albo-cinerascentem fibris tenacibus concoloribus adspersum dilatatis. — *Peziza Macropus* Pers. obs. II. 26. t. 1. f. 2., syn. 645. *Flor. dan.* t. 1200. f. 2. *Grev. scot.* t. 70. *Fr. syst.* II. 57. *P. Crater* Batsch. *Octospora villosa* Hedw. ? *Hellella plana* Huds. *P. hispida* Schaeff. bav. t. 167; *Bull. t. 196*. *P. stipitata* Huds. *Bull. t. 457*. *Dub. gall.* II. 741.

Ad terram nudam fagetorum umbrosorum rarissime, in agri halensis campis arenosis satis frequentes. (Spr. mant. I.)

d. aliphitophloea, ascomatibus substantia et figura variis, plerumque majusculis, extus s. ad latuscula furfure pertenui, veluti pruinoso detergibili adspersis.

+ *lenticulares*, *geophilae*, ascomatibus sessilibus, latusculis adpressis, demum saepius convexiusculis. (*P. Aleuriac humariae* Fr.)

2605. *P. miliaris* IV., ascomatibus sessilibus sparsis microscopicis pallentibus, extus tenuiter pruinosis immarginatis, cum disco demum convexiusculo concoloribus.

Ad Peltigerae caninae paginam superiorem in locis uidis Thuring. passim.

2606. *P. Haematostigma* Fr., ascomatibus sessilibus dilute sanguineis glabris immarginatis extus pruinosis, primum subglobosis, dein hemisphaericis. — *Fr. syst. II.* 74. *Octospora* Hedw. l. l. t. 5. f. B.

Ad terram sabulosam agri Lipsiens. Vere. (Hedwig.)

2607. *P. convexula* Pers., ascomatibus sessilibus carnosis fragilibus, extus tenuiter pruinosis carneo-ochraceis, primum plano-convexiusculis inciso-marginatis, dein convexis immarginatis. — *Peziza convexula* Pers. syn. 666. *Fr. syst. II.* 73.

Ad terram nudam German. boreal. passim. (Persoon.)

2608. *P. Schenkii* Batsch, ascomatibus sessilibus convexo-depressis atris nitidis, margine brunneo incuso cinctis. — *Peziza Schenkii* Batsch clench. f. 52. *Pers. myc. I.* 243. *Fr. syst. II.* 72.

Ad terram muscosam agri jenens. (Batsch.)

2609. *P. xanthomela* Pers., ascomatibus gregariis sessilibus carnosis, extus nigrescentibus pruinoso-sulfureis, disco convexiusculo lutescente, margine discoloro veluti livido s. nigro cincto. — *Peziza xanthomela* Pers. syn. 665. *Fr. syst. II.* 72.

Ad terram pinetorum Hercyn. (Persoon), Saxoniae (Kunze) et alibi passim. Similem ipse in caudicibus putredine exesis Thuring. passim legi.

2610. *P. rubricosa* Fr., ascomatibus sessilibus gregaris rufis, primum plano-concaviusculis carnosulis extus calvis dilutioribus, dein convexis marginem farinoso-puberulum reclinantibus. — *Peziza rubricosa* Fr. *syst. II.* 72. *P. rufa* Fr. obs. *P. rufa* β. Pers. syn. 666.

Ad terram pinetorum Hercyn. super. (Persoon.)

2611. *P. humosa* Fr., ascomatibus sessilibus carnosis demum glabrescentibus sanguineo-rubris plano-concaviusculis marginatis. — *Peziza humosa* Fr. syst. II. 71. *Helvella cartilaginea* Bolt. t. 101. f. 1.

Ad terram nudam glareosam passim.

2612. *P. hepatica* Batsch, ascomatibus sessilibus atro-purpureis depressis, demum reflexis discoque saepius scrobiculo inscriptis. — Batsch. cont. I. 138. Pers. myc. I. 243. Fr. syst. II. 71. (inter dubias.)

In similibus cum prioribus locis. (Batsch.)

2613. *P. macrospora* JV., ascomatibus sessilibus carnososo-stipatis castaneo-nigricantibus, primum subglobosis, dein discum concaviusculum concolori-marginatum, ascis maximis foetidum rugulosum opacum recludentibus, majusculis scutellaribus.

Ad terram nudam glareosam grumos tectorum conficietem Thuring. passim. Vere. (Wallr.) (Similem quoque ad muros calcareos observavi, cum *P. depressa* Alb. et Schw. forsan comparandam.)

2614. *P. leucoloma* Robent., ascomatibus sessilibus sparsis rubris, primum subglobosis clausis, dein planiusculis marginem flocculis albis fimbriatum circumducentibus deinceps reclinantibus, scutellaribus. — *Peziza leucoloma* Robent. neom. 386. Nees syst. f. 268. Fr. syst. II. 71. *Octospora leucoloma* Hedw. l. l. II. 13. t. 4. f. A.

Intèr muscos terram gregatim obducentes, in Bryi argentei et Phascorum consortio. Vere.

2615. *P. rutilans* Fr., ascomatibus subsessilibus pallidis extus subtilissime pubentibus farinulosisque campanulatis, dein explanatis inque discum aurantio-rubrum reclusis. — *Peziza rutilans* Fr. syst. II. 68. *P. leucolome* var. Alb. et Schw. nisk. 335.

Ad terram nudam sterilem in pascuis et pratis passim.
NB. Praeter species laudatas geophilas alias complures

variis locis legi, quae quidem siccando perierunt, nec certam distinctionem permittunt.

†† *cochleatae*, *ascomatibus primum saepius cochleatis, dein cupularibus.* (*P. Aleuriaec gcopyrides cupulares Fr.*)

* *sessiles, ascom. sessilibus s. subsessilibus.*

2616. *P. dimorpha* W., ascomatibus primum depresso-convexusculis discum rotundum cinereo-viridulum convexiusculum, latusculis tenuiter furfuraceis cinereo-olivaceis propexis, limbo pallido marginatis incarceratum monstrantibus eoque veluti ocellatis, dein sensim dilatando applanatis tenuatis discum lutescentem incensum, margine tenui concolore nudo cinctum informantibus, scutellaribus, demum saepe contractis. — *Peziza lentiformis* W. in lit. *P. olivacea* var. *lentiformis* Fr. clench. II. 12.

Ad truncos Tiliae putredine exesos Thuring. passim. (Wallr.) Vere. (Ascomata juniora praeter basin adnatam ad latuscula magis elevata prominent et disci initia incarceraata ita comprehendunt, ut ille populae instar intra palpebras prominere videatur, dein vero latuscula sensim dilatando reclinant discumque tenuatum helvolum s. lutescentem ex ascis emergentibus tenuiter farinosum, margine tenui concolore cinctum arcte adpressum informant. Senilia saepe confluant, multangula marginibusque crista evadunt, faticunt et compagem internam fibrosam monstrant.)

2617. *P. Lancicula* Rebent., ascomatibus sessilibus caespitosis campanulatis, extus rugosis dilute-fuscis, demum in discum subolivaccum dilatatis. — *Peziza lancicula* Rebent. neom. 384. Fr. syst. II. 65.

Ad terram udam, fossarum v. c. Neomarch. (Rebent.)

2618. *P. saniosa* Schrad., ascomatibus sessilibus fusco-purpurascenibus similemque succum stillantibus, extus umbrinis pulverulentis, in discum concavum reclusis. — *Peziza saniosa* Schrad. Journ. 1799. II. 64. Fr. syst. II. 65.

Ad terram nudam arborumque truncoſ patres Hercyn. ſuperior. paſſim.

2619. *P. violacea* Pers., ascomatibus ſubſeſſili-
bus gregariis carnoſis purpureo-coeruleis, extus pruino-
ſis, prium globoſis, dein campanulatiſ, demum ſubi-
ſidentib⁹ baſi que crassam productam obliterantib⁹ ex-
planatiſ ſubrepando-laceriſ. — *Peziza violacea* Pers. syn.
639. Alb. et Schw. nisk. 312. Fr. ſyst. II. 65.

Ad terram nudam truncoſque, preeprimis in carbo-
nariorum areis derelictis paſſim. Vere.

2620. *P. purpurascens* Pers., ascomatibus ſeſſili-
bus subgregariis livido-purpuracentib⁹ campanulatiſ,
dein ore late ſubobliquo hiantib⁹, diſcum concolorē
monſtrantib⁹. — *P. purpurascens* Pers. myc. I. 242.
t. 12. f. 10.

Ad terram pinguem nemorum patruorum rarius.

2621. *P. applanata* Fr., ascomatibus ſeſſili-
bus prainoſis carneiſ, prium campanulatiſ, dein ſubi-
ſidentib⁹ applanatiſ, diſcumque ruſum planum nonniſi
poroſum immarginatum expandentiib⁹. — *Peziza appla-
nata* Fr. ſyst. II. 64. *P. depreſſa* Pers. syn. 640. Alb.
et Schw. nisk. 312. *Octospora applanata* Hedw. l. l.
t. 5. f. C.

Ad terram humidam s. argilloſam rarius.

2622. *P. pustulata* Pers., ascomatibus baſi ap-
planata ſeſſilibus pallido-Subfuligineis, extus albido-fur-
furaceis, dein magis expansis margineque obtuso integro
ciuctis — *Peziza pustulata* Pers. syn. 646. Fr. ſyst. II.
55. *P. spurcata* Pers. myc. *P. cochlæata* Batsch cont. I.
f. 157. *Octospora pustulata* Hedw. l. l. t. 6.

Ad terram nudam in nemoribus umbrosis rarius.

2623. *P. cupularis* L., ascomatibus ſeſſilibus te-
nuibus, prium globoſis pisiformib⁹, extus farina fur-
furacea rugulosa cinereo-s. pallido-cerviniſ, dein cam-
panulatiſ diſcum pallidum concavum margine crenato inſexo-

cinctum monstrantibus. — *Peziza cupularis* L. Poll. Sw. Fr. syst. II. 62. *P. crenata* Bull. t. 396. Pers. obs. II. 79. t. 4. f. 6. — Vaill. bot. t. II. f. 1-3.

Ad terram nudam in promontoriis patruis passim.

2624. *P. thelephora* W., ascomatibus demum unidique adnatis applanatis circumscripte rotundatis immarginatis amplis crassiusculis, supra atro-sanguineis, (siccando) plerumque fissis fibrosis, subtus albentibus tenuissime pruinosis undique aequalibus, papillis sparsis parvis instructis. — *P. sauguinolenta* W. in lit.

Ad terram tersam pivotorum Hercyn. superior. Vere. (Wallr.) (Ascomata adulta joachimici molem et ambitum aequant et papillarum ratione ad Rhizinas accedere videntur.)

2625. *P. badia* Pers., ascomatibus subsessilibus, extus pruinosis dilutioribus subbolivaceis basin villosulam sublacunosum nonnisi emitentibus, primum globosis integris, dein discum e rufo-fuscescentem (porosum s. papillosum), margine involuto cinctum recludentibus, demum flexuosis subcaespitosis difformibus brunneis. — *Peziza badia* Pers. obs. II. 78., syn. 639. Alb. et Schw. nisk. 311. Fr. syst. II. 46. *Helvella cochleata* Bolt. fung. t. 99. — Vaill. bot. t. II. f. 8.

Ad terram pinetorum, Hercyn. superior. v. c. (In sicci exemplis hisque plerumque valde corrugatis, papillas exiguae, semine papaverino multo minores, nitidulas sphaeriaeformes, disco inspersas video, quae forsitan stirpi propriae.)

2626. *P. mespiliformis* W., ascomatibus basi obesa plicata sessilibus carnosis fragilibus, extus furfure pruinoso adsperso stramineo-fuscis, primum globosis nuciformibus s. ovoidibus, dein discum saturate-fuscescentem cinnamomeum, ore irregulariter scisso dilatato aperatum expansis concavis, demum difformibus insignibus. — *Peziza ochracea* Schaeff. bav. t. 155., quam quidem Friesius ad *P. cochleata* refert.

Ad terram nudam glareosam collum editiorum occatorum inque murorum grumis limosis Thuring. (Wallr.)

2627. *P. carbonaria* A. et Schw., ascomatibus subcesilibus gregariis teneris fragilibus ochraceo-rufescens, extus tenuiter pruinosis, primum globosis, dein campanulatis marginem fariooso - crenulatum informantibus. — *Peziza carbonaria* Alb. et Schw. nisk. 314. Fr. syst. II. 62. Pers. myc. 228.

In areis carbonariorū relictis, v. c. Lusatiae, Hercyn. et alibi passim.

2628. *P. venosa* Pers., ascomatibus sessilibus basi albida extusque venoso-rugosis subcostatis pruinosis badio-umbris, primum subglobosis, dein hemisphaericis, denique subsidentibus repandis contortis saturationibus. — *Peziza venosa* Pers. syn. 638. Fr. syst. II. 46. *Rivella cochleata* Wulff. in Jacq. miss. II. 112. t. 17. f. 1.

Ad terram pinguem Austriae (Wulffen) et forsitan aliis Germaniae australis locis.

2629. *P. cochleata* Huds., ascomatibus sessilibus subcespitosis carnosis, extus pruinosis pallidis s. helvolis, primum subglobosis, dein discum margine involuto ciacum reclusis, demum contortis iocunditis latuscula reclinantibus. — *Peziza cochleata* Huds. Bull. t. 154. f. 2. Fr. syst. II. 50. *P. umbrina* Pers. syn. 638. Alb. et Schw. nisk. 310.

β. alutacea, ascomatibus minoribus subsessilibus contortis, extus dilutionibus, disco pallido-fulgineis. — *Peziza cochleata* β. *alutacea* Fr. I. I. *P. alutacea* Pers. ?*P. ochracea* Schaeff. bav. t. 155. teste Fr.

Ad terram nudam in nemoribus udis passim.

2630. *P. onotica* Pers., ascomatibus speciosis erectis e basi tenuata nonnisi substipitiformi ovato-oblongis, extus scobe fibrilloso-furfuracea ferraginea aequaliter superfusis tenuiterque pruinosis dilutionibus, primum clausis inflatis, dein hinc (latere alter quoque) longitudiniter fissis, discum roseum demum rugosum margine in-

voluto cinctum monstrantibus. — *Peziza onotica* Pers. syn. 637. Alb. et Schw. nisk. 310. *Ditmar in Sturm germ.* III. t. 16. *Fr. syst. II.* 48. *P. rosea* Schum. *P. leporina* Sowerb. t. 19.

Ad terram in nemoribus frondosis, v. c. Lusatiae, agri berolin. et rostoch. (*Ditmar, Ehrenberg*) et thuring. rarius.

2631. *P. leporina* Batsch, ascomatibus erectis, e basi tenuata stipitiformi ovatis, extus farinosis subferruginea, deinceps longitudinaliter fassis elongatis auri-formibus. — *P. leporina* Batsch clench. 117. Pers. syn. 637. Nees syst. f. 278. *Fr. syst. II.* 47. *P. Auricula* Schaeff. bav. t. 156.

Ad terram pinetorum rarius. Auctumno. (Colore vario, ferrugineo, cinereo (*P. felina* Pers. myc.), citrino et stramineo reddit.)

2632. *P. aurantiæ* Oed., ascomatibus sessilibus carnosis tenacellis, extus pruinosis tenuiterque furfuraceis albidis, primum subglobosis integris, deinceps campanulato-hemisphaericis sensim magis subsidentibus, discum amplum aurantiacum politum aperientibus, demum flexuosis inconditis, latuscula reclinantibus. — *Peziza aurantiæ* Oed. fl. dan. t. 657. f. 2. Pers. syn. 637. Nees syst. f. 279. *Fr. syst. II.* 49. *P. cochleata* Lumn. Willd. Batsch. *P. cyathoides* Wahlenb. ups. 466. *P. coccinea* Huds. Schaeff. t. 148. *Bull. t. 474. Helvella coccinea* Bolt. t. 100.

Ad terram nudam glareosam in promontoriis lucisque herbidis, v. c. Thuring., Hercyn. infer. et alibi passim. Auctumno.

2633. *P. abietina* Pers., ascomatibus e basi non nisi producta lacunosa sessilibus carnosis fragilibus subcaespitosis magnis, extus cinnamomeo-fuscescentibus farinosis, demum concavis flexuosis integris. — *Peziza abietina* Pers. syn. 637., myc. I. 232. Alb. et Schw. nisk. 309. *Fr. syst. II.* 47. *P. integra* Schum. saec. II. 419.

(*lucus ertus umbrinus.*) *P. grandis* Pers. l. l. (*l. olivaceo-umbrinus.*) *P. porosa* Pers. l. l. (*l. disco poroso.*)

Ad terram im campis abietinois collinis, v. c. Lusatiae (Alb. et Schw.), Hercyn. super, et alibi rarius.

2634. *P. repanda* Wahlenb., ascomatibus carnosis fragilibus, e basi producta penetrante primum hemisphaerico-concavis cyathiformibus, demum subsidentibus discumque rugosum fuscum deplanantibus, extus dilutionibus albo-farinosis. — *Peziza repanda* Wahlenb. upr. 466., suec. II. 980. *ipsiusque forsan* Pers. icon. t. 22. f. 3. (*disco magis lutescente.*) *P. granulosa* et *pedunculata* Schum. l. l. *P. coronata* Jacq. misc. II. 140. t. 10.

Ad trucos putredine exexos, tum fagineos, tum abietinos, Hercyn. superior. et inferior. rarius.

2635. *P. cerea* Sowerb., ascomatibus carnosis fragilissimis lutescentibus, e basi stipitiformi ventricosis infundibuliformibus, dein subsidendo expansis repandis insignibus, *Peziza cerea* Sowerb. fung. t. 3. Pers. myc. I. 232. Fr. syst. II. 52.

In vaporariis locisque humetosis passim. Aestate calida.

2636. *P. Marsupium* Pers., ascomatibus sessilibus subgregariis albido-glaucis dein pallescentibus, praeter farinam subtilem glabriusculis, ore flexuoso conniventibus. — *P. Marsupium* Pers. syn. 641. excl. syn., myc. I. 228. *Eloela auriformis* Hoffm. veg. crypt. II. 10. t. 5. f. 3.

Ad terram nudam nemorum frondosorum, post pluvias passim. (Persoon.)

2637. *P. lycoperdooides* DC., ascomatibus magnis sessilibus gregariis fragilibus carnosò-pulposis, extus ex albo lutescentibus fuligineisque tenuiter surfuraceis, primum globoso-turbinatis conniventibus, dein ore granulato-crenato in discum dilute fuscescentem reclusis campanulato-hemisphaericis, denique subsidentibus flexuosis inconditis. — *P. lycoperdooides* DC. gall. II. 87. Dub. gall. II. 741. *P. vesiculosa* Bull. Sowerb. Pers. Fr.

syst. II. 52. *P. turbinata* Pers. *syn.* 641. Nees *syst. f.* 277. *P. coronata* Batsch. *P. alutacea* Alb. et Schw. nisk. 310. *Elvella lycoperdoides* Scop. *carn.* H. 480. — Mich. *gen. t.* 86. *f.* 2.

Ad terram pinguem, sive humo equino, sive cortice coriaceo subactam, in areis hortorum, nec non in conceptaculis similem terram continentibus. Aestate calida post imbræ, suis locis ubertim. (Tum colore et mole, tum habita externo valde polymorpha.)

** *stipitatae, ascomatibus stipitatis.*

2638. *P. purpurea* Fr., ascomatibus subcoriaceis, extus albido-pruinosis papillatisse fuscescentibus cum purpura debili tinctis, e basi brevi stipitiformi leviter striata in discum sanguineum dilatatis infundibuliformibus. — *P. purpurea* Fr. *syst. II.* 11. *P. calycina* Nees *syst. f.* 286. *Octospora purpurea* Hedw. *musc.* II. 63. *t.* 22. *A.*

Ad cunctos quercinos putres v. c. agri lips. (Hedwig.)

2639. *P. varia* Fr., ascomatibus submembranaceis, extus fusco-badiis tenuiter pruinosis, e stipite brevissimo sulcato in discum orbicularem cinuamomeum non-nisi repandum dilatatis, cyathiformibus. — *P. varia* Fr. *syst. II.* 61. *Octospora varia* Hedw. *l. l. t.* 6. *f.* D.

In muris argillaceis agri lipsiens. (Hedwig.)

2640. *P. Catinus* Holmsk., ascomatibus dilutius saturatiusse fuscescentibus, extus tenuiter furfuraceis, e stipite brevi sublacunoso in cupulam primum globosam, deinde margine crenato patentem hemisphaericam, denique concavum expansam dilatatis. — *P. Catinus* Holmsk. Fr. *syst. II.* 61. *P. varia* Alb. et Schw. nisk. 311. *P. sphacelata* Schurm. saell. II. 419. *P. hypocrateriformis* Flor. dan. *t.* 1558. *f.* 1.

Ad truncos vetustos mucidos nec non ad terram nudam, v. c. Lusatiae rarius. (Albert. et Schw.)

2641. *P. sulcata* Pers., ascomatibus subcarnosulis tenacibus, extus praeter proinam tenerimam laevibus

albido-pallentibus, e stipite obeso farcto lacunoso in discum leviter excavatum fuligineo-pallentem s. nigrescentem sensim dilatatis hypocrateriformibus. — *P. sulcata* Pers. syn. 643. t. 5. f. 1. Alb. et Schw. nisk. 313. Nees syst. f. 290. *E. leucomelas* Pers. myc. (cum lusus disco potius nigrescente.)

In nemoribus patruis et Lusatiae, tam frondosis tam acerosis rarius.

2642. *P. Acetabulum* L., ascomatibus fuligineis tenuiter pruinosis, e stipite brevi fistuloso lacunoso obeso in cupulam pallido-fuscum dein rimosam, extus costis ramosis exaratam dilatatis cyathiformibus. — *P. Acetabulum* L. Bull. t. 485. f. 4. Sowerb. t. 59. Pers. syn. 643. — *Vaill. bot.* t. 13. f. 1.

Ad terram nudam in nemoribus umbrosis, v. c. agri berol. (Gleditsch) et alibi rarius.

2643. *P. Rapulum* Bull., ascomatibus teneris fragilibus insignibus, extus proiuosis ex albo stramineis magis minusve fuscescentibus in discum concavum subsulcinem dilatatis infundibuliformibus, stipite glabriusculo distincto, in basin cubilia penetrantem denuo producto fibrilluloso suffultis. — *P. Rapulum* Bull. t. 485. f. 3. Fr. syst. II. 59. *P. Rapula* Pers. syn. 658. Nees syst. f. 291. *P. radiata* Holmsk.

Ad terram pinguem Hercyn. v. c. superior. (Persoon.)

2644. *P. tuberosa* Bull., ascomatibus tenuibus infundibuliformibus spadiceis expallentibus, extus subtilater pruinosis, stipite gracili flexuoso ex tuberculo difformi nigro intus farinaceo-floccoso albo emergente suffultis. — *P. tuberosa* Bull. t. 485. f. 2. 3. Pers. syn. 644. Alb. et Schw. nisk. 313. cum var. *f. strobilina*, extus farinacea, stipite breviore stricto. Fr. syst. II. 58. *Octospora tuberosa* Hedw. l. l. t. 10. f. B.

In nemoribus umbrosis pratisque uidis rarius.

N.B. In genere tam naturali, aliae complures norae non solum latent omnino, sed quoque aliae dubiae et

aspectae redenot, quae ulteriorem quam exposcant indaginem, hoc loco sub auctorum titulis solum indicantur: *P. viridula* Schrad.; *P. cupula*, *dubia*, *miniata*, *Seminalulum* Batsch; *P. cryptophila* et *nemorosa* Humb. (*P. triquetra* Pers.); *P. marchica* Willd. in Uster. Mag. IV. 14.; *P. Oederi* (*P. marginata* Reh.), *plicata* Pers.; *P. betulina* et *subteres* Alb. et Schw.; *P. rufa* Vibel; *P. stipitata*, *fusco-badia*, *olivascens* (*P. olivacea* Spr.); *P. subulosa* Mong.; *P. epidermidis* Opiz et quae aliae quacunque sunt et in posterum certius innotescunt.

@@ ascis foras profusis.

305. XYLOGRAMMA W. Schriftschorf.

Ascoma primum hypophloeoides, dein erumpens ellipiticum elongatum tenuiter marginatum. Hymenium tenuissimum, excipulo tenuero in marginem tenuato exceptum, humectum tremellussum, dein ascis emersis pulverulentum.

(*Stictis B. Xylographa* et *C. Propolis* Fr. syst. *Hysterii* sp. Pers. *Opegraphae* sp. Achar.) Cum *Hysterium* hypophloeoides et *Opegraphis* analogon genus.

2645. *X. sticticum* W., ascomatibus immersis punctiformibus oblongis nigris, disco tenuato (humectato) fuscamente, labiis convexinsculis succincto. — *Stictis stictica* Fr. syst. II. 197. *Hysterium sticticum* Fr. olim.

Ad ligna sicca passim.

2646. *X. Taxi* W., ascomatibus immersis sparsis utrinque attenuatis subcincereis ligno prominente ciuctis, dein osculo subrotundo liantibus. — *Hysterium Taxi* Pers. syn. 99.

Ad ligna exsiccata Taxi baccatae agri gotting. (Persoon.) Alias complures ligno decorticato sambucino proprias, utpote dubias, consulto omisi.

2647. *X. parallelum* W., ascomatibus longitudinaliter erumpentibus membranaceis, primum clavis oblongis pallide fuscamentibus, dein reclinatis verticeque longitudinaliter liante discum rugulosum nigrescentem

margine elevato integro rufescente cinctum recludentibus, striaeformibus, longitudine et latitudine variis.—*Stictis parallela* Fr. syst. II. 197. *Hysterium abietinum* Pers. obs., syn. 101. *H. parallelum* Wahlenb. lapp. 523. *Opegrapha parallela* Ach. lichen. *Lichen parallelus* Ach. prodr.

Ad ramos decorticatos ventis expositos, salicinos, lignaque quaecunque in locis subhalpestribus vulgare.

2648. *X. album* W., ascomatibus erumpendo-prominulis elongatis immarginatis niveis in discum coavexum farinaceum reclusis. — *Stictis alba* Fr. elench. II. 27. *Sclerotium album* DC. gall. I.

Ad ligna quercina passim.

2649. *X. versicolor* W., ascomatibus carnosis hypophloeodeis pallide fuscis s. carneo-fuscescentibus, mox epidermidem a vertice iude ad ambitum persistentem indurescētem lacero-fissam penetrantibus insculptis gregariis ovatis oblongisque utrinque obtusis plano-convexiusculis, dein discum tenuiter farinosum versicolorem recludentibus. — *Stictis versicolor* Fr. syst. II. 198. *Peziza versicolor* Spr. syst.

a. lacteum, ascomatis disco albo, demum nigrescente. Fr. l. l. *Stictis saligna* Pers. myc. I. 337. *Tremella saligna* Alb. et Schw. 303. t. 9. f. 7. *Hysterium sagineum* Schrad. Pers. syn. praef.

b. aeruginosum, ascomatis disco pulveraceo aeruginoso. — Fr. l. l. *Stictis aeruginosa* Pers. myc. I. l. *Hysterium viride* Fr. obs.

γ. fuscum, ascomatis disco fusco. Fr. l. l. *Stictis Hippocastani* Pers. myc. l. l. *Hysterium pezizoides* Wahlenb. lapp. 523.

Ad ligna exsiccata humecta saginea, betulina, pyrina vel lubentius intra Salices cavas passim.

306. CYCLEDUM W. Schüsselscheibling.

Ascoma orbiculatum carnosum tenax, ex latusculorum reclinazione in discum, hymenio primum tergo deinceps

profusis incuso tenuiterque pulverulento obductum, margine excipuli proprio cinctum, pateiture. Asci connati magni foeti (absque paraphysibus), primum insculpti, dein emergentes.

(*Patellaria* Fr. *Wahlenb.* nec *Hoffm.* et *Wallr.* *Schizoxylon* Pers. *Pezizae* et *Cenangii* sp. auct. *Patella* Chevall. nec *L. Lichenis* sp. *Hedw.*) Cum Lichenibus et nominatim Patellariis nostris analogou genus et praeclarum, Pezizis adhuc, fabricam mycetoideam plane abscondens.

† *sessilia*, ascomatibus ex ipsis cubilibus emergentibus.

2650. *C. Leccideola* IV., ascomatibus sessilibus minutissimis gregariis subcorneis nigris, primum hemisphaericis vertice impressis, dein subsidentibus discum concolorem opacum rugulosum concaviusculum, margine tenui integro cinctum recludentibus. — *Peziza Leccideola* Fr. syst. II. 151.)

Ad lignorum sagineorum et quercinorum frustula hemi jacentia. (Crusta maculaeformis cinerascens, quam *Friesius* huic tribuit, liguum fibrosum est; cf. *Wallr. Naturg. der Flechten* I. 151.

2651. *C. atrum* IV., ascomatibus sessilibus subco riaceis nigris, primum basi appianata subinnatis ovato contractis subnavicularibus, dein magis emergentibus sessilibus orbiculatis in discum opacum rugosum planum, nonnisi tenuiter pruinosum, margine volvato tumidulo concolore (siccando) demum transversim fissili cinctum deplanatis patellaribus, intus cinereis. — *Patellaria atrata* Fr. syst. II. 160. *Patella difformis* Chev. par. 302. *Peziza atrata* Wahlenb. ups. 466. P. *Patellaria* Pers. syn. 670. *Nees syst. f.* 257. *Lichen atratus* Hedw. muse. Fr. II. 61. t. 21. f. A.

Ad ligna putrida, Tiliarum praeprimis et Salicam Thuring. ubertim. Auctumno et hyeme.

2652. *C. spincola* IV., ascomatibus primum hypophloeodeis subglobosis verruciformibus, dein vertice transversam irregulariterque rupto emergentibus discum-

que planum corneum opacum cassio-pulverulentum nigrum, strato intus carnoso atro-sanguineo impositum, margine crenato nitido cinctum recludentibus, demum libere sessilibus scutellaribus. — *Limboria sepincola* Ach. Fr. lichenogr. 456. *Schizoxylon sepincola* Pers. in Moug. et Nestl. vog. n. 174.

Ad ligna antiqua decorticata fraxinea mont. vogesi (Mougeot) et Thuriog. rarius. (Lichenis naturam prorsus tergiversatur, blastematis vestigio allo orbum, habitu quoque Patellariae abietinae exercet.)

†† *stromatica*, ascomatibus ex strato pseudostromatico emergentibus. (Dermea Fr. syst. orb. Cenangii spec. Fr. syst.)

2653. *C. Carpini* W., ascomatibus subcaespitosis exiguis, primum clavis, mox in discum planum carneo-flaventem, margine dilutiore tenuiter farinoso cinctum reclusis, sessilibus patellaribus, strato carnoso primum hypophloeodeo dein epidermidem scissam infarcenti superadditis, verrucas roteundatas mentientibus. — *Ditiola fasciculata* Fr. syst. II. 173. (inter dubias.) *Pezizacarpinea* Ehrh. Pers. syn. 673., myc. I. 312. *Tubicularia fasciculata* Tod. mecl. 20. t. 4. f. 32.

Adramos Carpini Betuli languidos Hercyn. infer. passim.

2654. *C. truncatum* W., ascomatibus subcaespitosis hypophloeodeis, dein erumpentibus atris in discum planum dilatum, margine tenui cinctum reclusis. — *Peziza truncata* Pers. syn. 673., myc. I. 325. Fr. syst. II. 177. nec Rebent.

Ad ramulos fagineos. (Persoon.)

2655. *C. Cerasi* W., ascomatibus primum hypophloeodeis stratoque hypostromatico fulvo-rufescente gromoso, epidermidem fissam infarciendo obliterante exceptis subcaespitosis inque illud nounisi deliquescentibus, primum clavis, dein discum patellarem nigrum rugulosum, margine obtuso tenui concolore stratique rufescens gremio veluti excepto cinctum recludentibus, scutel-

laribus. — *Cendngium Cerasi* Fr. syst. II. 179. *Peziza Cerasi* Pers. syn. 673., myc. I. 329. *Tubercularia Cerasi* Schum. nec non *Sphaeria dubia* Pers. icon. 43. t. 20. f. 1. *Sph. achroa* DC. gall. VI. 125. (ceu monstra ab ascomatibus informandis deliquescentia.)

β . *Padi*, ascomatibus subsolitariis, subtus ferrugineis. Fr. l. l. *Peziza Cerasi* β . Alb. et Schw. nisk. 345. *Sphaeria fallax* Wahlenb. lapp. 522.

Var. u. ad *Pruni Cerasi* ramulos languidos, v. c. Thuringiae passim; β . in *Pruno Pado rarius*.

307. ASCOBOLUS PERS. Schlauchscheidling.

Ascoma subcarnosum, primum globosum excipulo veluti corticatum, dein in discum hymenio ascophoro mox evanido obductum reclasam eoque marginatum. Ascii clavati ampli diluti, sporidiis ovatis uniseriatis, latice exceptis foeti emergentes, elastice dissilientes.

(*Ascobolus* Pers. ex emend. Lk. Fr. *Pezizae* sp. auct.)

† sessiles, ascomatibus sessilibus.

2656. *A. carneus* Pers., ascomatibus sessilibus gregariis minutis carneis s. dilute-vinosis laevibus nudis, primum convexiusculis dein in discum subimmarginatum, ascis plurimi prominentibus demum caducis foetum reclusis, applanatis. — *Ascobolus carneus* Pers. syn. 676. Alb. et Schw. nisk. 348. Fr. syst. II. 165.

Ad firmum vaccinum Lusatiae inferior. (Alb. et Schw.), agri gotting. (Persoon), thuring. (Wallr.), in consortio *A. surfuracei*, at parcus. Aestate.

2657. *A. immersus* Pers., ascomatibus immersis subconicis irregularibus marginatis, ascis emersis inscriptis, extus tenuiter surfuraceis. — *Ascobolus immersus* Pers. obs. I. 35. t. 4. f. 7., syn 677. Nees syst. f. 297. Fr. syst. II. 164.

Ad firmum vaccinum rarius. Auctumno.

2658. *A. testaceus* W., ascomatibus sessilibus coraceo-gelatinosis glaberrimi testaceo-rufescensibus, demum

depressis, disco tenuiter punctulatis. — *Peziza testacea* Moug. in Fr. elcnch. II. 12. nec Pers.

Ad panos putredine exesos talem qualem legi, qui cum hac congruere et cum aliis quibuscumque Pezizis, v. c. cum P. albo-violascente hoc potissimum pertinere videtur.)

2659. *A. pilosus* Fr., ascomatibus minimis granuliformibus fulvo-testaceis gregariis, e basi parce pilosa albida sensim glabrescentibus discum angustum, ascis prominulis decoloribus inscriptum monstrantibus. — *Ascobolus pilosus* Fr. syst. II. 164.

Ad simum capreolinum et caprinum rarius.

2660. *A. glaber* Pers., ascomatibus sessilibus minutis glabris intentibus conicis confertis, primum rubentibus dein spadiceis s. aurantiis, demum convexiuscalis discum marginatum, ascis prominulis inscriptum reincidentibus, senilibus nigrescentibus. — *Ascobolus glaber* Pers. obs. I. 34. t. 4. f. 5., syn. 677. Nees syst. f. 297. Alb. et Schw. nisk. 348. Fr. syst. II. 164.

Ad simum vaccinum passim. Auctumno.

2661. *A. ciliatus* Schm., ascomatibus sessilibus gregariis subhemisphaericis glabris aurantiacis minutis, dein discum planum ascis paucis validis inscriptum, margine tumido ciliato albo cinctum recludentibus. — *Ascobolus ciliatus* Schmidt in Kz. myk. Hf. I. 90. Fr. syst. II. 164.

Ad simum vaccinum in locis uidis rarius. Auctumno.

2662. *A. papillatus* W., ascomatibus carnosis gregariis, extus setis porrectis hyalino, primum in comam congestis torvis sphaericis, dein obconico-turbinatis discum planum angustum, ascis ovalibus pellucidis prominulis inscriptum nitidulum immarginatum setis porrectis rounitum recludentibus, sessilibus dein deplanatis, effloctis tenuiter membranaceis. — *Peziza papillata* Pers. syn. 650. Alb. et Schw. nisk. 321. Nees syst. f. 276. Fr. syst. II. 88.

In similibus cum praecedente locis, nec non in simo

equino. Auctumno. (Asci pellucidi octospori ovales discum demum relinquent omnino saepiusque pilis laterali bus adhaereunt; hinc Ascoboli species acque ac Peziza albo-violaceus. Cf. Fr. elench. II. 16.)

2663. *A. porphyrosporus* Fr., ascomatibus sessilibus gregariis minutis, extus hirtulis lurido-viridibus, primum globoso-conoideis illisque dein rotundato-cupulatis, his subcylindricis, discum e purpura micantem monstrantibus. — *Ascobolus porphyrosporus* Fr. syst. II. 163. *Octospora porph.* Hedw. l. l. II. 25. t. 7. f. A.

Ad stramina fimi veteris equini in agro lipsiens. (Hedwig.) Auctumno.

2664. *A. furfuraceus* Pers., ascomatibus carnosis dilute-fuscescentibus, extus tegmine grumoso-furfuraceo ruguloso pallido-cinereo tectis, primum subglobosis subsessilibus, dein vertice in osculum rotundum hiantibus discumque concavum fuscescentem ascis nigris inscriptum latuscolorumque reclinatorum limbo marginatum informantibus, scutellaribus, mole varis. — *Ascobolus furfuraceus* Pers. obs. I. 33. t. 4. f. 3., syn. 676. Alb. et Schw. nisk. 348. Fr. syst. II. 163. *Peziza fusca* Bolt. fung. t. 109. f. 2. *P. stercoraria* Bull. t. 376. Sowerb. fung. t. 18. *P. atra* Huds. *Elvella fimetaria* Scop.

Ad fimum vaccinum in nemoribus ubertim. Auctumno sero.

†[†] substipitati, lignatiles.

2665. *A. denudatus* Fr., ascomatibus luteo-viridibus glabris breviter stipitatis in cupulam turbinatam planam marginatam, ascis nigricantibus refertam sensim dilatatis. — *Ascobolus denudatus* Fr. syst. II. 162.

Ad ligna pinæ humo obversa Hercyn. super. rariss.

2666. *A. lignatilis* A. et Schw., ascomatibus gregariis sordide lutescentibus, e basi stipitiformi brevi crassiuscula in cupulam planam marginatam, ascis plurimis nigro-puocataam dilatatis. — *Ascobolus lignatilis* Alb. et Schw. nisk. 347. t. 6. f. 6. Fr. syst. II. 162.

Ad ligna pinea subterranea sordibus sparca Lusatiae v. c. superior. (Albertini et Schweiniz.) Auctumno.

2668. BULGARIA FR. Bulgariæ.

Ascoma primum clausum obconicum, extus rugosum, intus glutinoso-pulposum veluti elasticum, mox vertice rupto in discum planum, ascis stipatis deinde emersis foetum, reclusum. Ascii ampli distincti nigri, demum cum sporidiis elastice erumpentes, saepius in paraphyses inaeus intermixtas desciscentes.

(*Ascoboli* sp. *Lk.* Nees. *Pezizar.* *tremelloidearum* sp. *Alb.* et *Schw.* *Tremellae* et *Octosporae* sp. *auct.* *Burcardia* Schmid. nec *Scop.* et *Schreb.* *Polymorphus* Naumburg, nec *Chevall.* *Lycoperdi* sp. *L.*)

2667. *B. fusco-badia* Fr., ascomatibus carnosotremellosis fusco-badiis caespitosis, disco varie impresso. — *Fr. syst. II.* 169. *Peziza fusco-badia* Rebent. neom. 383.

Ad ramos fagineos putres Neomarchiae. (Rebentisch.)

2668. *B. laciniata* W., ascomatibus exiguis carnosulis, extus umbrinis praeter rugas venoso-reticulatas subtilissimas glabris, primum e basi brevi stipitiformi hemisphaericis clausis, dein vertice stellatim scissis discumque pallide-lividum, ascis emersis incusum recludentibus, siccando conniveatibus nigrescentibus. — *Phacidium laciniatum* Fr. et Léch. *II.* 132. *Peziza laciniata* Alb. et Schw. nisk. 333. t. 7. f. 8.

Ad folia (salicina v. c. et alnea) aliasque quisquiliis locis uidis putrescentes, Lusatiae. (Albert. et Schweiniz.) (Aacorum emersorum et sumi instar secedentium ratione hoc retuli.)

2669. *B. Clavus* W., ascomatibus carnosotremellosis firmulis gregariis, extus glabris e viola debili pallentibus, e basi stipitiformi crassa obconica, dein in discum livido-violaceum immarginatum convexiusculum dilatatis pileatis. — *Peziza Clavus* Alb. et Schw. nisk. t. 306. f. 11. f. 5. *Fr. syst. II.* 137. *Pers. myc. I.* 322.

Ad folia putrida locis uidis delapsa, Lusatiae v. c.
(Albertini et Schweinitz). Vere, rarius.

2670. *B. sarcoides* Fr., ascomatibus gregariis subcaespitosis carnosο-tremellosis tenacibus incarnato-rubris majusculis, extus glabris subvenosis, subturbinatis valde polymorphis, saepius figurās amorphas adficentibus, vertice demum in discum concolorēm dilatatis. — *Bulgaria sarcoides* Fr. syst. II. 168. *P. sarcoides* Pers. syn. 633. Alb. et Schw. nisk. 305. Pers. myc. I. 320., (quo loco plures var. sigillatim describuntur.) *P. metamorpha* Schum. saell. II. 414. pr. pr. *P. carnosa* Flor. dan. t. 1017. f. 1. *P. turbinata* Flor. dan. t. 1017. Pers. syn. 634. *Otospora carneae* Hedw. L. L. t. 7. f. 1. *B. Peziza porphyria* Batsch elench. f. 53. *Merulius violaceus* Flor. dan. t. 655. f. 3. *P. tremelloides* Bull. t. 410. *Helvella sarcoides* Bolt. t. 101. *Elvella purpurea* Schaeff. t. 323. 324. *Lichen sarcoides* Jacq. misc. II. t. 22.

Ad caudices arborum, Quercuum praeprimis et Alnorum putrescentes ubertim, mira figuræ mutabilitate fastidiens. Auctumno et hyeme vulgaris.

2671. *B. pura* Fr., ascomatibus molliter tremellosis laevibus carneo-pallidis, primum obconicis dein tenuatis expansis irregulariter repandis, marginem revolventibus. — *Bulgaria pura* Fr. syst. II. 168. *Peziza pura* Pers. obs. I. 40., myc. I. 320.

Ad caudices abietinos patres, v. c. Hercyn. superior. (Persoon.) Auctumno. (Vix a sequente diversa.)

2672. *B. inquinans* Fr., ascomatibus stipato-pulposis elasticis, extus rugulosis tenuiter surfuraceis umbrinis, intus venoso-marmoratis dilutioribus, primum e basi insculpta obovatis clausis, mox turbinatis vertice in discum sensim dilatatum plano-convexiusculum marginatum, ascis profusis inquinantibus nigris tectum reclasis latusculisque reclinatis subsidentibus. — *Bulgaria inquinans* Fr. syst. II. 167. *Ascobolus inquinans* Nees syst. f. 296. *Peziza inquinans* Pers. syn. 631. *P. infundibuliformis* Hoffm. veget. cr. II. t. 6. f. 2. *P. nigra* Bull.

t. 460. *Sowerb.* t. 428. *Octospora elastica Hedw.* l. l.
 t. 6. f. 5. *Burcardia turbinata Schmid.* anal. t. 70. *Polyorphus tremelloides Naumb.* *Pez. brunnea Batsch*
elench. f. 50. *Elvella pulla Schaeff.* t. 158. *Tremella turbinata Huds.* *Tr. agaricoides Retz.* *Pez. polymorpha Flor.* dan. t. 464.

Ad trunco caeos, *Quercus potissimum*, *Alnus et Fagus*, *Hyades praenotana*, ubertim. *Hyeme*.

2673. *B. globosa Fr.*, ascomatibus globosis, basi sequali parce fibrillosa leviter adfixis, extus longitudinaliter plicatis transversimque rugosis sericeo-mollibus minutissimeque papulosis umbrinis, intus pulposis, dein vertice in discum concavo-plauisculum atrum reclusis. — *B. globosa Fr.* l. l. *Peziza Burcardia Pers. myc. I.* 632. *Ascobolus Burcardia Mart. ert. 471.* *Burcardia globosa Schmid. anal. t. 69.* *Lycoperdon truncatum L. syst.*

In pinetis humidis ad terram argillaceam agri erlangens. fere solum a *Schmidelio* anno 1755 detecta.

309. CYPHELLA FR. Becherscheibling.

Ascoma tenuiter membranaceum concavum, e basi brevi obliquatum subcernuum, intus membranola tenua, sporidiis globoisis majusculis liberis suffusa vestitum, demum hinc lacero-hians hymeniumque inferuci veluti mentiens.

2674. *C. muscicola Fr.*, ascomatibus gregariis tenuerrimis fragilibus subsessilibus albido-pallentibus, primum integris urceolatis dein magis dilatatis cernuis, extus glabriuscilia fibroso-striatis, denique lacero-repandis, hymenium dilute-fuscescens pruinosum explanantibus. — *Cyphelia muscicola Fr. syst. II.* 202.

α. cinerea, ascom. extus cinereis, intus albidis. *C. muscicola β. inaequilatera Fr. l. l. Peziza inaequilatera Schum. saec. II.* 421.

β. lutescens, ascom. extus albicantibus, intus ochraceo-lutescentibus. *Fr. l. l. Thelephora lutescens Pers. myc. I.* 116.

Ad Muscos, paeprimis Neckerae curtipendulam. Autumno passim suisque locis.

2675. *C. lacera* Fr., ascomatibus membranaceis exiguis erectiusculis campanulatis, colore et superficie variis, intus rugoso-venosis, demum multifido-laceris. — *C. lacera* Fr. l. l. 202. *Peziza membranacea* Alb. et Schw. nisk. 316. t. 1. f. 5. *P. lacera* Pers. myc. I. 280. sec 227.

Ad sarmenta aliasque quisquiliis humo putrescentes passim. (Ascomatibus variis, nunc intus albidis, extus cum stipite brevi ciuereo-nigricantibus, fibrillulis adpresso nigricantibus striatulis, nunc luevibus omnino, e basi crassiore obconicis albo-glaucoscentibus minus laceris, nunc dilute flaventibus promiscue redit.)

2676. *C. Digitalis* Fr., ascomatibus subpapyraceis, e basi stipitiformi obliquo-gibba in cupulam primum clausam, mox apertam subventricosam pendulam, digitaliformem, extus fibrillosam umbriam, intus albido-caesiam farinosam dilatatis. — *C. Digitalis* Fr. l. l. *Peziza Digitalis* Alb. et Schw. nisk. 315. t. 5. f. 1.

Ad truncos abietinos et pineos passim.

810. VOLETELLA TODE. Wulstscheibling.

Ascoma hypocrateriforme stipitatum coriaceum, margine revolutum apertum, velo partiali tectum, intus repleta unguinosa, in resinam coagulanda communenda farctum. *Tode meclb.* I. 28. *Fr. syst.* II. 172. — Genus inquirendum neque *Friesio* neque mihi notum, incerti loci, habitu ad *Tympania* vergens.

2677. *V. volvata* Tode l. l. t. 5. f. 43. *V. nuda* Fr. l. l.

Ad ramulos languentes Pruni spinosae, tempore pluvio in agro mecklenburg. (*Tode.*) Autumno. (Sparsa, colore albo, fulvescente, demum flavo-fusco. Cupula linea minor, formam hypocrateris cum patellae, demum permutat. Velum candidum dissiliens. Hymenium cerati-

primo consistentia, obdurescens, dein facie placentae resinosa, coloris fusco-nigrescentis, e cupula palam excutitur modoque plane ignoto comminutum disparet. Tode.
Fr. l. l.)

B. gymnospori, ascomatibus sessilibus stipitatis-
ve, colore, substantia, mole et figura perquam variis,
membranulam ascophoram effusam immarginatam gliscendo
faciemque alteram utram sensim informando et expandendo,
ascis variis magis minusve perfectis, innatis s.
immersis vestitam ex prona s. supina pagina monstran-
tibus et informantibus.

(*Fungi hymenomycetes tremellini*, *uterini* et *hymenini*
Fr. *F. clavati*, *pileati*, *ramigeri*, *mitrati* et *pistillares*
Nees. Mart.)

a. *peridochii*, ascomatibus figura variis, rarius
amorphis omnino, nunc tremellino-gelatinosis, siccando in
membranam corneam contabescuntibus, nunc molliter car-
nosis membranaceis, sessilibus stipitatisve, praeter sti-
pitem sterilem distinctum, ad reliquas et pruesertim ex-
tremas partes hymenium superficiale immarginatum te-
nerum circumducentibus.

a. *amorphi*, ascomatibus erumpentibus dein liberis, hu-
mectis tremellino-gelatinosis tenacellis s. lubricis, siccis
corneo-membranaceis, ex aqua denuo reviviscentibus, ut
plurimum a figura rata aberrantibus, veluti amorphis, e
forma globosa, taeniata foliacave magis minusve ex-
pansis, extus saepius gyris exaratis. (*Fungi tremel-
lini Fr.*)

311. MYXOMPHALOS W. Schleimträger.

Ascoma gelatinosum punctiforme plano-convexuscu-
lum, ascis globosis saturioribus minutissimis cum pulpa
circumflua coactis undique farctum.

2678. *M. guttatus* W., ascomatibus sparsis puncti-
formibus, e basi depressa subrotundo-ellusa convexiuscu-

lis umboatis mammillaribus livido-nigris, guttulam coactam veluti mentientibus.

Ad ligoa quercia decorticata v. c. Hercyn. inferior. passim. Auctumuo.

312. PERIOLA FR. Kappenträger.

Ascoma varium sessile arrizum, intus solidum carno-so-gelatinosum, extus villo persistente cum sporidiis obsoletis interspersis vestitum eoque veluti corticatum.

(*Periola Fr. Sclerotii sp. auct.*) — Vegetabilia ampli-bola, nondum rite perspecta, habita Sclerotii, substantia sere Tremellae.

2679. *P. hirsuta* Fr., ascomatibus sparsis subrotundis pulvinatis subturbinate, extus hirsutis ochro-leucis, basin versus umbrinis, intus carno-so-gelatinosis pallidioribus. — *Periola hirsuta* Fr. syst. II. 266. *Sclerotium hirsutum* Schum. saell. II. 187. *Flor. dan.* t. 1320.

Ad Rhizomorpham subcorticalē truncos exesos undas perreptantem rarius, sero auctummo.

2680. *P. furfuracea* Fr., ascomatibus hemisphaericis sessilibus inconditis, extus testaceo-furfuraceis, intus carno-so-gelatinosis nigrescentibus, siccando coactis. *Periola furfuracea* Fr. elench. II. 46.

Ad poma in straminibus putrescentia, v. c. Thuring. (Wallr.) Hyeme. (Cautio, si quidem differt, a *Sclerotio pyrino* Nees (cf. fl. cr. II. 138.) dignoscendum, quod Friesio auctore hanc speciem sistit.)

2681. *P. tomentosa* Fr., ascomatibus sparsis conglomeratisque rotundatis albis saepius difformibus, extus tomentosis, intus subcarnosis coactis pallidioribus. — *Periola tomentosa* Fr. syst. II. 267. *Sclerotium tomentosum* Fr. obs. I. 205. an quoque Tod. mecl.

Ad tubera Solani tuberosi et Daucos Carotas hyeme in cellis putrescentes, in consortio Sclerotii variii Pers., pro cuius iactiis junioribus illud dia habui.

818. AGYRIUM FR. Glatzenfräger.

Ascoma compactum, humectum gelatinosum, siccando ceraceo-coactum, inuato-sessile laeve undique glabrum ascophorum, extus dein in sporidia fatiscens.

(*Stictis et Tuberculariae s. auct.*) Generis notio parum constat ejusque cives *Friesio* auctore laudati, tum *Tubercularias* tum *Sphaeriarum stromaticarum* initia, in phymata desciscentia referre plane videntur.

2682. *A. herbarum* Fr., ascomatibus gregariis exquis irregularibus planiusculis laevibus rufo-fuscis, intus albentibus, siccando nigrescentibus. — *Agyrium Herbarum* Fr. syst. II. 233. *Tremella Stictis* Alb. et Schw. nisk. 304.

Ad caules herbarum elatiorum, hyeme, passim.

2683. *A. nigricans* Fr., ascomatibus gregariis adnatis subrotundis convexis; dein rugulosis confluentibus fuligineo-nigricantibus. — *Agyrium nigricans* Fr. L. L. *Tubercularia nigricans* Spr. syst. IV. 565.

Ad ligna putrida, quercina et tiliacea, in quibus quidem saepius ascomata minora et subsphaerica occurunt. Hyeme.

2684. *A. rufum* Fr., ascomatibus punctiformibus, e basi applanata innata sphaericis, halone albicante saepius cinctis, humectis incarvatis, siccis compactis rufo-fuscis. — *A. rufum* Fr. syst. II. 232., etenach. II. 37. Grev. scot. t. 232. *Tubercularia rufa* Spr. t. l. *Stictis rufa* Pers. obs. II. 74. t. 6. f. 6. *Tremella Stictis* Pers. syn. 628. *Lichen hyloicus* Ach. prodr.

Ad ligna abietina et pinea vetusta, vulgare.

2685. *A. caesium* Fr., ascomatibus punctiformibus gregariis convexis albido-caesiis, humectis molibus pellucidis, siccis indurescentibus. — *A. caesium* Fr. syst. t. l. ?*Aegerita caesia* Pers. syn. 635.

Ad ligna vetusta decorticata passim.

314. DACRYMYCES NEES. *Tropfenpilz.*

Ascoma guttatum erumpens glaberrimum sessile rotundatum, ex floccis assurgentibus sporophoris in massam carnoso-gelatinosam conformem coactis, demum deliquescentes.

2686. *D. Syringae Fr.*, ascomatibus orbicularibus subtuberculosis minutis aurantio-rubris, basi stipitiformi brevissimi suffultis. — *Dacrym. Syringae Fr. syst. II. 230. Tremella Syringae Schum. saec. II. 440.*

Ad ramos Syringae languidos passim. Hyeme.

2687. *D. tortus Fr.*, ascomatibus laevibus lutescentibus, e basi tereti cibilibus insculpta in verticem subrotundum convexiusculum immarginatum dilatatis subturbinatis, demum luteo-fusca tortis hyalinis. — *Dacrymyces tortus Fr. elench. II. 36. D. stillatus auct. ipsiusq. Neesii pr. pr. Tremella torta Willd. in bot. Mag. IV. 182.*

Ad ligna putrida pioea, exente hyeme, frequens.

2688. *D. roseus Fr.*, ascomatibus minutissimis molibus roseis immarginatis, vertice impressis cupuliformibus. — *Dacrymyces roseus Fr. elench. II. 35.*

Ad Jungermanniam byssaceam senio confectam, v. c. in monte vogeso. (Mougeot.)

2689. *D. stillatus Nees*, ascomatibus gregariis subconfluentibus polymorphis aureo-lutescentibus, siccando corneis aurantio-rubentibus, basi infixa cubilia penetrantibus pezizoideis, primum sphaericis, dein obconicis convexis. — *D. stillatus Nees syst. 89. f. 90. Fr. syst. II. 230. Tremella spincola Willd. t. I. Tr. abietina Pers. obs. Alb. et Schw. 304. Tr. deliquescens Bull. t. 455. f. 3. Rebent. neom. 284. Tr. miliaria Schrank.*

f. lutescens, ascomatibus tenuibus nitidis, siccando fuscescentibus. *Fr. t. I. Tremella lacrymalis Pers. syn. 628.*

Ad ligna abietiva et pinea fabrefacta putredini uiae subjecta frequens. Hyeme.

2690. *D. violaceus Fr.*, ascomatibus erumpentibus

gregariis minatis compactis gyrosis pallide-violaceis, siccando nigrescentibus. — D. violaceus Fr. l. l. Tremella violacea Relh. Pers. syn. 623.

Ad truncos Pyri et Mali patres, hyeme, rarius.

2691. *D. fragiformis* Nees, ascomatibus subcompactis rotundis rubentibus, extus plicis confertis lobatis exaratis, intus pallescentibus. — *D. fragiformis* Nees l. l. Fr. syst. l. l. *Tremella fragiformis* Pers. syn. 622., icon. t. 10. f. 1.

$\beta.$ *carpinea*, ascom. minoribus, oblongis. Fr. l. l. Tr. fragif. $\beta.$ *carpinea* Alb. et Schw. nisk. 301.

Ad cortices pineos, $\beta.$ *carpinea*, rarius. Vere.

315. NAEMATELIA FR. Kernling.

Ascoma gelatinosum glabrum amorphum pulvinatum plicato-gyrosum, extus undique sporidiis minutissimis simplicibus dein emersis foetum, intus corpusculo nucleiformi carnososo coacto durinasculo dissimili suorum.

(*Naematelia* Fr. *Tremellae* sp. Nees Spr. Willd. Pers. *Encephalium* Lk.) Genus anceps, ascomatis foras sporophori indole ad Tremellas, corpusculo nucleiformi inditi figuraione ad Myxarium meum (cr. II. 260) revergens.

2692. *N. rubiformis* Fr., ascomatibus subaesaliibus orbicularibus depressis gyrosis luteo-aurantiacis. *N. rubiformis* Fr. syst. II. 228. *Encephalium aurantiacum* Link. *Tremella encephaloides et alutacea* Schum. saec. II. 438.

Ad virgas humi jacentes putrescentes, hyeme.

2693. *N. encephala* Fr., ascomatibus subsessilibus solitariis pulvinato-difformibus crassiusculis pulposo-gelatinosis carneo-pallentibus, corpusculum album graniforme hinc saepius productum soventibus, siccaudo fuscescentibus. — *N. encephala* Fr. syst. II. 227. *Tremella encephaliformis* Willd. l. l. t. 4. f. 14. Alb. et Schw. nisk. 301. Pers. myc. I. 98.

Ad truncos pineos et abietinos dejectos. Vere.

316. HYMENULA FR. Häutling.

Ascoma epiphloecodes applanatum laeve tenuatum determinatum, humidum molle subgelatinosum, siccum coriaceum inconditum, extus ascis imperfectis s. sporidiis foetum.

(*Hymenula Fr. elench. Hymenella Fr. syst. Tremellae leiodermatinae Pers. myc.*)

2694. *H. umbilicata* Fr., ascomatibus humectis tremellosis orbicularibus atris opacis submargiatis, centro umbilicatis. *Hymenula umbilicata* Fr. elench. II. 37. *Peziza umbilicata* Pers. myc. I. 323.

Ad caules sicos Gentianae luteae in summis m. vogesi jugis. (Mougeot.)

2695. *H. Arundinis* Fr., ascomatibus subrotundis majusculis nigrescentibus, dein effusis interruptis subrimosis. — *Hymenella Arundinis* Fr. l. l.

Ad culmos Arundinis Phragmitis putres. Vere.

2696. *H. Georginae* W., ascomatibus effusis, via sebaceo-aquosis, dein sordide violaceis, denique nigrescentibus membranaceo-expansis arcte adnatis.

Ad caules putres Georginae hort. northus. Vere.

2697. *H. areolata* W., ascomatibus primum effusis continuis tenuissimis, vivis tremellinis nigro-fuscis, dein areolato-rimosis, areolis e figura subrotunda multangulaque polymorphis, patellas adpressas parce marginatas mentientibus nigricantibus.

Ad virgas salicinas decorticatas Thuring. Vere.

317. TREMELLA DILL. Gallertschwamm.

Ascoma gelatinosum pulposo-fluxile conforme subpellucidum glabrum multifloriter lobato-plicatum, intus vesiculoso-cellulosum, extus sporidiis minutissimis globosis, dein emersis foetum iisque superfusum, siccando contubescens, (ex aqua denuo reviviscens.)

\ddagger cerebrinae, ascomatibus plicatis polymorphis, foetis demum ex sporidiis profusis tenuiter pruinosis.

2698. *Tr. disciformis* Fr., ascomatibus erumpentibus subcompactis epidermidem acissam insarcientibus subrotundo-deplanatis albido-iucarnatis glaberrimis, dein rugosis nigrescentibus tenuiter pruinosis. — *Tremella disciformis* Fr. syst. II. 216.

Ad ramulos, praeprimis tiliaceos putres. Hyeme.

2699. *Tr. indecorata* Sommerf., ascomatibus erumpentibus rotundis duris, dein convexis plicatis tumidis opacis nigro-fuscis, ex sporidiis emersis livido-fuscescenscentibus. — *Tr. indecorata* Sommerf. lapp. 306. Fr. clench. II. 33. *Tr. populina* Moug. *Tr. episphaeria* Chaill. in lit.

Ad ramos populinos languidos German. australis et borealis, rarius. Auct.

2700. *Tr. albida* Huds., ascomatibus hypo-s. epiphloeoideis, primum compactis subrotundis, dein expansis tenacibus undulato-gyrosis amorphis ex albo hyalinis, dein candido-pruinosis, siccando callosis fusco-nigrescentibus. — *Tremella albida* Huds. angl. II. 565. Fr. syst. II. 215. Engl. bot. t. 2117. *Tr. cerebrina alba* Bull. t. 386. f. A. *Tr. candida* Pers. syn. 624. Alb. et Schw. nisk. 302. cum var. *effusa* et *applanata*.

Ad ramos, praeprimis fraxineos et populeos. Vere.

2701. *Tr. mesenterica* Jacq., ascomatibus adscendentibus subtenaciter pulposis plicato-undulatis aurantiacis, e figura auriculari phylloide subclavataque variis, valde polymorphis, foetis extus sporidiis flavis emersis inquinantibus superfusis. — *Tr. mesenterica* Jacq. misc. I. 142. t. 13. Pers. syn. 622. Nees syst. f. 142. Fr. syst. II. 214. *Tr. auriformis* Hoffm. veg. cr. I. 31. t. 6. f. 4. *Tr. juniperina* Huds. *Elvella mesenterica* Schaeff. t. 168. — *Flor. dan.* t. 885.

Ad caudices ramosque humi jacentes et putrescentes, hyeme et vere vulgaris.

*++ mesentericae, ascomatibus caespitosis lobatis, ex-
tus sporidia magis constipata monstrantibus, siccando
subcartagineis.*

2702. *Tr. lutescens Pers.*, ascomatibus erumpen-
tibus coactis subcaespitosia gyroso-plicatis ovidis luteis,
dein undulatis mollioribus flexis dilutius lutescentibus.
— *Tr. lutescens Pers. syn. 622. Fr. syst. II. 213. Tr.
mesenterica Bull. t. 406., β. lutescens Pers. myc. 100.
Tr. mesenteriformis DC. gall. II. 92. excl. var. γ. δ.
Vaill. bot. t. 14. f. 4.*

Ad ramos dejectos arborum frondosarum ipsaque ligna
fabrefacta, auctumno pluvio satis vulgaris, ex aetate ve-
ro et tempestatis conditione satis mutabilis.

2703. *Tr. foliacea Pers.*, ascomatibus diaphanis un-
dulato-plicatis speciosis, e basi connata sulcata subcae-
spitosis integerrimis cinnamomeo-carneis laevibus. —
Tr. foliacea Pers. syn. 626. Fr. syst. II. 213.

β. succina, ascom. tenuioribus pellucidis fucescenti-
succinis. *Tr. succina Pers. myc. I. 101.*

γ. violascens, ascom. exiguis purpureo-violaceis. *Alb.
et Schw. nisk. 303.*

Ad caudices putres abietinos aeque ac quercinos et
alneos passim. Auctumno. (Praeter alias plures exsic-
catas, *Tr. mutabilis* nomine servo speciem, in vivis de-
duo indagaudam, colore atygio sordido insignem.)

2704. *Tr. frondosa Fr.*, ascomatibus liberis, e basi
obesa plicata caespitosia, in lobos gyroso-undulatos im-
plexis maximis laevibus luteo-pallentibus, homecis pul-
poso-lubricis, siccis coriaceis sequacibus, demum satu-
ratiobus. — *Tr. frondosa Fr. syst. II. 212. Tr. pul-
posa Wallr. in lit. 1815.*

Ad candices fagineos agri hering, Thuring. auctumno
udo passim.

2705. *Tr. fimbriata Pers.*, ascomatibus maximis,
e basi implexa corrugata caespitosis erectis in lobos mar-
gine iucisos undulato-fimbriatos divulsis flaccidis fuligi-

neo-purpureo que nigrescentibus. — Tr. fimbriata Pers.
syn. 626. Fr. syst. II. 212. Tr. tinctoria Pers. L. L. Tr.
verticalis Bull. t. 272.

β. undulata, ascom. purpureo-nigrescentibus. *Fr. l. L.*
Tr. undulata Hoffm. veg. crypt. I. t. 7. f. 1. Pers. l. L.

Ad caudices ramosque arborum frondosarum, aliosque potissimum. Auctumno, (Ex aqua iterum reviviscit eamque colore saturatius fulvo tingere solet.)

γ. clavati, ascomatibus e stipite sterili suffulcante
 in clavulam subcylindricam simplicem s. in ramos divulsam desinentibus, ad extremitates ascis sublinearibus foetis.

(*Hymenomycetum ordo II. elevati Fr. Fungi claviformes et helvelloidei Pers. pr. pr. F. clavati Dill. Nees.*
Clavariae typhulae A. et Schw. Clavariae sp. L.)

δ. corynoidei, ascomatibus simplicibus pistillari-clavatis, nisi ramos redintegrandi insignibus.

318. PISTILLARIA FR. *Pistillträger.*

Ascoma simplicissimum ovato-cylindricum gracile cum
 stipite sensim confusus, apicem versus hymenio concreto
 obsolete sporophoro foetum.

(*Pistillaria Fr. Clavariae sp. auct. Phacorrhiza Pers.*
syst. 198.)

2706. *P. pusilla* Fr., ascomatibus minimis gregariis linearibus glaberrimis albis, siccando pallentibus. — *Pistillaria pusilla* Fr. *syst. I. 498. Clavaria pusilla Pers. sp. 86. t. 3. f. 6., syn. 605. Atb. et Schw. 292.*

Ad folia sicca Betulae in locis uidis rarius. Auctumno sero.

2707. *P. muscicola* Fr., ascomatibus e basi fibrilosa dilatata in clavulam filiformem obtusam glabram album sensim desinentibus. — *Pistillaria muscicola* Fr. *I. L.*
Clavaria muscicola Pers. II. 60. t. 3. f. 2., syn. 606. Nees syst. f. 154.

Inter muscos terrestres in locis umbrosis litosis,
 Leskeam polyantham potissimum occupans.

2708. *P. quisquiliaris* Fr., ascomatibus e basi stipitiformi sensim in clavulam ovato-oblongam concolorum albam glabram sensim incrassatis. — *P. quisquiliaris* Fr. L. l. *P. obtusa* Dub. gall. II. 761.

Ad stipites Pteridis aquilinas putres rarius.

2709. *P. ovata* Fr., ascomatibus e stipite brevissimo pellucido distincto in clavulam obovatam candidam subcompressam conformem, ex sporidiis adspersis pruinosaem desinentibus. — *P. ovata* Fr. L. l. *Clavaria ovata* Pers. syn. 605. *Cl. pusilla* Sw.

Ad quisquilias herbaceas patres passim. Ver.

2710. *P. micans* Fr., ascomatibus e stipite brevi albidente pellucido subcorneo in clavulam obovatam obtusam, ex sporidiis adspersis dilute roseam desinentibus. — *P. micans* Fr. L. *Stibium micans* Pers. myc. I. 355. *?Sclerotium lactum* Ehrenb. berol. 27. t. 3. f. 2. Wallr. crypt. II. 140. *Clavaria micans* Pers. syn. 604.

Ad caules herbarum elatiorum putres passim. (Cant ab Acrospermo compresso dignoscenda.)

319. TYPHULA FR. Kolbensträger.

Ascoma carnosum subcylindricum, stipite discreto filiformi tenacello suffultum, superne in clavulam undique sporophoram desinens.

(*Clavariae* sp. auct. *Cl. stipite elongato, tuberculo radicali insidente* Pers. myc.)

2711. *T. villosa* Fr., ascomatibus simplicibus e stipite glabro rubente-badio in clavulam obovatam turgidam pallidam villosulam albidam desinentibus. — *Typhula villosa* Fr. syst. I. 495. *Clavaria villosa* Schum. *Cl. capillaris* Holmsk.

Ad folia putres, alnea praepritinis, rarissime.

2712. *T. erythropus* Pers., ascomatibus simplicibus exiguis, e stipite erecto subcorneo parce pubescente stricto atro-rubente, saepius ex tuberculo scleratiforme

matricali succrescente in clavulam glabram albam cylindricam desinentibus. — *Typhula erythropus* Fr. l. l. *Clavaria (Typhula) erythropus* Pers. syn. 606. t. 3. f. 14. *Phacorrhiza erythr.* Grev. scot. t. 43. *Cl. gyrans* Bolt. t. 112. nec Batsch.

Inter folia putria rarius. Auctumno sero.

2713. T. *Phacorrhiza* Fr., ascomatibus simplicibus e stipite fuscescente parce pubescente (tuberculo sclerotiformi firmo s. obtecto superaddito) in clavulam linearis-subulatam glabram albam desinente. — *Typhula Phac.* Fr. syst. I. 495. *Phacorrhiza filiformis* Grev. scot. t. 93. *Clavaria filamentosa* Wallr. in lit. C. *Rhacorrhiza* Pers. myc. I. 192.

Ad terram hortorum nudam post imbras copiosos, nec non ad folia decidua in locis uidis (var. *epiphylla* Alb. et Schw.), at parcins.

2714. T. *gyrans* Fr., ascomatibus simplicibus, e stipite tenerimo flexuoso tenuiter pubente, ex tuberculo sclerotiformi oblongo fusco assurgente in clavulam albam filiformem desineatibus. — *Typhula gyrans* Fr. syst. I. 494. Ehrenb. sylv. 18. *Clavaria gyrans* Batsch cont. II. f. 194. Pers. syn. 606., myc. I. 191. Alb. et Schw. nissk. 292. *Cl. setipes* Grev. scot. t. 49. (ceu forma tuberculo destituta.) *Cl. granulata* Willd. berol. 705. t. 7. f. 17. Pers. I. l.

Ad folia decidua, alnea potissimum et stipites arescentes quoquaque, passim. Auctumno.

2715. T. *Todei* Fr., ascomatibus simplicibus e stipite elongato capillari glabro albo clavulam sublinearem flavam emittentibus. — *T. Todei* Fr. syst. I. 494. *T. filicina* Dub. gall. II. 760. *Clavaria chordostyla* Pers. myc. I. 189. *Cl. filicina* Pers. l. l. *Mitrula Todei* Fr. obs. I. 160. *Chordostylum Clavaria* Tod. mecl. I. 37. t. 6. f. 55.

Ad caules herbarum elatiorum petrescentes et ad stipites filicinos passim.

320. GEOGLOSSUM PERS. Zungenfräger.

Ascoma clavaeforme erectum laevigatum hymenio undique aequaliterque ascophoro obductum, cum stipite sterili confluens. Asci elongati catenulati disjuncti.

(*Geoglossum Pers. Lk. Nees. Fr. Fungi ophioglossoidei auct. vet.*) Vegetabilia Clavariae adfinia, colore tristri tamen et ascorum dispositione aliena.

2716. *G. carneum* Schultz, ascomatibus compressis gracilibus carneis, stipite dilutiore. — Schultz starg. 486. Fr. syst. I. 490.

Ad vias sylvaticas in solo argillaceo agri stargard. (Schultz.) (Melius forsan pro Clavaria qualicunque ignobilis sumendum.)

2717. *G. viscosum* Pers., ascomatibus gracilibus viscosis tenuissime velutinis nigris, e stipite dilutiore sensim in clavulam teretem leviter incrassatis. — *Geoglossum viscosum* Pers. comm. 39., syn. 609. Fr. syst. I. 489.

In promontoriiis graminosis passim. Auctumno.

2718. *G. viride* Pers., ascomatibus subsaccularibus subunguinosis olivaceo-viridibus, e stipite tereti dilutiore squamuoso-rugoso sensim in clavam cylindricam obtusam simplicem partitamve aëneo-virentem desinentibus. — *Geoglossum viride* Pers. comm. 40., syn. 610. *Ditmar in Sturm germ.* t. 48. Fr. syst. I. 489. Nees syst. f. 158. (*lusus gracilior.*) *G. glutinosum* Nees syst. f. 149. (*t. ascomatibus solito magis unguinosis.*) *G. aeruginosum* Kz. et Schm. myk. Hft. I. 104. (var. *ascum. viridi-lutescente, siccando expallente.*) *G. atro-virens* Kz. et Schm. I. I. (var. *atro-virens subcoeruleescens.*) *G. mitratum viride* Holmsk. *Clavaria viridis* Schrad. Wallr. ann. bot. 154. *Flor. dan.* t. 1258. f. 1. *Cl. serpentina* Müll.

In promontoriiis sylvaticis pinguibus et adis, pro varia loci conditione, molem et proceritatem augens diminuens-
vo et colorem mutans. Auctumno.

2719. *G. olivaceum* Pers., ascomatibus glaberrimis nitidis olivaceo-fuligineis, e basi incrassata in clavam compressam obtusam sensim desinentibus, demum nigro-virentibus. — *O. oliraceum* Pers. obs. 40. t. 5. f. 7., syn. 610. Fr. syst. I. 489.

In similibus cum reliquis locis at parcios. Auctumno.

2720. *G. glutinosum* Pers., ascomatibus glabris e stipite glutinoso spadiceo-nigricante in clavulum lanceolatum nigrum viscidulam desinentibus. — *G. glutinosum* Pers. et Fr. t. l.

In vallibus promontor. nostratum udis. Auct.

2721. *G. difforme* Fr., ascomatibus glabris subgregariis fuscis, e basi brevi dilutiore sensim in clavam compressam conico-pyramidalam saturatiorem abeuntibus. *G. difforme* Fr. t. l. *G. pruniforme* Wallr. in lit.

In promont. graminosis Thuring. v. c. circa Heringham, quo loco omnes inter se promiscue redent. Auct.

2722. *G. glabrum* Pers., ascomatibus glabris subcaespitosis, e basi squamuosa inferne dilutiore sensim in clavam spadiceo-nigrum desinentibus. — *G. glabrum* Pers. et Fr. t. l. *Clavaria nigrita* Schl. Cl. ophinglosoides L. Bull.t. 372. Bolt. t. 111. f. 2. Flor. dan. t. 1076. f. 2. — *Mich.* t. 87. f. 4. *Vaill.* bot. t. 7. f. 3.

In similibus locis. Auctumno.

2723. *G. sphagnophilum* Ehrenb., ascomatibus glabris e basi tereti elongata atro-purpurea in clavulum olivaceo-atram desuentibus. — *G. glabrum d. sphagnophilum* Ehrenb. sylv. 30.

In sphagocetis egri berol. (Ehrenberg.)

2724. *G. atro-purpureum* Pers., ascomatibus glabris atro-purpureis, e basi squamuosa crassa in clavam teretiusculam s. compressam, demum ventricosam difformem desuentibus. — *G. atro-purpureum* Pers. obs. II. t. 3. f. 5., syn. 609. Alb. et Schw. 294. Fr. syst. I. 490. *G. purpurascens* Pers. comm. Cl. mitrata Holmsk. Cl. atro-purpurea Batsch clench. f. 47.

In collibus graminosis rarius. Auctumno.

2725. *G. hirsutum* Pers., ascomatibus subfasciculatis nigris, pilis brevibus densis patentibus undique hirsutis, e basi stipitiformi elata in clavum capitatum abrupte s. sensim incrassatis, subrotundis elongatisque. — *G. hirsutum* Pers. syn. 608. Nees syst. f. 157. *G. capitatum* Pers. et auct. I. Grev. scot. t. 185. Fr. syst. I. 488. *Clavaria atra* Schrad. Cl. ophioglossoides Schmid. icon. t. 25. Schaeff. bac. t. 327.

In promontorii udis arenosis, in consortio Gentianae Amarellaee passim. Auctumno.

b. *pterygoidei*, ascomatibus e stipite nervoso in expansiones alares dilatatis.

324. SPATHULARIA PERS. Spathelträger.

Ascoma carnosum-membranaceum compressum verticale, utrinque in stipitem discretum decurrens, superne hymenio obductum. Ascii elongati, sporidiis minimis elastice secedentibus foeti.

2726. *Sp. flavidæ* Pers., ascomatibus gregariis, clavula pileata unibonata ovata s. inflata, stipite compressiusculo suffulta, primum pallida dein flavescente. — *Spathularia flavidæ* Pers. comm. 34., syn. 610. Fr. syst. I. 491. *Helvella spathulata* Afzel. *H. faritoria* Bolt. t. 97. *Elveta* Batsch. Cl. spathulata Dicks. Flor. dan. t. 658. Schmid. icon. t. 50.

Ad folia et muscos putres rarius. Auctumno.

2727. *Sp. rufa* Nees, ascomatibus sparsis, clavula obverse ovata marginè undulata, fusco-rola, in stipitem abrupte desinente. — *Spathularia rufa* Nees syst. f. 156. B. Pers. myc. I. 108. Schmid. icon. t. 50. f. 1.

In pinetis udis agri erlang. (Schmidel.)

322. SPARASSIS FR. Lappenträger.

Ascoma carnosum, e basi crassa rapiformi ramicis ex membranula duplice conferruminata, utrinque ascis

elongatis foeta laevi compositos, in verticem capitatum: conglobatos exserens.

(*Clavariae et Elvellae* sp. auct.)

2728. *Sp. crispa* Fr., ascomate carnosò pallide-flaveute s. albente, e basi obesa rapiformi rami-formes, inferne latescentes acrobiculato-rugosos in alios, margine praeter apices obtusos dentato-serratos partitos exserentibus illosque in capitulum crispato-conglobatum colligentibus. — *Sparassis crispa* Fr. syst. I. 465. *Thelephora frondosa* Pers. myc. I. 110. *Clavaria crispa* Wulff. in Jacq. misc. II. 108. t. 14. f. 1. Alb. et Schw. nisk. 285. Pers. myc. I. 160. *Elvella ramosa* Schaeff. t. 163.

In campis abietinis siccioribus, v. c. Bavariae (Schaeffer), Lusatiae (Albertini et Schweinitz), et aliis suisque locis rariis. Auctumno. (Speciosa satis et deliciosaissima.)

c. *merismoides*, ascomatibus ramosis, nisi ramos redintegrandi insignibus.

323. CALOCERAS FR. Hornträger.

Aecoma cylindricum erectum simpliciter clavatum s. ramoso-partitum, basi in stipitem desiuens, carnosò-ge-latinosum, superne hymenio unguinoso obductum. Asci tenuissimi.

† *simplicia*, ascomatibus simplicibus.

2729. *C. glossoides* Fr., ascomatibus sparsis s. gregariis subtremellosis flaveutibus, e stipite tereti inferne nigricante in clavulum compressam ligulatam obtusam desinentibus. — *Calocera glossoides* Fr. syst. I. 487. *Tremella glossoides* Per. myc. I. 107. *Clavaria glossoides* Pers. comm. 68., syn. 596.

Ad trunco quercino passim. Auctumno.

†† *ramosa*, ascomatibus ramosis.

2730. *C. aculeiforme* W., xylophilum, ascomati-bus subcaespitose erumpentibus, e basi aequali saepius

connata in clavulas teretes simplices parceque ramosas aequales apice acutiusculas breves corniculatas, ad axillas striatas desinentibus, humectis luteis viscido-gelatinosis, siccis corneis fragilibus aurantiacis nitidulis. — *Calocera cornaea* Fr. syst. I. 486. *Tremella aculeiformis* Pers. myc. I. 106. *Clavaria cornea* Batsch cont. I. 161. *Flor. dan.* t. 2305. f. 2. Pers. syn. 596. *Cl. medullaris* Holmsk. *Cl. striata* Hoffm. germ. III. t. 7. f. 1. nec Pers. (ceu *tusus conicus*, *simplerior magisque striatus*.) *Cl. aculeiformis* Bull. t. 463. f. 4.

Ad ligna quercina fabrefacta putredine uda adgressa, vulgare. Auctumno. (Variat insigneiter: ascomatibus simplicissimis, e basi distincta s. connata corniculatis, elongatis, rimulas ligni infarcentibus s. byssum circumcirca spargentibus (var. d. Fr. I. I.), nec nou couicis iisque magis striatis.)

2731. *C. furcatum* Fr., ascomatibus viscosis gracilibus teretibus lutescentibus, in ramos vagos furcatos acutos divalsis. — Fr. syst. I. 486. *Clavaria mucida* Flor. dan. t. 1305. f. 1.

Ad trancos abietinos Hercyn. super. rarius. Auct.

2732. *G. flammeeum* IV., ascomatibus tenuibus viscosis vitelliniis, e basi simplici penetrante tereti dilatiori in ramos ramulosque furcatos divalsis, raro in apicem truncatum cristatumque desinentibus. — *Cl. viscosa* Pers. commun. 53. t. 1. f. 5., syn. 594. Fr. syst. I. 486. *Merisma viscosum* Spr. syst. IV. 496. *Cl. gelatinosa* Holmsk. *Cl. aurea* Ehrh. *Cl. flammnea et cornuta* Schaeff. bav. t. 174. 289.

Ad caudices putres muscosos abietinos, nec non in bryetis pinguibus pinetorum, v. c. Hercyn. minime raro.

324. CLAVARIA VAILL. Keulenträger.

Ascoma cylindricum erectum carnosum conforme ramosum s. ex nisu ramos redintegrandi simplex clavatum, cum basi stipitiformi sterili confluens, superae hymenio

concreto laevi, prope apicem ascis tenuibus (albis a. oehraceis) exstructo vestitum.

(*Clavaria* Vaill. Mich. Pers. (excl. *Typhula*.) Lk. Fr. *Coralloidis* et *Lycoperdi* sp. Tournef.) — Fungi carnosí edules, e basi simplici, sive in ramos tenatos partiti, sive ex nisu redintegrandi simpliciter clavati, apicem versus incrassati.

+ simplices, ascomatibus simplicibus e basi tenuata, raro distincta sensim incrassatis, subclavatis. (*Clavaria* Spr. syet. veg.)

2733. *Cl. nivea* Humb., ascomatibus simplicissimis cylindricis nucialibus albis glabris apice attenuatis, basi fibroso concolore sustentatis. — *Clavaria nivea* Humb. frib. 116. Pers. coryph. 219.

Ad terram nudam agri friberg. (Humboldt.)

2734. *Cl. falcata* Pers., ascomatibus simplicibus solitariis cylindricis albis, e basi pellucida sensim incrassatis falcatis obtusis. — *Cl. falcata* Pers. comm. 81. t. 1. f. 3., syn. 604. Alb. et Schw. 291. *Cl. delicata* Tod.

Ad terram fagetorum umbrosorum. Auctumno.

2735. *Cl. uliginosa* W., ascomatibus simplicissimis tenerrimis niveis farctis fragilibus, e basi nuda tenuata capillari in clavulam teretem obtusam desinentibus. — *Cl. uliginosa* W. ann. bot. 141.

In uliginosis in corsortio *Stellariae uliginosae* Thuring. passim. Auctumno.

2736. *Cl. uncialis* Grev., ascomatibus gregariis erectiusculis albis tenacellis laevibus, e basi tenuata glabra obtusis subclavatis. — *Cl. uncialis* Grev. scot. t. 98. Fr. elench. I. 232. *Cl. obtusa* Pers. myc. I. 190. excl. syn.

Ad caules herbarum elatiorum siccios in nemoribus ropestribus, v. c. montis vegeti (Mougeot), Hercyn. et alibi rarius.

2737. *Cl. juncea* Fr., ascomatibus gregariis tenuibus subaequalibus flaccidis pallidis a. rufescentibus, basi

fibrillosa subrepentibus. — *Cl. juncea* Fr. syst. I. 479.
Cl. pilosa et virgultorum Pers. myc. *Cl. hirta* Flor. dan. t. 1257. *Cl. fistulosa* Bull. t. 463. *Cl. triuncialis juncea* Alb. et Schw. nisk. 289. — Mich. t. 87. f. 5.

Inter folia decidua in nemoribus uidis, auctumno.

2738. *Cl. fragilis* Pers., ascomatibus caespitosis subsimplicibus fistulosis fragilissimis albis facile versicolaribus, e basi tenuata sensim clavatis, apice obtusis acutiusculis. — *Cl. fragilis* Fr. syst. I. 484. *Cl. eburnea* Pers. syn. 603. *Cl. pistilliformis, vermicularis, gracilis* et *helvola* y. *dispar* Pers. myc. — Mich. gen. t. 87. f. 6.

a. gracilis, arcom. subaequalibus e. sursum attenuatis. Fr. t. l. *Cl. fragilis* Pers. comm. et syn. *Cl. fistulosa* Tod. *Cl. gracilis* Bolt. t. 111. f. 1. — Flor. dan. t. 175. f. 2. *Cl. simplex* Rets.

β. cylindrica, arcom. obtusis turgidis, stipite tenui. Fr. t. l. *Cl. cylindrica* Bull. t. 463. f. 1. Pers. comm. 76. — Vaill. bot. t. 1. f. 5.

In ericetis graminosis vulgaris. Auctumno.

2739. *Cl. nigrita* Pers., ascomatibus caespitosis fistulosis fragilibus laevibus nigrescentibus, e basi tenuata tereti in clavulam praelongam subcompressam desinentebus. — *Clavaria nigrita* Pers. syn. 604. Fr. syst. I. 483.

In promontoriis graminosis Thuring. (Heyder.)

2740. *Cl. rosea* Dalm., ascomatibus gregariis simplicissimis solidis fragilibus glabris cylindricis, e basi tenuata albida in clavulam roseam, apice luteoresentem absuntibus. — *Clavaria rosea* Dalm. Fr. obs. II. 290. t. 5. f. 2., syst. I. 482.

In vopretis promontoriorum Thuring. semel. Auctumno.

2741. *Cl. fumosa* Pers., ascomatibus caespitosis fragilibus laevibus subfistulosis flexuosis subsimplicibus e fuligineo-cinerascentibus. — *Cl. fumosa* Pers. syn. 602. Fr. syst. I. 483.

In fagetis ad terram passim. Auctumno.

2742. *Cl. striata* Pers., ascomatibus caespitosis fistulosis longissimis flexuosis utrinque attenuatis subcompressis subfuligineis. — *Clavaria striata* Pers. icon. 11. t. 3. f. 5. Fr. syst. I. 483.

In similibus cum praecedente locis, rarius. Auctumno.

2743. *Cl. fasciculata* Vill., ascomatibus fasciculato-caespitosis, mole et proceritate inaequalibus farctis subfragilibus cylindricis, e basi subaequali in apicem acutiusculum productis luteis. — *Clavaria inaequalis* Fr. elench. I. 231.

a. inaequalis, ascom. difformibus acutis. — *Cl. inaequalis* β. Fr. I. l. *Cl. inaequalis* Fr. syst. I. 481. *Cl. vermiculata* Sowerb. t. 253. *Cl. bifurca* Bull. t. 364. *Cl. inaequalis* Flor. dan. t. 873. *Cl. fasciculata* Vill.

β. angustata, ascom. praelongis angustatis deorsum flexuosis. Fr. I. l. *Cl. angustata* Pers. l. l. *Cl. helvola* var. *teres* Baumg. Lips. *Cl. helvola* Fr. I. l. *Cl. simplicissima* Willd.

γ. fusiformis, ascom. incurvis, apicem versus sensim incrassatis. Fr. I. l. *Cl. fusiformis* Fr. syst. I. 480. Sowerb. t. 224. *Cl. fasciculata* Pers. *Cl. pistillaris* Bolt. t. 110.

δ. aurantiaca, ascom. subcompressis aurantiacis, basi villosis. Fr. I. l. *Cl. aurantiaca* Bull. t. 463. Pers. syn. 598. Fr. syst. I. 482.

In vegetatis promontor. nostratum passim. Auctumno.

2744. *Cl. flavipes* Pers., ascomatibus caespitosis fragilibus, e basi laete flavente implexa in clavulam cylindricam albido-pallecentem opacam subpruiniosam incurvam desidentibus. — *Cl. flavipes* Pers. comm. 15. t. l. f. 4., syn. 602. Alb. et Schw. nisk. 290. Fr. syst. I. 483.

In versuris graminosis rarius. Auctumno.

2745. *Cl. bulbosa* Schum., ascomatibus gregariis, e basi stipitiformi distincta inferne inflata tenacella glaberrima rufescente tenuata abrupte in clavam aurantia-

cam spicę obtusam duplo longiorem incrassatim. — *Cl. stipitata* W. in lit. *Cl. bulbosa* Schum. saec. II. 405., quam quidem Friesius in syst. inter dubias, in elench. sub *Cl. inaequali* recenset, in literis pro hac agnovit.

In betuletis udis sterilibus glareosis agri heringent. Thuring., in consortio Baeomycis rosei. Auctumno. (Stipes Polytrichi setam ferme aequalitatur.)

2746. *Cl. anomala* Pers., ascomatibus connato-caespitosia clavulas simplices fusiformes incarnatas dein expallentes, ramaorum instar spargentibus. — *Cl. anomala* Pers. comm. 73. Fr. syst. I. 480. *Cl. sylvestris* Pers. l. l. *Cl. digitella* Schaeff. bav. t. 326.

Ad radices Qercum putrescentes passim. Auctumno.

2747. *Cl. fistulosa* Holmsk., ascomatibus gracilibus strictis glabris longissimis fistulosis aequalibus flavis s. pallide-rufescens, basi villosa infixa. — *Cl. fistulosa* Holmsk. fl. dan. t. 1256. Fr. syst. I. 479. *Cl. pilipes* Vahl fl. dan. t. 1100. f. 3. Pers. syn. 599. *Cl. stri-gosa* Schum.

Ad ramulos aliasque quisquiliis humi jacentes rarius. Auctumno.

2748. *Cl. Ardenia* Pers., epixyla, ascomatibus e basi tomentosa in clavulam cavam longissimam rufescensem s. spadiceam sursum incrassatis. — *Cl. Ardenia* Pers. syn. 599. Fr. syst. I. 478. Sowerb. t. 215.

Ad ramulos Coryli et Tiliae putres rarius. Auctumno.

2749. *Cl. argillacea* Pers., ascomatibus subcaespitosis, e basi distincta glabra uitente discolore flavente in clavulam obtusam subcompressam alutaceo-pallidam incrassatis. — *Cl. argillacea* Pers. comm. 74. *Cl. ericetorum* Pers. syn. 600. Nees syst. f. 155. *Geoglossum argillaceum* Fr. obs. — Schmid. icon. t. 15.

In ericetis sterilibus passim.

2750. *Cl. Ligula* Schaeff., ascomatibus gregariis polymorphis laxe factis, e basi villosa in clavam obtu-

gam, apice obtusam truncatamve desinentibus, primis luteolis, dein pallide - rufescentibus spongiosis fragilibus. — *Cl. Ligula Fr. syst. I. 477.* eoque interprete: *Cl. luteola Pers. syn. 598. Cl. paesilosa Wulff. Flor. dan. t. 837. f. 1. Schmid. ic. t. 5. fig. super. seu aetates ju- niiores. — C. Ligula Schaeff. t. 171. Schmid. l. l. fig. infer. Pers. com. 65. Cl. pistillaris Schrank. seu aet. ad ultae. — Cl. cochleariformis Schum. seu monstrum com- planatum, apice fissum. — Vaill. bot. t. 8. f. 3.*

In campis abietinis satis vulgaris. Aestate.

2751. *Cl. pistillaris L.*, ascomatibus solitariis elatiis glaberrimis carnosis sarcis tenacellis, e basi cylindrica robusta abrupte in clavam obtusam subcapitata in- crassatis, raro utrinque aequalibus; primum dilute fuscis, dein rufescentibus. — *Cl. pistillaris L. Schaeff. bav. t. 169. 170. Ratsch. elem. f. 46. Bull. t. 244. Flor. dan. t. 1253. Pers. syn. 597. Schmid. ic. t. 4. Fr. syst. I. 477. Barb. hal. 132. cum icon. Mich. gen. t. 87. f. 1.*

In fagetis, potissimum in solo calcareo, v. c. Thuring- haud quidem rara. Auctumoo. (Neque minus polymorpha: plerumque e basi cylindrica abrupte clavata, ob- orata, subcapitata fucus instar, ibique non nisi dehiscens (var. b. major Fr. l. l. *Cl. herculana Holmsk.*), rarius a basi inde aequaliter producta, spithamea, digitii crassioris molem et longitudinem aequans.)

2752. *Cl. rugosa Bull.*, ascomatibus subsimpli- cibus polymorphis, apicem versus saepius inaequaliter in ramos conformes obtusos partitis tenacibus rugosis al- bidis. — *Cl. rugosa Bull. t. 448. f. 2. Pers. syn. 594., comm. t. 2. f. 4. Flor. dan. t. 1301. Fr. syst. I. 473. Cl. elegans Bolt. t. 115. Cl. coralloides Sowerb. t. 278. Cl. damaecornis Schrank. Cl. laciniata Schaeff. bav. t. 291. — Vaill. bot. t. 8. f. 2. Mich. t. 88. f. 5.*

In ericetis uidis rarius. Auctumno.

†† ramosae, ascomatibus erectis, e basi aequali s. inaequali in ramulos dichotomos s. cristatos divulsis. (*Merisma Spr. syst. IV. 495.*)

* *leptocaulas*, *ascosatum ramis cum basi subaequalibus*, nonnisi in simplices s. apicis cristatos descentibus. (*Cl. tribus Ramariae Fr.*)

2753. *Cl. mucida Pers.*, ascomatibus subgregariis tenuibus subcarnosulis simplicibus s. a basi inde vage ramosis albidis, siccando pallentibus. — *Cl. mucida Pers.* comm. 55. t. 2. f. 3., syn. 595. *Fr. syst. I.* 476. *Cl. pallida Flor. dan.* t. 1375.

Ad caudices arborum putres, nec non in terra vicia passim. Aestate pluvia.

2754. ?*Cl. byssiseda Pers.*, ascomatibus polymorphis, primum villoso-byssinis, dein glabrescentibus ramosis pallide-rufescentibus, basin hyphoideam spargentibus. — *Cl. byssiseda Pers.* comm. t. 3. f. 7., syn. 593. *Fr. syst. I.* 476. *Ramaria byssiseda Holmsk.*

Ad trunco quercinos putres passim.

2755. *Cl. carnea W.*, ascomatibus angustissimis linearibus cylindricis tenacellis carneis, a basi inde in ramos conformes dichotomos divulsis, ramulis extremis acutissimis bi-trichotomis flexuosis elongatis, raro simplicibus.

Ad cunctos quercinos muscosos Thuring. Auctummo. (*Isarium spiculosum* fl. cr. II. 309. fere refert, glabritio tamen recedit.)

2756. *Cl. Macropus Pers.*, ascomatibus gracilibus albentibus dein pallentibus, e basi tenui elongata conformiter dichotomo-ramosis, ramis in ramulos extremos furcatus subulato-apiculatos subaequales desinentibus. — *Cl. Macropus Pers.* comm. 51. t. 1. f. 2., syn. 593. *Fr. syst. I.* 475.

Ad terram fagitorum umbrosorum passim. Auct.

2757. *Cl. crocea Pers.*, ascomatibus exiguis flaccidis croceis, e basi subsimplici pallida in ramos congestos conformiter ramulosos subfurcatos abeuntibus. — *Cl. crocea Pers.* icon. 36. t. 11. f. 6., syn. 595. *Fr. syst. I.* 472.

Ad terram fagitorum, rarissime. Auct.

2758. *Cl. subtilis Pers.*, ascomatibus strictis albo-pallecentibus, e basi simplici elongata in ramos subaequales obtuse-dichotomos divulsis, ramulis extremis brevissimis obtusis, aliis divergentibus, aliis luanato-inflexis. — *Cl. subtilis Pers. comm. 183., syn. 592. Fr. syst. I. 475.*

Ad terram macram fagorum passim. Auctumno.

2759. *Cl. gracilis Pers.*, ascomatibus albo-pallecentibus flaccidis, e basi gracili simplici in ramos multifidos aequales subincarnatos. divulsis. — *Cl. gracilis Pers. I. I. Fr. syst. I. 475.*

In piuetis Hercyn. super., rarius. Auctumno.

2760. *Cl. corniculata Schaeff.*, ascomatibus sparsis luteis, e basi simplici gracili bi-terve furcato-ramosa, ramulis elongatis subcompressis attenuatis divergentibus acutis obtusisve. — *Clavaria corniculata Schaeff. t. 173. Pers. syn. 588. Nees syst. f. 152. Fr. syst. I. 471. Cl. furcata Pers. comm. 184. Cl. muscoidea L. Fl. dan. t. 775. f. 2.*

In lucis promontoriorum graminosis passim. Aestate.

2761. *Cl. pratensis Pers.*, ascomatibus depresso-caespitosis subunguinosis luteis, e basi simplici brevi curta multiplicitate ramosis, ramis brevibus divaricatis confertis subfastigiatis, alios ramulos brevissimos obtusos emittentibus. — *Clavaria pratensis Pers. comm. 51. t. 4. f. 5., syn. 590. Fr. syst. I. 471. Cl. vitellina Pers. myc. Cl. fastigiata Bull. t. 358. f. D. Cl. muscoidea Flor. dan. t. 836. f. 2.*

In promontoriis apricis, v. c. Thuring., ut plurimum in consortio Gentianae Amarella, passim. Auctumno. (Satis polymorpha; coram enim sunt formae simplices, cristatae, pyxidatae, fastigiato-coufertinque ramosae, omnes tamen habitu brevi et constipato insigues.)

2762. *Cl. cristata Pers.*, ascomatibus caespitosis tenacibus glabris albidi, dein fuligineo-lutescentibus polymorphis, nunc e basi simplici in apicem truncatum

cristatumque dilatatis, nunc tortuoso-obtuseque ramosis.
— *Cl. cristata Pers. syn. 591. Fr. syst. I. 473.*

α. bacillaris, ascom. deformibus compressis, a basi inde in apicem aequalem truncatam ramulorumque rudimentis succrescentibus cristatum desinentibus. — *Cl. cristata* auct., var. *α. Alb.* et Schw. 287. *Cl. albida* Schaeff. t. 170. *Cl. fallax Pers. comm.* 180. *Flor. dan.* t. 1304. f. 2. *Ramaria cristata* Holmsk.

β. fimbriata, ascom. ramis elongatis in ramulos confertos setaceo-incisos abeuntibus. — *Cl. cristata* γ. *fimbriata* Fr. I. I. *Cl. fimbriata Pers. I. I.*

γ. ramosa, ascom. mole variis, a basi saepius deformi inde dichotomo-multipliciterque ramosie, ramis ramulisque brevibus divaricatis. — *Cl. grossa Pers.* *Cl. trichopus Pers. syn. 474. Fr. syst. I. 474.*

In bryetis nemorum acerosorum et frondosorum ubertim, tanta vero mutabilitate coloris et habitus externi decipiens, ut difficillime ad var. reducatur.)

2763. *Cl. amethystea* Bull., ascomatibus ramosissimis dilute-violaceis, e basi simplici dilutiore in ramos elongatos teretiusculos obtusos ramulisque brevissimis coronatos divisus. — *Cl. amethystea* Bull. t. 496. f. 2. *Pers. syn. 590. Nees syst. f. 151. Fr. syst. I. 472.*

In ericetis collinis rarissime. Auctumno.

2764. *Cl. palmata Pers.*, ascomatibus pallescentibus subalutaceis, e basi tensi tereti in ramos subcompressos palmatos, ramulis acuminatis finientes divulsis, caecapitosis. — *Cl. palmata Pers. syn. 588. Fr. syst. I. 469.*

In fagetis nostratibus rarius. Auctumno.

2765. *Cl. tenacella Pers.*, ascomatibus fasciculatis tenacellis fuligineo-rufis subcylindricis, in ramulos conformes elongatos obtusos furcatos divisus. — *Cl. tenacella Pers. comm. 47. t. 3. f. 5, syn. 591. Fr. syst. I. 472.*

In ericetis sylvaticis patruis passim. Auctumno.

2766. *Cl. pyridata Pers.*, ascomatibus pallido-

transfuscentibus, e basi depressa in ramos plurimos tortuosos divulsis, ramulis subverticillatis in extremitates similiiter apiculatas dilatatis. — *Cl. pyridata* Pers. comm. t. I. f. 1., syn. 286. *Flor. dan.* t. 1304. f. 1. *Fr. syst.* I. 470.
Ad caudices abietiuos passim. Auctumno.

2767. *Cl. Kunzei* Fr., ascomatibus caespitosis candidis, a basi stricta tensacella profunde divisa iude in ramos confertissimos plurimos graciles repetito-furcatos subfastigios, axillis compressos desinentibus. — *Cl. Kunzei* Fr. *syst.* I. 474. *Cl. chionea* Pers. myc.
Ad terram nudam nemorum Thuriog. passim.

2768. *Cl. abietina* Pers., ascomatibus gregariis obscurae ochraceis, siccando sordide-olivaceis, e basi brevi crassiuscula byssoidea alba ramosissima in ramos strictos confertos subaequales, ramulis brevibus acuminatis terminatos desinentibus, arbusculam corymbosam mentionibus. — *Cl. abietina* Pers. comm. 46., syn. 588. *Alb. et Schw. nisk.* 286. *Fr. syst.* I. 469. *Merisma abietinum* Spr. *syst.*

In campis abietinis, Hercyn. v. c. superioris minime raro. Auctumno.

2769. *Cl. suecica* Fr., ascomatibus e basi obesa decumbente albido-byssoidea ramosissimis mollibus, primum dilute-incarnatis, dein pallido-alutaceis, ramis laxis distantibus, ramulos acutos emittentibus caespitemque pyramidatum formantibus. — *Cl. suecica* Fr. *syst.* I. 469. *Merisma sueicum* Spr. *syst.* *Cl. rubella* Schaeff. t. 171. (Juvenis.)

In iisdem cum praeced. locis, v. c. Hercyn. super. passim. (Wallr.) Auct.

2770. *Cl. stricta* Pers., ascomatibus e basi obesa fibrillis sustentata alba, ramulos plurimos adscendentibus confertissimos colligentibus caespitemque pyramidatum stipatum constituentibus. — *Cl. stricta* Pers. comm. 45. t. 4. f. 1., syn. 588. *Flor. dan.* t. 1302. *Fr. syst.* I. 468. *Cl. pallida* Schaeff. t. 286. *Merisma strictum* Spr. *syst.*
Ad arborum troncos exesos passim. Auctumno.

2771. *Cl. coralloides* L., ascomatibus e basi carnosae producta ramosis albis erectis, caespitem ovulum constituentibus. — *Cl. coralloides* L. Fr. syst. I. 467. *Cl. Holmskioldii* Fr. obs. *Cl. Arbuscula* Scop. *Cl. alba* Pers. myc. *Merisma coralloides* et *Holmshk. Spr.*

In fagetis uidis editoribus post imbras continuos rarius, vix nisi aestate calida emergens.

^{**} *macrocaulæ, ascomatibus e basi obesa carnosa, veluti truncum proprium praestante, ramos plurimos, superne in comam comprehensos emittentibus.* (*Cl. botryoideæ* Nees. Fr. *Cl. coralloideæ* Pers. *Cl. crassicaules* Alb. et Schr.)

2772. *Cl. spinulosa* Pers., ascomatibus ramosissimis, e basi crassa glabra pallidiore, ramos strictos attenuatos subcionamomeos emittentibus, ramulis sibulato-spinulosis. — *Cl. spinulosa* Pers. obs. II. 59. t. 3. f. 1., syn. 587. Fr. syst. I. 468.

In fagetis campestribus patruis rarius. Aestate.

2773. *Cl. grisea* Pers., ascomatibus ramosissimis, e basi crassa albida ramos rugosos sensim attenuatos, apice obtusos inaequales dilute-cinerascentes, dein ascis brunneo-rubis tectos emittentibus. — *Clavaria grisea* Pers. L. Fr. I. I.

In iisdem cum praecedente locis, rarius. Aestate.

2774. *Cl. flava* Pers., ascomatibus ramosissimis, e basi crassa alba carnosa, ramos teretes rectos in comam fastigiatos implexos flavos fragiles emittentibus. — *Cl. flava* Pers. L. I. *Cl. dichotoma* Pers. — Fr. syst. I. 467. *Cl. flava, flavescens et aurea* Schaeff. t. 175. 285. 287. *Cl. coralloides* Bull. t. 123. *Cl. fastigiata* L.

In fagetis caeduis vulgaris. Aestate.

2775. *Cl. formosa* Fr., ascomatibus e basi subdecurrente albida subventricosa in ramos strictos elongatos aurantio-roseos, ramulis subfastigiatis flavescentibus coronatos protensis. — *Cl. formosa* Fr. syst. I. 466.

Cl. coralloides Pers. & I. et auct. *Cl. fastigiata* Batsch
elench. f. 48.

In nemoribus caeduis patruis rarius. - Aestate.

2776. *Cl. Botrytis* Pers., ascomatibus e basi decumbente crassissima obesa carnosa, nunc in ramicos cristatos difformes deliquescentibus, nunc in ramos breves rugosos strictiores productiores albos s. incarnato-lutescentes, apice rubentes desinentibus. — *Clavaria Botrytis* Pers., comm. 42., syn. 587. Nees syst. f. 150. Flor. dan. t. 1303. Fr. syst. I. 466. *Cl. rubescens* Schaeff. t. 288. *Cl. plebeja* Wulff. *Cl. acroporphyria* Schaeff. t. 176. *Cl. coralloides* Scop. et auct. med. aet.

In fagetis patruis vulgaris. Aestate calida.

y. mitrati, ascomatibus capitatis s. mitratis, hymenio supero nudo persistente, ascis subfixis clavatis amplis foeto vestitis, limbo inflexo, veluti inverse cupulato, patulo s. connato, stipitem transmittentibus s. comprehendentibus, intus subtusque cavis nudis. (*Hymenomycetes uterini* s. elvellacei, *mitrati*. Fr. *Clavariae mitratae* Nees. *Helvelloidei* Sw. *Helvella Brong.*)

825. DITIOLA FR. Nagelschwamm.

Ascoma primum velo floccoso fugaci tectum, dein erumpens, e basi saepius penetrante s. cubilia perreptante in stipitem assurgens, vertice hemisphaericо-capitato aper- tam discoideo-orbiculatum, hymenio primum concreto laevi, dein gelatinoso corrugato-plicato, ascis tenerimis fixis, sporidia ovata continentibus foeto, limbum ambeau- tem reclinante obductum, immarginatum.

(*Ditiola* Fr. *Pezizae*, *Helvellae*, *Tremellae*, *Leotiae* et *Helotii* sp. auct. *Tuberculariae* sp. Tode.) — Neque genus, neque species a Friesio receptae, certo patent.

2777. ?D. paradoxa Fr., ascomatibus e basi an- gusta adpressa abrupte dilatatis lateritio-fuscis tubercu- lato-rimosis aggregatis, dein inter se secedentibus plures que acervulos segregatos mentientibus. — *Ditiola para-*

dora Fr. syst. I. 171. *Octospora paradoxa* Hedw. fil. obs. I. t. 9.

Ad frustula corticis faginei, agri lipsiens. (Hedwig.) (Species suspecta et ex definitione auctoris sicutem paradoxo.)

2778. *D. volvata* Fr., ascomatibus e volva nigra enpulari subeantibus stipitemque conicum subtomentosum candidum, vertice in capitulum convexum repandum fuscum dilatatum transmittentibus. — *Ditiola volvata* Fr. syst. I. 171. *Tubicularia volvata* Tod. mecl. I. 20. t. 44. f. 33.

Ad alburnum pluvias maceratum ramorum quercinorum aridorum, in agro mecklenburg. (Tode.) Auctummo. (Species satis singularis, denuo ad auctoris descriptionem additam indaganda. Ex volvae nigrae copularis, massa nivea molli farctae, dein intumescendo hemisphaerico-conoideac vertice, ascomatis primordia sessilia convexiscaula succulenta pallide fuscescutis s. murina emergere incipiunt, quae basi senam aliquitem obesum cylindricum, vertice capitulum hemisphaerico-dimidiatum rugoso-cripsum fuscum, limbum reclinantem informant.)

2779. *D. radicata* Fr., ascomatibus primum insculptis tuberculiformibus, extus furfuraceo-floccosis albidis, dein in stipites connato-aggregatos crassos villosos breves, basi cubilia penetrantes, vertice in capitulum hemisphaerico-depressum aurantio-rubrum s. aureum desineentes, pileatos dilatatis. — *Ditiola radicata* Fr. syst. II. 170. *Helotium radicatum* Alb. et Schw. nissk. 348. t. 8. f. 8. Nees syst. f. 161. *Leotia tuberculata* Flor. dan. t. 1378. f. 2. *Peziza Turbo* Pers. myc. I. 321. *Tremella flavescens* Hebent. neom. 362. t. 3. f. 15. Tr. *Peziza Ehrh.* Pers. syn. 170. (eius lusus hemisphaericus subsessilis.) *Tubicularia Pini* Schum. *Elrella lentiformis* Scop.

Ad ligna pinea fabrefacta suis locis vulgaris, aliis plane non obvia. Aestate tepida.

2780. *D. sulcata* Fr., ascomatibus primum innatis

tuberculiformibus, extus tenuiter villosis albidis, dein e basi carta cubilia perreptante subsessili abrupte in capitulum depresso fulvum, ambitu undulato-lobatum dilatatis, sulcatis, crucibuliformibus. — *Ditiola sulcata* Fr. syst. I. 172. *Tuberularia sulcata* Tod. mecl. I. 21. t. 4. f. 34. *Fungus astroites* Scop. subterr. 117. t. 45. f. 2.

Ad trunco vetustos cariosos salignos, e rimis erampens, in agro meclenb. (Tode.) Hyeme.

326. MITRULA FR. Haubenschwamm.

Ascoma carnosum ovatum laeve undique ascophorum, basi stipitem discretum arcte ambiens. Ascii elongati.

(*Leotiae* sp. Pers. *Helvellae* sp. auct.) Generis notio nondum satis liquet.

2781. *M. paludosa* Fr., ascomatibus gregariis fragilibus glabris cavis, clavula obtusa lutea, stipite elato albo-flavescente. — *Mitrula paludosa* Fr. syst. I. 491. *Mitrula phalloides* Chev. par. Dub. gall. *Helvella Bulliardii* DC. *Leotia uliginosa* Pers. myc. I. 200. *L. Ludwigi*, *Dicksoonii*, *Bulliardii*, *larinina* Pers. syn. 611. Alb. et Schw. nissk. 296. *Flor. dan.* t. 1377. *Helvella laricina* Vill. *Clavaria epiphylla* Dicks. cr. III. 22. t. 9. f. 10. *Cl. phalloides* Bull. t. 463. f. 3.

Ad solia patrida in paludosis passim. Auctumno.

327. VIBRISSEA FR. Schleuderschwamm.

Ascoma capitatum, stipite centrali siccitatem, supra hymenio primum laevi, dein ex ascis paraphysibusque inditis transversis fugacibus velutino vestitum, subtus nudum.

2782. *V. truncorum* Fr., ascomatibus capitatis hemisphaericis, primum aureis, dein fusco-aurantiis, stipite tereti albido fareto, demum glauco-nigricante cavo. — *Vibrissa truncorum* Fr. syst. II. 31. *Leotia truncorum* Alb. et Schw. nissk. 297. t. 3. f. 2. *L. Clavina* Pers. myc. I. 200. t. 11. f. 9.

Ad ligna in locis paludosis putrescentia, v. c. Lusa-

tiae super. (*Alb. et Schw.*), tractus rhenan. (*Kniff*), Hercyn. super. (*Wallr.*) et ubi rarius.

328. VERPA SW. *Eichelschwamm.*

Ascoma carnosο-membranaceum clavato-pileatum, stipite centrali distincto suffultum, supra hymenio laevi a corrugato persistente, ascis fixis foeto colorato vestitum, subtus concavum laeve liberum.

(*Verpa Sw. in Vet. Acad. Handl.* 1815. p. 129. Pers. myc. Fr. *Leotia et Helvella* sp. auct. *Mitrula* sp. Fr.)

2783. *H. ferruginea W.*, ascomatibus exiguis conicis s. ovatis obtusis ferrugineis laevibus gregaris, stipite tenacello setiformi flexuoso fusco-nigricante asperulo. — *Geoglossum cucullatum* Fr. elench. I. 233. *Mitrula (Heyderia) Abietis* Fr. syst. I. 493. *Leotia Mitrula* Pers. syn. 611. *Alb. et Schw.* 295. *Mitrula Heyderi* Pers. disp. 36. t. 3. f. 12. *Flor. dan.* t. 1670. f. 2. *Clavaria ferruginea* Sowerb. t. 84. *Elvella cucullata* Batsch cont. I. f. 132.

Ad folia abietina delapsa in vallibus adia passim. Auct.

2784. *V. conica* Sw., ascomatibus campanulato-conicis acutis laevibus fuscis, margine subsinuatis, subtus stipiteque tereti aequali favis. — *Verpa conica* Sw. I. l. 131. Pers. myc. I. 204. Fr. syst. II. 24. *Leotia conica* Pers. syn. 613. *Phallus conicus* Flor. dan. t. 654. Timm. megap. 263.

In collibus nemorosis docat. megapol. pr. Malchio. (Timm.) Auctumno.

2785. *V. digitaliformis* Pers., ascomatibus campanulatis digitaliformibus rugulosis umbrinis, stipite cylindrico cavo aequali, extus regis transversis undulato pallido. — *Verpa digitaliformis* Pers. myc. I. 202. t. 7. f. 1 - 3. Fr. syst. II. 24.

In ditione neocomensi primunt a *Chaillletio* repartam, in collibus graminosis agri badensis rariissimam legit *Kneiffius amiciss.* Auctumno.

329. LEOTIA HILL. Kappenschwamm.

*Ascoma subtremellosum pileatum stipite centrali sa-
fultum, orbiculare, limbo revoluto connatum s. liberum
patens, supra marginaque hymenio persistente, ascis fixis
clavato-cylindricis foeto coque unguinoso aequaliter ob-
ductum.*

(*Leotia Hill. ex emdt. Fr. Helvella sp. auct.*)

† *cucullata*, *ascomatibus tenaciter carnis persistentibus, a stipite liberis.* (*Leotiae cucullariae Fr.*)

2786. *L. circinans Pers.*, *ascomatibus circina-
tim gregariis, pileo carnoso convexo subrotundo, primum
laevi, dein undulato, sicco tuberculato, humecto unguino-
so, margine involuto plicas tendineas paucas ad stipi-
tem fistulosum crassum teretem pallidum albo-pulvera-
lentem decurrentes emitentes. — Leotia circinans Pers.
comm. 31., icon. 16. t. 5. f. 5-7., syn. 612. Fr. syst.
II. 27. Alb. et Schw. nisk. 297. Helotium circinans Sw.
Helvella revoluta Wahlenb. upsal. 464.*

In pinetis editioribus muscosis passim.

† *clavatae*, *ascomatibus tremellinis facile caducis
clavato-capitatis, margine adnato decurrentibus.* (*L. Hygromitiae Fr. Tremellae Hygromitiae Nees. L. cu-
cullariae Pers. myc.*) — Despectinot ad Hymenom. hy-
podochios, nec a Tremellis figurae ratione longe distant.

2787. *L. atro-virens Pers.*, *ascomatibus grega-
riis pusillis subcarnosis atro-virentibus, stipite aeneo-
virente dilutiore, e basi tenuata sensim incrassato inque
pileum depresso angustum atro-viride utidulum ab-
eunte. — Leotia atro-virens Pers. myc. I. 282. t. 9. f.
1-3. Tr. syst. II. 30. Helotium atrovirens Spr. syst.*

In monte vogeso. (Mougeot.) Auctumno.

2788. *L. lubrica Pers.*, *ascomatibus gregariis tre-
mellinis, pileo tumido repando lubrico flavo-virente, mar-
gine inflexo tumido decursive connato, stipite cavo sub-
aequali furfuraceo-gleboso flavo intus cavo, latice fluxo*

scatente. — *Leotia lubrica* Fr. syst. II. 29. Pers. syn. 613. *L. gelatinosa* Hill. *Helvella gelatinosa* Bull. t. 473. f. 2. *H. hitea* Berg. *Elvella lubrica* Scop. — Vaill. bot. t. 11. f. 7.

a. lacunosa, pileo tenui deflexo plano-lacunoso. Fr. l. *L. Helvella flavo-vires* Nees syst. 176. f. 162. Mart. erl. 402.

β. umbonata, pileo plano-convexo subumbonato undulato-tuberculoso. Fr. l. l. Pers. myc. t. 9. f. 4-7 *Merulius lubricus* Schum.

γ. laevis, pileo subrotundo laevi. Fr. l. l. *Phallus lubricus* Flor. dan. t. 719.

δ. revoluta, pileo depresso laevi. Fr. l. l. *Hygromitra tremula* Nees syst. f. 144. B. *Clavaria tremula* Holmsk. *Peziza Cornucopiae* Hoffm. veg. cr. II. 21. t. 6. f. 1. *Helvella revoluta* Afsel.

In vallis udis, humectis promontor. patrorum, var.
α. agri erlangensis (Küttlinger); *β. Hercyn.* infer. rarius.

330. MORCHIELLA DILL. *Morchelschwamm.*

Ascomia ceraceo-carnosum pileato-clavatum rotundatum cum stipite centrali cavo confluens, supra plicato-reticulatum lacunosum, hymenio effuso, aacis fixis foeto undique vestitum.

(*Morchella* Dill. et auct. *Phalli* sp. L. Vent. *Boletus* et *Phallo-Boletus* Mich.) Fungi vernalis majores, diu persistentes, edules, a sequeate consuetudinis ratione magis quam notis essentialibus distinguendi, aegre ad species revocandi, atavis *Maurachen* dicti.

† *ascomatibus basi cum stipite connatis.*

2789. *M. deliciosa* Fr., ascomatis pileo subcylindrico sensim acuminato, basi adnato firme, lacunis longitudinalibus oblongis angustis, trabeculis brevibus conexis exarato, livido-pallente deinde sumoso-cinerascente, stipite albo pallente nequali tenuiter furfuraceo. — *Morchella deliciosa* Fr. syst. II. 8. *M. costata* Schmidt et

Kz. D. Schw. n. 195. nec Pers. *M. conica* Pers. myc. I. 207. *M. contigua* Trattin. *M. esculenta* f. *grisea* Pers. I. l., var. *vulgaris* Pers. syn.; var. *y. nova* Alb. et Schw. nisk. 300.

In pomariis editioribus arcisque graminosia nemorum patraorum passim suisque locis gregatim. Primo vere. (Pileus subcylindricus, 2 uncias longus, $\frac{1}{2}$ latus, lacunis oblongis concavis, trabeculis scalaribus interstinctis, regularibus exaratus. In deliciis est, reliquis magis aestuata sub nomine: *graue Spitzmorchel*. — *M. Mitra* Lens essb. Schw. t. 16. f. 67., stipite elato, 2-3 unciali, pileo conico basi sublibero, mera var. esse videtur ex loco pinguiore.)

2790. *M. esculenta* Pers., ascomatis pileo ovato obtusiusculo basi adnato inflato, lacuosis ovalibus profundis, plicis turgidis succinetis difformibus exarato, helvolo dein sordido, stipite albo-pallescente aequali iussato tenuiter furfuraceo. — *Morchella esculenta* Pers. syn. 618., myc. I. 206. Grev. scot. t. 68. Fr. syst. II. 6. *Phallus esculentus* L. Schaeff. t. 298. 299. 300. Bull. t. 218. — *Menz.* pug. t. 6. f. 3-7 Chabr. stirp. 587. f. 3. Clus. hist. p. 244.

In pascuis editioribus, pratis nemorensibus, ad sepes hortorum interque vepreta patria, veris tempestate favente, abundanter. (Insigniter variat, ad pilei figuram: $\alpha.$ rotunda, pileo areolisque rotundis. Fr. l. l. Mich. t. 85. f. 1.; $\beta.$ ovalis, pileo ovali, areolis subquadrangularibus. Fr. l. l. Mich. t. l. f. 2. Lens l. l. t. 15. f. 63.; $\gamma.$ conica, pileo conico, areolis productionibus. Fr. l. l. excl. syn. Pers. Flor. dan. t. 53. Schaeff. t. 199.; ad colorem saepius ex helvolo fuliginosum: $\delta.$ fulva, pileo rhombico-areolato. Fr. l. l. Lens l. l. f. 64.; ad proceritatem: $\eta.$ stipitata, stipite elato, pileo duplo longiore. Lens l. l. f. 65., et denique praeter alias deflexus ignobiles ex basi inflata, ad lacuarum figuram: $\zeta.$ corrugata, pilei areolis approximatis acutis contractis.)

2791. *M. crassipes* DC., pileo carnoso conico cel-

buloso-areolato acuminato helvolo, stipite e basi bulbosa sensim attenuato elato. — *M. crassipes DC. gall. II.* 213. *Fr. l. l.*

In promontoriis nemorensibus Thuring. rarius. (Aliam Morchellam giganteam qualemcumque infra arcem Rothenburg Thuring. legi, apithama elatiorem, pugna crassioram, librac unius pondere, alibi illustrandas.)

† pileo basi a stipite soluto, ad dimidiam partem libero.

2792. *M. patula Fr.*, ascomatis pileo ovato-subrotundo obtuse-conico rhomboidro-areolato, basi libero flavo-rufescente, stipite elato surfuraceo-squamoso. — *Morchella patula Fr. syst. II. 10. nec Pers., excl. saltem syn. Mich. Nees syst. f. 164. Lenz l. l. t. 16. f. 66. Helvella et Morchella esculenta auct.*

Ad terram pingue, praesertim ad ripas arenosas fossarum, v. c. agri halens. et thuring. rarius.

381. HELVELLA L. *Runzelschwamm.*

Ascoma pileatum ceraceo-membranaceum, stipite centrali sullatum, inflatum, subtus concavum, supra sinuato-plicatum marginaque hymenio laevi persistente, ascis fixis foeto vestitum.

(*Helveliae sp. L. Lk. Nees. Fr. Boleti-Lichen Juss.*)

† liberae, ascomatis pileo a stipite soluto.

2793. *H. fistulosa A. et Schw.*, pileo libero planiusculo repando demum deflexo, supra livido-fuligineo, subtus laevi incarnato-rosello, stipite longo sursum incrassato carneo. *Fr. syst. II. 21. Alb. et Schw. nisk. 299.*

In aylvis undis muscosia Lusatiae superior. semel. (*Albertini et Schweiniz.*) Autumno.

2794. *H. elastica Bull.*, ascomatis pileo libero laevi inflato, demum acute lobato, stipite elongato tenui attenuato pruinoso. — *Fr. syst. II. 21. Bull. t. 242. H. Mitra Bull. fung. t. 95. H. laevis Berg.*

a. albida. — *H. albida* Pers. syn. 616.

g. fuliginea. — *H. fuliginosa* Dicks. Sowerb. t. 154. Schaeff. t. 220.

In nemoribus frondosis udis rarius. Aestate.

2795. *H. pulla* Holmsk., ascomatis pileo deflexo libero lobato undulato fuligineo, subtus stipiteque mediotenuis attenuato, basi lacunoso nadiuscule. — *Helvella pulla* Holmsk. Fr. syst. II. 20. *H. cinerea* Vill. — Mich. gen. t. 86. f. 9.

Ad terram pingueam caudicesque mucidos German. australis occurtere dicitur. Auctummo.

2796. *H. atra* Koenig, ascomatibus minoribus fuligineo-nigris, pileo deflexo utrinque adpresso libero, subtus laevi, stipite farcto furfuraceo-villoso. — *Helvella atra* Koenig ist. 20. Flor. dan. t. 534. f. 1. *H. nigricans* Pers. syn. 617. Alb. et Schaeff. nisk. 376.

In nemoribus fagiueis campisque abietinis rarius.

† adnatae, ascomatibus basi cum stipite connexis.

2797. *H. Monachella* Fr., pileo deflexo lobato adnato laevi subspadiceo, stipite cavo laevi glabro albo. — *Helvella Monachella* Fr. syst. II. 18. *H. spadicea* Schaeff. t. 283. *Phallus monachella* Scop. carn. II. 476. — Mich. t. 86. f. 8.

In campus arenosis et ad arborum truncos passim.

2798. *H. Infula* Schaeff., ascomatibus maguis, pileo deflexo lobato adnato subcinnamomeo inflato, subtus albido pubente, stipite sublaevi villosulo, stipite sublaevi villoso pallido crassiusculo, demum irregulariter lacunoso. — *Helvella Infula* Schaeff. t. 159. Pers. syn. 617. Fr. syst. II. 17. Lenz l. l. t. 14. f. 61. *Elvella Mitra* Poll. et alior. *H. brunnea* Gmel. *Phallus triceps* Flor. dan. t. 835. — Weinm. herb. t. 524. Ments. pug. t. 6.

Ad terram uadam nec non ad truncos putredine excisos passim. Aestate exeunte.

2799. *H. esculenta* Pers., ascomatibus majusculis, pileo inflato difformi undulato gyroso-rugoso branneo rotundato, costis crassis elevatis tortuoso-implexis exarato scrobiculato, margine cum stipite laevi fragili villosulo adnexo. — *Helvella esculenta* Pers. syn. 618. Alb. et Schle. nissk. 298. Fr. syst. II. 16. *Elvelia Mitra* Schaeff. t. 160. — Weinm. herb. t. 523. Mentz. pug. t. 6.

In pinetis arenosis editioribus, suis locis abundanter, v. Lusatiae, nec non Hercyn. super. Vere incunata,

2800. *H. sulcata* Afsel., ascomatibus glabris, pileo deflexo aequaliter 2-3 lobo compresso laevi, intus cum stipite farcto, sulcis longitudinalibus profundis constisque tenuibus solidis exarato connexis. — *Helvella sulcata* Afsel. Vet. Ac. Handl. 1783. p. 305. Pers. syn. 615. Schultz starg. 496. Fr. syst. II. 16. *H. pallescens* Schaeff. t. 322. (ceu var. *pallidior*, stipite cavo.)

In lucis nemorensibus editioribus, v. c. agri stargard. (Schultz), Bavariae (Schaeffer) et alibi rarius.

2801. *H. lacunosa* Afsel., ascomatibus majusculis, pileo inflato subregulariter lobato cinereo-nigrescente, lobis deflexis adustis, stipite fistuloso costato-lacunoso. — *H. lacunosa* Afsel. I. I. Fr. syst. II. 15.

a. major, stipite albo. Fr. I. I. *Helvella sulcata* Willd. berol. 398. *H. Mitra* Schaeff. t. 154. Pers. syn. 615. Nees syst. f. 163. Bull.

β minor, stipite nigricante. — *H. monacella* Schaeff. t. 162. Pers. comm. 62.

Ad terram graminosam nec non ad truncos mucidos rarius.

2802. *H. crisp a* Fr., ascomatibus magnis solitariis, pileo inflato deflexo lobato, primum adnato, dein libero nodulato laciniato-contorto pallido, stipite fistuloso niveo robusto costato-lacunoso, in basin ventricosam desinente. — *Helvella crispa* Fr. syst. II. 14. nec Bull. *Phallus lobatus* Batsch. *Ph. crispus* Scop. carn. II. 475. — Mich. t. 86. f. 7.

a. alba, pileo albo, dein pallescente. *Fr. l. l. H. leucophaea* Pers. syn. 616. *Flor. dan. t. 1560.* *H. nivea* Schrad. *H. Mitra* Sowerb.; var. *alba* Bull. t. 466. *H. alba* Berg. *H. lacunosa b. pallida* Afzel. *H. albida* Schaeff. t. 282.

b. lutescens, pileo siccando subfulvo. *Fr. l. l. H. leucophaea* Trattin. essb. Schw. t. DD.

In nemoribus pinguioribus udis passim. Auct.

332. PHALLUS MICH. Eichelschwamm.

Volva uteriformis sessilis radicata ovalis, e membrana duplice, gelatinosa distenta composite, primum clausa, dein ex vertice scisso (Schaeff. t. 196.) ascomatis foeturam occidente in stipitem cylindricum celluloso-cribrosum succrescentem, capitulo subconico, basi laxe adnato, superne hymenio tenacello sporophoro in laticem diffluente foeto illuito glandiformi coronatum transmittens.

2803. *Ph. impudicus* L., ascomatis nauseosi capitulo libero conico olivaceo, dein reticulatim pervio, subtus nudo, stipite cribroso-subobliquo albo elato. — *Phallus impudicus* L. *Flor. dan. t. 175.* Schaeff. t. 196 - 198. *Bull. t. 182.* Nees syst. f. 259. Pers. syn. 242. *Fr. syst. II. 283.* *Ph. foetidus* Sowerb. t. 329. *Ph. vulgaris* Mich. t. 93. — *Clus. hist. 286.*

In nemoribus caeduis patruis, aestate calida rarius.

2804. *Ph. caninus* Huds., ascomatis capitulo cum stipite contiguo ovalo tuberculoso impervio rubescente, stipite flacco celluloso deorum attenuato. — *Phallus caninus* Huds. Schaeff. t. 330. Pers. syn. 243. *Flor. dan. t. 1259.* Nees syst. f. 260. *Fr. syst. II. 284.* *Ph. inodorus* Sowerb. t. 330.

Ad truncos putrescentes, coryleos potissimum, v. c. Hercyn. inferior. at rarissime.

b. epidochii, ascomatibus depresso-thalloideis immarginatis, substantia variis, pagina superiori hymenium

politum cum inferiore heterogenea confertuminatum asco-phorum explanantibus.

(*Fungorum tremellinorum et elvellaceorum gener. Fr.*) Vegetabilia inter Hymenomycetes angiosp. lomatodochias et gymnosp. amorphos quodammodo ambigentia et praeter hymenium asperum, habita nunc Pezizam, non Tremellam planis referentia.

288. EXIDIA FR. Schleimschwamm.

Ascoma uniforme gelatinosum, in hymenium superum stipatum persistens politum s. papillis spinuliformibus asperum, ascis fistulosis, dein sporidia elastice profundentibus intertextis foetum expansum, inferne tegmine stratoso rugoso s. vellere sericeo-fibroso munitum.

(*Exidia Fr. Néea. Auricularia Wahlenb. Pora. myc. nec Fr. Spicularia Chevaill. Tremellae et Pezizae sp. auct.*)

+ glandulosae, ascomatibus inconditis applanatis subtus rugoso-plicatis nudiusculis, supra papillis spinuliformibus asperis.

2805. *E. pithya* Fr., ascomatibus parvis crassiusculis subgregariis nigris, supra laevibus, subtus laete olivaceis rugoso-plicatis villosulis, demum deplanatis effusis. — *E. pithya* Fr. syst. II. 226. *Tremella Auricula* *pithya* Alb. et Schw. nissk. 302.

Ad ramos pineos Lusatiae passim. (Alb. et Schweinitz.)

2806. ?*E. impressa* Fr., ascomatibus crassiusculis impressis, dein explanatis subconchiformibus, humectis laevibus opacis fusco-nigrescentibus, siccis rugosis. — *E. impressa* Fr. l. l. *Tremella impressa* Pers. myc. I. 102. *Tr. rufescens* Ehrenb. in lit.

2807. *E. repanda* Fr., ascomatibus subrotundis turgidis gregariis pellucidis subapplanato-depressis carneocinnamomeis, subtus liberis rugosis saturatoribus, supra laevibus gyroso-plicatis obsolete papillosis, ambitu crenulato criso. — *E. repanda* Fr. syst. II. 225.

Ad ramos alneos Saxonie. (Schubert.)

2808. *E. saccharina* Fr., ascomatibus erumpentibus, primum subrotundis compactis tuberculiformibus, dein elongatis flexuosis inconditis gyroso-undulatis crassis fulvo-cinnamomeis, supra papillis minutis obtusis caducis adspersis. — *E. saccharina* Fr. l. l. *Tremella spiculosa* y. *saccharina* Alb. et Schw. nissk. 302.

Ad trunco Pini sylvestris et Abietis prostratos, Lusatiae v. c. (Alb. et Schw.), Saxoniae (Schubert) et alibi.

2809. ?*E. guttifera* W., ascomatibus dein effusis, siccando membranaceis teneris plicatis fusco-rufis, extus corpusculis glanduloso-resinosis aureis liberis adspersis.

Ad ligna abietina nuda Thuring., semper glandulis resinosis exiguis, quales in *Tabularia granulata* Pers. adnotavi, adspersa.

2810. *E. glandulosa* Fr., ascomatibus erumpentibus, primum subrotundis lenticularibus obesis, basi tenuata adnatis pezizoideis, ambitu liberis, dein effusis incombentibus undulatis violaceo-nigris, siccando membranaceis expansis nigris opacis, supra papillis conicis spinuliformibus emersis asperis, subtus dilutioribus politis s. piloso-fibrosis. — *E. glandulosa* Fr. syst. II. 224. *Auricularia glandulosa* Wahlenb. suec. II. 994. *Tremella spiculosa* Pers. syn. 624. *Tr. glauca* Pers. disp. *Tr. papillata* Kunze myk. Hft. I. 86. *Tr. atro-virens*, *umbrina* Schumach. *Tr. glandulosa* Bull. t. 420. f. I. *Tr. Nostoc* f. *Leers* herb. 271. *Tr. arborea* Huds. Hoffm. veg. cr. I. t. 8. f. I. — *Dill. hist.* t. 10. f. 15.

Ad ramos et trunco siccandos, praeprimis salicinos, auctumno et hyeme volgaris. (Valde polymorpha et decipiens. Lusum uncias 2 latum, liberum, foliaceo-membranaccum, figuratum ad ligna Hercyna. inferior. legi.)

† *scabrae*, ascomatibus minoribus orbiculatis, subtus punctato-scabris.

2811. *E. truncata* Fr., ascomatibus orbiculatis aterrimitis, e basi leviter producta truncato-deplanatis molliissimis elasticis, supra discoideis planis polito-nitentibus,

papillis obtusis adspersis, subtus punctato-scabris, — *E. truncata* Fr. syst. II. 224.

Ad ramulos sicclos tiliaceos et quercinos, (*Tremella flaccida* Engl. bot. t. 2452.) passim.

2812. *E. recisa* Fr., ascomatibus primum erumpentibus orbiculis gregariis fusco-rufescentibus mollessimis, deinde e basi stipitata brevissima obliqua, vertice truncato-plana nitentibus laevibus, ambitu repandis, subtus punctato-scabris obsolete-costatis. — *E. recisa* Fr. syst. II. 233. Tr. *Salicum* Pers. myc. Tr. *recisa* Dittmar in Sturm III. t. 13. Nees. syst. f. 141. Tr. *boletiformis* Engl. bot. t. 1819. *Peziza gelatinosa* Bull. t. 460. Tr. *Sagarum* Retz.

Ad ramulos putrescentes, salicinos praeprimis, passim. Hyeme.

+++ tomentosae, ascomatibus majusculis, subtus tomentosis.

2813. *E. Auricula* Fr., ascomatibus sessilibus concavis flexuosis caespitosis magnis utrinque plicato-venosis, humectis gelatinosis, siccis membranaceis sequacibus, supra, fusco nigris opacis laevibus, subtus tomento sericeo stipato cinereo-olivaceo s. rufescente vestitis. — *E. Auricula* Fr. syst. II. 221. *Auricularia Judae* Wahlenb. t. I. *A. sambucina* Mart. erl. 459. Pers. myc. *Peziza Auri-cula Judae* Hall. Bolt. t. 107. *Tremella A. Judae* L. sp. II. 1625. Pers. syn. 624. — Blackw. t. 334. Mich. gen. t. 66. f. 1.

Ad candices Sambuci nigrae annosos passim. Autumno et hyeme.

284. RHIZINA FR. Haferschwamm.

Ascoma carnosum tenuatum crustaceo laminare, subtus bullatum, ramicibus tentaculatis homogenis radiciformibus prope xix limboque deflexo innixum, supra hymenio laevi persistente, ascis fixis amplis, sporidia ovato-oblonga continentibus foeto undique obductum.

(*Rhizina* Fr. Nees. Pers. myc. *Elvellae et Pezizae* sp. auct.) Vegetabilia pezizoidea rigida fragilia terrestria, sessilia, primum ambitu byssina.

2814. *Rh. laevigata* Fr., ascomatibus orbiculatis laevis fuscis, marginis prominulo cinctis, subtus granulosis ramiceaque breves pallidos fibrosos exserentibus. — *Rh. laevigata* Fr. syst. II. 33. Pers. myc. I. 217. *Octospora rhizophora* Hedw. musc. Fr. II. 15. t. 5. f. A. *Peziza rhizophora* Willd. berol. n. 1170.

β. praetexta, ascom. effusis convexiusculis fusco-purpurascens, limbo albo margine fibrilloso praetextis subtusque ramices radiciformes concolores exserentibus. *Rh. praetexta* Ehrenb. sylv. 29.

Ad terram arenosam macram, v. c. agri berolin. (Willdenow, Ehrenberg), alibi rarissime. Auctummo.

2815. *Rh. undulata* Fr., ascomatibus effusis fragilibus spadiceis, primum planiusculis regularibus laevis, limbo albidente cinctis, dein convexis undulatis, saepius difformibus, subtus flocculosis, ramices radiciformes firmos crassiusculos pallidos exserentibus. — *Rh. undulata* Fr. syst. I. I. *Helvella acaulis* Pers. syn. 614. Alb. et Schw. nisk. 293. *Phallus acaulis* Batsch elench. 129. *Elvella inflata* Schaeff. t. 153.

Ad terram sabulosam et deostam in pinetis siccis, nec a muscia pulvinatis aliena, v. c. Hercyn. superior, Lusatiae, rarius. Aestate et auctummo.

c. *hypodochii*, ascomatibus figura et substantia variis, sessilibus s. stipitatis, ex aversa (vix nisi resupinationis caso) superiore parte ascophoris.

(*Hymenomycetes hymenini pileati* Fr. *Fungi agariceti* Dub. *F. pileati* Nees. Mart. Sp. *Hymenothecii* Pers.)

a. laminares, ascomatibus sive basi, sive latere adnatis crustaceo-deplanatis semiliberisve dimidiatis, sive raro in basin stipitiformem productis, ex aversa parte hymenio subcarnoso concreto laminari undique aequali, saltem non figurato obductis. (*Fungi pileati explanati* Nees. *Hymenothecii gymnodermatini* Pers. syn.)

385. THELEPHORA EHRH. Warzenschwämme.

Ascoma varium, sive adnatum determinatum, demum deplanando crustaceum, sive latoscula primum conuentia sensim reclinando cupulamque recludendo resupinatum, sive denique dimidiatum-pileato-flabelliforme liberum, extus intusque stuppeo-fibrosum, ex aversa (antica s. postica) parte ascophorum laeve politum omnino nec figuratum. Hymenium distinctum carnosum, ascia immersis tenuibus constipatis, superficiem coactam coloratam terram parceve pruinosa construentibus foetum, aequale s. papulis convexis (saepius fortuitis) colliculosum, plerumque faticando rimosum.

(*Thelephora* Ehrh. *Willd.* Lk. obs. I. f. 61. Pers. ipsiusque Fr. elench. II. 156-227. excl. ejus trib. *Meriostatum*, *Phylacteriorum* et *Stereorum*. *Auriculariae* et *Cellulariac* sp. *Bull. Helvella* sp. L. *Agaricorum* ordo 8. Mich.) — Genus tritum at difficillimum; aegre saltem secundum notas essentiales ad species revocandum, morphoseos et metamorphoseos mutabilitate, ex locorum et aetatis conditione et cubilium situ irruptente saepius pessum datum, cautus quoque ab aliis, *Hypochno*, *Peziza*, et *Coniophora* dico scandum.

+ crustaceae, ascomatibus ex initio hyphoideis stratum hypostromaticum haud figuratum mentientibus iisque sub luce abbreviatis grumosis, sub umbra productioribus radiantibus orbiculatim semet informatibus, hinc arcte adnatis cubilia ambeuntibus et cum illis praeter ambitum saepius fibrillosum prominulum jugiter conferruminatis, hinc (sperne) hymenio membranaceo colorato obductis, demum effusis inconditis, colore et substantia variis. (*Thelephorae* tribus 4. resupinatae, *Himantiae* (aliarum astas juvenilis), *Ceraceae*, at *exclus*. *Coniophoris* (genere distinguendis) et *Leiostromatibus* (aliarum initii). *Theleph.* *Corticaria* Pers.) — Omnes lichenibus crustaceis analogae et simulac suspectae, saepius formas Th. thalloidearum primitus resupinatas praestantes, interim tamen ad auctorum fidem receptas.

† uniformes, ascematibus subtus et in ambitu conformibus. (*Th. stratosac et ceraceat Fr.*)

2816. *Th. calcea Pers.*, strato hypostromatico epiphloeoodeo floccoso-farinoso, e centro mammillato in ambitum rotundatum subtilissimum diffluente albo, demum sensim confluendo effuso, ascoma arcte adnatum membranaceum contiguum tenerrimum late aequaliterque expansum parce papillosum, hymenio tergo denique incuso colore s. argillaceo tenuissimo stipato obtectum, grumosum informante. — *Pers. syn. 581. nec myc. Alb. et Schw. nisk. 283. Fr. elench. II. 215.*

a. acerina, ascom. tenuissimis anguste circumscriptis lacteis subcaesiisve. — *Th. acerina Pers. syn. 581. Fr. syst. II. 453.*

β. salicina, ascom. tenuibus anguste rotundatoque limitatis cinereis, — *Th. calcea v. nivea Pers. l. l.*

γ. dryina, ascom. ruguloso-pulverulentis albo-pallentibus. — *Th. dryina Pers. myc. I. 152. Th. acerina β. dryina Pers. syn. l. l.*

δ. sambucina, ascom. demum longe lateque expansis, cubilia undique jugiter obducentibus. — *Th. Sambuci Pers. myc. I. 152. Th. calcea γ. sambuci Pers. syn. Th. oretacea Fr. obs. I. 153. nec Pers.*

Ad arborum cortices antiquos pone radices s. ad earum ramos humili jacentes, Aceris v. c. campestris, Sambuci, Salicium, Pinorum, quovis anni tempore. •

2817. *Th. cinerea Pers.*, strato hypostromatico epiphloeoode floccoso-farinoso, e centro mammillato in ambitum conformem sensim tenuando declinante, dein confluente effuso carneo-gryseo, demum ascoma undique arete adnatum contiguum expansum pruina tenui cinerea suffusum parce papillatum grumosum informante. — *Pers. syn. Fr. elench. II. 221. Th. fraxinea, Tiliac, Picceae et Pini Pers. myc. Th. nigrescens Schrad.*

Ad ramulos humili jacentes, Salicum praeprimis, Fraxinorum, Pinorum, Tiliarum aliарumque. (Praecedentem

fabrica interna, sequentem colore adpellat quidem, et si quidem tote ab hac differt, ambitu conformi, tenuitato et parenchymate grumoso-floccoso, vix in laminam ceraeum constipato diversa esse videtur.)

2818. *Th. colliculosa Hoffm.*, strato hypostromatico epi-a. hypophloeode, primum floccoso-farinoso in ambitum conformem s. tenuissime hyssinum sensim tenuando declinante, dein effuso incarnato, demum ascomata undique adnatum ceraceum in areolas polygonias dehiscentes, pruina tenui concolore suffusum papillatum informant. — *Thelephora incarnatam Pers.* syn. 573. Fr. syst. I. 444., elench. I. 219. *Th. aurantia, lateritia, salinar, bolavie Pers.* & l. *Th. confluenta Fr. syst. I. 447., elench. 218.* (actus junior, in locis uidis hymenio nondum informato.)

a. epiphloeodes, initia epiphloeodeis mamillaribus ambitum conformem angustum spargentibus, demum effusis ceraceo-membranaceis, plerumque papillato-colliculosis undulato-contortis laminaribus s. bracteatis, a centro inde in areolas polygonias fisis. — *Th. polygonia Pers.* syn. 374. Fr. syst. II. 444., elench. I. 222. *Th. colliculosa Hoffm.* germ. III. t. 6.

b. hypophloeodes, initia hypophloeodeis s. epixylis, primum capillaribus ambitum dilutiorem spargentibus, dein longe lateque effusia expansis ceraceo-membranaceis crustaceis parce papillosis, in areolas plurimas dadeales dehiscentibus. *Th. nuda Fr. elench. l. l. Th. dichroa et Castaneae Pers. myc.*

Ad ramulos arborum plurimarum, maxime tamen *Quercus*, *Fagi*, *Tiliae*, *Fraxini*, *Rosarum*, *Ligustri* (?*Th. limitata Fr. elench. 222.*), et aliarum ejusmodi, vulgaris. (Suspecta et forsitan ipaius *Th. carneae* Humb. lusus ab informatione thallodeo prohibitus.)

2819. *Th. decorticata Pers.*, ascomatibus primum hypophloeodeis epixylis, dein epidermidem inaequaliter scissam revelantibus, aequaliter longe lateque effusis

tenuibus membranaceo-subcarnosis contiguis carneo-lutescentibus, pruina debili albida adspersis, ambitu conformibus, parce papillosis, papillis saepius semet productibus.

a. membranacea, ascom. aequaliter effusis membranaceis contiguis parce papillois. — *Th. comedens* Nees syst. f. 255. *Fr. syst. I.* 447., cl. I. 219. *Th. carnea* Ehrenb. sylo. 30.

β. hydroidea, ascom. effusis membranaceis papillosis carneo-lutescentibus s. aurantiacis, papillis sparsis inaequilibus, saepius elongatis difformibus. — *Th. hydroidea* Fr. syst. II. 445. *Pors. syn.* 516. *Th. fissilis* Pers. myc. I. 133. *Radulum laetum* Fr. elench. I. 152. *Hydnium telephoroideum* Dub. gall. II. 774.

Sub cortice ramorum quercinorum, coryleorum, carpineorum et sorbeorum delitescit et demum illo desquamante in conspectum venit; rarius etiam epiphloeoidea vel epixyla.

2820. *Th. paradox a* W., ascomatibus epiphloeoideis, primum orbiculatis implexo-hypoideis tenerimis lacteis, deinde magis constipatis effusis, a centro iude (saepius) in papillas conico-elongatas difformes, vertice obtuso clausas byssinove-solutas succrescentibus hymenio, que albido-lutescens coactum, denique incusum undique praeter ambitum byssinum effoetum superiodacentibus. — *Radulum orbiculare* Grev. scot. t. 278. *Fr. elench.* I. 150. *Sistotrema Cerasi*, *digitatum* et *leucoplacum* Pers. *Odontia Cerasi* Pers. olim. *Hynum laevigatum* Pers. *H. Radula* Fr. syst. I. 423. *H. paradoxum* Schrad. spic.

Ad cortices ramorum Cerasi, Sorbi, Betulae et Alni patrescentes, auctummo sero passim.

2821. *Th. illinita* W., ascomatibus epixylis membranaceis coriaceis tenerimis, cubilia longitudinaliter obducentibus, arcte adnatis, ambitu determinato conformi dilutiore circumscriptis caesio-lacteis, primum contiguis nudis, deinde incuso-pruinosis, in rimas multifariam decussatas dehiscentibus.

Ad tabulas abietinas laevigatas in spricis passim.
(Maculis veluti calce illinitis tenuatis, longitudinaliter ex-
pansis, uluam saepius longis, 1-2 uncias latis oculos
allicit.)

2822. *Th. viscosa Pers.*, ascomatibus effusis sub-
gelatinosis viscosis delicatis glaberrimis mollibus hyalinis
albido-caesiliis s. pallide-fuscescentibus, ambitu conformi-
bus, sicando fugacibus s. in membranulam contabescen-
tibus. — *Thelephora viscosa Pers.* syn. 580. Fr. syst. I. 448.

Ad ramos dejectos arborum in locis uidia vulgaris.

2823. *Th. ochracea Fr.*, ascomatibus epixylis arcte
adnatis, primum tenuissimis rotundatis, ambitum dilutio-
rem floccoso-grumosum spargentibus, dein carneo-ochra-
ceis contiguis ceraceis, demum longissime effusis, in ri-
mas multifariam foraminulosa secedentibus, glabris. —
Fr. syst. I. 446., elench. I. 216. *Th. fallax* β . Alb.
et Schw.

β . *concentrica*, ascom. crassioribus e lateo rubenti-
bus, centro papillosis, siccando rimoso-areolatis. — *Th.*
ochracea β . *crassior* Fr. elench. I. I. *Th. concentrica*
Alb. et Schw. nisk. 279. Fr. syst. I. I.

Ad ligna mucida, salicina et pinea passim.

2824. *Th. gigantea Pers.*, ascomatibus contiguis
carnosis ceraceis latissime expansis hyalinis lacteis, sic-
cando papyraceo-cartilagineis, dein ambitum strigoso-ra-
diatum reclinantibus. — *Th. gigantea Pers.* myc. I. 150.
Fr. elench. I. 213. coque teste *Th. pergamentea* Pers. L.L.
Th. fimbriata Sommerf. *Th. lactea* Pers. (ceu actas ju-
venilis.)

Ad cortices Pini sylvestris et Abietis passim.

2825. *Th. suaveolens Fr.*, ascomatibus suberoso-
mollibus longe lateque expansis contiguis laevibus albo-
pallidescientibus, siccis duris subcoriaceis. — *Th. suaveo-
lens* Fr. elench. I. 208. *Xylostroma suaveolens* Moug.
Th. Corium W. in lit.

Ad caudices fagineos putres, quos integros saepe obducit. (Polypori cujuscunque incunabula thelephoroidea esse videntur.)

2826. Th. cretacea Pers., ascomatibus determinatis, ambitu strigoso-fibrilloso concolore obvallatis tenuibus albo-palescentibus, vivis molliter carnosis, siccando subcoriaceis in rimas fibrosas scissilibus papillosis.
— Pers. myc. I. 150. nec Fr. Th. papillosa Fr. elench. I. 212.

Ad tabulas abietinas in locis natis propter terram, hortorum areas concipientes s. aquam ducentes vulgaris.

2827. Th. laevis Pers., ascomatibus membranaceis effusis laevibus pallidis subtus araneoso-tomentosis albis.
— Pers. syn. 573. Fr. syst. I. 451. Th. domestica Fr. I. L (lusus magis relaxatus ex loco nato.)

Ad ramos populneos pineosque, ad asceres abietinos in locis natis passim.

2828. Th. incrustans Pers., epixyla s. epigaea, strato hypostromatico byssideo albo, nonnisi in hypham mollem effusam pallidam laxam sterilem succrescente, demum determinato, ambitum tenuem byasinum spargente hymeniumque subcarnosum helvolam contiguum parce papillosum informante, ascoma laminare subcarnosum, cubilia obducens praestante.

α. laminaris, ascom. determinatis laminaribus carnosia helvolis, ambitu byssideo pertenui circumscriptis, contiguis, saepius deformiter papillosis. — Th. incrustans Pers. syn. 577. Fr. syst. I. 448., elench. I. 214., var. lignaria Alb. et Schw. nisk. 280. Th. sebacea Pers. l. l. Corticium incrustans Pers. obs.

β. cristata, ascom. dein effinis, sive cubilia quaecunque incrassando obducentibus, sive primitus statim deformiter succrescentibus formasque varias ramosas cristatasque mentientibus. — Merisma serratum Pers. comm. 106. t. 4. f. 4., syn. 583. Flor. dan. t. 1302. f. 2. M. cristatum Pers. l. l. Thelephora cristata et penicillata Fr. elench. I. 168.

Ad trunco arborum languidarum (*Pyrorum* v. c., *Ballicum*, *Quercuum*) Hyadibus regnantibus, nec non ad terram nudam pinguem, in quo loco saepius sive in monstra valde deformia, habitum alienum, clavatum, stalacticum s. merismoideum mentientia succrescit, sive gramine aliasque quisquiliis ambit et cum illia concrescit. Intra corticum rimas udas et ad terram roridam (*Th. mollissima Pers. syn. 572.*) saepe valde relaxatur et hymenium bombycinam elatam praestat.

**** difformes, ascomatibus subtus hyphoideis, ambitu subfigurato prominulo cinctis.** (*Th. Himantiae et Coniaphorae sp. Fr.*)

2829. ? *Th. byssoides* Pers., ascomatibus byssino-hyphoideis ochroleucis irregulariter effusis, ambitum delicatum tomentosum apargentibus, deinde superficiem coactam nudam s. demum tenuiter incusam flavam inducentibus. — Pers. syn. 577. Alb. et Schw. nisk. 280. Fr. syst. I. 452.

Ad quisquiliis hemi jacentes post imbræ intensos passim.

2830. *Th. rosea* Pers., ascomatibus adnatis, primum orbiculatis membranaceis laeviusculis, deinde effusis incusis roseis subtus ambituque albo-tomentosis, a centro inde areolato-rimosis. — Pers. syn. 575. Fr. syst. I. 451., cleorch. I. 203. *Corticium roseum* Pers. disp.

Ad cortices sub aepimentis putrescentes passim. Hyeme. (Cauta ab Hyphodermate fibrilloso dignoscenda.)

2831. ? *Th. reticulata* Fr., ascomatibus adnatis orbiculatis ex antratio s. rubente cinerascentibus incusotomentosis, a centro obeso subcasnoso succulento confertim-papilloso iude in ambitum subtilissimum reticulatum olivaceum desinentibus. — Fr. cleorch. I. 196. *Th. marginata* Alb. et Schw. nisk. 281.

Ad ligna pinæ putrescentia intra celles udas Lusatiae, semel. (*Albertini et Schweinitz.*)

†† thallodeæ, ascomatibus primum verruosis, extus plerumque strato carnoso distincto, vellere floccoso s.

hirsuto colorato obductis, dein latusculis a vertice inde reclinatis revolutisque resupinatis, praeter marginem adscendentem s. basin adnatam magis minusve liberis, nunc membranam adnatam, nunc pileum dimidiatum flabelliformem mentientibus hymeniumque ex aversa parte recludentibus. (*Th. Auriculariae Fr. elench.*, *apodes et resupinatae Fr. syst.* *Th. Stereum pileo resupinato Pers. myc.*) Lichenibus thallinis et Calyciis Umbilicariis eximie analogae.

* *laminares, ascom. ex initio verrucosis resupinando subsidentibus, sensim deplanatis, praeter marginem adscendentem s. revolutum liberum adnatis, laminaribus.*

2832. *Th. disciformis D C.*, ascomatibus subrotundis tenuibus coriaceis, centro adnatis, subtus saturationibus pubescentibus, supra albis parce papillosis. — *D C. gall. VI. 31. Fr. syst. I. 443.*

Ad caudices quercinos passim.

2833. *Th. Pini Fr.*, ascomatibus resupinando peltatis demum bullatis duris, subtus glabris pallidis, supra purpureo-fuscescensibus tenuiter pruinosis papillosis. — *Th. Pini Fr. syst. I. 443., elench. I. 187.*

Ad ligna pinea et abietina passim.

2834. *Th. avellana Fr.*, ascomatibus primum verrucosis hemisphaericis, dein deplanatis subrotundis lobatiave crassis testaceo-lignescentibus, margine obtuso libero elevatis, subtus nudis saturationibus, supra helvolis tenuiter pruinosis. — *Th. avellana Fr. syst. I. 442., elench. I. 188.*

Ad caudices siccos Coryli Avellanae, v. c. Thuring. passim. (Prima initia Sphaeriam fuscam dilutiorem exacte mentinuntur, sensim deplanantur, e figura orbiculata subangulata evadunt margineque obtuso libero elevato monetam cubilibus impositam referunt. Durities ac color fere putaminis avellanae.)

2835. *Th. abietina Pers.*, ascomatibus resupinatis coriaceo-rigidis subrotundis peltatis, dein elongatis dif-

fortibus confluentibus in marginem deplanatis, subtus subtomentosis umbrinis, supra fuscoc-purpureo-scentibus laevis. — Pers. syn. 573. Fr. syst. I. 442.

Ad trucos abietinos passim.

2836. *Th. frustulata* Sw., ascomatibus resupinatis effusis lignosis durissimis crassis cibilia ambeuntibus, subtus glaberrimis cum ambitu solito leniter adscendentibus spadiceo-nigricantibus, supra laevibus pallide ciuamomeis, demum areolato-diffractis. — *Th. frustulata* Sw. Fr. syst. I. 445., elench. I. 191. *Th. sinuans* Pers. myc. I. 145.

Ad ligna quercina rarissima haud rara.

2837. *Th. rufa* Pers., ascomatibus subrotundis cartilagineis peltatis crassis marginatis fusco-rufis, subtus concoloribus glabris, supra tuberculosis gryseo-pruinosis. — Pers. myc. I. 124. Fr. elench. 187.

Ad cortices Tiliae passim.

2838. *Th. carne a* Humb., ascomatibus epiphloeo-deis, primum verrucosiformibus, dein longitudinaliter expansis resupinatis, subtus fusco-nigricantibus glabrinasculis rugosis, praeter marginem involutum adpressis, supra carneis papillosis glabris, demum albo-pruinosis. — *Th. carne a* Humb. Frib. n. 207. Schrad. epic. 187. *Th. quer- cina* Pers. syn. 573. Fr. syst. I. 442. Grev. scot. t. 142. *Th. adglutinata* Pers. myc. *Th. ciliata* Fr. elench. I. 186. (*tusus margine nigro-strigoso.*) *Gyrophora Clementei* Ach. syn. 68.

Ad ramulos putres arborum nemorensium, quercinorum praesertim, ubique.

2839. *Th. rugosa* Pers., ascomatibus resupinatis coriaceis, primum peltatis arcte adpressis, dein ambitu subtus tenuiter hirsuto helvolo a cubilibus secedentibus reflexis semiliberis conchatis, supra carneo-lutescentibus subcruentatis verrucoso-colliculosis contigua glabris rugosis, siccando cartilagineis rigidis, saepè longe effusis. — Pers. syn. 569. Fr. syst. I. 439. *Th. corylea*, *peltata*, *rudis*, *pachyderma* Pers. myc. I. 126.

Ad caudices alneos et coryleoos passim, siquidem a Th. avellana ipsaque Th. hirsuta reapse differt.

*** cupulares, ascomatibus primum verruciformibus, vertice reclusis cupularibus, dein ex latusculorum reclinatione pro cubilium situ et directione varia magis minusve subsidentibus resupinandoque reclinatis, s. praeter basin adnatum liberis pileato-flabelliformibus dimidiatis. (Thelephora Apus C. Auricularia Fr. et.)*

2840. *Th. evolvens* Fr., ascomatibus epiphloeo-deis verruciformibus semiglobosis, intus nigro-violaceis, extus praeter hypham radiantem laxam tomentosis dilute-helvolis clausis, dein e vertice aperto hymenium discoideo-immersum fusco-sanguinem glauco-pruinosem monstrantibus cupularibus, demum latuscula reclinando deplanantibus effuso-resupinatis, margine tomentoso leviter inflexo ciuctis. — Fr. syst. I. 441., elench. I. 181. *Th. larva* Pers. myc. I. 143.

Ad corticem ramorum Pruni Cerasi, Betulae, Tiliae aliarumque patruarum passim. (Aetas adulta resupinata Th. purpuream omnino aequat.)

2841. *Th. amorpha* Fr., ascomatibus primum tuberculiformibus, extus albido-tomentosis, deinde cupularibus sensim deplanatis subcoriaceis marginatis, hymenium rufo-pallescens aperientibus. — Fr. elench. I. 183. *Peziza amorpha* Pers. syn. 657.

Ad caudices abietinos in regionibus editioribus passim.

2842. *Th. flocculenta* Fr., ascomatibus primum tuberculiformibus byssinis ceraceis albidis, dein effuso-resupinatis hymenium marginatum colliculosum sanguineocrustum cervino-pruinosum aperientibus, subcoriaceis. — Fr. elench. I. 184. *Th. populina* Fr. in lit. (cum forma lignicola.) *Peziza amorpha* Alb. et Schw. nissk. 329. (*f. corticola* exserta.)

Ad truncos Populi suis locis passim.

2843. *Th. sarcoides* Fr., ascomatibus erumpentibus, primum orbicularibus depresso-cupularibus molliter

carnosis crassiusculis, subtus liberis adpresso-villosis albis, dein declinatis hymenium obscure-carneum centro tuberculatum mentientibus, demum a cibilibus secedentibus liberis, siccando pallentibus profunde-rimosia. — Fr. et. I. 185. Th. cruenta Fr. syst. I. 444., var. β . Alb. et Schw. 277.

Ad ramos betulinos humi jacentes rarius.

2844. Th. versiformis Fr., ascomatibus primum verrucosis, extus parce villosis, dein cupularibus marginatis hymenium discoideum depresso-rubrum subtuber-culosum monstrantibus, demum deplanatis laevigatis pal-lentibus, siccando sublignosis uniformibus, profunde-ri-mosis. — Fr. et. I. 184.

Ad corticem acerinum v. c. Hercyn. infer. rarius.

2845. Th. salicina Wohl., ascomatibus resupina-tis praeter centrum adfixum liberis, subtus villosis albis, supra glaberrimis sanguineo-rubris. — Wahlenb. succ. Fr. syst. I. 442. Peziza sarcoides a. Alb. et Schw. L. L.

Ad trunco salicinos in regionibus subalpestribus.

2846. Th. sanguinolenta A. et Schw., asco-matibus coriaceo-mollibus, intus atro-sanguineis, fractis cruentantibus, extus pallidis sericeo-tomentosis, primum peltato-laminaribus praeter basin adnatam liberis, hymenium glabrum gryseo-fuscescens aperientibus, demum di-midiato-pileatis effusisque tenuatis. — Th. sanguinolenta Alb. et Schw. nisk. 274. Fr. syst. I. 440., elench. I. 178. Grev. scot. t. 225. Th. sericea β . et crispa Pers. Th. nitida Pers.

Ad ligna pinæ et abietina Lusatiae (Alb. et Schw.)

2847. Th. purpurea Schum., ascomatibus molliter coriaceis, intus purpureo-violaceis, extus pilis strigosis pallidis conformibus zonatisve hirsutis, primum tubercu-liformibus, dein e basi hiuc adnata dimidiato-flabellifor-mibus properis liberis, supra convexis undulatis, subtus dilutius saturatiusve purpurascens glabris, rore gryseo adspersis, demum plerumque imbecicatis. — Schum. saec.

H. 398. *Fr. syst. I.* 440. *Th. vorticosa* *Fr. obs.* *Th. re-
flexa* *l. amethystea* *DC. Bull. t.* 483. *f. 1.*

Ad truncos arborum frondosarum fere omnes ubique. (*Stirps vulgata*, in cambris obnoxia mutationibus ad molem, ascomatum dispositionem ipsiusque coloris utriusque paginae mutabilitatem. Hinc redeunt in Corylo et Fago, ascomata valde exigua, lantis majoris molem aequantia; nunc in caudicibus betulinis ascom. abbreviata cespitosa, tam firmiter inter se imbricatimque congesta, ut unicum plicatum umbonatum rotundatum s. *Cantarellum crispum* referre videantur; nunc stipitata geophila, *Ab.* et *Schweinizio* jam nota, vel plane resupinata, a *Th. cinerea* cautius dignoscenda; nunc productiora convoluta, eaque omnia promiscue superne azona et zonata. Color hymenii neque minus varius, nonnisi tam dilute purpurascens, ut *lilacinum* praestet (*Elvella lilacina* *Batsch* cont. *I. f. 131.* *Th. lilacina* *Pers. syn. 572.*)

2848. *Th. ochroleuca* *Fr.*, ascomatibus papyraceo-membranaceis effuso-reflexis flaccis, supra zonato-pubescentibus striatis, subtus glabris ochraceis, rimosissimis. — *Fr. syst. I.* 440., *elench.* 178. *Th. pallida* *Schum.* *Auricularia papyrina* *Bull. t.* 402.

Ad truncos pineos et betulinos, rariss.

2849. *Th. bicolor* *Pers.*, ascomatibus tenuiter membranaceis sequacibus imbricatis, supra obsolete zonatis subtomentosis spadiceis, subtus albis glabris. — *Pers. syn. 568.* *Fr. syst. I.* 438. *Th. fusca* *Schrard. epic. 184.*

Ad truncos pineos Hercyn. super. rariss.

2850. *Th. crispus* *Pers.*, ascomatibus effuso-reflexis duris undulatis, zonis crispis spadiceis inscriptis, subtus cinereo-pubescentibus. *Pers. syn. 568.*, *myc. I.* 122.

Ad candices abietinos Hercyn. super. (*Persoon.*) (Pro *Th. sanguinolenta* senili declarat *Friesius in elench. I.* 173.)

2851. *Th. hirsuta* *Willd.*, ascomatibus firmiter coriaceis, intus fusco-rufescentibus, extus pilis strigosis pallide cervinis demum dilutius canescens zonatis hirs-

sutis, primum tuberculiformibus, dein basi adnata cupularibus peltato-umbilicatis s. hinc dimidiatis flabelliformibus propexis liberis planis s. complicatis, hymenium glabrum contiguum pallide-lutescens occultantibus. — Willd. ber. 397. Pers. syn. 570. Fr. syst. I. 439. Th. papryracca Flor. dan. t. 1199. Boletus auriformis Bolt. t. 82. Auricularia reflexa Bull. Sowerb. Helvella aculea Huds. — Mich. L. 66. f. 2.

Ad arborum frondosarum caudices ipsaque ligna fabrefacta ubique, labentia tamen quercta. (Figura et mole infinitate variat et more reliquarum thallodearum, similiter dijudicandarum formas analogas, v. c. setatum verrucosam, statum *cupularem*, formam *discoideam*, monstrum *respinatum*, a Th. regosa, si quidem differt, caute dignoscendum et multisariam imbricatam suppeditat.)

2852. *Th. spadicea* Pers., ascomatibus tenaciter coriaceis, intus fusco-rufescens, extus pilis tomentosis ferrugineo-spadiceis zonatis vestitis, primum tuberculiformibus, dein busi adnata sive peltato-umbilicatis, sive hinc dimidiatis, autororum porrectis plicato-flabelliformibus, margine saturatiore nudis, subtus fuscescensibus. — Pers. syn. 568. Fr. syst. I. 438.

Ad caudices quercinos, alneos et betalinos virgultuosos passim. (Fabrica interna cum praecedente congruit, hymenii crassioris, saturius fuscescens indole potius differt.)

2853. *Th. tremelloides* Chev., ascomatibus primum resupinatis, dein reflexis co-iaceo-tremellosis, superne vellere byssideo distorto obtextis zonisque fuscis variegatis, margine undulato-lobatis, subtus gyroso-pliatis laevibus fusco-violaceis, humectis gelatinosis, siccis coriaceis. — Phlebia mesenterica Fr. elench. 154. Ph. tremelloides Fr. syst. orb. I. 83. Auricularia mesenterica Pers. myc. I. 97. Thalephora mesent. Pers. syn. 571. Bolt. fung. t. 172. Th. tremelloides DC. gall. II. 104. et al. var. *Helvella mesenterica* Dicks. Auricularia tremelloides Bull. t. 290. A. corrugata Sowerb.

Ad truncos arborum v. c. agri missici (Ludwig),

quereinos Lusatiae (*Alb. et Schw.*) ulmeos agri viteberg. (*Klotzsch*), agri argendor. (*Kneiff*), tiliaceos Thuring. (*Waller*.) aliisque locis rariss. (De generis notione adhuc sub judice lis est. Ambigit inter Thelephoram et Exidiam illamque habitu, velleris zonati et fabricae internae conditione et hymenio infero, hanc fabrica gelatinosa hymenii refert. Hinc eo titulo interim indicavi.)

N.B. Praetor has aliae quaecunque Thelephorae species landantur spud auctores, *Persoonium* nimirum: *Th. cyclothelis*, *fuliginosa*, *adglutinata*, *Lycii*, *poroides*, *obscura*, *pithya*, *bifonia*, *Taxi*, *Typhae*, *leproides*, *cricetorum* et *epiderma*, apud *Sprengelium* in fl. *hal.*; *Th. Schwieana*, *Bucreas* et *dispersa*; apud *Friesium*: *Th. sterilis*, *circinata* (*Sarcopodium* *Ehrenb.* cf. *supra* II. 229.), *amphibolia*, *laevigata*, *maculaeformis*, *comedens*, *livida*, *serialis*, *alnea*, *mollis* et quae sunt aliae, quae quidem a civitate patrua minime alienae, mihi tamen dubiae et suspectae melius et ad posterum diem omittuntur. Haud secus est cum *Merismate* *Pers.* *Lk.*, genere inter *Clavariam* et *Thelephoram* fere medio, et a *Friesio* hand sine ratione quidem huic subscripto, interim tamen sigillatum indicando.

386. ?MERISMA PERS. Rankenträger.

Ascoma subcoriaceum irregulariter ramosum, sive in ramos compressos, apice dilatatos pilosiusculos divulsos, sive in laminas crustaceas supra deformiter luxuriantes coactum, hymenio concreto laevi undique obductum, subitus potissimum aacis distinctis foetum.

(*Thelephorae* tribus 2. *Merisma* *Fr.* syst. elem. *Merisma* *Pers.* *Link.* *Mart.* *Grev.*)

† subcrustacea, ascomatibus in laminas deiformes effusas succrescentibus.

2854. *M. penicillatum* *W.*, ascomatibus subcarnosis effusis albido-fuscescentibus s. purpurascientibus, sensim incravando diversissimas formas adficientibus ramoque difformes incisos emittentibus. — *Thelephora*

penicillata Fr. elench. I. 168. *Merisma cinereum* et *vermiculare* Pers. myc. I. 155. *M. cristatum* $\beta.$ et $\gamma.$ Fr. syst. I. 156.

In nemoribus umbrosis, quisquiliis qualescumque ipsam-que terram ambiendo incrustans. Auctumno.

2855. *M. fastidiosum* Pers., ascomatibus effusis carnosulis candidis late incrstantibus ramicesque lami-nosos disformes emittentibus. — Pers. syn. 582. *Thele-phora fastidiosa* Fr. syst. 435.

In fagetis umbrosis passim.

† *ramosa*, ascomatibus e basi conformi in ramos divulsis.

2856. *M. Küttingeri* Mart., ascomatibus erectis subfibrosis, inferne croceis, superne flavis nitentibus, ramis approximatis, basi filiformibus, apice dilatatis valde connexis, cum hypostromate floccoso adscendentio inter-textis. Mart. erl. 396. *Thelephora Küttingeri* Fr. syst. I. 434.

In terra nuda nemorum in agro erlang. (Küttinger.)

2857. *M. palmatum* Pers., ascomatibus erectis caespitosis purpureo-fuscis, ramis complanatis laevibus dilatatis palmatis pubescentibus, apice albicantibus. — Pers. myc. I. 157. *M. foetidum* Pers. syn. 584. Grev. scot. t. 46. *Thelephora palmata* Fr. el. I. 167. *Clavaria tomentosa* Lam. DC. *C. palmata* Scop.

$\beta.$ *anthocephala*, ascom. subferrugineis, ramis approximatis obtuse lucinatis fastigiatis s. in comam pileolos-que cyathiformes concrecentibus. Fr. I. I. *M. petaloïdes* Cheraill. *C. anthocephala* Bull. t. 452. f. I.

Ad terram in pinetis uidis post pluvias. Auctumno.

2858. *M. coralloides* Pers., ascomatibus erectis coriaceo-molliusculis fusco-diganticibus, ramis dilatatis, apice fimbriatis albicantibus. Pers. myc. I. 159. *Thelephora coralloides* Fr. elench. I. 167. *Clavaria coriacea* Bull. t. 452. f. 2.

Ad terram nudam inter folia rarius, auctumno.

337. HYPHODERMA W. Stachelhäutling.

Ascoma ex fibris hyphoideis subtilissimis vage ramosis remote septatis jugiter intertextis, singulis in alteraque pagina in ascos subclavatos emersos desinentibus contextum, sive adnatum, sive dimidiatum pileo-flabelliforme, visu fibras in fasciculos tendineos constipandi earumque ope ramos veluti informandi insigne. Hymenium solutum, ex ascis subclavatis, sporidiis subrotundis foetis compositum, subpulverulentum s. spiculosum.

(*Thelephorae et Himantiae* sp. auct. *Merismatis* sp. Pers. *Craterella* Pers.) — Genus vexatum, aptius forsitan sub *Hyphomycetibus militans*.

† crustacea, ascomatibus adnatis ambitum rotundatum hyphoideum circumscriptibus, supra ascis spiculosis acutis horridulis. (*Th. Himantiae* sp. Fr.)

2859. *H. spiculosum* W., ascomatibus adnato-resupinatis tenuissime membranaceis albis, primum rotundatis, ambitu conformi limitatis, dein effusis pallentibus, supra setulis sparsis s. in grumulos convexos congestis acuminatis majusculis dilutioribus pellucidis obsoletestatis obsessis. — *Thelephora spiculosa* W. in lit.

Ad ligna putredine uida exesa in sepimentis thuring. minime raro. Vere. (Ex hoc censu procul dubio etiam *Th. setigera* Fr. elench. I. 208., quam quidem secundum formas l. nondum persequuntur sum.)

2860. *H. puberum* W., ascomatibus adnato-resupinatis ceraceo-membranaceis lacteis s. pallide-argillaceis, supra setulis curtis parce prominulis hispidulis. — *Thelephora pubera* Fr. elench. I. 215.

Ad ligna faginea in locis uida passim. Vere.

2861. *H. granulosum* W., ascomatibus adnato-resupinatis pallentibus, ex hyphis brevissimis subtilissimis, aliis in flocculos contortis crustam tenerrimam hyalino-papyraceam coactam mentientibus, alia in verrucas papulosas sparsas constipatis sparsimque prominulis can-

clidis compositis. — *Thelephora granulosa* Pers. syn.
576. Fr. syst. I. 446. *Corticium alutaceum* Pers. obs.

In similibus cum praeced. locis. Hyeme.

2862. *H. asperum* W., ascomatibus adnato-resupinatis tenerimis papyraceis, primum subrotundis, ambitu obtuso cinctis candidis verrucosis, dein effusis pallentibus, papillis conicis in setulas acutas subtilissimas pellucidas fatiscentibus, pulverulentis. — *Thelephora aspera* Pers. myc. I. 153. t. 6. f. 5. (icon ruditis nimisque cinerea.)

Ad ramos putres, habitu prorsus Peltigerae agelaeae. Vere.

2863. *H. sulfureum* W., ascomatibus adnato-resupinatis effusis, ambitu fibrilloso-byssino succinctis laete-sulfureis, nunc sterilendo tenuiter membranaceis, nunc foetis hymenium subsulvam, setulis albidis asperulum informantibus. — *Thelephora sulphurea* Fr. syst. I. 452., elench. I. 204. et 159. eoque teste: *Athelia citrina*, *Rhacodium ochroleucum*, *Ceratonema capillare* et *Ozonium croceum* Pers. myc., *Himantia sulfurea* Pers. syn. et *Sporotrichum croccum* Kz. — cf. crypt. II. 279.

Ad ligna putredine uida exesa, eaque non solum obducens sed quoque penetrando infarciens et tingens. Hyeme.

2864. *H. fibrillosum* W., ascomatibus adnato-resupinatis membranaceis circumscriptis, dein confluendo effusis, ex fibris hyphoideis rigidulis carneo-pallidis, ambitum versus in fasciculos tendineos radiantes exsertos steriles collectis, centro dense intertextis illisque in papillas conoideas confertissimas, demum in setulas acutas hyalinas solutas succrescentibus, hymenium carneum s. dulce-cinnamomeum, veluti areolato-colliculosum s. papulis pulverulentis exaratum mentientibus. — *Th. fibrillosa* W. in lit.

Ad ramos Cerasi potres sepimentorum odorum. Hyeme.

†† *thalloea*, ascomatibus thalloidis, magis constipatis, aliis perfectis in pilei dimidiati s. integri figuram concinnatis, aliis a figura rata aberrantibus, resupinatis divisisque. (*Thelephora Phylacteria* Pers. Fr.)

2865. *H. linteum* W., ascomatibus stuporis polymorphis, inter figuram membranaceo-resupinatum lamnarem dimidiatoque pileatam variis, aderatis semiliberisve fusco-umbrinis, humectis spongiosis, siccis linteis, ex alteraque pagina hymenium dilute-cinnamomeum pulverulentum informantibus. *Thelephora laciniata* Fr. elench. 170.

a. résupinatum, ascom. membranaceo-linteis arcte adnatis constipatis umbrinis, primum continuis orbiculatis, dein longe lateque expansis, margine in tendines fibroso-stipatos saturiores comprehensis, supra hymenio tergo concolore superfusis. — *Hypochnus umbrinus* W. crypt. II. 312. exc. syn. *Th. laciniata* d. pileo toto resupinato Fr. el. I. 171. *Th. umbrina* β. *lignatilis* Alb. et Schw. nisk. 281.

β. laciniatum, ascom. dimidiato-flabelliformibus ferrugineo-fuscis linteis, praeter basin tenuatam stipitata (pro maxima parte) liberis, supra squamis fibrosis adpressis ad marginem productis saturioribus vestitis, subtus hymenio dilute cinnamomeo laxo supersus. — *Th. laciniata* Pers. syn. 567. Fr. syst. 431. Grev. scot. t. 264. *Th. caryophyllea* Pers. myc. *Th. mesenteriformis* Flor. dan. t. 1198. *Corticium lacin.* Pers. obs. *Helvella pincti* L.

γ. crateriforme, ascom. gregariis crateriformibus ferrugineo-fuscis, in basin stipitiformem productis, margine inciso, saepius subradiato. — *Th. lacin.* b. pileo integro substipit. Fr. I. I. *Th. caryoph.* Pers. Nees syst. f. 250. nec Fr. el. *Craterella ambigua* Pers. obs. t. 6. f. 8. *Merulius radiatus* Holmsk. *Peziza radiata* Flor. dan. t. 469. f. 2.

δ. palmatum, ascom. e basi stipitiformi constipata compressa in lacinias obovatas, apice calloso truncatas divisas, habitum flabellarem mentientibus, erectis, utrinque ascophoris ferrugineo-fuscis. — *Merisma palmatum* β. *angulatum* Pers. myc. *Theleph. palmata* Fr. syst. 432. *Clavaria palmata* Nees f. 151. nec Pers.

η. strigosum, ascom. e basi deformiter confluente incrassata in lacinias plurimas, apice iterum fissas desinentibus pallide cinnamomeis, caespites declinatos divergentes merismoideos mentientibus. — Fr. I. I. *Merisma stri-gosum* Pers. syn. et myc. *M. cristatum* β. *fuscum* A. et Schw.

C. flabelliforme, ascom. e basi stipitiformi constipata compressa erecta ramosis, ramis fissis dichotomisque linearibus acutis utrinque ascophoribus ferrugineo-fuscia. — *Merisma foetidum* Pers. syn. *Th. flabelliforme* Fr. syst. I. 433. *Clavaria foetida* Batsch cont. II. f. 159.

Ad terram arenosam promontiorum uodorum sterilium et ex illa quisquiliis quaecunque, maxime herbaceas appetens et incrustans; m. a. ad ligna subterranea. Hyemo. (*Th. coryophyllaea* Fr. nec Pers. ab hac ascom. coriaceis depresso-pileatis fibroso-laceris, subtus glabris, stipite distincto et odore nullo differre dicitur, nec tamen mihi nota.)

2866. *H. terrestre* W., ascomatibus e basi stipitiformi dimidiato-pileatis obscure-fuscia fibroso-strigosis. *Th. terrestris* Fr. elench. I. 171. *Th. umbrina* Pers. syn. *Th. crustacea* Schum. (m. uscom. effusis.) *Th. dubia* Pers. syn. (ascom. integris pileatis.)

In similibus cum priore locis, at multo rarior. (*Th. intybacea*, caespitosa imbricata, pileo subdimidiato fibroso-squamoso pallido, subtus cinereo-fuscescente, stipitibus basi unitis Pers. syn. 567., in fogetis rarissime crescens, mihi plane latet.)

2867. ?*H. pannosum* W., ascomatibus gregariis suberosis tenuibus pallidis, e stipite subtiliter villoso in pileum excavato-infundibuliformem squamosum fimbriatolacernum abrupte dilatatis, subtus striato-plicatis laevibus parce setulosis. — *Th. pannosa* Fr. syst. I. 430. *Th. pannosa* et *pallida* Pers. syn. 565. *Craterella pannosa* Pers. icon. t. 1. f. 3. *Helvella pannosa* Sowerb. t. 155.

In fogetis umbrosis German. boreal., raro. (Persoon.)

B. fistulosi, ascomatibus ex alteraque (in resupinatis superiore, in sessilibus stipitatisque inferiore) parte, tubulis connator s. inter se secidentes, intus hymenio ascophoro vestitos exserentibus iisque veluti strato poroso regulari expuncto obtessit.

(*Fungi polyporei* Fr. Dub.) Ex impressionibus formulosis fiunt pori et tubuli s. meatus fistulosi.

388. POLYPORUS MICH. Löcherschwamm.

Ascoma fibroso-floccosum stuppeum lentum, ex aversa (s. resupinationis casu interveniente) antica parte stratum porosum concretum, ex poris cylindricis jugiter connexis, hinc clausis, hinc apertis, intus hymenio ascophoro aequilateri vestitis compositam exserens, foraminulisque quasi expunctum. Ascii tenues soluli, sporidiis exiguis foeti.

(*Polyporus Mich. Juss. Fr. emend. Favolus et Microporus Palis. Beauv. Mison, Agaricon, Poria Adans. Boleti sp. L. et auct. ante Fr. B. siccioris substantiae Wahlenb. B. concreti Spr. syst. Thelephorae tribus Stereum Fr. Stereum Lk. pr. pr.*)

A. resupinati, ascomatibus inter initia, (sive ex stirpis natura, sive contra illam) fibroso-obtectis expansis partimque superiore reclinando occultantibus, superne in tubulos favosos cylindricosve, obliquos s. rectos, integratos et hiantes succrescentibus stratumque resupinatum cubilibus arcte adnatum, poris expunctum mentientibus. (*Polypori resupinati et polystictae Fr.*) Plurimae sp. suspectae, aliarum initia, resupinationis casu intercurrente pessumdata, alio tempore suis locis inserenda.

* *favosi, ascomatis effusi tenuati strato superiore poris superficialibus, favi instar expunctis.* (*Polyporus C. Polysticta Fr.*)

2868. *P. reticulatus* Nees, ascomatibus tenuissimis resupinatis byssinis determinatis albis fugacibus, dein poros distantes cupuliformes pulverulentos concolores informantibus. — *P. reticulatus* Nees syst. f. 225. Fr. syst. I. 385. *Poria reticulata* Ehrenb. *Boletus reticulatus* Pers. syn. 548.

Ad ligna pinæ, aestate uda.

* *fistulosi, ascomatibus resupinatis, poris saepius obliquis.*

* *leucospori, tubulis intus albis.*

2869. *P. terrestris* Fr., ascomatibus effusis delicatis byssinis albis, centro poris minutissimis dein ru-

fesceribus expunctis. — Fr. syst. I. 383. *Boletus terrestris* Pers. icon. t. 16. f. 1.

Ad terram nudam, locis humectis rarius.

2870. *P. molluscus* Fr., ascomatibus effusis tenibus mollibus albis, ambitum fimbriato-fibrillosum spargentibus centroque poros tenuissimos subrotundos angulatos sublaceros informantibus. — Fr. syst. I. 384. *P. concentricus* Pers. myc. *Boletus epiphyllus* Pers. Alb. et Schw. *B. molluscus* Pers. syn. *Flor. dan.* t. 1299. *B. latue* Sowerb. t. 387. f. 9.

Ad trunco mucidos foliaque vicina passim.

2871. *P. Vaillantii* Fr., ascomatibus byssinis effusis albis contiguis costatis, dein membranulam rufescens tem basi radicantem mentientibus, supra poris majusculis oblongis irregularibus conglomeratis inscriptis. — Fr. syst. I. 383. *Boletus Vaillantii* DC. gall. VI. 38. *Agaricus cryptarum* Palis. *P. Medulla panis* Sowerb. t. 326. *P. rangiferinus* Pers. myc. — *Vaill. bot.* t. 8. f. 1.

Ad trabes defossas caudicesque humo obtectos Hercyn. infer. talem qualem, nec tamen tubuliferam semel legi.

2872. *P. sanguinolentus* Fr., ascomatibus albis, primum byssinis orbiculatis, dein effusis magis constipatis ad tactum cruentantibus, supra poris minutis subrotundis inscriptis. — Fr. syst. I. 383. *B. sanguinolentus* Alb. et Schw. nisk. 257. *P. terrestris* Pers. myc.

Ad trunco mucidos terramque vicinam rarius.

2873. *P. micanus* Ehrenb., ascomatibus carneo-pallidis, primum ambitum byssinum spargentibus tenuibus, dein poros varios hexagonos acutos informantibus. — Ehrenb. sylv. 30. Fr. syst. I. 383.

Ad ramum quercinum agri berolin. (Ehrenberg.)

2874. *P. Radula* Fr., ascomatibus effusis mollibus albis, subtus margineque parce villosis, poris angulatis dentatis majusculis, intus saepe puberalis. — Fr. syst. I. 383. *Boletus (Poria) Radula* Pers. syn. 547.

Ad ligna ramosque putrescentes passim.

2875. *P. mucidus* Fr., ascomatibus effusis suberoso-carnosis mollibus subflexilibus candidis, ambitu byssino succinctis, poris subrotundis sublaceris. — Fr. syst. I. 382. *Boletus mucidus* Pers. syn. 546. Alb. et Schw. nisk. 256.

Ad truncos cariosos pineos rarius.

2876. *P. Cerasi* Fr., ascomatibus orbiculatis tenuissimis albis dein confluentibus, ambitu tomentoso ciuctis, poris laceris, hymenio sinuoso-poroso. Fr. syst. I. 382. *Hydnum Cerasi* DC. gall. VI. 36. *Sistostrema Cerasi* Pers. syn. 552. *Odontia Cerasi* Pers. obs.

Ad truncos Cerasi et Betulae rarius. (Persoon.)

2877. *P. vaporarius* Fr., ascomatibus stipatis se-riatis tenuatis siccis albido-pallescentibus glaberrimis, poris magnis laceris angulatis. — Fr. syst. I. 382. *P. incertus* Pers. myc. *Boletus vaporarius* Pers. syn. 546. Alb. et Schw. nisk. 256. *Poria vaporaria* Pers. disp.

Ad ligna pinea et populina cariosa in vaporariis.

2878. *P. vitreus* Fr., ascomatibus effusis carnosis crassiusculis undulatis aquose-albidis subhyalinis, ambitu parce villosulo ciuctis, poris minimis obliquis. — Fr. syst. I. 381. *Boletus vitreus* Pers. syn. 545. *Poria vitrea* Pers. obs.

Ad truncos fagineos passim.

2879. *P. vulgaris* Fr., ascomatibus longo-effusis tenuibus siccis laevibus albis, poris exignis aequalibus subrotundis. — Fr. syst. I. 381. *P. obducens* et *versiporus* Pers. myc. *Boletus tunicatus* Schum. *B. Proteus* Bolt. t. 166. *B. cellulosus* Flor. dan. t. 716. *B. papyraceus* Schrank. *B. Medulla panis* auct.

Ad ligna pinea exesa ubertim.

2880. *P. Medulla panis* Fr., ascomatibus effusis duris glabris crassis subundulatis siccis albis, poris elongatis rotundis plerumque obliquis. — Fr. syst. I. 380. *P. bibulus* Pers. myc. *Boletus M. panis* Pers. syn. 544. Alb. et Schw. 256. *B. firmus* Spr. mant. I. 23.

Ad ligna subrefacta prostrata passim.

o phaeospori, poris intus e rosa fuscenscentibus.

2881. *P. incarnatus* Fr., ascomatibus demum effusis suberoso-coriaceis persistentibus glabris dilute incarnatis, poris inaequalibus rectis obliquisque. — Fr. syst. I. 379. *P. nisetensis et cruentus* Pers. myc. *Boletus incarnatus* Pers. syn. 546. Alb. et Schw. nisk. 258.

Ad ligna abietina (Hercyn.) passim.

2882. *P. bicolor* W., ascomatibus demum effusis resupinatis, intus subtusque grumoso-fibrosis friabilibus vi-vide-roseis fragilissimis, tubulis erectis cylindricis glabris aequalibus, primum lacte roseis, dein miniatu - cinnamomeis s. fulvis.

Ad asseres abietinos Hercyn. infer. horizontaliter expansus.

2883. *P. violaceus* Fr., ascomatibus resupinatis, primum subrotundis arcte adnatis, dein effusis dilute-violaceis, ambitu pallidiore cinctis, poris centralibus subrotundis concoloribus. — Fr. syst. I. 379. *Boletus nitidus* γ. *violascens* Alb. et Schw. nisk. 258.

Ad ligna pinea et abietina Lusat. v. c. (Alb. et Schw.).

2884. *P. nitidus* Fr., ascomatibus resupinatis effusis confluentibus flavis tenuibus, ambitu sterilem sublobatum pallidiorem spargentibus, poris arcte concretis brevissimis rectis subrotundis. — Fr. l. l. *Poria nitida* Pers. obs.

Ad ramos fagineos Hercyn. super. (Persoon.)

2885. *P. rufus* Fr., ascomatibus effusis coriaceis rufis, poris minutissimis rotundatis — Fr. syst. I. 379. *Boletus rufus* Schrad. spic. 172.

Ad cortices putres Hercyn. (Schrader.)

2886. *P. obliquus* Fr., ascomatibus duris contiguis crassiusculis latissime expansis spadiceis, margine erecti - sculo cristato cinctis, poris minutis decumbentibus. — Fr. syst. I. 378. *P. incrustans et umbrinus* Pers. myc. *Boletus obliquus* Pers. syn. 548.

Ad trunco putridos similem legi. Aestate.

2887. *P. ferruginosus* Fr., ascomatibus effusis crassis ferrugineo-spadiceis duris, poris subrotundis iaequalibus subobliquis. *Fr. syst. I.* 378. *Boletus ferruginosus* Schrad. spic. 172. *Pers. syn. 544.*

Ad trunco alneos, in *P. caticularis* consortio, cuius forsan iuxta resupinata.

2888. *P. contiguus* Fr., ascomatibus longe effusis crassis glabris ferrugineis, poris majusculis aequalibus. — *Fr. syst. I.* 378. *Boletus contiguus* Pers. syn. 544.

Ad palos januasque hortorum passim.

B. apodes, ascomatibus dimidiato-pileatis, e latere sessilibus horizontalibus marginatis simplicibus, subtus strato tubolorum ascophoro obssessis, saepius ex monstrè casu et cum strati ascophori situ inverso imbricatis, multipliciter lobatis. effuso-resupinatis, annuis perennibusve, nonnisi amorphis lobatis s. primitus in monstra rhacodea s. thelephorea desciscentibus. — (*Polypori tribus 3. Metriematis* sp. et tribus 4. *Apus* Fr. Nees. *Thelephorae tribus Stereum* Fr. *Stereum L.* *B. retiporei* Batsch. *B. aculea* L. Schrad.)

† leucospori, ascomatibus substantia variis, tubulis intus albis, demum magis minusve evidenter pallorem flaventem inducentibus.

* *coriacei*, ascom. *coriaceis* s. *suberonis*.

2889. *P. Neesii* Fr., ascomatibus coriaceo-suberosis tenacissimis tenuatis laevibus glabris (raro pubentibus) intus albis plerumque imbricatis, poris obtusis subrotundis exiguis, intus albis. — *Fr. syst. I.* 370., *clench. I.* 91.

Ad ramos caudicesque fagineos rarius.

2890. *P. versicolor* Fr., ascomatibus coriaceis annuis, e basi tenuata adnata in pileum dimidiato-flabellarem aequaliter deplanatum expansis, intus candidis laxis, supra membrana tenui stipata, extus vellere sericeo laxe adpresso splendente versicolore, fasciis saturationibus semicircularibus variegato velatis, subtus ex strato velutino albo, dein poros rotundos concolores, primum undique

villosos obtusos, demum tenuatos acutos glabrescentes informantibus, simplicibus imbricatisve, vel inter initia desciscentibus. — *P. versicolor* Fr. syst. I. 368. *P. argyraeus* Pers. myc. *B. plicatus* Schum. *B. imbricatus* Scop. *B. atro-rufus* Schaeff. t. 268. *B. versicolor* L. Bull. t. 86. *Flor. dan.* t. 1554. Pers. syn. 540.

Ad caudices arborum fruticumque German. totius et praesertim Thuring. et Hercyn. iofer. penitus omnes abundat. Aestate ad anustumnum. (Cum Thelephora hirsuta analoga sp., ionumeris reddit, me observante, desflexibus et veluti transfigurata aegre interpretatur. Ejus initia udore faveute, nunc primitus jam desiscunt et monstra rhacodea, fibris hyphoideis membranae tenuioris instar intertextis, cubilibus incumbentibus (*Rhacodium papyraceum* Pers. syn. 703., myc. I. 71.); s. illa penetrantibus (m. *xylotromatica*; *Xylotroma candidum* Pers. myc. I. 93. pr. pr.) insignia edunt; nunc a primis inde incanabulis verruciformibus s. maculari-stratos resupinando et amplius progrediendo monstra resupinata, ascom. primum rotundatis maculqibus stratos pulvinatisque albis, candidis s. eburneis (in Tilia), infra arce adnatis, supra pulveruleto-velutinis, a centro inde punctis impressis rotundatis porisque rectis obliquisque, hinc hiantibus pubemque velutinam monstrantibus, deinceps effusa crostaceis suberosis, strata longe lateque expansa constituentibus (*Polyporus vulgaris* Fr. pr. pr. *P. medulla panis cunct.* *P. populinus v. deformis* Fr. in lit.); nunc ex simili caso m. *semiresupinata*, ascom. hinc praeter marginem latusque adnatura pallide-sericeum leviter inflexum utrobique liberis, supra poris rectis, stirpis more exaratis, mole et dispositione variis, sive orbiculatis discoideis (*lusus discoideus*), sive subtus liberis magis et margine adscendentibus inflexo obeso elevato succinctis (*l. conchatus*) sive (ad cubilia perpendicularia sursum propexis, faciem superiorem sericeam porrigentibus, deorsum adnatis, non nisi in appendices contiguas nec poris inscriptas decurrentibus (*l. decurrens*), saepius monstrosis compressis s. incrassatis itidemque imbricatis (*l. imbricatus*); nunc

m. appendiculata, ascom. initii compressis porrectis, antice in pileum sive rite figuratum infundibuliformem (*I. infundibuliformis* Alb. et Schw.) subitus pororum strato marginato veluti prolifico-resupinato connato auctum dilatatis, postice in appendiculum compressum, utrinque vellere sericeo pallido azono aequaliter vestitum productis eoque veluti stipitatis (*Boletus versicolor* y. *stipitatus* A. et Schw. Humb. frib. 74. ceu *lusus cryptophilus* sensim suisve locis in ipsum *P. cryptarum* Fr. abiens, ejus monstris saltem naturam eximie illustrans insignia largiuntur.)

2891. *P. radiatus* Fr., ascomatibus biennibus suberoso-coriaceis subimbricatis deplanatis, e basi ferruginea supra radiato-striatis velutinis fusco-lutescentibus, poris rotundis albis s. sordide flaventibus nitidis vibrantibus exiguis. — Fr. syst. I. 369. *P. lutescens* Pers. myc. *Boletus radiatus* auct.

Ad truncos arborum rarius.

2892. *P. velutinus* Fr., ascomatibus coriaceo-suberosis, primum convexiusculis, deinde depressis tenuatis albidis velutinis subzonatis, poris aequalibus rotundis albis s. pallido-lutescentibus: — Fr. syst. I. 368. *B. velutinus* Pers. syn. 539. (*forma alba*) *B. lutescens* Pers. I. L. (f. *lutescens*.)

Ad cunctes arborum passim.

2893. *P. hirsutus* Fr., ascomatibus coriaceo-suberosis utrinque deplanatis subreniformibus elevato-s. stri-goso-zonatis albidis, poris rotundis obtusis e pallido-cinerascentibus dein fuscescentibus, intus albis. — Fr. syst. I. 367. *Boletus hirsutus* Schrad. spic. 169.

In iisdem cum reliquis locis passim. Aestate.

2894. *P. zonatus* Fr., ascomatibus suberoso-coriaceis tenacissimis subgregariis semiorbiculatis, e basi crassiuscula sensim deplanatis, intus stipato-floccosis pallide-stramineis, extus versicoloribus (saepius helvolis), vellere tenui stipato dein basin versus in rugas verrucosas carnosulas coenunte supersusis plicato-tuberculosis

subzonatis, margine tenuato aporis, poris subangulis tenuatis, primum albis dein helvolis, intus albidis. — Fr. syst. I. 368. *P. leucomus et angulatus* Pers. myc. — *Boletus zonatus* Nees syst. f. 221. *B. multicolor* Schaeff. t. 269. (*Iusus pileo ochraceo, fasciis cinereis.*) — *B. ochraceus* Pers. syn. 539. *Alb. et Schw. nisk.* 253. (*I. pileo ochraceo concolore.*) *B. placenta et angulatus* Schum. (*I. pileo cinereo s. gryco.*)

Ad arborum, Populorum paeprimis et Ulmarum candices rarius.

2895. *P. rubiginosus* W., ascomatibus coriaceo-suberosis dein sublignosis, e basi truncata adnata in pileum dimidiatum obtusiusculum abrupte dilatatis, e stupa filamentosa fulvo-ferruginea supra tegmen stipatum rugosum, volvis semicircularibus elevatis exaratum, subtus e strato velutino ferrugineo-canescente tubulos rotundos obtusos hymenio albido, setulis septatis ferrugineis prominentibus horridalo obductos informantibus, raro simplicibus, saepius inter initia in monstra rhacodes, thelephorea et resupinata desciscentibus, perennibus. — *Polyporus Ribis* Fr. syst. I. 375. (*I. tenuatus, imbricatus.*) *P. odoratus* Fr. I. I. *Boletus annulatus* Schaeff. t. 106. (*I. angulatus.*)

a. m. rhacodes, hygrophilum, ascomatis initii filamento-tosis fulvo-ferrugineis asynthetis succrescentibus hyphamque laxe intertextam foras effusam penitusque penetrantem, sive inconditam sterilem, sive finibus extremis ascophoribus membranam setulosam laxe stipatam mentientibus. — *Racodium Aluta, subcorticale et strigosum* Pers. myc. I. 69. pr. pr. *Hypharma flavescens* Rebent. nom. 397. pr. pr. (ceu *Iusus steriles effusi.*) *Thelephora cinnamomea* Pers. myc. I. 141. Fr. elench. I. 201.

β. m. xylostromaticum, scotophilum, ascomatis initii filamentosis asynthetis in stratum effusum immarginatum suberosum crassiusculum cinnamomeum arcte adeoatum coactis, ex finibus extremis ascophoribus dilutionibus hymenium obsoletum setulosum informantibus. — *Thele-*

phora corrugata Fr. obs. I. 134., elench. 224. Pers. Th. Padi
Pers. l. l. Grev. scot. t. 234. Th. fusco-purpurascens Pers.

γ. m. thelephorum, heliophilum, ascomatis initiis syntheticis rigidis membranaceis, primum cupularibus, deinceps resupinatis xylostromoideis, sive in pileos dimidiatis, hinc simpliciter decursiveque adnatos, supra volvis semi-circularibus elevatis dein glabrescentes nitidos, subtus contiguos irregulariter papillosos, hymenio caesio ferrugineo-setuloso vestitos succrescentibus thelephoroideis, perennibus, siccando fragilissimis. — *Thelephora rubiginosa* Schrad. spic. 185. Pers. syn. 567. Flor. dan. t. 1619. f. 2. Fr. syst. 436. nec Nees. *Stereum rubiginosum* Lk. obs. I. 47. f. 62. *Auricularia ferruginea* Bull. t. 378. Th. *fragilis* Ehrh.

δ. m. resupinatum, scotophilum, ascomatis initiis stuporis rufi-ferrugineis, primum laxe intertextis dein magis saepius contiguo-constipatis horizontaliter expansis aequaliter interruptoque stratos pulvinatissime arcte adnatis immarginatis, supra velutinis impresso-porosis et tubulis obliquis supinatis, intus caesiis setulosis exaratis. — *Polyporus salicinus* Fr. syst. I. 376. *Boletus salicinus* Pers. syn. 543. Alb. et Schw. nisk. 255.

Ad arborum quarumcunque caudices earumque cortices; m. u. potissimum ad ligna putredine uida corrupta molliora, salicina, tiliacca eaque sive hyphae ferrugineae instar obreptaudo, sive penetrando signans; β. ad ramulos humi jacentes rarior; γ. ad caudices (quercinos prae-primis) et aseres soli expositos; δ. lumentios intra Salices cavas caudicesque quercinos. (Stirps incestis velutini aberrationibus obnoxia, ex monstris variis intercurrentibus, aliter interpretatis, ambitum, me interprete, amplissimum adficiens.)

2896. *P. gilvus* Fr., ascomatibus suberosis molibus, e basi subaequali semiorbiculatis margine tenuatis, intus e stupa filamentosa aurea supra tegmen stipatum rugis tenuibus concentricis exaratum, subtus e strato velutino fulvo tubulos rotundos minitissimos obtusiusculos, hymenio caesio, setulia septatis ferruginea prominulis hor-

rido vestitos informantibus, raro simplicibus, saepius in-cubentibus interve initia in monstra resupinata et the-lephorea flacca descendentibus. — *P. gilvus* Fr. elench. 104. (*sp. extorris.*)

a. m. thelephorcum, ascomatis initiis ut in *P. rubigo-niei* m. *γ.* homonymo, at primum aureo-margiuntis multoque mollioribus flexilibus. — *Thelephora tabacina* Fr. syst. I. 437. *Th. ferruginea* Pers. syn. 569. *Th. variegata* Schrad. *Auricularia tabacina* Sowerb. t. 25. *A. nicotiana* Bolt. t. 174.

Ad arborum truncos German., in boreali saltem praecedente multo rarius. (Stirps cum praecedente analoga, aegre et vix nisi stupa intus dilutiore deaurata, pileos moliores minusque rigidos, sequaces informante et poris duplo minoribus praeter alias notas externas dignoscenda, et anis locis ad eadem monstra gignenda, ex quorum numero m. resupinatum *Polypori pectinati* nomine *Klotzschio* cel. annotuit, facta.)

2897. *P. cuticularis* Fr., ascomatibus carnososuberosis perennibus, e basi crassiore nonnisi subeffusa s. subtriquetra lignosa in pileos semicirculares saepius in-cubentes marginis intexo tenuatos deplanatis, intus stupa filamentosa fulva in superficiem primum strigosam dein plicato-rugosam ferrugineam confluente, demum calve-scente novumque tegmen crustaceum superinducente farctis, poris nitidis tendatis exiguis, intus caesiis argenteo-mi-cantibus. — *P. cuticularis* Fr. syst. I. 363. *P. argen-tatus* Ehrenb. *Boletus triquetus* et *alneus* Pers. syn. 528. *B. impuber* Sowerb. t. 195. *B. cuticularis* Bull. t. 462.

Ad caudices arborum caesarum, Alni praesertim et Quercus, Fagi, Populi, Betulae et Pini frequens.

2898. *P. suaveolens* Fr., ascomatibus suberosis elasticis biennibus, e basi sursum incrassata in pileum semicircularem brevem obtuse-cuneatum acute marginatum abrupte desinentibus solitariis, iotus stupa floccosa candida elastica in superficiem concolorem villosam azo-nam laxe contexta farctis, poris majusculis candidis, pri-

rimum obtusis dein tenuatis, hymenio tenui albo, cito pallidius flavente vestitis stratumque inferius pallide-fuscescens mentientibus, suaveolentibus. — *Fr. syst. I.* 366. *Boletus suaveolens* L. *Willd.* *Pers.* syn. 530. *B. suberosus* *Bolt.* t. 162.

Ad Salicem albam et fragilem, v. c. Thuring. copiose. (Recens radices Iridis florentiae fere spirat.)

2899. *P. populinus* *Fr.*, ascomatibus carnosso-suberosis e basi incrassata in pileum semicircularem acute marginatum productis subimbricatis, poris parvis rotundis utriuque albis. — *Fr. syst. I.* 367. *Flor. dan. t.* 1791.

Ad trunco Populi tremulae passim. (Praecedenti similis simulacra monstris resupinatis proferendis decipiens.)

2900. *P. fumosus* *Fr.*, ascomatibus carnosso-fibrosis biennibus subcaespitosis, e basi crassiuscula dimidiatis undulatis acute marginatis, intus fibrosis albis, supra glabriusculis s. sericeis, halitu gryseo superfusis, fuligineo-pallidis s. testaceis, poris curtis minutis albis concoloribus. — *Fr. syst. I.* 367. *P. gibbosus* *Pers. myc. II.* 67. *B. fumosus* *Pers.* syn. 530. *Alb. et Schw.* 250. *B. salicinus* *Sowerb.* t. 227. nec *Fr.*

Ad Salices vetustas et Populos passim.

2901. *P. resinosis* *Fr.*, ascomatibus carnosso-suberosis crassis subtomentosis fusco-rubiginosis succum resinosum fluidentibus, poris rotundis minimis obtusis longe-tubulosis pallidis. — *Fr. syst. I.* 361., *elench. I.* 100. *P. guttatus* *Weinm.* *Boletus fuscus* *Pers.* syn. 527. *B. resinosis et rubiginosus* *Schrad.* *B. velutinus* *Flor. dan. t.* 1138.

Ad arborum domesticarum trunco passim.

2902. *P. pinicola* *Fr.*, ascomatibus duris perennibus solitariis, e basi adnata gibbosa pulvinatis, primum semi-oviformibus dein uogulaeformibus, intus stuppeis constipatis ligneo-pallentibus, supra glaberrimia vitta semicirculari resinosa nitida sanguinea dein nigrescente magis dilatata illinitis, poris tornato-rotundatis obtusis, primum albis dein flavo-pallescibus.

a. annolitus, ascom. supra rufo-fulvis, margine lachrymante tuberculosis, poris pallidis. — *P. marginatus* Fr. syst. I. 372., elench. 105. *Boletus fulvus et marginatus* Schaeff. t. 137. 262. Pers. syn. 534.

B. perennis, ascom. dilatatis, supra inaequabilibus nigriscentibus, margine rubentibus, poris magnis flaventibus. — *P. pinicola* Fr. syst. I. 372. *Boletus ignarius* Flor. dan. t. 953. Pers. syn. 534. *B. ellipticus* Pers. *B. sanguineus* Liljebl. *B. pinicola* Sw. *B. semiorboidens* Schaeff. t. 270.

Ad trunco, praeprimis abietinos et piceos passim, nec non ad fagineos, betulinos et pyrinos rariss.

2903. *P. dryadens* Fr., ascomatibus perennibus explanatis mollibus crassis tuberculosis subcinoamomeis, margine tumidis, poris exiguis curtis albidis mox fuscescentibus. — Fr. syst. I. 374. *Boletus dryadeus* Pers. syn. 537. *B. pseudo-ignarius* Bull. t. 458.

Ad caudices quercinos passim.

2904. *P. fomentarius* Fr., ascomatibus perennibus glabris subriquetris dein duris lignescentibus magnis, iutus spongiosis mollibus, supra fuligineo-canescens, marginem tenuem versus fasciis cinereis nigricantibusque obsolete zonatis, tubulis stratosis tenuissimis pallido-glauca dein ferruginea. — Fr. syst. I. 374. *B. fomentarius* L. Willd. Sowerb. t. 133. Pers. obs. Alb. et Schw. Polyp. conchatus Fr. syst. I. I. et *Boletus conchatus* Pers. (monstrum conchatum.) *B. ignarius* Scop. *B. ungulata* Bull. t. 491.

Ad trunco et caudices, fagineos praeprimis, minime raro. (Cryptophilus monstris satis peculiaribus ortum debet.)

2905. *P. appianus* Pers., ascomatibus glabris dimidiatis, e basi sursum incrassata, ad marginem tenuatum deplanatis dilatatis perennibus demum sublignescentibus, iutus strato stupido molli ferrugineo farctis, supra rufescens, valleculis concentricis exaratis, tubulis subrotundis tenuatis concoloribus, iutna albo-caesiis. — *P.*

fomentarius b. dilatatus Fr. l. l. *Boletus lipsiensis* Batsch
cont. l. f. 130. *B. applanatus* Pers. l. l.

Ad truncos Salicis et Tiliae, Saxon. et Thuring. passim.

2906. *P. igniarium* Fr., ascomatibus primum tuberoso-stramosis dein dimidiatis, stratis annotinis subtus succrescentibus marginemque convexum circumdacentibus crassis angulaeformibus lignescentibus perennibus, saepè in monstra resupinata desciscentibus, supra primum tomento arachnoideo cinereo tenui obtectis, dein glabrescentibus sordide-fuscis, intus stipato-staposis fusco-caustaneis, tubulis angustis obtuse-marginatis, intus caesiis. — Fr. syst. I. 375. *P. loricatus* Pers. myc. *P. strigosus* et *pomaceus* Pers. pr. pr. *P. torulosus* Pers. *Boletus angulatus* et *obtusus* Pers. *B. fulvus* Willd. *B. igniarium* L. — Bull. t. 361.

Ad truncos salicinos et fraxineos abundat; ad arbores pruniferas domesticas vero saepius monstra resupinata (*P. igniarium* b. *minor* Fr. l. l. *B. strigosus* Schults. *B. pomaceus* Pers. *B. fulvus* Scop. *B. Prunastri* Pers. syn. 538.) profert et in cryptis in monstra effusa subspongiosa amorpha deflectit.

** *carnosi*, ascomatibus carnosis plerumque annuis, quibusdam deformiter lobatis. (*P. Merisma* Fr. pr. pr.)

2907. *P. mollis* Fr., ascomatibus annuis fibroso-carnosis subtriquetris, margine acutis mollibus saepius imbricatis, supra rugosis pallide incarnatis, poris inaequilibus subflexuosis albis. — Fr. syst. I. 360. *Boletus mollis* Pers. syn. 526.

Ad truncos pineos rarius. Aestate sera.

2908. *P. stipticus* Fr., ascomatibus tenacellis carnosis annuis, e basi incrassata in marginem rufescens deplanatis plerumque imbricatis albidis, poris subrotundis concoloribus s. pallide-flaventibus. — Fr. syst. I. 359. *Boletus stipticus* Pers. syn. 525.

Ad truncos pineos et abietinos passim. Auctumno.

2909. *P. fragilis* Fr., ascomatibus carnosis fragi-

libus, e basi porrecta superne strigoso-rugosa albida subtas gibbosa crassiuscula in marginem acutum deplanatis, intus dilute fuscescentibus, tubulis tenuibus longissimis flexuosis angustissimis. — *Fr. elench. I.* 86. *Boletus mollis* *ß. Alb.* et *Schw.* 247.

Ad candices abietinos putredine exesos Lusatiae (*Alb.* et *Schweinitz.*)

2910. *P. destructor* *Fr.*, ascomatibus incoaditis inaequalibus albidis, saepius effusis molibus fibrosis glabris rugosis, poris subrotundis obtusis integris laceriave. — *Fr. syst. I.* 359. *Boletus destructor* *Schrad.* spic. 166. *Pers. syn.* 543. *B. sebaceus* *Leyss.* hal. (albido-spadicetus.)

Ad trunco putredine uida exesos nec non ad ligna fabrefacta domestica. *Hyeme leni.*

2911. *P. betulinus* *Fr.*, ascomatibus carnosis glabris, junioribus subovatis molibus, adultis e basi obesa producta (stipitiformi) subreniformi polymorphis, supra pellicula separabili rufescente tectis, poris inaequalibus albis, ore denticulatis. — *Fr. syst. I.* 358. *Grev. scot. t.* 229. *Boletus suberosus* *L.* suec. *Wahlenb.* *B. sutorius* *Scop.* *B. betulinus* *Bull. t.* 312. *Flor. dan. t.* 1254. *Pers. syn.* 535.

Ad caudices betulinos passim.

2912. *P. caesius* *Fr.*, ascomatibus tenacellis tenuibus annnis polymorphis, nunc effuso-reflexis, nunc triquetris, nunc in basin productis subinfundibuliformibus, supra subsericeis albido-caesiis, poris exiguis albis plerumque laceria. — *Polyporus caesius* *Fr. syst. I.* 360. *Boletus caesius* *Schrad.* spic. 167. *Pers. syn.* 526. *B. candidus* *Roth cat.* *B. albidus* *Schaeff.* t. 124.

Ad trunco pineos, abietinos et fugineos passim.

2913. *P. alligatus* *Fr.*, ascomatibus carnosofibrosis sessilibus villosis inaequalibus azonis subisabellinis imbricato-multipliciterque lobatis difformibus, non nisi in monstra clavata apora desciscentibus, poris minutis albis, dein pallentibus. — *Fr. elench. I.* 78. *Boletus mucidus* *Scop. ann. hist. nat. IV.* 149.

Ad truncum vetustum Juglandis Thuring. ejus initia vidi incondita et valde deformia. Vere.

† *tephrospori, hymenio argenteo-cinereo.*

2914. *P. crispus Fr.*, ascomatibus tenaciter-carnosis tenuibus rugosis cinereo-nigricantibus obsolete zonatis, a basi inde in marginem acutum undulato-crispum nigrescentem tenuatis aequaliterque deplanatis imbricatis resupinatis, poris majusculis inaequalibus argenteo-cinereis. — *Fr. syst. I.* 363. *Boletus crispus Alb. et Schw. nissk.* 249. *B. adustus f. crispus Pers. syn.* 529.

Ad trunco putrescentes passim.

2915. *P. adustus Fr.*, ascomatibus tenaciter carnosis, e basi varia (saepius decurrente sterili apora) in pileum dimidiatum subbellarem, margine tenuissimo membranaceo decolore-nigrescente succinctum aequaliter dilatatis, intus stipposis albis in superficiem primam villosulam dein stipatam obtextis, poris minutis rotundis velutinis cincereo-micantibus tenuatis, saepius laceris demumque nigrescentibus. — *Fr. syst. I.* 363. *Poria argentea Ehrenb. sylv. 17. (junior.) B. concentricus Schum. B. adustus Willd. berol. 392. Schrad. spic. 168. Pers. I. L. B. carpineus With. Pers. (pileo magis flavescente.) B. pelleporus Bull. t. 501. f. 2. B. suberorus Batsch cont. II. f. 227. B. fuscoporus Planer.*

Ad candices arborum caesarum quarumquaque, nec non in terra vicina, in agro thuring. ubertim. (Satis polymorphus consistentia, crassitudine non nisi papyracea, et colore praeterea monstra resupinata et sistotremoidea.)

2916. *P. abietinus Fr.*, ascomatibus coriaceis dimidiatis imbricatim congestis effuso-reflexis tenuibus, superne villosis cincereo-albis margine undulatis, poris primum integris angulato-dentatis tenuiter purpurascensibus, dein laceris expallentibus. — *Fr. syst. I.* 370., elench. 97. *P. dolosus Pers. myc. Boletus incarnatus Schum. Flor. dan. t. 1298. B. abietinus Dicks. Pers. L.L. B. decipiens Liljebl. Hydnus obliquum et fimbriatum*

D.C. gall. VI. 37. H. decipiens Schrad. spic. 180. Sistostrema violaceum Pers. syn. 551. Agaricus decipiens Willd. in Uster. Annal. IV. t. 2. f. 5. Hydnus parasiticum Timm. Willd. berol. Boletus dubius Plancr. H. parasiticum Linn. pr. pr.

Ad caudices pineos et abietinos caeos minime rarus, pororum figuratione obscura satis decipiens.

+++ erythrospori, hymenio roseo.

2917. *P. cinnabarinus* Fr., ascomatibus suberosis rugulosis crassiusculis convexiusculis bieunibus utrinque concoloribus cinnabarinis, intus albentibus, supra obsolete zonatis parce pubescentibus deinde glabris, poris rotundis majusculis mox pallentibus. — Fr. syst. I. 371. *Boletus coccineus* Bull. t. 501. f. 1. *B. cinnabarinus* Jacq. austri. t. 304. Pers. syn. 540. Alb. et Schw. nisk. 254.

Ad ramos Pruni avium German. boreal. (Persoon), in tractibus australioribus frequentius. (Color externus suspecti quid adfert et quem equidem in Sorbo olim legi, praeter illum habitu ad *P. odoratum* accedere videtur.)

2918. *P. roseus* Fr., ascomatibus suberosis triquetris duris, e basi crassa abrupte acutequis marginatis luevibus, extus intusque concolori-roseis, supra fasciis saturatiorebus fuliginosis inscriptis, poris intus roseis. — Fr. syst. I. 372. *Boletus roseus* Alb. et Schw. nisk. 251.

In trunco caeso abietino Lusatiae. (Albertini et Schw.) (Forsan *P. bicolor* monstrum hujus resupinatum offert, et *B. sanguineus* Schk. in agro viteberg. lectus ad alterumquemque nec ad Linnaeanum spectat.)

++++ phacospori, hymenio fusco-ferrugineo.

2919. *P. nidulans* Fr., ascomatibus mollibus suberoso-carnosis semicircularibus, supra villosis ochroleucis s. ferrugineo fulvis obsolete zonatis, poris rotundis flexuosis quadrangulis fulvo-testaceis. — Fr. syst. I. 362. *P. tutescens* Pers. myc. pr. pr. *Boletus versicolor* Schaeff. t. 136.

Ad truncos Fagi et Betulae rarius.

2920. *P. rutilans* Fr., ascomatibus carnosao-fibrosis mollibus e basi subeffusa obtuse marginatis fragilibus rufescentibus, saepius imbricatis, poris aequalibus ferrugineis nitidis. — Fr. syst. I. *L. Boletus rutilans* Pers. icon. t. 6. f. 4., syn. 525.

Ad truncos Quercus et Sorbi rarius.

2921. *P. hispidus* Fr., ascomatibus carnosao-fibrosis spongiosis crassis strigoso-villosis ferrugineis annulis, tubulis aequalibus pallide-fuscescentibus longis, senescendo nigrescentibus. — Fr. I. *I. Boletus hispidus* Bull. t. 493. (*rubens*), t. 210 (*flutescens*) Pers. syn. 526. Alb. et Schw. nisk. 248. *B. velutinus* Sowerb. *B. spongiosus* Lightf. *B. hirsutus* Scop. *B. villosus* Huds.

Ad truncos ramosque lauguidos Quercus et Pyri passim.

+++++ ochrospori, hymenio citrino-flavente.

2922. *P. amorphus* Fr., ascomatibus carnosao-te-nacibus effuso-reflexis imbricatis resupinatisque inconditis sericeis candidis, tubulis minutis dein flavis. — Fr. syst. I. 364. *P. irregularis* Pers. myc. II. 75. *Poria nitida* β. Alb. et Schw. nisk. 258.

Ad truncos pineos et abietinos passim.

2923. *P. croceus* Fr., ascomatibus carnosao-suberosis effuso-reflexis tomentosis lutescentibus, poris majusculis inaequalibus croceis. — Fr. syst. I. 364. *Boletus croceus* Pers. syn. 525.

Ad truncos cariosos quercinos rarius.

2924. *P. officinalis* Fr., ascomatibus crassis suberoso-carnosis mollibus lentis, siccando spongiosis friabilibus angulatis zonatis glabris albo-pallentibus, poris lutescentibus tenuibus. — Fr. syst. I. 365. *P. Laricis* Dub. gall. II. 788. *B. Laricis* Jucq. Bull. t. 353. *B. purgans* Pers. syn. 531. *B. Agaricus* Allion. *B. officinalis* Vill. — Mich. t. 61. f. 1.

Ad truncos Pinus Laricis in German. austral. montibus editioribus et praesertim carinthiacis abundat.

2925. *P. sulphureus* Fr., ascomatibus e basi breviter producta imbricatum-connatoque caespitosis, nunc dimidiatis latecentibus, nunc multiplicitate lobatis amorphis supra albidis aleuritico-nitrosis s. calvis, primum carnosis flavo-rubellis intus stipato-fibrosa, demum friabilibus dealbatis, poris minutis sulfureis depresso angulatis tenuiter velutinis in stratum tenuem dispositis. — Fr. syst. I. 357. Grev. scot. t. 113. *B. citrinus* Planer. Pers. syn. 524. Nees syst. f. 219. *B. sulphureus* Bull. t. 429. Sowerb. t. 135. *Sistotrema sulphureum* Rebent. *B. Lingua cervina* Schrank. *B. caudicinus* Scop. Schaeff. t. 131. 132. Flor. dan. t. 1019. *B. coriacens* Huds.

Ad caudices arborum, Pyri praeprimis, Pruni, Fagi, Salicis et Quercus vetustos. Aestate post pluvias calidas insiguerter saepe exuberans.

2926. *P. imbricatus* Fr., ascomatibus glabris, e basi truncata s. rarius producta dimidiatis latescentibus sinuato-undulatis multiplicitate concrescentibus deformiterque desciscentibus fragilibus luteo-fulvis, intus albescientibus, poris minutis pallide-flaventibus, dein fulvo-ferrugineis. — Fr. syst. I. 357. *Boletus americanus* Pers. syn. 531. *B. imbricatus* Bull. t. 366.

B. m. ramosum, ascomatibus monstrosis cylindrico-ramosis, undique poris expunctis luteo-fulvis. Fr. I. I. *Boletus ramosus* Bull. t. 418. Pers. syn. 549. Nees syst. f. 226.

Ad trancos vetustos fraxineos rarius; *B.* in cryptis ad trabes uadas occursero dicitar.

C. pleuropodes, ascomatibus stipite proprio laterali subhorizontali suffultis, dimidiatis integris s. primis lobatis difformibusve.

† dimidiati, ascom. dimidiatis saepius deformibus.

2927. *P. candidus* JV., ascomatibus carnosis molliusculis convexis albis parvulis, stipite brevi lateralii suffultis, poris convexis aequalibus. — *Boletus candidus* Pers. syn. 529.

Ad ramulos putres agri gotting. (Persoon.) Auctumno. (Friesio auctore P. variu lusum sistit.)

2928. *P. lucidus* Fr., ascomatibus coriaceis glabris lucidis reni- s. flabelliformibus, stipite (non nisi subcentrali s. plane nullo) nitido adfixis expansis, primum albido-lutescentibus, dein castaneis, demum nigro-fuscescentibus concentrico-solcatis, poris minutis pallidis. — Fr. syst. I. 353. Grev. scot. t. 245. *P. laccatus* Pers. myc. *Boletus lucidus* Leyss. hal. 300. Schrad. spic. 163. Pers. syn. 522. Flor. dan. t. 1253. *B. vernicinus* Brot. *B. laccatus* Timm. *B. castaneus* Heber. *B. crustatus* Planer. *B. obliquatus* Bull. t. 7. et 459. *B. nitens* Batsch f. 223. *B. variegatus* Schaeff. t. 263. *B. flabelliformis* Scop.

Ad caudices quercinos German. boreal. passim.

2929. *P. nigripes* W., ascomatibus coriaceis tenacissimis glaberrimis, e basi cordata dimidiatis flabelliformibus s. spatulatis autrorsum latescentibus, supra primum albis vernicosis, dein castaneis nitidis, tubulis primum albis dein aureo-lutescentibus micantibus tenuissime membranaceis apice laceris, hinc ad stipitem teretem atro-piceum nitidum semidecurrentibus.

Ad trunco Salicorum, Juglandis et Fraxini in agro thuring. passim. Auctumbo et hyeme. (Ambigit inter praecedentem et sequentem, stipitis 1-2 uncias longi digitumque crassi colore constanter atro-piceo distingui mcretur.)

2930. *P. varius* Fr., ascomatibus dimidiatis carnosis dein iudorescentibus rigidis glabris laevibus versicoloribus, stipite brevi laevi pallido deorsum abrupte nigro adfixis, poris minutis subrotundis pallidis. — Fr. syst. I. 352.

a. badius, ascom. badiis, lateritiis s. aurantiis. Fr. l. l. *Boletus badius* Pers. syn. 523. *B. durus* Timm. *B. perennis* Batsch. cont. I. f. 129. *B. elegans* Bull. t. 46. *B. aurantius* Schaeff. t. 110.

b. fuscus, ascom. pallide-fuscescentibus s. subgryseis. Fr. l. l. *B. calceolaris* Bull. t. 360. 445.

c. ochraceus, ascom. ochraceo. Fr. l. l. *B. variae* Pers. *B. lateralis* Holt. t. 83. Flor. dan. t. 1075. f. 1.

Ad caudices arborum frondosarum freqvencs.

2931. *P. squamosus* Fr., ascomatum initii strumosis, centro stipitem occultantibus illumque dein obesum brevem retroflexum s. lateralem exserendo hincque (postice) desciscendo basin subcordatam crassam recludentibus, hincque (antice) pileum dimidiatum pallidum, squamis adpressis fuscescentibus lepidotum horizontaliter prope xum marginemque inflexum versus sensim tenuatum informantibus, amplissimis tenaciter carnis, poris albopallentibus angulatis patulis. — Fr. syst. I. 343. *P. flabelliformis* et *tigrinus* Pers. myc. *Boletus platyporus* Pers. syn. 521. *B. Juglandis* Bull. t. 19. 144. *B. celtulosus* Lightf. *B. caudicinus* L. Scop. *B. squamosus* Huds. Schaeff. t. 101. 102. *Flor. dan.* t. 983. et t. 1196.

Ad trunco adultos Juglandis praeprimis, nec non Fraxini, Quercus, Populi silarumque, aestate calida post imbrues, minime raro.

†† lobati, ascomatibus multipliciter lobatis, incumbendo et findendo habitum ramosum s. difformem multantibus. (*P. Merisma* Fr.)

2932. *P. eburneus* W., ascomatibus coriaceis lenti, e basi tereti carta stipitiformi nigrescente dimidiatis inciso-multipliciterque lobatis, supra glaberrimis politis candidis eburneis, intus pallide-fuscescentibus stuposis, poris tenuibus cum virore quodam concoloribus glabris, demum scariosis.

Ad trunco tiliaceos agri thuring. rarius. Auctumno. (In ascomatum senilium facie superiore Phacidium punctiforme quoddam saepius nidulatur.)

2933. *P. cristatus* Fr., ascomatibus subcarnosis subdimidiatis imbricato-multiplicibus irregulariter lobatis involuto-deformiterque concrecentibus flavo-virentibus villoso-pulverulentis, poris niveis dein laceris sulfureis. — Fr. syst. I. 356. *Boletus cristatus* Schaeff. t. 316. 317. Pers. syn. 522. Alb. et Schw. nisk. 245. Nees syst. f. 217. *B. intybaceus* Mapp. als.

In sagitis umbrosis patruis rarissime. Auctumno.

2934. *P. confluens* Fr., ascomatibus tenaciter carnosis dimidiatis laevibus carneo-rufescentibus lobatis, postice connatis atipitemque brevem exserentibus caespitesque ramosos mentientibus, poris parvis subrotundis albis decurrentibus. — Fr. syst. I. 355. *Boletus confluens* Alb. et Schw. nisk. 244.

Ad terram in pinetis collinis Lusatiae. (Alb. et Schw.)

2935. *P. frondosus* Fr., ascomatibus dimidiatis rugosis numerosissimis, primum tomentosis obscure-fuligineis, dein glabrescentibus gryeo-lividis, e basi brevi stipitiformi latescentibus ibique truncum carnosum obesum, nonnisi elatum undique obsidentibus s. decurrentibus, habitum frondosum mentientibus. — Fr. syst. I. I. *Boletus frondosus* Schrank. Flor. dan. t. 952. Schrad. spic. 159. Pers. syn. 520. Necs syst. f. 216. *B. ramosissimus* Schaeff. t. 127-129. *B. cristatus* Gouan. *B. intybaceus* Bmg.

Ad radices Quercuum rarissime. Auctumno.

2936. *P. giganteus* Fr., ascomatibus dimidiatis flaccidis latissimis subzonatis rivilosis spadiceo-pallidis, e stipe crasso brevissimo tuberoso assurgentibus imbricato-multiplicibus caespitemque giganteum informantibus. — Fr. syst. I. 356. *Boletus giganteus* Pers. syn. 521. Alb. et Schw. nisk. 244. *B. imbricatus* Sowerb. t. 86. *B. elegans* Bolt. t. 76. *B. acanthoides* Bull. t. 486. *B. mesentericus* Schaeff. t. 267. *Agaricus multiples* Dill.

Ad caudices fagineos patres rarius. Aestate.

D. mespodes, ascomatibus stipe perpendiculari simplici s. ramoso contiguo suffultis, pileatis, lenis. (Polypori tribus 1. *Mesopus* Fr. *Microporus* Palis. *Boleti milleporoi* Batesch. *B. petiolati* Hall.)

† *simplices*, ascom. simpliciter stipitatis.

2937. *P. debilis* W., ascomatibus exiguis coriaceis utrinque planiusculis orbiculatis tenuatis, supra stipiteque centrali farcto pileum aequante albidis, vellere tenui dilute fuscescente detergibili vestitis, poris albis patulis demum fascescentibus laceris. — *Polyporus debilis* W. in lit.

Ad comisuras quercinas internas fenestrarum caldarium patrum quoddam munieotium, semel. Aestote.

2938. *P. leptocephalus* Fr., ascomatibus carnosocoriaceis tenuibus glabris planiusculis cervinis, poris subrotundis minimis albis, stipite brevi pallido. — Fr. syst. I. 349. *Boletus leptocephalus* Jacq. miscell. I. 142. t. 12. Dicks. Pers. syn. 519. ?*B. fuscidulus* et *pallescens* Schrad. spic. 154. (*Iucus pileis pallidioribus*.)

Ad ligna antiqua, v. c. agri anhaltin. (Sckkuhr), nec non Hercyn. inferior. passim. Auctumno.

2939. *P. numularius* W., ascomatibus tenuatis planiusculis orbiculatis glabris parvulis duris albido-palescentibus, stipite subcentrali basi nigrescente, poris minutis subrotundis. — *Polyporus varius* β. *numularius* Fr. syst. I. 353. *Boletus numularius* Bull. Sowerb. Schrad. spic. 152. Pers. I. L. Nees syst. f. 214.

Ad ramos dejectos passim.

2940. *P. fuligineus* Fr., ascomatibus carnosolentis orbiculato-cupularibus laevibus fuligineo-cinereis stipiteque centrali glabris, poris albis demum dilute cinerascentibus. — *P. fuligineus* Fr. I. I. *Boletus fuliginosus* Pers. syn. 516. *B. polyporus* Bull. t. 469.

Ad terram nudam nemorum thuring. rariss. Auct.

2941. *P. perennis* Fr., ascomatibus tenuatis coriaceis velutinis zonatis stipiteque inaequali subtuberoso brevi centrali cinnamomeis, primum cyathiformibus dein magis deplanatis saepius conuatis, poris minutis demum laceris concoloribus. — Fr. syst. 350. *Boletus confluens* Schum. *B. leucoporus* Holmsk. Nees syst. f. 213. *B. sub-tomentosus* Bolt. *B. pictus* Schultz. *B. cinnamomeus* Jacq. *B. cyathiformis* Vill. *B. Infundibulum* Roth. *B. coriaceus* Scop. Schaeff. t. 125. Bull. t. 28. t. 449. *B. perennis* L. Flor. dan. t. 1075. f. 2. Pers. syn. 518. (*B. connatus*) Nees syst. f. 212.

β. *fimbriatus*, ascomatibus umbrinis margine fimbriatis,

poris curvis irregularibus. *Fr. l. l. Boletus fimbriatus* Bull. t. 254. — *Mich. gen. t. 70. f. 8.*

Ad terram arenosam et ad caudices vetustos vicinos auctummo nec vere persistens, hinc vix perennis.

**2942. *P. melanopus* Fr., ascomatibus carnosis lentis albido-fuligineis cyathi - s. infundibuliformibus glabris, stipite crasso firme centrali, basin versus nigrescente suffultis, poris minutis rotundis albidis. — *Fr. syst. I. 347.*
a. infundibuliformis, ascom. infundibuliformibus. — *Fr. l. l. Boletus infundibulif.* Pers. syn. 516., icon. t. 4. f. 1.
β. cyathiformis, ascom. umbilicatis, stipite tenuiore. *Fr. l. l. Boletus umbilicatus* Scop. *B. melanopus* Pers. syn. l. l. Alb. et Schw. nisk. 242.**

Ad basin truncorum, β. ad ramulos dejectos passim.

2943. *P. planus* JV., ascomatibus coriaceis orbiculatis tennatis utrinque deplanatis, supra stipiteque centrali farcto, & basi incrassata emergente aequali pallide-fuscis, furfure parco mox deliquescente adpersis, tubulis brevibus hyalinis tenerrimis rotundis albis, apice laceris fimbriatis.

Ad terram sterilem glareosam humectam agri hering. Thuring. in consortio *Baeomycis rosei*, rarius.

2944. *P. brumalis* Fr., ascomatibus carnosō-lentis subumbilicatis villosis fuligineis expallentibus, demum glabrescentibus squamoso-cervinis, stipite hirsuto-squamuloso crasso albido-fuscescente suffultis, poris albis subangulatis, dein pallentibus. — *Fr. syst. I. 348.*

a. vernalis. — *B. pictus* Ehrenb. sylv. 31 *B. ciliatus* Flor. dan. t. 1297. *B. fasciculatus* Schrad. Pers. syn. *B. polyporus* Retz.

β. auctumnalis. — *B. trichocephalus* Ehrenb. *B. brumalis* Pers. syn. 517. *B. hypocrateriformis* et *umbilicatus* Schrank. *B. pusillus* Schrad. *B. lacteus* Batsch f. 42. *Elvella Pileus* Schaeff. t. 281.

Ad trunco putres et quidem auctummo sero, colore obscuro, fere nigrescente porisque brevioribus, veris tempore, lutescente magis redire ideoque facile decipere solet.

2945. *P. arcularius* Fr., ascomatibus suberosis flavescentibus, margine deflexo hispidis, stipite centrali laevi dilute fusco suffultis, poris rhombearia albis. — *Fr. syst. I. 342. B. exasperatus Schrad. B. arcularius Batsch. Pers. l. l.*

Ad trancos Hercyn. superioria rarius. (*Schrader.*)

2946. *P. ovinus* Fr., ascomatibus carnosis fragilibus ex albo-dein lateoque fuscescentibus, stipite brevi centrali inaequali crasso, nonnisi tuberoso s. excentrico suffultis, poris subrotundis exiguis albo-citrinis. — *Fr. syst. I. 346. B. ovinus Schaeff. t. 121. 122. Flor. dan. t. 1618. Nees syst. f. 210. B. albidus Pers. syn. 515.*

In pinetis montosis passim.

2947. *P. sub squamosus* Fr., ascomatibus carnosis lentis compactis albidis inaequalibus diffracto-squamosis, stipite obeso crasso glabro albido-cinereo suffultis, poris flexuosis niveis exiguis. *Fr. syst. I. 346. B. carinthiacus Pers. syn. 514. B. subsquamulosus L. Jacq. Wulff.*

β. leucomelus, ascom. sublaevibus stipiteque fuligineo-nigriscantibus, poris candidis aequalibus. *Fr. l. l. B. leucomelas Pers. syn. 515. Alb. et Schw. nisk. 241.*

Var. α . in pinetis montosis austriacis β . in saltu hercyn. rarissima. (*Persoon.*)

2948. *P. Schweinitzii* Fr., ascomatibus suberosis giganteis tomentosis fusco-ferrugineis, margine subtusque sulfureo-virescentibus polymorphis, aliis infundibuliformibus stipato-caespitosis, aliis dimidiatis stipitem varium curtum exserantibus, poris magnis difformibus laceris. *Fr. syst. I. 351. P. sistotremoides Dub. Sistotrema ferrugineum Pers. myc. II. 205. B. sistotremoides Alb. et Schw. nisk. 243. B. perennis 2. Scop. carn. II. 466.*

In nemoribus umbrosis ad basin truncorum, v. c. Lusatiae superior. (*Albertini et Schweinitz.*)

†[†] *ramosus*, stipitibus *ramosis multiplicibus*.

2949. *P. umbellatus* Fr., ascomatibus integris orbiculatis umbilicatis pallide-fuligineis s. ex luteo-albo-

que pallentibus, stipitibus teretibus elongatis basi coalitis suffultis caespitesque ramosissimos squarrosos polycephalos constituentibus, poris inaequalibus ad stipitem coquolorem saepius decurrentibus. — *Fr. syst. I.* 354.

a. fuligineus, ascom. pallido-fuligineis. — *Fr. I. I.* *B. umbellatus et polycephalus Pers. syn.* 519. *Nees syst. f.* 215. *B. ramosissimus Scop. Schaeff. t.* 111. 265. 266. *Jacq. austr. t.* 172.

b. ochraceus, ascom. subrafis s. fusco-ochraceis. — *Fr. I. I. B. ramosus Flor. dan. t.* 1197.

In fagetis nemorosis, agri v. hannoveran. (Persoon), Hercyn. iuxta. et alibi suisque locis rarissime. Autumno.

NB. Corollarii loco monstrum deforme alias cujuscunque stirpis interim addo:

2950. *P. cryptarum Fr.*, ascomatibus spongiosis effuso-reflexis fuligineo-ferrugineis imbricatis s. capitato-adscendentibus sericeo-tomentosis, poris longissimis, aliis rotundis, aliis hiantibus. — *Fr. syst. I.* 376. *B. cryptarum Bull. t.* 478. *Pers. syn.* 542. *Nees syst. f.* 222. *B.*

Ad trabes querinas et abietinas in cryptis patulis passim, per totam annem.

339. BOLETUS DILL. Rockröhrlungen.

Ascoma carnosum, siccando saepius stupposum molle, hemisphaericō-explanatum orbiculato-pileatum, stipite centrali suffultum, ex aversa parte tubulis cylindricis s. angulatis discretis, inter se secedentibus, in complexum stratosum leviter conjunctis, perviis, intus ascophoris obturatum. Asci subcylindrici, sporidiis exiguis subglobosis foeti.

(*Boletus Dill. L. Pers. ex emend. Fr. B. suilli Wah- lerb. suec. B. discreti Spr. syst. Hypodrys Pers. comm. Agarici sp. Lam. Suillus Mich.*)

† nudi, stipite nudo (i. e. annulo et cortina destituto. (*B. hyporrhodii et leucospori Fr.*)

2951. *B. cyanescens Bull.*, ascomatibus compactis rigidis stramineo-s. fuligineo-tomentosis acute marginatis,

fractis alborem internum cum viola debili mutuantibus laticemque coerulecentem stillantibus, tubulis liberis rotundis brevibus albo-flaventibus leucosporis, stipite farcto laevi ventricoso. — Bull. t. 369. Fr. syst. I. 395. *B. constrictus* et *amarus* Pers. syn. 508. *B. fulvidus* et *testaceus* Pers. myc. (lucus píleo magis fulvo.)

In nemoribus patruis passim. Aestate exente.

2952. *B. felleus* Bull., ascomatibus molibns glabris planis luteo-castaneis, fractis roseis, tubulis prae-longis angulatis albis rhodosporia, stipite attenuato reticulato. — Bull. t. 379. Fr. syst. I. 394. *Alb.* et Schw. 240. (pileo fulvo-fuligineo.) *B. alutarius* Fr. obs. I. 115.

In pinetis v. c. Hercyn. super. et Lusatiae. Aestate.

†† cortinati, ascomatibus vole fugaci plerunque instructis.

2953. *B. edulis* Bull., ascomatibus amplis hemisphaericis glabris, dein dilatatis albido-fuligineis saepius dispanso-reticulatis, tubulis semiliberis subtrotundis minutis albis, mox flavicantibus, stipite crasso, raro subaequali reticulato. — Bull. t. 60. 494. Fr. syst. I. 392. *B. dulcis*, umbrinus et tuberosus Pers. *B. esculentus* Pers. *B. crassipes* Schum. *B. bulbosus* et *reticulatus* Schaeff. t. 134. 135. — Mich. gen. t. 68. f. 1.

In nemoribus nostris suo tempore ubertim.

2954. *B. castaneus* Bull., ascomatibus subvillosis castaneo-lateritiis, fractis albidis immutabilibus, tubulis semiliberis minutis ex albo-flaventibus, dein sordide-lutescentibus, stipite sursum attenuato subfalso laevi. — Bull. t. 328. Pers. syn. 509. Fr. syst. I. 392.

In fageticis nostratis passim. Auctumno.

2955. *B. luridus* Schaeff., ascomatibus speciosis succosis pulvinatis subtomentosis olivaceis, dein subviscosis fulvo-fuligineis, tubulis subliberis rotundis luteis, ore rubentibus, stipite crasso reticulato rubro. — Schaeff. t. 107. Pers. syn. 512. Fr. syst. I. 391. *B. rubeolarius* Bull. t. 100. 490. *B. mutabilis* Schult. *B. tuberosus* Schrad.

B. subfuscus Schrank. *B. sanguineus* Pers. *B. bovinus* Bolt. (var. *stipite curto obsolete reticulato*.)

B. erythropus, ascomat. fusco-umbriuis decoloribus, stipite attenuato, furfuribus squamulosis adsperso. *Fr. l. l.* *B. erythropus* Pers. syn. 513.

In nemoribus passim. Aestatis fine.

2956. *B. pachypus* Fr., ascomatibus obesis pulvinatis subtomentosis alutaceis siccis, tubulis liberis rotundis flavis, stipite crasso reticulato flavo-rubro. *Fr. syst. I.* 390. *B. vitellinus* Pers. obs. *B. elatus* Pers. myc.

B. mutabilis, ascom. olivaceis. *Fr. l. l.* *B. mutabilis* Schrad. epic. 145. excl. syn. *B. olivaceus* Schaeff. t. 105.

In nemoribus, tum frondosis, tum acerosis vulgaris. Auct.

2957. *B. calopus* Pers., ascomatibus pulvinatis subolivaceis, fractis (intus) coerulecentibus, tubulis adnatis angulatis flavis, stipite subaequali reticulato coccineo. — Pers. syn. 513. Nees syst. f. 208. *Fr. syst. I.* 390. *B. terreus* Schaeff. t. 315.

In promontoriis graminosis passim. Auct. (Potius seq. var.)

2958. *P. radicans* Pers., ascomatibus pulvinatis cinereo-flavescens, margine involuto tomentosis, tubulis stipiteque laevi radicato tomentoso citrinis. — Pers. syn. 507. *Fr. syst. I.* 390.

In quercetis patruis passim. Auctumno sera.

2959. *B. subtomentosus* L., ascomatibus pulvinatis siccis in areolas polygoas dehiscentibus subtomentosis versicoloribus (gilvis, fascis, aeneis), fractis flavis, tubulis adnatis magnis angulatis luteis, stipite subaequali firme rigido glabro flavo-rubente. — *Fr. syst. I.* 389. *B. chrysenteron* Bull. t. 490. *L.* Pers. syn. 506. Nees syst. f. 206. *B. bovinus* Flor. dan. t. 1074. *B. communis* Bull. t. 393. *B. cupreus et crassipes* Schaeff. t. 133. 112. *B. luteus* Bolt. t. 84. *B. sanguineus* With. (*pileo sanguineo*.)

In nemoribus fere ubique. Aestate sera.

2960. *B. Satanas* Lens, ascomatibus obesis stipatis pallide-stramineis viscidulis, fractis albidis cum ra-

bedine violaque subente, tubulis lutecentibus, ore lateritiis, sauciis violaceis, stipite brevi crasso atro-sanguineo, sarsum reticulato. — Lenz Schw. 67. t. 8. f. 33.

In quergetis Thuring. passim. (Lenz.) Auctumno. (Lenzio teste ex venenatis est, si quidem aliter a B. pa-chypode satis diversus.)

2961. *B. variegatus* Sw., ascomatibus plano-convexusculis humidis fasciculato-pilosis obscurae luteis, tubulis adnatis rotundis angustis ferrugineis, stipite firmo aequali laevi luteo-rufescente. — Fr. syst. I. 388. *B. reticulatus* f. Alb. et Schw. nisk. 240. ? Pers. syn. 508. (dubius et forsan diversus.) *B. guttatum* Pers. myc.

In pinetis haud quidem raro. Auctumno.

2962. *B. piperatus* Bull., ascomatibus primum convexis, dein planis glabris flavo-gilvis viscosis, saepius irregularibus, tubulis adnatis majusculis angulosis tenuissime pubescentibus (ex uscis conglomeratis fuscis) rufoferrugineis, stipite crasso laevi fragili flavescente, intus basique flavissimis. — Bull. t. 451. Pers. syn. Fr. syst. I. 388. Nec syst. f. 207. *B. ferruginatus* Batsch cont. I. f. 28.

In ericetis nemusculisque vicinis passim. Auctumno.

2963. *B. bovinus* L., ascomatibus planiusculis subviscosis gilvis, tubulis adnatis angulatis inaequalibus, aliis majoribus cum minoribus mixtis, primum gryseo-flavia, deinde ochraceo-ferrugineis, stipite laevi teoui glabro dilute-flavo. — L. Fr. syst. I. 388. *B. gregarius* Fl. dan. t. 1018. *B. circinatus* Alb. et Schw. nisk. 239.

In pinetis Lusatiae v. c. et alibi passim. Auctumno.

2964. *B. scaber* Bull., ascomatibus pulvinatis utrinque convexusculis glabris e fulvo rufescentibus, fractis albidis immutabilibus, tubulis liberis rotundis albis, dein dilute fuscenscentibus, stipite firme attenuato elato squamoso s. punctato-scabro. — Fr. syst. I. 393. *B. viscidus* L. *B. converus* Retz. — *B. chionense* Fr. obs. *B. procerus* Bolt. t. 86. (ascom. candido, acrugineo s. olivaceo.) — *B. leucopodium* Pers. obs. (ascom. fulvo, squa-

squamulis stipitis albis.) — B. aurantius Bull. t. 236. (ascom. squamulisque subaurantiacis.) — B. rufus Schaeff. t. 103. et 104. (ascom. subrufo, squamulis nigris.) — B. scaber Bull. t. 132. 489. Schrad. Pers. syn. 505. B. bovinus Schaeff. t. 104. Flor. dan. t. 833. (ascom. subfuligineis, squamulis nigris.)

In nemoribus nostris abundat auctummo.

5965. *B. floccipes* Vahl, ascomatibus compactis pulvinatis gryseis, dein nigrescentibus tomentoque fasciculato obsessis, tubulis subliberis longis candidis, stipite elato crasso velato squamoso. — Vahl fl. dan. t. 1252. Fr. syst. I. 593. *B. cinereus* Pers. syn. 504. *B. leucophaeus* Pers. myc. II. 140.

In fageticis umbrosis rarius. Auctummo ineunte.

2966. *B. stygicus* W., ascomatibus umbonatis, deinde nigro-fuscis in areolas convexas subquadrangulas glabras profunde distractis, intus stipiteque lacunoso-striato suberoso-stupposis pallidis, tubulis amplis subcylindricis, ore quadrangulo hiantibus concoloribus, aacia castaneis maguis ovalibus uberrimis suffusiis.

In nemoribus et pinetis Hercyn. superioris rarius. (IV.)

2967. *P. squarrosum* Pers., ascomatibus nigrescenti-umbrinis hemisphaericis pulvinatis, supra in squamas crassas squarrosso-assurgentibus densas solatis, tubulis majusculis albis, stipite longo apicem versus sulcato, basi fuligineo, cortina tomentosa. Pers. myc. II. 145. t. 20. ?*B. strobilaceus* Scop. Fr. elench. I. 127.

Ad trunco petrae Pini Piceae m. vogesi. (Mougeot.)

†† annulati, stipite annulato.

2968. *B. granulatus* L., ascomatibus compactis lutescentibus mollibus, glutine fusco dein secedente collinitis virgato-stramineis, tubulis adnatis manusculis subsimplicibus lateis, stipite elato deorsum attenuato, primum ex albido-flavente, dein punctato-scabro. — L. sp. II. 4647. Fr. syst. I. 387. *B. circinans* Pers. syn. 505.

Nees syst. f. 205. *B. inquinans* Schrad. *B. flavo-rufus,*
aureus, ferrugineus Schaeff. t. 115. 123. 126.

In nemoribus nostris et pioetis vulgaris, alibi rariss. Auct.

2969. *B. flavidus* Fr., ascomatibus umbonatis viscosis sordide flaventibus, tubulis adeoatis angulatis subdecurrentibus inaequalibus subconcoloribus, stipite tenui laevi, annulo viscoso. — *Fr. syst. I.* 387. *B. luteus* Linn.

In aluetis et pioetis humidis Hercyn. passim. Auct.

2970. *B. luteus* L., ascomatibus compactis magnis flavescens, glutine fusco in maculas virgatas secedente oblinitis, tubulis adnatis rotundis luteis, stipite firme annulato, apicem versus punctato-scabro. — *L. sp.* Schaeff. t. 114. *Fr. syst. I.* 386. *B. annulatus* Bull. t. 316. 332. *Flor. dan.* t. 1135. *Nees syst.* 304. *Pers. syn.* 593. *B. cortinatus* Pers. l. l. *B. flavus* Willd. *B. annulatus, de-*
currens et elegans Schaeff.

Ad margines semitaram in pioetis passim. Auct.

340. BUGLOSSUS WAHLENB. Zungenschwamm.

Ascoma fibroso-carnosum succosum, e basi brevi (saepe nulla) sensim in ramicem linguisiformem obesum s. pileum dimidiatum succrescens, subius pavimento floccoso, verrucis tabulosis dein emittentibus obsoito tectum. Tubuli distincti liberi, primum apice papillato clausi, dein sperti, intus ascis minutis (dilate-fuscescentibus) foeti.

(*Buglossus Wahl. Fistulina Bull. Fr. Lk. Boleti sp. H.*)

2971. *B. quercoinus* Wahlenb., ascomatibus crassis carnis succosis, e basi laterali brevi crassa dimidiato-pileatis sublinguisiformibus fusco-sanguineis, tubulis discretis concoloribus. — *Wahlenb. suec. II.* 961. *Fistulina buglossoides* Bull. t. 74. 464. 497. *F. hepatica* Fr. syst. I. 396. *Hypodrys* Pers. myc. *Boletus Buglossum* Rets. *Flor. dan.* t. 1039. *B. hepaticus* Huds. Schaeff. t. 116—120. *Pers. syn.* 549. — *Mich. gen.* t. 60.

Ad tanticas, praeprimitas quercinas, nec non fagineas Thuring. v. c. rariss. Auctumao.

y. radulares, ascomatibus ex alteraque; (in resupinatis superiore, in sessilibus stipitatis inferiori) parte tubercula verrucosa s. radulas (aculeos auct.) subuniformes exserentibus iisque veluti strato verrucoso s. spinuloso munitis et inhorcentibus.

(*Fungi hydnacei Fr. Dub.*) Ex verrucis radulac subuliformes succrescant.

341. HYDNUM L. Stachelchwamm.

Ascoma floccoso-carnosum, ex aversa, s. resupinationis casu (saepius monstroso) interveniente, antica parte stratum conforme, ex radulis propexis clavis subulatis s. incisis, extus ascis tenuibus foetis vestitis muricatum exserens, nunc resupinato-adnatum, nunc dimidiatum, nunc stipitatum s. metismoideum.

(*Hydnum L. nec graecor. Hericium et Odontia Pers. Hericus Juss. Bidona, Martela, Somion Adans. Echinus Hall. Erinaceus et Agarici ordo Mich. Dill.*)

† resupinata, ascomatibus resupinatis effusis, nonnisi subiculiformibus, undique adnatis immarginatis, ambitum byssinum saepius spargentibus, superne radulas varias exserentibus.

* radulis variis, compressis, incisis s. subangulatis, colorum variorum.

2973. *H. byssinum* Schrad., ascomatibus adnato-resupinatis tormentosis candidis, hinc radulas subulatas glabriusculas exserentibus. — Schrad. spic. 177. Fr. syst. I. 425.

Intra Salices cavae passim.

2973. *H. subtile* Fr., ascomatibus adnato-resupinatis tenerrimis effusis glabria aquose-albidis, radulis granuliformibus tenuiter incisis sparsis. — Fr. syst. I. 425. *H. ochroleucum* v. *subtile* et *H. acutum* Pers. myc. II. 179.

Ad ligna betulina putrida rarius.

2974. *H. argutum* Fr., ascomatibus adnato-resupinatis effusis subiculiformibus tenuissimis tormentosis

candidis, radulas acutas densas serrulatas tenuiter tomentosae emittentibus. — *H. orgutum* Fr. L. L.

Ad ligna betulina putrida passim.

2975. *H. quercinum* Fr., ascomatibus adnato-resupinatis tenuibus effusis glabris albo-pallentibus, radulis crassis obliquis subcompressis, saepius incisis difformibus. — Fr. L. L. *Sistotrema quercinum* Pers. syn. 552. Nees syst. f. 239. *Odontia quercina* Pers. obs. *H. candidum* Willd.

Ad ligna quercina passim.

2976. *H. fagineum* Fr., ascomatibus adnato-resupinatis siccetibus effusis glabris albo-pallescensibus, radulis confertis elongatis connato-fasciculatis obtusis integris. — Fr. L. L. *Sistotrema fagineum* Pers. syn. 552.

Ad ramos fagineos passim.

2977. *H. imbriatum* DC., ascomatibus adnato-resupinatis effusis membranaceis subcostatis incarnato-rufis, ambito fimbriato cinctis, radulis chartis obtusis dein multifidis. — DC. gall. VI. 37. Fr. L. L. *Sistotrema imbriatum* Pers. obs., syn. 553.

Ad ramos fagineos et carpineos minime rarum.

2978. *H. viride* Fr., ascomatibus adnato-resupinatis tenerrimis effusis tomentosis mollissimis viridibus, radulis erectis crassiusculis difformibus subincisis. — Fr. L. L. *Sistotrema viride* Alb. et Schw. nissk. t. 6. f. 4.

Ad ligna alnea, v. c. Lusatiae super. (Alb. et Schw.)

2979. *H. Hollii* Fr., ascomatibus adnato-resupinatis effusis membranaceis lilacino-fuscis, ambito dilutione albo cinctis, radulis erectis difformibus incisis. Fr. L. L. *Sistotrema Hollii* Schmidt. ?*S. carneum* Ehrenb. sylv. 30.

Ad ligna picea humi jacentia rarius.

† radulis aequalibus teretibus integris.

2980. *H. ilveum* Pers., ascomatibus adnato-resupinatis effusis submembranaceis albis, ambito byssino cinctis, radulis confertis acutiusculis exiguis. Pers. syn. 563. Nees syst. f. 246. Fr. syst. L. 419.

Ad caudices putridos passim.

2981. *H. crustosum* Pers., ascomatibus adnato-resupinatis effusis tenuissimis subcubiformibus subfarinaceis candidis, radulis confertis subdifformibus minimis obtusiusculis. — Pers. syn. 562. Fr. syst. I. 419. Ness syst. f. 247. *Odontia crustosa* Pers. obs. II. 16.

Ad ligna salicina putrida passim.

2982. *H. farinaceum* Pers., ascomatibus adnato-resupinatis subcubiformibus effusis farinaceis, ambitu subbassino cinctis, radulis acutis tenuissimis sparsis. Pers. Fr. I. I.

Ad caudices putredine excesso frequens.

2983. *H. obtusum* Schrad., ascomatibus adnato-resupinatis membranaceis caudidis, radulis obtusis teretibus, apice villosis. — Schrad. spic. 178. Pers. Fr. I. I.

In similibus cum praeced. locis, passim.

2984. *H. diaphanum* Schrad., ascomatibus adnato-resupinatis effusis tenuiter papyraceis glabriusculis pellucentibus albidis, radulis subulatis distinctis dein albo-flaventibus. — Schrad. I. I. t. 3. f. 3. Pers. Fr. I. I.

Ad trunco fagineos et betulinos macidos passim.

2985. *H. mucidum* Pers., ascomatibus adnato-resupinatis membranaceis, subtus ambituque villosulis, radulis confertis longis acutis subdeclinatis. — Pers. syn. 561. Fr. syst. I. 418.

Ad caudices Sorbi et Fagi putres rarior.

2986. *H. fasciculare* A. et Schw., ascomatibus adnato-resupinatis albidis cum radulis fasciculatis longis propexis confluentibus. — Abb. et Schw. misk. 269. t. 10. f. 9. Fr. I. I.

Ad trunco pineos putridos frequens.

2987. *H. fragile* Pers., ascomatibus adnato-resupinatis tenuiter membranaceis effusis albidis, radulis longissimis opacia rectis subflexuosis fragilibus. — Pers. syn. 561. Fr. I. I.

Ad trunco macidos agri misniaci. (Ludwig.)

2988. *H. microdon* Pers., ascomatibus adnato-

resupinatis effusis coriaceis ochraceo-carnesis, radulis con-
gestis tenuibus acutis. — Pers. syn. 561. Fr. l. l.

Ad trabes fodiens lithanthr. mont. Meissner. (Pers.)

2989. *H. ferruginosum* Fr., ascomatibus adnato-
resupinatis, stipato-tomentosis ferragineis, primum orbicu-
latis, ambitu dilutiore ciuctis, dein effusis, radulis te-
retibus acutis confertissimis subobliquis coicoloribus parce
tomentosis. — Fr. syst. I. 416. *H. ferrugineum* Pers. l. l.
Nees syst. f. 248.

Ad trunco udos, paeprimis populeos rarius. (Cf.
Ceratium ferrugineum mecum p. 205.)

2990. *H. fuscocastaneum* Fr., ascomatibus adnato-
resupinatis, primum orbiculatis glaucis glabriusculis, dein
effusis ferrugineo-fuscis latissime expansis, radulis brevi-
bus obtusiusculis cervinis, demum nigricantibus. — Fr.
syst. I. 416.

β . *castaneum*, ascom. subvillosis glaucis, dein badiis,
radulis longis confertis. Fr. l. l. *H. castaneum* Alb. et
Schw. nisk. 269.

Ad trunco populeos et betulinos putres, rarius.

2991. *H. tremellosum* W., ascomatibus adnato-
resupinatis carnosò-tremellosis carneo-rubentibus orbicu-
latis, praeter ambitum dilatiorem villosulum glabris, ra-
dulis confertis cylindricis longis propexis a. decumbenti-
bus acicularibus glabris, basi confluentibus.

Ad caudices salicinos putres agri thuring. rarius. (Co-
lor et substantia Merulii tremellosi Fr.)

2992. *H. macrodon* Pers., ascomatibus adnato-re-
supinatis rufescens cum radulis obliquis longissimis
pendulis basi connatis confluentibus. — Pers. syn. 560.
Fr. syst. I. 415.

Ad trunco piaceos in agro misnico. (Ludwig.)

†† *apodes*, ascomatibus sessilibus dimidiato-pileatis,
latere horizontaliter adfixis planis marginatis.

2993. *H. ochraceum* Pers., ascomatibus apodibus

effuso-reflexis tenuiter coriaceis zonatis ochraceis, radulis minutis confertis ochraceo-carneis. — Pers. syn. 559. Alb. et Schw. nisk. 268. Fr. syst. I. 414. 7S. Schulz-morlini Spr. hal. 377.

Ad ligua abietina passim.

2994. *H. strigosum* Sw., ascomatibus dimidiato-pileatis sessilibus coriaceis crassiusculis rugosis fuscis planiusculis subimbricatis, supra squamis adpressis palmo-incisis setosis saturationibus obsessis, radulis confertis aequalibus rigidis longis albo-variegatis, dein gryeo-cinerascentibus. — Sw. Fr. syst. I. 414. *H. parasiticum* Pers. icon. t. 14. f. 1., syn. 558. Nees syst. f. 245.

Ad arbores frondosas, v. c. agri berolin. (Ehrenberg.)

2995. *H. crispum* Schaeff., ascomatibus dimidiato-pileatis sessilibus coriaceis lobatis squamoso-plicatis rufo-fuscis planiusculis irregulariter imbricatis inque basin stipitiformem brevissimam porrectis, radulis imbricatis pallide-rufescens. — Schaeff. t. 147. Fr. syst. I. 413.

Ad trunco putridos German. austr. (Schaeffer.)

2996. *H. lacteum* Fr., ascomatibus dimidiato-pileatis sessilibus coriaceis conchatis, e basi concreta imbricatis albis, supra villosis, radulis confertis longis compressiusculis acutis subincisis. — Fr. syst. I. 412. *Sistotrema lacteum* Fr. obs. II. 266.

Ad ramos putres dejectos, fagineos, Hercyn. iuxta.

2997. *H. cirrhatum* Pers., ascomatibus dimidiato-pileatis carnosis subreniformibus albidis, supra muricibus sparsis decumbentibus, versus marginem prominentibus fibrillosis, radulis aequalibus tenacibus gracilibus longissimis, denum (siccando) rufescens. — Pers. syn. 558. Fr. syst. I. 411. *H. paradoxum* Schultz.

Ad trunco fagineos et quercinos rarius.

+++ pleuropodes, ascomatibus inaequaliter pileatis, stipite excentrico lateralí suffultis. (*Tremellodon* Pers. myc.)

2998. *H. gelatinosum* Scop., ascomatibus gelatinosis papulosia, e basi stipitiformi brevi laterali in pileum

dimidiatum dilatatis, radulis mollibus pyramidatis glaucis teuacellis. — Scop. carn. II. 472. Pers. syn. 249. Fr. syst. I. 407. *H. crystallinum* Flor. dan. t. 717.

Ad trunco abietinos passim. (*H. gelatinosum* Schaeff. t. 144. Nees syst. f. 244. forsan var. insignis; var. horridam, ascom. undique radulis obsessum Jacq. coll. I. 139. t. 9. reddit.)

2999. *H. Erinaceus* Bull., ascomatibus crassis carnosis elasticō-tenacellis albīs, e basi curta in pileum dimidiatum cordiformēm, supra fibrillis subfasciculatis laceris obsessum dilatatis maximis, intus subcancellatis concoloribus, radulis confertissimis propexis longissimis. — Bull. t. 34. Pers. syn. 560. Fr. syst. I. 408. *Hericium Erinaceus* Pers. obs. *Marina cordiformis* Scop. (monstr. subterr.)

Ad trunco quercinos et fagineos putres, rarius. Auct.

+++ mesopodes, ascomatibus coriaceis s. carnosis, stipite subcentrali perpendiculari cum pileo contiguo suffultis.

* ascomatibus subturbinatis coriaceo-suberosis.

3000. *H. Auriscalpium* L., ascomatibus umbo natis coriaceis horizontalibus tomentosis fusco-castaneis, raro calvis, hinc (postice) exciso-desciscentibus ibique stipitem erectum elatum basi muricato-tomentosum spadiceo-nigrum concipientibus subdimidiatis, radulis cylindricis subaequalibus acutis propexis glabriusculis tenacellis, non nisi rore caesio gryseis. — L. Schaeff. t. 143. Bull. t. 481. Flor. dan. t. 1020. Nees syst. f. 243. Grev. scot. t. 196. Fr. syst. I. 406. — Mich. gen. t. 72. f. 8.

Ad quisquilias pietas patredine coactas inque homum redactas in pueris minime raro. Per totum annum.

3001. *H. melaleucum* Fr., ascomatibus coriaceis imbricato-difformiterque concrecentibus striatis, primum fusco-purpurascens tibis, deinde coeruleo-nigricantibus, disco colliculosis, margine radulisque albīs, stipito nigricante, non nisi ramoso s. obsoleto. — Fr. syst. I. 406. *H. tomentosum* y. atro-album A. et Schw. *H. pullum* Schaeff. t. 273.

In campis abietinis ad terram muscosam rarius.

3002. *H. tomentosum* L., ascomatibus coriaceis
plano-infundibuliformibus rugoso-fibrosis zonatis, praeter
discum villosum glabrescentibus stipiteque aequali ferru-
gineis s. dilutius cinerascentibus, margine radulisque ulbis.
— *H. cyathiforme* Schaeff. t. 139. *Flor. dan.* t. 1020. f.
I. *H. tomentosum* L. Pers. syn. 556. Fr. I. I.
In pinetis editioribus passim. Auctummo.

3003. *H. connatum* Schultz, ascomatibus coria-
ceis gregariis infundibuliformibus fasciatis spadiceis,
stipe tenui nigro nitido glabro siccitatis, radulis ochraceo-
cinereis tenuibus. — *Schultz sterg.* 491. Fr. I. I.

In pinetis deensis agri stargard. (Schultz.)

3004. *H. cyathiforme* Bull., ascomatibus coriaceis
plano-infundibuliformibus zonatis glabrescentibus
stipiteque tenui subinaequali ferrugineis, radulis tenuibus
aequalibus pallidis, demum fusco-rufescens. — Fr.
syst. I. 405.

$\alpha.$ minus, ascom. minoribus, vertice squamoso-scrobicu-
culatis. Fr. I. I. *H. scrobiculatum* Fr. obs. *H. cyathi-
forme* Bull. t. 156. — Mich. t. 72. f. 7.

$\beta.$ majus, ascom. majoribus dilatatis glabris radiatis.
Fr. I. I. H. concrescens Pers. syn. 556. *H. sonatum*
Batsch cont. II. f. 224. Nees syst. f. 242.

In fagetis et quergetis passim ad trunca. Auctummo.

3005. *H. velutinum* Fr., ascomatibus subcoriaceis
gregariis infundibuliformibus laevibus velutinis azonis,
radulis stipiteque tomentoso testaceo-ferruginea. — Fr.
syst. I. 404.

In campis abietibus German. boreal. passim.

3006. *H. nigrum* Fr., ascomatibus coriaceo-suberosis
tomentosis azonis plano-depressis tuberculosis coeruleo-
nigricantibus, intus stipiteque basi subbulboso nigris, ra-
dulis albidis, dein cinereo-tomentosis. — Fr. syst. I. 404.

$\beta.$ olivaceum, ascom. olivaceo-cinereo. Fr. I. I. *H. pullum* Sw. *H. suberosum cinereum* Batsch cont. II. f.
221. *H. cinereum* Pers. myc. II. 164.

In pinetis subalpestribus rarius. Auctummo.

3007. *H. striatum* Schaeff., ascomatibus suberosis mollibus velutinis ferrugineis obconicis dein plano-depressis azonis, radulis stipiteque elato aequali concoloribus. — *H. ferrugineum* Fr. syst. I. 403. nec Pers. et Nees. *H. hybridum* Bull. t. 453. f. 2. *H. striatum* Schaeff. t. 271. *H. suberosum spongiosum* Batsch f. 221.

In pinetis collinis rarius. Aestate.

3008. *H. aurantiacum* A. et Schw., ascomatibus stipato-suberosis tomentosis ex albo aurantiacis, primum turbinatis, dein dilatatis, intus zonato stipiteque inaequali subbulboso brevi aurantiacis, radulis albis, dein sordide spadiceis. — Alb. et Schw. nissk. 265. Flor. dan. t. 1439. Fr. syst. I. 403. *H. suberosum aurantiacum* Batsch cont. II. f. 222. *H. floriforme* Schaeff. t. 146. f. 4.

In pinetis siccis editioribus rarius. Auctumno.

3009. *H. compactum* Pers., ascomatibus stipato-suberosis crassis, saepius e figura obconica descicando deformiter concrescentibus undulatis tomentosis olivaceo-cinereis, intus fusco-coeruleoqne variegatis, radulis aequalibus castaneo-fuscis, stipite brevissimo crasso, saepius obsoleto. — Pers. syn. 556. Alb. et Schw. nissk. 266. Fr. syst. I. 402. *H. floriforme* Schaeff. t. 146.

In ericetis pinetorum passim. Auctumno.

3010. *H. suaveolens* Scop., ascomatibus molliter-suberosis tomentosis albidis, primum obconicis, dein dilatatis, supra planis undulato-colliculosis, intus albo-coeruleoqne variegatis, radulis tenuibus aequalibus violaceis, stipite brevi inaequali parco tomentoso coerulecente. — Scop. carn. II. 472. Pers. syn. 558. Alb. et Schw. 267. Fr. syst. I. 402. *H. pullum* Fr. obs. *H. coeruleum* Pers. myc.

In pinetis subalpestribus siccis, v. c. Lusatiae super. (Alb. et Schw.) Auct. (Odore Anthoxanthi.)

* ascomatibus converiusculis subrepandis carnosis.

3011. *H. violaceens* A. et Schw., ascomatibus fibroso-carnosis repandis tomentosis sordide violaceis, nonnisi lobato-flexuosis, radulis aequalibus albis, stipite

inaequali firmo subtuberoso mediocri, nonnisi connato. — *Alb. et Schw.* nissk. 265. *Fr. syst. I.* 401.

In campis abietiis Lusatiae super. (*Alb. et Schw.*) Auct.

3012. *H. rufescens Pers.*, ascomatibus carnosis subtomentosis planivculis obsolete zonatis carneo-rufescentibus, radulis incarnato-ochraceis subaequalibus nonnisi incisia, stipite tenui aequali pallido longo. — *Pers. syn. 555. Fr. syst. I.* 401. *H. repandum Bolt.* t. 88.

In fageticis editoribus passim. Auctumno.

3013. *H. repandum L.*, ascomatibus carnosis glabris azonis albis a. flaventibus (incarnato-pallidis) polymorphis repandis, saepius rugoso-flexuosis sublobatis fragilibus, radulis inaequalibus integris compressis incisive stipite que difformi glabro obeso pallentibus. — *H. medium Pers. obs. H. carnosum et clandestinum Batsch clench. f. 136. 144. H. flavidum et rufescens Schaeff.* t. 318. 141. *H. repandum L. Flor. dan. t. 310. Bull. t. 172. Pers. syn. 555. Fr. syst. I.* 400. — *H. squamosum Schaeff.* t. 278. *H. imbricatum Bolt. Willd.* (*meras var. sistunt.*)

In nemoribus caeduis vulgaris. Aestate.

3014. *H. candidum Schm.*, ascomatibus carnosogelatinosis plano-convexusculis candidis, supra glabris pruinosis, radulis brevibus diaphanis sparsis, stipite crasso tuberoso albo. — *Schmidt myk. Hft. I.* 89. *Fr. I. I.*

Inter folia decidua fagetorum Saxon. (Schmidt.)

3015. *H. fuligineo-album Schm.*, ascomatibus carnosis difformibus lobatis roseo-albis, radulis albis, stipite crasso fuligineo. — *Schmidt I. I. Fr. I. I.*

In pinetis Silesiae et Saxoniae. (Schmidt.)

3016. *H. laevigatum Sw.*, ascomatibus carnosis pileatis subrepandis rugulosis azonis rufo-cinereis fragilibus, radulis albido-cinerascentibus, stipite laevi inaequali. — *Sw. Fr. syst. I.* 399. *H. leucopus et bubulinum Pers. myc. H. pulvinatum Schultz. H. imbricatum Vill.*

In pinetis collinis rarius. Auctumno.

3017. *H. subsquamosum Batsch*, ascomatibus

carnosis irregulariter pileatis diffracto-squamosis subzonatis testaceo-ferrugineis, radulis longis aequalibus albidis, dein fuscescentibus, stipite crasso inaequali demum rimoso-squamoso. — Batsch elench. f. 43. Fr. syst. I. 299. *H. imbricatum* Schum. *H. squamosum* Bull. t. 409. *H. badium* Pers. myc.

In similibus cum praeced. locis rarius. Auctumno.

3018. *H. imbricatum* L., ascomatibus carnosis pileatis planis tessellato-squamosis azonis umbrinisi, radulis teretibus albido-cinereis, stipite brevi firme deorsum attenuato. — L. Schaeff. t. 140. Flor. dan. t. 176. 1500. Pers. syn. 554. Fr. syst. I. 398. Grev. scot. t. 71. *H. cervinum* Pers. obs. *H. squarrosum* Nees syst. 240.

In pinetis editioribus minime raro. Auctumno.

+++ merismata, ascomatibus a figura pileata descentibus partitis, e basi crassa in ramicos plurimos ramiformes divulsis habitumque ramosissimum mentientibus. (*Hericium* Pers.)

3019. *H. coralloides* Scop., ascomatibus candidis dein lutescentibus, e basi in ramicos patentes attenuatos divulsis, veluti ramosissimis, undique a. hinc radulas aequales subuliformes exserentibus. — Scop. Schneff. t. 141. Fr. syst. I. 408. *H. ramosum* Bull. t. 390. *H. laciniatum* Leers. — *H. crispum* Scop. *H. abietinum* Schrad. *H. muscoideum* Schum. (actas juvenilis tenera.)

$\beta.$ *subterraneum*, ascom. undique radulis horridis. *Manina muscoidea* Scop. *H. muscoidea* Pers. *Clavaria madreporeiformis* Retz.

Ad troncos fagineos et abieticos rarissime; $\beta.$ in cryptis et cellis natis neque minus raro.

342. IRPEX FR. Raspelschwamm.

Ascom. subcoriaceum dimidiato-a. resupinato-pileatum, subtus scariosus homogeneis seriatim a. reticulatum dispositis exaratum ibique radulas discretas compressas a. teretiusculas, apicem versus ascis tenuibus foetas ex-

serens i. e. hymenium inferum plicatum dentato - radulare informans.

(*Hypes* Fr. syst. orb., *elench. Hydni* sp. auct.) Genus ab Albertini et Schweinitz jam praeuotatum, ob radulas non libere, sed ex scanno plicato illas comprehendente enatas Friesio praeante servandam. Ab Hydno, ut Merulius a Polyporo et Daedalea differt.

† resupinati, ascomatibus resupinatis effusis, supra scannis depresso reticulatis raduligeris exaratis.

3020. *I. obliquus* Fr., ascomatibus adnato-resupinatis effusis albo-pallescentibus ambitumque subtiliter hyssimum spargentibus, radulis compressis inaequalibus iucisia ex scanno sinuosus succrescentibus. — Fr. elench. I. 141. *Hydnum obliquum* Schrad. Fr. syst. I. 424. *Sistotrema obliquum* Alb. et Schw. nisk. 263.

Ad ramos fagineos et betulinos putres passim. Auct.

3021. *I. spathulatus* Fr., ascomatibus adnato-resupinatis effusis tenuibus albis, primum hypoideis, dein constipatis glabrescentibus, scanno reticulatum concrexis, dein in radulas rectas obtusiusculas subspathulatas exsuccrescentibus. — Fr. l. l. *Hydnum spathulatum* Schrad. spic. 178. t. 4. f. 3. Fr. syst. I. 423. ?*Xylodon candidum* Ehrend. sylv. 30. *Sistotrema spathulatum* Alb. et Schw. nisk. 263. Pers. syn. 553. Nees syst. f. 231.

Ad caudices abietinos putres passim.

†† apodes, ascomatibus dimidiato-pileatis sessilibus, scanno parallelis s. sinuosus raduligeris.

3022. *I. fusco-violaceus* Fr., ascomatibus dimidiato-pileatis dilatato-reniformibus subeffusis reflexis suberoso-coriaceis, supra sericeo-canescenscentibus, subtus fusco-violaceis, scanno dichotomis in radulas compressas discretas submembranaceas acutas sublamellosas concordes succrescentibus exaratis. — Fr. elench. I. 144. *Sistotrema violaceum* β. Pers. myc. *Daedalca decipiens* Sommerf. *D. fusco-violacea* Ficin. dred. *Hydnum fusco-violaceum* Fr. syst. I. 421. Schlechtld. berol. II. 197.

Sistotrema fuscoviolaceum Ehrenb. syst. 30. *Agaricus decipiens* Willd. in bot. Mag. IV. 12. t. 2. f. 5.

Ad truncos lignaque pinet, v. c. agri berolin. (Willdenow), dresdens. (Ficinus) et aliis locis passim.

843. SISTOTREMA FR. Schaufelschwamm.

Ascoma carnosum dimidiatum varie stipitatum, subtus radulis irregulariter dispositis brevibus planis gyrosoflexuosis lamellosis interruptis utrinque ascophoris exaratum.

(*Sistotrema Fr.* nec *Pers. Hydn* et *Sistotrem. sp. auct.*)

3923. *S. confluenta* Pers., ascomatibus gregaribus fragilibus albo-palescentibus carnosis flexuosis cum stipite sublaterali, nonnisi obsoleto confluentibus difformibus, radulia albida gyroso-confluentibus difformibus, radulia albida gyroso-lamellosis daedalica. — *Pers. syn. 551. Alb. et Schw. nissk. 260. Fr. syst. I. 426. Hydnus lamellosum* Bull. t. 453. f. 1.

In pinetis ad terram, praecipue ad latera viarum arenosa rarius. Auctumno.

s. lamellares, ascomatibus dimidiato-rotundoque pileatis, sessilibus s. stipitatis, rarius (ex monstri caseo) resupinatis, ex pagina inferiore plicis s. lamellis varie figuratis, liberis interque se trabeculis sinibusque connectis ascophoris exaratis. (*Fungi agaricini Fr. Dub.*) Ex plicis lamellae sunt.

844. PHLEBIA FR. Aderschwamm.

Ascoma effuso-resupinatum carnosulum, supra hymenio homogenee concreto glabro venoso-rugoso vestitum. Rugae plicatae interruptae parco prominulae irregulariter dispositae cum hymenio undique ascophorae.

3924. *PhL. vagia* Fr., ascomatibus effuso-resupinatis mollibus sulfureis, ambitum hyssimum spargentibus plicasque vagas distantes informantibus. — *Fr. syst. I. 428.*

Ad cortices alnos putres rarius, cautius tamen ab Hyphodermate sulfureo dignoscenda. Auctumno.

3025. Phl. radiata Fr., ascomatibus orbiculatis resupinatis carnosò-membranaceis saturate-carnetis, supra plicis e centro radiantibus brevibus confertis flexis seriatis, versus ambitum radiatum evanescentibus exaratis. — *Phl. radiata et contorta Fr. syst. I. 427., elench. II. 154.* (quo loco plures ex colore enumerantur lusus.)

Ad trunco betulinos putres, v. c. Hercyn. superior. passim. Auctumno.

3026. Phl. merismoides Fr., ascomatibus effuso-resupinatis carneo-rubris, subtus villosis albis, margine aurantio-piloais, raro adnatis, saepius in tubercula papilloso-venosa desciscentibus. — *Fr. syst. I. 427. Grev. scot. t. 280. Merulius fulvus Lasch in Schleid. Linn. 1829.*

Ad ligna faginea vicinosque muscos, in quibus saepe daedaleas jactat formas. Auctumno sero.

845. MERULIUS HALL. *Faltenchwamm.*

Ascoma resupinatum stipato-floccosum, saepius inconditum, late expansum s. subfigurato-pileatum, ex aversa (superiore) pagina hymenium plicis gyroso-s. sinuato-flexuosis homogeneis interrupte ascophoris exoratum informans.

(*Merulius Hall. Schrad. Pers. ex emendat. Fr. Xylomyzon Pers. myc. Xylophagus Lk. obs.*)

3027. M. Corium Fr., ascomatibus primum tuberculatis clausis implexo-tomentosis albidis, dein latuscula reclivando hymenium immerso-discoideum pallidum politum monstrantibus depresso-cupularibus, demum sive deplanatis effuso-resupinatis praeter ambitum villosum subliberum arcte adnatis, sive e basi hinc decurrente adnata dimidiato - flabelliformibus propaxis semiliberis, hinc stipato-tomentosis azonis pallidis, hinc (ex aversa pagina) carnosò-tremellosis glabris carneo-pallentibus, plicis magis minusve costatis exaratis. — *Fr. elench. I. 58. Thelephora Corium Pers. Grev. scot. t. 147. Polyporus Corium Pers. myc. Boletus purpurascens DC. Auricularia papyrina Sowerb. (teste Klotzschio.)*

Ad ramos salicinos putrescentes in septentris udis Thuring. passim. Nyeme.

3028. *M. aureus* Fr., ascomatibus adnato-resupinatis effusis, præter ambitum pallidum villosum aureis constipatis, supra plicis crassis gyroso-venosis. — Fr. elench. I. 62. *M. vastator* Fr. syst. I. 329.

Ad ligna abietina putrida foliisque vicina rarius. Hyeme.

3029. *M. Vastator* Tode, ascomatibus adnato-resupinatis, dein longe lateque expansis, extus intusque stipato-fibrosis pallentibus, hinc plicis emersis quadrangularis poros siuatos mentientibus exaratis flavo-ferrugineis stillantibus, postice ambituque saepius demum solutis albo-tomentosis similemque hypham penitus penetrantem emitentes. — *M. Vastator* Tode accib. I. 351. t. 2. f. 1. Pers. syn. 497. Alb. et Schw. nisk. 236. *M. Crucibulum* Fr. obs. I. 99. (juvenis, magis cupularis.) *M. lacrimans* Schum. saec. II. 371. *M. destruens* Pers. syn. 496. *Boletus arboreus* Sowerb. t. 346. *B. lacrymans* Wulf.

B. hydnoideus, ascomatibus plicatis, dein in radulas propexas succrescentibus. — Fr. I. I. *Sistotrema cellare* Pers. syn. 554. *Boletus obliquus* Bolt. t. 74.

Ad ligna quaecunque putredine uida adgressa; aedificiorum minus solerter exstructorum in trabibus murorumque lateribus, a sole et ventis retractis pestis illa vulgaris et nefaria. Per totum annum. (Aliorum Hyphomycetum (*Byssi floccosae* Schreb. v. c. *Coniophorarum ipsorum* forsitan) mater feracissima. Plicae saepius decumbunt, liant et verum Polyporum praestant.)

3030. *M. serpens* Tode, ascomatibus adnato-resupinatis carnoso-membranaceis siccis rubentibus, præter ambitum simbriatum album glabris, hinc plicis primum rugosis, dciu siuato-porosis angulatis exaratis. — Tode in act. soc. hal. I. 355. Pers. syn. 497. Alb. et Schw. nisk. 237. Fr. syst. I. 327. *Xylomyzon crustosum* Pers. myc.

Ad ligna ramosque in locis uidis putrescentes. Perennis.

3031. *M. rufus* Pere., ascomatibus adnato-resupinatis cartilagineo-membranaceis glabris carneo-rufescensibus, hinc plicas porosas oblongas lacernas in-

formantibus. — Pers. syn. 498. *Xylomyzon rufum* Pers. myc. *X. isopyrum* Pers. (junius.)

Ad truncum carpineum agri gotting. (Persoon.)

3032. *M. paucirugus* Dub., ascomatibus adnato-respinatis flavo-brunneis tenuibus cubilia incrustantibus ambitumque villosulum albicantem spargentibus, hinc plicas paucas latas transversim reticulatas informantibus. — Dub. gall. II. 796. *Xylomyzon paucirugum et porinoides* Pers. myc. II. 33. t. 14 f. 6.

Ad ligna putrida v. c. montis vogesi. (Mougeot.)

3033. *M. tremellosus* Schrad., ascomatibus primum globosis clavis albo-tomentosis, dein latoscula reclinando cupularibus amplis, demum sive hinc adscendentibus cecullato-inflexis basique decurrente adnatis, sive respinatis omnino, faciem inferiorem villoso-tentaculatam obliterantibus orbiculatis carnosio-tremellosis plicasque isthmis patulis transversis interceptas hiantes carneo-rubentes informantibus. — Schrad. spic. 139. Pers. syn. 496. Flor. dan. t. 1553. Fr. syst. I. 327. *Xylomyzon tremellosum* Pers. myc. *Agaricus betulinus* Flor. dan. t. 776. f. 1.

Ad ligna (salicina, faginea, betulina, tiliacea) putredine uida exesa abundat et praeter molem velleris indole eximie ludit. Auctumao et hyeme.

346. CANTARELLUS ADANS. Krugschwamm.

Ascoma carnosum s. tenuiter membranaceum, e basi stipitiformi distincta s. plane obsoleta in pileum dimidiatum s. infundibuliformem desinens, subtus hymenio undique ascophoro, plicis subparallelis s. trabeculis conexo-reticulatis subdecurrentibus obtusis exarato concreto undique vestitum, varie figuratum. Ascii majusculi.

(*Cantharellus* Adans. Juss. Pers. Lk. Fr. Merulii sp. Hall. Pers. Nees. Pezizae, Helvellae, Agarici sp. auct.) *Cantharellus* J. Bauhino a Chantrelle gallica voce eaque, me interprete, a Cantar, arabica, fungum designante dictus.

+ brachypodes, ascomatibus membranaceis, e basi stipitiformi brevi, non nisi obsoleta omnino (apodes), laterali

s. centralis in pileum dimidiatum expansit. (*C. apodes* et *pseuropodes* Schrad. Fr.) Praeter plicas Agaricos resupinatos ferme aemulantur.

3034. *C. retirugus* Fr., ascomatibus tenuissime membranaceis subrotundis verticalibus sessilibus laevibus albido-cidereis, venis saturioribus reticulatis. — Fr. syst. I. 324. *Merulius retirugus* Pers. syn. 494. *Helvelia retiruga* Bull. t. 498. f. 1.

Ad muscos aliasque quisquilias humi jacentes rarius.

3035. *C. laevis* Fr., ascomatibus sessilibus subverticalibus carnosso-membranaceis planis candidis, venis obsoletis. — Fr. syst. I. 324. *Thelophora vulgaris* Pers. myc. I. 115. t. 1. f. 6. *Th. muscigena* Pers. syn. 572.

Ad muscos udos, v. c. ad *Polytrichum commune* compactum et ad ore semicorruptum.

3036. *C. muscorum* Fr., ascomatibus sessilibus exiguis auriformibus gelatinosis sordide rufescens, intus concavis, plicis venosis e basi obsoleta sensim divisis inscriptis. — Fr. l. l. *Merulius muscorum* Roth cat. I. 238., in *Uster. Annal.* I. t. 1. f. 4. Pers. syn. 495.

Ad muscos caudices quercinos obtegentes rarius.

3037. *C. bryophilus* Fr., ascomatibus e basi brevi correcta pezizoideo-flabellaribus candidis teneris, extus parco tomentosulis, plicis latiusculis, e centro radiatis, apicem versus bi-trifidis. — Fr. l. l. *Merulius bryophilus* Pers. syn. 495. Ness syst. f. 237.

Ad terram nudam interque muscos patres rarius.

3038. *C. lobatus* Fr., ascomatibus e basi brevi tenuata sessilibus horizontalibus lobatis fuscis planinsculis, venis vase-ramosis subreticulatis. — Fr. l. l. *Merulius lobatus* Pers. syn. 494. *M. uliginosus* Pers. myc. *Helvelia membranacea* Dicks. Flor. dan. t. 1077. f. 1.

Ad *Hypna palustria* in vallibus subalpestribus rariss.

3039. *C. muscigenus* Fr., ascomatibus membranaceis glabris, e basi brevi tenuata unguicularibus horizontalibus pallido-fuscis, plicis tumidulis divergentibus,

basin versus confluentibus. — *Fr. syst. I. I. Merulius muscigenus Pers. syn. 493. Nees syst. f. 236. M. scor-
tinus Pers. myc. Helvella dimidiata Bull. t. 498. f. 2.
Ag. muscigenus Bull. t. 288. Ag. Foliolum Retz.*

Ad muscos corruptos tectaque straminea rarius.

3040. *C. crispus Fr.*, ascomatibus primum pezizoi-
deis candidis tenuiter villosis, dein e basi stipitiformi
brevi s. plane nulla dimidiato-pileatis subflabellaribus
carnoso-membranaceis horizontalibus imbricato-caespitosis
subdiformibus, supra deo glabrescentibus pallide-fuscis,
plicis subparallelis, e basi simplici dichotomis criso-cor-
rugatis albidis. — *Fr. syst. I. 323. Merulius crispus
Pers. icon. t. 8. f. 7., syn. 495. Flor. dan. t. 1739. M.
fagineus Schrad. M. Weinmanni Spreng.*

*Ad ramos arborum patres, carpineos v. c., betulinos,
coryleos et fagineos minime raro. Auctumno.*

3041. *C. buxbaumiaeformis W.*, ascomatibus
pusillis tenuissime membranaceis pellucidis pallidis, sic-
cando dilute fuscescentibus, e basi stipitiformi gracili-
teret laevi in pileum dimidiatum flabelliformem glaber-
rimum sensim dilatatis, subtus plicis paucissimis subsim-
plicibus striaeformibus parce inscriptis.

Ad vias in terra arenosa agri hering. rarissime. Auct.

3042. *C. pygmaeus W.*, ascomatibus pusillis sparsis,
e basi stipitiformi gracili tereti laevi in pileum semiun-
fundibuliformem sordide-stramineum, supra tenuissime
flocculosum, subtus venis aliquot remotis, nunc lamella-
ribus, nunc obsoletis omnino usque supra stipitem volvato-
incrassatum desinentibus inscriptum obtusum tenuiter
membranaceum diaphanum dilatatis. — *P. pygmaeus W.
in lit. ad Fricium coque monente Peziza foliacea Holmsk.
ot. II. 42. t. 23. cf. Fr. elench. I. 54.*

In tectorum grumis limosis Thuring. rarius. Auct.

3043. *C. fissus W.*, ascomatibus exiguis, e basi
stipitiformi brevi crassa albida in pileum infundibuliformem,
hinc fissum cinereum abrupte desinentibus, subtus venis

exsertis lamellaribus concoloribus exaratis. — *Agaricus fuscus* Leyss. hal. 297.

In aggeribus graminosis agri halens. (Leysser.) Auct. (Habitus et moles Lichenis pyxidati cujuscunque s. Cyathi striati minoris.)

† mesopodes, ascomatibus e basi stipitiformi in pileum infundibuliformem s. depresso dilatatis, subtus plicis dichotomis decurrentibus exaratis.

3044. *C. pusillus* Fr., ascomatibus parvis, e basi stipitiformi solida cuperascente in pileum subvillosum gryseum, subtus laevem caesium, deinde regulosum desinentibus. — Fr. syst. I. 321. *Craterellus pusillus* Pers. myc. II. 6.

Ad terram nudam glareosam v. c. Hercyn. infer. rarius. Auctumno.

3045. ?*C. pezizoides* Fr., ascomatibus gregariis exiguis obconicis glauco-albidis, disco depresso ibique venoso. — Pers. obs. I. 22., syn. 493.

Ad ligna fodinarum metallic. Hercyn. super. (Persoon.)

3046. *C. undulatus* Fr., ascomatibus coriaceo-membranaceis lenti, e basi stipitiformi solida elata glabra albo-pallente seorsim in pileum depresso s. infundibuliformem undulatum, supra subconcolorum s. livido-pallentem, vellere tenui stipato adpresso in fibras erectinasulas sparsim collecto tectum dilatatis, subtus rugosum s. costato-plicatis leucosporia. — *Thelephora undulata* Fr. elong. I. 164. (stipite villoso et hymenio setuloso ?) *C. fimbriatus* Weinm. *C. undulatus et albidus* Fr. syst. I. 321. *Merulius undulatus* Pers. syn. 492. Fl. dan. t. 1293. (rugis magis exaratis.) *M. crispus* Pers. icon. t. 8. f. 7. *Craterellia et Helvella crispa* Pers. *Elvella floriformis* Schaeff. t. 278.

Ad terram nudam in nemoribus caeduis rarius. Auct.

3047. *C. canaliculatus* Fr., ascomatibus parvis albido-pallentibus, pileo subumbilicato oblique, basi stipitiformi solida undulata suffulta, plicis canaliculatis subsimplicibus. — Pers. icon. 57. t. 14. f. 1.

Ad truncos arborum frondos. Hercyn. rarius. (Persoon.)

3048. *C. Cornucopiae IV.*, ascomatibus majusculis subcaespitosis, e basi tenuata elastica nigricante in pileum membranaceum infundibuliformem, margine reflexo cinctum sensim dilatatis tubaeformibus perviis, intus squamulosis umbrino-nigris, extus politis gryseis, demum parce rugulosis. — *C. cornucopioides* Fr. syst. I. 321. *Craterellus cornuc.* Pers. myc. II. 5. *Merulius cornucopioides* Pers. syn. 491. *Helvella cornuc.* Scop. Schaeff. t. 165. 166. Bull. t. 150. 498. f. 3. *Peziza cornucopioides* L. Flor. dan. t. 384. t. 1260. — *Vaill. bot.* t. 13. f. 2. 3.

Ad trunco mucidos ipsamque terram pingue in nemoribus frondosis passim frequenter. Auctumno. (Superficie externa polita nec plicata a generis nota desciscit, nec tamen cum aliis subtus rugosis civitatem reticet.)

3049. *C. cinereus* Fr., ascomatibus majusculis subcaespitosis, e basi stipitiformi cava nigrescente polita in pileum membranaceum infundibuliformem perivium, iutus parce squamułosum, extus plicis distantibus cinereis crassis exaratum dilatatis. — Fr. l. l. *Merulius cinereus* Pers. icon. t. 3. f. 3., syn. 490. Alb. et Schw. nisk. 234. ?*M. cornucopioides* Nees syst. f. 235. (saltē ob hymenium nimis perspicue plicatum.) *Agaricus fissus* Humb. frib. *M. hydrolips* Gmel. DC. *M. fissus* Roth. *Helvella hydrolips* Bull. t. 465. f. 1.

In nemoribus muscosis apricis, at multo rarius quam praecedens sp., quam prater superficiem plicatam et molem minorem fere refert.

3050. *C. sinuosus* Fr., ascomatibus gregariis subcaespitosis membranaceis, e stipite farcto difformi glabro pallidiore elato abrupte in pileum infundibuliformem, intus floccoso-villosum fusco-gryseum, dein saepius undulatum dilatatis, plicis implexis tumidis exaratis, raro depresso. — Fr. syst. I. 319., elench. I. 52. *Merulius fuligineus* Alb. et Schw. nisk. 234. *M. tubiformis v. sinuosus* Pers. myc. 18. (plicis implexis exaratis.) — *Elvella floriformis* Sowerb. t. 75. *Helvella crispa* Bull. t. 465. (plicis magis depresso.)

In nemoribus et quergetis patruis rarius. Auctumno.

3051. *C. lutescens* Fr., ascomatibus submembranaceis e basi stipitiformi cava lutea in pileum infundibuliformem fusco-lutescentem undulatum, intus subfloccosum demumque saepius pervium dilatatis, plicis venosis implexis decurrentibus consertis e cinereo-lutescentibus. — Fr. syst. I. 320., elench. I. 50. *Merulius villosus*, *xanthopus et aureus* Pers. myc. II. 19. *M. cantherelloides* Sw. Schum. *M. lutescens* Pers. syn. 489. *Flor. dan.* t. 1617. *M. reflexus* Gmel. *Elvella tubaeformis* Schaeff. t. 157. *Agaricus Aurora* Batsch et f. 36. (plicis rutiliis.)
In nemoribus uidis, alnetis sphagnosis passim.

3052. *B. tubaeformis* Fr., ascomatibus gregariis, e basi stipitiformi cava lutea in pileum submembranaceum umbilicato-infundibuliformem lutescenti-cinereum s. fuscescens, intus rugulosum parve squamulosum dilatatis, demum undulatis, plicis tendineis remotis, e basi inde simpliciter repetitove dichotomis, aëris aureo-flaventibus constipatis superfusis usque cinereo-flaventibus. — Fr. syst. I. L. *Merulius tubaeformis* Pers. syn. 489. *M. villosus* Pers. icon. t. 6. f. 1. *Ditmar* in *Sturm. germ.* III. t. 30. *Peziza undulata* Bolt. t. 105. *Helvella tubaeformis* Bull. t. 461. *Mer. hispidus et Infundibulum* Scop. — *Vail. bot.* t. II. f. 9. 10. — *Agaricus pruinatus* Batsch f. 35. *Mer. fuligineus* Pers. syn. 490. (var. plicis cinereis.) *A. degener* Schaeff. t. 243. *A. cornucopiaeoides* Bull. t. 208. (var. pileo zonato.)

Ad trancos putridos ipsamque terram passim.

3053. *C. violaceus* Fr., ascomatibus gregariis, e basi stipitiformi solida in pileum infundibuliformem carnosum glabrum violaceo-purpureum, demum repandum dilatatis, plicis venosis pallidis decurrentibus. — Fr. syst. I. 319. *Merulius Ottonis* Spr. pug. I. 66.

In pinetis Saxoniae. (Sprengel.) Auct.

3054. *C. cibarius* Fr., ascomatibus carnosis sparsis aurantiaco-vitelliosis, e basi stipitiformi solida tenuata tensim inflata in pileum orbiculatum planum, dein depresso s. repandum dilatatis, plicis crassis angustis remotis.

semidecurrentibus, apicem versus subdichotomis s. connotatis, sulcatae mentientibus, demum rugoso - flexuosis. — Fr. syst. I. 318. *Merulius cibarius* Pers. syn. 488. *A. cantharellus* L. Schaeff. t. 82. Bull. t. 62. t. 505. f. 1. Flor. dan. t. 264. Bott. t. 62. *Agaricus luteolus* et *pseudounctuosus* Batsch el. f. 37. 120. — Vaill. bot. t. 11. f. 14. 15.

In nemoribus frondosis et acerosis vulgaris. Auct.

3055. *C. aurantiacus* Fr., ascomatibus carnosis aurantio-ochraceis, e basi stipitiformi farcta concolor s. discolorie in pileum mollem tomentosum subdepressum, saepius excentricum undulatum dilatatis, plicis strictis repetito-dichotomis confertis aurantiacis, demum rugosis. — Fr. I. I. *Merulius aurantiacus* Pers. syn. 488. Nees syst. f. 233. *M. pseudo-cantharellus* Pers. nuc. *Agaricus aleotorolophus* Schaeff. t. 206. — *M. nigripes* Pers. I. L. *Agar. cantharelloides* Bull. t. 503. f. 2. (*monstrum senile*, *stipite, ex putredine nigrescente.*)

In similibus cum praeced. locis, nec non in arvis et promontoriis graminosis passim. Auct. Venenatus.

3056. *C. umbonatus* Pers., ascomatibus gregariis carnosulis, e basi stipitiformi producta farcto dilutiore in pileum primum umbonato-convexum, dein depresso dilatatis, cinereo-nigricantibus, plicis strictis latiscalis confertis candidis. — Pers. disp. Fr. syst. I. 317. *Merulius umbonatus* Gmel. Pers. syn. 491. Alb. et Schw. 234. *Agaricus muscooides* Wulff. in Jacq. coll. II. t. 16. f. 1.

$\beta.$ *carbonarius*, ascom. radicatis fasciculatis, pileo striato-squamuloso, spadiceo - nigro. Fr. I. I. Alb. et Schw. nisk. 375.

Inter muscos torridos passim; $\beta.$ in areis carbonariis muscosis v. c. Lusatiae. Auctummo.

††† clavati, ascomatibus e basi clavata in pileum truncatum immarginatum confluentibus, latere tenuissime venosis. (*C. gomphus* Pers. Fr.)

3057. *C. clavatus* Fr., ascomatibus carnosia, e basi subdivisa sensim incrassatis, in apicem truncatum discoi-

deum depresso, ambitu repandum desinentibus, turbinatis, ad latera plicis tenuibus inscriptis, carneo-violaceis. — Fr. syst. I. 322. — *Merulius violaceus* et *clavatus* Pers. obs., syn. 498. (*violaceo-spadiceus*.) — *Clavaria truncata* Schmid. icon. t. 60. Nees syst. f. 239. *Evelia carneus* Schaeff. t. 164. *Merulius carneus* Pers. l. l. (*disco ochraceo*.)

In campis abietinis ad candices, nec non ad truncos quercinos passim. Auctemmo.

347. DAEDALEA PERS. Buchterschwamm.

Ascoma coriaceum s. *suberosum tenax*, *saepius sessile* dimidiato-s. *integro-pileatum*, ex pagina *aversa* conformi plicas homogenas concretas, primum obtusas (*velutinas*), dein tenuatas prominentes scalari-lamellares simplices s. dichotomas, ad latuscula ascis tenuibus foetas, isthmus brevius longiusve disseptos, sinus porosos s. lamellas trabeculis conexas (iisque deum saepius transversim fissis) meointentes obvallantes exserens.

(*Daedalea* Pers. Lk. Nees. Fr. *Agarici*, *Boleti*, *Merulii* et *Sistotrema* sp. auct.) Plicis inexplicatis in ascomate horizontaliter dissecto Tuberis viscera, explicatis iisque simplicibus *Agaricum*, repetito-conferendumque dichotomis s. obtuso-furcatis *Polyporum*, transversim fissis, radulas veluti spathulares informando *Hydnum* s. *Sistotrema* haud male refert, eximie tamen differt.

† *resupinatae*, *ascomatibus resupinatis*, *supra lamellari-scalaris*. (Suspectae, quippe omnes sp. *resupinationis* casni obnoxiae.)

3058. *D. latissima* Fr., *ascomatibus effuso-resupinatis* crassis suberosis sublignescenibus duris undulatis pallidis, supra lacunis subrotundis elongatisque flexuosis exaratis. — Fr. syst. I. 340. *D. vermicularis* Pers. myc. II. 2.

Ad latera truncorum fagineorum supina rariss.

†† *apodes*, *ascomatibus sessilibus dimidiatis*.

* *sinuosae*, *plicis lamellaribus confertim-disseptis*, *primum poros*, *dein isthmos sinuosos clausos* s. *trans-*

*versim scissos usque radulae spatulares s. aciculares
mentientes informantibus.*

3059. *D. rubescens A. et Schw.*, ascomatibus albido-pruinosis subcarnoso-suberosis tenuibus laevibus pallido-rubescensibus, sinibus elongatis rectis angustis. — *Alb. et Schw. nisk. 238. Fr. syst. I. 339.*

Ad Salices capreas, v. c. Lusatiae. (*A. et Schw.*) Auct.

3060. *D. gibbosa Pers.*, ascomatibus sessilibus elasticis albidis villosis, e basi porrecta gibbosis, sinibus linearibus brevibus angustis rectiusculis. — *Pers. syn. 501. Fr. syst. I. 338. Merulius gibbosus Pers. obs. Boletus suberosus L.*

Ad trunco Fagi, Salicum et Betularum rarius. Auct.

3061. *D. suaveolens Pers.*, ascomatibus sessilibus dimidiatis coriaceo-suberosis glubris e niveo subfulvis, sinibus elongatis irregularibus rufescentibus. — *Pers. syn. 502. Fr. syst. I. 337. Boletus suaveolens Bull. t. 310.*

Ad trunco salicino, rarius. Auctumno.

3062. *D. unicolor Fr.*, ascomatibus sessilibus, e basi subaequali s. decurrente dimidiatis tenaciter coriaceis propexis amplis, supra vellere stipato albido concolori-vittato tomentosis, subtus sinibus angustis velutinis daedaleo-implexis, a margine poroso tenuato inde saepius transversim fissis radularibus exaratis, pallentibus s. cinerascentibus. — *Fr. syst. I. 336. Sistotrema cinereum Pers. syn. 551. Neos syst. f. 229. S. versicolor Trattin. Schw. t. 5. Boletus decipiens Schrad. spic. 169. B. unicolor Bull. t. 408. t. 501. Bolt. t. 163.*

Ad trunco arborum, Carpini praesertim, Fagi, Aesculi, Salicum, in agro Thuring. minime raro, ibique praeter alios lusus resupinatos, imbricatos et decurrentes, var. duplii, alia subtus pallente, alia evidenter cinerascente rediens.

3063. *D. confragosa Pers.*, ascomatibus dimidiatis sessilibus subero-coriaceis zonato-scabris lateritio-fuscis, sinibus latecentibus rotundis angulatisve daedaleo-implexis cinereis. — *Pers. syn. 501. Fr. syst. I. 336. B. labyrinthiformis Bull. t. 491. f. 1. B. confragosus Bolt. t. 160.*

Ad truncos Sorbi aucupariae et terminalis varius.

3064. *D. quercina* Pers., ascomatibus dimidiatis sessilibus suberosis crassiusculis duris utrinque subcoloribus, supra vellere sericeo stipato in tegmen rugulosum coacto tectis, subtus plicis lamellaribus crassis velutinis inaequaliter-obtuseque dichotomis, isthmos breviores longioresve obvallantibus, raro transversim scissis obtectis. — Pers. syn. 500. Fr. syst. I. 333. *Merulius quercinus* Pers. disp. *Agaricus dubius* Schaeff. t. 331. *A. labyrinthiformis* Bull. t. 352. t. 442. *A. quercinus* L. Bolt. t. 73.

Ad caudices quercinos antiquos, ubertim per totum annum. (Coram sunt monstra resupinata, stipitata et radularia praeter alios lusus.)

*** lamellatae, plicis subsimpliciter lamellaribus.*

3065. *D. trabea* Fr., ascomatibus sessilibus dimidiatis suberosis glabris sordide-fuscis subimbricatis, supra tenuissime tomentosis, plicis lamellaribus subsimplicibus carneo-rutilis. — Fr. syst. I. 335. *Agaricus trabeus* Pers. syn. praef. 29.

Ad trabeas abietinas rares. Per totum annum.

3066. *D. abietina* Fr., ascomatibus sessilibus dimidiatis s. deorsum decurrentibus suberoso-coriacis, supra vellere umbrino stipato zonato, dein coacto-glabrescente sordido tectis, subtus plicis lamellaribus latescentibus concolori-velutinis rectis subsimplicibus s. sinuato-dichotomis glaucoспорia munitis. Fr. l. l. *Agaricus assercorum* Schrad. spic. 134. *A. abietinus* Bull. t. 442. Pers. syn. 486.

Ad trabeas abietinas, pro vario situ variana, per tot. annum.

3067. *D. sepiaria* Sw., ascomatibus sessilibus dimidiatis coriacis strigoso-tomentosis zonatis apadiceis elongato planiusculis, margine lamellisque ramoso-implexis lutescentibus. — Sw. Fr. syst. I. 333. *Agaricus sepiarius* Pers. syn. 487. *Merulius squamosus* et *sepiarius* Schrad. l. l. *A. quercinus* Humb. frib. n. 125. *A. sepiarius* Wulff. *A. betulinus* All. *A. tricolor* Bull. t. 541. *A. hirsutus* Schaeff. t. 76.

Ad ligna pinca putrida vulgaris. Perennis.

3068. *D. betulina* Rebent., ascomatibus sessilibus dimidiatis s. subrotundatis coriaceis. tomentosis dilutius saturatusve zonatis, lamellis rectis subsimplicibus obtuseque dichotomis latescentibus pallidis. — Rebent. neom. 371. *Flor. dan.* t. 1555. *Fr. l. l.* *Agaricus labyrinthiformis* Wilk. gryph. *A. coriaceus* Bull. t. 537. Pers. syn. 486. *A. quercinus* Schaeff. t. 57. *A. versicolor* Plan. Pers. (ascom. supra fusco gyreoque zonatis.) *A. slabelliformis* Scop. *A. betulinus* L.

Ad cunctas arborum, Betulae praeprimis, Quercus, Salicem, ubertim per totum annum.

+++ mesopodes, ascomatibus stipitatis.

3069. *D. biennis* Fr., ascomatibus suberosis depresso-hemisphaericis, dein cyathiformibus margine repando reflexis subvelutinis subferrugineis, sinubus angustis subporosis irregularibus labyrinthiformibus albidis, mox cinereis facile laceris, stipite ferrugineo obeso, basin versus parce-villoso. — Fr. syst. I. 332. *Sistotrema rufescens* et bienne Pers. syn. 550. Nees syst. f. 228. *Boletus biennis* Bull. t. 449. f. 1.

Ad terram nudam et ligna putrida v. c. Thuring. rarissime.

3070. *D. spadicea* Fr., ascomatibus suberosia planiusculis tomentosis spadiceis, sinubus primum gyrois lutescentibus, dein laceris concoloribus, stipite brevissimo crasso difformi scabroso. — Fr. syst. I. 505. *Hydnus spadiceum* Pers. icon. 34. t. 9, syn. 557. A. et Schw. nisk. 267.

Ad terram in pinetis, v. c. Hercyn. superior. Perennis.

348. AGARICUS L. Blätterschwamm.

Ascoma carnosum s. membranaceum, stipite centrali (rarius nullo) suffultum, primum oviforme, subtus velo cum stipite contiguo obductum eoque varie scisso, lamellas e centro s. basi radiantes simplices parallelas discretas, e membranula duplice conferruminata confitas, utrinque ascophoras, pileo umberato hinc (i. e. subtus, raro ex rupinatione casu, supra) appensa expandens,

s. superne pileatum, inferne aequaliter inaequaliterve lamellosum. Ascii colore et loculis variis.

(*Amanita, Russula, Agaricus, Lactarius, Coprinus Pers. disp. meth. Lk. obs. I. 33. Agaricus L. Pers. Nees. Fries. Volva, Amanita, Fungarius, Gelona, Kulma, Potrona Adans. Amanita Dill. Lam. Juss. Fungus et fungi spec. auct. priscorum et mediae aetatis.* — Genus variissimum, veluti patronum, a Friesio, duce certissimo, super post multorum conamina, mirando ad trutinum vocatum studio et felicissimo successu retractatum, antea inconditum omniaco synonymorumque farragineo fastidieus.

I. melanopori, sporidiis nigrescentibus.

A. coprinus, ascomatibus ephemeras saepius, pileis membranaceis ovato-conicis, dein campanulatis, velo universalis concreto flocculoso fugaci, lamellis inaequalibus liberis tenerrimis simplicibus, contabescendo in laticeum nigricantem spurcum ocius jam diffluentibus et inquinantibus, ascis segregatis majusculis quaternatim junctis nigricantibus, stipite fistulosis strictis fragilibus.

(*Agaricus Coprinus Pers. syn. Nees. Fr. Coprinus Pers. disp. Lk. Fungi fugaces Batsch. Ag. atramentarius Scop.*)

3071. *A. ephemerus* Bull., ascomate tenui mox glabro, pileo campanulato, dein expanso fiso-striato subcivereo involvendo diffluente, lamellis distantibus, stipite tenui nudo albido. — Bull. fung. t. 542. f. 1. Pers. syn. 406. Fr. syst. I. 313. *A. stercoreus* Scop. Sowerb. t. 262. *A. momentaneus* Bull. I. L. t. 128. *A. crenulatus* Flor. dan. t. 382. f. 2.

In stercoreis passim quoque tempore.

3072. *A. radiatus* Bolt., ascomate tenerimo fugaci, pileo primum ovato cinereo-tomentoso, dein deplanato radiato-fiso glabro ochraceo, lamellis pancis, stipite filiformi. — Bolt. t. 89. Pers. syn. 407. Alb. et Schw. nisk. 200. Fr. syst. 313. *A. stercoreus* Bull. t. 68. et 542. f. 2.

In fimo vaccino locorum roridorum passim.

3073. *A. plicatilis* Curt., ascomate tenerimo,

pileo primum subcylindrico furfuraceo, dein umbilicato tenuiter papyraceo hyalino exsocco expanso nudiusculo, plicis sulcatis tendiceis subsfurcatis carneis, dein hiantibus exarato cinereo-fuscescente, lamellis annulato-adnexis, dein remotis angustatis linearibus gyroso-flexuosis nigrescentibus, stipite gracili glabro exerto. — *Curt. Sowerb. t. 364. Fr. syst. I. 312. A. pulcher Pers. syn. 404. cum var. β . subssimiili. A. semistratus Flor. dan. t. 1134.*

In terra hortorum stercore subacta inque ipso fimo vaccino et equino promontoriorum udorum circa Northusam minime raro, aestate, Jore pluvio emergens eodemque die sole tactus contabescens.

3074. *A. lagopus* Fr., pileo campanulato-explanato, primum flocculoso albido-cinereo, dein nudo radiato-sulcato magis lvescente, lamellis linearibus remotis nigris, stipite debili praelongo, basi lanato. — *Fr. syst. I. 312.*

In nemoribus roridis Hercyn. infer. inter folia emergit.

3075. *A. papillatus* Batsch, pileo papillato furfuraceo gryseo, margine striato, lamellis atris limbum albidam exserentibus, stipite aequali unciali inquinato. — *Batsch cont. I. t. 78. Pers. syn. 406. Fr. syst. I. 312.*

Ad latera viarum German. mediae. (Batsch.)

3076. *A. Scoptrum* Jungk., ascomatibus gregariis tenerrimis ephemeras cinerascentibus, pileo membranaceo umberato-campanulato sulcato laevi, lamellis distantibus melanosporis, stipite aequali fastuloso cinerascente. — *Junghuhn in Schlechtld. Linn. 1830. p. 406. t. 6. f. 10.*

In areis graminosis agri mansfeld. (Junghuhn.)

3077. *A. narcoticus* Batsch, pileo conico-cylindrico squamulis recurvatis villoso albo, dein obtuso glabrescente striato, lamellis nigrescentibus, stipite gracili aequali subviloso. — *Batsch I. I. cont.. I. f. 77. Pers. syn. 405. Fr. syst. I. 312.*

Ad terram semitarum German. mediae. (Batsch.)

3078. *A. domesticus* Bolt., pileo membranaceo campanulato obtuso furfuraceo undulato-sulcato, vertice nudiusculo spadiceo, lamellis linearibus confertis, primam

albis, ocellis rubentibus brunneoque nigriscentibus, stipitibus fragilibus subsericeis caespitosis elongatis. — Bolt. t. 26. Pers. syn. 401. Fr. syst. I. 311. A. sociatus Schum. Juxta maras udos domiciliorum, auctumno.

3079. *A. nivea* Pers., pileo primum subclavato, dein campanulato magisque sensim expanso revoluto squamuoso-farinoso stipiteque tomentoso niveis, lamellis distantibus angustis fusco-nigricantibus. — Pers. syn. 400. Flor. dan. t. 1671. Fr. syst. I. 311.

Ad finum equinum in nemoribus udis.

3080. *A. cinereus* Bull., pileo membranaceo conico subtomentoso cinereo, a vertice inde sensim glabrescente, lamellis linearibus (angustissimis) punctatis subflexuosis, stipite candido tomentoso-aquamoso. — Bull. t. 88. Schaeff. t. 100. Flor. dan. t. 1195. (solito magis furfuraceus.) Pers. syn. 398. Fr. syst. I. 310. *A. simetarius* L. suec. ?*A. cylindricus* Schaeff. t. 8. (*Iucus squamosus*.)

a. margaritaceus, pileo margaritaceo. — *A. margaritaceus* Schaeff. t. 216. *A. strictus* Pers. syn. 399.

b. tomentosus, stipite breviore, tenuiore. — *A. tomentosus* Bull. t. 138. B. t. 156.

c. calvus, pileo calvo. — *A. pullatus* Bolt. t. 20.

d. stellatus, stipite basi stellatim fiso. — *A. astroides* Fr. syst. I. 312. *A. stellatus* Hoffm.

e. macorrhizus, stipite in mycelia rhizomorpha valida expanso. — *A. macorrhizus* Pers. syn. 398.

In nemoribus udis, tum ad finum, tum ad terram truncosque exesos, auctumno exeunte passim, varietatum l. aliquamque mater feraciissima. (Volvae rudimentum circa basin residuum semper adest.)

3081. *A. micaceus* Bull., pileo membranaceo tenuiter sulkato squamuoso-furfuraceo s. calvo versicolore (ferrugineo, ochraceo, livido magis et badio), lamellis confertis primum albo-roseis, dein nigriscentibus, aciem saturatiorem tendineam revolventibus, stipitibus fragilibus aequalibus caespitosis. — Bull. t. 246. t. 565. Flor. dan.

t. 1193. *Fr. syst. I.* 309. *Grev. cr. t.* 76. *A. extinctorius* Bull. t. 437. *A. ferruginosus* Pers. syn. 400. Schum. *A. digitellus* Batsch. *Flor. dan. t.* 1371. *A. congregatus* Sowerb. t. 261. *A. lignorum* Scop. Schaeff. t. 6.

Ad trunco hortorum nemorumque, Jove pluvio, quo-
cunque, praeter brumam, tempore, passim, valde tamen
polymorphus.

3082. *A. deliquescentia* Bull., pileo membranaceo
striato fuligineo tenui, lamellis linearibus lurido-nigris,
limbo saepe albicantibus, stipitibus aequalibus nodiusculis
subcaespitosis. — Bull. t. 558. f. 1. *Fr. syst. I.* 309.
A. bicolor Flor. dan. t. 1070. *A. fuscescens* Schaeff. t. 17.

Ad terram arborumque trunco passim.

3083. *A. atramentarius* Bull., pileo subcarnoso
campanulato fuscescente, dein vertice squamoso revoluto,
lamellis ventricosis ex albo-purpureo-fuscis, stipitibus
aequalibus nudis caespitosis. — Bull. t. 164. *Fr. syst. I.* 308. *A. plicatus* Lightf. Pers. syn. 396. *A. deliquescentia* Flor. dan. t. 1370. *A. soboliferus* Hoffm. *A. fimbriatus* Sowerb. t. 138. *A. striatus* Huds. *A. luridus* Bolt. t. 54. *A. ovatus* Curt. Agaricus fugax Schaeff. t. 67. et t. 68. ?*A. rufo-candidus* ejusd. t. 201.

Ad trunco arborum domesticarum infimo minime
raro. (Velut saepius adeat, fugax quidem, nonnisi tameu
volvam exiguum relinquens.)

3084. *A. picaceus* Bull., pileo campanulato te-
nuissime membranaceo albido in squamas latae demum
fatiscente, lamellis ventricosis confertia umbrinis dein
nigrescentibus, stipite longissimo nudo bulboso. — Bull.
t. 206. Sowerb. t. 170. Pers. syn. 397. *Fr. syst. I.* 308.
— *Flor. dan. t.* 1499.

Inter hortorum rejectamenta putrida, auctummo rarius.
(Inter hunc et praecedentem, Friesio monente, ambigunt
A. extictorius Bolt. t. 24. et *A. cylindricus* Schaeff. t. 8.)

3085. *A. sterquilinus* Fr., pileo submembranaceo
ovato-conico salcato, dein campanulato squamoso fiso,

lamellis purpurascensibus, stipite attenuato, basi annulato.

— Fr. syst. I. 308.

In sime vaccino Thuring. Auctummo.

3086. *A. ovatus* Schaeff., pileo campanulato dense minuteque squamoso cinereo, dein a margine fissili inde deliquescente, lamellis primum umbrinis, dein atris, stipite in basi rhizoden (radicatam Fr.) producto. — *Agaricus comatus* Fr. syst. I. 307. *A. ovatus* Schaeff. t. 7.

In hortis sime pingui subactis.

3087. *A. comatus* Müll., pileo subcarnoso, primum cylindrico squamoso albo, dein expanso, squamis comosis imbricatis obtecto, demum praeter umbonem revolvendo liquefaciente, lamellis albis dein purpurascensibus, stipite intus molliter fareto subbulboso, annulo mobili. — Müll. fl. dan. t. 384. Schmid. icon. t. 10. Pers. syn. 395. Fr. syst. I. 307. *A. fimetarius* Bolt. t. 44. et alior. *A. cylindricus* With. Sowerb. *A. typhoides* Bull. t. 582. *A. porcellanus* Schaeff. t. 46. 47.

In hortis ruderibusque pinguibus, passim.

3088. *A. flavicomus* W., pileo carnoso, primum conico, dein campanulato, a vertice papilloso inde squamu-
lis villosis flaventibus obtecto, lamellis consertis fer-
rugineo-purpurascensibus, dein nigrescentibus, stipite crasso
surfuraceo. — *Agaricus giganteus* Schaeff. t. 84. Fr.
syst. I. 314. (inter dubias sp.)

Ad saepes hortorum patraorum. (Nolum omittere sp.
claram, ad sequeantem tribum vergentem.)

B. coprioi, ascomatibus diutius persistentibus, pileis
carnosulis s. membranaceis glabris, velo margine adfixo,
plerumque fugacissimo, rarus annuliformi, lamellis ca-
ducis melanosporis, stipite tenui fistuloso, a pileo discreto
subfragili. (*Agaricorum* tribus 36. *Coprinarius* Fr. *Co-
prini* et *Pratellae* sp. Pers.)

† striati, pileo membranaceo, dein striato, vir revo-
luto, lamellis adfixis s. liberis liquecentibus, stipitibus
fragilibus gregariis.

3089. *A. disseminatus* Pers., ascomatibus parvis gregariis, pileo ovato-campanulato (digitaliformi), primum ochraceo, dein gryseo-virescente plicato, lamellis angustis remotis adnexis albido-cinerascentibus, stipite incurvo glabro. — Pers. syn. 403. Fr. syst. I. 305.

a. minutulus, ascomatibus debilibus gregariis, omissime caducis, pileo pallide ochraceo dein gryseo-cinerascente, lamellis adnexis. — *A. disseminatus* a. Pers. Fr. *A. Tintinnabulum* Batsch cont. I. f. 2. *A. minutulus* Schaeff. t. 308.

b. striatus, pileo sulcato. — Sowerb. t. 166. *A. striatellus* Batsch.

c. digitaliformis, pileo albo s. rufescente, primum ovoidi dein digitaliformi, margine striis nigris notato, lamellis liberis albentibus, dein nigrescentibus, stipite stricto elongato. — Bull. t. 22. et t. 525. f. 1. *A. congregatus* Bull. t. 94. (forsan pr. sp.) *A. petasitiformis* Humb.

Ad truncos arborum muscosos eorumque cavitates humum tersam foventes, Salicam paeprimis, Populorum et Tiliarum. Vere et auctummo.

3090. *A. marchantiaeformis* W., ascomatibus debilibus gregariis ephemeras, pileo conico vitro fragili, sulcis distinctis exarato corpusculisque microscopicis sphaericis hyalinis adperso albo, lamellis adnexis remotis tenuerrimis demum castaneo-nigris, stipite gracili aciculari hyalino elato, basi fibrilloso-stuppea adfixis.

Ad sentinam ex rivis rejectam gregatim. Vers. (Quamvis vivus fragilissimus, siccando tamen persistit tuncque Marchantiae hemisphaericae habitum haud male reddit.)

3091. *A. papyraceus* Bolt., pileo hemisphaericō diaphano sublaevi albido, lamellis liberis purpurascētē-nigricantibus, stipite nudo albo. — Bolt. t. 11. Pers. syn. 425. Fr. syst. I. 305.

Ad caudices quercios Thuring. similem saltem, nisi eundem legi.

3092. *A. hydrophorus* Bull., pileo primum campaniformi, dein conico, vertice laevi rufescente, margine lacero striato gryseo sursum replicato, lamellis confertis

liberis albo-purpurascens, dein nigrescentibus, stipite subradicato glabro. — Bull. t. 558. DC. gall. II. 150. Fr. syst. I. 305.

In dampnis promontiorum pinguium Thuring.

3093. *A. conocephalus* Bull., pileo conico striato livido-pallescente obtuso, lamellis liberis fusco-nigrescentibus, stipite longo albo in basin crassiorem desinente. — Bull. t. 563. Pers. syn. 427. Alb. et Schw. nisk. 206. Fr. syst. I. 306.

Ad sepea hortorum pinguium rarius. Auctumno.

3094. *A. subliquescens* Schum., pileo carnosulo conico subviscido pallido, dein explanato fusco-striato, lamellis subliberis albido-fuscis, stipite attenuato. — Schum. saec. II. 358. Fr. syst. I. 304.

Ad finum vaccinum Thuring., ni fallor.

3095. *A. titubans* Bull., ascomatibus debilibus glaberrimis, pileo pertenui viscose plicato flavente, primum campaniformi dein explanato, lamellis adnexis purpurascens, mox incarnato-fuscis, stipite aequali nitido-lutescente. — Bull. t. 425. f. 1. Sowerb. t. 128. Pers. syn. 415. Alb. et Schw. nisk. 202. Fr. syst. I. 304.

Ad finum vaccinum locorum roridorum.

3096. *A. vitellinus* Pers., pileo campaniformi viscido vitellino subfissili, lamellis adnexis distanibus argillaceis, stipite aequali squamuoso pulverulento. — Pers. syn. 402. Fr. syst. I. 303.

B. flavidus, pileo convexo, stipite glabro. — *A. Boltonii* Pers. syn. 415. Fr. syst. I. 303. *A. flavidus* Bolt. t. 149. nec Schaeff.

Ad finum in pascois uia. Auctumno.

3097. *A. superbus* Jungh., pileo tenui carnosulo laevi campanulato intescenti-pallido, lamellis liberis purpureo-nigris, stipite fistuloso albido gracili. — Jungh. L. t. 405. t. 6. f. 11.

In pinetis umbrosis Hercyn. (Jungkuhn.)

† corrugati, pileo carnosulo conico-campanulato obtuso, demum corrugato, lamellis adnatis cinereo-nigroque variegatis.

3098. *A. subtilis* Fr., pileo submembranaceo campaniformi laevi albido, lamellis adnatis latiusculis cinereo-nigricantibus margineque albantibus, stipite glabro fragili eborneo. — Fr. syst. I. 302. *A. papyraceus* Pers. myc.

Ad finum vaccinum lucorum udorum Thuring.

3099. *A. fimbriola* Pers., pileo subcarnoso hemisphaericō alutaceo rufescente, lamellis latiusculis adnatis fuscis, stipite fistuloso nitido fuscescente. — Pers. syn. 412.

In pascuis nec non in stercore vaccino German. mediae. (Persoon.)

3100. *A. caliginosus* Jungh., pileo carnosulo campanulato brunneo-nigrescente, lamellis liberis foligineo-nigris, apice basique aequaliter acuteque attenuatis, stipite fistuloso aequali fragili. — Jungh. t. l. t. 6. f. 13.

In humo saxorum Hercyn. infer. (Junghuhn.)

3101. *A. papilionaceus* Bull., pileo carnosulo campaniformi, dein (exsiccando) rufescente s. cinereo-foligineo, lamellis adnatis confertis cinereo-nigrescentibus, margine dilutiore vittatis, stipite elongato rufescente apicem versus striato atro-pulverulento. — Bull. t. 56. t. 561. Pers. syn. 410. Fr. syst. I. 301. *A. carbonarius* Batsch pr. pr. *A. varius* Pers. icon. *A. acuminatus* Schaeff. t. 202. *A. campanulatus* L. suec. pr. pr.

In finetis terraque stercore subacta passim.

3102. *X. clypeatus* Bolt., pileo subcarnoso campaniformi, (vivo) pallido-cinerascente, (siccando) livescente, lamellis adnatis ventricosis nigro-cinerascentibus, margine concoloribus demum liquescensibus, stipite praelongo rufescente, anculo lacero succinto. — *Agaricus simplicis* Bull. t. 66. Fr. syst. I. 300. *A. clypeatus* Bolt. t. 57. *A. semiovatus* Schum.

Ad finum vaccinum Thuring., rarius. Auctumno.

3103. *A. separatus* L., pileo carnosulo obtuso vi-

scoso argillaceo-albido, lamellis adnatis cinereo-atris, stipite longo albido, annulo laxo albo integro. — L. succ. n. 1220. Dub. gall. II. 804. *A. seniovatus* Sowerb. t. 131. Pers. syn. 408. Fr. syst. I. 308. *A. ciliaris* Bolt. t. 53. *A. nitens* Bull. t. 84.

In similibus cum praecedent. locis.

C. clavati, pileis cornosis umbonato-turbanatis viscosis glabris, margine infexo, velo, praeter rudimenta pileum tegentia, fugaci, lamellis longius decurrentibus ramosis distinctis remotis decoloribus, ascis nigris fusiformidis, stipite solido saepius squamuoso. (*Agaricus Gomphus* Fr.)

3104. *A. flavescens* W., pileo umbonato conico lutescente viscido, dein hemisphaerico & iofundibuliforme saturatiore, lamellis concoloribus, dein umbrinis longe decurrentibus, stipite obeso dilutiore. — *Agaricus viscidus* Schaeff. t. 97. Fr. syst. I. 315. (inter dubias) nec aliorum.

In dumetis alnetorum Thuring. Auctumno.

3105. *A. rutilus* Schaeff., pileo umbonato subviacoso fusco-rubo nitido, lamellis purpureo-umbrinis deorsum decrescentibus, stipite obeso squamoso-fibrilloso. — Schaeff. t. 55. Sowerb. t. 105. Fr. syst. I. 315. *A. hepaticus* Batsch cont. t. 15. *A. Gomphus* Pers. icon. t. 13., syn. 18. *A. viscidus* L.

In pinetis Hercyn. superioris et Bavariae.

3106. *A. glutinosus* Schaeff., pileo obtuso glutinoso purpureo-fusco, lamellis ramosis albido-cinereis, stipite albido-lutescente obeso. — Schaeff. t. 36. Fr. syst. I. 315. Flor. dan. t. 1247. *A. viscidus* Pers. syn. 291. *A. limacinus* Dicks. *A. velatus* With. *A. lubricus* Scop.

B. roseus, pileo roseo, stipite deorsum tenuato magis, ac dilutius carneo, ascomate pygmaeo. — *Agaricus viscidus* Nees syst. f. 197. B.

In pinetis Hercyn. superior. passim.

H. phaeospori, sporidiis e fusco-purpurascentibus, lamellis decoloribus nebulosis. (*Agaricorum series 5. Pratella Fr.*)

A. psathyri, pileis submembranaceis, junioribus glandiformibus, dein campaniformibus magisque expansis planiusculis fragilibus siccis glabris, fibrillis potius s. atomis innatis tectis, lamellis plerumque adfractis fuscescentibus, sporidiis fusco-purpurascentibus, stipitibus fistulosis albis fragilibus. (*Agarici Pratellae Pers. syn. Pratellae Mycenae Nees. Agar. tribus 35. Psathyra Fr. syst.*)

3107. *A. gracilis Pers.*, pileo submembranaceo campaniformi obtuso, lamellis postice latissimis adnatis cinereo-nigricantibus, margine roseis, stipite tenui glabro. — *Pers. syn. 425. Fr. syst. I. 299. ? A. diffusus Batsch cont. I. t. III. A. tentaculum Sowerb. t. 335.*

In hortis collinis inter folia paucim.

3108. *A. corrugis Pers.*, pileo membranaceo campaniformi umbonato roseo subrugoso, lamellis adnatis violaceo - nigricantibus nebulosis, stipite elongato albo, praeter basin villosam glabro. — *Pers. syn. 424. Alb. et Schw. nisk. 206. Fr. syst. I. 298. A. carbonarii var. Batsch l. l. f. 91. A. pellospermus Bull. t. 561. (teste Pers.) Dub. gall. II. 804.*

In hortis umbrosis et nemusculis. (*Persoon.*)

3109. *A. cernuus Horne m.*, pileo submembranaceo hemisphaericolivido, sicco albido, lamellis adnatis cinereo-nigricantibus, stipite glabro, apice albo-pulverulento, saepius incurvo. — *Horne m. fl. dan. t. 1008. f. 1. Fr. syst. I. 298. A. alneti Schum. A. farinulentus Schaeff. bav. t. 205.*

In nemoribus odidis, alnetis Hercyn. infer.

3110. *A. bullaceus Bull.*, ascomatibus gregariis parvulis, pileo submembranaceo rufo, margine striato, lamellis planis latissimis cinnamomeis, stipite brevi tomentoso. — *Bull. t. 566. f. 2. Pers. syn. 412. Fr. syst. I. 298.*

In fmetis Thuring. paucim.

3111. *A. coprophilus Bull.*, pileo subcarnoso

laevi fuligineo-rufescente, lamellis arcuato-adfixis lividis, stipite hirsato cinerascente. — Bull. t. 566. f. 3. Pers. syn. 412. Fr. syst. I. 297.

In similibus cum praecedente locis, rarius.

3112. *A. fibrillosus* Pers., ascomatibus fragilissimis, pileo submembranaceo striatulo albido, lamellis adnatis purpureo-nigris, stipite elongato fibrilloso-aquamoso. — Pers. syn. 424. Fr. syst. I. 297.

Ad terram inter folia decidua Hercyn. rarissime. (Pers.)

3113. *A. Candolleanus* Fr., pileo subcarnoso laevi, primum spadiceo, dein dilatiore, lamellis adfixis violaceis decoloribus, stipitibus fibrillosis caespitosis, cortina fimbriante. — Fr. syst. I. 296. *A. violaceo-lamelatus* DC. gall. II. 143. *A. mutabilis* Oed. fl. dan. t. 714. *A. appendiculatus* Bull. t. 392.

In fageti Thuring. rarius. (Pileus pro varia aetate versicolor; lamellae juniores limbo albo cinctae; stipites basi incrassati, 2-3 unciales, apicem versus striati.)

3114. *A. stipatus* Pers., pileo subcarnoso glabro fusco-spadiceo expallente, (siccando) rugoso, lamellis adnatis confertis incarnato-fuscis, stipitibus caespitosis glabris. — Pers. syn. 423. exct. var. β. Flor. dan. t. 1673. Fr. syst. t. 296. *A. appendiculatus* Pers. nec DC. *A. xylophilus* auct. *A. concinnus* Bolt. t. 15. *A. hydrophilus* Bull. t. 511. *A. spadiceus* et *A. spadiceo-griseus* Schaeff. t. 60. et t. 233.

Ad trunco arborum agmine denso crescens, in capitibus formam plerumque congestus. (Variabilis, *Agaricum fuscum* Schum. et *A. macropodum* Pers. syn. 402. seu formam annulatam non excludens.)

B. *Psilocybae*, ascomatibus tenacibus, diutius persistentibus, a liquecenda praecedentium indole alienis, pileis subcarnosis laccibus (saepe viscidis), velum marginale tenuiter-flocculosum ocius exuentibus, lamellis latiusculis, stipitibus tenacibus subfibrillosis. (*Psilocyba Agaricorum* trib. 34. *Pratella Gymnopus* Nees. *Coprinii* spec. Pers.)

3115. *A. foecisecii* Pers., pileo subcarnoso glabro dilatate umbrino sensim magis pallescente, lamellis ventricosis adnexis umbriculis, stipite nudo glabro rufescente. — Pers. syn. 411., icon. t. 11. f. 1. Fr. syst. 295.

In areis hortorum graminosis, passim.

3116. *A. campanulatus* Bull., pileo submembranaceo campaniformi laevi brunneus, lamellis latissimis liberis ferrugineis, stipite laevi fistuloso obsoleto-angulato. — Bull. t. 552. Pers. syn. 426. Fr. syst. I. 295.

In ericetis udis Thuring. similem saltim legi.

3117. *A. canobrunneus* Batsch, pileo plano-convexusculo laevi fuscescente carnoso, lamellis subliberis fusco-purpureis latescentibus confertis, stipite firmo radicato albido subsquamuloso. — Batsch cont. I. f. 105. Fr. syst. I. 294.

In areis carboniorum Hercyn. inferior. passim.

3118. *A. ventricosus* Bull., pileo conico demum expanso laevi umbrino-pallescidente, lamellis adnexis pallide-umbrinis sinuosis subdecurrentibus, stipite basi ventricosa radicato. — Bull. t. 411. Fr. syst. I. 294.

In versuris arborum fino subactorum Thuring. similem legi fungum, nisi eundem.

3119. *A. obtusus* Pers., pileo campaniformi obtuso nitido carnosulo dilute-badio, lamellis adeatis subnebulosis margine dilatioribus, stipite deorsum incrassato albo-pallescente tenuiter villoso. — Pers. syn. 428. *A. obtusatus* Fr. syst. I. 293.

Ad truncos putrescentes Hercyn. (Persoon.)

3120. *A. montanus* Pers., pileo convexo obtuso subspadiceo, dein pallescente, lamellis adnatis planis subdecurrentibus umbrinis, stipite brevi glabro concolore. — Pers. syn. 428. excl. var. β. Fr. syst. I. 293. *A. atrocruus* Schaeff. t. 234. (var. stipite fibrilloso.)

In promontoriis campesribus agri gotting. (Persoon), et aliis Thuring. locis haud adeo rarus.

3121. *A. callosus* Fr., pileo conico tenaci poly-chloro, margine tenuiter striato, lamellis adnatis adscendentibus atro-purpureis, stipite glabro pallido (ex sporodiiis saepius inquinato.) — Fr. syst. I. 292., obs. II. 180. (lusus pileo albido.) *A. semiglobatus* Sowerb. t. 240. *A. semilanceolatus* Fr. obs. II. 178. (l. pileo lutescente.) *A. varius* Bolt. t. 66. Pers. syn. 414. (l. pileo lutescente.) *A. campanulatus* L. succ. ed. 2. nec 1.

In pascois et versusia udis Thuring. passim.

3122. *A. udis* Pers., pileo convexo ruguloso testaceo-fulvo s. subochraceo sensim pallescente, lamellis adfixis ventricosis subpurpurecentibus, stipite praelongo ferrugineo, basi fibrilloso. — Pers. syn. 414. Fr. syst. I. 292. *A. obscurus* Schum.

$\beta.$ *elongatus*, pileo submembranaceo obtuso, humido striatulo livido-flavente, lamellis pallide-nebulosis, stipite tenui. — *Ag. elongatus* Pers. icon. t. 1. f. 4., syn. 384.

In campis turfosis Hercyn. superior, var. $\beta.$ in sphagnosis, auctumai tempore rarius.

3123. *A. ericaeus* Pers., pileo convexo laevi (subviscoso) nitente, lamellis latescentibus adnatis, praeter marginem albicantem nigricantibus, stipite elongato nudo firme lutescente. — Fr. syst. I. 291.

$\alpha.$ *fulvus*, pileo ferrugineo-fulvo, siccando fulvo-lutescente. — *A. helvolus* Schaeff. t. 210. *A. ericaeus* Pers. syn. 413.

$\beta.$ *spadiceus*, pileo subspadiceo. — *A. nitidus* Pers. syn. I. L. ? *A. fuscopurpureus* With.

In ericetis udis et betuletis umbrosis. Auctummo.

3124. *A. stercorearius* Fr., pileo obtuso laevi viscido livido-flavescente, lamellis latescentibus decurrentibus fuscis, dein utrinque olivaceo-nigrescentibus, stipite stricto fibrilloso. — Fr. syst. I. 291. ? Schum. nec alior. *A. adnatus* Huds.

Ad finum vaccinum paschorum subalpestrium Hercyn. superior. talem qualem passim legi.

3125. *A. compactus* Schum., pileo carnoso umbo-nato viscoso badio, lamellis adnatis badio-purpureis, stipite longo sericeo. — Schum. saec. II. 285. Fr. syst. I. 299. *A. sarkocephalus* Fr. obs. I. 51.

In pinetis muscosis Hercyn. superior. Auctumno.

C. hypholomatici, pileis carnosis convexis, primum velo marginali, secundo margini stipitique adhaerentes exustis (cortina), lamellis confertis adnatis, stipite firmo cavo, a pileo discreto. (*Agaricorum trib. 33. Hypholoma Fr. Pratellae Cortinariae Nees.*)

3126. *A. hybridus* Bull., pileo umbonato, deinde convexo ex carne sulfurea conflato; seccando lateo, lamellis adnexis angustis flaventibus dein caeaco-purpurascens-tibus, stipite fistuloso glabro crasso, in basin sensim tonuato. — Bull. t. 368. et t. 562. E. H. *A. capnoides* Fr. syst. I. 289. *A. turfosus* Schum.

In pinetis roridis Hercyn. super. Auctumno.

3127. *A. marginatus* Pers., pileo campaniformi ferragineo, marginem pallidiorem villosum excente, stipite stricto nitido argenteo fibrilloso. — *A. fascicularis* $\beta.$ *marginatus* Fr. I. I. *A. marginatus* Pers.

In pinetis Hercyn. superior. rarius.

3128. *H. fascicularis* Huds., pileo subcarnoso umbonato ochraceo, lamellis olivaceo-s. sordide virentibus nebulosis, stipite cavo tenui, cortina nigrescente. — Huds. Bolt. t. 29. Sowerb. t. 285. Pers. syn. 421. Nees syst. f. 198. Fr. syst. I. 288. *A. lucidus* Otto. *A. Ligula* Spr. mant. *A. olivaceus* Hoffm. *A. jonesii* Batsch f. 29. *A. pulvriulentus* Bull. t. 178. *Agaricus lateritius* Schaeff. t. 49.

Ad trunco putridos, salicinos praeprimis, frequens.

3129. *A. lateritius* Schaeff., pileo carnoso obtuso fulvo-lateritio, primum saepius sericeo s. viscidulo, lamellis subvirescentibus dein nigrantibus, stipite farcto valido, cortina nigrescente. — Schaeff. t. 49. Pers. syn.

421. *Fr. syst. I.* 288. *A. atmarus* Bull. t. 30. f. 262. *A. suratus* Flor. dan. t. 290. *A. mutabilis* Scop.

In similibus tam praecedentē locis. Auctumao.

3130. *A. silaceus* Pers., ascomatibns gregariis, pileo carnoso viscoso aurantio-rubo (bolari), lamellis contextis cinereo-virentibus, stipite bulboso corticato. — Pers. syn. 421. *A. lateritii* var. *bulbosa* Fr. l. l.

Ad terram promontoriorum adorū Thuring. rarius.

3131. *A. lacrimabundus* Bull., pileo carnoso piloso-aquinoso albo-fusco, lamellis ambrinīs latestentibus, stipite cavo fibrilloso. — Bull. t. 526. f. 5. Sowerb. t. 41. *Fr. syst. I.* 287.

β. velutinus, pileo umbonato ferrugineo, lamellis fusco-nebulosis. — *A. velutinus* Pers. syn. 409.

Ad truncos arborum in pascuis Thuring. passim.

D. *psallii*, pileis magis minusve carnosis converis, dein campaniformibus expansis viscosis et squamis fibrillatis obiectis, lamellis lateocentibus fuscocentibus, velutiniformi subpersistente, stipite firma discreto. (Agaricorum trib. 32. Prallota Fr. Pratella Lepiota Neer. Lepiatae esp. Pers.)

3132. *A. aeruginosus* Curt., pileo carnoso flavo, glutinae coeruleo secedente collinito virente, lamellis adnatis planis purpureo-fuscis, stipite cavo squamoso. — Curt. lond. t. 309. Flor. dan. t. 1373. Pers. syn. 419. *Fr. syst. I.* 286. *A. beryllus* Batech cont. 2. f. 218. *A. politus* Bolt. t. 30. Flor. dan. t. 1248. *A. cyaneus* Bull. t. 120. f. 530. *A. viridulus* Schaeff. t. 1. *A. acuminatus* Scop.

Ad truncos arborum nemorensium passim.

3133. *A. echinatus* Roth, pileo subcarboso plano convexiusculo squamoso-echinato fuliginoso, margine membrana lacera cincto, lamellis adnatis miniatis, stipite fistuloso reflexo-squamoso purpurascente. — Roth cat. II, t. 9. f. 1. Pers. syn. 419. *Fr. syst. I.* 286.

In vaporariis Germaniae. (Roth.)

3134. *A. squamosus* Pers., pileo subviscoso lateo, squamis sparsis concentricis, lamellis adnatis nigricantibus, stipite farcto, infra annulum villoso-squamoso. — Pers. syn. 409. Fr. syst. I. 284.

a. fibrillosus, stipitis squamis fibrillosis reflexis. *A. squamosus* a. Pers. *A. subcernuus* Schum.

b. strigosus, stipitis tomento strigoso. — *A. distans* Pers. *A. sphaleromorphus* Schum.

Ad arborum truncos in nemoribus.

3135. *A. semiglobatus* Batsch, pileo hemisphaericō laevi viscoso flavo, lamellis adnatis nigro-nebulosis, stipite fistuloso glabro, apice nigro-punctato. — Batsch I. f. 110. Sowerb. t. 248. Pers. syn. 407. Fr. syst. I. 284. *A. praecox* Schum. *A. glutinosus* Curt. *A. milens* Bull. t. 566. f. 4. nec Flor. dan.

Ad finem pascuorum sylvaticorum.

3136. *A. purpureo-brunneus* Jungh., pileo carnoso convexo subumbonato flaventi-brunneo innato-fibrilloso, margine involuto, lamellis purpureo-brunneis, margine albis, stipite aequali albo adpresso-fibrilloso con-colore. — Jungh. I. I. 404.

In vallibus uia Hercyn. infer. (Junghuhn.)

3137. *A. melanospermus* Bull., pileo carnoso laevi flavo, lamellis rotundato-adnexis e flavo-nigrescentibus, stipite cavo albido deorsum incrassato. — Bull. t. 540. f. 2. Pers. syn. 420. Fr. syst. I. 283.

In arvis verisque pinguioribus Thuring.

3138. *A. praecox* Pers., pileo carnoso laevi alutaceo-lutescente obtuso, lamellis adnexis subemarginatis tenuibus pallide-fuscis, stipite subfarcto glabro albo, annulo patulo striato albo, facile caduco. — Pers. syn. 420. Alb. et Schw. nisk. 205. Fr. syst. I. 282. *A. aestivus* auct. *A. cereolus* Schaeff. t. 51. (*lusus minor*). *A. candidans* Schaeff. t. 217.

In similibus cum priore locis, per quam varius.

3139. *A. sagatus* Fr., pileo carnoso laevi fulvo,

lamellis liberis umbrinis, stipite cavo fragili obeso, annulo albo patulo. — Fr. syst. I. 282. A. mutabilis Flor. dan. t. 1008. f. 2.

In pratis humectis Thuring. auctumno.

3140. ? *A. haematospermus* Bull., ascomatibus gregariis teneris, pileo umbonato, dein depresso glabro argillaceo-flavente, lamellis liberis ventricosis lateritioribus, stipite fistuloso tenui, annulo exiguo. — Bull. t. 595. f. 1. Fr. syst. I. 282.

In promontorii graminosis Thuring.

3141. *A. campestris* L., pileo carnoso umbonato polychloro (albo, flavente, rufescente, umbrino) stipato-squamoso a. subsericeo, lamellis liberis confertis ventricosis, primum albida, mox carneo-rubentibus, dein a fuscoc-a. cinereo nigrescentibus, stipite farcto albo, annulo concolore vario. — L. suec. n. 1203. Flor. dan. t. 704. Schaeff. nov. t. 33. Sowerb. t. 305. Grev. scot. t. 161. Pers. syn. 418. Fr. syst. I. 281. *A. modestus* et *pellitus* Batsch. *A. Pratella* fl. wett. *A. edulis* Bull. t. 134. t. 514. Nees syst. f. 195. Pers. l. l. *A. alutarius* Pers. *A. arvensis*, *pratensis* et *sylvaticus* Schaeff.

In veranis dumetisqns siccis ubertim. Auctumno.

3142. *A. cretaceus* Bull., pileo carnoso ampio umbonato-convexo obtuso, polito cretaceo-candidante laevi, rarius in squamulas teneras diducto, lamellis latissimis liberis, primum albido-carneis, dein remotis carneo-fuscenscentibus, stipite dein cavo laevi, annulo adscendente lacero vario. — Bull. t. 374. Fr. syst. I. 280. nec Pers. *A. cepaestipes* a. DC. gall. II. 202. excl. syn.

In aggeribus et versuris piagibus Thuring. passim. Aestate.

E. volvati, pileis carnosis campanulatis sericeis s. viscidulis, lamellis liberis ventricosis lateritiosibus (ex albo-carneis) nebulosis thecisque prominulis veluti asperulis, velo universalis simplici discreto, prima juventute totum ascoma ovatum involucrante (volva), dein stipite

crescere; in Lachidias rumpente. (Agaricarum tribus) 31. — *Volvaria* Fr. syst. *Amanitae* sp. Pers. *Ag. velutina* Batsch.)

3143. *A. pusilla* D. C., pileo platiuscudo tenero obsolete pilosulo pellucido albido facile caduco, lamellis rotatis, stipite fistuloso concolori fragili, volva laxa. — *Amanita pusilla* Pers. syn. 249. *Agaricus pusillus* D. C. gall. II. 211. Fr. syst. I. 279. nec alior. *A. volvaceus* Bull. t. 530. (1782). PELLUCA PELLUCIDA VELUTINA.

In hortorum arcis arboreisqno subarbiiis passim.

3144. *A. speciosus* Fr., pileo subumbonato brado viscoso albo-gryseo, lamellis incarinalis, stipite solidi attenuato volvaque lata villosis, stipite subbulboso. — Fr. syst. I. 278. *A. pubescens* Schüm. *Amanita incarnata* f. *laevis* Alb. et Schw. nissk. 142.

In ruderibus Lusatiae. (Albertini et Schœnlinis.)

3145. *A. volvaceus* Bull., pileo campaniformi conico adpresso-piloso cinereo nigroque variegato, lamellis remotis obtusis carneo-rubris pulverulentis, stipite solidi subaequali glabro, volva laxa fuscescente irregulariter scissa. — Bull. t. 262. Sowerb. t. I. Fr. syst. I. 278. *Amanita virgata* Pers. syn. 249. excl. syn. Schaeff.

In hortis eborumque vaporariis, inter scobem coriarium rarius. Auctummo inenote.

3146. *A. bambusicinus* Schaeff., pileo depresso-umbonato sericeo caudido, lamellis carneis, stipite solidi attenuato incurvo, volva ampla laxa. — Schaeff. t. 98. Fr. syst. I. 277. *A. incarnatus* Batsch. *Amanita incarnata* Pers. syn. 248. *A. calyptata* Lam. *A. dentata* Schrad.

Ad trunco arboreum, Acerum præprimis. Auctummo.

III. erythrospori, sporidius a rubro ferrugineis, lamellis decoloribus subpersistentibus, velo vario, nec tamen araneoso. (Agaricarum series 4. Dermatus Fr.)

A. crepidoti, pileis inaequalibus, excentricis s. lateritibus, lamellis inaequalibus decoloribus, velo tenuissimo fibrilloso, operidius saturatus dibrutus a ferrugineis

s. rufescensibus. (*Agaricorum trib. 3d. Crepidotus Fr.*)
A. Pleuropi sp. Pers.)

+ villosi, ascomatibus minoribus, pileo submembranaceo villoso.

3147. *A. pezizoides* Nees, ascomatibus sessilibus reversis cyathiformibus olivaceo-fuscis, extus granulosis, lamellis crassiusculis ventricosis paucis rufescensibus. — Nees *nat. cur. IX.* 249. t. 6. f. 18. Fr. syst. I. 276.

Ad palos salicicos patridos Thuring. rarius.

3148. *A. byssisedus* Pers., pileo tenui villoso griseo, primum resupinato, deinde horizontali, lamellis adnato-decurrentibus ventricosis, stipite incurvo, mycelia rhizoides alba, basi spargento. — Pers. icon. t. 14. f. 4. syn. 482. Fr. syst. I. 276.

Ad trancos (Fagorum) putredine excesso passim.

3149. *A. violaceo-fulvus* Batsch, pileo tenui sessili reniformi tomentoso fragili fusco-purpurascente, lamellis ventricosis concoloribus. — Batsch *elench. f. 39.* Pers. syn. 483. Nees syst. f. 180. Fr. syst. I. 276.

Ad tristes humidas lignorumque salicium patridam Thuring. rarius.

3150. *A. depauperata* Batsch., pileo subsessili tenui fragili reniformi rufescente-cano parcius tomentoso, lamellis distinctis divergentibus rufescensibus. — Batsch *cont. I. f. 122.* Nees syst. f. 179. Fr. syst. I. 275. *A. epigaeus* Pers. syn. 484. *A. gramineus* Otto.

Ad terram muscosam, auctumino, rarius.

3151. *A. variabilis* Pers., pileo membranaceo, sericeo-tomentoso albo, nunc resupinato sessili, nunc stipite incurvo curto subfulto reflexo, lamellis albido-rubiginosis. — Pers. syn. 483. Fr. I. I. *A. pubescens* Flor. dan. t. 187B. f. 2. *A. sessilis* Bull. t. 152. f. 581. Flor. dan. f. 1556. *Pekiza lamellata* Poll. pr. pr.

Ad cortices putres passim. Auctumino.

3152. *A. bouetellaris* Fr., pileo reniformi villoso, atrocaeruleo-pallido, lamellis rotundatis ferrugineis, stipite

lateralis sursum attenuato albo. — Fr. l. l. *A. umbilinus* Pers. myc. *A. flurstedensis* Batsch cont. I. 171.

Ad ramos populinos putres passim.

† glabri, ascom. carhosia glabria majoribus.

3153. *A. mollis* Schaeff., pileo subsessili laevi flaccido pallido, lamellis aquoso-cinnamomeis. — Schaeff. t. 213. Pers. syn. 480. Fr. l. l. *A. canescens* Batsch f. 38.

Ad trunco putres rarius. Auctummo.

3154. *A. panuoides* Fr., pileo carnoso sessili obovato glabro luteo, lamellis decurrentibus subramosis crispatis. — Fr. l. l. *A. scobigenus*, *mollis*, *atrotomentosus* Pers. et Friesio teste (el. J. 56.) *Merulius* et *Gomphus pezizoides* Pers. myc. (ceu monstra.)

Ad caudices pineos putres rarius. Auctummo.

3155. *A. atro-tomentosus* Batsch, pileo carnoso excentrico rivuloso ferrugineo, lamellis basi ramosis, stipite firmo elasticо velutino. — Batsch el. f. 32. Pers. syn. 374. Fr. l. l. *Necs* syst. f. 175.

Ad trunco pineos et salicinos putres. Auctummo.

B. tapini, pileis carnosis laevibus nudis, primum plano-convergis, margine involuto carnoso dein depresso late umbilicatis, lamellis adnato-decurrentibus, velo marginali villoso fugaci, stipite in pileum abeunte. (*Agaricorum* trib. 29. *Tapinia* Fr. *A. Omphalias* sp. Pers.)

3156. *A. involutus* Batsch, ascomatibus compactis, pileo depresso subferragineo, margine obtusissimo involuto albo-tomentoso, hymenium suboccultante, lamellis angustis dichotomis, basi poriformibus s. isthmis remotis interceptis, stipite brevi obeso saepius maculato. — Fr. syst. I. 271.

a. regularis, pileo stipite centrali instructo. — *A. contiguus* Bull. t. 240. t. 576. f. 2. Sowerb. t. 98. *A. adustus* With. *A. involutus* Batsch cont. I. f. 61. Pers. syn. 448. Schaeff. t. 71.

b. excentricus, stipite subexcentrico. — *A. cyathiformis* Schaeff. t. 252. *A. lateralis* Schaeff. t. 72.

Var. α . ad terram, β . ad trunca Thuring. passim.
(Compages Boleti; lamellae plicaeformes saepissimae Daedaleae quercinae.)

3157. *A. subreflexus* Otto, pileo carnoso subinvoluto candido, lamellis subumbribus, stipite solido tenue flavecente. — Otto agar. 77. Fr. syst. I. 271.

Ad terram Saxoniae. (Otto.)

3158. *A. Trickloma* A. et Schw., pileo subcarnoso albido, pilis a vertice iude adpressis, ad marginem propexis strigosis obtecto, lamellis confertis decurrentibus ex argillaceo-fuscescentibus, stipite tenue farcto squamuoso. — Alb. et Schw. nisk. 188. Fr. syst. I. 270.

Ad promontoria declivia Lusatiae. (Alb. et Schw.)

3159. *A. hirsutissimum* Fr., pileo subcarnoso glabro plato-umbilicato nitente tenaci e cinereo albente, lamellis cincrascentibus, stipite tenui basi albo-villoso. — Fr. syst. I. 269. *A. ericetorum* Schum. *A. nigrella* Pers. syn. 463. (est forma minor ad junior.)

β . undulatus, pileo inaequali undulato, lamellis stipite que cavo griseis. — Bull. t. 535. f. 2. Pers. syn. 371.

Ad terram glareosam mesocosam Hercyn. infer.

3160. *A. fragilis* Batsch, ascocarne tenere fragili subnudo, pileo leviter carnoso glabro convexo, dein umbilicato (sicco) ochraceo, margine dilutiore, lamellis carneo-rubellis dehaud luridis, stipite solido brevi subfibroso. — Batsch cont. I. f. 215. Pers. syn. 455.

Ad terram piastorum Thuring. passim,

C. galericulati, pileis conicis, dein campaniformibus membranaceis, humidis substriatis, siccis laevibus expallentibus nudis, lamellis adnexis s. adnatis ferrugineis. (Agarioorum trib. 28. Fr. Mycenae sp. Pers.)

3161. *A. pitigrinus* Fr., pileo conico-subcampaniformi viscoso striato lurido, lamellis adnexis confertis uquoso-cinnamomeis, stipite argenteo, apice albo-pulverulentu. — Fr. syst. I. 268.

In nemoribus humidis Hercyn. infer. passim.

3162. *A. stagnina* Fr., pileo submembranaceo hemisphaerico obtusissimo basio-ferrugineo expallente, praeceps marginem obsolete squamulosum nude, lamellis latissimis decurrentibus concoloribus, stipite clato, gracili, tenui, rubiginoso, basi puberulo. — Fr. syst. I. 268.

In dumetis udis Hercynia, passim.

3163. *A. Hypnorum* Schrk., pileo campanulato parvo, tenero, subpapillato membranaceo, humectando sulcato subochraceo expallente, lamellis adnatis latascentibus remotis, stipite tenui flexili, apice pruinoso. — Schrank bav. II. 603. Batsch elem. f. 96. Pers. syn. 385. Fr. syst. I. 267.

a. bryorum, pileo obtuso umbonato expallente lamellisque ventricosis cinnamomeis, stipite longo pallido, apice pruinoso. — *A. bryophilum* Pers. syn. I. I. Fr. I. I. seu var. *a. major*.

b. sphagnorum, pileo convexo umbonato flavo-ochraceo sensim magis pallescente, lamellis planis subtriquetris stipiteque longo glabro laxe fuscescente. — *Ag. hypnorum* Pers. et Fr. I. I. *A. aciculata* Schaeff. bav. I. 222.

c. rubiginosus, pileo obtusitculo lamellisque ferrugineis, stipite longo rubiginoso. — Fr. I. I. *A. rubiginosus* Pers. syn. 385.

In terra muscosa bryetisque udis vulgaris.

3164. *A. gilvo-brunneus* Jungh., pileo carnosulo gilvo campanulato obtuso laevi, lamellis liberis bruneo-cinnamomeis, stipite aequali fistuloso gratili laevi nitente. — Jungh. in Schleid. Linn. 1830. p. 408. t. 6. f. 12.

In promontoriis siccis agri mansfeld. (Junghuhn.)

3165. *A. melinoides* Bull., pileo obtuso, margine striato ochraceo-helvolo sensim palloescente, lamellis adfixis ventricosis stipiteque subpruinoso dilutioribus. — Bull. t. 560. f. 1. Pers. syn. 387. Fr. syst. I. 266. eoque monente *A. circumseptus* et *lachrimalis* Batsch. seu formae affines.

In pratis muscosis udis vulgaris. Auctummo.

3166. *A. tener* Schaeff., pileo conico-campanu-

Iato obtuso, humido striato, siccо laevi ochraceo, lamellis linearibus adnatis, stipite longo stricto glabro. — Schaeff. t. 79. Sowerb. t. 33. Pers. sys. 386. Fr. syst. I. 265. *Amanita tenera* Alb. et Schw. nissk. 194. (cum var. β . vaporaria, a Friesio ad *Ag. apalum laudata*.) *A. ferruginosus* Bull. t. 535. f. I. t. 403. f. b. c.

β . pilosellus, pileo stipiteque pilosulis. Pers. sys. 387.

Var. α . in promontorii graminosis; β . ad trancos patres Hercyn. rariissime.

3167. *A. undulatus* Jungb., pileo campanulato-convexo umbo nato laevi nitido membranaceo, lamellis adnatis, basi acutis brunnens, stipite aequali solido tenaci. — Jungb. l. l. t. 6. f. 14.

In promontorii calcareis Hercyn. infer. (Jungb.)

3168. *A. lateritius* Schum., pileo submembranaceo laevi ferrugineo sensim pallescente, lamellis subliberis dilute cinnamomeis, stipite longo glabro albido. — Schum. sacil. II. 359. Fr. syst. I. 255.

In fine congesto Hercyn. super. rara.

D. naucorii, pileis carneis-membranaceis umbo natis, squamu lis s. fibrillis adpressis, raro secedentibus tectis, lamellis cinnamomeis, velo cum ascomatis integumento externo conformi fugacissimo, stipite subfusiforme tenui squamu loso intus flocculoso. (*Agaricorum trib. 27. Naucoria* Fr.) Fungi minores, gregarii, fragiles, epiphyti, persistentes.

3169. *A. inquilinus* Fr., pileo subcarnoso laevi umbo nato subtestaceo, micando pallidiori, lamellis latenteribus ferrugineis, stipite tenui brevi tenaci spadicino. — Fr. syst. I. 264. *A. squarrosum* Bull. t. 538. (var. stipite squamu loso.)

Ad ligna putrida pone terram Thuring.

3170. *A. pygmaeus* Bull., pileo subcarnoso, primum convexo, dein deplanato glabro rufo, marginem versus striato, lamellis liberis striatis ventricosis ferrugineis,

stipite tenui fistuloso albo, basi pilis hirsuto. — *Bell.* t. 525. f. 2. *Fr. syst.* I. 253.

Ad caedices arborum putres Thuring. rariss.

3171. *A. pumilus Pers.*, pileo subcarnoso laevi subhemisphaericō ochraceo, lamellis adnexis confertis dilute cinnamomeis latiusculis planis, stipite tenui cavo. — *Pers.* syn. 317. *Fr. syst.* I. 263. *coquē monente A. pusillus Schaeff.* t. 203.

Ad versuras graminosas Hercyn. inferior.

3172. *A. furfuraceus Pers.*, pileo subcarnoso, dein umbilicato squamoso sericeo, lamellis subdecurrentibus cinnamomeis, stipite fistuloso furfuraceo. — *Pers.* syn. 454. *Fr. syst.* I. 262. *A. pulverulentus Schaeff.* t. 226.

In quisquiliis herbaceis putrescentibus passim.

3173. *A. graminicola Nees*, pileo convexo-papillato sericeo fuscescente membranaceo, lamellis adnexis pallidioribus, stipite tenui hirsuto. — *Nees syst.* f. 186. *Fr. syst.* I. 261.

Ad graminum culmos putres German. mediae. (Nees.)

3174. *A. conspersus Pers.*, pileo subcarnoso furfuraceo-squamuloso rufo-cinnamomeo depresso-campaniformi, lamellis emarginatis linearibus cinnamomeis, stipite fistuloso, apicem versus squamuloso. — *Pers. icon.* t. 12. f. 3., syn. 318. *Fr. syst.* I. 260.

In alnetis et sphagnoetis Hercyn. super. passim.

E. Inocybace, pileis carnosulis umbonatis dein magis deplanatis, siccando tenacellis, e fibrillis longitudinalibus stipatis sericeis s. squamosis, lamellis subliberis confertis ventricosis, primum albidis dein decoloribus, nonnisi margine dilutiore denticulatis, velo fugacissimo, stipite solido subaequali, s. fibrillis vestito. (*Agaricorum tribus 26. Inocybe Fr. Cortinariac et Gymnopi s. Pers.*)

3175. *A. obscurus Pers.*, ascomatibus parvia sparsis, pileo subcarnoso convexo umbonato squamoso-fuliginoso, lamellis latiusculis plano-adscendentibus olivaceo-fuligineis,

stipite solido longo fibrilloso, — Pers. syn. 347. nec Alb. et Schw.

In piastis montosis Hercyn. superior. paucim. (Ericio teste vix ab A. calamistrato s. lacero diversa.)

3176. *A. petiginosus* Fr., pileo convexo subcarnoso rufo-fuscescente cano-sericeo, lamellis liberis ciliatis pallidis, dein spadiceis flavis, stipite farcto rufo pulverulento. — Fr. syst. I. 259. *A. rufipes* Pers. icon. t. 1. f. 5.

In promontoriis sylvaticis paucim.

3177. *A. scabellus* A. et Schw., pileo subcarnoso planiusculo umbonato albido rufo-piloso tenerimo, lamellis liberis albidis, stipite farcto rufo furfuraceo. — Alb. et Schw. nissk. 189. Fr. syst. I. 259.

In versuris graminosis Lusatiae (Alb. et Schw.)

3178. *A. brunneo-villosus* Jungh., pileo carnoso, dein depresso floccoso-fibrilloso cervino-brunneo, lamellis adnatis saturatioribus, stipite floccoso-fibrilloso fistuloso deorsum attenuato. — Jungh. I. L. t. 6. f. 5.

In saltu hercynico paucim, gregarius.

3179. *A. albo-crinitus* Jungh., pileo tenui carnoso conico convexo subcampanulato umbonato brunneo squamoso-fibrilloso, margine deflexo, lamellis liberis subrotundis basi emarginatis, stipite aequali solido albo glabro cursum pruinoso. — Jungh. I. L. p. 402. t. 6. f. 4.

In saltu hercyn. paucim.

3180. *A. geophilus* Pers., pileo subcarnoso conico, dein expanso umbonato sericeo, lamellis adnexis argillaceo-fuscescentibus lutiisculis, stipite tenui farcto albo-pulverulento. — Fr. syst. I. 258.

a. *albus*, pileo albente. — *A. albus* Schum. *A. argillaceus* Pers. syn. 372. *A. inodorus* Bull. t. 524.

b. *lilacinus*, pileo lilacino. — *A. geophilus* Pers. syn. 340. Fr. syst. I. 258. *A. affinis* Pers. icon. t. 1. f. 1. *A. illopodium* Bull. t. 578. *A. candidus* Batsch cont. I. f. 106.

c. *lutescens*, pileo lutescente. — *A. geophilus* Bull. t. 522. f. 2. *A. auricomus* Batsch elench. f. 21.

In nemoribus caeduis frequens simulac versipellis.

3181. *A. lucifugus* Fr., pileo carnoso placo-convexiusculo fibrilloso-squamoso subolivaceo, lamellis subliberis ex argillaceo olivaceis, stipite solido aequali-subondo. — Fr. syst. I. 258., cl. I. 32. *A. dulcamorus* Pers. syn. 824.

In pinetis umbrosis passim. Auctumno vero.

3182. *A. sterilis* Jung h., pileo carnoso acute convexo ghibro violaceo, lamellis liberis angustis crassiusculis brunnescens, stipite aequali solido concolore, apicem versus pruinoso, basis substriato. — Jung h. I. I. 404. t. 6. f. 8.

In sylvis Hercyn. inferior. ad Harzgerode, auct. (Jung h.)

3183. *A. rimosus* Bull., pileo carnoso campaniformi, deinde magis expanso longitudinaliter rimoso fuscoluminescente, lamellis adnexis latiusculis olivaceo-argillaceis, margine dilatioribus, stipite solido pallescente, apicem versus farinaceo, basis subtuberoso. — Bull. t. 388. f. 559. Sowerb. t. 323. Pers. syn. 310. Fr. syst. I. 258. Geel. cr. I. t. 128. *A. auricenius* Batsch elench. f. 107.

In nemoribus caeduis passim. Auctummo.

3184. *A. sambucinus* Fr., pileo carnoso obtuso sericeo laevi stipiteque solido obeso subondo albis, lamellis adnexis demum spadiceis. — Fr. syst. I. 257. *A. obesus* Pers. syn. 330. nec Batsch. *A. candidus* Fr. obs. I. 80. excl. syn.

In campis arenosis passim. Auctummo.

3185. *A. montosus* Pers., ascomatibus subcaespitosis carnosis, pileo ex rufu sensim pallescente, lamellis subliberis angustis aquose-argillaceis, stipite brevi subbulboso. — *Agaricus obesus* β . *montosus* Pers. I. I.

In promontoriis agri gotting. (Persoon.)

3186. *A. lacerus* Fr., pileo subcarnoso fibrilloso subsquamoso marino, lamellis adnexis ventricosis stipiteque solido fibrilloso ex albido-concoloribus. — Fr. syst. I. 257. *A. rimosus* β . *vialis* Pers. syn. 310. Alb. et Schw. nisk. 164. *A. maritimus* Fr. obs. II. 41.

Ad semitas uadas arenosasque passim.

3187. *A. lanuginosus* Bull., pileo subcarnoso umbonato convexo brunneo, tomento lanato-squamoso cinereo-crenato magis tenuato tecto, lamellis liberis laevis, stipite farrago brunneo fibrilloso striato. — Bull. t. 370. Fr. syst. I. 257. *A. phaeocomes* Pers. syn. *A. cervicolor* Pers. syn. 325. *A. flocculentus* Poll.

In nemoribus umbrosis Thuring. passim.

3188. *A. cincinnatus* Fr., pileo subcarnoso plano-convexo villosa-squamoso fusco, lamellis adnatis stipiteque solidis squamoso rigidato fascio-violaceis. — Fr. syst. I. 256. *A. cristatus* Scop.

In nemoribus editioribus Hercyn. inferior.

3189. *A. scaber* Müll., pileo carnoso obtuso squamoso fuligineo-pallescens, lamellis subliberis saturationibus, stipite solido fibrilloso. — Müll. flor. dan. t. 832. f. 3. Sowerb. t. 207. Fr. syst. I. 255.

In pinetis Hercyn. superior. rarius.

3190. *A. pyrioderus* Pers., pileo carnoso umbonato fibrilloso-subquamoso fuligineo, lamellis adnexis dilute-fuscescentibus, stipite cavo fibroso. — Pers. syn. 300. Abb. et Schle. nissk. 162. Fr. syst. I. 255. *A. furfuraceus* Bull. t. 532. f. 1.

In pinetis arenosis Hercyn. auctummo.

3191. *A. morosus* Jungh., pileo carnoso campanulato-concaviusculo umbonato innato-fibrilloso cinereo-lutescente subbrunneo, margine contracto, lamellis albis dein nebulosis subbrunneis, stipite albo laevi solido nitente subbulboso. — Jungh. L. I. p. 402. t. 6. f. 6.

In nemoribus Hercyn. (Jungh.)

3192. *A. repandus* Bull., pileo carnoso laevi lutescente, margine infracto flexuoso longitudinaliter rimoso, lamellis pallidis liberis, stipite longo solido striato, apicem verana fibroso-squamoso. — Bull. t. 423. f. 2. Pers. syn. 319. Fr. syst. I. 255.

In campis arenosis Hercyn. superior. passim.

*F. Flammulae, pileis carnis coloris, dein ex-pansis laevibus glabris, rarissime squamu-los adspersis, saepius viscidis, velo marginali fibrilloso fugacissimo arido, lamellis variis, stipite primum farcto dein cavo undique aequali, in pileum leviter diffuso. — (Agaricorum tribus 25. *Flammula* Fr. A. *Cortinariae et Gymnopodis* sp. Pers.) — Fungi subcaespitosi, firmi, persistentes, saepius esculentii, colore magis minusve lutescente insignes.*

— + terrestres, gregarii. (Cum *A. Hebelomatibus* analogi.)

3193. *A. cohaerens* Pers., pileo molli rugoso cinnamomeo hemisphaericō obtuse umbonato, lamellis subadnexis aquoso-cinnamomeis, stipite cavo nitente badio. — Pers. syn. 306. Alb. et Schw. nissk. 163. Fr. syst. I. 253.

Ad terram udam truncosque patres rari.

3194. *A. Liquiritiae* Pers., pileo carnoso con- vexo glabro aureo, lamellis consertis fulvo-cinnamomeis, stipite cavo fibrilloso cum pileo concordore. — Pers. syn. 306. (Friesius dubie cum *A. astragalino* comparat.)

Ad truncos abietinos Hercyn. superior. (Persoon.)

† viscosi, pileo viscoso, (ideoque cum *A. Myracii* analogi.)

3195. *A. maculosa* Pers., pileo subviscoso albido umbrino squamoso obtuse-umbonato, lamellis adnatis teneris, primam albis dein incarnato-cinerascentibus, stipite squamoso albo. — Pers. syn. 268. Fr. syst. I. 253.

In saltu sollingensi (Persoon.)

3196. *A. lenta* Pers., pileo obtuso planiustulo laevi viscoso, lamellis adnatis, stipite farcto squamoso. — Pers. syn. 287. Alb. et Schw. nissk. 157. Fr. syst. I. 253.

Ad ramenta lignea ipsamque terram.

3197. *A. Lubricus* Pers., pileo obtuso viscoso fulvo, lamellis adnatis argillaceis, stipite solido fibrilloso albo. — Pers. syn. 307. Fr. syst. I. 252.

Ad caudices arborum patres terramque.

3198. *A. thelephorus* Pers., pileo convexo viscoso-papillato crustallino carnosò dein magis deplanato, lamellis aquoso-cinnamomeis confertis planis, stipite solidissimè ferrugineo utrinque pallido. — Pers. syn. 307. Fr. syst. I. 252.

In pinetis Hercyn. superior. rarius.

3199. *A. carbonariorum* Fr., pileo umbrinato laevi viscoso fulvo, lamellis adnatis argillaceo-fuscescentibus, stipite rigido squamoso. — Fr. syst. I. 252.

In areis carbonariorum relictis Hercyn.

3200. *A. spumosus* Fr., ascomatibus gregariis intus flavo-virentibus pileo subumbonato laevi viscoso flavidò, lamellis adnatis e flavo-ferrugineis, stipite cavo in basin tenuato. — Fr. syst. I. 252. *Amanita silacea* var. *ebulbis* Alb. et Schw. niss. 205.

Ad truncos in pinetis passim.

+++ sicci, pileo sicco. (Cum *Pholiota* analogi.)

3201. *A. astragalinus* Fr., pileo laevi, sicco aureo-incarnato obtuso, lamellis adnexis pallidis demum ferrugineis, stipite flexuoso squamoso-fibrilloso. — Fr. syst. I. 251. *A. astragalinus* β. Alb. et Schw. niss. 160.

Ad truncos Hercyn. superior. passim.

3202. *A. flavidus* Schaeff., ascomatibus caespitosis, pileo obtuso laevi flavidò, lamellis adnatis e luteo ferrugineis, stipite dein cavo elato fibrilloso, basi ferruginea. — Schaeff. t. 35. Pers. syn. 295. Fr. syst. t. 250. *A. lignatilis* Bull. t. 554. f. 1.

Ad truncos arborum muscosos frequens.

++++ olidi, pileo glabro olido. (*A. tribus* 24. *Hedeloma* Fr.)

3203. *A. fastigilis* Pers., pileo obtuso obeso, humido viscidulo lateritio-rufo opaco flexuoso-repaudo; lamellis aquoso-cinnamomeis, sporidiis ferrugineo-argillaceis, stipite squamuoso crasso albido-fibrilloso. — Pers. syn. 326. Fr. syst. I. 249. *A. obesus* Schum. *A. circi-*

nans Pers. obs. *A. ceraceus*, *lateritius*, *subtestaceus*, *clavus* Batsch t. 195. t. 198. t. 199. *A. crustuliniformis* Bull. t. 308. t. 546. *A. gilva* Schaeff. t. 221.

a. crustulinus, pileo convexo sordide dilatateque spadiceo, stipite subbulboso crasso albo-villoso. Pers. l. l.

b. circinans, ascom. gregariis, pileo pallidius fuscus, lamellis dilutionibus guttas stillantibus, dein maculatis. Pers. l. l.

c. involvatus, ascom. pallidis primum tomento volvato formi involutis, stipite dein polyrrhizo. Pers. l. l.

d. versicolor, pileo alutaceo, lamellis dein sublineatatis. Pers. l. l.

e. parvulus, pileo piano ochraceo viscoso, lamellis subterreis. Pers. l. l.

In sylvis abietinis et fagineis Hercyn. utriusque.

3204. *A. punctatus* Schaeff., pileo carnoso convexo dein deplanato punctato, luteo-fuscescente, lamellis confertis subcinnamomeis, stipite striato in basin incrassato. — Schaeff. t. 40.

In nemoribus caeduis Bavar. et Thuring.

H. myxacei, pileis mucido-carnosis glabris viscosis, lamellis subdecurrentibus, dein obscure ferrugineis, vello viscoso fugaci, stipite fareto valido, primum veluto-subriscoso, albo, deinceps protruso in squamas adpressas floccoso-gelatinosas rupto. (*Agaricorum tribus 23. Myctrium Fr.*) Fungi solitarii terrestres mucosi, inodori.

3205. *A. longicaudus* Pers., pileo convexo obtuso subcarnoso laevi subviscoso alutaceo, lamellis confertis planis argillaceis opacis subliberis, stipite longissimo albidente. — Pers. syn. 332. Fr. cyst. & 348.

In ericetis sylvaticis Hercyn. passim.

3206. *A. elatus* Batsch, pileo campanulato subcarnoso plicato-rugoso sordide-ochraceo viscoso, lamellis remotis brunneo-ferrugineis, stipite albo squamuoso longissimo. — Batsch cont. II. f. 188. Pers. syn. 332.

In pinetis Hercyn. superior. passim.

3207. *A. collinitus* Sow., pileo obtuso-umbonato

carnoso laevi aurumto-fulvo viscoso ornallino, lamellis purpurascensibus, dein ferrugineis, stipite transversim in squamas corrulescentes gelatinosas dispanso. — Sowerb. t. 9. Pers. syn. 281. Alb. et Schw. miss. 154. Fr. syst. L 248. A. mucosus Bull. t. 596. f. 1.

? β . mucosus, ascomatibus robustioribus, lamellis albido-dein ferrugineis, stipite albo subrufico. Bull. t. 549. f. D—F.

In nemoria montosis Hercyn. inferior.

J. pholiphoi, pilei convexis (non umbilicatis), lamellis erucis decoloribus, sporidius ferrugineis s. fulvo-ferrugineis, velo sicco annuliformi coque sive membranaceo, sive floccoso-radiato, stipite subsquamoso, utrinque aequali. — (Agaricorum tribus 22. Pholiota Fr. A. Leptoae et Gymnopodis sp. Pers.)

3208. A. mutabilis Schaeff. emend., pileo planiusculo tenuiter-carnoso glabro cinnamomeo, lamellis confertis subdecurrentibus pallide-ferrugineis, stipite fistuloso tenui, anulo distincto nonnisi fugaci. Fr. syst. I. 245. α . annulatus, ascomatibus caespitosis, stipite squamoso. — Pers. syn. 271. A. ochroleucus Vahl. A. polymorphus Baumg. Lips. A. traneigenus Schrk. A. annularis Bull. t. 542. A. zygophilus Bull. t. 530. A. mutabilis Schaeff. t. 9.

β . dentatus, ascomatibus subcespitosis oahraceo-ferrugineis, stipite fibrilloso laevi. A. mutabilis et marginatus Batsch cont. II. f. 207. et f. 208. A. acutes Schüm.

Ad truncas vulgaris, rarius etiam ad terram.

3209. A. muricatus Fr., pileo campanulato convexo leviter carnoso obtuso fulvo-hateo ex squamulis stipatis villoso, lamellis aduatis lutescentibus serrulatis flaventibus, stipite fistuloso. — Agaricus muricatus Fr. syst. I. 244.

α . legitimus, pileo stipiteque squarrosis, anulo distincto. Fr. I. I. A. scaritus Willd.

β . desiccans, stipite fibrilloso velato. A. luteus Bolt. t. 50. A. flammula Alb. et Schw. miss. 149.

γ. cortinatus, pileo stipiteque cortinato villosis. *Fr.* L. L. *A. limulatus* Fr. obs. I. 12.

Ad arborum, abietum praeprimis truncos.

3210. *A. tuberculosus* Schaeff., pileo carnoso obtuso adpresso-breviterque squamoso, lamellis latescentibus emarginatis flaventibus, stipite subbalboso cavo incurvo, annulo submembranaceo reflexo, rarius cortinaeformi. — Schaeff. t. 79. f. 5—7. *Fr. syst.* I. 244. *A. curvipes* Pers. syn. 312.

Ad truncos arborum passim.

3211. *A. flammans* Batsch, pileo carnoso subumbonato, squamulis pilosis sparsis adsperso luteo, lamellis confertis primum flavis, dein ferrugineis, stipite aequali squarroso flavissimo, annulo integro approximato. — Batsch elench. f. 30. *A. rheoides* With. *A. rhabarbarinus* Pers. syn. 271.

Ad truncos putres abietineas Hercyn. passim.

3212. *A. floccosus* Schaeff., pileo obtuse-umbonato carnoso, sicco croceo-ferrugineo, squamis confertis minutis adpressois dein revolutis tecto, lamellis confertis olivaceo-pallentibus, dein ferrugineis, stipite squarroso in basin tenmato. — *Agaricus squarrosus* Willd. berol. 380. *?Flor. dan.* t. 491. Pers. syn. 268. *A. squamosus* Bull. t. 266. *A. floccosus* Schaeff. t. 61. Grev. scot. t. 2.

β. olidus, pileo obtuso pallido, lamellis pallide fuscescentibus. — *A. scaber* Flor. dan. t. 831. f. 3.

γ. reflexus, pileo elevato-umbonato piloso-squamoso ochraceo, stipite elato. — *Fr. l. l.* *A. pilosus* Schaeff. t. 80. *A. reflexus* Pers. syn. 311.

Ad arborum truncos minime raro.

3213. *A. aurivellus* Batsch, pileo hemisphaerico, dein explanato luteo, squamis sparsis adpressois obsoito; lamellis adfixis latissimis planis rotundatis, primum pallido-olivaceis, dein ferrugineis, stipite solido compacto in basia bulbosam rhizoden incrassato. — Batsch conf. I. f. 115. *Fr. syst.* I. 242. *A. villorius* Bolt. t. 42. *A.*

squamrosi var. *β. auricellus* Pers. syn. 268. *A. salicinus* Schum. *A. filamentosus* Schaeff. t. 209.

Ad arborum (Betulae, Salicis) truncos.

3214. *A. adiposus* Batsch, ascomatibus giganteis subcaespitosis, pileo carnoso viscoso luteo, squamis concentricis ferrugineis dein secedentibus parce adsperso, lamellis adnatis primum flavia, mox ferrugineis, stipite squarroso facto flavo viscido in basin intumescente. — Batsch clench. f. 31. Fr. syst. I. 242. *A. squarrosus* et *imbricatus* Batsch I. I. t. 113. t. 114. *A. squamosus* Schum. Ad arborum (Fagorum) truncos passim.

3215. *A. radicosus* Bull., ascomatibus magnis (fragrantibus) compactis duris, pileo placo-convexo obtuso umbonato glabro pallido, maculis sordide rubis variegato, lamellis congeatis rotundatis rufescentibus, stipite solidi concentrica squamoso, in basin crassam radicantem intumescente. — Bull. t. 160. Fr. syst. I. 242. *A. radicatus* Pers. syn. 266.

Ad arborum truncos in nemoribus undis passim.

3216. *A. togularis* Bull., pileo carnoso glabro subargillaceo s. dilate ferrugineo, lamellis rotundatis subventricosis pallide-cinnamomeis, stipite praelongo fragili cavo glabro, annulo reflexo. — Bull. t. 595. f. 2. Pers. syn. 262. Fr. syst. I. 241.

In promontoriorum campestribus Thuring.

3217. *A. caperatus* Pers., pileo convexo carnoso lacanoso citrino, disco villo albido, marginem versus squamu-
lis adsperso, stipite valido solido albo, supra annulum reflexum squamuoso. — Pers. syn. 273. (excl. pileo
glabro.) Fr. syst. I. 241. Flor. dan. t. 1615. *A. macro-
pus* Alb. et Schw. nissk. 151. *A. incrustans* Schum. *A.
pudicus* Bull.

In saltu hercyn. minime raro.

3218. *A. aureus* Mattuschk., ascomatibus magnis subcaespitosis, pileo umbonato carnoso, squamis dispersis pilosis tecto, lamellis adnexis pallide-olivaceis, dein fer-

ruginosus, stipite aequali fuscato glabro, annulo pallido striato parvo. — *Mattuschk.* syl. II. 331. *Pers.* syn. 517. *Bull.* t. 92. *Sowerb.* t. 77. *Pers.* syn. 269. *Fr. syst.* I. 241.

In terra pingui fagitorum Hercyn. inferior.

3219. *A. tomentosus*. *Jungh.*, pileo cardoso convexo bruno fibrilloso-tomentoso, lamellis dilutius suavis margine albentibus, stipite aequali solidi fimo striato-fibrilloso, supra velutina pruinoso. — *Jungh.* L. L. p. 403.

In nemoribus Hercyn. inferior. passim.

IV. ochrospori, sporidiis ochraceis, lamellis deoloribus arecentibus, velo araneoso.

(*Agaricorum series III. Cortinaria Fr.*)

A. Telamonez, pileis carnosis marginem versus levatis, campanulatis, dein magis expansis, squamuosis s. fibrillosis, lamellis adnatis latercentibus decoloribus, sporidia uberrima spargentiibus, velo e fibrillis aranciosis in annulum obsoletum quidem at satis persistentem contexto, stipite solidi fibrilloso. — (*Agaricorum tribus 18. Telamonia Fr. A. Lepiotae et Cortinariae sp. Pers.*)

3220. *A. bulbosus*. *Sow.*, pileo obtuse umbonato glabriusculo fragili spadiceo, siccando testaceo, lamellis cinnamomeis distinctis rotundatis, stipite longo balboso veloque albido. — *Sowerb.* t. 230. *Pers.* syn. 295. *Fr. syst.* I. 214.

In promontoriis graminosis Thuring.

3221. *A. sublanatus* *Sow.*, pileo obtuse-lateque umbonato squamuoso testaceo-olivaceo, lamellis e luteo-cinnamomeis, stipite bulboso squamuoso pallide-lutescente, velo fusco. — *Sowerb.* t. 224. *Fr. syst.* I. 214.

A. notatus, ascomatibus subgregariis, pileo incano-squamuloso, stipite lutescente nitido, linea obscura ambeante saepius notato. *Pers.* syn. 296.

In pinetis et fagetis. (Odor fere Rephani.)

3222. *A. haematochelis* *Bull.*, pileo campanulato squamuoso testaceo-rubro, lamellis pallide-cinnamomeis, dein ferrugineis, stipite elato albido-rufescente bul-

hoso, velo contexto rubro. — Bull. t. 596. f. 1. *A. armillatus* Fr. syst. I. 214. *A. Bulliardii* B. *squamulosa* Alb. et Schw. nisk. I. 157.

In pinetis udia Hercyn. passim.

3223. *A. sericeus* Schaeff., pileo convexo obtusissimo fulvo s. testaceo, lamellis emarginatis subremotis fulvis subnitentibus, stipite brevi subbulboso, anulo fugaci. — Schaeff. t. 24. *A. bisporus* Fr. syst. I. 215. *Amanita fulgens* Alb. et Schw. nisk. 161. *A. crassipes* Bull. t. 598.

B. fulgens, pileo aereo nitido, balbo marginato. *A. fulgens* Pers. syn. 294.

In nemoribus caeduis frequens.

3224. *A. latus* Pers., pileo leniter umbonato cristallino, lamellis emarginatis confertis argillaceo-cinnamomeis, stipite albo-pallescente albo cortinato elato. — Pers. syn. 276. Fr. syst. I. 215.

In paludosis saltus hercyn. (Persoon.)

3225. *A. gentilis* Fr., pileo primum conico, deinde umbonato subcarnoso subcinnamomeo pallente, lamellis adnatis cinnamomeis, stipite tenui aequali stricto. — Fr. syst. I. 212. *A. helvolus* Pers. syn. 273. nec Bull. *A. hinnuleus* Sow. t. 173.

B. glandicolor, pileo umbrino, lamellis minus distans, stipite. Fr. I. I.

C. incisus, pileo squamuoso fulvo-ferrugineo, lamellis dilutionibus, stipite brevi. Fr. I. I. *A. incisus* Pers. syn. 319.

D. punctatus, pileo obsolete umbonato canescente umbrino. Fr. I. I. *A. punctatus* Pers. syn. 274.

E. spurius, pileo stipiteque albido-pallidis. Fr. I. I. *A. spuritus* Pers. syn. 288.

In pinetis Hercyn. utriusque vulgaris.

3226. *A. flexipes* Pers., pileo acute-umbonato fusco-cinnamomeo subcaruoso fibrilloso-canescente, lamellis adnatis e purpureo-cinnamomeis, stipite tenui fibrilloso

undulato. — Pers. syn. 275. Alb. et Schw. nisk. 151.
Fr. agst. I. 213.

In saltu hercynico passim. (Persoon.)

3227. *A. brunneus* Pers., pileo obtuse-umbonato subfibrilloso umbrino sensim pallente, lamellis adnatis umbrinaria, stipite subbulboso striato dilutiore, velo contexto. — Pers. syn. 274. Alb. et Schw. nisk. 171. Fr. agst. I. 211. *A. spongiosus* Willd.

In pinetis Hercyn. suis locis abundanter.

3228. *A. umbrinus* Pers., pileo obtuso fibrilloso canescens-testaceo, lamellis adnatis planis obscuris purpurascens deinceps umbrino-cinnamomeis, annulo atipitem apice violaceo-corticatum vaginante. — Pers. syn. 280. *A. torvus* Fr. syst. I. 211. *A. araneosus* Bull. t. 600.

In nemoribus nostris passim.

3229. *A. fuscescens* Jungh., pileo tenui carnosulo laevi fulvo-fuscescente, lamellis latis rubro-brunneis latescentibus, stipite aequali solido firme fibrilloso cum pileo concolore, infra apicem fibrillis adpressis saturatioribus striato. — Jungh. I. I. 400. t. 6. f. 9.

In pinetis Hercyn. inferior. (Junghuhn.)

B. Dermocybace, pileis subcarnosis, nonnisi submembranaceis, marginem versus tenuatis, conicis s. umbonatis, dein magis deplanatis, saepius fibrillis vestitis, rarius glutine obductis s. omnino glabris, lamellis inaequalibus latiusculis confertis, velo sicco araneoso fugacissimo, stipite subaequali, firme. (Agaricorum tribus 21. *Dermocybe* Fr. *A. Cortinariae* et *Gymnopodis* sp. Pers.)

+ glabri, pileo carnosulo obtuso glaberrimo sicco lutescente. (*Ag. Dermocybæ* 4. *lignatiles* Fr.)

3230. *A. picreus* Pers., pileo carnosulo laevi cinnamomeo convexo-campaniformi polychloro (rufo, badio, fulvo s. saepius cinnamomeo), lamellis tenuibus luteis, stipite tenui subpruinoso fistuloso umbrino. — Pers. icon. 14. t. 4. f. 7., syn. 315. Alb. et Schw. nisk. 168. Fr. syst. I. 239.

Ad truncos abietinos Hercyn. passim.

3231. *A. spinicrus* Fr., pileo carnosu lutescente convexo laevi (non nisi diffracto-squamoso), lamellis adfixis albido-flaventibus, dein fulvo-cinnamomeis, stipite sarcato, dein cavo striato pallescente. — Fr. syst. I. 239. *F. penetrans* Fr. obs. I. 25. *A. flavicans* Pers. myc.

B. hybridus, pileo convexo (humido) aurantio s. fulvo, lamellis luteis, stipite cavo. Fr. I. I. *A. hybridus* Sowerb. t. 221.

In iisdem cum priore locis, rarius.

3232. *A. incurvus* Schaeff., pileo carnosu demum infundibuliformi flavo-ferrugineo, lamellis subdecurrentibus stipiteque sarcato, dein striato inaequali incurvo pallidioribus. — Schaeff. t. 65. *A. testaceus* With. *A. flavidus* Sowerb. t. 366.

Ad arboram (Fagorum) truncos passim.

† viscosi, pileo carnosulo obtuso viscoso s. villosi, lamellis liberis ventricosis, velo fugacissimo, stipite aequali dein cavo. (*Ag. Dermocybae lysiphyllo* Fr.) — Plurimi epiphyti.

3233. *A. ephedae* Fr., pileo villosu purpureo-violaceo campanulato, dein magis expanso, lamellis rotundatis dein ochraceis, stipite sarcato albo. — Fr. syst. I. 238. *A. villosus* Bull. t. 214.

Ad truncos fagetorum Thuring. rarius.

3234. *A. reticulatus* Pers., pileo demum subumbilicato reticulato tenui subviscoso dilate violaceo, mox nigrescente, lamellis rotundatis diluto croceis, stipite fibrilloso fistuloso fragili albo, apicem versus striato. — Pers. icon. t. 4. f. 4., syn. 341. Fr. syst. I. 238.

In fagetis editoribus Hercyn. inferior. passim.

3235. *A. croceo-caeruleus* Pers., pileo carnosulo plano-convexo subviscoso dilute-violaceo, lamellis croceis emarginatis, stipite glabro albo. — Pers. icon. t. 1. f. 2., syn. 341. Fr. syst. I. 238.

In similibus cum priore iisque umbrosis locis.

3236. *A. semiglobatus* A. et Schw., pileo carnosu-membranaceo hemisphaerico subviscoso flavidu,

mellis concoloribus latissimis, stipite tenui brevi striato.
— Alb. et Schus. nissk. 169. Fr. syst. I. 231.

In pinetis siccis Losatiae. (Albertini et Schweiniz.)

3237. *A. barbatus* Batsch., pileo planiusculo laevi stipiteque longo viscosis candidis, lamellis rotundatis ochraceo-fulvis. — Batsch elench. 163. f. II. Fr. syst. I. 231.

In nemoribus hamentibus.

††† leucopodes, pileo polito glabro praeter fibrillas superficiales (a velo secedentes), stipite albo, rarius dilute violaceo, velo sericeo albo. (Ag. Dermocybe leucopodii Fr.)

3238. *A. pluvius* Fr., pileo tenuato campanulato submembranaceo helvelo-viscidulo, lamellis adnatis pallidis, stipite albo molli. — Fr. syst. I. 236.

In pinorum penetralibus roridis Hercyn.

3239. *A. rigens* Pers., pileo subcarnoso convexo-plano glabro albo-pallescente fragili, lamellis subdecurrentibus demum cinciamomeis, stipite longo tenui, in basin bulbosam villosam incrassato. — Pers. syn. 288.

In nemoribus Hercyn. inferior.

3240. *A. decumbens* Pers., ascomatibus parvulis, pileo carnoso umbonato subhemisphaerico, primum albo dein pallescente, lamellis remote-adnexis ochraceis, stipite clavato bulboso decumbente candido. — Pers. syn. 286. ?*A. candidus* Batsch cont. I. t. 20. f. 106.

In faginetis Hercyo. rarissime. (Persoon.)

3241. *A. leucopodus* Bull., pileo tenui subcarnoso, demum acute-umbonato subrepando helvolo, sicco alutaceo, lamellis adnexis confertis e violaceo-testaceis, stipite brevi firme fibrilloso albido. — Bull. I. 533. f. 2. *A. leucopus* Pers. syn. 533. Fr. syst. I. 236.

In pinetis Hercyn. passim.

3242. *A. lugens* Jungk., pileo carnoso convexo-explanato testaceo-pallido glabre, lamellis subliberis pal-

lidis dein umbrinis ochrosporis, stipite solido striato albo
in basin incrassato. — Jungh. I. l. 1830. p. 399.

In collibus nemoros. Hercyn. infer. (Junghuhn.)

3243. *A. carneo-violaceens* Jungh., pileo car-
noso convexo plano, demum depresso laevi incarnato-te-
staceo sublivido, lamellis adnatis inaequalibus confertis
incarnato-violaceis, stipite bulboso solido firme albo-to-
mentoso. — Jungh. I. l.

In nemoribus Hercyn. inferior. (Junghuhn.)

3244. *A. decipiens* Pers., pileo glabrinculo sub-
membranaceo umbrino, umbone conico nigrescente, la-
mellis adnatis confertis cinnamomeis, stipite tenui pallido.
— Pers. syn. 298. Fr. syst. I. 236. eoque teste *A. mam-
mosus* L. sueo.

In campis nemorosis minime rarus.

3245. *A. castaneus* Bull., ascomatibus gregariis
mediocriter magnis, pileo subcarnoso convexo dein um-
bonato castaneo, lamellis adnexis confertis e violaceo-
testaceis, stipite brevi firme fibrilloso albido. — Bull. t.
268. f. 521. f. 2. Pers. syn. 298. Alb. et Schw. nisk.
161. Fr. syst. I. 235. *A. leucopaeus* Holmsk.

A. caesius, pileo depresso obtuso castaneo-fusco, la-
mellis adnatis aquose cinnamomeis, stipite gracilesciente.
— Flor. dan. t. 1010.

In nemoribus patruis passim.

3246. *A. tortuosus* Fr., pileo subcarnoso, dein
umbonato ferrugineo pallente; lamellis adnatis latescenti-
bus fulvis, stipite subcavo torto argenteo — Fr. syst. I. 235.

In caespitosis Hercyn. superioris rarius.

3247. *A. lucidus* Pers., pileo carnoso obtuse-
umbonato nitente, lamellis latiusculis decurrentibus satu-
ratiobus, stipite furto subincurvo. — Pers. syn. 299.
Fr. syst. I. 235. *A. lamprocephalus* Bull. t. 544. f. 2.

In pinetis German. austral. passim intercurrere dicuntur.

3248. *A. armeniacus* Schaeff., pileo subcarnoso,
dein obtuse-umbonato fulvo-cinnamomeo pallente, lamellis

confertis cinnamomeis, stipite farcto sursum attenuato albo. — Schacff. t. 81. Pers. syn. 298. Alb. et Schw. nsk. 161. Fr. syst. I. 234.

β . *badius*, pileo badio s. ferrugineo. — *A. badius et castaneus* Schum. Bolt. t. 10.

γ . *dilutus*, pileo duriusculo obtusiusculo pallido, lamellis latescendo decurrentibus. — *A. dilutus* Pers. syn. 300. In pinetis udis minime raro.

3249. *A. ochroleucus* Schaeff., pileo carnososo obtusiusculo albo-pallescidente (sub lente obsolete-sericeo), lamellis subliberis argillaceo-ochraceis, stipite subventricoso firme. — Schaeff. t. 54. Pers. syn. 295. Fr. syst. I. 234.

In nemoribus Thuring. passim.

††† *squamulosi*, pileo squamulis s. fibrillis innatis adperso, stipite cum pileo concolore s. dilutiore. (Ag. Dermotybae raphanoidei Fr.)

* pileo submembranacco, primum subconico.

3250. *A. obtusatus* Fr., pileo submembranaceo obtuse umbonato ferrugineo, sicco ochraceo-alutaceo, lamellis adnatis latis, stipite brevi. — Fr. syst. I. 233.

In pinetis udis Hercyn. talis qualis obvius.

3251. *A. acutus* Pers., pileo submembranaceo striato, dein acute umbonato ferrugineo, sicco laevi ochraceo, lamellis adnatis linearibus obscure-ochraceis, stipite tenui aequali. Pers. syn. 316. Fr. syst. I. 233.

In nemoribus udis Hercyn. inferior. passim.

** pileo carnosulo, primum campanulato.

3252. *A. urens* Bull., pileo carnosulo obtuso glabriusculo, lamellis adnexis ferrugineis, stipite longo pallido. — Bull. t. 524. Pers. syn. 333. Fr. syst. I. 232.

In nemoribus udis Hercyn. inferior. passim.

3253. *A. Cucumis* Pers., pileo carnosulo dein umbonato glabriusculo purpureo-fusco, lamellis adfixis ventricosis ferrugineis, stipite fusco. — Pers. syn. 316. Alb. et Schw. nsk. 166. Fr. syst. I. 231. *A. nigripes* Sow. t. 341.

In nemoribus udis passim.

3254. *A. iliopodius* Bull., ascomatibus polymorphis fuscescens, pileo subcarnoso campanulato sericeo s. rimoso-squamoso, dein convexo s. deplanato umbo-nato, lamellis aduatissimis latescentibus ex rubro surantiacis, stipite tenui aequali. — Bull. t. 272. excl. fig. L. t. 592. Fr. syst. I. 231. *A. dulcamarus* Pers. 324.

In fageticis Thuring. et Hercyn. inferior. passim.

3255. *A. hemitrichus* Pers., pileo subcarnoso, deinceps acute umbonato canescens-tomentoso, lamellis aduatissimis argillaceis, stipite pallido. — Pers. syn. 206. Fr. syst. I. 230.

In nemoribus muscosis passim.

*** pileo carnosulo, primum convexo.

3256. *A. raphanoides* Pers., pileo primum convexo deinceps deplanato, humecto fuscescens, sicco olivaceo-lutescente sericeo, lamellis adfixis laxis, stipite farcto deorsum incrassato. — Pers. syn. 324. Alb. et Schw. nisk. 170. Fr. syst. I. 230.

In fageticis passim.

3257. *A. sanguineus* Wulff., pileo carnosulo subglobose-umbilicato stipiteque tenui aequali obscurè sanguineis, lamellis adfixis saturatioribus. — Wulff. in Jacq. coll. II. t. 15. f. 3. Sowerb. t. 43. Pers. syn. 289. Fr. syst. I. 229. *A. rubens* Bolt. t. 36. *A. santalinus* Scop.

In similibus cum praeced. locis passim.

3258. *A. cinnamomeus* L., pileo leviter carnosulo obtuse umbonato sericeo subcinnamomeo, lamellis adfixis confertis nitidis latescentibus inaequalibus, stipite tenui aequali lutescente. Fr. syst. I. 229.

α. semisanguineus, firmior, lamellis nitidissimis sanguineo-rubentibus, pileo helvolo s. cinnamomeo. — Fr. t. I. *A. cinnamomeus* L. *Amanita sanguinea* γ. *media* Alb. et Schw. 158.

β. rubicundus, pileo firmiore lamellisque rubro-cinnamomeis. Fr. t. I. *A. cinnamomeus* Bolt. t. 150. Sow. t. 205. Pers. syn. 297. *A. betulinus* Scop.

A. conformis, pileo helvolo-cinnamomeo, lamellis nitidis croceo-fulvis. Fr. l. l. *A. tomentosus* Hoffm.

A. croceus, lamellis flavo-croceis, pileo mole et colore vario. Fr. l. l. — *A. croceus* Schaeff. t. 4. Pers. syn. 297. *A. squamulosus* Batsch etenach. f. 117. *A. icterinus* Scop. *A. ileopodius* Bull. t. 586. Ag. infer.

A. luteolus, pileo stipiteque luteis, lamellis flavis. Fr. l. l.

In nemoribus patruis ubertim. Aliarum variet. triadem *Jungduhniius* (Schltdl. Lian. 1830. p. 400.) addidit.

3259. *A. carneo-virens* Jungk., pileo carnoaulo luteo-virente convexo striato sulcato nitente, lamellis liberis latis distantibus incrustatia ochrosporis, stipite aequali solido luteo-aeruginoso nitido. — Jungk. l. l. 398. t. 6. f. 2.

In dumetis Hercyn. superior. (Junghuhn.)

3260. *A. purpureus* Bull., pileo carnosulo obtuso-umbonato squamuoso stipiteque brevi aequali coccineo-rubro, lamellis adnatis saturioribus. — Bull. t. 598: f. 1. Pers. syn. 290. Fr. syst. I. 228.

In fageticis Thuring. rarissime.

3261. *A. bolariis* Pers., pileo carnoso obsoleto-umbonato rufescente, squamulis maculiformibus saturioribus obtecto, lamellis subdecurrentibus testaceo-cinnamomeis, stipite aequali variegato. — Pers. syn. 291. Fr. syst. I. 228.

In similibus cum priore locis, at frequentius.

B. inolomatiae, pileis succulento-carnosis, junioribus convexis, dein explanatis fibrillosis s. viscosis, lamellis emarginato-adnexis latescentibus decoloribus (plenumque cum pileo violaceo-concoloribus), velo marginali fugaci in fila libera araneosa soluto. (*Agaricorum tribus* 19. *Inoloma* Fr. *A. Cortinariae* sp. Pers.)

† arescentes, pileo arido squamuoso s. (sub lente) villoso fibrilloso obtuso s. umbonato, numquam depresso. (*Inolomata genuina* Fr.)

3262. *A. Bulliardii* Pers., pileo sicco glabrinculo rufescente, lamellis remotis cinnamomeis, stipite firme

sanguineo-maculato elato crasso bulboso, bulbo ovato cinnabarinus. — Pers. syn. obs. II. 43., syn. 289. Fr. syst. I. 221. *A. araneosus* v. *cinnabarinus* Bull. t. 431. f. 3.

In fagetis Hercyn. inferior. passim.

3263. *A. eumorphus* Pers., pileo obtuso glabriuscenso canescente-faligineo, dein magis fulvo, lamellis confertis caesio-purparascentibus, stipite tenue squamuoso in basi inflato. — Pers. syn. 342. *A. anomalus* Fr. syst. I. 220. *A. olivascens* Batsch elenck. f. 185.

$\beta.$ *incurvus*, pileo subumbonato lilacino, lamellis primum concoloribus, dein ochraceis, stipite caudato tomentoso deorsum incurvo. Fr. I. I. Pers. icon. t. 7. f. 5., syn. 342.

$\gamma.$ *tabularis*, pileo latescente firmiore, demum deplano, lamellis oculis jam caesiis, deinceps argillaceo-cinnamomeis, stipite pallido. Fr. I. I. *A. araneosus kelouensis* Bull. t. 431. f. 5.

$\delta.$ *diabolicus*, pileo fibrilloso subrimoso fucescente dein olivaceo, siccando subferrugineo, lamellis mox caesiis. Fr. I. I. *A. araneosus* var. *rimosa* Bull. t. 431. f. 4.

In nemoribus frondosis nostratis, per quam versipellit.

3264. *A. psammoccephalus* Bull., pileo umbonato cervino, squamis pilosis fuligineis squarroso, lamellis confertis violaceis argillaceo-cinnamomeis, stipite squamuoso transversiter nigricante, apicem versus laevi. — Bull. t. 586. f. 1. t. 531. f. 2. *A. araneatus* Pers. syn. 293. *A. lepidomyces* Alb. et Schw. nisk. 155. t. 12. f. 1. *A. pholidotus* Fr. syst. I. 219.

Ad truncum alneum in vallis irriguis umbrosis Lusatiae inferior. (Albertini et Schweinitz.)

3265. *A. conopus* Pers., pileo obtuso-umbonato piloso ex olivaceo subferrugineo, lamellis emarginatis confertis, stipite longo mediotenuis velato indeque conoideo. Pers. syn. 285. Fr. syst. I. 219.

In nemoribus caeduis Hercyn. infer. (Persoon.)

3266. *A. malachites* Fr., pileo subcarneo lilacino, mox subtestaceo, villo squamuoso canescente testo, la-

miellis confertis purpurascentibus ocius jam cinnamomeis,
stipite spongioso dilute-lilacino. — Fr. syst. I. 218.

In pinetis Hercyn. superior. rarius.

3267. *A. albo-violaceus* Pers., pileo late-obtuseque umbonato sericeo-fibroso e viola sensim magis pallescente, lamellis primum dilute-violaceis serrulatis, dein argillaceis confertis, stipite clato obverse-clavato. Pers. syn. 286. Fr. syst. I. 218.

In nemoribus nostris passim.

3268. *A. argentatus* Pers., pileo obtuse-umbonato sericeo-nitente lilacino argentato, lamellis confertis cinnamomeis, stipite concolore bulboso, cortina cinnamomea. — Pers. syn. 286. Fr. syst. I. 218.

In pinetis Hercyn. superioria.

3269. *A. amethystinus* Schaeff., pileo fibriloso lilacino-pallescente obtuse umbonato, lamellis distantibus dein ochraceis, stipite albo-violaceo, intus croceo. — Schaeff. t. 56. *A. traganus* Fr. syst. I. 217.

In nemoribus caedulis minime raro.

3270. *A. violaceo-cinereus* Pers., pileo carnosu hemisphaericu umbrino-violaceo, squamulis punctiformibus cinerascentibus asperalo, lamellis remotis purpurascenti-umbrinis, stipite bulboso concolore. — Pers. syn. 279. Alb. et Schir. nissk. 152. Fr. syst. I. 217. *A. violaceus* Schaeff. t. 3. *A.*

In quercetis Thuring. rarius.

3271. *A. violaceus* L., pileo obtuso, dein deplano villoso-squamoso obscure violaceo, lamellis distantibus connexis, stipite subtomentoso concolore spongioso, intus violaceo-cinereo. — Fr. syst. I. 217. Pers. syn. 277. *A. hercynicus* Pers. I. I. 278. *A. araneosus violaceus* Bull. t. 250. t. 598. f. 2. *A.*

In nemoribus frondosis Hercyn., satis speciosus, in pinetis umbrosis minor passim reddit.

† *viscosi*, pileo glabro, vivo viscoso obtuso, demum

magis depresso, stipite coerulescente oculis jam firmo exalbescente. (*Inolomata phlegmacioidea Fr.*)

3273. *A. turbinatus* Bull., pileo viscoso laevi flavo dein depresso fulvo, lamellis confertis integerrimis & flavo cinnamomeis, stipite bulboso albo. — Bull. t. 110. Fr. syst. I. 225.

β. repandus, pileo subrepando. Pers. syn. 388.

In nemoribus nostris passim.

3273. *A. varius* Schaeff., pileo luteo subaqueo-moso firme, humido viscoso, lamellis confertis serratia albido-caesiis, stipite attenuato albo. — Schaeff. t. 42. Fr. syst. I. 225. *A. truncatus* Schaeff. t. 251. (varietas mera.) *A. subgranulatus* Batsch Stech. f. 22. (mala.) *A. turbinatus* Sowerb. t. 102. *A. glaukopodis* var. *β.* Pers. syn. 282. *A. multiformis* Fr. obs. II. 63.

In nemoribus nostris haud raro.

3274. *A. glauopus* Schaeff., pileo subolivaceo-foligineo latescente compacto, primum viscoso, dein rivuloso inaequabili, lamellis coerulecenti-argillaceis, stipite crasso brevi bulboso coerulecente. — Schaeff. t. 53. Sowerb. t. 223. Pers. syn. 282. Fr. syst. I. 224. *A. granulosus* Bull. t. 96.

In campis arenosis et ericetis nostris passim.

3275. *A. rufo-olivaceus* Pers., pileo plano viscoso subrufo, lamellis confertis olivaceis, stipite aequali, basi bulboso. — Pers. syn. 285. Fr. syst. I. 223. *Amanita rufo-olivacea* Alb. et Schw. nissk. 156.

In campis nemorosis passim.

3276. *A. callochrous* Pers., pileo aequali laevi viscoso polichloro (pallido, argillaceo, luteo, lilacino s. purpurascente), lamellis confertis violaceo-purpureis dein cinnamomeis, stipite bulboso e violaceo-albido. — Pers. syn. 282. Fr. syst. I. 224. *A. decolorans* Pers. I. I. 283. (lucus carne stipiteque albidis.) — *A. porphyropus* Alb. et Schw. nissk. 153. *A. subpurpurascens* Batsch cont. I. f. 74. *A. purpurascens* Fr. obs. II. 68. *A. badium* Pers.

syn. 279. (*I. carne fracta stipiteque magis tenuato purpureo-violaceis.*)

In lucis nemorumque aratis passim.

3277. *A. scaurus* Fr., pileo aequali viscoso, deinde depresso polychloro, lamellis confertis olivaceo-purpurascientibus, mox cinnamomeis, stipite tenuato elato in basi incrassato. — Fr. syst. I. 223.

a. fuligineus, pileo fulvo-fuligineo, sicco sordide ochraceo. Fr. l. l. *A. fulvo-fuligineus et subaequalis* Pers. syn. 284. *A. orichalceus* Batsch cont. II. f. 184. *A. defossus* Batsch cont. I. f. 73. *A. curvatus* Schum.

β. olivaceus, ascomatibus olivaceo-virentibus. Fr. L. L. *A. scaurus* Fr. obs. II. 75.

γ. umbrinus, pileo umbrino. Fr. l. l. *A. spadicetus* Batsch cl. f. 16. *A. turbinatus* β. *inquinatus* Pers. syn. 294.

In campis aridis Hercyn. superior.

3278. *A. infractus* Pers., pileo plano-convexus inaequali subviscoso olivaceo-fuligineo a. sublurido, disco saturatiore, lamellis confertis olivaceo-umbrinis, stipite solido bulboso. — Pers. syn. 283. Alb. et Schw. nisk. 155. Fr. syst. I. 223.

In sagetis umbrosis Hercyn. rarius.

3279. *A. subtortus* Pers., pileo molli inaequali viscoso pallido convexo-planiusculo, lamellis latis olivaceo-cinereis, stipite subbulboso, demum cavo subtorto inaequali. — Pers. syn. 284. Fr. syst. I. 222.

In nemoribus Hercyn. inferior. passim.

3280. *A. variegator* Pers., pileo (dilatius saturatiuave) rufo-spadicetio, margine nitido sublumentoso violaceo, lamellis latescentibus confertis albido-fuligineis nitidulis, stipite crasso bulboso. — Pers. syn. 280. Alb. et Schw. nisk. 153.

In nemoribus nostris passim.

D. phlegmacii, pileis carnis succulento-concrexis, mox deplanatis laevibus firmis, siccis nitidis, junioribus et humectatis viscosis, lamellis adnatis subdecurrentibus,

velo viscoso tenui fugacissimo, in fila arachnoidea sanguine soluto. (*Agaricorum* tribus 20. *Pileogracium* Fr.)

3281. *A. vibratilis* Fr., pileo fulvo-luteo carnosio umbonato, lamellis tenuibus confertis ochraceis s. dilute cinnamomeis, stipite molli niveo elato flexuoso in basi incrassato. — Fr. syst. I. 217.

In nemoribus Thuring. superior. passim.

3282. *A. obtextus* W., pileo convexo carnoso obeso, glutine oleoso nitente oblicito, glaberrimo fusco-luteacente, lamellis inaequalibus latis erosis pallido-cinnamomeis, velo araneoso ferrugineo diu obtextis, stipite dilutiore sericeo splendente, basi bulboso.

In fagetis Thuring. passim. Auctummo.

P. rhodospori, pileis variis, stipite centrall nec velo exstructis, lamellis decoloribus rhodosporis. (*Agaricorum* series II. *Hyperrhodius* Fr.)

A. umbilicati, pileis tenuibus membranaceis convexo-planisculis striatis glabris s. obsolete squamuosis, dein umbilicatis, lamellis adnatis subdecurrentibus distantibus latescentibus, stipite flocculoso-farcto, dein fistuloso tenui aequali. — *Agaricorum* tribus 17. Ecclesia Fr. *A. Omphalae* Pers.)

3283. *A. nigrella* Pers., ascomatibus subcaespitosis parvulis, pileo glabro umbilicato nigrescente nitidulo, lamellis incarnato-subcinereis, stipite brevi glanco. Pers. syn. 463. nec Fr.

In pratis montosis Hercyn. inferior. passim.

3284. *A. calophyllus* Pers., pileo hemisphaerico substriato ambriso-fuligineo, lamellis decurrentibus reborperparascentibus, stipite subviscoso. — Pers. syn. 464. Fr. syst. I. 210.

Ad truncos putridos German. mediae. (Persoon.)

3285. *A. politus* Pers., pileo submembranaceo profunde-umbilicato margine striato stipiteque elato fragili fistuloso aequali lividis nitidis, lamellis decurrentibus

albidis dein *incarnatis*. — *Pers. syn.* 465. *Fr. syst. I.* 209. *A. lividus Pers. disp.* 22.

In fagetis udis passim.

3286. *A. aquilus Fr.*, pileo plano-convexusculo profunde umbilicato umbrino s. spadiceo, lamellis latissimis sinuato-adfixis, primum concoloribus, dein purpureo-scapitibus, stipite abbreviato farcto. *Fr. syst. I.* 208.

Ad ripas limoso-arenosas Thuring. passim.

3287. *A. asprellus Fr.*, pileo primum convexo fragili fibrilloso-squamoso fuligineo, lamellis adnatis latescientibus roseis, stipite fistuloso, basin versus albolanato. — *Fr. syst. I.* 208.

In promontoriis graminosis Hercyn. passim.

B. campanulati, accomatibus fragilibus, pileis submembranaceis campanulatis, dein expansis subvelutoidis striatis (saepius veluti sericeis nitidulis, numquam umbilicatis), lamellis liberis latescientibus rhodosporis, stipite fistuloso discreto. (*Agaricorum tribus 16. Notanea Fr. A. Pratellae sp. Pers.*)

3288. *A. hirtipes Schum.*, pileo striato livido-fusco, lamellis subliberis obovatis rhodosporis, stipite fistuloso laevi deorsum hirto. — *Schum. encl. II.* 272. *Fr. syst. I.* 206.

In pinetis Hercyn. superioris passim.

3289. *A. paeculus Pers.*, pileo campanulato expanso fuligineo-nigrescente, humecto tenuiter striato, sicco pallente nitorem sericeum induente, lamellis constrictis subliberis sordide incarnatis, stipite tenui stricto fistuloso. — *Pers. syn.* 427. *Fr. syst. I.* 205. *A. fuliginosus Pers. l. l.* — *A. pyramidatus Schaeff.* t. 229. *A. luridus Batsch.* *A. fissus Holt.* t. 85. *A. melinoides*, *tortilis*, *albipes* et *fuliginosus* Schum. *A. sericeus Bull.* t. 413. f. 2. t. 526.

In promontoriis et paucis Germaniae minime raro.

C. peruvicaceus, pileis carnosso-membranaceis convexis, vertice parce fibrillosis ibique nonnisi depresso, veluti subumbilicatis senacellis, lamellis decurrentibus

latiusculis dein incarnatis, stipite tenui aequali, ut plurimum cyaneo. (*Agaricorum tribus 15. Leptonia Fr. A. Gymnopodium spec. Pers.*)

3290. *A. serrulatus* Pers., pileo convexo glabriuscule subsquamoso nigrescente dein fuligineo, lamellis adnatis caesio-incarnatis margine nigrescentibus, stipite fistuloso glabro, praeter basin dilutiorem coeruleo-nigricantibus. — *Fr. syst. I. 203. A. serrula* Pers. syn. 462. *Alb. et Schw. nisk. 222. A. coerulea* Schum. *A. cyanipes* Flor. dan. t. 1071. f. 3.

In promontorii patruis passim.

3291. *A. euchrous* Pers., pileo convexo obtuso squamoso-fibrilloso violaceo, dein purpureo-fuligineo, lamellis adfixis violaceis, demum praeator marginem saturatiorem pallentibus, stipite farcto glabro violaceo crasso. — *Pers. syn. 343. Alb. et Schw. nisk. 174. Fr. syst. I. 203.*

Ad arborum (Corylorum et Alnorum) truncos.

3292. *A. chalybeus* Pers., pileo campanulato obtuso, dein magis depresso squamoso cyaneo, lamellis adnatis caesio-albis demum purpurascensibus subaerulatis, stipite farcto glabro subfragili cyaneo. — *Pers. syn. 343. icon. t. 4. f. 3. Fr. syst. I. 203. A. nigricans* Schum. *A. columbarius* Sowerb. t. 161. *A. glaucus* Bull. t. 521. f. 1.

In campis graminosis Thuring. passim.

3293. *A. placidus* Fr., pileo plano convexiunculo villoso-squamoso gryaeo, lamellis planis ventricosis adfixis, stipite farcto glabro violaceo, apicem versus subfarinaceo. — *Fr. syst. I. 204. A. virgatus* Pers. icon. t. 6. f. 5. nec syn. *A. elegans* Scop.

Ad arborum (Fagorum) truncos passim.

3294. *A. salicinus* Pers., pileo convexo subumbonato caesio-cinereo, vertice ruguloso, lamellis liberis, stipite tenui fibrilloso albido-coeruleo. — *Pers. icon. I. 9. syn. 344. Fr. syst. I. 202.*

B. bergellus, pileo molli crassissimo cinereo stipiteque brevi vittis virescentibus notatis. *Fr. et Pers. I. 1.*

Var. ss. ad Salices; *B. ad Alnos* parcus.

3295. *A. gryseo-cyanus* Fr., pileo submembranaceo campanulato fibrilloso lilacino-gryseo, lamellis liberis distinctis purpurascensibus, stipite crassiusculo cavo fibrilloso viridi-caesio. — Fr. syst. I. 202. *A. atro-cyanus* Pers. syn. 344. *A. globosus* Schum. *A. purpureus* Bolt. t. 41. B.

In promontoriis Thuring. rarius.

3296. *A. dichrous* Pers., pileo subcarnoso ambo-nato violaceo, lamellis subadnexis gryseis pulverulentis, stipite farcto subsarinaceo dilato. — Pers. syn. 343. Fr. syst. I. 203.

In promontoriis dumetosis passim.

D. deplanati, pileis carnosis campanulatis s. con-carinatulis deinceps magis deplanatis (nec siccando umbilicatis), lamellis inaequalibus vir (nisi in *A. Prenulo*) longe decurrentibus decoloribus rhodosporis, stipite firme discreto. (*Agaricorum tribus* 14. *Citopilus* Fr. *A. gymnopodus* sp. Pers.)

† lamellis liberis. (*A. Plutei* Fr.)

3297. *A. hispidulus* Fr., ascomatibus minoribus, pileo subcarnoso sericeo gryseo planiusculo obtuso, stipite fistuloso argenteo fragili glabro incurvo. — Fr. syst. I. 201. *A. sericellus* Pers. syn. 358. et *A. hispidus* Batsch elench. t. 25.

Ad ligna putrida Hercyn. superioris, ni fallor.

3298. *A. plebophorus* Ditm., pileo subcarnoso glabro plano umbrino, venis ramosis plurimis undique inscripto, lamellis subventricosis roseis, stipite fistuloso glabro caudito. — Ditmar in Sturm. germ. III. t. 15. Fr. syst. I. 200. Nees syst. f. 202. *A. reticulatus* With.

Ad caudices fagineos Hercyn. inferior. passim.

3299. *A. nanus* Pers., pileo subcarnoso depresso-ambonato rugoso umbrino, vertice fuligine superfuso, marginem nudum versus tenuiter striato, stipite acido tenui glabro argenteo obsoleto striato. — Pers. syn. 357. Fr. syst. I. 200.

Ad ligna faginea Thuring. passim.

3300. *A. umbrinus Pers.*, pileo carnoso rugoso-lacunoso fuligineo umbrinoque villosa, a margine fimbrias propexas emitente, lamellis fuligineis, stipite solido crasso incurvo villoso-squamoso. — Pers. icon. t. 2. f. 5. 6., syn. 358. Fr. syst. I. 200.

In sagetis umbrosis rarissime. (Persoon.)

3301. *A. Pluteus Batsch*, pileo carnoso glabro fuligineo-nigrescente, stipite firmo nigro-fibrilloso. — Batsch elench. f. 16. Pers. syn. 357. Ditmar t. 28. Nees syst. f. 201. Fr. syst. I. 199. *A. atricapillus* Batsch l. l. f. 16. *A. latus* Bolt. t. 2. *A. luridus* et *rimosus* Schum. *A. fuliginatus* Batsch l. l. f. 26. et Flor. dan. t. 1063. f. 4. *A. lividus* Bull. t. 382. *A. cervinus* Schaeff. t. 10. Ad arborum truncos minime rarus.

3302. *A. leoninus* Schaeff., pileo depresso-campanulato fragili submembranaceo glabro luteo, lamellis margine flavescentibus, stipite solido striato. — Schaeff. t. 48. Pers. icon. t. 7. f. 3. 4., syn. 337. Fr. syst. I. 199. *A. pyrrooperminus* Bull. t. 547. f. 3.

A. chrysophaeus, minor, firmior, pileo obscuriore subrugoso, lamellis carneis. — Fr. l. l. *A. chrysophaeus* Schaeff. t. 253.

Ad ligna petredine exesa passim.

3303. *A. pellitus* Pers., pileo carnoso molli fragili planiusculo villoso stipiteque solido glabro candido. — Pers. syn. 366. Fr. syst. I. 198. *A. lividus* Pers. disp. 22. In collibus dumetosis Thuring. passim.

3304. *A. prunulooides* Fr., pileo carioso glabro stipiteque solido laevi albo. — Fr. syst. I. 198. *A. peltatus* Mart. erl. 415. (teste Friesio.)

In versaria sterilibus Francon. (Martini.)

†[†] lamellis adfixis (*A. rhodopallii* Fr.)

3305. *A. ardestaceus* Bull., pileo carioso glabro campanulato, dein depresso cinereo-virente, lamellis subliberis latescentibus rufescensibus, stipite praelongo crasso

concolore glabro cavo. — *Bull.* t. 348. *Pers.* syn. 466. *Fr.* syst. I. 198.

In pascuis udis Thuringiae, ni fallor.

3306. *A. sinuatus* *Bull.*, pileo amplissimo glabro lato sinuato dein depresso albo-lutescente, lamellis confertissimis subadnexis latissimis rufescensibus, stipite crasso solido aequali candido. — *Bull.* t. 379. f. 1. *Fr.* syst. I. 197. *A. grandis* *Pers.* syn. 329.

In fugetis patruis rarissime.

3307. *A. fertili* *Pers.*, pileo subumbonato glabro (fuligineo) livido-pallescens, lamellis latescentibus adnexis distinctis incarnatis, stipite farcto glabro subbulbosus. — *Pers.* syn. 328. *Fr.* syst. I. 197. *A. phonospermus* *Bull.* t. 534. 547. f. 1. 590. *A. intybaceus* *Bull.* t. 534. (var.)

In pratis et versuris rarius.

3308. *A. rhadopolius* *Fr.*, pileo primum campanulato fibrilloso fuscescente, dein livido subsericeo magis deplanato, lamellis adnatis albido-roseis, stipite cavo glabro albo, basin versus strigoso. — *Fr.* syst. I. 197. *A. flexuosa* *Schum.* *A. hydrogrammus* *Bull.* t. 564. f. 1. *O. A. repandus* *Bolt.* t. 6.

In dumetis umbrosis, coryletis passim.

3309. *A. sericellus* *Fr.*, pileo campanulato convexo subcarnoso sericeo stipiteque fistuloso tenui fibrilloso albis, lamellis adnatis incarnatis. — *Fr.* syst. I. 196. nec *Pers.*

B. sericeus, pileo ampliore campanulato sericeo squamuoso. *Fr.* I. I. *A. sericeus* *Pers.* syn. 366., icon. t. 6. f. 2.

In pascuis graminosis rarius.

3310. *A. elodes* *Fr.*, pileo carnoso glabro umbonato fuligineo fragili, lamellis adfixis planis incarnatis, stipite cavo crasso gryseo fibrilloso. — *Fr.* syst. I. 196. *A. adstringens* *B. placentia* *A.* et *Schw.* nissk. 176. excl. syn.

In nemoribus udis, v. c. Lusatiae. (*Alb.* et *Schw.*)

3311. *A. adstringens* *Pers.*, pileo subcarnoso glaberrimo fuligineo-cinereo subumbonato subappongioso (adstringente), lamellis lati subdecurrentibus confertis

candidis, dein incarnatis, stipite solido substriato, basi subtuberoso. — Pers. syn. 350. Fr. syst. I. 195.

3312. *A. atro-punctatus* Pers., ascomatibus parvis gregariis, pileo subcarnososo dilute-cinereo hemisphaericо molli, lamellis decurrentibus distantibus parcis arcuatis crassiusculis pallido-s. cinereo-incarnatis, stipite uno teaccello livido, squamis punctiformibus nigris adperso. — Pers. syn. 353. Fr. l. l.

In fagetis Hercyn. inferior. rarissime. (Persoon.)

3313. *A. angustus* Pers., pileo subumbonato glabro livido-caesio, lamellis coetertis angustis plano-decurrentibus incarnatis, stipite furcto crasso dilutiore, basi incarnuo villoso. — Pers. syn. 345. Fr. l. l.

In nemoribus udis inter folia rarius. Auctumno.

3314. *A. hortensis* Pers., ascomatibus caespitosis, pileo subumbonato fuligineo-subnigrescente, lamellis plano-decurrentibus angustis subcontortis albidis, dein subincarnatis, stipite cavo deorsum incrassato. — Pers. syn. 362. Fr. l. l.

In hortis lucisque nemorensibus passim. Auctumno.

3315. *A. Prunulus* Pers., pileo compacto planinsculo albo, saepius excentrico angulato, lamellis longe decurrentibus, postice acuminatis subcoerctatis albis, dein incarnatis, stipite solido crasso, basi villoso, in pileum diffuso. — Pers. syn. 457. Fr. l. l. *A. Mouceron* Bull. t. 142. *A. albellus* Schaeff. t. 78.

In dumetis graminosis passim.

VI. leucospori, pileis veloque variiis, lamellis ex sporidiis albis per quamcunque aetatem carentibus. (Agaricorum series 1. Leucosporus Fr. syst.)

A. pleuropodes, ascomatibus admodum variis, stipitibus inasqualibus, excentricis s. lateralibus, non nisi plane nullo suffultis s. sessilibus, lamellis inasqualibus postice acutis, leucosporis. (Agaric. tribus XII. Pleurotus Fr. A. Pleuropodes Pers.)

3316. *A. striatulus* Pers., ascomatibus resupinato-sessilibus gregariis persistentibus pusillis dilute cinereis striatis glabris, lamellis paucis inaequalibus distantibus distinctis. — Fr. syst. I. 193. Pers. syn. 485. *A. membranaceus* Scop. *A. striato-pellucidus* Pers. obs.

Ad ramulos humi putrescentes passim. Hyeme.

3317. *A. applicatus* Batsch, ascomatibus resupinate-subsessilibus reflexis pruinatis basi villosis obscure cineraecentibus, lamellis distantibus radiantibus laxis gryseis. — Batsch f. 125. Nees syst. f. 183. Fr. I. I. *A. merulinus* et *trichotis* Pers. myc. *A. epigaei* var. Pers. syn. 483. *A. striatus* b. Alb. et Schw. *A. epixylon* Bull. t. 581. f. 2.

Ad trunco putredine ada consumtos. Vere.

3318. *A. perpusillus* Lumn., ascomatibus tenuerrimis albis resupinato-sessilibus reflexis laevibus glabris, lamellis distinctis pallide lutescentibus. — Fr. I. I. *A. applicatus* Flor. dan. t. 1295. f. 1. *A. subversus* Schum.

In similibus cum priore locis passim.

3319. *A. septicus* Fr., ascomatibus resupinato-reflexis s. stipite tenui curto suffultis, candidis laevibus pubescentibus, e basi hyphoidea subeantibus. — Fr. I. I. *A. niveus* Ehrenb. sylv. 31. *A. flabellatus* Bolt. t. 72. *A. pubescens* Sow. t. 321. *Peziza lamellata* Poll. pr. pr. Ad Salices cavas putres et Populos passim.

3320. *A. tremulus* Schaeff., pileo reniformi membranaceo diaphano gryseo, stipite adscendente marginali viloso adfixis s. subsessilibus, lamellis distinctis remotis sublinearibus. — Schaeff. t. 224. Fr. syst. I. 191. *A. glaucus* Batsch cont. I. f. 123. *A. epigaeus* Sw. et Pers. syn. *A. teckromelus* Pers. obs. II. 47.

Ad terram mycosam rarius. Auctummo sero.

3321. *A. algidus* Fr., pileo carneso laevi glabro umbrino subreniformi subimbricato subsessili, striato gelatinoso superne illinito, lamellis pallidis, dein lutescentibus confertis linearibus. — Fr. syst. I. 190. *A. sub-*

sessilis Flor. dan. t. 1552. et *A. lateralis* t. 1556, f. 2.
(junior.) *A. cymotis* Pers. n. g.

Ad truncos Betulae rarius. Auctumno.

3322. *A. nidulans* Pers., pileo carnoso, dein resiformi subsessili tomentoso lutescente, margine involuto, lamellis strictis confertis aurantio-luteis. — Pers. icon. t. 6. f. 4. syn. 482. Fr. syst. I. 189. *A. lateralis* auct.

Ad truncos pineos a. fagineos putres. Auctumno.

3323. *A. mittis* Pers., pileo subcarnoso glabro laevi sicco ex albo rufescente, lamellis adnatis confertis simplicissimis distinctis stipiteque laterali sursam dilatato squamuoso albis. — Pers. syn. 481. Fr. syst. I. 188.

Ad caudices putres Pini Laricis Hercyn. (Persoon.)

3324. *A. serotinus* Pers., pileo compacto subviscoso crasso olivaceo-viridi, lamellis adnatis confertis pallidis angustis, stipite brevi sublaterali fuligineo-squamoso. — Pers. syn. 479. Fr. syst. 187. *A. lateralis* a. Schum. *A. crassipes* Planer.

Ad caudices fagineos et alneos passim. Hyemo.

3325. *A. palmatus* Bull., pileo carnoso tenaci laevi glabro rafescente, lamellis adnatis coucoloribus, stipite aequali excentrico crassiusculo glabro dilatiore. — Bull. t. 216. Pers. syn. 474. Fr. syst. I. 187.

Ad truncos quercinos eorumque ligna, rarius.

3326. *A. ulmarius* Bull., pileo compacto glabro obtuso paleacente, nonnisi maculis lividis picturato leviterque excentrico, lamellis confertis distinctis emarginatis albis, stipite valido subbulboso elasticо subtomentoso. — Bull. t. 510. Sowerb. t. 67. Pers. syn. 473. Fr. syst. I. 186.

Ad truncos Ulmi, Populi nigrae et Fagi. Auctumno.

3327. *A. porrigens* Pers., ascomatibus imbricatis subflaccidis, pileo adscendente auriformi glabriusculo candido, a basi porrecta tomentosa sessilibus, lamellis linea-

ribus angustis integerrimis. — Pers. obs. I. 54., syn. 480.
Fr. syst. I. 184. *A. abietinus* Schrad. spic. 134.

Ad truncos abietinos passim. Auctumno.

3328. *A. petalooides* Bull., pileo carnoso planiusculo dimidiato spathulato albido-fuscescente, disco stipiteque curto adsidente parce villosis, lamellis confertis linearibus albis. — *Fr. syst. I.* 183. *Bull. t.* 226. 557. *f. 2.* *A. spathulatus* Alb. et Schw. nisk. 229.

$\beta.$ *spathulatus*, ascomatibus erectis spathuliformibus, pileo alutaceo pallido, disco spongioso-squamuloso, stipite canaliculato. *Fr. t. I.* *A. spathulatus* Pers. syn. 479. Nees *syst. f.* 178. *A. anomalus* Pers.

Ad truncos fagineos; $\beta.$ ad terram umbrasam.

3329. *A. salignus* Pers., pileo convexo dilatato, basin depresso versus substrigoso ex albo ochraceo-fuligineo, lamellis albidis subramosis, stipite laterali tenaci albo-tomentoso s. nullo. — Pers. syn. 478. cum var. *ochracea et fuliginea* Fr. t. L.

Ad truncos fagineos et salicinos passim.

3330. *A. ostreatus* Curt., ascomatibus caespitosis, pileo carnoso glabro, primum nigrescente, mox fusco & cinerascente, dein pallide-flavescente, lamellis postice per anastomosin concurrentibus eglandulosis albis, stipite brevi sublaterali, basi strigoso s. nullo. — Curt. Lond. t. 216. Pers. syn. 477. Jacq. austr. t. 288. *Fr. syst. I.* 182. *A. glauco-umbrinus et crispatus* Schum. *A. nigricans* Fl. dan. t. 892. *A. atro-albus* Otto. *A. dimidiatus* Bull. t. 508.

Ad caudices arborum haud quidem raro. Auctumno.

3331. *A. glandulosus* Bull., ascomatibus caespitosis horizontalibus, pileo compacto dilute badio dimidiato laevi sublobato, lamellis latescentibus, basin versus ramoso-concurrentibus glandulosis candidis, stipite brevi crasso s. plane nullo. — Bull. t. 426. Pers. syn. 476. Alb. et Schw. nisk. 228. *Fr. syst. I.* 182.

Ad truncos Populi, Juglandis et Sambuci, rarius, v. c. Lusatiae superior. Auctumno.

3332. *A. conchatus* Bull., pileo tenaci difformi cinnamomeo-incarnato, lamellis integerrimis crassiusculis distantibus stipitaque brevis irregularis basi pubescente pallidis. — Bull. t. 298. Fr. syst. I. 181. *A. Corance-piae*, *fornicatus*, *torulosus* et *incrustans* Pers. myc. *A. inconstans* f. Pers. syn. 476.

Ad truncos populacos rarissime. Anatomia.

3333. *A. inconstans* Pers., pileo depresso tenero carnoso subintegro flexuoso subrufescente parce striato, lamellis subramosis basi crispis pallidis, stipite brevi fuligineo, rarius laterali. — Pers. syn. 475. Fr. I. I. *A. flabelliformis* Schaeff. t. 43. 44. *A. dimidiatus* Bull. t. 517.

Ad truncos fagineos passim. Acetate.

3334. *A. torulosus* Pers., pileo tenacissimo depresso integro alutaceo-rubescente, demum subinfundibuliformi, lamellis crispis pallidis, stipite brevi crasso gryeo-violaceo-tomentoso. — Pers. syn. 475. Alb. et Schw. nisk. 227. Fr. syst. I. 181. *A. carneo-tomentosus* Batsch f. 33. Nees syst. f. 176.

Ad caudices betulinos patres, passim. Acetate.

3335. *A. pulvinatus* Pers., pileo pulvinato integro subrepando excentrico albido subincarnato (ruguloso), lamellis confertis tenuibus forniciatis integerrimis, stipite glabro brevi. — Pers. syn. 370. Fr. syst. I. 180.

Ad truncos in salto solliugensi, rarissime. (Persoon.)

3336. *A. dryinus* Pers., pileo carnosu planiusculo albido, squamis fuscescentibus adperso, lamellis angustis dein (exsiccando) flavescientibus, velo fugaci, stipite ligulento subsquamuloso. — Pers. syn. 478. Fr. syst. I. 180. Nees syst. f. 177. *A. dimidiatus* Schaeff. t. 233.

Ad truncos Malii s. Quercus passim.

3337. *A. Albertinii* Fr., ascomatibus caespitosis, pileo carnosu convexo dilute fuligineo, hymenis adpressis pilosis nigricantibus latis vestito, lamellis latis candidis, stipite laterali brevi crasso squamoso, annulo fuligineo. — Fr. syst. I. 179. *A. Lepiota* Alb. et Schw. nisk. 229.

Ad truncum abiotinum Lusatias. (Alb. et Schw.)

B. depresso, ascomatibus substantia et colore variis, pileis primum umbilicatis, dein expansis, infundibuliformibus, semper depresso, margine reflexis, raro patulis, lamellis inaequalibus exsuccis leucosporis, velo nullo, stipitibus primum farctis, dein cavis, vix bulbosis. (*A. tribus XI. Omphalia Fr. Pers.*)

† membranacei, pileis submembranaceis, lamellis decurrentibus. (*Ag. Omphalia Mycenaria Fr. Micromphali Nees.*) — Fauci minores, terrestres s. epiphyti, insipidi.

3338. *A. muscorum* Hoffm., pileo plano-convexusculo umbilicato striato stipiteque brevi basin versus incrassato flavo-fuscis, lamellis pallidioribus. — Hoffm. nomencl. t. 5. f. 3. Pers. 470. Fr. syst. I. 167.

Inter muscos ad arborum trascos passim. Auctumno.

3339. *A. Campanella* Batsch, ascomatibus subcaespitosis, pileo convexo tenaciter membranaceo umbilicato striato ferrugineo, lamellis flavescentibus, stipite fistuloso spadiceo deorsum viloso. — Batsch. Pers. syn. 469. Nees syst. f. 191. Fr. syst. I. 166. *A. fragilis* Schaeff. t. 230.

Ad arborum, Abietum v. c. caudices. Auctumno.

3340. *A. badiopus* Pers., pileo carnosso-membranaceo glabro subferrugineo, dein obtuso subcampanulato, lamellis latiusculis plano adscendentibus concoloribus, stipite albido-fibrilloso deorsum badio subtenaci. — Pers. syn. 318. Fr. syst. I. 167.

In pinetis Hercyn. super. passim subsolitarius. (Pers.)

3341. *A. tricolor* A. et Schw., pileo plano-umbilicato glabro ochraceo-flavo, lamellis distantibus subramosis, postice latissimis aurantio-roseis, stipite farcto tenaci deorsum pubescente. — Alb. et Schw. nisk. 224. t. 9. f. 5. Fr. syst. I. 166.

In versuris et pascuis graminosis, rarius. Aestate.

3342. *A. cricetorum* Pers., pileo subturbinato plano-umbilicato striato albo s. stramineo, lamellis distantibus postice crassioribus latissimis albis, stipite brevi,

basin versus pubescente. — Fr. syst. I. 165. *A. grossulus* et *hygrophilus* Pers. myc. *A. niveus* Fl. dan. t. 1015. f. 1. *A. umbellifer* L. sicc. (pileo albo.) — *A. ericetorum* Pers. 472. Alb. et Schw. 225. (pileo gryseo.)
Ad terram in campis uliginosis s. udis. Hyeme.

3343. *A. pyridatus* Bull., ascomatibus testaceo-rufescens expallentibus, pileo infundibuliformi submembranaceo glabro, lamellis angustis decurrentibus, stipite firmo albido viloso. — *A. pyridatus* Bull. t. 569. f. 2. Nees syst. f. 192. Pers. syn. 171. Fr. syst. I. 164. *A. ventosus* Fr. obs.

In campis editioribus passim. Hyeme.

3344. *A. Fibula* Bull., ascomatibus tenellis, pileo convexo glabro aurantio-fusco, lamellis distantibus decurrentibus albidiioribus, stipite tenui puberulo lutescente. — Bull. t. 186. 550. Pers. syn. 471. Fr. syst. 163. *A. Clavus* Schum. *A. parvus* With.

$\beta.$ tubaeformis, ascom. majoribus, pileo umbilicato striato ochraceo-fusco, lamellis arcuatish candidis, stipite undulato cencolore. — *A. Fibula* $\beta.$ *Tubula* Pers. L. L.

Ad trancos putros; $\beta.$ inter muscos in monte Meissner Hass. (Persoon.)

3345. *A. scyphoides* Fr., pileo membranaceo in-sequali sericeo candido, lamellis subplicaeformibus angustis confertis, stipite farcto viloso. — Fr. syst. I. 163. *A. buccinalis* Batsch cont. II. f. 214.

In lucis umbrosis ad terram rarissime.

3346. *A. chrysoleucus* Pers., pileo profunde umbilicato glabro albido submembranaceo, margine reflexo striato, lamellis angustis confertis luteis, stipite farcto. — Fr. syst. I. 167. ? Pers. syn. 457. *A. mollis* Bull. t. 38. *A. excavatus* Leyss. Willd. berol. 389.

In nemoribus caeduis passim. Autumno.

3347. *A. chrysophyllus* Fr., pileo flocculoso flaccido humido luteo-fusco, sicco alutaceo-cano, lamellis distantibus stipiteque subsistuloso luteo-vitellinis. — Fr.

syst. I. 167. *A. trichaeus* Fr. obs. *A. Epichysium* & *xantophyllea* Alb. et Schw. nissk. 222.

Ad truncos pineos putridos passim. Auctumno.

3348. *A. obliquus* Pers., pileo subinfundibuliformi tenui pallide-cinereo glabro obliquo, stipite crasso. — Pers. icon. t. 13. f. 3. Fr. syst. I. 169.

Ad terram nudam German. boreal. (Persoon.)

3349. *A. Epichysium* Pers., ascomatibus teneris submembranaceis cinereo-nigricantibus, pileo infundibuliformi striato, margine deflexo, lamellis linearibus angustis albido-cinereis, stipite subfarcito tenaci, basin versus villoso. — Pers. syn. 462., icon. t. 13. f. 1. Fr. syst. I. 169.

Ad truncos (salicinos et fagineos) udos. Auctumno.

3350. *A. hydrogrammus* Bull., pileo glabro livido submembranaceo profunde umbilicato margine striato, lamellis confertis longe decurrentibus mediotenus latescentibus, stipite fistuloso, basi insixa strigoso. — Bull. t. 564. f. 1. Fr. syst. I. 169.

In alnetis udis ad terram, v. c. Hercyn. passim.

† carnosuli, pileis carnosso-submembranaceis planodepressis, humectis pellucido-striatis, siccis laevibus, lamellis adnatis. (Ag. *Omphalia Collybaria* Fr.)

3351. *A. difformis* Pers., pileo subumbilicato glabro, vivo striato livido, siccо laevi albo-nitente, lamellis albidis planis distantibus, stipite cavo longiusculo tenassello aequali nitido. Pers. syn. 462. Fr. syst. I. 170.

In pinetis udis Hercyn. superior. (Persoon.)

3352. *A. fragrans* Sowerb., pileo planiusculo sordide pallido siccо albido, lamellis confertis distinctis stipiteque cavo attenuato albis. — Sowerb. t. 10. Pers. syn. 455. Fr. syst. I. 171. *A. gratus* Schum.

In campis gramin., v. c. Thuring. passim, odore amiso.

3353. *A. metachrous* Fr., pileo subconvexo carnoso glabro laevi, dein planiusculo s. umbilicato pellucido striato, lamellis confertis albidis, basin versus

deficientibus, stipite tenaci aequali cavo sursum pruinato. — Fr. syst. I. 172. *A. dicolor* Pers. syn. 462. *A. cyathiformis* Bull. t. 248.

In pinetis patruis passim. Auctumno.

3354. *A. expallens* Pers., pileo carnosulo umbilicato (bramido) striato lamellisque distantibus cinereis, stipite farcto crassissculo aequali tenaci. — Pers. syn. 461. Fr. syst. I. 172.

In pinetis, v. c. Hercyn. super. passim. Aestate.

3355. *A. cyathiformis* Bull., pileo carnosulo infundibuliformi laevi glabro nigrescente-umbrino, margine reflexo, lamellis distantibus cinerascentibus, stipite elastico sursum attenuato. — Bull. t. 575. 568. f. 1. Nees syst. f. 172. Fr. syst. I. 173. *A. obcampanulatus* et *umbrinus* Schum. *A. tardus* Pers. syn. 461. *A. discolor* B. Alb. et Schw. nisk. 221. *A. sordidus* Dicks. *A. Infundibulum* Leyss. *A. sericeus* Planer. *A. concavus* Scop. — Vaill. bot. t. 14. f. 1.

Ad terram truncosque exesos frequens, auctumno.

††† lenti, pileis subinfundibuliformibus (saepius inaequalibus et squamosis) carnosono-coriaccis lenti, durinclusis, lamellis decurrentibus, stipitibus firmis in picum diffusis. (Ig. *Omphalia, Lentiscyphi* Fr.)

3356. *A. tigrinus* Bull., pileo regulari umbilicato albido, squamis pilosis nigricantibus vestito, lamellis denticulatis albis, stipite tenui parce squamuoso. — Bull. t. 70. Sowerb. t. 68. Pers. syn. 458. Fr. syst. I. 176.

Ad truncos patres rarius. Aestate s. vere.

3357. *A. lepidus* Fr., pileo compacto inaequali dilute ochraceo, squamis maculoribus saturationibus vestito, lamellis laceris, stipite valido squamuoso. — Fr. syst. I. 176. *A. polymorphus* Pers. myc. *A. tigrinus* Schum. *A. tessellata* var. *dentata* A. et Schw. 226. *A. squamosus* Schaeff. t. 29. 30. — Monstra sunt: *A. tubaeformis* Schaeff. t. 248. 249. *Flor. dan.* t. 1438. (stipite longo curvo, pileis imminutis.) — *Clavaria cornuta* Retz.

Elella serpentiformis Batsch. *Flor. dan.* t. 405. (*monstra ramosa, in ramice pileo destitutos desinentia.*)

Ad trunco pineo vulgaris; monstra in cryptis, cellis canalibusque ligneis rarius obvia. Per totum annum.

3358. *A. cochleatus* Pers., ascomatibus caespitosis, pileo tenaci sublobato contorto glabro rufescente, lamellis dentatis pallidis, stipite firmo sulcato rufescente. — Pers. 450. Fr. syst. I. 177. *A. confluens* Sowerb. t. 168. *A. dentatus* Pers. 476. Alb. et Schw. nisk. 227. *A. intermedius* Schum., (var. *minor*, pileo excentrico; teste Fr. I. l.)

Ad arborum trunco petres passim. Auctumno.

C. mammosi, ascomatibus plerumque gracilibus, periclavibus, tenellis subgregariis, pileis membranaceis, primum conicis, dein mammosis s. umbonatis, rarius campanulatis magisque expansis, glabris, squamis saltet destitutis, lamellis subexsuccis, inaequalibus leucosporis, stipitibus stipatis discretis, basi saepius infixa villosis. (Agar. tribus 10. Mycenæ Fr. Pers.)

† firmi, ascomatibus siccis, pileo demum depresso, lamellis subdecurrentibus. (*A. Mycenæ omphalariae* Fr.)

3359. *A. corticola* Pers., ascomatibus pusillis stipatis gregariis, pileo tenui hemisphaerico, dein umbilicato striato, lamellis uncinato-decurrentibus distantibus stipiteque brevi incurvo glabris. — Fr. syst. I. 159.

a. fuscescens, ascom. fuscescentibus. — *A. corticola* Pers. syn. 394. *A. corticalis* Bull. t. 519. Sowerb. t. 243.

β. albidus, ascom. albidis. — *A. clavularis* Batsch cont. I. f. 81. *A. hiemalis* Retz. *A. umbellifer* Scop.

Ad arborum (Pyri, Alni) cortices muscosos. Hyeme.

3360. *A. pterigenus* Fr., ascomatibus tenuibus roseis, pileo campanulato laevi, dein umbilicato, lamellis latescentibus adnatis subdecurrentibus distantibus, stipite capillari fistuloso, basi in bulbillum strigosum desinente. — Fr. syst. I. 160. *A. rosellus* With. *A. saccharinus* Batsch cont. I. f. 83. (pileo lamellisque albis forsitan distinctus.)

Inter muscos udos aliasque quisquilias putres.

3361. *A. acicularis* Hoffm., ascomatibus albis, pileo primum subcapitato, dein campanulato s. umbili-
cato tenerissimo, lamellis adnatis distantibus, stipite tena-
cello flaccido glabro capillari, apicem versus fuscescente.
— *A. capillaris* Schum. Fr. syst. I. 160. *A. acicularis*
Hoffm. nomencl. t. 5. f. 2.

Ad folia faginea putrida. Auctumno.

3362. *A. integrillus* Pers., ascomatibus condi-
dis exiguis, pileo hemisphaericō, dein depresso, margine
striato, lamellis rugaeformibus decurrentibus distantibus,
stipite basia bulbosam versus pilosulo. — Pers. icon. t.
13. f. 5., syn. 393. Fr. syst. I. 161.

Inter quisquiliae humi putrescentes. Auctumno.

3363. *A. cucullatus* Pers., ascomatibus subgrea-
gariis candidis, pileo campanulato laevi, lamellis arcuatissi-
mō decurrentibus, stipite longo, basi subincrassato pilis erectis
horrido. — Pers. syn. 372. Fr. syst. I. 158.

Inter muscos Hercyn. inferior. rarius. (Persoon.)

3364. *A. pellucidus* Bull., ascomatibus rufescen-
tibus, pileo submembranaceo umbonato-campaulato, mar-
gine striato, lamellis latissimis decurrentibus, stipite farcto,
basin versus incrassato. — Bull. t. 550. f. 2. Fr. syst.
I. 156. *A. biconus* Pers. syn. 317.

Ad terram nudam Thuring. Auctumno.

†† *visciduli*, ascomatibus viscidulis, lamellis adnatis
s. decurrentibus. (*Ag. Mycenae hygrociboideae* Fr.)

3365. *A. vulgaris* Pers., ascomatibus parvis gregariis
niveis, pileo umbonato, demum depresso striato ciuera-
scente, lamellis decurrentibus candidis, stipite brevi firmo
viscoso. — Pers. syn. 394. Fr. syst. I. 156. *A. cucul-
latus* Flor. dan. t. 1678. f. 2. *A. papillatus* Schrad.

In pinetis ad terram passim. Auctumno udo.

3366. *A. citrinellus* Pers., pileo umbonato striato
stipiteque brevi subviscoso citriuis, lamellis uncinatis albis.
— Pers. icon. t. II. f. 3., syn. 384. Flor. dan. t. 1614.
f. 1. Fr. syst. I. 155. *A. tenellus* Batsch elench. f. 88.

In pinetis ad terram rarius. Auctumno.

3367. *A. epipterygius* Scop., pileo obtuso striato stipiteque elongato flavo viscosis, lamellis uncinatis. — Scop. Pers. Sw. DC. Fr. syst. I. 155. *A. flavipes* Schaeff. t. 31. *A. rufoccephalus, strigosus et laevigatus* Schum. *A. clypeatus* With. *A. nutans* Sowerb. t. 92.

Ad terram muscosam dumetorum passim. Auctummo.

+++ siccii, pileis siccis umbonatis, vir saltem depresso, lamellis liberis s. adnatis (ne decurrentibus.) (Ag. Mycenae genuinae Fr.)

3368. *A. Mucor* Batsch, ascomatibus minimis gryseis, pileo glabro, primum conico, dein magis explanato plicato, lamellis adnatis paucis distantibus, stipite glabro in basin dilatato. — Batsch cont. I. f. 82. Fr. syst. I. 155. *A. integrillus* Nees syst. f. 187.

Ad folia humi putrescentia passim. Auctummo.

3369. *A. platypus* Nees, ascomatibus albo-canescensibus minimis, pileo hemisphaerico exigue sublaevi, lamellis adnexis confertis, stipite brevi, basi dilatata floccosa adhæso. — Nees syst. 202. f. 188. Fr. syst. I. 154.

Ad ramulos putres, v. c. agri erlang. (Nees jun.)

3370. *A. stylobates* Pers., ascomatibus sparsis tenerrimis candidis s. gryseis, pileo campanulato, dein convexo striato parcissime piloso, lamellis liberis distinctis, stipite in basin membranaceam orbiculatum expansam striatam dilatato. — Pers. syn. 390. t. 5. f. 4. Ditmar I. I. III. t. 29. Nees syst. f. 189. Fr. syst. I. 153.

Ad folia lignique frustula putrida passim. Auctummo.

3371. *A. lacteus* Pers., pileo subumbonato striatulo albo-flavescente, lamellis adnexis distinctis stipiteque rigidulo laevi albis. — Pers. syn. 394. Fr. syst. I. 153. *A. tener* Schum. *A. tenuis* Bolt. t. 37. *A. papillatus* Hoffm. nom. t. 3. f. 2.

In ericetis campisque pinetorum vulgaris. Auctummo.

3372. *A. luteo-albus* Bolt., ascomatibus parvis siccis, pileo umbonato striato stipiteque tenui luteis, la-

mellis adnatis albis. — *Fr. syst. I.* 152. *Alb. et Schw.* n. s. t. 194. *Bolt. t.* 38. *f. I.*

In pinetis muscosis Lusatiae. (*Alb. et Schwaeiniz.*)

3373. *A. lineatus* Bull., pileo obtuso lineostriato flavo, lamellis subventricosis adfixis albis, stipite basi albo-villoso. — *Bull. t.* 522. *f. 3.* *Pers. syn.* 383. *Fr. syst. I.* 152.

In terra nuda fagetorum. Auctumno.

3374. *A. Adonis* Bull., pileo obtuso laevi albo (a. roseo, flavente viridique), lamellis adnatis candidis, stipite laevi glabro, basi fibris villosis destituto. — *Bull. t.* 560. *f. 2.* *Pers. syn.* 391. *Fr. syst. I.* 152.

Ad terram nemorum udorum. Auctumno.

3375. *A. purus* Pers., pileo carnosò-membranaceo obtuso subroseo, lamellis rotundatis ventricosis pallidioribus, stipite laevi e purpura fuscescente, basin versus viloso. — *Pers. syn.* 339. *Flor. dan. t.* 1612. *Fr. syst. I.* 151. *A. lilacinus, dilutus et purpurascens* Schum. *A. roseus* Bull. *t.* 162. 507. *Flor. dan. t.* 1613. *A. janthinus* Batsch *elench. f.* 20.

In bryetis fagetorum minime raro. Auctumno.

3376. *A. rosellus* Bull., ascomatibus roseis, pileo obtuso umbonato striato membranaceo, lamellis adnatis, margine saturatius tinctis, stipite exsucco tenui basi albo-villoso. — *Bull. t.* 518. *Fr. syst. I.* 151. *A. roseus* Pers. *syn.* 393. *t. 3. f. 5.*

In pinetis umbrosis passim et gregatim. Auctumno.

3377. *A. strobilinus* Pers., ascomatibus gregariis coccineis, pileo acute umbonato, margine striato, lamellis adnatis rubellis apicem versus saturatioribus, stipite firmo fistuloso exsucco rigidulo, prope basin albo-strigoso. — *Pers. syn.* 393. *Alb. et Schw.* 190. *Fr. syst. I.* 150. *A. rosaceus* Schum. *A. coccineus* Sowerb. *t.* 197.

In fagetis et pinetis ad ramos deciduos. Auctumno.

3378. *A. elegans* Pers., pileo striato livido-flavescente, lamellis linearibus adnatis lividis, margine croceis,

stipite rigido laevi, basi fibrilloso. — Pers. syn. 391. *A. et Schw.* 176. Fr. syst. 149. *A. foeniculacei* var. *Schum.*
In pinetis patruis passim. Auctumno.

3379. *B. sanguinolentus* *A. et Schw.*, pileo striato subhemisphaericō rubello tenuissimo, lamellis adfixis atro-purpureo-marginatis, stipite debili laticem rubellum stillante. — Alb. et Schw. 196. Fr. syst. I. 149.

In nemoribus udis, v. c. Lusatiae super. (*A. et Schw.*)

3380. *A. haematopus* Pers., ascomatibus caespitosis, pileo carnosō-membranaceo albo-rubescente, lamellis adfixis albis stipiteque succo atro-sanguineo scatentibus. — Pers. syn. 379. Fr. syst. I. 149.

Ad trancos abietinos et fagineos passim. Auctumno.

3381. *A. galopus* Pers., pileo striato glauco-nigrescente obtuse umbonato, nonoisi tenuiter pruinoso, lamellis adfixis albis a. glaucescentibus, stipite gracili (saepius in basin fibrillosam protenso), succo albo scatente. Pers. et Fr. I. I. Flor. dan. t. 1550. f. 2. *A. lactescens* Schrad.

In versuris graminosis passim. Auctumno.

3382. *A. crocatus* Schrad., ascomatibus inodoris, pileo obsolete striato cinereo, lamellia attenuato-adnexis albia stipiteque longo croceo-sanguineo strigoso-radicate, laticem crocatum fundentibus. — Schrad. spia. 127. Pers. Fr. I. I. Flor. dan. t. 1550. f. 1.

Inter folia decidua, faginea praeprimis. Auctumno.

3383. *A. prasiomimus* Fr., ascomatibus olidis, pileo hemisphaericō cinereo, lamellis subliberis, stipite laevi elongato, latice croceo scatente. — Fr. syst. I. 148. *A. porreus* Pers. pr. pr. *A. alliaceus* Scop.

Ad folia decidua, auctumno sero.

3384. *A. Zephyrus* Fr., pileo obtuso albo-incarnato a. livido-roseo, margine striato, lamellis adnatis linearibus albis, stipite striato squamuoso lilacino. — Fr. syst. I. 147. *A. spinipes* Sw. *A. galericulata* e. *rubella* *A. et Schw.*

In pinetis et fagetis passim. Aestate sera.

3385. *A. janthinus* Fr., ascomatibus janthino-purpureis expallentibus, pileo subumbonato membranaceo, margine striato, lamellis attenuato-adnexis antice latioribus, stipite glabro striato. — Fr. syst. l. l. *A. purpurascens* Schrad. spic. 127.

In pinetis muscosis Hercyo. Auctumno.

3386. *A. atro-cyanus* Batsch, pileo obtuso stipiteque brevi subpruinosis striatis nigricantibus, margine lamellisque subadnexis albidiioribus. — Fr. l. l. Batsch cont. I. f. 87. *A. Batschii* Fr. obs. I. 47.

Ad terram in lucis umbrosis. Auctumno.

3387. *A. polygrammus* Bull., pileo obsoleto striato subcinereo, lamellis attenuato-adnexis albis, stipite longo rigido striato splendente. — Fr. l. l. Bull. t. 395. Pers. syn. 277. Flor. dan. t. 1615. f. 1. *A. fuscipes* et *galericulatus* Schum. Flor. dan. t. 1398. *A. fistulosus* Bull. t. 518. *A. cynophallus* Batsch cont. I. f. 85.

Inter folia decidua et ad trunco pntres. Auctumno.

3388. *A. plexipes* Fr., pileo umbonato striatulo fuligineo, lamellis attenuatis albis, stipite e fibris implexis sericeo-striato livido. — Fr. l. l. *A. inodorus* Schum. *A. fuliginarius* Batsch cleanch. f. 40.

In campis graminosis juxta trunco passim.

3389. *A. muscigenus* Schum., ascomatibus tenellis albis, pileo hemisphaericо laevi, lamellis adyutis subconfertis linearibus, stipite setaceo exsucco flacco. — Fr. l. l. Schum. saett. II. 145. *A. trichopus* Scop.

Ad caudices muscosos rarius.

3390. *A. metatus* Fr., ascomatibus exsuccis inodoris gregariis, pileo obtuso membranaceo striato, sicco expallente laevi, lamellis adnatis albis, stipite rigido subfragili, basi fibrilloso. — Fr. syst. l. l. *A. pilosus* Flor. dan. t. 1615. f. 2. *A. laevigatus* Pers. *A. tener* Scop.

f. plicosus, pileo lineato-striato, lamellis crassiusculis stipiteque gryceis. — Fr. l. l. *A. griseus* Batsch.

In pietis ad terram ubertimi. Auctumno sero.

3391. *A. galericulatus* Scop., ascomatibus tenacellis exsuccis inodoris, pileo membranaceo rugoso striato fuscescente, lamellis adnatis albidis dein cinera-scentibus denteque decurrentibus, stipite laevi rigido opaco tenaci, basin versus radicato strigoso. — Scop. Schaeff. t. 52. Nees syst. f. 185. Pers. syn. 376. Fr. l. l. *A. fistulosus* Bull. t. 518. *A. pseudoclypeatus* Bolt. *A. mammillaris* Hoffm. l. l. t. 4. f. 1. *A. campanulatus* L.

In terra, vel intra s. juxta truncos putres abundanter. Auctumno. (Perquam variabilis: major, pileo carnosulo rugoso majore, stipite rigido, (Schaeff. l. l. f. 7-9. Nees syst. f. 185. f. A. galcr. praemorsus Pers. *A. aestivus* Pers. *Amanita sulcata* Lam.); elatus, pileo subhemisphaerico papillato, stipite praelongo filiformi flaccido, (*A. cincinnatus* Schum. *A. tenuis* auct. *A. pilosus* Pers. Bull. t. 518. f. P.) Nec desunt monstra cryptophila in cellis truncisque cavis, (*A. Myurus* Hoffm. veg. t. 3. — *A. proliferus* Sow.)

3392. *A. alcalinus* Fr., pileo obtuso striato cinereo olido, lamellis adnatis ex albo-glaucis, stipite laevi firme, basi villosa. — Fr. l. l. *A. sulphureus* Scop.

f. *leptocephalus*, pileo umbonato tenui cinereo, lamellis crassis, stipite glabro brevi. — Fr. l. l. *A. leptocephalus* Pers. ic. t. 14. f. 4., syn. 381.

Ad truncos; f. in sylva solliugens. rarissime. (Pers.)

3393. *A. supinus* Fr., ascomatibus parvis gregariis, pileo obtuso striato gryseo, lamellis subliberis ventricosis stipiteque brevi incurvo glabro albis. — Fr. l. l. *A. griseus* Flor. dan. t. 1551. f. 2. *A. pusillus* Hoffm. t. 6. f. 3.

Ad truncos fagineos passim. Auctumno.

3394. *A. fitipes* Bull., pileo obtuso striato livido-fusco, lamellis liberis ventricosis albis, stipite longo laevi, in basin infixam pilosam desinente. — Fr. l. l. Bull. t. 320. *A. pilosus* Batsch el. f. 1. *A. membranaceus* Hoffm. l. l. t. 6. f. 1.

In dumetis umbrosis passim. Auctumno.

3395. *A. alliacens* Jacq., pileo lento-albo fuscescente, olido, lamellis liberis adnatis, stipite procero rigido subcorno pruinoso-velutino nigrescente. — Fr. L. I. Jacq. austr. t. 82. Pers. syn. 375. Flor. dan. t. 1251.

Inter folia in fugitis, rarius etiam in puetis. Aestate.

D. scleropodes, ascomatibus aridis persistentibus parvis, stipite fistuloso tenui stipato, plerumque colorato insignibus, pileis membranaceis tenacellis, vir nisi carnosulis, convexis dein deplanatis, lamellis exsucis obtusis albis, passim etiam lutescentibus. (Agar. trib. 9. *Collybia* Fr. *Gymnopodis*, *Mycenae* et *Omphaliae* sp. Pers.)

+ tenacelli, pileis tenaciter membranaceis lenti planis, dein depressis plicato-rugosis, lamellis subvenosis homogeneis, stipite gracili, subcorno (ex fusco-nigroque) colorato. (Ag. *Collybiac omphalariae* Fr.)

3396. *A. epiphyllus* Pers., pileo planiusculo rugoso lamellisque aduatibus paucis venosis albis, stipite fistuloso tenuiter velutino, deorsum spadiceo. — Fr. syst. I. 139. Pers. syn. 468. *A. rugatus* Flor. dan. t. 1194. *A. umbellifer* Bolt. *A. Squamula* Batsch. Sowerb. t. 93. *A. lacteus* Bull. t. 601. f. 2. *Helotium melanopus* Pers. (monstr.)

Ad folia decidua aliasque quisquiliis putres. Auct.

3397. *A. perforans* Hoffm., pileo subcarnoso planiusculo ruguloso pallescente, lamellis adnatis simplicibus crassiusculis alternatim inaequalibus, stipite fistuloso laevi velutino nigro-badio. — Hoffm. nom. t. 4. f. 2. Fr. syst. I. 138. *A. Abietis* Batsch cl. f. 10. (junior.) *A. androsaceus* Schaeff. t. 239.

In foliis abietinis dejectis minime raro. Hyeme.

3398. *A. venosus* Pers., pileo submembranaceo tenaci umbilicato exarato-plicato badio-fulvo, lamellis paucis subconcoloribus glaucisve annulato-connexis cumque stipite fistuloso spadiceo velutino adnatis. — Pers. syn. 467. *A. foetidus* Fr. syst. I. 138.

* Ad ramos truncosque arborum putres rarius. Aestate.

3399. *A. androsaceus* L., pileo convexo plicato

albo-fuscecente, lamellis simplicibus distinctis, stipite fistuloso sulcato glaberrimo nigro adnatis. — *Fr. syst. I.* 137. *Flor. dan. t. 1551. f. 1.* *A. epiphyllus* Bull. *t. 569. f. 3.*

Inter quisquilias acerosas, tum pineas, tum abietinas, nec non ad ramulos arborum deciduos.

3400. *A. Rotula* Scop., pileo convexiusculo umbilicato plicato lamellisque basi connatis collarium stipitem fistulosum striatum glabrum nigrescentem libere ambiens mentientibus laxe adnatis albis. — *Scop. Sowerb. t. 95.* *Pers. syn. 467.* *Fr. syst. I.* 136. *A. androsaceus* Bull. *t. 64. 569.* *A. nigripes* Schrad. *Flor. dan. t. 1134. f. 1.*

In similibus cum praecedente locis, nec non in terra nuda, a basi inde stipites steriles proliferos ramosos exserens (*Ehrenb. sylv. n. 61.*) Per totum annum.

3401. *A. Vaillantii* Pers., pileo plano plicato lamellisque postice latissimis adnatis distantibus candidis, stipite solido glabro spadiceo sursum incrassato pallidore. — *Fr. I. I.* *A. ericotorum* *Ag. Vaillantii* Pers. *syn. 472.* *A. nitidus* Gunn. — *Vaill. bot. t. 11. f. 21-24.*

Ad ramulos et folia dejecta faginea. Auctumno.

†† carnosuli, pileis carnosulis laevibus, vix umbilicatis, stipite cavo s. obsolete fistuloso suffultis. (*Ag. Collybiae genuinae* Fr.)

3402. *A. ocellatus* Fr., pileo subcarnoso plano albo, dein discum versus saturatiore, lamellis adnatis albis, stipite fistuloso subpulverulento rufescente in basin fibrilloso-radicatam desinente. — *Fr. I. I.* *A. clavus* Bull. *t. 569. f. 1.* *A. pallor* Batsch cont. I. f. 95.

Inter folia humi putrescentia rarius. Auctumno.

3403. *A. parasiticus* Bull., pileo carnosulo convexiusculo, mox deplanato pruinoso irregulari albo s. gryseo-pallescente, lamellis adnatis crassis plicaeformibus distantibus saturioribus, stipite fistuloso villoso. — *Fr. syst. I.* 133. *el. I.* 19. (*Nyctalis* Fr. *syst. orb. 78.*) *Pers. syn. 371.* Bull. *t. 574. f. 2.*

Ad Agaricis majores rarius obvius. Auctumno.

3404. *A. ramealis* Bull., pileo carnosulo planiusculo albido subrufescente opaco, lamellis adnatis distinctis albis, stipite farcto brevi rufescente piloso s. furfuraceo-squamuloso. — Fr. l. l. Bull. t. 336. Pers. syn. 375. *A. candidus* Bolt. t. 39. f. D. Schrad. spic. 126.

In ramis aridis, quercinis v. c. fagineis aliisq. Hyeme.

3405. *A. acicola* Jungh., pileo membranaceo tenaci convexo-umbonato laevi, lamellis adnatis inaequalibus, stipite fistuloso, basi in bulbum villosum incrassato. — Jungh. in Schltdl. Linn. 1830. p. 398. t. 6. f. 3.

In Hercyniae pinetis (Junghuhn.)

3406. *A. Clavus* Bull., pileo carnosulo planiusculo aorantio-rubescente, lamellis adfixis latiusculis stipiteque farcto brevi glabro albidis. — Fr. l. l. Bull. t. 148. Pers. syn. 392.

Ad quisquilias nemorenses patres rarius. Auctumno.

3407. *A. tuberosus* Bull., pileo subcarnoso convexo albo, dein umbonato, lamellis adnatis confertis, stipite fistuloso nudiusculo, corpusculo sclerotiformi innato. — Fr. syst. I. 133. Bull. t. 256. 522. Pers. syn. 374. Flor. dan. t. 1613. *A. Amanitae* Batsch cont. I. 93. *A. albumus* Bolt. t. 155. *A. bulbosus* Schum. *A. racemosus* Pers. Grev. scot. t. 23. Friesio teste huj. monstrum.

In Sclerotio fungorum et muscorum parasita. Auct.

3408. *A. conigenus* Pers., pileo subcarnoso inaequalli subumbonato pallido s. livido-cinereo, lamellis liberis linearibus albidis, stipite fistuloso tenaci filiformi pulverulento, basi radicata strigoso. — Pers. syn. 388. Fr. syst. I. 132. Alb. et Schw. 195. cum var. β . pallente.

In pinetis ad folia conosque passim. Auctumno.

3409. *A. tenacellus* Pers., pileo carnosulo fusco-expallente livido, lamellis adnexis laxis niveis, stipite fistuloso longissimo fulvo, basi villoso-radicato. — Pers. syn. 387., icon. t. 1. Fr. syst. I. 131. *A. longicaudus* Schum.

In pinetis terram saepius longe penetrans. Auctumno.

3410. *A. esculentus* Wulff., pileo subcarnoso obtuso argillaceo s. fuscescente, lamellis adnexis laxis albis, stipite fistuloso radicato glabro flavescens. — Wulff. in Jacq. coll. II. t. 14. f. 4. Pers. Fr. Alb. et Schw. I. I.
In versuris, pascuis et ericetis vulgaris. Auctumno.

3411. *A. carneus* Bull., pileo subcarnoso laevi carneo-rubente, lamellis adnexis candidis coafertis, stipite subfaretto firme crasso brevi villoso-squamuloso. — Bull. t. 533. f. 1. Pers. syn. 340. Fr. syst. I. 130.

In campis pinetorum graminosis. Auctumno.

3412. *A. calopus* Pers., pileo subcarnoso laevi lamellisque adnexis albidis inodoris, stipite fistuloso glabro badio-rubro. — Pers. syn. 373. Fr. syst. I. 130.

In fagetis Hercyn. infer. rarius. (Persoon.)

3413. *A. scorodonius* Fr., pileo subcarnoso lamellisque adnatis crispis albidis graveolentibus, stipite fistuloso brevi glabro rufo. — Fr. syst. I. 130. *A. Schaefferi* Pers. obs. *A. alliatus* Schaeff. t. 99. Pers. syn. 373.

In campis pinetorum editiorum. Auctumno.

3414. *A. merulinus* H., pileo subcarnoso umbo-nato margine tenuiter striato lamellisque adnatis venoso-connexis, ad latuscula costis cristatis transversis rugosis albo-pallentibus exaratis, stipite gracili fistuloso concolore.

Ad trunco Salicis capreae putres Thuring. Auct.

E. gymnopodes, ascomatibus majoribus, diutius persistentibus, saepius innocuis omnino, pileo plus minusve carnoso juniore convexo, demum magis depresso, vel a figurazione infundibuliformi haud alieno, lamellis inaequalibus exsuceis tenacibus, varie adfixis s. liberis, leucosporis, velo nullo, stipite aequali s. sursum attenuato, nec bulboso laeviusculo, satis firmo. (Agar. trib. III. Clitocybe Fr. syst. Gymnopodis et Omphaliae sp. Pers.)

† lamellis postice aequalibus obtusis.

a. *scortei*, pilo subcoriaceo sicco, lamellis liberis subdistantibus pallescentibus, ascomatibus tenacibus subelasticis, saepius epiphytis.

3415. *A. fusco-purpureus* Pers., pileo subcarnoso rugoso atro-purpureo expollente, lamellis liberis rufescentibus, stipite fistuloso rubiginoso in basin cunctam strigosam desinente. — Pers. syn. 451., icon. t. 4.f. I.

Inter quisquilias fagitorum putres rarins. Aestate.

3416. *A. porreus* Fr., pileo subcarnoso laevi lamellisque subliberis albis graveolentibus, stipite fistuloso longo tomentoso rufescente. — Fr. syst. I. 128. *A. alliaceus* Schum. *A. alliaceus* Bull. t. 158. 524. *A. porreus* Pers. pr. pr.

In fagetis et quercetis passim. Auctumno.

3417. *A. oreades* Bolt., pileo carnoso tenaci subumbonato e rufo-pallescidente, lamellis distantibus stipite que solido tereti villoso-corticato pallidis. — Fr. l. l. Bolt. t. 151. *A. collinus* Pers. syn. 330. excl. syn. *A. corticatus* Fr. obs. *A. tortilis* DC. *A. caryophylleus* Schaeff. t. 77. *A. coriaceus* Lightf.

In pascuis versurisque passim. Vere.

3418. *A. peronatus* Bolt., pileo convexo carnoso, dein subcoriaceo explanato, lamellis distantibus flavis pallescentibus, stipite albo-flavente solido, in basin incurvam radicatam flavo-strigosam producto. — Fr. l. l. Bolt. t. 58. Pers. syn. 331. *A. lanatus* Schum.

Inter quisquilias nemorenses vulgaris. Aestate.

3419. *A. chrysenteros* Bull., pileo carnoso hemisphaericо subumbonato lamellisque liberis flavis, stipite glabro laevi solido, basi albo-strigoso. — Fr. l. l. Bull. t. 556. f. 1. Pers. syn. 321.

Inter folia dejecta, nec non ad ramos. Auctumno.

b. chondropodes, pileis carnosulis dein expansis siccis, lamellis liberis angustis, stipite rigido tenaci, extus striato striato s. villosi, sursum attenuato, basi radicato. (*Ag. Clitocybe* S. *chondropodes*. Fr.)

3420. *A. agnosus* Bull., pileo subcarnoso planiusculo albo-lutescente, margine striato, lamellis fragili-

bas liberis subaequalatis, stipite fistuloso fulvo. — *Fr. syst. I.* 125. *Bull. t. 17. A. melleus Schaeff.* *t. 45.*

In nemoribus frondosis inter muscos. Aestate.

3421. *A. dryophilus Bull.*, pileo subcarnoso explanato laevi non nisi depresso, lamellis subliberis, stipite fistuloso glabro lutescente, basi incrassato. — *Fr. L. Bull. t. 434. Pers. syn. 452. A. ochraceus Schaeff.* *t. 255.*

In nemoribus caeduis ubertim. Vere.

3422. *A. collinus Scop.*, pileo subcarnoso campanulato, dein umbonato expanso pallescente exsacco, lamellis liberis, stipite fistuloso laevi glabro rigidulo. — *Fr. I. L. Schaeff.* *t. 220. Flor. dan. t. 1609.*

In promontoriis collinis, calcareis Thuring. Aestate.

3423. *A. confluens Pers.*, ascomatibus complicato-caespitosis, pileo subcarnoso albido, lamellis liberis confertis linearibus, stipite fistuloso subcarnoso albido, lamellis liberis confertis linearibus, stipite fistuloso subcompresso rubro villoso-pulverulento. — *Pers. syn. 368., icon. 5. f. 1. Fr. syst. I.* 123.

β. rufo-cinnamomeus, pileo rufo-cinnamomeo, lamellis subadnexis incarnatis, stipite farcto tereti. *Fr. L. L. Alb. et Schw. nisk.* 184.

In nemoribus umbrosis; *β.* in pinetis. Auctumno.

3424. *A. erythropus Pers.*, ascomatibus caespitosis, pileo subcarnoso albido, lamellis liberis connexis, stipite fistuloso elongato glabro atro-rubente. — *Pers. syn. 367. Fr. syst. I.* 122.

β. repens, pileo subdepresso, stipitibus flexuosis flaccidis. *F. L. L. Alb. et Schw. nisk.* 184. *A. repens Bull. t. 90.*

Inter quisquilias nemorenses passim.

3425. *A. maculatus A. et Schw.*, pileo carnoso planiusculo obtuso sicco albido rufescente-maculato, lamellis liberis confertissimis linearibus, stipite farcto ventricoso striato. — *A. et Schw. nisk.* 186. *Fr. el. I.* 17. *A. rubiginosus Schum.* *A. carnosus Sowerb.* *t. 246.* *A. fuscipes β. Fr. syst. I.* 121.

In pinetis roridis rarius. Auctumno.

3426. *A. aceratus* Fr., ascomatibus fasciculatis, pileo subcarnoso incarnato, dein explanato, lamellis liberis, stipite fistuloso rubro glabro, sursum attenuato, basin versus tomentoso. — Fr. t. L. *A. erythropus* g. *aestivalis* Alb. et Schw. t. L.

In pinetis juxta caudices putres passim. Auctumno.

3427. *A. butyraceus* DC., pileo carnoso, dein umbonato badio-ruso s. fuscescente, lamellis subliberis crenulatis, stipite subconico cartilagineo-corticato striato rufescente, basin versus incrassato tomentoso. — DC. gall. II. 181. Fr. syst. I. 121. *A. leuophyllus* et *trichopus* Pers. syn. 308. *A. leiopus* var. *A.* et Schw. 181. *A. spongiosus* Schum. — Bull. t. 572.

Inter folia decidua in pinetis. Auctumno.

3428. *A. fusipes* Bull., ascomatibus gregaris, pileo carnoso laxo, lamellis subliberis serratis, stipite cavo ventricoso sulcato albido radicato, — Fr. syst. I. 120. Bull. t. 516. Pers. syn. 312. *A. crassipes* Schaeff. t. 87. 88. *A. mollis* et *Rudolphi* Batsch f. 14. 23. (pileo flavo.)

Inter ramenta liguea tuta. Aestate.

3429. *A. costatus* W., pileo ampio, a centro carnoso umbonato-mamillari inde depresso, pilis brevibus sparsis dilute fuscescentibus obsito fusco-canescente, lamellis latescentibus crassiusculis candidis remotis cum aliis minoribus dentiformibus antice interjectis, stipite spithameo stricto albo-farcto sublignescente corticato, pilis subfasciculatis densis rubiginosis brevibus adpressis velutino, siccando sulcato-striato. — ?*A. longissimus* Batt. t. 9. J. Fr. syst. I. 120.

Ad latera viarum tuta Hercyn. infer. Auctumno. (Stipites praelongi, medioteus plerumque nodo incrassato intercepti, colore novellos Rhois typhinae, sulcis Clematis Vitaliae viticea fere simulantur stirpemque signant perquam singularem ac pulcherrimam.)

c. *rhizopodes*, pileo carnosulo piano-converiusculo glabro, dein rugoso, stipite juniore spongioso-farcto, dein

carnosus subcartilagineo, basi in placrum radiciformem protenso. Fr. l. l.

3430. *A. velutipes* Curt., pileo inaequali fulvo glutinoso molli planiusculo, lamellis ventricosis albo-luminescentibus, stipite incurvo velutino brevi nigrescente-badio. — Fr. syst. I. 119. Curt. lond. IV. t. 70. Bolt. t. 135. Pers. syn. 314. *A. Aesculi* Schüm. *A. nigripes* Bull. t. 344. *A. mutabilis* Huds.

Ad Salices, Fagos, Alnos passim. Hyeme.

3431. *A. radicatus* Reichenb., pileo rugoso glutinoso convexo, dein deplanato, lamellis adfixis candidis, stipite procero rigido glabro, in basin radiciformem fusiformem protenso. — Fr. syst. I. 118. Sowerb. t. 48. Pers. 313. Grev. scot. t. 217. *A. macrorrhizus* Pers. obs. *A. longipes* Bull. t. 515. *A. Umbraculum* Batsch f. 4. *A. macrourus* a. Sc.

β. pudens, pileo laevi, margine stipiteque villosis. Pers. l. L Bull. t. 232.

Ad latera truncorum putridum passim. Aestate.

d. thrausti, pileis carnosulis siccis, dein planiusculis, stipitibus farctis aequalibus, ascomatibus fragilibus sub-teneris. Fr. l. l.

3432. *A. atro-cinereus* Pers., pileo carnoso obtuso umbonato cinereo, umbone nigrescente glabro, lamellis aquoso-albidis emarginato-adnexis, stipite solido glabro. — Pers. syn. 348.

In pinetis hercynicis. (Persoon.)

3433. *A. platyphyllus* Pers., pileo subcarnoso piano cinereo-albido subvirgato, lamellis latissimis remotis stipiteque farcto aequali striato radicato albis. — Pers. syn. 302. Fr. syst. I. 117. *A. grammocephalus* Bull. t. 594.

Ad trunco fagineos passim. Aestate uda.

3434. *A. cuneifolius* Fr., pileo subcarnoso glabro fuligineo-livido, denum rimoso, lamellis ventricosis albis, stipite cavo deorsum attenuato, apice pruinato. — Fr.

*I. l. A. pratensis var. Pers. syn. praef. 29. A. cinerentimulosus Batsch cont. II. f. 206. A. ovinus Bull. t. 580.
In pratis colluiis passim. Auctumno.*

3435. *A. nitens Batsch*, pileo subcarnoso ruguloso subtomentoso nigrescenti-umbrino, margine inaequali, lamellis ventricosis glauco-cinereis, stipite brevi albicans. — *Batsch cent. II. f. 192. Pers. syn. 359. Fr. syst. I. 116.*

In promontorii siccis, passim. Auctumno sero.

3436. *A. murinaceus Bull.*, pileo subcarnoso difformi rimoso-squamuloso cinereo, lamellis collinitis distantibus stipiteque cavo dilormi cuperascentibus. — *Fr. L. l. Bull. t. 520. A. nitratus Pers. syn. 356.*

In similibus cum praeced. locis. Auctumno.

3437. *A. murinus Batsch*, pileo carnosulo obtuso laevi brunneo-fusco, lamellis latissimis albis, stipite cavo longo aequali. — *Batsch elench. f. 19. Fr. L. l.*

In pratis pinguisibus passim. Auctumno ineunte.

3438. *A. melaleucus Pers.*, pileo carnosulo molli planiusculo laevi, lamellis confertis subventricosis candidis, stipite striato livido tenui longo, demum cavo. — *Pers. syn. 355. Fr. syst. t. 114.*

In pinetis montosis passim.

c. calodontes, ascomatibus rigidis firmis, pileis carnosulis campanulato-explanatis, margine tenuatis, lamellis latecentibus, venoso-connexis, margine denticulis s. floccis saturioribus veluti appendiculatis, stipite gracili, subflatuloso. Fr. L. l.

3439. *A. marginellus Pers.*, pileo campanulato albido-umbrino discoideo, lamellis arcuato-adnexis inaequalibus albis, margine simbriato umbrino, stipite basi subtuberoso piloso. — *Pers. syn. 309. Fr. syst. I. 113.*

Ad truncos abietinos Hercyn. super. (Persoon.)

f. oesypii, ascomatibus rigidis exsuecis, pileis convexo-explanatis, dein depresso, epidermide in squamas

a. vellus sericum secedente tectis, stipite cum pileo contiguo. Fr. l. l.

3440. *A. lascivus* Fr., pileo carnoso obtuso leviter sericeo alutaceo-pallido, lamellis arcuato-adfixis confertis stipiteque solido aequali, basi radicato tomentoso albis. — *Fr. syst. I. 110.* ?*A. sulphureus* *ß. coronarius* Pers. syn. 322.

In pinetis hercynicis rarius. (Persoon.)

3441. *A. sulfureus* Bull., pileo carnoso subumbonato leviter sericeo testaceo-luteo, lamellis arcuato-adnatatis subdistantibus stipiteque farcto aequali sulfureis. — *Fr. syst. I. 110.* Bull. t. 168. 545. Alb. et Schw. nisk. 170. Pers. syn. 322. *A. luteus* Schum.

Ad terram arenosam trucosque arborum rarius. Auct.

3442. *A. ovinus* Bull., pileo carnoso plano-convexusculo subsquamuloso fuscescente, lamellis arcuato-adfixis connexis albis, stipite farcto brevi firme. — *Fr. l. l. Bull. t. 580.* Pers. syn. 303. *A. metapodium* Fr. obs. *A. obscurus* Alb. et Schw. 174.

In pratis editioribus nemorosis. Auctumno.

3443. *A. trichaeus* Pers., pileo carnoso umbilicato piloso-squamuloso alutaceo, lamellis dentato-decurrentibus stipiteque cavo luteis. — Pers. syn. 451. Fr. l. l.

Ad ligna putrida pinea Hercyn. super. (Persoon.)

3444. *A. bellus* Pers., pileo subcarnoso depresso squamuloso aureo, lamellis distantibus dentato-conoexis stipiteque tenaci dilutioribus. — Pers. syn. 452. Alb. et Schw. nisk. 218. Fr. syst. I. 107.

Ad trancos pineos putres Hercyn. (Persoon.)

3445. *A. laccaetus* Scop., ascomatibus gregaris, pileo subcarnoso tenaci stipato-sericeo ex fusco violaceo-que belle colorato versicolore demum expallente, disco depresso, lamellis subdecurrentibus distinctis distantibus, stipite tenaci elongato, saepius in fibras cortinatas soluto. — Fr. l. l. Schaeff. t. 13. *A. amethysteus* Bull. t. 510. f. 1. Pers. syn. 465.

s. rufus, pileo rufo s. carneo, siccando subochraceo. Fr. l. l. *A. rosellus*, subcarneus Batsch cont. I. f. 99. 100. *A. farinaceus* Huds. Bolt. t. 64. Pers. Flor. dan. t. 1249. *A. rubellus* et *carneus* Schaeff. t. 303. 304.

y. amethysteus, pileo violaceo s. amethysteo, siccando versicolore canescente. Fr. l. l. *A. amethysteus* Huds. Bull. t. 198. Sowerb. t. 187. Flor. dan. t. 1250. Pers.

Ad terram pinguem nemorum passim. Aestate.

g. hygrococybi, ascomatibus succulentis, subfragilibus, pileis carnosulis, dein convero-expansis, humidis viscosis diaphanis, stipite cavo glabro. Fr. l. l.

3446. *A. miniatus* Fr., pileo convexo sicco, deum pmbilicato stipiteque subfarcto aequali tereti miniatiss, lamellis adnatis distinctis lutecentibus. — Fr. syst. I. 105. *A. glutinosus* Flor. dan. t. 1609. f. 2. *A. flammatus* Scop.

In lucis paludosis passim. Auctumno.

3447. *A. coccineus* Pers., pileo convexo expanso viscoso, dein sicco depresso pallente, lamellis adnatis dente decurrente connexis verecoloribus, stipite compresso coccineo. — Fr. l. l. Pers. syn. 334. *A. scarlatinus* Bull. t. 570. f. 2. *A. kermesinus* Flor. dan. t. 715. *A. fulvus* Pers. obs. (var.) *A. miniatus* Scop.

In pratis nemorensibus passim. Aucturano.

3448 *A. puniceus* Fr., pileo campanulato obtuso lobato aurantio-coccineo, lamellis adfixis adscendentibus flavis, stipite crasso ventricoso, basi albo. — Fr. syst. 104. *A. aurantio-crocatus* Schum. *A. rigidus* Bolt. t. 43. *A. aurantius* Vahl fl. dan. t. 833. *A. coccineus* Bull. t. 202. pr. pr.

In promontoriorum valleculis rarius. Auctumno.

3449. *A. conicus* Schaeff., pileo conico acuto sublobato, dein expanso acute umbonato, lamellis adscendentibus confertis ventricosis attenuato-liberis, stipite cylindrico striato. — Fr. syst. I. 103. — Schaeff. t. 2.

Pers. syn. 335. A. croceus Bull. t. 50. 524. A. aurantius
Sow. t. 381. A. dentatus L.

β. flavus, pileo flave, citrino s. virenti-flavo. — *A. hyacinthus Batsch f. 28. Flor. dan. t. 599.*

γ. tristis, pileo demum nigrescente. — *A. tristis Pers. obs. A. inamoenum Pers. syn. l. l.*

δ. aurantius, pileo aurantio s. coccineo. — *Flor. dan. t. 1609. f. 2. dextr. A. aurantius Lightf. Curt. Bolt.*

In pratis editioribus muscosis et versuris. Aestate.

3450. *A. phrygius JV.*, pileo umbonato-deplanato tenuiter viscido pallide-fusco, dein rugis saturationibus exarato, lamellis crassiusculis valde inaequalibus candidis exsuccis, stipite farcto aequali laevi elato stricto, siccando striato.

In lucis umbrosis Thuringiae. Auctumno rarius et solitarie. (*A. galericulati var. β. Fr. Schaeff. t. 52. f. 7-9. habitu refert.*)

3451. *A. cerasinus Wulff.*, pileo convexo-planiusculo viscoso obsolete striato luteo, lamellis adnato-decurrentibus distantibus stipiteque subinaequali flavis. — *Wulff. in Jacq. coll. II. t. 15. Pers. syn. 336. Fr. l. l.*
A. hypoxanthus Otto.

α. hypoxanthus, pileo planiusculo subobliquo, lamellis rotundato-adnexis. *Pers. l. l.*

β. fissus, pileo amoene-fulvo rimoso, stipite fulvo utrinque longitudinaliter sulcato. *Pers. l. l.*

In pratis editioribus rarius. Auctumno.

3452. *A. psittacinus Schaeff.*, ascomatibus vi-ridi-lutescentibus viscidis, pileo campanulato expanso, humido striato, lamellis adnatis subdistantibus, stipite aequali laevi. — *Fr. l. l. Pers. syn. 335. Schaeff. t. 301.*
A. chamaeleo Bull. t. 545.

In pratis collinis versurisque passim.

3453. *A. irrigatus Pers.*, pileo campanulato laevi stipiteque aequali viscoso lividis, lamellis forniciatis di-strictis albidis. — *Pers. syn. 361. Fr. syst. l. 101.*

In pinetis Hercyn. super. (Perseoon.)

A. camarophylli, pileis carnosis rigidis expansis non viscosis, lamellis utrinque attenuatis longe decurrentibus fornicatis latiis, saepius venoso-connexis, stipite firme farcto. Fr. l. L.

3454. *A. virginicus* Pers., ascomatibus candidis, pileo tenui humido convexo, dein umbilicato, lamellis decurrentibus venoso-connexis distantibus, stipite fistuloso tenui, deorsum attenuato. — Pers. syn. 456. Fr. syst. I. 100. *A. ericeus* Bull. t. 188. *A. conocephalus* Schum. *A. niveus* Scop. Schaeff. t. 232.

In ericetis et pratis muscosia, ubertim. Edulis.

3455. *A. pratensis* Pers., ascomatibus stipatis, pileo subcompacto convexo-expanso glabro, lamellis decurrentibus crassis, stipite farcto brevi, deorsum attenuato. — Fr. syst. I. 99. — *A. pratensis* Pers. syn. 304. *A. fulvus* Willd. *A. scoides* Bull. t. 587. *A. miniatus* Schaeff. t. 313. (pileo toto fulvo.) — *A. vitulinus* Pers. syn. 305. (lusus pileo rufescente, lamellis albis.) *A. claviformis* Schaeff. t. 307.

♂. *ericinus*, pileo tenuiore, margine striato. Fr. l. l. *A. turbinatus*, *Lacmus* Schum. *A. meisneriensis* Pers. *A. ericotessus* Bull. t. 461. (ceu var. ex colore flavente, coerulecente, cinereo et albo.)

In ericetis collinis minime raro. Auctumad.

3456. *A. nemoreus* Pers., pileo compacto glabro fulvo-rubescente, lamellis decurrentibus albis, stipite solidio longo, basi lanato. — Pers. syn. 305. Fr. syst. I. 99.

In nemoribus umbrosis Hercyn. infér. rarius. (Pers.)

♂. *dasyphylli*, pileis carnosis siccis glabris, lamellis confertis angustis sublineariis, utrinque aequaliter attenuatis, saepius longe decurrentibus s. acute adnatis, stipite farcto, in pileum diffuso. Fr. l. l.

† *heterocliti*, ascomatibus variis caespitosis.

3457. *A. oedematopus* Schaeff., ascomatibus subcaespitosis, pileo conico pulverulento rufo, lamellis decurrentibus stipiteque solido ventricoso pulverulentio

rufescens. — Schaeff. t. 259. Fr. syst. I. 96. *A. fusiformis* Bull. t. 76.

In nemoribus caeduis patruis rarissime. Vere.

3458. *A. adhaerens* A. et Schr., ascomatibus caespitosis adglutinatis, pileo inaequali lacunoso sordide pallente, lamellis tenuissimis lineatum longe decurrentibus albis, stipite cavo subradicato. — Alb. et Schw. nisk. 187. Fr. l. l.

Ad caudices abietinos patres Lusatiae. (A. et Schw.)

3459. *A. amplius* Pers., ascomatibus caespitosis, pileo convexo glabro nigrescenti-sulagineo, lamellis adnatis confertis aquoso-cinereis, stipite ampio glabro albo. — Pers. syn. 459. Fr. l. l.

In pinetis agri gotting. rarius. (Persoon.)

3460. *A. lignatilis* Pers., ascomatibus caespitosis, pileo irregulari subexcentrico villosulo albo, lamellis adnatis angustis confertis candidis, stipite farcto flexuoso, basi villoso. — Pers. syn. 368. ex emend. Fr. l. l.

In ligno fagineo^m putrido passim. Auctumno.

k. collybarii, pileis planiusculis, lamellis adnatis nec decurrentibus, stipite tenui. Fr. l. l.

3461. *A. cerussatus* Fr., pileo carnoso laevi albo inodoro, lamellis adnatis confertis, stipite solido laevi, basi tomentoso. — Fr. syst. I. 92., elench. I. 15. coque teste *A. cretacens* Pers. syn. nec Bull.

In pinetis muscosis passim. Auctumno.

3462. *A. candicans* Pers., ascomatibus minoribus albo-nitentibus, pileo laevi convexo, dein umbilicato, lamellis adnatis, dein subdecurrentibus, stipite fistuloso laevi. — Pers. syn. 456. Fr. syst. I. 91. Bolt. t. 17. *A. cyathiformis* Lumb. *A. umbilicatus* Bull. t. 411.

In fagetis et quergetis, auctumno inenunte passim.

3463. *A. tornatus* Fr., pileo regulari laevi albo inodoro, lamellis adnato-decurrentibus minus confertis,

stipite farcto aequali glabro concolore. — Fr. L. l. A. sapidus Pers. myc.

In nemoribus pinguioribus Thuring. passim.

3464. *A. odoratus* Bull., ascomatibus fragrantibus ex albo sordide virentibus, pileo laevi, lamellis adnato-decurrentibus subconfertis, stipite farcto inaequali glabro. — *Fr. syst. I. 90.* — *Bull. t. 176. 556. Humb. frib. 86. Pers. syn. 323. Flor. dan. t. 1611. A. aeruginosus Schum. (var. pileo viridi, lam. albis. — *A. anisatus* Pers. et auct. (var. *glaucoc-aeruginosa*.)*

In nemoribus umbrosis, quercetis et pinetis. Auct.

3465. *A. subalutaceus* Batsch, pileo laevi pallescente, lamellis adnatis subdistantibus albidis, stipite farcto elasticо pallido. — *Batsch f. 194. Fr. syst. I. 90.*

In nemoribus caeduis Thuring. rarius. Auctumno.

3466. *A. cerinus* Pers., pileo laevi opaco flavo-
cerino, lamellis adnatis confertis stipiteque farcto brevi
substriato laetius flaventibus. *Pers. syn. 321. Fr. L. l.*

β. vernicosus, pileo depresso splendente, lamellis stipiteque dilute flaventibus. *Fr. l. l. A. cerinus β. splen-
dens Alb. et Schw. nisk. 169.*

In pinetis editioribus muscoisis, rariis. Auctumno.

3467. *A. fumosus* Pers., pileo glabro fuligineo-
livido, lamellis adnatis confertis stipiteque farcto laevi
sordide albis. — *Pers. syn. 348. Fr. l. l.*

In pinetis, betuletis et quercetis. Auctumno.

3468. *A. bufo* Pers., pileo obsolete umbo-
nato rugoso stipiteque longo subtomentoso umbrinis sub-
nigrescentibus, lamellis pallide-alutaceis. — *Pers. syn.
359. Fr. l. l.*

In pinetis Hercyn. super. pr. Oderbrück. (Persoon.)

+++ *genuini, pilis compacto-carnosis convexis, dein
explanatis, lamellis ad stipitem validum decurrentibus.*
Fr. l. l. Esculenti.

3469. *A. amarus* Fr., ascomatibus compactis can-

didis, pileo planiusculo rimoso-rivuloso, disco rufo, lamellis leviter decurrentibus, stipite solido subtomentoso.
— Fr. syst. I. 87. *A. rivulosus* B. A. et Schw. 185.

In dumetis mixtis Lusatiae. (Alb. et Schweiniz.)

3470. *A. rivulosus* Pers., ascomatibus compactis, pileo convexo-plano ex albido subrufescente, demum rimoso-rivuloso, lamellis leviter decurrentibus confertis stipiteque subtomentoso albidis. Pers. syn. 369. Fr. I. L.

In pinetis Hercyn. super. pr. Clausthal. (Persoon.)

3471. *A. luscinus* Fr., ascomatibus minoribus, pileo convexo laevi livido, lamellis leviter decurrentibus pallidis, stipite solido farinoso albo. — Fr. syst. I. 87. *A. nimbatus* Batsch cont. I. f. 65.

In paucnis montosis rariis. Auctumno.

3472. *A. Schumacheri* Fr., pileo convexo-explanato obtuso subfuscō, margine albicante, lamellis decurrentibus confertis albīs, stipite farcto striato, basi incrassato. Fr. I. L. *A. fagineus* Schum. *A. pullus* Pers.

In nemoribus frondosis, fagineis potissimum. Auct.

3473. *A. nebularis* Batsch, pileo compacto laevi cinerascente, lamellis leviter decurrentibus confertis albidis, stipite farcto sursum attenuato. — Fr. I. L. Pers. syn. 349. Batsch cont. II. f. 193. *A. mollis* Bolt. t. 40. *A. pileolarius* Bull. t. 400.

In pinetis viciisque ericetis. Auctumno.

3474. *A. clavipes* Pers., pileo planiusculo laevi fuligineo-laevi, margine subalbicante, lamellis decurrentibus subdistantibus albīs, stipite solido molli conico. — Pers. syn. 353. *A.* et Schw. 177. Fr. syst. I. 86.

In quercetis et fagetis passim. Auctumno.

3475. *A. comitialis* Pers., pileo convexo-plano laesi stipiteque farcto conico fuligineis, lamellis decurrentibus confertis niveis. Pers. syn. 352. Fr. I. L.

In pratis montosis uliginosis, plerumque circinatis.

++++ *omphalarii*, pileis junioribus convexo-deflexis,
dein depressis s. infundibuliformibus, lamellis decurrentibus.
Fr. l. l.

3476. *A. splendens* Pers., pileo plano-depresso
glabro cristallino splendente, lamellis decurrentibus albis,
stipite solido deorsum villosso. *Pers. syn. 452. Fr. syst. I. 84.*

In fagetis patruis rarius. Auctumno.

3477. *A. phyllophilus* Pers., ascomatibus gregariis albis, pileo laevi umbilicato, dein infundibuliformi,
lamellis subdecurrentibus, stipite cavo, basi incurvo villoso. — *Pers. syn. 457. Fr. syst. I. 83.*

Inter folia faginea putris, nec non pinea. Auctumno.

3478. *A. squamulosus* Pers., pileo furfuraceo-squamuloso obtuso sordide-alutaceo, dein infundibuliformi,
lamellis decurrentibus albis, stipite farcto subbulboso. —
Pers. syn. 449. Fr. syst. I. 82.

In pinetis editioribus passim. Auctumno.

3479. *A. cervinus* Hoffm., pileo infundibuliformi,
obliquo obtuso laevi cervino, lamellis decurrentibus albis,
stipite farcto basi tuberoso tomentoso. — *Fr. l. l. Pers. syn. 451. Nees syst. f. 174. Hoffm. nomencl. 119. t. 2. f. 2.*

In nemoribus montosis Hercyn. (Hoffmann.)

3480. *A. gibbus* Pers., pileo umbonato glabro,
deum infundibuliformi, lamellis decurrentibus candidis,
stipite farcto elastico sursum attenuato. — *Pers. syn. 449. Fr. l. l., elench. I. 12. Alb. et Schw. 217. Flor. dan. t. 1012. A. maximus Fl. wett. A. giganteus auct. A. suavis Pers. myc. — Bull. t. 573. f. 2. (var. major.)*

In areis nemorensibus muscosis passim.

3481. *A. flacidus* Sow., pileo tenui infundibuliformi
obtuso laevi flaccido, lamellis decurrentibus albidis,
stipite farcto, basi incrassato villoso. — *Fr. syst. I. 81. Sowerb. t. 185. A. membranaceus Flor. dan. t. 1012. A. infundibuliformis Schaeff. t. 212. Bull. t. 286. 553.*

In pinetis et fagetis passim. Auctumno.

3482. *A. gilvus* Pers., pileo convexo obtuso magno, dein infundibuliformi laevi rigido, lamellis decurrentibus e pallido gilvio, stipite farcto subradicato, basi villoso. — Pers. syn. 448. Fr. syst. I. 80. Flor. dan. t. 1606. *A. cyathiformis* Flor. dan. t. 1011. *A. castaneus*, cordido-flavus With. *A. cinnamomeus* Bolt. t. 22. *A. subinvolvatus* Batsch cont. II. f. 204. *A. inversus* Scop.

In similibus cum praeced. locis, vulgaris. Auctumno.

3483. *A. giganteus* Leyss., pileo amplissimo albido, dein infundibuliformi laevi s. obsolete squamuoso, lamellis decurrentibus confertis dein rufescentibus, stipite solidi obeso. — Fr. I. I. Leyss. hal. 294. *A. maximus* Fl. wetterav. Alb. et Schw. nisk. 215.

In dumetis frondosis patruis rarius. Auctumno.

F. lactiflui, ascomatibus majusculis firmis succulento-carnosis, pileis plano-depressis umbilicatis, lamellis inaequalibus variis, frangendo laticem albidum lacteum stillantibus, stipite nudo aequali, in pileum diffuso. (*Ag. trib. VII. galorrhæus*. Fr. *A. lactiflui* Hoffm. Pers.)

† *piperati*, pileis siccis, margine nudis, lamellis immutabilibus, ascomatibus compactis acerrimis. Fr.

3484. *A. velleucus* Fr., pileo umbilicato tomentosq; albo rigido, lamellis angustis distantibus, lacte albo scatentibus, stipite solidi obeso. — Fr. syst. I. 76. *A. Listeri* Sow. t. 104. *A. pubescens* Schrad. (var. minor.)

β. *exsiccus*, pileo infundibuliformi adpresso-tomentoso, lamellis latis crispis pallescentibus exsiccis. — Fr. I. I. *A. piperati* var. Pers. syn. 429. *A. exsiccus* Otto.

In dumetis fagetorum; β. in pinetis rarius. Auctumno.

3485. *A. piperatus* Scop., pileo infundibuliformi rigido (praeter hypham tenuiter stipatam) glabro albo, lamellis angustissimis confertis, lacte parco stipiteque solidi curto obeso albis. — Fr. syst. I. 76. Scop. II. 449. Pers. syn. 429. Flor. dan. t. 1132. *A. amarus* Schaeff. t. 83. *A. acris* Bull. t. 200.

In nemoribus patruis passim. Edulis at acerrimus.

3486. *A. pargamenus* Sw., pileo planiusculo lento glabro albido, lamellis confertis, latice albo scatentibus, stipite farcto longiusculo saturatiore. — Fr. l. l. *A. urens* Schum. *A. piperatus* Batsch cont. I. f. 59.

In nemoribus frondosis passim. Auctumno.

3487. *A. violascens* Otto, pileo glabro cinereo, zonis fuligineis picto, lamellis stipiteque solido albis, latice viola debili tincto scatentibus. — Otto Ag. 34. Fr. l. l.

In pinetis Saxoniae. (Otto.) (Dulcis est.)

3488. *A. flexuosus* Pers., pileo repando compacto sicco glabro, lamellis distantibus pallidis, latice albo scatentibus, stipite solido brevi. — Fr. obs. I. 48., syst. L. l. *A. umbrinus* Pers. syn. 435. *A. Persoonii* Otto. *A. azonites* Bull. t. 559. — *A. zonarius* Bull. t. 104. *A. flexuosus* Pers. 430. (var. pileo incarnato-vitellino.)

In pinetis juxta semitas haud raro. Aestato.

3489. *A. pyrogalus* Bull., pileo sicco glabro subzonato livido, lamellis distantibus flavis, latice acerrimo scatentibus, stipite cavo cinerascente. — Fr. l. l. Pers. syn. 436. Bull. t. 529. f. 1. *A. rusticanus* Scop.

In nemoribus et pratis pinguioribus, rarius. Auct.

† subdulces, pileis siccis, margine nudis, lamellis confertis, junioribus albidis, dein lutescentibus & rufoscentibus. (*A. galorrhæi russulares* Fr.)

3490. *A. fuliginosus* Fr., pileo azono sicco umbrino, fuligine fusca consperso, lamellis dein ochraceis, latice albo-crocato scatentibus, stipite fragili laevi, fuligineo, intus albo. — Fr. syst. I. 73. *A. plinthogolus* Otto. *A. azonites* Bull. t. 567.

In nemoribus umbrosis nec non in pinetis raria.

3491. *A. plumbeus* Bull., pileo sicco azono nigro-fusco fuliginoso e convexo-depresso perlato, lamellis flavescientibus, latice albo scatentibus. — Fr. l. l. Pers. syn. 435. Bull. t. 435. *A. nigrescens* Pers. l. l.

In pinetis Hercya. super. v. c. passim. Auctumno.

3492. *A. ruber* Pers., pileo depresso ochraceo-rubro convexo rigido majusculo, lamellis flavescentibus, stipite crassiusculo praeter basin albicanem ferrugineo-rubro. — Pers. syn. 433. excl. syn. ?*A. helvus* Fr. I. L.

In pinetis Hercyn. super. passim. Aestate.

3493. *A. rufus* Scop., pileo umbonato sicco polito badio-rubro acerrimo, lamellis rufescentibus, latice albo scatentibus, stipite farcto. — Fr. I. I. Scop. corn. II. 451. *A. rubescens* Schrad. *A. ruber* Sw.

In pinetis patruis passim. Aestate.

3494. *A. tithymalinus* Scop., pileo sicco glabro obsolete zonato acri pallide-luteo, lamellis incarnato-pallidis, latice lacteo scatentibus, stipite solido. — Fr. I. I. *A. testaceus* Pers. syn. 431. pr. pr. *A. ichoratus* Batsch cont. I. f. 60.

In nemoribus arenosis rarius. Auctumno.

3495. *A. thejogalus* Bull., pileo acri sicco glabro subzonato rufo-fulvo convexo, dein depresso, latice flavo scacente, stipite solido. — Fr. syst. I. 71. Pers. syn. 431. Bull. t. 567. f. 2.

In nemoribus passim. Auctumno. (Venenatus.)

3496. *A. sub dulcis* Pers., pileo glabro polito sicco rufescente, lamellis incarnatis, dein ferrugineis, latice albo scatentibus, stipite dein calvo glabro. — Fr. I. I. Pers. syn. 433. cum var. a. - d. *A. rufo-flavidus* Otto. (var. colore carneo-flavo.) *A. dulcis* Bull. t. 324. *A. Bulbardi* Fl. dan. t. 1069. *A. lactifluus* Bolt. t. 3. *A. rubescens* Schaeff. t. 73.

In quercketis minime raro. Auctumno.

3497. *A. quietus* Fr., pileo obtuso laevi sicco opaco, lamellis testaceo-rufescentibus, stipite solido firmo rufescente. — Fr. syst. I. 69. *A. rubescens* Flor. dan. t. 1069. *A. testaceus* Scop. *A. lactescens* L.

In nemoribus patruis satis raro. Auctumno.

3498. *A. mitissimus* Fr., pileo papillato sicco laevi aurantiaco dulci, lamellis dilutioribus, laticem album

stillantibus, stipite cavo longo. — Fr. L. l. *A. testaceus*
β. Pers. syn. A. sororius Otto.

In nemoribus patruis aequae ac pinetis passim.

3499. *A. volemus* Fr., pileo obtuso sicco laevi
 magno nitido fulvo pallente, lamellis albo-lutescentibus,
 fractis sordide fuscescentibus, stipite solido obeso. — Fr.
 L. l. *A. testaceus* A. et Schw. 209. *A. ruber* Trattin.

In similibus cum praeced. locis. Auctumno.

+++ deliciosi, pileis glabris, viscosis, margine nudis.
 Fr. L. l. (*A. galorrhæi limacini* Fr.)

3500. *A. aurantiacus* Fr., pileo subviscoso azono
 aurantiaco, lamellis confertis lutescentibus angustis, la-
 tice albo scatentibus, stipite elongato laevi. — Fr. syst.
 I. 68. *A. rufus* Schum. *A. testacei v. aurant.* Pers. L. l.
A. hybridus Scop.

In nemoribus muscosis passim. Auctumno.

3501. *A. deliciosus* L., pileo viscoso obsolete zo-
 nato aurantio-expallente, lamellis laticeque aurantiacis, fra-
 ctis virentibus, stipite cavo glabro scrupulato. — Fr. L. l.
 Schaeff. t. 11. Flor. dan. t. 1131. *A. zonarius* Bolt. t. 141.

In pinetis satis vulgaris. Auctumno.

3502. *A. pallidus* Pers., pileo viscoso laevi azono
 stipiteque brevi cavo firme pallidis, lamellis laticeque
 albidis. — Pers. syn. 431. Fr. L. l.

In fagetis haud quidem raro.

3503. *A. blennius* Fr., pileo viscoso subguttato
 azono virescente, lamellis laticeque albis. — Fr. L. l. *A.*
curtipes et *affinis* Schum. *A. xylophilus* β. *viscosus* Pers.
 syn. 438. *A. viridis* Schrad. spic. 123.

In fagetis patruis passim. Auctumno udo.

3504. *A. victus* Fr., pileo tenui laevi subviscoso
 azono livido expallente, lamellis laticeque albidis, stipite
 subcavo fragili. — Fr. syst. I. 66.

In lucis umbrosis Thuring. passim. Auctumno.

3505. *A. uvidus* Fr., pileo viscoso azono incar-

nato-livido s. fuscescente, lamellis albis, latice albo-lilacinio scatentibus, stipite fragili aequali cavo. — *Fr. l. l.*
A. livido-rubescens Batsch.

In nemoribus udis rarius. Auctummo.

3506. *A. acris* Bolt., pileo viscoso azono cinereo-fuligineo, lamellis flavis, latice albo-rubente acerrimo scatentibus, stipite farcto brevi pallido. — *Fr. l. l.* Pers. syn. 437. Bolt. t. 60. *A. deliciosa* var. *Batesii* cont. I. f. 68. *A. pudibundus* Scop.

In nemoribus caeduis frequens. Auctummo.

3507. *A. luridus* Pers., pileo viscoso zonato larido planiusculo, lamellis albis, latice primum concolore, mox rubescente scatentibus, stipite cavo pallido. — Pers. syn. 436. *Fr. l. l.* *A. zonarius* With. *A. fuscus* Schaeff. t. 235.

In ericetis graminosis editioribus. Auctummo.

††† terminosi, pileorum margine involuto tomentoso. — Acres, venenati.

3508. *A. Necator* Bull., pileo glabro zonato olivaceo-umbriño plano-disciformi, margine villosi, lamellis ex albo lutescentibus, stipite farcto brevi. — *Fr. l. l.* Pers. syn. 435. Bull. t. 14. *A. plumbeus* Schum.

In nemoribus caeduis passim. Auctummo.

3509. *A. crampylus* Otto, pileo viscoso subzonato rugoso-tomentoso fuligineo-rubro, lamellis flavis, stipite solido cinereo. — Otto Agar. 53. *Fr. syst. l.* 63.

In pinetis Saxoniae. (Otto.)

3510. *A. cilicioidea* Fr., pileo tomentoso sordide incarnato, lamellis flavescensibus, stipite subcavo. — *Fr. l. l.* *A. tomentosus* Otto l. l.

In iisdem cum praec. locis.

3511. *A. turminosus* Schaeff., pileo carnosulo, primum umbilicato-depresso umbonato tegmine delicato stupposo stipato lateritio-rubente, ad marginem reversum obtusissimum in steppam tortuosam albida soluto tecta, dein deplanato dispanso-vittato undique recutito, intus,

lamellis basi forcatis laticeque albīs, stipite cavo laevi. — Fr. l. l. Pers. syn. 430. Flor. dan. t. 1068. Schaeff. t. 12. *A. necator* Bull. t. 529. *A. pseudonymus* Schrank.

In ericetis et betuletis vulgaris. Auctumno.

3512. *A. scrobiculatus* Scop., pileo perlato adglutinato-villoso viscoso azono flavo, dein rigido, margine barbato, lamellis albīs, primum latice concolore, dein sulfureo scatentibus, stipite cavo maculato. Fr. l. l. Schaeff. t. 227. 228. *A. crinitus* ejusd. *A. torminosus* Vill. *A. luteus* Alb. et Schw. nisk. 208. *A. intermedius* Fr. obs. *A. favolarius* Otto.

In pinetis muscosis roridis passim. Auctumno.

3513. *A. controversus* Pers., pileo planiusculo albo villoso, maculis zonisque sanguineis variegato, margine tomentoso, lamellis tenuibus consertis pallidis s. incarnatis, stipite solidō. — Pers. syn. 430. Fr. l. l. *A. sanguineus* Batsch cont. H. f. 201. *A. ocris* Bull. t. 538.

In fagetiis Hercyn. inferior. rarius. Auctumno.

G. integrī, ascomatibus majusculis stipatis, pilis junioribus campanulatis, dein hemisphaericis, mox planis centroque depresso nudis glabris, lamellis exsiccatis crassiusculis inaequalibus saepiusque furcatis cum pileo satie regularibus, albīs s. pallentibus, stipite aequali laevi utplurimum glabro, intus spongioso. (Agar. trib. VI. Russula Fr. Pers. Nees. *A. integrī* L.)

3514. *A. adustus* Pers., pileo depresso cinereo s. olivaceo, dein sub diu exarescente versicolore veluti adusto-nigrescente, margine laevi, lamellis inaequalibus latissimis crassis subfurcatis distantibus albīs sensim cinerascentibus, stipite solidō obeso. — Pers. syn. 459. Fr. syst. I. 60. *A. nigricans* Bull. t. 212. 370. *Ditmar. l. l. t. 26.* (decrepitus.)

In nemoribus nostris abundat diuque post vitam superstes, exaridus, rigens et veluti adustus ater oculos allicit aliosque fungos (*Myriothecium iundatum* v. c. et *Asterophoram agaricoiden*) nutrit. Aestate.

3515. *A. furcatus* Pers., pileo planiusculo, dein insundibuliformi viridulo, margine laevi, lamellis furcatis candidis. — Pers. syn. 446. Fr. l. l.

B. heterophyllus, pileo plano-depresso, dein rimoso-rugoso, lamellis furcatis dimidiatisque candidis latescentibus, opere venoso connexis. — Fr. l. l. *A. lacteus* Pers. Alb. et Schw. Bull. t. 509. (ceu var. pileo albido.) — *A. virescens* Pers. *A. aeruginosus* Schum. (var. pileo sordide virescente.) — *A. lividus* Pers. *A. livescens* Batsch f. 67. (var. pileo livido.)

In nemoribus caeduis ubertim. Auctumno.

3516. *A. foetens* Pers., pileo convexo-depresso viscoso flavo olido, margine tuberculato sulcato, lamellis connexis stipiteque cavo albis. — Pers. syn. 443. Fr. l. l. *A. fastidiosus* Pers. olim. *A. piperatus* Bull. t. 292.

In nemoribus umbrosis vulgaris. Aestate.

3517. *A. ruber* DC., pileo roseo-sanguineo acerrimo, margine laevi, lamellis furcatis candidis confertis. — Fr. syet. l. 58. *A. sanguinarius* Bull. t. 42. *A. sylvaticus* Lam.

In nemoribus caeduis, Thuring. v. c. passim. Aest.

3518. *A. hirtus* W., pileo depresso livido-fusco lamellisque distinctis aequalibus tenacibus albis glabris, stipite brevi obeso farcto, pilis albis tortuosis densis hirto.

Ad caudices juglandinos caesos Thuring. Hyeme.

3519. *A. depallens* Pers., pileo difformi opaco sordide rubroque fuscescente, margine dein striato, lamellis distinctis albidis, stipite demum cinerascente. — Pers. syn. 440. pr. pr. Fr. l. l.

In ericetis editioribus passim. Aestate.

3520. *A. fragilis* Pers., pileo subirregulari s. undulato difformi parvo tenui ex albo-purpurascente, margine sulcato, lamellis latis simplicibus candidis. — Fr. l. l. *A. niveus* Pers. (var. pileo albo.) — *A. ochroleuci* var. Alb. et Schw. (var. pileo flavo-viridi.) — *A. fragilis* Pers. (pileo rubro s. purpurascente.)

In nemoribus patrais minus frequenter. Auctumno.

3521. *A. emeticus* Schaeff., pileo compacto, juvōre campanulato, e flavo-alboque rubescente, dein deplanato magno sensim exalbicante margineque sulcato, lamellis latis subaequalibus candidis — *Fr. l. l.* — *A. emeticus* Schaeff. t. 15. *Flor. dan.* t. 1009. *A. sanguineus* Batsch f. 13. Pers. syn. 445. (var. pileo roseo, rubro, sanguineo.) — *A. cyanoxanthus* Schaeff. t. 93. Pers. l. l. (var. pileo livido, caecios. coeruleo.) — *A. vivescens* Schaeff. t. 94. *A. luridus* Pers. (var. pileo vi-ridi, olivaceo, fusco.) — *A. ochroleucus* Pers. *A. Georgii* L. Bull. t. 509. (var. pileo flavo.)

In nemoribus patruis ubertim. Auctumno.

3522. *A. nitidus* Pers., pileo tenui depresso-pla-nuscule e rufo-purpurascente, margine sulcato, lamel-lis latis subdistantibus aequalibus flavis, stipite forcito albo-flavente. — *Fr. syst. I.* 55. *A. nitidus et purpureo-fulgineus* Pers. *A. purpureus* Schaeff. t. 254. (var. pileo purpurascente, rufo.) *A. nauseosus* Pers. (var. pileo sub-olivaceo.) — *A. vitellinus* Pers. *A. ringallenus* Batsch (var. pileo luteo, subincarnato.)

In nemoribus caeduis minime raro. Auctumno.

3523. *A. luteus* Huds., pileo plano-depresso sub-viscoso flavo, margine laevi, lamellis angustis confertis aequalibus vitellinis, stipite cavo albo. — *Fr. l. l.* Pers. syn. 442. *A. leucothejus* Fr. obs. *A. inanis* Scop.

In fagetis passim. Aestate excuento.

3524. *A. alutaceus* Pers., pileo subcompacto viscidulo versicolore, margine demum subtuberculato sul-cato, lamellis latis aequalibus confertis alutaceis. *Fr. l. l.* — *A. campanulatus et alutaceus* Pers. syn. 440. Schaeff. t. 16. f. 6. Bull. t. 509. (var. pileo rubro.) — *A. gry-sens* Pers. (var. gryeo-purpurascente.) — *A. coeruleus* Pers. (pileo coeruleo.) — *A. olivaceus* Schaeff. t. 264. Pers. l. l. (var. pileo olivaceo.) — *A. ochraceus* Pers. (var. pileo vitellino.)

In nemoribus caeduis minime raro. Auctumno.

3525. *A. caseosus* IV., pileo compacto carnosus albo, tegmine caseoso dein dispanso-areolato gryaeo-vividulo tecto, demum plano-depresso, margine plano estriato saepius radiatim fisso, lamellis latis crassissimis coriaceis pallentibus, aliis simplicibus, aliis sinuoso-furcatis dae-daleiformibus.

In betuletis agri northus. Auctumno.

H. tricholomatici, ascomatibus majoribus, pileis carnosis compactis hemisphaericis, dein explanatis, lamellis exsuccis inaequalibus, velo fugacissimo fibrilloso s. floccoso. (Agar. trib. V. Tricholoma Fr.)

† personati, pileis siccis glaberrimis, margine tenui inflexo flocculoso-pruinosis Fr.

3526. *A. albus* Schaeff., pileo aequali glabro albo immaculato, lamellis rotundatis confertis, stipite farcto elasticо glabro. — Fr. syst. I. 53. Schaeff. t. 256.

In quercelis lutosis rarius. Auctumno.

3527. *A. nudus* Bull., pileo tenui glabro lilacino-rufescente plano-depresso, lamellis rotundatis dilute violaceis, stipite solidо aequali nudo. — Fr. I. l. Pers. syn. 277. Bull. t. 439. *A. quadrifarius* Schum.

In pomariis nemorumque oris passim. Auctumno.

3528. *A. humilis* Pers., pileo planinsculo molli fuscescente, lamellis rotundatis albis, stipite farcto brevi aequali pulverulento-villoso. — Fr. syst. I. 51. Pers. syn. 560.

In promontoriis graminosis pratisque passim.

3529. *A. personatus* Fr., pileo subcompacto glabro livido-violaceo, margine villoso-pruinoso, lamellis rotundatis liberis stipiteque solidо subbulboso villoso subviolaceis. — Fr. I. l. *A. bicolor* Pers. syn. 281. *A. violaceus* Scholl. Vill. Flor. dan. t. 1133. *A. bulbosus* Huds. Bolt. t. 147.

In nemoribus hortisque graminosis rarius. Auctumno.

3530. *A. dasypus* Pers., ascomatibus subcaespitosis, pileo compacto glabro convexo murino, lamellis

emarginatis stipiteque solido tomentoso candidis. — Pers.
syn. 348. Fr. l. l.

Ad truncos querinos Hercyn. inferior. passim.

3531. *A. molybdinus* Fr., ascomatibus subcaespitosis maximis, pileo subumbonato glabro fusco-aeneo, lamellis rotundatis latissimis stipiteque solido, apice squamoso gryeo-pallidia. — Fr. syst. I. 49. *A. molybdocaphalus* Bull. t. 523. *A. aeneus* Pers. syn. 302.

In pinetis agri halens. (Sprengel.)

†† *spurii*, pileis siccis laevibus glaberrimis, saepe virgatis s. fibrillosis, margine nudis, stipite solido glabro striato. Fr. l. l.

3532. *A. multicolor* Pers., pileo plano-convexo laevi fuligineo-cinereo, lamellis rotundatis pallidis, stipite solido subbulboso candido. — Pers. syn. 350. Fr. l. l.

In nemoribus Hercyn. inferior. (Persoon.)

3533. *A. tumidus* Pers., pileo obtuso laevi sicco cinereo, lamellis emarginatis latis stipiteque solido tumido striato candidis. — Pers. et Fr. l. l.

In nemoribus arenosis rarissime.

3534. *A. virgatus* Fr., pileo umbonato sicco gryeo nigro-virgato, lamellis emarginatis latis canis, stipite solido striato albido. — Fr. l. l. *A. Friesii* Jungh. *A. astro-cinerei* var. Alb. et Schw. nissk. 175.

In ericetis sabulosis rarius. Auctumno.

3535. *A. leucanthus* Pers., pileo subumbonato sicco amoene flavo, pilis nigris virgato, lamellis emarginatis latis stipiteque solido candidis. — Pers. syn. 319. *A. sejunctus* Fr. syst. I. 47. *A. candidus* Schaeff. t. 225.

In ericetis siccis arenosis. Auctumno.

3536. *A. graveolens* Pers., pileo crasso subhemisphaericō glabro fuligineo-cinereo, lamellis emarginatis confertis sordide albis, stipite solido rivuloso. — Pers. syn. 361. Fr. syst. I. 45.

In promontorii graminosis rarius. Auctumno.

+++ genuini, pileis siccis squamosis, margine junctore involuto tomentoso s. villoso. Fr. l. l.

3537. *A. Columbetta* Fr., pileo irregulari convexo-explanato flexuoso candido, demum saepe rimoso-squamoso, lamellis emarginatis confertis, stipite solido obeso glabro. — Fr. l. l. *A. albus* Pers. syn. 363. excl. synonym. *A. leucocephalus* Bull. t. 428. 536.

In campis arenosis inter gramine passim. Edulis.

3538. *A. Myomyces* Pers., pileo sicco glabro olido firmo subsquamuloso fusco-livido, lamellis emarginatis subdistantibus albidi, stipite solido inaequali. — *A. saponaceus* Fr. in Schlechtd. Linn. 1830. p. 721. Fr. syst. I. 44. Pers. syn. 345. *A. fusiformis* Schum. *A. madreporeus* Batsch cont. 2. f. 203. *A. lividus* Huds. *A. frumentaceus* Bull. t. 371. *A. atrovirens* Pers. l. l. (var. pileo atro-virente.)

In fagetis et pinetis minime raro. Auctumno. (Variat: lamellis luteis (*A. albo-umbinus* Schum. *A. luridus* Schaeff. t. 40. Pers. syn. 321.)

3539. *A. terreus* Schaeff., pileo leviter carnosu e conico expanso acute umbonato sicco fibrilloso-squamoso, lamellis adnexis confertis, stipite solido aequali. — Fr. in Schlechtd. Linn. l. l. *A. nigro-marginatus* Lasch. — Schaeff. t. 64. *A. argyraceus* Bull.

In nemoribus caeduis rarius. Auctumno.

3540. *A. vaccinus* Schaeff., pileo umbonato rufo, epidermide in squamas pilosas lacera, margine tomentoso, lamellis adhæsis albido-rutilis, stipite cavo fibrilloso. — Fr. syst. I. 42. Pers. syn. 293. Schaeff. t. 25. *A. rufus* Pers. icon. t. 4. f. 4. *A. impuber* Batsch cont. I. f. 116.

In pinetis montosis Hercyn. super. passim.

3541. *A. rutilans* Schaeff., pileo obtuso sicco lavo, villo squamuloso rubello tecto, lamellis rotundatis confertis Inteis, stipite subsarcato variegato. — Fr. l. l.

Pers. syn. 326. *Schaeff.* t. 219. *A. variegatus* *Schum.*
A. terampelinus *Sowerb.* t. 31.

In sylvis caeduis ad truncos rarius. Auctumno.

3542. *A. flavo-virens* *Pers.*, pileo obtuso compacto flexuoso subsquamoso flavo-rufescente, lamellis emarginatis confertis stipiteque solido squamuoso sulfureis. — *Pers.* syn. 319. *Fr.* l. l. *A. aureus* *Schaeff.* t. 41.
A. equestris *L.*

In pinetis siccis arenosis rarius. Auctumno.

3543. *A. luteo-virens* *A.* et *Schw.*, pileo compacto flexuoso pulverulento lutescenti-viridi, lamellis rotundatis pallidis, stipite solido brevi squamuoso albo. — *Fr. syst.* l. 41. *Alb.* et *Schw.* nisk. 168.

In pinetis siccis Lusatiae super. (*Alb.* et *Schw.*)

++++ viscidali, pileis carnosis obtusis, humidis viscosis, margine involuto pubescentibus, stipite vestito, a pileo subdiscreto. *Fr.* l. l.

3544. *A. luridus* *Schaeff.*, pileo flexuoso glabro et viridi-subcinereo, lamellis emarginatis angustis interscentibus, stipite solido squamuoso pallescente. — *Pers.* syn. 321. *Fr. syst.* l. 40. *Schaeff.* t. 69.

In pinetis nemoribusque mixtis passim. Auctumno.

3545. *A. granulatus* *Schaeff.*, pileo granulato-squamoso cinereo-livido, disco umbrino, lamellis adfixis distantibus lacteis, stipite farcto aequali fibrilloso. — *A. micularius* *Fr. syst.* l. 39. *A. granulatus* *Schaeff.* t. 21,

In quercetis patruis satis raro. Auctumno.

3546. *A. prasinus* *Schaeff.*, pileo squamuoso viscido luteo-viridi, lamellis liberis luteis, stipite solido crasso tuberoso. — *Fr. syst.* l. 36. *Schaeff.* t. 218.

In pratis muscosis rarius. Aestate.

3547. *A. aurantius* *Schaeff.*, pileo squamuoso viscoso flavo-aurantio, lamellis adnexis candidis, stipite solido aurantio-squamoso. — *Schaeff.* t. 37. *Pers.* syn. 292. *Fr.* l. l.

In pinetis muscosis, auctumno sero rarius.

3548. *A. Russula Schaeff.*, pileo subdepresso viscoso granulato stipiteque solido aequali, apice squamuoso roseis, lamellis subliberis candidis. *Fr. I. I.* — *A. Russula Schaeff. t. 58. Pers. syn. 338. (var. stipite brevi.) A. roséus Schaeff. t. 75. (stipite longo.)*

In nemoribus caednis rarius. Auctumno.

3549. *A. ustalis Fr.*, pileo laevi viscoso badio-rubro, lamellis emarginatis albis, stipite farcto aequali fibrilloso. — *Fr. syst. I. 37. A. leucophyllus A. et Schw. nisk. 163. A. permutteratus Otto Agar. 84.*

In betuletis et fagetis rarius. Auctumno.

3550. *A. fulvus Bull.*, pileo viscoso virgato rufosulvo discoideo, lamellis adnexis flavis, stipite cavo aequali fibrilloso. — *Fr. syst. I. 37. Bull. t. 555. f. 2. A. flavobrunneus Fr. obs. A. trichop. var. Alb. et Schw. 163. A. incertus Schaeff. t. 63.*

In dumetis-humidis passim. Auctumno.

3551. *A. albo-brunneus Pers.*, pileo laevi viscoso convexo-plano umbrino, lamellis adnexis albis, stipite farcto glabro, apice squamuoso. — *Pers. syn. 293. Fr. syst. I. 37. A. striatus Schaeff. t. 38. A. glutinosus Bull. t. 258. 539.*

In pinetis umbrosis rarius. Auctumno.

I. limacini; pileis carnosis converis explanatis veleque tenui viscosis, lamellis adnato-decurrentibus, stipite firmo aequali squamuoso s. maculato. (*Agar. trib. IV. Lamacium Fr.*)

3552. *A. hypothecius Fr.*, pileo obtuso laevi flavido, glutine olivaceo oblitito, lamellis distinctis stipiteque submaculato flavis. — *Fr. syst. I. 35. A. vitellicolor Pers. myc. A. vitellinus A. et Schw. nisk. 179. t. 10. f. 3.*

In pinetis vicinisque ericetis gregatim, Auctumno.

3553. *A. olivaceo-albus Fr.*, pileo umbonato glabro olivaceo-fusco, lamellis connexis candidis, stipite

solido fusco-maculato. — *Fr. l. l. A. striatus* Schum.
A. limacinus Schaeff. t. 312. *Pers. myc.*; var. β . *A. et Schw.*
 In pinetis ventosis rarius. Auctumno ineunte.

3554. *A. tephroleucus* Pers., pileo subcarnoso
 convexo-plano squamuoso livido subcinereo, lamellis pla-
 nis subdecurrentibus distinctis niveis, stipite longo solido
 albo tenui nigro-squamoso. — *Pers. syn.* 351. *Fr. l. l.*
A. discors Batsch cont. II. 196.

In pinetis umbrosis Hercyn. super. (Persoon.)

3555. *A. pustulatus* Pers., pileo carnoso sub-
 flexuoso viscoso cinereo-livido, papillis discoideis albido-
 obsito, stipite tenui albo squamuoso. — *Pers. syn.* 354.
 cum var. β . *y.* *Fr. syst.* I. 34. *A. agathosmus* Fr. obs.
 In pinetis hercynicis minime raro. Auctumno.

3556. *A. purpurascens* A. et Schw., pileo sub-
 siccо squamuoso albo, disco purpurascente, margine pri-
 mum involuto villoso, stipite squamuoso aequali. — *Alb.*
 et Schw. nissk. 182. *Fr. syst.* I. 34.

In pinetis Lusatiae super. (Alb. et Schweinitz.)

3557. *A. discoideus* Pers., pileo laevi albo-fla-
 vente discoideo, lamellis tenuibus, stipite farcto albo-
 squamuoso. — *Pers. syn.* 365. *Fr. l. l.*

In campis ubietinis editioribus. (Persoon.)

3558. *A. eburneus* Bull., pileo candido laevi ni-
 tido, lamellis latia distantibus, stipite farcto albo-squa-
 muoso. *Fr. l. l.* — *Bull. t.* 118. 551. *Pers. syn.* 364.
A. virgineus Batsch f. 12. *A. nitens* Sowerb. t. 71. *A.*
lacteus Schaeff. t. 39. — *A. discoxanthus* Fr. obs. *A.*
elongatus Schum. (var. *disco flavente*, *stipite longo*.)

In nemoribus frondosis et acerosis passim.

3559. *A. erubescens* Fr., pileo laevi albo-rube-
 scente, margine involuto tormentoso, lamellis strictis, sti-
 pite sursum incrassato squamuoso. — *Fr. l. l.* *A. ru-
 bescens* Pers. syn. 366.

In fageticis nemoribusque graminosis passim.

3560. *A. chrysodon* Batsch, pileo laevi albido sahdepresso, margine stipiteque apice flavo-floccosis, lamellis crispis nonnisi floccosis. — Fr. l. l. Pers. syn. 365. Batsch cont. II. f. 212.

In fagitorum dumetis umbrosis passim.

K. armillares, pileis carnosis convexis, dein expansis obtusis, epidermide continua tectis, stipite solidi, velo simplici annuliformi, stipiti innato primumque cum pileo nero. (*Agar. trib. III. Armillaria* Fr.)

3561. *A. melleus* Vahl, ascomatibus caespitosis, pileo sordide luteo, squamis pilosis nigricantibus echinato, lamellis adnato-decurrentibus distantibus, stipite fibrilloso, annulo tumido patulo. — Fr. syst. I. 30. Vahl flor. dan. t. 1013. *A. Polymyces* Pers. syn. 269. *A. pistillaris et occultans* Batsch. *A. cumulatus* Willd. *A. fusco-pallidus* Bolt. t. 136. *A. annularius* Bull. t. 377. 540. *A. obscurus* Schaeff. t. 74. *A. putridus* Scop.

Ad arborum truncos putres haud raro. Auctumno.

3562. *A. denigratus* Pers., ascomatibus caespitosis, pileo campanulato nigrescente-umbrino, maculis latiusculis saturationibus tecto, stipite tenui subincarve, annulo subfugaci. — Pers. syn. 267. Fr. l. l.

Ad arborum truncos putres rarios. Auctumno.

3563. *A. mucidus* Schrad., ascomatibus subcaespitosis, pileo tenui glutinoso, lamellis adnexis distantibus, stipite bulboso, annulo reflexo iterumque erecto sulcato. Fr. l. l. — Schrad. spic. 116. Pers. *A. chrysospermus, venosus, splendens* Schum. *A. nitidus et splendens* Flor. dan. t. 773. 1130. *A. valens* Scop.

Ad truncos fagineos putridos vulgaris. Auctumno.

3564. *A. bulbiger* A. et Schw., pileo sicco glabro, lamellis emarginato-adnexis, stipite marginato-bulbose rufo-fibrilloso, annulo depauperato. — Fr. l. l. Alb. et Schw. nissk. 150.

Inter folia et muscos pinetorum Lusatiae.

3565. *A. anginaceus* Jungk., pileo carnoso con-

vexo glabro obscure nebuloso, lamellis distantibus arcuatis adnato-decurrentibus, stipite aequali solido albolutecente inflato tomentoso. — Jungh. in Schleid. Linn. 1830. p. 395. t. VI. f. 1.

In pinetis Hercya. inferior. (Junghuhn.)

3566. *A. guttatus* Pers., pileo sicco compacto glabro, lamellis liberis pallidis, stipite elongato subbulboso, annulo supero gattato. — Fr. l. l. Pers. 265.

In pinetis montosis Hercyn. (Persoon.)

3567. *A. robustus* A. et Schw., pileo hemisphaerico robro-badio, margine fibrilloso, lamellis liberis albo-pallentibus, stipite curto fibrilloso sursum incrassato, annulo floccoso. — Alb. et Schw. nisk. 147. Fr. l. l.

In pinetis roridis Lusatiae super. (A. et Schw.)

L. lepiotae, pileis carnis, junioribus ovatis, mox campanulatis, dein expansis umbonatis, epidermide e velo formata tectis, lamellis inaequalibus confertis, stipite cavo, intus floccoso, velo universali simplici, cum epidermide pilei contiguo, rupto dein annulum inferum, nonnisi fugacem relinquente. (Ag. trib. II. Lepiota Fr. Pers.)

3568. *A. ramentaceus* Bull., pileo albido, disco squamulisque nigrescentibus, lamellis subadnexis, stipite farcto aequali, infra annulum erectum squamuoso. — Fr. syst. I. 25. Bull. t. 595. *A. ambiguus* Lasch.

In promontoriis graminosis Thuring. rarius.

3569. *A. granulosus* Pers., pileo furfuraceo-granuloso lutescente, lamellis adfisis, stipite subcavo, infra annulum patulum squamoso. — Fr. syst. I. 24. — *A. fimbriatus* Schum. *A. spinulosus* Lumn. *A. muricatus* Flor. dan. t. 1015. *A. crocus* Bolt. *A. flavo-floccosus* Batsch f. 97. *A. ochraceus* Bull. t. 352. 530. (var. pileo luteo); — Batsch f. 24. (var. pileo ferrugineo.) — *A. Carcharias* Pers. *A. albo-marginatus* Schum. (var. pileo incarnato.)

In pinetis ericetisque vulgaris. Autumno.

3570. *A. mesomorphus* Bull., pileo sicco laevi,

lamellis liberis, stipite glabro, annulo erecto. — *Fr. L. L.*
Pers. syn. 262. Nees syst. f. 169. Bull. t. 506.

In hortis graminosis agri berol. (Ehrenberg.)

3571. *A. sudans* *W.*, ascomatibus fasciculatis, pileo glutine nitido obliuio humecto laevi cinereo-livido, primum umbonato, margine inflexo parce striato, dein explanato, lamellis inaequalibus latis subliberis cygneis, stipite e basi bulbosa attenuata laevi, supra cortinum sursum flexam, extus limbo nigro-fusco vittatam sulcato-angulato.

Ad truncos fagineos nuper caesos Thuring. Auct.

3572. *A. delicatus* *Fr.*, pileo viscoso laevi, lamellis liberis, stipite e velo fugaci floccoso. — *Fr. L. L.*
A. mesomorphus *ß. Alb. et Schw. nisk. 146.*

In pinetis roridis Lusatiae super. (Alb. et Schw.)

3573. *A. cristatus* *Bolt.*, pileo albido graveolente, epidermide in squamulas secedeunte tecto, lamellis remotis, stipite laevi, annulo fugaci. — *Fr. L. L. Bolt. t. 7.*
A. colubrinus *γ. Pers.* *A. concentricus* *Pers.* (var. *absque annulo.*) *A. conspurcatus* *Willd.* *A. subantiquatus* *Batesch. cont. II. f. 265.*

In promontoriis gramibiosis rarius. Auctumno.

3574. *A. clypeolarius* *Bull.*, pileo umbonato albido, epidermide in squamas rupta tecto, lamellis approximatis, stipite floccoso squamoso, annulo fugaci. — *Fr. syst. I. 21. Bull. t. 405. 506.* *A. colubrinus* *Pers. syn. 258.* *A. obscurus* *Vill.* *A. felinus* *Pers.* (var. *umbone squamisque nigrescentibus.*)

In fagetis umbrosis passim. Aestate pluvia.

3575. *A. excoriatus* *Schaeff.*, pileo obtuse-umbonato, dein plano, epidermide continua s. in squamulas tenerrimas soluta tecto, lamellis remotis, stipite stricto aequali, annulo mobili. — *Fr. L. L. Schaeff. t. 18. 19.* (*L. pilci epidermide in squamas secedente.*)

In pomariis et versuris passim. Aestate.

3576. *A. procerus* Scop., pileo umbonato, epidermide in squamas secedente tecto, lamellis remotis, stipite cylindrico elato squamuoso, in basin bulbosam intumescente, annulo mobili. Fr. l. l. — Schaeff. t. 22. 23. Flor. dan. t. 772. Pers. syn. 257. *A. colubrinus* Bull. t. 78. 583. *A. antiquatus* Batsch pr. pr. *A. squamosus* Vill.

In pratis collinis siccioribus hortisque graminosis haud raro. Auctummo. (Variat absque annulo: *A. extinctorius* L.)

M. volvati, pileis campanulato-planis verrucosis, stipite basi incrassato, velo duplice, alio universali volvato, a pileo discreto, fungum juniores ovatum totum involueri instar amboinico, dein stipite assurgente rupto ejusque basin a. pilei marginem muniente, alio partiali annulato supero membranaceo reflexo. (Agar. trib. l. Amanita Fr. Pers. Nces. *A. volvati* Batsch. *A. tuberosi* Scop.)

3577. *A. asper* Pers., pileo subumbonato rubescens-fuligineo, verrucis minutis acutis scabro, margine laevi, stipite farcto attenuato squamuoso. — Fr. cyst. I. 18. Pers. syn. 256. *A. myodes* Bolt. t. 139. *A. verrucosus* Bull. t. 316.

In nemoribus caedulis apricis rarius. Aestate.

3578. *A. rubescens* Fr., pileo obtuso pallido a. alutaceo-rufescente fuscove, verrucis farinosis inaequalibus adperso, margine laevi, intus rubescente, stipite farcto squamuoso subbalboso lacero-volvato. — Fr. l. l. nec Pers. *Amanita rubescens* Pers. syn. 254. *A. circinatus* Schum. *A. verrucosus* Curt. *A. margaritiferus* Batsch. *A. pulstulatus* Schaeff. t. 91. *A. crassipes* Flor. dan. t. 831.

In campis sterilibus et ericetis ubertim. Aestate.

3579. *A. excelsus* Fr., pileo carnoso latissimo gryseo-fusco, margine laevi dilutiore, disco inaequaliter verrucoso, carne immutabili, stipite solido crasso squamuoso bulboso, annulo ampio subtas. villosulo. — Fr. l. l. *Amanita ampla* Pers. syn. 255.

In pinetis subalpestribus Hercyn. rarius.

3580. *A. solitarius* Bull., pileo umbonato, squamis sparsis floccosis adsperso, margine substriato, stipite solido squamoso-bulboso, basi volvato. — *Fr. l. l.* Bull. t. 48. 593. *Amanita nitida* Fr. obs. *A. albellus* Scop.

In dumetis pinguioribus Thuring. rarius. Aestate.

3581. *A. pantherinus* DC., pileo lato subviscoso olivaceo-fusco aequaliter verrucoso, margine striato, stipite subfarcto aequali, volva ocreato-adnata. — *Fr. l. l.* *A. ruderatus* Batsch. *Amanita umbrina* Pers. syn. 254. *A. maculatus* Schaeff. t. 90.

In nemoribus umbrosis passim. Auctummo pluvio.

3582. *A. muscarius* L., pileo umbonato, dein piano margine striato, e minio lateoque rubente s. hepatico, verrucis albis tessellatis adsperso, lamellis candidis, stipite subfarcto bulboso, superne a volva squamosa inde unginoso-viscoso. *Fr. l. l.* — Schaeff. t. 27. 28. *A. pseudo-aurantius* Bull. t. 122. *A. imperialis* Batsch. *Amanita muscaria* Pers. *A. rubens* Scop. (*Iusus verrucis stipiteque rubentibus.*) *Am. flavescens et formosa* Pers. (*südern partibus flavescentibus.*)

In betuletis macris ubique. Aestate exēunte.

3583. *A. caesareus* Schaeff., pileo primum hemisphaericō, dein umbonato, margine striato, lamellis latēis, stipite farcto, volva laxa. — *Fr. l. l.* Schaeff. t. 207. *A. speciosus* Gouan. *A. aurantiacus* Bull. t. 120. *Amanita aurantia et caesarea* Pers. syn. 252.

In nemoribus Germ. australis. (Host.)

3584. *A. vaginalis* Bull., pileo primum campanulato, squamis latis membranaceis tecto, rarius nudo, margine sulcato, lamellis albis, stipite fistuloso attenuato subnudo, volva vaginali oviformi. *Fr. l. l.* Bull. t. 512. *Amanita livida et spadicca* Pers. syn. 247. — *A. fungites* Batsch f. 79. (pileo albido.) — *A. plumbeus* Schaeff. t. 85. 86. *Flor.* dan. t. 1014. (pileo griseo, livido,) — *A. hyalinus* Schaeff. t. 244. (pileo caesio.) — *A. badius* t. 245. (p. spadiceo.) — *A. fulvus* ej. t. 95. (p. fulvo.)

In oris nemorum et pinetorum post imbreas ubertim.

3585. *A. porphyrius* Fr., pileo convexo nudo laevi purpureo-livescente, margine laevi, stipite subfistuloso aequali, annulo subconcolore, volva crenata. — Fr. syst. I. 14. *Amanita porphyria* Alb. et Schw. 142. t. 11. f. 1. *A. gracilis* Schum.

In pinetis udis muscosis rarius. Aestate.

3586. *A. phalloides* Fr., pileo subsquamoso, margine laevi, stipite spicato cavo, volva connata bulboso. — Fr. syst. I. 13. *A. bulbosus* et *verrucosus* Bull. t. 2. 571. *A. vernalis* Bolt. t. 48. — Vaill. t. 14. f. 5. — *A. bulbosus* Schaeff. t. 241. *Amanita Pers.* (pileo albo.) — *A. citrinus* Schaeff. t. 20. Nees f. 165. *A. Mappa Willd.* (pileo citrino.) *A. virescens* Flor. dan. t. 1246. (pileo pallide viridi.) Vaill. bot. t. 14. f. 5.

In nemoribus umbrosis passim. Aestate.

3587. *A. verna* Bull., pileo subsquamoso, primum ovato, dein depresso, margine laevi, stipite farcto subaequali, volva libere vaginato. — Fr. I. I. Bull. t. 108. *Amanita verna* Pers. syn. 250.

In nemoribus udis, Thuring. v. c. rarius. Vere et aest.

N.B. Praeter has alias complures restant Agaricorum species, sive dubiae omnino sive suspectae, denuo indagandae suisque locis, ut aliis inserantur, interim omissae.

3588. *A. laceratus* Bolt., pileo subconico pallide flavo, margine lacero, lamellis latissimis trididis basi angustatis, stipite fistuloso contorto. — Pers. syn. 336. Bolt. t. 68.

In pratis siccis Hercyn. (Persoon.)

3589. *A. sordarius* Pers., ascomatibus subgargariis sordide albis, pileo carnoso compacto hemisphaericо convexo, marginem subtomentosum primum involvente, lamellis confertis angustis aquoso-albidis, stipite subsolido fibrilloso. — Pers. syn. 370.

Ad truncos arborum domesticarum (Persoon.)

3590. *A. ditutus* Pers., pileo convexo-plano gla-

bro helvolo, lamellis latiusculis dilute cinnamomeis, stipite albicante. — Pers. syn. 300, nec homonym. p. 261. ab Ag. feligo vix diversus.

In nemoribus patruis passim. (Persoon.)

3591. ?*A. atro-virens* Pers., pileo tenui obscure viridi, squamulis minutis scabro, lamellis pallidis, stipite solido longo nigricante. — Pers. syn. 319. cf. supra p. 730.

In fagetis ad terram rarius. (Persoon.)

3592. *A. firmus* Pers., pileo aequali convexo rufescente-vaccino, lamellis coucoloribus, stipite solido incrassato furfuraceo-tomentoso fuligineo. — Pers. icon. 15. t. 5. f. 3., syn. 315.

In nemoribus patruis rarissime. (Persoon.)

3593. *A. leucocrocus* Pers., pileo carnoso convexo plano albido nitido substriato, lamellis confertis angustis dentatis dilute croceis, stipite utrinque subincrassato concolore. — Pers. syn. 367.

Ad trunco in nemor. patruis rarissime. (Persoon.)

3594. *A. lacunosus* Pers., pileo campanulato obtuso expallescidente ruguloso, lamellis subadscendentibus latiusculis cinered-purpurascensibus, stipite mediocri deorsum squamuoso. — Pers. syn. 401.

Ad trunco nemorum patruorum rarius. (Persoon.)

3595. *A. glandifer* Pers., pileo carnoso umbo-nato-campanulato cinereo-livido, lamellis distantibus plano-decurrentibus candidis, stipite longo albido-cinereo. — Pers. syn. 352.

In pinetis Hercyo. super. rarius. (Persoon.)

3596. *A. luridus* Pers., ascomatibus subgregariis, pileo carnoso subsflexuoso glabro e virescente subcinereo, lamellis angustis lutescentibus, stipite solido subsquamuloso pallescente. — Pers. syn. 321. Schaeff. t. 69. *A. Schaefferi* Fr.

In nemoribus udis rarius. (Schaeffer, Persoon.)

3597. *A. laetus* Pers., pileo subcarnoso piano-

convexo viscoso dilute fulvo, lamellis distantibus longe decurrentibus, apicem versus flavicantibus, basi purpurscentibus, stipite longo subtenaci. — Pers. syn. 334. Fr. syst. I. 102.

In pratis montosis tempore pluvio. (Persoon.)

3598. *A. pyriformis* Pers., ascomatibus parvissim umbriatis, pileo subcarnoso-membranaceo piano cum lamellis decurrentibus obconico, stipite brevi crasso cavo. — Pers. syn. 317.

In collibus graminos. Hercyn. inf. pr. Osterode. (Pers.)

3599. *A. ellipticus* Pers., pileo piano elliptico dilute caesio s. albido-cinereo, lamellis plauisculis subconsertis, primam subpurpurascensibus, deinde cinnamomeis, stipite brevi nitido, — Pers. syn. 406. *A. aleuriticus* Fr. syst. I. 238.

Ad truncos putres rarius. (Persoon.)

3600. *A. depallens* Pers., ascomatibus gregariis magnis, pileo opaco fuscescenti-rubris, disco sensim expallescidente, lamellis crassiusculis distinctis albis. — Pers. syn. 440. ?Schaeff. t. 112.

In nemoribus montosis rarius. (Persoon.)

3601. *A. coccinellus* Ehrenb., ascomatibus carnosis fragilibus, pileo aurantio-coccineo subundulato, lamellis flavidis in pileum venas demittentibus inaequalibus, stipite tenui pellucido recto coccineo. Ehrb. sylv. n. 62.

Ad versuras agri berolin. (Ehrenberg.)

Aliae insuper suspectae, nec dum in sistema a Friesio editum receptae, apud autores patruos redeunt, nominibus tantum indicandae: apud Hurboldtum: *Agaricus acephalus*, *acheruntius*, *Batschii*, *cepaceus*, *Gleidtschii*, *gottingensis*; apud Hoffmannum: *A. abbreviatus*, *albido-fuscus*, *elagenfurensis*, *cochleariformis*, *contractus*, *explicatus*, *corallinus*, *flammeus*, *horizontalis*, *infundibuliformis*, *mitratus*, *nigro-villosus*, *setaceus*; apud Persoonium: *A. albidus*, *brevis*, *cirrhatus*, *coronarius*, *crispus*, *inflexus*, *praeorsus*, *suavis*; apud Schaefferum: *A. agrestis*, *aggregatus*, *aliatus*, *aureus*, *coeruleoaccens*,

lacer; apud *Batzchium*: *A. angulatus*, *atro-squamulosus*, *bicolor*, *buccinalis*, *caesius*, *cinerascens*, *cyprinus*, *Digitalis*, *dispar*, *fimbriatus*, *floccosus*, *fuscescens*, *lustrans*, *niveo-brunneus*, *nivosus*, *peltigerus*, *Puella*, *pulillus*, *rostratus*, *submaculatus*, *subulatus*; apud *Roschnigium*: *A. amarus*, *chrysomallus*, *inermis*, *prolifer*, *longipes*, *strictus*, *subglobosus*, *vialis*; apud *Ottoneum*: *A. acetosa*, *aerocéphalus*, *aulacopus*, *badipus*, *caticidus*, *chloropotalus*, *commutans*, *crassipes*, *formosus*, *galophylthus*, *hyalopus*, *hyemalis*, *icterinus*, *leucus*, *micropus*, *mycophilus* et quae sunt alias ejusmodi, tum a me ipso, tum ab aliis repertae.

349. RHIPIDIUM W. Lefzschwamm:

Ascoma tenaciter carnosum, stipite subexcentrico auffultum, inferne e lamina distincta lamellas utringue ascophoras, primum ad aciem conferruminatas, dein longitudinaliter fissas revolutas exserens.

(*Agarici sp. auct.*, a quo lamellis fissis differt, cumque alia Ag. Aegeritariis Fr. transitum ad sequens parat.)

3602. *Rh. stypticum* W., ascomatibus gregariis, subcaespitosive, pileo ceriaceo-carnoso reni - a. infundibuliformi, supra tegmine grumoso-alutaceo helvolo tecto, lamellis angustis seriatis stipitem sublateralem pruinosum a. parce tomentosum, e basi sensim incrassatum circumscripte ambeantibus. — *Agaricus stipticus* Bull. t. 140. 557. *Flor. dan.* t. 1292. *Pers. syn.* 481. *Fr. syst.* I. 188. *A. betulinus* Bolt. t. 72. *A. ficoides* Willd. *A. gramineus* *Flor. dan.* t. 832. *A. flabelliformis* Wulff. *A. semipetiolatus* Schaeff. t. 208. *A. lateralis* Huds.

Ad trunco arborum caesarum Alni et Fagi. Hyeme.

e. lirati, ascomatibus dimidiatis, subtus hymenio carnosulo, primum contiguo, mox lirarum transmissarum, longitudinaliter conniventium veluti sulcatarum latuscula, primum replicata, dein assurgentia obducente instructis.

(Novam indicare volui. Hymenomycetum seriem, melius inter radulares et lamellares p. 621. inserendam.)

350. SCAPHOPHORUM EHRENB. *Nachenschwämme.*

Ascoma membranaceo-coriaceum dimidiatum s. sessile, supra vellere septato albo, paginam inferiorem hymenio carnosulo leucosporo obductam liratim transi-
gentio lirasque colliculoso-emersas parallelas, primum sulcatae tomentosas, ad latuscula replicata ascophoras,
dein assurgendo conniventem hymeniumque explicantes
informante subtus oblitteratum, i. e. subtus liris gemina-
tis a centro polito radianti-labellaribus, costam parallelam solcatam, ad latuscula externa hymenio vestitam
mentientibus exaratum.

(*Schizonia Pers. myc. Scaphophorum Ehrenb. Schizophyllum Fr. Agarici sp. auct.*)

3603. *Sc. agaricoides* Ehrenb., oscomatibus subgregariis resupinatis s. subsessilibus dimidiatis, mar-
gine lobatis multifidisque, supra vellere albido-gryseo ex pilis septatis intertexto obductis, subtus liris par-
allelis geminato-coniventibus conformibus, a centro polito
inde radiantibus, ad latuscula hymenophoris oblitteratis,
concoloribus. — Ehrenb. kor. phys. I. 94. *Schizonia cul-
goris* Pers. myc. III. *Schizophyllum commune* Fr. syst.
I. 330. *Rhipidium liratum* Wallr. in lit. 1816. *Agaricus*
alneus L. Bull. t. 346. 491. Schaeff. t. 246. Pers. syn.
4t3. *A. multifidus* Batsch f. 126. Nees syst. f. 181.
(nula.) *A. radiatus* Sw. — Vail. bot. t. 10. f. 7.

Ad tristes fagineas, alneas, pyrinas putres passim. Auct.

*Ordo VI.*PYRENOMYCETES W. *Kernschwämmae.*

Vegetabilia mycetoides perfectiora, forsitan typo et fab-
ricae internae apparatu magis composito suadentibus
perfectissima, cum Lichenibus pyrenocymatiis saltem ana-
loga; ex conceptaculis (*pyrenium* W., *peritheciū*
auct., *uterus* et *cellula* Fr.) mole, substantia, colore et
superficie varis, plerumque tornatis, praeter baseos, non-

nisi in haec s. utrinque aequaliter, columnae instar productae conditionem facile aberrantem, ad figuram sphæricam tendentibus, verrucosis, nucamentaceis s. tuberosis, primum undique clausis, sive deinceps pro visceribus projiciendis hiatu clandestino (*Pyrenomyces cryptostomi*), vertice papillato, poro circinato et transverso eoque in effiectis iterum contracto (*P. sphinctrostomi*), vel osculi labiati instar patente (*P. custodi*) reclusis, sive undique conferruminatis, nec sponte dehiscentibus (*P. astomi*), foetoram ex ascidiis vesiculosis e figura ovali subelavataque varie concinnatis sporidiorumque multifariam dispositorum serie praegmantibus, veluti multilocularibus, fuscissimis s. diutius persistentibus conflatam, intus nuclei iustar exceptam (*P. astomi pleropyrenii*), s. intra ipsas parietum lamidas distentas, spatium vacuum amplexuras (*P. astomi coelopyrenii*) reconditam, sive in latice gelatinoso, mox coēundo subsidente (*P. astomi hyalopyrenii*), sive in pulpa ceracea siccante delitescentem (*P. astomi sarcopyrenii*), sive ad corpuscula lenticularia distincta redactam (*P. astomi pycnopyrenii*) soventibus effiectisque jam denuo pervicacibus, nunc stromate destitutis ejusque loco a cubilibus quibuscumque ipsisque hypogaeis, non stromate proprio eoque ex cellulis ovalibus s. protensis fistuloso-hypoideis distinctis, ad compaginem variam laevis densiusque intertextis, incondito plane s. ad figuram rotam redacto, pyrenia indita, innata, adnata s. superaddita gerente susceptis composita, saepius perenia, lucis, umbrae vitaeque conjunctaque tenuioris conditionum patientia.

(*Angiogastres et Pyrenomycetes* Fr. *Gonio-* et *Myelomyces* Nees. *Mycelomycetes* Spr. syst. *Hypoxyla* DC. Dub. *Sclerotocarpi* Pers. syn. *Gasteromyceti* Willd. *Xylomyces* Rebent. *Lycoperdi* sp. Schaeff. Huds.)

A. cryptostomi, pyrenius globosis dimidiatisque astomis s. orificium figuratum saltum occultantibus, secundando sine ordine, nec sponte dehiscentibus s. integris secedentibus.

.. (*Gasteromycetum* ordo 5. *perisporiaceae* Fr.)

351. PHOMA Fr. Buckelsporling.

*Pseudopyrenium hypophloeodes tenerrimum, supra sum-
mam epidermidis pelliculam obvelantem constipando et
decolorando adficiens propriumque innatum pustulare,
intus grumosum, sporidiis globosis s. elongatis factum
mentiens.*

(*Phoma Fr. Xylomatis et Sphaeriae sp. auct.*) Genus dubium.

3604. *Ph. saligna Fr.*, pseudo-pyreniis convexis
fuscoc-nigris, s. multilocularibus, centro umberatis. —

*Fr. syst. II. 546. Xyloma salignum Pers. syn. 106.
Sphaeria saligna Ehrh.*

Ad folia salicinae dejecta. Hyeme.

3605. *Ph. areolata W.*, confluentis, planiascula, opaca,
nigro-fusca, angulato-areolata. — *Sclerotium areolatum*
Fr. syst. II. 263.

Ad folia dejecta Pruni Padi. Hyeme.

3606. *Ph. Pustula Fr.*, unilocularis, convexa, lae-
vis, rufescenti-fusca, intus alba, nucleo atro. — *Fr. J. I.
Sphaeria Pustula Pers. syn. 91.*

Ad folia dejecta quercina. Vere.

352. CEUTHOSPORA FR. Linsensporling.

*Pseudó-pyrenium hypophloeodes determinatum, sum-
mam epidermidis pelliculam constipando et decolorando
adficiens propriumque innatum s. synphloeodes umbera-
tum, intus grumosum sporidiisque cylindricis foetum,
vertice irregulariter dehiscentem mentiens.*

3607. *C. phacidioides Grev.*, pseudo-pyreniis
synphloeodeis in maculam orbiculatam deplanatam piceam
nitidam confluentibus, dein vertice depresso lacero de-
presso dehiscentibus. — *Grev. scot. t. 253. Xyloma
multivalve DC. Ph. multivalve Schmidt. Fr. syst. II.
576. Sphaeria Hederae f. Ilicis Nees [syst. f. 53.
Sph. bifrons Sowerb. t. 316.*

Ad folia Ilicis Aquifolii putrida rarius. Auctemmo.

3608. *C. umbonata* W., pseudo-pyrenia synaploeoidea, primum punctiformibus orbiculatis atris, dein umbonatis rugosis, punctis impressis inscriptis, vertice depresso demum irregulariter dehiscentibus.

Ad folia Iberidias sempervirentis hortorum. Autumno.

363. PERISPORIUM FR. Kugelporling.

Pyrenium subcarnosum nudum, dein collabecando umbilicatum apiceque irregulariter scissum, intus molle gelatinosum. Asci pertenues soluti globosi, pulpa excepti.

(*Perisporium* Fr. *Sclerotii et Sphaeriae* sp. auct.)
Genus vagum.

† *epiphylla, pyreniis superficialibus adnatis.*

3609. *P. speireum* Fr., adnatum planiusculum, orbiculatum, opacum, atrom. — Fr. syst. III. 250.

Ad foliorum paginam inferiorem. Autumno.

3610. *P. alneum* Fr., superficiale, globosum, minimum, nigrum, opacum. Fr. l. l.

Ad folia putrescentia alnea.

3611. *P. betulinum* Fr., adnatum, rotundato-adpressum, demum collapso-umbilicatum, opacum, e flavo-fusco-nigrescens. — Fr. l. l. *Peziza betulina* Alb. et Schw. nask. 339. t. 12. f. 5.

Ad folia emarcida betulina in locis turfosis.

3612. *P. populinum* W., innatum, subrotundum s. angulato-confluens, varium, convexo-planum, fulvo-rufum, deinde nigrescens. — *Sclerotium populinum* Fr. syst. II. 262. Pers. syn. 125.

Ad folia populiæ delapsa vulgaris.

3613. *P. acerinum* W., innatum subrotundum; depresso, ambitu veluti marginato elevatum, fuscum, intus carnosum concolor.

Ad folia Aceris Pseudo-Platani delapsa rarius.

3614. *P. Fragariae* W., innatum, orbiculatum, convexusculum, tenuissime aletaceum, nigro-fuscum.

Ad folia Fragariae virginianæ putrida.

3615. *P. gramineum* Fr., aduatum, turbinatum, demum umbilicato-pertusum opacum testaceo-nigrum. Fr. l. l.
Ad folia marcida Holci lanati.

†† *epicaula, pyreniis erumpentibus subliberis.*

3616. *P. circinans* Fr., aduatum, circinato-gregarium, subglobosum, collabescens, opacum, atrum, —
Fr. syst. III. 252. *Erysiphe Geranii* Moug.

Ad Geranii mollis foliorum paginam superiorem rarius.

3617. *P. Alismatis* Fr., emergens, globosum, fuscum, macula indeterminata effusa expallente. — Fr. l. l.
Sclerotium Alismatis Nees. Fr. syst. II. 257.

Ad folia Alismatis natantis languida. Auctummo.

3618. *P. alienum* Fr., emergens, globosum, nigrum, macula elongata pallida. — Fr. l. l. *Sphaeria aliena*.
Fr. syst. II. 502.

Ad ramos Evonymi languidos. (Mougeot.)

3619. *P. maculare* Fr., emergens, liberato-deciduum, globosum, minimum, liberum, stromate tenuissimo fuscō sub epidermide gryseo-maculata latente. Fr. l. l.
In foliis siccis Populi tremulae. Hyeme.

3620. *P. Galba* Fr., emergens, maculis indeterminatis albicanti-testaceis cinctum, globosum, subspinosum nigrum. — Fr. l. l. *Sphaeria Galba* Fr. syst. II. 512.

Ad caules Heraclei et Chaerophyllorum. Vero.

3621. *P. exuberans* Fr., emergens, cumulis subtriangularibus subcoacervatum, demum liberum, subglobosum, nigrum. Fr. l. l. *Sphaeria exuberans* Fr. syst. II. 482.

Ad caules Alliorum hyeme perstites.

3622. *P. Agaricola* W., pyreniis globosis fascis parvis carnosis clausis, cubilia undique penetrantibus, intus dilutioribus.

Stipites Agarici emetici putres extos intusque infarcit. Auctummo sero. (*Sphaeria Agaricola* simillimum.)

3623. *P. disseminatum* Fr., emergens, globosum,

nulla macula cinctum, fuscum nigrumve, intus concolor, demum umbilicatum. — *Fr. l. l. Sphaeria disseminata*
Fr. syst. II. 513.

Ad quisquilias herbarum putrescentes. Hyeme.

3624. *P. Tragopogonis* Fr., emergens, globosum, nulla macula cinctum, fusco-nigrum, intus album, disco colapseo subpezizoideo. — *Fr. l. l. Sclerotium Tragopagi* Alb. et Schw. *Tl. Fr. syst. II. 276.*

Ad caules Tragopogonum. Auctammo.

354. LEPTOTHYRIUM KZ. Schildeporing.

Pyrenium dimidiatum scutiforme longitudinaliter sulcatum, ascos solutos fusiformes obducens.

3625. *L. Lunariae* Kz., pyreniis minimis nigris mitidis dense stipatis, maculae effusas mentientibus. Kz. in myc. *Hft. II. 79. Leptostroma rimosum* Kz. in lit.

Ad caules siliculosque Lunariae redivivae.

355. ACTINOTHYRIUM KZ. Sternporling.

Pyrenium dimidiatum scutiforme radiato-fibrosum, obtegens sporidia fusiformia. Kz.

3626. *A. graminis* Kz., pyreniis epiphloeoideis adnatis sparsis orbiculatis nigris, a centro umbonato inde sensim deplanatis. — *Kunze l. l. 81. Grev. acot. t. 218.*

Ad culmos et folia sicca graminum rariss. Vere.

356. LASIOBOTRYS SPR. Traubensporling.

Pyrenium carnosob-corneum s. subcoriacum, nudum, apice dein depresso, intus massa granuloso-gelatioosa coacta, ascis globosis sporophoris foeta factum.

3627. *L. Lonicerae* Kz., pyreniis obovatis s. rotundatis laevibus atris, apice depressis in caespitolum orbiculariter congestis basique fibris brevibus fuscis subradiantibus adnatis. — *Kunze l. l. 88. Fr. syst. III. 233. Dothidea Lonicerae* Fr. l. l. II. 557. *Xyloma Lo-*

nickerae Fr. obs. t. 4. f. 7. X. *Xylostei* DC. *Sphaeria*
ruboidea Fr. olim.

Ad folia viva Lonicerae Xylostei et coeruleas in
German. australi.

B. sphaerostomati, pyreniis globosis membranaceis carnosissimae, syn-hypophloeodeo-insculptis s. epiphloeodeis, nonnisi stromate hypophloeis suffultis, colore variis, primum clausis, dein ex vertice sensim tenuato aperto pulpam ascophoram nudam s. sacculo veluti exceptam eructantibus, illaque protrusa inter hiatum denuo constrictum saepius coronatis. (*Hypozyla cytispora* et *Lycoperdaceae sclerotiaeae Dub.* *Pyrenomycetes cytisporae* et *Hymenomycetum sclerotiaeorum gen.* Fr.)

357. CYTISPORA FR. Nudelschneller.

Pyrenia tenuissime membranacea diformia cellaloss; in tuberculo gramoso hypophloeode, circa columnam centralem (nonnisi pyrenium distinctum) circinantia, subconata, apice juncta, collo discum erumpentem perforantia ostiolumque solitariam mentientia, pulpam sporophorain, dein coactam ascidiis solutis foetam, ex ostiolo cirrhorum instar eructantia.

(*Cytospora* Ehrenb. *Bostrychia* Fr. olim. *Spr. syst.*
Nemasporae sp. Pers. *Sphaeriac cirrhiferae* Tode.)

3628. *C. betulina* Ehrenb., pyreniis depresso-
atris, disco erumpente cinerascente, cirro tenui rabello.

— Ehrenb. sylv. 28. Fr. syst. II. 545.

In ramis betulinis passim. Auctumno.

3629. *C. melanospora* Fr., pyreniis depresso-
atris, disco erumpente albido, cirro rudi atro. Fr. l. l.

In ramis coryleis rarius. Auctummo.

3630. *C. guttifera* Fr., pyreniis atris in tuber-
culum immersum nigrum attenuatum, collo erumpente
conico obtuso conjunctis, pulpa globosa albida, dein
nigrescente. — Fr. l. l. *Sphaeria guttifera* DC. gall. VI. 136.

In ramulis quercinis rarius.

3631. *C. pyxiformis* Fr., pyreniis numerosissimis atris disformibus irregulariter coacervatis, in conceptaculo erumpente atro-fusco globoso inclusis, disco minuto subconcolori plano, ostiole centrali nigro. — *Dub. gall. II.* 725.

In ramulis quercinis mont. vogesi. (*Mougeot.*)

3632. *C. ferruginea* Desmaz., pyreniis 15 - 20, extus albidi circumantibus coacervatis in conceptaculo atro crasso orbiculari planiusculo hypophloeode, ostiole centrali epidermidem perforante punctique albi. instar prominulo, cirrhis ferrugineis. — *Dub. gall. II.* 725.

In ramis fagineis languentibus rarius.

3633. *C. fugax* Fr., pyreniis atris circumantibus, conceptaculo nullo, disco plano fuligineo, cirrhis tenellis pallidis. — *Fr. syst. II.* 544. *Nemaspora pustulata* Rebent. *Sphaeria pustulata* Hoffm. veg. er. t. 5. f. 5. Pers. syn. 41. *Variolaria fugax* Bull. t. 432.

In ramulis salicinis et coryleis vulgaris.

3634. *C. Aquifolii* Fr., pyreniis nigris circumantibus, conceptaculo nullo, disco convexo gryseo, ostiole centrali prominulo aterrimo. — *Fr. in lit. Dub. gall. II.* 725.

Ad corticem Ilicis in monte vogeso. (*Mougeot.*)

3635. *C. leucosperma* Fr., pyreniis nigris circumantibus, conceptaculo nullo, disco plano albido, cirro albido. — *Fr. l. l. Nemasp. leucosperma* Pers. syn. 108. *Sphaeria cirrhata* Hoffm. veg. t. 5. f. 1.

Ad ramos fagineos, acerinos et fagineos passim.

3636. *C. floccosa* W., pyreniis nigris simplicibus, epidermide scissa tinctis, vertice truncato albo ocellato, cirro candidum crassum guttatum, ex ascidiis solutis ovatis conflatam eructantibus.

Ad ramos Pruni domesticae. Autumno.

3637. *C. carphosperma* Fr., pyreniis nigris circumantibus, conceptaculo nullo, disco sordido, cirro albolutecente. *Fr. l. l.*

In ramulis tiliaceis passim.

3638. *C. xanthosperma* Fr., pyreniis circa columnam centralem circibantibus, conceptaculo nullo, disco hypophloeode latitante, cirrho rudi sureo. Fr. l. l.

In ramis salicinis similem saltem legi. Auctumno.

3639. *C. chrysosperma* Fr., pyreniis oblongis atris in conceptaculo incisis, disco erumpente nigrescente, cirris luteis. — Fr. l. l. *Nemaspora chrysosperma* Pers. syn. 108. *Sphaeria cirrhata* Sow. t. 138. *Hypoxylon cirratum* Bull. t. 487.

Ad corticem populinum vulgaris. Hyeme miti.

3640. *C. aspera* W., pyreniis subrotundis nigris hypophloeodeo-latitantibus epidermidemque pustulatam elevantibus, cirris teretiusculis asperis pallidis.

Ad corticem fagineum rarius. Auctumno.

3641. *C. rubescens* Fr., pyreniis in conceptaculo depresso incisis, disco erumpente fuligineo, cirris rubescentibus. — Fr. l. l.

Ad ramos Prunorum et Sorbi passim.

3642. *C. incarnata* Fr., pyreniis subglobosis atris in conceptaculo lenticiformi proprio nidulantibus, cirro filiformi incarnato-roso. Fr. l. l. *Sph. cordida* Pers. syn. 25.

Ad ramos carpinoe passim. Hyeme mitiori.

3643. *C. coccinea* Fr., pyreniis nigris ostiolo parco prominulis, cirro filiformi coccineo. — Fr. l. l. *Nemaspora coccinea* Rebent. nom. 339.

In ramis siccis Robiniae Pseud-Acaciae rarius. (Præter hanc dubiam Rebent. N. Juglandis et nigram l. l. indicat, denuo indagandas s. alii subscrivendas.)

368. HELICOBOLUS W. Schneckenhaeller.

Pyrenium membranaceum sphaericum synphloeodes simplex s. uniloculare, pulpa ascophora mera gelatinosa farctum illamque dein ex ascidiis follicularibus asporia hyalinis liberis conflatam, per verticem tenuando scissum eructans.

(*Septariae et Septoriae* sp. Fr. *Phleosporae* sp. W.)

3644. *H. Crataegi* W., pyreniis tenuiter membranaceis atris synphloeodeis, primum globosis clavis latitibus, dein vertice aperto summam epidermidis pelliculam permeantibus stillamque albam tortam, ex ascidiis simplicibus longissimis curvatis 8-12-septatis conflatam eructantibus, dein subsidentibus deplanatis nigro-margiatis. *Phlocospora Crataegi* W. cr. *H. 177. sum synonym.*

In soliis vivis Crataegi Oxyacanthae rariss. Nest. (Ph. Ulmi l. l. pyrenio caret et maculam modo in folii parenchymate edit.)

3645. *H. Serratulae* W., pyreniis membranaceis nigris synphloeodeis, primum conicis clavis, dein vertice truncato aperto emergentibus stillaque ascophora pallida coronatis.

In foliis Serratulae arvensis languidis passim.

3646. *H. Rhois* W., pyreniis membranaceis nigrofuscis minutissimis conglomeratis synphloeodeis, ex vertice tenuato stillam ascophoram vermicelliformem lutescentem itorquentibus.

In soliis Rhois typhicis hort. languidis. Auctummo.

3647. *H. epizygia* W., pyreniis parvis membranaceis nscalpto-latitibus subglobosis nigris, dein ex vertice pertuso cirrhus tortuosus candidus, mox in stillas umboinas coactos, ex ascidiis cylindricis in orbem ovalem conjunctis, septo transverso distantis conflatas eructantibus.

Ad ligna putrida abietina siphonaria hypogaeorum semel at abundanter. Auctummo. (Aacidia pecularia, fine utroque consistit, ovalis, mediotenus septo transverso distenta, spiralem pistoriam haud inique referentia, deinde in cumulos umboinatos siccando, more reliquorum coquantes et diu perstites congesta et ex aqua facile subzanda.)

359. COCCOBOLUS W. Böhmischkeller.

Pyrenium tenuiter membranaceum, nigrum latitans insculptum cubilibusque coarctatum simplex, pulpa gelatinosa fluxa farctum eaque dein ex vertice dimoto prominulo denuoque contracto propulsa sphærica limpida superficiali,

mbr (siccando) coacta vesicaeformi, ascidis extitissimis sphaericis gelatinae innatantibus foeta, extus glutinosa coronatum.

3648. *C. castaneus* W., globulo sporophoro emerso, primum limpido dilute-dein saturatus fusco nitido majusculo.

Ad ligna decorticata fraxinea Thuring. Autunno.

3649. *C. aeneus* W., globulo sporophoro emerso, primum vinoso, dein aeneo-virente s. melanophaeno parvo.

Ad fructulae ligni faginei Hesca. infer. Hyemo.

360. ALPHITOMORPHA W. Mehlkeimer.

Pyrenium carnosum vericolor (primum album, mox pallide flavescens citrinumve, denique fusco-castaneum s. melanophaenum), capillitio peripherico-radiante suffultum a. basi nuda adfixum, primum clausum, latice sporophoro fluxo, utricle excepto disteatum hemisphaericum cumque ascidiis oligosporis foetum, deinde ex vertice dimoto transmittens. Stroma hyphoides subiculoso-araneosum dense intertextum, aliis cellulis sphaericis excretis saepissime floccoso-palverulentum.

(*Alphitomorpha* Wallr. in ann. wett. IV. 226. (genus sensu Candolleano anno 1815 traditum); in Verhandl. d. Naturf. Fr. in Berl. 1819. I. 6-51. (idem ad novam meth. anno 1816 retractatum.) Spr. syst. Erysiphe Rebent. Link sp. pl. VI. Ehrenb. N. A. Leop. X. 203, t. 12. (neque Wallr. cum Murrayi et Graecorum auctoritate, a scriptoribus in syst. restaurato neglecta neque Roxb.) *Erysiphe Hedw.* fil. D.C. Fr. Sclerotii sp. auct. *Mucor Erysiphe* L. *Albugo* Ehrh.

† pyrenis capillitio distincto suffultio.

* radiis capillitii spicæ figuratio.

3650. *A. tridactyla* W., pyrenis minutissimis sparseis, primum subglobosis opacis fuscis, capillitii elongati fuscescentie radiis ternis trifloratis, in furcas geminas.

divaricatas, apice trifido-penicillatae deaeuntibus; dein convergendo-deflexis pyreniumque depresso-concaviusculum elevantibus, stromate delicatissimo effuso laxe intertexto crispulo albo-gryseo.

In ultraque Prudi Padi foliorum facie. Auctumno.

3651. *A. clandestina* W., pyreniis minutissimis sparsis subglobosis opacis fuscis, capillitii abbreviati fuscescens radiis senis in surcas geminas nodosas desinentibus, dein convergentibus facile anfugis, stromate effuso delicatissimo albo laxe intertexto. — *W.* in *Berl. Verh.* l. l. 37. excl. var. β . *A. Oxyacanthae* W. in *min.* l. l. 242. *Erysibe clandestina* Ek. l. l. 103. *Erysiphe Oxyacanthae* DC. gall. VI. 106.

In Crataegi Oxyacanthae foliis. Auctumno.

3652. *A. divaricata* W., pyreniis minutissimis confertim sparsis, primum subglobosis, dein depressis opacis fuscis, capillitii candidi radiis 6-8 tortis, apice bifurcatis floccosis deflexis pyreniumque elevantibus, stromato effuso dense intertexto gryeo-albo. — *W.* in *B. Verh.* l. l. 39. *Erysibe divaricata* Lk. l. l. 112. excl. var. β . *E. Daphnes* Dub. gall. II. 870.

In Rhamni Frangulae foliis novellisque passim.

3653. *A. penicillata* W., pyreniis minutissimis globosis fuscis opacis, capillitii candidi brevissimi patentis radiis plurimis aequaliter expansis, apice in discum floccoso-penicillatum expansis succinctis, stromate delicato effuso dense intertexto albo s. obsoleto. — *W.* in *B. Verh.* l. l. 40. *E. penicillata* Lk. l. l. 113.

α . *Alni*. — *W.* l. l. *A.* *Alni* W. wett. l. l. 287. *E. penic.* α . *Alni* Lk. l. l. *E.* *Alni* DC. VI. 104.

β . *Caprifoliacearum*. — *A. penic.* β . *Lonicerae* W. B. Verh. l. l. *A.* *divaricatae* var. 2. Lk. l. l. 113. *E. Lonicerae* DC. gall. VI. 107. *E. Viburni* Opall Moug. Dub. gall. II. 872.

γ . *Herberidis*. — *W.* in *B. Verh.* l. l.; var. 3. *Herb.* Lk. l. l. 114. *E. Berberidis* DC. gall. II. 275.

δ . *Rosacearum*. — *A. Rosarum* *W.* in wett. l. l. 238.
 η . *Grossulariae*. — *W.* et *Lk.* l. l.

Var. α . in *Alno glutinosa*; β . in *Lonicera Caprifolia*,
Xylosteo, *tartarica*, *Viburno Opulo* et *Lantana*; δ . in
Rosae majalis monstro foecundissimo paasim. Auctumno.

3654. *A. adunca* *W.*, pyrenis minutis depresso-globosis fusca opacis, capillitii candidi radiis confertissimis (40-60) patentissimis longis aequaliter expansis, apice incurvatis a. aduncis, stromate effuso maculari, non nisi constipato lacteo. — *W.* in *Berl. Verh.* l. l. 31. *E. adunca* *Lk.* l. l. III.

α . *Amentacearum*. — *A. adunca* α . *Populi* *W.* *Verh.* l. l. *A. Populi* *W.* *wett.* l. l. 236. *E. Populi* *DC. gall.* *VI.* 104. — *A. obtusata* *Schlechtd.* *Verh.* l. l. *E. obt.* *Lk.* l. l. 117. *E. Salicis* *DC. gall.* *II.* 273. *E. Capreae* *Dub. gall.* *II.* 871.

β . *Ulmorum*. — *W.* l. l. *E. clandestina* *Bernard.* *sicul.* *III.* 20. t. 4. f. 4.

γ . *Rosacearum*. — *A. adunca* β . *Prunastri* *W.* l. l. *E. Prunastri* *DC. gall.* *VI.* 108. *E. Malii* *Moug.* *Dub.* l. l. *E. abnormis* *Dub. pr. pr.*

δ . *Ligustri*. — *Fr. syst.* *III.* 545.

Var. α . in *Populi nigrae*, dilatatae et tremulae, nec non in *Salicis Helicis*, *triaandrae* et *capreae*; γ . in *Pruni insiticiae*, *spinossae*, *domesticae*, *Cerasi*, *pygmaeae*, *Pyri*, *Mali*, *Fragariae* foliis. Auctumno.

3655. *A. bicornis* *W.*, pyrenis sparsis parvis sphaericis, dein depressis fusca opacia, capillitio multiradiato brevissimo apice furcato nudo cinctis, atromate effuso in pelliculam continentem submembranaceam constipato albocinerascens. — *W.* in *B.* *Verh.* l. l. 38. *A. Acerum* *W.* *ann. wett.* l. l. 235. *E. bicornis* *Lk.* l. l. 112. *E. Aceris* *DC. Muco* *Erysiphe* in fol. *Aceris* *Schrantz.*
In foliis *Acerum* patruorum. Auctumno c. reliquia.

3656. *A. horridula* *W.*, pyrenis majusculis hemisphaericis, dein nigro-fusca opacia confertis, capillitio multiradiato, radia robustia ramosissima septatis taeniatis;

primum expansis, dein tortuosis nigro-fuscis pyreniis obvallantibus, stromate dense-intertexto cinereo.

a. Asperifoliarum. — *E. biocellata* Ehrenb. l. l. *Mucor Erysiphe in Symphyto* Leyss. hal. 305.

b. Cichoreacearum. — *A. communis s. Cich.* W. Verh. l. l. 32. *E. Cichoreacearum* DC. gall. II. 274.

y. Spiraeacearum.

d. Dryadearum. — *E. communis f. senticosa* Fr. syst. III. 240.

Var. *a.* in Lycop. europaeo, Symphyto, Asperagine, et forte etiam in Cynoglossis, Lappulis et Myosot.; *b.* in Scorzonera hispanica spontanea et culta, Cichorio In-tybo; *y.* in Spiraea Arunco, Geo urbano, Potentillis; *d.* in Agrimonias passim.

** *radiis capillitii apice simplicibus.*

3657. *A. macularis* W., pyreniis minutissimis sphacelia sparsis gregariisve, dein depresso fuscis opacis, capillito multiradiato tentaculato-expanso, mox fuscocastaneo rigido flexuoso sursumve distorto crispo, stromate determinato maculiformi breviter-stipato, demum obsoleto, pyreniorum grege oblitterato. — W. Verh. l. l. 35. *E. macularis* Schlechtld. ber. II. 168. Fr. Lk. l. l. l. l.

a. Humuli, pyr. confertis macularibus. — W. l. l. E. Humuli Lk. l. l. 101. *Erysiphe H.* DC. l. l. *Sclerotium Erys. a.* Pers. obs. *Mucor Erys. a. Humuli* L. Leers.

b. Epilobii, pyr. confertissimis, plerumque epicaulis. W. l. l. *A. Epilobii* W. wett. l. l. 243. *E. Epilobii* Lk. l. l. 102. *Sphaeria xantholeuca* Spr. syst. IV. 404.

y. Poterii. — *A. ferruginea* Schiltl. Verh. l. l. 47. *E. Poterii* Lk. l. l. 103.

d. Dryadearum, pyr. dispersis. *A. clandestina* *b. Alchemillae* W. Verh. l. l. 36. *A. Aphanis* W. wett. 242. *E. Alchemillae* Dub. gall. II. 870.

Var. *m-p.* in pl. l. frequens; *d.* in *Alchemilla Aphanes* et *vulgaris* rarius.

3658. *A. tortilis* W., pyreniis exiguis sparsis globosis, dein fasciis opacis solutis, capillito longissimo re-

verso tortuoso in comam replicato condato rectecto, stromate expanso pareo laxe intertexto lanoso caueascente. — *W.* Verh. I. I. 35. *A. Corni* *W.* wett. I. L. 244. *E. tortilis* Lk. 111.

In foliis *Corni sanguineae* hypophylla vulgaris.

3659. *A. comata* *W.*, pyreniis parvis confertim sparsis globosis, dein depressis fuscis, capillitii longissimi radiis albo-splendentibus, apice subdivisis floccosis, pri- mum expansis, deinde reflexis in comam posticam congestis basinque elevatis, stromate effuso crispato stipato al- bido. — *W.* Verh. I. I. 40. *A. Euonymi* *W.* wett. I. L. 245. *E. comata* Lk. I. I. 114. *E. Euonymi* DC. gall. VI. 10b.

In *Euonymo europaeo* hypophylla passim.

3660. *A. sericea* *W.*, pyreniis parvis confertis glo- bosis nitidulis, dein fuscis, capillitio candidissimo lon- gissimo tortuoso nudo simplici, deinde sursam flexo py- reniumque depresso involvente propexo-comoso, stromate effuso crispato albescente. — *A. holosericea* *W.* Verh. I. I. 41. *A. Astragali* *W.* wett. I. I. 244. *E. Holosericea* Lk. I. I. 115. *E. Astragali* DC. VI. 103. *Mucor Erysiphe* in *Astragalo* L.

In *Astragalo glycyphyllo* passim.

3661. *A. nitida* *W.*, pyreniis minutis sphaericis farctis, dein melanophoenis nitidissimis confertis, capil- litio brevi multiradiato tenuissimo hyalino cum stromate delicato hyphideo cinereo effuso arcte connexo. — *Mu- cor Erysiphe* in *Delphinio Alb.* et Schw. nish. 76.

In foliis, canibus pedunculisque Aconitorum horten- sium, Delphiniorum ipsiusque Actaeae spicatee passim.

3662. *A. lamprocarpa* *W.*, pyreniis majusculis sphaericis confertim sparsis farctis, dein opacis nigro- fuscis capillitium longissimum multiradiatum tortuosum exserentibus stromatisque effusi albo-cinerascentis dense intertexti hypham, veluti halone cianamomeo ciuctam obscurantibus. — *W.* Verh. I. L. 33. *E. lamproc.* Lk. I. L. 108.

a. *Labiatorum*. — *A. communis* a. *Labiatorum* *W.*

Perh. 31. A. Ballotae W. wett. 239: E. lamprocarpa Lk. l. l. 109. M. Erysiphe L. sp. pr. pr.

β. Balsaminaceae.

γ. Plantaginis. — Alph. communis var. W. et Schl. l. l. A. circumfusa Schl. berol. II. 169.

Var. α , in *Ballotis*, *Galeopaidibus*, *Stachydibus*, *Lamia*, *Marrubio*, *Mentis* aliisque *Labiatis*; β . in *Balsamina* *Noli tangere*; in *Plantaginibus* *passim*.

3663. *A. de pressa* W., pyreniis majusculis sphæricis, dein vertice depresso concaviusculis, veluti marginatis fuscis opacis, capillitio delicatissimo brevi mox fuscescente, cum stromate effuso ex hyphia longissimis laxe intertextis connexis. — *W. Verh. l. l. 34. E. de pressa* Lk. l. l. 110.

α. Bardanae. — W. l. l. A. Bardanae W. wett. 239.

β. Artemisiae. — W. l. l. A. Artemisiae W. wett. 240.

γ. Corymbiferarum. — E. circumfusa Lk. l. l. 109.

Var. γ . in *Eupatoriis* et *Solidag.*, v. α . β . in *herbis* l.

3664. *A. communis* W., pyreniis majusculis sphæricis confertim sparsis, dein nigro-fuscis opacis rugulosis, capillitio multiradiato basiliari hyalino cum stromate hymideo concolore conformi effuso jugiter contextis appendis eoque tenuato basi nudosculis. — *W. Verh. l. l. 31. Erysipe communis* Lk. l. l. 105.

α. Graminearum. — W. l. l. E. graminis DC. VI. 106.

β. Polygonearum. — W. l. l. E. Polygoni DC. II. 273.

γ. Ranuncularum. — W. l. l. F. Aquilegiae DC. l. l.

δ. Convolvulacearum. — W. l. l. E. Convolv. DC.

ε. Alsinacearum. — Fr. syst. III. 240.

ζ. Rubiacarum. — Fr. l. l. W. l. l.

η. Solanacearum. — Fr. l. l. W. l. l. (E. epimegpha Ehrb.)

θ. Personatarum. — Fr. l. l.

ι. Dipsaccarum. — Fr. l. l.

κ. Cruciferarum. — Fr. l. l.

λ. Onagriarum. — Fr. l. l.

μ. Campanulacearum. — W. l. l.

ν. Geraniacearum W.

ξ. Hyperioearum. — W. l. l. Fr. l. l.

o. Compositarum. — E. detonsa Fr. l. f. 247. (capillito oblitterato.)

n. Cucurbitacearum. — IV. in lit.

o. Umbelliferarum. — W. l. l. Fr. l. l. E. Piss DC. Grev. scot. t. 134. A. macropus Mart. erl. 392.

o. Leguminosarum. — IV. l. l. Fr. l. l. E. Scandicis et Heraclei DC. l. l. E. macropus Mart. l. l.

Communia at nefaria pestis herbarum vegetarum plurimarum, tum spontearum tum cultarum, et quidem *a.* in graminibus latifoliis passim; *b.* in Polygono aviculari; *c.* in Aquilegiis, Thalictris, Clematis, Anemone et Ranunculis fere omnibus pubescentibus; *d.* in Arenaria trinervia et Lino; *e.* in Galii fere omnibus; *f.* in Verbasco et Physalide; *g.* in Autirrhinis, Euphrasiis, Menthis, Glechomate; *h.* in Scabiosis; *i.* in Lepidiis, Cheiranthis et Erysimum; *j.* in Oenothera, Circaeae; *k.* in Campanula; *l.* in Geranio pratensi et phaeo; *m.* in Hyperico hirsuto; *n.* in Achilleis, Asteribus, Carduis, Cynara, Onopordo et Sestrula; *w.* in Cucurbitis et Cucumeribus; *o.* in Heracleo, Chærophyllo, Scandice, Laserpitio; *s.* in Piso, Ononide, Viciis, Trifoliis, Ervis, Medicaginibus quacunque aestate pyrenophora, in aliis permultis herbis inque ipsis foliis abietinis, quae *Friesius immunita* habet, stromate sterili.

3665. *A. lenticularis* W., pyrenis magnis sparsis orbiculato-depressis lenticularibus, capillitiis radiis panicis brevibus equaliter expansis radiantibus fragilibus caducis, basi bulbosis, apice simplici acuto cum stromate dense intertexto determinato albo leviter connexis. — *A. lenticularis* W. in lit.

a. Fraxini. — A. guttata *β.* Fraxini W. Verh. l. l. 42., Ann. weit. l. l. 245: Erysipe guttata var. Lk. l. l. Erysiphe Fraxini DC. gall. ff. 273.

β. Fagi. — A. guttata *γ.* Fagi W. l. l. E. orbicularis Ehrenb. l. l. t. 12. f. 1-15. Lk. l. l. 113.

γ. Mespilorum. — A. lenticularis *γ.* Mespil. W. in lit.

δ. Carpinii. — E. guttata *β.* Carpinii Fr. syst. III. 246.

ε. Juglandis. — E. guttata *γ.* Fr. l. l.

ζ. Ulmorum. — W. l. l.

Ad solia arborum l. et y. in Crataego Oxyacantha latifolia passim.

3666. *A. guttata* W., pyreniis magnis sparsim consertis sphaericis melanophaenis, capillitii depauperati radiis basi bulbosis rectis patentibus, demum genaflexis, pyrenium vertice impressum (utriculo hyalino saepius obsoessum) suffulciendo elevantibus, stromate determinato tenui stipato-contexto albo. — *A. guttata* W. Verh. l. l. 42. excl. var. β . γ . *Erysibe guttata* Lk. l. l. 116. excl. var. 2. 3.

α . *Coryli*. — *A. gutt. a.* Wallr. et auct. l. l. *Erysiphe pachypus* Mart. erl. *E. Coryli* DC. l. l. *E. vagans* Bernard. l. l. 19. t. 4. f. 3. *E. suffulta* Rebent. neom. 360. t. 3. f. 14. Nees syst. f. 134. *Dematium Erysiphe* Spr. hal. 387. *Sclerotium Erys. β . corylea* Pers. syn. 124.

β . *Betulae*. — W. l. l. *E. Betulae* DC. gall. 107.

Ad foliorum coryleor. et betulin. faciem inferiorem vulg.

†† pyreniis basi stromati incidentibus, nec capillitio proprio auctia.

3667. *A. fumosa* W., pyreniis minutissimis gregariis confertissimis globosis, dein depressis fuscis impresso-corrugatis, basi nuda stromati primum determinato soridide albo adpressis, demum effusis, maculas longe expansas castaneas mentientibus. — *A. fumosa* W. in lit. 1816. *A. fuliginea* Schlechtld. Verh. l. l. 47. *Erysibe fulig.* Lk. l. l. *E. Sanguisorbae* DC. gall. VI. 108.

Ad Veronicam longifoliam spontan. et hortensem.

3668. *A. pannosa* W., pyreniis dense aggregatis hemisphaericis minutissimis opacis, dein depressis rugulosis, stromate ex hyphis candidis sericeo-splendentibus assurgentibus, in villum pulvriatum paucosum constipatis exceptis oblitteratis. — W. Verh. l. l. 43. *E. pannosa* Lk. l. l. 104. ?*Eurotium Rosae* Grev.

In ramiculis alabastrisque Rosarum, maxime R. poniferae Herm.

3669. *A. epizyga* Schl., pyreniis sparsis sphaericis, dein depressis melanophaenis, basi stromati hyphoideo

effuso delicatissimo laxe intertexto issidentibus. — Schlechtendal. Verh. I. I. 50. E. epiryton Lk. I. I. 117.

Ad ramos quercinos decorticatos. (Schlechtendal.)

3670. *A. epigaea* W., pyreniis maximis hemisphaericis nitidis sparsis laevissimis, deinde melanophaenitis, basi depresso stromatis hyphis crassis candidis elongatis issidentibus. — W. Verh. I. I. 45. E. epigaea Lk. I. I. 104.

Ad terram nudam viciasque radices Thuring. rarissime. Hyeme. (Sclerotio splendenti similis.)

361. SPHAERONAEMA FR. Tropfenschneller.

Pyrenium verticale, e basi subaequali sensim tenuatum: subcylindricum, primum vertice truncato obturatum, pulpa mucosa, sporidiis exilissimis foeta farctum illaque dein veluti sacculo coactum ex apicis tenuati hiatu transmissa coronatum.

(*Sphaeromyxa* Spr. syst. *Sphaeriae*, *Calycii* sp. auct., *Sph. globiferae* Tod.)

3671. *Sph. microscopicum* W., pyreniis conoideis minutissimis nigris gregariis, e vertice truncato globulum sporophorum albido transmittentibus.

Ad velum Daedaleae quercinae putridae.

3672. *Sph. hemisphaericum* Fr., pyreniis hemisphaericis subellipsoideis laevibus nigris, globulo sporophoro albo-livido facile caduco. — Fr. syst. II. 539. *Sphaeria hemisphaerica* Alb. et Schw. nissk. 51. t. 8. f. 8.

Ad ligna duriora, pinea v. c. et faginea. Vere.

3673. *Sph. subtile* Fr., pyreniis globosis regulibus miserrimis sparsis nitidalis laevibus, globulo sporophoro albido exiguo caduco. — Fr. syst. II. 539.

Ad ligna mucida, salicina et corylea. Hyeme.

3674. *Sph. truncatum* Fr., pyreniis cylindricis robustis truncatis nigris, globulo caudido prominulo. — Fr. I. I. *Sphaeria cylindrica* Alb. et Schw. nissk. 56.

Ex lignis putridis ubietinis ubique emergit. Vere.

3675. *Sph. pyriformis* Fr., pyreniis e basi latiore conicis acentis laevibus aterrimis, globulo sporophoro ovali piceo facile deciduo. — Fr. l. l. *Sphaeria pyriformis* Pers. syn. 64.

In lignis exsiccatis, quercinis v. c. Vere.

3676. *Sph. parabolicum* Fr., pyreniis parabolicis gregariis laevibus nigris, globulo sporophoro prominulo livido. — Fr. l. l. *Sphaeria parabolica* Tod. meclb. 43. t. 115. Nees syst. f. 345. A.

In lignis putredine uda consumptis ubique.

3677. *Sph. cylindricum* Fr., pyreniis cylindricis simplicissimis gracilibus laevibus nigris, globulo sporophoro albo prominulo. — Fr. l. l. *Sphaeria cylindrica* Tod. l. l. f. 114. Pers. syn. 93.

Ad ligna patrida, salicina praetrimis. Hyeme.

3678. *Sph. cladonissum* Fr., pyreniis cylindricis subramosis nigris, globulo sporophoro albo exiguo, vertice impresso excepto. — Fr. l. l. *Calicium cladoniscum* Ach. lich. 241.

In ramis putridis, salicinis v. c., passim.

3679. *Sph. ventricosum* Fr., pyreniis elongatis strictis atris rigidis simplicibus, mediotenus ventricosis, basi verticeque abrupte attenuato truncato discoideo globulum sporophoram minutam punctiformem cibereum monstrantibus. — Fr. l. l. *Calicium ventricosum* Ach. l. l.

Fz rimis arborum (Tiliarum, Prunorum) rarissime emergit.

3680. *Sph. pistillare* W., pyreniis elongatis strictis rigidis atro-piceis nitidis, e basi tenui sensim in apicem incrassatis clavatis s. pistillaribus, vertice attenuato poro exilissimo pertusis.

In praecedentis consortio neque minus raro et cum illo novum genus indicans.

3681. *Sph. Acrosperrnum* Fr., pyreniis cylindrico-ventricosis laevibus nigris, globulo sporophoro ob-

soleto sordide flavicante. — *Fr. l. l. Sphaeria Acrospernum* Tod. *l. l. f. 119. A. et Schw. 50. Pers. syn. 92.*

In ligno quercino et pineo rariissime.

3682. *Sph. semipellitum* IV., pyreniis pachydermatinis, e basi ovata hypophloeode, tegmine fibroso fusco obducta crassiore in verticem nudum convexum nigrum nitidum, poro tenui pertusum abeuntibus coquè mamillari epidermidem permeantibus globulumque sporophorum cinerium caducum stillantibus.

Ad caudices quercinos effosatos languidos rarius.

3683. *Sph. conicum* Fr., pyreniis e basi depresso-globosa hypophloeode in apicem mamillarem e. conico-cylindricum acutum nigro-fuscum, epidermidem scissam superantem productis libere prominulis, globulo flavente, mox nigrescente facile deciduo tectis. — *Fr. syst. II. 538. Sphaeria conica* Tode *l. l. f. 116. Pers. syn. 94.*

Ad ramos Pruni domesticæ, Rhamni et Fagi passim. Auct.

3684. *Sph. columnare* IV., pyreniis fasciculatis subtconflentibus nigris incisis strictis speciosis, e basi sequali cylindrica in verticem obtusum umbo-natum veluti operculatum nitidum, poro tenuissimo pertusum productis.

Ad trunca fraxineos caesos Thuring. rarius. Vere.

3685. *Sph. aciculare* Fr., pyreniis attenuato-cylindricis gryeo-nigricantibus, globulo albo-lutescente. — *Fr. l. l. Sphaeria dubia* Tod. *l. l. f. 118.*

Ad ligna quercina suis locis parcis. (Tode.)

3686. *Sph. subulatum* Fr., pyreniis e basi conica in acumen subulatum tenuatis lutescentibus laevissimis glaberrimis, vivis pellucidis ceraceis, siccando cornis cumque globulo sporophoro limpidiore ovali persistentibus. — *Fr. l. l. Sphaeria subulata* Tod. *l. l. f. 117. Pers. syn. 14. Nees syst. f. 345. B.*

Ad Agaricos induratos passim. Auctumno.

3687. ?*Sph. Pteridij* Fr., pyreniis subtuberulosis magnis sparsis badio-fuscis, primum globoso-depressis,

dein obconicis collabecendore obcordatis. — Fr. L. I.
Sphaeria Pteridis A. et Schw. 49. t. 10. f. 5. neo-Raben.
 Ad frondes Pteridis nive oppresas Lusatiae (A. et Schw.)

362. THELEBOLUS TOD. Blasenschneider.

Pyrenium sessile subrotundum arceolato-ventricosum gelatioso-tenacellum, ex vertice hiante vesiculam sporophoram globosam, apice papillaeformi sporidia soleta mucosa transudentem excutientis.

3688. *Th. lignatilis W.*, pyreniis hemisphaericocoideis pallidis, ex stromate hypoideo stipato-velutino candido emergentibus confertis, dein a vertice hiante vesiculam sporophoram globosam transmittentibus, intus ictenum cornelis, dissectis corculo saturatore farctis. — *Th. lignatilis W.* in lit. 1815. *Th. sudans Fr.* et II. 51. *Hydnus sudans Alb.* et *Schw.* nisk. 232.
 Ad asperos abietinos patres (Lusat., Thuring.) rarius.

3689. *Th. stereocerus Tod.*, pyreniis subglobosis majusculis gregariis, praeter pilos radiantes basilares nudis, demum croceis, effoetia subsidentibus. — Fr. syst. II. 307. *Tod. I. I. t. 1. f. 56.* Pers. syn. 116. *Alb.* et *Schw.* nisk. 70. Nees syst. f. 363.
 Ad sumum vaccinum rarissime. Auctumno pluvio.

3690. *Th. terrestris A. et Schw.*, pyreniis hemisphaericis maximis confertissimis croceis, stroma hypoidium dilatè flavum stipatum oblitterantibus. — Fr. l. I. A. et Schw. nisk. 71. t. 2. f. 4. Nees syst. f. 364.
 Ad terram quisquiliisque humi putrescentes in Lusatiae nemorum opacis penetralibus. (Alb. et Schw.)

363. SPHAEROBOLUS TOD. Kugelschneller.

Pyrenium immerso-sessile rotundatum carnosum-fibrosum, primum clausum, dein stellatum fissum vesiculamque globosam sporidiis centralibus conformibus majusculis foetam, tunica stipato-membranacea, dein elastice inversa inclusam projiciens.

(*Sphaerobolus* Tod. Lk. *Nees.* *Lycoperdi* sp. *L. Carpobolus* Mich.)

3691. *Sph. stellatus* Tod., pyreniis globosis pallide flaventibus gregariis, vertice in lacinias 5-8 acutas fissa, vesiculam basi tunica stipata hyalina exceptam promentibus illaque mitraeformi coronatis. — *Tode* I. I. I. 43. *Pers.* syn. 115. *Nees* syst. 129. f. 122. *Fr.* syst. II. 310. *Carpobolus albicans* Mich. gen. t. 101. *Willd.* beroj. 413. *Lycoperdon Carpobolus* L. *Flor.* dan. t. 865.

Ad truncos putredine uida consumtos rurius. Auct.

3692. *Sph. tubulosus* Fr., pyreniis obovato-cylindricis solitariis albis extus villosis, vertice irregulariter lacero vesiculam pallidam promentibus. — *Fr.* I. I. *Sph. Solen* Alb. et Schw. nisk. 70.

Ad ramos pineos putreos Lusat. super. rariissime.

C. custodi, pyreniis membranaceis stipatis, figura, superficie, colore et dispositione perquam variis, primum vertice papillato clausis, dein papilla caduca osculo tornato aequali, labiato corniculatore pertusis, ascidia elongata, sporidiis septatis varie digestis foeta, pulpa subgelatinosa nucleata versicolore excepta projicientibus exinanitisque diutius persistentibus, fere perennibus.

(*Pyrenomyces sphaeriacei* Fr. *Gonio-* et *Myelomycet* Nees. *Hypoxyla sphaeriacea* DC. Dub. *Sclerocarporum* gen. *Pers.* *Xylocyti* Willd. *Lycoperdi* Huds. Schaeff.)

364. SPHAERIA HALL. Kugelschwämme.

Pyrenium membranaceum, vertice primum papillato (nonnisi etiam deinceps) clausum, dein osculo tornato aequali, labiato rostellato pertosum, e figura orbiculata umbonata semet in apicem produceodi nisi insigne, nunc simplex distinctum, ipsis cubilibus, nunc stromate varie figurato exceptum, intus ascidiis elongatis, sporidiis transversim s. oblique digestis foetis s. cum paraphysisibus effoetis intermixtis, nucleum pulposo-gelatinosum fluxum constituentibus farctum eoque dein deliquescente s. projecto exinanitum.

(*Sphaeria* (Hall); *Valsa*, *Hypoxylon*; *Hypocreæ* Reichenb.; *Kylluria*; *Stromatosphaeria*, *Cucurbitaria*, *Cryptosphaeria* et *Sphaeria* Groe.; *Poromia* Willd.; *Hypoxylon* Juss. et *Varicolaria* Bull.; *Sphaeria* Hall. Tod. Pers. Nœs. et Fr. *Dothideæ* sp. Fr. *Aecidium* Hill. *Valsa* Scop.) — Genus naturale, vastissimum, quamvis in plura genera dispersum sit, h. l. sensu Persooniano nunc quoque tueor, donec ambiguities quaecunque dispulsæ generumque reliquorum fides ionotuerint.

A. astromaticæ, pyreniis simplicibus distinctis, ab ipsis cubilibus sine ullo stromatis proprii indicio conceptis usque sive subjectis (*hypophloeoideis*), sive jugiter contextis (*synphloeoideis*), sive superadditis (*epiphloeoideis*), figura, mole et colore variis, a nucleo informando nonnisi decurrentibus. — (*Sphaeræ simplices* Pers.; *superficiæ, subimmersæ et subinnatae* Fr.; *nudæ* Schum.; *gestitromas* Schmidt in Kunz. myk. Hft. II. 1—30.)

a. *lepto stomæ*, pyreniis subglobosis s. hemisphaericis distinctis, nonnisi gregaris, siccando et senescedo saepius subsidentibus, vertice obsolete papillato epidermidia varic scissam, sive aequaliter infargientibus, sive permeantibus poro que exilissimo pertusis. (*Sph. astomæ* Schm. *Hypodermi* sp. DC.)

— *leciopyreniqæ*, pyreniis calvis.

b. *synphloeoideæ*, pyr. simplicibus, basi cum subilibus connatis, nucleo cerasco, ascidiis obsoletis foeto factis.

c. *limbatæ*, pyr. epiphyllinis, aream limbo discolori cinemat tenuatam, veluti aridam obsidentibus. (*Sph. foliicolæ* Depazæ Fr. *Phyllosticta* Pers. *Sph. lichenoides* DC. gall. VI. 147.)

3693. *Sph. vagans* Fr., pyreniis innatis minimis sparsis nigris, vertice convexiusculo parce prominulis, maculae albidae, limbus fuscum spargentem obsidentibus. Fr. syst. II. 533. *Sph. lichenoides* foliorum vegetorum DC. L. L.

In herbâ foliâ plurimis, v. c. Ballote, Malvis, Atriplicibus, Scabiosis, Beta, Geò ipsique forsitan arboribus, Pyris v. c. Prunis et Salicibus (*Sph. salicicola* Fr. L. L.).

3694. *Sph. Spinaciae Fr.*, pyrenia minutissima punctatissimis nigris sparsis, maculam diffusam cinereum-nigrum obvidentibus. — *Fr. l. l.*

Ad folia Spinaciae oleraceae vira passim.

3695. *Sph. Gentianaecola DC.*, pyreniis centralibus minutissimis confertis convexis nigris, maculam rufescentem subzonatam effusam obsidentibus. *Fr. et DC. l. l.*

Ad Gentianae luteae et cruciatae folia laugida.

3696. *Sph. Brassicaecola Fr.*, pyreniis aggregatis numerosissimis subrotundis nigrescentibus laevibus, maculam viridulam centro rufescentem inscribentibus. — *Fr. in lit. Dub. gall. II. 712.*

Ad folia Brassicæ oleraceæ languida.

3697. *Sph. Vincetoxicii Fr.*, pyreniis epiphyllinis minutissimis depresso-rotundatis fuscocinereis immatis, maculam pellucidam albam, halone pallide fuscocinectam inscribentibus. — *Fr. elenck. II. III.*

Ad folia Vincetoxicii vegeta passim.

3698. *Sph. Dianthi A. et Schw.*, pyreniis epigenis minutissimis globoso-depressis nigrescentibus tenuiter pertusis nucleumque cirrhosum transmittentibus, dein centro apertis punctoque dilutiore reclusis magis subalbidis, maculam stramineam pallidam picturantibus. — *A. et Schw. nisk. 47. t. 6. f. 2. Fr. l. l. Sph. Saponariae DC. l. l. Naemaspura epiphylla DC. syn.*

Ad folia Dianthi carthusianorum et Saponariae officinalis.

3699. *Sph. Fragariaecola W.*, pyreniis microscopicis epigenis depresso-globosis nigris, maculam pallidam, halone latescente fuscocrufo cinctam occupantibus.

Ad folia Fragariae virginiana hortens.

3700. *Sph. Cornicola DC.*, pyreniis exiguis sparsis orbiculatis pallidis, vertice depresso reclusis, macula suborbiculata sordide cinerea tenuata, limbo atro-sanguineo elevata cincta. — *DC. et Fr. l. l.*

Ad Corni sanguineae folia languida.

3701. *Sph. Juglandicola Fr.*, pyreniis nigris minutis nitentibus planis subrugulosis ancolatim dispositis, maculam subrotundam indeterminatam gryaco-rufescensem occupantibus. — *Fr. syst. II. 621. Xyloma Juglandis DC.* *Sph. acericola Dub.* *I. I.*

Ad folia Juglandis et Aceris campestris.

3702. *Sph. Castaneaecola DC.*, pyreniis epiphyllis sparsis punctiformibus atris, maculam indeterminatam pallide lutescentem obsidentibus. *DC. et Fr. I. I.*

Ad folia Castaneae vescae languida.

3703. *Sph. frondicola Fr.*, pyreniis hypophyllis sparsis depressis subconcentricis majusculis, centro depressis circumscissiave, maculam albo-cinerascentem fusco-cinctam obsidentibus. — *Fr. I. I. Xyloma concentricum Pers. syn. 107.*

Ad folia Populi tremulae et nigrae viva.

3704. *Sph. Hederaecola Fr.*, pyreniis epigenis minutis depresso-globosis sparsis prominulis, maculam pallidam, halone lato rubro-fusco cinctam occupantibus. *Fr. I. I.*

Ad Hederae et Ilicis folia vegeta rarius.

3705. *Sph. Quercicola W.*, pyreniis microscopicis epigenis hemisphaericis nigris sparsis, maculam fusco-nigrescentem, limbo elevato lineato redimitam occupantibus.

Ad folia quercina arida.

3706. *Sph. Buxicola Fr.*, pyreniis hypophyllis sparsis convexiusculis atris, maculam candidam nigro-limitatam obsidentibus. — *Fr. I. I. Psyllosticta limbalis Pers. Sph. lichenoides γ. buricola DC.*

Ad folia Buxi, nec non Vincae et Jasminorum,

3707. *Sph. Pyrolae Ehrenb.*, pyreniis gregariis hemisphaericis nigris, demum collapsis ruptis, maculam purpuream nigro-cinctam obsidentibus. — *Ehrenb. sylv. 29. Fr. I. I.*

Ad folia Pyrolae umbellatae. (*Ehrenberg.*)

3708. *Sph. Tremulaecola DC.*, pyreniis epigenis

microscopicis sphaericis atris nitidis confortissimis, maculae orbiculatae gryseae, halone livido-fusco cinctae centrum occupantibus. — DC. et Fr. l. l. *Sph. macularis* Schmidt et Kunz. D. Schw. n. 78.

Ad folia Populi tremulae viva.

3709. *Sph. stemmatea* Fr., pyreniis globosis minutis gregariis epiphyllis, summam epidermidis pelliculam determinate dealbatam excurrentibus. Fr. l. l.

Ad folia Vaccini Vitis idaeae viva.

3710. *Sph. Linnaeae* Ehrenb., pyreniis gregariis hemisphaericis atro-nitidis epiphyllis minimis concavis, maculam candidam, halone latescente roseo cinctam ob-sidentibus. — Ehrenb. l. l. Fr. l. l.

Ad folia Linnaeae borealis. (Ehrenberg.)

3711. *Sph. crispans* Pers., pyreniis nigris confortissimis subrotundis laevibus nigrantibus, maculam fulvo-lutescentem dein expallentem ob-sidentibus. Dub. l. l.

Ad folia Convallariae bifoliae rarius.

3712. *Sph. cruenta* Ks., pyreniis montis sparsis subrotundis obesis firmulis, vertice convexo dein depresso prominulis nigris, maculam pallide rubentem, halone elevato fusco-sanguineo limitatam ob-sidentibus. Fr. l. l.

Ad folia Convallariae multiflorae, auct. uti reliquae.

3713. *Sph. Ostruthii* Fr., pyreniis globosis minimis astomis nigrescentibus hypophyllis gregariis, arcas inter-nervias subangulatas lividas inscriventibus. Fr. syst. II. 526.

Ad folia Imperatoriae Ostruthii languida.

3714. *Sph. Aegopodii* Fr., pyreniis amphigenis hemisphaericis parvis sparsis nigris, dein summam epidermidis pelliculam elevantibus prominulis, maculam pal-lidam effusam angustam occupantibus. — Pers. syn. 89. excl. var. β . Fr. l. l.

Ad folia Aegopodii Podagrariae langida.

.. effusa e, pyreniis basi synphlocode connatis, cu-bilia vegeta non adscientibus, massa ceracea alba, acci-

dissimilis subclavatis simpliciter sporophoribus farctis, (Sphaeridiae trib. 21. Foliolacae Fr. Dothideae sp. Fr.)

3715. *Sph. culmorum W.*, pyreniis microscopinis synphloeodeis atro-fuscis globosis, vertice depresso parce prominentibus, interstitia lioeata obidentibus culmosque dein veluti nebula nigrescente tingentibus. — *Sph. acericola et recutita Fr. syst. II. 510. 525. Sph. punctiformis f. culmi DC. gall. II. 299.*

Ad culmos Scirpi lacustris et Junci laevis patres. Vero.

3716. *Sph. caulincola W.*, pyreniis minimis varie dispersis synphloeodeis, vertice convexiusculo nitido nigro prominulis, nucleo albido.

Ad caules herbarum, Seabiosarum v. c. sicciorum.

3717. *Sph. stipata Fr.*, pyreniis minimis confertis synphloeodeis convexis nigris nitidis, maculam punctatam nigrum determinatam mentientibus. — *Dothidea stipata Fr. syst. II. 558.*

Ad caules sicciorum, v. c. Chaerophyllorem. Vero.

3718. *Sph. acerina W.*, pyreniis exiguis confertim sparsis synphloeodeis orbiculatis nigris nitidulis, centro tenuiter papillato dein umbilicato-depressis marginemque obtusum prominulum veluti circumducentibus. — *Dothidea acerina W. in lit.*

Ad folia Aceris Pseudo-Platani putrida Thuring. rariss.

3719. *Sph. marginata W.*, pyreniis parvis confertis synphloeodeis orbiculatis atris nitidissimis, primum rambonatis, dein centro papillato depressis marginemque volvatum veluti circumducentibus. — *Dothidea marginata Kneiff in lit.*

Ad folia Pyrolae umbellatae radicalia epigena. Aest.

3720. ?*Sph. Helicis W.*, pyreniis epiphyllis sparsis subrotundis glabris opacis nigris, intus cinerascentibus. — *Dothidea Hederae Fr. syst. II. 564.*

Ad folia viva Hederae Helicis. Auctumno.

3721. *Sph. corylaria DC.*, pyreniis minutis con-

sértim sparsis hemisphaericō-synphloeoideis hypophyllis pachydermatinis, vertice convexo nitido prominentibus, nucleo albo farctis. — *Sph. punctiformis* & *corylaria* DC. gall. VI. 144.

Ad folia Coryli decidua frequens. Hyeme.

3722. *Sph. leptidea* Fr., pyreniis minutis hemisphaericis confertim-sparsis hypogenis, e basi synphloende innata verticem prominulum nigrum opacum, primum convexum papillatum, dein osculo circinato pertenui pertusum umbilicato-depressum informantibus, nonnisi confluendo irregulariter-oblongatis, intus fuscis. — Fr. syst. II. 522. *Xyloma erumpens* aust.

Ad folia Vaccinii Vitis Idaea passim. Auctumano.

3723. *Sph. Empetri* Fr., pyreniis subgregariis minortis hemisphaericis epigenis, e basi synphloodee innata convexiusculis prominulis atris obsolete papillatis, demum collapsis rugosis. — Fr. l.l. *Hypodermium sphærioides* v. *Empetri* DC.

Ad folia Empetri arida, rarius. Hyeme.

3724. *Sph. Epilobii* W., pyreniis sparsis minutis nigris epicaulis, e basi synphloodee innata verticem umbilicato-depressum nitidum obtuse marginatum informantibus. — ?*Dothidea Epilobii* Fr. syst. II. 559.

Ad caules siccos Epilobii angustifolii passim. Hyeme.

3725. *Sph. Geranii* W., pyreniis basi synphloodeis punctiformibus subrotundis oratisque atro-viridibus laevissimis nitidissimis sparsis, primum hemisphaericō-emersis exilissime papillatis, dein vertice subsidentibus impresso-umbilicatis, intus albis. — Wallr. in lit. 1816. *Dothidea Robertiani* Fr. syst. II. 564. Grev. scot. t. 146.f. 1.

Ad folia Geranii Robertiani vegeta Thuriag. passim.

3726. *Sph. leguminum* W., pyreniis synphloodeis sparsis parvis nigro-fuscis, dein umbilicato-impressis subsidenteque cum epidermide adaequatis.

Ad legamina Dolichorum languida s. putrescentia.

3727. *Sph. Hederae* Fr., pyreniis parvis sparsis hemisphaericis hypogenis, e basi synphloeode innata verticem nigrum opacum, primum prominulum umbonatum obsolete papillatum informantibus, dein collapsis in discum concaviusculum veluti marginatum subsidentibus deplanatis ostioloque albido reclusis. — Fr. l. l. 521. *Sph. punctiformis* β. *Hederae* Pers. syn. 90. *Sph. Craterium* DC. ?*Sph. complanata* var. δ. DC.

Ad folia Hederae, Rusci et Ilicis passim.

3728. *Sph. punctiformis* Pers., pyreniis minutissimis ictato-synphloeodeis hypogenis laevibus nigris convexiusculis, dein vertice umbonato obsolete papillato emergentibus nitidalis, nucleo albo-tenui fæctis, demam subsidentibus impressis.

α. *sparsa*, pyreniis confertim sparsis. — *Sph. punctiformis* Pers. syn. 90. sxl. var. β. γ. et descript. Fr. syst. II. 525.; var. *quercaria* DC.

β. *aggregata*, pyreniis confertissimis confluentibus, stroma rotundato-angulatum 3-8 pyrenium veluti mentionibus. — *Sph. maculneiformis* Pers. syn. 90. Fr. l. l. pr. pr.

Ad folia (quercina et tiliacea) humi jacentia. Hyeme.

3729. *Sph. radiata* W., pyreniis hemisphaericis sparsis nigris minutissimis synphloeodeis, summam epideridis pelliculam tenuissimam hyalinam veluti in fibrilulas radiantes divulsam elevantibus. ?*Actinonema Crataegi* Pers. myc. I. 53.

Ad folia Sorbi terminalis sicca passim.

3730. *Sph. sparsa* W., pyreniis dispersis minutis fuscis synphloeodeis convexis obsolete papillatis poroque nucleum album transmittentibus, demum depresso-umbilicatis.

Ad folia Tiliae microphyllae sicca passim.

3731. *Sph. atomaria* W., pyreniis confertim sparsis minutis inaequalibus nigris, e basi synphloeode innata aequali sensim verticem convexum obsolete papillatum, dein inconditum, osculo irregulari pertusum informantibus,

nucleo albente farctis. — *Sph. epidermidis* Fr. syst. II. 499. *Sph. atomaria* W. Naturg. I. 153. *Verrucaria atomaria* DC. *V. punctiformis* Pers. Ach. Fr. lich. 447. *V. cinerea* Pers. *V. stigmatella* Ach. pr. pr. *V. Hippocastani et microscopica* DC. *Lichen mycoporoides* Ehrh.

Ad epidermidem fruticum arborumque junior., Populorum praesprimis, Berberidis, Daphnes aliarumque, in quibus quidem inter initia facile desciscunt monstrosique veluti arthonioideis locum dant (*V. galactites* DC.)

3732. *Sph. analepta* W., pyreniis sparsis pervia hemisphaerico-tornatis nigris, e basi synphloeode innata circumscripto-orbiculata verticem umbonatum papillatum, dein pero pertusum informantibus, inter initia saepius in monstra placodes effoeta desciscentibus. — *Verrucaria epidermidis* a. Fr. lich. 447. *V. analpta* Ach. lich. 275. *V. olivacea* Pers. Schrad.

Ad epidermidem vegetam ramorum, Fagi potissimum, Pyri, Crataegi, Cydoniae, Sorbi aliarumque. (Monstra placodes titulis ambiguis *Arthoniae punctiformis* Ach. pr. pr. redeunt, epidermide lacera cincta.)

3733. *Sph. elliptica* W., pyreniis sparsis majusculis hemisphaericis nigris, e basi synphloeode plano-depressa elliptica maculari expansa dein scutiformi, ad ambitum subsoluta sensim in verticem umbonatum papillatum, nucleo albo farctum, dein pero pertusum abeuntibus. — *Sph. infarciens* W. Naturg. I. I. *Verrucaria epidermidis* a. Ach. I. I.; var. b. Fr. lich. I. I. *Lichen epidermidis et ellipticus* Ach. prodr.

Ad ramos betulinos vulgaris. (Speciem triadem, a Fleerkeo (Ann. wett. I. 120.) *Verruc. punctiformis* titulo comprehensam, equidem dudum ex *Lichenum* classi expunxi, nuncque tute distinguo.)

3734 *Sph. chartarum* W., pyreniis confertim sparsis minutis hemisphaericis nigro-fuscis, e basi synphloeode halonem concolorem dilatiorem orbiculatum tenuem circumfundente convexis obsolete papillatis carnosis,

intus concoloribus. — *Sph. epipapyra* Wallr. in Lit.
Fr. encycl. II. 103.

Ad chartas quasconque locis uidis reportas.

3735. *Sph. epimyces* Fr., pyreniis gregariis punctiformibus globosis papillatis atris, e basi synphloeode halonem purpuraseentem spargente subeuntibus, demum pulpam gelatinosam albam subcirtrosam stiltantibus. — Fr. syst. II. 499. *Cytopsora epimyces* Ehrenb. sylo: 28.

Ad Thelephoras restipinatas destructas rarius.

3736. *Sph. Cucurbitacearum* Fr., pyreniis gregariis e basi synphloeode inesta hemisphaericis proximulis laevibus nitidis astomis, pulpa gelatinosa molli farctis. — Fr. syst. II. 502.

Ad fractus Cucurbitarum exsiccatos rarius.

3737. *Sph. maccea* Pers., pyreniis globosis molibus astomis, siccando corrugatis, primum rubentibus, e basi synphloeode emergentibus, demum opacis gryseo-nigrescentibus confluentibus, maculam crustaceam effusam mentientibus. Pers. syn. 29. A. et Schw. 12. Fr. syst. II. 426.

Ad fractus Cucurbitarum et Pepoaeum sicos, rarius.

3738. *Sph. Agaricola* Chaillet, pyreniis confermissimis carnosis partis hemisphaericis fuscis, deinde e basi synphloeode cubilium carbosorum compagem veluti pseudostromaticam obstruente, verticem convexam teniter impressoque papillatum informantibus faciemque superiorem s. utramque collicaloso-exarataam obliteratedibus. — Fr. syst. II. 339.

Ad Agarioos maiores Heroyn. infer. passim legi sub vellere sericeo latitatem omnemque compagem (stroma inst.) pyreniis insculptis infarcentem. Auctummo.

^{**} *hypophloeodae*, pyreniis simplicibus hypophloeodetis, vertice umbonato libero s. udato summanum epidermidis pellisulam scissam revealentibus. (*Sph. folii-cauliolaris*, subflectarum et pertusarum sp. Fr.)

^{*} pyreniis summam epidermidem velutin scindentibus.

3739. *Sph. Eryngii* Fr., pyreniis minutissimis

hypophloeodeis amphigenis nigris inaequalibus sparsis, gregariisve spatia internervia obliterantibus astomis, demum vertice convexo emergentibus, intus albis. — *Fr. in lit. Dub. gall. II. 710.*

Ad folia Eryngii campestris arida. — *Hyeme.*

3740. *Sph. scutina Fr.*, pyreniis depresso-glebois exignis sparsis nigris, sub summa epidermidie pellicula delitescentibus illamque vertice hemisphaericō prominulo sublevantibus semiperforantibus, intus albis. *Fr. syst. II. 520.*

Ad folia Pyri, communis et Mali putridi. — *Hyeme.*

3741. *Sph. epicymatia W.*, pyreniis minutissimis hemisphaericis atris nitidis, e basi synphloicode subtilli in verticem convexum tenuissime papillatum, mox osculo angustissimo foratum abeantibus, dein confertissimis confluentibus rugulis cymatiorumque discoam obovataam obliterantibus. — *Sph. epicymatia W. in lit. 1818. Fr. el. II. 103. Sph. lichenicola Sommerf. Iapp. 218. Fr. I. I.*

Ad Lichenum plurimorum cymatia, v. c. Parmelise subfuscæ, (quæ quidem P. atræ faciem exacte præ se ferre solent), P. fraxineæ, Patellæ, staphylocarpi, atiarumque.

3742. *Sph. hians W.*, pyreniis minutissimis sparsis insculptis nigris, e basi synphloicode in verticem promonitum coovexam, mox osculo aperto hiantem excipuliformem abeantibus cubiliaque exasperantibus.

Ad pyra immatura humi putrescentia. — *Aubtundio.*

3743. *Sph. stercoreis DC.*, pyreniis minutissimis punctiformibus tectis ovoides nitidis atris, dein vertice carbonato poro-pertuso parce prominulis. — *DC. gall. II. 791. Fr. el. II. 104. Sph. stercorearia ß. Fr. syst. II. 456.*

Ad fimum cervinum et leporinum siccum passim.

3744. *Sph. sthenograpta W.*, pyreniis minutissimis sphaericis nigris synphloicode sparsim confertimque gregariis, dein vertice impresso subemergentibus, intus albidis. — *Sph. epidermis v. minor aut.*

Ad ramos Pruni, Cerasi, rerinae.

3745. *Sph. custos* Fr., pyreniis depresso-globosis hypophlocoidea atris, osculo umbilicato pares prominolis. — *Fr. elench. II.* 109.

Ad calmos graminum siccus. Auctumno sero.

3746. *Sph. duplex* Sow., pyreniis depresso-globosis exiguis nigris sub summa epidermidis pellicula delitescentibus translucentibus illamque vertice depresso umbilicato prominulo, dein poro pertuso perforantibus. — *Fr. syst. II.* 520. *Sowerb. t. 375. Sph. transducens* et *Sph. paludosa* Nees in Lit.

Ad culmos Arundinis Phragmitis, nec non ad folia Sparganii, Sagittariae, Typhae, Nardi aliorumque.

3747. *Sph. Pinastri* DC., pyreniis depresso-globosis sparsis parvis nigris, sub summa epidermidis pellicula delitescentibus illamque ambo depresso comprehensam vertice prominulo acutiusculo longitudinaliter scissam leviter perforantibus. — *DC. gall. VI.* 133. *Fr. syst. II.* 488. *Cryptosphaeria Tari var. Grev.*

Ad folia pinea humi putrescentia frequens.

3748. *Sph. Vincae* Fr., pyreniis sparsis globosis nigra nitidis hypophlooeolis, dein vertice depresso albo summati epidermidis pelliculam perforantibus. — *Fr. in lit. Dub. gall. II.* 709.

Ad folia Vincae minoris languida. Auctumno.

3749. *Sph. Russi* W., pyreniis minutissimis sparsis nigrescentibus sub summa epidermidis pellicula delitescentibus illamque vertice orbiculato depresso laevi comprehendens aequaliter expansam translucentibus demumque poro circinato parce perforantibus. — *Sph. atro-virens* d. *Russi* Fr. *syst. II.* 501. *Cryptosphaeria glauco-punctata* Grev.

Ad folia Russi aculeati hortensi. passim. Hyeme.

3750. *Sph. Eryngyi* Kz., pyreniis minutissimis atris, sub summa epidermidis pellicula delitescentibus iunatis illamque vertice orbiculato depresso rugoso, primum comprehendens, deinde tenuiter fissam parce perforan-

tibus, confertissimis, areolas maculares inter nervias multangulas paucato-acbras nigro-fuscas mentientibus. — *Fr. syst. II.* 439.

Ad folia *Evonymi europaei* putrescentia passim.

3751. *Sph. Taxi* Sow., pyreniis minutis sparsis hypophloeodeis nigris orbiculatis, vertice umboato summam epidermidis pelliculam nigro-pellocentem integrum elevantibus centroque albicante perforantibus, nucleo albo farctis. — *Fr. syst. II.* 500.

Ad folia et ramulos languidos *Taxi baccatae* hort.

3752. *Sph. delitescens* W., pyreniis exiguis tenuerrimis subrotundis, primum hypophloeode-latitantibus dilute fascescentibus, deinde nigrescentibus, summam epidermidis pelliculam vario acissam elevantibus illamque translucentibus, demum vertice aperto hiantibus. — ?*Sph. Miribelii* Fr. in Schleidl. Linn. 1830. p. 548.

Ad foliorum *Buxi* hort. utramque faciem et ramos Thuriog. passim. (*Melius* forsan sub *Helicobolo* genere militat, a *Sph. Buxi* DC. diversa.)

3753. *Sph. Corni* Sow., pyreniis minutissimis gregariis hypophloeodeis globosis nigris, vertice convexo leevi epapillato summam epidermidis pelliculam integrum nigro-translucentem sublevantibus exasperantibusque. — *Sowerb. t. 370. f. 5.*

Ad ramulos novellos *Corni sanguineae* languidos.

3754. *Sph. foveolaris* Fr., pyreniis minutis masculisve confertis hypophloeodeis depresso-globosis nigris, intus albis, vertice deplanato summam epidermidis pelliculam integrum, halone nigro-pellucido subrotundo inustam centroque puncto aequali albo inscriptam comprehendentibus, demum convexiusculo perforantibus foveolasque depressas nigras relinquenteribus. *Fr. syst. II.* 499.

Ad ramos mortuos *Evonymi europaei* passim.

3755. *Sph. sarmatorum* Fr., pyreniis minutis sparsis hypophloeodeis orbiculatis, vertice depresso papillato summam epidermidis pelliculam, halone nigro-

pellacido subrotundo inscriptam poreque centrali nigro pertusam comprehendentibus, insculptis, nucleo dein sanguinante, ascis ovato-oblongis septatis foeto farctis. — Fr. syst. II. 498.

Ad sarmenta Menispermi canadensis hort. languida.

3756. *Sph. Visci DC.*, pyreniis confertim sparsis hypophloeodeis aeneo-nigris hemisphaericis, vertice convexo summam epidermidis pelliculam nigro-pellucidentem elevantibus denumque varie scissam perforantibus ostioloque subrimoso nucleum nigro-virentem, ascis magnis oblongo-cylindricis obtusis medio contractis bi-trisporis foetum cirtosum projicientibus. — DC. gall. VI. 146. *Sph. atro-virens* a. *Visci Alb.* et Schw. nijk. 48. t. 2. f. 1. excl. var. β . Schmidt l. l. t. 1. f. 2. Fr. syst. II. 501. excl. var. β .

Ad Viscam album languidum rarius.

3757. *Sph. apiculata W.*, pyreniis exiguis sparsis atris, a basi depresso-globosa hypophloeode obvelata in verticem concreviusculum, papilla apiculata acutiusculo similiterque pertuso, summam epidermidis pelliculam elevatam adnexam perforante coronatum dilatatis, nucleo atro. Ad novellos Salicis vitellinas languidos.

3758. *Sph. sepincola Fr.*, pyreniis minutissimis confertim sparsis hypophloeodeis depresso-globosis nigris, vertice deplanato summa epidermidis pelliculam, halone subrotando ovalique pallido nigro-limitato inscriptam comprehendentibus ostioloque centrali nigro tenui pertusis, intus albis. — Fr. syst. II. 498. excl. syn. Sow.

Ad ramos Rosatam, Salicum aliorumque fruticis.

3759. *Sph. culmifraga Fr.*, pyreniis minotis confertim sparsis, cabilium vallecalas depressas parallelas occupantibus, subseriatim compulsis nigris hemisphaericis, primum summa epidermidis pellicula hyalina tenuissima laxe velatis illamque lacero-scissam, vertice convexo rugoso permeando sublevantibus. — Fr. syst. II. 510. exs. var. *majore et minore*.

Ad caules herbarum, graminum calmos vitisque sarmenta.

3760. *Sph. fissa* Pers., pyreniis parvulis atris dilatis, primum hypophloeodeis sparsis hemisphaericis, deinde vix irregulariter rimoso summam epidermidis pelliculam permeantibus sensimque magis emergentibus, subglobosis confertissimis in crostam pseudo-stromaticam seriatam colliculosam veluti constipatis. — Pers. syn. 79. Fr. syst. II. 424. (excl. stromate villosa fortuito.)

Ad ramos Rosarum sylvestrium recisos humique jacentes.

3761. *Sph. Mictula* Fr., pyreniis globosis pruinatis albo-pubescentibus parvis sparsis, vertice papillato impresso fuoco summam epidermidis pelliculam parce scindentibus. — Fr. elench. II. 101.

Ad ramos languidos Rhamni alpini voges. (Meng.)

3762. *Sph. inquilina* JV., pyreniis immersis latentibus tenuissimas pubescentibus, nucleo atro farctis, hypophloeodeis, dein ostiolo punctiformi nigro prominulis. — JV. in lit. Fr. elench. II. 100.

Ad caules Heraclei Thuring. Auctummo.

3763. *Sph. herbarum* Pers., pyreniis mole variis subgregariis atris, primum hypophloeodeis, vertice umbo-nato s. depresso-globoso papillato summam epidermidis pelliculam laxe obvelantem translucentibus deinceps revelando excentribus, praeter basin leviter adfixam liberis subrotundis caseiformibus centroque demum osculo prominulo pertuso umbilicato-depressis veluti epiphloeo-deis, nucleo albo farctis. — Pers. syn. 79.

a. minor, pyr. parvis subrotundis. — *Sph. herbarum* Fr. syst. II. 511., var. *y. tecta* Pers. & I.

b. major, pyr. rotundatis majoribus. — *Sph. complanata* Tod. med. 21. f. 88. Fr. I. I. 508.; *Sph. herb. a.* Pers. I. I.

y. conica, pyr. truncato-conicas. — *Sph. coniformis* Fr. I. I. 508.

Var. *a.* ad caules quoscunque languidos; *b.* ad escopos Alliorum; Asparagos, Armembracias auct. siccandos ubertim; *y.* ad Crepidem tectorum. (Adulta habitum epiphloeo-deum mole quo eximio variat.)

3764. *Sph. Lonicerae Sow.*, pyreniis globosis gregaris nigris tenuibus hypophloeodeis, dein erumpentibus subliberia, vertice subsidentibns, cupuliformibus s. lacero-diffractis. — Sowerb. t. 393. f. 6. Fr. syst. II. 492.
Ad ramos Lonicerae Periclymeni rarius. Auctumno.

3765. *Sph. rugosa W.*, pyreniis parvis confertim-sparsis nigris, e basi globosa insculpto-hypophloeode obvelata abrupte in verticem, papilla sphaerica prominula corrugata coronatum summamque epidermidis pelliculam perforantem abeuntibus, nucleo hyalino farctis. — *Sph. occultata Fr. elench. II. 72. ad mea specim.*

Ad ramos Syringae putres passim

3766. *Sph. protracta Pers.*, pyreniis parvis nigris, e basi globosa insculpto-hypophloeode obvelata in verticem depresso, papille subtili summam epidermidis pelliculam penetrante parceque prominulam abeuntibus sparsis confluentibusve, strias inordinatas per paria seriatas mentientibus. — Pers. syn. 34. Nees syst. f. 322. Fr. syst. II. 425.

Ad ramos Aceris campestris mortuos passim.

3767. *Sph. prorumpens W.*, pyreniis parvis sparsim - confertis, nonnisi aggregato - confluentibus atris, e basi globosa insculpta in verticem convexiusculum, praeter papillam conicam prominulam cubilia exasperantem hypophloeodeis, nucleo pulposo hyalino farctis. — Wallr. in lit. Fr. syst. II. 357.

Ad trancos caesos Viburni Opuli Thuring.

3768. *Sph. Spartii Nees*, pyreniis parvis nigris, e basi globosa insculpto-hypophloeode obvelata in verticem planiusculum rugulosum, osculo impresso obtuso pertusum, summam epidermidis pelliculam fissam aquatiter penetrantem dilatatis, sparsis, deinde aggregato-confluentibus, veluti pseudostromate connexis. — Nees in lit. Fr. syst. II. 424.

Ad vitices Spartii scoparii languidos rarior.

3769. *Sph. spurca W.*, pyreniis parvis nigro-fuscis

sparsis tenacellis, e basi depresso insculpto-hypophloeodeis obvelata in verticem hemisphaericum sordide fuscum incusum nigro-papillatum, dein oscule aequali pertusum absentibus summarumque epidermidis pelliculam percissime scissam elevantibus, nucleo atro-viridi coacte, ascis solutis oblongis obtusis minitatisimis uniseptatis foeto farctis.

Sub epidermide Rosarum sylvestris in ramulis latet.

3770. *Sph. Amorphae* W., pyreniis minutis sparsis s. aggregato-subseriatis nigris globosis, praeter verticem umbonatum summam epidermidis pelliculam subtiliter elevantem hypophloeodeis eamque dein scissam infarcentibus, nucleo gelatinoso atro, ascis solutis ovatis minutis uniseptatis foeto farctis.

Ad novellos Amorphae fruticosae frigore tactos. Auct.

3771. *Sph. eructans* W., pyreniis minutis sparsis nigris globores, nucleo atro-violaceo glutinoso farctis, praeter verticem umbonatum, dein ascis solutis ovato-oblongis obtusis opacis uniseptatis profusis inquinantibus elevato-emersum, hypophloeodeis.

Ad ramos juglandinos gelu tactos passim.

3772. *Sph. Xylostei* Pers., pyreniis majusculis sparsis, aepriis geminatis nigris, nucleo concolore farctis, primum insculpto-hypophloeodeis subglobosis, dein vertice umbonato papillato summam epidermidis pelliculam integrum illamque ascis ovato-subrotundis, centro ponetatis nigrescentibus transfusis intertextam longitudinaliter elevantibus basinque ellipticam nigrescentem mentientibus, demum poro pertusis parce prominulis. — Pers. disp. §. Fr. syst. II. 487. *Sph. inquinans* β. *Xylostei* Pers. syn. 84.

Ad ramos Loniceras Xylostei vivos et laeuidos.

3773. *Sph. inquinans* Tod., pyreniis majusculis creassis sparsis nigro-fuscis, nucleo albo ascis nigris oblongis majusculis opacis foeto farctis, e basi globosa involuta latitante in verticem mamillarem abrupte contractis ejusque apice epidermidem verrucosam, ascis profusa adglutinatis inquinatam perforantibus. — Tod. med. II.

17. f. 83. Pers. syn. 83. Ness syst. f. 356. Fr. syst. IL 486. *Nemaspore inquinans* Spr. hal. *Variolaria ellipso-sperma* Bull. t. 493. f. 1.

Ad ramos acerinos, quos ascis profusis et adhaereuntibus solet inquinare. (Synonyma l. titulum vagum praestant; nec alias excludunt siamles, ascorum indole tamen facile dignoscendas.)

3774. *Sph. maculata* W., pyreniis parvis sparsis nigro-fuscis, e basi globosa insculpta latitante, nucleo nigro, ascis nigro-violaceis oblongo-cylindricis utrinque scuticululis trisporis pellucidis foetis farcta in verticem granuloatum contractis ejusque apice papillato verrucoso laquinate promulsa. — *Sph. inquinans* auct.

Ad ramulos carpineos siccios passim.

3775. *Sph. conspurcata* W., pyreniis parvis teneris confertim sparsis, e basi globosa insculpta latitante, nucleo nigro, ascis cylindricis utrinque acuminitatis trisporis foeta, in verticem abrupte papillatum, halone cinctum summam epidermidis pelliculam penetrantem abeuntibus ascosque in verracam conicam colligentibus. — *Sph. inquinans* auct, ?Ness syst. f. 356. Kunze D. Schw. n. 180.

Ad ramos Pruni Pedi siccios passim.

3776. *Sph. succincta* W., pyreniis majusculis sparsis nigris, basi globosa insculpta latitibus, nucleo atro glutinoso ascis nigris oblongo-cylindricis utriusque scuticululis trisporis a. triseptatis foeto farctis, extre cingulo grumo fuso obvallatis, vertice verrucoso summam epidermidis pelliculam demum perforantibus ascosque conglutinatos stipantibus. — *Sph. inquinans* auct.

Ad ramos Rhamni cathartici siccios passim. (*Sph. circumscripata* K., fere aemulator.)

3777. *Sph. pertusa* Pers., pyreniis majusculis sparsis atris, e basi globosa insculpta in verticem umbonatorem, demum papilla conica decidua ostiolo subrotundo patulo aequandi pertusam abeuntibus ascosque epidermidem scissam aequaliter infarcentibus. — Pers. syn. 83. Fr. LL 464.

Ad ramos acerinos siccios varijs,

3778. ? *Sph.* *Eremita* Rebent., pyreniis atris sparsis ligno immersis sub prominulis cortice papillatis. — Rebent. neom. 336.

Ad ramos coryloes Neomarch. (Rebentisch.)

3779. *Sph. ericola* W., pyreniis parvis sparsis nigris, e basi globosa insculpta latitante in verticem planum, primum ascis coactis albis obturatum summaque epidermidis pellicula velatum dilatatis eaque demum sedente in osenulum rotundum apertis vacuis urceolaribus. Ad ramos carpinoes siccos, albuno insculpta.

3780. *Sph. papillata* Schum., pyreniis sparsis orbicularibus laevibus atro-fusco, basi umberata immersis, nucleo gelatinoso albo farctis; majusculis, vertice papillato obtuso dein impresso prominentibus. — Schum. Scell. II. 161. Fr. syst. II. 461.

Ad lignum salicinum patridum passim.

3781. *Sph. patellaria* W., pyreniis sparsis orbiculatis atris hypophloeode-latitatis, basi convexis scutula latiore epidermide adnatis illamque dein vertice planis, primum membranis delicatescens concolora cum cubilibus confluentibus, dein ascis solatis oblongis atro-nitidis pteroscapentibus in mastam palpabilem coactis obteoto rotundato-scissam infarcentibus, effectis vacuis patellis diu persisteotibus.

Ad ramos Pruni domesticae languidos Thuring. passim.

3782. *Sph. limitata* Pers., pyreniis majusculis sparsis (raro confluentibus) atris, e basi anglobosa leviter insculpta umberent convexum emersum, epidermide tenui velatum papillaque globosa prominula coronatum, nucleo pulposo hyalino farctum abeuntibus, dein hemisphaericis, ovoalo-amplo pertusis. — Pers. in tñ. *Sph. macilenta* Fr. syst. II. 487.

Ad ramos siccos Corni sanguineae et Rhamni passim.

3783. *Sph. cylindrica* Nees, pyreniis majusculis grêgariis atris, e basi depresso insculpta in verticem deplanatum, epidermide tenuiter velatum papillaque conico-

truncata coronatum abeuntibus, deinde subsidentibus osculoque amplio pertuis. — *Nees syst. f. 355. Fr. syst. II. 487.*

Ad ramos Rubi fruticosi. Vere. (Nees.)

3784. *Sph. seminuda* Pers., pyreniis sparsis nigris, basi ligno albicante insculptis s. veluti tegmine tenui albicante tectis, vertice conico acuto nudo prominulis, dein poro pertusis. — *Pers. syn. 70. Fr. syst. II. 464.*

Ad ligos exsiccatos. (Persoon.)

3785. *Sph. albicans* Pers., pyreniis majusculis sparsis s. seriato-confluentibus, e basi globosa ligno insculpta latitante, tegmine coacto candido foras profuso illaque veluti halone cingente tecta in verticem convexum magis minusve prominulum, papilla conica nigra nitida nuda coronatum abeuntibus. — *Pers. syn. 70. ?Sph. mastoidea Fr. syst. II. 463. (pyreniis conicis.) Sph. confusa Tode l. L. t. 10. f. 87. (lusus confusa.)*

Ad torticem salicinam antiquum rarius.

3786. *Sph. Mamma* W., pyreniis majusculis sparsis, nonnisi geminatis atris, e basi semiglobosa insculpta contracta in verticem cibilibus deplanando abrupte adpressum sensim conoideam, summa epidermidis pellicula diu velatum papillaque conica acuta insigni prominula coronatum abeuntibus, mammosis, nucleo pulposo hyalino farctis, demum osculo ampio rotundo patentibus, vacuis.

Ad ramos Ligustri siccos rarior.

3787. *Sph. Tiliac* Pers., pyreniis magnis sparsis atris opacis hypophloeode-latitantibus, e basi depresso-globosa leviter insculpta abrupte in collum brevissimum, summam epidermidem perforans attenuatum verticeque emerso varieque figurato, nonnisi enormiter dilatato prominens productis eoque deciduo poro rotundo hiantibus. — *Pers. sys. 84. Nees syst. f. 339. Fr. syst. II. 486. Nemaspora Tiliac Rebent. neom. 340. Sph. ampullacea Pers. syn. 41. (pyreniis compositis, intus subcellulosis.)*

Ad ramos tiliaceos siccos, perquam versipellia.

... *pyreniis sparsis, summam epidermidem velantem,*
dein scissam apice prehendentibus illique detraetis sub-
tus adhaerentibus. (Sph. tribus 23. obtectae Fr.)

3788. *Sph. vibratilis* Fr., pyreniis sparsis con-
 vexis globoso-depressis tenuerrimis aterrimis nitidis hypo-
 phloecodeis latitantibus osculoque subtilissimo summam epi-
 dermidem comprehensam perforantibus. Fr. syst. II. 84.

Ad ramos languidos Pruni domesticae passim.

3789. *Sph. ditopa* Fr., pyreniis globosis nigris,
 binc urceolato-depressis sparsis hypophloecodeo-latitantibus
 osculoque in disco angustissimo heterogeneo prominulo
 summam epidermidem laxe aduatam permeantibus. —
 Fr. syst. II. 481. *Sph. alnea* Pers. in lit. ? *Sph. socia*
 Nees in lit.

Ad ramos alueos languidos frequens. Vere.

3790. *Sph. Corticis* Fr., pyreniis glébosis ma-
 jusculis sparsis hypophloecodeo-latitantibus osculisque sub-
 tilissimis summam epidermidem binc appensam dea parce
 scissam perforantibus et veluti punctis picturantibus. —
 Fr. syst. II. 481. *Sph. millepunctata* Dub. *Cryptosphaeria*
 millep. Grev. scot. t. 201. *Sph. populina* Pers. ic. 52. t. 21.
 Ad corticem ramorum populinorum passim.

3791. *Sph. decedens* Fr., pyreniis globosis immersis
 hypophloecodeo-latitantibus sparsis gregariisqae nigris,
 osculis brevissimis summam epidermidem laceram per-
 forantibus. — Fr. L. I. *Sph. tessella* B. Pers. syn. 48.
 Nees syst. f. 340.

Ad ramos coryleo passim. Vere.

3792. *Sph. pruinosa* Fr., pyreniis e basi globosa
 vasculosa nigra turgida, siccando urceolato-collapsa epi-
 dermidi innata, primum tegmine tenui albo-sulfuraceo
 tecta, dein nuda abrupte in collum abbreviatum contractis,
 insculpto-latitantibus, denum osculo umbonato-mamillari,
 poro tenui pertuso nigro summam epidermidis pelliculam
 parvo elevatam scissam perforantibus. Fr. syst. II. 486.
 Ad ramos fraxineos languidos Thyg. vulgaris. Aust.

3793. *Sph. anserina* Pers., pyreniis ovatis nigris (Hgno) immersis comque illo bullato-elevato prominulis osculisque papillato-teretiusculis perforantibus. — Pers. icon. 5. t. 1. f. 8. Fr. syst. II. 480.

Ad ligna sicca. (Persoon.)

3794. *Sph. ocellata* Fr., pyreniis globosis atris sparsis immersis, osculo solitario umbilicato in disco albo truncato, epidermidem scissam infariente prominulo eoque veluti ocellato. — Fr. syst. II. 480. *Sph. Stictis* Pers.

Ad ramos fraxineos et salicinos languidos. Vere.

3795. *Sph. eunomia* Fr., pyreniis parvis nigris liberis confertis s. subgregariis hypophloeode - latitantibus epidermidemque circumscripte pallidam velantem osculis brevibus prominulis permeantibus. — Fr. syst. II. 377.

Ad ramos fraxineos et pruneos passim.

3796. *Sph. rhodostoma* A. et Schw., pyreniis depresso-globosis concentrico-striatis sordide nigris sub-aggregatis, crustulae concolori hypophloeodi innatis osculis que denudato roseo epidermidem hinc adnatam perforantibus. — Fr. syst. II. 483. A. et Schw. nisk. 43. t. 4. f. 3. Nees syst. f. 338.

Ad ramos Rhamni Frangulae siccios passim. Vere.

*** epiphloeodeae, pyreniis simplicibus astromaticis epiphloeodeis, praeter basin adnatam liberis nec velatis, calvis, primum vertice papillatis, dein osculo tornato reduisis, nucleo gelatinoso, ascis elongatis septato-sporophoris forcatis eoque exinanito saepius subsidentibus. (*Sph. trib. 19. denudatae* Fr.)

3797. *Sph. stigmatella* W., pyreniis microscopicis nigris nitidulis arce adpressis convexiusculis, primum sparsis, dein aggregatis subcircinantibus, circulos nigro-punctatos maculares mentientibus. — ?*Coniosporium circinans* Fr. syst. III. 257.

Ad vaginas Arundinis Phragmitis passim.

3798. *Sph. congregata* W., pyreniis minutissimis confertissimis, cubilibus laxe adhaerentibus, subrotundis

atris nitidis subtilissime rugositas, vòtice depresso: tenuiter papillato demum pertusis, nucleo albido tenui farctis. — ?*Sph. Atomus Schum.* *suec.* II. 158.

Ad ligna salicina patredine exesa Thuring.

3799. *Sph. myriocarpa* Fr., pyreniis minimis globosis laevibus astomis atris nitidis sparsis, dein conservisimis depresso: — *Fr. syst. II.* 459. *Grev. scot.* I. 152. f. 1.

Ad ligna decorticata humi jacentia. Auctumno.

3800. *Sph. vilis* Fr., pyreniis sparsis minutis atris opacis, praeter basin planam cubilibus innatam liberis hemisphaericis obsolete papillatis, dein depressisoulis pertusis. — *Fr. syst. II.* 466. *Sph. umbratilis* Reb. *neom.* 335.

Ad ligna decorticata molliora ventis exposita.

3801. *Sph. excularum* Fr., pyreniis epiphloeo-deis sparsis minimis nigris sessilibus atris nitidis teneria regularibus, primum conico-hemisphaericis; dein centro depresso: papillatis, veluti marginem tenuem circumducentibus s. pezizoideis, nucleo nigrescente gelatinoso farctis. — *Fr. syst. II.* 466.

Ad ramulos novellos decorticatos, salicinos v. c., sambucinos et Rosarum, in quibus saepius seriatim erumpit.

3802. *Sph. complicata* W., pyreniis coosferim sparsis nigris minutis, primum insculptis elliptico-compressis, dein praeter basin infixam tenuatam emergentibus obovatis in verticem subrotundum convexum obsolete papillatum liberum, siccando verium, nunc discoideo-depressum, nunc multipliciter complicatum obtusum exempliatis, nucleo albo farctis. — ?*Sph. taphrina* Fr. I. t.

Ad ramulos decorticatos salicinos et sambucinos, ipsosque caules Malvarum et Bardanae siccios.

3803. *Sph. mycophila* Fr., pyreniis sparsis atris hemisphaericis laevibus subinaequalibus, a basi adnata liberis, vòtice primaum papillatis, dein pertusis. — *Fr. syst. II.* 462.

Ad Polyporos destructos rarius. Auctumno.

3804. *Sph. pulv racea* Ehrh., pyreniis confertis nigris nitidis rigidis minutis, praeter basin adnatam epiphloeo-deo-liberis ovato-subglobosis tenuissime rugulosis, vertice convexe obtuse papillatis, dein poro portoau pertusis. — Pers. syn. 83. Fr. l. l. 459.

Ad ligna saginae et quercina sicca passim.

3805. *Sph. mobilis* Tod., pyreniis gregariis liberis tenerrimis minimis mollibus fusco-nigricantibus, primum globosis papillatis, dein depressis pertusis. — Tod. n. cib. II. 9. f. 71. Fr. syst. II. 461.

Ad ramulos putridos quercina rarius.

3806. *Sph. microthelia* W., pyreniis confertis atris nitidis rigidis minutis, praeter basin adnatam epiphloeo-deo-liberis globoso-tortatis laevissimis, vertice convexo acute-papillatis, dein osculo conformi pertusis.

Ad ligna Pronorum vetusta simulac indurata.

3807. *Sph. Citrum* W., pyreniis parvis tornato-globosis sparsis incusis laete citrinis, praeter basin leviter adnatam liberis, vertice umbonato papilla exiliissima saturata inscriptis, mollibus, dein membranaceis, nucleo gelatinoso hyalino fæctis.

Ad troncos alneos putredine exesos Thuring.

3808. *Sph. sanguinea* Sibth., pyreniis minutis sparsis politis ovato-subglobosis miniato-rubris, praeter basin leviter eduatam liberis, vertice convexo papilla saturatiore inscriptis, mollibus, dein membranaceis subdepressis. — Fr. syst. II. 453. Nees syst. f. 360. Bolt. t. t. 121. *Hypoxylon phoeniceum* Bull. t. 487. f. 3.

Ad ligna putrida nec non ad Sphaerias aromaticas.

3809. *Sph. episphaeria* Tod., pyreniis minutis confertim gregariis politis ovato-subglobosis laete coccineis, praeter basin adfixam liberis, mollibus, vertice convexo prominulo-papillato dein subsidentibus concavis s. compresso-complicatis. — Tod. l. l. f. 89. Pers. syn. 57. Nees syst. f. 351. Fr. syst. II. 454. *Sph. erythroccocca* Ehrenb. sylv. 29.

In Sphaeris Stigmate et spinosa passim. Auctummo.

3810. *Sph. Resinæ Fr.*, pyreniis globosis laevibus glabris aurantiis mollibus sparsis, emergenti-epiphloesdeis liberis, ostiole obsolete gelatinam albam coactam tridentibus. — *Fr. syst. II. 453. Cytospora Resinæ Ehrenb. sylv. 28.*

Ex resina abietina passim emergit. Vere.

3811. *Sph. Granatum IV.*, pyreniis majusculis confertim-sparsis carnosis tenacellis globoso-tornatis, praeter basin leviter adfixam (saepius hypham delicatissimam exserentem) liberis glabris, vertice convexo obsolete papillatis, primum nucleo albo fuscis flavis, dein effiectis urceolato-subsidentibus puniceis. — ?*Sph. affinis Gren. scot. t. 186. f. 2. Fr. elench. II. 93. (in blastem licherum.)*

Ad Polypori hispidi senio confoeti faciem superiorem Thuring. rarius. Auct. (Asci clavati numerosissimi pul-pam constituentes et in sporidia ovalia uniseptata hyalinu facile secedentes.)

3812. *Sph. Aurantium W.*, pyreniis parvis sparsis incensis globoso-tornatis aurantiis, praeter basin levissime adnatam liberis, vertice convexo papilla globosa in basin dilatata operculiformi obturatis eoque dein deciduo poro ampio retundato pertusis, urceolato-subsidentibus duriusculis expallentibus.

Ad laburnum Populi tremulae putridum Thuring.

3813. *Sph. Peziza Tod.*, pyreniis majusculis gregariis s. confluentibus globoso-tornatis miniatis, tegmine grumoso pertenni obductis, praeter basin leviter adfixam (nonnisi in hypham succrescentem) liberis, vertice umbonato papilla globosa fusca obturatis eoque dein decidua in porum rotundum reclusis concavo-subsidentibus. — *Tod. I. I. f. 132. Pers. syn. 66. Gren. scot. t. 186. Fr. syst. II. 452. Sph. miniata Hoffm. germ. III. t. 12. f. 2. Nees syst. f. 316. (lusus villosus.) Peziza hydrophora Bull. t. 410. f. 2.*

Ad ligna quaecunque putredine uda exesa.

3814. *Sph. nitroa W.*, pyreniis confertim gregariis parvis globoso-tornatis nigris, extus praeter verticem

summum nigro-papillatum ocellatum: tegmina nitroso tenui albo, deinde in rimulas tenuissimas scisso obductis illoque dein deterso nigricantibus rugulosis. — *Sph. ocina* aust.

Ad trancoos tiliaceos putres Thuring. passim.

3815. *Sph. Puleia pyrius* Pers., pyreniis parvis confertissimis, veluti in pseudostroma crustaceum confluens atris opacis, praeter basin aduatam (nonnisi hypophloeodeo-immersam) liberis ovato-subglobosis tenuissime rugulosis rigidis, vertice difformi compresso s. rimoso-sulcato, demum poro minutissimo pertusis. — Pers. syn. 86. Nees syst. f. 348. Fr. syst. II. 458.

Ad ramos (coryleo) siecos ubertim.

3816. *Sph. ooides* Fr., pyreniis sparsis ovatis opacis laevibus atris rigidis sparsis liberis, vertice tenuatis, dein osculo subtilissimo pertusis. Fr. I. I.

Ad ligna exsiccata quericina rarius.

3817. *Sph. obducens* Schum., pyreniis confertis ovato-rotundatis inaequalibus rigidis atris opacis parvis liberis, vertice obsolete papillatis, dein confluento subeognatis, cubilia oblitterantibus. — Schum. saec. II. 159. Fr. I. I.

Ad ramos decorticatos, fraxineos v. c. passim.

3818. *Sph. stercoraria* Sow., pyreniis confertis globosis crassis rigidis nigris nitidis laevibus, vertice convexo papillatis, nucleo albo farctis. — Sowerb. t. 357. Fr. syst. II. 455. excl. var. β.

In fimo equino putri rarius.

3819. *Sph. spermoides* Hoffm., pyreniis majusculis globosis sparsis rigidis nigris opacis subtilissime incusis, vertice convexo aequalibus epipapillatis, dein poro pertusis, nucleo hyalino tunica inclusa farctis, nunc confertissimis in basiu attenuatis pseudostroma coccodes expansum mentientibus, nunc sparsis. — Hoffm. I. I. t. 3. f. 3. Pers. syn. 75. Grev. scot. t. 6. Fr. I. I. 457. *Sph. Graminum* Fl. dan. t. 131 L f. 1. *Sph. globularis* Batsch.

1. f. 180. *Hypoxylon miliaceum* Bull. t. 444. *Sph. cornicosa* Sowerb.

Ad trunco petros ados abandat. Vera.

3820. *Sph. operculata* Pers.; pyreniis ovato-globosis sparsis nigris (ligno) immersis, demum osculo emerso excavato, margine annulari veluti cincto hiantibus, parce prominulis. — Pers. syn. 80. exol. var. *β. Fr.* syst. II. 479.

Ad ligna pinea et alnea patrida passim.

3821. *Sph. livida* Pers., pyreniis subglobosis atris tenuibus sparsis, tuberculo ligneo prominenti elliptico griseo insculptis ostioloque pertuso parce prominulis. — Fr. syst. II. 479.

β. cinerascens, pyreniis immersis subcompressis sub prominulis, massa cinereo-livida cinctis. — Fr. l. l. *Sph. livida* Pers. syn. 80. Rebent. neom. 387. t. 2. f. 6.

Ad ramos exsiccatos rarius. (Persoon.) Auct. (Utrique dubia, potius sub *Sph. hypophloeodeis* no. 3782 militat.)

3822. *Sph. Nucula* Fr., pyreniis parvis gregariis, raro confluentibus nigris opacis rigidis, basi dimidiata innatis, vertice convexo prominente hemisphaerico in ostiolum conicum, primum impresso-obturatum attenuatis, dein poro coarctato retracto pertusis. — Fr. syst. II. 466.

β. polypyrenia, pyreniis ambonatis, ostiola 1-3 conica exserentibus. — *Sph. latericolla* DC. gall. II. 464.

Ad ligna duriora salicina et quercina soli exposita; in tiliaceis similem, at pyreniis confluentibus veroicoso-nitentibus minusque prominulis aberrantem legi.

3823. *Sph. Rhamni* Nees, pyreniis sparsis consertim gregariis majusculis depresso-globosis atris rigidis nitidulis, siccando vertice umbilicato tenuiter papillato subsidentibus superficiemque concentrico-sulcatam corrugatam conformem extus informantibus. — Nees syst. 299. f. 326. Fr. syst. II. 417. *Sph. lacunosa* Fr. olim.

Ad ramos Rhamni Frangylæ sicclos passim.

3824. *Sph. moriformis* Tod., pyreniis majusculis

confertissimis obovato-subrotundis friabilibus, vertice obsolete papillatis, extus atro-piceis nitidulis transversam rimosis, veluti ex verrucio rugosis exaratis conglobatis, intus fuscis. — Tode l. l. f. 90. Pers. syn. 86. Fr. l. l. 458. *Sph. claviformis* Sowerb. t. 337. (*Iulus obovatus*.)

Intra Salices cavas, nec non ad ramulos fagineos, syringeos et ribesios patres, in quibus quidem varie, non nisi fasciculatum a. ordine seriato solet emergere.

3825. *Sph. pomiformis* Pers., pyrenia globosis rigido-testaceis fragilibus, mole variis, sparsis, vertice convexo acute papillatis, extus primum tegmine delicatissimo fuscescente mox cadaco velatis nigris laeviusculis, intus ascis solutis cylindricis utrinque acuminatis nigris, pulpa hyalinam candidam infarcentibus foetis. — ?*Sph. pomiformis* Pers. syn. 65., icon. t. 3. f. 4. Fr. l. l. 455.

Ad ramulos decorticatos salicinos, alneos, rhamnicos ipsaque Sphaerias aromaticas varias rarius.

3826. *Sph. medullaris* W., pyrenis magnis ovato-subglobosis atris testaceis fragilissimis laxe adnatis, vertice convexo coenico-papillatis, extus pulvere fuliginoso delicatissimo obducto sparco-rugulosis, intus ascis ovalibus utrinque acutis nigris centro opacis, massam medullarem granulosam sphaerico-cellulosam candidam (siccando) palpabilem infarcentibus foetis. — *Sph. vesicaria* Fr. ?*Sph. pomiformis* β. *rugulosa* Pers. l. l.

Ad radices alneas effossas siccas rarius.

3827. *Sph. Bombarda* Batsch, pyrenis majoris confertissimis subfasciculatis oblongis in basi productis tenacibus crassiusculis nigro-fuscis, apice obtusiusculo papilla exiliissima nigra depressa inscriptis, dein oculo pertenenti nigro-ocellato pertusis. — Batsch cat. l. f. 181. Pers. syn. 75. Nees syst. f. 357. Fr. l. l. 456. *Naemaspora glabra* Willd. *Sph. clavata* DC. *Hypoxylon elevatum* Bull. t. 444. f. 5.

Ad trunca caenos putres. Salicesque cavas.

†† *eriopyrenide*, pyrenis astromaticis leptostomis, pila

s. vellere vestitis coque saepius inter se commixta. (Sph. caulicolarum sp. Sph. trib. 18. villosae Fr.)

* *hypophloeodeae, pyren. hypophloeodeo-latitantis.*

3828. ?*Sph. zantholeuca* Kz., pyreniis conico-subrotundis sparsis minutissimis mollibus subpellucidis astomis albo-lutescentibus hypophloeodeo-erumpentibus, extus villo delicato albido tectis. — Fr. syst. II. 503.

Ad caules Epilobiorum vidi initia.

3829. *Sph. larvata* Fr., pyreniis hemisphaericis gregariis firmis atris, extus pilis strigosis luteo-olivaceis tectis, deo vertice papillato emergentibus. — Fr. L. L. Ad caules putrescentes Solani tuberosi. Vere.

3830. *Sph. rufa* Fr., pyreniis minutis confertis globoso-depressis nigris furfuraceo-villosis, basi (laburno denigrato) insculptis, summam epidermidis pelliculam bullatam elevantibus, nucleo albido-roseo farctis. — Fr. elench. II. 98.

Ad ramos Cytisi Laburni languidos rarius. Vere.

3831. *Sph. hirta* Fr., pyreniis rotundatis depressis exilissimis nigricantibus, pube fusco-nigricante tenuiter vestitis, summam epidermidis pelliculam parce perforantibus. — Fr. syst. II. 483.

Ad ramos emortuos Sambuci racemosae rarius.

3832. *Sph. lanata* Fr., pyreniis hypophloeodeis subglobosis tenuissimis majusculis liberis, extus tormento longo denso ferrugineo-fusco vestitis, demum ostiolo nigro, summam epidermidis pelliculam comprehensam permeantibus. — Fr. syst. II. 482.

Sab epidermide ramorum betulinorum et rhamneorum.

* *epiphloeodeae, pyreniis praeter basin ipsis cubilibus adnatam liberis.*

3833. *Sph. exilis* A. et Schw., pyreniis exilissimis epiphloeodeis globoso-depressis atris, pilis brevibus patulis adspersis, dein collapso-concavis astomis. — Alb. et Schw. nisk. 44. t. 9. f. 4. Fr. syst. II. 452.

Ad ligna populina humi jacentia rario.

3834. *Sph. depilata* Fr., pyreniis minimis epiphloeoideis subovatis laevibus atris, praeter basin setulis brevibus cinctam calvis. — Fr. l. l.

Ad Polyporum indurescentem rarius.

3835. *Sph. Vermicularia* Nees, pyreniis ovatis subdepressis epiphloeoideis atris minimis astomis confertis, extus undique setalis erectis concoloribus tectis, nucleo aereis amplis ovatis annulatis foeto farctis. — Nees syst. f. 347. Fr. syst. II. 451.

Ad ligna pinæ putredine exesa. Hyeme.

3836. *Sph. comata* Tod., pyreniis rotundatis obtusis majusculis fragilissimis nigris astomis epiphloeoideis sparsis, vertice pilis longissimis in comam congestis fastigiatis adspersis, deinde calvescentibus. — Tode l. l. f. 81. Pers. syn. 88. Fr. syst. II. 504. *Chaetomium comatum* Fr. syst. III. 253.

β. capillata, pyreniis subglobosis nigro-fuscis, e vertice pilorum comam divergentem cano-virescentem excurrentibus. — Fr. l. l. *Sph. capillata* Nees syst. f. 346.

Ad caules herbarum siccōs rarius.

3837. *Sph. herpotricha* Fr., pyreniis minutis hemisphaerico-conicis atris opacis liberis, pilis decumbentibus late excurrentibus fuscis tectis, ostulo obsoleto papillato. — Fr. syst. II. 504.

Intra vaginas culmorum graminum majorum. Vere.

3838. *Sph. polytricha* IV., pyreniis majusculis nigris, praeter basin innatam vertice convexo epapillato, pilis tortuosis concoloribus undique obcesso prominulis, ovato-subrotundis hemisphaericis, intus albo-farctis rotundato-cellulosis ceraceis.

Ad culmos secalios et triticeos patres. Vere. (*Sph. Dematium* Fr. syst. II. 505. interim sub *Exosporium* p. 232 laudavi, cum aliis novum genus forsitan pertinente. Cf. Fr. elench. II. 107.)

3839. *Sph. erythrella* IV., pyreniis minutis sparsis a. confertim gregariis subglobosis epiphloeoideis, basi nuda

leviter adfixis nigro-fusco, extus praeter verticem tenuiter papillatum vellere delicato rufo-ferrugineo, dein sorride fusco vestitis, demum calvis, nucleo albo tenui.

Ad stipites Brassicae oleraceae putres rarissime.

3840. *Sph. canescens* Pers., pyreniis globosis epiphloeoodeis aggregatis hirsutis papillatis incandescentibus fragilibus parvis, demum subconfusantibus. — Pers. syn. 72. Fr. syst. II. 448.

Ad ramos quercinos putres et fagineos rarius.

3841. *Sph. calva* Tod., pyreniis sparsis globosis epiphloeoodeis papillatis atris, inferne pilis brevibus hispidis, vertice deinde calvis nitidis depresso. — Tode l. l. f. 83. Fr. syst. II. 451.

Ad ramos exsiccatos raro. Auctummo.

3842. *Sph. basstrichia* W., pyreniis sparsis minutis epiphloeoodeis subrotundis nigris, basi adpressa pilos concolores horizontaliter expansos breves rigidos tentaculatos exserentibus, vertice obtuso papillato depresso calvis.

Ad ligna corylea rarius. (Pezizae tentaculatae W. A. et H. II. 460. similis.)

3843. *Sph. crinita* Pers., pyreniis subglobosis laevibus atris epiphloeoodeo-liberis, pilos confertos molles alios exserentibus, alios productiores cubilia obtexentes emittentibus, fragilibus, vertice convexo obsolete papillato. Pers. syn. 72. Fr. syst. II. 450.

Ad ligna putredine uda exesa passim.

3844. *Sph. araneosa* Pers., pyreniis majusculis subgregariis subovatis papillatis laevibus nigris epiphloeoodeis, vilo delicatissimo albicante tectis. — Pers. icon. 24, t. 7. f. 6., syn. 67. Fr. syst. II. 447.

Ad ramos sicclos. (Dubia, forsitan juvenis.)

3845. *Sph. strigosa* A. et Schw., pyreniis aggregatis epiphloeoodeo-liberis ovato-subglobosis papillatis nigris majusculis tenacellis, extus setis longis rigidis undique

divergentibus incanis horridia. — Alb. et Schw. nissk. 37.
f. 5. f. 7. Fr. syst. l. l.

Ad ligna pinea Lusatiae, siquidem a praec. differt.

3846. *Sph. horridula* W., pyreniis minutis confertis nigris epiphloeodeis tenuissime rugulosis, primum subglobosis, vertice convexo sphaerico-papillatis, extus pilis sparsis brevibus pellucidis parce vestitis, dein collapsis depresso-umbilicatis, nucleo gelatinoso hyalino, aereis secatis foeto farctis, poro tenui pertusis.

Ad trunca Pyri caesos gonidio adspersos rarissime.

3847. *Sph. hispida* Tod., pyreniis sparsis minutis epiphloeodeis ovato-conicis cum ostiolo confluentibus atris, pilis brevibus parcis adspersis, dein nudiusculis. — Tode l. l. f. 84. Pers. syn. 74. Fr. l. l. *Sph. lignaria* Grev. scot. f. 82.

Ad ramos decorticatos dejectos rarius.

3848. *Sph. pilosa* Pers., pyreniis minutis ovato-subrotundis epiphloeodeo-liberis breviter pilosis, vertice convexo subastomis. — Pers. icon. t. 10. f. 9. syn. 73. Fr. l. l.

Ad ligna putrida passim. Hyene.

3849. *Sph. auricomata* W., pyreniis minutissimis confertissimis epiphloeodeis globosis aurantio-puniceis, extus praeter verticem convexum minute papillatum nudum concolorum vellere delicato granuloso aureo vestitis eoque soncisi basin versus productiore connexis.

Ad virgas salicinas decorticatas putres Thuring.

3850. *Sph. ovina* Pers., pyreniis sparsim confertis epiphloeodeis globoso-tornatis, basi nuda leviter adfixis fusco-nigris, nucleo gelatinoso hyalino-flavente farctis, praeter papillam rotundam calvam, extus villo primum mucido hyphideo candido, dein magis stipato subcoriaceo obductis eoque demum caduco nudis sordide fuscis. — Pers. syn. 71., var. a. Fr. syst. II. 446. (*infans*); var. β . *glabrata* Fr. l. l. *Sph. melanostoma* Rebent. *Sph. alba* Schum. (*juvenis*). *Sph. mucida* Fr. l. l. (*senex*). Ad ligna putredine nuda confecta frequens.

3851. *Sph. mutabilis* Pers., pyrenia majusculis subglobosis sparsis confertissimisque epiphloeoideis, basi nuda insculpta nigris, extus praeter papillam nigram prominulam calvam villo tortuoso, primum luteo-vireacente, dein ferrugineo tectis, denum calvis nigro-fascis inconditis, nucleo gelatinoso, ascis maximis clavatis foetidis farctis. — Pers. icon. t. 7. f. 6., syn. 72. Dittmar l. 4, t. 64. Fr. syst. II. 447. Alb. et Schw. nisk. 37. cum var. *pyrenia extus tuberculosis*.

Ad ligna durissima quercina et carpinea passim.

3852. *Sph. acinosa* Batsch, pyrenia ovato-subglobosis majusculis nigro-fascia liberis obsolete papillatis, extus undique tuberculatis, pilos sparsos erectos concolores exserentibus exaratis hispidis. — Batsch cont. I. f. 170. Nees syst. f. 359. B. nec Fr. *Sph. hirsuta* Sowerb. t. 386. f. 3.; β. Pers. syn. 73. Fr. syst. II. 449.

Ad ligna salicina mellea, nec non in terra glareosa.

δ. *platystoma*, pyrenia simplicibus astromaticis hypo-s. epiphloeoideis, superficie variis, vertice nunc in rimulam depressam longitudinalem scissis, nunc in osculum labiatum cristatoque dilatatum reclusis. (Sphaeriac trib. 21. *platystomae* Fr. Pers. *Hysteria* et *Hypodermatis* sp. DC. *Lophii* sp. Fr. obs. *Sph. stomalophorae* Mart., *Sph. macrostomae* Tode.)

† *leiopyreniae*, pyrenia calvis.

* *rimosae*, pyr. vertice in rimulam dehiscentibus.

3853. *Sph. hysterina* W., pyrenia exiguis basi insculpto hypophloeoideo-lattitantibus confertim sparsis globosis atris, verticis convexi apice subcompresso summam epidermidis pelliculam parce permeantibus rimamque transversam informantibus, nucleo caudido ceraceo. Ad ramos Rosarum sylvestrium siccios. Vere.

3854. *Sph. conigena* Dub., pyrenia gregariis hypophloeoideo-crumpentibus subdissimilibus rotundatis, primum mollibus fuligineis, dein nigris, nucleo albido farctis, rimulaque longitudinali inscriptis atomis, effoetis irre-

gulariter laceris. — *Dub. gall. II. 705. Sph. strobilina Fr. syst. II. 495. Hypoderma conigenum DC. Hysterium conigenum Pers. syn. 102. Alb. et Schw. 57. cum var. β . ostiolata.*

Ad conos dejectos abietinos ubertim. Auctumno.

3855. *Sph. glauca Fr.*, pyreniis sparsis globosis rugoso - subverrucosis atris ostomis, dein epidermidem scissam superantibus subliberic, intus albo-farctis, vertice osculo inaequali parce pertusis. — *Fr. syst. II. 493.*

Ad ramos betulinos languidos ratissime. Hyeme.

3856. *Sph. appilata Fr.*, pyreniis globosis laevis nigris opacis majusculis nigro-farctis, dein erumpentibus osculoque rimoso inscriptis. — *Fr. syst. II. 493.*

In similibus cum praecedente locis neque minus raro. Auctumno.

3857. *Sph. Berberidis Pers.*, pyreniis majusculis globosis sparsis aggregatisve iisque cubilia obliterantibus versicoloribus, junioribus ruhentibus insculptis summis epidermidis pellicula velatis, dein rufo-fuscis scissam insufficientibus semiemergentibus, adultis vertice rimoso-rugoso-prominentibus melanophaenis. — *Pers. syn. 53. Nees syst. f. 324. Fr. syst. II. 415. (inter cespitosas.) Sph. rufo-fusca Fr. obs. (juvenis.)*

Ad ramos Berberidis languidos vulgaris.

3858. *Sph. barbara Fr.*, pyreniis magnis hemisphaericis sparsis, primum hypophloeodeis, tegmiose cinereo-canescente tenui tectis, dein emergendo summamque epidermidis pelliculam revelando praeter basin adpressam semiliberic nigra, vertice convexo sulco rimaeformi involuto transverso inscriptis, — *Fr. syst. II. 468. Lophium barbarum Fr. obs. Hysterium rotundum Berah. H. cinereum Pers. syn. 99. (juvenis.)*

Ad ramos putres, fraxineos et salicinos, rarius.

3859. *Sph. Cistula W.*, pyreniis magnis sparsis nigris, praeter basin adnatam epiphloeodeis liberis orbiculatis ovalibusque utrinque obtusissimis, vertice pla-

tinaculo lineato mediotepus sulco rimæformi concavente depresso exaratis, nucleo albo colapse; aegis oblongis obtusis hyalinis tetrasporis fasto farctis, demum vacua. — *Sph. truncata* Fr. syst. II. 468. nec homonymia p. 442. est Schwein. *Hysterium truncatum* Pers. syn. 98.

Ad truncos quercinos et betulinos imos patruas minime rara, a reliquis habitu aberrans.

^{**} *labiatæ, pyreniorum vertice cristata* s. *labelloata*.

3860. *Sph. caulium* Fr., pyreniis globoso-ellipticis nigris insculpto-hypophloecodeis, osculo nudo labiato linearis dehiscente parce prominulis. — Fr. I. I. 509.

Ad canes herbarm (Urticæ) sicclos passim.

3861. *Sph. Arundinis* Nees, pyreniis subglobosis sparsis s. aggregato-confluentibus rigidulis nigris, primum insculpto-hypophloecodeis rugulosis, dein ostiolo crasso nudo compresso labiato prominulis. — Nees in lit. Fr. syst. 510. *Sph. cristata* Pers. syn. 54. *Sph. diminuens* Pers.

Ad culmos Arundinis Phragmitis sicclos. Vere.

3862. *Sph. angustata* Pers., pyreniis globosis sparsis nigris insculpto-latitantibus, nucleo albo farctis, labellum aequalis lineare illud subaequans parce prominulum exserentibus. — Pers. syn. 55. Fr. syst. II. 470.

Ad ramos sicclos Hederaeque vitices passim.

3863. *Sph. compressa* Pers., pyreniis globosis sparsim confertis nigris insculpto-latitantibus, nucleo albo farctis, labellum e basi tumidula in limbum linearem abrupte tenuatum conchatum arcta clausum conceperet duplo majus prominens exserentibus. — Pers. syn. 56. t. 2. f. 13. Fr. syst. II. 470.

Ad ligna decorticata doriora. Hyeme.

3864. *Sph. cristata* Pers., pyreniis globosis parvis sparsis nigris insculpto-latitantibus, nucleo albo farctis, vertice hemisphaerico in ostium latum subcrenatum sensim compresso-cristatum dilatato prominulis. — Pers. syn. 54. t. 1. f. 15. Nees syst. f. 350. Schmidt I. I. t. 1. f. 9. Fr. I. I. *Lophium crenatum* Fr. obs.

Ad ramos Pruni, Corni, Fraxini sicclos vulgaris.

3865. *Sph. libera* Tod., pyreniis hemisphaericis majusculis sparsis atris opacis incondito-rugulosis, basi adnatis, vertice convexo papillam compressam exserentibus eaque decidua osculo labiato dehiscentibus, nucleo albo farcta. — Pers. syn. 54. *Sph. macrostoma* d. libera Tode l. l.

Ad cortices Pyri domesticae antiquos rarius.

3866. *Sph. ventricosa* Pers., pyreniis confertis majusculis atris strinque attenuatis mediotenus ventricosus mollibus, demum ostiole lato sublabiato dehiscentibus. — Pers. syn. 76., icon. 64. f. 24. f. 8. Fr. syst. II. 457.

Ad ramulum exsiccatum. (Alex. de Humboldt.)

3867. *Sph. cirrhosa* Pers., pyreniis sparsis nigris subglobosis immersis, nonnisi fibrillulas exserentibus, demum collo spinuloso radi subfalcato glaberrimo noduloso emersis transversimque hiantibus. — Pers. syn. 59., icon. l. l. f. 3. Nees syst. f. 352.

Ad ligna patredine uda consumta rarius. Hyeme.

3868. *Sph. excipuliformis* Fr., pyreniis sparsis, praeter basin leviter insculptam liberis globosis atris rugulosis majusculis, e vertice umbonato abrupte ostiolum breve cylindricum fragile, apice in labellum compressum dilatatum exserentibus. — Fr. syst. II. 469.

Ad ligna fraxinea et acerina rarius.

3869. *Sph. macrostoma* Tod., pyreniis sparsis, praeter basin leviter insculptam liberis globosis nigris, mole variis, saepe majusculis, vertice umbonato abrupte ostiolum breve compressiusculum, apice dilatato dehiscens labellatum exserentibus. — Tode l. l. II. 12. f. 76. 77. Fr. syst. II. 469. *Lophium Loniceras* Fr. obs. *Sph. dehiscens* Pers. syn. 55,

β. media, pyr. immersis, ostiole prominulo latiusculo. — *Sph. media* Pers. syn. 55.

Ad ligna duriora corticesque sole tactos passim.

3870. *Sph. pileata* Tod., pyreniis sparsis, praeter basin leviter insculptam liberis emergentibus ovato-sub-

globosis nigris, vertice collum obconicum truncatum planum exserentibus. — Tode l. l. f. 18. Pers. syn. 54. Fr. l. l.

Ad ramos decorticatos aridos rarius.

†† eriopyrenias, pyreniis pilis s. vellere testitis.

3871. *Sph. Hericium W.*, pyreniis micantissimis epiphloecodeis obovatis nigris rugulosis, pilis concoloribus brevissimis fragilibus caducis obsessis, vertice obtuso protracto diutius barbulatis.

Ad ligna populina humi jacentia rarius. Autumno.

3872. *Sph. sanguinolenta W.*, pyreniis parvis confertis (sub cortice delitescentibus) erestis, praeter basin aduatam liberis obverse pyriformibus nigris, pilis concoloribus brevissimis stipatis undique hirsutis mucosus cruento coacto obductis, apice nigro osculo prominulo nudo pertusis.

Sub cortice mox desquamato Lonicerae Xylostei Hercyn. inferior. rarissime. Aestate.

3873. *Sph. biformis Pers.*, pyreniis majusculis confertis epiphloecodeis nigris, e basi obtusa ovata in verticem nudum magis minusve prominulum, nonnisi collum pentagonum mentientem sensim tenuatis conicis, extas incisis pilisque strigosis divergentibus concoloribus rigidis horridis. — Pers. syn. 59. t. 2. f. 14., loc. t. 24. f. 3. Fr. l. l. cum var. *bachy*-et *macrostoma*.

S. terrestris, pyreniis confertis, pilos e basi in subiculum contextos emittentibus. — Fr. l. l. *Sph. terrestris* Sowerb. t. 373. *Sph. biformis* var. *byssidea* Kunze.

Ad ligna putria nec non ad terram passim.

c. ceratostomae, pyreniis astromaticis simplicibus e basi globosa hypophloecodeo-insculpta s. epiphloecode, nucleo flavo-gelatinoso, ascis subclavatis elliptico-sporophoris foeto repleta, dein in penicillos hypophloecos asciplus profusus abrupte in collum brevius conoidem s. longius corniculatum prominulum nudum, apice aequali pertusum productis. (*Ceratostoma* Fr. obs. *Sph. tribus 22. ceratostomae* spec. Fr. syst. *Sph. macrostoma* Pers. Nees.)

+ *epiphyllae, pyren. synphloeodeis ex foliorum parenchymate subeuntibus.* (*Sph. foliæolarum.* sp. Fr.)

* *leiopyreniae, pyreniis calvis.*

3874. *Sph. erythrostoma* Pers., *pyreniis sparsis subglobosis synphloeodeis, summam epidermidis pelliculam in fibrillulas radiantes delicatissimas dehiscentes sublevantibus verticeque dein depresso collum breve cylindricum obtusum compactum rubellum exserentibus.* — *Pers. syn. 81. Fr. syst. II. 521.*

Ad folia Pruni avium languida. Vere.

3875. *Sph. Grossulariae* Fr., *pyreniis sparsis synphloeodeis globosis utrinque prominulis atris, intus albido-cellulosis, puncto centrali nigro inscriptis, collum brevissimum tenuiter pertusum exserentibus.* *Fr. syst. II. 521.*

Ad folia putrida Grossulariae rarius.

3876. *Sph. amoena* Nees, *pyreniis sparsis synphloeodeis subglobosis atris, in collum duplo longius filiforme compressiusculum productis eoque aream elevatam roseam perforantibus.* — *Nees act. N. cur. IX. t. 4. Fr. I. l.*

Ad petiolos foliorum carpineor. et coryleor. rarius.

3877. *Sph. setacea* Pers., *pyreniis minimis synphloeodeis subglobosis atris per spatia interuvia sparsis, e. vertice convexiusculo collum setaceum cylindricum nigrum nitidulum fragile, illis quadruplo longius erectum liberam exserentibus.* — *Pers. syn. 62. Fr. syst. II. 518.*

Ad folia quercina decidua vulgaris. Hyeme.

3878. *Sph. acicularis* W., *pyreniis minimis convervis synphloeodeis collum tenuissimum setaceum illis duplo majus exserentibus.* — *Sph. subtilis Mart. erl. 488. nec Grev.*

Ad folia sicca Trifolii repens rarius.

3879. *Sph. nervisequa* W., *pyreniis depresso-globosis exiguis atris synphloeodeis sparsis nervisequis, e. vertice umbonato collum setaceum cylindricum triplo longius nitidum flexuosum libere prominens exserentibus.*

Ad folia putrida Salicis capreae Thuring.

3880. *Sph. pungens* W., pyreniis exiguis confertim sparsis nigris, e basi hypophloeoodea verticem hemisphaericum emersum, collo recto illis duplo longiore rigido fragili coronatum exserentibus.

Ad folia Lonicerae Xylostei patrida.

3881. *Sph. melanostyla* DC., pyreniis depresso-globosis exiguis atro-fuscis hypophloeoodeo-lititantibus sparsis, e vertice depresso collum capillare aequale quinque sexiesve longius erectum exserentibus. — DC. gall. VI. 129. Fr. l. l.

Ex foliis tiliaceis putridis emergit.

3882. *Sph. curva* W., pyreniis ovatis minimis atris hypophloeoodeo-lititantibus ad greges determinatae sparsim compulsiis, e vertice conico collum setaceum cylindricum opacum tenacellum, illis quadruplo longius incurvum exserentibus. — ?*Sph. curvirostra* auct. ?*Sph. Capreae* DC.

Ad folia Ribes alpini patrida Thuring. rarius.

3883. *Sph. Gnomon* Tod., pyreniis globosis exiguis nigris hypophloeoodeo-lititantibus sparsis, dein vertice collapo concavo summam epidermidis pelliculam elevatam scindentibus collumque subtilissimum capillare rectum concolor, illis duplo longius emitentibus. — Tod. l. l. II. 50. f. 125. Pers. syn. 61. Fr. syst. II. 517.

Ad folia corylea humi jacentia vulgaris. Vero.

3884. *Sph. tubaeformis* Tod., pyreniis majusculis exacte globosis nigro-fuscis, foliorum parenchyma hypophloeoodeo-infarcentibus, utrinque hemisphaericos-mamilari-prominulis, hinc (supra) clausis, hinc (subtus) in vertice ambonatum fusco, summa epidermidis pellicula, dein radiatim fissa velatum, collo rostellato stricto robusto satratinus fusco oblique truncato rigido coronatum succrescentibus. — Tod. l. l. f. 128. Pers. syn. 60. Nees syst. f. 343. Fr. l. l.

Ad folia dejecta alnea, betulina, ulmea aliaque. Vero.

*** eriopyreniae, pyreniis vestitis.*

3885. *Sph. Avellanae Schm.*, pyreniis synphloeodeis minimis sparsis subhemisphaericis nigris, vellere delicato radiatim divergente gryeo-fusco vestitis, ostiolo papillaeformi atro-nitente prominulis, intus albo-lutescentibus. — Schmidt myk. Hst. I. 84. Fr. syst. II. 514.

Ad folia corylea decidua. Vere.

3886. ?*Sph. barbata Pers.*, pyreniis hypophloeodeis glabris subglobosis, basi pilos radiantes exserentibus, collo exerto spinuloso apice in fibrillulas dissecto fimbriato coronatis. — Pers. syn. 60. Nees syst. f. 344. Fr. syst. II. 514.

Ad folia quericina decidua (Persoon.)

†† *epiphyte, pyreniis hypo- et epiphloeoideis, caules pl. lignaque exesa occupantibus.*

3887. *Sph. microscopica Fr.*, pyreniis sparsis atris hypophloeoideis nudis minimis ovatis, ostiolo subnato stricto breviusculo prominulis. — Fr. syst. II. 476.

Ad ramos putrescentes rarius. Auctumno.

3888. *Sph. atro-rubens W.*, pyreniis epiphloeoideis sparsis minutissimis conicis, a basi subaequali libare emergentibus nigris, cubilia tintura atro-rubente tingeantibus.

Ad caules Bardanæ siccōs. Auctumno.

3889. *Sph. Solani Pers.*, pyreniis minimis hypophloeoideis globosia laevibus atris, collo tenerrimo flexili erumpentibus. — Pers. syn. 62. Fr. syst. II. 518.

Ad tubera Solani humi jacentia. Hyeme.

3890. *Sph. suffulta Nees*, pyreniis parvis sparsis nigris nitidis laevissimia, dein epiphloeoideo-sesilibus, a basi adglutinata appanata, cinctura circulari pertenui volvata redimita exacte hemisphaericis, vertice convexo collum obsoletum papillaeforme facile caducum informantibus. — Nees syst. f. 358. Fr. syst. II. 508.

Ad caules herbarum (Melampyri) siccōs. (Colli brevissimi ratione ad Sph. leptostomas, habitu ad has cum seq. vergit.)

3891. *Sph. redimita* W., pyrenis parvis sparsis nigris nitidulis laevissimis epiphloeo-deo-sessilibus, e basi appianata membranaceo-dilatata rotundata hemisphaericis, vertice convexo collo brevi papillaeformi coronatis.

Ad Rubi caesii sarmenta sicca. Auctummo.

3892. *Sph. Doliotum* Pers., pyrenis majusculis confertim sparsis nigris laevibus epiphloeo-deo-sessilibus, e basi plana adglutinata aequali rotundata nonnisi sub-plicata hemisphaerico-conoideis, vertice depresso-convexusculo, collo tornato nitido mamillari-prominulo coronatis. — Pers. icon. t. 10. f. 5., syn. 78. Fr. syst. II. 509. *Cryptosphaeria Doliolum* Grev. scot. t. 239.

Ad caules herbarum majorum (Urticæ) vulgaris.

3893. *Sph. Lingam* Tod., pyrenis magnis gregariis nigro-fuscis opacis, praeter basin adnotatam liberis epiphloeo-deis, nucleo albo carnosò-ceraceo stipato farctis, valde disformibus, aliis umbonatis depressis centro sub-cristatis veluti proliferis clausis, aliis vertice seu ad latera collis brevibus impresso-obturatis parce prominulis demum pertusis annularibus instructis. — Tode l. l. II. 77. f. 116. Pers. syn. 77. Fr. syst. II. 507.

Ad stipites Brassicarum infimos sicclos ipsosque herbarum caules rarius. (Haud mediocriter pyrenio leptodermatino, nucleo, totoque habitu a reliquis defectit.)

3894. *Sph. Carduorum* W., pyrenis gregariis hypophloeo-deo-latitantibus, basi arce insculptis depresso-globosis, e vertice convexiusculo mox deplanato collum breve, apicem versus incrassatum obconicum truncatum pertusum, summam epidermidem penetrans informantibus. — ?*Sph. acuminata* Sowerb. t. 394. Fr. syst. II. 506.

Ad caules Carduorum sicclos. Hyeme.

3895. *Sph. Bardanae* W., pyrenis confertia sub-globosis parvis, primum hypophloeo-deis, dein emergentibus, praeter basin adnotatam liberis atris rugulosis, e vertice convexiusculo collum breve rigidum crassum truncatum, dein poro ampio pertusum exserentibus.

Ad caules Bardanae sicclos passim. Hyeme.

3896. *Sph. infarcens* W., pyreniis exiguis sparsis nigris nitidis laevissimis, e basi semiglobosa elliptico-compressa lignum infarcente in verticem umbonatum, collo brevi acuto recto coronatum abeuntibus.

Ad ramos sambucinos cito decorticatos patres. Hyeme.

3897. *Sph. brachystoma* W., pyreniis sparsis, praeter basin insculptam sessilibus epiphloeoideis globosis atris nitidis minutis abrupte in collum pertusum cartum illa subaequans abeuntibus, nucleo albo farctis. — *Sph. mammiformis* auct.

Ad ligna putrida salicina passim. Auctummo.

3898. *Sph. orthoceras* Fr., pyreniis globosis nigris, praeter basin insculptam liberis subseriatim, collo stricto conico-cylindrico summam pelliculam perforantibus. — *Fr. elençā. II. 97.*

Ad caules Lapsanae sicclos passimi. Auctummo.

3899. *Sph. putaminum* Fr., pyreniis sparsis fuscobigris conicis lineas concentricas circumducentibus striatis, vertice depresso collo crasso, poro ampio hiante pertuis umbilicatis. — *Fr. syst. II. 461.*

Ad putamina quercina fractusque pyrinos sicclos.

3900. *Sph. rubella* Pers., pyreniis sparsim confertis subglobosis insculpto-latitantibus, primum rubellis, dein nigrescentibus, e vertice umbonato collum cylindricum robustum apiculatum abrupte exserentibus cubiliaque tintura rubella subeunte tangentibus. — *Pers. syn. 63. Nees syst. f. 353. Fr. syst. II. 506. Sph. porphyrogona Tode l. l. f. 72.*

Ad caules herbarum elatiorum, nec non in lignis putridis. (Ad Malvas et Lavateras hort. siccas eadem redire videtur, pyreniis conicis hypophloeoideis seriatim apiculatis.)

3901. *Sph. obstrusa* W., pyreniis sparsis nigris nitidis majusculis, e basi globosa (ligno immersa insculpto-latitante), nucleo cinereo, ascis solutis minutissimis ovato-oblongis obsolete septatis foeto farcta, abrupte in collum

exsertum, primum obturatum convexum, dein osculo impresso pertusum fragile attenuatis.

In Salicibus cavis Thuring. rarius. Autumno.

3902. *Sph. trichostoma* W., pyreniis sparsis nigris nitidis majusculis, e basi subglobosa (liguo) immersa in sculpto-latitante, nucleo sordido farcta, abrupte in collum exsertum rugosum, pilis concoloribus rigidis patentibus & divergentibus parcis horridum, primum obturatum convexum, dein osculo impresso pertusum fragile productis.

Ad ligna alnea, patredine quæ exesa Thuring. raris.

3903. *Sph. acuta* Hoffm., pyreniis parvis hemisphaericō-globosis rigidis laevibus nitidis atris, deinde epiphloeoideis epidemidem excurrentibus, e vertice convexo collum rostellatum cylindricum rectum duplo aenepe longius infraque apicem pleurostomum glabriuscum fragile exserentibus. — Hoffm. veget. I. 21. t. 5. f. 2. Pers. syn. 63. Fr. syst. II. 507. *Cryptosph. acuta* Grev. scot. t 239. f. 1.

Ad caules (Urticae, Ononidis, Solani) siccos vulgaris; ad Balloten vulgarem pyreniis duplo minoribus, rarius. Hyem.

3904. *Sph. crassicollis* W., pyreniis globosis sublaevibus opacis nigris confertis majusculis, e vertice convexo abrupte in collum breve rectum crassum, apice primum papilla sphaerica obturatum eaque dein decidua poro rotundo reclusum attenuatis.

Ad siphones abietinos subterraneos putres.

3905. *Sph. Penicillus* Schm., pyreniis majusculis hemisphaericis tenacibus laevibus atro-fuscis hypophloeoideo emergentibus & primitus liberis, vertice convexo collum rostellatum cylindricum breve, apicem inaequalem versus parce puberulum fragile exserentibus. — Schmidt in lit. Fr. syst. II. 508.

Ad caules Georginæ hortens. putres. Hyeme.

3906. *Sph. pleurostoma* Kz., pyreniis sparsis ovatis firmis nigris laevibus exiguis epiphloeoideis, collum cylindricum tenue breve exserentibus. — Kz. in lit. Fr. syst. II. 456.

Ad ligna exsciccata. (Kunze.)

3907. *Sph. rostellata* Fr., pyreniis globois parvis hypophloeodeo-insculptis gregariis, epidermidem mox excutientibus collumque demum e vertice depresso rostellatum gracile cylindricum fragile acutum exserentibus. — Fr. syst. II. 476. *Sph. Rubi* Nees. Mart. *Sph. Clavus* Schm. *Sph. acuta* f. Alb. et Schw. nisk. 33.

Ad sarmenta Roborum sicca passim. Vere.

3908. *Sph. stricta* Pers., pyreniis parvis confertis atris glabris globosis laevibus fragilibus, dein emergentiibus collumque rostellatum strictum crassissimum illis duplo longius exserentibus. — Pers. syn. 59. Fr. syst. II. 474.

Ad ligna quercina putrida. Vere.

3909. *Sph. cuspidata* Fr., pyreniis confertis ovato-globosis rugosis nudis atris majusculis, dein emergentiibus collumque cylindricum illis duplo longius exserentibus. — Fr. syst. II. 474.

Ad ligna faginea et carpinea. Vere.

3910. *Sph. rostrata* Tod., pyreniis gregariis s. subconfluentibus nigris majusculis rugulosis, primum hypophloeodeo-latitudinibus, dein emergentiibus collumque longissimum inaequabile flexuoso compressiusculum atrinque sulcatum tenacellum exserentibus. — Tode L. L. f. 79. Pers. syn. 58. Fr. syst. II. 475.

Ad ligna putrida faginea passim.

B. stromaticae, pyreniis distinctis s. verticibus umbonatis inter se confluentibus tegmenque contiguum, collis prominulis expunctum mentientibus, stroma varium ex cellulis sphaericis fistulosive meris interv se jugiter contextis compositum, jam inconditum plane, vel ex pyreniorum parenchymate erundante venosum, vel grumosum ab ipsis cubilibus s. cingulo depresso vasculique instar emerso exceptum, jam ad figuram ratam generique propriam redactum extus penitusve insarcientibus osculisque foras tendentibus prominulis semet praenotantibus s. libere occupantibus, nucleo gelatinoso, ascis variis at perfectioribus foeto sarcis.

(*Sphaerias*: sect. *epiphleriae*, *amphiphleriae*, *hypopheriae* et *peripheriae* Fr. sest. *Sph.* II. *myclostomaticae* Schmidt l. l. *Sph.* sect. 1-6 Petz. syn.)

a. *phlebo-stromaticae*, *pyreniis minutissimis* plurimumque *hemisphaericis*, e basi, *stromatis* loco massam conformem coactam tonerriam serpentinis - s. *dendriticis* figuratum emitteatibus eique instratis, *habitu* fibrilloso, *centrifugum* mentientibus. (*Dothidea Asteroma* Fr. Dub. *Asteroma* DC. *Sphaerias* sp. auct.)

3911. *Sph. venulosa* W., *pyreniis microscopiois* nigris gregariis adnatis hemisphaericis, dein depressis centro obsolete-papillato albis, basi fibrillulas stromaticas adpressus delicatissimas concolores periphericas emitteatibus, greges concentricas maculari-punctatas mentientibus.

Ad folia *Sparganiis* ramosi putris auctumno.

3912. ?*Sph. dendrica* W., *pyreniis minutissimis* depressis epapillatis nigris coacatenatis, *venulas* adpressas divaricato-ramosas delicatissimas, veluti maculas rotundatus dendritico-expansas informantibus.

Ad folia *Viburni Opuli* patria rarius. Auctumno.

3913. *Sph. vernicosa* DC., *pyreniis minutis* adeato-hemisphaericis nigris nitidis, dein depressiusculis papillatis, basi fibrillulas stromaticas innatas dilate fuscescentes forcato-ramosas protensas emitteatibus iisque per anastomosis concatenate, picturam oblongo-macularem venulosam nigro-punctatam praestantibus. — DC. gall. VI. I38. *Dothidea vernicosa* Fr. syst. II. 559.

Ad caules *Chacrophyllorum* siccos rarius. Hyeme.

3914. *Sph. geographicæ* DC., *pyreniis exiguis* orbiculatis nigris, centro epapillato in discum marginatum veluti depresso deplanatis, juxta fibrillulas stromaticas flexuosas seriatis, picturam catenuliformem serpentinam mentientibus. — DC. l. l. 138. *Dothidea geographicæ* Fr. l. l. *Phlyctidium geographicum* Wallr. in lit.

Ad folia (pyrina) putredine exesa rarius. Hyeme.

3915. *Sph. reticulata* DC., *pyreniis minutissimis*

orbiculatis oralibusque livido-nigris adnatis, centro depresso reclusis dilatioribus seriatim confluentibus fibrasque stromaticas concatenatas flexnosas praestantibus. — *DC. gall. I. l. Dothidea reticulata Fr. l. l. Phlyctidium catesbeatum W. in lit.*

Ad folia Convallariæ Polygonati langida. Auct.

3916. *Sph. abjecta W.*, pyreniis minutissimis nigris rugulosis obsolete papillatis, basi fibrillulas stromaticas delicatissimas breves ramosas adhuc exserentibus, dein confertissimis, centro depresso, cumulos amorphos convexiuncios connexos mentientibus.

Ad Veronicæ officinalis fol. radicalia putria. Aest.

3917. *Sph. nervisequia DC.*, pyreniis globulosis nigris laevibus astomis nervisequis, strias nigras reticulatas mentientibus. — *DC. gall. VI. 140. Dothidea nervisequia Fr. l. l.*

Ad folia viva Melampyri nemorosi. Auctumno.

3918. *Sph. stellaris Fr.*, pyreniis minutissimis centralibus, fibrillas stromaticas praeter ambitum libere radiante pallidiorem confluentes occupantibus maculasque piceas tenuissimas effusas mentientibus. — *Fr. olim. Dothidea stellaris Fr. syst. II. 560. Asteroma Phytemaq DC. Xyloma stellare Pers. syn. 105.*

Ad folia Phytematum et Campanularum langida.

3919. ?*Sph. Asteroma Fr.*, pyreniis microscopiciis confertis, fibrillas stromaticas confluentes obsoletas, maculas nigras subrotundas mentientes occupantibus. — *Dothidea Asteroma Fr. l. l. Asteroma Violae, Dentariae et Polygonati DC. l. l.*

Ad folia languida Convalliarum, Violarum, et Dentariae passim, si quidem satis differt.

3920. *Sph. Himantiae Pers.*, pyreniis prominulis seriatis nigris, fibrillas stromaticas centrifugas, ambitu liberas, centro confluentes occupantibus maculorumque nigrorum expansam mentientibus. — *Pers. syn. 89. Dothidea Himantia Fr. syst. II. 559.*

Ad caules plantarum sicciorum passim.

b. *triplostromaticae*, *stromate* syn-s. *hypophloeodee* ex cellulis subrotundis liberis inconditis laxe congestis composito, sive ab ipsis cubilibus, sive conceptaculis conformibus magis stipatis cinguli-s. vasculiformibus comprehendendo, intus grumoso s. farinoso prorsusque a figurazione rata alieno, *pyrenia* calva leptos. *ceratostoma* indita, vir nisi apice prominula soveute. (Sph. tribus 7-17 Fr. syst.)

a. *cubicularae*, *pyreniis* leptos. *ceratostomis* tectis, *stromate* syn-s. *hypophloeode grumoso*, cubilium saepè vegetorum parenchymate excepto summaque epidermidis pellicula inde decolore integra obvelato comprehensa, veluti conceptaculo spurio at determinato cubiculari fotis. (Sph. trib. 15. 16. *sériatae et consertae* Fr. Sph. *granulatae* Schm. Sph. *monostichae* Pers.)

+ *brachystomae*, *pyreniis* subastomis.

3921. *Sph. theracella* Ruttstr., *pyreniis* microscopicis syophloeodeis tenerimis albo-farctis astomis latitantibus, summae epidermidis cellulas insarcientibus stromaque tenerimum determinatum oblongum piceum tenuissime rugulosum, halone flavente circumscriptum, iustus obsolete grumosum informantibus. — Ruttstr. dissert. 17. *Ectostroma Sedi* Fr. syst. II. 602.

Ad caules *Sedi Telephii* languidos passim. Auctumno.

3922. *Sph. melana* Fr., *pyreniis* subglobosis seriatis albo-farctis astomis syophloeodeis, summaam epidermidem nigricantem constipantibus maculamque indeterminatam effusam informantibus. — Fr. syst. II. 431.

Ad caules *Lathyrorum* et *Astragalorum* siccios.

3923. *Sph. picea* Pers., *pyreniis* sparsis mollibus subdepressis hypophloeodeis astomis, dein peritus, summa epidermidis pellicula piceo-denigrata tectis, maculam opacam elongatam mentientibus. — Pers. syn. 31., icon. t. 10. f. 7. Fr. I. I.

Ad caules (*Artemisiae*) aridos passim. Vere.

3924. *Sph. denigrata* W., *pyreniis* minutiissimis

synphloeodeis nigris, intus albo-farctis, summam epidermidis pelliculam, vertice convexo astomo parce prominulo comprehendentibus deinde confluentissimis, stromatis tenuerrimi effusi alutacei ambeuntis instar denigrantibus. — *Dotkidea Heliopsidis Fr. syst. II. 556.*

Ad caules Dauci Carotae siccios rarior. Auctummo.

3925. *Sph. eutkocarpa Fr.*, pyreniis subglobosis astomis subsolitariis in stromate fenu obsoletō synphloeode nigro, halone pallido succincto insculpto-latitantibus, hiac prominulis. — *Fr. syst. II. 439. Xyloma concentricum Poir. Xyloma populinum Pers. syn. 107. pr. pr.*

Ad folia populinaria exsiccata. Hyeme.

3926. *Sph. bifrons Kz.*, pyreniis convexiusculis minutissimis nigris parce prominulis, demum umbilicatis, pseudostromati maculaeformi subrotundo-angulato orbicularium disposito appланato concolori, cibilia exarescenti insculptis. — *Schm. et Kz. D. Schw. n. 204. Fr. syst. II. 438. Xyloma bifrons DC. gall. VI. 156.*

Ad folia quercina exsiccata. Hyeme. (Haec cum praecedente a reliquis haud mediocriter aberrat certioremente locum tamen retinet.)

3927. *Sph. coenosia Fr.*, pyreniis minutissimis in series longissimas confluentibus stromaque opacum nigrum tuberosum erumpens mentientibus. — *Fr. syst. II. 427.*

Ad caules Umbelliferarum Saxon. (Schubert.)

3928. *Sph. Lirella Moug.*, pyreniis globosis minutis mollibus distinctis seriatis nigris hypophloeodeo-latitantibus subliberis, epidermidi (bullae lanceolatae instar) inflatae denigratae subjectis. — *Moug. vog. n. 668. Fr. elench. II. 105.*

Ad caules Spiraeae Ulmariae siccios, rarios.

3929. *Sph. polita Schub.*, pyreniis subglobosis conglomeratis nigris laevibus, intus albido-cinerascentibus, cam stromate primum hypophloeode concolore confluentibus parceque prominentibus. — *Fr. syst. II. 426.*

Ad caules Heraclei siccios agri dresdens. (Schubert.)

3930. *Sph. Graminis Pers.*, pyreniis exiguis sphaericis astomis nigris, primum synphloeoede deinde hypophloeoedeo-insculptis latitantibus, nucleo hyalino, mox coidente farctis seriatis, stromate intus grumoso pallido ovato-oblongo, summa epidermidis pellicula integra nigra parce premicula jagiter obvelato exceptis. — Pers. obs. I. 18. t. 1. f. 1., syn. 30. Nees syst. f. 314. Fr. l. l. *Sph. Caricis Fr. l. l.* *Uredo ferruginea Schum.* saec. II. 230. (stromate in cellulas faticente.)

Ad folia graminea, Elymorum v. c. Festucarum aliorg.

3931. *Sph. filicinae Fr.*, pyreniis minutissimis tenuerrimis confertim seriatis nigro-fuscis, nucleo hyalino, ascis tetrasporis cylindricis foeto farctis synphloeoedeo-insculptis latitantibus, stromate intus fusco grumoso linearie summam epidermidis pelliculam colliculoso-prominulam verticeque longitudinaliter scissam denigratam infarciente exceptis, strias parallelas dein confluentes nitidas meentientibus. — Fr. syst. II. 427. *Sph. rimosa f. altra A. et Schw.* 13. *Hysterium aquilinum Schum.* *Sph. Pteridis Sowerb.* t. 394.

Ad stipites Pteridis aquilinae siccios. Vere.

3932. *Sph. rimosa A. et Schw.*, pyreniis exiguis confertim seriatis globoso-angulosis fusco-nigris, nucleo ceraceo primum sordide dein albo farctis synphloeoedeo-lattitantibus, stromate fusco-nigro grumoso, interstitia cubilium bullatum infarciente summaque epidermide longitudinaliter scissa obvelato exceptis eoque saepius sterili in granulos ovali-oblongos erysiboideois olivaceo-nigros nudos, epidermide lacera cinctos desciscentibus. — Alb. et Schw. nisk. 18. t 3. f. 1. Schm. l. l. t. 1. f. 15. Fr. syst. II. 427. *Xyloma arundinaceum Rebent.* — *Uredo Phragmitis Schum.* l. l. (stromate in cellulas faticente.)

Ad culmos vaginasque Arundinis Phragmitis; ad folia plerumque in monstra erysiboidea sterilia desciacens.

3933. *Sph. Junci Fr.*, pyreniis parvis globosis nigris rigidulis sparsim aggregatis, nucleo nigrescente mox volapeo farctis, stromate hypophloeoede carbonaceo exceptis,

vertice convexo s. compresso summam epidemidis pelliculae elevatis tenuiterque soindentibus translucendo que maculas ovales effuses furco-nigricantes verrucosopunctatas mentientibus. — Fr. syst. II. 429. Sph. striiformis f. Junci Alb. et Schw. nisk. 15.

Ad Junci communis culmos putres passim. Hyeme.

3934. *Sph. striiformis* Fr., pyreniis globosis seriatim albo-farctis astomis hypophloeodeis, strias laevatae breves acutas nigras mentientibus epidermidemque decolorem demum in rimam longitudinalem findentibus. — Fr. I. I. et auct. plurim.

Ad caules herbaram (Epilobii angustif.) majores. Auct.

3935. *Sph. macularis* Fr., pyreniis sparsis globosis minutissimis nigro-fuscis hypophloeodeis, dein confertissimis, stroma grumosum tenuissimum fuscum occupantibus, erumpendo summam epidemidis pelliculam perforantibus. — Fr. syst. II. 502.

Ad folia Populi tremulae dejecta. Auctummo.

3936. *Sph. insularis* W., pyreniis microscopicis globosis gregariis nigris, nucleo cinereo-albo-farctis cum stromate tenui grumuloso fusco synphloeodeo-latitans, deinde vertice convexo tenuiter perforato prominulis insulatique rotundato-angulatis fusco-virentes mentientibus. — *Sph. maculaformis* auct.

Ad folia ulmea et corylea langnida. Auctummo.

3937. *Sph. conglomerata* W., pyreniis globosis minutissimis nigro-fuscis confertissimis conglomeratis aeternis insculpto-hypophloeodeis, nucleo ceraceo albo-farctis, stromati tenui fusco tenuissimo exceptis, deinde vertice vario, saepius impresso prominulis, acervulos inconditos hypophyllos parvos constitutentibus.

Ad folia alnea dejecta vulgaris. Hyeme.

3938. *Sph. Oedema* Fr., pyreniis globosis minutissimis nigris confertissimis s. coenatis, stromate tenui fuscum, spuma epidemidis pellicula volato exceptis, nucleo ceraceo albo-farctis, deinde emergendo illam aciesatu margini-

nantem permeantibus tuberculisque rugulosa exigua hypophylla constituentibus. — Fr. in lit. Dub. gall. II. 626.

Ad folia Ulmi suberosae decidua passim.

3939. *Sph. cellulosa* W., pyreniis exilissimis depresso-globosis tenerrimis, nucleo livido gelatinoso farctis, stromate hypophloeoide nigro-olivaceo tenui exceptis, deinceps summam epidermidis pelliculam constipatam nigro-macularem vertice pallidiore subtilissime elevantibus, maculas oblongas effusas nigras nitidulas albido-punctatas mentientibus.

Ad caules Asclepiadis syriacaee siccatos. Hyeme.

3940. *Sph. Anethi* Pers., pyreniis minutissimis confertissimis globosis nigris rigidulis, basi rugulosa libera stromate hypophloeoide olivaceo tenui exceptis, nucleo ceraceo albo farctis, deinceps vertice impresso papillato conato summam epidermidis pelliculam tenuiter velantem comprehendentibus translucendoque signantibus, strias parallelas interstitiales, saepius interruptas colliculosas praestantibus. — Pers. syn. 30. Fr. syst. II. 429. *Sph. microscopica* Khrh.

Ad caules Anethi graveolentis sicclos. Hyeme.

3941. *Sph. subscripta* W., pyreniis exilissimis depresso-globosis tenerrimis, nucleo ceraceo cinereo farctis, stromate hypophloeoide dilute fuscō grumoso tenuato exceptis confertissimis, deinceps summam epidermidis pelliculam integrā constipatam aequaliter obvelantem punctato-elevantibus maculasque nigro-fuscas opacas limitatas elongatas praestantibus. — ?*Sph. striiformis* Pers. syn. 32.

Ad caules Pastinacae sativae passim. Auctumao.

3942. *Sph. arundinacea* Sow., pyreniis globosis minutissimis connatis astomis 1-2 seriatis hypophloeoideis nigris, intus subconcoloribus, stromati obsoleto impositis, deinceps summam epidermidem scindentibus striasque simplicissimas breves angustas, facile confluentes mentientibus. — Sowerb. t. 336. Fr. syst. II. 429. *Sph. striiformis* a. *Arundinis* Alb. et Schr. nisk. 15.

3943. *Sph. longissima* Pers., pyreniis minutis sparsis globosis, nucleo ceraceo albo farctis, summam epidermidis pelliculam aequalem, ex stromatis hypophloeoide rudimentis obsoletis decolorum signantibus verticeque dein impresso punctato-elevantibus, striis longissimas parallelas interstitiales lineares s. confluendo latiores nigro-fuscas mentientibus. — Pers. syn. 31. Fr. syst. II. 439.

Ad caules Chaerophylli bulbosi aliarumque. Hyeme.

3944. *Sph. signans* W., pyreniis parvis sparsis nigris hemisphaericis, poro pertenui pertusis, nucleo albido farctis, stromate tenuissimo fusco-grumoso, primum hypophloode, dein summa epidermidis pellicula secedente nudo cinctis, maculas transversas oblongas stygias metientibus.

Ad trunca Salicis et Populorum juniores. Peregrinis.

3945. *Sph. Podagrariae* Roth, pyreniis minutissimis nigris nitidulis semiglobosis obsolete papillatis, nucleo albido tenui ceraceo farctis, dein praeter basis adnetam emergentibus, stromate nigro parco coonatis, unum veluti tuberoso-acinosum polypyrenium rotundum s. irregulare mentientibus. — Roth cat. I. 230. Sph. Aegopod. p. Pers. syn. 90. Dothidea Pedagr. Fr. syst. II. 556.

Ad folia Aegopodii Podagrariae viva in consortio Sph. Aegopodii passionis. Aestate sera.

3946. *Sph. Trifolii* Pers., pyreniis minutis semi-globosis rigidis nigris, nucleo albo ceraceo farctis, stromate hypophloeoide nigro-fusco grumoso exceptis summanque epidermidis pelliculam dein tenuatam transientibus, plenum vertice depresso, ureas nigro-fuscas tuberosas, plerumque internervias oblongas distinctas praestantibus. — Pers. syn. 30. Fr. syst. II. 435.

Ad Trifoliorum nostratum (repentis, flexuosi, pratensis) folia. Auctumno.

3947. *Sph. atro-nitens* Holt, pyreniis minutissimis teneris nigricantibus, nucleo albo ceraceo farctis, stroma atro-nitens colliculosum nitidum, intus opacum

stipato-grumosum infarcentibus, aream tuberculosaam pleniusculam angulato-diformem epiphyllam praestantibus.

— Holl in D. Schw. n. 29. *Dothidea betulina* Fr. syst. II. 554. *Sph. xylomoides* Fr. *Xyloma betulinum* Hoppe. DC.

Ad folia betulina vegeta. Aestate sera passim.

3948. *Sph. Ulmi* Duval, pyreniis minutis teneris, nucleo albo ceraceo farctis, stroma tuberculoso hemisphaericō - subrotundum, intus stipato-grumosum nigrofuscum, primum somma epidermidis pellicula tenuata, deinceps nadiusculum extus alutaceum nigrum, verticibus prominentiis verruculosam infarcentibus, cicatriculam convexam asperulam mentientibus. — Duval in Hopp. Tusch. 1809. p. 105. Nees syst. f. 21. *Xyloma sticticum* Mart. erl. 369. *Sph. xylomoides* DC. *Dothidea Ulmi* Fr. syst. II. 555. *Sph. Ulmaria* Sowerb. t. 874.

Ad folia Ulmi campestris putrida. Hygme.

3949. *Sph. Dothidea Moug.*, pyreniis minutis teneris subglobosis nigris, nucleo albido ceraceo farctis sparsis, stromate tuberculoso umbonato circumscripto hypophloeoidei, intus fuscō-grumoso insculptis, extus epidermidem stipitatae inaequaliter scissam, vertice incendito perineantibus, tuberculum clypeatum rotundum in signum rimosum fuscō-nigrum mentientibus.

a. Fraxini. — *Sph. Dothidea Moug.* Fr. l. l. 423.

b. Rosae. — *Sph. Doth. b. Rosarum* Fr. elench. II.

86. *Philocoscoria umbonata* W. Naturg. d. Pl. 1. *Sph. cicatrica* Pers. in lit. *Xyloma Rosae* DC. gall. VI. 161. pr. pr. *Sph. Rosae* Schleicher.

Ad ramos Fraxini rarius, multo saltem frequentius ad Rosae Cynorrh. truncos et ramos vegetos Thrg. Aest.

† ceratostomae, pyreniis in colla cosserta productis.

3950. *Sph. Cayti* Batsch, pyreniis hemisphaericis innato-synphloendeis teneris sparsis consertisque, tegmine grumoso candido latente fotis, extus summa epidermidis pellicula denigrata nitidula jugler obvelatis collumque rostellatum teretiusculum rectum cornenm nigrum, apice truncato poro pertusum, basi coccinula candida redimitum

exserentibus, nucleo pallido gelatinoso farctis. — *Batsch*
cont. II. f. 234. *Fr.* I. L. 436. *Sph.* *Gnomon Schum.* *Sph.*
fimbriata b. *Pers.* syn. 36.

Ad foliorum coryleorum paginam infexam passim. Auct.
3951. *Sph. fimbriata Pers.*, pyreniis hemisphaerio-
closionato-synphloeodeis tenerrimis cooscentibus, tegmine
candido latente grumoso fatis, extus summa epidermidis
pellicula denigrata in tuberculum planiusculum elevata
nitidula jugiter obvelatis collamque rostellatum compres-
susculum rectum cornuum, apice truncato pertusum, basi
corticula caudida redimitum exserentibus, nucleo pallido-
livido farctis. — *Pers.* syn. 36. *Fr.* I. L. *Sph. distans*
Alb. et *Schw.* *Sph. Gnomon DC.* *Sph. Carpini Hoffm.*
veg. t. 1. f. 1. *Sph. spiculosa Batsch* f. 182.

Ad folior. carpineorum vegetor. pagiuam infer. vulgaris.

β. circinata e, pyreniis exiguis hypophloeodeo-tectis
aggregatis, in orbem dispositis, subdecumbentibus, e basi
libera (epidermidi detractae plerumque, sacculi instar
inhaerente) in colla nuda breviora s. longiora inter se
convergendo juncta, apice truncato pertuso summam epi-
dermidem perforantia attenuatis, praeter massam gru-
muloso-cellulosam neque conceptaculo proprio neque va-
sculo exceptis, ascis uniseriatis subsimplicibus foetis. (*Sph.*
tribus 12. circinatas Fr. *Pers.* *Nees et Schm.*)

† *brachystomae*, pyreniis in colla magis minusve elon-
gata latitania nec exserta productis.

3952. *Sph. Aethiops W.*, pyreniis 5-8 minutissimis
nigris hypophloeodeis ovato-oblongis, in colla brevia
productis circinatis conglomeratis, laburno leviter ad-
hixis ibique halone orbiculato nigro-fusco tenerrimo pul-
verulento circumscriptis, in capitulum minutum iunctis
summanque epidermidem aequalem perforantibus.

Ad laburnum ramorum tiliaceorum languidorum.

3953. *Sph. pusilla Pers.*, pyreniis minutissimis
subterris velati superficialibus nigris globosis circinatis,
in colla recta brevia leviter adscendentia teretiascula at-
tenuatis. — *Pers.* syn. 16. t. 1. f. 14. *Fr. syst.* II. 411.

In Sphaeria velata hypophloeode parasita.

3954. *Sph. syncephala* W., pyreniis minutis 15-20 nigris hypophloeodeo-latitentibus circinatis, corculum grumosum fuscova circumvallantibus, e basi ovato-oblongata in collum seuam tenuatis osculisque in capitulum subglobosum exiguum nigrum, epidermidem fissam permeans confluentibus, tuberculum unguiculatum epiphloeodes mentientibus.

Ad radices alnæ effossas Thuring. passim.

3955. *Sph. convergens* Tod., pyreniis minutis subserenis ovatis circinatis hypophloeodeis, in colla convergentia teretia attenuata usque apice pertusis conjunctis, sumam epidermidem fissam subaequalem perforantibus. — *Tode l. l. II. 39. f. 111. Pers. syn. 46. Sowerb. t. 374. f. 6. Fr. syst. l. l.*

Ad corticem ratrorum laevem rarios.

3956. *Sph. acclinis* Fr., pyreniis minutissimis subquinis globosis erectis late circinatis hypophloeodeis, in colla brevia stipata globoso-teretia nitida crassinsula obtusa productis prominulis. — *Fr. syst. II. 410.*

Ad ramos juniores Pyri Malii rarius.

3957. *Sph. socialis* Ks., pyreniis globosis parvis nigris insculpto-latitentibus senis, stroma tenuis grumosum pallidum subrotundam hypophloeodes occupantibus idque colliculosso-elevatum collis productis perforatis subglobosis depressis nitidis conjunctis obsidentibus. — *Sph. socialis* Kunze in lit.

Ad virgas betulinas agri Lips. (Kunze) et alibi.

3958. *Sph. conjugata* Nees, pyreniis globosis nigris ternis octonisve confertim circinatis insculpto-latitentibus in circulum regularem constipatis, collis in discum tubulosum nitidum connatis, epidermidem transgentibus. — *Nees syst. 305. f 337. Fr. l. l.*

Ad ramos coryleo passim. Vere.

3959. *Sph. umbilicata* Pers., pyreniis exiguis globosis nigris subternis circinatis insculpto-latitentibus,

in colla brevia, apice profunde umbilicata attenuatis epidermidemque transigentibus et veluti exasperantibus. — Pers. syn. 45. Fr. t. l. l.

Ad ramos coryleos varios. Auctummo.

3960. *Sph. decumbens* Schm., pyreniis exiguis globosis nigris subsenis consertim circinatis immersis, in colla subteretia brevia rigida nitida obtusa, in fasciculum cylindricum juncta productis. Schmidt in lit. apud Fries. t. l.

Ad ramos pineos Lusatiae. (Schmidt.)

3961. *Sph. quaternata* Pers., pyreniis majusculis hypophloeodeo-latitantibus tuberculosis testaceis fragilibus nigris quaternis sensive connato-circinatis subangulatis, e basi appланata decubante adpressa convexis, dein impresso-umbonata convergendo adscendentibus collisque brevissimis obtusis pertusis conniventibus summodum epidermidem aequalem permeantibus, dein confluentibus stromaque verrucosum expansum mentientibus. — Pers. syn. 45. t. 2. f. 1; Nees syst. f. 336. Fr. syst. II. 409.

Sub epidermide ramor. fagin. et carpineorum passim.

3962. *Sph. vesiculosae* Fr., pyreniis majusculis nigris senis denique circinatis, e basi ovata, massa grossa pallida parce obvallata hypophloeode, in colla cylindrica attenuatis illisque in apicem acutiusculum iucundatis emersis, discum summum epidermidem transversim fissum infarcentem mentientibus. — Fr. syst. II. 408. *Sph. oblonga* Sowerb. t. 374. f. 7.

Ad ramos betulinos rarius. Hyeme.

†† ceratostomae, pyreniis in colla exserta prominula productis.

3963. *Sph. hypoderma* Fr., pyreniis globosis minutissimis pacis laxe circinantibus iusculptis nigris, massa crustulata nigra tectis, in colla erectiuscula conferta, tuberculum aigrum exsertum constituentia productis. — Fr. syst. II. 407.

Ad ramos languidos Ulmi campestris. Auctummo.

3964. *Sph. operta* Schm., pyrenis exiguis globosis nigris immersis laxe irregulariterque aggregatis, massa grumosa tenui nigra obducta, in colla recte subconvergentia scabriascula, epidermidem transversitatem elongatis. — Schmidt in myk. Hist. I. 60. Fr. L. l.

Ad ramos populinos rarius. Auctummo.

3965. *Sph. Strumella* Fr., pyrenis parvia nigris octoglia levissime hypophloeodeis, corculum grumosum album circinatim occupantibus, a basi ovato in colla coniuentia latitantia attenuatis iisque emersis discum nigrum tuberculosum, epidermidem transversim scissam elevatam informantibus ostiolisque rectis exsertis nitidis pertundentibus, tubercula strumosa elliptica nigra spiculosa men-tingentibus. — Fr. syst. II. 365. *Sph. olivacea* Ehrenb. syst. 16. *Sph. Grossulariae* Nees in lit.

Ad ramos sicclos Grossulariae, Viburni aliaramq. (Collum morphosi desciscit et ad Sph. confluentes vergit.)

3966. *Sph. Persoonii* W., pyrenis globosis paucisiliis globosis subsenis hypophloeodeis nigris, in colla teretia erecta aequalia distincta attenuata, epidermidem pustulatam fissam permeantia producta. — *Sph. Frit* Fr. syst. II. 395. *Sph. coronata* var. *alta* Pers. syn. 44.

Ad ramos Aceris Negundiis hort. thuring. rarissime.

3967. *Sph. coronata* Hoffm., pyrenis minatis simis insculpto-hypophloeodeis sensim deorsum stipato-circinantibus ovato-oblongis nigris laevibus, epidermidem orbiculato-umbonatam fuso-nigrum, halone saturatore circumscriptam elevantibus deinceps collis cylindricis terribus perfrantibus forasque solatis rostellatis fasciculatis subclavatis nitidis libere emergentibus. — Hoffm. reg. cr. 26. t. 5. f. 2. Pers. syn. 43. Schm. L. L. t. 1, f. 14. Fr. syst. II. 395.

Ad ramiculos Corni albae et Crataegi rarius.

3968. ?*Sph. pentagona* Pers., pyrenis majusculis insculpto-hypophloeodeis nigris circinatis, in colla recte nitida primam euleato-angulata deorsum pentagona, cylindri-

cum crassum obtusum constituentia productis. — Pers.
syn. 42. Fr. syst. II. 407.

Ad ramos Sambuci Ebuli. (Persoon.)

3969. *Sph. Friesii* Dub., pyreniis globosis insculptis latitantibus circinatim decumbentibus nigris, in colla longa grumulis albis conglutinata productis usque in ostiola erumpentia subaequalia subdivaricata cylindrico-conica, apice truncata umbilicata desinentibus erumpentibus. — Dub. gall. II. 690. *Sph. picea* Fr. in lit.

Ad ramulos Pini Piceae m. vogeai. (Mougeot.)

3970. *Sph. ciliatula* Fr., pyreniis globosis minutis nigris opacis, decumbendo in circulum oblongum circinatis, in colla longissima setacea flexuosa acutissima libera productis, sub epidermide latitantibus. Fr. syst. II. 406.

Ad ramos betulinos rarissime. Autumno.

3971. *Sph. pulchella* Pers., pyreniis maximis numerosissimis pachydermatinis nigro-fuscis nitidis, e basi globosa hinc sensim declinata in colla praelonga decumbentia nodulosa abrupte productis, acervulos circinatim-pulvinatos, apicibus operculiformibus convergentibus concentrico-elevatos informantibus, raro sparsis erectis, illis epidermide obesa diu occultatis, his epixylis. — Pers. syn. 43. Nees syst. f. 335. Schm. I. I. t. I. f. *Sph. pusilla* Wohl. lapp. 320. *Sph. Haklbergii* Dermaz. (*Iucus minor*, collis abbreviatiss.)

Sub cortice Cerasorum et Prunorum; var. minor ad Betulas paucim. Perennis.

y. ovalatae, pyreniis tenuiter membranaceis hyphophloideo-latitantibus, e basi subglobosa, arcis subclavatis septato-sporophoribus foeta, in orbem aggregata libera, massa que grumosa aromatico superfusa, in colla convergentia brevius longiusve producta tenualis, adscendentibus, eorumque osculis dein umbilicato-pertusis, sive discum conformem constituentibus, sive circa circulum centrale pseudostromaticum carnorum difforme congestis illudque circumvallantibus, omni conceptaculo destitutis. (*Sphaeriac*

trib. II. obvallatae Fr. Sph. disciformes Schm. Sph. pulsatilae et circinatae Pers.)

3972. *Sph. dolosa* H. z., pyrenis depresso-globosis immerso-hypophloeoideis irregulariter aggregatis nigris, in colla brevia angustatis iisque stipatis eouexiusculis, epidermidem scissam vix permeantibus discumque stromaticum obliterantibus. — *Sph. dolosa* Kunze in Fr. syst. II. 463.

Ad corticem salicinum languidum rarius. Auctummo.

3973. *Sph. tessera* Fr., pyrenis globois subdensis irregulariter circumantibus corticemque internum elevantibus, dein collis subglobosis in disco verumpené subrotundo mere corticali prominulis. — Fr. syst. II. 463.

Ad ramos coryleos passim. Auctummo.

3974. *Sph. stylostoma* Fr., pyrenis numerosis insculpto-hypophloeoideis nigris, e basi subglobosa in colla brevia adscendentia producta osculisque globosis laevibus nitidis umbilicatio parce sparsimque prominula, demum discum ellipticum s. subrotundum stromaticum obliterantibus. — Fr. syst. II. 463. cum var. *s. populi*, disco elliptico; *s. umbilicata*, disco subrotando lutescente (*Sph. Pseudo-Platani* Fr.) et *s. conferta*, disco irregulari, osculis obliterato (*Sph. Talus v. conferta* Tod. t. I. f. 94. *Sph. platenoides* Pers. syn. 45.)

Ad ramos languidos, betulinos et acerinos satis mutabilis.

3975. *Sph. capsularis* Pers., pyrenis subglobosis nigris, stroma grumosum albido tenuis hypophloedes, dein epidermidem scissam determinatam penetrans infarcentibus verticeque in colla ovato-subglobosa emergentia producto perforantibus, pyrenia subglobosa aggregata, disco albido depresso imposita mentientibus. — Pers. syn. 42. Fr. syst. II. 402.

Ad ramos Pruni domesticae siccis rarius. Auct.

3976. *Sph. ambiens* Pers., pyrenis subglobosis nigris exiguis, stroma grumosum albido subrotundum, primum hypophloedes, dein epidermidem scissam permeans infarcentibus osculisque depresso-umbilicatis pertusis cir-

sum corculum centrale ceraceum album s. pallidum congestis perforantibus. — Pers. syn. 44. Fr. syst. II. 403. *Sph. mixta* Schum. *Sph. calvula* Wahlenb. lapp. 519. t. 80. f. 4. *Sph. Tulus v. licheniformis* Tode l. l. f. 95.

Ad ramos Crataegi, Pruni, Mali aliarumque. Auct.

3977. *Sph. salicina* Pers., pyreniis minutis globosis teneris suboctonis distinctis circinantibus nigris hypophloeodeo-insculptis, in colla globosa brevia minima, dein parce prominula, discum stromaticum ceraceum minutum primum fuligineum, mox albescens, poro nigro pertusum circumvallantibus. — Pers. syn. 47. Fr. syst. II. 401. *Sph. cancellata* Tod. l. l. f. 107.

Ad ramos salicinos siccandos ubertim. Auctumno.

3978. *Sph. deplanata* Nees, pyreniis depresso-globosis nigris parvis inesculpto-latitantibus, stroma granulosum fuscum subrotundum, dein epidermidem scissam permeans occupantibus oscalisque umbilicatis pertusis circum corculum centrale ceraceum fuscum congestis discomque deplanatum mentientibus. — *Sph. deplanata* N. in lit.

Ad ramos Pyri Mali et Salicis siccis passim.

3979. *Sph. leucopis* Fr., pyreniis ovatis majusculis nigris subquinis hypophloeodeis, nucleo albissimo farctis, in colla brevia stipata, corculum centrale album minutum ambeuntia productis. — Fr. syst. II. 402.

Ad ramos coryleo rariis. Auctumno.

3980. *Sph. turgida* Pers., pyreniis globosis majusculis turgidis nigris hypophloeodeo-latitantibus sub-octonis, nucleo atro gelatinoso farctis epidermidemque bullatam elevantibus inquinantibus, demum osculis convexis obtusis exsertis (hamatis asperis Pers.) in discum minutum coarctatis perforantibus. — Pers. obs. II. 17. Fr. syst. II. 400. *Sph. faginea* Pers. syn. 44. cum var. β . *turgida*.

Ad ramos fagineos et alneos rariis. Auctumno.

3981. *Sph. leiphaemis* Fr., pyreniis globosis tenuibus atris aggregatis inesculpto-latitantibus, epidermidem pustulatam elevantibus demumque transversum scissam,

discō erumpente pallido-lutescente farctam osculis sparsis opatis pertusis prominentibus occupantibus. — Fr. syst. II. 399. Sph. *Saturnus* Sowerb. t. 218. Sph. *Hystrix* DC. (L. *rostellatus*) Sph. *Radulae* var. Alb. et Schw. 18.

Ad ramos quercinos emortuos rarius. Auctumno.

3982. Sph. *Abietis* Fr., pyreniis ovalis nigris profunde immersis numerosis aggregatis, in colla oblonga nitida umbilicato-pertusa in discum, stromate tenui albocinctum implexa productis eorumque oculis prominentis, — Fr. syst. II. 398. excl. var. β. Sph. *Pinastris* Gr. soot. t. 50.

Ad corticem abietinam squamosum. Auctumno.

3983. Sph. *Pini* A. et Schw., pyreniis ovatis minutissimis copiosissimis nigris epiphloeoideis, epidermidem subtus albidiā pustulatam elevantibus, in colla convergentia stromate flavido tecta abeuntibus osculisque exsertis obtusis subglobosis aequaliter constipatis emergentibus. — Alb. et Schw. nisk. 20. t. 8. f. 1. Fr. syst. I. 397. Sph. *leucophaeata* Rebent. neom. 329. t. 1. f. 2.

Ad corticem Pini sylvestris rarius. Auctumno.

3984. Sph. *decoricans* Fr., pyreniis consertim aggregatis rubdiformibus nigris hypophloeoideis, osculis minutis consertis globosis umbilicatis nitidis stipatis epidermidem demum excutientibus. — Fr. syst. II. 396.

Ad ramos siccos fugineos v. c. et sorbeos. Vero.

3985. Sph. *lizivis* Fr., pyreniis globosis minutis nigris hypophloeoideis, collis erumpentibus opacis subglobosis corcalam galatinosum flavum laxe ambenatibus. — Fr. syst. II. 385.

Ad ramos juglandinos putres rarius. Auctumno.

3986. Sph. *dimorpha* W., pyreniis obovatis hypophloeoideis senis densis nigro-fasciis opacis; in colla cylindrica brevia productis, apice aequali truncato umbilicatis, centrale ampullaeforme obtusum nonnisi pertusum duplo majus arce ambenatibus ibunque vasculosum veluti mentientibus, dein solatis.

Ad ramos quercinos junclos rarius. Auctumno.

3987. *Sph. tortuosa* Fr., pyrenis globosis aggregatis hypophloeodeo-latitantibus nigris, in colla convergentia tenuatis osculisque subcylindricis inaequalibus obtusis fasciculatis subdivalentibus, epidermidem pustulatae excedentibus. — Fr. syst. II. 395. *Sph. Hystrix* Nees syst. f. 329. B.

Ad ligna putrida ramosque decidua passim.

3988. *Sph. ciliata* Pers., pyrenis ovatis subdenis insculpto-latitantibus convergentibus; in colla subaeacetacea acuta inaequalia divaricata flaccida, epidermidem scissam excedentia attenuatis. — Pers. syn. 35, obs. II. 67. t. 6. f. 3. Nees syst. f. 329. Fr. syst. II. 394.

Ad ramulos ulmeos et alneos passim. Auct. (Hae quidem satis evidenter ad *Sph. circinata* reflectunt.)

S. incurva, pyrenis subaggregatis s. obsoleti circumstantibus, raro simplicibus, stromate celluloso-grumoso hypophloeode, cingulo nigro veluti annulari ambeante, dein vertice aperto discoideo incuso s. polito, summam epidermidem scissam permeante comprehensis illudque (*polystichum*) paree perforantibus. (*Sph. trib. 10. incurva* Fr. *Sph. disciferae* Schm. *Sph. pustulatae* Pers.)

3989. *Sph. clandestina* Fr., pyrenis paucis globo-depressis hypophloeodeo-latitantibus nigris, epidermide parce prominula continua adnata rauissima grumosa albida subtus adhaerente tecis plane delitescentibus. — Fr. syst. II. 484. *Sph. hypodermia* Pers. in lit.

Sub epiderride ramorum carpinoeorum et sorbeorum.

3990. *Sph. cubicularis* Fr., pyrenis subglobosis in collum constrictum elongatis nigris, cibilia (laburnum) penetrando insculpto-latitantibus, dein verticem tenuatam collarem, massa celluloso-grumosa alba obvallatum subglobosum, centro osculo transverso connivente (veluti ocello nigro) inscriptum, epidermidem rotundato-scissam aequaliter infarcientem monstrantibus. — Fr. syst. II. 477, elench. II. 97.

Ad ramos Crataegi languidos Thuring. passim.

3991. *Sph. tessellata* Pers., pyrenis globosis tigris insculpto - latitantibus irregulariter circumstantibus, linea subflexuosa laxe circumscriptis cellisque dein umbilicatis prominulis in quindecim dispositis, areolam emersam inscribentibus. — Pers. syn. 48. Fr. syst. II. 392.

Ad ramos salicinos passim. Auctummo.

3992. *Sph. dissepta* Fr., pyrenis globosis parvis nigris insculpto - latitantibus, stromate stipato - grumoso albido subrotundo hypophloeode, cingulo nigro excepto dimidiato, supra tergo testaceo occultatis verticibusque punctiformibus tigris sequilibus vix prominolis, placentas hypophloeodeas orbiculatas nigro marginatas, centro navo nigro rotando, epidermidem perforante inscriptas men- tientibus. — Fr. syst. II. 392. *Sph. Wallrothii* Kz. in lit. ad Fr. stenck. II. 78. *Sph. melanotoma* Wallr. in lit.

Sub epidermide ramulorum tiliaceor. et cerasin. lateat et vix nisi vasculo nigro centrali sterili semet prodit. (Nuclei livescentes insculpti pyrenio destituantur ideoquo ad genus novam s. ad aliud (Bothideam) revergent.)

3993. *Sph. circumscripta* Kz., pyrenis majusculis confertis tigris, basi globosa insculptis latitantibus, nucleo atro glutinoso, ascis nigris oblongis utriusque obtusis tetrasporia foeto, vasculo grumoso fusco, superne in discum deplasatum terasum marginatum, summa epidermidis pellicula velutina emersum exceptis illudque osculis paucis perforantibus, demum ascis glutinosis profusis cum bilia undique inquinantibus. — Kuns. in D. Schw. n. 153. *Sph. profusa* Fr. syst. II. 392. *Sph. grumosa* Pers. in lit.

Ad ramos Robiniae Pseudacaciae siccis vulgaris, ratis etiam ad Ligustrum, ascis profusis semet prodens.

3994. *Sph. Radula* Pers., pyrenis exiguis numerosis, stromate subrotundo s. elliptico laxe circumscripto albo s. in discum pallidum dilatato hypophloeode exceptis illudque osculis punctiformibus laevibus s. dein teretiusculis inaequalibus subrinsculis rostellatis perforantibus. — Pers. syn. 37. (statue adultus, pyrenis magis emersis rostellatis.) *Sph. tuleola* Fr. syst. II. 391.

- Ad ramos quercidos passim.
3995. *Sph. angulata* Fr., pyrenis majusculis ovatis
viginti, nucleo albo farctis, stromate hypophloeode pustulo-
so cupuliformi nigro-anulato, superne in discum sub-
angulatum, epidermide stellatim fissa cinctum angustato
exceptis illiosque cestroni osculis minutissimis signantibus.
— Fr. syst. II. 390. *Sph. nigro-angulata* Grev.; *Sph. circumvallata* Nees. (major, depresso magisque rotundata.)
Ad ramos fagineos, betulios, et coryleos rarius.
3996. *Sph. scutellata* Pers., pyrenis vasculosis
consertis nigris, stromati hexagonaliter orbiculato volvato
hypophloeodi impositis stipato-polinatis, unum veluti
subrotundum crassum mentientibus, dein osculis teretius-
culis obcaeli scutis sessargentibus subtuberis, epidermidem
scissam permeantibus. — Pers. syn. 37. Nees syst. f.
333. Fr. syst. II. 390.
Ad ramos alnos et acerines rarius. Auctumno.
3997. *Sph. tumida* Pers., majuscula turgida, disco
prominente planiusculo obtuso nigro, ostiolis nullis. —
Pers. syn. 41. Fr. syst. II. 389.
- Ad ramos quercinos sicclos. (Persoon.)
3998. *Sph. Kunzei* Fr., pyrenis globosis nigris,
parvis latitantibus insculptis, stromatis granulosi luteo-
pallidi ovalis utriusque attenuati, primum hypophloeodis,
dein epidermidem transversim scissam penetrantis con-
ceptaculo comprehensis verticibus in collum abrupte re-
gnati osculo atro-umbilicato minutissimo pertuso, discum
sordide cinereum punctatum insuribentibus. — Fr. syst.
II. 388. *Sph. Pini* a. Schm. et Ks. D. Schw. n. 153.
Sph. oxystoma Pers. apud Moug. et Nestl.
- Ad corticem Pinii Piceae et Abietis rarius. Vere.
3999. *Sph. microstoma* Pers., pyrenis parvis
nigris, stromate hypophloeode in discum prominulum pla-
niusculum orbicularem aperto exceptis illumique osculis
minutissimis globosis granuliformibus obstruentibus. —
Pers. syn. 40. Nees f. 331. Fr. syst. II. 388.
- Ad ramos Pinii domesticae rarius. Auctumno.

4000. *Sph. melanostoma* Fr., pyreniis ovatis parvis nigris, stromate albido adnato hypophloeoede, supra in discum subellipticum angustum contracto areto inclusis illumque dein osculis minitissimis nigris stipatis obliterantibus. — Fr. syst. II. 388.

Ad ramos Pyri Mali siccis passim. Vere.

4001. *Sph. diatrypa* Fr., pyreniis subglobosis, sternente hypophloeoede-innato, superne in discum truncatum nivem; primam poro simplici pertusam, dein oscalis in centrum coestipatis minitissimis obcessum proculalem recessis. — Fr. syst. II. 388.

Ad ramos alnetos siccis passim. Vere.

4002. *Sph. cincta* Fr., pyreniis globosis circumstribua nigris, stromati grumoso, cingulo nigro circumscripto hypophloeoedi, superne in discum planum nudum sordide album contracto immersis osculisque globosis periphericia exiguis, centrale majus cingentibus inscriptis. — Fr. syst. II. 387.

Ad corticem ramulorum tiliaceorum rarus. Vere.

4003. *Sph. leucostoma* Pers., pyreniis globosis nigris pluribus, stromate postuloso, cingulo nigro circumscripto hypophloeoedi, superne in discum truncatum album contracto subconico insculptis osculisque nigrescentibus sparsis magis minneve prominolis obsideantibus. — Pers. syn. 39. Nees syst. f. 332. Fr. syst. 387. *Sph. marginata* Sowerb. t. 372. — *Sph. Talus v. pileata* Tod. L. I. f. 80. (stromate polyporo;) Ad corticem Prudorum frequens. Vere.

4004. *Sph. nivea* Hoffm., pyreniis globosis parvis nigris, stromati grumoso, albo subrotundo hypophloeoedi, cinctura nigra redimicula conico-elevata immersis, osculisque globosis nigris parce prominolis discum nivem farinaceum circumscriptum, epidermide lacera exceptum perforantibus nigro-punctatumque mentientibus. — Hoffm. veget. cr. I. 26. t. 6. f. 3. Pers. syn. 38. Fr. I. L. Sph.

Talas a. cylindrica Tod. L. t. f. 92. *Lichen rosaceus* Flor. dan. t. 825. f. 1.

Ad cortices Populi, Salicis, Ulmi ubertim. Vere.

— e. *vasculosae*, — pyreniis subglobosis pulpa gelatinosa, aecis brevibus clavatis septato-sporophoris foctis, extus massa stromatica grumoso-cellulosa tenui conjunctis, conceptaculo proprio vasculosae, e basi adnata ventricosa, in apicem integrum caerulato iisque obturata exceptis, in colla corniculata magis minusve exserta convergentia subconnata productis, discumque superne conformem nee heterogeneum praestantibus. (Sph. trib. 9. circumscriptio Fr. Sph. conniventes N. Sph. pustulatae Pers. Schm. pr. pr.)

+ leptosporae, pyreniis umbilicato-papillatis.

4905. *Sph. Carpini* Pers., pyreniis subglobosis inquinatis nigris numerosis stipato-circinantibus, massa stromatica pallida junctis vasculoque nigro circumseptis, deinde in ostiola conferta globosa laevia subpapillata, non nisi sublibera epidermidem stellatim fissam excedentia productis. — Pers. syn. 39. Fr. syst. II. 384.

Ad ramos carpineos siccios vulgaris.

4906. *Sph. fibrosa* Pers., pyreniis globosis parvis nigris; in stromate stipato-granoso subrotundo flavescente hypophlypoide, cingulo nigro redimite conoideo occultatis verticemque in colla longa tenuata productorum connatorum osculis sphaericis umbilicatis ejus discum, epidemidem transversaliter fissum infarcentem circuinatum cordonibus s. obliterantibus. — Pers. syn. 40. t. 2. f. 3. Fr. syst. II. 384.

Ad Ihamai cathartici Pranorumque ramos ratis.

4907. *Sph. corniculata* Ehrh., pyreniis nigris e basi levata decumbentibus, massa stromatica albida, conceptaculo nigro recondita exceptis, in colla teretioscila obtusa umbilicata distincta laevia conferta prominula dentantibus. — Ehrb. cr. n. 300. Pers. syn. 40. Nees syst. f. 330. Fr. t. 1.

Ad ramicos salicinos et querinos passim.

4008. *Sph. syngenesia* Fr., pyreniis globosis sub-quinis nigris invatis s. subliberis, basi adnata, massa stromatica cinereo-nigricante obessa, conceptaculo concentrica striato sensim coarctato conico exceptis illudque collis exsertis in corpus corrugatum fragile connata co-ronantibus. — Fr. syst. II. 382. *Sph. tumida* anet.

Ad ramos siccos, quercinos v. c. et fugineos.

4009. *Sph. anomalis* Fr., pyreniis ovatis majusculis paucis, e basi immersa, massa stromatica cinereo-nigricante obesa in colla exerta distantia laevia robusta rotula productis vasculoque convexo difformi rugoso exceptis. — Fr. syst. II. 381. *Sph. torquata* Pera. *Sph. irregularis* DC. gall. VI. 116.

Ad ramos Robiniae Ps. Acaciae et Populi rarius.

4010. *Sph. enteroleuca* Fr., pyreniis minutis nigris subglobosis numerosis nigris, massa stromatica alba intermixta, conceptaculo crustaceo rugoso orbiculari convexo libero pisiformi exceptis, osculis confertis liberis globosis rostellatisque subrugosis. — Fr. syst. II. 381. *Sph. ceratosperma* DC. *Variolaria ceratosperma* Bull. t. 432. f. 1.

Ad ramos quercinos et carpineos rarissime.

4011. *Sph. gastrina* Fr., pyreniis globosis numerosis irregulariter aggregatis s. succenturiatis, pustulas ventricosas orbiculatas, cortici immersas constituentibus collisque inclusis prominulis. — Fr. syst. II. 379.

Ad trunco alnos et carpineos rarius.

† *ceratostomae*, collis longioribus magis exsertis.

4012. *Sph. ceratina* W., pyreniis oblongis hypophloeodeis in colla cylindrica sensim attenuatis, conceptaculo vasculo hemisphaericо-conoideo nigro-fusco tenui, epidermidem seism permeante comprehensa discumque osculis sphaericis rostellatisque exsertis nigris nitidis confertissimis obvallatum informantibus. — *Sph. Abietis* β. *veratina* Fr. syst. II. 398. *Sph. corniculata* β. *Abietis* A. et Schw. nisk. 20.

Ad corticem abietinum rarius.

4012. *Sph. detrusa* Fr., pyrenis ovatis stipatis, stromate laete luteo immerso, conceptaculo nigro conico cincto tectis, osculis conjunctis umbilicatis nigris prominentibus. — Fr. syst. II. 382.

Ad ramos siccos Berberidis vulgaris passim.

4014. *Sph. fascicularis* W., pyrenis 8-10 nigris, conceptaculo stipato, massa grumosa flavente farcto sphacelico sursum attenuato hypophloeodeo-luitante reclusis, e basi subglobosa in colla conniveutia arcta constricta, tenuis, superne demum liberis strictis nigris in apicem acutum elongatis rudibus effinis.

Ad radices quercinae effossas rarius. Auctummo. (Morphoseos ratione perquam versipellis habituque satis vario rediens, collis fasciculatis demum solutie facile recognoscenda.)

4015. *Sph. Hystrix* Tod., pyrenis globosis parvis nigris, conceptaculo nigro ovali depresso transversim erumpente, massa grumosa fuscescente farcto collumque breve constringente exceptis, superne in rostella rudia longissima subdivergentia libera subinerasatis. — Tode l. l. f. 127. Fr. syst. II. 364.

Ad ramos acerinos deciduos rarius. Auctummo.

4016. *Sph. ceratosperma* Tod., pyrenis globosis nigris tuberculo subrotundo convexo nigro, deinceps erumpentes, intas albido-fuscescente exceptis, in colla longa productis rostelleque brevia recta conferta spinulosa scabra exserentibus. — Tode l. l. f. 131. Pers. sys. 23. Fr. syst. II. 364.

Ad ramos Rosarum sylvestrium et Quercus passim. Vere. (Toden's var. *s. farctam* habet, a Personio huic s. Sph. podoidi dubie subscriptam, mihi plane dubiam.)

4017. *Sph. ferruginea* Pers., pyrenis plurimis nigris, conceptaculo stipato hypophloeode nigro subgloboso, dein reclinato-dilatato, epidermidem scissam cingentem pertuadente exceptis, e basi subglobosa in colla

aggregata teretia spinulosa, apicis impresso perforata productis. — Pers. syn. 35., obs. 66. t. 5. Schmidt l. l. f. 12. Nees syst. f. 321. c. Fr. syst. II. 363.

Ad ramos coryleos, populinos et sorbeos passim.

4018. *Sph. Sorbi Schm.*, pyreniis globosis plurimis nigris, conceptaculo nigro, intus albido tectis, nucleo gelatinoso, ascis filiformibus, sporidia ovata exigua continentibus farctis, collis longis sulcato-augulatis subconvergentibus stipato-confluentibus unumque veluti cylindricum mentieatis, demum patulis epidermidem scissam permeantibus. — Schm. myk. Hst. I. 59. Fr. syst. II. 380. *Sph. pentagona* Fr. olim. *Sph. coronata* Wahlenb. lapp. 520. *Sph. Prunastri* var. *Sorbi* A. et Schm. niss. 17.

Ad ramos sorbeos siccios passim.

4019. *Sph. Prunastri* Pers., pyreniis pluribus nigris majusculis, conceptaculo amplio concoloro subgloboso, epidermidem transversim scissam aequalem infarcientibus denumque excedentibus, massa albida coacta farcto conceptis, e basi subglobosa abrupte angustatis ejusque verticem coarctatum, collis exsertis 4-6-gonis sulcatis a. alutis stipatis, mox effusa obsideando dilatatis.

— Pers. syn. 37. Fr. syst. II. 380.

Ad ramos Prunorum patruorum siccios passim.

c. *hyphostromatiae*, stromate fibroso hyphideo in subiculum lanatum contexto, hypo- e. epiphloeoden, pyrenia simplicia distincta saepius calva, ascis longis subelavatis, in sporidia septata facile diffluentibus foetulentibus. (*Sph. tribus* 17. *bryosidue* Fr. *Sph. tomentosae* Schm.)

† *leptostomae*, pyreniis vertice aequali papillatis.

4020. *Sph. contexta* W., pyreniis hypophloeodeis, parvis teneris subglobosis papillatis, extus tenuiter villosis vilisque propexi dilute fuscoaceentia ope inter se contextis, vertice umbonato epidermidem scissam elevantibus, nucleo albo gelatinoso, ascis ovato-oblongis olivaceis utrinque acutiusculis biserratis foeto farctis.

Ad ramulos Populi balsamiferas hort. noribus,

4021. *Sph. infernalis* Kz., pyreniis hypophloeo-deis globosis tenuibus majusculis gregariis, stromate effuso floccoso-furfuraceo fusco-nigro latitate obvolutis, dein vertice convexo obsolete papillato, summam epidermidem bullata-elevatam parce acindentibus. — *Sph. infernalis* Kunze in lit. Fr. syst. II. 371.

Ad ramos quercinos in agro Lipsiens. rarius (Kunze.)

4022. *Sph. elongata* Fr., pyreniis subglobosis parvis nigro-fusco confertis hypophloeo-deo-insculptis, praeter basin pilis implexis fuscis, in stroma breve rigidulum contextis mucilaginosis calvis, primum nucleo albo, dein aeneo-nigro, fuscis; vertice convexo obsolete papillato s. annulato-depresso summam epidermidem insarcientibus seriatimque prorumpendo confluentibus, ascos solutos oblongos obtusos pentasporos longitudinaliter striatos multioculares profundentibus. — Fr. syst. II. 22. *Sph. Fumago* W. in lit. Cucurbitaria elongata Grev. scot. t. 195. *Sph. scabra* Schm. myk. Hft. I. 58. (*Iunus magis opatus, astomus, annulato-depressus.*)

Ad ramos Robiniae Pseudo-Acaciae siccios paessim.

4023. *Sph. flavescens* Fr., pyreniis gregariis epiphloeo-deis subglobosis distinctis papillatis, extus vellere delicato recedente albo tectis basique stromati tenuissimo radiatum expanso laxe intertexto lutecenti insidentibus. — Fr. syst. II. 44.

Ad ligna quiesquiliisque locis uidis putrescentes rarius.

4024. *Sph. aurantia* Pers., pyreniis gregariis subrotundis papillatis aurantio-rubris minutis laevibus, ex stromate subiculoso effuso aurantio emergentibus, vertice papillatis demumque ostiole obtuso crasso dilatiori pertusis. — Pers. syn. 69., icon. t. II. f. 4. Nees syst. f. 362. Fr. syst. II. 440. ?*Sph. aurea* Grev. scot. t. 47.

Ad ligna mucida Hymenomycetesque putres rarius.
Auct. (Aliam in Agarico haud dissimilem lectam servo,
pyreniis basi tenuis minoribus, fibris cartis tortuosis
succinctis.)

4025. *Sph. viridis* A. et Schw., pyreniis globosis obovatisque molibus pallide-virentibus sparsim-confertis stromati tomentoso concolori, dein coacto virescente incidentibus Hymenomycetumque velum obducentibus s. penitus penetrantibus, demum vertice convexo papillato prominulis. — A. et Schw. nissk. 8. t. 6. f. 8. *Sph. luteo-virens* Fr. syst. II. 239.

Ad Agaricos Russulas Lusatiae. (Alb. et Schweinitz.)

4026. *Sph. tristis* Tod., pyreniis globosis parvis alnaceo-rugulosis atris astomis confertis, stromate striato-hypoideo torvo concolori incidentibus, demum poro pertusis. — Tode t. I. t. 9. f. 67. Pers. icon. t. 12. f. 5., syn. 87. Alb. et Schw. 44 cum var. β -fusca (stromate crassiore magis fusco.) Fr. syst. II. 444.

Ad truncos patres, Viburni Opuli praeprimis, passim.

4027. *Sph. cinerea* Pers., pyreniis confertis globosis papillatis atris, primum tegmine crasso cinereo testis illoque demum secedente austus, calvis. — Pers. syn. 68. Fr. syst. II. 443.

Ad ligna exsiccata German. rarissime. (Persoon.)

4028. *Sph. violacea* Schm., pyreniis globoso-depressis umbilicatis confertis purpurascensibus, e stromate effuso brevi floccoso-contexto tenui albido emergentibus. — Schmidt in lit. Fr. syst. II. 441.

Ad Fuliginem violaceam, rarissime. (Schmidt.)

4029. *Sph. gressada* Tod., pyreniis depresso-globosis firmis papillatis sparsis cinereis, basi stromati fibroso gryseo-fusco laxe contexto interrupto incidentibus. Tode t. I. f. 69. excl. var. β . Fr. syst. II. 442.

Ad ramos salicinos humi patrescentes rariss.

4030. *Sph. Aquila* Fr., pyreniis globosis tornatis gregariis magnis (1-3) mamillato-papillatis astomis, primum stromate subiculpo crasso tomentoso fusco, ex hyphis delicatissimis ramosis septatis jugiter contexto obductis, bicorticatis, cortice externo testaceo fragili, primum tegmine velutino gryseo tenui vestito dein nudo,

interno cinereo tenuiter membranaceo, ascorum linearium in sporidia oblonga septata solitorum sarcime nigrum comprehendentibus. — Fr. l. f. Sph. byssiceda β . γ . Tod. l. l. f. 70. Pers. syn. 67. *Hypasma griseo-fuscum* Re-bent. nem. 997. (stroma sterile.) Sph. mammiformis auct. ?Fr. syst. 455. (Senilia, nude.)

Ad virgas in sepimentis uidis sepultas passim.

4031. Sph. *Rhaecodium* Pers., pyreniis minutis ovatis rugulosis, vertice contracto papillatis hirtis nigris, basi stromati hyphideo tomentoso, delicato in pellem expansam constipato insidentibus. Pers. syn. 74. Fr. syst. II. 449.

Ad trunco caesos in locis uidis rarius. Auctumno.

4032. Sph. *Trichoderma* Hoffm., pyreniis canicis teneris minimis aurantio-rubris, demum melanophaenis, stromate hyphideo in membranam tomentosam intescentem contexto insidentibus. — Hoffm. veg. cr. I. 9. t. 6. f. 1. Pers. syn. 69. Fr. syst. II. 440.

Ad ligna exesa fodinarum hercynic. (Hoffmann.)

\ddagger ceratosporiae, pyreniis rostellatis.

4033. Sph. *dryina* Pers., pyreniis minutissimis sphaericis, nunc stromati hyphideo delicato insidentibus, nunc nudis, atris calvis pilisye patulis horridis, vertice convexo rostellum setaceum rigidum nitidum illo sexies deciesve longius strictum acutum abrupte exserentibus. — Pers. syn. 58. t. 2. f. 6. Alb. et Schw. nisk. 26. cum var. laevi et tomentosa. Sph. *Pinastri* Nees syst. f. 354. B. Sph. *pilifera* Fr. syst. II. 472. cum var. β . *pilifera* et δ . *capillata*.

Ad ligna abietina et quercina molliora. Auctumno. (Satis versipellis stromatis ratione rostellarumque longitudine, quibus lusibus nunc quoque var. eriopyreniam addg.)

4034. Sph. *Stilbum* Schm., pyreniis globosis atris pusillis glabris, e vertice rostellum elongatum strictum triplo longius, apicem versus ampliatum exserentibus, stromati floccoso atro gregatim insidentibus. — Schmidt mgk. Hft. I. 63. Fr. syst. II. 472.

Ad ligna pluea Lusatiae. (Schmidt.)

4035. *Sph. lucifuga* Jungh., pyreniis aggregatis confertissimis ovatis villosis virgescitibus, rostellum elongata lutescentia exserentibus basique stromati delicato insidentibus. — Jungh. I. p. 409.

Ad ligna patris subterranea Hercyn. (Junghuhn.)

4036. *Sph. lagenaria* Pers., pyreniis parvis gregariis molibus badio-fuscis globosis rugulosis glabriusculis, e. vertice rostellum longissimum subulatum, apice hyalinum dilutum abrupte exserentibus, basi stromati hyphoideo fusco delicatissimo stipato intertexto insidentibus. — Pers. syn. 58. Fr. syst. II. 472.

Ad Hymenomycetes auberosos, nec non ad ipsa saxa arenaria humecta Thuring. rarius, stromate hyphoideo longe expanso.

d. *pachystromaticae*, pyreniis variis confertis, palpa gelatinosa ascis brevibus, sporidia simplicia exigua varie digesta foventibus farctis, stromati coacto s. stipato figurato adfixis s. insculptis. (Sph. sect. I. periphericae et II. hypophericae Fr. Sph. caulescentes et periphericas Pers.)

a. *ectopyreniae*, stromate subrotundo determinato carnoso s. grumoso conpresso, primum hypophlacoide, deinceps emerso, pyrenia simplicia sphærica, praeter basin adnatam libera, papillata, pulpa gelatinosa, ascis brevibus, sporidia simplicia exterrima foventibus farcta exserente et voluti caespitosa in superficie gerente. (Sph. trib. 13. caespitosae Fr. Fr. Schm. Sph. impositae Nees. Sph. converae Wahlenb. succ.) — Stroma saepenumero exuberat, in tuberculum sterilescens male succrescit omnemque edit Tuberculariae generis habitum ejusque fidem in contentionem trahit.

† *leiopyreniae*, pyrenis cálvis.

4037. *Sph. chaquatica* W., pyreniis rugulosis nigris minutis confertissime conglomeratis, intus albidis, stroma carnosum viridi-atrum carnosum hypophloëdes oblitterantibus granulosque exignis ovato-subrotundos

planiusculos scariosos, epidermidem scissam reclinantes
mentientibus.

Ad corticem Populi tremulae languidum Thrg. rarius.

4038. *Sph. flaccia* W., pyreniis parvis ovatis nigris
nitidis mollibus obsolete papillatis confertissimis, stroma
tenne carnosum pallidum laxe obsidentibus acervulumque
pulvinatum subrotundum baccum mentientibus, nucleo ge-
latinoso albo sarcis, demum contabescentibus amorphis,
vertice apertis, facile caducis. — ?*Sph. Dulcamarae* Schm.
myk. Hft. I. 62. Fr. syst. II. 421.

Ad vitices Dulcamarae ramulosque sambucinos rarius.

4039. *Sph. pulicaris* Fr., pyreniis stipato-caespito-
tosis, mole variis, parvis suepe minutissimis inaequalibus
ovato-subglobosis nigris sublaevibus, vertice epapillato
rimoso-dehiscentibus deinceps impressis pertusisque, stroma
nigrans tenue, nonnisi carnosulum, rimas infaciens ob-
literantibus. — Fr. syst. II. 417.

Ad ramos Sambuci nigrae languidos passim.

4040. *Sph. baccata* W., pyreniis parvis, e basi
attenuata sensim incrassatis obovato-turbinate nigris lae-
viusculis, vertice papillatis, confertissimis, primum sarcis
stroma carnosum fusco-nigrum obvallantibus, dein de-
pressis compressisve contabescentibus, acervulos hemi-
sphaericos stipato-baccatos mentientibus.

Ad ramos Cytisi Laburni languidos rarius.

4041. *Sph. acervalis* Moug., pyreniis globosis
rugulosis nigris subconnatis, demum umbilicatis, stromati
depresso pallido insidentibus granulosque minutos emersos
praestantibus. — Fr. elench. II. 83.

Ad ramos salicinos rarius.

* 4042. *Sph. populina* Pers., pyreniis majusculis
laevibus atris nitidulis stipatis, vertice convexo obsolete
papillatis exiliissime pertusis polymorphis, aliis subrotundis
depressis, aliis obovatis compressis, basi connata stro-
mati convexo compacto infisis, caespitulos subrotundos
confluendoque elongatos exsertos divergentes praestantibus,

raro sparsis, epidermidem permeantibus. — Pers. obs. II. 67. t. 5. f. 19., syn. 50. Fr. syst. II. 413.

Sph. elatina, pyreniis sparsis obovatis. — Fr. l. l. Alb. et Schw. nisk. 24.

Ad trunco Populi nigrae; s. ad ramos Pini Picæae, vel ad ipsas squamas strobilorum abietinorum.

4043. *Sph. varia* Pers., pyreniis nigris nitidulis sublaevibus, stromati nigro tenui subrotundo hypophloeodi, epidermidem scissam infarcenti impositis, biformibus, aliis foetis farctis globosis majusculis, vertice papillato mox depresso-umbilicatis, aliis subrotundis epapillatis sternilibus vacuis duplo minoribus, granulos stipatos parvos planos constituentibus. — Pers. syn. 52. Fr. syst. II. 416.

Ad ramos Pruni Cerasi putres terissime.

4044. *Sph. naucosa* Fr., pyreniis globosis laevibus opacis nigro-fuscescentibus astomis, nucleo albo farctis, stromati tenuato concolori, saepius obsoleto superadditis, caespitulos minutos rotundatos efficiuntibus. — Fr. syst. II. 416. *Sph. inaequalis* Pers. in lit.

Ad ramos ulmeos humi jacentes rariss.

4045. *Sph. pithyophila* Kze., pyreniis globosis patulis nigris laevibus nitidulis, vertice convexo obsoleto-papillatis, dein depresso-concavisculis poroque rotando hiantibus, consertim sparsis, basi stromati tenui expanso bullato nigro carbonaceo, primum hypophloeodi, dein emerso, summam epidermidem desquamantem abtergenti insidentibus, semilibera. — Schm. et Kunz. D. Schw. n. 133. Fr. syst. II. 425.

Ad corticem Pini sylvestris Lusatias et Abietum Hercyn. superior. passim.

4046. *Sph. conglobata* Fr., pyreniis subglobosis rugulosis nigris opacis rigidis, vertice convexo parce papillatis pertusisque, in stromate obsoleto laxe caespitosia. — Fr. syst. II. 414. *Tremella granulosa* Rets.

Ad ramos siccos cotyleos et betulinos rarius.

4047. *Sph. punicea* Schm., pyreniis globosis laevibus miquitis mollibus laete puniceis astomis, intus roseis,

collabescendo concavis, in stromate obsoleto laxe seriatimque caespitosis. — Schm. myk. Hist. I. 61. Fr. I. l.
Ad ramos Rhamni Frangulae Lusatiae. (Schmidt.)

4048. *Sph. Cucurbitula* Tod., pyreniis ovato-globosis laevibus mollibus aurantio-rubris, dein in caespites subrotundos junctis, mox collapsis cupuliformibus sub-astomis. — Tode I. l. f. 110. Pers. syn. 53. Nees syst. f. 321. Fr. syst. II. 415.

Ad corticem arborum, Abietum v. c., rarius.

4049. *Sph. Ribis* Tod., pyreniis subglobosis laevibus, primum rubro-purpurascens, mox fuscescens, nucleo ceraceo albo, dein fuscescente farctis, vertice papillatis, stromati corticali lutescenti laxe superadditis. — Tode I. l. f. 103. Fr. syst. II. 413. *Sph. appendiculata* Pers. syn. 50. (lusus stromate villoso-appendiculato.)

Ad ramos Ribes rubri rarius.

4050. *Sph. sinopica* Fr., pyreniis globosis minimis mollibus laevibus sublateritiis, collabescendo cupuliformibus, cinnamomeis, ostiolo papillato saturiore demum deciduo instructis, laxe caespitosis. — Fr. elench. II. 81.

Ad sarmenta Hederae languida rarius.

4051. *Sph. Laburni* Pers., pyreniis mole variis, saepe magnis obovatis rugulosis nigris, vertice dilatato convexiusculo, dein depresso mammillato-papillatis, nucleo ceraceo albo, dein ex ascis solutis oblongis transversim longitudinaliterque disseptis nigris decolore fuligineo-nigro farctis, basi stromati stipato-grumoso infixa, caespites subrotundos elongatosque, epidermide scissa aequali circumseptos constituentibus. — Pers. syn. 50. Nees syst. f. 325. Fr. syst. II. 413.

Ad ramos Cytisi Laburni bruma tactos passim.

4052. *Sph. Aurora* Fr., pyreniis globose laevibus coccineis subastomis minutis, siccis collapsis, e stromate carioso albo stellato erumpentibus caespitulosque subrotundos constituentibus. — Fr. elench. II. 80.

Ad corticem ramulorum tiliaceorum, rarius.

4053. *Sph. coccinea* Pers., pyreniis parvis teneris vitreis laevibus laete coccineis, vertice papilla mamillari prominula saturatiore obsessa, basi stromati carnosulo testaceo-lutescenti hypophloeodi adfixis caespitosis sparsive libere prominulis, primum oviformibus, dein depresso-depressis caducis. — Pers. syn. 49., icon t. 13. f. 2. Fr. syst. II. 912. cum var. β . *parasitica* et γ . *sanguinella* (*Sph. Mori* Weig.) *Sph. decidua* Tod. l. l. f. 104.

Ad corticem Tiliae, Fagi, Mori inque aliis Sphaeriis parasita, cum *Tubicularia minore* Lk. forsitan analoga.

4054. *Sph. chrysitis* W., pyreniis majusculis globosis aureis gleboso-furfuraceis, vertice umbilicato-impressis fragilibus, intus dilatieribus, basi attracta stromati carnosu hypophloeodi fulvo adfixis, caespitulos emersos liberos praestantibus.

Ad *Ribes nigri* ramos siccios in locis natis Thuring.

4055. *Sph. decolorans* Pers., pyreniis majusculis globosis gleboso-corrugatis cinnabarinis-miniatis, dein vertice depresso papillatis, mox fusco-decoloribus, e stromate carnosu-grumoso hypophloeode, nonnisi in tuberculum convexum roseum succrescente erumpentibus liberis caespitosis. Pers. syn. 49. cum var. β . *decipiente*. *Sph. pezizoidea* DC. gall. VI. 125. *Sph. cinnabarina* Fr. syst. II. 412. *Sph. fragiformis* Sowerb. t. 256.

Ad ramos qualescunque languecentes, salicinos, populinos fraxineosque praeprimis abundanter. (Persoonius jam stroma cum *Tremella purpurea* L., s. cum *Tubicularia vulgari* comparat, nec displicet hanc pro stromate hujus denuo succrescente agnoscere itaque utriusque conubium mutuasque colorum mutationes explicare.)

†† *criopyreniae*, pyreniis hirsutis.

4056. *Sph. Vaccinii* Sow., pyreniis subglobosis sarcitis astomis minutis atris stipato-caespitosis, primari villoso, dein calvescientibus. — Sowerb. t. 373. f. 1. Fr. syst. II. 418. *Sph. accumulata* Pers. in lit.

Ad ramos *Vaccinii* *Vitis Idaea* languidos rarius.

4057. *Sph. décorata* W., pyreniis exilibus globoso-tornatis pallide-miniatis, vellere furfuraceo delicato roseo, mox expallente vestitis, vertice papilla saturatiore minuta inscripta, basi aequali stroma carnosum tenue hypophloeodes occupantibus, confertissimis caespitalumque parvum hemisphaericum prominolum praestantibus.

Ad *Aceris campestris* ramulos languidos Thrg. rari.

S. entopyrenes, pyreniis subglobosis in colla magis minusave elongata productis, praeter oscula parce prominula, a cubilibus mutatis s. stromate ex substantia propria composito ineondito vel figurato exceptis, insculptolatitantibus genuinamque stromatis figuram concinnantibus. (*Sph. periphericae et hypophericae* Fr.)

effusata, pyreniis subglobosis, primum distinctis sparsis, deinceps congregando collaque producendo concrecentibus saepiusque stroma effusum indeterminatum longe lateque expansum cum cubilibus inde mutatis confluentibus s. ex mutuo pyreniorum connubio placentari conflatum, osculis magis minusave prominentibus asperum informantibus. (*Sph. tribus 8. concrecentes* Fr. *Sph. lignosae* Schm. *Sph. monostichae* Pers. pr. pr.)

4058. *Sph. simeti* Pers., pyreniis confertis oblongis connatis nigris, stroma effusum crustaceum nigrum, cubilibus immersum informantibus idque dein osculis conicis elongatis emergentibus subobliquis crassiusculis exasperantibus. — Pers. syn. 64. Fr. syst. II. 373. *Lichen sterecoreus* Schrank.

Ad fimum vaccinum et equinum rarius.

4059. *Sph. lineata* A. et Schw., pyreniis globosis nigris (ligno) immersis in seriem simplicem confluentibus osculisque ovato-oblongis teretiusculis rugosis distinctis emergentibus. — Alb. et Schw. nisk. 30. t. 11. f. 6. Fr. syst. II. 373.

Ad usques pineos Lusatiae rarius. (Alb. et Schweinitz.)

4060. *Sph. parallela* Fr., pyreniis globosis immersis, rimas cubilium infarciendo confluentibus s. in

caespites seriatim dispositos conglomeratis, osculis prominulis stipatis globosis laevibus. — Fr. syst. I. I. Spk. vda auct. nec Pers.

Ad ligia pinea putredine exesa raria.

4061. *Sph. insitiva* Tod., pyreniis globosis exiguis nigris longitudinaliter immersis confluendoque stroma fuscescens elongatum, intus albida, osculis subglobosis nigris prominulis asperulum menticatibus. — Tode t. I. t. 13. f. 108. Reb. neom. 328. Fr. syst. II. 366. nec Mart. Intra sarmentorum viteorum rimas rarius.

4062. *Sph. Melogramma* Pers., pyreniis obovatis nigris, vertice depresso umbilicato-papillatis, sensis s. denis in caespitulum, basi massa grumosa fusca friabili comprehensum confluentibus stroma que varium plerumque subrotundum, epidermidem scissam permeans tuberculoso-colliculosum redintegrantibus, raro distinctis sparsis. — Pers. syn. 13. Fr. syst. II. 420. *Sph. ocellata* Pers. disp. *Sph. caudata* Schum. *Variolaria melogramma* Bull. t. 492. f 1.

Ad ramos fagineos passim. (Paradoxa sp., jam *Sph. caespitosam*, jam confluentem, jam pulvinatam, habita *Sph. disciformem* inaequabilem montem, ex pyreniorum plurium connubio semet informans.)

4063. *Sph. sphaceroeca* JV., pyreniis globosis nigris parvis sparsis cortici insculptis latitantibus, in collum breve abrupte tenuatis osculoque sphaericō tornato, primum papillato, dein poro tenui pertuso, summam epidermidem perforante prominentibus.

Ad corticem Syringae et Ligustri Thuring. passim.

4064. *Sph. lata* Pers., pyreniis globosis nigris confertis (ligo corticive) insculptis latitantibus, in collum brevissimum abrupte tenuatis osculoque conico saepius quadrigono rimose perforato prominentibus, nunc distinctis cubilia permeando denigrantibus, nunc confluentibus illaque obducendo in stroma longe lateque effusum coaguum colliculosoque-umbonatum crassum mutantibus. — Pers. syn. 29.

a. stigmatica, pyreniis insculpto-latitantibus, cubilia integra oscula hemisphaerico permeantibus. — *Sph. maura et millaria* Fr. syst. II. 370.

β. scoriadea, pyreniis insculpto-latitantibus, cubilia in stroma contiguum crassum carbonaceum mutantibus. — *Sph. lata* Fr. syst. II. 369. Nees syst. f. 320. *Sph. fragifera* Tode l. l. f. 132. *Sph. fuliginosa* Sowerb. t. 373. *Sph. papillata* Hoffm. veg. t. 4. f. 3.

Ad ligna quaecunque arida ipsaque Hederae vitices seniles. (Utraque var. in ramis salicinis, sub umbra putrescentes, Helmisorii rhabdis obseasa saepius reddit habituque strigoso et colore fusco facile decipit.)

4065. *Sph. flavo-virens* Pers., pyreniis globosis nigris confertis (ligno a. cortici) insculptis latitantibus, massa stromatico gramoso-pulverulentia flavo-virente, cubilia penetrante a. in stroma colliculosum effusum confluendo obducente melanophaena exceptis, in collum breve abrupte tenuatis osculoque subrotundo ruguloso pertuso prominentibus. — Pers. syn. 22. Fr. syst. II. 357.

a. stigmatica, pyreniis distinctis, praeter oscula prominula latitantibus, stromate effuso cubilia integra penetrante decolorante exceptis. — ?*Sph. viridis* Sowerb. t. 375. f. 5.

β. scoriadea, pyreniis stromate emerso subrotundo a. pulvinato incondito exceptis. — Fr. l. l. *Cryptosphaeria aurantiaca* Grev. scot. t. 78. *Sph. flavo-virescens* Hoffm. veg. t. 2. f. 4.

Ad ramos quoquaque sub umbra putrescentes.

4066. *Sph. velutina* W., pyreniis globosis nigris sparsim confertis ligno insculptis latitantibus, dein in colla brevia abrupte tenuatis, massam stromaticam coactam trigram crustaceam, vellere tenni fusco obtextam effusam informantibus osculisque sphaericis rugulosis pertusis prominulis glabris nitidis perforantibus.

Ad truncos acerinos exsiccatos Thuring. rarius.

4067. *Sph. Stigma* Hoffm., pyreniis ovatis sensim in colla productis nigris confertissimis, cortici insculptis

latitantibus illamque in massam stromaticam friabilem versicolorem, primum albentem dein nigro-fuscescentem, extus politam contiguam longe lateque ambeuntem crassiusculam inversam, epidermidem scindentem infarcentibus osculisque planiusculis subimmersis nigris inscribentibus. — Hoffm. veg. t. 2. f. 1. Pers. syn. 21. Fr. syst. II. 350. *Stromatosphaeria Stigma* Grev. scot. t. 223. *Hypoxyylon operculatum* Bull. t. 478.

Ad ramos languidos Oxyacanthae, Carpini, Fagi aliarumque, primum epidermide tecta, dein illa latius angustiusve desquamante reclusa.

4068. *Sph. undulata* Pers., stromate effuso interrupto undulato atro, intus albo, osculis subrotundis prominulis. — Pers. syn. 21. Fr. syst. II. 350.

Ad ramos coryleos. (Persoon.)

4069. *Sph. velata* Pers., pyreniis globosis sparsis parvis laburno insculptis latitantibus illudque rimosam deum massu stromatico tenui contigua effusa nigra obductum, collis corniculatis prominulis difformibus raris permeantibus. — Pers. syn. 32. t. 1. f. 14. Fr. syst. II. 375.

Ad ramos tiliaceos dejecitos passim.

4070. *Sph. scabrosa* DC., pyreniis globosis parvis nigris in colla brevia tenuatis (ligoo) insculptis latitantibus stromaque effusum nigrum emersum crustaceum, osculis conicis permeantibus asperum informantibus. — DC. gall. II. 288. Fr. syst. II. 360. *Sph. tuberculata* Schum. *Hypoxylon scabrosum* Bull. t. 468.

S. podoides, pyreniis confertis distinctis prominulis rigidis verruciformibus nigris, cornicula brevia exserentibus. — Fr. t. I. *Sph. podoides* Pers. syn. 22. excl. syn.

Ad ligna querciuá duriora rarius.

4071. *Sph. spinosa* Pers., pyreniis ovatis confertis magnis nigris crassiusculis ligno insculptis latitantibus, in collum brevissimum coarctatis ostiolisque crassis 4-6 gonis sulcatis brevibus glabris a. pilos tortuosos exserentibus, veluti in stroma colliculosum atrum latissime

effusum contiguum confluentibus s. hinc inde in cornicula radia pyramidata hexagona succrescentibus. — Pers. syn. 34. t. 2. f. 9. Fr. syst. II. 368.

Ad ligna saginea putrida, rarius etiam ad corticem betulinum crassum pone radices.

4072. *Sph. spiculosa* Pers., pyreniis globosis ligno immersis aggregatis confluendo veluti stroma crustaceum umbonatum contiguum montantibus, in colla praelonga teretiuscula saepius utrinque sulcata tenuissima erumpentia productis. — Pers. syn. 33. Fr. l. l.

Ad ramos salicinos humi jacentes rarius.

4073. *Sph. spinifera* W., pyreniis subglobosis nigris, nucleo gelatinoso albo, ex sporidiis solatis geminatis vigrescentibus demum fusco-castaneo farctis, stroma primum hypophloeodes dein emersum hemisphaericum distinctum pisiforme nigrum, in crustam latam crassam confluentibus, extus undique cornicula tortuosa crassa cylindrica radia tortuosa aequalia s. nodis intercepta praelonga exserentibus. — *Sp. spinosa* auct. Flor. dan. t. 1311. f. 2.

Ad corticem truncorum sagineorum et pyrinorum caecorum imorum Thuring. passim.

† pulvinatae, stromate subcarnoso ex substantia propria composito, e basi sessili deplanata convexo subhemisphaerico immarginato, plerumque epidermide scissa succineto, sive primitus sive deinceps pube excussa calvescente, pyreniis inditis periphericis farcto eorumque osculis expuncto. (*Sph. tribus 3 - 6 pulvinatae, connatae, glebasae et lignosae* Fr. *Sph. convirae* Schm. *Sph. periphericae* Pers. *Dothideae Xylomatis* sp. Fr. *Polystigma DC.*)

† calvae, stromate primitus jam calvo.

4074. *Sph. rubra* Fr., stromate synphloeoide suborbiculari carnoso rubro, deinde rufo-fusco amphigeno, hiac maculari concaviusculo, hinc convexo, intus carnoso dilutiore, pyreniis rotundis numerosis saturatioribus exiguis parce prominulis insculpto. — Fr. obs. I. 172. *Dothidea rubra* Fr. syst. II. 553. *Sph. hyetosipilus* Mart. erl. 479. *Polystigma rubrum* DC. *Xyloma rubrum* Pers. syn. 105.

Ad folia Pruni domesticae et spinosae vegeta.

4075. *Sph. ochracea* Wahlenb., stromate syn-phloeode hypogeno subangulato lutescente ochraceo, deinceps fulvo, hinc maculari, hinc planiusculo, intus carnosus dilutiore, pyrenia sphaerica saturiora parco prominula exigna occultante. — Wahlenb. Lapp. 518. nec Fr. *Sph. xantha* Fr. obs. L. L. *Sph. Padi* Holl. *Dothidea fulva* Fr. syst. L. L. *Polystigma fulvum* DC. *Xyloma aurantiacum* Schlecht.

Ad folia Pruni Padi vegeta hort. Haleus. v. c. passim.

4076. *Sph. Ribis* Pers., stromate hypophloeode elliptico pulvinato planiusculo, summam epidermidem transversim scissam aequaliter infarcente nigro, intus stipato-granuloso nigrescente, pyreniis minimis concoloribus insculpto-latitabibus periphericis confertissimis, nucleo albido ceraceo farctis obpresso hisque prominulis subtilissime asperulo. — *Sph. Ribesia* Pers. syn. 14. Rebent. neom. 324. t. 1. f. 5. Nees syst. f. 312. *Dothidea Ribesia* Fr. syst. II. 550.

Ad ramos Ribes nigri et rubri languidos. Hyeme.

4077. *Sph. friabilis* Pers., stromate hypophloeode subrotundo disciformi, summam epidermidem scissam subaequaliter infarcente atro, intus nigrescente grumoso friabili, pyreniis sphaericis majusculis nigris, nucleo coacto albido farctis eorumque osculis punctiformibus inscripta. — Pers. syn. 24. Fr. syst. II. 361.

Ad ramos quercinos juniores languidos rarius.

4078. *Sph. quercina* Pers., stromate hypophloeode hemisphaericō s. semigloboso nigro, summam epidermidem varie scissam, extus adpressam superante tuberculiformi, pyreniis nigris, e basi globosa nuda in collum rectum, massa coacta albido-carea obducta producta, ampullaeformibus farcto eorumque osculis globosis exiguis prominulis aspero. — Pers. syn. 24. t. 1. f. 7. ? Nees syst. f. 321. Fr. syst. II. 362. *Sph. lignea* Pers. L. L.

Ad ramos quercinos putreantes passim.

4079. *Sph. disciformis* Hoffm., stromate hy-

pophloeoode pulvinato orbiculato tornato in verticem deplanato, primum fusco-cinerascente carioso, deo coacto nigro, epidermidem scissam permeante, pyreniis nigris confertis e basi globosa nuda in collum brevissimum, massa coacta albido-carnes obliterata abeuntibus farcto eorumque osculis iusqualiter fassis insculptis nigris expuncto. — Hoffm. veget. 15. t. 4. f. 1. Pers. syn. 24. Nees syst. f. 321. Fr. syst. II. 353. Sph. grisea DC. gall. VI. 122. (*Iusus superficie cinerea.*) *Variolaria punctata* Bell.

Ad ramos quercinos, fagineos et carpineos languidos ubertim, in quibus rarius in corpora verracosa nigra sterilia (?Agyrium) desciscit.

4080. *Sph. bullata* Ehrh., stromate hypophloeoode plano-convergivasculo nigro vario (subrotundo, ovali reniformique), deo sammam epidermidem reclinatam superante depresso-placentari, pyreniis nigris confertis, e basi globosa nuda in collum brevissimum, massa coacta alba obliteratam abeuntibus farcto eorumque osculis depressis insculptis stellato-fassis expuncto. — Ehrh. exsicc. n. 199. Hoffm. I. I. t. 2. f. 3. Pers. syn. 27. Fr. syst. II. 349. *Sph. depressa* Bolt. t. 122. *Sph. Placenta* Tode I. I. t. 12. f. 97.

Ad ramos salicinos languidos vulgaris.

4081. *Sph. sordida* Pers., stromate erumpente subrotundo sordide-nigro rugoso, intus pyreniis globosis exiguis, massa molliuscula cinereo-fuscescente obliteratis farcto, in discum depresso osculis impressis parce expunctum deplanatis. — Pers. syn. 25. Fr. syst. II. 361.

?*s. Crataegi*, stromate subrotando, intus cinereo-vidente, pyreniis gelatinam rubentem stillantibus. Pers. I. I.

Ad ramos fraxineos; *s. in Crataego rarius*. (Pers.)

4082. *Sph. lanciformis* Fr., stromate transversim erumpente lanciformi convexo atro, intus cinereo-nigricante, pyreniis paucis globosis majusculis, ostiolis demum parco prominentibus — Fr. syst. II. 362. *Sph. forami-*

nosa Pers. *Sph. cincta* DC. gall. VI. 119. Duby. *Sph. Betulae* Schum. *Sph. quercina* B. Alb. et Schw. nisk. II.
Ad corticem betulinum passim.

4083. *Sph. lenta* Tode, stromate rotundato sublibero repando fuscescenti-nigro, intus albo, pyreniis globosis minutis inaculpto-latitantibus osculisque depressis punctiformibus prominulis. — Tode I. l. t. 12. f. 102. Fr. syst. II. 349.

Ad ramos decorticatos Salicis capreae rariss.

4084. *Sph. succenturiata* Tode, stromate hypophloeode hemisphaericō, summa epidermide irregulariter fissa minuto, tuberculiformi, pyreniis biformibus, aliis basilaribus globosis astomis latitantibus, aliis obovatis in collum massa ceracea alba tectum productis farcto eorumque osculis impreassis punctato. — Tode I. l. f. 109. Schum. myk. Hft. II. f. 19. Fr. syst. II. 347.

Ad ramos ulmeos et acerinos rariss.

4085. *Sph. lutea* A. et Schw., stromate hemisphaericō nigro ruguloso, intus grumoso luteo, dein in verticem discoideum marginatum, osculis nigris prominentibus expunctum dilatato, veluti cupuliformi. — Alb. et Schw. nisk. II. t. 1. f. 1. Fr. syst. II. 347.

Ad truncum alnem Lusatiae. (Alb. et Schweinitz.)

4086. *Sph. verrucaeformis* Ehrh., stromate hypophloeode convexo pulvinato, saepius insigni nigro, primum epidermide varie (longitudinaliter s. stellatim) scissas arcte adnata elevata excepto illamque dein reclinata excedente verruci- & pisiformi, pyreniis majusculis nigris confertis, e basi globosa in collum breve, massa sita obliteratum productis eorumque osculis parce prominentibus incondito-rugalosis. — Ehrh. ess. n. 280. Pers. syn. 26. Fr. syst. II. 555. *Sph. Avellanae* Pers. disp.

Ad ramos carpineos et fagineos vulgaris.

4087. *Sph. favacea* Fr., stromate hypophloeode convexo pulvinato magno nigro, summa epidermide irregulariter transversimque fissa adnata excepto verruciformi,

pyreniis ovatis majusculis in collum breve, massa alba obductum abrupte tenuatis eorumque osculis parce prominentis rugaloso. — *Fr. syst. II. 354. Sph. grossa et variolosa Pers. Sph. verruciformis y. Alb. et Schw. nisk. 12. Sph. betulina Chev.*

Ad ligna betulina truncosque Ribes nigri vetustos.

4088. *Sph. pilulifera* Kz., stromate subrotundo difformi immerso plano, extas intusque atro, pyreniis insculpto-latitantibus, e basi globosa in collum longum attenuatis osculisque globosis maximis cavis prominentibus. — *Fr. syst. II. 352.*

Ad trunco fagineo Bohemiae. (Kunze.)

† vestitus, stromate ex plurium pyreniorum connubio in figuram pulvinatam s. hemisphaericam concinato, rarus effuso omnino s. areolato-placentari, acmet ex pube hyphoidea velutinave substrata coeunte informante, s. scobem velutino-pulverulentam superinduente, deinde calvescendo iterum exuente.

* *hyphoideac, stromatis initii hyphoideis, dein coactis pyreniorumque agmine centro oblitteratis.*

4089. *Sph. typhina* Pers., stromatis initii deliciatissime hyphoideis niveis (vaginas Graminum) longe jugiterque ambeuntibus, dein in stroma carnosulum album coactis, pyreniorum globosorum insculptoram confluentium astomororum luteorum, nucleo gelatinoso farctorum pavimento contigno glabro laete-rubiginoso alutario oblitterato. — *Pers. syn. 29., icon. t. 7. f. 1. Nees syst. f. 314. Stromatosphaeria typhina Grev. scot. t. 204. Typhodium graminis Lk. Dothidea typhina Fr. syst. II. 553. Polystigma typhinum DC. Sph. spiculifera Sowerb. t. 270.*

Ad vaginas graminum vegetorum (Dactylis). Aestate.

4090. *Sph. gelatinosa* Tod., stromatis initii delicatissime hyphoideis albis epixylis, dein in stroma carposum convexum aequale pulvinatum opacum coactis, pyreniis sphaericis prominentibus saturationibus super-

fusis. — Tode I. I. II. 48. f. 123. 124. Fr. syst. II. 336.
Sph. pallida Pers. syn. 12.

Ad ligna molliora putrescentia rarius.

4091. *Sph. rufa* Pers., stromatis initia tenuiter-hypoideis albicantibus epizyliis, mox in stroma carnosum convexum irregulare rufum, intus albidum, pyreniis globosis parce prominulis saturatioribus, superficiem rugulosam impertinentibus tectum abeuntibus. — Pers. syn. 13. Fr. syst. II. 335. *Sph. scarlatina* Schum.

Ad ligna quercina, faginea Ruboramusque sarmenta rarius.

4092. *Sph. citrina* Pers., stromatis initia flocoso-velutinis pallescentibus in stroma carnosum effusum planum s. interrupto - areolatum delicatissime velutinum crassiusculum citrinum coactis, pyreniis insculpto-latitibus minutissimis confertissimis, nucleo hyalino farctis, e basi globosa abrupte in collum brevissimum tenuatus superficiem quemammoso-colliculosam, osculis papillaribus saturate frangis inscriptam parce elevantibus. — Pers. syn. 18. Fr. syst. II. 337. *Naemaspora sulfurea* Wahl. sps. 471.

Ad terram, trunco Polyporosque exsiccatos rarius.

4093. *Sph. lateritia* Fr., stromatis initia hypoido-velutinis delicatissimis in stroma carnosum glabrum late effusum pallide lateritium abeuntibus, pyrenia globosa irregulariter immersa minuta saturatiora, osculis punctiformibus prominula soventibus. — Fr. syst. II. 338. *Hypolyssus ventricosus* Pers. myc. II. 7.

Ad Agaricos putres, v. c. *Saxouiae*. (Schmalz.)

4094. *Sph. rosea* Pers., stromatis initia hypoides laxe intertextis albo-flavescensibus, dein sensim in stroma determinatum constipatis, pyrenia conoidea ovatoye-subglobosa papillata saquineo-rosea mollia confertissima, vertice demum depresso-subsidentia informantibus eorumque agmine confluenta crustamque mentiente obliteratis. — Pers. syn. 18. (*sterilis*, *terrestris*, ideoque *dubia*.) Fr. syst. II. 338. *Sph. rosella* Alb. et Schw. nissk. 35. f. 7. f. 3. Fr. l. l. Nees syst. f. 362. B. Gr. scot. f. 138.

Tam lignum patridam Salicam cavarum, tam Polyporum lucidum, latitudine 2-3 unciali et crassitudine plurium linearum obducentem circa Heringam Thuring. semel legi. Auctumno. (Cave, ne initia hyphoidea pyrenophora in lignis obvia pro nova specie habeas!).

4095. *Sph. deusta Hoffm.*, stromatis initii stipato-hyphoideis intus abituque determinato albis, centro coacto pulverulento gryseo-cinerascens subcarnosis thelephoroideis, sensim in stroma caruosum undulato-rugosum rigidum carbonaceum nigrum glabrum effusum, intus grumosum indurescentibus, pyrenia superficia magna insculpta, collis brevibus mamillari-prominula foventibus. — Hoffm. veget. I. 3. t. 1. f. 2. Pers. syn. 16. Nees syst. f. 316. Fr. syst. II. 345. *Sph. albo-deusta* Wahl. sicc. II. 1001. *Sph. versipellis* Tode l. l. f. 120. *Sph. maxima* Web. *Hypoxylon undulatum* Bull. t. 487.

Ad basin truncorum vetustorum vulgaris.

** *velutina*, stromate primum ex scube velutino-pulverulenta colorata incuso, dein calvesceate. (*Hypoxylon* Bull.)

4096. *Sph. confusa* Tod., stromate subrotundo s. oblongo aegusto brevi, primum tomento macido vestito, dein calvo nigro, intus albo, pyrenius subglobosis nigris seriato-confluentibus majusculis farcto verticibusque umbonatis mamillato-papillatis prominulis colliculoso. — Tode l. l. f. 87. Fr. syst. II. 342. *Sph. uda* auct. et forsitan ipsius Pers. cum var. β . *salicaria* *Sph. albicans* β . *confusa* Pers. syn. 33. et 70.

Ad ligna salicina et quercina putredine extesa. Hyeme.

4097. *Sph. coprophila* Fr., stromate effuso, primum tomento tenui albicante cadaco tecto, ex pyreniis subglobosis conuatis nigris conflato eorumque verticibus umbonatis globoso-papillatis ruguloso, detum atro. — Fr. syst. II. 342. *Sph. albicans* γ . *fimicola* A. et Schw. 36.

Ad fimum vaccinum in nemoribus adis. Aestate.

4098. *Sph. botryosa* Fr., stromate epixylo tuberoso prominulo rotundo ex pyreniis globois conuatis

atria opacis (6 - 10) caespitoso-conglomerato conflato corrugato, verticibusque depresso-papillatis inscripto. — Fr. syst. II. 342.

Ad ligna quercina dura montis vogesi. (Mougeot.)

4099. *Sph. nummularia* DC., stromate determinato suborbiculari s. elliptico, primum hypophloeode, scobe pertenui fusca superfuso, dein epidermidem scissam marginantem excedente ab ambitu volvato clypeato-pulvinato atro, pyreniis ovatis majusculis farcto eorumque osculis impresso-umbilicatis pertuisis exiguis piceis nitidis expuncto. — DC. gall. II. 290. Fr. syst. II. 348. *Sph. Macula* Tode l. l. f. 106. Pers. syn. 19. *Sph. anthracina* Schm. l. L. t. l. f. 16. *Sph. Clypeus* Schw. *Sph. diffusa* Sowerb. t. 373. *Hypoxylon nummularium* Bull. t. 478.

Ad corticem fagineum et quercinum rarius.

4100. *Sph. rubiginosa* Pers., stromate epixylo, e figura hemisphaerica vario libero, saepius pulvinato s. in areas inconditas depresso effusa protracto, primum scobe steppeo-pulverulenta sordide luteacente, mox laete rubiginosa obducto, dein calvescendo nigrescente, pyreniis nigris globosis, vertice mammillari osculis, halone nudo albo cinctis pertuso, magis minusve prominulis. — Pers. syn. 11. Fr. syst. II. 340. *Sph. atro-purpurea* Tode l. l. f. 105. et eliorum.

Ad ligna humi putrescentia truncosque vulgaris.

4101. *Sph. uda* Pers., stromate depresso-pulvinato oblongato, ambitu elevato determinato, primum scobe delicatissima ferruginea adsperso, dein calvo nigro, pyreniis ovalibus celluloso-counatis nigris, supra aequaliter confluentibus farcto eorumque osculis acutis parce prominulis aspero. — Pers. syn. 33. Fr. syst. II. 358. pr. pr.

Ad ligna salicina uda Thuring. (*Sph. confluens* Tod. a *Sph. uda* Pers. plane non, certo tamen ab hac differt.)

4102. *Sph. serpens* Pers., pyreniis depresso-globosis majusculis connato-confluentibus stroma que effusum appланatum cubilia longe lateque obducens, primum tegmine mucoso sordide-cinereo obductum, dein mundum

nigrum verticibusque umbonatis acute papillatis colliculosum mentientibus. — *Pers. syn. 29. Nees syst. f. 317. 318. Fr. syst. II. 341. Sph. crustacea Sowerb. t. 372. Sph. mammiformis Hoffm. veg. t. 3. f. 1.*

Ad ligna salicis molliora et putrida. Hyeme.

4103. *Sph. fusca* Pers., stromate epixylo, praeter basis applanatum libero hemisphaericō s. pulvinato majusculo, raro effuso latescente, extus primum scobe stuppea carneo-fusca obducto, dein calvescente intusque concoleore fusco, osculis minutissimis s. obsoletis prominulis expuncto. — *Pers. syn. 12. Nees syst. f. 310. Fr. syst. II. 332. Sph. glomerata et Coryli DC. Sph. confluenta Willd. Sph. tuberculosa Bolt. t. 123. Sph. castorea Tod. I. I. f. 100. Sph. lycoperdoidea Weigg. Hypargylon glomeratum Bull. t. 468.*

Ad cortices patrescentes abundat quovis tempore.

4104. *Sph. rubricosa* Fr., stromate elastico, epidermidem dein reclinante disformiter tuberculoso nigro-fusco, scobe rubricosa pulvriato-grumosa obtecto, intus albo-cinerascente frisibili, pyreniis globosis periphericis immersis atris confertis insculptis obliterate eorumque osculis hemisphaericō-mammillaribus prominulis pertusis nitidis aspero. — *Fr. elench. II. 63.*

Ad ramos quercios agri badens. primus Kneiffius, nec non in agro thuring. rarius obviam auctor legit.

4105. *Sph. rubiformis* Pers. emend., stromate hypo-s. epiphloeode hemisphaericō, mole et dispositione vario, pyreniis globosis bicorticatis nigricantibus insculptis eorumque vertice umbonato papillato baccato-prominalis farcto, primum distincto, scobe velutina fuscenscenti vestito, dein calvo nigro nitido, piluli-s. rubiformi s. aggregato confluente.

α. cohaerens, stromatibus epiphloeodeis hemisphaericis piluliformibus, plurimiis plerumque aggregato-confluentibus areasque latas colliculosas interruptasque mentientibus. — *Sph. cohaerens Pers. syn. II. Nees syst. f. 310. Fr. sys. II. 333.*

β. incrassans, stromatibus epiphloeodeis bullato-pul-

vinatis dein longe expansis. — *Sph. incrassans* Pers. syn. 62. Fr. syst. II. 343.

γ. baccata, stromate hypophloeode, e basi coarctata elliptico, epidermidem scissam reclinante, *s. epiphloeode*, e basi dilatata hemisphaerico-pulvinato rubiformi insigni. — *Sph. multiformis* Fr. syst. II. 334. — *Sph. argillacea* Pers. *Sph. cinereo-fusca* Schum. *Sph. peltata* DC. *Sph. pulvinata* Hedw. (status juvenilis.) — *Sph. rubiformis* Pers. syn. 9. *Sph. granulosa* Sow. DC. Dub. *Sph. labiata* Pers. *Stomatosphaeria elliptica* Grev. *Sph. deusta* Wahl. *Lapp. Hypoxylon granulatum* Bull. t. 487.

Var. α . ad cortices fagineos; β . ad trunco alueos; γ . ad trunco betalinos siccis passim redent et vix nisi stromatis mole, dispositione mutua et figura inter se different.

4106. *Sph. fragiformis* Pers., stromate epiphloeode, primum praeter basin rotundatam adnatam tornato-globoso, scobe pulverulenta miniato-rubiginosa superfusso, dein calvescente, saepius difformi, mole (pisi s. avellanae) vario, pyreniis ovatis nigris parvis parce prominulis peripherico-confluentibus corticemque veluti, globum stipato-gramosum atro-fuscum ambeuntem mentientibus. — Pers. syn. 9. t. 1. f. 1. Nees syst. f. 309. Fr. syst. II. 332. *Sph. bicolor* DC. *Sph. rubra* Willd. *Sph. radians* Tod. *Hypoxylon coccineum* Bull. *Lycoperdon cariolum* L.

Ad cortices fagineos et betalinos passim.

4107. *Sph. Tubulina* A. et Schw., stromate ovato-oblongo semiintumero insigni, primum scobe delicata viridula adperso, dein calvo nigro-ferrugineo (terreo) pulvinato calvo, pyreniis maximis confertis insculptis, e basi ovato-ventricosa subprismatica in collum longum terè sensim attenuatis, lageniformibus, nucleo gelatinoso nigro farctis. — A. et Schw. 6. t. 4. f. 4. Fr. syst. II. 346.

Ad truncum abietinum Lusatiae. (Ald. et Schleinitz.)

4108. *Sph. concentrica* Bolt., stromate saepius maximo, primum turbinato, scobe delicatissima velutina

ruginosa adsperso, dein globoso-difformi fusco-nigricante veluti corticato rigido, intus stratis concentricis zonatis celluloso, pyreniis oblongis periphericis immersis foeto. — Bolt. t. 180. Pers. syn. 8. t. I. f. 2. Nees syst. f. 308. (*lusus basi angustataebovatus.*) Fr. syst. II. 331. *Sph. tunicata* Tode t. I. f. 130. *Lycoperdon fraxineum* Huds. *L. atrum* Schaeff. t. 329. *Sph. tuberosa* Timm. *Valsa tuberosa* Scop.

Ad truncos fraxineos, alneos et salicinos rarius.

7. *discoidea*, stromate figurato carnoso cupulari, disco pyreniorum insculptorum osculis expuncto. (*Sph. tribus 2. Poronia* Fr. *Poronia* Willd.)

4109. *Sph. cupularis* Fr., stromate carnoso cupulari marginato luteo, extus villoso, disco depresso, pyreniis periphericis tecto. — Fr. in Schlechtd. Linn. 1830. p. 539. *Sph. pallida* Willd. herb.

Ad ligna putrida agri berol. (Willdenow.)

4110. *Sph. Poronia* Pers., stromate carnoso-coriaceo elato, e basi stipitiformi pubente s. glabriuscula abrupte in discum truncatum albo-farinaceum, pyreniorum insculptorum osculis nigris sparsis punctatum coucavium marginatum abrupte dilatatis, extus fuligineo-nigricantibus, intus albis. — Pers. syn. 15. Nees syst. f. 313. *Sph. punctata* Sowerb. t. 127. Fr. syst. II. 330. *Poronia Gleditschii* Willd. berol. 400. *Peziza punctata* L. Flor. dan. t. 288. Bull. t. 252.

Ad simum equinum et asininum rarissime. Hyems.

8. *clavatae*, stromate figurato carnoso stipato distincto eretto, superficie et colore vario, e basi cauli-stipiti-s. radiciformi, longius nonnisi protensa sterili in clavulam simplicem s. proliferam, pyreniis amphiphericis insculptis corticato. (*Sph. trib. 1. Cordyceps* Fr. *Cordyceps* Fr. obs. *Xylaria* Schrk. Rebent. Grev. *Sph. clavatae* Schm. *Sph. caulescentes* Pers.)

4111. *Sph. filiformis* A. et Schw., stromate gregario eretto subsessili arrizo simplici s. prolifero sub-

eroso funiculari, primum pallente dein nigrescente, praeter basin obsolete pilosam striatam glabro, mediotenus pyreniis ovatis prominentibus aspero, in apicem roseum sterilem desinente. — Alb. et Schw. nissk. 2. t. 3. f. 5. Fr. syst. II. 329. *Rhizomorpha simplicissima* Pers. myc.

Ad foliorum deciduorum (Syringae) petiolaris rarissime. (Similem s. novam in linteis durioribus putrescentibus legi.)

4112. *Sph. carpophila* Pers., stromate suberoso gracili simplici, e stipite basi longissima rhizode villosa sustentato in clavulam subulatam, primum albido-pulverulentam, dein nigricantem, pyreniis globosis, umbero hemisphaericō prominentibus asperam desinentibus. — Pers. obs. t. 1. f. 3., syn. 6. Fr. syst. II. 328. *Xylaria flexuosa* Schrank.

Ad pericarpia saginae locis udis jacentia rarius.

4113. *Sph. Hypoxylon* Ehrh., stromate tenaciter suberoso compresso simplici gregario, juveuili e stipite pilis rigidis densis patentibus nigro-fuscis hirto in apicem cornutum acuminatum s. truncatum pedato-incisum, tegmine candido incuso illinitum desinente, senili calvo detrito undique concolore nigro rigido, mediotenus pyreniis insculptis globosis umberonato-prominentibus turgescere cylindrico, apice compresso sterilemente. — Ehrh. exs. n. 150. Pers. syn. 5. Fr. syst. II. 327. *Sph. digitata* Bolt. t. 129. *Sph. cornuta* Hoffm. veg. t. 3. f. 1. *Sph. aspera* Fl. dan. t. 1258. *Sph. hirta* Batsch. *Valsa digitata* Scop. *Clavaria Hypoxylon* L. Bull. t. 130.

Ad trunco vetustos ubique. Auct. — Vere.

4114. *Sph. stuprea* W., stromate nigro fusco, tegmine stupposo stipito-contexto, stratum medullare album ambeunte tecto, molli, e basi rhizode ramosissima implexa in stipites proliferis, inferne bulbosos, superge in apicem primum albo-pruinosum tenuatum, dein pyreniis globosis, vertice acuto papillato prominentibus, nucleo nigro faretis asperum cylindricum desinente, plexus fasciculatos rhizomatoideos mentiente. — *Sph. rhizoides* Wallr. in lit. *Sph. digitata* β. *rhizoides* Fr. elench. II. 56.

* Ad ligna quercina aqueductuum northusanorum semel at abundantem.

4115. *Sph. digitata* Ehrh., stromatibus e basi connata stipites glabros caespitosos exscentibus iisque in clavam teretem atro-rufescens carnoso-suberosam, pyreniis globosis vertice prominulis asperam oblongam, apice sterili acuto terminatam desinentibus. — Ehrh. Beytr. VI. 7. Pers. obs. II. 63. t. 2., syn. 6. Flor. dan. t. 1306. Nees syst. f. 307. Fr. syst. II. 326. *Clavaria Hypoxylon* Schaeff. t. 265. *Cl. digitata* L. Bull. t. 220.

Ad ligna domestica fabrefacta in hortis rarius.

4116. *Sph. bulbosa* Pers., stromate simplici s. subramoso coriaceo glabro cinereo-nigrescente, e basi subrotunda laevi fusca alba sclerotioidea in stipitem flexuoso, clavulam subcompressam, pyreniis insculptis vertice prominulis asperam sustinente, abeunte. — Pers. obs. II. t. 1., syn. 5. Nees syst. f. 306. Fr. syst. II. 327.

In pinetis ad terram Hercyn. super. (Persoon.)

4117. *Sph. polymorpha* Pers., stromatibus gregariis, e basi curta tereti crassa in clavam obesam obtusam, e figura obovata, cylindrica s. spathulata variam saepius difformem, extus primum albida, dein sordide nigram, intus subcarnosam, siccando suberoso-lignescensem incrassatis maximis, pyreniorum globosorum nigro-fuscorum osculis papillatis prominentiorum agmine corticatis. — Pers. obs. t. 2. f. 2. Nees syst. f. 307. Fr. syst. II. 326. *Sph. ectyloglossa* Rebent. neom. t. 1. f. 1. *Xylaria polymorpha* Grev. scot. t. 237. *Sph. carcharias obtusa* Weigg. *Valsa clavata* Scop. *Sph. digitata* Flor. dan. t. 900. — Menth. pug. t. 6.

Ad truncos fagineos lignaque querc. fabrefacta passim.

4118. *Sph. alutacea* Pers., stromate simplici carnoso molli laevi fragili, dein alutaceo, e stipite brevi sensim in capitulum clavatum pallido-alutaceum demum pyreniis prominentibus tuberculosum abeunte. — Pers. obs.

*t. 2. f. 2., syn. 2. Flor. dan. t. 300. Nees syst. f. 304.
Fr. syst. II. 323. Sph. clavata Sowerb. t. 159.*

In pinetis inter folia putrescentia rarissime.

4119. *Sph. militaris* Ehrh., stromate carnosum aurantiaco, e stipite aequali tenaci dilatiore in capitulum clavatum tuberculatum deorsim attenuatum desinente. — Ehrh. Beytr. I. I. Pers. obs. t. 2. f. 3., syn. I. cum var. *polycephala*. Nees syst. f. 305. Fr. syst. II. 323. *Cl. granulosa* Bull. t. 496. *Clavaria militaris* L. Flor. dan. 651. — Vail. bot. t. 7. f. 4.

β. sphærocephala, stromatis capitulo subgloboso, stipite tenui longissimo. — Schm. myk. Hst. I. 116.

Ad truncos patres muscosos Hercyn. larvis insectorum ionata, Jove pluvio rarissime reddit.

4120. *Sph. capitata* Holmsk., stromate carnosum intus stipiteque elato aequali glabro citrino, dein nigrescente clavulamque capitatum ovato-subglobosam badiam s. rufescens, extus pyreniis prominentibus asperam sustinente. — Holmsk. coryph. 52. Pers. syn. 3., myc. I. t. 10. f. 1. Fr. syst. II. 324. Schm. myk. Hst. I. 93. *Sph. agariciformis* Bolt. t. 130. Sowerb. t. 354.

In pinetis German. austral. Ceraunio granulato constanter innata rarissime obvia.

4121. *Sph. ophioglossoides* Ehrh., stromate carnosum elato insigni rufo-nigrescente, intus luteo-virente, e stipite robusto sterili, basi in processus rhizoideos multipliciter divisos flexuosos conformes stipatos (*Ceraunium granulatum*) prehendentes, apice abrupte in clavam oblongam obtusam saepius bifidam, extus undique pyreniorum ovatorum exiguorum, umbone papillato prominentiorum tegmine corticatam abenote. — Ehrh. exs. n. 160. Pers. syn. 4., myc. I. I. f. 5. 6. Fr. syst. II. 324. *Sph. radicosa* DC. *Clavaria parasitica* Willd. *Cl. radicosa* Bull. t. 440. — Schmid. icon. t. 5.

In nemoribus et pinetis Thuring. et Hercyn., Ceraunio innixa rarissima, si quidem a precedente differt.

D. astomi, pyreniis mole et figura variis, plerumque tamen sphaericis nisi que basin producendi insignibus, obovatis s. subclavatis, distinctis, stromate destitutis, foeturam ascoden diversimode, nunc intra tegminis laminas ipsas undique clausas s. cancellatim fissas, cavitatem vacuam munientes, nunc nuclei hyalini, carnosii s. calculosi instar exceptam comprehendentibus virgue nisi senescendo s. hiatum recludendo projicientibus.

(*Angiogastres tuberacei nidulariacei Fr. Gasteromycetes compositi Lk. Sarcocarpi Pers.*)

a. coelopyrenii, pyreniis foetura tegminis laminas ipsas infarciente distentis, intus vacuis. (Novam indicat, *Chlaenomycetum* classem, aliis generibus intermediis (*Lycoperdon lamellatum Lour.*, *Gemmularia Rafin.*) redintegrandam.)

365. HYDNOCARYON W. Trüffelness.

Pyrenium naucosum nuciforme depresso-globosum inflatum s. intus gyroso-plicatum, hypogaeum, intra tegminis subcoriacei laminas utrinque conformes, ascis folliculatis speciosis, a pariete utroque assurgentibus erectis, sporidia sphaerica seriato-connata hyalina 10-12 continentibus, veluti in pulpam gelatinosam coactis foetam.

4122. *H. fragrans W.*, pyrenio nuciformi, e. basi depresso plicata, centro plexum stipato-fibrillosum rhizoden monstrante globoso inflato vacuo, extus intusque nigro conformi, verrucis depresso-hemisphaericis exiguis glutaceo-ruglosis tessellato aspero.

Faugum rarissimum, Aschio habitu externo plane non dissimilem illoque suavius fragrantem, a pisii majoris ad uticis molem varium, hypogaeum, praeceteris peculiarem, ex fagetorum editiorum thuring. straussbergens. terra glareosa, Irmischii, venatoris exercitatiss. canis in Aschii investigandis adsuetus, me comite, in lucem edidit.

366. CLATHRUS MICH. Gitterschwamm.

Pyrenium primum volva globosa, mox laciniato-dehiscente, dein ad basin residua exceptum, rotundatum

sessile, in ramicos reticulato-connexos, massa farinoso-
uvida sporophora, gelatina ocius diffluente excepta di-
stentos cancellatum.

4123. *Cl. cancellatus* L., pyrenio primum ovi-
formi, dein in ramicos oblique anastomosantes rubro-
flavescentes cancellato - divulso, volva pallida laciñiata
sustentato. — *Liun. syst. 2017. Fr. syst. II. 288. Cl.
ruber Mick. gen. t. 93. et Cl. flavescens Pers. syn. 241.
Nees syst. f. 261. Cl. volvaceus Bull. t. 441.*

In sylvis frondosis, nec non in arundinetis exsiccatis
agri berolin. (Gleditsch.)

b. myelopyrenii, pyreniis clausis, nucleo gelati-
noso, carnosò s. calculosò farctis,
+ *hyalopyrenes*, pyr. clausis gelatina sporophora
distentis.

367. APIOSPORIUM KZ. Beerensparling.

Pyrenium globosum minutissimum, basi leviter tenuata
cubilibus adfixum, vertice aequali clausum, apiculis glo-
bosis pellucidis, pulpas gelatinosae immersis, dein trans-
fusis foetum.

4124. *A. Abietis* Kz., pyreniis minutissimis glo-
bosò-pyriformibus in grumulos hemisphaericos olivaceos
congestis. — *Kunze myk. IIft. I. 8. Fr. syst. III. 255.*
Ad ligna abietina Saxoniae. (Kunze.)

4125. *A. Salicis* Kz., pyreniis minutissimis ob-
longo - pyriformibus, grumulos irregulares nigros confi-
cientibus. — *Kunze I. l. Fr. I. l.*
Ad trunco salicinos patres passim.

4126. *A. profusum* JV., pyreniis minutissimis ob-
longo-pyriformibus longe lateque effusis, maculas nigro-
olivaceas granulosas praestantibus.
Ad trunco salicinos antiquos Thuring. passim.

4127. *A. Mali* JV., pyreniis minutissimis globosis
olivaceo-nigris nitidis, primum hypophloeodeis aggregatis,

grumulos ovales minutos nigros, dein effusis, maculas tenues stygias mentientibus.

Ad epidermidem *Pyri* Mali truncorum laevigataam.

4128. *A. Corni* W., pyreniis minutissimis tornato-globosis laevissimis nitidis olivaceo-nigris sparsim aggregatis, dein integrum folii faciem obliterantibus stratoque granuloso stygio velati obdacentibus.

In foliis *Corni sanguineae* vegetis hypophyllum rarius.

4129. *A. stygium* W., pyreniis minutissimis pyriformibus laevibus nigris nitidis, in strata effusa, dein areolata congestis.

Ad ligna quercina caesa Hercyn. infer. passim.

4130. *?A. velutinum* W., pyreniis minutis tenuibus elongato-subcylindricis atris nitidis, stratum velutinum effusam praestantibus.

Ad trunco quercinos caeos Hercyn. inferieris passim.

568. PYRENIUM TOD. Erdnüsschen.

Pyrenium subrotundum sessile arrhizum nuciforme corticatum, intus primum pulposum, dein in massam conformem indurescens. (Genus a Todeo statutum, dubium.)

4131. *P. terrestre* Tod., pyrenio subgloboso, non nisi in basin producto, primum papilloso aurantiaco, extus fulvo-pulverulento. — Tode l. l. I. 35. Pers. syn. 236. Fr. syst. II. 244. Sclerotium *Pyrenium* Spr. syst.

Sub terra nuda sterili nemor. ducat. meclenb. (Tode), quod quidem in nemore roslebieusi. Thuring. lectum cum amico communicavi.

4132. *P. lignorum* W., pyreniis aggregatis sphæricis, praeter basin leviter adnatam liberis carnosis, siccando corneis duris, extus dilute helvolis; scobs reticula parca vestitis, nuciformibus, intus denudata (pulpa gelatinosa coacta) vacuis.

Ad ramos in sepientis relictis sub terra patrescentes Thuring. singulararem myceten legi, et sive cum *P.*

lignatili Fr. syst. III. 227., sive cum Cenococco xylophilo Fr. l. l. 67. comparavi. (Alia etiamnum sub terra nemorum thuring. lecta sp. per bella, dudum cum praecoptore communicata (*Trichoderma Pyrenium Spr. hal. mant. II. 29. nec Pers.*) latet denuoque indaganda.)

† *sarcopyrens*, pyreniis corticatis carnosofarctis, ascis hyalinis subclavatis, sive ad globulos, sive sphaericos, ad venas congestos, s. dispersos, massa sterili exceptos foventibus. (*Angiogastres tuberacei Fr. Sarcocarpi Pers. Lycoperdaceae tubereae Dub.*)

369. DOTHIDEA FR. Rindenknapf.

Pyrenium subrotundum hypo-, rarius epi-phloeodes, praeter basin adnatum semiliberum, clausum, tegmine tenui colorato tectum, nucleo cereo, ascis erectis fixis subclavatis, sporidia simplicia foventibus, in globulos coactis foeto farctum.

(*Dothideae denudatae et erumpentes Fr. Arthoniae et Sphaeriae sp. auct.*)

* *hypophloeodcae*, pyr. *hypophloeodeo-insculptis*.

4133. *D. pyrenophora* Fr., pyreniis insculptis ellipticis laevibus atris, dein epidermidem scissam infarcentibus plano-convexusculis, intus albis, globulo ascophoro nigricante furctis. — *Fr. syst. II. 552.*

Ad ramos populinos et juglandinos languidos passim.

4134. *D. cellulosa* IV., pyreniis subrotundis laevibus atro-fuscis; dein epidermide scissa cinctis planis, intus globulis ascophoris albidis veluti interceptis.

Ad ramos Rhois typhinae frigore tactos rarius.

4135. *D. sphaerioides* Fr., pyreniis confertim gregariis subrotundis oblongisve planis nigro-fuscis exiguis, epidermide scissa exceptis, intus concoloribus, globulis ascophoris albis variegatis. — *Fr. syst. II. 552. Sclerotium sphaeroides Pers. syn. 125.*

Ad ramos populinos languidos minime raro.

4136. *D. insculpta* W., pyreniis confluentibus in-sculptis oblongis convexiusculis nigro-fascis angustis, rima longitudinaliter infarcentibus, intus albis.

Ad sarmenta Clematis Vitalbae emortuos rarius.

4137. *D. genistalis* Fr., pyreniis tuberculiformibus difformibus sordide nigris, epidermidem laceram infarcentibus, intus albis. — Fr. l. l.

Ad folia viva Genistae sagittalis ogesor. (Mougeot.)

4138. *D. puccinioides* Fr., pyreniis sparsis ovatis s. subdiformibus, epidermidem scissam permeantibus convexo-pulvinatis, intus coactis cinerascentibus, globulos ascophoros dilutiores foventibus. — Fr. syst. II. 551. *Sphaeria puccinioides* DC. gall. VI. 118.

Ad ramos Buxi sempervirentis hort. rarius.

4139. *D. Sambuci* Fr., pyreniis majusculis sparsis subrotundis nigro-fascis, dein erumpentibus convexo-pulvinatis, epidermidem scissam reclinatam infarcentibus rugulosis, intus ceraceis cinerascentibus, globulis ascophoros albidis consertis exiguis superficialibus variegatis. — Fr. l. l. *Sphaeria Sambuci* Pers. syn. 14. Nees syst. f. 311. *Sph. natans* Tode l. l. f. 98.

Ad ramos Sambucorum petruarum siccios. Vere.

** liberae, pyreniis epixylis liberis.

4140. *D. moriformis* Fr., pyreniis exiguis subglobosis atris asperulis, praeter basin attractam liberis, intus corneis obsolete ascophoros albis; — Fr. syst. II. 549. *D. gibberulosa* Fr. obs. *Arthonia moriformis* Ach. lich. 5.

Ad ligna salicina putrida passim.

370. ENDOGONE LK. Knotenschwämme.

Pyrenium globosum pisiforme, extus tegmine tenui floccoso corticatum, intus grumosum coactum, uscis sphacelis membranaceis, sporidiorum congeriem foventibus, interspersis foetum.

*
*
*

4141. *E. pisiformis* Lk., pyreniis globosis pisiformibus, extus floccosis pallidis, intus lutescentibus conformiter grumosis. — Lk. obs. I. 33. f. 52. Nees syst. f. 145. Fr. syst. II. 295.

In pinetis muscis fibrillarum ope adhaerens. (Link.)

371. ASCHION THEOPHR. Träffel.

Pyrenium subglobosum arrhizum corticatum primitus clausum s. involuto-coalitum tuberiforme, intus demum ascis globosis vesiculosis majusculis hyalinis, hinc in appendiculum abrupte productis veluti caudatis, sporidia globosa ovatave magna 4-5 reticulato - aspera s. muricata colorata foventibus, carnem nucleiformem coactam, isthmis stipato-hypoideis venoso-ramosis dilutioribus sterilibus (in dissectis parenchyma venoso-marmoreum mentientibus) interceptam iufacientibus foetum.

(Tuber Mich. Bull. Lk. (obs. I. 31. f. 51. ascis sterilibus) et auct. Lycooperdi sp. L. Tuber terrae Plin. Acerv. Tvor, Iror, Oidvor Theophr.) — Tuber terrae, veluti ejus callos Plinius jam praemonuit; pro genere sanxere vaperi, canonum Linnaeanorum (phil. bot. ed. Spr. §. 221. 242. 244.) Eresiique auctoritatis, quae nobis cynosura, immemores.

4142. *A. atro-rubens* W., pyreniis parvis sparsis globosis farctis molliter carnosia pisiformibus, extus tenuiter alutaceis plicatis atro-rubentibus, siccando collapsis corrugatis, dissectis parenchyma molle avenum, ascis exiguis subrotundis, sporidia sphaerica asperula minima sanguinea foventibus farctum monstrantibus.

Sub humo laxa fagitorum circa arcem Strausberg Thuriog. rarissime. Auctqmo. (Semper reliquis minus, odore debili, hinc vilius.)

4143. *A. castaneum* W., pyreniis subglobosis ovalibusque sparsis farctis molliter carnosia subelasticis, mole variis, cortice membranaceo subsolabili laevissimo, dein tenuiter tessellato-dispanso dilutius saturatisve fusco s. dilute castaneo tectis, dissectis parenchyma pa-

ponaceo-coactum album, ex ascis ovato-rotundis sporidia ovalia exigua tenuissime muricata carneo-fusca foventibus, albo-carneum, isthmis obaeletis ramosis variegatum monstrantibus.

In iisdem cum reliquis locis passim. (Moles a piso ad castaneam majorem varia; color corticis membranacei, a nucleo facile secedentis, cum quodam rubore dilutius saturatusve fuscus, fere castaneus; odor graveolens, suavis; sapor amygdalinus, gratissimus; parenchyma carnososo-saponaceum, inter digitos sequax, intus album, praeter iathmos concolores irregulariter interceptos, ex sporidiis ubertate dilute carneum.)

4144. *A. concolor* W., pyreniis giganteis ovalibus depresso tuberiformibus s. sublobatis aquoso-carnosis, extus epidermide tenui alba laevissima, dein straminea irregulariter disparsa tectis, dissectis parenchyma carnosum album, sporidiis solutis exiguis sphaericis, ad ambitum brillatum alios globulos minutissimos secedentes gerentibus concoloribus foetum conforme monstrantibus.

In reliquorum consortio semel. Aucturno. (Disforme, tuberibus Solani tuberosi similis albis, extus intusque simillimum; pondus exempli libras unius; sapor mitis at procul dubio vilis; odor recentis minus fortis at aschoides, sicci collapsi et lignescens, fere aceti aromatici, graveolens. Ascii pertenues, sporidia, ut videtur, facile transmittentes.)

4145. *A. fuscum* W., pyreniis depreso-globosis farctis stipato-carnosis tuberiformibus magnis, cortice carnosu arcte connato, extus continuo laevi sordide fusco, scobe surfuracea fulva tenuissime adsperso tectis, dissectis parenchyma coactum, ascis insignibus inflatis, sporidia maxima sphaerica horrido-muricata rufa foventibus uberrimis farctum hepatico-fuscum, isthmis farcato-ramosis jatescentibus albis pictum monstrantibus.

Sub humo terfa promontoriorum Hercyn. inferior. et Thuring. passim. Auct. (Moles pomi minoris s. tuberis solanacei mediocriter magis; compages durissima, saepim

involvendo coalescendo spatiū vacuum, cum tegmine
externo conforme concludens s. redintegrans; color cor-
ticis crassiusculi arcte connati sordide s. terreo-fuscus,
ex scobe delicata in helvam vergens; odor minus gra-
veolens, hinc vilior in usu culinari. Ascī uberrimi, ex
carne terfa dissecta propullulantes, nudis osculis, sicut
in reliquis, conspicui, sporidiis maximis reticulatis, semi-
num daucinorum luster horrido-muricatis foeti.)

4146. *A. filamentosum* W., pyreniis globosis
faretis stipato-carnosis magnis, cortice carnosō arcte con-
nato, extus pallido fuscō, scobe sulfuracea alba in gru-
mulus convexos dispanso-tessellatos coacta asperulo tectis
reticulōque filamentoso delicatissimo atro-violaceo ad-
presso uudique obtextis, dissectis parenchyma aquoso-
carneum, ascis insignibus, sporidia magna rotunda parce
muricata forentibus insculptum, isthmis subtilibus forcatis
albo-hypoideis pictum monstrantibus.

In iisdem cum reliquis locis, rarius. Auct. (Moles
caestaneas majoris; habitus Ceranii granulatus; compages
nucleiformis, coacta; reticulum filamentosum mi-
nime fortuitum, in cortice, ex condoplicationis vitio in-
tromissa concinuus expansum, at ex filamentis obsolete
septatis, vase irregulariterque ramosis tamque subtilibus
conflatum, ut lentem acriorem penitus fugere videatur,
verrucis grumalosis intertextum; odor aromaticus, suauissimus; sapor gratissimus.)

4147. *A. nigrum* W., pyreniis subglobosis sparsis
s. aggregatis carnosis duris, mole variis, cortice adnato
grumoso discolorē nigro, verrucis pentagonis depresso-
conicis, striis transversis parallelis subtilissimis exaratis,
dein multifariam longitudinaliterque dehiscentibus areo-
lato-colliculosō obturatis, dissectis parenchyma coactum
album, ascis sporidia sphaerica majuscula subtiliter mu-
ricata pallide fuscā forentibus, in strias gyroso-flexuosas
angustas dispositis cumque isthmis candidis conformibus
interceptum marmoreo-variegatum monstrantibus. — Tu-
ber cibarium Sibth. Bull. t. 356. Pers. syn. 126. Fr.

syst. II. 290. *Lycoperdon gulosorum* Scop. carn. II. 491.
L. Tuber L. sp. 1053. pr. pr.

a. scabrum, pyrenicarum verrucis insignibus conoideis propexis carunculae angulis in apicem acetum compressum facile caducum confluentibus.

b. muricatum, pyr. verrucis magnis, e basi latescente obtuse angulata in apicem depresso dilatatis, veluti angulato-umbonatis. — Nees syst. f. 147.

c. areolatum, pyr. verrucis minoribus imminutis subcandidoque areolatis, minus prominulis.

Sub humo laxa, gypso imposita nemorum, promontiorum versurarumque adjacentium Thuring., opima v. c. libertate in agro straussberg. Auct., hyeme et vere, tempestate pluvia et serena favente. (Moles a piso minimo ad pomum maximum; hincq[ue] pondus ab asse ad libras duas. Sparsim gregatimque (Math. 386. Camer. ep[ist] 317.) degit canemque gregem ex pyreniis 72 majusculis conglobatam l. l. in lucem edidisse ajunt. Figura pyrenii saepius tornata, alias incondita satis, idque ex conduplicacionis vitio saepe iuane, terram, calculos, gramine, ipsum olim nummum (Plin hist. XIX. 2.) aliasque quisquiliis abscondens.) — Talem equidem Aschiologiae prodromum, cum emendato generis neglecti charactere ex thuringiacis solum largior, alio tempore extendendum, *Tuberisque albidi* Cesa[lp]. Fr. syst. II. 291., verrucis exasperati, albidi aliorumque notionem reticulata.

372. RHIZOPOGON FR. Netztrüffel.

Pyrenium globosum tuberiforme hypogaeum, extus flocculosum, e basi radicante reticulum filamentosum exserens eoque saepius laxe obtextum, intus carnosum, venis distinctis per anastomosis connexis, ad latissimam fasciam membranaceis globosis ecaudatis, sporidia sphaerica foventibus foetis cancellatum. (*Tuberis et Lycoperdi* sp. auct.)

4148. *Rh. alb us* Fr., pyrenis subrotundis s. difformibus, extus leviter floccosis subrugosis albido-rufescens, e basi plenum rhizoden brevem fibrillosum

exserentibus, dissectis albis, siccaudo leviter rubentibus.
— Fr. syst. II. 293. Tuber album Bull. t. 404. Pers.
syn. 128. Lycoperdon gibbosum Dicks.

In ericetis arenosis German. austral. rarius.

4149. *Rh. luteolus* Fr., pyreniis sphaericis nuciformibus, mole variis, extus sordide lutescentibus, fibrillis fusco-purpureis filariibus vase ramosis undique obtextis, dissectis labyrinthico-venosis albido-lutescentibus, venulas ascophoras nigricantes excipientibus. — Fr. syst. II. 294. Tuber obtectum Spr. pug. II. 97. Lycoperdon persicatum Sowerb. t. 412. — Ments. pug. t. 6.

In pinetis sabulosis German. medias paessim.

4150. *Rh. virens* Fr., pyreniis lobato-diformibus, extus sordido spadiceis nudiusculis, intus viridi-cinerascentibus, e basi plexum rhizodenaxe filamentosum exserentibus. — Fr. L. I. Tuber virens Alb. et Schw. 17. t. 8. f. 3.

Ad latera viarum arenosarum Lusat. (Alb. et Schw.)

+++ pycnopyrenes, pyreniis figura variis, pulvinatis pyridatiue, intus ascoperas distinctas utricularies & lenticulares duras, massa grumosa sporophoras soventibus. (Angiogastres nidulariae Fr. Lycoperdaceae nidulariae Dub. Fungi seminiferi Veter.) Huc quoque spectant: Myxarium p. 260. et Tremella nucleata Fr.

373. POLYANGIUM Lk. Eyerträger.

Pyrenium subrotundum s. hemisphaericum vesiculoso-floccosum, demum fatiscens, ascoperas oblongas majusculas, massa grumosa refertas liberas circumcludens.

4151. *P. vitellinum* Lk., pyreniis membranaceis sparsis s. gregariis exiguis rotundatis vitellinis subpellatidia, ascoperas 4-6 oblongo-ovatae laeves saturiores soventibus. — Lk. obs. I. 65. Ditmar I. L. t. 27. Nees syst. f. 131. Fr. syst. II. 305.

Ad truncos locis uidis putrescentes paessim.

374. CYATHUS HALL. Linsenträger.

Pyrenium coriaceum vasculosum - pyxidatum, priuum membrana mox decidua s. veluti epiphragmate obturata, extus subflocosum, latice gelatinoso ascoperas lenticulares carnosas, margine s. centro umbilicato incumbentes funicolove appensa, ascis majusculis centro foetas circumfuso, demum coacto scatens.

(*Nidularia* Bull. Lk. Fr. *Gemmularia* Willd. *Cyathus* Hall. Pers.)

4152. *C. deformis* Willd., pyreniis primis hemisphaericis, dein irregularibus rugosis pubescentibus albis, ascoperis oblongis brunneis minutis, funiculo filiformi tenuissimo appensis. — Willd. in Uster. bot. Mag. II. 4. p. 14. t. 5. f. 8. Pers. syn. 246. Fr. syst. II. 302.

Ad ramos dejectos agri berolin. rarius. (Willdenow.)

4153. *C. globosus* Ehrenb., pyreniis globosis parvis tuberculosis glabriusculis albidis irregulariter rumpentibus, ascoperis subglobosis flaventibus, margine incumbentibus. — Ehrenb. sylv. 28. f. 8. Fr. syst. II. 302.

Inter muscos agri berolin. in terra sabulosa. (Ehrbg.)

4154. *C. corrugatus* W., pyreniis obovatis membranaceis majusculis, extus glabriusculis pallescentibus, vertice depresso poro circinato contracto-rugoso pertusis, intus laevissimis, ascoperis lenticularibus politis fascis marginatis, margine incumbentibus, latice albo exceptis.

Ad finum stramineum ovinum in agris siburgens. relictum. Aest. (Ambigit inter sequentem et *C. fumigatum* DC.)

4155. *C. farctus* Roth, pyreniis subrotundis subconfertis basive confluentibus, extns villosis sordide albidis, dein calvescentibus irregulariterque rumpentibus, ascoperis orbiculatis corrugatis brunneis majusculis, pulpam albam infarcentibus. — Roth cat. I. 237. t. 7. f. 2. Pers. syn. 239. (*Iusus plexum rhizoden fibrillosum* ascerens.) *Nidularia confluenta* Fr. obs. *N. furcata* Fr. syst. II. 301.

Ad ligna quercina et piae rarius.

4156. *C. scutellaria* Roth, pyrenis globosis, extus tomentosis cinereis, primum operculo ferrugineo tectis, dein hemisphaericis, ore repando reclusis, intus laevibus albis, ascoperis majusculis laevibus albidis, dein nigrescentibus. Roth et Pers. L. L. Flor. dan. t. 780. f. 2. Fr. syst. II. 300.

Ad ramos dejectos in nemoribus rarius.

4157. *C. Crucibulum* Hoffm., pyrenis majusculis gregariis subcoriaceis, extus tomento stipato ochraceo-ferrugineo, in basin adhaerentem nonnisi expanso vestitis, primum breviter cylindricis, vertice depresso truncatis, dein obcampanulatis hiantibus, intus concoloribus, ascoperis glabris laevissimis albis, hinc convexiusculis, hinc impresso-umbilicatis ibique incumbentibus. — Hoffm. veget. 29. t. 8. f. 1. Pers. et Fr. l. l. Nees syst. f. 132. *C. cylindricus* Willd. *Nidularia laevis* Bull. t. 40. *Peziza crucibuliformis* Schaeff. t. 189. *P. lentifera* Poll.

Ad ligna vetricata ramosque locis uidis jacentes.

4158. *C. striatus* Hoffm., pyrenis magnis gregariis membranaceo-subcoriaceis, primum e basi magis minusve producta tenuata subcylindricis clausis, dein obconicis s. scyphiformibus, extus pilis spadiceis tortuosis subfasciculatis hirsutis, ascoperas funiculo brevi penicillato appensa foventibus, effuetis hiantibus, intus longitudinaliter striatis. — Hoffm. veget. t. 8. f. 3. Nees syst. f. 132. Pers. syn. 237. *Nidularia striata* Bull. t. 40. Fr. syst. II. 298. *N. hirsuta* Sow. t. 29. *Pez. striata* Huds. Schaeff. t. 178.

Ad terram traucosque arborum in nemoribus. Hyeme.

4159. *C. laevis* Hoffm., pyrenis magnis gregariis membranaceo-coriaceis, extus pilis albido-gryseis s. fascis stipatis vestitis, primum e basi brevi obovatis in porum rotundum contractis, dein subcampanulatis patulis, ascoperas magnas fericulo protensa appensa monstrantibus, effuetis intos laevissimis argenteo-plumbeis nitentibus. — Hoffm. l. l. t. 8. f. 2. *Nidularia vernicosa* Bull. t. 488. *Cyath. nitida* Roth. *C. Olla* Pers. syn. 237. Nees syst. f. 133. t. *Nid. campanulata* Sibth. Fr. l. L. *Peziza*

series Schaeff. t. 180. *P. leatifera L.* sp. II. 1049.
Flor. den. t. 780. — *Menz. pug.* t. 6.
 In arvis et hortis ad terram quisquiliisque ligneas.

375. POLYSACCUM DC. Beutelträger.

Pyrenium e basi tenuata plexum rhizoden exserente subglobosum insigne suberosum rigidum, vertice irregulariter dehiscent, intus stupido-fibrosum celluloso-lamellosum, ascoperia discretis inaequalibus plurimis, sporidia filis intertexta, primam pulposa, dein furfuracea foventibus cellulasque infarcteotibus foetum.

(*Polygaceum DC. Fr. Dub. Polypera Ficin. Pisocarpum Lk. Nees. Pisolithus Alb. et Schw. Sclerodermatis sp. Pers. Lycoperda capsulifera Sow.*) Ambigit inter hos et Myxomycetes sphaerogasteres, cum Isoëte analogon.

4160. *P. accule DC.*, pyreniis e basi brevi parce fibrillosa attracta sphaericis tenuibus fragilibus pallide fuscis, intus concameratis, ascoperis difformibus flavis, sporidia terrea foventibus farctis. — *DC. rapp. voyag. II. 80. Pisocarpum Fr. syst. III. 54. Pisocarpium arenarium Nees syst. f. 131. Pisolithus arenarius Alb. et Schw. nisk. 82. t. I. f. 3.*

In campis arenosis Lusatiae. Auctumno. (*A. et Schw.*)

4161. *P. crassipes DC.*, pyreniis e basi obesa carnosa compacta crassa plexum rhizoden exserente sub-clavatis pallide-rufis, demum rufo-fuscis, ascoperis sulfureis, sporidiis fuscis foetis farctis. — *DC. l. l. gall. VI. 103. Fr. syst. III. 53. Polypera crassipes Ficin. dred. 206. t. I. f. 51. Pisocarpum clavatum Nees syst. 138. f. 131. Scleroderma tinctorium Pers. Lycoperdon capitatum Battsch. — Mick. gen. t. 98. f. 1.*

In campis sabulosis ad Albim, Rhenum et alibi rariis. Auctumno.

OMISSA ET EMENDANDA.

No. 157. b. *Helmisporium setiforme* W., rhabdias simplicissimia continua laevibus rigidis erectis fasciculatis atris nitidis subtilissimis, appendicibus sporomorphis lateralibus paucis laxe appensis ovato-subrotundis opacis minutissimis.

Ad Rhizomorpham subcorticalem humo obiectam intra Salices cavae Thuring. Vere.

1810. b. *Chaetomium Alchemillae* W., sporidochiis hemisphaericis microscopicas nigris, pilis brevissimis rigidis concoloribus horridulis, in series rectas, a centro radiantes dispositis, maculam nigrum fibrillosoradiantem mentientibus. — ? *Chaetomium Alchemillae* W. in lit. 1810. *Dothidea ceramoides* Dub. gall. II. 715. *Asteroma Alchemillae* Fr. clench. II. 152.

Ad folia Alchemillae vulgaris vegeta Thurg. rarius. (Similem at magis fuscescentem ad caules Delphinii Ajacia languidos legi.)

1943. b. *Aciadium globosum* W., hyphis hyalinis articulato-septatis, siccando contractis crispis, sterilibus implexis decumbentibus, fertilibus gregaris, apice sequali sporidia simplicia concatenata, in capitulum globosum flavum micans congesta sustinentibus.

Agaricos putres agmine denso obdaci. Auctummo.

2286. b. *Bullardiae* generis Junghuhniani notio-
nem *Decandollei*, Neckeri aliorumque synonyma extin-
guunt. Hinc novum ad genus distinctum indicandum
condidi, *Argylium* (Schaalensieubling), idque Bul-
lardiae no. 289, p. 405 expositae loco, cum generis char-
actere additaque specie nova profiteor:

2286. c. *Argylium liquaminosum* W., peridio
subterraneo haucoso depresso rotundo scrobiculato rufo-
fusco arrhizo, iatus trabeculis albidis erosis, fundam re-

plentibus, sporidiorum ovatorum utriusque attenuatorum liquamine atro-violaceo, dein exsiccando coacto atro-suffusis instructo.

Fungum extitum; pedem dimidium sub terra terza promontoriorum gypsaceorum prope Crimderodam defossum, canis in Aschiis investigandis exercitatissima, me comite indigitavit, castaneae molem aequantem, cortice testaceo fragilissimo rufo-fusco tenero compositum, vegetum latieem, Vanillam redolentem, fluxum atro-violaceum, liquaminis s. pigmenti unguinoso-oleosi instar stilatricem rumpendo profundentem, mox vero in massam fuligineo-atram, papyro adhaerentem, nec manum inquinantem, ex mira sporidiorum ovatorum, utriusque attenuatorum copia conflatam testamque conspurcantem, coeuntem.

2351. *Tympans cupularis* W., in ramis alneis et coryleis, ascomatibus triplo minoribus, dense constipatis, acervulos hypophloeodeos subrotundos elevatos formantibus saepius reddit et stirpem distinctam forsitan praestat.

2902. b. *Polyporus odoratus* Wulff., ascomatibus duris perennibus, e basi umbrino-nigrescente in pileum pulvinatum rugosum rubiginosum dilatatis s. in monstra merismoideo-corniculata abenutibus, margine porisque subtetragonis cinnamomeis. — Fr. eyst. I. 373. Wulff. in Jacq. coll. II. 150. Pers. syn. 532. *Boletus annulatus* Schaeff. t. 106.

Ad troncos abietinos ratins; in fodinis saepius in monstra daedalea abit, ex quorum numero, *Ceratophora fribergensis* Humb. frib. 112. t. 1., *Boletus ceratophorus* Hoffm. veget. I. t. 1., *Helvella subterranea* Houtt. Pfannensyst. XIII. t. 105. f. 3., ascomatibus merismoideo-corniculatis insigne, vel quoque *Boletus polymorphus* Hoffm. t. L. innotuerant.

3038. b. *Cantarellus chrysosporus* W., ascomatibus carnosis fragilibus aeneo-virentibus, e basi brevissima s. obsoleta in pileum dimidiatum flexuosum difformem declinatum dilatatis, subtus laevigatis, primum

concoloribus, dein a scis majorculis pulverulentis luteo-virentibus profusis, effoetis dein fuscis scariosis tenuatis.

Ad truncos Populi tremulae putres muscosos Thuring. rarissime. Auctumno. (Habitus fere Peltigeræ sphæhocæ junioria, ob faciem inferiorem prorsus laevem erugem, Thelephoram s. potius Cyphellam mentiens et rectius forsitan C. chrysosporæ nomine indicandus.)

3910. b. *Sphaeria chionæ Fr.*, pyreniis globoſis rugulosis, villo stipato obdactis albis, abrupte in collum cylindricum flavum, apice conico hians desidentibus. — *Fr. syst. II. 446. Ehrenb. sylv. 29. Ceratostoma chionæ Fr. obs.*

Ad quisquilias pineas humi putrescentes rarius.

3993. *Sphaeriae circumscriptae Kunzeus* noster ostiola subconica rudia; *Friesius* in *syst. prominula*, *io elenco*, punctiformia et anomala, adscribit, quae in perfectis, pyrenio duplo saepius longiora, 4-5 angula, columnaria, erecta, assurgentia sunt et ex apice obtuso, poro angusto pertuso, ascos in cirrhos sesquunciales nigro-violaceos tortos trudunt, et *Sph. anomiam Fr.* in hoc opere sub no. 4009 receptam in contentione vocant.

4048. *Sph. Cucurbitula* passim ad truncos Lonicerae tartaricae hort. languidos Thuring. reddit et in Tuberularias sic dictas desciscit.

4076. *Sph. Ribes*, *Sph. Ribesia* vocanda.

4147. b. *Aschion albidum W.*, pyreniis globosis, extus verrucis muricato-scabris, intus sordide albidis. — *Tuber albidum Caesalp. 616. Fr. syst. II. 291. Schlecht. berol. II. 171. Lycoperdon globosum subterraneum Gled. meth. 157. ? Tuber aestivum, pulpa subobscura Mich. gen. 221. (teste Fr.)*

In densis et umbrosis coryletis agri berolin. profunde defossum. (*Gleditsch*). Aestate et auctumno. — Nuperæ, cane præstantissima comite, ad *Aschia* patrua eruenda indaginiæ institutæ, seq. fere, præter alias, ob-

tulerunt, emendationes. — *Aschion concolor* fl. cr. no. 4144, nonnisi etiam pyreniis mediocriter magnis, castaneam majorem excedentibus redit, tubera solasacea, recens effossa exalbida exacte refert odoremque spirat gravissimum, aromatico-graveolentem, aliis Aschio nigro gratiorem, aliis minus jucundum. — *A. filamentosum* l. l. no. 4146, melius *A. pallidum* vocandum, quippe reticulum filamentosum potius ad Iusam qualemcumque insignendum, quam ad stirpem denominandam, saepius deficere videatur idemque pyreniis plane nudis in iisdem locis redire solet.

N.B. No. 1942. *Charae coronatae* synonymis addantur; *Ch. Braunii* Gmel., p. 114. inter dubias recensita et *Ch. scoparia* Bauer; no. 1702: *Thelephora circinata* Fr. elench. II. 226.; no. 1991. *Merulius pulverulentus* Fr. l. l. l. 60. — Deleantur species suspectae: no. 1449. *Acrospermum laetum*; no. 2543. *Peziza microscopica*; sp. 3168. *Agaricus lateritius* Schum.; no. 3879. *Sphaeria nervisequa*. — Expuugantur synonyma: pag. 53. lin. 22. *Ulva foetida*; pag. 170. lin. 21. *Byssus intertexta*; p. 285. lin. 10. *Dichosporium aggregatum*; pag. 666. lin. 27. *Agaricus scaber*; pag. 784. lin. 16. *Sphaeria confluenta*. — Sphalmata innotuere: pag. VII. lin. 18. interpretate l. interprete; pag. 12. lin. 19. evanescata l. conjuncta; p. 17. lin. 18. Mart. l. Mert.; p. 88. lin. 4. *Chordaria* l. *Chondria*; p. 161. l. 69. lege 66.; p. 218. l. 16. l. 190. leg. 189; p. 123. l. 19. *Hymenom.* l. *Hyphotryc.*; p. 270. lin. 25. *Iyeosp.* l. *Lycosp.*; p. 276. lin. 1. *Hypamom.* l. *Hyphom.*; p. 352. lin. *coamatum* L. *concentrum*; p. 611. lin. 16. *imbriatum* l. *fimbriatum*; p. 539. lin. 19. t. 1100. f. 3. l. 1. 1076. f. l.; p. 671. lin. 36. *semiglobatus* l. *semiglobosus*; p. 768. lin. 28. *Psyllost.* l. *Phyllosticta*; p. 868. l. 22. Plin. leg. Plin.

INDEX.

Literae rectae genera et species receptas, obliquae genera
synonyma indicant.

<i>Achnanthes</i> <i>Bor.</i>	120.	<i>Acrosporium</i> <i>P.</i>	182.
brevispes	120.	<i>Acrothamnium</i> <i>N.</i>	152.
longipes	120.	<i>violaceum</i>	152.
<i>Acladium</i> <i>Lk.</i>	286.	<i>Actidium</i> <i>Fr.</i>	433.
capitatum	287.	<i>hysteroides</i>	433.
confervinum <i>W.</i>	288.	<i>Actinocladium</i> <i>E.</i>	286.
conspersum	286.	<i>rhodosporum</i>	286.
epiphyllum <i>W.</i>	288.	<i>Actinothyrium</i> <i>Kz.</i>	748.
globosum <i>W.</i>	873.	<i>graminis</i>	748.
gryseum <i>W.</i>	288.	<i>Aecidium</i> <i>P.</i>	247.
heterosporum <i>W.</i>	287.	<i>Actaeae</i> <i>W.</i>	252.
microcarpon <i>W.</i>	287.	<i>Asclepiadeum</i> <i>W.</i> . . .	259.
<i>Acremonium</i> <i>Lk.</i>	301.	<i>Aasperifoliarum</i>	254.
alternatum	301.	<i>Barbareae</i> <i>DC.</i>	255.
fuscum <i>Schm.</i>	301.	<i>bifrons</i> <i>DC.</i>	251.
nitidum <i>Mart.</i>	301.	<i>cancellatum</i>	259.
verticillatum	301.	<i>Gichoreacearum</i> <i>DC.</i>	249.
<i>Acrospermum</i> <i>Td.</i>	146.	<i>Clematitis</i> <i>DC.</i>	256.
compressum	146.	<i>columnare</i> <i>A. et S.</i>	257.
conicum <i>Fr.</i>	147.	<i>Compositarum</i> <i>M.</i>	252.
cornutum <i>P.</i>	147.	<i>Convallariac Lk.</i>	250.
laetum <i>W.</i>	147.	<i>cornutum</i> <i>Hedw.</i>	258.
pyramidalis	147.		
<i>Phacorrhiza</i> <i>W.</i>	147.		

<i>Aecidium P.</i>	247.	<i>Agaricus L.</i>	634.
<i>Cyani DC.</i>	249.	<i>acervatus Fr.</i>	709.
<i>elatinum A. Schw.</i>	250.	<i>acicularis Hfsm.</i>	697.
<i>Epilobii DC.</i>	249.	<i>acicola Jungk.</i>	705.
<i>Ervi W.</i>	247.	<i>acris Bolt.</i>	724.
<i>Euphorbiae Gm.</i>	250.	<i>acutus P.</i>	674.
<i>Falecariae DC.</i>	249.	<i>adhaerens A. Schw.</i>	716.
<i>Geranii</i>	255.	<i>adiposus B.</i>	667.
<i>Grossulariae DC.</i>	254.	<i>Adonis Bull.</i>	699.
<i>leucospermum W.</i>	248.	<i>adstringens P.</i>	686.
<i>Lysimachiae Schl.</i>	252.	<i>adustus P.</i>	725.
<i>Melampyri Kz.</i>	255.	<i>aeruginosus C.</i>	649.
<i>Menthae Schl.</i>	255.	<i>Albertinii Fr.</i>	691.
<i>Nymphaeae W.</i>	255.	<i>albo-brunneus P.</i>	732.
<i>Paeoniae W.</i>	259.	<i>albo-crenatus J.</i>	659.
<i>Pedicularis Lab.</i>	254.	<i>albo-violaceus P.</i>	678.
<i>Periclymeni DC.</i>	256.	<i>albua Sch.</i>	728.
<i>Phaseolorum W.</i>	256.	<i>alcalinus Fr.</i>	702.
<i>pocaliforme W.</i>	257.	<i>alliaceus Jacq.</i>	703.
<i>Populi Vahl.</i>	253.	<i>alutaceus P.</i>	727.
<i>punctatum</i>	248.	<i>amarus P.</i>	717.
<i>Salicorniae DC.</i>	252.	<i>amethystinus Bull.</i>	678.
<i>Soldanellae H.</i>	250.	<i>amples P.</i>	716.
<i>Thessii DC.</i>	248.	<i>androsacens</i>	703.
<i>Tusilaginis Gm.</i>	253.	<i>anginaceus J.</i>	734.
<i>Urticæ Grta.</i>	254.	<i>angustus P.</i>	687.
<i>Xylostei DC.</i>	256.	<i>applicatus B.</i>	688.
<i>Aegerita P.</i>	234.	<i>aquilus Fr.</i>	682.
<i>aeruginosa W.</i>	235.	<i>aqusus Bull.</i>	707.
<i>caesia</i>	235.	<i>ardosiacens Bull.</i>	685.
<i>candida</i>	234.	<i>argentatus P.</i>	678.
<i>epixyla DC.</i>	235.	<i>armeniacus Sch.</i>	673.
<i>Aethalium Lk.</i>	340.	<i>asper P.</i>	737.
<i>flavum</i>	341.	<i>asprellus Fr.</i>	682.
<i>rufum W.</i>	341.	<i>astragalinus Fr.</i>	663.
<i>septicum Fr.</i>	340.	<i>stramentarius Bull.</i>	638.
		<i>atro-cyanens B.</i>	701.
		<i>atro-punctatus P.</i>	687.

<i>Agaricus L.</i>	634.
<i>atrocinnigerus</i> B.	654.
<i>aurantiacus</i> Fr.	723.
<i>aurantius</i> Fr.	731.
<i>aureus</i> B.	667.
<i>badipus</i> P.	692.
<i>barbatus</i> B.	672.
<i>bellus</i> Fr.	649.
<i>bivalvis</i> Fr.	669.
<i>blennius</i> Fr.	723.
<i>bolaris</i> P.	676.
<i>bombycinus</i> Sch.	652.
<i>brunneo-villosus</i> J.	659.
<i>brunneus</i> P.	670.
<i>bufonius</i> P.	717.
<i>bulbiger</i> A. Schw.	734.
<i>bulbosus</i> Sow.	668.
<i>bullaceus</i> Bull.	644.
<i>butyracenus</i> Bull.	709.
<i>caesareus</i> Sch.	738.
<i>caliginosus</i> J.	642.
<i>callochrous</i> P.	679.
<i>calophyllus</i> P.	681.
<i>calopus</i> P.	706.
<i>callosus</i> Fr.	647.
<i>Campanella H.</i>	692.
<i>campanulatus</i> Bull.	646.
<i>campestris</i>	651.
<i>candicans</i> P.	716.
<i>Candolleanus</i> Fr.	645.
<i>cano-brunneus</i> R.	646.
<i>caperatus</i> P.	667.
<i>carbonaceus</i> Fr.	663.
<i>cano-violaceus</i> J.	673.
<i>cano-virens</i> J.	676.
<i>carnarius</i> Bull.	706.
<i>caseocephalus</i> W.	728.
<i>castaneus</i> Bull.	673.

<i>Agaricus L.</i>	634.
<i>ceraceus</i> Wulf.	714.
<i>cetinus</i> P.	717.
<i>cerous</i> Horn.	644.
<i>cernuatus</i> Fr.	716.
<i>cervinus</i> Hoffm.	719.
<i>chalybeus</i> P.	683.
<i>chrysenteros</i> Bull.	707.
<i>chrysodon</i> B.	734.
<i>chrysoleucus</i> P.	693.
<i>chrysophyllus</i> Fr.	693.
<i>cilicioides</i> Fr.	724.
<i>circinatus</i> Fr.	661.
<i>cinerens</i> Bull.	637.
<i>citrinellus</i> P.	697.
<i>clavipes</i> P.	718.
<i>clypeatus</i> Bolt.	642.
<i>clypeolarius</i> Bull.	636.
<i>coccinellus</i> Ehrk.	741.
<i>coccineus</i> P.	713.
<i>cochleatus</i> P.	696.
<i>cohaerens</i> P.	662.
<i>collinitus</i> Sow.	664.
<i>collinus</i> Scop.	708.
<i>Columbetta Fr.</i>	730.
<i>comitialis</i> P.	718.
<i>compactus</i> Sch.	648.
<i>couchatus</i> Bull.	691.
<i>confluens</i> P.	708.
<i>conicus</i> Sch.	713.
<i>conigenus</i> P.	705.
<i>conocephalus</i> Bull.	641.
<i>conopus</i> P.	677.
<i>conspersus</i> P.	658.
<i>controversus</i> P.	725.
<i>coprophilus</i> Bull.	644.
<i>corrugis</i> P.	644.
<i>corticola</i> P.	696.

<i>Agaricus L.</i>	634.	<i>Agaricus L.</i>	634.
<i>costatus W.</i>	709.	<i>ericaeus P.</i>	647.
<i>cramppylus Otto</i>	724.	<i>ericetorum P.</i>	692.
<i>cretaceus Bull.</i>	651.	<i>erythropus P.</i>	708.
<i>cristatus Bolt.</i>	736.	<i>esculentus Wulff.</i>	706.
<i>crocatus Schr.</i>	700.	<i>euchrous P.</i>	683.
<i>cucullatus P.</i>	697.	<i>eumorphus P.</i>	677.
<i>Cucumis P.</i>	674.	<i>excelans Fr.</i>	737.
<i>cuneifolius Fr.</i>	710.	<i>excoriatus Sch.</i>	736.
<i>cyathiformis Bull.</i>	695.	<i>expalleus P.</i>	695.
<i>decipiens P.</i>	673.	<i>fascicularis Huds.</i>	648.
<i>decumbens P.</i>	672.	<i>fertilis P.</i>	686.
<i>delicatus Fr.</i>	736.	<i>fibrillosus P.</i>	645.
<i>deliciosus</i>	723.	<i>Fibula Bull.</i>	693.
<i>deliquescent Bull.</i>	638.	<i>filipes Bull.</i>	702.
<i>denigratus P.</i>	734.	<i>fimicola P.</i>	642.
<i>depallens P.</i>	726.	<i>firmus P.</i>	740.
<i>deplueus B.</i>	653.	<i>flaccidus Sow.</i>	719.
<i>dichrous P.</i>	684.	<i>flammans B.</i>	666.
<i>disformis P.</i>	694.	<i>flavescens W.</i>	643.
<i>dilutus P.</i>	739.	<i>flavidus Sch.</i>	663.
<i>discoideus P.</i>	733.	<i>flavicomus W.</i>	639.
<i>disseminatus P.</i>	640.	<i>flovio-virens P.</i>	731.
<i>domesticus Bolt.</i>	636.	<i>flexipes P.</i>	669.
<i>dryinus P.</i>	691.	<i>flexuosus P.</i>	721.
<i>dryophilus Bull.</i>	708.	<i>floccosus Sch.</i>	666.
<i>eburneus Bull.</i>	733.	<i>foenisecti P.</i>	646.
<i>echinatus R.</i>	649.	<i>foetens P.</i>	726.
<i>elutus H.</i>	664.	<i>fragilis B.</i>	655.
<i>elegans P.</i>	699.	<i>fragrans Sow.</i>	694.
<i>ellipticus P.</i>	741.	<i>fuliginosus Fr.</i>	721.
<i>elodes Fr.</i>	686.	<i>fulvus Bull.</i>	732.
<i>emeticus Sch.</i>	727.	<i>fumosus P.</i>	717.
<i>ephbeus Fr.</i>	671.	<i>fuscatus Fr.</i>	726.
<i>ephemerus Bull.</i>	685.	<i>furfuroceus P.</i>	658.
<i>Epiophysium P.</i>	694.	<i>fuscescens J.</i>	670.
<i>epiphyllus P.</i>	708.	<i>fusco-purpureus P.</i>	707.
<i>epipterygins Scop.</i>	698.	<i>fusipes Bull.</i>	709.

- | | | | |
|-----------------------------|------|-------------------------------|------|
| <i>Agaricus L.</i> | 634. | <i>Agaricus J.</i> | 634. |
| <i>galericulatus Sp.</i> | 702. | <i>inconstans P.</i> | 691. |
| <i>galopus P.</i> | 700. | <i>incurvus Sch.</i> | 671. |
| <i>gentilis Fr.</i> | 669. | <i>infrafractus P.</i> | 680. |
| <i>geophilus Fr.</i> | 659. | <i>inquilinus Fr.</i> | 657. |
| <i>gibbus P.</i> | 719. | <i>integrellus P.</i> | 697. |
| <i>giganteus Leyss.</i> | 720. | <i>involutus B.</i> | 654. |
| <i>gilvo-brunneus J.</i> | 656. | <i>irrigatus P.</i> | 714. |
| <i>gilvus P.</i> | 720. | <i>laccatus Sc.</i> | 712. |
| <i>glandifer P.</i> | 740. | <i>laceratus Bolt.</i> | 739. |
| <i>glandulosus Bull.</i> | 690. | <i>lacrymabundus B.</i> | 649. |
| <i>glaucopus Sch.</i> | 679. | <i>lacunosus P.</i> | 740. |
| <i>glutinosus Sch.</i> | 643. | <i>laetus P.</i> | 740. |
| <i>gracilis P.</i> | 644. | <i>lagopus Fr.</i> | 636. |
| <i>graminicola N.</i> | 658. | <i>lanuginosus Bull.</i> | 661. |
| <i>granulatus Sch.</i> | 731. | <i>lascivus Fr.</i> | 712. |
| <i>granulosus P.</i> | 735. | <i>lateritius Sch.</i> | 648. |
| <i>graveolens P.</i> | 729. | <i>latus P.</i> | 669. |
| <i>griseo-cyanus F.</i> | 684. | <i>lentus P.</i> | 662. |
| <i>guttatus P.</i> | 735. | <i>leoninus Sch.</i> | 635. |
| <i>haematochelis Bull.</i> | 668. | <i>lepidens Fr.</i> | 995. |
| <i>haematopus P.</i> | 700. | <i>leucocrocceus P.</i> | 740. |
| <i>haematospermus Bull.</i> | 651. | <i>leucopodium Bull.</i> | 672. |
| <i>haustellaris Fr.</i> | 653. | <i>lencoxanthus P.</i> | 729. |
| <i>hemitrichus P.</i> | 675. | <i>lignatilis P.</i> | 716. |
| <i>birneolus Fr.</i> | 655. | <i>lueatus Bull.</i> | 699. |
| <i>hirtus W.</i> | 726. | <i>Liquiritiae P.</i> | 662. |
| <i>hirtipes Sch.</i> | 682. | <i>longicaudus P.</i> | 664. |
| <i>hispidulus Fr.</i> | 684. | <i>lubricus P.</i> | 662. |
| <i>hortensis P.</i> | 786. | <i>lucidus P.</i> | 673. |
| <i>humilis P.</i> | 728. | <i>lucifugus Fr.</i> | 660. |
| <i>hybridus Bull.</i> | 648. | <i>lugeus J.</i> | 672. |
| <i>hydrogrammus Bull.</i> | 694. | <i>luridus P.</i> | 724. |
| <i>hydrophorus Bull.</i> | 640. | <i>luscinus Fr.</i> | 718. |
| <i>Hypnorum Schrk.</i> | 656. | <i>luteo-albus B.</i> | 698. |
| <i>hypothecus Fr.</i> | 732. | <i>luteo-virens A. Schub.</i> | 731. |
| <i>janthinus Fr.</i> | 700. | <i>luteus Huds.</i> | 727. |
| <i>liopodium Bull.</i> | 675. | <i>maculatus A. Schub.</i> | 708. |

- | | | | |
|-----------------------------|------|---------------------------|------|
| <i>Agaricus L.</i> | 634. | <i>Agaricus L.</i> | 634. |
| <i>maculosus P.</i> | 662. | <i>nidolans P.</i> | 689. |
| <i>malachius Fr.</i> | 677. | <i>nigrella P.</i> | 631. |
| <i>marchantiaeformis W.</i> | 640. | <i>nitidus P.</i> | 727. |
| <i>margioatus P.</i> | 648. | <i>niveus P.</i> | 637. |
| <i>marginellus P.</i> | 711. | <i>nudus Bull.</i> | 728. |
| <i>melaleucus P.</i> | 711. | <i>obliquus P.</i> | 694. |
| <i>melanospermus B.</i> | 650. | <i>obscurus P.</i> | 653. |
| <i>melinoides Bull.</i> | 656. | <i>obtectus W.</i> | 681. |
| <i>melleus Vahl.</i> | 734. | <i>obtusatus Fr.</i> | 674. |
| <i>merulius W.</i> | 706. | <i>obtusus F.</i> | 646. |
| <i>mesomorphus Bull.</i> | 735. | <i>ochroleucus Sch.</i> | 674. |
| <i>metachrous Fr.</i> | 694. | <i>odorua Bull.</i> | 717. |
| <i>metatus Fr.</i> | 701. | <i>oedematopae Sch.</i> | 715. |
| <i>micaceus Bull.</i> | 687. | <i>olivaceo-albus Fr.</i> | 732. |
| <i>miniatus Fr.</i> | 713. | <i>Oreades Bolt.</i> | 707. |
| <i>mitis P.</i> | 689. | <i>ostreatus Curt.</i> | 690. |
| <i>mitissimus Fr.</i> | 722. | <i>ovatus Sch.</i> | 639. |
| <i>mollis Sch.</i> | 654. | <i>ovinus Bull.</i> | 712. |
| <i>molybdinus Fr.</i> | 729. | <i>pallidus P.</i> | 723. |
| <i>montanus P.</i> | 646. | <i>palmatus Bull.</i> | 689. |
| <i>montosus P.</i> | 660. | <i>pantherinus DC.</i> | 733. |
| <i>monosporus Jung.</i> | 661. | <i>pancoides Fr.</i> | 654. |
| <i>multicidus Schr.</i> | 784. | <i>papilioacens Bull.</i> | 642. |
| <i>Mucor R.</i> | 698. | <i>papillatus B.</i> | 636. |
| <i>multicolor P.</i> | 729. | <i>papyraceus Bolt.</i> | 640. |
| <i>muticatus Fr.</i> | 665. | <i>parasiticus Bull.</i> | 704. |
| <i>Nitrixius Bull.</i> | 711. | <i>pascuus P.</i> | 682. |
| <i>Onygenacibus</i> | 738. | <i>pellitus P.</i> | 685. |
| <i>Strophacenus Sch.</i> | 701. | <i>pellucidus Bull.</i> | 697. |
| <i>Onycomyces H.</i> | 692. | <i>perfornatus H.</i> | 703. |
| <i>omptabilis Schfr.</i> | 665. | <i>pergamentus Sw.</i> | 721. |
| <i>Myomyces P.</i> | 730. | <i>personatus Bolt.</i> | 707. |
| <i>Onanus P.</i> | 684. | <i>perpusillos Lazz.</i> | 688. |
| <i>naroticus B.</i> | 636. | <i>personatus Fr.</i> | 728. |
| <i>nebularia B.</i> | 718. | <i>petalodes Bull.</i> | 690. |
| <i>Necator Bull.</i> | 724. | <i>petiginosus Fr.</i> | 659. |
| <i>nemoreus P.</i> | 715. | <i>pezizeoides N.</i> | 653. |

<i>Agaricus L.</i>	634.	<i>Agaricus L.</i>	634.
<i>phalloides Fr.</i>	739.	<i>purpureus Bull.</i>	676.
<i>phlebophorus D.</i>	684.	<i>parus P.</i>	699.
<i>phrygius W.</i>	714.	<i>pusillus DC.</i>	652.
<i>phylophilus P.</i>	719.	<i>pustulatus P.</i>	753.
<i>picaceus Bull.</i>	658.	<i>pygmaeus Bull.</i>	657.
<i>picreus P.</i>	670.	<i>pyriformis P.</i>	741.
<i>piperatus Sc.</i>	720.	<i>pyriodermis P.</i>	661.
<i>pityreus Fr.</i>	655.	<i>pyrogalus Bull.</i>	721.
<i>placidus Fr.</i>	683.	<i>pyxidatus Bull.</i>	693.
<i>platyphyllus P.</i>	710.	<i>quietus Fr.</i>	722.
<i>platypus N.</i>	698.	<i>radiatus Bull.</i>	695.
<i>plexipes Fr.</i>	701.	<i>radicatus Relb.</i>	710.
<i>plicatilis Curt.</i>	635.	<i>radicosus Bull.</i>	667.
<i>plicatus P.</i>	638.	<i>ramealis Bull.</i>	706.
<i>plumbeus Bull.</i>	721.	<i>ramentaceus Bull.</i>	735.
<i>Plutens B.</i>	685.	<i>raphanoides P.</i>	675.
<i>pluvias Fr.</i>	672.	<i>repandus Bull.</i>	661.
<i>politus P.</i>	681.	<i>reticulatus P.</i>	671.
<i>polygrammus B.</i>	701.	<i>rhodopelius Fr.</i>	686.
<i>porphyrius Fr.</i>	739.	<i>rigens P.</i>	672.
<i>porreus P.</i>	707.	<i>rimeans Bull.</i>	680.
<i>porrigens P.</i>	689.	<i>rivulosa P.</i>	718.
<i>prascon P.</i>	650.	<i>robustus A. Schw.</i>	735.
<i>prasinus Sch.</i>	731.	<i>rossellus Bull.</i>	699.
<i>prasiosmanni Fr.</i>	700.	<i>Rötula Sc.</i>	704.
<i>pratensis P.</i>	715.	<i>ruber DC.</i>	736.
<i>procera Sc.</i>	787.	<i>tubescens Fr.</i>	797.
<i>prunuloides Fr.</i>	685.	<i>rufo-olivaceus P.</i>	679.
<i>Prunulus P.</i>	687.	<i>rufus Scop.</i>	732.
<i>psammocephalus Bull.</i>	677.	<i>Russula Sch.</i>	782.
<i>psittacinus Sch.</i>	714.	<i>rusticens Sch.</i>	790.
<i>pterigenus Fr.</i>	696.	<i>sanguineus Fr.</i>	660.
<i>polviaetus P.</i>	691.	<i>salicinus P.</i>	683.
<i>pumilos P.</i>	658.	<i>salicinus P.</i>	690.
<i>punctatus Sch.</i>	664.	<i>sambucinus Fr.</i>	680.
<i>punicus Fr.</i>	713.	<i>sanguinolentus A. Sch.</i>	700.
<i>purpurascens A. Schw.</i>	733.	<i>sapineus Fr.</i>	671.

<i>Agaricetis L.</i>	634.	<i>Agaricus L.</i>	634.
<i>acabellus A. Schw.</i>	659.	<i>sulfureus Bull.</i>	712.
<i>scaber Müll.</i>	661.	<i>superbus Jungh.</i>	641.
<i>scaurus Fr.</i>	680.	<i>supinus Fr.</i>	702.
<i>Sceptrum Jungh.</i>	636.	<i>thelephorus P.</i>	663.
<i>Schumacheri Fr.</i>	718.	<i>tanaceus P.</i>	705.
<i>scorodonius Fr.</i>	706.	<i>tener Sch.</i>	656.
<i>scrobiculatus Sc.</i>	725.	<i>tephroleucus P.</i>	733.
<i>scyphoides Fr.</i>	698.	<i>terrens Sch.</i>	730.
<i>semiglobatus B.</i>	650.	<i>thejogalus Bull.</i>	722.
<i>semiglobosus A. Sch.</i>	671.	<i>telephorus P.</i>	663.
<i>separatus</i>	642.	<i>tigrinus Bull.</i>	695.
<i>septica Fr.</i>	688.	<i>tithymalinus Sc.</i>	722.
<i>sericellus Fr.</i>	686.	<i>titubans Bull.</i>	641.
<i>sericens Sch.</i>	669.	<i>togularis Bull.</i>	667.
<i>serrulatus Fr.</i>	683.	<i>terminosus Sch.</i>	724.
<i>silaceus P.</i>	649.	<i>tortuosus Fr.</i>	673.
<i>sinuatus Bull.</i>	686.	<i>torulosus P.</i>	691.
<i>solitarius Bull.</i>	738.	<i>tremulus Sch.</i>	688.
<i>sordarius P.</i>	789.	<i>trichaeus P.</i>	712.
<i>speciosus Fr.</i>	662.	<i>Tricholoma A. Schw.</i>	635.
<i>splendens P.</i>	719.	<i>tricolor A. Schw.</i>	692.
<i>squamosus Fr.</i>	663.	<i>tuberculatus Sch.</i>	666.
<i>quamulosus P.</i>	719.	<i>tuberous Bull.</i>	705.
<i>stagninus Fr.</i>	656.	<i>tumidus P.</i>	729.
<i>stercorarius Fr.</i>	647.	<i>turbanatus Bull.</i>	679.
<i>sterquilinus Fr.</i>	688.	<i>udes P.</i>	647.
<i>stipatus P.</i>	645.	<i>ulmarius Bull.</i>	689.
<i>striatulus P.</i>	688.	<i>umbrius P.</i>	654.
<i>strobilinus P.</i>	699.	<i>umbrosus P.</i>	635.
<i>stylobates P.</i>	698.	<i>undulatus J.</i>	657.
<i>subalutaceus B.</i>	717.	<i>urens Bull.</i>	674.
<i>subleanatus Sow.</i>	668.	<i>ustalis Fr.</i>	732.
<i>subdolus P.</i>	722.	<i>viduus Fr.</i>	723.
<i>subreflexus O.</i>	656.	<i>vaccinus Sch.</i>	730.
<i>subtilis Fr.</i>	642.	<i>vaginatus Bull.</i>	738.
<i>subtortus P.</i>	680.	<i>Vaillantii Fr.</i>	704.
<i>Sudans W.</i>	736.	<i>Variabilis P.</i>	653.

<i>Agaricus L.</i>	634.	<i>Alphitomorpha W.</i> 753.
<i>variegatus P.</i>	680.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">divaricata</div> 751.
<i>varius Sch.</i>	679.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">epigaea</div> 761.
<i>vellerinus Fr.</i>	720.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">epixylon Schlechtd.</div> 760.
<i>velutipes C.</i>	710.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">fumosa</div> 760.
<i>venosus P.</i>	703.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">guttata</div> 760.
<i>ventricosus Bull.</i>	646.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">horridula</div> 755.
<i>vernus Bull.</i>	739.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">laevigata</div> 757.
<i>vibratilis Fr.</i>	681.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">lepticularis</div> 758.
<i>victus Fr.</i>	723.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">macularis</div> 756.
<i>violaceo-cineraceus P.</i>	678.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">nitida</div> 757.
<i>violaceo-fuscus B.</i>	655.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">pennosa</div> 760.
<i>violaceus</i>	678.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">penicillata</div> 754.
<i>violascens O.</i>	721.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">sericea</div> 757.
<i>virgatus Fr.</i>	729.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">tortilia</div> 756.
<i>virginensis Fr.</i>	715.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">tridactyla</div> 759.
<i>vitellinus P.</i>	641.	<i>Alternaria N.</i> 148.
<i>volemus Fr.</i>	723.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">radis Ehrh.</div> 148.
<i>volvaceus Bull.</i>	652.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">tennis</div> 148.
<i>vulgaris P.</i>	697.	<i>Alysidium Kz.</i> 183.
<i>zephyrus Fr.</i>	700.	<i>Alytosprium Lk.</i> 281.
<i>Agyrium Fr.</i>	522.	<i>Amanita Pers.</i> 737-39.
<i>caesium</i>	522.	<i>Amphiconium N.</i> 150.
<i>herbarum</i>	522.	<i>Amphisporium Lk.</i> 335.
<i>nigricans</i>	522.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">versicolor</div> 336.
<i>rufum</i>	522.	<i>Amphitrichum N.</i> 148.
<i>Albugo Ehrh.</i>	753.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">effusum</div> 148.
<i>Aleurisma Lk.</i> 276. 316.		<i>Antennaria Lk.</i> 169.
<i>Alphitomorpha W.</i> 753.		<i>Apiosporium Kz.</i> 861.
<i>adunca</i>	754.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">Abietis</div> 861.
<i>bicornis</i>	755.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">Corni W.</div> 862.
<i>clandestina</i>	754.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">Mali W.</div> 861.
<i>bicornis</i>	755.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">profusum W.</div> 861.
<i>clandestina</i>	754.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">Salicis</div> 861.
<i>comata</i>	757.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">stygium W.</div> 862.
<i>communis</i>	758.	<div style="display: inline-block; width: 150px;">velutinum W.</div> 862.
<i>depressa</i>	758.	

- | | | |
|-------------------------------------|------|---|
| <i>Arcyria P.</i> | 382. | <i>Ascophora Td.</i> 187. 332. |
| <i>carnnea W.</i> | 383. | <i>Aspergillus Lk.</i> 296. |
| <i>cinerea</i> | 383. | <i>candidus</i> 296. |
| <i>conjugata</i> | 385. | <i>conoideus Spr.</i> 297. |
| <i>fusca</i> | 384. | <i>flavus</i> 297. |
| <i>incarnata</i> | 384. | <i>glaucus</i> 297. |
| <i>ochroloma Fr.</i> | 382. | <i>griseus</i> 297. |
| <i>nutans</i> | 383. | <i>laneus</i> 297. |
| <i>punicina</i> | 384. | <i>oosporus W.</i> 296. |
| <i>straminea W.</i> | 385. | <i>roseus</i> 298. |
| <i>umbra Schum.</i> | 382. | <i>virens</i> 298. |
| <i>Aregma Fr.</i> | 188. | <i>Aspergillus P.</i> 294. |
| <i>Arthrinium Kz.</i> | 162. | <i>Asperococcus Lmz.</i> 121. |
| <i>caricicola</i> | 162. | <i>Asteroma DC.</i> 417. |
| <i>curvatum</i> | 162. | <i>Asterophora Ditm.</i> 270. |
| <i>puccinioides</i> | 162. | <i>agaricoides Fr.</i> 270. |
| <i>pyrinum W.</i> | 163. | <i>lycoperdonoides</i> 270. |
| <i>sporophloeum Kz.</i> | 163. | <i>Asterosporium Kz.</i> 179. |
| <i>Aschion Theophr.</i> 865. | | <i>Hoffmanni</i> 197. |
| <i>atro-rubens W.</i> | 865. | <i>Astoma Gray</i> 137. |
| <i>castaneum W.</i> | 865. | <i>Athelia P.</i> 310. |
| <i>concolor W.</i> | 866. | <i>Atractium Lk.</i> 241. |
| <i>filamentosum W.</i> | 865. | <i>Auricularia Bull.</i> 559. |
| <i>fuscum W.</i> | 866. | |
| <i>nigrum W.</i> | 867. | |
| <i>Ascobolus P.</i> | 513. | |
| <i>carneus</i> | 513. | <i>Bactridium Kz.</i> 315. |
| <i>ciliatus Schw.</i> | 514. | <i>candidum</i> 316. |
| <i>denudans Fr.</i> | 515. | <i>carneum</i> 316. |
| <i>furfuraceus</i> | 515. | <i>flavum</i> 315. |
| <i>glaber</i> | 514. | <i>Balanium W.</i> 159. |
| <i>immersus</i> | 513. | <i>stygium</i> 160. |
| <i>ligatilis A. Schw.</i> | 515. | <i>Bangia Lyngb.</i> 53. |
| <i>papillatus W.</i> | 514. | <i>astro-purpurea Ag.</i> 53. |
| <i>pilosus Fr.</i> | 514. | <i>foetida</i> 53. |
| <i>porphytorporus Lk.</i> | 515. | |
| <i>testaceus W.</i> | 513. | |

<i>Bangia Lyngb.</i>	53.	<i>Botrytis P.</i>	290.
<i>rutilans</i>	53.	<i>cane Schm.</i>	294.
<i>torta Ag.</i>	53.	<i>cinerea</i>	295.
<i>Batrachospermum R22</i>		<i>cinereo-virens Schm.</i>	264.
<i>infleatum W.</i>	22.	<i>dendroides DC.</i> . . .	291.
<i>moniliforme</i>	23.	<i>densa Ditm.</i>	291.
<i>Blennoria Fr.</i>	227.	<i>elegans Lk.</i>	291.
<i>Buxi</i>	227.	<i>epigaea Lk.</i>	291.
<i>Bolbochaete Ag.</i>	32.	<i>epiphylla</i>	292.
<i>setigera</i>	32.	<i>flavicans Lk.</i>	292.
<i>Boletus L.</i>	604.	<i>fulva Lk.</i>	292.
<i>bovinus</i>	607.	<i>geotricha Lk.</i>	290.
<i>calopus</i>	606.	<i>hepatica W.</i>	293.
<i>castaneus Bull.</i>	605.	<i>leucospora Lk.</i>	291.
<i>cyanescens Bull.</i>	604.	<i>macrospora Lk.</i>	292.
<i>edulis Bull.</i>	605.	<i>marina Ditm.</i>	295.
<i>felleus Bull.</i>	605.	<i>nigra Lt.</i>	296.
<i>flavidus Fr.</i>	609.	<i>olivacea Lk.</i>	294.
<i>floccipes Vahl.</i>	608.	<i>Polyactis Lk.</i>	294.
<i>granulatus</i>	608.	<i>polyspora Lk.</i>	294.
<i>luridus Sch.</i>	605.	<i>pulvinata Lk.</i>	294.
<i>luteus</i>	609.	<i>racemosa DC.</i>	295.
<i>pachypes</i>	606.	<i>ramosa</i>	295.
<i>piperatus Bull.</i>	607.	<i>ramulosa Lk.</i>	290.
<i>radicans P.</i>	606.	<i>rosea Lk.</i>	292.
<i>Satanas Lz.</i>	606.	<i>turbinata Lk.</i>	295.
<i>scaber Bull.</i>	607.	<i>umbellata DC.</i>	296.
<i>squarrosum P.</i>	608.	<i>varia Dub.</i>	293.
<i>stygius W.</i>	608.	<i>velutina W.</i>	293.
<i>subtomentosus</i>	606.	<i>Bovista P.</i>	391.
<i>variegatus Sw.</i>	607.	<i>nigrescens</i>	392.
<i>Bonnemaisonia Ag.</i>	85.	<i>nuciformis W.</i>	392.
<i>Botrydium W.</i>	57.	<i>plumbea</i>	393.
<i>Botrytis P.</i>	290.	<i>tunicata Fr.</i>	393.
<i>aurantiaca Lk.</i>	293.	<i>Bryopsis Lmx.</i>	63.
<i>bicolor</i>	295.	<i>Arbuscula Ag.</i>	63.

<i>Buglossus</i> <i>Wahl.</i>	609.	<i>Campsothrichum</i> 299.
<i>quercinus</i>	609.	bicolor 299.
<i>Bulgaria</i> <i>Fr.</i> . . .	516.	<i>Camtosporium</i> <i>E.</i> 283.
<i>Clavus</i> <i>W.</i>	516.	<i>Cantarellus</i> <i>Fr.</i> . . 624.
<i>globosa</i>	518.	<i>aurantiacus</i> 630.
<i>inquinans</i>	517.	<i>bryophilus</i> 625.
<i>lacinia</i> <i>W.</i>	516.	<i>buxbaumiaeformis</i> <i>W.</i> 626.
<i>pura</i> <i>Fr.</i>	517.	<i>canaliculatus</i> 627.
<i>sarcoides</i>	517.	<i>chrysosporus</i> <i>W.</i> . . . 873.
<i>Bullardia</i> <i>Jungh.</i>	405.	<i>cibarius</i> 629.
<i>inquinans</i>	405.	<i>cinereus</i> 628.
<i>Bullaria</i> <i>DC.</i> . . .	191.	<i>clavatus</i> 630.
<i>Umbelliferarum</i> . . .	191.	<i>Cornucopiat</i> <i>W.</i> . . . 628.
<i>Burcardia</i> <i>Schmid.</i>	516.	<i>crispus</i> 626.
<i>Byssocladium</i> <i>Lk.</i>	274.	<i>fissus</i> <i>W.</i> 629.
<i>fenestratum</i>	274.	<i>laevis</i> 625.
<i>Byssus</i> <i>Humb.</i> . . .	173.	<i>lobatus</i> 625.
<i>argentea</i> <i>Dub.</i> . . .	154.	<i>lutescens</i> 629.
<i>clavata</i>	154.	<i>muscigena</i> 625.
<i>digitata</i>	154.	<i>muscorum</i> 625.
<i>elongata</i> <i>DC.</i> . . .	153.	<i>pezizoides</i> 627.
<i>fluccosa</i> <i>Schrub.</i> . .	153.	<i>pusilla</i> 627.
<i>membranacea</i>	155.	<i>pygmaeus</i> 626.
<i>Penicillium</i> <i>Scop.</i> . .	154.	<i>retiringus</i> 625.
<i>radiciformis</i> <i>Lesk.</i> .	154.	<i>sinuosus</i> 628.
<i>speciosa</i>	154.	<i>tubaeformis</i> 629.
<i>sulfurea</i> <i>Dub.</i> . . .	153.	<i>umbonatus</i> 630.
<i>undulatus</i>		<i>undulatus</i> 627.
<i>violaceus</i>		<i>violaceus</i> 629.
<i>Caeoma</i> <i>Lk.</i> 193. 247.		<i>Capillaria</i> <i>Pers.</i> 170.
<i>Callithamnium</i> <i>L.</i> 76. 80.		<i>Cenangium</i> <i>Fr.</i> . . . 424.
<i>Caloceras</i> <i>Fr.</i> . . .	534.	<i>Cenococcum</i> <i>Fr.</i> . . . 264.
<i>coleiforme</i> <i>W.</i> . . .	534.	<i>geophilum</i> 264.
<i>hammeum</i> <i>W.</i> . . .	535.	<i>Cephalotrichum</i> <i>L.</i> 830.
<i>furcatum</i>	535.	<i>moailioides</i> 830.
<i>glossoides</i>	534.	<i>rigescens</i> 830.

- Ceramium** *Roth*. 75.
corymbosum *Ag.* 80.
Daviesii *Ag.* 76.
diaphanum 77.
Hookeri *Ag.* 79.
purpurascens *W.* 80.
repens *Ag.* 76.
roseum 80.
Rothii *Ag.* 77.
setaceum *W.* 77.
tetragonum *Ag.* 79.
tetricum *Ag.* 79.
vitatum 78.
- Ceratium** *A. Schw.* 304.
ferrugineum *W.* 305.
hoechosum *W.* 304.
hydnoides 305.
pyxidatum 304.
rubicundum *Ehrb.* 305.
virescens *W.* 305.
- Ceratonema** *P.* 170.
Arandinis *W.* 171.
capillare 171.
Crabronis 171.
capillare 171.
fracinum *W.* 171.
hypotrichodes 171.
- Ceratostoma** *Fr.* 801.
- Ceratinium** *Thph.* 405.
granulatum *W.* 406.
multicatum *W.* 407.
scabrum *W.* 407.
- Ceuthospora** *Fr.* 745.
phacidioides *Grev.* 745.
verbenata *W.* 746.
- Chaenocarpus** *Reb.* 471.

- Chaetomium** *Ks.* 264.
Alchemillae *W.* 873.
strum *Lk.* 266.
chartarum *Ehrenb.* 265.
circinans *W.* 266.
coccodes *W.* 265.
depressum *W.* 266.
elatum 267.
epiphyllum 265.
galatinosum *Ehrenb.* 266.
globosum 265.
pannosum *W.* 265.
Potentillae *W.* 266.
strigosum 265.
- Chaetophora** *Schrk.* 10.
anisocarpa *Spr.* 10.
dura *Ag.* 11.
elegans *Ag.* 10.
endiviaefolia *Ag.* 11.
pisiformis *Ag.* 10.
- Chaetospora** *Ag.* 24.
- Champtoum** *Lk.* 162.
- Chantransia** *D.C.* 22. 43.
- Chiara** *L.* 101.
barbata *Meyen* 106.
ceratophylla *W.* 113.
coronata *Ziz.* 107.
crinita *W.* 109.
flexilis 104.
gracilis *Sm.* 102.
hispida 112.
papulosa *W.* 107.
pulchella *W.* 108.
tomentosa *Pl.* 113.
translucens *P.* 105.
vulgaris 119.

Chloridium Lk.	289.	Clavaria L.	535.
<i>griseum Ehrenb.</i>	289.	<i>anomala Fr.</i>	539.
<i>viride</i>	289.	<i>Ardenia Sow.</i>	539.
Chondria Ag.	87.	<i>ergillacea P.</i>	539.
<i>articulata</i>	88.	<i>Botrytis Holmst.</i>	547.
<i>clavellosa</i>	88.	<i>bulbosa Schum.</i>	538.
<i>ovalis</i>	87.	<i>bysesidea P.</i>	541.
Chondrus Stackh.	93.	<i>carnea W.</i>	541.
Chorda Lyngb.	28.	<i>corniculata Sch.</i>	542.
Chordaria Ag.	24.	<i>crocea P.</i>	541.
<i>filiformis W.</i>	27.	<i>falcata P.</i>	536.
<i>Filum W.</i>	28.	<i>fasciulata P.</i>	538.
<i>multifida Lyngb.</i>	25.	<i> fistulosa Holmst.</i>	539.
<i>Thoreana W.</i>	25.	<i>flava Sch.</i>	545.
<i>rhizodes</i>	26.	<i>flavipes P.</i>	538.
<i>vaga W.</i>	25.	<i>formosa P.</i>	545.
<i>Wigghii W.</i>	26.	<i>fragilis P.</i>	537.
Chroolepus Ag.	151. 280.	<i>fumosa P.</i>	537.
Cionium Lk.	367. 377.	<i>gracilis P.</i>	542.
Circinotrichum N.	284.	<i>grisea P.</i>	545.
Cladobotryum N.	293.	<i>junccea Fr.</i>	536.
Cladosporium Lk.	167.	<i>Kunzei Fr.</i>	544.
<i>atrum</i>	167.	<i>Ligula Fr.</i>	539.
<i>dendriticum W.</i>	169.	<i>Macropus P.</i>	541.
<i>fuscum</i>	167.	<i>mucida P.</i>	540.
<i>gramineum</i>	168.	<i>migrata P.</i>	537.
<i>polysporum</i>	167.	<i>nivea Humb.</i>	536.
<i>tenerrimum</i>	167.	<i>palmata P.</i>	543.
Cladostephus Ag.	85.	<i>pistillaris</i>	542.
<i>spongiosus</i>	85.	<i>pratensis P.</i>	542.
Clathrus L.	860.	<i>pyxidata P.</i>	544.
<i>cancellatus</i>	860.	<i>rosea Dalm.</i>	537.
Clavaria L.	535.	<i>rugosa Bull.</i>	540.
<i>abietina P.</i>	544.	<i>spinulosa P.</i>	545.
<i>amethystea Bull.</i>	545.	<i>striata P.</i>	538.
		<i>subtilis P.</i>	542.
		<i>suecica Fr.</i>	542.
		<i>tenacella P.</i>	543.

<i>Clavaria L.</i>	535.	<i>Confervà L.</i>	83.
<uliginosa ul="" w.<=""></uliginosa>	536.	<i>collabens Ag.</i>	39.
uncialis Grev.	536.	<i>compacta R.</i>	34.
<i>Cluzella Bor.</i>	12.	<i>congregata Ag.</i>	41.
<i>Coccobolus W.</i>	752.	<i>crispata R.</i>	43.
<aénens< td=""><td>753.</td><td> <i>crystallina R.</i></td><td>41.</td></aénens<>	753.	<i>crystallina R.</i>	41.
castaneus	753.	<i>dissiliens D.</i>	34.
<i>Coccochloris Spr.</i>	5.	<i>dubia Leibl.</i>	40.
aurantia W.	6.	<i>enterochlora W.</i>	46.
minuta W.	5.	<i>ericetorum D.</i>	35.
sanguinea W.	6.	<i>expansa Mert.</i>	44.
stagonia	6.	<i>flacca D.</i>	38.
<i>Coccopleum Ehrb.</i>	189.	<i>flaccida D.</i>	39.
<i>Coccospora W.</i>	176.	<i>flavescoena R.</i>	42.
aurantiaca	176.	<i>flavicans M.</i>	35.
<i>Coccotrichum Lk.</i>	314.	<i>floccosa Ag.</i>	33.
carneum W.	315.	<i>fracta Vahl.</i>	45.
Martii	315.	<i>fragilis D.</i>	59.
rhodochroom W.	315.	<i>fucicola Ag.</i>	39.
<i>Coelosporium Lk.</i>	165.	<i>fuciform R.</i>	39.
<i>Collarium Lk.</i>	283.	<i>fugacissima R.</i>	36.
<i>Colletosporium L.</i>	316.	<i>glomerata</i>	43.
umbriolum	316.	<i>hormoides Lyngb.</i>	39.
<i>Colpoma W.</i>	422.	<i>hyemalis R.</i>	34.
elatinum	423.	<i>implexa D.</i>	35.
quercinum	423.	<i>Jürgensii Mert.</i>	37.
trigonum	422.	<i>laete-virens D.</i>	42.
verrucosum	422.	<i>lanosa Mert.</i>	42.
<i>Confervà L.</i>	83.	<i>Linum fl. dan.</i>	38.
<i>Aegagropila</i>	41.	<i>margosa Mert.</i>	38.
<i>aénea Dillw.</i>	37.	<i>Melogonium W. M.</i>	37.
<i>arcta D.</i>	44.	<i>mucosa Mert.</i>	38.
<i>canalicularis Huds.</i>	43.	<i>olivacea W.</i>	41.
<i>Candollei Ag.</i>	36.	<i>prolifera R.</i>	46.
<i>capillaris Ag.</i>	36.	<i>refracta R.</i>	44.
		<i>riparia R.</i>	43.
		<i>rivularis</i>	36.
		<i>rupestris</i>	44.

- Confervae L.** 83.
sericea *Huds.* 42.
sordida *D.* 83.
stellaris *R.* 40.
tortuosa *D.* 87.
tumidula *Sm.* 36.
usneoides *W.* 45.
Youngeana *W.* 38.
zonata *W. et M.* 34.
- Coniophora DC.** 312.
cerebrella 313.
foetida *P.* 313.
membranacea 312.
- Conjugata Vauch.** 47.
- Conoplea P.** 243.
hispida 243.
- Coremium Lk.** 303.
candidum 303.
citrinum 304.
glaucum 303.
- Corticium P.** 561.
- Coryne N.** 557.
- Coryneum N.** 227.
brachyurum *Lk.* 228.
confineas 228.
depressum *Kz.* 228.
disciforme *Sch.* 227.
pulvinatum *Kz.* 227.
umbonatum 227.
- Corynephora Ag.** 8.
marina 8.
- Corynodesmium W.** 301.
- Craterium Trent.** 357.
leucocephalum *Dit.* 357.
minutum *Fr.* 358.
- Craterium Trent.** 357.
mutabile *Fr.* 357.
motans *Fr.* 358.
pedunculatum 359.
pyriforme *Ditm.* 359.
xanthopus *W.* 358.
- Cibraria Schr.** 361.
argillacea *P.* 363.
aurantiaca 362.
fulva 364.
intricata 362.
macrocarpa 364.
purpurea *A. et Schw.* 362.
pyriformis 363.
rubiginosa *Fr.* 363.
tenella 360.
vulgaris 362.
- Cronartium Fr.** 259.
- Cryptosphaeria Gr.** 766.
- Cryptosporium K.** 191.
atrum 191.
aurantiacum *Lk.* 191.
- Cyathus P.** 870.
corrugatus *W.* 870.
Crucibulum Hoffm. 871.
deformis *Willd.* 870.
farcetus *Roth* 870.
globosus *Ehrenb.* 870.
laevis *Hoffm.* 871.
scutellaris *Roth* 871.
striatus 871.
- Cycledum W.** 510.
atrum 511.
Carpini 512.
Cerasi 512.
Lecideola 511.

- | | | | |
|---------------------------------|------|-------------------------------|------|
| <i>Cycledum</i> <i>W.</i> | 510. | <i>Dactylium</i> <i>N.</i> | 299. |
| <i>sepincola</i> | 511. | <i>candidum</i> | 299. |
| <i>truncatulum</i> | 512. | <i>nigrum Lk.</i> | 299. |
| <i>Cyclobion</i> <i>Ag.</i> | 6. | <i>Daedalea</i> <i>P.</i> | 631. |
| <i>Cylichnium</i> <i>W.</i> | 267. | <i>abietina</i> | 633. |
| <i>operculatum</i> | 268. | <i>betulina Reb.</i> | 634. |
| <i>Cyphella</i> <i>Fr.</i> | 518. | <i>biennis Fr.</i> | 634. |
| <i>Digitalis</i> | 519. | <i>cofragosa</i> | 632. |
| <i>lacera</i> | 519. | <i>gibbosa</i> | 631. |
| <i>muscicola</i> | 518. | <i>latissima Fr.</i> | 631. |
| <i>Cystosira</i> <i>Ag.</i> | 99. | <i>quercina</i> | 638. |
| <i>siliquosa</i> | 99. | <i>rubescens A. Schw.</i> | 632. |
| <i>Cytispora</i> <i>Ehrenb.</i> | 749. | <i>sepiaria</i> | 633. |
| <i>Aquifolii Fr.</i> | 750. | <i>spadicea Fr.</i> | 634. |
| <i>aspera W.</i> | 751. | <i>suaveolens</i> | 632. |
| <i>betulina</i> | 749. | <i>trabea Fr.</i> | 633. |
| <i>carphosperma Fr.</i> | 750. | <i>unicolor Fr.</i> | 632. |
| <i>chrysosperma Fr.</i> | 751. | <i>Dasya</i> <i>Ag.</i> | 85. |
| <i>ferruginea Desm.</i> | 750. | <i>Delesseria</i> <i>Lmx.</i> | 94. |
| <i>floccosa W.</i> | 750. | <i>Dermatium</i> <i>Pers.</i> | 156. |
| <i>fugax Fr.</i> | 750. | <i>Aluta Lk.</i> | 158. |
| <i>guttifera Fr.</i> | 749. | <i>badium Lk.</i> | 157. |
| <i>incarnata Fr.</i> | 751. | <i>castaneum Lk.</i> | 158. |
| <i>melanosperma Fr.</i> | 749. | <i>cinnabarinum</i> | 158. |
| <i>pyriformis Fr.</i> | 750. | <i>geotrichum W.</i> | 157. |
| <i>tubescens Fr.</i> | 751. | <i>giganteum W.</i> | 157. |
| <i>xanthosperma Fr.</i> | 751. | <i>jubatum Lk.</i> | 158. |
| <i>Dacrymyces</i> <i>N.</i> | 523. | <i>Nidulus W.</i> | 159. |
| <i>fragiformis</i> | 524. | <i>nigrum Lk.</i> | 157. |
| <i>roseus Fr.</i> | 523. | <i>mollissimum Lk.</i> | 157. |
| <i>stillatus</i> | 523. | <i>rupestre N.</i> | 157. |
| <i>Syringae</i> <i>Fr.</i> | 523. | <i>rupincola Lk.</i> | 157. |
| <i>tortus Fr.</i> | 523. | <i>violaceum</i> | 153. |
| <i>violaceus</i> | 523. | <i>Dendryphion</i> <i>W.</i> | 890. |
| | | <i>comosum</i> | 300. |
| | | <i>Depazea</i> <i>Fr.</i> | 766. |

<i>Dermodium Lk.</i>	346.	<i>Diderma P.</i>	370.
<i>Dermosporium Lk.</i>	235.	<i>contextum Lk.</i>	371.
<i>flavicans</i>	235.	<i>coutortum P.</i>	371.
<i>Desmaretia Lmx.</i>	89.	<i>difforme A. et Schw.</i>	373.
<i>Desmia Lyngb.</i>	90.	<i>floriforme</i>	377.
<i>Desmidium Ag.</i>	118.	<i>globosum</i>	373.
<i>Swartzii</i>	118.	<i>globuliferum</i>	376.
<i>Diachea Fr.</i>	385.	<i>ochraceum H.</i>	371.
<i>elegans</i>	385.	<i>papaverinum W.</i>	375.
<i>Diadenus Pal. Br.</i>	47.	<i>reticulatum Fr.</i>	370.
<i>Diatoma DC.</i>	118.	<i>spumariaeforme</i>	374.
<i>arcuatum Lyngb.</i>	119.	<i>stellare</i>	377.
<i>Biddulphianum Ag.</i>	119.	<i>testaceum</i>	373.
<i>fenestratum Lyngb.</i>	119.	<i>trichodes Fr.</i>	372.
<i>flocculosum</i>	118.	<i>umbilicatum</i>	377.
<i>Lyngbii Ag.</i>	120.	<i>valvatum Fr.</i>	372.
<i>marinum Lyngb.</i>	118.	<i>vernicosum</i>	374.
<i>obliquatum Lyngb.</i>	119.		
<i>tenue Lyngb.</i>	118.	<i>Didymium Schr.</i>	364.
<i>unipunctatum Ag.</i>	119.	<i>cinereum Fr.</i>	364.
<i>Dicaeoma Lk.</i>	218.	<i>complanatum</i>	365.
<i>Dichaena Fr.</i>	438.	<i>effusum Fr.</i>	365.
<i>Dichosporium N.</i>	334.	<i>farinaceum</i>	367.
<i>aggregatum</i>	334.	<i>filamentosum</i>	368.
<i>Dictyidium Schr.</i>	359.	<i>furfuraceum Fr.</i>	369.
<i>ambiguum</i>	361.	<i>hemisphaericum</i>	369.
<i>cernuum N.</i>	361.	<i>herbarum</i>	366.
<i>compactum W.</i>	376.	<i>Iridis</i>	366.
<i>cyanocacens Fr.</i>	371.	<i>leucopus Fr.</i>	366.
<i>microcarpum</i>	360.	<i>lobatum N.</i>	366.
<i>splendens</i>	360.	<i>melanopus Fr.</i>	367.
<i>trichoides Chev.</i>	360.	<i>muscicola Lk.</i>	367.
<i>umbilicatum</i>	361.	<i>nigripes Fr.</i>	367.
<i>venosum</i>	360.	<i>physaroides Fr.</i>	365.
		<i>ruhipes Fr.</i>	369.
		<i>Serpula Fr.</i>	364.
		<i>squamulosum</i>	368.
		<i>tigrinum</i>	369.
		<i>xanthopus Fr.</i>	367.

- Didymosporium* 185.
 complanatum 185.
 elevatum 185.
Diphtherium Ehrb. 339.
Diplosporium Lk. 302.
 nigrescens 303.
Ditiola Fr. 546.
 paradoxa *Fr.* 546.
 radicata *Fr.* 547.
 sulcata *Fr.* 547.
 volvata *Fr.* 547.
Dothidea Fr. 863.
 cellulosa *W.* 863.
 genistalis 864.
 insculpta *W.* 864.
 moriformis 864.
 puccinioides 864.
 pyrenophora 863.
 Sambuci 864.
 sphaerooides 863.
Draparnaldia Bor. 20.
 glomerata 21.
 plumosa 20.
 tenuis 20.
 uniformis *Ag.* 20.

Echinella Ag. 120.
 Acharii *Ag.* 121.
Ectocarpus Lyngb. 73.
 compactus *Ag.* 74.
 flavesceus *W.* 75.
 litoralis 74.
 siliculosus 73.
 tomentosus 74.
Ectosperma V. 58-60.
Ectostroma Fr. 409.
Elaphomyces N. 405.
Encoelium Ag. 121.
 echinatum 121.
Endogone Lk. 864.
 pisiformis 865.
Enteridium Ehrbg. 336.
 olivaceum 336.
Enteromorpha Lk. 63.
Entomyclium W. 189.
 folliculatum 189.
Epichysium Tod. 313.
 argenteum 313.
Epicoccum Lk. 234.
 atro-sanguineum *W.* 234.
 nigrum 234.
 purpurascens 234.
Epochnium Lk. 285.
Erineum Pers. 126.
 acerinum 131.
 alnenm 128.
 aereum 126.
 badium *Kz.* 127.
 betulinum *A. Schw.* 129.
 curtum *Grev.* 129.
 fagineum 128.
 griseum 126.
 ilicinum 131.
Juglandinum DC. 133.
 nervisequum *Kz.* 127.
Oxyacanthae 127.
Padi Duo. 127.
 plateoidis 129.
 populinum 130.
Pseudo-Platani K. 131.

<i>Erineum Pers.</i>	:	126.	<i>Erysibe Theoph. W.</i>	193.
purpurascens Gaertn.	.	128.	hypodites	215.
purpureum DC.	.	131.	insculpta	202.
pyrinum		132.	Labiatarum	198.
roseum Schltz.	.	129.	Ledi	199.
salicinum W.	.	130.	linearis	194.
Sorbi Fk.	.	132.	limbata	195.
tiliaceum		130.	Lini	205.
Vitis DC.	.	132.	longissima	215.
<i>Erysibe Theoph. W.</i>	193.		Maydis	215.
aecidiiformis		203.	mamillaris	195.
Alchemillae		199.	miniatia	200.
antherarum		217.	mixta	204.
appendiculata		210.	maricella	203.
areolata		203.	nitida	197.
arillata		211.	oblongata	196.
Armeriae		208.	occulta	212.
baccata		214.	olivacea	215.
betulina		196.	Panicorum	216.
Caprearum		204.	polymorpha	197.
Cerealium		194.	Populi	203.
chrysodes		195.	Poterii	205.
Cicerbitae		219.	Pulsatillae	203.
cinnamomea		207.	pustulata	198.
circuialis		208.	quadrata	194.
confluens		201.	receptaculorum	214.
cylindrica		196.	Rhinanthaceorum	201.
Empotri		199.	Rhudodeudri	199.
Filicem		205.	Rosae	200.
floccosa		212.	rostellata	209.
Floeculosorum		206.	Ruborum	200.
formosa		206.	Senecionis	195.
foetida		213.	Silenes	206.
fulva		201.	sphaerica	198.
Genistarum		207.	sphaerococca	213.
gyrosa		202.	suaveolens	206.
Helioscopiae		205.	Symphyti	200.
Hypericorum		199.	tremellosa	202.

Erysibe <i>Theop. W.</i>	193.
<i>typhoides</i>	215.
<i>utriculosa</i>	216.
<i>variolosa</i>	195.
<i>vera</i>	217.
<i>Vitellinae</i>	204.
<i>volvata</i>	196.
Erysibe <i>R. et auct.</i>	753.
Erysiphe <i>Hdw. DC.</i>	753.
Eurotium <i>Lk.</i>	331.
<i>coriorum</i> <i>W.</i>	331.
<i>epixylon</i> <i>Kz.</i>	331.
<i>fructigenum</i> <i>Mart.</i>	331.
<i>herbariorum</i>	332.
Eustegia <i>Fr.</i>	431.
Excipula <i>Fr.</i>	417.
Exidia <i>Fr.</i>	557.
<i>Auricula</i>	559.
<i>glandulosa</i>	558.
<i>guttifera</i> <i>W.</i>	558.
<i>impressa</i>	557.
<i>pithya</i>	557.
<i>recisa</i>	559.
<i>repanda</i>	557.
<i>saccharina</i>	558.
<i>truncata</i>	558.
Exosporium <i>Lk.</i>	231.
<i>circinatum</i> <i>W.</i>	233.
<i>clavuligerum</i>	233.
<i>ditrichum</i>	231.
Eryngii <i>Chev.</i>	232.
hispidulum <i>N.</i>	232.
hypodermium	232.
maculaos	231.
minutum	232.
Rubi	231.

Exosporium <i>Lk.</i>	231.
<i>Tiliae</i>	233.
<i>trichellum</i>	231.
Fistulina <i>Bull.</i>	609.
Fragilaria <i>Lyngb.</i>	116.
Frustulina <i>Ag.</i>	116.
Fucus <i>L.</i>	96.
<i>canaliculatus</i>	97.
<i>lorenzii</i>	99.
<i>nodosus</i>	97.
<i>serratus</i>	98.
<i>vesiculosus</i>	97.
Fuligo <i>P.</i>	338-341.
Fumago <i>P.</i>	168.
Furcellaria <i>Lmx.</i>	96.
<i>fastigiata</i>	96.
Fusarium <i>Lk.</i>	241.
<i>candidum</i>	241.
<i>Chaetomium</i> <i>W.</i>	242.
<i>ciliatum</i>	242.
<i>heterosporum</i> <i>N.</i>	242.
<i>lateritium</i>	241.
<i>pallens</i> <i>N.</i>	241.
<i>Stilbaster</i>	241.
<i>roseum</i>	241.
<i>tremelloides</i> <i>Grev.</i>	242.
Fusidium <i>Lk.</i>	177.
<i>aureum</i>	178.
<i>Buxi</i> <i>Schn.</i>	178.
<i>candidum</i>	178.
<i>expansum</i>	178.
<i>flavo-virens</i> <i>D.</i>	177.
<i>griseum</i>	177.
<i>sulfureum</i>	178.

<i>Fusisporium Lk.</i>	283.	<i>Gonytrichum N.</i>	274.
<i>aurantiacum</i>	283.	<i>caesium</i>	274.
<i>circinatum W.</i>	284.	<i>Griffitsia Ag.</i>	77.
<i>glaucum W.</i>	284.	<i>Gymnosporangium</i>	229.
<i>longum W.</i>	283.	<i>Juniperi Lk.</i>	229.
<i>roseum</i>	283.		
 <i>Gastridium Lgb.</i>	28. 88.		
<i>Geaster P.</i>	399.	<i>Halydrys Stackh.</i>	97.
<i>fimbriatus Fr.</i>	401.	<i>Hatelymenia Ag.</i>	28. 92.
<i>fornicatus Fr.</i>	400.	<i>Haplaria Lk.</i>	286.
<i>limbatus Fr.</i>	401.	<i>Haplotrichum Lk.</i>	287.
<i>mammosus Chev.</i>	401.	<i>Helicobolus W.</i>	, 751.
<i>rufescens</i>	402.	<i>Crataegi</i>	752.
<i>stellatus W.</i>	402.	<i>epixyla</i>	752.
<i>striatus</i>	400.	<i>Rhois</i>	752.
<i>Gelidium Lyngb.</i>	87.	<i>Serratulae</i>	752.
<i>Geoglossum P.</i>	531.	<i>Helicomyces Lk.</i>	147.
<i>atro-purpureum</i>	532.	<i>roseus</i>	147.
<i>carneum Sch.</i>	531.	<i>Helicosporium N.</i>	161.
<i>diforme Fr.</i>	532.	<i>Helicotrichum N.</i>	161.
<i>glabrum</i>	532.	<i>pulvinatum</i>	161.
<i>glutinosum</i>	532.	<i>vegetum</i>	161.
<i>hirustum</i>	533.	 <i>Helmisporium Lk.</i>	163.
<i>olivaceum</i>	533.	<i>Cheiraanthi W.</i>	166.
<i>sphaguicolum E.</i>	533.	<i>cylindricum W.</i>	164.
<i>viride</i>	531.	<i>fugax W.</i>	164.
<i>viscosum</i>	531.	<i>gracile W.</i>	164.
<i>Geotrichum Lk.</i>	. 291.	<i>minus</i>	165.
<i>Gigartina Lmx.</i>	89. 91.	<i>nanum N.</i>	164.
<i>Globulina Lk.</i>	. 47.	<i>nodosum</i>	165.
<i>Gongylocladium</i>	160.	<i>pellucidum Kz.</i>	165.
<i>atrum</i>	160.	<i>praelongum W.</i>	166.
<i>Goniocladum Lk.</i>	. 61.	<i>simplex N.</i>	164.
		<i>subulatum N.</i>	165.
		<i>setiforme W.</i>	873.

- Helmisporium Lk.** 163.
tenuissimum N. 164.
velutinum 166.
vesicarium W. 166.
- Helotium P.** 546.
- Helvella L.** 553.
atra Koeng. 554.
crispa Fr. 555.
elastica Bull. 553.
esculenta P. 555.
fistulosa A. Schw. 553.
Infula P. 554.
Incunosa Afz. 555.
Monachella Fr. 554.
pulla Holmsk. 554.
sulcata Afz. 555.
- Hempelia Meyen.** 883.
- Hericium P.** 619.
- Himantia P.** 156.
- Himanthalia Lyngb.** 99.
- Hormiscium Kz.** 186.
atrum 187.
compactum W. 186.
condensatum W. 186.
expansum 186.
laxum W. 186.
- Hutchinsia Ag.** 82.
- Hydnocaryon W.** 860.
fragrans 860.
- Hydnوم L.** 610.
argutum Fr. 610.
aurantiacum A. Schw. 617.
Anisocalpium 615.
byssinum Schr. 610.
candidum Schm. 618.
- Hydnوم L.** 610.
cirratum P. 614.
compactum P. 617.
connatum Schiz. 616.
coralloides Scop. 619.
crispum Schr. 614.
crustulosum P. 612.
cyathiforme Bull. 616.
diaphanum Schr. 612.
Erinaceus Bull. 615.
fagineum Fr. 610.
farinaceum P. 612.
fasciculare A. Schw. 612.
ferruginosum Fr. 613.
fragile P. 612.
fusco-atrum Fr. 613.
fuligineo-album Sch. 618.
gelatinosum Scop. 614.
Hollii Fr. 611.
imbricatum 619.
lacteum Fr. 614.
laevigatum Sw. 618.
macrodon P. 613.
melaleucum Fr. 615.
microdon P. 612.
mucidum P. 612.
nigrum Fr. 616.
niveum P. 611.
ochraceum P. 613.
quercinum Fr. 611.
repandum 618.
rufescens P. 618.
striatum Sch. 617.
strigosum Sw. 614.
suaveolens Scop. 617.
subsquamatum B. 618.
subtile Fr. 610.
tomentosum 616.

- | | | | |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------|
| <i>Hydnium L.</i> | 610. | <i>Hyphoderma W.</i> | 576. |
| <i>tremellosum W.</i> | 613. | <i>asperum</i> | 577. |
| <i>velutinum Fr.</i> | 616. | <i>fibrillosum</i> | 577. |
| <i>violascens A. Schw.</i> | 617. | <i>granulosum</i> | 576. |
| <i>viride Fr.</i> | 611. | <i>lintaceum</i> | 578. |
| <i>Hydrocoryne Schb.</i> | 18. | <i>paucosum</i> | 579. |
| <i>spongiosa</i> | 18. | <i>puberum</i> | 576. |
| <i>Hydrodictyon R.</i> | 50. | <i>spiculosum</i> | 576. |
| <i>utriculatum</i> | 50. | <i>sulfureum</i> | 577. |
| <i>Hydrogastrum Dev.</i> | 57. | <i>terrestris</i> | 579. |
| <i>Hydrogera Wigg.</i> | 318. | <i>Hypochnus Fr.</i> | 309. |
| <i>Hydrophora Tod.</i> | 322. | <i>coeruleus</i> | 311. |
| <i>Hydrurus Ag.</i> | 12. | <i>dendriticus W.</i> | 310. |
| <i>crystallophorus Sch.</i> | 13. | <i>epiphyllus W.</i> | 310. |
| <i>penicillatus</i> | 13. | <i>ferrugineus W.</i> | 311. |
| <i>Rothii W.</i> | 13. | <i>reticulatus W.</i> | 311. |
| <i>Vaucherii</i> | 12. | <i>sericeus</i> | 310. |
| <i>Hygrocybe Ag.</i> | 19. | <i>sericeus W.</i> | 310. |
| <i>stramenti</i> | 19. | <i>strigosus W.</i> | 312. |
| <i>cerevisiae</i> | 19. | <i>umbrius W.</i> | 312. |
| <i>vini</i> | 19. | <i>velatinus W.</i> | 310. |
| <i>Hymenula Fr.</i> | 515. | <i>Hypoderma DC.</i> | 136. |
| <i>areolata W.</i> | 525. | <i>Hypoxyylon Adans.</i> | 856. |
| <i>Arundinis</i> | 525. | <i>Hysterium Tod.</i> | 434. |
| <i>umbilicata</i> | 525. | <i>acuminatum Fr.</i> | 440. |
| <i>Hypha P.</i> | 153-155. | <i>aggregatum DC.</i> | 439. |
| <i>Hyphasma Reb.</i> | 148. | <i>angustatum P.</i> | 440. |
| <i>Hyphelia Fr.</i> | 243. | <i>arundinaceum Schr.</i> | 435. |
| <i>castanea W.</i> | 244. | <i>biforme Fr.</i> | 441. |
| <i>fusca</i> | 244. | <i>commune Fr.</i> | 436. |
| <i>nigrescens</i> | 244. | <i>confluens W.</i> | 440. |
| <i>rosea</i> | 243. | <i>conigenum Moug.</i> | 437. |
| <i>terrestris</i> | 244. | <i>contortum Ditm.</i> | 441. |
| <i>viridula W.</i> | 244. | <i>culmigenum Fr.</i> | 435. |

Hysterium Tod.	434.	Isaria Pers.	306.
episphaerium Fr.	441.	crassa	306.
foliicolum Fr.	434.	eleutheratorum N.	306.
Fraxini P.	439.	epiphylla	307.
herbarum Fr.	434.	filiformis W.	307.
Lauri Fr.	435.	funicularis W.	309.
Ledi	438.	furcellata M.	308.
maculare Fr.	435.	glaucha Ditm.	308.
melaleucum Fr.	436.	glaucoccephala	308.
naviculare W.	441.	hydnoides Lk.	308.
nervisequum Fr.	436.	spiculososa W.	309.
Pinastri Schr.	437.	tartarea W.	309.
pulicare P.	442.	truncata	307.
punctiforme Fr.	434.	umbrina	308.
Rubi Fr.	437.	velutipes Lk.	306.
rugosum Fr.	438.		
scirpinum P.	436.		
sphaerioides A. et Sch.	436.		
Striola Fr.	437.	Laminaria Lmx.	69.
tumidulum Fr.	435.	digitata	71.
varium Fr.	440.	esculenta	72.
		Fascia Ag.	70.
		lapathifolia W.	71.
		palmata W.	71.
		Phyllitis	70.
		saccharina	70.
Illosporium Mart.	236.	Lasiobotrys Kx.	748.
carneum Fr.	236.	Lonicerae	748.
coccineum Fr.	236.	Leangium Lk.	377.
roseum	236.	Lemanea Bor.	61.
Irpea Fr.	619.	fluvialis	62.
fusco-violacens	620.	pulchella W.	61.
obliqua	620.	torulosa	62.
spathulata	620.	Leocarpus Lk.	348.
Isaria Pers.	306.	calcareus	348.
agaricina	307.	Leotia Pers.	550.
arachnophila	306.	atro-virens	550.
bulbosa N.	308.		
citrina	307.		
clavata D.	308.		

Leotia Pers.	550.	Licea Schr.	342.
circuans	550.	suberea Fr.	343.
lubrica	550.	sulfurea W.	344.
Leptomitus Ag.	19.	Serpula Fr.	346.
candidus	19.	variabilis	346.
inconspicuus	19.	Lignydiump Lk.	339.
lacteus	19.	Linckia Wigg.	9. 31. 57.
niveus	19.	Lomentaria Lyngb.	88.
nanus	19.	Lophium Fr.	432.
Leptostroma Fr.	184.	dolabiforme W.	433.
areolatum W.	185.	mytilinum	432.
filicinum	186.	Utriculus Spr.	432.
hysterooides	185.	Lycogala Pers.	389.
junceum	186.	conicum	390.
maculare W.	185.	miniatum	390.
nitidum W.	186.	parietinum	391.
punctiforme W.	185.	plumbeum Fr.	391.
scirpinum	186.	punctatum	391.
sphaerioides	185.	Lycoperdon L.	395.
Spiraeae	186.	Bovista P.	394.
vulgare	135.	caelatum Bull.	394.
Leptothyrium Kz.	748.	constellatum Fr.	398.
Lunariae	748.	granulatum W.	395.
Licea Schr.	342.	pasillum B.	395.
abietina W.	343.	pyriforme Rupp.	396.
alotacea W.	344.	saccatum Fr.	396.
circumscissa P.	343.	utriforme Bull.	398.
congesta W.	345.	verrucosum Rupp.	397.
contorta W.	345.	Lyngbya Ag.	54.
cylindrica Fr.	346.	aeruginosa	54.
ellusa Ehrenb.	347.	crispa	54.
Tragiformis P.	347.	lutescens	55.
incarnata A. Schw.	345.	muralis	54.
minima Fr.	343.	ochracea Leibl.	55.
pannorum W.	344.		
quercina W.	344.		
strobilina A. Schw.	343.		

<i>Manina Scop.</i>	619.	<i>Mitrula Pers.</i>	548.
<i>Melanconium Lk.</i>	179.	<i>paludosa</i>	548.
<i>apiocarpon</i>	181.	<i>Monilia Pers.</i>	184.
<i>bicolor N.</i>	180.	<i>antennata</i>	184.
<i>effusum</i>	181.	<i>Mougeotia Ag.</i>	49.
<i>glomeratum</i>	180.	<i>Morchella Pers.</i>	551.
<i>microsporum N.</i>	180.	<i>crassipes DC.</i>	552.
<i>ooidium</i>	181.	<i>deliciosa Fr.</i>	551.
<i>ovatum</i>	181.	<i>esculenta</i>	552.
<i>putredinis W.</i>	181.	<i>patula</i>	553.
<i>sphaeroideum</i>	180.	<i>Mucedo Pers.</i>	321.
<i>sphaerosporum W.</i>	180.	<i>Mucor Pers.</i>	319.
<i>Melidium Eschw.</i>	318.	<i>acicularis Lk.</i>	322.
<i>subterraneum</i>	318.	<i>aqosus Mart.</i>	322.
<i>Melosira Ag.</i>	117.	<i>carnis Lk.</i>	320.
<i>Jürgensii</i>	117.	<i>clavatus Lk.</i>	323.
<i>moniliformis</i>	117.	<i>corymbosus W.</i>	320.
<i>Menispora P.</i>	284.	<i>ferrugineus Lk.</i>	320.
<i>Meridion Ag.</i>	121.	<i>fimetarius Lk.</i>	319.
<i>Merisma Pers.</i>	574.	<i>flavidus Lk.</i>	320.
<i>coralloides</i>	575.	<i>fimbria N.</i>	323.
<i>fastidiosum</i>	575.	<i>fusipes Lk.</i>	323.
<i>Küttingeri M.</i>	575.	<i>globifer Lk.</i>	323.
<i>palmatum</i>	575.	<i>Juglandia Lk.</i>	320.
<i>penicillatum W.</i>	574.	<i>lateritius Lk.</i>	321.
<i>Merulius Hall.</i>	622.	<i>lutescens Lk.</i>	323.
<i>anreus</i>	623.	<i>microcephalus W.</i>	321.
<i>Corium Fr.</i>	622.	<i>minimus Lk.</i>	322.
<i>paucirugum Dub.</i>	624.	<i>Mucedo</i>	322.
<i>rufum P.</i>	623.	<i>marinus</i>	323.
<i>serpens</i>	623.	<i>oosporus Lk.</i>	321.
<i>tremellosum Schr.</i>	624.	<i>pygmaeus Lk.</i>	321.
<i>Vastator Tod.</i>	623.	<i>rufus</i>	319.
<i>Mesenterica Tod.</i>	526.	<i>stercoreus Lk.</i>	322.
<i>Mesogloia Ag.</i>	26.	<i>stolonifer Ehrenb.</i>	323.
		<i>tenellus</i>	322.
		<i>tenuis Lk.</i>	321.

- | | | | |
|----------------------------------|------|----------------------------------|------|
| <i>Mucor Pers.</i> | 319. | <i>Nodularia Mert.</i> | 8. |
| <i>terrestris Lk.</i> | 321. | <i>spatigena</i> | 8. |
| <i>truncorum Lk.</i> | 319. | <i>Nodularia Lyngb.</i> 62. | |
| <i>Mycobanche Pers.</i> 272. | | <i>Nostoc Ag.</i> | 30. |
| <i>cervina W.</i> | 273. | <i>confluens</i> | 32. |
| <i>chrysosperma W.</i> . . | 273. | <i>pruiniforme</i> | 31. |
| <i>miniata W.</i> | 273. | <i>Rothii</i> | 31. |
| <i>rosea W.</i> | 273. | <i>sphaericum Vaucl.</i> . . 30. | |
| <i>Mycinema Ag.</i> | 149. | <i>verrucosum Vaucl.</i> . . 31. | |
| <i>Mycoderma Pers.</i> 19. | | | |
| <i>Mycogone Lk.</i> | 273. | | |
| <i>Myrothecium Td.</i> 268. | | <i>Octospora Hedw.</i> 449. | |
| <i>inundatum</i> | 269. | <i>Odontia P.</i> | 610. |
| <i>rорidum</i> | 268. | <i>Oedemium Lk.</i> | 160. |
| <i>Verrucaria Ditm.</i> . . . | 268. | <i>Oedogonium Lk.</i> | 34. |
| <i>Myxarium W.</i> | 260. | <i>Oidium Lk.</i> | 182. |
| <i>nucleatum W.</i> | 250. | <i>Oncidium Nees</i> | 314. |
| <i>Myxosporium Lk.</i> 176. | | <i>Oncocladium W.</i> | 289. |
| <i>Myxomphalos W.</i> 520. | | <i>flavum</i> | 289. |
| <i>guttatus</i> | 520. | <i>Oospora W.</i> | 182. |
| <i>Myxotrichum Kz.</i> 314. | | <i>aurea</i> | 183. |
| <i>chartarum</i> | 314. | <i>candida</i> | 182. |
| <i>murorum</i> | 314. | <i>chartarum</i> | 184. |
| | | <i>fructigena</i> | 182. |
| | | <i>fuliginosa</i> | 184. |
| | | <i>fulva</i> | 183. |
| | | <i>laxa</i> | 183. |
| | | <i>moniliformis</i> | 182. |
| | | <i>subramosa</i> | 183. |
| | | <i>Uredinis</i> | 183. |
| | | <i>vireacens</i> | 184. |
| <i>Naematelia Fr.</i> | 524. | <i>Onygena Pers.</i> | 263. |
| <i>encephala</i> | 524. | <i>torvina W.</i> | 263. |
| <i>rubiformis</i> | 524. | <i>equina</i> | 263. |
| <i>Nemaspora Ehrb.</i> 176. | | <i>faginea Schr.</i> | 264. |
| <i>crocea P.</i> | 176. | | |
| <i>Nidularia Bull.</i> | 870. | | |
| <i>Nitella Ag.</i> | 104. | | |

<i>Oscillaria</i> <i>Bosc.</i>	14.	<i>Periconia</i> <i>Tod.</i>	829.
<i>aeruginea</i> <i>Mart.</i>	16.	<i>Peridermium</i> <i>Lk.</i>	262.
<i>alba</i> <i>Vauch.</i>	18.	<i>Pini</i>	262.
<i>amphibia</i> <i>Ag.</i>	16.	<i>Periola</i> <i>Fr.</i>	521.
<i>autiliaria</i> <i>Mert.</i>	18.	<i>furfuracea</i>	521.
<i>auctumualis</i> <i>Ag.</i>	16.	<i>hirsuta</i>	521.
<i>chalybea</i> <i>Mert.</i>	17.	<i>tomentosa</i>	521.
<i>decolorans</i> <i>Lyng.</i>	18.	<i>Perisporium</i> <i>Fr.</i>	746.
<i>elegans</i> <i>Ag.</i>	16.	<i>acerinum</i>	746.
<i>Flos aquae</i> <i>Ag.</i>	14.	<i>Agaricola</i>	747.
<i>labyrinthiformis</i>	14.	<i>alienum</i>	747.
<i>luminosa</i> <i>Ag.</i>	16.	<i>Alismatis</i>	747.
<i>limosa</i> <i>Ag.</i>	15.	<i>alneum</i>	746.
<i>nigra</i> <i>Ag.</i>	17.	<i>betulinum</i>	746.
<i>ochracea</i> <i>Lyngb.</i>	18.	<i>circinans</i>	747.
<i>Okeni</i> <i>Ag.</i>	17.	<i>disseminatum</i>	747.
<i>papyracea</i> <i>Ag.</i>	52.	<i>exuberans</i>	747.
<i>parietina</i>	54.	<i>Fragariae</i> <i>W.</i>	746.
<i>rupestris</i> <i>Ag.</i>	17.	<i>Galba</i>	747.
<i>subsalsa</i> <i>Ag.</i>	15.	<i>gramineum</i>	747.
<i>Oscillatoria</i> <i>Vauch.</i>	14.	<i>maculare</i>	747.
<i>Ostracococcum</i> <i>W.</i>	261.	<i>populinum</i>	746.
<i>graniforme</i>	261.	<i>speireum</i>	746.
<i>Ozonium</i> <i>Pers.</i>	155.	<i>Tragopogonis</i>	748.
<i>candidum</i> <i>N.</i>	155.	<i>Peziza</i> <i>L.</i>	448.
<i>castaneum</i> <i>W.</i>	155.	<i>Abietis</i> <i>P.</i>	505.
<i>flammeum</i> <i>W.</i>	156.	<i>Acetabulum</i>	508.
<i>stuposum</i>	156.	<i>acicularis</i> <i>Fr.</i>	448.
<i>Palmella</i> <i>Lyngb.</i>	5.	<i>acuum</i> <i>A. et Schw.</i>	456.
<i>Penicillium</i> <i>Lk.</i>	298.	<i>adhaerens</i> <i>W.</i>	480.
<i>candidum</i>	298.	<i>adpressa</i> <i>W.</i>	451.
<i>glaucum</i>	298.	<i>aeruginosa</i> <i>P.</i>	476.
<i>roseum</i>	298.	<i>albipes</i> <i>W.</i>	490.
<i>Perichaena</i> <i>Fr.</i>	843.	<i>allo-violascens</i>	455.
		<i>aleuritica</i> <i>W.</i>	488.
		<i>amentei</i> <i>B.</i>	472.
		<i>anomala</i> <i>P.</i>	491.

- | | | | |
|--------------------------------------|------|-------------------------------------|------|
| Peziza <i>L.</i> | 448. | Peziza <i>L.</i> | 448. |
| <i>applasata Fr.</i> | 502. | <i>clavicularis W.</i> | 477. |
| <i>Arenula A. Sch.</i> | 467. | <i>coecinea Bolt.</i> | 494. |
| <i>Arundinis Fr.</i> | 449. | <i>cochleata Huds.</i> | 504. |
| <i>strata P.</i> | 467. | <i>coccostigma W.</i> | 466. |
| <i>atro-virens P.</i> | 469. | <i>compressa P.</i> | 465. |
| <i>aurantia Oed.</i> | 505. | <i>conigena P.</i> | 472. |
| <i>aurea Fr.</i> | 478. | <i>convexula P.</i> | 499. |
| <i>aurelia P.</i> | 482. | <i>coronata Bull.</i> | 493. |
| <i>axillaris N.</i> | 468. | <i>corticalis P.</i> | 454. |
| <i>badia P.</i> | 503. | <i>crassipes W.</i> | 489. |
| <i>herbata Kz.</i> | 453. | <i>cruenta</i> | 454. |
| <i>Berberidis P.</i> | 450. | <i>cupularis</i> | 502. |
| <i>bicolor Bull.</i> | 455. | <i>cyathiformis W.</i> | 488. |
| <i>bolaris B.</i> | 490. | <i>cyathoidea Bull.</i> | 492. |
| <i>brunnea A. Schw.</i> | 463. | <i>Cyathus N.</i> | 487. |
| <i>Buccina P.</i> | 477. | <i>decipiens W.</i> | 466. |
| <i>Cacaliae Fr.</i> | 476. | <i>decolorans W.</i> | 490. |
| <i>caesia P.</i> | 479. | <i>dentata P.</i> | 486. |
| <i>calycina P.</i> | 458. | <i>dilutella Fr.</i> | 468. |
| <i>Campanula N.</i> | 491. | <i>dimorpha W.</i> | 501. |
| <i>carbonaria A. Schw.</i> | 504. | <i>discolor P.</i> | 476. |
| <i>carneo-rufa M.</i> | 462. | <i>dispersa W.</i> | 469. |
| <i>Catinus Holmsk.</i> | 507. | <i>divaricicolor Fr.</i> | 460. |
| <i>Caucus Reb.</i> | 477. | <i>elatina A. Schw.</i> | 490. |
| <i>caulicola Fr.</i> | 456. | <i>epiblastematica W.</i> | 464. |
| <i>ceracella Fr.</i> | 487. | <i>epiphylla P.</i> | 471. |
| <i>Cerastiorum W.</i> | 465. | <i>episphaeria M.</i> | 452. |
| <i>cerea Sow.</i> | 506. | <i>erioloma Fr.</i> | 490. |
| <i>cerina P.</i> | 457. | <i>faginea P.</i> | 472. |
| <i>chionea Fr.</i> | 473. | <i>farinacea P.</i> | 488. |
| <i>chrysocoma Bull.</i> | 470. | <i>farinosa W.</i> | 454. |
| <i>chrysostigma Fr.</i> | 471. | <i>ferruginea Sch.</i> | 474. |
| <i>ciliaris Schr.</i> | 459. | <i>fibrosa W.</i> | 498. |
| <i>cincta Fr.</i> | 459. | <i>fibrillosa W.</i> | 479. |
| <i>cinerea B.</i> | 482. | <i>fimetaria Fr.</i> | 477. |
| <i>citrina B.</i> | 474. | <i>flammea A. Schw.</i> | 458. |
| <i>clandestina P.</i> | 457. | <i>flavo-fuliginea</i> | 452. |

Peziza <i>L.</i>	448.	Peziza <i>L.</i>	448.
fulgens <i>P.</i>	496.	lutescens <i>P.</i>	474.
fusca <i>P.</i>	483.	lycoperdoides <i>DC.</i> .	506.
fuscescens <i>P.</i>	456.	Macropus <i>P.</i>	498.
fusco-atra <i>Reb.</i>	463.	macrospora <i>W.</i>	500.
fusco-cana <i>A. Schw.</i> .	485.	Marsupiam <i>P.</i>	506.
gemmata <i>Schw.</i>	496.	melanoloma <i>A. Schw.</i> .	462.
gemmifera <i>W.</i>	496.	melanophaea <i>Kz.</i>	466.
granulata <i>B.</i>	496.	melaxautha <i>Fr.</i>	466.
haemaites <i>W.</i>	472.	mespiliformis <i>W.</i>	503.
hemiasphaerica <i>Wigg.</i> .	464.	micacea <i>P.</i>	450.
hepatica <i>B.</i>	500.	Micropus <i>P.</i>	497.
herbarum <i>P.</i>	473.	microscopica <i>W.</i>	471.
hirta <i>Schum.</i>	463.	microstoma <i>W.</i>	495.
hispida <i>Schr.</i>	453.	miliaris <i>W.</i>	499.
humosa <i>Fr.</i>	500.	Nidulus <i>Kz.</i>	450.
hyalina <i>P.</i>	451.	Nigrella <i>P.</i>	484.
Hypuorum <i>Fr.</i>	467.	nigripes <i>P.</i>	475.
hypocrateriformis <i>P.</i> .	498.	nivea <i>Fr.</i>	459.
janthina <i>Fr.</i>	476.	olivacea <i>P.</i>	469.
imberbis <i>Bull.</i>	472.	omphalodes <i>Bull.</i>	482.
infixa <i>W.</i>	470.	onotica <i>P.</i>	504.
inflexa <i>Bolt.</i>	493.	pallescens <i>P.</i>	473.
Infundibulum <i>B.</i> . . .	475.	papillaris <i>Bull.</i>	495.
Jungermanniae <i>N.</i> . . .	468.	papillosa <i>Reich.</i>	496.
Kneiffii <i>W.</i>	488.	patula <i>P.</i>	459.
lacustris <i>Fr.</i>	467.	Persoonii <i>Moug.</i>	489.
Lancicula <i>Reb.</i>	501.	phaeoloma <i>W.</i>	463.
lateritia <i>P.</i>	484.	Pineti <i>B.</i>	452.
Ledi <i>A. Schw.</i>	488.	pithya <i>P.</i>	458.
lenticularis <i>Bull.</i> . . .	475.	Platani <i>P.</i>	451.
leporina <i>B.</i>	505.	poriaeformis <i>DC.</i>	481.
leucoloma <i>P.</i>	500.	poroides <i>A. Schw.</i>	480.
leucotricha <i>A. Schw.</i> .	468.	proboscidea <i>W.</i>	459.
limbata <i>W.</i>	470.	pruinosa <i>W.</i>	487.
litorea <i>Fr.</i>	489.	Pteridis <i>A. Schw.</i>	495.
Lonicerae <i>A. Schw.</i> .	479.	punctiformis <i>Fr.</i>	449.
luteola <i>Fr.</i>	480.	purpurascens <i>P.</i>	502.

- | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------|
| Peziza L. | 448. | Peziza L. | 448. |
| <i>purpurea</i> Fr. | 507. | <i>tentaculata</i> W. | 460. |
| <i>pustulata</i> P. | 502. | <i>theleboloides</i> A. Schr. | 461. |
| <i>pyriformis</i> P. | 489. | <i>thelephora</i> W. | 503. |
| <i>Rapulum</i> Bull. | 508. | <i>torva</i> W. | 456. |
| <i>relicina</i> Fr. | 551. | <i>tubaeformis</i> W. | 492. |
| <i>repanda</i> P. | 506. | <i>tuberosa</i> Bull. | 508. |
| <i>Resinae</i> Fr. | 466. | <i>tumida</i> B. | 454. |
| <i>rhizopus</i> A. Schw. | 485. | <i>uda</i> P. | 439. |
| <i>rouida</i> W. | 457. | <i>umbrosa</i> Schr. | 495. |
| <i>rubella</i> P. | 469. | <i>varia</i> Fr. | 507. |
| <i>rubiginosa</i> P. | 497. | <i>variecolor</i> Fr. | 452. |
| <i>rubricosa</i> Fr. | 499. | <i>velutina</i> W. | 437. |
| <i>rufo-olivacea</i> A. Schw. | 453. | <i>venosa</i> P. | 504. |
| <i>ratilans</i> Fr. | 500. | <i>verrusosa</i> P. | 497. |
| <i>Salicella</i> Fr. | 473. | <i>versiformis</i> P. | 476. |
| <i>sanguinea</i> P. | 480. | <i>villosa</i> P. | 450. |
| <i>sanguinolenta</i> A. | 487. | <i>vinosa</i> A. Schw. | 469. |
| <i>saniosa</i> Sch. | 501. | <i>violacea</i> P. | 502. |
| <i>Schenkii</i> B. | 459. | <i>virgiuea</i> B. | 459. |
| <i>scatellata</i> | 452. | <i>virgultorum</i> Wigg. | 494. |
| <i>scutelliformis</i> W. | 484. | <i>viridans</i> P. | 468. |
| <i>scutula</i> P. | 474. | <i>viridula</i> Schr. | 458. |
| <i>acyphiformis</i> W. | 491. | <i>vulgaris</i> Fr. | 463. |
| <i>sepulchralis</i> Reb. | 497. | <i>xanthomela</i> P. | 499. |
| <i>sericea</i> A. Schw. | 457. | Phacidium Fr. | 413. |
| <i>aerotina</i> P. | 474. | <i>abietioum</i> Schm. | 415. |
| <i>setosa</i> N. | 461. | <i>arundinaceum</i> Kz. | 413. |
| <i>spadicea</i> P. | 453. | <i>carbonaceum</i> | 416. |
| <i>sphaerocephala</i> W. | 456. | <i>coronatum</i> Fr. | 414. |
| <i>sthenostoma</i> M. | 485. | <i>dentatum</i> Schm. | 413. |
| <i>stercorea</i> P. | 461. | <i>fimbriatum</i> Schm. | 414. |
| <i>striata</i> N. | 492. | <i>lacerum</i> | 415. |
| <i>striatula</i> W. | 457. | <i>Ledi</i> | 415. |
| <i>strigosa</i> Fr. | 451. | <i>pulverulentum</i> Schw. | 416. |
| <i>sulcata</i> P. | 507. | <i>punctiforme</i> W. | 413. |
| <i>sulfurea</i> Fr. | 450. | <i>quadratum</i> Schm. | 415. |
| <i>syringea</i> W. | 455. | <i>repandum</i> Fr. | 414. |

- Phacidium Fr.** 413.
Rubi Fr. 414.
Taxi Schm. 415.
valvatum Schm. 416.
- Phacorrhiza Pers.** 146.
- Phallus L.** 556.
caninus Timm. 556.
impudicus 556.
- Phibalis W.** 446.
ampliata 447.
bicolor 446.
farinacea 446.
fascicularis 446.
fissa 447.
furfuracea 447.
glabra 447.
pulveracea 446.
- Phlebia Fr.** 621.
merismoides 622.
radiata 622.
vaga 622.
- Phlebomorpha P.** 620.
- Phloeospora W.** 176.
Oxyacanthae 176.
Ulmii 177.
- Phlyctidium W.** 417.
Crataegi 418.
Empetri 418.
Gentianae 419.
Heraclei 419.
melanophaeum 419.
nervisequum 420.
nitidum 418.
Padi 417.
Ranunculi 420.
Rosae 417.
- Phlyctidium W.** 417.
Rubi 419.
Saniculae 419.
Solidaginis 419.
sphaeroides 418.
- Phoma Fr.** 745.
areolata W. 745.
pustulata 745.
salina 745.
- Phragmidium Lk.** 187.
asperum W. 183.
bulbosum Schl. 189.
incrassatum L. 188.
intermedium 188.
mucronatum 187.
obtusum 188.
Poterii W. 188.
- Phragmotrichum** 280.
Chailletii 280.
- Phycomyces Kz.** 316.
nitens 316.
- Phyllacteria Pers.** 561.
- Phyllospadix Fr.** 130.
- Phyllona Wigg.** 69.
purpurea W. 69.
- Phyllosticta Pers.** 766.
- Physarum Pers.** 348.
alatum Fr. 355.
albipes Lk. 356.
album Fr. 349.
aureum 356.
bullatum Ditm. 353.
cancellatum W. 351.
colombinum 353.
coronatum Sch. 352.
compressum A. Sch. 355.

- Physarum Pers.** 348.
confluens 349.
conglobatum Ditm. 350.
fimicarium Schum. 352.
flavum Fr. 353.
furfuraceum 469.
gracilentum Fr. 354.
hyalinum 351.
leucophaeum Fr. 354.
Licea Fr. 360.
muscicola 352.
nigrum Fr. 349.
nutans 356.
Pini Sch. 355.
psittacinum Ditm. 354.
rubiginosum Chev. 352.
sinuosum Fr. 349.
striatum Fr. 365.
subnatum Schum. 354.
sulphureum A. Schw. 353.
thejoteum Fr. 351.
utriculare W. 351.
virescens Ditm. 350.
Physoderma W. 192.
gibbosum 192.
maculare 192.
pulposum 192.
Pilobolus Tod. 318.
crystallinus 318.
Pilophora W. 332.
agaricina 333.
rrorida 332.
Pisocarpium Lk. 872.
Pisolithus A. Schw. 872.
Pistillaria Fr. 528.
micans 529.
Pistillaria Fr. 528.
muscicola 528.
ovata 529.
pusilla 528.
quisquiliaris 529.
Placuntium Ehrb. 409.
Plegmatium Fr. 148.
ebeneum W. 150.
fulvum 149.
muscicola 149.
olivaceum W. 149.
Pteridis 150.
saxicola W. 149.
Podisoma Lk. 230.
clavariaeforme 231.
fuscum Dub. 230.
Polyactis Lk. 317. 295.
Polyangium Lk. 869.
vitellinum 869.
Polyides Ag. 89.
aculeatus 89.
ligulatus 90.
Polymorpha Stackh. 89.
Polymorphum Chv. 439.
Polymorphus Nmb. 517.
Polypera Ficin. 872.
Polyporus Fr. 580.
adustus Fr. 594.
alligatus 593.
amorphus 596.
applanatus W. 591.
arcularius 603.
betulinus 593.
bicolor W. 583.
brumalis 602.

Polyporus Fr.	. 580.	Polyporus Fr.	. 580.
caesius	593.	nigripes <i>W.</i>	598
candidus <i>W.</i>	597.	nitidus	583.
Cerasi	582.	numularius <i>W.</i>	601.
cinnabarinus	595.	obliquus	583.
confluens	600.	officinalis	596.
contiguus	584.	perecanis	601.
crispus	594.	Pinicola	590.
cristatus	599.	planus <i>W.</i>	602.
croceus	596.	populinus	590.
cryptarum	604.	radiatus	587.
cuticularis	589.	Radula	581.
debilis <i>W.</i>	600.	resinosus	590.
destructor	593.	reticulatus	580.
dryadeus	591.	rosens	595.
eburneus <i>W.</i>	599.	rabiginosus <i>W.</i>	587.
ferruginosus	584.	rufus	583.
fomentarius	591.	rutilans	596.
fragilis	592.	Schweinizii	603.
frondosus	600.	squamulos	599.
fuligineus	601.	stypticus	592.
fumosus	590.	suaveolens	589.
giganteus	600.	subsquamulos	603.
gilvus	588.	sulfurens	597.
hispidus	596.	terrestris	580.
igniarius	592.	umbellatus	603.
imbricatus	597.	vaporarius	582.
incarnatus	583.	varius	598.
leptocephalus	601.	versicolor	584.
lucidus	598.	violaceus	583.
Medulla panis	582.	vitreus	582.
melanopus	602.	vulgaris	582.
micana	581.		
mollis	592.		
molluscus	581.		
mucidus	582.		
Neesii	584.		
nidulans	595.		
		Polysaccum Desp.	. 872.
		erasipes	872.
		acaule <i>DC.</i>	872.
		Polysiphonia Grev.	. 81.
		allochroa <i>W.</i>	82.

- Polysiphonia** *Grev.* 81.
atrosanguinea 83.
bryoides 82.
elongata *Spr.* 83.
fastigiata 84.
fibrillosa *Spr.* 81.
hirantia *W.* 85.
nigrescens *W.* 84.
stricta 81.
urceolata 82.
- Polysperma** *Vauch.* 33.
- Polythrincium** *Kz.* 161.
Trifolii 161.
- Poria** *Scop.* 580.
- Poronia** *Willd.* 856.
- Porothelium** *Fr.* 580.
- Porphyra** *Ag.* 69.
- Prolifera** *V.* 22. 37.
- Prosthemium** *Kz.* 229.
betulinum 229.
- Protonema** *Ag.* 114.
- Puccinia** *Pers.* 218.
Acerum *Lk.* 220.
Adoxae *DC.* 220.
annularis *Röhl.* 223.
Asari *Kz.* 220.
Buxi *DC.* 222.
Calthae *Lk.* 221.
Caryophyllearum *W.* 224.
Circaeae 224.
clavuligera *W.* 222.
conglomerata *Kz.* 222.
Dianthi *DC.* 224.
Discoidearum *Lk.* 222.
fusca *W.* 220.
- Puccinia** *Pers.* 218.
Graminis 225.
inquinans *W.* 218.
Thessii *Chaill.* 221.
Tripolii *W.* 223.
- Pyrenium** *Tod.* 862.
ligeorum *W.* 862.
terrestris *Tod.* 862.
- Rhabdium** *W.* 116.
obtusum 116.
cuneatum 116.
- Rhacodium** *Pers.* 169.
aterimum *Ehrenb.* 170.
cellare 169.
pithyophilum *W.* 170.
rabiginosum *Fr.* 170.
- Ramaria** *Holmsk.* 541.
- Reticularia** *Bull.* 337.
atra *Fr.* 337.
flavo-fusca *Fr.* 339.
maxima *Fr.* 337.
muscorum *Fr.* 339.
olivacea *Fr.* 339.
plumbea *Fr.* 338.
testacea *W.* 340.
umbrina *Fr.* 338.
versicolor *Fr.* 339.
- Rhizina** *Fr.* 559.
laevigata 560.
undulata 560.
- Rhizoctonia** *DC.* 144.
- Rhizomorpha** *Rth.* 172.
chordalis *Ach.* 174.
divergens *Grev.* 173.
fusca *Nestl.* 174.

<i>Rhizomorpha Rth.</i>	172.	<i>Sclerococcum Fr.</i>	261.
<i>Humboldtiæ W.</i>	174.		
<i>subcorticalis</i>	173.		
<i>subterranea P.</i>	172.		
<i>tuberculosa Ach.</i>	172.		
<i>Rhipidium W.</i>	742.		
<i>stypticum</i>	742.		
<i>Rhizophorus Ehrenb.</i>	485.		
<i>Rhodomela Ag.</i>	86.		
<i>subfusca</i>	86.		
<i>volubilis</i>	86.		
<i>Rhytidia Fr.</i>	409.		
<i>Rivularia Roth</i>	8.		
<i>angulosa</i>	9.		
<i>atra</i>	9.		
<i>elegans</i>	10.		
<i>Schwabeana W.</i>	9.		
<i>Roestelia Reb.</i>	260.		
<i>Rubigo Lk.</i>	128.		
 <i>Salmacis Bory</i>	47.		
<i>Sarcopodium Ehb.</i>	229.		
<i>circinatum</i>	229.		
<i>Sargassum Ag.</i>	100.		
<i>bacciferum</i>	100.		
<i>Scaphophorum E.</i>	743.		
<i>agaricoides</i>	743.		
<i>Schizoderma Ehrb.</i>	190.		
<i>filicinum</i>	190.		
<i>nervisequum Dub.</i>	190.		
<i>scirpinum</i>	190.		
<i>Schizonema Ag.</i>	53.		
<i>Schizophyllum Fr.</i>	743.		
		<i>Scleroderma Pers.</i>	403.
		<i>areolatum Ehrenb.</i>	404.
		<i>Bovista Fr.</i>	405.
		<i>macrorrhizum W.</i>	404.
		<i>verrucosum</i>	404.
		<i>vulgare</i>	403.
		<i>Sclerotium Tod.</i>	137.
		<i>atro-virens Schm.</i>	143.
		<i>Brassicæ P.</i>	137.
		<i>bryophilum W.</i>	144.
		<i>bullatum DC.</i>	138.
		<i>byssisedum W.</i>	142.
		<i>Clavus DC.</i>	145.
		<i>compactum DC.</i>	138.
		<i>complanatum</i>	144.
		<i>Conii Dub.</i>	139.
		<i>durum P.</i>	138.
		<i>fulvum Fr.</i>	140.
		<i>fongorum P.</i>	143.
		<i>fuscum W.</i>	140.
		<i>immersum DC.</i>	140.
		<i>inclusum Ks.</i>	139.
		<i>laetum Ehrenb.</i>	140.
		<i>Maydis DC.</i>	139.
		<i>muscorum P.</i>	143.
		<i>nervale Fr.</i>	137.
		<i>palliolatum Fr.</i>	139.
		<i>pezizaeforme Sch.</i>	141.
		<i>Pustula DC.</i>	137.
		<i>pyrinum Fr.</i>	138.
		<i>radicatum</i>	142.
		<i>roseum Kneiff.</i>	145.
		<i>sanguineum Fr.</i>	139.
		<i>acutellatum A. Schu.</i>	141.
		<i>Semen</i>	141.
		<i>stercorarium DC.</i>	140.

- Sclerotium** *Tod.* 137.
 . *stipatum Fr.* 142.
 . *strobilinum Schm.* . 142.
 . *tectum Fr.* 143.
 . *truncorum Fr.* 143.
 . *undum Fr.* 140.
 . *vaporarium A. Schw.* 144.
 . *variegatum W.* 189.
 . *varium P.* 142.
 . *vulgatum Fr.* 140.
- Scolicotrichum** *Kz.* 285.
 . *virescens* 285.
- Scytonema** *Ag.* 55.
 . *comoides* 56.
 . *Kneiffii W.* 56.
 . *myochrous Ag.* 55.
 . *velutinum W.* 56.
- Scytosiphon** *Ag.* 63.
 . *clathratus Lyngb.* . . 65.
 . *compressus Lyngb.* . . 64.
 . *foeniculaceus* 66.
 . *intestinalis Lyngb.* . . 63.
 . *Jürgensii Ag.* 66.
 . *percursus W.* 66.
 . *uncinatus W.* 66.
- Seiridium** *N.* 187.
 . *marginatum* 187.
- Sepedonium** *Lk.* 272.
- Septoria** *Fr.* 177.
- Sistotrema** *Fr. em.* 621.
 . *confluens* 621.
- Solenia** *Hoffm.* 448.
 . *candida* 448.
 . *fasciculata* 448.
 . *ochracea* 448.
- Solenia** *Spr.* 7. 65.
- Sparassis** *Fr.* 533.
 . *crispa* 534.
- Spathularia** *Pers.* 533.
 . *flavida* 533.
 . *rufa N.* 533.
- Spermatodermia** *T.* 262.
 . *clandestina* 262.
- Spermoedia** *Fr.* 145.
- Sphacaelia** *Leveill.* 145.
- Sphaelaria** *Lyngb.* 75.
 . *cirrhosa* 75.
- Sphaeria** *Hall.* 765.
 . *Abietis Fr.* 825.
 . *abjecta W.* 810.
 . *abstrusa W.* 806.
 . *acclinis Fr.* 819.
 . *acerua W.* 770.
 . *acervalis Moug.* . . . 838.
 . *acicularis W.* 802.
 . *acinosa B.* 797.
 . *acuta Hoffm.* 807.
 . *Aegopodii Pers.* 769.
 . *Aethiops W.* 818.
 . *Agaricola Chaill.* . . . 774.
 . *albicans Pers.* 784.
 . *alutacea Pers.* 858.
 . *ambiens Pers.* 828.
 . *amoena N.* 802.
 . *Amorphae W.* 781.
 . *analepta W.* 773.
 . *Anethi Pers.* 815.
 . *angulata Fr.* 828.
 . *angustata Pers.* 799.
 . *anomia Fr.* 831.
 . *anserina Pers.* 786.
 . *apiculata W.* 778.

<i>Sphaeria Hall.</i>	765.	<i>Sphaeria Hall.</i>	765.
<i>Aquila</i>	835.	<i>caulincola W.</i>	770.
<i>araneosa Pers.</i>	795.	<i>caulium Fr.</i>	799.
<i>arundinacea Sow.</i>	815.	<i>cellulosa W.</i>	815.
<i>Arundinis Fr.</i>	799.	<i>ceratina W.</i>	831.
<i>Asteroma Fr.</i>	810.	<i>ceratosperma P.</i>	832.
<i>atomaria JV.</i>	772.	<i>ceuthocarpa Fr.</i>	812.
<i>atro-nitens Holl.</i>	816.	<i>chartarum W.</i>	773.
<i>atro-rubens W.</i>	804.	<i>chionea Fr.</i>	874.
<i>aurantia Pers.</i>	834.	<i>chaumatica W.</i>	837.
<i>Aurantium W.</i>	789.	<i>chrysitis W.</i>	841.
<i>Aurora Fr.</i>	840.	<i>ciliata Pers.</i>	826.
<i>auricoma JV.</i>	796.	<i>ciliatula Fr.</i>	822.
<i>Avellanae Pers.</i>	804.	<i>cincta Fr.</i>	829.
<i>baccata W.</i>	838.	<i>cinerea Pers.</i>	835.
<i>barbara Fr.</i>	798.	<i>circumscripta Kz.</i>	827.
<i>barbata Pers.</i>	804.	<i>cirrhosa Pers.</i>	800.
<i>Bardanae W.</i>	805.	<i>Cistula W.</i>	798.
<i>basitrichia W.</i>	795.	<i>citrina Pers.</i>	851.
<i>Berberidis P.</i>	798.	<i>Citrum W.</i>	788.
<i>biformis P.</i>	801.	<i>clandestina Fr.</i>	826.
<i>bifrons Schm. Kz.</i>	811.	<i>clypeata N.</i>	783.
<i>Bombarda B.</i>	792.	<i>coccinea Pers.</i>	840.
<i>botryosa Fr.</i>	852.	<i>coenosa Fr.</i>	811.
<i>brachystoma W.</i>	806.	<i>comata Tod.</i>	794.
<i>Brassicacecola Fr.</i>	767.	<i>complicata W.</i>	787.
<i>bulbosa Pers.</i>	858.	<i>compressa P.</i>	799.
<i>bullata Ehrh.</i>	848.	<i>concentrica Tod.</i>	855.
<i>Buxicola Fr.</i>	768.	<i>confluens Tod.</i>	852.
<i>byssiseda Tod.</i>	835.	<i>conglomerata W.</i>	814.
<i>calva Tod.</i>	795.	<i>conglobata Fr.</i>	839.
<i>canescens Pers.</i>	795.	<i>congregata W.</i>	786.
<i>capitata Pers.</i>	859.	<i>conigena Dub.</i>	797.
<i>capsularis Pers.</i>	828.	<i>conjuncta Fr.</i>	819.
<i>Carduorum W.</i>	805.	<i>contexta W.</i>	838.
<i>Carpini Hoffm.</i>	830.	<i>convergens Tod.</i>	819.
<i>carpophila Pers.</i>	857.	<i>coprophila Fr.</i>	852.
<i>Castaneaccola Fr.</i>	768.	<i>Corni Sow.</i>	777.

<i>Sphaeria Hall.</i> . . .	765.	<i>Sphaeria Hall.</i> . . .	765.
<i>Cornicola DC.</i> . . .	767.	<i>dolosa Fr.</i>	823.
<i>corniculata Ehrh.</i> . . .	830.	<i>Dothidea Mgt.</i>	817.
<i>coronata H.</i>	821.	<i>dryina Pers.</i>	836.
<i>corticis Fr.</i>	785.	<i>duplex Sow.</i>	776.
<i>corylaria DC.</i>	770.	<i>elliptica W.</i>	773.
<i>Coryli B.</i>	817.	<i>elongata Fr.</i>	834.
<i>crassicollis W.</i>	807.	<i>Empetri Fr.</i>	771.
<i>erinita Pers.</i>	795.	<i>enteroleuca Fr.</i>	831.
<i>crispans Pers.</i>	769.	<i>epicymatia W.</i>	775.
<i>eristata Pers.</i>	799.	<i>Epilobii Ch.</i>	771.
<i>eruentea Hz.</i>	769.	<i>epimyces Fr.</i>	774.
<i>cubicularis Fr.</i>	826.	<i>episphaeria Tod.</i>	788.
<i>Cucurbitacearum</i>	774.	<i>Eremita Reb.</i>	783.
<i>Cucurbitala P.</i>	840.	<i>Eryngii Fr.</i>	774.
<i>culmifraga Fr.</i>	778.	<i>eructans W.</i>	781.
<i>culmorum W.</i>	770.	<i>erythrella W.</i>	794.
<i>cupularia Fr.</i>	856.	<i>erythrostoma P.</i>	802.
<i>curva W.</i>	803.	<i>eudomia Fr.</i>	786.
<i>ensipidata Fr.</i>	808.	<i>eustoma Fr.</i>	776.
<i>decedens Fr.</i>	785.	<i>excipuliformis Fr.</i>	800.
<i>decolorans P.</i>	841.	<i>exilis A. Schw.</i>	793.
<i>decora W.</i>	842.	<i>fascicularia W.</i>	832.
<i>decorticans Fr.</i>	825.	<i>favacea Fr.</i>	849.
<i>decumbens Schm.</i>	820.	<i>ferruginea P.</i>	832.
<i>delitescens W.</i>	777.	<i>fibrosa P.</i>	830.
<i>dendritica W.</i>	809.	<i>filicina Fr.</i>	811.
<i>denigrata W.</i>	811.	<i>filiformis A. et Schw.</i>	856.
<i>deplauata N.</i>	924.	<i>fimbriata P.</i>	818.
<i>detruse Fr.</i>	832.	<i>fissa P.</i>	779.
<i>deusta Hoffm.</i>	852.	<i>flacca W.</i>	838.
<i>diatrypa Fr.</i>	829.	<i>flavescens Fr.</i>	834.
<i>digitata Pers.</i>	858.	<i>flavo-virens P.</i>	844.
<i>dimorpha W.</i>	825.	<i>foveolaris Fr.</i>	777.
<i>disciformis H.</i>	847.	<i>Fragariaecola W.</i>	767.
<i>dissepta Fr.</i>	827.	<i>fragiformis P.</i>	855.
<i>ditopa Fr.</i>	785.	<i>friabilis P.</i>	847.
<i>Doliolum Pers.</i>	805.	<i>Friesii Dub.</i>	822.

<i>Sphaeria Hall.</i>	765.	<i>Sphaeria Hall.</i>	765.
frondicola Fr.	768.	laeviformis Fr.	848.
fusca P.	854.	larvata Fr.	793.
gastrina Fr.	831.	lata P.	843.
gelatinosa T.	850.	lateritia P.	851.
Gentianaecola Fr.	767.	leguminum W.	771.
geographica DC.	809.	leiphaemia Fr.	824.
Gorani Fr.	771.	lenta Tod.	849.
glaucina Fr.	798.	leptidea Fr.	771.
Gnomon Tod.	803.	leucopis Fr.	824.
Graminis P.	811.	leucostoma P.	829.
Graeatum W.	789.	libera Tod.	800.
Grossulariae Fr.	802.	limitata P.	783.
Hederae Fr.	772.	lineata A. Schm.	842.
Helicis W.	770.	Lingam Tod.	805.
herbarum P.	779.	Linnaeæ Ehrenb.	769.
Hericium W.	800.	Lirella Moug.	812.
herpotricha Fr.	794.	livida Pers.	791.
hiaus W.	775.	liribia Fr.	825.
Himantinae Fr.	810.	longissima P.	816.
hirta Fr.	793.	Lonicerae Sow.	780.
hispida Tod.	796.	lucifuga Jungh.	837.
horridula W.	796.	lutea A. et Schm.	837.
hypodermia Fr.	820.	macrostoma Fr.	800.
Hypoxyton P.	857.	maculata W.	782.
hysterina W.	797.	macularia Fr.	814.
Hystrix Tod.	832.	Mamma W.	784.
infasciens W.	806.	marginata W.	770.
infernalis Kz.	834.	medullaris W.	792.
inqüilina W.	779.	melaena Fr.	811.
inquinans T.	781.	melanostoma Fr.	829.
insitiva T.	843.	melanostyla DC.	805.
insularis W.	814.	Melogramma P.	843.
Junci Fr.	813.	microscopica Fr.	804.
Kunzei Fr.	828.	microstoma P.	828.
Laburni P.	840.	microthelia W.	788.
lagenaria P.	837.	Micula Fr.	779.
lanata Fr.	793.	militaris Ehrenb.	869.

<i>Sphaeria Hall.</i>	.	765.	<i>Sphaeria Hall.</i>	.	765.
<i>mobilis Tod.</i>	...	788.	<i>Pini Kz.</i>	...	825.
<i>moriformis Tod.</i>	...	791.	<i>pithyophila Kz.</i>	...	839.
<i>mucosa P.</i>	...	774.	<i>pleurostoma Kz.</i>	...	807.
<i>mutabilis P.</i>	...	797.	<i>Podagrariae Rth.</i>	...	816.
<i>mycophila Fr.</i>	...	787.	<i>polita Schub.</i>	...	811.
<i>myriocarpa Fr.</i>	...	787.	<i>polymorpha P.</i>	...	858.
<i>naucosa Fr.</i>	...	839.	<i>polytricha W.</i>	...	794.
<i>nervisequia DC.</i>	...	802.	<i>pomiformis P.</i>	...	792.
<i>nitrosa W.</i>	...	789.	<i>populina P.</i>	...	838.
<i>nivea Hoffm.</i>	...	829.	<i>Poronia P.</i>	...	856.
<i>Nucula Fr.</i>	...	791.	<i>prorampens JV.</i>	...	780.
<i>nummularia DC.</i>	...	853.	<i>protracta P.</i>	...	780.
<i>obducens Schum.</i>	...	790.	<i>pruinosa Fr.</i>	...	785.
<i>ocellata P.</i>	...	786.	<i>Prunastri P.</i>	...	833.
<i>ochracea Wahleb.</i>	...	847.	<i>pulchella P.</i>	...	822.
<i>Oedema Fr.</i>	...	814.	<i>pulicaris Fr.</i>	...	838.
<i>ooidea Fr.</i>	...	790.	<i>pulveracea Ehrh.</i>	...	788.
<i>operculata P.</i>	...	791.	<i>Polvis pyrius P.</i>	...	790.
<i>operta Schm.</i>	...	821.	<i>punctiformis P.</i>	...	772.
<i>ophioglossoides P.</i>	...	859.	<i>pungens JV.</i>	...	813.
<i>oppilata Fr.</i>	...	798.	<i>punicia Schm.</i>	...	839.
<i>orthoceras Fr.</i>	...	806.	<i>pusilla P.</i>	...	818.
<i>Ostrathii Fr.</i>	...	769.	<i>putaminum Fr.</i>	...	806.
<i>ovina P.</i>	...	796.	<i>Pyrolae Ehrenb.</i>	...	768.
<i>papillata Schum.</i>	...	783.	<i>quaternata P.</i>	...	820.
<i>parallelia Fr.</i>	...	842.	<i>Quercicola JV.</i>	...	768.
<i>patellaris W.</i>	...	783.	<i>quercina P.</i>	...	847.
<i>Penicillus Schm.</i>	...	807.	<i>radiata W.</i>	...	772.
<i>petagona P.</i>	...	821.	<i>Radula P.</i>	...	827.
<i>Personoii W.</i>	...	821.	<i>redimita JV.</i>	...	805.
<i>pertusa P.</i>	...	782.	<i>Resinæ Fr.</i>	...	789.
<i>Peziza Tod.</i>	...	789.	<i>reticulata DC.</i>	...	809.
<i>picea P.</i>	...	811.	<i>Rhacodium P.</i>	...	836.
<i>pileata P.</i>	...	800.	<i>Rhamni N.</i>	...	791.
<i>pilosa P.</i>	...	796.	<i>rhodostoma A. Schm.</i>	...	786.
<i>pilulifera Ks.</i>	...	850.	<i>Ribesia P.</i>	...	847.
<i>Pinastri DC.</i>	...	776.	<i>Ribis Tod.</i>	...	840.

<i>Sphaeria Hall.</i>	765.	<i>Sphaeria Hall.</i>	765.
<i>rimosa A. et Schw.</i>	812.	<i>spinosa P.</i>	845.
<i>rosea P.</i>	851.	<i>spurca W.</i>	780.
<i>rostellata Fr.</i>	808.	<i>stellaria P.</i>	810.
<i>rostrata P.</i>	808.	<i>stemmatea Fr.</i>	769.
<i>rubella P.</i>	806.	<i>stercorea Sow.</i>	790.
<i>rugosa W.</i>	780.	<i>stercoris DC.</i>	775.
<i>rubiformis P.</i>	854.	<i>stenograpta W.</i>	775.
<i>rubiginosa P.</i> *	853.	<i>Stigma H.</i>	844.
<i>rubra Fr.</i>	846.	<i>stigmatella W.</i>	786.
<i>rubricosa Fr.</i>	854.	<i>stilbostoma Fr.</i>	823.
<i>rudis Fr.</i>	793.	<i>Stilbum Schm.</i>	836.
<i>rufa P.</i>	851.	<i>stipata Pr.</i>	770.
<i>Rusei W.</i>	776.	<i>striaeformis Fr.</i>	814.
<i>salicina P.</i>	824.	<i>stricta P.</i>	808.
<i>sanguinea Tod.</i>	788.	<i>strigosa A. et Schw.</i>	795.
<i>sanguinolenta W.</i>	801.	<i>Strumella Fr.</i>	821.
<i>sarmentorum Fr.</i>	777.	<i>stuppea W.</i>	857.
<i>scabrosa DC.</i>	845.	<i>subscripta Fr.</i>	815.
<i>scutellata P.</i>	828.	<i>succentriata T.</i>	849.
<i>seminuda P.</i>	784.	<i>succincta W.</i>	782.
<i>sepincola Fr.</i>	778.	<i>taffulta N.</i>	808.
<i>sentia Fr.</i>	775.	<i>Surculi Fr.</i>	787.
<i>serpens P.</i>	853.	<i>syncephala W.</i>	819.
<i>setacea P.</i>	802.	<i>syngenesia Fr.</i>	831.
<i>signata W.</i>	816.	<i>tessellata P.</i>	827.
<i>sinopica Fr.</i>	840.	<i>tessera Fr.</i>	823.
<i>socialis Kz.</i>	819.	<i>thoracella Rutstr.</i>	811.
<i>Solani P.</i>	804.	<i>Tiliae P.</i>	784.
<i>Sorbi Schm.</i>	833.	<i>tortuosa Fr.</i>	826.
<i>sordida P.</i>	848.	<i>Tremulaecola Fr.</i>	768.
<i>sparsa W.</i>	772.	<i>trichoderma Hoffm.</i>	836.
<i>Spartii N.</i>	780.	<i>trichostoma W.</i>	807.
<i>spertooides Hoffm.</i>	790.	<i>Trifolii P.</i>	816.
<i>sphaerococca W.</i>	843.	<i>tristis Tod.</i>	835.
<i>Spinaciae Fr.</i>	767.	<i>tubaeformis Tod.</i>	803.
<i>spiculosa P.</i>	845.	<i>Tubulina A. Schw.</i>	855.
<i>spinifera W.</i>	845.	<i>tumida P.</i>	828.

- Sphaeria Hall.** . 765.
turgida P. 824.
typhina P. 850.
uda P. 853.
Ulmi Duo. 816.
umbilicata P. 819.
umbratilis Reb. 787.
undulata P. 845.
urceolata W. 783.
Vaccinii Sow. 841.
vagans Fr. 766.
varia P. 839.
vasculosa Fr. 820.
velata P. 845.
velutina W. 844.
ventricosa P. 800.
venulosa W. 809.
Vermicularia N. 794.
vernícosa DC. 809.
verruciformis E. 849.
vibratilis Fr. 785.
vilis Fr. 787.
Vincae Fr. 776.
violacea Schm. 835.
viridis A. et Schm. 834.
Visci DC. 778.
xantholeuca Kze. 793.
Xylostei P. 781.
- Sphaerobolus Tod.** 764.
stellatus 765.
tubulosus Fr. 765.
- Sphaerocarpus B.** 344.
- Sphaerococcus St.** 90.
Brodiaei Ag. 92.
coufervoides 90.
crispus 93.
membranifolius Ag. 92.
- Sphaerococcus St.** 90.
plicatus Ag. 91.
purpurascens Ag. 91.
- Sphaeronema Fr.** 761.
aciculare 763.
Acrospermum 762.
cladoniscum Fr. 762.
columnare W. 763.
conicum Fr. 763.
cylindricum Fr. 762.
hemisphaericum Fr. 761.
microscopicum W. 761.
parabolicum Fr. 762.
pistillare W. 762.
pyriforme 762.
semipellitum W. 763.
subulatum 763.
truncatum 761.
ventricosum 762.
- Sphaeroplea Ag.** . 55.
anodina 55.
- Sphaerotheca Dsv.** 247.
- Sphaerothrygium** 431.
arundinaceum W. 431.
discolor W. 431.
Ilicis W. 431.
- Sphaerozyga Ag.** .. 6.
flexuosa 7.
Jacobi 7.
mucoriformis 7.
- Sphondylocladium** 160
fumosum 161.
- Spicularia Pers.** 290.
- Spirogyra Lk.** . . . 48.

<i>Spongiocarpos</i> Grv.	89.	<i>Sporotrichum</i> Lk.	274.
<i>Sporidesmium</i> N.	228.	<i>merdarium</i> Ehrenb.	277.
atrum	228.	<i>minutum</i>	282.
olivaceum W.	228.	<i>mycocephalum</i>	279.
<i>Sporendonema</i> D.	272.	<i>obduceps</i>	275.
<i>Sporochnus</i> Ag.	27.	<i>ollare</i> P.	278.
<i>Sporodinia</i> Lk.	317.	<i>pannorum</i> W.	279.
candida W.	317.	<i>parietinum</i>	282.
carnea Ehrenb.	317.	<i>Pellicula</i> Lk.	276.
grandis	317.	<i>scotophilum</i>	278.
<i>Sporophleum</i> N.	163.	<i>stercorarium</i>	278.
<i>Sporotrichum</i> Lk.	274.	<i>tortuosum</i> W.	280.
agaricinum	277.	<i>virescens</i> Lk.	281.
aureum	279.	<i>vitellinum</i>	278.
<i>Boletorum</i> Ehrb.	275.	<i>Spumaria</i> Pers.	335.
bombacinum	281.	<i>alba</i> DC.	335.
byssinum	276.	<i>Stachylidium</i> Lk.	302.
calcigenum	282.	<i>bicolor</i>	302.
candidum	275.	<i>terrestre</i>	302.
chlorinum Lk.	281.	<i>Stegia</i> Fr.	431.
cinnamomeum W.	280.	<i>Stemonitis</i> Gled.	386.
coccineum W.	280.	<i>ferruginea</i> Ehrenb.	388.
collae	282.	<i>fusca</i> Roth	388.
croceum Kz.	279.	<i>oblongata</i> Fr.	387.
fructigenum P.	276.	<i>obtusata</i> Fr.	387.
fungorum	277.	<i>ovata</i> Pers.	387.
fuscum P.	281.	<i>papillata</i> Pers.	387.
griseum	282.	<i>physcoides</i> A. Sch.	387.
helvolum W.	280.	<i>Tubulina</i> A. Sch.	389.
inquinatum	277.	<i>typhoides</i> DC.	388.
laetum	278.	<i>violacea</i> Fr.	386.
lanatum W.	276.	<i>Stemphylium</i> W.	300.
lateritium Ehrenb.	279.	<i>botryosum</i>	300.
laxum N.	279.	<i>Stephanoma</i> W.	269.
lyococcum Ehrenb.	282.	<i>strigosum</i>	269.
		<i>Stereum</i> Lk.	561.

- Stictis Pers.** . . . 442.
arundinacea 444.
Betuli Fr. 443.
chrysophaea 445.
insculpta W. 442.
Lecanora Fr. 443.
ollaris W. 445.
pallida Pers. 443.
Pelvicula 443.
Pupula Fr. 444.
radiata 444.
stellata W. 444.
- Stilbospora Hoffm.** 173.
angustata Pers. 179.
macrosporoma P. 178.
- Stilbum Tod.** . . . 324.
aquigenam Reb. 327.
brevispes W. 326.
bulbosum 326.
byssisedum P. 324.
byssoides Spr. 327.
citrinum Pers. 327.
equinum Pers. 328.
erythrocephalum D. 325.
flave-virens Spr. 329.
hirustum Hoffm. 325.
hyalinum A. Schw. 326.
leciopus Ehrenb. 328.
luteum Pers. 328.
micropus Pers. 328.
mycophilum Pers. 328.
nanum Spr. 329.
pallens Spr. 328.
piliforme Pers. 327.
puberulum 325.
pusillum W. 326.
rigidum 327.
- Stilbum Tod.** . . . 324.
rubicundum 328.
setosum W. 329.
smaragdinum A. 329.
subulatum 329.
tenax Spr. 326.
tomentosum Schr. 325.
typhinum W. 330.
zanthocephalum D. 325.
- Strongylium Lk.** 338.
- Stylobasis Schwab.** 9.
- Syncoelium W.** . . . 151.
catenulatum 152.
- Synaphia N.** 6.
- Syncollesia N.** 6.
- Syzygites Ehrenb.** 318.
megalocarpus 318.
- Taphria Fr.** 126.
- Temachium W.** . . . 116.
hyemale 117.
pectinale 116.
striatulum 117.
- Tetraclonium Lk.** 185.
Tuberulariae 185.
- Tetraspora Desv.** . . . 7.
explanata Ag. 8.
gelatinosa 8.
lubrica Ag. 7.
- Thamnidium Lk.** 324.
- Thanatophyton Lk.** 144.
- Thelebolus P.** . . . 764.
lignatilis W. 764.

Thelebolus <i>P.</i>	764.
stercoreus	764.
terrestria	764.
Thelephora <i>Ehrh.</i>	561.
abietina <i>P.</i>	568.
amorpha <i>Fr.</i>	570.
<i>Avellanae</i> <i>Fr.</i>	568.
bicolor <i>P.</i>	572.
byssoides <i>P.</i>	576.
calcea <i>P.</i>	562.
carnea <i>Humb.</i>	569.
cinerea <i>P.</i>	562.
colliculosa <i>Hoffm.</i>	562.
cretacea <i>Fr.</i>	566.
crispa <i>P.</i>	572.
decorticans <i>P.</i>	568.
disciformis <i>DC.</i>	568.
evolvens <i>Fr.</i>	570.
flocculenta <i>Fr.</i>	570.
frustulata <i>P.</i>	569.
gigantea <i>P.</i>	565.
hirsuta <i>Willd.</i>	572.
illinita <i>W.</i>	564.
incrustans <i>P.</i>	566.
laevis <i>Pers.</i>	566.
ochracea <i>Pers.</i>	565.
ochroleuca <i>Fr.</i>	572.
paradoxa <i>W.</i>	564.
Pini <i>DC.</i>	568.
purpurea <i>Schum.</i>	571.
reticulata <i>Fr.</i>	567.
rosea <i>Pers.</i>	567.
rufa <i>Pers.</i>	569.
rugosa <i>Pers.</i>	569.
salicina <i>Pers.</i>	571.
sanguinolenta <i>A. Schw.</i>	571.
sarcoides <i>Fr.</i>	570.
spadicea <i>P.</i>	573.

Thelephora <i>Ehrh.</i>	561.
suaveolens <i>Fr.</i>	565.
tremelloides <i>DC.</i>	573.
versiformis <i>Fr.</i>	571.
viscosa <i>Pers.</i>	566.
Thorea <i>Bory</i>	25.
Torula <i>Lk.</i>	170. 182.
Tremella <i>L.</i>	525.
albida <i>Huds.</i>	526.
disciformis <i>Fr.</i>	526.
fimbriata <i>P.</i>	527.
foliacea <i>P.</i>	527.
frondosa <i>Fr.</i>	527.
indecorata <i>Somm.</i>	526.
lutescens <i>P.</i>	527.
mesenterica <i>Jacq.</i>	526.
Trentepohlia <i>Mart.</i>	150.
aurea	150.
Jolithus <i>W.</i>	151.
Trichia <i>Hall.</i>	878.
chrysosperma <i>DC.</i>	879.
circumscissa <i>W.</i>	878.
clavata	880.
fallax <i>Pers.</i>	881.
nigripes <i>Pers.</i>	880.
pyriformis <i>H.</i>	881.
rubiformis <i>P.</i>	882.
Serpula <i>P.</i>	878.
turbinata <i>With.</i>	879.
varia <i>P.</i>	879.
Trichoderma <i>P.</i>	245.
cinnabarinum <i>W.</i>	245.
dubium	246.
flavum <i>Sommerf.</i>	246.
penicillatum <i>W.</i>	246.

- Trichoderma** *P.* 245.
pezizoideum *W.* 246.
viride 245.
- Trichogomum** *Pal. B.* 22
- Trichophorus** *Pal. B.* 14
- Trichothecium** *Lk.* 284.
candidum 285.
moniliforme *W.* 285.
roseum 284.
virescens *W.* 285.
- Tryblidium** *Reb.* 420.
abietinum *W.* 421.
calyciforme 421.
Pinastri *Fr.* 421.
seriatum *Fr.* 421.
- Tuber** *L.* 865.
- Tubercularia** *T.* 237.
ciliata *Ditm.* 240.
granulata *P.* 238.
liceoides *Fr.* 240.
persicina *Ditm.* 240.
 vulgaris *P.* 237.
- Tubulifera** *Jacq.* 346.
- Tubulina** *Pers.* . 346.
- Tylostoma** *Pers.* 398.
fimbriatum *Fr.* 399.
mammosum *Fr.* 399.
- Tympanis** *Tod.* . 423.
Aparines *W.* 424.
Ariae *Fr.* 426.
Aucopariae *W.* 427.
conspersa *Fr.* 427.
cupularis *W.* 428.
Frangulae *Fr.* 426.
fuliginosa *W.* 429.
- Tympanis** *Tod.* . 423.
obtecta *W.* 420.
Patella *W.* 425.
Praunstri *W.* 427.
Ribes *W.* 430.
Rubi *W.* 434.
saligna 427.
turgida *W.* 424.
Urceolus *W.* 425.
- Typhula** *Fr.* 529.
erythropus 529.
gyraeus 530.
Phacorrhiza 530.
Todei 530.
villosa 529.
- Ulva** *L.* 67.
bullosa *Roth* 68.
crispá 67.
furfuracea *Mert.* 67.
Lactuca 68.
- Uredo** *Pers.* 193-218.
- Uromyces** *Lk.* . 218.
- Ustilago** *Pers.* . 211.
- Valsa** *Scop.* 766.
- Vanhallia** *Mich.* 264.
- Variolaria** *Bull.* 782.
- Vaucheria** *DC.* 57.
caespitosa 60.
clevata 69.
dichotoma *Lyngb.* 57.
Dillwynii 59.

<i>Veucheria DC.</i>	57.	<i>Xyloglossum P.</i>	146.
<i>fusca Ag.</i>	61.	<i>Xylogramma W.</i>	509.
<i>geminata</i>	60.	<i>album</i>	510.
<i>granulata</i>	57.	<i>parallelum</i>	509.
<i>hamata</i>	58.	<i>sticticum</i>	509.
<i>ovata</i>	58.	<i>Taxi</i>	509.
<i>racemosa</i>	60.	<i>versicolor</i>	510.
<i>sessilis</i>	60.	<i>Xyloma Pers.</i>	409.
<i>terrestris Lyngb.</i> . . .	59.	<i>amphigenum W.</i>	411.
<i>Vermicularia Tod.</i>	231.	<i>Cicatrix W.</i>	412.
<i>Verpa Sw.</i>	549.	<i>giganteum Reb.</i>	412.
<i>conica</i>	549.	<i>gyrans W.</i>	410.
<i>digitaliformis P.</i> . . .	549.	<i>hypophyllum W.</i>	409.
<i>ferruginea W.</i>	549.	<i>lacrymans W.</i>	410.
<i>Verrucaria Ach.</i>	773.	<i>leucocreas DC.</i>	412.
<i>Verticillium N.</i>	301.	<i>Liriocandri W.</i>	410.
<i>capitatum Ehrb.</i> . . .	301.	<i>punctatum</i>	410.
<i>teuerum</i>	301.	<i>umbilicatum</i>	411.
<i>Vibrissea Fr.</i>	548.	<i>umbonatum Hopp.</i>	411.
<i>truncorum</i>	548.	<i>Urticae W.</i>	409.
<i>Virgaria N.</i>	296.	<i>Xylostroma Tod.</i>	158.
<i>Volutella Tod.</i>	519.		
<i>volvata</i>	519.		
<i>Wormskioldia Spr.</i>	94.	<i>Zygnema Ag.</i>	47.
<i>alata</i>	94.	<i>capacinum Dub.</i>	50.
<i>Hypoglossum</i>	95.	<i>condensatum</i>	49.
<i>Jacera</i>	94.	<i>eraciatum</i>	47.
<i>sanguinea</i>	95.	<i>decimium</i>	48.
<i>Xylaria Hill.</i>	856.	<i>geouflexum</i>	49.
		<i>nitidum</i>	48.
		<i>pectinatum</i>	48.
		<i>quininum</i>	48.
		<i>serpentinum Dub.</i> . .	50.

Andere Verlagsbücher von J. L. Schrag
in Nürnberg.

Authon, E. F., Tabelle über die in Deutschland vorkommenden natürlichen Pflanzensammlungen. Folio. Schreibp. 12 gr. od. 45 kr.

Bischoff, G. W., Handbuch der botanischen Terminologie und Systemkunde, als zweite, nach einem völlig veränderten und erweiterten Plane, umgearbeitete Ausgabe der bot. Kunstsprache in Umrissen. gr. 4. Erste Abtheilung mit 21 lithographirten Tafeln. 1830. 2 Thlr. 12 gr. oder 8 fl. 34 kr. Zweite Abtheil. erste Hälfte mit 14 Tafeln. 1831. 2 Thlr. oder 8 fl.

— — die kryptogamischen Gewächse, mit besonderer Berücksichtigung der Flora Deutschlands und der Schweiz, organographisch, phytonomisch und systematisch bearbeitet. In zehn Lieferungen, mit 60 Kupfertafeln. gr. 4. I. Lief. Chareen u. Equiseten. 1828. 2 Thlr. 9 gr. oder 4 fl. 12 kr. II. Lief. Rhizokarpen u. Lycopodeen. 1828. 2 Thlr. 9 gr. od. 4 fl. 12 kr. III. Lief. Ophioglosseen u. Farne. 1830. IV. Lief. Lehermoose. V. Lief. Moose. VI. Lief. Flechten. VII. Lief. Algen. VIII. u. IX. Lief. Pilze.

X. Lief. Allgemeine Uebersicht der krypt. Gewächse, zugleich als Einleitung zum Ganzen, und ein genaues Register.

Brown's, R., vermischté botanische Schriften; in Verbindung mit einigen Freunden ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Dr. C. G. Nee's von Esenbeck. Erter u. zweiter Band, mit 1 Steintaf. gr. 8. 1825 u. 1826. 3 Thlr. 12 gr. oder 6 fl. 18 kr. Dritten Bandes erste Abtheil., auch unter dem besondern Titel: Prodromus Florae novae Hollandiae et Insulae Van-Diemen etc. Vol. I. 1827. 2 Thlr. 12 gr. oder 4 fl. 30 kr. Vierter Band, mit 5 Steintafeln. 1830. 3 Thlr. 8 gr. od. 6 fl. Fünften Bandes erste Abtheilung. gr. 8. 1833.

Eschweiler, F. G., Systema Lichenum, genera exhibens rite distincta, pluribus novis adacta. Cum tabula lapidi incisa. 1824. 16 gr. oder 1 fl.

Fingerhuth, C. A., Tentamen florulae Lichenum Eiffliacae, sive Enumeratio Lichenum in Eifflia provenientium. gr. 8. 1829. 12 gr. oder 54 kr.

Haworth, A. H., synopsis plantarum succulentarum cum descriptionibus, synonymis, locis, observationibus culturaque. Usui hortorum Germaniae accommodata. gr. 8. 1819. 2 Thlr. 12 gr. oder 3 fl. 45 kr.

Martius, C. F. P. v., Flora Cryptogamica Erlangensis, sistens Vegetabilia e classe ultima Linn. in agro Erlangensi hucusque detecta. Accedunt Tab. II. aeneae, muscos nonnullos, et IV. lapidi incisae Jungermanias germanicas foliosas illustrantes. gr. 8. 1817. 2 Thlr. 16 gr. oder 4 fl. 30 kr.

Nees von Esenbeck, C. G., Handbuch der Botanik für Vorlesungen und zum Selbststudium. Zwei Bände. gr. 8. 1820—1821. 5 Thlr. 21. gr. od. 10 fl.

— — Genera et species Asterearum. Recensuit, descriptionibus et animadversionibus illustravit, synonyma emendavit. gr. 8. 1833. 1 Thlr. 18 gr. oder 3 fl.

Richard's, A., neuer Grundriss der Botanik, und der Pflanzenphysiologie, nach der vierten, mit den Characteren der natürlichen Familien des Gewächsreiches vermehrten und verbesserten Originalausgabe übersetzt und mit einigen Zusätzen, Anmerkungen, einem Sach- und Wort-Register versehen von M. B. Kittel. Zweite Auflage. Mit 8 Kupfertafeln. 8. 1831. 2 Thlr. 12 gr. oder 3 fl. 45 kr.

Osterreichische Nationalbibliothek



+Z169370703



