


## BORAGINACEAE

*Elizaldia calycina* subsp. *multicolor* (Kunze) Chater

**Taxón ibero-norteafricano, citado en varias ocasiones de la provincia de Cádiz y que no ha vuelto a ser encontrado en España desde principios del siglo XX.**



R. Tavera. © Junta de Andalucía

## Ficha Roja

Categoría UICN para España: EX  
 Categoría UICN mundial:  
 No evaluada  
 Figuras legales de protección:  
 CNEA (E), Andalucía (E)

**Identificación**

Hierba anual, de hasta 30 cm, hispida. Hojas alternas, las inferiores atenuadas en la base, las superiores sentadas. Flores actinomorfas, con cáliz de 7-8 mm, profundamente dividido en lóbulos estrechamente lanceolados. Corola de 10-12 mm, blanca, con garganta violeta y limbo amarillo. Estambres insertos en la parte superior del tubo de la corola, alcanzando el borde superior de los lóbulos.

**Distribución y hábitat**

Taxón ibero-norteafricano, recolectado en tres localidades próximas de la provincia de Cádiz: Cádiz, San Fernando y Puerto de Santa María. La primera de las citas tiene más de 130 años y la última es de principios del siglo XX. Desde entonces no ha vuelto a ser encontrada en España. En el norte de África habita en Libia, Túnez, Argelia y Marruecos.

Vive sobre arenas, en terrenos algo ruderalizados.

Florece entre abril y mayo.

**Causas de extinción y medidas de conservación**

Se desconocen las causas de la extinción de esta especie. Se ha apuntado que su presencia en España habría sido el resultado de introducciones ocasionales desde el norte de Marruecos<sup>1</sup>.

**Referencias:** [1] BLANCA *et al.* (1999); [2] VALDÉS (1987); [3] HERNÁNDEZ-BERMEJO & CLEMENTE (1994).

**Autores:** D. GALICIA HERBADA.