



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius uliginosus Berkeley

Synonyme possible : *C. concinnus*

Nom français : Cortinaire des marais

Sous saules, parfois aulnes. Chapeau mamelonné, orange cuivré, rouge brique à brun orangé. Lames jaune safrané. Stipe jaune pâle couvert de voile rouge orangé vif. Chair jaune rougeâtre dans le chapeau et jaune dans le stipe. Odeur et saveur sans particularité. Spores 8-11 x 5-6,5 µm. A comparer avec :

- *C. croceoconus* : sous épicéas humides en montagne, chapeau aux couleurs moins vives ;
- *C. cinnamomeus* : sous épicéas, pins ou bouleaux, chapeau non mamelonné, lames orange dès le départ ;
- *C. cinnamomeoluteus* : sous saules, basidiome entièrement jaune olivâtre.

C'est généralement dans les zones humides avec sphaignes que nous observons ce cortinaire aux couleurs vives, il ne passe pas inaperçu et est fréquent, par exemple dans les tourbières de Montendre et Brigueuil, dès la fin de l'été et tout l'automne, nous l'avons également rencontré en forêt de Secondigny.

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al.





