



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## *Gymnopilus pseudofulgens* Romagnesi

Sur sol incendié. Chapeau brun-roux à orange ochracé, non strié. Lames beige jaunâtre puis rouille. Stipe subconcolore au chapeau. Spores (8,5)-9-11(11,7) X 4,5-5,5  $\mu\text{m}$ . A comparer avec d'autres espèces pouvant être carbonicoles :

- *G. decipiens* et *G. odini* : spores inférieures à 9  $\mu\text{m}$  ;
- *G. fulgens* : rarement sur lieux brûlés, spores 5,5-7  $\mu\text{m}$  de largeur.

Nous avons rencontré ce gymnopile dans de nombreux lieux incendiés, par exemple à Ste Gemme, St Sornin Montendre, Soyaux. La saveur était farineuse à subfarineuse, voire légèrement amère. La microscopie était toujours à peu près identique, avec des spores mesurant 8,5-11 x 5-5,5  $\mu\text{m}$ .

Biblio : Funghi e cenosi di aree bruciate, G. Monti, M. Marchetti, L. Gorreri, P. Franchi - Bull. SMF. 95, fasc. 2, 1979.

*Fiche réalisée en avril 2018 par Patrice TANCHAUD*