



Rougnac (16), fév. 2009
Leg. Robert Lagarde



Bédenac, mars 2016

Ordre : Pezizales

Famille : Sarcosomataceae

Plectania melastoma (Sowerby) Fuckel

Synonyme : *Urnula melastoma*

Au sol, sur bois mort ou débris végétaux. Apothécies cupulées, 4-30 mm, hyménium noir, extérieur brun noirâtre couvert dans la jeunesse de poils orangés à rouge brique, cette belle couleur disparaissant assez rapidement. Spores 20-27 x 10-12 µm, finement granuleuses.

A noter l'existence de deux espèces proches :


- *P. zugazae* (très rare et connu de Chypre) : face externe non colorée, seule la marge est brun orangé, spores nettement plus larges 19-22 x 12,5-15 µm ;
- *Urnula craterium* (rare, existant en France mais dont nous n'avons jamais entendu parler dans la région) : face externe et hyménium gris-noir.

Cet ascomycète est peu fréquent dans la région, à ce jour nous n'en avons que de rares observations sur le littoral et à l'intérieur des terres, sa période d'apparition semble se situer de la fin de l'hiver au début du printemps.

Biblio : Boudier icône n° 342 - Grelet p. 130 - Medardi p. 219.



*Rougnac (16), fév. 2009
Leg. Robert Lagarde*



Bédenac, mars 2016



Bédenac, mars 2016

