



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## ***Cortinarius semisanguineus*** (Fr. : Fr.) Gillet

Nom français : Cortinaire semi-sanguin

Surtout sous conifères sur sol sablonneux, mais aussi sous feuillus. Chapeau feutré à fibrilleux, brun-jaune olivacé à brun ochracé. Lames rouge sang puis brun-rouge sombre. Stipe jaune, parfois guirlandé, et pouvant être envahi de rouge à la base. Chair jaune. Odeur faible de rave ou d'iode, saveur douce. KOH pourpre noir sur cuticule, stipe, lames et chair. Spores 5,5-8 x 3,5-5 µm.

A comparer avec :

- *C. ominusus* : sous feuillus ou conifères, chapeau rouge purpurin sombre sur le frais, brun cuivré à brun olivâtre en séchant ;
- *C. fervidus* (n'existant peut-être pas dans notre région car surtout lié à l'épicéa et au pin dans les milieux humides montagnards) : chapeau brun-rouge et lames moins rouge sang.

Ce cortinaire est très fréquent sur le littoral, un peu moins à l'intérieur des terres, il est visible tout l'automne et éventuellement l'hiver lorsque les conditions météorologiques restent favorables.

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al.- GEPR.



