



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius caninus (Fr. : Fr.) Fr.

Nom français : Cortinaire des chiens

Surtout sous épicéas. Chapeau fibrilleux, jaune-brun clair, brun ochracé à fauve roussâtre, marge lilacine dans la jeunesse. Lames lilas puis gris-brun violeté. Stipe fibrilleux de blanchâtre sur fond brunâtre, bleu violeté au sommet, avec présence d'une zone annulaire. Chair blanchâtre à lilas. Odeur faible à raphanoïde ou de punaise, saveur douce. Chair réagissant en rose sous l'effet du formol. Spores 7,5-10 x 6-8 µm.

C. anomalus peut ressembler, son chapeau est gris-bleu et le stipe voilé de blanchâtre.

A noter que *C. caninus* f. *saugeti* se distinguerait par ses lames pâles tirant sur le rose.

Nous avons observé ce cortinaire l'automne, dans les bois d'Ecuras et de Brigueuil. Il est à noter que le rosissement de la chair, sous l'effet du formol, ne commence à apparaître qu'au bout d'une dizaine de minutes, et il faut environ une heure pour obtenir un rosissement comme celui présenté sur la page 2.

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al.

