



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius rapaceoides Bidaud, G. Rioussset & Rioussset

Synonymes : *C. flavidolilacinus* ?

Nom français : qui ressemble à *Cortinarius rapaceus*

Description : Chapeau charnu de 5 à 10 (12) cm de diamètre, d'abord convexe puis plan-convexe-à marge enroulée ; cuticule visqueuse puis sèche, soyeuse, lisse, ornée de plaques vélaires membraneuses blanches plus ou moins persistantes au disque ; couleur d'abord crème ivoire uniforme puis entièrement jaune paille ou ocracée ; réaction jaune ambré à la potasse; stipe peu élancé, blanchâtre à reflets bleu-lilacin sur les jeunes exemplaires, à bulbe blanc, très large et marginé ; lames assez serrées, d'abord beige pâle à reflets bleuâtres puis argillacées enfin rouillées ; chair blanchâtre nettement nacrée de bleu lilacin à la moelle ou au cortex du stipe, à forte odeur chocolatée (*Hebeloma edurum*) ; réaction subnulle à la potasse (rosâtre sale) ; spores 10-13 x 6-7 µm.

Récoltes : en 2009-2010 et 2011 sous chênes verts et chênes pubescents sur sol calcaire à Soullignonnes, Trizay, Pont l'Abbé d'Arnoult et Le Douhet (17).

Remarques : ce cortinaire est remarquable par son port massif, son revêtement lisse, crème pâle puis jaune paille et sa nette odeur chocolatée ; il peut être confondu avec *C. rapaceomentosus* qui exhale sensiblement la même odeur mais est différent par son chapeau moins régulier à cuticule remarquablement feutrée-tomenteuse ornée d'un voile blanc apprimé.

Biblio : Micologia 2000 : 68. 2000

Fiche réalisée en mars 2012 par Patrick BOISSELET