



Base de données mycologique

Leptosphaeria acuta (Hoffmann) P. Karsten (1873)





- Division - Classe - Ordre - Famille

Ascomycota / Dothideomycetes / Pleosporales / Leptosphaeriaceae

- Synonymes

Sphaeria acuta Hoffmann (1787), *Vegetabilia cryptogama*, 1, p. 22, tab. 5, fig. 2 (Basionyme)
Sanctionnement : Fries (1823)

Sphaeria coniformis Fries (1818), *Kongl. vetenskaps akademiens handlingar*, 1818, p. 109

Dryinosphaera acuta (Hoffmann) Dumortier (1822), *Commentationes botanicae*, p. 88

Cryptosphaeria acuta (Hoffmann) Greville (1824), *Flora edinensis*, p. 360

Sphaeria herbarum var. *c. conica* Rabenhorst (1844), *Deutschlands kryptogamen-flora*, 1, p. 175

Aposphaeria acuta (Hoffmann) Berkeley (1860), *Outlines of british fungology*, p. 315

Pleospora acuta Fuckel (1870) [1869-70], *Jahrbücher des nassauischen vereins für naturkunde*, 23-24, p. 135

Phoma acuta Fuckel (1870) [1869-70], *Jahrbücher des nassauischen vereins für naturkunde*, 23-24, p. 125

Leptosphaeria acuta (Hoffmann) P. Karsten (1873), *Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk*, 23, p. 98 (nom actuel)

Ampullina coniformis (Fries) Quélet (1875), *Mémoires de la Société d'Emulation de Montbéliard*, série 2, 5, p. 524(96)

Ampullina acuta (Fuckel) Quélet (1875), *Mémoires de la Société d'Emulation de Montbéliard*, série 2, 5, p. 523(95), tab. 4, fig. 38

Heptameria acuta (Hoffmann) Cooke (1889), *Grevillea*, 18(86), p. 31

Leptosphaeria coniformis (Fries) J. Schröter (1894), in Cohn, *Kryptogamen-flora von Schlesien*, 3(2), p. 369 ('coniformis') (nom. illegit.)

Leptophoma acuta (Fuckel) Höhnelt (1915), *Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, mathematisch-naturwissenschaftliche klasse*, Abt. 1, 124, p. 73

Plenodomus acutus (Fuckel) Bubák (1915), *Annales mycologici, edii in notitiam scientiae mycologicae universalis*, 13(1), p. 29

- Fructification

- **Couleur** : Noir

- **Description** : 0,3-0,4 mm, globuleuse-conique, larmiforme. Surface externe lisse, noire et brillante, se développant sous l'épiderme puis se déchirant à maturité.

- Spores

Fusiformes, lisses, jaunâtres, (4)-6-11-(13) cloisons, la cellule centrale parfois un peu étranglée, souvent à petites guttules, 40-60 x 6 µm. Asques octosporés, spores bisériées, 150-170 x 10-11 µm, bituniqués, J-.

www.mycodb.fr

Paraphyses filiformes, septées et fourchues.

- Ecologie

Sur les tiges d'*Urtica dioica*, recouvrant des tiges entières .
Cespiteux. Fréquent. De Février à Avril.

- Comestibilité

Sans intérêt

- Références bibliographiques

BK 1 381 ; Ellis p. 442 fig. 1705 ; Wergen 682

- Commentaires

Cespiteux. Fréquent. De Février à Avril.