

Daphne (Lýkovec)

čeleď: Thymelaeaceae

Rodové jméno bylo vybráno na počest řecké nymfy Daphne. Roste v Evropě, severní Africe a mírném pásu Asie v podobě opadavého nebo stálezeleného keře. Listy jsou přisedlé, kopinaté, podlouhlé nebo čárkovité a přisedlé. Kvete růžovými nebo bílými vonnými trubkovými aromatickými květy rozšiřujícími se do široka na konci do 4 cípů dříve než vyraší listy. Plodem je peckovice. Je jedovatý. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Eternal Fragrance'

Vyhovuje mu kamenitá, zpravidla vápenitá půda bohatá na živiny.

Množí se řízků, hřížením nebo semeny.

Daphne acutiloba

synonyma: *D. odora* subsp. *acutiloba*

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Fragrant Cloud' - kvete bílými květy

Daphne alpina (Lýkovec alpský)

synonyma: *D. alpina* var. *petiolata*, *D. candida*, *D. pubescens*, *Thymelaea alpina*, *Thymelaea candida*

oblasti: Alpy, Itálie, Katalánsko, Německo, Švýcarsko

Kvete bílými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *alpina* (Lýkovec alpský pravý)

- subsp. *scopoliana*

Daphne altaica (Lýkovec altajský)

synonyma: *D. undulata*

oblasti: Altaj, Kazachstán

Daphne angustiloba

Daphne arbuscula (Lýkovec slovenský)

synonyma: *D. abietina*, *D. arbuscula* f. *albiflora*, *D. arbuscula* f. *grandiflora*, *D. arbuscula* f.

platyclada, *D. arbuscula* f. *radicans*, *D. cneorum* var. *abietina*, *D. cneorum* var. *hirsuta*, *D. juranyana*

oblasti: Slovensko, Z Karpaty

Roste v západních Karpatech v podobě poléhavého stálezeleného keře. Dorůstá výšky 10 - 20 (i 35)cm. Větve jsou poléhavé nebo pomalu vystoupavé, jsou na nich jasně patrné jizvičky po odpadlých listech. Listy jsou úzce obkopinaté, lesklé, podvinuté, dlouhé 2cm a seskupené na koncích větví. Kvete také na koncích větví růžovými (i bílými) aromatickými květy ve svazcích po 3 - 8ks. Patří mezi chráněné druhy. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Maritzina'

<div>Vyhovuje mu plné slunce, ale kořeny ve stínu.</div>

Daphne arisanensis

Daphne aurantiaca

synonyma: D. aurantiaca var. calcicola, D. calcicola, Wikstroemia aurantiaca, Wikstroemia aurantiaca var. pulvinata, Wikstroemia calcicola

Daphne axillaris

synonyma: Wikstroemia axillaris

Daphne bholua (Lýkovec bhutanský)

synonyma: D. odora

oblasti: V Himálaj

Roste ve východním Himálaji v podobě stálezeleného i opadavého vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do 3,5m a šířky 1,5m. Listy jsou kožovité. Kvete na koncích větví růžovými trubkovými květy rozevírajícími se do 4 korunních lístků. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba'

- 'Darjeeling'

- 'Gurkha' - opadavý

- 'Jacqueline Postill' - stálezelený; výška do 2,5m a šířka 1,5m

Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín. Půda by měla být stále mírně vlhká, propustná, bohatá na živiny.

Daphne blagayana (Lýkovec jugoslávský)

synonyma: D. lerchenfeldiana

oblasti: Itálie, Jugoslávie

Daphne brevituba

Daphne caucasica (Lýkovec kavkazský)

synonyma: *D. caucasica* var. *cognata*, *D. euphorbioides*, *D. salicifolia*

oblasti: Kavkaz

Roste v podobě vzpřímeného opadavého keře. Dorůstá výšky 1,8m. Listy jsou tuhé a kopinaté. Květenstvím je hlávka, vlastní květy jsou bílé a aromatické. Plodem je černá nebo červená peckovice.

Daphne championii

Daphne chingshuishaniana

Daphne circassica

Daphne cneorum (Lýkovec vonný)

synonyma: *D. bellojocensis*, *D. cneorum* var. *cantabrica*, *D. cneorum* var. *glabrata*, *D. cneorum* var. *verlotii*, *D. delphini*, *D. odorata*, *D. prostrata*, *D. rhodanica*, *D. verlotii*, *Laureola cneorum*, *Thymelaea cneorum*, *Thymelaea odorata*

oblasti: Alpy, Balkánský poloostrov, Česká republika, Francie, Itálie, Katalánsko, Německo, Polsko, Slovensko, Švýcarsko

Roste v horách střední a jižní Evropy v podobě stálezeleného poléhavého hustého keře. Dorůstá výšky 10 - 30 (i 40)cm. Borka je šedohnědá. Větvě jsou dlouhé a poléhavé, v horní části mírně ochlupené a v mládí zelené. Listy jsou střídavé, často seskupené na koncích větví, úzce obvejčité, kopinaté nebo kopist'ovité, max. krátce řapíkaté, mírně kožovité, dlouhé 1 - 1,5 (i 2)cm, široké 3 - 5mm a báze je klínovitá. Kvete tmavě červenorůžovými trubkovitými aromatickými 4četnými květy délky 0,6 - 1cm v hlávkách po (4 -) 5 - 10ti ks a vnější strana je ochlupená. Plodem je peckovice délky 4mm obsahující 1 semeno. Patří mezi chráněné druhy C1. Je jedovatý. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba' - květy bílé
- 'Albovariegata' - listy s bílým okrajem; květy světle růžové
- 'Carminea' - vysoký; květy červené
- 'Eximia'
- 'Major' - výška 40cm
- var. *pygmaeum*
- 'Ruby Glow' - vysoký; květy červené
- 'Variegata' - listy pestré

Má rád teplo, vyhovují mu okraje listnatých lesů s pH od mírně kyselého po mírně zásadité, sušší trávníky, mělké kyselé vlhké dobře propustné půdy a plné slunce.

Množí se semeny nebo řízků.

Daphne collina

Daphne depauperata

Daphne domini

Daphne erosiloba

Daphne esquirolii

synonyma: D. leuconeura, D. leuconeura var. mairei, Stelleria mairei, Wikstroemia leuconeura, Wikstroemia mairei

Daphne feddei

synonyma: D. feddei var. taliensis, D. martinii

Daphne formosana

synonyma: Chamaejasme formosana

Daphne gemmata

synonyma: Wikstroemia gemmata

Daphne genkwa (Lýkovec genkwa)

synonyma: D. fortunei, D. genkwa f. taitoensis, D. genkwa var. fortunei, D. taitoensis, Wikstroemia genkwa

oblasti: Čína, Japonsko

Roste v Číně v podobě hustého opadavého keře a zavlečený byl do Japonska. Větve jsou slabé. Kvete ve svazečcích světlorůžovými trubkovitými květy.

Vyhovuje mu plné slunce a chráněné místo.

Daphne giraldii (Lýkovec Giraldův)

oblasti: SZ Čína

Daphne glomerata

synonyma: D. comosa, D. glomerata subsp. ziganae, D. glomerata var. nivalis, D. glomerata var. pauciflora, D. glomerata var. puberula, D. glomerata var. ziganae, D. imerica

oblasti: Arménie, Gruzie

Kvete bílými květy.

Daphne gnidioides

synonyma: D. oleoides

Daphne gnidium (Lýkovec podzimní)

synonyma: D. orthophylla, D. paniculata, Laureola gnidium, Mistralia gnidium, Thymelaea gnidium

oblasti: Andalusie, Itálie, Katalánsko, Makaronésie, Středozeří, Turecko

Roste ve středozeří a na Kanárských ostrovech v podobě stálezeleného chudě větveného keře. Dorůstá výšky 0,5 - 1,5 (i 2)m. Větve jsou vzpřímené, prutovité a bohatě olistěné. Borka je hnědá nebo hnědočervená. Listy jsou střídavé, přisedlé, úzce čárkovité, zašpičatělé, tuhé, sivozelené, dlouhé (1 -) 1,5 - 5 (i 5,5)cm, široké (1,8 -) 3 - 7 (i 8)mm a na spodní straně s bělavými žlázkami. Květy na koncích větví, jsou oboupohlavné, 4četné, krátce stopkaté, dlouhé (2,5-) 4 (i 6,5)mm, kališní lístky jsou dlouhé 1,5 - 2mm, korunní lístky jsou trubkovitě srostlé, cípy rozevřené a běžovobílé. Plodem je dužnatá prakticky kulovitá oranžová, později červená peckovice délky 7 - 8mm a obsahuje 1 semeno.

Vyhovují jí řídké lesy, makchie, garigue a úhory.

Daphne gracilis

synonyma: Wikstroemia domkeana, Wikstroemia gracilis

Daphne grueningiana

Daphne hekousensis

Daphne holosericea

synonyma: Wikstroemia holosericea

Daphne jarmilae

Daphne jasminea

synonyma: D. microphylla, D. oleoides var. jasminea

Daphne jezoensis

synonyma: D. kamtschatica subsp. jezoensis, D. kamtschatica var. jezoensis, D. kamtschatica var. rebunensis, D. pseudomezereum var. jezoensis, D. rebunensis

Daphne juliae

synonyma: D. cneorum subsp. juliae

Daphne kamtschatica (Lýkovec kamčatský)

oblasti: Kamčatka, Korea

Daphne kingdon-wardii

Daphne kiusiana

synonyma: *D. cannabina* var. *kiusiana*, *D. kiusiana* f. *fasciata*, *D. kiusiana* var. *fasciata*, *D. odora* var. *fasciata*, *D. odora* var. *kiusiana*

Daphne koreana

synonyma: *D. pseudomezereum* var. *koreana*

Daphne kosaninii

synonyma: *D. oleoides* var. *kosaninii*

Daphne laureola (Lýkovec vavřínový)

synonyma: *D. arvernensis*, *D. cantabrica*, *D. kabylica*, *D. laureola* subsp. *latifolia*, *D. laureola* var. *latifolia*, *D. major*, *D. multiflora*, *D. pycnophylla*, *D. sempervirens*, *Laureola sempervirens*, *Thymelaea laureola*

oblasti: Andalusie, Britská Kolumbie, Itálie, Katalánsko, Německo, Oregon, Švýcarsko, Washington

Roste zejména v západním a středním středozeří a severní Africe v podobě stálezeleného chudě větveného keře. Dorůstá výšky 0,4 - 1 (i 1,5)m. Větve jsou vzpřímené, zelené, později světlehnědé s příčnými lenticelami. Listy jsou střídavé, mírně obvejčité až obkopinaté, kožovité, tmavězelené, seskupené na koncích větví, dlouhé (3 -) 3,5 - 10,5 (i 13)cm, široké 1,5 - 3,7cm a spodní strana je světlejší. Květenstvím je úžlabní 5 - 10tikvětý hrozen, vlastní květy jsou krátce stopkaté, 4četné, dlouhé (0,7 -) 0,9 - 1,3cm (samičí 5 - 7mm), mírně aromatické, kališní lístky jsou dlouhé 2,5 - 4mm, korunní lístky jsou světležluté až žlutozelené, srostlé v úzkou baňku s rozevřenými cípy. Plodem je vejčitá dužnatá modročerná peckovice délky (0,7 -) 0,8 - 0,9 (i 1)cm a obsahuje 1 semeno. Je jedovatý. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *laureola* (Lýkovec vavřínový pravý)
- subsp. *philippii* - výška do 40cm; rozrůstá se výmladky do šířky

Vyhovují mu listnaté lesy s půdou bohatou na živiny s vápencovým základem. Snáší i stín.

Daphne limprichtii

Daphne linearifolia

Daphne linoides

Daphne longilobata

synonyma: *D. altaica* var. *longilobata*

Daphne ludlowii

Daphne luzonica

synonyma: *D. odora* var. *luzonica*

Daphne macrantha

Daphne malyana

Daphne mauritanica

synonyma: *D. gnidium* f. *latifolia*, *D. gnidium* subsp. *mauritanica*, *D. gnidium* var. *lanata*, *D. gnidium* var. *sericea*

Daphne mezereum (Lýkovec jedovatý)

synonyma: *D. albiflora*, *D. florida*, *D. houtteana*, *D. lateriflora*, *D. liottardi*, *D. mezereum* var. *albablena*, *D. mezereum* var. *albida*, *D. mezereum* var. *album*, *D. mezereum* var. *rubrum*, *Mezereum officinarum*, *Thymelaea mezereum*, *Thymelaea praecox*

oblasti: Aljaška, Anglie, Apeniny, Bajkal, Connecticut, Česká republika, Finsko, Írán, Jugoslávie, Katalánsko, Kavkaz, Maďarsko, Maine, Malá Asie (Anatolie), Massachusetts, Montana, Německo, New Hampshire, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Polsko, Quebec, Rakousko, Rhode Island, Slovensko, Střední Rusko, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Ural, Vermont, Z Čína, Z Rusko, Z Sibiř

Roste od Evropy po Ural v podobě vzpřímeného opadavého krátkověkého keře. Dorůstá výšky (0,3 -) 0,4 - 1,5 (i 2)m. Kůra je svažštělá. Větvě vyrůstají téměř vertikálně vzhůru, jsou dobře ohebné, v mládí hnědozelené a ochlupené. Listy jsou seskupené na koncích větví, jsou střídavé, brvitě, úzce kopinaté až dlouze obvejčité či obkopinaté, tmavězelené, našedlé, krátce řapíkaté, dlouhé do 6 - 10cm, široké 1 - 2cm, báze klínovitá. Kvete max. 1cm růžovými, červenými nebo červenofialovými květy ve svazcích po 2 - 3 (i 5)ks ještě před listy s velikostí 0,5 - 1cm, jsou aromatické, trubkovité, se 4mi kališními cípy (korunní lístky chybí). Plodem je červená jedovatá vejčitá až kulatá dužnatá peckovice velikosti 5 - 8mm. Patří mezi chráněné druhy C4. Je jedovatý. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba'/f. *alba* - květy bílé
- 'Autumnalis' - kvete v zimě
- 'Grandiflora' - výška až 2m
- subsp. *rechingeri*/*D. rechingeri*
- 'Rubra' - květy fialově červené
- 'Riby Glowe' - květy fialově červené

Vyhovuje mu mírně kyselá až zásaditá stále mírně vlhká hlinitá až písčité půda bohatá na živiny a polostín především v listnatých nebo smíšených lesích. Na slunci je bohatěji větvený až bochníkovitý. Snáší mrazy až do -35°C.

Množí se hřížením nebo semeny.

Daphne genkwa

Daphne modesta

synonyma: Wikstroemia modesta

Daphne genkwa

Daphne mucronata

synonyma: D. acuminata, D. acuminata var. kochii, D. angustifolia, D. angustifolia var. affghanica, D. angustifolia var. mucronata, D. argentea, D. cachemireana, D. coriacea, D. escalerae, D. mucronata var. affghanica

oblasti: Afganistán, Afrika, Írán, J Evropa, Pákistán

Roste v Afganistánu, Pakistánu, Íránu, severní Africe a jižní Evropě v podobě keře. Dorůstá výšky do 2,5m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé, mírně eliptické až kopinaté s hrotem na konci, přisedlé, dlouhé 3 - 5,8cm a široké 0,4 - 1cm. Květy mají korunu s ochlupenou trubkou délky 6 - 8mm a 4mi vejčitými až obvejčitými laloky délky 4mm. Plodem je kulovitá ochlupená oranžová bobule délky 1cm.

Daphne genkwa

synonyma: Wikstroemia myrtilloides, Wikstroemia pretiosa

Daphne genkwa

Daphne genkwa

synonyma: D. chinensis, D. hybrida, D. japonica, D. kiusiana var. odora, D. mazellii, D. odora f. alba, D. odora f. leucantha, D. odora f. marginata, D. odora f. rosacea, D. odora var. alba, D. odora var. leucantha, D. odora var. marginata, D. odora var. mazellii, D. odora var. punctata, D. odora var. rosacea, D. odora var. rubra, D. odora var. variegata, D. sinensis, D. sinensis var. hybrida, D. speciosissima, D. triflora

oblasti: Čína, Japonsko

Roste v Číně v podobě stálezeleného hustého rozložitého keře a rozšířil se do Japonska. Dorůstá výšky do 1,2m. Listy jsou zelené. Květy bílé, ale poupata jsou růžová. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba' - poupata i květy bílé
- 'Aureomarginata' - listy se žlutým okrajem; květy s červenorůžovofialovými skvrnami

Daphne oleoides (Lýkovec olejový)

synonyma: *D. buxifolia*, *D. euboica*, *D. glandulosa*, *D. gnidioides*, *D. hispanica*, *D. lucida*, *D. oleoides* f. *puberula*, *D. oleoides* subsp. *hispanica*, *D. oleoides* var. *brachyloba*, *D. oleoides* var. *buxifolia*, *D. oleoides* var. *glandulosa*, *D. oleoides* var. *jaminea*, *D. oleoides* var. *puberula*, *D. sericea*

oblasti: Andalusie, Írán, Itálie

Dorůstá výšky 50cm. Listy jsou střídavé, dlouhé 1 - 3 (i 3,5)cm a široké 0,6 - 1,1cm. Květy jsou dlouhé 1 - 1,5cm a kališní lístky jsou dlouhé 4 - 7mm. Plody jsou dlouhé 0,8 - 1cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *kurdica*
- subsp. *oleides* (Lýkovec olejový pravý)

Daphne pachyphylla

Daphne papyracea

synonyma: *D. cavaleriei*, *D. eriocephala*, *D. laciniata*, *D. mairei*, *D. papyracea* f. *grandiflora*, *D. papyracea* var. *grandiflora*

oblasti: Himáčalpradéš, Nepál, Pákistán, Uttarpradéš, Z Himálaj

Roste v Himálaji, Nepálu, Indii a Pákistánu v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky do 2m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou mírně eliptické až kopinaté, přisedlé, dlouhé 6 - 14cm a široké 2 - 3cm. Květenstvím je vrcholový 4 - 9tičetný svazek, vlastní květy jsou bílé, přisedlé, mají 5 - 7 vejčitých listenů délky 1,4mm, kališní trubka je trubkovitá, ochlupená, dlouhá 1cm a má 4 vejčité laloky délky 4mm. Plody jsou vejčité, tmavěčervené, ztlustlé a dlouhé 1cm.

Daphne penicillata

synonyma: *D. flaviflora*, *Wikstroemia flaviflora*, *Wikstroemia penicillata*

Daphne petraea (Lýkovec skalní)

synonyma: *D. rupestris*

oblasti: J Alpy, S Itálie

Roste v Itálii v Alpách v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 30cm. Na koncích větví kvete ve svazečcích růžovými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Corna Blacca'
- 'Grandiflora' - pomalý růst
- 'Punchinello'

Daphne pontica (Lýkovec černomořský)

synonyma: *D. libanotica*, *D. pontica* subsp. *melanocarpa*, *D. pontica* var. *szovitsii*

oblasti: Bulharsko, Černé moře, Gruzie, Kavkaz, Turecko

Roste v jihovýchodní Evropě, Turecku a na Kavkaze v podobě rozkladitého stálezeleného řídkého keře. Dorůstá výšky 0,6 - 1 (i 1,5)m. Větve jsou v mládí zelené. Listy jsou seskupené na koncích větví, střídavé, obvejčité až eliptické, zašpičatělé, zelené, lesklé, kožovité, dlouhé 3 - 8 (i 10)cm, široké 1,5 - 4cm, báze klínovitá a řapíky jsou krátké. Kvete párovými žlutozelenými aromatickými 4četnými aromatickými květy po 1 - 2 (i 3)ks a kališní lístky jsou zašpičatělé. Plodem je jedovatá dužnatá červená peckovice obsahující 1 vejčité semeno velikosti 5mm.

Vyhovuje mu polostín, zásaditá až mírně kyselá písčité či hlinitá vlhká dobře propustná půda, vyšší vzdušná vlhkost a i hlubší stín (pak méně kvete).

Daphne pseudomezereum (Lýkovec pseudoobecný)

synonyma: *D. japonica*

Daphne pseudosericea

Daphne reginaldi-farreri

synonyma: *Wikstroemia reginaldi-farreri*

Daphne retusa (Lýkovec zakrslý)

oblasti: Pákistán, Z Čína

Roste v Pakistánu a Číně v podobě hustého keře. Dorůstá výšky 75cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou úzce kopinaté, přisedlé, na vrcholu mírně vykrojené, tmavězelené, lesklé a dlouhé 3 - 5cm. Květy jsou aromatické, bílé, vně růžovočervené, dlouhé 2cm, trubka má délku 1,2cm a laloky jsou mírně kratší. Plody jsou vejčité, červené a dlouhé 8mm.

Daphne rhynchocarpa

synonyma: *D. axillaris* subsp. *rhynchocarpa*

Daphne rodriguezii

synonyma: *D. vellaoides*

Daphne rosmarinifolia

synonyma: *D. clivicola*, *Stellera chinensis*, *Stellera diffusa*, *Wikstroemia clivicola*, *Wikstroemia diffusa*, *Wikstroemia lecomteana*, *Wikstroemia rosmarinifolia*

Daphne salicina

synonyma: *Wikstroemia salicina*

Daphne sericea

synonyma: *D. aurea*, *D. australis*, *D. blagayana*, *D. buxifolia*, *D. collina*, *D. collina* var. *napolitana*, *D. elisae*, *D. napolitana*, *D. oleifolia*, *D. vahlii*

oblasti: Itálie, Kavkaz, Kréta, Malá Asie (Anatolie), V Středozeří

Roste od Itálie po Turecko a Kavkaz v podobě stálezeleného asymetricky větveného kompaktního keře. Dorůstá výšky do 0,5 (i 1,5)m. Listy jsou střídavé, obkopinaté až obvejčité, celokrajné, na okraji chlupaté, tmavězelené, dlouhé do 6cm a široké 2cm. Kvete v 5 - 15tičetných svazečcích, vlastní květy jsou trubkovité, aromatické, růžové, 4četné a dlouhé do 1,4cm. Plodem je peckovice.

Vyhovují mu světlé lesy, mýtiny, křoviny s vápenitým základem.

Daphne skipetarum

Daphne sojakii

Daphne sophia

Daphne souliei

synonyma: *Wikstroemia souliei*

Daphne stapfii

oblasti: Írán

Daphne striata (Lýkovec pruhovaný)

oblasti: Alpy, Itálie, Německo, Švýcarsko

Patří mezi endemity Alp. Dorůstá výšky 5 - 15 (i 35)cm. Větvičky jsou poléhavé. Listy nemají řapíky, mají dlouze kopinatý tvar, kožovitý povrch a jsou seskupené na koncích větví. Kvete intenzivně vonícími růžovými květy ve svazečcích po 8 - 15ks. Plodem je červená peckovice. Je jedovatý.

Vyhovují mu travnaté nebo skalní stráně, louky, štěrbiny, atp.

Daphne sureil

synonyma: *D. shillong*

Daphne tangutica (Lýkovec tangutský)

synonyma: *D. argyi*, *D. retusa*, *D. szetschuanica*, *D. tangutica* var. *wilsonii*, *D. vaillantii*, *D. wilsonii*

oblasti: SZ Čína

Roste v Číně v podobě hustého keře. Dorůstá výšky i šířky 1m. Větve jsou v mládí tlusté. Květenstvím je hlávka, vlastní květy jsou aromatické, růžovofialovočervené a uvnitř světlejší.

Daphne taurica

synonyma: D. sophia subsp. taurica

Daphne taylorii

Daphne tenuiflora

synonyma: D. angustiloba, Wikstroemia angustiloba

Daphne tripartita

Daphne velenovskyi

Daphne wangeana

synonyma: D. holosericea var. wangeana

Daphne wolongensis

Daphne x burkwoodii (Lýkovec Burkwoodův)

Kříženec D. cneorum x D. caucasica. Roste v podobě 1/2opadavého keře. Dorůstá výšky do 1 (i 1,5)m. Listy jsou tmavě zelené a dlouhé 2 - 4cm. Kvete bílými, později světle růžovými květy. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Summerset' - mírně mohutnější; květy růžové se světlejšími cípy
<div>Vyhovuje mu plné slunce</div>

Daphne x hauseri

Daphne x hendersonii

Daphne x hybrida

Daphne x juraseki

Daphne x neapolitana

Kříženec D. sericea a D. cneorum. Roste v podobě kompaktního stálezeleného keře. Dorůstá výšky do 75cm. Listy jsou tmavězelené. Kvete růžovočervenými aromatickými květy, občas i remontuje. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Šťásek' - listy žlutobíle lemované; dokáže remontovat

Daphne x reichsteinii

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Daphne x rossetii

Daphne x sillingeri

Daphne x thauma

Další informace:

http://rostliny.prirodou.cz/?rostlina=daphne_cneorum

<http://www.botany.cz/cs/daphne-mezereum/>

<http://www.garten.cz/a/cz/5154-daphne-bholua-jacqueline-postill-lykovec-bhutansky/>

<http://www.sharkan.net/467-lykovec-slovensky-lykovec-muransky-daphne-arbuscula>

<https://www.rostliny.net/>