

Beitrag zur Kenntnis der Pilz-Flora von Aussee in Steiermark.

I. Basidiomycetes.

Von K. H. Rechinger (fil.), Wien.

Im nachfolgenden übergebe ich eine Liste der im Laufe der Jahre 1912 bis 1929 teils von meinen Eltern, teils von mir in der engeren und weiteren Umgebung von Aussee in Steiermark beobachteten *Basidiomyceten* der Öffentlichkeit.

Die Bestimmung der *Agaricaceae* erfolgte nach A. Ricken, Die Blätterpilze Deutschlands, Österreichs und der Schweiz (Leipzig 1915), die der übrigen Gruppen, soweit sie von uns selbst durchgeführt wurde, zumeist nach dem Vademekum (Leipzig 1918) desselben Autors.

Außer den selbst beobachteten Arten wurden auch sämtliche von Frau P. Demelius¹ aus dem Gebiete angeführten Arten mit aufgenommen; sie sind durch (D.) gekennzeichnet. Sonst fand ich vereinzelt Angaben aus dem Ausseer Gebiet nur in Wettsteins Vorarbeiten z. e. Pilzflora d. Steiermark, Verh. d. z. b. G. Wien, Bd. 35 (1885), p. 529—618.

Vollständigkeit wurde selbstverständlich angestrebt, aber wohl nicht in allen Gruppen erreicht, brachte doch noch jedes Jahr wieder Neues; nicht einmal der trockene, auf einen im Gebiet schneearmen Winter folgende Sommer 1929 war ganz ergebnislos. Ein Nachtrag wird sich also in einigen Jahren als notwendig erweisen, umso mehr, als ich über die Vertreter einiger besonders kritischer Sippen (etwa der Verwandtschaftskreis von *Boletus luridus* und *B. Satanas*) nicht genügende Klarheit erlangen konnte und das gesammelte Material nebst genauer makro- und mikroskopischer Beschreibung der frischen Fruchtkörper erst Spezialisten vorlegen möchte. Auch ein ziemlich reichliches *Ascomyceten*- (besonders *Discomyceten*-) Material harret noch der Bearbeitung.

Wenn ich dennoch nicht mit der Veröffentlichung zögere, geschieht dies einerseits, weil ich in nächster Zeit kaum Gelegenheit haben werde, die diesbezüglichen Studien fortzusetzen, andererseits, weil in einigen Gruppen doch schon ein ziemlich hoher Grad von Vollständigkeit erreicht worden ist (*Agaricaceae*, *Hydnaceae*, *Telephoraceae*).

Auf die Frage über den Wert einer solchen „Pilzflora“ eines kleinen

¹ Beitr. z. Kenntnis d. Cystiden in Verh. zool.-bot. Ges., Wien, Bd. 61—62 (1911 bis 1912) und Beitr. z. Kenntnis d. Pilzflora Aussees in Mitt. naturwiss. Ver. f. Steiermark, Bd. 48 (1911).

Gebietes hier einzugehen, erübrigt sich wohl. Tatsache ist, daß einerseits die Kenntnis der horizontalen und vertikalen Verbreitung der Pilze in den österreichischen Alpen noch recht lückenhaft ist und daß andererseits das hier behandelte Gebiet einiger eigenartiger Züge nicht entbehrt: es sei nur das Fehlen von *Lactarius volemus*, das auffallend seltene und vereinzelte Vorkommen von *Boletus edulis* (beide sonst weit und allgemein verbreitete Typen), ferner das auffallend häufige und massenhafte Auftreten von *Lactarius scrobiculatus* und das verhältnismäßig häufige, wenn auch immer vereinzelt Erscheinen von *Heritium alpestre* erwähnt. Eingehendere derartige Vergleiche mit Nachbargebieten durchzuführen, ist derzeit unmöglich, da über deren Pilzflora nichts bekannt ist.

Für die Bearbeitung einzelner kritischer Gruppen, resp. für Bestimmung oder Revision einzelner Arten bin ich folgenden Herren und Damen zu Dank verpflichtet: Herrn Abb. Gio. Bresaola †, Trient (Verschiedenes); Frau Paula Demelius †, Wien (Verschiedenes); Herrn Prof. Doktor F. v. Höhnelt †, Wien (*Telephoraceae* z. T., einige *Polyporaceae*); Herrn Hofrat Dr. K. Keißler, Wien (Verschiedenes; allgemeine Ratschläge); Herrn Prof. V. Litschauer, Innsbruck (*Telephorac.*, *Hydnac.*, *Polyporac.* p. p.); Herrn Prof. Dr. Heinrich Lohwag (*Gasteromyc.*); Herrn Rolf Singer, Wien (*Russula* p. p.).

In der systematischen Anordnung halte ich mich bezüglich der Gattungen und größeren Einheiten, soweit es sich um dort abgehandelte Gruppen handelt, an das *Vademekum* von Ricken, innerhalb der Gattungen sind die Arten in alphabetischer Reihenfolge angeführt.

In Klammern sind die Nummern der in den „Cryptogamae exsiccatae“ des Naturhistorischen Museums in Wien aus dem Gebiete ausgegebenen Exsikkaten beigefügt.

Die römischen Zahlen nach den Fundortsangaben bedeuten die Monate, in denen die Pilze beobachtet wurden.

Angaben aus angrenzenden Gebieten bringe ich meist in Fußnoten.

Nachfolgend eine Erläuterung der oft lokalen Standortsbezeichnungen:

Alpengarten, am Ostfuß der mit 992 notierten Anhöhe bei Reitern.

Au, am Grundlsee, Buchenbestand am Fuß des „Reschenhorn“.

Auermahdiesen, zwischen Reschenhorn und Hohen Zlaimkogel.

Blaa-Alm, ist Blaa der Spezialkarte.

Bachwirt = „Bach“ in Lupitsch.

Bärenmoos, feuchte Waldlichtung im Mischwald am Fuß des Tressenstein, zirka 850 m.

Dachsteinblick in der Ortschaft Obertressen.

Fachwerk, auenartiger Bestand von *Salix incana* und *Alnus incana* an der Traun, am Weg nach Grundlsee, seit vorigem Jahr (1928) abgeholzt.

Froschwald, vorwiegend Nadelwald, zwischen den Ortschaften Obertressen und Untertressen, zirka 7—800 m.

Gamsstelle, am Fuß der Trisselwand ober dem Alt-Ausseersee,

zirka 1000 m.

Henatritt-Alm = Hech-Alm.

Hotel Bellevue (jetzt „Seeblick“) am Westende des Grundl sees.

Hotel Elisabeth, siehe Praunfalk zwischen Aussee und Alt-Aussee.

Ischlerstraße, die über die Ortschaften Reitern und Lupitsch und über die Pötschenhöhe nach Goisern und Ischl führende Straße.

Lenauhügel, mit alten Rotbuchen bestandener Hügel nächst der Ortschaft Reitern.

Lerchenreit = Lerchenreith.

Loitzl, in der Ortschaft Obertressen.

Mahdiesen, siehe Auermahdiesen.

Nagelsteig, Aufstieg aus dem Redtenbachtal über das Nagelbründl zur Schwarzenbergalm, 800—1300 m.

Pfeiferalm = Pfeiferin.

Pflindsberg = Pflinsberg der Spezialkarte.

Pötschen = Pötschenhöhe der Spezialkarte.

Ramgut, in der Ortschaft Obertressen.

Riebeis, Vorberg der Trisselwand, zirka 1300 m.

Sattel = Tressen der Spezialkarte, 1000 m.

Schoberwiesberg, zum Stock der Trisselwand gehörig.

Seewiese = Seewiesen der Spezialkarte.

St. Leonhard, in der Ortschaft Strassen.

Tannenwirt, an der Straße zwischen den Ortschaften Reitern und Lupitsch.

Teichschloß = Teichschlüssel der Spezialkarte.

Traunmühle, in der Ortschaft Archkogel, zwischen Aussee und Grundlsee.

Verwaltersteig, führt am West- und Nordabhang des Tressensteines entlang, zirka 800 m.

Wasenmeisterlacke, bei der Ortschaft Gallhof.

Wasnerin = Wasner der Spezialkarte.

Weißbachtal, zwischen Hohen Zlaimkogel und Kanzlerfall.

Zirbe („Zirm“), altes kultiviertes Exemplar von *Pinus Cembra* in der Ortschaft Reitern, das am 3. Juli 1929 einem Sturm zum Opfer fiel.

Substrat durchaus Kalk.

Hymenomycetes.

Agaricaceae.

Agariceae.

1. *Amanita excelsa* (Fr.).

Buchenwald am Fuß des Gallhofkogels, VII; Froschwald, VII.

2. *A. mappa* Batsch.

Alt-Aussee.

3. *A. muscaria* L.

Totes Gebirge: Wald unter der Gößleralm, zirka 1200 m, VII; Nagelsteig, IX; Ober-Tressen Wald, VII; Froschwald, VII.—IX.

4. *A. pantherina* (Cand.).

Waldwiese am Sattelweg, VII.—VIII.

5. *A. porphyrea* (Fr.)

Wald beim Tannenwirt, VIII.

6. *A. rubescens* Fr.*

Wald beim Tannenwirt, VIII.; Sattelwald, Wald bei der Hechalm, zirka 1000 m, VI.; Froschwald, VI.

7. *A. vaginata* Bull.

Torfmoor unter dem Teichschloß, IX. (braun und grau); Wald bei der Ruine Pflindsberg, IX.; Totes Gebirge: Wald unter der Gößleralm, zirka 1200 m, VII.; Salzofen, zirka 1600 m, VII.; Wald beim Tannenwirt, VIII., am Sattelweg und im Froschwald, VII. (eine üppige, mehr braune Form und eine zartere graue); Wald auf der Hechalm, VI.; Froschwald, VIII.; Buchenwald am Fuß des Gallhofkogels, VII.

8. *A. verna* Bull.

Wald ober dem Alpengarten, IX.

9. *Lepiota amianthina* (Scop.).

Moorwiesen bei der „Wasnerin“, IX.; Waldwiesen um den Alt-Ausseer-See, IX.

10. *L. carcharias* Pers.

Tressenstein, VIII und IX.; Lenauhügel, VIII.

11. *L. clypeolaria* Bull.

Weideplätze bei Kainisch (Weideform 4 cm), IX.; Ober-Tressen im Wald, IX.; Wald am Weg zur Gamststelle, VII.; Sattelwald, IX.

12. *L. cristata* Bolt.

Wald bei Aussee, VIII.; Wald bei der „Zirbe“, IX.; Buchenwald bei der Wasnerin, IX.; Alt-Aussee — Seewiese, X.; gesellig auf kleinen Holzstücken im Wald, am Weg nach Grundlsee, VII.; Nadelwald bei der Ortschaft Saarstein, VII.

13. *L. demisannula* (Secr.).

Aussee, gegen Grundlsee (Traunmühle) mit *Lep. Friesii*, VII. (Cryptog. exsicc. Nr. 2405).

14. *L. Friesii* Lasch.*

Ober-Tressen, VIII.; Traunmühle auf Holzmulm, VII.

15. *L. lenticularis* Lasch.

Wald auf der Obertressen, IX.

16. *L. procera* Scop.

Mitterndorf, am Fuß des Rabenkogels, VIII.; Wald am Sommersbergsee, VII.; am Weg zum „Sattel“, VII.; im Bärenmoos, VIII.

* Wald ober dem Rohrmoos bei Schladming, zirka 1200 m, VIII.; im Krummholz auf dem Neudeck bei Schladming, VIII.

* Chorinskyklause—Knallalm (bei Goisern), IX.

17. *L. strangulata* (Fr.).
Wald, Obertressen, VIII.; ? da Exemplar unvollständig (leg. Heim),
18. *Tricholoma albobrunneum* Pers.
Im Froschwald, VII. und IX.; Lerchenreit (D.).
19. *T. album* (Schff.).
Wiesen ober der Wasenmeisterlacke, IX.
20. *T. Ambrosii* (Bres.).
Wegrand, Alt-Aussee — Bachwirt, VII.
21. *T. argyraceum* Bull.
Froschwald, IX. (Cryptog. exsicc. Nr. 2508); Wald bei der Zirm, IX.
22. *T. aurantium* Scheff.
In manchen Jahren sehr häufig im Froschwald, IX. (Cryptog. exsicc. Nr. 2317); Waldrand Gallhofkogel, VII.; Mitterndorf, Fuß des Rabenkogels, VIII.; Wald am Sommersbergsee, VII, Alt-Aussee — Seewiese X.; Verwaltersteig — Seewiese, X.; Wälder am Grundlsee, IX.
23. *T. atrocinereum* Pers. — det. Demelius.
Aussee, VIII.
24. *T. cartilagineum* (Bull.).
Unter Acer pseudoplatanus auf den Mahdwiesen, IX.
25. *T. cinerascens* (Bull.).
Froschwald, VIII.
26. *T. crista* Fr.
Weideplätze bei Kainisch, IX.; Alt-Aussee gegen Lupitsch auf gemähten Wiesen, IX.; Weißenbach bei Aussee, IX.
27. *T. cognatum* Fr.
Nadelwald Aussee (D.).
28. *T. columbetta* (Fr.).
Wald am Abstieg vom Sattel nach Alt-Aussee vor den Buchen, IX.
29. *T. comatum* Schw.
Ressenweg, X.; Verwaltersteig — Seewiese, X.
30. *T. compactum* (Fr.).
Froschwald, IX.
31. *T. conglobatum* Vitt.
Radlingwald, VIII.; Wald beim Tannenwirt, VIII.; Lenauhügel, IX.; Froschwald, VII.; an der Straße nach Alt-Aussee, IX.
32. *T. equestre* L.
Vereinzelt in Wäldern, VIII., IX.
33. *T. flavobrunneum* Fr.
Alt-Aussee, im Wald, VIII.
34. *T. fumosum* (Pers.)
Lenauhügel, VII.; Mischwald, unweit des Bärenmooses, VIII.
35. *T. goniospermum* (Bres.).
Praunfalk an der Traun, VI.
36. *T. grammopodium* Bull.

- Ressenweg, X.; Wiesen Alt-Aussee, VII.; Aussee auf Wiesen gesellig, IX.
37. *T. humile* (Pers.).
Wiese Obertressen, VII.; Buchenhain Alt-Aussee gegen den Sattel, IX.
38. *T. ionides* Bull.
Wald unter dem „Alpengarten“, IX.
39. *T. irinum* Fr.
Göbl., X.
40. *T. lascivum* Fr.
Aussee-Grundlsee, IX.
41. *T. melaleucum* Pers.
Alt-Aussee, Uferwald, VIII.; Waldrand Gallhofkogel, VII.; Froschwald, IX.
42. *T. nudum* (Bull.).
Wald auf dem Sattel, VIII.; Froschwald, IX., blaßviolett bis 12 cm.
43. *T. portentosum* Fr.
Aussee in Wäldern, VIII., IX., in manchen Jahren nicht selten, in Graz Miesling genannt (det. Fritsch).
44. *T. psammopus* (Kalchbr.).
Fuß des Gallhofkogels unter Lärchen, VII.
45. *T. robustum* Schff.
Mahdwiesen, IX.; Wald am Sommersbergsee, VIII.; Totes Gebirge: Schweibenwiese — Grauser Steg, IX.; Salzburg: Paß Gschütt — Trauwandalm bei Abtenau, IX.
46. *T. rutilans* Schff.
Totes Gebirge: Klammkogel, VIII.; Wald auf dem Tressenstein, VII.; Froschwald, VII., VIII. (kleine Exemplare schon Mitte Juli), Klopfsattel unter Krummholz (D.).
47. *T. saponaceum* Fr.
Froschwald, VIII., IX. (in manchen Jahren sehr häufig).
48. *T. scalpuratum* Fr.
Fahrweg auf den Sattel, VIII.; Alt-Aussee zur Seewiese, X.; Fuß des Gallhofkogels, VII.; Lenauhügel, VII.; Wald bei der Traummühle, IX.
49. *T. sudum* Fr.
Pötschen, X.
50. *T. sulphureum* Bolt.*
Verwaltersteig-Seewiese, X.
Froschwald, VIII., IX. (in allen Teilen grüngelb, nach Gas riechend, in manchen Jahren selten).
51. *T. terreum* Schff.**
Nagelsteig, IX.; Alt-Aussee — Seewiese, X, im Krummholz zwischen Rinnerkogel und Schönberg, zirka 1800 m, IX.; Wald bei der Ruine Pflinds-

* Oberste Waldregion auf dem Neudeck bei Schladming, zirka 1850 m, VIII.

** Nied. Tauern: Alpenmatten oberhalb des Oberhüttensees, zirka 1800 m, VIII.

berg, IX., Froschwald, VII.; Lenauhügel, VIII.; Fachwerk, VIII.; Wald beim Tannenwirt, VIII., IX. (in manchen Jahren häufig).

52 I. *T. tigrinum* Schiff.

Alt-Aussee — Seewiese, X.; kleiner Sattel beim Bartlhof, X.; Sattelweg, X.; Wald auf der Obertressen, IX.

52 II. *T. tumidum* Pers.

Sarsteinwald (D.).

52 III. *T. vaccinum* Pers.

Im Mischwalde beim „Loitzl“, X.; Wald bei Pflindsberg, IX.; Wald ober dem Rohrmoos bei Schladming, VIII.; Salzatal — Gößl, VIII.; Gallhofkogel, VIII.; Wald am Fuß des Rötelsteines, VII.; Waldrand der Mahdwiesen, IX.; Wald am Ödensee, VIII., IX., in manchen Jahren sehr häufig.

53. *T. virgatum* (Fr.).

Lenauhügel, VIII.; im Weißenbachtal und im Radlingwald, IX.

54. *Clitocybe cacabus* Fr.

In Wäldern bei Aussee, VIII.

55. *C. candida* Bresad.

Wald am Ödensee, IX.

56. *C. catinus* (Fr.).

Buchenhain vor Weißenbach, IX.

57. *C. cerrusata* Fr.

Wald bei der Blaalm, IX.; Fichtenwald bei Alt-Aussee, IX.

58. *C. cyathiformis* Bull.

Buchenwald beim Bartelhof, VI.; Aussee, auf Wiesen, Ende IX.

59. *C. dealbata* Sow.?

Froschwald, VIII.

60. *C. diatrete* Fr.?

Froschwald, auf Nadeln (kleine Exemplare), VIII., vielleicht junge Exempl. v. *C. infundibiliformis*?

61. *C. fritilliformis* (Lasch.).

Froschwald, zwischen Holzstückchen, IX.

62. *C. gallinacea* Scop.?

Moosige Mauer an der Ischlerstraße, IX.

63. *C. geotropa* Bull.

Wiesen in der „Seewiese“ bei Alt-Aussee, X.; Ressenweg, X.; Obertressen, IX.; Wald bei Aussee, IX.; Waldrand unweit der Zirbe, IX.; lichte Waldstellen gegen den Sommersberg-See, IX.; Wald am Sattel, VIII.

64. *C. hirneola* Fr.

Verwaltersteig — Seewiese, X.

65. *C. infundibiliformis* Scheff.

Totes Gebirge: Wald unter der Gößleralm, zirka 1100 m, VII.; Wald am Sommersbergsee, VII.; bei Mitterndorf, Fuß des Rabenkogels, VIII.; am Sattelweg im Fichtenwald, VI.; Ramgut, VI.—IX.; Froschwald, VII.; Buchenwald beim Bartlhof, VI.

66. *C. laccata* Scop.
 Var. *amethystina* (Bolt.). Kleiner Sattel b. Bartlhof, vereinzelt, X.
 Var. *rufocarpa* (Fr.), Torfmoor unter dem Teichschloß, IX. Torfmoor beim Ödensee, IX.
 Var. *tortilis* (Boll.) (det. Ricken) Tressenstein, VII. Var. nicht näher bestimmt: Loitzlwald, VII.; Verwaltersteig, VIII.; Sattel, zirka 1000 m, VIII.
67. *C. lentiginosa* Fr.
 Kainisch auf Moorwiesen, IX.
68. *C. mellea* Wahl.
 Holzschlag auf dem Riebeis, VII. In manchen Jahren sehr häufig, VII. bis X.; Froschwald, VI.; Bärenmoos, VII.; an der Promenade nach Alt-Aussee, IX, häufig in verschiedenen Formen; seit Mitte IX. besonders häufig. Aussee, Sarsteinwald (D).
 Var. *pinetorum* (det. Bresadola). In Unmassen im Froschwald, IX.
69. *C. nebularis* Batsch.
 Verwaltersteig, Seewiese, X.; Nagelsteig, IX.; Sattelweg, IX.; Wald beim Bartlhof, IX.
70. *C. obbata* Fr.
 Wald beim Loitzl, X.; Weißenbachtal, IX.
71. *C. odora* Bull.
 Froschwald, VII.; Wald beim Tannenwirt, VIII.; auf dem Sattel, IX.; Lenauhügel, VII.
72. *C. subalutacea* (Batsch).
 Am Sattelweg, VII.
73. *Omphalia campanella* Batsch.
 Auf faulenden Fichtenstrünken um Aussee. Lebend in allen Teilen orange-gelb. Froschwald, VII.; Lerchenreit (D.).
74. *O. epichysium* (Pers.).
 Auf morschem Holz am Ödensee, VII., VIII.
75. *O. fibula* (Bull.).
 Froschwald, VII.; Fuß des Radling, VIII.; Lerchenreit (D.).
76. *O. litua* Fr.
 Fuß des Radling, VIII.
77. *O. scyphiiformis* Fr.
 Auf moorigen Heidewiesen mit schütterem Baumwuchs, Koglerwiese bei Alt-Aussee, IX.
78. *O. stellata* Fr.
 Torfmoor unter dem Teichschloß. Hut bis 1.5 cm breit, IX.
79. *O. telmatiaea* Berk et Cooke.
 Lerchenreit (D.).
80. *O. tricolor* Schw.?
 Gipfel des Loser, zirka 1830 m, VII.
81. *O. umbilicata* (Schff.).
 Ober-Tressen, unter Laubbäumen, VII.

82. *Mycena alcalina* (Fr.).
Wald beim Hotel Elisabeth, VI.; Froschwald, VII.; Ödensee, auf einem alten Fichtenstrunk, VIII.
83. *M. amicta* (Fr.).
Lenauhügel, unter Buchen bei der Villa Eschenburg, VIII.
84. *M. atroalba* Bolt.
Vereinzelt im Froschwald, VI., IX.
85. *M. atrocyanea* (Batsch).
Cystiden spärlich. Wälder bei Aussee, VII.
86. *M. aurantiomarginata* (Fr.).
Sattelwald, auf Fichtennadeln, IX.
87. *M. avenacea* Fr.
An einem moosigen Bretterzaun unter Buchen bei Aussee, IX.
88. *M. acicula* (Schff.).
Auf Moos auf dem Erdboden im Gebüsch, VII.
89. *M. calopus* (Fr.).
Dichtrasig unter einer Eiche, Obertressen, VII.
90. *M. corticola* (Pers.).
Lenauhügel, auf Eichenrinde, VII.
91. *M. dilatata* (Fr.).
Wald beim Tannenwirt, VIII.
92. *M. epipterigia* Scop.
Im Froschwald, IX, X.; Alt-Aussee — Seewiese besonders häufig, X.; Sattelweg an Baumstumpf, VI.; auf Buchenlaub im Bärenmoos, VIII.; überhaupt häufig um Aussee im Moos der Wälder, Alt-Aussee, Wildnis (D.).
93. *M. excisa* (Lasch.).
An Fichtenstrünken am Verwaltersteig, VIII.
94. *M. galericulata* Scop.
Wald in der Seewiese an Baumstümpfen, X.; häufig im Moos der Wälder um Aussee, VIII., IX.
95. *M. galopus* (Pers.).
Froschwald, VII.
96. *M. lactea* (Pers.).
Aussee, vereinzelt zwischen Moos, VII, IX.
97. *M. lineata* Bull.
Alt-Aussee, Stummer-Alpe (D.).
98. *M. metata* Fr.
In Nadelwäldern, VIII.
99. *M. olida* Bresad.
Zwischen Moos an Bäumen im Kurpark in Aussee, IX.
100. *M. pithya* (Fr.)
Auf Tannennadeln, Praunfalk, VII.; auf Fichtennadeln, VII. (weiß).
101. *M. prolifera* (Fr.).
Wald bei der „Zirbe“, IX.

102. *M. pura* Pers.
Wald beim Alpengarten, im Moos, IX.; Lerchenreit (D.).
103. *M. rorida* (Fr.).
Am Ödensee, VII.
104. *M. rosella* (Fr.).
Froschwald, IX.; Wald beim Tannenwirt, VIII.
105. *M. rubromarginata* (Fr.).
Froschwald, an Strünken und Ästchen, VII.
106. *M. rugosa* (Fr.).
Froschwald, VII.; Bärenmoos, VIII.; Sattelwald, VIII.
107. *M. sanguinolenta* (Schw.).
Wald an der Ischlerstraße, im Moos, VII.
108. *M. stannea* (Fr.).
Waldränder, VIII.
109. *M. supina* (Fr.).
Beim „Loitzl“ an Aesculus-Stämmen, VII.
110. *M. tintinabulum* (Fr.).
Nagelsteig, auf Buchenholz, IX.; Zlaimkogel, auf Baumstumpf, IX.
111. *M. umbellifera* (Schff.).
Ischlerkogel bei Aussee, auf Holz (D.).
112. *M. vitilis* (Fr.).
Moorwiesen am Ödensee, VIII.
113. *M. vulgaris* (Pers.).
Seewiese, auf Nadeln, X.; Gamsstelle, auf Krummholznadeln, VII.
114. *Collybia acervata* (Fr.).
Oberer Grundlsee, unter *Acer Pseudoplatanus*, VII.; Aussee gegen Grundlsee, VII.
115. *C. cirrhata* Schm.
Mit Sclerotien auf modernden Nadeln zwischen Aussee und Grundlsee, IX.
116. *C. conigena* (Pers.).
Auf Fichtenzapfen im Wald beim Barthhof, VI.
117. *C. dryophila* (Bull.).
Froschwald, VII.; Gamsstelle, unter Krummholz, zirka 1000 m, VII.
118. *C. ephippium* (Fr.).
Obertressen, IX.
119. *C. ingrata* Schum.
Lerchenreit (D.); Ischlerkogel (D.).
120. *C. longipes* (Bull.).
Froschwald, Grundlsee, VII.—IX. Um Aussee ein charakteristischer Waldpilz, stets einzeln, aber fast überall.
121. *C. mucida* (Schrad.).
Verwaltersteig-Seewiese, auf Buchen, IX.; auf einem Buchenstamm am Abstieg vom Tressenstein, IX.; Gallhofkogel, auf Ahornrinde, VII.; oberer Weg nach Grundlsee, auf Ahornrinde, VIII.

122. *C. platyphylla* (Pers.).

Im Buchenhain von Grundlsee, VII.; Froschwald, VIII.; Holzschlag auf dem Riebeis, VII.

123. *C. radicata* (Relh.).

Totes Gebirge: Hohe Schrott, zirka 1400 m, VIII.; Wald unter der Gößleralm, 11—1300 m, VII.; an der Ischlerstraße, VII.; Froschwald (mitunter mit rosenfarbigen Lamellen), VII.; Sattel, zirka 1000 m, häufig, IX.; Buchenwald ober dem Bartlhof, VII.

124. *C. rancida* (Fr.).

Ahornwald beim Bartlhof, VIII.

125. *C. stritula* Fr.

Pötschen im Nadelwald, zwischen Holzstückchen, X.

126. *C. tuberosa* (Bull.).

Sattelwald, auf Fichtennadeln, IX.

127. *C. velutipes* (Curt.).

Wald am Wege Aussee nach Grundlsee, VII.; an einer Roßkastanie, Straße in Grundlsee, IX.; Lenauhügel, im Buchenwald, VI.

128. *C. xanthopus* (Fr.).

Schoberwiesberg, unter Krummholz, VII.

129. *Pleurotus decorus* Fr.

Wald auf der Pötschen-Höhe, VIII.; Wald gegen die Henatritalm, VIII.; an einem Fichtenstrunk, gesellig, VIII.

130. *P. ostreatus* (Jacq.).

Am Weg nach Grundlsee, VII.; auch bei Bellevue (jetzt Seeblick), VII.

131. *P. perpusillus* (Fr.) (= subversus).

An dünnen Ästen, IX.

132. *P. podoleucus* Fr.

Sattel, einzeln am Fuß eines Baumes, IX.

133. *P. porrigens* (Pers.).

Froschwald, VII.

134. *P. septicus* (Fr.).

An Nadelholzzweigen, Fuß des Rötelsteines, IX.

135. *Paxillus atrotomentosus* (Batsch.).

Oberer Weg nach Grundlsee, an altem Baumstumpf, VII.; Wald unter der großen Zirbe, IX.

136. *P. involutus* Batsch.

Torfmoor unter dem Teichschloß, IX.; Wegränder bei der Villa Fröhlich, IX.; Lenauhügel, am Grund eines Baumes, VIII.; Wald bei der Zirbe, IX.; Nadelwald bei der Ortschaft Sarstein, VII.

137. *P. lepista* (Fr.).

Auf Buchenlaub am Ödensee, VIII.

138. *P. panuoides* (Fr.).

Aussee, Garten der Villa Braun, VII.

139. *P. prunulus* Scop.*

* Chorinskyklause—Knallalm, IX.

Wald bei der Ruine Pflindsberg, IX.; Nagelsteig, IX.; Weg auf den Sattel, VII.; Wald am Ödensee, IX.; Grundlsee, beim Hotel Bellevue (Seeblick), VII.; unter alten Buchen Lenauhügel zahlreiche große Exemplare einen „Hexenring“ bildend, VI.; Lerchenreit (D.).

140. *Inocybe asterospora* (Quél.).

Schoberwiesberg, VII.

141. *I. Bongardi* Weinm.

Froschwald, VII. (rot anlaufend mit Birnengeruch); Wald am Fuß des Sarstein, VIII.

142. *I. caesariata* Fr.

An der Quelle am Weg auf den Sattel, VI.

143. *I. descissa* (Fr.).

In einem Garten in der Braungasse, Aussee, VII.; am Weg zur Obertressen, VI.

144. *I. destricta* Fr.

Gebüsch bei der Villa Geier, Obertressen, VII.; Weg zur Seewiese, X.; am oberen Weg nach Grundlsee, VI.

145. *I. fastigiata* Scheff.

Wald an der Ischlerstraße, VII.; Obertressen, im Wäldchen bei der Villa Vogelsang, VII.; Totes Gebirge: Im Wald auf dem Schoberwiesberg, zirka 1100 m, VIII.

146. *I. frumentacea* Bull.

Wald am Ödensee, IX.

147. *I. fulvella* (Bres.).

Froschwald, Lamellen rosenfarbig, Stiel violett, VII.

148. *I. geophylla* Sow.

Wald am Weg nach Grundlsee, VII.; im Bärenmoos, VIII.; Froschwald, VII.; Totes Gebirge: Im Wald auf dem Schoberwiesberg, zirka 1100 m, VIII.

149. *I. glabripes* Ricken.

Weg auf den Sattel, VI.; Wald am Fuß des Sarsteins, VIII

150. *I. hirtella* (Bres.).

Obertressen, Wäldchen bei der Villa Vogelsang, VIII.

151. *I. lanuginosa* (Bull.).

Froschwald, auf Baumstrünken, VIII.

152. *I. lucifuga* Fr.

Elisabethpromenade, VII.; Lerchenreit (D.).

153. *I. pyriodora* Pers.

Am Weg auf den Sattel, VIII.; Wald am Ödensee, IX.; Froschwald, VIII.; Praunfalk, VII., Wald bei der Ortschaft Sarstein, VII.

154. *I. relicina* (Fr.).

Froschwald, VII., VIII.; am Weg auf den Sattel, häufig, VI, VII.

155. *I. salicina* Fr.

Nadelwald auf dem Tressenstein, VI.; Froschwald, VIII.

156. *I. Trinii* Wim.
Lenauhügel, im Buchenwald, VI.
157. *Hebeloma claviceps* Fr.
Beim Birkenbrückel nächst dem Teichschloß, X.; Buchenwald bei der „Wasnerin“ (fraglich).
158. *H. crustuliniforme* (Bull.).
In Wäldern um Aussee, mitunter in großer Menge (IX. 1915); Wald auf dem Sattel, VII.; Nagelsteig, IX., Verwaltersteig-Seewiese, X.; Lenauhügel, VIII.; Wald am Grundlsee, IX.
159. *H. diffractum* (Fr.).
Im Nadelwald unter der Pfeiferalm, VII.
160. *H. fusipes* Bresad.
Wald bei der Zirbe, IX.; Froschwald, VII.
161. *H. longicaudum* Pers.
Traunmühle, IX.
162. *H. mesophaeum* Fr.
Obertressen, an Zäunen, IX.; lichter Wald bei der Zirbe, IX.; am Alt-Ausseer See, IX.
163. *H. punctatum* Fr.
Im lichten Buchenwald am Fuß des Gallhofkogels, VIII.; am Weg zum Sattel, VII., gesellig wachsend; bei Alt-Aussee, IX.
164. *H. spoliatum* Fr.
Unter Gebüsch auf Wiesen bei Kainisch, IX.; am Ödensee, VII.
165. *H. strophosum* Fr.
Im Alpengarten, IX.
166. *Myxaciium collinitum* Pers.
Lenauhügel, VIII.; Buchenwald am Grundlsee, VII.; Wald auf dem Radling, VIII.; *var. repanda* Ricken: auf dem Sattel, IX.
167. *M. delibutum* Fr.
Am Alt-Ausseer See, VIII.
168. *M. mucifluum* Fr.
Wald beim Tannenwirt, VIII.; Knappenwald, VIII.; Buchenwald auf dem Gallhofkogel VIII (mit Cystiden).
169. *M. nitidum* (Schff.).
Auf dem Sattel, IX.
170. *M. pluvium* Fr.
Wald am Fuß des Rötelsteines, VII.; Froschwald, VIII., IX.; am Weg nach Grundlsee, IX.; auf dem Sattel, VIII.
171. *Phlegmacium arquatatum* Fr.
Froschwald, IX.
172. *P. calochroum* Pers.
Auf dem Sattel, IX.; Wald am Ödensee, IX.
173. *P. camphoratum* (Fr.).
Am Ressenweg, X.; im Mischwald beim „Loitzl“, X.; im Nadelwald an der Traun in Aussee, VII.; Buchenwald auf dem Gallhofkogel, VIII.

174. *P. cliduchum* Fr.
Fuß des Radling, Weißenbach, IX.
175. *P. coerulescens* Scheff.
Froschwald, IX. 1912, sehr häufig (det. Bresadola); Gebüschrand ober Großbauer (Aussee), VIII., IX. 1915, häufig.
176. *P. croceocoeruleum* Fr.
Wald am Alt-Ausseer See, IX.
177. *P. elegantius* Fr.
Verwaltersteig-Seewiese, X.; Mischwald beim „Loitzl“, X.; am Res-senweg, X.; Nadelwald bei der Ortschaft Sarstein, VII.
178. *P. fulgens* Schw.
Froschwald, VIII., IX.; Gallhofkogel, VIII.; Weg zum Bärenmoos, VII.
179. *P. glaucopus* Schff.
Weißenbach, VIII., IX. In manchen Jahren dort häufig.
180. *P. infractum* Pers.
Froschwald, VIII., IX.; Au am Grundlsee, unter Buchen, VIII.; Sattel, VIII.; Lenauhügel, VIII.
181. *P. largum* Busch.
Froschwald, VII.—IX.; Tressenstein, X.
182. *P. multiforme* Fr.
Ressenweg, X.; Weg zur Seewiese, X.; am Ödensee, VII., IX.; im Mischwald auf dem Zlaimkogel, IX.
184. *P. orichalceum* Batsch.
Wald bei der Ruine Pflindsberg, IX.; Froschwald, VII.—IX.; am Öden-see, IX.; im Grundlseer Wald, VIII.
185. *P. pansa* (Fr.).
Sattel, IX.
186. *P. percome* (Fr.).
Am Ödensee, VII.
187. *P. prasinum* (Schff.).
Froschwald, am Beginn des Weges auf den Sattel, IX.
188. *P. purpurascens* (Fr.).
Weißenbach, IX.
190. *P. russum* Fr.
Verwaltersteig-Seewiese, X.
191. *P. subsimile* (Pers.).
Wald ober dem „Loitzl“, VII.
192. *P. sulfurinum* Quel.
Sattel, IX.
193. *P. triumphans* (Fr.).
Knappenwald, VIII.
194. *P. turbinatum* (Bull.).
Buchenwald ober dem Alpengarten, IX.; Buchenwald, Sattel — Alt-Aussee, IX.; Wald am Fuß des Rötelsteines, VII.

195. *P. varium* Schw.
Wald am Ödensee, IX.
196. *Inoloma alboviolaceum* Pers.?
Hie und da in Wäldern.
197. *I. muricinum* Fr.
Wälder um Aussee, VIII.; am Ödensee, VII.; Froschwald, VIII.; Lenau-
hügel, unter Fichten, VIII.
198. *I. opimum* Fr.
Am Ödensee, IX.; Lenauhügel, VII.
199. *I. sublanatum* Sow.
Wald beim Tannenwirt, VIII.; Buchenwald auf dem Sattel am Weg
nach Alt-Aussee, IX. (olivbraun, nach Rettich riechend); Weg nach Grundl-
see im Wald, VII.; Weg zur Seewiese, X.; Lenauhügel, VII.
200. *I. tophaceum* (Fr.).
Weg nach Grundlsee, im Wald mit der vorigen Art, VII.
201. *I. traganum* Fr.
Häufig in Wäldern.
202. *I. violaceocinereum* (Pers.).
Froschwald, IX. Geruch rettichartig.
203. *I. violaceum* L.
Wald beim Tannenwirt, VIII.; Froschwald ziemlich selten, VIII.
204. *Dermocybe anthracina* (Fr.) ?
Wald am Fuß des Rötelsteines, VII.
205. *D. azurea* Fr.
Wald beim Dachsteinblick, X.
206. *D. cinnamomea* (L.).
Froschwald, VII.; Wald am Ödensee, IX.; Fuß des Radling, VIII.
207. *D. colymbadina* Fr.
Wald beim Tannenwirt, VIII.; kleiner Sattel am Alt-Aussee See, VIII.;
Weg zum Bärenmoos, VII.
208. *D. malicoria* Fr.
Im Fichtengestrüpp am Ödensee, VII.; Weißenbach, IX.
209. *D. miltina* (Fr.).
Wald auf dem Radling, VIII.; Froschwald, IX.
210. *D. orellana* Fr.
Wald am Ödensee, IX. Riecht stark anisartig.
211. *D. raphanoides* (Pers.).
Wald am Fuß des Rötelsteines, VII.
212. *D. sanguinea* Wulf.
Fuß des Radling, VIII.; Wald bei Lerchenreit, VII.; Abstieg vom Sattel
gegen Alt-Aussee, IX.
213. *D. valga* (Fr.).
Froschwald, VII.
214. *D. veneta* (Fr.).
Froschwald, IX.

215. *Telamonia biformis* (Fr.) ?
Bei Aussee, VIII., IX.
216. *T. brunnea* Pers.
Weißenbach, IX.; Wald bei Alt-Aussee, X.
217. *T. bruneofulva* Fr.
Wald am Ödensee, IX.
218. *T. bulbosa* Sow.
Waldwiese am Fuß des Gallhofkogels, IX.
219. *T. evernia* (Fr.).
Lenauhügel, VIII.
220. *T. flexipes* (Pers.) ?
Sattel, IX.
221. *T. gentilis* (Fr.).
Wald bei der Auer-Mahdwiesen, IX.
222. *T. glandicolor* Fr.
Verwaltersteig-Seewiese, X.; Weißenbach, Weideplatz unter Lärchen,
IX.
223. *T. illipodia* Bull.
Wald am Ödensee, IX.
224. *T. licinipes* Fr. ?
Weg zur Seewiese, X.
225. *Hydrocybe balaustina* Fr.
Lenauhügel, VIII., Sporen rundlich.
226. *H. obtusa* (Fr.).
Froschwald, VII.
227. *H. privigna* (Fr.).
Nadelwald am Weg von Aussee nach Grundlsee, VII.; am Weg zur
Pfeiferalm, VIII.; Lenauhügel, VIII.
228. *H. scandens* Fr.
Lichte Wälder bei Aussee, VIII.
229. *H. subferruginea* (Batsch.).
Wald an der Ischlerstraße, VII.
230. *H. tortuosa* Fr.
Froschwald, IX.
231. *H. uracea* (Fr.).
Nadelwald an der Traun bei Aussee, VII.
232. *Pholiota adiposa* (Fr.).
Blaa-Alm, IX.
233. *Ph. blattaria* (Fr.).
Moorwiesen zwischen Kainisch und Ödensee, VIII.
234. *Ph. caperata* (Pers.).*
Salzatal-Göbl, VIII.; im Wald gegen den Sommersbergsee, VII.; Frosch-
wald, VIII.; Wald auf dem Radling, VIII.; Sattel im Wald, VIII.

* Sehr häufig im Wald am Neudeck bei Schladming, VIII.

235. *Ph. curvipes* (Fr.).

An alten Baumstrünken bei Aussee, sehr kleine Exemplare, VIII.

236. *Ph. marginata* Batsch.

Ödensee, IX.; Wald bei der Ortschaft Sarstein, VII.; Wald an der Ischlerstraße bei Aussee, VII.

237. *Ph. mutabilis* (Schff.).

Am oberen Grundlseeweg, VII.; Obertressen, an alten Brettern, VII.; am Weg auf den Sattel, VI.—VIII.; bei der Ortschaft Sarstein, VII.; Wald beim Hotel Elisabeth, VI.

238. *Ph. praecox* (Pers.).

Obertressen, auf Wiesen, VII.; Lenauhügel, VIII.

239. *Ph. spectabilis* Pers.-Maire.

Blaa-Alm, Waldrand, sehr selten, X.

240. *Ph. squarrosa* Fr.

Aussee, am Grund eines Apfelbaumes, VIII.

241. *Ph. subsquarrosa* (Fr.).

Aussichtsplatz auf dem Sattel, VII.

242. *Ph. togolaris* Bull.

Im Moos im Nadelwald am Weg zur Seewiese, X.; im Wald bei der Zirbe, im Moos, IX.

243. *Ph. tuberculosa* (Fr.).

Froschwald, IX.

244. *Ph. unicolor* Fl. Dan.

Bei Aussee, VIII. (det. P. Demelius).

245. *Flammula astragalina* Fr.

Am Alt-Aussee See an Baumstümpfen, IX.

246. *F. hybrida* (Fr.).

Zwischen Holzstückchen, Gallhofkogel, X.; auf Fichtenstrunk im Wald bei der Zirbe, IX.

247. *F. liquiritiae* Pers.

Ressenweg, X.; Aussee, auf Schindeln in der Braungasse, VIII.

248. *F. sapinea* (Fr.).

Am Ödensee, VII.; Wald beim Tannenwirt, VIII.; Froschwald, IX.

249. *F. spumosa* Fr.

Alt-Aussee, Fuchsbauerwald (D.).

250. *Naucoria centunculus* (Fr.).

Grundlsee beim Hotel Bellevue (Seeblick), auf einem alten Buchenstumpf, VIII.

251. *N. cidaris* Fr.

Torfmoor nächst Neuhofen (bei Grubegg) im Sphagnum, IX.

252. *N. erinacea* (Fr.).

Auf alten Zweigen von *Salix incana*, im Fachwerk, VIII.

253. *N. furfuracea* Pers.

Beim Bartelhof, X.

254. *N. pellucida* Bull.

- Auf der Pötschen, auf Holz, X.; Waldrand bei Aussee, VIII.
255. *Galera badipes* Fr.
Wald am Fuß des Sarsteines, VIII.
256. *G. cerina* Bresad.
Lerchenreit (D.).
257. *G. Hypnorum* var. *Sphagnorum* Pers.
Lerchenreit (D.).
258. *G. mniophila* Lasch.
In Moospolstern im Wald bei Aussee, VIII.
259. *G. pygmaeo-affinis* (Fr.).
Im Fachwerk bei Aussee, VII.
260. *G. tenuissima* (Weinm.).
Im Gras am Ufer des Ödensees, VIII.
261. *Crepidotus alveolus* Lasch.
Auf dem Tressenstein, an morschen Buchenstämmen, VI.
262. *C. mollis* Scheff.
Ist nach Keißler kaum von *C. alveolus* zu trennen; ersterer ist im allgemeinen dunkler.
263. *C. applanatus* Pers.*
Grundlsee, auf einem alten Buchenstrunk, VIII.; am oberen Weg nach Grundlsee, VIII.
264. *Volvaria media* (Flor. Dan.).
Mischwald am linken Traunufer bei Obertraun, VIII.
265. *V. volvacea* (Bull.).
Froschwald, VII.
266. *Pluteus cervinus* Schff.
Bärenmoos, VII.; Ahornwiese ober dem Barthhof, IX.; Totes Gebirge: Am Fuß der „Hohen Schrott“, VIII. Nicht schwarzschneidige Lamellen: Auf Buchen am Nagelsteig, IX. Lamellen schwarzschneidig, var. *atromarginata* Singer, Zeitschr. f. Pilzk. IV, p. 40, Nr. 42: Froschwald, VII.; Wald bei der Ortschaft Sarstein, VII.
267. *P. nanus* (Pers.).
Obertressen, Garten der Villa Vogelsang, VII.; auf Buchenstrünken im Bärenmoos, VIII.
268. *Entoloma clypeatum* (L.).
An der Straße nach Leonhard, VI.; Lenauhügel, VI.
269. *E. erophilum* (Fr.).
Gemähte Wiese auf dem Sattel, VI.
270. *E. lividum* (Bull.).
Wald im Weißenbachtal, IX.
271. *E. rhodopolium* Fr.
Ressenweg, X.; Weg zum Sommersbergsee, VIII.; Obertressen, auf Waldwiesen, IX.

* Bei Hallstatt, VIII.

272. *E. rhodocalix* (Lasch).
Obertressen, Gebüsch der Villa Voglsang, VIII.
273. *E. rusticoides* (Gill.).
Weg nach Grundlsee, VII.
274. *Leptonia anatina* Lasch.
Moorwiesen zwischen Kainisch und Ödensee, VIII. (Cryptog. exsicc. Nr. 2507); Lerchenreit (D.).
275. *L. chalybaea* (Pers.).
Mischwald am linken Traunufer bei Obertraun, VIII.; Wiesen am Fuß des Gallhofkogels, VIII.
276. *L. euchlora* Lasch.
Sixtleiten (Aussee), am Weg (D.).
277. *L. incana* (Fr.).
Froschwald, VII.; Fuß des Gallhofkogels, VII.
278. *L. lampropus* Fr.
Weideplatz unterhalb der „Zirbe“, X.
279. *L. sarcita* (Fr.).
Wiesen beim Gallhofkogel, VIII. (Hygrophan, strahlig gerieft).
280. *L. sericella* (Fr.).
Moorwiesen bei der „Wasnerin“, IX.; Bärenmoos, VII.; Lenauhügel, VIII.
281. *L. serrulata* (Fr.).
Wiesen beim Gallhofkogel und bei Kainisch, VIII. (mit schwarzer Lamellenschneide).
282. *L. Turci* (Bresad.).
Sumpfwiesen bei Kainisch, VIII. (rötend).
283. *Nolanea juncea* (Fr.).
Moorwiesen zwischen Kainisch und Ödensee, VIII.
284. *N. pascua* Pers.
Bärenmoos, VIII.; unter dem Teichschloß, VIII., IX.
285. *Psalliota arvensis* (Schff.).
Bärenmoos, VIII.
286. *P. campestris* (L.).
An der Straße nach Grundlsee, VI., VII.
287. *P. cretacea* (Fr.).
Am Ödensee, VII.
288. *P. perrara* (Schulz).
Bärenmoos, im Wald, VIII.
289. *P. sagata* (Fr.).
Froschwald, VII. (klein, gelb, beringt, Lamellen schwärzlich).
290. *Stropharia aeruginosa* Curt.
Alt-Aussee — Seewiese, X. (blasse zarte Form mit flockigen Hüllresten am Hutrand); bei Weißenbach, X.; am Weg nach Grundlsee, IX.; bei Kainisch, IX.; Froschwald, VIII., IX.; Obertressen, Garten der Villa Voglsang, unter Farnen, VIII.

291. *S. albonitens* (Fr.)?
Unter *Salix incana*, im Fachwerk, VIII.
292. *S. coronilla* (Bull.).
Wiesen an der Straße nach Leonhard, VI.; Obertressen, auf Wiesen des Ramgutes, IX.
293. *Hypholoma candolleianum* (Fr.).
An der Traun im Fachwerk, VII.
294. *H. capnoides* Fr.
Auf Fichtenholz am Ödensee, VIII., IX., in manchen Jahren häufig.
295. *H. fasciculare* Huds.
Totes Gebirge: Wald unter der Schweiben-Alm, zirka 800 m, VII.; Wildensee auf *Pinus Mughus*, IX.; Wald am Sommersbergsee, VII.; Wald auf dem Sattel, VI.—VIII.; Froschwald, VII.; an Baumstrünken, Obertressen, VII.; Lenauhügel, VIII.; Wald am Grundlsee, in einer sehr kleinen Form, die hier öfter vorkommt, VIII.
296. *H. lacrimabundum* Bull.
Am Weg zur Obertressen, IX.; unter Obstbäumen der Villa Großauer, Aussee, VI., IX.
297. *H. sublateritium* Fr.
Auf dem Sattel, im Wald, VIII.—X.
298. *Psilocybe cernua* Fl. Dan.
Moosiger Buchengrund, Nagelsteig, IX.; Ressenweg, X.
299. *P. foeniseeii* Pers.
Wiesen auf dem Ramgut, VII.; Wiesen bei St. Leonhard, VI., VIII.
300. *P. merdaria* (Fr.).
Am Ödensee, VII.
301. *Psathyra fatua* (Fr.).
Garten am Weg zur Obertressen, IX.; Wegrand bei der Tauscherin, IX.
302. *Panaeolus accuminatus* (Fr.).
Fachwerk, VII.; Weideplätze vor der Zirbe, X.
303. *P. campanulatus* L.
Lupitsch, auf gedüngten Wiesen, IX.; auf gedüngten Wiesen unter dem Teichschloß, VIII., IX.; Wiesen bei Kainisch, auf Kuhmist, VIII.; an der Ischlerstraße, VIII.
var. *sphinctrinus* Fr.
Wiesen am Sommersbergsee (D.).
304. *P. phalaenarum* Fr.
Totes Gebirge: Schoberwiesalm, zirka 1650 m, VIII.
305. *P. fimicola* Fr.
Kogler-Wiese bei Alt-Aussee, IX.
306. *P. separatus* L.
Torfmoor am Sommersbergsee, Kuhweideplatz, IX.; Weideplätze bei Kainisch, selten, VIII.
307. *P. subbalteatus* (Bk.).
Weißenbachtal, auf altem Kuhmist, IX.

Coprineae.

308. *Coprinus Boudieri* (Quél.).
Grundlsee, im Buchenwald beim Hotel Bellevue (Seeblick), VIII.
309. *C. comatus* Scheff.
Obertressen, Ramgut, an Straßenrändern, VIII., IX.
310. *C. micaceus* Bull.
Weißenbach, IX., an der Straße Obertressen, VIII.; oberer Weg nach Grundlsee, am Grund von Stämmen, IX.
311. *C. niveus* (Pers.).
Obertressen, im Gras am Straßenrand, vielleicht auf Rindermist, VIII.
312. *C. plicatilis* Curt.
Bartlhof, IX.; bei Aussee, IX.
313. *C. porcellanus* Schff. (= *C. comatus* Fl. Dan.).
Wiesen bei Aussee, VII.; Alt-Aussee zur Blaa-Alm, VII.
314. *C. soboliferus* (Fr.).
Unter Obstbäumen bei St. Leonhard, VIII.
315. *C. stercorarius* (Bull.).
Am oberen Weg nach Grundlsee, auf Rindermist, IX.
316. *Coprinellus disseminatus* Pers.
Obertressen, an einem Strunk beim „Loitzl“, VII.; Froschwald; bei der Wasnerin, VIII.
317. *C. hemerobius* (Fr.).
Aussee gegen Alt-Aussee, VII.
318. *C. impatiens* (Fr.).
Im Wald, Praunfalk, VIII.; Aussee-Grundlsee, VII.
319. *C. roris* (Quél.).
Fachwerk, am Straßenrand, VII.
320. *Bolbitius luteolus* (Lasch.).
Weideplätze unter der Zirbe, X.

Marasmiaceae.

321. *Marasmius alliaceus* Jacq.*
Nagelsteig, im Buchenwald, IX.; Wald auf dem Tressenstein, im Buchenlaub, VI.
322. *M. alliatus* Schff.
Wälder bei Aussee, VIII.; Grundlsee (D.), siehe auch Nr. 332.
323. *M. amadelphus* Bull.
Ödensee, auf morschem Fichtenholz, VIII.; Froschwald, IX.
324. *M. androsaceus* L.
Froschwald, auf Rindenstücken, VII.; Lerchenreit (D.).
325. *M. cohaerens* Pers.
Alt-Aussee, VIII.; Bartlhof, IX.
326. *M. confluens* Pers.

* Im Redtenbachtal bei Ischl, IX.

Lenauhügel, VIII.; Weg auf den Sattel ober dem Barthof, IX.; Froschwald, VII.; Verwaltersteig—Seewiese, X.; Gallhofkogel, im Buchenwald, VII.; Weg auf den Sattel VI.—VIII.; am Fuß der „Hohen Schrott“, VIII.; Totes Gebirge: Salzofen auf Triften, zirka 2000 m, VII.

327. *M. lupuletorum* (Weinm.).

Alt-Ausseer Sattelweg, VIII.

328. *M. oreades* Bolt.

Obertressen, auf Wiesen, VII.—IX.

329. *M. perforans* (Hoffm.).

Froschwald, VI., VII.; Weg auf den Sattel, auf Fichtennadeln, VI., sehr häufig.

330. *M. ramealis* (Bull.).

Unter *Alnus incana*, im Fachwerk, VIII.

331. *M. rotula* (Scop.).

Oberer Grundlseeweg, VII.; Fuß des Gallhofkogels, VIII.; Alt-Aussee gegen Lupitsch, auf Bucheckern, IX.; Straße Obertressen, am Grund eines morschen Stammes, VII.

332. *M. scorodoni* Fr. (= *M. alliatus* Schff.).

Wald auf dem Sattel, VII.; Wald beim Ramgut, VII.—IX.

333. *Lentinus cochleatus* Pers.

Froschwald, an Baumstümpfen, VIII., IX.

334. *L. cyathiformis* (Schff.) Bres. — det. Singer.

An morschem Laub(?)holz, Aussee, X. 1915.

335. *Schizophyllum commune* Fr.

Auf Buchenstümpfen, Lenauhügel, VI.; Aussee, an Zäunen, an Scheitern und Stämmen, VII.; Grundlsee, an Eschen, VII., gesellig und häufig; Lerchenreit (D.).

336. *Troglia crispa* Pers.

Rabenkogel bei Mitterndorf, auf Buchen, X.

Lactarieae.

337. *Lactarius acer* Bolt.

Lenauhügel, VII.; Lupitsch, IX.; Totes Gebirge: Wald unter der Gößleralm, 1200 m, VII.

338. *L. aurantiacus* Fl. Dan.

Im Wald am Alt-Ausseer See, IX.; Gallhofkogel, VII.

339. *L. blenni* Fr.

Lenauhügel, VII.; Wald bei der Pfeiferalm, IX.; im Waldmoor unter dem Teichschloß, VIII.

340. *L. camphoratus* Bull.

Alt-Ausseer See, im Wald, IX.

341. *L. chrysorrhoeus* Fr.

Aussee, Nadelwald (D.).

342. *L. deliciosus* L.

Bärenmoos, VII.; Lenauhügel, VI.; Wald am Weg nach Grundlsee,

VII.; Froschwald, VII.—IX., in manchen Jahren zahlreich, meist aber vereinzelt; Paß Gschütt—Trauwandalm, IX.; Mitterndorf, am Fuß des Rabenkogels, VIII.; Salzatal—Göbl, VIII.; Wald am Sommersbergsee, VII.

343. *L. fuliginosus* Fr.*

Wald am Alt-Aussee See, VIII., IX.; Froschwald, VIII. (Milch läuft rosenfarbig an); Gallhofkogel, VII.

344. *L. helvus* Fr.

Alt-Aussee — Seewiese, X.; Hochmoor am Ödensee am Rand des Krummholzes, IX. (Zichoriengeruch); Waldmoor unter dem Teichschloß, VIII.

345. *L. hysginus* (Fr.).

Gallhofkogel, VII.; Waldmoor unter dem Teichschloß, VIII.

346. *L. ichoratus* (Batsch.).

Buchenwald am Gallhofkogel, VIII.; Wald unter der Pieiferalm, IX.

347. *L. insulsus* Fr.

Bärenmoos, VIII.; Wald vor dem Bachwirt, IX.

348. *L. luridus* Pers.

Wald gegen den Sommersbergsee, VIII.; am Ödensee, VIII. (gezont, Milch rot-violett).

349. *L. mitissimus* Fr.

Waldwiese vor den Mahdwiesen, IX.; Wald am Fuß des Radling; Ödensee, VIII.

350. *L. musteus* (Fr.).

Wald vor dem Bachwirt, IX.

351. *L. obnubilus* (Lasch.)**

Gamsstelle.

352. *L. pallidus* Pers.

Lenauhügel, im Buchenwald, VI.; Moorwiesen „Wasnerin“, VII.; Buchenwald am Fuß des Radling, VIII.; Obertressen, IX.; Buchenwald am Grundlsee, VIII.; Bärenmoos, VIII.; Wald am Sommersbergsee, VII.

353. *L. piperatus* Scop.

Paß Gschütt—Trauwandalm, IX.; Alt-Aussee gegen den Lupitschbach, häufig, IX.; Radlingwald, VIII.; Froschwald, VIII.; Buchenwald am Gallhofkogel, VIII.

354. *L. pyrogalus* (Bull.).

Wald bei Lupitsch, IX.; Waldmoor unter dem Teichschloß, VIII.

355. *L. rufus* Scop.

Wald auf dem Sattel, VII.—IX. (gesellig); Torfmoor unter dem Teichschloß, häufig, IX.; Dachsteingebiet: Gjaidalm—Gjaidstein (1750—2100 m), VIII.; Totes Gebirge: Schoberwiesberg, im Krummholz, zirka 1700 m, VIII.; Wald unter der Gößleralm, 1200 m, VII.; Salzofen, im Krummholz, zirka 1650 m, VII.

* Oberösterreich. Im Krummholz auf dem Kalmberg (Kahlenberg) bei Goisern, zirka 1600 m, IX.

** Hallstatt, auf morschen Strünken am Weg z. Rudolfsturm, VII

356. *L. scrobiculatus* Scop.

Waldrand Gallhofkogel, VII.; Froschwald, VII.—IX. (in manchen Jahren sehr häufig, in anderen fast fehlend); Wald am Sommersbergsee, VII.; Wald bei der Ruine Pflindsberg, IX. (sehr häufig); Nagelsteig, IX.; Totes Gebirge: Wald unter der Gößleralm, 11—1300 m, VII.; Mitterndorf, Fuß des Rabenkogels, VIII.; Salzatal—Gößl, VIII.; Wald am Fuß der hohen Schrott, VIII.; Paß Gschütt—Trauwandalm, IX. (sehr häufig).

357. *L. subdulcis* (Bull.)

Wälder am Ödensee, VIII.

358. *L. torminosus* Schff.

Wald auf dem Zlaimkogel, IX.; Waldsattel gegen Alt-Aussee, IX.; Bärenmoos, Ruine Pflindsberg (vereinzelt).

359. *L. trivialis* Fr.

Alt-Aussee — Seewiese, X.; Froschwald, IX.; Abstieg vom Sattel nach Alt-Aussee, im Moos unter Fichten, VIII.; Gipfel des Ressen, IX.

360. *L. uvidus* Fr.

Alt-Aussee—Seewiese, X.; Tressenstein, X.; „Au“ am Grundlsee, VIII., Wald beim Bärenmoos, IX.; Waldmoor unter dem Teichschloß, VIII.

361. *L. velleus* Fr.

Buchenwald beim „Loitzl“, X.; Buchenwald beim Gallhofkogel, VIII.; Wald am Weg nach Grundlsee, VII.; Lenauhügel, VII.—IX. (überhaupt um Aussee nicht selten).

362. *L. vietus* Fr.

Torfmoor unter dem Teichschloß, IX.

363. *Russula adusta* Pers. (nach Singer vielleicht *R. densifolia* [Sécr.] Gill.)

Lenauhügel, VII.; Froschwald, VIII.

364. *R. albonigra* (Krombh.).

Mischwald am Weg zum Sattel, VIII.

365 I. *R. alutacea* Pers.

Wald bei der Ortschaft Sarstein, VII.; Gallhofkogel, VII.; Froschwald, VII.—IX. (in allen Wäldern um Aussee häufig); Salzatal—Gößl, VIII.; Totes Gebirge: Wald unter der Gößleralm, VII., zirka 1200 m (sehr häufig, mitunter ganz grün gefärbt).

365 II. *R. amoena* Quél. — det. Singer.

Gallhofkogel, VII.

366. *Russula aurata* With.

Froschwald, VII., VIII. (häufig), in Mischwäldern überall, aber meist vereinzelt; Wald unter der „Wasnerin“, VIII.; Bärenmoos, VII.; Wald am Sommersbergsee, VI.; Wald beim „Loitzl“, VII.

367. *R. badia* Quél. var. *cinnamomicolor* Krlz.

Wald am Fuß des Radling, VIII.

368. *R. cyanoxantha* Scheff.

Lenauhügel, unter Buchen, VI.; Grundlsee bei Bellevue (Seeblick), im

lichten Buchenwald, VII. (an dieser Stelle in manchen Jahren in großer Zahl, in anderen sehr selten); Wald am Sommersbergsee, VII.; Totes Gebirge: Wald unter der Gößleralm, 11—1300 m, VII.

369. *R. delica* Fr.

Wald am Sommersbergsee, VII.

370. *R. elephantina* Fr. — det. Singer.

Froschwald, VIII.; Wald a. Obertressen, VIII.; Bärenmoos, VII.

371. *R. emetica* Scheff. var. *alpestris* Singer.

Totes Gebirge: Im Krummholz am Salzofen, zirka 1800 m, VII.; Rin-
nerkogel—Schönberg, zirka 1800 m, IX.; Dachsteingebiet: Gjaidalm—Gjaid-
stein, zirka 1700—2100 m, Wilder Gößl, 2000 m, VII.

372 I. *R. fellea* Fr.

Wald unterhalb der „Wasnerin“, sonst vereinzelt in Wäldern um
Aussee, IX.

372 II. *R. flava* Romell. — det. Singer.

Wasnerin, im Wald gegen die Traun zu, VII.

373. *R. foetens* Pers.

Wald am Grundlsee, IX.; Froschwald, VII.; am Weg auf den Sattel,
VII.—VIII.; am Ödensee, IX. Letztere gehört nach Singer in den For-
menkreis der *R. consobrina* Fr.

374. *R. fragilis* Pers.

Fuß des Gallhofkogels, VII.; am Ödensee, VII., ziemlich häufig um
Aussee, aber fast immer nur vereinzelt; f. *nivea* Pers. Grundlsee, VIII.;
f. *violascens* Secr. Wald a. Obertressen, VIII.

375. *R. graminicolor* (Secr.) = *R. aeruginea* Lindb., det. Singer.

Wald auf der Obertressen, VII.

376. *R. heterophylla* Fr.

Froschwald, VII.—VIII. (det. Demelius, aber unsere Exempl. größer als
5—6 cm, Stiel rosa); Lerchenreit (D.).

377. *R. integra* L.

Wald unter der „Wasnerin“, VIII.; Lenauhügel, VIII.; Wald am Som-
mersbergsee, VII.; Totes Gebirge: Wald unter der Gößleralm, VII.

378. *R. lepida* Fr.

Bärenmoos, VIII.; Lenauhügel, VIII.; Buchenwald bei Bellevue (See-
blick) am Grundlsee, VIII.; Buchenwald Gallhofkogel, VIII.; Wald unter der
Schweibenalm, zirka 800 m, VII.

379. *R. Linnaei* (Fr.) Ricken = *R. xerampelina* (Schiff.) Fr. — det. Singer.

Bärenmoos, VII.; Fuß des Gallhofkogels, VII.; Froschwald, VIII.

380. *R. livescens* (Batsch.).

Bärenmoos, IX.

381. *R. lutea* (Huds.).

Froschwald, VII.

382. *R. Mairei* Singer, Arch. f. Protistkunde, Bd. 65 (1929), p. 306—314;
Bull. Soc. Myc. 55 (1929), S. 103.

Pflindsberg, VIII.; Froschwald, IX.

383. *R. mollis* Quél.
Alt-Aussee, Nadelwald (D.).
384. *R. nauseosa* Pers.
Froschwald, VIII. (klein); Weg auf den Sattel, VI.; Wald am Sommersbergsee, VII.; Wälder am Fuß des Sarstein (Hechalm), häufig, VI.; Totes Gebirge: Wald unter der Gößleralm, VII.; Schoberwiesberg, im Wald, zirka 1200 m, VIII.
385. *R. nigricans* Bull.
„Au“ am Grundlsee, VIII.; Wald am Fuß des Radling, VIII.
386. *R. nitida* Pers. nec Ricken; det. Singer.
Froschwald, VII.; Wald unter der „Wasnerin“, VIII.; Wald beim Tannenwirt, VIII.
387. *R. ochroleuca* Fr. nec. Pers. — det. Singer.
Im Nadelwald bei der Ortschaft Sarstein, VII.
var. claroflava (Grove) — det. Singer.
Froschwald, VII., VIII.
388. *R. olivacea* (Schff.).
Bärenmoos, VII.; Froschwald, VII., VIII.; Obertressenwald, VIII.
389. *R. puellaris* Fr.
Wald am Sommersbergsee, VII.
390. *R. Quéletii* Fr. — det. Singer.
Lenauhügel, VII.; Wald am Fuß des Sarstein, VIII.; Froschwald, IX,
391. *R. vesca* (Fr.) nec Ricken.
Wald auf der Obertressen, VIII.
392. *R. virescens* (Schff.).
Froschwald, VIII.
393. *R. xerampelina* (Schff.) Ricken = *R. punctata* Krlz. det. Singer.
Froschwald, VII., VIII.; Wald im Weißenbachtal, IX.

Hygrophoreae.

394. *Hygrophorus caprinus* Scop.
Wald am Alt-Ausseer See, IX.
395. *H. ceraceus* Wulf.
Auer-Mahdwiesen, IX.; Wiesen beim „Loitzl“, VIII.
396. *H. coccineus* Schff.
Waldrand beim Bachwirt, VIII.; Weißenbach, VIII.
397. *H. conicus* Scop.
Waldwiesen bei der „Wasenmeister-Lacke“, IX.; Lenauhügel, VIII.; Buchenwald am Fuß des Gallhofkogels, VII.; Wiesen im Froschwald, VII.
398. *H. flammans* (Fr.).
Bei Aussee, VIII.
399. *H. intermedius* (Pass.).
Wiesen am Fuß des Gallhofkogels, VIII.; bei Alt-Aussee, VI.
400. *H. leporinus* Fr.

Auer-Mahdiesen, IX.; Waldwiesen bei der „Wasenmeister-Lacke“, IX.; Weideplätze beim Ödensee, IX.

401 I. *H. miniatus* (Fr.).

Auer-Mahdiesen, IX.; Lenauhügel, VIII.

401 II. *H. niveus* Scop.

Weideplätze Obertressen, IX.

402. *H. obrusseus* Fr.

Wiesen bei Aussee, VI.—IX.; Ufer des Alt-Ausseeer Sees, VI.; Wiesen am Fuß des Gallhofkogels, VIII.; Totes Gebirge: Klammkogel, 1790 m, VIII.; Dachsteingebiet: Gjaidalm—Gjaidstein (1750—2100 m), VIII.

403. *H. ovinus* Bull.

Koglerwiese bei Alt-Aussee, IX.

404. *H. psittacinus* Schff.

Wiesen in der „Grube“ bei Grundlsee, IX.; Waldrand beim Bachwirt, VIII.; Lenauhügel, VIII.

405. *H. puniceus* Fr.

Wiesen bei Aussee, VIII.

406. *Limacium agathosmum* (Fr.).

Bebuschte, moorige Wiese bei Kainisch, IX.; Froschwald, X.; Bärenmoos, VII.; in Wäldern um Aussee in manchen Jahren häufig, VIII., IX. (Cryptog. exsicc. Nr. 2617).

407. *L. aureum* (Arrh.) Bres.

Burgstall bei Pürgg, IX.; ober der Pfeiferalm, IX.; Weißenbach, IX.; unter Lärchen, Gallhofkogel, VIII.

408. *L. chrysodon* (Batsch.).

Froschwald, VIII.; Wald auf dem Sattel IX. Nicht selten, aber stets vereinzelt, duftet nach Lilien.

409. *L. discoideum* (Pers.) — det. Bresadola.

Froschwald, IX. 1912, sehr häufig.

410. *L. eburneum* (Bull.).

Nagelsteig, IX.; Verwaltersteig — Seewiese, X.; Froschwald, VII.—IX.; in manchen Jahren häufig um Aussee, VIII.—IX.; Wald am Fuß der hohen Schrott, VIII.

411. *L. erubescens* Fr.

Wald am Abstieg vom Sattel nach Alt-Aussee, IX.; Wald beim Alpengarten, IX.; in Wäldern häufig „Hexenringe“ bildend, VIII., IX.

412. *L. leucophaeum* Scop.

Mischwald beim „Loitzl“, X.; Alt-Aussee — Seewiese, X.; Buchenwald auf dem Lenauhügel, VIII.

413. *L. ligatum* Fr.

Wald beim Tannenwirt, VIII.; Totes Gebirge: Rinnerkogel—Schönberg im Krummholz, IX.

414. *L. lucorum* Kalchbr.

Alt-Aussee — Seewiese, unter Lärchen, X.; Lärchenhain bei Weißenbach, IX.

415. *L. melizeum* Fr.

Bärenmoos, VIII.; Weg auf den Sattel, VIII.; Buchenwald bei der Wasnerin, IX.

416. *L. penarium* Fr.

Wald bei Aussee, VIII.; Weißenbach, IX.; Bärenmoos, VIII.; Lenauhügel, VIII.

417. *L. pudorinum* Fr.

Mischwald beim „Loitzl“, X.; Verwaltersteig — Seewiese, X.; Wald bei der Ruine Pflindsberg, IX. (sehr häufig); Wald beim Alpengarten, IX.; Froschwald, IX.; Wald auf dem Sattel, IX., häufig in Wäldern, auch Nadelwäldern. (Cryptog. exsicc. Nr. 2316.)

418. *L. russula* Schff.

Mischwald beim „Loitzl“, X.; Nagelsteig, IX.; Froschwald sehr häufig, IX. (det. Bresadola); Wald auf dem Sattel, IX.; beim Alpengarten, IX.

419. *Gomphidius glutinosus* Schff.

Froschwald, VII.—IX. (stets vereinzelt); Weg auf den Sattel, VII.

420. *G. maculatus* Scop.

Waldrand Gallhofkogel, VII.; Froschwald, VII.; unter Lärchen am Rand des Buchenhaines „Wasnerin“, IX.; „Au“ am Grundlsee, VII.; Weg zum Sattel gegen Alt-Aussee, X.

421. *G. roseus* (Fr.).

Wald auf dem Radling, VII.; Buchenwald Lenauhügel, VII.

422. *G. viscidus* L.

Wald beim Barthhof, VIII.; Wald zwischen Aussee und Alt-Aussee, IX.; Buchenwald am Grundlsee, VIII.; Knappenwald, VIII.; Froschwald, VIII.; Gallhofkogel, VII.

423. *Nyctalis parasitica* Bull.

Weißenbachtal auf *Lactarius*, VIII.; Fuß des Rötelsteines auf *Lactarius scrobiculatus*, auf demselben im Froschwald, VIII.

Cantharelleae.424. *Cantharellus albidus* (Fr.).

Moos am Gipfel des Ressen, IX.

425 I. *C. cibarius* (Fr.).

Nagelsteig, IX.; Wald gegen den Sommersbergsee, VIII.; Froschwald, VII.; Bärenmoos, VII., in Wäldern zerstreut; Totes Gebirge: Wald unter der Gößleralm, VII.

425 II. *C. cinereus* Pers.

Aussee, VIII. (ohne nähere Fundortsangabe).

426. *C. clavatus* Pers.

Froschwald, VII.; Fichtenwald hinter dem Tannenwirt, VIII.; Ödensee, VIII.

427. *C. infundibuliformis* Scop.

Ödensee; bei Alt-Aussee, VIII.; Alt-Aussee — Seewiese, X.; Froschwald IX.

428. *C. lutescens* Pers.

Alt-Aussee — Seewiese, X.; Ödensee, VIII.; Froschwald, IX.

429. *C. tubaeformis* Fr.

Wälder bei Weißenbach, IX.

Polyporaceae.

Boleteae.

430. *Boletus cavipes* Opat.

Fichtenwald beim Barlhof, VI.; Alt-Aussee — Seewiese, X.; Wasenmeisterlacke, IX. (in manchen Jahren in ziemlicher Menge). Die gelbe Varietät im Wald am Fuß des Zinken, VII.; im Weißenbachtal, IX. (Cryptog. exsicc. Nr. 2616).

431. *B. chrysenteron* Bull.

Alt-Aussee—Seewiese, X.; Buchenwald gegen Lupitsch, IX.; Nadelwald bei der Blaa-Alm, IX.; Totes Gebirge: Wald zwischen Schweibenwiesen und Grausen Steg, IX.

432. *Boletus edulis* Bull.

Paß Gschütt—Trauwandalm, IX.; Weg auf den Sattel, VII.; Fuß des Gallhofkogels, VII.; Bärenmoos, VIII.; Totes Gebirge: Wald unter der Gößleralm, 11—1300 m, VII., an allen Fundorten sehr vereinzelt und selten; Alt-Aussee, Loserweg (D.).

433. *B. elegans* Schum.

Wald bei der Ruine Pflindsberg, IX.; Alt-Aussee gegen den Lupitschbach, häufig, IX.; Wasenmeisterlacke, IX.; Wald am Sommersbergsee, VII.; Froschwald, VII.; Hechalm, im Wald, VI. In manchen Jahren häufig, in anderen zerstreut, oft bis in die Krummholzregion.

434. *B. flavus* With.

Lichter Wald am Fuß des Sarstein, VIII.; Weißenbachtal, IX.

435. *B. granulatus* L.

Froschwald, VIII.; Alt-Aussee, IX.; Ödensee, VII.; Totes Gebirge: Schoberwiesberg, 1650 m, VIII.; Hohe Schrott, zirka 1700 m, VIII.

436. *B. luridus* Scheff.

Weg auf den Sattel, VI.; Lenauhügel, VI.; Sommersberg, Wiese (D.).

437. *B. pachypus* (Fr.).

Lenauhügel, VII. (sehr klein, schmeckt bitter).

438. *B. piperatus* Bull.

Wasenmeisterlacke, IX.; Froschwald, VIII.; Totes Gebirge: Unter der Gößleralm, zirka 1200 m, VII.

439. *B. placidus* (Bon.).

Moorwiese (am Waldrand), „Wasnerin“, VII.

440. *B. porphyrosporus* Fr.

Waldblöße, Wald auf dem Sattel, VIII.

441. *B. rubescens* Trog.

Obertressen, in feuchten Wäldern, sehr selten, IX.

442. *B. satanas* Lenz.

Grundlsee, im Buchenwald, VII.; am Ödensee, scharenweise, VII.; Weg zum Bärenmoos, VII.; Wald am Sommersbergsee, VII.

443. *B. scaber* Bull.

Zwischen dem Ort Sarstein und der Zirbe, X.; Torfmoor unter dem Teichschloß, IX. Bis 15 cm Huthdurchmesser, oft auf morschem Holz (Birken?); Wiesen am Fuß des Gallhofkogels, VIII.

444. *B. viscidus* L.

„Au“ am Grundlsee, VII.—IX.; Trauwandalm—Paß Gschütt (unter Lärchen), IX.; Wasenmeisterlacke, IX.; Wald an der Alt-Ausseeerstraße, VII.; Lerchenreit (D.).

445. *Tubiporus (Boletus) calopus* (Fr.).

Lenauhügel, VII.

Polyporeae.446. *Polyporus adustus* (Willd.).

Wasnerin, auf *Acer Pseudoplatanus*, VII.; Holzzaun bei Eselsbach, VII.; auf abgestorbenen Buchen am Sattel, IX.; Aussee, auf *Aesculus*, VII.

447. *P. amorphus* Fr.

Gallhofkogel, auf Fichten, VI.

448. *P. arcularius* Batsch.

Lerchenreit (D.).

449. *P. borealis* (Wahl.).

Weißbach, IX.

450. *P. brumalis* Pers.

Lerchenreit (D.), auf Fichtenstrunk gegen Kainisch, VII.; Froschwald, VIII.

451. *P. caesius* Schrad.

Aussee, an einem Brunnen, VIII.

452. *P. confluens* (Schw.).

Wälder bei Aussee, VIII.

453. *P. cristatus* Pers.

Trauwandalm—Paß Gschütt, häufig, IX.; Gallhofkogel, im Buchenwald, VIII.

454. *P. elegans* (Bull.).

Aussee, VIII.; Obertressen, VIII.—IX., an Laubholz.

455. *P. hispidus* (Bull.).

Weißbach, IX.

456. *P. leucomelas* (Pers.).

Am „Ochsenweg“ auf den Sattel, VIII.

457. *P. nummularius* Fr.

Fachwerk, auf *Salix incana*, VIII.; ebendort auf Holzstückchen von *Salix purpurea*, VII. (Cryptog. exsicc. Nr. 2720); Lenauhügel, VII.

458 I. *P. ovinus* Schff.

Totes Gebirge: Schoberwiesberg, im Nadelwald, zirka 1200 m, VIII.;

Mitterndorf, am Fuß des Rabenkogels, VIII.; Froschwald, VIII., IX., ziemlich häufig auf Waldboden.

458 II. *P. Schweinitzii* Fr.

Totes Gebirge: Elmgrube, 1550 m, am Grund von Lärchen, VIII.; am Grund der Zirm, VIII.

459. *P. squamosus* Huds.

Um Aussee ziemlich häufig. Am oberen Grundlseeweg an Ahornstümpfen, IV.—V.; an Ahorn an der „Bahnhofpromenade“ (jahrelang beobachtet), VIII.; Lenauhügel, auf Acer, VI.; hinter dem „Alpengarten“ auf Acer Pseudoplatnus ein Exemplar von 80 cm Hutdurchmesser.

460. *P. sulphureus* (Bull.) Fr.

Lupitsch, auf Obstbäumen; Grundlsee, VIII.

461. *P. varius* Fr.

Grundlsee, VIII.

462. *Polystictus abietinus* Dicks.

Aussee.

463. *P. albidus* Schff.

Wälder bei Aussee.

464. *P. cinnabarinus* (Jacq.).

Gamsstelle, VII.

465. *P. hirsutus* (Schrad.).

Weißbach, IX.; an der Traun auf Alnus und Salix, VII.

466 I. *P. perennis* (L.)*

Im Wald bei Aussee, einzeln, VIII.

466 II. *P. varius* (Pers.) Fr.

Aussee, an Laubholzstrunk, VII.

467. *P. velutinus* (Pers.).

Bärenmoos, IX.

468. *P. versicolor* (L.).**

Ziemlich häufig um Aussee.

469. *Poria callosa* Fr.

Grausenwald ober d. Ödensee, VIII.

470. *P. mollusca* Pers.

Grausenwald ober d. Ödensee, VIII.

471. *P. purpurea* (Pers.).

Bei der „Wasnerin“, auf Salix nigricans, VII.

472. *P. xantha* (Lind.) L. Romell.

Aussee.

473. *Fomes applanatus* (Pers.).

Häufig um Aussee, z. B. Verwaltersteig, Weißbach usw.

474 I. *F. marginatus* Fr.

* Niedere Tauern: Wald ober dem Rohrmoos bei Schladming, zirka 1300 m.

** Oberösterreich, Redtenbachtal bei Ischl, auf Buchenholz, IX.

Lerchenreit, Sarsteinwald (D.).

474 II. *F. nigricans* (Fr.).

Aussee, an lebendem Apfelbaum, VIII.

475. *F. pinicola* Swartz.

Froschwald, VI., auch sonst allgemein verbreitet.

Trameteae.

476 I. *Trametes anisatus*.

Weißbach, IX.

476 II. *F. gibbosa* (Pers.).

Aussee.

476 III. *T. odorata* (Wulf.) Fr.

Aussee.

477. *T. rubescens* Fr.

Am Ufer des Grundl- und Alt-Ausseer Sees, auf alten Stämmen von *Salix incana*, VIII., IX. (det. Keißler).

478. *T. stereoides* (Fr.) Bresad.

Im Grausenwald am Ödensee, VIII.

479. *Daedalea unicolor* Fr.

Praunfalk, auf *Aesculus*.

480. *Lenzites abietina* (Bull.).

An Balken, Stümpfen überall, IV.—X.

Merulieae.

481. *Merulius Corium* Pers.

Fachwerk, auf *Salix incana*.

482. *M. lacrimans* Wulf.

Im Keller des Landhauses in Aussee auf alten Balken, VIII. (Cryptog. exsicc. Nr. 1911).

483. *M. tremellosus* (Schrad.).

(Steril) Fachwerk, auf *Salix incana*, VIII.

Hydnaceae.

484. *Hydnum aurantiacum* Schw.

Wald b. Loitzl, VII.; Sommersberg, Tannenwald (D.) (Cryptog. exsicc. Nr. 2015, det. Bresadola).

485 I. *H. coeruleum* (Fl. dan.).

Froschwald, VIII.

485 II. *H. caerulescens* Schmalz.

Froschwald (Cryptog. exsicc. Nr. 2208, det. Bresadola).

486. *H. cyathiforme* Schff.

Nadelwälder bei Aussee, IX. (Cryptog. exsicc. Nr. 2614).

487. *H. ferrugineum* Fr.

Froschwald, VIII.; Wald beim Bachwirt, IX.; Au am Grundlsee, IX.

488. *H. imbricatum* (L.)

Wald bei der Ruine Pflindsberg, IX.; Froschwald, VIII.—IX.; Mitterndorf: Am Fuß des Rabenkogels, VIII.; Salzatal—Gößl, VIII.; im Gebiet allgemein verbreitet. (Cryptog. exsicc. Nr. 2108).

489. *H. infundibulum* Schw.

Nicht selten in Nadelwäldern um Aussee.

490. *H. melaleucum* Fr.

Froschwald, VIII.—IX., selten.

491. *H. nigrum* Fr.

Froschwald, VIII.—IX. (Cryptog. exsicc. Nr. 2016, det. Bresadola).

492. *H. ochraceum* (Pers.) Fr.

Loser, auf Fagus; Fuß des Gallhofkogels, auf Larix ?, VIII.

493 I. *H. repandum* L.

Wald am Fuß des Gallhofkogels, VIII.; Wald bei der Ortschaft Sarstein, VII.; Froschwald, VIII.; auch sonst verbreitet.

493 II. *H. Schiedermayeri* Heufl. det. Keißler.

Grundlsee, die Rinde eines Apfelbaumes abhebend, IX. Riecht nach Obstmost.

494. *Hydnum scrobiculatum* Fr.

Wälder bei Aussee (Cryptog. exsicc. Nr. 2017).

495. *H. suaveolens* Scop.

Weißbach, IX.; Wald beim Loitzl, VII. (Cryptog. exsicc. Nr. 2814, det. Bresad.).

496. *H. versipelle* Fr.

Fichtenwald, Lenauhügel, VII.; Nadelwälder bei Aussee, VIII. (Cryptog. exsicc. Nr. 2615.)

497. *H. fuligineo-violaceum* Kalchbr.

Wald am Sommersbergsee, VII.; Froschwald, VIII.; Ödensee, VII.

498. *H. violascens* Alb. et Schw.

Froschwald, VIII.

499. *H. zonatum* (Batsch.).

Weißbach, IX.

500. *Heritium alpestre* Pers.*

Auf Nadelbäumen auf dem Sandling, IX.; Radling, IX.; unter der Schneckenalm, X.; Rötelstein, VIII. (leg. J. Zellner); Nagelsteig, IX.; Oberwasseralm, IX. (Cryptog. exsicc. Nr. 1808, det. Bresadola.)

501 I. *Irpex fuscoviolaceus* Schrad.

Froschwald, VII.; Weißbachtal, Weg zur Langmoosalm, VIII., meist häufig sowohl auf Balken wie auf Scheitern von Fichten und Tannen.

501 II. *Irpex deformis* Fr.

Aussee, auf Fagus, VII.

502. *I. obliquus* Fr.

* Oberösterreich, Redtenbachtal bei Ischl, IX.; am Sole-Leitungsweg Gosauszwang—Hallstatt.

- Losser, Grasberg bei Gößl, auf Buchen, Grausenwald am Ödensee, VII.
(Cryptog. exsicc. Nr. 2718.)
503. *Radulum Kmetii* Bresad.
Grausenwald ober dem Ödensee.
504. *R. orbiculare* Fr.
Klachau, auf Sorbus Aucuparia; Zaun des Alpengartens, VIII.; Lenau-
hügel, auf Fichten; Ödensee, auf Fichten, Fuß des Rötelstein, IX.
505. *Odontia bicolor* Alb. et Schw.
Auf dem Losser auf Fichten; Sandling, 1200 m, auf Fichtenholz, IX.
506. *O. crustosa* Pers.
Auf Corylus Avellana, im Garten, Aussee.
507. *O. Pruni* Lasch.
Torfmoor bei Kainisch, auf Sorbus, VIII.
508. *O. stipata* Fr. (= *O. arguta* Fr.).
Obertressen, auf Corylus Avellana, VII.
509. *Phlebia albida* Fr.
Kainisch, auf Alnus glutinosa, VII.
510. *P. radiata* Fr.
Türkenkogel, auf Buchen.

Telephoraceae.

511. *Stereum Chailletii* (Pers.) Fr.
Wörschach, VIII.
512. *S. gausapatum* Fr.
Ramsau bei Alt-Aussee, auf Salix; Kainisch, auf Alnus.
513. *S. hirsutum* Pers.
Grasberg bei Gößl, auf Fagus.
514. *S. Murrayi* Burt.
Losser, auf Tannen, 1300 m.
515. *S. purpureum* Pers.
Aussee, auf Aesculus, VII., VIII.; Fachwerk, auf Salix incana, VIII.,
häufig.
516. *S. rugosum* Pers.
Ramgut, auf Alnus glutinosa (Cryptog. exsicc. Nr. 2506); Gallhofkogel,
auf Buchen, VIII.; Lenauhügel, auf Acer Pseudoplatanus, VI.
517. *S. sanguinolentum* (Alb. et Schw.) Fr.
Auf Fichten, Aussee; Obertressen, an Zäunen von Fichtenholz, VIII.,
auch auf Tannen.
518. *Lloydella striata* Bres.
Praunfalk, auf Fichten, VII.; Sarstein, auf Nadelholz, VIII.
519. *Hymenochaete corrugata* (Fr.) Lévl.
Auf Acer pseudoplatanus bei Aussee, VII.
520. *H. fuliginosa* (Pers.) Bres.
Auf entrindeter Fichte am Ödensee, VII.

521. *H. Mougeoti* (Fr.) Cooke.

Bärenmoos, Gallhofkogel, Rötelstein, Weg zur Pfeiferalm, Weg zur Langmoosalm, VIII., ziemlich verbreitet auf Tannen und Fichten (Cryptog. exsicc. Nr. 2505).

522. *Corticium confluens* Fr.

Aussee, VIII., IX., auf *Aesculus*.

523. *C. flavescens* Bourd.

Tressenstein, auf *Fagus*, VIII.

524. *C. laeve* Pers.

Fachwerk, auf *Salix purpurea* und *S. incana*, VII.; Grausenwald ober dem Ödensee, auf morschen Buchenzweigen; Aussee, auf Zweigen von *Acer Pseudoplatanus*.

525. *C. lividum* (Pers.) Fr. var. *odontioides* (siehe Bourdot et Galzin, Hymen. de France). Grausenwald ober dem Ödensee.

526. *C. roseum* Fr.

Aussee, auf *Salix incana*, IX.

527. *C. serum* (Pers.) Quél.

Aussee, in unserem Garten auf *Lonicera*, *Philadelphus coronarius*, in der Braungasse auf *Sambucus nigra*, *Juglans regia*; auf *Prunus spinosa* an der Straße nach Grundlsee, VII.—IX.

528. *C. Teutoburgense* Brinkm.

Alt-Aussee, am Weg zum Salzbergwerk, VII.

529. *Vuilleminia comedens* Maire.

Ramsau bei Alt-Aussee, auf *Acer Pseudoplatanus*.

530. *Gloeocystidium pallidulum* Höhn. et Litsch.

Bei Trautenfels (nächst Steinach-Irdning) auf Balken einer Brücke (Nadelholz).

531. *G. praetermissum* (Karst) Bresad.

Aussee, auf Coniferenholzbalken, VII.

532. *Peniophora aurantiaca* Bresad.

Dachsteingebiet: Tiergarten, zirka 1700 m, VIII.; Totes Gebirge: Henarwiesenalm, auf *Alnus viridis*, IX.

533. *P. caesia* Bresad.

Aussee, im Garten auf *Syringa*.

534. *P. ciliata* (Fr.) Bresad. ap. Brinkm.

Aussee, auf *Fraxinus excelsior*, IX. (Crypt. exsicc. Nr. 2717).

535. *P. cinerea* (Fr.) Cke.

Aussee, im Garten auf *Syringa persica*; Fuß des Rötelstein, auf Coniferen; bei der „Wasnerin“, auf *Salix nigricans* und *Alnus incana*; Froschwald, auf Fichten; Lupitsch, auf Buchen und *Aesculus*; Fachwerk, auf *Salix*, IX.

536. *P. cremea* Bresad.

Aussee, auf *Aesculus*; Grausenwald ober dem Ödensee, auf Fichten; Tressenstein, Südabhang, auf Buchen, IX.

537 I. *P. gigantea* (Fr.) Mass.

- Alt-Aussee am Weg zum Salzbergwerk, auf *Pinus silvestris*, IX.
 537 II. *P. incarnata* (Pers.) Cooke.
 Aussee, Garten, auf *Syringa*, VII.
538. *P. laevis* Bresad.
 Grausenwald ober dem Ödensee, auf Buchen, VII.
539. *P. pallidula* (Bresad.) Bourd. et Galz.
 Oberösterreich: Windisch-Garsten, VIII.
540. *P. setigera* Höhn. et Litsch.
 Öblarn, auf *Alnus*, VII.
541. *P. velutina* Cooke.
 Grausenwald ober dem Ödensee, auf Buchen, VII.
542. *Aleurodiscus amorphus* (Fr.) Rabh.
 Fuß des Rötelstein, auf Coniferen, IX.
543. *A. roseus* (Pers.) Höhn. et Litsch.
 Bei der Wasnerin, auf *Salix cinerea* und *S. nigricans*, VIII.
544. *Cytidia cruenta* (Pers.).
 Fachwerk, auf *Alnus*, VIII. (Cryptog. exsicc. Nr. 2612).
545. *Coniophora cerebella* (Pers.) Duby.
 Aussee, auf Holz einer Planke (Conifere) in der Braungasse, IX.; Ortschaft Sarstein, auch Coniferenbalken, IX.
546. *Gloeopeniophora aurantiaca* Höhn.
 Sandling, auf *Alnus viridis*, det. Höhnel (Cryptog. exsicc. Nr. 1712).
547. *G. incarnata* (Fr.) Höhn. et Litsch.
 Aussee, auf *Aesculus* und *Berberis vulgaris* Braungasse, VII.—IX.; Aussee, auf Buchen, auf *Corylus Avellana*, auf *Acer Pseudoplatanus*, auf *Cornus?*; Ramsau bei Alt-Aussee, auf *Alnus*; Bärenmoos, auf *Acer Pseudoplatanus*.
548. *Sebacina calcea* (Pers.) Bresad.
 Verwaltersteig, auf Fichten; Unterburg bei Pürgg, auf *Pinus silvestris*; Alpengarten, auf Fichten.
549. *Septobasidium Carestianum* Bresad.
 Fachwerk, auf *Salix incana* (Cryptog. exsicc. Nr. 1806 b).
550. *Craterellus cornucopioides* (L.).
 Wald am Fuß der Hohen Schrott, VIII.; Bärenmoos, VIII.; Wald ober Weißenbach, stellenweise in Menge.

Clavariaceae.

551. *Clavaria coralloides* (L.).
 Aussee, hie und da auf Waldboden (det. Demelius).
552. *C. cristata* (Holmsk.).
 Totes Gebirge: Wald unter der Gößleralm, 1200 m, VII.; Froschwald, VIII.
553. *C. aurea* Scheff.
 Aussee, ziemlich häufig in Wäldern, VII.—IX.; Totes Gebirge: Schoberwiesberg, zirka 1200 m, Paß Gschütt—Trauwandalm, IX.

554. *C. Botrys* Pers.

Bärenmoos, VIII.; Wald am Sommersbergsee, VIII.; Hechalm, VI. Verbreitet, aber stets vereinzelt.

555. *C. flava* Schiff.

Wald am Sommersbergsee, VII.; Froschwald, häufig, VII.; Wald b. Ruine Pflindsberg, IX.; Hechalm, VI.; Paß Gschütt—Trauwandalm, IX.; Totes Gebirge: Wald unter der Gößleralm, 11—1300 m, VII.

556. *C. formosa* Pers.

Froschwald, VIII. (häufig); Wald auf der Hechalm, VI.; Wald am Fuß der Hohen Schrott, VIII.

557. *C. grisea* (Pers.).

Praunfalk, in Wäldern, VIII.

558. *C. pistillaris* L.

In manchen Jahren in großer Menge in Wäldern, z. B. Froschwald (Cryptog. exsicc. Nr. 327 c), Lenauhügel, Obertressen, Bärenmoos, Alt-Aussee gegen den Lupitschbach, VII.—IX., sowohl in gemischten, wie in Nadelholzbeständen; Trauwandalm—Paß Gschütt, IX.

559. *C. rugosa* (Bull.).

Aussee, Nadelwälder, VIII.

560. *C. stricta* Pers.

Aussee.

561. *Typhula phacorrhiza* Fr.

Aussee, auf kalksandigem Gartenweg, auf Fichtennadeln in großer Zahl Mitte Oktober 1927.

Die Exemplare stimmen sehr gut auf jenen Pilz, den Rabenhorst in den Fungi europaei unter Nr. 239 als forma praegrandis ausgegeben hat. Wahrscheinlich ist *T. phacorrhiza* identisch mit *Clavaria juncea* Fr. var. *gracilis* Desm., doch müßte dies erst noch sicher festgestellt werden. Vgl. Winter in Rabh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Bd. I/1, p. 302, und Herter in Kryptfl. Brandenb., Bd. VI, p. 152 und 153 (det. Keißler).

T r e m e l l a c e a e.

D a c r y o m y c e t e a e.

562 I. *Calocera viscosa* (Pers.).

Weg auf den Sattel, VI.; Froschwald, an morschen Nadelholzstrünken, VI.—IX., verbreitet, aber fast immer vereinzelt.

562 II. *Dacryomyces chrysocomus* Tul. — det. Keißler.

Oberösterreich, Traunkirchen, auf Coniferenbalken, IX.

562 III. *Dacryomyces palmatus* (Schw.) Bres.

Auf Fichten beim Alpengarten, IX.

A u r i c u l a r i e a e.

563. *Auricularia auricula ludae* L.

An Holunderstämmen, Aussee, Braungasse, im Ort Anger, VI.—IX., sehr häufig an Holunderstämmen.

564. *A. mesenterica* (Dicks.).

Aussee, VII.

Tremelleae.

565. *Tremellodon gelatinosus* (Pers.).

Froschwald, VIII.; Wald bei der Ortschaft Sarstein, VII.; Wald auf dem Sattel, Wald am Fuß der Hohen Schrott an Nadelholzstrünken stets vereinzelt.

566. *Gyrocephalus rufus* (Jacq.) (= *Guepinia helvelloides* Fr.).

Gartenanlage beim Hotel Elisabeth, VI.; Wald bei Loitzl, VII.; Salztal—Göbl, VIII.; Ischlerkogel (D.); Sommersberg (D.). (Cryptog. exsicc. Nr. 1713.) Im Gebiet allgemein verbreitet.

567. *Exidia pithya* Fr.

Auf Fichten bei Aussee, VIII.

568. *E. plicata* Kl.

Auf *Salix incana* und *Alnus incana* a. d. Traun bei Aussee. (Cryptog. exsicc. Nr. 2807.)

569. *Ulocolla saccharina* (Fr.) Bref.

Bartlhof an Zäunen (Fichtenholz), VII.; Obertressen, IX. (det. Keißler) (Cryptog. exsiccatae Nr. 2207).

570. *Tremella foliacea* Fr. var. *violascens* Alb. et Schw.

Auf Tannenholz bei Aussee, IX.

571. *T. lutescens* Pers.

Praunfalk, auf Balken (Fichte ?), VII.

Gasteromycetes.

Phallaceae.

572. *Phallus impudicus* L.

Obertressen, Waldrand, VIII. Eine Reihe von Jahren immer an derselben Stelle, sich durch den Geruch bemerkbar machend.

Nidulariaceae.

573. *Cyathus striatus* Huds.

Bei Aussee, VII.—IX.

574. *Crucibulum vulgare* (Hoffm.).

Wald bei der Ruine Pflindsberg, IX.; Weißenbachalm, VIII., IX., in manchen Jahren häufig; Obertressen, an alten Balken, VIII.

Lycoperdaceae.

575. *Geaster coronatus* Sch.

Froschwald, VIII.

576. *G. fimbriatus* (Fr.)*

* Gosaumühle—Hallstatt, IX.

In Nadelwäldern bei Aussee verbreitet, VIII.—IX.; Ufer des Alt-Ausseer Sees, X.; Klachau—Steirersee, X.; Froschwald, VIII.; Rötelstein, IX.; Obertressen, IX.

577. *G. rufescens* Pers.

Wald Obertressen, IX.

578. *G. pectinatus* Pers.

Auf einem alten Ameisenhaufen am Weg vom Sattel nach Alt-Aussee, VI.

579. *G. triplex* Jungh. — det. Lohwag.

Trockene Nadelwälder am Südabhang der Trisselwand, VIII., und des Tressenstein, IX. (Cryptog. exsicc. Nr. 330 als fimbriatus).

580. *Scleroderris Solleana* Sacc. et Cav.

Am Ödensee auf Tannen, VII.

581. *Lycoperdon caelatum* (Bull.).

Obertressen, auf Wiesen, VII.

582. *L. gemmatum* Batsch.

Bärenmoos, VIII.; Buchenwald beim Barthhof, VI.; Froschwald, VIII.; in unserem Garten (Aussee), VII.; auch auf Wiesen häufig, VIII.—IX.; Totes Gebirge: Wald unter der Gößleralm, zirka 1100 m, VII.; Salzatal—Gößl, VIII.

583. *L. pyriforme* Scheff.

Bärenmoos, VIII.; auch sonst an alten Strünken häufig, VII.—IX.

584. *Globaria bovista* (L.).

Roßalm, VIII.; Auer-Mahdwiesen, IX. (riesige Exemplare).

585. *Bovista plumbea* Pers.

Moorwiesen bei Kainisch, VIII.

586. *Bovista nigrescens* Pers.*

Sattel, auf gemähten Wiesen, VI.; Wiesen bei St. Leonhard, VIII., Wasnerin, zerstreut hie und da; Totes Gebirge: Salzofen, Triften, zirka 2000 m, VII.; Klammkogel, auf Weideplätzen, zirka 1700 m, Langmoosalm, 1500 m, VIII.; Dachsteingebiet: Gjaidalm—Gjaidstein, 1750—2100 m, VIII. Auf Alpenmatten allgemein verbreitet.

* Nied. Tauern: Neudeck bei Schladming, auf Alpentriften, zirka 1900 m, VIII.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien](#)

Jahr/Year: 1930

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): Rechinger Karl Heinz

Artikel/Article: [Beitrag zur Kenntnis der Pilz-Flora von Aussee in Steiermark. I. Basidiomycetes. 279-317](#)