

12  
197.1

# Beiträge zur Naturkunde Preussens

herausgegeben

von der

physikalisch-ökonomischen Gesellschaft

zu Königsberg.

4.

## Catalog der Preussischen Käfer

neu bearbeitet

von

**Prof. Dr. Lentz.**

(Preis 2,50 Mark.)

*Sm* Königsberg 1879.

In Commission bei W. Koch.



# Beiträge zur Naturkunde Preussens

herausgegeben

von der

physikalisch-ökonomischen Gesellschaft

zu Königsberg.

---

4.

---

## Catalog der Preussischen Käfer

neu bearbeitet

von

**Prof. Dr. Lentz.**

(Preis 2,50 Mark.)

---

**Königsberg 1879.**

In Commission bei W. Koch.



## Catalog der preussischen Käfer.

---

Nach den gewaltigen Leistungen von Gemminger und v. Harold (*Catalogus coleopterorum hucusque descriptorum 1868—71*), nach dem neuen Catalog von Stein und Weise (Berlin 1877) ist auch eine neue Bearbeitung des Verzeichnisses der preussischen Käfer nothwendig geworden. In dem früher von mir (Königsb. 1857) herausgegebenen Catalog stehen begreiflicherwise viele Irrthümer, welche durch neuere Forschungen beseitigt sind, und die vier in diesen Schriften erschienenen Nachträge enthalten, abgesehen von der Unannehmlichkeit der Zerstückelung so manche Behauptungen, die wieder zurückgenommen oder wenigstens modificirt werden mussten. — In Beziehung auf die Quellen unserer Kenntniss verweise ich auf das Vorwort meines früheren Verzeichnisses. Ich habe mir zu der vorliegenden Arbeit das vortreffliche Verzeichniss der Käfer Schlesiens von K. Letzner Breslau 1871 (*Zeitsch. für Schles. Insektenkunde* Heft 2; Nachtrag 1876 Heft 5) zum Muster genommen: nur habe ich geglaubt diejenigen Sammler namentlich anführen zu müssen, welche die Käfer entweder selbst gefunden haben oder wenigstens wissen, dass und von wem sie gefunden sind. Wenn man das Faunagebiet Schlesiens mit dem der beiden preussischen Provinzen vergleicht, so sollte man meinen, dass, sowie das Areal Preussens (etwa 1172 [Q]M.) um 332 grösser ist als das Schlesiens, so auch die Anzahl der Käferspecies höher wäre. Das ist nun nicht der Fall. In Schlesien sind Ende 1875 nach Letzner 4159 Species gezählt worden, in Preussen jetzt etwa 3250. Der Grund dieser Erscheinung liegt auf der Hand. Was die Verschiedenheit der Bodenbeschaffenheit betrifft, so möchte wohl die Gebirgsfauna Schlesiens der Seefauna Preussens entsprechen: aber Schlesien ist bedeutend besser durchforscht als unser Land, und namentlich ist der Sinn für coleopterologische Forschungen dort entschieden reger; man lese das Vorwort Letzners p. XIII bis XXIV. Bei uns ist es dem gewöhnlichen Manne noch immer unbegreiflich, wie man ohne materiellen Gewinn am Suchen und Forschen nach Insekten Freude haben kann, und angestaunt wird, wer etwa in einem Pilzenhaufen oder unter welchem Laube etwas sucht. Im Letzner'schen Verzeichnisse findet man aus den verschiedensten Gegenden Schlesiens Angaben: von den 55 Kreisen Preussens kann man nur etwa 6 zählen, die einigermaßen durchforscht sind, und auch aus diesen wird jährlich noch eine ziemliche Anzahl neu aufgefundenener Käfer angegeben. Im Norden ist die Fauna der Gegend von Königsberg und Danzig bekannt geworden durch die Bemühungen der Herren s. h. t. v. Siebold, v. Frantzius †, Andersch †, Steffahn †, Bogeng †, v. Dommer, Kumm, Helm,

---

 II
 

---

Fritzen, Elditt †, Sauter, Kuwert, Schiefferdecker, Künow, Pfeil †, Seydler, Steiner, Dossow, Czwalina; in der Mitte der Provinz Osterode und Allenstein (Kugelann † 1815, dessen reiche Sammlung leider verschollen ist, woher die in seinen noch vorhandenen Manuscripten niedergelegten Namen zum grossen Theil nicht mehr deutungsfähig sind), Pr. Stargard (Schmidt Pr. Prov. Blätter 1839 p. 563); im Süden Gilgenburg (Kramer), Lyck (Sanio). Was die mächtigen Forsten und Seen des Ostens und Südwestens bieten, ist bis jetzt noch keinem Sterblichen kund geworden. Sollte also die Behauptung, dass in unserm Lande noch Hunderte von Species angefundnen werden können, zu gewagt erscheinen? zumal da auch die Forschungen des preuss. botan. Vereins in den Kreisen Carthaus, Dt. Crone, Flatow, Allenstein schon jetzt eine beträchtliche Zahl von bisher nicht in Pr. gefundenen Pflanzen ergeben haben. Dass nun andererseits die Freude am Sammeln und Bestimmen des gesammelten Materials durch die unselige Verwirrung, die in neuerer Zeit in die Wissenschaft hineingekommen ist, sehr verkümmert wird, ist ebenso betrübend als unleugbar. Man vergleiche den ehemaligen doch recht werthvollen Schaumschen Catalog der Käfer Europas 1859 mit dem jetzigen von Stein u. Weise 1877, man lese die Bemerkungen, Vorschläge, Erweiterungen und Erläuterungen dazu in der Deutschen entom. Zeitschrift XXII p. 161—196, ferner bei Katter in den entomol. Nachrichten, und man wird gestehen müssen, dass wir in ein Labyrinth von Genus-, Species- und Varietätennamen geführt werden, aus dem schwerlich ein Ariadnefaden uns herausführen möchte. Die consequente Durchführung des Prioritätsprinzips ist wissenschaftlich wohl begründet, allein das Bedenken und die Warnung v. Kiesewetters l. c. p. 177 ist doch auch wohl zu beherzigen, und ich verstehe nicht, wie v. Harold die Nomenclatur des Catalogs vollständig aufrecht erhalten will, wie er p. 196 verspricht: leider sehen wir einer end- und zwecklosen Polemik entgegen. Wer vermuthet den allbekannten *Omius hirsutulus* Fabr. unter dem Namen *Platytarsus echinatus* Bousd.? wer sucht den *Lathridius liliputanus* Mannh. unter *Cartodere ruficollis* Marsh.? Unter diesen Umständen habe ich es für zweckmässig gehalten, möglichst die bisher gebrauchten bekannten Namen beizubehalten; der Anordnung des neuen Catalogs bin ich aber gefolgt. Sehr oft wiederkehrende Namen von Localitäten habe ich abgekürzt; die wesentlichsten sind folgende:

Dz. = Danzig.

Fehst. = Friedrichstein bei Königsberg.

F. F. = Fritzensche Forst im Samlande.

Heub. = Heubude bei Danzig.

Hlgb. = Heiligenbeil.

Ggbg. = Gilgenburg.

Kbg. = Königsberg.

Ktzn. = Katznase bei Marienburg.

Schr. = Schrombehnen bei Pr. Eylau.

---

## Carabidae.

*Cicindela campestris* L. h. im Frühjahr auf Sandwegen überall, var. *connata* Heer. (Eld.).

*C. hybrida* h. — var. *maritima* Dej. gewiss nicht eigene Art, vielfache Uebergänge, am Nordstrande des Samlandes g. Juli (Ltz.).

*C. silvatica* L. n. s. auf sandigen Wegen unter Nadelholz. Rauschen, Caporn. Haide (Ltz.), Dz. (Czw.).

*C. literata* Sulz. var. *sinuata* F. n. s. bei Alt-Pillau in den Schluchten der Dünen, namentlich, wo der spärliche Sand die darunter liegende Thonschicht sichtbar lässt. Ende Juni. (Ltz.); Zoppot (Eld. Frantz.).

*C. germanica* L. n. h. auf Lehmboden. Elbing, Braunsbg. (Sieb.); Wehlau (Sauter).

*Omophron limbatus* F. n. s. an Teichrändern im Kiessande, Lauthsche Teich (Eld. Ltz.); Zoppot (Helm).

*Notiophilus aquaticus* L. h. an feuchten Orten, auf dem sandigen Boden wasserloser Gräben (Ltz.).

*N. palustris* Dfl. ebenso.

*N. biguttatus* F. u. var. *semiguttatus* F. ebenso.

*Elyphrus uliginosus* F. s. im Uferschlamm der Gewässer. Sarkauer Wald (Nanke), Wehlau (Sauter).

*E. cupreus* Dfl. n. s. an gleichen Orten (Ltz.), an der Motllau (Helm).

*E. riparius* L. g. an gleichen Orten.

*E. aureus* Müll. n. h. Elbing (Sieb.), Ktzn. (Czw.).

*Blethisa multipunctata* L. n. s. am See-strande, Juli (Eld. Ltz.).

*Cychnus rostratus* L. n. h. in Laubwäldern unter Steinen (Eld.); var. *elongatus* Hoppe (Eld.).

*Procrustes coriaceus* L. n. h. in Laubwäldern. Warnicken, Kleinhaide (Eld.).

*Carabus intricatus* L. s. unter Waldmoos in Erdlöchern. Kahlberg (Ltz.).

*C. purpurascens* F. einmal bei Osterode (Kug.), seitdem nicht wieder gefunden.

*C. violaceus* L. n. s. in Laubwäldern. Neu-häuser (Ltz.).

*C. catenulatus* Scop. Osterode (Kug.), nachher nicht wieder gefunden.

*C. auronitens* F. s. in waldigen Strecken, Osterode (Kug.), Elbing, Kbg. (Sieb.), Capornische Haide, Galtgarben (Fritzen).

*C. nitens* L. n. s. auf Grasplätzen, Kbg. (Ltz.).

*C. granulatus* L. s. h. unter Steinen.

*C. arvensis* F. in versch. Farben n. s. im Frühjahr. Neuhausen (Ltz.).

*C. clathratus* L. n. h. in der Bludauer Forst in Sandlöchern und Käfergräben (Eld.). Einmal Splbr. 1821 h. bei Pr. Stargard unter der Rinde alter Kiefernstubben (Schmidt Pr. Prov.-Bl. 1839 p. 563).

*C. cancellatus* Jll. s. h. unter Steinen. var. *tuberculatus* Schm. h.

*C. auratus* L. s. auf Aeckern. Osterode (Kug. Sieb.).

*C. convexus* F. n. h. unter Steinen, Elbing (Ltz.).

*C. hortensis* L. n. s. in Laubwäldern. Neu-häuser, Blauslein (Ltz.).

*C. silvestris* F. s. s. in Preussen (Illig. K. Pr. p. 151), Tilsit (Andersch).

*C. marginalis* F. in Kieferwäldern unter alten Baumwurzeln, August. Osterode (Kug.), Dz. (Helm), Pr. Stargard (Sieb.). Einmal in Menge bei Rosenberg (Eld.).

*C. glabratus* Pk. n. h. in Laubwäldern, in Sandgruben u. Käfergräben (Ltz.).

*C. nemoralis* Müll. n. s. in Feld u. Wald (Ltz.).

*Culosoma inquisitor* L. n. s. von Bäumen, besonders Eichen, herabgeklöpft, auf denen er Nahrung sucht. Corjeiten (Ltz.), Hlgl. (Str.).

*C. sycophanta* L. s. Allensteiner Glashütte (Kug.), Warnicken, Schwarzort, Rothenen (Ltz.).

*C. sericeum* F. s. Neuhäuser (Ltz.).

*C. investigator* Ill. s. s. Kbg. (Illig. K. Pr. p. 142), Tilsit (Stf.).

*C. reticulatum* F. einmal bei Dz. in grösserer Zahl (Domm.), Ufer des Drewenzsee (Illig), Neustadt auf tristen Brachfeldern, Juli, Aug. (Fritzen).

*Nebria livida* L. n. s. Sarkau an den Wurzeln von *Carex* (Nanke), Osterode einmal zahlreich an alten Ellernwurzeln (Kug.), an den Ufern der Weichsel und der Memel, Zoppot (Sieb.), Glettkau (Czw.), Chmelno bei Carthaus (Helm). Die var. *lateralis* F. war ehemals bei der Kbg. Sternwarte s. h., jetzt daselbst nicht mehr vorhanden. Am Lauthschen Teiche (Eld. Ltz.), an der Ausmündung kleiner Bäche bei Rauschen unter Steinen auf Lehmboden (Eld. Ltz.), Dz. (Domm. Helm).

*N. brevicollis* F. n. s. unter Steinen und faulem Holze. Dz. (Sieb.), Georgenswalde (Ltz.).

*Pelophila borealis* Pk. s. s. Osterode (Kug.), Ggbg. (Janke teste Kr.).

*Leistus rufomarginatus* Dft. s. Putzig (Stf.), Dz., (Domm., Helm, Czw.).

*L. ferrugineus* L. *spinilabris* Pz. s. unter modernem Laube, Warnicker Park (Ltz.)

*L. rufescens* F. n. s. ebenso.

*Clivina fossor* L. h. unter Steinen an Pflanzenstoffen. Die var. *collaris* Hbst. n. s. daselbst.

*Dyschirius globosus* Hbst. *gibbus* F. g. in Pflanzenerde.

*D. laeviusculus* Putz. s. Nogatufer bei Ktzn. (Czw.).

*D. salinus* Schaum. s. Dz. (Ltz.).

*D. angustatus* Ahr. s. Dz. (Frantz.).

*D. chalceus* Er. s. am Weichselufer (Sieb.).

*D. nitidus* Dej. *inermis* Curt. s. Helaer Strand (Stf.).

*D. politus* Dej. s. Dz. im Werder (Sieb. Czw.).

*D. intermedius* Putz. s. Schwarzort Juli (Ltz.), Schrb. (Czw.).

*D. thoracicus* Rossi h. am Weichselufer (Sieb.), Kbg. (Ltz.). Die var. *obscurus* Gyll. n. s. Seestrand bei Putzig u. Dz. (Stf. Czw.).

*D. aeneus* Dej. n. h. ebenda.

*Brachynus crepitans* L. s. s. Mewe (Stf.), Neustadt (Fritzen) auf Lehmboden.

*Odaecantha melanura* L. n. h., lebt im Phragmites am Ufer von Landseen. Neuhausen. (Stnr.), Dammhof (Ltz.), Dz. (Fritzen).

*Aëtrophorus imperialis* Germ. s. Dz. auf den Dünen (Helm), Ktzn. (Czw.).

*Demetrias unipunctatus* Germ. h. zwischen

den Stengeln von *Juncus balticus* u. auf *Elymus arenarius*, in dessen Halmen er sich entwickelt, OXHÖFT, Heub. (Fritzen), Neuhäuser (Stnr.).

*D. atricapillus* L. s. daselbst (Sieb.).

*Dromius longiceps* Dej. s. unter Pappelrinde Dz. (Sieb.), Kbg. Neue Bleiche, Dammhof (Czw. Stnr.).

*D. linearis* Oliv. s. unter Pappelrinde Kbg. (Ltz.), Dz. (Czw.).

*D. marginellus* F. n. s. unter Rinde von Laub- u. Nadelhölzern. Margen bei Kbg. (Ltz.).

*D. testaceus* Er. n. h. Dz. unter Kiefernrinde (Sieb.).

*D. agilis* F. h. unter Rinde vieler Bäume.

*D. fenestratus* F. s. Dz. (Sieb.).

*D. quadrimaculatus* L. n. s. unter Rinde Kbg. (Ltz.).

*D. quadrinotatus* L. n. h. ebenso.

*D. nigriventris* Thoms. *fasciatus* Dej. n. h. unter Weidenrinde, Rastenbg. Elbing (Ltz.), Dz. (Czw.).

*D. sigma* Rossi n. s. daselbst.

*Blechnus glabratus* Dft. *maurus* St. s. Wernsdorf, im Tharauer Walde (Kuwert), Dz. (Helm, Czw.). Vgl. v. Heyden Käf. v. Nassau p. 16.

*Metabletus obscureguttatus* Dft. s. Ggbg. (Kr.), Heub. (Helm), Neustadt un'er *Erica vulgaris* (Fritzen).

*M. truncatellus* L. g. auf sandigen Aeckern.

*M. foveola* Gyll. g. ebenso.

*Lebia cyanocephala* L. s. Aweiden b. Kbg. (Ltz.).

*L. chlorocephala* Hoffm. n. s. Kbg. (Ltz.), Dz. (Sieb.), liebt *Hypericum perforatum* (Fritzen).

*L. crux minor* L. einmal Aug. 77 h. auf Nesseln bei Dammhof (Stnr.), sonst s. Pelonken bei Dz. (Sieb.), Caporn. Haide (Sauter), Warnicken, Fchst. (Ltz.).

*Cymindis humeralis* F. s. Dz. (Fritzen), Caporn. Haide (Ltz.), Rauschen (Stnr.)

*C. axillaris* F. wird von Kug. angeführt, ist aber bisher nicht wieder gefunden.

*C. angularis* Gyll. s. Ludwigsort bei Kbg. (Sauter, Künow).

*C. macularis* Dej. n. h. Hlgl. (Seydler), Ragnit am Rombinusberge (Stf.), Rauschen (Ltz.), Neustadt (Fritzen), Heub. (Helm).

*C. vaporariorum* L. n. h. Rauschen (Ltz.), Putziger Stadtwald (Stf.), Neustadt (Fritzen), Pr. Stargardt (Schmidt), Bohnsack (Helm).



*Masoreus Wetterhallii* Gyll. s. Tuchelsche Haide (Sieb.), Rauschen, Schwarzort unter Steinen und Brettern auf Sandboden (Ltz., Eld.), Neustadt (Fritzen), Dz. (Czw., Helm), Memel (Stur.).

*Loricera pilicornis* F. h. unter abgefallenem Laube und im Moose.

*Panagaeus crux major* n. s. Kbg. Pregeldamm unter Steinen (Ltz.).

*P. quadripustulatus* St. s. Dz. (Sieb.).

*Chaenius spoliatus* Rossi s. s. Ggbg. (Kr.), Elbing (Hennig).

*C. vestitus* Pk. s. Kbg. Teichufer bei Lauth unter Steinen (Ltz.), Koliebkken bei Dz. (Fritzen).

*C. Schrankii* Dft. s. am Ufer des frischen Haffes bei Bodenwinkel, Elbing, Vogelsang (Dommer), Heub. (Fritzen).

*C. tibialis* Dej. n. s. Dz. Ottominer Wald an einer sumpfigen Stelle (Dommer), Radaunufer (Helm), Nogatufer bei Ktzn. (Czw.).

*C. nigricornis* F. mit var. *melanocornis* Dej. h. an feuchten Ufern unter Steinen.

*C. sulcicollis* Pk. einmal bei Rauschen zahlreich (Ltz.), sonst s., Dünen bei Heub. (Fritzen, Czw.).

*C. holosericeus* F. n. s. an denselben Stellen.

*C. caelatus* Web. s. s. Neukuhren (Eld.), Heub. (Fritzen).

*C. quadrisulcatus* Ill. s. auf Moorwiesen, Daminhof, Spittelhof (Eld.), Caporn. Haide (Ltz. Stnr.).

*Oodes helopioides* F. n. s. auf den Weichselkämpfen unter Laub (Fritzen), Kbg. (Ltz.).

*Licinus depressus* Pk. n. h. Dz. (Czw.), Braunsbg. (Sieb.), Fuchshöfen (Ltz.), an Waldrändern bei Oliva (Fritzen), Hlgbl. (Stnr.).

*Badister unipustulatus* Bon. s. Seestrand bei Steegen (Dommer), Neustadt (Fritzen).

*B. bipustulatus* F. mit var. *laerfosus* St. n. s. im ausgeworfenen Röhricht an Teichen und Wiesen (Ltz.).

*B. humeralis* Bon. s. Grebbiner Wald und an Weidenstämmen in dessen Nähe (Dommer).

*B. peltatus* Pz. n. s. an Ulmen (Dommer), im ausgeworfenen Röhricht (Ltz.).

*Brosicus cephalotes* L. h. im Sande unter Steinen u. Brettern in selbstgegrabenen Höhlen.

*Miscoderu arctica* Pk. s. s. überwintert im Kiefernwalde in nach Norden gelegenen Ab-

hängen, deren Sandboden mit dünnem Moose bekleidet ist. Ein glänzendes Pünktchen zeigt den in einer Höhle ruhenden Käfer. Putzig (Stf.), Brösen (Dommer), Caporn. Haide (Ltz.), Neustadt an tristen Bergabhängen (Fritzen).

*Pogonus chaleeus* Marsh. halophilus Nicol. s. s. am Weichselufer bei Käsemark (Dommer).

*Patrobis excavatus* Pk. n. h. Neustadt unter Steinen u. in Moos an feuchten Stellen (Fritzen), Neuhausen (Stnr.).

*Sphodrus leucophthalmus* L. s. in Ställen u. Kellern bei Bäckern (Fritzen), Kbg. (Czw.). Im Keller in Katzn. fing Czw. ein Stück mit doppelt so breitem Halssch. als gewöhnlich unter mehreren normalen.

*S. inaequalis* Pz. *terricola* Hbst. s. daselbst.

*Culathus cisteloides* Illig. n. s. in Wäldern unter *Erica vulgaris* (Ltz.).

*C. flavipes* Fourr. *fulvipes* Gyll. g. daselbst.

*C. fuscus* F. g. ebenso.

*C. melanocephalus* L. h. unter Steinen, an Baumwurzeln; die var. *ochropterus* Dft. s. Dz. (Helm).

*C. micropterus* Dft. h. mit *flavipes*.

*Tapiria nivalis* Pz. n. s. Neustadt unter Steinen an Bergabhängen (Fritzen), Samländ. Strand (Ltz.).

*Dolichus flavicornis* F. im Norden der Prov. s. auf einem lehmigen Brachfelde bei Gr. Zünder (Dommer); im Süden weniger selten, Ggbg. (Kr.).

*Anchomenus livens* Gyll. s. Kbg. (Ltz.), Memel (Stnr.).

*A. prasinus* Thunb. h. unter Steinen und an Baumwurzeln.

*A. albipes* F. n. s. an der Weichsel (Fritzen), Ufer des Rauschener Teichs (Ltz.).

*A. oblongus* F. n. s. in Stubben an sumpfigen Stellen (Fritzen), Kbg. (Ltz.).

*A. marginatus* L. n. s. an schlammigen Teichufern, Lauth, Rauschen (Ltz.).

*A. impressus* Pz. n. h. Tilsit am Memelufer unter Weiden (Nanke), am Lauthschen Teiche im Kiessande (Ltz.).

*A. sexpunctatus* L. h. unter Steinen und im Grase.

*A. ericeti* Pz. in Wäldern unter Moos überwintert (Dommer), bei Kbg. auf einer Pregelwiese bei Horst im Frühjahr zahlreich mit grosser Schnelligkeit umherlaufend (Kuwert).

- A. parumpunctatus* F. h. in Feld u. Wald.  
*A. gracilipes* Dft. *elongatus* Dej. h. unter Tang am Seestrände (Ltz.).  
*A. lugens* Dft. s. Putzig (Stf.), Neustadt an feuchten Waldstellen (Fritzen).  
*A. viduus* Pz. (grünlich) *moestus* Dft. (schwarz) s. h. an feuchten Waldstellen: die var. *emarginatus* Gyll. s. auf Pregelwiesen (Czw.).  
*A. versutus* St. s. Neuhausen (Stnr.).  
*A. dolens* Sahlb. s. Dz. (Stf.).  
*A. micans* Nicol. s. Kbg. (Ltz.)  
*A. scitulus* Dej. s. Cranz unter Sectang (Ltz.), Hlgbl. (Stnr.).  
*A. piccus* L. *picipes* F. h. am Seestrände unter Tang.  
*A. gracilis* Gyll. s. an Flussufern (Fritzen).  
*A. fuliginosus* Pz. n. s. wie *piccus*.  
*A. puellus* Dej. *pelidius* Pk. n. s. Putzig (Stf.), Nordstrand des Samiandes (Ltz.), Ktn. (Czw.).  
*A. quadripunctatus* Deg. s. Seestränd unter Tang (Ltz., Stnr.).  
*Olisthopus rotundatus* Pk. s. Rauschen (Ltz.), Dz. (Czw.), Memel (Stnr.).  
*Stomis pumicatus* Pz. s. an feuchten Waldstellen unter Steinen (Fritzen), Kbg. einmal mehrfach im botan. Garten (Czw.), F. F. (Stnr.).  
*Feronia (Pterostichus) punctulata* F. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*F. cuprea* L. g. auf Aeckern.  
*F. versicolor* St. *pauciseta* Thoms. n. h. Kbg. (Czw.).  
*F. dimidiata* Oliv. s. Striesser Feld bei Dz. unter Steinen (Dommer), Nordenbg. (Andersch).  
*F. lepida* F. n. s. mit *cuprea*. Rauschen (Ltz.).  
*F. subcoerulea* Quens. s. Glettkau (Czw.), Dz. (Helm), von Dommer fälschlich als *puncticollis* Dej. aufgeführt.  
*F. picimana* Dft. s. Dz. in einem Pilzenhaufen (Dommer), Kbg. Putzig am Seestrände (Stf.), Warnicken (Eld, Ltz.).  
*F. vernalis* Pz. *crenata* Dft. g.  
*F. aterrima* Pk. n. s. Neuhäuser, Rauschen (Ltz., Stnr.).  
*F. nigra* Schall. h. unter Steinen.  
*F. vulgaris* L. *melanaria* Ill. h. ebenso.  
*F. nigrita* F. h., var. *Rhaetica* Heer. Gbg. (Kr. Schaum K. D. I. 457. 15).  
*F. anthracina* Illig. h. unter Steinen.  
*F. gracilis* Dej. n. h. Kbg. (Ltz.), Neuhäuser (Stnr.).  
*F. minor* Gyll. n. h. ebenso.  
*F. strenua* Pz. *erythropus* Marsh. g.  
*F. diligens* St. *strenua* Er. g.  
*F. oblongopunctata* F. n. s. in Wäldern unter Laub und im Moose.  
*F. angustata* Dft. s. Neustadt (Fritzen); Putzig, Braunsbg. (Stf.), Dz. (Helm).  
*F. aethiops* Pz. n. h. Ottominer Wald in Eichenstubben (Dommer), Warnicker Forst (Ltz.), Dzer Nehrung (Fritzen).  
*F. fasciatopunctata* Creutz. nur einmal in Pr. gefangen (Illig. Magaz. I. p. 58), seitdem nicht wieder.  
*F. (Abax) carinata* (Dft.) s. Belschwitz (Kr.).  
*F. ovalis* s. Angerburg (Fritzen).  
*Amora concinna* Zimm. *lepida* Er. s. s. Neustadt (Fritzen).  
*A. tricuspadata* Dej. s. Putzig (Stf.).  
*A. strenua* Zimm. s. Dz. (Czw.), Samländ. Strand (Ltz.), Neustadt (Fritzen).  
*A. plebeja* Gyll. n. s. unter Steinen. Kbg. (Ltz.), Dz. (Dommer).  
*A. similata* Gyll. ebenso.  
*A. ovata* F. *obsoleta* Dej. Dz. auf lehmigen Feldern (Dommer).  
*A. nitida* St. s. Sandgruben bei Ludwigsort (Sauter).  
*A. communis* Pz. g. Ich mache aufmerksam auf die sehr ähnliche *continua* Thoms. Dtsch. Ent. Ztschr. XX p. 183 u 397.  
*A. lunicollis* Schiöd. *vulgaris* Pz. h.  
*A. curta* Dej. s. Neustadt (Fritzen).  
*A. trivialis* Gyll. g.  
*A. spreata* Dej. n. h. Neuhäuser (Ltz., Stnr.).  
*A. famelica* Zimm. *contrusa* Schiöd. s. Neustadt (Fritzen).  
*A. acuminata* Pk. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*A. familiaris* Dft. g.  
*A. lucida* Dft. *gemina* Zimm. n. s. am Seestrände (Ltz.).  
*A. tibialis* Pk. h. ebenda.  
*A. ingentra* Dft. s. Neustadt (Fritzen), Kbg. (Ltz.).  
*A. munitipalis* Dft. s. Kbg. (Ltz.).  
*A. Quenselii* Schh. s. s. Dz. (Sieb.).  
*A. silvicola* Zimm. *maritima* Schiöd. n. s. Putzig (Stf.), Weichselmünde (Helm, Czw.), Cranz

(Ltz.), einmal bei Schwarzort zwischen den Dünengräsern s. h. (Ltz.).

*A. rufocincta* Dej. s. s. Schaum K. D. I. p. 547.

*A. infima* Dft. n. h. am Samländ. Strande (Ltz.).

*A. brunnea* Gyll. s. s. Dz. (Sieb.).

*A. aulica* Pz. *picea* Er. h. unter Steinen.

*A. convexiuscula* Marsh. s. Dz. Weichselmünde (Helm).

*A. torrida* Illig. nach dessen Bericht (K. Pr. 173. 42) von Kug. einmal gefangen, nachher nicht wieder. Illiger verbindet damit als var. *alpina* Pk., jedoch ist das Vorkommen beider Käfer in Pr. sehr zweifelhaft, sie sind bochnordisch.

*A. consularis* Dft. s. Kbg. (Ltz.).

*A. fulva* Dij. *ferruginea* Pk. n. s. Die var. *iridipennis* Heer. s. bei Gedingen am Meeresstrande. Mai (Dommer).

*A. apricaria* Pk. h. unter Steinen.

*A. patricia* Dft. n. s. Kbg. (Ltz., Stnr.).

*Diachromus germanus* L. s. Kbg. (Ltz.)

*Diachrotrichus pubescens* Pk. s. Putzig einige-mal unter Tang (Stf.).

*D. rufithorax* Sahlb. n. h. Kbg. unter Stei-nen vor dem Brandenburger Thor (Czw.).

*D. lacustris* Redt. s. Dz. (Helm).

*Anisodactylus signatus* Ill. s. Dz. (Fritzen. Czw.).

*A. binotatus* F. mit var. *spurcatornis* Dij. h. im Frühjahr auf gedüngten Aeckern (Ltz.).

*A. nemorivagus* Dft. n. h. Neustadt (Fritzen).

*Harpalus punctatulus* Dft. s. Dz. Katzn. (Czw.).

*H. azureus* F. s. auf Lehmboden, Dz. (Dom-mer, Frantz.).

*H. puncticollis* Pk. s. Gr. Zünder in einem lehmigen Graben (Dommer), Dammhof (Stnr.).

*H. brevicollis* Dej. s. auf Lehmboden, Dz. (Sieb.).

*H. ruficornis* F. g. unter Steinen.

*H. griseus* Pz. h. ebenso.

*H. calceatus* Dft. n. h. Neustadt im Herbste auf Feldern (Fritzen), Schwarzort (Ltz.), Pr. Stargardt (Schmidt), Dz. (Czw.).

*H. ferrugineus* F. s. bei Ludwigsort am frischen Haffe, Kahlberg (Ltz.), Neustadt (Fritzen), Oliva (Czw.).

*H. honestus* Dft. *ignavus* Dft. n. h. Conitz (Sieb.), Heub. (Czw., Helm).

*H. distinguendus* Dft. n. h. Pröbbernau (Schindowski).

*H. aeneus* F. in allen Farbenvarietäten g.

*H. discoideus* F. s. Schwarzort (Ltz.), Pr. Stargard (Schmidt).

*H. rubripes* Dft. s. Lyck (Sanio).

*H. latus* L. s. h. am Nordstrande von Sam-land (Ltz.).

*H. luteicornis* Dft. s. Neustadt (Fritzen).

*H. quadripunctatus* Dej. s. Pelonken, Ca-dienen (Dommer, Helm).

*H. fuliginosus* Dft. s. s. in den Dünen von Glettkau, Juli (Czw.).

*H. neglectus* Dej. s. Neustadt (Fritzen).

*H. melancholicus* Dej. s. Dz. unter Steinen auf Saatfeldern (Dommer), Glettkau (Czw.)

*H. tardus* Pz. n. s. wie *latus*.

*H. Frölichii* St. n. h. Samländ. Strand (Ltz.), Dz. (Dommer).

*H. serripes* Quens. s. Neustadt auf sandi-gen Feldern (Fritzen).

*H. hirtipes* Pz. n. h. auf Sandboden, Allen-stein (Eld.).

*H. impiger* Dft. s. Kbg. (Ltz.), Pr. Stargard (Schmidt).

*H. servus* Dft. n. s. Neustadt (Fritzen), Kbg. (Ltz.).

*H. anxius* Dft. n. h. Ludwigsort (Ltz.), Neu-stadt (Fritzen).

*H. picipennis* Dft. *vernalis* F. h. in Sand-gruben, Ludwigsort (Ltz.).

*Stenolophus vaporariorum* F. s. Rauschen (Ltz.).

*S. vespertinus* Illig. n. s. Kbg. (Ltz.).

*Acupalpus flavicollis* St. n. s. Kbg. (Ltz.), Dz. (Dommer).

*A. dorsalis* F. g. unter Laub.

*A. brunnipes* St. s. Ggbg. (Kr.), F. F. (Stnr.).

*A. exiguus* Dej. n. s. unter Laub. Kbg. (Sauter, Ltz.) Dz. (Helm).

*A. meridianus* L. n. s. Kbg. (Ltz.).

*A. consputus* Dft. ebenso.

*Bradycellus cognatus* Gyll. s. Dz. (Czw.)

*B. placidus* Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.).

*B. collaris* Pk. n. s. Blaustein (Ltz.), Pr. Stargard (Schmidt).

*B. similis* Dej. n. h. Neustadt an tristen Bergabhängen unter Moos (Fritzen).

*Trechus discus* F. n. h. Rhedafluss bei Neu-stadt (Fritzen), Schwarzort (Ltz.), Dz. Weichsel-

kämpfen unter Weidenblättern, Gr. Zünder unter Schilf (Dommer), Kbg. Neue Bleiche (Czw.).

*T. micros* Hbst. Ggbg. (Kr.).

*T. rubens* F. *paludosus* Gyll. s. Ufer der Pengau bei Leesen (Dommer), Cranz (Ltz.), Kbg. Pregelewisien (Czw.).

*T. palpalis* Dej. s. Kbg. (Sauter).

*T. rivularis* Gyll. s. s. Belschwitz (Kr.), Cranz (Ltz.).

*T. minutus* F. s. h. am Strande unter Tang.

*T. obtusus* Er. s. Neustadt (Fritzen).

*T. secalis* Pk. s. h. wie *minutus*.

*Perileptus areolatus* Creutz. s. s. Rastenbg. (Czw.).

*Tachys nanus* Gyll. s. wie *Tr. obtusus*.

*Bembidium quinquestriatum* Gyll. s. Ggbg.

*B. obtusum* St. s. Kbg. (Sauter), Ggbg. (Kr.), Dz. (Helm).

*B. Mannerheimii* Sahlb. *unicolor* Chaud. s. Schrb., F. F. (Czw., Str.).

*B. guttula* F. s. h. an sandigen Ufern zwischen Schilf.

*B. biguttatum* F. g. Ich mache aufmerksam auf das sehr ähnliche *B. inoptatum* Schaum (Seidl. Fn. Balt. p. 36).

*B. assimile* Gyll. h. wie *guttula*.

*B. fumigatum* Dft. s. Lyck (Sanio).

*B. quadrimaculatum* L. s. h. auf Lehm-boden.

*B. quadriguttatum* F. n. s. Kbg. (Ltz.).

*B. humerale* St. *pulehrum* Gyll. s. Fischhausen (Ltz.).

*B. articulatum* Pz. n. s. Kbg. (Ltz.).

*B. Doris* Pz. n. s. zwischen den Wurzelfasern von *Sagittaria* (Kug.), Kbg. (Ltz.).

*B. gilvipes* St. s. Dz. (Czw. Helm), Neuhäuser (Str.).

*B. Schüppelii* Dej. s. s. Putziger Stadtwald (Stf.).

*B. tenellum* Er. s. Dz. (Sieb.).

*B. minimum* F. *pusillum* Gyll. s. Hlglb. (Str.).

*B. nigricorne* Gyll. wird von Sieb. angeführt, von Schaum u. Stf. bezweifelt; wahrsch. war die Bestimmung falsch. Seidl. Fn. Balt. p. 38 stellt es zu *pusillum*. Fehlt im Catal. von Stein u. Wiese.

*B. lampros* Hbst. *celere* F. *velox* Er. s. h. in feuchtem Moose. var. *felixianum*. Heer. s. Dz. (Dommer).

*B. bipunctatum* L. n. h. Heub. (Fritzen), Kbg. Pregel (Str.).

*B. nitidulum* Marsh. *rufipes* Gyll. s. Neustadt (Fritzen), var. *alpinum* Dej. Dz. (Dommer).

*B. saxatile* Gyll. wird von Sieb. angeführt, wahrsch. nicht richtig bestimmt; mir unbekannt.

*B. Andreae* F. *femoratum* St. g. unter ausgeworfenen Pflanzenresten.

*B. rupestre* L. *Bruxellense* Wesm. s. Dz. an der Weichsel und Radaune (Helm).

*B. littorale* Oliv. *rupestre* F. n. s. Kbg. (Ltz.).

*B. fluviatile* Dej. s. an den Seen bei Karthaus (Helm).

*B. lunatum* Dft. s. Haffstrand bei Bodenwinkel (Dommer), Schwarzort (Ltz.), Weichselmünde (Helm).

*B. pallidipenne* Illig. n. h. Haffufer bei Pillau (Eld.), Zoppot (Sieb.).

*B. splendidum* St. s. Neuhäuser (Str.).

*B. pygmaeum* F. s. Dz. am Weichselufer (Fritzen): var. *bilunulatum* Bielz. Cranz (Ltz.).

*B. dentellum* Thunb. *undulatum* St. n. s. Schwarzort (Nanke), Kbg. (Ltz.).

*B. varium* Oliv. n. s. Kbg. (Ltz.).

*B. adustum* Schaum. *fumigatum* Dej. s. Wernsdorf (Kuwert).

*B. obliquum* St. h. Radauneufer (Dommer), Rauschener Teich (Ltz.), Neuhäuser, Memel (Str.).

*B. ruficolle* Pz. s. s. Osterode 1795 (Kug.), Heub. (Fritzen), Neufähr u. Zoppot (Helm).

*B. punctulatum* Drap. *aerosum* Er. n. h. Loppelnen (Eld.), Rhedafluss b. Neustadt (Fritzen), Rastenbg. (Czw.).

*B. laticolle* Dft. s. Dz. an der Weichsel (Sieb.).

*B. striatum* s. Dz. (Fritzen), Ktzn. (Czw.).

*B. velox* L. *impressum* Pz. s. Schwarzort (Ltz.).

*B. argenteolum* Ahr. s. ebenso, Ktzn. am Nogatufer (Czw.). Die var. *azureum* Gebl. daselbst mit der Stammart (Czw.).

*B. paludosum* Pz. n. s. Weichsel- und Rhedafluss bei Neustadt (Fritzen), Kbg. (Ltz.).

*Tachypus caraboides* Schrk. s. Lyck (Sanio), Strand b. Broesen (Dommer), Rhedafluss (Fritzen).

*T. pallipes* Dft. n. s. unter Spreu u. Blättern. Kbg. (Ltz.).

*T. flavipes* L. s. h. ebenso.

**Dytiscidae.**

*Cnemidotus caesus* Dft. n. s. Kbg. (Ltz.), F. F. (Stnr.).

*Haliplus obliquus* F. n. s. Glettkau (Czw.), F. F. (Czw., Stnr.).

*H. varius* Nicol. s. s. Mühlenteich bei Glettkau (Czw.).

*H. confinis* Steph. *lineatus* Aubé. s. F. F. (Czw.), Lyck (Sanio); merkwürdig ist eine einfarbige var. *concolor*, die Sanio in einzelnen Stücken gefangen hat.

*H. variegatus* St. n. s. Putzig (Stf.), Kbg. Landgraben (Eld.), Neustadt in den Gräben von Moorwiesen (Fritzen).

*H. fulvus* Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.).

*H. impressus* Fabr. *flavicollis* St. s. Memel (Stnr.), in der Radaune bei Pechbude (Dommer), Haffufer bei Margen unter Blättern von *Tussilago* (Ltz.).

*H. affinis* Steph. *cinereus* Aub. n. h. Putzig (Stf.), Kbg. Landgraben (Eld.).

*H. ruficollis* Deg. s. h.

*H. Heydeni* Wehncke s. s. F. F. (Czw.), Memel (Stnr.).

*H. fluvialis* Aub. s. im Lyckflusse (Sanio).

*H. fulvicollis* Er. s. Dz., Neustadt (Fritzen).

*H. lineatocollis* Marsh. s. Putzig (Stf.), Dz. (Czw.).

*Brychius elevatus* Pz. s. Kbg. Landgraben, Palmburg (Eld. Ltz.), Memel (Stnr.), Neustadt im Cedronflüsschen (Fritzen).

*Pelobius tardus* Hbst. *Hermanni* F. 1 St. in einer Lehmplütze März 78 Wernsdorf (Kuwert).

*Hyphydrus ovatus* L. *ferrugineus* L. h. Dammhof (Ltz.).

*Hydroporus reticulatus* F. h. ebenso.

*H. inaequalis* F. h. ebenso.

*H. decoratus* Gyll. n. h. ebenso.

*H. confluens* F. s. Heub. (Dommer), Corjeiten bei Fischhausen (Ltz.), F. F. einmal zahlreich (Czw.).

*H. parallelogrammus* Ahr. s. Heub. (Dommer).

*H. picipes* F. ♀ *lineatus* Gyll. g.

*H. Marklini* Gyll. s. Kbg. in Teichen des Landgrabens (Eld.).

*H. geminus* F. n. s. Ggbg. (Kr.).

*H. unistriatus* Schrk. n. s. Dammhof (Ltz. Stnr.).

*H. pictus* F. n. s. in der Deime bei Goldbach (Ltz.), Neustadt (Fritzen).

*H. granularis* L. n. s. Dz. (Dommer), Neustadt (Fritzen).

*H. bilineatus* St. s. Kbg. (Ltz.).

*H. latus* Steph. *ovatus* St. s. s. in einem Waldtümpel bei Ottomin (Dommer), Glettkau (Czw.).

*H. depressus* F. zuw. h. im Uferschlamm. Rauschen, Schwarzort (Ltz., Stnr.), Karwenbruch bei Neustadt (Fritzen).

*H. halensis* F. einmat h. bei Belschwitz (Eld.), Loppennen (Eld.), Dz. (Czw.), Neukuhren (Stnr.).

*H. dorsalis* F. s. h. in Moorgräben.

*H. oblongus* Steph. *nitidus* St. s. s. Heub. (Dommer), Neustadt (Fritzen).

*H. rufifrons* Dft. n. s. Ggbg. (Kr.).

*H. erythrocephalus* L. *deplanatus* Gyll. h. Schwarzort, Kapkeim (Ltz.).

*H. planus* F. n. s. Schwarzort (Ltz.).

*H. pubescens* Gyll. n. h. Putzig (Stf.), Cranz (Ltz.), Weichselmünde (Helm).

*H. fuscipennis* Schaum. *piccus* St. n. h. Ggbg. (Kr.).

*H. discretus* Fairm. s. Kbg. am Veilchenberge, F. F. (Czw.).

*H. nigrita* F. s. Heub. (Dommer).

*H. brevis* Sahlb. s. Kbg. (Ltz.).

*H. melanarius* St. s. Schwarzort (Ltz.), F. F. (Stnr.), Neustadt (Fritzen).

*H. elongatulus* St. s. Schiefdr

*H. tristis* Pk. n. s. Ggbg. (Kr.).

*H. umbrosus* Gyll. n. s. ebenso.

*H. obscurus* St. s. Neustadt (Fritzen).

*H. notatus* St. s. ebenso.

*H. vittula* Er. n. h. Grebbiner Forst (Dommer).

*H. palustris* L. h. Dammhof (Ltz.).

*H. angustatus* St. n. h. Neustadt (Fritzen).

*H. pygmaeus* St. s. Ggbg. (Kr.).

*H. lineatus* F. h. wie *palustris*.

*Noterus crassicornis* F. h. ebenso.

*N. semipunctatus* F. *sparsus* Marsh. n. s. ebenso.

*Laccophilus minutus* L. *interruptus* Pz. n. h. Dammhof (Ltz.).

*L. hyalinus* Deg. *obscurus* Pz. h. ebenso.

*Colymbetus fuscus* L. g.

*C. Paykulli* Er. n. h. Neuhäuser (Stnr., Ltz.), Braunsbg. (Sieb.).

*C. striatus* L. n. s. Samländ. Strand (Str. Ltz.).

*C. pulverosus* Steph. s. Saspe bei Dz. (Dommer), Glettkau (Czw.).

*C. notatus* F. h. Ggbg. (Kr.), Memel (Str.).

*C. notaticollis* Aub. s. Heub. in einem Moortümpel (Dommer), Lyck (Sanio).

*C. bistriatus* Bergstr. s. mit dem vorigen (Dommer), Ggbg. (Kr.), Neuhäuser (Str.).

*C. adpersus* F. h. in den Strandgegenden.

*C. collaris* Pk. h. ebenso.

*C. Grapei* Gyll. n. s. Rauschen (Ltz.).

Anm. Was den *C. dolabratus* Pk. betrifft, so ist Elditts Irrthum längst nachgewiesen worden, es war ein etwas kleineres St. von *striatus* ♀. Auch Fritzen Preuss. Käfer p. 52 beschreibt ihn zwar, ist aber den Fundort schuldig geblieben. Der Käfer ist hochnordisch.

*Ilybius fenestratus* F. n. h. Dammhof (Ltz.).

*I. subaeneus* Er. n. h. ebenso.

*I. fuliginosus* F. h. in den Strandgegenden.

*I. similis* Thoms. s. Kbg. (Czw.), Rauschen (Ltz.).

*I. ater* Deg. s. h. am Strande.

*I. obscurus* Marsh. quadriguttatus Er. h. ebenso.

*I. guttiger* Gyll. h. ebenso.

*I. aenescens* Thoms. n. h. überall noch als *angustior* Gyll. angegeben, der uns fremd und hochnordisch ist. Kraatz Berl. Ent. Ztsch. XV. p. 166. Lentz in der Allpreuss. Monatschrift XV. p. 366.

*Liopterus agilis* F. n. h. Schwarzort (Ltz.).

*Agabus fuscipennis* Pk. h. am Seestrande (Ltz.), Dammhof (Czw.).

*A. maculatus* L. n. s. in Bächen unter Steinen. Rauschen (Ltz.).

*A. femoralis* Pk. n. h. Ggbg. (Kr.), F. F. (Czw.).

*A. unguicularis* Thoms. s. Kbg. Hufen (Hensche, Tiessen, Czw.), Dz. (Berl. Ent. Ztschr. 1871 p. 167).

*A. abbreviatus* F. mit *maculatus*, aber seltener; die var. mit verloschener Queerbinde s. Kbg. (Ltz.).

*A. Sturmii* Gyll. bei Putzig g. (Stf.), sonst n. h.

*A. bipunctatus* F. n. h. Corjeiten (Ltz.), Braunsb. (Sieb.), Glettkau (Czw.).

*A. uliginosus* L. n. s. Neustadt (Fritzen).

*A. paludosus* F. h. in den Strandgegenden, Cranz, Rauschen (Ltz.).

*A. congener* Pk. ebenso.

*A. affinis* Pk. s. Ggbg. (Kr.).

*A. guttatus* Pk. s. Kug. Schieffdr.

*A. bipustulatus* L. h. Kapkeim, Seestrand (Eld., Ltz.).

*A. nigroaeneus* Er. s. Lyck in der Milchbuder Forst (Sanio).

*A. chaeonotus* Pz. s. Grebbiner Wald (Dommer), Pregel bei Palmburg (Eld.).

*A. neglectus* Er. s. Dz. am Strande (Dommer, Frantz.).

*A. subtilis* Er. s. Ggbg. (Kr.), F. F. (Czw.).

*Cybister Roeselii* F. bei Belschwitz h. (Eld.), sonst einzeln, Schwarzort (Ltz.), Dz. in der Weichsel (Sieb., Helm), Liebschauer See bei Dirschau (Czw.).

*Dytiscus latissimus* L. in mehreren Masurischen Seen h., im Norden s. (Eld.).

*D. marginalis* L. ♀ var. *conformis* Kunze s. h.

*D. circumcinctus* Abr. n. s. Dammhof (Ltz., Str.), die var. *dubius* Gyll. s. s. Putzig (Stf.).

*D. circumflexus* F. s. in Gesellsch. der verwandten Arten, Dz. (Dommer).

*D. lapponicus* Gyll. im Dammhof Teich h., sonst s. Braunsbg (Sieb.), in den Karthäuser Seen (Fritzen).

*D. punctulatus* F. n. h. im Herbste in Gräben Neustadt (Fritzen), Dz. (Sieb.).

*D. dimidiatus* Bergstr. s. Weststr. v. Samland (Nanke), Dammhof Teich (Ltz.), Ktzn. (Czw.), Hlglbl. (Str.).

*Hydaticus bilineatus* Deg. s. Heub. (Dommer), Dammhof (Str.).

*H. zonatus* Pz. n. s. ebenso.

*H. piciventris* Thoms. s. s. 1 St. ♀ Ggbg. (Kr. Berl. Ent. Ztschr. XV. 168 cf. XVII. 225.)

*H. einereus* L. s. in stehenden Gewässern (Dommer), Pregel bei Palmburg (Eld.), Neuhäuser (Str.).

*H. austriacus* St. s. mit *bilineatus* (Dommer).

*H. Hybneri* F. h. Rauschen (Ltz.).

*H. transversalis* Pontopp. n. h. Dammhof (Ltz.).

*H. stagnalis* F. s. ebenso.

*Gyrinus concinnus* Klug. im Festungsgraben von Dz. und in der Radaune s. h. (Fritzen, Helm)

*G. minutus* F. n. s. Heub., Putzig (Sieb.), Dammhof (Str.).

*G. natator* L. *mergus* Ahr. g.

*G. bicolor* Pk. s. in der Drewenz bei Strassburg in Westpr. (Stf.).

*G. colymbus* Er. s. Kbg. (Ltz.).

*G. Suffriani* Scrib. Kbg. (Czw.).

*G. marinus* Gyll. n. s. Elbing (Ltz.), Dammhof (Str.).

*G. opacus* Sahlb. n. s. Lyck (Sanio), Memel (Str.), Glettkau (Czw.).

*Orectochilus villosus* F. n. s. ein nächtliches Thier, in der Weichsel (Dommer), in d. Alle bei Heilsbg. u. Schippenbeil (Andersch), Putzig (Stf.).

*Hydrophilus piceus* L. stellenweise h. Lyck 1875 (Sanio), im Norden s. s.

*H. aterrimus* Eschsch. n. s. in krautreichen Wassergräben, Kbg. (Ltz.).

*Hydrous caraboides* L. n. s. in den Strandgegenden.

*H. flavipes* Stev. s. Loppennen, Cranz (Eld.), Belschwitz (Eld.), Ktzn. (Czw.).

*Hydrobius oblongus* Hbst. s. Dz. auf einer sumpfigen Wiese von Wasserpflanzen geschöpft (Dommer), Ggbg. (Kr.).

*H. fuscipes* L. g.

*H. bicolor* Pk. n. s. Dammhof (Ltz.).

*H. globulus* Pk. h. daselbst.

*Philhydrus testaceus* F. h. daselbst.

*P. melanocephalus* Oliv. h. ebenso.

*P. nigricans* Zett. *frontalis* Er. n. h. ebenso. (Helm), Kbg. (Str.).

*P. marginellus* F. *marginatus* Dft. ovalis Thoms. g.

*Hydrochares lividus* Forst *griseus* F. n. s. Dammhof (Ltz.).

*Laccobius sinuatus* Motsch *nigriceps* Thoms. in Bächen unter Steinen n. s. Kbg. (Ltz.), Ktzn. Schrb. (Czw.).

*L. bipunctatus* Thoms. h. Kbg. (Sauter, Czw., Ltz.).

*L. minutus* L. n. h. Kbg. (Ltz.).

*L. alutaceus* Thoms. s. Schrb. (Czw.).

*Berosus luridus* L. h. Dammhof (Ltz.).

*B. aericeps* Curt. s. Ggbg. (Kr.).

*Limnbius truncatellus* Thunb. s. h.

*L. papposus* Muls. s. Kbg. (Czw.).

*L. truncatulus* Thoms n. s. Kbg. Landgraben (Czw.).

*L. nitidus* Marsh. n. h. Ktzn. (Czw.).

*L. atomus* Dft. *minutissimus* Germ. s. Dz. (Sieb.), Neustadt (Fritzen).

*Cyllidium seminulum* Pk. s. h. im Uferschlamm u. unter Steinen.

*Spercheus emarginatus* Schall. n. s. Kbg. Lizentgraben (Sauter).

*Helophorus nubilus* F. h. in Conserven. Dammhof (Ltz.).

*H. tuberculatus* Gyll. s. unter ausgeworfenem Seegrase, Neuhäuser (Ltz.), Brösen (Helm); einmal bei Rauschen zahlreich (Ltz.).

*H. arvernienus* Muls. s. s. Kbg. im Festungsgraben am Brandenburger Thor (Czw.).

*H. aquaticus* L. *grandis* Illig. s. h. in Wiesengräben.

*H. granularis* L. g.

*H. griseus* Hbst. g.

*H. obscurus* Muls. *aeneipennis* Thoms. s. Neustadt (Fritzen).

*H. nanus* St. s. ebenso.

*H. pumilio* Er. n. s. ebenso.

*Hydrochus elongatus* Schall. g. Dammhof (Ltz.).

*H. carinatus* Germ. g. ebenso.

*H. brevis* Hbst. n. s. ebenso.

*Ochthebius gibbosus* Germ. n. h., einmal zahlreich gefangen bei Ktzn. (Czw.)

*O. margipallens* Latr. n. h. Schrb., Pregelwiesen (Czw.).

*O. pygmaeus* F. g.

*O. bicolor* Germ. s. in Waldbächen unter Steinen, Putzig, Neustadt (Stf.), Neuhausen (Str.).

*O. rufomarginatus* Er. s. Kbg. Pregeldamm, Neue Bleiche (Czw.).

*O. foveolatus* Germ. s. Neuhäuser unter Sectang (Ltz.).

*Hydraena palustris* Er. s. einmal bei Heub. von Riedgras geschöpft (Stf.), Kbg. (Str.), Blaustein (Ltz.).

*H. riparia* Kugel. n. s. im Bache bei Loppennen (Eld.), Putzig, Neustadt, Dz. (Stf.).

*H. angustata* St. s. Neustadt in Waldbächen (Fritzen).

*H. gracilis* Germ. s. Memel in der Dauge (Str.).

*H. pulchella* Germ. Schrb. an einem Wiesebache (Czw.).

*Cyclonotum orbiculare* F. h. im Uferschlamm und unter Steinen. Dammhof (Ltz.).

*Sphaeridium scarabaeoides* L. g. in frischem Rinderdünger.

*S. bipustulatum* F. mit var. *marginatum* F. ebenso.

*Cercyon obsoletus* Gyll. n. s. im Dünger, Kbg. (Strn.), Loppennen (Eld.), Dz. Cranz unter Seetang (Stf.).

*C. haemorrhoidalis* F. n. s. in fetter Erde Kbg. (Ltz.).

*C. haemorrhous* Gyll. ebenso.

*C. lateralis* Marsh. s. Ggbg. (Kr.), Kbg. nasse Garten (Czw.), Fuchshöfen (Strn.).

*C. flavipes* F. g.

*C. palustris* Thoms. s. Kbg. Pregelwiesen (Czw., Strn.).

*C. littoralis* Gyll. n. s. am Meeresufer, Dz. (Dommer), Samländ. Strand (Ltz.), Memel (Strn.).

*C. unipunctatus* L. n. s. Kbg. (Ltz.).

*C. quisquilius* L. h. Loppennen (Eld.).

*C. melanocephalus* L. n. h. Kbg. (Ltz.).

*C. pygmaeus* Illig. h. ebenso.

*C. terminatus* Marsh. *plagiatus* Er. s. im Pferdedünger, Dz. (Dommer).

*C. centrimaculatus* St. h. im Rinderdünger, Loppennen (Eld.), Putzig (Stf.).

*C. minutus* F. s. h. ebenso.

*C. lugubris* Pk. n. s. am Rande von Gewässern, Neustadt (Fritzen).

*C. analis* Pk. h. im Schlamm und in fetter Erde, Kbg. (Ltz.).

*C. granarius* Er. s. ebenso, Dz. (Helm), Neustadt (Fritzen).

*C. pulchellus* Heer. s. Kbg. Plantage (Strn.).

*Megasternum bolitophagum* Er. s. in faulenden Pflanzenstoffen Putzig (Stf.), Schrb. (Czw.).

*Cryptopleurum atomarium* F. g. im Dünger.

### Staphylinidae.

*Autalia impressa* Oliv. s. in Blätterpilzen, Dz. (Dommer), Warnicken (Strn., Ltz.).

*A. rivularis* Grav. n. s. Blaustein (Ltz.), am Pregelufer (Strn.).

*Falagria thoracica* Curt. n. h. Pillau (Sauter), Neuhäuser (Ltz.).

*F. sulcata* Pk. n. s. unter faulenden Gewächsen (Kug.), Kbg. (Ltz.).

*F. sulcatula* Grav. n. s. an Wasserrändern, Haßstrom (Eld.).

*F. obscura* Grav. n. s. Putzig (Stf.).

*F. nigra* Grav. n. s. wie *sulcata*.

*Bolitochara lunulata* Pk. n. h. in Blätterpilzen.

*B. obliqua* Er. s. Kbg. an Baumschwämmen auf dem Kneiph. Kirchhof (Strn., Ltz.), auf Holzwiesen (Czw.).

*Phytosus balticus* Kraatz s. s. Glettkau (Czw.).

*Silusa rubiginosa* Er. n. h. Kbg. (Ltz.).

*Ocalca castanea* Er. s. Conitz (Sieb.).

*O. badia* Er. n. h. Nodems am Samländ. Weststrande (Ltz.), Kbg. Poln. Kirchhof (Czw.).

*Ischnoglossa proluxa* Grav. s. s. Dz. (Kumm).

*I. corticina* Er. s. Kbg. (Ltz.).

*Leptusa analis* Gyll. s. F. F. unter Carpinusrinde (Czw.).

*L. fumida* Er. s. Dz. (Kumm).

*L. ruficollis* Er. n. h. Dz., Kbg. (Czw., Strn.).

*Thiasophila angulata* Er. s. h. unter Ameisen, Putzig (Stf.).

*T. inquilina* Märk. s. Loppennen (Eld.).

*Homoeusa acuminata* Märk. wird von Zebe in lit. aus Dz. angegeben; ist aber noch zu bezweifeln.

*Microglossa (Haploglossa) gentilis* Lünem. n. s. an Eichenwurzeln unter Ameisen, Kbg., Moosbude (Pfeil, Ltz.).

*M. pulla* Gyll. n. h. Dz. unter Steinen (Dommer).

*M. rufipennis* Kraatz. s. Kbg. (Sauter).

*M. praetexta* Er. n. h. Kapkeim (Ltz.), Ktzn., Dz. (Czw.), Neuhausen (Strn.).

*Alcochara fuscipes* Grav. n. s. unter Steinen, im Dünger und bei Aesern (Kug.), Georgenswalde (Ltz.).

*A. curta* Sahlb. *fumata* Er. s. Kbg. aus Moos (Sauter).

*A. brevipennis* Grav. n. s. Ggbg. (Kr.).

*A. bipunctata* Oliv. n. h. in sandigen Gegenden unter Dünger (Kug.), Cranz (Ltz.).

*A. morion* Grav. s. Kbg. (Ltz.).

*A. puberula* Klug. s. s. Ktzn. in einem Stalle (Czw.).

*A. crassiuscula* Sahlb. s. Kbg. (Czw.).

*A. tristis* Grav. *nigripes* Mill. n. s. Kbg. (Ltz.).

*A. bisignata* Er. n. s., unter faulendem Holz (Kugel), Kbg. (Ltz.).

*A. brunneipennis* Kr. s. Kbg. (Ltz.), von Lindenblüthen geklopft Glettkau (Czw.).



- A. rufitarsis* Heer. s. Kbg. (Ltz.).  
*A. lanuginosa* Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*A. villosa* Mannh. s. in Taubennestern, Dz. (Dommer).  
*A. mycetophaga* Kr. n. h., Loppelnen (Eld.), Kbg. (Ltz.).  
*A. moerens* Gyll. n. s. Fischhausen (Ltz.), Dz. (Dommer).  
*A. moesta* Grav. h. an Excrementen, Kbg. (Ltz.).  
*A. bilineata* Gyll. n. s. ebenso.  
*A. nitida* Grav. h. ebenso.  
*A. binotata* Kr. h. Loppelnen (Eld.), in den Dünen von Glettkau (Czw.).  
*A. obscurella* Grav. s. Dz. am Seestrände (Dommer), Glettkau (Czw.).  
*Dinarda Märkelii* Kow. n. s. in Ameisennestern, Putzig (Stf.), F. F. (Str.).  
*D. dentata* Grav. viel seltener an gleichen Orten (Stf.), Kbg. Wilkie (Sauter).  
*Atemeles paradoxus* Grav. s. bei Ameisen, Putzig (Stf.), Rauschen (Ltz.).  
*A. emarginatus* Grav. n. h. Putzig (Stf.), Ludwigsort in Sandgruben (Sauter).  
*Lomechusa strumosa* Fabr. einmal bei Kbg. unter Ameisen zahlreich (Sauter), sonst s. Dz. (Dommer), Rauschen (Ltz.).  
*Myrmedonia collaris* Payk. n. s. unter moderndem Laube, im Garten von Margen (Ltz.); an Schwämmen unter der Rinde abgestorbener Bäume (Kugel).  
*M. humeralis* Grav. s. Blaustein (Ltz.).  
*M. cognata* Märk. s. Rosenau bei Kbg. (Ltz.), Dz. (Helm).  
*M. funesta* Grav. s. in Pilzen bei Dz. (Stf.), Vierbrkr. (Str.).  
*M. limbata* Pk. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*M. lugens* Grav. s. Dz. (Sieb.).  
*M. laticollis* Märk. s. Loppelnen (Eld.), Dz. (Helm), Vierbrkr. (Str.).  
*M. canaliculata* Fabr. s. h. unter Steinen.  
*Ilyobates nigricollis* Pk. s. unter Steinen im Putziger Stadtwalde (Stf.), Schwarzort (Ltz.), Glettkau (Czw.).  
*I. forticornis* Lac. s. s. Ktzn. unter faulenden Pflanzen (Czw.).  
*Calodera nigrita* Mannh. n. h. in Wäldern, Dz. (Dommer), Ggbg. (Kr.).  
*C. uliginosa* Er. n. h. Ktzn. (Czw.).  
*C. riparia* Er. s. Kbg. am Pregel (Sauter, Czw.).  
*C. aethiops* Grav. s. Dz. (Dommer).  
*C. umbrosa* Er. s. wie *riparia*.  
*Chilopora rubieunda* Er. s. Dz. (Dommer), Neue Bleiche (Czw.).  
*Tachyusa constricta* Er. n. h. Ktzn. am Nogatufer, Kbg. Neue Bleiche, Neuhausen (Czw., Str.).  
*T. coarctata* Er. h. Dz. am Seestrände (Dommer), Heilsberg am Alleufer (Ltz.), Rastenburg Guberufer, Ktzn. Nogatufer (Czw.).  
*T. scitula* Er. s. Rauschen (Ltz.). Die Angabe von Dommer war unrichtig, es war *Homalota puncticeps* Thoms. (Czw.).  
*T. flavitarsis* Sahlb. *chalybea* Er. s. Ktzn. Rastenberg. (Czw.), Dz. (Dommer).  
*T. umbratica* Er. s. Dz. aus Moos (Dommer).  
*T. atra* n. s. Kbg. (Ltz.).  
*T. concolor* Er. s. Ktzn. am Nogatufer, Kbg. Pregelufer (Czw.).  
*Ocyusa maura* Er. s. Kbg. (Sauter, Str., Czw.).  
*O. picina* Aubé s. Ktzn. (Czw.).  
*Ocyropa ruficornis* Gyll. n. s. in Schwämmen u. unter abgefallenem Laube, Putzig, Dz., Elbing (Stf.). Die var. *spectabilis* Märk. bei Ggbg. (Kr.).  
*O. lividipennis* Mannh. *luteipennis* Er. überall h.  
*O. vittata* Märk. s. Kbg. (Sauter).  
*O. humidula* Kr. *umbrata* Er. s. Ggbg. (Kr.).  
*O. opaca* Grav. überall h.  
*O. funebris* Kr. s. Ggbg. (Kr.), F. F. (Czw.).  
*O. longiuscula* Er. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*O. lentula* Er. s. Ktzn., Schrb. (Czw.).  
*O. umbrata* Gyll. n. s. Ggbg. (Kr.).  
*O. cuniculina* Er. s. Kbg. (Ltz.).  
*O. togata* Er. h. daselbst.  
*O. abdominalis* Sahlb. s. Dz. (Kumm).  
*O. testacea* Er. s. s. Sieb.  
*O. alternans* Grav. n. s. Dz. am Meeresstrände und aus Moos (Dommer), Kbg. (Ltz.).  
*O. exoleta* Er. n. h. Dz., Kbg. (Sauter, Czw.).  
*O. inerassata* Rey s. F. F. (Czw.).  
*O. formiceticola* Märk. n. h. in Ameisenhaufen, Kbg. (Dommer, Ltz.).  
*O. haemorrhoea* Sahlb. *myrmecophila* Märk. ebenso, Putzig (Stf.).  
*O. amoena* Fairm. s. Glettkau (Czw.).

- O. terrestris* Kr. wie *incrassata*.  
*O. rufescens* Kr. s. Kbg. (Czw.).  
*O. annularis* Sahlb. s. Ggbg. (Kr.).  
*O. brachyptera* Steph. *ferruginea* Er. s. Schrb. (Czw.)  
*Homalota*. Der Uebersichtlichkeit wegen werde ich die sehr bedeutende Menge der Species (97) in alphabetischer Reihenfolge aufzählen.  
*H. aequata* Er. n. s. Kbg. (Sauter, Ltz., Stnr.).  
*H. analis* Grav. g. unter Blättern u. im Moose.  
*H. anceps* Er. h. am Meeresstrande (Dommer, Ltz.).  
*H. angusticollis* Thoms. s. Schrb. in Pilzen (Czw.), nach Eppelsh. ♀ von ravilla.  
*H. angustula* Gyll. h. Dz. (Frantz.), Kbg. (Ltz.).  
*H. aterrima* Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*H. atramentaria* Gyll. n. s. Kbg. Pregelwiesen, Glettkau im Kuhdünger (Czw.).  
*H. atricolor* Sharp. *mortuorum* Sharp. s., wie *angusticollis*.  
*H. cadaverina* Bris. ebenso.  
*H. cauta* Er. *parvula* Mannh. s. Kbg. (Sauter).  
*H. cavifrons* Sharp. s. F. F. (Stnr. Czw.).  
*H. celata* Er. n. s. Loppennen (Eld.), Kbg. (Ltz.).  
*H. cinnamomea* Grav. s. am ausgeflossenen Eichensaft Dz. (Dommer); Neuhausen, Memel (Stnr.).  
*H. circellaris* Grav. unter Abiesrinde g.  
*H. coriaria* Kr. n. h. Kbg. (Ltz.).  
*H. cuspidata* Er. unter Rinden s. h.  
*H. debilis* Er. s. im Röhricht am Pregeldamme (Ltz.).  
*H. decipiens* Sharp. s. Schrb., F. F. (Czw.), nach Eppelsh. ♀ zu *analis* gehörig.  
*H. deformis* Kr. n. h. Pregelwiesen, Schrb., Ktzn. (Czw.).  
*H. depressa* Grav. *brunnea* Fabr. s. unter faulenden Vegetabilien, Putzig (Stf.).  
*H. divisa* Märk. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*H. elongatula* Grav. h. am ausfliessenden Baumsaft Kbg. (Ltz.).  
*H. exilis* Er. n. s. Kbg. (Sauter, Ltz.).  
*H. flavipes* Grav. h. überall.  
*H. fragilicornis* Kr. s. Ktzn. am Nogatufer (Czw.).  
*H. fungi* Grav. g. unter Laub; var. *orbata* Er. Glettkau (Czw.).  
*H. fungicola* Thoms. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*H. gagatina* Baudi. *variabilis* Kr. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*H. gemina* Er. s. Kbg. (Ltz.).  
*H. germana* Sharp. n. h. Kbg. (Czw.).  
*H. graminicola* Grav. h. Kbg. (Ltz.).  
*H. granigera* Ksw. s. Ggbg. (Kr.), Kbg. (Sauter).  
*H. gregaria* Er. *Tachyusa immunita* Er. h. Kbg. (Ltz.).  
*H. grisea* Thoms. s. Kbg. (Czw.). Seidl. Fn. Balt. p. 302.  
*H. humeralis* Kr. s. in der F. F. im Schwamm eines *Carpinus*stammes (Czw.).  
*H. hygrobia* Thoms. s. Kbg. (Czw.).  
*H. hypnorum* Ksw. *silvicola* Fuss. s. Corjeiten, am Meeresstrande (Ltz.).  
*H. ignobilis* Sharp. s. Kbg. (Sauter, Stnr.), Dz. (Czw.).  
*H. immersa* Er. s. Loppennen (Eld.), Ggbg. (Kr.).  
*H. incana* Er. s. Kbg. Holzwiesen- (Ltz., Stnr.).  
*H. inquinula* Er. n. s. Loppennen (Eld.), Ggbg. (Kr.).  
*H. insecta* Thoms. *languida* Scriba s. Neuhäuser unter Tang (Stnr.), Pregelwiesen (Czw.).  
*H. labilis* Er. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*H. laevana* Rey. *setigera* Sharp. n. s. an Excrementen Ggbg. (Kr.), Schrb. (Czw.).  
*H. languida* Er. n. s. Ggbg. (Kr.), Kbg. (Sauter); in der Dommerschen Sammlung hat Czw. 3 St. gesehen.  
*H. lepida* Kr. *corvina* Thoms. s. in Pilzen bei Jäschkenthal (Czw.).  
*H. linearis* Grav. s. Kbg. (Ltz.).  
*H. lividipennis* Er. überall h. am Baumsafte.  
*H. longicornis* Grav. h. ebenso.  
*H. luridipennis* Mannh. h. ebenso.  
*H. luteipes* Er. s. F. F. (Czw.).  
*H. mareida* Er. s. Kbg. (Ltz.).  
*H. merdaria* Thoms. n. s. in übelriechenden Pilzen, Kbg. (Ltz.).  
*H. nigerrima* Aubé. s. Seestrand (Eld.).  
*H. nigricornis* Thoms. n. h. Kbg., Dz. (Czw.).  
*H. nigritula* Grav. s. Kbg. vom Pregeldamm (Ltz.).

- H. nitidula* Kr. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*H. oblita* Er. s. Ktzn. (Czw.).  
*H. oblonga* Er. s. Kbg. (Czw.).  
*H. occulta* Er. h. Dz., im Frühjahr am Meeresstrande (Dommer).  
*H. orphana* Er. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*H. pagana* Er. s. Kbg. (Czw.).  
*H. palliata* Er. s. Dz. (Dommer), Ggbg. (Kr.)  
*H. palustris* Ksw. s. Dz. am Strande (Dommer), Kbg. (Ltz.).  
*H. pilicornis* Thoms. pilosa Kr. s. Schrb. (Czw.).  
*H. plana* Gyll. s. Loppennen (Eld.), Kbg. (Stnr.).  
*H. pulchra* Kr. s. Schrb. Ktzn. (Czw.).  
*H. pumila* Kr. s. Kbg. (Czw.).  
*H. puncticeps* Thoms. s. an der Seeküste, Neufahrwasser (Czw.), in der Dommerschen Sammlung als *Tachyusa scitula* bezeichnet (Czw.).  
*H. pygmaea* Grav. n. h. Ggbg. (Kr.), die var. *obfuscata* Grav. aus Moos, Kbg. (Sauter).  
*H. ravilla* Er. s. F. F. (Czw.), cf. *angusticollis*.  
*H. sericea* Rey. s. Ggbg. (Kr.).  
*H. simillima* Sharp. s. F. F. (Stnr.).  
*H. sodalis* Er. s. Kbg. (Ltz.).  
*H. sordidula* Er. h. Kbg., im Pferdedünger auf den Holzwiesen (Czw.), Loppennen (Eld.)  
*H. soror* Kr. s. Kbg. Ktzn. (Czw.).  
*H. splendens* Kr. s. Rastenburg (Czw.).  
*H. stercoraria* Kr. s. Dz., an der Krähen-schanze unter Steinen (Czw.).  
*H. subalpina* Rey. s. Kbg. (Sauter).  
*H. sublinearis* Kr. s. Kbg. (Ltz.); mit- unter sehr zahlreich bei Katzn. (Czw.).  
*H. subrugosa* Ksw. s. F. F. (Czw.).  
*H. subsinuata* Er. s. Karlikau bei Zoppot (Czw.).  
*H. subterranea* Rey. s. Ggbg. (Kr.).  
*H. subtilis* Scriba. s. Schrb., F. F. (Czw.).  
*H. talpa* Heer. n. s. Kbg. (Dommer), Putzig (Stf.), Ggbg. (Kr.).  
*H. terminalis* Gyll. n. s. Samländ. Seestrand (Eld. Ltz.), Ggbg. (Kr.).  
*H. testudinea* Er. s. ebendasselbst.  
*H. thinobioides* Kr. s. Loppennen (Eld.).  
*H. tibialis* Heer. obwohl ein entschiedener Gebirgskäfer, doch in 2 Stück von Czw. bei Schrb. und in der F. F. gefangen (von Scriba bestimmt).
- H. trinotata* Kr. socialis Thoms. n. s. am Baumsafte Kbg. (Ltz.).  
*H. validicornis* Märk. n. s. am Eichensaft Kbg. (Ltz.).  
*H. velata* Er. n. s. Dz. (Dommer).  
*H. vernacula* Er. n. s. Dz. (Dommer) Kbg. (Ltz.), Ggbg. (Kr.).  
*H. vestita* Grav. n. s. am Ostseestrande (Dommer, Eld., Ltz.).  
*H. vicina* Kr. nigra Kr. n. s. Loppennen (Eld.), Löwenhagen (Ltz.), Ktzn. (Czw.).  
*H. vilis* Er. s. F. F. (Czw.).  
*H. volans* Scriba. n. s. Ggbg. (Kr.), Kbg. auf den Pregelwiesen (Czw.).  
*Placusa complanata* Er. s. aus Röhricht am Pregeldamme (Ltz.).  
*P. atrata* Sahlb. s. Ktzn. (Czw.).  
*P. infima* Er. s. Kbg. ♂ ♀ (Sauter).  
*P. adscita* Er. s. F. F. (Czw.).  
*Cyphaea curtula* Er. s. F. F. unter Rinde von *carpinus*; die Vermuthung von Kraatz K. D. II. 191 ist richtig (Czw.).  
*Phloeopora reptans* Grav. h. unter Tannensrinde Kbg. (Ltz.).  
*P. corticalis* Grav. ebenso.  
*Hygronoma dimidiata* Grav. s. auf Wasserpflanzen b. Heub. (Dommer); unter ausgespütem Röhricht Zinten (Ltz.); Ktzn., Kbg. (Czw.).  
*Oligota pusillima* Grav. n. s. aus Moos vom Seestrande (Eld.); auf Waldwiesen bei Sonnenuntergang geschöpft Putzig (Stf.).  
*O. parva* Kr. s. Kbg. Poln. Kirchhof (Czw.).  
*O. inflata* Mannh. n. h. Dz., Ktzn. (Czw.), Kbg. Holzwiesen (Stnr.).  
*O. granaria* Er. s. wie *pusillima*, Kbg. (Czw. Stnr.), Schwarzort (Stnr.).  
*O. flavicornis* Lac. s. F. F. (Stnr.).  
*Encephalus complicans* Westw. s. s. Löwenhagen auf dem östlichen Abhange des Waldes, Rastenburg. (Czw.), Vierbrkr. aus Moos (Stnr.).  
*Gyrophæna pulchella* Heer. n. s. Loppennen (Eld.), Kbg. (Czw.). Alle Species in Blätterpilzen.  
*G. affinis* Sahlb. n. s. Neuhäuser (Ltz.).  
*G. punctulata* Rey. s. F. F. (Czw.), 6 St. alles ♂; auch Muls. sagt: la femelle nous est inconnue (Société Linn. Lyon 1872).  
*G. gentilis* Er. s. Schrb. (Stnr.).  
*G. nana* Pk. überall g.  
*G. laevipennis* Kr. n. h. Kbg. auf dem Poln. Kirchhof (Czw. Stnr.).

- G. lueidula* Er. s. daselbst (Czw.).  
*G. congrua* Er. h. Dz. (Dommer), Kbg. (Ltz.).  
*G. bihamata* Thoms. s. F. F. Ktzn. (Czw.).  
*G. minima* Er. n. s. Dz. (Dommer).  
*G. manca* Er. n. s. Loppelnen (Eld. Ltz.).  
*G. polita* Grav. ebenso.  
*G. strictula* Er. s. ebenso, im Schlossgarten von Friedrichstein (Ltz.).  
*G. boleti* L. n. s. ebenso, F. F. (Stnr.).  
*Pronomaca rostrata* Er. bei Ggbg. (Kr.) nicht sehr selten; Heub. Dz. (Czw.).  
*Myllaena dubia* Grav. s. im Grebbiner Walde im Frühjahr unter feuchtem Laube (Dommer), Kbg. (Stnr.).  
*M. intermedia* Er. n. s. ebenso.  
*M. minuta* Grav. h. aus Moos von Sorquitten (Eld.), unter Tang bei Zoppot, Mai (Stf.).  
*Gymnusa brevicollis* Pk. s. Dz. in Wäldern unter Laub und im Moose (Dommer).  
*Dinopsis fuscata* Matth. s. Grebbiner Wald (Dommer), Ktzn. (Czw.).  
*Hypocytyus longicornis* Pk. n. h. Putzig Mai, Juni (Stf.); Neuhausen, F. F., Metgethen (Stnr.), Oliva (Czw.).  
*H. seminulum* Er. n. s. Neuhäuser (Ltz.), Glettkau (Czw.).  
*H. laeviusculus* Mannh. s. Dz., aus Moos (Dommer), Kbg. (Czw.).  
*Trichophya pilicornis* Gyll. s. s. Rastenburg (Czw.).  
*Habrocerus capillareornis* Grav. n. h. Kbg. auf dem Poln. Kirchhof, Dz. am Carlsberg, Ktzn. unter Stroh (Czw.), F. F. (Stnr.).  
*Leucoperyphus silphoides* L. n. s., im Frühjahr an Apfelblüthen (Dommer); auf Eichen, Rauschen (Ltz.), im Kuhdünger in den Dünen von Glettkau (Czw.).  
*Tachinus humeralis* Grav. Loppelnen (Eld.).  
*T. rufipes* Deg. h. im Dünger (Ltz.).  
*T. flavipes* Fabr. g. ebenso.  
*T. rufipennis* Gyll. s. Kbg. bei Wilkie (Pfeil), Ggbg. (Kr.).  
*T. marginatus* Gyll. n. h. Rauschen (Ltz.), Hlgl. (Stnr.), in der Dommerschen Sammlung als *T. pallipes* Grav. (Czw.).  
*T. pallipes* Grav. s. Blaustein (Ltz.).  
*T. bipustulatus* Fabr. n. h. unter Steinen (Kug.), hiezu gehören die 4 St. der Dommerschen Sammlung, die er *pallipes* Grav. bezeichnet hat (Czw.).  
*T. subterraneus* L. n. h. am ausfliessenden Birkensaft, Blaustein (Ltz.).  
*T. fimetarius* Fabr. g. auf Hollunderblüthen.  
*T. marginellus* Fabr. s. Dz. (Sieb.).  
*T. laticollis* Grav. n. s. Kbg. (Czw. Ltz.).  
*T. collaris* Grav. h. an feuchten, schattigen Stellen (Kugel), Kbg. (Ltz.).  
*Tachyporus obtusus* L. überall h.  
*T. formosus* Matth. s. s. Schrb. (Czw.).  
*T. ruficeps* Kr. s. aus Ellernlaub gesiebt an der Dallnitz bei Lyek (Sanio).  
*T. solutus* Er. n. s. Kbg. (Ltz. Stnr.).  
*T. chrysomelinus* L. g.  
*T. hypnorum* Fabr. g.  
*T. tersus* Er. s. s. Dz. 1869 (Helm).  
*T. atriceps* Steph. *humerosus* Er. s. bei Stegen, unter Fichtennadeln (Dommer), Kbg. (Stnr.).  
*T. ruficollis* Grav. s. Kbg. (Sauter).  
*T. transversalis* Grav. h. Dz. aus Moos (Dommer), Kbg. (Ltz.).  
*T. scitulus* Er. ebenso.  
*T. pusillus* Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*T. brunneus* Fabr. n. s. an feuchten, schattigen Stellen (Kugel. Sieb.).  
*T. saginatus* Grav. s. Osterode, in der Erde, auf Blumen, in Schwämmen (Kugel.), Dz. (Sieb.), Glettkau (Czw.), F. F. (Stnr.).  
*Conurus pubescens* Pk. h. unter Laub, Kbg. (Ltz.).  
*C. pedicularius* Grav. n. s. an alten Baumstämmen im Moose (Kugel. Dommer).  
*C. littoreus* L. n. s. Kbg. Holzweiden, Juditten (Ltz. Stnr.).  
*C. bipustulatus* Grav. Osterode unter moderndem Holze, unter Baumrinde (Kugel.), jedoch nicht wieder gefunden.  
*C. bipunctatus* Grav. s. an einem Weidenstubben bei Heub. (Dommer), Kbg. (Ltz.).  
*Bolitobius lunulatus* L. *atricapillus* Fabr. h. in faulenden Pilzen, Kbg. (Ltz.).  
*B. pulchellus* Mannh. *lunulatus* Er. bei Putzig n. s. Mai—October (Stf.).  
*B. trinotatus* Er. s. Kbg. vom Pregeldamm (Ltz.).  
*B. exoletus* Er. n. s. Dz. (Dommer), Kbg. (Ltz.).  
*B. pygmaeus* Fabr. g. hierher gehört sicher auch *B. trimaculatus*, von dem Kugel. sagt, dass er von ihm in einem *Agaricus* wohl über

tausend Stücke gefunden habe. Die var. intrusus Hampe. Rauschen (Ltz.).

*B. striatus* Oliv. s. Osterode in faulendem Holze, (Kugel.), Kbg. aus Moos (Sauter), Schrb. (Czw.).

*B. cingulatus* Mannh. n. h. Kbg. bei Liep (Ltz.), Glettkau (Czw.).

*B. analis* Payk. s. Putzig, Elbing Mai—October (Stf.).

*B. inclinans* Grav. s. s. überwinternd an Weiden, die mit Pilzen besetzt sind, Gr. Zünder (Dommer).

*B. formosus* Grav. n. s. in feuchtem Moose, Putzig (Stf.), Ktzn. Schrb. F. F. (Czw. Stnr.).

*B. cernuus* Grav. s. Dz. (Dommer), Ggbg. (Kr.), F. F. (Stnr.).

*B. rufus* Er. s. Schwarzort (Ltz., Schieff.).

*Mycetoporus splendidus* Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).

*M. lucidus* Er. s. aus Moos von Dammhof (Sauter).

*M. nanus* Er. n. h. Kbg., nasser Garten (Czw.).

*M. punctus* Gyll., wie *lucidus*; Schwarzort (Ltz.).

*M. brunneus* Marsh. *longulus* Mannh. *lepidus* Grav. *ruficornis* Kr. n. s. in Pilzen, Kbg. (Ltz.), Dz. (Dommer, Czw.).

*M. splendens* Marsh. s. Rauschen (Ltz.).

*M. pronus* Er. n. s. aus Moos, F. F. (Ltz., Stnr.).

*Acyllophorus glabricollis* Grav. s. s. Ggbg. (Kr.).

*Euryporus picipes* Payk. s. Schrb., F. F., Löwenhagen im Spätherbst (Stnr.), Ggbg. (Kr.).

*Heterothops praevia* Er. n. s. an Stubben im Moose (Dommer), Kbg. (Ltz.).

*H. binotata* Grav. *quadripunctula* Gyll. h. am Seestrande (Ltz.), Kbg. Holzwiesen, F. F. (Stnr.).

*H. dissimilis* Grav. s. an feuchten, dumpfigen Orten (Kugel.), an Stubben im Moose (Dommer).

*Quedius dilatatus* Fabr. s. s. im Ottominer Walde an ausgeflossenen Eichensaft, August (Dommer); Warnicken (Eld.).

*Q. chrysurus* Ksw. s. Ggbg. (Kr.).

*Q. brevis* Er. n. h. Putzig, April—Juni, unter Ameisen (Stf.), Neuhausen (Stnr.).

*Q. lateralis* Grav. n. s. in faulenden Pilzen bei Zoppot, Aug. Septbr. (Dommer), Putzig (Stf.), Rauschen (Stnr.).

*Q. fulgidus* Fabr. (mit rothen Decken) n. h. Katznase (Czw.), Kbg. (Stnr.).

*Q. mesomelinus* Marsh. (schwarz) h. im Moose (Ltz.).

*Q. cruentus* Oliv. s. Ggbg. (Kr.), Kbg. Plantage (Stnr.).

*Q. xanthopus* Er. n. s. im Waldlaube (Dommer), Kbg. (Stnr.).

*Q. scitius* Grav. s. Kbg. (Ltz.).

*Q. laevigatus* Gyll. s. Putzig (Stf.), Schrb., F. F. (Czw. Stnr.).

*Q. impressus* Panz. s. unter Steinen in Wäldern (Kugel.), Putzig (Stf.), Kbg. am Trenker Waldhause (Ltz.), Ktzn. (Czw.).

*Q. fuliginosus* Grav. h. im Moose.

*Q. molochinus* Grav. ebenso.

*Q. umbrinus* Er. s. im Moose überwinternd (Dommer).

*Q. nigriceps* Kr. s. Lopphehen (Eld.), Kbg. (Ltz.).

*Q. praecox* Grav. s. von Blumen geschöpft (Dommer).

*Q. suturalis* Ksw. n. s. Ggbg. (Kr.).

*Q. marginalis* Kr. s. s. Dz. Jäschkenthal (Czw.).

*Q. scintillans* Grav. s. Trenker Waldhaus (Ltz.), Ktzn. (Czw.).

*Q. maurorufus* Grav. s. Lopphehen (Eld.), Kbg. (Ltz.), F. F. (Stnr.).

*Q. lucidulus* Er. s., von Büschen geklopft (Dommer), Ggbg. (Kr.).

*Q. attenuatus* Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.).

*Q. boops* Grav. s. Putzig (Stf.), am Pregel (Stnr.).

*Emus maxillosus* L. h. am Aase, Kbg. (Ltz.).

*E. hirtus* L. s. Blaustein an Kuhdünger (Ltz.).

*Leistostrophus nebulosus* Fabr. h. wie *Emus maxillosus*.

*L. murinus* L. ebenso.

*Staphylinus pubescens* Deg. n. s. wie *Emus maxillosus*.

*S. fulvipes* Scop. s. s. unter Laub in Wäldern (Dommer), Vierbrkr. (Stnr.).

*S. stercorarius* Oliv. s. Dz. (Sieb.).

*S. latebricola* Grav. s. ebenso.

*S. erythropterus* L. h. in Wäldern, Warnicken, Lyck, Rastenburg (Ltz.).

- S. caesareus* Cederh. überall h.  
*S. Ocyppus olens* Müll. s. Heilsberg, Rastenburg (Sieb.).  
*S. brunripes* Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*S. cyaneus* Payk. s. Allenstein, in faulenden Stämmen (Kugel.), Braunsberg (Str.), im Walde von Schwarzort, Juli (Ltz.), Oliva (Czw.).  
*S. similis* Fabr. s. Dz. (Sieb.).  
*S. picipennis* Fabr. n. s. im Moose, Fischhausen (Ltz.).  
*S. fuscatus* Grav. n. h. Zoppot (Ltz.), Ggbg. (Kr.).  
*S. cupreus* Rossi. n. h. Kbg. (Ltz.).  
*S. ater* Grav. s. Ktzn. (Czw.).  
*S. morio* Grav. s. in trockenen Gräben bei Gr. Zünder (Dommer), Kbg. (Ltz.)  
*Philonthus xantholoma* Grav. an der Samländ. Seeküste unter Tang mitunter n. s. (Eld. Ltz.).  
*P. einerascens* Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*P. elongatulus* Er. s. Kbg. auf Pregelwiesen (Czw. Str.).  
*P. procerulus* Grav. Kbg. (Ltz. Str.).  
*P. proluxus* Er. s. Rastenburg, am Kiesufer der Guber (Czw.).  
*P. splendens* Fabr. s. Kbg. (Ltz.), Schrb. (Czw.).  
*P. intermedius* Lac. s. Dz. (Ltz.)  
*P. nitidus* Febr. s. Kbg. (Ltz.).  
*P. proximus* Kr. carbonarius Er. suecicola Thoms. z. h. im Dünger, Dz. (Dommer), Kbg. (Ltz.).  
*P. carbonarius* Gyll. tenuicornis Muls. n. s. Schromb. (Czw. Str.).  
*P. aeneus* Rossi. s. h. überall.  
*P. punctus* Grav. mit var. binotatus Grav. s. Schwarzort (Ltz.), Kbg. nasse Garten (Czw.).  
*P. puella* Nordm. s. am Eichensaft, Schromb. (Czw.).  
*P. cephalotes* Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*P. umbratilis* Grav. s. Ludwigsort (Ltz.), Ktzn. (Czw.).  
*P. sordidus* Grav. n. s. Conitz (Sieb.), Kbg. (Ltz.), Ktzn. (Czw.).  
*P. fuscus* Grav. s. Dz., Grebbiner Wald am Eichensaft (Dommer, Ltz.), Schwarzort in Reihernestern (Czw.), Kbg. am Pappelsaft (Str.).  
*P. sanguinolentus* Grav. n. s. am Aase (Kugel.), in frischem Dünger (Ltz.).  
*P. ventralis* Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*P. debilis* Er. s. ebenso.  
*P. discoideus* Grav. n. s. unter faulenden Gewächsen (Kugel.), Dz., in Stubben (Dommer), Kbg. am Trenker Waldhause (Ltz.).  
*P. laminatus* Creutz. n. s. Dirschau an der Weichselbrücke (Ltz.).  
*P. atratus* Grav. ebenso.  
*P. laevicollis* Lac. s. Kbg. (Ltz., Sauter).  
*P. dimidiatus* Sahlb. s. am Weichsel- und Haffufer, Juli (Dommer).  
*P. ebeninus* Grav. in allen Grössen g. Die var. *coruscus* Grav. seltener, Kbg. (Ltz.), Ggbg. (Kr.).  
*P. quisquiliarius* Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.), die var. *rubidus* Er. Ggbg. (Kr.).  
*P. splendidulus* Grav. n. s. Conitz (Sieb.), Kbg. (Ltz.).  
*P. fimetarius* Grav. ebenso, Dz. (Kumm.).  
*P. nigrutilus* Grav. trossulus Nordm. s. h. Kbg. (Ltz.).  
*P. decorus* Grav. n. h. Kapkeim (Ltz.).  
*P. politus* Fabr. h. Kbg. (Ltz.).  
*P. lepidus* Grav. s. im Frühjahr, Putzig (Stf.), Dz. (Czw.).  
*P. nitidulus* Grav. s. Dz. auf der Krähen-schanze (Czw.).  
*P. varius* Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.), die var. *bimaculatus* Grav. s. Putzig (Stf.).  
*P. tenuis* Fabr. im Süden der Prov. n. s. bei Osterode auf Aeckern unter Steinen (Kugel.), Conitz (Sieb.), Blaustein (Ltz.).  
*P. marginatus* Müll. h. im frischen Dünger, Kbg. (Ltz.).  
*P. bipustulatus* Panz. n. h. Kbg. (Ltz.).  
*P. scybalarius* Nordm. n. h. ebenso, Dz. (Czw.).  
*P. varians* Payk. opacus Thoms. in frischem Dünger, auch die var. *agilis* Grav. Kbg. (Ltz.).  
*P. albipes* Grav. s. Ggbg. (Kr.).  
*P. fumarius* Grav. s. in abgefallenem Laube, Kbg. (Ltz.), am Damnteich, Juni (Czw.).  
*P. nigrita* Grav. s. h. ebenso.  
*P. micans* Grav. g. ebenso.  
*P. fulvipes* Fabr. n. s. an Flussufern (Czw.).  
*P. virgo* Grav. s. s. Kbg. (Pfeil).  
*P. vernalis* Grav. n. s. unter abgefallenem Laube, Kbg. (Ltz.).  
*Xantholinus relucens* Grav. s. Ggbg. (Kr.).  
*X. glaber* Nordm. s. in fetter Erde (Kugel.), Juditten (Str.).

*X. rufipennis* Er. s. Kbg. an Birkenstubben in Wilkie (Pfeil).

*X. tricolor* Fabr. n. s. in Fanggräben der Forsten und unter Moos (Dommer, Frantzius, Ltz.).

*X. distans* Rey. ebenso, Kbg. (Czw., Ltz.).

*X. linearis* Oliv. *longiventris* Heer. h. unter Laub, Kbg. (Ltz.), Dz. (Helm).

*X. punctulatus* Payk. *ochraceus* Gyll. h. ebenso.

*X. fulgidus* Fabr. s. in Wäldern unter faulendem Holz, Osterode (Kugel.), Dz. (Dommer), Kbg. im Tharauer Walde (Ltz.).

*X. lentus* Grav. bei Rastenburg im Walde von Blaustein n. s. unter Abiesrinde (Ltz.).

*Leptacinus batycheus* Gyll. *linearis* Grav. n. s. Ggbg. (Kr.), Kbg. Plantage (Stnr.).

*L. formicetorum* Märk. h. unter Ameisen, Kbg. (Eld., Ltz.).

*Baptolinus pilicornis* Payk. s. Dz. in einer Sägegrube (Dommer), Kbg. in Abiesstubben (Ltz.).

*B. alternans* Grav. s. Lopphehen (Eld.), Schwarzort im Pilz einer alten Weide (Ltz.), unter Kiefernrinde Kbg. (Czw.).

*Othius fulvipennis* Fabr. n. s. unter abgefallenen Laube und Nadeln, Dz. (Dommer), Kbg. (Ltz.).

*O. melanocephalus* Grav. h. in feuchtem Moose u. Baummoder Kbg. (Ltz., Stnr.).

*O. lapidicola* Ksw. s. Ludwigsort (Ltz.), Wilkie (Pfeil).

*O. myrmecophilus* Ksw. s. Dz. aus Laub gesiebt neben dem Carlsberg bei Oliva (Czw.), Kbg. (Ltz.).

*Lathrobium brunripes* Fabr. h. Kbg. (Ltz.).

*L. elongatum* L. s. h. unter Laub, Kbg. (Ltz.).

*L. boreale* Hochh. s. s. F. F. (Czw.).

*L. fulvipenne* Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).

*L. rufipenne* Gyll. s. Dz. (Dommer).

*L. filiforme* Grav. s. Kbg. (Ltz.).

*L. longulum* Grav. s. aus Moos (Eld.), Putzig Juni (Stf.).

*L. multipunctum* Grav. Dz. auf Feldern n. s. (Dommer), Corjeiten (Ltz.).

*L. scutellare* Nordm. s. s. auf einem Felde neben der F. F. (Czw.).

*L. quadratum* Payk. n. s. unter Laub, Kbg. (Ltz.).

*L. terminatum* Grav. ebenso, bei Putzig s. (Stf.). bei Kbg. h. Wernsdorf (Kuwert). Ich kann mich von der Identität mit *quadratum* nicht überzeugen, letzteres ist stets grösser, breiter und überhaupt plumper gebaut; auch habe ich *terminatum* ohne rothe Punkte hier noch nicht gesehen. Czw. sagt darüber folgendes: Auch ich würde nach den bei uns vorkommenden Stücken die Arten sicher trennen: aber aus Italien (Vallombrosa) habe ich wirkliche Mittelformen mitgebracht und bin seitdem Fauvels Ansicht von der Nothwendigkeit der Vereinigung beigetreten. Es scheinen werdende Arten (Darwin), die bei uns schon getrennt sind.

*L. punctatum* Zett. n. h. Kbg. (Ltz.).

*L. pallidum* Nordm. s. in trocknen Gräben, Gr. Zünder (Dommer), Kbg. Holzweiden (Stnr.).

*L. scabricolle* Er. s. s. Kbg. in Birkenstubben bei Wilkie (Pfeil).

*Cryptobium fracticorne* Pk. n. s. auf alten Baumwurzeln unter Moos (Kugel.), Dz. (Dommer), Kbg. (Ltz., Stnr.).

*Lithocharis ochracea* Grav. s. aus Moos Dz. (Frantz.), Kbg. (Ltz.), Ktzn. (Czw.).

*L. obsoleta* Nordm. *obscurilla* Er. s. Ktzn. (Czw.).

*L. melanocephala* F. s. Dz. (Dommer), Wilkie in Abiesstubben (Ltz.).

*Scopacus laevigatus* Gyll. n. s. Ggbg. (Kr.), Kbg. (Sauter, Stnr.).

*S. cognatus* Rey. s. unter Röhricht, Kbg. (Ltz.), Rauschen (Stnr.).

*S. sulcicollis* Steph. *minutus* Er. s. in einer Sandgrube, Ktzn. (Czw.).

*Stilicis fragilis* Grav. s. am Seestrande bei Adlershorst, Juni (Dommer).

*S. orbiculatus* Payk. h. unter faulendem Heu, Kbg. (Ltz.).

*S. geniculatus* Er. s. Kbg. auf der Plantage I ♂ (Czw.).

*S. similis* Er. s. Kbg., in der Brandenburger Haide (Ltz.).

*S. rufipes* Germ. s. h. mit *orbiculatus*.

*S. subtilis* Er. s. Dz. (Sieb.).

*Sumius filiformis* Latr. s. Seestrand bei Kahlberg (Dommer), Ggbg. (Kr.).

*S. angustatus* Payk. n. s. Putzig, unter Steinen (Stf.), Kbg. im Moose (Sauter, Czw., Ltz.).

*Paederus riparius* L. h. auf sandigen Ufern unter Schilf, Kbg. (Ltz.).

- P. littoralis* Grav. ebenso.  
*P. longipennis* Er. ebenso.  
*P. limnophilus* Er. s. Rauschen (Stnr.).  
*P. ruficollis* Fabr. s. Osterode (Kugel.), Dz. (Sieb.).  
*Dianous coeruleescens* Gyll. s. Putzig, am Seeufer unter Tang, im ersten Frühjahr (Stf.).  
*Stenus biguttatus* L. s. h. unter feuchtem Laube in Gärten.  
*S. bipunctatus* Er. weniger h. Kbg. (Ltz.).  
*S. guttula* Müll. s. Dz. (Dommer).  
*S. aterrimus* Er. n. h. Putzig, bei Ameisen, April—Juni (Stf.), F. F. (Stnr.).  
*S. nanus* Steph. *declaratus* Er. n. h. Kbg., aus Röhricht (Sauter).  
*S. stigmula* Er. s. Ktzn. am Nogatufer (Czw.).  
*S. bimaeculatus* Gyll. s. Kbg. (Dommer, Ltz.).  
*S. speculator* Lac. n. s. Conitz (Sieb.); Kbg. Dammhof unter Schilf (Ltz.).  
*S. providus* Er. h. Kbg. (Ltz.).  
*S. lustrator* Er. s. Kbg. (Ltz.).  
*S. silvester* Er. s. F. F. 2 ♂ (Czw., Stnr.).  
*S. calcaratus* Scrib. s. Glettkau, Schromb. Neue Bleiche (Czw.), am Pregel (Stnr.).  
*S. Juno* Fabr. s. h. überall.  
*S. ater* Mannh. n. s. F. F. (Stnr.), Dz. (Czw.).  
*S. longitarsis* Thoms. s. Kbg. Pregelwiesen (Czw.).  
*S. circularis* Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*S. palposus* Zett. *argentellus* Thoms. s. Glettkau (Czw.).  
*S. buphthalmus* Grav. h. Kbg. (Ltz.).  
*S. incrassatus* Er. s. Kbg. Pregelwiesen (Czw.), Dammhof (Stnr.).  
*S. melanarius* Steph. *einerascens* Er. n. h. Kbg. (Ltz.).  
*S. canaliculatus* Gyll. n. h. Conitz (Sieb.).  
*S. nitens* Steph. *aemulus* Er. s. Blaustein (Ltz.).  
*S. melanopus* Marsh. *nitidus* Lae. s. Ktzn. unter Spreu (Czw.), Kbg. (Stnr.).  
*S. atratulus* Er. n. s. Kbg. (Sauter, Ltz.).  
*S. morio* Grav. h. ebenso.  
*S. vafellus* Er. s. Kbg. Pregelwiesen (Czw.).  
*S. cautus* Er. s. ebenso.  
*S. fuscipes* Grav. g.  
*S. crassiventris* Thoms. s. Schwarzort (Stnr.).  
*S. opticus* Grav. s. Putzig (Stf.), Pregelufer, Dammhof (Stnr.).  
*S. argus* Grav. s. Kbg. (Ltz., Schieffdr.).  
*S. humilis* Er. s. h.  
*S. carbonarius* Gyll. *niger* Mannh. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*S. nigritulus* Gyll. s. ebenso.  
*S. latifrons* Er. s. ebenso.  
*S. paganus* Er. s. Dz. am Seestrände (Dommer).  
*S. tarsalis* Ljung. g. auf Wasserpflanzen.  
*S. oculatus* Grav. h. ebenso.  
*S. eieindeloides* Schall. n. h. Putzig (Stf.), Kbg. Holzwiesen (Stnr.), Rastenbg. (Czw.).  
*S. contraetus* Er. s. Radauneufer (Dommer), Kbg. (Czw., Stnr.).  
*S. subimpressus* Er. s. Blaustein (Ltz.), Kbg. Prege wiesen (Czw.), Neuhausen (Stnr.).  
*S. binotatus* Ljung. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*S. plantaris* Er. s. h. wie *tarsalis*.  
*S. picipes* Steph. *rusticus* Er. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*S. bifoveolatus* Gyll. s. Kbg. (Czw.).  
*S. tempestivus* Er. s. Oliva, Juli (Czw.).  
*S. filum* Er. n. s. auf feuchten Waldwiesen, F. F. (Czw.), Horst am Pregel (Ltz.).  
*S. impressus* Germ. n. s. im Waldmoose, Kbg. (Ltz.).  
*S. geniculatus* Grav. s. Oliva, Schrb. (Czw., Stnr.).  
*S. pallipes* Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*S. palustris* Er. s. Ktzn. (Czw.).  
*S. flavipes* Er. n. s. F. F. (Stnr.), Kbg. (Sauter).  
*Euaesthetus seaber* Grav. n. s. Putzig (Stf.) Kbg. Pregeldamm (Ltz.).  
*E. ruficapillus* Lac. n. s. Teichrand von Dammhof (Eld.), Kbg. (Ltz.).  
*E. laeviusculus* Mannh. n. h. wie *seaber*.  
*Oxyporus rufus* L. h. in Blätterpilzen.  
*O. maxillosus* Fabr. s. Elbing (Ltz.), Rauschen, Georgenswalde (Stnr.).  
*Bledius tricornis* Hbst. Osterode in fetter Gartenerde (Kugel.), Hlgl. (Stnr.), Pregelwiesen (Czw.).  
*B. arenarius* Payk. n. h. Tilsit (Ltz.), Glettkau (Czw.).  
*B. talpa* Gyll. einmal im Mai in Menge gefunden, am Ufer des Ottominer Sees, sonst nicht wieder (Dommer).



- B. subterraneus* Er. h. Kbg. (Ltz., Stnr.).  
*B. pallipes* Grav. terebrans Schiödt. s. Dz. am Seestrande (Dommer), Loppelnen (Stnr.).  
*B. erraticus* Er. h. daselbst; Cranz (Ltz.).  
*B. atricapillus* Germ. nanus Er. s. Neuhäuser (Stnr.).  
*B. opacus* Block. n. h. in trocknen Gräben (Dommer).  
*B. longulus* Er. s. Dz. (Sieb.).  
*B. crassicollis* Lac. ebenso (Dommer).  
*B. procerulus* Er. s. Kbg. Pregeldamm (Czw., Stnr.).  
*B. fracticornis* Payk. n. s. Kbg. Trenker Waldhaus (Ltz.).  
*Platystethus morsitans* Payk. g. im Dünger.  
*P. cornutus* Gyll. n. h. Conitz (Sieb.), Kbg. (Ltz.).  
*P. capito* Heer. s. Kbg. (Ltz.)  
*P. nodifrons* Sahlb. n. h. ebenso.  
*P. nitens* Sahlb. n. s. Kbg. Neuhäuser (Ltz., Stnr.).  
*Oxytelus rugosus* Fabr. g. im Dünger.  
*O. Eppelsheimii* Bethe. s. Dz., F. F. (Czw. Stnr.).  
*O. insectatus* Grav. s. Kbg. Liep (Ltz.).  
*O. fulvipes* Er. s. s. besitzt aus Pr. Schffdr.  
*O. luteipennis* Er. s. Dz. im Pferdedünger (Dommer), Neuhausen (Stnr.).  
*O. piceus* L. h. Conitz (Sieb.), Marienburg (Ltz.), Neuhausen (Stnr.).  
*O. sculptus* Grav. s. Kbg. (Ltz., Stnr.).  
*O. inustus* Grav. s. ebenso.  
*O. sculpturatus* Grav. s. im Pferdedünger (Dommer).  
*O. nitidulus* Grav. g.  
*O. complanatus* Er. g.  
*O. Sauleyi* Pand. s. Kbg. auf dem Polnischen Kirchhof, Ktzn. (Czw.).  
*O. transversalis* Czw., n. h. Berl. Ent. Zt. 1870 p. 411, unter Laub, Kbg., Ktzn. Dz. (Czw.).  
*O. depressus* Grav. g.  
*O. affinis* Czw. s. Kbg., Ktzn. (Czw.).  
*O. tetratoma* Czw. s. s. Kbg. auf dem Poln. Kirchhoff (Czw.).  
*Haploderus caelatus* Grav. n. h. Putzig (Stf.), Zinten (Ltz.).  
*H. caesus* Er. s. Rauschen (Ltz.).  
*Trogophloeus bilineatus* Steph. riparius Lac. n. h. Putzig (Stf.), Wilkie (Eld.), Ktzn. (Czw.).  
*T. obesus* Ksw. s. Ggbg. (Kr.).  
*T. fuliginosus* Grav. s. Putzig (Stf.).  
*T. inquilinus* Er. s. Kbg. (Eld.)  
*T. corticinus* Grav. g.  
*T. elongatulus* Er. n. s. Ggbg. (Kr.), Vierbrkr. (Stnr.), Ktzn. (Czw.).  
*T. foveolatus* Sahlb. s. Putzig (Stf.), Heub. (Czw.).  
*T. exiguus* Er. n. h. im Pferdedünger (Dommer), Kbg. (Stnr.).  
*T. pusillus* Grav. n. s. Putzig (Stf.), Kbg. (Czw.).  
*T. tenellus* Er. s. Loppelnen (Eld.), Ggbg. (Kr.), Kbg. (Czw.).  
*T. subtilis* Er. s. Kbg. Pregelwiesen (Czw., Stnr.), Zinten (Ltz.).  
*Thinobius longipennis* Heer. s. Rastenburg, an der Guber (Czw.).  
*T. brevipennis* Ksw. s. Kbg. (Sauter), Heub. (Czw.).  
*Syntomium aeneum* Müll. s. Neuhäuser (Stnr.), Ktzn. an einem Grabenrande unter Blättern, October (Czw.).  
*Coprophilus striatulus* Fabr. n. s. Seestrand bei Zoppot, Mai (Dommer), Zinten (Ltz.).  
*Compsochilus palpalis* Er. Ggbg. (Kr.), Pregelwiesen (Czw.).  
*Acrognathus mandibularis* Gyll. s. Ggbg. (Kr.).  
*Delcastar dichrous* Grav. s. Dz., am Seestrande (Dommer, Helm), die var. *adustus* Küst. ebenda (Kumm).  
*Anthophagus caraboides* L. abbreviatus Fabr. s. h.  
*A. testaceus* Grav. ebenso.  
*Geodromicus plagiatus* Er. aus der Sammlung Nanke's von Kugel. angeführt, aber nicht weiter gefunden.  
*Lesteva pubescens* Mannh. n. s. Kbg. aus Röhricht (Ltz.).  
*L. bicolor* Fabr. s. von Büschen am Seestrande geschöpft (Dommer).  
*Olophorum piceum* Gyll. s. unter Moos im Spätherbste bei Heub. (Dommer); Dammhof, Juditten (Stnr.).  
*O. fuscum* Grav. s. besitzt aus Pr. Schffdr.  
*O. assimile* Payk. n. s. unter Laub, Rauschen (Ltz.), Ktzn. (Czw.).  
*O. consimile* Gyll. s. Ggbg. (Kr.), Heub. (Fritzen), Pregelufer (Czw.).

*Lothrimaeum melanocephalum* Illig. n. s. Osterode, an verwundeten Stellen der Eichen und Buchen, auch unter deren Rinde (Kugel.); Dz. unter feuchtem Laube, besonders in Gräben (Dommer).

*L. atrocephalum* Gyll. s. Dz. unter Schilf (Dommer), Juditten (Stnr.).

*L. fuscum* Er. s. Dz. im Moose (Dommer).

*Deliphrum tectum* Payk. n. h. Osterode am ausquellenden Saft von Buchen und Birken (Kugel.); Kbg. (Ltz.).

*Acidota crenata* Fabr. s. Osterode, im Herbste an Zäunen und Mauern (Kugel.); Kbg. bei Rosenau (Ltz.).

*A. eruentata* Mannh. s. s. Putzig (Stf.).

*Arpedium quadrum* Grav. s. Dz. unter Moos (Dommer), Ggbg. (Kr.).

*Homalium rivulare* Payk. n. s. Osterode an schattigen Stellen unter faulenden Gewächsen (Kugel.), Ggbg. (Kr.).

*H. fossulatum* Er. ebenso, Putzig (Stf.), Kbg. (Ltz.), F. F. (Stnr.).

*H. caesum* Grav. ebenso, Dz. (Dommer), Ggbg. (Kr.).

*H. oxyacanthae* Grav. s. besitzt aus Pr. Schffdr.

*H. exiguum* Gyll. s. Kbg. (Ltz.).

*H. minimum* Er. s. wie oxyac.

*H. pusillum* Grav. h. auf Ebereschblüthen bei Liep (Ltz.). Dz. (Dommer).

*H. monilicorne* Gyll. s. Kbg. (Ltz.).

*H. planum* Payk. h. wie pusillum.

*H. conforme* Kr. pineti Thoms. s. unter Carpinusrinde, F. F. (Czw., Sauter, Stnr.).

*H. concinnum* Marsh. s. wie pusillum.

*H. deplanatum* Gyll. s. Conitz (Sieb.), Dz. (Dommer).

*H. testaceum* Er. s. Kleinhaide (Stnr.).

*H. lucidum* Er. h. wie pusillum, auch unter Eichenrinde bei Ludwigsort (Ltz.).

*H. brunneum* Payk. n. h. Osterode (Kugel.), Dz. (Dommer), Kbg. (Ltz.).

*H. florale* Er. ruficorne Steph. h. an Gartenspiräen, Kbg. (Ltz.).

*H. salicis* Gyll. s. Kbg. Rosenau (Ltz.).

*H. pygmaeum* Payk. s. Neuhäuser (Ltz.).

*H. striatum* Grav. s. Dz. (Dommer), Kbg. (Stnr.).

*H. inflatum* Gyll. s. wie oxyacanthae.

*Pycnoglypta lurida* Gyll. einmal h. unter Röhricht am Pregeldamm (Pfeil, Ltz., Stnr.).

*Anthobium florale* Panz. s. besitzt aus Pr. Schffdr.

*A. primulae* Steph. triviale Er. h. in Pilzen (Dommer).

*A. ophthalmicum* Payk. im Radaunethal h. auf Spiraea ulmaria (Dommer).

*A. minutum* Fabr. g. auf Wiesen.

*A. luteipuum* Er. s. Blaustein (Ltz.).

*A. longipenne* Er. s. im Moose (Dommer).

*A. sorbi* Gyll. n. s. Putzig, Juni—Aug. (Stf.).

*Protinus brachypterus* Fabr. n. h. im Moose, Cranz (Ltz.).

*P. macropterus* Gyll. ebenso.

*P. atomarius* Er. s. in Blätterpilzen, Hirschau (Stnr.), Neuhäuser (Ltz.).

*Megarlarus depressus* Payk. n. h. aus Moos, Kbg. (Ltz.).

*M. nitidulus* Kr. s. Kbg. (Sauter), Poln. Kirchhof (Czw.).

*M. sinuatoecollis* Lac. n. s. an Abiesstubben, Blaustein (Ltz.).

*M. denticollis* Beck. marginicollis Er. s. Dz. in Pilzen (Dommer).

*M. hemipterus* Ill. s. Osterode unter Eichen- und Buchenrinde (Kugel.), Dz. in Pilzen (Dommer), im Walde von Kleinhaide (Eld.).

*Phloeocharis subtilissima* Mannh. n. s. im Moose und unter Rinde, Kbg. (Eld., Ltz.), F. F. (Stnr.).

*Prognatha quadricornis* Krb. Osterode, in Schwämmen (Kugel.), aber bisher nicht wieder gefunden.

*Micropeplus porcatus* Fabr. n. h. Rausehen (Ltz.), Dz. Ktn. (Czw.).

*M. caelatus* Er. n. h. auf Pregelwiesen (Pfeil, Czw., Stnr.).

*M. fulvus* Er. s. in verrottendem Stroh (Czw.).

### Pselaphidae.

*Batrissus Delaportei* Aub. s. in Masuren unter morscher Baumrinde, Eichen, Kiefern, Birken (Mühl.).

*B. venustus* Rehb. s. aus Moos von Karschau (Eld.), Masuren (Mühl.).

*Trichonyx sulcicollis* Rehb. s. unter Kiefernrinde, Osterode (Kugel.), Kbg. unter Mistbrettern (Ltz.).

*Tyrus mueronatus* Panz. s. Putzig, aus Moos (Stf.), Wehlau (Ltz.).

*Pselaphus Heisei* Hbst. n. s. aus Moos (Ltz., Czww.).

*P. dresdensis* Hbst. s. aus Moos von Gr. Karschau (Eld.), Masuren, Juni (Mühl.).

*Tyclus niger* Payk. h. Kbg. (Ltz.).

*Bryaxis fossulata* Rehb. h. Blaustein (Ltz.).

*B. haematicea* Rehb. n. h. ebenso

*B. juncorum* Leach. n. h. Zoppot (Czww.), Ggbg. (Kr.), Kbg. Holzwassen (Str.).

*B. impressa* Panz. s. Kbg. (Sauter).

*B. sanguinea* L. h. im Waldmoose (Ltz.).

*Bythinus puncticollis* Denny. n. s. aus Moos von Wundlack (Eld.).

*B. validus* Aub. s. ebenso (Sauter).

*B. bulbifer* Rehb. ♀ *glabrieollis* Aub. n. s. Kbg. (Ltz.).

*B. glabrieollis* Rehb. s. Kbg. in Erde (Eld.) Seidl. Fn. Balt. p. 229; fehlt im Catalog. von St. u. W.

*B. Curtisii* Denny. s. Kbg. in Gartenerde (Eld.).

*B. Burellii* Denny s. Kapkeim (Ltz.), Karschau (Eld.).

*Euplectus Eriehsonii* Aub. s. s. einmal unter einem Steine, Kbg. (Ltz.).

*E. signatus* Rehb. s. unter Ameisen, Kbg. (Eld.), Putzig (Stf.).

*E. sanguineus* Denny s. im Moose, Dz. (Dommer), Kbg. Holzwassen (Str.).

*E. Karstenii* Rehb. *graeilis* Chaud. n. s. Kbg. (Eld.), Dz. (Dommer, Frantz.).

*E. nanus* Rehb. s. unter Ameisen u. Baumrinde (Stf., Eld.), Ggbg. (Kr.), F. F. (Str.).

*E. ambiguus* Rehb. s. n. im Moose.

*Trinimum brevicorne* Rehb. n. s. im Moose (Dommer), Kbg. (Ltz.).

*T. brevipenne* Chaud. n. s. aus Moos von Zimmerbude (Eld.), F. F. (Czww.).

### Clavigeridae.

*Claviger testaceus* Preyßler. *foveolatus* Müll. n. s. unter Ameisen, Kbg. (Sauter).

*C. longicornis* Müll. s. s. Lyek, auf den Schedlisker Bergen unter einem Steine (Sanio).

### Scydmaenidae.

*Cephenium thoracicum* Müll. n. s. Zimmerbude (Eld.), Margen (Ltz.), Dammhof, F. F. (Str.).

*Euthia plieata* Gyll. s. in einem Stalle in Wernsdorf, Neuhausen (Str.).

*E. abbreviatella* Er. n. h. Kbg. unter Gartenbrettern (Ltz.), Holzwassen am Pregel, Juni (Czww.), im Moose von Karschau (Eld.).

*Scydmaenus Godarti* Latr. s. Kbg. (Eld.), Putzig, Mai (Stf.), Rastenburg (Czww.).

*S. seutellaris* Müll. h. unter Laub; Wundlack (Eld.).

*S. collaris* Müll. h. ebenso. Kbg. (Ltz.).

*S. pusillus* Müll. unter Kiefernrinde Osterode (Kugel.), aber bisher nicht wiedergefunden.

*S. exilis* Er. s. im Moose von Karschau (Eld.).

*S. angulatus* Müll. s. unter Ameisen, Kbg. (Eld.), Putzig (Stf.), Ktzn. (Czww.).

*S. elongatulus* Müll. s. Putzig (Bogeng). Schrb. (Czww.).

*S. pumilio* Schaum. s. Kbg. unter Ameisen (Dommer).

*S. Motschulskyi* St. s. 1 ♂ im Moose aus der F. F. (Str.), Jäschenthal bei Dz. (Czww.).

*S. denticornis* Müll. s. F. F. (Czww.).

*S. rutilipennis* Müll. s. Ggbg. (Kr.), am Damnteich (Str.).

*S. hirticollis* Illig. h. unter Mistbeetbrettern und leichtem Steingerölle (Ltz.).

*S. claviger* Müll. s. im Moose, Dz. (Dommer), F. F. (Str.).

*S. Mäklini* Mannh. s. Kbg. (Eld.), Putzig (Stf.).

*S. Wetterhalli* Gyll. s. Putzig, Mai, aus Moos (Stf.).

*S. nanus* Schaum. s. Kbg. (Eld.).

*S. tarsatus* Müll. n. s. Kbg. (Ltz.), Dz. (Frantz.).

*S. Hellwigii* Fabr. s. unter Kiefernrinde und Ameisen, Kbg. (Eld.).

*S. rufus* Müll. n. s. im Moose, Dz. (Dommer), unter Mistbeetbrettern Liep (Str., Ltz.).

### Silphidae.

*Leptinus testaceus* Müll. s. s. aus Laub, Putzig (Stf. Bogeng).

*Choleva intermedia* Kr. s. unter trockenem Laube, im Samlande (Hagen, Ltz.), Putzig (Stf.).

*C. angustata* Fabr. s. ebenso (Ltz.).

*C. cisteloides* Fröl. *castanea* St. s. s. unter Pilzen im Grebbiner Walde (Dommer), Kbg. Kleinhaide (Eld.).

*C. agilis* Illig. s. Osterode, Kbg. unter Eichen- und Buchenrinde (Kugel.), Samland (Ltz.).

*C. velox* Spence. wird von Zehe als preussisch angeführt ist jedoch zweifelhaft.

*C. praecox* Er. s. Loppelnen unter trocknem Laube (Eld.).

*Catops picipes* Fabr. s. im Grebbiner Walde in einem faulen Eichenstubben (Dommer), Fuchshöfen (Stnr.).

*C. fuscus* Panz. h. Ggbg. (Kr.), Loppelnen (Eld.), Ktzn. (Czw.).

*C. nigricans* Spence. s. Dz. unter verwehenden Pflanzenstoffen (Dommer), die var. fuliginosus Er. daselbst (Kumm).

*C. morio* Fabr. n. h. Blaustein (Ltz.).

*C. nigrita* Er. h. unter Pilzen (Dommer, Frantz.).

*C. tristis* Pz. s. in Pilzen einer Kieferwaldung, Pr. Stargard (Schmidt).

*C. Watsoni* Spence. fumatus Er. g. am Aase.

*C. fumatus* Spence. scitulus Er. s. unter faulem Holze (Dommer, Czw.).

*C. sericeus* F. n. s. wie Watsoni.

*Colon viennense* Hbst. s. s. Masuren (Mühl.), F. F. (Czw., Stnr.).

*C. bidentatum* Sahlb. s. Loppelnen in trockenem Laube (Eld.).

*C. serripes* Sahlb. n. h. wie viennense.

*C. clavigerum* Hbst. s. s. Glettkau (Czw.), Neustadt (Fritzen).

*C. fuscicornis* Kraatz. s. s. Neustadt (Fritzen).

*C. dentipes* Sahlb. s. Ggbg. (Kr.).

*C. appendiculatum* Sahlb. s. Masuren (Mühl.); Rastenbg., Glettkau, Oliva (Czw.).

*C. armipes* Kraatz. s. s. Glettkau (Czw.).

*C. denticulatum* Kraatz. s. s. ebenso.

*C. affine* St. s. Neustadt (Fritzen).

*C. brunneum* Latr. n. s. Neuhausen, Hlgbl. (Stnr.), F. F. Oliva (Czw.).

*C. latum* Kraatz. s. Ggbg. (Kr.), Kbg. (Ltz., Stnr.).

*Thosphuga laevigata* Fabr. s. Kug. Sieb.

*P. atrata* L. mit var. brunnea Hbst. h. Kbg. (Ltz.).

*P. opaea* L. n. s. am Aase, Loppelnen (Eld.).

*P. reticulata* Fabr. n. s. Rauschen (Ltz.), Glettkau (Czw.).

*Thanaophilus thoracicus* L. h. in Wäldern am Aase.

*T. rugosus* L. h. ebenso.

*T. sinuatus* Fabr. n. h. ebenso

*T. dispar* Hbst. s. Pregelwiesen (Czw.).

*Xylodrepa quadripunctata* L. n. s. sucht auf Bäumen (Eichen) nach Insecten, Osterode (Kugel.), Galtgarben (Ltz.), F. F. (Czw.), Hlgbl. (Stnr.).

*Silypha tristis* Illig. n. h. Leesen und Gr. Zünder (Dommer), Tilsit, Pillau (Eld.), Schwarzort (Ltz.).

*S. obscura* L. h. Kbg. (Ltz.).

*S. carinata* Illig. n. s. Schwarzort (Ltz.).

*S. littoralis* L. ebenso, an todtlen grösseren Säugethieren.

*Necrophorus Germanicus* L. n. h. am Aase, Rauschen (Ltz.).

*N. humator* Goeze. n. s. ebenso.

*N. vespillo* h. ebenso.

*N. vestigator* n. h. ebenso

*N. ruspator* Er. microcephalus Thoms h. Fischhausen (Ltz.), Dz. (Czw.).

*N. interruptus* Steph. fossor Er. n. h. Loppelnen (Eld.).

*N. sepultor* Charp. s. Dz. (Dommer), Kalkstein bei Fischhausen (Ltz.), Hlgbl. (Stnr.).

*N. mortuorum* Fabr. n. h. in Pilzen, Neuhausen (Ltz.), Dz. Kbg. (Czw.).

*Aggytes castaneus* Pk. s. s. Dz. Kleinhaide (Stf.).

*Sphaerites glabratus* Fabr. s. Fehst. am Birken-saite (Sauter), Schrb. Oliva (Czw.), Vierbrüderkrug (Stnr.).

*Triarthron Märkelii* Schm. s. s. Putzig im Stadtwalde (Stf.), Hochwasser bei Oliva Jul 78 I Ex. (Czw.).

*Anisotoma cinnamomea* Pz. s. Sieb. Die Arten an unterirdischen Pilzen (Tuber), Neustadt (Fritzen).

*A. oblonga* Er. s. s. Osterode (Kugel.), Er. K. D. III p. 53 Anm.

*A. Triepkii* Schm. s. Lyek (Sanio), Dz. (Czw., Helm).

*A. picea* Illig. s. Rauschen (Ltz.).

*A. obesa* Schm. s. Dz. (Kumm).

*A. brunnea* St. s. Dz. (Helm), Neustadt (Fritzen).

*A. dubia* Kugel. n. s. Osterode, an trockenem Weidenschwämmen, Ggbg. (Kr.).

*A. silesiaca* Kr. s. s. ein St. in der Sammlung der pr. Käfer des Museums. Dz.

*A. ciliaris* Schm. s. s. Kbg. (Ltz.), Hlglb. (Stnr.).

*A. ovalis* Schm. s. Dz. (Frantz.).

*A. rubiginosa* Schm. s. s. Dz. Sieb.

*A. calcarata* Er. n. s. bei Fuchshöfen von Gräsern geschöpft, Juni 69 (Ltz.), Danziger Glacis, Oliva (Czw.).

*A. badia* St. s. Schwarzort (Ltz.), Dammhof (Stnr.).

*A. parvula* Sahlb. n. s. in Laubwäldern des Abends von Gräsern geschöpft, Kadienen (Stf.), Masuren (Mühl), F. F., Fuchshöfen (Sauter, Ltz., Czw.).

*Cyrtusa subtestacea* Gyll. s. an Baumschwämmen, Putzig (Stf.), Loppennen (Eld.), Dammkrug (Stnr.).

*C. minuta* Ahr. s. Dz. (Kumm).

*C. pauxilla* Schm. s. s. F. F. Juni 67 (Czw.).

*Colenis dentipes* Gyll. n. s. im Moose, Creuzburg (Eld.), Kadienen (Stf.), F. F., Oliva (Czw.).

*Liodes humeralis* Kug. n. h. in Schwämmen an alten Eichenstubben, zuweilen unter Kiefernrinde, Osterode, Warnicken (Ltz.).

*L. glaber* Kug. n. h. ebenso.

*L. axillaris* Gyll. s. ebenso.

*L. serricornis* Gyll. s. s. in rothfaulen Eichenstubben, Föddersdorf Mai 68 (Mühl).

*L. castaneus* Hbst. s. Masuren (Mühl).

*L. orbicularis* Hbst. s. aus Moos von Wundlack (Eld.), Putzig, Dz. (Stf.), Kbg. (Czw.), Hirschau (Stnr.).

*Amphicyllis globus* Fabr. s. unter Kiefernrinde, Putzig Mai — Juni (Stf.), Vierbrüderkrug (Sauter, Stnr.).

*A. globiformis* Sahlb. bei Ggbg. n. s. (Kr.), F. F. (Czw.).

*Agathidium nigripenne* Kug. s. Osterode, in Eichenschwämmen; Memel (Nanke), Dz. (Dommer), Wehlau (Sauter), F. F. (Stnr.).

*A. atrum* Pk. s. Ggbg. (Kr.), F. F. Vierbrüderkr. (Stnr.).

*A. seminulum* L. h. unter Eichen- und Kiefernrinde, Kbg. (Ltz.).

*A. laevigatum* Er. s. Wilkie (Eld.); Putzig, im Frühjahr an Schwämmen (Stf.).

*A. badium* Er. s. F. F., Vierbrkr. (Stnr.).

*A. mandibulare* St. s. Kbg. (Ltz.).

*A. rotundatum* Gyll. s. Ggbg. (Kr.), Vierbrüderkrug (Stnr.).

*A. nigrinum* St. s. F. F. (Stnr.).

*A. piceum* Er. s. I St. in der Sammlung von Eld.

*A. marginatum* St., wie *laevigatum*.

*A. haemorrhoum* Er. s. Kbg. aus Moos (Eld.).

### Clambidae.

*Cybocephalus exiguus* Sahlb. s. an Pappelstämmen, Ggbg. (Kr.), Wernsdorf (Kuwert).

*Clambus minutus* St. s. an faulenden Vegetabilien, Kbg. Aweiden (Stnr.).

*C. Armadillo* Deg. punctulum Beck. n. s. in Schwämmen, Putzig (Stf.), Dz. (Dommer).

*C. pubescens* Redt. n. h. Kbg. (Sauter, Ltz., Stnr.).

*C. punctulum* Gyll. s. Rastenburg (Czw.), Schromb. (Stnr.).

### Sphaeriidae.

*Sphaerius acaroides* Wallt. s. Dz. (Kumm), Ktzn., Rastenburg am Ufer der Guber unter Kies (Czw.).

### Trichopterygidae.

*Ptenidium formicetorum* Kr. apicale Er. h. unter Ameisen und im Moose, Loppennen (Eld.), Putzig (Stf.).

*P. laevigatum* Gillm. n. s. Kbg. (Ltz.).

*P. pusillum* Gyll. ebenso.

*Ptilium elongatum* Thoms. n. s. Kbg. Liep (Czw.), Plantage unter Mistbeetbrettern (Stnr.).

*P. transversale* Er. s. s. Heub. (Czw.).

*P. minutissimum* Ljung. n. s. unter Spreu, Ktzn. (Czw.).

*P. inquilinum* Gillm. s. h. unter Ameisen, Kbg. (Sauter, Eld.).

*P. canaliculatum* Gillm. n. s. ebenso.

*P. angustatum* Er. s. Dz. (Zebe), Kbg. Aweiden (Stnr.).

*P. fuscum* Gillm. s. Loppennen (Eld.).

*P. Kunzei* Heer. n. s. Kbg. (Sauter, Czw., Stnr.).

*Trichopteryx pumila* Er. s. Kbg. aus Gerülle vom ehemaligen Philosophendamm (Sauter).

*T. brevipennis* Er. s. ebenso (Stnr.).

*T. sericans* Heer. h. Kbg. (Ltz.), Putzig (Bogeng).

*T. fascicularis* Hbst. h. unter feuchtem Laube (Dommer).

*T. grandicollis* Mannh. h. Kbg. (Czw.), F. F. (Stnr.).

*T. atomaria* Dej. s. h. überall.

*T. thoracica* Waltl. n. s. Putzig, Mai — Juli (Stf.), Dammhof (Stnr.).

*Picrox suturalis* Heer. s. unter Ameisen, Kbg. (Eld.).

### Scaphidiidae.

*Scaphidium* 4-maculatum Ol. n. h. an Baumschwämmen, Zinten (Ltz.).

*Scaphisoma agaricinum* L. s. h. unter Rinde an Pilzen, überall.

*S. boleti* Pz. s. Kbg. aus Gerülle (Sauter).

*S. assimile* Er. s. Kbg. Holzweiden, Neuhäuser (Stnr.).

### Histeridae.

*Hololepta plana* Füssly. s. s. bei der Allensteinischen Glashütte in dem vermoderten Baste alter gefällter Pappeln und Birken, einige St. Mai 1793 (Kugel.); Dammhof (Dossow).

*Platysoma frontale* Pk. s. unter Buchenrinde (Kugel.), Zinten (Ltz.), Pr. Stargardt (Schmidt).

*P. depressum* Fabr. n. s. unter Abiesrinde, Zinten (Ltz.).

*P. oblongum* Fabr. s. Grebbiner Wald, in Eichenstubben (Dommer), Masuren (Mühl), Schromb. (Stnr.).

*P. lineare* Er. s. Osterode (Kugel.), Zinten (Ltz.), Frauenburg (Czw.), Metgethen (Stnr.), an Pinusstubben Neustadt (Fritzen).

*P. angustatum* Hoffm. s. (Sieb.)

*P. filiforme* Er. s. s. Kbg., unter Abiesrinde (Pfeil).

*Hister* 4-maculatus L. n. h. Putzig (Stf.)

*H. unicolor* L. h. Kbg. (Ltz.).

*H. cadaverinus* Hoffm., *striola* Sahlb. ebenso, Schromb. (Stnr.).

*H. succicola* Thoms. n. h. am ausfließenden Eichensaft. Schrb. (Czw.).

*H. terricola* Germ. s. Kbg. (Ltz.).

*H. merdarius* Hoffm. n. s. ebenso.

*H. fimetarius* Hbst. *sinuatus* Fabr. n. s. Loppehnen (Eld.).

*H. neglectus* Germ. n. h. Kbg. (Ltz.).

*H. carbonarius* Illig. h. ebenso.

*H. ventralis* Marsh. n. s. Lyck (Sanio), Dz. (Helm).

*H. purpuraseens* Hbst. n. s. auf sandigen Wegen im Mist, Kbg. (Ltz.).

*H. marginatus* Er. s. in Wäldern unter faulenden Vegetabilien, unter Rinde von Baumstubben, Dz., Putzig (Stf.), Pillau, Loppehnen (Eld.).

*H. stercorarius* Hoffm. h. Kbg. (Ltz.).

*H. sinuatus* Illig. *uncinatus* Illig. s. Dz. (Dommer), Cranz (Eld.).

*H. 4-notatus* Scrib. bei Lyck h. (Sanio).

*H. bissexstriatus* Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.).

*H. arenicola* Thoms. s. Kbg. 2. St. (Stnr.).

*H. bimaculatus* L. s. Kapkeim (Ltz.), Glettkau (Czw.).

*H. 12-striatus* Schrk. n. s. Tilsit, Kbg., Elbing, Putzig (Stf.), die var. *14-striatus* Gyll. seltener, Loppehnen (Eld.), Tilsit (Stf.).

*H. eorvinus* Germ. n. h. Loppehnen (Eld.), Putzig, Mai (Stf.), Neuhäuser (Stnr.).

*Carcinops pumilio* Er. n. s. Seestrand, in Sandgruben (Eld., Ltz.); Putzig (Stf.), Ktn. (Czw.).

*Paromalus complanatus* Pz. s. unter Eichen- und Buchenrinde, Osterode (Kugel.), Ortelsburg unter Espenrinde (Mühl).

*P. parallelepipedus* Hbst. unter Kiefernrinde (Eld., Ltz.).

*P. flavicornis* Hbst. n. h. ebenso.

*Heteracrius sesquicornis* Preysl. n. h. unter Ameisen, Kbg. (Eld.), unter Birkenrinde (Kugel.), Pilzenkrug (Stnr.).

*H. Sartorii* Redt. s. s. Ggbg. (Kr.). Berl. E. Z. VII. 233.

*Dendrophilus punctatus* Hbst. n. h. im Kainchendünger, Dz. (Dommer), Kbg., Pillau (Eld.); bei Ameisen, Putzig (Stf.), Ktn. (Czw.).

*D. pygmaeus* L. s. Dz. (Dommer), F. F. bei Ameisen (Stnr.).

*Saprinus nitidulus* Pk. s. h. an sandigen Ufern im Miste (Kugel.), Kbg. (Ltz.).

*S. immundus* Gyll. s. Conitz (Sieb.), Rauschen (Ltz.).

*S. rugifer* Pk. s. am Seestrande, Putzig (Stf.).

*S. speculifer* Latr. s. Loppehnen, Pillau (Eld.).

*S. aeneus* Fabr. h. an Excrementen am See-  
strande (Ltz.).

*S. virescens* Pk. s. Ggbg. (Kr.), Westpr.  
(Strübing B. E. Z. IV. 322), Neubäuser (Stnr.),  
Dz. (Helm).

*S. conjungens* Pk. s. ebenso

*S. rufipes* Pk. s. Schwarzort (Ltz.), Lop-  
pehnen (Eld.), Insterburg (Bachmann), Dz. (Helm).

*S. antiquulus* Illig. wird zwar von Sieb.  
angegeben, doch ist die Bestimmung wahrsch.  
unrichtig gewesen. Kraatz B. E. Z. XII. 336.

*S. 4-striatus* Hoffm. n. s. auf der kurischen  
Nehrung. Rossitten (Nanke), Schwarzort (Ltz.),  
Glettkau (Czw.).

*S. rugifrons* Pk. g. wie *aeneus*.

*S. metallicus* Hbst. h. in sandigen Gegen-  
den beim Aase u. im Miste (Kugel.), Schwarz-  
ort (Ltz.), Dz. (Helm).

*Gnathoneus rotundatus* Kugel. n. s. Nord-  
strand (Eld., Ltz., Stnr.).

*G. punctulatus* Thoms. n. h. Dz. (Czw.,  
Helm); aus Reihernestern bei Schwarzort, Pfing-  
sten 78 (Czw.).

*Myrmetes piceus* Pk. s. im faulenden Holze  
(Dommer), Putzig (Stf.), Kbg. (Stnr.).

*Teretrius picipes* Fabr. s. unter Buchen- u.  
Eichenrinde (Kugel.), Cadienen (Stf.), in Bohr-  
löchern alter Weiden auf der Pregeltrift bei  
Fehstein, Juni (Pfeil, Ltz.), Kbg. neue Reiferbahn  
(Czw.).

*Plegaderus saucius* Er. s. s. unter Baumrinde,  
Dammhof (Ltz.).

*P. vulneratus* Pz. n. s. unter Eichen- und  
Pappelrinde (Kug.), Juditten (Eld.), Dammhof  
(Ltz.).

*P. caesus* Illig. s. unter Pappelrinde (Kug.),  
Kbg. (Ltz.).

*P. dissectus* Er. s. s. einmal an der Wurzel  
einer alten Eiche bei Schwarzort, Juli (Ltz.).

*P. discisus* Er. s. s. in faulendem Kasta-  
nienholze (Dommer).

*Onthophilus sulcatus* Fabr. s. Osterode (Kug.),  
Putzig (Stf.).

*O. striatus* Forst. s. ebenso.

*Abraeus globulus* Creutz. n. s. unter Mist-  
beetbrettern, Kbg. (Ltz.).

*A. globosus* Hoffm. s. Kbg. im botan.  
Garten unter Blumentöpfen (Eld.), Putzig unter  
Ameisen (Stf.).

*Acritus sulcipennis* Fuss. s. s. einmal zwei  
Stück unter einem Mistbeetbrette, Liep bei  
Kbg. (Ltz.), ist nicht = *punctum* Aub. Reitt.  
Dt. Ent. Zt. XXII. p. 50.

*A. minutus* Hbst. g. unter faulenden Vege-  
tabilien.

## Phalacridae.

*Phalacrus corruscus* Pk. h. auf Blumen u.  
Sträuchern, Kbg. (Ltz.).

*P. grossus* Er. s. Kbg. aus Moos (Eld.).

*P. substriatus* Gyll. s. Loppehnen (Eld.).

*P. cariceis* St. s. Neubäuser (Stnr.), Putzig  
(Stf.).

*Olibrus corticalis* Pz. n. s. Kbg. (Ltz.), Dz.  
(Fritzen, Czw.).

*O. aeneus* Fabr. h. überall.

*O. bicolor* Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.).

*O. liquidus* Er. s. Neustadt (Fritzen).

*O. affinis* St. s. Dammhof (Stnr.).

*O. millefolii* Pk. h. auf Syngenesisten,  
überall.

*O. pygmaeus* St. s. Neubäuser (Ltz.), auf  
Epilob. angustif. Neustadt (Fritzen).

*O. testaceus* Pz. *geminus* Illig. h. Kbg.  
(Ltz.).

*O. atomarius* L. *piceus* Steph. n. h.  
ebenso, F. F. (Czw.), Neustadt (Fritzen).

## Nitidulariae.

*Cercus pedicularius* L. g. auf Thymus,  
Rauschen (Ltz.).

*Brachypterus pubescens* Er. n. h. Kbg. (Ltz.).

*B. urticae* Fabr. g. auf blühender *Urtica*  
*dioica*.

*B. gravidus* Illig. n. h. wie *pubescens*.

*B. cinereus* Heer. Schwarzort, ausschliess-  
lich in den Blüten der *Linaria Loeselii* zahlreich  
(Czw.).

*Carpophilus hemipterus* L. s. s. Putzig (Stf.)

*Epuraca limbata* Fabr. n. s. unter Rinde  
von Apfel- und Birnbäumen (Kugel.), Putzig, in  
Löcherpilzen (Stf.).

*E. 10-guttata* Fabr. s. am Safte v. Eichen  
und Buchen (Kugel), Blaustein (Ltz.), Neuhausen  
(Stnr.).

- E. silacea* Hbst. s. (Sieb.).  
*E. aestiva* L. mit var. *bisignata* St. s. h. auf Blüten.  
*E. melina* Er. ebenso.  
*E. deleta* Er. s. am Seestrände (Eld.).  
*E. immunda* Er. s. ebenso (Eld., Ltz.).  
*E. neglecta* Heer. n. s. am Birkensaft, Apr. Mai (Dommer, Ltz.).  
*E. variegata* Hbst. h. Kbg. (Ltz.).  
*E. obsoleta* Fabr. h. ebenso.  
*E. boreella* Zett. s. s. aus einer Ostpr. Forst (Dossow).  
*E. pygmaea* Gyll. h. Zinten (Ltz.).  
*E. pusilla* Illig. s. Osterode, unter Weidenrinde (Kugel.), Ludwigsort (Ltz.), Dz. (Helm).  
*E. florea* Er. h. Osterode an Birnbäumen (Kugel.), Kbg. (Ltz.).  
*Nitidula bipustulata* L. s. an thierischen Stoffen, Kbg. (Ltz., Stnr.).  
*N. obscura* Fabr. n. h. im Grebbiner Walde, einmal an einem todten Igel zahlreich (Dommer), Kbg. aus Moos (Eld.).  
*N. 4-pustulata* Fabr. s. Gr. Zünder, in todten Maulwürfen (Dommer), Rauschen (Ltz.).  
*Omosita depressa* L. s. am Eichensaft (Dommer), aus Moos von Rosenberg (Eld.), an einem todten Reiher in Schwarzort (Czw.).  
*O. colon* L. g. überall.  
*O. discoidea* Fabr. s. Osterode unter Eichenrinde (Kugel.), Elbing (Ltz.).  
*Soronia punctatissima* Illig. n. s. am Saft von Eichen, Birken, Espen (Kugel., Dommer); Liep, Georgenswalde (Ltz.), Dz. (Helm), Fehst. (Stnr.).  
*S. grisea* L. g. an Weiden u. am Eichensaft.  
*Amphotis marginata* Fabr. s. Masuren (Mühl), Oliva (Czw.).  
*Ipidia 4-notata* Fabr. s. Masuren, unter morscher Birkenrinde, Septbr. (Mühl)  
*Pria dulcamarae* Scop. s. Dz., im Frühjahr am Seestrände (Dommer), Rosenberg (Eld.), Rauschen (Ltz.), Osterode s. h. auf *Lycium europ.* (Kugel.).  
*Meligethes rufipes* Gyll. s. Sieb.  
*M. hebes* Er. s. Dz. (Frantz.).  
*M. pumilus* Er. s. Kbg. (Czw.).  
*M. coracinus* St. n. s. ebenso, Dz. (Dommer).  
*M. coeruleovirens* Forst. n. s. Kbg. auf Weiden (Czw.).  
*M. aeneus* Fabr. g. überall.  
*M. viridescens* Fabr. h. Kbg. (Ltz.), var. *azureus* s. Kbg. (Czw.).  
*M. symphyti* Heer. h. ebenso.  
*M. subrugosus* Gyll. s. Dz. Aug. (Czw.).  
*M. serripes* Gyll. s. ebenso.  
*M. umbrosus* St. s. Georgenswalde (Czw.).  
*M. maurus* St. s. Dz., Hlgbl. (Czw.).  
*M. incanus* St. s. Kbg. (Czw.).  
*M. picipes* St. h. ebenso.  
*M. memnonius* Er. n. s. ebenso.  
*M. ochropus* St. n. s. auf *Lamium album*, Dz. (Czw.).  
*M. difficilis* Heer. mit var. *Kunzei* Er. n. s. ebenso.  
*M. morosus* Er. h. wie *ochropus*, Dirschau (Czw.).  
*M. viduatus* St. h. Dz. (Czw.).  
*M. pedicularius* Gyll. n. s. ebenso.  
*M. assimilis* St. s. ebenso.  
*M. aestimabilis* Reitt. s. Ggbg. (Kr.) B. E. Z. XVI. 133. 11.  
*M. tristis* St. h. auf *Echium vulgare*, Lyck (Sanio), Kbg. (Czw.).  
*M. gagatinus* Er. h. Kbg. (Ltz.).  
*M. exilis* St. s. Dz. (Czw.).  
*M. erythropus* Gyll. s. Ggbg. (Kr.).  
*M. solidus* St. Osterode (Kug.), aber nicht wieder gefunden.  
*Thalycra sericea* St. n. h. auf *Spiraea ulm.* Craam (Ltz.), Oliva (Czw.).  
*Pocadius ferrugineus* Fabr. n. s. in Staupilzen, Rauschen (Ltz.), Dz. (Czw.), Hlgbl. (Stnr.).  
*Cyphramus 4-punctatus* Hbst. n. h. von *Abies* geklopft, Löwenhagen (Ltz.).  
*C. fungicola* Heer. h. in Pilzen, Dz., Putzig (Stf.), Kleinhaide (Eld.).  
*C. luteus* Fabr. s. h. auf *Spiraea ulm.*  
*Strongylus (Cyllodes) ater* s. s. in morschem Kieferholz, Masuren (Mühl), Wilkie an einem Birkenstubben (Pfeil).  
*Cryptarcha strigata* Fabr. n. s. am Eichensaft, Dz. (Dommer, Helm), Georgenswalde (Ltz.). Mehlsack (Eld.).  
*C. imperialis* Fabr. n. s. ebenso, Neuhausen (Stnr.).  
*Ips 4-guttatus* Fabr. s. unter Eichenrinde (Kugel.), Kbg. Holzstellen (Stnr.), Dammhof (Kuwert).



*I. 4-punctatus* Oliv. n. s. im Frühjahr auf Stubben, Kbg. (Ltz.).

*I. 4-pustulatus* L. n. s. ebenso.

*I. ferrugineus* Fabr. n. s. an Eichen, Kbg. (Ltz.), Vierbrüderkr. (Strn.).

*Rhizophagus grandis* Gyll. s. s. Putzig (Stf.).

*R. depressus* Fabr. s. h. unter Rinde von Abiesstubben.

*R. cribratus* Gyll. s. Dammbhof unter Abiesrinde 2 St. (Ltz.).

*R. ferrugineus* Pk. n. s. Wilkie (Eld.), Vierbrüderkr. (Strn.).

*R. parallelocollis* Gyll. einmal h. an einem schönen Sommerabend auf dem Altrossg. Kirchhof umherfliegend, Kbg. (Ltz.).

*R. nitidulus* Fabr. n. s. Margen an Birkenstubben (Ltz.).

*R. dispar* Pk. n. s. Loppennen (Eld.), Putzig (Stf.).

*R. bipustulatus* Fabr. s. h. unter Eichen-, Abiesrinde, Kbg. (Ltz.).

*R. politus* Hellw. s. unter Abiesrinde, Osterode (Kugel.), Mehlsack (Eld.).

*R. coeruleipennis* Sahlb. s. Kbg. bei Moosbude 2 St. (Ltz.), Pregelwiesen (Czw., Strn.).

*R. parvulus* Pk. s. unter Pappelrinde Kbg. (Ltz.), Albrechtsthal bei Wehlau (Sauter).

### Trogositidae.

*Nemosoma elongatum* L. n. h. unter Kiefern-, Buchen-, Weidenrinde, Dahlheim (Wohlfromm), Perkappen (Ltz.), Putzig (Stf.), Kbg. (Eld.).

*Tennochila coerulea* Oliv. von 3 pr. St. berichtet Kugel., wovon 1 bei Kbg., aber nicht wieder gefunden.

*Trogosita mauritanica* L. caraboides Fabr. s. s. durch den Handel eingeführt bei Apothekern (Naumann), aber auch unter Weidenrinde (Sieb.).

*Peltis dentata* Fabr. s. s. unter Rinde von Kiefernstubben, Cadienen (Stf.).

*P. grossa* L. s. unter Eichenrinde, Elbing (Sieb.), Zinten (Ltz.).

*P. ferruginea* L. s. in Falten der Baumschwämme, in altem Holze (Kugel.), Dz. (Czw.).

*P. oblonga* L. n. s. an Weidenschwämmen, Kbg. (Ltz.).

*Thymalus limbatus* Fabr. s. s. Osterode unter Kiefernrinde (Kug.), Masuren unter Eichenrinde 3 St. (Mühl.).

### Colydiidae.

*Sarrotrium clavicornis* L. h. bei Loppennen in Sandgruben (Eld.), Rauschen, Neuhäuser (Strn.).

*Ditoma crenata* Hbst. h. unter Birkenrinde, Löwenhagen (Ltz.).

*Synchlita juglandis* Fabr. obscura Redt. s. unter Rinde von Birnbäumen (Kug.), Birken, Erlen und Linden (Ltz., Czw., Fritzen).

*Cicones variegatus* Hellw. s. s. Stadtwald zu Neustadt, aus einer abgestorbenen Buche (Fritzen).

*Colydium elongatum* Fabr. Osterode, in altem Eichenholz (Kug.), aber seitdem nicht wieder gefunden.

*C. filiforme* Fabr. s. Putzig, unter Eichenrinde (Stf.); einige alte Eichen bei Liep und Moosbude haben mir zahlreiche Stücke geliefert, wo sie in Bohrlöchern wohnen, Juni (Ltz.).

*Aglenus brunneus* Gyll. s. an Mistbeeten bei Dz. und Putzig (Stf.), Kbg., Liep (Czw.).

*Bothrioderes contractus* Fabr. s. Kug., Sieb.

*Cerylon histeroides* Fabr. h. unter Buchen-, Kiefern- und Eichenrinde, Kbg. (Ltz.).

*C. angustatum* Er. s. Blaustein aus Buchenstubben (Ltz.), Neustadt (Fritzen).

*C. impressum* Er. s. Hgbl., unter Rinde von Kiefern (Czw.), von Buchen, Neustadt (Fritzen).

*C. deplanatum* Gyll. s. unter Pappelrinde, Kbg. (Sauter), unter Carpinusrinde, Fehst. (Ltz.).

### Cucujidae.

*Prostomis mandibularis* Fabr. von Senator Schneider als preussischen Käfer erhalten unter dem Namen *Cucujus maxillosus* (Kug.), später nicht wieder gefunden.

*Cucujus haematodes* Er. s. s. unter Kiefern- und Eichenrinde (Kug.), Putzig (Stf.).

*Dendrophagus erenatus* Pk. s. unter Eichenrinde in Masuren (Mühl.), unter Birkenrinde in einem Holzgarten in Kbg. (Ltz.), Domszin bei Labiau (Wahnschaffe).

*Brontes planatus* L. *flavipes* Fabr. unter versch. Rinden (Kug.), Memel (Nanke), Kbg. auf den Holzwiesen (Ltz., Stnr.).

*Laemphloeus denticulatus* Preysl. *monilis* Fabr. s. unter Lindenrinde, Putzig (Stf.), Domnau (Sauter), Liep (Ltz.), Fehstein. (Stnr.).

*L. muticus* Fabr. unter Birnbaumrinde (Kug.), nachher nicht wieder gefunden.

*L. himaculatus* Pk. s. unter Birkenrinde, Putzig (Stf.).

*L. testaceus* Fabr. s. unter Baumrinde, Kadienen (Stf.).

*L. duplicatus* Waltl. s. unter Abiesrinde, Loppennen (Eld), Dz. (Kumm.).

*L. ferrugineus* Steph. s. s. Kbg. an Birkenholz auf der Altstädtischen Holzweise, 1 Stück (Ltz.).

*L. ater* Oliv. s. s. am Harzausfluss einer Abies in Masuren, Juli 63 (Mühl), und zwar die rothe Var., Dz. in Speichern an altem Brode (Fritzen), Ggbg. (Kr.).

*L. corticinus* Er. s. s. unter Baumrinde Putzig (Stf.).

*Pediacus dermestoides* Fabr. s. s. nur einmal bei Osterode unter Eichenrinde (Kugel.), ein preuss. St. besitzt Schiefferdecker.

*Psammoechus bipunctatus* Fabr. bei Osterode s. h. in einer feuchten Gegend unter abgemähem Schilf (Kugel.), Ktzn. (Czw.), Neuhäusen (Stnr.).

*Nausibius dentatus* Marsh. s. s. einmal unter Buchenrinde bei Putzig (Stf.), einmal Dz. (Helm).

*Silvanus frumentarius* Fabr. *sex dentatus* Fabr. s. Kbg. in einem Garten (Eld.).

*S. bidentatus* Fabr. n. h. aus Moos von Wundlack (Eld.), Wilkie, Blaustein (Ltz.).

*S. unidentatus* Fabr. n. s. unter Buchen- und Eichenrinde (Kug.), Fehstein (Ltz.), Kbg. Holzwiesen (Stnr.).

*S. similis* Er. s. s. Holstein an der Pregelmündung 1 St. (Czw.).

*Airaphilus elongatus* Gyll. bei Dz. auf dem Dünengrase h. (Erichs. K. D. III. 340. 7).

*Monotoma conicicollis* Aub. *angusticollis* Thoms. h. in Ameisenhaufen, Kbg. (Eld.).

*M. angusticollis* Gyll. *formicetorum* Thoms. s. Cranz (Ltz.).

*M. spinicollis* Aub. n. s. an Scheunenwänden, Liep (Ltz.).

*M. 4-foveolata* Motsch. s. s. Dz. (Helm).

*M. brevicollis* Aub. s. in trockenem Miste, Putzig (Stf.).

*M. pieipes* Hbst. n. s. Ggbg. (Kr.), Neustadt (Fritzen), Cranz (Ltz.).

*M. longicollis* Gyll. s. Neustadt (Fritzen), Putzig (Stf.).

*Hypocopus lathridioides* Motsch. s. in den Dünen von Glettkau, bei Oliva in trockenem Ziegenmiste (Czw.).

## Cryptophagidae.

*Telmatophilus caricis* Oliv. u. s. Dzer. Nehrung, Putzig (Stf.), Kbg. (Ltz.).

*T. brevicollis* Aub. n. s. auf Typha, Blaustein (Ltz.), Kbg. Holzwiesen (Stnr.).

*T. typhae* Fall. s. von Blumen und Schilf geschöpft (Dommer), am Pregel (Czw., Stnr.).

*T. pumilus* Reitt. s. von einer Pregelwiese 1 St. (Czw.).

*T. Schönherri* Gyll. s. bei Glettkau 1 St. (Czw.).

*Antherophagus nigricornis* Fabr. s. (Sieb.).

*A. silaceus* Hbst. n. h. Galtgarben (Eld.), Putzig auf Umbellaten (Stf.), Warnicken (Ltz.).

*A. pallens* Oliv. n. h. Löwenhagen (Ltz.).

*Emphylus glaber* Gyll. s. von Blumen geschöpft (Dommer), unter Ameisen Putzig (Stf.), F. F. (Stnr.).

*Henoticus (Paramecosoma) serratus* Gyll. s. Dz. (Sieb.).

*Cryptophagus crenatus* Gyll. *crenulatus* Er. s. Kbg. aus Moos (Eld.), Putzig (Stf.), F. F. (Stnr.).

*C. Lycoperdi* Hbst. n. s. in Staubpilzen (Kug.), Rauschen (Ltz.).

*C. pilosus* Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.).

*C. setulosus* St. s. ebenso (Ltz., Czw.), in Blätterpilzen an Buchen, Neustadt (Fritzen).

*C. Schmidtii* St. s. ebenso.

*C. affinis* St. n. s. Loppennen (Eld), Putzig (Stf.).

*C. cellaris* Scop. n. h. im Moose aus der Caporn. Haide (Eld.), Putzig (Stf.).

*C. aeutangulus* Gyll. ebenso, Ktzn. in Spreu (Czw.).

*C. fumatus* Marsh. s. Putzig (Stf.).

*C. quercinus* Kraatz h. Kbg. (Ltz.).

*C. badius* St. s. Kbg. (Sauter), Putzig (Stf.).

*C. labilis* Er. s. Kbg. (Ltz.); unter Spreu, Ktzn. (Czw.).

*C. bicolor* St. n. s. unter Ameisen (Eld.), Putzig (Stf.), Ggbg. (Kr.)

*C. saginatus* St. s. Dz. (Frantz.).

*C. dentatus* Hbst. n. s. wie *affinis*.

*C. scanicus* L. mit var. *cellaris* St. h. in Häusern, auch unter Baumrinde (Kug.), Kbg. (Ltz.).

*C. dorsalis* Sahlb. s. wie *affinis*, Schwarzort (Czw.).

*C. subdepressus* Gyll. s. Kbg. (Ltz., Czw.), Neustadt (Fritzen).

*C. lapponicus* Gyll. *pubescens* St. s. s. Glettkau (Czw.).

*C. bimaeculatus* Pz. s. Dz. (Dommer), Oliva (Czw.), Kbg. (Ltz.).

*C. vini* Pz. s. Kbg. von einer *Abies* geklopft (Ltz.).

*Paramecosoma abietis* Pk. h. von *Abies* geklopft (Ltz.), Loppehen (Eld.), Putzig (Stf.).

*P. pilosulum* Er. n. s. Ggbg. (Kr.), nach Thoms. = *Cryptophagus vini* Pz.

*P. melanocephalum* Hbst. n. h. aus Moos (Sauter), Putzig (Stf.), Pregelwiesen (Czw.).

*Atomaria fimetarii* Hbst. s. s. Dz. (Czw.).

*A. umbrina* Gyll. *fumata* Er. z. h. an Baumswämmen bei Schrb. (Czw., Stnr.).

*A. linearis* Sleph. n. s. Kbg. (Ltz.).

*A. elongatula* Er. s. Ggbg. (Kr.), Pregelwiesen (Czw.).

*A. nana* Er. h. aus Moos von Zimmerbude (Eld.), Putzig (Stf.).

*A. impressa* Er. s. Kbg. (Czw.), Neustadt (Fritzen).

*A. munda* Er. n. s. wie *nana*.

*A. nigripennis* Pk. s. Dz. (Kumm).

*A. cognata* Er. s. aus Moos, Kbg. (Sauter).

*A. gravidula* Er. s. ebenso (Eld.).

*A. fuscata* Schh. h. ebenso, Putzig (Stf.).

*A. pusilla* Pk. n. s. ebenso.

*A. atricapilla* Steph. *nigriceps* Er. s. Dz. (Czw., Fritzen).

*A. atra* Hbst. n. s. Kbg. (Ltz.).

*A. basalis* Er. n. h. Putzig (Stf.).

*A. mesomelas* Hbst. h. Kbg. (Ltz.).

*A. gutta* Steph. h. Kbg. Holzwiesen (Stnr., Ltz.).

*A. fuscipes* Gyll. n. h. wie *basalis*, Kbg. (Stnr.).

*A. turgida* Er. s. wie *nana*.

*A. versicolor* Er. s. wie *basalis*.

*A. analis* Er. n. s. ebenso.

*A. apicalis* Er. n. h. wie *nana*.

*A. ruficornis* Marsh. *terminata* Com. h. ebenso.

*A. gibbula* Er. s. ebenso.

*Ephistemus globosus* Waltl. s. Dz. (Czw.), F. F. (Stnr.).

*E. globulus* Pk. *ovulum* Er. *dimidiatus* St. h. im Moose von Zimmerbude (Eld.), unter faulenden Vegetabilien Putzig (Stf.), Kbg. Holzwiesen (Stnr.).

*E. exiguus* Er. seltener, ebenso.

### Lathridiidae.

*Myrmecoxenus subterraneus* Chev. h. unter den kleinen gelben Ameisen (Dommer, Stf., Eld.); F. F., Dammhof (Stnr.).

*M. vaporariorum* Gnér. einmal h. bei Ggbg. in einem auf Ameisen liegenden Unkrauthaufen (Kr.).

*Lathridius lardarius* Deg. s. h. im Moose.

*L. angulatus* Mannh. s. Masuren (Mühl).

*L. angusticollis* Humm. n. s. Dz. (Frantz.), Blaustein (Ltz.), Kbg. (Czw.).

*L. alternans* Mannh. s. Loppehen (Eld.), Neu Häuser im Eichenschwamm 2 St. (Ltz.).

*L. rugicollis* Oliv. Ludwigsort (Ltz.).

*L. carinatus* Gyll. s. s. Dz. I St. (Helm).

*L. constrictus* Humm. s. s. (Sieb.).

*L. hirtus* Gyll. n. s. Kbg. an Weidenstämmen (Ltz.).

*L. minutus* L. g. überall.

*L. anthracinus* Mannh. s. ist eigene Art (Seidl. Fn. Balt. p. 167). Ggbg. (Kr.), Neustadt (Fritzen).

*L. rugosus* Hbst. n. s. Kbg. (Ltz.).

*L. transversus* Oliv. n. s. an Scheunenwänden (Dommer, Ltz.).

*L. elongatus* Curt. s. Putzig (Stf.).

*L. liliputanus* Villa. n. s. wie *E. transversus*, Liep (Ltz.).

*L. collaris* Mannh. s. Loppehen (Eld.).

*L. filiformis* Gyll. n. h. Putzig (Stf.).

*Corticaria pubescens* Gyll. *piliger* Mannh. n. s. im Moose, Kbg. (Ltz.).

*C. cylindrica* Mannh. s. Neustadt (Fritzen).

- C. crenulata* Gyll. h. Kbg. (Ltz.).  
*C. fulva* Com. s. wie *cylindrica*.  
*C. denticulata* Gyll. n. h. ebenso.  
*C. longicornis* Hbst. s. Dz. (Frantz., Fritzen).  
*C. formicetorum* Mannh. n. s. Kbg. (Ltz.),  
 Putzig (Stf.); unter Ameisen, Vierbrkr. (Stnr.).  
*C. serrata* Pk. h.-Kbg. (Ltz.).  
*C. linearis* Pk. s. Sieb.  
*C. foveola* Beck. n. h. Dz. an Gebäuden  
 (Dommer).  
*C. elongata* Humm. n. h. Loppennen (Eld.).  
*C. gibbosa* Hbst. g. überall.  
*C. transversalis* Gyll. h. Dz. (Frantz.), Ggbg.  
 (Kr.).  
*C. distinguenda* Com. s. Kbg. aus Baum-  
 moos (Sauter).  
*C. similata* Gyll. parvula Mannh. s. Neu-  
 stadt (Fritzen).  
*C. fuscata* Humm. trifoveolata Redt. n. s.  
 wie *distinguenda*, Kbg. (Ltz.).  
*C. truncatella* Mannh. s. ebenso.

### Mycetophagidae.

- Mycetophagus 4-pustulatus* s. h. in Weiden-  
 schwämmen.  
*M. piceus* Fabr. variabilis Hellw. n. s.  
 F. F. (Stnr.), Kbg. (Ltz.).  
*M. 10-punctatus* Fabr. s. Dz. (Helm),  
 Wernsdorf (Kuwert).  
*M. atomarius* Fabr. n. s. Wilkie (Eld.),  
 Kleinhaide (Stnr.).  
*M. multipunctatus* Hellw. n. s. im Eichen-  
 und Weidenschwamm, Margen (Ltz.).  
*M. fulvicollis* Fabr. s. Wicken, an alten  
 Kastanienbäumen (Sauter), Kapkeim (Ltz.).  
*M. populi* Fabr. s. F. F. (Stnr.).  
*M. 4-guttatus* Müll. s. Spittelhof (Eld.,  
 Ltz.), Kbg. Holzwiesen (Stnr.), Dz. (Helm).  
*Triphyllus punctatus* Fabr. s. Warnicken  
 (Ltz.), Dz. (Czw.).  
*Litargus bifasciatus* Fabr. h. an Birken,  
 Margen, Kbg. Holzwiesen (Czw., Stnr., Ltz.).  
*Typhaca fumata* L. g. an Ställen u. Scheunen  
 überall.  
*Diphyllus lunatus* Fabr. s. s. einmal bei  
 Putzig, Juni (Stf.).

### Dermestidae.

- Dermestes vulpinus* Fabr. s. Lyck (Sanio).  
*D. Frischii* Kug. s. Osterode einigemal am  
 Aase angetroffen (Kugel.), Dz. (Fritzen, Czw.).  
*D. murinus* L. n. s. am Aase, Rauschen  
 (Ltz.), Schwarzort in Reihernestern (Czw.).  
*D. atomarius* Er. z. h. unter Pflanzenresten  
 am sandigen Ufer des frischen Haffes, Margen  
 (Ltz.), Neuhäuser (Stnr.).  
*D. mustelinus* Er. s. Grebbiner Wald, an  
 einem toten Fuchse (Dommer).  
*D. lanarius* Illig. affinis Gyll. n. s. Margen  
 (Ltz.); merkw. kleine Expl. Dz. (Helm).  
*D. eadaverinus* Fabr. s. Ggbg. (Kr.), Lyck  
 (Sanio).  
*D. lardarius* L. g. überall.  
*D. bicolor* Fabr. in Taubenschlägen n. s.  
 (Dommer), Ktzn. (Czw.). Die Larven leben zum  
 Theil parasitisch im Fleische der Vögel, auch  
 an Stockfisch in Speichern (Fritzen).  
*Attagenus pellio* L. g. überall.  
*A. Schäfferi* Hbst. n. s. Osterode, auf Um-  
 bellaten (Kug.), Moosbude an Schwämmen (Ltz.).  
*A. megatoma* Fabr. n. s. an Weidenblüthen  
 Loppennen, Kobbeldude (Eld., Ltz.).  
*A. 20-guttatus* Fabr. s. s. Tolckemit am  
 frischen Haff (Sieb.).  
*A. pantherinus* Ahr. s. s. einmal Ludwigs-  
 dorf bei Ggbg. an Käsekasten (Kr.).  
*Megatoma undata* L. n. s. auf blühenden  
 Obstbäumen; die Larven nähren sich von Blatt-  
 wespenlarven, Wernsdorf (Kuwert).  
*Hadtrotoma marginata* Pk. n. h. Moosbude  
 (Ltz.), Schwarzort (Czw.).  
*Trogoderma elongatum* Dit. s. s. Osterode,  
 an alten Zäunen (Kug., Sieb.).  
*T. nigrum* Hbst. s. s. auf Umbellaten, Putzig  
 (Stf.).  
*Tiresias serra* Fabr. s. Osterode an alten  
 Buchen (Kug.), Dz. (Czw.), Kbg. an alten Wei-  
 den (Pfeil, Ltz.), Kahlberg (Stnr.).  
*Anthrenus scrophulariae* L. s. h. auf Garten-  
 blumen, namentlich *Saxifraga caespitosa* (Ltz.).  
*A. pimpinellae* Fabr. s. Dz. (Czw.), Oste-  
 rode (Kug.).  
*A. verbasci* L. varius Fabr. s. Putzig (Stf.).  
*A. signatus* Er. s. s. in der F. F. 1 Stück  
 (Czw.).

*A. muscorum* L. leider überall g.

*A. elaviger* Er. s. Kbg. (Stnr.), auf Umbellaten in Gärten, Neustadt (Fritzen).

*Trinodes hirtus* Fabr. n. s. Osterode auf *Corylus* (Kug.), Kbg. auf Eichen und Weiden (Ltz.), Oliva an Ulmen (Czw.).

### Byrrhidae.

*Nosodendron fasciculare* Oliv. s. s. Sieb.

*Syncalypta setigera* Illig. s. an feuchten Stellen im Felde, Gbg. (Kr.), Loppennen (Stnr.).

*S. spinosa* Rossi. s. ebenso.

*Byrrhus Dennyi* Curt. s. s. Lyek 1 Stück (Sanio).

*B. pilula* L. h. Rauschen auf Sandboden (Ltz.).

*B. foveolatus* Fabr. h. ebenso.

*B. dorsalis* Fabr. n. s. ebenso.

*B. murinus* Fabr. h. ebenso.

*Cytilus varius* F. h. in trocknen sandigen Waldgegenden (Kug.), Dz. (Helm); die var? *auricomus* Dft., Kbg. Pregelwiesen (Czw., Dt. Ent. Z. XXII. 205).

*Morychus aeneus* F. n. s. Rauschen in Sandgruben (Ltz.), Dz. (Czw.).

*M. nifens* Pz. s. Gbg. (Kr.), Neuhäuser (Stnr.).

*Simpliocaria metallica* St. s. Pulzig (Stf.), Gbg. (Kr.).

*S. semistriata* Fabr. n. s. Kbg. bei Rosenau (Ltz.).

*Limnichus pygmaeus* St. s. Loppennen (Eld.), Kbg. Neue Bleiche (Czw.).

*L. sericeus* Dft. s. am Seeufer bei Fiselhausen 2 St. (Ltz.), am Pregel (Stnr.).

### Georyssidae.

*Georyssus pygmaeus* Fabr. n. s. am Ufer des Lauthschen Teiches (Eld., Ltz.), Dz., Glettkau (Czw.), Radaune (Helm).

### Parnidae.

*Parnus prolifericornis* Fabr. g. in Wasserpfützen auf Wiesen. Die var. *bicolor* Curt. Gbg. (Kr.).

*P. griseus* Er. s. Kbg. Damnhof (Pfeil).

*P. lutulentus* Er. n. s. Kbg. Neue Bleiche (Czw.).

*P. auriculatus* Pz. n. s. Kbg. (Ltz.), Memel (Stnr.).

*P. nitidulus* Heer. s. Dz. (Helm).

*Limnius tuberculatus* Müll. s. Masuren (Mühl.).

*L. troglodytes* Gyll. s. in einem Waldbach unter Steinen, im Frühjahr, Putzig (Stf.).

*Elmis aeneus* Müll. h. Rauschen, Loppennen im Müh'enbaeche (Eld., Ltz.); Dz., Neustadt, Putzig (Stf.).

*E. obseurus* Müll. s. s. Osterode (Kug.), aber nicht wieder gefunden.

*E. eupreus* Müll. s. Dz. im Mühlenflüsse bei Brentau (Fritzen, Helm).

*E. Volkmari* Pz. h. mit *aeneus* (Eld., Stf.).

*E. opacus* Müll. s. mit *aeneus* (Stf.).

*E. Mülleri* Er. s. Pohibels (Sauter).

*Macronychus 4-tuberculatus* Müll. s. s. in Pfützen, die mit *Chara* gefüllt sind: durch Rühren mit einem Stocke bringt man das träge Thier in Bewegung, Osterode im Spätsommer (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

### Heteroceridae.

*Heterocerus marginatus* Fabr. s. macht wie die Maulwürfe Gänge im Lehm und Sand, welche man auf der Oberfläche bezeichnet findet (Kug.), Schwarzort (Ltz.).

*H. intermedius* Ksw. s. am Radauneufer (Dommer, Fritzen).

*H. hispidulus* Ksw. n. s. ebenso, Rhedathal bei Neustadt (Fritzen).

*H. obsoletus* Curt. s. am Seestrände bei Schwarzort (Ltz.).

*H. laevigatus* Pz. s. ebenso, Dz. (Fritzen).

*H. fuseulus* Ksw. n. s. am Rande von Lehmputzen, Wernsdorf (Kuwert), Kbg (Czw.), Dz. (Helm).

### Lucanidae.

*Lucanus cervus* L. s. an Eichen in der Warnicker Forst, Galtgarben (Ltz.), die var. *hircus* Hbst. auf Kartoffelfeldern bei Rauschen (Ltz.).

*Dorcus parallelepipedus* L. n. s. ebenso.

*Platycerus caraboides* L. *rufipes* Hbst. Osterode, an Ellern und Eichen s. h. (Kug.), sonst n. h. Warnicken (Ltz.).

*Ceruchus tenebrioides* Fabr. s. s. Lötzen (Eld.), Tilsit (Sieb.).

*Sinodendron cylindricum* L. n. s. im Mulm alter Weiden, Eichen und Buchen, Rauschen (Ltz.).

### Scarabaeidae.

*Copris lunaris* L. n. s. im Pferdedünger auf den Wiesen am Galtgarben (Ltz.), Hlgbl. (Stnr.).

*Onthophagus Schreberi* L. n. s. im Rinderdünger, Rauschen (Ltz.), Hlgbl. (Stnr.).

*O. taurus* L. n. h. im Rinderdünger, Pillau, Kahlberg (Ltz.).

*O. nutans* Fabr. s. s. bei Kbg. (Kug., Sieb.).

*O. austriatus* Pz. bei Lyck im Kuhdünger auf sandigen Feldern h. (Sanio), Tilsit am Rombinus (Nanke).

*O. vacca* L. *medius* Pz. g. überall.

*O. coenobita* Hbst. n. s. Kbg. Sternwarte an Excrementen (Ltz.).

*O. fracticornis* Preysl. h. wie *vacca*.

*O. nuchicornis* L. h. Neuhäuser (Ltz., Stnr.).

*O. camelus* Fabr. s. s. bei der Allensteinischen Glashütte auf sandigem Wege, Juni 1789 (Kug.), aber nicht wieder gefunden.

*O. ovatus* L. n. h. Kbg. (Kug., Sieb.).

*Oniticellus flavipes* Fabr. s. s. Osterode (Kug.), Thorn (Czw.), im Kuhdünger, Ohra bei Dz. (Fritzen).

*Aphodius erraticus* L. h. Kbg. (Ltz.).

*A. subterraneus* L. h. ebenso.

*A. fossor* L. mit var. *sylvaticus* Ahr. n. s. ebenso.

*A. haemorrhoidalis* L. h. im Schafmiste, Loppennen (Eld.), Lyck (Sanio).

*A. scybalaris* Fabr. bei Osterode g. (Kug.), bei Kbg. nicht bemerkt, bei Dz. s. (Helm).

*A. foetens* Fabr. g. überall.

*A. fimetarius* L. ebenso.

*A. ater* Deg. *terrestris* Fabr. n. s. im Pferdedünger Dz. (Dommer), Neuhäuser (Stnr.).

*A. constans* Dft. s. Nehrung bei Pillau (Sauter).

*A. granarius* L. h. Kbg. (Ltz.).

*A. putridus* Hbst. *foetidus* Fabr. n. s. wie *ater*, Ggbg. (Kr.), Fahrwasser bei Dz. (Dommer), Galtgarben (Eld.).

*A. sordidus* Fabr. h. Kbg. (Ltz.).

*A. rufescens* Fabr. s. Danziger Sanddünen (Czw.).

*A. lugens* Creutz. s. frische Nehrung bei Pillau (Sauter), Ggbg. (Kr.).

*A. nitidulus* Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.).

*A. immundus* Creutz. s. ebenso.

*A. bimaculatus* Fabr. n. s. im Schafdünger, Dz. (Dommer).

*A. niger* Pz. s. Dammhof, Neuhäuser (Stnr.), Schwarzort (Czw.).

*A. plagiatus* L. n. s. am Pregeldamm (Ltz.), Neuhäuser (Stnr.).

*A. inquinatus* Fabr. g. überall.

*A. melanostictus* Schm. n. s. im Pferdedünger Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).

*A. sticticus* Pz. n. h. Putzig (Stf.), Kbg. (Ltz.).

*A. conspurcatus* L. s. Blaustein (Ltz.).

*A. tessulatus* Pk. s. (Sieb.).

*A. maculatus* St. s. Neustadt (Fritzen).

*A. Zenkeri* s. s. 1 St. Juli 78 im Walde bei Oliva (Czw.).

*A. lutarius* Pk. s. s. Grebbiner Wald (Dommer), Bludauer Forst (Eld.), Masuren (Mühl).

*A. scofa* Fabr. s. s. Osterode (Kug.), Lyck im Schafsmist (Sanio), Dz. (Helm), Neustadt (Fritzen).

*A. tristis* Pz. s. Dz. (Czw.).

*A. pusillus* Hbst. h. Kbg. (Ltz.).

*A. 4-guttatus* Hbst. s. auf den Rauschener Dünen im Pferdedünger (Ltz.).

*A. 4-maculatus* L. s. ebenso, Caporn. Haide (Nanke), Nehrungsforst im Rehdünger (Dommer), Galtgarben (Eld.).

*A. merdarius* Fabr. h. Kbg. (Ltz.).

*A. prodromus* Brahm. g.

*A. punctatosulcatus* St. g.

*A. contaminatus* Hbst. s. s. Osterode (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

*A. rufipes* L. n. h. Warnicken (Ltz.).

*A. bipunctatus* Fabr. Osterode auf sandigen Wegen im Pferdedünger (Kug.), war bis etwa 1840 bei Braunsberg nicht gerade selten, ist aber seitdem verschwunden.

*A. luridus* Pk. mit der ganz schwarzen var. g.

*A. depressus* Kug. n. s. im Pferde- und Rinderdünger, Osterode, Dz., Lyck (Kug., Dommer, Sanio).

*A. pccari* Fabr. s. an Excrementen Dz. (Dommer).

*A. arenarius* Oliv. h. Kbg. (Ltz.).

*Oxyomis* sus Hbst. n. h. an Excrementen, Rauschen (Ltz.).

*O. testudinarius* Fabr. s. in trockenem Pferdedünger, Margen (Ltz.).

*O. villosus* Gyll. s. s. 2 St Juli 78 im Walde bei Oliva (Czw.).

*O. porcatus* Fabr. s. h. Kbg. in den Speicherrivieren (Ltz.).

*Rhyssemus germanus* L. *asper* Fabr. n. h. Kapkeim (Ltz.), Dz. (Helm).

*Psammodius vulneratus* St. n. s. in Sandgruben bei Ludwigsort (Ltz.), Hgbl. (Stnr.).

*P. sulcicollis* Illig. z. s. Schwarzort (Ltz.), Dz. (Helm), Hgbl. (Stnr.).

*Aegiala sabuleti* Pk. s. s. Kug., Sieb., von Fritzen bezweifelt.

*A. rufa* Fabr. s. Kbg. (Erichs. K. D. III. 919); bei Pasewark auf der Nehrung (Dommer).

*A. arenaria* Fabr. *globosa* Kug. n. h. auf den Sanddünen bei Pillau und Neuhäuser (Ltz.), unter ausgeworfenem Seegrass (Sieb.), Glettkau, Schwarzort (Czw.).

*Ochodaeus chrysomelinus* Fabr. s. s. Dz., unter altem trockenem Kuhdünger (Fritzen).

*Odontaeus mobilicornis* Fabr. s. s. Insterburg (Bachmann).

*Geotrypes Typhoeus* L. s. s. Kbg., Dz., Rastenburg (Sieb.).

*G. stercorarius* L. *putridarius* Er. g. im Pferdedünger.

*G. spiniger* Marsh. *stercorarius* Er. h. ebenso.

*G. mutator* Marsh. g. ebenso.

*G. sylvaticus* Pz. h. Rauschen (Ltz.).

*G. vernalis* L. n. s. mit var. *autumnalis* Er. ebenso.

*Lethrus cephalotes* Fabr. nach Kug. bei Schwarzort am Meeresufer unter verfaulten Gewächsen, auch im Dünger gefunden, nachher nicht wieder; dürfte in Pr. nicht vorkommen.

*Trox concinnus* Er. s. s. Putzig (Stf., von Fritzen bezweifelt).

*T. hispidus* Pontopp. s. Kbg. vor dem Sackheimer Thore, in Lumpen (Pfeil).

*T. cadaverinus* Illig. s. Putzig (Stf.).

*T. sabulosus* L. n. s. in Lumpen, in Haaren von Thierfellen (Kug.). Kbg. (Ltz.).

*T. scaber* L. h. Wernsdorf (Kuwert).

*Hoplia philanthus* Füssl. *argentea* Fabr. s. s. Rhedathal bei Neustadt (Fritzen), Glettkau (Czw.).

*H. farinosa* L. *squamosa* Fabr. s. s. Kbg. (Sieb.).

*H. pollinosa* Er. *minuta* Illig. n. s. auf den Dünen zwischen Pillau u. Neuhäuser, Juni (Ltz.), Bohnsack bis zur Pommersehen Grenze (Fritzen), Dünengräser bei Fahrwasser (Dommer), Memel (Stnr.).

*H. graminicola* Fabr. n. s. ein Dünenkäfer (Ltz.), aber auch auf dem Quednauer Berge (Stnr.).

*Homalopia ruricola* Fabr. n. s. Braunsbg., Kbg. in den Strandgegenden auf Weiden (Ltz.).

*Serica holosericea* Scop. n. h. auf Brachäckern, an den Wurzeln versch. Pflanzen, *Scleranthus*, *Erica*, Osterode (Kug.), am Seestrande (Ltz.).

*S. brunnea* L. h. in den Strandgegenden, Cranz, Rauschen (Lz.).

*Rhizotrogus solstitialis* L. n. s. auf Brachäckern, Kbg. (Lz.), Hgbl. (Stnr.).

*R. ruficornis* Fabr. s. Putzig (Stf.), Lyck (Gortzilta), Gbg. (Kr.).

*R. aequinoctialis* Hbst. 2 St. von Kugel. an Hellwig übersandt u. von diesem als *aequin.* bestimmt, aber bisher nicht wieder gefunden.

*Polyphylla fullo* L. n. s. in den Strandgegenden von Pillau bis Cranz auf Kiefern (Ltz.), Dz., Rastenburg, Lyck (Sieb.).

*Melolontha vulgaris* Fabr. mit var. *albida* Friv. h. überall, letzterer am besten auf Sandboden, der beim Auschlüpfen keinen Widerstand bietet und das Haarkleid nicht abreibt.

*M. hippocastani* Fabr. h. ebenso.

*Anisoptia fruticola* Fabr. s. Kug., Sieb.

*A. agricola* Fabr. fand Kugel. in 2 versch. Sammlungen vaterländ. Insecten: bis jetzt nicht wieder gefunden.

*A. erueifera* Hbst. s. von Stf. in Litthauen gefangen (Dommer), von Fritzen bezweifelt.

*A. austriaca* Hbst. s. Braunsbg. (Sieb.), von Fritzen bezweifelt.

*Phyllopertha horticola* L. g. überall.

*Anomala Frisehii* Fabr. g., namentlich in den Strandgegenden auf Weiden.

*Oryctes nasicornis* L. n. s. in Gerberlohe, Kbg. (Ltz.).

*Oxythyrea stictica* L. s. bei der Allensteinischen Glashütte auf jungen Eichen (Kug.), Cadienen (Dommer, Frantzius).

*Cetonia hirtella* L. s. Braunsbg. (Seydler), Dz. (Sieb.).

*C. speciosissima* Scop. *fastuosa* Fabr. s. s. Osterode 1 St. auf *Thalictrum flavum* (Kug.), Thorn (Eld.), Pelplin, wo die Larve im Mulme alter Linden wohnt (Fritzen).

*C. marmorata* Fabr. n. h. an alten Weiden Fehstein. (Ltz.), Dz. (Czw.), Hlglbl. (Stnr.).

*C. aenea* Gyll. *metallica* Fabr. h. Lyck (Sanio).

*C. aurata* L. s. h. auf *Spiraea ulmaria* und auf Rosenblüthen, überall.

*Osmoderma eremita* Scop. n. h. an alten Birnbäumen u. Weidenstämmen, August (Kug.), Dz. (Czw.), Kbg. (Ltz., Stnr.).

*Gnorimus variabilis* s. an Eichenstubben Osterode (Kug.), Carmitten (Ltz.), Neuhausen (Stnr.).

*G. nobilis* L. n. s. auf blühendem *Cirsium oleraceum*, Warnicken in der Wolfsschlucht (Ltz.), Neuhausen, Kleinheide (Stnr.).

*Trichius fasciatus* L. n. s. auf blühendem *Chrysanthemum*, Warnicker Forst (Ltz.), F. F. (Stnr.).

*Valgus hemipterus* L. s. Osterode (Kug.), Pillau (Nanke), Dz., Thorn (Sieb.).

## Buprestidae.

*Chalcophora Mariana* L. fehlt in den Strandgegenden, ist aber tiefer nach Süden in Kieferwäldern n. s. Osterode (Kug.), Elbing, Rastenbg., Tucheler Haide, Lyck (Sieb.).

*Dicerca Berolinensis* Hbst. *calcarata* Fabr. s. s. an Baumstämmen der Laubwälder, Osterode (Kug.), Kbg. (Sieb.), Dz. (Helm).

*D. aenea* L. s. s. Jäschkenthal 2 St. 1871 (Helm).

*D. acuminata* Pall. s. s. auf der frischen Nehrung bei Pröbberau 1 St. (Stf.).

*D. alni* Fisch. *fagi* Lap. s. s. Ortelsburg (Mühl).

*Poecilnota conspersa* Fabr. einmal bei Penlonken (Dz.) auf Buchen und Pappeln zahlreich

(Stf.), sonst s., zuerst 1790 bei Kbg. an alten Pappelstämmen (Kug.).

*P. rutilans* Fabr. s. bei Liebemühl an den Knorren alter Lindenstämmen (Kug.), Rastenbg. (Sieb.), einmal in Mehrzahl an alten Linden in Catharinenhof bei Kbg. (Bender).

*P. decipiens* Mannh. s. Rastenbg. (Mühl).

*Ancylotretra rustica* s. in Kieferwäldern an der Mittagseite der Stämme bei heissem stillem Wetter sich sonnend, Osterode (Kug.), Kahlberg (Ltz.).

*A. punctata* Fabr. n. h. Kahlberg (Bachmann, Ltz.).

*A. flavomaculata* Fabr. ebenso, Tuchelsche Haide (Sieb.).

*A. octoguttata* L. s. Braunsbg., Heilsbg., Rastenbg., Tuchel. Haide (Sieb.), Schwarzort (Ltz.).

*A. splendida* Pk. s. s. Thorn (Sieb.).

*Eurythyrea austriaca* L. s. s. Osterode im Lubninschen Wäldchen auf einer gefällten Buche Juli 1789 (Kug.), ein zweites St. Juli 1877 von einem Gymnasialschüler (Stadie) bei Neukuhren gef. (Czw.).

*E. carniolica* Hbst. s. s. ein von einem Schüler in den Holzgärten in Kbg. gef. St. besitzt Kuwert-Wernsdorf.

*Melanophila cyanea* Fabr. *tarda* Fabr. n. s. im Kiefernwalde von Schwarzort (Ltz.).

*M. appendiculata* Fabr. s. ebenso.

*Anthaxia nitida* Rossi. s. Cadienen (Stf.).

*A. nitidula* L. *laeta* Fabr. s. in Wäldern auf Blumen, Osterode (Kug.), Elbing (Sieb.).

*A. morio* Fabr. s. s. in einer ostr. Forst (Dossow).

*A. sepulchralis* Fabr. s. s. Braunsberg (Eld.).

*A. 4-punctata* L. h. auf *Syngenesisten*, bes. *Hieracium*, Loppennen (Eld. Ltz.).

*Chrysobothris chryso stigma* L. s. an alten Weidenstämmen (Kug.), Braunsbg. (Sieb.).

*C. affinis* Fabr. s. Osterode (Kug.), Elbing (Sieb.), Gbg. (Kr.).

*C. Solieri* Lap. s. s. in Masuren auf Kiefernholz (Mühl).

*Agrilus sexguttatus* Hbst. s. Greibensche Forst (Ltz.).

*A. biguttatus* Fabr. n. h. auf jungen Eichen, Elbing, Braunsbg. (Sieb.), Wilkie (Ltz.).

*A. mendax* Mannh. s. in *Sorbus*-Stämmen, Warnicken (Dossow).



*A. subauratus* Gebl. *coryli* Ratz. s. s. Dammhof (Pfeil).

*A. viridis* L. h. auf Haseln und Eichen, Braunsbg., Kbg. (Ltz.); var. *linearis* Fabr. h. auf Weiden (Kug. Eld.); var. *noeivus* Kbg. (Ltz.); var. *fagi* Ratz., Aubei Lap., *quercinus* Ratz. (Dossow, Sauter).

*A. betuleti* Ratz. s. Elbing, Kbg. (Sieb.).

*A. pratensis* Ratz. n. h. Löwenhagen (Ltz.).

*A. tenuis* Ratz. n. h. Kbg. (Ltz.).

*A. angustulus* Ill. n. s. ebenso.

*A. laticornis* Ill. n. h. an den Beeren von *Daphne mezereum* (Dommer), Brandenburger Haide (Ltz.), Oliva (Czw.).

*A. olivicolor* Ksw. h. Braunsbg. (Mühl), auf Rüstern in Westpr. (Strübing, Berl. Ent. Ztg. IV. 322).

*A. integerrimus* Ratz. s. Lyek (Sanio).

*A. hyperiei* Creutz. s. Albrechtsthal bei Wehlau (Sauter).

*Aphanisticus pusillus* Oliv. s. s. Waldenburg bei Neustadt auf einer feuchten Wiese, August (Fritzen).

*Trachys minutus* L. s. h. auf blühenden Weiden, Kbg. (Ltz.).

*T. pygmaeus* Fabr. s. Gbg. (Kr.).

*T. troglodytes* Gyll. s. Lyek (Sanio).

*T. nanus* Hbst. s. Cadienen (Stf.), Gelgubnen (Ltz.).

### Eucnemidae.

*Throscus dermestoides* L. s. h. auf Eichen, Kbg. (Ltz.).

*T. carinifrons* Bonv. n. s. Dammhof (Ltz., Czw.).

*T. elateroides* Heer. s. ebenso; Kbg. (Pfeil).

*T. obtusus* Curt. s. ebenso; an Weiden am Pregel (Stnr.), Neustadt (Fritzen).

*T. Duvalii* Bonv. n. s. bei Dz. an Wiesenrändern unter alten Weiden (Czw.).

*Drapetes equestris* Fabr. s. s. Osterode (Kug.), Gbg. (Kr.).

*Melasis buprestoides* L. s. s. Osterode, im Holze eines alten Kastanienbaumes, dann auf Blumen im Eichen- u. Buchenwalde (Kug.), seitdem nicht wieder gefunden.

*Tharops melasoides* Lap. s. s. Kbg. in einem Garten (Borgien).

*Eucnemis capueinus* Ahr. s. Kbg. in alten Weiden bei Fort Friedrichsburg (Pfeil, Ltz.), Löwenhagen (Czw.).

*Microrrhagus pygmaeus* Fabr. s., zuerst 1795 an alten Pappelstämmen (Kug.), dann Putzig (Stf.), Warnieker Park (Ltz.).

*M. clypeatus* Hampe in Pr. von Kug. entdeckt (als *Eucnemis gibbicollis*), aber bisher nicht wiedergefunden, vergl. Erichs. K. D. IV. p. 205.

*Xylobius alni* Fabr. s. s. unter Buchen- und Eichenrinde (Kug.), frische Nehrung, Cadienen (Stf.), Gbg. (Kr.).

*Hylochares cruentatus* Gyll. s. s. Elbing (Eld.).

### Elateridae.

*Adelocera lepidoptera* Pz. s. s. Elbing (Sieb.).

*A. fasciata* L. s. s. Kbg., Rastenbg. (Sieb.).

*A. varia* Oliv. s. s. einmal an einer Tanne bei Labiau (Nanke teste Kug.), sonst nicht wieder gefunden.

*Lacon murinus* L. h. Kbg. (Ltz.).

*Drasterius bimaculatus* s. s. Pillauer Strand (Sauter).

*Elater (Ampedus) sanguineus* L. n. h. auf Birken, Lyek (Sanio), Zinten (Ltz.).

*E. lythropterus* Germ. *satrapa* Ksw. n. h. ebenso.

*E. ephippium* Oliv. n. h. Kbg. (Ltz.).

*E. pomonae* Steph. h. Dz. (Helm), Kbg. (Ltz.), ist hier wie in Livland die häufigste Art (Seidl. Fn. Balt. p. 119).

*E. praeustus* Fabr. s. Dz. (Ltz.).

*E. pomorum* Hbst. s. Kbg. (Ltz.).

*E. croceatus* Lae. n. h. ebenso.

*E. balteatus* L. n. s. auf Nadelholz Kbg. (Ltz.); auf Birken, Lyek (Sanio).

*E. elongatulus* Fabr. s. Neustadt (Fritzen).

*E. erythrogonus* Müll. n. h. auf Tannen, Bludauer Forst (Pfeil, Eld., Ltz.).

*E. scrofa* Germ. s. Kbg. (Pfeil).

*E. nigrinus* Pk. n. Wilkie (Ltz.).

*Megapenthes subearinatus* Germ. s. s. auf Tannen, Kbg. (Pfeil).

*Cryptohypnus riparius* Fabr. n. h. Palmburg am Pregel (Ltz.).

*C. 4 pustulatus* Fabr. h. auf den Dünen, Pillau-Cranz (Ltz.), Hgbl. (Stnr.).

- C. elongatus* Redt. s. Dz. (Helm).  
*C. pulchellus* L. n. s. am Fuss der Dünen unter trockenen Blättern, Schwarzort, Cranz (Ltz.).  
*C. sabulicola* Boh. n. s. ebenso, Dz. (Helm, Czvw.).  
*C. dermestoides* Hbst. tetragraphus Germ. s. Putzig, am Seestrande (Stf.), Pillau (Sauter).  
*C. lapidicola* Germ. wird von Zebe als pr. angeführt.  
*Cardiophorus thoracicus* Fabr. s. Sieb.  
*C. ruficollis* L. n. s. auf Tannen, Bludauer Forst (Ltz.).  
*C. rufipes* Fourer. s. Dz. (Ltz.).  
*C. ebeninus* Germ. s. Dz., im Grebbiner Walde (Dommer).  
*C. atramentarius* Er. wird von Zebe als pr. angeführt.  
*C. musculus* Er. n. s. bei Pillau auf den mit spärlichem Grase bewachsenen Dünen, Juni (Ltz.), Neubäuser (Str.).  
*C. asellus* Er. n. h. Dz. (Helm), Neubäuser (Hensche), Neustadt (Fritzen) auf jungen Kiefern im Mai, Juni.  
*C. cinereus* Hbst. n. s. Pillau (Sauter, Str.), Ludwigsort auf Sandboden (Ltz.).  
*C. equiseti* Hbst. n. s. ebenso.  
*Melanotus (Cratonychus) niger* Fabr. s. Kug. Sieb.  
*M. brunripes* Germ. s. Sieb.  
*M. castanipes* Pk. h. auf Corylus, Kbg. (Sauter, Ltz.).  
*M. rufipes* Hbst. mit var. *bicolor* Fabr. n. s. ebenso, F. F. (Str.), Neustadt (Fritzen).  
*M. crassicollis* Er. s. Neustadt (Fritzen).  
*Limonius nigripes* Gyll. s. h. auf Weidengesträuch, Kbg. (Ltz.).  
*L. cylindricus* Pk. s. h. ebenso.  
*L. minutus* L. s. Sieb.  
*L. parvulus* Pz. s. Neumark in Westpr. (Janke teste Kramer).  
*L. lythroides* Germ. s. Ggbg. (Kr.).  
*L. Brueteri* Pz. s. im Radaunethal auf Blumen (Dommer).  
*Athous rufus* Deg. s. unter Kiefernholzstapeln, Dz., Elbing, Thorn (Sieb.); Kahlberg, Schwarzort (Ltz.).  
*A. niger* L. *hirtus* Hbst. *pubescens* Koch mit var. *scrutator* Hbst. h. auf Gebüsch, Kbg. (Ltz.).  
*A. haemorrhoidalis* Fabr. g. überall.  
*A. vittatus* Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.), var. *semipallens* Muls. Neustadt (Fritzen).  
*A. longieollis* Oliv. s. Sieb.  
*A. trifasciatus* Hbst. *bifasciatus* Gyll. s. s. Kbg. (Kug.), Ohra bei Danzig (Sieb.).  
*A. subfuscus* Müll. *analis* Fabr. g. überall.  
*A. Zebei* Bach. n. s. bei Putzig (Stf.).  
*Corymbites pectinicornis* L. n. s. auf blühenden Ripsfeldern Kbg. (Ltz.).  
*C. aeruginosus* Fabr. s. Pröbbernau auf d. frischen Nehrung (Schindowsky), Dz. (Helm).  
*C. haematodes* Fabr. s. s. in den Wäldern bei der Allensteinschen Glashütte (Kug.), Cadienen (Sieb.).  
*C. castaneus* L. s. Rossitten (Nanke), Dammhof, Blaustein (Ltz.).  
*C. tessellatus* Fabr. *assimilis* Gyll. s. h. auf Gebüsch und Wiesen Kbg. (Ltz.).  
*C. holosericeus* Oliv. h. ebenso.  
*Diacanthus impressus* Fabr. n. h. Dammhof (Ltz.), Dz. (Dommer, Frantzius).  
*D. metallicus* Pk. n. s. auf jungem Nadelholz Kbg. (Ltz.), Putzig (Stf.).  
*D. melancholicus* Fabr. s. Dz. auf Blumen (Dommer).  
*D. aeneus* L. h. unter Steinen, Kbg. (Ltz.), ebenso die var. *germanus* L. u. *nitens* Scop.  
*D. latus* Fabr. n. s. bei Ggbg. (Kr.), Dz., Ktzn. (Czvw.), var. *milo* Germ. Neustadt (Fritzen).  
*D. cruciatus* L. n. s. Neuhausen, Fuchshöfen (Ltz.).  
*D. bipustulatus* L. n. h. Conitz (Sieb.), Neustadt (Fritzen), an laufenden Birkenstellen im Mai, Blaustein (Ltz.), Aweiden (Str.), ebenso die ganz rothgelbe var., die häufiger zu sein scheint, Fehstein (Ltz.).  
*Ladius ferrugineus* L. s. s. Kug. Sieb.  
*Ectinus aterrimus* L. h. auf Gebüsch (Ltz.).  
*Agriotes sputator* L. *graminicola* Redt. h. auf Wiesen (Ltz.).  
*A. lineatus* L. h. ebenso.  
*A. obscurus* L. h. ebenso.  
*A. ustulatus* Schall. var. *sputator* Redt. s. Neustadt (Fritzen).  
*Dolopius marginatus* L. h. auf Gebüsch.  
*Sericosomus brunneus* L. *fugax* Fabr. n. s. Conitz (Sieb.), auf Nadelholz, Margen (Ltz.).  
*Synaptus filiformis* Fabr. n. h. Elbing (Eld.), Cranz (Ltz.).

*Adrastus pallens* Fabr. limbatus Pk. pusillus Hbst. s. h. überall.

*A. lateralis* Er. s. Kbg. (Ltz.), Wehlau (Sauter), fehlt bei Stein u. W.

*Campylus linearis* L. mesomelas L. n. h. auf Weiden, Ellern, Eschen (Kug.), Dammhof (Ltz.).

### Dascillidae.

*Dascillus cervinus* L. n. h. auf Buchenstubben (Kug.), am Seestrände (Ltz., Eld.).

*Helodes pallidus* Fabr. h. Kbg. (Ltz.).

*H. marginatus* Fabr. s. Kbg. (Kug.), Dz. (Dommer).

*H. lividus* Fabr. n. s. Lyck, in der Milchbuder Forst (Sanio), Kbg. (Ltz.).

*H. Bohemanni* Mannh. s. bei Neuhäuser von einem Gymnasialschüler (Hensche) gefunden, Neustadt (Fritzen).

*Cyphon coarctatus* Pk. n. s. Kbg. (Ltz.).

*C. nitidulus* Thoms. s. Neustadt (Fritzen).

*C. palustris* Thoms. s. ebenso.

*C. fuseicornis* Thoms. s. ebenso (fehlt bei Stein u. W.).

*C. padi* L. g. überall auf Nadelholz.

*C. variabilis* Thunb. pubescens Fabr. ebenso.

*C. pallidulus* Boh. n. h. auf Weiden, Rauchen (Ltz.), F. F. (Czw.).

*Prionocyphon serricornis* Müll. s. Schellmühle bei Danzig (Dommer, Frantzius).

*Hydrocyphon deflexicollis* Müll. s. Fehstein (Sauter).

*Scirtes hemisphaericus* L. h. Kbg. auf Pregelwiesen (Ltz.).

*S. orbicularis* Pz. h. ebenso, wahrscheinlich nicht eigene Art, da Übergänge vorhanden (Czw.).

*Eucinetus haemorrhoidalis* n. n. auf den Dünen bei Heub. unter dürrer Laube (Dommer, Helm), Ggbg. (Kr.), unter verrottendem Stroh, Ktzn. (Czw.).

*Eubria palustris* Germ. n. h. auf Wasserpflanzen an sumpfigen Stellen, Pampauer Thal bei Leesen (Dommer), Ggbg. (Kr.).

### Thelephoridae.

*Thelidion papilla* (Ksw. in Berl. Ent. Zt. 1860 p. 95).

*Dictyoptera sanguinea* L. n. s. F. F., Katharinenhof (Ltz.).

*Eros Aurora* Hbst. n. s. ebenso, einmal bei Osterode auf Buchenstöcken s. h. (Kug.), Dammhof (Stnr.).

*E. minutus* Fabr. n. h. in allem Buchenholz (Kug.), Kbg. (Ltz., Stnr.).

*E. affinis* Pk. s. Heilsberg (Sieb.), Hlgbl. (Stnr.).

*Lampyrus noetiluca* L. n. s. unter Gebüsch in Moose, Georgenswalde (Ltz.), durch die ganze Prov. verbreitet, var. Bellieri Reiche Neustadt (Fritzen).

*L. splendida* L. n. s. ebenso, Reimannsfelde (Ltz.).

*Phosphaenus hemipterus* Geoffr. s. Leesen bei Danzig (Sieb.), Schromb. (Czw.), Warnicker Park (Ltz.), Kbg. Landgraben (Eld.), nasser Garten (Czw.), var. braehypterus Motsch. Neustadt (Fritzen).

*Podabrus alpinus* Pk. n. s. auf jungen Kiefern, Capornsehe Haide (Ltz.), Oliva, Zoppot (Helm), var. ruhens F. Neustadt (Fritzen).

*Thelephorus violaceus* Pk. s. Kbg. im botanischen Garten, Georgenswalde (Czw.).

*T. fuscus* L. g. überall, bes. auf Doldengewächsen u. an Kornähren.

*T. rusticus* Fall. g. ebenso.

*T. obscurus* L. g. ebenso.

*T. nigricans* Müll. h. Margen (Ltz.).

*T. pellucidus* Fabr. h. Kbg. (Ltz.).

*T. lividus* L. dispar Fabr. h. ebenso.

*T. assimilis* Pk. dilatatus Redt. s. Putzig (Stf.).

*T. clypeatus* Illig. n. s. Kbg. (Ltz.).

*T. figuratus* Mannh. s. Dz., Heub. auf torfigen Waldwiesen, Neustadt (Czw., Fritzen).

*T. rufus* L. lituratus Fall. bicolor Pz. h. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).

*T. thoracicus* Oliv. fulvicollis Redt. g. überall.

*T. flavilabris* Fall. s. Dz. (Dommer).

*T. paludosus* Fall. n. s. Dammhof (Ltz., Stnr.), Neustadt (Fritzen).

*T. oralis* Germ. lateralis Gyll. h. Wicken bei Domnau (Sauter), F. F. (Stnr.).

*T. pilosus* Pk. n. h. Wilkie (Sauter), Putzig (Stf.), Masuren (Mühl).

*T. prolixus* Märk. s. Neustadt (Fritzen).

- T. fulvicollis* F. ebenso.  
*Rhagonycha melanura* Oliv. g. auf Garten-  
spiräen.  
*R. fuscicornis* Oliv. n. h. Kbg., Eichen-  
krug, Oliva (Czw.).  
*R. testacea* L. g. überall.  
*R. pallipes* Fabr., *pallida* Fabr. h. Kbg.  
(Ltz.).  
*R. atra* L. n. s. Dammhof (Ltz.).  
*R. elongata* Fall. *paludosa* Redt. n. h.  
Metgethen (Ltz., Stnr.).  
*Silis nitidula* Fabr. *spenicollis* Charp. n.  
h., die ♀ s. Dammhof (Ltz.).  
*S. ruficollis* Fabr. s. s. Kbg. auf einer  
Holzwiese (Czw.).  
*Malthinus flaveolus* Pk. h. auf jungen Eichen  
(Ltz.).  
*M. fasciatus* Oliv. s. Neustadt (Fritzen).  
*M. biguttulus* Pk. h. ebenso.  
*M. frontalis* Marsh. s. Ggbg. (Kr.)  
*Malthodius sanguinolentus* Fall. n. s. Dz.  
(Dommer), Kbg. (Ltz.).  
*M. pellucidus* Ksw. s. Sieb.  
*M. nigellus* Ksw. s. Schromb. (Czw., Stnr.)  
*M. marginatus* Latr. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*M. crassicornis* Mäkl. s. Neustadt (Fritzen).  
*M. dispar* Germ. ebenso.  
*M. flavoguttatus* Ksw. s. Oliva (Czw.).  
*M. misellus* Ksw. n. s. auf Doldengewächsen,  
Kbg. (Sauter, Ltz.).  
*M. fibulatus* Ksw. s. 2 ♂ Juni 1867 Geor-  
genswalde (Czw.).  
*M. mysticus* Ksw. n. h. Kbg. (Ltz.).  
*M. trifureatus* Ksw. s. F. F. Juli 1867  
(Czw.).  
*M. guttifer* Ksw. s. Neustadt (Fritzen).  
*M. brevicollis* Pk. h. auf *Vaccinium*. Kbg.  
(Ltz.).  
*M. spathifer* Ksw. n. s. F. F., Oliva (Czw.,  
Stnr.), Neustadt (Fritzen).  
*Drilus concolor* Ahr. s. s. Dz. (Sieb.), Rau-  
schen (Stnr.).  
*Hapalochrus femoralis* Er. s. vom Dünen-  
grase geschöpft, Heub. (Helm), Schwarzort,  
Cranz (Ltz.), Memel (Stnr.); bei Glettkau hat  
ihn Czw. mit Tabaksdampf aus dichten Büschen  
von *Elymus arenarius* erhalten.  
*Malachius aeneus* L. auf Blumen g. überall.  
*M. bipustulatus* L. ebenso.  
*M. scutellaris* Er. s. Dz. (Stf.).
- M. viridis* Fabr. h. Kbg. (Ltz.).  
*M. marginellus* Oliv. n. h. Rosenau bei  
Kbg. (Ltz.), Neuhausen (Stnr.).  
*M. elegans* Oliv. n. h. ebenso, Wehlau  
(Sauter).  
*M. pulicarius* Fabr. s. h. Kbg. (Ltz.).  
*M. rubricollis* Marsh. s. Dz. (Dommer).  
*Anthocomus sanguinolentus* Fabr. n. h.  
Juditten, Wilkie (Eld.), Ggbg. (Kr.).  
*A. equestris* Fabr. s. h. Kbg. (Ltz.)  
*A. fasciatus* L. h. ebenso.  
*Ebaeus pedicularius* Schrk. g. überall.  
*E. appendiculatus* Er. s. s. Westpr. (Strü-  
bing, Berl. Ent. Z. IV. p. 322) 1 ♂.  
*E. flavipes* Fabr. s. Sieb.  
*Charopus pallipes* Oliv. s. h. überall.  
*C. flavipes* Pk. s. Neustadt (Fritzen).  
*Dasytes niger* L. n. s. Kbg. (Ltz.), Neustadt  
(Fritzen).  
*D. coeruleus* Deg. *cyaneus* Fabr. s. Trenker  
Waldhaus (Ltz.).  
*D. plumbeus* Müll. *flavipes* Fabr. g.  
überall.  
*D. fuscus* Illig. n. h. Kbg. (Ltz.); Ra-  
daunethal, bei Kahlbude (Dommer).  
*Dolichosoma lineare* Rossi. s. h. auf Dünen-  
gräsern, Rauschen, Schwarzort, Cranz (Ltz.).  
*Haplocnemus tarsalis* Sahlb. n. h. Putzig  
(Stf.), Kbg. (Ltz.).  
*H. nigricornis* F. n. s. Pampauer Thal  
(Dommer), Kbg. (Ltz.), Schromb. (Czw.).  
*H. basalis* Küst. s. s. Lyck, I St. (Sanio).  
*Julistus floralis* Oliv. s. Conitz (Sieb.).  
*J. memnonius* Ksw. s. Schwarzort auf  
einer blühenden Linde u. auf Espen (Ltz.), Heub.  
(Czw.).  
*Byturus fumatus* Fabr. h. auf *Rubus idaeus*,  
Kbg. (Ltz.).  
*B. tomentosus* Fabr. h. ebenso.

### Cleridae.

- Tillus elongatus* L. n. h. Osterode, auf  
*Chaerophyllum silvestre* (Kug.), Rauschen (Ltz.).  
*Opilo mollis* L. n. s. in Häusern auf frischen  
Dielen, Kbg. (Ltz.), im Freien an einer Pappel  
bei Putzig (Czw.).  
*O. domesticus* St. n. h. ebenso, Dz. (Czw.),  
Neustadt (Fritzen).

*Clerus mutillarius* Fabr. Osterode, auf Schirmblumen (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

*C. formicarius* L. s. h. an Kiefern-Klafterholz (Ltz.).

*C. rufipes* Brahm. *substriatus* Gebl. s. ebenso, Blaustein (Ltz.), Putzig (Stf.).

*Tarsostenus (Opilo) univittatus* Rossi. s. s. Danzig, aus morschem Weidenholz erzogen (Stf.).

*Trichodes alvearius* Fabr. s. s. Osterode (Kug.), Dz. (Kumm).

*T. apiarius* L. h. auf Gartenspiräen (Ltz.).

*Corynetes coeruleus* Deg. n. s. Kbg. (Ltz.).

*Necrobia violacea* L. h. in thierischen Abfällen (Ltz.).

*Opetiopalpus scutellaris* Panz. n. h. Osterode, auf *Coronilla varia* (Kug.); an Scheunenwänden, Liep, Margen (Ltz.), Ktzn. (Czw.).

*Hydrocoetus dermestoides* L. proboscideus F. morio F. s. Cadienen, Pr. Holland, Braunsbg. (Sieb.), h. in Buchenstubben bei Neustadt (Fritzen).

*H. flabellicornis* Uddm. s. in Bohrlöchern der zweijährigen Abiesstubben, Mai. Zinten, Dammhof, Blaustein (Ltz.), F. F. (Czw.), Hlgl. (Stnr.).

*Lymexylon navale* L. s. im Holz alter Eichen, Moosbude, Elbing auf dem Schiffsbauplatze (Ltz.), Putzig, aus morschem Holz erzogen (Stf.).

## Ptinidae.

*Hedobia imperialis* L. s. Osterode, in alten Weiden u. Linden (Kug.), Fchstein (Ltz.).

*Pinus dubius* St. *crenatus* Pk. s. ♂ im Harzfluss einer Abies, F. F. (Czw.), im Winter unter Pinusrinde Neustadt (Fritzen).

*P. rufipes* Fabr. *elegans* Illig. h. auf Eichen, Pilzenkrug (Ltz.).

*P. coarcticollis* St. s. s. in einem Hause in Danzig, Ostern 78, 1 St. ♂ (Czw.).

*P. bicinctus* St. s. Ggbg. (Kr.).

*P. fur* L. g. leider überall.

*P. pilosus* Müll. *pallipes* Dft. s. Dz. Schweinsköpfe, unter Eichenrinde (Helm), Schwarzort (Czw.).

*P. latro* Fabr. s. ebenso, und in Häusern (Fritzen).

*P. raptor* St. *bidens* Thoms. s. Neustadt (Fritzen), Löwenhagen an einer alten Weide (Ltz.).

*P. pusillus* St. s. Liep (Ltz.), Jäschkenthal (Czw.).

*P. suppiliosus* St. s. i. Häusern, Dz. (Fritzen).

*Niptus crenatus* Fabr. n. h. Dz. (Ltz., Czw.).

*N. hololeucus* Fald. s. s. Neustadt (Fritzen) in einem Spinngewebe.

*Mezium affine* Boield. s. s. einmal in einem alten Herbarium gefunden (Sieb.).

*Gibbium scotias* Fabr. s. s. Dz. (Kug., Sieb.).

## Anobiidae.

*Dryophilus pusillus* Gyll. n. s. Putzig auf Kiefernspossen (Stf.), Schwarzort (Ltz.), Neuhäusen, F. F., Vierbrkr. (Stnr.).

*Priobium castaneum* Fabr. s. s. Osterode, an alten Eichen (Kug., Sieb.).

*Anobium pertinax* L. h. in Häusern (Ltz.).

*A. striatum* Oliv. h. ebenso.

*A. fulvicorne* St. h. an Buchen u. Ellern Neustadt (Fritzen); var. *rufipenne* Dft. s. Kbg. (Ltz.).

*A. nitidum* Hbst. n. s. Dz. (Dommer), Glettkau (Czw.), Kbg. (Ltz.).

*A. emarginatum* Dft. s. Wehlau (Sauter), Blaustein (Ltz.).

*A. rufipes* Fabr. n. h. an Eichen, Rauschen (Ltz.), an Erlen, Glettkau (Czw.).

*A. paniceum* L. h. bei Bäckern u. Brauern (Ltz.).

*A. tessellatum* Fabr. n. h. Osterode, in altem Weidenholz (Kug.); auf Linden u. Eichen, Kbg. (Ltz.), Vierbrkr. (Stnr.).

*A. plumbeum* Illig. s. s. Osterode (Kug.), aus Fichtenzweigen gezogen, aus denen der Käfer im April erschien, Neustadt (Fritzen).

*Ermobius abietinus* Gyll. s. Blaustein, auf Abies (Ltz.), Putzig (Stf.), F. F. (Stnr.).

*E. angusticollis* Ratz. s. Dz. (Helm).

*E. abietis* Fabr. n. s. Wilkie (Eld.), Rauschen, Arnau (Stnr.).

*E. mollis* L. n. s. ebenso, Blaustein (Ltz.), Kbg. (Stnr.).

*E. pini* Muls. s. Kbg. (Sauter), Dz. (Helm).

*E. parens* Muls. s. s. Schromb. 1 St. ((Czw.), Neustadt (Fritzen).

*E. parvicollis* Muls. s. Kbg. (Ltz.), F. F. (Stnr.).

*E. longicornis* St. s. Kbg. (Ltz., Sauter), Neustadt (Fritzen), aus Pinus gezogen.

- E. fuscus* Muls. s. Kbg. Plantage (Czw.), Ggbg. (Kr.).
- E. nigrinus* St. s. Pr. Stargard (Sieb.), Ggbg. (Kr.), Dz. (Helm).
- Oligomerus brunneus* Oliv. s. an alten Eichen, Moosbude (Ltz.).
- Gastrallus laevigatus* Oliv. immarginatus Redt. s. ebenso.
- G. sericatus* Lap. s. s. Kbg. (Ltz.).
- Ptilinus pectinicornis* L. s. h. in Bohrlöchern alter Weiden, Juli, Cranz, Rauschen (Ltz.).
- P. costatus* Gyll. h. ebenso.
- Trypopytus carpini* Hbst. serricornis Dft. s. Moosbude, Margen (Ltz.), Neuhausen, Metgethen (Str.).
- Xyletinus ater* Pz. s. in faulem Holze, Putzig (Stf.), Schwarzort (Ltz.).
- X. pectinatus* Fabr. n. s. in vermodertem Eichenholz, Osterode (Kug.), Moosbude (Ltz.), Pr. Stargard (Schmidt).
- X. laticollis* Dft. s. Pampauer Thal (Dommer).
- Doreatoma dresdensis* Hbst. s. in Schwämmen an Eichen und Buchen, Osterode (Kug.), Schwarzort, Blaustein (Ltz.).
- D. chrysomelina* St. n. s. auf Eichen, Neukuhren, Schwarzort, Moosbude (Eld., Ltz.).
- D. flavicornis* Fabr. n. s. ebenso.
- D. bovistae* Hoffm. s. Cadienen (Stf.), Blaustein (Ltz.), Memel (Str.).
- D. affinis* St. s. s. auf Eichen, Wehlau (Mühl), Ggbg. (Kr.).
- D. subglobosa* Muls. s. Kbg. (Kraatz Berl. E. Z. XV. p. 148); auf Eichen, Loppennen (Eld.).
- D. rubens* Hoffm. s. s. aus faulem Eichenholz gezogen, Putzig (Stf.), aus Buchen (Fritzen).
- Sphindus dubius* Gyll. Gyllenhalii Chevrol. s. in Staubpilzen auf alten Stubben, Sperlings (Eld.), Warnicken, Fuchshöfen (Ltz.), F. F. (Str.).
- Aspidiphorus orbiculatus* Gyll. n. s. Loppennen, Fuchshöfen (Eld., Ltz.), Putzig (Stf.), F. F., Vierbrkr. (Str.).
- Apate capucina* L. n. h. in altem Eichenholz. Elbing, Braunsberg (Sieb.), Wernsdorf, Craam (Ltz.), Hlgl. (Str.).
- Dinoderus elongatus* Pk. Osterode in altem Eichenholz (Kug.), bisher nicht wieder gefunden.
- Lyctus fuscus* L. canaliculatus Fabr. pubescens Pz. Dft. n. s. in alten Weiden, Löwenhagen (Ltz.).
- Cis boleti* Scop. g. in Schwämmen.
- C. micans* Hbst. h. Grebbiner Wald (Dommer), Kbg. (Ltz.).
- C. hispidus* Pk. g. wie boleti.
- C. elongatulus* Gyll. s. Neustadt (Fritzen).
- C. laminatus* Mell. s. in faulendem Holze, Putzig (Stf.).
- C. bidentatus* Oliv. s. Osterode (Kug.), Warnicken (Ltz.).
- C. nitidus* Hbst. n. s. Kbg. im Schwamm einer alten Esche (Pfeil), Warnicken (Ltz.).
- C. Jacquemartii* Mellié. s. Neustadt (Fritzen).
- C. alni* Gyll. n. h. auf Erlen, Warnicken (Ltz.).
- C. festivus* Pz. h. wie boleti: auffallend ist im Catalog die Bezeichnung Alp. P., da das Thier in Dtschld. sehr häufig ist. Kiesw. K. D. IV. 186.
- Rhopalodontus perforatus* Gyll. s. in einem Birkenschwamm, Labiau (Mühl).
- R. fronticornis* Pz. h. Kbg. (Ltz.).
- Enncarthron affine* Gyll. h. ebenso.
- E. cornutum* Gyll. n. s. Wicken bei Domnau (Sauter), Kbg. (Ltz.).
- Ocotommus mandibularis* Gyll. s. ebenso.
- O. glabriculus* Gyll. h. Kbg. (Ltz.).

### Teucrionidae.

- Blaps mortisaga* L. n. s. in stockigen Stuben, Kellern, Rauschen (Ltz.).
- B. fatidica* St. obtusa Curt. s. Culmsee (Janke teste Kramer), Dz. (Ltz.).
- Crypticus quisquilius* L. h. auf dem Dünen- sande kriechend, Pillau (Ltz.).
- Pedinus femoralis* L. wird zwar von Kug. aus „Südpreussen“ angeführt, dies gehörte jedoch nicht zu dem jetzigen Pr.; er ist auch in der Prov. nicht weiter gefunden worden.
- Heliopates gibbus* Fabr. s. h. auf den Sanddünen, Pillau u. Dz. (Ltz., Czw.).
- Opatrum sabulosum* L. s. h. überall.
- Microzoum tibiale* Fabr. h. Dünenkäfer.
- Bolitophagus reticulatus* L. erenatus Fabr. s. in Baumschwämmen (Kug.), Warnicken (Ltz.).
- Heledona agaricola* Pz. s. h. ebenso.

*Diaperis boleti* L. n. s. ebenso, Georgenswalde (Ltz.).

*Hoplocephala haemorrhoidalis* Fabr. s. s. im zunderartigen Schwamm einer alten Buche bei der Allensteinschen Glashütte (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

*Scaphidema bicolor* Fabr. s. s., zuerst 1794 in Angerburg unter der Rinde eines abgestorbenen Pflaumenbaumes gefunden (Nanke), Kbg. (Dommer, Ltz.), Aweiden (Strn.).

*Platyedema violaceum* Fabr. s. Grebbiner Wald, in Moos an Eichen (Dommer), Putziger Stadtwald (Stf.), Neustadt (Fritzen).

*Alphitophagus 4-pustulatus* Steph. einmal h. Gbg. (Kr.).

*Pentaphyllus testaceus* Hellw. n. h. in morschem Eichenholz, Moosbude (Ltz.), Bantau (Dommer), in alten Weiden, Neustadt (Fritzen).

*Tribolium ferrugineum* Fabr. *castaneum* Hbst. s. Putzig (Stf.), in Kleie bei Bäckern in Neustadt (Fritzen).

*T. madens* Charp. s. lebt in Scheunen und Strohdächern (Dommer, Fritzen).

*Hypophloeus depressus* Fabr. an alten Eichen Moosbude (Ltz.), Dz. (Helm).

*H. castaneus* Fabr. n. h. unter Buchenrinde, auch in Schwämmen, Osterode (Kug.), Warnicken, Elbing (Eld.).

*H. fraxini* Kug. n. s. im Holz alter Eschen, Osterode (Kug.); unter Tannenrinde, Samitten (Ltz.).

*H. pini* Pz. s. s. Lyck (Sanio).

*H. suturalis* Pk. s. Kapkeim (Ltz.), Masuren (Mühl), Grünhöfchen bei Hlgl. (Czw.).

*H. bicolor* Oliv. s. Hlgl. (Seydler), Putzig (Stf.).

*H. fasciatus* Fabr. s. an Eichen bei Moosbude (Pfeil, Ltz.).

*H. linearis* Fabr. s. Kbg. (Pfeil), Gbg. (Kr.).

*Uroma culinaris* L. s. in altem Holz und unter Rinde (Kug.), unter Holzspähnen in der Tueler Haide (Schmidt), unter Pinusrinde bei Hela (Fritzen).

*Heterophaga dia perina* Pz. s. s. Kbg. unter Kiefernrinde (Kug.), Gr. Zünder an einem hölzernen Gebäude (Dommer).

*Upis ceramboides* L. in einer Sammlung pr. Käfer 4 St. gesehen (Kug.), aber nicht wieder gefunden.

*Tenebrio obscurus* Fabr. s. Masuren, Mai 1863 (Mühl), Neustadt (Fritzen).

*T. molitor* L. s. h. bei Bäckern im Mehl.

*T. pieipes* Hbst. *transversalis* Dft. s. unter morscher Eichenrinde, Masuren (Mühl), Neustadt (Fritzen).

*Menephilus curvipes* Fabr. *loripes* Illig. s. s. Osterode, an einem Eichenstubben, Kbg. unter Weidenrinde (Kug.), Dz. (Sieb.).

*Helops lanipes* L. s. s. in Wäldern, Osterode (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

*H. quisquilius* Fabr. s. Lyck (Sanio), Gbg. (Kr.), Heub. (Sieb.).

### Cistelidae.

*Allecula morio* Fabr. s. in faulem Eichenholz, Oliva, Putzig (Stf.).

*Cistela fulvipes* Fabr. s. Kug., Sieb.

*C. ceramboides* L. s. Schwarzort (Ltz.), Vierbrkr. (Strn.).

*C. saperdoides* Küst. s. s. Sieb.

*C. rufipes* Fabr. s. Dz. (Ltz.).

*C. murina* L. *thoracica* Fabr. *evonymi* Fabr. n. s. auf *Evonymus europ.*, Kbg. (Ltz.).

*Prionychus ater* Fabr. n. h. Fuchshöfen (Ltz.), Glettkau an alten Weiden (Czw.).

*Hymenorus Doublieri* Muls. s. s. einmal im Juni 1862 in Masuren in morschem Eichenholz (Mühl); das Vaterland ist das südliche Frankreich (Berl. Ent. Z. VII. 233).

*Myectochares axillaris* Pk. *morio* Redt. s. Moosbude (Pfeil), an Eichenschwämmen, Liep (Ltz.).

*M. flavipes* Fabr. *humeralis* Fabr. *bimaculata* Mannh. s. Moosbude (Ltz.), Neustadt (Fritzen).

*M. bipustulata* Illig. *seapularis* Gyll. n. s. an Weiden- und Hainbuchenstämmen, ebenso.

*M. barbata* Latr. *brevis* Pz. n. s. ebenso, Arnau (Strn.).

*Ctenopus sulphureus* L. h. Osterode, Zoppot, Elbing (Ltz.); seltener ist var. *bicolor* Fabr. auf *Matricaria*, Westpr. (Strübing Berl. Ent. Z. IV. 322).

*Omioplus pinicola* Redt. n. h. Ludwigsort (Sauter), Gbg. (Kr.), Dz. (Ltz.), Braunsbg. (Strn.).

*O. lepturoides* Fabr. s. Osterode (Kug.), auf jungen Kiefern Dz. (Sieb.), von Fritzen bezweifelt.

### Lagriidae.

*Lagria hirta* L. h. auf Gesträuchen.

### Melandryidae.

*Tetratoma fungorum* Fabr. s. im Schwamm einer alten Birke, Osterode (Kug.), Dz. (Helm, Ltz.).

*T. ancora* Fabr. s. an Carpinus, Grebbiner Wald (Dommer), Kleinhaide (Eld.), Neustadt (Fritzen).

*Eustrophus dermestoides* Fabr. n. s. in Schwämmen an Weiden und Eichen, Osterode (Kug.), Moosbude (Ltz.), Glettkau (Czw.), Holstein (Stnr.).

*Orchesia micans* Pz. s. in Buehenschwämmen, Osterode (Kug.), Dz. (Dommer), Wilkie (Eld.), Dammhof (Stnr.).

*O. luteipalpis* Muls. s. s. aus einem Baumschwamm gezogen, Neustadt (Fritzen).

*O. sepieola* Rosenh. s. aus trockenem Laube Ggbg. (Kr.), Dz. (Helm).

*O. fasciata* Pk. n. h. von einer Carpinus geklopft, Fehstein (Ltz.), Osterode (Kug.), Dz. (Dommer), Wilkie (Eld.).

*Hallomenus humeralis* Pz. n. h. in Schwämmen an versch. Bäumen, Gr. Zünder (Dommer), Kbg. nasse Garten (Ltz., Stnr.).

*H. fuscus* Gyll. s. Ggbg. (Kr.).

*Abdera 4-fasciata* Curt. s. s. 2 St. von einer Eiche in der Brandenburger Haide geklopft, Juli 1876 (Ltz.).

*A. triguttata* Gyll. s. s. unter Kiefernrinde bei Pr. Stargard (Schmidt).

*A. affinis* Pk. s. s. an Ellern in einem den Stamm überziehenden Pilz, aus welchem der Käfer im April und Mai sich entwickelt, Putzig (Stf.), Neustadt (Fritzen).

*A. flexuosa* Pk. s. in morschen Erlenstöcken, Masuren (Mühl), Corjeiten (Ltz.), Dz. (Helm).

*Anisoxya fuscula* Illig Osterode (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

*Diracca 4-maculata* Illig. 4-guttata Pk. ebenso.

*D. discolor* Fabr. n. h. an Stubben in der Caporn. Haide, Medenauer Wald, Wilkie (Eld.), Putzig (Stf.), Wehlau (Mühl), Vierbrkr. (Stnr.).

*Serropalpus barbatus* Schall. s. Osterode (Kug.), Kbg. (Ltz.), Hgbl. (Fritzen).

*Hypulus quereinus* Quens. s. an alten Eichen u. Ahorn im Grebbiner Walde (Dommer), Wehlau (Mühl), Neustadt (Fritzen).

*H. bifasciatus* Fabr. s. Braunsbg., Conitz (Sieb.), Dammhof (Ltz.), F. F. (Stnr.).

*Melandrya caraboides* L. s. Elbing (Sieb.), Gelguhn (Ltz.).

*M. canaliculata* Fabr. s. Labiau (Nanke, Eld.); unter Pappel- und Birkenrinde, Masuren (Mühl).

*M. flavicornis* Dft. s. Kug., Sieb.

*Platyganophilus nigri ventris* Hampe s. s. 1 St in der Forst Klein-Nuhr (Dossow).

*Scroptia fuscula* Müll. s. am Abende fliegend in Kiefernwaldungen (Dommer).

### Anthicidae.

*Notoxus monoceros* L. s. h. überall.

*Anthicus humilis* Germ. s. Rauschen, Juli (Ltz.).

*A. bimaculatus* Illig. n. h. Dünen bei Heub. (Sieb.), Haffufer bei Schwarzort (Ltz.).

*A. floralis* L. h. an Scheunenwänden, Liep (Ltz.), Ktn. (Czw.).

*A. bifasciatus* Rossi. s. im Sande, überwintend an Kastanienstämmen (Dommer).

*A. sellatus* Pz. n. s. Schwarzort am Haffstrande (Ltz., Stnr.), Pillau (Nanke, Eld.), Dz. (Dommer).

*A. graecilis* Pz. s. Ktn. (Czw.), Neuhäuser (Stnr.).

*A. antherinus* L. n. h. Georgenswalde (Ltz.).

*A. 4-guttatus* Rossi. s. s. Sieb.

*A. hispidus* Rossi. s. s. Cranz, am Seestrande (Stf.).

*A. ater* Pz. s. einmal 3 St. am Seestrande bei Zoppot (Ltz.), Kbg. (Sauter, Stnr.).

*A. luteicornis* Schmidt s. s. 1 St. am Pregeldamm (Ltz.).

*A. flavipes* Pz. h. am Haffstrande, Pillau, Schwarzort, Neuhäuser (Ltz., Stnr.).

*Xylophilus amabilis* Sahlb. s. s. Ggbg. (Kr.) Berl Ent. Z. VII. 233, Masuren (Mühl).



*X. pygmaeus* Deg. *fennicus* Mannh. s. s. auf einer Weide bei Glettkau I St. Juli 1871, ein zweites auf einer Pregelwiese 1874 (Czw.), auf Eichenstrauch einmal Neustadt (Fritzen).

*X. populneus* Pz. s. Liep (Ltz.), Putzig (Stf.), Kbg. Plantage (Stnr.).

*X. nigrinus* Germ. n. h. Danziger Nehrung, Putzig (Dommer, Stf.), Schwarzort (Ltz.), Vierbrkr. (Stnr.).

*X. tyrolensis* Gredl. s. s. unter abgefallenen Fichtennadeln auf Sandboden Neustadt (Fritzen).

### Pyrochroidae.

*Pyrochroa coccinea* L. n. s. Hlgbl., Neuhäuser (Stnr.), Elbing, Braunsbg., Pr. Holland (Sieb.), Margen (Ltz.).

*P. rubens* Schall. s. Dz. (Helm), Elbing (Sieb.).

*P. pectinicornis* L. s. Elbing, Braunsbg. (Sieb.), Trenker Waldhaus, Neuhäuser (Ltz.), Dz. (Helm).

### Mordellidae.

*Tomocia biguttata* Gyll. n. h. an morschen Weiden und Eschen Dz. (Helm), an einer abgestorbenen Sorbus Fehstein (Ltz.), Dammhof (Stnr.).

*Mordella guttata* Pk. n. s. in Pilzen auf Eichenstubben, Samitten (Eld., Ltz.), Löwenhagen (Ltz., Czw.).

*M. fasciata* Fabr. h. auf *Spiraea ulmaria*.

*M. aculeata* L. g. ebenso.

*Mordellistena abdominalis* Fabr. *ventralis* Fabr. s. auf *Hypericum perf.* (Kug.); auf Umbellaten, Putzig (Stf.).

*M. grisea* Muls. s. Neustadt (Fritzen).

*M. brunnea* Fabr. s. Albrechtsthal b. Wehlau (Sauter), Dammhof (Stnr.).

*M. humeralis* L. n. s. Warnicken, auf *Spiraea ulm.* (Ltz.), Dammhof (Stnr.).

*M. variegata* Fabr. n. s. ebenso, Glettkau (Czw.).

*M. parvula* Gyll. *pusilla* Redt. *liliputana* Muls. h. Dz. (Czw., Helm), Kbg. (Ltz.).

*M. subtruncata* Muls. *brevicauda* Boh. n. h. Kbg., Dz. (Czw.).

*M. pumila* Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.).

*M. episternalis* Muls. s. Neustadt (Fritzen). *Anaspis phalerata* Germ. s. s. F. F. (Czw.)

I Stück.

*A. frontalis* L. *lateralis* Fabr. s. h. überall.

*A. ruficollis* Fabr. s. Dz. 1867 (Helm).

*A. flava* L. *thoracica* L. h. Kbg. (Ltz.).

*A. rufilabris* Gyll. s. h. überall.

*A. varians* Muls. s. auf blühendem *Craetagus* Schromb., Dz. (Czw.).

*A. brunnipes* Muls. s. Horst bei Fehstein (Stnr.).

### Rhipiphoridae.

*Pelecotoma fennica* Pk. s. in Bohrlöchern alter Weiden und Eichen, bei Neue Bleiche (Künow), Blaustein (Ltz.), Kbg. neue Reifebahn (Czw., Stnr.).

*Meteocus paradoxus* L. s. s. in einem Wespenneste (Frantzius), Landsberg i. Ostpr. (Ltz.).

### Cantharidae.

*Meloe proscarabaeus* L. h. im Frühjahr im Grase (Ltz.).

*M. violaceus* Marsh. n. s. ebenso.

*M. variegatus* Donovan. n. s. Zinten (Ltz.), Dz. (Czw.).

*M. scabriusculus* Brandt n. h. Lyek (Sanio), Kbg. (Ltz.).

*M. brevicollis* Pz. n. s. Kbg. (Ltz.).

*Cerocoma Schaefferi* L. n. s. auf *Chrysanthemum*, Rauschen (Eld., Ltz.); Elbing, Dz., Braunsbg. (Sieb.).

*Cantharis (Lytta) vesicatoria* L. im Süden der Prov. h. auf *Syringa* u. *Fraxinus*, Ggbg. (Kr.).

### Oedemeridae.

*Calopus serraticornis* L. s. unter Baumrinde, Osterode, Dz., Memel (Kug.); Braunsbg., Lyek (Sieb.), Zinten (Ltz.).

*Ditylus laevis* Fabr. s. s. in Erlenstubben, Kupstinen bei Labiau (Max Wahnehaffe), Greibener Forst bei Postnicken (Dossow).

*Nacerdes (Anoncodes) melanura* L. n. h. Kbg. (Ltz.).

*N. adusta* Pz. s. auf Holzplätzen in Dz. (Frantzius, Ltz.).

*N. rufiventris* Scop. einmal h. an einem Holzschuppen am Seeufer, Schwarzort (Ltz.), Elbing (Abs).

*N. ustulata* Fabr. s. wie *adusta*, Kbg. Plantage in Diefen eines Wohnhauses schädlich (Stnr.).

*N. viridipes* Schmidt. s. s. Dz. (Sieb.).

*Asclera coerulea* L. s. Kug. Sieb.

*Oedemera podagrariae* L. n. s. Kbg. (Ltz.)

*O. flavescens* L. h. ebenso.

*O. marginata* Fabr. s. bei Kobbeldude auf dem Silberberge (Kuwert).

*O. croceicollis* Gyll. s. s. am Saspersee bei Danzig (Sieb.).

*O. flavipes* Fabr. s. Sieb.

*O. virescens* L. h. auf Blüten, Kbg. (Ltz.).

*O. lurida* Marsh. g. überall.

*Chrysanthia viridissima* L. s. Lyck (Gortzitza), Putziger Stadtwald (Stf.).

*C. viridis* Schmidt. h. in Laubwäldern im Grase, Schwarzort, Warnicken (Ltz.).

### Pythidae.

*Pytho depressus* L. bei Osterode Ende März recht häufig unter der Rinde gefällter Fichtenstämme (Kug.), sonst s. Lyck (Eld.), Putzig (Stf.), Fuchshöfen (Ltz.), Hlgbl. (Stnr.). Var. *castaneus* F. s. s. (Eld.).

*Boros Schneideri* Pz. *corticalis* Pk. s. s. beim Zersägen grosser Birkenklötze 2 St. gef. Osterode, auch vom Senator Schneider zugeschickt (Kug.), aber bis jetzt nicht wieder gefunden.

### Salpingidae.

*Lissodema denticolle* Gyll. s. einmal unter Eichenrinde, Putziger Stadtwald (Stf.), Kbg. Plantage (Stnr.).

*L. cursor* Gyll. s. Warnicken, 1 St. Juli 1860 (Ltz.).

*Salpingus ater* Pk. s. Grebbiner Wald an Apfelbäumen überwintert (Dommer), Dz. (Ltz.), Juditten (Stnr.).

*S. castaneus* Pz. *piccae* Germ. n. s. Kbg. (Ltz.), Schwarzort (Stnr.).

*S. viridipennis* Latr. *ruficollis* Pz. s. Neustadt (Fritzen).

*S. foveolatus* Ljung. s. s. unter einem Steine bei einer Eiche im Frühjahr 1 St. Moosbude (Ltz.).

*Rhinosismus ruficollis* L. *roboris* Pk. n. s. an Eichenrinde, Dz. (Kumm), Kbg. (Ltz.), Neustadt (Fritzen).

*R. planirostris* Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.); bei Osterode an Eichen (Kug.), auch an *Aesculus* Dz. (Fritzen).

*R. viridipennis* Steph. *ruficollis* Pz. s. Neustadt (Fritzen).

*R. aeneus* Oliv. einmal s. h. 280 St. an Eichenstämmen (Dommer, Berl. Ent. Zt. III. p. XXX), Böttchershöfchen (Ltz.), Juditten (Stnr.), an Ulmen Neustadt (Fritzen).

### Curculionidae.

*Mylacus (Omius) rotundatus* Fabr. s. Ggbg. (Kr.), Dz. (Czw.).

*Otiorrhynchus tenebricosus* Hbst. s. s. Pröbbernau auf der frischen Nehrung (Schindowsky).

*O. niger* Fabr. Osterode (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

*O. irritans* Hbst. Thorn am Weichselufer auf Haseln s. h. (Strübing, Berl. Ent. Zt. IV. p. 322).

*O. laevigatus* Fabr. s. Sieb.

*O. atroapterus* Deg. n. s. bei Putzig auf den Dünen, Juni-Aug. (Stf.), Dz. (Kumm, Czw., Helm).

*O. raucus* Fabr. n. s. auf Gebüsch, Kbg. (Ltz.).

*O. porcatus* Hbst. s. s. Sieb.

*O. septentrionis* Hbst. h. auf Nadelholz (Ltz.).

*O. picipes* Fabr. n. s. wie *raucus*.

*O. gemmatus* Fabr. Kug. im Berl. Manusc. p. 179 ohne Angabe des Fundorts, also sehr zweifelhaft, zumal da das Thier ein südeurop. Gebirgskäfer ist.

*O. lepidopterus* Fabr. wird von Zebe aus Pr. angegeben, möglicherweise richtig, da der Käfer weit verbreitet ist. Seidl. Fn. Balt. p. 400.

*O. sulcatus* Fabr. s. Warnicker Forst, Kbg. Plantage und im botan. Garten (Stnr., Eld.), an *Vitis vinifera* (Hensche).

- O. nigrita* Fabr. n. s. bei Kbg. (Ltz., Czw.),  
h. bei Lyck (Sanio).  
*O. ligustiei* L. zuweilen h. am Seestrande,  
Rauschen (Eld., Ltz.).  
*O. ovatus* L. g. überall.  
*O. rotundatus* Sieb. Dz. zuerst auf dem  
Wege nach Heub. in Wagengeleisen von Sieb.  
entdeckt (Stierlin Berl. Ent. Zt. XVI. 328), dann  
auch von Helm u. Cz. gefunden, von letzterem  
auch bei Oliva am Zaun des Königl. Gartens  
neben dem Wege nach dem Karlsberge, Juli  
1878 sehr zahlreich, aber erst nach Sonnen-  
untergang vorkommend. Sieb. Pr. Prov.-Blätter  
1847 p. 431.  
*Peritelus hirticornis* Hbst. s. Dammhof  
(Sauter).  
*Phyllobius maculicornis* Germ. n. s. Kbg.  
(Ltz.), Kleinhaide (Str.).  
*P. glaucus* Scop. calcaratus Fabr. alneti  
Fabr. brevitarsus Thoms. s. h. auf *Urtica dioica*.  
*P. psittacinus* Germ. h. Kbg. (Ltz.), Lyck  
(Sanio).  
*P. argentatus* L. g. auf *Carpinus*.  
*P. betulae* Fabr. s. Ggbg. (Kr.).  
*P. oblongus* L. g. auf Obstbäumen.  
*P. piri* L. *vespertinus* Fabr. s. h. ebenso.  
*P. scutellaris* Redt. s. Ktzn. (Czw., Seidl.  
Fn. Balt. p. 402).  
*P. pomonae* Oliv. h. Kbg. (Ltz.).  
*P. uniformis* Marsh. n. s. ebenso, auf  
Eichen (Dommer, Frantzius).  
*P. viridicollis* Fabr. n. s. Putzig (Stf.),  
Lyck auf der Karbogiu (Sanio).  
*P. cinereus* Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*P. brevis* Gyll. s. Dz., Neustadt auf *Galium*  
*verum* (Fritzen).  
*P. mus* Fabr. s. s. (Ktzn.) auf Weiden am  
Nogatufer (Czw.), Neustadt (Fritzen).  
*Polydrosus undatus* Fabr. h. auf jungen  
Laubhölzern (Ltz.).  
*P. fulvicornis* Fabr. Kug. im Manusr. II.  
122. II ohne Angabe des Fundorts, bisher nicht  
wieder gefunden.  
*P. impressifrons* Gyll. s. Dz. (Ltz.).  
*P. flavipes* Deg. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*P. coruscus* Germ. n. s. (Helm), Kbg.  
(Ltz.), Ktzn. (Czw.).  
*P. bardus* Gyll. s. Neustadt (Fritzen).  
*P. cervinus* L. h. Kbg., Blaustein (Ltz.).  
*P. confluens* Steph. s. Ggbg. (Kr.).
- P. picus* Fabr. h. wie *undatus*.  
*P. micans* Fabr. n. s. ebenso.  
*P. sericeus* Schall. n. s. ebenso.  
*Metalites atomarius* Oliv. n. h. auf Kiefern,  
Preil (Str.), Lyck (Sanio), Glettkau (Czw.).  
*Scythropus mustela* Hbst. n. h. Kbg. (Ltz.).  
*Sciaphilus muricatus* Fabr. h. auf Nadelholz,  
ebenso.  
*Platytarsus (Omias) setiger* Gyll. *pruinous*  
Schh. n. s. Dz. (Helm, Fritzen).  
*P. hirsutulus* Fabr. auf Gesträuchen, Kbg.  
(Ltz.).  
*Foucartia (Strophosomus) squamulata* Hbst.  
s. Loppehnen (Eld.), Heub. (Czw.).  
*Barypithes (Omias) mollicomus* Ahr. h.  
Heiligenbrunn bei Dz. (Helm, Cz.), Heub.  
(Fritzen).  
*Strophosomus coryli* F. *obesus* Thoms. s. h.  
auf allerlei Gebüschchen.  
*S. obesus* Marsh. g. ebenso.  
*S. faber* Hbst. n. s. auf sandigen Bergen,  
Osterode (Kug.), Ggbg. (Kr.).  
*Eusomus ovulum* Illig. s. auf den Danziger  
Dünen am Riedgrase (Dommer).  
*Brachyderes ineanus* L. h. auf Nadelholz,  
Kbg. (Ltz.).  
*Sitones griseus* Fabr. n. h. F. F. (Str.), auf  
den Pillauer Dünen (Ltz.), Dz. an *Sarothamnus*  
(Czw.).  
*S. flavescens* Marsh. 8-punctatus Germ.  
s. h.  
*S. sulcifrons* Thunb. *medicaginis* Redt.  
h. Wehlau (Sauter), Kbg. (Ltz.).  
*S. tibialis* Hbst. h. *ambiguus* Gyll. auf  
den Danziger Dünen (Dommer), Loppehnen  
(Eld.).  
*S. crinitus* Oliv. *lineellus* Schh. g. auf  
Kleefeldern.  
*S. Regensteinensis* Hbst. s. Lyck (Sanio),  
Kbg. (Ltz.).  
*S. cambricus* Steph. s. Neustadt (Fritzen).  
*S. puncticollis* Steph. s. im Braunsberger  
Stadtwalde (Schindowsky).  
*S. lineatus* L. g. wie *erinitus*.  
*S. lateralis* Gyll. s. Ggbg. (Kr.), Lyck  
(Sanio), Neustadt (Fritzen).  
*S. hispidulus* Fabr. h. wie *crinitus*.  
*S. humeralis* Steph. s. Lyck, auf einer Feld-  
wiese (Sanio).  
*Trachyploeus spinimanus* Germ. Sieb.

- T. scabriculus* L. *setarius* Gyll. *erinaeus* Redt. n. s. Ggbg. (Kr.).
- T. seaber* L. *squamosus* Gyll. h. Kbg. (Ltz.).
- T. aristatus* Gyll. s. Kbg. (Grabowski teste Ltz.), Neustadt (Fritzen) unter *Erica* vulg.
- T. squamulatus* Oliv. n. h. Loppelnen (Eld.), Ggbg. (Kr.).
- T. setiger* Schh. s. Sieb.
- Cncorhinus geminatus* Fabr. s. h. auf den Pillauer und Danziger Dünen, Juni.
- Barynotus obscurus* Fabr. n. h. Kbg. (Ltz.), Dz. (Czw.).
- Liophloeus nubilus* Fabr. n. s. ebenso.
- L. Herbstii* Gyll., von Sieb. angegeben ohne Fundort; ist mir zweifelhaft: ich habe noch kein pr. St. gesehen.
- Thylacites pilosus* Fabr. s. s. Ggbg. (Kr.), Dz. (Helm).
- Chlorophanus viridis* L. n. s. auf Weiden, Kbg. (Ltz), Hlgl. (Stnr.).
- C. salicicola* Germ. n. h. Dz. (Helm).
- Tanymecus palliatus* Fabr. n. s. auf Nadelholz Kbg. (Ltz.).
- Tropiphorus mercurialis* Fabr. n. h. Damnhof (Ltz.).
- T. carinatus* Müll. s. s. 2 St. Loppelnen (Eld.).
- Gronops lunata* Fabr. s. in Sandgruben der Strandgegenden, Rauschen (Stnr., Ltz.).
- Aloplus triguttatus* Fabr. n. h. Kbg. (Eld., Ltz.).
- Phytonomus (Hypera) punctatus* n. s. ebenso, Dz. (Czw.).
- P. fasciculatus* Hbst. n. s. Vierbrüderkr. (Künow), Heub. (Helm).
- P. Julini* Sahlb. s. aus Moos von Berse-nicken (Ltz.).
- P. polygoni* Fabr. h. Kbg. (Ltz.).
- P. murinus* Fabr. n. s. Dz. (Czw.).
- P. variabilis* Hbst. h. Lyck (Sanio).
- P. plantaginis* Deg. n. s. ebenso, Damnhof (Ltz.).
- P. arundinis* Pk. n. s. wohnt in Sium, Phellandrium u. ähnlichen Umbellaten, Brücken-kopf bei Tilsit, Damnhof (Ltz.).
- P. pollux* Fabr. n. h. wie *plantaginis*.
- P. rumicis* L. s. h. überall.
- P. contaminatus* Hbst. s. Sieb.
- P. striatus* Boh. s. Kbg. (Ltz.), Neustadt (Fritzen).
- P. meles* Fabr. n. s. Lyck (Sanio), Kbg. (Ltz.).
- P. posticus* Gyll. s. Dz. (Dommer, Frantzius), Loppelnen (Eld.).
- P. elongatus* Pk. s. Dz. auf Wasserpflanzen (Dommer, Helm), Ggbg. (Kr.). (Berl. E. Z. XV. p. 190.)
- P. suspiciosus* Hbst. h. Lyck (Sanio).
- P. vieiae* Gyll. n. s. Loppelnen (Eld.), Fuchsberg (Sauter), Hochwasser b. Dz. (Czw.).
- P. nigrirostris* Fabr. h. Kbg. (Ltz.).
- Limobius dissimilis* Hbst. s. s. Dz. (Czw.).
- Cleonus albidus* Fabr. n. h. in Kiefernwäldern, in Fangraben, Lyck (Sanio), Kbg. (Ltz., Grabowski).
- C. nebulosus* L. n. h. Dz. (Dommer).
- C. turbatus* Schh. *glaucus* Gyll. h. wie *albidus* (von *nebulosus* verschieden?).
- C. ophthalmicus* Rossi. einmal bei der Allensteinschen Glashütte gefunden (Kug.), aber nicht wieder.
- C. varius* Hbst. s. in einer pr. Forst (Dossow).
- C. alternans* Oliv. *cinereus* Schrk. s. ebenso.
- C. costatus* Fabr. in Kug. Berl. Manusc. p. 174 durch Hellwig nachgetragen; ohne Angabe des Fundorts; neuerlich nicht wieder gefunden.
- C. trisulcatus* Hbst. s. Spittelhof 1843 (Eld.), Goldap, Lyck (Sanio).
- C. marmoratus* Fabr. n. h. wie *albidus*.
- C. sulcirostris* L. h. auf Sandboden.
- Lixus paraplecticus* L. h. wohnt in Phellandrium, Damnhof (Eld., Ltz.).
- L. turbatus* Gyll. n. s. ebenso; auf *Cicuta virosa*, Lyck (Sanio).
- L. angustus* Hbst. s. Lyck (Sanio).
- L. ascanii* L. s. zwischen Pillau u. Fischhausen (Nanke), Dz. (Sieb.).
- L. angustatus* Fabr. s. s. wie *angustus*.
- L. bardanae* Fabr. n. s. auf *Rumex*-Arten, Oletzko, Lyck (Sanio).
- L. junci* Boh. s. Oliva, Juli (Stf.).
- L. pollinosus* Germ. s. Dz. in Sandgruben (Dommer).
- Larinus sturnus* Schall. s. Neuhausen (Sauter), Bludauer Forst (Dossow), Pogrimmen bei Darkehmen (Hensche).
- L. jaceae* Fabr. n. s. auf *Centaurea jacea*, Lyck (Sanio).

*L. planus* Fabr. u. var. *carlinae* Oliv. (Kraatz B. E. Z. XVI. 144) n. h. Ggbg. (Kr.), auf *Cirsium arvense* Lyck (Sanio), Dammhof (Ltz.).

*L. senilis* Fabr. s. auf *Carlina vulgaris*, Lyck (Sanio).

*Molytes coronatus* Goeze s. s. Sieb.

*M. germanus* L. s. s. Kug., Sieb.

*M. carinaerostris* Küst. n. h. Hlgl. (Stnr.), Tilsit (Ltz.).

*Trachodes hispidus* L. n. h. Putziger Stadtwald, Oliva (Stf.), Kbg. (Sauter, Czwo.), Ggbg. (Kr.) F. F. (Stnr.).

*Lepyryus colon* Fabr. h. auf Weiden.

*L. binotatus* Fabr. n. s. ebenso, Kbg. (Ltz.).

*Hyllobius pineti* Fabr. n. h. Galtgarben (Eld.), Wilkie (Ltz.).

*H. abietis* L. g. überall auf Nadelholz.

*H. pinastri* Gyll. bei Kbg. h. (Ltz.), bei Lyck s. (Sanio).

*H. fatuus* Rossi. s. Ludwigsort (Sauter), Dz. (Zebe).

*Pissodes piceae* Illig. s. Pr. Stargard (Schmidt).

*P. pini* L. s. Lyck (Sanio), Wilkie (Eld., Ltz.).

*P. notatus* Fabr. s. h. auf Nadelholz.

*P. strobili* Redt. n. s. Kbg. (Ltz.), Loppchen (Eld.), Lyck Neuendorfer Wald (Sanio).

*P. harcyniae* Hbst. zuw. h. Galtgarben (Eld., Ltz.).

*P. piniphilus* Hbst. s. Ggbg. (Kr.), Kbg. Holzwiesen, Schwarzort (Czw.).

*Grypidius equiseti* Fabr., *atirostris* Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.)

*G. brunnirostris* Fabr. n. h. ebenso.

*Eriehinus bimaculatus* Fabr. n. h. Dammhof (Pfeil, Ltz.), Dz. (Czw.).

*E. scirpi* Fabr. h. Dammhof (Kuwert, Ltz.).

*E. acridulus* L. s. h. überall.

*E. Märkelii* Boh. n. h. Loppchen (Eld.).

*E. aethiops* Fabr. n. h. ebenso, Palmburg (Ltz.), Kbg. Pregelwiesen (Czw., Stnr.).

*E. festucae* Hbst. n. s. Dammhof (Stnr., Czw., Ltz.).

*E. nereis* Pk. n. s. ebenso.

*E. scirrhosus* Gyll. n. s. ebenso.

*Dorytomus vorax* Fabr. *macropus* Redt. n. s. Kapkeim (Ltz.).

*D. tremulae* Pk. h. auf Espen, Kbg. (Ltz.).

*D. variegatus* Gyll. s. Dz. Neustadt (Fritzen).

*D. costirostris* Gyll. *bituberculatus* Zett. n. s. auf Weiden, Dammhof (Sauter, Ltz.).

*D. affinis* Pk. s. Kbg. (Ltz.).

*D. suratus* Gyll. s. Kbg. Plantage (Stnr.), Neustadt (Fritzen).

*D. taeniatus* Fabr. n. s. ebenso.

*D. occalescens* Gyll. s. Loppchen (Eld.), Dz. (Helm).

*D. flavipes* Pz. s. Neustadt (Fritzen).

*D. agnathus* Boh. n. h. Ggbg. (Kr.), F. F. (Stnr.).

*D. majalis* Pk. n. s. auf Weiden, Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).

*D. pectoralis* Pz. n. s. auf *Salix fragilis*, ebenso.

*D. tortrix* L. n. s. wie *majalis*.

*D. minutus* Gyll. s. Dz. (Helm), Wernsdorf (Stnr.).

*D. villosulus* Gyll. s. Neustadt (Fritzen).

*D. filirostris* Gyll. s. Kbg. (Czw.), Kapkeim (Ltz.), Neustadt (Fritzen).

*D. dorsalis* L. n. h. auf Weiden, Dammhof (Ltz.).

*Pseudostyphlus* (*Eriehinus*) *pilumnus* Gyll. n. h. Ggbg. (Kr.), Warnicker u. F. F. (Ltz. Czw.).

*Smicronyx politus* Boh. s. aus Röhricht vom Pregeldamm (Sauter, Ltz., Stnr.).

*Brachonyx indigena* Hbst. h. auf Nadelholz (Ltz.).

*Anoplus plantaris* Naezen, *roboris* Suffr. n. s. auf Birken, Kbg. (Ltz.).

*Tanyssphyrus lemnae* Fabr. h. an Lemnaarten, Dammhof (Ltz.).

*Bagous* (*Lyprus*) *cylindrus* Pk. n. s. Goldbach an der Deime (Ltz.), Dz. (Frantzius).

*B. rotundicollis* Boh. s. s. Dammhof (Pfeil).

*B. nodulosus* Schh. s. Dz. auf nassen Wiesen an der Weichsel (Fritzen).

*B. binodulus* Hbst. h. auf *Stratiotes aloides*, Dammhof (Kuwert, Ltz.).

*B. subcarinatus* Gyll. s. Kbg. Pregelwiesen am Holländer Baum (Czw.).

*B. frit* Hbst. s. Dammhof (Eld.).

*B. diglyptus* Boh. s. ebenso.

*B. lutulosus* Gyll. s. Lyck (Sanio), F. F., Neuhäuser (Stnr.).

*B. tempestivus* Hbst. s. Dz. (Ltz.).

*B. limosus* Gyll. s. an Sümpfen auf Wasserpflanzen Dz. (Dommer, Frantzius), Dammhof (Czw.).

*B. lutosus* Gyll. s. Kbg (Ltz.), Memel (Stnr.).

*B. lutulentus* Gyll. h. Dammhof (Eld., Stnr., Ltz.).

*B. nigratarsis* Thoms. s. Kbg. auf Pregelwiesen, Dammhof (Czw.), Neustadt (Fritzen).

*Hydronomus alismatis* Marsh. n. s. auf Wiesen Blaustein (Ltz.), Dz. (Helm), Kbg. (Sauter).

*Cryptorhynchus lapathi* Linn. n. s. am Stamme von Weidengesträuch, Kbg. (Eld., Ltz.).

*Acalles camelus* Fabr. s. fehlt im Norden; aus Laub gesiebt, Ggbg. (Kr.).

*A. ptinoides* Marsh. s. ebenso.

*Magdalinus memnonius* Fald. carbonarius Fabr. s. Nehrung bei Pillau (Sauter).

*M. phlegmaticus* Hbst. s. Ggbg. (Kr.).

*M. linearis* Gyll. s. Löwenhagen (Ltz.), Rauschen (Stnr.).

*M. duplicatus* Germ. n. s. ebenso, von *Abies* geklopft, Pr. Stargard (Schmidt).

*M. frontalis* Gyll. s. Schwarzort (Czw.).

*M. violaceus* L. n. h. Ludwigsort (Ltz.).

*M. nitidus* Gyll. einmal h. bei Fehstein (Ltz.), Dz. (Helm).

*M. cerasi* L. n. s. Kbg. (Ltz.).

*M. aterrimus* Fabr. stygius Gyll. s. Dz. (Frantzius), Pröbbernau (Schindowsky).

*M. carbonarius* L. atramentarius Germ. s. Warnicken (Ltz.).

*M. flavicornis* Gyll. s. Zoppot (Czw.).

*M. barbicornis* Latr. s. Dz. (Frantzius), Loppehnen (Eld.).

*M. pruni* L. h. namentlich auf Ebereschen, Liep (Ltz.).

*Balaninus venosus* Germ. s. im Gutsgarten von Liep von Eichen geklopft Ende Mai (Ltz.).

*B. nuceum* L. n. h. auf *Corylus*, Warnicken (Ltz.).

*B. turbatus* Gyll. s. s. Luckneiner See bei Nicolayken, I St. (Sanio).

*B. villosus* Fabr. n. h. auf Eichen, Neuhausen, Arnau (Stnr.), Juditten (Ltz.), Oliva (Czw.).

*B. cerasorum* Hbst. n. s. auf Birken und Erlen, Pillauer Plantage (Eld., Ltz.), Oliva (Czw.), Memel (Stnr.).

*B. rubidus* Gyll. s. Dz. (Dommer), Glettkau (Czw.).

*B. crux* Fabr. h. Kbg. (Ltz.).

*B. brassicae* Fabr. h. ebenso.

*B. pyrrhoceras* Marsh. n. h. auf Weiden, Loppehnen (Eld.), Putzig (Stf.), Preil (Stnr.).

*Anthonomus rubi* Hbst. h. Kbg. (Ltz.).

*A. pubescens* Pk. h. im ganzen Sommer auf Nadelholz, Bludauer Forst (Ltz.), Schromb. (Stnr.).

*A. varians* Pk. n. h. ebenso.

*A. cinctus* Redt. s. Heub. Dünen (Fritzen).

*A. ulmi* Deg. s. Dz. (Ltz.).

*A. pedicularius* L. s. ebenso.

*A. spilotus* Redt. n. h. auf blühendem *Crataegus*, Schromb. (Czw., Stnr., Ltz.), Dz. (Helm).

*A. pomorum* L. n. s. an Obstbaublüthen, Kbg. (Ltz.).

*A. incurvus* Pz. n. h. Putzig (Stf.), von Ebereschen geklopft, Dammhof (Sauter).

*A. druparum* L. g. auf blühender *Prunus padus*, Arnau, Aweiden (Ltz.).

*Acalyptus carpini* Hbst. s. Kbg. (Ltz.), Dz. (Dommer).

*Elleschus scanicus* Pk. n. h. Schwarzort (Ltz.).

*E. bipunctatus* L. h. Fehstein, Margen, auf Weiden (Ltz.).

*Tychius 5-punctatus* L. n. s. auf *Potentilla verna*, Loppehnen (Eld.), Rauschen (Ltz.).

*T. polylineatus* Germ. s. auf *Anthyllis vulneraria*, Pillauer Dünen Juli (Ltz., Stnr.).

*T. schneideri* Hbst. s. Dz. (Zebc), Kbg. (Ltz.).

*T. squamulatus* Gyll. n. h. auf *Melilotus*, Cranz (Ltz.).

*T. venustus* Fabr. Dz. auf *Sarothamnus h.* (Ltz.), Kleinhaide (Stnr.).

*T. medicaginis* Bris. s. Ggbg. (Kr.).

*T. junceus* Reich. h. auf *Lotus cornic.* Pillau, auf *Melilotus vulgaris* Arnau (Ltz.), Memel (Stnr.), Dz. (Czw.).

*T. tomentosus* Hbst. g. überall.

*T. picirostris* Fabr. n. s. Dz. von Haidekraut geschöpft (Dommer, Frantzius, Czw.), Kbg. (Ltz.), var. *posticinus* Schh. Neustadt (Fritzen).

*Sibinia sodalis* Germ. s. Ggbg. (Kr.).

*S. primita* Hbst. s. ebenso, Dz., Neustadt (Fritzen).

*S. cana* Hbst. n. s. auf grasigen sandigen Anhöhen, Loppehnen (Eld.), Lyck (Sanio).

- S. viscaria* L. s. Dz. (Dommer).  
*S. potentillae* Germ. h. auf *Spergula arvensis*, Rauschen (Ltz.), Dammhof (Str.).  
*Mecinus piraster* Hbst. n. h. Rauschen (Ltz.).  
*M. collaris* Germ. n. h. in Sandgruben bei Ludwigsort (Pfeil); Kbg., Tilsit (Ltz.).  
*Gymnetron pascuorum* Gyll. s. Loppelnen (Eld.). Kbg. (Ltz.).  
*G. villosulum* Gyll. s. auf *Veronica beccabunga* Kbg. (Ltz.).  
*G. veronicae* Germ. h. überall.  
*G. beccabungae* L. n. h. Kbg. (Ltz.).  
*G. labile* Hbst. n. h. Hirschau (Ltz.).  
*G. stimulosum* Germ. s. s. 1 St. Lyck (Sanio).  
*G. rostellum* Hbst. n. h. Palmburg (Ltz.), Ggbg. (Kr.), Neustadt (Fritzen).  
*G. netum* Germ. s. am See-Strande (Ltz.).  
*G. linariae* Pz. h. auf *Lin. vulgaris*, Rauschen (Ltz.).  
*G. tetrum* Fabr. n. h. ebenso, Lyck (Sanio).  
*G. antirrhini* Germ. h. wie *linariae*.  
*G. noctis* Hbst. s. Rauschen (Ltz.).  
*G. pilosum* Gyll. s. Kbg. (Sauter), Lyck (Sanio).  
 Der als *G. thapsicola* Germ. von Stf. bezeichnete Käfer (Putzig) ist wahrsch. *asellus* Grav. gewesen (Seidl. Fn. Balt. p. 438 Anm.).  
*Miarus longirostris* Gyll. s. 2 St. am See-Strande (Ltz.).  
*M. graminis* Gyll. s. aus den Samenkapseln von *Campanula rapunculoides* gezogen (Sieb.), Lyck (Sanio).  
*M. campanulae* L. s. h. in den Glocken von *Camp. latifolia*, Warnicker Park (Eld., Ltz.).  
*M. miosus* Germ. s. Neustadt (Fritzen).  
*M. plantarum* Dej. s. Putzig (Stf.).  
*Cionus serophulariae* L. h. auf der Nährpflanze.  
*C. verbasci* Fabr. h. ebenso.  
*C. Olivieri* Chev. s. Kbg. (Eld.).  
*C. thapsus* Fabr. h. auf *Verbascum th.* Lyck (Sanio).  
*C. hortulanus* Marsh. s. Dz. (Dommer) auf *Verbascum*.  
*C. blattariae* Fabr. Hellwig im Berl. Manusc. p. 172 bemerkt: „eines der von Kugel als *Cure. thapsi* überschickten Expl. war *blattariae*“. Bis jetzt nicht wieder gefunden.
- C. pulchellus* Hbst. s. Dz. (Dommer, Frantzius), Ponarth (Ltz.).  
*C. fraxini* Deg. s. auf jungen Eschen Putzig (Stf.), Fehstein (Ltz.).  
*Nanophyes gracilis* Redt. s. Horst, auf einer Pregelwiese 4 St. (Kuwert), auf Rasenplätzen Neustadt (Fritzen), Juditten (Grabowski).  
*N. globulus* Germ. s. auf *Populus tremula* Putzig (Stf.).  
*N. lythri* Fabr. h. Kbg. (Ltz.).  
*Orchestes quercus* L. h. auf Eichen, Warnicken (Ltz.).  
*O. rufus* Oliv. s. auf Ulmen am Alleufer (Sauter), Dz. (Dommer).  
*O. scutellaris* Fabr. n. s. F. F. (Str.), Loppelnen (Eld.) auf Birken; die var. *pubescens* Stev. s.  
*O. alni* L. s. Friedland, am Alleufer, Wehlau (Sauter).  
*O. Ilicis* Fabr. h. auf Eichen, überall (Ltz.).  
*O. Jota* Fabr. n. h. auf *Rubus saxatilis* (Kug.), Fehstein (Ltz.), Vierbrkr. (Str.).  
*O. fagi* L. h. auf *Carpinus*, Kbg. (Ltz.).  
*O. pratensis* Germ. n. h. Dz. (Frantzius), Luckneiner Forst bei Nikolayken (Sanio).  
*O. Ionicerae* Hbst. n. s. auf *Lon. xylosteum* Blaustein (Ltz.).  
*O. rusci* Hbst. *bifasciatus* Gyll. h. auf Weiden Kbg. (Ltz.).  
*O. signifer* Creutz. n. s. ebenso, Putzig (Stf.).  
*O. decoratus* Germ. s. F. F., Juni (Czw.).  
*O. salicis* L. h. wie *rusci*; die var. *rufitarsis* Germ. Loppelnen (Eld.), Lyck (Sanio).  
*O. stigma* Germ. h. wie *rusci*.  
*O. populi* Fabr. s. h. überall auf Pappeln.  
*O. saliceti* Fabr. n. s. wie *rusci*.  
*Ramphus flavicornis* Clairv. h. auf versch. Gesträuchen, bes. Ellern, Kbg. (Ltz.).  
*Mononychus pseudaeori* Fabr. n. h. auf Iris, Kbg. (Ltz.), Dz. (Dommer).  
*Coeliodes quercus* Fabr. h. auf Eichen, Warnicken (Ltz.).  
*C. rubicundus* Pk. s. auf Birken, Putzig (Stf.), Loppelnen (Eld.), Lyck (Sanio).  
*C. epilobii* Pk. h. auf *Epil. angustif.* Putzig (Stf.), Löwenhagen (Ltz.).  
*C. guttula* Fabr. n. h. Ggbg. (Kr.), Lyck (Sanio), Neuhausen (Str.).

- C. subrufus* Hbst. h. F. F., Neuhäuser, Preil (Ltz., Stnr.).  
*C. didymus* Fabr. g. überall auf Labiaten.  
*C. lamii* Fabr. h. *punctulum* Hbst. auf Lam. album, Kbg. (Ltz.)  
*C. geranii* Pk. *exiguus* Oliv. im Süden n. s. Ggbg. (Kr.), Lyck (Sanio)  
*Scleropterus serratus* Germ. n. s. an sumpfigen Stellen der F. F. (Czw., Ltz.), Fchstein, Liep (Eld.).  
*S. (Rhytidosomus) globulus* Hbst. s. Dz. (Ltz., Cz w.), F. F., Löwenhagen (Stnr.).  
*Rhinoncus castor* Fabr. s. h. auf Rumex acetosella.  
*R. bruchoides* Hbst. h. ebenso.  
*R. inconspectus* Hbst. n. s. Pr. Holland (Sieb.), Kbg. (Ltz.).  
*R. pericarpus* L. h. wie *castor*, Kbg. (Ltz.).  
*R. guttalis* Grav. *subfasciatus* Gyll. n. s. ebenso, Lyck (Sanio), Pregelwiesen (Czw.).  
*R. albicinctus* Gyll. s. s. Sieb.  
*Phytobius Waltoni* Boh. *notula* Germ. s. Dz. (Dommer), Ggbg. (Kr.), an sumpfigen Stellen der F. F. und Löwenhagen (Czw.).  
*P. canaliculatus* Fabr. n. h. Kbg. (Ltz.).  
*P. 4-nodosus* Gyll. s. Dz. (Frantzius), Lyck (Sanio).  
*P. comari* Hbst. n. h. Dammhof (Ltz.).  
*P. 4-tuberculatus* Fabr. h. Kbg. (Ltz.).  
*P. 4-cornis* Gyll. s. wie *4-nodosus*.  
*Litodactylus leucogaster* Marsh. s. Lyck (Sanio), Neuhäuser (Stnr.).  
*L. velatus* Beck. s. Blaustein (Ltz.).  
*Amalus seortillum* Hbst. h. auf Cruciferen, Kbg. (Ltz.).  
*Orobittis cyaneus* L. s. Georgenswalde (Ltz.), F. F. (Stnr.), Heub. (Sieb.).  
*Ceuthorhynchus troglodytes* Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*C. apicalis* Gyll. s. Sieb.  
*C. depressicollis* Gyll. s. Sieb.  
*C. melanarius* Steph. *convexicollis* Boh. s. Loppennen (Eld.).  
*C. quercicola* Pk. s. Wehlau (Sauter), Lyck (Sanio).  
*C. floralis* Pk. s. h. auf Cruciferen.  
*C. achilleae* Gyll. s. Lyck (Sanio).  
*C. constrictus* Marsh. s. Neustadt (Fritzen).  
*C. pulvinatus* Gyll. s. Wehlau (Sauter).  
*C. pumilio* Gyll. s. Ggbg. (Kr.).  
*C. querceti* Gyll. n. h. Kbg. (Ltz.).  
*C. arator* Gyll. s. wie *pumilio*.  
*C. syrites* Germ. *alauda* Fabr. h. ebenso, Kbg. (Ltz.).  
*C. assimilis* Pk. h. ebenso.  
*C. erysimi* Fabr. h. auf Cruciferen, Kbg. (Ltz.).  
*C. contractus* Marsh. *hirtulus* Germ. h. ebenso.  
*C. cochleariae* Gyll. n. h. Putzig (Stf.), Wehlau (Sauter), Lyck (Sanio).  
*C. nanus* Gyll. n. s. Lyck (Sanio).  
*C. ericae* Gyll. n. h. auf *Er. vulgaris*, Rauschen (Stnr., Ltz.), Putzig (Stf.).  
*C. sphaerion* Schh. s. Neustadt (Fritzen).  
*C. echii* Fabr. s. Kbg. (Ltz.), häufiger bei Dz. (Czw.).  
*C. viduatus* Gyll. s. Rosenau b. Kbg. (Ltz.).  
*C. raphani* Fabr. s. Loppennen (Eld.), Kbg. (Ltz.).  
*C. borraginis* Fabr. s. s. Loppennen (Eld.).  
*C. abbreviatulus* Fabr. s. Dahlheim (Wohlfrohm), Kbg. (Ltz.).  
*C. cruciger* Hbst. n. h. Kbg. (Ltz.).  
*C. litura* Fabr. n. h. Lyck, Nicolayken (Sanio), Warnicken (Ltz.).  
*C. trimaculatus* Fabr. s. Lyck (Sanio).  
*C. albosignatus* Gyll. s. Löwenhagen (Ltz.).  
*C. asperifoliarum* Gyll. n. s. ebenso, Dz. (Frantzius).  
*C. campestris* Gyll. n. h. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio), Neustadt (Fritzen).  
*C. pubicollis* Gyll. s. F. F. (Czw.).  
*C. triangulum* Boh. s. Lyck (Sanio), Ggbg. (Kr.), Kbg. (Grabowski).  
*C. chrysanthemi* Gyll. *figuratus* Gyll. s. ebenso, Loppennen (Eld.), Putzig (Stf.), Lyck (Sanio), F. F., Neuhausen (Stnr.).  
*C. rugulosus* Hbst. s. Putzig (Stf.), Kbg. (Grabowski), wohl mit dem vorigen identisch (Thoms.).  
*C. arquatus* Hbst. s. Ggbg. (Kr.).  
*C. melanostictus* Marsh. s. Dz. Hochwasser (Czw.), var. *lyeopi* Gyll. Ggbg. (Kr.).  
*C. quadridens* Pz. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*C. marginatus* Pk. *punctiger* Gyll. h. ebenso.  
*C. pollinarius* Forst. n. h. ebenso.  
*C. obsoletus* Gyll. s. Loppennen (Eld.), Waldau (Ltz.).



- C. tarsalis* Boh. s. Loppehnen (Eld.).  
*C. rapae* Gyll. n. h. Dz. (Frantzius), Lyck (Sanio).  
*C. barbareae* Suffr. cyanopterus Redt. s. s. Lyck (Sanio).  
*C. ignitus* Germ. s. Dz. (Czw.).  
*C. cyanipennis* Germ. h. auf Brassica-Arten Kbg. (Ltz.).  
*C. suturellus* Gyll. s. Lyck (Sanio).  
*C. chalybaeus* Gyll. s. ebenso.  
*Poophagus sisybrii* Fabr. n. s. Dammhof (Ltz.).  
*Tapinotus sellatus* Fabr. n. h. auf Moorwiesen, Juditten, Dammhof (Ltz.), F. F. (Czw., Stnr.).  
*Marmaropus Besseri* Gyll. s. Kbg. (Sauter).  
*Coryssomerus capucinus* Beck. s. Kbg. Ausfallthor, Neuhäuser, Oliva (Stnr., Czw.).  
*Baridius nitens* Fabr. s. in den Danziger Dünen (Dommer, Frantzius).  
*B. artemisiae* Hbst. n. s. auf Artem. vulgaris Kbg (Ltz., Stnr.).  
*B. picinus* Germ. n. s. Lyck (Sanio), Neuhäuser (Stnr.).  
*B. chloris* Fabr. s. Sieb.  
*B. lepidii* Germ. n. s. wie picinus, Dz. (Frantzius).  
*B. abrotani* Germ. s. Kbg. (Ltz.), Dz. (Helm).  
*B. T-album* L. n. s. auf Wiesen ebenso.  
*Sphenophorus abbreviatus* Fabr. auf Cornus sanguinea, Osterode (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.  
*Calandra granaria* L. zuw. h. an sonnigen Frühlingstagen an den Wänden der Kornspeicher (Ltz.).  
*Dryophthorus lymexylon* Fabr. s. Gelguhnen (Ltz.).  
*Cotaster uncipes* Boh. s. s. Georgenswalde unter Seetang Juli 1860 (Ltz.).  
*Cossonus linearis* Fabr. n. s. im Mulm alter Weiden und Linden, Osterode (Kug.), Kbg. (Nanke, Ltz.).  
*C. ferrugineus* Clairv. s. in Holzwerk, Dz. (Schmidt).  
*C. cylindricus* Sahlb. n. s. wie linearis.  
*Phloeophagus spadix* Hbst. s. s. Memel (Stnr.).  
*Rhyncolus chloropus* Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*R. elongatus* Gyll. n. h. Pröbbernau (Schindowski).  
*R. culinaris* Germ. s. Kbg. Plantage (Eld., Stnr.), Dz. (Frantzius).  
*R. lignarius* Marsh. cylindrirostris Oliv. s. Kbg. (Ltz.).  
*R. reflexus* Boh. s. Dammhof, Wilkie (Sauter).  
*R. porcatus* Germ. s. wie elongatus, Dz. (Helm).  
*R. truncorum* Germ. s. Sieb.  
*Apion pomonae* Fabr. g. auf Nadelholz.  
*A. opeticum* Bach. s. Ggbg. (Kr.), Dammhof, Neuhausen (Stnr.).  
*A. craccae* L. h. Kbg. (Ltz.).  
*A. cerdo* Gerst. s. Ggbg. (Kr.), Lyck (Sanio).  
*A. subulatum* Kirb. n. h. Milchbuder Forst bei Lyck (Sanio), F. F., Kleinhaide (Stnr.).  
*A. ochropus* Germ. s. s. Braunsbg., von jungen Buchen geklopft (Schindowsky).  
*A. carduorum* Kirb. h. Kbg. (Ltz.).  
*A. basicorne* Illig s. Sieb.  
*A. tenue* Kirb. s. Neustadt (Fritzen).  
*A. penetrans* Germ. s. Westpr. (Strübing Berl Ent. Z. IV. p. 322), Lyck (Sanio).  
*A. onopordi* Kirb. s. Lyck (Sanio).  
*A. confluens* Kirb. stolidum Germ. n. h. wie penetrans, Kbg. (Stnr.).  
*A. vicinum* Kirb. n. s. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).  
*A. atomarium* Kirb. n. s. Dammhof (Eld.), Putzig (Stf.).  
*A. Hookeri* Kirb. h. Kbg. (Ltz.).  
*A. difficile* Hbst. s. Dz. (Dommer).  
*A. fuscirostre* Fabr. h. aus den Früchten von Sarothamnus erzogen, Redlau b. Dz. (Eld.), Zoppot (Ltz.).  
*A. pallipes* Kirb. s. Dz. (Dommer).  
*A. vernale* Fabr. h. auf Urtica dioica.  
*A. aeneum* Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).  
*A. radiolus* Kirb. n. s. ebenso.  
*A. astragali* Pk. n. h. Dz. (Dommer), Kbg. (Ltz.), auf Astr. glycyphyllos.  
*A. ononis* Kirb. s. Neustadt (Fritzen).  
*A. dispar* Germ. s. Loppehnen (Eld.).  
*A. striatum* Marsh. s. Neustadt (Fritzen).  
*A. pubescens* Kirb. civicum Germ. n. s. Putzig (Stf.).  
*A. simile* Kirb. n. h. auf Birken, Loppehnen (Eld.), Putzig (Stf.), Lyck (Sanio).  
*A. alcyoneum* Germ. s. Neustadt (Fritzen).  
*A. seniculus* Kirb. n. s. ebenso; Dz. Nehrung (Helm).  
*A. elongatum* Germ. s. s. Lyck (Sanio).

- A. rufirostre* Fabr. n. h. Kbg. (Ltz.).  
*A. viciae* Pk. h. Lyck (Sanio).  
*A. dissimile* Germ. s. Oliva (Czw.).  
*A. varipes* Germ. s. Loppennen (Eld.).  
*A. apricans* Hbst. fagi Kirb. g. überall auf Trifolium.  
*A. ononidis* Gyll. s. Loppennen (Eld.).  
*A. assimile* Kirb. n. h. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).  
*A. trifolii* L. *aestivum* Germ. h. Dz. (Dommer, Frantzius), die var. *ruficus* Germ. seltener (Helm).  
*A. flavipes* Fabr. g. wie *apricans*.  
*A. nigritarse* Kirb. s. s. Lyck (Sanio).  
*A. eheninum* Kirb. s. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).  
*A. sulcifrons* Hbst. s. Dz. (Dommer, Frantzius).  
*A. punctigerum* Pk. s. ebenso.  
*A. virens* Hbst. h. Kbg. (Ltz.).  
*A. validirostre* Gyll. s. ebenso, Lyck (Sanio).  
*A. Gyllenhalii* Kirb. s. Kbg. (Sieb.), Lyck (Sanio).  
*A. ervi* Kirb. n. h. Kbg. (Ltz.).  
*A. filirostre* Kirb. s. Dz. (Helm), Kbg. (Ltz., Stnr.).  
*A. minimum* Hbst. n. s. Putzig (Stf.), Ggbg. (Kr.), Dammhof (Stnr.).  
*A. pisi* Fabr. n. s. Loppennen (Eld.), Kbg. (Ltz.).  
*A. aethiops* Hbst. h. ebenso, Dz. (Dommer).  
*A. sorbi* Hbst. n. s. wie *psi*.  
*A. angustatum* Kirb. *loti* Kirb. n. h. Waldau (Ltz.).  
*A. columbinum* Germ. s. Wehlau (Sauter), Dz. (Helm).  
*A. Spencei* Kirb. s. Putzig (Stf.), Kbg. (Ltz.).  
*A. vorax* Hbst. h. Kbg. (Ltz.).  
*A. pavidum* Germ. s. auf *Coronilla varia*, Dz. (Czw.).  
*A. miniatum* Germ. n. s. Dz. (Dommer), Lyck (Sanio), auf *Rumex obtusifolius*.  
*A. frumentarium* L. *haematodes* Kirb. *cruentatum* Watton h. Kbg. (Ltz.).  
*A. rubens* Steph. s. Löwenhagen (Ltz.), Lyck (Sanio).  
*A. sanguineum* Deg. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*A. brevirostre* Hbst. s. Loppennen (Eld.), F. F. (Stnr.).  
*A. aciculare* Germ. s. Sieb.
- A. violaceum* Kirb. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*A. hydrolapathi* Kirb. bei Lyck h. (Sanio).  
*A. marchicum* Hbst. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*A. humile* Germ. s. h. überall  
*A. simum* Germ. s. Kbg. Hlgl. (Stnr.).  
 Anm. *A. difforme* Ahr. von Eld. (Loppennen) angegeben, aber das St. seiner Sammlung war *varipes* ♀ (Ltz.).  
*Aulettes basilaris* Gyll. s. s. Neustadt (Fritzen), Strübing (Berl. Ent. Z. IV. p. 323).  
*Rhynchites betuleti* Fabr. h. Kbg. (Ltz.).  
*R. populi* L. h. ebenso.  
*R. auratus* Scop. s. auf Obstblüthen, Margen (Ltz.).  
*R. Bacchus* L. s. Blaustein (Ltz.).  
*R. aequatus* L. n. s. auf blühenden Ebereschen, Arnau, Liep (Ltz.).  
*R. alliariae* Pk. n. s. Loppennen (Eld., Ltz.), Neuhausen (Stnr.).  
*R. germanicus* Hbst. *minutus* Gyll. h. Dz. (Frantzius), Kbg. (Ltz.).  
*R. aeneovirens* Marsh. s. Wargen (Sauter), Dz. (Helm).  
*R. cupreus* L. n. s. wie *aequatus*.  
*R. nanus* Pk. n. s. Lyck (Sanio), Kbg. (Ltz.).  
*R. megacephalus* Germ. s. in den Strandgegenden (Ltz.), Dammhof (Stnr.).  
*R. pubescens* Fabr. s. Elbing (Kug.), Dz. (Sieb.).  
*R. ophthalmicus* Steph. s. auf jungem Hasellaube, Neustadt (Fritzen).  
*R. coeruleocephalus* Schh. s. Kug., Sieb.  
*R. betulac* L. h. auf jungen Birken, überall.  
*Atelabus curculionoides* L. n. h. Lyck (Sanio), Preil (Ltz.).  
*Apoderus coryli* L. *avellanae* L. h. auf Haseln, Bludauer Forst (Ltz.).  
*A. intermedius* Hellw. zuw. h. auf *Comarum palustre* von Moorwiesen, Margen, Dammhof (Pfeil, Ltz.), Neuhausen (Stnr.).  
*Diodyrhynchus austriacus* Oliv. s. Hlgl. (Stnr.), Blaustein, Metgethen, von *Abies* geklopft (Ltz.), Schromb. (Czw.).  
*Rhinomacer attelaboides* Fabr. n. h. Bludauer Forst, auf Nadelholz (Ltz., Stnr.).

### Anthribidae.

- Platyrhinus latirostris* Fabr. n. h. an Pinusstubben, Elbing (Sieb.), Putzig (Stf.), Neustadt (Helm), Fchstein (Ltz.).

*Tropideres albirostris* Hbst. s. Kug., Sieb.  
*T. Edgreni* Schh. s. s. auf einem Grasplatze neben Rothbuchen und Espen, Neustadt (Fritzen).

*T. sepicola* Fabr. s. Vogelsang bei Elbing (Eld.), Putzig (Stf.), Alexwangen (Ltz.).

*T. niveirostris* Fabr. s. in Eichenholz, Osterode (Kug.), Putzig (Stf.), Wargen (Sauter), Löwenhagen (Ltz.).

*T. cinctus* Pk. zuw. h. bei Osterode (Kug.), einmal bei Tilsit (Stf.).

*Anthrribus albinus* L. n. h. Kgb. (Ltz.), Eichenkrug (Stnr.).

*A. (Brachytarsus) scabrosus* Fabr. s. auf *Rhamnus cathartica*, Putzig (Stf.).

*A. varius* Fabr. s. h. auf *Abies*, Schwarzort in den kugelförmigen ♀ von Schildläusen, besonders *Lecanium racemosum* Ratz. (Künow).

*Choragus Sheppardi* Kirb. s. auf Gartenspiräen, Blaustein (Ltz.), Bludauer Forst (Dossow), Glettkau (Czw.).

### Bruchidae.

*Spermophagus cardui* Boh. n. s. Ggbg. (Kr.), bei Lyck vor wenigen Jahren g. (Sanio).

*Bruchus marginalis* Fabr. s. in den Samen von *Oxytropis pilosa* Graudenz (Körnicker).

*B. olivaceus* Germ. n. s. Karbojin bei Lyck (Sanio).

*B. pisi* L. s. Lyck (Sanio).

*B. rufimanus* Boh. bei Kbg. jetzt kaum bemerkt (Stnr.), bei Lyck auf *Vicia Faba* n. s., auch überwintert im Moose (Sanio), Neustadt (Fritzen).

*B. luteicornis* Illig. n. h. Ggbg. (Kr.), Lyck (Sanio), Aweiden (Stnr.).

*B. granarius* L. g. in Leguminosen, bes. in *Vicia sepium*.

*B. loti* Pk. n. h. auf *Lathyrus pratensis*, Waldau (Körnicker), Lyck (Sanio), Schromb. (Czw.).

*B. cisti* Pk. ater Marsh. n. s. Allenstein (Kug.), Lyck (Sanio), Neustadt (Fritzen).

*B. bipunctatus* Sulz. Kbg. (Nanke), seitdem nicht wieder gefunden.

### Scolytidae.

*Hylastes ater* Pk. s. h. auf Kiefern.

*H. cunicularius* Er. n. s. Dammbhof (Ltz.), Wilkie (Eld.).

*H. attenuatus* Er. s. unter Pinusrinde, Neustadt (Fritzen).

*H. angustatus* Hbst. n. s. wie cunicul.

*H. opacus* Er. n. s. Dz. (Ltz.).

*H. palliatus* Gyll. g., wie ater.

*H. trifolii* Müll. in der Juraer Forst bei Tilsit n. s. (Andersch).

*Hylurgus ligniperda* Fabr. n. h. an gefälltten alten Kiefern, Putzig (Stf.).

*H. piniperda* L. g. in Kiefernstubben.

*H. minor* Hartig. s. Ggbg. (Kr.).

*Dendroctonus micans* Kug. s. Mohrunge (Eld.).

*Carphoborus pilosus* Ratz. s. Braunsbg.; unter Fichtenrinde (Schindowsky).

*Phloeophthorus rhododactylus* Marsh. n. h. Palmburg (Ltz.), Wilkie (Pfeil), F. F. (Stnr.).

*Hylesinus crenatus* Fabr. s. an den Wurzeln alter Eschen, Osterode (Kug.), Kbg. (Ltz.).

*H. oleiperda* Fabr. s. s. Warnicker Park (Eld.), Kbg. Plantage (Stnr.), sicherlich auf Eschen, welche botanisch mit *Olea* verwandt sind; früher auch bei Stettin und Hamburg gefunden (Berl. E. Z. XI. 429, XVIII. 128).

*H. fraxini* Fabr. varius Fabr. g., eine Pest der Eschen.

*H. vittatus* Fabr. s. Kbg. (Andersch).

*Polygraphus pubescens* Fabr. n. h. Juraer Forst (Andersch), Blaustein (Ltz.).

*Scolytus (Eccoptogaster) Ratzeburgii* Janson. destructor Ratz. s. Kbg. (Ltz.).

*S. destructor* Oliv. *Eccopt. scolytus* Fabr. n. h. ebenso, in Birken u. Ulmen (Andersch).

*S. multistriatus* Marsh. s. in Ulmen, Kbg. (Andersch, Ltz.).

*S. pruni* Ratz. piri Ratz. s. Westpr. (Andersch).

*S. intricatus* Ratz. pygmaeus Gyll. n. h. ebenso.

*S. rugulosus* Ratz. s. in Pflaumenbäumen, Braunsbg. (Dossow), Glettkau (Czw.), Neuhausen (Stnr.).

*S. carpini* Ratz. n. h. in einem *Carpinus*-Stamme auf dem Tragheim in Kbg. (Eld., Ltz.).

*Crypturgus pusillus* Gyll. n. s. Wilkie (Eld., Ltz.), Vierbrkr., F. F. (Stnr.).

*C. cinereus* Hbst. n. s. ebenso.

*Cryphalus abietis* Ratz. n. s. Zinten, in der Damerau (Ltz.).

*C. tiliae* Pz. n. s. Fehstein. aus Linden-  
zweigen (Ltz.).

*C. fagi* Nördl. s. aus Rothbuchen bei Lud-  
wigsort (Dossow).

*C. asperatus* Gyll. *binodulus* Ratz. s.  
im Greibenschen Revier in Espenrinde (Dossow),  
F. F. (Stnr.).

*Pityophthorus Lichtensteinii* Ratz. n. h.  
Löwenhagen (Ltz.), Masuren (Mühl), Gauleden  
in absterbenden Rothtannenästen (Dossow).

*P. pityographus* Ratz. s. nach dem Zeug-  
niss Ratzeb. Forstins. 182 (Andersch).

*Tomicus (Bostrychus) bispinus* Dft. s. Brauns-  
berg (Sauter).

*T. bicolor* Hbst. s. Schwarzort, Dammhof  
(Stnr.).

*T. stenographus* Dft. n. s. in Kiefernrinde,  
Braunsbg., Lyck, Wilkie (Andersch).

*T. typographus* L. h. in allen Nadelholz-  
wäldern.

*T. acuminatus* Gyll. s. s. Eichholz bei  
Mehlsack (Andersch).

*T. rectangulus* Eichh. *duplicatus* Sahlb.  
s. s. Kbg Holzwiesen bei der Plantage (Czw.).

*T. laricis* Fabr. h. in Nadelholz.

*T. suturalis* Gyll. *nigritus* Gyll. s. wie  
*acuminatus*; Kbg. (Czw.), Metgethen (Stnr.).

*T. curvidens* Germ. h. Kbg. (Ltz.), Brauns-  
berg, Tilsit, Rastenbg. (Andersch).

*T. chalcographus* L. h. Brandenbrger Haide  
(Ltz.), Osterode (Kug.).

*T. albatus* Fabr. h. ebenso.

*T. autographus* Ratz. h. in allen Nadel-  
holzwäldern (Andersch).

*T. villosus* Fabr. s. s. Sieb. teste Andersch.

*T. dispar* Fabr. n. h. Osterode an alten  
Buchen (Kug.), Dz. aus Birkenholz (Dommer),  
unter Apfelrinde Wernsdorf (Kuwert).

*T. cryptographus* Ratz. s. unter Pappel-  
rinde in der F. F. ♂ u. ♀ (Dossow, Czw., Stnr.).

*T. Saxeseni* Ratz. s. unter Pappelrinde,  
Kbg. (Pfeil, Dossow).

*T. dryographus* Ratz. s. Eichholz bei Meh-  
lsack (Andersch).

*T. monographus* Fabr. n. s. an den Eichen  
bei Moosbude (Ltz.).

*Xyloterus domesticus* L. s. unter Tannen-  
rinde (Andersch).

*X. lineatus* n. s. ebenso, Braunsbg. (Sieb.),  
Zinten, Samitten (Ltz.).

*Platypus cylindrus* Fabr. s. s. Kbg., in  
Eichenholz (Kug., Andersch).

## Cerambycidae.

*Ergates faber* L. s. in Kiefernwäldern, Elbing,  
Rastenbg., Thorn (Sieb.), Neidenburg (Ltz.).

*Tragosoma depasarium* L. s. s. Elbing (Sieb.).

*Prionus coriarius* L. n. s. in Kiefernwäldern,  
Rauschen (Ltz.).

*Cerambyx (Hammacherus) heros* Scop. s. s.  
Kug., Sieb.

*C. cerdo* Scop. s. Elbing (Ltz.).

*Purpuricenus Köhleri* L. s. s. 1 St. in der  
Sammlung des Museums, Thorn.

*Rosalia alpina* L. s. s. einmal bei der  
Allensteinschen Glashütte (Kug.), bisher nicht  
wieder gefunden.

*Aromia moschata* L. n. s. an Weiden Kbg.  
(Ltz.).

*Callidium clavipes* Fabr. s. Dz. (Schmidt),  
Elbing (Ltz.), Braunsbg. (Sieb.).

*C. femoratum* L. s. Labiau (Nanke), Liep  
auf Sorbus aucup. (Ltz.), Dz. Grebbiner Wald  
(Dommer, Frantzius).

*C. violaceum* L. n. s. auf Spiräen, Arnau  
(Ltz.).

*C. dilatatum* Pk. in dem Ziegeleigebäude  
bei Wernsdorf h. (Kuwert), sonst n. h. an Kie-  
fernholz, Zinten (Ltz.).

*C. sanguineum* L. s. s. Tilsit (Nanke),  
Mehlsack (Sieb.).

*C. alni* L. einmal s. h. an einem alten Zaune,  
der von Ellernstrauch geflochten war (Kug.),  
bisher aber nicht wieder gefunden.

*C. variabile* L. mit seinen Varietäten n. s.  
wie *violaceum*.

*C. undatum* L. s. s. Kbg., Elbing (Andersch),  
Wehlau (Ltz.).

*Hylotrypes bajulus* L. g. an Getreidespeichern.

*Tetropium (Criomorphus) luridum* L. *aulicum*  
Fabr. *fulcratum* Fabr. h. unter Tannrinde,  
Zinten (Ltz.), Braunsbg., Kbg. (Sieb.).

*T. fuscum* Fabr. n. h. bei Schaaken auf  
Weiden (Eld.), F. F. (Czw., Stnr.).

*Notorhina muricata* Sehh. s. s. einmal unter  
Kiefernrinde bei Osterode (Kug.), 1 St. auf

einer Espe neben dem Pfarrhause von Schwarzort, Juli 1864 (Ltz.); Neustadt (Fritzen) an alten Pinusstämmen, Juli — August.

*Spondylis buprestoides* L. h. in Kiefernwäldern, Kahlberg (Ltz.).

*Asemum striatum* L. n. h. Schwarzort (Ltz.); die var. *agreste* Fabr. bei Osterode (Kug.), Neustadt (Fritzen).

*Crioccephalus rusticus* L. n. s. Braunsbg., Pr. Holland, Rastenbg. (Sieb.), Schwarzort (Ltz.).

*C. ferus* Kraatz. *epibata* Schjöd. s. Kbg. (Guthzeit), Dz. (Dommer), Neustadt (Fritzen) in Pinusstubben.

*Clytus detritus* L. n. h. an den Moosbuder Eichen (Ltz.).

*C. areuatus* L. n. s. Löwenhagen (Ltz.).

*C. rusticus* L. *hafniensis* Fabr. zuw. h. Osterode im Pappelgehölz (Kug.), Heilsberg, Tilsit (Sieb.), Gelgühen (Ltz.).

*C. arietis* L. n. h. Rauschen (Ltz.).

*C. antilope* Illig. s. s. wird von Kug. im Manuser. angegeben, ohne Fundort, ist aber bis jetzt nicht wieder gefunden.

*C. Herbstii* Brahm. *verbasci* Fabr. s. Elbing, Lyek (Sieb.), Blaustein (Ltz.).

*C. verbasci* L. *ornatus* Hbst. s. s. Dz. (Dommer).

*C. massiliensis* L. s. s. in Ostpr. von Stf. gefangen (Dommer).

*C. plebejus* Fabr. s. Osterode (Kug.), sodann nur an einer ganz beschränkten Stelle im Wiesengrunde bei Craam auf *Spiraea ulm.* und auf Doldengewächsen mehrfach gefunden (Ltz.).

*C. mysticus* L. *rusticus* Scop. *hieroglyphicus* Hbst. n. h. Margen (Ltz.), Oliva (Czw.), F. F. (Stnr.).

*Obrivum ferrugineum* Fabr. s. s. Kug. Sieb.

*O. brunneum* Fabr. s. s. Dz. am Seestrände (Dommer).

*Gracilia pygmaea* Fabr. s. s. unter den Duplis der Eldittschen Sammlung fand ich 2 St. bezeichnet: Kapkeim (Frisching) von Patze gefunden 1865 (Ltz.).

*Molorchus minor* L. *dimidiatus* Fabr. n. s. auf Gartenspiräen Margen (Ltz.).

*M. umbellatarum* L. s. Elbing (Sieb.), Neuhausen (Stnr.).

*Necydalis major* L. *salicis* Muls. s. an Weiden, Ludwigsort (Ltz.), Kbg. (Guthzeit), Dz. (Brischke).

*Lamia textor* L. n. s. Rauschen, Cranz (Ltz.), Memel (Stnr.).

*Monochamus sartor* Fabr. s. Kbg. (Ltz.).

*M. sutor* L. n. h. Schwarzort (Ltz.).

*M. galloprovincialis* Oliv. [s. s. Danzig, Braunsbg. (Dommer)].

*Acanthoderes varius* Fabr. s. an Buchen, Osterode (Kug.), Cadienen (Stf.), Norkitten (Ltz.).

*Astynomus aedilis* L. h. am Kiefernklafferholz, Mai Ludwigsort (Ltz.).

*A. atomarius* Fabr. s. s. Johannisburger Haide (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

*A. griseus* Fabr. n. h. Kbg., Braunsbg., Elbing (Stf., Ltz.).

*Liopus nebulosus* L. h. in Buchenwäldern (Kug.), auf Liden (Ltz.).

*L. punctulatus* Pk. s. s. F. F. an einem Pappelstamme 3 St. (Czw., Stnr.) Juni 1872; aus faulen Lindenästen gezogen, Neustadt (Fritzen).

*L. fennicus* Pk. s. Dz. (Frantzius, Dommer), Neustadt, Putzig (Stf.), Löwenhagen, Arnau, auf Linden (Ltz.).

*Exocentrus balteatus* Fabr. n. h. Arnau unter Linden (Ltz.), Dz. (Helm).

*Pogonochaerus hispidus* Schrk. *pilosus* Fabr. s. Sandgruben bei Ludwigsort (Sauter, Ltz.), Elbing (Sieb.).

*P. fasciculatus* Deg. n. s. Elbing, Pr. Holland (Sieb.), Löwenhagen (Ltz.).

*P. ovalis* Gmel. s. Kbg. (Ltz.).

*Mesosa careulionoides* L. s. s. Thorn (Kug.), Elbing (Sieb.).

*M. nebulosa* Fabr. s. s. Osterode (Kug.), bei Schöneberg (Dommer).

*Anaethetis testacea* Fabr. s. s. Osterode (Kug.), Dz. Nehrung an Weidengeflecht (Fritzen).

*Agapanthia eardui* Fabr. s. Kug. Sieb.

*A. angusticollis* Gyll. n. s. Grebbiner Wald auf *Urtica dioica* (Dommer), Kleinhaide (Eld.), Deimewiesen (Ltz.), Schromb., Ktzn. (Czw.).

*Saperda careharias* L. n. s. an Pappelstämmen, Kbg. (Ltz.).

*S. phoea* Fröl. s. s. Wehlau (Sauter); 1 St. auf *Spiraea ulm.* Warnicken (Ltz.).

*S. sealaris* L. n. h. an Eichenholz, Braunsberg (Sieb.), Zinten (Ltz.).

*S. Seydlii* Fröl. s. Elbing, Braunsbg. (Sieb.), F. F. (Czw., Stnr.).

- S. tremulae* Fabr. s. Wehlau (Andersch).  
*S. populnea* L. n. s. an Espen, Kbg. (Ltz.).  
*Menesia bipunctata* Zubk. s. s. Kbg. (Kug.).  
 Horst am Pregel (Kuwert).  
*Tetrops praeusta* L. h. auf Sorbus, Liep (Ltz.).  
*Oberca oculata* L. n. h. an Espenstrauch Schwarzort (Ltz.), auf Weiden Dz. (Czw.), Kbg. (Guthzeit).  
*O. pupillata* Gyll. s. s. Heilsberg (Sieb.).  
*O. erythrocephala* s. s. Litthauen (Kug.), Masuren (Sieb.).  
*O. linearis* L. s. s. Masuren (Mühl), n. s. Hgbl. (Stnr.), Dz. auf Haseln (Czw.).  
*Phytoecia affinis* Harrer. s. Elbing (Sieb.).  
*P. virgula* Charp. punctum Muls. s. Heilsberg auf einem Brachacker (Ltz.), Oliva (Czw.).  
*P. lineola* Fabr. s. ebenso; Dz. auf Viburnum-Blüthen (Dommer).  
*P. cylindrica* L. s. Elbing (Ltz.).  
*P. nigricornis* Fabr. s. Jäschenthal (Czw.).  
*P. virescens* Fabr. s. s. aus Litthauen (Kug.), neuerlich nicht wieder gefunden.  
*P. molybdaena* Dalm. s. s. in der Eldittschen Sammlung 1 St. Kbg.  
*Rhammusium salicis* Fabr. n. h. auf Gartenspiräen, Arnau, Blaustein (Ltz.).  
*Rhagium mordax* Fabr. n. h. am Eichenholze, Lauth (Ltz.).  
*R. inquisitor* Fabr. n. s. an Abiesstubben, Zinten (Ltz.).  
*R. indagator* Fabr. h. ebenso.  
*R. bifasciatum* Fabr. von Kug. angemerkt ohne Angabe des Fundorts, später nicht wieder gefunden; meistentheils ein Gebirgskäfer.  
*Toxotus cursor* L. noctis L. n. s. im Warnicker Park auf Spiraea ulm. Juli (Ltz.), Dz. am Carlsberge (Schmidt), Vierbrkr. (Stnr.).  
*T. meridianus* L. n. s. ebenso, Grebbiner Wald (Sieb.). Die schöne var. e. (Thoms. VIII. 54) in der Eldittschen Sammlung.  
*Pachyta lamed* L. spadicea Pk. s. s. Braunsberg (Sieb.), Warnicken (Ltz.).  
*P. 4-maculata* L. n. s. auf Dolden und Spiräen, Georgenswalde (Ltz.).  
*P. interrogationis* L. s. s. bei Kbg. 1788 in Kiefernwäldern auf Farnkraut (Polypodium, Pteris) gefunden (Kug.), später jedoch nicht wieder.  
*P. strigilata* Fabr. s. s. (Sieb.).
- P. marginata* Fabr. aus Kugel. Beschreibung seiner *Leptura spreta* im Manusc. vermuthet Kraatz Berl. Ent. Ztg. XII. 303, dass er eine Var. der *marginata* vor Augen gehabt und dieselbe als *strigilata* angeführt habe.  
*P. collaris* L. h. auf Spiräen, Kbg. (Ltz.).  
*P. virginea* L. n. h. ebenso, Vierbrkr. (Stnr.).  
*P. sexmaculata* L. s. s. 1 St. Masuren auf einer Dolde (Mühl).  
*P. octomaculata* Fabr. n. s. Warnicken auf *Cirsium oleraceum* (Ltz.), Carthaus im Radaunenthal (Helm).  
*P. septemsignata* Küst. s. s. 1 St. an Kiefernklasterholz bei Ludwigsort (Pfeil).  
*Strangalia 4-fasciata* h. auf Spiräen, Kbg. (Ltz.).  
*S. revestita* L. s. Dz., Elbing (Sieb.).  
*S. pubescens* Fabr. s. s. auf Wiesen an *Scabiosa succisa* und *Carduus nutans* gefunden, 2 St. Osterode (Kug.), seitdem nicht mehr.  
*S. atra* Fabr. n. h. auf Dolden, Gelgubnen (Ltz.).  
*S. armata* Hbst. *calcarata* Fabr. n. h. auf Spir. ulmar. Warnicken auf dem Wilhelms-horster Gestell, Gelgubnen (Ltz.).  
*S. annularis* Fabr. s. s. Osterode, in Kiefernwäldern auf *Orehis bifolia* und *Stachys silvatica*; Kbg. (Kug.), Masuren (Mühl).  
*S. attenuata* L. h. auf Gartenspiräen, Wernsdorf (Ltz.).  
*S. nigra* L. h. Arnau (Ltz.).  
*S. bifasciata* Müll. s. Kug., Sieb.  
*S. melanura* L. h. Löwenhagen (Ltz.).  
*Leptura sanguinosa* Gyll. s. s. Sieb.  
*L. virens* L. s. s. Kug., Sieb.  
*L. rubra* L. *rubrotestacea* Illig. h. auf Spiräen, Warnicken (Ltz.).  
*L. variicornis* Dalm. s. s. Braunsbg. (Sieb.), Zinten (Ltz.).  
*L. scutellata* Fabr. s. s. Allenstein (Kug., Sieb.).  
*L. tomentosa* Fabr. s. s. Dz. u. Osterode einigemal im Garten auf Schirmblumen (Kug., Sieb.).  
*L. cineta* Fabr. s. Gbg. (Kr.), Lyck (Sanio).  
*L. sanguinolenta* L. n. h. Schwarzort (Ltz.).  
*L. maculicornis* Deg. g  
*L. livida* Fabr. ebenso.

*L. sexguttata* Fabr. s. Corjeiten (Ltz.).

*L. rufipes* Schall. s. Masuren (Mühl).

*Grammoptera 4-guttata* Fabr. s. nur die schwarze Var. *femorata* Fabr. Neuhausen (Ltz.), Pr. Stargard (Schmidt).

*G. laevis* Fabr. h. bes. auf *Phyteuma spicatum*, Fchstein (Ltz.).

*G. analis* Pz. s. am Waldrande beim Garnierberge geschöpft, Neustadt (Fritzen).

*G. ruficornis* Fabr. s. auf Spir. ulm. im Prangenauer Thal (Dommer), Zoppot (Ltz.).

*G. ustulata* Schall. *praeusta* Fabr. s. aus Eichenzweigen erzogen, April, Neustadt (Fritzen).

### Chrysomelidae.

*Orosodacna cerasi* Fabr. nebst Var. n. s. bes. auf *Lonicera xylosteum*, Kellermühle (Ltz.), Braunsbg. (Sieb.).

*Donacia crassipes* Fabr. h. auf Nuphar-Blättern sitzend, Rauschener Teich, Dammhof (Ltz.).

*D. cincta* Germ. n. s. auf den Blättern von Wasserpflanzen Kbg. (Ltz.).

*D. dentata* Hoppe n. s. ebenso.

*D. sparganii* Ahr. s. Dz. (Czw.).

*D. dentipes* Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).

*D. lemnae* Fabr. n. s. Dammhof (Ltz.).

*D. sagittariae* Fabr. h. ebenso.

*D. obscura* Gyll. n. s. ebenso, an Schilf auf der Dz. Nehrung (Dommer), Lyck (Sanio).

*D. thalassina* Germ. s. Pregelufer bei Holstein (Czw.).

*D. impressa* Pk. *brevicornis* Ahr. h. Neuhäuser, Dammhof (Ltz.); die var. *platysterna* Thoms. (Czw. Dt. Ent. Zt. XXII. 204) n. h. daselbst, Memel (Stnr.).

*D. antiqua* Kunze. *simplicifrons* Lac. *brevicornis* Gyll. s. Pr. Friedland (Föllmer teste Czw.).

*D. sericea* L. *violacea* Gyll. n. h. auf Schilf, Rosenau (Ltz.).

*D. nigra* Fabr. s. Cranz (Ltz.), Pregelmündung (Stnr.).

*D. discolor* Hoppe n. s. auf der Moorbiese bei Dammhof (Ltz.), Lyck (Sanio), Osterode auf *Potamogeton natans* (Kug.).

*D. affinis* Kunze n. s. Kbg. auf den Pregel-

wiesen, ebenso die var. *rustica* Kunze (Czw. Dt. Ent. Zt. XXII. 205), vielleicht eigene Art, Neuhausen (Stnr.), Neustadt (Fritzen) auf *Caltha palustris*.

*D. semicuprea* Pz. *simplex* Fabr. h. auf Schilf überall.

*D. Menyanthidis* Gyll. n. s. auf der Nährpflanze, Dammhof in den Blattwinkeln von *Phragmites*, Juditten (Ltz.), bei Lyck h. (Sanio).

*D. linearis* Hoppe n. h. auf *Carex*-Arten, Kbg. (Ltz.), Dammhof (Czw.).

*D. typhae* Brahm n. s. Putzig (Stf.), Lyck (Sanio), F. F. (Czw., Stnr.).

*D. fennica* Pk. s. Dammhof; die var. *Malinovskyi* Ahr. häufiger, beide unter Wasser auf *Sparganium natans* (Czw.), Grebbiner Wald (Dommer).

*D. hydrocharidis* Fabr. n. s. Leesen, auf Schilf (Dommer) auf *Typha latif.*, Lyck (Sanio), Dammhof (Ltz.).

*D. tomentosa* Ahr. s. auf *Butomus umbellatus*, im Bache von Rosenau (Ltz.).

*Haemonia zosterae* Fabr. *Sahlbergii* Lac. *Curtisii* Thoms. n. s. zuerst bei Putzig (Bogeng), dann Rauschener Teich an *Myriophyllum* (Ltz.), Dz. in einem salzhaltigen Teiche an der Küste auf *Potamogeton marinus* in Menge (Helm).

*H. equiseti* Fabr. s. s. aus dem Damnteich (Czw.).

*Zeugophora subspinoso* Fabr. h. auf Pappeln (Ltz.).

*Z. frontalis* Suffr. s. einmal im Kbg. botan. Garten (Eld.), Neustadt (Fritzen).

*Z. flavicollis* Marsh. h. wie *subspinoso*.

*Z. Turneri* Power. *rufotestacea* Kraatz. s. Dz. Westerplatte (Helm), Ggbg. (Kr.), Higl., Preil (Stnr.).

*Lema rugicollis* Suffr. n. h. Kbg. (Ltz.).

*L. cyanella* Fabr. h. überall auf Wiesen.

*L. Erichsonii* Suffr. s. s. Lyck (Sanio), Dammhof (Stnr.).

*L. flavipes* Suffr. s. s. 1 St. im Königsthal bei Dz. gefangen (Helm).

*L. melanopa* L. h. wie *cyanella*.

*L. cyanipennis* Dft. s. Neustadt (Fritzen).

*Crioceris merdigera* L. n. s. an *Lilium candidum* (Ltz.).

*C. brunnea* Fabr. n. h. Liep (Ltz.).

*C. 14-punctata* Scop. s. Dz., Allenstein (Kug.), auf Spargel, Graudenz (Schmidt).

- C. 12-punctata* L. var. *dodecastigma* Suff. s. s. Osterode (Kug.), Pelplin (Fritzen).
- C. asparagi* L. h. auf Spargelkraut (Ltz.).  
*Clythra tridentata* L. s. auf Weiden und Birken, Dz. (Sieb.), Rauschen (Ltz.).
- C. longimana* L. h. bei Loppehnen auf *Trifolium* (Eld., Ltz.).
- C. longipes* Fabr. s. s. auf Birken, Osterode (Kug.), ist bisher nicht wieder gefunden.
- C. 4-punctata* L. n. s. auf Weidengesträuch Kbg. (Ltz.); die *4-signata* Märk. seltener, Wilkie unter Ameisen (Eld.).
- C. laeviuscula* Ratz. s. Sieb.
- C. aurita* L. s. auf *Salix caprea*, auf Birken, Osterode (Kug.), Dz. (Czw.).
- C. affinis* Hellw. s. Kbg., Elbing, Dz., Putzig (Stf.).
- C. flavicollis* Charp. s. Neuhausen (Stnr.).
- C. cyanea* Fabr. n. h. Fuehshöfen, Blau-stein, Gelguhnen (Ltz.), Lyck (Sanio), Kellermühle (Stnr.).
- C. bucephala* Schall. s. s. auf *Betula nana*, Osterode (Kug., Hellw.), bisher aber nicht wieder gefunden.
- C. 4-maculata* L. h. auf *Pencedanum*, Neu-häuser, Littausdorf (Ltz.), Lyck (Sanio).
- C. scopulina* Fabr. s. Dz. (Dommer).
- Anm. *C. taxieornis* Fabr. wird zwar von Dommer angegeben, doch von den 3 St. seiner Sammlung sind 2 nichtpr., das dritte ist *tridentata* (Czw.).
- Cryptocephalus laetus* Fabr. s. Elbing (Sieb.), Hlgbl. (Seydler), Lyck (Sanio).
- C. coryli* L. n. h. Margen (Ltz.).
- C. cordiger* L. s. Sieb.
- C. variegatus* Fabr. s. Putzig (Stf.).
- C. variabilis* Schneid. n. s. auf Birken, Rauschen (Ltz.).
- C. sexpunctatus* L. s. ebenso.
- C. violaceus* Laich. n. s. auf allerlei Syn- genesisten, ebenso.
- C. aureolus* Suffr. h. ebenso, Warnicken (Ltz.).
- C. serieus* L. 1 St. Warnicken (Ltz.), wahr- scheinlich mit dem vorigen zusammengehörig, was mir die sehr zahlreichen Stücke der Suf- frianschen Sammlung in Halle zu beweisen scheinen: namentlich ist der Unterschied der Biegung der Halsschildseitenränder hinfällig.
- C. hypochoeridis* L. h. auf *Achyrophorus maculatus*, Warnicken (Ltz.), Lyck (Sanio).
- C. nitens* L. n. h. Rauschen (Ltz.), Dz. (Dommer).
- C. nitidulus* Gyll. s. Heilsberg (Sieb.), Lyck (Sanio), Hlgbl. (Stnr.).
- C. 4-pustulatus* Gyll. s. Lyck (Sanio).
- F. Moraei* L. h. auf *Hypericum perfor.* Rauschen (Ltz.).
- C. flavipes* Fabr. n. s. auf *Corylus* ebenso, Dz. (Dommer).
- C. 10-punctatus* L. mit var. *bothnicus* L. s. Horst bei Fehstein (Stnr.), aber h. im Süden der Prov., namentlich bei Lyck auf Wei- den (Sanio).
- C. frenatus* Laich. mit *flavescens* Schneid. h. ebenso, und bei Dz. (Sieb.), bei Kbg. nicht bemerkt.
- C. punctiger* Pk. s. Warnicken (Ltz.), Lop- pehnen (Eld.).
- C. janthinus* Germ. s. auf Weiden, Ortels- burg (Mühl).
- C. fuleratus* Germ. s. Warnicken (Ltz.), Lyck (Sanio), Neustadt (Fritzen) auf *Viburnum opulus*.
- C. flavilabris* Fabr. h. Rauschen (Ltz.).
- C. marginatus* Fabr. s. s. von Kugel. an- gegeben ohne Fundort; bisher nicht wieder ge- funden.
- C. pallifrons* Gyll. n. h. Gbg. (Kr.), Lyck (Sanio).
- C. bipunctatus* L. *bipustulatus* Fabr. *lineola* Fabr. n. h. auf sonnigen Hügeln auf niedrigen Haseln (Kug.), Rauschen, Fehstein (Ltz.).
- C. bistrispunctatus* Germ. Tilsit (Stf.), Hlgbl. (Seydler).
- C. vittatus* Fabr. n. h. Warnicken, Gel- guhnen (Ltz.).
- C. bilineatus* L. s. Kug., Sieb.
- C. vittula* Suffr. h. bei Dz. auf *Thymus serp.* (Stf.).
- C. minutus* Fabr. g. überall, ebenso.
- C. pusillus* Fabr. s. auf Ellern u. Haseln (Kug.); Loppehnen, Lauth (Eld.), Putzig (Stf.), Preil (Ltz.).
- C. gracilis* Fabr. n. h. auf *Melampyrum pratense*, Galtgarben (Eld.), Georgenswalde am Waldhäuschen (Ltz.), Neuhausen, Dammhof (Stnr.).



*C. Hybneri* Fabr. n. s. Conitz (Sieb), Rauschen (Ltz.), Metgethen (Stnr.).

*C. labiatus* L. h. mit var. *digrammus* Suffr. Rauschen (Ltz.), Lyck (Sanio), Neustadt (Fritzen).

*C. Wasastjerna* Gyll. s. auf nassen Wiesen, Lyck (Sanio), F. F. (Czw.).

*C. geminus* Gyll. n. s. Lyck (Sanio).

*C. querceti* Suffr. s. Dz. (Czw.).

*C. frontalis* Marsh. s. Corjeiten (Ltz.).

*C. pini* L. *abietis* Suffr. n. h. Rauschen (Ltz.).

*Pachybrachis hieroglyphicus* Leach. *histrion* Fabr. h. bei Loppennen auf *Trifolium* (Eld., Ltz.).

*Pachnephorus tessellatus* Dft. s. s. Lyck (Sanio), Memel (Stnr.).

*P. arenarius* Fabr. bei Osterode in sandigen Gegenden g. (Kug.), auch sonst n. s. Rauschen (Ltz.).

*Eumolpus obscurus* L. n. s. auf *Epilobium angustif.* Löwenhagen (Ltz.).

*E. vitis* Fabr. s. im Frühjahr auf Buchenstrauch, Neustadt (Fritzen).

*Timarctia coriaria* Laich. s. s. Arnstein bei Zinten (Schiefferdecker).

*Chrysomela staphylea* L. n. s. auf Grasplätzen Kbg. (Ltz.).

*C. varians* Schall. h. auf *Hypericum* (Ltz.).

*C. gottingensis* L. n. s. wie *staphylea*.

*C. haemoptera* L. n. h. Rauschen (Ltz.).

*C. gypsophylae* Küst. s. s. Dz. (Stf.).

*C. sanguinolenta* L. n. s. Rauschen, Kahlberg (Ltz.).

*C. marginalis* Dft. n. h. Putzig (Stf.), unter Steinen auf Sandboden (Ltz.), Neuhäuser (Stnr.).

*C. limbata* Fabr. n. s. in Sandgräben, Rauschen (Stnr.).

*C. carnifex* Fabr. n. s. Dz. (Ltz.).

*C. marginata* L. h. in den Strandgegenden unter Steinen (Eld., Ltz.); auf *Anchusa offic.* und *Achillea millef.* Lyck (Sanio)

*C. analis* L. Schach Fabr. n. s. Rauschen (Ltz.), Dz. (Helm).

*C. lurida* L. s. Dz. (Ltz.).

*C. menthastri* Suffr. n. s. Westpr. auf *Mentha silvestris*, Juli (Strübing).

*C. graminis* L. h. auf *Tanacetum*, Warnicken (Ltz.).

*C. fastuosa* L. g. auf *Lamium album*.

*C. cerealis* L. h. auf *Thymus serp.* Lyck (Sanio), Neustadt (Fritzen), die var. *alternans* Pz. Megerlei Fabr. h. Pillau (Ltz.); var. *violacea* Schall. *mixta* Suffr. h. Neustadt (Fritzen).

*C. polita* L. n. s. Warnicken (Ltz.), Lyck (Sanio).

*C. lamina* Fabr. n. h. ebenso; zuerst Oct. 1795 von Kug. auf Nessel gefunden.

*C. fucata* Fabr. zuw. h. auf *Hypericum* perf. Lyck (Sanio), Putzig (Stf.), Ggbg. (Kr.), Dz., Westerplatte (Helm).

*C. geminata* Pk. s. Sieb.

*Lina aenea* L. g. auf Ellern.

*L. collaris* L. n. s. auf *Salix rosmarinifolia* Heub. (Sieb.), Lyck (Sanio), Putzig (Bogeng), Schwarzort (Ltz.); die var.? *alpina* Zett. seltener, auf dem Sarker Bruche (Sanio), Glettkau (Czw.).

*L. 20-punctata* Scop. n. h. Elbing, Pr. Holland (Sieb.), Hlgbl., einmal 1868 auf Weidenblättern sehr zahlreich (Stnr.), Masuren (Mühl).

*L. cuprea* Fabr. n. h. Dammhof (Eld., Ltz.).

*L. lapponica* L. s. Margen (Ltz.), Braunsberg (Sieb.), die var. *bulgharensis* Fabr. Dz. auf *Alnus glutinosa* Neufahrwasser (Helm), Hlgbl. (Stnr.); zw. Zoppot a. Oxhöft auf Weiden, die Hauptform bes. in trocknen heißen Sommeren (Fritzen).

*L. populi* L. h. auf Espen Kbg. (Ltz.).

*L. tremulae* F. h. auf *Salix purpurea*, Lyck (Sanio).

*L. longicollis* Suffr. s. Wernsdorf (Kuwert), Lyck (Sanio), Putzig (Stf.).

*Gonioctena rufipes* Deg. s. Dz. (Dommer), Putzig (Bogeng), Oliva (Czw.).

*G. viminalis* L. g. auf Weidenstrauch; die var. *haemorrhoidalis* Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.).

*G. triandrae* Suffr. *affinis* Schh. n. h. Putzig (Stf.).

*G. sexpunctata* Pz. von Kug. angegeben ohne Fundort, auch bisher nicht wieder gefunden.

*G. litura* Fabr. n. s. auf *Sarothamnus*, Zoppot (Ltz.).

*G. 5-punctata* Fabr. n. h. Putzig (Stf.).

*G. pallida* L. n. h. Wehlau (Ltz.).

*Gastrophysa polygoni* L. g. überall.

*G. raphani* Fabr. n. s. Kbg. am Pregeldamm auf Cruciferen (Ltz.).

*Colaphus sophiae* Schall. n. h. ebenso.

- Plagiodera armoraciae* L. n. s. ebenso.  
*Phaedon pyritosus* Ross. *graminicola* Dft. s. unter Weidenblättern, Kbg. (Sauter).  
*P. betulae* L. Suffr. *cochleariae* Gyll. n. s. Lyek (Sanio).  
*P. concinnus* Steph. s. auf Triglochin maritima, Putzig (Stf.).  
*P. cochleariae* Fabr. s. Osterode (Kug., von Fabr. selbst anerkannt), Neustadt (Fritzen).  
*Phratora vitellina* L. g. überall auf Weiden.  
*P. vulgatissima* L. n. s. Dz., Putzig (Stf.), Kbg. (Ltz.); auf *Salix viminalis*, Lyek (Sanio); hieher *tibialis* Suffr. Lopphehen, Lauth, Dz., Putzig, Kbg., Lyek (Stf., Eld., Ltz.); nach Sanio nur auf *Salix purpurea*; den Uebergang bildet die von Sanio i. l. *nigripes* genannte Form (Lyek).  
*P. atrovirens* Corn. s. Dammhof von jungen Espen geklopft (Czw.).  
*Prasocuris (Helodes) aucta* Fabr. *egena* Gyll. n. s. in Gräben auf *Ranunculus*, Kbg. (Ltz.); Stücke mit rothgelbem Rande der Fld. habe ich hier noch nicht gefunden.  
*P. marginella* L. h. auf *Caltha pal.* Kbg. (Ltz.).  
*P. hannoverana* Fabr. n. s. ebenso, auch auf *Cardamine prat.* (Kug., Ltz.).  
*P. phellandrii* L. h. auf der Nährpflanze, Dammhof (Ltz.).  
*P. beceabungae* Illig. n. s. wie *aucta*.  
*Adimonia tanacetii* L. h. auf der Nährpflanze (Ltz.).  
*A. rustica* Schall. h. ebenso.  
*A. fontinalis* Boh. n. h. Dz. (Czw., Helm).  
*A. Dahlii* Joann. s. Neustadt (Fritzen).  
*A. Oelandica* Boh. unter den Duplis der Eld. Sammlung fand ich unter *tanacetii* einige St. (Ltz.).  
*A. interrupta* Oliv. s. Lopphehen (Eld.).  
*A. haematidea* Germ. s. s. im Pampauer Thal auf Erlengebüsch (Dommer), Wernsdorf (Kuwert).  
*A. sanguinea* Fabr. s. auf Weidengebüsch, Dz. (Ltz.).  
*A. cupreae* L. g. auf Weiden.  
*Galeruca viburni* Pk. h. auf *Vib. opulus*, Zinten (Ltz.).  
*G. crataegi* Forst. n. h. aus einer pr. Forst (Dossow), im Danziger Lazarethgarten (Helm).  
*G. nymphaeae* L. *sagittariae* Gyll. g. auf Nupharblättern, Rauschener Teich (Ltz.).  
*G. lineola* Fabr. h. Kbg. (Ltz.).  
*G. calmariensis* L. h. ebenso.  
*G. tenella* L. h. ebenso.  
*Agelastica alni* L. g. auf Ellern.  
*A. halensis* L. n. s. Arnauer Kirchhof (Ltz.), Bohnsack, Jäsehkenthal (Helm).  
*Phyllobrotica 4-maculata* L. h. am Sasper See (Dommer). im Ellernbruch bei Cranz (Ltz.), Baranner Forst Lyek (Sanio).  
*Luperus (Calomicrus) pinicola* Dft. n. h. Tapiau, im Frischingswalde auf Kiefern (Patzé), Dz. (Czw., Helm), bei Neusladt s. h. (Fritzen).  
*L. rufipes* Fabr. n. h. Heilsberg, im Simserthale (Ltz.).  
*L. flavipes* L. n. h. ebenso, Memel (Nanke), Neustadt (Fritzen).  
*Haltica eruceae* Oliv. n. s. auf Weiden und Birken, Trenker Waldhaus, Rastenbg. (Ltz.).  
*H. oleracea* L. g. auf Kohlblättern.  
*H. lythri* Aubé n. h. wie *eruceae*.  
*H. mercurialis* Fabr. auf der Nährpflanze Warnicker Park s. h. Juni (Ltz.).  
*H. (Crepidodera) impressa* Fabr. h. auf feuchten Wiesen Kbg. (Ltz.).  
*H. ferruginea* Scop. g. überall.  
*H. rufipes* L. n. h. ebenso, Lyek (Sanio).  
*H. nitidula* L. s. Ggbg. (Kr.).  
*H. aurata* Marsh. *versicolor* Kutsch. h. auf Weiden, Kbg. (Ltz., Czw.).  
*H. chloris* Foudr. n. h. Nogatufer bei Ktzn. (Czw.).  
*H. helxines* L. s. h. auf Weiden.  
*H. femorata* Gyll. wird von Zebe als pr. angeführt; ich habe sie noch nicht gefunden.  
*H. nigritula* Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*H. Modeeri* h. Conitz (Sieb.), Kbg. (Ltz.).  
*H. salicariae* Pk. n. s. Kbg. (Ltz.).  
*H. pubescens* Koch. n. s. auf sehr versch. Pflanzen, ebenso.  
*H. rubi* Pk. h. ebenso.  
*H. (Balanomorpha) rustica* L. h. Dz. (Dommer), auf *Rumex*, Neuhäuser (Ltz.).  
*H. chrysanthemi* Koch. h. ebenso.  
*H. obtusata* Gyll. n. h. Dz. (Dommer).  
*H. (Podagrica) fuscipes* Fabr. s. auf Schilf, Dz. (Dommer).  
*H. malvae* Illig. s. s. Dz. (Zebe).  
*H. fuscicornis* L. s. Kug. Sieb.

- H. (Phyllostreta) armoraciae* Koch. h. auf Meerrettig, Rosenau, Wernsdorf (Ltz.).  
*H. tetrastigma* Com. einmal h. auf Cardamine amara, Schromb. (Czw.).  
*H. flexuosa* Illig. h. Kbg. (Ltz.).  
*H. brassicae* Fabr. h. ebenso.  
*H. excisa* Redt. h. ebenso; auf Flusswiesen, Lyck (Sanio).  
*H. sinuata* Steph. h. ebenso.  
*H. undulata* Kutsch. n. h. ebenso.  
*H. nemorum* L. g. überall.  
*H. vittula* Redt. n. s. Kbg. (Ltz.), Neustadt (Fritzen).  
*H. atra* Pk. *obscurella* Illig. s. h. überall auf Cruciferen.  
*H. lepidii* Koch. s. h. ebenso.  
*H. antennata* Koch. s. s. Lyck (Sanio).  
*H. (Aphthona) cyparissiae* Koch. s. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).  
*H. lutescens* Gyll. s. Lyck (Sanio), Kbg. (Stnr.), Neustadt (Fritzen).  
*H. coerulea* Pk. h. auf Iris pseud. Cranz (Ltz.).  
*H. hilaris* Steph. n. s. Kbg. (Czw.), Dz. (Helm, Fritzen).  
*H. euphorbiae* All. g. auf Nadelholz.  
*H. cyanella* Redt. n. h. Ggbg. (Kr.).  
*H. violacea* Koch. s. Blaustein (Ltz.), Ktzn. (Czw.).  
*Longitarsus echii* Koch. n. h. Sieb.  
*L. Linnaei* Dft. s. Neustadt (Fritzen).  
*L. anchusae* Pk. n. s. Rauschen (Ltz.).  
*L. niger* Koch. s. wie Linnaei.  
*L. ater* Fabr. *parvulus* Pk. g. auf Nadelholz.  
*L. holsaticus* L. n. h. Kbg. (Ltz.).  
*L. 4-pustulatus* Fabr. s. im Moose b. Kbg. (Ltz.).  
*L. castaneus* Dft. s. F. F. (Czw.), Dz. (Helm).  
*L. luridus* Scop. h. Wernsdorf (Ltz.).  
*L. brunneus* Dft. h. wie castaneus.  
*L. minusculus* Foudr. s. Neustadt (Fritzen).  
*L. nasturtii* Fabr. n. h. Rosenau (Ltz.).  
*L. thoracicus* Steph. All. s. Kbg. Plantage (Czw.), Neustadt (Fritzen).  
*L. tabidus* Fabr. *verbasci* Pz. h. bes. auf Senecio Jacobaea (Ltz.).  
*L. atricillus* L. s. h. bes. auf *Lepidium ruderales* (Ltz.).  
*L. atricapillus* Dft. n. h. Lyck (Sanio) Kbg. (Sauter).  
*L. melanocephalus* Deg. *atriceps* Kutsch. s. Dz. (Dommer), F. F. (Czw.).  
*L. lycopi* Foudr. s. wie *thoracicus*  
*L. pusillus* Gyll. s. bei Nicolayken (Sanio).  
*L. femoralis* Marsh. s. wie *melanoceph.*  
*L. pratensis* Pz. n. h. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).  
*L. ochroleucus* Marsh. einmal 1875 in Menge gefangen, sonst nicht, Lyck (Sanio), Neustadt (Fritzen).  
*L. laevis* Dft. h. Kbg. Pregelwiesen (Czw., Stnr.).  
*Plectroscelis semicoerulea* Koch. s. Ktzn. auf Weiden an der Nogat (Czw.), Memel (Stnr.).  
*P. concinna* Marsh. *dentipes* Koch. g. überall.  
*P. aridella* Pk. h. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).  
*P. aerosa* Letzn. s. am Ufer d. Damnteichs Juni (Czw.).  
*P. Sahlbergii* Gyll. s. ebenso.  
*P. Mannerheimii* Gyll. s. s. Belschwitz (Kr.).  
*P. aridula* Gyll. s. Putzig (Stf.), Lyck (Sanio).  
*Psylliodes dulcamarae* Koch. h. Kbg. (Ltz.).  
*P. chalcomerus* Illig. s. Kbg. (Czw., Ltz.), Neustadt (Fritzen).  
*P. hyoseyami* L. n. s. Dz. (Ltz.).  
*P. chrysocephalus* L. h. Kbg. (Ltz.), Putzig (Stf.); die var. f. Thoms. einmal Kbg. (Ltz.).  
*P. rapae* Illig. h. auf Raphanus, Dz. (Dommer).  
*P. cupreus* Koch. n. h. auf *Sisymbrium officinale*, Kbg. Plantage (Czw.).  
*P. marcidus* Illig. s. Pillau, auf *Elymus arenarius* (Eld.), Dz. (Helm).  
*P. affinis* Pk. n. s. Kbg., Dz. (Czw.).  
*P. attenuatus* Koch. n. s. bei Lyck (Sanio).  
*P. piceus* Redt. s. Kbg. auf dem nassen Garten (Czw.), F. F. (Stnr.).  
*P. luteolus* Müll. s. Neustadt (Fritzen).  
*P. cucullatus* Illig. s. h. überall.  
*Dibolia occultans* Koch. n. h. Kbg. (Ltz.), Neustadt (Fritzen).  
*D. Foersteri* Bach. Neustadt (Fritzen).  
*D. depressiuscula* Ltzn. s. s. Lyck (Sanio).  
*D. cryptocephala* Koch. s. Kbg. (Sauter, Ltz.), Dz. (Helm).

*D. cynoglossi* Koch. s. Ggbg. (Kr.).  
*D. rugulosa* Redt. s. Kbg. (Czw.), Dz.  
 (Helm).

*Mniophila muscorum* Koch. n. h. aus Moos  
 von Margen (Sauter, Ltz.), F. F. (Czw., Stnr.),  
 Vierbrkr. (Stnr.).

*Sphaeroderma cardui* Gyll. zuw. h. Lop-  
 pehnen (Eld.), Lyck (Sanio).

*Argopus hemisphaericus* Dft. n. s. auf  
 Trollius europ. Ramukwald b. Allenstein (Müller),  
 auf Pulsatilla patens Lyck (Sanio).

*Hispa atra* L. s. s. Warnicken (Ltz.), lebt  
 auf Rubus caesius.

*Cassida murraea* L. s. Kbg. (Ltz.), Lyck  
 (Sanio).

*C. sanguinosa* Suffr. n. s. Putzig (Stf.),  
 Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).

*C. rubiginosa* Illig. n. s. Kbg. (Ltz.), Lyck  
 (Sanio).

*C. thoracica* Fourc. s. s. einmal Osterode  
 (Kug.), Elbing (Sieb.), Lyck (Sanio).

*C. vibex* Fabr. n. h. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).

*C. seladonia* Gyll. s. s. Kbg. (Czw.), Dz.  
 I St. als prasina bestimmt in der Dommerschen  
 Sammlung.

*C. chloris* Suffr. languida Cornel. s. im  
 Luckneiner Forst bei Nieolayken wahrsch. auf  
 Cirsium arvense (Sanio).

*C. stigmatica* Suffr. h. wie vibex, Qued-  
 nau, Dammhof, Rauschen (Stnr.).

*C. denticollis* Suffr. s. Dz. (Czw.), Cranzer  
 Plantage (Ltz.).

*C. sanguinolenta* Müll. n. s. Kbg. (Ltz.).

*C. oblonga* Illig. s. Sanio (Lyck).

*C. nobilis* L. viridula Pk. n. s. Kbg. (Ltz.).

*C. margaritacea* Schall. s. s. Dz., Putzig  
 (Stf.).

*C. subreticulata* Suffr. s. Ggbg. (Kr.), Neu-  
 stadt (Fritzen).

*C. nebulosa* L. g. auf Kleefeldern.

*C. ferruginea* Fabr. n. h. wie vibex.

*C. obsoleta* Illig. s. h. Kbg. (Ltz.).

*C. atrata* Fabr. s. s. auf der Karbojin bei  
 Lyck (Sanio).

*C. equestris* Fabr. h. Kbg. (Ltz.).

*C. hemisphaerica* Hbst. s. Zinten (Ltz.),  
 Lyck (Sanio).

## Erotyliidae.

*Engis bipustulata* Fabr. s. in Schwämmen,  
 Grebbiner Wald (Dommer), Kbg. (Andersch).

*E. rufifrons* Fabr. s. Dz. ebenso (Stf.).

*E. humeralis* Fabr. g. in Weidenschwämmen.

*E. sanguinicollis* Fabr. s. wie bipust.

*Triplax russica* L. n. h. Hirschau (Eld.,  
 Ltz., Stnr.), Ottominer Wald (Dommer), Pr.  
 Eylau (Andersch).

*T. aenea* Schall. n. s. Fehstein, Zinten (Ltz.),  
 Hgbl. (Stnr.).

*T. rufipes* Fabr. n. h. ebenso, Neustadt  
 (Fritzen), im Buchenschwamm, Osterode (Kug.).

*Tritoma bipustulata* Fabr. n. h. in Buchen-  
 schwämmen Osterode (Kug.), Warnicken (Ltz.).

## Endomychidae.

*Lycoperdina succincta* L. s. in Baumschwäm-  
 men, Putzig (Stf.), Weichselmünde (Helm),  
 Rauschen (Ltz.).

*L. bovistae* Fabr. s. Stangenwalder Forst  
 (Dommer), Rauschen (Ltz.).

*Mycetina cruciata* Schall. s. Osterode, im  
 Polyporus suaveolens (Kug.); im Schwamm einer  
 morschen Birke Masuren (Mühl), Neustadt  
 (Fritzen).

*Endomychus coccineus* L. n. h. Warnicken  
 (Ltz.), Kbg. in Holzgärten (Czw., Stnr.).

*Mycetaca hirta* Marsh. g. in Kellern auf Me-  
 ruliuss lacrimans u. Schimmel (Czw.), Moosbude  
 in morschem Eichenholz (Ltz.).

*Alexia pilifera* Müll. s. s. im Moose von  
 Heub. (Stf.).

## Coccinellidae.

*Hippodamia 13-punctata* L. g. in den Strand-  
 gegenden.

*H. 7-maculata* Deg. s. s. Kug. Sieb.

*H. 11-notata* Schnd. s. Neustadt (Fritzen)  
 auf Disteln am Zarnowitzer See.

*Anisosticta 19-punctata* L. n. s. Kbg. (Ltz.).

*Adalia oblitterata* L. M-nigrum Fabr. h.  
 auf Nadelholz, Bludauer Forst (Ltz.).

*A. bothnica* Pk. h. ebenso.

*A. bipunctata* L. mit vielen Var. g. überall.  
*Coccinella marginepunctata* Schall. s. am Luckneiner See (Sanio), Metgethen (Ltz.), Weichselmünde (Helm).

*C. impustulata* L. n. s. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).

*C. 14-pustulata* L. n. s. ebenso.

*C. variabilis* Fabr. mit vielen Var. h.

*C. undecimpunctata* L. s. Kbg. (Ltz.).

*C. hieroglyphica* L. n. h. ebenso.

*C. 5-punctata* L. g. überall.

*C. 7-punctata* L. g. ebenso.

*C. distincta* Fald. *labilis* Muls. s. s. Neuhäuser (Hensche), Calvarienberg bei Neustadt (Fritzen).

*Halysia oblongoguttata* L. h. auf Nadelholz (Ltz.).

*H. ocellata* n. h. ebenso.

*H. tigrina* L. s. ebenso, Margen, Wernsdorf (Ltz.), Weichselmünde (Helm).

*H. 18-guttata* L. h. ebenso.

*H. 10-guttata* L. s. Masuren (Mühl), Ggbg. (Kr.).

*H. bis 7-guttata* Schall. s. s. Kug., Sieb.

*H. 16-guttata* L. n. s. Ludwigsort (Ltz.).

*H. 12-guttata* Poda. n. s. ebenso.

*H. 22-punctata* L. s. im Holsteiner Park (Ltz.).

*H. 14-guttata* L. n. s. Kbg. (Ltz.).

*H. conglobata* L. *14-punctata* L. g. überall.

*Micraspis 12-punctata* L. h. an Baumwurzeln, Margen (Ltz.), Dz. (Dommer, Frantzius).

*Chilocorus renipustulatus* Scrib. h. auf Nadelholz (Ltz.).

*C. bipustulatus* L. h. ebenso.

*Eochoinus 4-pustulatus* L. h. ebenso.

*E. auritus* Scrib. s. Oliva (Czw.).

*Hyperaspis campestris* Hbst. s. Vierbrkr. (Ltz.).

*H. reppensis* Hbst. s. Cranz (Ltz.).

*Epilachna globosa* Schneid. g. überall.

*E. 11-maculata* Fabr. s. s. Osterode, nur einmal (Kug.), nachher nicht wieder.

*E. impunctata* L. h. Kbg. (Ltz.).

*Novius cruentatus* Muls. s. s. einmal unter Kiefernrinde bei Dz. (Stf.).

*Platynaspis villosa* Fourer. s. Lyck (Sanio), Kbg. (Ltz.).

*Scymnus 4-lunulatus* Illig. s. Kug., Sieb.

*S. Redtenbacheri* Muls. s. s. Lyck (Sanio), Ggbg. (Kr.).

*S. bipunctatus* Kug. *biverrucatus* Pz. s. Kug., Sieb.

*S. nigrinus* Kug. n. s. auf Pappeln u. Nadelholz, Lyck (Sanio).

*S. pygmaeus* Fourer. *parvulus* Fabr. s. nur einmal auf Rosen, Osterode (Kug.), Sieb.

*S. marginalis* Rossi. s. Dz. (Dommer), Lyck (Sanio).

*S. frontalis* Fabr. *affinis* Redt. *bisbisignatus* Redt. n. s. Kbg. (Ltz.).

*S. abietis* Pk. h. ebenso, Dammhof (Str.).

*S. discoideus* Illig. h. auf Nadelholz (Ltz.).

*S. analis* Fabr. s. Kug., Sieb.

*S. haemorrhoidalis* Hbst. n. h. Kbg. (Ltz.), Neustadt (Fritzen).

*S. capitatus* Fabr. n. s. ebenso.

*S. ater* Kug. h. wie *discoideus*.

*S. minimus* Rossi. s. Sieb.

*Rhizobius litura* Fabr. n. s. an Weiden und Eichen (Kug.), Lyck (Sanio).

*Coccidula scutellata* Hbst. n. h. Kbg. (Ltz.).

*C. rufa* Hbst. h. an den Wurzeln von Weiden an Gräben (Kug.), Kbg. (Ltz.), Glettkau zwischen *Elymus arenarius* (Czw.).

### Corylophidae.

*Sacium (Clypeaster) pusillum* Gyll. s. s. unter Baumrinde, Putzig (Stf.).

*Sericoderus lateralis* Gyll. s. s. ebenso, Kbg. (Str.).

*Corylophus cassidoides* Marsh. s. Ktzn. (Czw.), Kbg. (Eld., Ltz.).

*Orthoperus punctatus* Wank. s. s. Kbg. (Czw.).

*O. Klucki* Wank. s. Ktzn. unter Heu am Rande eines Baches (Czw.) Artrechte? Seidl. Fn. Balt. 197; Berl. Ent. Z. XV. 140.

*O. brunripes* Gyll. *piceus* Steph. g. in faulenden Pflanzenstoffen.

*O. punctulum* Marsh. *atomarius* Heer. s. s. Rastenbg. (Czw.).

Während des Druckes dieser Arbeit gingen mir von Hrn. Calculator Fritzen in Neustadt (Westpr.) sehr schätzenswerthe Notizen und Beiträge zu, die ich nur zum Theil für dies Verzeichniss habe benutzen können. Die unmittelbare Nähe bedeutender Forsten (Darzluber und Piekelkener Forst), ferner der grosse Zarnowitzer See bieten dem Manne vortreffliche Gelegenheit, und seine sehr anerkennenswerthe Energie trägt zum Erfolge erfreulich bei.

Das nachzutragende ist folgendes: *Dromius melanocephalus* Dej., *Helophorus aeneipennis* Thoms., *Hydraena flavipes* St., *Cercyon aquaticus* Muls., *Gyrinus natator* L. var. *marginatus* Germ., alles bei Neustadt u. Danzig gefunden; *Anchomenus longiventris* Mannh. aus einer vom Sturm umgebrochenen Esche bei Ponarth bei Kbg. 7 St. (Fritzen).

Aber auch andere Sammler haben nicht gefeiert, von ihnen ist das Verzeichniss mit folgenden seltenen Arten bereichert: *Platystethus capito* Heer. Kbg. (Ltz.); *Synchita Mediolanensis* Villa. 1 St. Gelgubnen bei Allenstein (Ltz.); *Apion meliloti* Kirb. Kbg. (Ltz.); *Magdalinus coeruleipennis* Desbr. (fehlt bei Stein u. Weise) 2 St. mit *violaceus*, Löwenhagen (Ltz.); *Quedius picipes* Mannh. unter Buchenlaub bei Pelonken (Czw.); *Q. fumatus* Steph. *peltatus* Er. Schwedendamm bei Oliva u. Pelonken (Czw.); *Epuraea melanocephala* Marsh. im königl. Garten von Oliva (Czw.); *Agaricophagus cephalotes* Sehm. Dz. Rheda u. Conradshammer (Czw.); *Stenus coxalis* I. Sahlb. bisher nur aus Finnland be-

kannt, mehrfach bei Dz. (Czw.) nach einem typ. Stücke durch Eppelsheim bestimmt; *Hygropora cunctans* Er. Dz. (Czw.); *Homalota villosula* Kraatz. ebenso. *Ceuthorh. Sahlbergi* Schh. Gbg. (Kr.); *Calodera protensa* Er. s. Kbg. (Czw.). Auffallend ist der Fund eines lebenden Stückes von *Ochina hederæ* Müll. in einem Zimmer, das einige Töpfe mit Epheu enthielt (Künow). Da der Epheu aber in manchen unserer Wälder sogar recht reichlich vertreten ist (ich erinnere nur an den Wald bei dem sog. Ziegenhals bei Elbing), so ist die Möglichkeit eines weiteren Vorkommens jenes Käfers nicht ausgeschlossen.

Das Resultat ist nun, dass wir in unserer Fauna 3255 Arten von Coleopteren haben, d. h. annähernd  $\frac{1}{4}$  von den Europ. bei Stein u. Weise verzeichneten 14621 Arten, genauer 0,223. Von den grösseren Familien haben bei uns die meisten Repräsentanten: die *Coccinellidae*  $\frac{523}{223} = 0,424$ , die *Wasserkäfer*  $\frac{119}{114} = 0,369$ , die *Nitidulidae*  $\frac{232}{234} = 0,348$ , die *Staphylinidae*  $\frac{284}{155} = 0,322$ ; die übrigen stehen tiefer, am niedrigsten die *Tenebrionidae*  $\frac{11}{11} = 0,042$ . Es fehlen uns nur die auch in Europa nur durch sehr wenige, mitunter durch eine einzige Art repräsentirten Familien der *Paussidae*, *Rhyssodidae*, *Derodontidae*, *Thorictidae*, *Cebrionidae*, *Rhipiceridae*, *Brenthidae*, *Platypyllidae*.

Möchte meine Arbeit zu weiterem Forschen in bisher unberührten Gegenden Preussens veranlassen; es wird sicherlich nicht vergeblich sein!

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Preussens](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Lentz Leonhard

Artikel/Article: [Catalog der Preussischen Käfer 1-64](#)