

Septoria Bromi Sacc. Var. *Alopecuri* Karst.

Maculae nullae. Spermogonia 80—100 mmm lata. Spermatia dilutissime flava, longit. 58—65 mmm, crassit. 2,5—3 mmm.

In foliis *Alopecuri pratensis* prope Mustiala.

Coniothyrium myriocarpum (Fr.) Sacc. var. *abietinum* Karst.

Stylosporae ovales, subinde inaequilaterales, fuligineae, eguttulatae, fuligineae, longit. 11—15 mmm, crassit. 5—8 mmm.

In ligno abietino ad Mustiala.

Ceratostomella microcarpa Karst. (N. sp.)

Perithecia gregaria, erumpentia, denique libera, vulgo sphaeroidea, atra, latit. circiter 0,3 mm, rostro cylindraceo, aequali, laevi, perithecium aequante vel eo duplo longiore. Ascii crasse clavati, longit. 18—25 mmm, crassit. 4 mmm. Sporae congregatae s. tristichae, elongatae vel cylindraceae, curvulae, simplices, hyalinae, longit. circiter 4 mmm, crassit. 0,5—1 mmm.

In ligno vetusto Populi tremulae prope Mustiala, m. Majo.

A congeneribus minutie partium omnium statim tuteque dignoscitur.

Fragmenta mycologica XVIII. Auctore P. A. Karsten.

Peziza asperior Nyl. eadem est ac *Sphaerospora trechispora* (Berk. et Br.) Cook.

Metasphaeria Trollii Karst. (N. sp.)

Perithecia in greges minutos sociata, primitus epidermide tecta, deinde denudata, applanata, orbicularia vel ellipsoidea, demum poro pertusa atra, latit. 0,3—0,4 mm.

Ascii cylindracei, brevissime pedicellati, longit. 30—40 mmm, crassit. 5—6 mmm. Sporae 8 : nae, distichae, cylindraceae, rectae, 4-guttulatae, hyalinae, longit. 11—15 mmm, crassit. 1,5—2 mmm.

Ad caules *Trollii europaei* emortuos prope piscinam Olenji Maris glacialis.

Phoma Callunae Karst. a *Phoma Ericae* Sacc. Mich. VII., p. 336 (non *Sphaeria Ericae* Fr.) tantum spermogoniis minoribus, semper epidermide tectis spermatiisque ellipsoideis et crassioribus differre videtur, ergo solum ut ejusdem variatio censenda.

Aposphaeria subcrustacea Karst. (N. sp.)

Spermogonia superficialia, confertissima, ovoidea vel sphaeroideo-ovoidea, vertice in ostiolum brevissimum conoi-

deum attenuata, nitida, laevia, diam. circ. 0,3 mm. Spermatia fusoideo-oblongata, vulgo recta, 2-guttulata, hyalina, longit. 6—7 mmm, crassit. 1,5—2 mmm.

Supra lignum Pruni Padi in Mustiala.

Dothiorella populicola Karst. (*Phoma populicola* Karst. antea), in ramis Populi speciei obvia, affinis est populicolis: *Dothiorellae populaceae* Thuem., *Phomae Crepini* Speg. et *Phomae populeae* Sacc., his omnibus autem differens spermatiis allantoideis, minoribus, curvulis, eguttulatis.

Species *Dothiorellae* Sacc., exc. *Dothiorella pyrenophora* Sacc. = *Dothiora pyrenophora* Fr. = *Hysterio Sorbi* Wahl. = *Dothichyiza Sorbi* Lib. = *Micropora Sorbi* Thuem. nec. *Micropora Sorbi* Sacc. *spermogonium?* *Dothiorae* Fuck. verisimiliter sistente, *spermogonia Otthiae* (et *Botryosphaeriae*) videntur.

Dothiorella sorbina Karst. (N. sp.)

Spermogonia cortici innata, erumpentia, caespitosa vel botryose aggregata, obovoidea vel rotundata, vulgo inaequalia, vertice subinde depressa, astoma, interdum ostiolo papillato, aterrima, latit. circ. 0,3 mm. Spermatia fusoideo-elongata, recta, eguttulata hyalina, longit. 3—5 mmm, crassit. 0,5 mmm. Basidia nulla visa.

In cortice ramorum exsiccatorum *Sorbi Aucupariae* ad oppidum Wasam.

Diplodia (*Pseudodiplodia*) *lignaria* Karst. (N. sp.)

Pycnidia laxe gregaria, emergentia, demum subsuperficialia, applanata, orbicularia vel ellipsoidea, nigrescentia, humectata fuliginea, primitus clausa, mox ore lato orbiculari vel ellipsoideo aperta, latit. circ. 0,2 mm. Stylosporae ellipsoideae, utroque apice obtusae, uniseptatae, ad septum non vel vix constrictae, loculis uniguttulatis, dilute olivaceae, longit. 10—13 mmm, crassit. 6—8 mmm.

In ligno vetusto ad Helsingforsiam.

A *Diplodia* generice distingvi meretur ob pycnidia ceraceo-carnosa, mox ore lato aperta.

Hendersonia ulmea Karst. (N. sp.)

Pycnidia subgregaria, cortici plus minus insculpta, rotunda, ut plurimum inaequalia, vulgo papilla brevissima, obtusa instructa, atra, latit. 0,4—0,5 mm. Stylosporae ellipsoideae vel oblongatae, utrinque plus minus attenuatae vel subacutatae, 3-septatae, fulvae, dein fulvofuligineae, longit. 14—18 mmm, crassit. 6—8 mmm.

Ad ramos exsiccatos Ulmi, Aboae.

Myxosporium carneum Thuem. * *sticticum* Karst. (N. subsp.)

Acervuli elongati, saepe flexuosi, rarius oblongati vel orbiculares, peridermio demum rima longitudinali dehiscente velati, applanati, flavidi, longit. circ. 1 mm. Conidia elongata vel oblongata, simplicia, recta, hyalina, longit. 9—11 mmm, crassit. 2—3 mm.

Ad ramos emortuos Fraxini excelsioris in Mustiala, m. Oct.

Cercosporaella Pastinaceae Karst. a Cercospora Apii Fres. forte haud satis diversa.

Fragmenta mycologica XIX. Auctore P. A. Karsten.

Solenia crocea Karst. (N. sp.)

Tubuli dense gregarii, cylindracei, erecti, tomentosi, circiter 0,3 mm alti. Sporae clavatae, utroque apice acutatae, hyalinae, simplices, longit. 9—12 mmm, crassit. 3—4 mmm.

In frondibus Struthiopteridis germanicae emortuis in Fennia australi.

Helotium nectriella Karst. (N. sp.)

Apothecia gregaria vel sparsa, saepe confluentia, sessilia, convexa, subimmarginata, ceracea, incarnata, glabra, latit. 0,2—0,3 mm. Ascii clavati, longit. 33—45 mmm, crassit. circiter 7 mmm. Sporae 8:nae, distichae, elongatae, longit. 6—7 mmm, crassit. 1,5—2 mmm. Paraphyses filiformes, apice incrassatae.

Ad caules aridos Solani tuberosi in Mustiala.

Diplodia obsoleta Karst. (N. sp.)

Pycnidia subgregaria, epidermide tecta, subsphaeroidea, astoma vel saepius ostiolo papillato perforante, atra, latit. 0,1—0,2 mm. Stylosporae oblongatae vel subellipsoideae, rectae vel leniter curvulae, septulo obsoleto, flavescentes, subeguttulatae, longit. 3—8 mmm, crassit. 2—3 mm.

Ad caules exsiccatos Solani tuberosi in Mustiala.

Godroniella Karst. (N. gen.)

Receptacula sphaeriaeformia, primitus clausa, dein ore rotundato, integro dehiscentia, e hyphis fuligineis vel fuscescentibus composita, superficialia, sicca coriacea, atra, glabra. Conidia elongata, simplicia, hyalina. Basidia filiformia, ramosa.

Ex. *G. juncigena* Karst. (*Excipula juncigena* Karst. in Hedw. 1884, n. 2, p. 5).

Phaciidiella Karst. vix dubie est *Blennoria* Fr.

Protomyces (*Exomyces*) *muscorum* Karst. *Coccospora muscorum* Karst. est nominandus.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [23_1884](#)

Autor(en)/Author(s): Karsten Petter Adolf

Artikel/Article: [Fragmenta mycologica XVIII. 86-88](#)