

N. Zanzibarica. Grev. n. sp. c. ic. Groß; elliptisch mit stumpfen, etwas ausgezogenen Spitzen; Streifung sehr fein rosenförmig, durch eine glatte in zwei Felder getheilt, das eine linear, schmal, parallel mit der zunächst stehenden Mittellinie, das andere mit einem unregelmäßigen Flecke seitlich vom Knoten. Länge 190 Mik. Fundort: Zanzibar.

N. rimosa Grev. n. sp. c. ic. Elliptisch oder verlängert-elliptisch, mit einem fein quergestreiften Bande am Rand von der Breite des 6. Theils des Querdurchmessers der Frustel, einem zweiten schmäleren Band nächst der Mittellinie und einem dritten, nicht bis zu den Enden reichenden zwischen den beiden andern; der übrige Raum der Oberfläche ist undeutlich punctirt. Länge 89—152 Mik. Fundort: rothes Meer.

N. excavata Grev. n. sp. c. ic. Elliptisch mit einem äußern fein gestreiften Bande, etwas weniger breit, als der 4. Theil des Querdurchmessers der Frustel und gegenüber dem Knoten gegen diesen hin plötzlich ausgebuchtet — und einem sehr schmalen innern nächst der Mittellinie. Dazwischen undeutliche Punctirung. Länge ca. 76 Mik. Fundort: ebenda. Stizb.

M. G. Cooke, Fungi britannici exsiccati. Cent. II.
London, 1866.

Die erste Centurie dieser Pilzsammlung haben wir angezeigt, doch ohne den Inhalt speciell anzugeben. Da diese Sammlung aber in Deutschland bisher gar keine Verbreitung gefunden, die erste Centurie sogar der Redaction der botanischen Zeitung nur dem Titel nach bekannt geworden ist, so scheint es uns im Interesse der „Hedwigia“ zu liegen, vor jezt ab den Inhalt der Centurien den laufenden Nummern nach aufzuführen:

101. Aecidium quadrifidum DC. 102. Aec. Periclymeni DeC.
103. Aec. Valerianacearum Duby. 104. Aec. Violae Schuni.
105. Acc. Pedicularis Libosch. 106. Aec. Orchidearum Fiedl.
107. Aec. Betonicae DeC. 108. Aec. Geranii DeC. 109. Puccinia Campanulae Carm. 110. Puccinia Asari Link. 111. P. Asparagi DeC. 112. P. Veronicarum DeC. 113. P. difformis Kze. 114. P. Calthae Lk. 115. Trichobasis Artemisiae B.
116. T. fallens Cooke. 117. Utedo confluens DeC. 118. U. Hypericorum DeC. 119. U. Vacciniorum (Lk.) Rabenh.
120. U. Potentillarum DeC. 121. Uromyces intrusa Lév.
122. U. Ficariae Lév. 123. U. Polygoni Fck. 124. Lecythea betulina mit Melampsora betulina Lév. 125. Podisoma Juniperi Fr. 126. Septoria Hederæ Desm. 127. S. Convolvuli Desm. 128. S. Sorbi Lasch. 129. S. Castanæcola Lasch.
130. S. Ribis Desm. 131. S. Ficariae Desm. 132. S. Clematidis Desm. 133. Septoria Sedi. 134. S. Hydrocotyles

- Desm. 135. *S. Unedinis* Desm. 136. *S. cornicola* Desm.
137. *S. Urticæ* Desm. 138. *S. Gei* Desm. 139. *S. Lavan-
dulæ* Desm. 140. *S. heterochroa* v. *Lamii* Desm. 141. *S.
Astragali* Desm. 142. *S. Lysimachiæ* West. 143. *S. Loni-
ceræ* Desm. 144. *S. Virgaureæ* Desm. 145. *S. Populi* Desm.
146. *S. Aegopodii* Desm. 147. *Phyllosticta Primulæcola* Desm.
148. *Ph. Atriplicis* Desm. 149. *Ph. vulgaris* Desm. v. *Loni-
ceræ*. 150. *Ph. Cytisi* Desm. 151. *Leptothyrium Ribis* Lib.
152. *L. Juglandis* Lib. 153. *L. Fragariæ* Lib. 154. *Cheilaria
Coryli* Roh. 155. *Asteroma Ulmi* Chev. 156. *A. Rosæ* DeG.
157. *Ceutospora Lauri* Grev. 158. *C. phacidiooides* Grev.
159. *Sphaeropsis Candolii* B. et Br. 160. *Phoma Samarorum*
Desm. 161. *Gnomonia setacea* (P.) 162. *G. petioli* Fck.
163. *Mamiania fimbriata* DeN. 164. *Veturia Myrtillæ* Cooke.
165. *Sphaerella carpinea* (Fr.) 166. *S. Rusei* DeN. 167. *S.
isariphora* DeN. 168. *S. Rumicis* Desm. 169. *S. centigrana*
Cooke. 170. *S. maculæformis* P. P. 171. *S. Ostruthii* (Fr.)
172. *S. myriadea* DeG. 173. *S. inæqualis* Cooke. 174. *Stig-
matea Potentillæ* Fr. 175. *Sphaerella Pteridis* Desm. 176. *Spha-
rella Vaccinii* Cooke. 177. *Sphaerella quercina* Fr. 178. *Stegia
Ilicis* Fr. 179. *Trochila Lauro-cerasi* Fr. 180. *T. crate-
rium* Fr. 181. *Rhytisma acerinum* Fr. 182. *Polystigma
rubrum* P. 183. *Stigmata Robertiana* Fr. 184. *Dothidea
Ulmi* Fr. 185. *D. graminis* Fr. 186. *Epichloe typhina* Fr.
187. *Torrubia entomorrhiza* Tul. 188. *Cladosporium epiphy-
lum* N. 189. *Peronospora effusa* Grev. 190. *P. gangliformis*
Berk. 191. *P. nivea* Ung. 192. *P. infestans* Cap. 193. *P.
parasitica* Cord. 194. *P. Trifoliorum* d'By. 195. *P. obliqua*
Cooke. 196. *Polythrincium Trifolii* Kze. 197. *Macrosporium
Cheiranthi* Fr. 198. *Fusidium griseum* Fr. 199. *Erysiphe
Linkii* Lév. 200. *E. lamprocarpa* Lm.

Die Exemplare sind genügend, wenn auch nicht reichlich. Wünschenswerth ist es, daß die Blätter in Papierkapseln gegeben werden, einfach mit Gummi aufgeklebt hat keine lange Dauer, das Blatt springt ab und geht auf diese Weise leicht verloren. Mit den Autoren nimmt es der Herausgeber eben nicht genau.

Dr. Th. M. Fries, Botaniska Notiser. 1865. Der
Jahrgang enthält folgende Abhandlungen über Kryptogamen:

- 1) R. F. Fuistedt, Bidrag till kannedomen of Skandi-
naviens Woodsia-arter.
- 2) Th. M. Fries, Nya Skandinaviska Laf-arter.
- 3) S. O. Lindberg, Adnotationes bryologicae.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1866

Band/Volume: [5_1866](#)

Autor(en)/Author(s): Rabenhorst Gottlob Ludwig

Artikel/Article: [Literaturbesprechung 182-183](#)