

# **Die Käfer (Coleoptera)**

## **Beiträge**

**zur**

**Fauna des unteren Maingebietes von Hanau  
bis Würzburg mit Einschluß des Spessarts**

**von**

**DR. KARL SINGER**

**ASCHAFFENBURG FEBRUAR 1955**

# VORWORT

Das untere Maintal in der näheren und weiteren Umgebung von Aschaffenburg wurde bereits von den älteren Entomologen Brahm, Oechsner, Döbner und Scriba nach Käfern durchforscht. Ihre Funde hat Hofrat Dr. Fröhlich in seinem im Jahre 1897 erschienenen Werk (Beiträge zur Fauna von Aschaffenburg und Umgebung — Die Käfer —) festgelegt. Diese, sowie die Käferfunde unseres Gebietes von Dr. Flach, Dr. Alzheimer, Professor Dr. Spangenberg und Dr. Fröhlich selbst habe ich in Nachfolgendem übernommen, soweit nach dem Stand der heutigen Kenntnisse offensichtliche Irrtümer ausgeschlossen schienen.

Wertvolle Beiträge zum Gelingen des heutigen Verzeichnisses leisteten mir mein Sohn Josef, Konservator Wilhelm Noll, Dr. Hans Stadler Lohr, Eduard Dehnert Groß-Auheim, Alfred Eckert und neuerdings Edmund Wolfram in Aschaffenburg, denen ich an dieser Stelle meinen besten Dank ausspreche.

Die Sammelgrenzen, die Fröhlich sich für sein Verzeichnis steckte, habe ich nach Osten etwas erweitert, wodurch die Kalkhochsteppen bei Gambach a. M., Karlstadt a. M. und Homburg a. M. in unser Interessengebiet einbezogen wurden. Hierdurch wurde unsere Fauna mit vielen interessanten Arten bereichert, die in Fröhlichs Werk noch nicht angegeben sind.

Die Grenzen unseres Gebietes laufen demnach ungefähr von

Hanau — Babenhausen — Amorbach — Wertheim — Würzburg —  
Gemünden — Burgsinn — Gelnhausen — Hanau.

Viele der von den älteren Entomologen und selbst von Flach und Fröhlich im hiesigen Gebiet festgestellten Arten lassen sich nicht mehr auffinden. Fortschreitende Bodenkultur und wohl auch vermehrte Anwendung scharfer chemischer Düngemittel, sowie das Verschwinden alter Bäume in Wald und Flur, wirkten sich mehr oder minder verhängnisvoll für die Insektenwelt aus, andererseits brachte der steigende Verkehr neue und oft recht unerwünschte Arten mit sich. Anfangs der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts hatte ich noch die Freude die Kähler- und Groß-Krotzenburger Moore in ihrer ursprünglichen Schönheit kennen zu lernen. Mit den tiefangelegten Braunkohlengruben und dem dadurch bedingten Absinken des Grundwasserspiegels schwand die prachtvolle Flora und Fauna der Moore dahin.

Als Grundlage für die Reihenfolge der Familien und Gattungen benutzte ich das „Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas“ von Ad. Horion. Die Bestimmungen oder Nachprüfungen schwer zu erkennender Arten übernahmen anerkannte Spezialisten, deren Name ich in der Regel bei den geprüften Stücken angegeben habe. Ihnen allen sei nochmals dafür mein bester Dank ausgesprochen. Ganz besonderen Dank schulde ich Herrn Pfarrer Dr. Ad. Horion für die Durchsicht des Manuskriptes dieser Arbeit und die dabei gegebenen Ratschläge.

*Zur Erklärung der Abkürzungen mögen folgende Angaben dienen:*

- A. = Professor Dr. Alzheimer †. Er sammelte Käfer während seiner Studienzeit am Gymnasium in Aschaffenburg Ende der 70er und anfangs der 80er Jahre.
- B. = Hermann Bücking, Kaufmann in Höchst a. M. Geb. 30. 12. 1855, gest. 28. 3. 1928
- D. = Dr. E. Döbner, Professor der Zoologie und Botanik an der Forstl. Hochschule in Aschaffenburg. Gest. 29. 12. 1891
- D. N. = Döbners Notizen zu Oechsners Verzeichnis der „Käfer der Umgebung Aschaffenburgs“.
- Fl. = Dr. Karl Flach, Arzt in Aschaffenburg. Geb. 13. 9. 1856, gest. 18. 7. 1920
- Fr. = Hofrat Dr. Karl Fröhlich, Arzt in Aschaffenburg. Geb. 31. 7. 1850, gest. 28. 10. 1928
- H. = Hofmann, Werkmeister, Hanau †.
- L. v. H. = Dr. Lucas von Heyden, Professor und Major a. D. in Frankfurt a. M., Verfasser des Werkes „Die Käfer von Nassau und Frankfurt“, erschienen 1904.
- M. = Maass, technischer Bahnbeamter in Erfurt. Sammelte vielfach in unserem Gebiet.
- Oe. = G. Oechsner, Lehrer der Naturgeschichte an der K. Gewerbeschule zu Aschaffenburg. Gest. 1862.
- Schw. = Bernhard Schwarzer, Musiklehrer in Aschaffenburg, Cerambyciden-Spezialist, geb. 25. 10. 1868, gest. 3. 9. 1931.
- Scr. = Wilhelm Scriba, Dekan in Wimpfen, früher Pfarrer in Seligenstadt und am Vogelsberg. Gest. 5. 2. 1892.
- S. = Dr. Karl Singer.
- St. = Dr. Hans Stadler, Arzt und Ornithologe in Lohr.

*Zum Schlusse ist es mir eine angenehme Pflicht, dem Stadtrat Aschaffenburg und seinem naturverbundenen Oberbürgermeister Dr. Vinzenz Schwind für die Übernahme der erheblichen Kosten des Verlages meinen allerherzlichsten Dank auszusprechen. Auch dem Vorstand des naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg, Herrn Konservator Noll, sei mein bester Dank ausgesprochen für seine weitgehenden Bemühungen für das Erscheinen dieser Arbeit.*

*Aschaffenburg, im Februar 1955*

*Dr. Karl Singer*

# Caraboidae

## Carabidae

### Cicindelinae

#### Cicindela L.

##### **C. silvatica L.**

Auf sonnigen Waldwegen und Waldlichtungen. Im Stockstadter Wald in Kulturgräben 19. 3. 22, 5, 04. Auf dem Erbig 2. 4. 26 (Noll). Auf dem Stengerts 25. 4. 26 (Noll). 5. — 8. (Fr.). 22. 7. 20 (S.). Schweinheimer Wald 8. 5. 28, 16. 6. 27. Sodenberg 1. 8. 26 (Noll). Gailbachtal 16. 8. 28 (Noll).

##### **C. silvicola Deg.**

An sonnigen Waldrändern, früher häufiger wie die nachfolgende Art. (Fröhlich unterschied beide noch nicht voneinander.) Stengerts 18. 4. 26 (Noll). Bei Oberbessenbach 21. 5. 49 (J. S.). Bei Sternberg 3. 7. 16. Sodenberg 1. 8. 26 (Noll). Am Strietrand 11. 8. 24 häufig. Lohr oberer Talweg 5. 23 (St.).

##### **C. hybrida L.**

An gleichen Plätzen wie *silvicola* Deg. Im Gailbachtal mehrfach 25. 3. 40. Schweinheimer Wald 9. 4. 26, 28. 5. 28, 16. 6. 27 (Noll). Kahl 13. 7. 35 (Noll). Sodenberg 1. 8. 26 (Noll).

##### **C. campestris L.**

Im ganzen Gebiet sehr häufig.

###### a. *funebri* Sturm.

Im Buchenwald bei den Ellerhöfen 6. 4. 28 (Noll).

###### a. *coerulescens* Schilsky.

Lohr oberer Talweg 5. 23 (St.).

##### **C. germanica L.**

Wurde im Gebiet nur von G. Oechsner bei Rauental und Hammelsborn, sowie von Flach einmal gefunden. Bei Würzburg auf einem Brachacker am Ostrand des Gutenberger Waldes in großer Anzahl mit der a, *obscura* F. vom 7. 7. 18 bis 4. 8. 18 von Dr. Ettinger gefunden. (Mitteilung von Dr. Stadler.)

## Carabinae

### Cychrus Fab.

##### **C. caraboides L. s. sp. caraboides L.**

An feuchten Stellen unter Steinen und in morschen Baumstrünken, in unserem Gebiet sehr selten. Früherer Wiesenweg zum Godelsberg unter einem Stein 17. 10. 36. Großkrotzenburger Moore 10. 9. 26. Fasanerie unter Steinen mehrfach 1869, 1889 und 1897 (Fr.). In der Fischerhecke 1889 (Fr.). Lohr nachts 6. 9. 25 (St.).

##### **C. attenuatus F.**

In der Ebene sehr selten, mehr in bergigem Gelände. Bei Fronhofen (Oe.). Im Hochspessart (Fl.). Seebachgrund bei Hain 24. 8. 40 (J. S.). Im Stockstadter Wald einmal von Professor Waegner gefunden.

## Carabus L.

### C. (*Procrustes* Bon.) *coriaceus* L.

Fasanerie 20. 2. 26, 1. 7. 28 (Noll). Schloßgarten 5. 26 (Noll). Bischberg 27. 6. 27 (Noll). An der Miltenberger Bahnstrecke frisch entwickelt und noch ganz weich 24. 6. 46 (S.). Godelsberg 28. 8. 29 (Noll). Fischerhecke 8. 10. 27 (Noll).

### C. (*Meyodontus*) *purpurascens* F.

Aschaffenburg rechts (nördlich) des Mains. Schmerlenbacher Wald 16. 8. 26 M., 19. 5. 34 W. Fasanerie 31. 7. 25 W.

#### f. *crenatus* Sturm.

Schmerlenbacher Wald 19. 2. 20 W. Fasanerie 20. 2. 26 W., 31. 7. 25 W.

### C. *violaceus* L.

Aschaffenburg links (südlich) des Mains Stockstadter Wald 12. 5. 26 (Noll). Mainufer 3. 7. 26 (Noll).

### C. (*Chaetocarabus* Thms.) *intricatus* L.

Auf dem Erbig 31. 1. 36. Schmerlenbacher Wald im Winterlager unter Moospolstern nicht selten (S.). Bei Kleinwallstadt im Wald 19. 3. 26 (S.). Godelsberg 25. 4. 36 (Noll). Stengerts 25. 4. 26 (Noll). Daxberg 26. 5. 35 (Noll). Sodener Wald 5. 6. 27. (Noll). Bei Rothenbuch 31. 7. 29 (St.). Im Hainer Forstgarten mehrfach 6. 8. 23 (St.). Stockstadter Wald unter gefälltten Baumstämmen 11. 9. 30 (S.).

### C. (*Chrysocarabus* Thms.) *auronitens* F.

In höheren Berg-Laubwäldern. Rothenbuch i. Sp. 22. 2. 25, 22. 4. 25. Bei Waldaschaff 29. 4. 26. Auf dem Sommerberg bei Miltenberg 5. 1893 (Fr.). Klingenberg Burgweg 1. 6. 16.

### C. (*Mesocarabus* Thms.) *problematicus* Thms. (= *catenulatus* auct. Rtt. F. G.)

Schmerlenbacher Wald unter Moospolstern im Winterlager mehrfach 13. 2. 26 (Noll). 8 St., 28. 5. 26 (Noll). Stockstadter Wald 12. 5. 26 (Noll). 3. 7. 26, 11. 9. 20 Hainer Forstgarten 6. 8. 23 häufig (St.). Moore bei Großkrotzenburg 6. 9. 36.

### C. (*Autocarabus* Seidl.) *auratus* L.

Auf Feldern und Feldwegen nicht selten. Findberg 29. 2. 26 (Noll). Stengerts 25. 4. 26 4 St. (Noll). Erbig 5. 6. 26. Bei Damm 5. 5. 28 (Noll).

### C. (*Carabus* s. str.) *granulatus* L.

Godelsberg 30. 1. 26 (Noll). Schmerlenbacher Wald 27. 2. 26 (Noll). Gailbachtal 4. 1895 (Fr.). Im Spessart 5. 26 (Noll). Erbig 5. 8. 26. Bei Schweinheim unter lockerer Robinienrinde 10. 1877 (Fr.).

### C. (*Tomocarabus* Rtt.) *convexus* Fab.

Von den älteren Entomologen Oechsner und Döbner in unserem Gebiet noch nicht beobachtet. Dagegen fanden ihn bereits Flach und Fröhlich im Stockstadter Wald, letzterer einmal in größerer Anzahl am 6. 5. 1896. In den Kulturgräben des gleichen Waldes von mir ebenfalls öfter gefunden, so im März 1929, 23. 4. 04, 14. 5. 04. Bei der Waldmühlerruine im Stockstadter Wald 1. 10. 31. Schönbusch 13. 5. 46 (Noll).

### C. (*Gonicarabus* Rtt.) *cancellatus* Illig.

In Wäldern nicht selten, mit roten und schwarzen Schenkeln, oft mit kupferbrauner und metallgrüner Oberseite.

**C. (Eucarabus Géh.) Ullrichi Germ.**

Im ganzen Gebiet verbreitet. In den Monaten I, II, IV, V, VI, VII, VIII.

**C. (Eutelocarabus Géh.) arcensis Hbst. (arvensis Payk.)**

Weniger häufig und sehr variabel in der Färbung: Kupferrot, metallgrün, violett und schwarz. Stockstadter Wald in den Schutzgräben der Saatbeete 12. 3. 26, 6. 1881 (Fr.). Kreuzgrund bei Laufach 4. 1895 (Fr.). Hain i. Sp. 14. 5. 25. Weibersbrunn i. Sp. 20. 4. 33, 30. 4. 34 (Noll). Schmerlenbacher Wald 28. 5. 25, 22. 7. 25 (Noll). Miltenberg 1 Exemplar mit gelben Beinen 4. 1895 (Fr.).

**C. (Morphocarabus Géh.) monilis F. s. sp. monilis F.**

Hanau 9. 5. 07 mehrfach, wohl von der Kinzig angeschwemmt (Seidler). Groß-Gerau Dammwald 6. 50, 2 St. (Dehnert).

**C. (Archicarabus Seidl.) nemoralis Müll.**

Im ganzen Gebiet häufig. Im Stockstadter Wald ein vollständig grüngelbtes Stück 6. 1896 (Fr.). Moore bei Großkrotzenburg unter gemäßigtem Gras 21. 9. 27. In den Monaten I — VIII beobachtet.

**C. (Phricocarabus Rtt.) glabratus Payk.**

Hainer Forstgarten 6. 8. 23, mehrfach (S.) Fasanerie 13. 2. 26, 2 St. (Noll), 19. 5. 34 (Noll), 8. 5. 26, 5 St. (Noll), 31. 7. 25, 3 St. (Noll).

**Calosoma Web.**

**C. inquisitor L.**

In Laubwäldern nicht selten. In der Fasanerie 1853 massenhaftes Auftreten nach OE. 1895 daselbst ebenfalls sehr häufig. 18. 4. 26, 8. 5. 26 zahlreich (Noll). Bei Waldaschaff i. Sp. unter Laub 29. 4. 26. Schönbusch 6. 5. 34 an einer Eiche anliegend. 25. 5. 26 von Eichengebüsch geklopft. Schmerlenbacher Wald an Eiche 12. 5. 06. Im Hasselbachtal bei Rohrbrunn am 26. 4. 53 frisch entwickelt und noch weich M. u. W. (J. S.).

a. *coerulea* Letz.

Schönbusch 6. 06. Fasanerie 7. 5. 52 (J. S.).

a. *nigra* Letz.

Fasanerie mehrfach 8. 5. 26 (Noll).

**C. sycophonta L.**

In Fraßjahren der Nonne, des Kiefernspinners, der Kieferneule und des Kiefernspanners zahlreich im Stockstadter- und Großstheimer Wald 22. 5. 21 (S.). 29. 6. 27 (Noll). 15. 7. 19 (S.). 11. 7. 46 (Noll). Im gleichen Waldgebiet konnte ich am 26. 6. 21 an einem sehr heißen Nachmittag den Käfer in den Baumkronen 40 — 50 jähriger Kiefern schwärmend beobachten. Im Striet von Oe., in der Buschallee, in der Fischerhecke von Fr. beobachtet 6. 1896. Lohr im Wald unter Moos überwintert 14. 3. 26 (St.).

## Nebriinae

### Leistus Fröl.

**L. spinibarbis F.**

Nach Fr. von Oe. einmal hier gefunden.

**L. rufescens F.**

Großkrotzenburger Moore unter Schilfhaufen 16. 8. 40 (J. S.). Bei Hanau (H.).  
Bei Seligenstadt (Scr.).

**L. ferrugineus L.**

An feuchten Waldstellen von mir nicht selten in den Monaten III, IV, VI und VIII  
beobachtet. Fasanerie und auf dem Godelsberg 9. 1894 (Fr.).

**L. piceus Fröl.**

Wurde von D. hier gefunden nach FR.

**N e b r i a Latr.**

**N. brevicollis F.**

Unter Rinde von morschen Baumstrünken und gefälltten Bäumen nicht selten.

**N. salina Fairm.**

Umgebung Aschaffenburg (t. Bänninger, Gießen).

## Notiophilinae

**N o t i o p h i l u s Duméril.**

**N. pusillus Waterh.**

Auf dem Mäusberg bei Wiesenfeld 1. u. 7. 9. 35 (J. S. u. W.). Auf dem Kalmut bei  
Homburg a. M. 28. 6. 25.

**N. aquaticus L.**

Nicht selten. Fasanerie 6. 1894 (Fr.). Sodener Wald 12. 6. 06. Mäusberg bei Wie-  
senfeld 1. u. 7. 9. 35. Kahl am Rand der Moore. Erbig 2. 10. 27 (Noll).

**N. palustris Duft.**

Nicht selten. Fasanerie 4. 1894 (Fr.). Stockstadter Wald 22. 4. 11. Miltenberg  
6. 1894 (Fr.). Schönbusch 8. 1894. Oberes Aschafftal im Spessart 14. 10. 05. Hinter  
Damm 22. 10. 29 (Noll).

**N. hypocrita Putz.**

Karlstadt bei den Landwehren 1. 4. 29. Krainberg bei Gambach a. M. 17. 3. 43,  
8. 9. 34, 14. 10. 34. Umgebung von Aschaffenburg t. Bänninger (n. Horion).

**N. substriatus Waterh.**

Nach Fr. von Scr. in einem Kiefernwald bei Seligenstadt gefunden.

**N. rufipes Curtis.**

Aschaffenburg-Schafheim 1. St. (Bickhardt). Groß-Auheim Dammwald 20. 5. 53  
(Dehnert) 1 St. Heusenstamm 9. 5. 53, 1 St. (Dehnert).

**N. biguttatus F.**

Überall sehr häufig.

## Elaphrinae

**B l e t h i s a Bon.**

**B. multipunktata L.**

In unserem Gebiet selten an feuchten Waldstellen. Striet (Oe.) Fasanerie (Fr.).  
Bei Hörstein auf einer Sumpfwiese 5. 50, 2 St. (Dehnert).

## **Elaphrus F.**

### **E. uliginosus F.**

Selten. Am Schöllmüllersee 6. 1893 (Fr.). Fasanerie 5. 1895 (Fr.). Schweinheim Exerzierplatz an ausgetrocknetem Tümpel 22. 4. 48, 2. 5. 40 (Noll).

### **E. cupreus Duft.**

Schöllmüllersee 6. 1893 (Fr.). Mainufer 12. 5. 25, 14. 8. 26 (Noll). Striet. Gersprenzger bei Stockstadt a. M. 11. 5. 25. Bei der Eckertsmühle 15. 6. 27 (Noll). Am Wachenbach 4. 8. 28, 11 St. (Noll).

### **E. riparius L.**

Häufig. Striet 4. 1895 (Fr.). Fasanerie 5. 1895 (Fr.). Schöllmüllersee 6. 1893 (Fr.). Schönbusch. Mainufer 14. 8. 26 (Noll). Bei Schweinheim 18. 4. 48 (Noll).

### **E. aureus Müll.**

Hanau Große Buleu, Kinzigufer 4. 5. 52 mehrfach (Dehnert).

## **Loricarinae**

### **Loricera Latr.**

#### **L. pilicornis F.**

Nicht selten an feuchten Stellen. Schönbusch 10. 3. 23, 4. 1895 (Fr.). Stockstadter Wald 21. 5. 25, 3. 7. 26 (Noll). Schmerlenbacher Wald 9. 8. 26 (Noll).

## **Scaritinae**

### **Clivina Latr.**

#### **C. fossor L.**

An feuchten Plätzen. Mainufer 10. 3. 26 (Noll). 23. 4. 43. Fasanerie 13. 5. 26 (Noll). 6. 1894 (Fr.). Erbig 31. 7. 26 (Noll).

#### **C. collaris Hbst.**

An gleichen Plätzen wie fossor L.

### **Dyschirius Bon.**

#### **D. nitidus Dej.**

Mainufer 12. 5. 05 Schönbuschsee.

#### **D. lucidus Putz. sp. Obenbergeri Maran.**

Schönbuschsee 23. 5. 33.

#### **D. politus Dej.**

Mainufer (Scr.) Schönbusch (Fr.) Hanau (H.)

#### **D. aeneus Dej.**

Mainufer 22. 5. 05. Kahl 25. 7. 04. Dammer Sumpfwiesen 6. 1894. (Fr.).

#### **D. intermedius Putz.**

Stockstadter Wald 15. 3. 26.

#### **D. laeviusculus Putz.**

Mainufer bei Seligenstadt (Scr.).



**D. semistriatus Dej.**

Mainufer bei Seligenstadt (Scr.). Nach Horion bisher einziger sicherer Fund in Deutschland. Belegstück im Museum Frankfurt a. M.

**D. globosus Hbst.**

Überall häufig.

## Omophrinae

### Omophron Latr.

**O. limbatum Fab.**

Auf sandigen Fluß- und Bachufern. Er erscheint bei festem Auftreten auf den Sand, ebenso beim Aufschütten von Wasser auf den Sand. Gersprenzufer bei Stockstadt a. M. 12. 5. 26, 26. 6. 27 (J. S.). Im Maingenist nach einer Sommerüberschwemmung (Fr.). Bei Schweinheim in größerer Anzahl am Bach 1 cm tief im Sand vergraben 25. 4. 48 (Noll).

## Broscinae

### Broscus Panz.

**B. cephalotes L.**

Auf sandigen Flächen eingegraben. Bei Nilkheim Ende 4. 26. Obernau 5. 27. Sandgrube bei Mainaschaff 31. 7. 36. Erbig 8. 1893. (Fr.). Bei Dettingen 23. 9. 28. Büchelberg 9. 1893 (Fr.). Einmal aus dem Mulm eines hohlen Apfelbaumes. Erbigrain 6. u. 7. 46 (Noll).

## Bembidiinae

### Asaphidion Gozis. (= Tachypus Laporte.)

**A. pallipes Duft.**

Am Ufer des Steinbachs (Oe.). Bei Seligenstadt (Scr.).

**A. flavipes L.**

An feuchten Stellen nicht selten. Fliegt nach Fr. schon im April an sonnigen Tagen zur Mittagszeit und läßt sich dann oft in größerer Anzahl von den bestrahlten Mauerwänden ablesen. Gailbachtal 18. 10. 26. Erbig 28. 11. 26 unter Moos. Kahl Moore.

### Bembidion Latr.

**B. striatum F.**

Bei Seligenstadt von Scr. festgestellt.

**B. velox L.**

Glattbacher Wald 4. 1895 (Fr.). Büchelberg unter Rinde 11. 1894 (Fr.). Exerzierplatz 11. 1894 (Fr.).

**B. litorale Ol.**

Gersprenzufer bei Stockstadt a. M. 10. 5. 27. Mainufer bei Obernau 3. 9. 33.

**B. lampros Hbst.**

Überall häufig.

- B. properans Steph.**  
Maingenist 5. 3. 47 (Noll).
- B. punctulatum Drap.**  
Am Mainufer nicht selten.
- B. dentellum Thnbg.**  
Häufig am Mainufer. 7. 3. 26, 5. 1894 (Fr.) 28. 7. 20, 27. 9. 04. Fasanerie 4. 5. 1893 (Fr.). Unter Rinde 17. 11. 46. Schönbusch am oberen See 5. 1894 (Fr.).
- B. varium Ol.**  
Mainufer 27. 9. 04. Seligenstadt (Scr.) 1863.
- B. obliquum Strm.**  
Aschaffenburg (Oe.) 1853. Seligenstadt (Scr.) 1863.
- B. semipunctatum Donov. (= adustum Schaum.)**  
Mainufer bei Nilkheim.
- B. tibiale Duft.**  
Steinbachtal 16. 5. 24, 22. 7. 04. Kahlthal am steinigem Ufer der Kahl 8. — 30. 6. 22 (Oe.).
- B. geniculatum Heer (= Redtenbacheri Daniel)**  
Kleinheubach 4. 12. Sodener Wald 9. 8. 26 (Noll).
- B. monticola Strm.**  
Auf der Mainbrücke in Aschaffenburg angefliegen 14. 4. 06.
- B. nitidulum Marsh.**  
Rückersbacher Schlucht 2. 4. 26. Langer See bei Kahl 19. 4. 25. Findberg 15. 11. 36. Schweinheimer Wald 9. 8. 26 (Noll).
- B. Stephensi Crotch.**  
Aschaffenburg am Krautbach. Bei Sodental 1. 8. 26 (Noll).
- B. lunatum Duft.**  
Bei Aschaffenburg selten (Oe.) 1853. Bei Seligenstadt und Babenhausen (Scr.) 1863. Stockstadter Wald 2. 27 (S.).
- B. rupestre L.**  
Hörstein Heuserackerhof 26. 5. 53 (Dehnert) 5 St.
- B. ustulatum L.**  
Am Rückersbach 3. 5. 35. Stockstadt a. M. unter Stein 31. 5. 04. Erbig 5. 6. 26 (Noll)
- B. fluviatile Dej.**  
Hanau Kinzigufer Ende 6. 50 (Dehnert) 2 St.
- B. femoratum Strm.**  
Mainhecken 3. 10. Steinbachtal 16. 5. 24. Schönbusch 21. 8. 25. Unter Platanenrinde 12. 9. 06.
- B. testaceum Duft.**  
Mainufer bei Aschaffenburg (Fr.).
- B. decorum Panz.**  
Auf der Mainbrücke angefliegen 8. 4. 09 u. 9. 04. Exerzierplatz am Mainufer unter Steinen 9. 1894 (Fr.).
- B. Illigeri Net.**  
Büchelberg 19. 3. 08. Striet Steinbachufer 16. 5. 24. Eckertsmühle 27. 5. 26.

**B. elongatum Dej.**

Vor Amorbach am Bachufer 15. 7. 06. Kahler Moore (S.). Am Langen See bei Kahl (Schw.). Striet (Schw.).

**B. decoratum Duft.**

Fahrachtal am Bachufer 17. 3, 28, 1. 7. 27. Striet am Steinbachufer 16. 5. 24, 4. 7. 09 zahlreich. Am Mainufer von Hanau bis Aschaffenburg. Kahl 1907 zahlreich, 1908 6 St. (Maass). Sternachtal 24. 6. 26 (Noll).

**B. gilvipes Strm.**

Fasanerie 5. 1895 (Fr.). Im Maingebiet bei Aschaffenburg. Stockstadter Wald an der Gersprenz 1924 (S.).

**B. assimile Gyll.**

Häufig am Schönbuschsee. An der Gersprenz. Im Schmerlenbacher Wald und an den Kahler Mooren.

**B. humerale Strm.**

Hanau Kl. Bulau 4. 52 1 St. (Dehnert).

**B. quadrimaculatum L.**

Nicht selten an feuchten Stellen. Fasanerie unterm Moospolster eines Eichenstrunkes 29. 3. 43. Am Schöllmüllersee 6. 1893 (Fr.). Sumpfwiese bei Damm 4. 1894 (Fr.).

**B. quadripustulatum Serv. (= quadriguttatum Oliv.)**

Nicht selten. An Häusern angefliegen 4. 1894 (Fr.). Schönbusch 12. 3. 24. Striet 4. 1895 (Fr.).

**B. doris Panz.**

Bei Seligenstadt (Scr.).

a. *aquatica* Panz.

Kahl.

**B. articulatum Panz.**

Striet am Steinbach 3. 5. 25. Mainufer 12. 5. 25. Fasanerie. Schönbusch. Schöllmüllersee 5. u. 6. 1894 (Fr.). Kahl 11. 9. 07. Schweinheimer Wald 24. 6. 26 (Noll).

**B. octomaculatum Goeze.**

Aschaffenburg (Oe.). Frankfurt (v. Heyden) 1904.

**B. obtusum Serv.**

Am Fuß des Erbig 20. 1. 24. Glattbacher Wald 7. 06. Am Schönbuschsee im Herbst 1904.

**B. (Ocys Steph.) harpaloides Serv.**

Aschaffufer bei der Hanauer Straße unter Laub am Fuß von Erlen 23. 1. 27 (J. S.). Hanau Kinzigufer (Wiltscheck).

**B. (O. Steph.) quinquestriatum Gyll.**

Unter Baumrinden insbesondere am Fuß von Platanen 8. u. 9. 1894 (Fr.). 8. 07, 12. 9. 06 (S.). Im Frühjahr an Häusern anfliegend.

**B. biguttatum F.**

An feuchten Stellen häufig.

**B. unicolor Chd. (= Mannerheimi Sahlbg.)**

Aschaffenburg. Sodener-, Stockstadter- und Schmerlenbacher Wald.

**B. guttula F.**

Aschaffenburg 12. 3. 26. Kahl Moore 7. 5. 26. Gersprenzhofer 8. 11. 26.

**T a c h y s Steph.**

**T. bistriatus Duft.**

Häufig an feuchten Stellen. Mainhecken.

**T. micros Fieb.**

Sodental 9. 3. 41. Mainufer 12. 9. 05.

**T. parvulus Dej.**

An trockenen, sonnigen Stellen (Fr.). Wendelberg 9. 8. 35.

**T a c h y t a Kirby.**

**T. nana Gyll.**

Rothenschuch i. Sp. unter Buchenstrunkrinde 13. 4. 30, 2. 8. 25, 26. 9. 46. Schönbusch unter Hainbuchenrinde 2. 6. 32. Weiler i. Sp. unter Buchenrinde 6. 6. 26.

## Trechinae

**Trechus Clairv.**

**T. (Epaphius Steph.) secalis Payk.**

In feuchten Gräben und mit Laub bedeckten Erdmulden. Stockstadter Wald 14. 4. 05, 22. 8. 37. Kahl Moore 25. 7. 04. Mainufer. Graben am Ernthof 2. 7. 1894 (Fr.).

**T. rubens F.**

Frankfurt a. M. (Haag). Könnte auch in unserem Gebiet noch zu finden sein.

**T. quadristriatus Schrk.**

Nicht selten unter Laub und Steinen.

**T. cardioderus Putz.**

Im Spessart zwischen Heigenbrücken und Schöllkrippen nach Horion.

**Trechoplemus Gglb.**

**T. micros Hbst.**

Einmal am Fasanersee 1875 (Fr.).

**Lasiotrechus Gglb.**

**L. discus F.**

Sehr selten. Von Oe. nur einigemal, von Fl. am Mainufer, von Scr. bei Seligenstadt ebenfalls am Mainufer gefunden. (Hanau H.).

**Perileptus Schaum.**

**P. areolatus ereutz.**

Hanau Bulau Kinzigufer 15. 6. 53 mehrfach (Dehnert).

## Pogoninae

**Patrobis Dej.**

**P. atrorufus Stroem (excavatus Payk.)**

Kahl in ausgetrocknetem Tümpel unter feuchtem Laub 12. 10. 07 (S.).

# Panagaeinae

**Panagaeus Latr.**

**P. crux mayor L.**

An feuchten Stellen nicht selten.

**P. bipustulatus F.**

Bei Sodental 10. 1. 26. Karlstadt a. M. 19. 3. 26. Bei Radheim 12. 3. 27. Am Mainufer. Am Wegrain nach Glattbach 7. 6. 04.

# Chlaeniinae

**Callistus Bon.**

**C. lunatus F.**

Fahrachtal unter Moos 12. 2. 25. Büchelberg unter Stein 19. 3. 08. Karlstadt 14. 3. 29, 19. 3. 26 mehrfach, 14. 4. 29. Bahndamm gegenüber Nilkheim 17. 4. 29. Krainberg bei Gambach a. M. unter Moos 14. 10. 24.

**Chlaenius Bon.**

**C. vestitus Payk.**

Mainufer 7. 3. 26. Kahl Moore 24. 5. 36. Sumpfwiese hinter Damm (Fr.).

**C. nitidulus Schrnk.**

Haibacher Höhe 27. 4. 08. Rothenbuch i. Sp. 11. 4. 37. Mainufer 6. 1876 (Fr.). Gailbachtal 11. 7. 37. Kahltal 6. 9. 42.

**C. nigricornis F.**

Am Bahndamm gegenüber Nilkheim 7. 3. 26. Stockstadter Wald unter Rinde eines Erlenstrunkes 3. 4. 42 (J. S.). Am Krautbach 30. 4. 26. Striet an sumpfigem Wiesenrand 7. 1881 (Fr.). Kahl am Langen See 11. 9. 07. Lohr 29. 4. 29, 18. 5. 22. (St.).

**C. tristis Schall.**

Nach Oe. sehr selten unter feuchtem Laub 1854. Am Mainufer (Scr.).

**C. sulcicornis Payk.**

Von Oe. bei Aschaffenburg sehr vereinzelt gefunden. 1853. Seitdem nicht mehr festgestellt.

# Oodinae

**Oodes Bon.**

**O. helopioides F.**

Am Sumpf vor Dettingen 8. 3. 36. Am Langen See bei Kahl 19. 4. 25. Sumpf bei Station Kleinostheim 12. 5. 25. Stockstadter Wald 27. 3. 27, 29. 11. 31. Bei Sulzbach a. M. 14. 11. 27. Außerdem von Fr. im Schönbusch, im Striet, Lindig und bei Miltenberg gefunden.

# Licininae

**Badister Clairv.**

**B. unipustulatus Bon.**

Sehr selten. Aschaffenburg (Oe.) Bei Großkrotzenburg am Fuß einer Pappel im Frühjahr (H.).

**B. bipustulatus F.**

Im ganzen Gebiet nicht selten.

**B. sodalis Duft.**

Mainufer 1. 1. 26. Karlstadt 28. 3. 26, 25. 4. 26, 8. 5. 27, 16. 5. 29. Fasanerie 4. 1895 (Fr.). Steinbachtal 18. 5. 32. Schönbusch 4. 10. 04.

**B. peltatus Panz.**

Karlstadt am Steig 25. 4. 26. Kahler Moore.

**Licinus Latr.**

**L. cassideus Fab.**

Auf den trockenen Kalkhöhen des Maintales nicht gerade selten. Karlstadt am Steig 19. 3. 26. Kalmut bei Homburg a. M. 26. 6. 25. Krainberg 9. 8. 25. Mäusberg 26. 8. 26, 25. 9. 37, 2 St. (S.), Benediktushöhe bei Retzbach a. M. 13. 6. 47, 1 St. (J. S.).

## Harpalinae

**Harpalus Latr.**

**H. (Ophonus Bedel) sabulicola Panz.**

Krainberg bei Gambach a. M. 5. 8. 34.

**H. obscurus Fab.**

Würzburg mehrfach (Zwecker).

**H. (Metophonus Bedel) punctatulus Duft. (= punctulatus Rtt.)**

Bischberg unter Stein 25. 8. 07.

**H. rupicola Strm.**

Auf dem Kalmut bei Homburg a. M. 25. 6. 25 (S.).

**H. (Seladon Schaub.) brevicollis Serv.**

Fasanerie 30. 4. 09. Kleinheubach 4. 12. Wiesenfeld 28. 8. 20. Hörstein Weinberge 9. 53 (Dehnert).

**H. (S.) cordatus Duft.**

Aschaffenburg (Oe.) 1853, (Fr.) 1897. Kalmut 28. 6. 25. Krainberg 5. 8. 35. Wiesenfeld.

**H. (S.) azureus Fab.**

Besonders häufig auf den Kalkhöhen bei Karlstadt a. M. II — V. Godelsberg. Erbig 6. 1894 (Fr.), Lohr 5. 21 (St.).

**H. (S.) puncticollis Payk.**

Karlstadt 28. 3. 26. Krainberg 5. 7. 25. Striet 6. 1892 (Fr.).

**H. (S.) zigzag Costa.**

Striet 1. 1. 28. Obernauer Wald 26. 4. 26. Erbig 21. 11. 26.

**H. puncticeps Steph. (= angusticollis Müll.)**

Groß-Auheim Waller See unter Stein 8. 8. 53, 3 St. (Dehnert).

**H. (Semiophonus Schaub) signaticornis Duft.**

Sehr selten. Godelsberg 6. 1876 (Fr.) 1 St.

- H. (Pseudophonus Mots.) pubescens Müll.**  
Häufig unter Steinen.
- H. (P.) griseus Panz.**  
Unter Steinen. Fasanerie. Exerzierplatz 5. 9. 1894 (Fr.). Lohr 7. 8. 25 nachts (St.).
- H. (Pardileus Göze) calcaratus Duft.**  
Groß-Auheim Wallersee 9. 51 (Dehnert).
- H. (Acardystes Rtt.) rufus Brüggm.**  
Sandgrube bei Mainaschaff 23. 8. 31.
- H. (Haploharpalus Schaub.) Frölichi Strm.**  
Anfangs Mai 1914 auf einem Brachacker bei Stockstadt a. M. von B. Schwarzer in Anzahl gesammelt. Striet 19. 9. 25. Lohr-Sendelbach hinter dem Steigweg unter Stein 16. 3. 22 (St.).
- H. hirtipes Panz.**  
Nach Fr. in Sandgegenden selten. Stockstadter Wald.
- H. (Harpalus s. str.) aeneus F.**  
Häufig unter Steinen.  
a. *confusus* Dej.  
Bei Glattbach unter Steinen 27. 6. 04. Eckertsmühle 25. 4. 25.
- H. distinguendus Duft.**  
Hain i. Sp. im Pollaschgrund 18. 4. 43. Bahndamm gegenüber Nilkheim 24. 4. 26.  
Rothenbuch i. Sp. am Breitsee 4. 9. 27.
- H. smaragdinus Duft.**  
Fasanerie. Schmerlenbacher Wald, Fischerhecke Striet 4. 6. 1894 (Fr.). Sandgrube bei Mainaschaff 29. 7. 25 frisch entwickelt und noch unausgefärbt.
- H. dimidiatus Rossi.**  
Auf den Kalkhöhen bei Karlstadt 19. u. 28. 3. 26 nicht selten. Schönbuschallee 5. 1894 (Fr.). Stockstadter Wald 15. 8. 25.
- H. atratus L.**  
Fasanerie 8. 1894 (Fr.). Seligenstadt (Scr.)  
a. *subsinnuatus* Duft.  
Fasanerie 14. 4. 05. Schmerlenbacher Wald 1. 5. 05.
- H. fuliginosus Dgl.**  
Stockstadter Wald in Kulturgräben 14. 5. 04.
- H. latus L.**  
Nicht selten.
- H. luteicornis Duft.**  
Selten. Von Oe. bei Aschaffenburg gefunden nach Fr.
- H. marginellus Dej.**  
Aschaffenburg 1 St. (t. Fl.).
- H. rubripes Duft.**  
Eine häufige in der Färbung sehr variable Art.
- H. honestus Duft.**  
Findberg 18. 4. 25. Büchelberg 11. 8. 20. Erbig 23. 8. 25.

**H. rufitarsis Duft.**

Sodener Wald 6. 5. 06. Schweinheimer Wald 14. 8. 26 (Noll).

**H. autumnalis Duft.**

Sandgrube bei Mainaschaff 29. 7. 21. Bei Kleinheubach.

**H. melancholicus Dej.**

Von Oe. 1853 und D. 1883 von Aschaffenburg angegeben. Babenhausen (Scr.).

**H. picipennis Duft.**

Häufig.

**H. servus Duft.**

Mainaschaff 1933. Karlstadt a. M. Hanau 1910 zahlreich (M.). Babenhausen (Scr.) 1863.

**H. flavicornis Dej.**

Fasanerie 3. 1894 (Fr.). Striet 5. 1894 (Fr.). Godelsberg 6. 1894 (Fr.).

**H. tardus Panz.**

Nicht selten. Haibacher Höhe 27. 4. 08. Kahl Rand der Moore 19. 4. 25. Sodener Wald 6. 5. 06. Lohr Beilstein 18. 6. 22 (St.).

**H. modestus Dej.**

Nicht selten. Kl. Exerzierplatz 4. 11. Großostheim 2. 4. 16, fliegend. Kahl auf Sandflächen 19. 4. 25. Dammer Sumpfwiesen 5. 1894 (Fr.).

**H. anxius Duft.**

Nicht selten. Sandgrube bei Mainaschaff 23. 2. 25. Ende 4. 26. 7. 10. 25. Kleinwallstadt 13. 3. 26. Obernauer Wald 27. 4. 25.

**H. serripes Quens.**

Im Gebiet nicht selten. Mainaschaff Sandgrube 29. 7. 25. Karlstadt am Steig 25. 4. 26. Lohr Beilstein 18. 6. 22 (St.).

**Parophonus Gglb.**

**P. maculicornis Duft.**

Fahrachtal 12. 2. 28, 1. 3. 27. auf trockenem Grashang. Obernauer Wald 1927 1 St. (Noll). Schmerlenbacher Wald 1908 1 St.

**Trichotichnus Heer.**

**T. laevicollis Duft.**

Gartenberg unter Moos 8. 2. 25. Heigenbrücken 14. 7. 26. Lindig am Waldrand 30. 3. 47.

**T. nitens Heer.**

Erbig 3. 10. Kahltal 13. 4. 48. 1 St.

**Acupalpus Latr.**

**A. (Stenolophus Dej.) teutonius Schrnk.**

Häufig. Striet unter Moos 30. 3. 24. Stockstadter Wald 24. 4. 37.

**A. (St.) Skrimshiranus Steph.**

Bei Kleinostheim 11. 5. 35. Kahl am Langen See im Frühjahr 1920. Hanau am Franzosenloch (H.).



**A. (St.) mixtus Hbst.**

Kahl Moore unter Schilfhaufen 16. 4. 22. Stockstadter Wald 8. 4. 28. Hanau 22. 4. 06 (H.). Bei Station Kleinostheim an den Sumpflöchern 10. 10. 27.

a. Ziegleri Panz.

Umgebung Hanau 22. 4. 06 (H.).

**Acupalpus s. str. elegans Dej.**

Auf feuchter Mainwiese gegenüber Obernau 4. 10. 42 (S.).

**A. flavicollis Strm.**

Nicht selten. Bischberg 19. 3. 08. Sodener Wald. Stockstadter Wald unter Moos und Laub in Erlenschlägen zahlreich 22. 4. 11. Steinbachtal 7. 8. 25. Auch von Oe in Aschaffenburg und von Scr. in Babenhausen und Seligenstadt nachgewiesen. Kahl Moore 18. 3. 26.

**A. brunripes Strm.**

Nicht selten. Seligenstadt (Scr.) Sandgrube bei Großostheim 19. 3. 29. Hanauer Straße mittags 1 Uhr fliegend 12. 4. 21. Gersprenzufer bei Stockstadt a. M. 31. 5. 04. Stockstadter Wald 8. 10. 26 zwischen Torfmoospolstern. Waldrand bei Obernau 28. 10. 26. Sulzbach a. M. in der Sandgrube 6. 11. 28.

**A. meridianus L.**

Verbreitet und häufig. Mainufer im Genist 2. 1. 26. Kahl Moore 7. 2. 26. Glattbach an Feldrainen 10. 4. 27. Gersprenzufer bei Stockstadt a. M. 12. 5. 25.

**A. dorsalis F.**

Verbreitet. Kahl Rand der Moore 7. 2. 26, 19. 4. 25, 28. 11. 24, Sodener Wald. Stockstadter Wald 17. 4. 26.

**A. dubius Schilsk. (=luridus Dej.)**

Kahl Moore 7. 2. 26, 19. 5. 04, Striet 1. 3. 36. Stockstadter Wald 22. 4. 11.

**A. exiguus Dej.**

Stockstadt a. M. Gersprenzufer 17. 4. 26. Am unteren Schönbuschsee 26. 5. 04.

**Anthracus Mots.**

**A. consputus Duft.**

Am unteren Schönbuschsee 26. 5. 04. Fasanerie 6. 1895 (Fr.). v. Wimmeli Rtt. Moore bei Großkrotzenburg 20. 4. 27. Eckertsmühle 20. 5. 27 (Noll).

**Bradycellus Er.**

**B. (Tetraplatypus Tschit.) similis Dej.**

Häufig unter Moos zwischen Heidekraut. Erbig 3. 10. Stockstadter Wald 22. 4. 11. In einem Hausgarten unter Digitalis purpurea 17. 10. 30. Waldaschaff unter Moos 1. 11. 25.

**(Bradycellus s. str.) verbasci Duft.**

Stockstadter Wald 16. 1. 27. Lohr 28. 7. 21 (St.). Kahl Moore 2. 8. 26. Schmerlenbacher Wald 26. 10. 24.

**B. harpalinus Serv.**

Nicht selten. Stockstadter Wald 22. 4. 11, 21. 11. 25. Mainaschaff Sandgrube 29. 7. 25.

**B. collaris Payk.**

Erbig 3. 10., 14. 8. 25 unter Moos. Striet unter Stein 30. 3. 24. Rothenbuch i. Sp. 11. 4. 37.

## Diachromus Er.

### D. germanus L.

Im ganzen Gebiet verbreitet. Kahltal 14. 4. 36. Lösshänge hinter Damm 1. 5. 36. Ellerwald 14. 5. 36. Breunsberg 26. 5. 35. Schmerlenbacher Wald 1. 6. 30. Kahler Moore 11. 6. 25. Obernburg im alten Steinbruch 15. 9. 38. Dornauer Graben 1. 9. 35. Am Steiger bei Unterbessenbach 15. 11. 31.

## Anisodactylus Dej.

### A. binotatus F.

Häufig. Aschaffenburg. Kahl.

#### a. spurcaticornis Dej.

Fasanerie 4. 1894 (Fr.). Sodener Wald 17. 4. 26.

### A. nemorivagus Duft.

Nach Oe. nicht selten. Fr. 1897. Wintersbach i. Sp. (Buchka 1916) Mainufer bei den Mainhecken 11. 9. 05. Bei Goldbach 24. 5. 26 (Noll).

### A. signatus Panz.

Aschaffenburg (Oe.) Mainufer bei Aschaffenburg 11. 9. 05.

## Pterostichinae

### A m a r a Bon.

### A. fulvipes Serv.

Wendelberg an Grassamen 8. 5. 38, 6. 6. 07 (Fl.). Stockstadter Wald.

### A. tricuspidata Deg.

Schönbusch (Oe) Büchelberg 30. 6. 25 an Grassamen. Bei Glattbach an Kornähren 8. 7. 06. Vor dem Steinbachtal an Grassamen 8. 7. 16.

### A. plebeja Gyll.

Häufig. Schmerlenbacher Wald 18. 3. 05, 9. 1893 (Fr.). Fasanerie 9. 25.

### A. strenua Zimm.

Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg (Fl. 2 St.)

### A. similata Gyll.

Schönbusch 11. 3. 40. Karlstadt am Steig 28. 3. 26, 25. 4. 26, Bischberg 24. 4. 07. Sodener Wald 21. 11. 26.

### A. ovata F.

Karlstadt auf dem Haag 9. 3. 30, 25. 10. 42. Auf den Landwehren 1. 4. 29, 10. 6. 42. Am linken Mainufer 1. 4. 11. Am Schönbuschsee. Kahl.

### A. montivaga Strm.

Ellerwald 14. 5. 36. Mainufer Mörswiese 29. 5. 05. Erbig 6. 1894 (Fr.). Gailbachtal 11. 7. 31, 18. 10. 36. Glattbacher Wald. Schweinheimer Wald 14. 7. 26 (Noll).

### A. nitida Strm.

Im Kahltal bei der Herrenmühle 21. 5. 22 (Ochs).

### A. communis Panz. (= convexior Steph.)

Nicht selten. Gailbachtal 17. 1. 43, 26. 4. 41. Bahndamm gegenüber Nilkheim 3. 4. 27. Kahl 14. 4. 11, 21. 7. 09. Kalbenstein 30. 8. 28. Mäusberg bei Wiesenfeld 28. 8. 20. Striet 19. 9. 25.

- A. lunicollis Schiödde.**  
Hörstein 28. 3. 48. Großauheim 5 St. (Dehnert).
- A. curta Dej.**  
Kahlthal 16. 4. 26.
- A. aenea Deg.**  
Häufig im ganzen Gebiet.
- A. spreta Dej.**  
Kahl 16. 4. 22, 26. 7. 03. Sodener Wald 6. 5. 06. Stockstadter Wald 31. 10. 26, 21. 11. 25.
- A. famelica Zimm.**  
Lohr a. M. (St.).
- A. familiaris Duft.**  
Häufig. Mainufer 1. 1. 26. Krainberg 28. 2. 26, 17. 3. 43. Fasanerie. Stockstadter Wald. Erbig (Fr.).
- A. anthobia Villa.**  
Aschaffenburg. Stockstadter Wald 3 St. (St.).
- A. lucida Duft.**  
Seligenstadt (Scr.). Sodener Wald 6. 1. 26, 30. 3. 07. Bahndamm gegenüber Nilkheim 21. 3. 26. Karlstadt am Steig 19. 3. 26. Oberbessenbach 19. 4. 41. Sandgrube bei Mainaschaff 21. 7. 25. Bahndamm unterhalb Station Kleinostheim.
- A. tibialis Payk.**  
Aschaffenburg (Scr.) Sodener Wald 10. 1. 26. Unterhalb Dettingen 7. 2. 26. Karlstadt am Steig 28. 3. 26. Obernauer Wald 26. 4. 26.
- A. ingenua Duft.**  
Von Fr. einmal hier gefunden.
- A. fusca Dej.**  
Sandgrube bei Mainaschaff 29. 7. 25, 8. 10. 25, 6. 11. 26. Schönbusch 29. 7. 25. Sandgrube bei Sulzbach a. M. 20. 10. 28, 6. 11. 28. Großkrotzenburg Rand der Moore 2. 10.. 25.
- A. cursitans Zimm.**  
Bischberg 2 St. (S.).
- A. bifrons Gyll.**  
Kl. Exerzierplatz 11. 4. 11. Kahl 16. 6. 35. Obernauer Wald 30. 7. 08. Stockstadter Wald 8. 1894 (Fr.).
- A. infima Duft.**  
Erbig 6. 3. 10. Gailbach. Seligenstadt (Scr.) Zellhausen (H.).  
**A. apricaria Payk.**  
Nicht selten (Fr.) 1897.
- A. fulva Deg.**  
Stockstadter Wald 13. 5. 26, 29. 11. 31. Sandgrube bei Mainaschaff 29. 7. 25. Sandgrube bei Station Sulzbach a. M. Am linken Mainufer unter Steinen 9. 1894 (Fr.). Fischerhöhle 20. 5. 48 (Noll).
- A. consularis Duft.**  
Karlstadt am Steig 25. 4. 26. Kalbenstein 9. 8. 25. Schmerlenbacher Wald 9. 9. 04. Johannesberg 10. 1893 (Fr.). Godelsberg 11. 1894 (Fr.).

**A. aulica Panz.**

Von Oe als häufig angegeben. (Nach Fr.)

**A. equestris Duft.**

Godelsberg 9. 6. 1894 (Fr.). Gailbachtal 11. 7. 37. Striet 10. 9. 35.

**Z a b r u s Clairv.**

**Z. tenebrioides Goeze.**

Getreideschädling. Die Larve zerstört die Wurzeln. (v. H.) Der Käfer frißt die weichen Körner. Auf Äckern 7. 9. 24. Johannesberg 10. 1895 (Fr.).

**S t o m i s Clairv.**

**St. pumicatus Panz.**

Aschaffenburg (Oe.) Bischberg 19. 3. 08. Gailbachtal 25. 3. 46. Mörswiese am Mainufer 24. 5. 05. Am Schönbuschsee 4. 10. 04. Hain i. Sp. Seebachtal 14. 9. 22. Eckertsmühle 13. 6. 27 (Noll).

**P t e r o s t i c h u s Bon.**

**Pt. (Poecilus Bon.) punctulatus Schall.**

Am Bahndamm gegenüber Nilkheim 21. 3. 26. Schönbusch 14. 4. 1878 (Fl.). Großostheimer Wald 8. 9. 1898 (Fl.). Erbig an faulen Schwämmen 9. 1885 (Fr.). 2. 9. 27 (Noll).

**Pt. (P.) dimidiatus Oliv.**

Buschallee 4. 1894 (Fr.). Obernauer Wald 26. 4. 26. Sodener Wald 6. 5. 06. Stockstadter Wald 5. 1896 (Fr.). Wendelberg 12. 7. 36. Erbig 2. 9. 27 (Noll).

**Pt. (P.) lepidus Leske.**

In unserem Gebiet seltener geworden. Exerzierplatz 5. 1894 (Fr.). Fasanerie 6. 1894 (Fr.). Miltenberg 6. 1894 (Fr.). Kahl am Langen See 19. 4. 25. Erbig 5. 1898 (Fr.). Stengerts 15. 8. 26 (Noll).

**Pt. (P.) cupreus L.**

Häufig.

**Pt. (P.) coerulescens L.**

Im Gebiet seltener. Kahl am Langen See 19. 4. 25. Dammer Sumpfwiesen 4. 1895 (Fr.). Lindig 4. 1895 (Fr.). Am Schöllmüllersee 6. 1893 (Fr.). Lohr Beilstein 18. 6. 22 (St.). Stengerts 25. 7. 26 (Noll).

**a. tenebricosus Westh.**

Bei Hain i. Sp. auf Moorwiesen 9. 6. 23.

**Pt. (Pediurus Motsch.) inaequalis Marsh.**

Aschaffenburg nicht selten (Oe.) 1853. Würzburg im Zeller Wald 24. 5. 07 (Zwecker).

**Pt. (Lagarus Chaud.) vernalis Panz.**

Nicht selten. Schönbusch 20. 1. 24, 13. 3. 24. Bei Sulzbach a. M. 14. 2. 26. Stockstadter Wald unter morscher Erlenrinde 3. 4. 42. Mainufer 12. 5. 25. Wenighösbach im Mulm eines morschen Baumstrunkes 11. 12. Kahl Moore. Am Fasanerie-see unter Stein 12. 11. 1894 (Fr.). Unter Laub (Oe.).

**Pt. ((Adelosia Steph.) macer Marsh.**

Nach Horion in unserem Gebiet wahrscheinlich noch zu finden.)

**Pt. (Lyperosomus Mots.) aterrimus Hbst.**

Kahl Moore 16. 4. 22. Am Langen See 19. 4. 25.

**Pt. (Bothriopterus Chd.) oblongopunctatus F.**

Sehr häufig in Wäldern unter Rinde morscher Bäume und Baumstrünke.

**Pt. (B.) angustatus Duft.**

Seligenstadt (Scr.) Lindig 9. 4. 1894 (Fr.). Stockstadter Wald unter Moospolster 14. 5. 04. Sodener Wald unter Grashaufen 30. 7. 04. Stengerts 9. 9. 29. Erbig 5. 6. 26 (Noll).

**Pt. (Platysma Bon.) niger Schall.**

Nicht selten. An morschem Eichenstrunk 22. 3. 43. Fasanerie 8. 1894 (Fr.).

**Pt. (Omascus Dej.) vulgaris L.**

Häufig unter Steinen. Fasanerie. Striet 5. — 8. (Fr.).

**Pt. (Melanias Bon.) nigritus F.**

Häufig. Fasanerie 5. — 9. 1894 (Fr.). Stockstadter Wald 5. 4. 24. Hain i. Sp. im Pollaschgrund 18. 4. 43. Sodener Wald auf Sumpfwiesen 17. 10. 32. Kahl Moore.

**Pt. (M.) anthracinus Illig.**

Fasanerie 5. — 9. (Fr.). Mainufer unter Stein 27. 9. 04. Wachenbachtal 30. 10. 38. Schmerlenbacher Wald. Schönbusch.

**Pt. (M.) gracilis Dej.**

Fasanerie (Fr.). Bahndamm gegenüber Nilkheim 7. 3. 26. An den Altwässern des Mains 23. 9. 04. Stockstadter Wald 8. 10. 26 (Noll).

**Pt. (M.) minor Gyll.**

Häufiger. Stockstadter Wald 30. 1. 27, 17. 4. 26, 9. 5. 25. Kahler Moore 19. 4. 11, 1. 10. 25. Am Schönbuschsee unter Schilf 30. 9. 09.

**Pt. (Argutor Steph.) strenuus Panz.**

Fasanerie 1. 1895, 9. u. 11. 1894 (Fr.). Kahl Moore 7. 2. 26, 14. 4. 11. Schönbusch unter Moos 12. 3. 27. Godelsberg.

**Pt. (A.) dilligens Strm.**

An feuchten Stellen nicht selten.

**Pt. (A.) interstinctus Strm.**

Karlstadt am Waldrand des Haag 26. 1. 30, 9. 3. 30, 24. 4. 32, 25. 10. 42. Kahltal.

**Pt. (Steropus Dej.) madidus F. f. concinnus Strm.**

Aschaffenburg. Spessart (Polentz 1925). Schönbusch 27. 4. 24, 24. 5. 22, 11. 7. 24. Kalmut 27. 6. 25. Schmerlenbacher Wald. Striet (Oe.) Bei Karlstadt 28. 8. 26.

**Pt. (Pterostichus s. str.) melas Creutz.**

Bei Wiesenfeld 28. 8. 20 (S.). Hanau Bulau, Kinzigufer 5. 50 u. 4. 52. Groß-Auheim Waller-See 7. 49, 1 St. (Dehnert).

**Pt. metallicus F. (= Burmeisteri Heer.)**

Bei Miltenberg 4. 1893 (Fr.). Im Striet 5. 18. Hain i. Sp. Seebachtal 21. 3. 37, 17. 4. 25. Stengerts 9. 5. 26 mehrfach (Noll).

**Haploderus Chd.**

**H. pumilio Dej.**

Bei Oberbessenbach 19. 3. 22. Kahl 19. 4. 25. Am Langen See. Hain i. Sp. Seebachtal 15. 5. 38. Waldaschaff 28. 4. 26. Rohrbrunn i. Sp. 1910 (Buchka) Miltenberg 4. 1893 (Fr.).

## A b a x Bon.

### A. ater Vill.

Häufig unter Steinen.

### A. parallelus Duft.

Häufig wie der Vorige.

### A. ovalis Duft.

Steinbachtal im Strietwald (Fr.). Sodener Wald 16. 2. 41. Klingenberg 1. 6. 16. Rottenberg 29. 5. 22 (St.). Amorbach Wildenburg 11. 10. 25. Stengerts 9. 5. 26 (Noll)

### A. carinatus Duft. s. sp. porcatus Duft.

Heigenbrücken 1 St. (Nürnberg 1939) nach Horion.

## M o l o p s Bon.

### M. elatus F.

Nicht häufig. Fasanerie 4. 1894 (Fr.). 1906 (S.). Lindig 4. 1894 (Fr.). Fischerhecke 3. 1894 (Fr.). In Miltenberg häufiger 4. 1893 (Fr.). Bei Rohrbrunn i. Sp. 22. 6. 52 (J. S.). Stengerts 9. 5. 26 (Noll).

### M. piceus Panz.

Striet und Schmerlenbacher Wald 5. — 10. (Fr.). Karlstadt 16. 3. 41. Schönbusch unter Steinen 27. 4. 24. Hinter Damm 29. 10. 29.

## C a l a t h u s Bon.

### C. fuscipes Goeze.

Nicht selten unter Steinen. Karlstadt Steig 28. 3. 26. Kahl am Langen See 19. 4. 25. Exerzierplatz 5. 1894 (Fr.). Sandgrube bei Mainaschaff 29. 7. 25.

### C. erratus Shlb.

Überall häufig.

### C. ambiguus Payk. (= fuscus F.)

Büchelberg 27. 4. 08. Mainaschaff Sandgrube. Kahl 12. 6. 04, 30. 8. 42.

### C. micropterus Duft.

Metzgergraben i. Sp. 12. 4. 25. Stockstadter Wald 18. 4. 25. Sodener Wald 29. 7. 25. Schönbusch 20. 11. 38.

### C. melanocephalus L.

Häufig.

## S p h o d r u s Clairv.

### S. leucophthalmus L.

In Kellern (Oe.) Mainufer in einem alten Stiefel 27. 10. 25 (Noll).

## P r i s t o n y c h u s Dej. (Laemostenus Bon.)

### P. terricola Hbst.

In Kellern (Oe.). Im Haus Albrechtstraße Nr. 11 13. 12. 26. Stockstadter Wald unter altem Papier 5. 1894 (Fr.). Lohr nachts im Zimmer 2. 9. 22 (St.).

## S y n u c h u s Gyll.

### S. nivalis Panz.

Striet (Oe.) Graben am Ernsthof 7. 1894 (Fr.). Stockstadter Wald 16. 7. 18. Bischberg 29. 7. 25, 8. 07. Am Kalbenstein 30. 8. 25. Godelsberg.

## **Olisthopus Dej.**

### **O. rotundatus Payk.**

Im Frühjahr unter Steinen (Fr.). Mainufer 2. 1. 26. Bahndamm gegenüber Nilkheim 21. 3. 26. Steinbachtal 10. 4. 39, 7. 8. 25. Stockstadter Wald 25. 11. 25.

## **Agonum Bon.**

### **A. quadripunctatum Dej.**

Aschaffenburg abends an ein Haus angefliegen (Fl.) 1899, 1 St. (t. Buchka).

### **A. sexpunctatum L.**

In unserem Gebiet nicht selten.

### **A. viridicupreum Goeze.**

Am Langen See zwischen Dettingen und Kahl (H.) 19. 5. 07 (St.). Mainufer bei Hanau (Lamy 1907 1 St.). Mainufer bei Kahl 07 u. 08 zahlreich (M.).

### **A. gracilipes Duft.**

Rothenbuch an einem moorigen Grashang unter Moos 17. 5. 36.

### **A. marginatum L.**

Karlstadt auf den Landwehren 28. 3. 26, 1. 4. 29. Kahl 24. 5. 36. Mainufer 15. 5. 05. Gersprenzufer 10. 5. 27. Erbig unter Moos überwintert 7. 2. 26 (Noll).

### **A. Mülleri Hbst.**

Häufig an feuchten Stellen.

### **A. versutum Gyll.**

Leiderer See 3. 1894 (Fr.). Miltenberg 4. 1893 (Fr.). Gersprenzufer bei Stockstadt a. M. 15. 5. 25. Am Schöllennüllersee 6. 1893 (Fr.).

### **A. viduum Panz.**

Häufig an feuchten Stellen. Im Spessart 1. 2. 25. Kahlthal 10. 4. 26. Striet 16. 5. 24. Büchelberg 16. 9. 25. Kahl Moore.

### **A. moestum Duft.**

Stockstadter Wald 8. 2. 25, 17. 4. 26 Karlstadt am Steig 28. 3. 26. Unterhalb Dettingen 7. 2. 22.

### **A. (Batenus Motsch.) livens Gyll.**

Aschaffenburg (Oe.). Kahl unter Moos eines Erlenstrunkes 22. 10. 04.

### **A. (Europhilus Chaud.) micans Nicol.**

Kahler Moore 7. 2. 26, 30. 9. 25, 16. 11. 26. Mainufer 9. 4. 09. Exerzierplatz 11. 9. 07. Fasanerie 9. 1894 (Fr.).

### **A. (E.) piceum L.**

Kahler Moore 1 St.

### **A. (E.) gracile Gyll.**

Kahler Moore 17. 10. 04. 15. 11. 23 unter Moos am Fuß einer alten Eiche.

### **A. (E.) fuliginosum Panz.**

Stockstadter Wald 14. 2. 26. Sumpf zwischen Kleinostheim und Dettingen 8. 3. 36. Großkrotzenburger Moore 19. 11. 20. Kahler Moore in Sphagnum-Polstern 3. 11. 04.

### **A. (E.) Thoreyi Deg.**

Kahler Moore 25. 1. 08 (M.). 18. 9. 04, 28. 11. 24. Bei Sulzbach a. M. 11. 2. 26. Lindigwiesen 26. 4. 29, 19. 9. 48.

- A. (Limodromus Motsch.) assimile Payk.**  
Häufig unter morscher Baumrinde.
- A. (Anchomenus Bon.) ruficornis Goeze.**  
Exerzierplatz unter Steinen 9. 4. 1894 (Fr.).
- A. (Anchus Lec.) obscurm Hbst.**  
Sehr häufig an feuchten Stellen unter Steinen und Moospolstern.
- A. (Anchodemus Motsch.) dorsale Pont.**  
Unter Steinen oft in großer Anzahl.

## Aepnidiinae

### Masoreus Dej.

- M. Wetterhali Gyll.**  
Steppentier, auf sehr trockenen, feinsandigen Stellen unter Grasbüschen und *Artemisia campestris* L. Sande bei Mainaschaff 8. 3. 31, 4. 4. 31, 18. 10. 30. Bei der Eckertsmühle 29. 5. 31. Kahl Sandgebiet 3. 6. 37, 26. 7. 26, 13. 9. 36. Schönbusch Sandgrube 1. 7. 46. Stockstadter Wald in einer Sandgrube 28. 7. 40. Mainufer bei Obernau unter Grasbüschen 21. 12. 30.

## Lebiinae

### Lebia Latr.

- L. chlorocephala Hoffm.**  
Nicht selten unter Steinen, Moos und Laub. Lösswände hinter Damm 12. 3. 28, 23. 12. 29. Karlstadt 9. 3. 30, 28. 3. 26, 27. 10. 29. Rothenbuch i. Sp. 21. 4. 40. Striet 22. 9. 34.
- L. cyanocephala L.**  
In unserem Gebiet selten. Karlstadt 6. 3. 27. Bischberg 19. 4. 24 (Noll). Schönbusch von Schlehen geklopft 3. 5. 31.
- L. crux minor L.**  
Dornauer Graben 9. 2. 26. Godelsberg unter Birkenrinde 3. 1894 (Fr.). Gailbachtal 17. 1. 43. Feldkahl 30. 3. 46. Wendelberg 13. 4. 46. Kahl 11. 5. 29, 19. 11. 25. Striet von Eichen geklopft 7. 1893 (Fr.). Großkrotzenburg Rand der Moore 30. 9. 25, 21. 9. 27. Aus gemähem Gras 19. 11. 25.
- L. marginata Geoffr.**  
Nicht selten unter Laub, auf niederen Pflanzen und Gebüsch. Gailbachtal 17. 1. 43, 5. 3. 38, 20. 10. 40, 24. 11. 35. Wendelberg 13. 4. 46. Am Strietrand 16. 7. 18, 24. 8. 28. Waldrand am Lindig 7. 11. 37.

### Demetrias Bon.

- D. atricapillus L.**  
In den Mainhecken nicht selten 28. 10. 04. Kahl Moore 20. 11. 24. Bei Sulzbach a. M. 11. 10. 05. Stockstadter Wald 30. 3. 50.
- D. monostigma Sam.**  
Fasanerie (Oe.). Babenhausen und Seligenstadt (Scr.). Oestl. Strietrand 16. 3. 50. Hanau 1. 4. 06 (H.). Lösswände hinter Damm 4. 7. 08.



**D. imperialis Germ.**

Lehmgruben bei Bahnhof Kleinostheim 24. 4. 28, 7. 5. 37. Schönbusch im Herbst am Seeufer. Fasanerie (Oe.). Kahl Moore.

**Dromius Bon.**

**D. longiceps Dej.**

Hanau im Winter unter Platanenrinde (H.). Von Oe. angeblich in der Fasanerie und auf dem Godelsberg gefunden. (Nach Fr.)

**D. linearis Ol.**

Sehr häufig in Hecken. Mainhecken 21. 4. 06. Gailbachtal 23. 5. 20. Stengerts 27. 8. 25. Kalbenstein 30. 8. 25. Bei Oberbessenbach 23. 9. 46. Lösswände hinter Damm 11. 10. 24. Obernburg im alten Steinbruch 13. 11. 38. Früher von Oe. 1853 als selten angegeben.

**D. agilis Fab.**

Sehr häufig unter lockerer Rinde von Laub- und Nadelhölzern.

**D. angustus Brullé.**

Schönbusch unter Platanenrinde 26. 1. 24. Kl. Exerzierplatz 1. 1894 (Fr.). 1. 3. 25 unter Platanenrinde. Schmerlenbacher Wald unter Platanenrinde 5. 11. 23. Büchelberg unter Spitzahornrinde 11. 12. 38.

**D. marginellus F.**

Mehrfach unter Platanenrinde. Schönbusch 1. 1894 (Fr.). Exerzierplatz 1. 3. 25, 11. 1894 (Fr.). Schmerlenbacher Wald 5. 12. 13.

**D. fenestratus F.**

Unterhalb Stockstadt (Oe.). Hanau am Friedhof unter Platanenrinde (H.).

**D. quadrimaculatus L.**

Häufig unter lockerer Baumrinde.

**D. quadrinotatus Panz.**

Häufig wie der Vorige.

**D. sigma Rossi.**

Kl. Exerzierplatz unter Platanenrinde in Menge 1. 1894 (Fr.) 6. 4. 06. Aschaffufer am Fuß von Erlen und Pappeln unter Laub in großer Anzahl 24. 11. 29 (J. S.).

**D. nigriventris Thoms.**

Großostheimer Wald 19. 3. 31. Glattbacher Wald 4. 1895 (Fr.). Kalmut zahlreich an Schwarzkieferwellen 22. 6. 25. Büchelberg von Kiefern geklopft 23. 7. 25. Wendelberg 25. 10. 25. Erbig 28. 11. 26. Stockstadter Wald 8. 11. 25.

**D. melanocephalus Dej.**

Im Glattbacher Wald einmal gefunden. Auf dem Ammersfeld bei Aschfeld 25. 4. 48 (J. S.). Platanenallee unter Rinde 12. 1893 (Fr.).

**Metabletus Schm.-Goeb.**

**M. truncatellus L.**

Häufig an bemoosten Baumstrünken, unter Laub und Steinen. I — IV, VI, VIII — XI.

**M. foveatus Fourcr.**

Im Moos am Fuß alter Bäume 20. 1. 24. Stockstadter Wald 5. 4. 14. Sumpf an der Landstraße 5. 4. 24. Kalmut 26. 5. 25. Sandgrube bei Mainaschaff 29. 9. 25.

## **Microlestes Schm.-Goeb.**

### **M. minutulus Goeze.**

Häufig unter Moos und Laub an Waldrändern. Rückersbacher Schlucht 22. 2. 25.

Schönbusch 26. 3. 22. Fasanerie unter Moos eines alten Eichenstrunkes 22. 10. 05,  
8. 12. 23. Glattbacher Wald 24. 9. 04.

### **M. maurus Strm.**

Unter Laub, Moos und lockerer Baumrinde. Bei Eisenbach 20. 1. 26. Krainberg  
28. 2. 26, 17. 3. 43. Schönbusch 12. 3. 24. Karlstadt am Steig 19. 3. 26. Kahl Moore  
30. 9. 25. Obernauer Wald 8. 10. 27 (Noll).

## **Lionychus Wissm.**

### **(L. quadrillum Duft.**

Bei Frankfurt a. M. mehrfach gefunden (Nach L. v. Heyden). Nach Horion wohl  
auch in unserem Gebiet zu finden.)

## **Cymindis Latr.**

### **C. humeralis Fourcr.**

Nicht selten unter Laub, Moos und Steinen. Stockstadter Wald 18. 3. 26, 2. 10. 25.  
Obernauer Wald 26. 4. 26, 6. 5. 16. Karlstadt 6. 4. 30, 25. 10. 42. Fischerhecke  
22. 8. 96 (Fr.). Schönbusch 7. 1882 (Fr.). Erbig 23. 8. 25.

### **C. axillaris F.**

Von Oe. und Scr. von Aschaffenburg angegeben. Von mir in nächster Nähe der  
Stadt nicht mehr gefunden. Auf dem Krainberg und Kalbenstein bei Gambach  
a. M. nicht selten 28. 2. 26, 25. 3. 29, 8. 5. 27. Karlstadt 28. 3. 26, 1. 4. 29. Bei den  
Landwehren 24. 9. 30.

#### **v. lineola Duft.**

Südliche Form. Kalbenstein unter Moos 28. 2. 26, 1 St.

### **C. angularis Gyll.**

Auf dem Kalbenstein und Krainberg 28. 2. 26 unter Moos. Karlstadt am Steig  
28. 3. 26, 25. 4. 26. Auf den Landwehren unter Moos 16. 5. 29.

### **C. macularis Fisch.**

Auf sandigen Flächen unter Moos zwischen Heidekraut. Nach Hoffmann bewegt  
sich die Art langsam, ist meist mit Staub bedeckt und dadurch schwer zu sehen.  
Bei Kahl, Zellhausen, Seligenstadt, Hanau V — IX (H.).

## **Odacanthinae**

### **Odacantha Payk.**

### **O. melanura L.**

Moore bei Kahl und Großkrotzenburg 19. 3. 33, 20. 4. 27, 18. 9. 08 (Fr.). Im Schilf  
der Lehmgruben bei Kleinostheim 24. 4. 28. Nach Fr. bereits 1853 von Oe. in  
Rohrstengeln am Guten Mann unterhalb Leider und von Fl. etwa 1882 am Fasa-  
nersiese festgelegt.

## **Brachininae**

### **Brachinus Web.**

### **B. crepitans L.**

Erbig 4. 1894 (Fr.). Rohrbrunn 6. 96 (Fr.). Stockstadter Wald 3. 4. 07. Im Kalk-

gebiet häufiger. Karlstadt a. M. 9. 3. 30, 24. 4. 32, 27. 10. 32. Krainberg 15. 5. 47, 14. 10. 34. Mäusberg bei Wiesenfeld 28. 8. 20. Feldkahler Höhe 17. 5. 31 (Noll).

**B. explosens Duft.**

Häufig unter Steinen.

## Hygrobiiidae

### *Hygrobia* Latr.

**H. tarda Hbst. (= Hermannii F.)**

Von mir einmal in einem Wasserloch auf den Gersprenzwiesen bei Stockstadt a. M. gefunden. Von Oe. früher in den Lettlöchern bei Damm festgestellt.

## Haliplidae

### *Pelto dytes* Illig. (= *Cnemidotus* Illig.)

**P. caesus Duft. (= impressus Panz.)**

Nicht selten in Weihern der Fasanerie, hinter dem Bahnhof und im Schöllmüllersee (Fr.). Stockstadter Wald 11. 4. 25. Langer See bei Kahl 19. 4. 25. Lindigsümpfe bei Dettingen 3. 5. 25. Bei Station Kleinostheim 12. 5. 25.

### *Haliphus* Latr.

**H. obliquus F. (= amoenus Ol.)**

In den Tümpeln der Gersprenzwiesen bei Stockstadt a. M. Kahl Langer See 19. 4. 25.

**H. confinis Steph. (= lineatus Aub.)**

Langer See bei Kahl 19. 4. 25.

**H. lineatocollis Marsh.**

Kahl Langer See 19. 4. 25. Stockstadter Wald 12. 4. 09.

**H. ruficollis Deg.**

Stockstadter Wald in Tümpeln 18. 4. 09. Kahl Moore 11. 4. 25. Leiderer See 12. 4. 07.

**H. Heydeni Wehncke.**

Leiderer See 1. 4. 07.

**H. fluviatilis Aubé.**

Leiderer See 12. 4. 07. Im unteren Buschsee 2. 4. 09. Lindigwiesen 3. 5. 25. Lehmgrube bei Station Kleinostheim 12. 5. 25. Altwasser des Mains bei Niedernberg 10. 9. 13.

**H. Wehnckei Gerh. (= lineolatus auct.)**

Aschaffenburg (Scr.). Langer See bei Kahl 3 St.

**H. immaculatus Gerh.**

Im unteren Schönbuschsee 2. 7. 04.

**H. fulvicollis Er.**

Früher in einem Tümpel hinter dem Bahnhof Aschaffenburg 5. 1894 (Fr.). Babenhäusen (Scr.).

**H. laminatus Schall.**

Von Oe. als selten angegeben (Fr.).

**H. flavicollis Strm.**

Aschaffenburg (D.). Steinbach bei Lohr 28. 8. 21 (St.).

**H. fulvus F.**

Stockstadter Wald im Tümpel bei dem ersten Bahnwärterhaus 11. 4. 25, 8. 4. 28.

**H. variegatus Strm.**

Lehmgruben bei Bahnhof Kleinostheim 12. 5. 25. Nach Fr. auch von D. u. Oe. hier nachgewiesen.

## Dytiscidae

### Noterinae

#### Noterus Clairv.

**N. crassicornis Müll.**

In Tümpeln häufig.

**N. clavicornis Deg.**

In Tümpeln. Lindigwiesen 3. 5. 24. Bei Station Kleinostheim 12. 5. 24. Schönbuschsee 30. 9. 26 (Noll).

## Laccophilinae

#### Laccophilus Leach.

**L. minutus L. (= obscurus Panz.)**

Früher in den Lettlöchern, in der Kiesgrube der Großen Schönbuschallee häufig (Fr.). Kahl Langer See 17. 9. 29 (Noll).

**L. hyalinus Deg. (= interruptus Panz.)**

An den gleichen Fundorten wie der Vorige. Kahl am Langen See 19. 4. 25. Gustavsee 5. 6. 47 (Noll).

## Hydroporinae

#### Hyphidrus Illig.

**H. ovatus L. (= ferrugineus L.)**

Häufig in Tümpeln und Seen.

#### Bidessus Sharp.

**B. geminus F.**

Aschaffenburg nicht selten (Oe.). Leiderer See 12. 4. 07.

**B. unistriatus Schrnk.**

Aschaffenburg nicht selten (Oe.). Leiderer See 5. 07. Wiesentümpeln an der Gersprenz 13. 8. 24. Kahl Moore.

**B. grossepunctatus Vorbr.**

Seligenstadt 2 St. (Scr.).

## **C o e l a m b u s Thoms.**

### **C. impressopunctatus Schall.**

Leiderer See 12. 4. 07. Kahl am Langen See 29. 4. 25.

### **C. confluens F.**

Aschaffenburg (Oe.) 1853. Babenhausen (Scr.) 1863.

### **C. impressopunctatus var. linellus, Gyll.**

Schönbuschsee 30. 9. 26 (Noll).

## **H y g r o t u s Steph.**

### **H. versicolor Schall.**

Altwasser des Mains 18. 9. 23.

### **H. inaequalis F.**

Leiderer See 18. 4. 07. Kahl Langer See 19. 4. 25. Lohr Seegraben 21. 5. 45 (St.).  
Schmiedsee 24. 6. 45 (St.). Altwasser des Mains 30. 9. 23.

### **H. decoratus Gyll.**

Aschaffenburg (Fl.). Leiderer See 12. 4. 07. Hanau (Scr.).

## **H y d r o p o r u s Clairv.**

### **H. dorsalis Fab.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Seligenstadt (Scr.). Schmiedsee bei Lohr-Sendelbach  
12. 5. 45 (St.).

### **H. scalesianus Steph.**

Leiderer See 12. 4. 07 (t. Hoch.).

### **H. angustatus Strm.**

Häufig im Leiderer See 12. 4. 07. Schmiedsee bei Lohr-Sendelbach 3. 47, 12. 4. 47  
(St.).

### **H. neglectus Schaum.**

Stockstadter Wald Tümpel an der Gersprenz 9. 5. 25 (t. Hoch).

### **H. umbrosus Gyll.**

Leiderer See 12. 4. 07. Stockstadter Wald (t. Hoch).

### **H. tristis Payk.**

Kahl Moore 19. 4. 28, 2. 8. 26 (t. Hoch). Stockstadter Wald mehrfach in Wald-  
tümpeln 9. 5. 25.

### **H. piceus Steph.**

Seligenstadt in größerer Anzahl (Scr.). Aschaffenburg (D.). Stockstadter Wald  
(t. Hoch).

### **H. palustris L.**

Sehr häufig in Tümpeln und Wassergräben.

### **H. striola Gyll. (= vittula Er.)**

Stockstadter Wald 9. 5. 25.

### **H. erythrocephalus L.**

Häufig im Leiderer See 12. 4. 07. Kahl im Langen See 19. 4. 25.

### **H. obscurus Strm.**

Stockstadter Wald 18. 4. 09 (t. Hoch).

**H. elongatulus Strm.**

Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg (D.). Lohr a. M. 1 St. (St.).

**H. marginatus Duft.**

Stockstadter Wald, Tümpel in einem Erlengrund 18. 4. 08. Bischbrunn 10. 4. 39.

**H. rufifrons Duft.**

In Tümpeln der Lindigwiesen 3. 5. 25. Wassergraben der Gersprenzweiden bei Stockstadt a. M. 9. 5. 25. Moore bei Kahl 1. 10. 24. Schmiedsee bei Lohr-Sendelbach 12. 5. 45 (St.).

**H. planus F.**

Kahl Moore 19. 4. 25. Fasanerie 5. 1893 (Fr.). Lehmgruben bei Station Kleinostheim zahlreich 12. 5. 25. Stockstadter Wald 9. 5. 25.

**H. pubescens Gyll.**

Stockstadter Wald 18. 4. 09, 9. 5. 25. Kahl Langer See 19. 4. 25. Bei Station Kleinostheim häufig 12. 5. 25.

**H. nigritus F.**

Stockstadter Wald 18. 4. 09. Bei Station Kleinostheim selten 12. 5. 25.

**H. melanarius Strm.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Kahl Moore 6. 10. 25 (t. Hoch).

**H. memnonius Nicol.**

Büchelberg 20. 5. 28 (t. Hoch). Sodener Wald. Fasanerie.

**H. ferrugineus Steph.**

Aschaffenburg (S.) (t. Hubenthal).

**G r a p t o d y t e s Seidl.**

**G. lineatus F.**

Aschaffenburg. Leiderer See 12. 4. 07. Lehmgruben bei Station Kleinostheim 12. 5. 25. Kahl Moore 5. 10. 10. Schmiedsee bei Lohr-Sendelbach 3. 47 (St.).

**G. granularis L.**

Leiderer See 14. 4. 07. Kahl Moore 19. 4. 25. In Tümpeln auf den Gersprenzweiden bei Stockstadt a. M. 12. 9. 25.

**G. bilineatus Strm.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Seligenstadt (Scr.).

**G. pictus F.**

Wassergraben in der Rückersbacher Schlucht 3. 5. 25. Bei Partenstein i. Sp. 19. 5. 23. Kahl Moore 6. 10. 26.

**D e r o n e c t e s Sharp.**

**D. latus Steph.**

Striet im Steinbach 19. 6. 09.

**D. platynotus Germ.**

Lohr bei der Walkmühle 15. 5. 23 (St.).

**D. XH-pustulatus F.**

In der Aschaff hinter der Zellstoffabrik 7. 7. 04. Quelltümpel am Partensteiner Grund öfters (St.).

**D. rivalis Gyll. (= Sanmarki Shlbg.)**

Hain i. Sp. Seebachtal 27. 4. 24. Frammersbach in der Lohr 18. 9. 45 (St.). Bischbrunn 7. 10. 23 (St.).

**D. halensis F.**

Leiderer See 12. 4. 05. Stockstadter Wald bei der Waldmühle in einem Wassergraben 8. 4. 28. Kahl in einem Wassergraben 12. 6. 04.

**A g a b u s Leach.**

**A. subtilis Er.**

Stockstadter Wald 18. 4. 09 2 St. (t. Hoch).

**A. neglectus Er.**

Stockstadter Wald 18. 4. 09. 2 St. (t. Hoch). Oberbessenbach 2. 10. 48. Auch von Oe. u. D. angegeben.

**A. chalconotus Panz.**

Aschaffenburg auf dem Schindanger 5. 3. 10 (t. Hoch). Stockstadter Wald in einem Erlengrund 18. 4. 09, 9. 5. 25. Kahl Moore (t. Hoch).

**A. guttatus Payk.**

Bischbrunn im Kendelbrunn 10. 4. 39 (t. Hoch). Im Rückersbach 3. 5. 25 (t. Hoch). Fasanerie 2. 5. 04. Homburg a. M. in einem Brunnentrog 14. 6. 25 (t. Hoch).

**A. bipustulatus L.**

Stockstadter Wald 18. 4. 09. Bischbrunn im Kendelbrunn 10. 4. 39 (Noll). Waldaschaff im Autenborn 15. 4. 38 und im oberen Aschaffthal 14. 10. 23 (Noll).

**A. Sturmi Gyll.**

Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg 1 St. (D.). Waldaschaff im Autenborn 15. 4. 38 (Noll). Kahl Moore 17. 9. 28 (t. Hoch).

**A. uliginosus L.**

Aschaffenburg früher in den Lettlöchern bei Damm selten (Fr.). Stockstadter Wald in Kulturschutzgräben 7. 5. 07. Wassergraben in den Gersprenzweiden 11. 5. 25 (t. Hoch).

**A. paludosus F.**

Aschaffenburg in früheren Jahren in den Lettlöchern bei Damm häufig (Fr.). Graben am Ernthof 6. 1894 (Fr.). Kahl Moore 5. 23.

**A. nebulosus Forst.**

Früher im Kapuzinersee nicht selten (Fr.). Lettlöcher bei Damm 6. 1876 (Fr.). Waldaschaff im Autenborn 15. 4. 38 (Noll). Aschaffenburg Wendelberg im Steinbruch-Tümpel 1. 11. 06 (t. Hoch).

**A. affinis Payk.**

Von Oe. als sehr selten angegeben. Stockstadter Wald Tümpel in einem Erlengrund 18. 4. 09 (t. Hoch).

**A. didymus Oliv.**

Stockstadter Wald häufig in einem Wassergraben 19. 2. 28, 8. 4. 28.

**A. undulatus Schrk.**

Sumpf zwischen Kleinostheim und Dettingen 5. 5. 35 (Noll). Lindigtümpel 1. 9. 36.

**A. labiatus Brahm (= femoralis Payk.)**

Leiderer See 12. 4. 07 (t. Hoch). Kahl Langer See 16. 4. 22 (t. Hoch).

**C o p e l a t u s Er. (= Liopterus Aubé.)**

**C. ruficollis Schall.**

Nicht selten in Tümpeln und Seen. Fasanerie 5. 1892 (Fr.). Lindig 19. 10. 33.

**P l a t a m b u s Thoms.**

**P. maculatus L.**

In fließenden Gewässern. Hain Seebachtal 27. 4. 28. In der Aschaff 7. 7. 07. Kahl Moore im Bach 19. 7. 23.

**J l y b i u s Er.**

**J. fenestratus F.**

Fasanerie beim Wasserfall 6. 1894 (Fr.). In der Aschaff hinter der Zellstofffabrik 7. 7. 07.

**J. ater Deg.**

Nicht selten in Tümpeln und Wassergräben.

**J. fuliginosus F.**

Sendelbach bei Lohr im Schmiedsee 20. 5. 43 (St.). Im See hinter der Zellstofffabrik 7. 7. 07. Kahl, Langer See 17. 9. 26 (Noll). Schönbuschsee 30. 9. 26 (Noll).

**J. subaeneus Er.**

Angeblich von Oe. hier gefunden.

**J. obscurus Marsh. (= quadriguttatus Er.)**

Lehmgruben bei Station Kleinostheim 2. 5. 25 (t. Hoch). Schönbusch 2. 7. 04 (t. Hoch). Im Lindig 1. 9. 36.

**J. guttiger Gyll.**

In Aschaffenburg fragliches Vorkommen. Bei Frankfurt a. M. nachgewiesen.

**J. aenescens Thoms.**

Aschaffenburg 1904 1 St. Stockstadter Wald, Tümpel an der Gersprenz 31. 5. 04 (t. Hoch). Kahl Moore 16. 11. 26.

**N a r t u s Zaitzew.**

**N. Grapei Gyll.**

Leiderer See 17. 4. 07. Stockstadter Wald 14. 4. 09. Kahl Moore (t. Hoch).

**R h a n t u s Lacord.**

**R. punctatus Fourcr. (= pulverosus Steph.)**

Stockstadter Wald 24. 4. 44. Kahl Moore 19. 4. 20. Gruben bei Station Kleinostheim 12. 5. 26. Gartenbassin 29. 10. 40. Am Licht im Haus 26. 10. 40. Wendelberg im Steinbruchtümpel 1. 11. 06. Schönbuschsee 30. 5. 1926 (Noll). Kahl, Langer See 31. 8. 35 (Noll).

**R. notatus F.**

Seligenstadt (Scr.). Schönbuschallee Kiesgrube 6. 1882 (Fr.).

**R. suturellus Harr. (= bistratus Er.)**

Seligenstadt (Scr.).



**R. bistriatus Bergstr. (= adpersus F.)**

Stockstadter Wald Tümpel in einem Erlengrund (t. Hoch). Kahl Moore 19. 4. 20 (t. Hoch). Im Langen See bei Kahl.

**R. exoletus Forst.**

Stockstadter Wald, Tümpel in einem Erlengrund 11. 4. 24 (t. Hoch). Bei Station Kleinostheim in den Lehmgruben 12. 5. 25 (t. Hoch).

**R. latitans Sharp.**

Bei Seligenstadt (Scr.).

**C o l y m b e t e s Clairv.**

**C. fuscus L.**

Stockstadter Wald in einem Wassergraben bei der Gersprenz 9. 5. 25. Fasanerie in einem Tümpel ziemlich häufig 6. 1893 (Fr.). In einem Mainaltwasser 30. 9. 25.

**H y d a t i c u s Leach.**

**H. transversalis Pontopp.**

Seligenstadt (Scr.). Sendelbach im Schmiedsee 22. 4. 44, 2. 5. 43, 7. 43 (St.). Leiderer See 5. 07.

**H. stagnalis F.**

Angeblich von Oe. hier gefunden (Fr.).

**H. seminiger Deg.**

Nicht häufig in den Tümpeln der Fasanerie (Fr.). Leiderer See 12. 4. 07. Lindigwiesen in Sumpflöchern 1. 9. 36. Stockstadter Wald. Kahl, Langer See 17. 9. 26 (Noll).

**G r a p h o d e r e s Thoms.**

**G. zonatus Hoppe.**

Fasanerie (Fr.). Leiderer See 12. 4. 07. Sendelbach bei Lohr im Schmiedsee (St.).

**G. cinereus L.**

Leiderer See 12. 4. 07. Sendelbach bei Lohr Schmiedsee (St.).

**G. austriacus Strm.**

Aschaffenburg zuweilen häufig (Oe.) 1853. Lettlöcher bei Damm 6. 1887 nicht häufig (Fr.).

**A c i l i u s Leach.**

**A. sulcatus L.**

Nicht selten in Tümpeln. Winzenhohl in einem Teich 15. 12. 51 M. u. W. (Noll).

**A. canaliculatus Nicol.**

Sumpf zwischen Kleinostheim und Dettingen 29. 9. 25. Hanau (H.).

**D y t i s c u s L.**

**D. latissimus L.**

Von Oe. bereits im Frühjahr 1854 hier festgestellt. Von Fr. im Sommer 1887 im Schönbuschsee gefunden.

**D. semisulcatus Müll. (= punctulatus F.)**

Nicht selten im Gebiet. Seligenstadt (Scr.). Fasanerie 6. 1876 (Fr.). Lohr Rüthsee 29. 6. 32 4 W. (St.). Rexrothsee 22. 10. 32 M. u. W. in copula (St.). Stockstadt a. M.

in einem Wassergraben der Gersprenzwiesen 9. 5. 25, 2. 7. 37. Kahl Moore 19. 7. 23. Aschaffenburg 25. 10. 04.

**D. dimidiatus Bergstr.**

Angeblich von Oe. in Aschaffenburg gefunden (Fr.).

**D. marginalis L.**

Häufig in Seen, Tümpeln und Wassergräben. Stockstadter Wald Graben bei der Waldmühle 9. 5. 25. Aus einem Brunnenablauf 19. 11. 37.

a. conformis Kunze. W.

Leiderer See 25. 5. 12.

**D. circumcinctus Aehr.**

Aschaffenburg (Oe.). Hanau (Heynemann).

**D. circumflexus F.**

Große Kiesgrube bei der Obernburger Straße 2. 5. 33 (Noll). Hanau (Heynemann).

**Cy b i s t e r Curts.**

**C. lateralimarginalis Deg.**

Ist in unserem Gebiet sehr selten geworden. Früher sehr vereinzelt in den Tümpeln der Fasanerie (Fr.). In Aschaffenburg auch von mir in den achtziger Jahren vereinzelt gefunden, seitdem nicht mehr. Sendelbach bei Lohr im Schmiedsee um 1935, 1 St. (St.). Moore bei Kahl 25. 7. 27 (Noll).

## Gyrinidae

**Gyrinus Geoffr.**

**G. minutus F.**

In den Tümpeln bei der Station Kleinostheim nicht selten. 29. 4. 32. Mehrfach 12. 5. 23.

**G. marinus Gyll.**

Steinheim Basaltbrüche 10. u. 23. 5. 25 (Ochs).

**G. substriatus Steph.**

Früher als natador L. bezeichnet, der aber nach Ochs ein östliches Tier ist. Sehr häufig auf laufenden und stehenden Gewässern.

**G. Suffriani Scr.**

Großkrotzenburger Moore in dem Wassergraben am nördlichen Rand der Moorwiesen 29. 5. 39, 13. 6. 38 (Seidler). Hanau (Lamy).

**G. Paykulli Ochs (= bicolor Payk.)**

Von Oe. im Lindig, von Scr. bei Seligenstadt gefunden (Fr.).

**O r e c t o c h i l u s Lacord.**

**O. villosus F.**

Fröhlich schreibt über ihn: „Unter Steinen und Wasserpflanzen in manchen Jahren in großer Anzahl im sogenannten Krautbach und im Röderbach. Meist sitzen sie tagsüber klumpenweise unter Steinen und kommen erst mit eintretender Dunkelheit aus ihrem Versteck hervor. Doch beobachtete ich dieselben im Juni 1893 wiederholt, wo sie bei hellem Sonnenschein in großer Anzahl, ganz wie Gyrinus auf der Wasseroberfläche ihre Kreise zogen.“ Krautbach auf dem Wasserspiegel bei Tageslicht in Anzahl 10. 1910 (S.).

# Palpicornia

## Hydraenidae

### Hydraena Kugelann.

- H. palustris** Er.  
Aschaffenburg angeblich nicht selten 1853 (Oe.). Babenhausen (Scr.).
- H. riparia** Kugel.  
Aschaffenburg (Oe.), Leiderer See 17. 4. 07. Stockstadter Wald in einem Wassergraben 7. 5. 07. Mainufer gegenüber Obernau 17. 7. 05. Amorbach 7. 8. 04.
- H. nigrita** Germ.  
Kahl in Wassergräben 23. 10. 04.
- H. pygmaea** Waterh.  
Lohr Steinbach bei der Schürgersmühle 16. 2. 23. Hausen bei Lohr in der Quelle Geisbrunn 20. 3. 22 (St.).
- H. gracilis** Germ.  
Stockstadter Wald 7. 8. 04. Striet im Steinbach 5. 11. 05.
- H. minutissima** Steph. (= **atricapilla** Waterh.)  
Striet im Steinbach 5. 11. 05. Hain i. Sp. im Seebach.

### Ochtebius Leach.

- O. exsculptus** Germ.  
Aschaffenburg (Oe. u. D.).
- O. gibbosus** Germ.  
Aschaffenburg (Oe.). Mainufer bei Seligenstadt (Scr.).
- O. minimus** F. (= **impressus** Marsh.)  
Leiderer See 12. 4. 07. Stockstadter Wald, Tümpel bei der Gersprenz 17. 4. 03. Kahl.
- O. pusillus** Steph.  
Im Main selten (Fr.).

## Limnebinae

### Limnebius Leach.

- L. truncatellus** Thnbg.  
In stehenden Gewässern nicht selten (Fr.). Sackenbach bei Lohr 10. 10. 22 (St.).
- L. papposus** Muls.  
Aschaffenburg (D. u. Fl.). Stockstadter Wald in Tümpeln 18. 4. 09, 9. 5. 25. Kahl 8. 7. 05. Leiderer See 12. 4. 07. Striet im Steinbach häufig 5. 11. 05.
- L. crinifer** Rey.  
Leiderer See. Kahl Moore 1 St. (t. Hubenthal).
- L. atomus** Duft. (= **picinus** auct.)  
Aschaffenburg (Oe. u. D.).

**L. aluta Bedel.**

Angeblich von D. hier gefunden.

## Spercheidae

### Spercheus Kug.

**S. emarginatus Schall.**

In den Tümpeln unterhalb von Kleinostheim von Oe. nachgewiesen.

## Hydrophilidae

### Helophorinae

#### Helophorus F.

**H. aquaticus L.**

Am Fasanersee 3. 1894, 4. 1894 (Fr.). An das elektr. Licht im Zimmer anfliegend  
4. 9. 46. Sumpfwiese bei Damm in einem Tümpel 4. 1894 (Fr.). Sodener Wald.  
Sendelbach bei Lohr 7. 3. 22 (St.).

**H. nubilus F.**

Aschaffenburg (Oe.). Mainufer 5. 06. Sandgrube bei Mainaschaff 6. 10. 25.

**H. guttulus Motsch. (s. brevialpis Bed.)**

Schönbuschsee. Stockstadter Wald. Kahl Moore.

**H. nanus Strm.**

Höchst a. M. (Sattler). Hanau 1901 zahlreich. Belege im Museum Erfurt (t. Hubenthal).

**H. flavipes F. (= viridicollis Steph.)**

Stockstadter Wald im Tümpel eines Erlengrundes 18. 4. 09. Aschaffenburg (D.).  
Kahl Moore.

**H. villosus Duft.**

Höchst a. M. (B.).

**H. granularis L.**

In Tümpeln der Sumpfwiesen bei Damm in Menge 4. 1894 (Fr.). Leiderer See  
12. 4. 07. In der Gersprenz bei Stockstadt 7. 7. 05. Schönbuschsee 13. 10. 04. Kahl  
Moore.

**H. griseus Hbst.**

In Tümpeln der Sumpfwiesen bei Damm in Menge 4. 1894 (Fr.).

**H. pumilio Er.**

Höchst a. M. (Hepp) 1900, Hanau (Wiltschek) (t. Hubenthal).

**H. croaticus Kuw.**

Höchst a. M. 2 St. (Sattler) 1904 u. Bücking 1931.

**H. strigifrons Thms.**

Hanau 1 St. (M.). 1900. Im Museum Erfurt (t. Hubenthal). Südlichster Fund  
in Deutschland dieser nordeuropäischen Art (Horion.).

**H. fallax Kuw.**

Kahl Moore (Bücking). Hanau (Bücking). Beleg im Museum Mainz.

## Hydrochinae

### Hydrochus Leach.

**H. elongatus Schall.**

Aschaffenburg (Oe.). Sendelbach bei Lohr 7. 3. 22 (St.). Leiderer See 12. 4. 07, 5. 07. Gruben bei der Station Kleinostheim 12. 5. 25. Schönbuschsee 26. 6. 04. Kahl Moore.

**H. carinatus Germ.**

Leiderer See 12. 4. 07. Gruben bei der Station Kleinostheim 7. 5. 35. Sendelbach bei Lohr im Schmiedsee 30. 11. 37 (St.). Kahl Moore.

**H. nitidicollis Muls.**

Bei Hanau 4. 9. 54 mehrfach (Dehnert) (v. Hoch).

**H. angustatus Germ.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Stockstadter Wald Tümpel in einem Erlengrund 18. 4. 09, 13. 9. 23. Sendelbach bei Lohr im Schmiedsee 10. 11. 37 (St.).

## Sphaeridiinae

### Coelostoma Brul.

**C. orbiculare F.**

Häufig in stehenden Gewässern. Schöllennüllersee 6. 1893 (Fr.). Kahl Moore 16. 4. 22. Stockstadter Wald 15. 8. 25, 17. 9. 05.

### Sphaeridium F.

**S. bipustulatum F.**

Häufig in Mist.

**a. marginatum F.**

Gartenberg unter Moos bei Kaninchenlosung 1. 2. 25. Kahl 8. 9. 05.

**S. scarabaeoides L.**

In frischem Kuhdünger nicht häufig (Fr.).

### Cercyon Leach.

**C. ustulatus Preys.**

In einem Hausgarten 6. 1894 (Fr.). Graben am Ernstthof 7. 1894 (Fr.). Wiesen bei der Fischerhecke aus Moos gesiebt 4. 11. 42. Kahl Moore 26. 11. 24.

**C. haemorrhoidalis F.**

Häufig.

**C. melanocephalus L.**

Aschaffenburg (Oe.).

**C. bifenestratus Küst.**

Aschaffenburg 1907. Hanau 1911 (M.) (t. Hubenthal).

**C. terminatus Marsh.**

Von D. in Aschaffenburg nachgewiesen.

**C. pygmaeus Illig.**

Aschaffenburg (Oe.).

**C. unipunctatus L.**

Nicht selten. Stockstadter Wald 9. 5. 25. Im Fluge 8. 1894 (Fr.). Mainufer 30. 9. 23. Kahl 28. 11. 24.

**C. quisquilius L.**

Häufig in Mist.

**C. atricapillus Marsh. (= nigriceps Marsh.)**

Von Oe. und D. hier nachgewiesen. Selten nach Fr.

**C. granarius Er.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.).

**C. tristis Illig.**

Aschaffenburg (Oe.).

**C. convexiusculus Steph.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

**C. analis Payk.**

Aschaffenburg (Oe.). Nach Scr. besonders in Schlamm.

**Megasternum Muls.**

**M. boletophagum Marsh.**

Aschaffenburg (Oe.). Bischberg unter Stein 18. 4. 25. Kahl Moore 23. 11. 24.

**Cryptopleurum Muls.**

**C. minutum F.**

Gemein in trockenem Dünger (Fr.). Dornauer Graben unter Moos 7. 4. 40. Fasanerie in Pferdekot 8. 1893 (Fr.). Findberg unter Moos 30. 11. 40.

**Hydrobius Leach.**

**H. fuscipes L.**

Leiderer See 12. 4. 07. Stockstadter Wald in Tümpeln 18. 4. 05.

**Limnoxenus Mots.**

**L. niger Zschach.**

Aschaffenburg (Oe.) in stagnierenden Wässern.

**Anacaena Thoms.**

**A. globulus Payk.**

Leiderer See 12. 4. 07. Lohr Seegraben 15. 5. 45 (St.). Heigenbrücken (Fr.).

**A. limbata F.**

Leiderer See 12. 4. 07. Fasanerie 4. 1895 (Fr.). Schönbusch 5. 1895 (Fr.). Sendelbach bei Lohr im Schmiedsee 7. 3. 22, 20. 5. 43, 24. 6. 45 (St.).

**Laccobius Er.**

**L. minutus L.**

In stagnierenden Gewässern an Pflanzenwurzeln. Schmerlenbacher Wald 5. 1891. Lettlöcher 6. 1893 (Fr.). Hanau 15. 7. 06 (H.).

**L. striatulus F.**

Leiderer See 12. 4. 07 Kahl.

**L. bipunctatus F. (= alutaceus Thoms.)**

Kahl Moore. Sendelbach Schmiedsee 4. 10. 45 (St.).

**L. gracilis Motsch.**

Bei Hanau 4. 10. 54 (Dehnert) (v. Hoch).

**Helochares Muls.**

**H. lividus Forst. (= griseus F.)**

Leiderer See 12. 4. 07. Kahl Langer See 19. 4. 25. Dammer Sumpfwiesen 5. 1894 (Fr.). Früher am Ufer des Fasanerisees an Wasserpflanzen.

**Enochrus Zaitz. (= Philhydrus Sol.)**

**E. melanocephalus Ol. (= bicolor Payk.)**

Kahl Moore 20. 11. 24. Bei Seligenstadt in großer Menge (Scr.).

**E. ochropterus Marsh. (= frontalis Er.)**

Leiderer See häufig 12. 4. 07.

**E. quadripunctatus Hbst.**

Gruben bei Station Kleinostheim 29. 9. 36. Moore bei Kahl 26. 11. 24.

**E. testaceus F.**

Sodental 5. 1891 (Fr.).

**E. affinis Thnbg. (= minutus F.)**

Leiderer See 12. 4. 07. Kahl Langer See 19. 4. 25.

**E. coarctatus Gredler.**

Leiderer See 12. 4. 07. Kahl Langer See 19. 4. 25.

**Cymbiodyta Bed.**

**C. marginella F.**

Leiderer See 12. 4. 07. Gruben bei Station Kleinostheim 12. 5. 25.

**Chaetarthria Steph.**

**C. seminulum Hbst.**

Im Moos sumpfiger Wiesen nicht selten. Kahl Moore 16. 4. 22. Wiesen bei der Fischerhecke 7. 10. 42.

**Hydrophilus Leach.**

**H. caraboides Er.**

Häufig in stehenden Gewässern.

**Hydrous Leach.**

**H. piceus L.**

Leiderer See in Anzahl 21. 5. 07. Lehmgruben bei Station Kleinostheim 24. 4. 28. Kahl Moore 19. 9. 26.

**H. aterrimus Eschscholtz.**

Leiderer See mehrfach 21. 5. 07. Fasanerie am runden Tümpel in vielen Exemplaren mit *H. piceus* L. 1878 (Fr.).

## Berosus Leach.

### **B. signaticollis Charp.**

Stockstadter Wald in Tümpeln 18. 4. 09. Aschaffenburg in stehenden Wässern nicht selten (Oe.).

### **B. luridus L.**

Sendelbach bei Lohr 7. 3. 22 (St.). Tümpel hinter der Bahn 4. 1894 (Fr.). Leiderer See 12. 4. 07, 5. 07. Kahl Moore. Stockstadter Wald in Tümpeln 18. 4. 09.

# Staphilinoidea

## Silphidae

### Necrophorus F.

#### **N. germanicus L.**

v. H. schreibt: „Die Art kommt nach Scr. nicht selten in Pferdemist vor, wo sie den großen Kotkäfern, bes. Geotrupes nachgeht. Wirft man einen solchen Kothaufen auseinander und findet man frisch zerfressene Stücke von Geotrupes, so kann man sicher sein, daß N. germanicus L in der Nähe ist.“ (Fr.). Lohr Schindanger 23. 4. 07 (St.). Bei Großostheim 29. 5. 35 (J. S.). Schmerlenbacher Wald 6. 1894 (Fr.). Hanau am Mainufer einmal in großer Anzahl im Juni von H. gefunden. Bischberg an toter Maus 1. 9. 46 (Elbert). Am Fußweg nach Glattbach 20. 9. 42 (J. S.).

#### **N. humator F.**

Fasanerie einmal in Menge an Aas 1875 (Fr.). Laufacher Wald an einem toten Dachs 6. 1895 (Fr.). Schönbusch an Vogelaas 11. 8. 24, 6. 10. 04, 10. 10. 27. Bischberg an Hundeaas 18. 5. 47 (Elbert). An toter Maus 1. 9. 46 (Elbert).

#### **N. sepultor Charp.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt selten (Scr.). Hanau (H.) und Holtz 1921.

#### **N. investigator Zett.**

Laufacher Wald an Aas 6. 1895 (Fr.). Großostheimer Wald mehrfach von Schw. gefunden. Bei der Schöllmühle an Vogelaas 11. 8. 24.

#### **N. interruptus Steph.**

An Haus angefliegen 11. 5. 47. Fasanerie in Mehrzahl an toten Vögeln 6. 1894 (Fr.). Stockstadter Wald 6. 1895 (Fr.). Schönbusch an einer Bienenwabe mit abgestorbenen Drohnenlarven 2. 7. 46 (Noll). Lohr 5. 6. 26 (St.).

#### **N. vespiloides Hbst.**

Nicht selten an Aas und faulen Schwämmen. Schönbusch 5. 1895 (Fr.). Stockstadter Wald in den Fanggräben häufig. 5. 1895 (Fr.). Hain i. Sp. Pollaschgrund 29. 5. 32. Schönbusch an Bienenwaben mit abgestorbenen Drohnenlarven 2. 7. 46 (Noll). An Aas 4. 10. 04. Großkrotzenburger Moore 24. 8. 26. Godelsberg an Schwämmen 10. 08.

#### **N. vespillo L.**

Sehr häufig an Aas jeder Art. Mainufer an faulen Fischen 2. 4. 11, 11. 4. 23.



**N. vestigator Herschel.**

Stockstadter Wald 21. 5. 04, 6. 1895 (Fr.). Laufach 6. 95 (Fr.). Hanau bei der Pulverfabrik 1921 selten (Holtz.).

**Necrodes Leach.**

**N. litoralis L.**

Schönbusch an Hundeaas 18. 5. 47 (Elbert). Schmerlenbacher Wald unter morscher Eichenrinde 11. 5. 49 (J. S.). Schweinheimer Wald an stark verwestem Fuchs 6. 1895 (Fr.).

**Thanatophilus Sam.**

**T. rugosus L.**

Schönbuschallee an totem Raben in Menge 3. 1894 (Fr.). Karlstadt Landwehren 17. 3. 29. Schönbusch an fauler Bienenwabe mit abgestorbenen Drohnenlarven 2. 7. 46 (Noll). Lohr 31. 5. 22 (St.).

**T. dispar Hbst.**

Stockstadter Wald 5. 4. 26. Findberg 13. 4. 52 (J. S.). Kalmut 14. 6. 25. Schönbusch an fauler Bienenwabe mit abgestorbenen Drohnenlarven 2. 7. 46 (Noll).

**T. sinuatus F.**

Karlstadt 19. 3. 20. Mainufer Mörsweise 1. und 13. 5. 05, 6. 05. Schönbusch an fauler Bienenwabe mit abgestorbenen Drohnenlarven 2. 7. 46 (Noll).

**Oecoptoma Sam.**

**O. thoracicum L.**

Häufig an Aas jeder Art. Schönbusch an Vogelaas 5. 1895 (Fr.). Fasanerie an Eichensaft abends 21.30 Uhr 4. 6. 25.

**Blitophaga Reitter.**

**B. opaca L.**

Nicht selten. Sodener Wald 6. 1. 26. Sandgrube bei Mainaschaff 12. 2. 30, 5. 8. 27. Kleinwallstadt 19. 3. 26. Stockstadter Wald 8. 4. 25, 7. 11. 29. Dornauer Graben 16. 9. 38. Mäusberg 6. 10. 29.

**B. undata Müll.**

Aschaffenburg nicht häufig (Oe.). Bei Breunsberg 26. 2. 28. Stockstadter Wald 31. 5. 04. Büchelberg 9. 6. 40. An Getreide 26. 6. 49 1 St. (Wolfram).

**Xylodrepa Thoms.**

**X. quadripunctata Schreber.**

Auf Gebüsch nicht selten. Striet in Menge auf jungen Eichen 4. 1882 (Fr.). Schönbusch und Fasanerie 5. 1895 (Fr.). Mäusberg 14. 4. 52.

**Silpha L.**

**S. carinata Illig.**

Sehr selten im Kahlgrund (Oe.). Nach Scr. im Odenwald.

**S. obscura L.**

Sodener Wald 10. 1. 26. Krainberg 28. 2. 26. Aschaffenburg 6. 1894 (Fr.). Bei Retzbach 22. 9. 35.

**S. tristis Illig. (= granulata Thbg.)**

Aschaffenburg (Oe. und D.). Bei Lohr im Partensteiner Grund 14. 5. 06 (St.).

## **Ablattaria Rtrr.**

### **A. laevigata F.**

Selten. Kahltal 20. 4. 26 (J. S.). Stockstadter Wald 6. 1882 (Fr.). Einzeln bei Seligenstadt (Scr.). Roßtalsberg bei Karlstadt 27. 4. 24 (St.). Würzburg 1 St. 1941 (Hüther).

## **Phosphuga Leach.**

### **P. atrata L.**

Sehr häufig.

## **Agyrtes Fröl.**

### **A. castaneus Fab.**

Im Schmerlenbacher Wald bereits von Oe. angegeben. Aschaffenburg zahlreich schwärmend am Bahnhof 19. 4. 1889 (S.). Im Frühjahr 1904 in Anzahl auf der Mainbrücke schwärmend (S.). Im Spessart nördlich Sailauf an verpilztem Buchenstrunk 19. 4. 50 (J. S.).

### **A. bicolor Lap.**

An faulenden Vegetabilien. Büchelberg 1. 08 (Wagner). Fasanerie an einem mit Pilzen bedeckten Brett 2. 12. 11 (J. S.).

## **Catopinae**

### **Ptomophagus Illig.**

#### **P. variicornis Rosh.**

In den Mainhecken 6. 06.

#### **P. subvillosus Goeze.**

Karlstadt 17. 3. 29 (t. Sokolowski). Bei Obernau 22. 3. 05 (t. Sokol.).

#### **P. v. sericatus Chd.**

Aschaffenburg auf der Mainbrücke schwärmend 11. 4. 06 (t. Sokol.). Lohr Sandgrube 18. 10. 24 (St.).

#### **P. medius Rey.**

Obernau in hohlem Apfelbaum bei Ameisen 20. 3. 11 (t. Sokol.). Aschaffenburg in hohlem Apfelbaum 26. 4. 17 (t. Sokol.). Kalmut 19. 8. 26 (t. Sokol.). Kleinostheim aus hohlem Apfelbaum 12. 1912 (t. Sokol.).

### **Nemadus Thoms.**

#### **N. colonoides Kr.**

Schönbusch im Mulm einer hohlen Buche zahlreich 12. 09. Nach Fr. fand schon D. die Art in Aschaffenburg und Scr. bei Seligenstadt in einer Kolonie der *Formica fuliginosa*.

### **Nargus Thoms.**

#### **N. velox Spence.**

Aschaffenburg Mainhecken (Oe. und D.). Schönbusch am Seeufer Herbst 1904 (t. Sokol.).

#### **N. badius Strm.**

Angewiesen von Oe. in Aschaffenburg gefunden (Fr.).

#### **N. Wilkini Spence.**

Aschaffenburg (Oe.). Schönbusch Herbst 1904. Schmerlenbacher Wald (t. Sokol.).

**N. brunneus Strm.**

Karlstadt Landwehren 6. 3. 27 (t. Sokol.). Mäusberg bei Wiesenfeld 7. 9. 35 (t. Sokol.).

**N. anisotomoides Spence.**

Schmerlenbacher Wald 30. 10. 04 (t. Sokol.). Sodener Wald (t. Sokol.).

**C h o l e v a Latr.**

**C. spadicea Strm.**

Seligenstadt (Scr.). Stockstadter Wald 20. 4. 04 (t. Sokol.).

**C. agilis Illig.**

Seligenstadt 1 St. (Scr.). Schmerlenbacher Wald (t. Sokol.). Mainufer 2. 1. 26 (t. Sokol.).

**C. oblonga Latr.**

Aschaffenburg im Wachenbachtal 30. 3. 07, 17. 10. 26 (t. Sokol.). Sandgrube bei Sulzbach a. M. 27. 10. 28 (t. Sokol.).

**C. cisteloides Fröl.**

Aschaffenburg beim Städt. Wasserwerk 5. 07. (t. Sokol.). Mainhecken. Schönbusch 23. 5. 30. Mainbrücke 23. 5. 07. Kleinostheim 14. 5. 31 (alle von Sokol. geprüft.). Fasanerie 7. 1889 (Fr.).

**C. bicolor Jeanni.**

Mainaschaff am Calvarienberg 5. 6. 26 (t. Sokol.).

**C. glauca Britten.**

Aschaffenburg 21. 6. 12 (t. Sokol.).

**C. angustata F.**

Aschaffenburg, schwärmend 23. 5. 07 (t. Sokol.). Mainufer 15. 5. 07 (t. Sokol.).

**C. Fagniezi Jeann.**

Mainflingen 1. 11. 28 (t. Sokol.).

**C. Jeanneli Britten.**

Stockstadter Wald 20. 3. 27 (t. Sokol.).

**S c i o d r e p o i d e s Hatch.**

**S. Watsonni Spence.**

Aschaffenburg Mainhecken 14. 3. 26. Lößwände hinter Damm 15. 4. 28. Kleinostheim 5. 37. Karlstadt am Steig 25. 4. 26. Schönbusch 4. 10. 07.

**S. fumatus Spence.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

**C a t o p s Payk.**

**C. grandicollis Er.**

Aschaffenburg und Seligenstadt (Scr.). Schönbusch an Vogelaas 4. 10. 04 (t. Sokol.).

**C. Kirbyi Spence.**

Aschaffenburg (Fr.). Seligenstadt (Scr.). Schönbusch an Vogelaas 4. 10. 04 (t. Sokol.).

- C. tristis Panz.**  
Aschaffenburg (Oe.). Fasanerie an Vogelaas 29. 3. 07. Schönbusch an Vogelaas 4. 10. 04 (t. Sokol.).
- C. chrysoloides Panz.**  
Stockstadter Wald 30. 1. 27. Karlstadt Landwehre 17. 3. 29. Schönbusch 4. 10. 04. Lößwände hinter Damm 11. 10. 24.
- C. neglectus Kr.**  
Schönbusch an Vogelaas 25. 3. 26, 4. 10. 04 (t. Sokol.). Dammer Wiesen 5. und 6. 1894 (Fr.).
- C. morio F.**  
Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Stockstadter Wald 1. 1. 27, 29. 11. 31, 4. 12. 27. Mainufer 8. 4. 09. Striet 24. 7. 27. Lindig 28. 8. 29, 26. 4. 29 (t. Sokol.).
- C. nigrita Er.**  
Fischerhecken 5. 1894 (Fr.). Aschaffenburg 29. 11. 07 (t. Sokol.).
- C. Dorni Rttr.**  
Aschaffenburg Mainhecken 25. 9. 35 (t. Sokol.). Heigenbrücken 15. 9. 31 (t. Sokol.).
- C. Westi Krog.**  
Bei Sodental 30. 3. 07 (t. Sokol.). Stockstadter Wald 10. 4. 27 (t. Sokol.). Schönbusch 6. 7. 31 (t. Sokol.). Großkrotzenburger Moore 16. 11. 26 (t. Sokol.).
- C. fuscus Panz.**  
Fasanerie an Boletus 6. 1894 (Fr.).
- C. fuliginosus Er.**  
Krainberg 14. 10. 34 (t. Sokol.).
- C. nigricans Spence.**  
Stockstadter Wald 13. 2. 26. Schmerlenbacher Wald an Vogelaas 20. 2. 05. Sodener Wald 20. 5. 27. Lößwände hinter Damm 1. 5. 36. Gartenberg 25. 10. 24. Striet 20. 10. 34 (t. Sokol.).

## Coloninae

### Colon Hbst.

- C. latum Kr.**  
Aschaffenburg (Oe.).
- C. angulare Er.**  
Aschaffenburg (Oe.).
- C. dentipes Sahlbg.**  
Angeblich von Oe. unter schwarzen Ameisen in der Fasanerie gefunden (Fr.).
- C. Zebei Kr.**  
Bei Seligenstadt (Scr.).
- C. brunneum Latr.**  
Aschaffenburg (Oe.). Glattbacher Wald 3. 6. 04.
- C. appendiculatum Sahlbg.**  
Aschaffenburg (Fl.). Seligenstadt (Scr.).

**C. secripes Sahlbg.**

Aschaffenburg, Seligenstadt (Scr.).

**C. viennense Hbst.**

Stockstadter Wald 20. 6. 04. Schmerlenbacher Wald (Oe.).

## Liodidae

### Triarthron Schmidt.

**T. Maerkeli Schmidt.**

Aschaffenburg 1 St. (D.).

### Hydnobius Schmidt.

**((H. punctatus Strm.))**

Bei Frankfurt a. M. festgestellt, dürfte auch in unserem Gebiet zu finden sein.)

### Liodes Latr.

**L. cinnamomeus Panz.**

Bei Lichtenau i. Sp. gestreift 1 St. 9. 1890 (S.), (t. Flach.). Aschaffenburg (Fl.).

**L. flavescens Schm.**

Aschaffenburg (Oe.). Bei Seligenstadt einzeln (Scr.).

**L. calcarata Er.**

Die häufigste Art der Gattung. Mörsweise am Mainufer 7. 5. 05. Bei Glattbach 3. 6. 04.

**L. dubia Kugl.**

Aschaffenburg (S.). Dammer Sumpfwiesen 5. und 7. 1894 (Fr.). Schmerlenbacher Wald 6. 1894 (Fr.). Miltenberg 6. 1894 (Fr.).

**L. obesa Schm.**

Aschaffenburg (D. N.). Selten.

**L. ovalis Schm.**

Aschaffenburg (D. und Scr.). Seligenstadt (Scr.).

**L. badia Strm.**

Aschaffenburg (Fl.).

Außer den Obigen sind in der Fauna „Die Käfer von Nassau und Frankfurt zusammengestellt von Lucas v. Heyden“ noch 11 Liodes-Arten angegeben, von denen die eine oder andere auch in unserem Gebiet vorkommen dürfte.

### Cyrtusa Er.

**C. subtestacea Gyll.**

Aschaffenburg (D. N.).

**C. pauxilla Schm.**

Aschaffenburg sehr selten (Oe. und D. N.).

**C. minuta Ahr.**

Aschaffenburg selten (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

## Colenis Er.

### C. immunda Strm.

Aschaffenburg nicht selten (Oe.).

## Anisotoma Panz.

### A. humeralis F.

Fasanerie 28. 4. 52. Mainhecken. Weiler i. Sp. 6. 6. 26. Geierkopf i. Sp. 21. 5. 25. Gailbachtal an verpilztem Eichenstrunk 26. 7. 25.

#### a. globosa Payk.

Fasanerie gestreift bei Eichenstöcken 7. 5. 52 (J. S.).

### A. axillaris Gyll.

Aschaffenburg (Fl.). Stockstadter Wald 31. 5. 04. Gailbachtal an verpilztem Eichenstrunk 26. 7. 25. Godelsberg an Schwämmen 19. 10. 06.

### A. castanea Hbst.

Striet 8. 3. 08, 30. 8. 20.

### A. glabra Kugl.

Hain i. Sp. unter Buchenstrunkrinde 29. 6. 23, 16. 7. 22, 3. 8. 24. Ernsttal i. O. unter morscher Eichenrinde 15. 7. 05. Heigenbrücken unter Eichenstrunkrinde 3. 8. 05.

### A. orbicularis Hbst.

Fasanerie in naßfaulen mit Polyporus bewachsenen Baumstrünken zahlreich 6. 1894 (Fr.). Schönbusch unter morschem Eichenast 20. 5. 22, 4. 7. 27. Dornauer Graben 20. 6. 37.

## Amphicyllis Er.

### A. globus F.

Aschaffenburg (Oe.). Hanau (H.).

#### a. ferrugineus Strm.

Karlstadt 9. 3. 30. Urspringen 20. 5. 29. Fasanerie 6. 1876 (Fr.).

### A. globiformis Sahlbg.

Aschaffenburg (Fl., D. N. und S.).

## Agathidium Panz.

### A. nigripenne Kug.

Aschaffenburg (Fr.). Stockstadter Wald an verpilzter Kiefernrinde 3. 4. 11.

### A. atrum Payk.

Karlstadt auf dem Haag 9. 3. 30. Sodener Wald 30. 3. 07. Striet unter Laub 8. 4. 1889. Schönbusch an verpilzten Eichenästen 20. 5. 22. Godelsberg an Agaricus 10. 1894 (Fr.). Seligenstadt (Scr.).

### A. seminulum L.

Aschaffenburg (D. N.). Seligenstadt (Scr.). Gailbachtal 4. 05.

### A. laevigatum Er.

Obernauer Wald 8. 1895 (Fr.). Schmerlenbacher Wald 24. 6. 04. Stockstadter Wald 8. 11. 25.

**A. badium Er.**

Aschaffenburg selten (Oe.). Seligenstadt einzeln (Scr.). Steinbachtal unter Laub  
22. 7. 04.

**A. marginatum Strm.**

Aschaffenburg (Oe. und D. N.).

**A. varians Beck.**

Aschaffenburg Mainhecken 5. 06.

**A. rotundatum Gyll.**

Aschaffenburg (Fl.).

**A. nigrinum Strm.**

Bei Seligenstadt (Scr.).

## Clambidae

### *Calyptomerus* Redt.

**C. dubrus Marsh.**

Bei Schaafheim unter verpilzten Zweigen (H.).

### *Clambus* Fisch.

((**C. minutus Strm.**))

Bei Frankfurt a. M. festgestellt, dürfte auch in unserem Gebiet zu finden sein.)

**C. armadillo Deg.**

Aschaffenburg (Oe., Fl., Fr. und S.).

**C. pubescens Redt.**

Aschaffenburg sehr selten (Oe.). Im Maingenist manchmal häufig mit dem  
Vorigen (Fr.).

## Scydmaenidae

### *Euthia* Steph.

**E. scydmaenoides Steph.**

Aschaffenburg je einmal hier gefunden (Oe. und Fl.).

### *Cephennium* Müll.

**C. thoracicum Müll.**

Nicht selten. Gailbachtal 3.08. Stockstadter Wald 20. 4. 11. Schmerlenbacher Wald  
an bemoosten Buchenstrünken 19. 4. 05. Kahl Moore 4. 10. Striet im Steinbach-  
tal 5. 11. 05. Fasanerie (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

### *Neuraphes* Thoms.

**N. elongatulus Müll.**

Sodener Wald 20. 3. 07. Kahl Moore 5. 4. 12, 28. 11. 24. Godelsberg 4. 1895 (Fr.)  
(Fl.). Steinbachtal 5. 11. 05.

**N. rubicundus Schaum.**

Aschaffenburg sehr selten (Fl.).

**N. angulatus Müll.**

Schönbusch (Fl.). 12. 3. 25 (S.). Seligenstadt 1 St. (Scr.).

**N. praeteritus Rye.**

Aschaffenburg 1 St. 1879 (Fl.). Schmerlenbacher Wald an bemoosten Erlenstrüngen 17. 4. 05.

**N. Sparshalli Denny.**

Striet selten (Fl.).

**Stenichnus Thoms.**

**S. Godarti Latr.**

Aschaffenburg (Oe.). Hanau Bulau (H.).

**S. scutellaris Müll.**

Nicht selten. Schönbusch 12. 3. 24. Schmerlenbacher Wald 21. 4. 29. Godelsberg 6. 5. 05. Findberg unter Stein 9. 1893 (Fr.). Kahl Moore 9. 10. 05, 26. 11. 24. Gailbachtal 8. 12. 04.

**S. pusillus Müll.**

Aschaffenburg im ersten Frühjahr unter Steinen (D. N. u. Fl.).

**S. collaris Müll.**

Aschaffenburg (Oe.). Schönbusch 12. 3. 24. Glattbacher Wald 24. 3. 05. Mainhecken 3. 10. Kahl Moore 7. 2. 26, 5. 4. 12, 26. 9. 24. Stockstadter Wald 3. 5. 04.

**S. bicolor Denny (= exilis Er.)**

Aschaffenburg (Oe.).

**Euconnus Thoms.**

**E. claviger Müll.**

Aschaffenburg selten (Oe. 1853). Wenighösbach in hohlem Baum 12. 12.

**E. Maeklini Mannh.**

Aschaffenburg (Oe. u. Fl.). Bei Formica rufa (Fr.). Seligenstadt (Scr.).

**E. denticornis Müll.**

Hain i. Sp. 14. 4. 22. Godelsberg 6. 5. 05. Mainhecken. Seligenstadt unter Moos von Erlen 25. 10. 23. Kahl Moore 26. 11. 24.

**E. Wetterhali Gyll.**

Aschaffenburg Godelsberg unter Laub 4. 1894 (Fr.). Seligenstadt (Scr.). Stockstadter Wald 22. 4. 11. Kahl Moore 14. 4. 11, 22. 11. 24.

**E. rutilipennis Müll.**

Aschaffenburg (Fl.).

**E. hirticollis Illig.**

Nicht selten. Kahl 5. 4. 12. Mörsweise am Main 7. 5. 05. Mainhecken 11. 9. 05.

**E. fimetarius Chaud.**

Aschaffenburg (S.). Kahl Moorwiesen 28. 11. 24.

**E. pubicollis Müll.**

Häufig. Mainhecken 3. 10. Stockstadter Wald 22. 4. 11. Gailbachtal 5. 11. 05. Kahl Moore 13. u. 23. 11. 24.



## **Microscydmus Croiss.**

### **M. nanus Schaum.**

Steinbachtal im Striet unter Eichenrinde 11. 3. 16.

## **Scydmaenus Latr.**

### **S. rufus Müll.**

Aschaffenburg (Oe.). Unter Baumrinde bei Ameisen (Fr.).

### **S. Hellwigi Hbst.**

Aschaffenburg (Oe.). Nach v. Heyden in hohlen Bäumen bei *Lasius brunneus*.

### **S. tarsatus Müll. et Kze.**

Nach Fr. von Fl. häufig in Kehrlicht gefunden. Aschaffenburg Mainhecken 28. 10. 04. Bei Glattbach 11. 10. 05.

## **Orthoperidae**

### **Sacium Lec.**

### **S. pusillum Gyll.**

Aschaffenburg (Oe.), in trockenen Schwämmen (Fr.).

### **Arthrolips Woll.**

### **A. obscurus Sahlbg.**

Aschaffenburg (Oe.).

### **Sericoderus Steph.**

### **S. lateralis Gyll.**

Unter faulem Laub (Fl.). Stockstadt a. M. Sumpfwiesen an der Gersprenz 19. 9. 05

### **Corylophus Steph.**

### **C. cassidoides Marsh.**

Striet 5. 11. 05. Kahl Moore 1. 11. 05. An trockenen Schwämmen (Fr.).

### **Orthoperus Steph.**

### **O. brunnipes Gyll.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Godelsberg 6. 5. 05.

### **O. atomus Gyll. (= corticalis Redt.)**

Seligenstadt (Scr.).

### **O. atomarius Heer.**

Seligenstadt an alten Fässern in Kellern (Scr.).

## **Sphaeriidae**

### **Sphaerius Waltl.**

### **S. acaroides Waltl.**

Schönbusch am Rand eines moorigen Wiesengrabens (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

# Ptiliidae

## Ptenidium Er.

**P. Gressneri Er.**

Aschaffenburg (Fl.). Gailbachtal 10. 4. 05.

**P. laevigatum Er.**

Aschaffenburg unter Formica fuliginosa (D.).

**P. fuscicorne Er.**

Gailbachtal 10. 4. 05.

**P. myrmecophilum Motsch.**

Seligenstadt in Kolonien von Formica fuliginosa (Scr.).

**P. nitidum Heer.**

Aschaffenburg (Fl.). Godelsberg 6. 5. 05. Mainhecken 10. 04.

## Millidium Mots.

**M. minutissimum Ljungh.**

Aschaffenburg (Fl.). Würzburg (Fl.).

## Ptilium Er.

**P. caesum Er.**

Würzburg 1 St. (Fl.).

**P. exaratum Allib.**

Aschaffenburg (Oe.). An feuchten Stellen (Fr.).

**P. myrmecophilum Allib.**

Seligenstadt (Scr.).

## Oligella Mots.

**O. foveolata Allib.**

Würzburg (Fl.).

## Ptiliolum Flach.

**P. Kunzei Heer.**

Stockstadter Wald unter Laub 7. 04. Gailbachtal.

**P. Spencei Allib.**

Seligenstadt (Scr.).

## Nephanes Thoms.

**N. Titon Newm.**

Aschaffenburg (Fl.).

## Ptinella Motsch.

**P. limbata Heer (= testacea Heer)**

Seligenstadt unter fauler Kiefernrinde (Fr.).

**P. tenella Er.**

Schmerlenbacher Wald aus altem Eichenstrunk 23. 1. 07. Aschaffenburg unter Rinde (D. N.).

## **P t e r y x Matth.**

### **P. suturalis Heer.**

Aschaffenburg (Fr.). Seligenstadt (Scr.). Gailbachtal 4. 05. Steinbachtal 22. 7. 04.  
Bei Glattbach.

## **S m i c r u s Matth.**

### **S. filicornis Fairm.**

Aschaffenburg einzeln, aber in den letzten Jahren häufiger. Im Fluge, unter  
Kompost, auch auf Flugsand nach Fl. 1889. Mainufersand 1881 und Schöntal  
1886 (Fl.).

## **A c r o t r i c h i s Motsch. (= Trichopteryx Kirby.)**

### **A. grandicollis Marsh.**

Aschaffenburg nicht selten (Oe.). Glattbach 11. 10. 05. Schmerlenbacher Wald.  
Kahl.

### **A. Montandoni Allib.**

Schönbusch am See, am Fuß alter Weiden 2. 7. 04 (t. Fl.).

### **A. thoracica Waltl.**

Aschaffenburg selten (Oe.). Seligenstadt einzeln (Scr.).

### **A. atomaria Deg.**

Häufig unter faulenden Pflanzen (Fr.). Aschaffenburg. Lindigwiesen 12. 7. 04.

### **A. intermedia Gillm.**

Aschaffenburg (S.).

### **A. fascicularis Hbst.**

Aschaffenburg bei *Formica fuliginosa* (Oe.).

### **A. brevipennis Er.**

Aschaffenburg (Oe. u. S.). Seligenstadt (Scr.).

### **A. sericans Heer.**

Aschaffenburg (Oe. u. S.). Seligenstadt (Scr.).

## **Scaphidiidae**

### **S c a p h i u m Kirby.**

#### **S. immaculatum Ol.**

Schmerlenbacher Wald an faulem *Boletus* 5. 1894 (Fr.), 18 St. mit vielen Larven.  
Von Oe. an Ziegenbart (*Sparassis crispa*) gefunden. Scr. fand ihn besonders in  
alten schimmeligen Mauselöchern (Fr.). Striet unter Graswurzeln in einem Bir-  
kenbestand. Hausen bei Lohr 6. 26 (St.). Auf dem Beilstein unter Stein 25. 10. 47  
(St.). Auf dem Kalbenstein bei Gambach a. M. 27. 7. 46 (J. S.). Sandgrube bei  
Mainaschaff 23. 8. 31. Auf dem Kalmut bei Homburg a. M. 11. 10. 31 (S.).

### **S c a p h i d i u m Ol.**

#### **S. quadrimaculatum Ol.**

Nicht selten an Pilzen.

## **Scaphosoma Leach.**

### **S. agaricinum L.**

Häufig an Schwämmen und verpilztem Holz.

### **S. assimile Er.**

Aschaffenburg (Fl.). Seligenstadt im Anspülicht des Mains. (Scr.).

### **(S. boleti Panz.)**

Bei Frankfurt a. M. gefunden, dürfte auch in unserem Gebiet zu finden sein.

# **Staphilinidae**

## **Oxytelinae**

### **Siagonum Kirby.**

#### **S. quadricorne Kirby.**

Neuendorf a. M. auf der linken Mainseite im Mühltal 1 St. aus einem Reisigbündel geklopft 13. 11. 32 (J. S.).

### **Thoracophorus Motsch.**

#### **T. corticinus Motsch.**

Aschaffenburg. Von Fl. in faulem Holz eine Pappel bei *Lasius brunneus* in großer Anzahl gefunden. 3. 1875, 1878. Bisher einziger Fund in Westdeutschland nach Horion.

### **Micropeplus Latr.**

#### **M. porcatus Payk.**

Gersprenzwiesen bei Stockstadt a. M. 18. 4. 24. Wiesen hinter Damm 5. u. 6. 1894 (Fr.). 15. 5. 24 (S.). Striet 29. 9. 25.

### **Phloeocharis Mannh.**

#### **P. subtilissima Mannh.**

Häufig unter morscher Baumrinde.

### **Phloeobium Boisd.**

#### **P. clypeatum Müll.**

Aschaffenburg (Oe.). Schmerlenbacher Wald (Fl.). Steinbachtal 1. 3. 27. Karlstadt 25. 4. 26. Mäusberg bei Wiesenfeld 28. 8. 20, 27. 9. 35. Gersprenzwiesen bei Stockstadt a. M. 17. 9. 05. Mainufer unter Platanenrinde 10. 11. 25.

### **Megarthus Steph.**

#### **M. depressus Payk.**

Aschaffenburg unter Rinde (Oe.). Babenhausen (Scr.).

#### **M. sinuaticollis Lac.**

Aschaffenburg in Mist (Scr.). Fasanerie 13. 2. 08.

#### **M. denticollis Beck.**

Aschaffenburg (D. N.). Fasanerie aus verschimmelten Reisigwellen 13. 2. 08. Glattbach 29. 11. 07. Hain i. Sp. an schimmeligem Holz 3. 6. 23.

**M. hemipterus Illig.**

Aschaffenburg sehr selten an faulen Pilzen (Oe.).

**Proteinus Latr.**

**P. ovalis Steph.**

Lößhänge hinter Damm 11. 10. 24. Seligenstadt an Schwämmen 28. 10. 23.

**P. brachypterus F.**

Häufig auf Blüten, Pilzen und Aas (Fr.). Fasanerie an Agaricus 11. 1894 (Fr.).  
Striet 21. 5. 35.

**P. macropterus Gyll.**

Aschaffenburg (D. N.). Rückersbacher Schlucht 22. 2. 25. Kahl Moore 23. 10. 04,  
28. 11. 24.

**P. atomarius Er.**

Aschaffenburg (D. N.).

**Anthobium Steph.**

**A. ophthalmicum Payk.**

Aschaffenburg (D.). Kahl Moore 17. 8. 25.

**A. rectangulum Fauv.**

Steinbachtal 19. 6. 09.

**A. sorbi Gyll.**

Häufig auf Blüten (Fr.). Steinbachtal auf blühenden Kirschen 25. 5. 24. Schmer-  
lenbacher Wald 5. 1894 (Fr.).

**A. torquatum Marsh.**

Aschaffenburg (S.).

**A. limbatum Er.**

Aschaffenburg (Scr.). Schmerlenbacher Wald auf blühenden Weiden 21. 4. 12,  
3. 5. 04. Striet auf blühenden Kirschen 15. 4. 24. Hain i. Sp. auf blühenden Wicken  
11. 5. 24.

**A. signatum Märk.**

Aschaffenburg 5. 1894 (Fr.). Schmerlenbacher Wald auf Kirschblüten 21. 4. 12.

**A. abdominale Grav.**

Häufig auf blühenden Weiden, Schlehen und Kirschen.

**A. minutum F.**

Nach Fr. besonders auf Ranunculus-Arten. Am Guten Mann 4. 1894 (Fr.). Dam-  
mer Sumpfwiesen 5. 1894 (Fr.). Striet auf Erlen.

**A. atrum Heer.**

Wiesen hinter Damm auf *Caltha palustris* 23. 5. 09.

**A. florale Panz.**

Aschaffenburg (D. N.). Kahl a. M. (S.).

**Acrolocha Thoms.**

**A. striata Grav.**

Aschaffenburg, Feldweg nach Glattbach an gefrorenem Menschenkot häufig 22.  
u. 29. 11. 07. In hohlem Baum 12. 12. Erbig 10. 11. 26.

**A. amabilis Heer.**

Glattbacher Wald 3. 11. 07.

**Phyllocrepa Thoms.**

**P. melanocephala F.**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.). Aschaffenburg in hohlem Apfelbaum 27. 2. 36. Gailbachtal 10. 4. 05. Kahl Moore 5. 4. 12. Striet in hohler Buche 12. 10. 1

**P. salicis Gyll.**

Aschaffenburg (D.). Schönbusch an Blüten von *Prunus padus* 4. 1894 (Fr.). Striet in hohler Buche 2. 11. Kl. Exerzierplatz 8. 07.

**P. floralis Payk.**

Häufig auf blühenden Weiden, Kirschen etc.

**P. (Dropephylla Rey.) ioptera Steph.**

Aschaffenburg (Oe.). Unter Kastanienrinde 23. 10. 07. Schönbusch. Sodener Wald. Fasanerie unter Moos am Fuß alter Eichen 8. 12. 23.

**P. (Hapalaraea Thoms.) pygmaea Gyll.**

Aschaffenburg, Kl. Exerzierplatz 8. 07. Seligenstadt in Baumschwämmen (Scr.).

**Omalium Grav.**

**O. rivulare Payk.**

Häufig an faulen Vegetabilien, besonders Pilzen, auch an Aas. Fasanerie an Eichensaft 15. 6. 39, 24. 5. 39.

**O. septentrionis Thoms.**

Aschaffenburg 1 St. (coll. Schwarzer).

**O. oxyacanthae Grav.**

Seligenstadt (Scr.).

**O. caesum Zett.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Häufig an faulen Vegetabilien. In hohlem Apfelbaum 2. 20.

**O. excavatum Steph.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Seligenstadt (Scr.).

**Phloeonomus Heer.**

**P. (Phloeostiba Thoms.) planus Payk.**

Aschaffenburg (Oe.). Schmerlenbacher Wald 10. 4. 05, 3. 5. 08. Schönbusch an alten Weiden 2. 7. 04.

**P. lapponicus Zett.**

Seligenstadt (Scr.). Großostheimer Wald unter Kiefernrinde 3. 4. 21. Hain i. Sp. unter Eichenstrunkrinde. Heidberg bei Oberbessenbach unter Kiefernrinde 4. 10. 20. Am Engländer i. Sp. unter Rinde geschlagener *Pinus strobus* bei dem Borkenkäfer *Pityogenes chalcographus* 16. 10. 21.

**P. (Phloeonomus S. str.) pusillus Grav.**

Aschaffenburg (Oe.). Großostheimer Wald unter Kiefernrinde 3. 4. 21. Striet unter Kiefernrinde bei *Pityogenes bidentatus* 11. 10. 24. Hain i. Sp. unter Eichenstrunkrinde 27. 4. 24.

## **Xylodromus Heer.**

### **X. depressus Grav.**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.).

### **X. affinis Gerh.**

Höchst a. M. (Stock).

### **X. concinnus Marsh.**

Aschaffenburg (Oe.). Schmerlenbacher Wald in einem wurmstichigen Apfel 7. 10. 11. An einem alten Apfelbaum 7. 12. 11.

### **X. testaceus Er.**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.), Hanau (H.).

## **Orochares Kraatz.**

### **O. angustatus Er.**

Schmerlenbacher Wald 30. 10. 04. Am Feldweg nach Glattbach an gefrorenem Menschenkot mehrfach 29. 11. 07. Godelsberg 11. 1894 (Fr.). An einem Fenster der Stadt 12. 1894 (Fr.). Auch von Wägner bei Aschaffenburg mehrfach gefunden.

## **Lathrimaeum Er.**

### **L. melanocephalum Illig.**

Aschaffenburg Schmerlenbacher Wald.

### **L. unicolor Marsh.**

Seligenstadt (Scr.). Rückersbacher Schlucht an faulem Holz 22. 2. 25. Mainhecken 24. 10. 04.

### **L. atrocephalum Gyll.**

Aschaffenburg (D. N.). Godelsberg an Birkensaft 4. 1895 (Fr.). Häufig unter modernem Laub und an faulen Hölzern.

## **Olophrum Er.**

### **O. piceum Gyll.**

Aschaffenburg (Oe.). Babenhausen (Scr.). Glattbacher Wald 3. 4. 07. Stockstadter Wald 12. 4. 08, 5. 4. 24. Kahl Moore 3. 10. 04. Striet Steinbachtal unter Laub 5. 11. 05. Spessart 10. 10. 26.

### **O. fuscum Grav.**

Aschaffenburg (D. N. u. Fl.). Hanau hinter der Pulverfabrik 2. u. 11. (H.).

### **O. assimile Payk.**

Mainhecken 4. 06. Schönbusch. Steinheim bei Hanau 14. 4. 07 (H.).

## **Acidota Mannh.**

### **A. crenata F.**

Aschaffenburg (Fl.). Stockstadter Wald bei der Waldmühle in einem Erlengrund 19. 4. 31. Wachenbachtal 30. 3. 07. Hain i. Sp. 29. 5. 32. Pollaschgrund in Moospolstern.

### **A. cruenta Mannh.**

Aschaffenburg Fasanerie (Oe. u. Fl.). Stockstadter Wald 19. 4. 31, 3. 11. 29. Kahl 11. 05. Mäusberg bei Wiesenfeld 13. 11. 31.

## **L e s t e v a Latr.**

### **L. punctata Er.**

Bei Bischbrunn i. Sp. an der Springquelle 2. 7. 22 (St.). Kahl Moore bei dem Bahndamm 13. 10. 07 (H.).

### **L. longelytrata Goeze.**

An Bachufern in feuchtem Moos. Fasanerie 4. 1894 (Fr.). Am Leiderer See 5. 07. Hain i. Sp. im Pollaschgrund 24. 5. 32. Waldaschaff 27. 5. 37.

## **A n t h o p h a g u s Grav.**

### **A. praeustus Müll.**

Aschaffenburg nicht selten auf Erlen. Mainufer 9. 6. 09. Aschaffufer 14. 9. 28. Gersprenzufer bei Stockstadt a. M. 16. 9. 28.

### **A. caraboides L.**

Aschaffenburg 1853 sehr selten (Oe.). Schönbusch auf Prunus 5. 1894 (Fr.).

### **A. bicornis Block.**

Krainberg bei Gambach a. M. auf Gebüsch 13. 5. 26 1 St. Ruine Homburg 2. 5. 36 6 St.

### **A. angulicollis Mannh. (= abbreviatus L.)**

Schönbusch selten 5. 1894 (Fr.). Auf *Urtica dioica* 12. 6. 28 2 St. (S.). Auf Schlehen 18. 6. 36. Krainberg 17. 5. 25 1 St.

## **S y n t o m i u m Curt.**

### **S. aeneum Müll.**

Striet am Ufer des Steinbachs aus Laub gesiebt 1. 3. 27. Ferner am 16. 5. 24, 12. 5. 25, 5. 11. 05.

## **D e l e a s t e r Er.**

### **D. dichrous Grav.**

Aschaffenburg am Weg nach Kleinostheim bei der Lackfabrik 7. 5. 05. Auch schon von Oe. angegeben. Lohr, nachts ins Zimmer geflogen 2. u. 12. 7. 27 (St.).

## **C o p r o p h i l u s Latr.**

### **C. striatulus F.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Mainhecken unter Rinde eines Buchenstrunkes 2. 4. 11. Moore bei Großkrotzenburg auf blühender *Salix aurita* 20. 4. 27. Nach Fr. unter Steinen und an Aas.

## **T r o g o p h l o e u s Mannh.**

### **T. dilatatus Er.**

Höchst a. M. 1896 (W. Sattler).

### **T. arcuatus Steph. (= scrobiculatus Er.)**

Aschaffenburg (D. N. u. Fl.). Striet am Ufer des Steinbachs 12. 5. 24.

### **T. bilineatus Steph.**

Aschaffenburg (D. N.). Stockstadter Wald Sumpf an der Gersprenz 16. 4. 27. Am Leiderer See 12. 4. 07. Kahl Moore 16. 4. 22. Mainufer 11. 9. 04. Mainwiesen gegenüber Oberrnau 13. 10. 42.

### **T. rivularis Mots.**

Aschaffenburg (D. N.). Kahl Moore. Striet unter Eichenrinde 19. 3. 16.



**T. obesus Kiesw. (= memnonius Er.)**

Aschaffenburg (Fl.). Striet Steinbachtal 4. 7. 09. Hanau (H.).

**T. fuliginosus Grav.**

Seligenstadt (Scr.).

**T. elongatulus Er.**

Aschaffenburg (D. N.). Kahl Moore 6. 4. 12 (t. Hubenthal) 8. 11. 07, 13. 11. 24.  
Sendelbach bei Lohr am See 11. 5. 22 (St.).

**T. impressus Lac.**

Aschaffenburg (D.). Seligenstadt (Scr.). Stockstadter Wald Sumpf an der  
Gersprenz 5. 4. 24. Hanau (H.).

**T. corticinus Grav.**

Aschaffenburg (D. N.). Häufig am Leiderer See 12. 4. 07. Am Schönbuschsee 15. 4.  
04, 10. 04. Kahl Moore 7. 2. 26, 5. 4. 12, 13. 11. 04. Mainufer 12. 9. 07, 20. 10. 04.

**T. punctatellus Er.**

Aschaffenburg (D.) 3 St. in Nestern von Myrmica.  
Seligenstadt (Scr.) 2 St.

**T. foveolatus Sahlbg.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Seligenstadt (Scr.).

**T. gracilis Mannh.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.) (S.) (t. Hubenthal).

**A p l o d e r u s Steph. (Haploderus Kr.)**

**A. caelatus Grav.**

Häufig. Kleinheubach 5. 12. Fasanerie 21. 6. 39. Dammer Sumpfwiesen 7. 1894  
(Fr.). Mainufer. Erbig 10. 11. 26.

**A. caesus Er.**

Aschaffenburg (D. N.).

**O x y t e l u s Grav.**

**O. rugosus F.**

Häufig. Kahl Moore 7. 2. 26, 16. 4. 12, 13. 11. 24. Obernauer Wald 19. 3. 26. Fasa-  
nerie unter Steinen 3. 1895 (Fr.). Krainberg 17. 3. 43. Mainhecken 13. 4. 24. Auf  
der Mainbrücke im Frühjahr schwärmend. Lettlöcher 9. 1894 (Fr.). Oberes  
Aschafftal 24. 10. 24.

**O. rugifrons Hochh.**

Höchst a. M. 1900 (B.).

**O. insecatus Grav.**

Hinter Damm 15. 5. 04. Godelsberg an Aas von Helix pomatia 6. 5. 25. Steinbach-  
tal an Aas 3. 6. 04. Auch von Oe. u. D. dahier und von Scr. bei Seligenstadt  
gefunden.

**O. fulvipes Er.**

Kahl 1931 (B. und Stock).

**O. piceus L.**

Aschaffenburg (D. N.) Mainufer. Kahl Moore 14. 9. 25.

**O. sculptus Grav.**

Aschaffenburg (D. N.). Striet 4. 1894 (Fr.).

**O. inustus Grav.**

Aschaffenburg (D. N.). Schmerlenbacher Wald unter Eichenrinde 24. 5. 04.

**O. sculpturatus Grav.**

Aschaffenburg (D. N.). Schönbusch 12. 3. 24, 21. 11. 07. Fasanerie 5. 1894 (Fr.).  
Mainufer 5. 6. 11. Bei Glattbach an gefrorenem Menschenkot 21. 11. 27. Erbig  
13. 11. 26. Am Saft eines Eichenstrunkes 10. 6. 39.

**O. nitidulus Grav.**

Obernau in hohlem Apfelbaum 20. 3. 11. Kahler Moore 11. 9. 07. Glattbach 22. 11.  
05. Mainufer. Nach Fr. häufig in Mist.

**O. intricatus Er.**

Aschaffenburg (D. N. u. Fl.).

**O. complanatus Er.**

Aschaffenburg (D. N.) Obernauer Wald unter Eichenrinde 5. 5. 07. Striet 7. 8. 15.  
Schloßgarten 15. 10. 08.

**O. clypeonitens Pand.**

Höchst a. M. (Stock).

**O. hamatus Fairm.**

Seligenstadt (Scr.).

**O. tetracarinatus Block.**

Häufig in Mist (Fr.) Striet. Fasanerie an Eichensaft 26. 4. 40.

**Platystethus Mannh.**

**P. arenarius Fourcr.**

Häufig in Mist und unter Steinen (Fr.). Mainhecken 3. 10, 25. 6. 24. Striet 5. 1895  
(Fr.). Schloßgarten 5. 1894 (Fr.). Erbig 8. 10. 26, 10. 11. 26.

**P. cornutus Grav.**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.). In nasser Erde (Fr.). Mainufer Mörswiese 24. 5. 05.

**P. alutaceus Thoms.**

Schmerlenbacher Wald an Vogelaas 1. 5. 05.

**P. capito Heer.**

Kahl Moore (Wiltschek.).

**P. nodifrons Sahlbg.**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.).

**P. nitens Sahlbg.**

Seligenstadt (Scr.).

**Bledius Mannh.**

**B. tricornis Hbst.**

Aschaffenburg (D. N.). Mehr auf Salzboden (Fr.).

**B. pallipes Grav.**

Aschaffenburg (D. N.).

**B. longulus Er.**

Aschaffenburg (D. N.), Seligenstadt (Scr.).

**B. opacus Block.**

Bei Damm fliegend 4. 1894 (Fr.). Schmerlenbacher Wald 3. 5. 05. Schönbusch 4. 7. 27. Sodener Wald 15. 8. 16. Mainufer unter Stein 10. 1894 (Fr.).

**B. fracticornis Payk.**

Aschaffenburg (D. N.). Mainhecken 3. 10.

**B. femoralis Gyll.**

Aschaffenburg (D. N.), Seligenstadt in Mehrzahl (Scr.).

**B. cribricollis Heer.**

Aschaffenburg (D. N.).

**B. dissimilis Er.**

Seligenstadt (Scr.).

**B. subterraneus Er.**

Seligenstadt (Scr.). Auf der Mainbrücke schwärmend 23. 4. 06.

## Oxyporinae

### Oxyporus F.

**O. rufus L.**

Nicht selten an Pilzen. Schmerlenbacher Wald in Menge an Agaricus 6. 1894 (Fr.). Fasanerie 26. 6. 43. Bei Oberbessenbach 4. 7. 43. Amorbach 1. 8. 10.

**O. maxillosus F.**

Weniger häufig. Schmerlenbacher Wald in Anzahl 18. 8. 12. Fischerhecken an Agaricus 9. 1892 (Fr.).

## Steninae

### Stenus Latr.

**S. biguttatus L.**

Häufig. Kleinostheim in hohlem Apfelbaum mehrfach überwintert 1. 1911. Fasanerie 29. 1. 43. Steinbach auf Sumpfwiese 8. 4. 09. Hösbach auf feuchter Wiese 16. 5. 07. Stockstadt a. M. Gersprenzweiesen 8. 7. 05. Bei Glattbach 29. 11. 07.

**S. bipunctatus Er.**

Schönbusch 5. 1894 (Fr.). Mainufer 6. 25. Bei Rohrbrunn im Hasselbachtal 17. 9. 52.

**S. guttula Müll.**

Seligenstadt (Scr.). Striet 4. 7. 09.

**S. aterrimus Kr.**

Aschaffenburg (D. N.). Bei Formica rufa (Scr.). Dettingen bei Ameisen (H.).

**S. Juno F.**

Aschaffenburg (Oe. u. Scr.). Mainhecken häufig 13. 4. 24. Am Leiderer See 12. 4. 07. Langer See bei Kahl a. M. 11. 9. 07. Großkrotzenburger Moore 10. 9. 26.

- S. ater Mannh.**  
Häufig. Kl. Exerzierplatz unter Platanenrinde 1. 1894 (Fr.). Kahl Moore 7. 2. 26, 16. 3. 12. Erbig 6. 3. 10. Sandgrube bei Mainaschaff 23. 2. 26, 10. 10. 36. Schmerlenbacher Wald 3. 5. 08. Oberes Aschafftal bei Waldaschaff 14. 10. 24.
- S. longitarsis Thoms.**  
Kahl Moore 3. 4. 26, 10. 9. 26, 20. 11. 24 (t. Benick).
- S. lustrator Er.**  
Kahl Moore 1. 10. 24. Rückersbacher Schlucht 19. 9. 48 4 St., 15. 10. 31 (t. Benick).
- S. sylvester Er.**  
Aschaffenburg (Oe.). Babenhausen (Scr.).
- S. stigmula Er.**  
Aschaffenburg (D. N.). Seligenstadt Mainufer (Scr.).
- S. clavicornis Scop.**  
Aschaffenburg (Oe. u. D.). Mainhecken 3. 10, 13. 4.24. Kahl Moore 10. 04. Schönbusch Waldrand beim Jägerhof 19. 4. 47, 6. 12. 31. Rückersbacher Schlucht 30. 3. 47
- S. Rogeri Kr.**  
Kahl Moore 7. 2. 26, 14. 4. 11, 1. 10. 24. Hain i. Sp. 29. 5. 32. Rückersbacher Schlucht 23. 11. 46.
- S. providus Er.**  
Aschaffenburg unter Platanenrinde 1. — 3. 1894 (Fr.). Johannesberg unter Stein 3. 1894 (Fr.). Bei Oberbessenbach 19. 3. 22.
- S. bimaculatus Gyll.**  
Nicht selten. Karlstadt 14. 3. 11. Rückersbacher Schlucht 5. 5. 12, 23. 11. 46. Schöllmüllersee 6. 1894 (Fr.). Striet Steinbachtal 5. 11. 06. Bei Glattbach 29. 11. 07.
- S. palposus Zettst.**  
Hanau (H.).
- S. ruralis Er.**  
Einmal bei Babenhausen (Scr.).
- S. boops Ljungh (= bupthalmus Grav.)**  
Kl. Exerzierplatz unter Platanenrinde 1. 1894 (Fr.). Mainhecken 3. 08. Kahl Langer See 19. 4. 20, 11. 9. 07. Schöllmüllersee 6. 1893 (Fr.). Kahl Moore 13. 11. 24.
- S. incrassatus Er.**  
Kahl Moore. Hanau (H.).
- S. melanarius Steph.**  
Kahl Moore 5. 4. 12, 14. 4. 11. Stockstadt Sumpf an der Gersprenz 18. 4. 24, 17. 9. 05. Fasanerie. Hanau 1. 4. 06 (H.).
- S. subdepressus Rey.**  
Rückersbacher Schlucht 22. 2. 25 2 St. aus Moos gesiebt. 3. Fundstelle in Deutschland nach Benick. 1 St. im Lübecker Museum vernichtet. 1 St. in meiner Sammlung.
- S. morio Grav.**  
Sendelbach bei Lohr 22. 8. 22 (St.). Stockstadt a. M. Sumpf an der Gersprenz 17. 9. 05. Aschaffenburg (Oe.):

- S. melanopus Marsh.**  
Kahl Moore 16. 4. 22. Rückersbacher Schlucht 2. 4. 26. Stockstadt a. M. Gersprenz-  
wiesen 18. 4. 24. Schönbusch. Leiderer See 21. 5. 07.
- S. canaliculatus Gyll.**  
Aschaffenburg (Oe.). Kahl Moore 11. 4. 25. Striet Steinbachtal 4. 7. 09. Hanau (H.).
- S. nitens Steph.**  
Kahl Moore 15. 11. 24. Hörstein 8. 52 (Dehnert) t. Wüsthoff.
- S. fuscipes Grav.**  
Aschaffenburg (D. N.). Stockstadter Wald 2. 1. 27. Kahl Moore 7. 2. 26, 23. 11. 24.  
Mainwiesen gegenüber Obernau 4. 5. 43.
- S. argus Grav.**  
Aschaffenburg (D. N.). Seligenstadt (Scr.). Kahl Moore 7. 2. 26, 9. 24, 1. 10. 24,  
10. 11. 24. Stockstadter Wald 12. 4. 24. Fasanerie 25. 9. 23.
- S. cautus Er.**  
Stockstadt a. M. Gersprenzweiden 18. 4. 24. Hain i. Sp. 14. 4. 24. Aschaffenburg  
7. 5. 37. Kahl 1. 10. 24, 18. 11. 24.
- S. vafellus Er.**  
Stockstadter Wald Gersprenzweiden 8. 3. 05, 17. 9. 05. Schönbusch.
- S. pusillus Er.**  
Aschaffenburg (Oe.). Stockstadter Wald 12. 2. 27. Fahrbachtal 17. 3. 22. Kahl  
Moore 16. 3. 07, 13. 11. 14, 11. 9. 07. Striet 28. 7. 26, 27. 8. 25. Bei Glattbach  
29. 11. 07
- S. nanus Steph.**  
Nicht selten. Fahrbachtal 1. 3. 27. Mainufer 14. 3. 26. Stockstadter Wald 12. 4. 11.  
Fasanerie 5. 1893 (Fr.). Kahl Moore 30. 9. 25, 6. 10. 26.
- S. circularis Grav.**  
Aschaffenburg (Oe.). Mainufer 4. 08. Fahrbachtal 1. 3. 27. Wenighösbach in  
Baummulm 11. 12. Fasanerie 29. 1. 43.
- S. humilis Er.**  
Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Kahl 7. 2. 26. Mainhecken 3. 20. Striet  
23. 7. 04, 5. 11. 05. Kahl Moore 24. 4. 11, 1. 10. 24, 13. 11. 24. Rückersbacher Schlucht  
26. 2. 25, 27. 3. 47, 23. 11. 46.
- S. carbonarius Gyll.**  
Aschaffenburg (S.).
- S. opticus Grav.**  
Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg (S.).
- S. crassus Steph.**  
Aschaffenburg (S.).  
v. formicetorum Marsh.  
Kahl Moore 16. 4. 28, 1. 10. 24. Schönbusch am See unter Schilfhaufen 26. 9. 04.
- S. brunripes Steph.**  
Seligenstadt im Anspülicht (Scr.). Kahl 5. 4. 12, 10. 9. 26. Rückersbacher Schlucht  
am Bachufer 3. 5. 25. Karlstadt 26. 4. 32. Kalmut bei Homburg a. M. 19. 8. 26.  
Erbig 28. 11. 26.

- S. nigrutilus Gyll.**  
Seligenstadt (Scr.). Kahl 7. 2. 26, 5. 4. 12, 1. 10. 24. Fahrbachtal 15. 5. 24.
- S. latifrons Er.**  
Seligenstadt einzeln auf Schilf (Scr.). Kahl Moore 12. 4. 07, 1. 10. 24, 1. 11. 05, 28. 12. 24. Lindigwiesen 3. 5. 25. Gersprenzwiesen 14. 4. 24.
- S. fulvicornis Steph.**  
Nicht selten. Kahl Moore 5. 4. 12, 17. 9. 26, 1. 10. 24, 3. 11. 04. Mörswiese am Mainufer 23. 5. 05. Sumpfwiesen hinter Damm 23. 5. 05. Stockstadter Wald 7. 8. 25.
- S. tarsalis Ljungh.**  
Nicht selten. Stockstadter Wald 13. 2. 26, 18. 4. 24, 7. 8. 25. Rückersbacher Schlucht 3. 5. 25, 13. 11. 46. Kahl bei der Herrenmühle 12. 7. 25. Steinbachtal 7. 8. 25. Kahl Moore 7. 2. 26, 11. 6. 25, 1. 10. 24. Schönbusch 5. 1895 (Fr.). 29. 11. 46. Mainufer 9. 9. 42.
- S. similis Hbst.**  
Aschaffenburg 7. 20. Schmerlenbacher Wald 18. 8. 08.
- S. solutus Er.**  
Kahl Moore 18. 9. 08, 1. 10. 24.
- S. cicindeloides Schall.**  
Häufig. Gersprenzwiesen 18. 4. 24. Kahl Moore 11. 9. 07, 1. 10. 24. Schönbusch. Mainufer 9. 9. 42.
- S. fornicatus Steph.**  
Stockstadter Wald 18. 4. 24, 8. 11. 26. Sumpf bei Station Kleinostheim 29. 4. 32. Kahl Moore.
- S. pallitarsis Steph.**  
Aschaffenburg (D. N.). Nicht selten. Schönbusch am See 12. 3. 14, 26. 5. 04. Mainhecken 4. 08. Stockstadt a. M. Sumpf an der Gersprenz 18. 4. 24. Rückersbacher Schlucht 15. 10. 31. Kahl Fasanerie. Sendelbach bei Lohr 23. 8. 22 (St.).
- S. binotatus Ljungh.**  
Leiderer See 12. 4. 07. Wiesen hinter Damm 5. 1894 (Fr.). Sumpf bei Station Kleinostheim 12. 25. Schönbusch. Kahl 17. 9. 26.
- S. pubescens Steph.**  
Aschaffenburg (D. N.). Mainufer 11. 9. 05. Schönbusch am See 29. 9. 04. Kahl Moore 26. 11. 21.
- S. flavipes Steph.**  
Häufig. Kahl Moore 7. 2. 26, 21. 9. 24, 1. 10. 24, 13. 11. 24. Dammer Sumpfwiesen 5. 1894 (Fr.). Rückersbacher Schlucht 15. 10. 31, 23. 11. 46. Steinbachtal 5. 11. 05.
- S. nitidiusculus Steph.**  
Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg (S.).
- S. picipennis Er.**  
Stockstadter Wald 17. 9. 05. Kahl 1. 10. 24. Gailbachtal 12. 9. 52
- S. bifoveolatus Gayll.**  
Aschaffenburg (Oe. u. D.). Stockstadter Wald Sumpf an der Grenze 5. 4. 24,

9. 5. 25. Steinbachtal 7. 8. 25. Gailbachtal 10. 04. Kahl Moore 1. 10. 24, 6. 11. 24, 12. 04.

**S. picipes Steph.**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.). Rückersbacher Schlucht 5. 12. Grashang bei Rothenbuch i. Sp. 8. 8. 49. Bei Rohrbrunn i. Sp. 17. 9. 52.

**S. impressus Germ.**

Nicht selten. Aschaffenburg (Oe. u. D. N.). Kahl 7. 2. 22. Oberbessenbach 19. 3. 22. Laufach 5. 2. 28. Mainhecken 3. 10. Weiler i. Sp. 11. 4. 26. Karlstadt 24. 4. 32. Hain i. Sp. 8. 7. 23, 20. 11. 27. Wiesenfeld 28. 8. 20. Am Engländer i. Sp. 8. 05. Stengerts 27. 8. 25.

**S. coarcticollis Epp.**

Bei Wiesenfeld 24. 8. 20. Kalmut 10. 10. 52.

**S. Erichsoni Rye.**

Nicht selten. Aschaffenburg (D. N.). Schönbusch 12. 2. 24. Bei Oberbessenbach 19. 3. 22. Karlstadt am Steig 28. 3. 26. Kalbenstein 15. 5. 47. Mäusberg 13. 11. 32. Rückersbacher Schlucht 23. 11. 46.

v. longelytrata Bernh.

Gailbachtal 17. 1. 43. Aschfeld 26. 4. 47. Kalbenstein 15. 5. 47. Kalmut 3. 6. 34.

**S. fuscicornis Er.**

Aschaffenburg (D. N.). Gailbachtal 17. 1. 43. Rückersbacher Schlucht 23. 11. 46.

**S. palustris Er.**

Aschaffenburg (D. N.).

**S. geniculatus Grav.**

Seligenstadt (Scr.). Erbig 3. 10, 14. 8. 25. Schmerlenbacher Wald 3. 5. 08. Pollaschgrund 9. 5. 48. Karlstadt a. M. 8. 9. 26.

**S. pallipes Grav.**

Aschaffenburg (D. N.). Mainhecken 3. 10. Schönbusch am See unter Schilf 30.9.04.

**Dianous Sam.**

**D. coeruleus Gyll.**

Aschaffenburg (D. N.). Hain i. Sp. Seebachtal 27. 4. 24. Kahl am Ufer der Kahl an Wehren im Frühjahr besonders nach Hochwasser (H.). Steinbach bei Lohr im Park 29. 10. 21 (St.).

## **Euaesthetinae**

### **Euaesthetus Grav.**

**E. bipunctatus Ljungh.**

Nicht selten. Fasanerie (Oe. u. D.). Seligenstadt im Anspülicht auf nassen Wiesen (Scr.). Stockstadter Wald 5. 4. 24. Mainufer. Kahl Moore 5. 4. 12, 3. 11. 07, 26. 11. 24.

**E. ruficapillus Lac.**

Seligenstadt (Scr.). Schönbusch.

**E. laeviusculus Mannh.**

Höchst a. M. (Stock). Kahl Moore 26. 11. 24.

# Paederinae

## Paederus F.

### **P. ruficollis F.**

Heigenbrücken unter nassem Torfmoos 4. 1895 (Fr.). Stockstadter Wald 10. 5. 27.  
Kahl Moore.

### **P. riparius L.**

Am Schöllmüllersee 6. 1893 (Fr.). Schönbusch Seeufer 10. 04. Kahl Moore 3.  
11. 04.

### **P. caligatus Er.**

Bischberg unter Stein 18. 4. 25. Dammer Sumpfwiesen 5. 1894 (Fr.). Aschaffenburg 29. 11. 46 (Elbert). Gailbachtal 8. 12. 04. Sodener Wald.

### **P. fuscipes Curt.**

Aschaffenburg (Oe.). Mainhecken 4. 08. Kahl Moore 18. 10. 04.

### **P. limnophilus Er.**

Aschaffenburg selten (Oe. u. Scr.).

### **P. litoralis Grav.**

Sehr häufig an feuchten Stellen. Am Fasaneriesee 3. u. 4. 1894 (Fr.). Mainhecken 13. 4. 24, 23. 10. 04. Krainberg 17. 3. 43. Gailbachtal 8. 12. 04.

### **P. brevipennis Lac.**

Nicht selten. Rückersbacher Schlucht 28. 2. 25. Karlstadt auf dem Haag zahlreich 15. 3. 41. Sodener Wald 4. 7. 09.

## Astenus Steph.

### **A. filiformis Latr.**

Nicht selten. Erbig 3. 10. Haibacher Höhe 27. 4. 08. Striet 9. 8. 27. Kalbenstein 9. 8. 25. Stengerts 27. 8. 25. Godelsberg 11. 1894 (Fr.). Kahl Moore 1. 11. 05.

### **A. pulchellus Heer.**

Hanau nach Reitter. Kahl 7. 10. 53 unter gefällttem Kieferstamm. (Dehnert, t. Wüsthoff).

### **A. angustatus Payk.**

Kahl Moore 7. 2. 26, 26. 11. 24. Fischerhecke 3. 1894 (Fr.). Kalbenstein 5. 7. 25 (t. Benick). 30. 8. 25, 19. 9. 25. Erbig 14. 8. 25. Striet 19. 9. 25.

### **A. immaculatus Steph.**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.).

## Stilicus Latr.

### **S. angustatus Fourcr.**

Kahl Moore 7. 2. 26, 26. 11. 24. Obernauer Wald 14. 3. 26. Kalbenstein 5. 7. 25, 30. 8. 25. Erbig 24. 8. 25.

Striet 19. 9. 25. Zu Oechsners Zeit noch als sehr selten in unserem Gebiet angegeben.

### **S. subtilis Er.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Hain i. Sp. Seebachtal 13. 3. 27, 14. 4. 23. Wiesenfeld 8. 20.



**S. rufipes Germ.**

Aschaffenburg häufig (Oe.). Kahl Moore 7. 2. 26, 5. 4. 12. Rückersbacher Schlucht 22. 4. 25. Mainhecken 3. 10. Steinbachtal 24. 7. 04. Schönbusch am See 4. 10. 04.

**S. similis Er.**

Nicht selten. Schönbusch 12. 3. 24. Schöllmüllersee 7. 1894 (Fr.). Kahl Moore unter gemähten Uferpflanzen 23. 10. 04.

**S. geniculatus Er.**

Kahl Moore 7. 2. 26. Mainufer 10. 3. 26.

**S. orbiculatus Payk.**

Nicht selten. Am Schönbuschsee. Bei Stockstadt a. M. unter Kartoffelkrauthaufen 17. 9. 05. Kahl Moore 10. 9. 26, 13. 11. 24. Erbig 8. 10. 26. Exerzierplatz unter Baumrinde 11. 1884 (Fr.).

**S. Erichsoni Fauv.**

Nicht selten. Rückersbacher Schlucht 27. 2. 25, 23. 11. 46. Kahl Moore 7. 3. 26, 17. 9. 26, 28. 12. 24. Schönbusch 27. 3. 47.

**M e d o n Steph.**

**M. castaneus Grav.**

Aschaffenburg selten unter Steinen und abgefallenem Laub (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

**M. piceus Kr.**

Schönbusch 20. 9. 04. Kahl Moore 13. 11. 04.

**M. brunneus Er.**

Aschaffenburg nicht selten (Oe.). Rückersbacher Schlucht 22. 2. 25, 29. 11. 46. Oberbessenbach Seitental an der Quelle 19. 3. 22, 14. 4. 22. Hain i. Sp. Seebachtal. Kahl. Sodener Wald. Dornauer Graben 30. 3. 41.

**M. fusculus Mannh.**

Seligenstadt selten (Scr.). Findberg 20. 3. 48, 1 St. (J. S.).

**M. ripicola Kr.**

Aschaffenburg (Fl.). Stockstadter Wald 30. 1. 27.

**M. bicolor Oliv.**

Hanau 1914 (M.) 1 St.

**M. melanocephalus F.**

Mainhecken 3. 10. Kahl Moore 13. 11. 24. Nach v. Heyden auch bei Formica congruens (Fr.).

**M. obsoletus Nordm.**

Nicht selten. Kahl Moore 16. 4. 22, 13. 11. 04. Am Langen See 19. 4. 29. Mainufer bei Obernau 11. 9. 05. Mainhecken 28. 10. 04.

**L i t h o c h a r i s Boisid. Lac.**

**L. ochraceus Grav.**

Aschaffenburg (Fl.). Äußere Glattbacher Straße abends schwärmend 19. 8. 08.

**S c o p a e u s Er.**

**S. cognatus Rey. (= sulcicollis Steph.)**

Aschaffenburg selten (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

**S. minutus Er. (= sulcicollis Fauv.)**

Aschaffenburg (D. N.).

ab. *pusillus* Kiesw.

Seligenstadt (Scr.).

**S. minimus Er.**

Im ganzen Gebiet vorkommend (Scr.) nach (D. N.).

**S. laevigatus Gyll.**

Aschaffenburg (D. N.). An feuchten, sumpfigen Orten unter Steinen (Fr.).

**Domene Fauv.**

**D. scabricollis Er.**

Aschaffenburg Gailbachtal 3. 05. Rothenbuch i. Sp. am Breitsee 13. 3. 27. Metzgergraben 11. 4. 25, 4 St., 2. 5. 40. Kahl Moore (H.).

**Lathrobium Grav.**

**L. multipunctum Grav.**

Laufach auf Moorwiesen 29. 1. 28. Bahndamm gegenüber Nilkheim 21. 2. 28. Fahrachtal 1. 3. 27. Rand der Kahler Moore 23. 2. 36. Stockstadter Wald 16. 5. 35. Wendelberg 13. 4. 47. Lindigwiesen 9. 9. 31.

**L. quadratum Payk.**

Obernauer Wald 30. 3. 07. Mainhecken 11. 9. 05, 18. 10. 04.

**L. terminatum Grav.**

Nicht selten. Kahl Moore 7. 2. 26, 16. 4. 28, 15. 5. 04. Büchelberg 5. 3. 10. Stockstadter Wald Sumpf an der Grenze 5. 4. 28. Schönbusch 5. 04. Gersprenzufer 8. 11. 26. Sodener Wald 19. 12. 26.

ab. *atripalpe* Scriba.

Moore bei Großkrotzenburg.

**L. gracile Hampe.**

Stockstadter Wald Sumpf an der Grenze 5. 4. 24.

**L. rufipenne Gyll.**

Großkrotzenburger Moore 4. 21. Kahl 1905 2 St. (Maass).

**L. elongatum L.**

Aschaffenburg Erbig 16. 3. 24. Fasanerie 2. 4. 05. Station Kleinostheim 23. 9. 09. Schmerlenbacher Wald 5. 1894 (Fr.).

ab. *fraudulentum* L.

Aschaffenburg (S.).

**L. geminum Kr.**

Mainufer im Genist 2. 1. 26. Mainhecken 13. 4. 24. Kahl Moore 14. 4. 11. Stockstadter Wald 9. 5. 24, 15. 9. 25. Fasanerie 9. 1894 (Fr.). Schönbusch 27. 3. 47.

**L. ripicola Czwal.**

Schönbusch (S.).

**L. laevipenne Heer.**

Striet. Bei Hösbach 14. 3. 43. Niederrodenbach 28. 4. 08. (Seidler).

**L. castaneipenne Kol.**

Seligenstadt in Anzahl im Genist (Scr.).

**L. fulvipenne Grav.**

Nicht selten an feuchten Stellen unter Moos und Laub. Fasanerie 3. 1895 (Fr.).  
Kahl 27. 2. 26. Erbig 10. 3. 47. Rothenbuch i. Sp. 21. 4. 40. Mainufer.

v. **Letzneri Gerh.**

Stockstadter Wald 30. 1. 27, 16. 4. 27. Sodener Wald 30. 3. 07. Hain i. Sp. Seebachtal 14. 4. 22.

**L. brunripes F.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Nicht selten. Schönbusch 11. 3. 24. Kahl Moore. Stockstadter Wald 3., 4., 5., 7. — 9. 1904.

ab. **luteipes Fauv.**

Stockstadter Wald 20. 5. 04.

**L. fovulum Steph.**

Stockstadter Wald Sumpf an der Grenze 5, 4. 24. Mainufer Mörsweise 13. 5. 05. Mainhecken 28. 10. 04. Von Oechsner als punctatum Zett. und sehr selten angegeben (Horion).

**L. filiforme Grav.**

Aschaffenburg selten (Oe.). Stockstadter Wald 13. 2. 47, 18. 4. 24. Kahl Langer See 19. 4. 25. Moore 1. 10. 24. Sumpfwiesen hinter Damm 6. 1894 (Fr.).

**L. longulum Grav.**

Aschaffenburg ziemlich selten (Oe.). Laufach auf mooriger Wiese 7. 2. 28. Glattbacher Wald unter Hecken 3. 4. 07. Hain i. Sp. Seebachtal 14. 4. 28. Kahl Moore 28. 11. 24.

v. **longipenne Fairm.**

Bei Seligenstadt im Anspülicht (Scr.).

**L. dilutum Er.**

Höchst a. M. im Niddagenist 1895 (B.).

**L. pallidum Nordm.**

Selten (Scr.). Stockstadter Wald Sumpf an der Grenze 5. 4. 24.

**Cryptobium Mannh.**

**C. fracticorne Payk.**

Aschaffenburg (Oe.). Häufig an feuchten Stellen unter Laub III. IV. X. XI.

## Staphilininae

**Leptacinus Er.**

**L. parumpunctatus Gyll.**

Selten (Oe.).

**L. batychnus Gyll.**

Stockstadter Wald an der Gersprenz 17. 9. 05. Kahl Moore 2. 10. 04.

**L. linearis Grav.**

Aschaffenburg Mainbrücke mittags schwärmend 14. 4. 06.

**L. formicetorum Maerk.**

Aschaffenburg in Haufen von Formica rufa Ende 6. 24. Oberes Aschafftal unter Buchenstrunk 14. 10. 24. Hanau 2. 21. (H.).

## **Nudobius Thoms.**

### **N. lentus Grav.**

Aschaffenburg selten (Oe.).

## **Xantholinus Serv.**

### **X. punctulatus Payk.**

Fasanerie unter Stein 3. 1895 (Fr.). Obernauer Wald 12. 3. 37. Großkrotzenburg 10. 9. 27. Bei Glattbach 11. 10. 05.

ab. Thomsoni Schwarz.

Seligenstadt (Scr.). Bischberg 21. 7. 04.

### **X. angustatus Steph.**

Aschaffenburg Erbig 5. 3. 27, 23. 6. 26, 8. 10. 26. Kahl 7. 2. 26, 18. 9. 26. Damm 4. 1894 (Fr.). Schönbusch 10. 04 (Fr.).

ab. nitidicollis Rtrr.

Kahl Moore 16. 4. 22. In hohlem Apfelbaum 30. 11. 24.

### **X. atratus Heer.**

Seligenstadt bei Lasius fuliginosus 1883 (Scr.).

Rückersbacher Schlucht 30. 3. 47.

### **X. glabratus Grav.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Am Krautbach hinter der Fasanerie.

### **X. glaber Nordm.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Büchelberg in hohler Silberpappel 2. u. 3. 21 (J. S.). Heigenbrücken unter Buchenstrunkrinde 1. 8. 25. In hohlem Apfelbaum 26. 4. 17. Hafenlohrtal in Buchenstrunk 28. 9. 40.

### **X. tricolor F.**

Heigenbrücken 6. 1894 (Fr.). Johannesberg 9. 1894 (Fr.). Häufig unter Laub. Kahl Moore 18. 4. 22, 16. 7. 12, 1. 8. 22. Stockstadter Wald in Kulturgräben 19. 7. 04.

### **X. distans Muls. Rey.**

Aschaffenburg (Fl.). Kl. Exerzierplatz am Mainufer 1. 4. 11. Gailbachtal 3. 05.

### **X. linearis Ol.**

Fasanerie 4. 1894 (Fr.). Schönbusch unter Stein 27. 4. 24. Kahl Moore 10. 9. 26, 28. 11. 24. Rückersbacher Schlucht 23. 11. 46. In alter Weide 30. 12. 46.

ab. longiventris Heer.

Fasanerie 26. 3. 09. Mainufer bei Nilkheim 20. 9. 07.

## **Gauropterus Thoms.**

### **G. fulgidus F.**

Aschaffenburg unter faulenden Pflanzenstöcken (Oe.).

## **Baptolinus Kraatz.**

### **B. affinis Payk.**

Schönbusch in hohler Eiche 28. 1. 31. Stockstadter Wald in Kiefernstrunk 5. 4. 24. Sodener Wald in morschem Buchenstrunk. Kahl Moore. Heigenbrücken 4. 1895 (Fr.). Fasanerie unter Rinde 11. 1894 (Fr.).

## **Othius Steph.**

### **O. punctulatus Goeze (= fulvipennis F.)**

Häufig. Stockstadter Wald 15. 3. 36. Hain i. Sp. 14. 4. 22. Mainufer Mörswiese 7. 5. 05. Büchelberg 11. 8. 28. Schönbusch 4. 10. 04.

**O. laeviusculus Steph.**

Aschaffenburg (D. N.).

**O. melanocephalus Grav.**

Aschaffenburg selten (Oe.). Unter Baumrinde (Fr.).

**O. myrmecophilus Kiesw.**

Nicht selten. Gartenberg 8. 2. 25. Hain i. Sp. 14. 4. 22. Stockstadter Wald 18. 4. 24. Kahl Moore 7. 2. 26, 5. 4. 12, 28. 11. 05. Aschaffenburg in hohler Pappel 3. 6. 12.

**N e o b i s n i u s Ganglb.**

**N. villosulus Steph.**

Höchst 1903 (B.).

**N. procerulus Grav.**

Kahl (S.).

**N. prolixus Er.**

Kahlthal bei der Herrenmühle auf Kiesbänken der Kahl (W.).

**A c t o b i u s Fauv.**

**A. cinerascens Grav.**

Hain i. Sp. Seebachtal in Torfmoos 14. 4. 22. Stockstadter Wald Sumpf an der Grenze 5. 4. 24. Sumpf an der Gersprenz 18. 4. 24. Kahl Moore 3. 11. 04. Mainhecken 28. 10. 04. Hörstein 8. 52 (Dehnert). Hanau 9. 52 (Dehnert).

**A. signaticornis Rey.**

Hain i. Sp. Seebachtal 14. 4. 22. Kahl Moore 26. 11. 24.

**P h i l o n t h u s Curt.**

**P. splendens F.**

Fasanerie 9. 1892 (Fr.).

**P. intermedius Boisd.**

In faulen Pflanzen und an Aas (Fr.).

**P. laminatus Creutz.**

Aschaffenburg an einer Hauswand 9. 1894 (Fr.). Hanau (H.) 1 St. von mir gesammelt. Fundort Aschaffenburg ohne nähere Angabe.

**P. laevicollis Boisd.**

Striet 4. 1894 (Fr.).

**P. nitidus F.**

Aschaffenburg (Oe. u. D. u. S.). Selten. Larven in Baummulm 2. 11 (S.). Kalbenstein b. Gambach 20. 7. 52.

**P. cyanipennis F.**

Striet an Agaricus mehrfach 7. 1893 (S.). An Birkensaft und an der davon durchtränkten Erde 6. 14 (Schw.).

**P. politus L. (= aeneus Rossi)**

Mainufer Mörswiese 6. 05. Schmerlenbacher Wald. An Hauswand angefliegen 11. 1894 (Fr.).

**P. chalceus Steph.**

Schmerlenbacher Wald an feuchtem Baumstrunk 24. 5. 04. Sodener Wald unter Grashaufen 3. 7. 04.

- P. carbonarius Gyll.**  
Fasanerie 9. 1894 (Fr.).
- P. atratus Grav.**  
Aschaffenburg 24. 4. 09. Erbig 29. 5. 25. Bachrand bei der Eckertsmühle 29. 5. 24.  
Mainufer. Kalbenstein 30. 8. 25. Seligenstadt im Genist (Scr.).
- P. coerulescens Boisd.**  
Kahl. Hanau (H.).
- P. rotundicollis Mén.**  
Aschaffenburg (D. N.). Kleinheubach 4. 12. Exerzierplatz 9. 1894 (Fr.).
- P. ebeninus Grav.**  
Aschaffenburg (D. N.). Kahl Langer See 11. 9. 07, 23. 10. 04.
- P. coruscus Grav.**  
Schönbuschallee an Aas 4. 1894 (Fr.). Fasanerie an Eichensaft 25. 8. 40. Gailbachtal 12. 4. 52.
- P. rectangulus Shrp.**  
An Komposthaufen in unserem Gebiet vorkommend (Horion).
- P. concinnus Grav.**  
Hinter Damm 1. 3. 17. Kahl Moore 7. 2. 26. Gailbachtal 17. 1. 43. Exerzierplatz 9. 1894 (Fr.). Striet 9. 10. 25. Stockstadter Wald 8. 11. 25.
- P. sanguinolentus Grav.**  
Aschaffenburg (Oe.). Gartenberg unter Moos 8. 2. 25.
- P. immundus Gyll.**  
Gartenberg 8. 2. 25. Rückersbacher Schlucht 21. 2. 25. Godelsberg in Agaricus und unter Steinen 10. u. 11. 1894 (Fr.).
- P. debilis Grav.**  
Kahl Moore 16. 4. 22, 21. 9. 24. Obernauer Wald 12. 3. 27. Exerzierplatz unter Rinde 11. 1894 (Fr.).
- P. decorus Grav.**  
Aschaffenburg Fasanerie 30. 1. 26. Gartenberg 8. 2. 25. Kahl Langer See 19. 4. 25.  
Mörswiese am Mainufer 2. 5. 05.
- P. fuscipennis Mannh.**  
Gartenberg 8. 2. 25. Erbig unter Moos 6. 3. 10, 2. 10. 27 (Noll). Büchelberg 6. 2. 47.  
Karlstadt 28. 2. 26, 28. 3. 26. Obernauer Wald 29. 3. 26. Ammersfeld 21. 4. 47.  
Schönbusch am Seeufer 9. 8. 46.
- P. Mannerheimi Fauv.**  
Aschaffenburg (S.). Hanau Bulau (H.). Kahltal 24. 10. 43.
- P. varius Gyll.**  
Unterhalb Dettingen 7. 2. 26, 19. 4. 25. Auf dem Kalbenstein 28. 2. 26. Striet unter Stein 30. 3. 24. Erbig 5. 3. 27. Stockstadter Wald unter Laub 19. 10. 26, 8. 11. 25.
- P. bimaculatus Grav.**  
Aschaffenburg (Oe.).

**P. lepidus Grav.**

Auf dem Kalbenstein 28. 2. 26. Findberg 26. 2. 25, 26. 7. 25. Auf der Mainbrücke angefliegen 11. 4. 06. Mäusberg 27. 9. 52. Kalmut 10. 10. 52.

**P. nitidulus Grav.**

Aschaffenburg (Oe.). Kl. Exerzierplatz unter Platanenrinde 1. 1894 (Fr.). 4. 11 (S.).  
Am Mainufer. Rückersbacher Schlucht 23. 11. 46.

**P. longicornis Steph.**

Kahl 23. 2. 26. Büchelberg 5. 3. 10.

**P. cruentatus Gmelin.**

Dornauer Graben 30. 3. 41.

**P. varians Payk.**

Kahl 7. 2. 26. Mainhecken 23. 2. 26, 7. 9. 47. Schmerlenbacher Wald 13. 3. 26.

**P. albipes Grav.**

Aschaffenburg (Oe.). Mainhecken 9. 4. 09. Kahl Moore 30. 9. 25, 23. 10. 04.

**P. fimetarius Grav.**

Aschaffenburg an Aas (Oe.). Im Schloßgarten 15. 10. 08.

**P. cephalotes Grav.**

Aschaffenburg selten an Aas (Oe.). Seligenstadt (Scr.). In Gräben auf dem Kl. Exerzierplatz 16. 4. 08.

**P. sordidus Grav.**

Aschaffenburg selten (Oe.). Mainufer. Kahl Moore 3. 11. 04.

**P. fuscus Grav.**

In hohlen Bäumen mit alten Vogelnestern. Schönbusch in hohler Eiche 28. 1. 31, 1. 3. 15. Obernau in hohlem Apfelbaum 3. 11. Hain aus Baummulm 4. 11. Striet im Mulm einer alten Buche 12. 1895.

**P. umbratilis Grav.**

Aschaffenburg unter faulen Pflanzen (Oe.). Hanau bei der Pulverfabrik an Erlen 30. 1. 22 (H.).

**P. ventralis Grav.**

Aschaffenburg an Aas (Oe.). Glattbacher Wald 1. 4. 09. Schmerlenbacher Wald 17. 4. 04. Kahl Moore 25. 7. 04. Gailbachtal 8. 12. 04.

**P. discoideus Grav.**

Seligenstadt (Scr.).

**P. quisquiliarius Gyll.**

Aschaffenburg selten unter Abfallstoffen (Oe.). Am Mainufer. Bei Kahl und im Spessart.

v. inquinatus Steph.

Seligenstadt (Scr.).

**P. rufimanus Er.**

Aschaffenburg Fasanerie (Oe.).

**P. fumarius Grav.**

Schönbusch am Seeufer 17. 8. 28, 8. 10. 04. Kahl Moore.

**P. nigrita Grav.**

Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg 18. 4. 24. Kahl Moore 5. 4. 12.

**P. micans Grav.**

Aschaffenburg nicht selten (Oe.). Rückersbacher Schlucht 22. 2. 25. Mainhecken 13. 4. 24. Kahl Moore 14. 4. 11. Am Langen See 11. 9. 07.

**P. fulvipes F.**

Aschaffenburg 28. 3. 36. Mörswiese am Mainufer an Fischeas 13. 5. 03.

**P. punctus Grav.**

Mainufer Mörswiese 6. 09. Kahl am Langen See 11. 9. 07.

**P. tenuis F.**

Am Weg nach Glattbach 10. 4. 07, 6. 07, 5.6.21. Mainufer unter Stein 10. 1894(Fr.).

**P. pullus Nordm.**

Seligenstadt im Genist (Scr.). Am Mainufer beim Kl. Exerzierplatz 4. 11.

**G a b r i u s Steph.**

**G. vernalis Grav.**

Aschaffenburg (Oe.). Bei Formica fuliginosa (Fr.). Mainufer. Stockstadter Wald in Kulturschutzgräben.

**G. exiguus Nordm.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

**G. splendidulus Grav.**

Nicht selten. Rückersbacher Schlucht 21. 2. 25. Steinbachtal unter Erlenstrunkrinde mehrfach 19. 3. 16. Stockstadter Wald 5. 4. 24. Glattbacher Wald 1. 4. 07. Schönbusch aus morschem Eichenholz 18. 6. 25 und unter Schilf 4. 10. 04.

**G. lividipes Baudi (= rubripennis Kiesw.)**

Aschaffenburg auf der Mainbrücke schwärmend (S.).

**G. nigrutilus Grav.**

Sehr häufig und weit verbreitet. Stockstadter Wald 5. 4. 24, 17. 9. 05. Kahl am Langen See 11. 9. 07.

**G. trossulus Nordm.**

Seligenstadt einige Stücke (Scr.).

**G. pennatus Shp.**

Schönbusch 12. 3. 24. Kahl Moore 13. 9. 24.

**H e s p e r u s Fauv.**

**H. rufipennis Grav.**

Aschaffenburg selten (Oe.) 1853.

**S t a p h y l i n u s L.**

**S. pubescens Deg.**

An Pferde- und Schafmist (Fr.). Mainufer Mörswiese 6. 05. Steinbachtal 22. 7. 09. Hochspessart 9. 24. Kahl Moore 11. 10. 26.

**S. fossor Scop.**

Aschaffenburg (D.). Mäusberg bei Wiesenfeld 15. 4. 34. Karlstadt Haag 19. 4. 35.



- S. chalcocephalus F.**  
Aschaffenburg selten (Oe.). Schmerlenbacher Wald an Buchensaft 25. 5. 04.
- S. latebricola Grav.**  
Aschaffenburg (Oe.).
- S. stercorarius Ol.**  
Aschaffenburg (Oe.). Stengerts 7. 8. 25. Kahl Rand der Moore 15. 8. 20.
- S. fulvipes Scop.**  
Aschaffenburg selten (Oe.). Findberg unter Stein 13. 4. 25. Kahl 26. 4. 26. Hanau 5. 21 (H.). Kahlthal 15. 8. 20. Oberbessenbach 23. 9. 46.
- S. (Staphylinus s. str.) caesareus Ced.**  
Aschaffenburg nicht selten. Steinbachtal 7. 8. 25. Mäusberg bei Wiesenfeld.
- S. erythropterus L.**  
Selten. Stockstadter Wald in Kulturgräben 14. 5. 04. Gailbachtal 12. 9. 52.
- S. olens Müll.**  
Bischberg unter Stein 18. 4. 25. Fasanerie 9. 1896 (Fr.).
- S. tenebricosus Grav.**  
Umgebung von Frankfurt a. M. 1931 (B.). In unserem Gebiet noch nicht nachgewiesen.
- S. ophthalmicus Scop.**  
Häufig auf Wegen.
- S. similis F.**  
Häufig. Sandgrube bei Mainaschaff 23. 2. 26. Haibacher Höhe 27. 4. 08. Karlstadt 28. 3. 26, 25. 10. 42. Kleinostheim 27. 7. 29. Erbig 31. 7. 26. Mäusberg bei Wiesenfeld 28. 8. 20. Im Garten 6. 8. 04. Kalbenstein 26. 9. 26.
- S. brunripes F.**  
Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Karlstadt 16. 5. 29. Wiesenfeld 7. 19. Thüngersheim Ezberg 16. 8. 46. Kahl bei den Emmerichshöfen 14. 9. 50.
- S. fuscatus Grav.**  
Leiderer Feld 3. 1894 (Fr.). Fasanerie unter Steinen 4. 1894 (Fr.). Mainufer. Büchelberg. Kahl Moore 13. 11. 24.
- S. aeneocephalus Deg.**  
Stockstadter Wald 2. 27. Oberbessenbach 15. 4. 41. Waldaschaff 28. 4. 26. Kahl Moore 1. 10. 24. Gailbachtal 12. 9. 52.
- S. picipennis F.**  
Sandgrube bei Mainaschaff in Grasbüscheln 22. 2. 30, 3. 11. 26. Karlstadt Landwehren 17. 3. 29. Ammersfeld bei Aschfeld 21. 4. 47. Pollaschgrund bei Hain i. Sp. 1. 6. 47. Karbach 27. 8. 43.
- S. fulvipennis Er.**  
Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Bahndamm gegenüber Nilkheim 21. 3. 26. Karlstadt 9. 3. 30. Krainberg 19. 3. 26, 27. 7. 46. Aschaffenburg X u. XI. Bischberg 1. 10. 46.

s. *confusus* Baudi.

Bischberg 6. 2. 26. Oberbessenbach 23. 9. 46. Hain i. Sp. Pollaschgrund 19. 10. 47.

**S. ater Grav.**

Höchst a. M. 1908 1 St. (Stock).

**S. pedator Grav.**

Aschaffenburg (Fl.). Karlstadt Haag 12. 6. 38. Klingenberg 3. 8. 08.

**S. (Ocybus Steph.) globulifer Fourcr. (= edentulus Block.)**

Aschaffenburg (Fr.). Bahndamm gegenüber Nilkheim 4. 4. 26. Wiesenfeld 23. 5. 20. Büchelberg 22. 8. 08. Moore bei Großkrotzenburg 1. 10. 35.

**S. compressus Marsh.**

Fasanerie (Fr.). Striet Birkenallee unter Moos 24. 8. 40 (J. S.).

**E m u s Curt.**

**E. hirtus L.**

Auf Misthaufen. Aschaffenburg (Oe.). Klingenberg in einem Garten 11. 5. 48.  
Auf einem Acker hinter dem Städt. Gaswerk 2. 6. 34 (Noll). Bischberg 26. 5. 47  
schwärmend (Elbert).

**O n t h o l e s t e s Glb.**

**O. tessellatus Fourcr. (= nebulosus F.)**

Kleinostheim 11. 5. 35. Schmerlenbacher Wald 6. 1894 (Fr.). Stockstadter Wald  
6. 1894 (Fr.). Erbig 31. 7. 26. Aschaffenburg Ludwigshöhe 3. 10. 26.

**O. murinus L.**

Häufig an Aas. Karlstadt 25. 4. 26. Schönbusch an fauler Bienenwabe mit abge-  
storbenen Drohnenlarven 2. 7. 46 (Noll).

**C r e o p h i l u s Mannh.**

**C. maxillosus L.**

Nicht selten an Aas.

**H e t e r o t h o p s Steph.**

**H. praevius Er.**

Aschaffenburg (Oe.). In hohlem Baum 2. 10. In einem Wühlmausnest 25. 3. 26.  
Lindigwiesen 3. 5. 25. Schönbusch am unteren See gestreift 26. 5. 04.

**H. dissimilis Grav.**

Aschaffenburg nicht häufig (Oe.). Mainufer, kl. Exerzierplatz 12. 2. 05. Kahl  
Moore 7. 2. 26, 3. 11. 04. Schönbusch unter Moos 12. 3. 24.

**H. quadripunctulus Grav.**

Bei Seligenstadt einzeln bei *Formica fuliginosa* (Fr.).

**E u r y p o r u s Er.**

**E. picipes Payk.**

Sehr selten. Kahl Moorwiesen aus Moos gesiebt 14. 4. 11 (S.). Rothenbuch i. Sp.  
2. 4. 35 (J. S.).

**V e l l e i u s Mannh.**

**V. dilatatus F.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Beide fanden den Käfer an ausfließen-

dem Eichensaft (Fr.). Fr. selbst fand die Art bei Miltenberg an einer von Hornissen bewohnten Eiche. 8. 1885. Ein weiteres Stück fand Fr. in der Nähe des Schloßgartens an eine Wand angefliegen 8. 1894. Schönbusch auf dem Speicher des Parkaufsehers Herrn Petermann hing auf einem Dachsparren ein großes Nest von *Vespa crabro*. In dem am Boden liegenden Detritus befanden sich zahlreiche Larven von *Velleius* 23. 10. 24 (Noll). In einem von *Vespa crabro* bewohnten Meisen-Nistkasten 12. 8. 35 (Noll). Im Kahlthal bei der Herrenmühle 30. 6. 26 (Ochs). Pflochsbach aus Hornisnest bei abgestorbenen Hornissen 12. 10. 29 1 St. (St.).

### Q u e d i u s Steph.

#### Qu. brevis Er

Aschaffenburg bei *Formica rufa* (Oe.). Seligenstadt bei *Formica fuliginosa* (Scr.). Striet bei *Formica rufa* (S.). Dettingen (H.).

#### Qu. ventralis Arag.

Mainanlage am alten Hafen mittags 12 Uhr schwärmend 30. 9. 12 (S.).

#### Qu. microps Grav.

Seligenstadt bei *Formica fuliginosa* (Scr.). Auch bei *Lasius brunneus* (Dr. Fuchs).

#### Qu. lateralis Grav.

Aschaffenburg an Pilzen (Oe.). Büchelberg 12. 8. 20. Glattbacher Wald. Godelsberg 14. 10. 04.

#### Qu. longicornis Kr.

Mainufer im Angeschwemmten 2. 1. 26.

#### Qu. ochripennis Mén.

Nicht selten. Schmerlenbacher Wald 21. 6. 28. Krainberg 26. 6. 32. (t. Benick). Obernau 4. 7. 26. Schönbusch V — VII. Steinbachtal 8. 9. 28. An einer Hauswand 27. 9. 12. Bei Glattbach 29. 11. 07.

#### Qu. fulgidus F.

Unter Baumrinde (Fr.). Hanau (H.).

#### Qu. cruentus Ol.

Aschaffenburg (S.).

#### Qu. brevicornis Thoms.

Obernau im Mulm alter Apfelbäume 18. 6. 11. Striet in hohler Buche mit alten Vogelnestern 2. u. 5. 11.

#### Qu. mesomelinus Marsh.

Im Metzgergraben i. Sp. 17. 4. 25, 2. 5. 40. Schmerlenbacher Wald 5. 1893 (Fr.). Fasanerie an Eichensaft 8. 6. 25 und unter Moos 11. 1894 (Fr.). Obernau Moorwiese 27. 11. 38. Kahl Moore 14. 9. 25.

a. Jaeneri Hubenthal

Gailbachtal 1. 3. 05. Mainufer 6. 4. 09. Kahl Moore 3. 6. 04. Erbig 13. 8. 25.

#### Qu. xanthopus Er.

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Schmerlenbacher Wald 21. 4. 05, 30. 10. 04. Metzgergraben i. Sp. 14. 10. 24. Im oberen Aschaffthal 14. 10. 24.

#### Qu. scitus Grav.

Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg Schönbusch in hohler Eiche 17. 11. 40. Obernau links des Mains an alter Weide 27. 11. 38.

- Qu. cinctus Payk.**  
Aschaffenburg Schönbusch. Mainufer (S.). Erbig 8. 2. 26. Gailbachtal 12. 9. 52 2 St.
- Qu. laevigatus Gyll.**  
Aschaffenburg (S.).
- Qu. fuliginosus Grav.**  
Aschaffenburg. Kahl. Stockstadter Wald 2. 27. Im Spessart häufig 26. 7. 18.
- Qu. tristis Grav.**  
Aschaffenburg 21. 2. 26. Seligenstadt (Scr.). Haibacher Höhe 27. 4. 08. Erbig 14. 8. 25. Mainufer. Kahl Moore.
- Qu. picipennis Payk.**  
Erbig 11. 1. 48, 16. 9. 48. Kalmut 10. 10. 52 2 St.  
v. **molochinus Grav.**  
Stockstadter Wald 2. 27, 16. 4. 39, 26. 7. 18 (t. Benick). Kl. Exerzierplatz 6. 6. 11.  
Kahl Moore 16. 4. 22, 16. 8. 40, 10. 9. 26 (t. Benick).
- Qu. ochropterus Er.**  
Bischberg 6. 2. 26. Karlstadt 20. 3. 38 (t. Benick).
- Qu. picipes Mannh.**  
Verbreitet und nicht selten an feuchten Stellen. III VIII IX X XI. Von Oe. noch als selten bei Aschaffenburg, von Scr. als einzeln bei Seligenstadt angegeben.
- Qu. umbrinus Er.**  
Kahl Rand der Moore 14. 4. 11, 10. 9. 26, 18. 11. 24.
- Qu. nigriceps Kr.**  
Aschaffenburg und Seligenstadt (Scr.). Stockstadter Wald 16. 1. 27. Erbig 23. 8. 25.  
Striet 19. 9. 25. Rothenbuch am Breitsee 10. 10. 26. Rückersbacher Schlucht 15.  
10. 31. Büchelberg 10. 11. 26. Sulzbacher Wald 14. 11. 37. Hain i. Sp. 8. 12. 27.
- Qu. humeralis Steph.**  
Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Kahl Moore 1. 11. 04.
- Qu. limbatus Heer.**  
Stockstadter Wald 22. 4. 11. Kahl Moore 16. 4. 22, 19. 9. 25, 28. 11. 24. Sodener  
Wald 19. 12. 26.
- Qu. maurorufus Grav.**  
Stockstadter Wald 18. 4. 24 5 St. Kahl Moore 16. 4. 22, 19. 9. 24 1 St. 28. 11. 24 1 St.  
Sodener Wald 19. 12. 26 4 St. Gailbachtal in feuchtem Moos 8. 12. 40 3 St. (t.  
Benick).
- Qu. nemoralis Baudi.**  
Seligenstadt (Scr.). Gailbachtal. Kalbenstein 30. 8. 25. Kahl Moore 30. 11. 04.
- Qu. fumatus Steph.**  
Fasanerie 13. 2. 08. Hain i. Sp. 14. 4. 22. Kahl Moore.
- Qu. scintillans Grav.**  
Kahl Moore 23. 10. 04.
- Qu. paradisiacus Heer.**  
Babenhausen (Scr.). Heigenbrücken 23. 7. 16.

**Qu. semiaeneus Steph.**

Hanau (H.).

**Qu. attenuatus Gyll.**

Aschaffenburg (Oe.).

**Qu. fulvicollis Steph.**

Kahl Moore 5. 4. 12. Stockstadter Wald 22. 4. 11. Bei Hösbach auf Sumpfwiesen 16. 5. 09.

**Qu. boops Grav.**

Aschaffenburg (Oe.). Im ganzen Gebiet verbreitet. Dettingen 7. 2. 26. Auf dem Erbig 6. 3. 10. Kahl Moore 16. 4. 12, 23. 10. 04, 13. 11. 24. Stockstadter Wald 5. 4. 24, 13. 8. 25. Auf dem Kalbenstein unter Moos 9. 8. 25.

v. Reitteri Grid.

Karlstadt 6. 3. 27. Auf dem Kalbenstein 28. 2. 26.

**Acylophorus Nordm.**

**A. glaberrimus Hbst.**

Seligenstadt am Rand von Tümpeln 26. 7. 08 (Wiltschek). Bei Hanau und Kahl (H.). Spessart 1908, 2 St. (M.).

**Atanygnathus Jakobs (= Tanygnathus Er.)**

**A. terminalis Er.**

Bei Seligenstadt gegen Froschhausen an Tümpeln (Wiltschek). 26. 7. 08. Am gleichen Platz 8. 08 (H.). Spessart 1908 und 1911 zahlreich (M.).

## Habrocerinae

**Habrocerus Er.**

**H. capillaricornis Grav.**

Aschaffenburg (Oe.). Schönbusch an faulen Schwämmen 20. 9. 08. Sodener Wald an Schwämmen 13. 10. 23.

## Trichophyinae

**Trichophya Mannh.**

**T. pilicornis Gyll.**

Von Dr. M. Schmidt bei Frankfurt a. M. gesammelt (L. v. Heyden).

## Tachyporinae

**Mycetoporus Mannh.**

**M. Mulsanti Gglb.**

Kahl (H.).

**M. Baudueri Muls. Rey.**

Stockstadter Wald 5. 04. Hinter Damm 11. 10. 04. Kahl Moore.

**M. piceolus Rey.**

Lößwände hinter Damm 11. 10. 24.

**M. brunneus Marsh.**

Aschaffenburg (Oe.). In hohlem Apfelbaum 2. 20. Erbig 15. 10. 27. Stockstadter Wald 15. 11. 25.

**M. longulus Mannh.**

Aschaffenburg (D. N.). Striet 1. 3. 36. (t. Benick).

**M. bimaculatus Lac.**

Aschaffenburg (D. N.).

**M. ruficornis Kr.**

Seligenstadt einzeln (Scr.).

**M. clavicornis Steph.**

Aschaffenburg (D. N.). Sodener Wald 30. 3. 07. Kahl Moore 14. 4. 11.

v. Reichei Pand.

Kahl Moore.

**M. splendens Marsh.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Obernauer Wald 12. 3. 27. Sandgrube bei Mainaschaff 19. 4. 37. Karlstadt 25. 4. 26. Stockstadter Wald 18. 4. 24, 8. 6. 23, 21. 11. 25. Kahl 23. 10. 04.

**M. rufescens Steph.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Stockstadter Wald 8. 11. 25.

**M. punctus Gyll.**

Aschaffenburg (Oe.). Stockstadter Wald an Sümpfen 18. 4. 24.

v. plagiellus Rtt.

Schönbusch unter Moos 12. 3. 24.

**M. (Ischnosomata E. Strand) longicornis Mkl.**

Aschaffenburg (D. N.).

**M. (I.) splendidus Grav.**

Aschaffenburg (Oe.). Stockstadter Wald 22. 4. 11. Sodener Wald 3. 11. 04.

**Bryoporus Kr.**

**B. rufus Er.**

Aschaffenburg (Oe.). Im Spessart 7. 5. 16.

**B. cernuus Grav.**

Aschaffenburg selten (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Bei Oberbessenbach 16. 5. 48. Hain Seebachtal 6. 11. 27. Hanau 28. 3. 09. (H.).

**Bolitobius Mannh.**

**B. exoletus Er.**

Fasanerie an Agaricus 10. 1894 (Fr.). Schmerlenbacher Wald (S.).

**B. trinotatus Er.**

Fasanerie an Agaricus 11. 1894 (Fr.). Godelsberg an ausfließendem Birkensaft 4. 1895 (Fr.). Gailbachtal 3. 05.

**B. thoracicus F. (= pygmaeus F.)**

Stockstadter Wald 5. 4. 24, 3. 10. 07. Fasanerie an Agaricus 6. 1894 (Fr.). Hanauer Straße in Boletus 10. 1894 (Fr.). Erbig 10. 11. 26.

**B. lunulatus L.**

An Pilzen. Rothenbuch i. Sp. 12. 4. 25. Fischerhecke an Agaricus 5. 1894 (Fr.).

**Bryocharis Lac.**

**B. analis Payk.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Stockstadter Wald 26. 3. 39. Sodener Wald 9. 3. 41. Karlstadt auf den Landwehren unter Moos 28. 5. 26, 10. 9. 31. Wendelberg 10. 11. 26. Kahl unter Laub 5. 4. 12. Hain i. Sp. 8. 5. 32.

**B. cingulata Mannh.**

Stockstadter Wald 20. 3. 27. Weiler i. Sp. 7. 4. 28. Hain i. Sp. 21. 4. 28. Kahl Moore 14. 4. 11, 18. 11. 08.

**B. formosa Grav.**

Aschaffenburg (Fl.). Stockstadter Wald 16. 1. 27. Rückersbacher Schlucht 22. 2. 25. Glattbacher Wald 24. 3. 05. Karlstadt 5. 5. 29. Striet aus Moos gesiebt 19. 10. 26

**B. inclinans Grav.**

Aschaffenburg (Fl. u. D. N.). Stockstadter Wald 25. 9. 04. Kahl Moore 13. 10. 04.

**Conosoma Kraatz.**

**C. litoreum L.**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.). Schmerlenbacher Wald 3. 5. 08. Hain i. Sp. Seebachtal aus dürrem Reisig. Kalmut aus Kiefernwellen 21. 6. 25. Kleinostheim an Schwämmen 14. 10. 07.

**C. pubescens Payk. (= testaceum F.)**

Kahl 16. 4. 22. Aschaffenburg an Schwämmen 15. 9. 06. Erbig 8. 10. 26. Fischerhecke auf Sumpfwiese 7. 10. 42. Schmerlenbacher Wald an Agaricus 11. 1894 (Fr.). Mainufer unter Stein 10. 1894 (Fr.).

**C. immaculatum Steph.**

Aschaffenburg (Oe.). Stockstadter Wald 18. 10. 24, 8. 7. 04. Sodener Wald 17. 10. 23.

**C. pedicularium Grav.**

Aschaffenburg (Oe.). Büchelberg an Schwämmen 15. 9. 08. Schönbusch 9. 23.

**C. bipunctatum Grav.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt unter Weidenrinde (Scr.). Schmerlenbacher Wald 15. 4. 05. Krausenbach i. Sp. an morschem Eichenholz (J. S.). Am Saft eines Eichenstrunkes 6. 6. 39.

**Tachyporus Grav.**

**T. nitidulus F.**

Aschaffenburg unter Baumrinde 1. und 3. 1894 (Fr.). Haibacher Höhe 27. 4. 08. Mainhecken 9. 4. 09. Mäusberg 8. 20. Auf dem Steiger bei Hösbach 20. 9. 25. Kahl 23. 10. 04. Mainwiesen gegenüber Obernau 13. 10. 43.

**T. macropterus Steph.**

Aschaffenburg (Oe.). Lößhänge hinter Damm 21. 10. 24.

**T. pusillus Grav.**

Kahl 23. 11. 04. Glattbacher Wald. Hanau 20. 2. 10. (Kaufmann).

**T. transversalis Grav.**

Kahl Moore 3. 11. 04 (S.).

**T. ruficollis Grav.**

Aschaffenburg (Oe.). Gartenberg unter Moos 8. 2. 25. Fasanerie 5. 1893 (Fr.).  
Hain i. Sp. 12. 8. 47.

**T. atriceps Steph.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt im Genist (Scr.). Oft bei *Formica fuliginosa*  
(Fr.). Fasanerie 13. 2. 08. Schönbusch unter Moos 10. 3. 24.

**T. chrysoelinus L.**

Häufig.

**T. hypnorum F.**

Häufig.

**T. solutus Er.**

Fasanerie 5. 1894 (Fr.). Stockstadter Wald 8. 7. 05. Karlstadt 9. 8. 25.

**T. laticollis Luze. (= formosus Matth.)**

Fasanerie am Saft eines Eichenstrunkes 29. 2. 43. Kahl 23. 11. 04.

**T. obtusus L.**

Aschaffenburg (Oe.). Exerzierplatz unter Rinde 1. 1894 (Fr.). Fasanerie unter Platanenrinde 3. 1894 (Fr.). Schmerlenbacher und Glattbacher Wald. Kahl Moore. Krainberg 15. 5. 47.

**L a m p r i n u s Heer.**

**L. erythropterus Panz.**

Seligenstadt (Scr.) 1863.

**T a c h i n u s Grav.**

**T. lignorum L. (= flavipes F.)**

Häufig.

**T. proximus Kr.**

Aschaffenburg (D. N.). Hanau in faulen Baumschwämmen 6. 21 (H.).

**T. humeralis Grav. (= rufescens Muls. Rey.)**

Nicht selten in faulen Schwämmen und an Menschenkot (Oe.). Godelsberg in Schwämmen 14. 10. 06. Schönbusch an Vogelaas 6. 10. 04. Glattbacher Wald an Schwämmen 3. 11. 04.

**T. subterraneus L.**

Aschaffenburg selten (Oe.). An einer Hauswand 15. 3. 05. Fischerhecke unter Laub 2. 4. 11. Godelsberg an ausfließendem Baumsaft 4. 1895 (Fr.). Johannesberg 24. 9. 13.

**T. bipustulatus F.**

An ausfließendem Eichensaft. Aschaffenburg selten (Oe.).

**T. scapularis Steph.**

Seligenstadt (Scr.).

**T. pallipes Grav.**

Aschaffenburg Hanauer Straße 29. 9. 07.

**T. fimetarius Grav.**

Aschaffenburg häufig (Oe.). Auf Weißdornblüten und im Mist (Fr.). Fasanerie



5. 1894 (Fr.). Mainufer 19. 5. 12. Krainberg 21. 5. 33. Schönbusch von Kiefer 2. 6. 42. Kalmut 14. 6. 25. Erbig 10. 11. 26.

**T. rufipes Deg.**

Aschaffenburg an Misthaufen und faulen Pflanzen nicht selten (Oe.). Rückersbacher Schlucht 20. 2. 25. Haibacher Höhe 27. 4. 08.

**T. laticollis Grav.**

Seligenstadt (Scr.). Mainufer. Stockstadter Wald 13. 9. 25.

**T. marginellus F.**

Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg (Fl.).

**T. corticinus Grav. (= collaris Grav.)**

Aschaffenburg häufig (Oe.). Hinter Damm 1. 3. 27, 29. 12. 11. Mainufer unter Steinen 19. 4. 23.

**T. rufipennis Gyll.**

Fasanerie 13. 2. 08 (S.).

**T. elongatus Gyll.**

Aschaffenburg (Oe.). Im Wald bei Krausenbach i. Sp. schwärmend 27. 5. 39 (J. S.).

**L a m p r i n o d e s Luze**

**L. saginatus Grav.**

Hain i. Sp. Pollaschgrund 9. 5. 48 (J. S.). (t. Loße v. Horion).

**L. haematopterus**

Hain i. Sp. Pollaschgrund 18. 9. 49 (J. S.). (t. Loße).

**L e u k o p a r y p h u s Kr.**

**L. silphoides L.**

Aschaffenburg selten (Oe.). Sodener Wald (S.). Oberhalb Sailauf 30. 4. 50.

**H y p o c y p t u s Mannh.**

**H. longicornis Payk.**

Aschaffenburg (Oe.). Schmerlenbacher Wald 10. 2. 05. Erbig 3. 10. Hain i. Sp. Seebachtal 14. 4. 22. Schmerlenbacher Wald 5. 1894 (Fr.). Sodener Wald 17. 10. 23. Kahl 8. 12. 04. häufig.

**H. laeviusculus Mannh.**

Aschaffenburg (Fl.).

**H. discoideus Er.**

Aschaffenburg (Fl.).

**H. seminulum Er.**

Aschaffenburg (Oe.). Godelsberg 6. 5. 05 (S.).

## Aleocharinae

**D e i n o p s i s Matth. (= Dinopsis Er.)**

**D. erosa Steph.**

Aschaffenburg (Fl.). Mainhecken bei der früheren Schiffswerft 21. 3. 08 häufig (23 St.).

## **G y m n u s a Grav.**

### **G. brevicollis Payk.**

Kahl Moore 28. 11. 04 (S.). Stockstadt a. M. Sumpfwiese an der Gersprenz nächst dem Sportplatz 8. 11. 26.

## **M y l l a e n a Er.**

### **M. dubia Grav.**

Aschaffenburg (Oe. u. Fl.). Gersprenzufer 18. 4. 24. Rand der Kahler Moore.

### **M. intermedia Er.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Mainhecken 4. 08, 28. 10. 04. Mainwiesen gegenüber Obernau 13. 10. 42. Kahl Moore 1. 11. 05. Schönbusch.

### **M. Kraatzi Sharp.**

Seligenstadt (Scr.).

### **M. brevicornis Matth.**

Aschaffenburg (Fl.). 4. 8. 09 (S.).

### **M. gracilis Matth.**

Kahl mehrfach 1910 (Hepp).

### **M. minuta Grav.**

Aschaffenburg (D. N.). (Scr.). Mainufer. Kahl 16. 4. 22, 28. 11. 24, 8. 12. 04.

## **P r o n o m a e a Er.**

### **P. rostrata Er.**

Stockstadter Wald (Oe.). Striet. Lettlöcher (Fl.). Mainufer. Kalmut bei Homburg a. M. 28. 6. 25. Wenighösbach im Mulm einer hohlen Buche 12. 12 (J. S.).

## **O l i g o t a Mannh.**

### **O. flavicornis Boisd.**

Aschaffenburg (Oe.). Gailbachtal 10. 4. 05.

### **O. granaria Er.**

Aschaffenburg (Oe. u. Scr.).

### **O. atomaria Er.**

Schmerlenbacher Wald 20. 2. 05. Gailbachtal 10. 4. 05.

### **O. pusillima Grav.**

Aschaffenburg (Oe.). Exerzierplatz unter Platanenrinde 2. 1894 (Fr.). Gailbachtal 10. 4. 05. Mainufer bei Nilkheim 21. 9. 05.

## **H y g r o n o m a Er.**

### **H. dimidiata Grav.**

Aschaffenburg (Oe.). Nicht selten im Schilf. Kahl 29. 4. 25, 18. 11. 24. Schönbusch. Sodener Wald.

## **B r a c h i d a Muls. Rey.**

### **B. exigua Heer.**

Aschaffenburg (Oe.). Kalbenstein bei Gambach a. M. 18. 2. 26. Breunsberg aus Moos gesiebt 26. 2. 28. Karlstadt bei den Landwehren aus Moos gesiebt 6. 3. 27. Wendelberg 25. 10. 25.

## **Encephalus Westw.**

### **E. complicans Westw.**

Aschaffenburg (Fl.). Stockstadter Wald unter Laub mehrfach 12. 4. 08 (S.).

## **Gyrophæna Mannh.**

### **G. pulchella Heer.**

Aschaffenburg (Fl.). Seligenstadt an faulenden Schwämmen (Scr.). Schönbusch 20. 9. 08.

### **G. affinis Sahlbg.**

An Schwämmen eines Hausgartens dahier 6. 1894 (Fr.). Findberg an verpilzter Eichenborke 26. 7. 25.

### **G. nana Payk.**

Aschaffenburg (Oe.). Mainhecken 3. 10. Fasanerie 12. 7. 04. Lindig 12. 7. 04. Schmerlenbacher Wald 18. 8. 08.

### **G. gentilis Er.**

Aschaffenburg (D. N.).

### **G. fasciata Marsh.**

Fasanerie an Agaricus 11. 1894 (Fr.).

### **G. lucidula Er.**

Aschaffenburg (Oe.).

### **G. minima Er.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Schmerlenbacher Wald 18. 8. 08.

### **G. strictula Er.**

Hanau Gr. Bulau 4. 51 (Dehnert, t. Wüsthoff).

### **G. polita Grav.**

Aschaffenburg in Baumschwämmen (Scr.).

## **Agaricophæna Reitt.**

### **A. boleti L.**

Aschaffenburg (S.).

## **Rhopalocerina Rtt.**

### **R. clavigera Scrib.**

Seligenstadt 2 St. (Scr.).

## **Placusa Er.**

### **P. complanata Er.**

Kahl 26. 4. 40.

### **P. depressa Maekl. (= humilis Er.)**

Seligenstadt (Scr.).

### **P. pumilio Grav.**

Unter Baumrinde besonders der Birken. Sehr selten. Fischerhecke (Oe.). Einzeln bei Seligenstadt (Scr.).

### **P. tachyporoides Waltl. (= infima Er.)**

Einzeln unter Baumrinde und an ausfließendem Eichensaft (Scr.). Aschaffenburg

(D. N.). Gailbachtal 10. 4. 05. Hafenlohrthal 29. 4. 34. Striet unter Kiefernrinde 11. 8. 24.

**P. adscita Er.**

Bei Babenhausen an ausfließendem Eichensaft (Scr.).

**H o m a l o t a Mannh.**

**H. plana Gyll.**

Schmerlenbacher Wald unter Buchenrinde 2. 4. 11. Bei Glattbach unter Nußbaumrinde bei Xyleborus Saxesenii 6. 11. 07.

**A n o m o g n a t h u s Gem. Har. (= Thectura Thoms.)**

**A. cuspidatus Er.**

Aschaffenburg (D. N.). Unter Baumrinde nicht selten. Striet unter Eichenrinde 19. 3. 16. Schmerlenbacher Wald 2. 4. 11. Hain i. Sp. unter Eichenstrunkrinde 27. 4. 24. Unter Kiefernstrunkrinde 5. 4. 24. Kleinostheim unter Kastanienrinde 23. 10. 07.

**S i l u s a Er. (= Stenusa Kraatz.)**

**S. rubra Er.**

Aschaffenburg (Scr.).

**S. rubiginosa Er.**

In Schwämmen und an ausfließendem Baumsaft sehr selten. Stockstadter Wald (Oe. u. Scr.). Kahler Moore aus Moos gesiebt 8. 12. 04 (S.).

**L e p t u s a Kr.**

**L. fumida Er. (= haemorrhoidalis Heer.)**

Mainhecken 3. 08. Striet in Hohлтаubennest 12. 09.

**L. ruficollis Er.**

Aschaffenburg (D. N.). Fasanerie unter Eichenrinde 25. 11. 23. Schmerlenbacher Wald unter Moos 2. 10 und 1912. Metzgergraben i. Sp. 20. 4. 26.

**L. pulchella Mannh. (= angusta Aubé)**

Kleinheubach in hohler Pappel 3. 6. 12, 12. 09.

**E u r y u s a Er.**

**E. optabilis Heer (= laticollis Heer)**

Bei Obernau in hohlem Apfelbaum 2. 1910, 20. 3. 11, 12. 1912 (S.). Mäusberg bei Wiesenfeld 4. 10. 53.

**E. sinuata Er.**

Aschaffenburg (Fl.). In hohlem Apfelbaum 2. 1920, 4. 1917. Kleinheubach in hohler Pappel 5. 12. Feldkahler Höhe in morschem Nußbaum 3. 3. 48 2 St. (J. S.).

**B o l i t o c h a r a Mannh.**

**B. lucida Grav.**

Aschaffenburg (D. N.).

**B. lunulata Payk.**

Aschaffenburg (Oe.). Weiler i. Sp. 11. 4. 26. Kleinheubach in hohler Pappel 5. 12. Kleinostheim im Nest einer Rauchschnalbe 12. 11. 25.

**B. Mulsanti Sharp.**

Bei Rohrbrunn 22. 6. 22 (J. S.).

**B. bella Maerk.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Wendelberg 10. 11. 26 (t. Benick.).

**B. obliqua Er.**

Bei Seligenstadt in Mehrzahl in Baumschwämmen (Scr.). Schönbusch an Eichenschwämmen 27. 6. 24, 20. 7. 24.

**A u t a l i a Steph.**

**A. impressa Ol.**

Fischerhecke in Pilzen 5. 1894 (Fr.). Mäusberg bei Wiesenfeld 8. 20. Schmerlenbacher Wald an Schwämmen Herbst 1901. Fasanerie an Agaricus 11. 1894 (Fr.).

**A. rivularis Grav.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

**C o r d a l i a Jacobs. (Cardiola Muls. Rey.)**

**C. obscura Grav.**

Häufig. Johannesberg 3. 1894 (Fr.). Aschaffenburg 23. 4. 08. Fasanerie unter Steinen bei Ameisen 4. 1894 (Fr.). Erbig 8. 10. 26. Kahl Moore 13. 11. 24.

**F a l a g r i a Mannh.**

**F. sulcata Payk.**

Häufig. Kahl Rand der Moore 7. 2. 26. Schönbusch 10. 04. Exerzierplatz unter Rinde 11. 1894 (Fr.).

**F. sulcatula Grav.**

Aschaffenburg (Oe.). Moore bei Großkrotzenburg am Bach 28. 11. 24.

**F. thoracica Curt.**

Aschaffenburg (Oe.). Kleinheubach in hohler Pappel 10. 6. 12. Mäusberg bei Wiesenfeld 7. 9. 35.

**F. nigra Grav.**

Aschaffenburg (Oe.). Stockstadter Wald Gersprenzwiesen 2. 27, 12. 4. 04, 18. 4. 24, 5. 3. 10 (S.). Sumpf bei Station Kleinostheim 23. 9. 05. Haibacher Höhe aus Haufen von faulem Kartoffelkraut gesiebt.

**T a c h y u s a Er.**

**T. (Thinonoma Thoms.) atra Grav.**

Aschaffenburg (Oe.). Bei Oberbessenbach 19. 3. 22. Kahl Moore 8. 9. 07, 1. 11. 05. Stockstadt a. M. Gersprenzufer 5. 11. 26.

**T. (Ischnopoda Thoms.) umbratica Er.**

Aschaffenburg selten an Ufern (Oe.).

**T. (Cathusya Muls. Rey.) scitula Er.**

Aschaffenburg selten (Oe.). Seligenstadt am Mainufer (Scr.).

**T. constricta Er.**

Schönbusch (Oe.). Striet Steinbachufer 16. 5. 24. Stockstadt a. M. Gersprenzufer 30. 7. 16.

**T. (Tachyusa s. str.) coarctata Er.**

Aschaffenburg (Oe. u. S.).

**T. (Caliusa Muls. Rey.) balteata Er.**

Aschaffenburg (Oe.).

**G n y p e t a Thoms.**

**G. carbonaria Mannh.**

Aschaffenburg (Oe.). Bei Oberbessenbach 19. 3. 12. Mainhecken 5. 4. 09. Leiderer See 18. 4. 07.

**G. ripicola Kiesw.**

Aschaffenburg (S.).

**G. velata Er.**

Höchst a. M. 1901 (B.).

**D a d o b i a Thoms.**

**D. immersa Er.**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.). Steinbachtal unter Eichenrinde 19. 3. 16. Wiesenfeld bei Lohr 3 St. 1920 (S.) (t. Benick).

**S c h i s t o g l o s s a Er.**

**Sch. viduata Er.**

Kahl Moore 6. 4. 22, 13. 11. 24.

**Sch. gemina Er.**

Aschaffenburg (Oe. u. S.). Seligenstadt (Scr.).

**Sch. Aubéi Bris.**

Schönbusch 26. 5. 04 (t. Benick). Kahl 3. 11. 04.

**C a l l i c e r u s Grav.**

**C. obscurus Grav.**

Aschaffenburg (Scr.).

**A m i s c h a Thoms.**

**A. analis Grav.**

Aschaffenburg in hohlem Apfelbaum 1. 3. 09. Schmerlenbacher Wald 3. 5. 08. Kahl Moore 13. 11. 04. Nach Fr. unter Steinen und bei *Formica fuliginosa*.

**N o t o t h e c t a Thoms.**

**N. flavipes Grav.**

Aschaffenburg (D. N.). Dettingen (H.).

**N. confusa Maerk.**

Aschaffenburg (D. N.). Seligenstadt (Scr.) 1863.

**N. anceps Er.**

Aschaffenburg (D. N.). Kahl (S.). Dettingen (H.).

**S i p a l i a Muls. Rey. (= Geostiba Thoms.)**

**S. circellaris Grav.**

Exerzierplatz unter Platanenrinde 1. 1894 (Fr.). Rückersbacher Schlucht 22. 3. 25. Stockstadter Wald 5. 4. 24. Hain i. Sp. 14. 4. 22. Kahl 11. 28.

**A l a o b i a** Thoms.

**A. scapularis** Sahlbg. (= *ochracea* Er.)

Aschaffenburg (D. N.).

**A t h e t a** Thoms.

**A. (Dilacra** Thoms.) *luteipes* Er.

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

**A. (Dacrila** Muls Rey.) *fallax* Kr.

Höchst (1904 Enkheim) (1897 Sattler).

**A. (Glossola** Fowl.) *gregaria* Er.

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

**A. (Alloeonota** Thoms.) *insecta* Thoms.

Höchst Niddagenist (B.).

**A. (Disopora** Thoms.) *languida* Er.

Aschaffenburg (Oe.).

**A. (D.) longicollis** Muls. Rey.

Höchst a. M. Niddagenist 1917 (B.).

**A. (Hygroecia** Muls. Rey.) *palustris* Kiesw.

Aschaffenburg (D. N.). Unter alter Nußbaumrinde 1. 7. 12 (S.).

**A. (H.) terminalis** Grav.

Höchberg bei Würzburg am Schwemmsee (Zwecker).

**A. (H.) Gyllenhalii** Thoms.

Aschaffenburg (D. N.).

**A. (H.) luridipennis** Mannh.

Seligenstadt (Scr.).

**A. (H.) elongatula** Grav.

Stockstadter Wald 5. 4. 24. Kahl am Langen See 19. 4. 25. Am Schöllennmüllersee  
6. 1893 (Fr.).

**A. (H.) melanocera** Thoms.

Kahl Moore 5. 4. 12.

**A. (H.) volans** Scriba.

Fasanerie 13. 2. 08.

**A. (H.) obtusangula** Joy.

Aschaffenburg 2 St. (S.).

**A. (H.) debilis** Er.

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Stockstadter Wald 5. 5. 24.

**A. (H.) deformis** Kraatz (= *complana* auct.)

Fasanerie 4. 1886 (S.) (t. Benick).

**A. (Dinaraea** Thoms) *angustula* Gyll.

Nicht selten. Johannesberg unter Stein 3. 1894 (Fr.). Fischerhecke unter Stein  
3. 1894 (Fr.) 6. 3. 10. Kahl 15. 5. 04. Mäusberg bei Wiesenfeld 28. 8. 20.

**A. (D.) aequata** Er.

Aschaffenburg (Oe.). Rückersbacher Schlucht 22. 2. 23, 3. 5. 35

- A. (D.) linearis Thoms.**  
Aschaffenburg Mainhecken 3.08. Kahl Moore 22. 10. 04.
- A. (D.) arcana Er.**  
Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.).
- A. (Pachnida Er.) nigella Er.**  
Kahl Moore 16. 4. 22, 28. 11. 24.
- A. (Plataraea Thoms.) nigrifrons Er. (= melanocephala Heer)**  
Höchst a. M. Niddafer 1903 (B.).
- A. (P.) brunnea F.**  
Fasanerie unter Steinen 4. 1894 (Fr.). In faulem Eichenholz 24. 3. 22. In der Pappelallee 6. 15. Rothenbuch 11. 4. 36.
- A. (Enalodroma Thoms.) hepatica Er.**  
Aschaffenburg (Oe. u. S.). Hanau, Gr. Bulau 4. 52 (Dehnert t. Wüsthoff).
- A. (Bessobia Thoms.) oculata Er.**  
Aschaffenburg (Oe.).
- A. (B.) fungivora Thoms.**  
Höchst a. M. 1 St. (Stock).
- A. (Anopleta M. R.) corvina Thoms.**  
Schmerlenbacher Wald (S.).
- A. (Traumoecia Muls. Rey.) angusticollis Thoms.**  
Schmerlenbacher Wald. Unter alter Nußbaumrinde 1. 7. 12. Unter Platanenrinde 16. 2. 05.
- A. (Microdota Muls. Rey.) palleola Er.**  
Aschaffenburg in Pilzen, besonders an Boletus (Oe.).
- A. (M.) inquinula Er.**  
Aschaffenburg in Kuhmist (Oe.).
- A. (M.) liliputana Bris.**  
Kahl aus Genist (B.).
- A. (M.) talpa Heer.**  
Aschaffenburg bei Formica rufa (Oe.).
- A. s. str. Gglb. nigricornis Thoms.**  
Aschaffenburg (Scr.). Schönbusch 20. 3. 24, 27. 4. 25 im Detritus eines auf einem Speicher befindlichen Hornisnestes.
- A. Harwoodi Will.**  
Striet aus Baummulm.
- A. divisa Maerk.**  
Aschaffenburg (D. N.). Stockstadter Wald 4. 1881 (Fl.).
- A. autumnalis Er.**  
Aschaffenburg (D.).
- A. oblita Er.**  
Aschaffenburg (Oe.). An Pilzen und bei Formica fuliginosa (Fr.).



- A. coriaria Kr.**  
Aschaffenburg (D. N.). Seligenstadt (Scr.). Kleinostheim im Schwamm eines Apfelbaumes 17. 7. 24. Fasanerie unter Fichtenrinde bei *Pityogenes chalcographus* (t. Benick). Am Saft eines Eichenstrunkes 24. 5. 39 (t. Benick).
- A. gagatina Baud.**  
Kahl 9. 10. 04. Aschaffenburg (S.).
- A. myrmecobia Kr.**  
Aschaffenburg (D. N.). Hain i. Sp. unter Fichtenreisig 2. 7. 22.
- A. sodalis Er.**  
Aschaffenburg (Oe.). An Baumschwämmen und bei *Formica fuliginosa* (Fr.). Stockstadter Wald 22. 4. 21. Schmerlenbacher Wald.
- A. pallidicornis Thoms.**  
Fasanerie an Pilzen 13. 2. 08.
- A. nigrifulva Grav.**  
Seligenstadt (Scr.). Damm im Fluge gefangen 10. 1894 (Fr.).
- A. inoptata Sharp. (= crassicornis F.)**  
Stockstadter Wald 22. 4. 11. Schönbusch. Hörstein 4. 51 (Dehnert t. Wüsthoff).
- A. Britanniae Bernh. (= fulvipennis Muls. Rey.)**  
Schönbusch an Vogelaas 4. 10. 04.
- A. pilicornis Thoms.**  
Hain i. Sp. Seebachtal unter Eichenstrunkrinde 21. 4. 24 (t. Benick). An das Museum in Lübeck gegeben.
- A. xanthopus Thoms.**  
Aschaffenburg (S.).
- A. hypocrita Sharp.**  
Fasanerie an Eichensaft 26. 4. 40 (t. Benick).
- A. trinotata Kr.**  
Aschaffenburg (D. N.).
- A. euryptera Steph.**  
Fasanerie an Eichensaft 4. 6. 25. Kalmut 28. 11. 25.
- A. (Hypatheta Fenyés) Pertyi Heer.**  
Aschaffenburg an Apfelbaumsaft 19. 5. 09.
- A. (H.) incognita Sharp.**  
Hain i. Sp. unter Fichtenreisig 21. 5. 24.
- A. (H.) castanoptera Mannh.**  
Aschaffenburg (D. N. u. S.).
- A. (Liogluta Thoms.) pagana Kr.**  
Stockstadter Wald 12. 4. 08.
- A. (L.) granigera Kiesw.**  
Kahl Moore 23. 11. 04.

- A. (L.) longiuscula Grav.**  
Höchst a. M. (B.).
- A. (L.) nitidula Kr.**  
Aschaffenburg (S.). Erbig 8. 10. 26.
- A. (L.) oblongiuscula Sharp. (= oblonga Er.)**  
Aschaffenburg Schmerlenbacher Wald 9. 6. 05.
- A. (Megista Muls. Rey.) graminicola Grav.**  
Aschaffenburg (Oe.).
- A. (Dimetrota Muls. Rey.) cadaverina Bries.**  
Aschaffenburg (S.).
- A. (D.) livida Muls. Rey.**  
Fasanerie 13. 2. 08. Schmerlenbacher Wald. Kahl.
- A. (D.) marcida Er.**  
Fasanerie an Agaricus 11. 1894 (Fr.). Auch an Aas (Fr.). Sodener Wald 4. 10. 08.  
Schmerlenbacher Wald 30. 10. 04, 8 St.
- A. (D.) nigripes Thoms.**  
Höchst a. M. 1921, 1 St. (t. Heymes) (B. 1930).
- A. (Badura Muls. Rey.) macrocera Thoms.**  
Höchst a. M. 1 St. (Sattler) (t. Hubenthal).
- A. (B.) parvula Mannh.**  
Schmerlenbacher Wald.
- A. (Datomicra Muls. Rey.) dadopora Thoms.**  
Aschaffenburg Mainufer.
- A. (D.) sordidula Er.**  
Aschaffenburg (Oe. u. S.).
- A. (D.) celata Kr.**  
Aschaffenburg Exerzierplatz unter Rinde 11. 1894 (Fr.). Auch an Aas nicht selten (Fr.).
- A. (D.) nigra Kr.**  
Aschaffenburg unter alter Nußbaumrinde 1. 6. 12 (t. Benick). Stockstadter Wald unter Kartoffelkraut 17. 9. 05 (t. Benick).
- A. (Chaedita Muls. Rey.) longicornis Grav.**  
Aschaffenburg (Oe.). In Mist, unter Moos und faulenden Vegetabilien (Fr.).
- A. (Coprothassa Thoms.) sordida Marsh.**  
Aschaffenburg (Oe.). Meist an Pilzen (Fr.). Bei Stockstadt a. M. in Kartoffelkrauthaufen 17. 9. 08.
- A. (Acrotona Thoms.) pygmaea Grav.**  
Aschaffenburg (D. N.). Mainufer (S.).
- A. (A.) aterrima Grav.**  
Aschaffenburg (Oe. u. D. N.). Mainufer (S.).
- A. (A.) parva Sahlbg. (= parvula Mannh.)**  
Aschaffenburg (D. N.). An Aas und im Mist (Fr.). Kahl 14. 4. 11, 29. 11. 07.

**A. (A.) orphana Er.**

Aschaffenburg (Oe.). An sumpfigen Stellen unter Schilf (Fr.). Seligenstadt im Genist (Scr.). Erbig 3. 10. Haibacher Höhe 27. 4. 08. Kahl Moore 13. 11. 04.

**A. (A.) fungi Grav.**

Nicht selten unter faulenden Pflanzen und Pilzen (Fr.). Auch bei Formica fuliginosa (v. H.). Exerzierplatz unter alter Platanenrinde (Fr.). Fischerhecke unter Stein 3. 1894 (Fr.). Mainwiesen gegenüber Obernau 13. 10. 42.

**A. (A.) laticollis Steph.**

Aschaffenburg unter Gras und im Mist (Scr.). Mainhecken 3. 10. Kahl 23. 10. 04.

**A. (A.) subsinuata Er.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

**T a x i c e r a Muls. Rey.**

**T. deplanata Grav.**

Nach D. N. von Scr. bei Seligenstadt gefunden.

**M e g a l o s c a p a Seidl.**

**M. punctipennis Kr.**

Seligenstadt am Rand eines Waldbaches gestreift 1863 (Scr.).

**A l i a n t a Thoms.**

**A. incana Kr.**

Aschaffenburg (D.N.). Kahl Moore in Stengeln von Typha 19. 9. 08, 28. 11. 24.

**P y g n o t a Muls.**

**P. nidorum Thoms. (= paradoxa Rey.)**

Höchst a. M. in Hamsterbau 1908 (B.) (t. Bernh.).

**T h a m i a r a e a Thoms.**

**Th. cinnamomea Grav.**

Aschaffenburg (D. N.). Fasanerie an Eichensaft 4. 6. 25, 30. 7. 52. In alter Eiche bei Ameisen 31. 5. 52.

**Th. hospita Maerk.**

Stockstadter Wald an Eichensaft 21. 4. 25. Striet bei Formica rufa 28. 8. 26.

**A s t i l b u s Steph.**

**A. canaliculatus F.**

Sehr häufig unter Steinen und Laub.

**Z y r a s Steph.**

**Z. collaris Payk.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Sodener Wald. Kahl Moore 5. 4. 18, 11. 9. 07.

**Z. Haworthi Steph.**

Aschaffenburg (Oe.).

**Z. (Pella Steph.) funestus Grav.**

Bei Formica fuliginosa nicht selten. Fischerhecke unter Stein 3. 1894 (Fr.). Aschaffenburg 14. 3. 37. Kahl 14. 4. 11. Rothenbuch i. Sp. 21. 4. 36, 17. 5. 36.

**Z. (P.) cognatus Maerk.**

Aschaffenburg bei *Formica fuliginosa* (Oe.). Hanau 29. 3. 07 (H.). Rothenbuch i. Sp. bei *Lasius niger* 22. 3. 36, 11. 4. 36. Mainhecken 9. 4. 08. Striet 13. 4. 35. Stockstadter Wald 17. 4. 28. Ellerwald 14. 5. 26. Kahl 21. 7. 35.

**Z. (P.) humeralis Grav.**

Aschaffenburg bei *Formica fuliginosa* (Oe.). Auch unter Moos im Walde (Fr. u. S.). Rothenbuch i. Sp. 17. 5. 36. Karlstadt 14. 6. 42, 4. 10. 36.

**Z. (P.) similis Maerk.**

Seligenstadt bei *Formica fuliginosa* (Scr.). Aschaffenburg (Oe.) (Fl.).

**Z. (P.) limbatus Payk.**

Aschaffenburg (Oe.). Kahl Moore 14. 3. 11. Am Mainufer 14. 4. 08. Büchelberg 27. 4. 04. Bei Glattbach unter Stein 27. 6. 04.

**Z. (*Myrmedonia* Thoms.) lugens Grav.**

Aschaffenburg bei *Formica fuliginosa* (Oe.).

**Z. (M.) laticollis Maerk.**

Aschaffenburg (Oe. u. S.). Rothenbuch i. Sp. 2. 4. 39.

**Z. (*Myrmoecia* Muls. Rey.) plicatus Er.**

Mäusberg bei Wiesenfeld 28. 8. 20 (S.) (t. Bennick).

**Z. (M.) confragosus Hochh.**

Ammersfeld bei Aschfeld 25. 4. 48 (t. Loße).

**Lomechusa Grav.**

**L. strumosa F.**

Aschaffenburg (Oe.). Unter Steinen in Nestern der *Formica congerens* (Fr.). Krainberg bei Gambach 22. 5. 31. Karlstadt 12. 5. 29.

**Atemeles Steph.**

**A. emarginatus Payk.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). In Nestern der *Formica rubra* und verwandter Arten (Fr.). Dornauer Graben 25. 2. 26. Stockstadter Wald 8. 4. 28. Obernauer Wald 2. 5. 27. Bei Großostheim 10. 5. 31. Gailbachtal 4. 6. 31.

**A. paradoxus Grav.**

Aschaffenburg (Oe.). Im Fahrbachtal 9. 3. 30, 7. 9. 07. Kl. Exerzierplatz 22. 7. 08.

**A. pubicollis Bries.**

Aschaffenburg (D. N.). Schmerlenbacher Wald 26. 4. 06. Bei Rothenbuch i. Sp. 30. 7. 20. Stengerts 9. 9. 20.

**Tinotus Sharp.**

**T. morion Grav.**

Aschaffenburg (Oe.). Kleinostheim Lehmgruben am Bahnhof 27. 4. 32.

**Phloeopora Er.**

**P. testacea Mannh. (= reptans Er.)**

Schönbusch. Babenhauser Wald unter Kiefernrinde 19. 5. 22.

**P. teres Grav.**

Schönbusch unter Platanenrinde 12. 3. 24. Unter Kiefernrinde 19. 4. 23.

**P. corticalis Grav.**

Unter Baumrinde häufig. I II III IV V VIII X

**Ilyobates Kraatz.**

**I. nigricollis Payk.**

Seligenstadt am Mainufer (Scr.). Miltenberg 4. 1893 (Fr.). Schönbusch am Seeufer  
4. 7. 27. Lohr 21. 7. 22 (St.).

**Calodera Mannh.**

**C. protensa Mannh.**

Aschaffenburg (Oe.). An feuchten Orten unter Holz und Steinen (Fr.). Hanau (H.).

**C. aethiops Grav.**

Kahl 13. 11. 04. Aschaffenburg (Oe.).

**C. uliginosa Er.**

Hanau (M.) 1906, 1 St.

**C. riparia Er.**

Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg (S.).

**Chilopora Kr.**

**C. longitarsis Steph.**

An sonnigen Fluß- und Bachufern (Fr.). Häufig am Mainufer bei Seligenstadt  
(Scr.). Aschaffenburg Mainufer 19. 5. 12. Steinbachufer 16. 5. 24, 4. 7. 09. Stock-  
stadter Wald Gersprenzufer unter Schilf 18. 10. 07.

**Amarochara Thoms.**

**A. umbrosa Er.**

Höchst a. M. (Stock). Bei Seligenstadt 1861 in Mehrzahl unter Kuhdünger in den  
Gängen von Aphodius-Arten (Scr.).

**A. (Mniobates Muls. Rey.) forticornis Boisd. Lac.**

Seligenstadt (Scr.). Höchst a. M. 19. 1. 20. Am Niddaufer 7. 3. 06 (B.).

**Ocalea Er.**

**O. badia Er.**

Kahl Moore 16. 4. 22. Sodener Wald. Mäusberg bei Wiesenfeld 24. 8. 20. Kalmut  
10. 10. 52.

**O. concolor Steph.**

Hanau-Bulau 17. 3. 07 (H.).

**O. picata Steph.**

Aschaffenburg (Fl.). Steinbachtal 5. 11. 05. Kahl Moore 4. 11. 04. Rückersbacher  
Schlucht 23. 11. 40.

**O. rivularis Mill.**

Stockstadt a. M. Sumpf an der Gersprenz 18. 4. 25. Hain i. Sp. Seebachtal aus  
feuchtem Moos gesiebt 2. 7. 22. Steinbachtal am Ufer des Baches 5. 11. 05.

**Homoeusa Kr.**

**H. acuminata Maerk.**

Aschaffenburg (Scr.). Nach v. Heyden bei Lasius niger, Formica rufibarbis und  
Formica cuniculina bei Frankfurt a. M. gefunden.

## **D i n a r d a Mannh.**

### **D. dentata Grav.**

Aschaffenburg (Oe.). Nach Scr. nur in den Nestern der *Formica congerens*, nach v. Heyden auch bei *Formica sanguinea* (Fr.). Wiesenfeld 8. 20.

v. Maerkeli Kiesw.

Dettingen 28. 3. 09. Waldaschaff 2. 4. 39.

v. Hagensi Wasm.

Wendelberg 13. 4. 46 (J. S.). Im Metzgergraben bei Lichtenau 12. 6. 52 (J. S.). Kahl 30. 9. 25.

## **M e o t i c a Muls. Rey.**

### **M. exilis Er.**

Aschaffenburg an nassen Plätzen (Oe.). Stockstadter Wald Sumpf an der Landesgrenze 5. 4. 24. Kahl Moore 4. 11. 05, 8. 11. 04.

## **O c y u s a Kr.**

### **O. maura Er.**

Babenhäuser Wald 5. 4. 24. Schönbusch unter Schilf 4. 10. 04. Kahl Moore 9. 10. 04.

## **O c y u s i d a Bernh.**

### **O. rufescens Kr.**

Seligenstadt (Scr.).

## **O x y p o d a Mannh.**

### **O. spectabilis Maerk.**

Glattbacher Wald 3. 11. 07.

### **O. lividipennis Mannh.**

Am Leiderer See 5. 07. Am Schönbuschsee unter Schilf 25. 9. 04. Wiesen hinter Damm 10. 1854 (Fr.). Hanauer Straße an Boletus 10. 1894 (Fr.). Erbig 8. 10. 26, 10. 11. 26.

### **O. opaca Grav.**

Mainufer. Fasanerie am Saft eines Eichenstrunkes 15. 6. 39. Kahl 10. 04, 3. 11. 04.

### **O. vittata Maerk.**

Aschaffenburg in Nestern der *Formica fuliginosa* (Oe.).

### **O. elongatula Aubé.**

Hain i. Sp. Seebachtal 14. 4. 22. Kahl Moore 16. 4. 22, 28. 11. 28. Stockstadter Wald auf den Gersprenzwiesen 18. 4. 24.

### **O. lentula Er.**

Aschaffenburg bei *Formica fuliginosa* (D.). Seligenstadt (Scr.). Hanau (M.).

### **O. vicina Kr.**

Seligenstadt (Scr.). Stockstadt a. M. Gersprenzwiesen 17. 9. 05.

### **O. umbrata Er.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Kleinheubach in hohler Silberpappel 16. 5. 12. Kahl Moore unter Moos 23. 5. 04.

### **O. sericea Heer.**

Höchst a. M. 1896 (Stock).

- O. Doderoi Bernh. (= subnitida Muls. Rey.)**  
Seligenstadt (Scr.).
- O. exigua Er.**  
Seligenstadt (Scr.). Kahl Moore 14. 4. 11.
- O. (Deropoda Bernh.) rugulosa Kr.**  
Seligenstadt (Scr.). Nach D. N.
- O. (Baeoglena Thoms.) exoleta Er.**  
Frankfurt a. M. (Dr. Haag).
- O. (B.) praecox Er.**  
Aschaffenburg (S.).
- O. (Mycetodrepa Thoms.) alternans Grav.**  
Fasanerie in Agaricus und Boletus 10. u. 11. 1894 (Fr.). An Pilzen 16. 5. 12, 9. 06.
- O. (Sphenoma Mannh.) togata Er.**  
Homburg a. M. auf dem Kalmut unter Pflanzenrasen 26. 6. 23.
- O. (S.) rufa Kr.**  
Kahl Moore 16. 4. 22, 13. u. 26. 11. 24 (t. Benick).
- O. (Demosoma Thoms.) haemorrhoea Mannh.**  
Aschaffenburg (Oe. u. S.). In Nestern von Formica rufa. Seligenstadt (Scr.).  
Dettingen.
- O. (D.) formiceticola Maerk.**  
Aschaffenburg bei Formica rufa (D.).
- O. (Bessopora Thoms.) annularis Sahlbg.**  
Aschaffenburg (Oe.). Kahl 14. 4. 11. Nicht selten.

#### **Stichoglossa Fairm.**

- St. (Dexiogyia Thoms.) corticina Er.**  
Aschaffenburg (Oe.). Schmerlenbacher Wald 3. 06. Stockstadter Wald unter Kiefernrinde 5. 4. 24. Findberg unter Eichenstrunkrinde 26. 7. 25. Kahl unter Kiefernrinde 23. 10. 04.
- S. (Ischnoglossa Kr.) proluxa Grav.**  
Hanau 5. 19 (Stock).

#### **Thiasophila Kr.**

- Th. angulata Er.**  
Aschaffenburg (Oe. u. Scr.). Bei Formica rufa. Dettingen. Striet bei Formica rufa 28. 8. 26.
- Th. inquilina Maerk.**  
Seligenstadt bei Formica fuliginosa (Scr.) Höchst a. M. 4. 4. 1893 (B.). Enkheim 9. 11. 1900 (Sattler).

#### **Crataraea Thoms.**

- C. suturalis Mannh.**  
Aschaffenburg (Oe.). Kahl 9. 10. 04.

## **Microglotta Kr. (Microglossa Muls.)**

### **M. pulla Gyll.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt bei Ameisen (Scr.). Lohr Sandgrube 4. u. 31. 7. 22 (St.).

### **M. nidicola Fairm.**

Von L. v. Heyden bei Bockenheim am Eingang der Nesthöhlen der Uferschwalbe (*Hirundo riparia*) gefunden 20. 7. 81. Bei Offenbach fand Stock ein Exemplar bei *Formica fuliginosa* 21. 4. 1898. Kahl, anfangs 7. 49 (Dehnert).

### **M. gentilis Maerk.**

Bei Obernau in hohlem Apfelbaum 20. 3. 11 u. 12. 12.

### **M. marginalis Gyll.**

Aschaffenburg (Oe.). Exerzierplatz unter Rinde 1. 1894 (Fr.). Schönbusch unter Platanenrinde 26. 1. 24. Fasanerie unter Platanenrinde 11. 22. Steinbachtal 18. 7. 33.

## **Aleochara Grav.**

### **A. curtula Goeze (= fuscipes Grav.)**

Fasanerie an Rabenaas 4. 1895 (Fr.). 27. 5. 39. Mörsweise an Aas häufig 13. 5. 05. Auf dem Ammersfeld bei Aschfeld 21. 4. 47. Stengerts 29. 6. 26.

### **A. crassicornis Boisd. Lac.**

Aschaffenburg (Oe.). Mainhecken 3. 10. Karlstadt am Steig unter Moos 6. 3. 27. Mainwiesen gegenüber Obernau 1. 5. 43.

### **A. lata Grav.**

Schmerlenbacher Wald an Vogelaas 1. 5. 05. Mainufer an Fischeas 13. 5. 05.

### **A. (Euryodma Rtt.) brevipennis Grav.**

Aschaffenburg (Oe.). Stockstadter Wald 13. 2. 27, 17. 4. 16. Lindigwiesen 26. 4. 29. Kahl Moore 22. 9. 26, 8. 11. 04.

### **A. (Baryodma Thoms.) intricata Mannh. (= bipunctata Er.)**

Aschaffenburg (Oe.). Erbig 6. 3. 10, 23. 8. 25. Kahl Moore 20. 4. 27, 30. 9. 25. Bei Waldaschaff 28. 4. 46. Schwärmend 17. 7. 23.

### **A. (Isochara Bernh.) tristis Grav.**

Aschaffenburg in Kuhmist (Oe.).

### **A. (I.) moesta Grav.**

Aschaffenburg besonders an ausfließendem Baumsaft (Oe.).

### **A. (Homoeochara Muls. Rey.) sparsa (Heer.)**

Rückersbacher Schlucht 22. 2. 25. Schmerlenbacher Wald 30. 10. 04. Stockstadter Wald 4. 12. 27.

### **A. (Dyschara M. R.) inconspicua Aubé**

Schönbusch an Vogelaas 4. 10. 04.

### **A. (Polychara Muls. Rey.) lanuginosa Grav.**

Aschaffenburg (Oe.). Schönbusch im Moos an alten Eichen 10. 3. 40, 26. 11. 35. Stockstadter Wald an Eichensaft 21. 5. 25. Mainufer 3. 6. 11. Rückersbacher Schlucht 23. 11. 46.



- A. (P.) lygaea Kr.**  
Aschaffenburg 1 St. (Fl.).
- A. (P.) rufitarsis Heer.**  
Aschaffenburg (Oe.).
- A. (P.) villosa Mannh.**  
Aschaffenburg unter Baumrinde am Exerzierplatz 1. 4. 05. Ebenso 12. 1893 (Fr.).
- A. (P.) diversa Sahlbg.**  
Mainufer unter Platanenrinde 14. 10. 04.
- A. (P.) fumata Grav.**  
Aschaffenburg (Oe.).
- A. (P.) moerens Gyll.**  
Aschaffenburg (Oe.).
- A. (P.) sanguinea L.**  
Aschaffenburg (D. N.). Sandgrube bei Mainaschaff 29. 7. 25. Striet in hohlem Baum 12. 10.
- A. (P.) laevigata Gyll.**  
Aschaffenburg (Oe.).
- A. (Rheochara M. R.) spadicea Er.**  
Aschaffenburg (Scr.).
- A. (Ceranota Steph.) ruficornis Grav.**  
Hinter Damm 3. 5. 26. Hanau Kinzigufer.
- A. (C.) erythroptera Grav.**  
Aschaffenburg in Dünger (D.).
- A. (Coprochara Muls. Rey.) bilineata Gyll.**  
Aschaffenburg (D. N.).
- A. (C.) verna Say.**  
Hanau 1903 u. 1904, 3 St. (M.). Aschaffenburg Mainufer, 2 St. (S.).
- A. (C.) bipustulata Say. (= nitida Grav.)**  
Aschaffenburg (Oe.). Erbig 20. 2. 26. Karlstadt 7. 3. 26. Kahl Moore 25. 7. 04.  
Mainufer 23. 11. 24. Schönbusch 29. 11. 46.

## Pselaphidae

### Trimium Aubé

- T. brevicorne Reichenb.**  
Aschaffenburg Fasanerie (Oe. u. Fl.). Glattbacher Wald 29. 3. 05. Mainhecken unter Moos 4. 09. Hain i. Sp. Seebachtal 14. 4. 12.

### Plectophloeus Rtt.

- P. Fischeri Aubé.**  
Aschaffenburg (Fl.).

## **Euplectus Leach.**

- E. Duponti Aubé.**  
Aschaffenburg (Fl.).
- E. brunneus Grimm.**  
Aschaffenburg (D. N.).
- E. nanus Reichenb.**  
Fasanerie in Mulm (Fl.). Schmerlenbacher Wald in Buchenstrunk 21. 4. 05.
- E. sanguineus Denny.**  
Aschaffenburg (Oe. u. D. N.). Obernau in hohlem Apfelbaum 1. 3. 09.
- E. signatus Denny.**  
Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Obernau in hohlem Apfelbaum 1. 3. 09.  
Striet in hohlen Bäumen 2. 10. Schönbusch.
- E. Karsteni Reichenb.**  
Aschaffenburg (Oe. u. D.). Häufig in hohlen Bäumen. Striet 2. 10. Obernau 3. 11.  
Schmerlenbacher Wald in altem Buchenstrunk 21. 4. 05.
- E. punctatus Bedel.**  
Striet im Mulm hohler Bäume 2. 10.

## **Bibloporus Thoms.**

- B. bicolor Denny.**  
Aschaffenburg (Fl.). Schmerlenbacher Wald unter Eichenstrunkrinde. Striet  
unter Eichenrinde 19. 3. 16. Kahl.

## **Biblopectus Rtrr.**

- B. ambiguus Reichenb.**  
Mainhecken 12. 4. 06. Auch von Oe. und Scr. bereits als häufig angegeben. Hanau  
6. 5. 14.

## **Pseudoplectus Rtrr.**

- P. perplexus Jacq.**  
Aschaffenburg 1881 und 1885 abends in Anzahl gekätschert (Fl.). Nach Horion  
einzigster Fund in Deutschland.

## **Trichonyx Chaudoir.**

- T. sulcicollis Reichenb.**  
Schöntal im Mulm einer alten Kastanie. Kleinheubach in alter Pappel 5. 12.  
Kleinostheim 10. 6. 12. Godelsberg im Fluge gefangen 6. 1894 (Fr.). Rückers-  
bacher Schlucht in morschem Baumstrunk bei Ameisen 31. 8. 48, 1 St. (J. S.).

## **Amauronyx Rtrr.**

- A. Maerkeli Aubé.**  
Seligenstadt (Scr.). Höchst a. M. in Hamsterbau 6. 8. 10 (B.). Karlstadt am Steig  
6. 3. 27.

## **Batrisus Aubé.**

- B. formicarius Aubé.**  
Aschaffenburg Schmerlenbacher Wald unter gelben Ameisen (Oe.). Fasanerie an  
alter Eiche bei der Ameise *Lasius niger brunneus* (t. Prof. Dr. Gösswald) 31. 3. 50  
1 St. (J. S.).

## **B a t r i s o d e s R t r .**

### **B. Laportei Aubé.**

Aschaffenburg unter Steinen (Oe.) (Fl.). Seligenstadt in alten Pappeln (Scr.).

### **B. venustus Reichenb.**

Aschaffenburg in hohlen Bäumen bei *Formica cuniculina* (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Obernau in hohlem Apfelbaum bei Ameisen 20. 3. 11, 6. 17.

### **B. adnexus Hampe.**

Aschaffenburg in alten Pappeln bei *Lasius niger* (Fl.). Würzburg 1877 (Fl.).

## **B r a c h y g l u t a T h o m s .**

### **B. fossulata Reichenb.**

Im ganzen Gebiet unter Moos, Laub und Steinen.

ab. *rufescens* Reitter.

Schönbusch 12. 3. 24.

### **B. rubripennis Aubé (= xanthoptera Reichenb.)**

Aschaffenburg (Fl.).

### **B. Lefebvrei Aubé.**

Aschaffenburg (Fl.).

### **B. haemastica Leach.**

Häufig. Unter Platanenrinde 2. 1894 (Fr.). Gailbachtal auf feuchter Wiese am Fuß einer Weide massenhaft bei Ameisen 21. 3. 36. Mainhecken 27. 9. 04. Schönbusch am See unter Laub 4. 10. 04.

v. *perforata* Aubé.

Lindigwiesen bei Dettingen 13. 7. 04.

## **R e i c h e n b a c h i a L e a c h .**

### **R. impressa Panz.**

Aschaffenburg (Oe. u. Fl.). Kahl Moore 5. 4. 12, 6. 9. 05, 26. 11. 24.

### **R. juncorum Leach.**

Aschaffenburg in *Sphagnum* (Fl.). Mainhecken 3. 4. 09. Steinbachtal 5. 11. 05. Kahl Moore 26. 11. 24.

## **B r y a x i s L e a c h .**

### **B. sanguinea Reichenb.**

Fasanerie (Fl.). Schönbusch. Mainhecken 3. 10, 4. 06. Kahl Moore nicht selten 10. 04

## **B y t h i n u s L e a c h .**

### **B. nigripennis Aubé.**

Aschaffenburg (Fl.). Mainhecken 4. 09. Stockstadter Wald 22. 4. 11.

### **B. puncticollis Denny. (= validus Aubé.)**

Aschaffenburg (Oe.). Wachenbachtal aus Moos gesiebt 14. 4. 22. Stockstadter Wald an Erlenstrunk 14. 4. 06. Hain i. Sp. Seebachtal 14. 4. 22. Striet im Steinbachtal 5. 11. 05. Kahl Moore 13. 11. 24. Seligenstadt (Scr.).

### **B. bulbifer Reichenb.**

Aschaffenburg (Oe.). Sodener Wald. Hain i. Sp. Seebachtal 14. 4. 22. Kahl Moore 5. 4. 12, 26. 11. 24.

**B. femoratus Aubé.**

Auf dem Kalbenstein bei Gambach a. M. aus Moos gesiebt 9. 8. 25, 28. 2. 26.

**B. clavicornis Panz.**

Von Oe. als nicht selten angegeben.

**B. Curtusi Denny.**

Aschaffenburg (D. N.). Gailbachtal 10. 4. 05.

**B. nodicornis Aubé.**

Aschaffenburg (Fl.). Steinbachtal 20. 7. 04, 5. 11. 05.

**B o l b o y t h u s Raffr.**

**B. distinctus Chaud. (= macropalpus Aubé)**

Enkheim 3. 4. 04 (Sattler).

**B. securiger Reichenb.**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.). Häufig. Kahl Moore 5. 4. 12, 3. 10, 6. 04. Mainhecken 10. 04.

**B. Burelli Denny.**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.). Mainhecken 3. 10. Glatzbacher Wald 4. 07. Stockstadter Wald 22. 4. 11. Striet Steinbachtal 3. 11. 05.

**T y c h u s Leach.**

**T. niger Payk.**

Aschaffenburg (Oe. u. Fl.). Nicht selten. Schönbusch 3. 04. Mainhecken 4. 06. Hain i. Sp. Seebachtal 14. 4. 22. Steinbachtal 5. 11. 05.

**P s e l a p h u s Hbst.**

**P. Heisei Hbst.**

Aschaffenburg (Oe.). Auf feuchten Wiesen und unter Laub und Moos häufig. Stockstadter Wald 18. 4. 24. Obernauer Wald 5. 1895 (Fr.). Gersprenzweiden 17. 9. 05. Kahl Moore.

**P. dresdensis Hbst.**

Aschaffenburg (Oe.). Sehr selten. Hochstadt bei Hanau auf nassen Wiesen 10. 4. 20 (H.). Kahl am Rand der Moorwiesen mit *Orobatis cyaneus* L. mehrfach aus Moos- und Pflanzenrasen gesiebt 13. u. 28. 11. 24 (S.).

**C h e n n i u m Latr.**

**Ch. bituberculatum Latr.**

Schweinheim bei Aschaffenburg bei *Myrmica caespitum* gefunden (Oe.). Aschaffenburg (Fl.).

**C t e n i s t e s Reichenb.**

**C. palpalis Reichenb.**

Aschaffenburg am Fuß des Büchelbergs unter faulenden Pflanzenstoffen sehr selten (Oe.). Auch von Fl. hier gefunden.

**T y r u s Aubé.**

**T. mucronatus Panz.**

Aschaffenburg. Äußerst selten bei *Formica cunicularia* (Fl.). Im Spessart Pol-laschgrund 9. 5. 48, 1 St. Oberbessenbach 31. 7. 49, 1 St. (J. S.).

# Clavigeridae

## Claviger Preyssl.

### C. testaceus Preyssl.

Aschaffenburg unter Steinen bei Ameisen (Oe. u. Fl.). Karlstadt am Steig 25. 4. 26. Steinheim bei Hanau bei Lasius flavus und niger (H.).

### C. longicornis Müll.

Aschaffenburg Erbig (Fl.). Wallstadt (A.).

# Histeridae

## Teretriinae

### Teretrius Er.

### T. picipes F.

Aschaffenburg Schmerlenbacher Wald (Oe.). In Borlöchern von alten Weiden (Fl.).

## Abraeinae

### Ontophilus Leach.

### O. sulcatus F.

Aschaffenburg sehr selten (Oe. u. Fl.). Sandgrube bei Bahnhof Sulzbach a. M. 14. 2. 26. Stockstadter Wald 19. 4. 31. Bei Glattbach unter Pflanzenhaufen 28. 11. 07

### O. striatus Forster.

Nicht selten unter faulenden Vegetabilien und Mist.

### Plegaderus Er.

### P. vulneratus Panz.

Aschaffenburg, Schmerlenbacher Wald (Oe.). Großostheimer Wald unter Rinde von Kiefernklafferholz, das mit Hylastes palliatus Gyll. und Crypturgus cinereus Hbst. besetzt war. Striet unter Kiefernrinde 11. 8. 24. Kahl an Fichtenstrunk 6. 9. 05.

### P. caesus Hbst.

Aschaffenburg, Schmerlenbacher Wald (Oe.). Erbig in hohlem Apfelbaum 3. 24. Bei Oberrnau in hohlem Apfelbaum zahlreich 1. 3. 07, 26. 4. 27.

### P. dissectus Er.

Seligenstadt (Scr.). Schmerlenbacher Wald in morschen Buchenstrünken 11. 4. 05.

### Abraeus Leach.

### A. globulus Creutz.

Aschaffenburg, Exerzierplatz in trockenem Kuhmist 7. 1896 (Fr.).

**A. granulum Er.**

Seligenstadt (Scr.). Büchelberg in hohler Silberpappel 3. 21 (J. S.). In altem Apfelbaum 26. 4. 17 (S.).

**A. globosus Hoffm.**

Aschaffenburg in naßfaulem Holz (Oe.). Büchelberg in hohler Silberpappel 3. 21. Im Mulm alter Pappeln 10. 4. 12.

**A c r i t u s L e c o n t e .**

**A. minutus Hbst.**

Aschaffenburg unter Steinen (Oe. u. S.).

**A. nigricornis Hoffm.**

Aschaffenburg nicht selten in Gärten unter Brettern (Oe.).

## Saprininae

**S a p r i n u s E r .**

**S. semistriatus Scriba**

Schönbuschallee an totem Raben 4. 1894 (Fr.). Sandgrube bei Sulzbach a. M. 8. 6. 29. Mainufer an Fischeaas. Fasanerie 4. 6. 39, 2 St.

**S. aeneus F.**

Schönbuschallee an totem Raben 4. 1894 (Fr.). Schönbusch Sandgrube 2. 5. 31. Mainufer Mörsweise an Fischeaas.

**S. lautus Er.**

Aschaffenburg an faulen Champignons (D. u. S.).

**S. virescens Payk.**

Nach Reitter Parasit von *Phaedon cochlaeariae* und *armoraciae*. Bei Karlstadt a. M. 6. 3. 27, 25. 4. 26, 26. 5. 29, 7. 8. 34 unter Moos. Sendelbach bei Lohr am Rühsee auf *Nasturcium amphibium* (St.).

**S. conjungens Payk.**

Aschaffenburg (Fl.).

**H y p o c a c c u s T h o m s .**

**H. rugifrons Payk.**

Seligenstadt (Scr.). Obernau Sumpfwiese links des Mains 30. 9. 23.

**H. metallicus Hbst.**

Mainufer 7. 4. 06.

**G n a t h o n c u s D u a l .**

**G. rotundatus Kugel.**

Hösbach an einem Abortfenster 4. 5. 24. Schmerlenbacher Wald einige Stücke 6. 1878 (Fr.). Lohr an Feldspatzenaas 2. 7. 26 (St.).

**G. punctulatus Thoms.**

Striet in hohlen Buchen und Eichen mit alten Vogelnestern 12. 09.

**G. nidicola Joy.**

Im Mulm eines Apfelbaums 30. 1. 26. Schmerlenbacher Wald 19. 9. 26.

## **Myrmetes** **Marseul.**

### **M. piceus** **Payk.**

Aschaffenburg, Schmerlenbacher Wald (Oe.). Zellhausen bei Dettingen a. M. bei Formica rufa (H.).

## **Dendrophilinae**

### **Dendrophilus** **Leach.**

#### **D. punctatus** **Hbst.**

Schmerlenbacher Wald bei Formica rufa und fuliginosa 6. 1876 (Fr.). Oberrau in hohlem Apfelbaum 1. 3. 09. Ebenso bei Wenighösbach 11. 12. Striet in hohlen Buchen und Eichen nicht selten.

#### **D. pygmaeus** **L.**

Aschaffenburg (Oe.). Nach v. Heyden nur bei Formica rufa. Striet bei Formica rufa 27. 4. 27, 10 St. (S.). Laufach bei Formica rufa 7. 24. Bei der Herrenmühle im Kahlthal 21. 5. 27 (Ochs).

### **Micromalus** **Lew.**

#### **M. parallelopedus** **Hbst.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). In morschem Holz. Stockstadter Wald unter Kiefernstrunkrinde 5. 4. 24.

#### **M. flavicornis** **Hbst.**

Aschaffenburg unter Weidenrinde 10. 2. 1894. Oberrau in hohlem Apfelbaum ab. Maerkeli Kiesw.

14. 3. 11. In altem Eichenstrunk 19. 3. 16, 27. 4. 25. In Buchenstrunk 19. 4. 05. Fasanerie unter Eichenrinde 5. 3. 48 (Elbert). 8. 12. 23 (J. S.).

## **Histerinae**

### **Platysoma** **Leach.**

#### **P. frontale** **Payk.**

Schmerlenbacher Wald in altem Buchenstock 15. 4. 05. Waldaschaff in einem Buchenstrunk mehrfach 29. 4. 25. Striet unter Buchenstrunkrinde 5. 7. 25, ebenso bei Heigenbrücken 2. 8. 25.

#### **P. compressum** **Hbst.**

Häufig unter Rinde gefällter Bäume und an Baumstrüngen 5. 5. 06.

#### **P. oblongum** **F.**

Aschaffenburg (D.).

#### **P. angustatum** **Hoffm.**

Seligenstadt (Scr.).

### **Hister** **L.**

#### **H. quadrimaculatus** **L.**

Nicht selten an faulen Stoffen.

#### **H. unicolor** **L.**

Stockstadter Wald 13. 4. 25. Hain i. Sp. an Aas nicht selten 27. 5. 28.

- H. striola Sahlbg.**  
Bei Stockstadt (Schw.). Sendelbach bei Lohr 7. 7. 45 (St.).
- H. merdarius Hoffm.**  
Schönbusch in Mulm alter Eichen 28. 1. 31. In hohler Silberpappel 2. 21.
- H. cadaverinus Hoffm.**  
An Aas nicht selten. Mainufer 5. 05. In ein Haus geflogen 3. 6. 21.
- H. quadrinotatus Scr.**  
Aschaffenburg (Oe.). Büchelberg 27. 4. 08. Bei Schweinheim 7. 5. 35 (Noll). Mörs-  
wiese am Main 6. 05. Laufach 6. 22.
- H. uncinatus Illig.**  
Aschaffenburg (Oe.).
- H. helluo Truqui.**  
„Verfolgt nach Perris die Larven von Agelastica alni auf Erlen“ (Rtt.). Striet  
Steinbachtal auf Erlen (S.).
- H. bissexstriatus F.**  
Seligenstadt (Scr.). Hain i. Sp. Pollaschgrund 9. 5. 48 (J. S.).
- H. stercorarius Hoffm.**  
Häufig. Striet 30. 3. 24. Schönbusch 4. 1894 (Fr.). Büchelberg bei Ameisen 26. 4. 08.  
Mainhecken 13. 4. 14. Striet 18. 5. 38. Mainbrücke 13. 9. 24. Sandgrube bei Main-  
aschaff 1. 9. 27.
- H. bipustulatus Schrk. (= fimetarius Hbst.)**  
Von Fr. ohne Fundort angegeben.
- H. purpurascens Hbst.**  
Karlstadt 19. 3. 26, 28. 3. 26. Schönbusch 13. 3. 22 unter Steinen bei Ameisen.  
Fasanerie unter Steinen 1. 4. 05. Mörs- wiese am Mainufer 2. 5. 05. Sandgrube bei  
Mainaschaff 29. 7. 25. Großostheim in der Sandgrube 10. 10. 27.
- H. neglectus Germ.**  
Aschaffenburg selten (Oe.). Hain i. Sp. 8. 12. 27.
- H. ventralis Marsh.**  
Seligenstadt (Scr.). Mörs- wiese an Fischaas 11. 5. 05. Homburg a. M. 4. 5. 35 (Noll).
- H. carbonarius Illig.**  
Aschaffenburg (Oe.). Karlstadt a. M. 18. 3. 26. Mörs- wiese am Main an Fischaas  
13. 5. 05. Fasanerie 7. 6. 39.
- H. (Grammostethus Lew.) marginatus Er.**  
Aschaffenburg (D.). Stockstadter Wald 1. 5. 32.
- H. ruficornis Grimm.**  
Aschaffenburg (Fl.). Seligenstadt (Scr.) bei Formica fuliginosa. Stockstadter Wald  
(Schw.). Karlstadt 28. 3. 26.
- H. (Paranus Lew.) bimaculatus L.**  
Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg (S.).
- H. duodecimstriatus Schrk.**  
Aschaffenburg (Fl.). Sandgrube bei Großostheim 19. 3. 29. Karlstadt 28. 3. 26.  
Kahl 17. 9. 26, 16. 11. 26.



**H. corvinus Germ.**

Karlstadt am Steig 18. 3. 26. Am Weg nach Glattbach 18. 5. 04. Am Weg nach Sodenthal unter Grashaufen 30. 7. 04. Fasanerie 8. 1893 (Fr.).

## Hetaeriinae

### Hetaerius Er.

**H. ferrugineus Oliv.**

Lebt bei Ameisen. Nach Fr. fand sie Fl. bei Formica fusca. Wendelberg 17. 3. 26. Godelsberg 6. 5. 05. Findberg unter Steinen 9 St. 2. 5. 48 (J. S.).

## Malacodermata

### Lycidae

#### Homaligus Geoffr.

**H. Fontisbellaquei Fourcr.**

Striet (Oe.). 19. 6. 26 (S.). Krainberg 13. 5. 26, 20. 6. 43. Hain i. Sp. 29. 6. 26. Oberbessenbach 4. 7. 43.

ab. **monochlorus** Torre.

Wiesenfeld 23. 5. 20. Krainberg 7. 6. 25.

#### Dictyopterus Latr.

**D. Aurora Hbst.**

Schmerlenbacher Wald auf Spiraea (Fr.). Abends fliegend 24. 5. 04. (St.). Wald bei Sulzbach 27. 4. 26. Rückersbacher Schlucht 5. 5. 12.

**D. affinis Payk.**

Heigenbrücken (Fl.). Schmerlenbacher Wald auf Sarothamnus 15. 7. 1899 (Dr. Müller).

**D. Cosnardi Chevr.**

Aschaffenburg (D.). Am südlichen Strietrand gestreift 18. 5. 32.

#### Platycis Thoms.

**P. minuta F.**

Schmerlenbacher Wald auf Spiraea Aruncus 1876 in Menge (Fr.). Rothenbuch i. Sp. 27. 8. 43. Karbach 27. 8. 43. Dornauer Graben 1. 9. 25. Fasanerie an be-  
moostem Fichtenstock zahlreich 17. 9. 12. Kalmut 19. 10. 26.

#### Lygistropterus Muls.

**L. sanguineus L.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.).

## Lampyridae

### Phausis Lec.

**Ph. splendidula L.**

Aschaffenburg in manchen Jahren in zahlloser Menge (Fr.).

## Lampyris Geoffr.

### L. noctiluca L.

Aschaffenburg sehr häufig. Schwärmzeit Ende Juni bis Anfang Juli.

## Phosphaenus Cast.

### Ph. hemipterus Goeze.

Aschaffenburg (D.).

## Cantharidae

### Cantharis L.

#### C. violacea Payk.

Aschaffenburg (D.). Fischerhecke 6. 1894 (Fr.).

#### C. fusca L.

Häufig. Weiler i. Sp., eine Blattwespe verzehrend, 10. 6. 18.

#### C. rustica Fall.

Häufig auf Grasplätzen und Stauden.

#### C. obscura L.

Nicht selten. Spessart 7. 5. 16. Fasanerie 2. 6. 29.

#### C. pulicaria F.

Sehr vereinzelt. Striet 4. 1895. Godelsberg 5. 1895 (Fr.). Seligenstadt (Scr.).

#### C. nigricans Müll.

Nicht selten. Büchelberg 4. 1894. Schönbusch 5. 1894 (Fr.).

ab. immaculata Schils.

Fasanerie 2. und 10. 6. 39.

#### C. pellucida F.

Schloßgarten 5. 1894 (Fr.). Fasanerie 10. 6. 39.

ab. Rauterbergi Rtt.

Fasanerie 24. 5. 39, 17. 6. 39.

#### C. livida L.

Sehr häufig auf Stauden und Sträuchern.

ab. rufipes Hbst.

Ebenso häufig.

#### C. quadripunctata Müll.

Aschaffenburg (D.).

#### C. sudetica Letzn.

Seligenstadt (Scr.).

#### C. rufa L.

Häufig.

#### C. pallida Goeze.

Fasanerie 3. 6. 37, 10. 6. 39. Dörngraben auf Gebüsch.

#### C. fulvicollis F.

Schönbusch auf niederen Sträuchern. 5. 1895 (Fr.). Fasanerie 24. 6. 06. Striet 19. 6. 26.

**C. bicolor Hbst.**

Bei der Schöllmühle 1. 7. 28. Am Fasaneriesee 13. 7. 42.

**C. paludosa Fall.**

Seligenstadt (Scr.).

**C. lateralis L.**

Mörswiese am Mainufer 27. 6. 06. Am Krautbach 20. 6. 40. Bei Weiler i. Sp. 6. 6. 26

**Metacantharis Bourg.**

**M. discoidea Ahrens.**

Krainberg bei Gambach a. M. 7. 6. 25, 21. 6. 31. Mäusberg bei Wiesenfeld 7. 6. 29.  
Kalbenstein 20. 6. 26. Oberbessenbach 20. 5. 48. Kalmut 23. 6. 35.

**M. haemorrhoidalis F.**

Ruine Homburg bei Gößenheim 2. 5. 26. Krainberg 7. 6. 33.

**Rhagonycha Eschscholtz.**

**R. translucida Kryn.**

Im Kahltal bei der Herrenmühle 6. 22 (Ochs).

**R. lutea Müll.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Godelsberg 20. 6. 42. Striet 19. 6. 09. Fasanerie 19. 7. 39.  
Krainberg 7. 6. 25. Kalmut 14. 6. 25.

ab. Maerkeli Kiesw.

Gailbachtal 23. 5. 26, 2 St. Retzbach a. M. 13. 6. 47, 1 St. (J. S.).

**R. fulva Scop.**

Sehr häufig auf Stauden, besonders Schirmblumen und auf Gebüsch. Im Garten  
auf blühender Petersilie zahlreich in copula 11. 7. 46.

**R. testacea L.**

Aschaffenburg häufig. V VI VII. Kahltal bei der Herrenmühle 6. 22 (Ochs).

**R. limbata Thoms.**

Hain i. Sp. Pollaschgrund 11. 5. 24. Seebachtal auf Disteln 8. 7. 22.

**R. lignosa Müll.**

Häufig auf Gebüsch.

**R. femoralis Brull.**

Seligenstadt (Scr.).

**R. elongata Fall.**

Gailbachtal 23. 5. 26. Schönbusch 18. 6. 36. Weiler i. Sp. 6. 6. 26.

**R. atra L.**

Aschaffenburg (D.).

**Malthinus Latr.**

**M. biguttulus Payk.**

Aschaffenburg (D. u. Scr.). Schönbusch 5. 1894 (Fr.).

**M. flaveolus Payk. (= punctatus Fourcr.)**

Fasanerie auf Hecken 6. 1896 (Fr.). 11. 7. 35. Godelsberg auf Eiche 22. 6. 46. Stock-  
stadter Wald auf Faulbaum 23. 6. 26. Wendelberg auf Eiche 29. 6. 42.

ab. immunis Marsh.

Weiler i. Sp. 6. 6. 26.

**M. seriepunctatus Kiesw.**

Weiler i. Sp. 6. 6. 26. Retzbach a. M. 4. 7. 35.

**M. fasciatus Oliv.**

Aschaffenburg (Oe.).

**M. glabellus Kiesw.**

Seligenstadt (Scr.).

**M. frontalis Marsh.**

Aschaffenburg (D.). Seligenstadt (Scr.).

**M a l t h o d e s Kiesw.**

**M. marginatus Latr.**

Aschaffenburg (D.). 23. 6. 42 (S.). Metzgergraben im Spessart 13. 5. 40. Am Krainberg 27. 5. 25. Kahl. Lohr 1. 7. 45 (St.).

**M. trifurcatus Kiesw.**

Aschaffenburg (D.). Seligenstadt (Scr.).

**M. guttifer Kiesw.**

Seligenstadt (Scr.).

**M. brevicollis Payk.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

**M. minimus  $\mu$ . (= sanguinolentus Gyll.)**

Wiesen hinter Damm 6. 1894 (Fr.). Am Krautbach 23. 6. 42.

**M. flavoguttatus Kiesw.**

Seligenstadt (Scr.). Hanau (H.).

**M. dispar Germ.**

Aschaffenburg (D.). 24. 5. 43 (S.).

**M. maurus Cast.**

Seligenstadt (Scr.).

## Drilidae

**D r i l u s Oliv.**

**D. concolor Ahrens.**

Auf feuchten Wiesen und unter Gebüsch. Entwicklung in Schneckenhäusern. Aschaffenburg, Schloßgarten (Oe.). Schönbusch auf feuchten Wiesen am See 25. 8. 28. Krainberg 7. 6. 25, 26. 6. 32. Karlstadt a. M. 20. 5. 34, 25. 6. 32.

**D. flavescens Fourcr.**

Im Frankfurter Gebiet mehrfach nachgewiesen. Kahlthal bei der Herrenmühle 6. 22 (Ochs). Hanau (Junker).

## Malachidae

**T r o g l o p s Er.**

**T. albicans L.**

Von Fr. als selten ohne Fundort angegeben. Bei Frankfurt a. M. nachgewiesen.

## **H y p e b a e u s K i e s w .**

### **H. flavipes F.**

Entwicklung nach v. Heyden in Hainbuchen. Von Fr. als selten ohne Fundort angegeben.

## **C h a r o p u s E r .**

### **Ch. flavipes Payk. (= plumbeomicans Goeze.)**

Auf Wiesen nicht selten. Wendelberg 26. 5. 31, 24. 6. 42. Fasanerie am See 5. 6. 40. Kahl Moore 11. 6. 25. Karlstadt 28. 6. 32. Wiesen hinter Damm 6. 1894 (Fr.).

## **E b a e u s E r .**

### **E. thoracicus Fourcr.**

Schönbusch 5. 1895 (Fr.). Fasanerie 6. 1894 (Fr.). Krainberg 22. 6. 30. Wendelberg 23. 7. 32. Bei Obernau 4. 7. 25. Kahltal 12. 7. 25.

### **E. pedicularis F.**

Gailbachtal auf Weißdorn 23. 5. 26. Am Weg nach Glattbach 23. 5. 05. Fasanerie 6. 1893 (Fr.).

## **A x i n o t a r s u s M o t s c h .**

### **A. ruficollis Oliv.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Fasanerie 30. 6. 38, 15. 7. 39. Haibacher Schweiz 18. 7. 37.

### **A. pulicarius F.**

Häufig auf Grasplätzen. VI u. VII.

### **A. marginalis Cast.**

Aschaffenburg (D.). Hinter Damm 18. 7. 45. Moore bei Großkrotzenburg 25. 6. 25. Weiler i. Sp. an Hainbuchen 6. 6. 25.

#### **ab. infuscatus Ab.**

Weiler i. Sp. 6. 6. 25.

## **M a l a c h i u s F a b .**

### **M. scutellaris Er.**

Aschaffenburg (D.). Mörswiesen 19. 5. 12. Nach Fr. wurde die Larve von L. v. Heyden im Nest einer Mauerbiene beobachtet.

### **M. rubidus Er.**

Glattbacher Tal 4. 1894 (Fr.). Im Garten 21. 5. 17. Schönbusch 21. 6. 32. Godelsberg. Ruine Homburg 2. 5. 26. Krainberg 15. 5. 47, 2 W. 21. 6. 32, 1 W. Obernauer Wald 17. 5. 37 M.

### **M. aeneus L.**

Nicht selten auf Grasplätzen.

### **M. marginellus Ol.**

Am Krautbach 6. 6. 42. Gersprenzweiden bei Stockstadt 9. 6. 05. Kalmut 26. 6. 25. Schönbusch 1. 7. 24.

### **M. bipustulatus L.**

Häufig. Puppe aus hohler Platane, Entwicklung 18. 4. 43. Striet 5. 1894 (Fr.). Fasanerie 10. 6. 39.

#### **ab. immaculatus Rey.**

Godelsberg bei der Ruine 20. 6. 42. Karlstadt 14. 6. 42.

**M. viridis F.**

Nicht selten. Mainwiesen. Wiesen am Schöllmüllersee 5. 1894 (Fr.). Kalmut 14. u. 28. 6. 25. Krainberg 20. 6. 26.

**M. elegans Oliv.**

Vor Glattbach 13. 5. 05. Oberbessenbach 25. 5. 25. Striet 19. 6. 09. Godelsberg 29. 6. 09. Wendelberg 23. 6. 37. Kahltal bei der Herrenmühle 6. 22 (Ochs). Fasanerie 6. 6. 39.

**M. spinipennis Germ.**

Krainberg 15. 5. 47.

**Anthocomus Er.**

**A. coccineus Schall (= rufus Hbst.)**

Aschaffenburg (Fl.) Moore bei Großkrotzenburg 17. 8. 25, 30. 9. 25, 11. 10. 20 (Gulde). Schönbusch am See 25. 9. 08. Mainufer.

**A. bipunctatus Harr. (= equestris F.)**

Häufig. V VI. Nach Fr. schon im März.

**A. fasciatus L.**

Schönbusch 5. 1894 (Fr.). Bei Gambach 17. 5. 25. Lohr 22. 5. 22 (St.). Schloßgarten 6. 1894 (Fr.). Am Fuß des Büchelbergs 21. 6. 42. Wiesenfeld 7. 19.

## Dasytidae

**Haplocnemus Steph.**

**H. pini Redtenb.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Überwintert im Moos alter Laubbäume. Schmerlenbacher Wald 13. 1. 24. Rückersbacher Schlucht auf Kiefern 22. 2. 25, 16. 4. 06. Striet 18. 5. 32. Bei Seligenstadt 28. 10. 23. Fasanerie 8. 12. 23.

**H. nigricornis F.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Auf Fichten nicht selten. Gailbachtal 28. 2. 43. Schmerlenbacher Wald 16. 4. 06, 3. 5. 08, 3. 8. 05. Büchelberg 25. 4. 06. Hain i. Sp. 9. 4. 39, 2. 5. 35. Schönbusch 16. 6. 05.

**Trichocele Thoms.**

**T. floralis Oliv.**

Schönbusch 12. 6. 28.

**T. memnonia Kiesw.**

Schönbusch auf Pinus austriaca 17. 6. 32. Büchelberg auf Pinus silvestris 23. 7. 35.

**Dasytes Payk.**

**D. niger L.**

Aschaffenburg auf blühendem Baldrian 17. 6. 04. Schönbusch 21. 6. 25. Kalmut 22. 6. 25.

**D. coeruleus Deg.**

Nicht selten auf Blüten. Larven in dürrer Nadel- und Laubholz, anderen Larven nachstellend (Fr.). Hain i. Sp. Seebachtal in morschem Buchenast zahlreich frisch entwickelt 19. 3. 50. Büchelberg aus morschem Eichenast gezogen M. u. W. 9. 2. 48

**D. nigrocyaneus Muls.**

Lößwände hinter Damm auf Weißdorn 17. 5. 24.

**D. plumbeus Müll.**

Häufig auf Blüten. Fischerhecke in Menge 5. 1894 (Fr.).

**D. subaeneus Schönb.**

Aschaffenburg (D.). Kalmut 28. 6. 25. Krainberg 11. 7. 28. Mäusberg bei Wiesenfeld 7. 09.

**D. fuscus Illig.**

Aschaffenburg (D.).

**Dolichosoma Steph.**

**D. lineare Rossi.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Auf trockenen Grasplätzen. Stockstadter Wald 31. 5. 04. Schönbusch 11. 6. 33. Strietrand 19. 6. 26.

**Danacaea Cast.**

**D. pallipes Panz.**

Häufig auf Blüten.

**D. nigritarsis Küst.**

Krainberg 7. 6. 25. Kalmut 14. 6. 25. Mäusberg bei Wiesenfeld 7. 19 nicht selten.

**Phloeophilus Steph.**

**Ph. Edwardsi Steph.**

Im Wald zwischen Dettingen und Kahl an frisch geschlagenen und entrindeten Kiefern sitzend, meist durch das Harz festgehalten, mehrfach 29. 12. 12.

## Cleridae

**Tillus Oliv.**

**T. elongatus L.**

Aschaffenburg Fasanerie (Oe. u. D.). Hain i. Sp. Seebachtal an altem Buchenscheitholz 20. 6. 26 (J.S.). Im Kahltal bei der Herrenmühle 6. 22. (Ochs).

**T. unifasciatus F.**

Aschaffenburg von Oe. u. D. in Mehrzahl an aufgehäuften Daubholz gefunden. Hanau 1898 (M.). Von Fl. bei den Lettlöchern auf *Salvia pratensis* gefunden 19. 5. 82. Im Messeler Park bei Darmstadt fand ich die Art an Eichenklafferholz 31. 5. 39.

**Opilo Latr.**

**O. mollis L.**

Fasanerie in alten Eichenästen 26. 3. 07. Rothenbuch i. Sp. 24. 5. 28. Gemünden a. M. beim Sägewerk (Ade).

**O. domesticus Sturm.**

Fr. berichtet in seiner Fauna über die Art: „Die Larve wurde im April 1860 von Prof. Dr. Döbner in einem alten, von Larven des *Hylotrupes bajulus* bewohnten Fichtenbrett gefunden. Die Verpuppung erfolgte im Mai und 6 Wochen darauf entwickelte sich der Käfer. Von Klingelhöfer wurde der Käfer in den Gängen

von Anobium angetroffen, deren Larven er verzehrte.“ In der Platanenallee 1. 1894 (Fr.). Im Haus ans Licht geflogen 28. 6. 23, 25. 7. 36. Mainaschaff im Schulhaus 3. 7. 06. Unter Platanenrinde 5. 3. 50 (Wolfram).

### **Thanasimus Latr.**

#### **Th. formicarius L.**

Häufig an Nadelhölzern, den Borkenkäfern nachstellend. Überwintert als Imago unter lockerer Rinde. I III VI X.

#### **Th. rufipes Brahm.**

Aschaffenburg (Brahm). Schmerlenbacher Wald unter Platanenrinde 1. 1894 (Fr.). Schönbusch Südseite unter Rinde einer alten Eiche 20. 1. 38 (J. S.).

### **Pseudoclerops Duv. (Clerus Geoffr.)**

#### **P. mutillarius F.**

Aschaffenburg (Oe.). Sehr selten in Holzhöfen. Brahm fand ihn nach Fr. im Mai stets nur an Holzstößen von frischgeschlagenen Eichenscheiten, auf denen er unruhig hin- und herlief und schwer zu erhalten war.

### **Allonyx Duv.**

#### **A. quadrimaculatus Schall.**

Aschaffenburg (Brahm u. Oe.). Nach Rtt. geht die Art auf Kieferstämmen den Aradus-Larven nach. Großostheimer Wald 28. 5. 35. Auf dem Krainberg von verkrüppelten Kiefern geklopft 24. 5. 31.

### **Trichodes Hbst.**

#### **T. apiarius L.**

Schönbusch auf Spiraeen. 6. 1875 (Fr.). In unserem Gebiet selten.

#### **T. alvearius F.**

Häufig auf Blüten, besonders auf Löwenzahn.

## **Corynetidae**

### **Orthopleura Spin.**

#### **O. sanguinicollis F.**

Schmerlenbacher Wald (Oe.). Babenhausen (Scr.). Speesart (D.). Hanau 1 St.

### **Corynetes Hbst.**

#### **C. coeruleus Deg.**

Auf Blüten und faulenden tierischen Stoffen. Fasanerie 5. 1893 (Fr.). Schönbusch 17. 6. 32. Wendelberg 9. 7. 35.

### **Necrobia Latr.**

#### **N. ruficollis F.**

Aschaffenburg (Fl.). Hanau (H.).

#### **N. violacea L.**

Auf Blüten und an Aas. Auf Esche am Schöllmüllersee 27. 7. 36. Mäusberg bei Wiesenfeld 29. 9. 29. Aschaffenburg 9. 10. 28.

#### **N. rufipes Deg.**

Auf Aas (D.). Im Floßhafen an Tenkholz zahlreich herumlaufend 25. 6. 39 (Noll).



# Derodontidae

## Laricobius Rosenh.

### L. Erichsoni Rosh.

Fasanerie an Weihmutskiefer der Wollaus Chermes strobi nachstellend. Vielfach in copula. Ende 4. 09. Auch an Weißtanne der Chermes picaee nachgehend. Godelsberg von Lärche geklopft 6. 5. 05.

# Lymexylidae

## Hylecoetus Latr.

### H. dermestoides L.

Heigenbrücken 4. 1895. „Eine Menge Puppen in alten Eichenstöcken, aus denen sich in einigen Wochen die Käfer entwickelten. Die Puppen liegen waagrecht mit dem Kopf in der Rinde, mit dem Hinterteil im Splind, so daß die abgenommene Rinde wie gespickt aussieht.“ (Fr.). 12. 4. 53, 5 St., 16 Uhr schwärmend (J. S.). Hain i. Sp. Seebachtal 7. 5. 16. Schmerlenbacher Wald in Buchenstock 21. 4. 05, 3. 5. 08. Weibersbrunn an Buchenstock 1. 5. 52, 3 St.

#### ab. fulvipennis Rtt.

Schmerlenbacher Wald in Buchenstock 21. 4. 05, 3. 5. 08.

#### ab. Marei.

Hain i. Sp. 14. 4. 12, 14. 5. 25. Schmerlenbacher Wald 21. 4. 05. Sodener Wald 22. 4. 22. Am Krautbach an Erle 14. 4. 27.

#### ab. morio F.

Schmerlenbacher Wald an Buchenstock 21. 4. 05, 3. 5. 08. Bei Sailauf 20. 4. 27.

## Lymexylon F.

### L. navale L.

Schmerlenbacher Wald (Oe.). Hanau-Bulau (H.). Lohr a. M. im Juni 1949 an den Eichenbeständen massenhaftes Auftreten. (St.). Am Rohrberg bei Rohrbrunn 9. 6. 53, 1 St. (J. S.).

# Sternoxia

## Elateridae

### Adelocera Latr.

### A. quercea Hbst.

Schmerlenbacher Wald unter Rinde alter Eichen 1853 (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Hanau 1 St.

### Lacon Cast.

### L. murinus L.

Häufig.

### Elater L.

### E. cinnaberinus Esch.

Aschaffenburg, unter der lockeren Rinde von gefällttem Laubholz und Baumstrünken nicht selten III IV VII IX.

- E. sanguineus L.**  
Unter Rinde von altem Nadelholz nicht selten. IV V VI.
- E. rufipennis Steph. (= satrapa Kiesw.)**  
Metzgergraben i. Sp. an altem Eichenholz 12. 4. 25 (J. S.). Striet auf Birken 19. 6. 25. Fasanerie (D.). Stockstadter Wald (A.). Bei Rohrbrunn im Haßlochtal 22. 3. 53 (J. S.). Findberg 17. 3. 53 (J. S.) (t. Dorn).
- E. pomonae Steph.**  
Aschaffenburg (S.).
- E. sanguinolentus Serk.**  
Stockstadter Wald an Erlen- und Fichtenstöcken 17. 4. 26, 1. 5. 41. Heigenbrücken an Eichenstock 6. 1894 (Fr.).  
ab. *immaculatus* Schrk.  
Messeler Park an Eichenstock 31. 5. 39.
- E. nigroflavus Goeze (= crocatus Lac.)**  
An Pappeln (Fr.). Wiesenfeld an Zwetschgen 10. 4. 24. Aschaffenburg Kl. Exerzierplatz an Weide 5. 6. 11. In hohlem Apfelbaum 12. 11. Am Schöllmüllersee an Weide 24. 2. 53 (J. S.) (t. Dorn).
- E. ferrugatus Lac. (= pomorum Hbst.)**  
Stockstadter Wald an Erlenstock 14. 4. 05. An Birkenstock 1. 5. 41. Striet. Metzgergraben i. Sp. an Eichenholz 12. 4. 25. Hain i. Sp. an Buchenstöcken 28. 4. 40, 3. 6. 23, 1. 7. 12. Wiesenfeld 23. 5. 20. Findberg 17. 3. 53.
- E. elongatulus Schönh.**  
Aschaffenburg (Oe. u. D.). Hain i. Sp. an altem Eichenholz 2. 4. 22. Striet 16. 5. 20, 19. 6. 26. Kalbenstein 8. 5. 27, 20. 10. 25. Großostheimer Wald an Kiefern 20. 5. 25. Bei Rohrbrunn 26. 4. 53.
- E. balteatus L.**  
Aschaffenburg (D.). Stockstadter Wald an morschen Erlen 14. 4. 05, 8. 4. 28. Hain i. Sp. an alten Eichen 2. 4. 22, 6. 5. 24. Obernauer Wald 1. 5. 27. Waldaschaff 9. 5. 26. Sodener Wald im Mulm eines Kiefernstrunkes 30. 5. 37. Schönbusch 7. 6. 36.
- E. praeustus F.**  
Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.).
- E. erythrogonus Müll.**  
Nach Fr. von D. im Spessart an Buchen gefunden. Metzgergraben i. Sp. in rotfaulem Eichenholz 18. 4. 51, 2 St. 30. 9. 50, 4 St. (J. S.).
- E. sinuatus Germ.**  
Mäusberg bei Wiesenfeld 14. 4. 53, 1 St. (J. S.).
- E. aethiops Lac.**  
Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg (D.).
- E. nigerrimus Lac.**  
Aschaffenburg in Eichenmulm 2. 1884 (Fr.). Schönbusch an Eichenstrunk 25. 3. 22 (J. S.). Rückersbacher Schlucht unter Baummoos 23. 11. 46 (J. S.). Hanau (M.) 1904. Bei Lichtenau 30. 9. 50 (J. S.).
- E. nigrinus Payk.**  
Metzgergraben i. Sp. 31. 5. 41 u. 30. 9. 50 (J. S.). Schönbusch in alter Eiche 6. 11. 28 (J. S.).

## **I s c h n o d e s E s c h s c h .**

### **I. sanguinicollis Panz.**

Aschaffenburg Schmerlenbacher Wald in alter Buche (Oe. u. Fl.). Hanau (M.) 1902

## **P r o c r a e r u s R t t .**

### **P. tibialis Lac.**

Schönbusch in Eichenmulm 16. 2. 32 (J. S.). Schmerlenbacher Wald in Eiche 5. 1893 (Fr.).

## **M e g a p e n t h e s K i e s w .**

### **M. lugens Redt.**

Aschaffenburg 1869 von D. gefunden.

## **B e t a r m o n K i e s w .**

### **B. ferrugineus Scop. (= bisbimaculatus F.)**

Aschaffenburg (D.). An der Aschaffmündung an Weide 11. 7. 29 (S.).

## **H y p n o i d u s S t e p h .**

### **H. riparius F.**

Amorbach am Bach unter einem Stein 15. 7. 06 (S.).

### **H. quadripustulatus E.**

Mainufer (Fl.). Striet 5. 1893 (Fr.).

### **H. pulchellus L.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Stockstadter Wald 8. 4. 28, 1. 5. 32. Schweinheimer Exerzierplatz an sandigen Stellen zahlreich 2. 5. 48 (Noll). Kahl 16. 6. 35. Schönbusch 23. 5. 23. Mainaschaff 26. 5. 33.

#### **ab. laeta Fried.**

Stockstadter Wald auf sandigen Flächen 13. 5. 04.

### **H. dermestoides Hbst.**

Seligenstadt (Scr.). Exerzierplatz unter Rinde 10. 1894 (Fr.). Mainufer 9. 4. 09, 21. 9. 08.

#### **ab. bipustulatus Schilsk.**

Mainufer 13. 4. 06.

## **Q u a s i m u s G o e z e .**

### **Q. minutissimus Germ.**

Aschaffenburg Godelsberg (Oe. u. D.). Wendelberg 26. 5. 36. Kahlthal bei der Herrenmühle auf Ödflächen am Fuß der Weinberge 21. 7. 25 (J. S.).

## **C a r d i o p h o r u s E s c h s c h .**

### **C. gramineus Scop.**

Schönbusch Südseite auf Weißdorn 23. 5. 30. Krausenbach i. Sp. an Eichenholz 6. 1877 (Fr.). Heigenbrücken 5. 1876 (Fr.).

### **C. ruficollis L.**

Großostheimer Wald in einem Eichenstrunk 5. 4. 24, 14. 5. 22 von Fichte geklopft; an Kiefernast 19. 6. 21. Kahl 30. 4. 04. Obernauer Wald 6. 5. 06. Hanau 5. 20.

### **C. Erichsoni Buyss.**

Kalbenstein aus Pflanzenrasen gesiebt 28. 2. 26. Hinter Damm auf Schlehen 26. 5. 02. Benediktushöhe bei Retzbach a. M. 6. 5. 35.

**C. nigerrimus Er.**

Schönbusch unter Eichenrinde 2. 3. 25.

**C. ebeninus Germ.**

Schönbusch unter Eichenrinde 5. 2. 37 (J. S.).

**C. asellus Er.**

Aschaffenburg (D.). Seligenstadt (Scr.).

**C. cinereus Hbst.**

Schönbusch auf Kirschblüte und Eiche 17. 5. 22. Fasanerie 5. 1894 (Fr.). Seligenstadt (Scr.).

**C. equiseti Hbst.**

Seligenstadt 1865 (Scr.).

**Paracardiophorus Schwarz.**

**P. musculus Er.**

Kahl im Sandgebiet 5. 4. 35. Vor der Rückersbacher Schlucht auf *Oenothera biennis* 28. 8. 04. Aschaffenburg (D.). Hanau 1893 u. 1903, 3 St. (M.).

**Melanotus Eschsch.**

**M. rufipes Hbst.**

Fasanerie unter Birken- und Fichtenrinde 30. 4. 44. Rothenbuch i. Sp. 17. 4. 25. Metzgergraben i. Sp. an Eichenholz 12. 4. 05. An Buchenstock 26. 5. 40. Kalmut 28. 6. 25. Striet 6. 1891 (Fr.). Aus Eichenmulm gezogen 14. 8. 28.

**M. crassicollis Er.**

Hanau 1902, 1 St. (M.).

**M. punctolineatus Pelerin (= niger F.)**

Wiesenfeld 24. 5. 20. Lohr 15. 5. 45, 18. 6. 22 (St.). Striet 5. 1889 (Fr.). Krainberg an Schwarzkiefer 27. 6. 25. Seligenstadt (Scr.).

**M. brunnipes Germ.**

Hinter Damm 16. 4. 24. Miltenberg 4. 1889 (Fr.). Krainberg 6. 7. 25. Kalmut 25. 6. 25. Seligenstadt (Scr.).

**Limoniuss Eschsch.**

**L. pilosus Lesk.**

Striet in Anzahl 4. 1894 (Fr.). Schönbusch 5. 1895 (Fr.). Auf Gebüsch 6. 5. 05.

**L. aeruginosus Oliv.**

Nicht selten auf Gebüsch IV V VI.

**L. minutus L.**

Nicht selten auf Laubholz IV V VI.

**L. parvulus Panz.**

Auf Sträuchern nicht selten. Fasanerie 5. 1894 (Fr.).

**Limoniscus Rtt.**

**L. violaceus Müll.**

Aschaffenburg Fasanerie in Eichenmulm (Fl. u. D.).

## P h e l e t e s Kiesw.

### Ph. aeneoniger Deg. (= Bructeri Panz.)

Rückersbacher Schlucht 22. 2. 25. Hain i. Sp. 1. 3. 25, 11. 5. 24 auf Fichte und Espe.  
Dörrmorsbach 20. 4. 41. Steinbachtal auf Feldahorn 15. 5. 24.

### Ph. quercus Ol.

v. lythrodes Germ.

Aschaffenburg (Oe. u. D.) 23. 5. 05 (S.). Krainberg 25. 5. 33. Kalmut in Anzahl  
14. 6. 25.

## A t h o u s Eschsch.

### A. rufus Deg.

Lohr — Sackenbach Sanatorium (St.).

### A. villosus Fourcr.

Unter Pappelrinde 4. 17 (Schw.). In der Stadt angefliegen 6. 17. Bei Winzenhohl  
7. 6. 49. Puppe unter Rinde eines morschen Eichenastes. Entwicklung zur imago  
am 16. 6. 49 (J. S.). Metzgergraben i. Sp. in Buche 12. 6. 52 (J. S.).

### A. hirtus Hbst.

Hinter Damm 26. 4. 24. Dornauer Graben 20. 6. 37.

### A. niger L.

Hinter Damm 26. 4. 24.

ab. scrutator Hbst.

Aschaffenburg (D.). Hinter Damm 7. 6. 24.

### A. vittatus Fl.

Häufig auf Gebüsch.

### A. haemorrhoidalis F.

Häufig wie der Vorige.

### A. subfuscus Müll.

Nicht selten. Striet 5. 1894 (Fr.). Waldaschaff 5. 5. 26. Heigenbrücken 6. 1894 (Fr.).

### A. bicolor Goeze (= longicollis Oliv.)

Krainberg 14. 6. 31. Mäusberg bei Wiesenfeld 9. 6. 19. Hinter Damm 29. 6. 24.  
Mainwiesen. Lindigwiesen 13. 7. 04. Findberg 14. 7. 40.

## C o r y m b i t e s Latr.

### C. pectinicornis L.

Wiese hinter Damm 5. 1894 (Fr.). Steinbachtal 15. 5. 24. Sodener Waldwiese 21.  
5. 25. Pollaschgrund bei Hain i. Sp. 6. 5. 28, 29. 5. 32. Bei Oberbessenbach 25. 5. 47.

### C. cupreus F.

Aschaffenburg (D.). Östlich Waldaschaff 16. 5. 48 (Elbert).

v. aeruginosus F.

Aschaffenburg (D.). Am Bomigsee bei Rothenbuch i. Sp. fliegend 17. 5. 48 (Elbert).

### C. purpureus Poda.

Am Findberg auf Kirschblüten in Anzahl 1. 5. 44. Bei Hain i. Sp. 7. 5. 16. Heigen-  
brücken 5. 1882 (Fr.).

### C. castaneus L.

Heigenbrücken 5. 1893 (Fr.). 12. 4. 53, 5 St. um 16 Uhr schwärmend (J. S.).  
Schmerlenbacher Wald an Buchenrinde 16. 4. 06. Rückersbacher Schlucht 2. 4. 26.

Findberg schwärmend 2. 5. 43. Metzgergraben i. Sp. von Lärche geklopft 26. 5. 40 (J. S.). Bei Winzenhohl 7. 6. 49 (J. S.).

**C. sjaelandicus Müll. (= tessellatus F.)**

Auf Sumpfwiesen nicht selten. Hinter Damm 5. 1894 (Fr.).

ab. *assimilis* Gayll.

Fasanerie 5. 1894 (Fr.). Wendelberg 8. 6. 38.

**C. (Selatosomus Steph.) impressus F.**

Godelsberg 6. 1894 (Fr.). Metzgergraben i. Sp. 12. 4. 25. Aschaffenburg 5. 5. 08. Orb i. Sp. 9. 6. 06.

a. *rufipes* Schilsky.

Schmerlenbacher Wald in altem Eichenstock 17. 4. 05. Bei Haibach an Buche 13. 5. 06

**C. nigricornis Panz.**

Seligenstadt (Scr.). Stockstadter Wald 5. 1896 (Fr.).

**C. aeneus L.**

Häufig.

ab. *germanus* L.

Schöllmüllersee 5. 1894 (Fr.). Kalmut 28. 6. 25.

ab. *cyaneus* Marsh.

Obernauer Wald 25. 5. 23.

**C. latus F.**

Mörsweise am Mainufer 5. 1894 (Fr.). 12. 5. 07 (S.).

**C. cruciatus L.**

Babenhauser Wald (Oe.). Stockstadter Wald bei der Waldmühle 23. 4. 44 (J. S.). Bei Stockstadt a. M. von blühendem Weißdorn 2. 6. 01 (S.). Schönbusch bei der Sandgrube von Lärche geklopft 10. 6. 35 (S.).

**C. (Calambus Motsch.) bipustulatus L.**

Auf dem Erbig unter Rinde eines Apfelbaumes 21. 7. 24. Schönbusch unter Rinde und Moos an alten Eichen 20. 1. 25. Fasanerie 24. 5. 43. Schmerlenbacher Wald unter Eichenrinde 5. 12. 23.

**Prosternon Latr.**

**P. tessellatum L. (= holosericeum Ol.)**

Hain i. Sp. im Pollaschgrund 22. 4. 28. Schönbusch 25. 5. 26. Büchelberg 22. 6. 43.

**Hypoganus Kiesw.**

**H. cinctus Payk.**

Selten. Rothenbuch i. Sp. in alten Eichenästen 3. 25 (J. S.). Schmerlenbacher Wald an Eiche 10. 5. 49 (J. S.). Fasanerie in der Rinde einer alten Birke mehrfach 22. 10. 05 (S.). Metzgergraben i. Sp. 10. 10. 34 (Beyer). Bei Rohrbrunn i. Sp. 27. 7. 52 (J. S.).

**Ludius Latr. (= Steatoderus Eschsch.)**

**L. ferrugineus L.**

Aschaffenburg aus hohler Buche (Oe.). In der Ludwigsallee (D.). Aus dem Mulm eines hohlen Apfelbaumes gezogen 14. 4. 13 (S.). Lohr 18. 7. 25 (St.). Aus Eichenmulm gezogen 12. 6. 52. 2 St.

ab. occitania Villers.  
Gartenberg aus faulem Birkenholz 11. 6. 11.

### **A g r i o t e s** Eschsch.

#### **A. aterrimus L.**

Hain i. Sp. unter Stein 1. 2. 25, 27. 4. 24, 7. 5. 16. Sodener Wald 21. 5. 11. Heigenbrücken 6. 1894 (Fr.). Auf dem Steiger fliegend 2. 6. 40, 2 St. An Buchenast 2. 6. 35. Laufach im Kreuzgrund unter Stein 21. 12. 24.

#### **A. gallicus Lac.**

Schönbusch Sandgrube 14. 6. 24. Kalmut auf Gebüsch 2. 6. 25. Krainberg 5. 7. 25. Thüngersheim 2. 7. 27 (St.).

#### **A. acuminatus Steph. (= sobrinus Kiesw.)**

Aschaffenburg (D.). Striet auf Feldahorn 15. 4. 24.

#### **A. pallidulus Illig.**

Fasanerie in Anzahl 5. 1894 (Fr.). Bei Rothenbuch i. Sp. 26. 5. 40. Hain i. Sp. Seebachtal aus Buchen- und Erlenreisig 3. 6. 23. Stockstadter Wald auf den Gersprenzweiden 8. 7. 05.

#### **A. ustulatus Schall.**

Nicht selten. Kalmut 28. 6. 25. Stockstadter Wald 8. 7. 05.

ab. flavicornis Panz.

Stockstadter Wald 8. 7. 05. Krainberg 5. 7. 25.

#### **A. elongatus Marsh. (= pilosus Panz.)**

Nicht selten. Striet 4. 1894 (Fr.). Findberg 14. 5. 44. Schmerlenbacher Wald 7. 1894 (Fr.).

#### **A. sputator L.**

Häufig im ganzen Gebiet.

ab. rufulus Lac.

Aschaffenburg 30. 4. 26. Kl. Exerzierplatz 4. 11. Stockstadter Wald 11. 5. 24.

#### **A. lineatus L.**

Häufig auf Wiesen. Erbig 3. 1893 (Fr.). 30. 4. 26. Fasanerie 5. u. 6. 1893 (Fr.).

#### **A. obscurus L.**

Schmerlenbacher Wald unter Steinen bei Ameisen 20. 4. 06. Büchelberg 27. 4. 08, 14. 5. 21.

### **D o l o p i u s** Eschsch.

#### **D. marginatus L.**

Häufig auf Gebüsch. V VI.

### **S e r i c u s** Eschsch.

#### **S. brunneus L.**

Steinbachtal auf Eichen 12. 4. 02. Findberg 14. 5. 44. Schönbusch 1. 6. 35.

### **S y n a p t u s** Eschsch.

#### **S. filiformis F.**

Nicht selten. Stockstadter Wald 9. 5. 25. Mörsweise 25. 5. 05.

### **A d r a s t u s** Eschsch.

#### **A. limbatus F.**

Aschaffenburg 30. 5. 04. Kahl 13. 6. 37. Seligenstadt (Scr.).

ab. axillaris Er.

Krainberg 20. 6. 43. Lindigwiesen bei Dettingen 13. 7. 04.

**A. nitidulus Marsh. (= pallens Er.)**

Fasanerie. Fischerhecke. Schönbusch. Heigenbrücken 5. — 7. 1874 (Fr.). Am Krautbach 24. 6. 43. Findberg 14. 7. 40.

**A. rachifer Fourcr. (= pusillus F.)**

Häufig. Wiesen hinter Damm 16. 6. 24. Kalmut 20. 6. 25. Fasanerie auf Tanacetum 13. 7. 05. Bischberg 25. 8. 07.

**A. montanus Scop. (= humilis Er.)**

Aschaffenburg (D.). Mäusberg auf Haseln 7. 19.

**Denticollis Pili.**

**D. rubens Pill.**

Aschaffenburg im Holzmagazin der Stadt sehr selten (Oe.). Metzgergraben i. Sp. aus einem morschen Lärchenast gezogen 9. 5. 40 (J. S.).

**D. linearis L.**

Schönbusch an dürrer Eichenast 24. 5. 27, 30. 5. 39. Lindig an Eiche 13. 5. 28 Fischerhecke 6. 1885 (Fr.). Hanau (H.).

## Cerophytidae

### Cerophytum Latr.

**C. elateroides Latr.**

Hanau 3 St. (in coll. Horion) Enkheim in alter Pappel 16. 4. 06 (B.).

## Eucnemidae

### Melasis Oliv.

**M. buprestoides L.**

Aschaffenburg in altem Holz der Fasanerie (Oe.). Schönbusch an gefällter Eiche 6. 5. 34 (Noll). Steinbachtal an Erle 11. 5. 35. Schmerlenbacher Wald zahlreich an trockenem Eichenast 10. 5. 49 M. u. W. (J. S.). Büchelberg an Birkenklafterholz 6. 6. 43 (J. S.).

### Isorhipis Lac. (= Tharops Lap.)

**I. melasoides Cast.**

Fischerhecke 5. 1893 (Fr.). Hain i. Sp. an Buchenscheitholz 2. 7. 22 (S.).

### Eucnemis Ahrens.

**E. capucinus Ahr.**

Selten, in Pappeln und Buchen (Fr.). Hain i. Sp. Seebachtal 1. 6. 52, 1 St. (J. S.).

### Dromaeolus Kiesw.

**D. barnabita Villa.**

Sehr selten (D.).



## **Dirrhagus Latr.**

### **D. pyrenaeus Bonv.**

Aschaffenburg, aus dürrer Waldholz gezogen (Fl.).

### **D. pygmaeus Bonv.**

Bei Frankfurt a. M. von altem Rhamnus geklopft und späterhin mehrfach gestreift 7. 6. 1894 (v. H.).

## **Hypocoelus Lac.**

### **H. procerulus Mannh.**

Im Spessart (Fl.).

# **Throscidae**

## **Throscus Latr. (= Trixagus Kug.)**

### **T. brevicollis Bonv.**

Aschaffenburg (D.). 1874, 1 St. (Fl.).

### **T. dermestoides L.**

Fasanerie 6. 1894 (Fr.). In großer Menge am rechten Aschaffufer unterhalb Damm 6. 1894 (Fr.).

### **T. carinifrons Bonv.**

Aschaffenburg Stockstadter Wald 8. 7. 04. Klingenberg aus Pappel 4. 7. 26.

### **T. elateroides Heer.**

Seligenstadt (Scr.). Stockstadter Wald unter Laub 8. 7. 04.

### **T. Duvali Bonv. (= exul Bonv.)**

Aschaffenburg Schönbusch unter Platanenrinde 21. 1. 24.

### **T. obtusus Curt.**

Unter Platanenrinde 16. 2. 04. Mainhecken 4. 06, 11. 5. 05. Hanau 1 St.

## **Drapetes Redt.**

### **D. biguttatus Pill.**

Freudenberg 6. 1897 (Lehrer Heeg). Hain i. Sp. an altem Buchenscheitholz 10. 6. 26, 2. 7. 22. Eisenbach an Buchenstöcken 24. 6. 35 (Noll). Aschaffenburg Fasanerie 2. 7. 46 (J. S.).

# **Buprestidae**

## **Chalcophora Sol.**

### **C. mariana L.**

Schönbusch 1860, 2 St. (Oe.). Freudenberg im Sommer 1899 an einem Tag 20 St. (Lehrer Heeg).

## **Dicerca Eschsch.**

### **D. berolinensis Hbst.**

Aschaffenburg in einem Holzlager (Oe.). An alten abständigen Buchen (Scr.).

## **Poecilonota Eschsch.**

### **P. variolosa Payk.**

Karlstadt a. M. auf dem Haag mittags 1 Uhr von Espe geklopft 30. 6. 29 (S.).

## Lampra Lac.

### L. rutilans F.

Aschaffenburg an Linden (Oe.).

## Eurythrea Solier.

### E. austriaca L.

Im Babenhausen- und Stockstadter Wald (Oe.).

### E. quercus Hbst. (= scutellaris Ol.)

Babenhauser Wald an alten Eichen (Scr.)

## Buprestis L.

### B. rustica L.

Aschaffenburg (Oe.).

### B. octoguttata L.

Obernauer Wald an alten Kiefernstöcken 30. 6. 35. Krainberg bei Gambach a. M. mehrfach frühmorgens von Krüppelföhren geklopft 22. 6. 30. Kahl an Kiefernstöcken 4. 7. 37. Mainaschaff an Kiefernstunk 1. 9. 27.

## Melanophila Eschsch.

### M. (Phaenops Lac.) cyanea F.

Stockstadter Wald unter Kiefernrinde als Larve 27. 9. 21. Im Frankfurter Wald mehrfach gefunden nach v. Heyden.

## Anthaxia Eschsch.

### A. cichorii Ol.

Hanau (Scr.).

### A. candens Panz.

Hanau (Scr.). Sendelbach bei Lohr an Zwetschgenbaum 20. 5. 26 (St.). Außerhalb unseres Gebietes von mir an Kirschbäumen beobachtet.

### A. salicis F.

Schönbusch auf Waldlichtung gestreift 13. 5. 31. Bei Glattbach 14. 5. 28. Rothenbuch i. Sp. mehrfach an einem Espenstrunk 17. 5. 36. Babenhausen (Scr.).

### A. nitidula L.

Auf Blüten, besonders an Löwenzahn, Rosen und Kirschblüten nicht selten. V — VIII.

#### ab. cyanipennis Lap.

Retzbach auf der Benediktushöhe 6. 8. 33.

### A. morio F.

Büchelberg Südseite an Fichte 28. 5. 23. Schönbusch 30. 5. 39. Krainberg 17. 5. 37. Babenhausen (Scr.).

### A. sepulchralis F.

Babenhausen (Scr.).

### A. quadripunctata L.

Häufig auf Blüten bei Kieferwäldungen. Larvenentwicklung an gefällten Kiefern und Kiefernstrünken. Godelsberg 4. 1894 (Fr.).

## Chrysobothris Eschsch.

### C. affinis F.

Im ganzen Gebiet nicht selten an gefällten Eichen, sowie an den vom Sonnen-

brand aufgesprungenen Luftwurzeln alter Buchen. Aschaffenburg (Oe. u. D.). Seligenstadt (Scr.). Striet an Birke 21. 5. 39, 4. 7. 04. Sodener Wald 25. 5. 22. Waldaschaff 30. 5. 26. Laufach an Buche 5. 6. 22. Hain i. Sp. beim Forstgarten 2. 7. 22. Zahlreich an Buchen 1. 8. 22.

**C. Solieri Cast.**

Nach Oe. einmal von Hauptmann Klingelhöfer in der Nähe von Aschaffenburg festgestellt.

**C o r a e b u s Cast.**

**C. undatus F.**

Aschaffenburg (Oe.) 1853. Schönbusch Holzplatz 10. 6. 31 (Noll). Hanau Pulverfabrik an abgestorbenen Eichen 1921 (Holtz).

**C. rubi L.**

Aschaffenburg 1853 (Oe.), 1880, 2 St. (Fl.).

**C. sinuatus Creutz. (= lampanae Bon.)**

Auf dem Krainberg bei Gambach a. M. öfters gestreift 20. 6. 26, 22. 6. 30, 29. 6. 31, 20. 6. 43.

**A g r i l u s Curt.**

**A. sex-guttatus Hbst.**

In der großen Schönbuschallee und Ludwigsallee sind die schleifenförmigen Larvengänge an anbrüchigen Pappeln häufig zu beobachten. Der Käfer ist jedoch selten zu sehen, weil er, wie Fr. in seiner Fauna schreibt, nach seiner Entwicklung wahrscheinlich die Gipfel der Bäume aufsucht. (Nach Scr.)

**A. biguttatus F.**

Nicht selten an Eichen V — VII. Fr. beobachtete bereits im März 1894 einige Exemplare nebst mehreren Larven in einem Eichenstrunk des Großostheimer Waldes.

ab. hiemalis Obbg.

Ende Mai 1922 aus Eichenstrunk gezogen, 8 St.

**A. subauratus Gebl. (= coryli Ratzbg.)**

Hanau im sogenannten Mississippi (H.). Im Kahltal auf Weide 1 St. 30. 6. 22 (Ochs). Würzburg Guttenberger Wald aus Salweide, 1 St. 24. 6. 20.

**A. convexicollis Redt.**

Am Schöllmüllersee auf Eschen mehrfach 1. 7. 28 (S.). Auf Linde 9. 8. 28.

**A. coeruleus Rossi.**

Wiesenfeld 9. 7. 19. Aschaffenburg an Eichenästen 7. 14. Am Röderbach 24. 5. 43.

**A. laticornis Illig.**

Aschaffenburg (D.). Schönbusch an Eichen nicht selten 14. 6. 29, 1. 7. 26, 3. 7. 28. Wendelberg an Eiche 23. 6. 37.

**A. angustulus Illig.**

Aschaffenburg (D.). Lohr Beilstein 18. 6. 22 (St.). Findberg 23. 5. 26. Bei Glattbach an Eiche 14. 5. 28. Schmerlenbacher Wald 24. 5. 04, 6. 8. 35. Kahl 25. 6. 26, 2. 8. 26. Am Röderbach auf Weide 30. 3. 20.

**A. sinuatus Oliv.**

Hain i. Sp. von Birnbaum 29. 6. 26. Bei Gamburg 20. 8. 22 (St.).

**A. Roberti Chevr.**

Wendelberg an Espe 29. 6. 35. Karlstadt a. M. 21. 6. 31. Großostheim Steinbruch  
11. 6. 50 (Noll) (t. G. Schmidt).

**A. viridis L.**

Striet auf Birke 14. 6. 26. Krainberg 7. 6. 25, 5. 7. 25 (t. Quelle).

ab. **linearis F.**

Kahl 13. 6. 37. Karlstadt 14. 6. 43. Krainberg 18. 7. 36. Nach Döbner kommt auch  
ab. fagi Ratzebg. hier vor.

**A. aurichalceus Redt.**

Aschaffenburg (D.). Krainberg 19. 7. 25.

**A. derasofasciatus Lac.**

Gamburg a. d. Tauber 20. 8. 23 (St.).

**A. cinctus Oliv.**

Schönbusch auf Sarothamnus 25. 7. 1880 (A.).

**A. olivicolor Kiesw. (olivaveus Ratzbg.)**

Aschaffenburg Fasanerie von einem Hainbuchenzaun 6. 1894 (Fr.). Schloßgarten  
7. 1886 (Fr.). Godelsberg auf Brombeerstauden 6. 1894 (Fr.). Großkrotzenburger  
Moore 25. 6. 26. Schönbusch 1. 7. 24, 29. 7. 27 von Esche.

**A. elatus F. (= hyperici Creutz.)**

Mäusberg bei Wiesenfeld 29. 6. 30. Karlstadt 25. 7. 30. Im Spessart 1 St. (Schneid).

**Aphanisticus Latr.**

**A. emarginatus Oliv.**

Aschaffenburg (Oe.). Sumpfwiese zwischen Damm und der Aktienbrauerei in  
Menge 5. 1894 (Fr.). Striet 5. 6. 26. Kahl auf Moorwiesen 15. 8. 20, 10. 9. 26,  
23. 11. 24.

**A. elongatus Villa.**

Großkrotzenburger Moore 10. 9. 26.

**A. pusillus Oliv.**

Aschaffenburg (D.). Schönbusch 6. 2. 27. Kahl Moore 6. 10. 26. Erbig 28. 11. 26.  
Hain i. Sp. Seebachtal 16. 10. 38, 8. 12. 37.

**Habroloma Thoms.**

**H. nana Hbst.**

Aschaffenburg (Fl.). Im Kalkgebiet auf *Geranium sanguineum* nicht selten. Karl-  
stadt a. M. 28. 3. 26, 22. 9. 29. Mäusberg bei Wiesenfeld 3. 1893, 8. 10. 29. Krain-  
berg 7. 4. 25, 5. 7. 25. Kalmut 28. 6. 25.

**Trachys F.**

**T. minuta L.**

Häufig auf Salweide. IV V VI.

**T. troglodytes Schönh.**

Aschaffenburg (D.). Stockstadter Wald Gersprenzwiesen 15. 2. 17, 17. 9. 05. Kal-  
mut 14. 6. 05. Kalbenstein 30. 8. 35. Großkrotzenburger Moore 16. 11. 25.

**T. pygmaea F. (= corrusca Ponza.)**

Von Oe. als selten angegeben. Aschaffenburg (Fl.). ca. 1880, 3 St.

**T. pumila Illig.**

Bei Großwallstadt 11. 3. 33. Karlstadt 6. 3. 37. Godelsberg in der Obstanlage  
7. 7. 38.

**T. fragariae Rtt.**

Im Kalkgebiet an *Fragaria collina* Ehrh. Kalbenstein bei Gambach aus Moos-  
und Pflanzenrasen gesiebt 11. 3. 33. Kalmut an *Fragaria collina* Ehrh. 21. 8. 26.

# Fossipedes

## Dascillidae

*Dascillus* Latr.

**D. cervinus L.**

Krainberg bei Gambach 26. 6. 32.

*Eubria* Latr.

**E. palustris Germ.**

Striet (D.).

## Helodidae

*Helodes* Latr.

**H. minuta L.**

Häufig auf feuchten Wiesen. V — VII. (Fr.).

ab. *laeta* Panz.

Wiesen hinter Damm 5. 1894 (Fr.). Strietrand unterhalb Kleinostheim auf blühen-  
dem Weißdorn 22. 5. 1898 (Fr.).

**H. marginata F.**

Vor der Rückersbacher Schlucht auf feuchter Wiese 3. 5. 25. Hain i. Sp. Pollasch-  
grund 2. 6. 35. Wiesen hinter der Schöllmühle von Espe und Salweide geklopft  
10. 5. 37.

*Microcara* Thoms.

**M. testacea L.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Südöstlicher Strietrand 3. 6. 26. Sendelbach bei Lohr  
am See (St.).

*Cyphon* Payk.

**C. coarctatus Payk.**

Schönbusch 4. u. 5. 1894 (Fr.). Fasanerie 24. 5. 39. Kahl 11. 6. 25. Am Mainufer  
25. 6. 24. Klingenberg 4. 7. 26. Rückersbacher Schlucht 3. 5. 25.

ab. *palustris* Thoms.

Seligenstadt (Scr.).

**C. variabilis Thunbg.**

Nicht selten am Schönbuschsee. Sendelbach bei Lohr am See (St.). Lindig 3. 5. 25.  
Rückersbacher Schlucht unter Schilf 22. 2. 25, 23. 11. 46.

**C. padi L.**

Aschaffenburg (D.). Schönbusch.

**C. Paykulli Guer.**

Wiesen hinter Damm 6. 1894 (Fr.). Fasanerie 10. 6. 39.

ab. macer Kiesw.  
Seligenstadt (Scr.)

### **Prionocyphon Redt.**

#### **P. serricornis Müll.**

Seligenstadt (Scr.). Lohr auf dem Rotenberg, Larven zahlreich in einer Wasserpfütze eines Föhrenstrunkes 5. 04 (St.). imago 16. 8. 28 (St.).

### **Hydrocyphon Redt.**

#### **H. deflexicollis Müll.**

Striet auf Wiesen (Oe.).

### **Scirtes Illig.**

#### **S. hemisphaericus L.**

Nicht selten am Rand von Gewässern und Sümpfen VII VIII.

#### **S. orbicularis Panz.**

Am Röderbach gestreift 30. 6. 38, 2 St. (S.).

## **Eucinetidae**

### **Eucinetes Germ.**

#### **E. haemorrhous Duft.**

Von Oe. noch als sehr selten angeführt. Aschaffuer unter Laub. Karlstadt am Steig unter Moos 28. 3. 26, 26. 9. 26. Wendelberg 26. 5. 36. Sandgrube bei Mainaschaff 3. 11. 34.

## **Macroductylidae**

### **Dryopidae**

#### **Potamophilus Germ.**

#### **P. acuminatus F.**

Hanau (Junker).

#### **Dryops Oliv. (= Parnus F.)**

#### **D. viennensis Heer.**

Aschaffenburg (D.).

#### **D. luridus Er.**

Aschaffenburg Gr. Schönbuschallee in einem Wassergraben 21. 10. 04. Stockstadter Wald Sumpf an der Gersprenz 5. 3. 24. Amorbach 8. 04.

#### **D. Ernesti Gozis.**

Kahl. Amorbach 7. 8. 04.

#### **D. auriculatus Geoffr. (= prolifericornis F.)**

Aschaffenburg (Oe.). Lindigwiesen 3. 8. 28. Kahl Moore.

### **Helichus Er.**

#### **H. substriatus Müll.**

Hanau (Junker) 1875.

## Helmis Latr.

### H. Latreillei Bedel.

Waldaschaff 27. 5. 37 (Noll). Lohr im Seegraben 21. 5. 45 (St.). Hain i. Sp. im oberen Seebach 2. 7. 22.

### H. Maugei Bedel.

Hain i. Sp. 14. 4. 22. 2. 7. 22. Im Main 17. 7. 05. Striet im Steinbach 5. 11. 05. Im Bach bei Homburg a. M. 27. 11. 38.

### H. obscura Müll.

Striet sehr selten (Oe.). Im Abfluß des Fasaneriesees (Fl.).

## Esolus Muls.

### E. angustatus Müll.

Aschaffenburg in kleineren Quellwässern (Fl.).

### E. parallelopipedus Müll.

Aschaffenburg Striet sehr selten (Oe.). 5. 11. 05 (S.).

### E. pygmaeus Muls.

Seligenstadt am Mainufer (Scr.). Stockstadt a. M. in einem Seitenarm der Gersprenz mündung 8. 7. 05. Randersacker bei Würzburg im Altwasser des Mains 10. 10. 33 (St.).

## Limnius Müll.

### L. tuberculatus Müll.

Aschaffenburg (Oe. u. Fl.). Stockstadt a. M. in der Gersprenz 8. 7. 05. Striet im Steinbach 5. 11. 05. Lohr im Main an Steinen der Flußsohle (St.).

## Riolus Muls.

### R. cupreus Müll.

Fasanerie (Oe.). Stockstadt a. M. in der Gersprenz 8. 7. 05.

### R. subviolaceus Müll.

Steinbach bei Lohr bei der Schürgermühle 16. 2. 23 (St.).

### R. nitens Müll.

Im Main unter Steinen (Fl.). Mainufer bei Nilkheim im Schilf 22. 9. 05. Seligenstadt am Mainufer (Scr.).

## Lathelmis Rtrr.

### L. Perrisi Duf. (= Germari Er.)

Hain i. Sp. im Seebach 14. 4. 21, 2. 7. 22.

### L. Volkhari Panz.

Aschaffenburg (Oe.). 12. 6. 08 (S.). Im Spessart (Fl.). Sailauf im Bach 5. 05. Stockstadt am Main in einem Gersprenzarm 8. 7. 05, sowie im Bach bei der Waldmühle 13. 8. 20. Striet 5. 11. 05.

### L. opaca Müll.

Lohr im Main an Steinen der Flußsohle (St.).

### L. Mülleri Er.

Mainufer im Schilf (Oe.). Seligenstadt am Mainufer (Scr.).

# Georyssidae

## Georyssus Latr.

### G. crenulatus Rossi.

Kahl an schlammigen Uferstellen des Langen Sees. Schweinheimer Exerzierplatz an einem ausgetrockneten Tümpel zahlreich 18. 4. 48 (Noll).

# Heteroceridae

## Heterocerus Fabr.

### H. marginatus F.

Aschaffenburg (Fl.).

### H. fenestratus Thunbg.

Graben am Ernsthof 4. 1894 (Fr.). Mainufer.

### H. hispidulus Kiesw.

Aschaffenburg (D.). Mainufer 24. 5. 05, 19. 5. 42.

# Bradhymera

## Dermostidae

### Dermostes L.

### D. vulpinus F.

Aschaffenburg (Oe.).

### D. Frischi Kugel.

Aschaffenburg (Oe.). Beim Städtischen Wasserwerk an Aas 20. 5. 31 (Noll).

### D. murinus L.

Büchelberg an Vogelaas 15. 4. 06. Striet in Menge an einem toten Hasen 4. 1895 (Fr.). Dachsberg 26. 5. 35 (Noll). Sandgrube bei Mainaschaff unter Moos. Fasanerie 6. 1895 (Fr.).

### D. lanarius Illig.

In einem Stadtgarten an Aas 4. 1894 (Fr.). Bei Nilkheim an Menschenkot 4. 1894 (Fr.). Mainufer 5. 07, 10. 7. 26. Sandgrube bei Sulzbach a. M. 8. 9. 19. Kahl Moore 7. 11. 05.

### D. undulatus Brahm.

Aschaffenburg (D.). Seligenstadt (Scr.). Erbig in altem Apfelbaum 26. 1. 24. Unter Moos 20. 1. 35. Sandgrube bei Großostheim 24. 3. 29. An Vogelaas (Rabe) 23. 4. 06. Gemünden 10. 6. 22 (St.). An einem toten Maulwurf 7. 1894 (Fr.). Thüngerstheim an verwesten Hasen 2. 7. 22 (St.). Am Fuß des Findbergs 8. 11. 36.

### D. bicolor F.

Im Haus Albrechtstraße, 11. und 16. 5. 35. Auf der Mainbrücke fliegend 23. 5. 07. Fasanerie 6. 1874 (Fr.). In einem Taubennest 13. 8. 27 (Noll).



**D. lardarius L.**

Häufig an tierischen Stoffen. V VI VII.

**Attagenus Latr.**

**A. Schaefferi Hbst.**

Aschaffenburg auf Weißdornblüten (Hoppe und Brahm). In der Stadt angefliegen 7. 1896 (Fr.).

**A. piceus Oliv.**

Büchelberg 5. 1895 (Fr.). In der Stadt fliegend 7. 1896 (Fr.). Unter Baumrinde 28. 2. 05. Im Haus 30. 5. 37. An Weide an der Aschaff 15. 7. 29.

**A. pellio L.**

Schädlich in Häusern an Pelzen und Teppichen. Im Freien in hohlen Bäumen und auf Blüten, besonders auf Weißdorn und Spiraeen.

**A. punctatus Scop. (= XX- guttatus Fab.)**

Schmerlenbacher Wald unter Eichenrinde 6. 1876 (Fr.).

**Megatoma Hbst.**

**M. undata L.**

Godelsberg unter Birkenrinde 2. 1894 (Fr.). Großostheim unter Apfelbaumrinde 1. 2. 31. Kleinostheim in hohlem Apfelbaum 16. 2. 05. Stockstadter Wald an alter Eiche 21. 5. 25. Karlstadt a. M. an alten Balken 12. 5. 09.

**Globicornis Latr.**

**G. marginata Payk.**

Aschaffenburg sehr selten (Oe. u. D. N.). Bei Aschfeld gesiebt 12. 10. 46 (J. S.).

**G. corticalis Eichh.**

Aschaffenburg Exerzierplatz unter Platanenrinde 1. 1894, 5. 1895 (Fr.). Rothenbuch i. Sp. im Moos alter Eichen 13. 3. 27. Büchelberg von Fichte geklopft 15. 4. 23. Fasanerie unter Eichenrinde 25. 11. 23.

**G. nigripes F.**

Schönbusch am oberen See in Menge auf blühenden Umbelliferen 6. 1894 (Fr.). 8. 6. 33 (S.).

**Trogoderma Latr.**

**T. nigrum Hbst.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.).

**Ctesias Steph.**

**C. serra F.**

Obernauer Wald (Oe.). Schmerlenbacher Wald 6. 1896 (Fr.). Godelsberg auf blühender Linde 25. 6. 42. Schmerlenbacher Wald auf Fichte 1. 7. 29.

**Anthrenus F.**

**A. pimpinellae F.**

Häufig auf Blüten. V — IX.

**A. scrophulariae L.**

Häufig auf Blüten und in Häusern.

**A. verbasci L.**

Häufig auf Blüten und starker Schädling der Insekten-Sammlungen.

**A. museorum L.**

Häufig und schädlich wie der Vorige.

**A. fuscus Oliv.**

Auf Erdbeerblüten 5. 1894 (Fr.).

**Trinodes Latr.**

**T. hirtus F.**

Aschaffenburg an alten Pappeln (Oe.). Hanau in hohler Buche (H.).

## Nosodendridae

**Nosodendron Latr.**

**N. fasciculare Oliv.**

Aschaffenburg Striet an Birkenensaft 15. 4. 22. In der Bismarckallee an ausfließendem Ulmensaft zahlreich.

## Byrrhidae

**Pelochares Muls. Rey.**

**P. versicolor Waltl.**

Seligenstadt (Scr.). Gailbachtal unter Laub 8. 12. 04 Kahl a. M. (B. u. Sattler).

**Limnichus Latr.**

**L. pygmaeus Strm.**

Seligenstadt (Scr.).

**L. sericeus Duft.**

Aschaffenburg (D.).

**Simplocaria Steph.**

**S. semistriata F.**

Seligenstadt (Scr.). In einem Hausgarten unter Laub 6. 8. 04. Bei Stockstadt a. M. 9. 9. 07. Steinbachtal 25. 11. 05. Kahl, Moore 18. 11. 24.

**Morychus Er.**

**M. aeneus F.**

Aschaffenburg (Oe.).

**Lamprobyrrhulus Ggbl.**

**L. nitidus Schall. (= nitens Panz.)**

Vor Glatzbach 14. 4. 06. Karlstadt auf den Landwehren unter Moos- und Pflanzenrasen 1. 4. 29, 14. 6. 42. Hinter Damm an den Löbhängen herumlaufend. Mainufer. Bei Eichenberg 10. 8. 53.

**Cytilus Er.**

**C. sericeus Forster.**

Nicht selten. Kahl am Langen See 19. 4. 25.

**C. auricomus Duft.**

Am Schöllmüllersee gestreift 7. 5. 1894 (Fr.).

## **Byrrhus L.**

### **B. fasciatus Forst.**

Seligenstadt (Scr.). Schloßgarten 4. 1894 (Fr.). Stockstadter Wald 4. 1895 (Fr.). Metzgergraben i. Sp. 12. 4. 25. Hain i. Sp. Seebachtal 14. 5. 25. Kl. Exerzierplat 5. 07.

### **B. pustulatus Forst.**

Schloßgarten 4. 1894 (Fr.). Glattbacher Wald 4. 1895 (Fr.). Hain i. Sp. Seebachtal 21. 3. 27. Stockstadter Wald 10. 4. 26. Gailbachtal 14. 5. 32. Findberg 1. 5. 44. Kahl.

### **B. pilula L.**

Häufig auf trockenen Grasplätzen und unter Steinen.

### **B. glabratus Heer. (= ornatus Panz.)**

Obernauer Wald 4. 09. Waldaschaff 28. 4. 26. Striet 5. 5. 12. Miltenberg 4. 1895 (Fr.). Heigenbrücken 6. 1894 (Fr.).

### **B. luniger Germ.**

Im Kahlthal 8. 6. 22 (Ochs).

## **Porcinolus Muls.**

### **P. murinus F.**

Gartenberg unter Moos 8. 2. 25. Wachenbachtal 30. 3. 07. Weiler i. Sp. 7. 4. 26.

## **Syncalyptra Steph.**

### **S. setigera Illig.**

Seligenstadt (Scr.). Mainhecken 4. 06. Gailbachtal.

### **S. spinosa Rossi.**

Seligenstadt am Mainufer (Scr.). Schmerlenbacher Wald mehrfach.

# **Clavicornia**

## **Ostomidae**

### **Nemosoma Latr.**

### **N. elongatum L.**

Schönbusch und Schmerlenbacher Wald (Oe.). Schöntal unter Buchenrinde (Fl.).

### **Tenebrioides Pill. et. Mitt.**

### **T. mauritanicus L.**

Unter Pappelrinde 1. 1894 (Fr.). Bei Obernau unter Apfelbaumrinde 22. 3. 05. Unter Weidenrinde links des Mains 25. 9. 38, 27. 11. 38. Mömbris unter Rinde eines gefälltten Kirschaumes 13. 4. 44. Lohr im Weizenmehl 6. 10. 22 (St.).

### **Ostoma Laicharting.**

### **O. ferrugineum L.**

Schmerlenbacher Wald unter Rinde 7. 1874 (Fr.).

### **Grynocharis Thoms.**

### **G. oblonga L.**

Stockstadter Wald (Oe.). Seligenstadt unter Robinienrinde (Scr.).

## **T h y m a l u s Latr.**

### **T. limbatus F.**

Aschaffenburg im botanischen Garten der Forstlehranstalt (D.). Heigenbrücken 1880, 1 St. (Fl.). Weibersbrunn i. Sp. gestreift am Waldrand bei alten Hölzern 1. 5. 52 (J. S.). Bei Rohrbrunn i. Sp. unter Baumrinde 22. 6. 52, 12 St. (J. S.). 25. 10. 53, 3 St. (J. S.)

## **Byturidae**

### **Byturus Latr. (= Trixagus Kug.)**

#### **B. aestivus L. (= fumatus F.)**

Häufig auf Blüten V VI VII.

#### **B. tomentosus F.**

Häufig auf Blüten, besonders auf Himbeeren, in deren Früchten sich die Larven entwickeln, daher die Bezeichnung „Himbeerkäfer“ (Rtt). Auf Weidenblüten 10. 5. 37. Auf Sambuccus racemosa 1. 5. 05. Auf Kirschblüten 10. 5. 24.

## **Nitidulidae**

### **Cateretes Hbst.**

#### **C. pedicularius L.**

II — VI auf Blüten, im Winter unter Moos. Sumpfwiesen hinter Damm 4. 1894 (Fr.).

#### **C. rufilabris Latr.**

Seligenstadt (Scr.). Schönbusch am Seeufer 30. 5. 04. Stockstadt a. M. Gersprenzwiesen.

### **Heterhelus Duval.**

#### **H. scutellaris Heer.**

Auf blühender Weide 19. 4. 05. Fasanerie auf Sambuccus racemosa 1. 5. 05.

#### **H. solani Heer.**

Schmerlenbacher Wald auf blühender Weide 15. 4. 09. Auf Sambuccus racemosa (Fr.). Am Schöllmüllersee 5. 1894 (Fr.).

### **Brachypterus Kugel.**

#### **B. glaber Steph.**

Seligenstadt (Scr.).

#### **B. urticae F.**

Häufig, besonders auf Nesseln 20. 4. 04, 15. 6. 09.

#### **B. fulvipes Er.**

Seligenstadt 1869 mehrfach (Scr.).

### **Brachypterus Grouy.**

#### **B. pulicarius L. (= gravidus Illig.)**

Aschaffenburg (Oe.). Stockstadter Wald 29. 6. 28. Kahlthal bei der Herrenmühle 12. 7. 25. An Linaria-Blüten 23. 7. 10.

#### **B. villiger Rtt. (= cinereus Er.)**

Aschaffenburg selten (Oe. u. D. N.).

## Pria Steph.

### **P. dulcamarae Scop.**

Aschaffenburg (D.). Seligenstadt (Scr.). Kahl 9. 10. 04. In Blüten von *Solanum nigrum* und *dulcamara* (Fr.).

## Meligethes Steph.

### **M. (Odontogethes Rtrr) hebes Er.**

Aschaffenburg (Oe.). Striet auf Weißdorn 5. 5. 12. Spessart 7. 5. 16.

### **M. (Meligethes s. str.) atratus Oliv. (= rufipes Marsh.)**

Seligenstadt (Scr.). Striet auf Kirschblüte 15. 5. 24. Auf *Filipendula ulmaria* 14. 7. 24.

### **M. subrugosus Gyll.**

Aschaffenburg (Oe.). Gailbachtal 3. 5. 05. Mainhecken 9. 4. 09. Spessart 7. 5. 16.

### **M. coracinus Sturm.**

Aschaffenburg (Oe.). Am Bischberg auf Kirschblüte 2. 5. 05. Mörsweise 19. 5. 12. Striet auf *Ranunculus*-Blüten 5. 5. 12. Kahl Moore 10. 04 (S.).

ab. *pumila* Er.

Seligenstadt (Scr.).

### **M. subaeneus Strm.**

Seligenstadt (Scr.).

### **M. aeneus F. (= brassicae Scop.)**

Häufig auf Raps. Fasanerie an *Iris-pseudacoris* 3. 6. 40.

### **M. viridescens F.**

Am Bischberg auf Kirschblüten 2. 5. 05. Kahltal 12. 7. 25.

### **M. serripes Gyll.**

Aschaffenburg (D. N.). Seligenstadt (Scr.).

### **M. haemorrhoidalis Forst.**

Bischberg auf Kirschblüten 2. 5. 05. Striet 5. 5. 12.

### **M. difficilis Heer.**

Godelsberg 6. 5. 05. Mainufer gegenüber Nilkheim 22. 9. 05.

### **M. Kunzei Er.**

Gailbachtal 3. 3. 05. Mainufer.

### **M. ochropus Sturm.**

Aschaffenburg (Oe.). Am Bischberg auf Kirschblüten 2. 5. 05. Godelsberg 6. 5. 05.

### **M. morosus Er.**

Seligenstadt (Scr.). Nach v. Heyden gern auf *Lamium album* (Fr.).

### **M. viduatus Sturm.**

Aschaffenburg an *Epilobium* (Oe.).

### **M. pedicularius Gyll.**

Seligenstadt an *Epilobium* (Scr.).

### **M. umbrosus Sturm.**

Aschaffenburg selten (Oe.). Auf Löwenzahnblüte 28. 4. 05. Kalmut 28. 6. 25.

**M. symphyti Heer.**

Aschaffenburg (Oe.). Mörsweise an *Symphytum officinale* 19. 5. 12.

**M. ovatus Sturm.**

Seligenstadt (Scr.). Kalbenstein auf Schlehenblüten 7. 5. 22 (St.).

**M. maurus Sturm.**

Aschaffenburg (Oe.). Am Bischberg auf Kirschblüte 2. 5. 05. Mörsweise 12. 5. 05.  
Mindig 13. 7. 04.

**M. picipes Sturm.**

Aschaffenburg (D. N.). Seligenstadt (Scr.). Am Bischberg auf Kirschblüten 2. 5. 05

**M. flavipes Sturm.**

Aschaffenburg (D. N.). Bischberg auf Kirschblüte 2. 5. 05. Mörsweise 12. 5. 05.  
v. *moestus* Er.  
Seligenstadt (Scr.).

**M. tristis Sturm.**

Aschaffenburg (D. N.). Seligenstadt (Scr.). Geishöhe i. Sp. 5. 1882.

**M. assimilis Sturm.**

Seligenstadt (Scr.). Am Bischberg auf Kirschblüte 2. 5. 05. Mörsweise 12. 5. 05.

**M. obscurus Er.**

Kalmut 20. 6. 25, 20. 7. 25. Seligenstadt (Scr.).

**M. erythropus Gyll.**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.). Am Bischberg auf Kirschblüten 2. 5. 05.

**M. exilis Sturm.**

Aschaffenburg (D.). Seligenstadt (Scr.).

**M. lugubris Sturm.**

Aschaffenburg (D. N.). Mainwiese gegenüber Nilkheim 11. 9. 05.

**M. egenus Er.**

Aschaffenburg (Fl.). Fasanerie am See 6. 6. 40 (t. Rebmann).

**Carpophilus Leach.**

**C. dimidiatus F.**

Höchst a. M. in importiertem Reisabfall 1903 (n. Bücking).

**C. sexpustulatus F.**

Seligenstadt (Scr.). Schmerlenbacher Wald im Frühjahr 1905 und Herbst 1906 häufig<sup>1</sup> unter Rinde von Eichen- und Buchenstöcken. Mömbris unter gelockerter Rinde eines gefällten Nußbaumes 15. 4. 44.

**Nitidula Fabr.**

**N. bipunctata L.**

Aschaffenburg an Aas und alten Knochen (Oe.). Fasanerie 7. 1866 (Fr.). Unter lockerer Eichenrinde 1 St. 12. 5. 49 (J. S.).

**N. rufipes L.**

Schönbuschallee an Vogelaas 4. 1894 (Fr.). Schmerlenbacher Wald an Vogelaas 1. 5. 05. Mörsweise an Fischeaß 12. 5. 05.

**N. carnaria Schaller (= IV-pustulata F.)**

Seligenstadt unter Rinde (Scr.). Aschaffenburg an Vogelaas 4. 1894 (Fr.).

**O m o s i t a Er.**

**O. depressa L.**

An Aas und alten Knochen. Striet 7. 1892 (Fr.).

**O. discoidea F.**

Häufig unter Platanenrinde 10. 2. 04. An Vogelaas 29. 3. 07.

**O. colon L.**

Häufig unter Platanenrinde. 16. 2. 05. An Vogelaas 5. 7. 08.

**E p u r a e a Er.**

**E. (Eपुरaeanelle Er.) limbata F.**

Aschaffenburg (Oe.). An ausfließendem Baumsaft (Fr.). Obernau am Fuß einer Pappel 25. 9. 36. Großkrotzenburger Moore 26. 11. 25 (t. Rebmann).

**E. (Eपुरaea s. str.) guttata Oliv. (= decemguttata F.)**

Aschaffenburg (Oe.). Fasanerie an verpilzter Buche 19. 5. 49. An Eichensaft 27. 5. 39, 6. 6. 49 zahlreich. 7. 1874 (Fr.).

**E. fuscicollis Steph.**

Von Fl. und Schw. in Aschaffenburg nachgewiesen.

**E. depressa Illig. (= aestiva L.)**

Aschaffenburg (Oe.). Fasanerie an ausfließendem Eichensaft 16. 6. 25. An Weißdorn und Kirschblüte 4. 11.

**E. melina Er.**

Aschaffenburg (Oe.). Schmerlenbacher Wald unter Rinde eines Lärchenstrunkes 19. 4. 05. Mainwiesen.

**E. terminalis Mannh.**

Aschaffenburg aus Baumschwämmen (D.). Glattbacher Wald 3. 11. 07. Schmerlenbacher Wald 6. 11. 04.

**E. neglecta Heer.**

Aschaffenburg an ausfließendem Eichensaft (Oe.). Schönbusch auf Weißdornblüten 14. 5. 04.

**E. rufomarginata Steph.**

Aschaffenburg an ausfließendem Eichensaft und auf Blüten (Oe.). Heigenbrücken unter Eichenrinde 3. 8. 05.

**E. castanea Duft.**

Aschaffenburg (D.). Glattbacher Wald an Eiche 30. 5. 04.

**E. variegata Hbst.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

**E. biguttata Thunbg. (= obsoleta F.)**

Aschaffenburg (Oe.). Nicht selten an Eichensaft V — VIII.

**E. longula Er.**

Aschaffenburg (Oe.). Schmerlenbacher Wald 18. 3. 06, 18. 8. 12. Hain i. Sp. unter Buchenstrunkrinde 27. 4. 24.

**E. pygmaea Gyll.**

Seligenstadt (Scr.). Striet 27. 4. 39.

**E. pusilla Illig.**

Aschaffenburg (Oe.). Schmerlenbacher Wald unter Rinden 19. 4. 05 ebenso im Schönbusch.

**E. oblonga Hbst.**

Aschaffenburg (D. N.).

**E. florea Er.**

Aschaffenburg (Oe.). Nach v. Heyden an Blüten von *Salix caprea* (Fr.). Nach Scr. an Baumsaft. Bischberg an Kirschblüte 2. 5. 05. Mörswiese am Mainufer auf Blüten 12. 5. 05.

**E. (*Micrurula* Rtrr.) *melanocephala* Marsh.**

Auf Ahornblüten 4. 08. Schönbusch 5. 1895 (Fr.).

**I p i d i a Er.**

**I. quadrimaculata Quens. (IV-notata F.)**

Heigenbrücken an Buchen (Fl. und A.). Auch unter Eichenrinde (Fr.).

**S o r o n i a Er.**

**S. punctatissima Illig.**

Aschaffenburg beim Raental (Oe.). Seligenstadt und Aschaffenburg an ausfließendem Eichensaft (Scr.).

**S. grisea L.**

Unter Baumrinde und an Eichensaft sehr häufig.

**A m p h o t i s Er.**

**A. marginata F.**

Aschaffenburg bei *Formica fuliginosa* (Oe.). Stockstadter Wald unter Laub 25. 4. 37. Rothenbuch i. Sp. unter Laub bei *Formica fuliginosa* 6. 5. 37. Schönbusch Sandgrube von Salweide geklopft 27. 6. 24.

**C y c h r a m u s Kugel.**

**C. luteus F.**

Fasanerie an Blüten von *Sambucus racemosa* 2. 5. 05. Auf Himbeerblüten 5. u. 6. (Fr.). Kahlthal 12. 7. 25. Godelsberg an Schwämmen 14. 10. 05. Steinbachtal 9. 11. 05  
ab. *fungicola* Heer.  
Schönbusch 28. 5. 02. Striet an *Boletus* 9. 1893 (Fr.).

**P o c a d i u s Er.**

**P. ferrugineus F.**

Gailbachtal 26. 4. 51. Fischerhecke 6. 1894, 9. 10. 1893 an *Bovisten* (Fr.). Striet 5. 11. 05. Fasanerie an Eichensaft 16. 6. 25. Hanau bei der Pulverfabrik an alten Baumschwämmen 22. 7. 23 (Ochs). Hochspessart 9. 24 (St.).

**T h a l i c r a Er.**

**T. fervida Oliv.**

Stockstadter Wald an Eichensaft 21. 5. 25. Fasanerie an Eichensaft 4. 6. 25. Findberg in *Bovisten* 9. 1893 (Fr.). Auch auf Blumen (Fr.).



## **Cryptarcha Shuk.**

### **C. strigata F.**

Gailbachtal 10. 4. 05. Fasanerie an Eichensaft 8. 6. 25. Stockstadter Wald an Eichensaft 21. 5. 25. Sodener Wald auf Sumpfwiese im Herbst 1907. Im Winter unter Baumrinde.

### **C. imperialis F.**

Im Somler an Eichensaft, im Winter unter Moos und Rinde von alten Eichen. Stockstadter Wald 21. 5. 25. Fasanerie 16. 6. 25, 8. 12. 23.

## **Librodor Rtrr.**

### **L. quadriguttatus F.**

Aschaffenburg (D. N.). Schmerlenbacher Wald unter Rinde von Buchenstöcken 2. 4. 11, 11. 5. 06. Unter Eichenrinde 9. 4. 05.

### **L. hortensis Fourcr. (= quadripunctatus Oliv.)**

Stockstadt a. M. Gersprenzwiesen unter Pappelrinde 18. 5. 24. Fasanerie auf einem mit ausfließendem Saft bedeckten Eichenstrunk 4. 5. 39. Schönbusch 4. 6. 35 (Noll). An fauler Bienenwabe mit abgestorbenen Drohnenlarven 2. 7. 46 (Noll).

## **Glischochilus Rtrr.**

### **G. quadripunctatus L. (= quadripustulatus L.)**

Unter Buchenrinde 2. 3. 24, 2. 4. 11. Hain i. Sp. unter Eichen- und Erlenrinde 17. 4. 24. Geierkopf i. Sp. 21. 5. 25. Heigenbrücken unter Rinde 7. 1877 (Fr.). Oberes Aschafftal unter Buchenrinde 14. 10. 24.

## **Pityophagus Shuk.**

### **P. ferrugineus L.**

Bei Steinbach (Oe.). Bei Aschaffenburg (D. N.). Büchelberg am Haibacher Kreuz 26. 4. 08. Stockstadter Wald in Kulturschutzgräben 5. 5. 04. Spessart 9. 5. 16. Fasanerie unter Rinde 5. 1893 (Fr.).

## **Cybocephalus Er.**

### **C. politus Germ.**

Seligenstadt einmal in Anzahl unter Apfelbaumrinde (Scr.).

# **Rhizophagidae**

## **Rhizophagus Hbst.**

### **R. (Cyanostolus Ggl.) aeneus Richt.**

Hanau 1936, 4 St. (Hepp). Fasanerie an Eichenstrunk 26. 4. 40 (J. S.).

### **R. (Eurhizophagus Meg.) grandis Gyll.**

Von cand. forest Bergmüller im Spessart in Anzahl gefunden 7. 1897.

### **R. depressus F.**

Fasanerie in Boletus (Fr.). Glatzbacher Wald unter Kiefernrinde bei *Hylastes palliatus* Gyll. 15. 5. 21. Kahl unter Kiefernrinde 12. 6. 04. Bei Wiesen i. Sp. unter Fichtenrinde bei *Pityogenes chalcographus* 16. 10. 21, 2 St. Am Engländer i. Sp. unter Rinde von Weymuthskiefern bei *Pityogenes chalcographus* 16. 10. 21.

**R. (Rhizophagus s. str.) ferrugineus Payk.**

Fasanerie unter Rinde 5. 1893 (Fr.). Büchelberg am Haibacher Kreuz 26. 4. 08.  
Stockstadter Wald in Kulturschutzgräben 15. 5. 04.

**R. perforatus Er.**

Aschaffenburg (D. N.). Kahlthal 15. 4. 44 (J. S.). Heigenbrücken 21. 8. 1880 (Fl.).

**R. parallelicollis Gyll.**

Von Fl. einmal auf einem Grabstein dahier zu Tausenden gefunden. Die Larve lebt nach v. Heyden in der Tiefe im Holz der Särge, den Tomiciden-Larven nachstellend. Im Mark eines Kiefernastes 4. 10. 21. Auf der Mainbrücke fliegend. Im Kahlthal 16. 4. 16.

**R. picipes Oliv. (= politus Hellw.)**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Auf der Mainbrücke fliegend 11. 4. 06.  
Kahl 12. 5. 04. Stockstadt a. M. Gersprenzufer unter Pappelrinde 18. 5. 24. Obernau 28. 10. 28.

**R. bipustulatus F.**

Aschaffenburg unter Eichenrinde (Oe.). Glattbacher Wald unter Fichtenstrunkrinde 4. 07. Schmerlenbacher Wald unter Buchenstrunkrinde 10. 5. 06. Fasanerie an Eichenstrunkrinde 10. 6. 39, 30. 10. 04.

**R. dispar Payk.**

Heigenbrücken 4. 1895 (Fr.). Schmerlenbacher Wald unter Buchenstrunkrinde 11. 5. 06. Metzgergraben i. Sp. unter Eichenrinde 26. 5. 40. Jakobstal i. Sp. an Fichtenstrunk 17. 7. 27.

## Cucujidae

### Monotoma Hbst.

**M. (Gyrocecis Thoms) conicicollis Gyll.**

Schmerlenbacher Wald bei Formica rufa (Fl.). Sodener Wald bei Formica rufa (Eckart), ebenso im Striet 28. 4. 27, 28. 8. 26. Steinheim 2. 21 (H.).

**M. angusticollis Gyll.**

Fasanerie bei Formica rufa (Oe.). Laufach bei Formica rufa Ende 7. 24. Striet bei Formica rufa 28. 8. 26.

**M. (Monotoma s. str.) picipes Hbst.**

Aschaffenburg (D.). Meist in trockenem Mist (Fr.). Kahl Moore 14. 9. 25.

**M. longicollis Gyll.**

Seligenstadt (Scr.). Mainhecken 21. 4. 06.

### Airaphilus Redt.

**A. elongatus Gyll. (= geminus Kr.)**

Fasanerie (Oe.). Dammer Sumpfwiesen (Fl.). Stockstadter Wald 2. 1. 27. Kahler Moore 10. 05, 1. 11. 05 nicht selten.

### Orizaephilus Gglb.

**O. surinamensis L.**

Aschaffenburg im Getreide (Oe.). Zahlreich im Laboratorium des Städt. Gaswerkes Ende 8. 43 (Noll). Lohr in Weizenmehl 6. 10. 22 (St.).

## **Silvanus Latr.**

### **S. bidentatus F.**

Seligenstadt unter Kiefernrinde (Scr.).

### **S. unidentatus Oliv.**

Aschaffenburg unter abgestandener Rinde nicht selten (Oe.). Striet unter Eichenrinde 8. 4. 06, 29. 5. 22. Godelsberg unter Rinde alter Pfosten 7. 5. 05.

## **Silvanoprus Rtrr.**

### **S. fagi Guér (= similis Er.)**

Aschaffenburg (S.).

## **Psammoecus Latr.**

### **P. bipunctatus F.**

Fasanerie (Fl.). In den Kahler Mooren nicht selten im Schilf 18. 9. 05, 28. 11. 24. Bei den Lindigwiesen unter Schilf 23. 11. 46 (J. S.).

## **Uleiota Latr.**

### **U. planata L.**

Fasanerie unter Eichenrinde 14. 7. 46, 4. 8. 46 (J. S.).

## **Pediacus Shuk.**

### **P. depressus Hbst.**

Aschaffenburg (Oe.).

### **P. dermestoides F.**

Aschaffenburg (D.).

## **Laemophloeus Cast.**

### **L. (Laemophloeus s. str.) monilis F.**

Aschaffenburg unter Baumrinde (Fl.). Bei Rohrbrunn im Haßlochthal 23. 4. 53 1 St.

### **L. Kraussi Gglb.**

Aus Ulmenrinde bei Scolytus multistriatus 15. 4. 39 (S.).

### **L. testaceus F.**

Aschaffenburg unter Buchenrinde (Oe.). Striet unter Eichenrinde 8. 4. 06. Glattbacher Wald unter Eichenrinde 14. 4. 06.

### **L. (Cryptolestes Gglb.) bimaculatus Payk.**

Aschaffenburg (Oe.) und Scr. 1865.

### **L. duplicatus Waltl.**

Aschaffenburg an Buchenholz (Fl.). Seligenstadt (Scr.).

### **L. ferrugineus Steph.**

Aschaffenburg in Mehl (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

### **L. clematidis Er.**

Aschaffenburg Mainanlage (Oe.). Mainhecken auf Clematis vitalba 25. 6. 24, ebenso auf dem Kalmut bei Xylocleptes bispinus Duft. 19. 8. 26.

### **L. corticinus Er.**

Stockstadter Wald an Kiefernast 7. 1863 (Fl.).

# Erotylidae

## Tritoma F.

### **T. bipustulata F.**

In Schwämmen und morschem Holz. Überwintert in den trockenen Baumpilzen. Miltenberg einige Stücke in Polyporus perennis 8. 1894 (Fr.). Im ganzen Gebiet nicht selten.

ab. incerta Rossi (= binotata Rtrr.)

Sodener Wald 24. 4. 21. Hain i. Sp. an Buchenschwämmen 21. 4. 35, 16. 7. 22.

## Triplax Hbst.

### **T. aenoa Schall.**

Am früheren Viehmarkt an Ulmenschwämmen 8. 1897 (cand. forest Bergmüller). Gailbachtal an Apfelbaumschwamm 7. 10. 06. Bei Rohrbrunn im Haßlochtal 2 St. 23. 4. 53 (J. S.).

### **T. russica L.**

Am Erbig an Apfelbaumschwamm (Noll). Bei Oberrau an Weidenschwamm 23. 4. 43, 28. 5. 44. Gemünden an Polyporus 24. 7. 33 (Ade). Büchelberg 17. 10. 26.

## Dacne Latr.

### **D. bipustulata Thunbg.**

Häufig an Baumschwämmen II — V u. VII.

## Diplocoelus Guér.

### **D. fagi Guér.**

Aschaffenburg (Oe.). Selten unter Buchenrinde (Fr.). Hanau (H.).

# Cryptophagidae

## Telmatophilus Heer.

### **T. sparganii Ahrens.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). 1880 (Fl.). Mainufer 25. 6. 24. Schönbuschsee.

### **T. caricis Oliv.**

Aschaffenburg (Oe.). Kahl Moore 18. 3. 24, 9. 10. 25. Schönbusch. Mainufer.

### **T. brevicollis Aubé.**

Seligenstadt (Scr.). Stockstadt a. M. an der Gersprenz 17. 6. 05. Mainufer 11. 9. 05.

### **T. typhae Fall.**

Aschaffenburg (Oe.). Sehr häufig am oberen Schönbuschsee 2. 5. 37. Stockstadter Wald.

### **T. Schönherri Gyll. (t. Hubenthal)**

Schönbusch am See (S.).

## Paramecosoma Curt.

### **P. melanocephalum Hbst.**

Glattbacher Wald (Oe.). Mainufer (Fl.). Auf der Mainbrücke im Frühjahr 1906 zahlreich fliegend. Lohr Wackewiese 21. 4. 28 (St.).

## **C o n i o p t h a l m a K a n g .**

### **C. californicus Mannh. (= Henoticus Thoms) (germanicus Rtrr.)**

Hanau 1 St. in coll. Hubenthal (t. Bruce).

### **C. villosus Heer.**

Seligenstadt auf Leinkraut (Scr.).

## **C r y p t o p h a g u s H b s t .**

### **C. acutangulus Gyll.**

Platanenallee unter Rinde 11. 1893 (Fr.). Mainbrücke 10. 5. 07. Seligenstadt (Scr.).

### **C. badius Sahlbg.**

Aschaffenburg (D.).

### **C. quercinus Kr.**

Seligenstadt an alten Eichen (Scr.). Aschaffenburg (S.).

### **C. subdepressus Gyll.**

Kahl 11. 04 (S.).

### **C. pubescens Sturm.**

Aschaffenburg (D.). Heigenbrücken 14. 7. 20.

### **C. saginatus Sturm.**

Aschaffenburg an Pilzen und bei *Formica fuliginosa* und *rufa*.

### **C. labilis Er.**

Aschaffenburg (D. N.). Heigenbrücken 28. 8. 1880.

### **C. pseudodentatus Brucé.**

Aschaffenburg, kl. Exerzierplatz unter Rinde 1. 1894 (Fr.). Kleinostheim aus hohlem Apfelbaum 1. 11. Hinter Damm 1. 3. 37. Am Röderbach auf blühendem Weißdorn 24. 4. 40. Steinbachtal auf Schlehen 15. 5. 24. Kahl Moore 14. 9. 25.

### **C. dorsalis Sahlbg.**

Aschaffenburg (D. N.). Seligenstadt (Scr.). Schmerlenbacher Wald unter Baumrinde 30. 10. 04. Schönbusch. Kahl.

### **C. distinguendus Sturm.**

Platanenallee unter Rinde 1. 1894 (Fr.). Aschaffenburg (S.).

### **C. scanicus L.**

Häufig an Pilzen, faulem Holz und unter Rinde (Fr.).

ab. *patruelis* Sturm.

Aschaffenburg, Mainhecken.

### **C. lycoperdi Scop.**

Godelsberg an Bovisten 7. 1894 (Fr.). Bei Damm in *Scleroderma* (Fr.). 15. 5. 24. Kahl 17. 8. 25, 6. 9. 05. In Bovisten 1. 9. 05.

### **C. pilosus Gyll.**

Aschaffenburg (Oe.). Lohr Apothekenkeller 3. 22 (St.). Obernau an Baumschwämmen 25. 5. 04.

### **C. cellaris Scop.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Lohr Apothekenkeller 3. 22 (St.).

**C. affinis Sturm.**

Aschaffenburg (Oe. u. S.). Seligenstadt (Scr.).

**C. setulosus Sturm.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt nicht selten an schimmeligen Fässern (Scr.).  
Aschaffenburg (S.).

**C. Schmidti Sturm.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

**Emphilus Er.**

**E. glaber Gyll.**

Zellhausen bei Formica rufa (H.).

**Antherophagus Latr.**

**A. nigricornis F.**

Meist auf Himbeerblüten. Schloßgarten 1 St. in Blüte von Philadelphus 5. 1893 (Fr.). Striet 19. 6. 09. Fasanerie 28. 7. 05. Bei Waldaschaff 25. 7. 26. Redtenbacher fand einige Stücke mit zahlreichen Larven in einem Hummelnest.

**A. pallens Oliv.**

Aschaffenburg (D.). Hanau Mainufer (H.).

**A. canescens Grouv. (= silaceus Er.)**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Glattbacher Wald 3. 6. 09. Schönbusch. Striet auf Astragalus glycyphyllus 19. 6. 09, 14. 7. 24.

**Atomaria Mrsh.**

**A. (Anchicera Thoms.) impressa Er.**

Aschaffenburg (D.).

**A. munda Er.**

Aschaffenburg Hofgarten im Keller unter Stroh (Fl.).

**A. unifasciata Er. (= fasciata Kol.)**

Aschaffenburg unter faulen Vegetabilien nicht selten (Oe.).

**A. mesomelaena Hbst.**

Aschaffenburg (D. N.). Am unteren Schönbuschsee 26. 5. 04 (S.). Kahl, Moore 23. 10. 04.

**A. atra Hbst.**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.).

**A. nitidula Heer.**

Aschaffenburg selten (Oe.).

**A. fuscata Schönh.**

Kahl 10. u. 11. 1904. Aschaffenburg. Lindigwiesen 13. 7. 04.

**A. atricapilla Steph.**

Kahl Moore 14. 4. 11.

**A. Zetterstedti Zett.**

Einzel bei Seligenstadt.

**A. pusilla Payk.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Gemünden 10. 6. 22. Schmerlenbacher Wald 30. 10. 05.

**A. turgida Er.**

Aschaffenburg Ludwigshöhe auf *Prunus padus* 6. 5. 05.

**A. apicalis Er.**

Aschaffenburg selten (Oe.). Sodentaler Wald nicht selten.

**A. ruficornis Marsh.**

Aschaffenburg sehr selten (Oe.). Kahl Moore 25. 7. 04, 9. 10. 04.

**A. analis Er. (= testacea Steph.)**

Aschaffenburg selten (Oe.). Schönbusch am unteren See 26. 5. 04. Steinbachtal 31. 5. 04. Striet 22. 7. 04. Kahler Moore 11. 04.

**A. gibbula Er.**

Angeblich von Oe. hier gefunden (Scr.).

**A. umbrina Gyll.**

Aschaffenburg (Oe.). Selten in Dunghaufen, an Schimmel und unter Laub (Fr.).

**A. nigriventris Steph.**

Aschaffenburg selten. Dammer Sumpfwiesen 5. u. 6. 1894 (Fr.). Schönbusch am Fuß alter Weiden 2. 7. 04. Büchelberg Stockstadter Wald am Gersprenzufer 17. 9. 04. Schmerlenbacher Wald 17. 12. 05.

**A. linearis Steph.**

Schmerlenbacher Wald 5. 04. Sendelbach bei Lohr 6. 7. 22 (St.). Kahl. Aschaffenburg (Oe.).

**A. alpina Heer (= elongatula Er.)**

Aschaffenburg. Glattbacher Wald 4. 05 (Fr.).

**A. fuscicollis Mannh.**

Godelsberg 4. 1895 (Fr.). Büchelberg. Stockstadter Wald 19. 9. 04.

**O o t y p u s Gglb.**

**O. globosus Waltl. (= nigriclavis Rtrr.)**

Aschaffenburg (Oe.). Babenhausen (Scr.).

**E p h i s t e m u s Steph.**

**E. exiguus Er.**

Mainhecken 11. 9. 05.

**E. globulus Payk.**

Bei Seligenstadt (Scr.). Bei Glattbach unter Kartoffelkraut 17. 9. 05, 6. 5. 05. Godelsberg 29. 11. 07.

## **Phalacridae**

**P h a l a c r u s Payk.**

**P. fimetarius F. (= corruscus Panz.)**

Auf Blüten, im Winter oft unter Baumrinde. Schönbusch unter Platanenrinde 1. 1894 (Fr.). Godelsberg 2. 1895 (Fr.). Dammer Wiesen 5. 1894 (Fr.). Aschaffenburg 21. 7. 05. Krainberg 4. 8. 35.

ab. Humberti Ryc.

Unter Platanenrinde 1. 1894 (Fr.).

**P. substriatus Gyll.**

Auf dem Kalmut bei Homburg a. M. 25. 6. 25.

**P. grossus Er.**

Aschaffenburg (D. N.).

**P. caricis Sturm.**

Seligenstadt (Scr.).

**Olibrus Er.**

**O. aeneus F.**

Aschaffenburg unter Platanenrinde 1. 1894 (Fr.). Stengerts 6. 1. 48. Schmerlenbacher Wald 3. 1895 (Fr.). Schönbusch auf Kamillen häufig 5. 1894 (Fr.). Krainberg 9. 6. 25

**O. millefolii Payk.**

Am Schöllmüllersee 5. 1894 (Fr.). Dammer Sumpfwiese 5. 1894 (Fr.).

**O. pygmaeus Sturm.**

Seligenstadt auf Cineraria (Scr.). Aschaffenburg (Oe.). Kahl 6. 9. 05.

**O. corticalis Panz.**

Häufig auf Blüten. Überwintert meistens unter Baumrinde. Büchelberg 22. 3. 47.

**O. affinis Sturm.**

Aschaffenburg (Oe.).

**O. liquidus Er.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

**O. bicolor F.**

Aschaffenburg am Schöllmüllersee 5. 1894 (Fr.). Karlstadt auf dem Haag 25. 3. 48 (J. S.). Gamburg 20. 8. 22.

**Stilbus Seidl.**

**S. testaceus Panz.**

Aschaffenburg ziemlich häufig, besonders auf Juniperus (Oe.). Glattbacher Wald 4. 1895 (Fr.). Hanau (H.).

**S. atomarius L.**

Aschaffenburg nicht selten (Oe.) 8. 12. 04.

**S. oblongus Er.**

Bei Seligenstadt an Schilf (Scr.).

## Lathridiidae

**Dasycerus Brong.**

**D. sulcatus Brong.**

Fischerhecke an Agaricus zahlreich 7. 8. 1895 (Fr.). Gailbachtal (Oe.). 18. 1. 05 (S.). Kahl Moore 28. 11. 24

**Lathridius Hbst.**

**L. lardarius Deg.**

Aschaffenburg unter Laub (Oe.). Mainufer 3. 01. Gailbachtal. Kahl 9. 10. 04.



**L. angusticollis Gyll.**

Unter Platanenrinde zahlreich 1. 1894 (Fr.). Rückersbacher Schlucht unter Moos an alten Eichen 22. 2. 25. Kalmut 22. 6. 25.

**L. Pandellei Bris.**

Glattbacher Wald.

**L. rugicollis Mannh.**

Seligenstadt (Scr.).

**L. nodifer Westw.**

Aschaffenburg (D. N.) (Fl.). Schönbusch 8. 2. 25. Kalmut 22. 6. 25. Kahl am Bach an der Grenze 28. 11. 25.

**L. constrictus Gyll.**

Platanenallee unter feuchter Rinde in Menge 1. 1894 (Fr.). 16. 2. 05, 10. 10. 04 (S.).

**L. Bergrothi Rtt.**

Mainbrücke im Frühjahr fliegend.

**E n i c m u s Thoms.**

**E. hirtus Gyll.**

Aschaffenburg (D. N.).

**E. consimilis Mannh.**

Aschaffenburg (D. N.).

**E. minutus L.**

Aschaffenburg Platanenallee unter Rinde in Menge 1. 1894 (Fr.). 19. 5. 21. Schönbusch auf einem Speicher im Detritus eines Nestes von *Vespa crabro* 9. 24 (Noll).

**E. brevicornis Mannh.**

Seligenstadt (Scr.).

**E. transversus Oliv.**

Unter Platanenrinde 1. 1894 (Fr.). Glattbacher Wald 4. 1895 (Fr.).

**E. fungicola Thoms.**

Fasanerie (Fl.).

**E. rugosus Hbst.**

Aschaffenburg (Oe.). Schönbusch unter Eichenrinde 26. 1. 24.

**C a r t o d e r e Thoms.**

**C. elongata Curt.**

Aschaffenburg (D.). Schmerlenbacher Wald 20. 11. 04. Kahl Moore an Erlenstrunk 13. 11. 04.

**C. ruficollis Marsh.**

Häufig in Kellern (Oe.).

**C. filiformis Gyll.**

Lohr Apotheke oberer Keller 3. 22 (St.). Aschaffenburg 10. 1893 (Fr.). Seligenstadt (Scr.).

**C o r t i c a r i a Marsh.**

**C. pubescens Gyll.**

Aschaffenburg nicht selten (Oe.). Godelsberg 4. 5. 05. Stockstadter Wald unter Kiefernwellen 8. 6. 13. Kalmut unter Kiefernwellen 21. 6. 25.

**C. umblicata Beck.**

Kahl Moore 9. 10. 04, 26. 11. 24. Gailbachtal 8. 12. 04.

**C. impressa Oliv.**

Seligenstadt (Scr.). Kahl Moore 1. 11. 05, 28. 11. 24.

v. *badia* Mannh.

Seligenstadt (Scr.).

**C. serrata Payk.**

Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg (S.).

v. *laticollis* Mannh.

Seligenstadt (Scr.).

**C. foveola Beck.**

Aschaffenburg (S.).

**C. bella Redt.**

Aschaffenburg (S.). Seligenstadt (Scr.).

**C. elongata Gyll.**

Schmerlenbacher Wald unter Moos 8. 2. 23. Mainhecken 4. 06. Kahl 5. 4. 12.  
Büchelberg 6. 1896 (Fr.). Fasanerie unter Moos alter Eichen 25. 11. 23.

**C. ferruginea Marsh.**

Seligenstadt (Scr.).

**C o r t i c a r i n a R t t r .**

**C. gibbosa Hbst.**

Platanenallee unter Rinde 1. 1894 (Fr.). Stockstadter Wald von Fichte geklopft  
15. 5. 12. Kahl 10. 04. Aschaffenburg 25. 11. 23, 8. 12. 23. f

**C. similata Gyll.**

Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg an der Fasanerie unter lockerer Ulmenrinde  
29. 3. 39.

**C. fuscula Gyll.**

Unter Platanenrinde 1. 1894 (Fr.). 30. 12. 04 (S.).

**C. truncatella Mannh.**

Unter Platanenrinde 1. 1894 (Fr.). 16. 2. 05, 14. 10. 04.

**M e l a n o p h t h a l m a M o t s c h .**

**M. transversalis Gyll.**

Seligenstadt (Scr.).

**M. distinguenda Comolli.**

Unter Platanenrinde 1. 1894 (Fr.). Schmerlenbacher Wald 4. 1893 (Fr.).

## **Mycetophagidae**

**T r i p h y l l u s L a t r .**

**T. bicolor F. (= punctatus F.)**

Aschaffenburg (Oe.). Kahl in Baumschwamm 15. 8. 20.

**L i t a r g u s E r .**

**L. connexus Geoffr.**

Erbig unter Rinde eines Apfelbaumes 27. 1. 24. Ebenso bei Großostheim 1. 2. 31.

Unter Buchenstrunkrinde 2. 4. 11. Auf der Mainbrücke fliegend 11. 4. 06. Großostheimer Wald an morschem Eichenholz 30. 4. 39.

### **Mycetophagus Hellw.**

#### **M. quadripustulatus L.**

Aschaffenburg an Boletus (Oe. u. D.). Hafenlohrthal 22. 4. 34 (J. S.). Bei Rothenbuch i. Sp. an Buchenschwämmen 22. 6. 52, 2 St. (J. S.).

#### **M. piceus F.**

An Buchen- und Eichenschwämmen. In der Stammform seltener. Fasanerie 7. 1874 (Fr.). Schönbuschallee 8. 1889 (S.).

ab. humeralis Schilsky.

Schönbusch 11. 2. 25.

ab. sepxustulatus F.

An morschem Eichenholz 11. 2. 25, 3. 10.

ab. lunaris F.

In Aschaffenburg die häufigste Form. Feldkahler Höhe in morschem Nußbaum 3. 3. 48 (J. S.). An Eichenschwamm 10. 7. 24.

ab. histrio Sahlbg.

In morschem Eichenstrunk 3. 10. Am Gartenberg an Baumschwamm 17. 8. 29.

ab. punctulatus Schilsky.

Schönbusch in morschem Eichenholz 15. 2. 25.

ab. varius Marsh.

Hanau (H.).

#### **M. salicis Bris.**

Hanau (H.).

#### **M. decempunctatus F.**

Aschaffenburg an Baumschwämmen (Oe.).

#### **M. atomarius F.**

Schönbusch an verpilztem Buchenstrunk 11. 2. 25. Heigenbrücken unter abgestorbener Eichenrinde 4. 1895 (Fr.). Fasanerie 15. 4. 53 unter Eichenrinde zahlreich (J. S.).

#### **M. quadriguttatus Müll.**

Sehr selten. In alten Eichenschwämmen (Fr.).

#### **M. populi F.**

In Schwämmen an Pappeln, Eichen und Buchen. Ludwigsallee 6. 1874 (Fr.). Büchelberg in Anzahl (A.).

#### **M. multipunctatus F.**

Aschaffenburg in Schwämmen von Eichen und Pappeln (D. N.). Schönbuschallee in Baumschwamm 8. 1889 (S.).

#### **M. fulvicollis F.**

Aschaffenburg selten (Oe.). Babenhausen (Scr.).

### **Thyphaea Curt.**

#### **T. stercorea L.**

Dammer Wiesen 6. 1894 (Fr.). Schönbusch 10. 7. 24. Im Haus 12. 8. 45. Kleinostheim abends schwärmend 6. 9. 28. Unter Platanenrinde 9. — 11. 05.

# Colydiidae

## Myrmecoxenus Chevr.

### M. subterraneus Chevr.

Aschaffenburg (D. u. Oe.). Striet bei Formica rufa 22. 4. 27. Laufach im Nest von Formica rufa (Fr.).

## Aglenus Er.

### A. brunneus Gyll.

Aschaffenburg in einer Gerberei (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

## Pycnomerus Er.

### P. terebrans Oliv.

Sehr selten. Im Schmerlenbacher Wald (Oe.). „Im ganzen Gebiet“ (Scr.).

## Orthocerus Latr.

### O. clavicornis L. (= muticus L.)

Kahler Sande unter Grasbüscheln 7. 2. 26, 18. 3. 27. Godelsberg (Oe.). Gestreift 6. 5. 05 (S.). Gailbachtal 25. 5. 36. Mäusberg bei Wiesenfeld 13. 9. 31. Sandgrube bei Bahnhof Sulzbach a. M. 18. 10. 23, 6. 11. 26. Sandgrube bei Mainaschaff 8. 10. 27 Striet (Fl.).

## Coxelus Latr.

### C. pictus Sturm.

Aschaffenburg (D. A. u. Fl.). Südlicher Schönbuschrand gesiebt 27. 3. 47, 1 St. (J. S.).

## Synchita Hellw.

### S. humeralis F. (= juglandis F.)

Sehr selten. Bei den Ellerhöfen 1 St. (Oe.).

## Cicones Curt.

### C. variegatus Hellw.

Aschaffenburg in den Holzhöfen sehr selten (Oe.). In Sphaeria deusta an alten Buchen (Scr.). Schmerlenbacher Wald an einem Buchenstrunk 19. 4. 05. Hanau an den Pilzen von alten Buchen 5. u. 8. 20 (H.).

## Colobicus Latr.

### C. marginatus Latr.

Selten. Schmerlenbacher Wald (Oe.). Unter Rinde alter Buchen und Linden (D.). Seligenstadt (Scr.).

## Ditoma Er.

### D. crenata F.

Häufig unter abgestorbener Baumrinde.

#### ab. rufipennis F.

Schmerlenbacher Wald unter Rinde eines Buchenstrunkes 19. 4. 05. Unter Kastanienrinde 9. 8. 40, 23. 10. 07.

## Colydium F.

### C. elongatum F.

Aschaffenburg (Oe.). Unter Buchen- und Eichenrinde (Fl.). Fasanerie unter morscher Eichenrinde in der Nähe des Sees 5. 3. 48 (Elbert).

### C. filiforme F.

Von Fr. als selten ohne Fundort angegeben. Hanau (Heynemann).

### **Aulonium Er.**

#### **A. trisulcum Geoffr.**

Aschaffenburg unter Rinde abgestorbener Ulmen bei Scolytus scolytus und multistriatus in Anzahl, Käfer und Larven 28. 2. 29 (S.).

### **Teredus Shuk.**

#### **T. cylindricus Oliv.**

Schmerlenbacher Wald zahlreich (Oe.) nach Fr. 4 St. (Fl.).

### **Oxylaemus Er.**

#### **O. cylindricus Panz.**

Aschaffenburg (Scr. u. Fl.) 1876 und 1888. Schmerlenbacher Wald (Oe.). Fasanerie 6. 1876 (Fr.). Seligenstadt an alter Eiche (Scr.).

#### **O. variolosus Duft. (= caesus Er.)**

Seligenstadt (Scr.). Gernsbach 24. 9. 1878 (Fl.).

### **Cerylon Latr.**

#### **C. fagi Bris.**

Großauheim 3. 49 (Dehnert).

#### **C. histeroides F.**

Häufig unter Baumrinde 10. 12. 47.

#### **C. ferrugineum Steph.**

Dammer Wiesen 6. 1894 (Fr.). Seligenstadt (Scr.). Sodener Wald.

#### **C. impressum Er.**

Aschaffenburg unter Eichenrinde (S.).

#### **C. deplanatum Gyll.**

Seligenstadt (Scr.).

## **Endomychidae**

### **Sphaerosoma Leach. (Alexia Steph.)**

#### **S. globosum Sturm.**

Aschaffenburg (Oe. u. Scr.). Mainhecken unter Moos 4. 06.

#### **S. pilosum Panz.**

Mainhecken 4. 06. Aschaffenburg (D.). Bei Obernburg a. M. 15. 5. 35.

#### **S. piliferum Müll.**

Aschaffenburg (D. N.).

### **Mycetaea Steph.**

#### **M. hirta Marsh.**

Aschaffenburg in Schwämmen an feuchtem Holz, Lohr Apothekenkeller 3. 22 (St.). Wenighösbach an Schimmelpilzen in hohlem Baum 11. 12.

### **Symbiotes Redt.**

#### **S. latus Redt. (= rubiginosus Heer.)**

Schmerlenbacher Wald an alten Eichen (Oe. u. D.). Schönbusch unter Weidenrinde 5. 1894 (Fr.).

**S. gibberosus Luc.**

Nach Scr. an einem schimmeligem Waldholz. Unter Rinde abgestorbener Eichen in der Fasanerie gefunden (Fl.) nach Fr.

**Liesthes Ggl. (= Leiesthes Redt.)**

**L. seminigra Gyll.**

Babenhausen in einem Baumschwamm 1 St. (Scr.). Nach Horion einer der seltensten Käfer in Deutschland, bisher nur in 3 Fundorten: Pommern, Hamburg und Hessen. Wohl aus Deutschland verschwunden.

**Dapsa Latr.**

**D. denticollis Germ.**

Hanau (Scr.).

**Lycoperdina Latr.**

**L. bovistae F.**

In Bovisten nicht selten. Gartenberg unter Moos 6. 2. 25. Südl. Strietrand 1. 3. 26. Rothenbuch i. Sp. 11. 4. 26. Gailbachtal 4. 10. 31. Büchelberg unter altem Heuhaufen 22. 11. 36.

**L. succinata L.**

„Bei der Papiermühle an der Hanauer Straße in größerer Anzahl in staubenden Bovisten 9. 1882, 10. 1893. Anfang Oktober 1894 Larven daselbst gefunden, die sich Ende Oktober zu Käfern entwickelten. Zur gleichen Zeit 3 Puppen an einem Bovist des Godelsberges.“ (Fr.).

**Endomychus Panz.**

**E. coccineus L.**

Aschaffenburg 1 St. (Oe.). Bei Rohrbrunn im Haßlochtal an verpilztem Buchenstrunk 22. 3. 53, 1 St. (J. S.). 25. 10. 53, 2 St. (J. S.).

**Coccinellidae**

**Epilachna Bedel.**

**E. argus Fourcr.**

Seligenstadt (Scr.). D. beobachtete Verpuppung der Larven am 17. Juli und Erscheinen der Käfer am 28. Juli (Berl. E. Z. 6. 1862, Seite 64—68). Aschaffenburg, Weg an der Gasfabrik mehrfach an Bryonia dioica L. 10. 5. 07. Am Bahnhof Mainaschaff 20. 6. 12. Fasanerie 6. 1894. Hanau (Juncker).

**Subcoccinella Huber.**

**S. 24-punctata L.**

Häufig. IV V VIII IX XII.

ab. *limbata* Moll.

Mörswiese 7. 5. 12. Kahl Moore.

ab. *quadrinotata* F.

Kahl, Moore 10. 04. Stockstadter Wald 8. 12. 35.

ab. *colchica* Motsch.

Aschaffenburg 3. 3. 23. Schönbusch 1. 7. 24.

ab. *haemorrhoidalis* F.

Kahl Moore.

**Cynegetis Redt.**

**C. impuncta L.**

Auf sumpfigen Grasplätzen. Dammer Sumpfwiesen 6. 1894 (Fr.).

## **Coccidula Kug.**

### **C. scutellata Hbst.**

Häufig an den Ufern von Gewässern. Schönbusch am See 4. 1894 (Fr.). 21. 9. 04.  
Unter Rinde 12. 1894 (Fr.).

### **C. rufa Hbst.**

Häufig an Schilf. Schönbusch 9. 9. 07. Im Schloßgarten 12. 1894 (Fr.).

## **Rhizobius Steph.**

### **R. litura F.**

Häufig auf Nadelhölzern. Überwintert meistens unter Baumrinde.

## **Clitostethus Weise.**

### **C. arcuatus Rossi.**

Aschaffenburg an Efeu (Oe. u. D.).

## **Scymnus Kugel.**

### **S. (Stethorus Weise) punctillum Weise (= minimus Rossi)**

Unter Platanenrinde 1. 1894 (Fr.). Schloßgarten 5. 1894 (Fr.). 29. 11. 07. Gailbachtal. Kahl.

### **S. (Pullus Muls.) ferrugatus Moll.**

Fasanerie in Kirschblüten 4. 1894 (Fr.). Am Röderbach auf Erlen und blühender Weide 24. 4. 40. Schönbusch auf Kreuzdorn 21. 5. 37.

### **S. haemorrhoidalis Hbst.**

Aschaffenburg (D. N.). Im Gebiet häufig I III IV VI VIII IX.

### **S. auritus Thunbg. (= capitatus F.)**

Kahl Moore 10. 10. 04. Aschaffenburg 16. 11. 03. Striet 1912.

### **S. subvillosus Goeze. (= fasciatus Fourcr.)**

Von Oe. angegeben und wahrscheinlich hier vorkommend (nach Horion).

### **S. suturalis Thunbg.**

Unter Platanenrinde 1. 1894 (Fr.). Godelsberg unter Ahornrinde 2. 1894 (Fr.). Rückersbacher Schlucht 22. 2. 25. Kahl 3. 7. 04.

### **S. ater Kugel.**

Seligenstadt (Scr.). Fasanerie auf Kirschbäumen 4. 1894 (Fr.). Schmerlenbacher Wald 5. 1894 (Fr.).

### **S. nigrinus Kugel.**

Kahl 7. 2. 26. Haibacher Höhe auf Lärchen 22. 6. 24. Striet 17. 7. 26.

### **S. (Scymnus s. str.) abietis Payk.**

Auf blühenden Fichten häufig (Oe.). Am Schöllmüllersee auf Esche 3. 7. 41.

### **S. frontalis F.**

Aschaffenburg. Seligenstadt (Scr.).

ab. Suffriani Weise.

Aschaffenburg unter Platanenrinde 16. 2. 05. Mäusberg 7. 9. 35.

### **S. Apetzi Muls.**

Aschaffenburg (D. N.).

### **S. interruptus Goeze.**

Aschaffenburg (D. N.). Seligenstadt (Scr.). Mainbrücke 13. 4. 06.

**S. rubromaculatus Goeze.**

Aschaffenburg (D. N.). Seligenstadt (Scr.). Am Mainufer unter Platanenrinde  
16. 2. 05. Rückersbacher Schlucht unter Moos 22. 2. 25. Striet 10. 4. 36.

**S. (Nephus Muls.) quadrimaculatus Hbst. (= pulchellus Hbst.)**

Exerzierplatz unter Platanenrinde 1. 1894 (Fr.). Mainbrücke 13. 4. 06. Am Schöl-  
lenmüllersee 5. 1894 (Fr.).

**S. bipunctatus Kugel.**

Erbig 4. 1894 (Fr.).

**S. Redtenbacheri Muls.**

Kahl, Moore (S.).

**H y p e r a s p i s Redt.**

**H. repensis Hbst.**

Aschaffenburg (D. N.). Auf dem Kalbenstein 28. 2. 26. Rothenbuch i. Sp. am  
Breitsee 13. 3. 27. Kahl Moore 13. 6. 37, 9. 05.

**H. campestris Hbst.**

Karlstadt 6. 3. 27, 25. 4. 26. Gailbachtal 23. 5. 26. Spessart 8. 5. 05. Stockstadter  
Wald 29. 6. 26.

ab. concolor Suffr.

Stockstadter Wald 16. 1. 27. Aschaffenburg 24. 3. 05. Kahl Moore 16. 10. 04,  
6. 11. 25. Schönbusch 29. 11. 46.

**H i p p o d a m i a Muls.**

**H. tredecimpunctata L.**

Aschaffenburg am Guten Mann 4. 1894 (Fr.). Mainufer 7. 6. 09, 7. 9. 42. Schön-  
busch am See 8. 1894 (Fr.).

ab. spissa Weise.

Mainufer 7. 9. 42.

**H. septemmaculata Deg.**

Kahl Moore 15. 6. 20, 8. 9. 07, 30. 9. 25.

ab. Paykulli Weise.

Kahl, Moore 13. 8. 25, 14. 9. 25.

**A d o n i a Muls.**

**A. variegata Goeze.**

Aschaffenburg (D. N. u. Scr.). Schönbusch 1. 7. 24. Sandgrube bei Sulzbach a. M.  
27. 10. 26. Mainufer. Striet.

ab. 5-maculata F.

Kahl 4. 8. 38. Aschaffenburg 27. 10. 28, 11. 28.

ab. constellata Laich.

Kahl, Moore 17. 8. 25. Krainberg 15. 8. 34. Sandgrube bei Sulzbach a. M. 15. 9. 25.  
Sandgrube bei Mainaschaff 27. 10. 28. Stockstadter Wald 25. 11. 25.

ab. neglecta Weise.

Mainhecken 21. 9. 08. Sandgrube bei Sulzbach a. M. 27. 10. 28. Lohr 25. 5. 53  
(Wolfram).

ab. biconstellata Sajo.

Kahl, Moore 4. 8. 38. Mainflingen 1. 11. 26.

ab. obversepunctata Schrk.

Kahl, Moore 22. 10. 26. Sodener Wald 21. 10. 25.



## **A n i s o s t i c t a Dup.**

### **A. 19 — punctata L.**

Aschaffenburg, am Guten Mann 4. 1894 (Fr.). Lohr-Sendelbach am Rütsee 13. 5. 24, 23. 8. 22 (St.). Kahl, Moore 11. 6. 25. Schönbusch 3. 10. 35.

## **S e m i a d a l i a Crotsch.**

### **S. 11 — notata Schneid.**

Aschaffenburg (D. N.).

## **A p h i d e c t a Weise.**

### **A. obliterata L.**

Häufig an Nadelhölzern. II III VI X.

#### **ab. 6 — notata Thunbg.**

Büchelberg unter Rinde einer Silberpappel 1. 12. 40.

#### **ab. fenestrata Weise.**

Schmerlenbacher Wald unter Baumrinde 28. 2. 05. Auf Kiefer 17. 4. 05. Großostheimer Wald auf Fichte 14. 5. 22. Schönbusch 27. 8. 26. Büchelberg auf Kiefer 11. 9. 35. Unter Ahornrinde 4. 11. 39, 11. 12. 38.

#### **ab. fumata Weise.**

Hain i. Sp. auf Fichte 11. 5. 24. Büchelberg auf Kiefer 14. 10. 22.

## **T y t t h a s p i s Crotsch. (= M i c r a s p i s Redt.)**

### **T. 16 — punctata L.**

#### **ab. 12 — punctata L.**

Kahl, Moore 4. 8. 38. Sandgrube bei Sulzbach a. M. 20. 8. 37, 6. 11. 28.

## **A d a l i a Muls.**

### **A. conglomerata L.**

Aschaffenburg (D.). Schönbusch auf Eiche 17. 5. 22. Striet.

#### **ab. bothnica Payk.**

Aschaffenburg 11. 4. 11.

### **A. 10 — punctata L.**

Häufig.

#### **ab. lutea Rossi.**

Schönbusch 27. 2. 22.

#### **ab. guttatopunctata L.**

Fasanerie (Fr.).

#### **ab. lateralis Weise.**

Schönbusch 17. 5. 22.

#### **ab. 6 — punctata L.**

Karlstadt 9. 3. 30. Striet 5. 5. 12. Schönbusch 24. 6. 11.

#### **ab. 8 — punctata Müll.**

Karlstadt 26. 1. 30. Aschaffenburg 15. 5. 24. Rothenbuch i. Sp. 17. 5. 36. Schönbusch 24. 6. 11.

#### **ab. 13 — maculata Forst.**

Obernauer Wald 26. 4. 26. Gailbachtal 8. 7. 04. Fasanerie 21. 7. 39. Sandgrube bei der Lumpenmühle 7. 8. 43.

#### **ab. semifasciata Weise.**

Schmerlenbacher Wald 15. 4. 05. Obernau auf Apfelblüte 2. 5. 05.

#### **ab. humeralis Schall.**

Nicht selten.

ab. 10 — pustulata L.

Sehr häufig.

ab. bimaculata Hbst.

Sehr häufig.

**A. bipunctata L.**

Sehr häufig.

ab. pantherina L.

Aschaffenburg (S.).

ab. 6 — pustulata Weise.

Sehr häufig.

ab. 4 — maculata Scop.

Büchelberg unter Ahornrinde 6. 2. 38. Hecken am letzten Hieb 3. 6. 37. Fasanerie  
15. 7. 39.

ab. sublunata Weise.

Aschaffenburg (S.).

ab. annulata L.

Ellerwald beim Gailbachtal 5. 10. 33.

**Coccinella L.**

**C. 7 — punctata L.**

Sehr häufig.

**C. 5 — punctata L.**

Sehr häufig.

**C. 11 — punctata L.**

An der Gartenmauer am alten Hafen 3. 10. 48.

**C. distincta Fald. (= divaricata Oliv.)**

Mäusberg bei Wiesenfeld 23. 5. 20.

ab. magnifica Redt.

Mäusberg 9. 6. 19.

**C. hieroglyphica L.**

Nicht selten auf Kiefernwaldlichtungen. Kahl 15. 8. 20.

ab. flexuosa F.

Stockstadter Wald 22. 4. 11. Striet 7. 6. 15.

ab. marginemaculata Brahm.

Striet 5. 6. 26, 28. 8. 26. Lauterhof bei Obernburg 10. 7. 29.

ab. areata Panz.

Stockstadter Wald 13. 8. 25. Kahl 17. 8. 25. Hain i. Sp. 19. 8. 23.

**Coccinula Dobzh.**

**C. 14 — pustulata L.**

Aschaffenburg (Oe.). 13. 8. 37 (S.). Krainberg 11. 7. 38. Obernauer Wald 28. 8. 28.  
Schönbusch 3. 10. 35.

ab. caligata Weise.

Aschaffenburg (S.).

**Synharmonia Gglb.**

**S. lyncea Oliv.**

Aschaffenburg (S.).

**S. conglobata L.**

Aschaffenburg, Platanenallee unter Rinde 11. 1893 (Fr.). Fasanerie an alten

Eichen unter Moos 23. 11. 23.

ab. rosea Deg.

Aschaffenburg 26. 5. 36.

ab. gemellata Hbst.

Aschaffenburg nicht selten.

ab. meridionalis J. Müll.

Ans Haus geflogen 8. 9. 05.

ab. pineti Weise.

Kahl 13. 9. 36 (J. S.).

ab. impustulata L.

Aschaffenburg (D.).

#### **H a r m o n i a M u l s.**

##### **H. 4 — punctata Pont.**

Häufig auf Nadelhölzern. Schönbusch auf Pinus nigra 17. 5. 22. Schmerlenbacher Wald 6. 11. 04. Unter Platanenrinde 12. 1893 (Fr.).

ab. rustica Weise.

Schmerlenbacher Wald auf Kiefer 16. 4. 06.

ab. 16 — punctata F.

Schmerlenbacher Wald 16. 4. 06. Striet 22. 4. 11, 11. 8. 24. Gailbachtal 19. 6. 31. Büchelberg auf Kiefer 28. 7. 28, 11. 9. 35. Schönbusch 3. 10. 35. Platanenallee unter Rinde 12. 1893 (Fr.).

ab. abieticola Weise.

Kahl 26. 8. 26.

#### **H a l y c i a M u l s.**

##### **H. 16 — guttata L.**

Stockstadter Wald auf Kiefer 26. 4. 16. Schönbusch an Kirschbaum 4. 1894, 8. 6. 38 (S.). Findberg 14. 5. 44. Lauterhof bei Obernburg 20. 7. 24. Platanenallee unter Rinde 12. 1893 (Fr.).

#### **V i b i d i a M u l s.**

##### **V. 12 — guttata Poda.**

Seligenstadt (Scr.).

#### **M y r r h a M u l s.**

##### **M. 18 — guttata L.**

Auf Nadelhölzern nicht selten.

#### **S o s p i t a M u l s.**

##### **S. 20 — guttata L.**

Aschaffenburg (D. N.). Am Fuß von Erlen 14. 3. 37. Kahl, Moore auf Erlen 20. 4. 27. Auf Salix aurita 17. 9. 26. Stockstadter Wald 11. 5. 25. Am Röderbach 2. 5. 37. Dörngraben auf Erlen 6. 5. 38.

ab. Linnei Weise.

An der Aschaffmündung auf Weiden 15. 7. 29.

#### **T h e a M u l s.**

##### **T. 22 — punctata L.**

Aschaffenburg (D. N.). Schmerlenbacher Wald 18. 3. 06. Schönbusch auf Kreuzdorn 31. 5. 37. Gailbachtal auf Fichte 28. 5. 37. Krainberg 31. 7. 37.

#### **C a l v i a M u l s.**

##### **C. 10 — guttata L.**

Seltener. Aschaffenburg (D. N.). Gailbachtal 23. 5. 26. Fasanerie auf Linde 11. 5. 37, 28. 7. 37. Striet auf Birke 19. 6. 26. Am Röderbach 23. 8. 35.

**C. 14 — guttata L.**

Aschaffenburg unter Platanenrinde 1. 1894 (Fr.). Schöllmühle auf Weide 10. 5. 37. Am Röderbach auf Erle 7. 5. 37. Wendelberg 8. 7. 35. Schönbusch 10. 7. 37.

**C. 15 — guttata F.**

Aschaffenburg (D.). Seligenstadt (Scr.).

**Propylaea Muls.**

**P. 14 — punctata L.**

Häufig.

ab. suturalis Weise.

Häufig.

ab. biflexuosa Weise.

Aschaffenburg (S.).

ab. bifasciata Walter.

Kahl 5. 4. 12.

ab. leopardina Weise.

Mainufer 4. 9. 05. Kahl.

ab. 12 — pustulata Pont.

Häufiger. Am Röderbach auf Erlen 20. 10. 35.

**Paramysia Rtrr.**

**P. oblongoguttata L.**

Auf Kiefern nicht selten.

**Anatis Muls.**

**A. ocellata L.**

Schönbusch auf blühendem Kirschbaum in Anzahl 5. 1894 (Fr.). 10. 5. 16, 11. 6. 36.

Schöntal 6. 1895 (Fr.). Am Röderbach auf Erle 23. 8. 35. Breunsberg 5. 8. 38.

ab. bicolor Weise.

Aschaffenburg. Spessart 24. 5. 23.

**Platinaspis Redt.**

**P. luteorubra Goeze.**

Aschaffenburg Mainufer unter Platanenrinde 16. 2. 04, 1. 3. 25, 9. 1893 (Fr.).

**Chilocorus Leach.**

**C. renipustulatus Scriba.**

Oberbessenbach 4. 7. 43. Mäusberg 15. 8. 37. Fasanerie 6. 1893 (Fr.).

**C. bipustulatus L.**

Erbig 23. 8. 25. Glattbacher Wald auf Kiefern 8. 1894 (Fr.).

**Exochomus Redt.**

**E. quadripustulatus L.**

Mäusberg bei Wiesenfeld häufig auf Wacholder 20. 5. 34, 15. 8. 37, 7. 9. 35. Striet auf Kiefer 5. 1894 (Fr.). Büchelberg auf Kiefer 11. 9. 35.

ab. distinctus Brüll.

Steinbachtal 7. 8. 25.

ab. floralis Motsch.

Mäusberg 7. 9. 35.

**E. flavipes Thunbg.**

Unterafferbach 1. 6. 19. Aschaffenburg Striet auf Kiefern 6. 1895 (Fr.). 29. 7. 25, 7. 8. 25. Stockstadt a. M. Gersprenzufer 30. 7. 16. Großkrotzenburger Moore 29. 8. 36. Sandgrube bei Mainaschaff 15. 9. 25, 6. 10. 25.

# Sphindidae

## Sphindus Chev.

### S. dubius Gyll.

Schmerlenbacher Wald unter Rinde eines Eichenstrunkes 18. 3. 06. Unter Rinde eines Buchenstrunkes 17. 4. 05. Auch von Oe. u. D. in Laubwäldern festgestellt.

# Aspidiphoridae

## Aspidiphorus Latr.

### A. orbiculatus Gyll.

Aschaffenburg (Oe.). Am Schönbuschsee 2. 7. 04. Stockstadt a. M. Gersprenz-wiesen 8. 7. 05. Kahl Moore 4. 10. 04.

# Cisidae

## Cis Latr.

### C. pubescens Dej. (= striatulus auct.)

An morschem Eichenholz 23. 5. 33.

### C. comptus Gyll.

Aschaffenburg (Fl.).

### C. boleti F.

Häufig an Boletus-Arten.

### C. setiger Mell.

Aschaffenburg (D.).

### C. micans Hbst.

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Rückersbacher Schlucht 22. 2. 25.

### C. hispidus Gyll.

Aschaffenburg (Oe. u. D.) 20. 2. 05 (S.). Rückersbacher Schlucht 22. 2. 25. Gailbachtal an verpilztem Eichenstrunk 6. 6. 25.

### C. alni Gyll.

Stockstadter Wald 13. 2. 27. Gailbachtal 13. 3. 05. Hösbach 14. 3. 43.

### C. Lucasi Ab. (= reflexicollis Ab.)

Spessart (Fl.).

### C. festivus Panz.

Aschaffenburg (Oe. u. D.). In Gängen von Scolytus carpini 16. 1. 09.

### C. pygmaeus Mars. (= oblongus Mell.)

Schmerlenbacher Wald an alten Eichen 20. 2. 05.

### C. fagi Waltl. (= castaneus Mell.)

Aschaffenburg (D.), (Fl.). Erbig an Apfelbaumholz 3. 24. Schönbusch am Fuß alter Weiden 2. 7. 04.

## Rhopalodontus Mell.

### R. fronticornis Panz.

Aschaffenburg (Oe., D. u. S.).

**R. perforatus Gyll.**

In Frankfurt a. M. aus Buchenschwämmen nach L. v. Heyden.

**Ennearthron Mell.**

**E. affine Gyll.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Rückersbacher Schlucht 22. 2. 25. Ellerwald an verpilztem Eichenstrunk 3. 23, 6. 7. 25. An Buchenschwämmen 20. 7. 24.

**E. cornutum Gyll.**

Aschaffenburg (Oe.). Kahl 5. 7. 04. Amorbach in Baumschwämmen von Zwetschge 7. 8. 04.

**E. Reitteri Fl.**

Aschaffenburg Fasanerie in kleiner Anzahl aus Schwämmen eines Eichenplanken-Zaunes (Fl.) Bisher nicht weiter bekannt geworden (Horion).

**Octotemnus Mell.**

**O. glabriculus Gyll.**

Rüdighcim bei Hanau in Buchenschwamm 5. 1900 (H.).

## Teredilia

### Lyctidae

**Lyc tus F.**

**L. pubescens Panz.**

Aschaffenburg in altem Holz (Oe.).

**L. linearis Goeze (= canaliculatus F.)**

Aschaffenburg IV. u. V. 1894 (Fr.). Aus Eichenstöcken mehrmals in Anzahl 24. 6. 35, 10. 7. 35.

## Bostrychidae

**Bostrychus Geoffr.**

**B. capucinus L.**

Großostheim Sandgrube in einer alten Eichenwurzel zahlreich 29. 5. 35 (J. S.).  
Karbach bei Marktheidenfeld zahlreich in einem Eichenstrunk 1. 6. 35 (Noll).  
Gemünden 10. 6. 22 (St.).

**Lichenophanes Lesne.**

**L. varius Illig.**

Aschaffenburg an Buchenholz (Oe.).

**Xylonites Lesne.**

**X. retusus Oliv.**

Aschaffenburg in dünnen Eichenästen (D.). Gemünden a. M. 10. 6. 22, 3 St. (Ade).  
(Wahrscheinlich mit ausländischem Eichenholz des Sägewerks eingeschleppt.)

## Anobiidae

**Hedobia Latr.**

**H. regalis Duft.**

Seligenstadt (Scr.). Weiler i. Sp. 6. 4. 26. Bei Wiesenfeld im Mühlthal auf Gebüsch 2. 6. 29.

**H. imperialis L.**

Aschaffenburg (Oe.). Schönbusch 27. 3. 47, 19. 5. 31. Bei der Schöllmühle auf Kirschbaum 1. 5. 05. Godelsberg 6. 5. 05. Gailbachtal 23. 5. 20. Fasanerie 6. 1868 (Fr.).

**Dryophilus Chevr.**

**D. pusillus Gyll.**

Fasanerie 5. 1894 (Fr.). Kahl gestreift 15. 5. 04. Schönbusch auf Lärche 31. 5. 37, 1. 7. 26. Bei Haibach auf Lärche 22. 6. 24. Weiler i. Sp. 6. 6. 26. Striet auf Fichte 1. 7. 27.

**D. anobioides Chevr.**

Wendelberg auf Sarothamnus 8. 7. 33. Auch von D. daran festgestellt.

**Ochina Steph.**

**O. ptinoides Marsh. (= hederæ Müll.)**

Aschaffenburg im Schloßgarten an Efeu 15. 2. 25, 23. 4. 07, 5. 1894 (Fr.).

**Xestobium Motsch.**

**X. plumbeum Illig.**

Aschaffenburg (D.). Schöntal an alter anbrüchiger Hainbuche 6. 15.

**X. rufovillosum Deg.**

In castanea sativa Mill. am Godelsberg 5. 1896 (Fr.). In morschem Eichenholz 7. 5. 52.

**Ernobius Thoms.**

**E. nigrinus Sturm.**

Stockstadter Wald in Kiefernreisig 8. 7. 23.

ab. politus Redt. Striet von Fichten 4. 1894 (Fr.).

**E. densicornis Muls.**

Stockstadter Wald in Kiefernreisig 31. 5. 04, 8. 7. 13.

**E. abietis F.**

Striet 12. 6. 28. Lindig 10. 7. 27. Aus Fichtenzapfen 9. 23.

**E. pini Sturm.**

Aschaffenburg Schönbusch 30. 5. 30. Striet in Fichten 26. 6. 28. Lindig 10. 7. 27.

**E. mollis L.**

Im Haus 12. 4. 27. Schönbusch an Pinus nigra 1. 5. 24. An Lärche 31. 5. 37. Retzbach 16. 6. 35. Büchelberg auf Kiefern 17. 7. 35. Rothenbuch i. Sp. 19. 9. 26.

**Oligomerus Redt.**

**O. brunneus Sturm.**

In altem Apfelbaum am Weg nach Kleinostheim 28. 5. 04, 7. 6. 04. Erbig an alten Robinien 6. 1895 (Fr.). Aus Eichenholz gezogen 24. 6. 39.

**Stegobium Motsch. (= Sitodrepa Thoms.)**

**S. paniceum L.**

Einmal in altem Brot in Menge 5. 1894 (Fr.). In Häusern häufig 9. 8. 45.

**Gastrallus Duval.**

**G. immarginatus Müll.**

Aschaffenburg aus dürrer Holz gezogen (D.). Seligenstadt (Scr.).

## **A n o b i u m F.**

### **A. punctatum Deg. (= striatum Oliv.)**

In altem Holz nicht selten. VI. VII.

### **A. rufipes F.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). An Kirschbaum 18. 5. 04. Fasanerie in Buche 14. 6. 1896. Am Erbig an Robinien 11. 6. 1895.

### **A. nitidum Hbst.**

Aschaffenburg (D.).

### **A. fulvicorne Sturm.**

Schönbusch an Eichen 12. 6. 28, 1. 7. 26. Fasanerie an Erle 18. 6. 29, 11. 7. 35. An Apfelbaum 15. 7. 38.

### **A. emarginatum Duft.**

Schönbusch von Geisblatt geklopft 26. 4. 02. Fasanerie von *Sambucus racemosa* 3 St. 1. 5. 05.

### **A. pertinax L.**

Aschaffenburg (D.). An Linde 22. 7. 38.

## **P r i o b i u m Motsch. (= Trypopitys Reitter.)**

### **P. carpini Hbst.**

Aschaffenburg (S.). Seligenstadt (Scr.).

## **P t i l i n u s Geoffr.**

### **P. pectinicornis L.**

An alten Buchen (D.). Godelsberg an *Castanea sativa* 22. 6. 06. Metzgergraben bei Lichtenau i. Sp. 12. 6. 52, 2 M. u. 1 W. an abgestorbener Buche (J. S.).

### **P. fuscus Geoffr. (= costatus Gyll.)**

Aschaffenburg (D.). Hanau an alten Weiden 13. 6. 11 (H.).

## **X y l e t i n u s Latr.**

### **X. ater Creutz.**

Krainberg 15. 5. 47, 20. 6. 26. Retzbach Benediktushöhe 16. 6. 35.

### **X. pectinatus F.**

Aschaffenburg (D.). Schönbusch 21. 6. 35 (Noll).

### **X. laticollis Duft.**

Wendelberg 29. 6. 35, 2. 7. 39. Karlstadt 30. 6. 29. Hanau (H.).

## **L a s i o d e r m a Steph.**

### **L. laeve Illig.**

Aschaffenburg (D.). Mit amerikanischem Tabak eingeschleppt. Manchmal lebend in Herbarien (Fr.).

## **M e s o c o e l o p u s Duval.**

### **M. niger Müll.**

Aus Efeuranken eines Hausgartens in Aschaffenburg 6. 1894 (Fr.). Seligenstadt (Scr.).

## **D o r c a t o m a Hbst.**

### **D. flavicornis F.**

Aschaffenburg (D.). Schönbusch aus morschem Eichenholz 3. u. 15. 5. 25.



**D. chrysomelina Sturm.**

Aschaffenburg (D.). Schönbusch an Eichenschwämmen 27. 4. 25, 17. 5. 25, 21. 6. 24, 10. 7. 24.

**D. dresdensis Hbst.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Aus morschem Eichenholz 15. 5. 25. Bei Großkrotzenburg 19. 5. 07 (Sattler).

**C a e n o c a r a Thoms.**

**C. bovistae Hoffm.**

In Bovisten. Aschaffenburg (D.). Mörswiese 24. 5. 05. Schönbusch 9. 9. 07.

**C. affinis Sturm.**

Aschaffenburg (Oe.). Dammer Sumpfwiesen 5. 1894 (Fr.).

## **Ptinidae**

**G i b b i u m Scop.**

**G. psyilloides Czempinsk.**

Aschaffenburg in altem Pflanzenpapier gefunden (D.).

**N i p t u s Boield.**

**N. hololeucus Fald.**

In Häusern. Aschaffenburg 10. 8. 20.

**N. crenatus F.**

Aschaffenburg (D.). Seligenstadt (Scr.). Kommt nach v. Heyden in Schneckenhäusern mit halbvertrockneten Schnecken vor (Fr.).

**P t i n u s L.**

**P. lichenum Marsh.**

Aschaffenburg (D.).

**P. rufipes Ol.**

Fasanerie 5. 1894 (Fr.). Gailbachtal 23. 5. 26. Schönbusch gestreift 30. 5. 04, 6. 6. 28, 7. 6. 36. Büchelberg 9. 6. 1890.

**P. fur L.**

Aschaffenburg am Fuß von Erlen 16. 1. 38 (J. S.). Stockstadter Wald 4. 27. Im Nest einer Rauchschnalbe 9. 23, 12. 11. 25.

**P. pusillus Sturm.**

Seligenstadt (Scr.).

**P. latro F.**

Von Fr. als nicht selten im Gebiet angegeben.

**P. pilosus Müll.**

Aschaffenburg (D.). Seligenstadt (Scr.). Rückersbacher Schlucht unter Moos an alten Eichen 23. 2. 25. Schönbusch 9. 3. 41, 7. 6. 36, 20. 11. 24. Karlstadt auf dem Haag 20. 3. 28, 16. 3. 41.

**P. subpilosus Sturm.**

Seligenstadt im Mulm der Kolonien von *Formica fuliginosa* (Scr.). Von Fichten geklopft (Fl.). Schönbusch unter Platanenrinde 5. 1. 26, 27. 3. 22. Fasanerie 16. 2. 08, 3. 1894 unter Eichenrinde (Fr.).

**P. tectus Boield.**

Aschaffenburg aus Argentinien mit Casein eingeschleppt 7. 22 (Noll).

**P. dubius Sturm.**

Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg (D.). Schmerlenbacher Wald auf Fichte 16. 4. 06

**P. sexpunctatus Panz.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Seligenstadt (Scr.). Unter Platanenrinde (Fr.). Schönbusch aus hohler Silberpappel 20. 2. 27. Im Moos an alten Eichen 10. 3. 40.

**P. raptor Sturm.**

Aschaffenburg im Hause Ende 11. 1938. Bei Hobbach i. Sp. 23. 11. 33.

# Heteromera

## Oedemeridae

### Calopus F.

**C. serraticornis L.**

Aschaffenburg Anfang Mai 1895 am elektrischen Licht des Bahnhofs (S.). Klingenberg im Haus von Dr. Döhler 3. 4. 47, 2 St.

### Nacerda Steph.

**N. (Nacerda s. str.) melanura L.**

Aschaffenburg (Oe. 1853).

**N. (Anoncodes Dup.) rufiventris Scop.**

Aschaffenburg Schönbusch 28. 5. 46 morgens 10 Uhr in der Sandgrube in Anzahl schwärmend gefunden M. u. W. Die W. saßen meist im Gras. Auf dem Weg zur Grube befanden sich alte zum Teil morsche Bohlen, in denen sich die Tiere entwickelt haben dürften. Kleinwallstadt 20. 6. 44, 17. 6. 45 (Neckermann). Stadtgärtnerei auf Blüten 21. 6. 04 (S.).

**N. (A.) ustulata F.**

Aschaffenburg (Oe.). Gailbachtal gestreift 4. 6. 04. Amorbach 27. 6. 09. Freudenberg auf Spiraen häufig 7. 1898 (Lehrer Heeg).

### Asclera Schmidt.

**A. (Ischnomera Seidl.) sanguinicollis F.**

Aschaffenburg (Fl. 4 St.). Am Mainufer 6. 09. Godelsberg 25. 5. 03 (Fr.).

**A. (Asclera a. str.) cyanea F. (= coerulea L.)**

Schönbusch unter Platanenrinde 10. 4. 43. Striet auf Schlehenblüte 22. 4. 27. Auf blühendem Weißdorn 23. 5. 30. Auf blühendem Sorbus aucuparia 5. 1895 (Fr.). Kalmut 22. 6. 25.

### Chrysanthia Schmidt.

**C. viridissima L.**

Nicht selten auf Blüten.

ab. **cuprina L.**

Mäusberg bei Wiesenfeld 20. 8. 39.

**C. viridis Schmidt.**

Häufig wie die Vorige.

## **O n c o m e r a Steph.**

### **O. femorata E.**

Nach Horion in unserem Gebiet sicher vorkommend.

## **O e d e m e r a Oliv.**

### **O. flavipes F.**

Kalmut 14. 6. 25. Krainberg 28. 6. 25. Büchelberg auf Blüten 7. 1882 (Fr.). Mäusberg bei Wiesenfeld 3. 9. 33.

### **O. podagrariae L.**

Häufig auf Blüten VI — VIII.

### **O. femorata Scop. (= flavescens L.)**

Erlabrunn Volkenberg 25. 6. 44.

### **O. nobilis Scop.**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.). Häufig auf Umbelliferen. V — VIII.

### **O. virescens L.**

Auf Blüten häufig IV — VII.

### **O. lurida Marsh.**

Häufig auf Blüten.

## **Pythidae**

### **P y t h o Fabr.**

### **P. depressus L.**

Aschaffenburg wohl mit einem aus dem Gebirge stammenden Fichtenstamm eingeschleppt (1 altes Exemplar in coll. Kraatz). (Horion).

### **L i s s o d e m a Curt.**

### **L. cursor Gyll.**

Aschaffenburg Schönbusch auf Eschen 14. 7. 27, 14. 7. 33, 8. 8. 33 (S.).

### **L. quadripustulatum Marsh.**

Aschaffenburg (D. N.). Fasanerie auf Eschen am Adriansplatz 30. 7. 24 (S.).

### **R a b o c e r u s Muls.**

### **R. foveolatus Ljungh.**

Sodener Wald 30. 3. 07. Schmerlenbacher Wald 10. 4. 05.

### **S a l p i n g u s Gyll.**

### **S. (Sphaeriestes Steph.) castaneus Panz.**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.). Nicht selten an Kiefernstöcken IV — IX.

### **V i n c e n z e l l u s Rtrr.**

### **V. ruficollis Panz. (= viridipennis Latr.)**

Aschaffenburg (Oe.). Gailbachtal unter Buchen- und Eichenrinde 25. 3. 40. Bei Hain i. Sp. 19. 3. 30, 25. 3. 40, 8. 5. 32, 29. 5. 32.

### **R h i n o s i m u s Latr.**

### **R. planirostris F.**

Nicht selten. Schmerlenbacher Wald unter Platanenrinde 1. 1894 (Fr.). Unter

Eichenrinde 8. 12. 23. Schönbusch unter Eichenrinde 28. 2. 27. Kl. Exerzierplatz unter Platanenrinde 1. 3. 15. Hain i. Sp. Seebachtal aus Reisig 3. 7. 23. Bei der Schöllmühle auf Eschen 23. 7. 28.

**R. ruficollis L.**

Aschaffenburg (Oe.). Schmerlenbacher Wald unter Eichenrinde 13. 1. 24. Hain i. Sp. aus Reisig 3. 6. 23. Fasanerie unter Eichenrinde 22. 10. 05.

**Mycterus Clairv.**

**M. curculionoides F.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Auf Spiraeen. Mainufer 19. 7. 06, 13. 7. 26. Striet auf Spiraeen 4. 7. 09. Thüngersheim 2. 7. 22 (St.).

## Pyrochroidae

**Pyrochroa Geoffr.**

**P. coccinea L.**

Dörngraben Larven aus Birkenstock 6. 4. 49. Verpuppung am gleichen Tag. Entwicklung zur imago am 14. 4. 49 (J. S.). Schönbusch am Ökonomieplatz 30. 5. 30. Bei der Schöllmühle 6. 1895 (Fr.). Heigenbrücken 6. 1894 (Fr.).

**P. serraticornis Scop.**

Striet (Oe.).

**P. pectinicornis L.**

Hafenlohrthal im Loewensteinischen Park unter Rinde eines morschen Buchenstrunkes 2 St. 22. 4. 34 (J. S.). Oberhalb Sailauf in morschem Eichenast 3 Puppen 26. 4. 50. Entwicklung am 28. 4. 50, 2 M., 1 W. Am Bomigsee auf blühender Esche 17. 4. 48 (Elbert).

## Scraptiidae

**Scraptia Latr.**

**S. fuscata Müll.**

Hain i. Sp. aus dem Mulm alter Buchenstöcke 4. 11. Hanau (H.). Aschaffenburg sehr vereinzelt in alten Stämmen und geschlagenem Holz (Fr.). Schönbusch 19. 7. 33.

## Aderidae (= Hylophilidae)

**Aderus Westw. (= Hylophilus Berth.)**

**A. (Anisodorus Muls.) nigrinus Germ.**

Stockstadter Wald aus Kiefernreisig 31. 5. 04, 8. 6. 23. Godelsberg an Kiefer 30. 6. 41.

**A. (Aderus s. str.) populneus Panz.**

Aschaffenburg unter Rinde und in faulem Holz (D.). Enkheim unter Pappelrinde 9. 4. 05 (Sattler).

## Anthicidae

**Notoxus Geoffr.**

**N. brachycerus Fald.**

1 St. in der Fasanerie 6. 1893 (Fr.).

**N. monocerus L.**

Nicht selten. Striet in Menge an einer toten Meloe 4. 1895 (Fr.). Oberhalb der Fasanerie zu Hunderten an einer toten spanischen Fliege 7. 1893 (Fr.).

**Mecinotarsus Laf.**

**M. serricornis Panz.**

Aschaffenburg auf blühenden Kirschen an der Würzburger Straße 5. 5. 08.

**Anthicus Payk.**

**A. floralis F.**

Aschaffenburg (Oe.). Fasanerie. Striet. Wiesen hinter Damm 5. 1894 (Fr.). Auf der Mainbrücke schwärmend. Kahl Moore 21. 8. 28, 14. 9. 23, 9. 10. 25.

**A. antherinus L.**

Nicht selten. III IV VIII XI.

**A. bifasciatus Rossi.**

Aschaffenburg (Fl.).

**A. flavipes Panz.**

Aschaffenburg Mainufer (Fl.). Mainbrücke 13. 4. 06 (S.). Sodener Wald.

**A. luteicornis Schm.**

Höchst a. M. Mitte Februar 1896 (Stock).

## Meloidae

**Cerocoma Geoffr.**

**C. Schaefferi L.**

Aschaffenburg Schönbusch (Oe.). Bei Hanau auf blühenden Kamillen 6. 05 (H.).

**Lytta F.**

**L. vesicatoria L.**

„In manchen Jahren in zahlloser Menge an Eschen, so z. B. 1868 an den Eschen nächst dem Friedhof. 1891 in Menge an Liguster auf dem Büchelberg (Fr.).“ Stockstadter Wald 12. 6. 20 auf Eschen am Weg nach Babenhausen. Im Jahre 1919 waren um diese Zeit alle dortigen Eschen von der Lytta vollständig kahlgefressen. Fr. beobachtete die Art auch auf Flieder.

**Meloe L.**

**M. proscarabaeus L.**

Im April und Mai auf Grasplätzen und Rainen häufig. Erbig 4. 1895 (Fr.). Schmerlenbacher Wald 28. 5. 01.

**M. violaceus Marsh.**

Im Frühjahr nicht selten IV, V.

**M. autumnalis Oliv.**

Aschaffenburg (D. N.).

**M. variegatus Denov.**

Sehr selten. Erbig 4. 1882 (Fr.). Stockstadter Wald 5. 1882 (Fr.). Büdigheim bei Hanau (H.).

**M. cicatricosus Leach.**

Aschaffenburg (D.). Im ganzen Gebiet an Wegrändern nicht selten. Striet 4. 1894 (Fr.). Erbig 5. 1878 (Fr.).

**M. brevicollis Panz.**

Obernburger Wald 5. 1882 (Fr.). Kahl 7. 10. 34. Bei Glattbach 31. 10. 02. Gailbachtal 2. 11. 39. Sodener Wald, Gemünden (Ade).

**M. scabriusculus Brandt.**

Aschaffenburg (D. N.). Mainufer auf Wiesen 25. 5. 41. Am Weg nach Glattbach 25. 4. 02, 29. 5. 04.

**M. rugosus Marsh.**

Aschaffenburg (D.). Auf dem Erbig 10. 1878 (Fr.). Selten.

## Rhipiphoridae

### *Pelecotoma* Fischer.

**P. fennica Payk.**

Aschaffenburg (D. N.).

### *Metoecus* Deg.

**M. paradoxus L.**

Schönbusch 10. 10. 27 mehrfach in einem Erdnest von Wespen. Im Frankfurter Gebiet im VII. u. VIII. Monat festgestellt. Lohr im Bodennest von *Vespa vulgaris* (St.).

## Mordellidae

### *Tomoxia* Costa.

**T. biguttata Gyll.**

Gailbachtal 31. 5. 28, 4. 6. 31. Büchelberg 30. 5. 43. Fasanerie an altem Holzgeländer aus Birke 3. 6. 45. Hain i. Sp. Seebachtal 29. 6. 26, 2. 7. 22. Benediktushöhe bei Retzbach 30. 7. 33.

### *Mordella* L.

**M. perlata Sulz.**

Kleinwallstadt 10. 6. 46 (Neckermann). Hausen bei Lohr 6. 26 (St.). Hain i. Sp. auf einem Buchenschlag mehrfach auf Buchenstöcken mittags 2. 7. 22 (S.).

**M. maculosa Naezen.**

Bei Oberbessenbach 4. 7. 49 (J. S.).

**M. aculeata L.**

Auf Blüten am Godelsberg 6. 1894 (Fr.). Glattbacher Wald auf *Cornus* 6. 1895 (Fr.).

**M. brevicauda Costa.**

Aschaffenburg 3. 6. 04. Striet 4. 8. 03. Mainufer.

**M. holomelaena Apfelbeck.**

Aschaffenburg Steinbachtal 3 St. 1947 (t. Ermisch). Striet 4. 7. 09.

**M. fasciata F.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.).

ab. *villosa* Schrank.

Bei Babenhausen (Scr.). Kahl Moore 11. 6. 23. Bei Oberbessenbach 25. 6. 50 (J. S.).

### *Mordellistena* Costa.

**M. pumila Gglb.**

Aschaffenburg (Oe.). Bei Stockstadt a. M. auf den Gersprenzweiden 31. 5. 04.

**M. brevicauda Boh.**

Aschaffenburg 3. 6. 04. Striet 4. 8. 03. Mainwiesen.

**M. parvula Gyll.**

Seligenstadt (Scr.).

**M. humeralis L.**

Aschaffenburg sehr selten (D. N.).

**M. variegata F. (= lateralis Oliv.)**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.). Kahl Moore 25. 6. 26. Mäusberg 7. 19. Hanau (M.).

**M. Neuwaldeggiana Panz.**

Seligenstadt (Scr.). Fasanerie auf Umbelliferen 6. 1876 (Fr.).

**M. abdominalis F.**

Aschaffenburg Fasanerie 5. 1895 (Fr.). Godelsberg 4. 6. 08 (S.).

**Pentaria Muls. (= Anthobates Lec.)**

**P. badia Rosh.**

Fasanerie 10. 4. 1894 (Fr.).

**Anaspis Costa.**

**A. humeralis F. (= Geoffroyi Müll.)**

Seligenstadt (Scr.). Godelsberg auf blühendem Birnbaum 24. 4. 16. Auf Blüten von Prunus padus 6. 5. 05. Schönbusch 10. 5. 26.

**A. frontalis L.**

Auf Blüten nicht selten. IV V VI.

**A. maculata Fourcr.**

Büchelberg auf blühendem Ahorn 13. 5. 06. Godelsberg auf Eichen 22. 6. 42. Mäusberg 12. 7. 46.

**A. thoracica L.**

Aschaffenburg Fischerhecke 5. 1894 (Fr.). Fasanerie 10. 6. 39. Schönbusch 24. 7. 11, 9. 8. 33.

**a. fuscescens Steph.**

Lindig aus morschem Weißdornholz gezogen 24. 4. 47.

**A. ruficollis F.**

Aschaffenburg (D. N. u. S.).

**A. rufilabris Gyll.**

Fasanerie 6. 1894 (Oe. u. Fr.). Hain i. Sp. 11. 5. 04. Unter Moos an alten Eichen 25. 11. 23.

**A. melanostoma Costa.**

Aschaffenburg-Damm auf Weißdorn 17. 5. 24.

**A. flava L.**

Godelsberg auf Linde 25. 6. 42.

**ab. Schilskyi Pic.**

Fischerhecke 6. 1895 (Fr.). Glattbacher Wald auf Cornus 6. 1895 (Fr.).

**A. brunripes Muls.**

Aschaffenburg auf Verbascum 29. 6. 04.

**A. varians Muls.**

Godelsberg auf Blüten von Valeriana 17. 6. 04.

**A. quadrimaculata Gyll.**

Seligenstadt auf blühendem Dill häufig (Scr.). Wendelberg 12. 7. 46. Oberbessenbach 20. 7. 46. Retzbach Benediktushöhe 30. 7. 33. Am Röderbach auf Mentha aquatica 27. 8. 28. Striet 30. 8. 26. Gailbachtal 8. 11. 36.

## Serropalpidae (= Melandriidae)

### T e t r a t o m a Fabr.

**T. fungorum F.**

Aschaffenburg (Oe.). Gailbachtal an Baumschwämmen 7. 10. 08. Seligenstadt an Baumschwämmen 28. 10. 22. Rohrbrunn 5. 10. 49.

**T. ancora F.**

Fasanerie unter Moos an alten Eichen 26. 3. 07, 1 St. (S.).

### E u s t r o p h u s Latr.

**E. dermestoides F.**

Aschaffenburg in Baumschwämmen (D. N.).

### H a l l o m e n u s Panz.

**H. binotatus Quens.**

Fasanerie an Agaricus 6. 1894 (Fr.). An verpilztem Hainbuchenstrunk 12. 7. 04 (S.). 2 St. 7. 21 (H.) Hanau.

### O r c h e s i a Latr.

**O. micans Panz.**

In Baumschwämmen nicht selten. Platanenallee unter Rinde 2. 1894 (Fr.) 5. 2. 27. Aus einem Polyporus von Apfelbaum in Menge 8. u. 9. 1897 (Fr.).

**O. luteipalpis Muls.**

Hanau 18. 6. 12, 10. 7. 24, 7. 9. 03 (H.).

**O. minor Walck (= sepicola Rosenh.)**

Seligenstadt (Scr.).

**O. fasciata Payk.**

Fasanerie unter Eichenrinde 20. 1. 1894 (Fr.). Schmerlenbacher Wald 28. 2. 05.

**O. undulata Kr.**

Striet 28. 5. 28. Karbach 27. 8. 43.

### A n i s o x y a Muls.

**A. fuscula Illig.**

In altem Holz 1 St. bei Seligenstadt (Scr.). Hanau unter verpilzter Buchenrinde (H.). Aschaffenburg in altem Apfelbaum 23. 7. 26 (S.).

### A b d e r a Steph.

**A. affinis Payk.**

Seligenstadt in Baumschwamm (Scr.). Unter verschimmelter Buchenastrinde Hanau 4. u. 5. (H.). Schönbusch aus Eichenschwämmen 1 St. 10. 7. 24.

**A. flexuosa Payk.**

Aschaffenburg in Baumschwamm (Fl.).



## **Phloeotrya Steph.**

### **P. rufipes Gyll.**

Aschaffenburg an dürren Buchenästen (D.).

### **P. Vaudoueri Muls.**

Aschaffenburg an Buchen- und Birkenscheitholz (D.). (Im Sommersemester 1889 konnte ich das sonst sehr seltene Insekt Herrn Prof. Dr. Nördlinger in einem Sägewerk bei Tübingen unter der Rinde einer alten gefällten Eiche als Larve, Puppe und Imago zeigen.) (S.).

## **Xylita Payk.**

### **X. laevigata Hellen.**

Fasanerie (Oe.).

## **Hypulus Payk.**

### **H. quercinus Quens.**

Bei Schwanheim 20. 5. 08 (Schwarzer).

## **Melandrya F.**

### **M. caraboides L.**

In altem morschem Laubholz. An Erlenast 4. 4. 39. Striet 5. 5. 34. Gailbachtal 7. 6. 31. Schönbusch 7. 6. 26. Waldaschaff i. Sp. zahlreich 24. 5. 26. Metzgergraben i. Sp. in morschem Eichenholz 26. 5. 40.

### **M. barbata F. (= flavicornis Duft.)**

Bruchköbel bei Hanau von Tanne geklopft in der Nähe von Hainbuchen 6. 21 (H.)

## **Conopalpus Gyll.**

### **C. testaceus Oliv.**

Aschaffenburg (D.). Seligenstadt (Scr.) in faulem Hainbuchenholz. Schönbusch aus morschem Eichenholz 17. 4. 25, 14. 6. 29, 25. 6. 34 von alten Eichen geklopft (S.).

ab. *flavicollis* Gyll.

Aschaffenburg (D.).

## **OspHYa Illig.**

### **O. bipunctata F.**

ab. *Viertli* Rtrr.

Auf dem Krainberg bei Gambach a. M. auf blühendem Weißdorn 24. 5. 31 (J. S.).

# **Lagriidae**

## **Lagria F.**

### **L. hirta L.**

Häufig auf Gebüsch. VI VII.

### **L. atripes Muls.**

Erscheint vor *L. hirta*. Striet 17. 5. 1882 (Fr.). Schönbusch auf Sträuchern mehrfach 1. 6. 35, 10. 6. 36.

# **Alleculidae**

## **Allecula F.**

### **A. morio F.**

An altem Apfelbaum 18. u. 27. 7. 1898 (Fr.). Larven nicht selten im Mulm alter

Bäume. Hain i. Sp. aus alter Buche 18. 5. 11, 8. 6. 11. Schönbusch von Linden 17. 7. 28.

**Prionychus Solier (= Eryx Steph.)**

**P. ater F.**

Larve im Mulm alter Laubbäume. Nicht selten. Entwicklung von April bis Juni. An Apfelbaum 18. 7. 1897. An Staketenzaun des Schloßgartens 27. 7. 1898 (Fr.).

**Hymenalia Muls.**

**H. rufipes F.**

Kalmut unter Pflanzenrasen 28. 6. 25, 2 St. Am Weg nach Obernau an Getreideähren 10. 7. 09, 1 St. Lohr Beilstein 18. 6. 22 (St.).

**Gonodera Muls.**

**G. luperus Hbst.**

Schönbusch in Menge auf blühenden Kirschbäumen 5. 1894 (Fr.). An Geisblatt und blühendem Weißdorn 10. 5. 26. Krainberg auf Kiefer 7. 6. 25. Mäusberg 26. 5. 31.

ab. *ferruginea* F.

Ruine Homburg 2. 5. 26. Schönbusch auf Eichen zahlreich 7. 5. 47.

**Pseudocistela Crotch.**

**P. ceramboides L.**

Aschaffenburg 2. St. in coll. Koltze. Seligenstadt (Scr.). Aus Eichenmulm 3 St. 2. 5. 48 (S.).

**Isomira Muls.**

**I. murina L.**

Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg (Fr.). Stockstadter Wald 1. 7. 06. Krainberg 2 St. 7. 6. 25.

ab. *maura* F.

Kalbenstein 27. 6. 32, 1 St.

**Mycetochara Berthold.**

**M. flavipes F.**

Aschaffenburg an den Staketen des Schöntals (Oe.).

**M. axillaris Payk.**

Aschaffenburg (D. N.). Hain i. Sp. an morscher Buche mehrfach 8. 7. 23.

**M. humeralis F. (= bipustulata Illig.)**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Hanau (Heynemann).

**M. linearis Illig.**

Aschaffenburg (Oe.). Nicht selten in alten Laubhölzern. Schönbusch an morschem Eichenast 8. 5. 21. Weibersbrunn 4 Puppen aus morscher Eichenrinde 1. 5. 52. Entwicklung 10. 5. 52. In hohler Silberpappel 3. 6. 11.

**Cteniopus Solier.**

**C. flavus Scop. (= sulfureus L.)**

Aschaffenburg (Fr.). Vor Hofstetten bei Kleinwallstadt an *Scrophularia nodosa* 17. 7. 24. Krainberg 18. 7. 36.

**Omoplus Sol.**

**O. rufitarsis Leske (= amerinae Kirsch.)**

Bei Seligenstadt 1 St. (Scr.).

**O. lividipes Muls. (= picipes Redt.)**

Bei Seligenstadt (Scr.).

# Tenebrionidae

## **A s i d a Latr.**

- A. sabulosa Fuessel.**  
Aschaffenburg (D. N.). Kahl (n. Wilke.).

## **B l a p s F.**

- B. lethifera Marsh. (= similis Latr.)**  
Stockstadter Wald 5. 1895 (Fr.). Schönbusch 7. 6. 36.
- B. mortisaga L.**  
Hinter Damm 25. 4. 27. Lohr Bäckerei 28. 10. 22 (St.).
- B. mucronata Latr.**  
In Aschaffenburg die häufigste Art. In Kellern der Herstattstraße 23. 4. 43, 20. 6. 44, 3. 7. 44. In der Karlstraße 1. 8. 04. Im Schloßgarten Ende 1913.

## **M e l a n i m o n Stev. (= Microzoum Redt.)**

- M. tibiale F.**  
Auf sandigen Flächen. Aschaffenburg (D. N.). Sandgrube bei Mainaschaff 23. 2. 26, 1. 9. 27. Kahl Sande 23. 9. 34. Sandgruben bei Sulzbach a. M., im Schönbusch und Stockstadter Wald.

## **O p a t r u m F.**

- O. riparium Scr.**  
Steinheim Basaltbrüche unter Stein 7. 8. 21 (Ochs).
- O. sabulosum L.**  
An trockenen sandigen Stellen nicht selten. IV V VII.

## **C r y p t i c u s Latr.**

- C. quisquilius L.**  
An sandigen Plätzen nicht selten.

## **B o l i t o p h a g u s Illig.**

- B. reticulatus L.**  
Metzgergraben i. Sp. in Buchenschwämmen 11 St. 12. 6. 52 (J. S.). Bei Rohrbrunn im Haßlochtal 23. 4. 53, 25. 10. 53.
- B. (Eledonoprius Rtrr.) armatus Panz.**  
In Eichenschwämmen des Frankfurter Waldes nach v. Heyden. Die Art dürfte auch in unserem Gebiet noch nachzuweisen sein.

## **E l e d o n a Latr.**

- E. agaricola Hbst.**  
Schmerlenbacher Wald in Buchenschwämmen 30. 3. 07 zahlreich. Schönbusch in alten Weiden 2. 7. 04.

## **D i a p e r i s Geoffr.**

- D. boleti L.**  
Stockstadter Wald an einem morschen Birkenast in größerer Anzahl 6. 1. 30, 16. 2. 30 (J. S.). In Schwämmen der Schönbuschallee Mitte August mehrfach (S.). Bei Rothenbuch i. Sp. in einem Baumschwamm (St.).

## **S c a p h i d e m a Redt.**

- S. metallicum F.**  
Sandgrube bei Großostheim an verschimmeltem Holz häufig 19. 3. 29. Fasanerie

an schimmeligem Baumstrunk 1. 4. 08. Mainhecken 21. 4. 06. Hinter Damm 15. 5. 07. Schönbusch an verschimmelten Eichenästen 23. 5. 30, 1. 7. 23, 29. 11. 46. Bei Wenighösbach unter Moos 1. 12. 34.

### **Platydemia Lap.**

#### **P. violaceum F.**

Aschaffenburg Fasanerie (Oe.). Schönbusch an feuchtem, morschem Eichenast und unter lockerer Eichenrinde 9. u. 13. 2. 37 (J. S.).

### **Pentaphyllus Latr.**

#### **P. testaceus Hellw.**

Aschaffenburg (Fl.). Schönbusch an rotfaulem Eichenholz zahlreich 11. 2. 31. Schmerlenbacher Wald in einem morschen Eichenstrunk 18. 3. 06. Kahltal bei Mömbris unter lockerer Nußbaumrinde 15. 4. 47 (J. S.). Hinter Damm 18. 7. 25.

### **Gnathocerus Thunbg.**

#### **G. cornutus F.**

Lohr in Mehlkasten 16. 2. 22, 3. 22 (St.). In Brot 2. 9. 08, 23. 7. 32, 8. 22 (St.).

### **Tribolium Mac. Leay.**

#### **T. castaneum Hbst. (= ferrugineum F.).**

Aschaffenburg in Brot 1. 1894 (Fr.). Zahlreich in einer mit Kleie gefüllten Mehlwurmbox 10. 1. 40. Im Haus in Grieß 18. 1. 46.

### **Palorus Muls.**

#### **P. depressus F.**

Aschaffenburg unter Rinden (D. N.).

### **Uloma Cast.**

#### **U. culinaris L.**

Im Schmerlenbacher Wald (Oe.). Im Hafenlohrtal bei Lichtenau in einem alten Buchenstrunk 4 St. 28. 4. 40 (J. S.). Freudenstadt unter Kiefernrinde 1893 (Heeg).

### **Hypophloeus Hellw. (= Corticeus Piller)**

#### **H. unicolor Pill. (= castaneus F.)**

Hain i. Sp. Seebachtal unter Eichenrinde 14. 4. 22. An altem Buchenstrunk unter Rinde 2. u. 16. 7. 22, 2 St. Bei Rothenbuch 10. 7. 38. Bei Rohrbrunn 17. 9. 52, 4 St. (J. S.).

#### **H. longulus Gyll.**

Aschaffenburg (D. N.).

#### **H. fraxini Kugel.**

Aschaffenburg (Oe.).

#### **H. pini Panz.**

Mäusberg bei Wiesenfeld unter Kiefernrinde 2 St. 16. 4. 49 (J. S.).

#### **H. rufulus Rosenh.**

Hanau 1 St. (n. Horion).

#### **H. bicolor Oliv.**

Aschaffenburg unter Rinde gefällter abgestorbener Ulmen in den Gängen von Scolytus scolytus Fieb. 25. 1. 39, 20. 3. 39, 29. 4. 39, 18. 5. 39. Fasanerie unter Eichenrinde bei Xyleborus monographus 5. 3. 48 (Elbert), 14. 7. 46, 28. 7. 46 (J. S.).

#### **H. fasciatus F.**

Seligenstadt (Scr.).

**H. linearis F.**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.). Stockstadter Wald unter Rinde von Kiefernästen bei *Pityogenes bidentatus* Hbst. mehrfach 5. 5. 21. Großostheimer Wald unter Rinde von Schwarzkieferästen bei *Pityogenes monacensis* Fuchs und *Pityogenes trepanatus* (Nördl.) (S.). Nicht selten.

**Tenebrio L.**

**T. obscurus F.**

Aschaffenburg in einem Taubenschlag 10. 4. 06 mehrfach. In einem Hasenkasten 8. 7. 47 (Elbert).

**T. molitor L.**

In weichem, morschem Holz (Weide, Pappel), in Häusern, in altem Mehl und Brotresten. Die Larven (Mehlwürmer) sind ein beliebtes Vogelfutter für im Käfig gehaltene Singvögel.

**Neatus Lec.**

**N. picipes Hbst.**

Seligenstadt (Scr.).

**Cylindronotus Fald. (Helops F.)**

**C. (Stenomax Allard) aeneus Scop.**

Schönbusch unter Eichenrinde 30. 4. 39. In Menge unter alten Brettern 4. 1893 (Fr.). Mainhecken auf Gebüsch nicht selten 18. 6. 36. Kalmut auf Gebüsch 28. 6. 25. Lohr Beilstein 14. 6. 22 (St.). Mäusberg 7. 19.

**C. (Nalassus Muls.) laevioctostriatus Goeze (= caraboides Panz.).**

Häufig unter trockener Baumrinde. II VIII — XI.

# Lammellicornia

## Scarabaeidae

### Gymnopleurus Illig.

**G. Geoffroyi Fuessl. (= cantharus Er.)**

Kahl bei den Emmerichshöfen (Heynemann und Dr. Hille). Hanau (Dr. Hille) nach Fr.

**Sisyphus Latr.**

**S. Schaefferi L.**

Schmerlenbacher Wald (Oe.). Karlstadt auf dem Haag 24. 5. 20, 9. 6. 19. Mäusberg bei Wiesenfeld mehrfach an Menschenkot 24. 5. 20, 9. 6. 19, 16. 9. 24 häufig (Gopp). Zwischen Gössenheim und Aschfeld Anfang 5. 24 (St.).

**Copris Geoffr.**

**C. lunaris L.**

Aschaffenburg Exerzierplatz 9. 1894, 2 M. u. 2 W. (Fr.). Daselbst war die Art vor 1900 öfter zu finden. Wurde nachher nicht mehr beobachtet. Neuerdings fand Dr. Stadler 1 W. bei Lohr in seiner Brutröhre 3. 5. 52. Auf den Sanden bei Sendelbach 1 W. 29. 1. 54 (St.).

**Oniticellus Serv.**

**O. fulvus Goeze.**

Aschaffenburg (Oe.).

**C a c c o b i u s Thoms.**

**C. Schreberi L.**

In den letzten Jahrzehnten seltener geworden. In Schaf- und Kuhdünger. Erbig 5. 1882 (Fr.). Fasanerie 8. 1893 (Fr.). Seligenstadt (Scr.).

**O n t o p h a g u s Latr.**

**O. taurus Schreber.**

Erbig in Schafdünger selten 5. 1892 (Fr.). Früher in der Weidenanlage links des Mains (Oe.).

**O. ovatus L.**

Häufig. IV. V. VII. Mörsweise an Fischeas 13. 5. 05.

**O. verticicornis Laich.**

Häufig in Kuhdünger.

**O. fracticornis Preysl.**

Häufig in Kuhdünger.

**O. coenobita Hbst.**

Fasanerie in Kuhdünger 5. 1892 (Fr.).

**O. lemur F.**

Freudenberg in Schafmist 6. 1897 (Heeg).

**O. vacca L.**

In Kuhdünger.

**O. nuchicornis L.**

Erbig 5. 1882. Nilkheim 8. 1893 (Fr.).

**O d o n t a e u s Klug.**

**O. armiger Scop.**

Aschaffenburg Fasanerie 1 St. 17. 6. 02 (Fr.). Am Fuß des Erbig 8. 10. 26, 17 Uhr fliegend (Noll).

**T y p h o e u s Leach.**

**T. Typhoeus L.**

Sodener Wald in Schafsmist 31. 1. 26, 15. 9. 24. Spessart 15. 4. 23, 24. 5. 26. 15. 10. 53 bei Dörrmorsbach 2 M. frisch entwickelt (J. S.).

**G e o t r u p e s Latr.**

**G. mutator Marsh.**

Häufig in Kot. III. V. IX. X.

**G. spiniger Marsh.**

Sodener Wald 6. 1. 26. Sendelbach Sandgrube fliegend 21. 10. 20 (St.).

**G. stercorarius L.**

Häufig in Kot.

ab. foveata Marsh.

Nicht häufig unter der Stammform (Fr.).

**G. stercorosus Scriba (= silvaticus Panz.)**

Sehr häufig in Wäldern.

**G. vernalis L.**

Heigenbrücken 5. 1882. Stockstadter Wald 8. 1894 (Fr.). Stengerts 9. 9. 10.

## **Aphodius Illig.**

**A. erraticus L.**

Mainufer 5. u. 8. 07. Erbig in Schafdünger 5. 1882 häufig (Fr.).

**A. subterraneus L.**

Sandgrube bei Mainaschaff 24. 3. 30, 10. 1890. Mainbrücke fliegend 11. 4. 06,  
9. 24. Fasanerie in Pferdemit.

**A. scrutator Hbst.**

Aschaffenburg Exerzierplatz 5. 1894 (Fr.). Erbig 5. 1894 (Fr.). Kahl in Menschenkot 10. 6. 04.

**A. fossor L.**

Häufig.

ab. *silvaticus* Ahr.

Aschaffenburg 1 St. Kahl 1 St.

**A. haemorrhoidalis L.**

Babenhausen und Seligenstadt (Scr.).

**A. arenarius Oliv. (= rhododactylus Marsh.)**

Aschaffenburg sehr selten (Oe.).

**A. luridus F.**

Erbig 5. 1882 (Fr.).

**A. depressus Kug.**

ab. *atramentarius* Er.

Einzeln bei Seligenstadt (Scr.).

**A. rufipes L.**

Erbig in Schafsdünger 5. 1894. Johannesberg 5. 1895 (Fr.).

**A. satelliticus Hbst.**

Selten (Oe.).

**A. maculatus Sturm.**

Seligenstadt (Scr.).

**A. quadriguttatus Hbst.**

Aschaffenburg (Oe.). Hanau (Dr. Hille).

**A. biguttatus Germ.**

Krainberg 7. 5. 22.

**A. quadrimaculatus L.**

Mainufer 5. 07. Schmerlenbacher Wald (Oe.). Hanau (Scr.).

**A. sticticus Panz.**

Büchelberg. Fasanerie 5. 1895 (Fr.).

**A. tessellatus Payk.**

Glattbacher Wald 16. 10. 06, 1 St. Kahl 16. 10. 04, 1 St. 1. 11. 05.

**A. melanostictus Schmidt.**

Kahl 12. 4. 05, 1 St.

**A. distinctus Müll. (= inquinatus F.)**

Stockstadter Wald 4. 1895 (Fr.). 25. 9. 04 an Schafsmist.

- ab. **centrolineatus** Panz.  
Sandgrube bei Sulzbach a. M. 6. 11. 28.
- ab. **nubilus** Panz.  
Schmerlenbacher Wald 18. 3. 06. Lohr-Sendelbach 1. 3. 25 (St.). Stockstadter Wald an Schafsmist 18. 9. 04, 3 St.
- A. obliteratus** Panz.  
Aschaffenburg (Oe.). Fasanerie (Fr.).
- A. contaminatus** Hbst.  
Mainufer 30. 8. 06. Büchelberg 23. 8. 25. Stockstadter Wald an Menschenkot 19. 9. 05. Nicht selten.
- A. prodromus** Brahm.  
Sehr häufig.
- A. pubescens** Sturm.  
Hanau-Bulau 7. 23 (H.).
- A. sphacelatus** Panz.  
ab. **punctatosulcatus** Sturm.  
Südl. Strietrand 1. 3. 36. Stockstadter Wald an Schafsmist 23. 9. 04.
- A. consputus** Creutz.  
Seligenstadt (Scr.).
- A. porcus** F.  
Seligenstadt (Scr.).
- A. scrofa** F.  
Seligenstadt (Scr.). Exerzierplatz an Schafsmist 5. 1894 (Fr.). Mainufer 3. 6. 11.
- A. merdarius** F.  
Häufig.
- A. pusillus** Hbst.  
Nach Fr. nicht selten. Aschaffenburg an Schafsmist 23. 5. 46 (Elbert).
- A. tristis** Panz.  
Kahl 5. 5. 01.
- A. fimetarius** L.  
Sehr häufig.
- A. aestivalis** Steph. (= **foetens** F.)  
Aschaffenburg sehr selten. Heigenbrücken 7. 1894 (Fr.).
- A. scybalarius** F.  
Seligenstadt (Scr.). Mainufer 18. 3. 05, 1 St. 10. 1890. Erbig 5. 1894 (Fr.) 2 St.
- A. ater** Deg.  
Fasanerie 5. 1893 (Fr.).
- A. sordidus** F.  
Mainufer 16. 4. 24, 1. 9. 05. Schönbusch 9. 1893 (Fr.).
- A. nitidulus** F.  
Exerzierplatz unter Rinde 30. 11. 1894 (Fr.).



**A. rufus Moll.**

Seligenstadt (Scr.).

**A. immundus Creutz.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

**A. varians Duft.**

Aschaffenburg Mainufer.

**A. plagiatus L.**

Aschaffenburg (Oe. u. Fr.). Hanau (M.).

ab. immaculatus D. Torre.

Steinheim bei Hanau 12. 5. 07 (H.).

**A. niger Panz.**

Seligenstadt (Scr.). Striet 3. 5. 35, 1 St. Steinheim Basaltbrüche 5. 9. 23 (Ochs).

**A. lividus Oliv.**

Erbig 5. 1882 (Fr.). Seligenstadt (Scr.).

**A. granarius L.**

Verbreitet. Fasanerie an feuchten Stellen 5. 1895. Striet 4. 1895 (Fr.). Schönbusch 7. 5. 47. Bischberg 16. 5. 48 (Elbert).

**Heptaulacus Muls.**

**H. testudinarius F.**

Aschaffenburg auf Äckern fliegend (Fr.). Hanau 39 (M.) 1 St.

**H. villosus Gyll.**

Kalbenstein 17. 6. 32. Krainberg 26. 6. 32, 11. 7. 38, 1 St. (S.).

**Oxymus Lap.**

**O. silvestris Scop.**

Sehr häufig.

**Psammodius Heer.**

**P. sulcicollis Illig.**

Auf der Mainbrücke fliegend 11. 4. 06. Sande bei Mainaschaff unter Pflanzenrasen nicht selten 29. 7. 05.

**Diastictus Muls.**

**D. vulneratus Sturm.**

Auf der Mainbrücke schwärmend 13. 5. 07. Auf sandigen Flächen am Main häufig 28. 7. 08, 8. 07.

**Pleurophorus Muls.**

**P. caesus Panz.**

Obernau am Mainufer 19. 5. 09. Aschaffenburg 5. 7. 07. In Sandgruben kl. Exerzierplatz. Karlstadt a. M. 12. 10. 46.

**Rhyssemus Muls.**

**R. germanus L.**

Seligenstadt (Scr.). Kl. Exerzierplatz in Schafsmist 25. 5. 46 (Elbert). Sandgrube zwischen Großostheim und Pflaumheim 14. 8. 27, 7. 8. 48.

**Ochodaeus Serv.**

**O. chrysomeloides Schrk.**

Aschaffenburg (Oe.).

## **T r o x F a b r.**

### **T. perlatus Goeze.**

Hanau in einem Hasenfell (H.).

### **T. sabulosus L.**

Aschaffenburg. Stockstadter Wald nicht selten 1. 5. 32.

### **T. hispidus Pont.**

Büchelberg an Vogelaas 25. 4. 06, 1 St. Mainufer 5. 07, 1 St.

### **T. scaber L.**

In hohlen Bäumen mit alten Vogelnestern nicht selten. III. XII.

### **T. Perrisi Fairm. (= Haroldi Fl. = nidicola Bonn.)**

In hohlen Bäumen mit alten Vogelnestern. Schönbusch in hohler Eiche 26. 1. 31. Obernau in hohlem Apfelbaum am Weg zum Wald 8 St. Striet 2. 11, 12. 09, 12. 27 (S.). Von Fl. bereits 1874 und 1876 mehrfach im Mulm einer Eiche gefunden.

## **S e r i c a M a c. L e a y.**

### **S. brunnea L.**

Auf sandigen Flächen. Stockstadter Wald 5. 4. 26, 12. 7. 25. abends fliegend. In der Erde 1. 6. 45. Striet 1. 7. 25. Lohr nachts ins Zimmer geflogen 3. 7. 22, 5. 8. 28 (St.). Gailbachtal 26. 11. 27 in der Sandgrube mit *Maladera holosericea*.

## **M a l a d e r a M u l s.**

### **M. holosericea Scop.**

Lohr Romberg 29. 4. 24 (St.). Aschaffenburg Exerzierplatz im Sand 5. 07, 13. 9. 05. Sandgrube bei Sulzbach a. M. 15. 8. 28. Gailbachtal Sandgrube 18. 10. 36, 26. 11. 27. Sandgrube bei Mainaschaff 26. 11. 27.

## **H o m a l o p l i a S t e p h.**

### **H. ruricola F.**

Aschaffenburg Schönbusch 7. 24. Stockstadter Wald 1. 7. 06. Wiesenfeld 13. 7. 19 morgens zwischen 10 u. 11 Uhr schwärmend Kalmut 28. 6. 25, 5 St.

### **ab. atrata Geoffr.**

Krainberg morgens schwärmend 22. 6. 30, 28. 6. 32 je 1 St.

## **R h i z o t r o g u s L a t r.**

### **R. aequinoctialis Hbst.**

Seligenstadt (Scr.).

### **R. marginipes Muls.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Hanau 1909 zahlreich (M.). Schönbuschallee (S.). Bei Oberbessenbach 15. 4. 41, 1 St. Sandgrube bei Sulzbach a. M. 3. 5. 31.

### **R. aestivus Ol.**

Benediktushöhe bei Retzbach 28. 4. 29. Schloßgarten 23. 5. 1899 (Fr.). Mainanlage unterhalb des Schloßplatzes 20 Uhr zahlreich schwärmend 2. 5. 23. Karlstadt Haag unter Moos 5. 5. 29. Kalbenstein 11. 5. 31. Lohr am Schafhof 20. 5. 23 (St.).

## **A m p h i m a l l o n B e r t h.**

### **A. solstitialis L.**

Sehr häufig. Abends auf Grasflächen schwärmend VI. VII.

### **A. ochraceus Knoch.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

**A. ater Hbst.**

Auf dem Kalmut bei Homburg a. M. morgens zahlreich schwärmend nur M. 28. 6. 25. Auf dem Mäusberg bei Wiesenfeld 7. 19 M.

**A. ruficornis F.**

Bei Seligenstadt einmal um Pfingsten in großer Anzahl in früher Morgenstunde schwärmend (Scr.). Schönbuschallee und Striet (cand. forest Bergmüller). Thün-  
gersheim 1 M. u. W. 10. 6. 18 (Dr. Ettinger).

**A. assimilis Hbst.**

Aschaffenburg (D.).

**A n o x i a Lap.**

**A. villosa F.**

Kahl abends in Menge schwärmend, besonders um Populus nigra (Fr.), ebenso bei Hanau und Babenhausen (Scr.).

**P o l y p h y l l a Harris.**

**P. fullo L.**

Nach K. Hofmann, Hanau erscheint P. fullo bei eintretender Dämmerung Ende Juni gegen 21 Uhr. Vorher sieht man schon kleine maulwurfartige Erhebungen auf sandigem Boden, die eine kleine Öffnung zeigen (ebenso wie bei Anoxia villosa). Bei Verlassen des Bodens gibt fullo einen zirpenden Laut von sich. Zum Abflug sucht er eine Pflanze zu erklettern, von der aus er seinen Flug beginnt. Er windet sich in Spiralen in die Höhe. Bei Oberbessenbach im Wald 1 St. (Broili). Kahl (Fr.). Bei Stockstadt a. M. 3. 7. 50 (Noll). Bei Mainaschaff 15. 7. 50. Großauheim 7. 25. Lohr auf dem Romberg 8. 7. 32 und am Spielplatz 29. 7. 32, bei der Bahnmeisterei abends an das elektr. Licht anfliegend 16. 7. 19 (St.).

**M e l o l o n t h a F.**

**M. hippocastani F.**

Obernauer Wald zahlreich mit den Abarten coronata Muls., nigripes Comolli, nigricollis Muls. 21. 5. 11.

**M. vulgaris F. (= melolontha L.)**

Gemein mit den Abarten albida Redt., ruficollis Muls., lugubris Muls., letzterer selten auf dem Erbig.

**A n o m a l a Sam.**

**A. dubia Scop. v. aenea Deg.**

Kahl 12. 7. 15, 19. 7. 36. Schönbusch an Weiden (Fr.). An Getreidehalmen bei der Obernauer Landstraße 7. 1881 (Fr.).

ab. marginata Schilsky.

Häufig. Mainufer 30. 6. 46. Striet 7. 20. Erbig 12. 7. 25. Stockstadter Wald 21. 7. 40. Kahl auf Salweide 19. 7. 23.

ab. oblonga F.

Kahl (S.).

**P h y l l o p e r t h a Steph.**

**P. horticola L.**

Gemein auf Bäumen und Sträuchern, besonders schädlich an Rosen. Am 28. 5. 42 (spätes Frühjahr) morgens zahlreich auf trockener Rasenfläche schwärmend.

ab. ustulatipennis Villa.

Schönbusch auf Weißdorn 2. 6. 32, 1 St. Weiler i. Sp. auf Rosen 6. 6. 26. Kalbenstein 27. 6. 32, 1 St.

## **Anisoplia Serv.**

### **A. segetum Hbst.**

Bei Frankfurt a. M. festgestellt, könnte auch in unserem Gebiet vorkommen.

### **A. villosa Goeze (= agricola Hbst.)**

Dornauer Graben 8. 5. 38. Bei Sodental auf Wiesen an Grashalmen zahlreich  
6. 1895. Stockstadter Wald an Grasähren 5. 6. 31. Striet 22. 6. 28. Kahl 13. 6. 38.

## **Hoplia Illig.**

### **H. praticola Duft.**

Aschaffenburg nicht häufig nach Oe. Seligenstadt (Scr.). Fahrbachgrund 25. 4. 16.  
An gleicher Stelle auf Weißdorn 17. 5. 24. Bei der Herrenmühle im Kahlthal 21.  
5. 22 (Ochs).

### **H. philanthus Fuessl.**

Auf feuchten Wiesen Ende VI, Anfang VII morgens schwärmend. Häufig.

### **H. farinosa L.**

Thüngersheim 2. 7. 22 (St.).

## **Dynastinae**

### **Oryctes Illig.**

### **O. nasicornis L.**

In früherer Zeit Entwicklung der Larven in unserem Gebiet in Lohgerbereien.  
Letzte Spuren in hiesiger Gegend beobachtete Brahm Ende 1700. Nach Horion  
hat die Art in den letzten Jahrzehnten durch ökologische Umstellung auf ge-  
wöhnliche Mist- und Komposthaufen neue Lebensbedingungen bekommen. So ist  
sie seit 1930 im Rheinland weit verbreitet und nicht selten; ebenso in vielen  
anderen Gauen, sogar bis nach Südnorwegen und Südfinnland ist sie vorge-  
drungen seit 1920. Aschaffenburg in einem Garten der Jahnstraße 6. 8. 48 (Noll).  
In der Stadtgärtnerei mit Torfmull mehrfach eingeschleppt M. u. W. 1950 (Noll).  
Aus Torfmull gezogen 9. 53, 3 W.

## **Valginae**

### **Valgus Scriba.**

### **V. hemipterus L.**

Stockstadter Wald 27. 4. 30. Roßtalsberg bei Karlstadt 27. 4. 24 (St.). Am Röder-  
bach auf blühenden Weiden 3. 5. 37. Findberg in morschem Birnbaumstrunk 2 M,  
1 W. 1. 5. 51. Schönbusch auf blühendem Weißdorn 30. 5. 30, 19. 5. 31.

### **Osmoderma Serv.**

### **O. eremita Scop.**

Von Scr. an alten Weiden gefunden. Nach Fr. viele Jahre nicht selten an der  
großen alten Eiche nächst dem Wirtschaftsgebäude der Fasanerie. Letztes Exem-  
plar 1868 gefunden. Im Schmerlenbacher Wald 1875 (Fr.). Würzburg im Hofgarten  
14. 7. 20 (Dr. Ettinger). Bei Lichtenau i. Sp. 3. 9. 1890 (S.).

### **Gnorimus Serv.**

### **G. octopunctatus F. (= variabilis L.)**

Sehr selten. Glashütte im Kahlgrund (Oe.). An ausfließendem Eichensaft (Fr.).

**G. nobilis L.**

Steinbachtal auf Spiraeen (S.). Schönbusch auf Viburnum Opulus 26. 6. 46 ebenso  
25. 5. 46, 4 St. (J. S.).

**Trichius Fabr.**

**T. fasciatus L.**

Häufig auf Blüten. Waldaschaff Larven in morschem Buchenstock. Die Puppen-  
wiegen lagen nebeneinander. Entwicklung am 29. 5. 26.

ab. *dubia* Muls.

Schmerlenbacher Wald 5. 23, 1 St. Aus Buchenstock 5. 26. Hain i. Sp. 2. 7. 22.

**T. sexualis Bedel.**

Aschaffenburg (Oe.). Bei Großauheim (Dehnert).

**Tropinota Muls. (= Epicometis Burm.)**

**T. hirta Poda.**

Sehr häufig auf Blüten, besonders auf Löwenzahn.

**Oxythyrea Muls.**

**O. funesta Poda.**

Aschaffenburg (Oe. u. Fr.). Hanau auf Blüten (H.).

**Cetonia F.**

**C. aurata L.**

Häufig auf Blüten, besonders Rosen und Holunder.

**Liocola Thoms.**

**L. aeruginosa Drury. (= speciosissima Scop.)**

Schöntal nächst der Sandkirche 30. 6. 03 (Fr.). Aus dem Mulm von hohlen Eichen  
und Apfelbäumen öfters gezogen 20. 7. 30, 10. 8. 13. Schönbusch bei alten Eichen  
auf dem Weg laufend 7. 6. 33 (J. S.). An altem Apfelbaum 7. 24, 1 St.

ab. *aureocuprea* Muls.

Schöntal 2. 5. 41, 1 St.

**L. lugubris Hbst. (= marmorata F.)**

Aus dem Mulm von Eichen und Apfelbäumen mehrfach gezüchtet 1. 5. 21, 12.  
6. 13. An Apfelbäumen 9. u. 12. 7. 27. Auch in Weiden 22. 7. 28. Aschfeld 2 er-  
wachsene Larven aus hohler Weide 21. 4. 47. Entwicklung 13. 7. 47.

**L. cuprea s. sp. metallica Hbst.**

Auf den Kalkhöhen bei Homburg a. M. 20. 4. 52, 1 St. 5. 6. 47 fliegend. Erbig auf  
blühendem Raps 6. 5. 06. Glattbacher Wald 1. 6. 19. Schönbusch 11. 6. 36, 6. 6. 46.

**L. Fieberi Kr.**

Entwicklung im Mulm alter Apfelbäume. Mehrfach aus Larven gezogen 7. 09,  
6. 8. 25, 8. 26. Karlstadt am Steig unter Moos 25. 4. 26, 1 St. Fasanerie auf Wald-  
weg schwärmend 5. 6. 47, 3. 6. 42.

## Lucanidae

**Lucanus Scop.**

**L. cervus L.**

Im Jahre 1844 massenhaftes Auftreten der Art bei dem Hofgut Rauenthal in  
einem Eichenwald (Fr.). Kleinostheim an abgestorbener Wurzel von Kirschbaum  
2. 26. Schönbusch 25. 5. 22, 9. 7. 28. In der Rückersbacher Schlucht bei der Jagd-

hütte abends schwärmend 25. 5. 22, 8. 6. 26. An ausfließendem Saft eines Apfelbaumes 6. 11. Striet 29. 6. 23. An Rhabarberwurzel 2. 6. 19. An der Wurzel von abgestorbener Roßkastanie 12. 13.

ab. *capreolus* Sulz.

Bei Kleinostheim 4. 6. 12. Ende 7. 24. Rückersbacher Schlucht bei der Jagdhütte 8. 6. 24. Schönbuschallee im Wurzelstock einer italienischen Pappel 12. 1894 (Fr.).

ab. *pentaphyllus* Reiche.

Babenhausen (Scr.) nach Fr.

#### **Dorcus Mac. Leay.**

**D. parallelopedus L.**

In morschen Stöcken von Laubhölzern. Hanauer Landstraße an altem Apfelbaum 16. 5. 04. Waldaschaff an Buchenstrunk 9. 5. 26. Schmerlenbacher Wald an Eichengebüsch 8. 6. 52. Hain i. Sp. 7. 8. 32.

#### **Systemocerus Weise.**

**S. caraboides L.**

Hain i. Sp. in morschen Eichenwurzeln als Larve und Imago 2. 4. 22. Großostheim an Eichenstrunk 29. 5. 35. Gailbachtal 25. 5. 30.

ab. *rufipes* Hbst.

Gartenberg an Eichengebüsch anfliegend 26. 4. 16. Krausenbach i. Sp. an morschem Buchenholz 27. 5. 39.

#### **Ceruchus Mac. Leay.**

**C. chrysmelinus Hochenw.**

Metzgergraben i. Sp. einige Imagines und zahlreiche Larven in rotfaulem Eichenholz 12. 4. 25 (J. S.). Ebenso am 12. 5. 25. viele Larven und 3 Imagines (St.) sowie am 30. 9. 50, 6 M. u. 3 W. und Larven (J. S.).

#### **Aesalus F.**

**A. scarabaeoides Panz.**

Äußerst selten in unserem Gebiet. Von Scr. 1853 in mehreren Exemplaren in einem morschen Eichenstrunk bei Babenhausen gefunden (Oe.).

#### **Sinodendron Hellw.**

**S. cylindricum L.**

Im Hafenlohrthal an alten Laubhölzern. Bei Lichtenau an abgestorbenen Rotbuchen 12. 5. 40, 4 M., 1 W. 12. 6. 52, 1 M., 2 W. Am Weg nach Kleinostheim an altem hohlem Apfelbaum 12. 9. 26.

## **Phytophaga**

### **Cerambycidae**

#### **Megopsis Serv. (= Aegosoma Serv.)**

**M. scabricornis Scop.**

Fr. schreibt über die Art: „Nach D. N. in früheren Jahren 1844 — 1860 nicht besonders selten an Pappeln.“ Von Scr. bei Babenhausen in Mehrzahl an alten Buchen gefunden. Das letzte lebende Stück von Aschaffenburg brachte mir 1884 ein Mitschüler, der es gegen Abend an einer Pappel in der Nähe der Gasfabrik fing.

## **Ergates Serv.**

### **E. faber L.**

Fasanerie 1877, 1 W. Kugelberg 1892, 1 M. (Fr.). Stockstadter Wald 15. 3. 26. Sodener Wald an Kiefernstöcken 3 W. eierlegend 9. 22 (J. S.). Verpuppung einer im Frühjahr 1922 von Oberbessenbach eingetragenen Larve am 24. 5. 22. Die Entwicklung zum Imago erfolgte am 10. 6. 22. Verpuppung einer Larve am 23. 5. 24. Entwicklung zum Imago 24. 6. 24.

## **Prionus F.**

### **P. coriarius L.**

In der Fasanerie öfters an Hainbuchen 24. 7. 46, 5 St. 10. 8. 13. Schönbusch 3. 7. 18.

## **Spondylis F.**

### **S. buprestoides L.**

An Kiefernstöcken nicht selten. Einmal 21.30 Uhr ins Haus geflogen 4. 5. 11. Stockstadter- und Sodener Wald 7. 1895 (Fr.). Im Spessart 26. 8. 32. Striet. Großostheimer Wald.

## **Asemum Eschsch.**

### **A. striatum L.**

Nicht selten an Kiefernholz V. u. VI. IX.

#### **ab. agreste F.**

Großostheimer Wald auf Kiefer 15. 5. 21. Sodener Wald 21. 5. 22, 3 St. Bei Glattbach auf Kiefernstämmen 5. 11.

## **Tetropium Kirby.**

### **T. castaneum L.**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.). Seligenstadt unter Rinde gefällter Lärchen (Scr.). Büchelberg an Fichtenholz 2. 6. 41. Lichtenau i. Sp. Metzgergraben 12. 6. 52 (J. S.).

#### **ab. aulicum F.**

Findberg an Fichtenstrunk 11. 5. 52 (J. S.). Hain i. Sp. an Fichte 22. 5. 28, 19. 6. 24.

#### **ab. fulcratum F.**

Fasanerie an Fichte 24. 5. 04. Unterafferbach mittags fliegend 1. 6. 19. Waldleiningen 1. 6. 41.

### **T. fuscum F.**

Fischerhecke unter Kiefernrinde 1 totes Exemplar 10. 1893 (Fr.). Homburg a. M. 7. 38.

## **Criocephalus Muls.**

### **C. rusticus L.**

Bei Obernau sehr selten (Oe.). Freudenberg 6. 1898 (Heeg). Erbig aus altem Kiefernstrunk 6. 6. 48 (Noll). Bei Oberbessenbach 2 St. 4. 7. 49 (J. S.). Lohr nachts 21. 7. 25, 16. 8. 25, 20. 8. 25 (St.).

### **C. ferus Muls. (= polonicus Motsch.)**

In einem Haus der Obernauer Straße 4. 7. 24 (J. S.). Im Bahnhof Aschaffenburg 10. 7. 1893, 1 St. (Fr.). Im Striet und auf dem Erbig aus Kiefernstöcken herausgeholt (Kobmann).

## **Cerambyx L.**

### **C. cerdo L. (= heros Scop.)**

Nach Fr. früher in der Fasanerie und im Schmerlenbacher Wald an alten sogenannten Ureichen nicht selten. 1897 waren noch einige Stämme mit Larven besetzt. Von mir nicht mehr gefunden.

**C. Scopoli Fuessl.**

Striet auf Spiraea Aruncus 6. 1875 (Fr.). Laufacher Wald auf Brombeerblüten 6. 1895 (Fr.). Hain i. Sp. aus Buchenholz gezüchtet 11. 1. 25. Im Mühlthal bei Neuendorf auf Löwenzahnblüten 21. 5. 22, 1 St. Schmerlenbacher Wald an Eichenholz 8. 6. 52.

**Trichoferus Woll. (= Hesperandrius Rtt.)**

**T. pallidus Oliv.**

Bei Babenhausen 1 St. und Seligenstadt 2 St. in Buchen (Scr.). Aschaffenburg nahe dem Bahnhof 10. 7. 1893, 1 St. (Fr.).

**Gracilia Serv.**

**G. minuta Fal.**

In alten Weidenkörben und Faßreifen, in denen sich die Larve entwickelt. Fischerhecke 16. 6. 27 (Noll). Lohr 9. 6. 10. In einem Magazin der Stadt aus alten Körben 20. 7. 42 mehrfach. Aus Weidenkorb von Merck, Darmstadt, 2 St. 24. 6. 47 (Noll).

**Obrium Curt.**

**(O. cantharinum L.)**

Dürfte nach Horion im Spessart zu finden sein.

**O. brunneum F.**

Schönbusch auf Weißdorn 25. 5. 34, 2 St. 8. 6. 33. Fasanerie auf Linde 10. 6. 39. Am Steiger 10. 6. 04, 2 St. Godelsberg auf Spiraeen 7. 6. 34.

**Rhagium F.**

**R. bifasciatum F.**

Nicht selten an gefällten Kiefern und Kiefernstrünken. Sodener Wald 29. 4. 22. Hain i. Sp. 14. 4. 22, 3. 6. 23. Schmerlenbacher Wald 2. 6. 22. Stengerts in Kiefernstrunk frisch entwickelt 7. 29.

**R. sycophanta Schrk.**

An gefällten Eichen und an Eichenstrünken. Striet 16. 5. 20. Weiler i. Sp. 6. 6. 26. Karlstadt Haag 12. 6. 38 mehrfach an einem Eichenstock. Auf blühendem Flieder 5. 1892 (Fr.).

**R. mordax Deg.**

Stockstadter Wald unter Erlenstrunkrinde 8. 2. 25. Unter Eichenstrunkrinde 18. 3. 06. Hain i. Sp. 27. 5. 28, 3. 6. 25 schwärmend. Rohrbrunn in morscher Buche Puppe 17. 9. 52. Entwicklung 19. 9. 52.

**R. inquisitor L.**

Häufig an gefällten Kiefern und Fichten, sowie deren Strünken. Auch an Tanne und Lärche. II VIII IX. Stockstadter Wald an gefällten Kiefern im Larvenzustand, Puppe und frisch entwickelte Käfer 27. 9. 21. Bei Rohrbrunn i. Sp. frisch entwickelt und noch weich in Puppenwiege 22. 3. 53.

**Rhamnusium Latr.**

**R. bicolor Schrk.**

ab. *glaucopterum* Schall.

Hanau (H.). Schönbuschallee (Kobmann). Hain i. Sp. an geschlagenem Buchenholz 20. 6. 26. Im Hof des Forstamtes Aschaffenburg-Nord an Buchenscheitholz 8. 6. 50 (Neckermann).



## **Toxotus Zett. (= Oxymirus Muls.)**

### **T. cursor L.**

Bei Rohrbrunn i. Sp. 27. 5. 31 (J. S.). Östlich Waldaschaff 2 M. 16. 5. 48 (Elbert). Am Bomigsee bei Rothenbuch 17. 5. 48 (Elbert). Krausenbach i. Sp. 27. 5. 39. Seebachtal 4. 6. 39, 10. 6. 30. Laufach im Erlenbachtal 5. 6. 22 (J. S.). Lohr 30. 6. 49 (St.).

## **Stenocarus Bat.**

### **St. quercus Goeze.**

Großkrotzenburger Wald 1 St. (S.). Hanau (H.).

### **St. meridianus L.**

Schönbusch auf Umbelliferen 5. 1895, 1 St. (Fr.). Auf blühendem Liguster 30. 5. 46. An Eichen 8. 6. 33. Steiger bei Hösbach 10. 6. 40. Weiler i. Sp. 6. 6. 26.

## **Acmaeops Lec.**

### **A. collaris L.**

Auf Blüten nicht selten. Büchelberg auf Weißdorn 5. 1895 (Fr.). Dammer Wiesen 5. 1894 (Fr.). Dornauer Graben 20. 6. 37. Im Mühltal gegenüber Neuendorf 2. 6. 52.

## **Gaurotes Lac.**

### **G. virginea L.**

Dürfte im Spessart noch zu finden sein (Horion).

## **Cortodera Muls.**

### **C. femorata F.**

Stockstadter Wald auf blühendem Weißdorn 19. 5. 04. Beim Wärterhaus 28 der Bahnstrecke nach Hanau an Kiefern 12. 5. 02. Schmerlenbacher Wald 30. 5. 43.

### **C. humeralis Schall.**

Aschaffenburg (Oe.). Striet. Großostheimer Wald (Kobmann).

#### **ab. suturalis F.**

Schönbusch auf Weißdorn 23. 5. 30. Auf Schlehen 19. 5. 31. Auf dem Ökonomieplatz fliegend 22. 5. 37, 2. 6. 32. Auf Lonicera Xylosteum 25. 5. 26.

## **Grammoptera Serv.**

### **G. ustulata Schall.**

Schönbusch auf Weißdorn 10. 5. 26. Fischerhecke in morschem Eichenast 1. 5. 05. Krainberg an Eiche 23. 5. 31. Ruine Homburg 2. 5. 26. Fasanerie 6. 6. 39.

### **G. ruficornis F.**

Hain i. Sp. Pollaschgrund 18. 4. 53. Schönbusch auf Holunderblüte 31. 5. 37, 2. 6. 38. Fasanerie 10. 6. 29.

### **G. variegata Germ.**

Kleinwallstadt im Wald Puppe aus morschem Eichenast 1 St. 3. 26. Fischerhecke in morschem Eichenast 1. 5. 05. 1 St.

#### **ab. nigrescens Weise.**

Steinheim Basaltbrüche mit der Stammform 10. 5. 25 (Ochs).

## **Alosterna Muls.**

### **A. tabacicolor Deg.**

Striet auf Weißdorn. Schönbusch auf Schirmblumen 5. 1894 (Fr.). Fasanerie 6. 6. 30 häufig.

## Leptura L.

### **L. rufipes Schall.**

Aschaffenburg (Oe.). Hanau (H.). Im Mühlthal gegenüber Neuendorf a. M. mittags schwärmend 2. 6. 52, 1 St. (J. S.). Bei Veitshöchheim im Edelmannwald nicht selten 1917 und 1918 (Dr. Ettinger).

### **L. sexguttata F.**

Fasanerie sehr selten (Oe.). Seligenstadt und Babenhausen (Scr.). Am Bomigsee bei Rothenbuch i. Sp. auf Esche 17. 5. 48 (Elbert). Mäusberg bei Wiesenfeld 9. 6. 19. Weiler i. Sp. 10. 6. 28.

### **L. livida F.**

Auf Blüten häufig V. VI.

### **L. fulva Deg.**

Auf Blüten nicht selten (Fr.). Bei Aschaffenburg von mir noch nicht festgestellt (S.).

### **L. maculicornis Deg.**

Aschaffenburg Schönbusch auf Kreuzdorn 31. 5. 37, 17. 6. 32. Auf Umbelliferen 5. 1895 (Fr.). Godelsberg auf Spiraeen 5. 1895 (Fr.). Heigenbrücken auf Brombeerblüten in Anzahl 6. 1894 (Fr.). Wiestal auf Compositen 3. 6. 47 (Elbert).

### **L. rubra L.**

Häufig an alten Nadelholzstöcken. 3. 7. 1895, 8. 1894 (Fr.).

### **L. scutellata F.**

Von Oe. u. D. hier bereits gefunden. Weiler i. Sp. 10. 6. 28. Metzgergraben i. Sp. 12. 6. 52, 18. 7. 26. Freudenberg 6. u. 7. 1898 (Heeg). Hain i. Sp. an Buchenstöcken 2. 7. 22, 19. 7. 23 morgens 11 Uhr fliegend 1 St.

### **L. sanguinolenta L.**

Fischerhecke 1 St. 7. 1878 (Fr.). Sehr selten.

## Judolia Muls.

### **J. cermabyciformis Schrk.**

Häufig auf Blüten, besonders von Brombeeren und Spiraeen.

ab. *quadrimaculata* Scop.

Steiger bei Hösbach 1 St. 2. 2. 40.

## Strangalia Serv.

### **S. revestita L.**

Sehr selten im Striet und im Schmerlenbacher Wald (Oe.). An Buchen (D.). An Pappeln (Scr.). Striet 17 Uhr schwärmend 29. 5. 26. Schönbusch an Eichen 2. 6. 23, 17. 6. 30 je 1 St.

### **S. aurulenta F.**

Aschaffenburg 2 St. (D.). Hain i. Sp. mehrfach an alten Buchenstöcken 2. 7. 21, 15. 7. 23. Bei Rothenbuch i. Sp. an einem Buchenstock eierlegend 6. 8. 16.

### **S. quadrifasciata L.**

Nach Oe. u. D. sehr selten. Neuerdings häufiger und mehr verbreitet wie der vorige. Schmerlenbacher Wald 22. 6. 46. An der Aschaff an Weide 1. 7. 29. Stockstadter Wald 30. 7. 10. Striet 16. 8. 30.

ab. *divisa* Plav.

Stockstadter Wald aus Erlenast gezogen 2. 6. 39. Striet 1. 7. 22. Hain i. Sp. 12. 7. 24

**S. maculata Poda.**

Häufig auf blühenden Sträuchern. VI VII VIII.

ab. *impunctata* Muls.

Krainberg 20. 6. 43, 1 St.

**S. aethiops Poda.**

Schmerlenbacher Wald 5. 1882 (Fr.). Schönbusch 6. 1894 (Fr.).

v. *Letzneri* Gabriel.

Striet auf Euphorbia mehrfach 5. 20. Lohr 24. 6. 06 (St.).

**S. melanura L.**

Häufig auf Blüten. VI. VII.

**S. bifasciata Müll.**

Häufig auf Blüten. VI. VII.

**S. nigra L.**

Nicht selten auf Blüten. V. VI. VII.

**S. attenuata L.**

Klingenberg auf einer Bergwiese 3. 8. 08, 2 St.

**N e c y d a l i s L.**

**N. major L.**

Striet 5. 1895 (Fr.) (Oe. u. D.). Fasanerie auf blühender Distel 23. 7. 05, 1 St. (S.).

**L e p t i d e a M u l s.**

**L. brevipennis Muls.**

Im Aushilfsarbeitszimmer des Naturwissenschaftlichen Museums Aschaffenburg massenhaft aus einem von Merck, Darmstadt, stammenden Weidenversandkorb kommend 24. 6. 47. Schwärmt zwischen 11 und 15 Uhr (Noll). Im Laboratorium des hiesigen Gaswerkes mehrfach aus alten Weidenkörben 7. 7. 27 (Noll).

**S t e n o p t e r u s S t e p h.**

**S. rufus L.**

Schmerlenbacher Wald 6. 1880 (Fr.). Breunsberg 26. 6. 38. Retzbach 16. 6. 36, 30. 7. 33. Elsenfeld 3. 7. 38, 3 St. Karlstadt 2. 7. 33.

**M o l o r c h u s F. (= C a e n o p t e r a T h o m s.)**

**M. minor L.**

Häufig auf blühenden Sträuchern V. VI.

**M. umbellatarum Schreber.**

Krainberg an Kiefer 14. 6. 31, 21. 6. 31. Hain i. Sp. 29. 6. 26. Stockstadter Wald 29. 6. 28. Schönbusch auf Esche 3. 7. 28. Lohr im Zimmer 3. 7. 26 (St.).

**A r o m i a S e r v.**

**A. moschata L.**

An Weiden am Mainufer 6. 1876, 6. 1889 (Fr.). 10. 8. 26 (J. S.). Kahl Moore auf Blüten von *Angelica silvestris* L. 9. 8. 01, 4 St. (S.).

**R h o p a l o p u s M u l s.**

**R. femoratus L.**

Büchelberg auf Schlehen 5. 1894 (Fr.). Schönbusch 6. 1895 (Fr.). 23. u. 30. 5. 30, 11. 6. 33 unter Eichen. Godelsberg auf Espe 23. 6. 12. Wendelberg auf Schlehe 13. 5. 1894, 1 St. Dornauer Graben 4. 6. 33.

## **Phymatodes Muls.**

### **P. testaceus L.**

Im Jahre 1866 zog Fr. die Art in Anzahl mit der ab. fennicus und ab. praeustus aus Buchenholz. In der Stadt an Häusern 6. 6. 03, 13. 6. 29, 15. 6. 31. Lohr nachts 22. 6. 29 (St.).

ab. fulvipennis Rtrtr.

Schönbusch 10. 6. 31 (Noll).

ab. variabilis L.

Schönbusch und Großostheimer Wald zahlreich an Eichenholz 5. u. 6. 39.

ab. fennicus F.

V. u. VI. häufiger wie die Stammform.

### **P. (Poecilium Fairm.) alni L.**

Schönbusch unter Eiche 10. 5. 26, 23. 5. 30, 7. 5. 47. Hain i. Sp. Seebachtal an Erlenreisig 3. 6. 23, 1 St. Sendelbach bei Lohr 2. 6. 09 (St.). Im Garten des Forsthauses an Eschen (Neckermann) 3. 5. 53, 1 St.

### **P. rufipes F.**

Schönbusch unter Eiche 10. 5. 26, 19. 5. 31, 23. 5. 30, 6. 6. 28.

## **Callidium F.**

### **C. aeneum Deg.**

Godelsberg an Fichtenholz einer Naturbank 6. 6. 1896, 4 St. (S.). Schönbusch beim Dörfchen gestreift 19. 5. 31, 1 St. Fasanerie an alter Fichte 4. 6. 1895 (Fr.).

### **C. violaceum L.**

Nach Fr. nicht selten an Nadelhölzern und in Häusern, was heute nicht mehr zutrifft. Hanauer Straße 30. 5. 05, 1 St. Obernauer Straße 15. 5. 26.

## **Pyrrhidium Fairm.**

### **P. sanguineum L.**

Nach Fr. früher von Oe. öfters in der Fasanerie von Hainbuchen geklopft. Fr. selbst gibt die Art als sehr selten an, was jetzt nicht mehr der Fall ist. Am Fuß des Findbergs an Eichenklafterholz in Anzahl 22. 4. 46 (J. S.). Lohr 1. 4. 48 (St.). Mit altem Eichenholz in ein Haus in Aschaffenburg eingeschleppt, zahlreich 16. 4. 48 (Froese). Ebenso am 11. u. 23. 2. 53 im Haus Goethestraße 23.

## **Hylotrupes Serv.**

### **H. bajulus L.**

In altem Gebälk der Häuser häufig und schädlich VI VII VIII.

ab. lividus Muls.

Kahl Emmerichshöfe 6. 8. 01, 1 St.

## **Anisarthron Redt.**

### **A. barbipes Schrk.**

Nach Oe. sehr selten in Holzlagern am Main. Auch von D. hier gefunden. Im Garten Grünwaldstraße an Aprikosenbaum 8. 6. 11 (S.). Am Krainberg von Ulmengebüsch 9. 8. 25, 1 St. (S.). Lohr 31. 5. 22 (St.). Hanau an Kastanie 6. 21 (H.).

## **Xylotrechus Chev.**

### **X. rusticus L.**

Aschaffenburg an Buchen und Pappeln sehr selten (Oe.). Würzburg 7. 1890 (S.). Wiestal i. Sp. an Telegrafentange 2. 7. 06 (St.).

### **X. antilope Schönh.**

Schönbusch Ökonomieplatz auf gefällttem Holz 7. 6. 31 (Noll). Hanau-Bulau (H.).

## **Clytus Laich.**

### **C. tropicus Panz.**

Schönbusch Ökonomieplatz an gefällten alten Eichen 7. 6. 31, 1 M. u. 3. W. 14. 6. 33, 11. 6. 36. Hanau an freistehenden Eichen auf der von der Sonne beschienenen Seite gegen Abend zwischen den Borken sitzend 11. 6. 11. Bei der Pulverfabrik in Hanau an durch Explosion zum Absterben gebrachten Eichen in großer Anzahl 1921 (Holz.).

### **C. arietis L.**

Hain i. Sp. an Eichenästen 12. 4. 22, 29. 6. 23. Schönbusch 17. 6. 32. An Buchenstrunk 27. 5. 25, 2. 7. 22. Auch auf blühenden Sträuchern, besonders Weißdorn.

## **Plagionotus Muls.**

### **P. detritus L.**

In den fünfziger Jahren öfters an Eichen von D. gefunden (Fr.). Von mir in unserem Gebiet bis jetzt noch nicht beobachtet.

### **P. arcuatus L.**

Nicht selten an gefällten Eichen V. VI.

#### ab. Reichei Thoms.

Schönbusch an gefällten Eichen 22. 5. 37, 1 St. Schmerlenbacher Wald 24. 6. 23, 1 St.

## **Chlorophorus Chev. (= Clytanthus Thoms.)**

### **C. varius Müll.**

Aschaffenburg auf Blüten (D. N.).

### **C. sartor F.**

Retzbach a. M. 4. 7. 35 (Noll). 30. 7. 33. Karlstadt Haag 9. 7. 33. Krainberg 25. 7. 29. Bei Thüngersheim alljährlich im Juli 1890/91 einige Stücke (Dr. Ettinger).

### **C. figuratus Scop.**

Godelsberg auf blühenden Sträuchern und Wiesenblumen. Fasanerie 7. 1889 (Fr.). Miltenberg 7. 1891 (Fr.). Seit 1900 in unserem Gebiet nicht mehr beobachtet.

## **Anaglyptus Muls.**

### **A. mysticus L.**

Rückersbacher Schlucht an Weißdornast 30. 3. 47 (J. S.). Büchelberg auf blühendem Weißdorn 4. 1894 (Fr.). 26. 5. 28. Gailbachtal 4. 6. 31. Steiger auf Weißdorn 2. 6. 40.

## **Dorcadion Dalman.**

### **D. fuliginator L.**

Würzburg Guttenberger Wald mehrfach (Fr.). IV — VI alljährlich (Dr. Ettinger). Wertheim 1 St. (Fr.). Am Fuß des Krainberges 14. 5. 31. Mäusberg bei Wiesenfeld 23. 5. 20. Karlstadt Haag 14. 6. 42.

#### ab. atrum Bach.

Retzbach Benediktushöhe 26. 4. 36 (Noll). 6. 6. 35 M. u. W. Karlstadt am Steig 16. 5. 29. Thüngersheim Breitfeldhöhe 23. 6. 36 (Noll).

## **Lamia F.**

### **L. textor L.**

Mainufer an Weiden VI. u. VII. Fasanerie 6. 1889 (Fr.). Bei Lohr an Apfelbaum 12. 5. 06 (St.). Im Aschaffener Stadtgebiet an Pappel.

### **Monochamus Guér.**

#### **M. quadrimaculatus Motsch. (= Rosenmülleri Cederj.)**

Aschaffenburg Eisenstraße 1 an Balkonblumen angefliegen 3. 8. 26. Das Stück stammte jedenfalls vom Nadelholz der Weißpapierfabrik, das aus Rußland eingeführt wurde.

### **Mesosa Latr. (= Haplocnemis Gemm.)**

#### **M. curculionoides L.**

Aschaffenburg Bessenbacherweg an Apfelbaum 4. 6. 1896. An Eichen und Buchen (Fr.). Fasanerie 1875, 1 St. Schmerlenbacher Wald 1876, 2 St. (Fr.). Seligenstadt einzeln (Scr.).

#### **M. nebulosa F.**

In alten morschen Eichenästen. Büchelberg 14. 2. 48, M. u. W. (J. S.). Fischerhecke 18. 3. 23, 5. 12. 23. Schönbusch 9. 2. 37, 25. 4. 33.

### **Anaesthetis Muls.**

#### **A. testacea F.**

Schönbusch von Eiche 15. 6. 34. Striet von Eichengebüsch 14. 6. 26, 6. 7. 27. Mörs-  
wiese auf Weiden 1. 7. 09. Haibacher Schweiz 18. 7. 28. Krainberg auf Ulmen-  
gebüsch zusammen mit Anisarthron barbipes Sharp. 9. 8. 15. Hinter Damm an  
Ulmengebüsch 18. 7. 25.

### **Pogonocherus Zett.**

#### **P. hispidulus Pill.**

Hain i. Sp. Seebachtal unter Lärchenrinde 13. 1. 24. Gesiebt am 14. 4. 22, 3. 6. 23.  
Striet 7. 1876 (Fr.).

#### **P. hispidus L.**

Nicht selten an Laubhölzern. III u. VI — IX. Fr. fand die Larve auch an Efeu  
und dürren Mistelzweigen.

#### **P. fasciculatus Deg.**

Stockstadter Wald auf Faulbaum Ende 4. 1911 und 6. 1896. Hain i. Sp. an dürren  
Kiefernästen 29. 6. 23.

#### **P. decoratus Fairm.**

Stengerts unter Moos 6. 1. 28. Kahl an der Schnittfläche einer geschlagenen Kiefer  
sitzend 7. 2. 26. Gemünden Ende 4. 1922 (St.). Büchelberg von Kiefern geklopft  
17. 7. 35, 2. 8. 35.

#### **P. ovatus Goeze.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt einzeln (Scr.).

### **Liopus Serv.**

#### **L. nebulosus L.**

An Castanea sativa Mill. zwischen Godels- und Büchelberg 1897 (Bergmüller). In  
dürrem Eichenast Ende 3. 23. Schönbusch 23. 5. 30. Pollaschgrund 4. 6. 35. Fasa-  
nerie von Hainbuchenhecke 1. 7. 28.

### **Acanthocinus Steph. (= Astynomus Steph.)**

#### **A. aedilis L.**

Großostheimer Wald 10. 4. 11, 26. 7. 11. Obernauer Wald 17. 5. 37. Bei Dornau  
10. 5. 36. Sodener Wald 6. 1889 (Fr.). Im Haus 30. 9. 29.

#### **A. griseus F.**

Aschaffenburg sehr selten 5. 1867 (Fr.) 1 St.

## **Exocentrus Muls.**

### **E. adpersus Muls.**

Hanau-Bulau an Linde 29. 5. 10 (H.).

### **E. iustitanicus L.**

Aschaffenburg (Fl.), (D. N.). Seligenstadt (Scr.). Sehr selten. Larve in Laubholz, besonders Linde (Fr.).

## **Agapanthia Serv.**

### **A. villosoviridescens Deg.**

Kahl Moore 29. 5. 21, 28. 5. 35. Schönbusch Sandgrube 26. 5. 46, 3 St. Rothenbuch i. Sp. 11. 6. 39, 1 St. Freudenberg 6. 1897 (Heeg).

### **A. cardui F.**

Kahl auf Disteln 13. 5. 01, 1 St.

### **A. violacea F.**

Krainberg gestreift 14. 5. 31, 1 St. Karlstadt Haag 21. 5. 31, 3 St. Kalmut 23. 6. 35, 1 St. 13. 6. 36, 1 St. Würzburg Zeller Wald 7. 7. 44 (J. S.).

## **Saperda F.**

### **S. carcharias L.**

Bischberg an Espen 12. 7. 25, 20. 8. 23. Laufach an schmalblättriger Weide 19. 7. 28. Büchelberg 5. 8. 23. Ludwigsallee 9. 1893 (Fr.). 13. 10. 18. Schönbusch 10. 1891 (Fr.).

### **S. populnea L.**

Häufig an Espen V. VI.

### **S. similis Laich.**

Büchelberg an Salweide 4. 09 (Scheidter) 1 St.

### **S. scalaris L.**

Stockstadter Wald Larven in einem Erlenast, Verpuppung 2. 4. 39. Entwicklung zum Imago 14. 4. 39. Pollaschgrund bei Hain i. Sp. an Erle 29. 5. 32. Schmerlenbacher Forsthaus an altem Apfelbaum 25. 6. 32. An Nußbaum 2. 7. 29. Schönbusch 7. 6. 31. An Sorbus aucuparia in der Fasanerie 1897 (Bergmüller) ebenso am 11. 6. 1898 (Fr.).

### **S. octopunctata Scop.**

Fasanerie sehr selten an Espen (Oe.).

## **Menesia Muls.**

### **M. bipunctata Zoubk.**

Stockstadter Wald auf Rhamnus Frangula 23. 6. 26.

ab. quadripustulata Muls.

Kahl Moore auf Rhamnus Frangula 31. 5. 42 (J. S.).

## **Obera Muls.**

### **O. oculata L.**

Mainufer auf Weiden VII. u. VIII. Wendelberg auf Salweide 25. 8. 35. Fasanerie und Büchelberg auf Salweide 7. 1895 und 1896 (Fr.).

### **O. linearis L.**

Hanau-Bulau 28. 5. 22 (H.). Schönbusch auf Haseln 1. 7. 26.

**O. erythrocephala Schrk.**

Nach Oe. sehr selten. Aschaffenburg Hanauer Straße an Mauer angefliegen 28. 6. 06. Mainufer Mörswiese. Kahlthal bei der Herrenmühle 6. 22 (Ochs).

**Stenostola Muls.**

**S. ferrea Schrk.**

Oberhalb der Fasanerie an Linden 5. 1895 (Fr.). An Sorbus aucuparia 11. 6. 1896. Schönbusch auf Linde mehrfach 11. 6. 32, 16. 6. 36, 17. 6. 31.

**Phytoecia Muls.**

**P. ehippium F. (= icterica Schall.)**

Sehr selten. Striet Weidenanlage (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Krainberg 10. 5. 26. Mainufer 16. 6. 35. Striet auf Daucus carota Blüte 7. 7. 28 (Noll).

**P. cylindrica L.**

Am Fuß des Krainbergs gestreift 19. 5. 31.

**P. nigricornis F.**

Aschaffenburg auf Echium (D. N.).

**P. coerulea Scop.**

Schönbusch auf Cynoglossum 23. 5. 33, 8. 6. 33 mehrfach. Krainberg auf Echium 22. 5. 31. Godelsberg auf Echium 8 St. 30. 6. 1898 (Fr.). Wendelberg 22. 6. 38.

ab. *obscura* Bris.

Schönbusch auf Cynoglossum 30. 5. 40, 27. 6. 24.

**Tetrops Steph.**

**T. praeusta L.**

Häufig an Sträuchern, besonders Corylus. Gailbachtal an Apfelbaum 23. 3. 26. Dörngraben auf Haseln 24. 5. 27. Schönbusch und Striet IV. und V.

ab. *Starki* Chev.

Bei Oberbessenbach 21. 5. 49 (J. S.).

# Chrysomelidae

## Donaciinae

**Haemonia Latr. (= Macrolea Curt.)**

**H. appendiculata Panz.**

Aschaffenburg. Von Oe. als sehr selten im Striet vorkommend angegeben.

**Donacia Fabr.**

**D. clavipes F.**

Aschaffenburg nicht häufig (Fr.). Seligenstadt (Scr.). Am Mainufer schwärmend 29. 5. 49 (Elbert).

**D. crassipes F.**

Lohr a. M. Altwasser des Mains 29. 7. 24 (St.).

**D. dentata Hoppe.**

Seligenstadt (Scr.). Schönbusch See-Insel 17. 7. 28. Lohr Mainaltwasser 30. 7. 22 (St.).



**D. versicolore Brahm.**

Am Guten Mann 5. 1895 (Fr.). Seligenstadt (Scr.). Bei Unterbessenbach 9. 7. 50 (Wolfram). Moore bei Großkrotzenburg 6. und 18. 9. 33.

**D. semicuprea Panz.**

Seligenstadt nicht selten (Scr.). Sendelbach 5. 5. 23 (St.). Lohr im Seegraben 13. 5. 45 (St.). Stockstadt a. M. 9. 5. 25. Schönbuschsee Herbst 1904 häufig. Kahl Moore 28. 11. 24.

**D. sparganii Ahr.**

Im Unterlauf der Gersprenz bei Stockstadt a. M. auf Wassergräsern mehrfach 8. 7. 05.

**D. aquatica L.**

Nicht selten. Schönbusch 5. 1895 (Fr.). Mainufer in Altwässern. Kahl Moore. Lohr-Sendelbach 13. 5. 24 (St.).

**D. impressa Payk.**

Aschaffenburg (D. N. u. Scr.). Kalbenstein unter Pflanzenrasen überwintert 28. 2. 26. Leiderer See 21. 5. 07. Schönbuschsee nicht selten. Mainufer 9. 05.

**D. brevicornis Ahr.**

Aschaffenburg (D.). Seligenstadt (Scr.).

**D. marginata Hoppe (= limbata Panz.)**

Schönbusch ziemlich häufig (Fr.). Stockstadter Wald 8. 4. 28. Sendelbach 8. 5. 23 (St.). Sumpf bei Station Kleinostheim 10. 10. 27.

**D. bicolor Zschach.**

Schönbusch in Menge 5. 1894 Schöllmüllersee 5. 1894 (Fr.). Stockstadt a. M. an der Gersprenz 1. 5. 04, 18. 5. 24.

**D. obscura Gyll.**

Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg (D.). Kahl Moore 1. 5. 04, 16. 10. 04, 2 St.

**D. antiqua Kunze.**

Aschaffenburg selten (Oe.).

**D. thalassina Germ.**

Aschaffenburg (D. u. Fl.).

**D. vulgaris Zschach.**

Bei Aschaffenburg und Seligenstadt einzeln (Scr.).

**D. simplex F.**

Bei Seligenstadt gemein (Scr.). Häufig bei Kahl 5. 04. Leiderer See 21. 5. 07. Schönbusch.

ab. sanguinea Westh.

Leiderer See 21. 5. 07. Schönbusch.

**D. cinerea Hbst.**

Aschaffenburg (D. u. Fr.). Seligenstadt mehrfach (Scr.). Schönbusch mehrfach (S. u. Schw.).

**Plateumaris Thoms.**

**P. sericea L.**

Häufig. Stockstadt a. M. Gersprenzufer 6. 5. 16. Kahl 31. 5. 42. Schönbusch 30. 5. 12  
ab. festucae F. (= violacea Hoppe)

- Schönbusch 30. 5. 12.  
 ab. *micans* Panz.  
 Schönbusch häufig 30. 5. 12.  
 ab. *armata* Payk.  
 Schönbusch. Kahl 31. 5. 42 häufig.  
 ab. *nymphaea* F.  
 Schönbusch 30. 5. 12, 5 St.

**P. braccata Scop.**

Aschaffenburg (D. N.).

**P. consimilis Schrk.**

Auf Sumpfwiesen häufig IV V VI.

**P. affinis Kunze (= abdominalis Bedel.)**

Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg 3. 6. 04 (S.) 1 St.

## Orsodacninae

### O r s o d a c n e Latr.

**O. cerasi L.**

Auf blühenden Kirschbäumen 4. 1894. Auf blühenden Umbelliferen in Menge  
 5. 1895 (Fr.). Schönbusch auf blühendem Weißdorn 23. 5. 30 (S.).

ab. *Duftschmidti* Weise.

Schönbusch auf blühendem Weißdorn 10. 5. 26, 29. 5. 28, 16. 6. 36.

**O. lineola Panz. (= nigriceps Latr.)**

Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg-Schönbusch 4. 1894 (Fr.).

### Z e u g o p h o r a Kunze.

**Z. subspinosa F.**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.). Auf Espen, Pappeln und Weiden nicht selten V —  
 IX. Schönbusch auf *Populus alba* 17. 7. 26. Büchelberg 5. 7. 31. Hain i. Sp. 1. 8. 22.

**Z. flavicollis Marsh.**

Einzeln bei Seligenstadt (Scr.). Am Röderbach auf Weiden 23. 7. 28. Am Weg nach  
 Steinbach auf Silberpappel 3. 8. 18. Hain i. Sp. 1. 8. 22. Kahl 2. 8. 26.

## Criocerinae

### L e m a F.

**L. cyanella L. (= puncticollis Curt.)**

Sandgrube bei Großostheim 24. 3. 29. Schönbusch auf den hinteren Waldwiesen  
 10. 5. 26. Am Städt. Wasserwerk 6. 8. 27. Heigenbrücken 17. 7. 27. Mäusberg bei  
 Wiesenfeld 14. 8. 20.

**L. Erichsoni Suffr.**

Seligenstadt (Scr.). Stockstadter Wald 9. 5. 25, 1. 12. 27. Kahl Moore 30. 9. 25.  
 Sodener Wald, Heigenbrücken 26. 12. 24.

**L. lichenis Voet.**

Häufig auf Wiesen.

**L. tristis Hbst. (= flavipes Suffr.)**

Aschaffenburg (D. N.). Seligenstadt (Scr.). Bei Sodental 10. 1. 26. Kahl Moorwiesen 1. 11. 05 mehrfach unter Pflanzenrasen.

**L. melanopus L.**

Häufig auf Grasplätzen. III — VI, VIII — XII.

**Crioceris Geoffr.**

**C. 12-punctata L.**

Häufig auf Spargeln. VI VII.

**C. asparagi L.**

Häufig auf Spargeln. IV V VI.

**Lilioceris Rtt.**

**L. lillii Scop.**

Auf Lilien häufig. IV V. Südlich Burgsinn auf Fritillaria Meleagris 18. 4. 26 (St.) 2 St.

**L. meridigera L.**

Striet auf Maiglöckchen 5. 4. 12. Bei Glattbach 24. 4. 07. Stockstadter Wald 5. 1896 (Fr.). Krainberg auf Anthericum Liliago L. 7. 6. 25, 30. 8. 25.

## Clytrinae

**Labidostomis Redt.**

**L. tridentata L.**

Striet auf Weiden 5. 1895 (Fr.). Auf Birken 20. 6. 29. Gailbachtal 4. 6. 35. Hain i. Sp. 6. 7. 25.

**L. humeralis Schneid.**

Aschaffenburg in Mehrzahl (D.). Seligenstadt 1 St. (Scr.). Sodener Wald. Retzbach Benediktushöhe 4. 6. 35.

**L. longimana L.**

Mainufer auf Weiden 6. 1894 (Fr.). Schönbusch 27. 6. 24. Wendelberg auf Espe 16. 7. 34. Sandgrube bei Mainaschaff 29. 7. 25. Bei Eichenberg 10. 8. 53.

**Lachnaea Redt.**

**L. sexpunctata Scop.**

Krainberg 21. 5. 32. Kalbenstein 22. 5. 27. Stockstadter Wald auf Eichengebüsch 9. 6. 20.

**Clytra Laich.**

**C. quadripunctata L.**

Auf Weiden. Nach Scr. auch auf Eichen, Schlehen und Buchen. Kahl 31. 5. 42. Sodener Wald 6. 1896 (Fr.). Steinbach an Weiden ziemlich häufig 11. 7. 24. Am 6. 6. 24 fand Postamtmann Eckart im Wald bei Schweinheim auf einem Haufen der Formica rufa 10 Clytra quadripunctata Laich. mittags 12 Uhr. V. Heyden fand die Puppengehäuse des Käfers in Kolonien solcher Haufen. Nach Wassmann gehören die gehäusetragenden Larven des Käfers zu den indifferent geduldeten Gästen der Ameisen (Fr.).

**C. laeviuscula Ratzbg.**

Gemein auf Weiden. Fasanerie in Menge 6. 1896 (Fr.). Mainufer auf Weiden 25. 6. 24. Larve bei Formica sanguinea (Fr.).

## **Gynandrophthalma Lac. (= Cyaniris Redt.)**

### **G. cyanea F. (= salicina Lef.)**

Dammer Sumpfwiesen in Anzahl 5. 1894 (Fr.). Fasanerie 5. 1893 (Fr.). Hain i. Sp. auf Salweide 3. 6. 23. Wendelberg 22. 6. 38.

### **G. aurita L.**

Schönbusch 26. 5. 04, 12. 6. 28, 18.6. 36. Auch von Fr. daselbst 5. und 6. 1894 und 1895 gefunden. Wendelberg auf Crataegus 26. 5. 36.

### **G. affinis Illig.**

Aschaffenburg auf Blüten nicht selten (Oe.). Krainberg 21. 5. 33. Hain i. Sp. 3. 6. 23. Kalmut 23. 6. 36. Mäusberg 9. 6. 19, 1 St.

## **Chilotoma Redt.**

### **C. musciformis Goeze.**

Krainberg 8. 6. 35, 10 St. 28. 6. 32, 3 St. 5. 7. 42, 1 St. Kalmut 3. 6. 34, 1 St. 13. 6. 36 auf Anthyllis vulneraria L.

## **Coptocephala Chevr.**

### **C. unifasciata Scop.**

Aschaffenburg (D.). Mainufer 13. 7. 26, 2 St. 30. 8. 06. Sande bei Mainaschaff 12. 8. 37, 3 St. 10. 7. 32, 3 St. 23. 8. 32, 4 St. Kahl Sande 7. 7. 34. Stockstadter Wald 1 St. Kalmut 16. 8. 21, 2 St.

### **C. rubicunda Laich.**

Krainberg 31. 7. 37, 1 St.

# **Cryptocephalinae**

## **Pachybrachys Suffr.**

### **P. hieroglyphicus Laich.**

Auf Weiden nicht selten. VI VII.

### **P. tessellatus Oliv.**

Karlstadt Haag auf Eichen 30. 6. 29, 5 St. Krainberg 30. 7. 38, 1 St.

### **P. fimbriolatus Suffr.**

Retzbach a. M. 13. 6. 47, 4. 7. 35, 19. 7. 24 (Gulde). Krainberg 15. 7. 38, 1 St.

## **Cryptocephalus F.**

### **C. coryli L.**

Aschaffenburg (D.).

### **C. cordiger L.**

Mäusberg bei Wiesenfeld auf Eichengebüsch in copula 24. 4. 49 (J. S.). Krainberg 25. 5. 23, 2 St. 7. 6. 25, 1 St. 20. 6. 26, 1 St. 5. 7. 42, 1 St.

### **C. sexpunctatus L.**

Schönbusch 19. 5. 31. Stockstadt a. M. auf Weiden 4. 6. 01.

### **C. primarius Harold.**

Thüngersheim 16. 6. 35 (Noll). Krainberg 14. und 29. 6. 31, 2 St. 20. 6. 23, 18. 7. 36.

### **C. imperialis Laich.**

Mäusberg bei Wiesenfeld auf Haseln 7. 19, 1 St.

- C. bipunctatus L.**  
Hain i. Sp. auf Salweide 3. 6. 23. Krainberg 20. 6. 43. Wiesenfeld 6. und 7. 19.
- C. biguttatus Scop.**  
Bei Oberbessenbach 25. 5. 47, 2 St. Kahl 11. 6. 25, 2 St. Hain i. Sp. 3. 6. 23. Steinbachtal 4. 7. 09.
- C. Schaefferi Schrk.**  
Wiesenfeld 23. 5. 20, 1 W. (S.).
- C. aureolus Suffr.**  
Krainberg 7. 6. 25, 2 St. Hanau (H.).
- C. sericeus L.**  
Häufig auf Kompositen.  
ab. *purpurascens* Weise.  
Kahl 17. 6. 34, 7. 7. 34. Krainberg 20. 6. 43.  
ab. *coeruleus* Weise.  
Godelsberg.
- C. hypochaeridis L. (= cristula Duf.)**  
Im Kahlthal bei der Herrnmühle 6. 22 (Ochs). Karlstadt a. M. auf dem Haag 30. 6. 29. Kalmut 14. 6. 25, 2 St. Krainberg 11. 7. 38.
- C. violaceus Laich.**  
Häufig auf Kompositen. Eine schwarzblaue Abart auf dem Wendelberg 12. 7. 46.
- C. nitidus L.**  
Gailbachtal 27. 5. 26. Godelsberg 6. 1894 (Fr.).
- C. punctiger Payk.**  
Striet 14. 6. 26, 1 St.
- C. parvulus Müll.**  
Bei Seligenstadt sehr selten (Scr.).
- C. marginatus F.**  
Aschaffenburg-Striet 19. 6. 26, 2 St. 20. 6. 29, 2 St. 22. 6. 28, 3 St. Auch von Oe., D. und Scr. bereits festgestellt. Kahlthal bei der Herrnmühle 6. 22 (Ochs).
- C. pini L.**  
Büchelberg 8. 25. Kahl 28. 9. 27. Krainberg auf *Pinus austriaca* 9. 8. 25, 7 St. 30. 8. 25, 6 St. Stengerts 27. 8. 25, 1 St. Rohrbach 3. 10. 25, 6 St.
- C. X-maculatus L.**  
Kahl auf Salweiden 20. 7. 27, 1 St.  
ab. *scenicus* Weise.  
Hain Pollaschgrund auf Birke 10. 6. 24. Kahl auf Salweide 20. 7. 27, 1 St.  
ab. *barbareae* L.  
Kahl Moore 11. 6. 25, 1 St. 25. 6. 26, 2 St. 20. 7. 27, 1 St.
- C. Moraei L.**  
Häufig auf Kompositen. VI VII.
- C. quadripustulatus Gyll.**  
Im Kahlthal bei der Herrnmühle 6. 22 (Ochs).

- C. flavipes F.**  
Aschaffenburg auf Pappeln nicht selten (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Wendelberg auf Weißdorn 26. 5. 36, 2 St. Krainberg auf Schlehen 15. 5. 47, 7. 6. 25, 29. 7. 35.
- C. vittatus F.**  
Nicht selten auf blühenden Kompositen VI — VIII.  
ab. negligens Weise.  
Im Kahltal bei der Herrnmühle 6. 22 (Ochs). Bei Wiestal 5. 7. 53 (J. S.) 1 St.
- C. bilineatus L.**  
Aschaffenburg (Oe. u. D.). Seligenstadt (Scr.).
- C. elegantulus Grav.**  
Krainberg 7. 6. 25, 5 St. 6. 7. 25, 20. 6. 43, 5. 7. 25. Kalmut 20. 6. 25, 3 St. 28. 6. 25  
4 St.
- C. chrysopus Gmel.**  
Aschaffenburg (Oe.). Mainufer Mörswiese. Fasanerie 6. 1893, 1 St. (Fr.). Seligenstadt (Scr.).
- C. saliceti Zebe.**  
Ludwigshöhe auf Weide 21. 6. 37, 2 St. Obernauer Wald auf Salweide 22. 7. 26,  
1 St.
- C. ocellatus Drap.**  
Häufig V — VIII.
- C. querceti Suffr.**  
Wendelberg auf Eiche 27. 6. 35, 2 St. Krainberg 22. 6. 30, 1 St. Mäusberg 29. 6. 30,  
2 St.
- C. labiatus L.**  
Kahl Moore 25. 6. 26, 21. 8. 26. Striet auf Birke 31. 7. 36. Fischerhecke auf Weide  
31. 7. 26. Wendelberg auf Haseln 12. 7. 39. Krainberg 5. 7. 25.  
ab. diagrammus Suffr.  
Wendelberg auf Haseln 12. 7. 39, 1 St.
- C. exiguus Schneid.**  
Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg (D. N.). Sodener Wald 30. 5. 07. Hösbach auf  
Sumpfwiesen. Großkrotzenburger Moore 25. 6. 26, 2 St. Bei der Schöllmühle  
1. 7. 28, 1 St.
- C. pygmaeus F.**  
Fasanerie auf Wiesen nicht selten 6. 1893 (Fr.). Schönbusch 27. 6. 24. Gailbachtal  
19. 6. 31. Karlstadt 21. 6. 31. Kahltal 12. 7. 25. Kahl Moore 7. 8. 26.
- C. fulvus Goeze.**  
Schönbusch Sandgrube auf Verbascum Lychnitis 27. 6. 24, 1. 7. 24. Mainaschaff  
Sandgrube 29. 7. 25, 14. 7. 43, 3 St. Kahl Sande 4. 8. 38. Krainberg 5. 7. 25.
- C. populi Suffr.**  
Ludwigsallee auf Pappeln 8. 9. 06. Schöntal (D. N.). Einzelnen bei Seligenstadt (Scr.)
- C. pusillus F.**  
Ludwigshöhe 20. 6. 31. Godelsberg auf Birke 25. 7. 43. Großkrotzenburger Moore  
auf Weiden-Kulturen 17. 8. 25.

ab. *immaculatus* Westh.

Sandgrube bei Mainaschaff 25. 6. 33. Kahl 2. 8. 26, 1 St. Sulzbach a. M. Sandgrube 25. 6. 33, 1 St.

ab. *Marshami* Weise.

Wendelberg auf Espen 27. 6. 35, 4. 7. 34, 7 St. Großkrotzenburg auf Weidenkulturen 2. 8. 26, 17. 8. 25 in copula mit der Stammform. Hain i. Sp. auf Mistel 26. 8. 26.

**C. rufipes** Goeze.

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Schönbusch 29. 7. 27, 1 St.

## Lamprosominae

**Lamprosoma** Kirby.

**L. concolor** Sturm.

Steinbachtal 5. 11. 05, 1 St.

## Eumolpinae

**Adoxus** Kirby. (= **Bromius** Redt.) (= **Eumolpus** Redt.)

**A. obscurus** L.

Von Oe. noch als selten angegeben. Fr. gibt sie bereits als häufig an. Nicht selten auf *Epilobium angustifolium* V — VIII.

ab. *villosulus* Schrk. (= *vitis* auct.)

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Karlstadt 28. 4. 29. Fasanerie 24. 7. 06. Nach Fr. manchmal im Frühjahr den jungen Trieben des Weinstocks schädlich.

**Pachnephorus** Redt.

**P. pilosus** Rossi.

Aschaffenburg (Oe.). Feldkahler Höhe unter Moos 24. 11. 34 (Noll) 1 St. Zwischen Großostheim und Pflaumheim nahe der Bahnstrecke auf Lößboden laufend 6 St. 7. 8. 48 (J. S.).

## Chrysomelinae

**Leptinotarsa** Stal.

**L. decemlineata** Say.

Bei Mergentheim bereits im Jahre 1896 auf einem Kartoffelacker festgestellt (St.). Im ganzen Untermaingebiet massenhaftes Auftreten in den letzten Jahren.

**Chrysomela** L.

**C. herbacea** Duft. (= *menthastri* Suffr.)

Häufig auf *Mentha aquatica* VI — IX.

**C. limbata** F.

Stockstadter Wald in den Schutzgräben in Anzahl 5. 1894 (Fr.). Kl. Exerzierplatz am Mainufer 8. 07, 5 St. 22. 7. 08, 1 St.

**C. graminis** L.

Mainufer 5. 9. 05, 2 St. Nach Rtrr. auf *Tanacetum* (Rainfarn).

**C. polita L.**

Oft im Maingenist. Rückersbacher Schlucht 22. 2. 25, 3 St. Gailbachtal 4. 6. 35.  
Fasanerie auf Weiden 7. 1894 (Fr.).

**C. staphylea L.**

Häufig im Maingenist. An feuchten Plätzen auf niedrigen Pflanzen. Fasanerie  
3. 1894, 8. 1894 (Fr.). Stockstadter Wald 1. 5. 41. Mainufer 22. 9. 05.

**C. cerealis L.**

Wiesenfeld 3. 6. 19. Lohr Beilstein 18. 6. 22 (St.). Kahl Moore 19. 7. 23, 13. 9. 36.  
3 St. 11. 10. 36. Krainberg 27. 7. 46, 2 St. Wendelberg auf Besenginster 8. 9. 31.  
Karlstadt auf dem Haag 11. 9. 29.

**C. haemoptera L.**

Nicht selten im Gebiet.

**C. fuliginosa Oliv.**

ab. *galii* Weise.

Am Fuß des Kalbensteins 21. 5. 31. Krainberg 12. 5. 31, 2 St. 7. 6. 32. Ruine Hom-  
burg 21. 6. 41. Retzbach Benediktushöhe 4. 7. 35. Mäusberg 7. 19.

**C. violacea Müll. (= goettingensis L.)**

Häufig im Gebiet.

**C. sanguinolenta L.**

Nicht selten auf sandigen Grasflächen.

**C. marginalis Duft.**

Auf *Linaria vulgaris* Müll. Stockstadter Wald 22. 4. 11. Kalmut 23. 6. 35. Sodener  
Wald 24. 9. 07, 1 St. 4. 10. 08, 2 St. Sandgrube bei Mainaschaff 15. 9. 25. Krainberg  
14. 10. 24. Kahl 26. 11. 04.

**C. varians Schaller.**

Häufig auf *Hypericum*. IV — X, verschieden gefärbt grün, blau, violett, kupfer-  
rot und schwarz. a. *aethiops* F. schwarz Reichenberg 10. 8. 53 (J. S.).

**C. didymata Scriba.**

Seligenstadt 1 St. (Scr.).

**C. hyperici Forst.**

Häufig auf *Hypericum*. IV VI VII X.

ab. *privigna* Weise.

Dornauer Graben 20. 6. 37, 1 St.

**C. brunsvicensis Grav.**

Auf moorigen Wiesen auf *Hypericum* nicht selten. Kahl 29. 8. 28. Wachenbachtal.  
Hain i. Sp. Pollaschgrund 6. 8. 37. Moore bei Großkrotzenburg 8. 9. 07, 8 St.

**C. geminata Payk.**

Rothenschuch i. Sp. am Breitsee 13. 3. 27, 10. 10. 26. Karlstadt a. M. 6. 3. 27, 19. 3. 26;  
2 St. 26. 3. 26, 4 St. 14. 4. 19, 24. 10. 42. Bahndamm gegenüber Nilkheim 3. 4. 27.  
Mäusberg 24. 5. 20. Obernauer Wald 12. 7. 25, 1 St.

**C. cuprina Duft. (= quadrigemina Suffr.)**

Seligenstadt (Scr.).

**C. oricalcia Müll. (= orichalcea Gmel.)**

Aschaffenburg (D. N.). Wiesen vor Glatzbach 1. 4. 05 und Ende 6. 09. Am Zeug-



haus auf Anthriscus 17. 6. 19. Steinbachtal 4. 7. 09. Schönbusch 1. 7. 26, 29. 7. 27.  
Kahlthal 21. 9. 24.

**C. carnifex F.**

Rodenbach bei Hanau auf sandigem Boden (H.).

**C. analis L.**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.). Selten.

ab. lomata Hbst.

Kahl bei den Emmerichshöfen 13. 9. 36, 3 St. Hanau 30. 9. 06 (H.). Auf dem Ammersfeld bei Aschfeld 25. 4. 48 (J. S.).

**C. marginata L.**

Sandgrube bei Sulzbach a. M. 14. 3. 26, 13. 6. 32, 1 St. Krainberg 12. 5. 21. Kl. Exerzierplatz unter Stein 5. 1894 (Fr.). Schönbusch 10. 7. 29. Kalbenstein 13. 8. 34. Kahl Moore 14. 9. 26, 1 St. Seligenstadt (Scr.).

**C. fastuosa Scop.**

Häufig auf Galeopsis tetrahit (Hohlzahn).

**Gastroides Hoppe.**

**G. polygoni L.**

Auf Vogelknöterich nicht selten. Stadtgärtnerei auf Daucus carota, das W. eiertragend 29. 5. 40.

**G. viridula Deg.**

Von Oe. noch als sehr selten angegeben. Jetzt sehr häufig auf Rumex. Lohr Romberg 6. 4. 24. Fasanerie 6. 6. 40. Mainufer 13. 6. 35. Sandgrube bei Großostheim 14. 8. 27.

**Phaedon Latr.**

**P. laevigatus Duft.**

Seligenstadt (Scr.).

**P. cochleariae F.**

Stengerts unter Moos 6. 1. 28. Im Angeschwemmten des Mains 1. 1. 26. Kahl 26. 4. 22, 23. 9. 26, 13. 11. 24.

**P. armoraciae L.**

Stockstadt a. M. unter Moos 16. 1. 27. Am Gersprenzufer an Veronica Beccabunga 30. 7. 26. Retzbach 28. 4. 29. Steinbachtal 16. 5. 24, 7. 8. 15. Lohr 14. 6. 22 (St.).

**P. pyritosus Rossi.**

Aschaffenburg (Oe.). Mainufer Mörswiese 24. 5. 05, 5 St. Karlstadt am Haag 25. 10. 42.

**Hydrothassa Thoms.**

**H. glabra Hbst. (= aucta F.)**

Häufig auf Sumpfpflanzen.

**H. marginella L.**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.). Kahl Moore 13. 10. 07, 1 St. Nach Fr. selten auf Ranunculus aquaticus.

**H. hannoverana F.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt einzeln (Scr.). Oberrodenbach bei Hanau 4. 08, 6 St. Wachenbachtal 24. 9. 07, 1 St. Sodener Wald 24. 9. 07, 2 St.

## **Prasocuris Latr.**

### **P. phellandri L.**

Gersprenzufer 18. 4. 24. Kahl Moore 31. 5. 42, 13. 11. 24. Am Schönbuschsee unter Schilf 12. 1894 (Fr.).

### **P. junci Brahm.**

An Veronica Beccabunga Illig. Kahl 18. 3. 28. Am Steinbach in der Striet 15. 4. 22. Röderbach 6. 1894 (Fr.).

## **Plagiodera Redt.**

### **P. versicolora Laich.**

Häufig auf Weiden, Espen, Pappeln. Fasanerie auf Erlen 7. 5. 35. Kahl 3. 9. 22 (St.).

## **Melasoma Steph.**

### **M. aenea L.**

Nicht selten auf Erlen IV — VII.

### **M. lapponica L.**

ab. bulgharensis F.

Striet 5. 20. Zwischen Kugel- und Gartenberg auf Weiden 1 St. (Wägner).

### **M. XX-punctata Scop.**

Auf Weiden stellenweise nicht selten. Steinbachtal 8. 4. 06, 11. 5. 34, 4. 7. 09. Gersprenzufer bei Stockstadt a. M. frisch entwickelt 2. 5. 37. Fasanerie 6. 1876 (Fr.).

### **M. populi L.**

Häufig auf Pappeln und Espen.

### **M. tremulae F.**

Auf Espen. Krainberg 6. 25. Bei der Eckertsmühle 6. 1896 (Fr.). Findberg 9. 9. 03 (Fr.).

### **M. saliceti Weise.**

Hain i. Sp. mehrfach auf Weidenkulturen. Thüngersheim 2. 7. 22 (St.).

## **Phytodecta Kirby.**

### **P. flavicornis Suffr.**

Dörngraben auf Salweide 24. 5. 37, 1 St.

### **P. viminalis L.**

Auf Weiden nicht selten.

ab. gradli Heyden.

Jakobstal i. Sp. 7. 5. 16. Hain i. Sp. Seebachtal auf Salweide 3. 6. 23. Im Wachenbachtal 21. 5. 11.

### **P. rufipes Deg.**

Striet auf Weiden 4. 1895 (Fr.). Waldaschaff 28. 4. 26. Hain i. Sp. Pollaschgrund 11. 5. 24, 2 St. Steinbachtal 15. 5. 24. Gailbachtal 23. 5. 26, 1 St. Weiler i. Sp. 6. 6. 26

### **P. Linnaeana Schrk.**

Aschaffenburg (D.). Mömbris 8. 4. 44 (J. S.). Bei Stockstadt a. M. auf Weiden an der Gersprenz häufig 12. 5. 13. Lohr Wackenwiese 30. 4. 28, 9 St. (St.).

ab. decastigma Schrk.

Stockstadt a. M. auf Weiden an der Gersprenz 2. 5. 37, 1 St. 12. 5. 13, 6 St.

ab. **Kraatzi Westw.**  
Krainberg 12. 5. 31, 1 St.

**P. olivacea Forst.**

Häufig auf Sarothamnus mit der ab. flavicans.

ab. **litura F.**  
Schönbusch 24. 5. 35.

**P. V-punctata F.**

Schönbusch 10. 5. 26. Mainufer. Kahl Moore.

ab. **unicolor Weise.**  
Schönbusch auf Kirschblüten 12. 5. 22. Mainufer 5. 07. Auf Prunus padus 1. 7. 26,  
2 St.

**P. pallida L.**

Aschaffenburg selten auf Weiden (Fr.).

**Phyllosecta Kirby.**

**P. vulgatissima L.**

Sehr häufig auf Weiden und Pappeln.

**P. tibialis Suffr.**

Mainufer.

ab. **Cornellii Weise.**  
Mehrfach auf Weiden 9. 9. 42, 3 St. Mainufer unter Platanenrinde 1. 3. 25. Lohr  
unter Zwetschgenrinde überwintert 27. 3. 26 (St.).  
ab. **coerulea Rtrr.**  
Lohr Wackenwiese 30. 4. 28.

**P. vitellinae L.**

Häufig auf Weiden.

**P. laticollis Suffr.**

Rückersbacher Schlucht unter Moos 22. 2. 25. Fasanerie auf Espe 14. 5. 24, 2 St.  
Bei den Ellerhöfen auf Espe 28. 5. 37. Lohr 22. 5. 22 (St.). Am Haibacher Kreuz  
22. 6. 24, 2 St.

**Timarcha Latr.**

**T. tenebricosa F.**

Auf Galium mollugo. Mainufer 11. 4. 06, 4 St. Schönbusch 5. 1894 (Fr.). Stock-  
stadter Wald 6. 1894 (Fr.). Bischberg 29. 6. 52 (Elbert).

**T. goettingensis L. (= coriaria Laich.)**

Mainwiesen häufig im Genist. Kalmut 28. 6. 25.

**T. metallica Laich.**

Rothenbuch i. Sp. am Breitsee 13. 3. 27. Hain i. Sp. 13. 4. 43. Waldmichelbach  
17. 7. 49 (J. S.). Lichtenau i. Sp. 3. 9. 31. Miltenberg bei der Burgruine 9. 07, 1 St.

**Galerucinae**

**Galerucella Crotch.**

**G. lineola F.**

Kahl Moore. Striet 4. 1894 (Fr.). Wiesen hinter Damm 5. 1894 (Fr.). Auf dem  
Ammersfeld bei Aschfeld 21. 4. 47. Gailbachtal 8. 12. 04.

**G. luteola Müll.**

Fasanerie auf Salweide 7. 1896 (Fr.). Lehmgruben beim Bahnhof Kleinostheim 23. 9. 09.

**G. calmariensis L.**

Lohr Seegraben 13. 5. 46 (St.). Fasanerie auf Lythrum salicaria 3. 6. 37. Kahl Moore 21. 9. 24, 1. 10. 24.

ab. lythri Gyll.

Kahl Moore 21. 9. 24.

**G. pusilla Duft.**

Fasanerie 3. 6. 37. Sodenthal. Kahl 17. 10. 04.

**G. tenella L.**

Seligenstadt (Scr.). Fasanerie 6. 1892 (Fr.). Am Röderbach 13. 8. 40.

**P y r r h a l t a Joan.**

**P. viburni Payk.**

Von Oe. und D. noch als selten angegeben. Heute nicht selten auf Viburnum Opulus L. Im Hausgarten 19. 8. 39. Fischerhecke 6. 9. 28. Mäusberg 6. 10. 29.

**G a l e r u c a Geoffr.**

**G. tanacetii L.**

Häufig an Hainen und Ödplätzen. Auf Tanacetum.

**G. interrupta Oliv.**

Kahl 27. 5. 37, 1 St. 13. 9. 30, 3 St. Mainflingen 9. 6. 12, 2 St.

**G. pomonae Scop.**

Schöntal in auffallender Menge 6. 1892 (Fr.). Schönbusch Sandgrube 8. 7. 46, 3 St. Mainufer. Kalbenstein 30. 8. 25.

**G. (Haptoscelis Weise) melanocephala Panz.**

Kahl Moore nicht selten in gemähtem Gras. VI VIII — XI. Ebenso in den sich anschließenden Großkrotzenburger Mooren. Auch von Fl. im Oktober/November auf den Kahler Moorwiesen bereits festgestellt.

**L o c h m a e a Weise.**

**L. capreae L.**

Häufig auf Weiden und Birken.

**L. suturalis Thoms.**

An Heidekraut. Wald bei Eisenbach 8. 27, 14 St. Dornauer Graben 13. 9. 38, 3 St. Heigenbrücken 6. 10. 31. Hain i. Sp. Seebachtal 20. 11. und 8. 12. 27.

**L. crataegi Forst.**

Auf Weißdorn nicht selten. Schönbusch 10. 5. 26, 19. 5. 31, 7 St. 6. 6. 28. Striet 22. 5. 1898 (Fr.).

**P h y l l o b r o t i c a Redt.**

**P. quadrimaculata L.**

Auf Scutellaria galericulata L. Steinbachtal 22. 6. 28. Schönbusch. Krainberg 20. 6. 43. Fasanerie in Anzahl auf Scutellaria 7. 1896 (Fr.). 9. 46, 1 St. (S.). Hain i. Sp. 9. 9. 28.

## **L u p e r u s** Geoffr.

### **L. (Calomicrus Steph.) circumfusus** Marsh.

Findberg 23. 5. 26. Büchelberg an Genista tinctoria 30. 6. 25. Striet auf Sarothamnus 31. 7. 26. Kalmut 14. 6. 25, 26. 6. 25, 8 St. Von Oe. noch als sehr selten von Steinbach h. d. S. angegeben.

### **L. (C.) pinicola** Duft.

Auf Kiefern nicht selten.

ab. *silvestris* Weise.

Gailbachtal 4. 6. 35. Retzbach Benediktushöhe 16. 6. 35. Krainberg 8. 6. 35. Kalmut 12. 6. 25, 5 St.

### **L. (Luperus s. str.) xanthopoda** Schrk.

Aschaffenburg (D.). Seligenstadt nicht selten (Scr.). Kahl 31. 5. 42, 1 St.

### **L. longicornis** F.

Gailbachtal 23. 5. 26. Kahl Moore 11. 6. 25. Godelsberg auf Birken 5. 1895 (Fr.).

Hain i. Sp. auf Haseln 3. 6. 23, 1 St. Fasanerie 13. 7. 05, 2 St.

### **L. lyperus** Sulz. (= **niger** Goeze)

Fasanerie, besonders auf Schlehen häufig 6. 1895 (Fr.). Oberbessenbach 10. 5. 47. Thüngersheim 2. 7. 22 (St.).

### **L. flavipes** L.

Fasanerie 6. 1894 (Fr.). Im Garten auf Rosen 6. 6. 22. Wendelberg 24. 6. 42, 13. 7. 05. Seligenstadt (Scr.).

## **A g e l a s t i c a** Redt.

### **A. alni** L.

Häufig und schädlich auf Erlen. II — IV IX — XII.

## **S e r m y l a s s a** Rtrr. (= **S e r m y l a** Chap.)

### **S. halensis** L.

Nicht selten auf Galium.

# **Halticinae**

## **P h y l l o t r e t a** Steph.

### **P. vittula** Redt.

In Nordeuropa Getreideschädling nach Reitter. Aschaffenburg (D. N.). Karlstadt 16. 3. 41. Stockstadter Wald 25. 9. 04. Am Röderbach 6. 7. 40. Kahl 13. 11. 04.

### **P. armoraciae** Koch.

Nicht häufig (Oe.). Öfters auf Meerrettich.

### **P. nemorum** L.

Auf Cruciferen häufig. Schönbusch unter Moos an alten Eichen 26. 1. 24, 9. 3. 41. Kahl 15. 5. 04, 1 St.

### **P. undulata** Kutsch.

Häufig und schädlich auf Cruciferen.

### **P. tetrastigma** Com.

Kahl 4. 12. und 11. 04. Findberg 10. 11. 40.

ab. *dilatata* Thoms.

Striet. Fasanerie 5. 1893 einmal (Fr.).

**P. flexuosa Illig.**

Kahl Moore 5. 4. 12 (t. Heikertinger).

**P. vittata F.**

Ellerwald beim Gailbachtal 23. 4. 46, 1 St. Sendelbach bei Lohr 23. 8. 23 (St.).

**P. ochripes Curt.**

Schönbusch unter Platanenrinde 26. 1. 24, 10. 1894, 29. 11. 46. Kl. Exerzierplatz unter Platanenrinde 16. 2. 04, 3. 24.

**P. exclamationis Thnbg.**

Überwinternd im Moos alter Bäume 26. 1. 27. Kahl Moore 14. 4. 11, 14. 9. 25, 6. 10. 26. Schönbusch 21. 10. 07. Steinbachtal 5. 11. 05.

ab. *vibex* Weise.

Schönbusch am unteren See 27. 3. 47, 20. 5. 04. Kahl 16. 10. 04.

**P. atra F.**

Häufig und schädlich auf Cruciferen. II — V VIII — XII.

v. *crucifera* Goeze.

Häufig. I — VI IX — XII.

**P. diademata Foudr.**

Schönbusch im Moos alter Eichen 20. 1. 24, 8. 12. 23. Kahl 15. 5. 04 einzeln.

**P. aerea All.**

Aschaffenburg 3 St. (S.).

**P. nigripes F.**

Auf Cruciferen und Reseden häufig.

**P. procera Redt.**

Kalmut 19. 6. 25, 1 St.

**P. nodicornis Marsh.**

Kalmut 26. 6. 25, 1 St.

**A p h t h o n a Chev.**

**A. Cyparissiae Koch.**

Auf Euphorbia Cyparissia häufig. Kalmut 28. 6. 25. Krainberg 9. 7. 25. Stockstadter Wald 8. 7. 05.

**A. pallida Bach.**

Mainufer. Aschaffenburg 2 St. (Fl.). 1893, 8 St. (Koltze.).

**A. pygmaea Kutsch.**

Karlstadt 6. 3. 27. Kalbenstein 30. 8. 25. Erbig 28. 10. 26. Schönbusch 2 St. 10. 04. Schmerlenbacher Wald 3 St.

**A. cyanella Redt.**

Gailbachtal 2 St. Ende 3. 05, 4. 09. Stockstadter Wald 20. 5. 04, 8. 11. 25. Schmerlenbacher Wald. Kahl Moore 14. 9. 25.

**A. venustula Kutsch.**

Aschaffenburg (D. N.). Seligenstadt (Scr.). Stockstadter Wald 5. 4. 24. Godelsberg 6. 5. 05. Rückersbacher Schlucht 3. 5. 25. Striet 30. 8. 30. Mäusberg Ende 8. 20.

**A. euphorbiae Schrk.**

Dornauer Graben 24. 4. 11. Hain i. Sp. 11. 5. 24, 1 St. Schönbusch 17. 5. 22. Kalmut 12. 6. 25, 10. 7. 25. Krainberg 9. 8. 25. Sodener Wald 17. 10. 23.

**A. coerulea Geoffr.**

Häufig auf *Iris pseudacoris*. Aschaffenburg (Oe. u. D. N.). Schönbusch unter Platanenrinde 16. 3. 24, 17. 4. 06. Kahl.

**A. herbigrada Curt.**

Am Mäusberg mehrfach auf *Lappa major* 6. 20, 3. 9. 33. Kalbenstein 30. 8. 25. Nach Fr. nicht selten auf *Campanula*.

**A. atrovirens Först.**

Nach Weise auf *Euphorbia Cyparissia*. Schönbusch am oberen See 30. 5. 04. Krainberg 7. 6. 25. Kahl 25. 9. 26.

**L. Longitarsus Berth.**

**L. anchusae Payk.**

Aschaffenburg (Oe. u. D.). Seligenstadt (Scr.). Auf Boraginaceen.

**L. obliteratus Rosh.**

Schönbusch unter Moos 12. 3. 24. Mäusberg 28. 8. 20, 2 St. (t. Heikertinger). Mainufer 11. 9. 05.

**L. symphyti Heikert.**

Striet 1 St. 10. 11. 35.

**L. succineus Foudr.**

Aschaffenburg 1 St. (S.).

**L. aeruginosus Foudr.**

Mainufer 1 St. (t. Heikertinger).

**L. tabidus F.**

Schönbusch Sandgrube auf *Verbascum Lychnitis* 27. 6. 24, 10. 7. 24, 3. 8. 46.  
ab. *verbasci* Foudr.  
Kahl 9. 04. Seligenstadt (Scr.).

**L. Waterhousei Kutsch.**

Gartenberg 8. 2. 25 (t. Heikertinger).

**L. lycopi Foudr.**

Aschaffenburg 2 St.

**L. melanocephalus Deg.**

Bei Seligenstadt einzeln (Scr.). Gailbachtal 6. 3. 10 und 1912. Kahl.

**L. curtus All.**

Schönbusch Herbst 1904, 1 St.

**L. exoletus L.**

Seligenstadt (Scr.). Schönbusch auf *Cynoglossum* 27. 6. 24.

**L. pratensis Panz.**

Aschaffenburg (D.).

**L. ballotae Marsh.**

Seligenstadt (Scr.).

- L. longiseta Weise.**  
Rückersbacher Schlucht 22. 2. 25. Kahl 1. 11. 05, 2 St.
- L. Ganglbaueri Hktgr.**  
Aschaffenburg (D. N.).
- L. suturalis Marsh.**  
Schönbusch Herbst 1904, 2 St.
- L. atricillus L.**  
Seligenstadt (Scr.).  
ab. declivis Weise.  
Schönbusch 4. 10. 04, 2 St.
- L. nasturtii F.**  
Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg (D. N.). Schönbusch. Mäusberg 8. 20 (t. Heikertinger).
- L. dorsalis F.**  
Babenhausen 1 St. (Scr.).
- L. apicalis Beck.**  
Aschaffenburg (D. N.). Seligenstadt einige Stücke (Scr.).
- L. holsaticus L.**  
Seligenstadt (Scr.). Stockstadter Wald 1. 1. 27. Kahl 2. 6. 26, 1. 10. 06, 11. 04, 4 St.
- L. luridus Scop.**  
Aschaffenburg (D. N.). Fahrbachtal 1. 3. 27, 18. 7. 25. Lindigwiesen 13. 7. 04.  
Bischberg 25. 8. 07. Wiesen beim Bahnhof Kleinostheim 2. 9. 06. Mäusberg 7. 9.  
25. Stockstadter Wald 23. 10. 25, 4. 12. 27.  
ab. cognatus Weise.  
Schönbusch am oberen See 30. 5. 04. Lindigwiesen 13. 7. 04. Kahl 16. 10. 04.  
Sodener Wald.  
ab. quadrisignatus Duft.  
Kahl 16. 10. 04, 2 St.  
ab. nigricans Weise.  
Mainufer 11. 9. 04. Gailbachtal 8. 12. 04.
- L. brunneus Duft.**  
Aschaffenburg 1 St. Kahl Moore 13. 11. 24, 4 St. (t. Heikertinger).
- L. rubellus Foudr.**  
Mörswiese 7. 5. 05.
- L. niger Koch.**  
Seligenstadt einmal (Scr.).
- L. parvulus Payk.**  
Schönbusch unter Moos 11. 3. 24. Stockstadter Wald 1 St. 12. 4. 24. Mäusberg  
28. 8. 20.

#### **Haltica F.**

- H. brevicollis Foudr.**  
Godelsberg auf Haseln 5. 5. 07, 3 St. 15. 5. 10, 4 St.
- H. quercetorum Foudr.**  
Nach Oe. häufig auf Eichen. Lindig auf Eichen 13. 7. 04, 1 St.



**H. saliceti** Weise.

Striet auf Weiden 5. 1879 (Fl.).

**H. lythri** Aubé.

Gailbachtal 3. 05. Sumpfwiesen hinter Damm 16. 6. 24. Mörswiese 12. 5. 25. Kahl Moore 6. 9. 33, 11. 04. Stockstadt a. M. Gersprenzufer an *Epilobium hirsutum* 17. 9. 05, 5 St. 6. 6. 42, 5. 9. 40. Bei Kleinostheim auf *Oenothera biennis* 2 St. 1. 7. 06. Am Röderbach 6. 6. 42, 1 St. 5. 9. 40.

**H. oleracea** L.

Häufig auf *Oenothera biennis* und *Epilobium angustifolium* IV — VIII X XI.

**H. pusilla** Duft.

Stockstadter Wald am Gersprenzufer 8. 7. 05. Kahltal 21. 9. 24, 2 St.

**Hermaeophaga** Foudr.

**H. mercurialis** F.

Einige Stücke auf einer Waldwiese im Obernauer Wald 5. 1895 (Fr.). Die Art dürfte auch bei Hain i. Sp. Seebachtal vorkommen, wo *Mercurialis perennis* L. zu finden ist, an dem das Tier lebt.

**Batophila** Foudr.

**B. rubi** Payk.

Schmerlenbacher Wald 13. 5. 06, 1 St. Gailbachtal. Glattbacher Wald.

**Lythraia** Bedel.

**L. salicaria** Payk.

Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg (D.). Schönbusch am See 4. 10. 04. Kahl Moore 28. 11. 24, 8 St.

**Ochrosis** Foudr.

**O. ventralis** Illig.

Schmerlenbacher Wald 20. 2. 05, 1 St. Gailbachtal 28. 2. 26. Krainberg 9. 8. 25, 1 St. Sodener Wald 4. 12. 04, 1 St.

**Crepidodera** Dej.

**C. transversa** Marsh.

Häufig am Rand von Gewässern und auf feuchten Wiesen. VII u. VIII.

**C. ferruginea** Scop.

Wie die Vorige häufig am Rand von Gewässern.

**C. femorata** Gyll.

Hain i. Sp. Seebachtal 21. 3. 37, 19. 4. 22. Pollaschgrund 11. 5. 24. Heigenbrücken 17. 7. 27. Heinrichstal i. Sp. 26. 8. 31.

**C. nigrifula** Gyll.

Gailbachtal unter Laub 17. 1. 43, 2 St. Wachenbachtal 3. 3. 29. Kahl Moore 23. 9. 26, 22. 10. 20, 16. 11. 04. Mäusberg 7. 9. 35. Hain i. Sp. 8. 12. 27. Großostheim 20. 10. 35.

**Derocephala** Weise.

**D. rufipes** L.

Karlstadt am Steig unter Moos 25. 4. 26. Mäusberg 14. 5. 21. 7. 1919 auf *Genista tinctoria*. Haibach auf blühendem Apfelbaum 13. 5. 06. Ellerwald aus Moos gesiebt 19. 5. 46. Krainberg 7. 6. 25, 5. 7. 25. Kalmut 22. 6. 25. Oberbessenbach 4. 7. 43, 1 St.

## **Hippuriphila Foudr.**

### **H. Modeeri L.**

Auf Sumpfwiesen auf Equisetum. Kahl Moore 13. 11. 04, 21 St. Steinbachtal 1. 11. 05. Oe. gibt die Art noch als selten an.

## **Chalcoides Foudr.**

### **C. aurea Geoffr.**

An Populus tremula und nigra nicht selten. Büchelberg 27. 4. 08. Wendelberg 24. 5. 37. Dornauer Graben 20. 6. 37. Schönbusch 9. 04.

#### ab. *cyanea* Marsh.

Aschaffenburg 4 St. Dornauer Graben 20. 6. 37, 26. 6. 39 je 1 St.

### **C. fulvicornis F. (= helxines Weise.)**

Häufig auf Weiden. Kahl 7. 2. 26. Mainufer 22. 9. 06. Fasanerie unter Moos an alten Bäumen 5. 11. 23.

### **C. aurata Marsh.**

Am Röderbach auf blühenden Weiden 24. 4. 40, 2 St. 24. 6. 43. Büchelberg 11. 8. 20

#### ab. *pulchella* Steph.

Wendelberg 1. 1. 36. Kleinostheim auf Weiden 7. 5. 37. Eisenbach 24. 6. 35. Lindigwiesen 23. 7. 04. Schönbusch 14. 7. 42. Mainufer.

### **C. Plutus Latr.**

Schönbusch 16. 2. 05, 10. 3. 24 (t. Heikertinger). 14. 4. 06.

### **C. lamina Bedel.**

Findberg 14. 5. 44. Kalmut 20. 6. 25.

### **C. nitidula L.**

Aschaffenburg 1 St. Rothenbuch i. Sp. 11. 4. 37, 1 St.

## **Epithrix Foudr.**

### **E. atropae Foudr.**

Aschaffenburg (D. N.).

### **E. pubescens Koch.**

Auf Solanum dulcamare. Schönbusch unter Moos an alten Eichen 26. 1. 24, 2 St. Mainufer 7. 5. 05, 2 St. 25. 6. 24, 2 St. 28. 10. 04, 2 St. Stockstadter Wald 10. 6. 24. Kahl 13. 10. 04.

## **Podagrica Foudr.**

### **P. fuscicornis L.**

Auf Malven nicht selten. VI VII VIII. Am Apfelberg 3. 6. 35. Beim Bahnwärterhaus am Unterlauf des Steinbachs auf Malve neglecta mehrfach 7. 8. 25. Kalmut 16. 8. 26.

## **Mantura Steph.**

### **M. chrysanthemi Koch.**

Aschaffenburg selten (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Hinter dem Haibacher Kreuz 22. 6. 24. Kahl 16. 10. 04.

### **M. obtusata Gyll.**

Aschaffenburg Mainufer 7. 6. 90, 14 St. Kahlthal 21. 9. 24, 1 St.

### **M. rustica L.**

Schmerlenbacher Wald 20. 2. 05. Sandgrube bei Großostheim 19. 3. 29. Hinter Damm 16. 6. 24. Erbig 28. 11. 26.

ab. suturalis Weise.  
Hinter Damm 16. 6. 24, 1 St. auf einem Weizenfeld.

### **C h a e t o c n e m a Steph.**

- C. semicoerulea Koch.**  
Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.).
- C. concinna Marsh.**  
Häufig an Polygamum und Rumex. Sumpfwiese hinter Damm 4. 1894 (Fr.).
- C. aridula Gyll.**  
Karlstadt 6. 3. 27, 2 St. Kahl 14. 4. 11, 3 St. Schönbusch 1. 7. 24. Hinter Damm 11. 10. 24. Stockstadter Wald 21. 11. 25, 3 St.
- C. confusa Boh.**  
Stockstadter Wald an feuchten Stellen (Nach Bedel an Juncus) 17. 4. 26, 1 St. (t. Heikertinger).
- C. Mannerheimi Gyll.**  
Aschaffenburg Mainufer auf der Mörsiwiese 7. 5. 05, 10 St. Gersprenzweiden 17. 9. 05, 2 St.
- C. arida Foudr.**  
Auf feuchten Wiesen. Kahl 14. 4. 11, 20. 10. 04. Kleinostheim 30. 8. 04. Mainufer.
- C. subcoerulea Kutsch.**  
Stockstadt a. M. Gersprenzweiden 17. 9. 05, 1 St. Kahl 1. 10. 24, 8 St. (t. Heikertinger).
- C. hortensis Geoffr. (= aridella Payk.)**  
Sehr häufig auf Grasplätzen.
- C. Sahlbergi Gyll.**  
Seligenstadt einzeln (Scr.). Kahl 5. 4. 32, 3. 11. 06, 2 St. Spessart 14. 4. 22, 1 St. Kahlthal 21. 11. 24, 1 St.

### **S p h a e r o d e r m a Steph.**

- S. testaceum F.**  
Seligenstadt (Scr.). Am Röderbach auf Cirsium oleraceum 6. 7. 40. Kahlthal 12. 7. 25. Kahl Moore 1. 10. 35.
- S. rubidum Graélls.**  
Retzbach 16. 6. 35. Büchelberg 17. 7. 35, 1 St.

### **A p t e r o p o d a Chevr.**

- A. globosa Illig.**  
Kahl Moore 20. 4. 27, 2 St. Schmerlenbacher Wald 19. 9. 26.
- A. orbiculata Marsh.**  
Aschaffenburg und Seligenstadt (Scr.). Schönbusch 10. 3. 36, 2. 6. 42. Gailbachtal 3. 3. 05. Striet 8. 12. 35. Kahl Moore 22. 9. 47.

### **M n i o p h i l a Steph.**

- M. muscorum Koch.**  
Aschaffenburg (Oe.). Mainhecken im Moos 28. 4. 26.

## **Dibolia Latr.**

### **D. femoralis Redt.**

Aschaffenburg (D. N.). Auf *Salvia pratensis* Rtrr.

### **D. depressiuscula Letzn.**

Kahl 15. 5. 04, 1 St. Mainufer am kl. Exerzierplatz 14. 10. 04. Schmerlenbacher Wald 30. 10. 04, 1 St.

### **D. rugulosa Redt.**

Kalmut 24. 6. 25, 10 St. Krainberg 7. 6. 25, 2 St. 5. 7. 25, 4 St.

### **D. Cynoglossi Koch.**

Seligenstadt einmal (Scr.).

### **D. occultans Koch.**

Haibacher Höhe unter Apfelbaumrinde 19. 2. 40, 1 St. (t. Heikertinger).

## **Psylliodes Latr.**

### **P. affinis Payk.**

Aschaffenburg häufig (Oe.). Erbig 11. 1. 48, 28. 11. 26 gesiebt. Haibach unter Kartoffelkraut 17. 12. 05, 4 St.

### **P. luteola Müll.**

Seligenstadt (Scr.).

### **P. picina Marsh.**

Seligenstadt einzeln (Scr.).

### **P. attenuata Koch.**

Nach v. Heyden bei Frankfurt a. M. an Hopfen.

### **P. chrysocephala L.**

Von Oe. in Aschaffenburg als sehr selten angegeben. Büchelberg 30. 6. 25, 3 St. 23. 8. 25, 1 St. Schmerlenbacher Wald 1. 7. 27, 1 St. Kahl 17. 8. 25, 3 St. Hain i. Sp. 3. 8. 24, 1 St. Mäusberg 28. 8. 20.

### **v. collaris Weise (= *Cyanoptera* Illig.)**

Aschaffenburg (D. N.).

### **P. napi F.**

Bei Seligenstadt einmal (Scr.). Schönbusch 10. 3. 36, 2 St. Mainufer bei Nilkheim 22. 9. 04, 1 St. Kahl 1 St.

### **P. cuprea Koch.**

Karlstadt am Steig 25. 4. 26, 1 St. Kalmut 20. 6. 25, 28. 6. 25. Krainberg 9. 8. 25, 1 St.

### **P. hyoscyami L.**

Nach v. Heyden bei Wilhelmsbad.

### **P. chalconera Illig.**

Kahl 10. 4. 08. Kalmut 23. 6. 05, 2 St. 19. 8. 26, 1 St. Retzbach 30. 7. 33, 1 St. Schönbusch Herbst 1904, 1 St.

### **Ps. dulcamare Koch.**

Aschaffenburg auf *Solanum dulcamare* VIII (D.). Überall nicht selten. Stockstadter Wald am Gersprenzufer. Mainufer. Kahl.

# Hispinæ

## HisPELLa Chap.

### H. atra L.

Auf Grasplätzen nicht selten IV V VI IX XI.

# Cassidinae

## Hypocassida Weise.

### H. subferruginea Schrk.

Karlstadt 28. 2. 26, 3 St. Haibacher Höhe 22. 4. 08. Schmerlenbacher Wald. Lohr Beilstein 18. 6. 22.

## Cassida L.

### C. viridis L.

Häufig auf Mentha. V u. VIII.

### C. hemisphaerica Hbst.

Einzeln bei Aschaffenburg (D. N.). Seligenstadt (Scr.). Kalbenstein 28. 2. 26. Büchelberg 5. 5. 12. Hinter Damm 18. 7. 25. Kahl 17. 10. 04.

### C. canaliculata Laich.

Aschaffenburg (D. N.).

### C. Murraea L.

Aschaffenburg (D.). Seligenstadt (Scr.). Retzbach Benediktushöhe mehrfach 8. 9. 46 (J. S.).

### C. nebulosa L.

Häufig auf Chenopodium-Arten. Nach Reitter manchmal Schädling an Runkelrüben. Hinter Damm 18. 7. 25. Wendelberg 17. 7. 30. Findberg 10. 11. 40.

### C. flaveola Thnbg.

Stockstadter Wald Gersprenzufer 31. 5. 04, 3 St. Mainufer 11. 9. 05. Kahl Moore 1. 10. 24, 3 St.

### C. vibex L.

Aschaffenburg (D. N.). Striet 16. 7. 50. Großkrotzenburger Moore 22. 7. 23.

### C. Panzeri Weise.

Karlstadt 9. 1. 33, 1 St. (Noll). Obersailauf i. Sp. 1. 6. 30, 1 St. Mainufer 1 St.

### C. ferruginea Goeze.

Aschaffenburg (Oe.).

### C. rubiginosa Müll.

Aschaffenburg nicht selten (D. N.). Dornauer Graben 9. 2. 36. Wendelberg 6. 3. 48. Großkrotzenburger Moore 22. 7. 23 (Ochs). 8. 9. 38 (S.). Kahl Moore 8. 9. 35, 1. 10. 24.

### C. stigmatica Suffr.

Aschaffenburg 5. 24, 3 St. Hinter Damm 29. 6. 24, 1 St.

### C. sanguinosa Suffr.

Aschaffenburg selten (D. N.). Sandgrube bei Mainaschaff 30. 7. 50.

**C. denticollis Kahl.**

Aschaffenburg 1 St. (D.). Striet 19. 4. 22, 1 St. Am Röderbach 25. 8. 41. Rohrbrunn 5. 10. 49.

**C. sanguinolenta Müll.**

Fasanerie (Fr.). Kahl (S.). Feldkahler Höhe 3. 3. 48 (J. S.). Mainufer 20. 3. 37. Stockstadter Wald schwärmend Ende 3. 24. Bahndamm bei Nilkheim 5. 8. 30.

**C. prasina Illig. (= chloris Suffr.)**

Seligenstadt (Scr.). Kahl Moore 17. 8. 25.

**C. subreticulata Suffr. (= splendidula Sufr.)**

Aschaffenburg (Oe.).

**C. margaritacea Schall.**

Aschaffenburg (D. N.). Kalbenstein 28. 2. 26. Stockstadter Wald 10. 3. 29. Bischberg 25. 8. 07. Mainufer im Genist 2. 1. 26.

**C. nobilis L.**

Karlstadt 16. 3. 44. Am Guten Mann 4. 1894 (Fr.). Schönbusch 3. 4. 48. Häufig auf Wiesen außerhalb der Fasanerie 5. 1893 (Fr.). Am Röderbach 23. 6. 42. Mainufer. Kahl 6. 9. 05.

**C. vittata Vill.**

Mainufer 11. 9. 05. Kahl Moorränder 28. 11. 24. Stockstadter Wald 8. 12. 35.

## Bruchinae

### Spermophagus Schön.

**S. sericeus Geoffr. (= cisti Ol.)**

Einzeln bei Seligenstadt (Scr.). An Crataegus-Blüten (Fr.). Bahndamm gegenüber Nilkheim an Potentilla verna mehrfach 12. 4. 30.

### Bruchus L.

**B. atomarius L. (= granarius L.)**

Bei Glattbach 14. 4. 08. Aschaffenburg. Gailbachtal 23. 5. 26. Striet 15. 5. 24. Krainberg 7. 6. 25. Mäusberg 7. 19, 13. 11. 32.

**B. rufimanus Boh.**

Aschaffenburg (D. N.). Weikertswiese bei Rechtenbach i. Sp. 13. 6. 26. Hanau 1908 (M.).

**B. affinis Fröl.**

Auf dem Ammersfeld bei Aschfeld 21. 4. 47 (J. S.).

**B. pisorum L.**

Erbsenschädling. V u. VI. häufig.

**B. luteicornis Illig.**

Aschaffenburg und Seligenstadt (Scr.). Gartenberg unter Moos 2 St. 8. 2. 25. Schönbusch 17. 5. 22, 4 St. Fasanerie unter Moos 8. 12. 23, 1 St. Hinter Damm 18. 7. 25.

### Bruchidius Schilsky.

**B. marginalis F.**

Stockstadter Wald an Astralagusglycyphyllus 1. 7. 06, 1 St. Mäusberg 7. 19, 7. 9. 25.

**B. unicolor Oliv.** (= *olivaceus Germ.*) (= *cisti auct.*)  
Aschaffenburg (D.). Seligenstadt (Scr.). Kalmut 28. 7. 35, 3 St.

**B. nanus Germ.**  
Kalmut 28. 6. 25.

**B. fasciatus Oliv.** (= *cisti Payk.*)  
Aschaffenburg (D. N.). Wendelberg 6. 3. 48. Stockstadter Wald auf Sarothamnus  
9. 9. 07.

#### **Acanthoscelides Schilsky.**

**A. obtectus Say.** (= *obsoletus Say.*)  
Aschaffenburg. Damm in Bohnen 25. 7. 47. Im Haus mehrfach 16. 10. 46.

## **Urodoninae**

### **Urodon Schönh.**

**U. suturalis F.**  
Kalmut auf Reseda lutea 14. 6. 25, 6 St. Retzbach 16. 6. 35, 2 St.

**U. rufipes Oliv.**  
Wendelberg 29. 6. 35, 1 St. Kalmut 14. und 28. 6. 25, 3 St. 11. 8. 21, 1 St. Retzbach  
Benediktushöhe auf Reseda lutea 4. 7. 35, 1 St.

## **Rhynchophora**

### **Anthribidae**

#### **Anthribinae**

##### **Platyrrhinus Clairv.**

**P. resinosus Scop.**  
Schmerlenbacher Wald selten (Oe.). Hain i. Sp. Seebachtal 17. 5. 28, 1 St. 3. 6. 28,  
1 St. Karlstadt Haag an einem alten Eichenstrunk 12. 6. 38. Waldaschaff an alten  
Buchenstöcken 8. 7. 28.

##### **Tropideres Schönh.**

**T. albirostris Hbst.**  
Seligenstadt einzeln (Scr.). Schönbusch Oekonomieplatz 8. 6. 37 (Noll). 29. 11. 46,  
1 St. gesiebt aus Laub (J. S.). Striet Birkenallee 9. 11. 35. Hain i. Sp. Pollasch-  
grund unter Birkenrinde 19. 10. 46, 3 St. (J. S.).

**T. sepicola F.**  
Seligenstadt (Scr.).

##### **Rhaphitropis Rtrr.**

**R. marchicus Hbst.**  
Aschaffenburg 7 St. Wendelberg 29. 6. 35. Bei Schweinheim an Apfelbaum 21.  
6. 02.

##### **Dissoleucas Jord.**

**D. niveirostris F.**  
Aschaffenburg (D.). Schönbusch 18. 6. 31, 1 St. (Noll). Mäusberg 20. 6. 03. Krain-  
berg 14. 5. 31. Karlstadt Haag 12. 6. 38. Mainufer an Weiden 11. 7. 08. Stockstadter  
Wald 16. 9. 28.

# Curculionidae

## Rhynchitinae

### *Nemonyx* Redt.

#### *N. lepturoides* F.

Lößhügel hinter Damm an den Blüten des Rittersporns in Kornäckern mehrfach  
16. 6. 24, 29. 6. 24.

### *Rhinomacer* F.

#### *R. attelaboides* F.

Auf blühenden Kiefern im Ellerwald und in der Striet 22. 4. 27, 14. 5. u. 18. 5. 32  
mehrfach. Schönbusch 2. 6. 42. 10. 5. 26. Büchelberg 13. 5. 06. Sodentaler Wald  
21. 5. 11, 2 St.

### *Diodyrhynchus* Schönherr.

#### *D. austriacus* Oliv.

Aschaffenburg auf Kiefern IV. u. V. Mainbrücke fliegend 11. 4. 06. Stockstadter  
Wald 27. 4. 30. Kahl 20. 4. 27, 2 St. Schönbusch 10. 5. 35.

### *Lasiorrhynchites* Jek.

### (*Coccigorrhynchites* Prell.)

#### *L. sericeus* Hbst.

Aschaffenburg (D. N.). Striet auf Eichen 5. 5. 12, 14. 6. 26, 3 St. Glattbacher Wald  
3. 6. 04. Mäusberg 29. 6. 30.

#### *L. cavifrons* Gyll.

Volkenberg bei Erlabrunn auf Eiche 25. 6. 44 (J. S.). Ruine Homburg 21. 6. 42  
(J. S.). Schmerlenbacher Wald 19. 5. 06. Wiesenfeld 7. 19. Schönbusch 5. 8. 28.

#### *L. olivaceus* Gyll.

Kahl Moore auf Ohrweide 20. 4. 27, 2 St. Schmerlenbacher Wald 3. 5. 08, 11. 5. 06.  
Godelsberg auf Haseln 5. 5. 07, 3 St. Striet 4. u. 29. 5. 19. Karlstadt 16. 5. 29.  
Schönbusch 14. 6. 29.

#### *L. coeruleocephalus* Schall.

Aschaffenburg (D. N.). Gailbachtal auf Birken 19. 6. 31, 1 St. Stockstadter Wald  
23. 6. 26, 1 St. Striet 19. 6. 25, 14. 6. 26, 22. 6. 28, 5 St. 16. 6. 34, 1 St. Büchelberg  
17. 7. 28. Kahl Moore 25. 8. 37, 1 St.

### *Coenorrhinus* Seidl.

#### *C. nanus* Payk.

Aschaffenburg (D. N.). Häufig auf Birken und Weiden. Gailbachtal 23. 5. 26.  
Striet 14. 6. 26.

#### *C. tomentosus* Gyll.

Gailbachtal 23. 5. 26, 7 St. Hain i. Sp. 27. 5. 28, 1 St. Stockstadter Wald 31. 5. 04.  
Mainufer. Kahl Moore 17. 8. 25.

#### *C. germanicus* Hbst.

Karlstadt Steig 19. 3. 26. Rückersbacher Schlucht auf Schlehen 2. 4. 26. Gailbach-  
tal 23. 5. 26. Krainberg 13. 5. 26, 3 St. auf Schlehen. Fasanerie 2. 6. 39. Striet  
14. 6. 26, 12. 7. 26. Wendelberg 29. 6. 35. Weiler i. Sp. 6. 6. 26.



**C. aeneovirens Marsh.**

Aschaffenburg (D. N.). Nicht selten auf Laubhölzern III IV V

**C. interpunctatus Steph.**

Mäusberg 20. 4. 27, 1 St.

**C. pauxillus Germ.**

Häufig auf Schlehen, Weißdorn, Apfel- und Birnbäumen.

**C. aequatus L.**

Aschaffenburg auf Schlehen und Weißdorn (D. N.) IV u. V.

**R h y n c h i t e s Schneid.**

**R. pubescens F. (= parellinus Gyll.)**

Aschaffenburg (D. N.). Auf *Thalictrum minus*. Kalbenstein 8. 5. 37. Krainberg 24. 5. 31. Retzbach Benediktushöhe mehrfach 4. 6. 33.

**R. coeruleus Deg.**

Aschaffenburg (D.). Seligenstadt (Scr.). Großostheim im Moos eines Apfelbaumes überwintert 1. 2. 31. Karlstadt 16. 3. 41. Büchelberg auf Buche 25. 4. 06. Hinter Damm auf Weißdorn 8. 4. 06, auf Weiden 19. 7. 16. Bischberg 25. 8. 07. Stockstadter Wald 9. 9. 07. In Baummoos 8. 12. 23.

**R. cupreus L.**

Nicht selten auf *Prunus*-Arten VI — IX. Büchelberg auf *Sorbus aucuparia* häufig 19. 9. 26.

**R. aethiops Bach.**

Auf *Helianthemum vulgare*. Krainberg 22. 6. 30, 11. 7. 28. Karlstadt 30. 6. 29. Retzbach Benediktushöhe 30. 7. 33. Thüngersheim 23. 6. 33. Mäusberg 3. 9. 33.

**R. (Rhynchites s. str.) auratus Scop.**

Waldaschaff 29. 4. 26. Karlstadt 25. 4. 26. Ruine Homburg auf Schlehen 2. 5. 26. Krainberg 17. 5. 26. Retzbach Benediktushöhe 10. 7. 35. Mäusberg 7. 19.

**R. Bacchus L.**

Häufig und schädlich an Apfelbäumen. I II III IV X — XII.

**B y c t i s c u s Thomson.**

**B. betulae L.**

Auf Weinlaub schädlich, ferner auf Haseln, Birken, Erlen und Espen.

**B. populi L.**

Auf Espen häufig.

**C h o n o s t r o p h u s Prell.**

**C. tristis F.**

Glattbacher Wald auf Buchen 14. 4. 06, 2 St. Schmerlenbacher Wald 13. 5. 06, 1 St.

**D e p o r u s Mannh.**

**D. Mannerheimi Hummel (= megacephalus Germ.)**

Aschaffenburg (Oe.).

**D. betulae L.**

Häufig auf Birken und Erlen.

## Attelabinae

### Attelabus L.

#### **A. nitens Scop. (= curculionides L.)**

Aschaffenburg auf Eichengebüsch nicht selten.

## Apoderinae

### Apoderus Oliv.

#### **A. coryli L.**

Auf Haseln nicht selten.

## Apioninae

### Apion Hbst.

#### **A. (Pseudoperapion Wagn.) brevirostre Hbst.**

Aschaffenburg (D. N.) auf *Hypericum perforatum* 17. 9. 05. Kahl. Kleinostheim beim Bahnhof 2. 9. 06.

#### **A. (Perapion Wagn.) violaceum Kirby.**

Häufig auf Wiesen.

#### **A. (P.) marchicum Hbst.**

Büchelberg 20. 6. 25. Stockstadter Wald 1. 6. 06, 3 St. Lohr Romberg 10. 10. 53 (St.).

#### **A. (P.) affine Kirby.**

Stockstadter Wald 2. 1. 27. Kahl an *Rumex acetosa* 10. 04, 8 St. 26. 11. 24, 4 St.

#### **A. (P.) sedi Germ.**

Aschaffenburg (D. N.). Karlstadt 10. 3. 26, 6. 5. 27. Wendelberg 25. 10. 25, 10. 11. 26 je 1 St. Kleinostheim auf *Sedum reflexum*.

#### **A. (P.) curtirostre Germ.**

Striet 17. 7. 26, 6. 11. 06. Gersprenzuffer bei Stockstadt a. M. 8. 7. 05. Kahl 18. 9. 06, 1. 10. 24.

#### **A. (Pseudostenapion Wagn.) simum Germ.**

Aschaffenburg (D. N.). Wendelberg 26. 5. 26. Godelsberg 6. 10. 05. Waldaschaff 7. 10. 28.

#### **A. (Phrissostrictum Schy.) rugicolle Germ.**

Krainberg 26. 9. 26, 3 St. (t. H. Wagner).

#### **A. (Pseudapion Schy.) malvae F.**

Aschaffenburg (D.). Babenhausen (Scr.). Kleinostheim Bahnwärterhaus am Unterlauf des Steinbachs 7. 8. 25.

#### **A. (P.) rufirostre F.**

Aschaffenburg (D. N.). Auf *Malva rotundifolia* Godelsberg 6. 3. 05. Lindigwiesen 7. 7. 04.

#### **A. (Aspidapion Schy.) aeneum F.**

Aschaffenburg 6. 1894 (Fr.). Schönbusch auf Malven im Garten 27. 8. 26, 2 St.

- A. (A.) radiolus Kirby.**  
Aschaffenburg auf Malven häufig. Mainufer 7. 8. 26. Kahl 9. 10. 04.
- A. (Exapion Bedel) compactum Desbr.**  
Findberg 2. 5. 43, 1 St. (J. S.). Stockstadter Wald 16. 5. 48. Obernau in einem alten Sandsteinbruch unter Laub 6. 11. 38, 1 St. (t. H. Wagner).
- A. (E.) genistae Kirby.**  
Aschaffenburg (D. N. u. Scr.).
- A. (E.). Formaneki Wagn. (= hungaricum Wagner)**  
Aschaffenburg 11. 7. 1885 (Fl.). Wiesenfeld 7. 19. Krainberg 19. 7. 25. Bahnhof Kleinostheim 2. 9. 06, 8 St.
- A. (E.) difficile Hbst.**  
Aschaffenburg nicht selten (Oe. u. D. N.). Karlstadt auf dem Haag 25. 3. 48. Kalmut 14. 6. 25. Krainberg 20. 6. 43. Mäusberg auf Genista tinctoria 7. 19, 8. 20.
- A. (E.) fuscirostre F.**  
Aschaffenburg (D. N.). Wendelberg 6. 5. 38. Schönbusch auf Sarothamnus 25. 5. 26. Striet 19. 6. 26. Bei Stockstadt a. M. 9. 9. 07.
- A. (Erythrapion Schy.) miniatum Germ.**  
Aschaffenburg nicht selten (D. N.). Auf feuchten Wiesen IV V IX u. X.
- A. (E.) frumentarium F.**  
Aschaffenburg 4. u. 5. 1893 (Fr.). Wendelberg 29. 7. 25, 25. 8. 07. Seligenstadt (Scr.) transitus ad. pseudocruentatum Wagner  
Aschaffenburg Schönbusch 6. 2. 17. Steinbachtal 7. 8. 25. Kahlthal 21. 9. 24. Kahl 1. 10. 24. Lohr Romberg 9. 8. 53 (t. H. Wagner).
- A. (E.) sanguineum Deg.**  
Aschaffenburg (D. u. S.). Krainberg 3. 6. 25 (t. H. Wagner).
- A. (E.) rubens Steph.**  
Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg (D.). Gailbachtal 25. 8. 04. Stockstadter Wald 19. 9. 05.
- A. (Melanapion Wagner) minimum Hbst.**  
Aschaffenburg (D. N. u. Fl.). Häufig auf Salweiden. Godelsberg auf blühenden Schlehen 4. 11. Kahl 17. 8. 25. Sodener Wald 4. 10. 08.
- A. (Taenapion Wagner) urticarium Hbst.**  
Aschaffenburg 6. 4. 05. Häufig am Fuß des Godelsbergs (Oe. u. S.).
- A. (Squamapion Wagner) elongatum Germ.**  
Aschaffenburg Mörsweise 17. 8. 1884, 1 St. Schönbusch am oberen See 30. 8. 04.
- A. (S.) flavimanum Gyll.**  
Lößwände hinter Damm 11. 10. 24, 1 St.
- A. (S.). vicinum Kirby.**  
Seligenstadt selten (Scr.). Aschaffenburg 15. 4. 05, 3 St. Kahl Moore auf Schlehen 20. 4. 07. Am Lindigwald 23. 9. 48, 1 St.
- A. (S.). atomarium Kirby.**  
Aschaffenburg (D. N.). Radheim 19. 3. 27. Kleinostheim am Bahnhof 2. 9. 06. Kahl 9. 05, 1. 10. 05. Karlstadt.

- A. (Catapion Schy.) seniculum Kirby.**  
Stockstadter Wald 22. 1. 27. Büchelberg 17. 3. 26, 26. 8. 25. Sumpfwiesen hinter Damm 4. 1890 (Fr.).
- A. (C.) pubescens Kirby.**  
Aschaffenburg. Stockstadter Wald 2. 1. 27. Schönbusch 6. 2. 27, 20. 7. 24, 17. 9. 07. Steinbachtal 5. 11. 05.
- A. (Diplapion Rtrr.) confluens Kirby.**  
Aschaffenburg Schönbusch 1. 7. u. 21. 8. 25 (t. Wagner). Stengerts 27. 8. 25. Schmerlenbacher Wald.
- A. (D.) stolidum Germ.**  
Stengerts 27. 8. 25.
- A. (Taphrotopium Rtrr.) sulcifrons Hbst.**  
Aschaffenburg sehr selten (D.).
- A. (Ceratapion Schylks.) onopordi Kirby.**  
Stockstadter Wald 1. 1. 27. Dammer Sumpfwiese 4. 1894 (Fr.). Krainberg 13. 6. 26. Schönbusch auf Carduusacanthoides 1. 7. 24. Kalmut 19. 8. 26.
- A. (C.) penetrans Germ.**  
Fasanerie auf Centaurea jacea VII. (Fl.).  
ab. Gaullei Wenk.  
Aschaffenburg Fahrbachtal 11. 8. 28, 2 St.
- A. (C.) carduorum Kirby.**  
Kalmut 22. 6. 25, 16. 8. 25. Schönbusch auf Carduus acanthoides. Hinter Damm 18. 7. 25. Krainberg 9. 6. 25.
- A. (Omphalapion Schy.) laevigatum Payk.**  
Aschaffenburg am Westrand des Godelsberges in Grasbüscheln am Fuß von Robinien überwintert 3. 1879 (S.).
- A. (O.) Buddelbergi Bedel.**  
Kalmut 19. 8. 26.
- A. (O.) dispar Germ.**  
Aschaffenburg Schönbusch 1. 7. 24 (S.).
- A. (O.) Hockeri Kirby.**  
Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg (S.). Kalmut 19. 8. 26 (S.).
- A. (Synapion Schy.) ebeninum Kirby.**  
Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg (D. N.). Mörswiese 24. 5. 05, 1 St. Striet 12. 6. 26, 24. 8. 28. Kahl Moore 8. 10. 26. Karlstadt 13. 10. 29. Stockstadt am Gersprenz- ufer 8. 11. 26.
- A. (Leptapion Wagn.) meliloti Kirby.**  
Karlstadt 28. 3. 26. Am Röderbach auf Wiesen 6. 7. 40. Krainberg 25. 8. 29. Stockstadter Wald 17. 9. 05.
- A. (L.) loti Kirby.**  
Stockstadter Wald 2. 1. 27, 13. 2. 27. Hinter Damm 18. 7. 25. Kahl 9. und 11. 05.
- A. (L.) intermedium Epp.**  
Kalmut 26. 6. 25, 3 St. (t. H. Wagner).

- A. (L.) tenue Kirby.**  
Aschaffenburg nicht häufig (D. N.). Unter Laub 27. 2. 1887. Karlstadt a. M. 28. 3. 26. Mörsweise 24. 5. 05. Kalmut 28. 6. 25. Schönbusch 27. 7. 24. Mainwiese bei Nilkheim 22. 9. 05, 4 St.
- A. (Pirapion Rtrr.) striatum Kirby.**  
Aschaffenburg (D. N.).
- A. (P.) immune Kirby.**  
Büchelberg 12. 5. 04. Hain i. Sp. 29. 6. 26. Wendelberg 10. 7. 13. Stockstadter Wald 9. 9. 07.
- A. (Coelorhinapion Wagn.) platalea Germ.**  
Mainufer 14. 4. 26. Striet 19. 6. 24, 29. 9. 25. Hinter Damm 23. 7. 25. Schmerlenbacher Wald 19. 8. 08, 4 St.
- A. (C.) Gyllenhali Kirby.**  
Aschaffenburg (Oe. u. Fl.). Schmerlenbacher Wald 1 St.
- A. (Apion s. str. Wagner) pisi F.**  
Aschaffenburg 27. 3. 22. Schönbusch 1. 5. 37, 10. 7. 24. Krainberg 17. 5. 25. Mäusberg 25. 6. 28.
- A. aethiops Hbst.**  
Aschaffenburg (D. N.). Mainbrücke Ende 3. 16. Godelsberg 6. 5. 05. Schönbusch 10. 7. 24. Striet 6. 11. 05.
- A. (Cynapion Wagner) columbinum Germ.**  
Bei Seligenstadt 1 St. (Scr.). Aschaffenburg (Fl. u. S.). Krainberg 17. 5. 25. Mäusberg auf Lathyrus 7. 10, 2 St.
- A. (C.) Spencei Kirby.**  
Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg (D.). Stockstadter Wald 2. 1. 27, 1 St.
- A. (Pseudotrichapion Wagner) punctigerum Payk.**  
Aschaffenburg Gailbachtal 17. 1. 43, 14. 4. 26. Godelsberg 6. 5. 05. Findberg 10. 11. 40.
- A. (Metatrichapion Wagner.) reflexum Gyll.**  
Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg (D. N.). Kalmut 24. 6. 25. Am Lauterhof 20. 7. 24.
- A. (M.) Curtisi Steph.**  
Mainwiesen 24. 5. 05.
- A. (M.) lanigerum Germ.**  
Krainberg 19. 3. 26, 17. 5. 25. Kalmut 28. 6. 25.
- A. (M.) pavidum Germ.**  
Aschaffenburg (D. N.). Sandgrube bei der Lumpenmühle 6. 3. 27, 19. 7. 43. Krainberg 17. 5. 25. Kalmut 14. 6. 25, 7 St.
- A. (Cnemapion Schy.) vorax Hbst.**  
Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg (D. N.).
- A. (Holotrichapion Wagner) ononis Kirby.**  
Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg Striet 17. 2. 26. Hinter Damm 7. 6. 24. Mainwiesen.

- A. (Trichapion Schy.) simile Kirby.**  
Aschaffenburg Godelsberg 2. 9. 1891. Kahl 10. 04.
- A. (Eutrichapion Rtt.) viciae Payk.**  
Aschaffenburg (D. N.). 27. 3. 22. Mainwiesen 25. 6. 24. Gersprenzwiesen 8. 7. 05.  
Fasanerie 31. 8. 26.
- A. (E.) ervi Kirby.**  
Aschaffenburg nicht selten (D. N.). Schönbusch. Hinter Damm 29. 6. 24. Fasanerie  
10. 08. Kahl.
- A. (Neoxyatoma Bedel) cracca L.**  
Häufig. II IV VI — VIII.
- A. (N.) cerdo Gerst.**  
Aschaffenburg.  
transitus ad consanguineum Desbr.  
Aschaffenburg am Mainufer 5. 9. 05 (t. H. Wagner).  
ab. consanguineum Desbr.  
Mainufer 5. 9. 08 (t. H. Wagner).
- A. (N.) pomonae F.**  
Häufig und schädlich auf Obstbäumen. Entwicklung in den Samen der vicia  
sepium (n. H. Wagner). Schönbusch an Kirschblüten 5. 1894 (Fr.). An Lonicera  
Xylosteum 3. 5. 17. Hain i. Sp. 11. 5. 24.
- A. (N.) ochropus Germ.**  
Aschaffenburg am Guten Mann 5. 1894 (Fr.). 18. 7. 25, 18. 8. 12. Schmerlenbacher  
Wald 9 St.
- A. (Chlorapion Wagner) virens Hbst.**  
Aschaffenburg häufig auf Wiesen.
- A. (Pseudoprotapion Wagner) elegantulum Germ.**  
Bei Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg Gailbachtal. Krainberg 17. 5. 25. Kalmut  
14. 6. 25, 3 St. Mäusberg 8. 20, 3 St.
- A. (P.) astralagi Payk.**  
Aschaffenburg (D. N.). Auf Astralagus glycyphyllus L. im Stockstadter Wald (S.).
- A. (Protapion Schy.) flavipes Payk.**  
Aschaffenburg Fasaneriewiesen 6. 6. 40. Am Röderbach 6. 7. 40. Kahl 10. 04.  
Schönbusch 11. 23, 17. 12. 05 unter Moos an alten Eichen. Gailbachtal 10. 11. 40.
- A. (P.) nigritarse Kirby.**  
Aschaffenburg häufig (D. N.). Am Gartenberg 8. 2. 25. Steinbachtal 7. 5. 05,  
5. 11. 05. Schönbusch auf Melampyrum 10. 7. 24.
- A. (P.) filirostre Kirby.**  
Aschaffenburg (D.). 26. 1. 30. Erbig 3. 3. 10. Mörswiese 7. 5. 06. Krainberg 9. 7. 25.
- A. (P.) aestivum Germ.**  
ab. ruficrus Germ.  
Krainberg 19. 7. 25, 1 St. (t. H. Wagner).
- A. (P.) apricans Hbst.**  
Aschaffenburg Gartenberg 8. 2. 24. Schönbusch 27. 3. 47. Auf dem Ammersfeld

bei Aschfeld 21. 4. 47. Büchelberg Südrand 9. 6. 40. Kahl 10. 04. Rückersbacher Schlucht 23. 11. 40.

**A. (P.) varipes Germ.**

Aschaffenburg (D. N.). Schönbusch 27. 3. 22, 10. 7. 27. Glatzbacher Wald 24. 3. 05.

**A. (P.) assimile Kirby.**

Gersprenzwiesen bei Stockstadt a. M. 18. 4. 24. Kahl 10. 04, 3 St. Steinbachtal 5. 11. 05.

**A. (P.) onicola Bach.**

Seligenstadt einzeln (Scr.). Aschaffenburg (S.).

**A. (P.) dissimile Germ.**

Aschaffenburg 1 W. (S.). Entwicklung nach H. Wagner an *Trifolium arvense*. Copulation Anfang September. Nach dieser baldiges Absterben der M. Eiablage im folgenden Frühjahr (Coleopt. Centralblatt Heft 2 25. 5. 26.)

## Otiorrhynchinae

### Otiorrhynchus Germar.

**O. laevigatus F.**

Auf dem Kalbenstein bei Gambach a. M. unter Steinen 28. 2. 26, 1 St. Krainberg 24. 5. 31, 2 St. 27. 7. 46. Karbach 27. 8. 43. Karlstadt Haag unter Moos 14. 6. 43.

**O. raucus F.**

Nicht selten auf Laubhölzern. Am Aschaffufer unter Laub 16. 3. 46. Schmerlenbacher Wald auf Hecken 13. 5. 06, 8 St. Mäusberg 8. 20.

**O. porcatus Hbst.**

Nicht selten unter Steinen und Moos. IV. V. u. XI. Mainhecken 4. 11, 4 St. Reichenbach i. Sp. 11. 5. 19, 1 St.

**O. scaber L.**

Aschaffenburg sehr selten (Oe.). Hain i. Sp. 14. 4. 22 mehrfach.

**O. uncinatus Germ.**

Im Kalkgebiet bei Karlstadt nicht selten unter Moos. Kalbenstein 28. 2. 26, 10 St. Karlstadt am Steig unter Moos 17. 3. 29, 1 St. 25. 4. 26, 2 St.

**O. singularis L. (= picipes F.)**

Gemein und schädlich auf Laub- und Nadelbäumen.

**O. sulcatus F.**

Im Schloßgarten an Rosen von Apotheker Hock beobachtet (Fr.). In Gärten unter Steinen 15. 5. 36, 17. 9. 05 je 1 St. (S.). Obernau in einem alten Steinbruch 4. 7. 26, 1 St.

**O. (fullo) Schrk.)**

Dürfte nach Horion an den xerothermen Hängen des Maintals vorkommen.

**O. ovatus L.**

Häufig. Schädling an Waldkulturen. Fischerhecke 3. 1894. Fasanerie in Menge gekätschert 5. u. 6. 1894 (Fr.). Rothenbuch i. Sp. 21. 4. 40. Aschaffenburg Schönbusch auf *Lonicera* 31. 5. 37.

**O. ligustici L.**

Nicht selten, oft auf Wegen in der Nähe von Wiesen.

**Peritelus Germar.**

**P. hirticornis Hbst.**

Nicht selten auf Stauden und Laubhölzern. Büchelberg auf Kirschbaum 13. 5. 06.  
Hinter dem Haibacher Kreuz an Teucrium Scorodonia 22. 6. 24, 6 St.

**P. sphaeroides Germ.**

Auf Gebüsch häufig.

**Trachyploeus Germar.**

**T. alternans Gyll.**

Aschaffenburg (D.). Fahrachtal 12. 2. 28. Kalbenstein 28. 2. 26, 4 St. Karlstadt  
28. 3. 26. Mainhecken 23. 5. 05. Krainberg 21. 6. 32. Mäusberg 7. 9. 35, 2 St.

**T. scabriculus L.**

Mainufer 4. 11, 6 St. 8. 07. Stockstadter Wald 26. 7. 12. Sodener Wald 4. 10. 23.  
Sandgrube bei Sulzbach a. M. 6. 11. 28. Erbig 28. 11. 26.

**T. spinimanus Germ.**

Kalbenstein 18. 2. 26, 6 St. 3. 7. 25. Karlstadt 6. 3. 27, 3 St. Kalmut 28. 6. 25, 2 St.  
Lößwände hinter Damm 23. 7. 26, 1 St.

**T. bifoveolatus Beck. (= scaber L.)**

Sulzbach a. M. Sandgrube 14. 2. 26. Büchelberg 17. 3. 26. Karlstadt 6. 3. 27. Sand-  
grube bei Mainaschaff 29. 7. 25. 7. 10. 25. Kalmut 19. 8. 26. Stockstadt a. M.  
17. 9. 05. Gersprenzwiesen. Kahl Moore 17. 10. 04.

**T. aristatus Gyll.**

Seligenstadt (Scr.). Hinter Breunsberg 26. 2. 28, 1 St. Radheim 19. 3. 27. Kalben-  
stein 30. 8. 25, 2 St. Kahlthal 27. 9. 24. Mainhecken 28. 10. 04. Findberg 8. 11. 36, 1 St.:

**T. Oliveri Bedel (= spinosus Goeze.)**

Kalbenstein 28. 2. 26, 8 St. 5. 7. 25. Kalmut 19. 8. 26. Karlstadt 6. 3. 27, 16. 5. 29,  
27. 10. 29. Mainufer. Stockstadter Wald 20. 3. 27. Mäusberg 20. 9. 35.

**Mylacus Schönherr.**

**M. rotundatus F.**

Seligenstadt (Scr.). Nicht selten auf grasigen Lößhängen hinter Damm 15. 5. 24,  
9 St. 7. 6. 24. Karlstadt 6. 3. 27, 1 St. Krainberg 15. 5. 47, 1 St. Mörswiese am  
Mainufer 24. 5. 05.

**Omiias Schönherr.**

**O. concinnus Boh.**

Aschaffenburg selten (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

**O. mollinus Boh.**

Mainhecken 12. 4. 06, 1 St. Mörswiese am Mainufer 7. 5. 05, 1 St.

**Rhinomias Reitter.**

**R. forticornis Boh.**

Am Rand des Ellerwaldes 23. 4. 46, 2 St. frisch entwickelt. Weiler i. Sp. 21. 4. 26.  
Striet 21. 5. 35, 3 St. Hain i. Sp. Pollaschgrund nicht selten am Waldrand unter  
Laub 29. 5. 32, 4 St. Waldaschaff 28. 5. 22, 4 St.



## **Phyllobius Schönherr.**

### **P. sinuatus F.**

Seligenstadt (Scr.). Nach v. Heyden an Potentilla bei Frankfurt am Main.

### **P. parvulus Ol.**

Dornauer Graben 20. 6. 37. Kalmut 7. 5. 25, 26. 6. 25. Benediktushöhe bei Retzbach a. M. 13. 6. 47, 2 St.

### **P. viridiaeris Laich. (= pomonae Oliv.)**

Auf Wiesen und Grashängen an niederen Pflanzen stellenweise nicht selten. Bei Glattbach 24. 5. 04. Löbhänge hinter Damm 7. 5. 24, 16. 6. 24, 2 St. Mörsweise am Mainufer häufig 28. 5. 08, 7 St.

### **P. oblongus L.**

Auf Laubhölzern häufig und schädlich.

### **P. piri Desbr.**

Auf Laubhölzern häufig und schädlich.

### **P. maculicornis Germ.**

Am Röderbach auf Weiden 3. 5. 37. Im Dörngraben 25. 5. 37, 6. 5. 38. Am Letzten Hieb auf Hainbuchenhecke 3. 6. 37. Lohr 12. 5. 22 (St.).

### **P. argentatus L.**

Häufig auf Laubhölzern.

### **P. betulae F.**

Häufig auf Laubhölzern. Zu Oechsners Zeiten noch selten in der Fasanerie.

### **P. arborator Hbst. (= psittacinus Germ.)**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.).

### **P. calcaratus F. (= glaucus Scop.)**

Häufig auf Erlen, Haseln und Espen.

### **P. urticae Deg.**

Am Röderbach 30. 4. 36, 2 St. Mörsweise 5. 05. Fasanerie 2. 6. 39, 2 St. Mühlthal bei Neuendorf 2. 6. 29.

## **Brachyderinae**

### **Polydrosus Germar.**

#### **P. impar Gozis.**

Auf Kiefern häufig.

#### **P. marginatus Steph. (= ambiguus Gyll.)**

Auf Laub- und Nadelholz häufig.

#### **P. atomarius Oliv.**

Auf Fichten und Kiefern nicht selten.

#### **P. pterygomalis Boh.**

Bei Frankfurt a. M. nachgewiesen (C. Heyden).

#### **P. flavipes Deg.**

Aschaffenburg (D. N. u. Scr.).

**P. cervinus L.**

Aschaffenburg (D. N.). Gailbachtal 14. 5. 44, 28. 5. 37 auf Eiche.

**P. pilosus Gredler.**

Steinbachtal auf blühenden Kirschen 15. 5. 24. Hain i. Sp. auf Espe 19. 5. 24. Auf Buche 14. 5. 24, 8 St.

**P. confluens Steph.**

Auf Besenginster nicht selten. Striet 5. 1893 (Fr.).

**P. undatus F. (= tereatricollis Bonsd.)**

Auf Espen, Birken und anderen Laubhölzern.

**P. sericeus Schall.**

Auf Laubhölzern häufig.

**P. mollis Stroem. (= micans F.)**

Auf Laubhölzern nicht selten.

**Scythropus Schönherr.**

**S. mustela Hbst.**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.). Stockstadter Wald 27. 4. 30. Striet auf Kiefern 17. 5. 24. Schönbusch 19. 5. 31.

**Liphloeus Germar.**

**L. tessellatus Müll. (= nubilus F.)**

Schloßgarten 4. u. 5. 1894 (Fr.). Fasanerie im ausgetrockneten See mehrere St. 5. 1893 (Fr.). Aschaffenburg 25. 5. 22. Mainufer 20. 6. 29. Karlstadt Haag 14. 7. 43.

**Eusomus Germar.**

**E. ovulum Germ.**

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.). Schönbusch am oberen See 30. 5. 04, 1 St. Hafendamm 29. 5. 24. Mörsweise am Mainufer zahlreich 12. 5. 05. Krainberg 13. 5. 26. Kalmut 22. 6. 25. Großkrotzenburg Torfbruch 11. 6. 25 (St.).

**Sciaphilus Stephens.**

**S. asperatus Bonsd.**

Schönbusch unter Moos 12. 3. 24, 3 St. 28. 5. 37. Karlstadt am Steig 19. 3. 26, 1 St. Kahl 16. 10. 04, 4 St.

**Brachysomus Schönherr.**

**B. hirtus Boh.**

Karlstadt auf dem Haag unter Laub 24. 4. 32, 2 St.

**B. echinatus Bonsd.**

Gartenberg unter Moos 8. 2. 25. Kalbenstein 28. 2. 26, 2 St. Gailbachtal Ende 3. 05. Schönbusch 12. 3. 24. Rothenbuch i. Sp. 21. 4. 40, 17. 5. 36. Karlstadt am Steig 19. 3. 26, 25. 4. 26, 2 St. Obernburg im alten Steinbruch 15. 5. 35. Glattbacher Wald 4. 1895 (Fr.).

**Foucartia Duval.**

**F. squamulata Hbst.**

Seligenstadt (Scr.). Hinter Damm im Fahrachtal auf den Lößhängen häufig 15. 5. 24, 2 St. 7. 6. 24, 2 St. Ebenso an den Lößhängen am Weg nach Glattbach 23. 5. 05. Krainberg 20. 6. 26.

## **Barypithes Duval.**

### **B. araneiformis Schrank.**

Fasanerie unter Laub (S.). Weiler i. Sp. 11. 4. 26, 2 St. Waldaschaff 28. 4. 26.  
Hain i. Sp. Pollaschgrund unter Reisig 11. 5. 24. Bei den Ellerhöfen am Waldrand  
zahlreich unter Moos 14. 5. 36.

### **B. pellucidus Boh.**

An einer Gartenmauer der Grünewaldstraße 13, 9. 5. 16, 1 St. Gödelsberg 2. 6. 37.  
Schönbusch 18. 6. 36, 1 St. 4. 7. 27, 2 St.

### **B. mollicomus Ahr.**

Aschaffenburg (D. N.).

### **B. tener Boh.**

Fasanerie unter Steinen 4. u. 6. 1894 (Fr.). 7. 6. 30; 3 St. Stockstadter Wald in  
Kulturgräben 14. 5. 04. Gailbachtal 16. 5. 26, 5 St. Hain i. Sp. Seebachtal 3. 6. 28,  
3 St.

## **Brachyderes Schönherr.**

### **B. incanus L.**

Häufig und schädlich auf Kiefern.

## **Strophosomus Stephens.**

### **S. melanogrammus Forst. (= coryli F.)**

Auf Laubhölzern häufig und schädlich.

### **S. rufipes Steph.**

Auf Laub- und Nadelholz gemein und schädlich. Auch auf Heidekraut zumeist  
als v. capitatus Deg.

### **S. faber Hbst.**

Krainberg 19. 3. 26. Kahl am Langen See 19. 4. 25, 1 St. Gailbachtal 24. 11. 35.  
Kl. Exerzierplatz 10 St. Sandgrube bei Mainaschaff 6. 10. 25.

## **Philopeton Steph.**

### **(Cneorrhinus Schönh.)**

### **P. plagiatus Schall.**

Stockstadter Wald auf sandigen Flächen (Fr.).

## **Barynotus Germar.**

### **B. obscurus F.**

Hain i. Sp. Seebachtal unter Moos 21. 3. 27. Karlstadt am Haag 15. 3. 41. Feldkahl  
31. 3. 46. Striet an Buchen 16. 5. 24. Bei Glattbach 19. 7. 05. Homburg a. M. am  
Hallenknopf 18. 8. 26.

## **Sitona Germar.**

### **S. gressorius F.**

Sodental unter Moos 10. 1. 26, 1 St. Aschaffenburg-Leider 5. 07, 5. 5. 12. Schön-  
busch 26. 6. 35, 4. 7. 27. Heigenbrücken 31. 7. 27. Kleinostheim 7. 8. 25. Main-  
aschaff Sandgrube 9. 8. 46. Striet 9. 8. 27. Stockstadter Wald 21. 11. 28. Sendelbach  
Sandgrube 26. 10. 24, 5 St. (St.).

### **S. intermedius Küst.**

Karlstadt am Steig 17. 3. 29, 6. 8. 50. Krainberg 29. 6. 31, 30. 8. 25, 26. 9. 26. Kal-  
mut 16. 8. 16. Kalbenstein 30. 8. 25, 26. 9. 26.

**S. griseus F.**

Aschaffenburg (D. N.). Auf Lupinen und Besenginster. Sandgrube bei Mainaschaff auf Lupinen 29. 7. 25, 15. 9. 25, 16. 11. 27. Heigenbrücken 31. 7. 27. Kahl 9. 05, 14. 9. 25. Auf der Würzburger Straße fliegend 7. 10. 06. Stockstadter Wald 21. 11. 25.

**S. cambricus Steph.**

Aschaffenburg (D. N.). Kahl Moore 7. 2. 26, 18. 3. 28. Große Schönbuschallee am Wasserloch 21. 10. 07, 2 St.

**S. regensteinensis Hbst.**

Häufig auf Besenginster.

**S. tibialis Hbst.**

Nicht selten auf Besenginster. Erbig 6. 3. 12. Spessart 13. 3. 27. Mainufer 29. 5. 05. Kahl 6. 10. 26.

ab. *ambiguus* Gyll.

Erbig 6. 3. 10. Wendelberg 6. 5. 36. Mörswiese 29. 5. 05. Krainberg 7. 6. 25.

**S. languidus Gyll. (= Flecki Csiki)**

Karlstadt Landwehren aus Moos gesiebt 6. 3. 27, 1 St. Schönbusch 3. 4. 48, 1 St.

**S. lineatus L.**

Aschaffenburg (D. N.). Häufig an Klee.

**S. suturalis Steph.**

Mainwiesen 12. 5. 05, 22. 9. 05. Striet 5. 6. 26. Fasanerie 12. 7. 04. Lindigwiesen 13. 7. 04. Mainhecken 28. 10. 19.

ab. *elegans* Gyll.

Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg (D. N.).

**S. sulcifrons Thunbg.**

Erbig 20. 1. 24. Fasanerie und Striet 4. 1893 (Fr.). Schönbusch 20. 5. 04. Schmerlenbacher Wald 30. 10. 04.

**S. puncticollis Steph.**

Krainberg 26. 9. 26, 1 St. Lößwände hinter Damm.

**S. flavescens Marsh.**

Häufig. Lindigwiesen 13. 7. 04. Gersprenzweiden bei Stockstadt a. M. 8. 7. 05. Sodental auf Wiesen 29. 8. 09.

**S. Waterhousei Woll.**

Schönbusch 30. 5. 04, 1 St. Stockstadter Wald 10. 6. 09, 1 St. 17. 9. 05. Auf den Gersprenzweiden 1 St.

**S. crinitus Hbst.**

Aschaffenburg (D. N.). Häufig auf Leguminosen.

**S. hispidulus F.**

Auf Wiesen nicht selten.

ab. *tibialis* Gyll.

Aschaffenburg (D. N.) (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

**S. humeralis Steph.**

Aschaffenburg (D. N.). Schmerlenbacher Wald 24. 5. 04. Kalbenstein 6. 5. 27.

**S. cylindricollis F.**

Striet von Gebüsch geklopft 16. 5. 24, 1 St.

**S. inops Gyll.**

Kalbenstein 8. 5. 27, 1 St.

## Tanymecinae

### Chlorophanus Germar.

**C. viridis L.**

Steinbachtal auf Petasites, Nesseln und Spiraen mehrfach 29. 6. 20. meist in copula. Am Röderbach 18. 6. 40, 6. 7. 40, 3 St. Aschaffufer 11. 7. 29, 1 St. „Bei Seligenstadt am Mainufer häufig auf Weiden“ (Fr.).

### Tanymecus Schönh.

**T. palliatus F.**

Aschaffenburg mehrfach (D. N.). Hinter Damm 11. 5. 24, 3 St. 7. 6. 24. Findberg 23. 5. 26. Striet auf Disteln 2 St.

## Leptopinae

### Tropiphorus Schönherr.

**T. carinatus Müll.**

Aschaffenburg unter Moos 17. 3. 31. Am Niedernberger Wäldchen gesiebt 9. 3. 50, 1 St. (J. S.). Lindig 26. 4. 29, 1 St. Kahl 5. 4. 12. Hain i. Sp. 6. 5. 28, 1 St.

## Cleoninae

### Larinus Germar.

**L. planus F.**

Karlstadt 28. 3. 26. Ellerberg 14. 5. 26. Steinbachtal auf Cirsium oleraceum 14. 7. 24. Kahl 1. 10. 05, 20. 10. 35. Hinter Damm 5. 10. 25. Sandgrube bei Sulzbach 16. 12. 34.

**L. sturnus Schall.**

Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg auf Disteln. Moore bei Großkrotzenburg.

**L. jaceae F.**

Auf dem Kalmut bei Homburg a. M. 23. 6. 35, 2 St.

**L. turbinatus Gyll.**

Karlstadt 22. 9. 29, 1 St. Moore bei Großkrotzenburg 1. 10. 35, 1 St.

**L. obtusus Gyll.**

Aschaffenburg (D. N.). Seligenstadt (Scr.). Auf Disteln selten.

### Rhinocyllus Germar.

**R. conicus Froelich.**

Aschaffenburg sehr selten auf Disteln (Oe. u. D. N.). Kalmut an Cirsium lanceolatum 23. 6. 25. Schönbusch 1. 7. 24.

## Lixus F.

### L. paraplecticus L.

Nach Oe. früher an dem ehemaligen Kapuzinersee nicht selten. Kahl. Hanau 7. 19. Sendelbach bei Lohr 23. 8. 22, 3 St. (St.).

### L. myagri Oliv.

Mainbrücke 13. 4. 06. Mainufer bei der früheren Schiffswerft 11. 9. 05, 2 St. Hanau (Dr. Hille).

### L. subtilis Sturm.

Auf sandigen Flächen an *Chenopodium album*. Schönbusch 28. 2. 37, 19. 4. 47, 30. 5. 30, 30. 7. 30. Sandgrube bei Mainaschaff 1. 3. 30, 31. 3. 29, 11. 9. 29. Kahl 8. 26. Hinter Damm 1. 5. 36. Kleinwallstadt 28. 4. 35. Gailbachtal 24. 11. 35. Sandgrube bei Großostheim 21. 12. 30.

### L. ascanii L.

Striet. Karlstadt 28. 2. 26, 6. 3. 27, 2. 7. 33, 22. 9. 29. Karlstadt Haag 6. 8. 50. Godelsberg 8. 1893.

### L. algirus L. (= angustatus F.)

Seligenstadt auf Disteln (Scr.). Am Ludwigsdenkmal (cand. forest Bergmüller) (Fr.).

### L. bardanae F. (= cylindricus Hbst.)

Einmal im Schönbusch im Schilf 8. 1894 (Fr.). Am Röderbach 12. 7. 04.

### L. punctiventris Boh.

Sandgrube bei Mainaschaff aus Grasbüscheln 23. 2. 36. Karlstadt 28. 2. 26, 26. 3. 27, 25. 9. 29. Kalmut 23. 4. 35. Mörswiese 24. 5. 05. Stockstadter Wald 7. 11. 26.

### L. elongatus Goeze (= filiformis F.)

Aschaffenburg auf Kräutern beim Ernthof mehrere Stücke 7. 1866 (Fr.).

## Coniocleonus Motsch.

### C. glaucus F.

ab. *turbatus* Fahrs.

Häufig im Jahre 1904 in den Kulturgräben des Stockstadter Waldes 4. 5. 04. Sodener Wald 6. 5. 06. Lohr am Romberg 15. 5. 45 (St.). Hain i. Sp. 2. 7. 25.

### C. nebulosus L.

Von Fr. angeblich in Menge im Stockstadter Wald in den Kulturschutzgräben gefunden 6. 1896. Sodental unter Moos zwischen Calluna 6. 1. 26, 1 St. (J. S.). Vor Schweinheim an einem Rain 4. 6. 04 (S.). Platanenallee an der Hofgartenmauer 26. 8. 34 (S.), 1 St.

### C. nigrosuturalis Goeze (= obliquus F.)

Seligenstadt einige Stücke (Scr.). Erbig (Fl.). Auf dem Ammersfeld bei Aschfeld 1 St. 23. 4. 44.

## Mecaspis Schönh.

### M. alternans Hbst.

Breunsberg 26. 2. 28. Kl. Exerzierplatz am Mainufer in Gräben 4. 06. Bahndamm gegenüber Nilkheim 24. 4. 26. Retzbach 28. 4. 36. Sandgrube bei Mainaschaff 1. 8. 29. Gailbachtal 25. 10. 36.

### M. caesus Gyll.

Aschaffenburg selten (Fr.).

### **Chromoderus Motsch.**

#### **C. fasciatus Müll. (= affinis Schrk.)**

Aschaffenburg (D. N.). Mainaschaff Sandgrube in Grasbüscheln 9. 2. 30, 23. 2. 36.  
Unter *Artemisia campestris* 25. 11. 34. Karlstadt 28. 3. 26. Mainbrücke angefliegen  
21. 4. 06. Stockstadter Wald auf *Achillea* 1. 5. 32, 11. 9. 19, 31. 10. 26.

### **Leucosomus Motsch.**

#### **L. pedestris Poda (= ophthalmicus Rossi)**

Retzbach Benediktushöhe 26. 4. 36. Krainberg 12. 5. 21, 26. 6. 32, 26. 9. 26. Karbach  
7. 6. 35 (Noll). Aschaffenburg Striet (Fr.). Aschfeld 12. 10. 46.

### **Pseudocleonus Schönh.**

#### **P. cinereus Schrk.**

Seligenstadt (Scr.). Mainufer 16. 4. 08, 4 St. Karlstadt am Steig 24. 4. 26. Krain-  
berg 13. 5. 26, 27. 7. 46. Karbach 27. 8. 43 (J. S.).

#### **P. grammicus Panz.**

Retzbach a. M. auf der Benediktushöhe unter *Artemisia campestris* (Noll). Sehr  
selten.

### **Cyphocleonus Motsch.**

#### **C. tigrinus Panz.**

Aschaffenburg (D. N.). Am oberen Weg nach Glattbach 1. 4. 07, 24. 5. 05. Ruine  
Homburg 14. 6. 36 (Noll). Wendelberg 23. 7. 31, 1 St.

#### **C. trisulcatus Hbst.**

Einzeln bei Seligenstadt (Scr.). Kalmut 1 St. 23. 6. 35.

### **Cleonus Schönh.**

#### **C. piger Scop. (= sulcirostris L.)**

Kl. Exerzierplatz am Mainufer 17. 4. 11. Karlstadt 6. 4. 30, 17. 5. 25. Bei Glatt-  
bach auf Disteln 8. 7. 06. Wendelberg 17. 8. 35. Schönbusch 21. 8. 25. Kahl 29. 8. 26.  
Auf dem Ammersfeld bei Aschfeld 1. 10. 46.

## **Cossoninae**

### **Dryophthorus Schönh.**

#### **D. corticalis Payk.**

Oberbessenbach am Fuß des Haidberges an einem morschen Erlenstrunk 19. 3. 22.  
Aschaffenburg an den Lettlöchern (S.). Seligenstadt an faulem Eichenstrunk  
(Scr.).

### **Cossonus Clairv.**

#### **C. parallelepipedus Hbst.**

Aschaffenburg (D.). Bei Frankfurt a. M. und bei Soden i. Taunus festgestellt.

#### **C. linearis F.**

Häufig in Pappeln und Weiden.

#### **C. cylindricus Sahlbg.**

In Pappeln und Weiden. Am Hasenkopf aus hohler Silberpappel 1 St.

### **Eremotes Wollaston.**

#### **E. ater L.**

Aschaffenburg (D. N.).

**E. punctulatus Boh.**

Mainufer bei der Mörswiese an Silberpappel 3. 4. 11, 1 St.

**E. reflexus Boh.**

Aschaffenburg (D. u. Fl.). Seligenstadt (Scr.).

**E. (Brachytemnus Woll.) porcatus Germ.**

Aschaffenburg unter Kiefernrinde (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Glattbacher Wald 5. 1894 (Fr.).

**R h y n c o l u s Germ.**

**R. (Hexarthrus Woll.) culinaris Germ.**

Aschaffenburg (D. N.).

**R. (Stereocorynes Woll.) truncorum Germ.**

In Pappeln (Oe.). Häufig in hohlen Laub- und Nadelbäumen. In alter Pyramidenpappel 7. 1. 26. Mainufer an Silberpappel 3. 6. 11. Hain i. Sp. in alten Buchen. Schönbusch 16. 6. 39. In alter Eiche.

**R. (Rhyncolus s. str.) lignarius Marsh.**

Seligenstadt (Scr.). Hain i. Sp. in alten Buchen zahlreich 20. 3. 11.

## Bagoinae

**B a g o u s Schönh.**

**B. (ssp. Lyprus Schönh.) cylindrus Payk.**

Am Fasaneriesee in den achtziger Jahren häufig (Fl.). Stockstadter Wald 8. 4. 28 (S.). Sendelbach bei Lohr am See 11. 5. 22 (St.).

**B. (B. s. str.) limosus Gyll.**

Aschaffenburg (Fl.).

**B. (B.) subcarinatus Bris.**

Aschaffenburg (Fl.). Schönbusch 14 St. (S.).

**B. collignensis Hbst.**

Schönbusch bei der Sandgrube über dem Bahngleis 13. 5. 38 (t. H. Wagner).

**B. frit Hbst.**

Seligenstadt (Scr.). Schönbusch 10. 5. 35 (S.).

**B. lutulosus Gyll.**

Aschaffenburg (D. N.). Seligenstadt (Scr.).

**B. diglyptus Boh.**

Aschaffenburg (D. N. u. Fl.). Wendelberg 10. 11. 26 (S.). Glattbach am Waldsaum unter Laub 7. 3. 06.

**B. (Abagous Shp.) lutosus Gyll.**

Kahl am Langen See 2 St. Aschaffenburg (Alzheimer).

**B. lutulentus Gyll.**

Kahl Moore 7. 2. 26, 9. 10. 25, 8. 10. 26. Aschaffenburg Mörswiese 15. 5. 04.

**B. glabrirostris Hbst.**

Stockstadter Wald 8. 4. 28, 12 St. 18. 4. 24, 2 St.



## Hydronomus Schönh.

### H. alismatis Marsh.

An Alisma Plantago. An den Lettlöchern früher häufiger. Kahl Moore 30. 9. 25,  
2 St. Am oberen Schönbuschsee 10. 06.

## Tanysphyrinae

### Tanysphyrus Schönh.

#### T. lemnae Payk.

Nicht selten auf Lemna-Arten. Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Schön-  
busch zahlreich. Sendelbach bei Lohr im Schmiedsee 24. 6. 45 (St.).

### Notaris Germ.

#### N. scirpi F.

Kahl Moore 5. 4. 12, 20. 7. 27, 28. 9. 33. Schönbusch. Mainufer 24. 9. 35. Stock-  
stadt a. M. Gersprenzufer 17. 9. 05.

#### N. acridulus L.

Häufig in Sümpfen und am Rand von Gewässern.

### Dorytomus Germ.

#### D. (Praelamus Zumpt.) taeniatus F.

Weiler i. Sp. 6. 6. 26. Steinbachtal 21. 7. 04. Kahl Moore auf Salix aurita 25. 6. 26,  
5. 7. 04, 13. 11. 04. Schmerlenbacher Wald 6. 11. 04, 8. 12. 04.

#### D. Dejeani Faust.

Gailbachtal Ende 3. 05. Hain i. Sp. auf Espen 11. 5. 24. Lohr Herbst 1946, 9. 12. 46  
im Haus (St.).

#### D. affinis Payk.

Häufig auf Espen. Aschaffenburg (D.). Gailbachtal 3. 3. 05. Hain i. Sp. auf Espe  
11. 5. 24. Schmerlenbacher Wald 3. 5. 08.

#### D. salicis Walton.

Aschaffenburg 1 St. (Fl.). Großkrotzenburger Moore auf Salweide 20. 4. 27, 4 St.  
(S.) (t. Zumpt).

#### D. (Dorytomus s. str.) validirostris Gyll.

Aschaffenburg (Fl.). Großkrotzenburger Moore 18. 9. 33, 2 St.

#### D. minutus Gyll.

Aschaffenburg (Fl.) 1 St. Schönbusch an Populus alba 14. 7. 28, 3 St. (S.).

#### D. flavipes Panz.

Aschaffenburg (D. N.). Mainufer unter Moos 16. 2. 05. Fahrbachtal hinter Damm  
1. 3. 27. Mainbrücke 2. St. Lohr im Haus 5. 3. 22. Karlstadt 25. 6. 32.

#### D. Schoenherri Faust.

Weiler i. Sp. auf Espen 6. 6. 26, 1 St. (S.).

#### D. longimanus Forst.

Häufig auf Pappeln und Weiden.

ab. macropus Redt.

Fasanerie 5. 1893 und 1894 (Fr.).

**D. tremulae Payk.**

Aschaffenburg (Fl.) (Scr.) auf Espen. Sodener Wald 30. 5. 27. Wendelberg 24. 6. 42.  
ab. variegatus Gyll.  
Aschaffenburg sehr selten (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

**D. tortrix L.**

Rothensbuch 21. 4. 40. Mainufer auf Espe 13. 5. 04. Godelsberg 6. 5. 05. Schönbusch  
14. 5. 04. Spessart 4. 9. 27.

**D. filirostris Gyll.**

Aschaffenburg (D.). Seligenstadt einzeln auf Pappeln (Scr.). Striet 5. 1893 (Fr.).  
Stockstadt a. M. 9. 08. Am Schöllmüllersee 25. 7. 42.

**D. hirtipennis Bedel.**

Aschaffenburg (Fl.). An alten Weiden 2. 7. 04, 1 St. Mainhecken an Weide 7. 4. 47.

**D. (Olamus Rtr.) melanophthalmus Payk.**

Aschaffenburg (D. N.). Großkrotzenburger Moore 25. 6. 07. Steinbachtal 5. 9. 06.  
Stockstadter Wald 1. 10. 31.

**D. rufulus Bedel (= pectoralis Gyll.)**

Steinbachtal an Salweide 5. 11. 05, (5 St.).

**D. villosulus Gyll.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Kahl 4. 9. 28, 1 St.

**D. majalis Payk.**

Seligenstadt auf Weiden einzeln (Scr.).

**D. dorsalis F.**

Aschaffenburg (Fr.).

**D. salicinus Gyll.**

Aschaffenburg auf Weiden 4 St. (Fl.).

**Thryogenes Bedel (= Erirrhinus Schönherr.)**

**T. Nereis Payk.**

Stockstadt a. M. Gersprenzufer 17. 9. 05, 2 St. Sumpfwiesen beim Bahnhof Klein-  
ostheim 16. 10. 27. Kahl Moore 28. 11. 24. Schönbusch am See 10 St.

**T. festucae Hbst.**

Bei Seligenstadt nicht selten (Scr.). Aschaffenburg einmal am Mainufer 13. 6. 35  
(S.).

**T. scirrhosus Gyll.**

Seligenstadt (Scr.). Hanau (H.).

**Grypus Germar (= Grypidius Schönherr.)**

**G. equiseti F.**

An Equisetum a. Lam. nicht selten. Stockstadter Wald 5. 5. 35. Mainufer 17. 4. 29,  
10. 6. 29. Sandgrube bei Sulzbach a. M. 1. 8. 28.

**G. brunneirostris F.**

Selten. Aschaffenburg (D. N.). Lohr Seegraben 13. 5. 45 (St.). Bei Nilkheim 22.  
9. 05 (S.).

**Pseudostyphlus Tournier**

**P. pilumnus Gyll.**

Aschaffenburg (Alzheimer) nach D. N.

## **Orthochaetes Germar.**

### **O. setiger Beck.**

Stockstadter Wald 2. 1. 27, 1 St. 10. 4. 26. Striet 23. 2. 36. Dornauer Graben unter Moos 8. 5. 38. Kalbenstein 28. 2. 26. Sandgrube bei Mainaschaff aus einem Wurzelstock von *Artemisia campestris* 29. 7. 25. Rain am Weg nach Glattbach unter *Salvia pratensis* 3. 8. 28. Hain i. Sp. Pollaschgrund 22. 4. 28. 21. 10. 38. Auf dem Ammersfeld bei Aschfeld am Waldrand unter Laub 21. 4. 47 (J. S.). Erbig 28. 11. 26. Waldaschaff unter Laub 1. 11. 25, 1 St.

## **Smicronyx Schönherr.**

### **S. jungermanniae Reich.**

Aschaffenburg Mainufer 1 St. (S.). Mäusberg 7. 9. 35, 1 St.

## **Curculioninae**

### **Elleschus Stephens.**

#### **E. scanicus Payk.**

Aschaffenburg (D.). Seligenstadt (Scr.). Auf Espen nicht selten. Hain i. Sp. 11. 5. 24. Striet. Wendelberg 29. 6. 35, 9. 7. 35. Schönbusch 19. 7. 28.

#### **E. bipunctatus L.**

Auf blühenden Weiden im Frühjahr nicht selten.

#### **E. infimus Hbst.**

Aschaffenburg (Alzheimer).

### **Acalyptus Schönherr.**

#### **A. carpini Hbst.**

Aschaffenburg nicht selten (Oe.). Einigermal bei Seligenstadt (Scr.). Moore bei Kahl und Großkrotzenburg 20. 4. 27. Auf blühenden Ohrweiden zahlreich.

### **Lignyodes Schönherr.**

#### **L. enucleator Panz.**

Büchelberg 20. 5. 28. Schönbusch auf Eschen 26. 7. 27. Fasanerie.

### **Acromius Desb.**

#### **A. quinquepunctatus L.**

Nicht selten an Wicken-Arten.

### **Tychius Germ.**

#### **T. polylineatus Germ.**

Kahl 15. 5. 04, 1 St.

#### **T. Schneideri Hbst.**

Krainberg auf *Anthyllis vulnerata* L. 7. 6. 25, 1 St. Kalmut 28. 6. 25.

#### **T. venustus F.**

Nicht selten auf Besenginster.

#### **T. junceus Reich.**

Sehr selten im Striet (Oe.). Hanau 5. 8. 08 (H.).

#### **T. medicaginis Bris.**

Auf dem Krainberg 7. 6. 25, 5. 7. 25.

**T. haematopus Gyll.**

Lindigwiesen 1 St. Hanau 21. 6. 06 (H.).

**T. tomentosus Hbst.**

Aschaffenburg häufig (Oe. u. D. N.).

**T. meliloti Steph.**

Aschaffenburg (D. N.). Krainberg 7. 6. 25. Kalmut 14. 6. 25. Hinter Damm 18. 7. 25. Lindigwiesen. Striet 5. 11. 05.

**T. lineatulus Steph.**

Wiesen bei Schmerlenbach 16. 5. 09, 1 St. Mainwiesen 23. 5. 05. Sodener Wald 30. 5. 07. Haibacher Höhe 23. 6. 40.

**Miccotrogus Schönherr**

**M. picirostris F.**

Nicht häufig auf Wiesen (Oe. u. D.). Auf dem Ammersfeld bei Aschfeld 21. 4. 47. Schönbusch auf Lycopus 19. 4. 47, 1. 7. 24. Sodener Wald. Mainwiesen.

**Sibinia Germar.**

**S. primita Hbst.**

Aschaffenburg sehr selten (Oe.). Stockstadter Wald in Grasbüscheln überwintert 13. 2. 25, 15. 11. 25. Mainwiesen 11. 4. 06, 21. 6. 06. Schönbusch 21. 8. 25. Wendelberg 3. 9. 36. Kahl 1. 10. 05.

**S. vittata Germ.**

Seligenstadt 1 St. (Scr.).

**S. pellucens Scop.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Wendelberg 26. 5. 36. Schönbusch Sandgrube 1. 6. 35. Ludwigshöhe in den Samenkapseln von *Melandryum album* 13. 8. 05.

**S. viscaria L.**

Ammersfeld bei Aschfeld 26. 4. 47. Mainwiesen 14. 7. 06, 1 St. Retzbach 4. 7. 35, 1 St.

**S. potentillae Germ.**

Schönbusch 19. 4. 47, 29. 11. 46. Kahl Rand der Moore 15. 5. 04, 9. 05, 13. 11. 24, 4 St. Stockstadter Wald 10. 4. 26, 8. 11. 25. Aschaffenburg Mainufer 9. 7. 07.

**Anthonomus Germar.**

**A. (Anthonomidius Rtr.) rubripes Gyll.**

An *Fragaria viridis*. Karlstadt auf den Landwehren unter Pflanzenrasen 26. 3. 26, 6. 3. 27, 5 St. Kalmut 25. 6. 25.

**A. (Anthonomus s. str.) varians Payk.**

Auf Kiefern nicht selten. Schmerlenbacher Wald 16. 4. 06. Kahl 25. 6. 26. Büchelberg 12. 7. 27. Krainberg 8. 6. 25.

**A. pubescens Payk.**

In der Umgebung von Frankfurt a. M. gefunden, dürfte auch in Aschaffenburg vorkommen (Horion).

**A. rubi Hbst.**

Häufig und schädlich auf *Rubus*-Arten und Erdbeeren.

**A. pyri Kollar (= cinctus Redt.)**

Schönbusch auf Schlehen 3. 5. 17, 1 St.

**A. pomorum L.**

Gemein und schädlich auf Apfelbäumen.

**A. humeralis Panz.**

Am Stockstadter Wald auf Birnbaum 22. 8. 04, 1 St.

**A. spilotus Redt.**

Auf Obstbäumen. Aschaffenburg (Fl.).

**A. inversus Bedel.**

Seligenstadt (Scr.).

**A. pedicularius L.**

Godelsberg auf Schlehen 17. 4. 06, 4 St. Ruine Homburg 2. 5. 26, 3 St.

**A. rufus Gyll.**

Aschaffenburg (Fl.). Schönbusch auf Schlehen 2. 5. 31, 26. 6. 35. Großostheim auf Schlehen 1. 4. 16. Weiler i. Sp. 6. 6. 26.

**Furcipes Desbr.**

**F. rectirostris L.**

Häufig auf Prunus-Arten.

**Bradybatus Germar.**

**B. elongatulus Boh.**

Fasanerie im Moos alter Eichen 25. 11. 23, 1 St. 10. 12. 47, 1 St.

**Brachonyx Schönherr.**

**B. pineti Payk. (= indigena Hbst.)**

Kiefernscädling.

## Tychiinae

**Curculio L. (= Balaninus Sam.)**

**C. elephas Gyll.**

Auf Eiche und Edelkastanie. Aschaffenburg sehr selten (Alzheimer). Hanau-Bulau (H.).

**C. pellitus Boh.**

Schönbusch auf Eichen 17. 5. 22, 24. 6. 11. Schmerlenbacher Wald 31. 7. 28.

**C. venosus Grav.**

An Eichen. Schönbusch 5. 1895 u. 1896 (Fr.). 6. 5. 27, 15. 6. 34. Schmerlenbacher Wald 10. 5. 37, 12. 6. 29. Karlstadt Haag 30. 6. 25. Wendelberg 12. 7. 39. Mainbrücke fliegend 30. 8. 06.

**C. villosus F.**

Schmerlenbacher Wald auf Eichen 4. 1894 (Fr.). Rückersbacher Schlucht 2. 4. 26. Kalbenstein unter Laub 18. 4. 48. Schönbusch 6. 5. 34, 23. 5. 30. Striet 3. 5. 36.

**C. nucum L.**

Schönbusch auf blühenden Kirschen 5. 1895 (Fr.). Steinbachtal auf blühenden

Kirschen 15. 5. 24. Fahrbachtal 17. 5. 24. Mäusberg Ende 7. 19. Wendelberg auf Haseln 3. 8. 33. Lohr Waldspitze 3. 9. 32 (St.).

**C. glandium Marsh.**

Häufig auf Eichen.

**C. cerasorum Hbst.**

Aschaffmündung auf Erlen zahlreich 16. 8. 23, 11. 9. 30. Am Röderbach auf Erlen 15. 8. 36.

**C. rubidus Gyll.**

Aschaffenburg (D. N.). Kahl Moore auf Rhamnus Frangula 2. 8. 26, 1 St. Godelsberg 5. 8. 1893, 1 St.

**C. (Balanobius Jeckel.) crux F.**

Häufig auf Weiden.

**C. salicivorus Payk.**

Häufig auf Weiden.

**C. pyrrhoceras Marsh.**

Schmerlenbacher Wald 5. 1894 (Fr.). Fischerhecke 6. 1893 (Fr.).

## Pissodinae

### Pissodes Germar.

**P. piceae Illig.**

Eichelsbach an Tannenstöcken und gefällten Tannenstämmen als Larve, Puppe und Imago 15. 8. 23 (S.).

**P. notatus F.**

An Kiefernkulturen häufig und sehr schädlich.

**P. pini L.**

Schädlich an Kiefern und Fichten.

**P. piniphilus Hbst.**

Großostheimer Wald 1921 starker Fraß 10. 4. 21. Larven fast erwachsen in Puppenwiegen 8. 5. 21. Larven verpuppt 19. 6. 21. Imagines zahlreich aus Puppenwiegen, darin auch noch Larven und Puppen. Kleinostheim am Waldsaum frisch entwickelt. Imagines in Puppenwiegen (wohl 2. Generation) 11. 8. 24.

### Magdalis Germar.

**M. memnonia Gyll.**

Aschaffenburg (Scr.). Großostheimer Wald aus Kiefernästen gezogen 1. 22 (t. Zumpt.). Stengerts an Kiefernästen 22. 5. 21, 4. 6. 11. Retzbach 13. 6. 47. Krainberg 20. 6. 43. Kalmut 23. 6. 35. Lindig 13. 7. 04. Büchelberg an Kiefer 17. 7. 35.

**M. linearis Gyll.**

Stockstadter Wald an Kiefern 20. 5. 04, 12. 7. 27 (t. Zumpt.). Lindig 13. 7. 04. Büchelberg an Kiefer 17. 7. 35.

**M. phlegmatica Hbst.**

Stockstadter Wald 20. 3. 27. Großkrotzenburger Moore 20. 4. 27. Schmerlenbacher Wald 3. 5. 08. Kahl 15. 5. 04.

- M. rufa Goeze.**  
Nicht selten an Kiefern. Aschaffenburg (Alzheimer). Schönbusch 30. 5. 34. Krainberg 11. 7. 38. Büchelberg 17. 7. 35, 2. 8. 35. Kalmut 19. 8. 26.
- M. nitida Gyll.**  
Einzeln bei Aschaffenburg und Seligenstadt (Oe.) (Scr.) (D. N.). Gartenberg auf Fichten 5. 19. Stockstadter Wald 29. 6. 28. Striet auf Fichte 17. 6. 29. Heigenbrücken auf Fichte 17. 7. 27.
- M. violacea L.**  
Seligenstadt einige Stücke (Scr.). Auf Kiefern. Sodener Wald 21. 5. 11. Ellerwald 19. 5. 46, 2 St. Striet 20. 6. 28. Stockstadter Wald 20. 6. 26.
- M. frontalis Gyll.**  
Auf Kiefern. Sodener Wald 25. 5. 22. Stockstadter Wald. Kalmut auf Pinus austriaca 22. 6. 25. Im Januar und Februar mehrfach aus Kiefernästen gezogen.
- M. duplicata Germ.**  
Auf Kiefern. Aschaffenburg (D. N.). Sodener Wald 21. 5. 11, 2 St. Büchelberg 30. 6. 25 (t. Zumpt.). Schönbusch 1. 7. 25. Mäusberg 7. 19.
- M. armigera Geoffr. (= aterrima L.)**  
Seligenstadt einzeln (Scr.). Aschaffenburg Bismarckallee an Ulmen 25. 8. 42. Lohr Städt. Anlage zahlreich aus Ulmenästen gezogen 10. 5. 23 (St.).
- M. carbonaria L.**  
Aschaffenburg selten (D.).
- M. cerasi L.**  
Nicht selten auf Eichen (Oe. u. D.N.). Schönbusch 24. 6. 11, 4. 7. 27. Striet auf Schlehen 5. 6. 28. Hain i. Sp. 8. 7. 23.
- M. exarata Bris.**  
Striet 5. 13 (Fl.).
- M. barbicornis Latr.**  
Aschaffenburg (D. N.). Seligenstadt (Scr.). Geishöhe i. Sp. 28. 5. (Aulbach).
- M. nitidipennis Boh.**  
Aschaffenburg 5. 1894 (Fr.). Seligenstadt (Scr.). Auf populus nigra nach Rtrr.
- M. ruficornis L.**  
Auf Apfelbäumen und Sorbus. Seligenstadt (Scr.). Hinter Damm auf Weißdorn 24. 5. 04, 1 St. 17. 5. 26
- M. flavicornis Gyll.**  
Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg (D. N.). Schönbusch 24. 6. 11, 3 St.

## Trachodinae

### Trachodes Germar.

- T. hispidus L.**  
Seligenstadt einige Stücke an morschen am Boden liegenden Buchenästen (Scr.). Bei Einsiedeln i. Sp. 24. 4. 34. Schönbusch an morschen Eichenästen meist in copula mehrfach 24. 5. 22. Karlstadt 12. 6. 38. Kahl 15. 8. 20.

# Hylobiinae

## Hylobius Schönherr.

### H. abietis L.

Häufig und schädlich an Nadelhölzern.

### H. transversovittatus Goeze (= fatuus Rossi.)

Seligenstadt (Scr.) Mainufer 12. 5. 07. Fasanerie 6. 1889 (Fr.). 2. 7. 1897. Kalmut 23. 6. 35. Spessart 28. 7. 37. Am Röderbach auf Sumpfwiese an *Lythrum salicaria* 13. 8. 40 (S.). Nach Maass auch an *Thalictrum* und Weiden.

## Lepyrius Germar.

### L. palustris Scop. (= colon L.)

Auf Weiden. Striet 5. 1893 (Fr.). Mainufer 9. 1893 (Fr.). (S.). Die Art scheint jetzt bei uns seltener geworden zu sein.

### L. capucinus Schall.

Karlstadt 17. 3. 29. Mainufer 4. 08, 2 St. Stockstadter Wald 5. 4. 26, 16. 9. 28. Am Weg nach Glattbach 23. 5. 06. Karbach 27. 8. 43. Dornauer Graben 3. 10. 37. Auf dem Ammersfeld bei Aschfeld 1. 10. 46.

## Liparus Oliv. (Molytis Schönherr.)

### L. dirus Hbst.

Retzbach Benediktushöhe 27. 4. 29. Karlstadt bei der Ruine 5. 5. 03, 5. 5. 29, 14. 6. 42 je 1 St. Mäusberg 9. 6.19, 2. 10. 32 je 1 St.

### L. germanus L.

Aschaffenburg (Oe. u. D. N.).

### L. coronatus Goeze.

Vereinzelt auf sandigen Stellen. Eckertsmühle 29. 5. 31. Am Steiger bei Hösbach 2. 6. 40. Mainufer 27. 7. 46. Auf dem Krainberg 27. 7. 46, 3. 8. 47. Klingenberg 7. 8. 43. Erbig 7. 1894 (Fr.). Schönbusch 8. 6. 35.

## Liosoma Steph.

### L. deflexum Panz. (= ovatum Clairv.)

Aschaffenburg 1 St. (S.).

## Epipolaeus Weise.

### E. caliginæus F.

Von Oe. noch als sehr selten unter Steinen angegeben. Mainhecken bei der alten Schiffswerft unter Steinen und Moos nicht selten 10. 4. 19, 2. 5. 06. Striet südöstlich am Fuß eines Nußbaumes 10. 4. 36. Karlstadt am Steig unter Hecken 25. 4. 26. Auf dem Haag unter Moos 12. 9. 29. Kahlthal auf überschwemmter Wiese im Genist 21. 9. 24.

## Adexius Schönherr.

### A. scrobipennis Gyll.

Aschaffenburg Fasanerie und Steinbachtal unter Laub und an morschen verpilzten am Boden liegenden Eichenästen 8. 4. 06, 5. 11. 05.

## Alophus Schönherr.

### A. triguttatus F.

An feuchten sandigen Stellen unter Steinen nicht selten (Oe. u. D.). Stockstadter Wald 18. 5. 34. Hanau (H.). Rückersbacher Schlucht auf feuchter Waldwiese aus gemähtem Gras gesiebt mehrfach 19. 9. 48 (J. S.).



## Hypera Germar.

### H. tessellata Hbst.

Stockstadter Wald 25. 3. 26. Mainufer 4. 11, 22. 7. 08. Bahndamm gegenüber Nilkheim 1. 5. 27, 24. 8. 20. Großkrotzenburger Moore 19. 8. 28, 2. 9. 30, 3 St. Fahrbachtal hinter Damm 5. 10. 25.

## Phytonomus Schönherr.

### P. punctatus F. (= zoilus Scop.)

Nicht selten. Mainufer an Weiden 9. 1893 (Fr.). Schmerlenbacher Weg unter Pappeleinde 10. 1893 (Fr.).

### P. fasciculatus Hbst.

Sandgrube beim Bahnhof Sulzbach a. M. mehrfach 4. 11. 28 (S.).

### P. adpersus F. (= pollux F.)

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Karlstadt 24. 4. 32. Sendelbach 23. 8. 22 (St.). Großkrotzenburger Moore 19. 11. 25.

### v. alternans Steph.

Stockstadt a. M. Gersprenzwiesen 17. 4. 26. Hörstein 1. 7. 1897 (Fl.). Sumpf bei Station Kleinostheim 10. 10. 27. Kahl Moore 3. 11. 04.

### P. rumicis L.

Schmerlenbacher Wald unter Platanenrinde 1. 1894 (Fr.). Hinter dem Büchelberg unter Laub 6. 2. 34. Am Röderbach 30. 4. 26. Stockstadter Wald Gersprenzwiesen 11. 5. 25. Lohr 18. 6. 22 (St.). Bei Waldaschaff 1. 11. 25.

### P. meles F.

Aschaffenburg selten (Oe., D. N. u. Fl.). Großkrotzenburger Moore 20. 4. 27.

### P. ononidis Chevr.

Striet 17. 6. 29.

### P. nigrirostris F.

Häufig an Ononis.

### P. arator L. (= polygoni L.)

Häufig auf Wiesen.

### P. pedestris Payk.

Häufig auf Wiesen.

### P. elongatus Payk.

Seligenstadt (Scr.). Moore bei Kahl und Großkrotzenburg 10. 6. 25, 29. 8. 28, 30. 9. 25, 1. 10. 24.

### P. plantaginis Deg.

Häufig auf Wiesen.

### P. murinus F.

Einzelnen bei Seligenstadt (Scr.). Karlstadt Landwehren 28. 3. 26, 27. 10. 29. Kalmut 26. 6. 25 (S.).

### P. variabilis Hbst.

Häufig auf Grasplätzen.

### P. viciae Gyll.

Aschaffenburg (D. N.).

**P. trilineatus Marsh.**

Aschaffenburg (D. N.). 15. 5. 32. Kalmut 28. 6. 25. Mainufer 13. 7. 26. Krainberg 5. u. 19. 7. 25. Kahl 11. 04.

**Limobius Schönherr.**

**L. borealis Payk.**

Seligenstadt einige Stücke (Scr.). Nicht selten auf *Geranium sanguineum*. Mainhecken 29. 3. 06. Hinter Damm 1. 3. 27. Karlstadt am Steig 6. 3. 27. Am Haag 19. 3. 26, 15. 3. 41 mehrfach. Hain i. Sp. Pollaschgrund 15. 5. 32. Kalmut 28. 7. 25. Mäusberg 3. 7. 18. Sulzbach a. M. am Mainufer 30. 9. 23.

## Rhytirrhinae

**Gronops Schönherr.**

**G. lunatus F.**

Aschaffenburg (Oe. u. Fl.). Seligenstadt (Scr.). Glattbacher Wald aus Moos gesiebt 5. 4. 08. Sandgrube bei Mainaschaff unter *Artemisia vulgaris* 1. 6. 35. Sande bei Kahl 1. 6. 35, 21. 9. 37.

## Calandrinae

**Sphenophorus Schönherr.**

**S. striatopunctatus Goeze.**

Schönbuschallee 12. 5. 05, 6. 06. Stockstadter Wald an sandigen Stellen 6. 1895 (Fr.)

**Calandra Clairv.**

**C. granaria L.**

In Getreide häufig und schädlich.

**C. orycae L.**

Bei Seligenstadt unter Baumrinde (Scr.). Oft in Anzahl im Reis (Fr.). Aschaffenburg aus Gerstenkörnern 18. 2. 06.

## Cryptorrhynchinae

**Camptorrhinus Schönherr.**

**C. statua Rossi.**

Aschaffenburg Schmerlenbacher Wald (Oe. u. D.). „Unter Rinde alter Eichen und zahmer Kastanien, woselbst er nach v. Heyden überwintert“ (Fr.).

**Cryptorrhynchidius Pierce.**

(**Cryptorrhynchus Illiger.**)

**C. lapathi L.**

Häufig und schädlich an Weiden, Erlen und Pappeln.

**Acalles Schönherr.**

**A. roboris Curt.**

Aschaffenburg (Oe., Fl. u. S.). Hanau hinter der Pulverfabrik unter Eichen (H.). Bei Rohrbrunn im Haßlochthal 26. 8. 52 (J. S.).

**A. camelus F.**

Mainhecken 4. u. 5. 06, 12. 8. 20. Striet 8. 30. Nach D. N. auch von Alzheimer in den achtziger Jahren daselbst gefunden.

**A. ptinoides Marsh.**

Aschaffenburg (D. N.). Gailbachtal 3. 3. 05. Stockstadter Wald 17. 4. 26 (t. Zumpt). Fasanerie 8. 1888 (Fr.). Mainflingen aus Grasbüscheln gesiebt 1. 11. 28 (J. S.).

**A. turbatus Boh.**

Gailbachtal 8. 12. 04.

**A. lemur Germ.**

Mainhecken 4. 06, 4 St. 12. 8. 20, 1 St. (t. Zumpt). Hain i. Sp. unter Buchenstrunkrinde 14. 10. 35, 1 St.

**A. echinatus Germ.**

Seligenstadt (Scr.). Fasanerie an morschen Ästen (S.). Spessart (Alzheimer).

**Echinodera Woll.**

**E. hypocrifa Boh.**

Im Schloßgarten 1 St. (Alzheimer). Gailbachtal an Buchenstock 26. 4. 30, 23. 5. 30, 1 St. Stengerts 26. 4. 30. Karlstadt Haag 24. 4. 32, 24. 5. 32 je 1 St.

## **Ceutorrhynchinae**

**Baris Germar.**

**B. artemisiae Hbst.**

Aschaffenburg (Oe.). Einzeln bei Seligenstadt (Scr.). Mainbrücke 11. 4. 06. Kleinheubach 4. 12. Bei der Aschaffmündung 13. 5. 12. Am Leiderer See 5. 07. Kahl 9. 6. 34.

**B. morio Boh.**

Bei Frankfurt a. M. im ersten Frühjahr am Grund der Stengel von Reseda luteola (Dr. Buddeberg). Die Art dürfte auch bei uns zu finden sein.

**B. laticollis Marsh.**

Aschaffenburg (D. N.). Hanau (H.). 4 St. Überwintert in den verholzten Wurzelpartien der Kohlstengel.

**B. cupirostris F.**

Nach Oe. u. D. noch sehr selten in Aschaffenburg. Aschaffenburg Hanauer Straße an Diplotaxis tenuifolia mehrfach 28. 5. 08. Krainberg 14. 5. 30. Mäusberg aus Moos gesiebt 7. 9. 05.

**B. lepidii Germ.**

Aschaffenburg selten (Oe. u. D. N.). Bei Glattbach 19. 5. 04, 1 St. Neuer Hafendamm auf Erysimum hieracifolium 28. 6. 02, 1 St.

**B. coeruleus Scop.**

Aschaffenburg nicht selten (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Am Guten Mann in Anzahl 4. 1894 (Fr.). Sodener Wald 10. 1. 26. Schönbusch 13. 3. 12. Kalbenstein 19. 3. 26. Mainufer bei der Chem. Fabrik auf Ruderalhaufen 28. 5. 08.

**B. fallax Bris.**

Auf Isatis tinctoria. Karlstadt am Steig unter Moos 6. 3. 27, 2 St.

**B. picicornis Marsh.**

Retzbach a. M. auf Reseda lutea 16. 6. 35. Würzburg Botanischer Garten auf Reseda 6. 1890.

**B. chlorizans Germ.**

Sandgrube Mainaschaff 1. 3. 30, 2 St. Hanau 2 St. (H.).

**Limnobaris Bedel.**

**L. T-album L.**

Seligenstadt häufig an Schilf (Scr.). Dammer Sumpfwiesen in Menge 5. 1894 (Fr.). Am Guten Mann 6. 1895 (Fr.). Kahl Moore 1. 10. 24.

**L. philistrata Steph.**

Großkrotzenburger Moore 28. 5. 35, 30. 9. 25. Stockstadter Wald Gersprenzwiesen 17. 9. 05, 3 St. Schönbusch 15. 10. 04, 1 St. Wiesen an der Fischerhecke 4. 10. 42.

**L. Reitteri Munst. (= pusio Rtrr.)**

Kahl Moore 1. 10. 24, 30. 9. 25.

**Coryssomerus Schönherr.**

**C. capucinus Beck.**

Sehr selten. Einzeln bei Seligenstadt (Scr.). Am Guten Mann 4. 1894. Auf den Leiderer Wiesen 5. 1894 (Fr.). 14. 4. 08. Kalmut 23. 6. 35. Fasanerie am See.

**Mononychus Germ.**

**M. punctum album Hbst. (= pseidacori F.)**

Dettingen (Oe.). Schönbusch nicht selten auf Iris pseudacoris 30. 5. 12, 30. 6. 12. Kahl 29. 5. 21.

**Phytobius Schönherr.**

**P. comari Hbst.**

Stockstadter Wald 2. 1. 27, 2 St. 18. 4. 24. Sumpf an der Gersprenz. Oberrau links des Mains beim Stauwerk auf feuchter Wiese 1. 5. 43. Kahl Moore an Comarum palustre 6. 9. 05, 2 St. 11. 9. 07, 1. 10. 24, 6 St. 16. 11. 26. Nicht selten.

**P. Waltoni Boh.**

Aschaffenburg einzeln (Oe. u. S.). Auf feuchter Wiese bei der Fischerhecke 4. 10. 47.

**P. canaliculatus Fahrs.**

Aschaffenburg 2 St. (S.). Kahl 28. 11. 24, 1 St. (t. Hans Wagner).

**P. quadrituberculatus F.**

Aschaffenburg (D. N.). Karlstadt Landwehren 6. 3. 27. Dörmorsbach 20. 4. 41. Erbig 28. 11. 26, 1 St. Mainufer Schweinheim Tümpel am Exerzierplatz 18. 4. 48 (Noll).

**P. velaris Gyll.**

Lohr an Myriophyllum spicatum (St.).

**P. quadricornis Gyll.**

Schönbusch am unteren See 26. 5. 04, 2 St. 2. 7. 04, 1 St. Mainufer.

**Heterophytobius Wagner.**

**H. muricatus Bris.**

Kahl Moore 16. 4. 22, 10 St. 13. 11. 24, 1 St. (t. H. Wagner).

**H. quadrinodosus Gyll.**

Bei Seligenstadt am Mainufer in Mehrzahl (Scr.). Kahl Moore 7. 2. 26, 1 St. 1. 10. 24, 1 St. Stengerts 27. 8. 25, 1 St.

**R h i n o n c u s Stephens.**

**R. albicinctus Gyll.**

Aschaffenburg (Oe.). Schönbusch am oberen See mehrfach in gemähten Uferpflanzen im Herbst 1905 (S.).

**R. perpendicularis Reich.**

Nicht selten. Schönbusch 16. 3. 24. Karlstadt 16. 3. 41. Mörswiese 7. 5. 05.

**R. inconspicuum Hbst. (= gramineus F.)**

Aschaffenburg selten (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Schönbusch 30. 5. 04, 2. 7. 04. Mainufer 25. 6. 24, 22. 9. 05, 3 St. 28. 10. 04.

**R. pericarpus L.**

Häufig auf Rumex und Polygonum.

**R. bruchoides Hbst.**

Aschaffenburg selten (Oe.). Sodental. Mainbrücke schwärmend. Karlstadt 17. 3. 41, 3 St. Kahl Moore 17. 8. 25 (t. H. Wagner).

**R. bosnicus Schultze.**

Aschaffenburg 1 St. (S.). Südwestlichster bisher bekannter Fund (t. H. Wagner).

**R. castor F.**

Seligenstadt (Scr.). Sumpfwiese bei Damm 4. 1894 (Fr.). Nicht selten an Polygonum.

**R h y t i d o s o m u s Schönherr.**

**R. globulus Hbst.**

Nach Oe. sehr selten auf Zitterpappeln. Einzeln bei Seligenstadt (Scr.). Am grauen Stein (Alzheimer). Steinbachtal 18. 5. 32, 5. 11. 05. Stockstadter Wald 17. 9. 05 (t. H. Wagner).

**R. fallax Otto.**

Glattbacher Wald 5. 11. 08, 5 St. Rückersbacher Schlucht 23. 11. 46, 2 St. (t. H. Wagner).

**A m a l u s Schönherr.**

**A. haemorrhous Hbst.**

Aschaffenburg (D. N.). Godelsberg 6. 5. 05. Sandgrube bei Großostheim in Grasbüscheln 21. 12. 30, 1 St.

**D r u p e n a t u s Rthr.**

**D. nasturtii Germ.**

Großkrotzenburger Moore 23. 9. 26, 16. 11. 26, 3 St.

**P o o p h a g u s Schönherr.**

**P. sisymbrii F.**

Aschaffufer unter Laub 7. 2. 37. Mainufer 29. 4. 32, 7. 5. 06, 7. 6. 09, 27. 7. 27. Im Genist nicht selten. Lohr Seegraben 13. 5. 45 (St.).

**T a p i n o t u s Schönherr.**

**T. sellatus F.**

In den Blüten von *Lysimachia vulgaris* in der Fasanerie (Oe. u. D.). 3. 6. 37,

7. 5. 52. Moore bei Kahl und Großkrotzenburg 26. 4. 27, 15. 5. 04, 2. 10. 08. Schmerlenbacher Wald 18. 8. 12. Mainufer.

### **O r o b i t i s** Germar.

#### **O. eyaneus** L.

An *Viola palustris* L. und *canina* L. Nach Oe. sehr selten auf jungen Waldschlägen Auch Döbner stellte die Art bei Aschaffenburg fest. Dornauer Graben 17. 2. 35. Rothenbuch i. Sp. 7. 4. 50. Gersprenzweiden 31. 5. 04. Hain i. Sp. Pollaschgrund in Torfmoos 17. 10. 42. Kahler Moore aus Wiesenmoos gesiebt 1. 10. 27.

### **C o e l i o d e s** Schönherr.

#### **C. (Coeliodinus Wagn.) rubicundus** Hbst.

Aschaffenburg sehr selten (Oe.). 3. 5. 08, 2 St. Godelsberg 6. 5. 05, 1 St. Striet 5. 5. 12, 1 St. Schmerlenbacher Wald 17. 12. 05, 2 St. (t. H. Wagner).

#### **C. nigrinarsis** Hartmann.

An *Betula pubescens*. Nach H. Wagner. Stockstadter Wald 29. 6. 28, 1 St. (t. H. Wagner).

#### **C. (Coeliodinus s. str.) dryados** Gmel. (= *quercus* F.)

Aschaffenburg selten (Oe. u. D. N.). An Eichen. Schmerlenbacher Wald. Godelsberg 22. 6. 42 (t. H. Wagner).

#### **C. ruber** Marsh.

Schmerlenbacher Wald 3. 5. 08, 1 St. Schönbusch 12. 6. 28, 24. 6. 11, 1 St. (t. H. Wagner).

#### **C. cinctus** Geoffr. (= *erythroleucus* Gmel.)

An Eichen. Schmerlenbacher Wald 3. 5. 08, 10 St. (t. H. Wagner). Schönbusch 17. 5. 22, 16. 6. 36. Glatzbacher Wald. Kahl.

### **T h a m i o c o l u s** Thoms.

#### **T. viduatus** Gyll.

Seligenstadt (Scr.). Steinbachtal 19. 6. 09, 1 St. Kahl 3 St. Schönbusch 1 St.

#### **T. (Euthamiocolus Wagner) signatus** Gyll.

Seligenstadt (Scr.).

### **M i c r e l u s** Thomson.

#### **M. ericae** Gyll.

Häufig auf Heidekraut (Oe. u. Scr.). Büchelberg 25. 8. 07, 4 St. Stockstadter Wald 13. 5. 25. Hain i. Sp. Pollaschgrund 1. 6. 47. Striet 9. 10. 25.

### **C o e l i a s t e s** Weise.

#### **C. lamii** F.

Seligenstadt Scr. Schönbusch 10. 12. 24. Mainufer. Bei Glatzbach 29. 11. 04.

### **Z a c l a d u s** Rtrr. (= **A l l o d a c t y l u s** Weise.)

#### **Z. exiguus** Oliv.

Bei Frankfurt a. M. nachgewiesen.

#### **Z. affinis** Payk.

Häufig an *Geranium pratense*.

### **C n e m o g o n u s** Bedel. (= **C r a p o n i u s** Lac.)

#### **C. epilobii** Payk.

Aschaffenburg (D. N.). Auf *Epilobium angustifolium*. Schmerlenbacher Wald 13.

5. 06. Stockstadter Wald 13. 6. 27. Striet 19. 6. 09, 12. 7. 20. Kahler Moore 11. 6. 25.  
Am Lauterhof bei Obernburg 20. 7. 24.

**Phrydiuchus Goris.**

**P. topiarius Germ.**

Bahndamm bei der alten Schiffswerft 15. 4. 26. Bahndamm gegenüber Nilkheim  
8. 9. 48, 2 St.

**Ceuthorrhynchus Germar.**

**C. (Ceuthorrhynchus s. str.) scapularis Gyll.**

Aschaffenburg selten (Oe.). Seligenstadt sehr vereinzelt (Scr.).

**C. cochleariae Gyll.**

Häufig auf Sumpfwiesen an *Cardamine pratense* und *Cochlearia officinalis*.  
Stockstadt a. M. Gersprenzwiesen 2. 1. 17. Karlstadt 6. 3. 27. Wiesen am Büchel-  
berg 3. 5. 12, 5. 11. 05.

**C. constrictus Marsh.**

Aschaffenburg (Fl.). 24. 5. 22 auf Cruciferen 1 St. (S.). (t. H. Wagner).

**C. contractus Marsh.**

Aschaffenburg selten (Oe. u. D. N.). Bei Glattbach auf Raps 24. 3. 05. Schönbusch  
10. 7. 24. Krainberg bei Gambach 5. 7. 23. Steinbachtal 7. 8. 25. Schmerlenbacher  
Wald 30. 10. 04.

**C. erysimi F.**

Aschaffenburg (D. N.). Auf Cruciferen hinter Damm 11. 5. 24 (t. H. Wagner).  
Stockstadter Wald. Sodener Wald 2 St. (t. H. Wagner).

**C. viridanus Gyll.**

Aschaffenburg 1 St. (S.). (t. Hans Wagner).

**C. ignitus Germ.**

Aschaffenburg nicht häufig (Oe.). Seligenstadt sehr vereinzelt (Scr.).

**C. Leprieuri Bris.**

Bei Aschaffenburg nicht selten. Büchelberg 30. 6. 25, 25. 8. 07. Hinter Damm auf  
einem Kornfeld 16. 6. 24. Stockstadter Wald. Gersprenzwiesen 13. 8. 20. Krain-  
berg 9. 8. 25 (t. H. Wagner).

**C. chalybaeus Germ.**

An *Alliaria officinalis* (Fl.). Schönbusch 7. 5. 08, 19. 5. 08 (t. H. Wagner).

**C. hirtulus Germ.**

Aschaffenburg (D. N.) (S. 1 St.).

**C. griseus Bris.**

Sodener Wald (S.). (t. H. Wagner).

**C. sulcicollis Payk.**

Aschaffenburg am Guten Mann 4. 1894 (Fr.). u. (S.).

**C. atomus Boh.**

Aschaffenburg (D.). Auf Cruciferen bes. *Cardamine pratense* nicht selten.

**C. picitarsis Gyll.**

Auf Cruciferen. Steinbachtal 22. 7. 04, 1 St. Schönbusch 29. 11. 46. Gailbachtal  
8. 12. 04, 3 St.

**C. quadridens Panz.**

Aschaffenburg am Guten Mann 4. 1894 (Fr.). Häufig auf Cruciferen.

- C. pleurostigma Marsh.**  
Auf Cruciferen häufig.
- C. Roberti Gyll.**  
s. sp. *alliariae* Bris.  
Schönbusch unter Baumrinde 26. 1. 24, 1 St. Unter Moos 12. 2. 24, 1 St. (t. H. Wagner).
- C. napi Gyll.**  
Aschaffenburg (D. N.). Seligenstadt (Scr.). Karlstadt 25. 3. 48. Mainufer bei Aschaffenburg 28. 5. 08, 1 St. (t. H. Wagner). Lohr am Rütsee 8. 5. 23 (St.).
- C. rapae Gyll.**  
Aschaffenburg (D. N. u. Scr.).
- C. assimilis Payk.**  
Aschaffenburg (D. N.). Seligenstadt (Scr.). Häufig auf Cruciferen. Rapsschädling.
- C. nanus Gyll.**  
Östliche Art nach Hans Wagner. Aschaffenburg (Oe., D. N., Scr. u. Fl.). Selten an *Alyssum montanum* 1 St. (t. H. Wagner).
- C. inaffectatus Gyll.**  
Aschaffenburg (Fl.) 1 St. (t. H. Wagner).  
s. sp. *arator* Gyll.  
Seligenstadt (Scr.).
- C. syrites Germ.**  
Aschaffenburg (Oe. u. D. N.). Krainberg 17. 5. 25, 1 St. (t. H. Wagner).
- C. rusticus Gyll.**  
Roßtalsberg bei Karlstadt 27. 4. 24 (St.). Karlstadt a. M. 21. 5. 38. Krainberg auf *Isatis tinctoria* 8. 6. 35 (t. H. Wagner).
- C. suturalis F.**  
Aschaffenburg. Aschaffufer unter Laub 7. 2. 21. Sandgrube bei Mainaschaff 8. 3. 31. Neuer Hafendamm an *Isatis tinctoria* 29. 5. 24. Retzbach 28. 5. 29. Hain i. Sp. 6. 8. 26. Heigenbrücken 11. 9. 31. Rückersbacher Schlucht 23. 11. 40.
- C. (Orethelcus Rtrr.) denticulatus Rtrr.**  
Aschaffenburg (Fl.). Bahndamm bei der früheren Schiffswerft auf Mohn 29. 5. 23. Hinter Damm. Krainberg 20. 6. 26. Mainbrücke 1. 11. 05.
- C. (Parethelus Wagner) pollinarius Forst.**  
Bei Frankfurt a. M. (v. Heyden). Dürfte auch bei uns vorkommen.
- C. (Neoclocianus Wagner) macula alba Hbst.**  
Auf Mohn hinter Damm zahlreich 7. und 29. 6. 24. Am Guten Mann 4. 1894 (Fr.). Einzeln bei Seligenstadt (Scr.).
- C. (Clocianus Rtrr.) marginatus Payk.**  
Auf Cruciferen. Aschaffenburg unter Moos 28. 3. 36. 5. 1894 in Anzahl (Fr.). Hinter Damm 16. 6. 24. Striet 17. 7. 26. Mainhecken 18. 10. 04. Gailbachtal 8. 12. 04.
- C. punctiger Gyll.**  
Aschaffenburg (D. N.). Fahrbachtal 1. 3. 37. Mainufer 3. 11. Karlstadt 15. 3. 41. Kahl 14. 4. 11. Hafendamm auf *Isatis* 29. 5. 24, 4 St. Büchelberg 9. 6. 40. Gailbachtal 20. 10. 40.
- C. (Datonychus Wagner) arquatus Hbst.**  
Schönbusch am unteren See 20. 5. 04 und 11. 9. 05. Nilkheim 22. 9. 05. Striet 11. 12. 35.



- C. angulosus Boh.**  
Hanau (H.). Bei Winzenhohl i. Sp. gestreift 7. 6. 49 (J. S.).
- C. melanostictus Marsh.**  
Einzelnen bei Seligenstadt (Scr.). Dammer Sumpfwiesen 5. 1894 (Fr.). Am Röderbach 16. 10. 08, 6 St. Kahl Moore 12. 11. 24. Weiler i. Sp.
- C. (Microplontus Wagner) rugulosus Hbst.**  
Schönbusch 6. 3. 10. Herbst 1894. Weiler i. Sp. 24. 6. 28, 2 St. an Kamillen. Fasanerie unter Baumrinde 25. 11. 23. Sodener Wald. Kahl 28. 11. 24, 1 St.
- f. transitus ad. chrysanthemum Germ.**  
Schönbusch 31. 7. 36, 1 St. (t. H. Wagner). 8. 12. 04 (t. H. Wagner). Schmerlenbacher Wald 30. 7. 37 (t. H. Wagner).
- C. chrysanthemi Germ.**  
Aschaffenburg (Oe.). Findberg 10. 11. 40, 1 St. (t. H. Wagner).
- C. millefolii Schultes.**  
Auf Tanacetum nach Hans Wagner. Striet 6. 7. 27, 1 St. (t. H. Wagner).
- C. campestris Gyll.**  
Aschaffenburg (D. N.). Gailbachtal Ende 3. 05. Karlstadt am Steig 19. 3. 26, 2 St. Steinbachtal auf Wiesen 25. 4. 26. Fahrbachtal hinter Damm 15. 5. 24.
- C. (Hadroplontus Thoms.) trimaculatus F.**  
Aschaffenburg nicht selten auf Disteln (Oe. u. D. N.). Seither nicht mehr beobachtet.
- C. (Boraginobius Wagner) euphorbiae Bris.**  
Sodener Wald 1 St. (S.) (t. H. Wagner).
- C. austriacus Bris.**  
Aschaffenburg 1 St. (S.). (t. Hans Wagner). Ein östliches Tier lebt in Nonnea pulla, die mit Getreide manchmal eingeschleppt wird. Am Rande von Getreideäckern und Ruderastellen. Bei schlechtem Wetter findet sich der Käfer unter den Wurzelblättern und in der Wurzel. Er entwickelt sich wahrscheinlich in den Samen. (Nach Mitteilung von Hans Wagner).
- C. abbreviatulus F.**  
Nicht selten auf Symphytum officinale. Mainufer 11. 5. 12, 20. 6. 09 mehrfach.
- C. albosignatus Gyll.**  
Fahrbachtal 7. 6. 24, 1 St (t. H. Wagner). Sodener Wald.
- C. asperifoliarum Gyll.**  
Häufig auf Wiesen.
- C. crucifer Oliv.**  
Aschaffenburg (Oe. u. D.). In unserem Gebiet von mir noch nicht beobachtet.
- C. symphyti Bed.**  
Mainufer auf Symphytum officinale 7. 5. 05. Schönbusch 6. 6. 47, 1 St.
- C. (Mogulones Rtrr.) geographicus Goeze.**  
Häufig auf Echium.

**Neosirocalus Ner. et. Wagner.**

- N. posthumus Germ.**  
Seligenstadt (Scr.). Stockstadter Wald 20. 6. 04.

**N. floralis Payk.**  
Aschaffenburg (D. N.). Häufig auf Cruciferen.

**N. (Persirocalus Wagner) pulvinatus Gyll.**  
Seligenstadt (Scr.).

**N. pyrrhorhynchus Marsh.**  
Aschaffenburg (D. N.).

#### **Sirocalodes Neresheimer et Wagner**

**S. nigrinus Marsh.**  
Aschaffenburg (D.). Seligenstadt (Scr.). Büchelberg 30. 6. 25.

**S. quercicola Payk.**  
Schönbusch 9. 3. 41, 1 St. Schmerlenbacher Wald 18. 8. 08, 1 St. (t. H. Wagner).

#### **Calosiris Thoms.**

**C. terminatus Hbst.**  
Seligenstadt (Scr.). Wiesen hinter Damm 15. 4. 28. Stockstadter Wald Gersprenz-  
wiesen 8. 7. 05, 1 St.

#### **Centorrhynchidius Duval.**

**C. troglodytes F.**  
Häufig auf niederen Pflanzen.

**C. rufulus Duf.**  
Von Frankfurt a. M. angegeben. Dürfte auch bei uns zu finden sein.

**C. Barnevillei Grén.**  
Dürfte nach Horion an den xerothermen Mainhängen vorkommen.

**C. horidus Panz.**  
Dotzheim (Petry) und auch von Frankfurt a. M. angegeben.

#### **Stenocarus Thomson.**

**S. fuliginosus Marsh.**  
Im ganzen Gebiet nicht selten.

**S. cardui Hbst.**  
Seligenstadt nicht selten (Scr.). Striet 5. 1894 (Fr.).

#### **Cidnorhinus Thomson**

**C. quadrimaculatus L.**  
Häufig auf Nesseln.

## **Mecininae**

#### **Nanophyes Schönherr.**

**N. circumscriptus Aubé.**  
Kahl Moore 1. 10. 24. Stockstadter Wald am linken Gersprenzufer unter Moos  
3. 11. 35. Aschaffenburg unter Laub 16. 3. 46 (J. S.).

**N. hemisphaericus Oliv.**  
Aschaffenburg (Alzheimer).  
ab. *ulmi* Germ.  
Aschaffenburg (D. N.).

**N. globulus Germ.**

Aschaffenburg sehr selten (Oe.). Bei Seligenstadt einzeln (Scr.). Stockstadt a. M. am linken Gersprenzufer 8. 7. 05.

**N. marmoratus Goeze. (= lythri F.)**

Häufig auf *Lythrum salicaria*.

ab. *ruficollis* Ney. Illig.

Die Stammform nicht selten.

**Mecinus Germar.**

**M. collaris Germ.**

Aschaffenburg auf *Plantago major* (Alzheimer).

**M. janthinus Germ.**

Aschaffenburg (D. N.). Wendelberg 6. 3. 48, 3 St. (J. S.).

**M. pyraister Hbst.**

Nicht selten auf Wiesen.

**Gymnetron Schönherr.**

**G. labile Hbst.**

Bei Seligenstadt einzeln (Scr.). Striet 6. 7. 27, 1 St.

**G. rostellum Hbst.**

Aschaffenburg selten (Oe.) (Fl.).

**G. stimulosum Germ.**

Bei Seligenstadt einzeln (Scr.). Schönbusch unter Moos an alten Eichen 11. 2. 25, 1 St. Kahl am Harz geschlagener Kiefern klebend 29. 12. 12, 1 St.

**G. melanarium Germ.**

Bei Seligenstadt einige Stücke (Scr.). Kalmut 14. 6. 25, 3 St. Kahl 10. 04, 2 St.

**G. villosulum Gyll.**

Bei Seligenstadt nicht selten (Scr.).

**G. beccabungae L.**

Bei Seligenstadt in Mehrzahl (Scr.). Aschaffenburg an *Veronica Beccabungae* 16. 6. 24.

**G. veronicae Germ.**

Aschaffenburg nicht selten (Oe.). 16. 6. 24 (S.) mehrfach.

**G. asellus Grav.**

Aschaffenburg (D. N.). Großostheim 28. 5. 35. Kahl 12. 6. 04. Schönbusch auf *Verbascum Thapsus* 11. 6. 36. Nicht selten.

**G. tetrum F.**

Aschaffenburg auf *Verbascum* (Oe.). Seligenstadt (Scr.). Kalmut auf *Verbascum nigrum* 20. 6. 25. Kahl 12. 6. 04.

**G. antirrhini Germ. (= noctis Hbst.)**

Aschaffenburg sehr selten auf *Verbascum* (Oe. u. D.). Bei Seligenstadt nicht selten (Scr.). Aschaffenburg 23. 6. 10, 3 St. Krainberg 5. 7. 25. Mäusberg 8. 20.

**G. hispidum Brullé (= pilosum Gyll.)**

Aschaffenburg (D.). Nach Reitter entwickeln sich die Käfer in haselnußgroßen

Gallen an den Stengeln von *Linaria vulgaris* (ab Mitte Juli nach v. Heyden) und verbleiben darin bis zum nächsten Frühjahr.

**G. melas Boh.**

Kalmut an *Verbascum nigrum* 20. 6. 25, 1 St. (t. Zumpt.).

**G. netum Germ.**

Kalmut 14. 6. 25, 4 St. Fasanerie 21. 7. 05, 1 St. (t. Hubenthal).

**G. thapsicola Germ.**

Bei Seligenstadt an *Verbascum* in Mehrzahl (Scr.).

**G. collinum Gyll.**

Stockstadter Wald an dem Tümpel an der Grenze 5. 4. 24, 1 St. (t. Zumpt.).

**G. linariae Panz.**

Aschaffenburg (D.). Godelsberg 6. 5. 05. Büchelberg 23. 5. 42, 1 St.

**M i a r u s Stephens.**

**M. graminis Gyll.**

Aschaffenburg selten in Blüten von *Campanula* (Oe.). Seligenstadt einzeln (Scr.).

**M. planatrum Germ.**

Aschaffenburg selten (Oe.). Seligenstadt einzeln (Scr.).

**M. campanulae L.**

Nach Oe. häufig auf *Lychnis*, *Cerastium* und *Campanula*. Großkrotzenburger Moore 11. 6. 25, 3 St. Mäusberg 7. 19, 2 St.

**C i o n u s Clairv.**

**C. tuberculosus Scop. (= verbasci F.)**

Häufig auf *Scrophularia nodosa*.

**C. scrophulariae L.**

Häufig wie der Vorige auf *Scrophularia nodosa*.

**C. hortulanus Fourcr.**

Nicht selten auf *Scrophularia nodosa*.

**C. thapsi F.**

Häufig auf *Verbascum*.

**C. Oliveri Rosensch.**

Aschaffenburg auf *Verbascum* (Fr.). Babenhausen (Scr.).

**C. alauda Hbst.**

Nicht selten auf *Scrophularia* und *Verbascum*.

**C. (Cleopus Steph.) pulchellus Hbst.**

Aschaffenburg selten (Oe. u. D. N.). Stockstadter Wald auf *Scrophularia nodosa* 23. 6. 26, 8. 7. 24, 12 St. Bei Hofstetten auf *Scrophularia nodosa* 17. 7. 24.

**C. (Cl.) solani F.**

Aschaffenburg (Oe.). Seligenstadt (Scr.).

**C. (Stereonychus Suffr.) fraxini Deg.**

Nicht selten und schädlich an Eschen. Fasanerie 14. 5. 24, 25. 11. 23. Schönbusch 19. 5. 25. Kahl 2. 8. 26.

## **Anoplus Schönherr.**

### **A. plantaris Naezen.**

Bei Aschaffenburg auf Birken (S.). Seligenstadt (Scr.).

### **A. roboris Suffr.**

Aschaffenburg (D.). Am Röderbach auf Erlen 19. 4. 27, 1 St. (S.).

## **Rhynchaeninae**

### **Rhynchaenus Clairv. (Orchestes Illig.)**

#### **R. quercus L.**

Häufig auf Eichen.

#### **R. pilosus F.**

Aschaffenburg nicht selten auf Eichen (Oe. u. D. N.). Schönbusch 26. 4. 16, 15. 6. 34. Heigenbrücken 14. 7. 25. Schmerlenbacher Wald 17. 12. 05.

#### **R. erythropus Germ.**

Gailbachtal auf Eichengebüsch 1908, 1 St. (S.).

#### **R. jota F.**

Striet auf Birke 19. 6. 26. Kahl 14. 9. 25.

#### **R. fagi L.**

Gemein und schädlich auf Buchen.

#### **R. testaceus Müll.**

Bei Seligenstadt (Scr.). Aschaffenburg häufig auf Erlen.

#### **v. pubescens Steph.**

Seligenstadt (Scr.). Büchelberg unter Ahornrinde 3. 12. 39, 1 St.

#### **R. loniceræ Hbst.**

Schönbusch auf Lonicera Xylosteum (Fr.).

#### **R. rusci Hbst.**

Aschaffenburg (Fl.). Striet auf Birken 26. 4. 16, 19. 6. 26. Hain i. Sp. 15. 8. 28.

#### **R. avellanae Donov.**

Auf Eichen (D. N.). Schönbusch 17. 5. 22, 15. 6. 34, 19. 7. 33, 14. 8. 28. Striet 14. 6. 26.

#### **R. (Pseudorchestes Bedel) pratensis Germ.**

Bei Seligenstadt einzeln (Scr.). Kahl Rand der Moore 15. 6. 26, 3. 8. 27, 18. 9. 08, 1. 10. 24. Retzbach Benediktushöhe 4. 7. 35. Kalmut 28. 7. 25.

#### **R. (Tachyerges Schönherr) decoratus Germ.**

Auf Weiden (Fr.).

#### **R. rufitarsis Germ.**

Kalmut 22. 6. 25, 1 St.

#### **R. salicis L.**

Auf Weiden häufig.

#### **R. stigma Germ.**

Aschaffenburg (Oe.). Nicht selten auf Weiden und Erlen.

**R. populi F.**

Häufig auf Weiden und Pappeln.

**R. foliorum Müll.**

Aschaffenburg (D. N.). Hinter Damm 1. 3. 27. Mainwiesen auf Weiden 24. 5. 05.

**R h a m p h u s Clairv.**

**R. pulicarius Hbst.**

Striet auf Birke 14. 6. 26. Krainberg auf Apfelbaum 20. 6. 26. Karlstadt Haag 2. 7. 33. Kalmut 19. 8. 26. Godelsberg auf Weißdorn.

## Scolitydae (= Ipidae)

**S c o l y t u s Geoffr.**

**S. rugulosus Ratzebg.**

Häufig an Prunus-Arten. Aus Zwetschgenästen gezogen 20. 3. 22, 4. 22. Karlstadt 30. 6. 29, 30. 7. 10 an Schlehen. Krainberg an Birnbaum 9. 8. 25.

**S. multistriatus Motsch.**

Aus Ulmenästen zahlreich gezogen 21. 4. 07, 5. 5. 07, 2. 6. 39. Dabei am 29. 3. 39 sein Feind Aulonium trisulcatum Geoffr. als Larve und imago.

v. ulmi Redt.

Mit der Stammform 1907 und 1939.

**S. intricatus Ratzebg.**

An Eichen. Godelsberg 30. 5. 05. Großostheimer Wald als Puppe und imago 27. 5. 39. Waldaschaff in Eichenästen als ausgewachsene Larven 26. 10. 24.

**S. carpini Ratzebg.**

Schöntal an Hainbuchen 1. 5. 21, 3. 6. 21, 4. 7. 05 mehrfach.

**S. scolytus F.**

Aschaffenburg in anbrüchigen Ulmen zahlreich im Stamm und in den dickeren Ästen 5. — 8. 1921, 2. 6. 39. Überwintert als Larve. 25. 1. 39 massenhaft als Larve in verschiedener Entwicklung an geschlagenen Ulmen am Schießhaus mit seinen Feinden Hypophloeus bicolor und Aulonium trisulcum.

**S. Ratzeburgi Jans.**

An Birken. Kahl bei den Emmerichshöfen einigemal (Spangenberg).

**S. mali Bechst. (= pruni Ratzebg.)**

An anbrüchigen Obstbäumen häufig. 2. 9. 21. Larven in einem Apfelbaumast, Entwicklung zum imago im Febr. u. März 1922.

## Ipinae

**H y l e s i n u s Fabr.**

**H. fraxini Panz.**

Am Godelsberg an gefällter Esche 9. 4. 27, 18. 5. 08 mehrfach. Auf der Mainbrücke fliegend 11. 4. 06.

**H. oleiperda F. (= toranio Bernh.)**

Am Schöllmüllersee auf Eschen 21. 7. 33. Büchelberg auf Eberesche (*Sorbus aucuparia*) 20. 9. 27, 1 St. (auffallend kleine Form).

**Kissophagus Chapuis.**

**K. hederæ Schmidt.**

Aschaffenburg im Schloßgarten an altem Efeu mehrfach (Scheidter).

**Xylechinus Ratzebg.**

**X. pilosus Ratzebg.**

Aschaffenburg auf der Mainbrücke angefliegen 11. 4. 06. Mehrfach in der Faserie, bei Heigenbrücken, am Engländer und bei Weibersbrunn (Spangenberg).

**Hylastinus Bedel.**

**H. obscurus Mars. (= trifolii Müll.)**

Babenhausen und Seligenstadt (Scr.). Schönbusch 19. 5. 31, 29. 5. 28. Hösbach 16. 5. 09. Gailbachtal 28. 5. 30. Kalbenstein 7. 5. 22 (St.).

**Dentrocitonus Erichson.**

**D. micans Kugel.**

Heinrichstal i. Sp. an Fichte. Larven und imagines 12. 9. 30. Dasselbst zahlreiche imagines 30 St. 9. 10. 30 (A. S.). In den achtziger Jahren auf dem Büchelberg durch Prof. Spangenberg ausgerottet.

**Blastophagus Erichson. (= Myelophilus Eschsch.)**

**B. minor Hartig.**

Unter der Glanzrinde von Kiefern. Stockstadter Wald sehr häufig 4. u. 5. 1921. Am 10. 4. 21 bereits Eiablage in den Brutgängen. 20. 6. 21 fast völlig ausgefliegen, vereinzelt noch Puppen in den Puppenwiegen.

**B. piniperda L.**

Gemein an Kiefern. III — VII VIII u. IX. Stockstadter Wald bereits am 17. 3. 21 schwärmend. Am 21. 6. 21 massenhaft als Larven und Puppen in der dicken Rinde von gefällten Kiefern, teilweise schon frisch entwickelte Käfer 8. 21.

**Hylurgus Latr.**

**H. ligniperda F.**

Aschaffenburg und Seligenstadt (Scr.). Obernauer Wald an Kiefernstöcken 6. 3. 10 zahlreich. Großostheimer Wald an gefällten Kiefern sitzend 10. 4. 21. Büchelberg (Spangenberg).

**Hylurgops Lec.**

**H. palliatus Gyll.**

Häufig an Kiefern und Fichten. IV — VI. Großostheimer Wald an gefällten Kiefern, frische Gänge bohrend 3. 4. 21. Am 19. 6. 21 in Kiefernästen frisch angelegte Gänge, sowie solche mit ausgereiften Larven. Büchelberg 27. 5. 23. an gefällter Fichte.

**Hylastes Erichson.**

**H. ater Payk.**

Häufig an Kiefern III — VII. Stockstadter Wald mittags auf einer Waldlichtung schwärmend 17. 3. 21. Auf der Mainbrücke angefliegen 11. 4. 06. Büchelberg, Obernau (Spangenberg).

**H. cunicularius Er.**

Seligenstadt einzeln (Scr.). Godelsberg an Fichte 6. 5. 05. Spessart 7. 5. 16. Kahl 8. 6. 39.

**H. angustatus Hbst.**

Aschaffenburg auf der Mainbrücke zahlreich angefliegen 11. 4. 06. Stockstadter Wald (Spangenberg). Spessart (D.). Seligenstadt (Scr.).

**H. attenuatus Er.**

Im Spessart (D.). Seligenstadt einzeln (Scr.). Stockstadter Wald an den am Boden liegenden Kiefernzweigen 3. 5. 17, 5. 6. 21.

**H. opacus Er.**

Heinrichstal (D.). Nicht selten an jungen Kiefern (Fr.). Kahl unter Kiefernrinde 25. 5. 04, 25. 7. 04.

**H. glabratus Zett.**

Aschaffenburg an Fichten (Fr.).

**P o l y g r a p h u s Erichson.**

**P. polygraphus L. (= pubescens F.)**

In Fichten und Kiefern. „Fand sich nach D. und Scr. in den fünfziger Jahren in ungeheurer Anzahl im Schönbusch, wo er starke Fichten zerstörte.“ (Fr.).

**P. grandiclava Thoms.**

Bei Sternberg und Unterafferbach an abgesägten Kirschbaumästen 19. 4. 19, 4. 5. 19 (S.) 36 St. mit vielen Larven.

**C a r p h o b o r u s Erichson.**

**C. minimus F.**

Großostheimer Wald in Kiefernästen 19. 5. 21.

**C r y p t u r g u s Erichson.**

**C. pusillus Gyll.**

Seligenstadt (Scr.). Häufig an Kiefern, Fichten und Weißtannen. Großostheimer Wald IV. VII. VIII. 1921. Büchelberg an Fichtenstamm 27. 5. 23.

**C. cinereus Hbst.**

Aschaffenburg (Spangenberg). An Kiefern. Großostheimer Wald 17. 5. 21, 19. 6. 21 in Kiefernästen in den Gängen von Blastophagus minor (Hartig). Am Heidelberg bei Oberbessenbach in den Gängen von Ips acuminatus 4. 10. 21.

**C r y p h a l u s Erichson.**

**C. abietis Ratzebg.**

Himmeltal im Elsavatal an Weißtanne 9. 5. 24. Fasanerie. Heigenbrücken. Rothenbuch i. Sp. an Fichte (Spangenberg). Sehr gemein. Schönbusch 5. 1. 26.

**C. piceae Ratzebg.**

Fasanerie hie und da (Spangenberg). Soll früher nach Fürst schädlich aufgetreten sein (Fr.). Eichelsbach i. Sp. an gefällter Tanne frisch entwickelt 15. 8. 23.

**E r n o p o r u s Thoms.**

**E. fagi F.**

Hain i. Sp. unter und in der Rinde eines dünnen Buchenastes 3. 4. 32. Fasanerie, Rothenbuch i. Sp. an den sieben Wegen (Spangenberg).



**E. tiliae Panz.**

In Linden- und Hainbuchenzweigen. Großostheim (Oe.). Schöntal in dünnen Lindenästen 6. 1896 (Fr.). Fasanerie in Lindenzweigen (S.).

**Phloeophthorus Woll.**

**P. rhododactylus Marsh. (= spartii Nördl.)**

Stockstadter Wald 26. 5. 21. Schönbusch 5. 6. 21 im Bereich des ehemaligen Leiederer Wäldchens zahlreich in dünnen Besenginsterzweigen, teils noch in Puppenwiegen, teils frische Gänge bohrend.

**Taphrorychus Eichhoff.**

**X. bispinus Duft.**

Mainhecken an Clematis vitalba IV. u. VI. mehrfach. Kalmut 3. 6. 34, 21. 8. 26, 3 St. an Clematis vitalba 19. 7. 26, 2 St. Krainberg 8. 6. 35, 6 St.

**Taphrorychus Eichhoff.**

**T. bicolor Hbst.**

Von Fr. am Main an einem Holzplatz in Menge und im Spessart mehrfach unter Rinde von Rotbuchen, seltener von Hainbuchen, auch an der Walnuß festgestellt. Stockstadter Wald Gersprenzuzufer unter Schwarzpappelrinde 18. 5. 24.

**Dryocoetes Eichhoff.**

**D. autographus Ratzebg.**

Hain i. Sp. an Fichtenstrunk 27. 4. 24, 7. 5. 16. Godelsberg 6. 5. 06. Büchelberg an gefälltem Fichtenstamm 27. 5. 23, 2 St. Sodental 22. 5. 22. Stockstadt, Fasanerie, Spessart (Spangenberg).

**D. villosus F.**

Im Spessart Abt. Metzger an Eiche 12. 4. 25, 2 St.

**Pityophthorus Eichhoff.**

**P. Lichtensteini Ratzebg.**

In dünnen Kiefernzweigen. Großostheimer Wald 2 St. 20. 4. 23. Schmerlenbacher Wald 2. 6. 23, 4 St. 19. 7. 23. Kahl 29. 6. 21, 8 St. Hain i. Sp. 6 St.

**P. micrographus L.**

Im Spessart (Fr.).

**P. pubescens Marsh. (= ramulorum Perr.)**

Schmerlenbacher Wald im Mark von Kiefernzweigen 2. 6. 23. Bei Hain i. Sp. 29. 6. 23, 2 St.

**Trypodendron Steph. (= Xyloterus Kr.)**

**T. domesticus L.**

Am Mainufer in angeschwemmtem Holz (Oe.). Aschaffenburg unter Rinde von Laubhölzern. Spessart 4. 9. 27 an Buche.

**T. lineatus Oliv.**

Büchelberg an Fichte 27. 5. 23, 4. 7. 23. Am 18. 3. 16 gegen Abend in den Straßen fliegend.

**T. signatus F.**

Fasanerie an Ahorn (Spangenberg). Spessart Abt. Metzger in alten Eichen 12. 2. 25

## **Pityogenes Bedel.**

### **P. bidentatus Hbst.**

Häufig an *Pinus silvestris* und *Pinus austriaca*. III — V X.

### **P. chalcographus Nördl.**

An Fichten und Kiefern häufig. I II V VIII — X. Büchelberg 27. 5. 23 an Fichtenstamm.

### **P. monacensis Fuchs.**

Am 5. 6. 21 erstmaliger Fund im unteren Maingebiet an der Grenze zwischen dem Großostheimer- und Babenhauser Wald in abgestorbenen Schwarzkiefernästen (*Pinus austriaca*) frischentwickelt, teilweise noch hellbräunlich, noch in den Puppenwiegen im Splint liegend. An gleicher Stelle am 13. 3. 22 M. u. W. Am 15. 2. 22 und 8. 3. 24 je 1 W. und zahlreiche ziemlich ausgewachsene Larven im Garten des hiesigen Pompejanums an abgestorbenen Schwarzkiefernästen. Aus den im Frühjahr 1922 angelegten Zuchten entwickelten sich zahlreich M. u. W. in den Monaten IV V u. VI.

### **P. trepanatus Nördl.**

An *pinus austriaca*. Am Pompejanum 8. 3. 25, 4. 24. Schönbusch 18. 4. 24, 7. 8. 24. Großostheimer Wald 15. 5. 11, 5. 5. 21 in größerer Anzahl.

## **Ips Degeer. (= Tomicus Latr.)**

### **I. acuminatus Gyll.**

Oberbessenbach am Heidberg 21. 9. 21, 4. 10. 21. An den durch allzustarke Harzgewinnung geschwächten Kiefern von der Glanzringengend bis in die kleinsten Zweige. Am Ende der Larvengänge zahlreiche Jungkäfer. Im Frühjahr 1923 auch von Prof. Dr. Spangenberg am Büchelberg beobachtet. Aschaffenburg in seinen Gängen überwintert 6. 12. 21, 6. 3. 22.

### **I. cembrae Heer.**

Im Mai 1949 massenhaftes Auftreten der Art an Lärchen in der Umgebung von Aschaffenburg und im Elsavatal (Neckermann). Schönbusch 15. 5. 49. Glattbach 5. 49. Elsavatal 5. 49.

### **I. sexdentatus Boerner.**

Im Frühjahr 1923 am Büchelberg an einer gefällten Kiefer mit *Ips acuminatus* Gyll. von Prof. Dr. Spangenberg beobachtet und sehr wirksam bekämpft.

### **I. typographus L.**

Büchelberg 27. 5. 23, 27. 6. 23 an gefällter Fichte ohne Äste mit 7 anderen Borkenkäfern: *Hylastes palliatus* Gyll. *Crypturgus pusillus* Gyll. *Pityogenes chalcographus* L. *Ips laricis* F. *Dryocetes autographus* Ratzebg. *Xyleborus Saxesenii* Ratzebg. *Xyloterus lineatus* Oliv. Hain i. Sp. Ende 8. 23 frisch entwickelt und unausgereift. Hafenlohrtal 21. 9. 46, 2 St.

## **Orthomicus Ferr.**

### **O. laricis F.**

Büchelberg an Fichte 27. 5. 23. An Kiefer 25. 5. 21. Erbig an Kiefernstock 16. 3. 21. Jakobstal i. Sp. an Fichte 17. 7. 27. Stockstadt und Heigenbrücken (Spangenberg).

### **O. suturalis Gyll.**

Aschaffenburg (D.). Schmerlenbacher Wald an Kiefernstrunk 19. 4. 05. Kahl unter Kiefernrinde 25. 7. 04.

## **Xyleborus Eichhoff.**

### **X. cryptographus Ratzebg.**

Hanau-Bulau (H.). Im Spessart 4. 9. 27.

### **X. (Anisandrus Ferrari) dispar F.**

Glattbach an Eiche 14. 5. 21. Neudorf i. Sp. an Apfelbaumästchen mit zirkulären zum Mark gerichteten Gängen. Abbruch der Zweige an solchen Stellen bei leichtem Wind. 3. 6. 1895. Mainufer an Eichenstämmen kettenweis in den Gängen sitzend in größerer Anzahl 16. 7. 1889. An Apfelast 19. 8. 22.

### **X. dryographus Ratzebg.**

Einzeln bei Aschaffenburg und Seligenstadt (Scr.). Schmerlenbacher Wald an Eichenstrunk 30. 4. 04, 1 St.

### **X. monographus F.**

Einigmal im Spessart und um Aschaffenburg auf Holzplätzen (Spangenberg). Stockstadter Wald Gersprenzufer unter Schwarzpappelrinde 18. 5. 24. Fasanerie unter Eichenrinde 14. 7. 47, 2 St.

### **X. Saxesenii Ratzebg.**

Häufig an Laub- und Nadelholz. III — VI XI. Büchelberg an gefältem Fichtenstamm 27. 5. 23.

## **Platypodidae**

### **Platypus Hbst.**

#### **P. cylindricus F.**

Schmerlenbacher Wald an Eichenstöcken Mitte 4. 05 und 06. Rückersbacher Schlucht an alten Eichenstöcken zahlreich in Rinde und Splint 3. 5. 25. Striet 4. 23.

# NACHTRAG

Seite 45 nach Agyrtes:

**L e p t i n u s Müller.**

**L. testaceus Müller.**

Schon in D. N. als in Aschaffenburgs Umgegend vorkommend angegeben. Bei Rothenbuch i. Sp. unter Laub eines Gebüsches.

Seite 109 vor Cantharis:

**P o d a b r u s Westw.**

**P. alpinus Payk.**

Oberbessenbach 5. 6. 48 (J. S.).

Seite 120 nach Pheletes

**H a r m i n i u s Fairm.**

**H. undulatus Deg.**

Fasanerie (D.).

Seite 218 nach Dissoleucus:

**A n t h r i b u s F. (Platystomus auct.)**

**A. albinus L.**

Schönbusch 10. 6. 31 (Noll). Ebenso am 2. 5. 34. Hain i. Sp. 8. 5. 32. Obernburg an gefällter Pappel 6. 5. 35. Einsiedel i. Sp. an Eichenstrunk 24. 9. 38 (J. S.).

**B r a c h y t a r s u s Schönherr.**

**B. fasciatus Forst.**

Bei Wiesenfeld an Weißdorn 2. 5. 23.

**B. scapularis Gchl.**

Auf dem Krainberg bei Gambach a. M. wahrscheinlich von *Rosa pimpinellifolia* gestreift, die stark mit Schildläusen besetzt waren.

**B. variegatus Fourcr.**

Nicht selten auf Nadelhölzern

## Register der Familien

|                |     |               |     |                |     |
|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|
| Aderidae       | 167 | Drillidae     | 111 | Mordellidae    | 169 |
| Alleculidae    | 172 | Dryopidae     | 129 | Mycetophagidae | 149 |
| Anobiidae      | 161 | Dytiscidae    | 31  | Nitidulidae    | 135 |
| Anthicidae     | 167 | Elateridae    | 116 | Nosodendridae  | 133 |
| Anthribidae    | 218 | Endomychidae  | 152 | Oedemeridae    | 165 |
| Aspidiphoridae | 160 | Erotylidae    | 143 | Orthoperidae   | 52  |
| Bostrychidae   | 161 | Eucinetidae   | 129 | Ostomidae      | 134 |
| Bruchidae      | 217 | Eucnemidae    | 123 | Phalacridae    | 146 |
| Buprestidae    | 124 | Georyssidae   | 131 | Platypodidae   | 262 |
| Byrrhidae      | 133 | Gyrinidae     | 37  | Pselaphidae    | 100 |
| Byturidae      | 135 | Haliplidae    | 30  | Ptiliidae      | 53  |
| Cantharidae    | 109 | Helodidae     | 128 | Ptinidae       | 164 |
| Carabidae      | 7   | Heteroceridae | 131 | Pyrochroidae   | 167 |
| Cerambycidae   | 185 | Histeridae    | 104 | Pythidae       | 166 |
| Cerophytidae   | 123 | Hydraenidae   | 38  | Rhipiphoridae  | 169 |
| Chrysomelidae  | 195 | Hydrophilidae | 39  | Rhizophagidae  | 140 |
| Cisidae        | 160 | Hygrobiidae   | 30  | Scaphidiidae   | 54  |
| Clambidae      | 50  | Hylophilidae  | 167 | Scarabaeidae   | 176 |
| Clavigeridae   | 104 | Ipidae        | 257 | Scolytidae     | 257 |
| Cleridae       | 114 | Lagriidae     | 172 | Scaptiidae     | 167 |
| Coccinellidae  | 153 | Lampyridae    | 108 | Scydmaenidae   | 50  |
| Colydiidae     | 151 | Lathridiidae  | 147 | Serropalpidae  | 171 |
| Corynetidae    | 115 | Liodidae      | 48  | Silphidae      | 43  |
| Cryptophagidae | 143 | Lucanidae     | 184 | Spercheidae    | 39  |
| Cucujidae      | 141 | Lycidae       | 108 | Sphaeriidae    | 52  |
| Curculionidae  | 219 | Lyctidae      | 161 | Sphindidae     | 160 |
| Dascillidae    | 128 | Lymexylonidae | 116 | Staphylinidae  | 55  |
| Dasytidae      | 113 | Malachiidae   | 111 | Tenebrionidae  | 174 |
| Dermestidae    | 131 | Melandryidae  | 171 | Throscidae     | 124 |
| Derodontidae   | 116 | Meloidae      | 168 |                |     |

## Register der Gattungen und wichtigsten Untergattungen

|                 |     |             |     |               |     |
|-----------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|
| Abax            | 25  | Acmaeops    | 188 | Adelosia      | 23  |
| Abdera          | 171 | Acritus     | 105 | Aderus        | 167 |
| Ablattaria      | 45  | Acrolocha   | 56  | Adexius       | 243 |
| Abraeus         | 104 | Acromius    | 238 | Adonia        | 155 |
| Acalles         | 245 | Acrotona    | 93  | Adoxus        | 202 |
| Acalyptus       | 238 | Acrotrichis | 54  | Adrastus      | 122 |
| Acanthocinus    | 193 | Actobius    | 72  | Aegosoma      | 185 |
| Acanthoscelides | 218 | Acupalpus   | 19  | Aesalus       | 185 |
| Acardystes      | 18  | Acylophorus | 80  | Agabus        | 34  |
| Acidota         | 58  | Adalia      | 156 | Agapanthia    | 194 |
| Acilus          | 36  | Adelocera   | 116 | Agaricophaena | 86  |

|               |     |               |     |                |     |
|---------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|
| Agathidium    | 49  | Anthaxia      | 125 | Barynotus      | 230 |
| Agelastica    | 208 | Antherophagus | 145 | Baryodma       | 99  |
| Aglenus       | 151 | Anthicus      | 168 | Barypithes     | 230 |
| Agonum        | 26  | Anthobates    | 170 | Batenus        | 26  |
| Agrilus       | 126 | Anthobium     | 56  | Batophila      | 212 |
| Agriotes      | 122 | Anthocomus    | 113 | Batrisodes     | 102 |
| Agyrtes       | 45  | Anthonomus    | 239 | Batrisus       | 101 |
| Airaphilus    | 141 | Anthophagus   | 59  | Bembidion      | 12  |
| Alaobia       | 90  | Anthracus     | 20  | Berosus        | 43  |
| Aleochara     | 99  | Anthrenus     | 132 | Bessobia       | 91  |
| Alexia        | 152 | Anthribus     | 263 | Betarmon       | 118 |
| Alianta       | 94  | Aphanisticus  | 127 | Biblopectus    | 101 |
| Allecula      | 172 | Aphidecta     | 156 | Bibloporus     | 101 |
| Allodactylus  | 249 | Aphodius      | 178 | Bidessus       | 31  |
| Allonyx       | 115 | Aphthona      | 209 | Blaps          | 174 |
| Allosterna    | 188 | Apion         | 221 | Blastophagus   | 258 |
| Aloconota     | 90  | Aploderus     | 60  | Bledius        | 61  |
| Alophus       | 243 | Apoderus      | 221 | Blethisa       | 10  |
| Amalus        | 248 | Apteropeda    | 214 | Blitophaga     | 44  |
| Amara         | 21  | Archicarabus  | 9   | Bolbobythus    | 103 |
| Amarochara    | 96  | Argutor       | 24  | Bolitobius     | 81  |
| Amauronyx     | 101 | Aromia        | 190 | Bolitochara    | 87  |
| Amischa       | 89  | Arthrolips    | 52  | Bolitophagus   | 174 |
| Amphicyllis   | 49  | Asaphidion    | 12  | Bostrychus     | 161 |
| Amphimallus   | 181 | Asclera       | 165 | Bothriopterus  | 24  |
| Amphotis      | 139 | Asemum        | 186 | Brachida       | 85  |
| Anacaena      | 41  | Asida         | 174 | Brachionyx     | 240 |
| Anaesthetis   | 193 | Aspidiphorus  | 160 | Brachyderes    | 230 |
| Anaglyptus    | 192 | Astenus       | 67  | Brachygluta    | 102 |
| Anaspis       | 170 | Astilbus      | 94  | Brachynus      | 29  |
| Anatis        | 159 | Astynomus     | 193 | Brachypterolus | 135 |
| Anchomenus    | 27  | Atanygnathus  | 80  | Brachypterus   | 135 |
| Anchodemus    | 27  | Atemeles      | 95  | Brachysomus    | 229 |
| Anchus        | 27  | Atheta        | 90  | Brachytarsus   | 263 |
| Anisandrus    | 262 | Athous        | 120 | Brachytemmus   | 235 |
| Anisarthron   | 191 | Atomaria      | 145 | Bradybatus     | 240 |
| Anisoplia     | 183 | Attagenus     | 132 | Bradycellus    | 20  |
| Anisodactylus | 21  | Attelabus     | 221 | Bromius        | 202 |
| Anisodorus    | 167 | Aulonium      | 152 | Brosus         | 12  |
| Anisosticta   | 156 | Autalia       | 88  | Bruchidius     | 217 |
| Anisotoma     | 49  | Autocarabus   | 8   | Bruchus L.     | 217 |
| Anisoxia      | 171 | Axinotarsus   | 112 | Bryaxis        | 102 |
| Anobium       | 163 | Badister      | 16  | Bryocharis     | 82  |
| Anomala       | 182 | Badura        | 93  | Bryoporus      | 81  |
| Anomognathus  | 87  | Bagous        | 235 | Buprestis      | 125 |
| Anoncodes     | 165 | Balaninus     | 240 | Byctiscus      | 220 |
| Anopleta      | 91  | Balanobius    | 241 | Byrrhus L.     | 134 |
| Anoplus       | 256 | Baptolinus    | 71  | Bythinus       | 102 |
| Anoxia        | 182 | Baris         | 246 | Byturus        | 135 |

|                    |     |                    |     |                    |     |
|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|
| Caccobius          | 177 | Chlorophorus       | 192 | Coprothassa        | 93  |
| Caenocara          | 164 | Chloropterus       | 192 | Coptocephala       | 199 |
| Caenoptera         | 190 | Choleva            | 46  | Coraebus           | 126 |
| Calandra           | 245 | Chonostrophus      | 220 | Cordalia           | 88  |
| Calathus           | 25  | Chromoderus        | 234 | Corticaria         | 148 |
| Callicerus         | 89  | Chrysanthia        | 165 | Corticarina        | 149 |
| Callidium          | 191 | Chrysobothris      | 125 | Corticeus          | 175 |
| Callistus          | 16  | Chrysocarabus      | 8   | Cortodera          | 188 |
| Calodera           | 96  | Chrysomela         | 202 | Corylophus         | 52  |
| Calomicrus         | 208 | Cicindela          | 7   | Corymbites         | 120 |
| Calopus            | 165 | Cicones            | 151 | Corynetes          | 115 |
| Calosiris          | 253 | Cidnorrhinus       | 253 | Coryssomerus       | 247 |
| Calosoma           | 9   | Cionus             | 255 | Cossonus           | 234 |
| Calvia             | 158 | Cis                | 160 | Coxelus            | 151 |
| Calyptomerus       | 50  | Clambus            | 50  | Crataraea          | 98  |
| Camptorrhinus      | 245 | Claviger           | 104 | Cratonychus        | 119 |
| Cantharis          | 109 | Cleonus            | 234 | Creniphilus        | 41  |
| Carabus            | 8   | Cleopus            | 255 | Creophilus         | 77  |
| Cardiola           | 88  | Clerus             | 115 | Crepidodera        | 212 |
| Cardiophorus       | 118 | Clitostethus       | 154 | Criocephalus       | 186 |
| Carphoborus        | 259 | Clivina            | 11  | Crioceris          | 198 |
| Carpophilus        | 137 | Clytanthus         | 192 | Cryphalus          | 259 |
| Cartodere          | 148 | Clytra             | 198 | Cryptarcha         | 140 |
| Cassida            | 216 | Clytus             | 192 | Crypticus          | 174 |
| Cateretes          | 135 | Cnemidotus         | 30  | Cryptobium         | 70  |
| Catops             | 46  | Cnemogonus         | 249 | Cryptocephalus     | 199 |
| Cephennium         | 50  | Cneorrhinus        | 230 | Cryptophagus       | 144 |
| Cerambyx           | 186 | Coccidula          | 154 | Cryptopleurum      | 41  |
| Ceranota           | 100 | Coccigorrhynchites | 219 | Cryptorrhynchidius | 245 |
| Cercyon            | 40  | Coccinella         | 157 | Cryptorrhynchus    | 245 |
| Cerocoma           | 168 | Coccinula          | 157 | Crypturgus         | 259 |
| Cerophytum         | 123 | Coelambus          | 32  | Cteniopis          | 173 |
| Ceruchus           | 185 | Coeliastes         | 249 | Ctenistes          | 103 |
| Cerylon            | 152 | Coeliodes          | 249 | Ctesias            | 132 |
| Cetonia            | 184 | Coelostoma         | 40  | Curculio           | 240 |
| Ceuthorrhynchidius | 253 | Coenorrhinus       | 219 | Cyaniris           | 199 |
| Ceuthorrhynchus    | 250 | Colenis            | 49  | Cybister           | 37  |
| Chaetarthria       | 42  | Colobicus          | 151 | Cybocephalus       | 140 |
| Chaedita           | 93  | Colon              | 47  | Cychramus          | 139 |
| Chaetocarabus      | 8   | Colydium           | 151 | Cychnus            | 7   |
| Chaetocnema        | 214 | Colymbetes         | 36  | Cylindronotus      | 176 |
| Chalcoides         | 213 | Conioleonus        | 233 | Cymbiodyta         | 42  |
| Chalcophora        | 124 | Coniophagus        | 160 | Cymindis           | 29  |
| Charopus           | 112 | Coniophthulma      | 144 | Cynegetis          | 153 |
| Chennium           | 103 | Conopalpus         | 172 | Cyphocleonus       | 234 |
| Chilocorus         | 159 | Conosoma           | 82  | Cyphon             | 128 |
| Chilopora          | 96  | Copelatus          | 35  | Cyrtusa            | 48  |
| Chilotoma          | 199 | Copris             | 176 | Cytilus            | 133 |
| Chlaenius          | 16  | Coprophilus        | 59  |                    |     |
| Chlorophanus       | 232 |                    |     |                    |     |

|               |     |               |     |                  |     |
|---------------|-----|---------------|-----|------------------|-----|
| Dacne         | 143 | Dryocetes     | 260 | Exocentrus       | 194 |
| Dacrila       | 90  | Dryophilus    | 162 | Exochomus        | 159 |
| Dadobia       | 89  | Dryophthorus  | 234 |                  |     |
| Danacaea      | 114 | Dryops .      | 129 | Falagria         | 88  |
| Dapsa         | 153 | Dyschirius    | 11  | Foucartia        | 229 |
| Dascillus     | 128 | Dytiscus      | 36  | Furcipes         | 240 |
| Dasycerus     | 147 |               |     |                  |     |
| Dasytes       | 113 | Ebaeus        | 112 | Gabrius          | 75  |
| Datomiera     | 93  | Echinodera    | 246 | Galeruca         | 207 |
| Deinopsis     | 84  | Elaphrus      | 11  | Galerucella      | 206 |
| Deleaster     | 59  | Elater        | 116 | Gastrallus       | 162 |
| Demetrius     | 27  | Eledona       | 174 | Gastroidea       | 204 |
| Dendroctonus  | 258 | Elleschus     | 238 | Gauropterus      | 71  |
| Dendrophilus  | 106 | Emphylus      | 145 | Gaurotes         | 188 |
| Denticollis   | 123 | Emus .        | 77  | Georyssus        | 131 |
| Deporus       | 220 | Enalodroma    | 91  | Geostiba         | 89  |
| Dermestes     | 131 | Encephalus    | 86  | Geotrupes        | 177 |
| Derocrepis    | 212 | Endomychus    | 153 | Gibbium . .      | 164 |
| Deronectes    | 33  | Enicmus       | 148 | Glischrochilus   | 140 |
| Diachromus    | 21  | Ennearthron   | 161 | Globicornis      | 132 |
| Dianous       | 66  | Enochrus      | 42  | Glossola         | 90  |
| Diaperis      | 174 | Epaphius      | 15  | Gnathocerus      | 175 |
| Diastictus    | 180 | Ephistemus    | 146 | Gnathoncus       | 105 |
| Dibolia       | 215 | Epicometis    | 184 | Gnorimus         | 183 |
| Dicerca       | 124 | Epilachna     | 153 | Gnypeta .        | 89  |
| Dictyopterus  | 108 | Epipolaeus    | 243 | Goniocarabus     | 8   |
| Dilacra .     | 90  | Epitrix       | 213 | Gonodera         | 173 |
| Dimetrota     | 93  | Epuraea       | 138 | Gracilia .       | 187 |
| Dinaraea      | 90  | Eremotus      | 234 | Grammoptera .    | 188 |
| Dinarda       | 97  | Ergates       | 186 | Graphoderes      | 36  |
| Dinopsis      | 84  | Erirrhinus    | 237 | Graptodytes .    | 33  |
| Diodyrhynchus | 219 | Ernobius      | 162 | Gronops          | 245 |
| Diplocoelus   | 143 | Ernoporus     | 259 | Grynocharis      | 134 |
| Dirrhagus     | 124 | Erysx         | 173 | Grypidius        | 237 |
| Disopora      | 90  | Esolus        | 130 | Grypys           | 237 |
| Dissoleucas   | 218 | Euaesthetus   | 66  | Gymnetron        | 254 |
| Ditoma        | 151 | Eubria        | 128 | Gymnopleurus     | 176 |
| Dolichosoma   | 114 | Eucarabus     | 9   | Gymnusa . . .    | 85  |
| Dolopius      | 122 | Eucinetus     | 129 | Gynandrophthalma | 199 |
| Domene        | 69  | Eucnemis      | 123 | Gyrinus          | 37  |
| Donacia       | 195 | Euconnus      | 51  | Gyrophaena       | 86  |
| Dorcadion     | 192 | Eumolpus      | 202 |                  |     |
| Dorcatoma     | 163 | Euplectus     | 101 | Habrocerus       | 80  |
| Dorcus        | 185 | Europhilus    | 26  | Habroloma        | 127 |
| Dorytomus     | 236 | Euryporus     | 77  | Haemonia         | 195 |
| Drapetes      | 124 | Eurythyrea    | 125 | Haliplus         | 30  |
| Drilus        | 111 | Euryusa       | 87  | Hallomenus       | 171 |
| Dromaeolus    | 123 | Eusomus       | 229 | Haltica          | 211 |
| Dromius       | 28  | Eustrophus    | 171 | Halycia          | 158 |
| Drupenatus    | 248 | Eutelocarabus | 9   | Hapalaraea       | 57  |
|               |     | Euthia        | 50  | Haplocnemia      | 193 |



|                 |     |              |     |                 |     |
|-----------------|-----|--------------|-----|-----------------|-----|
| Haplocnemus     | 113 | Hylastinus   | 258 | Lamprinus       | 83  |
| Haploderus      | 24  | Hylecoetus   | 116 | Lamprobyrrhulus | 133 |
| Haploderus      | 60  | Hylesinus    | 257 | Lamprosoma      | 202 |
| Haploharpalus   | 18  | Hylobius     | 243 | Lampyrus        | 109 |
| Haptosoelis     | 207 | Hylophilus   | 167 | Laricobius      | 116 |
| Harminius       | 263 | Hylotrupes   | 191 | Larinus         | 232 |
| Harmonia        | 158 | Hylurgops    | 258 | Lasioderma      | 163 |
| Harpalus        | 17  | Hylurgus     | 258 | Lasiorrhynchus  | 219 |
| Hedobia         | 161 | Hymenalia    | 173 | Lasiotrechus    | 15  |
| Helichus        | 129 | Hypatheta    | 92  | Lathelmis       | 130 |
| Helmis          | 130 | Hypebaeus    | 112 | Lathridius      | 147 |
| Helochares      | 42  | Hypera       | 244 | Lathrimaeum     | 58  |
| Helodes         | 128 | Hyperaspis   | 155 | Lathrobium      | 69  |
| Helophorus      | 39  | Hyphydrus    | 31  | Lebia           | 27  |
| Helops          | 176 | Hypnoidus    | 118 | Leiestes        | 153 |
| Heptaulacus     | 180 | Hypocaecus   | 105 | Leistus         | 9   |
| Hermaphroditus  | 212 | Hypocassida  | 216 | Lema            | 197 |
| Hesperandrius   | 187 | Hypocoelus   | 124 | Leptacinus      | 70  |
| Hesperus        | 75  | Hypocyrtus   | 84  | Leptidea        | 190 |
| Hetaerius       | 108 | Hypoganus    | 121 | Leptinotarsa    | 202 |
| Heterhelus      | 135 | Hypophloeus  | 175 | Leptura         | 189 |
| Heterocerus     | 131 | Hypulus      | 172 | Leptusa         | 87  |
| Heterophytobius | 247 | Ilybius      | 35  | Lepyrus         | 243 |
| Heterothops     | 77  | Ilyobates    | 96  | Lesteva         | 59  |
| Hexarthrus      | 235 |              |     | Leucoparyphus   | 84  |
| Hippodamia      | 155 | Ipidia       | 139 | Leucosomus      | 234 |
| Hippuriphila    | 213 | Ips          | 261 | Librodor        | 140 |
| Hispella        | 216 | Ischnodes    | 118 | Lichenophanes   | 161 |
| Hister          | 106 | Ischnoglossa | 98  | Licinus         | 17  |
| Homalilus       | 108 | Ischnomera   | 165 | Liesthes        | 153 |
| Homaloplia      | 181 | Ischnopoda   | 88  | Lignyodes       | 238 |
| Homalota        | 87  | Isochara     | 99  | Lilioceris      | 198 |
| Homocochara     | 99  | Isomira      | 173 | Limnebius       | 38  |
| Homoeusa        | 96  | Isorhipis    | 123 | Limnichus       | 133 |
| Hoplia          | 183 |              |     | Limnius         | 130 |
| Hydaticus       | 36  | Judolia      | 189 | Limnobaris      | 247 |
| Hydnobius       | 48  |              |     | Limnoxenus      | 41  |
| Hydraena        | 38  | Kissophagus  | 258 | Limobius        | 245 |
| Hydrobius       | 41  | Labidostomis | 198 | Limodromus      | 27  |
| Hydrochus       | 40  | Laccophilus  | 31  | Limoniscus      | 119 |
| Hydrocyphon     | 129 | Lachnaea     | 198 | Limonius        | 119 |
| Hydronomus      | 236 | Laccobius    | 41  | Liocola         | 184 |
| Hydrophilus     | 42  | Lacon        | 116 | Liodes          | 48  |
| Hydroporus      | 32  | Laemophloeus | 142 | Liogluta        | 92  |
| Hydrothassa     | 204 | Laemostenes  | 25  | Lionychus       | 29  |
| Hydrous         | 42  | Lagarus      | 23  | Liophloeus      | 229 |
| Hygrobia        | 30  | Lagria       | 172 | Liopterus       | 35  |
| Hygroecia       | 90  | Lamia        | 192 | Liopus          | 193 |
| Hygronoma       | 85  | Lampra       | 125 | Liosoma         | 243 |
| Hygrotus        | 32  | Lamprinodes  | 84  | Liparus         | 243 |
| Hylastes        | 258 |              |     |                 |     |

|                |     |               |     |              |     |
|----------------|-----|---------------|-----|--------------|-----|
| Lissodema      | 166 | Meotica       | 97  | Nalassus     | 176 |
| Litargus       | 149 | Mesocarabus   | 8   | Nanophyes    | 253 |
| Lithocharis    | 68  | Mesocoelopus  | 163 | Nargus       | 45  |
| Lixus          | 233 | Mesosa        | 193 | Nartus       | 35  |
| Lochmaea       | 207 | Metabletus    | 28  | Neatus       | 176 |
| Lomechusa      | 95  | Metacantharis | 110 | Nebria       | 10  |
| Longitarsus    | 210 | Metoeus       | 169 | Necrobia     | 115 |
| Loricera       | 11  | Metophonus    | 17  | Necrodes     | 44  |
| Lucanus        | 184 | Miarus .      | 255 | Necrophorus  | 43  |
| Ludius         | 121 | Micraspis     | 156 | Necydalis    | 190 |
| Luperus        | 208 | Micrelus      | 249 | Nemadus      | 45  |
| Lycoperdina    | 153 | Microcara     | 128 | Nemonyx      | 219 |
| Lyctus         | 161 | Microdota     | 91  | Nemosoma     | 134 |
| Lygistopterus  | 108 | Microglossa   | 99  | Neobisnius   | 72  |
| Lymexylon      | 116 | Microglotta   | 99  | Neosirocalus | 252 |
| Lyperosomus    | 23  | Microlestes   | 29  | Nephanes     | 53  |
| Lyprus         | 235 | Micromalus    | 106 | Nephus       | 155 |
| Lytharia       | 212 | Micropeplus   | 55  | Neuraphes    | 50  |
| Lytta          | 168 | Microscydmus  | 52  | Niptus       | 164 |
|                |     | Miccotrogus   | 239 | Nitidula     | 137 |
| Magdalis       | 241 | Microzoum     | 174 | Nosodendron  | 133 |
| Malachius      | 112 | Micrurula     | 139 | Notaris      | 236 |
| Maladera       | 181 | Millidium     | 53  | Noterus      | 31  |
| Malthinus      | 110 | Mniobates     | 96  | Notiophilus  | 10  |
| Maltodes       | 111 | Mniophila     | 214 | Notothecta   | 89  |
| Mantura        | 213 | Molops        | 25  | Notoxus      | 167 |
| Masoreus       | 27  | Molorchus     | 190 | Nudobius     | 71  |
| Mecaspis       | 233 | Molytes       | 243 |              |     |
| Mecinotarsus   | 168 | Monochamus    | 193 | Oberea       | 194 |
| Mecinus        | 254 | Mononychus    | 247 | Obrium       | 187 |
| Medon          | 68  | Monotoma      | 141 | Ocalea       | 96  |
| Megaloscapa    | 94  | Mordella      | 169 | Ochina       | 162 |
| Megapenthes    | 118 | Mordellistena | 169 | Ochodaeus    | 180 |
| Megarthus      | 55  | Morphocarabus | 9   | Ochrosis     | 212 |
| Megasternum    | 41  | Morychus      | 133 | Ochtebius    | 38  |
| Megatoma       | 132 | Mycetaea      | 152 | Octotemnus   | 161 |
| Megista        | 93  | Mycetochara   | 173 | Ocypus       | 77  |
| Megodontus     | 8   | Mycetophagus  | 150 | Ocys         | 14  |
| Megopis        | 185 | Mycetoporus   | 80  | Ocyusa       | 97  |
| Melandrya      | 172 | Mycterus      | 167 | Ocyusida     | 97  |
| Melanimon      | 174 | Myelophilus   | 258 | Odacantha    | 29  |
| Melanius       | 24  | Mylacus       | 227 | Odontaeus    | 177 |
| Melanophila    | 125 | Mylaena       | 85  | Odontogethes | 136 |
| Melanophthalma | 149 | Myrmecoxenus  | 151 | Oeceptoma    | 44  |
| Melanotus      | 119 | Myrmedonia    | 95  | Oedemera     | 166 |
| Melasis        | 123 | Myrmetes      | 106 | Olibrus      | 147 |
| Melasoma       | 205 | Myrmoecia     | 95  | Oligella     | 53  |
| Meligethes     | 136 | Myrrha        | 158 | Oligomerus   | 162 |
| Meloe          | 168 |               |     | Oligota      | 85  |
| Melolontha     | 182 |               |     | Olisthopus   | 26  |
| Menesia        | 194 | Nacerda       | 165 | Olophrum     | 58  |

|                  |     |                |     |               |     |
|------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|
| Omalium          | 57  | Paramysia      | 159 | Plagiodera    | 205 |
| Omaseus          | 24  | Pardileus      | 18  | Plagionotus   | 192 |
| Omiias           | 227 | Parnus         | 129 | Platambus     | 35  |
| Omoplus          | 173 | Parophonus     | 19  | Plataraea     | 91  |
| Omophon          | 12  | Patrobus       | 15  | Plateumaris   | 196 |
| Omosita          | 138 | Pediacus       | 142 | Platycis      | 108 |
| Oncomera         | 166 | Pedius         | 23  | Platydema     | 175 |
| Oniticellus      | 176 | Pelecotoma     | 169 | Platynaspis   | 159 |
| Ontholestes      | 77  | Pella          | 94  | Platypus      | 262 |
| Onthophagus      | 177 | Pelochares     | 133 | Platyrrhinus  | 218 |
| Onthophilus      | 104 | Peltodytes     | 30  | Platysma      | 24  |
| Oodes            | 16  | Pentaphyllus   | 175 | Platysoma     | 106 |
| Ootypus          | 146 | Pentaria       | 170 | Platystethus  | 61  |
| Opatrum          | 174 | Perileptus     | 15  | Platystomus   | 263 |
| Opilo            | 114 | Peritelus      | 227 | Plectophloeus | 100 |
| Ophonus          | 17  | Phaedon        | 204 | Plegaderus    | 104 |
| Orchesia         | 171 | Phaenops       | 125 | Pleurophorus  | 180 |
| Orchestes        | 256 | Phalacrus      | 146 | Pocadius      | 139 |
| Orectochilus     | 37  | Phausis        | 108 | Podabrus      | 263 |
| Orobitis         | 249 | Pheletes       | 120 | Podamophilus  | 129 |
| Orochares        | 58  | Philonthus     | 72  | Podagraca     | 213 |
| Orsodacne        | 197 | Philopedon     | 230 | Poecilonota   | 124 |
| Orthochaetes     | 238 | Philydrus      | 42  | Poecilus      | 23  |
| Orthocerus       | 151 | Phloeobium     | 55  | Pogonochaerus | 193 |
| Orthomicus       | 261 | Phloeocharis   | 55  | Polychara     | 99  |
| Orthoperus       | 52  | Phloeonomus    | 57  | Polydrosus    | 228 |
| Orthopleura      | 115 | Phloeophilus   | 114 | Polygraphus   | 259 |
| Orycaephilus     | 141 | Phloeophthorus | 260 | Polyphylla    | 182 |
| Oryctes          | 183 | Phloeopora     | 95  | Poophagus     | 248 |
| Osmoderma        | 183 | Phloeostiba    | 57  | Porcinolus    | 134 |
| Osphya           | 172 | Phloeotrya     | 172 | Prasocuris    | 205 |
| Ostoma           | 134 | Phosphaenus    | 109 | Pria          | 136 |
| Othius           | 71  | Phosphuga      | 45  | Priobium      | 163 |
| Otiorrhynchus    | 226 | Phricocarabus  | 9   | Prionocyphon  | 129 |
| Oxylaemus        | 152 | Phrydiuchus    | 250 | Prionus       | 186 |
| Oxymirus         | 188 | Phyllobius     | 228 | Prionychus    | 173 |
| Oxyomus          | 180 | Phyllobrotica  | 207 | Pristonychus  | 25  |
| Oxypoda          | 97  | Phyllodecta    | 206 | Procraterus   | 118 |
| Oxyporus         | 62  | Phyllodrepa    | 57  | Procrustes    | 8   |
| Oxytelus         | 60  | Phyllopertha   | 182 | Pronomaea     | 85  |
| Oxythyrea        | 184 | Phyllotreta    | 208 | Propylaea     | 159 |
|                  |     | Phymatodes     | 191 | Prosternon    | 121 |
| Pachnephorus     | 202 | Phytobius      | 247 | Proteinus     | 56  |
| Pachnida         | 91  | Phytodecta     | 205 | Psammobius    | 180 |
| Pachybrachys     | 199 | Phytoecia      | 195 | Psammoecus    | 142 |
| Paederus         | 67  | Phytonomus     | 244 | Pselaphus     | 103 |
| Palorus          | 175 | Pissodes       | 241 | Pseudocistela | 173 |
| Panagaeus        | 16  | Pityogenes     | 261 | Pseudocleonus | 234 |
| Paracardiophorus | 119 | Pityophagus    | 140 | Pseudoclerops | 115 |
| Paramecosoma     | 143 | Pityophthorus  | 260 |               |     |
| Parameotica      | 91  | Placusa        | 86  |               |     |

|                |     |                       |     |                |     |
|----------------|-----|-----------------------|-----|----------------|-----|
| Pseudocypus    | 77  | Rhyssemus             | 180 | Sphaerius      | 52  |
| Pseudopelta    | 44  | Riolus                | 130 | Sphaeroderma   | 214 |
| Pseudophonus   | 18  |                       |     | Sphaerosoma    | 152 |
| Pseudoplectus  | 101 | Sacium                | 52  | Sphenophorus   | 245 |
| Pseudorchestes | 256 | Salpingus             | 166 | Sphindus       | 160 |
| Pseudostyphlus | 237 | Saperda               | 194 | Sphodrus       | 25  |
| Psylliodes     | 215 | Saprinus              | 105 | Spondylis      | 186 |
| Ptenidium      | 53  | Scaphidema            | 174 | Staphylinus    | 75  |
| Pterostichus   | 23  | Scaphidium            | 54  | Steatoderus    | 121 |
| Pteryx         | 54  | Scaphium              | 54  | Stegobium      | 162 |
| Ptilinus       | 163 | Scaphosoma            | 55  | Stenichnus     | 51  |
| Ptilium        | 53  | Schistoglossa         | 89  | Stenocarus     | 253 |
| Ptilolum       | 53  | Sciaphilus . .        | 229 | Stenocorus     | 188 |
| Ptinella       | 53  | Sciodrepoides Hatch . | 46  | Stenolophus    | 19  |
| Ptinus         | 164 | Scirtes               | 129 | Stenomax       | 176 |
| Ptomophagus    | 45  | Scolytus              | 257 | Stenopterus    | 190 |
| Pullus         | 154 | Scopaeus              | 68  | Stenostola     | 195 |
| Pycnomerus     | 151 | Scraptia              | 167 | Stenus         | 62  |
| Pycnota        | 94  | Scydmaenus            | 52  | Stenusus .     | 87  |
| Pyrochroa      | 167 | Scymnus .             | 154 | Stereonychus   | 255 |
| Pyrrhalta      | 207 | Scythropus            | 229 | Steropus       | 24  |
| Pyrrhidium     | 191 | Seladon               | 17  | Stichoglossa   | 98  |
| Pytho          | 166 | Selatosomus           | 121 | Stilbus        | 147 |
|                |     | Semiadalia            | 156 | Stilicus       | 67  |
| Quasimus       | 118 | Semiophonus           | 17  | Stomis .       | 23  |
| Quedius        | 78  | Serica                | 181 | Strangalia     | 189 |
|                |     | Sericoderus           | 52  | Strophosomus   | 230 |
| Rabocerus .    | 166 | Sericosomus           | 122 | Subcoccinella  | 153 |
| Reichenbachia  | 102 | Sericus               | 122 | Symbiotel      | 152 |
| Rhagium        | 187 | Sermyla               | 208 | Synaptus       | 122 |
| Rhagonycha     | 110 | Siagonum              | 55  | Syncalypta     | 134 |
| Rhamnusium     | 187 | Sibinia               | 239 | Synharmonia    | 157 |
| Rhamphus       | 257 | Silpha                | 44  | Synchita       | 151 |
| Rhantus .      | 35  | Silusa                | 87  | Syntomium      | 59  |
| Rhaphitropis   | 218 | Silvanoprus           | 142 | Synuchus       | 25  |
| Rheochara      | 100 | Silvanus .            | 142 | Systemocerus   | 185 |
| Rhinocyllus    | 232 | Simplocaria           | 133 |                |     |
| Rhinomacer     | 219 | Sinodendron           | 185 | Tachinus       | 83  |
| Rhinomias      | 227 | Sipalia .             | 89  | Tachyerges     | 256 |
| Rhinoncus      | 248 | Sirocalodes           | 253 | Tachyporus     | 82  |
| Rhinosimus     | 166 | Sisyphus              | 176 | Tachypus       | 12  |
| Rhizobius      | 154 | Sitodrepa             | 162 | Tachys         | 15  |
| Rhizophagus    | 140 | Sitona                | 230 | Tachyta        | 15  |
| Rhizotrogus    | 181 | Smicronyx             | 238 | Tachyusa       | 88  |
| Rhopalocerina  | 86  | Smicrus               | 54  | Tanygnathus    | 80  |
| Rhopalodontus  | 160 | Soronia               | 139 | Tanymecus      | 232 |
| Rhopalopus     | 190 | Sospita               | 158 | Tanysphyrus    | 236 |
| Rhynchaenus    | 256 | Spercheus             | 39  | Taphrorhynchus | 260 |
| Rhynchites     | 220 | Spermophagus          | 217 | Taphrorhynchus | 260 |
| Rhyncolus      | 235 | Sphaeridium           | 40  | Tapinotus      | 248 |
| Rhytidosomus   | 248 | Sphaeriestes          | 166 | Taxicera       | 94  |

|               |     |               |     |              |     |
|---------------|-----|---------------|-----|--------------|-----|
| Telmatophilus | 143 | Trachyphloeus | 227 | Tychius      | 238 |
| Tenebrio      | 176 | Trachys       | 127 | Tychus       | 103 |
| Tenebrioides  | 134 | Traumoecia    | 91  | Typhaea      | 150 |
| Teredus       | 152 | Trechoblemus  | 15  | Typhoeus     | 177 |
| Teretrius     | 104 | Trechus       | 15  | Tyrus        | 103 |
| Tetraplatypus | 21  | Triarthron    | 48  | Tytthaspis   | 156 |
| Tetratoma     | 171 | Tribolium     | 175 | Uleiota      | 142 |
| Tetropium     | 186 | Trichius      | 184 | Uloma        | 175 |
| Tetrops       | 195 | Trichocele    | 113 | Urodon       | 218 |
| Thalycra      | 139 | Trichodes     | 115 | Valgus       | 183 |
| Thamiaraea    | 94  | Trichoterus   | 187 | Velleius     | 77  |
| Thamiocolus   | 249 | Trichonyx     | 101 | Vibidia      | 158 |
| Thanasimus    | 115 | Trichophya    | 80  | Vincenzellus | 166 |
| Thanatophilus | 44  | Trichopterix  | 54  |              |     |
| Tharops       | 123 | Trichotichnus | 19  | Xantholinus  | 71  |
| Thea          | 158 | Trimium       | 100 | Xestobium    | 162 |
| Thectura      | 87  | Trinodes      | 133 | Xyleborus    | 262 |
| Thiasophila   | 98  | Triphyllus    | 149 | Xylechinus   | 258 |
| Thinonoma     | 88  | Triplax       | 143 | Xyletinus    | 163 |
| Thoracophorus | 55  | Tritoma       | 143 | Xylita       | 172 |
| Throscus      | 124 | Trixagus      | 135 | Xylocleptes  | 260 |
| Thryogenes    | 237 | Troglops      | 111 | Xylodrepa    | 44  |
| Thymalus      | 135 | Trogoderma    | 132 | Xylodromus   | 58  |
| Tillus        | 114 | Trogophloeus  | 59  | Xylonites    | 161 |
| Timarcha      | 206 | Trogosita     | 134 | Xyloterus    | 260 |
| Tinotus       | 95  | Tropideres    | 218 | Xylotrechus  | 191 |
| Tomicus       | 261 | Tropinota     | 184 |              |     |
| Tomocarabus   | 8   | Tropiphorus   | 232 | Zabrus       | 23  |
| Tomoxia       | 169 | Trox          | 181 | Zacladus     | 249 |
| Toxotus       | 188 | Trypodendron  | 260 | Zeugophora   | 197 |
| Trachodes     | 242 | Trypoptys     | 163 | Zyras        | 94  |