

## Les Espèces de *Peronospora* Corda de Roumanie.

par Tr. Săvulescu (Bucuresti).

Les espèces de *Peronospora* Corda ont été, dans le passé, peu étudiées par les botanistes qui se sont occupé de la flore mycologique de notre pays. Fuss (2) indique pour la première fois en 1878 de Transsilvanie deux *Peronospora*, à savoir: *Peronospora parasitica* (Pers.) Tul. sur *Capsella Bursa pastoris* et *Peronospora effusa* de By sur *Chenopodium hybridum*.

Linhart distribue par ses "Fungi Hung." encore deux espèces qu'il les a trouvé sur le territoire transsilvain: *Peronospora grisea* Unger sur *Veronica Beccabunga* et *Peronospora sordida* Berk. et Br. sur *Scrophularia nodosa*.

Bubák (1) mentionne en Banat à "Băile Herculane" encore trois espèces: *Peronospora Calaminthae* Fuckel sur *Satureja hungarica*, *Peronospora parasitica* (Pers.) Tul. sur *Lunaria pachyrhiza* et *Peronospora calotheca* De By sur *Galium flavicans*.

Petrescu (9) indique à son tour de Moldavie, *Peronospora Dianthi* De By sur *Sillene gallica* et *Peronospora parasitica* (Pers.) Tul. sur quelques Crucifères.

Tel était le bilan de nos connaissances jusqu'au moment où Gäumann (3) combinant la méthode expérimentale avec la méthode biométrique a obtenu de résultats remarquables et féconds pour le progrès de la systématique de genre *Peronospora*.

Les travaux de Gäumann ont servi comme base et point de départ pour de recherches similaires dans les différents pays.

Ainsi, pour ne pas donner qu'un seul exemple, A. A. et P. A. Jacewski (4) en U.R.S.S. en soumettant en une révision rigoureuse les données antérieures réussirent non seulement de confirmer les résultats de Gäumann mais d'ajouter encore de nouvelles espèces. Ces deux auteurs indiquent de l'U.R.S.S. pas moins de 232 espèces de *Peronospora*, accompagnée chacune de sa diagnose.

Moi et ma distinguée collaboratrice Prof. T. Rayss, en utilisant la méthode de Gäumann, nous avons entrepris depuis 1929 l'étude des Péronosporacées de Roumaine. Les résultats de nos investigations ont fait l'objet de quatre contributions succéssives (13—16) où sont décrites une série de nouvelles espèces. Ultérieurement continuant les

excursions et les recherches, j'ai ajouté encore d'autres espèces pas mentionnées dans les travaux antérieures (10—12).

Simultanément un des mes élèves, Rădulescu en collaboration avec Oescu ont étudié les Péronosporacées de la dépression Jijia de la Moldavie et ont publié trois notes (6—8), avec de résultats intéressants.

Moesz (5) dans son travail récent sur les Archimycètes et les Phycomycètes de l'Hongrie indique de Transsilvanie et de Banat, *Peronospora Chenopodii* Schlecht., *P. Lunariae* Gäum., *P. Calaminthae* Fuck., *P. Hyoscyami* De By, *P. grisea* Unger et *P. sordida* Berk. et Br., Les indications de Moesz se basent exclusivement sur les donnés de auteurs antérieurs (Fuss, Linhart et Kubák).

Nous donnons dans le présent travail l'énumérations complète des espèces de *Peronospora* trouvées jusqu'à présent en Roumanie. On y trouvera les espèces et les plantes hospitalières nouvelles et un certain nombre d'espèces intéressantes et rares pour la flore générale du genre *Peronospora*. Nous ajoutons aussi plusieurs espèces qui sont mentionnées ici pour la première fois. Ce travail se base d'une part sur nos propres travaux et matériaux et d'autre part sur les travaux et les matériaux de Oescu et Rădulescu, Petrescu, I. Constantineanu et aussi d'autres collecteurs sporadiques.

La plupart (113) des espèces de *Peronospora* indiquées dans le présent travail ont été déjà distribuées par le "Herbarium mycologicum romanicum" (Facicules: III, V, VII, XI, XXIII, et XXVI). Les spécialistes ont donc la possibilité de vérifier l'exactitude de nos déterminations et de nos observations. Nous espérons pouvoir distribuer dans les fascicules suivantes de notre exsiccatum aussi les autres espèces de *Peronospora* découvertes en Roumanie. Au total, le nombre des espèces de *Peronospora* indiquées par nous dans ce travail s'élève à 202 espèces vivant sur 282 plantes hospitalières.

#### Abbréviations fréquentes dans le texte:

Fuss M. (2): Fuss, Aufzähl.

Gäumann E. (3): Gäum., Monogr.

Jaczewski A. A. et P. A. Jaczewski (4): Jaczew., Phycon.  
Linhart, Fungi Hung.: L. F. H.

Moesz G. (5): Moesz, Phycom.

Oescu V. C. et I. M. Rădulescu (6—8): Oescu et Răduł., Note I;  
Note II; Note III.

Săvulescu Tr., Herbarium Mycologicum Romanicum: H. M. R.

Săvulescu Tr. et T. Rayss (13—16): Săyul. et Rayss, Contrib. I;  
Contrib. II; Contrib. III; Contrib. IV.

Les plantes marquées d'un astérisque sont indiquées pour la première fois dans le présent travail.

**Peronospora Corda.**

**Tableau pour la détermination des sections et sous-sections.**

- A.— L'épispore des oospores lisse ou pourve de quelques plis irréguliers, qui lui donnent une forme anguleuse irrégulière, jamais régulièrement verruqueuse ou réticulée . . . . . Section *Leiothecae* Schröter
- a.— La paroi de l'oogone épaisse constituée de deux couches, ne tombe pas ensemble après la maturité des oospores . . . . . Sous-section *Parasitiae* De By
- b.— La paroi de l'oogone mince, constituée d'une seule couche, après la maturité des oospores tombent ensemble . . . . . Sous-section *Effusae* De By
- B.— L'épispore des oospores pourvue d'épaississements verruqueux ou en forme de côtes réunies en un réseau régulier . . . . . Section *Calothecae* De By
- c.— Les oospores couvertes, plus ou moins, de verrucosités sphériques, jamais avec de côtes réunie en un réseau . . . . . Sous-section *Verrucosae* A. Fischer
- d.— Les oospores pourvues d'épaississements en forme de côtes réunies en un réseau régulier . . . . . Sous-section *Reticulatae* A. Fischer

**Tableau systématique des espèces de Peronospora Corda, trouvées en Roumanie.**

A.— Section *Leiothecae* Schröter

a.— Sous-section *Parasitiae* De By

*Urticaceae.*

*Urtica:* Conidies 20—32=17—25  $\mu$  . . . . *P. De Baryi* (Salm. et Ware) Viennot

*Papaveraceae.*

*Corydalis:* Conidies 15—30=14—26  $\mu$  . . *P. Bulbocapni* Beck  
Conidies 20—24=15—18  $\mu$  . . *P. Corydalis* De By

*Cruciferae.*

*Alliaria:* Conidies 21—33=15—21  $\mu$  . . . *P. Niessleana* Berlese

*Alyssum:* Conidies 18—26=15—22  $\mu$  . . . *P. Alyssi Arduini* Hrubby  
Conidies 17—28=15—22  $\mu$  . . . *P. Alyssi calycini* Gäm.

*Arabis:* Conidies 15—21=10—18  $\mu$  . . . *P. Arabidis hirsutae* Gäm.  
Conidies 11—24=9—23  $\mu$  . . . *P. Arabidis Turritae* Gäm.

- Barbaraea*: Conidies 15—25=9—18  $\mu$  . . . *P. Barbaraeae* Gäm.  
*Berteroia*: Conidies 15—28=14—20  $\mu$  . . . *P. Berteroae* Gäm.  
*Brassica*: Conidies 12—27=12—23  $\mu$  . . . *P. Brassicae* Gäm.  
*Bunias*: Conidies 16—32=12—26  $\mu$  . . . *P. Buniadis* Gäm.  
*Camelina*: Conidies 18—25=16—21  $\mu$  . . . *P. Camelinae* Gäm.  
*Capsella*: Conidies 16—27=15—21  $\mu$  . . . *P. parasitica* (Pers.) Fries  
*Cardamine*: Conidies 17—22=15—19  $\mu$  . . . *P. Cardamines lacinitae*  
Gäm.  
*Cheiranthus*: Conidies 15—25=12—24  $\mu$  . . . *P. Cheiranthi* Gäm.  
*Chorispora*: Conidies 19—29=17—26  $\mu$  . . . *P. Chorisporae* Gäm.  
*Conringia*: Conidies 15—21=13—18  $\mu$  . . . *P. Conringiae* Gäm.  
*Coronopus*: Conidies 14—31=11—24  $\mu$  . . . *P. Coronopi* Gäm.  
*Dentaria*: Conidies 11—23=9—18  $\mu$  . . . *P. Dentariae* Rabenh.  
Conidies 16—28=12—24  $\mu$  . . . *P. Dentariae macrophyllae*  
Gäm.  
*Diplotaxis*: Conidies 17—27=15—24  $\mu$  . . . *P. Diplotaxidis* Gäm.  
*Erophila*: Conidies 14—18=11—15  $\mu$  . . . *P. Erophilae* Gäm.  
*Erysimum*: Conidies 12—21=12—17  $\mu$  . . . *P. Erysimi* Gäm.  
*Euclidium*: Conidies 15—32=15—27  $\mu$  . . . *P. Euclidii* Sävul. et Rayss  
*Hesperis*: Conidies 21—24=19—21  $\mu$  . . . . *P. Hesperidis* Gäm.  
*Isatis*: Conidies 14—32=12—24  $\mu$  . . . . *P. Isatidis* Gäm.  
*Lepidium*: Conidies 14—35=11—24  $\mu$  . . . *P. Lepidii perfoliati* Sävul.  
et Rayss  
Conidies 21—24=16—21  $\mu$  . . . *P. Lepidii sativi* Gäm.  
*Lunaria*: Conidies 24—33=18—22  $\mu$  . . . *P. Lunariae* Gäm.  
*Matthiola*: Conidies 12—24=9—21  $\mu$  . . . *P. Matthiolae* Gäm.  
*Neslea*: Conidies 12—24=11—19  $\mu$  . . . . *P. Nesleae* Gäm.  
*Raphanus*: Conidies 12—27=12—23  $\mu$  . . . *P. Brassicae* Gäm.  
*Rapistrum*: Conidies 15—30=13—24  $\mu$  . . . *P. Rapistri Jacewski et*  
Serguieva  
*Roripa*: Conidies 15—22=13—18  $\mu$  . . . . *P. Roripae islandicae* Gäm.  
*Sinapis*: Conidies 12—27=12—23  $\mu$  . . . *P. Brassicae* Gäm.  
*Sisymbrium*: Conidies 12—26=12—21  $\mu$  . . *P. Sisymbrii Loeselii* Gäm.  
Conidies 18—26=16—20  $\mu$  . . *P. Sisymbrii officinalis*  
Gäm.  
Conidies 16—27=14—27  $\mu$  . . *P. Sisymbrii orientalis*  
Gäm.  
Conidies 17—30=16—24  $\mu$  . . *P. Sisymbrii Sophiae* Gäm.  
*Stenophragma*: Conidies 17—23=15—19  $\mu$  . *P. Arabidopsis* Gäm.  
*Syrenia*: Conidies 17—27=14—22  $\mu$  . . . *P. Syreniae cuspidatae*  
Oescu et Rädl.  
*Thlaspi*: Conidies 27—36=24—27  $\mu$  . . . *P. Thlaspeos arvensis*  
Gäm.  
Conidies 16—27=14—21  $\mu$  . . . *P. Thlaspeos perfoliati*  
Gäm.

*Turritis*: Conidies 16—21=11—21  $\mu$  . . . *P. ochroleuca* Cesati  
*Resedaceae*.

*Reseda*: Conidies 14—27=12—24  $\mu$  . . . *P. crispula* Fuckel  
*Euphorbiaceae*.

*Euphorbia*: Conidies 17—24=13—16  $\mu$  . . . *P. Cyparissiae* De By  
Conidies 15—22=12—16  $\mu$  . . . *P. Euphorbiae* Fuckel  
Conidies 19—26=15—24  $\mu$  . . . *P. valesiaca* Gäum.

b. — Sous-section *Effusae* De By

*Polygonaceae*.

*Fagopyrum*: Conidies 16—26=12—16  $\mu$  . . . *P. Ducometi* Siemaszko et Jankowska

*Polygonum*: Conidies 27—35=16—22  $\mu$  . . . *P. Polygoni* (Halsted) Fischer

*Rumex*: Conidies 23—28=17—24  $\mu$  . . . *P. Rumicis* Corda

*Chenopodiaceae*.

*Atriplex*: Conidies 15—29=13—24  $\mu$  . . . *P. Atriplicis hastatae* Sävul. et Rayss

Conidies 17—34=15—25  $\mu$  . . . *P. Atriplicis hortensis* Sävul. et Rayss

Conidies 15—28=15—26  $\mu$  . . . *P. Atriplicis tataricae* Oescu et Rădul.

Conidies 20—31=16—24  $\mu$  . . . *P. minor* (Casp.) Gäum.

Conidies 18—32=13—23  $\mu$  . . . *P. nitens* Oescu et Rădul.

Conidies 15—33=15—27  $\mu$  . . . *P. tatarica* Sävul. et Rayss

*Beta*: Conidies 21—27=16—20  $\mu$  . . . . . *P. Schachtii* Fuckel

*Chenopodium*: Conidies 17—34=16—31  $\mu$  *P. Boni Henrici* Gäum.

Conidies 17—32=8—24  $\mu$  *P. Chenopodii* Schlechtd.

Conidies 19—40=10—23  $\mu$  *P. Chenopodii glauci* Gäum.

Conidies 18—32=15—30  $\mu$  *P. Chenopodii opulifolii* Sävul. et Rayss

Conidies 19—23=10—24  $\mu$  *P. Chenopodii polyspermi* Gäum.

Conidies 19—36=15—27  $\mu$  *P. Chenopodii urbici* Sävul. et Rayss

Conidies 19—33=12—30  $\mu$  *P. Chenopodii vulvariae* Sävul. et Rayss

Conidies 18—36=18—28  $\mu$  *P. muralis* Gäum.

Conidies 24—36=18—22  $\mu$  *P. variabilis* Gäum.

*Kochia*: Conidies 25—29=19—23  $\mu$  . . . *P. Kochiae* Gäum.

(*Bassia*)

*Obione*: Conidies 14—35=13—30  $\mu$  . . . *P. Obionis verruciferae* Sävul. et Rayss

*Salsola*: Conidies 29—45=16—20  $\mu$  . . . *P. vistulensis* Wroblewski

*Spinacia*: Conidies 20—32=15—31  $\mu$  . . . *P. Spinaciae* Laubert

*Amaranthaceae.*

*Amaranthus:* Conidies 9—26≈8—23 μ . *P. Amaranthi* Gämum.

*Caryophyllaceae.*

*Spergula:* Conidies 20—35≈16—20 μ . . *P. obovata* Bonorden

*Ranunculaceae.*

*Ficaria:* Conidies 21—30≈16—21 μ . . . *P. Ficariae* (Nees v. Es.) Tul.

*Helleborus:* Conidies 13—40≈12—29 μ . . *P. Hellebori-purpurascens* Sävul. et Rayss

*Ranunculus:* Conidies 13—37≈10—31 μ . *P. Ranunculi* Gämum.

Conidies 16—32≈15—28 μ . *P. Ranunculi carpathici* Sävul. et Rayss

Conidies 16—26≈11—24 μ . *P. Ranunculi oxyspermi* Jaczewski et Sergueiva

Conidies 14—27≈14—22 μ . *P. Ranunculi Steveni* Sävul. et Rayss

Conidies 15—30≈10—24 μ . *P. Ranunculi Sardoi* Sävul. et Rayss

*Papaveraceae.*

*Fumaria:* Conidies 17—26≈15—18 μ . . *P. affinis* Rossm.

*Glaucium:* Conidies 12—27≈10—23 μ . . *P. Glaucii* Lobik

*Papaver:* Conidies { 15—18≈14—16 μ *P. arborescens* (Berk.) De By  
18—27≈18—22 μ By

*Saxifragaceae.*

*Chrysosplenium:*

Conidies 17—27≈16—20 μ . . . . *P. Chrysosplenii* Fuckel

*Rosaceae.*

*Alchemilla:* Conidies 12—27≈11—23 μ . *P. Alchemillae* Otth.

*Rosa:* Conidies 13—24≈11—21 μ . . . . *P. Rosae-gallicae* Sävul. et Rayss

*Papilionaceae.*

*Astragalus:* Conidies 14—30≈12—27 μ . *P. astragalina* Sydow

*Faba:* Conidies 18—30≈14—21 μ . . . . *P. Fabae* Jaczewski et Sergueiva

*Galega:* Conidies 14—31≈14—27 μ . . . . *P. Galegae* Sävul. et Rayss

*Lotus:* Conidies 17—35≈15—29 μ . . . . *P. Lotorum* Sydow

*Medicago:* Conidies 18—31≈16—23 μ . . . . *P. aestivalis* Sydow

*Onobrychis:* Conidies 21—34≈25—28 μ . *P. Ruegeriae* Gämum.

*Trifolium:* Conidies 18—26≈7—24 μ . . . *P. Trifolii alpestris* Gämum.

Conidies 16—21≈15—19 μ . . . *P. Trifolii arvensis* Sydow

Conidies 16—24≈15—24 μ . . . *P. Trifolii minoris* Gämum.

Conidies 22—29≈20—24 μ . . . *P. Trifolii repentis* Sydow

*Geraniaceae.*

*Geranium:* Conidies 20—33≈19—27 μ . . . *P. conglomerata* Fuckel

*Violaceae.*

*Viola:* Conidies 18—26=14—19  $\mu$  . . . . *P. Violae* De By

*Primulaceae.*

*Anagallis:* Conidies 13—26=9—23  $\mu$  . . . *P. candida* Fuckel

*Androsace:* Conidies 15—22=12—17  $\mu$  . . . *P. Androsaces* Niessl

*Primula:* Conidies 16—32=12—28  $\mu$  . . . . *P. Oerteliana* Kühn

*Apocynaceae.*

*Vinca:* Conidies 24—28=16—18  $\mu$  . . . . *P. Vincae* Schröter

*Labiatae.*

*Calamintha:* Conidies 19—26=18—22  $\mu$  . . *P. Calaminthae* Fuckel

*Lamium:* Conidies 18—28=15—21  $\mu$  . . . *P. Lamii* A. Braun

*Scutellaria:* Conidies 30—35=15—20  $\mu$  . . *P. Scutellariae* Beilin

*Stachys:* Conidies 12—28=8—24  $\mu$  . . . . *P. Stachydis* Sydow

*Mentha:* Conidies 27—42=12—17  $\mu$  . . . *P. stigmaticola* Raunkiaer

*Solanaceae.*

*Hyoscyamus:* Conidies 16—30=15—19  $\mu$  *P. Hyoscyami* De By

*Scrophulariaceae.*

*Linaria:* Conidies 22—40=14—37  $\mu$  . . . *P. flava* Gäum.

Conidies 24—48=14—27  $\mu$  . . . . *P. Linariae genistifoliae*  
Sävul. et Rayss

*Scrophularia:* Conidies 15—25=16—20  $\mu$  *P. sordida* Berk. et Br.

*Veronica:* Conidies 20—23=15—18  $\mu$  . . . *P. agrestis* Gäum.

Conidies 20—27=15—20  $\mu$  . . . *P. arvensis* Gäum.

Conidies 22—32=16—19  $\mu$  . . . *P. grisea* Unger

Conidies 26—39=10—27  $\mu$  . . . *P. palustris* Gäum.

Conidies 28—34=10—26  $\mu$  . . . *P. silvestris* Gäum.

Conidies 18—27=15—19  $\mu$  . . . *P. verna* Gäum.

*Plantaginaceae.*

*Plantago:* Conidies 15—32=13—25  $\mu$  . . . *P. alta* Fuckel

*Rubiaceae.*

*Galium:* Conidies 12—32=10—22  $\mu$  . . . . *P. Galii rubioides* Sävul.  
et Rayss

*Valerianaceae.*

*Valerianella:* Conidies 20—27=15—19  $\mu$  *P. Valerianellae* Fukel

*Dipsacaceae.*

*Dipsacus:* Conidies 21—35=15—28  $\mu$  . . . *P. Dipsaci* (Nees v. Es.)  
Tul.

*Campanulaceae.*

*Campanula:* Conidies 32—40=17—20  $\mu$  . . *P. Corollae* Tranzschel

*Compositae.*

*Anthemis:* Conidies 21—39=8—24  $\mu$  . . . . *P. Anthemidis* Gäum.

*Chrysanthemum:*

Conidies 25—39=17—21  $\mu$  . . . . . *P. Radii* De By

*Matricaria*: Conidies 27—45=13—26  $\mu$  . *P. leptosperma* (De By)  
Gäum.

*Tanacetum*: Conidies 26—51=22—27  $\mu$  . *P. Tanaceti* Gäum.  
*Liliaceae*.

*Allium*: Conidies 37—54=24—30  $\mu$  . . . *P. Schleideni* Unger

### B.-Section *Calothecae* De Bary

c. — Sous-section *Verrucosae* A. Fischer.

#### *Caryophyllaceae*.

*Agrostemma*: Conidies 17—34=10—27  $\mu$  *P. Agrostematis* Gäum.

*Arenaria*: Conidies 18—22=14—18  $\mu$  . . . *P. campestris* Gäum.

*Holosteum*: Conidies 20—25=15—20  $\mu$  . . . *P. Holostei* Casp.

*Lychnis*: Conidies 24—40=12—28  $\mu$  . . . *P. Lychnitis* Gäum.

*Melandryum*: Conidies 20—32=10—24  $\mu$  *P. Melandryi* Gäum.

*Moehringia*: Conidies 14—18=12—16  $\mu$  . *P. Arenariae* (Berk.) Tul.

#### *Cruciferae*.

*Berteroa*: Conidies 14—26=10—23  $\mu$  . . . *P. Alyssi incani* Gäum.

#### *Papilionaceae*.

*Ononis*: Conidies 21—25=15—20  $\mu$  . . . *P. Ononidis* Wilson

#### *Borraginaceae*.

*Asperugo*: Conidies 18—34=16—27  $\mu$  . . . *P. Asperuginis* Schröter

*Nonnaea*: Conidies 14—26=11—23  $\mu$  . . . *P. Nonnaeae* Jaczewski et Serguieva

#### *Dipsacaceae*.

*Cephalaria*: Conidies 18—45=12—31  $\mu$  . *P. Cephalariae laevigatae*  
Sävul. et Rayss

d. — Sous-section *Reticulatae* A. Fischer.

#### *Caryophyllaceae*.

*Cerastium*: Conidies 9—19=9—17  $\mu$  . . . *P. Cerastii brachypetalii*  
Sävul. et Rayss

Conidies 16—19=13—17  $\mu$  . . . *P. tomentosa* Fuckel

Conidies 19—31=8—18  $\mu$  . . . *P. trivialis* Gäum.

*Gypsophila*: Conidies 13—22=12—15  $\mu$  . *P. Gypsophilae* Jaczewski

*Herniuria*: Conidies 20—25=15—19  $\mu$  . . . *P. Herniariae* De By

*Spergularia*: Conidies 20—33=15—20  $\mu$  *P. Lepigoni* Fuckel

*Scleranthus*: Conidies 15—24=15—22  $\mu$  *P. Scleranthi* Rabenh.

*Stellaria*: Conidies 21—36=13—21  $\mu$  . . . *P. media* Gäum.

#### *Ranunculaceae*.

*Delphinium*: Conidies 18—38=7—19  $\mu$  . *P. Consolidae* Lagerheim

#### *Papilionaceae*.

*Glycine*: Conidies 14—30=14—29  $\mu$  . . . *P. manshurica* (Naumoff)  
Sydow

*Lathyrus*: Conidies 12—25=11—20  $\mu$  . . . *P. Lathyri aphaca* Sävul.

et Rayss

Conidies 12—27=11—24  $\mu$  . . . *P. Lathyri hirsuti* Sävul.

et Rayss

Conidies 19—31=14—18  $\mu$  . . . *P. Orobi* Gäum.

*Medicago*: Conidies 13—28=12—23  $\mu$  . . . *P. romanica* Sävul et  
Rayss

*Pisum*: Conidies 18—30=15—20  $\mu$  . . . . *P. Pisi* Sydow

*Vicia*: Conidies 16—30=11—21  $\mu$  . . . . *P. Mayori* Gäum.

Conidies 10—31=9—29  $\mu$  . . . . *P. sepium* Gäum.

Conidies 16—24=14—20  $\mu$  . . . . *P. Viciae* (Berk.) Gäum.

### *Linaceae.*

*Linum*: Conidies 18—20=13—18  $\mu$  . . . . *P. Lini* Schröter

### *Borraginaceae.*

*Lithospermum*: Conidies 20—37=14—30  $\mu$  *P. Lithospermi* Gäum.

*Myosotis*: Conidies 15—23=14—19  $\mu$  . . . *P. Myosotidis* De By

### *Gentianaceae.*

*Erythraea*: Conidies 15—27=12—16  $\mu$  . . *P. Erythraeae* (Kühn)  
Gäum.

### *Rubiaceae.*

*Asperula*: Conidies 19—30=15—21  $\mu$  . . . *P. calotheca* De By

*Galium*: Conidies 24—33=21—24  $\mu$  . . . *P. Aparines* (De By) Gäum.

Conidies 15—29=11—20  $\mu$  . . . *P. Galii pedemontani* Sävul.  
et Rayss

Conidies 13—31=10—21  $\mu$  . . . *P. insubrica* Gäum.

*Sherardia*: Conidies 18—27=16—20  $\mu$  . . *P. Sherardiae* Fuckel

Espèces qu'on ne peut pas distribuer avec certitude dans les différentes sections et sous-sections, parceque les oospores ne sont pas encore décrites.

### *Santalaceae.*

*Thesium*: Conidies 15—20=14—17  $\mu$  . . . *P. Thesii* Lagerheim

### *Caryophyllaceae.*

*Cerastium*: Conidies 16—33=12—24  $\mu$  . . . *P. Cerastii anomali* Sävul.  
et Rayss

*Melandryum*: Conidies 13—35=12—27  $\mu$  *P. Melandryi noctiflori*  
Sävul. et Rayss

*Silene*: Conidies 16—29=10—24  $\mu$  . . . . *P. vexans* Gäum.

*Stellaria*: Conidies 9—24=8—23  $\mu$  . . . . *P. parva* Gäum.

### *Ranunculaceae.*

*Myosurus*: Conidies 18—38=12—25  $\mu$  . . . *P. Myosuri* Fuckel

*Ranunculus*: Conidies 22—24=14—20  $\mu$  . . *P. illyrica* Gäum.

Conidies 22—42=16—34  $\mu$  . . *P. alpicola* Gäum.

Rosaceae.

*Agrimonia*: Conidies 12—27=9—24  $\mu$  . . . *P. Agrimoniae* Sydow

*Geum*: Conidies 15—18=12—15  $\mu$  . . . . *P. Gei* Sydow

*Potentilla*: Conidies 8—23=8—20  $\mu$  . . . . *P. Potentillae anserinae*  
Gäum.

Conidies 12—26=10—22  $\mu$  . . . *P. Potentillae reptantis*  
Gäum.

*Sanguisorba*: Conidies 16—22=14—18  $\mu$  *P. Sanguisorbae* Gäum.  
Papilionaceae.

*Coronilla*: Conidies 19—30=15—24  $\mu$  . . . *P. Coronillae* Gäum.

*Lathyrus*: Conidies 16—34=10—23  $\mu$  . . . *P. Lathyri versicoloris*  
Sävul. et Rayss

Conidies 21—39=15—22  $\mu$  . . . *P. Senneniana* Fragoso et  
Sacc.

*Melilotus*: Conidies 18—30=15—25  $\mu$  . . . *P. Meliloti* Sydow

*Tetragonolobus*:

Conidies 12—36=11—27  $\mu$  . . . . . *P. Tetragonolobi* Gäum.

*Trifolium*: Conidies 19—37=12—29  $\mu$  . . . *P. pratensis* Sydow

Conidies 11—30=11—27  $\mu$  . . . *P. Trifolii hybridii* Gäum.

*Vicia*: Conidies 20—27=18—22  $\mu$  . . . . *P. Viciae sativae* Gäum.

Zygophyllaceae.

*Tribulus*: Conidies 22—33=18—25  $\mu$  . . . *P. tribulina* Pass.

Plumbaginaceae.

*Statice*: Conidies 13—35=11—20  $\mu$  . . . . *P. Constantineanui* Sävul.  
et Rayss

Borraginaceae.

*Cynoglossum*: Conidies 15—24=13—19  $\mu$  *P. Cynoglossi* (Burill)  
Swingle

*Echinosperum*:

Conidies 21—37 = 14—27  $\mu$  . . . . . *P. Echinospermi* Swingle

*Omphalodes*: Conidies 16—31=10—27  $\mu$  . . *P. Omphalodis* Gäum.

*Sympytum*: Conidies 12—29=9—24  $\mu$  . . *P. Sympytii* Gäum .

Labiateae.

*Glechoma*: Conidies 14—32,5=11—24  $\mu$  . *P. Glechomae* Oescu et  
Rădul.

Scrophulariaceae.

*Veronica*: Conidies 19—37=13—26  $\mu$  . . . *P. aquatica* Gäum.

*Verbascum*: Conidies 13—27=12—19  $\mu$  . . *P. Verbsci* Gäum.

*Melampyrum*: Conidies 18—34=12—24  $\mu$  . . *P. Melampyri cristati* Sävul.  
et Rayss

Rubiaceae.

*Galium*: Conidies 21—30=15—21  $\mu$  . . . *P. Galii* Fuckel

Conidies 27—31=11—23  $\mu$  . . . *P. Galii veri* Gäum.

Conidies 20—28=15—19  $\mu$  . . . *P. silvatica* Gäum.

**Valerianaceae.**

*Valeriana*: Conidies 27—30=22—24  $\mu$  . . . *P. Valeriana* Trail  
**Dipsaceae.**

*Knautia*: Conidies 19—33=9—25  $\mu$  . . . *P. Knautiae* Fuckel  
**Compositae.**

*Artemisia*: Conidies 24—38=12—28  $\mu$  . . . *P. sulfurea* Gäum.

\* \* \*

**Observations.**

Nous avons considéré que c'est juste de séparer dans un groupe à part — incertae sedes — les espèces de *Peronospora* dont les oospores ne sont pas encore décrites, ou dont nous n'avons pas eu la possibilité de confirmer l'existence des organes essentielles pour la systématisation du genre. La distribution à priori dans telle ou telle section ou sous-section des espèces à l'oospore inconnue (*oosporae ignotae*) nous a semblé risquée.

Peut-on par exemple anticiper sur la position de *P. alpicola* Gäum., *P. Potentillae reptantis* Gäum., *P. Coronillae* Gäum., *P. Meliloti* Sydow, *P. Tetragonolobi* Gäum., *P. Verbasci* Gäum. etc. sans avoir une indication sur la constitution des oospores?

Ne résulterait-il pas que la même espèce serait changée d'une place à l'autre, comment c'est fut le cas de *P. Lini* Schröter, rangée par G à u m a n n (3) dans le groupe de Leiothecae-Effusae De By et par J a c z e w s k i (4) dans le groupe de Calothecae-Reticulatae A. Fischer?

Mais nous donnerons un autre exemple plus édificateur. Sur la Crucifère *Berteroa incana* vivent deux espèces de *Peronospora* distinctes l'une de l'autre *P. Berteroae* Gäum. et *P. Alyssi incani* Gäum. Avant de la découverte des oospores de la deuxième espèce on pouvait être tenté de la placer à côté de toutes les autres espèces parasites sur les Crucifères, c'est à dire dans le groupe Leiothecae-Parasiticae De By., quant en réalité les caractères des oospores nous oblige de la placer entre les Calothecae- Verrucosae A. Fischer.

**L'Enumération des espèces de Peronospora Corda trouvées en Roumanie.**

**1. *Peronospora aestivalis* Sydow**

Gäum., Monogr. 200; Jaczew., Phycom., 152; Săvul. et Rayss Contrib. I, 312; Oescu et Rădul., Note II, 437; Note III, 99.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 227; VII, 330; XI, 523.

Sur *Medicago lupulina* L.: Iași, Copou, Aroneanu-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Bicaz-distr. Neamț (Săvul.); Mărculești-distr. Ialomița (Săvul. et Rayss.); Băneasa-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss.); Lai-

nici-distr. Gorj. (Săvul. et Rayss); Timișul de Sus-distr. Brașov (Savul. et Rayss); Făgăraș-distr. Făgăraș (Savul. et Rayss); Aiud-distr. Alba (Săvul. et Rayss); Cheile Bicazului-distr. Ciuc (Săvul. et Rayss).

Sur *Medicago minima* (L.) Bartal: Iași, Copou, Miroslava, Beldiman, Sorogari-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Istrița-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); Comana-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Murtfatlar, Azamcea-distr. Constanța (Săvul. et Rayss); Orăștie-distr. Hunedoara (Săvul. et Rayss).

Sur *Medicago sativa* L.: Iași-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Buzău-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); București, Băneasa, Floreasca, Periș, Mănăstirea-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Comana-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Cernavoda-distr. Constanța (Săvul. et Rayss); Miniș-distr. Arad (Săvul. et Rayss).

2. *Peronospora affinis* Rossm.

Gäum., Monogr. 304; Jaczew., Phycom. 149; Săvul. et Rayss. Contrib. I, 309; Oescu et Rădul., Note I, 5.

Exsicc.: H.M.R. III, 139; V, 223.

Sur *Fumaria officinalis* L.: Constanța-distr. Constanța (Săvul. et Rayss).

Sur *Fumaria Vaillanti* Lois.: Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Mărcalești-distr. Lalomița (Săvul. et Rayss); Comana-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Hamangia-distr. Constanța (Săvul. et Rayss).

3. *Peronospora agrestis* Gäumann

Gäum., Monogr. 156; Jaczew., Phycom. 165; Săvul. et Rayss, Contrib. III, 51; Contrib. IV, 18.

Sur *Veronica opaca* Fr.: Cernica-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss).

Sur *Veronica polita* Fr.: Oltenița-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss).

\*4. *Peronospora Agrimoniae* Sydow

Gäum., Monogr. 289; Jaczew., Phycom. 160.

Sur *Agrimonia Eupatoria* L.: Văratec-distr. Neamț (Săvul.); Bădulești-distr. Dâmbovița (Săvul.); Borsec-distr. Mureș (Săvul.).

5. *Peronospora Agrostemmae* Gäumann

Gäum., Monogr. 52; Jaczew., Phycom. 131; Săvul. et Rayss, Contrib. III, 40.

Sur *Agrostemma Githago* L.: Oltenița-distr. Ilfov (Săvul.); Agigea, Mangalia-distr. Constanța (Săvul.).

6. *Peronospora Alchimiæ* Otth

Gäum., Monogr. 289; Jaczew., Phycom. 160; Săvul. in Bull. Sec. Sc. Acad. Roum. XX, 7.

Sur *Alchimilla vulgaris* L. (= *A. silvestris* Schm.): Poiana Brașov-distr. Brașov (Săvul.); Sinaia-distr. Prahova (Săvul.) Cumpăna, sur la Montagne Clăbucet-distr. Argeș (Săvul.).

- \*7. *Peronospora alpicola* Gäumann  
Gäum., Monogr. 113.  
Sur *Ranunculus platanifolius* L.: Bușteni Diham-distr. Prahova (Săvul.).
8. *Peronospora alta* Fuckel  
Gäum., Monogr. 307; Jaczew., Phycom. 156; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 319; Oescu et Rădul., Note I, 10; Note III, 102.  
Exsicc.: H.M.R.: III, 145.  
Sur *Plantago lanceolata* L.: Iași Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Văratec-distr. Neamț (Săvul.); București, Băneasa-distr. Ilfov (Săvul.); Sugag-distr. Alba (Săvul.); Dobra-distr. Sibiu (Săvul.).  
Sur *Plantago major* L.: Gura Putnei-distr. Rădăuți (Săvul. et Rayss); Iași-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Slănic-distr. Bacău (Săvul. et Rayss); Chiojdeni-distr. R. Sărat (Săvul. et Rayss); Buzău-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); Predeal, Sinaia, Chițorani, Izvoare-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Doicești, Moroieni-distr. Dâmbovița (Săvul. et Rayss); Câmpulung-distr. Muscel (Săvul. et Rayss); Băneasa, Stoienești-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Comana-distr. Vlașca (Săvul.) Tismana-distr. Gorj. (Săvul. et Rayss); Craiova-distr. Dolj. (Săvul. et Rayss); Vârciorova-distr. Mehedinți (Săvul. et Rayss); Periprava-distr. Tulcea (Săvul. et Rayss); ciud, Capâbne-distr. Alba (Săvul.); Oraștie, Căstăte-distr. Huneodora (Săvul. et Rayss); Orșova, Poarta-distr. Severin (Săvul. et Rayss).
9. *Peronospora Alyssi Arduini* Hruby  
Săvul. et Rayss, Contrib. I, 309.  
Sur *Alyssum Arduini* Fritsch: Vârciorova-distr. Mehedinți (Săvul. et Rayss).
10. *Peronospora Alyssi calycinii* Gäumann  
Gäum., Monogr. 254; Jaczew., Phycom. 139; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 309; Oescu et Rădul., Note I, 6.  
Exsicc. H.M.R.: V, 214.  
Sur *Alyssum alyssoides* L. (= *A. calycinum* L.): Tg. Frumos, Sorogari-distr. Iași (Oescu et Rădul.) Ciorogârla, Stoienești-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Cetățeni, Stoienesti-distr. Muscel (Săvul. et Rayss).
11. *Peronospora Alyssi incani* Gäumann  
Gäum., Monogr. 254; Oescu et Rădul., Note III, 95.  
Sur *Berteroa incana* (L.) DC (= *Alyssum incanum* L.): Ungheni. Socola, Copou, Tg. Frumos-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Borsec-distr. Mureș (Săvul.); Feldioara-distr. Brașov. (Săvul.).  
Sur la même plante hospitalière vit aussi *Peronospora Berteroae*

Gäum. Les oospores de *Peronospora Alyssi incani* Gäum. ont été décrites par Oescu et Rădul. (l. c.) et présentent l'épisore munie de verrucosités. C'est la seule espèce de *Peronospora* vivant sur les Crucifères qui appartient à la section *Calothecae*, sous-section *Verrucosae*; les autres espèces parasites sur les Crucifères appartiennent à la section *Leiothecae*, sous-section *Parasitiae*.

12. *Peronospora Amaranthi* Gäumann  
Gäum., Monogr. 235; Jaczew., Phycom. 134; Săvul. et Rayss, Contrib. III, 39.  
Sur *Amaranthus Blitum* L.: Orăştie-distr. Hunedoara (Săvul. et Rayss).
13. *Peronospora Androsaceis* Niessl  
Gäum., Monogr. 90; Jaczew., Phycom. 158; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 317.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 231.  
Sur *Androsace elongata* L.: Herăstrău, Bucureşti-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss).
- \*14. *Peronospora Anthemidis* Gäumann  
Gäum., Monogr. 126; Jaczew., Phycom. 138.  
Sur *Anthemis arvensis* L.: Lehliu-distr. Ialomiţa (Săvul.); Doiceşti-distr. Dâmboviţa (Săvul.).
15. *Peronospora Aparines* (De By) Gäumann  
Gäum., Monogr. 246; Jaczew., Phycom. 161; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 318; Oescu et Rădul., Note II, 440.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 244.  
Sur *Galium Aparine* L.: Stâncă, Sculeni, Copou-distr. Iaşi (Oescu et Rădul.); Buzău-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); Buşteni-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Mărcoleşti-distr. Ialomita (Săvul. et Rayss); Comana, Mihai Bravul, Căscioarele-distr. Vlaşca (Săvul. et Rayss); Letea, dans la forêt-distr. Tulcea (Săvul. et Rayss).
16. *Peronospora aquatica* Gäumann  
Gäum., Monogr. 160; Jaczew., Phycom. 165; Oescu et Rădul., Note III, 100.  
Sur *Veronicae Anagallis* L.: Şorogari-distr. Iaşi (Oescu et Rădul.); Broşteni-distr. Neamţ (Săvul.); Oneşti-distr. Bacău (Săvul.).
17. *Peronospora Arabidis hirsuta* Gäumann  
Gäum., Monogr. 256; Jaczew., Phycom. 140; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 312; Contrib. III, 44.  
Exsicc.: H.M.R.: VII, 319; XI, 515.  
Sur *Arabis arenosa* (L.) Scop.: Timişul de Sus-distr. Braşov (Săvul. et Rayss); Căpâlna, Sugag-distr. Alba (Săvul.).  
Sur *Arabis hirsuta* (L.) Scop.: Bicaz-distr. Neamţ (Săvul. et Rayss); Slănic-distr. Bacău (Săvul. et Rayss); Sinaia-distr. Pra-

hova (Săvul. et Rayss); Tismana-distr. Gorj (Săvul. et Rayss); Ghilcoș, sur la montagne Surduc-distr. Ciuc (Săvul. et Rayss).

- \*18. *Peronospora Arabidis Turratae* Gäumann  
Gäum., Monogr. 257.  
Sur *Arabis Turrata* L.: Călugăreni, dans la forêt-distr. Vlașca (Săvul.); Mănăstirea Dealului, Viforâta-distr. Dâmbovița (Săvul.).
19. *Peronospora Arabidopsis* Gäumann  
Gäum., Monogr. 278; Jaczew., Phycom. 144; Săvul. et Rayss, Contrib. II, 371; Contrib. IV, 10.  
Sur *Stenophragma Thalianum* (L.) Cel.: Buzău-distr. Buzău (Săvul.); Pantelimon, Cernica, Stoienești-distr. Ilfov. (Săvul. et Rayss).
20. *Peronospora arborescens* (Berk.) De Bary  
Gäum., Monogr. 69; Jaczew., Phycom. 149; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 309; Contrib. II, 367; Oescu et Rădul., Note I, 5; Note II, 434.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 224; VII, 327.  
Sur *Papaver dubium* L.: Tg. Frumos, Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Pietroasa Istrița-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); București, Herăstrău, Otopeni-distr. Ilfov. (Săvul. et Rayss); Comana-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Rosetti-Letea-distr. Tulcea (Săvul. et Rayss); Băile Herculane-distr. Severin (Săvul. et Rayss).  
Sur *Papaver Rhoeas* L.: Pasărea, Cernica-distr. Ilfov. (Săvul.); Dâlga, Ghimpăți-distr. Ialomița (Săvul.); Mihai Bravul-distr. Vlașca (Săvul.).  
Sur *Papaver somniferum* L.: Dărmănești-distr. Suceava (Săvul. et Rayss); Iași-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Feldioara-distr. Brașov (Săvul.).
21. *Peronospora Arenariae* (Berk.) Tulasne  
Gäum., Monogr. 48; Jaczew., Phycom. 133; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 301.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 210.  
Sur *Moehringia trinervia* (L.) Clairv.: Broșteni, Dârmoxa-distr. Neamț (Săvul.); Durău, vers Fântâna Măcărescu-distr. Neamț (Săvul.); Predeal, Sinaia, Cheia-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Timișul de Sus-distr. Brașov (Săvul. et Rayss); Ghilcoș, sur la montagne Surduc, Cheile Bicazului-distr. Ciuc (Săvul. et Rayss); Stănișoara-distr. Vâlcea (Săvul.); Câmpul lui Neag-distr. Hunedoara (Săvul.).
22. *Peronospora arvensis* Gäumann  
Gäum., Monogr. 158; Jaczew., Phycom. 165; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 317; Oescu et Rădul., Note I, 10.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 241.

Sur *Veronica hederifolia* L.: Pester Copou, Bălteni, Perieni-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Piatra Neamț, Roznov-distr. Neamț (Săvul.); Călugăra, Sănduleni-distr Bacău (Săvul.); Tigănești, Ciolpani, Tâncăbești, Snagov, Scrovăștea, Herăstrău, Pantelimon, Cernica, Ciorogărila-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Comana Căscioare, Malu Spart-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Bădulești-distr. Dâmbovița (Săvul.); Cotmeana-distr. Argeș (Săvul.); Hălchiu, Feldioara, Hărman-distr. Brașov (Săvul.).  
Sur *Veronica triphyllus* L.: București, Herăstrău-distr. Ilfov (Săvul.).

23. *Peronospora Asperuginis* Schroeter  
Gäum., Monogr. 169; Jaczew., Phycom. 128; Săvul. et Rayss, Contrib. II, 377; Oescu et Rădul., Note I, 9.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 232.  
Sur *Asperugo procumbens* L.: Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Comana-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Mărculești-distr. Ialomița (Săvul. et Rayss); Constanța, Agigea, Mangalia-distr. Constanța (Săvul.).
24. *Peronospora astragalina* Sydow  
Gäum., Monogr. 188; Oescu et Rădul., Note II, 439; Jaczew., Phycom. 150.  
Sur *Astragalus Onobrychis* L.: Entre Iași et Ciurea-distr. Iași (Oescu et Rădul.).
25. *Peronospora Atriplicis hastatae* Săvul. et Rayss  
Săvul. et Rayss, Contrib. II, 36; Oescu et Rădul., Note III, 95.  
Exsicc.: H.M.R.: VII, 307.  
Sur *Atriplex hastata* L.: Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.) Periprava, Sulina-distr. Tulcea (Săvul.); Balta Albă-distr. R. Sărat (Săvul. et Rayss).
26. *Peronospora Atriplicis hortensis* Săvul. et Rayss  
Săvul. et Rayss, Contrib. II, 363; Oescu et Rădul., Note II, 427.  
Syn.: *Peronospora litoralis* Gäum., Mitteil. d. Naturforsch. Gesellsch. Bern, 62, 1918; Monogr. 225.  
*Peronospora litoralis* forma *românica* Săvul. et Rayss in Schedis ad Herb. Mycol. Romanicum, Fasc. V, No. 204.  
Sur *Atriplex hortensis* L.: Horpaz, Tomești, Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.); R. Sărat, Obidiți, Boldu-distr. R. Sărat (Săvul.); Buzău-distr. Buzău (Săvul.); București, dans le jardin de la Faculté d'Agronomie (Săvul. et Rayss); Pitaru-distr. Dâmbovița (Săvul.); R. Vâlcea-distr. Vâlcea (Săvul.); Craiova, dans les environs-distr. Dolj (Săvul.); Brașov, Hălchiu, Harman-distr. Brașov. (Săvul.); Brețcu-distr. Trei Scaune (Săvul.); Tg. Mureș-distr. Mureș (Săvul.); Câmpia Turzii-distr. Turda (Săvul.); Arad, Radna-distr. Arad (Săvul.); Timișoara, Săcălaz-distr. Timiș Torontal (Săvul.).

27. *Peronospora Atriplicis tataricae* Oescu et Rădul.  
Oescu et Rădul., Note II, 429.  
Sur *Atriplex tatarica* L.: Copou, Nicolina, Ezăreni-distr. Iași  
(Oescu et Rădul.)  
Sur la même plante hospitalière se trouve aussi *Peronospora*  
*tatarica* Săvul. et Rayss.
- \*28. *Peronospora Barbareae* Gäumann  
Gäum., Monogr. 258; Jaczew., Phycom 139.  
Sur *Barbarea vulgaris* R. Br.: Văratec, Agapia-distr. Neamț  
(Săvul.); Sinaia, Izvoare-distr. Prahova (Săvul.); Bădulești, Valea  
Mare-distr. Dâmbovița (Săvul.); Călimănești, Cozia, Brezoi-distr.  
Vâlcea (Săvul.); Borsec-distr. Mureș (Săvul.); Rodna, Sanț-distr.  
Năsăud (Săvul.); Caransebeș-distr. Severin (Săvul.).  
Sur *Barbarea arcuata* Rchb.: Bușteni, dans la vallée Cerbului,  
Predeal-distr. Prahova (Săvul.).
29. *Peronospora Berteroae* Gäumann  
Gäum., Monogr. 258; Jaczew., Phycom. 139; Săvul. et Rayss,  
Contrib. I, 309.  
Sur *Berteroa incana* (L.) DC.: București, Herăstrău, Pantelimon,  
Pasărea-distr. Ilfov (Săvul.); Lehliu-distr. Ialomița (Săvul. et  
Rayss).
30. *Peronospora Boni Henrici* Gäumann  
Gäum., Monogr. 229; Jaczew., Phycom. 135; Săvul. et Rayss,  
Contrib. II, 355.  
Exsicc.: H.M.R.: VII, 309.  
Sur *Chenopodium Bonus Henricus* L.: Cârlibaba, Iacobeni-distr.  
Câmpulung (Săvul. et Rayss.); Broșteni, Bârnaru, Mănăstirea  
Neamț, Bicaz-distr. Neamț (Săvul.); Sinaia, Bușteni, Cheia-distr.  
Prahova (Săvul. et Rayss.); Sugag-distr. Alba (Săvul.); Ghilcoș-  
distr. Ciuc (Săvul.).
31. *Peronospora Brassicae* Gäumann  
Gäum., Monogr. 260; Jaczew., Phycom. 139; Săvul. et Rayss,  
Contrib. I, 309; Contrib. III, 44; Contrib. IV, 9; Oescu et Rădul.,  
Note I, 6; Note II, 434.  
Exsicc.: H.M.R.: VII, 320; XI, 517.  
Sur *Brassica Napus* L.: partout dans le pays.  
Sur *Brassica Rapa* L.: Mărcolești-distr. Ialomița (Săvul. et  
Rayss.).  
Sur *Raphanus raphanistrum* L.: Valul lui Traian, Medgidia,  
Agigea-distr. Constanța (Săvul.); Frățilești, Hagieni-distr. Ialo-  
mița (Săvul.).  
Sur *Raphanus sativus* L.: Iași-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Buzău,  
dans les cultures au bord de la rivière Buzău, une forte attaque

sur les feuilles, les tiges et les siliques en Juillet 1948 (Săvul. et Bontea); Pitaru-distr. Dâmbovița (Săvul.); București-distr. Ilfov (Săvul.), attaque sur les racines.

Sur *Sinapis alba* L.: Babadag-distr. Tulcea (Săvul.); Hamangia-distr. Constanța (Săvul.).

Sur *Sinapsis arvensis* L.: Vânători-distr. Neamț (Petrescu sub *P. parasitica*); Tg. Frumos, Socola-distr. Iași (Oescu et Rădul.) Viziru-distr. Brăila (Săvul.); Istrița-distr. Buzău (Săvul.); Studina, Deveselu-distr. Romanăți (Săvul.).

b. Forma *m a j o r* Săvul. et Rayss, Contrib. IV, 9.

Sur *Brassica oleracea* L.: Iași-distr. Iași (Constantineanu); Buzău-distr. Buzău (Săvul.); Făgăraș-distr. Făgăraș (Săvul.). Dans cette dernière localité une forte attaque sur les plantules envahissant surtout les cotyledons, a causé de grands dégâts.

c. Forma *B r a s s i c a e n i g r a e* Săvul. et Rayss, Contrib. III, 44 et in Schedis ad Herb. Mycol. Rom. VII, 320.

Sur *Brassica nigra* (L.) Koch: Tăbucani, Cârligi-distr. Baia Petrescu sub *P. parasitica*); Vânători-distr. Neamț (Petrescu sub *P. parasitica*); Constanța-distr. Constanța (Săvul. et Rayss); Dâlga, Ghimpăți-distr. Ialomița (Săvul.); Roșu, Stoenești-distr. Ilfov (Săvul.).

32. *Peronospora Bulbocapni* Beck

Gäum., Monogr. 80; Jaczew., Phycom. 148; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 309; Oescu et Rădul., Note I, 5.

a. Forma *Corydalis Marschalliana* Săvul. et Rayss, l. c.; Oescu et Rădul., l. c.

Exsicc.: H.M.R.: III, 137.

Sur *Corydalis Marschalliana* Pall.: Iași-distr. Iași (Constantineanu); Pester Copou, Băleni Perieni-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Ciolpani, Snagov, Scroviște, Băneasa, Cățelu-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss.).

33. *Peronospora Buniasidis* Gämman

Gäum., Über die Formen der *Peronospora parasitica* (Pers.) Fries, 132, 1918; Jaczew., Phycom. 140; Săvul. et Rayss, Contrib. II, 371; Oescu et Rădul., Note III, 98.

Sur *Bunias orientalis* L.: Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Pojorâta-distr. Câmpulung (Săvul.); Valea Vinului-distr. Năsăud (Săvul.); Broșteni, Valea Negrii-distr. Neamț (Săvul.); Băicoi, Valea Largă, Sinaia, Cheia-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Moroeni-distr. Dâmbovița (Săvul.).

34. *Peronospora Calaminthae* Fuckel

Gäum., Monogr. 139; Jaczew., Phycom. 147; Săvul. et Rayss, Contrib. II, 377; Contrib. IV, 16; Oescu et Rădul., Note III, 100; Moesz, Phycom. 88.

Exsicc.: H.M.R.: V, 238.

Sur *Calamintha acinos* Clairv.: Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Văratec-distr. Neamț (Săvul.); Onești-distr. Bacău (Săvul.); Malu Spart, Mihai Bravul-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Căpâlna, Sugag-distr. Alba (Săvul.). Dobra, Jina-distr. Sibiu (Săvul.); Băile Herculane, Domugled, Orșova-distr. Severin (Săvul. et Rayss).

Sur *Satureja hungarica* (Simk.) J. Wagn.: Băile Herculane (Bubák), Băile Herculane, Domugled-distr. Severin (Săvul. et Rayss).

35. *Peronospora calotheca* De Bary

Gäum., Monogr. 244; Jaczew., Phycom. 161; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 318; Oescu et Rădul., Note III, 102; Moesz, Phycom. 90. Exsicc.: H.M.R.: VII, 343.

Sur *Asperula odorata* L.: Bârnova-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Slănic-distr. Bacău (Săvul. et Rayss); Soveja-distr. Putna (Săvul.); Predeal, dans la vallée Râșnoava, Cheia dans la vallée Cheița-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Abrud-distr. Alba (Săvul.).

Nous considérons comme douteuse l'indication de Bubák (l. c. p. 22) à Băile Herculane de *P. calotheca* De By sur *Galium flavicans* Borb.

36. *Peronospora Camelinae* Gäumann

Gäum., Monogr. 260; Jaczem., Phycom. 140; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 309; Contrib. IV, 11; Oescu et Rădul., Note III, 98. Exsicc.: H.M.R.: III, 134.

Sur *Camelina microcarpa* Andrz.: Copou (Oescu et Rădul.), Horlaști, Iași (Petrescu sub *P. parasitica*)-distr. Iași; Istrița-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); Băneasa-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss).

Sur *Camelina sativa* (L.) Crantz: Pietroasa, Istrița-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); Inoștei-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Buftea-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss).

37. *Peronospora campestris* Gäumann

Gäum., Monogr. 49; Jaczew., Phycom. 131; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 301; Oescu et Rădul., Note II, 434.

Exsicc.: H.M.R.: XI, 511.

Sur *Arenaria serpyllifolia* L.: Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Fălticeni, Baia-distr. Baia (Săvul.); Vidra-distr. Putna (Săvul.); București, Herăstrău, Pantelimon-distr. Ilfov. (Săvul. et Rayss); Comana-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Curtea de Argeș-distr. Argeș (Săvul. et Rayss).

\*38. *Peronospora candida* Fuckel

Gäum., Monogr. 88; Jaczew., Phycom. 157.

Sur *Anagallis arvensis* L.; Băneasa, Ciorogârla-distr. Ilfov (Săvul.); Izvoare-distr. Prahova (Săvul.).

*Sur Anagallis coerulea* Schreb.: Hamangia, Valul lui Traian, Gura Dobrogii-distr. Constanța (Săvul.).

39. *Peronospora Cardamines laciniatae* Gäumann  
Gäum., Monogr. 265; Jaczew., Phycom. 140; Săvul. et Rayss, Contribut. I, 310; Oescu et Rădul., Note I, 6.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 217.  
*Sur Cardamine bulbifera* (L.) Crantz: Bârnova-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Sinaia, Cheia-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Pasărea, Cernica-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Căscioarele, Malul Spart-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Merișeni-distr. Argeș (Săvul.); Băile Herculane, Domugled-distr. Severin (Săvul. et Rayss).
40. *Peronospora Cephalariae laevigatae*, Săvul. et Rayss  
Săvul. et Rayss, Contrib. IV, 18.  
Exsicc.: H.M.R.: XI, 529.  
*Sur Cephalaria laevigata* (W. K.) Schrad.: Băile Herculane, Domugled-distr. Severin (Săvul. et Rayss).
41. *Peronospora Cerastii anomali* Săvul. et Rayss  
Săvul. et Rayss, Contrib. I, 302; Oescu et Rădul., Note III, 95.  
Exsicc.: H.M.R.: III, 128.  
*Sur Cerastium anomalam* W. K.: Valea Lupului, dans la plaine du Bahlui-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Tigănești, Ciolpani, Seroviștea, Pasărea, Ciorogârla-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Căscioarele-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss).
42. *Peronospora Cerastii brachypetalii* Săvul. et Rayss  
Săvul. et Rayss, Contrib. III, 40.  
Exsicc.: H.M.R.: VII, 314.  
*Sur Cerastium brachypetalum* Desp.: Chițorani-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Tigănești, dans la forêt Brânzeasca, Pasărea-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss).
- \*43. *Peronospora Cheiranthi* Gäumann  
Gäum., Monogr. 267; Jaczew., Phycom. 140.  
*Sur Cheiranthus* sp. cult.: Izvoare, dans un jardin-distr. Prahova (Săvul.).
44. *Peronospora Chenopodiella* Schlechtendal  
Gäum., Monogr. 230; Jaczew., Phycom. 135; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 301; Oescu et Rădul., Note I, 4; Moesz, Phycom. 81.  
Exsicc.: H.M.R.: VII, 310.  
*Sur Chenopodium hybridum* L.: Ungheni, Piciorul Lupului-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Câmpulung-distr. Câmpulung (Săvul. et Rayss); Mănăstirea Neamț-distr. Neamț (Săvul.); Jideni, Oratia-distr. R. Sărat (Săvul.); Buzău, Istrița, Cărpiniște-distr. Buzău (Săvul.); Chițorani, Izvoare-distr. Prahova (Săvul.); București, Băneasa, Cățelu-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Giresau-distr.

Sibiu (Fuss sub *P. effusa*); Orăştie, Deva-distr. Hunedoara (Săvul.); Aiud, Teiuş-distr. Alba (Săvul. et Rayss); Câmpia Turzii-distr. Turda (Săvul.); Rodna, Valea Vinului, Borgo Suseni-distr. Năsăud (Săvul.).

45. *Peronospora Chenopodiella glauci* Gäumann  
Gäum., Monogr. 230; Jaczew., Phycom. 135; Săvul. et Rayss, Contrib. II, 355;  
Exsicc.: H.M.R.: XI, 507.  
Sur *Chenopodium glaucum* L.: Periprava, Letea-distr. Tulcea (Săvul.); Câmpulung-distr. Muscel (Săvul. et Rayss).
46. *Peronospora Chenopodiella opulifoliella* Săvul. et Rayss  
Săvul. et Rayss, Contrib. II, 357; Oescu et Rădul., Note I, 4.  
Sur *Chenopodium opulifolium* Schrad.: Pester Copou-distr. Iaşi (Oescu et Rădul.); Mostiștea au bord du lac-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Mihai Bravu-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss).
47. *Peronospora Chenopodiella polyspermi* Gäumann  
Gäum., Monogr. 230; Jaczew., Phycom. 136; Săvul. et Rayss, Contrib. II, 355.  
Exsicc.: H.M.R.: VII, 311.  
Sur *Chenopodium polyspermum* L.: Beclean, Dej, Cășei-distr. Someș (Săvul. et Rayss).
48. *Peronospora Chenopodiella urbici* Săvul. et Rayss  
Săvul. et Rayss, Contrib. II, 365; Oescu et Rădul., Note II, 433.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 206.  
Sur *Chenopodium urbicum* L.: Larga-distr. Iaşi (Oescu et Rădul.); Călărași, Dâlga-distr. Ialomița (Săvul. et Rayss); Brezoi-distr. Vâlcea (Săvul. et Rayss).
49. *Peronospora Chenopodiella Vulvariae* Săvul. et Rayss  
Săvul. et Rayss, Contrib. IV, 1.  
Exsicc.: H.M.R.: XI, 508.  
Sur *Chenopodium Vulvaria* L.: Găgeni-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Bădulești Pătroaia-distr. Dâmbovița (Săvul.).
50. *Peronospora Chorisporae* Gäumann  
Gäum., Monogr. 268; Jaczew., Phycom. 141; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 312.  
Sur *Chorispora tenella* DC.: Viziru-distr. Brăila (Săvul.); Pietroasa-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); Lehliu, Dâlga, Ghimpați-distr. Ialomița (Săvul.).
51. *Peronospora Chrysosplenii* Fuckel  
Gäum., Monogr. 282; Jaczew., Phycom. 163; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 317.  
Exsicc.: H.M.R.: VII, 328.  
Sur *Chrysosplenium alternifolium* L.: Predeal, dans la vallée

"Râşnoava", Sinaia-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Bran-distr. Brașov (Săvul.); Stănișoara-distr. Vâlcea (Săvul. et Rayss).

52. *Peronospora conglomerata* Fuckel

Gäum., Monogr. 99; Jaczew., Phycom. 146; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 312; Oescu et Rădul., Note I, 9.  
Exsicc.: H.M.R.: III, 140; 141; XII, 519.

Sur *Geranium columbinum* L.: Lehliu-distr. Ialomița (Săvul. et Rayss).

Sur *Geranium dissectum* L.: Broșteni-distr. Neamț (Săvul.); Gheorgheni, Ghilcoș-distr. Ciuc (Săvul. et Rayss); Borsec-distr. Mureș (Săvul.).

Sur *Geranium phaeum* L.: Sinaia-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); R. Vâlcea, Ocnele Mari-distr. Vâlcea (Săvul. et Rayss).

Sur *Geranium pusillum* L.: Copou, Pester Copou, Tg. Frumos-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Sinaia, Chițorani-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Tânărești, Ciolpani Șirbei Vodă, Herăstrău, Pasărea, Cernica, Pantelimon, Jilava-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Lehliu-distr. Ialomița (Săvul. et Rayss); Căscioarele-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Orăștie-distr. Hunedoara (Sandu-Ville).

53. *Peronospora Conringiae* Gäumann

Gäum., Monogr. 268; Jaczew., Phycom. 141; Săvul. et Rayss. Contrib. II, 371.

Exsicc.: H.M.R.: VII, 322.

Sur *Conringia orientalis* Andrz.: Valul lui Traian, Medgidia, Cobadin-distr. Constanța (Săvul.); Izlaz-distr. Romanați (Săvul.).

\*54. *Peronospora Consolidae* Lagerheim

Gäum., Monogr. 108; Jaczew., Phycom. 158.

Sur *Delphinium Consolida* L.: București, Pasărea-distr. Ilfov (Săvul.).

55. *Peronospora Constantineanui* Săvul. et Rayss

Săvul. et Rayss, Contrib. II, 375.

Sur *Limonium vulgare* Miller (= *Statice Limonium* L.): Rosetti-Letea, Periprava-distr. Tulcea (Săvul. et Rayss).

Lobik apud Jaczewski (4). p. 156 a décrit de l'U.R.S.S. une *Peronospora Staticis* Lobik sur *Statice Gmelini* Willd. En comparant les diagnoses de ces deux espèces parasites sur deux Plumbaginacées apparentées, il en résulte de différences assez évidentes entre notre espèce et celle de Lobik. Les conidiophores de notre espèce sont beaucoup plus longs et plus minces (300—600  $\Rightarrow$  5—8  $\mu$ , au lieu de 86,4—465  $\Rightarrow$  6,6—9,3  $\mu$ ), les conidies de même sont plus grandes (13—25  $\Rightarrow$  11—20  $\mu$ , au lieu de 15,5—23  $\Rightarrow$  13,2—18,6  $\mu$ ); l'aspect général, la forme et la couleur de touffes de conidiophores sur les feuilles sont aussi différentes.

- \*56. *Peronospora Corollae* Tranzschel  
Gäum., Monogr. 315; Jaczew., Phycom. 130.  
Dans la corolle de *Campanula persicifolia* L.: Văratic, Ciungidistr. Neamț (Săvul.).
57. *Peronospora Coronillae* Gäumann  
Gäum., Monogr. 190; Jaczew., Phycom. 150; Săvul. et Rayss, Contrib. III, 49; Săvul., Nouvelle contrib. à la connaiss. des Péronopsoracées etc. in Bull. Sec. scient. Acad. Roum. XX, 7, 1938; Oescu et Rădul., Note II, 438.  
Exsicc.: H.M.R.: VII, 334; XXIII, 1107.  
Sur *Coronilla scorpioides* (L.) Koch: Murtfatlar-distr. Constanța (Săvul.). Sur cette plante hospitalière a été trouvée par nous aussi près Balcie, au bord de la Mer Noire (Voir Săvul., l. c. et H.M.R. XXIII, 1107).  
Sur *Coronilla varia* L.: Horpaz-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Izvoare-distr. Prahova (Săvul.); Bădulești-distr. Dâmbovița (Săvul.); Cheile Turzii-distr. Turda (Săvul. et Rayss); Ghilcoș, Surduc-distr. Ciuc (Săvul. et Rayss).
- \*58. *Peronospora Coronopii* Gäumann  
Gäum., Monogr. 275.  
Sur *Coronopus didymus* (L.) Smith: Sulina-distr. Tulcea (Săvul.). Espèce rare, mentionnée par Gäumann de l'Argentine.
59. *Peronospora Corydalidis* De Bary  
Gäum., Monogr. 79; Jaczew., Phycom. 148; Săvul. et Rayss. Contrib. I, 309; Oescu et Rădul., Note I, 5.  
Exsicc.: H.M.R.: III, 138.  
Sur *Corydalis solida* (L.) Sm.: Pester Copou, Bălteni Perieni, Miroslava-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Buzău-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); Păulești, Crângul lui Bot, Chițorani-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Snagov, Scroviște, Pantelimon, București-distr. Ilfov. (Săvul. et Rayss); Căscioarele-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Nucet, Bădulești-distr. Dâmbovița (Săvul.).
60. *Peronospora Corydalidis intermediae* Gäumann  
Gäum., Monogr. 82; Jaczew., Phycom. 149; Săvul. et Rayss, Contrib. IV, 11.  
Exsicc.: H.M.R.: XI, 518.  
Forma *Corydalis capnoides* Săvul. et Rayss, l. c. et in H.M.R.: XI, 518.  
Sur *Corydalis capnoides* Wahlenb.: Cheile Bicazului-distr. Ciuc (Săvul. et Rayss).
61. *Peronospora crisipula* Fuckel  
Gäum., Monogr. 274; Jaczew., Phycom. 160; Oescu et Rădul., Note I, 9.

*Sur Reseda lutea* L.: Dans les haies et les vignobles de Șorogari-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Jideni-distr. R. Sărat (Săvul.).

- \*62. *Peronospora Cynoglossi* (Burrill) Swingle  
Gäum., Monogr. 169; Jaczew., Phycom. 129.  
Sur *Cynoglossum officinale* L.: Afumați-distr. Ilfov. Espèce rare; connue de Illinois en U.S.A. et de l'U.R.S.S.
63. *Peronospora Cyprassiae* De Bary  
Gäum., Monogr. 322; Jaczew., Phycom. 145; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 303; Contrib. III, 441; Oescu et Rădul., Note III, 95. Exsicc.: H.M.R.: III, 130; VII, 326.  
Sur *Euphorbia amygdaloides* L.: Pester Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Sinaia-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Nucet-distr. Dâmbovița (Săvul. et Rayss); Comana-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Pasărea-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Horez-distr. Vâlcea (Săvul.); Vârciorova-distr. Mehedinți (Săvul. et Rayss); Brașov. Poiana-distr. Brașov (Săvul.); Căpâlna, Sugag-distr. Alba (Săvul.).  
Sur *Euphorbia virgata* W.K.: Cățelu-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Urziceni, dans les semaines-distr. Ialomița (Săvul.).
64. *Peronospora De Baryi* (Salm. et Ware) Vienot  
Jaczew., Phycom. 166; Săvul. et Rayss, Contrib. III, 39.  
Sur *Urtica urens* L.: Bârnova-distr. Iași (Oescu et Rădul. sub *P. Urticae*); Periprava-distr. Tulcea (Săvul. et Rayss); Orăștie-distr. Hunedoara (Săvul. et Rayss).  
Espèce remarquable par ses caractères: Attaque exclusivement *Urtica urens* L. Prefère les lieux abrités, sans courants d'aire, où le sol garde une humidité suffisante et régulière. Elle s'étend par taches et gagne rapidement les plantes voisines. Les pieds touchés le sont d'abord par le sommet, puis, si l'attaque se généralise, on peut trouver les plages isolées à n'importe quel niveau foliaire. Les pieds jeuns sont particulièrement sensibles, ils sont diformés, les entrenoeuds sont diminués, les feuilles se développent mal et prennent un aspect jaune-pâle à la face inférieure. Les conidiophores sont peu nombreux et fragiles, d'un blanc grisâtre brillant, épais, pourvus de stérigmates longs, franchement arquées. Les conidies peu nombreuses (même après maintient sous cloche), ovoïdes, elliptiques, non apiculées, 20—32 ⇒ 17—25  $\mu$ , en moyenne 25—28 ⇒ 21—22  $\mu$ .  
Espèce à rechercher dans les lots d'*Urtica urens* de le début de juin jusqu'en octobre.
65. *Peronospora Dentariae* Rabenh.  
Gäum., Monogr. 266; Jaczew., Phycom. 140; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 310.

Sur *Cardamine Impatiens* L.: Văratec, Ciungi-distr. Neamț (Săvul.); Predeal-distr. Prahova (Săvul.); Sinaia-distr. Prahova (Săvul.); Borsec-distr. Mureș (Săvul.); Vatra Dornii-distr. Câmpulung (Săvul.).

Sur *Cardamine pratensis* L.: Predeal, Sinaia-distr. Prahova (Săvul.); Soveja, Tulnici-distr. Putna (Săvul.); Broșteni-distr. Neamț (Săvul.); Tușnad-distr. Ciuc (Săvul.); Toplița-distr. Mureș (Săvul.).

66. *Peronospora Dentariae macrophylla* Gäumann  
Gäum., Monogr. 265; Jaczew., Phycom. 140; Săvul. et Rayss,  
Contrib. I, 310; Contrib. II, 369.

Exsicc.: H.M.R.: V, 218; VII, 323.

Sur *Cardamine enneaphyllos* (L.) Cr.: Predeal, dans la Vallée  
"Râşnoava"-distr. Prahova (Săvul. et Rayss).

Sur *Cardamine glandulosa* (W.K.) Schmalh.: Poiana Tapului,  
Sinaia-distr. Prahova (Săvul. et Rayss).

67. *Peronospora Diplotaxis* Gämänn

Gäum., Monogr. 268; Săvul. et Rayss, Contrib. III, 44; Oescu et  
Rădul., Note I, 6.

Exsicc.: H.M.R.: VII, 324.

Sur *Diplotaxis muralis* DC.: Şorogari, Valea Adâncă, Copou,  
Rediu Tătar-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Schitu Duca, Poieni-  
distr. Iași (Săvul.); Izvoare-distr. Prahova (Săvul.); Tg. Jiu,  
Sișești-distr. Gorj. (Săvul.); Baia de Aramă-distr. Mehedinți  
(Săvul.); Câmpia Turzii-distr. Turda (Săvul. et Rayss); Aiud,  
Alba Iulia, Zlatna-distr. Alba (Săvul.).

68. *Peronospora Dipsaci* (Nees v. Es.) Tulasne

Gäum., Monogr. 238; Jaczew., Phycom. 144; Săvul. et Rayss,  
Contrib. II, 318; Contrib. III, 51; Oescu et Rădul., Note I, 10;  
Note III, 102.

Exsicc.: H.M.R.: V, 248; XI, 528.

Sur *Dipsacus Fullonum* L.: Iași-distr. Iași (Oescu et Rădul.).

Sur *Dipsacus laciniatus* L.: București, Herăstrău-distr. Ilfov.  
(Săvul. et Rayss); Tg. Frumos-distr. Iași (Oescu et Rădul.).

Sur *Dipsacus sativus* (L.) Gars.: București, dans le jardin botanique de la Faculté d'Agronomie-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss).

Sur *Dipsacus silvestris* Mill.: Cristești, Vămeșoaia, Buciumi-distr.  
Iași (Oescu et Rădul.); Bucecea-distr. Botoșani (Săvul.); Săveni-  
distr. Dorohoi (Săvul.); Vama-distr. Câmpulung (Săvul.); Slănic-  
distr. Bacău (Săvul. et Rayss); Chiojdene-distr. R. Sărat (Săvul.  
et Rayss); Posada, Sinaia-distr. Prahova (Săvul. et Rayss);  
București (Constantineanu); Băneasa-distr. Ilfov (Săvul. et  
Rayss); Comana-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Bădulești, Valea

Mare, Glimbocata-distr. Dâmbovița (Săvul.); Slănicu de Muscel-distr. Muscel (Săvul. et Rayss); Cheile Bicazului-distr. Ciuc (Săvul. et Rayss); Toplița, Borsec-distr. Mureș (Săvul.); Brad-distr. Hunedoara (Săvul.).

- \*69. *Peronospora Ducometi* Siemaszko et Jankowska  
Phytopatologische Beobachtungen in Polen, in Zentralbl. Bakt. u. Parasitenk. II Abt. Bd. 78, 114, 1929.  
Syn.: *Peronospora Fagopyri* Elenev apud Jaczew., Phycom. 156, 1931.  
*Peronospora parva* Elenev nec Gäum.  
*Peronospora* sp. Miège apud Jaczew., l. c.  
Sur *Fagopyrum esculentum* L.: Roznov, Buhuși-distr. Neamț (Săvul.); Très fréquente cette année dans les culture du distr. Neamț.
70. *Peronospora Echinospormi* Swingle  
Gäum., Monogr. 170; Jaczew., Phycom. 129; Săvul. et Rayss, Contrib. III, 50; Oescu et Rădul., Note I, 9.  
Exsicc.: H.M.R.: VII, 340.  
Sur *Echinospermum Lappula* Lehm.: Şorogari-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Fetești-distr. Ialomița (Săvul. et Rayss); Pitaru-distr. Dâmbovița (Săvul.); Petroșani-distr. Vlașca (Săvul.); Studina, Deveselu-distr. Romanați (Săvul.).
71. *Peronospora Erophila* Gäumann  
Gäum., Monogr. 269; Jaczew., Phycom. 141; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 312.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 219.  
Sur *Erophila verna* (L.) E. Mey.: Păulești (Săvul. et Rayss); Homoriciu, Izvoare-distr. Prahova (Săvul.); Tigănești Ciolpani, Stirbei Vodă, Roșu-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Bădulești, Pătroaia-distr. Dâmbovița (Săvul.); Slobozia-distr. Argeș (Săvul.); Dâlga, Ghimpăți, Mărculești-distr. Ialomița (Săvul.).
72. *Peronospora Erysimi* Gäumann  
Gäum., Monogr. 270; Jaczew., Phycom. 141; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 312; Contrib. III, 44; Oescu et Rădul., Note I, 6.  
Sur *Erysimum repandum* L.: Copou, Socola, Cănești, Roșcani, Tg. Frumos-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Mircești, Strunga, Micălușeni-distr. Roman (Săvul.); Nicorești-distr. Tecuci (Săvul.); R. Sărat, Dărămați-distr. R. Sărat (Săvul.); Istrița-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); Constanța-distr. Constanța (Săvul. et Rayss); Tulcea, Nicolițel, Mănăstirea Cocoș-distr. Tulcea (Săvul.).  
Sur *Erysimum Wittmanni* Zaw.: Timișul de Sus-distr. Brașov (Săvul. et Rayss).

73. *Peronospora Erythraeae* (Kühn) Gäumann  
Gäum., Monogr. 94; Jaczew., Phycom. 146; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 318; Contrib. IV, 16; Oescu et Rădul., Note III, 102.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 232.  
Sur *Erythraea Centaurium* (L.) Pers.: Breazu-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Bucecea-distr. Botoșani (Săvul.); Baia-distr. Baia (Săvul.); Călugăreni-distr. Neamț (Săvul.); Mănechi Ungureni Izvoare-distr. Prahova (Săvul.); Colibași-distr. Gorj. (Săvul. et Rayss); Perșani, Șercaia-distr. Făgăraș (Săvul.); Poarta-distr. Severin (Săvul.).  
Sur *Erythraea pulchella* (Sw.) Fr.: Hărja-distr. Bacău (Săvul. et Rayss).
74. *Peronospora Euclidii* Săvul. et Rayss  
Săvul. et Rayss, Contrib. II, 369; Oescu et Rădul., Note I, 7.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 220.  
Sur *Euclidium syriacum* R. Br.: Șorogari-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Lehliu, Mărculești-distr. Ialomița (Săvul.); Fetești, Căurgeaua-distr. Ialomița (Săvul.); Cernavoda-distr. Constanța (Săvul. et Rayss); Valul lui Traian, Murtfatlar, Adam Clissi, Hamangia-distr. Constanța (Săvul.).
- \*75. *Peronospora Euphorbiae* Fuckel  
Gäum., Monogr. 322; Jaczew., Phycom. 145.  
Sur *Euphorbia platyphyllos* L.: Titu, Fusea-distr. Dâmbovița (Săvul.).
- \*76. *Peronospora Faba* Jaczewski et Sergueeva  
Jaczew., Phycom. 155.  
Sur *Vicia Faba* L.: Dans un jardin potager aux environs de Buzău-distr. Buzău (Săvul.). Trouvé au printemps (5. V. 1948) à la suite de pluies abondantes.
77. *Peronospora Ficariae* (Nees v. Es.) Tulasne  
Gäum., Monogr. 114; Jaczew., Phycom. 159; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 303; Oescu et Rădul., Note I, 5.  
Exsicc.: H.M.R.: III, 131.  
Sur *Ficaria verna* Huds.: Pester Copou, Bălteni Perieni-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Bălteni, distr. Vaslui (Constantineanu); Călugăra-distr. Bacău (Săvul.); Cotești-distr. R. Sarat (Săvul.); Izvoare (Săvul.); Sinaia-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Buzau, Crâng-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); Snagov, Balotești-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Căscioarele-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Bădulești-distr. Dâmbovița (Săvul.); Cotmeana-distr. Argeș (Săvul.); R. Vâlcea (Săvul. et Rayss); Brașov, Satu Lung-distr. Brașov (Săvul.).

78. *Peronospora flava* Gäumann  
Gäum., Monogr. 151; Jaczew., Phycom. 164; Oescu et Rădul., Note II, 440.  
Sur *Linaria vulgaris* Mill.: Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.).
79. *Peronospora Galagae* (Săvul. et Rayss)  
Săvul. et Rayss, Contrib. I, 315; Jaczew., Phycom. 155.  
Exsicc.: H.M.R.: III, 143.  
Sur *Galega officinalis* L.: Nucet-distr. Dâmbovița (Săvul. et Rayss); Izvoare-distr. Prahova (Săvul.); Periprava, Letea-distr. Tulcea (Săvul.).
80. *Peronospora Galii* Fuckel  
Gäum., Monogr. 247; Jaczew., Phycom. 162; Săvul. et Rayss. Contrib. III, 51.  
Exsicc.: H.M.R.: VII, 346.  
Sur *Galium Mollugo* L.: Cheia-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Toplița, Borsec-distr. Mureș (Săvul.); Tulgheș-distr. Ciuc (Săvul.).  
Sur *Galium palustre* L.: Periprava-distr. Tulcea (Săvul.); Luciu Giurgeni-distr. Ialomița (Săvul.).
81. *Peronospora Galii pedemontani* Săvul. et Rayss  
Săvul. et Rayss, Contrib. II, 380.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 245.  
Sur *Galium pedemontanum* (Bell.) All.: Lehliu-distr. Ialomița (Săvul. et Rayss); Cernica, Ciolpani-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Comana-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss).
82. *Peronospora Galii rubioidis* Săvul. et Rayss  
Săvul. et Rayss, Contrib. II, 383; Contrib. III, 51.  
Exsicc.: H.M.R.: VII, 345.  
Sur *Galium rubioides* L.: Letea-distr. Tulcea (Săvul. et Rayss); Cheile Turzii-distr. Turda (Săvul. et Rayss).
- \*83. *Peronospora Galii veri* Gäumann  
Gäum., Monogr. 249; Jaczew., Phycom. 162.  
Sur *Galium verum* L.: Champs, bord de la route de Văleni de Munte à Izvoare-distr. Prahova (Săvul.); Paturages à Perșani-distr. Făgăraș (Săvul.).
84. *Peronospora Gei* Sydow  
Gäum., Monogr. 291; Jaczew., Phycom. 160; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 327.  
Exsicc.: H.M.R.: III, 142.  
Sur *Geum rivale* L.: Predeal, dans la Vallée „Râșnoava“-distr. Prahova (Săvul. et Rayss).  
Sur *Geum urbanum* L.: Buzău-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); Stoenești (Savul.); București Herăstrău-distr. Ilfov (Savul et et Rayss); Pitariu, Titu, Bădulești-distr. Dâmbovița (Săvul.).

85. *Peronospora Glechomae* Oescu et Rădul.  
Oescu et Rădul., Note III, 100.  
Sur *Glechoma hederacea* L.: Ungheni, Socola, Copou-distr. Iași  
(Oescu et Rădul.).
86. *Peronospora Glaucii* Lobik  
apud Jaczew., Phycom. 149, 1931.  
Syn.: *Peronospora Glaucii* Săvul. et Rayss, Contrib. IV, 13, 1935.  
Sur *Glaucium corniculatum* (L.) Curt.: Murtfatlar-distr. Constanța (Săvul. et Rayss).
87. *Peronospora grisea* Unger  
Gäum., Monogr. 160; Jaczew., Phycom. 166; Săvul. et Rayss,  
Contrib. I, 317; Moesz, Phycom. 89.  
Exsicc.: L.F.H., (489!); H.M.R.: V, 240.  
Sur *Veronica Beccabunga* L.: Izvorul Arinului, Valea Mare,  
Rotunda-distr. Năsăud (Săvul. et Rayss); Vișău, Borșa-distr.  
Maramureș (Săvul.); Câmpulung, Cârlibaba, Iacobeni-distr. Câmpulung  
(Săvul. et Rayss); Broșteni, Gura Bârnarului, Bicaz-distr.  
Neamț (Săvul.); Slănic-distr. Bacău (Săvul. et Rayss); Predeal,  
Bușteni, Zamora, Sinaia, Cheia-distr. Prahova (Săvul. et Rayss);  
Timișul de Sus-distr. Brașov (Săvul. et Rayss); Cheile Bicazului-distr.  
Ciuc (Săvul. et Rayss); Sugag-distr. Alba (Săvul.); Câmpul  
lui Neag (Linhart, Săvul.); Lupeni-distr. Hunedoara (Săvul.).
88. *Peronospora Gypsophilae* Jaczewski emend. Săvul. et  
Rayss  
Jaczew., Phycom. 132, 1931.  
Syn.: *Peronospora Jaczewskii* Săvul. et Rayss, Contrib. III, 39,  
1934.  
Sur *Gypsophila muralis* L.: Cladova-distr. Arad (Săvul. et Rayss);  
Oraștie-distr. Hunedoara (Săvul. et Rayss); Brezoi, Gura Lotrului-distr.  
Vâlcea (Săvul.).  
Espèce connue seulement de l'U.R.S.S. et de Roumanie.  
Tranischel et Jaczewski ont trouvé pour la première fois, sur *Gypsophila muralis* L. une *Peronospora* que Jaczewski (Mycolog. Flora Evrop. Asiatisk. Rossii, Peronosporaceae 144, 1901) la considère comme voisine de *Peronospora Dianthi* De By, en indiquant seulement que les conidies sont ovoïdes, 19—14  $\mu$  et que les conidiophores apparaissent isolés. Găumann (Monogr. 66), avec bon raison, conseille de soumettre la forme de Jaczewski à une nouvelle étude.  
Nous avons récolté dans les localités sus-mentionnées une *Peronospora* qui envahissait les feuilles de *Gypsophila muralis* L. et qui correspondait aux caractères extrêmement sommaires donnés par Jaczewski. Le riche matériel que nous avons eu à notre

disposition nous à permis d'exécuter de mesures biometriques sur un grand nombre de conidies (au moins 500) et de présenter une diagnose complète accompagnée de figures des conidiophores et des conidies. Nous avons baptisé même cette rare Péronosporacée d'après le nom du célèbre mycologue russe, qui a eu le mérite de la découvrir.

Dans son travail plus récent (1931) Jaczewski, sans ajouter de nouveaux détails, ni de figures pour les caractères essentiels, donne le nom de *Peronospora Gypsophilae* Jaczew. pour la forme qui envahit les plantes de *Gypsophila muralis* L. et *G. repens* L. Nous adoptons le nom proposé par Jaczewski, parcequ'il a une priorité de trois ans, quoique l'imprécision de la diagnose et les autres déviations des règles de la nomenclature nous donnait le droit de l'éviter.

89. *Peronospora Hellebori purpurascens* Sävul. et Rayss.  
Sävul. et Rayss, Contrib. IV, 8.  
Exsicc.: H.M.R.: XI, 514.  
Sur *Helleborus purpurascens* W.K.: Sinaia, distr. Prahova (Sävul. et Rayss).
- \*90. *Peronospora Herniariae* De Bary  
Gäum., Monogr. 318; Jaczew., Phycom. 132.  
Sur *Hernaria glabra* L.: Fetești, Cocargea-distr. Ialomița (Sävul.).
91. *Peronospora Hesperidis* Gäumann  
Gäum., Monogr. 271; Jaczew., Phycom. 142; Sävul. et Rayss, Contrib. III, 44.  
Sur *Hesperis matronalis* L.: Vârciorova, la vallée Slătinic-distr. Mehedinți (Sävul. et Rayss).
92. *Peronospora Holosteii* Caspary  
Gäum., Monogr. 311; Jaczew., Phycom. 132; Sävul. et Rayss, Contrib. I, 303; Oescu et Rădul., Note I, 4.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 209.  
Sur *Holostium umbellatum* L.: Copou-distr. Iași (Constantineanu, Oescu et Rădul.); Izvoare-distr. Prahova (Sävul.); București, Herăstrău, Pasărea, Otopeni, Știrbei Vodă-distr. Ilfov (Sävul. et Rayss); Mănăstirea Dealului, Bădulești-distr. Dâmbovița (Sävul. et Rayss); Timișoara-distr. Timiș Torontal (Sävul. et Rayss).
93. *Peronospora Hyoscyami* De Bary  
Gäum., Monogr. 320; Jaczew., Phycom. 166; Sävul. et Rayss, Contrib. I, 317; Oescu et Rădul., Note I, 10; Moesz, Phycom 89.  
Exsicc.: H.M.R.: VII, 341.  
Sur *Hyoscyamus niger* L.: Iași, Nicolina, Copou, Valea, Adâncă-

distr. Iași (Oescu et Rădul.); Suceava-distr. Suceava (Săvul.); Văratec, Agapia, Băltătești-distr. Neamț (Săvul.); București Herăstrău-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss.); Comana-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Călărași, Fetești-distr. Ialomița (Săvul. et Rayss); Tulgheș-distr. Ciuc (Săvul.); Cluj-distr. Cluj (Páter); Abrud-distr. Alba (Săvul.); Petroșani-distr. Hunedoara (Săvul.); Orșova-distr. Severin (Săvul.);

\*94. *Peronospora illyrica* Gäumann

Gäum., Monogr. 116; Jaczew., Phycom. 159.

Sur *Ranunculus illyricus* L.: Ester, Gura Dobrogii-distr. Constanța (Săvul.).

Espèce indiquée seulement de l'U.R.S.S.

95. *Peronospora insubrica* Gäumann

Gäum., Monogr. 243; Săvul. et Rayss, Contrib. IV, 18.

Exsicc.: H.M.R.: XI, 527.

Sur *Galium purpureum* L.: Băile Herculane sur la montagne Domugled-distr. Severin (Săvul. et Rayss).

96. *Peronospora Isatidis* Gäumann

Gäum., Monogr. 271; Jaczew., Phycom. 142; Oescu et Rădul., Note III, 98.

Sur *Isatis tinctoria* L.: Ungheni-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Dâlga, Ciulnita-distr. Ialomița (Săvul.); Babadag-distr. Tulcea (Săvul.).

\*97. *Peronospora Knautiae* Fuckel

Gäum., Monogr. 238; Jaczew., Phycom. 145.

Sur *Knautia arvensis* (L.) Duby.: Bădulești, dans les buissons-distr. Dâmbovița (Săvul.); Curtea de Argeș-distr. Argeș (Săvul.).

\*98. *Peronospora Kochiae* Gäumann

Gäum., Zur Kenntnis der Chenopodiaceen bewohnenden Peronosporarten in Mitteil. Naturf. Gesellsch. Bern, 59, 1919; Monogr. 231; Jaczew., Phycom. 136.

Sur *Bassia sedoides* (Pall.) Asch. (= *Kochia sedoides* Schrad.): Tuzla, sables salés-distr. Constanța (Săvul.).

Espèce rare, indiquée seulement de l'U.R.S.S. Les conidiophores 340—480  $\mu$ , les conidies 20—36  $\mu$ , le plus fréquent 25—29  $\mu$ .

99. *Peronospora Lamii* A. Braun

Gäum., Monogr. 135; Jaczew., Phycom. 147; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 317; Contrib. III, 50; Oescu et Rădul., Note I, 10. Exsicc.: H.M.R.: V, 236, 237; XI, 526.

Sur *Lamium album* L.: Făgăraș-distr. Făgăraș (Săvul.).

Sur *Lamium amplexicaule* L.: Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Stirbei Vodă, Herăstrău, Otopeni, Cernica, Stoenești-distr. Ilfov

(Săvul. et Rayss); Comana-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Bădulești-distr. Dâmbovița (Săvul.).

Sur *Lamium maculatum* L.: Buzău-distr. Buzău (Savul. et Rayss); Slănic-distr. Bacău (Săvul. et Rayss); Bisericani-distr. Neamț (Săvul.); Cheile Turzii-distr. Turda (Săvull. et Rayss); Dobra Jina-distr. Sibiu (Săvul.); Cladova-distr. Arad (Săvul. et Rayss). Sur *Lamium pupureum* L.: Copou, Miroslava-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Văratec, Crăcăoani-distr. Neamț (Săvul.); Vidra-distr. Putna (Săvul.); R. Sărat, Obrejita-distr. R. Sărat (Săvul.); Cosmești-distr. Tecuci (Săvul.); Buzău-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); Pantelimon, București, Ciolpani-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Lehliu-distr. Ialomița (Săvul. et Rayss); Comana-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Curtea de Argeș-distr. Argeș (Săvul. et Rayss); Mercurea Ciucului, Ditrău-distr. Ciuc (Săvul.); Feldioara-distr. Brașov (Săvul.); Petroșani-distr. Hunedoara (Săvul.); Orșova-distr. Severin (Săvul.).

100. *Peronospora Lathyri Aphaca* Săvul. et Rayss  
Săvul. et Rayss, Contrib. I, 313.  
Sur *Lathyrus Aphaca* L.: Oltenița-distr. Ilfov (Săvul.); Comana-distr. Vlașca (Săvul.).  
Cette espèce a été décrite par nous de Turtucaia en Bulgarie.
101. *Peronospora Lathyri hirsuti* Săvul. et Rayss  
Săvul. et Rayss, Contrib. III, 46.  
Exsicc.: H.M.R.: VII, 331.  
Sur *Lathyrus hirsutus* L.: Chiojdene-distr. R. Sărat (Săvul. et Rayss); Cățelu-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss).
102. *Peronospora Lathyri versicoloris* Săvul. et Rayss  
Săvul. et Rayss, Contrib. II, 373.  
Sur *Lathyrus versicolor* (Gmel.) Beck: Săveni-distr. Dorohoi (Săvul.); Comana-distr. Vlașca (Săvul.).  
Cette espèce a été décrite par nous de Mihălășeni en Bessarabie.
103. *Peronospora Lepidii perfoliati* Săvul. et Rayss  
Săvul. et Rayss, Contrib. II, 367; Oescu et Rădul., Note III, 98.  
Exsicc.: H.M.R.: VII, 325.  
Sur *Lepidium perfoliatum* L.: Miroslava, Beldiman-distr. Iași (Oescu et Radul.); București, Herăstrău-distr. Ilfov (Săvul et Rayss); Ciulnița, Lehliu, Călărași-distr. Ialomița (Săvul et Rayss); Hamangia-distr. Constanța (Săvul. et Rayss); Jurilofca, Babadag-distr. Tulcea (Săvul.); Viziru-distr. Brăila (Săvul.); Gradiștea, Balta Albă-distr. R. Sărat (Săvul. et Rayss).
104. *Peronospora Lepidii sativi* Gäumann  
Gäum., Monogr. 271; Jaczew., Phycom. 142; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 312; Contrib. II, 367; Oescu et Rădul., Note I, 7.

Exsicc.: H.M.R.: III, 136.

Sur *Cardaria Draba* (L.) Desv.: Băleni Perieni Popricani, Socola, Şorogari, Voineşti, Tg. Frumos-distr. Iaşi (Oescu et Rădul.); Miclăuşeni-distr. Roman (Săvul.); Tg. Neamţ-distr. Neamţ (Săvul.); Câmpulung-distr. Câmpulung (Săvul.); Moisei, Săcel-distr. Maramureş (Săvul.); Sănduleni, Teçcani-distr. Bacău (Săvul.); Coteşti, Urecheşti, distr. R. Sărat (Săvul.); Posada-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Pasărea, Cătelu, Herăstrău, Stoieneşti-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Comana-distr. Vlaşca (Săvul. et Rayss); Ghimpăti-distr. Ialomiţa (Săvul.); Valul lui Traian-distr. Constanţă (Săvul.); Tg. Jiu, Bumbeşti-distr. Gorj (Săvul.); Palota, Turnu Severin-distr. Mehedinţi (Săvul.); Caransebeş-distr. Severin (Săvul.); Haţeg, Sarmisegetuza-distr. Hunedoara (Săvul.).

Sur *Lepidium campestre* (L.) R. Br.: Mănăstirea Dealului-distr. Dâmboviţa (Săvul. et Rayss).

Sur *Lepidium ruderale* L.: Călăraşi-distr. Ialomiţa (Săvul. et Rayss); Herăstrău, Otopeni, Stoieneşti-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Băduleşti-distr. Dâmboviţa (Săvul.); Feldioara-distr. Braşov (Săvul.).

105. *Peronospora Leptogonia* Fuckel

Gäum., Monogr. 60; Jaczew., Phycom. 134; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 301.

Exsicc.: H.M.R.: V, 212.

Sur *Spergularia marginata* (DC) Kittel: Agigea-distr. Constanţa (Săvul. et Rayss).

106. *Peronospora leptosperma* (De By) Gämänn

Gäum., Monogr. 129; Jaczew., Phycom. 138; Săvul. et Rayss. Contrib. I, 320; Contrib. III, 51; Oescu et Rădul., Note I, 10; Note III, 103.

Exsicc.: H.M.R.: V, 249.

Sur *Matricaria Chamomilla* L.: Iaşi-distr. Iaşi (Oescu et Rădul.); Sănduleni, Teçcani-distr. Bacău (Săvul.); Buzău-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); Izvoare Homoriciu, Văleni de Munte-distr. Prahova (Săvul.); Bucureşti, Herăstrău-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Titu-distr. Dâmboviţa (Săvul. et Rayss); Comana-distr. Vlaşca (Săvul. et Rădul.); Marculeşti-distr. Ialomiţa (Săvul. et Rayss); Nicolitel-distr. Tulcea (Săvul.); Vârciorava-distr. Mehedinţi (Săvul. et Rayss); Orăştie-distr. Hunedoara (Săvul. et Rayss); Sebeşul Săsesc, Petreşti-distr. Alba (Săvul.); Orşova-distr. Severin (Săvul. et Rayss).

Sur *Matricaria discoidea* DC: Rădăuţi-distr. Radauţi (Săvul.); Fălticeni-distr. Baia (Săvul.).

Sur *Matricaria inodora* L.: Aiud-distr. Alba (Săvul. et Rayss).

107. *Peronospora Linariae genistaefolia* Săvul. et Rayss Săvul. et Rayss, Contrib. II, 377.  
Sur *Linaria genistaefolia* (L.) Miller: Periprava, Rosetti-Letea-distr. Tulcea (Săvul.).  
Cette espèce a été décrite par nous d'après des exemplaires récoltés à Vâlcov en Bessarabie.
- \*108. *Peronospora Lini* Schroeter  
Gäum., Monogr. 119; Jaczew., Phycom. 148.  
Sur *Linum catharticum* L.: Broșteni, dans la vallée "Neagra"-distr. Neamț (Săvul.). Ghilcoș-distr. Ciuc (Săvul.); Bușteni, Sinaia-distr. Prahova (Săvul.).
109. *Peronospora Lithospermii* Gäumann  
Gäum., Monogr. 170; Jaczew., Phycom. 129; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 317.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 234.  
Sur *Lithospermum arvense* L.: București, Pasărea-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Comana-distr. Vlașca (Săvul.).
110. *Peronospora Lotorum* Sydow  
Gäum., Monogr. 199; Jaczew., Phycom. 152; Oescu et Rădul., III, 99.  
Sur *Lotus corniculatus* L.: Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Izvoare, Cheia-distr. Prahova (Săvul.).
111. *Peronospora Lunariae* Gäumann  
Gäum., Monogr. 273; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 312; Contrib. III, 45; Moesz, Phycom. 85.  
Exsicc.: H.M.R.: XI, 516.  
Sur *Lunaria annua* L.: Vârciorova-distr. Mehedinți (Săvul. et Rayss).  
Sur *Lunaria pachyrrhiza* Borb. (= *L. elliptica* (Schur) Simk.); Băile Herculane-distr. Severin (Bubák, sub *P. parasitica*, Săvul. et Rayss).  
Sur *Lunaria rediviva* L.: Bușteni près de la cascade "Urlătoarea"-distr. Prahova (Săvul. et Rayss).
- \*112. *Peronospora Lychnitis* Gäumann  
Gäum., Monogr. 54.  
Sur *Lychnis Coronaria* Thunb.: Comana, Mihai Bravul-distr. Vlașca (Săvul.); Afumați, Pasărea-distr. Ilfov (Săvul.).
113. *Peronospora manshurica* (Naoumoff) Sydow  
Gäum., Monogr. 221; Jaczew., Phycom. 153; Săvul. in Bull. Sec. Scient. Acad. Roum. XXX, 8, 494—498, 1948.  
Sur *Glycine hispida* Maxim.: Feldioara, champs d'expériences de l'école d'Agriculture-distr. Brașov (Săvul.).

114. *Peronospora Matthiola e* Gäumann

Gäum., Monogr. 273; Jaczew., Phycom. 142; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 312; Oescu et Rădul., Note II, 434.

Exsicc.: H.M.R.: XXVI, 1299.

Sur *Matthiola incana* R. Br.: Iași-distr. Iași (Oescu et Rădul.); București-distr.; Ilfov (Săvul. et Rayss); Timișoara-distr. Timiș Torontal (Săvul.); Aiud-distr. Alba (Săvul.).

115. *Peronospora Mayori* Gäumann

Gäum., Monogr. 217; Jaczew., Phycom. 154; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 313; Contrib. II, 371; Contrib. IV, 16.

Exsicc.: H.M.R.: III, 144; V, 229; XXVI, 1296.

Sur *Vicia angustifolia* L.: var. *segetalis* (Thuill) Koch: Chițorani, Puchenii-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); București, Băneasa, Pasărea-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Mărcalești-distr. Ialomița (Săvul. et Rayss); Comana-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Bădulești, Valea Mare Găești, Dragodana-distr. Dâmbovița (Săvul.); Mihăești-distr. Muscel (Săvul. et Rayss); Domnești-distr. Muscel (Săvul.).

Sur *Vicia Cracca* L.: Comana, Mihai Bravul-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss).

Sur *Vicia pannonica* Crantz: Oltenița, Ciorogârla-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Chițorani-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Orăștie-distr. Hunedoara (Săvul. et Rayss).

116. *Peronospora media* Gäumann

Gäum., Monogr. 59; Jaczew., Phycom. 134; Săvul. et Rayss. Contrib. I, 309; Oescu et Rădul., Note I, 4.

Exsicc.: H.M.R.: III, 129.

Sur *Stellaria media* (L.) Vill.: Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Gura Humorului-distr. Câmpulung (Săvul.); Broșteni, Borca-distr. Neamț (Săvul.); Slănic-distr. Bacău (Săvul.); Vidra, Câmpuri-distr. Putna (Săvul.); Podu Turcului-distr. Tecuci (Săvul.); Sinaia-distr. Prahova (Constantineanu); Izvoare, Cheia-distr. Prahova (Săvul.); Chițorani-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); București, Herăstrău, Pantelimon, Jilava, Ciorogârla, Periș, Pasărea, Stirbei Vodă, Tâncăbești, Tigănești-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Comana-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Bascov, Cotmeana-distr. Argeș (Săvul.); Mănăstirea Dealului (Săvul. et Rayss); Bădulești Glimbocata, Bogați, Găești-distr. Dâmbovița (Săvul.); R. Vâlcea (Săvul. et Rayss); Milostea, Horez-distr. Vâlcea (Săvul.); Alba Iulia, Zlatna, Căpâlna, Sugag-distr. Alba (Săvul.); Timișoara-distr. Timiș Torontal (Săvul.); Brașov, Hărman-distr. Brașov (Săvul.); Tușnad, Miercurea Ciucului-distr.

- Ciuc (Săvul.); Câmpia Turzii-distr. Turda (Săvul.).  
Sur *Stellaria nemorum* L.: Izvoare-distr. Prahova (Săvul.); Cum-păna-distr. Argeș (Săvul.).
117. *Peronospora Melampyri cristati* Săvul. et Rayss Săvul. et Rayss, Contrib. I, 317; Contrib. IV, 16 (voir ici les observations critiques).  
Sur *Melampyrum cristatum* L.: Mănăstirea Dealului-distr. Dâmbovița (Săvul. et Rayss).  
Sur *Melampyrum silvicum* L.: Gheorgheni, Ghilcoș-distr. Ciuc (Săvul. et Rayss).
118. *Peronospora Melandryi* Gäumann  
Gäum., Monogr. 54; Săvul. et Rayss, Contrib. III, 40; Jaczew., Phycom. 132.  
Sur *Melandryum album* (Mill.) Garke: București, Roșu-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Băbeni, Răducești-distr. R. Sărat (Săvul. et Rayss); Dobrovăț-distr. Vaslui (Sandu Ville).
119. *Peronospora Melandryi noctiflori* Săvul. et Rayss Săvul. et Rayss, Contrib. IV, 5.  
Syn.: *Peronospora vexans* Oescu et Rădul., Note I, 5, non Gäum. Exsicc.: H.M.R.: XI, 512.  
Sur *Melandryum noctiflorum* (L.) Fr. Buzău-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); Chițorani-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul. sub *P. vexans*).
120. *Peronospora Meliloti* Sydow  
Gäum., Monogr. 203; Jaczew., Phycom. 152; Săvul. et Rayss, Contrib. III, 50; Oescu et Rădul., Note II, 439.  
Exsicc.: H.M.R.: XI, 521.  
Sur *Melilotus albus* Desv.: Hagighiol, Babadag-distr. Tulcea (Săvul.).  
Sur *Melilotus officinalis* (L.) Lam.: Horpaz-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Laza-distr. Vaslui (Săvul.); Băltătești, Crăcăoani-distr. Neamț (Săvul.); Mănăstirea-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Lehliu, Mărcolești-distr. Ialomița (Săvul. et Rayss).
121. *Peronospora minor (Caspari)* Gäumann  
Gäum., Monogr. 225; Jaczew., Phycom. 134; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 301. Oescu et Rădul., Note II, 95.  
Exsicc.: H.M.R.: III, 125.  
Sur *Atriplex patula* L.: Breazu, Miroslava-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Deleni-distr. Iași (Săvul.); Slanic-distr. Bacău (Savul. et Rayss); Constanța-distr. Constanța (Săvul. et Rayss); București, Herăstrău, Pantelimon-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Alexandria-distr. Teleorman (Săvul.); Filiași-distr. Dolj (Săvul.); Orșova-distr. Severin (Săvul.).

122. *Peronospora muralis* Gäumann  
Gäum., Monogr. 223; Jaczew., Phycom. 136; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 301.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 205.  
Sur *Chenopodium murale* L.: Cornești-distr. Iași (Bontea); Buzău-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); Ploiești-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); București, Periș-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Constanța-distr. Constanța (Constantineanu); Periprava, Rosetti Letea-distr. Tulcea (Săvul. et Rayss); Orșova, Băile Herculane-distr. Severin (Săvul. et Rayss).
123. *Peronospora Myosotidis* De Bary  
Gäum., Monogr. 171; Jaczew., Phycom. 129; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 317; Oescu et Rădul., Note II, 440.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 235.  
Sur *Myosotis arvensis* Lam.: Bucium-distr. Iași (Oescu et Rădul.).  
Sur *Myosotis sparsiflora* Mikan.: Stâncă, Sculeni-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Văratec, Ciungi-distr. Neamț (Săvul.); Buzău-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); Pasărea-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Sinaia-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Câmpulung, Stoenesti-distr. Muscel (Săvul.); Timișul de Sus-distr. Brașov (Săvul.); Gheorghieni-distr. Ciuc (Săvul.); Borsec, Toplița-distr. Mureș (Săvul.).  
Sur *Myosotis stricta* Link: Comana, Mihai Bravul-distr. Vlașca (Săvul.).  
Sur *Myosotis sp.*: Pester Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.).
- \*124. *Peronospora Myosuri* (Fuckel)  
Gäum., Monogr. 110; Jaczew., Phycom. 159.  
Sur *Myosurus minimus* L.: Herăstrău, Pipera-distr. Ilfov (Săvul.).
125. *Peronospora Nesleae* Gäumann  
Gäum., Monogr. 273; Jaczew., Phycom. 142; Săvul. in Bull. Sec. scient. Acad. Roum. XX, 7, 1—2 (extr.) 1938.  
Sur *Neslea paniculata* (L.) Desv.: Tg. Frumos-distr. Iași (Săvul.); Horlești-distr. Iași (Petrescu sub *P. parasitica*).
126. *Peronospora Niessleiana* Berlese  
Gäum., Monogr. 252; Jaczew., Phycom. 139; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 309; Oescu et Rădul., Note I, 6.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 213.  
Sur *Alliaria Alliaria* (Salisb.) A. Kern.: Pester Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Mănăstirea Neamț, Broșteni-distr. (Săvul.); Mălini-distr. Baia (Săvul.); Slănic-distr. Bacău (Săvul. et Rayss); Câmpuri, Vidra-distr. Putna (Săvul.); Buzău-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); Bușteni Chițorani-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Izvoare, Homoriciu-distr. Prahova (Săvul.); Nucet-distr. Dâmbo-

vița (Săvul. et Rayss); Pasărea, Cernica-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Mihăești-distr. Muscel (Săvul. et Rayss); Letea-distr. Tulcea (Săvul. et Rayss); Băile Herculane-distr. Severin (Săvul. et Rayss); Sft. Gheorghe, Brețcu-distr. Trei Scaune (Săvul.).

127. *Peronospora nitens* Oescu et Rădul.  
Săvul. et Rayss, Contrib. IV, 3; Oescu et Rădul., Note II, 427.  
Exsicc.: H.M.R.: XI, 510.  
Sur *Atriplex nitens* Schkr.: Copou Pester-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Constanța, Anadalchioi-distr. Constanța (Săvul.); Nous avons indiqué cette espèce aussi de plusieurs localités de la Bessarabie.
- \*128. *Peronospora Nonneae* Jaczewski et Serguieva  
Jaczew., Phycom. 130.  
Sur *Nonnea atra* Gris.: Cobadin, Adam Clisii-distr. Constanța (Săvul.).  
Espèce connue seulement de l'U.R.S.S.
129. *Peronospora Obionis verruciferae* Săvul. et Rayss.  
Săvul. et Rayss, Contrib. IV, 3.  
Exsicc.: H.M.R.: XI, 509.  
Sur *Obione verrucifera* Moqu. Tend.: Balta Albă-distr. R. Sărat (Săvul. et Rayss).
- \*130. *Peronospora obovata* Bonorden  
Gäum., Monogr. 60; Jaczew., Phycom. 133.  
Sur *Spergula arvensis* L.: Secu, Pipirig-distr. Neamț (Săvul.); R. Sărat, Obidiți-distr. R. Sărat (Săvul.).
- \*131. *Peronospora ochroleuca* Cesati  
Gäum., Monogr. 280.  
Syn. *Peronospora Turritidis* Gäum. (1916); Jaczew., Phycom. 144.  
Sur *Turritis glabra* L.: Comana-distr. Vlașca (Săvul.); Bădulești-distr. Dâmbovița (Săvul.).
- \*132. *Peronospora Oerteliana* Kühn  
Gäum., Monogr. 89; Jaczew., Phycom. 158.  
Sur *Primula elatior* (L.) Jacq.: Sinaia-distr. Prahova (Săvul.).  
Sur *Primula veris* Huds. (= *P. officinalis* [L.] Jacq.): Izvoare-distr. Prahova (Săvul.).
- \*133. *Peronospora Omphalodis* Gäumann  
Gäum., Monogr. 172; Jaczew., Phycom. 130.  
Sur *Omphalodes scorpioides* Schrank: Sihlea, dans la forêt-distr. R. Sărat (Săvul.). Nous avons récoltée cette espèce aussi de plusieurs localités (Cornești, Golercani, Mărcăuți) de la Bessarabie.

- \*134. *Peronospora Ononidis* Wilson  
Gäum., Monogr. 205; Jaczew., Phycom. 152.  
Sur *Ononis hircina* Jacq.: Milcoiu, dans la vallée de Topolog-distr. Argeș (Săvul.); Gura Lotrului-distr. Vâlcea (Săvul.).
135. *Peronospora Orobi* Gäumann  
Gäum., Monogr. 194; Jaczew., Phycom. 151; Săvul. et Rayss. Contrib. III, 48; Oescu et Rădul., Note III, 99.  
Exsicc.: H.M.R.: VII, 332.  
Sur *Lathyrus tuberosus* L.: Breazu-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Cățelu-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Bădulești, Pătroaia-distr. Dâmbovița (Săvul.).
- \*136. *Peronospora palustris* Gäumann  
Gäum., Monogr. 159; Jaczew., Phycom. 165.  
Sur *Veronica scutellata* L.: Vatra Dornii, Poiana Stampii, dans les tourbières-distr. Câmpulung (Săvul.).
137. *Peronospora parasitica* (Pers.) Fries  
Gäum., Monogr. 263; Jaczew., Phycom. 140; Fuss, Aufzähl. 429; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 310; Oescu et Rădul., Note I, 6; Note III, 98.  
Exsicc.: H.M.R.: III. 135.  
Sur *Capsella Bursa pastoris* (L.) Moench: Câmpulung-distr. Câmpulung (Petrescu); Copou, Socola, Cănești, Roșcani, Tg. Frumos-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Pașcani, Tg. Frumos, Iași-distr. Iași (Petrescu); Vânători, Piatra Neamț, Războieni-distr. Neamț (Petrescu); Bârlad-distr. Tutova (Petrescu); Galați-distr. Covurlui-distr. (Petrescu); Bacău, Călugăra-distr. Bacău (Săvul.); Obrejia, R. Sărat-distr. R. Sărat (Săvul.); Cărpiniște-distr. Buzău (Săvul.); București, Herăstrău, Pasarea, Ciorogârla-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Comana-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Mănăstirea Dealului (Săvul. et Rayss); Bădulești-distr. Dâmbovița (Săvul.); Izvoare-distr. Prahova (Săvul.); Constanța-distr. Constanța (Săvul. et Rayss); Vârciorova-distr. Mehedenți (Săvul. et Rayss); Orșova-distr. Severin (Săvul. et Rayss); Abrud, Sugag-distr. Alba (Săvul.); Oraștie-distr. Hunedoara (Săvul. et Rayss); Dobra, Jina (Săvul.); Sibiu, Giuresau-(Fuss)-distr. Sibiu; Mediaș-distr. Târnava Mare (Fuss); Frumoasa-distr. Ciuc (Săvul.).
138. *Peronospora parva* Gäumann  
Gäum., Monogr. 55; Jaczew., Phycom. 134; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 301.  
Sur *Stellaria Holostea* L.: Predeal, dans la vallée "Râșnoava"-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Borsec-distr. Mureș (Săvul.); Broșteni-distr. Neamț (Săvul.).

139. *Peronospora Pisii* Sydow  
Gäum., Monogr. 209; Jaczew., Phycom. 152; Săvul. et Rayss, Contrib. III, 50; Oescu et Rădul., Note III, 99.  
Exsicc.: H.M.R.: XI, 522.  
Sur *Pisum sativum* L.: Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.); București, Herăstrău-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Slobozia-distr. Argeș (Săvul.); Chiselet-distr. Ilfov (Săvul.).
140. *Peronospora Polygoni* (Halsted) Fischer  
Gäum., Monogr. 324; Jaczew., Phycom. 157; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 301; Oescu et Rădul., Note II, 426.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 207; VII, 312.  
Sur *Polygonum aviculare* L.: Tg. Frumos-distr. Iași (Oescu et Radul.); Bacău-distr. Bacău (Săvul.); Buzău-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); Văleni de Munte, Teișani, Izvoare-distr. Prahova (Săvul.); R. Vâlcea, Călimănești-distr. Vâlcea (Săvul.); Comana-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Feldioara-distr. Brașov (Săvul.); Mercurea Sibiului-distr. Sibiu (Săvul.); Agigea-distr. Constanța (Săvul. et Rayss).  
Sur *Polygonum Convolvulus* L.: Buzău-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); București, Băneasa-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Comana-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Băicoi (Săvul. et Rayss), Izvoare (Săvul.)-distr. Prahova; Constanța-distr. Constanța (Săvul. et Rayss).
- \*141. *Peronospora Potentillae anserinae* Gäumann  
Gäum., Monogr. 292; Jaczew., Phycom. 161.  
Sur *Potentilla anserina* L.: Predeal, Cioplea-distr. Prahova (Săvul.).
142. *Peronospora Potentillae reptantis* Gäumann  
Gäum., Monogr. 293; Jaczew., Phycom. 161; Săvul. et Rayss, Contrib. III, 45; Contrib. IV, 14; Oescu et Rădul., Note II, 440.  
Sur *Potentilla chrysanthia* Trev.: Cheile Bicazului-distr. Ciuc (Săvul. et Rayss).  
Sur *Potentilla reptans* L.: Câmpulung-distr. Muscel (Săvul. et Rayss).  
Sur *Potentilla supina* L.: Tipilești, Izvoare, Epureni, Cilibiu, Golăești-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Tulcea-distr. Tulcea (Săvul.).
- \*143. *Peronospora pratensis* Sydow  
Gäum., Monogr. 213; Jaczew., Phycom. 154.  
Sur *Trifolium pratense* L.: Izvoare-distr. Prahova (Săvul.); Vințu de Jos-distr. Alba (Săvul.); Geoagiu-distr. Hunedoara (Săvul.); Tg. Săcuiesc-distr. Trei Scaune (Săvul.); Prisaca-distr. Câmpulung (Săvul.).

- \*144. *Peronospora Radii* De Bary  
Gäum., Monogr. 125; Jaczew., Phycom. 137.  
Sur *Chrysanthemum Leucanthemum* L., dans les capitules:  
Sinaia-distr. Prahova (Săvul.).
145. *Peronospora Rapistri* Jaczewski et Serguieva  
Jaczew., Phycom. 143, 1931.  
Syn.: *Peronospora Rapistri* Oescu et Rădul., Note II, 434, 1933.  
Sur *Rapistrum perenne* (L.) Bergeret: Copou, Mărzești, Capul Rediu lui, Aroneanu Valea Largă, Ruseni, Movileni, Larga-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Sculeni-distr. Iași (Petrescu sub *P. parasitica*).
146. *Peronospora Ranunculi* Gäumann  
Gäum., Monogr. 116; Jaczew., Phycom. 160; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 304; Oescu et Rădul., Note II, 434; Note II, 103.  
Exsicc.: H.M.R.: III, 132; VII, 317.  
Sur *Ranunculus bulbosus* L.: Bușteni, Sinaia, Valea Largă, Posada, Comarnic-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Izvoare, Cheia-distr. Prahova (Săvul.); Cumpăna-distr. Argeș (Săvul. et Rayss); Herestii-distr. Ilfov (Săvul.); Bădulești-distr. Dâmbovița (Săvul.); Satu Lung, Râșnov, Bran-distr. Brașov (Săvul.).  
Sur *Ranunculus polyanthemus* L.: Ilișești-distr. Suceava (Săvul.); Cotmeana-distr. Argeș (Săvul.); Bistrița-distr. Vâlcea (Săvul.).  
Sur *Ranunculus repens* L.: Bucecea-distr. Botoșani (Săvul.); Suceava-distr. Suceava (Săvul.); Horpaz-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Broșteni, Borca-distr. Neamț (Săvul.); Poiana Stampii-distr. Câmpulung (Săvul. et Rayss); Azuga, Valea Largă, Sinaia, Crivina-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Jilava, Ciorogârla, Pasărea-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Cumpăna-distr. Argeș (Săvul. et Rayss); Călimănești-distr. Vâlcea (Săvul. et Rayss); Timișul de Sus-distr. Brașov (Săvul. et Rayss); Gheorgheni, Ghilcoș sur la montagne Surduc, Cheile Biazului-distr. Ciuc (Săvul. et Rayss); Făgăraș, Ucea de Jos-distr. Făgăraș (Săvul.); Avrig, Dobra, Jina distr. Sibiu (Săvul.); Orăștie, Deva-distr. Hunedoara (Săvul. et Rayss); Zlatna, Căpâlna, Sugag-distr. Alba (Săvul.); Petroșani, Livezeni-distr. Hunedoara (Săvul.).
147. *Peronospora Ranunculi carpathici* Săvul. et Rayss  
Săvul. et Rayss, Contrib. II, 365; Contrib. IV, 7.  
Exsicc.: H.M.R.: XI, 513.  
Sur *Ranunculus carpathicus* Herbich: Sinaia-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Plaiul Ghilcoșului-distr. Ciuc (Săvul. et Rayss).
- \*148. *Peronospora Ranunculi oxyaspermi* Jaczewski et Serguieva  
Jaczew., Phycom. 160.

- Sur *Ranunculus oxyspermus* Willd.: Agigea, Mangalia-distr. Constanța (Săvul.).
149. *Peronospora Ranunculi Sardoi* Săvul. et Rayss  
Săvul. et Rayss, Contrib. I, 304, Jaczew., Phycom. 159; Oescu et Rădul., Note II, 434.  
Exsicc.: H.M.R.: III, 133.  
Sur *Ranunculus Sardous* Crantz: Socola-distr. Iași (Oescu et Rădul.); R. Vâlcea-distr. Vâlcea (Săvul. et Rayss).
150. *Peronospora Ranunculi Steveni* Săvul. et Rayss  
Săvul. et Rayss, Contrib. I, 306; Jaczew., Phycom. 159.  
Sur *Ranunculus Steveni* Andrž.: Cârlibaba-distr. Câmpulung (Săvul. et Rayss); Predeal, Posada, Comarnic-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Suzana, Cheia-distr. Prahova (Săvul.); Cumpăna-distr. Argeș (Săvul. et Rayss); Timișul de Sus-distr. Brașov (Săvul. et Rayss); Orăștie-distr. Hunedoara (Săvul. et Rayss).
151. *Peronospora romanica* Săvul. et Rayss  
Săvul. et Rayss, Contrib. II, 371; Oescu et Rădul., Note II, 437.  
Syn.: *Peronospora aestivalis* Sydow forma *Medicaginis falcatae* (Thuemen) Săvul. et Rayss, Contrib. I, 312.  
*Peronospora Trifoliorum* De By f. *Medicaginis falcatae* Thuemen, F. Austr. 110 et Herb. oec. 19.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 226.  
Sur *Medicago falcata* (L.) Döll: Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.).  
Sur *Medicago falcata* (L.) Döll var. *romanica* (Prodan) Hayek: Vârciorova-distr. Mehedinți (Săvul. et Rayss).
152. *Peronospora Roripae islandicae* Gäumann  
Gäum., Monogr. 274; Jaczew., Phycom. 143; Săvul. et Rayss, Contrib. II, 371; Oescu et Rădul., Note II, 436.  
Exsicc.: H.M.R.: VII, 326.  
Sur *Roripa silvestris* (L.) Besser: Larga-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Bușteni, Sinaia, Zamora, Românești-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Toplița-distr. Mureș (Săvul.); Ditrău-distr. Ciuc (Săvul.).
153. *Peronospora Rosae gallica e* Săvul. et Rayss  
Săvul. et Rayss, Contrib. III, 45.  
Exsicc.: H.M.R.: VII, 329.  
Sur *Rosa gallica* L.: Buzău-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); Cladova-distr. Arad (Săvul. et Rayss).
154. *Peronospora Rumicis* Corda  
Gäum., Monogr. 323; Jaczew., Phycom 157; Săvul. et Rayss, Contrib. III, 39.  
Exsicc.: H.M.R.: VII, 313.  
Sur *Rumex Acetosa* L.: Cheia-distr. Prahova (Săvul. et Rayss);

Orăştie-distr. Hunedoara (Săvul. et Rayss); Poarta-distr. Severin (Săvul. et Rayss).

Sur *Rumex arifolius* All.: Sinaia, vers Vârful cu Dor-distr. Prahova (Săvul.).

- \*155. *Peronospora Ruegeriae* Gäumann

Gäum., Monogr. 221; Jaczew., Phycom. 152.

Sur *Onobrychis sativa* Lam.: Bucureşti, Băneasa, dans les cultures-distr. Ilfov (Săvul.).

156. *Peronospora Sanguisorbae* Gäumann

Gäum., Monogr. 297; Jaczew., Phycom. 161; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 317.

Exsicc.: H.M.R.: V, 225.

Sur *Sanguisorba officinalis* L.: Bucureşti-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Mănăstirea Neamţ, Vâratori-distr. Neamţ (Săvul.); Topliţa-distr. Mureş (Săvul.).

157. *Peronospora Schachtii* Fuckel

Gäum., Monogr. 312; Jaczew., Phycom. 136; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 301.

Sur *Beta vulgaris* L.: Sascut-distr. Bacău (Săvul.); Chitila-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Giurgiu, Petroşani-distr. Vlaşca (Săvul.); Feldioara-distr. Braşov (Săvul.); Lovrin-distr. Timiş Torontal (Săvul.); Cenad-distr. Timiş Totontal (Săvul.).

158. *Peronospora Schleideni* Unger

Gäum., Monogr. 305; Jaczew., Phycom. 147; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 320; Oescu et Rădul., Note II, 441.

Exsicc.: H.M.R.: III, 147.

Sur *Allium Cepa* L.: Cilibiu-distr. Iaşi (Oescu et Rădul.); Bucureşti (Enculescu), Jilava, Copăceni-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); R. Sărat, Obidiţi-distr. R. Sărat (Săvul.); Buzău-distr. Buzău (Săvul.); Craiova, dans les environs-distr. Dolj (Săvul.); Arad-distr. Arad (Săvul.); Cluj-distr. Cluj (Săvul.); Bistriţa-distr. Năsăud (Săvul.); Constanţa-distr. Constanţa (Constantineanu).

159. *Peronospora Scleranthi* Rabenh.

Gäum., Monogr. 55; Jaczew., Phycom. 133; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 301; Oescu et Rădul., Note II, 434.

Exsicc.: H.M.R.: V, 211.

Sur *Scleranthus annuus* L.: Capul Rediului-distr. Iaşi (Oescu et Rădul.); Tigăneşti, Otopeni, Pasărea-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Plăineşti-distr. R. Sărat (Săvul.); Pauleşti, Chitorani-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Comana-distr. Vlaşca (Săvul. et Rayss); Mănăstirea Dealului-distr. Dâmboviţa (Săvul. et Rayss).

- \*160. *Peronospora Scutellariae* Beilin

Jaczew., Phycom. 146.

*Sur Scutellaria galericulata* L.: Luciu Giurgeni, paturages humides le long du Danube-distr. Ialomița (Săvul.).

161. *Peronospora Sennenianna* Frag. et Saccardo  
Gäum., Monogr. 198; Jaczew., Phycom. 151; Săvul. et Rayss, Contrib. III, 48.  
Exsicc.: H.M.R.: VII, 333.  
Sur *Lathyrus niger* (L.) Berh.: Chițorani, Plopeni, Găgeni-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Mihăești-distr. Vâlcea (Săvul. et Rayss); Horez, Milostea-distr. Vâlcea (Săvul.); Turnu Roșu-distr. Sibiu (Săvul.).
- \*162. *Peronospora sepium* Gäumann  
Gäum., Monogr. 220; Jaczew., Phycom. 155.  
Sur *Vicia sepium* L.: Bacău, Călugăra-distr. Bacău (Săvul.); Vidra-distr. Putna (Săvul.); Izvoare-distr. Prahova (Săvul.); Căpâlna-distr. Alba (Săvul.).
163. *Peronospora Sherardiiae* Fuckel  
Gäum., Monogr. 249; Jaczew., Phycom. 163; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 318.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 246.  
Sur *Sherardia arvensis* L.: Băicoi-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Vârciorova-distr. Mehedinți (Săvul.); Orșova-distr. Severin (Săvul. et Rayss).
164. *Peronospora silvatica* Gäumann  
Gäum., Monogr. 248; Jaczew., Phycom. 162; Săvul. et Rayss, Contrib. II, 380.  
Exsicc.: H.M.R.: VII, 344.  
Sur *Galium Schultesii* Vest.: Sur la montagne Cozia-distr. Argeș (Săvul. et Rayss); Sinaia, Poiana Tapului-distr. Prahova (Săvul.).
- \*165. *Peronospora silvestris* Gäumann  
Gäum., Monogr. 159; Jaczew., Phycom. 165.  
Sur *Veronica officinalis* L.: Văratec, Agapia-distr. Neamț (Săvul.).  
Sur *Veronica urticaefolia* Jacq.: Sinaia, le long de la route qui conduit à la cascade "Urlătoarea"-distr. Prahova (Săvul.).
166. *Peronospora Sisymbrii Loeselii* Gäumann  
Gäum., Monogr. 276; Jaczew., Phycom. 143; Săvul. et Rayss, Contrib. III, 45; Oescu et Rădul., Note I, 7.  
Sur *Sisymbrium Loeselii* L.: Copou, Sorogari-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Focșani, Odobești-distr. Putna (Săvul.); Slobozia Ciorăști-distr. R. Sărat (Săvul.); Aiud-distr. Alba (Săvul. et Rayss).
167. *Peronospora Sisymbrii officinalis* Gäumann  
Gäum., Monogr. 276; Jaczew., Phycom. 143; Săvul. et Rayss, Contrib. II, 369; Oescu et Rădul., Note I, 7; Note III, 99.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 215; VII, 321.

Sur *Sisymbrium altissimum* L.: Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Rosetti Letea-distr. Tulcea (Săvul. et Rayss); Orșova-distr. Severin (Săvul. et Rayss).

Sur *Sisymbrium officinale* Scop.: Vișan-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Dărmănești-distr. Suceava (Săvul. et Rayss); Drăgășani, Govora-distr. Vâlcea (Săvul.); Adakaleh, Orșova-distr. Severin (Săvul. et Rayss).

*Peronospora Sisymbrii orientalis* Gäumann

Gäum., Monogr. 277; Oescu et Rădul., Note II, 436.

Sur *Sisymbrium orientale* L.: Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.); R. Sărat, Jideni-distr. R. Sărat (Săvul.); Hamangia-distr. Constanța (Săvul.); Mehadia-distr. Severin (Săvul.).

*Peronospora Sisymbrii Sophiae* Gäumann

Gäum., Monogr. 277; Jaczew., Phycom. 143; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 312; Oescu et Rădul., Note I, 7.

Exsicc.: H.M.R.: V, 216.

Sur *Descurainia Sophia* (L.) Webb. (= *Sisymbrium Sophia* L.): Copou, Nicolina, Tg. Frumos-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Tecuci, Cosmești-distr. Tecuci (Săvul.); Popești, Urechești-distr. R. Sărat (Săvul.); Lipănești, Măgurele-distr. Prahova (Săvul.); Stoenești, Palanca-distr. Ilfov (Săvul.); Comana-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Pitaru, Titu-distr. Dâmbovița (Săvul.); Orăștie-distr. Hunedoara (Săvul. et Rayss).

*Peronospora sordida* Berk. et Br.

Gäum., Monogr. 153; Jaczew., Phycom. 165; Săvul. et Rayss, Contrib. II, 377; Oescu et Rădul., Note II, 440; Moesz, Phycom. 89. Exsicc.: H.M.R.: VII, 342; L.F.H. 490.

Sur *Scrophularia nodosa* L.: Valea Vinului-distr. Năsăud (Săvul. et Rayss); Breaza, Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Poieni, Schitul Duca-distr. Iași (Săvul.); Bușteni-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Slănic-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); Timișul de Sus-distr. Brașov (Săvul. et Rayss); Toplița, Borsec-distr. Mureș (Săvul.); Cladova-distr. Arad (Săvul. et Rayss); Surduc à Petroșani-distr. Hunedoara (Linhart, F.H. 490!).

*Peronospora Spinaciae* Laubert

Gäum., Monogr. 231; Jaczew., Phycom. 137; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 301; Oescu et Rădul., Note I, 4.

Exsicc.: H.M.R.: III, 127.

Sur *Spinacia oleracea* L.: Vișan-distr. Iași (Oescu et Rădul.); București (Enculescu), Pantelimon-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Pitaru, Bădulești-distr. Dâmbovița (Săvul. et Rayss); Timișoara-distr. Timiș Toronatal ((Săvul. et Rayss).

- \*172. *Peronospora Stachydidis* Sydow  
Gäum., Monogr. 140; Jaczew., Phycom. 147.  
Sur *Stachys palustris* L.: Oltenița, au bord marécageux du Danube-distr. Ilfov (Săvul.).
173. *Peronospora stigmaticola* Raunkiaer  
Gäum., Monogr. 140; Jaczew., Phycom. 146; Săvul. in Bull. Scient. Acad. Roum. XX, 7, p. 4 (extr.).  
Exsicc.: H.M.R.: XXIII, 1109.  
Sur *Mentha silvestris* L. (corolle, filets, étamines, stigmates): Tulgheș-distr. Brașov (Săvul. et Rayss); Râșnov-distr. Brașov (Săvul.); Predeal, Pârăul Rece, Cheia-distr. Prahova (Savul.).  
Sur *Mentha aquatica* L.: Chitila, Mogoșoaia-distr. Ilfov (Săvul.).
174. *Peronospora sulfurea* Gäumann  
Gäum., Monogr. 128; Jaczew., Phycom. 138; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 319; Oescu et Rădul., Note I, 10.  
Exsicc.: H.M.R.: III, 146; VII, 347.  
Sur *Artemisia Absinthium* L.: Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Bucecea-distr. Botoșani (Săvul.); Văratec-distr. Neamț (Săvul.); Boldu, Balta, Albă-distr. R. Sărăt (Săvul.); Lehliu, Mărculești-distr. Ialomița (Săvul. et Rayss); Comana-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Cheile Turzii-distr. Turda (Săvul. et Rayss).  
b. Forma *minor* Săvul. et Rayss in Schedis H.M.R., III, 146.  
Sur *Artemisia vulgaris* L.: Cheile Turzii-distr. Turda (Săvul. et Rayss).
175. *Peronospora Symphyti* Gäumann  
Gäum., Monogr. 173; Jaczew., Phycom. 130; Săvul. et Rayss, Contrib. II, 377.  
Sur *Symphytum cordatum* W.K.: Sinaia, Cheia-distr. Prahova (Săvul. et Rayss).
176. *Peronospora Syreniae cuspidatae* Oescu et Rădul.  
Oescu et Rădul., Note I, 7.  
Sur *Syrenia cuspidata* (M.B.) Rchb.: Vlădiceni, Pester Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.).
177. *Peronospora Tanacetii* Gäumann  
Gäum., Monogr. 130; Jaczew., Phycom. 138; Săvul. et Rayss, Contrib. III, 51.  
Exsicc.: H.M.R.: VII, 348.  
Sur *Tanacetum vulgare* L.: Bârlad, Dealul Mare, Zorleni-distr. Tutova (Săvul.); Tecuci, Liești, Hanu Conachi-distr. Tecuci (Săvul.); Mărășești-distr. Putna (Săvul.); Săcălaz, Lovrin-distr. Timiș Torontal (Săvul.).
178. *Peronospora tatarica* Săvul. et Rayss  
Săvul. et Rayss, Contrib. II, 359.

Exsicc.: H.M.R.: VII, 308.

Sur *Atriplex tatarica* L.: Călărași-distr. Ialomița (Săvul et Rayss); Budești, Curcani, Oltenița-distr. Ilfov (Săvul.).

- \*179. *Peronospora Tetragonolobi* Gäumann  
Gäum., Monogr. 209; Jaczew., Phycom. 153.  
Sur *Tetragonolobus siliquosus* (L.) Roth: Periprava, Rosetti Letea, sur les sables humides-distr. Tulcea (Săvul.).
- \*180. *Peronospora Thesii* Lagerheim  
Gäum., Monogr. 320; Jaczew., Phycom. 162.  
Sur *Thesium ramosum* Hayne: Mărculești-distr. Ialomița (Săvul.); Comana-distr. Vlașca (Săvul.).
181. *Peronospora Thlaspeos arvensis* Gäumann  
Gäum., Monogr. 279; Jaczew., Phycom. 144; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 312; Oescu et Rădul., Note II, 437.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 221.  
Sur *Thlapsi arvense* L.: Miroslava Beldiman, dans la plaine de Bahlui-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Jidenei-distr. R. Sărat (Săvul.); Pasărea (Săvul. et Rayss); Mănăstirea (Săvul.)-distr. Ilfov; Comana-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Hălchiu-distr. Brașov (Săvul.).
182. *Peronospora Thlaspeos perfoliatii* Gäumann  
Gäum., Monogr. 279; Jaczew., Phycom. 144; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 312; Oescu et Rădul., Note I, 9.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 222.  
Sur *Thlaspi perfoliatum* L.: Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Băcău, Călugăra, Onești-distr. Bacău (Săvul.); Obrejia, Slobozia Bradu-distr. R. Sărat (Săvul.); Tiganești, la forêt Brânzeasca, Stirbei Vodă-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Comana-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Mănăstiera Dealului-distr. Dâmbovița (Săvul. et Rayss).
183. *Peronospora tomentosa* Fuckel  
Gäum., Monogr. 61; Jaczew., Phycom. 131; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 302.  
Exsicc.: H.M.R.: V, 208; VII, 314.  
Sur *Cerastium glomeratum* Thuill.: Valea Vinului-distr. Năsăud (Săvul. et Rayss); Balta Albă-distr. R. Sărat (Săvul.); Bogătești, Inotești-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Herăstrău, Pasărea, Scroviștea-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Mănăstirea Dealului-distr. Dâmbovița (Săvul. et Rayss); Câmpulung-distr. Muscel (Săvul. et Rayss).
184. *Peronospora tribulinina* Pass.  
Gäum., Monogr. 311; Jaczew., Phycom. 167; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 312; Oescu et Rădul., Note II, 437.

Exsicc.: H.M.R.: XI, 520.

Sur *Tribulus terrester* L.: Holboca, Ruseni-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Călărași, Lichirești, Marculești-distr. Ialomița (Săvul. et Rayss); Constanța-distr. Constanța (Constantineanu); Babadag, Tulcea-distr. Tulcea (Săvul.).

185. *Peronospora Trifolii alpestris* Gäumann

Gäum., Monogr. 210; Jaczew., Phycom. 153; Săvul. et Rayss, Contrib. III, 50; Oescu et Rădul., Note II, 437.

Exsicc.: H.M.R.: XI, 524.

Sur *Trifolium alpestre* L.: Mărzești- Ruseni-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Vatra Dornii-distr. Câmpulung (Săvul.); Valea Vinului vers Ineu-distr. Năsăud (Săvul.); Gheorghieni, Ghilcoș, Lunca de Sus-distr. Ciuc (Săvul. et Rayss); Brețcu-distr. Trei Scaune (Săvul.); Făgăraș-distr. Făgăraș (Săvul.); Poiana Sibiu, Jina-distr. Sibiu (Săvul.); Comana, Mihai Bravu-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss).

186. *Peronospora Trifolii arvensis* Sydow

Gäum., Monogr. 210; Jaczew., Phycom. 153; Săvul. et Rayss, Contrib. III, 50; Oescu et Rădul., Note III, 100.

Exsicc.: H.M.R.: VII, 338.

Sur *Trifolium arvense* L.: Șorogari-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Peatra Neamț, Dobreni-distr. Neamț (Săvul.); Izvoare-distr. Prăhova (Săvul.); Bran-distr. Brașov (Săvul.); Sugag-distr. Alba (Săvul.); Orăștie-distr. Hunedoara (Săvul. et Rayss); Cladova-distr. Arad (Săvul. et Rayss).

187. *Peronospora Trifolii hybriди* Gäumann

Gäum., Monogr. 211; Jaczew., Phycom. 154; Săvul. et Rayss, Contrib. II, 371; Contrib. IV, 16.

Exsicc.: H.M.R.: XXVI, 1298.

Sur *Trifolium hybridum* L.: Chiojdeni-distr. R. Sărat (Săvul. et Rayss); Herăstrău, Copăceni-distr. Ilfov (Săvul.).

Sur *Trifolium striatum* L.: Herăstrău-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss).

188. *Peronospora Trifolii minoris* Gäumann

Gäum., Monogr. 212; Jaczew., Phycom. 154; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 313; Contrib. III, 50; Oescu et Rădul., Note III, 100.

Exsicc.: H.M.R.: VII, 337.

Sur *Trifolium procumbens* L.: Breazu-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Mihăești-distr. Muscel (Săvul. et Rayss).

189. *Peronospora Trifolii repentis* Sydow

Gäum., Monogr. 215; Jaczew., Phycom. 154; Săvul. et Rayss, Contrib. III, 50.

Exsicc.: H.M.R.: VII, 336.

Sur *Trifolium repens* L.: Crăcăoani-distr. Neamț (Săvul.); Onești, Borzești-distr. Bacău (Săvul.); Cărpiniște-distr. Buzău (Săvul.); Câmpulung-distr. Muscel (Săvul. et Rayss); Sinaia Valea Rea-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Timișul de Sus-distr. Brașov (Săvul. et Rayss); Gheorghieni-distr. Ciuc (Săvul. et Rayss); Toplița, Borsec-distr. Mureș (Săvul.).

190. *Peronospora trivialis* Gäumann

Gäum., Monogr. 63; Jaczew., Phycom. 132; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 302; Contrib. II, 365; Oescu et Rădul., Note I, 5.

Sur *Cerastium semidecandrum* L.: Comarnic-distr. Prahova (Săvul. et Rayss).

Sur *Cerastium triviale* Link: Valea Mare, Rotunda-distr. Năsăud (Săvul. et Rayss); Poiana Stampei-distr. Câmpulung (Săvul. et Rayss); Pester Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Borca, Broșteni-distr. Neamț (Săvul.); Sinaia, Comarnic, Buda, Cheia-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Bogătești, Inotești-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Chiojdenei-distr. R. Sărăt (Săvul. et Rayss); Pasărea-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); La montagne Cozia-distr. Argeș (Săvul. et Rayss); Câmpulung-distr. Muscel (Săvul. et Rayss); Mănăstirea Horez-distr. Vâlcea (Săvul. et Rayss); Orșova, Poarta-distr. Severin (Săvul. et Rayss); Tușnad, Gheorghieni-distr Ciuc (Săvul.).

191. *Peronospora Valerianae* Trail

Gäum., Monogr. 316; Jaczew., Phycom. 166; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 319.

Sur *Valeriana officinalis* L.: Poiana Tapului-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Sugag-distr. Alba (Săvul.).

192. *Peronospora Valerianellae* Fuckel

Gäum., Monogr. 316; Jaczew., Phycom. 167; Săvul. et Rayss, Contrib. II, 385.

Exsicc.: H.M.R.: V, 247.

Sur *Valerianella olitoria* (L.) Pollich: Căscioarele-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss).

193. *Peronospora vallesiaca* Gäumann

Gäum., Monogr. 322; Jaczew., Phycom 145; Săvul. et Rayss, Contrib. II, 365.

Exsicc.: H.M.R.: VII, 315.

Sur *Euphorbia Seguieriana* Neck.: Satu Nou, Cordon, dans le Delta du Danube-distr. Tulcea (Săvul. et Rayss); Agigea-distr. Constanța (Săvul.).

194. *Peronospora variabilis* Gäumann

Gäum., Monogr. 226; Jaczew., Phycom. 135; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 301; Oescu et Rădul., Note I, 4; Note III, 95.  
Exsicc.: H.M.R.: III, 126.

Sur *Chenopodium album* L.: Dărmănești-distr. Suceava (Săvul. et Rayss); Bucecea-distr. Botoșani (Săvul.); Cristești, Pester Copou, Șorogari-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Sănduleni. Tețcani-distr. Bacău (Săvul.); Chiojdene, Jideni-distr. R. Sărăt (Săvul. et Rayss); Buzău, Gura Câlnăului-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); Chițorani, Inotești, Gara Prahova, Românești-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Stoenești, Cățelu, Mănăstirea, Mostiștea, Jilava, Oltenița, Spanțov-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Comana, Mihai Bravu-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Lehliu, Fetești, Călă' distr. Ialomița (Săvul. et Rayss); Constanța, Techirghiol-distr. Constanța (Săvul.); Periprava-distr. Tulcea (Săvul. et Rayss); Zamfirești, Cotmeana-distr. Argeș (Săvul.); Ionești-distr. Vâlcea (Săvul. et Rayss); Butoiești-distr. Gorj (Săvul. et Rayss); Palota Turnu Severin-distr. Mehedinți (Săvul. et Rayss); Beclean-distr. Someș (Săvul. et Rayss); Câmpia Turzii-distr. Turda (Săvul. et Rayss); Aiud-distr. Alba (Săvul. et Rayss); Arad, Cladova, Minis-distr. Arad (Săvul. et Rayss); Orăștie-distr. Hunedoara (Săvul. et Rayss); Băile Herculane-distr. Severin (Săvul. et Rayss).

Sur *Chenopodium album* L. subsp. *striatum* Kras.: Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.).

195. *Peronospora Verbasci* Gäumann

Gäum., Monogr. 154; Jaczew., Phycom. 165; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 317; Contrib. II, 377; Contrib. IV, 18; Oescu et Rădul.. Note I, 10.

Exsicc.: H.M.R.: V, 239.

Sur *Verbascum Blattaria* L.: Ungheni, Cristești, Valea Adâncă-distr. Iași (Oescu et Rădul.); București, Herăstrău-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Drăgănești, Ghimpăti-distr. Vlașca (Săvul.).  
Sur *Verbascum speciosum* Schrad.: Budești-distr. Ilfov (Săvul.); Comana-distr. Vlașca (Săvul.).

Sur *Verbascum Thapsus* L.: Câmpulung-distr. Câmpulung (Săvul. et Rayss).

Sur *Verbascum nigrum* L.: Câmpulung-distr. Câmpulung (Săvul. et Rayss); Sinaia, Bușteni-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Turnu-distr. Vâlcea (Săvul. et Rayss).

Sur *Verbascum phlomoides* L.: Valea Rea-distr. Bacău (Săvul.); Izvoare-distr. Prahova (Săvul.); Jina, la yallé Dobra-distr. Sibiu (Săvul.).

Sur *Verbascum montanum* Schrad.: Curtea de Argeș-distr. Argeș (Săvul. et Rayss).

196. *Peronospora verna* Gäumann

Gäum., Monogr. 156; Jaczew., Phycom. 165; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 317; Contrib. III, 51; Oescu et Rădul., Note II, 440. Exsicc.: H.M.R.: V, 242, 243.

Sur *Veronica arvensis* L.: Herăstrău-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Cumpăna-distr. Argeș (Săvul. et Rayss).

Sur *Veronica Chamaedrys* L.: Cheia (Săvul. et Rayss), Mănechi Ungureni, Izvoare (Săvul.)-distr. Prahova; Timișul de Sus-distr. Brașov (Săvul. et Rayss); Gheorghieni-distr. Ciuc (Săvul.): Câmpia Turzii-distr. Turda (Săvul.); Deva-distr. Hunedoara (Săvul.).

Sur *Veronica serpyllifolia* L.: Predeal, Cheia-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Agapia-distr. Neamț (Săvul.); Malu Spărt, Căscioare-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss).

Sur *Veronica Teucrium* L.: Schitul Tărâța-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Lainici-distr. Gorj (Săvul. et Rayss).

\*197. *Peronospora vexans* Gäumann

Gäum., Monogr. 50; Jaczew., Phycom. 133.

Sur *Silene Armeria* L.: Tulgheș-distr. Ciuc (Săvul.); Borsec-distr. Mureș (Săvul.).

Sur *Silene gallica* L.: Vânători-distr. Neamț Petrescu sub *P. Dianthi* De By.

Ce que Oescu et Rădulescu (Note I, 5) ont déterminé comme *Peronospora vexans* Gäum. sur *Melandryum noctiflorum* appartiennent à *Peronospora Melandryi noctiflori* Săvul. et Rayss.

198. *Peronospora Viciae* (Berk.) Gäumann

Gäum., Monogr. 218; Jaczew., Phycom. 155; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 313; Contrib. III, 49; Contrib. IV, 16; Oescu et Rădul., Note III, 100.

Exsicc.: H.M.R.: V, 228; VII, 335; XI, 525; XXVI, 1297.

Sur *Vicia hirsuta* (L.) Koch: Breazu-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Chiojdenei-distr. R. Sărat (Săvul. et Rayss); Pasărea-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss).

Sur *Vicia grandiflora* L.: Buzău-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); Herăstrău-distr. Ilfov. (Săvul. et Rayss); Orăştie-distr. Hunedoara (Săvul. et Rayss). .

Sur *Vicia lathyroides* L.: Cernica-distr. Ilfov (Săvul. et Rayss); Bădulești, Gura Foiș-distr. Dâmbovița (Săvul.); Curtea de Argeș-distr. Argeș (Săvul.).

Sur *Vicia pisiformis* L.: Buzău-distr. Buzău (Săvul. et Rayss); Comana-distr. Vlașca (Săvul.).

Sur *Vicia tenuifolia* Roth: Măcin, Greci-distr. Tulcea (Săvul.).

Sur *Vicia tetrasperma* (L.) Moench: Breazu-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Chiojdenei-distr. R. Sărat (Săvul. et Rayss).

199. *Peronospora Viciae sativae* Gäumann

Gäum., Monogr. 219; Jaczew., Phycom. 155; Săvul. et Rayss, Contrib. I, 313; Oescu et Rădul., Note II, 439.

Exsicc.: H.M.R.: V, 230.

Sur *Vicia villosa* Roth: Chițorani, Ploiești-distr. Prahova (Săvul et Rayss).

Sur *Vicia sativa* L.: Tg. Frumos-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Băbeni, Răducești, Chiojdene-distr. R. Sărat (Săvul. et Rayss); Găgeni-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Mănăstirea Dealului-distr. Dâmbovita (Săvul. et Rayss); Vârciorova-distr. Mehedenți (Săvul. et Rayss); Ada Kaleh, Orșova-distr. Severin (Săvul. et Rayss); Orăștie-distr. Hunedoara (Săvul. et Rayss).

\*200. *Peronospora Vincae* Schroeter

Gäum., Monogr. 317; Jaczew., Phycom. 128.

Sur *Vinca minor* L.: Suceava, Ilișești-distr. Suceava (Săvul.).

201. *Peronospora Violae* De Bary

Gäum., Monogr. 313; Jaczew., Phycom. 167; Săvul. et Rayss, Contrib. III, 50; Oescu et Rădul., Note II, 440.

Exsicc.: H.M.R.: VII, 339.

Sur *Viola arvensis* Murr: Copou-distr. Iași (Oescu et Rădul.); Tg. Ocna, Slănic-distr. Bacău (Săvul. et Rayss); Chițorani-distr. Prahova (Săvul. et Rayss); Stoenești, Ciorogârla (Săvul.); Pantelimon, Periș (Săvul. et Rayss)-distr. Ilfov; Comana, Mihai Bravu-distr. Vlașca (Săvul. et Rayss); Bădulești-distr. Dâmbovița (Săvul.); Lugoj-distr. Severin (Săvul.); Orăștie-distr. Hunedoara (Săvul. et Rayss).

202. *Peronospora vistulensis* Wroblewski

Jaczew., Phycom. 137; Săvul. in Bull. Sec. scient. Acad. Roum. XXII, 5, 237, 1940.

Exsicc.: H.M.R.: XXIII, 1108

Sur *Salsola Kali* L. var. *crassifolia* Fenzl: Mangalia-distr. Constanța (Săvul.).

\* \* \*

### Bibliographie.

1. Bubák F., Adatok Magyarország gombáinok ismeretéhez. — Ein Beitrag zur Pilzflora von Ungarn. — Növ. Közlem. VI. 1907.
2. Fuss M., Syst. Aufzählung der in Siebenbürgen angegebenen Cryptogamen. — Arch. d. Ver. für siebenbürg. Landeskunde. Neue Folge XIV, Heft II, Hermannstadt, 1878.
3. Gäumann E., Beiträge zu einer Monographie der Gattung *Peronospora Corda*. — Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz, Bd. V, Heft 4, 1923.

4. Jaczewski A. A., et P. A. Jaczewski, Opriedielitel Gribov soverschenite gribii (Diploidniie stadii), Tom. I. Fikomitzet, Leningrad. 1931.
5. Moesz G., Fungi Hungariae II. *Archimycetes et Phycomycetes* in Annales Musei Nationalis Hungarici, XXXI, Pars botanica, 1937—38.
6. Oescu V. C., et Rădulescu I., Péronosporacées récoltées dans la dépression de la rivière Jijia-Bull. Sec. scientifique, Académie Roumaine, XV, No. 7—8, 1932.
7. — Idem in Annales scientifiques de l'université de Jassy, XVIII, fasc. 3—4, 1933.
8. — Idem in Buletinul Facultății de Stiințe din Cernăuti, VII, 1933.
9. Petrescu C., Contribution à la flore mycologique de la Moldavie. — Bull. Sec. scientifique, Académie Roumaine, VI, No. 2—4, 1920.
10. Săvulescu Tr., Nouvelle contribution à la connaissance des Péronosporacées et Ustilaginacées de Roumanie. — Bull. Sec. Scientifique, Académie Roumaine, XX, No. 7, 1938.
11. — Péronosporacées, Ustilaginacées et Urédinées nouvelles pour la mycoflore de Roumanie, Ibidem XXII, No. 5, 1940.
12. — Le mildiou du *Soja*, Ibidem XXX, No. 8, 1948.
13. Săvulescu Tr. et T. Rayss, Contribution à la connaissance des Péronosporacées de Roumanie. — Annales Mycologici, XXVIII, No. 3—4, 1930.
14. — Nouvelle contribution à la connaissance des Péronosporacées de Roumanie, Ibidem XXX, No. 3—4, 1932.
15. — Troisième contribution à la connaissance des Péronosporacées de Roumanie, Ibidem XXXII, No. 1—2, 1934.
16. — Quatrième contribution à la connaissance des Péronosporacées de Roumanie, Ibidem XXXIII, No. 1—2, 1935.

### Exsiccata.

1. Linhart, Fungi hung. No. 489, 490.
2. Săvulescu Tr., Herbarium mycologicum Romanicum, Fase.: III. V. VII, XI, XXVI.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Sydowia](#)

Jahr/Year: 1948

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Savulescu Trajan

Artikel/Article: [Les Espèces de Peronospora Corda de Roumanie. 255-307](#)