

Beiträge zur Flora der Niederelbe.

II. Ueber die Pilzflora unseres Gebietes von Th. Overbeck.

Fortsetzung des Verzeichnisses der sicher nachgewiesenen Pilze
der Umgebung Hamburgs und Harburgs.

(Schluss.)

Boletus granulatus bovinus L. Kuhpilz, essbar, Sand,
Kiefernwälder, gemein. Haacke, Dockenhuden.

„ *aereus* Bull., essbar. Dockenhuden, selten.

„ *rufus* Schaeff. (wohl nur Abart von *B. scaber*),
essbar. Hölzung nordöstlich Appelbüttel, häufig, Haacke,
selten, Dockenhuden.

„ *strobilaceus* Scop. sehr selten. Ward in dem
letzten Jahresbericht schon von mir mit ? ohne Namen
versehen, aufgeführt, ward vom Oberlehrer Dr. Wagen-
knecht, November 1879, in Jaenisch's Park bei kl. Flott-
beck, von mir, November 1880, auf's Neue im Centrum
der Haacke in einem Hohlwege ca. 500 Schritt nordöstlich
vom sogenannten Kaiserstuhl in zwei Exemplaren ge-
funden.

„ *spadiceus* Herbst. Haacke bei Hausbruch selten.

Polyporus sulfureus Fr. Herbst; am Fusse alter Baum-
stämme; Haacke, Rosengarten.

„ *igniarius* Fr. Unechter Feuerschwamm. An alten
Weidenstämmen, überall häufig.

„ *sanguinolentus* Fr. Herbst, Haacke bei Hausbruch
auf Moos.

„ *melanopus* an altem faulen Holz, Haacke; selten.

Irpex obliquus, an Stämmen bei der majestätischen Aussicht;
Timm jr.

Hydnum laevigatum Haacke, einzeln, in der Nähe der
Waldschenke.

„ *zonatum* Batsch. Herbst; gemischter Wald in der
Haide zwischen Falkenberg und Rosengarten, Kayser.

„ *coralloides* Scop. Herbst, an faulen Stämmen,
Sachsenwald, selten, essbar, Timm jr.

Radulum fagineum Fr. An alten Buchenstämmen in Stücken bei Lührade.

„ *orbiculare* Fr. Ebendasselbst.

Craterellus cornucopioides Pers. Ausser an dem im vorigen Hefte angeführten Punkte nicht selten in dem Laubholze nördlich vom Fuchsberge bei Rönneburg.

Telephora laciniata Pers. häufig, Schwarzenberg, Haacke auf der Erde.

„ *caryophyllea* Pers. Ebendasselbst.

Stereum purpureum Pers. An Buchenstämmen im Stücken bei Lührade.

„ *hirsutum* Fr. Ebendasselbst.

Clavaria argillacea Pers. Höpen, Haacke, Wald bei Lührade, Dockenhuden.

„ *fastigiata* L. Bremer Chaussee zwischen Tötensen und Lührade.

Tremella mesenterica Retz. Winter an alten Baumstämmen in der Haacke.

Exidia recisa Fr. Im Herbst und Frühling vereinzelt an alten Weiden bei Lührade, Timm jr., Höpen, selten.

Uredineae (Rostpilze).

Puccinea anemones P. Frühling auf Blättern von *Anemone ranunculoides*, Langenbeck.

„ *adoxae* D. C. auf *Adoxa moschatellina*.

„ *aegopodii* Link, auf *Aegopodium*.

Accidium rhamni Pers. auf Blättern von *Rhamnus frangula*.

„ *leucospermum* D. C. auf Blättern von *Anemone nemorosa*.

Peridermium pini Wallr. Kiefernblasenrost. Auf Kiefernzweigen, Schwarzenberg bei Harburg, Haacke.

Etymologische Späne.

Nicht ohne Berechtigung hat man neuerdings die Linguistik unter die naturwissenschaftlichen Fächer eingereiht; daher erlaube ich mir hier einige etymologische Späne mit-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Overbeck Th.

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora der Niederelbe 114-115](#)