

Addenda ad floram Čechoslovakiae mycologicam.

Pars VIII.

Dr. RICHARD PICBAUER.

Opera instituti phytopathologici Brunae (Brno in Čechoslovakia) nr. 137.

Addendorum ad floram Čechoslovakiae mycologicorum edita sunt:

Addenda I. in Sbornik Klubu Přírodovědeckého v Brně za r. 1924.
Tom. VII. 1925.

II. in Actis societatis scientiarum naturalium moravicae.
Tom. II. fasciculus 7. 1925.

III. in Sbornik vysoké školy zemědělské v Brně, 1927.

IV. Ibidem 1929.

V. Ibidem 1931.

VI. in Actis societatis scientiarum naturalium moravicae.
Tom. VII. fasciculus 4. 1932.

VII. Ibidem — Tomus VIII. fasciculus 8. 1933.

His addendis fungi Čechoslovakiae, quos in finibus rei publicae nostrae legeram atque determinavi, adnotantur. Fungus locorum ad opidum Moraviae Kroměříž positorum cl. dom. Hynek ZAVŘEL, professor scholae agronomicae, legit paucosque etiam cl. dom. Doc. Dr. E. BAUDYŠ et cl. dom. Doc. Dr. SUZA legerant egoque omnes perspexi atque determinavi. Omnibus his dominis hoc loco meas maximas gratias agere meum est.

Iterum fungi nondum in finibus Moraviae vel Sloveniae observati, numero XXV, adnotantur hique stella signati sunt. Horum maxime memorabiles videntur: *Tubercinia cortusae* Liro, quae in montibus Sloveniae Malá Fatra detecta, adhuc e Turkestaniam solum nota erat. Etiam *Ustilago intermedia* in antheris *Scabiosae lucidae* (matricis novae), *Ustilago milii*, *Puccinia Lojkaiana*, *Puccinia Fučkelii*, *Propolis rhodoleuca* non minoris ponderis videntur. *Didymella salicis* Grove, quae adhuc in finibus rei publicae nostrae non observata, in culturis salicum ad oppidum Bzenec magnopere nocere solet.

Septem species novae describuntur: **Helotium moravicum**, quod ad ramos decessos ad Tišnov advenit, **Pyrenoperiza nigra**, quale ad caules Dipsaci silvestris ad Pouzdřany advenit, **Ascochyta**

Zavřelii Ignatii ad folia Onopordonis acanthium, **Septoria oenanthis** ad folia Oenanthis aquaticae, **Marsonina moravica** ad folia Anemonis ranunculoidis, **Hainesia Zavřelii Ignatii** ad folia Lythri salicariae et **Cerebella moravica** ad spicas Alopecuri aequalis, quale ad oppidum Kroměříž adveniunt.

Myxomycetes.

Spumaria alba (Bull.) D. C. Ad gramen et ramos *Coryli avellanae* ad Střelice prope Brno.

Phycomycetes.

Synchytrium aureum Schröt. Ad folia *Lysimachiae vulgaris* in colle Burda in collibus Kovačovské kopce ad Szob Sloveniae.

Pycnochytrium laetum Schröt. Ad folia *Gageae luteae* in hortis Květná zahrada in Kroměříž (leg. Zavřel).

Urophlyetis pulposa Schröt. Ad caules foliaque *Atriplicis hastatae* in vico Těšnovice ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Peronospora rumicis Corda. Ad folia *Rumicis acetosae* ad ripas fluminis Morava ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Peronospora litoralis Gäum. Ad folia *Atriplicis hastatae* ad Trávník prope Kroměříž (leg. Zavřel).

Peronospora media Gäum. Ad folia *Stellariae mediae* ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Peronospora holostei Casp. Ad folia *Holostei umbellati* ad Ivančice.

Peronospora ranunculi Gäum. Ad folia *Ranunculi bulbosi* ad pagum Čebín prope Tišnov.

Peronospora scleranthi Rbh. Ad folia *Scleranthi perennis* ad Valečov pr. Něm. Brod (leg. Baudyš).

Peronospora bulbocapni Beck. Ad folia *Corydalis digitatae* in ripa fluminis Bečva in silva Plešovský les ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Peronospora hesperidis Gäum. Ad folia *Hesperidis tristis* in colle Tabulová in collibus Pavlovské kopce ad Mikulov.

Peronospora meliloti Sydow. Ad folia *Meliloti albi* ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Peronospora conglomerata Fuck. Ad folia *Geranii pusilli* in Kroměříž (leg. Zavřel).

Peronospora androsaces Niessl. Ad folia *Androsaces elongatae* ad Sct. Jakub ad Ivančice.

Peronospora valerianellae Fuck. Ad folia *Valerianellae olitoriae* ad Mor. Bránice prope Ivančice.

Peronospora calotheca D. B. Ad folia *Asperulae odoratae* in convalli Cvrčovská dolina ad Zdounky (leg. Zavřel).

Peronospora galii veri Gäum. Ad folia *Galii veri* ad Valečov pr Nĕm. Brod (leg. Baudyš).

Peronospora cyparissias D. B. Ad folia *Euphorbiae cyparissias* in silva „Šebrov“ pr. Ochoz ad Brno.

Peronospora Raddii D. B. Ad anthodia *Anthemidis vulgaris* ad Nové Veselí pr. Žďár na Mor. (leg. Baudyš)

Peronospora Schleideni Ung. Ad folia *Allii cepa* in Všetuly ad Holešov (leg. Ing. Jar. Deyl).

Pseudoperonospora humuli Myabe et Takah. Ad folia *Humuli lupuli* in horto in Kroměříž (leg. Zavřel).

Plasmopara densa Schröt. Ad folia *Odontitis rubrae* in tegularia Medek ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Albugo tragopogonis (Pers.) Gray. Ad folia *Inulae oculus Christi* in declivitate Rokytná pr. Mor. Krumlov.

Sclerospora graminicola (Sacc.) Schröt. Ad folia *Setariae viridis* ad mollas Olšiny pr. Zdounky (leg. Zavřel).

Ascomycetes.

Taphrina insititiae (Sad.) Johans. In ramulis *Pruni domesticae* in Jasenné ad Vizovice (leg. Polášek).

Taphrina minor Sadeb. Ad folia *Pruni fruticosae* in colle Vejhon inter Blučina et Židlochovice, ad Dol. Kounice.

Taphrina betulae (Fuck.) Johans. Ad folia *Betulae pendulae* in silva ad collem Bunč in collibus Chřiby (leg. Zavřel), ad Netín et Dědkov pr. Vel. Meziříčí.

Taphrina Rostrupiana Giesenh. In fructibus *Pruni spinosae* in declivitate ad tundum Světlá in collibus Chřiby (leg. Zavřel).

Taphrina aurea (Pers.) Fr. Ad folia *Populi nigrae* ad Cvrčovice pr. Zdounky (leg. Zavřel).

Erysiphe eichoriacearum D. C. Ad folia *Calendulae officinalis* in horto in Kroměříž (leg. Zavřel).

Plantaginis maioris ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Erysiphe polygoni D. C. Ad folia *Catalpae syringaetolae* in hortis Květná zahrada in Kroměříž.

Ononidis spinosae in foliis *Circaeae lutetianae* in silva ad Zástřizly pr. Zdounky (leg. Zavřel).

Phylactinia corylea Sacc. Ad folia *Betulae albae* in silva ad Zástřizly pr. Zdounky (leg. Zavřel).

Microsphaera berberidis D. C. Ad folia *Berberidis vulgaris* in hortis Zámecká zahrada in Kroměříž (leg. Zavřel).

Microsphaera Mougeotii Lév. Ad folia *Lycii halimifolii* ad Popovice pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Microsphaera grossulariae Lév. Ad folia *Ribis grossulariae* in hortis Květná zahrada in Kroměříž (leg. Zavřel).

Choiromyces meandriformis Vitt. In silva ad Zdounky (leg. Zavřel), in silva Peklo ad Olší et in silva Kačín ad Netín pr. Vel. Meziříčí.

Chaetomium comatum (Tode) Fr. Ad caules veteres *Dahliae variabilis* in Vel. Opatovice (leg. Baudyš).

* **Didymella salicis** Grove. Ad ramos *Salicis capreae* ad Valečov pr. Něm Brod (leg. Baudyš).

Salicis americanae et amygdalinae ad Mor. Písek pr. Bzenec (leg. Baudyš).

Guignardia astragalina Rehm. Ad folia *Astragali ciceris* in declivitate Vinohrady ad mollas Olšíny pr. Zdounky (leg. Zavřel)

Colorca chaetomium (Kze) Rbh. Ad folia *Rubi caesii* in pineto ad Těšany pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Rubi idaei in convalli ad Zástřizly pr. Zdounky (leg. Zavřel).

Stigmatea Robertiani Fr. Ad folia *Geranii Robertiani* in convalli ad Zástřizly pr. Zdounky (leg. Zavřel).

Mamiania coryli (Batsch) Ces. et De Not. Ad folia *Coryli avellanae* ad Hačava pr. Turňa nad B. Sloveniae merid.

Eurychora betulina (Fr.) Schröt. In convalli Divocká dolina pr. Zdounky in foliis *Betulae pendulae* (leg. Zavřel).

Melogramma spiniferum (Wallr) De Not. Ad lignum *Fagi silvaticae* in colle Bučín ad Tetčice pr. Brno.

* **Propolis rhodoleuca** (Sommft.) Fr. Ad strobilos *Pini silvestris* in colle Čebinka ad Tišnov.

Naemaeyelus niveus (Pers.) Sacc. In acubus *Pini austriaci* in colle Chochola ad Komín pr. Brno.

Stictis fimbriata Schwein. Ad strobilos *Pini silvestris* in colle Čebinka ad Tišnov, ad Rokytná pr. Mor. Krumlov.

Cenangium tiliaceum (Fr.) Karst. Ad ramos *Tiliae europaeae* ad arcem Veveří pr. Brno. Sporis 15·4 — 19·2 μ longis ac 4 μ latis, ascis 115 μ longis ac 9·6 μ latis.

Pyronema omphalodes (Bull.) Fuck. Humi in silva ad Březina propius flumen Říčka ad Brno, in silva ad Zadielská dolina pr. Horky Sloveniae merid.

* **Peziza corium** Weber. Humi in silva quercina inter Tetčice et Kývalka pr. Brno.

Helotium moravicum Picbauer sp. n.

Apotheciis 4—7 mm diam., singulatim sparsis, carnosocoriaceis plus minusve patellaribus, stipitatis, hymenio brunneolis, extus ochraceis, stipite 3—8 mm longo, deorsum attenuato, similiter ac extus apotheciorum ochraceo praeditis. Ascis cylindraco-clavatis, breviter stipitatis, octosporis; sporis oblique monostichis, oblonge ovoideis, continuis vel uni-biguttulatis, 15·5 — 22 μ (plerumque 19 μ) longis ac 7—7·7 μ latis, hyalinis; paraphysibus filiformibus.

Habitat ad ramulos carpineos decessos in declivi Čebinka ad Čebín prope Tišnov Moraviae. Mense martio ipse legi.

Pyrenopeziza nigra Picbauer sp. n.

Apotheciis hymenio denso, nigro insidentibus, gregariis, prominulis, $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ mm diam, membranaceis, patellaribus, basi contractis, extus nigris, intus plerumque nigris, rarius pallidioribus, siccis ore involuto et extus striatulis, margine pius minusve lacerato.

Ascis clavatis 70—80 μ longis ac 10—11 μ latis, poro apicali iodo tincto non coerulescente Sporis monostichis vel in superiore parte ascorum distichis, unicellularibus, protracte ovoideis, plerumque ad unum finem vel utrinque acutulis, 11·5—13 μ longis ac 5·5—6·4 μ latis. Paraphysibus ascos fere non superantibus, supra clavate incrassatis (usque 3 μ).

Habitat ad caules emortuos *Dipsaci silvestris* ad vicum Pouzdřany prope Hustopeče Moraviae merid. 4. VII. 1922 ipse legi ac 6. VII. 1922 in schedis ut *Pyrenopeziza nigra* sp. n. significavi.

Sclerotinia tuberosa (Hedw.) Fuck. Ad rhizomata *Anemonis nemorosae* ad Žďár na Mor. (leg. Baudyš).

* *Laehnella barbata* (Kunze) Fr. Ad ramos *Lonicerae xylostet* ad molas Hadecký mlýn in convalli Řička fluminis ad Brno, ad calcariam relictam ad Ochoz.

Stammaria equiseti (Hoffm.) Rehm. Ad folia *Equiseti ramosissimi* ad Hajnačka Sloveniae merid.

Fabraea ranunculi Karst. Ad folia *Ranunculi repentis* in convalli ad Zástřizly pr. Zdounky (leg. Zavřel).

Morehella hybrida (Sow.) Pers. Humi in aestatisilva Kolby ad Pouzdřany pr. Hustopeče, ad Horákov pr. Brno.

Morehella esculenta (L.) Pers. var. *vulgaris* sub salicibus in agris instituti nostri in Černá pole in Brno.

var. *fulva* Fr. loco graminoso ad Horákov pr. Brno. Locum indicavit dom. Fr. Švestka, etiam locum *Morchellae hybridae* ad Horákov.

Basidiomycetes.

Ustilaginales.

Ustilago Cordai Liro in ovariis *Polygoni hydropiperis* in silva Hulský les ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Ustilago maior Schröt. In ovariis *Silenis otitis* var. *pseudootitis* ad Břeclav.

Ustilago lychnidis dioicae (D. C.) Liro. In antheris *Melandryi albi* ad Rakšice, stationen viae ferreae pr. Břeclav.

Ustilago violacea (Pers.) Tul. In antheris *Dianthi caryophylli* ad Břeclav copiosissime.

Ustilago oxalidis Ell. et Tr. In ovariis *Oxalidis strictae* in laterum ductu Medek ad Kroměříž (leg. Zavřel), in Blučina (leg. Baudyš).

* *Ustilago intermedia* Schröt. In antheris *Scabiosae lucidae* ad castellum venatorium ad Pustopolje pr. Dobšina Sloveniae.

Ustilago scabiosae (Sow.) Wint. In antheris *Knautiae arvensis* ad Milovice pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Ustilago ischaemi Fuck. In ovariis *Andropogonis ischaemi* ad Milovice pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

* *Ustilago milii* (Fuck.) Liro. In foliis *Milli effusi* in hortis Zámecká zahrada in Kroměříž (leg. Zavřel).

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Wint. In culmis *Triticici repentis* ad mollas Podskalčí ad Troubsko pr. Brno.

Bromi erecti in prato ad Šelešovice pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Ustilago aculeata (Ule) Liro. In foliis *Triticici repentis* ad viam ad Borovina et ad Starč pr. Třebíč, in silva Wilsoni ad Brno.

Ustilago Salveii Berk. et Br. In foliis *Dactylidis glomeratae* in silva in colle Lysá hora ad Ochoz, in silva supra flumen Rokytná ad Rokytná pagum pr. Mor. Krumlov, ad Břeclav.

Ustilago panicis glauci (Wallr.) Wint. In ovariis *Setariae glaucae* ad Hrabětice pr. Znojmo.

Cintractia caricis (Pers.) Magn. In ovaris *Caricis caryophylleae* in colle Leskoun ad Vedrovice pr. Mor. Krumlov, in colle Lysá hora ad Ochoz.

Schizonella melanogramma (D. C.) Schröt. In foliis *Caricis humilis* in colle Lysá hora ad Ochoz.

Caricis digitatae in colle Čebinka ad Tišnov.

Sorosporium dianthorum Ciff. In ovariis *Dianthi deltoidis* in convalli Nerešnice ad Zvoleň Sloveniae, ad sepulcrum ad Netín pr. Vel. Meziříčí.

Dianthi Carthusianorum in colle Chochola ad Komín pr. Brno.

Sorosporium cerastiorum Ciff. In ovariis *Cerastii arvensis* ad Kroměříž (leg. Zavřel), in colle Cimberk ad Kuřim pr. Brno.

Tolyposporium leptideum Syd. In ovariis *Chenopodii albi* ad Sct. Floriánek ad Mor. Krumlov, inter Pravlov et Dol. Kounice.

Tilletia decipiens (Pers.) Körn. In ovariis *Agrostidis vulgaris* in convalli Nerešnice ad Zvolen Sloveniae.

Entyloma linariae Schröt. In foliis *Linariae vulgaris* in convalli Bobravae fluminis pr. mollas Anenský mlýn ad Ůřechov pr. Brno.

Entyloma eryngii (Corda) D. B. In foliis *Eryngii campestris* ad Komín pr. Brno.

Entyloma serotinum Schröt. In foliis *Symphyti officinalis* ad Skržice pr. Zdounky (leg. Zavřel).

Tubureinia muscari (Niessl.) Liro. In antheris *Muscari comosi* ad mollas Olišiny pr. Skržice ad Zdounky (leg. Zavřel).

Tubercinia coehicii (Schlecht.) Wint. In foliis *Colchici autumnalis* in convalli Řička fluminis ad molas Hadecký mlýn pr. Ochoz.

***Tubercinia cortusae** Liro. In ovariis *Cortusae Matthioli* in monte Suchý in montibus Malá Fatra Sloveniae (leg. Dr. Krist). Adhuc a Naringol in Jaganus in Turkestanian, ubi ab A. Regnel lecta est, nota.

Tubercinia anemones (Pers.) Liro. In foliis *Anemones nemorosae* in colle Lysá hora ad Ochoz pr. Brno; in silva Háje ad Zubří pr. Val. Meziříčí (leg. Dr. Krist).

Tubercinia pulsatillae Liro. In foliis *Pulsatillae grandis* in colle Malá Čebinka ad Tišnov, in planitie Zadielská planina ad Turňa n. B. Sloveniae merid.

Tubercinia agropyri (Preuss.) Liro. In foliis *Triticici repentis* in silva Wilsoni ad Brno.

Uredinales

Hyalopsora polypodii (Pers.) Magn. Ad folia *Cystopteridis fragilis* in convalli Zadielská dolina ad Turňa n. B. Sloveniae merid.

Calyptospora Geoppertiana Kühn. In caulibus *Vaccinii vitis idaei* in silva ad viam turistorum Žižkova mohyla — Borová pr. Žďar n. Mor (leg. Zavřel)

Thekopsora vacciniorum Karst. Ad folia *Vaccinii myrtilli* in silva ad Roštínská kaplička in collibus Chřiby (leg. Zavřel).

Thekopsora pirolae Gmel. Ad folia *Pirolae minoris* in silva infra colle Kleštěnec in collibus Chřiby (leg. Zavřel).

Pucciniastrum circaeae (Thüm.) Schröt. Ad folia *Circaeae luteiflorae* in convalli Divocká dolina ad Zdounky (leg. Zavřel).

Melampsora Magnusiana Wagn. Ad folia *Corydalis cavae* et *digitatae* in silva ad Břest pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Melampsora allii-populina Kleb. Caeoma ad folia *Allii ursini* at Pouzdřany et Vranovice.

Cronartium ribicolum Diet. In cortice *Pini strobi* in horto instituti stultorum in Kroměříž (leg. Zavřel).

Endophyllum sempervivi (Alb. et Schw.) D. B. Ad folia *Sempervivi* sp. in montibus Predné Kopršády, in ascensu alpis Zadné Jatky in montibus Belanské Alpy (leg. Dr. Suza).

Coleosporium pulsatillae (Strauss) Lév. Ad folia *Pulsatillae grandis* in colle Chochola ad Komín, in colle Kamenný kopec ad Lískovec pr. Brno.

Uromyces geranii (D. C.) Otth. Ad folia *Geranii columbini* in convalli Nerešnice ad Zvoleň Sloveniae.

Uromyces airae flexuosae (Liro) Ferd. et Winge. In foliis *Airae flexuosae* ad viam a Tatranská Poljanka Velická dolina versus.

Uromyces ranunculi-festuae Jaap. Ad folia *Ranunculi bulbosi* in colle Čebinka ad Tišnov.

Uromyces graminis (Niessl) Diet. Aecidia ad folia *Seseli glauci* in planitie Zadielská planina ad Turňa n. B. Sloveniae merid.

Melicæ ciliatæ in colle Leskoun ad Vedrovice et in colle Křižák ad Mor. Krumlov.

Uromyces euphorbiae-corniculati Jordi. Ad folia *Loti corniculati* in colle Klucanina ad Tišnov (leg. Baudyš).

Uromyces caryophyllinus (Schrauk) Schröt. Ad folia *Dianthi caryophylli* in Brno-V hlinkách

Uromyces verrucosus Schröt. Ad folia *Melandryi albi* ad flumen Jihlavka ad Dol. Kounice et Pravlov.

Uromyces scrophulariae (D. C.) Berk. et Br. Ad folia *Scrophulariae nodosae* in convalli Zadielská dolina ad Turňa n. B., in convalli Nerešnice ad Zvolen Sloveniae.

Uromyces thapsi (Opiz) Bub. Ad folia *Verbasci thapsi* ad pedes clivis Roháče ad Hajnačka Sloveniae merid.

Uromyces minor Schröt. Ad folia *Trifolii mantani* in planitie Zadielská planina ad Turňa n. B.

Uromyces ambiguus (D. C.) Fuck. Ad folia *Allii scorodoprasi* in colle Vejhon inter Blučina et Židlochovice.

* *Uromyces erythronii* (D. C.) Pass. Ad folia *Erythronii dentis canis* supra pagum Brzotín ad Rožňava in planitie Šilická planina Sloveniae merid (leg. Dr. Suza).

Uromyces genistae tinctoriae (Pers.) Wint. Ad folia *Cytisi nigricantis* in convalli Nerešnice ad Zvolen, in collibus Kováčské kopce ad Szob, in collibus Roháče ad Hajnačka, in Zadielská dolina et planina ad Turňa n. B.

Uromyces striolatus Tranzsch. Ad folia *Euphorbiae cyparissias* in colle Lysá hora ad Ochoz pr. Brno.

Uromyces gageae Peck. Ad folia *Gageae luteae* in hortis Květná zahrada in Kroměříž (leg. Zavřel).

Uromyces scillarum (Grev.) Wint. Ad folia *Muscari comosi* in colle Malá Čebínka ad Tišnov, ad Sct. Antonium ad Dol. Kounice, inter Dol. Kounice et Silůvky in agris.

Puccinia asparagi D. C. Ad folia *Asparagi officinalis* in agris ad Trboušany (leg. Ing. Šolc), in agris ad Kroměříž (leg. Zavřel), in agris ad Pravlov et Dol. Kounice.

Puccinia sweertiae (Opiz) Wint. Ad folia *Sweertiae perennis* in convalli Babilovská dolina in montibus Belanské alpy (leg. Dr. Suza).

Puccinia soldanellae (D. C.) Fuck. Ad folia *Soldanellae carpathicae* in Bednářský regl ad Žďár, inter Havran et Nový montes in montibus Belanské Alpy (leg. Suza), ad speluncam gelidam ad convallem Zadielská dolina Sloveniae.

Puccinia asperulae odoratae Wurth. Ad folia *Asperulae odoratae* in silva in convalli supra pagum Zástřizly (leg. Zavřel).

Puccinia asperulae cynanchicae Wurth. Ad folia *Asperulae cynanchicae* in collibus Kováčské kopce ad Szob, in convalli Nerešnice ad Zvolen, ad Hajnačka, Filakovo, Zadielská dolina, Horky, Hajská dolina ad Turňa n. B., Moldava in Slovenia merid.

Puccinia asperulina (Juel.) Lgh. Ad folia *Asperulae tinctoriae* ad speluncam gelidam ad convallem Zadielská dolina pr. Turňa n. B.

Puccinia galii silvaticae Otth. Ad folia *Galii silvatici* in convalli Nerešnice ad Zvolen, in convalli Zadielská et Hajská dolina ad Turňa n. B., ad Hačava, in collibus Kováčovské kopce Sloveniae merid.

Puccinia coëtanea Bub. Ad folia *Asperulae glaucae* in collibus Kováčovské kopce ad Szob, in convalli Nerešnice ad Zvolen Sloveniae.

Puccinia gentianae Strauss. Ad folia *Gentianae cruciatae* ad Jasov, in Miglincká pusta Sloveniae merid.

Puccinia cirsii eriophori Jacky. Ad folia *Cirsii eriophori* in Miglincká pusta ad Turňa n. B.

Puccinia retifera Lind. Ad folie *Chaerophylli bulbosi* in silva Plešovský les ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Puccinia Barkhausiae rhoeadifoliae Bub. Ad folia *Crepidis rhoeadifoliae* ad Hajnačka pr. Filiakovo, ad Zadiel pr. Turňa n. B.

Puccinia coronata Corda Ad folia *Festucae giganteae* ad ruinam Nový hrad pr. Blansko.

Puccinia pygmaea Eriks. Ad folia *Calamagrostidis epigeios* in laterum ductu ad Vážany pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Puccinia arrhenatheri Kleb. Aecidia in foliis *Berberidis vulgaris* in hortis Zámecká zahrada in Kroměříž (leg. Zavřel).

Puccinia stipae (Opiz) Hora. Aecidia in foliis *Thymi Chamaedrydis* ad Sct. Antonium pr. Dol. Kounice.

Stipae capillatae in declivitate inter Dol. Kounice et Pravlov.

Puccinia anthoxanthi Fuck. Ad folia *Anthoxanthi odorati* in collibus Kováčovské kopce ad Szob, in convalli Nerešnice ad Zvolen, in planitie Zadielská planina ad Turňa n. B.

Puccinia pruni spinosae Pers. Ad folia *Pruni armeniaca* in horto in Kroměříž (leg. Zavřel).

Puccinia polygoni amphibii Pers. Ad folia *Geranii pratensis* ad piscinam pr. Rataje ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Puccinia sessilis Schmidt. Ad folia *Convalariae maialis* in silva Hulský les ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Puccinia Schmidiana Diet. Ad folia *Leucoii aestivi* ad Mušov in pratis palustribus.

Puccinia melicae (Erick.) Syd. Ad folia *Melicae uniflorae* in convalli rivi a Vranov Lelekovice versus.

* **Puccinia ribesii-pseudocyperi** Kleb. Ad folia *Caricis pseudocyperi* in Hluboká dolina supra pagum Zástřízly ad Zdounky (leg. Zavřel).

Puccinia caricicola Fuck. Ad folia *Caricis supinae* in colle Leskoun ad Vedrovice pr. Mor. Krumlov.

Puccinia linosyridis-caricis E. Fisch. Ad folia *Asteris linosyridis* in planitie Zadielská planina ad Turňa n. B. Sloveniae.

Puccinia athamanthae (D C) Lind. Ad folia *Peucedani cervariae* in collibus Kováčovské kopce ad Szob, in convalli Nerešnice ad Zvolen, in planitie Zadielská planina, ad Jasov Sloveniae merid.

Puccinia bullata (Pers) Wint. Ad folia *Seseli glauci* ad Horky pr. Turňa n. B.

Puccinia pyrethri Rbh. Ad folia *Chrysanthemi corymbosi* ad Dol. Kounice; ad Kováčov pr Szob, in convalli Nerešnice ad Zvolen, in convalli Zadielská dolina et in planitie Zadielská planina ad Turňa n. B., ad Jasov Sloveniae merid

Puccinia chondrillina Syd. et Bub. Ad folia caulesque *Chondrillae iunceaë* ad mollas Olšiny pr. Skržnice ad Zdounky (leg. Zavřel), ad Dol. Kounice.

Puccinia carduorum Jacky. Ad folia *Cardui glauci* in faucibus Hrabušické rokle ad Kláštorisko pr. Spišská Nová Ves.

Puccinia echinopsis D. C. Ad folia *Echinopsis sphaerocephali* ad Hačava pr. Turňa n. B.

Puccinia absinthii D. C. Ad folia *Artemisiae absinthii* ad Sct. Antonium ad Dol. Kounice, ad Pravlov, in convalli Nerešnice ad Zvolen.

* **Puccinia Fuckelii** Syd. Ad folia *Jurineae mollis* ad ruinam arcis Čachtický hrad ad Nové Mesto n. V. (leg. Dr. Suza).

Puccinia carlinae Jacky. Ad folia *Carlinae acaulis* ad Cvrčovice pr. Zounky (leg. Zavřel).

Puccinia balsamitae (Strauss.) Wint. Ad folia *Tanacetii balsamitae* in Radostín ad Vel. Meziříčí (leg. Zavřel).

Puccinia tanacetii D. C. Ad folia *Tanacetii vulgaris* ad Velké Kršťiany ad Něm. Pravno Sloveniae (leg. Baudyš).

Puccinia liliacearum Duby. Ad folia *Ornithogali umbellati* in hortis Květná zahrada in Kroměříž (leg. Zavřel).

* **Puccinia Loikiana** Thüm. Ad folia *Ornithogali Boudheani* in hortis Květná zahrada in Kroměříž (leg. Zavřel).

Puccinia circaeae Pers. Ad folia *Circaeae lutetianae* in silva Břestský les ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Puccinia De Baryana Thüm. Ad folia *Anemonis silvestris* in colle Velký Ptešivec in collibus Čachtické kopce Sloveniae ocid. (leg. Suza), in Miglincká pusta ad Turňa n. B.

Puccinia salviae Ung. Ad folia *Salviae glutinosae* in convalli Zadielská et Hajská dolina ad Turňa n. B.

Puccinia asarina Kunz Ad folia *Asari europaei* ad Horky pr. Zadielská dolina ad Turňa n. B.

Puccinia valantiae Pers. Ad folia *Galii verni* in collibus Roháče ad Hajnačka, in collibus ad Zadielská dolina Sloveniae.

Puccinia grisea (Strauss.) Wint Ad folia *Globulariae Wilkommii* supra pagum Jalšová ad Piešťany Sloveniae acid. (leg. Suza).

Puccinia millefolii Fuck. Ad folia *Achilleae millefolii* in convalli Bobrave fluminis ad molas Annenský mlýn pr. Střelice ad Brno.

Puccinia artemisiicola Syd. Ad folia *Artemisiae campestris* ad Pravlov et Dol Kounice.

Uropyxis sanguinea (Peck.) Arth. Ad folia *Mañoniae aquifoliae* in communi sepulcrorum loco in Kroměříž (leg. Zavřel).

Gymnosporangium iuniperinum (L.) Mart. Ad folia *Sorbi ariae* in planitie Zadielská planina ad Turňa n. B., in collibus Kováčovské kopce ad Szob Sloveniae.

Gymnosporangium iuniperi Link. Ad folia *Sorbi aucupariae* in planitie Zadielská planina et in convalli Nerešnice ad Zvolen.

Phragmidium tuberculatum J. Müll. Ad folia *Rosae rubiginosae* in colle Leskoun ad Vedrovice pr. Mor. Krumlov.

Phragmidium rosae alpinae (D C.) Schröt. Ad folia *Rosae pendulinae* in convalli Zadielská dolina ad Turňa n. B.

Phragmidium pimpinellifoliae (Rbh.) Diet. Ad folia ramulosque *Rosae pimpinellifoliae* ad Rokytná pr. Mor. Krumlov.

Aecidium pulmonariae Thüm. Ad folia *Pulmonariae officinalis* in silva supra pagum Horky ad Zadielská dolina pr. Turňa n. B.

Hymenomyces.

Exobasidium vaccinii (Fuck) Wor. Ad folia *Vaccinii uliginosi* in prato sphagnali ad piscinam Velké Dářko pr. Žďár na Mor. (leg. Zavřel).

Auricularia auricula Iudae (L.) Schröt. Ad truncum *Sambuci nigrae* in hortis Lužánky in Brno.

Platyglöea nigricans Schröt. Ad ramos *Tiliae europaeae* in silva inter Týn et Okřešice ad Třebíč, ad arcem Veverčí, pr. Brno.

Boletus strobilaceus Scop. In silva ad Tři křiže pr. Vev. Bytýška (leg. Baudyš), in silva promiscua ad arcem Nový Hrad pr. Blansko.

Boletus pulverulentus Opatow. In aestatisilva (*Carpinus, Quercus, Tilia*) ad molas Podskalčí ad Střelice pr. Brno mense iunio.

Schizophyllum commune Fr. Ad corticem *Laricis europaeae et Pini austriacae* in colle Chochola ad Komín pr. Brno.

Leptoglossum museigenum (Bull.) Karst. Inter gramen et muscum in clivo Chochola ad Komín pr. Brno.

Lepiota rhacodes (Vitt.) Quél. Humi infra Robinias in colle Leskoun ad Vedrovice pr. Brno.

Astraeus stellatus Scop. Humi in declivitate Král. Stolice ad Znojmo.

Geaster coronatus (Schäff.) Schröt. In silva Šebrov ad Ochoz, ad Lelekovice, in convalli rivi Bílý potok inter Šmelcovna et Veverí Bitýška, ad Netín pr. Vel. Meziříčí Moraviae; in valle Černá voda Rakúská in Belanské Alpy (leg. Suza).

Geaster rufescens Pers. Humi in colle Čebinka ad Tišnov, in silva Střelický les ad Brno exeunte iunio.

Geaster fimbriatus Fr. In silva Šebrov ad Ochoz pr. Brno.

Geaster minimus Schw. Humi in colle Leskoun ad Vedrovice, in colle Křížák ad Mor. Krumlov, in colle Děvín in collibus Pavlovské kopce.

Geaster nanus Pers. Ad saxa permica in monte Křížák et ad Sct. Floriánek ad Mor. Krumlov, in colle Cimberk ad Kuřim, in declivitate Chochola ad Komín pr. Brno; in declivitate ad Vilikov pr. Boskovice (leg. Dr. Krist).

Calvatia cyathiformis (Bosc.) Morg. In silva urbana inter Klentice et Pulgarov pr. Mikulov (leg. Moravek et Dr. Fröhlich), supra rivum Pocoucovský potok inter Třebíč et Ptáčov (leg. Zdeňka Picbauerová), ad Rokytná pr. Mor. Krumlov; in planitie Žadielská planina ad Turňa n. B. in communi excursione leg. Švestka.

* *Calvatia hungarica* Holl. Ad Ochoz pr. Brno.

* *Calvatia candida* (Rostk) Holl. In margine agri ad Hrabětice pr. Znojmo, ad Rokytná pr. Mor. Krumlov, inter Dol. Kounice et Pravlov, inter Vel. Meziříčí et Moštiště, ad Troubsko pr. Brno

Lycoperdon umbrinum Pers. In silvis inter Vranov et Lelekovice, ad Ochoz pr. Brno.

var. **stellare** Peck in declivitate inter Dol. Kounice et Pravlov.

Lycoperdon spadiceum Pers. Humi in clivo Chochola ad Komín pr. Brno, in declivitatibus ad Dol. Kounice et Ivančice, ad Mor. Krumlov.

Lycoperdon hiemale Vitt. In pascuis ad Netín pr. Vel. Meziříčí, ad Svinošice pr. Kuřim.

Lycoperdon pussillum Batsch. In declivitatibus ad Hlína, Troubsko, Střelice, Želešice, Malá Čebinka ad Tišnov.

Lycoperdon papillatum Schäff. In clivo Chochola ad Komín pr. Brno.

Lycoperdon furfuraceum Schäff. In colle Cimberk ad Kuřim, in colle Malá Čebinka et Čebinka ad Tišnov, in colle Křížák ad Mor. Krumlov.

Bovista nigrescens Pers. In alpi Bednářský regl pr. pagum Žďár in montibus Belanské Alpy (leg. Suza), in convalli Nerešnice ad Zvolen.

Disciseda circumscissa Berk. et Curt. In clivo Chochola ad Komín pr. Brno, ad mollas Podskalčí ad Střelice pr. Brno, in convalli Bobrave fluminis ad Želešice lapidinas versus, in colle Leskoun ad Vedrovce pr. Mor. Krumlov, ad. Vel. Meziříčí.

Fungi imperfecti.

Phyllosticta atriplicis Desm. Ad folia *Atriplicis hastatae* in silva Plešovský les ad Kroměříž (leg. Zavřel).

* *Phyllosticta stomaticola* Bäum. Ad folia *Arrhenatheri elatioris* ad Cvrčovice pr. Zdounky (leg. Zavřel)

Phyllosticta lacerans Pass. Ad folia *Ulmi laevis* in silva Plešovský les ad Kroměříž (leg. Zavřel).

* *Phyllosticta Nikolai* Bub. Ad folia *Melandryi albi* ad flumen Jihlavka inter Dol Kounice et Pravlov.

Phyllosticta syringae West. Ad folia *Syringae vulgaris* in hortis in Kroměříž (leg. Zavřel).

* *Phoma chondrillae* Holl. Ad caules *Chondrillae iunceaе* inter Moštiště et Vel. Meziříčí.

Ascochyta Zavřelii Ignatii Picbauer sp. n.

Maculis utrinque visilibus, rotundatis vel ellipticis, solitariis vel confluentibus, brunneolis, medio arescentibus ac griseoalbis, circa medium arescentem obscuriore marginatis, locis macularum marginalibus dilutioribus. Pycnidii plerumque epiphyllis, bene visilibus, brunneolis, 185-195 μ diam., poro ca 30 μ lato praeditis, circa porum obscurioribus.

Sporulis hyalinis unicellularibus, cylindraccis, utrinque rotundatis 5-77 μ longis ac 2.5 μ latis, bicellularibus cylindraccis, utrinque rotundatis, medio septatis, ad septa non vel leniter constrictis, 8-9.6 (rarius usque 11.5) μ longis ac 3.5-4 μ latis.

Habitat ad folia viva *Onopordonis acanthium*. In vico Těšňovice prope oppidum Kroměříž prof. Hynek (Ignatius) Zavřel legit.

* *Septoria bromi* Sacc. Ad folia *Bromi mollis* in ripa fluminis Moravae ad Kroměříž (leg. Zavřel).

* *Septoria castanicola* Desm. Ad folia *Castaneae vescae* in silva ad Rakšice pr. Mor. Krumlov.

Septoria urticae Rob. et Desm. Ad folia *Urticae urentis* in Těšňovice pr. Kroměříž (leg. Zavřel), in Rakšice pr. Mor. Krumlov, in Hajnačka, Filakovo, Moldava et Dvorníky ad Turňa n B.

Septoria oenanthis Picbauer sp. n.

Maculis utrinque visilibus, irregularibus, ochraceo pallide brunneolis, plerumque confluentibus et magnam partem foliorum

occupantibus. Pycnidiis epi- et hypophyllis, irregulariter disseminatis, subglobosis, brunneo-nigris, 90-120 μ diam., poro ca 37 μ lato apertis, contextu flavo-brunneo, parenchymatico; sporulis filiformibus, ad unum finem paulum attenuatis, non septatis, 23-27 longis ac 2.5 μ latis.

Habitat ad folia viva *Oenanthis aquaticae* in palude in silva ad vicum Chropyň prope Kroměříž. Ibi prof. Hynek Zavřel legit.

Septoria hepaticae Desm. Ad folia *Hepaticae trilobae* in colle Čebinka ad Tišnov.

Septoria menyanthis Desm. Ad folia *Menyanthis trifoliatae* in pratis inter Netín et Olší ad Vel Meziříčí.

Septoria astragali Desm. Ad folia *Astragali glycyphylli* in convalli Nerešnice ad Zvolen, in collibus Kováčské kopce ad Szob, in convalli Zadielská dolina et Hajská dolina ad Turňa n. B.

var. *santonensis* Brun. Ad folia *Astragali glycyphylli* ad pedes montis Slavkovský štít in montibus Tatrensibus.

Septoria oenotherae West. Ad folia *Oenotherae biennis* in ripa Moravae fluminis ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Septoria heraclei Fuck. Ad folia *Heraclei sphondylii* in fossa viae ferrae ad Šelešovice pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

**Septoria aegopodina* Sacc. Ad folia *Pimpinellae saxifragae* in silva lucida ad Zadielská dolina pr. Turňa n. B.

**Septoria daucina* Brun. Ad folia *Dauci carotae* in horto in Kroměříž (leg. Zavřel).

Septoria convolvuli Desm. Ad folia *Convolvuli sepium* in ripa fluminis Moravae ad Trávník pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Septoria vincetoxici Sacc. Ad folia *Vincetoxici officinalis* in declivitate ad mollas Olšiny pr. Skržice ad Zdounky (leg. Zavřel).

Septoria stachydis Rob. et Desm. Ad folia *Stachydis palustris* in convalli Divocká dolina ad Zdounky (leg. Zavřel), ad Nový Hrad pr. Blansko.

Septoria tanacetii Niessl. Ad folia *Tanacetii vulgaris* in ripa Moravae fluminis ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Septoria cirsii Niessl. Ad folia *Cirsii oleracei* ad rivum Skržický potok pr. Zdounky (leg. Zavřel).

Hainesia Zavřelii Ignatii Picbauer sp. n.

Maculis amphivisilibus, subrotundatis, initio obscurius limitatis, deinde sine limitibus. Pycnidiis superficialibus, primo subglobosis ac clausis, deinde apertis cupulatisque, denique disciformibus, ceraceo-luteolis, sessilibus, 150-180 μ diam.; intus basidiis hyalinis, filiformibus usque 50-75 μ longis ac 1-15 μ latis expletis. Basidiis ramosis, apicibus monosporis.

Sporulis, hyalinis, apice ramulorum sessilibus, fusoidis usque subaulantoideis, utrinque attenuatis, 5·3-10·5 μ longis ac 1·5-2·6 μ latis.

Habitat ad folia viva *Lythri salicariae* in ripa paludis „U strže“ ad Kroměříž Moraviae. 19. VIII. 1933 Hynek Zavřel legit. Species ad memoriam lectoris nominata.

Gloeosporium umbrinellum Berk. et Br. Ad folia *Quercus lanuginosae* ad Rokytná pr. Mor. Krumlov.

* *Gloeosporium sanguisorbae* Fuck. Ad folia *Sanguisorbae officinalis* in pratis inter Vel. Meziříčí et Moštiště.

Marsonia Delastrei (De Lacr.) Sacc. Ad folia *Viscaria vulgaris* in convalli Nerešnice ad Zvolen.

Marsonina moravica Picbauer sp. n.

Maculis orbicularibus saepe irregularibus, parvis, olivaceo-brunneolis, saepe ad apices foliorum dispositis. Acervulis punctiformibus, epidermide diu tectis, brunneolis. Sporulis cylindraceutis, plus minusve pediformibus, utrinque ovato rotundatis, saepe uno loculo latiore alteroque angustiore, rectis vel paulum curvulis ad septa leniter constrictis 10-13 (rarius 15) μ longis ac 3·5-4 μ latis, hyalinis usque paulum fumosiusculis; sporulis unicellularibus duobus vel pluribus guttulis praeditis.

Habitat ad folia viva *Anemonis ranunculoïdis* ad oppidum Kroměříž Moraviae plerumque in societate *Synchytrii anemonis*. Legit Hynek Zavřel.

Marsonia truncatula Sacc. Ad folia *Aceris campestris* ad Skržice pr. Zdounky (leg. Zavřel).

Libertella faginea Desm. f. minor Sacc. In cortice *Carpini betuli* ad Nový Hrad pr. Blansko.

Stagonospora carpathica Bäum. = *Marsonia medicaginis* Voss. = *Aschochyta medicaginis* Bres. = *Stagonospora medicaginis* Bub. In foliis *Meliloti albi* in laterum ductu ad Vážany pr. Kroměříž (leg. Zavřel)

Botrytis parasitica Cav. Ad folia *Muscari comosi* in colle Malá Čebinka ad Tišnov.

* *Didymaria linariae* Pass. Ad folia *Linariae genistaefoliae* in convalli Nerešnice ad Zvolen.

Ramularia alismatis Fautrey. Ad folia *Alismatis plantaginis* in ripa paludis „U strže“ ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Ramularia arvensis Sacc. Ad folia *Potentillae reptantis* ad Těšňovice pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

* *Ramularia Winteri* Thüm. Ad folia *Ononidis hircinae* ad ascensum a domo turistorum in Zadielská dolina Hačava versus pr. Turňa n. B.

Ramularia oreophila Sacc. Ad folia *Astrantiae maioris* in silva infra collem Kleštětec in collibus Chřiby (leg. Zavřel), in convalli Zadielská et Hajska dolina ad Turňa n. B.

Ramularia heraclei (Oud) Sacc. Ad folia *Heraclei sphondylii* in convalli rivi Skržický potok ad Zdounky (leg. Zavřel)

Ramularia lysimachiae Thüm Ad folia *Lysimachiae vulgaris* in ripa piscinae ad Rataje pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Ramularia cortusae Petr. Ad folia *Cortusae Matthioli* ad speluncam gelidam ad Zadielská dolina pr. Turňa n. B.

Ramularia anchusae Mass. Ad folia *Anchusae officinalis* ad Plešovec pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Ramularia aiugae (Niesl.) Sacc. Ad folia *Aiugae genevensis* in collibus Kováčské kopce ad Szob, in convalli Nerešnice ad Zvolen, in planitie Zadielská planina ad Turňa n. B.

Ramularia caleca (Desm.) Ces. Ad folia *Glechomatis hederaceae* ad piscinam ad Chropyn pr. Kroměříž (leg. Zavřel)

Ramularia marrubii Mass. Ad folia *Marrubii peregrini* ad introitum convallis Zadielská dolina ad Turňa n. B.

Ramularia leonuri Sorok. Ad folia *Leonuri cardiaci* in Šanov ad Znojmo.

Ramularia stachydis Mass. Ad folia *Stachydis annuae* in agris ad molas Olšiny pr. Skržice ad Zdounky (leg. Zavřel).

***Hormiscium hysterioides** Corda. Ad ramos *Tiliae cordatae* in silva Dubinky ad Okřešice pr. Třebíč.

Bispora moulioides Corda. In ligno *Fagi silvaticae* in colle Bučín ad Tetčice pr. Brno.

Fusieladium radiosum (Lib.) Lind. Ad folia *Populi albae* in declivitate Vejhon inter Blučina et Židlochovice.

Fusieladium orbiculatum (Desm.) Thüm Ad folia *Sorbi terminalis* in silva Háj ad Šelešovice pr. Kroměříž, in silva in colle Kleštětec in collibus Chřiby (leg. Zavřel).

Fusieladium heterosporum v. H. Ad folia *Epilobii hirsuti* ad Šelešovice pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Scolecotrichum fraxini Pass. Ad folia *Fraxini excelsioris* in silva Hulský les ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Fraxini orni in collibus Kováčovské kopce ad Szob copiose.

Scolecotrichum compressum Allesch. Ad folia *Glyceriae fluitantis* ad piscinam pr. Rataje ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Scolecotrichum graminis (Fuck) Sacc. Ad folia *Alopecuri aequalis* in paludosis ad Morava flumen ad Trávník pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Cercospora dubia (Riess.) Wint. Ad folia *Chenopodii boni Hentici* in convalli Bobrave fluminis ad molas Anenský mlýn pr. Střelice ad Brno, ad Dol. Kounice.

Chenopodii albi in horto in Kroměříž (leg. Zavřel).

Chenopodii urbici in Popovice ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Atriplicis patuli in horto in Kroměříž (leg. Zavřel).

Atriplicis hortensis in laterum ductu Medek ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Cercospora mercurialis Pass. Ad folia *Mercurialis annuae* in horto in Kroměříž (leg. Zavřel).

Cercospora campi sili Speg. Ad folia *Impatiens noli tangere* in convalli Divocká dolina ad Zdounky (leg. Zavřel).

Cercospora circumscissa Sacc. Ad folia *Pruni spinosae* ad Rakšice pr. Mor. Krumlov.

Alternaria tenuis Nees v. E. Ad folia *Saponariae officinalis* ad mollas Olšiny pr. Skržice ad Zdounky (leg. Zavřel), ad Rakšice pr. Mor. Krumlov.

Illosporium roseum Mart. Ad thallum *Parmeliae saxatilis* in colle Leskoun ad Vedrovice pr. Mor. Krumlov.

**Fusarium pelargonii* Cr. Ad caules *Pelargonii zonalis* in caldariis firmae Vlk in Vel. Opatovice (leg. Baudyš).

Cerebella moravica Picbauer sp. n.

Stromatibus pulvinatis, cerebriformibus (tremellaceiformibus), thallo lichenis Synechoblasti vel Leptogii similibus, 2-5 mm diam., brunneo-atris Glomerulis globosis vel subglobosis, primo unicellularibus, deinde segmentatis ac e 2-5 segmentis compositis, 13-15.5 μ diam, rarius ovoideis, plerumque 23 μ longis ac 15.5 μ latis, brunneololuleolis, ad septa plus minusve constrictis, levibus vel minute asperulis. Cellulis irregularibus a lateribus mutua pressione angulatis, supra convexis.

Habitat ad spicas vivas *Alopecuri aequalis* Sobol. ad oppidum Kroměříž Moraviae. Mense septembre profesor Ignatius Zavřel legit.

Sclerotium rhizodes Auerw. Ad folia *Brachypodii pinnati* in colle Vejhon inter Blučina et Židlochovice.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn](#)

Jahr/Year: 1937

Band/Volume: [69](#)

Autor(en)/Author(s): Picbauer Richard

Artikel/Article: [Addenda ad floram Cechoslovakiae mycologicam. 29-45](#)