

Herbarium Normale Transsilvanicum, Centuria II.

Es hat uns der Herr Pfarrer Michael Fuss in Giresau, dem es gelungen, im Verein mit einigen Freunden der Kräuterkunde Siebenbürgens bereits die zweite Centurie des siebenbürgischen Herbarium Normale zusammenzubringen, das nachstehende Verzeichniss dieser Centurie überreicht. Wir theilen dasselbe unsern Lesern mit dem Bemerken mit, dass diese Centurie demnächst an die schon früher bestimmten Anstalten versendet, bezüglich bei denselben hinterlegt werden wird.

INDEX

Centuriae secundae Herbarii normalis Transsilvanici.

101. *Uredo Leguminosarum Rebh. c. Fabarum.* — Auf Blättern von *Faba vulgaris* im Herbste; wohl überall, wo die Mutterpflanze kultivirt wird. — Grossscheuern Fuss; Giresau Fuss; gesammelt bei Giresau von M. Fuss.
102. *Aecidium Compositarum Mart. b. Tussilaginis.* — Auf der untern Blattfläche von Tussilago- und Petasites-Arten. — Grossscheuern Fuss; Zood Fuss; gesammelt bei Zood gegenüber der Pulvermühle von M. Fuss.
103. *Puccinia Aethusae Lk.* — Auf Blättern von *Aethusae Cynapium*; häufig. — Grossscheuern Fuss; Hermannstadt Fuss; Giresau Fuss. — Gesammelt bei Hermannstadt im „Lectorgarten“ von M. Fuss.
104. *Tubercularia vulgaris Tode.* — Auf abgestorbenen Zweigen vieler Bäume und Sträucher; sehr häufig. — Schässburg Baumgarten; Grossscheuern Fuss; Gurariului Fuss; Arpasch mare Heufler; — gesammelt auf *Ribes rubrum* und *Prunus*-Arten bei Grossscheuern im Pfarrgarten von M. Fuss.
105. *Phyllinum tiliaceum Pers.* — Auf der untern Blattfläche von *Tilia*-Arten; sehr häufig. — Schässburg Baumgarten; Tallmesch Fuss; Hermannstadt Fuss; — gesammelt bei Tallmesch auf dem „Stein“ (Nagelflue) von M. Fuss.
106. *Polystigma rubrum DeC.* — Auf Blättern von *Prunus*-Arten; sehr häufig; in manchem Jahre so allgemein, dass kein Blatt vom Pilze verschont wird, und die Bäume und Gärten von weitem gesehen ihren grünen Habitus verlieren, und braun aussehen. — Schässburg Baumgarten; Grossscheuern Fuss; Neudorf Fuss; Giresau Fuss; — ge-

- sammelt bei Grossscheuern im „Wepersthal“ von M. Fuss.
- 107. Sphaeria Coryli Batsch.** — Auf Blättern von *Corylus Avellana*. — Beobachtet und gesammelt bei Giresau am „hohen Berg“ von M. Fuss.
- 108. Sphaeria fimbriata Pers.** — Auf Blättern von *Carpinus Betulus*; häufig. — Grossscheuern Fuss; — gesammelt bei Giresau auf dem „hohen Berg“ von M. Fuss.
- 109. Erysibe cometa Lk.** — Auf Blättern von *Enonymus europaeus*. — Beobachtet und gesammelt in Giresau im Pfarrgarten von M. Fuss.
- 110. Usnea barbata Fr.** — An Stämmen von *Abies*-Arten; sehr häufig. — Duscher Pass Fuss; Hermannstädter Alpen Sigerus; Kerzeschoraer Alpen Fuss; Arpasch mare Heufler; Butschetsch Kotschy; Borszék Salzer. — Gesammelt auf der Kerzeschoraer Alpe „Butian“ von M. Fuss.
- 111. Bryopogon ochroleucus Lk.** — An der Erde auf den Alpen; häufig. — Frumoasze Fuss; Arpasch mare Heufler; Butschetsch Baumgarten; Hargitta Baumgarten. Gesammelt auf der Grossauer Alpe „Frumoasze“ von M. Fuss.
- 112. Parmelia parietina Duf.** — An der Rinde von Bäumen, alten Schindeldächern, Planken etc.; sehr gemein. — Hermannstadt Fuss; Hammersdorf Fuss; Neudorf Fuss; Giresau Fuss; Arpasch mare Heufler; Kuhhorn Salzer. Gesammelt bei Hermannstadt von M. Fuss.
- 113. Polypodium vulgare L.** — Bgt. n. 2270. — SS. n. 3293. — In Felsenritzen und am Grunde alter Stämme, Berg- und Voralpenregion, ziemlich häufig. — Hatszeg Baumgarten; Vajda-Hunyad Baumgarten; Hermannstadt Fuss; Habnebach Fuss; Grossscheuern Fuss; Heltau Fuss; Michelsberg Fuss; Präsbe Kladni; Oberschebesch Fuss; Rothenthurmpass Gebirgszug Prehodischtie Fuss; Holzmünden Fuss; Kerzeschoraer Glashütte Fronius, Fuss; Arpascher Alpen Schur, Heufler, Fuss; Fogarascher Alpen Baumgarten, Schur; Kronstadt Schur; Héviz Baumgarten; Alsó-Rákos Baumgarten; Felső-Rákos Baumgarten; Búdös Schur; Tusnád Schur; Schässburg Baumgarten; Homorod Baumgarten; Thorenburger Alpen Ercsei; Ücsém Schur; Scharbuck Fuss. — Gesammelt bei Michelsberg an des „Teufel seiner Kihp“ von M. Fuss.
- 114. Asplenium Trichomanes L.** — Bgt. n. 2298. — SS. n. 3314. — In Mauer- und Felsenritzen; Berg- und Voralpenregion; sehr häufig. — Tömös Schur; Kronstadt Schur; Fogarascher Alpen Schur; Arpascher Alpen Schur;

- Heufler; Kerzeschoraer Alpe Butian Fuss; Rothenthurmpass Sigerus; Portschescht Fuss; Giresau Fuss; Zood Fuss; Michelsberg Fuss und Unvericht; Hermannstadt Fuss. — Gesammelt bei Portschescht von M. Fuss.
115. *Potamogeton natans* L. — Bgt. n. 214. — SS. n. 2642. — In Teichen und stehendem Wasser; häufig. — Tövis Fuss; Salzburg Fuss; Giresau Fuss; Thorenburg Baumgarten; Szt.-Iván Baumgarten; Schässburg Fronius; Hideg-szamos Bielz; Reen . . . — Gesammelt bei Salzburg von M. Fuss.
116. *Triglochin maritimum* L. — Bgt. n. 660. — SS. n. 2460. — Auf Sumpfboden; vorzüglich in der Nähe von Salzexhalationen; häufig. — Déva Unvericht; Salzburg Baumgarten, Sigerus, Fuss; Baassen Salzer; Thorenburg Baumgarten, Schur, Ercei; Repe Baumgarten; Homorod-Sz.-Pál Baumgarten; Homorod-Sz.-Péter Baumgarten; Büdös Baumgarten; Udvarhely Szabo; Kolos Baumgarten; Mezöség Janka; Paraid Baumgarten; Soakna Schur. — Gesammelt bei Salzburg von M. Fuss.
117. *Avena elatior* L. — *Holcus avenaceus* Bgt. n. 2114. — *Arrhenatherum avenaceum* SS. n. 3113. — In Grasgärten und auf Wiesen. — Broos Unvericht; Hermannstadt Fuss; Schässburg Fronius; Thorenburg Ercei; Mezöség Ercei; Klausenburg Schur. — Gesammelt bei Hermannstadt im „Priestergarten“ von M. Fuss.
118. *Triodia decumbens* P. B. SS. n. 3119. — *Triodon decumbens* Bgt. n. 2035. — Auf Grasplätzen der Voralpen. — Kerzeschoraer Glashütte Fuss; Arpascher Alpen Schur; Fogarascher Alpen Schur; Lázárfalva Baumgarten; Tusnád Baumgarten. — Gesammelt oberhalb der Kerzeschoraer Glashütte von M. Fuss.
119. *Setaria viridis* P. B. — SS. n. 3035. — *Pennisetum viride* Bgt. n. 2109. — Auf sterilen Aeckern; sehr häufig. — Déva Unvericht; Grossscheuern Fuss; Neudorf Fuss; Giresau Fuss; Schässburg Fronius; Thorenburger Comitat Ercei; Bistritz Herzog. — Gesammelt bei Grossscheuern von M. Fuss.
120. *Bromus sterilis* L. — Bgt. n. 2072. — SS. n. 3218. — Auf Grasplätzen, in Weinbergen, an Ackerrändern etc.; häufig. — Hermannstadt Sigerus, Fuss; Neudorf Fuss; Schässburg Fronius; Bistritz Herzog. — Gesammelt bei Hermannstadt auf der Promenade von M. Fuss.
121. *Carex leporina* L. — *C. ovalis* Bgt. n. 2114. — *Vignea leporina* SS. n. 2958. — Auf feuchten Grasplätzen; bis in die Alpen; — sehr häufig. — „Stine Paltinei“ im Mühlbachthal Fuss; Hermannstadt Schur, Fuss; Grossscheuern

Fuss; Frumoasze Fuss; Beschinou Unvericht; Tomnatik Fuss; Giresau Fuss; Tschorte Fuss; Negoi Fuss; Kerzeschoraer Glashütte Fuss; Arpascher Alpen Schur; Leschkirch Baumgarten, Fronius; Reps Baumgarten; Kronstadt Baumgarten; Lövete Baumgarten; Piatra Talhárului Bielz; Kuhnorn Bielz. — Gesammelt bei Hermannstadt auf der „Narzissenwiese“ von M. Fuss.

122. *Carex flava* L. — Bgt. n. 2153. — SS. n. 3024. — Auf sumpfigen Wiesen; häufig. — Hermannstadt Fuss; Giresau Fuss; Schässburg Fronius; Hargitta Baumgarten; Borszék Schur; Piatra Talhárului Bielz. — Gesammelt bei Hermannstadt auf der „Narzissenwiese“ von M. Fuss.

123. *Cyperus fuscus* L. Bgt. n. 2193. — SS. n. 2897. — Auf Sumpfboden; sehr häufig. — Broos Unvericht; Gura-riului Fuss; Hammersdorf Sigerus; Neudorf Fuss; Schässburg Fronius; Büdös Schur. — Gesammelt bei Broos von Unvericht.

124. *Iris caespitosa* Pall. — *Iris graminea* pr. pr. Bgt. n. 125. — *I. humilis* SS. n. 2765. — Auf grasigen Hügeln zwischen Gestrüch; stellenweise häufig. — Schässburg Fronius, Baumgarten; Hermannstadt Fuss, Unvericht; Klausenburg Wolff; Rodna Rekert; Hammersdorf Baumgarten, Rekert, Fuss; Giresau Fuss; Elisabethstadt Fuss; Neudorf Fuss; Tallmesch Fuss. — Gesammelt bei Hammersdorf von Rekert.

Von den Baumgarten'schen Standorten bei *I. graminea*, von welcher Art derselbe unsre Pflanze nicht unterschieden hat, gehören hieher sicher: „Hammersdorf“, wo *I. graminea* bis noch nicht, unsre Pflanze aber häufig gesammelt wurde; ferner „Schässburg am Witeberg — nicht weite Berg — und Siechenwald“; die übrigen Baumgarten'schen Standorte sind noch zu konstatiren.

125. *Crocus veluchensis* Herbert. — SS. n. 2742. — *C. vernus* Bgt. n. 117. — In Gestrüch und Wäldern der Berg- und Voralpenregion; sehr häufig. — Michelsberg auf dem „Giötzembrich“ Baumgarten, Fronius, Fuss; Reschinär Baumgarten; Szuru Baumgarten; Dscheammeanie Baumgarten (ein bis noch nicht ermittelter Standort, wahrscheinlich das Kuhnorn, oder jedenfalls eine der benachbarten Kuppen); Bistritz Herzog; Königstein Kotschy; Bullafall Schur; Koronyis Rekert; Klausenburg Wolff; Galatz Wolff; Hargitta Fronius; Kerz C. Fuss; Holzmünden Fuss; Oberarpascher Alpen Fuss; Präschbe Fuss; Burkátsch Fuss. — Gesammelt auf dem „Giötzembrich“ von M. Fuss. —

Ich habe die Pflanze nach der Bestimmung von Schott

- und Kotschy benannt; muss aber gestehen, dass ich den Unterschied zwischen unsrer Pflanze und *C. Heuffelianus* nicht finden kann. Namentlich die Pflanze der Bergregion bin ich geneigt, für die letztere zu halten.
- 126.** *Narcissus poeticus* *L.* — Bgt. n. 589. — SS. n. 2766. — Auf Bergwiesen; nicht häufig. — Hermannstadt Baumgarten, Sigerus, Fuss; Schönberg Baumgarten; Mergeln Baumgarten; Radeln Baumgarten; Reps Baumgarten; Alsó-Rákos Baumgarten; Lövéte Baumgarten; Oláhfaln Baumgarten, Fronius; Broos Unvericht; Romoschel Unvericht; Schässburg Fronius; Sz.-Keresztbánya Fronius; Medwisch Salzer; Koronyis Baumgarten; Bistritz Herzog. — Gesammelt bei Hermannstadt auf der „Narzissenwiese“ von M. Fuss.
- 127.** *Luzula campestris* *DeC.* — Bgt. n. 2224. — SS. n. 2893. — Auf Triften, Grasplätzen, Bergwiesen; sehr häufig. — Schässburg Fronius; Bistritz Herzog; Broos Unvericht; Grossscheuern Fuss; Oberschebesch Fuss; Neudorf Fuss; Hammersdorf Fuss; „Giötzembrich“ Fuss; Giresau Fuss. — Gesammelt bei Grossscheuern von M. Fuss.
- 128.** *Juncus bufonius* *L.* — Bgt. n. 2237. — SS. n. 2869. — Auf Sumpfboden; sehr häufig. — Schässburg Fronius; Kuhhorn Bielz; Thorenburger Comitatus Ercsei; Hermannstadt Sigerus, Fuss; Broos Unvericht; Reschinar Fuss; Zood Fuss; Michelsberg Fuss. — Gesammelt bei Broos von Unvericht.
- 129.** *Paris quadrifolia* *L.* — Bgt. n. 714. — SS. n. 2782. — In Wäldern der Berg- und Voralpenregion; — Schässburg Fronius; Bistritz Herzog; Rodna Schur; Medwisch Salzer; Thorenburg Ercsei; Görgény . . . ; Hammersdorf Sigerus; Schebesch Unvericht; Kerzeschoraer Glashütte C. Fuss; Riuszadului Fuss; Giötzembrich Fuss; Präsche Fuss. — Gesammelt auf der Präsche von M. Fuss.
- 130.** *Convallaria majalis* *L.* — Bgt. n. 639. — SS. n. 2779. — In Wäldern und Gesträuch der Bergregion; sehr häufig. — Schässburg Fronius; Bistritz Herzog; Kronstadt Lurz; Medwisch Salzer; Thorenburger Comitatus Ercsei; Reen . . . ; Broos Unvericht; Neudorf Fuss; Klein-Alisch Fuss; Reussmarkt Fuss; Grossscheuern Fuss; Hammersdorf Fuss. — Gesammelt bei Hammersdorf von M. Fuss.
- 131.** *Allium Ammophillum* *Heuff.* — *A. senescens* *Bgt.* n. 605. — *A. stramineum* *SS.* n. 2822. — An sonnigen, trocknen Berglehnen; stellenweise häufig; Kalkpflanze. — Mergeln Baumgarten; Mezöség Baumgarten, Schur; Grossscheuern Grisebach & Schenk, Fuss, Unve-

richt; Mühlbach Schur, Sigerus; Klausenburg Schur; Kalyán Janka; Päschteritze Unvericht; Elekes Baumgarten; Blasendorf Sigerus; Hahnebach Fuss. — Gesammelt bei Grossscheuern am „Zackelsberg“ von M. Fuss. — Das Baumgarten'sche Synonym gehört auf Grund von Originalexemplaren hierher; *A. senescens* dürfte schwerlich in Siebenbürgen vorkommen.

132. *Muscari botryoides* Mill. — SS. n. 2854. — *Hyacinthus racemosus* Bgt. n. 628. — Auf schattigen Bergplätzen zwischen Gestrüch, in Wäldern; stellenweise häufig. — Schässburg Baumgarten; Thorenburger Comit. Erceei; Grossscheuern Fuss. — Gesammelt bei Grossscheuern im „Bohtchen“ von M. Fuss. —

Trotz der Worte „foliis latis, dependentibus, corollis globosis“ in der Beschreibung Baumgarten's gehört doch seine Pflanze nach Standörtern und Original-Exemplaren hierher, und nicht zu *Muscari racemosum*, welches meines Wissens in Siebenbürgen noch nicht aufgefunden wurde. Nach Schnr's Ansicht ist indessen unsre Pflanze eine eigne Species, welche er *M. transilvanicus* nennt. Ich habe keine andre, als nur siebenbürgische Exemplare gesehen, weiss also nicht, ob unsre Pflanze mit der deutschen identisch ist, und aus den Diagnosen bei Koch und Reichenbach kann ich nicht klug werden. Nach Koch sollen die Blätter „lanceolata-linearia, basin versus attenuata“ sein; nach Reichenbach „linearia basi angustata“. Die Blätter unsrer Pflanze sind nun aber weder „linearia“, wie Reichenbach will, — soferne man nämlich unter folium lineare ein Blatt mit parallelen Rändern zu verstehen hat —; und noch viel weniger „lanceolato-linearia“, wie Koch will, — soferne ein folium lanceolato-lineare ein Blatt sein muss, welches anfangs mit parallelen Seitenrändern verläuft, dann gegen die Spitze schmaler wird; sondern sie sind „longe cuneata, apice breviter contracta“ d. h. sie haben oben unter der kurzverschmälerten Spitze ihren breitesten Durchmesser, und werden von da gegen den Grund allmähig und gleichmässig schmaler. — Nach Reichenbach sollen die Früchte von *M. botryoides* „obcordata“ sein; das ist an unsrer Pflanze wieder nicht der Fall, sondern dieselben sitzen mit der Mitte ihres breitesten Durchmessers auf dem Stiel, und werden nach oben schmaler, was bei „obcordata“ gerade umgekehrt der Fall sein müsste. Wenn ferner die Abbildung von Reichenbach die deutsche Pflanze genau wiedergibt, so hat allerdings unser *Muscari* einen ganz abweichenden Habitus, und die Ansicht Schur's dürfte gerechtfertigt erscheinen.

- 133.** *Anthericum ramosum* L. Bgt. n. 625.— SS. n. 2779.— Auf trocknen Bergplätzen; sehr häufig.— Hammersdorf Baumgarten, Sigerus, Fuss; Tallmesch Baumgarten, Unverricht; Rákovitzta Baumgarten; Schässburg Baumgarten, Fronius; Nagy-Bun Baumgarten; Reps Baumgarten; Bistritz Herzog; Klausenburg Wolff; Unter-Eidisch Nagy; Obereidisch . . . ; Feredö-Gyogy Unverricht; Grossscheuern Fuss; Neudorf Fuss. — Gesammelt bei Tallmesch auf dem „Stein“ auf Nagelflue von Unverricht.
- 134.** *Gymnadenia conopsea* R. Br. — SS. n. 2702. — *Orchis conopsea* Bgt. n. 1920. — Auf Wiesen der Berg- und Voralpenregion; sehr häufig. — Schässburg Fronius; Bistritz Herzog; Czibles Bielz; Fogarascher Alpen Schur; Arpascher Alpen Schur; Retjitzel Bielz; Heltau Sigerus; Hermannstadt Unverricht, Fuss; Schebeschel Unverricht; Udvarhely Szabo; Klausenburg Wolff; Borszék Salzer; Paringul Reissenberger; Königstein Fuss; Portscheschter Voralpen Fuss; Hammersdorf Fuss; Neudorf Fuss; Giötzembrich Fuss; Valia-Domnithal Fuss; Butian Fuss; Reschinarer Voralpen Fuss; Giresau Fuss. — Gesammelt bei Hermannstadt auf der „Narzissenwiese“ von M. Fuss.
Die Pflanze der Kalkvoralpen bedarf einer genauern Beobachtung.
- 135.** *Neottia Nidus Avis* Rich. — SS. n. 2732. — *Epipactis Nidus Avis* Bgt. n. 1937. — In Wäldern der Bergregion; häufig. — Schässburg Fronius; Bistritz Herzog; Rodna Schur; Medwisch Salzer; Öcsém Schur; Sz.-Iván Nagy; Hammersdorf Sigerus, Fuss; Giesshübel Sigerus; Broos Unverricht; Udvarhely Szabo; Rothberg Rekert; Michelsberg Fuss; Neudorf Fuss; Grosspold Fuss; Hermannstadt Fuss; Butschetsch Fuss. — Gesammelt bei Rothberg von Rekert.
- 136.** *Cephalanthera ensifolia* Rich. — SS. n. 2721. — *Epipactis ensifolia* Bgt. n. 1935. — In Wäldern der Bergregion. — Schässburg Fronius; Bistritz Herzog; Borszék Salzer; Persány Sigerus; Giötzembrich Sigerus, Fuss; Runk Unverricht; Grossscheuern Rekert, Fuss; Neudorf Fuss; Giresau Fuss. — Gesammelt bei Grossscheuern im „Kirchenbusch“ von Rekert.
- 137.** *Thesium ramosum* Hayne. — Bgt. n. 395. — S. S. n. 2464. — Auf Bergwiesen. — Reps Baumgarten; Oláh-falu Baumgarten; Klausenburg Baumgarten; Hammersdorf Rekert. — Gesammelt bei Hammersdorf von Rekert.
- 138.** *Daphne Mezereum* L. — Bgt. n. 689. — SS. 2455. — In Wäldern und Gesträuch der Berg- und Voralpenregion;

sehr häufig. — Giötzenbrich Baumgarten, Bock, Sigerus, Fuss; Hammersdorf Baumgarten; Duellen Baumgarten, Fuss; Burgberg Baumgarten; Mergeln Baumgarten; Bistritz Baumgarten, Herzog; Kronstadt Baumgarten; Klausenburg Baumgarten; Schässburg Baumgarten, Fronius; Reps Baumgarten; Kastenholz Bock; Medwisch Salzer; Reu . . .; Hermannstadt Unvericht, Fuss; Morpert Fuss; Tallmesch Fuss; Oberschebesch Fuss; Marosquelle Fuss; Michelsberg Fuss; Giresau Fuss. — Gesammelt bei Michelsberg von M. Fuss.

139. *Salix fragilis* L. — Bgt. n. 88. — SS. n. 2598. — An Wegen, Flussufern; gemein. — Leschkirch Baumgarten; Schässburg Baumgarten; Neuroda Schur; Marosquelle Schur; Balánbánya Schur; Kukujszás Schur; Annasee Schur; Hermannstadt Reissenberger, Sigerus, Fuss; Kronstadt Lurz; Csik Schur; Thorenburger Comitatus Ercei; Broos Unvericht; Bistritz Herzog; Hammersdorf Fuss; Neudorf Fuss; Giresau Fuss. — Gesammelt bei Neudorf von M. Fuss.

140 *Alnus viridis* DeC. *A. incana* β . Bgt. n. 207. — *Alnobetula viridis* SS. n. 2563. — Auf den Alpen; häufig. — Vurfu Krajului Baumgarten (nicht der Königstein bei Kronstadt); Wurfo Struniorlui Baumgarten; Haita Baumgarten; Pietroszu Baumgarten; Czibles Bielz; Fogarascher Alpen Schur; Arpascher Alpen Schur; Tunsu Fronius; Szaru Fronius; Bullathal Schur; Pitschoru Popi Fuss; Scherbuk Fuss; Avriscel Fuss; Wurtopiel Fuss. — Gesammelt auf dem Scherbuk von M. Fuss. —

Die von Baumgarten zu *Alnus incana* β . angegebenen Standorte gehören der Lokalität nach hierher; nur „in montosis juxta Talmatsch“ möchte ich bezweifeln; die Pflanze kommt nie in die Bergregion herab, sondern ist eine wahre Alpenpflanze, die über der Taunenregion ihren Stand hat.

141. *Asarum europaeum* L. — SS. n. 2469. — *A. officinalis* Bgt. n. 887. — Unter Gesträuch der Bergregion; sehr häufig. — Hammersdorf Bock, Fuss; Heltau Bock; Schässburg Fronius; Bistritz Herzog; Hermannstadt Reissenberger; Medwisch Salzer; Koppänder Kluft Ercei; Galonya Ercei; Broos Unvericht; Udvarhely Szabo; Grossscheuern Fuss; Michelsberg Fuss; Birtihalm Fuss; Rothberg Fuss; Giresau Fuss. — Gesammelt bei Hammersdorf im „Helvet“ von M. Fuss.

142. *Trichera lancifolia* (*Scabiosa* —) Heuff. — In Wäldern der Voralpenregion. — Königstein Kotschy; Zirnathal Kotschy; Öcsém Salzer, Fronius; Präschbe Fuss;

Schebeschel Unverricht; Kelemenhasvas Fuss; Orlather Voralpen Fuss; Reschinarer Voralpen Fuss. — Gesammelt auf den Orlather Voralpen von M. Fuss.

Ich will nicht entscheiden, ob die Pflanze von *Trichera sylvatica* *Schrad.* spezifisch verschieden sei, meine aber nicht zu irren, wenn ich glaube, dass Baumgarten's *Scabiosa silvatica* hierher gehört; ich wenigstens habe noch immer nur diese Form gefunden. —

- 143.** *Succisa glabrata* (*Scabiosa* —) *Schott.* — *S. pratensis* SS. n. 1464. — *Scabiosa Succisa* *Bgt.* n. 138. — Auf etwas feuchten Berg- und Waldwiesen; sehr häufig. — Schässburg Baumgarten, Fronius; Borszék Salzer; Grosscheuern Fuss; Hermannstadt Unverricht, Fuss; Csik Schur; Kreuzerfeld Ercsei; Záh Ercsei; Reen . . ; Paraid Baumgarten; Rodnaer Voralpen Baumgarten, Schur; Michelsberg Fuss; Zood Fuss; Giresau Fuss. — Gesammelt bei Giresau im „Olliemoorwald“ von M. Fuss.
- 144.** *Galium pusillum* *L.* — *Bgt.* n. 159. — *G. pumilum b. pusillum* SS. 1332 b. — Auf den Alpentriften; sehr häufig. — Hermannstädter Alpen Baumgarten; Szuru Fuss; Tschorte Rekert; Fogarascher Alpen Baumgarten; Burzenländer Alpen Baumgarten; Butschetsch Salzer, Fronius, Meschendorfer, Fuss; Rodnaer Alpen Baumgarten; Kuhhorn Schur, Herzog; Koronyis Schur; Fedeläse Sigerus; Öcsém Salzer, Fronius; Valia-Doamnisee Fronius; Butian Fuss; Arpascher Alpen Schur; Păstretze Baumgarten; Paringul Reissenberger. — Gesammelt auf dem Tschorte von Rekert.
- 145.** *Galium rotundifolium* *L.* — *Bgt.* n. 168. — SS. n. 1316. In den Wäldern der Voralpen. — Kronstadt Baumgarten; Lázárfalva Baumgarten; Burkatsch Sigerus, Rekert, Fuss; Spatia Tatarului unter dem Szuru Fuss. — Gesammelt auf dem Burkatscht von Rekert.
- 146.** *Asperula odorata* *L.* — *Bgt.* n. 146. — SS. n. 1300. — In Wäldern der Bergregion; sehr häufig. — Hammersdorf Baumgarten, Fuss; Burgberg Baumgarten; Hahnemach Fuss; Hermannstadt Fuss; Rothberg Fuss; Giötzembruch Fuss; Tallmesch Fuss; Giresau Fuss; Schönberg Baumgarten, Fronius; Nagy-Bun Baumgarten; Kronstadt Baumgarten; Bistritz Baumgarten; Medwisch Salzer; Hargitta Fronius; Udvarhely Szabo; Thorenburger Comitat Ercsei; Reen . . .; Broos Unverricht; Feredö-Gyogy Unverricht; Grosspold Fuss. — Gesammelt bei Hammersdorf im „Kirchenwald“ von M. Fuss.
- 147.** *Achillea Ptarmica* *L.* — *Bgt.* n. 1878. — SS. n. 1561. — Auf feuchten Wiesen. — Westen Baumgarten, Fuss;

Tallmesch Baumgarten, Fuss; Poplaka Sigerus; Hermannstadt Unvericht, Fuss; Neppendorf Fuss; Csomofalva Baumgarten; Karika Baumgarten; Sibó Baumgarten; Klausenburg Janka; Thorenburger Comitatus Ercei; Oláhfalú Fronius; Udvarhely Szabo; Hargitta Fuss; Magyar-Hermácy Fuss; Bistritz Rekert; Skorée Fuss. — Gesammelt bei Skorée von M. Fuss.

148. *Leucanthemum rotundifolium* DeC. — *Chrysanthemum rotundifolium* Bgt. n. 1810. — SS. n. 1590. — An den Büchen der Voralpen- und Alpenregion; sehr häufig. — Szuru Baumgarten, Schur, Fuss; Pitschoru Burkului Fuss; Valiadamnithal Fronius, Fuss; Negoii Reisenberger, Fuss; Kerzeschoraer Glashütte Fuss; Pietra mare Baumgarten; Königstein Kotschy; Csukás Kotschy; Tömös Schur; Arszu Baumgarten; Csiblesz Baumgarten; Kuhhorn Salzer, Janka, Fuss, Herzog; Zirnathal Kotschy; Fogarascher Alpen Schur; Öcsém Schur; Kertz Fronius; Beschinou Fuss; Zibinsjäser Fuss; Duduruk Fuss; Iván Fuss. — Gesammelt auf dem Kuhhorn von M. Fuss.

149. *Tephrosieris Fussii* Gr. et Sch. In Wäldern der Voralpenregion. — Bistritz Herzog; Giötzembrieh Fuss, Unvericht; Prehodischtie Fuss, Rekert; Broos Unvericht. Gesammelt auf dem Gebirgszug „Prehodischtie“ bei dem Rothenthurmpass von Rekert.

150. *Telekia speciosa* Bgt. n. 1899. — SS. n. 1503. — In den Wäldern der Berg- und Voralpenregion sehr häufig. — Schässburg Fronius; Bistritz Herzog; Frumoasze Grisebach & Schenk; Giresau Fronius, Fuss; Portschescht Fuss; Tallmesch Fuss; Grossscheuern Fuss; Gurfariului Fuss; Michelsberg Fuss; Riuszadului Fuss; Rodna Schur; Stimbe Salzer, Fuss; Ditro Schur; Borszék Schur; Hegyes am Töljöser Pass Salzer; Kereszthegey Schur; Csik Schur; Marosquelle Schur; Öcsém Schur; Felsötörja Schur; Tömös Schur; BIRTHÄLM Salzer; Arpascher Alpen Schur, Fuss; Kerzeschoraer Glahsütte Fuss; Görgegy . . . ; Schebeschel Unvericht. — Gesammelt bei Portschescht von M. Fuss.

151. *Scorzonera hispanica* L. — Bgt. n. 1618. — SS. n. 1679. — An sonnigen Bergabhängen. — Lövéte Baumgarten; Oláhfalú Baumgarten; Elekes Baumgarten; Mezöség Baumgarten; Billak Baumgarten; Székelykö Ercei; Thorenburg Unvericht; Reen . . . ; Giesshübel Sigerus; Mühlbach Fuss; Grossscheuern Fuss. — Gesammelt bei Grossscheuern am „Zahkelsberg“ von M. Fuss.

- 152.** *Crepis praemorsa* *Tsch.* — *Hieracium praemorsum* *Bgt.* n. 1674. — *Geracium praemorsum* *SS.* n. 1740. — Auf Grasplätzen der Bergregion; sehr häufig. — Schässburg Baumgarten, Fronius; Mergeln Baumgarten; Stolzenburg Baumgarten; Hermannstadt Reissenberger, Sigerus, Fuss; Grossscheuern Fuss; Neudorf Fuss; Hammersdorf Fuss; Rothberg Fuss; Marosnémethi Baumgarten; Broos Unvericht; Bistritz Herzog; Gáncs Czeecz; Klausenburg Schur; Reen . . . ; Elisabethstadt Fuss. — Gesammelt bei Grossscheuern in den „kalten Eichen“ von M. Fuss.
- 153** *Crepis hispida* *W. & K.* — *Bgt.* n. 1674. — *Barkhausia hispida* *SS.* n. 1720. — Auf trocknen Wiesen der Bergregion; sehr häufig. — Schässburg Baumgarten, Fronius; Reps Baumgarten; Hermannstadt, Grossscheuern, Kleinscheuern, Neudorf, Hammersdorf, Götzembruch und Giresau Fuss; Bistritz Herzog; Thorenburg Schur; Reussmarkt Fuss. — Gesammelt bei Hermannstadt gegen den „alten Berg“ von M. Fuss.
- 154.** *Phyteuma canescens* *W. & K.* — *Bgt.* n. 328. — *Trachanthelium canescens* *SS.* n. 1802. — Auf grasigen Bergplätzen. — Leschkirch, Morpert und Mergeln Baumgarten; Stolzenburg Baumgarten, Unvericht; Grossscheuern und Neudorf Fuss; Reps Baumgarten; Schässburg Baumgarten, Fronius; Nagy-Bun, Déva und Klausenburg Baumgarten; Hoya Schur; Mezöség Baumgarten; Sz.-Gothárd und Sz.-Enyed Janka; Zah, M.-Ludós und Thorenburg Erceei; Langendorf Sigerus. — Gesammelt bei Grossscheuern im „Zabengestuel“ von M. Fuss.
- 155.** *Campanula abietina* *Gr. & Sch.* — *C. Rochelii* *SS.* n. 1817. — In den Wäldern der Tannenregion; sehr häufig. — Präschbe, Borperbusch und Tomnatik Fuss; Zibinsjäser Grisebach & Schenk, Fuss; Gauschora Fuss; Beschinou Unvericht; Butschätsche (bei Hermannstadt), Michelsberg und Negoj Fuss; Mirie Fronius, Fuss; Pitschoru Burkului, Szurului und Butian Fuss; Arpascher Alpen Schur; Keperriatze und Podritschel Fuss; Kuhhorn Schur, Salzer, Czeecz, Fuss, Lurz, Herzog; Fogarascher Alpen Schur; Muntscheler Alpen Unvericht; „Stine in Peuru“ (Mühlbachthal) Fuss. — Gesammelt auf der Präschbe von Rekert.
- 156.** *Origanum vulgare* *L.* — *Bgt.* n. 1207. — *SS.* n. 2206. — In Gesträuch und Wäldern der Bergregion; sehr häufig. — Schässburg Fronius; Bistritz Herzog; Medwisch Salzer; Heltau Bock; Hammersdorf Bock, Fuss; Rothenthurmpass Unvericht; Grossscheuern, Duermen, Neudorf und Giresau

Fuss; Felső-Torja und Büdös Schur; Erdöhát Ercesei; Reen . . .; Schebeschel Unvericht; Udvarhely Szabo; Koronyis Herzog. — Gesammelt bei Schebeschel von Unvericht.

157. *Salvia nutans* L. — Bgt. n. 72. — SS. n. 2203. — Auf sonnigen Bergabhängen; stellenweise häufig. — Stolzenburg Baumgarten, Fuss; Hammersdorf Sigerus, Schur, Fuss, Rekert; Rothberg, Neudorf und Grossscheuern Fuss; Alzen, Unter-Gesess, Mergeln, Reps, Schässburg und Bachnen Baumgarten; Thorenburg Baumgarten, Janka, Ercesei, Unvericht; Gerend und Záh Ercesei; Klausenburg Baumgarten; Sz.-Gothárd Janka; Bogeschdorf Fuss. — Gesammelt bei Hammersdorf an „des alten Stephen seiner Koaste“ von Rekert.

158. *Ajuga Laxmanni* Benth. — *Teucrium Laxmanni* Bgt. n. 1150. — *Phleboanthe Laxmanni* SS. n. 2285. — Auf Bergplätzen zwischen Gesträuch. — Draas Baumgarten; Mezöség Baumgarten, Janka, Sigerus; Kolos Baumgarten; Klausenburg Schur; Thorenburger Kluft Baumgarten; Thorenburg, Gerend, Záh, Tobát und Pogácsa Ercesei; Karlsburg Baumgarten; Kecskö und Mühlbach Schur; Blutróth Sigerus; Broos und Bokai Unvericht; Reussmarkt Fuss; Kuhhorn (?) Herzog. — Gesammelt bei Broos von Unvericht.

Ich habe mir erlaubt, neben der Standort „Kuhhorn“ ein ? zu setzen; ich besitze zwar die Pflanze von dem angegebenen Standort durch die Güte meines Freundes Herzog, glaube aber es dürfte ein Gedächtnissirrhthum zum Grunde liegen.

159. *Echium rubrum* Jacq. — Bgt. n. 257. — SS. n. 1959. — Auf sonnigen Grasplätzen der Bergregion. — Nagy-Bun, Reps und Mezöség Baumgarten; Thorenburger Comitát Ercesei; Schässburg Fronius; Mühlbach Schur, Fuss; Giesshübel Sigerus; Reen . . .; Broos Unvericht; Duelmén, Grossscheuern, Hammersdorf, Reussmarkt Fuss. — Gesammelt bei Hammersdorf in den „breiten Häcken“ von M. Fuss.

160. *Myosotis suaveolens* Kit. — SS. n. 1980. — Auf den Alpen; sehr häufig. — Königstein Kotschy, Fuss; Butschetsch Kotschy, Fuss; Fogarascher Alpen Schur; Zirnathal Kotschy; Arpascher Alpen Schur; Wurtop Fuss; Valie Doamnisee Fronius, Fuss; Tschorte Reissenberger, Fuss, Rekert; Negoi Reissenberger; Albete und Fundu Bulli Fuss; Kuhhorn Schur, Salzer, Bielz, Fuss, Lurz; Koronyis Schur; Szuru Fronius, Fuss; Zibinsjäser Fuss. — Gesammelt auf dem Tschorte von Rekert.

- 161.** *Anchusa Barrelieri* *All.* — Bgt. n. 239. — SS. n. 1974. — Auf Grasplätzen der Bergregion; — Kalkpflanze. — Draas, Tepei, Kreisch und Nagy-Bun Baumgarten; Kronstadt Baumgarten, Fuss, Rekert; Déva Baumgarten, Fuss, Unvericht; Klausenburg und Mezöség Schur; Reen . . . ; Udvarhely Szabo; Bogeschdorf und Gálfalva Fuss. — Gesammelt bei Kronstadt auf dem „Kapellenberg“ von Rekert.
- 162.** *Melampyrum silvaticum* *L.* — Bg. n. 1242. — SS. n. 2129. Auf Grasplätzen der Alpen; häufig. — Tömös Schur; Pöschomok (unermittelter Standort) Sigerus; Piatra Arsze Baumgarten; Tschorte Reissenberger, Fuss; Szuru, Negoi, Pitchoru Popi und Butian Fuss; Ócsém Schur, Fuss; Galbine und Butschätsche (bei Hermannstadt) Fuss; Arpascher Alpen Schur, Fuss; Beschinou Fuss; Kuhhorn, Koronyis und Büdös Schur. — Gesammelt auf der Galbine von M. Fuss.
- 163.** *Melampyrum saxosum* *Bgt.* n. 1243. SS. n. 2130. — Auf Alpentriften. — Czibles, Arszu, Hudina und Guttin Baumgarten; Koronyis Schur, Rekert, Herzog, Baumgarten; Kuhhorn Salzer, Fuss, Lurz, Herzog; Muntile Gropilor Fuss; Piatra Arsze Bielz; Kis-Demeter Baumgarten. — Gesammelt auf dem Koronyis von Rekert.
- 164.** *Rinanthus minor* *Ehrh.* — Bgt. n. 1229. — SS. n. 2156. — Auf sterilen Bergplätzen; häufig. — Reps Baumgarten; Schässburg Fronius; Bistritz Herzog; Büdös Schur; Koronyis (?) Rekert; Broos Unvericht; Hermannstadt und Giresau Fuss. — Gesammelt bei Hermannstadt auf der „Narzissenwiese“ von M. Fuss.
Von den oben angeführten Standorten möchte ich „Koronyis“ für *R. alpinus* *Bgt.* vindizieren.
- 165.** *Linaria chloraefolia* *Rchb.* — *L. pyramidata* *b.* SS. n. 2055. — Auf trocknen Bergabhängen. — Reschinar Unvericht; Tallmesch, Portschescht und Grossscheuern Fuss; Hammersdorf Rekert; Broos Unvericht; Szászcsor Fuss. Gesammelt bei Hammersdorf an des „alten Stephen seiner Koaste“ von Rekert.
Ich halte diese breitblättrige Form von *L. genistaeifolia* für die Reichenbach'sche Pflanze, und kann nicht übereinstimmen mit Hrn. André, welcher die wesentlich und spezifisch verschiedene Pflanze des Kronstädter Kapellenberges hierher zieht; in der ich *L. dalmatica* zu erkennen glaube.
- 166.** *Plantago gentianoides* *Sm.* — *P. uliginosa* *Bgt.* n. 178. — SS. n. 2343. — An feuchten Stellen der Alpen, bald nach

dem Schmelzen des Schnee's; sehr häufig. — Hermannstädter Alpen Janka; Szuru Baumgarten, Fronius, Sigerus, Fuss; Zibinsjäser Grisebach & Schenk, Fronius, Fuss; Beschinou Unvericht; Dialu Stirpu und Galbine Fuss; Kubhorn Schur; Wurfu Lutzului und Dscheamoanie Baumgarten; Fogarascher Alpen Schur; Stina Bondsi Kotschy; Butschetsch Salzer, Fronius; Arpascher Alpen Schur; Kepriariate Fuss; Valia Doamnisee Fronius, Fuss; Butian, Negoj und Burkatsch Fuss. — Gesammelt auf der Kerzeschoraer Alpe Butian beim „Lakutz“ von M. Fuss.

167. *Armeria alpina* W. var. *pumila* — Bgt. n. 570. — SS. n. 2339. — Einzige Standort Butschetsch Baumgarten, Kotschy, Salzer, Fronius, Binder, Fuss. — Gesammelt auf der Spitze des Butschetsch „la Omu“ von M. Fuss.

168. *Androsace elongata* L. — Bgt. n. 262. — SS. n. 2314. — Auf Grasplätzen der Bergregion. — Mezöség, Kolos und Thorenburg Baumgarten; Záh Ercsei; Broos Unvericht. — Gesammelt bei Broos von Unvericht.

169. *Lysimachia punctata* L. Bgt. n. 286. — SS. n. 2303. — In Gesträuch und Wäldern der Bergregion; häufig. — Tallmesch Baumgarten, Fuss; Hahnebach C. Fuss; Hermannstadt Unvericht, Fuss, Rekert; Grossscheuern Michelsberg, Rothberg und Giresau Fuss; Lövéte Baumgarten; Felső-Torja Schur; Schässburg Fronius; Bistritz Herzog; Reen . . . ; Giesshübel Sigerus; Broos Unvericht. — Gesammelt bei Hermannstadt im „jungen Wald“ von Rekert.

170. *Pyrola media* Sw. — Bgt. n. 731. — SS. n. 1862. — In Wäldern der Berg- und Voralpenregion. — Schässburg Baumgarten, Fronius; Lövéte Baumgarten; Hargitta Baumgarten, Fronius; Annasee Schur; Udvarhely Szabo; Kronstadt Baumgarten; Theszla Binder; Szépviz Baumgarten; Bistritz Herzog, Rekert; Koronyis Schur; Hammersdorf Göbbel; Kornetzel Kladni; Giresau Fuss; Reen — Gesammelt auf dem Giötzebruch von M. Fuss.

171. *Azalea procumbens* L. — Bgt. n. 291. — SS. n. 1855. — Auf den Alpen. — Szuru, Moasche und Wurfu Foti (nicht ausgemittelt) Baumgarten; Beschinou Unvericht; Piatra mare Baumgarten; Butschetsch Baumgarten, Kotschy, Fronius, Fuss; Schullergebirge Sigerus; Fogarascher Alpen Schur; Dreguscher Alpen Lerchenfeld; Gordon la Smida und Pisku Lauti (nicht Lotri) Baumgarten; Skerischora und Valia Zimbeth Kotschy; Ar-

- pascher Alpen Schur; Wurfu Lutzului, Omu (bei Rodna) und Dscheammeanie Baumgarten; Kuhhorn Schur, Bielz; Szerencsetető Nagy; Öcsém Schur. — Gesammelt auf dem Beschinou von Unvericht.
- 172. Erythraea Centaurium Pers.** — Bgt. n. 356. — SS. n. 1912. — Auf Grasplätzen der Bergregion; häufig. — Schässburg Fronius; Bistritz Herzog; Thorenburger Comitatus Ercsei; Borszék Salzer; Reen . . .; Broos Unvericht; Szászsor, Grossscheuern, Tallmesch und Salzburg Fuss; Hermannstadt Fuss, Rekert; Neudorf, Kastenholz und Giresau Fuss. — Gesammelt bei Hermannstadt am „Schiewes“ von Rekert.
- 173. Gentiana phlogifolia Sch. & Kl.** — SS. n. 1887. — Am Felsen der Kalkalpen. — Königstein Kotschy; Öcsém Schur, Salzer, Fuss, Fronius, Apel; Egyeskö Bielz; Arpascher Alpen Schur. — Gesammelt auf dem Öcsém von Fronius.
- 174. Gentiana punctata L.** — Bgt. n. 406. — SS. n. 1884. — Auf den höhern Alpen; häufig. — Galatz, Wurfu Jetzilui, Dscheammeanie, Haita und Wurfu Stuniorlui Baumgarten; Thorenburger Alpen Ercsei; Fogarascher und Arpascher Alpen Schur; Valia Doamnithal Fronius, Fuss; Hatszege Alpen Unvericht; Paringu Reissenberger. — Gesammelt auf dem Paringu von Reissenberger.
- 175. Syringa vulgaris L.** — Bgt. n. 15. — SS. n. 1873. — Im Gesträuch der Bergregion. — Öcsém Schur; Kazanyas Schuttág, Unvericht; Runk Unvericht; zwischen Alsó- und Felső-Grohot Bielz; Limpert Unvericht. — Gesammelt bei Limpert von Unvericht. — An den angegebenen Standorten, — und wohl auch an andern — ist die Pflanze entschieden im wilden Urzustande, und somit eine in Siebenbürgen einheimische und nicht eingebürgerte; die übrigen bekannt gewordenen Standorte (Hermannstadt, Medwisch etc.) betreffen die in den Gärten stehende Pflanze, und beziehen sich nicht hieher.
- 176. Syringa Josikaea Jacq. f.** — Fuss Mant. n. 2587. — SS. n. 1876. — An Felsen der Bergregion; selten. — Szekelyó und Nagy-Sebes Baumgarten; Csucsa Schur. — Gesammelt bei Hermannstadt (kultivierte Exemplare) von Rekert.
- 177. Caucalis daucoides L.** — Bgt. n. 540. — SS. n. 1245. — Auf Aeckern; sehr häufig. — Alzen und Stolzenburg Baumgarten; Hammersdorf Sigerus, Unvericht, Fuss, Rekert; Grossscheuern Fuss; Rebs, Stein und Galt Baumgarten; Schässburg Fronius; Birk . . .; Broos Unve-

richt; Déva und Reussmarkt Fuss. — Gesammelt bei Hammersdorf von Rekert.

178. *Pimpinella alpina* Host. — SS. n. 1152. — *P. heterophylla* Bgt. Fuss Mant. n. 2624. — Fogarascher Alpen Schur; Utscha mare Baumgarten, Ungar; Arpascher Alpen Schur; Wurtopiel und Awrischel Fuss; Königstein Meschendorfer. — Gesammelt auf dem Awrischel von M. Fuss.

179. *Peucedanum Chabraei* Rchb. — Fuss Mant. n. 2618. — *Palimbia Chabraei* SS. n. 1211. — *Selinum turfosum* Bgt. n. 834. ? — Im Gesträuch und in Wäldern der Bergregion; sehr häufig. — Hermannstadt Fuss, Schur; Hammersdorf und Neudorf Fuss; Grossau Sigerus; Salzburg Unvericht, Fuss; Grossscheuern und Giresau Fuss; Karlsburg und Malomviz Baumgarten; Klausenburg, Ücsém und Sz.-Domokos Schur; Thorenburger Kluft Baumgarten. — Gesammelt bei Hermannstadt im „jungen Wald“ von M. Fuss.

Ich habe das oben citirte Synonym Baumgarten's nach Schur's Vorgang mit ? hier angeführt, weil ich keine Gewissheit habe, ob die Behauptung richtig sei. — Merkwürdig bleibt allerdings, dass Baumgarten die Pflanze in seinem Werke nicht anführt, da sie bei uns sehr häufig ist, und schwerlich von ihm übersehen werden konnte. In seinem handschriftlichen Nachlass hat er dieselbe an dem oben angegebenen Standorte aufgeführt, ohne jedoch auf irgend eine Synonyme seines Werkes hinzudeuten.

180. *Lotus Tetragonolobus* L. — *Tetragonolobus prostratus* Bgt. n. 1538. — *T. siliquosus* SS. n. 716. — Auf Grasplätzen der Bergregion; häufig. — Trappold und Flagen Baumgarten; Kaissd Fuss; Salzburg Baumgarten; Grossscheuern Fuss; Kolos Baumgarten; Klausenburg Schur; Thorenburg Baumgarten, Ercsei, Sigerus; Gerend und Koppánd Ercsei; Bistritz Herzog; Broos Unvericht; Baassen Fronius. — Gesammelt bei Grossscheuern im „Zabengestuel“ von M. Fuss.

181. *Galega officinalis* L. — Bgt. n. 1530. — SS. n. 718. — Auf feuchten Grasplätzen, an Strassengräben, Ackerrändern der Bergregion; häufig. — Bistritz Herzog; Thorenburg Ercsei; Csik Schur; Reen . . . ; Broos und Reussen Unvericht; Grossscheuern, Hermannstadt, Neudorf und Giresau Fuss. — Gesammelt bei Neudorf im „Grund“ von M. Fuss.

182. *Vicia Dumetorum* L. — Bgt. n. 1611. SS. n. 766. — In Weinberghecken, Gesträuch der Bergregion; häufig. — Schässburg Fronius; Bistritz Herzog; Thorenburger Comit

- Ercsei; Hammersdorf Sigerus, Göbbel, Fuss; Grossscheuern, Neudorf, Tallmesch und Giresau Fuss; Broos Unvericht. — Gesammelt bei Grossscheuern am „Geissberg“ von M. Fuss.
- 183. *Onobrychis montana* DeC.** — Bgt. n. 1558. — SS. n. 755. — In den Felsenritzen der höchsten Kalkalpen. — Butschetsch Baumgarten, Meschendorf, Fuss; Piroshka und Csukás Baumgarten; Kuhhorn Czeetz; Arpascher Alpen Schur; Valia Doamnithal Fronius, Fuss. Gesammelt auf dem Butschetsch im „Kezunu din schos“ von M. Fuss. — Wenigstens von der Pflanze, die wir hier zu Lande für *O. sativa* halten entschieden spezifisch verschieden! —
- 184. *Saxifraga muscoides* Wulf.** — Bgt. n. 769 — SS. n. 1109. — Auf den Alpen; sehr häufig. — Butschetsch Baumgarten, Kotschy, Salzer, André, Fronius, Fuss; Dscheamneonie Baumgarten; Kuhhorn Schur, Salzer, Bielz, Fuss, Herzog; Öcsém Salzer, Fronius, Fuss; Arpascher Alpen Schur, Fuss; Utschamare Baumgarten; Fundu Bulli und Valia Doamnithal Fuss; Tschorte Fuss, Rekert; Paringu Reissenberger. — Gesammelt auf dem Tschorte von Rekert.
- 185. *Rhodiola rosea* L.** — Bgt. n. 719. — SS. n. 1051. — Auf den Alpen; häufig. — Szuru Baumgarten, Fuss; Budislav Fronius, Fuss; Tschorte Reissenberger, Fuss; Bullasee Fuss; Arpascher Alpen Schur, Reissenberger, Fuss; Wurtop und Podritschel Fuss; Fogarascher Alpen Schur, Göbbel; Pisku Lanti und Wurfu Lutzului Baumgarten; Zirnathal Kotschy; Piroshka, Piatra mare und Schulergebirge Baumgarten; Butshetsch Baumgarten, Fuss; Königstein Fuss; Wurfu Jetzului, Stol und Dscheamneonie Baumgarten; Kuhhorn Salzer, Schur, Bielz, Fuss, Lürz, Herzog; Retjesat und Strazsa Baumgarten; Paringu Baumgarten, Reissenberger; Kelemenhasvas Baumgarten; Frumcasze Fronius, Fuss; Stine din Riu (nicht ausgemittelt) Sigerus. — Gesammelt auf dem Szuru von M. Fuss.
- 186. *Rumex Acetosella* L.** — Bgt. n. 658. — *Acetosa Acetosella* SS. n. 2433. — Auf magern Grasplätzen der Bergregion; sehr häufig. — Bistritz Herzog; Thorenburger Comitatus Ercsei; Öcsém Fronius, Salzer; Hermannstadt, Grossscheuern und Neudorf Fuss; Reen . . . — Gesammelt bei Grossscheuern von M. Fuss.
- 187. *Salicornia herbacea* L.** — Bgt. n. 1. — SS. n. 2365. — Auf Salzboden; häufig. — Salzburg Baumgarten, Si-

- gerus, Fuss; Paraid Baumgarten, Salzer, Fronius, Fuss; Kolos Baumgarten; Klausenburg Schur, Wolff; Thorenburg Baumgarten, Ercsei, Schur, Unverricht; Sookna . . . ; Vécs, Magyaró, Niedereidisch und Görgény Ercsei; Reps, Homorod Sz. Pál, Homorod Sz. Péter und Homorod Sz. Márton Baumgarten; Udvarhely Szabo; Szamosujvár Janka; Baassen Salzer; — Gesammelt bei Salzburg von M. Fuss.
- 188.** *Schoberia maritima* C. A. M. — SS. n. 2366. *Chenopodium maritimum* Bgt. n. 434. — Auf Salzboden. — Kolos Baumgarten; Szamosfalva Schur; Thorenburg Baumgarten, Ercsei, Unverricht; Salzburg Baumgarten, Sigerus, Unverricht, Fuss; Déesakua Baumgarten; Baassen Salzer; Reussmarkt Unverricht, Fuss. — Gesammelt bei Salzburg v. M. Fuss.
- 189.** *Spiraea Filipendula* L. — Bgt. n. 963. — SS. n. 866. — Auf Wiesen der Bergregion: sehr häufig. — Schässburg Fronius; Thorenburger Comitat Ercsei; Oecsém und Csik Schur; Reen . . . ; Broos Unverricht; Udvarhely Szabo; Hermannstadt und Giresau Fuss. — Gesammelt bei Hermannstadt unter „den Erlen“ von M. Fuss.
- 190.** *Cotoneaster vulgaris* Lindl. — SS. n. 975. — *Mespilus Cotoneaster* Bgt. n. 947. — Im Gestrüch der Berg- und Voralpenregion. — Schulergebirge, Piatra Laptie und Thetzla Baumgarten; Kronstadt Schur, Fuss; Maros-némethi Baumgarten; Déva Sigerus, Unverricht, Fuss; Reps Baumgarten, Fuss; Thorenburg Ercsei; Kecskés Schur; Klausenburg Wolff; Nagy-Kapus Bielz; Oecsém Schur. — Gesammelt bei Déva an der Burg von Unverricht.
- 191.** *Epilobium angustifolium* L. — Bgt. n. 669. — *Chamerium angustifolium* S. S. n. 998. — Auf Mauern, Geröllern, steinigen Plätzen, von der Ebene bis in die Alpen: häufig. — Tallmesch Baumgarten, Fuss; Gieötzembrich Sigerus, Fuss; Porkitzken b. Riuszadului, Poiana Nyemtzului, Michelsberg, Giresau, Szelischtie, Gurrariului und Hermannstadt Fuss; Schässburg Baumgarten, Fronius; Lövéte Baumgarten; Büdös Schur; Udvarhely Szabo; Bistritz Herzog; Tihutza C. Fuss; Gurra Haiti Fuss; Kereszthey und Borszék Schur; Reen . . . ; Broos Unverricht; — Gesammelt bei Michelsberg v. M. Fuss.
- 192.** *Elatine Alsinastrum* L. — Bgt. n. 718. — *Alsinastrum galiifolium* S. S. n. 553. — In Lücken, auf Sumpfboden. — Telek und Készi Sz. Iván Baumgarten; Thorenburger Comitat Ercsei; Salzburg Sigerus, Fuss, Reckert; Hermannstadt Kladni; Gurrariului Fuss; — Gesammelt bei Salzburg von Reckert.

- 193.** *Polygala major Jacq.* — Bgt. n. 1465. — SS. n. 384. — Auf trocknen Bergabhängen; häufig. — Schässburg Fronius; Bistritz Herzog; Thorenburg Ercei; Reichesdorf Fuss; Medwisch Salzer; Reen . . . ; Udvarhely Szabo; Tallmesch Unverricht, Fuss; Hammersdorf Fuss, Reckert; Grosscheuern, Neudorf und Rothberg Fuss; Broos Unverricht; Mühlbach und Elisabethstadt Fuss; — Gesammelt bei Hammersdorf von Reckert.
- 194.** *Amygdalus nana L.* — Bgt. n. 929. — SS. n. 833. — Auf trocknen Bergplätzen. — Hammersdorf Baumgarten, Sigerus, Unverricht, Fuss, Reckert; Grosscheuern, Rothberg und Neudorf Fuss; Werth und Mergeln Baumgarten; Schässburg Baumgarten, Fronius; Kisbunn, Nagybunn und Bachnen Baumgarten; Klausenburg Baumgarten, Schur; Mezöség Baumgarten, Ercei; Thorenburg Ercei; Medwisch Salzer; Broos Unverricht; Kastendorf Fuss; — Gesammelt bei Hammersdorf an des „alten Stephen seiner Koaste“ von Reckert. — Der von Baumgarten noch angegebene Fundort „Hermannstadt“ ist absichtlich weggeblieben, da die Pflanze auf dem eigentlichen Gebieth von Hermannstadt nicht wächst. — Nach der Meinung von Herrn Janka ist die Pflanze der Mezöség *A. Pallasiana* Schlecht., also vielleicht auch unsre Pflanze?
- 195.** *Lepidium perfoliatum L.* — Bgt. n. 1317. — SS. n. 314. — Auf Triften. — Mezöség, Kolos und Klausenburg Baumgarten; Thorenburg Janka, Baumgarten, Unverricht; Reen . . . ; — Gesammelt bei Thorenburg von Unverricht.
- 196.** *Kerneria saxatilis Rchb.* — SS. n. 293. — *Comelina saxatilis* Bgt. n. 1285. — In Ritzen der Kalkalpen. — Moldauer Grenzgebirge Ercei; Oecsém Schur; Arpascher Alpen Schur, Fuss; Valiadamnithal, Szuru und Kokeritsch Fuss; Schulergebirge und Piatra mare Baumgarten; Butschetsch Baumgarten, Fuss; Thetzla, Stol, Galatz, Dscheammeanie, Arszu und Czibles Baumgarten. — Gesammelt in der Kaldaria pe sub Arpasch marie von M. Fuss.
- 197.** *Sisymbrium Sophia L.* — Bgt. n. 1348. — SS. n. 224. — An Wegrändern, Zäunen; gemein. — Schässburg Fronius, Bistritz Herzog; Thorenburger Comitatus Ercei; Medwisch Salzer; Reen . . . ; Grosscheuern, Hammersdorf, Hermannstadt und Neudorf Fuss. — Gesammelt bei Hammersdorf von M. Fuss.
- 198.** *Fumaria Vaillantii Loisl.* — SS. n. 167. — *F. officinalis* Bgt. n. 1460. — Auf bebautem Boden; gemein. —

Klausenburg Schur, Baumgarten; Thorenburg Baumgarten; Schässburg Baumgarten, Fronius; Draas Baumgarten; Medwisch Salzer; Homorod Sz. Pál und Homorod Sz. Péter Baumgarten; Reen . . . ; Bistritz Herzog; Hammersdorf Schur, Fuss; Hermannstadt und Giresau Fuss; Fogarasch Goebbel; Rakovitz a Fuss; — Gesammelt bei Hammersdorf von M. Fuss.

Baumgartens Synonym gehört nach Originalexemplaren hieher; *F. officinalis* ist noch aus Siebenbürgen zu konstatiren.

199. *Viola mirabilis* L. — Bgt. n. 387. — SS. n. 368. — Im Gesträuch der Bergregion; sehr häufig. — Schässburg Baumgarten, Fronius; Reps Baumgarten; Bistritz Herzog; Klausenburg Joo, Janka; Hermannstadt Reissenberger; Hammersdorf Sigerus, Fuss; Grossscheuern, Neudorf und Rothberg Fuss; Medwisch Salzer. — Gesammelt bei Hammersdorf im „Hehwes“ v. M. Fuss.
200. *Hypericum elegans* Steph. — SS. n. 594. — *H. Kohlitanum* Bgt. n. 1611. — An sonnigen trocknen Bergabhängen. — Bachnen, Oláh Sz. Lászlo und Kreisch Baumgarten; Thorenburger Kluft und Klausenburg Schur; Hammersdorf Schur, Reckert; Salzburg, Neudorf und Grossscheuern Fuss. — Gesammelt bei Hammersdorf von Reckert.

Revision

der

Nacktschnecken Siebenbürgens

von

E. A. Bielz.

(Fortsetzung.)

3. *L. marginatus* Müll.

Syn. *L. arborum* Bouch. - Chant.

Von mittlerer Grösse; d. i. $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ “ lang und $2\frac{1}{2}$ —4“ dick, Körperfärbung weiss ins Graue häufig mit röthlichem Anfluge und meist stark durchscheinend. — Auf dem Schilde jederseits ein dunkelbrauner, weiss eingefasster Längsstreifen, neben welchem die Mitte und die Seiten des Schildes theils dunkel gewölkt, theils gefleckt sind, so zwar dass oft das ganze Schild mit einzelnen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1863

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Herbarium Normale Transsilvanicum, 188-207](#)